

**Para el tratamiento de todos los dolores espásticos, Baralgina : Reverin,
nuevo antibiótico de amplio espectro / Hoechst AG ; representantes:
Farmaceutica Hoechst Mexicana, S.A.**

Contributors

Farmaceutica Hoechst Mexicana
Hoechst AG

Publication/Creation

[1960]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/sb68xtva>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



PARA EL TRATAMIENTO DE TODOS LOS DOLORES ESPASTICOS

BARALGINA

**Cólicos biliares y renales
Tenosmos ureterales y vesicales
Espasmos gástricos e intestinales
Dismenorrea espástica**

En los cólicos agudos, severos, se deben aplicar 5 cms³. de BARALGINA (una ampollita), lentamente por vía intravenosa (en 2 a 3 minutos). Para el tratamiento posterior y para la terapia de espasmos y tenosmos ligeros o medio severos, se recomienda el empleo de las tabletas: una a dos tabletas, tres veces al día.

A-B-2232/58

Reg. No. 47703 y 47704 S.S.A.

**Exenta de alcaloides
Acción eficaz
Buena tolerancia**

Envases originales:
Caja con 5 ampollitas de 5 cm³.
Tubo con 20 tabletas.

MEDICAMENTOS HOECHST.



FARBWERKE

HOECHST AG

vormalis Meister Lucius & Brüning

FRANKFURT (M)-HOECHST

ALEMANIA

Representantes:

FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A. Arenal No. 24

México 20, D. F.



REVERIN[®]

Nuevo antibiótico de amplio espectro



▶ Diez veces más soluble que el clorhidrato de tetraciclina

▶ Proporciona niveles sanguíneos muy elevados

▶ Acción bactericida durante las primeras horas

▶ Efecto bacteriostático prolongado hasta por 24 horas

▶ Muy baja cuota de resistencia microbiana

▶ Eliminación renal en forma antibióticamente activa

Ahora!
también
REVERIN[®]
intramuscular

ENVASES ORIGINALES:

Reverín intravenoso

Caja con 1 frasco-ampolla de 275 mg. y 1 ampolleta de 10 cc. de agua bidestilada como solvente.

Reverín intramuscular

Para adultos.

Caja con 1 frasco-ampolla de 350 mg. y 1 ampolleta de 2 cc. de agua bidestilada como solvente.

Para niños.

Caja con 1 frasco-ampolla de 150 mg. y 1 ampolleta de 2 cc. de agua bidestilada como solvente.

Reg. Nos. 53215 y 55498 S.S.A. P. Med. 8779/60

FARBWERKE

HOECHST AG

vormals Meister Lucius & Brüning

FRANKFURT (M) HOECHST ALEMANIA

Representantes:

FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A.

Arenal No. 24

México 20, D. F.