

**Baralgina, el espasmo-analgésico de elección : nueva forma y además :
Gamma-Globulina "Behring" / Hoechst ; Behringwerke A.G.**

Contributors

Hoechst AG
Behringwerke AG

Publication/Creation

[1964]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qufh96kz>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

BARALGINA®

El espasmo - analgésico de elección

nueva forma 

y además



Una forma ideal para la terapéutica pediátrica, de fácil y cómoda administración y que permite la máxima individualización de la dosis.

Dosificación:

Lactantes y niños pequeños:

se recomienda administrar una gota por cada 2 kg. de peso cada 4 a 6 horas.

En los cólicos y vómitos por vagotonía de los lactantes, administrar la misma dosis 15 a 20 minutos antes de cada alimento.

Adultos: de 15 a 40 gotas cada 4 a 6 horas. (20 gotas equivalen a un comprimido).

Envases originales:

Gotas: frasco gotero de polietileno con 15 ml.

Ampolletas: caja con 5 de 5 ml. en estuche individual.

Comprimidos: caja con 20 de 0.5 g. en sobres de aluminio.

Supositorios (adultos): caja con 5

Supositorios (niños): caja con 5

Reg. Nos. 49703, 49704, 49706 y 61437 S.S.A.

P. Med. 3325/63

MAS DE 100 AÑOS
DE EXPERIENCIA



BEHRINGWERKE AG.
MARBURG-LAHN/ALEMANIA

S. Behring

Presenta:

**el medicamento más eficaz
para la prevención temporal**

y como auxiliar en el tratamiento de algunas infecciones por virus

GAMMA - GLOBULINA "BEHRING"

El inmunoterápico de más vasto potencial en alta concentración: 165mg. /cc.
(aproximadamente 25 veces más que en el plasma normal)

Padecimiento	Dosis (ml./kg.)	Observaciones
Reacciones post-vacunales severas(auxiliar)	0.02 - 2.0	Repetir según el caso
Infecciones por virus	0.02 - 2.0	Repetir según el caso
Sarampión:		
Profilaxis temporal	0.2	
4 - 7 días después del contacto	0.2 - 0.4	Protección por 3 - 10 semanas
Terapéutica	0.5 - 1.0	
Hepatitis (profilaxis temporal)	0.02	Protección por 5 a 9 meses
Poliomielitis (profilaxis temporal)	0.3	Protección por 1 a 8 semanas
Encefalitis sarampionosa (auxiliar)	2.0	
Herpes Zoster (auxiliar)	0.2 - 0.4	Repetir diariamente por 3 a 4 días
Rubeola durante el embarazo (auxiliar)	0.4	
Varicela (auxiliar)	0.2	Repetir diariamente por 3 a 4 días
Infecciones bacterianas	0.6 - 1.0	Repetir según el caso
Hipo y agamaglobulinemia	0.6 - 1.0	Repetir cada mes

ENVASES ORIGINALES:

Caja con 1 ampollita de 2 ml.



**MAS DE 100 AÑOS
DE EXPERIENCIA**

Reg. No. 60871 S.S.A.

P. Med. 1247/64