

Anestésico y analgésico ... Novocaina >T< ... : Para el tratamiento de los dolores espaxticos, Baralgina / Hoechst A.G. ; representantes: Farmaceutica Hoechst Mexicana, S.A.

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1959]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/cxbyejej>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Anestésico y Analgésico

Indicado en: **Geriatría** Ginecología, Obstetricia, Neurología, Cardiología, Gastroenterología, Reumatología, etc.



NOVOCAINA >T<

MEDICAMENTOS HOECHST

Según fórmula
original de
FARBWERKE



ENVASES ORIGINALES:

Caja con 5 y 25 ampollitas de 5 cm³ al 1%
Caja con 5 y 25 ampollitas de 5 cm³ al 2%

REG. No. 50237 S.S.A. Prop. No. A-B-2415/58 S.S.A.

vormal Meister Lucius & Brüning

Frankfurt (M) - Hoechst/Alemania

Representantes:

FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A.

Av. Ejército Nacional No. 209

MEXICO 5, D. F.

PARA EL TRATAMIENTO DE
LOS DOLORES ESPASTICOS



BARALGINA[®]

asociación de neo-melubrina con clorhidrato de p'piperidino etoxi-o-carbometoxi-benzofenona y bromometilato de difenil-piperidinoetil-acetamida.

Exenta de alcaloides

Acción eficaz

Buena tolerancia

Envases originales:
Caja con 5 ampollitas de 5 cm³.
Tubo con 20 tabletas.

Cólicos biliares y renales

Tenesmos ureterales y vesicales

Espasmos gástricos e intestinales

Dismenorrea espástica.

En los cólicos agudos, severos, se deben aplicar 5 cm³ de BARALGINA (una ampollita), lentamente por vía intravenosa (en 2 a 3 minutos). Para el tratamiento posterior y para la terapia de espasmos y tenesmos ligeros o medio severos, se recomienda el empleo de las tabletas: una a dos tabletas, tres veces al día.

MEDICAMENTOS HOECHST

Fabricado y
Envasado por:

FARBWERKE



HOECHST AG

Prop. No. A-B-2233/58

Reg. No. 47703 y 47704 S.S.A.

vormals Meister Lucius & Brüning

FRANKFURT (M)-HOECHST /Alemania

Representantes:

FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A.

Av. Ejército Nacional No. 209

MEXICO 5, D. F.