

Algunas... todavía no usan Reverin ... el antibiótico universal de amplio espectro para la terapéutica parenteral ... : Doctor no se arriesgue! : para su seguridad y la de su paciente recete Baralgina / Hoechst A.G. ; representantes: Farmaceutica Hoechst Mexicana, S.A.

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1963]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/z8guf55c>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Algunos ... todavía no usan

REVERIN®

El antibiótico universal de amplio espectro para la terapéutica parenteral

Efecto máximo

Riesgo mínimo

Resultado óptimo

ENVASES ORIGINALES Y DOSIFICACION:
Reverin intravenoso

Caja con 1 fco. - ámp. de **275 mg.** 1 fco. - ámp. cada 24, 12 u 8 horas, según la severidad de la Infección.

Reverin intramuscular

Caja con 1 fco. - ámp. de **150 mg.** 1 fco. - ámp. cada 24 o cada 12 horas.

Caja con 1 fco. - ámp. de **350 mg.** 1 fco. - ámp. cada 24 horas. En los casos graves se dará preferencia a la presentación intravenosa.



FARBWERKE

HOECHST AG

vormals Meister, Lucius & Brüning

FRANKFURT (M)-HOECHST/ALEMANIA

1863
 CIEN AÑOS HOECHST
 1963

Representantes: **QUIMICA HOECHST DE MEXICO, S. A.**
 Tecoyotitla 412 México 20, D. F.

Regs. Nos. 53215 y 55498 S.S.A. P. Méd.



Doctor ¡No se arriesgue!

Para su seguridad y la de su paciente recete

BARALGINA®

Contra toda clase de dolores
y espasmos:

Efectiva

**Exenta de
alcaloides**

**Perfectamente
tolerada**

ENVASES ORIGINALES Y DOSIFICACION:

Ampolletas:

Caja con 5 de 5 ml. en empaques individuales 1 ampolleta cada 6 a 8 horas de preferencia por vía intravenosa.

Comprimidos:

Caja con 20 en sobres de aluminio. Uno a dos comprimidos cada 4 a 6 horas.

Supositorios:

Caja con 5 (Para adultos). Un supositorio hasta 3 veces al día.
Caja con 5 (Para niños).

En niños de 3 a 10 años, un supositorio infantil una o dos veces al día. En lactantes basta medio supositorio infantil una o dos veces al día

Regs. Nos. 49704, 49703 y 49706 S.S.A.

P. Med. No. 12293/62



FARBWERKE

HOECHST AG

normali Master Lucius & Brünning FRANKFURT (M)-HOECHST/ALEMANIA

Representantes: **QUIMICA HOECHST DE MEXICO, S. A.**

Tecoyotitla 412

México 20, D. F.