

**Nuevo agente sedante de la tos"! Ticarda : Nueva substancia
hipoglicemiante descubierta por Farbwerke Hoechst AG., Rastinon /
Hoechst A.G. ; representantes: Farmaceutica Hoechst Mexicana, S.A.**

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1957]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/stx9xj3w>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Nuevo Agente

SEDANTE DE LA TOS!

Ticarda

Nueva sustancia descubierta por los Laboratorios de Investigación de **FARBWERKE HOECHST A.G.**

No es un derivado más del opio y no produce constipación ni resequedad de las mucosas del tracto respiratorio.

Especialmente indicado en la tos irritativa y convulsiva.

¡ UNA SOLA DOSIS CADA 24 HORAS ! administrada preferentemente por la mañana, es suficiente en la mayoría de los casos. En presencia de tos sumamente rebelde, puede repetirse la dosis antes de acostarse.

Fabricado y
envasado por:

FARBWERKE

HOECHST AG.

vormals Meister, Lucius & Brüning Frankfurt (M) - Hoechst/Alemania

Medicamentos
» **HOECHST** »



Presentaciones: Frascos-gotero de 15 cc. de solución al 1% de clorhidrato de fenil-dimetil aminoetil-butanona, con 2% de p-oxifenil-metilamino-propanol.

Tabletas: tubos con 10 tabletas, conteniendo cada una:

Clorhidrato de fenil-dimetil aminoetil-butanona 7.5 mg.

p-oxifenil-metilamino-propanol 10 mg.

Envases para clínicas y hospitales: frascos con 100 y 500 cm³ de solución; frascos con 250 tabletas.

Dosis cada 24 horas: Lactantes y preescolares, según la edad 2 a 5 gotas ó (1/4) un cuarto de tableta. Niños de 3 a 14 años: 5 a 10 gotas ó 1/2 tableta. Adolescentes mayores de 14 años: 15 gotas o una tableta. Adultos: 15 a 20 gotas o una tableta.

Importado por:

FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A.

Av. Ejército Nacional No. 209, Apartado No. 28975

Tels.: 11-26-46, 16-06-14 y de Grupo 25-76-35

MEXICO 5, D. F.

Reg. Nos. 47447 y 47448 S.S.A. Prop. No. A-B-F-111416/56 S.S.A.

Literatura exclusiva para médicos.

NUEVA SUBSTANCIA HIPOGLICEMIANTE
DESCUBIERTA POR **FARBWERKE HOECHST AG.**

RASTINON*

»HOECHST«

Formula original: N-(4-metil-benzol-sulfonil)-N¹-butil-urea.

Ultimo progreso en la terapia oral de la Diabetes Mellitus

**Buenas
perspectivas
de éxito**

Diabéticos de más de 40 años de edad, sin tratamiento previo con insulina o con necesidad insulínica baja.

El mismo tipo de enfermos, con necesidades medianas o altas de insulina, particularmente cuando durante el tratamiento insulínico tienden a hipoglicemias en cuyo curso sobrevienen reacciones vasculares.

Permite, en tratamientos combinados con insulina, reducir notablemente la dosis de ésta.

Ventajas

**¡No tiene acción quimio-
terápica! No altera la flora in-
testinal.**


**¡No se acetila! ¡No hay peli-
gro de cristalluria.**

**Posible
adaptación
ambulatoria**


Estado metabólico antes y después de la adaptación a

* **RASTINON »HOECHST«** en relación con la necesidad insulínica del período precedente.

GLICEMIA



GLUCOSURIA



Advertencia: X = 1 caso cada vez, en el que a causa de desviación metabólica precomatoso no se registró ya ningún perfil diario.

Tubos de 20, Frascos de 40 y 200 tabletas de 0.5 g.

(1) Tomado de Mohnike y Ulrich:
Dtsch. Med.Wschr. 21:823 (1956);
22:887 (1956).

Este producto no es un sustituto de la "Insulina" no está indicado en el tratamiento del coma diabético, de la diabetes grave y de la diabetes juvenil.

El uso terapéutico de este producto no excluye el cumplimiento de las indicaciones dietéticas e higiénicas de la diabetes azucarada.

Los conceptos expuestos en esta literatura son de la exclusiva responsabilidad de los autores mencionados en la bibliografía.

Fabricado y envasado por:



FARBWERKE

HOECHST AG

vormals Meister Lucius & Brüning

Frankfurt (M) - Hoechst/Alemania

Medicamentos
»HOECHST«

Reg. No. 47927 S.S.A.

Prop. No. A-B-12560/56 S.S.A.

Representantes:

FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A.
Av. Ejército Nacional No. 209, Apartado No. 28975
Tels.: 11-26-46, 16-06-14 y de Grupo 25-76-35
MEXICO 5, D. F.