

**Plegicil : neurolplégico : gran actividad, dosis terapeuticas bajas /
Laboratoires Clin-Comar ; hecho en Mexico por: Labfarmex, S.A.**

Contributors

Labfarmex
Laboratoires Clin-Comar

Publication/Creation

[1957]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/n9w3jb42>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Plegicil

(1522 CB)



NEUROPLÉGICO

- ♦ GRAN ACTIVIDAD
- ♦ DOSIS TERAPEUTICAS BAJAS

GRAGEAS

dosificadas a 0.010 g. de principio activo por gragea
Tubos con 40 grageas

GOTAS

en solución de 0.4 p. 100. (10 gotas = a 1 mg. de principio activo)
Frasco con 30 c. c.

INTRAMUSCULAR

ampolletas dosificadas 0.010 g. de principio activo por 5 c. c.
Cajas con 6 ampolletas de 5 c. c.

INTRAVENOSA

(en perfusión)

ampolletas dosificadas a 0.020 g. de principio activo por 2 c. c.
Cajas con 10 ampolletas 2 c. c.

Laboratoires CLIN - COMAR

20, rue des Fossés St-Jacques - PARIS 5^e - Tél. ODÉon 27-20

Plegicil

(1522CB)

NEUROPLÉGICO

Plegicil

(1522 CB)

GRAN ACTIVIDAD
DOSIS TERAPEUTICAS BAJAS

INDICACIONES:

1. - NEUROPSIQUIATRIA

Afecciones psicosomáticas
Psicosis y psiconeurosis
Estados de excitación de tipo maniaco
Estados depresivos — Estados de angustia
Estados de confusión postinfecciosos, alcohólicos y psiquiátricos
Esquizofrenia — Toxicomanías

2. - CIRUGIA Y ANESTESIA

Preanestesia — Hibernación artificial
Anestesia potenciada local y general
Tratamiento preventivo y curativo de los estados de shock
Hipotensión controlada
En el postoperatorio logra: Ausencia de náuseas y vómitos; igualmente proporciona estado de tranquilidad psíquica y relajamiento muscular
Durante la intervención quirúrgica relaja la musculatura y por su acción vasoplégica no permite sangrar a los capilares

3. - MEDICINA GENERAL

Desequilibrios neurovegetativos (asma, espasmos, algias precordiales, distonias digestivas, etc.)
Vómitos de diversa etiología tanto en el niño como en el adulto (infecciones, toxicosis, por intolerancia medicamentosa, del embarazo, por mareos, etc.)
Tos quintosa rebelde — Algias rebeldes
Insomnio que no cede a la medicación habitual
Pruritos (ictericia, urticaria, reacciones eczematosas)

4. - OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Analgesia obstétrica — Vómitos del embarazo
Tensión premenstrual y dismenorreas

5. - DERMATOLOGIA

Eczemas, neurodermitis, intertrigo y otras dermatosis pruriginosas. Urticaria

6. - CANCEROLOGIA

PLEGICIL potencia notablemente la acción de los analgésicos; evita los vómitos causados por el proceso neoplásico, la radioterapia o por medicamentos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

En adultos: empezar con $\frac{1}{2}$ gragea ó 50 gotas, 2 veces al día; el 2º día 1 gragea, 2 veces al día y el 3er. día se podrá administrar la dosis total.

Neuropsiquiatría (en 24 horas) 0.040 a 0.100 g.

Medicina general — Dermatología (en 24 horas) 0.020 a 0.050 g.

Obstetricia — Cirugía — Anestesiología $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ mg por kilo de peso.

En niños: de menos de 5 años, $\frac{1}{2}$ mg por kilo de peso y 24 horas; entre 5-12 años, $\frac{1}{2}$ de la dosis del adulto.

HECHO EN MEXICO POR:

LABFARMEX, S. A.

LUCERNA, 29

MEXICO, D. F.

Regs. Nos. 48044, 48045, 48046 y 48047, S. S. A.

SEGUN FORMULA DE LOS

LABORATOIRES CLIN-COMAR

PARIS-FRANCIA

Prop. No. AB-Ff-5223/57

L I T E R A T U R A E X C L U S I V A P A R A M E D I C O S

Plegicil
(1522 CB)
NEUROPSIQUICICO