

**Quién tosió? Siempre que la terapia de la tos este indicada Hycomine Jarabe ... : Coumadin anticoagulante comprobado /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.**

**Contributors**

Laboratorios Endo de Mexico

**Publication/Creation**

[1962]

**Persistent URL**


<https://wellcomecollection.org/works/mtwfxz59>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



quién  
tosizó?

SIEMPRE QUE LA TERAPIA DE LA TOS ESTE INDICADA

# HYCOMINE<sup>®</sup> Jarabe

LA FORMULA COMPLETA PARA EL  
TRATAMIENTO DE LA TOS

Antitusivo / Antihistamínico / Expectorante

Alivia la tos y síntomas asociados en 15-20 minutos<sup>(1)</sup> efectivo por 6 horas o más<sup>(1)</sup> promueve la expectoración - con agradable sabor de cereza que facilita su administración.

**Endo**

FORMULA: Cada 100 ml. contienen:

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Bitartrato de dihidrocodeinona             | 90 mg.  |
| Metilbromuro de homatropina                | 30 mg.  |
| Maleato de pirilamina                      | 259 mg. |
| Cloruro de amonio                          | 1.2 mg. |
| Citrato de sodio                           | 1.7 mg. |
| Vehículo aromatizado y edulcorado c. b. p. | 100 ml. |

## INDICACIONES:

HYCOMINE es efectivo en las toses húmedas o secas, en traqueítis, bronquitis, neumonía, laringitis, asma bronquial, tosferina y condiciones similares, tos alérgica y toses asociadas con alergia; y en general, siempre que la medicación contra la tos está indicada.

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.  
Amores No. 1734 México 12, D. F.

Reg. No. 48803 S. S. A.  
P. Méd. 9411/61 S. S. A.  
(R) Marca Registrada

# COUMADIN<sup>®</sup>


## anticoagulante comprobado

Para uso oral

Más de 125 trabajos publicados desde 1953.



Más de **179,000,000** de dosis administradas hasta la fecha.



**COUMADIN<sup>®</sup> es el Warfarin original y único al que debe atribuirse que esta droga sea considerada como el anticoagulante que más se aproxima al ideal.<sup>1,2,3.</sup>**

Gran variedad de formas de dosificación oral y parenteral. COUMADIN (Warfarin sódico) se presenta en tabletas ranuradas de 5 mg., 10 mg. y 25 mg.

Dosis Média: - Inicial: 40 a 50 mg.; para enfermos de edad avanzada o debilitados, 20 o 30 mg.

De sostén: 5 a 10 mg. diarios de acuerdo con la determinación del tiempo de protrombina.

1. Boer, S. et al. J.A.M.A. 167/704, June 7, 1958.

2. Moser, K. M.: Disease-a-Month, Chicago, Yr. Bk. Pub., Mar. 1960, p. 13.

3. Escudero Jorge, Principios Cardiológicos, 6,356, Dic. 1959.

© Marca Registrada

**Endo**

Para literatura sobre COUMADIN escriba a

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A. Amores No. 1734 México 12, D. F.

Literatura Exclusiva para Médicos.

Los conceptos vertidos en esta literatura son de la responsabilidad exclusiva de los autores mencionados en la Bibliografía. Regs. Nos. 48352 y 51901 S.S.A. P. Med. 11113/60 S.S.A.

1962