

Quién tosió? Siempre que la terapia de la tos este indicada Hycomine Jarabe ... : estimula sin exaltar Sistral tabletas, alertante y psicoenergetico /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1962]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/yfw5qhab>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

quién
tosió ?

SIEMPRE QUE LA TERAPIA DE LA TOS
ESTE INDICADA

HYCOMINE®

Jarabe

Antitusivo - Antihistaminico
Descongestionante

LA FORMULA COMPLETA PARA
EL ALIVIO DE LA TOS.

Provee una acción sedante de la tos igual
a la de la codeína sin sus efectos indesea-
bles colaterales. No es narcótico.

Produce alivio sintomático de las manifes-
taciones alérgicas del catarro común.

Promueve la espasmolisis bronquial con
acción broncodilatadora.

Provee acción descongestionante de la mu-
cosa nasal.

Cada cucharadita de HYCOMINE® JARABE proporciona

Hyerphan® (Bromhidrato de Dextro-3-Metoxi- N-Metilmorfinano)	0.010 g.
Clorhidrato de fenilefrina	0.010 g.
Metilbromuro de homatropina	0.0015 g.
Molesto de pirilamina	0.0125 g.
Vehículo	
Cloruro de amonio	0.060 g.
Citrato de sodio	0.085 g.
Conservadores, aromatizantes, correctivos, colorantes y Jarabe c. b. p.	5 ml.

DOSIS:

Adultos: Una cucharadita después de los ali-
mentos y antes de acostarse.

Niños: De 2 a 12 años, media cucharadita des-
pués de los alimentos y antes de acostarse.

Marca Registrada® Reg. No. 48803 S. S. A.
P. Méd 7347/62

Endo® LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.
Amores 1734 México 12, D. F.



Estimula sin exaltar

SISTRAL®

TABLETAS

ALERTANTE Y PSICOENERGETICO

- 1.- ALERTANTE porque el paciente sujeto a tratamiento con SISTRAL se encuentra en estado de ALERTA. Su ATENCION, PERCEPCION, JUICIO e INTELIGENCIA se agudizan, colocándolo en condiciones óptimas para desarrollar sus actividades. (1)
- 2.- PSICOENERGETICO porque desarrolla en el paciente la disposición al trabajo, así como su CAPACIDAD para desarrollarlo FISICA y MENTALMENTE. (2)

*Estimula
sin exaltar*

- *SISTRAL No tiene relación con ningún estimulante de los ya conocidos. (3)
- *SISTRAL Tiene acción selectiva sobre el sistema nervioso central. (3)
- *SISTRAL No estimula centros nerviosos inferiores, centros éstos que al ser estimulados por otras drogas son responsables de efectos indeseables colaterales. (3)
- *SISTRAL Tiene un amplio margen de seguridad terapéutica (1:500). (2)
- *SISTRAL Tiene una respuesta gradual, suave y duradera. (4)
- *SISTRAL No provoca euforia. (4)
- *SISTRAL No causa acostumbramiento ni habituación. (5 y 6)
- *SISTRAL No provoca depresión por REBOTE. (6)
- *SISTRAL ¡ESTIMULA SIN EXALTAR!

INDICACIONES:

Ciertos casos de depresión • Narcolepsia • Menopausia • Estados generales de fatiga y extenuación • Depresiones postalcohólicas y emocionales • Enfermedades debilitantes crónicas • Geriatria • Situaciones de agobio • Retardo mental • Como coadyuvante en manifestaciones depresivas consecutivas a ciertos tratamientos (hipertensión arterial y epilepsia).

DOSIS:

Debe adaptarse a cada paciente hasta obtener resultados óptimos. Se recomiendan de 1 a 2 comprimidos por la mañana. En contadas ocasiones se requiere otra dosis a medio día.

BIBLIOGRAFIA:

- 1.-Lienert G. A., Janke, W.: Pharmacologic Study of 5-Phenyl-2-imino-4-oxo-oxazolidine, *Arzneimittel forschung* 7:436, 1957.
- 2.-Bugar, P.: A New "Anti-fatigue" Agent, Preliminary Test, *La Presse Medicale* 68:1783 (Oct. 29) 1960.
- 3.-Feldman, H. S.: Personal communication, 1960.
- 4.-Franke, E. A. Experience with 5-Phenyl-2-imino-4-oxo-oxazolidine in Mental Diseases, *Medizinische Klinik* 54:2080 (Nov.) 1959.
- 5.-Schmidt, L.: 5-Phenyl-2-imino-4-oxo-oxazolidine. A Central Stimulant, *Arzneimittel forschung* 6:243, 1956.
- 6.-Lorge M.: "Experiences with a New Stimulant" (*Stimul*) *Praxis*, No. 49, (Dec. 8), 1960.

PRESENTACION:

Frasco de 25 y 100 tabletas de 20 mg.

FORMULA:

Cada tableta contiene 20 mg. de 5-fenil-2-imino-4-oxo-oxazolidina
Excipiente c. b. p.

LOS CONCEPTOS VERTIDOS EN ESTA LITERATURA SON DE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS AUTORES MENCIONADOS EN LA BIBLIOGRAFIA.

Endo®

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

AMORES NO. 1734

MEXICO 12, D. F.

REG. NO. 58145, S. S. A.

® MARCA REGISTRADA

P. MED. NO. 7330/62 S. S. A.

1762