

En el amplísimo campo del dolor de mediana intensidad, Percodan tabletas ... : Potencia por almacenamiento, Endo Acon Adekon vitaminas hidrosolubles /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1962]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/kmggew4u>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

en el amplísimo campo del dolor de mediana intensidad

Percodan

TABLETAS

llena el hueco
entre el
analgésico oral
de acción suave
y el parenteral
de acción
potente¹⁻⁷

- actúa en 5 a 15 minutos
- el alivio dura usualmente de 6 á 8 horas
- no produce constipación... se tolera perfectamente
- el sueño no se interrumpe por el dolor

BIBLIOGRAFIA

1. Blank, P., and Boas, H.: Improved analgesia for moderate pain, *Ann. West. Med. & Surg.* 6:376, 1952. 2. Bonica, J. J., et al.: The management of postpartum pain with dihydrohydroxycodone (Percodan): Evaluation with codeine and placebo, *West. J. Surg.* 65:84, 1957. 3. Cass, L. J., and Frederick, W. S.: A controlled study in pain relief, *M. Times* 84:1318, 1956. 4. Chasko, W. J.: Pain-free dental surgery: Postoperative extension of the pain-free state, *J. District of Columbia Dent. Soc.* 31:3, No. 5, 1956. 5. Cozen, L.: *Office Orthopedics*, ed. 2, Philadelphia, Lea & Febiger, 1953, pp. 120, 138, 145, 156, 234. 6. Nicolson, W. P., Jr., and Skandalakis, J. E.: Control of postoperative pain, *J.M.A. Georgia* 46:471, 1957. 7. Piper, C. E., and Nicklas, F. W.: Percodan for pain in industrial practice, *Indust. Med.* 23:510, 1954; abstracted, *Clin. Med.* 3:1008, 1956; *Current M. Digest* 22:135, No. 3, 1955.

Los conceptos vertidos en esta literatura son de la responsabilidad exclusiva de los autores mencionados en la Bibliografía.



para el rápido
y duradero
alivio del
dolor

DOSIS MEDIA
PARA ADULTOS

1 Tableta cada 6 hrs.

FORMULA:

Cada tableta de Percodan contiene: Clorhidrato de dihidrohidroxicodeinona 2.25 mg. Tereftalato de dihidrohidroxicodeinona-homatropina 0.38 mg. (equivalente a 0.15 mg. de Dihidrohidroxicodeinona y 0.14 mg. de homatropina) Acido acetilsalicílico 224 mg. Acetofenetidina 160 mg. Cafeína 32 mg. Excipiente c. b. p. 500 mg.

LABORATORIOS ENDO
DE MEXICO, S. A.

Amores No. 1734
México 12, D. F.

Endo

P. Med. 8454/61 S. S. A. Reg. No. 45743 S. S. A.
Literatura Exclusiva para Médicos



Endo

POTENCIA POR ALMACENAMIENTO

Acon-Adekon

Vitaminas hidrosolubles

- Mayores niveles terapéuticos
- Absorción rápida y fácil
- Actividad sostenida

Acon®

Vitamina "A" en solución acuosa con 25000 y 50000 U.I. por cápsula y gotas con 25000 U.I. por ml.

Acné, ceguera nocturna, embarazo, lactancia y cuando se requiere el aporte vitamínico "A".

Dosis: de 25000 hasta 200000 U.I. al día.

Adekon®

Cada ampollita de 5 ml. contiene:

Palmitato de vitamina A	120 000 U.I.
Vitamina D ₂ (calciferol 600 000 U. I.)	15 mg.
Acetomenaftona (vitamina K)	7.5 mg.
Vehículo hidrosoluble	5 ml.

*Raquitismo - osteomalacia - osteoporosis
fracturas y osteogénesis imperfecta.*

Embarazo-lactancia-dentición retardada.

En trastornos oculares por avitaminosis.

Dosis: 1 ampollita por vía bucal cada 15 a 30 días a juicio del médico.

HECHO EN MEXICO

® MARCA REGISTRADA

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

AMORES NO. 1734

MEXICO 12, D. F.

REGS. NOS- 48408, 41361, Y 43276, S. S. A.

PROP. MED. 1547/62

1225

APM

1962