

**Cuando el dolor ataca prescriba Percodan tabletas para una potente acción analgésica por vía oral ... : Terapia anticoagulante a largo plazo, mayor supervivencia, Coumadin /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.**

**Contributors**

Laboratorios Endo de Mexico

**Publication/Creation**

[1963]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/d49gmdnh>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

cuando el DOLOR ataca prescriba

# PERCODAN®

TABLETAS

para una  
potente acción  
analgésica  
por vía oral

una tableta de Percodan cada 6 horas

- actúa en 5-15 minutos <sup>(1)</sup>
- su acción dura generalmente 6 horas ó mas <sup>(1)</sup>
- excelente tolerancia <sup>(1)</sup>
- rara vez se produce constipación
- permite el sueño, sin que este sea interrumpido por el dolor



Contiene dihidrohidroxi-codeinona, un analgésico potente, por vía oral.

Percodan® tiene acción efectiva y selectiva sobre los centros de percepción del dolor.

Los demás componentes de Percodan® reducen la conducción del dolor e inhiben su reconocimiento <sup>(2)</sup>

DOSIFICACION: (adultos)  
1 tableta cada 6 horas

INDICACIONES: en el dolor moderado y relativamente severo. Influenza, <sup>(1)</sup> bursitis, migraña, otalgia, post-partum, <sup>(2)</sup> neuralgia, mialgia, artralgia, dismenorrea, heridas, contusiones, <sup>(1)</sup> antes y después de cirugía menor. Cáncer; en las primeras fases puede retardar la necesidad de analgésicos potentes por vía parenteral.

#### BIBLIOGRAFIA:

- 1.- Blank, P., and Boas, H.: Ann. West. Med. & Surg. 6:376.1952
- 2.- Bonica, J.J., Hadfield, D., and Bennett, B.: West. J. Surg. 65:84, 1957

Cada tableta ranurada de Percodan contiene

#### FÓRMULA

|                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Clorhidrato de Dihidrohidroxicodeinona                                                                                            | 2.25 mg. |
| Tereftalato de Dihidrohidroxicodeinona- homatropina (equivalente a 0.15 mg. de dihidrohidroxicodeinona y 0.14 mg. de homatropina) | 0.38 mg. |
| Acido Acetilsalicílico                                                                                                            | 224 mg.  |
| Fenacetina                                                                                                                        | 160 mg.  |
| Cafeína                                                                                                                           | 32 mg.   |
| Excipiente c.b.p.                                                                                                                 | 0.50 g.  |




LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.  
AMORES No. 1734  
MEXICO 12, D. F.

Los conceptos vertidos en esta literatura son de la responsabilidad exclusiva de los autores mencionados en la Bibliografía. Literatura exclusiva para médicos.  
©-Marca registrada Reg. No. 45743 S. S. A. P. Méd. 1196/63



*anticoagulante*  
**TERAPIA A LARGO PLAZO - MAYOR SUPERVIVENCIA**



## COUMADIN®

PARA USO ORAL, INTRAMUSCULAR O INTRAVENOSO

El valor de la anticoagulación en el infarto agudo del miocardio ha sido comprobado por más de 100 estudios reportados<sup>(1)</sup>. La terapia anticoagulante a largo plazo con el objeto de disminuir la mortalidad y la morbilidad se ha convertido en un método práctico con COUMADIN®<sup>(2)</sup>. La predicción de su respuesta y la facilidad con que se mantienen los niveles de protrombina han reducido considerablemente el riesgo terapéutico.<sup>(3,4)</sup>

En un estudio de 5 años en pacientes con enfermedad coronaria, la administración de COUMADIN® a largo

plazo, en pacientes post-infarto, proporcionó una prolongación de sus vidas en relación con un grupo testigo que no recibió anticoagulantes.<sup>(2)</sup>

Los resultados demostraron que la administración prolongada de COUMADIN® reduce la posibilidad de infartos subsecuentes y es efectivo como profiláctico del infarto en pacientes anginosos.

Coumadin® (Warfarin Sódico) tiene múltiples presentaciones:

Tabletas de 5 mg. ranuradas, durazno; tabletas de 10 mg. ranuradas, blanco; tabletas de 25 mg. ranuradas, rojo. Frasco amp. de 50 mg. inyectable.

- 1- Friedberg, C. K.: J.A.M.A. 180:307, Abr. (1962). 2- Nora, J.J.M. Times 89:502, (1961) 3- Baer, S., et al.: J.A.M.A. 167:704, Jun. (1958) 4- Escudero, J.: Principia Cardiologica 6:356 Dic. (1959).



Para literatura sobre COUMADIN® escriba a

**Laboratorios Endo de México, S. A.** Amores 1734 - México 12, D. F.

® Marca Registrada

Literatura exclusiva para médicos

Los conceptos vertidos en esta literatura son de la responsabilidad exclusiva de los autores mencionados en la bibliografía. Regs. Nos. 48352 y 51501 S. S. A. P. Med. 1168/63