

**Para analgesia potente por vía oral... Percodan tabletas : Valpine
(metibromuro de anisotropina), Valpine Compuesto (metibromuro de
anisotropina + fenobarbital) /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.**

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1964]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/pnawgtbb>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>


Para analgesia potente por vía oral...

PERCODAN®

Sales de dihidrocodéinona con tereftalato de homatropina más ácido acetilsalicílico, fenacetina y cafeína.

TABLETAS

Llena el hueco
entre el analgésico
oral de acción suave
y el parenteral
de acción potente¹⁻⁷



- Actúa en 5 a 15 minutos.⁽¹⁾
- No produce constipación.⁽¹⁻⁷⁾
- El sueño no se interrumpe por el dolor.⁽¹⁻⁷⁾
- El alivio dura usualmente de 6 a 8 horas.⁽¹⁾
- Se tolera perfectamente.⁽¹⁾

Dosis media para adultos: 1 Tableta cada 6 horas

Bibliografía

1. Blank, P., and Boas, H.: Improved analgesia for moderate pain, Ann. West. Med. & Surg. 6:376, 1952.
2. Bonica, J. J., et al.: The management of postpartum pain with dihydrocodéinone (Percodan): Evaluation with codeine and placebo, West. J. Surg. 65:84, 1957.
3. Cass, L. J., and Frederick, W. S.: A controlled study in pain relief, M. Times 84:1318, 1956.
4. Chasko, W. J.: Pain-free dental surgery: Postoperative extension of the painfree state, J. District of Columbia Dent. Soc. 31:3, No. 5, 1956.
5. Cozen, L.: Office Orthopedics, ed. 2, Philadelphia, Lea & Febiger, 1953, pp. 120, 138, 145, 156, 234.
6. Nicolson, W. P., Jr., and Skandalakis, J. E.: Control of postoperative pain, J. A. M. A. Georgia 46:471, 1957.
7. Piper, C. E., and Nicklas, F. W.: Percodan for pain in industrial practice, Indust. Med. 23:510, 1954; abstracted, Clin. Med. 3:1008, 1956, Current M. Digesta 22:135, No. 3, 1955.

Endo®

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

Amores No. 1734

México 12, D. F.

VALPINE®

(Metilbromuro de Anisotropina)

VALPINE® COMUESTO

(Metilbromuro de Anisotropina + Fenobarbital)

*Mayor selectividad
que ningún otro
antiespasmódico
conocido.*

Prácticamente no
actúa aquí




Prácticamente
no produce
visión borrosa

ni aquí




Ni sequedad de boca

ni aquí



Ni retención urinaria




Tabletas



Elixir



Elixir Pediátrico



Dosis:

Adultos:

1 tableta o una cucharadita 3 o 4 veces al día.

Niños:

Menores de 6 años: 10 gotas por año de edad, 3 o 4 veces al día.

Mayores de 6 años: de media a una tableta o de media a una cucharadita 3 o 4 veces al día.

Endo

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

Amores No. 1734

México 12, D. F.