

**Valpine (metibromuro de anisotropina), Valpine Compuesto (metibromuro de anisotropina + fenobarbital) : Para analgesia potente por vía oral...
Percodan tabletas /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.**

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1964]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/wxu75p6a>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

VALPINE®

(Metilbromuro de Anisotropina)

VALPINE® COMPUESTO

(Metilbromuro de Anisotropina + Fenobarbital)

*Mayor **selectividad**
que ningún otro
antiespasmódico
conocido.*


Tabletas



Elixir



Elixir Pediátrico



Dosis:

Adultos: 1 tableta o una cucharadita 3 ó 4 veces al día.

Niños: Menores de 6 años: 10 gotas por año de edad 3 ó 4 veces al día

Mayores de 6 años: de media a una tableta o de media a una cucharadita 3 ó 4 veces al día.



LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

Amores No. 1734

México 12, D. F.


Para analgesia potente por vía oral...

PERCODAN®

Sales de dihidrohidroxicodoinona con tereftalato de homotropina más ácido acetilsalicílico, fenacetina y cafeína.

TABLETAS

Llena el huevo
entre el analgésico
oral de acción suave
y el parenteral
de acción potente¹⁻⁷



- Actúa en 5 á 15 minutos.⁽¹⁾
- No produce constipación.⁽¹⁻⁷⁾
- El sueño no se interrumpe por el dolor.⁽¹⁻⁷⁾
- El alivio dura usualmente de 6 a 8 horas.⁽¹⁾
- Se tolera perfectamente.⁽¹⁾

Dosis media para adultos: 1 Tableta cada 6 horas

Bibliografía

1. Blank, P., and Boas, H.: Improved analgesia for moderate pain, *Ann. West. Med. & Surg.* 6:376, 1952.
2. Bonica, J. J., et al.: The management of postpartum pain with dihydrohydroxicodoinone (Percodan): Evaluation with codeine and placebo, *West. J. Surg.* 65:84, 1957.
3. Cass, L. J., and Frederick, W. S.: A controlled study in pain relief, *M. Times* 84:1318, 1956.
4. Chasko, W. J.: Pain-free dental surgery: Postoperative extension of the painfree state, *J. District of Columbia Dent. Soc.* 31:3, No. 5, 1956.
5. Cozem, L.: *Office Orthopedics*, ed. 2, Philadelphia, Lea & Febiger, 1953, pp. 120, 138, 145, 156, 234.
6. Nicolson, W. P., Jr., and Skandalakis, J. E.: Control of postoperative pain, *J. A. M. A. Georgia* 46:471, 1957.
7. Piper, C. E., and Nicklas, F. W.: Percodan for pain in industrial practice, *Indust. Med.* 23:510, 1954; abstracted, *Clin. Med.* 3:1008, 1956, *Current M. Digests* 22:135, No. 3, 1955.

Endo®

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.
Amores No. 1734 México 12, D. F.