

Organon presenta el anabólico oral idóneo para niños, mujeres y ancianos, Orgabolín : ...y para la terapéutica parenteral, Deca-Durabolín / Organon.

Contributors

Organon (Firm)

Publication/Creation

[1962]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/puvbbakv>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



ORGANON

presenta

BIBLIOGRAFIA

R. "Efectos y Reacciones Anabólicos en Niños". Voordwijk 10-13. Mayo.
Hartenbach, W., "Primeros Tratamiento General de las Graves". Münch. Med. (En prensa).—3 Hartenbach, W., Proteínas y Alteraciones Quemaduras Gra- (En prensa).— Mayo Terapéu- cientes ancia- 10-13 mayo to. de on.

aciones
e la ex-
autores.

y niños

el anabólico

ORAL

**idóneo para niños,
mujeres y ancianos**

ORGABOLIN[®]

...y p

ORGABOLIN®

(Etilestrenol) "ORGANON"

**IDONEO
para
NIÑOS
MUJERES
y
ANCIANOS**

Orgabolin "Organon" es el anabólico **oral** más seguro y mejor tolerado descubierto hasta ahora.

Las dosis terapéuticas necesarias para obtener **efectos óptimos** son mínimas. A éstas,

ORGABOLIN "Organon"

NO ejerce acción virilizante

NO ejerce efecto progestágeno

NO interfiere en el metabolismo hidrosalino

NO provoca efectos secundarios ni molestias gástricas

ORGABOLIN "Organon"

supera a todos

**los anabólicos orales anteriores
en su
índice terapéutico**



La relación entre la potencia anabólica del Orgabolin "Organon" y su actividad androgénica es:

- 19 veces**
más favorable que la de la metiltestosterona
- 6 veces**
más favorable que la de la noretandrolona
- 3 veces**
más favorable que la de la oximetazona



La formación y la destrucción de las proteínas en el organismo están constantemente sometidas a variaciones.

En numerosos casos predomina la destrucción proteínica, lo que produce un balance nitrogenado negativo:

Durante y después de enfermedades consuntivas.
Intervenciones quirúrgicas.
Tratamiento cortisónico prolongado.
Quemaduras y accidentes.
Esfuerzos intensos, etc.

Orgabolin "Organon" ejerce un **efecto anabólico-miotrófico superior** al de todas las sustancias de esta naturaleza hasta ahora sintetizadas, para administración oral.

Bajo su efecto:

- Se positiviza el balance nitrogenado.
- Se recupera el tono y el trofismo muscular.
- Aumenta el apetito y el peso.
- Cicatrizan las heridas y se consolidan las fracturas.
- Se acorta la convalecencia.
- Se restablece la vitalidad.

ORGABOLIN®

"ORGANON"

CONFIRMACION CLINICA

Orgabolin ha sido ensayado clínicamente en varios centenares de pacientes de ambos sexos y de distintas edades, obteniendo resultados que confirman sus propiedades terapéuticas sobresalientes:

En

Pediatría "El peso corporal aumentó rápidamente en todos los niños, en algunos ya manifiestamente desde el tercer día. También en prematuros se obtuvieron excelentes resultados. La tolerancia al preparado fue excelente" ¹.

Cirugía "El preparado mejoró sensiblemente el estado general de los pacientes sometidos a operaciones importantes".

Quemaduras "Siete casos de quemaduras graves respondieron magníficamente" ^{2, 3}.

Medicina Interna "Se obtuvieron muy buenos resultados en osteoporosis, cirrosis hepática, estados de debilidad, anemias ferroprivas y anorexia" ⁴.

Geriatría "En osteoporosis senil, en estados consuntivos, debilidad y falta de peso, se obtuvieron excelentes resultados con Orgabolin "Organon" ⁵.

BIBLIOGRAFIA

- 1) Bierich, J. R. "Efectos y Reacciones de los Esteroides Anabólicos en Niños". (Symposium Noordwijk 10-13, Mayo 1961).—2) Hartenbach, W., "Primeros Auxilios y Tratamiento General de las Quemaduras Graves". Münch. Med. Wschr. (En prensa).—3) Hartenbach, W., "Hormonas, Proteínas y Alteraciones Electrolíticas en las Quemaduras Graves". Arch. Clin. Chir. (En prensa).—4) Kalliomäki, L. "Un Ensayo Terapéutico con Etilestrenol en Pacientes ancianos". Symposium Noordwijk 10-13 mayo 1961.—5) Comunicación al Depto. de Invest. Clínicas de N. V. Organon.

Las citas bibliográficas e informaciones científicas que se ofrecen son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

**puede administrarse
sin inconveniente a mujeres y niños**

Dada la gran potencia del Orgabolin, sólo se requieren dosis mínimas para obtener efectos óptimos.

Niños: 1 a 2 mg. diarios (½ a 1 tableta) con la comida principal. En lactantes y niños pequeños, mezclar la fracción de tableta pulverizada con la leche o alimento.

Adultos: 2 a 4 mg. (1 a 2 tabletas) con la comida principal.


ENVASE

Frasco con 20 tabs. de 2 mg.



ORGANON

...y para la terapéutica



parenteral


DECA-DURABOLIN®

(Decanoato de nandrolona) "Organon"

el anabólico miotrófico
más potente conocido

CURVAS DE DURACION DE ACCION

Propionato de testosterona	3 a 4 días
Durabolín	8 a 10 "
Deca-Durabolín	20 a 25 "



Deca-Durabolín "Organon" es el anabólico **inyectable** más potente y de acción más prolongada.

- Su actividad miotrófica es 3 veces mayor en potencia y duración que la del fenilpropionato.
- Carece de efecto virilizante aún a dosis elevadas.
- **NO** ejerce acción progestágena.
- **NO** influye sobre el metabolismo hidrosalino.

ENVASES

Frasco-amp. de 1 ml. con 25 y 50 mg.
Frasco-amp. de 2 ml. con 5 mg. por ml.

Repr.: Organon Mexicana, S. A., Camarones 134, México 16, D. F.
Distr. exclusivos: André Bigaux, S. A., Camarones 138, México 16, D. F.
Reg. 53979, 57507 S. S. A. P. Med. 3114/62 S. S. A.

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS

Deca-Durabolín "Organon" es el agente de elección en todas las afecciones en las que se requiera estimular intensamente el anabolismo de las proteínas. Deca-Durabolín está especialmente indicado en:

retinopatía diabética
distrofia muscular progresiva
distrofia muscular mielopática
carcinoma de mama

afecciones en las que hasta ahora era imposible obtener un resultado óptimo con los anabólicos habituales por no poder ser éstos administrados a dosis suficientemente elevadas sin presentación de efectos secundarios indeseables.

Deca-Durabolín se administra a razón de:

UNA sola inyección cada
3 semanas.

N.V. ORGANON

KLOOSTERSTRAAT 6 — OSS, HOLANDA