Complejo "B" Gedeon Richter / Gedeon Richter (América), S.A.

Contributors

Gedeon Richter (América)

Publication/Creation

[1948]


Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/ntbvgdbr

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).





COMPLEJO"B" GEDEÓN RICHTER

COMPLEJO B RICHTER, AMPOLLETAS

Los principales factores del complejo vitamínico B en dosis y proporciones óptimas para su administración parenteral.

Reg. No. 30825 S. S. A.

PRESENTACION Y FORMULA: Caja de 6 ampolletas de 2 cm3 que contienen: Clorhidrato de tiamina, 50 mg., equivalente a 16650 U. l. de vitamina B1; Riboflavina, 2 mg; Nicotinamida, 25 mg; Piridoxina, 1 mg; Fosfato monosódico, 20 mg; Solución acuosa de urea al 10% c·b.p. 2 cm3.

INDICACIONES: Prevención de la deficiencia de varios factores vitamínicos del grupo B en sujetos sometidos a regímenes restringidos con tinalidad terapétutica (diabetes, obesidad, hipertensión, afecciones renales, afecciones digestivas, alergia, etc.) o a una alimentación defectuosa por cualesquiera circunstancias (anorexia por cualquier causa, carestía por causas diversas) y en circunstancias en que pueda estar anormalmente elevado el requerimiento de varios de dichos factores o dificultado el aprovechamiento o aumentada la eliminación de los mismos, (enfermedades infecciosas, hipertiroidismo, calor ambiente elevado, diuresis o sudoración excesivas, embarazo, lactancia, convalescencia, etc.)

Tratamiento de las carencias y de las deficiencias de cualquier grado de varios factores vitamínicos del grupo B y de algunos otros estados patológicos, tanto si existen síndromes o manifestaciones peculiares característicos de algunas de dichas avitaminosis (neuritis y otros síntomas o signos de avitaminosis B1, queilosis, ciertos trastornos del globo ocular y otras manifestaciones de arriboflavinosis, síntomas diversos de pelagra, etc.) como si solamente se aprecian ciertos trastornos inespecíficos, tales como anorexia, estreñimiento atónico, dispepsia, astenia, trastornos de tipo neurítico, además, trastornos cardíacos, anemias diversas, etc.

Dosis: de una ampolleta cada dos días a una o dos ampolletas diarias, por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

PRODUCTOS GEDEON RICHTER (AMERICA) S. A.

Boulevard Miguel Cervantes Saavedra No. 5

MEXICO, D. F.

TARJETA POSTAL