

Contributors

Gedeon Richter (América)

Publication/Creation

[1949]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/c9qev2tx>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



LISOZIMA

GEDEON RICHTER

LISOZIMA RICHTER

REG. NOS. 32170 - 32552 - 32553 S.S.A.

FORMULAS Y PRESENTACION:

LISOZIMA Lisozima (con una actividad de 225,000 U.M. lysodeikticus), 15 mg. Excipiente, c. b. p. una tableta.

LISOZIMA COMPUESTA INFANTIL Lisozima (con una actividad de 225,000 U.M. lysodeikticus), 15 mg; Acido cólico, 2.5 mg; Acido dehidrocólico, 20 mg; Fta-lil-sulfatiazol, 175 mg; Excipiente, c. b. p. una tableta.

LISOZIMA COMPUESTA ADULTOS Lisozima (con una actividad de 112,500 U.M. lysodeikticus), 7.5 mg; Acido cólico, 7.5 mg; Acido dehidrocólico, 15 mg; Fta-lil sulfatiazol, 300 mg; Excipiente, c. b. p. una tableta.

INDICACIONES Disentería bacilar, gastroenteritis, enterocolitis y colitis agudas y crónicas producidas por Shigella paradyenteriae, B. Shiga-Krause, Flexner-His, Sonne, Proteus morganii, Escherichia coli, Enterococo y B. coli. Tratamiento de la fiebre tifoidea y paratifoidea A. Coadyuvante valioso en las disenterías amibianas y en amibirosis intestinal crónica. Profilaxis de las complicaciones infecciosas en los períodos pre y postoperatorio, muy especialmente en las intervenciones quirúrgicas sobre el aparato digestivo. Los ácido biliares y las sulfonamidas potencian considerablemente la acción lítica de la lisozima.

PRODUCTOS GEDEON RICHTER (AMERICA), S. A.

Boulevard Miguel Cervantes Saavedra, Núm. 5
MEXICO, D. F.



1949