

Perheplex Fólico / Gedeon Richter (América), S.A.

Contributors

Gedeon Richter (América)

Publication/Creation

[1948]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/v2zy8mr2>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



PERHEPLEX

FÓLICO

Gedeón Richter



JARABE PERHEPLEX FOLICO RICHTER

AMINOACIDOS, VITAMINAS Y SALES MINERALES
CON EXTRACTO HEPATICO ANTIANEMICO Y ACIDO FOLICO

FORMULA Y PRESENTACION: Cada 100 cm³ contienen: Acido fólico 20 mg; Clorhidrato de tiamina 15 mg. (5000 U. I. de vitamina B-1); Riboflavina 10 mg; Acido nicotínico 133.3 mg; Extracto de hígado (1:100) 2 g. (equivalente a 200 g. de hígado fresco); Glicerofosfato de sodio 1 g; Glicerofosfato de calcio 1 g; Citrato de hierro amoniacial 1 g; Citrato de cobre 6.6 mg; Hidrolizado (enzimático) de sangre 10 g., con un contenido 1.54 g. de nitrógeno contenido en los siguientes aminoácidos libres: Arginina 0.25 g; Cistina 0.10 g; Acido glutámico 2 g; Glicina 0.05 g; Histidina 0.12 g; Isoleucina 0.29 g; Leucina 1.56 g; Lisina 0.10 g; Metionina 0.20 g; Fenilalanina 0.48 g; Treonina 0.26 g; Triptofano 0.50 g; Tirosina 0.43 g; Valina 0.33 g; Alanina, Serina, Prolina, Oxiprolína, Acido aspártico y Norleucina 6.66 g; Jarabe simple c. b. p. 100 cm³.

Frasco de 225 cm³. Reg. No. 26641 S. S. A.


INDICACIONES: Tratamiento de sostén de la **anemia perniciosa y del esprúo**. Prevención y tratamiento de las **anemias megaloblásticas y macrocíticas** causadas por deficiencias nutritivas. Coadyuvante muy útil en el tratamiento de las **anemias secundarias**. Profilaxis y tratamiento de **avitaminosis e hipovitaminosis B** y de los diversos trastornos que pueden originarse por una restricción de la ración proteica por razones terapéuticas o por otras causas. Tónico reconstituyente en **convalecencias y afecciones que se acompañan de anorexia, astenia o desnutrición**.

DOSIS: Una o dos cucharadas tres veces al día, separado de las comidas (1 hora antes o 3 o más horas después).

PRODUCTOS GEDEON RICHTER (AMERICA), S. A.

Boulevard Miguel Cervantes Saavedra No. 5
MEXICO, D. F.

TARJETA POSTAL



1948