

Neuroplagico Largactil : lo que hay que saber del: Largactil ... / marcas Rhône Poulenc Specia.

Contributors

Rhône-Poulenc (Firm)
SPECIA (Society)

Publication/Creation

[1963]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ce8u86mc>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

Lo que hay que saber del:

L A R G A C T I L

(4560 R. P.)

Clorhidrato de Cloro-3 (Dimetilamino-3' Propil)-10 Fenotiazina.

PROPIEDADES

Derivado sintético dotado de propiedades farmacodinámicas múltiples, principalmente ligadas a sus efectos "neuroplégicos" sobre el **sistema neuro-vegetativo** periférico y central.

- 1º Vagolítico, simpaticolítico.
- 2º Sedante, antiemético, potencializador de la actividad de numerosos agentes medicamentosos (anestésicos generales, hipnóticos, analgésicos).

INDICACIONES

1º Cirugía:

- Preparación para la anestesia.
- Anestesia potencializada.

Prevención y tratamientos de los estados de shock traumático y post-operatorio.

Tratamiento de las hipertermias post-operatorias.

Hipotensión controlada.

Hibernación artificial.

Hipo post-operatorio.

Vómitos post-anestésicos.

Preparación para los exámenes endoscópicos.

2º Obstetricia y ginecología:

Analgesia obstétrica.

Eclampsia.

Vómitos Gravídicos.

Dismenorreas esenciales.

3º Medicina general:

Desórdenes neuro-vegetativos: toxi-infecciones graves (en asociación con los tratamientos anti-infecciosos), ataques paralíticos perniciosos, distonías de órganos.

Vómitos de origen central (meningitis, uremia, enfermedad de los rayos X, enfermedades producidas por el movimiento: mareos, etc.).

Pruritos rebeldes de origen interno (diabetes, ictericia, intolerancias alimenticias, etc.).

Insomnios rebeldes.

4º Pediatría:

Estados pre-tóxicos y neuro-toxicosis del lactante.

Síndromes malignos de enfermedades infecciosas.

Encefalitis graves post-infecciosas.

Vómitos (vómitos habituales del lactante, coqueluche, acetoneia, etc.).

Toses quintosas, laringitis agudas.

5º Dermatología:

Dermatosis pruriginosas: neurodermitis, eczemas pruriginosas, eritrodermias premicóticas.

6° Neurología:

Neuralgias, algias diversas, simpatalgias, espasmalgias, Algunos Estados de mal comicial.

Corea.

Comas por intoxicación oxicarbonada por edema o compresión del encéfalo.

7° Psiquiatría:

Excitación maníaca, psicosis agudas excitomotrices.

Estados confusionales.

Estados neuropáticos.

Psicosis crónicas alucinatorias o interpretativas.

Melancolía.

Estados esquizofrénicos.

Afecciones psico-somáticas.

Curas de sueño (en asociación con los barbitúricos).

PRESENTACIONES

Vía bucal:

Comprimidos dosificados a 25 mg. Frascos con 50.

Comprimidos dosificados a 100 mg. Frascos con 20 y con 100.

Gotas solución al 4%. Frascos con 10 ml.

1 gota = 1 mg. de principio activo.

Vía rectal:

Supositorios dosificados a 25 mg. Cajas con 5.

Supositorios dosificados a 100 mg. Cajas con 5.

Vía parenteral:

Ampolletas de 2 ml. dosificadas a 50 mg. Cajas con 5, para perfusiones intravenosas.

Ampolletas de 5 ml. dosificadas a 25 mg. Cajas con 10, para inyecciones intramusculares profundas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1º Administrar el LARGACTIL según una posología lentamente progresiva para llegar a la dosis útil al cabo de algunos días (salvo urgencia terapéutica).

2º Las primeras inyecciones deben, necesariamente, ser administradas a pacientes acostados. En tratamientos bucales observar, después de las primeras tomas, un reposo horizontal.

Los comprimidos de LARGACTIL tienen un COLOR ANARANJADO y están cubiertos por una capa protectora que enmascara su sabor amargo. NUNCA SE VENDEN SUELTOS.

Las ampolletas LARGACTIL, son INCOLORAS. Una coloración moreno-violeta de la solución indica oxidación debida a alguna rajadura de la ampolleta. En estos casos. NO DEBE USARSE.

Su venta requiere receta médica.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
(SPECIA)

MARCAS



21, Rue Jean Goujon, Paris 8ème. (Francia)

REPRESENTANTES:

ESTABLECIMIENTOS MEXICANOS COLLIERE, S. A.

Czda. México-Xochimilco No. 4864.—México 22, D. F.

Los conceptos vertidos en esta literatura son de la responsabilidad exclusiva de los autores mencionados en la Bibliografía.

Literatura exclusiva para Médicos
P. Méd. No. 9092/62 S.S.A.

Reg. No. 41456, 42368, 42369, 43332 y 46649 S.S.A.

Ref. No. 83-15

BARRIE 26934