Die Lustseuche in allen ihren Richtungen und in allen ihren Gestalten, zum Behufe akademischer Vorlesungen / [Johann Wendt].

Contributors

Wendt, Johann, 1777-1845.

Publication/Creation

Breslau: W.G. Korn, 1816.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/qd2vp355


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



54711/8





Die Lustseuche

in

allen ihren Richtungen

und

in allen ihren Gestalten

jum Behufe

akademischer Vorlesungen

bargeftellt

pom

Dr. Johann Wendt,

praktischem Arzte, Königlichem Medicinalrathe, ordentlichem öffentlichem Lehrer der Seilkunde an der hohen Schule zu Breslau, dirigirendem Arzte des Ruhschen Hausarmen, Medis einalinstituts, Generalsekretair der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, Mitgliede der Kaiserlichen Akademie der

Naturforscher, der physikalische medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und der mineralogischen Societät zu Jena.

Breslau, ber Wilhelm Sottlieb Korn. 1816.

ofic Eulissends

er sement in the morni notte

div

in atten three Calatten

guin Wehnler

alavemischer Borleinigen

paracifette

30754

Congression Structures

refilitem from Artes der Celifone and est bonen ordere in faction of the first of t

. 出版社 日本

- 42 a : 11110 mls olim . 4 9 3



Dem

Serrn

Doctor J. W. Hancke,

praktischem Arzte und ausübendem Bundarzte, Oberarzte am Krankenhause der barmherzigen Bruder, Ritter bes eisernen Kreuzes und Mitgliede der Schlesischen Gesellschaft fur vaterländische Cultur

widmet

Diefe Schrift

als eine freundliche Erinnerung an viele gemeinschafts lich am Krankenbette im Sebiete der Sphilis gemachte Erfahrungen

der Verfaffet.

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Wellcome Library

ais folde von mic, zurdiefen Friegle Danlöge benußte worden aber die Kerderungen, welche au ein Lehr-

similaren Inels Barbon Concentration

Vorbericht.

Clouding Beatlaghteel, Babucidenno Bege

Preif ber juebiefem Gweige gehörenben Besommte

Sixrama madien fie allowings aus und find audy

Richt ein Handbuch über syphilitische Krankheiten wollte ich schreiben; diesem Bedürsnisse ist durch Swediaurs und Walchs sehr aussührliche Darssellungen der venerischen Krankheiten abgeholsen, aber an einem, dem Standpunkte der heutigen Medizin und der täglich reicher werdenden Ersahrung angepaßten Lehrbuche sehlt es noch; denn Niemand kann die jest vorräthigen sehr schäsbaren und zum Theil vortreslichen Abhandlungen über die Lustseuche von Astruc, v. Swieten, Fabre, Hunter, Fris, Girtanner, Schaarschmidt, Monteggia, Hahnemann, Haker, Müller,

Clossius, Berlinghieri, Schmidt und Lagne au für brauchbare Lehrbücher anerkennen. Einen Theil der zu diesem Zweige gehörenden Gesammt-Literatur machen sie allerdings aus und sind auch als solche von mir zu diesem Zwecke dankbar benußt worden; aber die Forderungen, welche an ein Lehrbuch gemacht werden können, erfüllen sie nicht.

Das von Jacob Joseph Plenk 1787 lateinisch herausgegebene und von Wasserberg ins
Deutsche übersetzte Lehrbuch über die Sphilis würde
sich allerdings dazu eignen, wenn es nicht (unbeschadet
der allen Plenkschen Handbüchern gebührenden
Vorzüge, einer klaren sostematischen Darstellung)
soweit hinter den bessern Ansichten und Ersahrungen
der heutigen Zeit zurück wäre. Mehger, kurzer Inbegriff der Lehre von der Lustseuche, Königsb. 1800,
kränkelt in mancher andern Beziehung an demselben
Uebel. Ueberhaupt fordern es die Fortschritte der
Wissenschaft, daß von Zeit zu Zeit sich auch in dem
Gebiet der Lehrbücher etwas Neues an das schon
Bestehende reihe.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich als die obersten Eigenschaften eines Leitfadens für Vorlessungen, eine sustematische und gedrängte Darstellung der vorzutragenden Lehre fordere; wo nur die obersten Säße aufgestellt und diese nur von den nösthigsten Erläuterungen begleitet sind. Der Lehrer muß den nöthigen Spielraum haben, um ben jedem Saße seine Ansichten näher zu entwickeln, und das Vorgetragene durch seine Erfahrungen zu bestätigen, zu ergänzen, oder, wo es nöthig ist, zu berichtigen oder zu widerlegen.

Zu weitläuftige Schriften dieser Art, welche in die geringfügigsten Darstellungen eingehn und alles erschöpfen wollen, sind Schuld, daß so häusig öffentsliche Borträge in bloße Borlesungen (mit buchstäblicher Bedeutung des Ausdrucks) entarten, woben die große Wirkung des lebendigen Wortes und die Kraft der eignen Ueberzeugung nothwendig verloren gehn mussen. Andrerseits soll aber auch ein Leitsaden nicht gar zu kurz seyn, damit kein wesentlicher Lehresaß übergangen, keine nothwendige Andeutung vers

deig- fich micht, zu geben vermag.

gessen, und, wo es nothig ist, aufreichhaltige Quellen hingewiesen werde. Mur auf diese Art wird ein Lehr-buch nicht blos ein Leitfaden in den Vorlesungen, sondern auch eine Erinnerungstafel für den künftigen Kreis praktischer Geschäfte seyn und bleiben. Mit wenigen Worten:

muß ben itoenigen Spielegen naben, um ber beit bein

Ein Lehrbuch foll einen rein harmos nischen Plan des Gesammtinhaltes der Wissenschaft aufstellen, und also das leisten, was der Studierende durch eigenen Fleiß sich nicht zu geben vermag. Nicht die bloße Mannigfaltigkeit ist hier das Wesentliche. Die strenge Systematif ist es, diese gewährt dem Studierenden einen tiesen Blick in den innern Bau, und einen vollständigen Ueberblick aller Gegenstände, und alles Inhalts seiner Wissenschaft.

Ob ich ben vorliegender Arbeit den mir wohl bekannten Zweck erreicht habe, muß ich Anderer Ur-

theile überlaffen; an Gelegenheit bat es mir in ben 18 Jahren meiner Praris mahrlich nicht gefehlt, Erfahrungen in dem Gebiete ber Gophilis zu machen, fo wie es mir auch fruber gestattet mar, die mannigfaltigsten Gestaltungen und die vielseitigften Richtungen dieser Rrankheit in den großten Rrankenhaufern Deutschlands und Italiens zu beobachten; daber fann ich auch versichern, daß mich in allen den Lehren, wo meine Unficht von dem gewöhnlichen bisher felten verlaffenen Wege abweicht, eigene Bahrnehmung und Erfahrung geleitet haben; dies gilt besonders, wo von der suphilitischen Ratur Des Trippers, von der Wirfung des Queckfilbers, den Rudfichten ben Berabreichung beffelben und abn= lichen Grundfagen die Rede ift. Alehnliche Unfichien find zwar fruber zum Theil angedeutet, aber noch nicht im Zusammenhange vorgetragen worden.

Db die Sphilis in allen ihren Gestaltungen ein für besondere Borlesungen geeigneter Gegenstand sen, wird der nicht fragen, der dieses Convolut von Krankheitssormen in allen seinen Beziehungen und

Der Mannigfaltigkeit seiner Erscheinungen kennt. Ohne zu denjenigen zu gehören, die ben jedem langwierigen Uebel Sphilis wittern, wird man doch
gestehn, daß diese unseelige Krankheit ungemein verbreitet und viel gestaltig vorkömmt, und daß sie eigener Vorträge wohl werth ist, die ihr auch bereits
an den meisten Universitäten zu Theil geworden sind.

Breslau im December 1815.

bisher ielen verlagenen Abege abweicht, eigene Absheitehning und Ersahrung geleiter haben, dies geleiter haben, dies geleiter haben, dies geleiter haben, dies Leiperre, dan der Abertung des Lucckfilbert, den Benchichten der Lucchfilbert, den Benchichten der Abertung des Lucckfilbert, den lichen Ernsteinung destellten und ahner lichen Ernsteilen Abertung destellten Auflichen aber nech sind prest frühert früher Inchesten abserner, aber nech nicht im Zusämmenhange vorgebenrer, aber nech nicht im Zusämmenhange vorgebenrer, aber nech

Db die Spohilis in alfen ihren Gestalrungen ein

en, ver biefes Convolut ven

Der Verfasser.

Remtheicesormen in ollen feinen Deziehungen und

ueberficht

Willheifungabie des Crinores des Miganern

Dor fonnikeite Gripper im Bernattniffe ju an

vern ebm abulichen Kormen

Erfcheinungen eines iehr

188 13

9, 19,

os 2

S. 21.

\$22.

50 03

在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

8

9.

.8.

Seite

81

22

10

(E.

des Inhalts diefes Lehrbuchs.

200	Einleitung.	.124.
1.8	der bereite beging bereite	Geit
§. I.	Definition der Luftfeuche	·òr
§. 2.	Die verschiedenen Benennungen	1
S. 3.	Alter Diefer Rrantheit .	2
§. 4.	Urfprung berfelben wir bed unmon .ollen inefne 3	-83
S. 5.	Muthmagliche Urfachen bes Uebergangs anderer	.91
#35	Rrantheitsformen in die Luftfeuche .	5
§. 6.	Die erften Erscheinungen ber Luftfeuche	5
S. 7.	Die Ratur des venerischen Stoffes	6
§. 8.	Empfanglichkeit fur die venerische Anfteckung .	8
9. 9.	Wege des Unfteckungsftoffes	8
§. 10.	Das Wie der Wirkung des Ansteckungsftoffes	10
S. 11.	Ueber die Verhütung der Luftfeuche im Allgemeinen	13
§. 12.	Eintheilung der Luftfeuche	14
17	Tehandlung der Prostatisis	-85
	Primitive Syphilis.	-65
§. 13.	. Formen der primitiven Syphilis	15
15	Report to the Continue of the Annualization of Co.	4-
54	Vom Tripper.	.14
\$. 14		15
S. 15		16
§. 16		16
§. 17	. Sig bes Trippers 104417 896 natisdianibile?	17

		Geite
S. 18. Mittheilungsart !	des Trippers ben Mannern	18
S. 19. Der fophilitische	Eripper im Berhaltniffe gu ans	
dern ihm ähnliche	en Formen	20
S. 20. Natur des Ausflu	iffes benm Eripper .	22
S. 21. Berhaltniß bes	Erippers ju ber fefundairen	
Spphilis .	Des Inhalts Stefes	23
S. 22. Gemehnlicher Ber	lauf bes Trippers .	24
S. 23. Ericheinungen eine	es fehr heftigen Trippers .	. 25
5. 24. Allgemeine Erflar	ung diefer Bufalle .	29
S. 25. Prognofe benm T	ripper	31
S. 26. Die allgemeine Se	eilart des Trippers	33
	orschriften fur die speciellen Be:	
	afte biefer Crantbeit. etfle	
	ien des Trippers and	52
	Durbmahliche Utelacher persed	52
	wulft am Hoden	
S. 31. Prognose ben der	Epididymitis	56
	ath, negeliouen ses untamenich	57
	enhodens den ge. molani . mo	61
	lebenbodens	63
The state of the s	Epididymitis	68
	orfieher:Druse	
	ntgundung ganlis . nis	70
	rostatitis	71
	Entftebung ber fonfensuellen	
	Sormen bee primiriven Sophili	
S. 40. Die Verhersagung		74
	verhaltung	
	rhoica arreging and affine to-	
	ser Iritis	
	dieser Iritis	
S. 45. Folgefrankheiten be	es Trippers	85 .

strad	Enr Say Williams	Geite
§. 46.	Die Erscheinungen ber Medorrhoea chronica	86
§. 47.	Das urfachliche Berhaltniß bes Machtrippers	87
S. 48.	Rennzeichen ber verschiedenen Rachtrippers	
INI	Formen	89
\$. 49.	. Bermechslung bes Machtrippers mit andern	17.3
	Formen	91
\$. 50.	. Worhersagung benm Nachtripper	91
§. 51.	. Allgemeine Seilanzeige ben bem Rachtripper	92
§. 52.	. Behandlung des von Erichtaffung herrührenden	
	Nachtrippers	93
\$. 53	. Therapeutische Borschriften fur die burch frank,	
MAT	hafte Reigbarkeit bedingte Nachtripperform .	101
\$. 54	. Beilverfahren ben dem durch ortliche Storungen	.85.2
	bedingten Nachtripper	103
\$. 55	. Das Jucken der Eichel	107
\$. 56		108
5. 57		108
S. 58		109
\$. 59		en:
A. 24	Robre: Verengerungen	111
§. 60		
	Sarnrohre vorbereitet und begunftigt werden	
§. 61	. Vorhersagung ben der Berengerung der harn:	
	Röhre	113
	. Kurmethode der Verengerungen der Harnröhre	114
	. Ein Geschwür in der harnröhre	116
\$. 64	. Ueber die suphilitische Ratur ber Geschwüre in	1 38 5
935	der Harnröhre	171
	. Ursachen des Geschwurs in der harnrohre .	
	5. Vorherfagung benm Geschwure in der Harnrohre	118
	7. heilung des Geschwürs in der harnrohre .	119
\$. 68	3. Berhartung der Prostata	120

Stite		Geite
S. 69.	Diagnofis diefer Berhartung	120
S. 70.	Urfachen Diefer Berbartung	121
S. 71.	Prognose ben der Proftatocele	121
S. 72.		122
§. 73.	Der weibliche Eripper	124
S- 74-		
10	mobnlichen weiffen Fluffe .	126
S. 75.		127
S. 76.	Rur des weiblichen Trippers	128
26.33	Mam Gichaleninnanthom	
	Vom Eicheltripper.	5. 53.
S. 77.	Bestimmung und Berlauf ber Form	131
S. 78.	Urfachliche Momente bes Eicheltrippers	132
S. 79.	Unterschied swifchen einem fophilitifchen und nicht	
107	fopbilitifchen Gicheltripper and and and	132
S. 80.	Prognose ben dem Eicheltripper an. Danied	133
§. 81.	Rur bes Eicheltrippers	134
toi ,	" THE COMMERCIAL SER ASSESSED AND	S. 28.
107	Vom venerischen Geschwüre ober Schanker.	9. 59.
S. 82.	Bestimmung bes venerischen Gefchwurs	136
S. 83.	Beschreibung der Zufälle	137
S. 84.	Die Merfmale welche ben Schanfer vor allen	
	andern unterfcheiden	138
S. 85.	Befondere Ericheinungen am Schanker	142
S. 85.	Wefen des Schankers	144
S. 87.	Prognose ben bem Schanfer	145
§. 88.	Rur des Schankers	147
\$. 89.	Nachfur bes Schanfers	. 153
§. 90.	Begriff ber Phimofe	154
§. 91.	Berlauf ber Phimose	154
§. 92.	Die urfachlichen Momente ber Phimofe	156
S. 93.	Prognosis ben ber Phimosis	157

			Geite
5.	94-	Rur der Phimofe	158
S.	95.	Beschreibung ber Paraphiniose	162
S.	96.	Urfachen der Paraphimsfe	163
S.	97.	Prognofe ben ber Paraphimofe	164
S.	98.	Behandlung ber Paraphimofe	165
S.	99.	Begriff bes Bubo	167
S.	100.	Verlauf des Bubo	168
S.	101.	Rabere Bestimmung bes Bubo	169
§.	102.	Die urfachlichen Momente bes Bnbo .	170
S.	103.	Prognose ben dem Bubo	173
S.	104.	Behandlung bes Bubo	174
		Secumbaire when confecution Sunkilia	
		Secundaire ober consecutive Syphilis.	161 3
S.	105.	Begriff der fecundairen Sphilis	183
§.	106.	Die Beit bes Ausbruchs ber fonfecutiven	
		Spphilis	184
S.	107.	Mahere Beschreibung ber fecundairen Syphilis	185
S.	108.		186
S.	109.	Die fopbilitischen Erscheinungen ber zwenten	
		Reihe	194
S.	110.	Das Wefen der Lues	200
		Heber die Lues larvata .	203
		Die Prognofis der Luftfeuche	207
S.	113.	Die Kur der Lues	211
S.	114.	Unfichten über die Wirfung bes Queckfilbers im	
		Allgemeinen	213
S.	115.	Heber die befondere Wirfung ber verschiedenen	
		Merkurial Bereitungen	216
S.	116.	Die verschiedenen Methoden bas Quedfilber	301.3
		angumenden .	217
S.	117.	Die jur Seilung der Cyphilis gewöhnlichen	
		Merkurial: Halbkalke	220

331303		Geite
5. 118.	Die Merkurialfalge	224
§. 119.	Die vollkommenen Merkurialkalke .	235
§. 120.	Heber die Ruckfichten auf bie erfte Reihe ber	
398 .	einzelnen Gestaltungen der fecundairen Sphilis	. 6
591	im Allgemeinen	238
§. 121.	Specielle Behandlung ber fophilitischen Pufteln	238
§. 122.	Spezielle Borfchriften fur die Flede .	240
§. 123.	Dertliche Behandlung ber fophilitischen Entjund:	
041	lichfeiten	241
§. 124.	Behandlung ber confecutiven Geschwure .	242
§. 125.	Behandlung der Schrunden	245
§. 126.	Dertliche Behandlung der fophilitischen Auswüchse	246
§. 127.	Therapeutische Borichriften fur die ortliche Be-	
SET	handlung aller in den Anochen hervorfiechenden	
	fophilitischen Gestaltungen im Allgemeinen	248
§. 128.	Therapeutische Rucksichten auf die Knochenge-	
381	schwülste	250
§. 129.	Spezielle Behandlung ber venerischen Knochen-	
	fcmergen	251
§. 130.	Spezielle Behandlung ber sphilitifden Caries	252
§. 131.	Spezielle Betrachtung der durch die Spphilis	
	herbengeführten Anchylofis und Defteofarcofis	
	in therapentischer hinficht	257
§. 132.	Heber die Merkurial Diat	258
§. 133.	Von ber Salivation	262
§. 134.	Bon den Contraindicationen fur den Gebrauch	
	bes Quecksilbers	268
S. 135.	Nachkur der Merkurial, Behandlung .	275
§. 136.	Mittel, welche außer bem Queckfilber gegen die	
1/15	Luftseuche empfohlen worden sind .	277.

Einleitung.

§. I.

Definition.

Unter Lues venerea (Lustseuche) verstehen wir ein Aggregat von chronischen Krankheitsformen, welches durch eisnen Ansteckungsstoff bedingt wird, durch die außere Oberstäche in den Organismus eingeht, und mit Zerstörungen der normalen Gebilde und Erzeugung krankhafter Metamorphosen verläuft.

§. 2.

Verschiedene Benennungen.

Da der unreine Benschlaf die gewöhnlichste Art der Anssteedung und die am häusigsten vorkommende veranlassende Urssache der Krankheit ist: so werden die gesammten Erscheinungen dieses Uebels unter dem Namen Lust seuche (Lues venerea) am besten begriffen. Das Uebel heißt auch Syphilis, eine Benennung, die auf die mannigsaltigste Art abgeleitet wird. Einige übersehen das Wort aus dem Griechlisschen Tuv und Pilis Cum amore, andere leiten es von

suillus. Fracastort endlich derivitt es von einem hitten Syphilus, welcher der Fabel zufolge die Sonne gestäftert haben, und von dieser dasur zur Strase mit der Lues heimgesucht worden seyn soll. Die Namen Malum hispanicum, Morbus gallicus und Mal de Naples beziehen sich auf das muthmaßliche Vaterland dieser Krantheit.

§. 3.

Alter der Krankheit.

Es ist gewiß, daß mehrere Rrankheiteformen welche jett die Lues constituiren so alt sind, als das menschliche Geschlecht; es scheint aber, daß in den frühsten Zeiten diese Uebel theils sporadisch, theils auch endemisch und in andern oft noch fürcheterlichern Complicationen geherrscht haben; der Aussatz in den frühern Jahrhunderten scheint eine dieser Complicationen geswesen zu senn. Fast zu Ende des 15 Jahrhunderts und zwar 1493, nach Fulgosius 1492, ist die Seuche allgesmeiner, gesonderter und eigenthümlich geworden; woben sie auch ein größeres Austeckungsvermögen erhalten zu haben scheint.

Im oben genannten Jahre war es, wo Paris, Maps land, Berlin, halle und mehrere Stadte Europens von dieser Seuche jugleich heimgesucht wurden.

§. 4.

Urfprung derfelben.

Die Meinungen über den Ursprung der Luftseuche find fehr verschieden; die größten Schriftsteller welchen darinn von eins ander ab; doch laffen fich alle darüber bestehenden Unsichten auf vier besonders herrschende zurückführen, und zwar:

- 1) daß die Luftseuche eine sehr alte Krankheit, und keinese weges zu Ende des 1 f. Jahrhunderts ausgebrochen ift.
- 2) Daß mehrere Krankheiten zu Ende des 15. Jahrhunderts in die Lues entartet sind.
- auf dessen zwenter Reise aus Amerika nach Europa gebracht worden ist. Derselbe landete den 4. März 1493, daher heißt auch dieser Tag bei Boerhave und Ustruc der dies fatalis. Wäre dies Seuche wirklich an diesem Tage nach Europa gekommen, so wurde derselbe allerdings zu den heillosesten des Kalenders gehören.
- 4) Daß die Luftseuche von den aus Spanien vertriebenen Juben (Maranen genannt) nach Italien gebracht und von da über bas übrige Europa verbreitet worden ift.

Für die erfte Meinung stimmen besonders Selmont, Zacutus Lusitanus, Daniel Turner, Harris, und mehrere andere, auch giebt es viele Stellen in den Schriften der Alten, welche darauf Bezug haben. Hierher gehört auch daß die Lustseuche eine Rrankheit sey, die nur alle tausend Jahre ausbricht, milder wird und wieder verschwindet. Daher erklart es Michaelis, daß sie zu Moses und Hiobs Zeiten da gewesen, zur Zeit des Hippocrates aber wieder gar nicht bestannt gewesen sey.

Die zweyte Meinung wird besonders von Nicolaus Leonicenus, Sanchez, Natalis, Montesaus rus vertheidigt. Hierher gehören auch diejenigen, welche in den verschiedenen Constellationen der damaligen Zeit den ersten Grund der Lues, und diese Krankheit überhaupt als das Produkt astralischer Einflüße ansehn.

Den amerikanischen Ursprung der Lustseuche vertheidigen Leonhard Schmaus, Joh. Erato, Joh. Ferne, lius, Pet. Lowe, Boerhave, Freind, Friedrich Hoffmann, Aftruc, B. Nobertson, van Swieten, Sirtanner, welcher lettere noch eine eigene Hppos these über die Entstehung dieses Uebels aufgestellt hat.

Die Meinung, welche die Maranen für die Verbreiter biefer Seuche erklärt, haben Hensler und Gruner durch ihre Autorität besonders begründet. Eine unbefangene Anssicht der Krankheit und ihrer Erscheinungen spricht für die zweyte Meinung, daß nämlich die Seuche um die oben ers wähnte Zeit durch Entartung anderer Krankheiten die bestimmte und eigenthümliche Form erhalten hat.

S. 5.

Muthmaßliche Urfachen diefes Ueberganges.

Die Constitutio aeris und die Constitutio terrae scheinen keinen unbedeutenden Antheil an dem Uebergange dies ser Krankheitssform gehabt zu haben. Die Spidemie, die das mals so bösartig unter den Heeren wüthete, die Dazwischenskunft der Maranen in Italien, unter denen gewiß endemische Formen herrschten, erklären, wie es möglich wurde, daß in den dortigen Gegenden der erste Uebergang geschah. In jedem Falle hatte die Lustseuche schon vor dem Ende des Jahres 1494 ihre bestimmte Form. Das eben Gesagte und die in dieser Zeit beobachtete Veränderung der aussähligen Symptome nach Entstehung dieser Krankheit scheinen zu beweisen, daß der Aussah die Form sey, welche unter einer andern Gestaltung sich als Lussah die Form sey, welche unter einer andern Gestaltung sich als Lussah die zeigte.

§. 6.

Die erften Erscheinungen der Luftseuche.

Wir wissen ganz gewiß, daß die Lustseuche, ben ihrer ersten Erscheinung, mit furchtbarer Heftigkeit ganze Lander verwüstete; weniger gewiß sind uns die Gründe, warum in uns
fern Tagen diese Seuche gelinder einhergeht. Die verfeinerte Lebensart, eine höhere Moralität und die strengere Behutsams keit tragen allerdings etwas dazu ben. Auch darf in den heus tigen Tagen die wesentlich bester gewordene Hellart nicht übers sehen werden. Noch kömmt die Erfahrung hinzu, daß die Länge der Zeit almählig die Heftigkeit der Formen mildert, welche urs sprünglich bösartig waren. Einige vermuthen, daß der Hinzutritt des Trippers eben zu der größern Gelindigkeit der Form bengestragen habe. Dieses alles voraus geseht darf doch nicht übers sehn werden, daß eine sich selbst überlassene oder nachtheiligen Einwirkungen Preis gegebene Lues auch heute eine höchst trautige Richtung erhalten kann.

English and tenest that the least thought

Die Ratur des venerischen Stoffes.

Die Unterschiede, welche zwischen den Begriffen eines Giftes und eines Ansteckungsstoffes herrschen, und welche zwisschen Contagien und Mlasmen von der Schule gemacht werden, können als bekannt übergangen werden. hier nur so viel; der venerische Ansteckungsstoff ist ein wahres Contagium, welches nur durch unmittelbare Berührung auf empfängliche Stellen übergestragen werden kann; verstüchtigen läßt es sich nicht. In der ältesten Zeit hielt man den venerischen Ansteckungsstoff sur einen humor melancholicus praeternaturalis, welcher die Eigenschaften besisen sollte die Wärme des Körpers zu vermindern, die Theile auszutrocknen, und sich mit dem Blute

bis auf den heutigen Tag noch nicht ganz aufgegebene Unsicht über das Wesen des Stoffes nimmt an, daß das eigentliche wirksame Prinzip in dem oben genannten Stoffe eine Saure sep. Franciscus de la Boe, Cochburn, Aftruc, haben diese Idee auch sestgehalten, Horn und Sirran, ner sie früher zwar geäußert, aber später aufgegeben. In der neusten Zeit hat Besnard dieser Ansicht besonders gehulz digt. Die für diese Meinung aufgestellten aber nicht haltbarren Gründe sind folgende:

- a) weil der Tripperschleim und der Eiter des venerischen Ge-
- b) weil der venerische Stoff die Lymphe verdickt, und die Knochen gleich jeder andern Saure zu erweichen vers mag;
 - c) weil das flüchtige Laugensalz als ein wichtiges Mittel gur Seilung der Luftseuche betrachtet werden kann.

Peter Desault, Weber und einige andre erklarten die Unsteckung durch kleine Thierchen, welche in dem ausgesons derten Unsteckungsstoffe sich befinden, und die Theile, auf welche sie übertragen werden, zernagen und entzünden sollten. Die Pathologia animata hat überhaupt wenig Slück gemacht, am wenigsten wird dieselbe zur Erklarung der syphilitischen Unssechung bentragen.

Eben so wenig Licht wird bie Erklarung ber Neuern in biese dunkle Region bringen; diese Ansicht versucht die Wirkung des Ansteckungsstoffes durch die entfernten Bestandtheile desselben (Stickstoff und Rohlenstoff) zu erklaren.

§. 8.

Empfänglichkeit für die venerische Unftedung.

Der menschliche Organismus hat die eigenthumliche Ems pfänglichkeit für diesen Stoff, und die Resultate seiner Eins wirkung; doch ist diese Empfänglichkeit nach der Individualls tät vielsach modifizier, mehr oder weniger zurückgedrängt. Nur wenige Benspiele von venerischen Formen giebt es im Thierreiche. Banford sucht die Möglichkeit der Ansteckung ben den Thieren zu beweisen, und Paw erzählt einige hierher gehörige Benspiele von Hunden in Südamerika. Die neusten von Attenhoser in St. Petersburg darüber angestellten Bersuche haben einiges Interesse.

§. 9.

Wege des Unstedungsstoffes.

Die unmittelbare Berührung des Ansteckungsstoffes ist die oberste Bedingung der venerischen Infection, daher ift der Bepschlaf der gewöhnlichste Weg, auf dem der Kranke zur Unssteckung gelangt. Doch kann auch jede andere unmittelbare Berührung eines andern Theils dazu führen. Kinder können benm Durchgange durch die Scheide angesteckt werden; wollüs

stige Kuffe können leicht die veranlassende Ursache bieser Ansteckung seyn. Durch das Saugen der Kinder ist eine wechselseitige Ansteckung möglich, eben so können Betaskungen vermittelst einer Hand, an welcher ein venerisches Geschwür offen ballegt, die Krankheitosorm herbensühren. Walch erzählt ein Benspiel von einer Hebamme, die auf eben erzwählt ein Benspiel von einer Hebamme, die auf eben erzwähnte Art über 50 Personen ansteckte. Ein ähnliches, in seinen Folgen surchtbares Benspiel ereignete sich vor einigen Jahren in einer Provinzialstadt Schlesiens, wo die ehrwürstigsten Familienmütter der Stadt binnen kurzer Zeit durch eine übrigens sehr gute Hebamme, welche von einer venerischen Persson an dem Zeigesinger der rechten Hand den Ansteckungsstoff erhalten, und das dort um sich fressende Geschwür vernachlässigt hatte, angesteckt und mehrere von ihnen in ein namenloses Elend gestürzt wurden.

Bundarztliche und zahnärztliche Instrumente konnten ebenfalls die Unsteckung bewirken, wie van Swieten vorsätiglich fürchtet, wenn die dazu gehörige Unreinlichkeit des Instruments bei einem Bundarzte vorausgeseht werden konnte. So sind auch gemeinschaftliche Trinkgeschirre oft verdächtig gesworden; vorzüglich hat Gruner den Abendmahlskelch, und gewiß nicht ohne Grund beschuldigt. Ob die Abs und Ausssonderungen des Körpers den venerischen Ansteckungsstoff mitstheilen, wird mit Recht bezweiselt; ben gemeinschaftlichen Betten und Kleidungsstücken aber sind doch Umstände sehr denks

bar, wo eine solche Möglichkeit wirklich statt finden kann, uns geachtet Girtanner dieselbe laugnet. Hierher gehört auch der hochst ekelhaste Gebrauch gemeinschaftlicher Zahnbursten. Ben der Untersuchung in hinsicht der Stattgefundenen Unstelltung muß der Arzt auf seiner hut sepn, weil ihn oft Kranke, wo selbst ihre außern Verhältnisse die Zurückhaltung nicht rechtsfertigen, über die erste Entstehung ihres Uebels zu täuschen suchen.

S. 10. and the cine at miles ?

Das Wie der Wirkung des Ansteckungsstoffes.

Auf mannigfaltige Weise hat man es zu erklaren vers sucht, wie der Ansteckungsstoff auf den Körper wirke; die frühsste Unsicht betrachtete den Ansteckungsstoff als eine scharfe, äßende Flüßigkeit, welche dem Blute bengemischt, die selbsistäns dige Form erzeugt. Diese Ansicht schien durch die Pusteln und Geschwüre angeregt zu seyn, von denen man annahm, daß dadurch der Stoff aus dem Körper gehe; was zurückbleibe, werfe sich auf die Nerven und erzeuge die Schmerzen. Eine zwepte, den damals noch wehenden Galenischen Geist athmende Lehre suchte ben der Lues das vorzüglichste Leiden in der Les ber, wohin der Ansteckungsstoff dringen sollte. Der Grundsstoff des Gistes war, wie oben schon bemerkt worden ist, ein widernatürliches Phlegma, welches die körperliche Wärme vers mindern und die Theile austrocken sollte.

Boerhavens Ansicht erklarte das Resultat der venerisschen Ansteckung durch ein Verderbniß des Zellstoffes, wohin die Ansteckung gelangt. Wenn auch diese Ansicht die Erscheisnungen nicht ganz zu erklaren vermag: so zeigt sie doch Boers havens große Erfahrung; kein Theil des Organismus leidet so entschieden durch die spehilitische Ansteckung, als der Zellstoff.

Diejenigen, welche mit &. de la Boe Sylvius ten venerischen Stoff für eine Saure hielten, erklarten die Er: scheinungen aus einer badurch verursachten Gahrung.

Die Ansicht Hunters, welcher eine spezifische Reinigung als causa proxima der spehiltischen Krankheit ansah, wurde von vielen neuern Schriftstellern angenommen, und von Fritze in seinem Handbuche besonders versochten. Diese Ansicht ers klärt ebenfalls nichts, und immer bleibt eine petitio principii zurück.

Eben so wenig erklart die Theorie welche Browns Unschänger aus den Grundsaben ihres Meisters ableiteten. Durch die Intensität der Einwirkung des Ansteckungsstoffes sollte eine indirekte Schwäche herbengeführt werden, und in dieser das Wesen der Lustseuche liegen. Mag immerhin in dieser Lehre die Idee des Organismus am tiefsten aufgefaßt seyn; die anssteckenden Formen wird sie nie erklaren, well sie das qualitas tive Verhältniß, als das hier besonders ergriffene, ganz über; sieht.

Mit der Erklarung des Wie der Wirkung geht es wie mit der Erklarung vieler andern Erscheinungen in dem Kreise der lebendigen Natur. Die scharssinnigste Theorie kann hier manches dunkel andeuten, aber nie den eigentlichen Urgrund gnügend erklaren. Was wir durch anhaltende und unbefansgene Beobachtung über diesen Gegenstand gewiß wissen, läßt sich auf folgende Sase zurückbringen:

Der Ansteckungsstoff ergreift zusörderst die Stelle, auf die er einwirkte; von dieser Einwirkung leidet zuerst das lyms phatische System. Rurze Zeit nachher wird das irritable Sysstem mit ergriffen, und eine entzündliche Erscheinung an der Stelle der Ansteckung kündigt das Hervortreten der Form an. Später erst, und nur durch hervorgerusene Mitleidenschaft äußert der venerische Stoff seine Wirkung in der sensibeln Sphäre.

Der syphilitische Stoff wirkt am entschiedensten auf den Zellstoff, den er zu entmischen und zu vernichten strebt; dages gen veranlaßt der syphilitische Stoff luxurirende Gebilde vers schiedener Theile. Alle Erscheinungen der Lues sprechen für die Wahrheit dieses Sahes.

Die Wirkung des venerischen Stoffes erscheint nicht abe solut, sondern sie ist nach der Verschiedenheit der Individualistät des Organismus verschieden; daher Schmidt ein mahres Princip ausstellt, wenn er sagt: daß der Arzt die richtigste Diagnose dieser Krankheit macht, welcher die Individualität des sphillitischen Kranken am richtigsten heraushebt.

§. 11.

Ueber die Verhütung der Luftseuche im Allgemeinen.

Da ber fophilitische Stoff nur durch unmittelbare Beruhrung eines empfindlichen Theile auf ein zwentes Indivis duum übertragen wird: fo fann alles, was unmittelbar nach ber Statt gefundenen lebertragung geschieht, um den neu empfangenen Stoff meggufpublen ober ju gerftoren, Dugen ftife ten, wenn es gang die beabsichtigte Wirfung leiftet. Gine unvollkommene Erreichung Diefer Abficht ift in einem folchen Falle so gut, als gar feine. Sierzu werden besonders forgfaltige Baschungen der dem Unftedungeftoffe ausgesehten Theile mit Seifenwaffer ober mit Scharfen Muftosungen, bas Urinlaffen unmittelbar nach dem Benfchlafe und bergleichen mehr empfohe Huch lagt es fich nicht laugnen, daß es Mittel giebt, Die len. durch oftere Unwendung die Empfänglichkeit der Oberflache abs flumpfen, und baber den Organismus für die Mufnahme bes Unftedungeftoffes weniger geneigt machen. Dazu empfiehlt man den außerlichen Gebrauch bochft verdunnter Mineralfaus ren und verschiedener Queckfilberbereitungen, sowohl in Basche maffern als auch in Galbenform, bas Beftreichen ber Theile mit Del oder Fett por dem Benichlafe und die Unwendung mehrer rer Mittel, benen insgesammt nicht gar juviel ju trauen ift. Mur der ift ficher gu preifen, den bie Datur bie gwar fel, tene, aber boch durch mehrere unbefangene Erfahrungen ers wiesene Unempfanglichfeit gegen diese Unftedung verlieben bat.

§. 12.

Gintheilung der Luftfeuche.

Da die Lues, wie in einem der vorhergehenden Paragraphe erwähnt worden ist, immer durch eine entzündliche Form sich als Krankheit für die Gesammtheit des Organismus ankündigt, so ist durch diese Erscheinung die oberste Eintheitung der Krank, heitesform gegeben. Man nennt nämlich diese ersten Erzscheinungen primitive Syphilis, auch mitgetheilte; und zuweilen auch Local, Syphilis; lettere Benens nung kann jedoch nur insofern eine Bedeutung haben, als sieht. Ein im strengsten Sinne und ausschließlich auf einen Theil beschränktes Local Leiden giebt es im Organismus, in dessen integrirenden Theilen ein und dasselbe Prinzip belebend waltet, nicht.

Die nach den ersten Zufällen eintretenden Erscheinungen der venerischen Form nannte man im Verhältniß zu den erstern secundaire Sphilis, auch vertheilte; und im Sesgensaße zur Local, Sphilis, auch Universal, Sphilis, wohl auch constitutionelle Lues. Wir werden die Eintheilung in primistive und secundaire Sphilis beybehalten.

Primitive Syphilis.

S. 13.

Formen der primitiven Syphilis.

Die Formen der primitiven Syphilis sind der Tripper, bas venerische Geschwür und die Entzündung der Eichel. Man hat die sich als Inguinalbubo in der Leisstengegend gestaltende Drüsen: Entzündung für eine primaire Syphilis Form anzunehmen versucht; indessen ist kein einziger Fall gehörig erwiesen, wodurch dargethan würde, daß ein Bubo unmittelbar nach einem unreinen Benschlafe, ohne daß die oben genannten Formen vorangegangen wären, erschienen ist, und die secundaire Syphilis zur Folge gehabt hat. Oft sind zwen primitive Formen das Resultat einer Ansteckung.

Bom Eripper.

§. 14.

Begriff bes Trippers im Allgemeinen.

Unter Tripper (Medorrhoea) verstehen wir im MIsgemeinen jeden Ausstuß einer Flüßigkeit von verschiedener Farbe und Consistenz aus den Zeugungstheilen bepderlen Geschlechts.

— Jeder anomale Ausstuß von einer Schleim absondernden Fläche wird in sensu laxiori auch Tripper genannt; so giebe es einen Mastdarmtripper, Nasentripper und Augentripper; hier ist jedoch nur von dem oben desinitren Ausstuße aus den Genitalten die Rede.

§. 15.

Verschiedenheit der Benennungen.

Man hat dieser Erscheinung verschiedene Namen bengestegt, die leicht zu Irrungen Unlaß geben können. Der Name Gonorrhoea (Saamenfluß) ist durchaus für diese Form unpassend; Leucorrhoea (weisser Fluß) ist unbessimmt, ein gerechter Vorwurf, der auch die Benennung Blennorrhoea (Schleimfluß) trist. Ploucquet hat den Namen vom Priaps Schenbilde entlehnt und Phallorrhoea vorgeschlagen; Schmidt braucht für den Tripper der Männer nicht mit Unrecht den Namen Urethritis, sur den der Weiber Elytritis.

S. 16.

Die urfächlichen Momente Diefer Form.

Ben dem Tripper lassen sich die drey Reihen von Ursaschen ebenfalls nachweisen, die bey jeder Krankheitssorm mehr oder weniger deutlich dargethan werden können. Die Causa praedisponens dieser Form muß in einer hohen Empfängs lichkeit der innern Fläche der Urethra bey den Männern, und der Scheide bey den Weibern gesucht werden. Die Causa occasionalis ist jede reizende Schädlichkeit, welche die Uresthra zu entzünden vermag; ein Tropfen Salmlakgeist und ein Tropfen des venerischen Stoffes wirken in Hinsicht der ersten wahrnehmbaren Erscheinungen der Entzündung gleich.

Die causa efficiens ift Entjunblichfeit ber innern Schleim absondernden Saut der Urethra und ber Scheide, beren nothwendiges Probutt ben gelinderm Berlaufe eine anomale Absonderung ift. Mus bem oben Gefagten erhellt iftens, baß ben fehlender entschiedener Pradisposition jum Eripper, von einem Individuo ein unreiner Benichlaf ungeftraft ausgeubt werben tann, mabrend ein ober mehrere andere auf bemfelben Dege wirklich angestecht werben; ztens folgt baraus, bag bet Eripper in Sinficht feiner veranlaffenden Urfache fo vielfach fenn fann, ale es reigende Schablichfelten giebt , welche ents weder von außen eingebracht ober auch durch innere franthafte Thatigfeit und dysfratische Entmischung von innen nach außen Die Rlache ber Sarnrohre und der Scheibe in Entzundungszus fand verfeben tonnen. Daraus fann man fich bie metaftatis Schen Eripper aller Urt am beften erflaren. Endlich folgt in Hinficht Der causa efficiens, daß die gange Korm bes Etippers ftets als Entjundung betrachtet werden muß, wie bies ben ber Erflarung ber Erfcheinungen noch naber entwickelt werden foll.

fossa ugricularis dengen can . Durch Neluriptica mid

Gis bes Trippers.

Der eigentliche Sit bes Trippers ben ben Mannern ift zwar im allgemeinen die Urethra, weil feine Stelle barinn vor. handen ift, die nicht entzündet werden konnte; boch scheint (was

der Italiener Terraneus im Jahre 1709 zuerst lehrte) die nachensormige Grube diejenige Stelle zu sepu, welche durch ihre Lage und durch ihre Struktur zur Aufnahme des reizenden Stoffes besonders geeignet ist. Den Sis des Trippers ben Männern in den Hoden, oder mit Mead in den Cowperschen Drusen anzunehmen: sind längst verjährte und widerlegte Meisnungen. Ben Weibern ist der Sis in der Tiefe der Scheide, und zwar in ihrer obern Segend, und nur in sehr seltnen Fälsten ist die Harnröhre mitergriffen. Bell hat daher offenbar Unrecht, wenn er ben Weibern den Sitz des venerischen Trippers in die Harnröhre, und den des gutartigen Ausstussies (Leucorrhoea) in die Scheide sest.

8. 194 8nu siddunacht ins odel 8 916

Mittheilungsart des Trippers ben Mannern.

Eine wichtige Frage, welche die Rosologen sehr beschäfe, tigt hat, ist in Hinsicht der Entstehung des Trippers ben Man, nern die, wie der den Tripper verursachende Stoff besonders während dem Benschlase in die Harnröhre, und zwar bis in die sossa navicularis dringen tonne. Durch Resorption und Wiederabsehung des Ansteckungsstoffes, wie Eruitschank meynt, läßt sich die Erscheinung nicht erklären; eben so wenig läßt es sich mit Nisbet annehmen, daß während dem Benschlase ein Theil des auszusprissenden Saamens in der Harnschlese, und sich mit dem unreinen Schleime aus der gebre zurückbleibe, und sich mit dem unreinen Schleime aus der

Mutterscheite vermischen, und ben der Erschlaffung des Gliedes in die Harnröhre treten könne. Diese Ansicht ist schon des, wegen ungegründet, weil die Erfahrung lehrt, daß auch ohne Ejaculation des Saamens Ansteckung möglich ist. Mehrere, denen das Vordringen des Ansteckungsstoffes unerklärdar schien, zäugneten dieses ganz und behaupteten, daß der Ansteckungs, stoff an der Oeffnung hängen bleibe, und die Zusälle im Ins nern der Harnröhre blos konsensuell sind, welches aber offens bar unrichtig ist.

Die Annahme einer Contraction der Harnrohre, wo, durch der im Benschlafe aufgenommene Stoff gleichsam bis zur sossa navicularis fortgeschoben wird, und sich dort hinein, senkt, hat etwas für sich, und so geringfügig auch eine solche zusammenziehende Bewegung senn mag, so ist sie doch nicht ganz zu läugnen, und gewinnt durch den von Weickard ans geführten und von Walch nacherzählten Bersuch, den einige Wüstlinge an sich selbst angestellt haben, noch mehr Wahrschein, lichkeit. Nachdem sie nämlich an dem in laue Milch getauchten Gliede die Manustupration vollendet hatten, bemerkten sie etz nige Zeit nachher beym Urinlassen, daß vor demselben einige Tropsen Milch ausstossen.

Die Mittheilungsart des welblichen Trippers ift leicht erklärbar; hier soll überhaupt zuerst vom mannlichen die Rede seyn.

§. 19.

Der sphilitische Tripper im Verhältniße zu andern ihm ahnlichen Formen.

Schon oben ist erwähnt worden, baß jede von außen an, gebrachte reizende Schädlichkeit, und von innen geweckte frank, hafte Thatigkeit, einen tripperartigen Ausfluß erzeugen können; es muß nun auch erwähnt werden, daß diese Ausslüffe besons ders vom Anfange ihrer Entstehung in Hinsicht ihrer Erschetznung schwer zu unterschelden sind.

Sartnäckigkeit der Erscheinungen, besonders aber ein heftigeres Brennen benm Urinlassen, und gewöhnlich vorzüglich zur Nachtsgelt sich einfindende Erectionen des Gliedes, eine langere Dauer der Form, sind die Data, aus denen im Verlaufe des Uebels mit einiger Wahrscheinlichkeit auf seine spehilitische Natur gerschlossen werden kann.

Der sogenannte gutartige Tripper zeichnet sich durch seine Gelindigkeit, besonders durch die Abwesenheit der benden zus lest genannten Erscheinungen aus. Den Blasenschleimfluß, Catarrhus vesicae, unterscheidet theils die größere Geslindigkeit der Zufälle, theils der Umstand, daß der Schleims ausstuß während dem Urinlassen am stärksten ist.

Seit Balfour hat man die suphilitische Ratur bes Erippers geläugnet, und aus hochst irrigen Grunden behaup,

tet, bag es feinen rein fophilitifchen Tripper gebe, und Der Chancreftoff mefentlich bon bem Tripperftoff verschieden fen. Schon geschichtlich wird erwiesen, daß anfanglich die Luftfeuche ohne Tripper (beffen Erifteng ohne fuphilitische Beziehung man feit bem frubften Alterthume fannte) einherging, und daß fes: terer einige Decennien fpater bingutrat, woraus einige, wie fcon oben ermabnt worden ift, die fpater eingetretene Gelia. digfeit des venerifchen Uebels ju erflaren fuchen. Aftruc, Undre, Smediaur, Monteggia, Sarrifon, Sunter, Callerter, Ochmidt und Langneau haben burch vieljahrige Erfahrungen die fophilitifche Datur des Erips pers erprobt. Sarrifon brachte den Eiter eines venerischen Geschwars in die Sarntohre und fah darauf einen Tripper entstehen. Die Bersuche von Lafont Gount (Journal de médecine, May, 1810.) beweifen dagegen gar nichts; berfelbe legte eine Bugfalbe auf eine Grelle am Bandchen ben einem feit 20 Tagen am Tripper leibenben Rranten, und bemertte, bag ungeachter biefe Stelle von der aus der Sarns robre fommenden bicen gelbgrunlichen Rlugigfeit immer bebedt mar, fie boch in einigen Tagen beilte ohne ein Geichmur auss gubilden. Diefer Berfuch fann infofern nichts beweifen, als bei der Gegenwart einer primitiven Form und der baburch febon erregten entzündlichen Thatigteit, felten eine zwepte von abnlicher Urfache fich ausbildet.

top ger the description of the solution of the solution of

§. 20.

Matur bes Ausfluffes benm Tripper.

Schon ans bem bisher Gefagten folgt, bag ber Eripper eine entzündliche Form einer Schleim abfondernden Flache ift. Bas daber durch verftartte Thatigtelt abgeschieben wird, ift eine Lymphe, welche nach ber Beftigfeit und dem tiefern Gindringen ber Entzundlichkeit, Farbe und Confifteng andert, maffrig, fcbleimig, eiterformig, mit blutigen Streifen vermifcht, ers Scheint, und ben der bochften Entzundung megen ber vermehre ten Dichtigfeit der von der Entzündlichkeit ergriffenen Lymphs gefaße, manchmal fast gang fract, woben oft die Bufalle eine furchtbare Sobe erreichen tonnen. Gine Erscheinung Die nicht blos ben der Entzundung der Sarnrobre, fondern ben dem Er griffensenn jeder Schleim absondernden Membrane der Fall ift, wie Bichat febr richtig bemerkt bat. Unrichtig ift es, ben Musfluß aus ber harnrohre als einen aus einem Geschwure ber harnrohre abgefonderten Giter zu betrachten. Daß ben einer entzundeten Schleim absondernden Rlache es feines Ges fdmutres bedarf um eine Aussonderung hervorzubringen, ift Befannt; auch haben die Untersuchungen Morgagnis, und ble Beobachtungen eines Stolls und Soffmanns gezeigt, daß es Tripper ohne Gefdmure giebt; doch mird bie Didglichfeit eines Gefchwurs benm Tripper nicht ausgeschloffen, besonders wird der syphilitische Unstedungestoff, bey febr

großer Empfänglichkeit ber Harnrohre, sehr teicht eine Erulces tation nach sich ziehn, Die zwar nicht absolut nothwendig ist, aber ben vielen Entzündungsformen sehr häusig vorkommt. Auch zeigen mehrere Untersuchungen des oben erwähnten Morgagni, daß es Eripper glebt, wo die Entzündung in Erulceration übergeht.

§. 21.

tim they down the high hands with the high high high

Verhältniß des Trippers zu der secundairen Sphilis.

Es laße sich nicht laugnen, daß die secundalre Sphilis so gut durch ben Eripper, als durch das venerische Geschwüt in den Gesammt Organismus eingehen kann; doch darf nicht unbemerkt bleiben, daß dieser Uebergang ohne Verhältniß selz tener ist. Der anhaltend entzündliche Zustand, und die lange Dauer einer so sehr vermehrten Absonderung, scheinen auf einem beschränkten Flecke das Leiden der übrigen Fläche zu vicartien, und durch eine anhaltende Ableitung (im höhern Ginne des Worts) die weiter um sich greisenden Metamorphissen zu verhüten. Schmidt glaubt, daß das Verhältniß der Fälle, wo durch Tripper die secundalre Sphills herbengestährt wurde, zu denen, wo dies durch ein Geschwür Statt sand, sich wied zu 20 verhalte. Doch scheint dieses Verhältniß viel zu günstig für den Tripper angenommen.

§. 22.

Gewöhnlicher Berlauf des Trippers.

Einige Tage nach einem unreinen Benfchlafe, gewohnlich awischen bem a ren und 8 ten Tage (bochft felten fruber, manchmal fpater) außert fich in der Sarnrohre der Danner eine juckende Empfindung, die fich bis an die Gichel erftrect, und weit ents fernt unangenehm ju fenn, ben ichon in ber Opportunitat fich Befindenben mehr wie gewöhnlich jum Benschlafe reigt. Dies bauert einige Tage, wo es bann in einen fluch: tigen brennenden Schmerg übergeht, woben ein magriger Schleim, besonders ben bem Drude ber Gichel abgesondert wird. Es gefellt fich eine Spannung bes Gilebes und eine Empfindung, welche fich lange beffelben, bis in bie Soben, den Saamenftrang und in die Leiftengegend erftredt, bingu. Der Ochmers und befonders das Gefühl des Brennens vermehrt fich, und wird benn Urinlaffen febr heftig. Diefe Empfindung verbreitet fich bis an die Manbung ber Gichel, welche roth, fchmerabaft, gefchwollen und febr empfindlich erscheint. Musfing befommt nun eine mehr gelbliche ober grunliche Farbe und eine elterformige Confifteng, Die Ochmergen werben befs tiger; ber Urin fliegt nur fparfam und anfanglich oft in ges theiltem Strable ab, die Spannung des Gliedes nimmt gu, es treten fchmerghafte Ereftionen befonders gur Dachtzeit ein, und find oft mit Gaamenergiegungen gepaart; der Rrante flagt über Stuhlzwang, über unruhige Nachte, und befindet sich in den Abendstunden in einem leicht gereizten Zustande. Wird der gewöhnliche Gang der Krankheit durch schlechtes Verhalten oder zweckwidriges Verfahren nicht gestört, so vers schwinden die Zufälle allmählig, der Schmerz im Urinlassen nimmt ab, die Röche der Mündung verliert sich, der Ausstuß wird zäher und weiß, er erhält die Consistenz eines dicklichen Schleims, und zieht sich zwischen den Kingern zu Käden. Zusleht sieht der Kranke nur noch des Morgens beym Erwachen einen Tropfen eines dicken Schleims an der Harnröhre, welcher endlich auch verschwindet.

§. 23.

o in Cas entilinbete

Erscheinungen eines febr heftigen Trippers.

Eigenthumliche Bosartigkeit ber Unstedung, vernachlass sigte oder verkehrte Behandlung von Seiten des Kranken oder des Arztes und andre unglückliche Umstände können dieser ursprünglich einfachen und gutartigen Form eine solche bösarstige Richtung geben, daß dadurch für den Kranken in mehrerer Hinsicht Gefahr entsteht. Schon in Hinsicht des ersten Aussbruches sindet die Abweichung Statt, daß in bösartigen Fällen sehr kurze Zeit nach dem Benschlase die ersten Zufälle eintreten, und mit schnellen Fortschritten sich vermehren. Es scheint, als wenn die Schnelligkeit des Ausbruchs im graden Verhältniße mit der Heftigkeit des Uebels stehe.

So wie ber Zustand der Entzündung sich mehrt, wird auch die ganze Meihe der im vorigen S. beschriebenen Zufälle heftiger. Die Spannung in den Leisten ist so groß, daß die Drüsen derseiben anschwellen, sehr schmerzhaft werden und sich bisweilen entzünden, wodurch der Kranke im Gehen ganz gehindert wird.

Die Ereftionen des Gliedes find ben Tag und Macht ofe so ftark, daß auch im völlig machenden Zustande des Kranken, Samenergießungen entstehen können. Im noch schlimmern Falle hören blese Erektionen gar nicht auf, und führen dann die höchst lästige Erscheinung des Priapismus herben.

Bey biesem Andrange des Blutes in das entzündete Glied, geschieht es, daß das stroßende Glied meistentheils nach unterwärts, selten nach oberwärts auf eine hochst schmerze hafte Art gekrümmt wird; ein Zustand, der unter dem Nasmen der Chorda venerea den Pathologen bekannt ist.

Oft zerreißen ben dieser gewaltsamen Krummung kleinere Gefäße, und ber Kranke verliert durch die Harnröhre eine oft mehrere Unzen betragende Quantitat Blut. Nach dieser Has morrhagie, so beunruhigend auch ihre Erscheinung für den Kranken wird, lindert sich gewöhnlich auf eine sehr auffallende Weise die Heftigkeit der Zufälle.

Theils durch die Heftigkeit der steigenden Entzündung, theils neu gereist von dem jest schärfer werdenden Ausflusse,

entzündet sich auch die Vorhaut, schließt sich entweder voe der Eichel und schwillt, oft dematds an, so, daß ihre Zustückbringung unter diesen Umständen unmöglich wird; oder das Praeputium zieht sich, besonders wenn das Zurückbringen der Vorhaut von dem ängstlich gewordenen und mit der Erzscheinung unbekannten Kranken gewaltsam bewerkstelligt wird, hinster der Sichel so zusammen, daß dadurch der Vlutumlauf sür die Sichel oft ganz gehemmt ist, und die augenscheinlichste Gesahr des Brandes entsteht. Erstern Zusall nannte man Phimosis (Vorhautverengerung), letztern Paraphimosis (spanischer Kragen); doch sind diese beyden Zusälle ben dem venerischen Geschwüre häusiger, und werden auch dort näher entwickelt werden.

Der Ausstuß ist jest bunne, missarbig, oft grau, verstreitend einen unangenehmen spezisischen Geruch, sließt ges wöhnlich etwas sparsamer, und nimmt sogar ben stelgender Hesselt des Uebels so ab, daß man einen sogenannten trockenen Tripper (Medorrhoea sicca) als das Resultat der höchsten Steigerung dieser entzündlichen Form kennt. Ift es so weit gekommen, so steigt auch das Leiden der benachbarten Theile, der Stuhlzwang vermehrt sich, der Kranke kann nur mit der größten Austrengung den Harn lassen (Dysuria), in dem schlimmsten Falle tritt vollkommene Harnverhaltung (Ischuria) hinzu. Alle nahe gelegenen Theile tragen die Spuren hestiger Entzündlichkeit; die Prostata schmerzt und

fühlt sich angeschwollen an (Prostatitis). Die Hoden sind hart und in ihrem Volumen sehr vergrößert (Epididymitis), sie schmerzen heftig und vertragen die Berührung nicht.

Unter gewissen, bisher noch nicht genug erörterten, Umständen entsteht auch nach ploblichem Verschwinden oder wenigstens auffallender Verminderung des Ausflusses, eine eigenthümliche höchst akute Augenentzündung, die in einem offenbaren Verhältnisse zu der Entzündung der Harnröhre steht, und einen so schnellen Verlauf hat, daß sie oft in wenig Tagen mit unheilbarer Blindheit endigt.

Bey den oben beschriebenen Zufällen eines bosartigen Trippers wird der ganze Körper auf eine sehr heftige Weise mitergriffen. Es entstehen steberhafte Erscheinungen, die offenbar den Chasrafter einer entzündlichen Form tragen; die Pulse werden hart und schnell, der Urin roth, oft flammend, die Haut fühlt sich trocken und heiß an, der Kranke klagt über Durst, Eingenomsmenheit des Kopse und über schmerzhafte Empfindungen im Unterleibe.

Läßt bieser Tripper in seiner Heftigkeit nach, so nimmt boch das Leiden der Harnrohre einen langsamen Sang. Wenn auch alle bosen Zufälle verschwunden find, so dauern doch Schmerz in der Urethra und der Aussluß noch fort, und so entsteht dann als Folgekrankheit der sogenannte Nachtripper (Medorrhoea chronica), der unter mannigsaltigen Ab.

wechselungen in hinsicht seiner Zufälle noch lange ben Kranken qualen kann, und von dem weiter unten die Nede seyn soll. Nuch bleiben von der Heftigkeit des Trippers und von der Langwierigkeit des Nachtrippers mannigsaltige, den Kranken oft durch sein ganzes Leben begleitende, höchst beschwerliche Folgen zurück, die ebenfalls unten noch näher entwickelt werden sollen.

§. 24.

bergornelle, bes bestein Ruchguche auch biefest Schmitz mie

Allgemeine Erklärung der Zufälle.

Eine genaue Prüfung aller Zufälle des Trippers zeigt deutlich, daß sie theils von der Entzündlichkeit, theils von den verhinderten Verrichtungen der ergriffenen Organe, theils von dem Consensus der Theile und in mancher Hinsicht auch von dem daben Statt sindenden Sästeverluste abhängig sind. Der Tripper verhält sich zu dem Organismus sowohl in Hinsicht seiner Erscheinungen und seiner Folgen, als auch in Hinsicht der daben anzuwendenden Heilart, wie jede andere entzündliche Form, besonders eine solche, welche die Oberstäche der Schleim absondernden Häute ergriffen hat; daher ist auch die Natur der Entzündung mehr erysipelatös als phlegmonds. Ben dem Tripper sind die drep Perioden jeder Entzündung, nämlich das Stadium Irritationis, Incrementi und Decrementi nachzuweisen.

Die Opportunität ist ben kontagibsen Formen das Sta: blum insectionis, und dieses geht dem Tripper so deutlich voran, daß es manchmal eine Art von unvollkommener Ansstedung darstellt, und sich blos als ein von Bureau zuerst bemerkter Schmerz an der Eichel des männlichen Gliedes dars stellt, einige Zeit dauert, und selten eher gehoben wird, bis nicht eine neue Ansteckung die vollendete Form des Trippers hervorruft, bey dessen Ausbruche auch dieser Schmerz versschwindet.

Die Bufalle, welche ben ber Steigerung bes Trippers'am Soben und in ber Leiftengegend entftebn, balt Och midt für Erichelnungen, durch welche fich der Gintritt ber fecundairen Sphills ankandigt; er hat hierin offenbar Unrecht, weil bie Erfahrung lehrt, baß jebe Entgundung der Sarntobre (ben großer Beftigfeit) abnitche Erfcheinungen veranlaffen fann, obne baß es eines eigenthamlichen fuphilitischen Unfteckungse ftoffes bedarf; fie tonnen weit leichter durch den Confensus ber Theile ertlart werden. Es ift ein organisches Gefet, bag im thierifchen Rorper gartere Organe unter ungludlichen Umftans ben bie Leiben anderer übernehmen; auch find bie Organe, melde entweder nabe mit einander verbunden find, ober ber felben Bunftion bienen, folden vicartrenden Erfcheinungen befonders ausgefest. Das Erftere erflart befonders bas Miter, griffenwerden der Mugen; das Lettere Die Leiden an ben Soden, in ter Prostata, Urinblafe, im Maftdarm und in ber Leiftengegend.

Alle diese Zufalle werden einzeln noch gehörig gewürdigt werden. Ben allem diesen läßt es sich doch nicht läugnen, ist auch frür her schon bemerkt worden, daß ein mit vielen bösartigen Resbenzufällen einhergehender Tripper ben Berbacht eines rein sphilitischen Ursprungs gegen sich habe.

Die Symptome des allgemeinen Uedelbesindens, welche ben höherer Steigerung der Tripperform so dentlich hervortresten, geben zu erkennen, daß die irritable und sensible Sphäre in die entschiedenste Mitleidenschaft gezogen sind. Die siebers haften Erscheinungen im Pulse und in der Wärme des Körpers deuten sehr klar auf das Witergriffensenn der irritabeln Thätigeteit, so wie die Eingenommenheit des Kopfs, das Gesühl der Abspannung und andre manchmal dazu tretende Zufälle, auf das Mitleiden der sensibeln hinweisen; auch hierinn verhält sich der Tripper wie andere entzündliche Formen.

S. 25.

Prognose benm Eripper.

Die Borhersagung ben dem Tripper wird zuvörderst durch die allgemeinen Principien der entzündlichen Formen ber gründet; ie einfacher und beschränkter die Entzündung in der Harnröhre ist, desto leichter verläuft die Form; ein gewöhne licher Tripper, wie derselbe §. 22. beschrieben worden ist, endigt in der Regel ben ganz gutem Berhalten mit 21 Tagen, höchstens mit 4 Wochen. Nicht so eine bösartige Mes

830

dorrhoe (§. 23.), biese kann bie nachtheiligsten Folgen haben Je weiter sich die Entzündung gegen die Blase verbreitet, besto größere Gesahr für die Aussonderung des Harns, dessen Unterdrückung oft das Leben selbst bedroht. Eine sogenannte Bers stopfung des Trippers hat in der Regel die surchtbarsten Folgen. Die Geschwulft an den Hoden, die Entzündung der Prostata die oben beschriebene Augenentzündung sind Formen von der höchsten Bedeutung, und mit ihrem Eintritte ist immer Gessahr verbunden. Durch einen krankhaften Habitus, besonders bey schon vorhandenen Dyskrasien, neigt sich das Uebel zur Langwierigkeit, vorzüglich ist dieses bey scrophulosen Subjecten zu fürchten.

Was den Tripper zu einer vorzüglich gefährlichen Kranks beit macht, sind die hier so leicht möglichen traurigen Folgens Verengerungen, Verdickungen und Seschwüre der Harnröhre, Seschwulst der Prostata und ähnliche Formen, sind oft die unglücklichen Ueberbleibsel dieser Entzündung. Ein Diätsehler, ein Misgriff in der ärztlichen Pslege, und jeder oft unbedeustend scheinende Umstand kann Folgen des Trippers veranlassen, an denen der unglückliche Kranke oft noch in den spätesten Jahren seines Lebens zu tragen hat. Walch hat sehr Recht, wenn er beim Tripper das eintretende Spannen im Unterleibe über dem Bauchringe und die Schmerzen in der Gegend des Mittelsteisches für sehr verdächtige Vorboten neuer Zufälle erztlärt, und am Ende der Kur aus dem dunn bleibenden Strahle

Des Urine auf Die Doglichkeit einer Statt gefundenen Berens gerung ober Berbidung ber Sarnrohre fchließt. Diejenigen Schriftsteller irren, welche behaupten, ein Tripper tonne in wenigen Tagen geheilt fenn; auch Walch verfichert, bag uns ter gemiffen Umftanden ble Rur des Erippers unter Dit: wirkung und Ginfluß des Organismus in Beit von & Tagen geendigt fenn tonne. Der Tripper gebort ad morbos acutos simplices, und vollendet in ber Regel gegen ben, ober gleich nach bem 21. Tage feinen Lauf. Es giebt gwar leichte Eripperformen, Die in 4 bis 5 Tagen verschwinden, Diefe aber haben ben Schein für fich, daß fie teine rein fophilitifche For: men maren. Die Borberfagung ben bem Tripper bange im Gangen von der Beilmethobe und dem Berhalten ab; wo Urgt und Rrante ohne gerechten Tabel und Borwurf find, geht alles auch ben bem heftigen Tripper febr gut. Ben Disgriffen fann man freglich mit Gewißheit darauf rechnen, daß fie nicht uns geftraft bleiben merben. Langneau hat Unrecht, wenn et ben ber Bestimmung ber Prognofe in ber oft ermabnten Korm. ble Constitutio aeris gar zu hoch in Unschlag bringt.

§. 26.

Die allgemeine Heilart bes Trippers.

Drey Indicationen bieten fich bey der arztlichen Behand, lung des Trippers dar.

- Borm ausgebrochen ift, ju zerftoren und hinwegzuschaffen.
- 2) Die ichon ausgebrochene entjundliche Form gu heben.
- 3) Endlich, allen übeln Folgen des Trippers (worunter wir sowohl die Ueberbleibsel der beschränkten Entzündung, als auch die secundaire Syphilis verstehn) vorzubeugen.

Die einfachfte Urt, bem Tripper nach einem verbachtigen Benichlafe vorzubeugen, und fo bie erfte Inbication ju erfullen, ift, fobald als moglich den empfangenen Stoff abgut Schweifen. Dan erinnere fich an bas 6. 18. ermabnte, von Beidarb querft ergablte Benfpiel, und man wird finden, baß bas balbige Urinlaffen nach bem Beufchlafe vorzüglich ju biefem Zwecke geeignet ift, befonders, wenn burch bas Bervor gleben ber Borhaut der Urin eine Beile in ber Sarnrohre gus ruckgehalten, und dann ploblich fortgestoßen wird; ein Sanbi griff, der gewiß febr oft einen beschwerlichen Eripper verhatet. Dan fucht auch durch oftere Ginfprigungen, theils von milden und bligen, theile von icharfen und reigenden Mitteln bem Uebel zuvorzukommen. Bu ben erftern geboren lauwarme Mild, laues Manbelol u. bgl., ju ben festern rechnet man besonders die Auflösungen von agendem Kali, und von falgfauerm abendem Quedfilber, in einem fcbleimigen 26bfube. Durch die erftern fucht man ben Stoff meggufpulen; burch die lettern, denfelben ju gerftoren und hinwegguichaffen.

zweckmäßig auch diese Mittel gleich nach vollbrachtem Benschlafe senn mögen, so hute man sich boch ben den ahenden Einsprihung gen, dieselben zu übertreiben, oder zu lange fortzuschen; man läuft Gefahr, durch ihren Misbrauch, die Entzündlichkeit noch früher herbeizusühren.

Sobald durch den Urin und durch einige wiederhohlte Insjectionen der empfangene Stoff hinweggespult ist, so leistet die Anwendung der kalten Bahungen und Bader des mannslichen Gliedes die besten Dienste; durch sie wird die vielleicht schon angeregte entzündliche Dlathesis am besten gehoben, und die krankhaft erhöhte Thatigkeit am besten herabgestimmt; doch passen die Mittel nicht mehr, wenn das erste Symptom der hervorstretenden Entzündlichkeit die unvermeidliche Gegenwart des Trippers anzeigt. Die mehr erysipelatose Entzündung verbie, tet gänzlich die Anwendung der Kalte bey schon ausgebildeter Form.

Wenn die Gegenwart des Trippers sich offenbart, dann eritt die zwente Indication ein. Hierher paßt nun die rein antiphlogistische Heilart, welche dem Grade und der Rich, tung der Krankheit, der Individualität des Kranken und den mit der obersten Form verbundenen Complicationen angemessen seyn muß.

So wie ben wenigen ernfipelatofen Formen Aberlaffe gerechtfertigt find; fo giebt es auch nur feltene Falle, mo die

Stelgerung ber entzündlichen Form benm Tripper, und besons bers das Mitergriffenseyn ber irritabeln Sphäre einen Aberlaß ersorderte; die Anwendung der Blutigel findet östers Statt. Die leichten, theils Fruchtsäuren, theils Schleimzucker entshaltenden Abführungsmittel sind in dem höhern Stadio der Entzündlichkeit nie zu verabsäumen. So sind auch einige Neustralsalze, besonders das Kali nitricum, das Kali tartaricum und das Kali citratum in einem verdünnenden Vehltel und in gemäßigter Gabe von sehr großem Nußen; man darf dann die so gefürchtete Beziehung dieser Sallen zu den Harnorganen nicht scheuen.

Daben ist eine strenge, dem ganzen Heilplane entspreschende Diat nothwendig; ein Kehler darinn wird oft noch vor dem Verlauf eines Tages durch Verschlimmerung aller Juställe bestraft. Enthaltsamkeit von kräftiger, scharf gefalzener und gewürzhafter Fleischkost, sorgfältige Vermeibung aller geizstigen Getränke mit Verhütung jeder Erhihung sind nothwenz dige Bedingungen eines glücklichen und berechneten Erfolgs. Leichte Kost und der Genuß verdünnender wässelger und schleis miger Getränke sind hier angezeigt; doch darf mit lestern kein Mißbrauch getrieben werden, weil sonst einerseits zu leicht die Thätigkeit des Magens leidet, andererseits zu Nachtrippern Veranlassung gegeben wird.

Opium und Camphor find zwen ben dem Tripper unter ben mannigfaltigften Berhaltniffen empfohlene Mittel; fie paffen

bezeichneten Umständen. Das Opium leistet dann nur gute Dienste, wenn die Sensibilität im ganzen Organismus übers haupt und in den leidenden Theilen insbesondere auf eine sehr auffallende Weise mitergriffen ist; dahingegen ist der Camphor nur dann heilbringend, wenn eine Ueberfüllung der Blutgefäße und eine daraus entstehende krankhafte Erpansion vorherrs schend ist.

Urintreibende Mittel paffen in bem entzündlichen Stablo gar nicht, benn häufig wird durch den unvorsichtigen Gebrauch ders felben die Entzündlichkeit so gestelgert, daß konsensuelle Formen erfolgen. Der Wachholdersaft ist das einzige hierher gehörige Mittel, weiches, mit einem schleimigen Absude verdunnt, dann gereicht werden kann, wenn die Heftigkeit der entzündlichen Diathesis gemindert ist.

Das von Pentilhe früher, und in der neuften Zeit von Besnard empfohlene Ummonium kann ben einem ent, gundlichen Tripper eben so wenig Gegen bringen, wie die Cansthariden, die Cochenille, ber Alaun und dergleichen empyrische, ben entzündlichen Formen hochst nachtheilige Mittel.

Hercules Saxonia (Luis venereae perfectissimus tractatus ex ore Herculis Saxoniae Patavini, Patav. 1597, c. 37.) macht ben eben so verruchten als zwecklosen Vorschlag, den Ersper durch den Benschlaf mit einer gesunden Person und zwar mit einer Jungfrau, zu heilen, wozu er ganz besonders Negerinnen vorschlägt. Pelargus war der erste, welcher diesem Unfinne widersprach. Swesdiaur erzählt, daß in Afrika die Eselinnen zu solchen Heilungss versuchen gebraucht werden.

Die topische Behandlung des Trippers erfordert Ruhe des Gliedes und die strengste Reinlichkeit. Die erstere erreicht man durch die Anlegung eines Tragebeutels, die lettere durch dfteres Waschen mit einem lauen schleimigen Absude oder Milch, woben auch dreliche oder sogenannte Stuhlbäder angemessen sind.

Die Einsprisungen gehörten sonst, besonders seit den von Bossi darüber entwickelten Lehrsäßen, zu den Hauptmitzteln ben der Kur des Trippers; besonders waren sie durch die Unheil bringende Unsicht von der Oertlichkeit und der nicht spehilitischen Natur des Trippers ben der Behandlung dieser Form ein unentbehrliches Mittel geworden. Man hatte sie von dem erstern Momente der Entstehung des Trippers empsohen, und für jedes Stadium hatten sie ihre Lobredner gefunden. Die bessere Unsicht der Neuern hat ihren Gebrauch sehr einz geschränft.

Wenn der Tripper zweckmäßig behandelt wird, wenn weder durch eine reizende Methode die Entzündlichkeit gestels gert, noch durch zu großen Mißbrauch asthenistrender Mittel Utonie herbeygesührt wird; so verläuft der Tripper ohne eine ges

grundete Unzeige für die Anwendung einer Einspritung. Der lette Tag der Entzündlichkeit wird der erste der eintretenden Genesung seyn; es versteht sich von selbst, daß sowohl die Constitution des Kranken, als auch sein Verhalten

legen burfen. Bey dem rein entzündlichen Tripper sind die Einsprikungen größtentheils nachtheilig. Eine vorsichtige Answendung einer milden, lauen, entzündungswidrigen Flüßigkeit ist zu diesem Zwecke blos zuläßig. Unter den Umständen, wo der Gebrauch des Opium zum innern Gebrauche past, kann zu der vorher erwähnten lau warmen Flüßigkeit eine kleine Quantität dieses Mittels hinzugesest werden. Die reizenden, zusammenziehenden und austrocknenden Einsprikungen, aus Quecksiber und andern Metallsalzen, Bleppräparaten, Balssamen und abstringirenden Decocten, sind in einer der Indisvidualität und der Dauer der Krankheit augepaßten Gabe und mit Vorsicht nur dann anwendbar, wo nicht mehr von einer entzündlichen Form, sondern von dem sogenannten Nachtripper die Rede ist.

Wenn Einsprigungen nothig werden, so ift fur Manner eine gang einfache, mit einer kurzen conischen gut abgerunde, ten Spige versehene ginnerne Injectionssprige bas brauchbarfte Inftrument, welches mit einiger Geschicklichkeit in der erfors derlichen Nichtung angewendet werden muß. Der von hah, nem ann zu diesem Behuse vorgeschlagene heber ift überflußig,

und wegen der Schwierigkeit ben seiner Anwendung verstwerslich. Derfelbe Borwurf trift den von Clossius zur Einbringung von Mitteln in die Harnrohre, vorgeschlagenen Haarpinsel. Die von Hecker empsohlenen auslöslichen Bouz gles sind ben mehrern Folgekrankheiten des Trippers von großem Muhen; ben der entzündlichen Form des primairen Trippers aber sind sie verwerslich.

Der dritten Indication wird am besten Gnüge geleistet, wenn die bey der zweyten Indication gegebnen Bors schriften genan befolgt werden. Die konsensuellen Leiden und die Folgefrankheiten sind gewöhnlich die Resultate des schlechten Verhaltens und der unzweckmäßigen Pflege.

wird die ganze Reihe der konfensuellen und Quacksalbern mit ben widersinnigsten Mitteln behandelt werden wird; so lange wird die ganze Reihe der konfensuellen und Folgekrankheiten des Trippers mit Inbegriff der secundairen Sphills nie eine seltene Erscheinung werden. Besonders haben die zweckwidrigen Einsprihungen große Nachtheile erzeugt, und der Mißbrauch der Bleppräparate veranlaßt häusiger eine Verdickung der Harnsröhre, als es der Tripper mit allen seinen Gestaltungen nur immer zu thun vermag. So sind durch die unbesonnene Unswendung der verschiedenen Vitriole und der zusammenziehenden

Einspritungen mehr Verengerungen herbengeführt worden, als bie bochfte Entzündlichkeit bes Trippers je herbenführen konnte.

Selbst der topische Mißbrauch des Opiums und des Camphors ist nicht ohne nachtheiligen Einfluß geblieben. Biele Ersfahrungen sprechen dafür, daß bende eine Art Impotenz erzeugen, wie erst kürzlich Arebentisch (Horns Archiv 1811. Jan. und Febr. Heft. pag. 158.) von dem Mohnsafte durch zwen Fälle bewiesen hat. So verschieden auch die Wirkung dieser benden Mittel auf den menschlichen Organismus ist, so leicht läßt sich die durch bende bewirkte Erscheinung erklären.

Aus dem J. 21. geht hervor, daß die secundaire Syphilis nach dem Tripper selten ist; doch erfordert es die Borsicht, daß ben allen Trippersormen, welche einen sehr bösartigen und hartnäckigen Berlauf hatsten, und woben konsensuelle Formen vorgeskommen sind, die Möglichkeit einer secundaisten Form angenommen und eine leichte Merekurial: Kur mit Borsicht und genauer Berücks sichtigung der individuellen Verhältnisse des Kranken eingeleitet werde.

S. 27.

Therapeutische Vorschriften für die speciellen Be-

Schon aus den allgemeinen Ansichten über die Rur des Trippers geht die Einfachheit und die Consequenz deutlich hers wenn ein gludlicher und berechneter Erfolg erwartet werden foll. Die speciellen Borfchriften werden biefes bestätigen.

Wenn nach einem verdachtigen Benichlafe, ungeachtet ber Unwendung der im vorigen f. angegebenen Vorbauungemes thobe, die Möglichkeit des Trippers gefürchtet wird, fo ift es gut, bag ber Rrante bie oben angeführten falten Bafchungen mit gewöhnlichem Baffer ober mit einer verdunnten Goularde fchen Difchung anwende, und auch die Gefchlechtstheile, bas Mittelfletich und bie Leiftengegend vermittelft eines Ochwammes burch furge Zeit falt babe; fur bie Genitalien und ben Damm eignet fich ein topisches faltes Bab, wozu die Borrichtung leicht ausfahrbar ift. Schon jest ift eine antiphlogiftifche Diat ans gurathen; besondere muß ber Genuß ftarfer fdmer verdaulicher Roft, gewurzreicher Speifen und aller ftarten geiftigen Ger trante forgfaltig vermieben werben, ber Rrante muß einen Tragebeutel anlegen, Die Feberbette mit Matragen vertaufchen, und fich fo rubig als moglich verhalten; jede Erhitung, befons bers jede Unftrengung bes Gefchlechtstriebs ift nachtheilig, bar ber muß ber Rrante bie Gefellichaft ber Weiber fliebn, und ben Bepfchlaf gang vermeiben. Gine leichte Roft ift besonders für die Abendmablgeit ju empfehlen; hierher paffen leichte Ge, mufe und Doft. Maffrige, verdunnende hier angezeigte Bes trante find : reines Baffer, Buckermaffer, ein leichter Gerftens trant, gang bunne Danbelmild, Dild mit Bager verbunnt;

boch muß ben ber Wahl der Lebensordnung die Individualität des Kranken strenge berücksichtigt werden; daher den schwäch, lichen Individuen, und besonders solchen, welche an dyspeptischen Formen leiden, eine milbe Fleischkost und zum Getranke leichtes Bier, oder mit 6 Theilen Wasser gemischter Wein, gestattet werden kann.

Wenn Schmerz in der Harnröhre entsteht, die Mündung derselben sich rothet, und der Urin ben seinem Durchgange in der Harnröhre Brennen verursacht: so bleibt die Anwendung der Kälte auf das bereits rosenartig entzündete Glied weg; blos die Hoden und die Leistengegend können, jedoch mit der nöthigen Vorsicht, kalt gewaschen werden. Die Borschriften für die entzündungswidrige Diat dauern fort, und werden ben Individuen, die es vertragen, noch geschärft. Jeder Zusall wird nun genau berücksichtigt, damit sogleich die nöthige Hüse gebracht werde. Sirtanner hat sehr Recht, wenn er es jedem Arzte zur Pflicht macht, des Kranken Glied zu sehn, damit ihm kein sich einstellender Zusall, besonders die erste Vildung der Chorda, der Phimose u. dgl., entgehe.

Sobald der Ausfluß sich einstellt, tritt auch die Indicas tion der strengsten Reinlichkeit ein, das Glied muß öfters mit lauer Milch oder einem Malven, oder Königskerzen, Absude abgewaschen werden; ist die Vorhaut sehr lang, so ist es gut, einigemal des Tages etwas von den eben genannten Flüßigkeiten zwischen die Vorhaut und die Eichel lauwarm einzusprißen. Mehrt fich die Entzündlichkeit, was man aus der Ver: mehrung des Harnbrennens, aus der Geschwulft des Gliedes, und aus der hohen Rothe der Mündung der Sichel leicht er, kennen kann, so kann eine leichte Mandel, oder Hans Emulsion mit Kali nitrico oder Kali citrato gegeben werden.

Rec. Kali nitrici 3jff
solve in
Emuls. amygd. 3x.
et adde
Syr. simpl. 3j.
M. D. Sig.

Mile : Stunden & Taffe gu nehmen.

Ober:

Rec. Sem. Cannabis 3j
f. cum
Aq. communis 15j
l. a. emulsio,
in qua solve
Kali citrati 3jj
et adde
Syr. Althaeae 3j
M. D. Sig.

Die bas Obige ju nehmen.

Auch wird es dem Kranken einige Erleichterung schaffen, wenn er beim Uriniren das Slied in eine milde lauwarme Flus Klakeit halt. Wird der Stuhlgang trage, oder ist eine gastrische Coms plication vorhanden, so gebe man Lenientia z. B.

Rec. Kali tartarici 3ß

Mannae electae 3jj

solve in

Dti Hordei ferv. 3x.

D. Sig. Stundlich 2 Egloffel ju nehmen.

Rec. Pulpae Tamarindorum 3jß
Tart. depurat. 3ß
Syr. Rubi idaei q. s.
ut f. Electuarium molle
d. ad vasculum.

Sig. Fruh und Abends 2 volle Theeloffel zu nehmen.

Sydenham hielt die Purgiermittel für das vorzüge lichste und oberste Mittel zur Heilung des Trippers. Boers have machte diese Lehre auch zu der selnigen; nur in der eben angegebenen Beziehung nüßen sie; doch mussen alle drastisch wirkenden bittern und harzigen Arzueten sorgfältig vermteden werden, daher paßt das von Girtanner unter diesen Umsständen besonders empsohlene Rheum gar nicht, selbst die Sens nesblätter sind nicht anzurathen. Daß das Rheum eine entsschiedene Beziehung zu den Harnorganen habe, ist unbezweits selt, bey dem entzündlichen Tripper aber ist es offenbar nachs theilig.

Oft verbieten Berhaltniffe, alle die gegebenen theils thes rapeutischen, theils biatetischen Borschriften zu befolgen; noch

ofter halt ber Rrante ben Tripper fur eine ju unbedeutende Form, um ihr fo viele Opfer ju bringen. In benben Rallen bleiben bann Berichlimmerungen bes Uebels nicht aus; die Entzündung vermehrt fich, die Ereftionen, befonders zur Dachte geit, ftellen fich febr oft und fo beftig ein, daß ber Rrante ben Schlaf gang entbehren muß, bas Glied ichwellt etwas an, und leicht tritt bier bie Chorda ein. Unter folchen Umftanben ift bas Unlegen einiger Blutigel an die Burgel bes Gliebes, ober ans Mittelfleisch unmittelbar hinter bem Sobenfacte gu empfehlen. Das Unlegen berfelben lange bem Gliebe ift megen bes heftigen Reizes nicht rathfam. Sier muß auch die ans tiphlogistische Diat im gangen Umfange mehr als jemals geltend gemacht werben. Der Rrante enthalte fich ber Mbendmablzeit, und trinte vor dem Schlafengebn Baffer, ober ein anderes verdunnendes fublendes Getrant; 3. D. dunne Dandelmild, leichte Limonade, Crangeade u. dgl.

Man hat auch warme Fußbader gerathen; indessen wis derspricht diesem Vorschlage die oftere Beobachtung Moscas tis, welcher auf die Anwendung derselben starte Spans nungen in der Leistengegend bemerkte.

Wenn sich die Schmerzen in der Harnrohre nicht auffale lend vermindern, und der Kranke ein sehr sensibles Individuum ist, so reicht man I bis einen ganzen Gran Opium mit einigen Granen Krebsaugen und Zucker abgerieben. Wird die Krume mung nach der Blutverminderung nicht geringer, und ist der Kranke nicht zu sehr plethorisch: so können in den Abendstunden 1 bis 2 Pulver aus 1 bis 2 Gran Camphor mit \(\frac{1}{2} \) Scrupel Pulv. gummosi gereicht werden, oder man verordnet bep dringenden Fällen dem Kranken eine leichte Mandelemulsion mit Camphor, und läßt anhaltend davon nehmen.

Rec. Camphorae rasae gr. viij

Mucilag. mimosae 3j

misce terendo invicem et sensim adde

Emuls. amygd. tenuis 3jv

Sacchari canar. 3jjj.

Med. Sig. 20le 2 Stunden 1 Egloffel zu nehmen.

Ist der Kranke sehr vollblutig und von fraftiger Constitus tion, so konnen noch einige Blutigel an ten Damm vorher angelegt werden, ehe zum Camphor geschritten wird.

Jur Beseitigung der Erectionen und zur Milderung des Harnbrennens, brauchen die englischen Aerzte folgende, von Henry besonders empfohlene Solution als Einsprigung:

Rec. Aq. destill. simpl. Ziv.

Liq. Zinci acetici gtt. xx.

M. D.

Sie wollen bavon gute Wirkungen gesehen haben, die sich jeboch nicht bestätigen. Ehe die Einsprigung gemacht wird, muß
bas Mittel gelinde erwarmt werden. Es gilt hier, was schon
oben über die Einsprigungen im Allgemeinen gesagt worden ift.

Wenn ble Schmerzen nicht sowohl auf die Stelle der fossa navicularis eingeschränft, als vielmehr in den corporibus cavernosis verbreitet sind, wenn daben die Umsstände obwalten, welche die Indication, das Oplum innerlich zu geben, herbenführen; so kann man folgende Einspritzungen täglich 2 bis 3 mal lauwarm anwenden:

Rec. Extr. thebaici gr. iij
solve in
Aq. destillatae simpl. Žiji
et adde
Mucilag. sem. Cydon. Žj.
M. D.

bende Injection, die allerdings oft gute Dienste leiftet.

Rec. Seminis Papaveris 36 affunde

Aq. communis zvj ut f. l. a. emulsio, cui adde

- Laurocerasi 3j

M. D. Sig.

Erwarmt taglich 3 bis 4mal anzuwenden.

Erltt ben sehr heftigen Erectionen oder Krummungen des Gliedes eine Blutung aus der Harnröhre hinzu, so wird dann nur Hulfe nothig, wenn sie zu große Erschöpfung droht; ist sie mäßig, so mindert sie die Zufälle der Entzündlichkeit und wird

wird nutilich. Wenn aber der Fall einer sehr bedeutenden Blutung eintritt, so werden Einspriftungen aus einer Auflösung des arabischen Gummi in die Harnrohre gemacht, oder man drückt die Harnrohre in der Nahe des Schaamberges gelinde zus fammen. Ben dringenden Fallen konnen auch bis zur Stillung des Blutes zusammenziehende Mittel eingesprift werden, z. B.

Rec. Aluminis crudi 3j solve in Dti Althaeae Ziij. D.

Nur im außersten Nothfalle, und ben weniger empfindlichen Kranken ist es rathsam, eine elastische Rohre in die Urethra einzubringen, und durch eine Zirkelbinde die Bande der Harnstöhre anzudrücken. Wenn die Spannung in der Leistengegend bedeutender wird, was gewöhnlich der Fall ist, wenn die Entstündlichkeit in der Harnröhre gesteigert ist, so lasse man den Kranken mit sorgfältiger Vermeidung der Geschlechtstheile, kalte Umschläge von Wasser mit Essig oder Aq. saturnina machen, und sich daben ganz ruhig verhalten. Es ist gut, wenn in dieser Zeit der Kranke das Vette hütet.

Die übrigen, auf vermehrte Entzündung in der harns rohre leicht folgenden consensuellen Formen werden in einzele nen S. abgehandelt werden.

Ben fraftiger antiphlogiftischer Behandlung sowohl in therapeutischer als diatetischer Beziehung, werden bald die Ere

Scheinungen gelinder werben. Die Dachte werden rubie, Die Erectionen verschwinden, bas Barnbrennen geht in ein gelindes Juden über, der graue ober grune und bunne Musflug erhalt eine weiße Farbe und eine gabere Confifteng. Die Rothe an ber Mundung der harnrobre verschwindet, und bas dafelbft befindliche Oberhautden wird runglich. Unter diefen Umftanben fann jedes therapeutische Mittel gegen ble primaire Form meg: bleiben; bie bloge Bermeidung einer erhigenden und febr reis genden Diat und eine gut geregelte Lebensordnung reichen gur vollftandigen Beilung aus. Doch muß jest ber Indifation, welche die Berhutung einer fecundairen Sphills erfordert, Sinuge geleiftet merben. Much ift es jest rathfam ben baufigen Genuß ber bemulcirenden und verbunnenden Getrante einzus fdranten, bamit nicht durch ju große Erichlaffung, wie im porigen &. gelehrt murbe, dem Machtripper der Beg gebabnt werde.

Ben schlaffen, schlecht genährten und besonders scrophu, losen Individuen, wo die Möglichkeit eines Nachtrippers so schnell entsteht, ist es sogar gerathen, auf diesen Umstand hin, zuwirken. Hierher paßt der oben erwähnte Gebrauch des Wachs holdersaftes in der Formel:

Rec. Dti Hordei Zjv Succi inspiss. Juniperi Zjj M. d. Sign.

Mlle 3 Stunden einen Egloffel ju nehmen.

Durande empfiehlt zu diesem Behufe die Stipites Dulcamarae; wer in dieser Burzel eine specifische Birkung sindet, kann statt des in voriger Formel angegebenen Dti Hordei, einen Absud von der Dulcamara mit dem Roob Juniperi vermischen lassen.

Das von Frige hier vorgeschlagene Selterwasser leie stet mit Milch sehr gute Dienste. Wein statt der Milch zu nehmen, ist nur unter der größten Vorsicht gestattet.

Der Ausfluß hort allmählig auf, alle Zufälle verschwins den, und der Tripper naht seiner Genesung, die auch gegen den 21. Tag erfolgt, wo nichts zurückbleibt, als daß der Wiesdergenesene in den Morgenstunden der nächt folgenden Tage ein einziges Tröpschen einer weissen zähen Flüßigkeit an der Oeffsnung der Harnröhre bemerkt, welches aber auch unmerklich versschwindet. Dauert diese Erscheinung in den Morgenstunden zu lange, und hat der Arzt Ursache zu sürchten, daß es unter Begünstigung der schwächlichen Constitution seines Genesenen teicht chronisch werden, sich wohl gar vermehren könnte: so ist es rathsam eine Injektion zu verordnen, wozu eine Modisitation der von Girtanner empsohlenen Einsprisung sehr zweckmäßig ist, und zwart Rec. Extr. Opii gr. vjjj
solve in
Aq. destill. simpl. Zjv.
et adde
Aceti saturnini gutt. vjjj
Mucilag. Mimosae. Zß.
M. D. Sign.

Taglich 2 mal anguwenden.

Statt des Aceti saturnini konnen auch hier 3 bis 4 Gran Plumbi acetici genommen werden.

§. 28.

Consensuelle Formen des Trippers.

Mitis, die Entzündung der Vorsteherdruse Prostatitis, die Hatzundung Ischuria und die Trippers Augenentzundung Iritis medorrhoica. Doch zus noch etwas über den sogenannten gestopsten Tripper.

Der gestopfte Tripper.

Mehrere Schriftsteller, besonders aber Sirtanner und mit ihm Cappel, behaupten, daß der Tripper nicht zelstig genug gehoben werden könne; doch unbeschadet einer solschen, in praktischer Beziehung nicht viel werthen Authorität bleibt es ausgemacht, daß ein in der ersten Periode der Entzünds lichkeit sich befindender Tripper durch ein unbesonnenes Verfahr

ven des Arztes, oder durch ein schlechtes, besonders erhitendes Werhalten des Kranken, leicht in einen sogenannten gestopften Eripper übergehn kann; daher nicht jede Verminderung des Ausflusses ben bestehenden Zufällen der Entzündlichkeit für Seilung gehalten werden darf.

In eben dem Grade als die Entzündlichkeit steigt, vers mindert sich der Ausstuß aus der Harnrohre; das Harnbrennen, die Rrummungen des Gliedes und die Erektionen werden heftiger; es gesellt sich eine anhaltende Neigung zum Urinlassen hinzu, und derselbe sließt nur sparsam und unter den hestigsten Schmerzen ab. Wird nicht bald Rath geschafft, so gesellen sich die konsensuellen Zufälle hinzu. Bey der durch neuere Ansichten und wiederholte Ersahrungen geleiteten Pflege, entsteht dieser Zusall weit seltener.

Damals als man die ersten Stadien des Trippers, nach Sydenhams, Boerhavens und van Swietens Mathschlägen, durch heftige brastische Purgiermittel behandelte, und als man mit Tode, Weidard, Cappel und andern, den Tripper für eine rein driliche Form ansah, die gar keine Rücksicht in Hinsicht der Lebensordnung und einer innern Pflege bedürfe: da war der gestopfte Tripper mit allen seinen uns glücklichen Folgen weit häufiger.

Um besten ift es unter solchen Umstanden das antiphlogis ftische Verfahren auszudehnen; man ift dann oft so glucklich, ben schon einbrechenden unglucklichen konsensuellen Folgen vorzubeugen. Hierher gehoren einige Blutigel an ben Damme, die strengste Ruhe des Korpers und besonders des leidenden Gliedes, der Gebrauch der Salpeter Emulsion, häufige vers dunnende Getranke, lau warme Milchdampfe und Bader des Gliedes; doch muß die Temperatur derselben nicht zu warm seyn. Die strengste Enthaltsamkeit in Hinsicht der Nahrungs, mittel ist nun ein wesentliches Erforderuiß.

S. 30.

Entzündliche Geschwulft am Boben.

Diese entsieht ben gesteigerter Entzündung in der harnrohre und daraus erfolgender Verminderung des Ausstusses. Bemerkt man ein Ziehen im Unterleibe, besonders in der Lendengegend und in das Becken hinab; so entsteht die gegründete Vermuthung einer bald eintretenden Epididymitis, welche sich auch bald durch die gefühlte Schwere im Hodensacke ankündigt; man sühlt daselbst eine ensormige welche, aber allmählig sich verhär, tende heise Geschwulft, welche von einigen gastrischen, durch Mitleidenschaft zu erklärenden Zufällen, als Ekel, Neigung zum Erbrechen und wirklichen Vomituritionen beglettet ift. Diese Geschwulft erreicht oft die Größe einer Faust und kann unter unglücklichen Umständen leicht eine hitzige Wassersucht der Scheidenhaut des Hodens nach sich ziehen. In der Neges ist die Geschwulft nur am Hoden und der Nebenhode der entz zündete Theil; eine Wahrheit, die Swediaur in seinen

Studienjahren an sich selbst zu beobachten Gelegenheit hatte. Doch verbreitet sich die entzündliche Diathesis in sehr uns glücklichen Fällen über die Scheidenhaut, das Vas deserens und über die Substanz des Hoden selbst. Selten werden bende Nebenhoden ergriffen, oft aber wechselt die Geschwulft, und das entzündliche Leiden ergreift bald den andern Epididymis. Ben reizbaren Individuen treten die gewöhnlichen Erscheinungen des Fiebers ein, und zulest kommen noch die Zusälle der um sich greifenden Entzündung im Unterleibe und der darinn konsensuell hervorgerusenen Erscheinungen; ich rechne hierher ein heftiges Erbrechen, meteoristische Austrelbung des Untersleibs, Schlucken u. dgl.

Sewöhnlich ist die Epididymitis eine konsensuelle Folge der vermehrten Entzündung in der Harnröhre; daher entsteht auch dieselbe am häusigsten in dem höchsten Stadio des Trippers; doch sehlt es nicht an Benspielen, daß diese Form gegen die Zeit der Abnahme der Entzündlichkeit am leichstesten, und zwar durch reizende und erhihende Schädlichsteiten hervorgerusen werden kann. Eine Erscheinung, welche Hunt er zuerst und sehr richtig dadurch zu erklären sucht, daß in der höchsten Periode der Entzündung benm Tripper der Reiz auf der primitiven Stelle viel zu heftig ist, als daß ders selbe durch eine leichtere in den Hoden erzeugte Reizung abge, leitet werden könnte. Erst dann, wenn die Entzündlichkeit in der Harnröhre sich vermindert, kann eine leichte Erregung

der Hoben durch Tanzen, Reiten oder andere Leibesübungen biese krankhaft vicartrende Thätigkeit herbenführen. Althof hat sogar einen Fall aufgestellt, wo sich eine Nebenhodenge, schwulst zeigte, nachdem der Tripper längst mit seinen Zusfällen verschwunden war. Aus dieser Beobachtung geht auch hervor, daß es eine Form von Epididymitis giebt, welche nicht blos die Folge einer konsensuellen entzündlichen Reizung, sondern der Nesser der secundairen Sphills ist.

g. 31. Prognose der Epididymitis.

So heftig und gefahrvoll auch diese Form erscheint, so ist doch ihr Ausgang ben zeitiger und zweckmäßiger Pflege ges wöhnlich glücklich; sie wird in der Negel bis zum 9ten Tage geheilt und folgt hierinn dem Gesetze der rosenartigen Entzünsdungen; doch kann eine allgemeine Schwäche des Körpers, eine durch vorherrschende Dyscrasien zerrüttete Constitution den Berslauf der Form sehr in die Länge ziehn; hier sind besonders die scrophulose und gichtische Dyscrasie und die Hämorrhoidals Complication zu berücksichtigen.

Die Siterung ist ein gang ungewöhnlicher, der Brand ein bochst seltener, aber doch durch hartnäckige Einklemmung des Saar menstrangs in den Bauchring, und durch grobe Miggriffe in der Behandlung, leicht möglicher Ausgang. Ein Wundarzt bielt einen sehr entzündeten Nebenhoden, worinn er eine

Schwappung zu bemerken glaubte, für einen Absceß, und ftach hins ein; Brand und Tod des Kranken waren die hochst unglucks lichen Folgen dieses groben Mißgriffs.

Berhartung des Nebenhobens, welche aber schmerzlos und ohne alle Folgen durch die ganze Lebenszeit fortdauern kann, und manchmal durch einen neuen Tripper ganzlich gehoben wird. Es gehört zu den seltnern Fällen, daß eine solche Verhärtung zu einer Entartung des Hodens Anlaß geben sollte; der Ueber; gang in ein kredshaftes Geschwür, und die durch eine solche Verhärtung berhärtung besonders zu begünstigenden Hydrocele und Sar, cocele kommen im Ganzen sehr seiten vor. Man kann letztere fürchten, wenn die Geschwulft im Hodensacke nicht abnimmt und sich auch der Ausstuß aus der Harnröhre nicht herstellt, der überhaupt ben Verminderung der konsensuellen Zufälle mehr oder weniger wieder zum Vorschein kömmt.

Ben der Prognose der Epididymitis ist auch nicht zu übersehn, daß ihre Heilung ben ihrem zwenten Erscheinen schwie, riger als ben dem ersten ist, und daß überhaupt die Schwieserigkeit ihrer Heilung im graden Verhältniß mit ihrer öftern Wiederkehr sieht.

§. 32.

Rur berfelben.

Eine doppelte Indifation bletet fich ben der Behandlung ber Epididymitis dem Argte bar.

Erftens, die schnellfte Berminderung ber Entzundung und zwentens die Berhutung der möglichen Folgen.

Eine verungludte Unficht ift es, burch Bervorrufung bes Erippers vermittelft angebrachter Reigungen in der Sarnrohre, die Debenhoben Entzundung beilen ju wollen. Girtanner bat febr Recht, wenn er behauptet, daß juforderft die Entjun= bung gertheilt werben muffe, worauf fich ber Eripper von felbft wieder einstellt. Die Bertheilung erreicht man durch ben Apparatus antiphlogisticus, welcher ber Intenfitat ber Entgindung und ber Individualitat des Rranten angepagt feon muß. Ben bringenden Bufallen pagt ein Mderlag, ber in febr vielen gallen durch die Unwendung von 6 bis 8 Blute igeln an ben Damm erfest wird, befonbers wenn man einige baburch erzeugte Deffnungen einige Zeit bluten lagt. Daben fen man auf Deffnung bes Leibes und auf Bebung der bier in ber Regel vorherrichenden Berftopfung, theile burch Rinftiere theils durch antiphlogistische Lententia, bedacht. 2118 Rips ftier Schlagt Strtanner eine Difchung aus 6 Ungen Dild, 2 Loth Del und I Loth Ruchenfalz vor, bie auch recht gute Dienfte leiftet. 21s eroffende Mittel giebt man entweder Die 6. 27. vorgeschlagene Unflosung bes Kali tartarici mit Manna, oder man giebt ein Dtum Tamarindorum cum Magnesia sulphurica.

Rec. Pulpae Tamarindorum Zjj

coque in suff. ∇ . per ½ hor. in

colat. Zx. solve

Magnesiae sulphuricae Zj

et adde

Syr. Rubi Idaei Zjß.

M. D. Sign.

Alle 2 Stunden I Caffe gu nehmen.

Auch ist die Anwendung des versüßten Quecksilbers scopo purgandi mit andern zweckmäßigen Mitteln verbunden aus mehr als einer hinsicht am rechten Orte.

Rec. Pulv. Hydr. muriat. mitis jj
— rad. Jalappae

Lap. Cancr. ppt. singul. 3j

Sacchari albi 3jj

M. divide in 5res aequales

Nro. x.

D. Sig. Alle 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Ift dieser Zweck erfüllt und sind die Schmerzen sehr hefs tig; so kann man, jedoch nach schon verminderter Entzündlichs keit, ein Schmerz linderndes Klystier aus einem Leinsaamenabs sude mit einem vollen Estöffel OL cocti Hyoscyami, oder aus Haferschleim mit 4 bis 5 Gran Opiumertract geben, und nothigenfalls früh und Abends wiederhohlen lassen. Dauern nach Anwendung dieser Mittel die Zufälle der Entzündlichkeit und besonders sehr hestige Schmerzen sort: so kann man die

Emulsio cum Kali nitrico, im lettern Falle auch dle Campborpulver mit Opium f. 27. reichen. In Sinficht ber Umfcblage auf den ergriffenen Theil, find bie Deinungen ber Mergte in Sinficht ber falten und warmen Comentationen ges theilt; doch durch Berudfichtigung ber entzundlichen Stablen leicht zu vereinigen. Ift die Entzundung neu, Die Sarte noch nicht febr bedeutend, fo tonnen Umfchlage von faltem Baffer oder von verdunnter Aqua saturnina vortreffiche Dienfte leiften. Erige bat Recht, wenn er bier ben Rath giebt, bey Unwendung der falten Umichlage auf ben Sobenfact, einen warmen erwelchenden Bren um das Glied, befonders wenn der Sarn mit Ochmergen gelaffen wird, umgulegen. Sat aber die Epididymitis ichon einige Tage gedauert, fieht man feine augenscheinliche und balbige Linderung auf den Gebrauch ber Ralte, nimmt befonders die Spannung nach dem Unterleibe au, fo mable man warme Umichlage, wozu ber Semmelbren mit Mild, ober auch eine Abtochung von Leins fuchen mit den Speciebus emollientibus gefest werden Fann, vorzäglich geeignet find.

Inter diesen Umstånden durfen auch milde, keineswegs sehr reizende Dampsbåder nicht übersehn werden; ganz besons ders eignen sich Essigdampse dazu, doch hute man sich durch zu große Bige die Intensität des Andranges zu vermehren. Im besten läßt man die Dampse auf einem Nachtstuhle aus sangen; es versteht sich von selbst, daß daben der Hodensack so

boch als möglich erhalten werden muß. Der Borschlag, Salben in den Hodensack einzureiben, ist ben der Epididymitis zwecklos, und ben bem hohen Grade der Entzündlichkeit
offenbar nachtheilig; ist aber das höchste instammatorische Star
blum gebrochen: so kann täglich 2 mal & Quentchen graue
Quecksibersalbe in die innere Fläche der Schenkel eingetrieben
werden.

Rec. Ungti. flavi (Althaeae)

— Hydrarg. einer.

singul. 3ß.

M. D. ad vasculum.

Sign. Frah und Abende ben achten Thell einzureiben.

Hat die Entzündung nachgelassen, oder hat sie überhaupt durch Schwäche der Constitution und vorherrschende Dyscrassen einen langsamen Sang genommen, so darf auch die Behands lungsart nicht so streng antiphlogistisch seyn. Dann kann, wenn großer Schmerz vorhanden ist, der Mohnsaft mit Cams phor dreister und in größern Saben gereicht werden. Aeußers lich werden dann warme Breyumschläge und besonders Dämpfe sehr gute Dienste leisten. Zu letztern sind gewürzhafte Kräuter, wie Chamillen, Hopfen, Flieder, Raute, Rosmarin und ähns liche, besonders geeignet.

§. 33.

Eiterung des Mebenhodens.

So felten auch biefer Musgang beobachtet wird; fo ge: wiß ift boch feine Doglichkeit, besonders wenn die antiphlogis stifche Hellart anfänglich zu lau betrieben, ober ganz vernache läßigt wird. Die erste Spur des Eiterungsprocesses kündigt sich durch einen klopfenden Schmerz in dem ergriffenen Theile, und durch neue Anfälle eines mit starkem Schauer verbundenen Fiebers an. So wie die Eiterung entsteht, wird der Hode mite ergriffen und oft so zerstört, daß nichts als seine Haut zurücksbleibt. Im Ganzen ist die Gegenwart des Siters im Hoden schwer zu erkennen, und man hüte sich, jede sich weich anführ lende Geschwulft des Testikels für Suppuration zu halten. Schon oben §. 31. ist bemerkt worden, daß oft in dem Stadio der höchsten Entzündlichkeit eine scheinbare Schwappung zu sühlen ist. Wird durch die Siterung der Hode nicht ganz zerz siert: so geht er zuweilen auch in unförmliche Desorganisas tionen über.

Hat man sich durch ein sorgfältiges, mehreremale vers suchtes Gefühl von der Anwesenheit des Eiters in dem Hoden überzeugt; so verfahre man kunstmäßig, suche den Proces der Sterung durch Breyumschläge zu befördern, und öffne den Absces zur gehörigen Zeit, worauf noch die Fortsesung der ers welchenden Breye einige Zeit zu rathen ist. Strenge Reinlichs keit der Wunde, die Sorge für den gehörigen Ausfluß des Siters und die Anlegung eines Tragebeutels reichen zur Heistung hin.

the films and the proper production to the second wife and the second that the

§. 34.

Berhartung des Rebenhodens.

Welt baufiger, ale bie Giterung, tritt die Berbartung bes Debenhodens als Folge der Statt gefundenen Epididymitis ein. Gine planlofe, burd Mittel von einer verschiedenen Begiehung ju ber Entzundlichkeit ber ergriffenen Organe bes wirfte Beilart, ju lange Fortfegung ber falten Umichlage und Diatfehler aller Urt icheinen einen folchen Musgang befonders au begunftigen. Der lette Umftand mag mobl Schuld fenn, warum febr felten eine Epididymitis fich volleommen gers theilt, und fo haufig eine Bergroßerung bes Debenhobens und bes Sodens felbft gurucklaft. Gewöhnlich ift eine folche Uns Schwellung ohne alle Gefahr, und Girtanner behauptet gradezu, daß nie ein folcher Ueberreft in den Soben eine bosars tige Richtung nehmen fonne, und verwirft baber auch alle Mittel bagegen; mehrere febr erfahrene Merzte bestätigen Die Behauptung Girtanners. Gewiß ift eine ungluckliche Folge einer folden Berhartung felten, und wie Larren (Denkwurdigkeiten pag. 596.) febr wahr behauptet, ohne innere franthafte Disposition und entschiedene Dyscrafien, als bloge Folge einer tonfenfuellen Entgundung, niemals möglich. Doch ift es nicht ju laugnen, und wird burch bie Erfahrung bestätigt, daß eine folche Induration ben einer vorherrichenden franthaften Disposition und ben neu hinzugekommenen Schabs

lichkeiten, besonders außern Verletzungen, neue Störungen bes
gunstigt; hierher gehören die varlobsen Anschwellungen der Venen des Hodensacks; die Hydrocele, welche in biesem Falle gewöhnlich eine Wasseranhaufung in der Scheidenhaut des Hos dens ist, wirkliche Scirrhosität und im ungläcklichsten Verhälts nisse frebshaftes Verderbniß.

Go lange die Unichwellung bes Debenhobens und bie bamit fo gewöhnliche Ditleibenschaft bes Sobens gang fcmerge los ift, ober nur unbedeutende Empfindung von Bieben ober Drucken verurfacht; fo ift es rathfam nichts anders ju unters nehmen, ale einen Tragebeutel angulegen und ben Sobenfact por allem Drucke ju bewahren; fo verliert fich oft mit ber Beit Die Unschwellung gang und alles febrt jur alten Dormalitat guruck. Sat fich eine Cirfocele ausgebildet, fo hat auch dies feinen nachtheiligen Ginfluß, und bas einzige hier gulagige Mittel find bftere Bafchungen mit faltem Baffer ober ber Gous lardichen Difchung. Sollten aber, mas bod nur außerft fels ten Statt findet, fich beftige, befonders frechende und anhals tende Schmerzen in dem Teftifel bingugefellen, bemertte man unebene Sarten an bem leibenben Soben, fühlte man ben Gaas menftrang noch fren binauffteigen, und berechtigte die Rorpers Constitution zu ber Furcht vor einer frebshaften Berftorung: fo tritt Die Caftration als ein Radifal, Mittel ein, wenn daben die nothigen Rudfichten auf ben Gefammtzuftand bes Organismus verbunden werden. Ift es aber mit ber Berrattung des innern Organismus und der Entwicklung dyskratischer Entmischung zu weit gekommen, oder subit sich der Saamenstrang bis zum Bauchringe hinaus, uneben, hart, knotig und mitergrissen an: so wird die Ausrottung des Hodens ein höchst problematisches Mittel, welches den Tod des Kranken früher herbenführen kann. Unter solchen Umständen ist es gerathen, das Suspens sorium mit einem Schwans oder Kantinchenselle aussüttern, und Tag und Nacht tragen zu lassen. Daben können ganz leichte Einreibungen aus zunze Mandelöl mit z Drachme Opium. Tinctur täglich 2 mal angewandt werden, wodurch oft die ausgenscheinlichste Hüsse geleistet wird. Alle kräftigen tief einwirs kenden Mittel werden den Ausbruch einer krebshaften Zerstös rung eher begünstigen, als verhindern.

Miche immer versuhren die Aerzte ben der Anschwellung und Verhartung der oft erwähnten Theile nach den hier aufgesstellten Prinziplen; dies beweist die Reihe der zu verschlesdenen Zeiten von den Aerzten vorgeschlagenen zertheilenden Mitstel, deren Kenntniß nach den oben aufgestellten Ansichten und den Beweisen einer unbefangenen Erfahrung nur historischen Werth hat. Celsus empfahl gegen die Hodengeschwässte eine Bähung von der Wurzel des Eselskürdisses (Momordica Elaterium) im Honigweine (Mulsum); die Wurzel des Alrauns (Atropa Mandragora) wurde von Plent, Swediaur und Hospergempfohlen, und als Cataplasma mit Semmeltrume auf den Hodensack angewandt; die

fluchtigen Galben wurden zu diefem 3mecte befondere gebraucht, und Seder empfiehlt vorzuglich eine Galbe aus ftinkendem Birfchornol mit Derfurialfalbe. Dirch in London mandte ben veralteten Gefchwülften ber Soben Die Glectricitat an; Diefes Mittel aber trift gang befonders der Borwurf, daß es leicht bey ber minteften innern Disposition eine hochft franthafte, wahrhaft frebshafte Entmifdung und Thatigfeit bervorrufen fann. Huch find mehrere innere Mittel ju verschiedenen Beiten empfohlen worden, beren oftere gladliche Wirfungen, burch Befeitigung der innern Urfache, befonders burch Befampfung ber vorherrichenden Dyscrafie ju erflaren find. Go empfiehle Smediaur unter Diefen Umftanden ein von van Swie, ten befonders gerühmtes Mittel, beffen Wirfungen felten in ber Erfahrung fich bestätigen. Rec. Lap Cancr. ppt. 3j satur. cum Vini rhenani Bj, wovon fruh und abends Eaffe genommen murbe. Stort fchlug bas Confum ins nerlich und außerlich vor, und diefes Mittel fann ben fcrophus lofem Sabitus gute Dienfte leiften. Die Ononis spinosa im Absube von a Ungen auf ein B Colatur, wovon alle 3 Stunden 2 Efloffel genommen murden, ift von Ucrel und Abraham fon empfohlen. Go ift auch ber 216fub von Getbelbaft, die Asa foetida, bas Aconit und ahnliche Mittel au abnlichem Zwecke angewendet worden. Dan hat fogar ver: fucht, burch unangenehme Erschutterungen vermittelft ange: mandter Brech ; und Efel erregender Mittel, Die Unschwels

lungen der Hoden zu zertheilen; besonders haben Swedlaut und Seder diesen Weg empsohlen. Wenn es auch in leichtern Fallen gelingt, so belohnt dann nicht der sehr geringe Erfolg die hochste Beschwerlichkeit der Heilmethode, von der überhaupt ben veralteten Hodengeschwülsten gar nichts, als eine geschwächte Berdauung zu erwarten ist.

Die fehr richtige Beobachtung, bag ein neuer Trippet Die vorhandene Unschwellung des Rebenhodens und des Teftie fels bebt, bat bie Unficht erzeugt, burch Meizmittel die in die Barnrohre eingebracht werben, ben Eripper hervorzurufen und burch die auf biefe Art erregte entzundliche Thatigfeit ben alten Schaden zu beilen. Cappel verwirft diefe Unficht gang; für ble melften galle bat er Recht; in einigen wenigen, wo bie Unschwellung neu, bedeutend und schmerzhaft ift, und bet Rrante in Berhaltniffen lebt, die Pflege des neu zu erzeugenden Erippere abwatten gu tonnen, ift diefe Methode nicht gang gut verwerfen; boch barf nie ble neue Entjundung ber Sarnrobre vermittelft eingebrachten Tripperftoffes bewirft merben; flergu reicht die oftere Einbringung einer Bougle, Die in bringenben Ballen an der Spife mit einer reigenden Galbe, g. B. mit etwas grauer ober rother Merfurialfalbe beftrichen werben fann, vollfommen aus,

9. 35.

Die Nachkur ber Epididymitis.

Ut geachtet ichon oben ermabnt worden ift, daß nicht jeder Tripper des Quedfilbers bedarf: fo ethelicht boch die Borficht, bag ber Argt befonders aufmertfam fen, wenn von einem Erips per die Rebe ift, mabrend beffen langerer Dauer mehrere tone fensuelle Bufalle eintraten. Wenn wir auch mit Od mi bt nicht jede Epididymitis für das Zeichen einer bereits fich ans fundigenden fecundairen Suphilis angenommen haben, und eine folche form burch bloge Unregung des entzundlichen Con: fensus, fo wie auch als Folge außerer Berlegungen gelten laffen: fo halten wir es boch fur febr gerathen, ben Trippers formen, wo eine Rebenhodenentgundung oder eine andere von den folgenden tonfensuellen Formen gegenwartig mar, mo übers baupt die Rolgen eines fogenannten geftopften Trippere vorges waltet haben, die Doglichfeit einer fecundairen Cuphilis ins Huge ju faffen, und das Mothige ju ihrer Berbutung einges leiten. Eine bier febr gu empfehlende Borficht rechtfertigt einen furgen Gebrauch eines milden Mercurialpraparate, moben bas milbe falafaure ausreicht.

Rec. Pulv. Hydr. muriat, mitis gr. xij

— Opii puri gr. vj.

Lap. Caner. ppt. 3j

Sacchari albi 3vj.

M. divide in Pulv. aequales No. xxiv. D. Sign. Fruh und Abende 1 Pulver zu nehmen.

Es versteht fich von felbst, daß unter diesen Umständen eine mit der Merkurialkur harmonirende Lebensordnung angezeigt ist; lettere soll im Verlaufe dieser Vorlesungen naher bestimmt werden.

§. 36.

Entzundung der Borfteber-Drufe.

Unter ben §. 30. gegebenen Bedingungen einer Entzun, dung am Hoden, kann auch ben verhandener Prädisposition zur Entzündlichkelt in ter Vorsteherdruse, eine Entzündung berselben, Prostatitis, Prostatocele inslammatoria Swediaur, (v. Novum medicinae rationalis Systema) entstehn; auch hier geht häusig die Versto, pfung des Trippers voran. Hestige brennende Schmerzen an dem hintern Theile der Harnröhre über dem Damme kündigen das Mitleiden dieser Drüse an. Wird die Berührung in dieser Gegend sehr empfindlich, ist die Stelle gespannt und heiß, wird die Aussonderung des Urins sehr schmerzhaft, oder tritt gar Unterdrückung des Harns hinzu, stellen sich überdies allger meine Zusälle der Entzündlichkeit ein: so bleibt kein Zweisel über die Anwesenheit der Prostatitis.

In eben dem Grade als sich die entzündliche Geschwulft der Drufe vergrößert, vermehren sich auch die Zufälle, besons bers wird der durch die Geschwulft, verursachte Druck auf den Blasenhals und den Mastdarm für die beyden Ausleerungen

gefährlich. Dysurie, Tenesmus und im unglucklichen Falle Ischurie sind dann die nothwendigen Folgen dieser Entz zindung. Gehr reizbare Individuen werden daben von dem hestigsten Fieber ergriffen, wozu sich oft sehr beunruhigende Zufälle gesellen konnen.

Ausgänge bieser Entzündung.

Beitig erfannt und zwechmäßig behandelt, gertheilt fich Die Entzundung der Prostata in wenig Tagen, worauf ber gehemmte Musfluß aus ber Sarnrohre fich auch balb wieber bere 3ft aber die Entzundung febr beftig, und die Form Rellt. verfannt ober vernachläßigt worden, fo fann auch Giterung Statt finden, wo bann die Elteranfammlung entweber in ber Drufe felbft ober in ihren Umgebungen gefchieht, und burch Die gewöhnlichen Erfcheinungen einer fich bilbenben Guppuras tion, durch flopfenden Ochmers in ber leibenben Stelle, burch eine in der Tiefe entftebende Schwappung und burch Abendfieber erfannt wird. Unter biefen Umffanden nehmen oft bie Barnber Schwerben noch mehr gu, und ber Buffand wird febr bedentlich. Ein febr ichlimmer Fall ift ber, wenn bie entganblich gefchwol, lene Drufe nicht gang in Citerung übergeht und lettere fich nur an einzelnen Stellen ausbilbet; eine Erscheinung bie auch in ben Umgebungen ber Prostata vorfommen fann; bann fann fich ber Eiter nicht entleeren und muß, wenn er nicht burch

bochft gluckliche zusammentreffende Umstande resorbirt wird, hochst bosartige sistulose Geschware veranlassen, deren Rur sehr langwierig und beschwerlich ist.

Prostata, welche als unglücklicher Ausgang der Prostatitis und als eine der schlimmsten Folgen des Trippers nicht so selten vorkömmt, als man glaubt; sie wird unter den Folgen des Trippers näher betrachtet werden. Hier nur so viel, daß ein nach der Prostatitis im Mittelsteische zurückleibender Druck diesen Ausgang fürchten läßt, dessen Entstehung von einem scrophulösen Kabitus ganz besonders begünstigt wird. Die sich bildende Verhärtung (Prostatocele scirrhosa Swediaur) bildet sich nur allmählig aus, und erreicht oft nach 20 und mehrern Jahren eine solche Größe, daß daraus höchst nachtheilige Störungen entstehn, und das Leben selbst offendar gefährdet wird.

Der Brand ist ben der Prostatitis ein zwar hochst sels tener, boch ben sehr ungeschlickter Behandlung und einem hos hen Grade der Entzündlichkeit als möglich denkbarer Ausgang.

Sehandlung der Prostatitis.

Sobald der gegründete Verdacht eines entzündlichen Mitleidens in der Prostata entsteht; so ist die Anwendung von 4 bis 6 Blutigeln an dem Damm in der Nähe der Druse das Ealomel mit Krebsaugen und Zucker (S. 32.) gereicht, und der Leib durch milde Alustiere von Rlepenabsude mit etwas Del, oder von lauer Milch, offen gehalten; außerlich wird ein Ums schlag von Semmelkrume mit Goulardschem Wasser befeuchtet und etwas erwärmt aufgelegt, und oft erneuert. Daben ist die strengste antiphlogistische Diat und die größte Rube des Körpers nothwendig.

Ift die Zertheilung nicht erfolgt, und benten die Zufälle auf den bereits Statt gefundenen Eintelet der Eiterung; so muß dieselbe nach den Regeln der Kunft befördert werden; wo dann warme Breyumschläge, Einreibungen von erweichenden Salben und die Unterstüßung der Gesammtkräfte ein zweck, mäßiges Verfahren begründen. Der Absces leert sich im glücklichen Falle durch die Harnröhre aus, oder er wird durch einen Einschnitt in das Mittelsteisch geöffnet.

Sut ist es, nach jeder Prostatitis, besonders wenn der obenerwähnte Druck fortdauert, an die Möglichkeit einer sich sortbildenden Verhärtung der Prostata zu benken, und durch Merkurtaleinreibungen, wozu von der grauen und der gelben Salbe gleiche Theile genommen werden können, der sernern Ausbildung dieses Uebels vorzubeugen. Die Friktionen können sheils an dem Damme, theils an der innern Fläche der Schenz kel gemacht werden.

S. 39.

Unsichten über die Entstehung der konsensuellen Harnverhaltung.

Dehrere Schadlichkeiten tonnen ben vorhandener Drai bieposition Sarnverhaltung erregen, und ben mehrern Rrant, beiteformen tritt diefer Bufall ein; Die Barnverhaltung ift baber in ihrem innern Wefen febr mannigfaltig; Diejenige aber, welche burch gefteigerte und weiter verbreitete Entzundlichfeit ber Barnrohre hervorgerufen wird, ift entichieden entgundlicher Matur, und muß von der frampfhaften Dpfurie und derjenigen, welche von organischen Storungen, befonders aber von ber Berdidung der Saute der Blafe entftebet, forgfattig unter fdieben werben. Unfangilch ftellt fich ben Steigerung ber Ente aundlichkeit nur ein fparfames bochft fcmerghaftes Urinlaffen (Dysuria) ein; oft ift blos die Reigung jum Urinlaffen febr vermehrt und der Sarn fitegt tropfenweise ab (Stranguria). Dur im bodften Grade tritt eine vollfommene Sarnverhaltung und mit ihr ein furchtbarer Bufall ein. Die Bedengegend ift bann febr gespannt, jeber Drud babin erregt große Schmerzen; ber Rrante empfindet Drang den Urin gu laffen, aber jeder Berfuch miflingt; es tommen heftige fieberhafte But falle baju; der Rrante mird unruhig, er belirirt, ber Dunft ift heftig, und wenn nicht zeitig Sulfe geschaft wird, so fteigen die Bufalle, mo bann burch die traurigften Musgange bas Leben bedroht wird,

5. 40.

Die Vorhersagung.

Schon aus dem vorigen S. läßt sich die Gefahr denken, welche ben dieser konsensuellen Form entstehen kann. Oben ist auch schon bemerkt worden, daß unter unglücklichen Umständen durch den Tripper das Leben selbst gefährdet werden kann. Die Harnverhaltung ist unstreitig derjenige Zufall, welcher die Möglichkeit der entschiedensten Lebensgefahr begründet. Wenn alles bald und zwar planmäßig geschieht: so wird die Entzündlichkeit bald gemindert und die Gefahr schnell beseitigt senn. Zwischen dem 4ten und 7ten Tag, selten später, erfolgt die Zertheilung; doch sind unglückliche Ausgänge nicht ganz selten.

Je langer die Harnverhaltung dauert, desto mehr tritt die Entzündlichkeit der Blase hervor, wo dann die Gefahr des Brandes oder der Zerreissung der Blase nahe liegt; es versteht sich von selbst, daß ben den eben genannten Umständen die Rettung unmöglich wird.

Ein höchst schlimmer Ausgang ist derjenige, wo ben der immer zunehmenden Anhäufung des Urins in der Blase, der lettere sich einen Weg in das Zellgewebe bahnt, woraus dann die nicht mehr zu verhütende Abscesse und Fisteln des Mittels seisches entstehn. In vielen Fällen, besonders ben sehr krank, lichem Habitus des ergriffenen Individuums erfolgt unter sole den Umständen der Brand.

S. 41.

Die Rur ber harnverhaltung.

Go bringend in einer folden Lage auch Die Entleerung bes Urins ift: fo ift doch bies nur auf einem allgemeinen ente gundungswidrigen Wege möglich. Swediaur bat Unrecht, wenn er bier auf die Ginbringung bes Ratheters bringt. Bep bem Gebrauche beffelben wird die Entzundlichkeit und mit dies fer die Gefahr vermehrt. Erft bann ift die Unwendung bes Ratheters gerathen, wenn bie größte Entjundlichkelt bereits gebrochen und der Buftand des Blafenhalfes mehr fpaftifch ift. Die Unwendung der Blutigel ift das oberfte Mittel, 6 bis Blutigel an ben Damm tonnen gur rechten Zeit angewendet, Schnelle und fichere Gulfe leiften. Dach der Unmendung ber Blutiget find Brepumichlage aus Gemmelfrume mit Milch ober ben Speciebus emollientibus, Dunftbaber aus Milch mit Baffer, ober einem Mufguß von Klieber ober Fl. Verbasci und ichleimige Ripftiere aus Leinfaamen, Dilch, Grau. penschleim u. bgl. angezeigt.

Auch kann ein mildes Halbbad, deffen Temperatur der individuellen Empfänglichkeit des Kranken angepaßt seyn muß, angewendet werden. Die Temperatur von 26 bis 30 Grad + 0 nach Reaumur ist die gewöhnlichste. Wenn die Heftige keit der entzündlichen Diathesis gebrochen ist, und die Schmer, den und das Drängen noch sortdauern: so tritt die Anzeige für

Drenumschlage wird etwas Hb. Hyoscyami hinzugeseht, auch für die Lavements ist ebenfalls der Zusah von 10 bis 20 Gran Hb. Hyoscyami von gutem Erfolge. Innerlich glebt man unter diesen Umständen eine Mohnmilch, wozu etwas Opium hinzugeseht wird.

Rec. Sem, Papaveris 3ß

Amygd, dulc, excort, Nro. iv

Aq. destill, simpl, Zviij

misce terendo invicem, u. f. l. a.

emulsio, in qua solve

Extr. Opii gr. iij

Sacchari canar. Ziij.

D. Sig. Stundlich zwen volle Egloffel zu nehmen.

Hamilton glebt innerlich Biffen aus 10 Gran Calo. mel und 2 Gran Opinm, von denen alle 6 Stunden einer gereicht wird. So zweckmäßig auch diese Mittel und ihre Verbindung sind: so übertrieben ist die Dosis. Die §. 32. vorgeschriebenen Calomet. Pulver sind zu diesem Zwecke besser geeignet. Swedt aur will von einer auf das Perinaeum gelegten gebratenen Zwiebel sehr gute Wirkungen gesehn haben; spezisisch scheint sie nicht zu wirken; in jedem bedeutenden Falle muß der Sebrauch der Blutigel vorangehn. Man hat Beys spiele, daß ein um die Sichel gewundenes Ephäutchen heftige Opsurien hob. Wenn es auch gestattet ist, dieses Mittel zu

versuchen: fo durfen doch ben feiner Unwendung die oben ans gegebenen nicht verabsaumt merden.

Girtanner schlägt ben verzweifelten Fällen die Ans wendung eines kalten Jußbades vor, und behauptet, daß oft in bemselben Augenblicke, als die Füße des Kranken das Wasser berührten, der Urin zu sließen anfing. Bep gehöriger Anwens dung der oben angezeigten Mittel wird man das kalte Fußbad nicht nothig haben; doch darf es in der höchsten Gesahr nicht unversucht bleiben.

So wenig ben ber höchsten Periode der entzündlichen Die athesis auf den Rath Swediaurs den Ratheter, oder auf den Borschlag Hunters, eine Sonde einzubringen, Rüchsche genommen werden darf: so nothig wird die Anwendung dieser Instrumente, wenn die Entzündlichkeit des Blasenhalses geshoben, aber der Absluß des Urins noch gehindert ist, weil die Stagnation des Urins zu mancherlen Entartungen der Blase, besonders aber zu der, sur die Folge so sehr nachtheiligen, Versbiedung der Haute Veranlassung geben kann; doch erfordert diese Anwendung immer große Vorsicht. In vielen Fällen ist wegen der sich die an den Blasenhals verbreitenden Entzündlich, keit die Einbringung des Katheters ganz unmöglich; doch scheint Swediaur manchmal Necht zu haben, wenn er beschauptet, daß es mehr an dem Mangel einer zweckmäßigen Mesthode, als an der Harnschre liege, wenn der Catheter nicht

hineingeht. In jedem Falle ift es gerathen, während best Einbringens des Infruments ben einem vorkommenden hinder niffe nicht mit Gewalt durchzustoßen, sondern einige Augenstlicke zu warten, und bann wieder den Bersuch zu eineuern.

Unter diesen Umftanden findet auch die Anwendung der auflöslichen Kerzen Statt, besonders wenn zu ihrer Bereitung eine Auflösung des Mohnsafts im arabischen Gummi genome men worden ift.

Sind alle Mittel fruchtlos gewesen, so bleibt dann zur Berhutung bes Brandes ober der Zerreissung der Blase nichts anders übrig, als der Blasenstich. Bon den drey Merhoden, denselben durch den Damm, durch den Mastdarm und über den Schaambeinen zu verrichten, verdient die lettere in den meisten Fallen den Borzug, wie Sommerring früher, und spater Murstnna in Heckers Annalen bewiesen hat.

Eritt ben dieser Form Elterung ein: so muffen die unter solchen Umständen geltenden und oben schon berührten Grunds sate der speciellen Chirurgie in Anwendung gebracht werden; so wie beym eintretenden Brande oder der geschehenen Zers reisung durch flüchtige inzittrende Mittel das entsliehende Leben des Kranken so lange als möglich aufgehalten werden muß.

§. 42.

Die Iritis medorrhoica.

Unter den sowohl durch die Schnelligfelt des Berlaufs, als durch die hohe Gefahr fur das Sehorgan furchtbaren Formen steht diese Iritis oben an.

Der Rrante empfindet ein Druden in einem Muge, bies rothet fich, wird gegen das Licht bochft empfindlich, moben bie Absonderung der Thranen ungemein vermehrt wird. Diothe des Muges ift fo charafteriftifch, daß aus derfelben der geubte Urgt die Matur der Entzundung auch ohne bas Geftande niß des Rranten zu errathen vermag. Die Conjunctiva fieht bennahe ziegelroth aus, schwillt und tritt mulftig unter ben aufgeschwollenen Mugenliedern bervor; es fictert baben eine gelbgrunliche Feuchtigfeit oft in febr großer Denge betaus, woben die Empfindlichfeit gegen das Licht den bochften Grad erreicht. Die Sornhaut trubt fich, und wird julest undurche fichtig, oder geht in eine ichnell zerftorende Giterung über, mos ben die Cornea berftet. In benden gallen bildet fich in febr furger Beit eine unheilbare Blindheit aus. Der gange fo Schreckliche Berlauf enbigt binnen 4 Tagen, nur in feltenen Fallen hat man diefe Iritis milber und langfamer verlaufen gefeben. Geit van Swieten icheinen die meiften Merate bie veranlaffende Urfache diefer Iritis vorzüglich in der materiellen Uebertragung des Tripperftoffes vom Penis an die Mugen gu fuchen und das Bange burch eine übergetragene Entjundung ju

erklaren. Einer der neusten, und in therapeutischer hinsicht unstreitig der beste Schriftsteller über diesen Gegenstand, Spangenberg, (Horns Archiv 1812. pag. 270.) hate ebenfalls diese unmittelbare Translocation des Stoffes für die alleinige Ursache.

Eine genaue Untersuchung über biesen Gegenstand und mehrere einzelne ganz unbefangene Beobachtungen widersprechen dieser Ansicht offenbar. Es ist nicht zu läugnen, daß durch Einbringung des Tripperstoffs in ein empfindliches Auge diese Iritisform herbeygeführt werden kann, wie auch das von Swediaur angeführte Benspiel lehrt; er kannte nämlich einen Menschen, der gewohnt war seine Augen mit Urin zu waschen, und als er dies einmal nach einem unreinen Benschlafe that, von einer surchtbaren Augenentzundung befallen wurde. Doch ist diese Art von Ansteckung ben einem schon ausgebildezten Tripper in demselben Individuo nicht gut möglich, weil die Erfahrung längst gelehrt hat, daß ein angesteckter Kranker sich, so lange die eine Form dauert, nicht wieder selbst anstessen ken kann.

Es scheint wohl außer allem Zweifel zu liegen, daß diese Form eben so eine konsensnelle Erscheinung des Trippers ist, wie die übrigen bisher beschriebenen. Die hohe Zartheit des Organs erklärt vieles, sowohl in hinsicht der Möglichkeit der Emstehung, als auch in hinsicht der Bosartigkeit des Berz laufs;

laufe; gewöhnlich entsteht die Iritis nach plohlicher Einwirs fung der Schädlichkeiten, wodurch eine sogenannte Medorrhoea suppressa herbengeführt wird, so daß bas sehr schnelle Berschwinden eines Tripperausstußes mit Recht Besorgnisse in Hinsicht dieser Entzündung erregen kann.

Es darf hier nicht unbemerkt bleiben, daß diese Iritis nicht mit der chronischen Psorophthalmie verwechselt werden darf, welche Plenk, Swediaur und mehrere andere als Folge eines schlecht geheilten Trippers bevbachtet und durch einen wiederkehrenden Ausfluß, oder wiederholte Ansteckung geheilt gesehn haben.

S. 43.

Prognosis ben dieser Iritis.

Die Vorhersagung ben dieser Augenentzundung war sonst hochst traurig, und man muß gestehen, daß auch noch jetzt die traurigsten Ausgange diese Formen begleiten konnen. Sirst anner hat ben seiner wirklich großen Gelehrsamkeit keinen Fall aufzuzeigen gewußt, wo das Auge erhalten worden ware. Das Eiterauge (Hypopion) ist die allergewöhnlichste unglückeliche Folge.

Seit der Unwendung der Methode Spangenbergs
ift der Ausgang gunftiger, wie die neuften Erfahrungen gelehrt
haben. Soll ein gunftiger und berechneter Erfolg möglich
fepn, so muß in den erften Stunden Sulfe gesucht werden,

weil ben einem fo bibigen Berlaufe schnell der Zeitpunkt eintritt, wo jede Rettung des Auges unmöglich wird.

In Hinsicht der Prognose verdient dies auch noch Bes rucksichtigung, daß diese Form oft bende Augen gefährdet, wo dann in dem hochsten Stadio des einen sich die ersten Erschets nungen in dem zweyten einstellen.

S. 44.

Beilverfahren ben diefer Iritis.

Die allgemeinen therapeutischen Ansichten ben dieser Form werden von den Principien, welche ben dem Tripper und selenen konsensuellen Formen aufgestellt worden sind, bestimmt. Cappel meint zwar, daß blos die schwächende Hellart an dem ewigen Mislingen der Kur Schuld sen: doch ist wohl nie eine seichtere Meinung über diesen Gegenstand geäußert worden, als diese; auch wird sie durch die so glückliche, von Spansen ber g vorgeschlagene Methode gänzlich widerlegt.

Richter empfiehlt gleichfalls aus glücklicher Erfahrung die antiphlogistische Methode, und es ist auch, besonders im Unfange der Form, teine andere denkbar. Spangenberg a. a. D. stellt zur Hellung dieser Iritis drey Indikationen auf:

- 1) das frankhaft absondernde Organ zu diefer Secretion uns tuchtig zu machen, und soviel als möglich zu zerftoren;
- 2) die icharfe und agende Beschaffenheit des Schleims gu mildern und ben Reiz aus den Augen zu entfernen;

3) eine andere starke Reizung in die Rafe des Auges aus jubringen.

Die erste Indikation wird dadurch erfüllt, daß man bie Wulft der Conjunctiva vom Rande der Cornea bis zur Thränenkarunkel mit der Scheere oder mit dem myrthenfor, migen Messer abschneidet und nach gestillter Blutung noch einige Scarisicationen macht.

Die zwepte Indication erfüllt er durch Einsprisungen, welche alle Stunden gemacht werden muffen, und durch Fos mentationen mit dem Conradischen Augenwasser, dessen Bors schrift so lautet:

Rec. Hydr. muriat. corrosivi gr. j.
solve in
Aq. Rosarum Zvj
Trae. Op. crocatae 3ß.
M. D. Sig. Augenwasser.

Die dritte Indifation wird durch ein Blasenpflaster er, fallt; dieses wird in der Große eines halben Guldens auf die Ausbreitung des Musculi supraorditalis gelegt, und hernach mit der granen Merfurialsalbe verbunden, worauf in 3 bis 4 Tagen alle Gefahr beseitigt ift. Aus mehrern Erfahreungen über die glückliche Anwendung dieser Methode geht hervor, daß unter allen bisher besolgten Versahrungsarten die eben beschriebene den Vorzug verdient. Das erstemal

wurde sie in bem hiesigen Krankenhause mit dem erwünsche testen Erfolge angewandt, und seit dieser Zeit mehreremal und immer glücklich befolgt; nur ein einzigesmal blieb eine kleine Verdunkelung der Cornea zurück, die auch allmählig kleiner wurde und jest kaum zu bemerken ist.

Schmidt empfiehlt bey diefer Angen Entzündung fols gendes Augenwaffer :

Rec. Aq. destill. simpl. 3x

Zinci sulphurici 9j

Aceti saturnini 3ß

Spir. vini camphor. 3ij.

M. D.

Daffelbe kann mit hinweglaffung des Camphorgeiftes ben der Spangenbergichen Methode anstatt des Conradifchen in Gebrauch gezogen werden; für fich allein reicht es nicht aus.

Eben so wenig reicht die Anwendung einiger Blutigel an die Winkel des Auges, und der Gebrauch eines kühlenden Aus genwassets aus. Die antiphlogistische Methode der alten Aerzte versehlte ihren Zweck, weil sie zu unkräftig war; hier muß tiefer ins Leben und in die Organisation des Auges einges griffen werden.

Diesenigen welche in Cappels Gelste diese Iritis mit heftig reizenden Mitteln behandeln zu mussen glauben, und zu diesem Zwecke Mra oleoso balsamica oder das Oleum aethereum Caryophyllorum unverdunt einstreichen,

werden fich gewiß nie eines gunftigen Erfolge erfreuen; Die Erfahrung hat fich langft gegen fie erflart.

Swediaur, der diese Iritis nie arztlich zu behandeln Gelegenheit gehabt hat, schlägt vor, einen Einschnitt in die Cornea zu mochen, und dadurch die Materie auszuleeren; der Rath ist unhaltbar, und seine Befolgung wurde zu manscherlen Störungen in den Augenkammern Beranlassung geben. Bildet sich schon ein Eiterauge aus, so kann es allerdings Fälle und Constitutionen geben, wo ein kleiner mit der höchsten Borssicht in die Hornhaut gemachter Schnitt den Eiter entleert, und so eine zweckmäßige Heilart gegen die Störungen des Auges für die Zukunft begründet.

Ueber die schon früher erwähnte Anwendung der Mittel um den Tripper wieder zum Fließen zu bringen, welche so viele Schriftsteller sur unerläßlich halten, gilt das, was über dies sen Segenstand bey der Epididymitis gesagt worden ist. Ift die Entzündung des Auges gehoben: so kehrt auch der Tripper zurück; doch können während der Behandlung der Augen. Entzündung die Seschlechtstheile warm gebadet, und mit großer Borsicht auch milde Kerzen in die Harnröhre gebracht werden.

§. 45.

Folgekrankheiten des Trippers.

Die Struftur der Harnrohre und ble Natur des Trip, pere begunstigen die Erzeugung mancher Uebel, welche als

Ueberreste des Trippers noch lange nach besselben Heilung forte dauern können. Folgende Anomalien können hierher gerecht net werden: der Nachtripper (Medorrhoea chronica), das Juden der Harnröhre (Pruritus urethrae), die Berengerung der Harnröhre (Coarctatio urethrae), die Berschwärung der Harnzeröhre (Exulceratio urethrae), und die Berhärstung der Prostata (Scirrhositas Prostatae). Diese Zusälle sollen einzeln abgehandelt werden.

§. 46.

Die Erscheinungen der Medorrhoea chronica.

Derjenige Aussluß, welcher nach entzündlichen Trippern aus der Harnrohre, und ben Weibern aus der Scheide zurücksteibt, ist unter dem Nahmen des Nachs oder Schleimtrippers, Medorrhoea chronica, habitualis, Blenorrhoea benigna, bekannt. In seinem Verzulause unterscheidet er sich besonders dadurch von dem akuten Tripper, daß ihm die Symptome der Entzündlichkeit mangeln. Das Brennen des Urins ist in dieser Krankheit höchst selten, und gewöhnlich nur ein Resultat einer zu reizenden und unzweckmäßigen Diat. Die Erektionen sind nicht schmerzhaft und die Mündung der Sichel nicht besonders geröthet. Die Farbe und die Consistenz des Ausslusses ist nicht immer ein so

sicheres Kennzeichen, als man wohl anzunehmen pflegt. Ges wöhnlich ist der Ausstuß weiß, zahe und klebrich; doch findet man denselben besonders nach vorausgegangenen Diatsehlern verandert, dunnflußiger und ins grünliche spielend. Die Dauer dieser Form läßt sich am wenigsten bestimmen. Sehr oft verläuft er in wenigen Wochen; er kann aber auch unter unglücklichen Umständen und mit den mannigsaltigsten Abwechstungen seiner Hestigkeit Jahre lang fortdauern.

§. 47.

Das urfachliche Berhaltniß des Nachtrippers.

Ben einer absondernden Membran läßt sich die Mögliche teit leicht voraussehen, daß die vorhandene durch Entzündliche teit hervorgebrachte Absonderung einer Stelle, nach Beseitts gung der entzündlichen Zufälle, noch als habituelle Sekretion zurückbleibe; diese Ansicht wird durch viele Entzündungsformen in andern Schleim absondernden Membranen hinreichend bes stätigt.

Als pradisponirende Ursache des Nachtrippers konnen besonders eine allgemeine Kranklichkeit des Organismus, und vorzüglich Opskrasien aller Art, namentlich strophuloser, gicht tischer und herpetischer Zunder betrachtet werden. Unter eben genannten Umständen kann es geschehen, daß bey der besten und

aufmerksamften Pflege und ben bem punktlichften Berhalten, durch eine gang geringe Schadlichkeit dieser chronische Zustand herben geführt wird.

Die Gelegenheitsursachen, welche den Nachtripper zu veranlassen pflegen, sind in der ärztlichen Pflege und dem diästetischen Verhalten zu suchen. Jedes Extrem in der Wahl der Mittel kann die genannte Veranlassung geben. Sine allzu reizende Methode einerseits, und eine allzu schwächende andrersseits können ben dem entzündlichen Tripper den Schleimtripper als unvermeibliche Folgekrankheit veranlassen. Die Causa essiciens, welche das Wesen dieser Krankheitssorm umfaßt, ist nach Walch siehr richtiger Unsicht in einer drensachen Unomalie zu suchen, wodurch auch eine drensache Heilanzeige dieser Form begründet wird, ben deren Vernachläßigung der Erfolg unberechnet und problematisch ist. Der Nachtripper ist entweder

- 1) durch allgemeine Atonie;
- 2) oder durch eine frankhaft erhöhte Relzbarkeit des Ges fammt. Organismus im Allgemeinen, und der Sexuals Parthien insbesondere, oder endlich
- 3) durch eine organische Störung in der Harnröhre bedingt. Zu lettern wird besonders ein Geschwür oder eine Verengerung der Harnröhre gerechnet.

9. 48.

Rennzeichen ber verschiedenen Nachtripperformen.

Der von allgemeiner Atonie unterhaltene Nachtripper entsteht gewöhnlich ben hochst schlaffen und kachektischen Individuen, besonders wenn ben diesen die asthenissrende Methode während der entzündlichen Periode übertrieben, und nachher zu lange sortgesetzt wurde. Männer, deren Hodensack lang und schlaff herabhängt, und diesenigen, welche aufgedunsen und blaß aussehn, und wenig Trieb zum Bepschlafe haben, sind dieser Nachtrippersorm ganz besonders unterworfen. Der Ausstuß ist hier klar wie Enweiß, klebend und geruchlos, in den Früh: und Abendstunden am stärksten, und der Kranke empfindet gar keinen Schmerz, höchstens ein gelindes Jucken.

Wo krankhafte Relzbarkeit dem Nachtripper zu Grunde liegt, ist in den übrigen Erscheinungen im Organismus eine erhöhte Sensibilität mehr oder weniger ausgeprägt; ben Wels bern und bei sehr erregbaren Jünglingen ist diese Art am häus sigsten. Eine Vernachläßigung der entzündlichen Periode und die verkehrte Ansicht von einer reinen Oertlichkeit des Trippers, woben jede diätetische Rücksicht aufhört, sühren diesen Nachstripper ben dazu vorherrschender Prädisposition leicht herben. Der Ausstuß erscheint hier unmittelbar nach dem akuten Teipsper, oder besser, der Ausstuß hört hier gar nicht auf, in hin sicht seiner Farbe und Consistenz ist derselbe ungleich und under

Statfehler wieder hervorgerusen, bas Glied bleibt empfindlich, und zuweilen, besonders nach Einwirkung irgend einer Schade lichkeit, stellt fich Harnbrennen ein; oft verursacht die bloße Berührung der Geschlechtstheile eine unangenehme Empfindung.

Unter die ortlichen Storungen , welche den Dachtripper ber britten Urt erzeugen und unterhalten tonnen, geboten Die Berengerungen und Berichmarungen ber Barnrobre und bie Geschwülfte und Berhartungen ber Borfteberdrufe. Stro: phulofe und überhaupt frankliche Individuen find auch diefer Rorm am meiften ausgefett. Gine planlofe, befondere durch frubes Ginfprigen eingeleitete, Behandlung ift baufig Schuld an biefer Rachtripperform. Der Schmerz verschwindet bier nie gang, beschrantt fich aber nur auf die ergriffene Stelle, bie man auch burch außeres Unfühlen, benm Abgange bes Urine, beutlich bemerten fann; auch findet Die eingebrachte Rerge bas Sinderniß. In der Regel und besonders ben Sehlern ber Borfteberdruse erscheint biefer Musfluß erft einige Beit nach dem entzundlichen Tripper und ift in feiner Dauer ungemein bart, nadig. Die Farbe und Confifteng ber Ubfonderung gleicht einer bunnflußigen Jauche. Ginige bem Musfluße oft bengemifchte Blutftreifen beuten mit vieler Bahricheinlichkeit auf die Gegen. wart eines Beidmurs.

minute the property of the

§. 49.

Verwechslung des Nachtrippers mit andern Formen.

Da wir nur benjenigen Ausstuß aus der Harnröhre für einen wahren Nachtripper halten, welcher als Kolge nach einem entzündlichen Tripper erscheint und durch die im vorigen J. erwähnten Modistationen gesetzt wird: so muffen auch alle diejenigen Ausstusse aus der Harnröhre und Scheide davon gesondert werden, welche als Resultate allgemeiner Kränkliche feit und bedeutender Entmischungen, z. B. beym wirklichen Saamensluße, bei Schwangern, kurz vor, oder gleich nach der Menstruation, beim Krebse der Sebährmutter, ben Scrospheln, Flechten, Sicht, und dem goldnen Aberfluße, hervorstreten und durch Auswüchse aller Art, besonders in der Scheide unterhalten werden.

sections of board the grant & . to . state a sect a countries

sigen ber Causa proxima beruht die E dieblichelt per

Borbersagung benm Nachtripper.

Durch einen Nachtripper wird zwar das Leben selbst nicht bedroht, aber sehr verbittert. Ben einer zweckmäßigen Bes handlung, wenn Kranke und Arzt die hier so nothige Geduld nicht verlieren, geht es gewöhnlich gut, und die Heilung ers folgt oft wunderbar schnell. Geschieht dies aber nicht, wird der Nachtripper ganz vernachläßigt, oder zweckwidrig behans

belt: so kann er so hartnackig werden, daß die krankhafte Abstonderung sich zum Organismus wie eine habituelle absondernde Thatigkeit verhalt, und kaum mehr zu tilgen ist. Durch den Nachtripper wird die Entstehung oder weitere Ausbildung manscher organischer Störungen langs der Harnröhre begünstigt, und so manche Gefahr für das spätere Leben vorbereitet. Man hat Fälle von Nachtrippern, welche durch drey, sechs, zehn und mehrere Jahre gedäuert und des Kranken beste Tage vers giftet haben.

dilladan, angliga dila digitale alla sindan nacesan

Allgemeine Beilanzeigen ben dem Machtripper.

Dieser Form die oberste Indikation darinn, daß der Arzt die eigenthümliche, das Wesen der Krankheit begründende Ursache aussuchen und heben muß, und auf dem Aussünden und Beseiftigen der Causa proxima beruht die Gründlichkeit der Heilung. Jeder täuscht sich, der da glaubt durch sogenannte Specisica sür alle Fälle auszureichen, und die Erfahrung zeigt uns Nachtrippersormen, welche allen Mitteln zu widerstehn scheinen, die durch eine glückliche Berücksichtigung der beding genden Ursache der gewünschte Zweck erreicht wird.

Balfamische, austrocknende, tonische, leicht abende und Jusammenziehende Mittel find unter den verschiedenartigften Gestaltungen und in den mannigsaltigsten Verbindungen zur Heilung bes Machtrippers sowohl für den innern als für den außern Gebrauch empfohien worden; besondern Rus haben sich der Copaiva. Balfam, der Terpentin, die Myrrhen, die Wachhols der Beereen, die China, und Eichenrinde, der Kino, und Catechusaft, der Alaun, die Tormentisswurzel, die Canthariden, die Mhabars bar, der Goloschwesel, das Opium, das Ammonium, die Merskurtals und Bleppräparate und die Vitriole erworben, und sind sowohl innerlich als auch in der Form von Einrelbungen anges wendet worden. Wie und unter welchen Umständen die oben erwähnten Arzneimittel nühlich werden können, muß aus der Beleuchtung der speciellen Heilanzeigen hervorgehn. In den Breslauer Sammlungen sieht ein Benspiel, daß ein hinzu gestretenes Fieber einen sehr hartnäckigen Nachtripper geheilt habe. Eben so erzählt To de von einem Nachtripper, der, nachdem alle Medicamente ben Seite geseht wurden, von selbst aufhörte.

S. 52.

Behandlung des von Erschlaffung herrührenden Nachtrippers.

Ben dieser Form des Nachtrippers sind die balfamischen, tonischen und starkenden Mittel ganz besonders indicirt; besond ders wirkt der Copalva Balsam und der Terpentin hier mit vieler Sicherheit. Man giebt den Copalva Balsam entweder tropfenweise mit Zucker oder läßt Wasser nachtrinken; täglich zmal 15 bis 20 Tropsen machen die mittlere Dosis aus. Da aber diese Tropfen häufig nicht vertragen werden, so ist die Pillenform noch vorzuziehn.

Rec. Bals. Copaivae 3ß

Extr. stip. Dulcamarae 3ij

Pulv. Rhei optimi 3j

— g. Mimosae q. s.

u. f. l. a. pil. gr. ij. consp. pulv. Cinnam, d. ad scatulam.

Sig. Taglich 4mal 7 bis 8 Stuck zu nehmen.

Die Verbindung des Terpentins mit Mprrhen leistet hier vorzüglich gute Dienste.

Rec. Terebinthinae venetae 3ß

Myrrhae electae 3j

Succi inspiss. Liquiritiae q. s. u. f. l.

a. pil, gr. iij. consp. pulv. Cinnam.

d. ad scatulam.

Sig. Alle 3 Stunden 4 Stuck zu nehmen.

Man hute sich, von den Balfamen zu große, der individuellen Empfänglichkeit nicht angepaßte Dosen zu verschreis ben; oft konnen ben unvorsichtigem Gebrauch derselben Harn-Beschwerden hervorgerufen werden.

Die Verbindung des Eisenvitriols mit Mprrhen gehört ebenfalls hierher.

Rec. Myrrhae electae 3jß

Ferri sulphurici 3iij

Pulv. rad. Tormentillae 3ij

Mucilag. Mimosae q. s.

u. f. l. a. pil. gr. ij

consp. pulv. Cinnam.

d. ad scatulam.

Sig. Täglich 4mal 7 Stud zu nehmen.

Das Catechus Extract fann in folgender Form und mit großem Rugen gereicht werden:

Rec. Catechu 3iij

Pulv. rad. Rhei opt. 3jß

Terebinthinae venet. q. s.

u. f. l. a. pil. gr. ij

consp. pulv. Cinnam.

d. ad scatulam.

Sig. Täglich 4mal 5 Stuck zu nehmen.

In eben biefer Urt kann auch Kino gereicht ober mit Catechu oder Myrrhen, Extract zu gleichen Theilen verbunden werden.

Die von Balch vorgeschlagene China paßt auch bep dieser Nachtripperform, besonders wenn die Atonie sehr groß und über den Gesammt, Organismus auffallend verbreitet ist. Folgende Formel gehört hierher: Rec. Cort. Chinae reg. opt. 3vj
inf. in s. q. \(\nabla \) ferv. per \(\frac{1}{2} \) hor.
colat. \(\frac{7}{2} \) viij refrig. adde
Trae, Op. simpl. gutt. viij
Syr. Balsami peruv. \(\frac{7}{3} \) j.
M. D. Sig.

Mile 2 Stunden 2 bolle Efloffel gu nehmen.

Ben großer Reiflofigkeit, besonders ben Leucophlegmatis ichen Constitutionen, konnen in veralteten Fallen auch die Cans thariden, jedoch mit der hochsten Borsicht und in einem schick, lichen Behikel, gereicht werden.

Rec. Pulveris Cantharidum gr. ij
Camphorae rasae gr. vj
Sacchari lactis 3iij
m. divide exactissime
in pulv. aequales Nro. xij.

D. Sig. Fruh und Abends ein Pulver mit Graupenschleim zu nehmen.

Die kunftliche Milchformel ift bey bem innern Gebrauch ber Canthariden noch vorzuziehn:

Rec. Pulv. Cantharid. gr. iij

— g. Mimosae 3ij
Sacchari albi 3vi
Amygd. dulc. excort. 3j
misce terendo
invicem et sensim

Aq. destill. simpl. Zviij u. f. l. a. emulsio.

D. Sig. Alle 2 Stunden I vollen Eploffel ju nehmen.

Sobald

Sobald ben dem Gebrauche ber Canthariden Sarnbes ichwerden eintreten, und auch ben verringerter Gabe berfelben fich vermehren: fo muffen fie ausgesett werden; ber Gebrauch einer Camphor, Emulfion bebt bann bie nachtheiligen Folgen am fdnellften.

Eine von Blanfard und Cloffins vorzüglich empfoblene und von Balch ebenfalls febr gerühmte Dillens maffe enthalt ein febr wirtfames Gemifche von ben bereits oben empfohlenen Mitteln:

> Rec. Terebinthinae Extr. Gentianae singul. Ziij Kino Ferri sulphurici singul. 3iß

m. f. l. a. pil. gr. ij consp. pulv. Cinnam.

D. Sig. Taglich 4mal 10 Stuck zu nehmen.

Die bier angezeigten Ginfprigungen muffen ebenfalls to. nifche, balfamifche und jufammenziehenbe Mittel enthalten; fie werben unter blefen Umftanden auch gut vertragen. Rolgende von 2l uguft in vorgeschlagene Ginfprigung leiftet gute Dienfte:

Rec. Catechu

Myrrhae

singul. 3i

solve in

Aq. Calcariae ustae 3iv.

D. Sig.

Mis Ginfprigung taglich 3mal anzuwenden.

Die von Becker gerühmte Injection gehört ebenfalls' ju ben wirksamsten gegen diese Machtripperform:

Rec. Cort. Chinae opt 3j

coque in suff. ∇ . per ½ hor.

colat. 3x. refrig. adde

Vini rubri Zij Aluminis crudi Zj.

M. D. Sig.

Menferlich, wie bas obige anzuwenden.

Das Decoctum Salicis laureae mit Alaun ist von Cappel unter diesen Umständen vorgeschlagen worden, und hat sich bewährt:

Rec. Cort. Salicis laureae 3j

coque in suff.

in Colat. 3viij solve

Aluminis crudi 3j

D Sig. Wite bas Obige.

Rortum empfiehlt in seinen Beyträgen zur praktischen Arzneiwissenschaft folgende Einsprisung mit Recht als eine der wirksamsten:

Rec. Gallarum in pulv. redactarum 3ß
coque cum

Aq. fontis q. s.

ut f. Colat. Zviij,

in qua solve

Aluminis 3ij

Zinci sulphurici gr. ij.

D. Sig. Heußerlich, wie die vorhergehenden anzuwenden.

Eine der heftigsten Injectionen empfahl Girtanner; er schlug namlich von folgender Mischung

Rec. Viridis aeris 3vj

Liq. Ammonii caustici 3ij

6 Tropfen auf i Unze destillirten Wassers vor. Nur mit der hochsten Borsicht ben weniger erregbaren Inoividuen und bey sehr hartnäckigen Ausstüßen ist die Anwendung gestattet. Friedrich Hoffmann nennt folgende zur Einsprihung für diese Falle bestimmte Mischung ein Remedium divinum:

Rec. Plumbi acetici 3j

solve in

Ol. Terebinthinae 3v et adde

Camphorae 38

M. D.

Dieses Mittel ist auch verdünnt offenbar noch zu reizend, und wird, mit aller seiner angeblichen Gottlichkeit, von den Sterblichen nicht vertragen. Hierher gehört auch die von Attenhofer so hoch gepriesene und für jeden nicht entzünds lichen Tripper als spezifisch empfohlene Einspritzung:

Rec. Lapidis divini gr. viij

Aq. saturninae Zviij.

D. Sig. Davon täglich 3mal, nachdem es wohl umgeschüttelt worden, eine oder zwen Sprigen voll anzuwenden.

Ausser den Einsprihungen eignen sich auch noch bey dieser Machtrippersorm Waschungen und Bader der Geschlechtetheile; man wählt hierzu geistige Aufgüsse, d. B. von aromatischen Kräutern, oder eine Mischung von Rosmarln Aufguß und Spir. Lavendulae. Cappel schlägt zu diesem Behuse die Auflösung der Stahlkugeln vor.

Die stärkende nährende Diat, welche man so häufig ben allen Nachtripperformen empfohlen hat, paßt ganz besonders ben dem Nachtripper aus Utonie. Eine gesunde und fraftige Kost, ber mäßige Genuß des Weins, Vermeidung seder übermäßigen Unstrengung des Körpers und Beibehaltung des Tragebeutels, sind wesentliche Bedingungen der glücklichen Kur.

Enllen will durch Bewegung zu Pferde mehrere Hels lungen des Machtrippers beobschtet haben; nur bey dem Nach, tripper aus Atonie läßt sich von diesem diatetischen Mittel etwas hoffen, in andern Fästen kann es leicht nachtheilig werden.

Dasselbe gilt auch von der Wirkung eines Benschlass, den viele zur Kur eines hartnäckigen Rachtrippers empsohlen haben; doch verbietet die Sittlichkeit dergleichen Mittel dem Kranken in Vorschlag zu bringen. Hunter empsiehlt Vesicastorien auf die Urethra; ein Mittel, wozu sich wenig Kranke verstehen wollen. Die Application desselben an das Perinaeum ist ausführbarer und in hartnäckigen Fällen sehr wirksam. Swediaur beobachtete einen hartnäckigen Nachs

tripper, wo die Einsprigung der Tra Psychotriae emeticae geholfen haben solt.

Die Electricität ist ebenfalls zur Hebung langwieriger Nachtripper angewendet und von Bacca Berlinghiert sehr gepriesen worden; sie past nur für die Form, welche durch Atonie bedingt wird; ben jeder andern ist sie ohne Nuhen und oft höchst nachtheilig. Dirch wandte elektrische Schläge an; besser ist es, mit Sprengel die Anwendung des Strahs lenbüschels zu versuchen.

5. 53.

Therapeutische Vorschriften für die durch frankhafte Reizbarkeit bedingte Nachtripperform.

Weit schwieriger ist diese Form zu behandeln; jede stür, mische Behandlung kann hier viel Unheil anrichten. Der glückliche Erfolg ist dann nur zu hoffen, wenn die Mittel der individuellen Empfänglichkeit des Kranken angemessen sind. Ungeachtet diese Vorschrift für alle Tripperformen gelten muß: so ist die in Rede stehende von krankhafter Reizbarkeit herrührende Nachtripperart dieser Regel ganz besonders unterworsen.

Für den innern Gebrauch sind die Mineralsäuren, wo man entweder die Tra aromatico-acida täglich 3 bis 4mal zu 30 bis 40 Tropfen mit Wasser reicht, oder auch das Hals lersche saure Mittel auf solgende Art verschreibt: Rec. Dti Salep. tenuioris zvj

Mrae sulphurico-acidae 3ß

Syr. Rubi idaei zj

M. D. Sig.

Alle 2 Stunden einen vollen Egioffel zu nehmen.

Ift die Sensibilität sehr erhöht, der Kranke daben sehr unruhig: so past Cappels Vorschlag, den Nachtripper durch die Tra Opii, von der täglich 3mal 5 bis 6 Tropfen gereicht werden, zu heilen. Der von einigen unter diesen Umständen empsohlene innere Gebrauch des Blenzuckers ist eben so uns sicher als gefahrvoll. Medicus empfahl zur Heilung des Nachtrippers die Haare von den Zeugungstheilen abzuscheren; bey dieser Nachtripperform scheint es am nühlichsten zu seyn.

Eben so schwer ist es ben dieser Form die zweckmäßigen Einsprißungen der individuellen Constitution des Kranken ans zupassen; leicht enisteht Ueberreizung, und wo diese entsteht, erfolgt Verschlimmerung des Uebels oft augenblicklich. Unter allen Einsprißungen ist hier die von Girtanner empsohlene und schon §. 27. angeführte Mischung vorzüglich zu empsehlen, und mit der Vorsicht auzuwenden, daß die Gaben des Opiums und des Blepessigs nur mit der höchsten Vorsicht gesteigert werden.

Auch paßt die von Henry empfohlene Auflösung des essigsauern Zinks hierher; die Verordnung dieses Mittels geschieht auf eine ganz einfache Urt: Rec. Zinci acetici gr. viij solve in Aq. destill. simpl. 3vj.

D. Sig. Lauwarm taglich 2 bis 3mal anzuwenden.

Sierher gehort auch die von Ochlegel empfohlene und §. 27. bereis mitgetheilte Dohnmild mit bem Ririchlorbeer, Baffer als Einsprigung. Der von Cappel empfohlene 216, fud von Lorbeerweidenrinde mit Opium Extract, welchen der, felbe in folden Sallen angewendet wiffen will, ift bier nicht angurathen. Gehr mefentlich ift es ben diefer Machtripperform auf die Lebensordnung fein Augenmert ju richten; eine ftrenge Musmahl ber Roft, Enthaltsamfeit von allen icharfen und febr erregenden Opeifen, Bermeldung vieler geiftigen Getrante, aller heftigen Bewegung, des Bepfchlafe, und ofteres Baben ber Ge-Schlechtstheile in lauer Dild, forgfaltiges Tragen bes Guspen: fortums find die Mittel, ben beren Muwendung es gewiß gelingt blefe bochft laftige Dachtripperform ju befeitigen. Gelingt biefes nicht, ift bie forgfaltigfte Unwendung ber eben genannten Mittel fruchtlos: fo muß man die fophilltische hier gewiß mals tende Dystrafie ergretfen, und wie es fich von felbft verftebt, darnach funftmäßig verfahren.

6. 94.

Heilverfahren ben dem durch ortliche Storungen bedingten Nachtripper.

hat man aus den §. 48. angegebenen Kennzeichen und besonders durch die genauste Local Untersuchung von der Univer

senheit einer örtlichen, ben Nachtripper unterhaltenden Störung sich zu überzeugen Gelegenheit gehabt: so darf man nur von denjenigen Mitteln Gulfe erwarten, welche im Stande sind, die vorhandene Störung aufzuheben und eine Normal: Repros duktion in dem Theile hervorzurufen.

Innere Mittel sind hier nur insofern anwendbar, als entweder diese drtlichen Störungen, wie es häusig der Fall ift, eine suphilitische Beziehung haben, oder auf den Gesammte Organismus so tief und so heftig eingewirkt haben, daß daraus eine allgemeine Form sich entwickelt. Im erstern Falle treten die Vorschriften für die antispphilitische Behandlung ein, im letztern muß eine genaue Untersuchung des Gesammtzustandes und eine sorgfältige Erwägung der Statt gesundenen Einwirstung den Helplan bestimmen und leiten.

Als Einsprisungen sind hier mehrere Mischungen vorges schlagen und in symptomatischer Hinsicht mit gutem Erfolge angewendet worden; zur Nadikalheilung scheinen sie aber nicht auszureichen. Die von Monteggia empfohlene Auflösung des Sublimats paßt in manchem Verhältnisse hierher:

Rec. Hydr. muriatici corrosivi gr. j solve in Aq. destill. simpl. Ziv.

Andere Merkuriolpraparate, besonders die nicht auflöslichen, burfen zu Injectionen nie gebraucht werben. Mit Recht hat

daher Cappel die von Girtanner vorgeschlagene Calomet enthaltende Einsprigung verworfen. Doch paßt die von Gire, tanner gerühmte Injektion:

Rec. Kali caustici 3ß
solve in
Aq. destill. simpl. 3vj
cola per chartam.

D. Sig. Täglich 3mal anzuwenden.

Unter allen außern Mitteln zeichnet sich ben dieser Nachs tripperform der Gebrauch der Kerzen aus. Sobald eine tichtige Diagnose über eine Störung der Form in der Harns röhre als Ursache des Trippers entschieden hat: so ist die Atu wendung der Kerzen das sicherste und schnellste Mittel.

Es versteht sich von selbst, daß die Anwendung der Bousgles mit der nothigen Geschicklichkeit und Borsicht geschehn muß, ungeachtet Swediaur in seinem Werke den merkwürsdigen Fall einer glücklichen Jeilung eines höchst langwierigen Nachtrippers durch eine höchst ungeschiefte Anwendung des Kastheters erzählt. Beim Einbringen kam viel Blut und die Heilung erfolgte; mahrscheinlich wurde durch die Auwendung des Insstruments ein schwieliges Geschwür aufgerissen, worauf dann die Heilung leicht wie bey einer einsachen Wunde erfolgen mußte; besonders wenn man durch den innern Gebrauch des Quecksilbers die syphilitische Beziehung dieses veralteten Gesschwürs zu tilgen suchte.

Die bier im Mllgemeinen angezeigten Rergen tonnen nach Maangabe ber fpegiellen Inbifation aus verfchledenen Gub: ftangen bereitet werben. Jede Pflaftermaffe ift ju Bougien geeignet und fann, wenn es bie Beilungsanzeige erforbert, baju verwendet werden. In der Regel reichen ble in unferer Pharmocopoe officinellen einfachen und blenhaltigen Rergen aus; eiftere find aus einer Mifchung des gelben Bachfes und Olivenols, lettere aus gelbem Bachs und Blepeffig bereitet. Doch ift die Bereitungsart ber Rergen aus Pflafterfreifen'nicht fo gut, wie die von Balch vorgeschlagene, wo namlich baumi wollene gaden gu wiederholtenmalen und fo lange in eine uber bem Feuer gerlaffene Daffe getaucht werden, bis fie bie nothige Dicte erreicht haben, wo fie bann geglattet und vollende gubereitet werden. Diefe von Se der fruher ale auflosliche Bou, gies gerühmten Rergen werben auch aus Merturial : Pflafter maffen bereitet und ben mehrern Bufallen mit einigem Bortheile angewendet. Die größte Wirtfamfelt der Rergen, befondere, wenn von Berengerungen und Berdickungen bie Rebe ift, ber fieht in der mechanischen Muedehnung und bem anhaltenden Drucke, welchen fie hervorbringen; baber find elaftifche Rergen in vielen Fallen allen übrigen vorzuglebn. Sierzu find befone beis (wie ichon oben bemerkt wurde) bie Dickelichen und gang vorzüglich die von Serbft in unfrer Stadt verfertigten gu empfehlen; lettere zeichnen fich befondere burch Glatte, Biege famteit und Dauer aus.

Ben dem Einbringen der Kerzen wird, wie schon oben bemerkt worden ist, Ausmerksamkeit und Geduld erfordert; besonders muß darauf gesehn werden, daß mit der dunnsten Kerze angesangen, und nur allmählig zu einer stärkern der Uebergang gemacht werde, daher sind im Ansange Darmsaiten dazu am besten geeignet. Ansänglich darf auch die Kerze nicht zu lange darinn gelassen werden, well daraus leicht Harnvers haltung entstehen kann.

Ein Mehreres wird von diesen brilichen Störungen in der Harnrohre als Folgeubeln des entzündlichen Trippers im folgenden &. gesagt werden.

S. 35. Das Juden der Eichel.

Sin sehr unangenehmes, haufig ganz vernachläßigtes Folgenbel des Trippers ist das Jucken und Krimmern der Eichel, wozu sich manchmal eine habituelle Chorda gesellt. Es scheint theils durch eine erhöhte Empfindlichkeit des Gliedes, theils durch leichte Störungen der Harnröhre bedingt zu sepn, und ben der Wahl der Mittel ist es sehr gerathen, auf diese Modifikationen Rücksicht zu nehmen. Oft wird dieses Jucken durch einen kleinen kaum sichtbaren nässenden Ausschlag beswirft, welcher häusiger nach dem Sicheltripper, doch aber zus weiten auch nach dem Harnröhres Tripper erscheint und das Jucken veranlaßt. Eine durch die dort Statt gefundene Ents

sündlichkeit dahin habituell gewordene Reigung zu Congestionen scheint diesen Ausschlag besonders zu veranlassen.

8. 56.

Worhersagung ben dem Pruritus glandis.

Das Mebel ist weder ansteckend noch gefähelich, es scheint in den meisten Fällen mehr das Mesultat ergriffner Form und Mischung zu senn und sich als Fehler zu verhalten; wenigstens sind keine Fälle bekannt, wo es eine secundaire Syphilis her, beygesührt hätte. Das Unangenehmste ist, daß es verschwinden kann und nach einiger Zeit doch wiederkehrt. Frihe erzählt von einem Manne, welcher mehrere Tripper gehabt hatte, von denen er aber gut geheilt war. Den biesem Manne entstand der Ausschlag gewöhnlich, wenn er einige Zeit den Beyschlaf unterließ, nach demselben verschwand er immer plöglich, kehrte aber nach 8 oder 14 Zagen eben so zurück.

8. 57.

heilung diefes Zufalls.

Ungeachtet es keiner großen Unzahl von Mitteln bedark, um diesen Zusall zu besettigent so wird boch auch die richtige Auswahl des passenden Mittels zu dem sichern und berechneten Erfolge erfordert. Stranner empsiehlt elektrische Funken aus dem Gliede zu ziehen. Frihe empsiehlt Einsprihungen von frischem Kalkwasser mit Milch, auch ein mit Camphor molagirtes Canthariden Pflafter auf ben Damm. Sunter empfiehlt einigemal des Tags eine Bougle in die Sarnrohre bin und ber ju giehn. Ben bem Musichlage werben Bafdjungen von einer ichwachen Subitmaraufibfung (4 Gran auf i Dit. Baffer) ober einer Difchung mit Liquor Hydr. nitrici, (15 Tropfen auf Diefelbe eben angezeigte Quantitat) ober eine Bleyguckerauflösung, & Ocrupel auf ein Pfd. empfohlen. Much haben fich Baschungen von einer Muflofung von Schwefelleber, Stablingeln ober Gifenvitrol bemabrt. Debrere baben Die Theile mit einem Abfude von Weibenrinde, wogu etwas Brandtwein gemifcht mar, mit gutem Erfolge mafchen laffen. Eine richtige Ueberficht ber eigentlichen Causa efficiens eines folden Juckens, und befonders die Bebergigung deffen, was über die verschiedenen Modifitationen des Machtrippers in bem vorbergebenden &. gefagt worden ift, wird flar zeigen, wie Die eben bier im Allgemeinen angezeigten Mittel in dem indis viduellen Ralle anzuwenden find. Ben großer Sartnachatelt warde jedoch eine Mercurialfur gu rechtfertigen fenn.

§. 58.

Die Verengerung der harnrohre.

Man hat vollen Grund dieses Uebel zu vermuthen, wenn ber Kranke mit Schmerzen Urin lagt, wenn der Strahl dese selben sehr dunne, oder getheilt, oder nach einer Seite gerich; tet, gelassen wird, und wenn endlich eine eingebrachte Rerze ein

Binderniß findet, wodurch das weitere Bordringen derfelben febr erichwert ober gar unmöglich gemacht wirt. Die Entites hung einer folchen Berengerung tann entweder burch Berdie, fung ber innern Wand ber Barnrobre, oder durch margenartige Musmuchfe in berfelben, ober burch frampfhafte Conftitctionen der harnrobre bedingt werden. Gebr oft ift auch die Beren. gerung mit Excoriationen gepaart, welche in Geldmure über geben und ben naberer Unterfuchung geabndet merden. mehrere Ranale ohne vorausgegangene Entzundung verengt werden tonnen: fo hat man auch die Berengerung ber Same robre nicht als Foigeabel des Trippers wollen gelten laffen; befonders hat Sunter, durch einige Benfpiele von Berengerung der Sarntobre ohne vorhergegangenen Tripper, ju diefer Uns ficht Beranlaffung gegeben. Es fann Die Doglichfeit juges geben werben, bag es Berengerungen ber Sarnrohre geben tonne, welche die Resultate ber bochften feblerhaften Bilbung find; aber gewiß ift es, daß die Entjundung der Sarnrobre allerlen franthafte Detamorphofen berbenführen tonne, mor burd Berengerungen bes Ranals nothwendig erzeugt merben muffen.

Solche Verengerungen entstehn sehr langsam; oft vers gehn mehrere, ja sogar bis 20 und 30 Jahre nach dem ges habten Tripper, ehe die Verengerung so weit ausgebildet ist, daß sie den Kranken zwingt, Hulfe zu suchen.

S. 59.

Unterschied der verschiedenen Form der Harnrohre-

Die Einbringung der Rerze Scheint unter allen gegebenen Rennzeichen diesen Unterschied am bestimmteften auszumitteln.

Die von Berdickung der Harnrohre entstandene Berenges rung ist diejenige, wo die eingebrachte Kerze immer an derselben Stelle das Hinderniß und zwar im ganzen Umfange der Harns rohre findet, und die ben aller innerer und (die Anwendung der Kerzen ausgenommen) auch ben der außern Pflege sich nie ans dert, und unter allen am langsamsten zunimmt.

Sind warzenartige Auswüchse (welche man auch als quers laufende Bulfte in der Harnrohre beobachtet haben will), die theils durch vorhergegangene Geschwüre hervorgebracht, theils ohne dieselben, durch blos krant' & Begetation entstehen konnen, vorhanden: so trift die Kerze zwar das Hinderniss immer an derzselben Stelle, aber beschränkt und in der Regel nicht unüberzwindlich. Auch kann die Körperbeschassenheit, in wiesern diesselbe zu Warzen oder andern krankhaften Metamorphosen mehr oder weniger hinneigt, einiges Licht verschaffen. Walch behauptet, daß man zuweisen unter diesen Umständen die inwendig hervorgewachsenen Körper von außen sühlen könne.

Ben der durch frampfhafte Striftur erzeugten Berenge: rung der Harnrohre ift der Umftand besonders wichtig, daß die Rerze oft sehr leicht, und manchmal nur mit vieler Schwierigs feit eingebracht, und bas Hinderniß nicht unwandelbar an ders selben Stelle getroffen wird. Die Harnrohre ist daben sehr empfindlich; der Kranke kann gewöhnlich die Blase nicht ganz auf einmal entleeren, und die letten Tropfen aus derseiben stießen immer sehr langsam hervor.

S. 60.

Urfachen, wodurch bergleichen Berengerungen ber Garnrohre vorbereitet und begunstigt werden.

Schon ben der Behandlung des Trippers ift ermahnt worden, daß die Berengerungen der Harnrohre durch vernache läßigte, übertriebene oder verkehrte Pflege vorbereitet werden können.

Eine gewisse Pradisposition gehört allerdings dazu; am wenigsten wurde die Verdickung der Harnröhre, ohne eine enteschiedene Anlage zu solchen Metamorphosen, wie dieselben leicht ben den Stropheln und der Gicht Statt finden können, entstehn.

Unter allen veranlassenden Schäblichkeiten steht der Mis, brauch einer reizenden, allgemeinen und topischen Behandlung und die übertriebene Anwendung der Bleymittel oben an. Auch mehrere nach einander folgende Tripper können zu Verenger rungen der Harnrohre, besonders aus krampshafter Striktur, leicht Veranlassung geben.

§. 61.

Vorhersagung ben der Verengerung der Harnrohre.

Diefer Bufall gehort unter die bringenoften und bedeus tendeften Folgenbel des Trippers. Ben feiner Entftehung fann er mit einiger Fertigfeit von Geiten bes Beilfunftlers und mit einiger Geduld von Seiten bes Rranten oft recht ichnell geheilt werden; nimmt er aber fo ju, daß dadurch der Ranal der Sarnrobre fo febr verengt wird, daß er nicht mehr bem feinften Strable den Durchgang gestattet: fo fann die daraus nothe wendig erfolgende Ischurie das Leben in die augenscheinlichfte Gefahr feten. Wird dann diefe Berhaltung nicht gehoben: fo berftet entweder die Blafe, ober fie wird gelahmt, ober ber Urin fammelt fich zwischen dem Blafenhalfe und der Stelle ber franthaften Berengerung, erweitert bort bie Sarnrohre und verurfacht Entzundung und Giterung; bann bringt er in bas nabegelegene Bellgewebe oder gar in den Sodenfact berab, mor durch Entzundungen und Bereiterungen berbengeführt werden, beren Folgen Gangran ober bie langwierigften und bart: nadigften Abfreffe und Fifteln im Mittelfletiche find. Der Rrante wird im erften Falle entweber bald am Brande fterben. ober unter unglucklichen Umftanben auf einem noch lange famern aber eben fo fichern Wege einem todtlichen Behrfieber entgegen gebn.

S. 62,

Rurmethode der Verengerungen der harnrohre.

Der Arzt wird gewöhnlich ben der Harnverenzerung dann erst um Rath gefragt, wenn dieselbe bereits zu einem so hohen Grade gestiegen ist, daß daraus die Harnverhaltung entsteht, woben dann zwen Hauptmomente zu berücksichtigen sind; erstens muß die gegenwärtige Ischurte oder Dysurte so bald als mögslich gehoben, und dann die Verengerung als oberste Ursache derselben geheilt werden.

Gegen die harnverhaltung werden gum Theil die S. 41. bereits ermabnten und empfohlemen Mittel vorgefchlagen. Sat bie Sarnverhaltung einige Beit gebauert: fo fann man einige Spuren der Entzundlichkeit vermuthen, und diefe durch eine zweckmäßige antiphlogistische Dethode befampfen. Much die Spaftifche Striftur fann leicht einen inflammatorifchen Buftand gur Rolge haben; baber find bie Unwendung einiger Blutigel an ben Damm, Brepumschlage, Salbbaber und Dampfe, bie hier angezeigten Mittel. Innerlich fann die bereits fruber ermahnte Emulsio cum Opio gegeben und damit fo fortges fahren werden, bis juforderft die entzundlichen, und bann die schmerzhaften Bufalle nachgelaffen haben. Sierauf wird bie Unwendung eines biegfamen Cathetere oder einer Bougie vers fucht, bis es gelingt, ben Abfluß bes Ilrins berguftellen. Dur wenn alles gehörig angewendet und ben der größten Borficht und Gorgfalt fruchtlos bleibt, und wenn daben die Gefahr für

die Urinblase ftundlich zunimmt: bann tritt die Indifation für den Blasenstich ein, wetcher nach den ben ber konsensuellen Sarnverhaltung gegebenen Vorschriften verrichtet wird.

Sft ber Urinabfluß bergeftellt: fo fen man fogleich auf Die Bebung der Berengerung der Sarnrohre bedacht. Ochon fraber ift ermahnt worden, daß, je einfacher die Rerge ift, fie fich besto mehr ju biefem 3mede eignet; es bedarf nichts als eines anhaltenden Druckes um in der frankhaften Metamors phose einen leichten Grad von Entzundlichkeit hervorzurufen, und fo bie Mormalitat wieder gurudguführen. Alles Ginbringen von abenden Mitteln durch bas Sunter iche Inftrument und andere Borrichtungen, tonnen leicht großen Dachtheil erzeugen, weil ftarre Mehmittel leicht gerbrockelt werden und flufige fich auch ben ber größten Borficht verbreiten und die nabe gelegenen Theile entzunden. Saviard will Benfpiele erlebt haben, baß Rrante 24 Stunden nach eingelegten Mehmitteln farben: eine Kolge, die zwar eine große Empfindlichkeit des Organiss mus vorausfest, aber unter unglacklichen Umftanden boch mogs lich ift. Bilfinfon ergablt von einem Unvermogen ju eja: culiren, welches burch Megmittel, die man ben einer Berenges rung ber Sarnrobre eingebracht hatte, erzeugt worden ift. Bon allen mit folchen Causticis verfebenen und gur Ginbringung in die Sarnrohre bestimmten Vorrichtungen lagt es fich behaupten, daß fich ihre Unwendung leicht anhoren, aber febr fcmer ins Wert feben laßt.

Die beste Zeit die Bougien einzubringen, ist fruh ben einer Rückenlage und entleerter Urinblase. Man versuche es zuvörderst mit einer Darmsaite, und halte den Kranken für gesteilt, wenn man so glücklich gewesen ist, diese durchzubringen. Man muß die Geduld nicht verlieren, oft vermag man es mehrere Tage nicht und endlich gelingt es doch. Es gehört Vorssicht dazu, um keinen neuen Kanal zu stoßen. Die Pickelsch en und Herben kerzen haben vorn ein Knöpschen und können daher leicht besestigt werden; wo dies Knöpschen sehlt, muß die Kerze umgebogen werden. Im Anfange sind Darmsaiten den Kerzen vorzuziehn, weil sie dunne ges wählt werden können, in der Harnröhre anschwellen und so diese allmählig ausdehnen.

Wenn alle Mittel, die Verengerung zu heben, fruchtlos find und die Gefahr für die Urinblase drohend wird, oder eine Aussickerung des Urins ins Zellgewebe wirklich Statt findet: so bleibt nichts übrig, als die Harnrohre langs dem Orte der Verengerung zu spalten, eine Kerze einzuziehen und nach den gewöhnlichen Regeln der Kunst zu heilen, was mit einiger Gefahr und vielen Schwierigkeiten verbunden ist.

6. 63.

Ein Geschwur in der harnrohre.

Schon im Verlaufe des Trippers kann die Möglichkeit eines fich bildenden Geschwurs vermuthet werden, wenn der

Pripper auch bey einem guten Verhalten sehr lange und sehr heftig fortdauert, wenn die Schnierzen beym Urinlassen an einer bestimmten Stelle besonders hestig sind, und sich nicht blos auf die Nachensörmige Grube, als den eigentlichen Sit des Trippers beschränken, sondern sich auch nach hinten zu verstreiten; ferner wenn mit dem Aussiuse viel Vlutstreisen absgehn, und der Schwerz beym äußern Drucke immer an einer bestimmten Stelle gefühlt wird. Die eingebrachte Kerze erregt auf der Stelle des Geschwürs Schwerzen, auch bleibt, wenn die Absonderung des Eiters sehr ergiebig ist, etwas Eiter daran hängen; der Ausstuß ist hier immer sehr sparsam, weil ben dem größten Umsange des Geschwürs nicht sehr viel abgesondert werden kann. Oft trifft es sich, daß ein gewöhnlicher Nache Tripper mit dem Geschwüre gepaart ist, wo dann die Quanstität der Aussonderung nichts entscheidet.

§. 64.

Ueber die sphilitische Natur der Geschwüre in der Harnrohre.

Da die Erscheinung eines Geschwürs in der Harnröhre nur nach dem durch Ansteckung erhaltenen Tripper bevbachtet wird: so muß es als suphilitische Form betrachtet werden. In den Fällen, wo durch eine ungeschickte Anwendung des Kathe, ters oder der Kerze die Harnröhre verwundet wird, wird die Stelle, ohne ein Geschwür zu hinterlassen, heilen; und verhindert ein vorhandener syphilitischer Tripper diese Heilung: so wird das Geschwar durch den syphilitischen Stoff die Natur des lettern annehmen.

6. 65.

Urfachen des Geschwürs in der Harnrohre.

Eine heftige Entzündung sophilltischer Natur ift benm Tripper die vorzüglichste Ursache eines Geschwürs in der Harns röhre; doch kann auch eine mechanische Schädlichkeit während eines suphilitischen Trippers eine Trennung des Continui in der Harnröhre erzeugen, und diese kann in ein Geschwür übergehn.

§. 66.

Worhersagung benm Geschwure in der harnrohre.

Ein Geschwür in der Harnrohre muß als eine Storung der Form, wodurch die suphilitische Beziehung für den Gessammt Organismus sehr leicht hervortreten kann, angesehen werden. Ein solches Geschwür darf daher nie vernachläßigt werden. Es ist wohl möglich daß Geschwüre in der Harnröhre vorgekommen sind, worauf die Syphilis nicht erfolgt ist; doch sind diese einzelnen Benspiele wohl erklärbar, und können nie die allgemein geltende Ansicht enekräften. Uebrigens heilt ein Geschwür in der Harnröhre in der Regel langsam, weil der darzüber sließende Urin als eine fortdauernde Schädlichkeit zu bestrachten ist.

§. 67.

Beilung des Geschwurs in der Barnrohre.

Da das Geschwür in der Harnrohre als suphilitische Ur- Form angenommen wird: so muß nothwendig auch die Kur in eine innere und äußere zersallen. Innerlich glebt man Mer, curialppte, wozu das versüßte Quecksilber, das Hahnemann, sche Präparat und nach dem Vorschlage Mehrerer das Hydrargyrum nitricum besonders empsohlen werden. Der von Lesterm bereitete Liquor wird täglich 2 mal zu einem Trospsen mit etwas destillirtem Wasser gegeben, oder auf solgende Art verwendet:

Rec. Aq. destill. simpl. Zvj
Liq. Hydr. nitrici gutt. xviij.
M. D. Sig.

Fruh und Abends i Efloffel ju nehmen.

Man hate fich dieses Mercurial, Praparat in einer febr complicirten Mischung zu verabreichen.

Bur topischen Pflege ist die Anwendung der Kerzen besonders angezeigt. Jede einfache Kerze kann hier einen Reiz verursachen und die Fläche des Geschwürs aufregen, wodurch dann die Heilung begründet wird; indessen ist hier der Gebrauch der auflöslichen Hahnemannschen Kerzen, welche aus Mercurialpstaster bereitet werden können, am rechten Orte. Auch können die Kerzen mit einer Merkurialfalbe, oder mit einer leichten, die gesunde Wand der Harnröhre nicht gefährdenden Gublimat: Auslösung

an der Spige bestrichen und mit Vorsicht eingebracht werden. Bu Einsprigungen konnen ebenfalls leichte Auflosungen bes salzsauern oder salpetersauern Quecksilbers genommen werden.

> S. 68. Verhärtung der Prostata,

theils als Folge einer konsensuellen Prostatitis (§. 37.) theils auch ohne dieselbe, als bloßes Folgeübel des Trippers, bildet sich die Geschwulft der Borsteherdrüse (Prostatocele Swediaur). Bey jedem heftigen Tripper ist die Prostata mehr oder weniger mitergriffen; das geschwollene und schmerz; baste Mittelstelsch deutet darauf. Schon oben ist erwähnt worden, daß sich dieses Uebel nur sehr langsam ausbildet, das her von vielen Kranken nie als Folge eines vielleicht vor 10 bis 15 Jahren da gewesenen Trippers begriffen werden kann. Unch ist dieses Uebel nicht so ganz selten, und Girtanner scheint Necht zu haben, wenn er das schwere Harnlassen im höhern Ulter nicht sowohl für die Beschwerden der hohen Jahre, wos für es mancher alte Lebemann gelten lassen will, als vielmehr für Folgen einer solchen Verhärtung hält.

S. 69.

Diagnosis diefer Berhartung.

Man vermuthet diese Geschwulft an bem Gefühle des Druckes und ber Schwere über dem Damme, an der Schwies rigfeit des Urinlassens, an der schmerzhaften Aussonderung des

Saamens; man erhalt Gewißheit, wenn man den mit wars men Del bestrichenen Finger in den Mastdarm bringt, wo man leicht die vergrößerte und verhartete Prostata fühlen kann. Le Drans seht als Kennzeichen für diese Geschwulst den Umsstand fest, daß daben der hartere aus dem Mastdarm entweischende Roth den Sindruck der verharteten Prostata annimmt. Diese Erscheinung ist zu schwer auszumitteln und zu trüglich; daher unzuverläßlich. Einige Erscheinungen verleiten oft den Arzt und den Kranken hier einen Stein zu vermuthen; eine genaue Untersuchung wird diese Täuschung bald heben.

S. 70.

Urfachen diefer Berhartung.

Der Tripper ist eine der vorzüglichsten Ursachen dieser Geschwulft; doch nicht die einzige. Ben strophuldser und gichtischer Dyskrasie ist eine solche Geschwulst der Borstehers Drüse als metastatische Erscheinung leicht möglich, wo dann dieselben Erscheinungen eintreten, als ben der, welche durch einen frühern Tripper veranlaßt wurde. Der bekannte Arzt Fothergill starb in seinem höhern Alter an einer Harnvers haltung, welche durch eine Prostatocele sungosa herbens geführt wurde, ohne je ein Weib erkannt zu haben.

§. 71.

Prognose ben der Prostatorele.

Diese Geschwulft gehört unter die hartnäckigsten Uebel, Die nur ben ihrem ersten Entstehn mit einiger Zuversicht eines

Berechneten Erfolge argtlich behandelt werben tonnen. blefe Beidmulft aber eine bedeutende Große erhalten, fo ift ihr oft auf teine Urt bengutommen. Manchmal entgundet fich eine folche Beidmulft, und bildet eine bochft langwierige und Schmerzhafte Exulceration S. E. Petit beobachtete eine Ge-Schwulft der Prostata von ber Große einer Fauft. Gin abne licher Fall ift bier vor einigen Jahren ben einem 75 jahrigen Beren vorgetommen, der daran farb, well er ben Blafenftich hartnadig ablebnte. Die Section zeigte Die Gefdmulft ber Prostata in der Große eines Suhnerenes. Ben diefer Sarts nadigfeit des Uebels muß man oft froh fenn, die dringenoften Erscheinungen beseitigen ju tonnen, mas in vielen gallen, wie Bribe febr richtig bemerft, ebenfalls eine große Schwierigfeit Oft gefellen fich Lahmungen ber Sphincteren der Blafe, hat. bes Maftdarms und ber untern Ertremitaten bingu, welche bie Leiden und die Gefahr noch vermebren.

§. 72. Speilung.

Da auch ben diesem Zufalle die arztliche Hulfe gewöhns lich erst dann gesucht wird, wenn bereits die ersten Zufalle der Harnverhaltung den Kranten qualen: so tritt zuförderst die symptomatische Indikation für die möglichst schnelle Entleerung der Blase ein. Man versucht das Einbringen des Katheters und sordert diese Operation durch innere Gaben des Bilsenkrauts

Ertracts, Einreibungen einer Opiatsalbe und durch Rinftiere aus digten und schleimigten Abkochungen, wozu 2 bis 3 Gran Mohnsaft hinzugeseht werden. Man sucht einen elastischen Katheter einzubringen, und läßt diesen dann einige Tage in der Blase, wo man ihn mit einem neuen und reinen verwechselt. Im Falle des Nichtgelingens, so wie ben den sich darbietenden Schwierigkeiten der Behandlung verfährt man, wie ben der Harnverhaltung gelehrt worden ist.

Bur Bertheilung der Gefdwulft find mehrere Mittel vorgefchlagen worden, deren innere und außere Unwendung aber nicht zuverläßig ift. Der innere Gebrauch des Schierlings, ber Belladonna, des Goldichwefels und des gebrannten Schwammes, burfte ben der Berhartung der Prostata. welche durch einen ferophulofen Sabitus begunftigt wird, und als Reffer der Stropheln hervortritt, am zweckmaßigften fenn. Ben arthritischer Dysfrafie werben Guaiaf, Spiefiglang, Afonit und das Decoctum Mezerei gute Dienfte leiften. Bo ein fruberer venerischer Tripper Die Proftatocele als Uebers bleibfel guractließ, find jum innern Gebrauch Mercurialia ans Menferlich empfiehlt man Ginreibungen vom Linimento ammoniato, der Merfurialfalbe, des Terpentins Dele, Beficatorten auf ben Damm, mit Del beftrichene Rergen in die Blafe. Das frifd gequetschte Schierlingefraut, ober bie Wurgel der Mandragora find ju gleichem Behufe empfohlen worden. Go hat man bas Geebab, ben Galvanismus, bie Electricität und die Bultigel an ben Damm bagegen angewendet. Man hute fich, durch zu häufige und reizende Mittel die ver, bartete Prostata zu entzünden, weil dies eine bösartige und schmerzhafte Sterung giebt. Sobald diese eintritt, muß sie nach ben Regeln der Kunst befördert und behandelt werden.

§. 73.

Der weibliche Tripper.

Im Allgemeinen gilt ben dieser Form alles dieses, was über die Entstehung, die eigenthümliche Natur, die prophystaktische und therapeutische Pflege des mannlichen Trippers gestagt worden; nur die Verschiedenheit des organischen Baues der weiblichen Sexual Organe und die davon abhängende Versschiedenheit der Zufälle, macht einige Modificationen nöthig, die hier näher entwickelt werden sollen.

Ben den Weibern beginnt der Tripper ebenfalls mit hef, tigem Jucken der Scheide und der Schaamlefzen, bis sich die Entzündung ausbildet, und die krankhafte Absonderung ein, tritt. Die Entzündung verbreitet sich hier über die Schaams lefzen, die Clitoris, und die innere, nach Girtanners sehr richtiger Bemerkung, besonders obere und hintere Fläche der Scheide. Bell hat offenbar Unrecht, wenn er behauptet, daß der Sig des sphilitischen Trippers ben ben Weibern in der

Barnrobre, bes gutarrigen weiffen Bluffes aber in ber Ocheibe Das Mitergriffenfenn ber Sarnrobre gebort unter bie feltenern galle und icheint bann nur fonfenfuell ju fenn. Da die absondernde Rlache viel großer ift, fo wird der Ausfluß auch viel bedeutender, und bangt, fo wie ben dem mannlichen, in Sinficht feiner Karbe und Confifteng von bem Grade Der ents gundlichen Seftigfeit ab. Die gange Flache ift mit biefer 216s fonderung überzogen ; diefe ift oft fo fcharf und freffend, bag fie fich bis gur Deffaung des Maftdarms ergießt und bort Schmerz und Stublzwang (mas man bier Maftdarm Tripper nennt) erregt, ober fich über Die innere Gette ber Schenfel verbreitet und dort Entzundung und Erofionen verurfacht, mos durch bas Geben febr ichmerzhaft und bas Gigen felbft bes fcmerlich wird. Unter biefen Umftanden treten bann auch fieberhafte Bufalle ein, und bie Lage wird unertraglich, boch gebort folche Seftigfeit unter Die feltnen Falle. 3m gewohns lichen Kalle ift wegen der ichwammigen Struftur und badurch bedingten individuellen geringern Empfindlichkeit, der Berlauf gelinder, und blos, wenn baufige Ercortationen und Erulceras tionen, die fich als wirklich venerische Geschwure verhalten, das mit verbunden find, fteigt die Seftigfeit der begleitenden Bus falle. Spannungen in der Leiftengegend fehlen felten; auch treten oft ichmerghafte durch Mitleidenschaft ertlarbare Empfindungen in der Blase und im Mittelfleische bingu.

S. 74.

Unterscheidung des weiblichen Trippers vom gewöhn-

So haufig auch ein Misgriff in dieser Hinsicht vorge, kommen ist: so wird die Diagnostif dem geübten Arzte boch nicht so schwer fallen. Erstens muß hier die Art der Entstehung gewürdigt werden; sie giebt darinn einiges Licht, dann bes rücksichtige man folgende, wahrhaft charafteristische Kennzeichen eines sphilitischen Trippers:

Hier sind deutliche Spuren der Entzündlichkeit und ein mehr akuter Berlauf; die Schaamlefzen sind geschwollen, in den meisten Fällen an ihren innern Flächen ercoriirt; das Brens nen beym, oder bester, nach dem Harnlassen sehlt in dem höchssten Stadio der Entzündlichkeit nie. Die monatliche Reinisgung macht ungestört ihren Berlauf, woben sich alle Zufälle der Entzündlichkeit vermehren; das übrige Besinden ist hier ungestört; die Gesichtsfarbe wie in gesunden Tagen. Ein Weib kann blühen, und den Zunder furchtbarer Unsteckung in sich tragen.

Ben dem chronischen weissen Flusse verhalt sich alles ans ders; die Erscheinungen deuten sammtlich auf hohe Erschlaffung des Organismus im Allgemeinen, und der Schleim abson; bernden Organe in der Scheibe insbesondere. Der Entstehung geben alle die Schädlichkeiten voraus, welche einen solchen Zus

stand vorbereiten und veranlassen können; der Verlauf selbst ist mit allen Erscheinungen bedeutender Schwäche gepaart. Ein blasses aufgedunsenes Aussehn, ein in Thränen schwimmendes Auge, öfteres saures Ausstehn, ein in Thränen schwimmendes Auge, öfteres saures Ausstehn, Appetitiosigkeit und mehrere andere Zufälle geschwächter Verdauung, Unmuth, Abgeschla, genheit der Glieder, Regellosigkeit oder gänzliches Ausbleiben der Periode, Schmerzen und Ziehen in den Lenden, gänzliche Abwesenbeit der entzündlichen Zufälle, und eine häusige aber nicht scharfe Aussonderung aus den Schaamtheilen sind die bes gleitenden Symptome einer Leucorrhoea benigna.

§. 75-

Prognose benm weiblichen Tripper.

Schon oben ist erwähnt worden, daß der Verlauf in Hinsicht der Erscheinungen gelinder ist, wie ben dem Tripper der Männer; dies gilt aber nur in Hinsicht der begleitenden konsensuellen Erscheinungen und der Folgeübel, die theils we, gen Mangel mehrerer, ben Männern leicht mitleidender Organe nothwendig wegfallen mussen, theils wegen der geringern Empfindlichkeit der Scheide überhaupt seltner sind. Offenbar unwahr ist jedoch Balchs Behauptung, daß die Iritis ex suppressa Medorrhoea ben Beibern nicht vorkomme; dieser Fall ist sogar nicht ganz selten.

Ben der Gelindigkeit der Zufälle ist aber der Uebergang dur sekundairen Syphilis durch den weiblichen Tripper leichter

und häufiger, als ben dem männlichen. Die ben jenen so häufig vorkommenden Excoriationen und Exulcerationen begünstigen die Ausbildung der sekundairen Syphilis ungemein. Der Ueber, gang in eine Medorrhoea chronica ist wegen den hier so häufigen Schleim absondernden Organen auch sehr häufig, und man muß auf diesen Umstand ben der Pflege ein stetes Ausgenmerk richten. Schon Boerhave hat sehr richtig bemerkt, daß der Tripper ben Welbern zwar weniger beschwerlich, aber langwieriger und hartnäckiger als ben den Männern ist.

§. 76.

Rur des weiblichen Trippers.

Im Allgemeinen wird die Kur des weiblichen Trippers nach den ben dem Tripper überhaupt bestehenden Prinzipien gesteitet; dieselben Indikationen, welche §. 26. aufgestellt worden sind, haben hier ebenfalls volle Gultigkeit. Die reizenden, den aufgenommenen Stoff zerstörenden Einsprisungen aus Kali caustico und Sublimat können hier wegen der geringern Empfindlichkeit weit leichter angewendet werden, als es bey den Männern der Fall ist.

Sobald sich die Entzündlichkeit ausgebildet hat, tritt auch hier die antiphlogistische Methode ein; doch darf nur außerst selten zu Blutentleerungen geschritten werden, weil auch in dem heftigsten Stadio die Entzündung nicht den hohen

boben Grad erreicht, den man so oft ben Mannern beobachtet. Daher konnen auch hier die ben dem mannlichen Tripper für die hochst entzündliche Periode so strenge untersagten Einzsprihungen Statt sinden, wozu man etwas laue Milch entzweder allein oder mit etwas Kalkwasser oder eine sehr verdünnte Austösung des Blepzuckers zu benuhen psiegt. Die Einzsprihungen geschehn entweder durch eine gewöhnliche Mutterzsprihe, oder durch einen zinnernen, oben converen und mit vielen kleinen Oeffnungen versehenen Inlinder, oder endlich durch die von Girtanner vorgeschlagene Sprihe, welche aus einer, 4 bis 7 Zoll langen, nur 2 Linten im Lichten haltenden, mit einem 6 bis 8 mal durchlöcherten Deckel versehenen elsenbeinerz nern Röhre besteht; am lehtern ist eine elastische Flasche, welche ungesähr 1 Tasse Flüßigseit hält, besestigt.

Erweichende, mildernde Dampfe sind hier besonders ans gezeigt; man kann sie nach Swedlaurs Vorschlag vermitt telft eines Schwammes anbringen. Gegen das Wundwerden der innern Flache der Schenkel leistet die von Swedlaur emspfohlene Galbe aus 1 Unze Hammelfett und 2 Unzen süßen Dels gute Dienste; auch kann ein frisch bereitetes Zink, oder Cerussa: Salbchen dazu genommen werden.

Die Schaamtheile felbst nach dem Rathe einiger mit Merkurialfalbe zu reiben, ift nachtheilig; find aber Erulceras tionen vorhanden: so muffen dieselben mit etwas grauer Salbs

ober mit einer Mischung aus dem Hydr. muriat. mitis 3j und Ungti rosati ZB bestrichen werden.

Der Gebrauch des Queckfilbers ist ben dem weiblichen Tripper wegen der hohen Gefahr einer sekundairen Syphilis unter allen Modifikationen des Trippers angezeigt. Sind Exulcerationen vorhanden: so muß die Merkurialkur gleich vom Unfange eingeleitet werden; ausserdem beschließt man die Kur mit einem 16 bis 20tägigem Gebrauche des Quecksilbers; man wählt in benden Fällen die mildern Praparate; das versüßte oder das Hahnemannsche Quecksilber.

Wenn das Stadium der Entzündlichkeit sich zum Ende neigt, und wenn besonders die körperliche Constitution einen chronischen Ausstuß begünstigen könnte: so sind tonische und abstringirende Einsprikungen angezeigt. Ausser den ben mannlichen Trippern zu diesem Behuse empfohlenen Mitteln, können auch die Swediaurschen Einsprikungen aus Kalkwasser mit Weingeist, oder einer leichten Aussösung des blauen Vitriols in destillirtem Wasser (5 bis 6 Gran auf 1 Pfd. Wasser) gemacht werden. Die Verengerung der Scheide entsieht selten, und wenn sie sich ausbildet, ist sie gar nicht zu fürchten, weil sie nie den hos hen Grad erreicht, um ben einer künftigen Entbindung ein wesentliches Hinderniß in den Weg zu legen.

Bom Gicheltripper.

S. 77.

Bestimmung und Berlauf der Form.

Eine Entzündung der Eichelfrone mit Absonderung einer zähen Flüßigkeit, heißt Eicheltripper (Balanitis) Blennorrhoea balani.

Ben Diefer Form ift ber Ochmers an der ergriffenen Stelle und in der Borhaut, befonders mo diefelbe die Entzundlichkeit beckt, an der fie immer mehr oder weniger Theil nimmt; in der Regel ift die Sarntobre baben nicht ergriffen, Daber bas Urin. laffen gang fren von Statten geht; boch giebt es Ralle mo bie Balanitis mit dem Tripper abwechfelt, oder damit gepaart ift, wo dann auch die Bufalle des Lettern vorfommen. Ereftionen Schmergen oft; doch wird diefe unangenehme Em= pfindung größtentheils burch die Spannung der entzundeten Borhaut erzeugt. Un bem entzundeten Theile ber Gichelfrone ficert mit heftigem Jucken entweder die Feuchtigkeit unmittelbar aus der entgundeten Stelle hervor, oder es bilden fich Ercoria, tionen, welche biefe Feuchtigfelt ergießen; immer aber nimmt ber Musfluß aus den die Gichelfrone umgebenden Drufen feinen Urfprung. Gobald die Borhaut abgezogen wird, findet man gewöhnlich einen talgartigen lebergug.

S. 78.

Urfächliche Momente des Gicheltrippers.

Als pradisponirende Urfache diefer Form ift eine große Empfindlichkeit der Sichel, welche durch eine zu lange Vorhaut besonders begunftigt wird. Selten findet diese Form ben denen, beren Vorhaut furz oder beschnitten ift, Statt.

Die Gelegenheitsursache ist in allem dem zu suchen, was die Eichelkrone, und besonders die sie umgebende Furche aufsreizen und in Entzündungszustand verseben kann. Mangel an Reinlichkeit, Verwahrlosung seines eignen Körpers, vielleicht auch schlechte und sparsame Nahrung können diese Form veranslassen. Ganz besonders aber ist der sphilitische Stoff dazu geeignet, der von einem andern Individuo auf eine empfindsliche Stelle der Sichelkrone übertragen, eine solche Entzündlichskeit hervorruft, und zugleich derselben die Ansteckungsfähigkeit mittheilt.

Die bedingende Ursache des Sicheltrippers ift eine Ente zundlichkeit der Drusen der Sichelkrone, jener nicht unahnlich, welche ben dem Tripper in der Nachenformigen Grube Statt findet.

§. 79.

Unterschied zwischen einem suphilitischen und nicht suphilitischen Gicheltripper.

Da die Bestimmung der Frage: in wiefern der Gichels Tripper im gegebenen Falle anstecken tonne? gang allein durch eine genaue Kenntniß des Eicheltrippers begründet werden kann: so kömmt es ben der Diagnose sehr darauf an, bestimmen zu können, wodurch der eigentlich sphilltische Eicheltripper sich von dem nicht sphilltischen auszeichne.

Dlejenige Entzündung, welche bald nach einem verdache tigen Bepschlafe entsteht, sich schnell ausbildet und mit Excorlationen begleitet ist, kann in der Regel für einen spehilitischen Eicheltripper anerkannt werden. Ein hartnäckiger Verlauf zeiche net ihn dann ganz besonders aus. Den dem nicht spehilitischen wird in der Regel eine sehr lange Vorhaut und ein Hang zur Unreinlichkeit wahrgenommen.

S. 80.

Prognose ben dem Gicheltripper.

Do geringfügig auch die Erscheinungen ben dem Sichels Tripper gewöhnlich sind: so bedeutend können sie ben der sysphilitischen Natur der Form und vorhandenen Ercoriationen werden. Verbreitet sich die Entzündlichkeit; so wird leicht die Vorhaut davon ganz ergriffen, und schließt sich dann entweder vor der Sichel, und seizt die Form der Phimose, oder was noch gewöhnlicher ist, die Zuschnürung geschieht hinter der Sichel, wo dann eine höchst gesahrvolle Paraphimose entsteht. Auch können die Ercoriationen in Geschwüre entarten, und eine Umgebung von Schankern um den hintern Rand der Sichel, die sogenannte Corona Voneris bilden; wodurch nicht blos

eine schmerzhafte Krankheit für den Moment erzeugt, sondern auch die sekundaire Syphilis fast unvermeidlich wird.

Als Folgeübel des Eicheltrippers entsteht leicht eine so gesteigerte krankhafte Empfindlichkeit der Eichel, daß ben der geringsten oft unerklärbaren Veranlassung leicht Entzündlichkeit an der Krone der Eichel, oder ein Hirse ähnlicher juckender Ausschlag hervortritt; besonders ist jede Friktion ben einem auchganz reinem Benschlase dazu geeignet, ein solches bereits vers schwundenes Folgeübel wieder hervorzurusen.

§. 81. Kur des Eicheltrippers.

Aus den allgemeinen Ansichten lassen sich die Indikationen, welche bey der Heilung eines syphilitischen Eicheltrippers leiten mussen, bald abstrahlren. Alles muß auf die Heilung der gegenwärtigen Form und auf die Verhütung der sekundairen Syphilis berechnet seyn. Diese doppelte Indikation erfüllt man zusörderst durch die strengste Reinlichkeit, deren Beobachstung zur Verhütung des Eicheltrippers überhaupt nothwendig und zur Heilung eines nicht syphilitischen Eicheltrippers insbessondere zureichend ist. Man benußt hierzu eine Mischung von Kalkwasser und Milch, oder eine verdünnte Aqua saturnina. Ist es schwer die Vorhaut zurück zu streisen: so mussen die oben genannten Mittel zwischen die Vorhaut und die Eichel vermittelst einer kleinen Sprifte insicirt werden, die es ohne

Gefahr der Möglichkeit einer Paraphimose gelingt, die Bor, haut zurückzubringen. Zeigen sich dann Excoriationen, deren Fläche speckartig wird, und die welter um sich freffen: so wende man eine leichte Auflösung des ähenden salzsauern Quecksils bers, wozu etwas Opiumtinctur gesetzt werden kann, vermitztelst etwas Charpie an:

negurous Rec. Hydr. muriat. corrosivi gr. ij

and dissect Aq. destill. simpl. 3ij

Trae Op. simpl. 3j.

M. D. Sig.

Heußerlich anzuwenden.

Auch kann eine ganz leichte Auflösung tes salpeter, sauern Quecksilbers (r Tropfen Liq. Hydrarg, nitrici auf zuge bestillirtem Wasser) zu diesem Behuse angewendet werden. Ginige empfehlen den Gebrauch einer leichten Pract, pitat Salbe, welche aber ben einem hohen Grade der Entzunde lichkeit oft recht sehr nachtheilige Folgen haben kann.

Sund Guilla

Lect Hydraes

Die bisher beschriebenen Zufälle sprechen deutlich für die Gegenwart eines spphilitischen Eicheltrippers, besonders wenn die Corona Veneris ausgebildet erscheint. Unter diesen Umständen ist der innere Gebrauch des Quecksilbers durchaus angezeigt. Man bedient sich hierzu des versüßten, des Hahner mannschen und des ähenden salzsauern Quecksilbers; woben

dann in den erften Tagen die entzündungswidrige Diat, fpater aber das ben dem Gebrauche des Quecksilbers noch naher zu bestimmende Verhalten beobachtet werden muß.

Sut ift es, die Geschlechtstheile mabrend der Rur durch einen Tragebeutel zu firlren, und dem Kranken jedes oftere Machsehn und Befühlen gang zu untersagen.

Segen die als Folgeübel des Trippers erwähnte Anlage zur steten Entzündlichkeit der Eichelkrone und zur frieselformigen Efflorescenz, nüht der fortgesetzte außerliche Gebrauch des Liq. Hydr. nitrici. Auch wird eine zwar sehr unchemische aber kräftige und ungemein wirksame metallische Mischung empsohlen:

Rec. Hydrarg. muriat. corrosivi gr. jv.

Plumbi acetici B

solve in

Aq. destill. simpl. Zjv

et adde

Zinci oxydati albi 3j M. D. Sig.

Bohl aufgeschüttelt taglich 2 bis 3mal außerlich anzuwenben.

Bom venerischen Geschwüre ober Schanker.

S. 82.

Bestimmung bes venerischen Geschwurs.

Ein schnell sowohl in der Tiefe als in der Breite um fich fressendes, mit einer speckartigen Oberfläche, schwieligen erha.

benen Raidern und einer ungleichen hochrothen Basis verses henes schmerzhaftes Geschwür, wird ein primairer Schans ter genannt. Der Name scheint von dem Worte Cancer herzurühren; wahrscheinlich hat man von der, den Krebeges schwüren gleichfalls eigenthümlichen Eigenschaft, die nahe lies gende Organisation schnell zu zerstören, diesen Namen entlehnt.

§. 83.

Beschreibung der Bufalle.

In allen febr erregbaren Stellen des Organismus fann, wenn diefelben mit bem venerifchen Stoffe in eine febr nabe und fast jufammen reibende Bewegung tommen, ein fophill: Bloge Berührung icheint nicht tifches Gefdwar entftebn. immer auszureichen. Wenn baber eine folche Beranlaffung ben einem für fopbilitische Unfreckung empfanglichen Individuo Statt gefunden hat: fo entfteht in der Regel zwischen dem zweiten und fechften Tage ein mit flarer Feuchtigfeit gefülltes Blaschen, an der in einige Berührung mit bem Unfteckungs. Stoffe gerathnen Stelle. Doch will man einerseite Schon nach 12 Stunden, andererfeits erft mit bem gten Tage bie Musbil. bung diefes Blaschens bemerkt haben. Diefes erhebt fich uber bie Saut, berftet und fieht bann einer fleinen Ercoriation nicht unabnitch, wo es baufig von bem Rranten erft bemertt wird; lettere vermandelt fich bann in das im vorigen S. beschriebene Gefdwur. Manchmal bildet fich auch diefes Gefchwur nicht aus einem, mit heller Reuchtigfeit gefülltem Blaschen, fonbern es entsteht an der Eichel eine kleine entzündliche Geschwulst einer Saugaderschlinge, welche Schmidt für eine neue Form einer primairen Sphills ausstellte und mit dem Namen Bubonulus belegte. Diese Geschwulst schmerzt und bricht endlich in ein wahres sphilitisches Geschwür aus, dessen erster Keim es überhaupt zu seyn scheint. Doch ist die Ausbildung eines sogenannten Bubonulus gar nicht häusig, und nur in den höchst seltnen Fällen, wo die Schanker an der Eichel beobachtet werden, wahrzunehmen. Ein solcher Bubonulus kömmt auch als Vorspiel eines Trippers vor.

Die Schanker welche wenige Stunden nach dem Beng schlafe erschienen find, dergleichen Sunter, Bell und Swedlaur beobachtet haben, scheinen nach Lagneaus riche tiger Bemerkung nur Excortationen gewesen zu seyn.

med mag in La All nen mi Sinch 84.01 ind nednufen eine S

Die Merkmale welche den Schanker von allen andern Geschwuren unterscheiden.

Da die richtige Diagnose und die davon abhängende Bestimmung des eigentlichen Wesens und der Natur eines sphistischen Geschwürs über die Indikationen der prophylaktischen und therapeutischen Pflege entscheidet: so mussen auch alle mit dem Schanker ähnliche und verwandte Formen genau gewürdigt werden, damit eine hier so vielen Einfluß habende Verwechsstung vermieden werde.

Juförderst muß das primaire Geschwür von jenen untersschieden werden, welche als Erscheinungen der sekundairen Sysphilis hervortreten, und den Namen konsecutive Geschwüre erhalten. Diese zeichnen sich dadurch aus, daß sie besonders jene Theile befallen, wo sich unsern knochige Theile besinden, z. B. am Ropse, den Schienbeinen, in der Höhle des Mundes und an der Nase. Ehe diese Geschwüre erscheinen, sind ber reits andere suphilitische Etscheinungen vorangegangen; die Haut wird hier blos mißfärdig und mit kleinen Bläschen beseht, sie bricht endlich auf und bildet schnell um sich fressende, sich mehr in die Breite als in die Tiese verbreitende, nicht sehr schmerzhafte Geschwüre, die eine scharfe Jauche ergiessen.

Bon den storbutischen Seschwüren zeichnen sich die prismairen Schanker dadurch aus, daß bey erstern mehr oder werniger Spuren einer storbutischen Dyskrasie, als siüchtige Schmerzen, besonders in den Füßen, mehrere dunkelrothe schmerzlose Flecken auf der Haut, übelriechender Athem, schwarze Zähne, schwammiges, bläuliches leicht blutendes Zahnssteisch, vorkommen. Die storbutischen Geschwüre selbst haben schwammige, bläuliche, leicht blutende Ränder, die wie anges nagt aussehn, und eine schwärzliche übelriechende Oberstäche.

Die ferophulosen Geschware find nicht leicht mit dem pris malren Schanker zu verwechseln; sie find immer von einem mehr oder weniger deutlich ausgeprägten skrophulosen Habitus begleis tet. Herher gehören: ein bleiches Aussehn, eine dicke Oberlippe, eine aufgetriebene Rasenscheidenwand und ein dicker gespannter Unterleib, wozu noch eine unreine, mit allerhand chronischen Aussschlägen befallene Haut, Schorfe an der Nase und schwache oft thranende Augen gerechnet werden muffen. Die, eine solche Dysserasse begleitenden Geschwure haben gewöhnlich ihren Sit an und in den Drusen, besonders des Halses und der obern Erstremitäten; sie haben eine welfe und bleiche Oberstäche mit aufgedunsenen schlaffen Randern, und sondern eine scharfe, klebrige, ber geronnenen Milch nicht unähnliche, Feuchtigkeit aus.

Sben so unterscheidet sich das gichtische Geschwur durch den allgemeinen Sabitus und das örtliche Aussehn von dem Schanker. Man bemerkt hier Schmerzen an den Gelenken, deren Heftigkeit ben kalter Bitterung sich offenbar vermehrt, und ben warmern Tagen auffallend vermindert. Damit sind Beschwerden des Unterleibs und die eigenthumliche, die Gichte Kranken so auszeichnende Dyspepsie vorhanden. Die Gerschwüre selbst haben einen breiten, unebnen und unreinen, von wulftigen, blassen, oft schwieligen Rändern umschlossenen Grund, und sondern eine sehr scharfe, wässerige, die Verbandsstücke oft schwärzlich tingirende Jauche ab.

Das carcinomatofe Geschwür, welches in hinficht des schnellen Umsichgreifens einige Hehnlichkeit mit bem Schanker hat, zeichnet sich doch durch die schmerzhaften umgeschlagenen Rander, durch die sehr unebene, gewöhnlich mit schwammigen, Blumenkohl ahnlichen Auswüchsen besehte Oberfläche, durch eine dunnere und dunkel gefärbte Jauche und besonders durch sehr heftige stechende und brennende Schmerzen aus.

Mit den Aphthen konnen venerische, besonders sekuns daire suphilitische Geschwüre häufig verwechselt werden. Die Rurze der Dauer und die gutartige Beschaffenheit der Schwämmchen wird aber bald ben Zweifel heben.

Eben so leicht werden bei genauer Untersuchung die sy, philitischen Geschwure von den manchmal durch Unreinlichkeit an den Brüsten der Schwangern herbeigeführten, oder den höchst selten und gewöhnlich nur bey den Negern an den Geschlechtstheilen vorkommenden, nicht venerischen Geschwüren unterschieden werden. Lestgenannte Geschwüre scheinen in den ältesten Zeiten häufiger als jest gewesen zu seyn. So erzählt Celsus viel von Geschwüren, welche besonders im Somsmer an den Zeugungstheilen vorkamen.

Die sogenannten Merkurial Seschwüre, die ben übertries benem und unvorsichtigem Gebrauche des Quecksilbers entstehen, zeichnen sich nicht blos durch ihr den storbutischen nicht unahmt liches Aussehn, sondern besonders durch den Umstand aus, daß sie ben dem fortgesetzten Gebrauche des Quecksilbers täglich ärger werden.

§. 85.

Besondere Erscheinungen am Schanker.

Es ift nicht ju laugnen, daß an allen empfindlichen, mit einem garten Oberhautden und einer lockern gefähreichen Strut, tur verfebenen Stellen, Die mit dem fophilitischen Unftechungs. Stoffe in unmittelbare Berührung gebracht werden fonnen: 3. 3. Die Gichel, Die Gichelfrone und bas Bandchen bey Dan: nern, an den fleinen und großen Ochgamlefgen, bem Ribler und ben Bruftwargen ber Beiber, ferner an den Lippen, in bem Bintel des Mundes, und an den Singern benderlen Ber Schlechts, Schanker entstehen fonnen; boch lehrt die Beobachs tung, bag ben Dannern ber Schanter bochft felten an ber fo febr empfindlichen Gichel, fondern an der innern Stache der Worhant und bem Bandchen entfteht; ein Umfand, welcher Suntern bewog die durchaus unerwiesene Ersudation einer fetten bligten Feuchtigfeit auch ber Gichel mabrend bem Bens Schlafe anzunehmen, wodurch bas Gindringen des Stoffes ver, bindert werden foll. Sirtanner erflart biefe Erfcheinung daburch, daß der Stoff an der Eichel nicht lange genug fiben bleibt, fondern bald meggerieben und meggemafchen wird, baß er hingegen an ber Borhaut und am Bandchen fich festfeben fann.

Die Manner, welche eine lange Vorhaut haben, find bem Schanter am haufigsten ausgesett, und scheinen überhaupt

auch zu nicht syphilitischen Geschwuren größere Unlage zu has ben; daher denn auch die Neger in Ufrika nach Schotts Er, zählung die Beschneidung mehr aus Reinlichkeit und zur bess sern Verhütung der Geschwure, als aus irgend einem Relis gionsgesehe vornehmen.

Borstehende, durch die Erfahrung so häusig bestätigte Bemerkung schließt jedoch keinesweges die Möglichkeit eines Schankers an der Eichel aus; es kann allerdings auch da ein primaires Geschwür entstehen, und es zeichner sich dann durch eine vorzügliche Bösartigkeit und üppige Produktion krank, hafter Metamorphosen aus. Ein solcher Schanker frist dann gewöhnlich besonders in die Tiefe, und man kennt Benspiele, daß in weuig Tagen der größte Theil der Eichel zerstört war. Die Lupuration, welche dann entsteht, gleicht sehr der krebs: haften, dem Blumenkohl ähnlichen Afterbildung und wird auch von den Franzosen choux-fleurs bezeichnet.

Ben Beibern nehmen die Schanker gewöhnlich die Schaamlefzen und den vordern Theil der Scheide ein, selten bemerkt man sie in der hintern Halfte, oder in der Rahe der Gebährmutter. Um bösartigsten werden sie an dem Bandchen der Weiber; da hat man Schanker beobachtet, die den ganzen Dann zerstört und zwey Deffnungen in eine zusammenges schmolzen haben.

Ben ganglicher Bermahrlosung, unschlicklicher Behand-

niffen, mehren fich die Schanker dergestalt, daß fie fich an dem Schenkel herum bis gegen den After glehn, wo sie die ekelhafte Form des venerischen Gartels (cingulum Veneris) bilden.

Eine auffallende Abwelchung bes Schankers in Hinsicht seiner Entstehung ist, daß er manchmal mit einem Schorse auf der Eichel zum Vorschein kommt. Diese Erscheinung des prismairen Seschwürs hat mehreren Beobachtungen zufolge einen eigenthümlichen Einfluß auf die Ausbildung der consecutiven Seschwüre; diese nämlich erscheinen in der Regel in offener Eiterung, wenn die primairen als Schorf hervortraten; karmen aber die primairen, wie dies am gewöhnlichsten der Fall ist, als eiternde Stellen, so bieten viele der consecutiven einen Schorf dar.

Einige Verschiedenheit auf die Sohe der Zufälle scheint auch die Art, wie der Ansteckungsstoff aufgenommen worden ift, zu haben. Wirkt der venerische Stoff auf früher verwuns dete Stellen, oder wird in offene Geschwüre gebracht: so giebt es ein sehr schmerzhaftes, hartnäckiges und bösartiges Gesschwür, wobey dann selbst die secundaire Sphilis Spuren einer größern Intensität trägt, und sich auch durch einen harts näckigen Verlauf auszeichnet.

S. 86.

Wesen des Schankers.

Dell's in Hinsicht der Lehre der sphilitischen Krankheiten ift:

o muß boch bemerkt werden, daß ihre Unsicht über die reine Dertlichkeit des Schankers, worauf dann auch eine strenge Los cal Behandlung desselben basirt ist, grundfalsch ist. Fried = rich Hahnemann hat in seiner 1812. erschienenen Inaus guraldissertation über diesen Gegenstand die frühere Meinung über die Localität des Schankers mit Glück bekämpft und es unterliegt keinem Zweisel, daß der Schanker als eine Kranks heit der Gesammtheit des Organismus hervortritt, so bes schankt auch der Rester ist, in dem sich die Erscheinung offensbart. Auf allgemeine Ansteckung deutet der Schanker, und eben so allgemein muß die Mes thode der Behandlung seyn.

S. 87. Prognose ben dem Schanker.

Ben der Vorhersagung kommt es auf den Sig, die Dauer und den Zustand der Entzündlichkeit des Schankers an. Ben den Mannern sind die Eichel und die Krone derseiben, bey den Weibern die Schaamlefzen die gefährlichste Stelle.

Je langer der Schanker gedauert hat, defto unvermelde licher ift die Gefahr einer sekundairen Sphills. Je franklicher und sensibler das Individuum ift, desto bosartiger kann der Schanker werden, und es giebt Falle, wo er, besonders bey außerer zu abender Behandlung ein frebsartiges Aussehn und einen hochst bosartigen Verlauf erhalt.

Wenn der Schanker Schorfe bildet und durch eine zu reizende drtliche Pflege behandelt wird, so kann er leicht brans dig werden. So lange der Schanker in dem Zustande einer leichten Entzündlichkeit erhalten wird: so gilt er gewöhnlich für den Gesammt. Organismus als eine vicarirende Thatigkeit, und die sekundaire Syphilis tritt dann nicht hervor.

Man bat oft baruber geftritten, ob eine Gelbftheilung bes Schankers möglich fen. Wenn unter Beilung nicht die Tile gung des Unftedungsftoffes und ber baburch berbengeführten Dysfrafie, fondern das bloge Hufhoren einer einzelnen aus einer Gefammtform hervorgebenden Erscheinung verftanben wird: fo fann es allerdings folche Gelbftheilungen geben. Bas am Gliebe eingegangen ift, tritt in erneuerter Geftaltung an einer anbern Stelle auf. Gegen wirfliche Gelbftheilungen ber burch einen Ochanker in ben Organismus eingegangenen Spphilis hat fich ble Erfahrung erflart. Dur wenige nicht genug erwiesene Falle fogenannter Gelbftheilungen ber Lues find in den Schriften ber Mergte enthalten. Die Gefahr und Die Seftigfeit des Schankers wird noch durch die bier fo leicht mögliche Ericheinung bochft gefahrvoller fonfenfueller Formen, der Phimosis, der Paraphimosis und des Bubo vers mehrt.

Die Narben welche nach geheilten Schankern zurücke bleiben, verschwinden nie wieder; eben so ersetzt fich das Band, chen nicht, wenn es von einem Schanker durchgefressen ift.

§. 88.

Rur bes Schanfers.

Bey feiner fuphilitischen Urform ift junachft der prophys lattifchen die boppelte therapeutische Indifation einer ortlichen und allgemeinen Pflege fo entschieden ausgesprochen, als ben Die allgemeine Rucfficht ift bier burchaus bem Schanfer. unerläßlich. Ben ber bretichen Pflege ift es in ber Regel ges rathen, burch außere Unwendung des Quedfilbers die Wirs fung bes innern Gebrauchs ju unterftugen; es wird badurch miteingewirft, auf die fpegifische Datur bes Geschwurs und bie sophilitische Thatigkeit beschrankt. In den Fallen aber, wo individuelle bobe Empfindlichkeit bes ergriffenen Theils ober andere im Organismus und den Umgebungen liegende Urfachen, Die Unwendung des Quecffilbers in außerlicher Begiebung nicht geftatten, und andere unten noch naber ju entwickelnde Ruch, fichten nothig machen; fo wird der innere Gebrauch diefes Mits tels gewiß ausreichen, Die fophilitische Dyskrafie ju tilgen, mo bann ber primaire Schanker wie ein einfaches Geschwar behans belt, und ben großem Unfange, ober febr unreiner Beschaffens heit mit ben leichteften Digestivis verbunden wird.

Gewiß ist es, daß auch die außere Anwendung des Queck, silbers auf das suphilitische Geschwar eine mahrhaft qualitative Beziehung auf die Reproduction hat; und Walch scheint Recht zu haben, wenn er dasselbe auch von den so oft beobachter ten glücklichen Wirkungen des Höllensteins und des kaustischen

Rali vermuthet, und daben viel auf die Grundlage der Mestallität wegen ihrer entschiedensten Beziehung zur Sphäre der Ernährung rechnet. Berlinghiert hat vorzüglich die Lokas lität des Schankers behauptet, und eine absolut örtliche Beshandlung vorgeschlagen. Er hat sehr viele Anhänger; die meisten scheinen einzuräumen, daß in der ersten Zeit eine rein dreische Pflege genüge, ein Grundsaß, dessen Gulstigkeit durchaus bestritten werden muß.

Als rein örtliche Methoden den Schanker zu behandeln, tennt man bren.

Das Ausschneiben des Schankers, ein sehr altes Mits tel, welches aber wegen der großen Empfindlichkeit der Theile, wegen der großen Blutung, und wegen der darauf folgenden tiefen Narbe verwerflich ist.

Das Wegaben der Rander, um den Schanker in ein reines Geschwur zu verwandeln; ein Mittel welches hohe Vorficht erheischt und ben hoher Entzündlichkeit die nachtheiligsten Folgen haben kann.

Die Anwendung der Quecksilbermittel, deren Rothwens digkeit und Brauchbarkeit wegen der spezisischen Wirkung auf den Ansteckungsstoff bereits naber entwickelt ist.

Unter den vielen zur außern Pflege der Schanker ems pfohlenen Vorschriften, gehoren folgende unter die wirtsamften:

Girtanner empfahl eine gelftige Auflösung des Sublis mats:

Rec. Hydr. muriat. corrosiv. gr. ij
Ammonii muriat. gr. xv
solve in
Aq. destill. simpl. Zij
dein adde
Spir. Lavendul. compos. Zj.
M. D.

Bogel empfiehlt:

Rec. Aq. Calcariae ustae Bß

Hydr. muriat. corrosiv. gr. xiij

Aloes opt. 3iij

Op. theb. gr. x

Mellis rosat. 3vj.

M. D.

Swediaur hat zu diesem Behufe zwenerlen Merku, rial. Baffer vorgeschlagen, von denen eine das schwarze, das andere das gelbe bezeichnet mird. Das erstere besteht aus einer Mischung des versüßten Quecksilbers mit Kalkwasser:

Rec. Hydr. muriat. mitis 3j

Aq. Calcariae ustae 3iv.

M. D.

Das gelbe ift bas altere phagadanische Baffer :

Rec. Hydr. muriat, corrosivi 36 solve in

Aq. Calcariae ustae 指ij.

D.

Rust empsiehlt ebenfalls das schwarze phagadanische Wasser, welches Swediaur anwendet; er läßt noch 4 Scrupel Opium hinzusetzen. So bedeutend und unvershältnismäßig auch dieser Zusaß ist: so läßt es sich doch nicht läugnen, daß das Opium ein ganz vorzügliches Adjuvans solcher Merkurials Praparate ben der Kur der Schanker wird.

Frite schlägt eine Mischung bes salpetersauern Queds silbers zur außern Pflege der Schanker vor:

Rec. Aq. destill. simpl. Zij
Liq. Hydr. nitrici gutt. x-xx.
M. D.

Ausser den stussigen Merkurial Praparaten wird auch dieses Mittel in Form einer Salbe oder als Streupulver angewendets Zu Salben bedient man sich gewöhnlich des versüßten Quecks silbers und des rothen Quecksilberkalks.

Rec. Calomel 3j

Adipis suillae 3j

Pulv. Op. puri 3ß.

M. D.

Frise wandte den rothen Quedsilberkalt an: Rec. Hydr. oxydati rubri 3j Ungti Basilici 3j. M. D.

Als Sinstreupulver wird ebenfalls ber rothe Merkurial, Rale, aber vorzüglich nur bann angewendet, wenn bas Geschwär

keine heftig entzandete Umgebungen hat, und mit einer so biden speckartigen Rrufte bedeckt ift, daß alle übrigen Mittel fruchtlos angewendet werden.

Die Merkurial Raucherungen, welche in früherer Zeit zur Seilung des Schankers angewendet wurden, find jest mit Recht auffer Gebrauch gekommen.

Aussica zur dreichen Pflege bes primairen Schankers empfohlen, die ben zweckmäßiger antisphilitischer innerer Pflege ihre Wirkung auch nicht versehlen, wenn keine andere Segens Unzeige für ihren Gebrauch Statt findet.

Sierher gehort die Anwendung des Kali causticum, des blauen Vitriols und des Grunspans, wovon in neuern Zeiten häufig Gebrauch gemacht worden ist.

Rec. Kali caustici Əj
solye in
Aq. destill. simpl. Ziij-Ziv.
D.

Rec. Cupri sulphurici 36 solve in Aq. destill. simpl. Ziij.

Rec. Viridis aeris 3vj
Liq. ammonii caust. 3ij.
M. D. Sig.

Seche Tropfen zu jeder Unge bestill. Baffere hinzugufegen.

Sind aber die Rander des Schankers zu sehr entzundet, die ganzen Umgebungen zu sehr aufgereizt, so ist es gerathen ben der drelichen Pflege von allen Aehmitteln so lange abzustehn, und ben dem innern Gebrauche des Calomels, so lange die Schanker mit beruhigenden und erschlaffenden Umschlägen und einem einfachen Cerate zu behandeln, bis die Heftigkeit der Entzundung gehoben ist.

Ben weiblichen Schankern treten dieselben Indikationen ein; nur ist hier zu berücksichtigen, daß die topischen Mittel in einer ungleich größern Menge angewendet werden mussen; daher ist es rathsam, die Mittel in verdunnter Form anzur wenden, besonders ist hierzu eine leichte Sublimatausidsung und die verdunnte Lusidsung des kaustischen Kali zu empfehlen.

Die allgemeine Heilung, welche, wie schon oben erwähnt worden, hier unerläßlich ist, wird am gewöhnlichsten und unsläugbar am sichersten durch eine zweckmäßige Merkurialkur bes wirkt. In gewöhnlichen Källen, wo die Entstehung bes Schankers noch neu, die Zufälle gelinde sind, und der Kranke in Verhältnissen lebt, in denen er seine Lebensordnung einer Merkurialkur anpassen kann, wird das versüßte Quecksiber und das Hahnemannsche Quecksiber ausreichen; in höhern Kormen und in Verhältnissen, welche einem durch solche Mittel leicht zu bewirkenden Speichelsluße nicht gunstig sind, vertraut man dem Sublimat, wenn keine dringende Gegensanzeige seinen Gebrauch verbletet.

In wie weit der innere Gebrauch der Mineralfauren, oder der antispphilitischen von Besnard empfohlenen Tinktur die Spphilis überhaupt und die primairen oder sekundairen Formen insbesondere zu heilen vermag, soll in eigenen g. naher entwickelt werden.

S. 59.

Machkur des Schankers.

Die allgemeine Nachkur eines suphilitischen Geschwürs ist der im vorigen & angezeigte Gebrauch des Quecksilbers, welches noch einige Zeit nach geschlossenem Geschwüre ges geben werden muß. Oft geschieht es, daß unter Begünstigung einer schlassen sehr sensibeln Constitution, der Schanker in ein rein atonisches Geschwür entartet, nachdem alle charaks teristischen Zeichen eines primairen suphilitischen Geschwüres verschwunden sind. Unter diesen Umständen ist es gut, das Geschwür mit leichten, stärkenden und zusammenziehenden Mitteln, z. B. mit Alaun oder schweselsauerm Zink zu vers binden.

Rec. Aluminis crudi 3j
solve in
Aq. destill. simpl. 3jj.

D.

Sterher pagt besonders die von Swediaur vorges

Rec. Zinci sulphurici

Spir. Vini camphor. singl. 3ß

Aq. destill. fervidae Hij

misce et per chartam cola.

D.

5. 90.

Begriff der Phimofe.

Die Zusammenschnürung der Vorhaut vor der Eichel hat den Namen Phimose erhalten. Ben manchen Individuen ist eine zu lange, vorn etwas zugeschnürte Vorhaut Bildungs; Fehler, und heißt dann Phimosis congenita. Ausser der angebornen Verengerung giebt es auch äussere Schädlichkeiten, z. B. Druck oder Stoß, welche eine Gesschwulft der Vorhaut und eine daher rührende nicht suphilissiche Phimose herbenführen; so mag diesenige gewesen senn, welche Celsus schon kannte.

§. 91.

Berlauf der Phimofe.

Die Vorhaut judt anfänglich und schwillt allmählig; nur in seltenen Fällen entwickelt sich die Geschwulft schnell. Von der Heftigkeit der Entzündung hängt das äussere Aussehn der Vorhaut ab; sie erscheint entweder hochroth mit geringer aber gespannter und glanzender Geschwulft und heftigem Schmerze; oder die Rothe ist geringer und weniger schmerzhaft, die Geschwulft aber heftiger, halbdurchsichtig, odematos und manche mal mit Bläschen besetzt. Frite sah in Folge einer zusame menziehenden Einspritung in dem letten Stadio des Trippers vermittelst einer langen zu tief eingebrachten Injections Sprite ein solches Oedem der Vorhaut binnen 10 Minuten entstehn und bis zu der Größe einer Faust anwachsen.

Durch die starke Verengerung wird der Urinabstuß gehindert, und da die Zurückbringung der Vorhaut erschwert
oder ganz unmöglich ist: so entarten die an der innern Fläche
der Vorhaut sienden Schanker oder der dabei Statt sindende
Eicheltripper in die bösartigsten Geschwüre, wodurch heftige
Schmerzen veranlaßt und die übelsten Folgen vorbereitet werden.
Der Zustand der Vorhaut, ob dieselbe entweder mit vieler,
Schwierigkeit oder gar nicht zurückgebracht werden kann, hat
zu der Eintheilung in unvollkommene und vollkom,
mene Phimose Veranlassung gegeben; ben der letztern wird
in der Regel die Unmöglichkeit des Zurückbringens durch einen
harten und heftig geschwollenen Ring (annulus venereus)
bewirkt, der entweder durch mehrere an der vordern Deffnung
sigende Schanker, oder durch eine Infiltration des dort bes
findlichen Zellgewebes erzeugt wird.

§. 92.

Die urfächlichen Momente der Phimose.

Mls pradisponirende Urfache ift eine ju lange Borhaut Die oberfte und vielleicht einzige, die wir fennen. Die Gelegen. heiteurfachen find theile alle reigenden Ochadlichkeiten mabrend ber Rur des Trippers ober bes Schanfers, welche die Ent. gundlichkeit in Diefen Theilen ju fteigern vermogen. Mangel an Reinlichkeit und baburch ftochender Musfluß, reigende Dabe rung, beftige Bewegung, Benichlaf, enge Rleibungsftucke, Druck auf diese Theile, und abnliche Ginwirkungen geboren blerber. Das Befen biefer form ift in der Regel eine ergfis pelatofe Entzundung, welche nur ben febr fraftigen, ju rein arteriellen Entzundungen neigenden Individuen eine tiefere Rothe und eine mehr phlegmondfe Beschaffenheit erhalt. Oft erscheint fie als ein blaffes bigendes Debem der Borbaut, bem aber immer mehr ober weniger der entzundliche Charafter jum Grunde liegt. Die Seftigfeit diefer Entzundlichkeit ift theils von ber Seftigfeit ber Einwirkung bes Unftedungeftoffes, theils von der Individualitat des Rranten und der Struftur ber Borhaut, theils endlich von der gleich anfange eingeschlagenen Beilmethobe abhangig. Die Entzundlichkeit einer tonfenfuellen Phimofis geht immer mit milbern Bufallen einher, als biejenige, ble ben vielen auf ber innern Glache ber Borhaut befindlichen Schankern als Refler ber bereite eingetretenen fefundairen Syphilis hervortritt.

S. 93.

Prognosis ben der Phimosis.

Ben zweckmäßigem und nicht zu stürmischem Hellverfahren wird diese Entzündlichkett bald und sicher zertheilt; doch giebt es nicht selten Fälle, wo entweder wegen zu großer Intensität der Form, oder wegen Mißgriffen und Berwahrlosung in Hinssicht der Behandlung andere höchst unglückliche Ausgänge mögslich werden.

So hat man Abscesse gesehn, welche die Borhaut durchs bobren und so der Eichel den Weg offinen. Unter diesen Umsständen geht der unter der neuen Oeffnung liegende Theil der Borhaut in eine monstrose Geschwulft über, welche oft durch eine sehr schmerzhafte Operation gehoben werden muß. Hecker hat einen Fall beschrieben, wo ben einer verwahrlosten Phimose die ganze Borhaut und die Eichel in eine unförmliche schwams mige Masse von der Größe eines Kinderkopse verwandelt worden ist. Aus der Eichel brang durch mehrere Deffnungen der Urin, und die Amputation des degenerirten Theils blieb das einzige Mittel, welches in ähnlichen Fällen immer anges zeigt ist.

Unter unglucklichen Umftanden kann auch ber Brand des ergriffenen Theils eintreten.

Nicht seiten bleibt eine chronische Unschwellung der Bor; haut zurud, die das Zurückbringen der letztern noch erschwert

und nur allmählig gehoben werden kann. Wenn der Kranke mit zu großer Gewalt die Versuche wiederholt, die Vorhant über die Sichel zurückzustreifen: so kann er dadurch leicht auch die Paraphimose veranlassen. Ein Fall der nicht ganz selten ift.

Auch Verwachsungen der Sichel mit der Vorhaut kommen als Folgen der Phimose vor. Die daraus entstehenden Nache theile und Desorganisationen erfordern oft schmerzhafte Opes rationen.

§. 94.

Rur der Phimofe.

Die Indikationen, welche bey der Phimose sich bar, bieten, sind:

- 1) bie Entzundlichkeit ber Borhaut gu minbern;
- 2) dem unter und hinter der Vorhaut fockenden Ausfluße freien Abgang zu verschaffen, und
- 3) alle nachtheiligen Folgen ju verhaten.

Die erste Indikation wird durch den antiphlogistischen Apparat erreicht, woben im Anfange und besonders ben phleg, mondser Beschaffenheit einige Blutigel angewendet werden können.

Hierauf folgen leichte Brepumschlage aus Semmelfrume, mit Goulardschem Wasser lauwarm umgelegt. Auch tonnen,

wenn besonders die Schmerzen heftig sind, lauwarme Brepe aus den Speciedus emollientidus mit etwas Herba Hyoscyami und Milch bereitet, um das Glied gelegt werden. Innerlich wird ein ausgedehnter antiphlogistischer Apparat wohl höchst selten nothig werden; der Gebrauch einer dunnen Mandelmilch mit Salpeter oder eine Saturatio Kalimit Zitronensaft reichen dann gewöhnlich hier aus.

Ben einer minder heftig hervortretenden Entzündlichkeit der Borhaut, können, wenn sich der Zustand rein erpsipelatös darstellt oder ödematös ist, trockne Umschläge aus den Speciedus pro komento der neuen Pharmacopoe angewender werden. Daben ist es nöthig, daß die strengste Ruhe beobache tet und das Giled vermittelst eines Tragebeutels gehörig sirtet werde.

Der zwenten Indikation wird genug gethan, wenn mit der gehörigen Aufmerksamkeit Einsprisungen in die Mündung der Vorhaut, und durch diese zwischen letztere und die Eichel gemacht werden; man wählt dazu in dem Stadio der höchsten Entzündlichkeit, Eibisch oder einen Malreabsud mit Milch, oder eine bloße Mischung von Wasser mit Milch. Hat die Entzündlichkeit etwas nachgelassen: so läßt man einen Aufguß von Schierling, und wenn der Theil ödematös und sehr wenig empfindlich ist, eine leichte Austösung des Sublimats in einem schieklichen Vehitel, einsprisen.

Rec. Hydr. muriat. corrosiv. gr. ij
solve in
Aq. destill. simpl. Zviij
et adde
Trae Op. simpl. 3ß.
M. D.

Die strengste Reinlichkeit ist vorzüglich angezeigt, und ausser den Einsprihungen sind auch lauwarme Waschungen dies jenigen Mittel, welche den bestimmten Zweck am sichersten erreichen.

um alle übeln Folgen zu verhüten, muß ben jeder Phie mose, die eine suphilitische primaire Form begleitet, das Quecks silber nach den schon öfter gegebenen Vorschriften und den noch in eigenen S. über diesen Gegenstand näher zu entwickelnden Bestimmungen gegeben werden, woben der innere Gebrauch des Quecksilbers ausreicht, ohngeachtet von mehrern die örtliche Anwendung der Merkurlalsalbe auch empsohlen wird.

Der zeitigen und vorsichtigen Pflege wird es gewiß immer gelingen, jeden übeln Ausgang zu verhüten, und das Buruder bringen der Vorhaut möglich zu machen.

Die Operation der Phimose, welche von einigen in dem gesahrvollsten Stadio empsohlen worden, ist ein sehr schmerze haftes, unzuverläßiges und größentheils entbehrliches Mittel. Durch das Ausschlißen der Eichel welches mit einem Bistouri caché von hinten nach vorn längst der ergriffenen, aber soviel als möglich zurückgezogenen Vorhaut verrichtet wird, gewinnt

man oft nichts, ale daß die Entzündlichkeit noch etwas mehr gesteigert und der Brand um fo eher herhengeführt wird.

Bildet fich ein Absceß: so muß berfelbe nach den Regeln ber Runft befordert und geoffnet werden.

Wird die Vorhaut mißfarbig, entstehen bunkle braunliche Flecke auf berselben: so ist der Brand nicht fern, den man durchaus zu verhüten sich bestreben muß. Man hat unter diesen Umständen eiskalte Umschläge, ja selbst die Unwendung des Sises und des Schnees empfohlen; diese Methode ist aber nur ben der höchsten dem Brande sich nahenden Entzündlichkelt angezeigt. Wo bereits eine mißfärbige Oberstäche entsteht, ist diese Indikation zwecklos; hier paßt die Anwendung der China und der Sichenrinde, sowohl in Brenumschlägen als auch zu Fomentationen. Man verbindet damit antiseptische Kräuter: wie Scordium, Raute, Urnica, Wermuth und ähnliche.

Rec. Pulv. cort Chinae Zinj

— hb. Rutae

— fl. Arnicae, singul. Zjß.

M. D. Species.

Sig. Mit fochendem Weine ju Brenumichlagen gu machen.

Rec. Cort. Quercus 30

coque in suff. ∇ per $\frac{1}{2}$ hor. sub
finem coct, inf.

per $\frac{1}{2}$ hor.

Hb. Absinthii

— Scordii. singul. $\frac{3}{2}$

colat. Bj. refrig. adde Spir. Vini camphorati 3ij.

M. D. Sig. Lauwarm als Bahung anzuwenden.

Wenn die Zufälle der Entzündung vorüber sind, und die Vorhaut sich dann auch ben wiederholten vorsichtigen Versuchen noch nicht zurückbringen läßt: so ist entweder die Verhärtung des Ringes um die Vorhaut, oder die Verwachsung derselben mit der Eichel oder endlich eine Callosität an der innern Fläche des Praeputiums daran Schuld. Im erstern Falle sind erweichende Mittel, Salben, Vreye und Dämpse angezeigt; sobald dadurch der Zweck nicht erreicht wird, bleibt nichts übrig als die Circumcision dieses Ringes. Im zweyten und letzten Falle sind blos mechanische Mittel angezeigt; hier läßt sich Hulse nur von der geschickten und vorsichtigen Anwendung des Presschwamms, und wenn diese nicht hilft, vom chirurgischen Messer erwarten.

Sollte aber die Verwachsung der Vorhaut auf diese Art nicht gehoben werden können, so hat man das Losprapariren vorgeschlagen. Eine Operation, die nur ben der Adhasson kleiner Flächen ausführbar ist. Ben größern ist ein solcher Verssuch sehr schmerzhaft, gefährlich, und in jedem Falle prosblematisch.

§. 95.

Beschreibung der Paraphimose.

Eine dem innern Wefen der Phimose fehr ahnliche, der auffern Gestaltung aber entgegengesetzte Form, ift die

Paraphimofis, auch spanischer Rragen genannt; welche als eine Zusammenschnurung der Vorhaut hinter der Eichel hervortritt.

Die Vorhaut schwillt und entzündet sich bergestalt, daß sie an mehrern Stellen gleichsam durch Ringe verengert wird, wodurch die Circulation ganz gehemmt, und so die Gefahr des Brandes herbengeführt wird. Diese Form kann schnell sich ausbilden, daher ben jeder primairen Form der Spphilis an die Möglichkeit dieser Erscheinung gedacht werden muß. Die Sichel bildet hier eine entzündete oft sehr große Geschwulft, deren Berührung viele Schmerzen erregt.

§. 96.

Urfachen der Paraphimofe.

Die Pradisposition liegt in einer hohen Empfindlichkeit ber Eichel, und in einer zu langen, von Hause aus zu engen Vorhaut, wie ben ber Phimose.

Die Veranlassung wird durch alles herbeigeführt, was die Entzündlichkeit steigern, und auf diese Art die Geschwulft der Eichel oder der Vorhaut erzeugen kann. Eine zu reizende Diat während einer primairen Form der Spphilis, jeder orts liche Druck oder Reibung, und die Anwesenheit vieler Schans ker an der innern Fläche der Vorhaut, oder vieler Pusteln hins ter der Krone der Eichel bey der Balanitis. Eine ganz vor, augliche Veranlassung giebt die oben §. 93. bereits ermabnte gewaltsame Zurückziehung der Vorhaut ben der Phimose; das zwente Uebel wird hier heftiger und gesahrvoller als das erste gewesen ist.

Die Causa efficiens der Paraphimosis liegt enteschieden blos in Entzündlichkeit der Eichel und der Vorhaut. Es tift offenbar Täuschung, hier Krampf als die nächste Ursache dieser Form anzunehmen. Die Entzündlichkeit ist auch hier manchmal ernstpelatöser Natur, doch greift sie hier gewöhnlich tiefer und wird phlegmonds. Auch kann ben sehr schlaffen Individuen der Verlauf eine chronische Nichtung erhalten, wo dann der Zustand der Vorhaut mehr in einer serdsen Unhäufung und das durch bedingten ödematosen Unschweslung zu suchen ist.

\$. 97.

Prognose ben ber Paraphimose.

Diese Korm gehört unter die akutesten und gefahrvollsten. Ist die Entzündung sehr hestig und die Behandlung nicht zwecke mäßig: so reichen einige Stunden hin, um den Brand here benzusühren, und eine Gefahr für das Leben selbst auszubilden. Um das Leben durch eine Paraphimose zu gefährden, gehört zwar eine große Verwahrlosung oder die unzweckmäßigste Psiege; doch sind Benspiele worhanden, daß Menschen ein Opfer eines solchen Brandes geworden sind.

Bereiterung ift ein ben biefer Form ungekannter Ausgang.

Eine chronische Berunstaltung der Vorhaut bleibt manch. mal zurück, wenn das Zurückbringen derselben durch Einschnitte bewerkstelligt werden mußte.

\$. 98.

Behandlung der Paraphimofe.

Wegen ber Seftigeeit und ber bringenden Gefahr ber Bufalle muß die Gulfe augenblicklich fenn. Ben heftiger Ents jundlichkeit thut man wohl, einige Blutigel an die entzundete Worhaut ju legen; geschieht bies zeitig: fo fann mon balb nachher die Borhaut ohne viele Gewalt über Die Gichel heruber-Dann find eistalte Umichlage mit Aqua saturnina atebn. oder einer Mlaun Auflofung bereitet, oder die Unwendung von Schnee ober Eis angezeigt. Die Sohe ber Gefahr rechtfertigt fogar bemm Tripper bie Unwendung ber Ralte; nur muß man im lettern Ralle barauf febn, daß nach gehobener Paraphimofe durch eine fortgefeste Unmendung lauwarmer Brenumichlage mit Opium oder Spofciamus, und bie gemiffenhaftefte Beobachtung einer antipblogiftifden Form, ber Tripper ale befdrantte Form der Sarnrobre erhalten, und jedes bobere fons fensuelle Leiden verhatet merde. In der Regel empfiehlt man ben jeder Paraphimofe Die Unwendung ber eben genannten lau: warmen Umschlage ober Bahungen von einem warmen Chas

millen Aufgusse, ehe noch die Kalte in Gebrauch gezogen wird; doch diesem widerspricht die Erfahrung; je hoher die Entzunds lichkeit ist: besto entschiedener nützt die Blutentziehung und die Kalte. Bey einer weniger phlegmonossen Entzundung konnen die lauwarmen Umschläge allerdings angewandt werden; aber dann wird man auch nicht nothig haben, durch Kalte einzus wirken. Sobald die Spannung gehoben ist, versuche man durch ein gelindes Drücken in der vollen Hand das Blut aus der stroßenden Eichel zurückzupressen, und mit einiger Sewalt die Vorhaut hervorzuziehn.

Wenn alles gehörig angewendet wird, und der Operateur hinreichende Derterität besitt: da wird das Zurückbringen der Vorhaut über die Sichel nur selten mißlingen; sollte dies aber doch der Fall seyn, und die Gefahr des Brandes immer dringender werden: so bleibt dann noch die Erweiterung der Vorshaut vermittelst eines Einschnittes, womit man sie vorsichtig und auf einer Hohlsonde spaltet, nachdem man zuvor einen kleinern Einschnitt in eine aufgehobene Falte der Vorhaut in der Nähe der gespannten Stelle gemacht hat, um die Sonde einbringen zu können.

Nach dieser Operation wird die Spannung gleich ges hoben, und es ist nicht nothig, die Versuche des Hervorziehens der Vorhaut zu wiederholen; man mache blos Umschläge ex speciedus ad somentum, wozu man etwas China, oder Eichenrinde hinzuseten kann.

Ift bereits ber Brand eingetreten: so biete man alles auf, was unter ahnlichen Umständen angezeigt ist; die kräftigste innere und äußere Behandlung mit China, Arnica, Camphor, gewürzhaften Kräutern und Wein werden den Brand gewiß beschränken und die nahe gelegenen Theile retten. Dann geht die Sichel allein versohren, und selbst die fachigen Körper können noch erhalten werden. Die gänzliche Verwachsung der Harne röhre verhütet man unter den zulest erwähnten Umständen durch eine bieierne Röhre, die in die Urethra gebracht, und bis zur vollkommenen Vernarbung darinn gelassen wird.

S. 99.

Begriff des Bubo.

Unter einem syphilitischen Bubo wird die Geschwulft einer Druse in der Leistengegend verstanden. Die Geschwulft besällt sowohl die Drusen der ersten als der zweyten Reihe. Diese Verschiedenheit des Sißes macht keinen wesentlichen Unsterschied in der Bestimmung des Bubo. Wichtiger ist der Unterschied, ob der Bubo blos die Folge einer Mitleidensschaft oder ein Rester der sekundairen Syphilis sey. Im erstern Falle wird er konsensuell, im letztern idiopathisch gesnannt. Im Jahre 1532 wurde er als Rester der allges meinen Syphilis bekannt, und von Nicolaus Massa sowohl in diagnostischer, als therapeutischer Beziehung genau beschrieben.

S. 100.

Berlauf des Bubo.

Dit einer unangenehmen fpannenden Empfindung in ber Gegend ber Leifte beginnt biefe Geldwutft. Der Rrante fühlt beim Strecken des Ruges und beim Einmartebengen Des Obers Schenkels Schmergen in Der Leiftengegend; Daber ihm bas Geben febr beschwertich wird. Allmablig fteigt bie im Un. fange nur bem &-fible tenntliche Gefdmulft und wird auffers lich fichtbar, fublt fich bart an und lage fich beutlich im Bellges webe bin und ber ichieben. Die Symptome ber Entgundliche feir mehren fich, Die Schmergen werden anhaltend, die Rothe febr deutlich; ein beglettendes Abendfieber fundigt unter biefen Limftanden das auffallende Mittleiden des Gefammt Organis, mus an. Meigt biefe Geschwuift in bem gegebenen Ralle nicht gur Bertheilung, ober wird fie vermabrloft: fo bereitet die Gie terung fich bor, mo bam ber Schmerz beftig, flopfend unb ftechend wird. Die Drufe wird an irgend einer Stelle weicher, und es erhebt fich eine Opibe über die bochfte Glache berfelben. Co bilbet fich mit immer banner werbenber Saut und unter Begleitung der gewöhnlichen febris suppuratoria. welche ben febr erregbaren Individuen oft recht bedeutend ift, ber Absceg aus, mo fich auch unter noch nicht genau feftgeftellten Umftanden eine boematofe Unfchwellung des umgebenden Belle Gemebes hingugefeut. Wenn biefer Abfceg berftet, ober auch

geoffnet wird: so stellt die elternde Drufe sowohl in Sinsicht ihrer Erscheinungen, als auch in Sinsicht ihrer Beziehungen jum Gesammtleben ein sekundatres syphilitisches Geschwur bar.

§. 101.

Mabere Bestimmung des Bubo.

In der Leiftengegend giebt es mehrere Störungen der Form, welche theils das Resultat einer innern frankhaften Stimmung der Thätigkeit, theils das Erzeugniß einer hestig wirkenden außern Schädlichkeit senn konnen. Man hat nämlich Fälle, daß der sphilitische Bubo mit den skrophulösen und katharrhalischen Geschwülsten der Leistendrusen, und auch mit einem Leistens Bruche verwechselt worden ist. Wer die Erscheinungen am kranken menschlichen Organismus nicht einzeln und aus dem Zusammenhange geriffen, zu beurtheilen sich bemüht, der wird keinen solchen Mißgriff begehn.

Ben ber skrophulosen Drusengeschwulft wird die im ganzen Habitus des Kranken deutlich, ausgeprägte Dyscrasia scrophulosa viel Licht gewähren. Daben ist der Verlauf chronisch, im Anfange sieberlos; an der Druse tritt deutlich die Reigung zur Verhärtung hervor.

Ben der katharrhaltschen zeige zuförderst die Abwesenhelt der sphilitischen Erscheinungen, der rein akute Verlauf der katharrhaltschen Form, die Berücksichtigung der Constitutio annua und besonders der Umftand, daß gewöhnlich auch die Submarillar. Drufen oder die Parotis entzündlich schwellen, die nichts weniger als syphilitische Natur dieser Geschwulft deutlich an.

Der Leiftenbruch unterfchetbet fich vom Bubo

- 1) durch fein plotiliches auf gewaltsame torperliche Unftren-
- 2) durch seinen Sig; benn die Geschwulft des Bruches nimmt mehr den obern Theil der Druse, der Bubo hine gegen den untern Theil derselben ein;
- 3) durch das Gefühl; indem der Leistenbruch fich gewöhnlich weich, elastisch und schmerzlos, der Bubo hingegen bart und schmerzhaft anfühlen läßt;
- 4) burch die Farbe der Haut, die beym Leiftenbruche unver: andert und im gewöhnlichen Zufiande, beym Bubo hingegen roth und entzündet erscheint.

§. 102.

Die urfächlichen Momente des Bubo.

Die Prableposition ju Bubonen fann man theils in einer strophulofen Disposition, theils in frühern schon gehabs ten Drufenkrankheiten, und in manchen andern noch nicht hin, reichend erörterten Umständen suchen.

Die veranlassende Ursache ist eine primaire Form ber Sphilis, woben entweder der Bubo als konsensuelle Erschei, nung, oder als Rester einer sekundairen Sphilis hervortritt. Man nimmt zwar auch den Bubo als primaire sphilitische Form an; doch ohne allen Grund und immer nur als Mögstichkeit. Eine unmittelbare Erscheinung des sphilitischen Bubo nach einem verdächtigen Bepschlase, ohne Dazwischenkunft einer von den eben genannten Ursormen, läßt sich weder theores tisch erklären, noch praktisch nachweisen.

Beym Tripper ift der Bubo in der Regel konsensuell, und wird wie alle konsensuelle Erscheinungen durch alle Schade sichkeiten herbengeführt, welche die Entzündlichkeit erhöhn und die Mitleidenschaft der nahe gelegenen Theile aufregen konnen; hierher gehören besonders heftige Bewegung des Korpers, Benschlaf und geistige Getranke.

Nach dem Schanker ist der Bubo gewöhnlich ein Res
fler der sekundairen Syphilis; er entsteht in der Regel erst
dann, wenn das primaire Geschwür einige Zeit gedauert, oder
sich bereits geschlossen hat, besonders wenn dasselbe verwahrs
lost, oder nur als bloße Dertlichkeit behandelt worden ist. Er
unterscheidet sich von dem konsensuellen durch ein langsameres
Entstehen, und eine entschiedene Neigung zur Bereiterung.

Auch giebt es Falle, wo ein ursprünglich konsensueller Bubo durch neue sich darauf beziehende Beranlassungen idios pathisch hervortritt.

Das Wesen des Bubo ift Entjundlichkelt, die bald mehr, bald weniger intenfiv ift. Der Umftand, bag bie Inguinal, Drufen der obern Reihe ihre Lymphgefage ben Dannern von ber Gichel, ben Beibern vom Damme; Die tiefer liegenden aber ben den erften von den Extremitaten, ben Weibern von den Momphen erhalten, ift Schuld baran, bag ben Mannern bie obere Reihe, benm weibilden Gefdlechte bingegen die Drufen in der Rabe des Poupartiden Bandes, haufiger entjundlich ergriffen werden, als bie tiefer gelegenen. Doch giebt es nicht feltene Benfpiele, bag auch in ber untern Reihe ber Bubo fich ausbildet. Swediaur und Doscatt ergablen ihre eigene Benfpiele; erfterer hatte ein fpphilltifches Gefchwur an der großen Bebe, worauf ein Bubo in der untern Reihe ents Letterer fab in beyden Leiftengegenden biefelbe Rolge frand. nach einem marmen Rugbade, welches er in ber bochft entaunb. liden Periode des Erippers genommen hatte. Die llebertra: gung des fopbilitifchen Groffes nach ber Juguinaldrufe fann burd eine periftaltifche Ucbertragung ober materielle Banberung Des Stoffes nicht erflatt werden. Die unmittelbare Einwit: fung auf Die reproductive Sphare ergreift biefeibe auf eine elgenthumliche Beife, und fo erfolgt nun die Fortpfiangung bis in bie Drufe, als Central Organ der Reproduction.

Die ben dem Bubo so häufig eintretende Eiterung ist nicht blos durch die Entzündung, sondern auch durch das in: nerste Wesen des Bubo bedingt; der Bubo, welcher konsens fuell entsteht, nimmt felten diese Michtung, welche ben einem fogenannten idiopathischen burch die größte Gorgfalt gewöhnlich nicht verhütet werden kann.

§. 103. -12200 stantante adamagital

Prognose ben dem Bubo.

Die Vorhersagung ben dem Bubo richtet sich sehr nach der individuellen Constitution des ergriffenen Subjekts. Ift die Constitution stark und unverleht, durch keine Opskrassen zerrüttet: so zertheilt sich der Bubo leichter, und entsteht die Eiterung, so verläuft sie gut und schnell; doch auch im besten Falle ist die Eiterung ein langwieriger, 3 auch 4 Wochen dauerns der sehr schmerzhafter Proces.

Ben schlaffen kachektischen Individuen nimmt der Bubo häusig einen sehr langsamen Sang; er neigt sich dann entsweder zur Verhärtung hin, oder die Eiterung artet in ein immer fließendes, fistuloses hochst bösartiges Geschwur aus, ber sonders wenn durch eine zweckwidrige Behandlung eine solche unglückliche Richtung begünstigt wird.

Ift der Bubo bis zur Eiterung gediehen, so ift es nicht gerathen die Zertheilungsversuche fortzuseben. Einzelne Bes obachtungen lehren zwar, daß auch dann noch Zertheilung mögslich ift, aber theils ist darauf nicht zu rechnen, und dies um so weniger, als eine fortgesehte Zertheilungsmethode leicht zu fistus

losen Geschwaren Anlaß giebt, theils scheint auch, daß in den eben ermahnten Fallen von spater Zertheilung, der sich bildende Absces nicht sowohl die Druse, als vielmehr das sie umgebende Zellgewebe ergriffen hatte.

6. 104.

Behandlung des Bubo.

Eine zwenfache therapeutische Indikation findet bier Statt:

der Arzt muß die Entzündlichkeit heben, und dem Umsichgreifen der sekundairen Syphilis vorzubeugen suchen.

Ein konsensueller Bubo, der blos durch Steigerung der Entzündlichkeit einer primairen sphilitischen Form, und nicht als Rester der sekundairen Syphilis entstand, ist, wie schon oben angedeutet worden, leichter und sicherer zu zertheilen. Die Zertheilung ist hier so eigenthümlich und so entschieden, daß selbst durch maturirende Mittel in gewöhnlichen Fällen nicht Eiterung, sondern Resorption erfolgt.

So wie die Spannung in der Leistengegend anfängt: so ming der Kranke sich so ruhig als möglich verhalten, und die antiphlogistische Lebensweise befolgen. Ein kühler, aus Sem, meltrume und Goulardschem Wasser bereiteter Brepumschlag, oder die Unwendung eines kublen, aus Essig mit Wasser be-

stebenden Epithems reicht ben noch nicht welt gediehener Form aus. Ift die Entzündung bedeutend gesteigert, die Constitustion des Kranken kräftig, das Wesen der Form der gesteigerten Arteriellität unterthan: so können einige Blutigel um die hoch entzündete Drüse angelegt, und dann die kühlen Umschläge, wie oben beschrieben worden ist, angewandt werden. Ausser einer strengen Auswahl in Hinsicht einer entzündungswidrigen Kost, und einer sorgfältigen Rücksicht auf die Unterhaltung des offnen Leibes, wird innerlich nichts zu geben senn, als was durch die schon vorhandene primaire Form nöthig gemacht wird.

Begleitet der konsensuelle Bubo den Tripper: so ist es rathsam das Glied durch lauwarme Umschläge vor dem nach, theiligen Einfluße der Kälte, welche der Bubo nothig macht, zu schüßen.

Ift die Entzündlichkeit nicht bedeutend, die Form mehr ernstpelatos, die Körperkonstitution des Kranken zart und sens sibel: so enthalte man sich von der Anwendung der Kälte; ein leichter lauwarmer Breyumschlag von Semmel mit Milch, wozu nach Dedürsniß besonders ben hoher Empsindlichkeit, Cosnium, Opium oder Hoosciamus hinzugesest werden können, oder auch aus den Speciedus ad Cataplasma mit ahne lichem Zusaße wird hier gute Dienste leisten.

Scheint die Form chronisch werden zu wollen, verschwin, den allmählig die Zufälle der Entzündlichkeit, ohne daß sich die

Geschwulft sehr vermindert, so kann man kräftige zertheilende Mittel in Gebrauch ziehn. Eine Mischung von Rosensalbe mit dem flüchtigen Liniment zu gleichen Theilen, oder eine leichte Merkurialsalbe

Rec. Ungti flavi 3j

- Hydr. ciner. 38,

welche man täglich amal an die innere und vordere Fläche des Schenkels einreiben läßt, find hier angezeigt. Auch thut ein iertheilendes Pflaster, womit man unter den eben erwähnten Umständen die blos geschwollene aber nicht entzündete Druse bedecken läßt, die ersprießlichsten Dienste:

Rec. Empl. Conii

- Hydr. cinerei
- Litharg. compos. singul. 38

Malax.

D. Sig. Auf Leder geftrichen anzuwenden.

Wenn der Bubo zertheilt ist: so erfordert es die Vorssicht, auch dann, wenn die primaire Form kein Quecksiber nothig macht, durch einige Tage ein mildes Quecksiber, Prasparat zu geben. Wenn auch die Schmidtsche Unsicht, daß jeder Bubo ein Beweis für die secundaire Syphilis sen, uns haltbar ist: so rechtsertigt thells die Schwierigkeit einer apos diktisch sichern Diagnose, theils die Natur der Form einen vorsichtigen Gebrauch milder Quecksiber, Praparate. Frige

hat Untecht, wenn er unter solchen Umffanden ben Gebrauch bes Quecksilbers für nachtheilig erklart; die Erfahrung hat gegen seine Ansicht entschieden.

Wenn der Bubo nnter den h. 102. angegebenen Um, ftanden als Reflex der sekundairen Syphilis eintritt, und sich durch eine langsamere Ausbildung als eine solche Form anskändigt, so ist auch die Intensität der Entzündlichkeit nicht so energisch, daß der antiphlogistische Apparat sehr umsassend sehn müßte.

Der Streit, ob ein folder Bubo gertheilt, ober in Eiterung gefest werden muffe, tann durch bie fo bemabrte, aber leiber fo oft vernachläßigte Lehre: quo natura vergit, eo ducenda, am besten geschlichtet werben. Solos pathifche Bubonen haben eine fo entschiebene Delgung que Suppuration, daß diese Tendeng ju einem charafteriftifchen Rennzeichen erhoben werden fann. Diese Meigung ift fo vors herrschend, daß die fraftigfte gertheilende Dethode in ben allermeiften Rallen ben Giterungsproceg nur ju verlangern abet nicht ju verhaten vermag. Unter folthen Umftanden ift es bochfe Unrecht, ben Bang ber Datur gewaltsam fieren gu wollen. Wer einen in Elterung gebenben Bubo fortdauernd gu gers theilen versucht, und fich auch burch einen weit vorgerückten Eiterungsprozeg von diefem Berfuche nicht abhalten lagt, giebt Die erfte Beranlaffung ju einem bosartigen fiftulofen Gefchmure, ju bem jeder Bubo wegen seines eigenthumlichen innern Des

Es ift febr mabr, daß ber Bubo fein fritischer Abfeeß ift, burch welchen bie Gefammtform ber Opphilis entichieben werden fonnte; es ift mabr, daß der idiopathifde Bubo eine nene Form ber bereits ale fefundair hervortretenden Syphilis ift: aber eben fo mabr ift es auch, daß in den meiften gallen der idiopathische Bubo eine franthafte vicarirende Thatigfeit für Die meiften andern Organe, Die benm Fortschreiten ber Suphills gewiß enitergriffen murben, übernimmt. Es ift eben fo wenig zu bezweifeln, baß ein idiopathischer Bubo unter manchen bieber nicht hinreichend erorterten Umftanden, auch ben einer fcon etwas vorgeschrittenen Giterung, gertheilt wers ben fann: aber faum ift bie Bertheilung erfalgt, fo tritt (wenn nicht durch die fraftigfte Seilmethode bagegen gewirft wird) bie fekundaire Sphills in andern Gebilden, befonders als fekundaires Gefdwar im Rachen auf. Benfpiele aus ber neuften Zeit bestätigen uns Diefe Wahrheit wollfommen.

Aus allem diesen geht hervor, daß es doppelt Unrecht ist, ben der entschiedensten Neigung zur Suppuration unnühe Zer, theilungs, Versuche zu machen. Wo die Natur zur Resolution hinneigt, da kann dieselbe befördert werden, nur muß der Zer, theilung eine zweckmäßige Merkurialkur solgen, damit größeres Unglück verhütet werde.

Ein Brenumschlag mit Conium ober Sposchamus; eine Einreibung einer milden Fettigkeit in die Drufe, g. B. der gelben Galbe, find in der Regel zuforderft anwendbar.

Geht die Eiterung sehr langsam, und zeigen fich wieder einige Spuren der Zertheilungt so fahre man mit den Brepums schlägen fort, und unterstüße die Resolution durch die Einreis bung mit Merkurialsalbe, welches nicht sowohl in die Subsstanz der entzündeten Drüse, als vielmehr in ihre Umgebungen geschehn muß. Das so oft vorgeschlagene Verfahren, unter solchen Umständen die kalten Umschläge mit den warmen öfters abwechseln zu lassen, ist gar nicht zu billigen, und scheint übers haupt die entzündliche Geschwulft zur Verhärtung zu präs disponiren.

Ben hoher Entzündlichkeit kann wohl die Anwendung einiger Blutigel, und in seltenen Fällen auch ein Aderlaß Statt finden, aber häufig wird das lettere nicht nöthig werden. Die Anwendung der Kälte ist ben hoher Entzündlichkeit auch ben dieser Form angezeigt; hat man sich aber von der Norhwendige keit der lauwarmen Brenumschläge überzeugt: so darf die Kälte nicht wieder angewandt werden.

Ift die Eiterung vollendet, zeigt eine erhabene miffarbige, Stelle die baldige Deffnung des Abscessest so fahre man noch mit allen erweichenden und maturirenden Mitteln fort, bis der Bubo von selbst aufgeht, wo bann unter Fortsetzung der

Brenumschläge, um die noch harten Rander ju schmelzen, und unter Beobachtung der strengsten Reinlichkeit vermittelft einer gut geordneten Merkurtaltur, die Heilung vollbracht wird.

Man hatte früher das künstliche Deffnen der Bubonen als eine zur Verhütung der Resorption und weitern Verbreistung der Lues nothwendige Maasregel empfohlen. Diese Ansicht aber ist unrichtig, weil ben so veränderter Funktion der Lymphgefäße und ben der entgegengesehten Richtung ihrer Thästigkeit keine Einsaugung zu befürchten, daher denn auch der Bubo in den allermeisten Fällen der Selbstöffnung zu überslassen ist.

Nicht blos das fünstliche Deffnen wurde als nothwendig erkannt, man ging noch weiter: Joh. Sograf hat den von mehrern mit Beyfall aufgenommenen, aber bey einer unbes fangenen Unficht durchaus verwerflichen Rath gegeben, die entzündete Druse vollkommen auszuschneiden.

Doch kann es Falle geben, wo eine kunstliche Deffnung bes Bubo nothig wird. Wenn die Haut zu dicht ist, und ben sehr heftigen Schmerzen die Selbstöffnung nicht erfolgt, oder wenn der Bubo auf einer sehr ungunstigen Stelle aufzu, brechen droht: dann tritt die Indikation für die kunstliche Deffnung ein.

Das Meffer ift das zweckmäßigste Instrument, um einen Bubo zu eröffnen; der Schnitt muß hinreichend groß senn, und der Abfluß nicht gewaltsam ausgedrückt werden.

Auch wandte man zur fünstlichen Deffnung solcher 216, scesse Alexanittel an, und stellte für ben Gebrauch derselben drey Inditationen auf. Wenn nämlich die Entwickelung des Bubo wegen Mangel an hinreichender Entzündlichkeit zu langsam ges schieht, wenn die Ränder sehr hart und schwielig sind, und wenn der Aranke das Messer zu sehr fürchtet. Nur die dritte Indikation kann zur Noth unter Umständen gelten. Was aber die langs same Ausbildung des Bubo und die dauernde Härte der Ränz der anbetrifft: so können diese die Anwendung der Aesmittel nicht rechtsertigen. Unter diesen Umständen sind innere Mittel anzurathen, welche der hier waltenden Dyskrasie entsprechen, und äußerliche Mittel anzuwenden, welche die Eiterung kräftig sördern und die Ränder zu schmelzen vermögen.

Soll ein Aehmittel angewandt werden, so bringt man auf ein mit einer Deffnung versehenes Pflaster das Aehmittel und läßt es mehrere Stunden liegen, die ein Schorf gebrannt ist, welcher durch eine Digestirsalbe losgewelcht wird. In der Megel reicht dazu der Zeitraum von einer Stunde aus, wo dann nach losgeweichtem Schorfe und darauf erfolgter Entlees rung der Eiterungshole die hier schon vorgeschriebene Helle Methode eingeschlagen wird.

Jum innern Gebrauch steht das Quecksilber als das vors
züglichste Mittel oben an; doch sind zu gleichem Behuse vers
schiedene Mittel von den bekanntesten Schriftstellern empschlen
worden. Hunter und Andre empsahlen ganz vorzüglich
die Brechmittel, und versichern, die herrlichsten Wirkungen
barnach beobachtet zu haben. Andere wollen von dem Gebrauche
des Opiums mit Camphor besondere Dienste gesehn haben;
und es läßt sich erwarten, daß ben hoher Empfänglichkeit und
großen Schmerzen diese Pulver auch besondere Wirkung äussern
werden.

Sollte burch die Intensität der Entzündlichkeit oder durch Verwahrlosung der Brand den Bubo ergriffen haben z so treten alle die Heilanzeigen hervor, welche unter solchen Ums ständen angezeigt und von uns bereits mehreremal entwickelt worden sind.

Sollte die Reigung zur Verhartung sich mehr ausbilden: so tritt die darauf wirkende Behandlung ein. Alles was bes reits in dieser Hinsicht empsohlen worden, muß auch hier ans gewendet werden. Es versteht sich von selbst, daß eine zwecks maßige Merkurialkur die ganze arztliche Pflege der Seirrhosität begleiten muß.

Secundaire oder consecutive Sphilis.

§. 105.

Begriff der secundairen Syphilis.

Wertilgt: so tritt sie in ihrer primitiven Gestaltung nicht vertilgt: so tritt sie in ihrer sekundairen Form, nicht als einzelner Zufall, sondern als Aggregat der mannigsaltigsten Ersschelnungen auf. Reine dieser Erschelnungen ist charakteristisch, und nur der Zusammenhang und die strenge Rücksicht auf die primitiven Formen, machen die Diagnose möglich; weshalb auch ein französischer Arzt in den neusten Tagen die Lues als Krankheitssorm läugnet, und in einer originellen Schrift sur la non-existence de la maladie venerienne die Erscheinungen anders zu erklären sucht.

Die Gebilde welche von der sekundairen Sphills besons ders ergriffen werden, sind nach Hunters sehr richtiger Ersfahrung, die Haut und alle ihre Fortsehungen nach der Mundshöle, dem Halse, der Nase, nach dem Auge und dem After; nächst der Haut auch die tiefern Gebilde des Körpers, die Sehnen, Bänder, Aponeurosen, das Periostium und die Knochen selbst. Diese Theile werden aber bep einer sekundairen Sphills von den mannigsaitigsten Zufällen und Störungen ergriffen, so daß Brassavolus zwey hundert und vier und drepsig sage 234 Gestaltungen als Restere der sekundairen

Sphills aufgestellt hat. Doch laffen sich alle bie von dem eben genannten Schriftsteller angeführten sphillitischen Zufälle im Allgemeinen auf folgende Formen zurückbringen:

Langwierige Entzündungen, Geschwüre an verschiedenen Steilen, Flecke aller Art, Hautrisse, Geschwülste und schmerzhafte Ano, chenleiden, wozu sich ben anhaltendem Bor; schreiten der Krankheit ein eigenthümliches Zehrsieber mit Vereiterung innerer Organe hinzugesellt.

§. 106.

Die Zeit des Ausbruchs der fonfecutiven Enphilis.

Man hat sich noch nicht geeinigt, wie viel Zeit zwischen der primitiven und dem Ausbruche der sekundairen Syphis lis verstreichen könne. Musitanus, Sylvaticus, van Swieten, mit ihm Rosenstein und mehrere andere bes haupten, daß die sekundaire Syphilis noch nach 30 Jahren aus, brechen könne, und Agostini erzählt den Fall, daß eine Monne im 40sten Jahre ihres Lebens an einem syphilitischen Osteocopus litt, der von einem in der frühsten Kindheit von der Amme erhaltenen Austeckungsstoffe hergerührt haben soll. Dergleichen Erzählungen von ärztlichen Beobachtungen scheinen zwar etwas abeutheuerlich zu seyn, und mögen oft mehr für die gutmuthige

Leichtglanbigkeit des Arztes, als für die Seltenheit der Thatz fache zeugen, doch unmöglich find sie nicht, und neuere ganz unbefangen gemachte Beobachtungen sprechen mehr für, als gegen die Wahrscheinlichkeit solcher Erscheinungen.

Dieses ift ein Lehrsah, für welchen die meisten Erfahrungen sprechen. Ungeachtet Hunter und Frank ebenfalls dieser Meinung find, so erzählt doch ersterer einen Fall, wo die kons sekutive Syphilis ein Jahr nach Heilung der primairen ausges brochen ist, und Frank hat mehrere Beyspiele, von 5 bis 6 Monaten, welche zwischen der primairen und sekundairen Syphilis verstoffen sind. Seitene Fälle von sehr zeltigem Ausschuche der Syphilis sind diese, welche Frize erwähnt, wo die Lues wenige Tage nach eingetretener primairer Korm erschien.

§. 107.

Mabere Beschreibung der secundairen Syphilis.

So unbestimmt und regellos auch im Allgemeinen bis Bufalle der konsecutiven Syphilis sind: so lassen sich doch die sammtlichen Erscheinungen in 2 Reihen theilen, von denen die erstere die naberen, die lettere die ent ferntern enthält.

Bur erften Reihe gahlt man alle Uffektionen der welchen, jedem Stoffe leichter juganglichen Theile Des Halfes, ber

außern Haut, der Drufen, der Mundhohle, der Mundwinkel, der Mase, des Auges und des Afters. Als Form gehören hierher alle Arten von Pusteln, Flecken, Entzündlich: keiten, Geschwüre, Schrunden und Auswüchse, welche in einzelnen Sagen naher beschrieben werden sollen.

Jur zweiten Reihe gehören die Leiden der tiefer in der Sphäre der Reproduktion liegenden sogenannten harten Theile, der Knochen, der Beinhaut, der Sehnen, der Bander und der Aponeurosen. Diese Leiden treten unter der Form von weichen und harten Geschwülsten, Auswüchsen, nächtlichen Schmerzen, Knochenfraß, als Anchylosis und als Osteosarcosis auf. In einzelnen Sähen werden auch diese Formen näher beleuchtet werden.

§. 108.

Die Erscheinungen der ersten Reihe.

Die Erscheinungen der ersten Reihe treten keinesweges sammtlich hervor, aber immer beginnt die Syphills mit einigen Symptomen dieser Reihe. Wir betrachten sie nun einzeln:

Die suphilitischen Pusteln treten bald als venes rische Kraze, bald als Flechte, oft als boser Grind und in hochst besartigen Fällen auch als eine hartnäckige, Aussah ahns liche Form hervor. Ihren Sit haben sie am häufigsten an der Stirne, am Untlike, an der Brust, den Handen, und häufig auch an den übrigen Theilen. Mehrere Schriftsteller haben es versucht, die verschiedenen Modistationen der Form und der Farbe ben diesen Pusteln zu beschreiben; indessen scheint darimm keine so große Eigenthümlichkeit zu herrschen, daß nicht auch Pusteln eines andern Ursprungs dieselben Eigenschaften haben könnten. Am gewöhnlichsten sind sie in Sestalt kleiner Bläschen, oder Linsen, oft auch vollkommen krähartig und in der Regel alle (die Bläschen ausgenommen) bräunlich von Farbe. Ein Wink für die Diagnose der Pusteln ist auch, daß sie häufig in Gestalt kleiner Furunkeln zum Vorschein kommen, die aber nicht eitern, sondern blos sickern. Eine hier nicht zu übersehende, ben suphilitischen Pusteln selten sehlende Eigenschaft ist auch, daß sie mehr brennen als schmerzen, und daß die Empsins dungen ben der Nacht zunehmen.

Wenn solche Pusteln die Stirne umgeben und einen fleche tenartigen Kreis bilden, so nennt man sie Corona Veneris; einen solchen Namen erhält auch die schon früher geschilderte Pustelerscheinung, welche von den Zeugungstheilen anfängt, und gürtelähnlich den Oberschenkel umgiebt. Noch ist zu bes merken, daß die Pusteln gewöhnlich als Symptome derjenigen Syphilis eintreten, welche durch den Tripper als Ursorm in den Organismus einging.

Die Flecke zeichnen sich anfänglich durch ihre hohe Rothe, welche später in eine dunkle Leber, oder Aupferfarbe übergeht, besonders aus. Man trift dieselben am Salse, der Brust, an den Handen, zwischen den Schultern und in der Nähe der Zeugungstheile am häusigsten. Einige behaupten, daß sie im Gesichte höchst selten vorkommen; diese Bemerkung scheint auf sehr individuellen Wahrnehmungen zu beruhen; die Weobachtungen anderer sprechen für das Gegentheil. Sie sind in der Regel schwerzlos, nicht über die Haut erhoben, nur manchmal erzeugen sie ein unangenehmes Breinen, und schlifern sich besonders während einer Merkurialkur, wenn sie der Heilung nahe sind, an der Oberstäche ab; manchmal sickert auch eine scharfe Feuchtigkeit aus, wo sie sich dann pustelartig über die Haut erheben, und leicht in ein Geschwüd übergehn.

Wenn bergleichen Flecke, oder die früher erwähnten Pusteln an behaarten Theilen vorkommen, so sallen die Haare, sowelt diese Flecken reichen, aus. Auf den Kopfe kann auf diese Weise eine Glahe (Madarosis) entstehn. Auch zeigen sich solche Flecke unter den Nägeln; wo dann diese häusig abs fallen oder durch Geschwüre, die sich an ihrer Wurzel erzeugen, abgestoßen werden. Der neue Nagel ist dick, rauh und uneben, aft von monstrosem krallenformigem Aussehn.

Die Entzündungen, welche fich als Reffer einer sekundalren Sphilis ausbilden, beobachtet man an allen Stollen der Haut und ihren Fortpflanzungen nach den innern Höhlen, wo fie als eine beschränkte rosenartige Rothe mit brennenden

Odmergen berbortreten, an einzelnen Stellen miffarbig werden, und endlich fich jum Gefdmare geftalten. Gang befonders aber find bie Entgundungen ju bemerken, welche unter biefen Umffanden gang charakteriftisch an ben Ohren und gang befons bers an den Mugen bervortreten. Die Entgundung ber lettern ift mit der Iritis ex suppressa medorrhoea nicht au verwechseln, aber fie ift eben fo wie biefe gang eigenthumlich gestaltet, so daß es dem geubten Muge fast unmöglich ift, bende Kormen unter fich, ober mit anbern ju verwechseln. Diefe als Erscheinung ber fonsekutiven Sphillis ausgebildete Ophthalmie geichnet fich befonders burch eine große Lichtscheu, Thranen Des Muges, leichte Baricofitat ber Gefaffe, ungleich jufammenges jogene Pupille, Berbunflung der Sornhant, und bedeutende Schmergen im Innern bes Muges aus. 3m Gangen fieht ber Renner nur bem Huge bie Gefahr an, in welcher es wirklich schwebt, and the land was beginning the sail

Die Ohren Entzündung, welche die Lues begleitet, ents steht entweder als Rester der Form im Ohre selbst, oder sie pflanzet sich durch die Tuba Eustachii als Nachenentzüns dung fort; sie ist mit großen Schmerzen gepaart und geht leicht in Abscesse und bösartige Geschwüre über. Von letztern werden die nahe liegenden Theile ergriffen und zerstört, wo dann durch diese dort entstandene höchst schmerzhafte und lästige Caries das Leben selbst gesährdet wird.

aldginahisch dordt andslår

Die Entzündung der Mundhole und besonders des Rachens zeichnet sich durch die Hartnäckigkeit in ihrer Dauer und durch eine gewisse Eigenthümlichkeit der Röthe aus. Ste erscheint an einzelnen Stellen dunkler, an einigen andern mißt farbig; gewöhnlich durch kleine Geschwüre unterbrochen, pflanzt sie sich strahlenförmig in die tiefern Gegenden hinab und versbreitet sich längs der Schneiberschen Haut bis in die Rasens Höhlen. Diese Entzündung ist in der Regel die erste Ersscheinung der konsekutiven Sphills und begleitet sie immer, wenn lehtere durch den Schanker in den Körper eingegangen ist.

Die kon sekutiven Geschwüre entstehen zusörberst in der Form kleiner Bläschen, im Rachen, am harten und weichen Saumen und an den Seiten der Mundsöle; manche mal auch in den äußern Winkeln des Mundes; sie bersten und verbreiten sich nach allen Segenden, wo sie oft mit vieler Schnelligkeit die Nasenlöcher ergreisen. Un ihrem eigenthüms lichen speckartigen Aussehn, ihrer Bösartigkeit und der sie ume gebenden verdächtigen Entzündung sind sie kenntlich; ungeach, tet es sich nicht läugnen läßt, daß in der Cynanche maligna ähnliche Seschwüre vorkommen, wo aber der Verlauf der Form und die Berücksichtigung der begleitenden Zufälle den nöthigen Ausschluß geben. Sie fressen schnell um sich und ers zeugen in den darunter liegenden Knochen, besonders in den schwammigen der Nase und des Gaumens die Caries. Nicht in allen Formen der Lues sind sie da, sehlen aber bep der

Syphilis, welcher ein Schanker vorherging, selten ober gar nicht. Franks in hinsicht der Thatsache sehr richtig gemachte Beobachtung, daß nämlich diese Geschwüre ben der sekundairen Syphilis seltner in Italien als in kaltern Gegenden vorkommen, kann nicht blos durch klimatischen Einfluß, wohl aber durch den Umstand eiklärt werden, daß in wärmern Gegenden übers haupt die Schankersorm seltener ist.

Auffer ber Mund, und der Nasenhole zeigen sich sekuns dalre sphilitische Geschwüre noch an andern Orten, besonders aber in der Segend, wo sich viel knochige Theile befinden: am Kopfe, an den Rippen, an Handen und an Schienbeinen.

Zuerst entzündet sich ein Fleck, wird misfärbig, und dann tritt entweder ein Blaschen hervor, welches berftend die ersten Erscheinungen des Geschwürs zeigt, oder eine scharfe Jauche sickert aus einer offenen nicht erhabenen Stelle. So bes ginnt das Geschwür unmittelbar in der Substanz. Diese Gesschwüre zeichnen sich besonders dadurch aus, daß sie schnell und mehr in die Breite um sich fressen und schmerzlos sind. So lange die Röthe dauert, ist Brennen zugegen, sobald aber das Geschwür ausgebrochen ist, läßt auch diese Empfindung nach.

Unter Schrunden werden misfarbige Riffe der Saus verstanden, welche auf der innern Flache der Sande, der Fuße, und in der Nahe des Ufters mit einer charafteristischen kupferfarbenen Umgebung entstehen, eine scharfe bosartige Jauche ergiessen und sich in mancher Beziehung als Geschwüre vershalten, daher hat man sie mit Unrecht zu den Auswüchsen gezählt. Ihre Ränder sind schmerzhaft, etwas aufgeworsen und schwielig. Man beobachtet sie gewöhnlich an den Händen und Küßen derer, welche eine sehr bichte, von grober Arbeit erhärtete Haut haben. Nach geheilter Lues, wenn die Schrunden längst den sphillitischen Charakter verloren haben, bleiben noch einige Zeit Rise in der Haut zurück, deren Ränder sich absschissen. Die oben erwähnten Schrunden sind eine gewöhne liche Erscheinung der Syphilis, die durch den Tripper in den Organismus eingegangen ist; sie sind ebenfalls sehr hartnäckig und erfordern viel Ausbauer und Ausmerksamkeit.

Die Auswüchse find sowohl in Hinficht ber Form; als auch in Hinsicht ihrer Struktur von einander verschieden; man theilt sie am besten in Verrucas, Warzen, und Condylomata, Feigwarzen ein. Erstere sind kleine erhabene auf der Oberstäche gefurchte Verhärtungen, deren inneres Gebilde hart, trocken und gleichiam pords erscheint. Sie entstehen theils an den Genitalien, wo sie unmite teldar nach der primairen Sphilis hervortreten, und auf eine nicht vollendete Heilung der Form hindenten; besonders gehören die schon ben der Beschreibung des Schankers erwähnten kleinen kalidsen Tuberkeln hierher, welche nach schnell geschlossenem Geschwüre an dieser Stelle zurückbleiben,

und die Unvollkommenheit der Heilung deutlich beurkunden. Ausserdem kommen auch Warzen als Symptome der sekuns dairen Syphilis am Antlike und an den Handen oft in bedeuten, der Menge hervor, und ein manchmal unerklatbarer Ausbruch derselben ohne andre Spuren der Lues giebt dem Arzte einen wichtigen, nicht zu übersehenden Wink. Diese Warzen sind schmerzlos, unbeweglich, und mehr über die Hant erhoben, wie die, welche an den Genitalten zum Vorschein kommen.

Die Condylomata (Mariscae) find in ihrer Form verschiedene, welche, fleischartige, auf ihrer Oberfläche ebenfalls gefurchte Musmuchfe, welche nach ber Berichiedenbeit ibrer Geffaltung mancherlen Damen erhalten haben. bat Cristas, Moros, Ficus, Thymos, Porra, Myrmecias, nachbem fie einer, freilich etwas febr regen Phantafie mit Sahnenkammen, Maulbeeren, Feigen, bem Thymian, dem Lauch, dem Blumentoble oder einem Umeifens haufen Mehnlichkeit zu haben icheinen. Ihr Gis ift an ben Genitalien und ihren Umgebungen und am Ufter, mo befons bere bie Cristae vorfommen, und mandmal mit Samorre hoibalfnoten verwechfelt werden, bis eine genaue Untersuchung und die Beruckfichtigung ber vorhergegangenen Erscheinungen ben Brrthum aufelaren. Ihre Oberflache fidert manchmal eine Scharfe anftedende Sauche aus, oft bluten fie auch; bendes geschieht besonders ben benen, welche in ihrer Struftur febr gefurcht find, wie der Thymus, das Porrum und bie Myrmecia. Manchmal bricht auch ein solcher Auswuchs auf, wo sich bann ein sekundaires suphilitisches Geschwür bars bietet. Diese Auswüchse können, wenn zu ihrer ihnen schon eigenthümlichen Hartnäckigkeit noch Verwahrlosung hinzutritt, zu monströsen Massen heranwachsen, die in ihrem Sewichte vft mehrere Pfund betragen und die mannigsaltigsten Gestaltungen haben; am gewöhnlichsten sind die Locken, und Knotens förmigen von einem Perückenartigen Bau. Die von Guillaus met zuerst erwähnten weißen mit dem Namen der Ritstallblasen bezeichneten Geschwülste der Geschlechtstheile gehören ebenfalls in die Reihe der eben abgehandelten Zufälle.

Hier ist nicht zu übersehn, daß manchmal ben ganz ges sunden Individuen kleine Rammahnliche Auswüchse an den Zeugungstheilen vorkommen, die von suphilitischer Dyskrasie weit entfernt, das leicht mögliche Resultat eines dort Statt gefundenen Druckes oder einer plotlichen Quetschung sind. Es gehört große Umsicht und genaue Erwägung aller Umstände dazu, um in einem solchen Falle keinen Mißgriff zu thun.

§. 109.

Die suphilitischen Erscheinungen der zwenten Reihe.

Die Erscheinungen der zwenten Reihe treten oft recht schnell als Symptom der sekundairen Sphills auf, aber immer-

spater als die Erscheinungen der ersten Reihe; daher kann es wohl, wie Schmidt sehr richtig bemerkt, manchmal geschehn, daß der hinzugerufene Arzt schon bende Reihen antrifft. Es versteht, sich von selbst, daß es nur höchst seltene Formen von Lues giebt, wo alle diese Störungen sich vereinigen.

Die fophilitifden Rnochenschmerzen zeichnen fich burch ihre Seftigfelt und Elefe aus; fie ergreifen felten bie Gelente, ihr vorzuglichfter Gis ift in der Ditte der Rnochen: es Scheint ben Rranten, als wenn bas Sinnere bes Rnochens burchwühlt und durchnagt wurde. Die Ochienbeine, die Urm: fnochen, das Bruftbein, die Clavicula und die Schabele Enochen find diefer Form vorzüglich unterworfen. Es icheint. bag eine Gubinflammation ber Beinhaut Diefer Form jum Grunde liege. 2118 ein faft charafter fifches Rennzeichen gift ben blefen Schmerzen ber Umftanb, daß fie jur Rachtzeit in ber Bettwarme heftiger merben, fruh aber mit einer verftarften Musbunftung nachlaffen und am Tage oft gang aufhoren. Go ungemein wichtig auch biefes Cymptom ift: fo fann es boch. mehrern Schriftftellern und unbefangenen Beobachtungen gus folge, nicht fur gang charafteriftifch gelten, weil es veraltete theumatische Schmerzen geben fann, die ohne vorhergegangene fppbilitifche Unfteckung einen folden Berlauf nehmen und obne Quecffilber geheilt merben fonnen.

Im Ganzen scheinen boch diese Beobachtungen bochst felten ju fepn; in der Regel ift auch bey solchen Schmerzen der Kranke

fich einer fruhern Unftedung bewußt. Es ift givar mahr, bag nach geheilter Lues oft noch Schmerzen in den Rnochen gus ruchbleiben, welche ohne Quedfilber mit tonischen Mitteln und Opium geheilt werden: aber diefen fehlt das Rennzeichen der nachtlichen Exacerbation, auch find fie minder heftig und fie treten mehr ale Abgeschlagenheit ber Glieber und große Schwäche hervor, woben ben Leibenden oft bie Rnie einbrechen. Gewöhnlich find die fopbilitifchen Ochmergen firirt; boch fehlt es nicht an Bepfpielen, daß fie fluchtiger Datur waren und Die Stellen wechselten. Wenn der Osteocopus lange mu: thet: fo wird ber Knochen leicht caribs; die breiten Rnochen find Diefer Berftorung leichter als die langrohrigen unterworfen; werden aber lettere bavon ergriffen : fo bildet fich unter ungluck. lichen Umftanden eine Art Spina ventosa, berjenigen nicht unahnlich, wie fie bey bosartigen Gfropheln entfteht. Die Berftorung geht von innen nach auffen, auch die gewöhnlichen Rennzelchen des Rnochenfrages treten bier ein; der rangige fper gififche Geruch, die fcharfe, die wundarztlichen Gerathichaften und Berbandfrucke schwarzlich tingirende Jauche, die Raubige feit des Knochen, Die miffarbige Umgebung und die nagenden Schmerzen feben diefe Berftorung des Knochens auffer Zweifel. 2m furchtbarften in ihren Erscheinungen und ihren Folgen fann diese Caries bann werden, wenn fie die Knochen des Gaumens, ber Dafenhole, die Gehorknochen und die die eben genannten Knochen umgebenden barten Theile ergreift. Ihre

Berftorung kann bier schrecklich enden, und das Leben felbft auf die schmerzhafteste Weise untergraben.

Manchmal schwillt die Beinhaut auf, und das Intersfitium füllt sich mit einer gallertartigen Masse; das Ganze bildet eine weiche bewegliche aber nicht schiebbare Geschwulft, welche Gummi heißt. Solche Gummata findet man ges wöhnlich auf den platten Knochen, besonders am Stirnbein, an der Wölbung der Orbita und am Sterno.

Tophus ift eine abnliche, aber barte und gewöhnlich fleinere und unbewegliche Geschwulft; die in ber Sole ents haltene Daffe ift freibenartig, und in der Confiftenz veralteten Sichtfnoten nicht unabnlich. Lettere aber unterscheiben fich jedoch durch das deutliche Geprage ber vorhergegangenen Urs thritis, durch ihren Gis in den Artifulationen, besonders der Extremitaten, durch ihre Ochmerglofigfeit fobald fie aus. gebildet find, und endlich durch den Umftand, daß die fie begleis tenden Schmerzen durch ben Ginfluß der Barme " milber werben. Die Topht entstehn in der Regel nur an den Kno: chen, bie von teinen bedeutenden Duskellagen bedeckt find, besonders am Schienbeine, der Clavicula und den Schar belfnochen. Es ift nicht ju laugnen, daß diese Geschwülfte auf eine im Leben febr tief rubende Syphilis bindeuten; boch fieht man dieselben ben zweckmäßiger innerer und topischer Bes handlung oft munderabnitch verschwinden. Gie fcmergen febr

Beftig: boch folgt dieser Schmerz ben Gesehen des Ostsocopus. Nach einer oft fürchterlich durchwachten Nacht vers
schwindet benm herannahenden Morgen oft jede Empfindung,
und der Kranke fühlt blos bey der Berührung die lästige
Gegenwart des Tophus.

Mird im Verlauf der Lues der Knochen in seiner Sub, stanz krankhaft aufgerieben: so erscheint die Exostosis syphilitica. Plenk definirt überhaupt die Erostose als eine Geschwulft, welche aus der Substanz des Knochens hervorgeht und die Härte des letztern erreicht. Die subinflammatorische Beschaffenheit des Periostiums, welche auch den Knochen ergreist, und eine eigenthümliche Depravation der Ernährung des Knochens, wodurch eine solche Weichheit und Dehnbarkeit erzeugt wird, liegt dieser Erostose zum Grunde. Sie kömmt gewöhnlich an den langröhrigen Knochen vor: doch sind die platten davon nicht ganz fren. Schmidt har Recht, wenn er behauptet, daß der Knochen von der Spphilis in der Regel dort ergriffen wird, wo seine Substanz am sprödesten ist.

Die Hartnäckigkeit der Erostosen ist nicht immer dieselbe; sie sind dem Tophus in dieser, so wie in mancher andern Hin: sicht ähnlich. Oft widerstehn sie der kräftigsten Heilmethode, und bleiben auch dann, wenn die Syphilis längst getilgt ist, noch als schmerzlose Störung der Form zurück; oft aber vers mindern sie sich schnell und verschwinden oft, wenn noch andere

Justille der Lues bestehn. Die Energie der Thätigkeit in der gesammten Reproduction des Kranken scheint für diesen Umsstand vorzüglich entscheidend zu sepn. Sine unter Begleitung des Ostsocopus entstehende Erostose ist den der Diagnose der Lues bestimmend. Es giebt zwar auch Auftreibungen der Knochen, welche ohne suphilitischen Sinstuß blos durch stors butische Opskrasse erzeugt werden: bende aber unterscheiden sich durch das deutliche Gepräge des durch diese Opskrassen erzeugten Habitus. Auch sind die skorbutischen Erostosen keiner Tumores ossei, sondern bloße Vergrößerungen des innern Raums der langröhrigen Knochen, der immer ein Verderbniß der Substanz zum Grunde liegt. Die skrophuldsen Erostosen besinden sich mehr an den Köpsen und Foresähen der Knochen, und ihr Sich ist gewöhnlich am Hand:, Fuß, und Ellbogens gelenke.

Bu den Zusällen einer weit gediehenen Lues gehören auch die beyden der äußern Erscheinung nach entgegengeseigten Formen, ein krankhaftes Sprodewerden der Knochen, (Anchylosis) welches in spätern Jahren Knochenbrüche ungemein begünstigt, und in den Gelenken als eine eigenthümliche Form von Anchylose hervortritt, und das Weich werden der Knochen (Osteosarcosis) wodurch die größten Deformitäten der Knochen vorbereitet werden. Ein solches Weichwerden der Knochen geht überhaupt mehr oder weniger jeder Erostose voraus.

Sammtliche Formen in den Gebilden der Knochen entiftehn als Restere jeder Lues ohne Rucksicht auf die primaire Syphilis; am häusigsten jedoch scheint die Lues consirmata, welche durch den Schanker in den Organismus einges gangen ist, von diesen Zusällen begleitet zu werden. Die wärmern Himmelsstriche sind der Ausbildung dieser Knochensübel nicht günstig, und Schmidt kann Recht haben, wenn er behauptet, daß diejenigen Nordländer, welche im südlichen Frankreich Heilung für die veraltete Lues suchen, die Linde, rung ihres Osteocopus und andrer sich darauf beziehenden Zusälle mehr dem wohlthätigen Einsluße des wärmern Hims mels, als den Ptisanen der französischen Aerzte zu danken haben. Nach ihrer Rücksehr ins kältere Vaterland stellen sich ost die alten längst geheilt geglaubten Schmerzen wieder ein.

§. 110.

Das Wefen ber Lues.

Schon in einem frühern S. ist angedeutet worden, daß ber sphillitische Stoff in dem reproductiven Systeme, in wies fern der Organismus dafür empfänglich ist, eine höchst krankshafte Richtung hervorbringt, die sich einerseits durch das Streben nach Vernichtung des Zellstoffs, und andrerseits durch krankhaftes Luxuriren in den Haut, und Knochengebilden uns verkennbar offenbart. Schon die Erscheinungen der primairen

Sphillis deuten darauf, und die Zufalle belder Reihen beftar tigen diefes in der konfekutiven Sphills vollkommen.

Daß die Syphilis der reproductiven Sphare eigen'thumlich zugewandt sen, hat Hunter schon geahndet und Schmidt deutlich ausgesprochen. Alle die Jeritabilität und Sensibilität am reinsten darstellenden Organe werden unmitztelbar von der Syphilis nicht ergeissen. Namentlich gilt dieses von dem Herzen, der Muskel, der Arterie, dem Hirn, dem Mückenmarke und dem Nerven. Die Lungen können zwar ben der höchsten Form auch syphilitisch affizier werden, wo dann die sogenannte Phthisis syphilitica entsteht, aber dann trifft es nur die das Organ in seinem Innern umkleidenden häutigen Gebilde, keinesweges aber die Gesäsbildung als das eigentlich Irritabele in den Lungen.

Durch diese krankhafte Tendenz in der reproductiven Sphare geschieht es, daß alles, was in den dadurch erzeugten Störungen als Produkt der eigenthümlichen Thatigkeit abgessondert wird, sich auch als der spezifische Austeckungsstoff darift. It, der auf jedes andere dafür empfängliche Individuum die Sphills zu übertragen vermag: so kann das speckige Eiter aus dem Geschwür, so die scharfe Jauche aus den Schrunden, so die mäffrige Flüßigkeit aus dem Thymus, so der ranzig rich chende körnige Ausstuß aus dem cariosen Knochen, die Uns stechung sortpsanzen. Es giebt zwar Aerzte, welche auf die eben

fo gewagten ale unguverläßigen Berfuche Suntere geftußt ben Producten der fonfekutiven Lues bas Bermogen, die Unftedung weiter ju verbreiten, absprechen: aber gegen diefe hat fich bie Erfahrung laut erflart. Doch fann jugegeben werben, daß die Unftedung aus fehr leicht begreiflichen Urfachen weit haufiger burch bie primaire Sophilis, ale burch die fecuns baire herbengeführt werde. Oprengel hat vollfommen Decht, wenn er eine Berpeffung des Blutes ben ben Opphilitis ichen laugnet. Alles was in dem Organismus auffer bem Daume der fuphilitischen Detamorphofen gestaltet und abges fondert wird, ift nicht fupbilitifd; bierber geboren auffer dem Blute, alle aus bem Organismus ausgeschiedenen Gafte, bie nur in fo fern anftedend werden tonnen, als ihnen etwas vom fpphilitifchen Stoffe aus irgend einer Geffaltung bengemische wird, wie dies mohl beim Speichel, beim Sarne, beim Saas men und ber Dilch baufig ber Rall feyn mag.

Wunden, welche Sphilitischen bengebracht werden, hellen eben so wie ben den Gesunden. Ben der Bildung des Callus ist dies weniger der Fall. Wenn ein von der Lues consirmata Ergrissener ein Bein bricht: so heilt es in der Megel sehr langsam, gewöhnlich nicht eher dis die Sphilts gehoben ist; wo sich erst dann der Callus vollkommen bildet. Luch ist dies ein Beweis mehr, daß die venerische Krankheit die Mischung und die Thätigkeit in dem der Jrritabilität vorzusglich zugewandten ben einfachen Verwundungen vorzüglich

feidenden Duskelfpsiem nicht ergreift, wohl aber die Rnochen, welche ber Reproduction allein unterthan find.

Wenn behauptet wird, daß bie Gafte bes fophilitifchen Rranfen auffer bem Rreife ber venerischen Detamorphofen nicht Sophilltisch verpeftet und anftedend find: fo wird boch feines, wegs geläugnet, bag bie ernabrenden Gafte nicht quantitativ und qualitativ verandert fenn tonnen, befondere ericheint das qualitative Berhaltnig febr geftort; Die Gafte find nicht er, nabrend, nicht bildend genug fur die Dorm des Organismus. Das Blut einer ichmangern fophilitifchen Frau, Die Dilch einer an der Lues leidenden 2mme, merden auf das Rind nicht Die eigenthumliche fuphilitifche Rrantheit übertragen; aber das Rind wird ichlecht genahrt werben, verfummern; es mer den mehrere Formen des findlichen Alters, Crusta lactea, Dyspepsia neonatorum, Atrophie, Stropheln, Sia: chitis, begunftigt werden. In folder Bebeutung fann auch Das Rind Die Ochuld des von der Opphilis ergriffenen Baters tragen, ohne daß ber Gaame geeignet gewesen ift, als Uns fedungeftoff ben Reim der Frucht in dem erften Momente ber Entftebung ju verpeften.

S. 111.

Heber die Lues larvata,

Die Lues ist eine von vielen Merzten so gefürchtete Rrantheit, daß sie bey jedem hartnäckigen Krantheitsfalle mit

ibr ju thun ju haben mabnen. Gin großer bereits verftorbener Urgt pflegte ben jeder chronischen Rrantheit in allem Ernfte gu sagen: Quilibet praesumatur venereus, donec probet contrarium. Diese große Furcht erzeugte bie Idee einer verlarvten Syphilis, die man auf mancherlen Art fich beutlich zu machen fuchte. Debrere von benjenigen, welche einen vieljahrigen, §. 106. naber angegebenen Beitraum für ben Musbruch der fekundairen Sophilis annahmen, hielten bafur, bag ber Stoff im gebundenen Buftande burch biefen gangen Zeitraum im Rorper verborgen liegen und bann bervorbrechen tonne. Gine folche Meinung ift unhaltbar und fann burch nichts erwiesen werden. Undere meinten, die Spubilis verberge fich hinter eine andere, thren Ericheinungen unger wohnliche Form, und indem fie als diefe Rrantheit ifoliet auf. trete, bestimme fie den Begriff der Lues larvata; fo tonnen j. B. die Rrage, der bofe Grind, Sarn. befdmerben, Mugenentzunbungen ben Begriff ber fophlitifchen Form barftellen, ohne daß biefe eigenthumliche Form erfannt und gehörig behandelt wird. Gin foldes Bers larvt fenn giebt es allerdings, aber wer fieht bier nicht, daß hier die Larve mehr fur das Urtheil des Arztes, als fur die Erscheinung hervortritt? Baren diefem Urgte die fpezifischen Somptome fophilitifcher Geftaltungen genau befannt, batte ber Argt die vorher gegangenen Bufalle, befonders die Ericheis nungen der primairen Syphilis erwogen, mußte er, bag bie

Lustseuche eine Proteussorm sep, die unter mannigfaltigen aber doch eigenthumlich bezeichneten Gestaltungen einhergeht: so wurde er die Krankheit entlarvt und geheilt haben.

Much bie Complicationen ber Sphille mit anbern Rrant: beitsformen bat man oft fur eine Larve ber erftgenannten Rrantheit gehalten, ohne ju bedenten, daß ber Sphilltifche benselben Schablichkeiten ausgeset ift, wie ein Gesunder, bag folglich andere theils afute, theils chronifche Formen bin: autreten tonnen, wie Fieber aller Urt, ber Schar, bod, die Rrabe, Die Gicht, Samorrhoidal: leiden u. dgl. Dan hat gwar die Beobachtung machen wollen, daß die Gegenwart der Spphilis vor mehrern befonders afuten Rieberformen, und namentlich vor bem Epphus ichuse, es Scheint, bag man in diefer Form eine ber Fontanellen Wirkung abnliche vicarirende Thatigfeit gesucht habe; aber eben fo wie die lettere nicht untruglich schuft, eben fo menig bewahrt die Lues davor. Die lette Epidemie hat mehrere Benfpiele gegen biefe ichagende Rraft aufgeftellt. Bo fich ein bosartiges Rieber ju einer fcon vorhandenen Opphilis bingn. gefellt: ba wird die Gefahr des erftern febr erbobt. Grund bavon liegt unftreitig in der im vorigen G. angedeus teten qualitativen Beranderung ber Reproduction.

Die ganz eigene Larve ber Lues confirmata beruft auf dem für die ganze Rur dieser Krankheit sehr wichtigen Ums

ftande, taf ben einer schon weit gediehenen Lues bas reproductive System des Organismus in seinem innersten Leben und
Walten so ergriffen ist, und die ihm untergeordneten Organe in
ihrer Mischung und Funktion so verändert sind, daß die Sesundheit für das ganze übrige Leben des Kranken sehr oft erschüttert wird. Unter solchen Umständen wird die höchste ärztliche Vorsicht erfordert um einerseits nicht jedes Uebelbesinden
für eine Spur der verlarvten Lustseuche zu halten, und um
andererseits keine darauf wirklich hindeutende Erscheinung zu
übersehn.

Es geschieht wohl auch, daß mancher sekundalte syphisitische Infall, ja seibst eine primaire Form, namentlich der Schanker als Erscheinung aufhört, ohne daß beswegen die Lues als geheilt anzusehn ist. Zeitig genug drängt dann eine andere Erscheinung sich hervor, um, wenn nicht kräftige und zweckmäßige Machregeln ergriffen werden, einem neuen noch schlimmern Zusalle Plaß zu machen. Diesen Zustand, der zwischen dem Aushören einer syphilitischen Erscheinung, und dem mit langsamer aber unbemerkbarer Progression Statt sindenden Hervortreten einer andern, für den befangenen und unausmerksamen Beobachter mit einem Anstriche der Genesung verstreicht, könnte man in mancher Beziehung mit vielem Rechte Lues larvata nennen.

§. 112.

Die Prognosis der Lustseuche.

Die Borberfagung ift ben ber Luftfeuche fchwierig, und nar eine genaue Renntnig ber Form im allgemeinen, und ber Richtungen inebesondere, welche fie nehmen fann, bestimmt ben Musgang ber Rrantheit mit einiger Buverläßigfeit. Role gende Puntte find ben der Prognofe befonders ju berucffiche tigen. Der Musgang wird durch die Constitution und bas Alter Des Rranten vorzüglich bestimmt; je fraftiger und ge, nahrter das Individuum ift: befto leichter ift die Rur; je empfånglicher und fchwachlicher bas Individuum ift, befto barts nachiger ift die Sphills. Gede Complication mit einer andern Rrantheit, befonders das Bufammentreffen mit einer andern tief eingewurzelten Dusfrafie erichwert die Beilung ungemein. In Sinficht des Alters lehrt die Erfahrung, daß Leute von einem fraftigen Mittelalter leichter genesen, als Greife und Die Dauer, das Berhalten der Kranthelt jum Ger fammtleben des Organismus und die Siefe ihrer Musbildung find bestimmend fur die Prognofe. Je farger die Rrantheit gedauert bat; befto gunftiger ift die Borberfagung. Go lange Die Sphills noch primair hervortritt, fo ift die Beilung leichter als dann, wenn fie fich als fefundaire Rrantheit ges ftgltet. Gind die Erscheinungen ber zwenten Reihe bervorge, treten; find besonders tiefe Storungen namentlich Caries der

Knochen und besonders der bedeutenden Stellen am Ropse, ber Basis Cranii, an den Wirbelbeinen, an der Orbita u. dgl. vorhanden; so wird das Leben des Kranken sehr bedroht.

Ein Gleiches ift zu fürchten, wenn sphilitische unbe, zwingbare Geschwüre in der Nahe größerer Gefäße um sich greifen und auf diese Urt eine todtliche Verblutung möglich machen.

Die Jahreszeit hat einen besondern Einfluß auf die Ber handlung der Syphilis; im Winter geschieht die Heilung schwerer als im Sommer. Des wohlthätigen Einflußes des mildern Klima bey der Syphilis ist bereits Erwähnung ger schehn.

Die Natur scheint burch Gelbstthätigkeit diese Krankheit nicht heben zu konnen; sie wird gewöhnlich ein Gegenstand der Kunst. Einzelne Beobachtungen haben zwar die Mogs lichkeit solcher Gelbstheilungen dargethan; doch scheint dieser Fall nur hochst selten vorzukommen, und nur ben der nicht vollkommen ausgebildeten Sphilis Statt zu finden.

Da es allen Erfahrungen zufolge bis jest kein wirkfastmeres und zuverläßigeres Mittel gegen die Lustfeuche giebt, als das Quecksiber: so versteht es sich von selbst, daß alle dies jenigen, welche das Quecksiber entweder wegen zu hoher Sens sibilität oder einer unbekannten Idiospnkrasse nicht vertragen können,

tonnen, ober bie, benen ju ichnell ben dem Gebrauche bes Quedfilbers ber Speichelfluß eintritt und die erforderliche Cur unmöglich macht, viel von der Syphilis ju fürchten haben.

Wenn von bem Einfluße bes Quedfilbers auf die Pros gnose die Rede ist: so barf nicht übersehn werden, daß das Uebermaaß oder die unzweckmäßige Berabreichung desselbent auch die nachtheiligsten Folgen nach sich ziehen kann.

Wenn ben den tiefen Störungen der Sphills im Ins nern des Organismus sich ein krankhafter Zustand der Organe ausbildet (labes organi); oder ein Fieber, welches sich als Zehrsieber verhält, sich dazu gesellt: so stelgt die Gefahr der Lues.

Wenn Schwangere eine bedeutende, in die Tiefe des Organismus eingehende Lues haben; so erleiden sie ente weder einen Mißfall oder sie gebahren ein sehr schwaches und schlecht genahrtes Kind.

Die vielent Benspiele von der Hartnacklgkeit und dem langsamen Gange der Spphilis muffen dem Arzte ben der Vorhersagung gegenwärtig senn. Sanchez hat zwar sehr Unrecht, wenn er von der Lustseuche behauptet, daß sie bis in die sechste, ja sogar bis in die achte Generation ihre nachtheistigen Folgen aussert: aber wahr bleibt es, daß ihre Spuren sehr lange zurückbleiben konnen.

Mile einzelnen Formen zeichnen fich burch Sartnactigfeit ber Dauer und Bosartigfeit aus. Die daben vorfommende Mugenentzundung bedroht bas Geficht ungemein; fie wirft gerftorend fur die Form und fur die Thatigfeit. Die Zers ftorungen, welche die Caries jurudlagt, gehoren unter bie traurigften Folgen ber Opphills. Die Berunftaltungen, welche am Untlige in folchen Kallen vorfommen, rubren größtentheils von ber caribfen Berftorung ber Dafenknochen und bes Stirn, beine ber. Doch tonnen folche Entstellungen auch durch die von bem Gummi und bem Nodus gurudgelaffenen Rarben ents ftebn; lettere findet man im gewöhnlichften Salle an der Or, bita. Die Caries am harten Gaume, fo wie Die Bereiterung bes Bapfchens find ber Sprache und bem Ochlingen gefährlich. Ift die durch caribfe Berftorung gebildete Deffnung nicht groß, fo follegt fie fich burch bie Lange ber Beit ohne eines fogenanns ten Obturatoriums zu bedurfen.

In allen den Auswüchsen, Flecken und Pufteln zeigt sich dadurch die syphilitische Eigenthümlichkeit, daß ben allen diesen Metamorphosen der stete Hang zur Wiedererzeugung vorwaltet. Wenn die Syphilis nicht durch eine ganz zweckmäßige innere Kur gehoben wird: so nützt kein topisches Mittel um die Er, crescenzen aller Art wegzubringen; sie kehren immer wieder zurück; selbst das Brennen und Wegschneiden derselben giebt keine Garantie gegen das Wiederkommen solcher Auswüchse.

S. 113.

Die Rur ber Lues.

Die ersten Heilungsversuche der Lues ben ihrem ersten Erscheinen liesen so unglücklich ab, daß die Aerzte, nachdem vierlerlen Mittel gegeben worden waren, der weitern Behands lung mude, die Pflege dieser Kranken ganz aufgaben und sie unberusenen Quacksalbern und Pfuschern überließen, und dies glaubten sie um so mehr mit allem Fug und Necht thun zu können, als Sennerts unzeitige Frommigkeit diese Kranksheit sur eine offenbare göttliche Strafe der begangenen Sünde und die Versuche diese Krankheit zu verhüten und zu heilen sür Frevel ansah. Der aufgeklärte Gabriel Fallopius dachte anders und suchte Sennerts ungereimte Behaup, tungen zu widerlegen.

Die ersten gegen die Lues angewandten Mittel ent; sprachen dem Geiste der damals noch allgemein herrschenden Schule. Je nachdem ein Arzt den Junder der Krankheit im Blute, in der Galle oder im Schleime gesucht hatte, verordnete er Aberlässe, auslösende oder gelind absührende Mittel. Später kann man auf den Gebrauch der Vipern, die besonders ausgesucht und zubereitet dem Kranken aufgetragen wurden. Diesem folgte, als die Alexipharmaca in der Medizin übers haupt die große Rolle spielten, die schweißtreibende Methode; der Schwiskasten sollte nun die sphilltischen Kranken heilen.

Als inneres zu Mesem Zwecke besonders geeignetes Mittel kam der Guajak an die Reihe, dessen Holz und Rinde ein gemisser Odello zuerst nach Europa gebracht und zu diesem Zweck ans gewendet haben soll.

Che noch bas Quedfilber gegen ble Spphilis angewandt wurde, mar langft der Gebrauch beffelben in der Dedicin gegen langwierige Sautausschlage, befondere gegen ble Rrage be: fannt. Zweb Baber follen bie erften gemefen feyn, die burch Analogie von der Impetigo auf die Lues ben Schluß mache ten, und ben lett genannter Rrantheit bas Quecffilber inner, lich ju geben magten. Einer von diefen Babern, die als bloge Barbae Tonsores ber Nachwelt genannt worden find, fand aus Furcht vor übeln Folgen von bem Gebrauche bes Quede filbers ab; der andre erwarb fich damit Geld und Unfebn. Berengarius von Carpi fah diefe Urt die Luftfeuche ju behandeln, und empfahl ben diefer Rrantheit querft das Queets Doch hat erft Joannes de Bigo Diefes Mittel innerlich gegeben, und ift dadurch in den bofen Ruf eines Gifte mifchers gerathen. Die durch Barbaroffa den Geeraubers Fürften von Algier und Tunis 1537 befannt gewordenen und von Frang dem Erften gebrauchten Pillen maren bas erfte berühmte Queckfilbermittel gegen die Opphilis. Gie bestanden aus robem Quedfilber, welches mit Terpentin und Debl abs gerieben wurbe.

§. 114.

Ansichten über die Wirkung des Quecksilbers im

Wir wollen auf die frubern Erflarungen ber Wirkung bes Quecifibers auf ben menschlichen Organismus feine Ruck. ficht nehmen, weil wir überzeugt find, daß in den heutigen Tagen Diemand mehr ble antifphilitifche Birtfamteit Diefes Mittele in feiner Schwere, in feiner purgirenden Eigenschaft, in feiner Bermanbichaft jum Ummonium ober in irgend einer andern von ben altern Sumaralpatholegen, Satromathematis tern ober Chemifern barinn vermutheten Gigenfchaft fuchen wird; wir richten aber blos unfre Mufmertfamteit auf eine Une ficht, die in ben Beiten ber Brownischen Berrichaft geboren, fich noch fortbauernd ben vielen ale die gultige erhalt; es ift Die Unnahme der erregenden Birfung bes Quecffibers, Die mehrere noch badurch bestimmter zu erflaren fuchen, daß fie als nachfte Wirfung der erregenden Gigenschaft des Quedfilbers Das fogenannte Merkurialfieber annehmen, und diefes als die bedingende Urfache ber Beilung der Lue's anfeben. fann von hoher Achtung fur mehrere aus der Brownischen Schule hervorgegangne Lehrfage burchbrungen fenn; fann die Ueberzeugung recht lebendig in fich tragen, baß bie Browniche Lehre es mar, welche den hohen Schwung der neuern Debigin junachft veranlagte: fo wird man boch jugeben

muffen, daß die quantitative Scala in hinsicht der Arznels mittel ohne Berücksichtigung der qualitativen Beziehung ein großer Irrthum ift. Dies gilt unter andern ganz vorzüglich vom Quecksilber, dessen Berhältniß zum Organismus nie rein quantitativ, am allerwenigsten rein erregend angenommen werden kann. Die unbefangene Erfahrung lehrt, und Swediaur hat dies vorzüglich bemerkt und hervorgehoben, daß sich der Gebrauch des Quecksilbers mit den sogenannten tonischen, stärkenden und rein erregenden Mitteln gar nicht vertrage. Werzte, welche die China, das Eisen, stärkende und erregende Bäder und dergleichen inzitirende Mittel mit dem Gebrauche des Quecksilbers verbinden, segen selbst der Heilung Hindernisse entgegen.

Das Queckfilber wirkt Cohafions, vermin, bernd und dadurch beschränkend für die krank, hafte reproductive Thatigkeit; diese Unsicht ift aus der Natur hervorgegangen, und wird täglich in der Ersah, rung nachgewiesen. Die Salivation ist die oberste Erscheinung der ausgehobenen Cohasion und für die Heilung keine absolute Bedingung. Wenn auch ben der Kur der Sphilis das Queckssilber gewöhnlich so lange fortgeseht wird, bis die ersten Spurren des Speichelflusses eintreten: so geschieht dieses nur um ein Zeichen der wirklich Stattgesundenen Merkurialeinwirkung zu haben, keinesweges aus der offenbar ganz irrigen Theorie,

tag ein anhaltender Speichelfluß zur Rur der Lues unum: ganglich nothwendig fen.

Das Fieber welches den Zustand ber zu einem höhern Grade gediehenen Salivation begleitet, ist eine Folge der unter solchen Umständen mitergriffenen Irritabilität; es entsteht immer, wenn Drüsen schwellen und Colliquationen eintreten. Dieses sogenannte Merkurlalsieber als eine nothwendige Bedingung der Heilung einer jeden Lues anzunehmen, ist eine durchaus verunglückte Unsicht, die täglich durch die Erfahrung widerlegt wird, da die Spphilis so oft gut und gründlich geheilt wird, ohne daß eine Spur des Merkurlalsiebers der Heilung vorangegangen wäre.

Durch die Eigenschaft die Cohasson der organischen Masse zu vermindern, wird das Quecksilber der Lues qualitativ ents gegengeseht. Das Wesen der lettern besteht offenbar in einer krankhaften Luxuration anomaler Sebilde und in einem uns aushaltsamen üppigen Hervordrängen auf die Oberstäche, wie alle der Syphilis angehörenden Formen deutlich beweisen. Da das Quecksilber die Cohasson vermindert und dadurch die resproductive Thätigkeit beschränkt: so ist es erklärbar, wie es diese krankhaften Bildungen aushalten und die schon vollendeten Metasmorphosen heben kann. Daraus geht nun auch hervor, daß alle die sogenannten tonischen und adstringirenden Mittel, welche die Cohasson offenbar vermehren, mit dem Quecksilber nicht gepaart

werden dürfen. Der große Vortheil, ben mehrere Quecksilbers praparate ben häutigen Entzündungen und andern von erhöhster Errregung im Lymphspsteme erzeugten Krankhelten leisten, muß ebenfalls als ein vollgültiger Beweis für die Richtigkelt der von uns vorgetragenen Unsicht über die Wirkung des Queckssilbers angesehn werden. Die Ursache, warum ben äussern Entzündungen keine Quecksilberbereitungen verordnet werden dürfen, liegt nicht sowohl in der erregenden sondern ebenfalls in der Cohassons, vermindernden Eigenschaft des Quecksilbers. Lestere wirkt ben äßenden Bereitungen zerstörend und trennt gewaltsam den Zusammenhang der organischen ben Entzüngbungen ohnehin schon tief ergriffenen Masse.

§. 119.

Ueber die besondere Wirkung der verschiedenen Merkurial-Bereitungen.

In drepfacher Gestaltung wird das Quecksiber auf den Organismus angewandt, als Halbkalk, als vollkommener Kalk, und als Salz. Wenn auch in allen diesen drep Formen die oberste Wirkung des Quecksibers cohäsionsvermindernd ersscheint: so entgeht es doch dem Auge des Beobachters nicht, daß nach dieser Verschiedenheit der Gestaltung, das Quecksiber auch verschiedenfach auf die hervorzubringende Colliquation wirke. Man bemerkt gewöhnlich, daß die Halbkalke mehr

Dauchstuß hervorrusen; von den Salzen hingegen ist es bes kannt, daß sie eine vermehrte Urinabsonderung leichter, als den Speichelfluß erzeugen. Diese Beobachtung ist ein wichtiger Fingerzeig ben der Verordnung des Quecksibers, wo nicht blos die individuelle Constitution, sondern auch die aussern Berschältnisse des Kranken zu berücksichtigen sind.

Š. 116.

Die verschiedenen Methoden das Quecksilber anzuwenden.

Der innerliche Gebrauch bes Quecksilbers ift unstreitig jedem andern vorzuziehn; nur einzelne Umstände und unversmeibliche Contraindicationen konnen diese Art, das Quecksilber anzuwenden, verbieten, wo dann verschiedene außere Desthoden dem Arzte zu Gebote stehn. Von den Gegenanzeigem für den Gebrauch des Quecksilbers wird in einem eigenen Segehandelt werden.

Die außerliche Unwendung des Quecksibers hat nun mannigfaltige Beränderungen erlitten, nachdem bey den verz schiedenen Erfindern derselben, entweder eigene Ueberzeugung, oder Furcht vor den möglichen Nachtheilen oder endlich die Sucht nach Neuerungen, diese ober jene Bereitung erzeugten. Mis Einreibung verdient zuerst diesenige Methode er: wähnt zu werden, wo das Quecksiber auf einzelne Stellen der-Obersiäche des Körpers, besonders auf die innere Fläche der Extremitäten angewendet wird, und wozu die graue Salbebesons ders empfohlen ist. Diese Methode ist die älteste, und noch heute in vielen Fällen, wo innerlich das Quecksiber nicht anges wendet werden kann, ersprießlich und empfehlungswerth, nur sehr umständlich, daher oft unausführbar. In Frankreich ist dieselbe die herrschende und unter dem Namen des großen Mitstels (grande remède) bekannt.

Dann folgt die Einreibung auf die Fußsohlen, welche Cirillo vorschlug und mit einer Sublimatauflösung verrichten ließ. Eine im südlichen Italien öfters vorkommende, leicht entbehrliche Methode.

Endlich wurde auch das Quecksilber und namentlich bas Calomel in das Zahnsteisch eingerieben. Clarke und Erut: schank empfahlen diese in England noch übliche, nicht nur ent; behrliche, sondern auch unzuverläßige Methode. Brera machte bergleichen Einreibungen nicht blos am Zahnsteische, sondern auch an andern Stellen längs dem Laufe der lymphatischen Sefäße mit gutem Erfolge.

Auferlich auf verschiedene Art angewendet; besonders waren

früher bie von Chevalier und Thieuillier besonders gez priesenen Merkurialraucherungen im Gebrauche; man brauchte dazu das rohe Quecksilber oder den Merkurialmohr oder endlich den Zinnober. Diese Methode ist eben so gefährlich als unzuvers läßig, und hat mit vollem Rechte das Bürgerrecht verloren.

Eine Auflösung des ahenden salzsauern Quecksilbers empfahl ein Apotheker zu Paris Baume als Bad zur Heis lung der Lues. Drephig Bader sollten hinreichend seyn alle Kranke zu heilen. De Horn empfahl diese Bader besonders ben schwarz gallichten Personen, die an Nervenzufällen leiden. Die Erfahrung hat bald das Unstatthafte dieser ebenfalls hochst unzuverläßigen Methode erwiesen.

Roger empfahl eine Auflösung des Sublimats mit einer Leinsaamenabkochung als Rlystier zur Heilung der Lues. Der Kranke erhielt täglich zwen solche Rlystiere. Un La Font, de Horn, Buchan und Lefebure fand diese Methode Lobredner, man wollte dadurch die schwersten syphilitischen Zufälle geheilt haben. Gardane widersprach zuerst und erklärte die Rlystiere mit Necht für unzureichend die Lussseuche gründlich zu heilen. Jest ist man davon ganz abgekommen.

Ein gewiffer Cortilio empfahl lederne Beinkleider, die auf ihrer innern Flache mit Merkurialfalbe bestrichen, und ununterbrochen auf dem Leibe getragen werden sollten. Diese

Methode zeigt nur zu deutlich von des Erfinders Sange zum

§. 117.

Die zur Heilung der Sphilis gewöhnlichen Merkurial-Halbkalke.

Bu ben heute gebräuchlichen Merkurial Halben gehört zuerst die graue Merkurialsalbe, Ungtum Hydr. einereum Pharm. borussicae. Dieses wird burch das Zusammenreiben von 12 Ungen roben Quecksiber und 8 Ungen Hammeltalg bereitet; nach vollendeter Mischung werden noch 10 Ungen Schweinesett und eine Drachme Citronenol hinzuger mischt. Wenn auch der Zusah des lehtern nicht so nachtheilig ist, wie das früher hinzugeseigte Terpentinol: so ist es doch besser, kein atherisches Del zu solchen Salben hinzuzusehen, weil sie dadurch scharf werden und ben der Anwendung die Hautsläche leicht entzünden.

Diese Salbe wird theils zu allgemeinen Einreibungen an die innern Flächen der Ertremitäten als alleiniges Merkurials Präparat gebraucht, wo dann mit der gehörigen Vorsicht von This zu 2 Drachmen täglich oder auch über den zweiten Tag eins rieben wird.

Diese Methode empfiehlt man, wenn die Verdanungs, Organe des Kranken so darniederliegen, daß er fein Queckfilber auch in Berbindung kleiner Opiate verträgt, oder wenn eine habituelle Anlage zu Durchfällen da ift. Auch ben Knochens schmerzen ziehen sie mehrere Aerzte ber innern Anwendung des Quechsibers vor, was auch die Erfahrung in vielen Fällen zu bestätigen scheint.

Diese Einreibungen haben viele Schwierigkeiten, sie ers fordern von Seiten des Kranken die hochste Borsicht, find im Winter schwer ausführbar, und ben gehöriger Vorsicht und Kenntniß der Merkurialpraparate, durch die innere Merkus rialkur in den meisten Fallen zu ersegen.

Auch wendet man diese Salbe zu Einrelbungen auf ber schränkte Flächen an, um die allgemeine Rur zu unterstüßen. Bey angelausenen Drüsen, bey Anschwellung des Nebenhoden, wo die Einrelbung an der innern Fläche der Schenkel geschieht. Bey Tophen und bey andern suphilitischen Geschwülsten, wo man jedoch oft das ebenfalls halb verkalktes Quecksiber enthale tende Merkurialpstaster mit Opium verbunden, vorzieht. Das letztgenannte Pflaster wird aus 24 Unzen einfachen Lithargystumpflaster, 6 Unzen gelben Bachs, 8 Unzen Quecksiber und 4 Unzen Terpentin bereitet. Zuehst wird die Pflasters masse mit dem gelben Wachse geschwolzen, und das mit dem Terpentin vorher zusammengeriebene Quecksiber hinzugesetzt. Die Verbindung des Merkurialpstasters geschieht nach solgender Vorschrift:

Rec. Empl. Hydr. ciner. 3j
Opii puri — 3j
Malax.

Ein zweytes sehr bekanntes und sehr gewöhnliches Merk kurtalpräparat ist der Mercurius solubilis Hahnemanni (Hydrargyrum oxydulatum nigrum Pharm. novae). Es besteht aus Quecksiber, welches in Scheidewasser ausgelöst, und durch ähenden Salmiakgeist ges fällt ist. Es hat eine ganz tief schwarze Farbe und sühlt sich weich und locker an. Es ist vorzüglich zum innern Gebrauch bestimmt, wo es aber (ungeachtet der Ersinder das Gegentheil behauptet) leicht Salivation erregt. Es ist ein sehr schäßbares Präparat, dessen Anwendung zu 3 bis einen Gran täglich zwey bis dreymal am besten in Pulversorm bey der primairen Spe philis, besonders gegen den Schanker und im Ansange der sekundairen Syphilis sehr zu empsehlen ist.

Rec. Hydr. oxydul. nigri gr. vj
Pulv. Op. thebaici gr. jv
Lap. Cancr. ppt. gr. xxiv
Sacchari albi 3iij
M. divide in Pulv. aequales Nro. xij.
D. Sig.

Täglich 3mal 1 Pulver zu nehmen.

Auch als Einreibung hat man es empfohlen, wo es aber wegen der Schwarze, mit der es mohrenartig den bestrichenen

Theil überzieht, von den Kranken oft verbeten und leicht durch die gewöhnliche graue Salbe ersetzt wird. Dies ift um so nothiger, als der hohere Preis dieses Praparats keine Ber, schwendung zum ausserlichen Gebrauche verstattet.

Der in der neuen Pharmacopoe offizinelle Quecksite bermohr (Hydr. sulphuratum nigrum) besteht aus gleichen Theilen Quecksiber und Schwefel, bey deren Insams menreibung die Halbverkalkung Statt sindet. Durch die Ver, mischung mit Schwefel ist dieses Praparat in seiner Wirksams keit gegen syphilitische Formen zu sehr geschwächt und kann das her zu diesem Zwecke nicht mit Zuverläßigkeit gegeben werden. Hingegen bey veralteten Hautausschlägen und andern höchst chrosnischen und verdächtigen Uebeln, die von strophulöser, rachtischer und ähnlicher Dyskrasie herrühren, zeichnet sich diese Bereitung sehr aus. Wan giebt dieses Mittel Kindern von 1 bis anz derthalb Jahren 2 Gran täglich 2 bis zmal. Bei Erwachssenen kann bis zu einem halben Scrupel täglich und zwey bis drey Saben getheilt, gestiegen werden.

Eine gleiche therapeutische nur intensivere Wirkung hat auch das Hydr. stibiato-sulphuratum, welches aus der Zusammenreihung zweper Theile roben Spießglauzes, eines Theils reinen Quecksilbers und eben so viel vom gereinigten Schwesel entsteht. Ben der Tinea capitis, der Psora syphilitica, verdächtigen Warzen und Flechten kront dieses Mittel oft die Rur. Die Gabe ift wie beg dem vorhers gebenden:

Rec. Pulv. res. nat. Guajaci

Hydr. stibiato-sulphur. singul. 36

Sacchari albi 3iii

m. divide in Pulv. aequales

Nro. xij.

D. Sig. Täglich 3mal 1 Pulver zu nehmen.

Die übrigen Merkurialpraparate, wo bas Quecksiber als Halbkalk enthalten ist, sind theils unzuverläßig, theils durch die bisher angesührten ersestich. Hierber gehören der Mercurius gummosus Plenckii, der Merc. saccharatus, alcalisatus, u. a. m.

§. 118.

Die Merkurialfalze.

Ungeachtet das Quecksilber nur in den concentrirtesten Sauren auflösbar ist: so geht es doch mit den meisten Sauren Werbindungen ein, daher denn auch viele Quecksilbersalze bereistet werden können, deren größere oder geringere Wirksamkeit zum Theil von der höhern oder geringern Orydation des mit der Saure verbundenen Quecksilbers, theils von der Causticistat der lettern abhängt.

Das salpetersauere Quecksilber (Hydr. nitricum) ist eine Auflösung des lettern in reiner Salpetersaure. Die Renftallsorm dieses Praparate wird von uns wegen der Heftigkeit der Einwirkung nicht gebraucht. Die neue Pharmacopoe empfiehlt eine Auflösung von einer Unze reinem Quecksilber in einer hinreichenden Menge reiner Salpetersaure. Das Ganze wird so lange mit destillirtem Wasser vers dunnt, bis die ganze Quantität fünf Unzen beträgt. (Liquor Hydr. nitrici). Wegen der so leichten Zersetharkeit dieser Bereitung muß sie immer ganz rein ohne allen Zusah versschrieben und mit destillirten Wasser genommen werden. Man läßt zum Anfange der Kur täglich 2 mal einen Tropfen nehmen, und steigt bis auf 5 oder 6 Tropfen täglich 2 mal. Daben muß der Kranke eine leichte Fleisch; und Milchkost genießen. Ben sehr kranklichen Individuen, ben denen, welche Blut ges hustet haben oder gar zur Schwindsucht neigen, muß man mit diesem Praparate vorsichtig seyn.

Wer die Krystallsorm dieses Praparats, welche Ausgustin (Pharmacop. extempor.) dem oben beschriebenen Liquor Hydr. nitrici welt vorzieht, verordnen will, kann dieselbe entweder nach der am erwähnten Orte von Augustin beschriebenen Methode oder in der Pillensorm verschreiben, die welter unten ben dem abenden salzsauern Quecksilber vorkommen soll.

Ben einer veralteten, tief in das Leben der reproductiven Sphare eingegangenen Sphilis, beseitigt es oft auf eine mun-

Geschwüre und die Erscheinungen der zwenten Reihe für den Gebrauch dieses Mittels geeignet. Aeusserlich wird auch dieses Mittels geeignet. Aeusserlich wird auch dieses Mittel zu Waschwässern, mit destillirtem Wasser verdünnt, ans gewendet. In dem berühmten Unguento Hydrargyri eitrino ist ein ähnliches Praparat der Hauptbestandtheil. Zu der eben erwähnten Bereitung wird eine Unge Quecksilber in der erforderlichen Menge Salpetersäure aufgelöst und mit einem Pfunde Schweinesett zusammengemischt.

Das ahende falgfaure Queckfilber (Hydr. muriaticum corrosivum) ift eine durch Auftosung des Quecksilbers in concentrirter Schwefelsaure und durch die Zerssehung des Rochsalzes vermittelft des größern, zwischen dem Natro des lehtern und der Schwefelsaure des erstern obwaltenden Affinitätsverhältnisses, wodurch die Salzsaure des Rochsalzes genöthigt wird, sich mit dem Quecksilber zu verbinden, entstandene Bereitung. Dieses Praparat gehört unter die wirksamsten Mittel gegen die Lues, auch ist sein Gebrauch unter allen Merkurialpraparaten am häusigsten verbreitet. Es wirkt schnell und sicher, es ist aber nicht rathsam den Gebrauch besselben zu lange fortzusehen; auch verdient er ben kranklichen Individuen große Vorsicht. Einen besondern Vorzug hat diese Bereitung auch darum, weil der Kranke daben an keine zu strenge Lebensordnung gebunden ist.

Wo die Lustseuche tief eingewurzelt ist oder schnell um sich greift, und wo sie durch heftige Zufälle dem Leben oder edlen Organen Gefahr droht, nimmt man gewöhnlich ju diesem Praparate seine Zuflucht, z. B. bei eintretender Ozana, ben tief fressenden Geschwüren und ben sehr bösartigen Hauts ausschlägen. Sobald die hohe Gefahr beseitigt ist, geht man gewöhnlich zu einem mildern Praparate über, dessen Anwens dung gesahrloser ist.

Man giebt dieses Quecksilber in Auflösung oder in Pillens form; lettere ist weniger zuverläßig. Wegen der atenden Eigenschaft ist die Pulverform gar nicht geeignet.

Rec. Hydr. muriat. corrosiv. gr. ij
solve in
Aq. destill. simpl. Zjv
et adde
Trae Op. simpl. Zj.
M. D. Sig.

Grub und Abends einen Egloffel gu nehmen.

Mixtura concentrata verordnet werden, wo die von Markus empfohlene sehr anwendbar ist:

Rec. Hydr. muriat. corrosiv. gr. iv solve in Aq. Cinnam. vinosae Zij et adde
Trae Op. simpl. Dij.
M. D. Sig.

Täglich 4mal 40 Tropfen mit einer schleimigen Flüßigkeit zu nehmen.

Die Pillenform ift folgende:

Rec. Hydr. muriat. corrosiv.

Pulv. Op. theb. singul. AB
Succi depur. Liquiritiae Aiv
Aq. destill. simpl. q. s.

u. f. l. a. pil. Nro. C.
consp. Pulv. Cinnam.
d. ad. scat.

Sig. Fruh und Abends eine Pille zu nehmen und allmählig bis auf 3 oder 4 zu steigen.

Die ursprüngliche Pillenform wurde vermittelst weisser Brodkrume, auch vermittelst einer Mischung aus Krume und Zucker bereitet; doch dadurch verhärtet die Masse so sehr, daß ihr anhaltender Gebrauch gang zwecklos wird. Herr Pfaff hat zwar in seiner Materia medica die Verbindung der Extracte mit Merkurlalten getadelt, weil letztere dadurch zers seht werden; indessen kann dies nur vom Pflanzenschleime gelten; daher auch das Liquiritienextract ganz gereinigt bazu verordnet werden muß.

Bey dem Sublimat muß noch bemerkt werden, daß die meisten aus Frankreich zu uns kommenden, gewöhnlich als frey von allem Quecksilber geschilderten Geheimmittel das ähende salzsauere Quecksilber als den wirksamsten Bestandtheil entshalten. Hierher gehören das Roob von L'Affecteur, der Liquor Royer's, der Sprup Arigonis, Le Feburs

Chocolade, bas Mittel von Beinos u. m. a. Siehe barüber Sufelands Annalen ir Bb. und Schreger's fritisches Dispensatorium ber geheimen Mittel.

Jum außerlichen Gebranche wird dieses Merkurialprapas rat ebenfalls sehr häufig und oft zur Ungebühr angewendet. Die gewöhnlichste Urt der außerlichen Unwendung ist die Auflos sung, wo die Verbindung mit Mohnsaft ebenfalls sehr zwecks mäßig ist:

Rec. Hydr. muriat. corrosiv. gr. ij
solve in
Aq. destill. simpl. Zij
et adde
Trae Op. simpl. 3ß.
M. D.

Der in der neuen Pharmocopoe empfohlene Liquor Hydr. muriat. corrosivi (aus 24 Gran abenden salze sauern Quecksilbers und eben soviel Salmiak, welche in 2 Pfund bestillirten Wassers aufgeloßt und mit einer Unze Rosenhonig vermischt werden) ist zum äußern Gebrauche sehr gut geeignet.

Ben primairen sphilitischen Geschwüren sowohl an der Eichel als an andern Stellen, bey sekundairen Formen, als Exulcerationen, impetiginosen Destruktionen der Haut, beg äußerlichen Desorganisationen aller Urt, wird, wenn der Bers dacht auf die sphilitische Dyskrasse fällt, dieses Praparat

angewendet. Doch verdient hier auch erwähnt zu werden, daß die Aqua phagadaenica der altern Pharmacopoen, welche bekanntlich aus einer sehr unchemischen Auflösung des Sublimats in Kalkwasser besteht, sehr oft ben sehr empfinds sichen Individuen und zur Entzündlichkeit neigenden Geschwüsten vor der neuen Bereitung in der Praris den Vorzug verstient.

Das milde salzsauere Quecksilber (Hydr. muriaticum, mite) wird bereitet, indem die im Sublimat überschüßige Salzsaure noch mit reinem Quecksilber im Verzhältnissezum Sublimat wie 3 zu 4 gesättigt wird, wodurch der höhere Grad der Oppdation ausgehoben wird und das Quecksils ber als Halbkalk die Verbindung mit Salzsäure eingeht. Jest geschieht dieser Prozes durch eine einmalige Sublimation; früher hingegen hatte man sälschlich geglaubt, daß die öftere Sublimation dem Quecksilber eine größere Milde gebe; so entstand nach smallgem Sublimiren die Aquila alba, nach 6 mas ligem das sogenannte Calomel, die Panacea mercurialis aber, wenn 9 mal die Sublimation unternommen wurde.

Dieses Praparat wird entweder in Pillen, und noch häufiger in Pulversorm zu T bis einen ganzen Gran täglich 2 bis 3 mal ben minder bösartigen Gestaltungen ber primairen Sphilis, ben gelinden Formen überhaupt und sehr erregbaren Individuen insbesondere verabreicht. Es hat besonders ben

Nachtheil, daß es leicht Durchfall oder Speichelfluß erregt, lettern besonders, wenn es mit starken Opiatdosen verbunden wird. Doch ist es zur Verhütung des erstern rathsam dieses Corrigens nicht zu übergehen. Man pflegt gewöhnlich auch etwas von irgend einer absorbirenden Erde hinzuzusetzen, um der Möglichkeit einer im Magen hervorstechenden Saure entges gen zu arbeiten und das Pulver immer trocken zu erhalten:

Rec. Hydr. muriatici mitis gr. xij
Pulv. Op. thebaici gr. iij
Lap. Cancr. ppt. 3ß
Sacchari albi 3iij
m. divide in Pulv. aequales
Nro. xij.

D. Sig. Fruh und Abende r Pulver zu nehmen.

Das essigsaure Queckstlber (Hydrarg. aceticum) wird gegenwärtig in unsver Pharmacopoe auf eine ganz andere, aber gewiß auf eine weit zweckmäßigere Art als früher bereitet. Es werden sunzen Liq. Kali acetici mit 4 Pfund kochendem destillirtem Wasser verdünnt und 4 Unzen von dem Liq. Hydr: nitrici hinzugesest, worauf das in Nede siehende glänzende Salz als schwer auslöslicher Niesderschlag zu Boden fällt. Dieses Praparat war früher mehr gebräuchlich als jese; besonders fand es als Hauptbestandthell der Repserschen Pillen vielen Beyfall. In der neuern Zeit hat wahrscheinlich seine in den frühern Ausgaben der Pharmas

tung viel dazu bengetragen, daß man es als ein unzuverläßiges und gefährliches Praparat nur höchst selten anwandte.

Es paßt für die Gestaltungen der Syphilis in der ersten Reihe, muß aber bei tieserem Eindringen der Krankheit wirksassen mern Merkurialpraparaten welchen. Man giebt es meistenz theils in Pillen, seltner in Pulver. In einem siüßigen Menstruo darf es wegen seiner Unauslöslichkeit gar nicht verordnet werden. Die Dosis für einen Erwachsenen sind täglich 2 bis 3 Gran.

Pracipitat wird aus einer Auflösung gleicher Theile von abendem salzsanerm Quecksilber und Salmiak, in einer hinreischenden Menge siedenden destillirten Wassers durch kohlensaures Matrum, als ein schneeweißes ganz unauslösliches Pulver niederzgeschlagen. Dieses sogenannte Trippelsalz ist zum innerlichen Gebrauche gar nicht geeignet, zum äusserlichen aber ein höchst schäbbares Mittel. Beh allen verdächtigen Hautausschlägen, Kräse, Flechten, Grinden, bey Schrunden, Flecken und allen spubilitischen Hautstörungen, ist es, verbunden mit der hiet unerläßlichen innerlichen Kur, ein vortressiches Mittel. Es wird gewöhnlich als Salbe angewendet. Die aus einer Unze Fett mit einer Drachme dieses Präparats zusammenge, riebene, früher unter Werthoff's und Zeller's Namen

befannte, jest ben une unter bem Namen Ungti Hydr. albi offizinelle Galbe bleibt immer eine vorzügliche Bereitung.

Ausser den in der Pharmacopoea borussica vors geschriebenen, in den vorhergehenden Satien dargestellten Mersturialsalzen verdienen auch noch zwei besonders in der neusten Zeit in hohen Ruf gekommene Praparate Erwähnung, nämlich das Hydrargyrum phosphoricum und das Hydr. zootinicum. Da die zu ihrer Vildung concurrirende Sauren ein animalisches Substrat haben: so sind sie schon wegen dieser der Sensibilität besonders zugewandten Homogeneität einer besondern Berücksichtigung werth.

Das phosphorsaure Quecksilber (Hydrargyrum phosphoricum) war in der zten Auflage unster Pharmacopoe noch offizinell und wurde durch Auflösung des Quecksilbers in Salpetersaure, wozu man eine massrige Auflössung des phosphorsauern Natrons tropfelte, bereitet. Man erhält auf diese Art durch Niederschlag ein weisses Pulver.

Wittels; wo die stärksten Praparate keine besondern Wirkungen hervorbrachten, hat dieses Metallsalz oft schnell geholfen; man verordnet es täglich zwen, bis drenmal von 2 bis zu i Gran in Pulver, oder Pillenform.

Das blausaure Quecksilber (Hydr. zootinicum) ist besonders durch Theers Streitschrift 1811 in Gebrauch gekommen, und von Horn in Berlin zuerst zu wies berholtenmalen versucht worden. Man giebt es zu ½ Gran mit Zucker oder nach Horns Vorns Vorschrift mit Calmus Burzel täglich 2 mal, sowohl gegen die primaire als sekundaire Formen. Auch äußerlich gegen Geschwüre wird es als Austösung (2 bis 3 Gran auf 3 Unzen destillirten Wassers) angewendet.

Zwanzig Gran sind nach Horn zur Kur hinreichend; diese Versicherung scheint jedoch durch die neusten Erfahrungen nicht bestätigt zu werden. Man bereitet es durch ein doppelztes Affinitätsverhältniß, welches durch Vermischung eines Theils rothen Quecksiberkalks und zweper Theile chemisch reinen blausauern Sisens hervortritt. (Das Nähere darüber siehe in Operfurts deutschem Apothekerbuche. Leipzig, 1812.

3 Theile. pag. 417.) Uebrigens ist dieses Präparat für die Praxis nicht ganzanzurathen, weil die Gewinnung des chemisch reinen blausauern Sisens höchst schwierig, und daher das daraus zu bereitende Mercurialpräparat immer mit Sisen verunreinigt ist, wodurch dann neue nicht berechnete therapeutische Rich, tungen entsiehn.

Bu den Merkurialfalzen gehört auch noch das wein, feinsauere Queckstlber, Hydrargyrum tartarioum. Man erhält dieses Salz, wenn man einen Thell aben, den salzsaueren Quecksibers mit 4 Theilen Kali tartaricum zusammen in destillirtem Wasser auflöst und diese Auflösung

langsam abdampsen läßt, wo bann durch eine doppelte Vers wandschaft der Quecksilberweinstein als ein schuppiges glanzens des Salz zu Boden gefällt wird und später das salzsaucre Kali anschießt.

Hunter hat dieses Salz ganz besonders empsohlen; auch wird es noch in England häusig angewendet. Den uns tommt es selten in Gebrauch, wo wahrscheinlich die Aerzte durch den Tadel Swediaurs, welcher dieses Praparat ganz verwarf, abgeschreckt worden sind. Es scheint wenige stens ganz entbehrlich zu seyn. Im Amwendungsfalle würde dasselbe Verhältniß der Gabe Statt finden, wie ben dem essige sauern Quecksilber.

§. 119.

Die vollfommenen Merkurialkalke.

unter den sogenannten Merkurial-Oryden ist nur ein Prasparat ofsizinell, und gegen die Syphilis in Gebrauch zu ziehen. Es ist das rothverkalkte Quecksilber, Hydr. oxydatum rubrum, welches nach der jeht gewöhnlichen Borsschrift nicht durch die langsame Einwirkung der Luft und des Feners, sondern auf dem kurzern Wege der vorhergehenden Ausschlichen Galpetersäure gewonnen wird. Diese Bereitung ist hochroth, glänzend und unter dem Namen rother Präcipitat bekannt. Man hat dieses Mittel auch innerlich angewandt;

jest geschieht dies, und zwar mit vollem Rechte, hochst selten, bagegen aber ist seine außerliche Unwendung um so häufiger und um so zweckmäßiger.

Ben primairen, sehr unreinen, mit hohen schwieligen Randern umgebenen und mit einer dicken Speckhaut bedeckten Geschwuren des Gliedes, wenn solche ohne bedeutende Entzund, lichkeit hervortreten, und die Rranken nicht zu empfindlich sind; ben bosartigen Auswüchsen, ben der suphilitischen dronischen Augenentzundung, ben harten Callositäten sekundairer Gesschwure, bedient man sich des rothen Quecksiberkalke mit großem Nuhen.

Die Anwendung geschieht entweder durch Auftragen des fein geriebenen Pulvers, vermittelst eines Pinsels, welches aber nur bey Geschwüren mit speckiger Oberstäche ohne ents dündete Umgebungen Statt sinden kann, oder als Salbe, wozu die früher unter mancherlen Namen bekannte, jeht als Ungtum Hydr. rubri ofsizinelle rothe Salbe am zwecks mäßigsten ist. Sie besteht aus einer halben Unze rothen Queck, silberkalks und fünf Unzen Schweinesetts, wozu noch die neue Pharmacopoe auf eine höchst überslüßige Weise ein halbes Quentchen Ol. de Cedro hinzusetzt.

Ist diese Salbe für eine Ophthalmia syphilitica bestimmt: so ist es am besten, einen halben Scrupel Quecksilberkalks mit einem Quentchen ganz frischer und ungefalzener Butter abreiben ju laffen und biefes Praparat oft ju ers neuern.

Der Innober (Cinnabaris, Hydr. oxydatum sulphuratum) ist heute gegen die Sphilis gar nicht mehr gebräuchlich; srüher wurde er zu Räucherungen anges wandt, welche jest, wie schon oben erwähnt wurde, mit Recht verworfen werden. Er besteht aus 6 Theilen start verstallten Quecksilbers und 1 Theile Schwefel; seine Gewinnung geschieht fabrikmäßig. Seine Anwendung zum Bestreuen der Pillen ist ebenfalls nicht zu empsehlen.

Das gelb verkalkte Quecksilber, (Turpethum minerale, Hydr. oxyd. flavum), welches man durch die vorsichtige Austösung des Quecksilbers in kochender Schwefelsaure, und nachherige Berkalkung dieser Masse ers halt, ist früher gegen mancherlen sphillitische Gestaltungen ans gewendet worden. So wandte man diesen Kalk als Nieses mittel ben der Ozaena syphilitica und als Brechmittel gegen die Epidydimitis an. Die Zeit hat gelehrt, daß dies ein eben so unsicheres als gesährliches Hellversahren ist; man ist sowohl ben diesen Formen, als auch nach dem tollen Hundse bisse, wo es zur Verhütung der Wasserschen Souvages dringend empsohlen hat, ganz davon abgesommen, und die Hellkunde hat wahrlich daran nicht verlohren.

S. 120.

Ueber die Rücksichten auf die erste Reihe ber einzelnen Gestaltungen der secundairen Syphilis im allgemeinen.

Mus ben bisher entwickelten Unfichten geht beutlich berbor, baß alle in beschränkter Form ale fogenannte Locals Storungen bervortretende Geffaltungen der Spobilie fowohl in ber erften, als auch in der zwepten Reihe nur baburch am fcmellften und ficherften geheilt werben, wenn bas zwechmas Bigfte, der Individualitat der Form und bes Rranten entfpres dende Mercurialpraparat in hinreichenber Gabe innerlich genommen, ober in feltnen Fallen als allgemeine Ginreibung anges wendet wird. Gine fleine Quantitat des blos auf die beschranfte Stelle des fophilitifchen Refferes angewendeten Mercurialprapas rats fann gwar die gegenivartige Form beben, aber die vorherr: fchende Dyscraffe nicht tilgen, woburch nothwendig ben follmmften Bufallen ber fecundairen Suphilis fur die Rolge ber Weg gebahnt wird. Doch darf nicht überfehn merden, daß auffer ber allgemeinen innern Pflege, ale oberften Bedingung ber Rur, auch eine ortliche Rucfficht auf die in beschrankter Korm bervortretenden Reffere nothwendig ift. Durch eine folche Berbindung der innerlichen und außerlichen Mittel wird theile das qualitative Berhaltnig in der Eigenthumlichkeit ber Sphilitifchen Duscrafie ficherer ergriffen, theils burch forge

faltige und zeitige Rudfichten auf die einzelnen, die nahe geleges nen Theile bedrohenden Storungen ben bringender Gefahr ein schnelleres und tieferes Umfichgreifen verhütet.

Diese hierher gehörigen Vorschriften sind, insofern sie diese beschränkten suphilitischen Restere angehen, größtentheils in dem S. entwickelt worden, wo von der Anzeige der einzelnen theils zum innern theils zum äußern Gebrauche bestimmten Mercurialpräparate die Rede war. Hier soll ben allen dazu gehörenden suphilitischen Gestaltungen das Nothigste theils nachgeholt, theils näher entwickelt werden.

§. 121.

Spezielle Behandlung der spphilitischen Pusteln.

Die Pusteln erfordern die außerliche Unwendung des Quecksilbers und diese reicht auch vollkommen aus. Lage neaus Behauptung, daß bei den blasenartigen und kräßsore migen Pusteln die orygenirte Salbe durchaus angewendet were den muffe, ist ungegründet. Den einer zweckmäßigen innern Mercurialbehandlung kann diese Salbe wohl den Zweck ere reichen, aber ein außeres Merkurialmittel wird noch sicherer wirken. Manche Aerzte empsehlen häusig die graue Merkur rialfalbe, die allerdings gute Dienste leistet, aber ben großer Liebe zur Reinlichkeit ungern angewendet wird, und auf das Antlig und die Hände auch gar nicht anzuwenden ist. Bester

ist in jedem Falle die Werlhoffsche Salbe, welche ben sickernden Pusteln und ben schorfigen Ausschlägen oft wunder, ahnlich wirkt, besonders wenn durch eine allgemeine Rut die Opskrasse zugleich getilgt wird.

Wenn nach sphilitischen Pusteln an behaarten Theilen kahle Stellen entstanden sind, so kann man nach ganglich gestilgter Sphilis die Stellen mit einem saturirten Aufgusse von Eberraute und Rosmarin waschen lassen. Oft sest man zu jedem Pfunde des ebengenannten Aufgusses ein Quentchen Kali carbonicum. Wenn auch keine untrügliche Wirkung davon erwartet werden darf, so kennt man doch viele Fälle, wo dieses Mittel gute Wirkung geleistet hat.

§. 122.

Spezielle Borfchriften fur Die Blecke.

Gegen die Flecke konnen örtlich ebenfalls die Mittel angewandt werden, welche ben den Pufteln empfohlen worden find. Die Anwendung der weiffen Pracipitatsalbe, oder das Benehen der Flecke mit einer leichten Sublimatauflösung ges horen zu den zweckmäßigsten und leicht ausführbaren Methoden. Diese Mittel muffen jedoch eine langere Zeit angewendet werden.

Wenn diese Fiecke sich abschilfern, so verliehren sie ihre hohere Farbe und die Stelle bleibt braun; dagegen empsiehlt Eullerier Compressen von Salzwasser, welches durch einen Zusatz Jusah von Alcohol geschärft worden ist. Die Fortsehung einer leichten Sublimatausidsung mit etwas Weingeist thut ebenfalls gute Dienste. Jedes geistige Mittel reicht ben ges höriger innerlicher Mercurialbehandlung zur Hebung der braus nen Flecke aus, die, sobald die sphilitische Opskrasse getilgt ist, auch von selbst, jedoch etwas langsamer verschwinden.

§. 123.

Dertliche Behandlung der sphilitischen Entzund-

ben fuphilitifden Entgundlichfeiten, Ben welche an einzelnen Stellen bes Rorpers, befonders an ben Mugen, der Dafe, im Innern des Salfes, an ben Gefchlechte: theilen und an bem Ufter als Reffere einer allgemeinen Spphilis bervortreten, wird die brtliche Behandlung durch die Beftigfeit ber entgundlichen Geftaltungen und burch die Empfanglichkeit bes franken Individuums bestimmt. Je heftiger die erftere und je erhohter lettere ift, befte entschiedener tritt die Inditation einer erichlaffenden, ermeichenden, ichmerglindernden Methode Sierber geboren ermelchende Mufguffe und Abfochungen ein. von Malven, Etbifch, Leinfaamen, die bald als Collyria, bald als Gurgelmaffer, oder als Fomentationen angewendet werden muffen. Daffelbe gilt von erweichenden Brenumichlagen aus Semmelbrey ober ben Speciebus emollientibus, die

auf die verschledenen ergriffenen Stellen, insofern es, thunlich ift, angewendet werden tonnen.

Hat die Heftigkeit der Entzündlichkeit nachgelassen, und ist der Kranke nicht so empfindlich, so werden zu dem obener, wähnten Malvenausgusse oder Eibischabsude einige Tropfen Liquoris Hydrargyri nitrici, ungefähr 8 bis 10 Tropfen gen zu einem Pfunde Flüßigkeit genommen, oder anderthalb bis zwen Unzen von dem Liquor Hydr. muriatici zu einem Pfunde eines schleimigen Behitels hinzugeseht, und auf diese Stellen angewendet.

Die Anwendung einer schwachen rothen Präcipitatsalbe poßt nur ben der chronischen Entzündung der Augenlieder. Für alle andern Fälle suphilitischer Entzündlichkeit ist diese Salbe nicht gemacht.

5. 124.

Behandlung ber confecutiven Gefdmure.

Die topischen Rücksichten für die confecutiven Geschwüre geben aus dem hervor, was früher über die Berhandlung bes Schaufers und imvorhergehenden Sate über die drtliche Pflege ber sophilitischen Entzündlichkeit gesagt worden ift. Ben sehr entzündeten Rändern und krankhaft erhöhter Sensibilität des Kranken werden erweichende und schmerzstile lende Kränter, namentlich Malven, Gibisch, Leinsaamen,

Conium, Hyoscyamus, die Species emollientes entweder als Abstergentia, wie Myrrhentinktur, Rosenhonig u. dgl.

Nach gehobener Entzündlichkeit und ben geringer Empfindlichkeit des Kranken passen die leichten Sublimatauflösungen
oder Zusätze von Liq. Hydr, nitrici. Rust hat ben sy,
philitischen Mund, und Halsgeschwüren als ganz spezifisch
empfohlen:

Rec. Hydr. muriat, corrosiv. gr. vj
Extr. Conii

— Chamomillae singul. 3ij
Trae Op. simpl. 3j
Mellis rosati 3j.
M. D. Sig.

Meußerlich anguwenden.

Daffelbe gilt von den Geschwüren der Nase, wo man bey der in die Nasenlöcher zuziehenden Flüßigkeit denselben Unssichten solgt, und bie bey den Mund, und Halsgeschwüren entswickelten Vorsichtsmaßregeln beobachtet. Bey diesen Gesschwüren muß nur noch bemerkt werden, daß ihr Ausbruch eine sehr tief ins Leben eingedrungene, für die nahe gelegenen Theile höchst gefährliche Sphilis ankündigt, die durch eine höchst wirksame und mit aller nothigen Vorsicht eingeleitete Mercurialkur verhütet werden muß.

Die syphilitischen Geschwüre an andern Stellen ber Oberfläche werden mit Sorgfalt verbunden und rein gehalten. Sind die Ränder sehr entzündet, da gelten die schon ermähnsten Borschriften, wobey man blos den innern Gaben des Quecksilbers vertraut.

Die unter dem Namen des Locatellischen Balfams aus Wachs, Del, Terpentin und rothem Wein bestehende Salbe ist zum Verbande dieser Geschwure besonders geeignet, und dient, wenn keine Gegenanzeige Statt findet, auch außerlichen Merscurialmitteln zum Behikel.

Much die von Langen beck empfohlene Methode jus nachst der allgemeinen Heilmethode eine Salbe aus Eperdotter und Ol. Terebinthinae ju verbinden, ift sehr zweckmäßig.

Dasselbe gilt in vielen Fällen von der aus Salpetersäure mit Schweinefett bestehenden als Unguentum oxygenatum in der neuen Pharmocopoe beschriebenen Salbe.

Auflösung des Sublimats in Kalkwasser bereitete, aber hier ber sonders adaquate Aqua phagadaenica. Die von Rust vorgeschlagene Salbe aus einer Unze Schweinesett, einer Drachme Calomel und Drachme Optum kann hier ebenfalls mit Nußen angewendet werden.

Won Hoffmann und Wedekind empfohlene Sublimat-Eharpie. Wenn durch die spehilitischen consecutiven Geschwüre im Halse das Zäpschen ganz zerstört ist, so ist kein Ersaß zu haffen, und dieser der Sprache und dem Schlingen höchst nach: theilige Mangel ist auch durch keine dritiche Vorrichtung ganz zu ersehen. Die bisher zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Masschinen sind unzulänglich und nicht anwendbar.

§. 125.

Behandlung der Schrunden.

Die Schrunden werden außerlich eben so behandelt, wie ben den Geschwuren gesagt worden. Wenn sie schmerzlos und gutartig find, so welchen sie einer gut eingeleiteten Mers curialfur und bedürfen außerlich selten mehr als strenger Reins lichkeit und eines leichten Mercurialsalbchens.

Sind sie aber sehr schmerzhaft, tief eindeingend und an ben Randern entzündet, so dürfte die von Celsus gegen die von anderer Opstrasse herrührenden Schrunden empfohlene Methode noch heute die zweckmäßigste senn. Hierher rechnen wir warme driliche Bader, Dampfe, gekochte Eper warm aufsgelegt, die gewöhnlichen Breyumschläge, ölige Mittel u. bgl.

Spater fann bas Unguentum oxygenatum ober ble Aqua phagadaenica angewendet werden, wo es bann

durch anhaltende Quecksilbermittel und durch eine elferne Huss dauer endlich doch gelingt diese eben so ekelhafte als hartnäckige Form zu heben.

S. 126.

the Latte and Antiment and site Levil

Dertliche Behandlung der fophilitischen Auswuchse.

Bey der Behandlung der verschiedenen syphilitischen Auswüchse muß man von dem unumstößlichen Grundsaße ausgehn, daß keine äußere Methode hinreicht diese Gestaltung gründlich zu beseitigen. Der Ruf der oft unbezwinglichen Hartnäckigkeit solcher Auswüchse ist durch die allgemeine Versbreitung einer unzulänglichen, daher unzweckmäßigen Methode veranlaßt worden.

Man kann täglich Bensplele sehn, daß Auswüchse ben dem innerlichen Gebrauche des Quecksibers ohne alle außer: liche Pflege von selbst abfallen und nie wieder zum Vorschein kommen, mahrend andere durch die heftigsten Aehmittel weg: gebeitt immer wieder erscheinen, bis nicht eine zweckmäßige Merkurialkur die suphilitische Dyskrasie und in ihr die bedinsgende Urfache solcher Metamorphosen getilgt hat.

Wenn solche Uftervegetationen schmerzlos und trocken sind, so befolge man Lagneaus Rath drillch nichts zu thun und verfolge den allgemeinen Heilplan mit Vorsicht und Aus' dauer.

Erft bann, wenn bas Queckfilber burch einige Zeit forte gegeben worden ift, und die Auswüchse nicht welchen wollen, nehme man zur topischen Behandlung seine Zuflucht.

Man hat hierzu dregerley Methoden in Vorschlag ges bracht:

- 1) das Wegschneiden, ein schmerzhaftes, nur ben fehr ausger Breiteten Metamorphosen dieser Urt anwendbares Mittel;
- 2) bas Abbinden, welches nur bei birnformigen auf einem bunnen Stile figenden Auswuchsen Plat greifen barf;
- 3) das Wegagen, wozu man febr viele Mittel empfohlen bat.

Ju den bekanntesten Specisicis dieser Art gehören die von Andre empsohlene Austosung des blauen Bitriols, das aus Sabina, rothem Pracipitat und gebranntem Alaun be, stehende von Gardiner gebrauchte Pulver, die von Balch in Vorschlag gebrachte Arsenlkalaustosung (2 Gran in 2 Unzen destillirten Wassers) und endlich das von Plenk und Swestaur hochgepriesene Gemisch:

Rec. Spir. Vini rectif.

Aceti concentrati singul. 36

Hydr. muriat. corros. 3j

Aluminis

Camphorae

Cerussae singul. 36.

M. D.

Bey unempfindlichen warzenahnlichen Auswuchsen kann auch das von Da fius empfohlene hochst wirksame Aesmittel angewender werden:

Rec. Hydr. muriat. corros.

Cupri sulphurici singul. 3ß

Argenti nitrici gr. vj.

M. D. Pulvis.

Bon diesem Pulver wird etwas auf ben wegzuchenden Auswuchs gebracht, und darauf etwas Wasser vermittelft eines Pinfels getropfelt.

Ben kleinen und weichen Excrescenzen reicht das Sabis napulver, ober der gebrannte Alaun vollkommen aus. Die tieser eindeingenden Caustica sind nur ben sehr hartnäckigen und ohne Schmerz und Entzündung hervortretenden Auss wüchsen angezeigt. Ift Schmerz oder Entzündlichkelt zugegen, oder findet in den an solchen Begetationen gewöhnlich vors kommenden Furchen eine tief fressende Exulceration Statt, so gelten alle ben den Geschwüren und Schrunden für solche Fälle aufgestellten Grundsähe.

§. 127.

Therapeutische Vorschriften für die örtliche Behandlung aller in den Knochen hervorstechenden suphilitischen Gestaltungen im Allgemeinen.

Das Rnochengerufte ift bem Gesammtleben und seinen Gefegen unterworfen, doch ift in ihm besonders im gang ger

funden Zustande jede andere Thatigkeit zurückgedrängt, und nur die Ernahrung in hochst langsamer Entwickelung hervertretend. Dieser Umstand erklart auch die bosartige Natur und die oft alle Geduld ermudende Hartnäckigkeit aller Knochens Kratkheiten.

Dieses ift, was der Arzt ben ber Behandlung der verschiedenen Gestalten der Syphilis in der zweyten Reihe nicht vergeffen darf.

Das Wesen der oberften Form haben alle sphilitischen Knochenübel mit den in dem vorhergehenden f erwähnten Unos malen gemein, aber es liegt tiefer und schwerer zu ergreisen. Die Heilung ist nur auf einem bochst langsamen Wege zu ers ielchen und der Ersah nach folchen Störungen besonders harte nach, oft unmöglich.

Diese Störungen sind dem Quecksilber zwar nicht unzugänge lich, aber man darf nicht übersehn, daß es ben diesen Formen vorzüglich Moth thut auch andere Mittel in Gebrauch zu ziehen. Besonders gehören die Schweißtreibenden und die sogenannten Blutreinigenden Ptisanen hierher. Auch kann man hier das Opium, den Gualak, die Asa soetida und ähnliche Mittel nicht entbehren.

Bieles, was ben der Entwicklung der Quecksitherpraparate vorgekommen ist, gehört auch hierher. Was die einzelnen ins philitischen Gestaltungen in der Knochenbildung noch besonders erheischen, soll in folgenden Gaben naher erörtert werden.

S. 128.

Therapeutische Rucksichten auf die Anochengeschwülste und Anochenauswuchse.

Wenn auch ben jedem Tophus, Gummi, Rodus oder einer sich ohne alle außere Beranlassung hervordränzenden Exostose die Wahrscheinlichkeit einer dagewesenen sophilltischen Opscrasse Statt findet, so ist doch auch nicht zu überseht, daß diese Metamorphosen als reine Formfehler übrig bleiben kinnen, ohne daß in ihnen das ursprüngliche Wesen vorwaltet. Es ist dies für die Behandlung ungemein wichtig und für die Praxis vom Einfluße. Besonders gilt dies von Exostosen, welche in den Fällen, wo sie schmerzlos nach einer zweckmäßigen Merkurialkur sortdauern, wenn längst alle übrigen syphilttischen Jussälle geheilt sind, die Wahrscheinlichkeit einer bioßen Formen störung sur sich haben.

Luffer der innerlichen zweckmäßig gewählten Merkurias fur werden ben den genannten Knochenübeln folgende driliche Maastegeln zu ergreifen fenn,

Ben dem Nodus und dem Gummt, als mehr ober minde harten Auflockerungen des Pertostiums, ist es am besten einer erweichenden Bren aus den Speciedus emollientidus dum Conio so lange aufzulegen und eine erweichende mit Opium vermischte Salbe einzureiben, die sich die Geschwult etwas weicher ansühlt, wo sie bann ohne Perzug ihrer längstet

Flache nach gespalten, und der darinn angesammelten gewöhn, lich gallertartigen Flüßigkeit der Ausweg gestattet werden muß. Dieser Handgriff giebt zwar zu einem offenen, eine häßliche Narbe hinterlassenden Geschwure, Beranlassung, aber es ist der einzige Weg die darunter liegenden Knochen vor der Caries und den Gesammtorganismus vor den schrecklichsten Zufällen zu bewahren.

Der Tophus erfordert ausser der schon oft ermähnten innern Kur ein leichtes Rubesaciens, wozu ein Cantharibens Pflaster oder ein Sensteig angewendet werden kann. Damit ben seiner Entstehung bedeckt, verschwindet er oft binnen einer Nacht.

Daffelbe gilt von ber Eroftose, welche jedoch ben größern Extensonen mit einer aus dem Empl. Hydrarg. cinereo mit Opium bereiteten und auf Leder gestrichenen Masse sehr zweckmäßig bedeckt wird.

§. 129.

Specielle Behandlung der venerischen Knochen-

Schon früher ist erwähnt worden, daß ben sphilltischen Knochenschmerzen die allgemeinen Einreibungen der grauen Salbe als das oberste Mittel empfohlen worden find. Es ift dies nur insofeen aussührbar, als mit dieser Kur das aller-

ftrengste warme Verhalten, der Gebrauch von Milchbadern, und die Anwendung bes Opiums, und aller schweißtreis benden Mittel unerläßlich ift. Sonft reicht auch der innere Gebrauch des Quecksibers mit Opium verbunden aus. Die einzelnen schmerzhaften Stellen werden entweder mit Wachss taffent oder dem ben den Erostosen erwähnten Mercurialpflaster umhüllt.

§. 130.

Spezielle Behandlung der sophilitischen Caries.

Es glebt feine Urt von Knochenfraß beffen Seilung nicht mit vielen Schwierigkeiten verbunden mare, gang besonders bosartig aber ift bie bier in Rede ftebende sophilitische Caries.

Wo daher im Verlaufe dieser Krankheit im Knochen selbst Auftreibungen oder fire nagende Schmerzen entstehen, und daben die Oberstäche mißfärbig wird, kann man eine karibse Zerstörung fürchten, und muß alles aufbieten um das Uebel noch zu verhüten oder wenigstens auf die möglich kleinste Fläche zu beschränken.

Ausser der allgemeinen gegen die Dyskrasse gerichteten Seilmethode, und ausser den Rücksichten, welche ben Knochenstrankheiten auch für die innere Pstege zu beobachten sind, entsteht in der Oertlichkeit die vorzügliche Heilanzeige: alles anzuwenden, damit die Absonderung der taribsen Fläche bewirkt werde. Man bewirkt dies

Wests durch Aehmittel, theils durch mechanische Trennung. Die Absonderung selbst ist Werk der Natur, und sie geschieht uns sehlbar sobald die zerstörte Fläche aller Vitalität beraubt ist. Man bewirkt die gänzliche Austrocknung der schadhaften Fläche durch die örtliche Anwendung der Tra Myrrhae, Tra Euphordii, einer leichten Austosung von salzsauerm oder einer Mischung von salzsauerm oder einer Mischung von salzsauerm Duccksilber, der concent trirten Phosphorsäure und ähnlicher Mittel.

Eine zweyte sich hier darbietende Heilanzeige ist die hier ausfließende Jauche zu verbessern und den Gestank zu vermindern. Dies geschieht theils durch gewürzhafte, theils durch absorbirende Mittel, z. B. Ralkwasser, einen Absud von Chinas, Eichens oder Weidens rinde, einen Ausguß von Wallnußschaalen, Chamillen, Kalsmus oder Sabina, durch die Anwendung des Kohlenstaubes, der Morrhen, oder des peruvianischen Balsams u. s. w.

Sobald man zu vermuthen Utsache hat, daß durch eine zweckmäßige Heilmethode die typhilitische Dyskrasie gehoben ist, so gehe man zu dem innern Sebrauche der Phosphorsaure über, wodurch auf die Mischung der Knochen sehr vortheilhaft einges wirkt wird.

Rec. Dti Salep tenuior. Zvj Acidi phosphorici Zij Syr. Rubi idaei Zß. M. D. Sig.

Alle 2 Stunden einen vollen Egloffel gu nehmen.

Wenn die syphilitische Caries schwammige und lockere Knochen befällt, so sind bedeutende Zerstörungen kaum zu ver, buten. Die gräßlichen Verwüstungen, welche diese Gestaltung an den Knochen der Nase, des Gaumens und des Antliges herbenzusühren vermag, sind allgemein bekannt und bedürsen daher keiner nahern Beschreibung.

Schon oben ist erwähnt worden, daß, sobald sich Infalle der anfangenden Caries einstellen, ein fest bestimmtes und tief ins Leben eingreisendes Versahren nothig wird um die Zerstörungen zu begränzen und aufzuhalten. Besonders gilt dies ben der eben beschriebenen Caries der Nasen, und Gaumen, knochen. Sobald sich daher als Begleitung oder als Folge ans derer syphilitischer Zufälle eine Auftreibung, dumpse Schmerzen oder eine verdächtige missärdige Röthe am Gaumen, oder an der Nase einstellen, und aus letzterer eine übelriechende Kenche tigkeit sließt (Ozaena syphilitica), so gehe man gleich zu einer krästigen Mercurialkur über, und steigere sie bis zu einer vollkommenen Salivation, welche jedoch mit den gehörigen Borsichtsmaasregeln zu erzeugen und nach den noch näher zu erörternden Vorschriften zu beschränken ist.

Daben aber hute man fich vor einer zu herotschen Unwens bung örtlicher Mercurialmittel. Durch zu ftark abende Pinsele fafte, Mund, Nasen, und Gurgelwasser kann die Zerstörung eher gefördert als verhütet werden. Man vergesse nicht, daß man es mit lockern brüchigen Knochen zu thun hat, die schon im gesunden Zustande leicht zerstörbar sind, und daher ben krankhafter Mischung um so leichter durch scharfe Achmittel zu Grunde gerichtet werden konnen. Ben dichtern und festern Knochen sind aber tief eindringende Mittel gerechtsertigt, und da gilt alles, was schon oben von den austrocknenden und kausstischen Mitteln gesagt worden ist.

Die Zerstörungen welche die Caries an der Nase und dem Gaumen hinterläßt, sucht man durch mancherlen zum Theil sehr sinnreiche Vorrichtungen zu verbergen, und den dadurch entstehenden Uebelständen abzuhelsen. So hat man fünstliche Nasen, die jedoch, ausser einer schlechten Nachahmung des verstornen Organs, keinen Nuben schaffen, und eben so wenig Slück, wie die künstlichen Zäpschen gemacht haben.

Durch die Deffnungen welche als Folgen karibser Zersich, rungen des hatten Gaumens jurückbleiben, wird die Sprache entstellt und erschwert, das Schlingen und besonders das Herunterschlucken stüßiger Nahrungsmittel ungemein verhin, dert; daher ist hier die Nothwendigkeit eines örtlichen Ersates im harten Gaumen sehr nothig. Zu diesem Zwecke hat man nun allerlep Obturatorien empsohlen, die aus schwer zu orydirenden Metallen, Gold, Silber oder Platina bereitet und in die Oeffnung eine und angebracht werden mussen. Die vorzügelichsten sind von Jourdain, Gariot, Laforgue,

Angermann und Gerre befchrieben, und ben jebesmas ligem Gebrauche noch auf mannichfaltige Beife verandert mor, ben; boch haben alle ben ihrer Unwendung mehrere Dangel. Muffer bem bochft brudenden Gefühle eines fremden Rorpers im Munde, welches ben allen folden Borrichtungen ben Genes fenen unaufborlich qualt, reigen fie alle bie nachften Umges bungen, wodurch fie ju Entjundungen und Erulcerationen Ber: anlaffung geben. Daber ift es gerathen, ben fleinen Deffnungen, beren Rander noch frisch und nicht durch einen langern Ges brauch eines Obturatoriums verhartet find, die Betlung burch bie reproductive Thatigfeit der Matur abzumarten. freplich ein bochft langweiliger, aber in ben meiften Rallen fiches rer Beilungsprozeg, der bey fleinen Deffnungen unter Unwens dung einiger gelinde erregender und gufammenziehender Mittel und unter Beobachtung einer ftrengen Berhutung aller Schads lichfeiten, befonders aller Berfaltung und des übermäßigen und au lauten Sprechens ober Lachens , gludlich jum 3weche führt.

Wo die Zerstörungen zu weit um sich gegriffen und die dadurch erzeugten Deffnungen einen zu großen Umfang gewons nen haben, oder wo die diatetischen und therapeutischen Bestingungen nicht aussührbar sind, da bleibt nichts als die Answendung des Obturaroriums übrig.

Moch muß hier eine hochst gefahrvolle suphilltische Caries erwähnt werden, welche die innern Sehörorgane, die Halte

Halswirbel und ben Luftröhrenkopf ergreifen kann, und aus den allgemeinen Erscheinungen erkannt wird. In therapeutis scher Hinsicht ift der Arzt ben diesen unglücklichen Formen auf die allgemeine Heilmethode eingeschränkt, und da ist ihm oft nur die Befolgung der Palliativ, und symptomatischen Indication gestattet. Dertlich ist wenig anwendbar. Dämpfe sind gut, aber unzureichend. Einsprisungen sind an die leidende Stelle nicht anzubringen. Ist es so weit gekommen, so enden ge, wöhnlich solche Kranken ihr elendes Leben durch einen quals vollen Tod, ohne daß der Arzt im Stande gewesen ist vieles und besonders viel Wesentliches zu ihrer Erleichterung beys zutragen.

S. 131.

Spezielle Betrachtung der durch die Sphilis herbengeführten Anchylosis und Osteosarcosis in therapeutischer Hinsicht.

Wo als Folge der Bosartigkeit der Form oder der Verswahrlosung der Behandlung das Summum und Ultimatum in der Zerstörung der Knochen eintritt, und wo sich diese hohe Zerstörung durch eine Verknöcherung der Gelenke, oder durch ein krankhaftes Weichwerden der Knochen offenbart, ist an vollendete Heilung kaum zu denken.

Die Befolgung ber allgemeinen Hellansichten ift bas Eins
zige, was hier bem Arzte übrig bleibt. Im ersten Falle kann

bie topische Unwendung ber Bahungen und ber Dampfe aus frisch getodteten Thieren einigen Vortheil bringen.

Ben der Ofteosarcosis ist außerlich wenig oder gar nichts anzuwenden, und selbst die zum innern Gebrauche bestimmten Arzneyen verlassen gewöhnlich den Arzt. Dies gilt ganz bes sonders von der Rubia tinctorum, den gewürzhaften Bådern und ähnlichen Mitteln.

S. 132.

Ueber die Mercurial-Diat.

Der allgemeine Grundsatz der Heilkunde, daß die Lexbensordnung der Indikation und dem darauf gegründeten Heilsplane ganz angepaßt seyn musse, verdient ben der Mercurialzkur vorzüglich Berücksichtigung. Schon oben ist behauptet und erwiesen worden, daß das Quecksilber durch seine eigenthumzliche antisphilitische Wirksamkeit die Cohasion vermindert und der Reppigkeit der luxurirenden Gebilde dadurch Schranken sest. Auf diese Ansicht stützt sich die Lebensordnung. Alles was auf irgend eine Art die Organisation verdichten, den Ton vermehren und die Cohasion verstärken kann, muß durchaus unterbleiben. Was oben von der Unzweckmäßigkeit der Mesthode, welche mit dem Gebrauche des Quecksilbers tonische und erregende Mittel verbindet, gesagt worden ist, gilt auch von der erregenden und die Cohasion vermehrenden Diat.

Die Roft sen daher mehr nahrend als erregend; hierher paßt eine leichte milde Fleischdlat, besonders gebratenes, leicht verdauliches, zahmes und wildes Fleisch. Ben denen, welche keine Unlage zu Durchfällen haben, und wo der Gebrauch des Quecksibers dem Darmkanale keine solche Richtungen giebt, kann auch etwas zartes Semuse gestattet werden. Alle gezwürzhaften, setten, scharfen, geräucherten und schwer verdaustichen Speisen, mussen, soviel als möglich vermieden werden.

Chen fo ift der Genuß aller geiftigen, heftig ingitirenden Getrante ftrenge unterfagt; ein gutes nicht ju ftartes Bier fann unter biefen Umftanden, wenn Gewohnheit es beifcht, erlaubt werden; ein leichtes einhullendes Getrante ift befonders ben bem Gebrauch der heftiger wirfenden Praparate angezeigt, Dan lagt bann entweber einen 26fud von den fogenannten blutreinigenden Rrautern, als Garfaparille, Lapathum acutum, Bardana, Quecen und abns lichen medizinischen Wurgeln, ober ein Schleimiges Gerrante von abgefochter Gerfte, Safer, Gibifchwurzel u. bgl., bereiten. Es verfteht fich von felbft, bag ber Genug biefer und abnitcher Getrante nicht übertrieben werben barf, weil badurch ber Dagen erfchlafft, Die Ophare ber nachften Reproduction in ihrer Thatigfeit herabgestimmt und eine langwierige Dospepfie porbereitet wird. Sat man diefes febr ju fürchten: fo fann auch etwas milber Bein geftattet, aber baben muß bie Indivis bualitat bes Organismus und die Gewohnheit des Rranten erwogen werden. So lange Quecksilber gebraucht wird, mussen sowohl sauere Speisen, als auch sauere Getranke als Limonade, sauerliche Weine und Fruchtsauern aller Urt sorgfältig gemieden werden; nicht deshalb blos, weil sie das Quecksilber im Magen mehr orydiren können, was überhaupt bey den Merkurialsalzen, in denen das Quecksilber bereits in vollkommener Orydation entshalten ist, nicht gut möglich seyn durste, sondern weil die Erssahrung lehrt, daß nach dem Genusse von Sauern während einer Merkurialkur leicht Koliken entstehen, und die Erzeugung hartnäckiger Diarrhoen, die hier stets zu verhüten sind, begünsstigt wird.

In hinsicht ber ben Kranken umgebenden Temperatur, ist es gut, wenn die Witterung trocken, beständig und milde ist. Ben dem Gebrauche der Merkurialhalbkalke, welche so leicht auf die Speicheldrusen einwirken, ist Verkältung doppelt schädlich; daher eine kühle Jahreszelt und Verhältnisse, die dem Kranken es nicht möglich machen, sich vor dem Einsluße der Kälte zu bewahren, den Arzt oft bestimmen, den Sublikmat oder das salpetersaure Quecksilber, wenn keine dringenden Gegenanzeigen vorhanden sind, zu verordnen, weil diese Besteitungen in ihrer Wirkung von den nachtheiligen Einslussen der Witterung am wenigsten abhängig sind. Doch ist es zwecks mäßig, ben jeder Merkurialkur und auch unter den günstigsten Umständen, das Reisen ben seuchter kalter Witterung und den Ausenthalt im Freyen des Abends zu untersagen, und überhaupt

Durch die ganze Zeit der Kur eine warmere Bekleidung ben Tage und eine gute Bedeckung ben der Nacht anzurathen. Ift die Lues veraltet, harenackig oder von vielen dringenden Erscheinungen begleitet, und trifft daben eine kalte Witterung, so wird ein warmes Berhalten zur Heilung unerläßlich. Der Kranke darf dann das Zimmer und in den schlimmsten Fällen und an sehr kalten Wintertagen sogar das Bette nicht verlassen. Diese Vorsicht kann nicht genug empsohlen werden. Luch ben der Reconvalescenz nach der Sphlits, bleibt Verkaltung noch immer eine der bedeutenosten Schädlichkeiten.

Die übrigen Ginflaffe find ben der Merturialtur theils weniger wichtig, theile bem Birfungsfreife bee Urates ju febr Dies gilt besonders von den Gemutheaffetten. Bu entrückt. munichen ift es freglich, daß jeder folcher Rrante ben der in Rede ftebenden Rur die Beiterteit feines Gelftes rette, und Duth und Musdauer behalte; aber wenn Unmuth, Reue, Rurcht vor ber Bufunft, besonders ben ichon weit vergeschrits tener Rranfbeie ben Leibenden qualen: fo wird der Urgt ben ber größten Renneniß und durch die herglichfte Sheilnahme nicht vermogend fenn, den Rranken gang ju beruhigen. Sier leifte er, was ihm moglich ift; wenn er auch einerfelts ben Rranten auf die Tucke der Korm und auf die baraus bervorgehende Bos. artigfeit der Erscheinungen aufmerkfam machen muß: fo beuge er boch andrerfelts denfelben nicht burd ju grägliche Schildes rungen ber Folgen nieder. Mirgends ift das, manchem

Aesculapiden so ganz eigenthumliche Wichtigmachen schlechter angebracht, als ben Krankheiten, wo zu den körperlichen Leiden noch das Bewußtsehn der eignen Schuld hinzutritt.

Der Arzt bemühe sich des Kranken Vertrauen zu verstenen und zu besithen. Der Leidende ist dann gewöhnlich ruschiger und heiterer, wenn seine Krankheit kein Gegenstand des öffentlichen Gesprächs ist. Der Arzt ist verpflichtet die Kranks heit seiner Pstegebesohlenen geheim zu halten; wenn er auch manchmal genothigt ist, zu einigen Sicherheitsvorschriften für die nächsten Umgebungen des Kranken zu schreiten: so kann ihn doch nichts des strengsten Stillschweigens über die wahre Natur des Uebels entbinden. Ist der Kranke von der Unverslehbarkeit seines traurigen Geheimnisses überzeugt, so pflegt er gewöhnlich über seinen Zustand ruhiger zu seyn.

§. 133.

Bon ber Salivation.

Es ist schon oben erwähnt worden, daß die Sallvation durchaus keine zur gründlichen Heilung nothwendige Bedingung ist; ben eingewurzelter und langwieriger Lustseuche ist sie, ber sonders im Anfange der Pflege, um so sorgfältiger zu vers meiden, als durch ihr Dazwischentreten die Fortsetzung der Merkurialkur vereitelt wird.

Die Borboten des Speichelfluffes find ein hoher gerothetes Zahnfleisch, ein metallischer Geschmad und ein

eigenthumlicher, dem Rranfen fowohl als auch den Umftebenben bemerkbarer Geruch aus dem Munde. Durch biefe Bufalle ift Die Gewißheit ber Statt gehabten Ginwirfung des Queckfilbers gegeben; baber auch viele Mergte bas Quedfilber bis ju biefer Periode zu reichen pflegen, was aber ben mehrern Individuen. besonders mabrend dem Gebrauche des Gublimats faum ju er: zielen ift, indem oft auch nach mehrwochentlichem Gebrauche feine Spur der Galivation jum Borichein fommt und boch alle Bufalle ber Sphilis verschwinden. Im Gangen find diefe Probroma des Speichelfluffes nicht fo febr ju fürchten, als bies fo haufig von den Lagen und felbft von vielen Mergten gefdieht; rathfam ift es aber, ben fernern Gebrauch bes Qued: filbers dann gleich wegzuseten, well fonft ber Speichelfluß gleich beftig eintritt, und dann fcmer ju gahmen ift. vollkommen ausgebildete Galivation ift ein bochft laftiges lebel, von beffen begleitenden und nachfolgenden Bufallen zwar nicht diefe bobe Wefahr, wenigstene nicht im gewöhnlichen Ralle zu fürchten ift, wie die Unerfahrenen mahnen, welches aber doch aus mancherley Urfachen fobald ale möglich gehoben werden muß.

Bey verjährten, durch syphilitische oder eine andere tief eingreifende Dyscrasie bedingten Krankheitssormen ist oft die Merkurialkur bis dur vollendeten Salivation mit entschiedenem Rusen angewendet worden, und es laßt sich nicht laugnen, daß wohl nichts die Ernährung so sicher in ihrem tiessten Leben

ju ergreifen, und die Constitution so ju sagen umzustimmen, daher die hartnäckigsten Uebel ju beseitigen vermöge, als eine anhaltende Salivation. Doch ist ben den gewöhnlichen Fällen der Syphilis, besonders der primairen, nie die Nothwendigkeit vorhanden, die Speichel: Secretion bis zu einem so hohen Grade zu vermehren.

Wenn die ersten Erscheinungen der Salivation eintreten, so ift es hinreichend, den fernern außerlichen und innerlichen Gebrauch des Quecksilbers auszusehen, die Speicheldrusen durch eine warme Halsbinde oder durch zertheilende Kräutersäcken warm zu halten und eine strengere Diat zu führen.

Ben dem vollkommen ausgebildeten Speichelflusse werden gewöhnlich zweyerlen Methoden befolgt, welche bende wenig nüßen und manches verderben konnen. Man purgiert ents weder den Kranken, oder man reicht ihm die Schwefelleber. Die erstere Unsicht ist eine Tochter der jatromathematischen Zeit, die letztere wurde durch eine chemische Ansicht erzeugt.

Durch die abführenden Mittel wird eine sogenannte Ab, leitung gemacht, d. h. es wird statt des Speichelflusses ein Bauchfluß hervorgebracht, der hier aber große Rücksichten verstient. Durch Entziehung der Safte stimmt derselbe die Krafte im allgemeinen und die Thätigkeit des Darmkanals insbesondere herab, ohne daß vorzüglich eine weit gediehene Salivation das durch bedeutend vermindert wird. Daraus solgt, daß die

Abführungsmittel beym Speichelfluß nicht angezeigt find; boch ift baburch einige Ruckficht auf die Unterhaltung einer maßigen Leibesöffnung telnesweges ausgeschloffen.

Die Deobachtung, bag ber Schwefel mit bem Quecf, filber Berbindungen eingeht, wodurch bie eigenthumliche Birt. famfeit bes lettern geschwächt wird, und im Organismus andere Richtungen erhalt; ferner die Beobachtung, daß auch ben Quedfilbervergiftungen Diefes Uffinitateverhaltnig benutt wird, um entweder bas im Dagen noch vorhandene Merfurialgift burch Schwefelleber theils ju gerfegen, theile ju entfraften, oder bie fpatern Folgen ber Intorication aufzuheben, bat tie in der argelichen Erfahrung gang verungluckte Dethode erzeugt, einen burch Quecffilber erzeugten Speichelfluß ebenfalls burch Schweffelleber ju befampfen, als wenn im lettgenannten 3us fande bas Quecffiber bier ebenfalls eine Bergiftung erzeugt hatte. Doch ben ber Galivation foll ja feintemege bas Queck, filber felbft gerfest ober feine eigenthumliche Wirtfamteit aufges boben werben; lettere ift ja die oberfte Bedingung der bevor, ftebenden Cur. Ben dem ju fchuell und ju beftig eingetreres nen Speichelfluffe foll ja blos der ju raich in den Drifen der Mundhole, auf welche das Quedfilber junachft einwirkt, aufgebor benen Cobaffon ju Salfe gefommen werben; fann bies aber ber Schwefel, der durch ein chemisches Uffinitatsverhaltnig bem Quecffilber gwar entgegen wirft, aber in tynamticher Begtes bung eben auch die Cobagon, wenn auch im geringern Grade, vermindert, leisten? Eine unbefangene Erfahrung spricht gegen eine Schwefelleberkur ben sphilitischen Krankheitsformen. Wann hat wohl der Sebrauch der Schwefelleber den Speichels sinß schnell und sich er gehoben ohne zugleich die Wirkung des Quecksibers gegen die sphilitische Dyskrasie zu vernichten? Zugleich sindet man auch immer, daß das daben verlaufende Fiesber nicht mäßiger wird, und die Aussonderung in ihrer Heftigs keit sich in die Länge zieht; woben die Funktion der ersten Versdauung ungemein leidet, und eine hartnäckige Magenschwäche die unvermeidliche Folge wird.

Aus der oben entwickelten Ansicht über die die Cohasion vers mindernde Bitkung des Quecksibers geht auch die von der Ersfahrung als richtig nachgewiesene Lehre für die Beseitigung der durch eine zu rasche oder zu anhaltende Quecksiberkur erzeugten Salivation hervor. Die Merkurialkur hat durch Aushbebung der Cohasion in der Liese der Reproduction, besonders aber in den Speicheldrüsen, die so häusige Absonderung des Speichels begründet; die Ergiessung desselben ist als eine zwar wieder vorübergehende, aber doch ausgebildete Colliquation zu bestrachten. Das einen solchen Zustand begleitende Fieber ist eine mahre Amphimerina, wie sie Colliquationen mit leichter Entzündlichkeit der Organe zu begleiten pflegt; daher sind auch Mittel, welche der Cohasionsverminderung Gränzen sehen, ohne durch Steigerung der Thätigkeit des Gesässystems das

Segen bringen. Aus lehtgenannter Ursache paffen die China, die Tormentilla, und die sogenannten Roborantia und Adstringentia, die man auch oft empfiehlt, gar nicht hierher, well sie von der hier vorhandenen Fieberform ganz contraindicitt werden.

Mit dem entschiedensten Nugen werden aber unter diesen Umftanden die Mineralfauern und die Phosphorsaure verorde net; lettere verdient in vielen Fallen den Borzug. Durch diese Mittel wird allen Forderungen genügt, und die Saliva, tion binnen furzer Zeit oft auf eine wunderbar schwelle Weise beschränkt und ausgehoben.

Man bedient sich zu biesem Zwecke gewöhnlich einer Misschung aus 6 Unzen eines dunnen Salepbekokts mit einer bis zwen Drachmen Phosphorsaure und einer Unze himbeersaft, wovon alle 2 Stunden 1 bis 2 Eslossel einzunehmen sind. Von der Schweselsaure reicht für die obengenannte Quantität des Vehikels, eine geringere Dosis aus; besonders past hier auch die Mixtura sulphurico-acida, von welcher 1 Scrupel, höchstens eine halbe Drachme auf 6 Ungen Flüßigkeit vollskommen dem Zwecke entspricht. Um die Säuern mit dem Quecksiber nicht in unmittelbare Verührung zu bringen, wars tet man mit dem Gebrauche der Säuse, bis nach der zuleht genommenen Dosis des Merknrialpräparats 24 Stunden versssoffen sind. Es versteht sich von selbst, daß diese Kur von

einer passenden Lebensordnung begleitet senn muß; einerseite ist jede Berkaltung, andrerseits jede höhere Reizung durch Spetisen und Getranke sorgfältig zu vermeiden. Die ergriffenen Drusen werden so gepflegt, wie oben bep den Prodromis der Salivation bereits erwähnt worden ist.

§. 134.

Von den Contraindicationen für den Gebrauch des Quecksilbers.

Der Grundsah, daß das Quecksiber nicht unter allen Umständen ben der Syphilis angewendet werden durfe, ist eine zwar von vielen Aerzten tief gefühlte, aber weder allgemein ans erkannte, noch weniger allgemein befolgte Wahrheit. Die Vernachläßigung dieser Vorschrift hat viel Unheil gestiftet, und man kann dreist behaupten, daß die meisten von den scheußlichen suphilitischen Folgen ihren Grund in der zweckwidrigen und unzeltigen Anwendung des Quecksibers haben.

Eine ganz vorzügliche Gegenanzeige für den Gebrauch des Quecksilbers ift jener, ben chronischen Krankheitsformen nicht seine Zustand, wo sich mit der Entmischung der Safte eine tief herabgesunkene Thätigkeit des Organismus paart. Da das Quecksilber Cohasions vermindernd wirkt: so kann es in Fallen, wo die Cohasion ohnehin sehr locker, und die Dichtigs keit der Faser sehr vermindert ist, den Kranken nur schneller und

ficherer verderben. Diejenigen Merzte thun fehr Unrecht, welche ben jeder Form, die verdächtigen Ursprungs ift, dem Kranken gleich Quecksilber geben, ohne den Stand der Krafte und die Thatigkeit seiner Ernahrung besonders in Anschlag zu bringen.

Wo sich Störungen, besonders Vereiterungen der innern Organs eingeschlichen haben, oder früher schon vorhanden waren; wo endlich die Kräfte die auf das Minimum gesunken sind: da kann von einer ordentlichen Merkurialkur nicht die Rede seyn. Unter diesen Umständen ist Aufrechthaltung der Lebensthätigkeit, Steigerung der Kraft und Ersah der Masse vor allen andern dringend angezeigt. Alles was zu diesem Zwecke schnell und sicher sühren kann, muß der Arzt in Gebrauch ziehen. Herher paßt besonders Milch, und Fleischdiät; die Anwendung stärs kender, nach Maasgabe der Indikation, mehr oder weniger wirksamer Mittel, und einer Lebensordnung, die diesem Plane vollkommen entspricht.

Man hat unter solchen Umständen, wo die unmittelbare Merkurialkur nicht rathsam schien, einen Ausweg dadurch zu treffen gesucht, daß man eine Ziege an verschiedenen Stellen scheeren und diese dann abwechselnd mit der grauen Salbe kunstmäßig schmieren ließ. Die Kranken erhielten davon die Milch, von der es sich zwar annehmen läßt, daß sie in ihrer innigsten Mischung eine Veränderung erlitten hatte, in der aber

die sorgfältigste chemische Untersuchung keinen Quecksilbergehalt entbecken konnte. Zu einem solchen Versuche gehören in der Negel mehrere Ziegen, weil diese Thiere die Quecksilberkur nicht vertragen, gleich in den ersten Tagen kranklich werden, und endlich an den Folgen der Hydrargyrosis sterben.

Ben veralteten, icon burch mehrere Mercurialmittel behandelten Lues, Formen ift es febr mefentlich, vor der Seft, ftellung ber Indication fur eine Quecffilberfur geborig aufgu, mitteln, ob der gange Buftand des Rranten nicht mehr Rolge des vielleicht in Uebermaage genommenen Quecffilbers, als ber wirklich noch vorschreitenden Suphilis fen. Diese oft bochft peinliche Ungewißheit laßt fich theile aus ber genauften Beobach. tung der Bufalle, befonders aber aus der nie zu vernachläßigen, den Indicatio ex juvantibus et nocentibus heben. Man wird dann immer finden, daß die Bufalle überhaupt einen meniger bosartigen und langfamern Berlauf nehmen; fobalb aber wieder Quedfilber gegeben wird, tritt ichnell eine neue Berichlimmerung ein. Doch vergeffe man auch bier nicht, bag man es mit einem in Sinficht feiner Ratur und feines Berlaufs bochft langwieris gen und beimtuctifden Hebel gu thun babe. Heberhaupt ift es eine wahrhaft schwierige Aufgabe ben verals teten dyefratischen Rrantheiteformen, wo burch bie Lange ber Beit bie erfte Gpur ihres Urfprungs und ihrer Beranlaffung verloren gegangen ift, einen entscheibenben Entschluß ju faffen.

Die Frage ist dann gewöhnlich, ob die gegenwärtige Form noch sphilitischer Natur sey, oder nicht? Jede Meinung hat geswöhnlich etwas für sich, und nur die größte Ausmerksamkeit und die sorgfältigste Erwägung aller Umstände kann hier den Art leiten, der sich überhaupt nie von einer einzelnen Erschet, nung hinreissen lassen darf, sondern nur auf den Grund der sämmtlichen Erscheinungen seinen Hellplan entwerfen muß. In höchst zweiselhaften Fällen ist es gerathen lieber etwas mehr, als zu wenig zu thun.

Muffer ben bisher ermabnten, den Gebrauch des Quede filbers unterfagenden Buftanden, giebt es noch eine Contras indication, welche nicht fowohl aus ber allgemeinen Stimmung bes Organismus, ale vielmehr aus idiofpnfratischen Berbalt: niffen und franthafter Beschaffenheit ber nachften Berdanungs, organe entfteht. Es glebt Individuen, denen bie fleinfte Gabe von Quedfilber heftige, fcmer zu hebende Durchfalle verurfacht. Man fucht zwar diefen Uebelftand durch einen Bufat von Opium, arabifchem Gummi und eine dabin wir, fende Diat ju heben: aber oft find alle Corrigentia vers gebene; wo bann auch nichte übrig bleibt, ale von bem inner: lichen Gebrauche der Merfurialmittel abzustehn. Dann find ble Ginreibungen angezeigt, wo man die Friftionen der Extres mitaten vermittelft der grauen Galbe (Das fogenannte grand remède ber Frangofen) anwenden, ober ben Gublimat nach Cirillos Borfchrift in die Fußsohlen einreiben läßt. Innerlich

wird bann gereicht, was der allgemeine Zustand der Krankheit und die Form der einzelnen Erscheinungen nothig machen. Gewöhnlich ist hier Opium, oder die Phosphorsaure, oder die Mineralsauren nach Maaßgabe der Indikation am rechten Plate. Bon vielen Aerzten wird dann auch der Gebrauch des Guajaks und der sogenannten blutreinigenden Getränke empsohlen.

Gine wenig gefannte, aber boch nicht ju aberfebende Cons traindication fur bie Merfurialfur find organische Storungen des Gefäßspftems, befonders aneurismatische Erweiterungen bes Bergens und ber Pulsabern. Die Cobaffons vermindernde Eigenschaft des Quedfilbers erzeugt, besonders wenn die Rur lange und mit großen Gaben fortgefest wird, eine fo frant' hafte Bruchigfelt ber Wefage, bag baraus leicht lebensgefahr. liche Dachtheile entftehn tonnen. Die aus innern Urfachen entstehenden Aneurismen tonnen oft als die traurige Folge anhaltenber und übertriebener Derfurialfuren angefeben werben. Muf diefen Umftand nimmt man dadurch gang befondere Rude ficht, wenn man überhaupt die heftig wirkenden Praparate nie ju lange fortfest, und ben benen, wo abnliche Storungen im Gefäßipfteme icon Statt finden, fie gang vermeibet. milben Praparate jum innerlichen Gebrauch und bie Unmene bung ber Friftionen find bann allein angezeigt. Im Gangen gilt biefe bier angedeutete Borfchrift überall, wo ben einem Suphille

Sphillitischen, dronische Beschwerden in den, ber Irritabis litat unterworfenen Organen vorfommen.

Eine temporaire Contraindication für die Merkurialkur bilden die meisten acuten Rrankheitsformen. Tritt eine solche in einem so bedeutenden Grade ein, daß dadurch andere Ruck, sichten nothig gemacht werden, so wird das Quecksiber ausge, set; dies gilt besonders vom Schlagsluße, von der Cholera morbus und chnlichen schnell verlaufenden Formen.

Mit bosen Fiebern, besonders wo große Entmischungen der Safte Statt finden, ist die Syphilis eine furchtbare Compplication, und auch hier muß der Gebrauch des Quecksilbers so lange unterbleiben, bis die erstere Form gehoben ist.

Unter ben chronischen Krankheiten ist besonders der Stor, but die Form, ben welcher dieselbe Gefahr und dieselbe Bor, sicht gilt. Ueberhaupt, wo die Cohasion schon früher aufges hoben ist, da past kein Quecksiber bis die früher vorhandene Form und mit ihr die schon früher vorhandene specifische Cohassions. Verminderung beseitigt ist.

Biele Aerzte haben verschiedene Zustande des weiblichen Geschlechts, namentlich die Schwangerschaft, das Bochen, bette und die frühste Periode des kindlichen Alters für Gegen, anzeigen zur Merkurialkur gehalten, jedoch mit Unrecht. Die Gefahr, welche aus der vernachläßigten Kur entsteht, ift zu

groß, und überdies vertragen Frauen und Kinder das Queckfilber in der Regel am besten, weil ihre Vegetation vorherr; schend ist. Es versteht sich von selbst, daß nur die mildesten Praparate, besonders ben Kindern gewählt werden durfen. Gewöhnlich braucht man hier das versüßte Quecksilber, und in mildern Fällen die Mohre.

Schlesinger empfiehlt ben der Sphillis der Kinder folgendes Praparat:

Rec. Hydr. puri 3ß

tere invicem in mortario calefacto

Syr. Althaeae singul. 38.

men ber die men Banan Banan ber et weine

Ein Mittel, von dem nach Maafgabe des Alters des Kindes und der Heftigkeit der Zufalle täglich 2 bis 3 Theeloffelchen gegeben werden können.

Ben Schwangern wirkt die Lues besonders feindlich, und oft kann die vorsichtigste Heilart und das beste Verhalten eine unzeitige oder frühzeitige Gebart nicht verhüten. Wird die Schwangere zu rechter Zeit entbunden: so ist das Kind in der Regel schwächlich, kränklich und überlebt häusig das erste Jahr nicht. Wird es erhalten: so sind gewöhnlich skrophulose Zufälle die spätern Folgen davon; wenn nicht gar ben dem

Durchgange durch die Scheide oder später durch die wunden Warzen der Brufte, Unstedung Statt gefunden und suphiliteische Zufälle sich ausgebildet haben. In allen diesen Fällen wird dem aufmerksamen Arzte die Diagnose leicht werden, und er wird im Quecksiber das Mittel finden, dessen vorsichtiger Gebrauch alle diese Zufälle heben kann.

§. 135.

Machkur ber Merkurial-Behandlung.

Die Machkuren überhaupt find ben fo vielen Rrantheiten mehr Sitte ale Bedurfnig. Ift die Rrantheit gludlich ges hoben: fo bebarf es felten noch vieler Ruckfichten; eine aut gemablte und genau befolgte Lebensordnung reicht in ben allere meiften Fallen aus. Die Dachkuren, welche nach bem Ges brauche des Quedfilbers gegen die Spphilis fo allgemein üblich find, Scheinen burch die Furcht, welche fo viele Mergte vor bem Queckfilber haben, erzeugt ju fenn. Der Genefene municht bas Quecffilber wieder los ju merben, und der Megt gieht da= gegen, wie gegen eine mabre Merfurialvergiftung gu Felbe. Der Gebrauch ber Schwefelquellen ift unter biefen Umftanben Die gewöhnlichfte Dachfur, und ber Rrante reift nach Hachen, Baden oder Barmbrunn um den Rolgen des Queckfilbers vor-Bubengen. Diefe Dethobe ift in oben ermannten Fallen offens bar bochft zweckwidrig, und nur bann angebracht, wenn ben einem vollkommen gefunden Rorper eine Merturialvergiftung Statt gefunden hat. Ift aber bas Quedfilber als Heilmittel angezeigt gewesen, und hat den gewünschten 3weck erreicht: so ist es unverantwortlich, die Wirkungen des gebrauchten Mittels wieder vertilgen zu wollen.

Biele Benspiele lehren, daß von der Spphilis Genesene nach dem Gebrauche der Schweselquellen mit neuen bösartigen Zufällen zurückgekehrt sind, wodurch eine neue Merkurialkur nothig gemacht wurde. Swediaur hat vollkommen Recht, wenn er ben ebengenannten Kuren gegen die Bader im allge, meinen warnt; diese Warnung aber trifft besonders die Schwessselbader. Eben so nachtheilig ist auch der innerliche Gebrauch des Schwesels und aller Praparate aus demseiben.

Wenn die Gaben des Quecksilbers im Verlaufe der Krankheit nicht übertrieben worden find; wenn während der Kur nicht durch allgemein wirkende Schädlichkeiten die Gorfammethätigkeit des Organismus gesunken ist; wenn endlich nicht durch andere zufällige Umstände ärztliche Pflege in der Wiedergenesungsperiode nach überstandener Lustseurhe nothig gemacht wird; so bedarf er hier keiner besondern Nachkur; man reicht mit einer gut gewählten nahrhaften Kost vollkoms men aus. Das einzige, was man hier dem Genesenen zur Pflicht machen muß, ist Ausmerksamkeit auf sich selbst, da, wie schon oben erwähnt worden ist, bey der heimtücksischen Natur dieser Form eine neue Erscheinung leicht möglich ist, die einer baldigen Anzeige und Berücksichtigung bedarf.

Ift aber durch zu anhaltenden Quedfilbergebrauch bie Cobafion ju febr verminbert, ober aus irgend einem Grunde bie Thatigfeit des Organismus gefunten : fo braucht man allers bings einer Rachfur. Im erftern Falle fommt es barauf an, ob die nachtheiligen Birfungen des Quedfilbers mehr als Schmerzen in ben Rnochen, oder mehr als Colliquationen in ben Organen des Unterleibes hervortreten, mo dann entweder Guajat mit Opium, ober ber Gebrauch des Etfens mit tonifchen Mitteln angezeigt ift. Im lettern Ralle, wenn namlich nach überftandener Spphilis eine allgemeine Schwache bemerkbar wird, die nicht im übertriebenen Gebrauche bes Quedfilbers, fonbern in andern Umftanden ihren Grund hat: fo ift eine allgemein ftarfende Bellart nothig; woben man am meiften auf ben Gebrauch ber China, ber Columbo und abne licher Mittel bauen barf; besonders wenn es die Berhalts niffe des von der Spphilis Genesenen geftatten, mit dem Ger brauche Diefer Mittel eine gute nahrhafte Roft, maßigen Ges nuß eines guten Weins und die hohern Bequemlichkeiten bes Lebens zu verbinden.

§. 136.

Mittel, welche außer dem Quecksilber gegen die Lustseuche empfohlen worden sind.

Die Theorie erklart und die Erfahrung befiatigt es, daß das Quedfilber unter allen bisher bekannten Mitteln am

entschiedenften mit der Suphilis und ben meiften rein in der Reproduction begrundeten dyscratischen Formen im qualita: tiven Berhaltniffe fteht. Es glebt fein Mittel welches mit Borficht und nach richtig geftellter Indication fo fchnell und fo ficher ber Luftfeuche und ihren mannigfaltigen fowohl primairen als fecundairen Erscheinungen fteuern tonnte, wie die oben ere mabnten Merkurialpraparate. Dichte defto weniger find gu allen Zeiten neue Mittel vorgeschlagen worben, mozu theils die Bosartigfeit und Sartnacfigfeit der in Rede ftebenben Form, theils die Furcht vor dem Gebrauche des Quedfilbers, theils endlich die Sucht nach Reuerung bas Ihrige bengetragen haben fonnten. Gine großer Theil ber fogenannten Geheimmittel, welche besonders die frangofische Frivolität erfunden hat und ben leichtgläubigen Nachbarn zu boben Preifen verfauft, enthalt tros der Berficherung des Gegentheils, Quedfilber, als feinen oberften und gewöhnlich einzig wirkfamen Beftandtheil, wie bies bereits ben der Darftellung des Gublimats naber erortert worden ift.

Reines von allen den hier in Rede stehenden, kein Queck, filber enthaltenden Mitteln, hat eine reine und ungetrübte Ersfahrung für seine antispphilitische Wirksamkeit; ben vielen jedoch sind Wirkungen beobachtet worden, die zur Beseitigung manscher Nebenumstände ben der Kur der Sphilis benuht werden mussen; daher es denn auch zweckmäßig ist, die wirksamsten Mittel hier näher zu erörtern.

Die Sauern wneden durch die von Scott, einem in Bombay sich aufhaltenden Arzte, geäußerte Idee, die Lustseuche durch Sauerstoff zu heilen, als antivenerisches Mittel aufges nommen und zuerst von Eruikschank, Alyon und später von Zeller in Wien in großen Gaben angewendet. Man branchte dazu gewöhnlich die Salpetersäuern zu i bis 2 Drachs wen auf 2 Pfd. Wasser in i bis 2 Tagen zu verbrauchen, oder die orygenirte zu 5 bis 40 Tropsen in einem schicklichen Behikel. Eruikschank empfahl auch die Eitronensäenere.

So problematisch die gründliche Heilung der Syphilis durch den Gebrauch der Sauern auch immer seyn mag: so läßt sich doch nicht läugnen, daß für viele bey einer sekundalren Syphilis vorkommende Zusälle die Mineralfäuern und die Phosphorsäure ganz vorzügliche nicht zu vernachläßigende Mittel sind. Schon oben ist ihr Nußen zur Beschränkung einer übers mäßigen Salivation als spezisisch empsohlen worden. Bey der syphilitischen Caries, wo die Merkurtalpräparate in hinzreichender Menge gegeben sind, kann die Phosphorsäure wegen ihrem entschiedenen qualitativen Verhältnisse zur Knochensubsstanz vorzügliche Dienste teisten. Bey den verbächtigen chronischen Entzündlichkeiten, welche sich bey der Syphilis im Halse, an der Nase und andern Stellen der Haut einsinden, und auch ost dann noch sortbauern, wenn sie durch eine hinreichende und vorsichtige Merkurtalkur längst beseitigt sind, nüßt der Sebrauch

der Tinctura aromatico-acida oder eines andern ahns lichen Praparats ungemein.

Die Langenfalze murben burch bie 3bee von ber fauern Matur des fpphilitifchen Stoffes ein nothwendiges antis Suphilitisches Mittel fur alle biejenigen, welche biefer Unficht anhiengen. Penrilbe mar ber erfte ber 1774 in einer gang eigenthumlichen Gprup abnlichen Difchung bas fluchtige Laugenfalz verordnete; daben wurden, ber befannten frangos fischen Dethode gufolge, Abführmittel, Tifanen und Baber nicht vergeffen. Deprilbe glaubte badurch ein fpegififches Mittel gefunden ju haben, welches dem Thierreiche entlehnt, den menschlichen Organismus ben diefer Rrantheit befonders freundlich ansprechen murbe. Opegifisch ift nun gwar biefes Mittel nicht, aber boch in ben gallen gut und zwedmäßig, mo wegen ju febr geftelgerter Genfibilitat des Individuums, bas Quedfilber im Unfange fruchtlos ift. Sierber gebort besonders ble von Besnard empfohlene Tra antisyphilitica, melde aus einer Berbindung bes fluchtigen Laugenfalzes mit Opium, mildem Kali und Bimmtmaffer febr umftandlich bereitet, und mit einem Eibischaufguffe taglich 3mal gu 24 Eropfen genommen wird, mabrend bamit auch alle außere Gefchware ver bunden merben. Besnard empfiehlt es ben ber primatren und fefundairen Sphille, ben allen Geftaltungen ohne Mus, nahme vom Eripper an, bis jum Rnochenfrage. Im Gangen wird diese Einktur bas Quedfilber in der Sphills nicht ver: brangen; aber in den Fallen, wo ben dem Gebrauch der Merkurialpraparate die sphilitischen Erscheinungen nicht beschränkt werden, vielmehr oft sich noch vermehren; wenn Durchfalle eintreten und der Kranke täglich schlechter wird: dann sehe man das Quecksilber weg, reiche die Besnardsche Tinktur in Berbindung einer gut gewählten Lebensordnung, so wird man bald sehen, daß alles ein beseres Aussehn gewinnt. Nach 4 bis 6 Wochen wird zwar die Lues nicht geheilt senn, aber nun verträgt der Kranke das Quecksilber gewiß, und die Ku ist oft auf eine kaum erklärbare Weise in kurzer Zeit vollendet.

Der Arfenit. Berr Profeffor Remer in Ronige berg (gegenwartig in Breslau) empfahl diefes Mittel im Sahre 1812 burch bas Sorn iche Archiv, wo man bie bamit anges ftellten Berfuche genau verzeichnet findet. Er will durch diefes Mittel in Fallen geholfen haben, wo ihn die wirkfamften Merfurtalpraparate, namentlich das falgfaure agende, und bas phosphorfaure verlaffen hatten. Er gab von einer aus einem Gran arfentesauern Kali und 8 Ungen bestillirten Baffere be reiteten Muflosung alle 2 Stunden einen Egloffel, woben er die Geschwure mit einer Galbe aus Rohlenpulver und Schweinefett verbinden ließ. Taglich ein Gran Opium in vier Gaben getheilt und der Genuß von roben Epern follen ale die vorzüglichften Corrigentia bes Arfenits mit diefer Rur vers Bur vollständigen Seilung gehoren 10 bis bunden werden. 24 Gran und darüber von dem Kali arsenicoso. Bep

fuphilitifchen Knochenschmerzen foll biefes Mittel oft in vier und zwanzig Stunden Erleichterung verschaffen, eine Erfcheis nung, Die eine Dofis Opium mit einem Merfurialpraparat ebenfalls und oft in noch furgerer Beit ju bewertstelligen vermag. Alls ein bem Reiche ber Metallitat angehörendes Mittel, bat der Arfenit ben allen in der tiefften Reproduction begrundeten Rranthelten, folglich auch ben ber Sphills, a priori viel für fich, und ble Erfahrung bat ibn auch in vielen gallen, befons bers in ben von Remer angeführten, als ein bochft wirefas mes Mittel nachgewiesen; indeffen feine fo entschiedene feinds liche Cinwirkung auf den Organismus, und Die leichte Dog. lichkeit einer Intorication machen bas Mittel bochft verdachtig. DBo der Urgt ben ber Unwendung des Mittels immer fur die Debenfolgen beffelben gittern muß, ift es beffer bavon abjus ftebn. Dur in verzweifelten gallen ift ber Berfuch gerechts fertigt; aufferbem faum ju entschuldigen.

Aus dem Mineralreiche ist auch noch das Gold als Kalk und als salzsaures Salz gegen die Sphills schon in frühern Zeiten empfohlen worden. Erestien ließ letteres ins Zahmsseisch einreiben, und fängt mit dem sunfzehnten Theile eines Grans an. Die Einreibung geschieht durch eine Minute. Das Mittel ist zwar bis jest unzuverläßig, und seine Anwens dung nicht ohne Gesahr. Doch wäre sehr zu wänschen daß in hartnäckigen und sehr bösartigen Fällen auf dieses so tief ins Leben eingreisende Mittel Rücksicht genommen würde.

Ob das weinsteinsauere, das phospharsauere und das kohlensauere Eisen, welches Carmichael gegen den Rrebs und verschiedene andere Metamorphosen so dringend empsohlen hat, auch gegen hartnäckige besonders in den Drüsen und in den Knochen waltende sphilitische Gestaltungen wirksam sey, muß die Erfahrung erst entscheiden. Die Theorie würde eine solche Wirkung schwer erklären können.

Das Opium. Grant und Michaelis haben Recht, wenn sie gestüht auf die Authorität des Fernelius, welcher 1579 den Mohnsaft ben der Lues als das vorzüglichste Mittel empfahl, dieses Mittel ben der genannten Krankheit für sehr nühlich erklären; aber Unrecht haben sie, wenn sie diese Substanz für spezisisch halten. Man kann zugeben, daß seiten ein suphilitischer Kranker geheilt wird, ohne daß er Opium während der Kur gebraucht hätte; aber man kann auch behaupten, daß das Opium allein keinen suphilitischen Kranken geheilt habe.

Es glebt in dem ganzen Apparatus medicaminum kein Arzneymittel, welches ben den Judicationen für das Quecksilber nach Maaßgabe der Umstände ein so gutes Adjus vans oder Corrigens ware, wie der Mohnsaft; daher seine so ausgebreitete Anwendung, die sich sowohl äußerlich als innerlich bewährt.

Die fogenannten blutreinigenben und Soweiß treibenben Getrante und Rrauterfuren. Der Ruf, in dem fruber bie Blutreinigungsfuren ftanden, und ber in ben zwen letten Jahrzehenden febr gefunten mar, bat fich in der neuften Beit wieder mehr gehoben. Dit Recht pers wirft man die Unficht von einem ju materiellen Berlaufe einer Blutverfugung, aber man giebt ju, bag diefe Eifanen ben ber Lues manchen Bortheil gemabren. Beg ber Merfurialfur bilben fie ein zwechmäßiges blatetisches Getrante, bem ber Rrante auf alten Brauch geftust gern vertraut. Die Dothe wendigfeit folder Getrante tritt besonders ben ben intenfiv mir, fenden Merkurialbereitungen ein. Mufferbem nugen bie Solg: trante auch nach dem Gebrauche des Queckfilbers, wo fie auf die Babl ber Diat eine vortrefliche Birfung außern, weil der Rrante Die Borfdriften um fo zwedmäßiger beobachtet. Wegen ibrer biaphoretischen Gigenschaft leiften fie auch ben mehrern Formen ber Opphills als Adjuvantia gute Dienfte, nament, lich ben Rnochenschmerzen und Sautausschlägen. Die bes ruhmteften barunter find das 1 508 aus Amerika ju uns ger brachte und einige Jahre fpater von Leonhard Schmauß, Ulrich v. Sutten und mehrern andern empfohlene Guas jatholy, beffen Sary in mancher Beziehung noch beffer und zweckmäßiger angewendet werden fann; ferner ble gu biefem Bebrauche besonders zwechmäßige und durch einheimische Pflans gen faum gu erfegende Garfaparillen , Burgel, bas

Sassaffasthold, die Rlettenwurzel, die Burgeln von der Smilar China, von der Carex arenaria, vom Astragalus escapus, von Lapathum acutum, von der Saponaria officinalis, und die unstreitig wirksame und ben heftigen Rnodenschmerzen sehr gute Dienste leistende Seidelbastrinde.

Ein Gleiches gilt von der Lobelia syphilitica, welche in Birginien, ihrem Baterlande, ganz allein gegen die Lues gebraucht werden soll, und die Hevermann in Deutschland mit Bortheil angewendet zu haben versichert.

Schlüßlich find noch diejenigen Falle zu bemerken, wo die Lustseuche durch die Krafte der Natur ohne Quecksilber oder ein anderes Mittel, blos durch eine sehr strenge Diat und große körperliche Anstrengung geheilt worden ist. Das merks würdigste Bepspiel dieser Art erzählt van Swieten von einer durch Feldarbeit und magere Kost geheilten Lustseuche. Im Sanzen sind solche Fälle höchst selten.

Parties of the second s

the country of the contract of the country of the c

Land and the Archest of Chains of the Constant, we die entitles in third fire Archest of Chains of the Archest of the Archest of Chains of the Archest of th

THE RESERVE THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Conference and the conference of the conference







