

Tableau de l'École de Botanique du Jardin du Roi / [René Louiche Desfontaines].

Contributors

Desfontaines, René Louiche, 1750-1833.

Publication/Creation

Paris : J.A. Brosson, 1815.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/zt5a37un>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Unable to display this page


20249/B

TABLEAU

DE

ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI.



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

42580
TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI,

Par M. DESFONTAINES, Membre de l'Institut et de
la Légion-d'Honneur, Professeur de Botanique, etc.

SECONDE ÉDITION.

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 9.

1815.

DE L'IMPRIMERIE DE FEUGUERAY,
rue Pierre-Sarrazin, n° 11.



PARIS

AVERTISSEMENT.

LE Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le Jardin du Roi. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Etrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Jardin par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'Ecole de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail; M. de Lamarck m'a communiqué ses herbiers; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du Jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'Ecole de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection des plantes vivantes cultivées au Jardin du Roi, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Ce Jardin est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot, cet Etablissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

*EXPLICATION des abréviations et des signes indicatifs
de la durée des Plantes.*

af.	Afrique.	ile de f.	Ile de France.
am. m.	Amérique méridionale.	n. esp.	Nouvelle-Espagne.
am. s.	Amérique septentrionale.	n. holl.	Nouvelle-Hollande.
ant.	Antilles.		
as.	Asie.	(alim.)	Alimentaire.
as. min.	Asie mineure.	(écon.)	Economique.
esp.	Espagne.	(méd.)	Médicinale.
eur.	Europe.	(orn.)	Ornement.
f.	France.	(vén.)	Vénéneuse.
f. m.	France méridionale.		

Noms d'Auteurs.

<i>All. ped.</i>	Allioni, Flora pedemontana.
— <i>Auct.</i>	— Auctuarium.
<i>Andr. rep.</i>	Andrews, Repository.
<i>Arduin. spec.</i>	Arduini, Specimen.
<i>Balbis, Add.</i>	Balbis, Miscellanea et Additamentum ad Floram pedemontanam.
— <i>H. Taur.</i>	— Hortus taurinensis.
<i>Beauv. Agrost.</i>	Beauvois, Agrostographie.
<i>Bellardi, App.</i>	Appendix ad Floram pedemontanam.
<i>Bill. N. Holl.</i>	La Billardièrre, Novæ Hollandiæ plant. Specimen.
<i>Bonpland, Malm.</i>	Plantes rares de Navarre et de la Malmaison.
— <i>Equinox.</i>	— Plantes équinoxiales.
<i>Bosc, Dict.</i>	Dictionnaire d'Agriculture.
— <i>Soc. Lin. Par.</i>	— Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
<i>Bot. Magaz.</i>	Botanical Magazin.
<i>Brotero, Fl.</i>	Flora lusitânica.
— <i>Phyt.</i>	— Phytographia lusitanicæ Selection.
<i>Brown. Prodr.</i>	Prodromus Floræ N. Hollandiæ.
<i>Cav. Ic.</i>	Cavanilles, Icones.
— <i>Diss.</i>	— Dissertationes.
<i>Correa, S. Lin.</i>	Transactions of the Linnean Society.
<i>Crantz, Austr.</i>	Stirpium austriacarum Fasciculi.
<i>Curtis, Fl.</i>	Flora Londinensis.
<i>Cyrillo, Dec.</i>	Plant. rariorum regni neapolitani Fasciculi.
<i>Dec. Ann.</i>	Decandolle, Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
— <i>Astr.</i>	— Astragalogia.

- Dec. cat.* Decandolle, Catalogus plant. horti botanici
 Monspeliensis.
 — *Fl.* — Flore française.
Delile, Fl. Delile, Floræ ægyptiacæ illustratio.
 — *Ægypt.* — Description de l'Égypte.
Desf. Atl. Desfontaines, Flora atlantica.
 — *Ann.* — Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
 — *Acad.* — Mémoires de l'Académie des Sciences de
 Paris.
Desvaux, Journ. Journal de Botanique.
Duham. Arbr. Duhamel, Traité des Arbres et Arbustes.
 — *Ed. n.* — Nouvelle Edition.
Dunal, sol. Histoire des Solanum.
Encycl. Encyclopédie méthodique.
 — *suppl.* — Supplément. (Poiret.)
Fl. Dan. Flora danica.
Fl. Per. Flora peruviana.
Forsk. Fl. Forskahl, Flora ægyptiaco-arabica.
Gærtn. Gærtner, de Fructibus, etc.
Good. s. Lin. Goodnow, Transactions of the Linnean Society.
Couan, ill. Illustrationes.
Guers. s. Philom. Guersant, Bulletin de la Société philomatique.
Haw. Mesemb. Haworth, Observations on the genus Mesem-
 bryanthemum.
H. K. Hortus Kewensis, ed. 2^a.
Host, Gram. Icones et Descriptiones graminum, etc.
Jacq. Amer. Jacquin, Selectarum Stirpium americanarum
 Historia.
 — *Austr.* — Flora austriaca.
 — *collect.* — Collectanea.
 — *Fragm.* — Fragmenta botanica.
 — *H. schœn.* — Hortus schœnbrunensis.
 — *Hort.* — Hortus vindobonensis.
 — *ic.* — Icones plantarum.
 — *miscell.* — Miscellanea.
 — *obs.* — Observationes botanicæ.
 — *ox.* — Oxalis.
Juss. Ann. De Jussieu, Annales du Muséum d'Histoire na-
 turelle.
Kœler, Gram. Descriptio graminum.
Lambert, Pin. A description of the genus Pinus.
Lamk, ill. Lamarck, Illustration des genres.
 — *Journ. d'hist. nat.* — Journal d'Histoire naturelle.
Lapeyr. Pyr. Lapeyrouse, Histoire des Plantes des Pyrénées.
Laroche, Eryng. Eryngiorum Historia.
Leers, Herb. Flora herbörnensis.
L'hérit. corn. L'Héritier, Cornus.
 — *Ger.* — Geranologia.

- L'herit. sert.* L'Héritier, Sertum anglicum.
 — *stirp.* — Stirpes novæ.
L. Linnæus, Species Plantarum.
 — *mant.* — Mantissa.
 — *L. f.* — Filius, Supplementum.
Lois. fl. Loiseleur, Flora gallica.
Marsch. cauc. Marschall, Flora Taurico-caucasica.
Mass. stap. Masson, Stapeliæ novæ.
Mich. fl. Michaux, Flora boreali Americana.
Mich. arbr. Michaux fils, Histoire des Arbres forestiers de
 l'Amérique septentrionale.
 — *goett.* — Commentaria Soc. Goettingensis.
Murray, s. veg. Systema vegetabilium.
Nester, pot. Potentillæ genus (*manuscrit*).
Ortega, dec. Decades.
Pallas, astrag. Species Astragalorum, etc.
 — *itin.* — Voyages.
 — *N. Act. petrop.* — Nova Acta Petropolitana.
 — *ross.* — Flora rossica.
Pers. syn. Persoon, Synopsis.
Pollich. palat. Historia Plant. in Palatinatu sponte nascentium.
Pouret, Act. tolos. Mémoires de l'Académie de Toulouse.
Ramat, Journ. d'hist. nat. Ramatuelle, Journal d'Histoire naturelle.
Ramond, s. phyl. Bulletin de la Société Philomatique.
Red. Lil. Redouté, Liliacées.
Retz. obs. Retzius, Observationes botanicæ.
Salisb. prodr. Salisbury, Prodromus.
Schk. car. Schkuhr, Histoire des Carex (*traduction*).
Schousb. maroc. Schousboe, Iagttagelser over vextriget i Marokko.
Schrad. germ. Schrader, Flora germanica.
Schreb. gram. Schreber, Gramina.
 — *spicil.* — Spicilegium.
 — *vert.* — Plantarum verticillatarum unilabiatarum ge-
 nera et species.
Scop. carn. Scopoli, Flora carniolica.
 — *insub.* — Deliciæ floræ et faunæ insubricæ.
Smith, fl. Flora britannica.
 — *N. holl.* — A Specimen of the Botany of New-Holland.
 — *pict.* — Icones pictæ.
 — *soc. Lin.* — Transactions of the Linnean Society.
 — *spicil.* — Spicilegium botanicum.
Sonn. itin. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc.
Swartz, obs. Observationes botanicæ.
 — *orchid.* — Orchides.
 — *prodr.* — Prodromus.
Thouin, ann. Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
Thuilier, fl. Flore des environs de Paris.
Vahl, sp. Enumeratio Plantarum.

- vahl, symb*..... Symbolæ botanicæ.
wald. et kitt. hung... Waldstein et Kittaibel, Descriptiones et Icones,
 Plant. rariorum Hungariæ.
wendl. sert. hann..... Wendland, Sertum Hannoverianum.
vent. choix de pl..... Ventenat, Choix de Plantes.
 — *H. cels*..... — Jardin de Cels.
 — *inst*..... — Mémoires de l'Institut.
 — *malm*..... — Jardin de la Malmaison.
vill. delph..... Villars, Histoire des Plantes du Dauphiné.
willd. Enum..... Willdenow, Enumeratio Plantarum horti regii
 berolinensis.
 — *Enum. suppl*..... — Supplementum.
 — *H. berol*..... — Hortus berolinensis.
 — *sp*..... — Species plantarum.
viviani, fragm..... Floræ italicæ Fragmenta.
- ⊙..... Annuel.
 ♂..... Bisannuel.
 ℥..... Vivace.
 ♃..... Ligneux.
 or..... Orangerie.
 s. ch..... Serre chaude.

Ardelia gazunifolia butnerianæ. 173.
Cyrtostomum... *Ligustrum*... 219.
Senecioia grandiflora... *specimen*... 93.
Saxifraga plumieria... *Lobelia*... 100.
Ardia javanica... *Guttiferum*... 161.
Garcinia celebica... *Dam*... 161.
Myristicium schottii... *Laud*... 46. *myristicium*
Norma chartacea... stictica
Satanus clerica... *Asclepias*... 93.
Echylachium panduriforme... *Cappadocia*... 188.
Canisium commune... *triplicatum*... 228.
Chelidonium majus... *Malva*... 175. *butnerianæ*...
Conoclinium pinnatum... *lysiacanthus*... 91.
Caryophyllus leucostachyus... *vel* *lysiacanthus* *Caryophyllata*... 186. *Caryophyllus*
Caryophyllus... *vel* *butnerianus*... *specimen*... 93.
Stamys trichotoma... *vel* *Stamys*... *lysiacanthus*... 226. & 269.

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI.

CLASSIS I.
ACOTYLEDONES.

CLASSE I.
ACTYLÉDONS.

N^o

NOTA. Cette Classe a été supprimée du Tableau, parce que les Plantes qu'elle renferme ne sont pas susceptibles d'être cultivées.

Les algues, les lichens, les mousses, les champignons, les végétaux marins, les végétaux aquatiques, les végétaux terrestres, les végétaux exotiques, les végétaux domestiques, les végétaux communs, les végétaux rares, les végétaux nouveaux, les végétaux anciens, les végétaux célèbres, les végétaux obscurs, les végétaux méconnus, les végétaux ignorés, les végétaux oubliés, les végétaux négligés, les végétaux méprisés, les végétaux méconnus, les végétaux ignorés, les végétaux oubliés, les végétaux négligés, les végétaux méprisés.

CLASSIS II.
MONOCOTYLEDONES.

CLASSE II.
MONOCOTYLÉDONS.

ORDO I.

ORDRE I.

FILICES.

FOUGÈRES.

I. Capsula nudæ nec annulo cinctæ.

I. Capsules nues et sans anneau.

Les fougères, les végétaux aquatiques, les végétaux terrestres, les végétaux exotiques, les végétaux domestiques, les végétaux communs, les végétaux rares, les végétaux nouveaux, les végétaux anciens, les végétaux célèbres, les végétaux obscurs, les végétaux méconnus, les végétaux ignorés, les végétaux oubliés, les végétaux négligés, les végétaux méprisés.
OPHIOGLOSSUM
vulgatum L.

OPHIOGLOSSE
commune. F. 7c

BOTRYCHIUM
lunaria swartz, syn. }
osmunda lunaria L. }

BOTRYCHIUM
lunaire. F. 7c

HYDROGLOSSUM
japonicum willd. H. Berol. }
lygodium japonicum swartz, }
syn. }

HYDROGLOSSUM
du Japon. s. ch. 7c

*Nephrodium splendens.
Ligularia sibirica.
Diplazium bulbiferum.
Adiantum truncatum.
Antrophyum boreale.*

OSMUNDA
regalis L.

II. Capsula nuda, annulo cincta.

ACROSTICHUM
aureum L.
marantæ L.

CETERACH
officinarum willd. sp. }
asplenium ceterach L. }

POLYPODIUM.

1. Fronde simplici.

^{pubescens.}
crassifolium L.

2. Fronde pinnatifidâ.

phymatodes L. Mant.
aureum L.
vulgare L.
cambricum L.

3. Fronde bipinnatifidâ.

phlegopteris L.

4. Fronde supra-decompositâ.

dryopteris L.

III. Capsula indusio velata.

ASPIDIUM.

1. Fronde ternatâ.

trifoliatum swartz, syn. }
polypodium trifoliatum L. }

2. Fronde pinnatâ.

lonchitis swartz, syn. }
polypodium lonchitis L. }
achrosticoides swartz, syn.

3. Fronde bipinnatifidâ, indusio reniformi.

oreopteris swartz, syn. }
thelypteris swartz, syn. }
polypodium thelypteris L. }
molle swartz, syn.
cristatum swartz, syn.

OSMONDE

officinale. F. ℥ (méd.)

II. Capsules nues, entourées d'un anneau.

ACROSTIC

doré. Antilles. s. ch. ℥
de Maranta. F. Alpes. ℥

CÉTÉRACH

officinal. F. ℥ (méd.)

POLYPODE.

1. Feuilles simples.

à feuell. épais. Ant. s. ch. ℥

2. Feuilles pinnatifides.

phymatode. Inde. s. ch. ℥
doré. Antilles. s. ch. ℥
commun. F. ℥ (méd.)
lacinié. F. ℥

3. Feuilles deux fois pinnatifides.

phégoptéris. F. ℥

4. Feuillage décomposé.

dryoptéris. F. ℥

III. Capsules recouvertes d'une enveloppe.

ASPIDIUM.

1. Feuilles ternées.

trifolié. Antilles. s. ch. ℥

2. Feuilles pennées.

lonchitis. F. Alpes. ℥
faux acrostic. virginie. ℥

3. Feuilles deux fois pinnatifides; enveloppe réniforme.

oreoptéris. F. ℥

thélyptéris. F. ℥

à feuell. moll. Am. m. s. ch. ℥
à crête. suisse. ℥

4. Fronde bipinnatâ triplicato-pinnatâve ,
indusiis reniformibus.

filix-mas swartz. syn. }
 polypodium filix-mas L. }
 filix fœmina swartz. syn. }
 polypodium filix fœmina L. }
 aculeatum swartz. syn. }
 polypodium aculeatum L. }
 dilatatum swartz. syn. }
 rigidum swartz. syn. }
 fragrans vill. delph. }
 Halleri willd. sp. }
 fontanum swartz. syn. }
 bulbiferum swartz. syn. }
 polypodium bulbiferum L. }
 fragile swartz. syn. }
 polypodium fragile L. }
 rhæticum swartz. syn. }
 polypodium rhæticum L. }
 montanum swartz. syn. }
 myrrhidifolium vill. delph. }

ONOCLEA

sensibilis L.

ASPLENIUM

septentrionale willd. sp. }
 acrostichum septentrion. L. }
 marinum L.
 acrostichoides swartz. syn.
 trichomanes L.
 furcatum swartz. syn.
 ruta-muraria L.
 adiantum-nigrum. L.

SCOLOPENDRIUM

officinarum swartz. syn. }
 asplenium scolopendrium L. }

BLECHNUM

occidentale L.
 boreale swartz. syn. }
 osmunda spicant L. }

WOODWARDIA

radicans swartz. syn.

PTERIS

aquilina L.
 arguta swartz. syn.
 serrulata L.

— hastata.
 — costata.

4. Feuilles deux ou trois fois pennées ,
enveloppe réniforme.

Fougère mâle. F. ℥ (méd.)

Fougère femelle. F. ℥

à aiguillons. F. ℥.

dilaté. F. ℥

à feuilles roides. F. ℥

de Haller. Alpes. ℥

bulbifère. Canada. ℥

fragile. F. ℥

de Rhétie. Alpes. ℥

des montagnes. Alpes. ℥

ONOCLEA

sensible. Am. s. ℥

ASPLENIUM

du nord. F. ℥

maritime. F. ℥

faux acrostic. Am. s. ℥

trichomanes. F. ℥

cunéiforme. Cap. or. ℥

rue des murailles. F. ℥ (méd.)

capillaire noir. F. ℥ (méd.)

SCOLOPENDRE

officinale. F. ℥ (méd.)

BLECHNUM

d'occident. Inde. s. ch. ℥

du nord. F. ℥

WOODWARDIA

prolifère. Italie. or. ℥

PTERIS

fougère commune. F. ℥

à feuil. en scie. Canar. or. ℥

crénelée. Inde. s. ch. ℥

— hastata.

cretica L.
 longifolia L.
 crispa swartz. syn. }
 osmunda crispa L. }

CHEILANTHES

odora swartz. syn. }
 polypodium fragrans Desf. Atl. }
 pteris acrosticha Balbis. Add. }

ADIANTUM

reniforme L.
 pedatum L.
 capillus-veneris L.

DAVALLIA

canariensis swartz. syn. }
 trichomanes canariense L. }

ORDO II.

RHIZOSPERMÆ.

PILULARIA

globulifera L.

MARSILEA

quadrifolia L.

ORDO III.

CICADEÆ.

ZAMIA

pumila Encycl. (non Lin.)
 furfuracea Willd. sp.
 integrifolia Jacq. Ic.
 spiralis. Salisb. Prodr.
 tridentata Willd. sp.

CYCAS

circinalis L.
 revoluta Thunb. Jap.

ORDO IV.

EQUISETACEÆ.

EQUISETUM

arvense L.
 sylvaticum L.
 palustre L.
 fluviatile L.

de Crète. or. ☞
 à f. long. Antill. s. ch. ☞
 crépue. Alpes. ☞

CHEILANTHE

odorant. f. m. or. ☞

ADIANTUM

reniforme. canaries. or. ☞
 de Canada. ☞ (méd.)
 de Montpellier. ☞ (méd.)

DAVALLIA

des Canaries. or. ☞

ORDRE II.

RHIZOSPERMES.

PILULAIRE

à globules. f. ☞

MARSILEA

à quatre feuilles. f. ☞

ORDRE III.

CICADÉES.

ZAMIA

nain. Am. s. s. ch. ☽
 furfuracé. inde. s. ch. ☽
 à feuell. entières. inde. s. ch. ☽
 en spirale. N. Holl. s. ch. ☽
 tridenté. N. Holl. s. ch. ☽

CYCAS

en éventail. inde. s. ch. ☽
 roulé. Japon. s. ch. ☽

ORDRE IV.

ÉQUISETACÉES.

PRÉLE

des champs. f. ☞
 des bois. f. ☞
 des marais. f. ☞
 des rivières. f. ☞

limosum L.
hyemale L.

ORDO V.

N A I A D E S.

HIPPURIS
vulgaris L.

CHARA
vulgaris L.
tomentosa L.
flexilis L.

CERATOPHYLLUM
submersum L.
demersum L.

NAIAS
major dec. fl. }
monosperma willd. sp. }
minor dec. fl. }
caulinia fragilis willd. sp. }

SAURURUS
cernuus L.

POTAMOGETON
natans L.
perfoliatum L.
densum L.
lucens L.
crispum L.
compressum L.
pectinatum L.
gramineum L.
pusillum L.

RUPPIA
maritima L.

ZANICHELLIA
palustris L.

CALLITRICHE
verna L.
— angustifolia }
— autumnalis L. }

LEMNA
polyrhiza L.
minor L.
— gibba L.
trisulca L.

limoneuse. F. ℥
d'hiver. F. ℥

ORDRE V.

N A I A D E S.

HIPPURIS (onagraires. decand.)
aquatique. F. ℥

CHARA
commun. F. ⊙
cotonneux. F. ⊙
flexible. F. ⊙

CERATOPHYLLUM (salicaires. dec.)
à fruit lisse. F. ℥
à fruit épineux. F. ℥

NALADE
à feuilles lancéolées. F. ⊙
à feuilles linéaires. F. ⊙

SAURURUS
incliné. Am. s. ℥

POTAMOGETON (Alismacées. dec.)
flottant. F. ℥
perfolié. F. ℥
bisurqué. F. ℥
luisant. F. ℥
crépu. F. ℥
comprimé. F. ℥
pectiné. F. ℥
à feuilles de gramin. F. ℥
gréle. F. ℥

RUPPIA (Alismacées. dec.)
maritime. F. ⊙ ?

ZANICHELLE (Alismacées. dec.)
des marais. F. ⊙

CALLITRIC (onagraires. dec.)
printanier. F. ⊙
— à feuilles étroites.

LEMNA
à larges feuilles. F. ⊙
à petites feuilles. F. ℥
— gibbeux.
à trois sillons. F. ℥

Plantæ monocotyledones

staminibus hypogynis.

O R D O I.

A R O I D E Æ.

I. *Spadix spathâ involutus.*AMBROSINIA
Bassii L.

ARUM.

1. *Acaulia, foliis compositis.*crinitum Willd. sp. }
muscivorum L. f. }
clavatum.
Dracunculus L.
Dracontium L.
triphyllum L.2. *Acaulia, foliis simplicibus.*maculatum L.
italicum Encycl.
Arisarum L.
colocasia L.
pictum L. f.
tenuifolium L.
divaricatum L.
trilobatum L.

CALADIUM.

1. *Acaulia.*reticulatum.
punctatum.
sagittifolium Willd. sp.
violaceum.
bicolor Vent. H. Cels.2. *Caulescentia.*lacerum Willd. sp.
seguinum Willd. sp.
auritum Willd. sp.
tripartitum Willd. sp.

CALLA

æthiopica L.
palustris L.

Plantes monocotylédones

à étamines sous le pistil.

O R D R E I.

A R O Î D E S.

I. Spadice entouré d'une spathe.

AMBROSINIA
de Bassi. sicile. or. ℥

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

chevelu. minorque. or. ℥
en massue. s. ch. ℥
serpenteire. F. ℥ (méd.)
dracontium. Am. s. or. ℥
à trois feuilles. Am. s. ψ

2. Point de tiges, feuilles simples.

maculé. F. ℥ (méd.)
d'Italie. ℥
capuchon. F. m. or. ψ
colocase. Égypte. s. ch. ℥
veiné. minorque. or. ℥
à feuilles étroites. F. m. or. ℥
divergent. inde. s. ch. ψ
trilobé. inde. s. ch. ψ

CALADIUM.

1. Point de tiges.

à réseau. s. ch. ψ
moucheté. s. ch. ℥
hasté. Antilles. s. ch. ψ
violet. Antilles. s. ch. ℥
bicolor. Buenos-Ayres. s. ch. ψ

2. Une tige.

lacéré. Antilles. s. ch. ψ
à f. de balisier. Antill. s. ch. ψ
auriculé. Antilles. s. ch. ψ
trilobé. Caracas. s. ch. ψ

CALLA

d'Éthiopie. cap. or. ℥ (orn.)
des marais. F. ψ

DRACONTIUM

pertusum L.
polyphyllum L.

POTHOS

crassinervia Jacq. IC.
lanceolata L.
cordata L.

II. Spadix spathá destitutus.

ORONTIUM

japonicum Thunb. Jap.

ACORUS

calamus L.
gramineus H. K.

ORDO II.

TYPHÆ.

TYPHA

latifolia L.
angustifolia L.
minima Dec. Fl.

SPARGANIUM

erectum L.
simplex Smith. Fl.
natans L.

ORDO III.

CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

CAREX.

1. Spicá unicá simplici.

dioica L.
pulicaris L.

2. Spicis androgynis.

foetida All. Ped.
baldensis L.
cyperoides Schk. Car. }
bohemica Schreb. Gram. }
disticha Schreb. Spic. }
intermedia Good. S. Lin. }
spicata Encycl. }
arenaria Leers. Herb. (non Lin.) }

DRACONTIUM

perforé. Antilles. s. ch. ♀
à f. nombr. Surinam. s. ch. ♀

POTHOS

à gross. nervur. Caracas. s. ch. ♀
lancéolé. Antilles. s. ch. ♂
à f. en cœur. Antill. s. ch. ♀

II. Spadice sans spathe.

ORONTIUM

du Japon. s. ch. ♀

ACORUS

aromatique. F. ♀ (méd.)
à feuilles étroites. Chine. or. ♂

ORDRE II.

MASSETTES.

MASSETTE

à larges feuilles. F. ♀
à feuilles étroites. F. ♀
petite. F. ♀.

RUBAN-D'EAU

rameux. F. ♂
à tige simple. F. ♀
flottant. F. ♀

ORDRE III.

SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

CAREX.

1. Un seul épi simple.

dioïque F. ♀
pulicaire. F. ♀

2. Épis androgynes.

fétide. Alpes. ♀
du mont Baldo. Italie. ♂

cypéroïde. F. ♀

à deux rangs. F. ♂

atrata L.
 arenaria L.
 tenella Thuil. Fl.
 ovalis Good. s. Lin.
 vulpina L.
 muricata L.
 stellulata Good. s. Lin.
 divulsa Good. s. Lin.
 curta Good. s. Lin.
 elongata L.
 brizoides L.
 paniculata L.
 teretiuscula Good. s. Lin.
 remota L.

3. *Spicis sexu distinctis, fœmineis sessilibus.*

digitata L.
 flava L.
 œderi Roth. Germ.
 extensa Good. s. Lin.
 montana L. }
 collina Willd. sp. }
 tomentosa L.
 præcox Jacq. Austr.
 filiformis L.
 distans L.

4. *Spicis sexu distinctis, fœmineis pedunculatis.*

argentea Vill. Delph. }
 scariosa Encycl. }
 prostrata All. ped. }
 clandestina Schk. car. }
 panicea L. }
 sylvatica Good. s. Lin. }
 drymeja L. f. }
 pallescens L. }
 plantaginea Encycl. }
 pseudo-cyperus L. }
 depauperata Good. s. Lin. }
 pendula Good. s. Lin. }
 maxima Scop. carn. }

5. *Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.*

cæspitosa L.
 glauca Scop. carn.

noirâtre. Alpes. ♀
 des sables. F. ♀
 grêle. F. ♀
 ovale. F. ♂
 compacte. F. ♂
 hérissé. F. ♀
 étoilé. F. ♀
 séparé. F. ♀
 tronqué. F. ♀
 allongé. F. ♂
 brizoïde. F. ♂
 paniculé. F. ♀
 cylindrique. F. ♂
 écarté. F. ♀

3. *Épis femelles sessiles, séparés des mâles.*

digité. F. ♂
 jaune. F. ♂
 d'œder. F. ♀
 à longues bractées. Anglet. ♂
 de montagne. F. ♀
 cotonneux. F. ♂
 précoce. F. ♀
 filiforme. F. ♀
 distant. F. ♂

4. *Épis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.*

argenté. F. ♂.
 faux panis. F. ♀
 des bois. F. ♂
 pâle. F. ♂
 à feuill. de plantain. Am. s. ♂
 faux souchet. F. ♀.
 à fruits rares. F. ♀
 à épis pendans. F. ♂

5. *Plusieurs épis mâles séparés des femelles.*

gazonnant. F. ♀
 glauque. F. ♀

stricta *Good. s. Lin.* }
verna *Encycl.* }
riparia *Good. s. Lin.*
paludosa *Good. s. Lin.*
acuta *Schk. car.*
secalina *Willd. sp.*
vesicaria *L.*
ampullacea *Good. s. Lin.*
hirta *L.*
hordeistychos *Vill. Delph.*

II. Flores hermaphroditi.

SCHOENUS.

1. *Culmo tereti.*

mariscus *L.*
mucronatus *L.*
nigricans *L.*
fuscus *L.*
rhinospora fusca *H. K.* }

2. *Culmo triquetro.*

compressus *L.*
albus *L.*
rhinospora alba *Vahl. sp.* }

ERIOPHORUM

polystachyum *L.*
latifolium *Schrad. germ.* }
vaillantii *Poiteau fl.*
gracile *Roth. catal.*
triquetrum *Schrad. germ.* }
angustifolium *Schrad. germ.*
vaginatum *L.*
capitatum *Host. Gram.*

SCIRPUS.

1. *Spicâ unicâ.*

articulatus *L.*
palustris *L.*
cæspitosus *L.*
acicularis *L.*
fluitans *L.*
ovatus *Roth. catal.*
campestris *Roth. catal.*

2. *Culmo tereti polystachyo.*

setaceus *L.*
supinus *L.*

serré. *F. ♀*

des rivages. *F. ♀*

des marais. *F. ♀*

aigu. *F. ♂*

à épi de seigle. *F. ♀*

vésiculeux. *F. ♂*

renflé. *F. ♀*

velu. *F. ♂*

épi d'orge. *F. ♂*

II. Fleurs hermaphrodites.

SCHOENUS.

1. Chaume cylindrique.

des étangs. *F. ♂*

acéré. *F. ♂*

noir. *F. ♀*

brun. *F. ♀*

2. Chaume triangulaire.

comprimé. *F. ♀*

blanc. *F. ♀*

LINAIGRETTE

à larges feuilles. *F. ♂*

de Vaillant. *F. ♂*

grêle.

à feuilles étroites. *F. ♀*

engainée. *F. ♀*

à fleurs en tête. *F. ♂*

SCIRPE.

1. Un seul épi.

articulé. *Inde. s. ch. ♀*

des marais. *F. ♀*

gazonnant. *F. ♂*

aiguille. *F. ♀*

flottant. *F. ♂*

ovale. *F. ♂*

des champs. *F. ♀*

2. Chaume cylindrique à plusieurs épis.

sétiforme. *F. ♀*

couché. *F. ♀*

lacustris L.
 holoschœnus L.
 romanus L.

3. *Culmo triquetro polystachyo.*

triqueter L.
 mucronatus L.
 maritimus L.
 sylvaticus L.
 annuus *All. ped.*
 umbellatus *Forsk. Fl.*
 dichotomus L.
 fimbriatilis dichotoma *Vahl.*
sp.

CYPERUS.

1. *Culmo tereti.*

junciformis *Desf. Atl.*
 articulatus L.

2. *Culmo triquetro.*

viscosus *Swartz. Prodr.*

longus L.

tenuiflorus *Jacq. Ic.*

rotundus L.

esculentus L.

vegetus *Vahl. sp.*

compressus *Jacq. Hort.*

patulus *Willd. Enum.*

strigosus *Willd. Enum.*

glomeratus *Willd. Enum.*

flavescens L.

fuscus L.

pannonicus *L. f.*

— papyrus L.

alternifolius L.

— *var.*

KILLINGIA

triceps L. f.

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

CINNA

arundinacea L.

Agrostis cinna *Willd. Enum.*

ANTHOXANTHUM

odoratum L.

des étangs. F. Ψ

à globules. F. Ψ

romain. F. Ψ

3. Chaume triangulaire à plusieurs épis

triangulaire. F. m. Ψ

piquant. F. m. or. Σ

maritime. F. Ψ

des bois. F. Σ

annuel. Italie. \odot

SOUCHET.

1. Chaume cylindrique.

junciforme. F. m. Ψ

articulé. Inde. s. ch. Σ

2. Chaume triangulaire.

visqueux. Antilles. Σ

odorant. F. Ψ (écon. méd.)

à petites fleurs. Σ

rond. F. Σ (méd.)

comestible. Égypte. or. Ψ

vert. Σ

étalé. Hongrie. Ψ

desséché. Virginie. Ψ

aggloméré. Italie. \odot

jaunâtre. F. Ψ

brun. F. Ψ

de Hongrie. Ψ

papyrus. Sicile. or. Σ

à feuil. alternes. Madagascar.

s. ch. Σ

KILLINGIA

à trois têtes. Antilles. s. ch. Σ

ORDRE IV.

GRAMINÉES.

CINNA

de Canada. Ψ

FLOUVE

odorante. F. Ψ .

amarum Brotero. Phyt. }
glaucum Vahl. sp. }

glaucue. Portugal. ℥

CRYPsis

aculeata H. K. }
schœnus mucronatus L. }
anthoxanthum aculeatum L. f. }
antitragus aculeatus. Gœrt. }
Fruct. }
Heleochloa aculeata Host. Gr. }
schœnoides H. K. }
phleum schœnoides L. }
Heleochloa schœnoides Host. }
Gram. }

CRYPsis

piquant. F. m. ψ

faux schœnus. F. m. ψ

CORNUCOPIÆ

cucullatum L.

CORNUCOPIÆ

en capuchon. orient. ⊙

ALOPECURUS

utriculatus Schrad. Germ. }
phalaris utriculata L. }
bulbosus L. }
agrestis L. }
pratensis L. }
arundinaceus Encycl. }
ventricosus Pers. syn. }
geniculatus L. }
gerardi Vill. Delph. }
phleum gerardi All. ped. }

ALOPÉCURE

à utricules. F. ⊙

bulbeux. F. ψ

des champs. F. ℥

des prés. F. ℥

arundinacé. F. ψ

geniculé. F. ψ

de Gérard. Alpes. ψ

PHLEUM

pratense L. }
nodosum L. }
alpinum L. }
echinatum Host. Gram. }
arenarium L. }
bellardii Willd. Enum. }
phalaris bulbosa L. }
phalaris cylindrica Dec. Fl. }
phleum tenue Schrad. Germ. }

FLÉAU

des prés. F. ℥

bulbeux. F. ℥

des Alpes. F. ψ

hérissé. F. ℥

des sables. F. ℥

de Bellardi. F. ℥

LEERSIA

oryzoides Willd. sp. }
phalaris oryzoides L. }

LÉERSIA

des marais. F. ℥

PHALARIS

aspera Retz. obs. }
phleum asperum Jacq. Ic. }
minor Retz. obs. }
canariensis L. }
paradoxa L. }

ALPISTE

rude. F. ⊙

mineure. orient. ⊙

des Canaries. ⊙

rongée. orient. ⊙

phleoides L.
 phleum boehemeri *schr. germ.* }
 mucronata.
 phleum phalaroides *vill.* }
delph.
 capensis *Thunb.*
 arundinacea L.
 — picta.

Fléau. F. ☞

à deux pointes. F. ☞

du Cap. or. ☞

roseau. F. ☞

— panachée.

BECKMANNIA

erucæformis *Host. Gr.* }
 phalaris erucæformis L. }

BECKMANNIA

chenillette. sibiérie. ⊙

PASPALUM

stoloniferum *Bosc. s. Lin. par.* }
 racemosum *Jacq. Ic.* }
 milium latifolium L. }
 membranaceum *Lamk. Ill.* }
 ceresia elegans *Willd. Enum.* }
 tenellum *Willd. Enum.*
 Kora *Willd. sp.*

PASPALUM

rampant. Pérou. ☞

membraneux. Pérou. s. ch. ☞

délicat. s. ch. ☞

Kora. inde. s. ch. ☞

CYNODON

dactylon. *Willd. Enum.* }
 panicum dactylon L. }

CYNODON

chiendent. F. ☞ (méd.)

DIGITARIA

sanguinalis *Willd. Enum.* }
 panicum sanguinale L. }

DIGITAIRE

sanguine. F. ☞

PANICUM.

1. Flores spicati.

verticillatum L.
 viride L.
 glaucum L.
 geniculatum *Willd. Enum.*
 maritimum *Encycl.*
 italicum L.
 germanicum *Willd. sp.*

1. Fleurs en épi.

verticillé. F. ⊙
 vert. F. ⊙
 glauque. F. ⊙
 coudé. Antilles. s. ch. ☞
 maritime. ⊙
 d'Italie. ⊙
 d'Allemagne. ⊙

2. Flores spicati, spicis pluribus.

crus-galli L.
 — aristatum.
 echinatum *Willd. Enum.*
 colonum L.

2. Plusieurs épis.

pied-de-poule. F. ⊙
 — barbu.
 hérissé. Am. m. ⊙
 tacheté. inde. ⊙

3. Flores paniculati.

sulcatum.
 plicatum *Lamk. Ill.* }
 plicatum *Willd. Enum.*

3. Fleurs en panicule.

sillonné. Antilles? s. ch. ☞
 plissé. inde. s. ch. ☞

— maximum vel polygamum.

Satague. Madag.

proliferum *encycl.*
 virgatum *L.*
 coloratum *L.*
 miliaceum *L.*
 — nigrum.
 capillare *L.*
 latifolium *L.*

LUDOLPHIA

glaucescens *willd. Enum.* }
 panicum arborescens *Lam. ill.* }

MILIUM

paradoxum *L.*
 effusum *L.*
 confertum *L.*
 multiflorum *schrad. Germ.* }
 agrostis miliacea *L.* }

GASTRIDIDIUM

lendigerum *Beauv. Agr.* }
 milium lendigerum *L.* }

AGROSTIS.

1. *Aristata.*

spica-venti *L.*
 interrupta *L.*
 retrofracta *willd. Enum.* }
 debilis *encycl. suppl.* }
 racemosa *Mich. Am.*

2. *Mutica.*

foliosa *Mertens.*
 stolonifera *L.*
 alba *L.*
 vulgaris *Smith. Fl.* }
 capillaris *Leers. Herb.* }
 dulcis.
 serotina *L.*
 pumila *L.*
 pungens *L.*
 mexicana *L.*
 tenacissima *Jacq. Ic.*

TRICHODIUM

caninum *schrad. Germ.* }
 agrostis canina *L.* }
 laxiflorum *Mich. Fl.* }
 agrostis cornucopiæ *Lam. ill.* }
 decumbens *Mich. Fl.*

prolifere. *Am. s. ℥*
 effilé. *Am. s. ℥*
 coloré. *Égypte. ☉*
 millet. *Inde. ☉ (écon.)*
 — noir.
 capillaire. *Am. s. ☉*
 à larg. feuell. *Am. m. s. ch. ♃*

LUDOLPHIA

glauque. *Inde. s. ch. ♃*

MIL

noir. *F. ℥*
 étalé. *F. ℥*
 ramassé. *F. ♃*
 à fleurs nombreuses. *F. ℥*

GASTRIDIDIUM

tuberculeux. *F. ☉*

AGROSTIS.

2. Fleurs garnies d'arêtes.

des moissons. *F. ☉*
 interrompu. *F. ☉*
 recourbé. *N. Holl. ℥*
 à grappes. *Am. s. ♃*

2. Fleurs sans arêtes.

feuillu. *℥*
 traçant. *F. ♃*
 blanc. *F. ℥*
 commun. *F. ♃*
 doux. orient. *☉*
 d'automne. *F. m. ♃*
 nain. *F. ℥*
 piquant. *F. m. ℥*
 du Mexique. *♃*
 à feuell. dures. *Inde. s. ch. ♃*

TRICHODIUM

des chiens. *F. ♃*
 à fleurs lâches. *Caroline.*
 tombant. *Am. s. ℥*

CHAMAGROSTIS

minima *schrad. germ.*
 Agrostis minima *L.*
 Knappia agrostidea *smith. fl.* }

CHAMAGROSTIS

filiforme. *F.* ☉

POLYPOGON

monspeliensis *Desf. Atl.*
 Alopecurus monspeliensis *L.*
 subspicatus *Willd. Enum.*
 chæturus subspicatus *Beauv. Gram.* }

POLYPOGON

de Montpellier. ☉

de Portugal. ☉

STIPA

capillata *Willd. sp.*
 pennata *L.*
 conferta.
 Aristella *Willd.*
 juncea *L.*
 tenacissima *L.*
 tortilis *Desf. Atl.*

STIPA

chevelu. *F.* ☿
 plumeux. *F.* ☿
 à fleurs serrées. ☿
 à petites barbes. *F.* ☿
 jonciforme. *F.* ☿
 spart. esp. or. ☿
 tordu. barbarie. ☿

ARISTIDA

cærulescens *Desf. Atl.*
 canariensis *Willd. Enum.* }

ARISTIDA

bleuâtre. barbarie. ☉

SACCHARUM

— officinarum *L.*
 — violaceum.
 cylindricum *Lamk. Ill.*
 imperata cylindrica *Beauv. Agrost.*
 Lagurus cylindricus *L.* }

SUCRE

officinal. inde. ☿ (écon.)
 — violet.

cylindrique. *F. m. or* ☿

ERIANTHUS

saccharoides *Mich. fl.*
 ravennæ *Beauv. Agr.*
 andropogon ravennæ *L.* }

ERIANTHUS

faux sucre. caroline. or. ☿
 de Ravenne. *F. m. or.* ☿

LAGURUS

ovatus *L.*

LAGURUS

ovale. *F. m.* ☉

PENICILLARIA

spicata *Willd. Enum.*
 Holcus spicatus *L.* }

PÉNICILLAIRE

en épi. inde. ☉ (écon.)

SORGHUM

vulgare *Willd. Enum.*
 cernuum *Willd. Enum.*
 saccharatum *Willd. Enum.*
 cafrorum *Willd. Enum.*
 halepense *L.*
 Holcus halepensis *L.* }

SORGHO

commun. inde. ☉ (écon.)
 penché. ☉ (écon.)
 sucré. inde. ☉ (écon.)
 des Cafres. Afr. ☉ (écon.)
 d' Alep. ☉

HOLCUS

lanatus L.
mollis L.

ANDROPOGON

Allionii *Decand. Fl.* }
contortum *Allion. (non Lin.)* }
provinciale *Encycl.*
ischœmum L.
annulatum *Vahl. symb.*
nardus *Pers. syn.* }
citriodorum. }
strictum *Host. Gr.*
hirtum L.
distachyon L.
Gryllus L.
— schoenanthus L.
macrouros *Mich. Fl.*

Antheum nunc a tenui vel andropogon.

CHLORIS

petræa *Swartz. Prodr.*
ciliata *Swartz. Prodr.*
scoparia. }
cynosurus scoparius *Encycl.* }
radiata *Swartz Prodr.* }
Agrostis radiata L. }
Andropogon fasciculatum L. }
ex *Swartz.*

CHONDROSUM *Willd. Mss.*

tenuè *Willd. Mss.* }
chloris filiformis *Encycl. sup.* }
chloris gracilis *Durand. Diss.*

TRIPSACUM

dactyloides L.
hermaphroditum L. }
Antephora elegans *Schreb. Gr.*

TRAGUS

racemosus *Desf. Atl.* }
cenchrus racemosus L. }
Lappago racemosa *Willd. sp.*

CENCHRUS

— echinatus L.
ciliaris L. }
pennisetum cenchroides *Pers.*

HOLCUS

laineux. F. ☞
velouté. F. ☞

ANDROPOGON

d'Allioni. F. ☞
de Provence. F. m. ☞
digité. F. ☞
annulaire. Égypte. or. ☞
odorant. île de F. s. ch. ☞
serré. Hongrie. ☞
hérissé. F. m. or. ☞
à deux épis. F. m. or. ☞
paniculé. F. ☞
jonc odorant. inde. s. ch. ☞
à grande panicule. caroline.
— or. ☞

CHLORIS

des rochers. Antilles. s. ch. ☞
ciliée. Antilles. s. ch. ☞
à balais. inde. ☉
rayonnante. inde. ☉

CHONDROSUM

filiforme. Mexique.

TRIPSACUM

monoïque. Am. s. ☞
hermaphrodite. Antilles. ☉

TRAGUS

à grappes. F. ☉

CENCHRUS

hérissé. Antilles. ☉
cilié. cap. ☉

ECHINARIA

capitata *Desf. Atl.*
 cenchrus capitatus *L.*
 sesleria echinata *Schrad. Ger.* }

ÆGILOPS

ovata *L.*
 triuncialis *L.*
 squarrosa *L.*

ROTTBOELLIA

incurvata *L.*
 pannonica *Host. Gr.* }
 biflora *Pers. syn.* }
 monandra *Schrad. Germ.* }
 nardus aristata *L.* }

AIRA

cæspitosa *L.*
 flexuosa *L.*
 juncea *Vill. Delph.*
 deschampsia juncea *Beauv.* }
Agrost. }
 caryophyllea *L.*
 præcox *L.*
 minuta *L.*
 canescens *L.*
 corynophorus canescens }
Beauv. Agrost. }
 pubescens *Vahl. symb.* }

CATABROSA

aquatica *Beauv. Agrost.* }
 aira aquatica *L.* }

MELICA

ciliata *L.*
 pyramidalis *Lamk. Ill.*
 bauhini *Willd. Enum.*
 uniflora *Retz. obs.* }
 lobelii *Vill. Delph.* }
 nutans *L.*
 montana *Dec. Fl.* }
 altissima *L.*

MOLINIA

cœrulea *Beauv. Agrost.* }
 melica cœrulea *L.* }

SPARTINA

cynosuroides *Beauv. Agrost.* }
 trachynotia cynosuroides }
Mich. Fl. }
 dactylis cynosuroides *L.* }

ECHINARIA

à fl. en tête. *F. m.* ☉

ÆGILOPS

ovale. *F.* ☉
 à longs épis. *F.* ☉
 rude. *Barbarie.* ☉

ROTTBOELLIA

arqué. *F.* ☉
 de Hongrie. ☉

à une étamine. *F.* ☿

AIRA

touffu. *F.* ☿
 tortueux. *F.* ☿

jonciforme. *Alpes.* ☿

étalé. *F.* ☉
 printanier. *F.* ☉
 filiforme. *Esp.* ☉.

blanchâtre. *F.* ☉

pubescent. *F. m.* ☉

CATABROSA

aquatique. *F.* ☿

MÉLICA

cilié. *F.* ☿
 pyramidal. *F. m. or.* ☿
 de Bauhin. *F.* ☿

à une fleur. *F.*

à fleurs penchées. *F.* ☿

élevé. *Sibérie.* ☿

MOLINIA

bleuâtre. *F.* ☿

SPARTINA

faux cynosurus. *Am. s.* ☿

DACTYLIS

glomerata L.

SESLERIA

cœrulea *Arduin. spec.* }
 cynosurus cœruleus L. }
 elongata *Host. Gr.*

DINEBA

ægyptiaca *Delile Fl.* }
 dactylis paspaloides *Willd.* }
Enum. }
 curtipendula *Beauv. Agrost.* }
 chloris curtipendula *Mich.* }
Fl.

CYNOSURUS

cristatus L.
 echinatus L.
 durus L.

LAMARCKIA

aurea *Dec. Fl.* }
 cynosurus aureus L. }
 chrysurus cynosuroides *Pers.* }
syn.

ELEUSINE

ægyptia. }
 cynosurus ægyptius L. }
 — { indica *Lamk. Ill.* }
 cynosurus indicus L. }
 coracana *Lamk. Ill.* }
 cynosurus coracanus L. }

LOLIUM

temulentum L.
 perenne L.
 — tenue.

ELYMUS

arenarius L.
 giganteus *Vahl. symb.* }
 racemosus *Lamk. Ill.* }
 virginicus L.
 sibiricus *Schr. Gram.* }
 tener L. f. ? }
 canadensis L.
 glaucifolius *Willd. Enum.*
 ramosus.
 europæus L.
 hordeiformis.

DACTYLIS

aggloméré. F. ψ

SESLERIA

bleuâtre. F. ψ
 à longs épis. Allem. ζ

DINEBA

d'Égypte. ⊙
 à fleurs pendantes. Am. s. ψ

CRETELLE

des prés. F. ψ
 hérissée. F. ⊙
 roide. F. ⊙

LAMARCKIA

jaune. F. m. ⊙

ELEUSINE

d'Égypte. ⊙
 des Indes. ⊙
 coracan. barbarie. ⊙

LOLIUM

ivraie. F. ⊙
 Raygrass. F. ψ
 — grêle.

ELYME

des sables. F. ζ
 gigantesque. ψ
 de Virginie. ζ
 de Sibérie. ψ
 de Canada. ψ
 glauque. Am. s. ζ
 rameux. ζ
 d'Europe. F. ψ
 épi d'orge. ψ

ASPRELLA

hystrix *Willd. Enum.* }
 elymus hystrix *L.* }

HORDEUM

vulgare *L.*
 — cœleste.
 hexastichon *L.*
 zeocriton *L.*
 distichon *L.*
 — nudum.
 maritimum *L.*
 secalinum *L.*
 murinum *L.*
 jubatum *L.*

TRITICUM

vulgare *Willd. Enum.*
 — hybernum.
 compositum *L. f.*
 durum *Desf. Atl.*
 spelta *L.*
 zea *Host. Gr.*
 monococcum *L.*
 polonicum *L.*
 cristatum *Pers. syn.*
 junceum *L.*
 rigidum *Schrad. Germ.* }
 elongatum *Host. Gram.* }
 repens *L.*
 — aristatum.
 caninum *L.*
 glaucum.
 prostratum *L. f.*
 patulum *Willd. Enum.* }
 secale pungens *Pers. syn.* }
 poa *Dec. Fl.*
 nardus *Dec. Fl.*
 unilaterale *L.*

SECALE

cereale *L.*
 villosum *L.*

BROMUS

mollis *L.*
 parviflorus.
 lanceolatus *Roth. Cat.*
 grossus.
 secalinus *L. (ex Swartz.)* }

ASPRELLA

divergent. orient. ℥

ORGE

commune. Russie. ⊙ (écon.)
 — *nue.*
hexagone. ⊙ (écon.)
éventail. ⊙ (écon.)
à deux rangs. Russie. (écon.)
 — *nue.*
maritime. F. ⊙
des prés. F. ⊙
des murailles. F. ⊙
chevelue. syrie. ⊙

FROMENT

cultivé. ⊙ (écon.)
 — *d'hiver.*
rameux. ⊙ (écon.)
corné. ⊙ (écon.)
épeautre. ⊙ (écon.)
zea. ⊙ (écon.)
monosperme. ⊙ (écon.)
de Pologne. ⊙ (écon.)
à crêtes. ℥
jonciforme. F. ℥
rude. Autriche. ℥
chiendent. F. ℥
 — *barbu.*
des chiens. F. ℥
glaucue. ℥
couché. Sibérie. ⊙
étalé. Égypte. ⊙
poa. F. ⊙
filiforme. F. ⊙
unilatéral. F. ⊙

SEIGLE

cultivé. ⊙ (écon.)
cilié. orient. ⊙

BROME

velu. F. ⊙
à petites fleurs. ⊙
lancéolé. orient. ⊙
à gros épis. F. ⊙

squarrosus L.
 dumetorum Lamk. ill. }
 asper L. f. }
 arvensis L.
 sterilis L.
 maximus Desf. Atl.
 madritensis L. }
 gynandrus Roth. cat. }
 tectorum L.
 pendulinus.
 commutatus Schrad. Germ. ? }
 giganteus L.
 pratensis Lamk. ill. }
 perennis Vill. Delph. }
 erectus Schrad. Germ. }
 purgans L.
 purpurascens Delile. Fl.
 rubens L.
 inermis Willd. sp.

FESTUCA

pinnata.
 Bromus pinnatus L. }
 Triticum pinnatum Dec. Fl. }
 sylvatica. }
 Bromus sylvaticus Lamk. ill. }
 Festuca gracilis Schrad. Germ. }
 Triticum sylvaticum Dec. Fl. }
 scabra Zea.
 distachyos. }
 Bromus distachyos L. }
 stipoides Desf. Atl. }
 Bromus stipoides L. }
 Bromoides L.
 ovina L.
 capillata Lamk. ill.
 tenella Willd. sp.
 heterophylla Lamk. ill.
 rubra L.
 duriuscula L.
 glauca Lamk. ill.
 dumetorum L.
 pratensis Schrad. Germ. }
 loliacea Dec. Fl. }
 elatior Lamk. ill. }
 varia Host. Gram.
 elatior Schrad. Germ. }
 arundinacea Vill. Delph. }
 loliacea Lamk. ill.

rude. F. ⊙
 des buissons. F. ♄
 des champs. F. ⊙
 stérile. F. ⊙
 à grands épis. F. ⊙
 de Madrid. ⊙
 des toits. F. ⊙
 pendant. ⊙
 gigantesque. F. ♄
 des prés. F. ♄
 purgatif. Canada. ♄
 pourpre. F. m. ⊙
 rougeâtre. F. ⊙
 sans arêtes. F. Alpes. ♄

FESTUCA

penné. F. ♄
 des bois. F. ♄
 rude. ⊙
 à deux épis. F. m. ⊙
 stipoïde. F. m. ⊙
 bromoïde. F. ♄
 des moutons. F. ♄
 capillaire. F. ♄
 à feuilles menues. Alm. s. ♄
 à feuilles variables. F. ♄
 rouge. F. ♄
 à feuilles dures. F. ♄
 glauque. F. ♄
 des buissons. F. ♄
 des prés. F. ♄
 panaché. F. ♄
 élevé. F. ♄

myuros L.
 uniglumis Willd. sp.
 spadicea Willd. sp.
 diandra Mich. Fl.
 unioloïdes Willd. H. Ber.
 alopecuros Willd. Enum.
 fascicularis Lamk. ill. }
 polystachya Mich. Fl. }
 virgata Lamk. ill.
 calycina L.
 divaricata Desf. Atl.
 phleoides Will. Delph.

DANTHONIA

decumbens Dec. Fl.
 Festuca decumbens L.
 triodia decumbens Beauv. }
 Agrost.

POA

fluitans Schrad. Germ. }
 Festuca fluitans L. }
 aquatica L.
 alpina L.
 molinerii Balbis Miscell. }
 badensis Willd. sp. }
 bulbosa L.
 seslerioides Mich. Fl.
 cenisii Allion. Auct.
 cæsia Smith. Fl.
 trivialis L.
 angustifolia L.
 debilis Encycl.
 pratensis L.
 trinervata Dec. Fl. }
 sylvatica Pollich. Palat. }
 pilosa L.
 annua L.
 compressa L.
 nemoralis L.
 rariflora.
 ægyptiaca Willd. Enum.
 rigida L.
 procumbens Smith. Fl.
 maritima Willd. sp.
 cristata Willd. sp.
 peruviana Jacq. Ic.
 glomerata.
 elongata Willd. Enum. }

myuros. F. ♂
 à une seule valve. F. ⊙
 jaune. Alpes. ℥
 à deux étamines. Am. S. ℥
 unioloïde. Caroline. ⊙
 plumeux. Maroc. ⊙
 fasciculé. Am. S. ℥
 effilé. Antilles. ⊙
 à grand calice. Esp. ⊙
 étalé. Barbarie. ⊙
 fléau. Alpes. ℥

DANTHONIA

incliné. F. ℥

POA

flottant. F. ℥ (écon.)
 aquatique. F. ℥
 des Alpes. F. ℥
 de Molineri. Alpes. ℥
 bulbifère. F. ℥
 sésleriôide. Am. S. ℥
 du mont Cénis. ℥
 bleuâtre. Écosse. ℥
 commun. F. ℥
 à feuilles étroites. F. ℥
 foible. F. ℥
 des prés. F. ℥
 à trois nervures.
 velu. F. ℥
 annuel. F. ⊙
 comprimé. F. ℥
 des bois. F. ℥
 à fleurs rares. F. ℥
 d'Égypte. ⊙
 roide. F. ℥
 tombant. Angleterre. ⊙
 maritime. F. ℥
 à crêtes. F. ℥
 du Pérou. ⊙
 aggloméré. Inde. S. Ch. ℥

retroflexa *curtis. Lond.* }
 distans. }
 striata *Lamk. ill.* }
 nervata *willd. sp.* }
 glauca *willd. Enum.*
 abyssinica *L.*
 capillaris *L.*
 tenella *L.*
 ciliaris *L.*
 sicula *Jacq. obs.*
 megastachya *Kœler. Gram.* }
 BRIZA ERAGROSTIS *L.* }

recourbé. *F. ℥*
 strié. *Am. s. ♀*
 glauque. ♀
 d'Abyssinie. ⊙
 capillaire. *Am. s. ⊙*
 délicat. *Inde. ⊙*
 cilié. *Antilles. ⊙*
 de Sicile. ⊙
 ERAGROSTIS. *F. ⊙*

BRIZA

minor *L.*
 media *L.*
 maxima *L.*

BRIZA

triangulaire. *F. ⊙*
 des prés. *F. ♀*
 à grandes fleurs. *F. ⊙*

UNIOLA

latifolia *Mich. Fl.*

UNIOLE

à larges feuilles. *Am. s. ♀*

AVENA

elatior *L.*
 — nodosa.
 striata *Lamk. ill.*
 sativa *L.*
 — nuda.
 orientalis *willd. sp.*
 brevis *willd. sp.*
 fatua *L.*
 sterilis *L.*
 pubescens *L.*
 pratensis *L.*
 bromoides *L.*
 distichophylla *vill. Delph.*
 flavescens *L.*
 panicea *Lamk. ill.*
 fragilis *L.*

AVOINE

Fromental. *F. ℥*
 — bulbeuse.
 striée. *F. Alpes. ℥*
 cultivée. ⊙ (écon.)
 — sans barbes.
 d'Orient. ⊙
 courte. *Brême. ⊙*
 Avron. *F. ⊙*
 stérile. *F. ⊙*
 pubescente. *F. ℥*
 des prés. *F. ℥*
 bromoïde. *F. ℥*
 distique. *F. Alpes. ♀*
 jaunâtre. *F. ♀*
 panis. *F. ⊙*
 fragile. *F. ⊙*

anthistemon bita

ARUNDO.

1. Calix multiflorus.

donax *L.*
 — variegata.
 phragmitis *L.*

2. Calix uniflorus.

epigeios *L.*
 calamagrostis epigeios *roth.* }
 Germ.

— bambou.

ROSEAU.

1. Calice à plusieurs fleurs.

à quenouille. *F. m. ♀* (écon.)
 — panaché.
 à balais. *F. ℥*

2. Calice à une fleur.

épigeios. *F. ℥*

bambou. Inde, Madagascar.

calamagrostis L.	}	<i>plumeux. F. ℥</i>
calamagrostis lanceolata Roth. germ.		
arenaria L.	}	<i>des sables. F. ℥</i>
calamagrostis arenaria Roth. germ.		
ORYZA		RIZ
saliva L.		cultivé. inde. ☉ (écon.)
EHRHARTA		EHRHARTA
panicea Willd. sp.		à fleurs de panis. cap. or. ♀
NARDUS		NARD
stricta L.		serré. F. ℥
LYGEUM		LYGEUM
spartum L.		sparte. F. m. or. ♀ (écon.)
ZEA		ZEA
— maïs L.		maïs. pérou. ☉ (écon.)
COIX		COIX
— lacryma L.		larme de Job. inde. ☉

CLASSIS III.

CLASSE III.

MONOCOTYLEDONES.

MONOCOTYLÉDONS.

*(stamina perigyna).**(étamines attachées au calice).*

ORDO I.

ORDRE I.

PALMÆ.

PALMIERS.

I. Fronde pinnatá.

I. Feuilles pennées.

PHOENIX

dactylifera L.

— Ricca alba vel pinnata.

DATTIER

cultivé. Afr. s. ch. ♀ (écon.)

Chou palmiste.

CARYOTA

urens L.

— Cocos, macaranga.

CARYOTA

brûlant. inde. s. ch. ♀

— Cocos, macaranga.

II. Fronde palmatá.

II. Feuilles palmées.

CHAMÆROPS

humilis L.

hystrix (an generis?).

CHAMÆROPS

commun. barb. or. ♀ (écon.)

hystrix. s. ch. ♀

SABAL

Adansonii Guers. s. Philom.

chamærops acaulis Mich. fl.

corypha minor Jacq. hort.

SABAL

d'Adanson. Am. s. or. ♀

LATANIA

chinensis Jacq. Frag. }
borbonica Willd. sp. }

RHAPIS

flabelliformis Willd. sp.

ORDO II.

ASPARAGINEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

DRACÆNA

draco L. s. veg.

— *terminalis Jacq. Ic.*
marginata Encycl.

reflexa Encycl. }
cernua Jacq. H. sch. }
umbraculifera Jacq. H. sch.

DIANELLA

nemorosa Encycl. }
dracæna ensifolia Willd. sp. }
cœrulea Bot. Mag.

ASPARAGUS

tenuifolius Encycl.
officinalis L.

— *maritimus.*

decumbens Jacq. H. sch. }
crispus Encycl. }

mauritanus.

retrofractus L.

asiaticus L.

pectinatus Red. Lil.

albus L.

acutifolius L.

aphyllus L.

— *horridus.*

capensis L.

sarmentosus L.

MEDEOLA

asparagoides L.

TRILLIUM

sessile L.

PARIS

quadrifolia L.

LATANIER

de Chine. s. ch. ♪

RHAPIS

éventail. chine. s. ch. ♪

ORDRE II.

ASPARAGINÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

DRACÆNA

sang-drag. can. s. ch. ♪ (méd.)

pourpre. chine. s. ch. ♪

à bords rouges. madagascar.
s. ch. ♪

recourbé. île de France. s. ch. ♪

en parasol. inde. s. ch. ♪

DIANELLE

des bois. inde. s. ch. ♪

bleue. N. Holl. s. ch. ♪

ASPERGE

à feuilles menues. F. ♪

officinale. F. (écon.)

— *maritime.*

tombante. cap. s. ch. ♪

de l'île de France. s. ch. ♪

coudée. cap. s. ch. ♪

d'Asie. s. ch. ♪

pectinée. or. ♪

blanche. orient. or. ♪

à feuilles aiguës. F. m. or. ♪

sans feuilles. orient. or. ♪

— *hérissée.*

du Cap. s. ch. ♪

sarmenteuse. ceylan. s. ch. ♪

MEDEOLA

sarmenteux. cap. s. ch. ♪

TRILLIUM

sessile. Am. s. ♪

PARISETTE

à quatre feuilles. F. ♪

CONVALLARIA

maialis L.
japonica Thunb. Jap.
ophiopogon japonicus Bot.
mag. }

POLYGONATUM

vulgare Desf. Ann. }
convallaria polygonatum L. }
multiflorum Desf. Ann. }
convallaria multiflora L. }
verticillatum Desf. Ann. }
convallaria verticillata L. }

SMILACINA

racemosa Desf. Ann. }
convallaria racemosa L. }
stellata Desf. Ann. }
convallaria stellata L. }

MAIANTHEMUM

bifolium Desf. Ann. }
convallaria bifolia L. }

II. Flores unisexuales.

RUSCUS

aculeatus L.
hypophyllum L.
hypoglossum L.
androgynus L.
racemosus L.

SMILAX.

1. Caule aculeato, fruticoso.

aspera L.
oblongata Swartz. Prodr.
mauritanica Desf. Atl.
excelsa? L.
horrida.
laurifolia L.
rotundifolia Mich. Fl.
glauca Mich. Fl.
pubera Mich. Fl.

2. Caule herbaceo.

herbacea L.

RAJANIA

cordata L.

MUGUET

de mai. F. Ψ (orn.)

du Japon. or. Ψ

SCEAU-DE-SALOMON

commun. F. Ψ

à plusieurs fleurs. F. Ψ

verticillé. F. Ψ

SMILACINA

à grappes. Am. s. Ψ

étoilé. Am. s. Ψ

MAIANTHEMUM

à deux feuilles. F. Ψ

II. Fleurs unisexuelles.

FRAGON

épineux. F. ♀ (méd.)
sans foliole. Italie. or. ♀
à foliole. Italie. or. ♀
androgyné. Canaries. or. ♀
à grappes. Italie. ♀

SMILAX.

1. Tige épineuse, ligneuse.

rude. F. m. or. ♀ (méd.)
à feuil. oblong. Antill. s. ch. ♀
de Mauritanie. Alger. or. ♀
élevé. orient. or. ♀
hérissé. Am. s. or. ♀
à feuilles de Laurier. Am. s. ♀
à feuilles rondes. Am. s. ♀
glauque. Am. s. ♀
velu. Am. s. ♀

2. Tige herbacée.

herbacé. Am. s. Ψ

RAJANIA

à feuil. en cœur. Ant. s. ch. ♀

III. Flores unisexuales, ovarium semi-inferum.

DIOSCOREA *Selinari*
villosa L.
alata L.

TAMNUS *bulbiferus*
communis L.

ORDO III.

JUNCEÆ.

APHYLLANTHES
monspeliensis L.

LOMANDRA
longifolia Bill. N. holl.

JUNCUS.

1. Culmo nudo.

acutus L.
maritimus *Encycl.*
conglomeratus L.
effusus L.
glaucus *Willd. sp.*
australis.
trifidus L.
squarrosus L.

2. Culmo folioso.

articulatus L.
sylvaticus *Willd. sp.*
bulbosus L.
tenageia L. f.
bufonius L.

LUZULA

nivea *Dec. Fl.* }
juncus niveus L. }
campestris *Dec. Fl.* }
juncus campestris L. }
pilosa. }
vernalis *Dec. Fl.* }
juncus pilosus L. }
maxima *Dec. Fl.* }
juncus maximus *Willd. sp.* }
compacta. }
pediformis *Dec. Fl.* }
juncus pediform. *Will. Delph.* }

III. Fleurs unisexuelles, ovaire moitié infère.

IGNAME *Amure*
velue. Am. s. ℥
ailée. inde. s. ch. ψ (alim.)

TAMNE *bulbifère*
commun. F. ψ (méd.)

ORDRE III.

JONCÉES.

APHYLLANTHES
de Montpellier. F. m. or, ℥
(écon.)

LOMANDRA
à feuilles long. N. holl, or. ψ.

JONC.

1. Chaume nu.

aigu. F. ψ
maritime. F. ψ
aggloméré. F. ℥
étalé. F. ℥
glauque. F. ψ
de la N. Hollande. or. ψ
trifide. Alpes. ψ
rude. F. ψ

2. Chaume garni de feuilles.

articulé. F. ℥
des bois. F. ψ
bulbeux. F. ℥
à fleurs sessiles. F. ψ
dichotôme. F. ψ

LUZULA

à fleurs blanches. F. ψ.
des champs. F. ℥
velu. F. ℥
à larges feuilles. F. ψ
à fleurs en tête. F. ℥
en grappe. Alpes. ℥

ORDO IV.

COMMELINEÆ.

COMMELINA.

1. Petala inæqualia.

communis L.

africana L.

erecta L.

pallida Willd. H. Ber. }

rubens Red. Lil. }

— benghalensis L.

caroliniana Willd. Enum.

2. Petala æqualia aut sub-æqualia.

virginica L.

dianthifolia Red. Lil.

tuberosa L.

cristata L.

Tradescantia cristata Willd. sp. }

zanonia L. }

Tradescantia zanonia Willd. sp. }

TRADESCANTIA

virginica L.

erecta Jacq. Ic.

rosea Mich. Fl.

discolor Smith Ic.

ORDO V.

ALISMACEÆ.

BUTOMUS

umbellatus L.

ALISMA

plantago L.

ranunculoides L.

natans L.

damasonium L.

SAGITTARIA

sagittifolia L.

SCHEUCHZERIA

palustris L.

TRIGLOCHIN

palustre L.

maritimum L.

ORDRE IV.

COMMÉLINÉES.

COMMÉLINE.

1. Pétales inégaux.

commune. Am. ☉

d'Afrique. cap. s. ch. ☿

droite. virginie. ☿

à fleurs pâles. s. ch. ☿

du Bengale. s. ch. ☿

de Caroline. or. ☿

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. ☿

à feuilles d'œillet. s. ch. ☿

tubéreuse. mexique. s. ch. ☿

à crête. ceylan. ☉

à fruit mou. Antilles. s. ch. ☿

ÉPHÉMÈRE

de Virginie. ☿ (orn.)

à tige droite. mexique. ☉

rose. Am. s. ☿

de deux coul. Am. m. s. ch. ☿

ORDRE V.

ALISMACÉES.

BUTOME

ombellifère. F. ☿ (orn.)

ALISMA

plantain-d'eau. F. ☿

renoncule. F. ☿

flottant. F. ☿

étoilé. F. ☿

FLÉCHIÈRE

aquatique. F. ☿

SCHEUCHZERIA

des marais. F. ☿

TRIGLOCHIN

des marais. F. ☿

maritime. F. ☿

ORDO VI.

COLCHICACEÆ.

NARTHECIUM

caliculatum *Lamk. ill.*
 anthericum caliculatum *L.*
 toffieldia palustris *Dec. Fl.*
 helonias borealis *Willd. sp.* }

HELONIAS

bullata *L.*

VERATRUM

album *L.*
 nigrum *L.*

COLCHICUM

autumnale *L.*
 variegatum *L.*
 montanum *L.*

MERENDERA

bulbocodium *Ram. Bul. Phil.*

ORDO VII.

LILIACEÆ.

TULIPA

sylvestris *L.*
 suaveolens *Roth. Cat.*
 oculus-solis *Red. Lil.*
 gesneriana *L.*

ERYTHRONIUM

dens-canis *L.*

METHONICA

superba.
 gloriosa superba *L.* }

UVULARIA

amplexifolia *L.*
 perfoliata *L.*

FRITILLARIA

imperialis *L.*
 persica *L.*
 meleagris *L.*
 latifolia *Red. Lil.*

ORDRE VI.

COLCHICACÉES.

NARTEC

caliculé. *F. ℥*

HELONIAS

à fleurs roses. *Am. s. ψ*

VERATRUM

blanc. *F. (vénén.)*
 noir. *Sibérie. ℥*

COLCHIQUE

d'automne. *F. ℥*
 panaché. *Orient. ℥ (orn.)*
 de montagne. *Alpes. ψ*

MERENDERA

bulbocodium. *Pyénées. ψ*

ORDRE VII.

LILIACÉES.

TULIPE

sauvage. *F. ψ*
 odorante. *Asie. ψ (orn.)*
 œil-de-soleil. *F. m. ψ (orn.)*
 des jardins. *Orient. ψ (orn.)*

ERYTHRONIUM

dent-de-chien. *Alpes. ψ*

METHONICA

superbe de Malabar. *Inde.*
 s. ch. *(orn.)*

UVULAIRE

des Alpes. *F. ℥*
 perfoliée. *Am. s. ℥*

FRITILLAIRE

couronne-impériale. *Asie. ℥*
(orn.)
 de Perse. *℥*
 panachée. *F. ℥ (orn.)*
 à larges feuilles. *℥*

LILIUM

candidum L.
 bulbiferum L.
 croceum.
 tigrinum Bot. Mag.
 pomponium L.
 pyrenaicum Gouan. Ill.
 martagon L.
 chalcedonicum L.
 pumilum Red. Lil.
 philadelphicum L.
 superbium L.
 canadense Red. Lil. }
 penduliflorum Red. Lil. }

YUCCA

gloriosa L.
 aloifolia L.
 draconis L.
 filamentosa L.
 boschii (an yucca?)

SANSEVIERA

zeylanica Willd. sp.
 guineensis Willd. sp.
 carnea Willd. Enum.

ALETRIS

fragrans
 dracena fragrans Bot. Mag. }

VELTHEIMIA

capensis.
 viridiflora Willd. sp. }
 Aletris capensis L. }
 glauca Jacq. H. Sch.

TRITOMA

uvaria Red. Lil. }
 Aletris uvaria L. }
 veltheimia uvaria Willd. sp. }
 sarmentosa.
 media Red. Lil. }
 Aletris sarmentosa Andr. Rep. }

PITCAIRNIA

bromeliaefolia L'Her. sert.

angustifolia H. K.
 latifolia H. K.

ALOE

purpurea Encycl. }
 dracena marginata Willd. sp. }

LIS

blanc. Asie. \mathcal{L} (orn.)
 bulbifere. Suisse. \mathcal{L} (orn.)
 orangé. \mathcal{V} (orn.)
 tigré. Chine. or. \mathcal{L} (orn.)
 pomponien. F. m. \mathcal{V} (orn.)
 des Pyrénées. \mathcal{L} (orn.)
 martagon. F. (orn.)
 hémérocale. Asie. \mathcal{V} (orn.)
 nain. \mathcal{L} (orn.)
 de Philadelphie. \mathcal{V} (orn.)
 superbe. Am. s. \mathcal{L} (orn.)
 de Canada. \mathcal{V} (orn.)

YUCCA

à feuilles entières. Am. s. \mathcal{D}
 à feuell. d'aloès. caroline. or. \mathcal{D}
 à larges feuell. Am. m. s. ch. \mathcal{D}
 filamenteux. caroline. or. \mathcal{D}
 de Bosc. s. ch. \mathcal{D}

SANSEVIÉRA

de Ceylan. s. ch. \mathcal{V}
 de Guinée. s. ch. \mathcal{L}
 couleur de chair. Chine. or. \mathcal{L}

ALETRIS

odorant. cap. s. ch. \mathcal{D}

VELTHEIMIA

du Cap. or. \mathcal{V}

glauque. cap. s. ch. \mathcal{V}

TRITOMA

à grappe. cap. or. \mathcal{V}

sarmenteux. cap. or. \mathcal{V}

PITCAIRNIA

à feuilles d'ananas. Antilles.
 s. ch. \mathcal{V}

à feuell. étroit. Antill. s. ch. \mathcal{V}

à larg. feuell. inde. s. ch. \mathcal{V}

ALOÈS

à bords rouges. île de Bourbon.
 s. ch. \mathcal{D}

vulgaris *Dec. pl. gr.*
 abyssinica *Encycl.*
 paniculata *Jacq. Frag.*
 rubescens *Dec. pl. gr.*
 soccotrina *Dec. pl. gr.*
 fruticosa *Encycl.*
 arborescens *Dec. pl. gr.* }
 ferox *H. K.*
 mitræformis *Encycl.*
 — angustior.
 rhodacantha *Dec. pl. gr.*
 perfoliata. }
 serra *Dec. pl. gr.* }
 brevifolia *Dec. pl. gr.*
 humilis *L.*
 echinata *Willd. Enum.*
 umbellata *Dec. pl. gr.*
 maculata. }
 picta *Dec. pl. gr.* }
 tenuifolia *Encycl.*
 variegata *L.*
 nigricans.
 disticha *L.*
 — triangularis.
 — latifolia.
 carinata *Dec. pl. gr.*
 obliqua *Dec. pl. gr.*
 plicatilis *L.*
 spiralis *L.*
 viscosa *L.*
 retusa *L.*
 rigida *Dec. pl. gr.*
 pentagona *H. K.*
 margaritifera *L.*
 radula *Jacq. H. Sch.*
 cymbæfolia *Willd. Enum.*
 arachnoidea *L.*
 atrovirens *Dec. pl. gr.*

ANTHERICUM

frutescens *L.*
 alooides *L.*
 annuum *L.*

ECHEANDIA

terniflora *Red. Lil.* }
 (anthericum reflexum *Cav. Ic.*) }

PHALANGIUM (anthericum *L.*)

revolutum *L.*

commun. barbarie. *s. ch. ♃*
 d' Abyssinie. *s. ch. ♃*
 paniculé. *cap. s. ch. ♃*
 rougêtre. *inde. s. ch. ♃*
 soccotrin. *cap. s. ch. ♃*
 corne-de-belier. *cap. s. ch. ♃*
 hérissé. *cap. s. ch. ♃*
 mitré. *cap. s. ch. ♃*
 — à feuilles étroites.
 à épines rouges. *cap. s. ch. ♃*
 perfolié. *cap. s. ch. ♃*
 à feuilles courtes. *cap. s. ch. ♃*
 nain. *cap. s. ch. ♃*
 hérissé.
 ombellifère. *cap. s. ch. ♃*
 moucheté. *cap. s. ch. ♃*
 à feuell. minces. *cap. s. ch. ♃*
 perroquet. *cap. s. ch. ♃*
 vert-noir. *cap. s. ch. ♃*
 bec-de-canne. *cap. s. ch. ♃*
 — triangulaire. *cap. s. ch. ♃*
 — à larg. feuell. *cap. s. ch. ♃*
 tuberculeux. *cap. s. ch. ♃*
 oblique. *cap. s. ch. ♃*
 éventail. *cap. s. ch. ♃*
 en spirale. *cap. s. ch. ♃*
 visqueux. *cap. s. ch. ♃*
 écrasé. *cap. s. ch. ♃*
 à feuilles roides. *cap. s. ch. ♃*
 pentagone. *cap. s. ch. ♃*
 perlé. *cap. s. ch. ♃*
 radula. *cap. s. ch. ♃*
 en nacelle. *cap. s. ch. ♃*
 patte d'araignée. *cap. s. ch. ♃*
 vert-livide. *cap. s. ch. ♃*

ANTHÉRIC

arbrisseau. *cap. or. ♃*
 à feuell. d'Aloès. *cap. or. ♃*
 annuel. *cap. ☉*

ECHEANDIA

à fleurs ternées. *cuba. s. ch. ♃*

PHALANGIUM

recourbé. *cap. or. ♃*

ramosum L.
Liliago L.
Liliastrum L.

bicolor Desf. Atl.
milleflorum Red. Lil.
arthropodium paniculatum
Brown, prodr. }
pendulum Red. Lil.

ASPHODELUS

— luteus L.
capillaris Red. Lil.
tauricus Mars. cauc.
ramosus L.
spicatus.
fistulosus L.

EUCOMIS

undulata H. K.
regia Red. Lil.
punctata L'Her. sert.

MASSONIA

pustulata Red. Lil.
latifolia Jacq. H. Sch.
violacea Red. Lil.
polyanthes pygmaea Jacq. Ic. }
agapanthus ensifol. Willd. sp. }
mauhlia ensifolia Thunb. Pr. }

DRIMMIA

elata Jacq. Ic.

HYACINTHUS

non-scriptus L.
patulus. }
amethystinus Encycl. }
amethystinus L. }
hispanicus Encycl. }
romanus L.
serotinus L.
orientalis L.
viridis L.
Lachenalia viridis H. K. }
zuccagnia viridis Willd. En. }

MUSCARI

moschatum Willd. Enum.
comosum Willd. Enum.
— monstrosum.

rameux. F. ♀
à grappes. F. ♀
Lis de St. Bruno. Alpes. ♂
(orn.)
bicolor. F. ♂

mille-fleurs. N. Holl. or. ♂

à fl. pendantes. N. Holl. or. ♂

ASPHODÈLE

jaune. F. m. ♀
capillaire. or. ♀
de la Tauride. ♂
rameux. F. ♂
à grappe. F. m. ♀
fistuleux. F. m. ♂

EUCOMIS

ondulé. cap. or. ♂
couronné. cap. s. ch. ♀
tacheté. cap. s. ch. ♀

MASSONIA

pustuleux. cap. s. ch. ♂
à feuil. larg. cap. s. ch. ♀

à fleurs violettes. cap. s. ch. ♂

DRIMMIA

élevé. cap. or. ♂

JACINTE

des bois. F. ♂

étalée. ♀

améthyste. Pyrénées. ♂

de Rome. F. ♀

rouillée. Espagne. ♀

d'Orient. ♀ (orn.)

verte. cap. or. ♀

MUSCARI

odorant. orient. ♀ (orn.)

chevelu. F. ♀

— monstrueux. (orn.)

racemosum *Willd. Enum.*
 botryoides *Willd. Enum.*

PHORMIUM

tenax *Forster. Gen.*

LACHENALIA

pendula *Jacq. Ic.*
 lanceæfolia *Jacq. Ic.*
 pallida *Willd. sp.*
 tricolor *Jacq. Ic.*
 luteola *Jacq. Ic.*
 angustifolia *Jacq. Ic.*
 orchioides *Jacq. Ic.*

CYANELLA

capensis *L.*

ALBUCA

alba *Encycl.*
 cornuta *Red. Lil.* }
 major *L.*
 minor *L.*
 abyssinica *Jacq. Ic.*
 asphodelus abyssinicus *Enc.* }

SCILLA

maritima *L.*
 peruviana *L.*
 italica *L.*
 amœna *L.*
 liliohyacinthus *L.*
 pomeridiana *Dec. cat.*
 hyacinthoides *L.*
 bifolia *L.*
 undulata *Desf. Atl.*
 autumnalis *L.*

ERIOSPERMUM

lanceæfolium *Jacq. Ic.*

ORNITHOGALUM

luteum *L.*
 tenuifolium *Red. Lil.*
 pyrenaicum *L.*
 pyramidale *Willd. sp.*
 narbonense *L.*
 trigynum *Red. Lil.*
 lacteum *Jacq. Ic.*
 umbellatum *L.*
 nutans *L.*

à grappe. *F. Ψ*
 botryoïde. *F. Ψ*

PHORMIUM

Lin de la N. Zélande. *or. Ψ*
 (écon.)

LACHENALIA

à fleurs pendantes. *or. ℥*
 lancéolé. *cap. or. Ψ*
 à fleurs pâles. *cap. or. Ψ*
 tricolore. *cap. or. ℥*
 jaune. *cap. or. Ψ*
 à feuilles étroites. *cap. or. ℥*
 moucheté. *cap. or. Ψ*

CYANELLA

du Cap. *or. ℥*

ALBUCA

blanc. *cap. or. ℥*
 jaune. *cap. or. ℥*
 petit. *cap. or. ℥*
 d'Abyssinie. *s. ch. ℥*

SCILLE

maritime. *F. m. or. ℥ (méd.)*
 du Pérou. *pyrénées. ℥ (orn.)*
 d'Italie. *Ψ*
 agréable. *orient. ℥*
 Lis-jacinte. *F. Ψ*
 poméridienne. *F. ℥*
 Jacinte. *madère. or. Ψ*
 à deux feuilles. *F. Ψ*
 ondée. *tunis. or. Ψ*
 d'automne. *F. Ψ*

ERIOSPERME

lancéolé. *cap. or. Ψ*

ORNITHOGALE

jaune. *F. Ψ*
 à feuilles menues. *or. Ψ*
 des Pyrénées. *F. Ψ*
 pyramidal. *F. m. Ψ*
 de Narbonne. *F. ℥*
 à trois styles *℥*
 blanc de lait. *cap. or. ℥*
 ombellière. *F. Ψ*
 à fleurs penchées. *F. Ψ*

longibracteatum Jacq. Hort.
arabicum L.
thyrsoides H. K.

à longues bractées. cap. or. ℥
d'Arabie. Alger. or. ℥ (orn.)
en thyrses. cap. or. ℥ (orn.)

ALLIUM.

1. Folia teretia aut sub-teretia.

cepa L.
schœnoprasum L.
ascalonicum L.
glaucum. }
foliosum Dec. syn. }
globosum Red. Lil.
moschatum L.
obtusiflorum Red. Lil.
bisulcum Red. Lil.
flavum L.
vineale L.
sphærocephalum L.
pallens L.
paniculatum L.
lusitanicum Red. Lil.
longispathum Red. Lil.
oleraceum L.

2. Folia plana.

carinatum L.
angulosum L.
baicalense Willd. Enum.
roseum L.
— bulbiferum.
striatum Jacq. Ic.
denudatum Red. Lil.
cernuum Roth. Cat.
tartaricum L. f.
carolinianum Red. Lil.
album Red. Lil.
ciliare Red. Lil.
brachystemon Red. Lil.
subhirsutum L.
nutans L.
sativum L.
scorodoprasum L.
arenarium L.
obliquum L.
ampeloprasum L.
porrum L.
monsperullanum Couan ill.
victoralis L.

AIL.

1. Feuilles cylindriques ou presque cylindriques.

oignon. ♂ (écon. méd.)
civette. sibérie. ♀ (écon.)
échalotte. palest. ℥ (écon.)
glaucum. F. m. ℥
globuleux. caucase. ♀
musqué. F. ♀
à fleurs obtuses. corse. or. ℥
à deux sillons. ♀
jaune. F. ♀
des vignes. F. ♀
à tête ronde. F. ℥
à fleurs pâles. F. ♀
paniculé. suisse. ♀
de Portugal. ♀
à long spathe. F. ♀
verdâtre. F. ♀

2. Feuilles plates.

en carène. F. ♀
anguleux. v. ℥
du lac Baïcal. ♀
rose F. ♀
— bulbifère.
strié. cap. or. ♀
dénudé. ♀
incliné. ♀
de Tartarie. ♀
de Caroline. ℥
blanc. F. m. ♀
cilié. ℥
à courtes étamines. ♀
velu. orient. ♀
penché. sibérie. ♀
cultivé. sicile. ♀ (écon. méd.)
rocambolle. F. ♀ (écon.)
des sables. F. ♀
oblique. sibérie. ♀
ampeloprasum. orient. ℥
poireau. suisse. ℥ (écon.)
de Montpellier. ℥
à feuilles de plantain. F. ♀

- tursinum L.
- scorzoneræfolium red. Lil.
- moly L
- fragrans Vent. H. cels.

POLIANTHES
tuberosa L.

HEMEROCALLIS
fulva L.
flava L.
cœrulea red. Lil.
japonica Rhumb. Jap.

AGAPANTHUS
— { crinum africanum L. }
— { umbellatus L'her. sert. }
— minor.

ORDO VIII.

NARCISSEÆ.

DORIANTHES
excelsa correa s. Lin. }
correa Brown. Prodr. }

AGAVE
americana L.
— variegata.
lurida Jacq. coll. ? }
mexicana. }
— angustifolia.
vivipara L.
— foetida L. *vet. hinc var. japonica.*
manguai. }
bulbifera Bonpland. }
yuccæfolia red. Lil.
spicata Dec. cat.

ALSTROEMERIA
pelegrina L.
ligtu L.

HEMANTHUS
coccineus L.
puniceus L.
pubescens L. f.
albiflos Jacq. H. sch.

pétiole. F. ψ
à feuell. de scorsonère. L
moly. F. ψ
odorant. cap. or. ψ

TUBÉREUSE
des jardins. inde. or. L (orn.)

HÉMÉROCALE
rouge. chine. L (orn.)
jaune. suisse. ψ (orn.)
bleue. chine. or. L (orn.)
du Japon. L (orn.)

AGAPANTHUS
ombellifère. cap. or. ψ (orn.)
— petit.

ORDRE VIII.

NARCISSÉES.

DORIANTHES
élevé. N. Holl. s. ch. ψ

AGAVÉ
d'Amérique. Am. m. or. ψ
(orn.)
— panaché.
du Mexique. s. ch. ψ
— à feuilles étroites.
vivipare. Am. m. s. ch. ψ
Aloës-Pitt. Am. m. s. ch. ψ
Manguai. Mexique. s. ch. ψ
à feuilles d'yucca. s. ch. ψ
à épis. Am. m. s. ch. ψ

PÉLÉGRINE
tachetée. Pérou. or. ψ (orn.)
veinée. Pérou. or. ψ (orn.)

HÉMANTHE
écarlate. cap. or. L (orn.)
ponceau. cap. or. L (orn.)
pubescent. cap. or. L (orn.)
à fleurs blanches. cap. or. ψ
(orn.)

quadrivalvis Jacq. H. sch.

lanceæfolius. Jacq. H. sch.

multiflorus Red. Lil.

CRINUM

asiaticum Red. Lil.

americanum Red. Lil.

erubescens Red. Lil.

commelini. Red. Lil.

giganteum Red. Lil.

otaitense Red. Lil.

multiflorum.

CIRTHANTHUS

obliquus Red. Lil.

amaryllis umbellata l'Her. }
sert.

angustifolius H. K. }
crinum angustifolium L. f. }

ANIGOZANTHOS

flavida Red. Lil.

AMARYLLIS

lutea L.

atamasco L.

formosissima L.

broussonetii Red. Lil. }

ornata Bot. Mag. }

longifolia Red. Lil.

belladonna l'Her. sert.

reginæ l'Her. sert.

revoluta l'Her. sert. }

variabilis Jacq. H. sch. }

equestris Red. Lil. }

punicea. Encycl. }

vittata l'Her. sert.

Josephinæ Red. Lil.

sarniensis L.

curvifolia Jacq. H. sch.

à quatre valves. cap. or. Ψ
(orn.)

à f. en lance. cap. or. Ψ (orn.)

à fleurs nombreuses. Guinée.
s. ch. Ψ (orn.)

CRINUM

d'Asie. Malabar. s. ch. Ψ (orn.)

d'Amérique. Am. mé. s. ch. Ψ
(orn.)

à bords rouges. Am. m. s. ch. Ψ

de Commelin. Am. m. s. ch.
 Ψ (orn.)

gigantesque. Siéra-Léona. s. ch.
 Ψ (orn.)

de Taïti. s. ch. Ψ (orn.)

à fl. nombreux. s. ch. Ψ (orn.)

CIRTHANTHUS

oblique. cap. or. Ψ (orn.)

à f. étroites. cap. or. Ψ (orn.)

ANIGOZANTHOS

à fleurs jaunes. N. Holl. or. Ψ

AMARYLLIS

jaune. F. m. Ψ (orn.)

Atamasco. Am. s. Ψ (orn.)

Lis de S.-Jacques. Mexique.
or. Ψ (orn.)

de Broussonet. s. ch. Ψ (orn.)

à feuilles longues. cap. or. Ψ
(orn.)

Belladone. cap. Ψ (orn.)

de la reine cap. or. Ψ (orn.)

réfléchie. cap. or. Ψ (orn.)

rose. Am. m. s. ch. Ψ (orn.)

veinée. cap. or. Ψ (orn.)

de Joséphine. Afr. mér. s. ch.
 Ψ (orn.)

Grénésienne. Grénesey. or. Ψ
(orn.)

à feuilles courbes. cap. or. Ψ
(orn.)

gigantea H. K. }
 sagus Rhomps. }
 undulata L. s. veg.
 aurea l'her. sert.
 spectabilis.

PANCRATIUM

speciosum Red. Lil.
 littorale Red. Lil.

fragrans Red. Lil.
 declinatum Red. Lil.
 amboinense L.
 illyricum L.
 maritimum L.

NARCISSUS

poeticus L.
 biflorus Bot. Magaz.
 pseudo-narcissus L.
 — bicolor Couan Ill.
 odorus L.
 pumilus Red. Lil.
 calathinus Red. Lil.
 minor L.
 tazetta L.
 jonquilla L.
 pseudo-jonquilla.
 bulbocodium L.

LEUCOIUM

vernum L.
 æstivum L.
 trichophyllum Red. Lil.

GALANTHUS

nivalis L.

HYPOXIS

erecta L.
 sobolifera Willd. sp.
 stellata Red. Lil.
 tridentata Red. Lil.

BROMELIA

Ananas L.
 pinguin L.

TILLANDSIA

serrata L. ?

gigantesque. siéra-léona. s. ch.
 ψ (orn.)
 ondulée. cap. or. ψ (orn.)
 jaune. chine. s. ch. ζ (orn.)
 élégante. s. ch. ψ

PANCRATIUM

élégant. Antilles. s. ch. ψ (orn.)
 des rivages. Am. m. s. ch. ζ
 (orn.)
 odorant. Am. m. s. ch. ψ (orn.)
 abaissé. Guiane. s. ch. ψ (orn.)
 d'Amboine. s. ch. ψ (orn.)
 de Dalmatie. ζ (orn.)
 maritime. F. ψ (orn.)

NARCISSE

des poètes. F. ψ (orn.)
 à deux fleurs. Angleterre. ψ
 Porion. F. ζ (orn.)
 — bicolor. F. ζ (orn.)
 odorant. F. m. ψ (orn.)
 nain. ζ
 à grande coupe. Portug. or. ψ.
 petit. Espagne. ψ
 à bouquets. F. m. ζ (orn.)
 jonquille. F. m. ζ (orn.)
 fausse jonquille. ζ
 trompette. F. m. ζ (orn.)

LEUCOIUM

printanier. Alpes ψ
 d'été. F. ψ
 à feuilles menues. Corse. or. ψ

GALANTHUS

perce-neige. F. ψ (orn.)

HYPOXIS

à tige droite. Am. s. or. ζ
 à rejeton. cap. or. ψ
 étoilé. cap. or. ζ
 à trois dents. cap. or. ψ

ANANAS

cultivé. Antilles. s. ch. ψ (alim.)
 pinguin. Antilles. s. ch. ψ

TILLANDSIA

à feuell. en scie. Antill. s. ch. ψ

ORDO IX.

IRIDEÆ.

SISYRINCHIUM

- bermudiana *Willd. sp.*
 gramineum *Bot. Magaz.* }
 anceps *Willd. sp.* }
 convolutum *Red. Lil.*
 tenuifolium *Red. Lil.*

striatum *Smith. Ic. pictæ.*

TIGRIDIA

pavonia *Red. Lil.*

FERRARIA

undulata *L.*

— IRIS.

1. *Barbatæ.*

- susiana *L.*
 florentina *L.*
 germanica *L.*
 — cœrulea.
 — violacea.
 pallida *Lamk. Ill.*
 flavescens *Red. Lil.*
 sambucina *Red. Lil.*
 plicata *Lamk. Ill.*
 swertii *Lamk. Ill.*
 squalens *L.*
 variegata *L.*
 aphylla? *L.*
 pumila *L.*
 — cœrulea.
 lutescens *Lamk. Ill.*
 cristata *Red. Lil.*
 arenaria *Kitt. et Wald. Hung.*

2. *Imberbes.*

- pseudo-acorus *L.*
 foetidissima *L.*
 Monnieri *Red. Lil.*
 ochroleuca *Willd. sp.*
 spuria *L.*
 fimbriata *Vent. H. cels.*
 sibirica *L.*
 pratensis *Lamk. Ill.* }

— *Chironid.*

ORDRE IX.

IRIDÉES.

BERMUDIENNE

- à petites fleurs. *Am. s.* ☿
 à feuilles de Gramen. *virgi-*
nie. ☿
 roulée. *mexique. or.* ☿
 à feuilles menues. *mexique.*
or. ☿
 à réseau. *mexique. or.* ☿

TIGRIDIA

panaché. *mexique. or.* ☿ (orn.)

FERRARIA

ondulé. *cap. or.* ☿

IRIS.

1. *Fleurs barbues.*

- de Suze. *orient. or.* ☿ (orn.)
 de Florence. *italie.* ☿ (méd.)
 flambe. *F.* ☿ (orn.)
 — bleue.
 — violette.
 pâle. *orient.* ☿ (orn.)
 jaunâtre. ☿ (orn.)
 à odeur de sureau. *F.* ☿
 plissé. *orient.* ☿
 de Swert. ☿
 sale. *F. m.* ☿
 panaché. *hongrie.* ☿
 sans feuilles. ☿
 nain. *F.* ☿ (orn.)
 — bleu.
 jaune-pâle. *F.* ☿
 à crête. *Am. s.* ☿
 des sables. *hongrie.* ☿

2. *Fleurs sans barbe.*

- des marais. *F.* ☿ (méd.)
 fétide. *F.* ☿
 de le Monnier. *orient.* ☿
 jaune. *orient.* ☿
 bâtard. *F.* ☿
 frangé. *chine. or.* ☿
 de Sibérie. ☿

De l'Inde.

versicolor L.
 stenogyna Red. Lil. }
 cawleri Red. Lil. }
 graminea L.
 scorpioides Desf. Atl.
 xiphium L.
 xiphioïdes Red. Lil.
 tuberosa L.
 persica L.
 sisyrinchium L.
 curtopetala Red. Lil.

VIEUSSEUXIA

glaucopis Dec. Ann. du Mus. }
 iris tricuspis Thunb. Prodr. }

MORÆA

iridioides L.
 northiana Andr. Rep. }
 vaginata Red. Lil. }
 elegans Jacq. H. Sch. }
 sisyrinchium elegans Red. Lil. }
 sordescens Jacq. Ic.
 — { chinensis Willd. sp. }
 — { ixia chinensis L. }
 — { belamcanda chinensis Red. Lil. }

IXIA

bulbocodium L.
 — parviflorum Red. Lil.
 crocata L.
 hyalina Red. Lil. }
 miniata Jacq. H. Sch.
 — maculata.
 polystachia L.
 scillaris Bot. Magaz.
 tricolor Bot. Magaz.
 anemonæflora Jacq. Ic.
 fusco-citrina Red. Lil.
 leucantha Jacq. Ic.
 bulbifera L.
 longiflora Lamk. Ill. }
 gladiolus longiflorus Jacq. Ic. }
 erecta Vahl. sp.
 maculata Jacq. H. Sch.
 viridis Jacq. H. Sch.
 cruciata Jacq. Ic.
 liliago. Red. Lil.

bigarré. Am. s. ψ

à stigmates étroits. ψ

à f. de Gramen. Autriche. ψ

queue de scorpion. Barb. ψ

xiphium. F. m. ζ (orn.)

xiphioïde. Esp. or. ψ (orn.)

hermodate. orient. or. ψ

de Perse. or. ψ

à feuilles de safran. or. ψ

à pétales bossus. or. ψ

VIEUSSEUXIA

à taches bleues. cap. or. ψ

MORÆA

Faux Iris. cap. or. ζ

à gânes. cap. or. ζ

élégant. cap. or. ψ

étalé. cap. or. ψ

de Chine. ψ (orn.)

IXIA

Bulbocodium. F. ψ

— à petites fleurs.

safrané. cap. or. ζ (orn.)

couleur de minium. cap. or. ζ
 (orn.)

— maculé.

à plusieurs épis. cap. or. ψ

à fleurs de scille. cap. or. ψ

tricolor. cap. or. ζ

à fl. d'Anémone. cap. or. ζ

brun-citron. cap. or. ζ

à fleurs blanches. cap. or. ζ

bulbifère. cap. or. ψ

à longues fleurs. cap. or. ψ

à tige droite. cap. or. ζ

maculé. cap. or. ζ

à fleurs vertes. cap. or. ζ

crucifère. cap. or. ζ

à fleurs de Lis. cap. or. ζ

GALAXIA

ixiæflora Red. Lil. }
ixia columnaris Andr. Rep. }

DIASIA

iridifolia Red. Lil.
graminifolia Red. Lil.

GLADIOLUS

communis L.
 — *grandiflorus*.
plicatus L.
mucronatus Jacq. Ic.
xanthopylus Red. Lil.
undulatus Jacq. Ic.
strictus Red. Lil.
hirsutus Jacq. Ic.
cardinalis Red. Lil.
tristis L.
angustus L.
carneus Jacq. Ic.
ringens Jacq. Ic.
cuspidatus Jacq. Ic.
lineatus Red. Lil.
merianus Jacq. Ic. }
antholiza meriana L. }
tubatus Jacq. Ic.
tubiflorus Jacq. Ic. }
inclinatus Red. Lil. }
junceus Red. Lil. }
Lapeyrousia juncea Pourret. }
Act. Tolos. }
securiger Bot. Magaz. }
Montbretia securigera Red. }
Lil. }

ANTHOLYZA

— *æthiopica* L.
cunonia L.

CROCUS

vernus Red. Lil.
multifidus Ramond. s. Phil.
biflorus Red. Lil.
susianus Red. Lil.
luteus Red. Lil.
sativus Willd. sp.

WACHENDORFIA

thyrsiflora L.

PONTEDERIA

cordata L.

GALAXIA

à fleurs d'*ixia*. cap. or. ℥

DIASIA

à feuilles d'*iris*. cap. or. ℥
 à feuell. de *cramen*. cap. or. ℥

GLAYEUL

commun. F. ℥ (orn.)
 — à grande fleur. (orn.)
plissé. cap. or. ℥
mucroné. cap. or. ℥
 à taches jaunes. cap. or. ℥
ondulé. cap. or. ℥
serré. cap. or. ℥
velu. cap. or. ℥
cardinal. cap. or. ℥ (orn.)
triste. cap. or. ℥
 à feuilles étroites. cap. or. ℥
couleur de chair. cap. or. ℥
 à deux lèvres. cap. or. ℥
pointu. cap. or. ℥
veiné. cap. or. ℥
 de Mérian. cap. or. ℥
trompette. cap. or. ℥
tubulé. cap. or. ℥
 jonciforme. cap. or. ℥
 en doloire. cap. or. ℥

ANTHOLYZE

d'*Ethiopie*. cap. or. ℥ (orn.)
cunonia. cap. or. ℥ (orn.)

SAFRAN

printanier. F. ℥ (orn.)
découpé. Pyrénées. ℥
 à deux fleurs. ℥ (orn.)
 de Suze. orient. ℥ (orn.)
jaune. ℥ (orn.)
cultivé. orient. ℥ (éc. méd.)

WACHENDORFIA

à fleurs en grappes. cap. or. ℥

PONTEDERIA

à f. en cœur. Am. s. ℥ (orn.)

CLASSIS IV.

CLASSE IV.

MONOCOTYLEDONES.

MONOCOTYLÉDONS.

(*stamina epigyna.*)

(étamines sur le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

MUSÆ.

BANANIER.

MUSA

sapientum L.

paradisiaca L.

— violacea.

coccinea *Andr. Rep.*

HELICONIA

humilis *Jacq. H. Sch.*

RAVENALA

madagascariensis *Encycl.*

STRELITZIA

reginæ *H. K.*

BANANIER

à petit fruit. inde. s. ch. τ
(alim.)à grand. fruit. inde. s. ch. τ
(alim.)

— violet.

écarlate. chine. s. ch. ψ

HÉLICONIA

de *Jacquin.* caracas. s. ch. ψ

RAVÉNAL

de *Madagascar.* s. ch. ψ

STRÉLITZIA

de la reine. cap. s. ch. τ

ORDO II.

ORDRE II.

CANNÆ.

BALISIERS.

CANNA

— indica L.

glauca L.

gigantea *Red. Lil.*flaccida *Red. Lil.*— *butas.*

GLOBBA

nutans *Red. Lil.*renealmia nutans *Willd.* }
*Enum.*erecta *Red. Lil.*

BALISIER

des Indes. s. ch. ψ glauque. caroline. or. ψ gigantesque. s. ch. τ flasque. caroline. or. ψ *Jacquin.*

GLOBBA

à fleurs penchées. inde. s. ch. τ à fleurs droites. inde? s. ch. ψ

AMOMUM

— zingiber L.

zerumbet L.

AMOME

gingembre. inde. s. ch. τ
(écon. méd.)zérumbet. inde. s. ch. τ (écon.
méd.)

cardamomum L.

granum-paradisi L.

HEDYCHIUM

coronarium Bot. Magaz.

COSTUS

arabicus L.

MARANTA

arundinacea L.

PERONIA

stricta Red. Lil.

CURCUMA

— longa L.

KÆMPFERIA

galanga L.

— longa Jacq. H. Sch.

angustifolia Willd. Enum.

ORDO III.**ORCHIDEÆ.****ORCHIS.**1. *Bulbis indivisis.*

bifolia L.

pyramidalis L.

coriophora L.

morio L.

mascula L.

laxiflora Encycl.

ustulata L.

militaris L.

variegata Encycl.

simia Encycl.

hircina Swartz. orch. }

satyrium hircinum L. }

2. *Bulbis palmatis.*

latifolia L.

maculata L.

conopsea L.

abortiva L.

cardamome. inde. s. ch. 75

(écon. méd.)

graine-de-paradis. Afr. s. ch.

7 (méd.)

HÉDYCHIUM

à bouquets. inde. s. ch. 75

COSTUS

d'Arabie. inde. s. ch. 7 (méd.)

MARANTA

à f. de balisier. Ant. s. ch. 75

PÉRONIA

à tige droite. s. ch. 75

CURCUMA

safran des Indes. s. ch. (écon. méd.)

KÆMPFERIA

galanga. inde. s. ch. 7 (méd.)

allongé. inde. s. ch. 75

à feuilles étroites. s. ch. 75

ORDRE III.**ORCHIDÉES.****ORCHIS.**1. *Bulbes entières.*

à deux feuilles. F. 75

pyramidal. F. 75

fétide. F. 75

morio. F. 75

mâle. F. 75

à fleurs lâches. F. 75

charbonné. F. 75

militaire. F. 75

panaché. F. 75

singe. F. 75

puant. F. 75

2. *Bulbes palmées.*

à larges feuilles. F. 75

maculé. F. 75

à long éperon. F. 75

avorté. F. 75

viridis swartz orch. }
satyrium viride L. }

vert. f. ψ

OPHRYS

anthropophora L.
insectifera L.
— musciflora.
— arachnites.
— rubiginosa.

OPHRYS

homme. f. ψ
insecte f. ζ
— mouche.
— araignée.
— rouillé.

NEOTTIA

elata willd. sp.
spiralis swartz. orch. }
ophrys spiralis L. }
æstivalis. }
ophrys æstivalis encycl. }

NÉOTTIA

élançé. Antilles. s. ch. ψ
en spirale. f. ψ
d'été. f. ζ

MALAXIS

lilifolia swartz orch. }
ophrys lilifolia L. }
Loeselii swartz. orch. }
ophrys Loeselii L. }

MALAXIS

à feuilles de Lis. Canada. ψ
de Loesel. f. ζ

EPIPACTIS

latifolia swartz. orch. }
serapias latifolia L. }
palustris swartz. orch. }
serapias longifolia L. s. veg. }
pallens swartz. orch. }
serapias grandiflora L. }
rubra swartz. orch. }
serapias rubra L. }
nidus-avis willd. sp. }
ophrys nidus-avis L. }
ovata willd. sp. }
ophrys ovata L. }

EPIPACTIS

à larges feuilles. f. ζ
des marais. f. ψ
à grandes fleurs. f. ζ
rouge. f. ψ
nid-d'oiseau. f. ψ
double-feuille. f. ψ

LIMODORUM

rankervilliae swartz. orch.

LIMODORUM

de Tankerville. chine. s. ch.
ψ (orn.)

CYMBIDIUM

purpureum. }
limodorum purpureum. }
encycl. }
aloifolium swartz. orch. }
epidendrum aloifolium L. }
sinense willd. sp. }
epidendrum sinense Andr. }
rep. }

CYMBIDIUM

pourpre. Antilles. s. ch. ψ
à feuilles d'aloès. inde. s. ch. ζ
de Chine. s. ch. ψ

CYPRIPEDIUM

calceolus L.

CYPRIPÉDIUM

des Alpes. ζ

Cynorchis latifolia L.
Cynorchis elatior.

EPIDENDRUM
 cochleatum L.
 elongatum Jacq. ic.

VANILLA
 aromatica swartz. orch. }
 epidendrum vanilla L. }

ORDO IV.

HYDROCHARIDÆ.

VALLISNERIA
 spiralis L.

STRATIOTES
 alooides L.

HYDROCHARIS
 morsus bane L.

NYPHÆA
 alba L.
 lutea L.

EPIDENDRUM
 limaçon. Antilles. s. ch. ☞
 allongé. Antilles. s. ch. ☞

VANILLE
 aromatique. Am. m. s. ch. ☞
 (écon.)

ORDRE IV.

HYDROCHARIDÉES.

VALLISNERIA
 en spirale. F. ☞

STRATIOTES
 à feuilles d'Aloès. F. ☞

MORÈNE
 aquatique. F. ☞

NYPHÉA
 blanc. F. ☞
 jaune. F. ☞

CLASSIS V.

MONOCOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

ARISTOLOCHIÆ.

ARISTOLOCHIA
 pubera BROWN. prodr.
 altissima Desf. Atl.
 sempervirens L.
 pistolochia L.
 oblongata Jacq. H. Sch.
 caudata L.
 trilobata L.
 siphon L'Her. stirp.
 rotunda L.
 clematitis L.
 serpentaria L.

CLASSE V.

MONOCOTYLÉDONS

APÉTALES.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARISTOLOCHES.

ARISTOLOCHE
 pubescente. N. Holl. or. ☞
 élevée. Alger. or. ☞
 toujours verte. orient. or. ☞
 crénelée. F. m. or. ☞ (méd.)
 à f. oblong. Caracas. s. ch. ☞
 filifère. Antilles. s. ch. ☞
 trilobée. Antilles. s. ch. ☞
 en siphon. Am. s. ☞
 ronde. F. m. ☞ (méd.)
 clématite. F. ☞ (méd.)
 serpenteire. Am. s. ☞ (méd.)

ASARUM
europæum L.
canadense L.
virginicum L.

ASARUM
d'Europe. F. 7 (méd.)
de Canada. 7
de Virginie. or. 7

CLASSIS VI.

CLASSE VI. n.º 2

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

APETALÆ.

APÉTALES.

(stamina perigyna.)

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

ELÆAGNÆ.

CHALEFS.

I. Stamina 5, aut pauciora.

I. Cinq étamines, ou moins.

THESIUM
linophyllum L.

THÉSIUM
à feuilles de Lin. F. 7

OSYRIS
alba L.

OSYRIS
blanc. F. 7

HIPPOPHAE
rhamnoides L.
canadensis L.

HIPPOPHAE
rhamnoïde. F. 7
de Canada. 7

ELÆAGNUS
angustifolia L.

CHALEF
à feuil. étroit. orient. 7 (orn.)

NYSSA
aquatica L. }
denticulata H. K. }
angulisans Mich. Fl. }
villosa Mich. Fl. }
caudicans Mich. Fl.

TUPÉLO
aquatique. Am. s. 7
velu. Am. s. 7
blanchâtre. Am. s. 7

II. Stamina sæpius 10.

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA
buceras L.

BUCIDA
cornu. Antilles. s. ch. 7

TERMINALIA
angustifolia Jacq. Hort. }
benzoin L. f. }

BADAMIER
à feuilles étroit. inde. s. ch. 7

— *estagay.*

— *de Malabar.*

ORDO II.

T H Y M E L E Æ.

DIRCA

palustris L.

DAPHNE.

1. Floribus lateralibus.

mezereum L.

— album.

thymelæa L.

tarton-raira L.

alpina L.

pontica L.

laureola L.

2. Floribus terminalibus.

odora Thunb. Jap. }

sinensis Encycl. }

collina Smith. spicil.

cneorum L.

gnidium L.

PASSERINA

hirsuta L.

dioica Ramond. Soc. Phil. }

daphne dioica Couan. Ill. }

spicata L. f.

filiformis L.

grandiflora. L. f.

STELLERA

passerina L.

STRUTHIOLA

virgata L. Mant.

erecta L. Mant.

imbricata. Andr. Rep.

LACHNEA

eriocephala Willd. sp.

DAIS

cotinifolia L. }

laurifolia Jacq. Ic. }

GNIDIA

simplex L. Mant.

pinifolia L. f.

ORDRE II.

T H Y M É L É E S.

DIRCA

bois-cuir. Am. s. ♪

DAPHNÉ.

1. Fleurs latérales.

bois-gentil. F. ♪ (orn.)

— à fleurs blanches.

thymélée. F. ♪ (orn.)

tarton-raire. F. m. or. ♪

des Alpes. ♪

de Pont. Asie. ♪

lauréole. F. ♪

2. Fleurs terminales.

odorant. Japon. or. ♪ (orn.)

d'Italie. or. ♪

cneorum. F. ♪ (orn.)

garou. F. m. ♪ (méd.)

PASSERINE

cotonneuse. F. m. or. ♪

dioïque. Pyrénées. ♪

à épis. cap. or. ♪

filiforme. cap. or. ♪

à grandes fleurs. cap. or. ♪

STELLERA

passerine. F. ⊙

STRUTHIOLA

effilé. cap. or. ♪

à tige droite. cap. or. ♪

imbriqué. cap. or. ♪

LACHNEA

à tête laineuse. cap. or. ♪

DAIS

à feuilles de fustet. cap. or. ♪

GNIDIA

à tiges simples. cap. or. ♪

à feuilles de pin. cap. or. ♪

ORDO III.

PROTEACEÆ.

PROTEA

argentea *L.*
 pallens *L. Mant.*
 conifera *L. Mant.*
 torta *Thunb. Diss.*
 obliqua *L. f.*
 Levisanus *L. Mant.*
 hirta *L. Mant.*
 prolifera *Lamk. (non Thunb.)*
 saligna *Thunb. Diss.*
 passerina.
 conocarpa *Willd. sp.*
 Leucospermum conocarpum }
Brown. Prot.
 ciliata. }
 Leucadendrum grandiflorum }
Bot. Magaz.

BANKSIA

serrata *L. f.*
 præmorsa *Andr. rep.* }
 marcescens *Brown. Prodr.* }
 spinulosa *Smith. N. Holl.*
 ericifolia *Brown. Prodr.*
 longifolia.

HAKEA

gibbosa *Cav. Ic.*
 dactyloides *Cav. Ic.*
 saligna *Brown. Prodr.*
 Embotrium salicifolium }
Vent. H. Cels.
 ceratophylla *Brown. Prodr.*
 suaveolens *Brown. Prodr.*
 epiglottis *La Bill. N. Holl.*
 pugioniformis *Cav. Ic. ?*
 acicularis *Vent. Malm.*

EMBOTHIUM

sericeum *Smith. N. Holl.* }
 Grevillea sericea *Brown.* }
Prodr.
 speciosissimum *Smith. N.* }
Holl.
 telopea speciosiss. *Brown.* }
Prodr.
 silaifolium *Smith. N. Holl.*

ORDRE III.

PROTÉACÉES.

PROTEA

Arbre d'arg. cap. or. ♀ (orn.)
 pâle. cap. or. ♀
 conifère. cap. or. ♀
 tortu. cap. or. ♀
 oblique. cap. or. ♀
 Levisanus. cap. or. ♀
 hérissé. cap. or. ♀
 prolifère. cap. or. ♀
 à feuilles de saule. cap. or. ♀
 passerina. cap. or. ♀
 à fruits coniques. cap. or. ♀
 cilié. cap. or. ♀

BANKSIA

à feuell. en scié. *N. Holl.* or. ♀
 tronqué. *N. Holl.* or. ♀
 épineux. *N. Holl.* or. ♀
 à f. de bruyère. *N. Holl.* or. ♀
 à long. feuilles. *N. Holl.* or. ♀

HAKEA

gibbeux. *N. Holl.* or. ♀
 dactyloïde. *N. Holl.* or. ♀
 à f. de saule. *N. Holl.* or. ♀
 à feuell. cornues. *N. Holl.* or. ♀
 odorant. *N. Holl.* or. ♀
 épiglotte. *N. Holl.* or. ♀
 à long. pointes. *N. Holl.* or. ♀
 à feuilles grêles. *N. Holl.* or. ♀

EMBOTHIUM

satiné. *N. Holl.* or. ♀
 écarlate. *N. Holl.* or. ♀ (orn.)
 à feuell. de silaüs. *N. Holl.* or. ♀

PERSOONIA
linearis BROWN. Prodr.

PERSOONIA
à f. linéaires. N. Holl. or. 5

ORDO IV.

ORDRE IV.

L A U R I N E Æ.

L A U R I N É E S.

LAURUS.

LAURIER.

1. Folia perennantia.

1. Feuilles persistantes.

- cinnamomum L.
- camphora Z.
- cassia Z.
- perseæ Z. *Vel Surca gratissima.*
- nobilis Z.
- indica Z.
- borbonia Z. ?
- caroliniensis Mich. Fl.
- foetens H. K.

- cannellier. ceylan. s. ch. 5
(écon. méd.)
- camphrier. Japon. or. 5 (écon. méd.)
- cassia. inde. s. ch. 5
- avocat. Antill. s. ch. 5 (alim.)
- d'Apollon. orient. or. 5 (écon. méd.)
- des Indes. canaries. or. 5
- Borbonia. or. 5
- de Caroline. or. 5
- fétide. canaries. or. 5

2. Folia decidua.

2. Feuilles tombantes.

- geniculata Mich. Fl.
- benzoin L.
- sassafras L.

- geniculé. caroline. or. 5
- faux Benjoin. Am. s. 5
- sassafras. caroline. 5 (méd.)

HERNANDIA

sonora L.

HERNANDIA

sonore, inde. s. ch. 5

ORDO V.

ORDRE V.

P O L Y G O N E Æ.

P O L Y G O N É E S.

COCCOLOBA

RAISINIER

- excoriata L.
- uvifera L.
- rheifolia. }
- latifolia Encycl. }
- rugosa.
- pubescens L.
- pyrifolia. }
- excoriata Encycl. var. B. }
- fagifolia Jacq. H. Sch. }
- nitida. }
- nivea Swartz. Prodr.
- laurifolia.

- écorcé. Antilles. s. ch. 5
- à grappes. Antilles. s. ch. 5
- à feuilles de rhapontic. Antill. s. ch. 5
- ridé. Antilles. s. ch. 5
- pubescent. Antilles. s. ch. 5
- à feuilles de Poirier. Antilles. s. ch. 5
- à feuilles de Hêtre. Antilles. s. ch. 5
- à fl. blanc. Antilles. s. ch. 5
- à feuilles de Laurier. Antilles. s. ch. 5

BRUNNICHIA

cirrhosa Mich. Fl.

ATRAPHRAXIS

undulata L.

spinosa L.

POLYGONUM.

1. Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.

aviculare L.

bellardi All. Ped.

maritimum L.

frutescens L.

divaricatum L.

alpinum All. Ped.

angustifolium. }
diffusum Encycl. }

2. Persicariae, stylo bifido, stamina minus 8.

orientale L.

persicaria L.

— maculata.

lapathifolium L.

minus Smith. Fl. }

pusillum Dec. Fl. }

Hydropiper L.

amphibium L.

virginianum L.

3. Bistortae, spica unica.

viviparum L.

Bistorta L.

— latifolia.

4. Folia subcordata.

tataricum L.

Fagopyrum L.

emarginatum Willd. sp.

convolvulus L.

dumetorum L.

scandens L.

acetosæfolium Vent. H. cels.

RUMEX.

1. Hermaphroditi, valvulis glandulâ destitutis.

Lunaria L.

vesicarius L.

BRUNNICHIA

à vrilles. Am. s. ♃

ATRAPHRAXIS

ondulé. cap. or. ♃

épineux. orient. ♃

POLYGONE.

1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.

renouée, centinode. F. ♀
(méd.)

de Bellardi. piémont. ♀

maritime. F. ♂

arbrisseau. sibérie. ♃

étalé. sibérie. ♀

des Alpes. ♂

à feuilles étroites. sibérie. ♀

2. Persicaires, style bifide, moins de 8 étamines.

d' Orient. ⊙ (orn.).

persicaire. F. ⊙

— maculée.

à feuilles de Lapatum. F. ⊙

nain. F. ⊙

poivre-d'eau. F. ⊙

amphibie. F. ♂

de Virginie. ♀

3. Bistortes, un seul épi.

vivipare. Alpes. ♂

Bistorte. F. ♂ (méd.)

— à larges feuilles.

4. Feuilles en cœur ou hastées.

de Tartarie. ⊙ (écon.)

sarrazin. Asie. ⊙ (écon.)

échancré. chine. ⊙ (écon.).

Liseron. F. ♂

des buissons. F. ♀

grimant. Am. s. ♂

à f. d'oseille. Brésil. s. ch. ♂

RUMEX.

1. Hermaphrodites, calice sans glandes.

arbrisseau. canaries. or. ♃

vésiculeux. barbarie. ⊙

roseus L.
tingitanus L.
scutatus L.
— glaucus.
digynus L.
bucephalophorus L.

2. Flores diclines.

abyssinicus Jacq. hort. }
arifolius L. f. }
alpinus L.
tuberosus Encycl. an L. ?
montanus. }
arifolius All. ped. }
cordatus.
acetosa L.
acetosella L.
spinosus L.

3. Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.

maritimus L.
crispatus Mich. fl. }
persicarioides Encycl. }
ægyptiacus L.
dentatus L. Mant.
pulcher L.
nemolapathum L. f.
sanguineus L.
purpureus Encycl.
obtusifolius L.
crispus L.
hydrolapathum Willd. sp. }
aquaticus Smith. fl. }
patientia L.
undulatus.

RHEUM

rhaponticum L.
compactum L.
undulatum L.
ribes L.
hybridum H. K.
palmatum L.

TRIPLARIS

americana Vahl. symb.

CALLIGONUM

comosum Desf. Atl.

rose. égypte. ☉
de Tanger. or. ☿
en bouclier. F. ☿ (écon.)
— glauque.
à deux styles. Alpes. ☿
tête-de-bœuf. F. ☉

2. Fleurs polygames.

d' Abyssinie. s. ch. ☿
des Alpes. ☿ (méd.)
tubéreux. or. ☿
de montagne. Alpes. ☿
en cœur. cap. or. ☿
oseille des prés. F. ☿
auriculé. F. ☿
épineux. orient. ☉

3. Fleurs hermaphroditis, valves glanduleuses.

maritime. F. ☉
crispé. Am. s. ☉
d' Égypte. ☉
denté. Égypte. ☉
violon. F. ♂
des bois. F. ☿
sanguin. Am. s. ☿
purpurin. ☿
à feuilles obtuses. F. ☿
crépu. F. ☿
des marais. F. ☿
patience. F. ☿ (méd.)
ondé. Sibérie. ☿

RHUBARBE

rhapontic. Asie. ☿ (méd.)
compacte. Chine. ☿ (méd.)
ondée. Chine. ☿ (méd.)
ribes. Asie min. ☿ (écon. méd.)
hybride. Asie boréale. ☿
palmée. Chine. ☿ (méd.)

TRIPLARIS

d' Amérique. s. ch. ♃

CALLIGONUM

hérissé. Afr. sept. or. ♃

PALLASIA

- caspiica L. f.
- pallasia pterococcus pall. }
ROSS.
- calligonum pallasia willd. sp.)

PALLASIA

de la mer Caspienne. or. ψ

ERYOGONUM

tomentosum Mich. fl.

ERYOGONUM

cotonneux. caroline. or. ψ

ORDO VI.

ORDRE VI.

ATRIPLICEÆ.

ARROCHES.

I. Fructus baccatus.

I. Une baie.

PHYTOLACCA

- octandra L.
- decandra L.
- dodecandra l'Her. stirp.
- icosandra L.
- dioica L.

PHYTOLACCA

- à 8 étamines. mexiq. s. ch. ♀
- à 10 étamines. AM. s. ♂
- à 12 étamines. Abyss. s. ch. ♀
- à 20 étamines. inde. s. ch. ♀
- dioïque. AM. m. s. ch. ♀

RIVINA

- humilis L.
- lævis L. Mant. vel frumilis.
- purpurascens willd. Enum.
- brasiliensis willd. sp. ?
- tetrandra.

RIVINA

- velu. Antilles. s. ch. ♀
- lisse. Antilles. s. ch. ♀
- pourpre. s. ch. ♀
- du Brésil. s. ch. ♀
- à 4 étamines. s. ch. ♀

BOSEA

yerva-mora L.

II. Fructus capsularis.

BOSEA

yerva-mora. canaries. or. ♀

II. Une capsule.

PETIVERIA

alliacea L.

PÉTIVÉRIA

alliaccé. Antilles. s. ch. ♀

POLYCNEMUM

arvense L.

POLYCNEMUM

des champs. F. ⊙

CAMPHOROSMA

monspeliaca L.

CAMPHRÉE

de Montpellier. or. ♀

PTERANTHUS

- echinatus Desf. Atl.
- camphorosma pteranthus L. }
Mant.
- louichea cervina l'Her. stirp.)

PTÉRANTHUS

hérissé. barbarie. ⊙

GALENIA

africana L.

GALÉNIA

d'Afrique. cap. or. ♀

III. Semen tectum calice, stamina 5.

BASELLA

rubra L.
alba L.
vesicaria *Encycl.*

SALSOLA.

1. Fruticosa.

brevifolia *Desf. Atl.*
fruticosa L.
chenopodium fruticosum
Willd. Enum. }
prostrata L.
sericea *Willd. Enum.* }
chenolea diffusa *Willd. sp.* }
oppositifolia *Desf. Atl.*

2. Herbacea.

baccata.
sueda baccata *Delile. Fl.* }
hortensis.
sueda hortensis *Delile. Fl.* }
hirsuta L.
muricata L. *Mant.*
laniflora *Pallas. Itin.*
arenaria *Wald. et Kitt. Hung.*
altissima L.
chenopodium altissimum
Willd. Enum. }
soda L.
radiata *Desf. Ann.* }
platiphyllo *Mich. Fl.* }
kochia dentata *Willd. Hort.* }
salsa L. *Mant.*
kali L.
tragus L.

SPINACIA

oleracea L.
— lævis.

BETA

vulgaris L.
— rubra.
cycla L.
trigyna *Wald. et Kitt. Hung.*
maritima L.

III. Graines reconvertes par le calice,
5 étamines.

BASELLE

rouge. inde. ♂ (écon.)
blanche. chine. ♂ (écon.)
vésiculeuse. Pérou. s. ch. ♀

SOUDE.

1. Tiges ligneuses.

à f. courtes. barbarie. or. ♀
arbrisseau. F. ♀
couchée. sibérie. ♀
satinée. cap. or. ♀
à feuell. opposées. barb. or. ♀

2. Tiges herbacées.

baccifère. or. ♀
des jardins. ⊙
velue. F. m. ⊙
hérissée. égypte. or. ♀
laineuse. sibérie. ♀
des sables. F. ⊙
élevée. italie. ⊙
commune. F. ⊙
rayonnée. Am. s. ⊙
salée. sibérie. ⊙ (arts.)
kali. F. ⊙ (arts.)
épineuse. F. ⊙ (arts.)

ÉPINARD

cultivé. ⊙ (alim. méd.)
— lisse.

BETTE

commune. Eur. Aust. ♂ (alim.)
— rouge.
racine de disette. Portugal. ♂
à 5 styles. Hongrie. ♀
maritime. F. ⊙

CHENOPODIUM.

1. *Foliis angulatis.*

bonus-henricus L.
 urbicum L.
 atriplicis H. K.
 quinoa Willd. sp.?
 rhombifolium Willd. Enum.
 crassifolium.
 opulifolium Nocca.
 murale L.
 hybridum L.
 ficifolium Smith. Fl.?
 album L.
 rubrum L.
 ambrosioides L.
 anthelminticum L.
 botrys L.
 multifidum L.
 foetidum Willd. Enum.
 glaucum L.

2. *Foliis integris.*

vulvaria L.
 lanceolatum Willd. Enum.
 caudatum Jacq. Ic.
 polyspermum L.
 scoparia L.
 villosum Encycl.
 aristatum L.
 maritimum L.

ATRIPLEX

halimus L.
 portulacoides L.
 albicans Willd. sp.
 rosea L.
 sibirica L.
 microsperma Willd. sp.
 lacera.
 hortensis L.
 — rubra.
 — ruberrima.
 nitens Willd. sp.
 laciniata L.
 multifida.
 hastata L.
 patula L.
 angustifolia Willd. sp.
 littoralis L.

ANSERINE.

1. Feuilles anguleuses.

Bon-Henri. F. ℥ (méd.)
 triangulaire. F. ⊙
 à feuilles d'Arroche. chine. ⊙
 quinoa. Pérou. ⊙ (alim.)
 rhomboïdale. Am. s. ⊙
 à feuilles épaisses. ⊙
 à feuilles d'obier. ⊙
 des murailles. F. ⊙
 hybride. F. ⊙
 à feuilles de Figuier. F. ⊙
 blanche. F. ⊙
 rouge. F. ⊙
 odorante. Mexique. ⊙
 anthelmintique. Am. s. or. ♃
 Botrys. F. ⊙ (méd.)
 laciniée. Buenos-Ayres. or. ♃
 puante. ⊙
 glauque. F. ⊙

2. Feuilles entières.

fétide. F. ⊙
 lancéolée. Am. s. ⊙
 à longues grappes. Guinée. ⊙
 polysperme. F. ⊙
 belvédère. chine. ⊙
 velue. Sibérie. ⊙
 barbue. Sibérie. ⊙
 maritime. F. ⊙

ARROCHE

halime. F. ♃
 à feuilles de pourpier. F. ♃
 blanchâtre. cap. or. ♃
 rose. F. ⊙
 de Sibérie. ⊙
 à petit fruit. Hongrie. ⊙
 lacérée. ⊙
 des jardins. Asie. ⊙ (écon.)
 — rouge.
 — très-rouge.
 luisante. Hongrie. ⊙
 laciniée. F. ⊙
 découpée. ⊙
 hastée. F. ⊙
 touffue. F. ⊙
 à feuilles étroites. F. ⊙
 des rivages. F. ⊙

III. Semen tectum calice, stamina pauciora
quàm 5.

AXYRIS
amaranthoides L.

BLITUM
capitatum L.
virgatum L.
chenopodioides L. Mant.

SALICORNIA
herbacea L.
fruticosa L.

CORISPERMUM
spicatum.
hyssopofolium L.

III. Graines recouvertes par le calice,
moins de 5 étamines.

AXYRIS
fausse Amarante. sibérie. ☉

BLETTE
à fleurs en tête. F. ☉
effilée. F. ☉
jausse anserine. tartarie. ☉

SALICORNE
herbacée. F. ☉
arbrisseau, F. m. or. ☽

CORISPERME
à épis. sibérie. ☉
à feuilles d'hysope. tart. ☉

CLASSIS VII.

CLASSE VII.

DYCOTYLEDONES

DYCOTYLÉDONS

APETALÆ.

APÉTALES.

(stamina hypogyna.)

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

AMARANTHI.

AMARANTES.

AMARANTHUS.

AMARANTE

1. Flores triandri.

1. 3 étamines.

albus L.
græcisans L. }
angustifolius Encycl. }
prostratus Willd. sp.
tricolor L.
lividus L.
melancholicus L.
blitum L.
sylvestris.
polygonoides L.

blanche. Am. s. ☉
à feuilles étroites. Am. s. ☉
couchée. Italie. ☉
tricolore. Inde. ☉ (orn.)
livide. Am. s. ☉
mélancholique. Inde. ☉
Blette. F. ☉
sauvage. F. ☉
membraneuse. Antilles. ☉

2. Pentandri.

2. 5 étamines.

chlorostachys Willd. sp.
flavus Willd. sp.

pâle. ☉
jaune. ☉

*lætus willd. sp.**paniculatus L.**hybridus L.**retroflexus Encycl. }*— *caudatus L.**sanguineus L.*— *spinus L. vel asperus.*

CELOSIA

*argentea L.**margaritacea L.**trigyna L. Mant.*— *cristata L.**coccinea L.**castrensis L.**paniculata L.*

IRESINE

*celosioides L.**herbacea.*

ACHYRANTHES

*argentea Encycl.**fruticosa Encycl.**crispa Encycl. suppl.**virgata Encycl. suppl.**lappacea L.**atropurpurea Encycl. }**porrigens Jacq. H. sch.*

GOMPHRENA

— *globosa L.**interrupta L.**decumbens Jacq. H. sch.**brasiliانا L.*

ILLECEBRUM

*lanatum. s. veget.**javanicum s. veget.**achyranthes alopecuroides
Encycl. }*

PARONYCHIA

*verticillata.**illecebrum verticillatum L. }**echinata Desf. Atl.**vulgaris.**illecebrum paronychia L. }**capitata.**illecebrum capitatum L. }**d'un vert gai. ⊙**paniculée. ⊙**hybride. F. ⊙.**à longs épis. Pérou. ⊙ (orn.)**couleur de sang. Antilles. ⊙**épineuse. Inde. ⊙*

CÉLOSIA

*argenté. inde. ⊙**perlé. inde. ⊙**à 3 styles. sénégal. ⊙**à crêtes. Asie. ⊙ (orn.)**écarlate. inde. ⊙ (orn.)**aigretté. inde. ⊙**paniculé. Antilles. ⊙*

IRÉSINE

*faux celosia. Antilles. s. ch. ♄**herbacée. s. ch. ♄*

CADÉLARI

*argenté. sicile ⊙**arbrisseau. inde. s. ch. ♄**crépu. s. ch. ♄**à longs épis. s. ch. ♄**hérissé. inde. s. ch. ♄**étalé. Pérou. s. ch. ♄*

GOMPHRÉNA

*globuleux. inde. ⊙ (orn.)**interrompu. Antilles. s. ch. ♄**couché. Mexique. ⊙**du Brésil. s. ch. ♄*

ILLECEBRUM

*laineux. inde. s. ch. ♄**de Java. s. ch. ♄*

PARONIC

*verticillé. F. ⊙**hérissé. Barbarie. or. ♄**commun. F. m. or. ♄**à fleurs en tête. F. ♄*

ficoidea L.
 illecebrum ficoideum L. }
 tenella.
 sessilis.
 illecebrum sessile L. }
 Achyrantha.
 illecebrum Achyrantha L. }
 frutescens.
 illecebrum frutescens L'Her.
 stirp. }

ficoïde. Antilles. s. ch. ☿
 délicat. s. ch. ☿
 sessile. inde. s. ch. ☿
 Achyrantha. orient. ☉
 arbrisseau. Pérou. s. ch. ♃

HERNIARIA

suffruticosa.
 illecebrum suffruticosum L. }
 fruticosa L.
 glabra L.
 hirsuta L.
 incana Encycl.

HERNIOLE

sous-arbrisseau. Esp. or. ♃
 ligneuse. F. m. or. ♃
 glabre. F. ☉
 velue. F. ☉
 blanche. Alpes. ☿

ORDO II.

ORDRE II.

PLANTAGINEÆ.

PLANTAGINÉES.

PLANTAGO.

PLANTAIN.

1. Caule folioso.

1. Tige feuillue.

psyllium.
 arenaria Willd. Enum. }
 cynops L.
 squarrosa Willd. sp.
 stricta Schousb. Maroc.

psyllium. F. ☉
 cynops. F. ☿
 rude. Égypte. ☉
 serré. Maroc. ☉

2. Caule aphylo.

2. Tige sans feuilles.

maxima Jacq. Ic. }
 cucullata Lamk. Ill. }
 asiatica Lamk. Ill.
 cordata Lamk. Ill.
 major L.
 media L.
 crassa Willd. sp. }
 crispa Jacq. collect. }
 saxatilis Marsch. cauc.
 sibirica.
 lanceolata L.
 Lagopus L.
 amplexicaulis Cav. Ic.
 serraria L.
 vaginata Vent. H. cels.
 virginica L.

capuchon. Sibérie. ☿
 d'Asie. ☿
 en cœur. Am. s. ☿
 commun. F. ☿
 moyen. F. ☿
 charnu. ☿
 des rochers. caucase. ☿
 de Sibérie. ☿
 lancéolé. F. ☿
 Lagopus. F. ☉
 amplexicaule. Esp. or. ☿
 en scie. Barbarie. or. ☿
 à gaine. canaries. or. ☿
 de Virginie. Am. s. ☉

albicans L.
 interrupta *Encycl.*
 alpina L.
 sphærocephala *Encycl.* }
 alpina *Jacq. hort.* }
 microcephala *Encycl.* }
 villosa *Roth. cat.* }
 holostea *Lamk. ill.* }
 zellardi *Vahl. symb.* }
 graminea *Lamk. ill.*
 hirsuta *Thunb. prodr.*
 tenuiflora *Wald. et Kitt. Hung.*
 maritima L.
 subulata L.
 coronopus L.

blanchâtre. F. m. ℥
 interrompu. Am. s. ψ
 des Alpes. F. ℥
 à tête ronde. Alpes. ψ
 à petite tête. orient. ⊙
 holostea. Alpes. ℥
 à feuilles de gramin. ℥
 pubescent. cap. ⊙
 à petites fleurs. Hongrie. ⊙
 maritime. F. ψ
 en alène. F. m. or. ψ
 corne-de-cerf. F. ⊙

LITTORELLA
 lacustris L.

LITTORELLE
 des marais. F. ψ

ORDO III.

ORDRE III.

NYCTAGINEÆ.

NYCTAGINÉES.

MIRABILIS

Jalapa L.
 — lutea.
 dichotoma L.
 longiflora L.

MIRABILIS

Belle-de-nuit. Mexiq. ⊙ (orn.)
 — jaune.
 dichotome. Mexique. ⊙
 à longues fleurs. Mexiq. or. ℥
 (orn.)

CALYXHYMENIA

viscosa *Fl. Per.* }
 mirabilis viscosa *Cav. Ic.* }
 glabrifolia *Ortega. Dec.*
 aggregata *Ortega. Dec.* }
 mirabilis aggregata *Cav. Ic.* }

CALYXHYMENIA

visqueux. Pérou. s. ch. ℥
 à f. glabres. N. Esp. s. ch. ψ¹
 aggloméré. N. Esp. s. ch. ψ

BOERHAAVIA

erecta L.
 — diffusa L. *var. succumbens*
 hirsuta L. *Mant.*
 scandens L.
 tuberosa *Lamk. ill.*
 arborea *Vahl. sp.*

BOERHAAVIA

à tige droite. Antilles. s. ch. ψ
 étalé. Antilles. s. ch. ℥
 velu. Antilles. s. ch. ℥
 grim pant. Am. m. s. ch. ♃
 tubéreux. Pérou. s. ch. ♃
 arbre. N. Esp. s. ch. ♃

PISONIA

aculeata L.
 fragrans.
 nitida.
 latifolia (*an generis?*)

PISONIA

épineux. Antilles. s. ch. ♃
 odorant. Antilles. s. ch. ♃
 luisant. Antilles. s. ch. ♃
 à larges feuilles. Ant. s. ch. ♃

ORDO IV.

PLUMBAGINEÆ.

PLUMBAGO

europæa L.

scandens L.

rosea L.

— *Capensis.*

STATICE.

1. *Caule ramoso.*

monopetala L.

— angustifolia.

suffruticosa L.

limonium L.

latifolia *smith. s. Linn.*spatulata *willd. hort.*bellidifolia *encycl.*mucronata L. *f.*graminifolia *willd. sp.*

tatarica L.

oleæfolia *scop. insubr.*tripteris *delile. fl.*

sinuata L.

spicata *willd. sp.*2. *Caule simplici, nudo, floribus capitatis.*

Armeria L.

maritima *willd. Enum.*fasciculata *vent. h. cels.*

pubescens.

ORDRE IV.

DENTELAIRES.

DENTELAIRE

*d'Europe. F. Ψ (méd.)**grimpeante. Antilles. s. ch. ♪**rose. inde. s. ch. ♪*

STATICÉ.

1. Tige rameuse.

*monopétale. F. m. or. ♪**— à feuilles étroites.**sous-arbrisseau. sibérie. ♪**limonium. F. Ψ**à larges feuilles. sibérie. Ψ**en spatule. F. or. Ψ**à f. de paquerette. F. m. or. Ψ**crépue. maroc. or. Ψ**à feuilles de gramin. sibér. Ψ**de Tartarie. Ψ (orn.)**à f. d'olivier. Italie. or. Ψ**à trois ailes. égypte. or. Ψ**sinuée. orient. or. Ψ**à épis. perse. or. Ψ*

2. Tige simple, nue, fleurs en tête.

*gazon-d'olympé. F. Ψ**maritime. F. Ψ (orn.)**fasciculée. Sardaigne. or. ♪**pubescente. or. ♪*

CLASSIS VIII.

CLASSE VIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

*(corolla hypogyna.)**(corolle attachée sous le pistil.)*

ORDO I.

ORDRE I.

LYSIMACHIÆ.

LYSIMACHIES.

CENTUNCULUS

minimus L.

CENTENILLE

naine. F. ⊙

ANAGALLIS

- arvensis L.
 — cœrulea.
 monelli L.
 latifolia L.
 collina schousb. Maroc. }
 fruticosa vent. ch. de pl. }
 tenella s. veg. }
 Lysimachia tenella L. }

LYSIMACHIA

- vulgaris L.
 Ephemeron L.
 orientalis Encycl. }
 atropurpurea Murray, Goett. }
 Thyrsoflora L.
 verticillata Marsch. cauc.
 punctata L.
 ciliata L.
 nemorum L.
 nummularia L.
 Linum-stellatum L.

HOTTONIA

- palustris L.

CORIS

- monspeliensis L.

LIMOSELLA

- aquatice L.

TRIENTALIS

- europæa L.

ARETIA

- vitaliana s. veg.

ANDROSACE

- maxima L.
 septentrionalis L.
 elongata s. veg.
 lactea L.
 carnea L.
 villosa L.

PRIMULA

- veris L.
 elatior Willd. sp.
 — acaulis.
 perreiniana Flugge, Ann.
 auricula L.

MOURON

- des champs. F. ☉
 — bleu.
 de Monelli. esp. ☉
 à larges feuilles. esp. ☉
 arbrisseau. Barbarie. or. ☽
 rampant. F. ♄

LYSIMACHIE

- commune. F. ♄ (méd.)
 éphémère. esp. ♄
 d'Orient. or. ♄
 en thyrses. F. ♄
 verticillée. caucase. ♄
 ponctuée. F. ♄
 ciliée. Am. s. ♄
 des bois. F. ♄
 nummulaire. F. ♄
 lin-étoilé. F. ☉

HOTTONIA

- des marais. F. ♄

CORIS

- de Montpellier. F. m. or. ♄

LIMOSELLE

- aquatique. F. ☉

TRIENTALIS

- d'Europe. F. Alpes. ♄

ARETIA

- des Alpes. F. ♄

ANDROSACÉ

- à grand calice. F. ☉
 du Nord. Russie. ☉
 à longs pédoncules. F. ☉
 blanc. Alpes. ♄
 couleur de chair. Alpes. ♄
 velu. Alpes. ♄

PRIMEVÈRE

- commune. F. ♄ (orn.)
 élevée. F. ♄
 — sans tige.
 de Perrein. ♄ (orn.)
 oreille-d'ours. Alp. ♄ (orn.)

marginata willd. sp.
farinosa L.
viscosa All. ped.
integrifolia L.
villosa Jacq. Aust. suppl.
auriculata Encycl.
cortusoides willd. sp.

CORTUSA
mathioli L.

SOLDANELLA
alpina L.

DODECATHÉON
meadia L.

CYCLAMEN
europæum L.
hederæfolium H. K.

Genera Lysimachiis affinia.

GLOBULARIA
alypum L.
longifolia H. K. }
salicina Encycl. }
vulgaris L.
nudicaulis L.
cordifolia L.

SAMOLUS
valerandi L.

UTRICULARIA
vulgaris L.
minor smith. Fl.

PINGUICULA
vulgaris L.

MENYANTHES
trifoliata L.

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Stamina 2 aut plura non didynama.

POLYGALA.

1. *Cristata.*

vulgaris L.

bordée. suisse. ψ
farineuse. Alpes. ζ
visqueuse. Alpes. ζ
à feuilles entières. Alpes. ψ
velue. Alpes. ψ
auriculée. orient. or. ζ
à feuilles de cortusa. sibér. ζ

CORTUSA
de Matthiole. Alpes. ψ

SOLDANELLE
des Alpes. ζ

DODÉCATHÉON
méadia. am. s. ζ (orn.)

CYCLAMEN
d'Europe. f. m. ψ (orn.)
à f. de Lierre. Italie. ζ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Lysimachies.

GLOBULAIRE
alypum. f. m. or. ψ
à long. feuilles. madère. or. ψ
commune. f. ψ
à tige nue. Alpes. ψ
à feuilles en cœur. Alpes. ζ

SAMOLUS
mouyon-d'eau. f. ⊙

UTRICULAIRE
commune. f. ψ
grêle. f. ζ

GRASSETTE
commune. f. ψ

MÉNYANTHE
trèfle-d'eau. f. ψ (méd.)

ORDRE II.

PÉDICULAIRES.

I. 2 ou plusieurs étamines non didynames.

POLYGALA.

1. Fleurs barbues.

commun. f. ψ

amara L.
 monspeliaca L.
 austriaca crantz. Austr.
 myrtifolia L.
 oppositifolia L. Mant.
 cordifolia Willd. sp.

2. Imberbes.

chamæbuxus L.
 Heisteria L.

VERONICA.

1. Spicata.

gentianoides Vahl. sp.
 virginiana L.
 spuria L.
 maritima L.
 longifolia L.
 elatior.
 incana L.
 spicata L.
 hybrida L.
 pinnata Willd. sp.
 incisa Willd. sp.

2. Corymboso-racemosa.

officinalis L.
 bellidioides L.
 fruticulosa L.
 alpina L.
 decussata Willd. sp.
 serpyllifolia L.
 beccabunga L.
 Anagallis L.
 scutellata L.
 Teucrium L.
 prostrata L.
 chamædryas L.
 latifolia L.
 melissæfolia Encycl.
 urticæfolia Jacq. Austr.
 montana L. f.
 multifida L.
 austriaca L.
 nitida.
 orientalis Vahl. sp.

amer. F. ℥
 de Montpellier. ⊙
 d'Autriche. F. ⊙
 à feuilles de myrte. cap. or. ♃
 à feuilles opposées. cap. or. ♃
 à feuilles en cœur. cap. or. ♃

2. Fleurs sans barbes.

à feuilles de buis. F. ♃
 d'Heister. cap. or. ♃

VÉRONIQUE.

1. Fleurs en épi.

à f. de gentiane. orient. ♣
 de Virginie. ℥
 à feuilles ternées. sibérie. ℥
 maritime. EUR. ♣
 à longues feuilles. suisse. ♣
 élevée. ♣
 blanche. Russie. ℥
 à épis. F. ♣
 hybride. suède. ℥
 pennée. sibérie. ℥
 incisée. sibérie. ℥

2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinale. F. ♣ (méd.)
 à f. de paquerette. Alpes. ♣
 fruticuleuse. Alpes. ♃
 des Alpes. F. ♣
 croisette. Magellan. ♃
 à feuilles de serpolet. F. ♣
 beccabunga. F. ℥ (méd.)
 Anagallis. F. ⊙ (méd.)
 à feuilles linéaires. F. ℥
 à feuell. de germandrée. F. ℥
 couchée. F. ℥
 chamædryas. F. ℥
 à larges feuilles. F. ♣
 à feuilles de mélisse. ♣
 à feuilles d'ortie. F. ℥
 des montagnes. F. ♣
 découpée. sibérie. ℥
 d'Autriche. ♣
 luisante. ♣
 d'Orient. ♣

3. *Pedunculis unifloris.*

persica.
 agrestis *L.*
 arvensis *L.*
 hederæfolia *L.*
 triphyllos *L.*
 verna *L.*
 romana *L.*
 peregrina *vahl. sp.* }
 præcox *vahl. sp.*
 acinifolia *vahl. sp.*
 digitata *vahl. sp.* }
 chamæpithyoides *Lamk. ill.* }

SIBTHORPIA

europæa *L.*
 africana *L.*

DISANDRA

prostrata *L. f.*

II. *Stamina 4 didynamis.*

ERINUS

alpinus *L.*

MANULEA

oppositifolia *vent. malm.*
 alternifolia.

EUPHRASIA

officinalis *L.*
 odontites *L.*

PEDICULARIS

palustris *L.*
 sylvatica *L.*

RHINANTHUS

crista-galli *L.*
 hirsuta.

MELAMPYRUM

arvense *L.*
 cristatum *L.*
 pratense *L.*
 sylvaticum *L.*

OROBANCHE

major *smith. fl.*
 caryophyllacea *smith. soc. Lin.*
 minor *smith. fl.*
 ramosa *L.*

3. Pédoncules à une fleur!

de Perse. ☉
 agreste. *F.* ☉
 des champs. *F.* ☉
 à feuilles de Lierre. *F.* ☉
 à trois feuilles. *F.* ☉
 printanière. *F.* ☉
 romaine. *F.* ☉
 précoce. *F.* ☉
 à feuilles d'acinos. *F.* ☉
 digitée. *F. m.* ☉

SIBTHORPIA

d'Europe. *F.* ☹
 d'Afrique. *cap. or.* ☹

DISANDRA

couchée. *madère. or.* ☹.

II. 4. étamines didyames.

ÉRINUS

des Alpes. ☹

MANULEA

à feuilles opposées. *cap. or.* ☹
 à feuell. altern. *N. Holl. or.* ☹

EUFRAISE

officinale. *F.* ☉ (méd.)
 odontites. *F.* ☉

PÉDICULAIRE

des marais. *F.* ☹
 des bois. *F.* ☹

COCRÉTE

crête-de-coq. *F.* ☉
 velu. *F.* ☉

MÉLAMPYRUM

des champs. *F.* ☉
 à crête. *F.* ☉
 des prés. *F.* ☉
 des bois. *F.* ☉

OROBANCHE

élevée. *F.* ☹
 odorante. *F.* ☹
 petite. *F.* ☹
 rameuse. *F.* ☹

LATHRÆA
clandestina L.

CLANDESTINE
commune. F. ☞

ORDO III.

ACANTHÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BARLERIA
prionitis L.
gentianoides.
— { eranthemum flavum Willd. }
Enum. suppl.

ACHANTHUS
mollis L.
spinosus L.
spinosissimus Pers. syn.

RUPELLIA
blechum L.
strepens L.
— { varians Vent. H. cels.
eranthemum pulchellum }
Andr. rep.
ovata Cav. Ic.
lactea Cav. Ic.
patula Jacq. Ic.
tuberosa L.

II. Stamina 2.

JUSTICIA.

1. Fruticosæ.

Adhatoda L.
hyssopifolia L.
orchioïdes L. f.
spinosa Jacq. Amer.
paniculata Vahl. sp.
— nasuta L.
bracteolata Jacq. Ic.
coccinea Smith. Pict.
pulcherrima Jacq. Ic.
formosa Willd. Enum.
lucida H. K.
cristata Jacq. H. sch.
infundibuliformis L.
æbolum L.

ORDRE III.

ACANTHÉES.

I. 4 étamines didynames.

BARLERIA
prionitis. inde. s. ch. ☞

à fleurs de gentiane. s. ch. ☞
blanches. — de l'Inde. Voir page 2.

ACANTHE
branche-ursine. ital. ☞ (méd.)
épineuse. italie. ☞
hérissée. ☞

RUPELLIA
blechum. Antilles. s. ch. ☞
élastique. Virginie. or. ☞

bleu. inde. s. ch. ☞

ovale. Mexique. s. ch. ☞
blanc. Mexique. s. ch. ☞
étalé. inde. s. ch. ☞
tubéreux. Antilles. s. ch. ☞

II. 2 étamines.

CARMANTINE.

1. Tiges ligneuses.

Adhatoda. ceylan. or. ☞ (orn.)
à f. d'hysope. canar. or. ☞
à fleurs d'orchis. cap. or. ☞
épineuse. Antilles. s. ch. ☞
paniculée. inde. s. ch. ☞
tubulée. inde. s. ch. ☞
bractéolée. caracas. s. ch. ☞
écarlate. caïenne. s. ch. ☞
mouchetée. Am. m. s. ch. ☞
élégante. s. ch. ☞
luisante. s. ch. ☞
à crêtes. s. ch. ☞
infundibuliform. inde. s. ch. ☞
æbolum. inde. s. ch. ☞

- *Gendarussa* L. f. }
quadrifida Vahl. sp. }
coccinea Cav. Ic. }
resupitana Vahl. sp. }
sexangularis Cav. Ic. }
Dicliptera resupinata Juss. }
 Ann. }
bicaliculata Vahl. sp. }
ligulata Cav. Ic. }
Dianthera malabarica L. f. }

2. *Herbaceæ.*

- furcata* Jacq. H. Sch. }
peruviana Cav. Ic. }
ciliaris L. f. }
lithospermifolia Jacq. H. Sch. }
ladanoides Lamk. Ill. }

in de Supplement p. 274,
 article Thunbergia.

ORDO IV.

J A S M I N E Æ.

I. *Fructus capsularis.*

SYRINGA

- vulgaris* L.
persica L.
 — *laciniata*.

FRAXINUS

- excelsior*.
 — *argentea*.
 — *verrucosa*.
 — *jaspidea*.
 — *horizontalis*.
 — *pendula*.
rotundifolia Encycl. }
lentiscifolia. }
parvifolia Encycl. }
monophylla Vahl. sp. }
ornus L.
pubescens Encycl.
americana L.
juglandifolia Encycl.
sambucifolia Encycl.
quadrangulata Mich. Fl.
platicarpa Mich. Fl.
nana Duham. Arb. Ed. n.
atrovirens Duham. Arb. Ed. n.

Gendarussa. inde. s. ch. ♀*quadrifide*. N. Esp. s. ch. ♀

à fl. renversées. N. Esp. s. ch. ♀

caliculée. inde. s. ch. ♀

2. Tiges herbacées.

fourchue. Pérou. ☞*ciliée*. Ceylan. ⊙

à feuilles de greuil. Pérou. ⊙

ORDRE IV.

J A S M I N É E S.

I. Une capsule.

LILAS

- commun.* Asie. ♀ (orn.)
de Perse. ♀ (orn.)
 — *lacinié*.

FRÉNE

- élevé*. F. ♀
 — *argenté*.
 — *graveleux*.
 — *jaspé*.
 — *horizontal*.
 — *pleureur*.
 à feuilles rondes. Italie. ♀
 à f. de Lentisque. orient. ♀
 à une feuille. Am. s. ♀
 à fleurs. Italie. ♀
pubescent. Am. s. ♀
d'Amérique. ♀
 à feuilles de Noyer. Am. s. ♀
 à feuilles de sureau. Am. s. ♀
quadrangulaire. Am. s. ♀
 à fruit large. Am. s. ♀
nain. Am. s. ♀
vert-sombre. Am. s. ♀

FONTANESIA
phillyreoides Bill. Decad.

II. Fructus baccatus.

CHIONANTHUS
virginica Z.

OLEA
europæa Z.
— buxifolia.
undulata Jacq. H. sch.
divaricata.
capensis Z.
americana L. Mant.
excelsa Vahl. symb.
fragrans Thunb. Jap.
emarginata Lamk. ill.

NOTELÆA
longifolia Vent. ch. de pl.
rigida.

PHILLYREA
angustifolia Z.
media L.
latifolia L.
— lævis.

MOGORIUM
— { sambac.
nyctanthes sambac Z.
jasminum sambac Vahl. sp. }

JASMINUM
glaucum Z. f.
simplicifolium Vahl. sp.

multiflorum Andr. rep. }
hirsutum H. K. }
fruticans Z.
humile L.
— odoratissimum L.
azoricum L.
volubile Jacq. H. sch.

— mauritianum. v. l. flexibile.
officinale L.
grandiflorum Z.

FONTANESIA
à feuilles de Filaria. Asie. ♀
(orn.)

II. Une baie.

CHIONANTE
de Virginie. ♀ (orn.)

OLIVIER
cultivé. F. m. ♀ (écon.)
— à feuilles de buis.
ondulé. cap. or. ♀
étalé. or. ♀
du Cap. or. ♀
d'Amérique. or. ♀
élevé. canaries. or. ♀
odorant. Japon. or. ♀ (écon.)
échancré. Madagascar. s. ch. ♀
de l'Inde & de la Sibirie.

NOTÉLÉA
à long. feuilles. N. Holl. or. ♀
à feuil. roides. N. Holl. or. ♀

FILARIA
à feuilles étroites. F. m. ♀
moyen. F. m. ♀ (orn.)
à larges feuilles. F. m. ♀ (orn.)
— lisse.

MOGORI
jasmin d'Arabie. s. ch. ♀
(orn.)

JASMIN
glaucum. cap. or. ♀
à feuilles simples. île des amis.
s. ch. ♀

à fleurs nombreuses. s. ch. ♀

cytise. F. m. ♀ (orn.)
d'Italie. or. ♀ (orn.)
jonquille. madère. or. ♀ (orn.)
des Açores. or. ♀ (orn.)
sarmenteux. inde. s. ch. ♀
(orn.)
de l'île de France. s. ch. ♀
officinal. inde. ♀ (orn.)
à grandes fleurs. inde. or. ♀
à feuilles de l'Inde.

LIGUSTRUM

- vulgare L.
japonicum Thunb. Jap.
lucidum H. K.

O R D O V.

VITICEÆ.

I. Flores oppositè corymbosi.

CLERODENDRUM

- viscosum Vent. Malm. }
infortunatum L. ? }
phlomis Vahl. symb. }
— phlomisides. }
— { siphonanthus H. K. }
— { siphonanthus indica L. }
— ovieda mitis L. }

VOLKAMERIA

- tomentosa Vent. Malm.
aculeata L.
inermis L.
angustifolia Encycl.

ligustrina Jacq. coll.

- { japonica Jacq. H. Sch. }
— { clerodendrum fragrans Willd. }
— Enum.

ÆGIPHILA

- martinicensis L. Mant.
macrophylla (an generis?).

VITEX

- agnus-castus L.
— albidus.
incisa Encycl.
— alba.

CALLICARPA

- americana L.
— cana Vahl. symb.
tomentosa Willd. Enum.

CORNUTIA

- pyramidata L. }
— hosta cœrulea Jacq. H. Sch. }

— Tectona grandis, J. Presl. Telleka.

TROËNE

- commun. F. ♪ (orn.)
du Japon. or. ♪
luisant. chine or. ♪

O R D R E V.

GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbe et opposées.

CLÉRODENDRUM

- visqueux. inde. s. ch. ♪
à feuilles de phlomis. inde.
s. ch. ♪
à longues fl. inde. s. ch. ♪

VOLKAMÉRIA

- cotonneux. s. ch. ♪
épineux. Antilles. s. ch. ♪
sans épines. inde. s. ch. ♪
à feuilles étroit. île de France.
s. ch. ♪
à f. de Troëne. île de Fr. s. ch. ♪

du Japon. s. ch. ♪ (orn.)

ÆGIPHILA

- de la Martinique. s. ch. ♪
à grand. f. Antilles. s. ch. ♪

VITEX

- agnus-castus. F. m. ♪ (méd.)
— blanc.
incisé. chine. ♪ (orn.)
— blanc.

CALLICARPA

- d'Amérique. Am. s. or. ♪
blanc. inde. s. ch. ♪
cotonneux. s. ch. ♪

CORNUTIA

pyramidal, Antilles. s. ch. ♪

Tect. s. 118. 119.

II. Flores racemosi in racemis alterni.

CITHAREXYLUM

- villosum *Willd. sp.* }
 tomentosum *Encycl. suppl.* }
 quadrangulare *s. veg.*
 coriaceum.
 pentandrum *vent. H. cels.*

DURANTA

- plumieri *L.*
 ellisia *L.*
 microphylla.

LANTANA

- trifolia *L.*
 annua *L.*
 involucrata *L.*
 recta *H. K.*
 salvifolia *Jacq. H. sch. (non Lin.)*
 violacea.
 cinerea *Encycl.*
 nivea *vent. Malm.*
 suaveolens.
 camara *L.*
 aculeata *L.*
 — flava.

SPIELMANNIA

- africana *Willd. sp.* }
 lantana africana *L.* }

ZAPPANIA

- globifera. }
 verbena globifera *P. Her. stirp.* }
 odoratissima *scop. Insubr.* }
 nodiflora *Pers. syn.* }
 verbena nodiflora *L.* }

PRIVA

- mexicana *Pers. syn.* }
 verbena mexicana *L.* }

STACHYTARPHETA

- angustifolia *Vahl. sp.* }
 verbena indica *Jacq. obs.* }
 (non *Lin.*). }
 mutabilis *Vahl. sp.* }
 verbena mutabilis *Jacq. Ic.* }
 jamaicensis *Vahl. sp.* }
 verbena jamaicensis *L.* }

— *Cavaler.*

— *Aubra.*

II. Fleurs alternes en grappes.

BOIS-GUITARE

- velu. Antilles. s. ch. 5
 quadrangulaire. Antill. s. ch. 5
 coriace. s. ch. 5
 à 5 étamines. Antill. s. ch. 5

DURANTA

- de Plumier. Antilles. s. ch. 5
 lancéolé. Antilles. s. ch. 5
 à petites feuil. Antill. s. ch. 5

LANTANA

- à feuilles ternées. Ant. s. ch. 5
 annuel. Antilles. ☉
 à involucre. Antilles. s. ch. 5
 à tige droite. Antill. s. ch. 5
 à feuil. de sauge. cap. or. 5
 violet. s. ch. 5
 cendré. Antilles. s. ch. 5
 à fleurs blanch. inde. s. ch. 5
 odorant. s. ch. 5
 camara. Antilles. s. ch. 5
 épineux. Antilles. s. ch. 5
 — jaune.

SPIELMANNE

- d'Afrique. cap. or. 5

ZAPPANIA

- globuleux. Antilles. s. ch. 5

- nodiflore. F. m. or. 5

PRIVA

- du Mexique. s. ch. 5

STACHYTARPHETA

- à feuilles étroites. Am. m. ☉

- changeant. Chili. s. ch. 5

- de la Jamaïque. s. ch. 5

— *Vahl.* 5

— *Anges.*

VERBENA

- triphylla *l'her. stirp.*
 multifida *Fl. per.* }
 erinoides *Lamk. ill.* }
 aubletia *L. f.*
 urticæfolia *L.*
 carolina *L.*
 stricta *Vent. H. cels.* }
 rigens *Mich. Fl.* }
 paniculata *Lamk. ill.*
 diffusa.
 hastata *L.*
 — bonariensis *L.*
 bracteosa *Mich. Fl.*
 officinalis *L.*
 supina *L.*

SELAGO

- Corymbosa* *L.*

HEBENSTRETIA

- dentata *L.*

ORDO VI.

LABIATÆ.

I. Stamina 2 fertilia.

LYCOPUS

- europæus *L.*
 exaltatus *L. f.*

AMETHYSTEA

- cœrulea *L.*

ZIZIPHORA

- capitata *L.*
 tenuior *L.*
 cunila.
 cunila capitata *L. f.* }
 pulegioides }
 cunila pulegioides *L.* }
 mariana.
 cunila mariana *s. veg.* }

MONARDA

- fistulosa *L.*
 didyma *L.*
 violacea. }
 clinopodia *L. ?* }
 punctata *s. veg.*

VERVEINE

- à trois f. chili. or. ♀ (orn.)
 laciniée. Pérou. ☉
 à bouquets. caroline. or. ♂
 à feuilles d'ortie. Am. s. ☿
 de Caroline. ♀
 fasciculée. Am. s. ♀
 paniculée. Am. s. ☿
 étalée. or. ♀
 hastée. Am. s. ♀
 de Buénos-Ayres. or. ♂
 à longues bractées. Am. s. ☉
 officinale. F. ♀ (méd.)
 couchée. F. ☉

SÉLAGO

- corymbifère. cap. or. ♀

HÉBENSTRETIA

- denté. cap. or. ♂

ORDRE VI.

LABIÉES.

I. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS

- d'Europe. F. ☿
 pinnatifide. Italie. ♀

AMÉTHYSTÉA

- bleu. Sibérie. ☉

ZIZIPHORA

- à fleurs en tête. orient. ☉
 lancéolé. orient. ☉
 cunila. Sibérie.
 à feuell. de pouliot. Canada. ☉
 de Virginie. Am. s. ♀

MONARDA

- fistuleux. Am. s. ♀ (orn.)
 écarlate. Am. s. ♀ (orn.)
 violet. Am. s. ♀
 ponctué. Am. s. ☿

WESTERINGIA
rosmarinifolia Andr. rep.

ROSMARINUS
— officinalis L.

SALVIA.

1. Fruticosa.

- pomifera L.
officinalis L.
— tricolor.
— variegata.
tenuior.
grandiflora Vahl. sp.
cretica L.
sypileæ Lamk. ill. }
triloba L. f. ? }
africana L.
paniculata L. Mant.
chamædryoides Cav. ic.
aurea L.
interrupta Schousb. Mar.
canariensis L.
mexicana L.
formosa L'Her. stirp. }
leonuroides Vahl. sp. }
polystachya Cav. ic.
melissæfolia.
scorodoniæfolia.
lamiifolia Jacq. H. Sch.
leucantha Cav. ic.
fœtida Desf. Atl. }
tingitana Willd. sp. }
— coccinea L. f.
pseudo-coccinea Jacq. ic.
disermas L.

2. Caule herbaceo.

- pulchella Dec. Cat.
pinnata L.
azurea Vahl. sp. }
acuminata Vent. H. Cels. }
angustifolia Mich. Fl. }
reptans Jacq. H. Sch. }
angustifolia Cav. ic. }
scabiosæfolia Lamk., Journ. }
d'Hist. nat. }
habliziana Willd. sp. }

WESTERINGIA
à f. de romarin. N. Holl. or. ♪

ROMARIN
officinal. F. ♪ (méd. orn.)

SAUGE.

1. Tiges ligneuses.

- pomifère. crète. or. ♪
officinale. F. m. ♪
— de trois couleurs.
— panachée.
de Catalogne. F. m. ♪
à grandes fleurs. orient. ♪
de Crète. ♪
du mont sypile. or. ♪
d'Afrique. cap. or. ♪
paniculée. cap. or. ♪
chamædry. mexique. or. ♪
dorée. cap. or. ♪
interrompue. Maroc. or. ♪
des Canaries. or. ♪
du Mexique. or. ♪
écarlate. Pérou. s. ch. ♪
à plusieurs épis. mexiq. or. ♪
à feuilles de mélisse. or. ♪
à feuil. de scorodonia. or. ♪
à feuilles de Lamium. or. ♪
à fleurs blanch. mexiq. or. ♪
fétide. Alger. or. ♪
rouge. Floride. or. ♪
fausse écarlate. Ant. s. ch. ♪
disermas. syrie. or. ♪

2. Tige herbacée.

- élégante. or. ♯
pennée. orient. or. ♯
azurée. caroline. or. ♯
rampante. N. Esp. s. ch. ♯
à f. de scabieuse. orient. or. ♯

glutinosa L.
 amarissima Vahl. sp. }
 circinata Cav. Ic. }
 pratensis L.
 sclarea L.
 patula Desf. Atl.
 præcox. }
 spinosa Jacq. Ic. }
 Æthiopsis L.
 austriaca Jacq. Austr.
 argentea L.
 phlomoïdes Vahl. sp.
 indica L.
 bicolor Desf. Atl. }
 crassifolia Jacq. Frag. }
 ceratophylla L.
 ceratophylloïdes L. Mant.
 runcinata L. f.
 clandestina Encycl. (non L.)
 erosa.
 sylvestris L.
 nemorosa L.
 virgata Jacq. Hort.
 gigantea.
 nubia Vahl. sp.
 nilotica L. f.
 viscosa Jacq. Ic.
 verticillata L.
 napifolia Jacq. Hort.
 ægyptiaca L.
 Horminum L.
 — rubens.
 viridis L.
 nepetifolia.
 lanceolata.
 verbenaca L.
 micrantha.
 serotina L. Mant.
 dominica L.
 hispanica L.
 tiliæfolia Vahl. sp.
 nutans L. ?
 pendula.
 nutans Wald. et Kitt. Hung. }

COLLINSONIA
 canadensis L.

gluante. Alpes. ♀
 amère. Mexique. or. ♀
 des prés. F. ℥ (méd.)
 sclarée. F. ♂ (méd.)
 étalée. Barbarie. or. ♂
 précoce. orient. ⊙
 cotonneuse. orient. ♂
 d'Autriche. ♀
 argentée. orient. or. ♂
 phlomoïde. Esp. or. ♀
 des Indes. ♀
 bicolore. Alger. ℥ (orn.)
 corne-de-cerf. Syrie. or. ♂
 laciniée. Sicile. or. ♂
 pinnatifide. Cap. or. ♀,
 clandestine. Italie. ♂
 rongée. ⊙
 sauvage. Allem. ♀
 des bois. Autriche. ♀
 effilée. orient. ℥
 gigantesque. ♂
 de Nubie. ⊙
 du Nil. ⊙
 visqueuse. Italie. ♀
 verticillée. F. m. ℥
 à feuilles de Navet. F. ♀
 d'Égypte. or. ♀
 ormin. F. m. ⊙
 — rouge.
 verte. Barbarie. ⊙
 à feuilles de cataire. ⊙
 lancéolée. ⊙
 verveine. F. ♂
 à petites fleurs. ♂
 tardive. orient. ♂
 des Antilles. s. ch. ♀
 d'Espagne. ⊙
 à feuilles de tilleul. Pérou. ⊙
 penchée. Russie. ♀
 pendante. Russie. ♀

COLLINSONIA
 de Canada. ♀

II. Stamina 4 didynama, labium superius nullum aut brevissimum.

AJUGA

orientalis L.
genevensis L.
pyramidalis L.
reptans L.

TEUCRIUM

canariense *encycl.* }
heterophyllum *willd. sp.* }
fruticans L.
rosmarinifolium *encycl.*
betonicum *l'her. stirp.* }
canescens *Forst. Coett.* }
maderiense *encycl.* }
abutiloides *l'her. stirp.*
campanulatum L.
orientale L.
resupinatum *Desf. Atl.*
chamæpitys L.
pseudo-chamæpitys L.
iva L.
Laxmanni *s. veg.*
botrys L.
cubense L. *Mant.*
flavum L.
lucidum L.
chamædrys L.
— major.
myrtiflorum.
marum L.
multifolium L.
canadense L.
hyrcanicum L.
massiliense L.
asiaticum L. *Mant.*
scorodonia L.
scordium L.
montanum L.
pyrenaicum L.
aureum *Schreb. Vert.* }
flavicans *encycl.* }
polium L.
capitatum L.
spinosum L.

II. 4 étamines didynames, lèvre supérieure nulle ou presque nulle.

BUGLE

d'Orient. or. ♀
de Genève. F. ♀
pyramidale. F. ♀
rampante. F. ♀

GERMANDRÉE

des Canaries. or. ♀
arbrisseau. F. m. or. ♀
à f. de romarin. orient. or. ♀
à f. de bétoine. canar. or. ♀
à f. d'abutilon. canar. or. ♀
campanulée. orient. ♂
d'Orient. or. ♂
renversée. Alger. or. ♂
chamæpitys. F. ⊙ (méd.)
faux chamæpitys. barb. or. ♂
ivette. F. m. or (méd.)
de Laxmann. sibérie. ♂
botrys. F. ⊙ (méd.)
de Cuba. s. ch. ♀
jaune. esp. ♀
luisante. F. m. ♀
chamædrys. F. ♀ (méd.)
— élevée.
à feuell. de Myrte. orient. or. ♀
marum. esp. or. ♀ (méd.)
à fleurs nombr. esp. or. ♀
de Canada. ♂
d'Hyrcanie. ♂
de Marseille. or. ♀
d'Asie. or. ♀
des bois. F. ♀ (méd.)
scordium. F. ♀ (méd.)
de montagne. F. m. or. ♀
des Pyrénées. F. ♀
jaunâtre. F. m. or. ♀
polium. F. m. or. ♀
à fleurs en tête. esp. or. ♀
épineuse. esp. ♂

III. *Stamina 4 didynama, corolla bilabiata.*

SATUREIA

græca L.
juliana L.
capitata L.
rhymbra L.
montana L.
hortensis L.

HYSSOPUS

officinalis L.
— myrtifolius.
angustifolius Marsch. cauc.
lophanthus L.
nepetoides L.
scrophulariæfolius Willd. sp.
ocimifolius Encycl.
mentha patrini Pallas. n. Act.
petr. }
mentha ovata Cav. Ic. }
elsholtzia cristata Willd. En. }

NEPETA

cataria L.
pannonica L.
marrubioïdes Willd. Enum.
incana Willd. sp.
nepetella L.
amethystina.
longiflora Vent. H. cels.
nuda L.
— alba.
violacea L.
crispa Willd. sp.
italica L.
reticulata Desf. Atl.
tuberosa L.
bipinnata Cav. Ic. }
botryoides Willd. sp. }
multifida L. f. (non L. sp.) }
multifida L. }
lavendulacea L. f. }

PERILLA

ocimoides s. Veg.

LAVANDULA

spica L.
latifolia.

III. 4 étamines didynames, corolle à deux lèvres.

SARRIETTE

de Grèce. or. ℥
à feuil. linéair. orient. or. ℥
à fleurs en tête. orient. or. ♃
Thymbra. orient. or. ♃
de montagne. F. ♃
des jardins. F. ⊙ (écon. méd.)

HYSOPE

officinal. F. ♃ (méd.)
— à feuilles de Myrte.
à feuilles étroites. ibérie. ♃
à fl. renversées. chine. or. ℥
à feuil. de cataire. Am. s. ℥
à f. de scrophulaire. canad. ℥

à grandes bractées. sibér. ⊙

CATAIRE

herbe-aux-chats. F. ℥ (méd.)
paniculée. Hongrie. ℥
à feuilles de Marrube. ℥
blanche. orient. ℥
à feuilles étroites. F. ℥
améthyste. ℥
à longues fleurs. orient. or. ℥
nue. suisse. ℥
— à fleurs blanches.
violette. Esp. ℥
crépue. orient. or. ℥
d'Italie. ℥
réticulée. barbarie. ℥
tubéreuse. Esp. ℥

bipennée. sibérie. ⊙

laciniée. Russie. ℥

PÉRILLA

à feuil. de Basilic. inde. ⊙

LAVANDE

spic. F. m. ♃ (orn. méd.)
à larges feuilles. or. ♃

stæchas L.
heterophylla.
dentata L.
multifida L.
pinnata willd. sp.
elegans.
abrotanoides willd. sp. }

stéchas. F. m. or. ♪ (méd.)
à feuilles variables. or. ♪
dentée. esp. or. ♪
découpée. barbarie. ⊙
pennée. madère. or. ♪
élégante. canaries. or. ♪

SIDERITIS.

1. Ebracteata.

cretica L.
candicans willd. sp.
canariensis L.
montana L.
romana L.
nigricans *encycl.* }
elegans willd. sp. }

2. Bracteata bracteis integris.

syriaca L.
perfoliata L.

3. Bracteata bracteis dentatis.

hirsuta L. (*exclus. syn. Bau-*
hini.)
foetida.
scordioides L.
hyssopifolia L.
incana L.

BISTROPOGON

canariense *l'her. sert.*
punctatum *l'her. sert.*

MENTHA.

1. Spicata.

lavandulæfolia.
sylvestris L.
viridis L.
rotundifolia L.
crispa L.
piperita L.

2. Capitata.

aquatica L.
citrata willd. sp.

SIDÉRITIS.

1. Fleurs sans bractées.

de Crète. or. ♪
blanchâtre. madère. or. ♪
des Canaries. or. ♪
des montagnes. F. ⊙
de Rome. F. m. ⊙
noirâtre. ⊙

2. Fleurs accompagnées de bractées entières.

de Syrie. or. ♪
perfolié. orient. or. ♯

3. Bractées dentées.

velu. F. ♪
fétide. esp. ♪
à feuilles de scordium. F. ℥
à feuilles d'hysope. F. ♪
blanc. esp. or. ♪

BISTROPOGON

des Canaries. or. ♪
ponctué. canaries. or. ♪

MENTHE.

1. Fleurs en épis.

à feuilles de lavande. or. ℥
sauvage. F. ♯ (méd.)
verte. F. ♯
ronde. F. ♯
crépue. F. ℥
poivrée. Angleterre. ♯ (méd.)

2. Fleurs en tête.

aquatique. F. ♯
citronnelle. Europe. ℥

3. *Verticillata.*

saliva L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

HYPTIS

capitata Jacq. ic.

GLECOMA

hederacea L.
hirsuta Wald. et Kitt. Hung. ?

LAMIUM

orvala L.
hirsutum *Encycl.*
maculatum L.
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
— album L.
molle H. K.

GALEOPSIS

tetrahit L.
ladanum L.
villosa Smith. fl.
grandiflora Willd. sp. }
versicolor Smith. fl. }

GALEOBDOLON

luteum Smith. fl.
Leonurus galeobdolon Willd. }
sp. }
galeopsis galeobdolon L. }

BETONICA

officinalis L.
hirsuta L. Mant.
orientalis L.
grandiflora Willd. sp.
alopecuros L.

STACHYS

sylvatica L.
palustris L.
coccinea Jacq. H. Sch.
lanata Jacq. ic.
germanica L.
intermedia Willd. sp.

— hirtusculina.
— muricata

3. Fleurs verticillées.

cultivée. Eur. Ψ (méd.)
purpurine. Eur. Σ (méd.)
des champs. F. Σ (méd.)
pouliot. F. Ψ (méd.)
fétide. F. Σ

HYPTIS

à fleurs en tête. Antill. s. ch. Σ

GLÉCOMA

Lierre terrestre. F. Ψ (méd.)
velu. F. Σ

LAMIUM

orvale. Italie. Ψ
velu. F. Ψ
maculé. F. Σ
à feuilles de cataire. Italie. Ψ
pourpre. F. \odot
amplexicaule. F. \odot
blanc. F. Σ (méd.)
à feuilles entières. Ψ

GALEOPSIS

tétrahit. F. \odot
ladanum. F. \odot
velu. F. \odot
à grandes fleurs. F. \odot

GALEOBDOLON

à fleurs jaunes. F. Ψ

BÉTOINE

officinale. F. Σ (méd.)
velue. F. Ψ
d'Orient. Σ
à grandes fleurs. orient. Σ
jaune. Alpes. Σ

STACHYS

des bois. F. Σ
des marais. F. Σ
écarlate. Mexique. or. Ψ
laineux. Sibérie. Ψ
cotonneux. F. Ψ
intermédiaire. Ψ

2. l'él. d. France

scordioides.
 palestina L.
 alpina L.
 circinata *Her. stirp.*
 nepetifolia.
 hirta L.
 glutinosa L.
 mollissima *Willd. Enum.*
 arvensis L.
 recta L. *Mant.*
 purpurea.
 annua L.
 maritima L. *Mant.*

BALLOTA

lanata L.
 nigra L.

MARRUBIUM.

1. *Calicibus quinque-dentatis.*
 Alysson L.
 peregrinum L.
 candidissimum L.
 supinum L.
 rugosum.
 astracanicum *Marsch. cauc.*

2. *Calicibus decem-dentatis.*
 vulgare L.
 crispum L.
 pseudo-dictamnus L.
 hispanicum *Encycl. (non L.)*

LEONURUS

marrubiastrum, L.
 sibiricus L.
 — cardiaca L. *vel officinalis.*
 crispus L.
 villosus.
 tataricus L.

PHLOMIS

fruticosa L.
 — angustifolia.
 — latifolia.
 italica *Smith. spicil.*
 purpurea *Smith. spicil.*
 lychnitis L.
 laciniata L.

à f. de scordium. maroc. or. ℥
 de Palestine. or. ♃
 des Alpes. ♣
 à feuilles rondes. barb. or. ♣
 à feuilles de cataire. or. ℥
 velu. F. ℥
 gluant. crête. or. ♣
 velouté. ℥
 des champs. F. ⊙
 crapaudine. F. ℥
 pourpre. or. ♣
 annuel. F. ⊙
 maritime. ♣

BALLOTE

laineux. sibérie. ℥
 noir. F. ♣

MARRUBE.

1. Calices à 5 dents.

Alysson. esp. or. ♣
 étranger. orient. ℥
 très-blanc. orient. ♣
 couché. F. m. or. ♣
 ridé. or. ♣
 d'Astracan. ♣

2. Calices à 10 dents.

commun. F. ♣ (méd.)
 crépu. italie. or. ♃
 faux dictame. crête. or. ♃
 d'Espagne. ℥

CARDIAQUE

à petites fleurs. Allem. ⊙
 de Sibérie. ♂
 officinale. F. ♣ (méd.)
 crépue. sibérie. ♣
 velue. ♣
 de Tartarie. ♂

PHLOMIS

arbrisseau. sicile. ♃ (orn.)
 — à feuilles étroites.
 — à larges feuilles.
 d'Italie. or. ♃
 pourpre. esp. or. ♃
 à feuil. de sauge. F. m. or. ♃
 lacinié. syrie. ♣

herba-venti *L.*
 tuberosa *L.*
 — leonurus *L.*
 nepetifolia *L. f.*
 zeylanica *L.*
 caribæa *Jacq. ic.*
 martinicensis *Willd. sp.* }

MOLUCELLA

lævis *L.*
 spinosa *L.*

CLINOPODIUM

vulgare *L.*
 incanum *L.*

ORIGANUM

dictamnus *L.*
 vulgare *L.*
 humile.
 pallidum.
 smyrneum *L.*
 ægyptiacum *L.*
 majoranoides *Willd. sp.*

THYMUS

serpyllum *L.*
 — villosum.
 — citratum.
 piperella *s. veg.*
 vulgaris *L.*
 — latifolius.
 majoranæfolius.
 filiformis *Willd. sp.*
 zygis *L.*
 hispanicus.
 mastichina *L.*
 alpinus *L.*
 patavinus *Jacq. obs.*
 acinos *L.*
 virginicus *s. veg.*
 brachystemum virginicum }
Mich. fl.

THYMBRA

spicata *L.*

MELISSA

officinalis *L.*
 hirsuta.
 grandiflora *L.*

violet. *F. m.* ☿
 tubéreux. sibiérie. ☿ (orn.)
 Léonurus. cap. or. ♀ (orn.)
 à feuilles de cataire. inde. ☉
 de Ceylan. ☉
 des Antilles. ☉

MOLUCELLE

lisse. syrie. ☉
 épineuse. syrie. ☉

CLINOPODIUM

commun. *F.* ☿
 blanc. *Am. s.* ☿

ORIGAN

dictame. crête. or. ☿ (orn.)
 commun. *F.* ☿ (méd.)
 nain. ☿
 pâle. orient. ☿
 de Smyrne. orient. or. ☿
 à coquilles. orient. or. ♀ (orn.)
 marjolaine. orient. or. ♀

THYM

serpolet. *F.* ☿ (méd.)
 — velu.
 — citronnelle.
 piperelle. *esp.* or. ♀
 commun. *esp.* ♀ (orn. méd.)
 — à larges feuilles.
 à feuilles de marjolaine. ♀
 filiforme. mahon. or. ♀
 zygis. *esp.* or. ♀
 d'Espagne. or. ♀
 mastichine. *esp.* or. ♀
 des Alpes. ☿
 de Padoue. or. ♂
 acinos. *F.* ☉
 de Virginie. ☿

THYMBRA

à épis. orient. or. ♀

MÉLISSE

officinale. *F.* ☿ (écon. méd.)
 velue. ☿
 à grandes fleurs. Alpes. ☿

nepeta L.
calamintha L.
cretica L.

Népéta. f. ψ
calament. f. ℥
de Crète. or. ψ

DRACOCEPHALUM

virginianum L.

DRACOCEPHALUM

de Virginie, ou cataleptique.

ψ (orn.)

canariense L.

des Canaries. or. ♪

peregrinum L.

découpé. sibérie. ℥

austriacum L.

d'Autriche. ψ

ruyschiana L.

à feuilles linéaires. sibérie. ℥

sibiricum L.

de Sibérie. ψ

moldavica L.

moldavique. sibérie. ⊙

canescens L.

blanc. orient. ⊙

peltatum L.

en bouclier. orient. ⊙

nutans L.

à fleurs penchées. sibérie. ⊙

thymiflorum L.

à fleurs de Thym. sibérie. ⊙

MELITTIS

melissophyllum L.

MÉLITTIS

à feuilles de mélisse. f. ℥

HORMINUM

pyrenaicum L.

melissa pyrenaica willd. sp. }

virginicum L.

caulescens ortega. dec. }

lepechinia spicata willd. }

Enum.

ORMIN

des Pyrénées. ψ

de Virginie. ℥

jaune. mexique. or. ψ

PLECTRANTHUS

fruticosus l'Her. stirp. }

germanea urticæfolia encycl. }

punctatus l'Her. stirp. }

ocimum punctatum L. f. }

parviflorus willd. Enum.

PLECTRANTHUS

arbrisseau. cap. or. ♪

tacheté. Afr. ♂

à petites fleurs. pérou. s. ch. ♪

OCIMUM

gratissimum L.

zeylanicum.

micranthum willd. Enum.

tenuiflorum L.

basilicum L.

— fimbriatum.

— bullatum.

minimum L.

SCUTELLARIA

fruticosa.

lupulina L.

alpina L.

lateriflora L.

BASILIC

suave. inde. s. ch. ♪

de Ceylan. s. ch. ♪

à fleurs menues. ⊙

à petites fleurs. inde. ⊙

cultivé. inde. ⊙ (orn.)

— lacinié.

— bulleux.

nain. ceylan. ⊙

SCUTELLAIRE

arbrisseau. perse. or. ♪

jaune-pâle. sibérie. ψ

des Alpes. ψ

à grappes. Am. s. ℥

galericulata L.
 minor L.
 integrifolia L.
 peregrina L.
 altissima L.
 albida L. Mant.

PRUNELLA

vulgaris L.
 grandiflora Willd. sp.
 laciniata L.
 hyssopifolia L.
 ovata.

CLEONIA

lusitanica L.

PRASIUM

majus L.
 minus L.

— Leonotis mauritiana.

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA

globosa Lamk. ill.
 salvifolia Willd. sp.
 salicifolia Jacq. n. sch.

— Madagascarensis.
SCOPARIA

dulcis. L.

CAPRARIA

biflora L.
 lucida Willd. sp.

HALLERIA

lucida L.

SCROPHULARIA

nodosa L.
 aquatica L.
 betonicifolia L. Mant.
 auriculata L.
 altaica Willd. sp.
 scorodonia L.
 scopoli Pers. syn.
 sambucifolia L.
 mellifera Vahl. symb.

Muzia verticillata.

toque. F. ☞
 petite. F. ☞
 à feuilles entières. Am. s. ☞
 étrangère. Italie. ☞
 élevée. orient. ☞
 blanche. orient. ☞

BRUNELLE

commune. F. ☞
 à grandes fleurs. F. ☞ (orn.)
 laciniée. F. ☞
 à feuilles d'hysope. F. m. ☞
 à feuilles ovales. Am. s. ☞

CLÉONIA

de Portugal. ☉

PRASIUM

arbrisseau. F. m. or. ☞
 herbacé. Italie. or. ☞

ORDRE VII.

SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

BUDLEIA

à globules. Chili. ☞
 à feuil. de sauge. cap. or. ☞
 à feuil. de saule. cap. or. ☞

— Madagascar.
SCOPARIA

doux. Antilles. ☉

CAPRARIA

à deux fleurs. Ant. s. ch. ☞
 à feuilles luisantes. cap. or. ☞

HALLÉRIA

luisant. cap. or. ☞

SCROPHULAIRE

des bois. F. ☞ (méd.)
 aquatique. F. ☞ (méd.)
 à f. de Bétoine. Portug. or. ☞
 auriculée. Barbarie. or. ☞
 de Sibérie. ☞
 scorodonia. Barbarie. or. ☞
 de Scopoli. Carniole. ☞
 à f. de sureau. Portug. or. ☞
 mellifère. Barbarie. or. ☞

trifoliata L. }
 appendiculata Jacq. H. Sch. }
 orientalis L.
 vernalis L.
 peregrina L.
 glabrata Jacq. H. Sch.
 lucida L.
 chrysanthemifolia Willd. H. Ber.
 verbenæfolia.

DODARTIA

orientalis L.

LINARIA (Antirrhinum L.).

1. Foliis angulatis.

cymbalaria Willd. Enum.
 pilosa Willd. Enum.
 elatine L.
 spuria L.
 cirrhosa Willd. Enum.
 ægyptiaca L.

2. Foliis inferioribus oppositis.

triphylla Willd. Enum.
 triornithophora Willd. Enum.
 purpurea Willd. Enum.
 bipartita Willd. Enum.
 versicolor Willd. Enum.
 repens Willd. Enum.
 marginata Desf. Atl.
 supina Willd. Enum.
 arvensis L.
 simplex Willd. Enum.
 pelisseriana L.
 multicaulis L.
 juncea Encycl. }
 Antirrhinum sparteum Cav. Ic }
 alpina Willd. Enum.
 elegans.
 organifolia Willd. Enum.
 minor Willd. Enum.
 littoralis Willd. Enum.
 pubescens.

3. Foliis alternis.

hirta L.
 genistifolia Willd. Enum.
 vulgaris Willd. Enum.
 chalepensis Willd. Enum.
 canadensis L.

à trois folioles. barbar. or. ☞
 d'Orient. ☞
 printanière. F. ♂
 étrangère. Italie. or. ☞
 glabre. canaries. or. ♂
 luisante. orient. or. ☞
 à feuil. de chrysanthème. F. ☞
 à feuilles de verveine. ☞

DODARTIA

d'Orient. ☞

LINAIRE.

1. Feuilles anguleuses.

cymbalaire. F. ☞ (méd.)
 velue. Alpes. ☞
 élatiné. F. ☉
 velvete. F. ☉
 à vrilles. égypte. ☉
 d'Égypte. ☉

2. Feuilles inférieures opposées.

à feuilles ternées. Tunis. ☉
 à grand. fleurs. Portugal. ☉
 pourpre. F. ☞
 à fleurs d'orchis. Maroc. ☉
 bigarrée. F. ☉
 rampante. F. ☉
 membraneuse. Barbarie. or. ☞
 couchée. F. ☉
 des champs. F. ☉
 à tiges simples. F. ☉
 de Pelissier. F. ☉
 paniculée. orient. ☉
 jonciforme. esp. ☉
 des Alpes. ♂
 élégante. esp. ☉
 à feuilles d'origan. F. m. ☉
 petite. F. ☉
 des rivages. Autriche. ☉
 pubescente. ☉

3. Feuilles alternes.

velue. esp. ☉
 à feuilles de genét. Suisse. ☞
 commune. F. ☞
 à long éperon. F. ☉
 de Canada. ☉

ANTIRRHINUM

majus L.
 orontium L.
 angustifolium *encycl. suppl.*
 molle L.
 sempervirens *Lapeyr. pyr.*
 asarina L.

ANARRHINUM

bellidifolium.
 antirrhinum bellidifolium L. }

NEMESIA

foetens *vent. malm.*
 chamædryfolia *vent. malm.*
 antirrhinum macrocarpum
vahl. symb. }

HORNEMANNIA

bicolor *willd. Enum.*

DIGITALIS

canariensis L.
 purpurea L.
 minor L. *Mant.*
 ambigua L. *f.*
 lutea L.
 aurea.
 ferruginea L.
 parviflora *Jacq. hort.*
 orientalis *encycl.*
 obscura L. *Mant.*

USTERIA

scandens *cav. ic.*
 maurandia semperflorens
Jacq. H. sch. }

II. Stamina 2.

CALCEOLARIA

pinnata L. *Mant.*

III. *Genera scrophulariis affinia,*
oppositifolia.

COLUMNEA

erecta *encycl.*
 cyrilla pulchella *Pher. stirp.*
 buchnera coccinea *scop. ins.*
 gesneria coccinea *swartz. pr.*
 achymenes coccinea *pers. syn.*
 trevirana coccinea *willd. En.*
 hirsuta *swartz. prodr. ?*

MUFLIER

des jardins. F. ♂ (orn.)
 tête-de-mort. F. ⊙
 à feuilles étroites. or. ♀
 veloué. esp. or. ♀
 toujours vert. F. m. or. ♀
 asarine. F. ℥

ANARRHINUM

à feuilles de paquerette. F. ♂

NÉMÉSIA

fétide. cap. or. ♀

à f. de chamædry. cap. or. ♀

HORNEMANNIA

bicolore. cap. or. ♂

DIGITALE

des Canaries. or. ♀ (orn.)
 pourprée. F. ♂ (méd. orn.)
 petite. esp. or. ℥
 ambiguë. F. ♀
 jaune. F. ℥
 dorée. ♀
 rouillée. italie. ℥
 à petites fleurs. ♂
 d'Orient. ℥
 à feuilles étroites. esp. or. ♀

USTÉRIA

sarmenteux. mexique. or. ℥

II. 2 étamines.

CALCÉOLAIRE

pennée. pérou. ⊙

III. Genres qui ont de l'affinité avec les
 scrophulaires, feuilles opposées.

COLUMNÉA

écarlate. Antill. s. ch. ℥ (orn.)

velu. Antilles. s. ch. ♀

GRATIOLA
officinalis L.

MIMULUS
ringens L.
glutinosus Willd. sp. }
aurantiacus Bot. Mag. }
guttatus Dec. Cat. }
luteus Bot. Mag. (non L.) }

LINDERNIA
pyxidaria L. Mant.

BROWALLIA
elata L.
demissa L.

ORDO VIII.

SOLANÆÆ.

I. Fructus capsularis.

CELSIA
orientalis L.
arcturus s. Veg.
cretica L. f.
heterophylla Pers. syn.

HÉMITOMUS
fruticosus l'Her. mss. }
celsia linearis Jacq. ic. }
hemimeris coccinea Willd. sp. }
urticæfolia. }
celsia urticæfolia Bot. Mag. }
hemimeris urticæfolia Willd. }
sp. }

VERBASCUM
thapsus L.
thapsoides L.
elongatum Willd. Enum.
phlomoïdes L.
lychnitis L.
— album.
nigrum L.
rugulosum Willd. Enum.
floccosum Willd. Enum.
pulverulentum Smith. Fl.
pyramidatum Marsch. Cauc.
sinuatum L.

GRATIOLE
officinale. F. ℥ (méd.)

MIMULUS
à deux lèvres. Am. s. ℥
glutineux. s. ch. ♃
tacheté. Pérou. s. ch. ♃

LINDERNIA
pyxidaire. F. ⊙

BROWALLIA
à tige droite. Pérou. ⊙
à tige tombante. Am. m. ⊙

ORDRE VIII.

SOLANÉES.

I. Une capsule.

CELSIA
d'Orient. ⊙
arcturus. orient. or. ♂
de Crète. or. ♂
à feuilles variables. or. ♂

HÉMITOMUS
arbrisseau. Pérou. s. ch. ♃
à feuilles d'ortie. Pérou. or. ♃

MOLÉNE
commune. F. ♂ (méd.)
thapsoïde. F. ♂
à longue grappe. ♂
phlomoïde. F. ♂
cunéiforme. F. ♂
— à fleurs blanches.
noire. F. ♂
ridée. ♂
floconneuse. Hongrie. ♂
pulvérulente. F. ♂
pyramidale. caucas. ♂
sinuée. F. ♂

n. 3.

phœniceum L.
 blattaria L.
 — alba.
 blattarioides *Encycl.*
 spinosum L.

RAMONDA

pyrenaica *Pers. syn.* }
 verbascum myconi L. }

HYOSCIAMUS

niger. L.
 pallidus *Willd. Enum.*
 reticulatus L.
 albus L.
 betæfolius *Encycl.* }
 datura *Forsk. Fl.* }
 muticus L. *Mant.* }
 aureus L.
 pusillus L.
 physalodes L.
 scopolia L. *Mant.* }
 scopolia carniolica *Jacq. obs.* }

NICOTIANA

— tabacum L.
 fruticosa L. ?
 glutinosa L.
 rustica L.
 paniculata L.
 plumbaginifolia *Willd. Enum.* }
 crispa. }
 undulata *Vent. Malm.*

DATURA

stramonium L.
 ferox L.
 tatula L.
 fastuosa L.
 metel L.
 humilis.
 ceratocaula *Jacq. H. sch.*
 lævis L. f.
 — { arborea.
 suaveolens *Willd. Enum.* }

II. Fructus baccatus.

TRIGUERA

ambrosiaca *Cav. Diss.*

bleue. carniole. ♂
 blattaire. ♀ ♂
 — à fleurs blanches.
 fausse blattaire. ♂
 épineuse. orient. or. ♀

RAMONDA

des Pyrénées. ♀

JUSQUIAME

noire. F. ♂ (vénén.)
 pâle. Hongrie. ⊙
 à réseau. orient. ♂
 blanche. F. m. ⊙

à feuell. de bette. égypte. or. ♂

jaune. orient. or. ♀
 grêle. orient. ⊙
 faux coqueret. sibérie. ♀
 scopolia. italie. ♀

NICOTIANE

Tabac. Am. m. ⊙ (écon. méd.)
 arbrisseau. chine. or. ♀
 gluante. Pérou. ⊙
 rustique. Am. m. ⊙ (écon.
 méd.)
 paniculée. Pérou. ⊙ (écon.)
 crépue. Pérou. ⊙
 ondée. N. Holl. or. ♂

DATURA

épineux. F. ⊙ (vénén.)
 à grosses épin. chine. ⊙ (vén.)
 Tatula. Asie. ⊙
 violet. Égypte. ⊙ (orn.)
 métel. Asie. ⊙
 nain. ⊙
 cornu. Cuba. ⊙
 à fruit lisse. Abyssin. ⊙
 en arbre. Pérou. s. ch. ♀ (orn.)

II. Une baie.

TRIGUERA

odorant. Portugal. ⊙

SOLANDRA

grandiflora swartz. prodr. }
natura sarmentosa Encycl. }

ATROPA

mandragora L.
belladonna L.
solanacea L. Mant.
arborescens L. }
cestrum campanulatum Enc. }
frutescens L.
procumbens Cav. Ic.

NICANDRA

- { physalodes.
- { Atropa physalodes L. }

PHYSALIS.

1. Perennes.

somnifera L.
arborescens L.
aristata H. K.
incana. }
chenopodiifolia Lamk. ill. }
curassavica L.
pensylvanica L.
Alkekengi L.

2. Annua.

barbadensis L.
prostrata l'her. stirp.
angulata L.
pubescens L.
foetens.
philadelphica Lamk. ill.

SARACHA

umbellata Dec. cat.

LYCOPERSICUM

esculentum Dunal. sol. }
solanum Lycopersicum L. }
cerasiforme Dunal. sol. }
solanum pseudo-Lycopersi- }
cum Jacq. hort. }
Humboldtii. }
solanum Humboldtii Willd. }
H. Ber. }
peruvianum Dunal. sol. }
solanum peruvianum L. }

SOLANDRA

à grandes fleurs. Ant. s. ch. ♪

ATROPA

Mandragore. F. ♣ (méd. vén.)
Belladone. F. ♣ (vénén.)
à f. de solanum. cap. or. ♪
en arbre. inde. s. ch. ♪
arbrisseau. esp. or. ♪
couché. Mexique. ⊙

NICANDRA

du Pérou. ⊙

COQUERET.

1. Vivaces.

somnifère. esp. or. ♪
arbre Antilles. s. ch. ♪
barbu. canaries. or. ♪
incane Pérou. s. ch. ♪
de Curaçao. s. ch. ♣
de Pensylvanie. ♣
Alkékenge. F. ♣ (méd.)

2. Annuelles.

de la Barbade. ⊙
couché. Pérou. ⊙
anguleux. inde. ⊙
pubescent. inde. ⊙
fétide. N. esp. ⊙
à gros fruit. Am. s. ⊙

SARACHA

ombellifère. ⊙

TOMATE

cultivée. Am. m. ⊙ (écon.)
cerise. Pérou. ⊙
de Humboldt. Am. m. ⊙
du Pérou. s. ch. π

SOLANUM.

1. *Inermia.*

dulcamara L.
 triquetrum Cav. Ic.
 crassifolium Lamk. Ill.
 quercifolium L.
 radicans L.
 corymbosum Jacq. Ic.
 — nigrum L. *vel archivi.*
 villosum Lamk. Ill.
 miniatum Dunal. Sol.
 suffruticosum Dunal. Sol.
 guineense Dunal. Sol.
 nodiflorum Jacq. Ic.
 tuberosum L.

reclinatum L'Her. stirp. }
 pinnatifidum Lamk. Ill. }
 laciniatum H. K.
 macrocarpon L.
 æthiopicum L.
 zucchagnianum Dunal. Sol.
 diphyllum L.
 pseudo-capsicum L.

aggregatum Jacq. Ic.
 muricatum H. K. }
 scabrum Lamk. Ill. }
 variegatum Fl. Per. }
 pubigerum Dunal. Sol.
 lanceolatum Cav. Ic.
 macrophyllum Dunal. Sol. }
 grandiflorum Desf. Arbr. }
 verbascifolium L.
 — auriculatum Lamk. Ill.
 bonariense L.
 betaceum Cav. Ic.

2. *Aculeata.*

— esculentum Dunal. Sol.
 ovigerum Dunal. Sol.
 fuscum L.
 mammosum L.
 ciliatum Lamk. Ill.
 aculeatissimum Jacq. Ic.
 coagulans Vahl. symb.
 decurrens Walb. H. Taur. }
 walbisi Dunal. Sol. }

SOLANUM.

1. Point d'aiguillons.

douce-amère. F. ♀ (méd.)
 triangulaire. N. Esp. s. ch. ♀
 à feuilles épaisses. Cap. or. ♀
 à feuell. de chêne. Pérou. or. ♀
 rampant. Pérou. or. ♂
 corymbifère. Pérou. or. ♂
 à fruit noir. F. ⊙ (méd.)
 velu. F. ⊙
 à fruit rouge. F. ⊙
 sous-arbrisseau. Barbarie? ♂
 de Guinée. ⊙
 nodiflore. île de Fr. s. ch. ♀
 pomme-de-terre. Pérou. ♀
 (alim.)

recliné. Pérou. s. ch. ♂
 lacinié. N. zél. or. ♀
 à gros fruit. Pérou. s. ch. ♂
 d'Ethiopie. ⊙
 de Zucchagni. s. ch. ♀
 à deux feuell. Am. m. s. ch. ♀
 faux-piment. Madère. or. ♀
 (orn.)
 aggloméré. Guinée. s. ch. ♀

rude. Pérou. s. ch. ♀
 pubescent. s. ch. ♀
 lancéolé. Mexique. s. ch. ♀
 à larges feuell. Mexiq. s. ch. ♀
 à f. de molène. Antill. s. ch. ♀
 auriculé. île de Fr. s. ch. ♀
 à bouquets. or. ♀ (orn.)
 à f. de bette. Pérou. s. ch. ♀

2. Tiges garnies d'aiguillons.

melongène. ⊙ (alim.)
 ovifère. ⊙
 brun. Am. m. ⊙
 pomme-de-teton. Antilles. ⊙
 cilié. ⊙
 très-épineux. Am. m. s. ch. ♀
 coagulant. Égypte. s. ch. ♀
 décurrent. île de Fr. s. ch. ♀

fontanesianum *Encycl. suppl.*
 sodomæum *L.*
 rostratum *Dunal. sol.*
 heterodoxum *Dunal. sol.*
 sarmentosum *Lamk. ill.* }
 lanceætiolum *Jacq. ic.* }
 vespertilio *H. K.*
 nycterium cordifolium *Vent.* }
 Malm.
 giganteum *Jacq. ic.*
 marginatum *L. f.*
 tomentosum *L.*
 coccineum *Jacq. ic.*
 polygamum *Vahl. symb.*
 elæagnifolium *Cav. ic.*

leprosum *Ortega. Dec.*
 bahamense *L.*
 igneum *L.*
 pyracantha *Lamk. ill.*
 polyacanthos *Lamk. ill.*
 carolinense *L.*
 milleri *Jacq. ic.*
 ferrugineum *Jacq. H. sch.*
 stramonifolium *Lamk. ill.* }
 torvum *Swartz. Prodr.*
 ficifolium *Ortega. Dec.*
 indicum *L. ex Swartz.*
 glutinosum *Encycl. suppl.*
 cuneifolium *Dunal. sol.*
 lycioides *L. Mant.*

CAPSICUM

grossum *L. Mant.*
 — deflexum.
 annuum *L.*
 conicum.
 — frutescens *L.*
 violaceum.
 cerasiforme *Willd. Enum.*
 baccatum *L. Mant.*

LYCIUM

afrum *L.*
 europæum *L. Mant.*
 carnosum.
 rhutenicum *Willd. sp.*
 — barbarum *s. Veg.*

de Desfontaines. ☉
 hérissé. cap. or. ♀
 corniculé. s. ch. ♀
 hétérodoxe. s. ch. ♀
 sarmenteux. Antilles. s. ch. ♀

vespertilion. canaries. or. ♀

gigantesque. cap. s. ch. ♀
 blanc. Abyssinie. s. ch. ♀
 cotonneux. Éthiopie. s. ch. ♀
 écarlate. s. ch. ♀
 polygame. Antilles. s. ch. ♀
 à feuilles de chafef. Am. m.
 s. ch. ♀

lépreux. Chili. s. ch. ♀
 de Bahama. s. ch. ♀
 couleur de feu. Ant. s. ch. ♀
 de Madagascar. s. ch. ♀
 polyacanthos. Antill. s. ch. ♀
 de Caroline. or. ♂
 de Miller. cap. s. ch. ♀

ferrugineux. Antilles. s. ch. ♀

glutineux. s. ch. ♀
 cunéiforme. Antilles. s. ch. ♀
 Faux-Lycium. Pérou. or. ♀
 (orn.)

PIMENT

irrégulier. Inde. s. ch. ♂
 — abaissé.
 annuel. Antilles. ☉ (écon.)
 conique. s. ch. ♂
 arbrisseau. Inde. s. ch. ♀
 violet. Chine. s. ch. ♂
 cerise. s. ch. ♀
 baccifère. Inde. s. ch. ♀ (écon.)

LYCIUM

d'Afrique. Esp. or. ♀
 d'Europe. F. m. or. ♀
 charnu. or. ♀
 de Russie. ♀
 lancéolé. Chine. ♀

chinense Lamk. ill.
boerhaaviifolium L. f.
ehretia halimifolia l'Her. stirp. }

de Chine. 5
à feuilles de Boerhaavia. Pé-
rou. or. 5

CESTRUM

nocturnum L.
diurnum L.
laurifolium l'Her. stirp.
macrophyllum.
foetidissimum Jacq. H. Sch.
auriculatum l'Her. stirp.
salicifolium Jacq. H. Sch.
vespertinum l'Her. stirp.
alaternoides.
parqui l'Her. stirp.

CESTRUM

de nuit. Chili. s. ch. 5
de jour. Chili. s. ch. 5
à f. de Laurier. Am. m. s. ch. 5
à grand. feuell. Ant. s. ch. 5
fétide. Antilles. s. ch. 5
auriculé. Pérou. s. ch. 5
à f. de saule. Caracas. s. ch. 5
à fruit noir. Antilles. s. ch. 5
à f. d'Alaterne. Ant. s. ch. 5
parqui. Chili. 5

III. Genera solaneis affinia.

III. Genres qui ont de l'affinité avec les
solanées.

BILLARDIERA

scandens Smith. N. Holl.

BILLARDIERA

sarmenteux. N. Holl. or. 5

BONTIA

daphnoides L.

BONTIA

à f. de Daphné. Ant. s. ch. 5

BRUNSFELSIA

americana L.

BRUNSFELSIA

d'Amérique. Antill. s. ch. 5

CRESCENTIA

cujete L.

CALEBASSIER

des Antilles. s. ch. 5

ORDO IX.

ORDRE IX.

BORRAGINEÆ.

BORRAGINÉES.

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut
arborescens.

I. Une baie, tiges ligneuses.

CORDIA

— { officinalis Lamk. ill. }
— { myxa L. }
crenata Delile. Egypt.
dentata Vahl. Mss.
gerascanthus L.
macrophylla L.
nitida Vahl. Mss.
parviflora Ortega. Dec.
— sebestena Andr. Rep.
patagonula.

CORDIA

officinal. égypte. s. ch. 5
(méd. alim.)
crénelé. égypte. s. ch. 5
à feuell. dentées. Ant. s. ch. 5
à f. de verveine. Ant. s. ch. 5
à grandes feuell. Ant. s. ch. 5
à feuell. luisant. Ant. s. ch. 5
à petites fl. N. Esp. s. ch. 5
sébestier. Antilles. s. ch. 5
patagonula. s. ch. 5

EHRETIA

tinifolia L.
beurreria L.

EHRETIA

à f. de Laurier-tin. Ant. s. ch. 5
de Beurrer. Antill. s. ch. 5

— macrophylla vel medagascariensis

— Antilles de Madagascar

VARRONIA

- ferruginea Lamk. ill.
 bullata L.
 mirabilioides Jacq. Am. }
 Tournefortia serrata L. }
 corymbosa Desvaux, Journ. }
 d'hist. nat. }
 monosperma Jacq. H. sch. }

TOURNEFORTIA

- lucida
 volubilis L.
 humilis L.
 scabra Lamk. ill.
 hirsutissima Swartz. obs.
 cymosa Swartz. obs.
 lævigata Lamk. ill.
 angulosa.
 laurifolia Vent. ch. de pl.
 mutabilis Vent. ch. de pl.

MESSERSCHMIDIA

- arguzia L. f.
 fruticosa L. f.
 angustifolia Lamk. ill.

II. Fructus uni aut bicapsularis.

ELLISIA

- nyctelea L. Mant.

HYDROPHYLLUM

- virginianum L.
 canadense L.
 magellanicum Lamk. ill.

DICHONDRA

- caroliniensis Mich. Fl.
 argentea Willd. H. Ber.

CERINTHE

- major L. }
 glabra Dec. syn. }
 aspera Dec. syn.
 minor L.

III. Fructus gymnospermus, faux
 corollæ nudæ.

HELIOTROPIUM

- peruvianum L.
 grandiflorum.
 — indicum L.

VARRONIA

- ferrugineux. Am. m. s. ch. ♀
 bulleux. Antilles. s. ch. ♀
 à grandes. fl. Antill. s. ch. ♀
 corymbifère. Caracas. s. ch. ♀

TOURNEFORTIA

- luisant. Antilles. s. ch. ♀
 sarmenteux. Antill. s. ch. ♀
 nain. Am. m. s. ch. ♀
 rude. Antilles. s. ch. ♀
 hérissé. Antilles. s. ch. ♀
 à longs épis. Antilles. s. ch. ♀
 lisse. Antilles. s. ch. ♀
 anguleux. s. ch. ♀
 à f. de Laurier. Ant. s. ch. ♀
 à fl. changeantes. Java. s. ch. ♀

MESSERSCHMIDIA

- herbacé. Sibérie. ♂
 arbrisseau. Canaries. or. ♀
 à feuilles étroit. Canar. or. ♀

II. Une ou deux capsules.

ELLISIA

- de Virginie. ☉

HYDROPHYLLUM

- de Virginie. ♂
 de Canada. ♂
 de Magellan. ♀

DICHONDRA

- de Caroline. or. ♀
 argenté. île de Fr. s. ch. ♀

MÉLINET

- glabre. F. ☉
 rude. F. ☉
 à fleurs aiguës. F. ♂

III. Quatre fruits distincts, entrée de la
 corolle nue.

HÉLIOTROPE

- du Pérou. or. ♀ (orn.)
 à grandes fl. s. ch. ♀ (orn.)
 des Indes. ☉

europæum L.
parviflorum L. Mant.
supinum L.
curassavicum L.

ECHIUM.

1. Herbacea.

vulgare L.
pyrenaicum Desf. Atl. }
italicum L. var. b. }
australe Lamk. ill. }
— violaceum L. Mant.
plantagineum L. Mant. }
creticum Lamk. ill. }
prostratum.

2. Fruticosa.

giganteum L. f.
candicans Jacq. ic. }
strictum Lamk. ill. }
virescens Dec. cat. }
cynoglossoides.

LITHOSPERMUM

arvense L.
officinale L.
purpureo-cœruleum L.
distichum Jacq. Fragm.
tinctorium Dec. Fl. Fr. }
Anchusa tinctoria Lamk. ill. }
(non Lin.) }
fruticosum L.
tenuiflorum L. f.

PULMONARIA

officinalis L.
angustifolia L.
virginica L.
sibirica L.
maritima L.

ONOSMA

echioides L.

IV. Fructus gymnotetraspermus, faux
corollæ instructa squamis.

SYMPHYTUM

officinale L.
tauricum Willd. Enum. }
orientale Marsch. cauc. }
asperrimum Marsch. cauc.

d'Europe. F. ⊙ (méd.)
à petites fleurs. inde. ⊙
couché. F. ⊙
de Curaçao. s. ch. ℥

VIPERINE.

1. Tige herbacée.

commune. F. ♂ (méd.)
des Pyrénées. F. or. ♂
à fleur rouge. orient. ⊙
violette. F. m. ⊙
à feuell. de plantain. italie. ⊙
couchée. égypte. or. ℥

2. Tiges ligneuses.

gigantesque. canaries. or. ♀
blanchâtre. canaries. or. ♀
ramassée. canaries. or. ♀
à f. de cynoglosse. canaries,
or. ♀

GRÉMIL

des champs. F. ⊙
officinal. F. ⊙
bleu-pourpre. F. ℥
distique. or. ℥

des teinturiers. F. m. ℥

arbrisseau. F. m. or. ♀
à petites fleurs. égypte. ⊙

PULMONAIRE

officinale. F. ℥ (méd.)
à feuilles étroites. F. ℥
de Virginie. ℥ (orn.)
de Sibérie. ℥
maritime. F. ⊙

ONOSMA

à f. de viperine. F. ♂

IV. 4 fruits distincts, tube de la corolle
couronné d'écaïlles.

CONSOUDE

officinale. F. ℥ (méd.)
d'Orient. ℥
à feuilles rudes. caucase. ℥

LYCOPSIS

arvensis L.

ECHIOIDES

nigricans Desf. Atl.

rubra Desf. Atl.

grandiflora.

MYOSOTIS

— arvensis Willd. sp.

palustris.

Lappula L.

ANCHUSA

italica Retz. obs.

angustifolia L. ?

ochroleuca Marsch. cauc.

barrelieri Dec. Fl.

buglossum barrelieri. All. Ped. }

tinctoria L.

undulata L.

milleri Willd. Enum.

sempervirens L.

verrucosa Lamk. ill. }

asperugo ægyptiaca L. }

laxiflora Dec. syn.

BORAGO

officinalis L.

orientalis L.

— indica L.

africana L.

ASPERUGO

procumbens L.

CYNOGLOSSUM

officinale L.

apenninum L.

montanum Lamk. ill.

hispidum Jacq. H. Sch.

canescens Willd. Enum.

parviflorum Encycl. suppl. }

cheirifolium L.

linifolium L.

nitidum Willd. Enum.

omphalodes L.

RINDERA

tetraspis Pallas. Itin. }

cynoglossum rindera L. f. }

NOLANA

prostrata L.

LYCOPSIS

des champs. F. ⊙

ECHIOIDES

à fleurs noires. Italie. ⊙

à fleurs rouges. Italie. ⊙

à grandes fleurs. ⊙

MYOSOTIS

des champs. F. ⊙

des marais. F. ♀

hérissé. F. ⊙

BUGLOSE

officinale. F. ♀ (méd.)

à feuilles étroites. Italie. ♀

jaune-pâle. caucase. ♀

de Barrelier. Alpes. ♀

orcanette. F. m. or. ♀

ondulée. F. m. or. ♀

de Miller. égypte. ⊙

toujours verte. esp. ♀

tuberculeuse. égypte. ⊙

à fleurs lâches. corse. ♀

BOURRACHE

officinale. F. ⊙ (méd.)

d'Orient. ♀

des Indes. ⊙

d'Afrique. ⊙

RAPETTE

couchée. F. ⊙

CYNOGLOSSE

officinale. F. ♂ (méd.)

des Apennins. ♂

des Alpes. ♀

à petites fleurs. inde. ⊙

à feuilles de cheiri. orient. ♂

à feuilles de Lin. esp. ⊙

luisante. Portugal. ♀

omphalodes. F. ♀ (orn.)

RINDÉRA

ailé. Russie.

NOLANA

couché. Pérou. or. ♂

ORDO X.

ORDRE X.

CONVOLVULACEÆ.

CONVOLVULACÉES.

CONVOLVULUS.

LISERON.

1. *Caule volubili.*

1. Tige grimpante.

- *arvensis* L.
sepium L.
inflatus.
panduratus L.
farinosus L. *Mant.*
— *batatas* L.
nervosus Lamk. *ill.*
canariensis L.
Jalapa L. *Mant.*
Ipomœa macrorhiza Mich. *Fl.* }
althæoides L.
pentaphyllus L.
cairicus L.
dissectus L. *Mant.*
hermanniæ *Her. sert.* }
crenatus Jacq. *ic.* }
fruticulosus Lamk. *ill.*
sibiricus L. *Mant.*
ebracteatus Lamk. *ill.*
siculus L.

- des champs.* F. ☞
des haies. F. ☞
renflé. AM. S. ☞ (orn.)
sinué. AM. S. ☞
farineux. Madère. or. ☞
patate. Antilles. s. ch. ☞ (alim.)
à nervures. Inde. s. ch. ☞
des Canaries. or. ☞
Jalap. Mexique. or. ☞ (méd.)
à f. de Guimauve. F. m. or. ☞
à cinq feuilles. Antilles. ☉
du Caire. or. ☞
découpé. Antilles. ☉
à feuil. d'hermannia. Pérou,
s. ch. ☞
fruticuleux. Canaries. or. ☞
de Sibérie. ☉
sans bractées.
de Sicile. ☉

2. *Caule non volubili.*

2. Tige non grimpante.

- pentapetaloides* s. *veg.*
evolvuloides Desf. *Atl.* }
humilis Jacq. *coll.* }
undulatus Cav. *ic.* }
lineatus L.
cneorum L.
oleæfolius Lamk. *ill.*
scoparius L. *f.*
cantabrica L.
pilosellæfolius Lamk. *ill.*
Dorycnium L.
tricolor L.
pes-capræ L.
soldanella L.
Falkia.

- à 5 divisions.* Italie. ☉
ondulé. Barbarie. ☉
rayé. F. m. or. ☞
satiné. Orient. or. ☞
à feuilles d'olivier. or. ☞
effilé. Canaries. or. ☞
à feuilles linéaires. F. ☞
à f. de piloselle. Orient. or. ☞
Dorycnium. Orient. or. ☞
tricolore. Esp. ☉ (orn.)
pied-de-chèvre. Inde. s. ch. ☞
soldanelle. F. ☞ (méd.)
de Falk. Cap. or. ☞

IPOMÆA

IPOMÆA

— *quamoclit* L.— *coccinea* L.— *glaberrima*.— *verucosa*.— *maritima*.— *venosa*.— *nervosa*.— *pentaphylla*.— *altissima*.

quamoclit. Inde. ☉ (orn.)
éparlate. Antilles. ☉

maritima.

à 9 feuilles.

à feuilles de tub.

— *Augustinus*
— *Director*

- *Juteola Jacq. ic.*
 - *leucantha Jacq. ic.*
 - *bona-nox L.*
 - *tuberculosa.*
 - *stipulacea Jacq. H. sch.*
 - *convolvulus tuberculosus Lamk. ill.*
 - *heterophylla Jacq. Fragm.*
 - *triloba L.*
 - *hederacea Jacq. ic.*
 - *nil.*
 - *convolvulus nil L.*
 - *ipomæa bicolor Lamk. ill.*
 - *purpurea Lamk. ill.*
 - *convolvulus purpureus L.*
- EVOLVULUS**
alsinoides L.
linifolius L.
- CUSCUTA**
europæa L.

- *jaune. Antilles. ☉*
 - *à fleurs blanches. Am. m. ☉*
 - *bona-nox. inde. s. ch. ☉*
 - *tuberculeux. île de F. ℥*
 - *à feuell. variabl. cuba. s. ch. ℥*
 - *à trois lobes Antilles. ☉*
 - *à feuell. de Lierre. Am. m. ☉*
 - *nil. Antilles. ☉*
 - *pourpre. Antilles. ☉ (orn.)*
- EVOLVULUS**
à feuilles d'Alsiné. inde. ☉
à feuilles de Lin. Antilles. ☉
- CUSCUTE**
d'Europe. F. ☉

ORDO XI.

ORDRE XI.

POLEMONIACEÆ.

POLÉMONIACÉES.

- PHLOX**
suaveolens H. K.
glaberrima L.
paniculata L.
divaricata L.
maculata L. Mant.
suffruticosa Willd. Enum.
ovata Bot. Mag.
subulata L.
reptans Mich. Fl.
- POLEMONIUM**
cœruleum L.
reptans L.
- CANTUA**
ligustrifolia Juss. Ann.
periphragmos foetidus Fl. Pér.
vestia lycioides Willd. Enum.
- BONPLANDIA**
geminiflora Cav. ic.
caldasia heterophylla Willd.
H. Ber.
- COBÆA**
scandens Cav. ic.

- PHLOX**
odorant. Am. s. ℥ (orn.)
glabre. Am. s. ℥ (orn.)
paniculé. Am. s. ℥ (orn.)
étalé. Am. s. ℥ (orn.)
tacheté. Am. s. ℥ (orn.)
sous-arbrisseau. Am. s. ℥ (orn.)
ovale. Am. s. ℥ (orn.)
en alêne. Virginie. ℥
rampant. Am. s. ℥ (orn.)
- POLÉMOINE**
à fleurs bleues. Eur. ℥ (orn.)
rampante. Am. s. ℥ (orn.)
- CANTUA**
à f. de Troéne. Pérou. s. ch. ℥
- BONPLANDIA**
à fleurs géminées. N. Esp. or. ℥
- COBÆA**
grimpant. Mexiq. or. ℥ (orn.)

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

CHELONE

glabra L.
obliqua willd. sp.
barbata cav. ic.

PENTSTEMON

lævigata willd. sp.
pubescens willd. sp. }
chelone pentstemon L. Mant. }
campanulata willd. sp. }
chelone campanulata cav. ic. }

SESAMUM

orientale L.

BIGNONIA.

1. Foliis simplicibus.

catalpa L. }
catalpa syringifolia H. K. }
quercus *encycl.* }
longissima willd. sp. }
catalpa longissima H. K. }
sempervirens L.

2. Foliis conjugatis.

unguis-cati L.
pseudo-unguis.
capreolata L.
crucigera L.
paniculata *vahl. symb.*

3. Foliis digitatis.

triphylla L. ?
pentaphylla L.

4. Foliis pinnatis.

grandiflora *andr. rep.*
radicans L.
stans L.
pandorea *andr. rep.* }
australis *brown. prodr.* }
chelonoides L. f. ?

MARTYNIA

capensis. indies.
proboscidea willd. sp.

ORDRE XII.

BIGNONES.

CHÉLONÉ

glabre. Am. s. ♀
oblique. virginie. ♀
barbue. mexique. or. ♀ (orn.)

PENTSTÉMON

à feuilles lisses. Am. s. or. ♂
pubescent. Am. s. or. ♂
campanulé. Mexiq. or. ♂ (orn.)

SÉSÂME

d'Orient. ☉ (écon.)

BIGNONE.

1. Feuilles simples,

catalpa. Am. s. ♀ (orn.)
à f. de chêne. Antill. s. ch. ♀
toujours verte. Am. s. or. ♀

2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Antilles. s. ch. ♀
fausse-griffe. Antill. s. ch. ♀
à vrilles. Antilles. s. ch. ♀
crucifère. Am. s. or. ♀
paniculée. Antilles. s. ch. ♀

3. Feuilles digitées.

trifoliée. Antilles. s. ch. ♀
à 5 feuilles. Antilles. s. ch. ♀

4. Feuilles pennées.

à grand. fl. chine. or. ♀ (orn.)
grimpante. Am. s. ♀ (orn.)
droite. Antilles. s. ch. ♀
pandorea. île norfolk. or. ♀
faux-chéloné. inde. s. ch. ♀

MARTYNIA

à longues cornes. Ant. ☉ (orn.)

angulosa *encycl.* }
 diandra *Jacq. H. sch.* }
 perennis *L.* }
 gloxinia maculata *L'Her. stirp.* }

ORDO XIII.

GENTIANEÆ.

I. Capsula simplex unilocularis.

GENTIANA.

1. Corollis 5 fidis, subcampanulatis.

lutea *L.*
 asclepiadea *L.*
 pneumonanthe *L.*
 acaulis *L.*
 amarella *L.*

2. Corollis 4 fidis.

campestris *L.*
 cruciata *L.*

SWERTIA

perennis *L.*

CHLORA

perfoliata *s. Veg.*

II. Capsula simplex, bilocularis.

CHIRONIA

decussata *Vent. H. cels.*frutescens *L.*linoides *L.*baccifera *L.*centaurium *Willd. sp.* }gentiana centaurium *L.* }

— minus.

filiformis.

gentiana filiformis *L.* }exacum filiforme *Smith. Fl.* }

SAROTHRA

gentianoides *L.*

VILLARSIA

ovata *Vent. ch. de pl.* }menyanthes ovata *L. f.* }nymphoides *Vent. ch. de pl.* }menyanthes nymphoides *L.* }

anguleux. mexique. ☉ (orn.)

vivace. Antilles. s. ch. ☿

ORDRE XIII.

GENTIANÉES.

I. Une capsule à une loge.

GENTIANE.

1. Corolle presque en cloche, à 5 divisions.

jaune. Alpes. ☿ (méd.)
 à feull. d'asclépias. Alpes. ☿
 pneumonanthe. F. ☿
 sans tige. Alpes. ☿ (orn.)
 amarella. F. ☉

2. Corolle à 4 divisions.

des champs. F. ☉
 croisette. F. ☿

SWERTIA

vivace. F. ☿

CHLORA

perfolié. F. ☉

II. Capsule simple, à 2 loges.

CHIRONIA

à feull. en croix. cap. or. ♃

arbrisseau. cap. or. ♃ (orn.)

à feuilles de Lin. cap. or. ♃

baccifère. cap. or. ♃

petite-centaurée. F. ☉ (méd.)

— naine.

filiforme. F. ☉

SAROTHRA

filiforme. Am. s. ☉

VILLARSIA

ovale, cap. or. ☿

à feuilles de Nymphaea. F. ☿

SPIGELIA
Anthelmia L.
Marylandica s. *veg.*

SPIGELIA
Anthelmia. Antilles. ☉
de Maryland. or. ☿

ORDO XIV.

APOCYNÆ.

I. *Germina* 2, *fructus bifollicularis*,
semina absque pappo.

VINCA
 — *major* L.
 minor L.
 herbacea *Wald. et Kitt. Hung.*
 — *rosea* L.

TABERNÉMONTANA
angustifolia *Willd. sp.*
Amsonia L.
citrifolia L.
nervosa.

CAMERARIA
latifolia L.

PLUMIERA
rubra L.
 — *alba* L.

II. *Germen duplex*, *fructus bifollicularis*,
semina papposa.

NERIUM
oleander.
 — — *album*.
odorum *Willd. sp.*
grandiflorum.
coronarium *Jacq. ic.*

STAPELIA
hirsuta L.
grandiflora *Mass. stap.*
Asterias *Mass. stap.*
cæspitosa *Mass. stap.*
papillosa *Dec. pl. gr.*
variegata L.
reticulata *Mass. stap.*

PERIPILOCA
græca L.
angustifolia *Bill. Dec.*

APOCYNUM
androsæmifolium L.

ORDRE XIV.

APOCYNÉES.

I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses,
 graines sans aigrette.

PERVENCHE
grande. F. ☿ (méd.)
petite. F. ☿
herbacée. Hongrie. ♀
rose. inde. s. ch. ♀

TABERNÉMONTANA
à feuilles étroites. Am. s. ☿
Amsonia. Am. s. ☿
à f. de citronnier. Ant. s. ch. ♀
à grosses nerv. Antill. s. ch. ♀

CAMÉRARIA
à larg. feuil. Antill. s. ch. ♀

PLUMIÉRA
rouge. Antilles. s. ch. ♀ (orn.)
blanc. Antilles. s. ch. ♀ (orn.)

II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses,
 graines aigrettées.

NÉRIUM
Laurier-rose F. m. or. ♀ (orn.)
 — *à fleurs blanches*.
odorant. inde. or. ♀ (orn.)
à grande fleur. or. ♀ (orn.)
à bouquets. inde. s. ch. ♀ (orn.)

STAPÉLIA
velu. cap. s. ch. ♀
à grandes fleurs. cap. s. ch. ♀
Astérias. cap. s. ch. ♀
touffu. cap. s. ch. ♀
mamelonné. cap. s. ch. ♀
panaché. cap. s. ch. ♀
à réseau. cap. s. ch. ♀

PÉRIPILOCA
de Grèce. ♀
à f. étroites. orient. or. ♀

APOCIN
à f. d'androsème. Am. s. ♀

cannabinum L.
hypericifolium Willd. sp.
venetum L.

CYNANCHUM

prostratum Cav. Ic.
acutum L.
monspeliacum L.
caroliniense Jacq. Ic.
macrophyllum (an generis?).
erectum L.
— mauritianum Encycl.

ASCLEPIAS

vincetoxicum L.
nigra L.
— nivea L. *Vel asthmatica.*
— curassavica L.
incarnata L.
tuberosa L.
amœna L.
linaria Cav. Ic.
angustifolia Willd. H. Ber.
mexicana Cav. Ic.
carnosa Bot. Mag.
fruticosa L.
syriaca L.
arborescens L. Mant.

III. Germen simplex, fructus baccatus aut rarius capsularis.

ALLAMANDA

— cathartica L. Mant.
verticillata.

RAUWOLFIA

nitida L.
glabra Cav. Ic.

OPHIOXYLON

serpentinum L.

CERBERA

— thevetia L.
— manghas L.

ARDUINIA

bispinosa Willd. sp.

THEOPHRASTA

americana L.

Arychnos.
Pentac.
Cryptostegia grandiflora.
Scammonia grandiflora.

à fleurs vertes. Am. s. L.
à f. d'hypericum. Am. s. L.
denté. Italie. P.

CYNANCHUM

couché. Mexique. s. ch. P.
aigu. F. L.
de Montpellier. Or. P.
de Caroline. Or. P.
à grandes feuilles. s. ch. P.
à tige droite. Syrie. P.
de l'île de France. s. ch. P.

ASCLEPIAS

dompte-venin. F. L. (méd.)
noir. F. P.
blanc. Am. s. Or. L.
de Curaçao. s. ch. L.
incarnat. Am. s. L.
tubéreux. Am. s. Or. L.
rose. Am. s. L.
à f. de Linair. Or. P.
à f. étroites. Mexique? s. ch. L.
du Mexique. s. ch. P.
charnu. Chine. s. ch. P.
arbrisseau. Tunis. Or. P.
à la ouate. Am. s. P.
arbre. Cap. s. ch. P.

III. Ovaire simple, une baie ou plus rarement une capsule.

ALLAMANDA

cathartique. Caienne. s. ch. P.
verticillé. s. ch. P.

RAUWOLFIA

à f. luisantes. Antill. s. ch. P.
glabre. N. Esp. s. ch. P.

OPHIOXYLON

Noix-de-serpent. Inde. s. ch. P.

CERBERA

Thévétia. Antilles. s. ch. P.
Manghas. Inde. s. ch. P.

ARDUINIA

bifurqué. Cap. s. ch. P.

THEOPHRASTA

d'Amérique, Antilles. s. ch. P.

Sarcocolla.
Variegata. Mexique.

ORDO XV.

SAPOTÆ.

SIDEROXYLUM

- melanophleos *L. Mant.* }
 laurifolium *Encycl.* }
 atrovirens *Encycl.*
 mastichodendrum *Jacq. coll.* }
 bumelia salicifolia *swartz.* }
Prodr.
 lycioides *L.*
 tenax *L. Mant.* }
 bumelia tenax *Willd. sp.* }

CHRYSOPHYLLUM

- glabrum *L.*
 cainito *L.*
 argenteum *Jacq. Am.*

ACHRAS

- sapota *L.*

MYRSINE

- africana *L.*
 ✕ retusa *Vent. H. cels.*

ORDRE XV.

SAPOTILLIERS.

SIDÉROXYLUM

- à f. de Laurier. inde. s. ch. ♪
 vert-sombre. Am. m. s. ch. ♪
 à f. de saule. Antill. s. ch. ♪
 à feuilles de Lycium. Am. s. ♪
 satiné. caroline. or. ♪

CAIMITIER

- glabre. Antilles. s. ch. ♪
 cainito. Antilles. s. ch. ♪
 argenté. Antilles. s. ch. ♪

SAPOTILLIER

- cultivé. Ant. s. ch. ♪ (alim.)

MYRSINÉ

- d'Afrique. cap. or. ✕
 à feuell. obtuses. Açores. or. ♪

CLASSIS IX.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(*Corolla perigyna.*)

ORDO I.

GUAIACANÆ.

DIOSPYROS

- ebum *Encycl.*

- virginiana *L.*
 Lotus *L.*
 kaki *L. f.*

CLASSE IX. n.º 4

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(Corolle attachée au calice.)

ORDRE I.

PLAQUEMINIERS.

PLAQUEMINIER

- ébénier. ile de fr. s. ch. ♪
 (écon.)
 de Virginie. ♪
 Lotos. orient. ♪
 kaki. japon. ♪ (écon.)

hirsuta Desf. Ann. }
royena hirsuta L. }
lycioides Desf. Ann.

ROYENA
lucida L.

VISNEA
mocanera L. f.

STYRAX
officinale L.
laevigatum Cav. Diss.
grandifolium Willd. sp.

HALESIA
tetraptera L.

HOPEA
tinctoria L. Mant.
symplocostinctoria Willd. sp. }

ORDO II.

RHODODENDRA.

KALMIA
latifolia L.
angustifolia L.
glauca H. K.

RHODODENDRON
ferrugineum L.
hirsutum L.
chamaecistus L.
minus Mich. Fl. }
punctatum Vent. H. cels. }
maximum L.
ponticum L.

AZALEA
viscosa L.
glauca L.
nudiflora L.
pontica L.
procumbens L.

RHODORA
canadensis L.

LEDUM
palustre L.
latifolium Encycl.
thymifolium Encycl.

velu. cap. or. ♪
à feuell. de Lycium. cap. ? or. ♪

ROYÉNA
luisant. cap. or. ♪

VISNÉA
mocanéra. canaries. or. ♪

STYRAX
officinal. F. m. ♪ (méd.)
glabre. Am. s. ♪
à grand. feuell. carol. or. ♪

HALÉSIA
à 4 ailes. Am. s. ♪ (orn.)

HOPÉA
des teinturiers. caroline. ♪

ORDRE II.

ROSAGES.

KALMIA
à larges feuell. Am. s. ♪ (orn.)
à feuell. étroit. Am. s. ♪ (orn.)
glauque. Am. s. ♪ (orn.)

RHODODENDRON
ferrugineux. Alpes. ♪ (orn.)
velu. Alpes. ♪ (orn.)
à feuell. de ciste. autriche. ♪
ponctué. Am. s. ♪ (orn.)
d'Amérique. Am. s. ♪ (orn.)
de Pont. ♪ (orn.)

AZALÉA
visqueux. Am. s. ♪ (orn.)
glauque. Am. s. ♪ (orn.)
à fleurs nues. Am. s. ♪ (orn.)
de Pont. ♪ (orn.)
couché. Alpes. ♪

RHODORA
de Canada. ♪

LÉDUM
des Marais. Alpes. ♪ (écon.)
à larges feuell. Am. s. ♪
à feuell. de Thym. Am. s. ♪

BĒFARIA

paniculata Mich. Fl.
 BĒfaria racemosa Vent. H. cels. }

MENZIEZIA

poliifolia Juss. Ann. }
 Erica daboecii L. }

ITEA

virginica L.

BĒFARIA

paniculé. Am. s. ʒ

MENZIÉZIA

à feuilles de polium. F. ʒ

ITĒA

de Virginie. Am. s. ʒ (orn.)

ORDO III.

ERICÆ.

1. *Anthæræ aristatæ.*

a. *Foliis ternis.*

viridi-purpurea L.

b. *Foliis quaternis.*

arborea L.

tetralix L.

abietina L.

c. *Foliis senis.*

mammosa L.

2. *Cristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

vulgaris L.

b. *Foliis ternis.*

scoparia L.

cinerea L.

australis L. Mant.

c. *Foliis quaternis.*

baccans L.

3. *Muticæ.*

a. *Foliis ternis.*

ciliaris L.

versicolor. Andr. rep.

b. *Foliis quaternis aut pluribus.*

curviflora L.

tubiflora L.

simpliciflora Willd. sp.

cerinthoides L.

conspicua H. K.

mediterranea L.

multiflora L.

ORDRE III.

BRUYÈRES.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles ternées.

vert-pourpre. Portugal. ʒ

b. Feuilles quatre à quatre.

en arbre. F. m. or. ʒ

tétralix. F. ʒ

à feuil. de sapin. cap. or. ʒ

c. Feuilles six à six.

mamelonnée. cap. or. ʒ

2. Anthères en crête.

a. Feuilles opposées.

commune. F. ʒ

b. Feuilles ternées.

à balais. F. ʒ

cechrée. F. ʒ

australe. F. m. or. ʒ

c. Feuilles quatre à quatre.

globuleuse. cap. or. ʒ

3. Anthères sans appendice.

a. Feuilles ternées.

ciliée. F. ʒ

bigarrée. cap. or. ʒ

b. Feuilles quatre à quatre ou en plus grand nombre.

à fleurs courbes. cap. or. ʒ

tubulée. cap. or. ʒ

à fleurs simples. cap. or. ʒ

à fl. de mélinet. cap. or. ʒ

remarquable. cap. or. ʒ

de la Méditerranée. F. m. or. ʒ

à fl. nombreuses. F. m. or. ʒ

vagans L.
herbacea willd. sp. }
carnea L.

CYRILLA
racemiflora L.

ANDROMEDA
mariana L.
nitida Mich. Fl. }
lucida Encycl. }
coriacea H. K. }
axillaris H. K.
cassinefolia Vent. H. cels. }
speciosa Mich. Fl. }
pulverulenta Vent. Malm.
paniculata L.
racemosa L.
arborea L.
caliculata L.
crispa.
ferruginea L. f.
polifolia L.
— angustifolia.
— latifolia.
— *borbonica*.

ARBUTUS
unedo L.
andrachne L.
uva-ursi L.
alpina L.

CLETHRA
alnifolia L.
— pubescens.
arborea H. K.

PYROLA
rotundifolia L.
minor L.
maculata L.

EPIGÆA
repens L.

GAULTHERIA
procumbens L.

VACCINIUM
myrtillus L.
pensylvanicum Encycl.
uliginosum L.

étalée. F. m. or. ♪
précoce. suisse. ♪

CYRILLA
à grappes. caroline. ♪

ANDROMÉDA
de Maryland. Am. s. ♪ (orn.)

luisant. Am. s. ♪

axillaire. Am. s. ♪

à feuell. de cassiné. Am. s. ♪

pulvérulent. Am. s. ♪

paniculé. Am. s. ♪

à grappes. Am. s. ♪

en arbre. Am. s. ♪

caliculé. Am. s. ♪

crépu. Am. s. ♪

ferrugineux. Am. s. ♪

à feuell. de polium. Am. s. ♪

— à feuilles étroites.

— à larges feuilles.

ARBOUSIER
des Pyrénées. or. ♪ (orn.)
andrachné. orient. or. ♪ (orn.)
busserole. Alpes. ♪ (méd.)
des Alpes. ♪

CLÉTHRA
à feuell. d'aune. Am. s. ♪ (orn.)
— pubescent.
arbre. canaries. or. ♪

PYROLE
à feuilles rondes. F. ♪
petite. F. ♪
maculée. Am. s. ♪

EPIGÆA
rampant. Am. s. ♪

GAULTHÉRIA
de Canada. Am. s. ♪

MYRTILLE
Lucet. F. ♪
de Pensylvanie. ♪
des marais. F. ♪

vitis-idea L.
 stamineum L.
 amœnum H. K.
 disomorphum Mich. Fl. }
 macrocarpon H. K.
 oxycoccus L.

STYPHELIA

daphnoides Smith. N. Holl. }
 Lissanthe daphnoides Brown. }
 Prodr.
 gnidium Vent. Malm. }
 Leucopogon lanceolatus }
 Brown. Prodr.

EMPETRUM

nigrum L.

— *Salix abies-tina*.

ORDO IV.

CAMPANULACEÆ.

I. Antheræ distinctæ.

MICHAUXIA

campanuloides L'Her. N. Gen.

CANARINA

campanulata L. Mant.

CAMPANULA.

1. Foliis lævibus ; calicis sinibus non deflexis.

uniflora L.
 hederacea L.
 rotundifolia L.
 carpatica L. f.
 rapunculus L.
 persicifolia L. sp. ed. 1^a.
 obliqua Jacq. H. Sch.
 pyramidalis L.
 lilifolia L.
 grandiflora L. f. }
 gentianoides Lamk. Ill. }
 rhomboidalis L.
 verticillata L. f.

2. Foliis asperis ; sinibus calicis non deflexis.

rhutenica Marsch. cauc.

ponctué. Alpes. ♀ (méd.)
 à longues étamines. Am. s. ♀
 corymbifère. Am. s. ♀
 à gros fruit. Am. s. ♀
 canneberge. F. ♀

STYPHÉLIA

à f. de daphné. N. Holl. or. ♀

cnidium. N. Holl. or. ♀

EMPÉTRUM

à fruit noir. Alpes. ♀

ORDRE IV.

CAMPANULACÉES.

I. Anthères distinctes.

MICHAXIA

à fruit rude. syrie. or. ♂

CANARINE

campaniforme. madère. or. ♂

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses ; sinus du calice non abaissés.

à une fleur. Alpes. ♂
 à feuilles de Lierre. F. ♀
 à feuilles rondes. F. ♂
 des monts Krapac. ♀ (orn.)
 raiponce. F. ♀ (alim.)
 à feuilles de pêcher. F. ♂
 oblique. ♂
 pyramidale. F. ♂ (orn.)
 à feuilles de Lis. sibérie. ♀
 à grandes fleurs. sibérie. ♀
 rhomboïdale. F. ♂
 verticillée. russie. ♂

2. Feuilles rudes ; sinus du calice non réfléchis.

de Russie. ♂

- latifolia L.
- trachelium L.
- rapunculoides L.
- bononiensis L.
- glomerata L.
- petraea L.
- thyrsoides L.
- tomentosa Lamk. ill.
- peregrina L.
- lanuginosa Lamk. ill. }
- erinus L.

3. Sinubus calicis deflexis.

- laciniata L.
- caucasica Marsch. cauc.
- betonicaefolia Marsch. cauc.
- lingulata Wald. et Kitt.
- medium L.
- longifolia Lapeyr. fl.
- barbata L.
- spicata L.
- sibirica L.

4. Capsulis columniferis aut prismaticis.

- speculum L.
- hybrida L.
- perfoliata L.

5. Caule fruticoso.

- aurea L. f.

TRACHELIUM
coeruleum L.

Noellea varians.

GESNERIA
tomentosa L.

PHYTEUMA

- canescens Wald. et Kitt. Hung.
- spicata L.
- orbicularis L.
- hemisphaerica L.
- pinnata L.

II. Anthera connata.

LOBELIA

- fulgens Willd. Enum.
- surinamensis L.
- longiflora L.

- à larges feuilles. Alpes. ψ
- gantelée. F. ζ
- fausse raiponce. F. ζ
- de Bologne. Italie. ψ
- agglomérée. F. ψ
- des rochers. Mont Baldo. ζ
- en thyrses. Alpes. ♂
- cotonneuse. orient. or. ζ
- hérissée. orient. or. ♂
- érine. F. ⊙

3. Sinus du calice abaissés.

- laciniée. crête. or. ζ
- du Caucase. ζ
- à feuilles de bétoine. cauc. ψ
- de Hongrie. ♂
- des jardins. F. ♂ (orn.)
- à long. f. Pyrénées. ψ (orn.)
- barbue. Alpes. ψ
- à épis. Alpes. ♂
- de Sibérie. ♂

4. Capsules en colonne ou prismatiques.

- miroir de Vénus. F. ⊙ (orn.)
- hybride. F. ⊙
- perfoliée. Am. s. ⊙

5. Tige ligneuse.

- jaune. canaries. or. ♀

TRACHELIUM

- à fl. bleues. Alger. or. ψ (orn.)

GESNERIA

- cotonneux. Antilles. s. ch. ♀

PHYTEUMA

- blanchâtre. Hongrie. ψ
- en épi. F. ψ
- orbiculaire. F. ψ
- hémisphérique. F. ζ
- à feuil. pennées. orient. or. ψ

II. Anthères réunies.

LOBELIA

- éclatant. Mexique. or. ζ (orn.)
- de Surinam. s. ch. ψ
- à longues fleurs. Antilles. s. ch. ψ (vénén.)

cardinalis L.
 syphilitica L.
 inflata L.
 cliffortiana L.
 urens L.
 triquetra L. Mant.
 Laurentia L.
 Erinus L.
 pubescens Jacq. H. Sch.
 minuta L. Mant.

— *Serpens.*
GOODENIA

ovata Smith. Soc. Linn.
 grandiflora Bot. Mag.
 lævigata Bot. Mag.

JASIONE

montana L.

— *Secunda plurimica.*

cardinale. Am. s. ℥ (orn.)
 syphilitique. Am. s. ψ (méd.)
 renflé. Am. s. ⊙
 de Clifford. Antilles. s. ch. ⊙
 brûlant. F. ⊙
 triangulaire. cap. or. ♂
 à longs pédoncules. Italie. ⊙
 à feuilles d'érine. cap. ⊙
 pubescent. cap. or. ψ
 nain. Corse. or. ψ

GOODÉNIA

à feuell. ovales. N. Holl. or. ℥
 à grandes fleurs. N. Holl. or. ℥
 lisse. N. Holl. or. ψ

JASIONÉ

de montagne. F. ♂

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(Corolla pistillo imposita; antheræ
 connatæ.)

ORDO I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum nudum; semen absque
 pappo.

LAMPSANA

communis L.
 — crispa.
 lyrata Willd. Enum.

RHAGADIOLUS

stellatus Willd. sp. }
 Lampsana stellata L. }
 lampsanoides. }
 edulis Willd. sp. }
 Lampsana rhagadiolus L. }
 kolpinia. }
 Lampsana kolpinia L. f. }

CLASSE X.

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil; anthères
 réunies.)

ORDRE I.

SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nu; graines sans aigrette.

LAMPSANE

commune. F. ⊙
 — crépue.
 en lyre. mer casp. ℥

RHAGADIOLE

étoilée. orient. ⊙

comestible. F. ⊙

kolpinia. tartarie. ⊙

II. *Receptaculum nudum ; semen papposum.*

PRENANTHES

- muralis* L.
hispida willd. sp.
viminea L.
purpurea L.
pinnata L. f.

CHONDRILLA

- juncea* L.

LACTUCA

- perennis* L.
tenerrima willd. sp.
saligna L.
sagittata wald. et kitt. hung.
viriosa L.
 — *laciniata.*
maculata Horn.
scariola L.
 — *sanguinea.*
 — *sativa* L.
 — *romana.*
 — *capitata.*
 — *crispa.*
intybacea Jacq. ic.
spinosa Desf. Atl.
prenanthes spinosa willd. sp. }

SONCHUS

- fruticosus L'her. stirp.*
pinnatus H. K.
congestus Decand. cat.
broussonetii ?
macranthos Encycl. suppl. }
tataricus L. Mant.
macrophyllus willd. sp.
plumieri L.
alpinus L.
floridanus L.
multiflorus. }
racemosus Encycl. }
oleraceus L.
 — *asper.*
lacerus willd. Enum.
divaricatus Desf. Ann.
chondrilloides Desf. Atl.
tenerrimus L.

II. Réceptacle nu ; graine couronnée d'une aigrette.

PRÉNANTHES

- des murailles.* F. ♂
hérissé. sibiérie. ♀
effilé. F. ♂
pourpre. Alpes. ♂
penné. canaries. or. ♀

CONDRILLE

- jonciforme.* F. ♀

LAI TUE

- vivace.* F. ♀
glauque. F. ♀
lancéolée. F. ⊙
sagittée. Hongrie. ♂
vireuse. F. ⊙
 — *laciniée.*
maculée. ⊙
Escariolle. F. ⊙
 — *pourpre.*
cultivée. ⊙ (alim. méd.)
 — *romaine.*
 — *pommée.*
 — *crépue.*
à tige nue. Antilles. ⊙
épineuse. barbarie. or. ♀

LAI TRON

- arbrisseau.* canaries. or. ♀
penné. madère. or. ♀
aggloméré. canaries. or. ♀
de Tartarie. ♀
à grandes feuilles. Am. s. ♀
de plumier. Alpes. ♀
des Alpes. ♂
de la Floride. Am. s. ♂
à fleurs nombreuses. ⊙
commun. ⊙
 — *rude.*
lacéré. ⊙
étalé. Égypte. or. ♂
à tige de condrilla. barb. ♀
lacinié. F. ⊙

palustris L.
arvensis L.
uliginosus Marsch. cauc.
maritimus L.

des marais. F. ☞
des champs. F. ⊙
aquatique. caucase ⊙
maritime. F. ☞

HIERACIUM.

1. Caule folioso.

fruticosum Willd. sp.
umbellatum L.
sabaudum L.
— maculatum.
— latifolium.
blattarioides L.
amplexicaule L.
villosum L.
grandiflorum Wald. et Kitt. }
 Hung. }
pappoleucum Vill. Delph. }
prostratum.
eriophorum Dec. syn.
lanatum Wald. et Kitt. Hung.
glaucum All. Ped.
lævigatum Willd. H. Ber.
nigrescens Willd. H. Ber.
alpinum L.
intybaceum Jacq. Austr. }
albidum Vill. Delph. }
tubulosum Encycl. }
paludosum L.
lampsanoides Couan. Ill.
prenanthoides L.
globosum.
jacquini Vill. Delph. }
pumilum Jacq. Austr. }
humile Willd. sp. }
murorum L.
sylvaticum Willd.
prunellæfolium All. Ped. }
pumilum L. Mant. }
porrifolium L.
echioides Wald. et Kitt. Hung.

2. Caule nudo multifloro.

aurantiacum L.
florentinum Willd. sp.
piloselloides Vill. Delph.
cymosum L.

EPERVIERE.

1. Tige feuillue.

arbrisseau. madère? or. ☞
ombellifère. F. ☞
de Savoie. F. ☞
— tachetée.
— à larges feuilles.
à feuil. de blattaire. Alpes. ☞
amplexicaule. Alpes. ☞
velue. Alpes. ☞

à grandes fleurs. Alpes. ☞

couchée. ☞
lanugineuse. F. ☞
laineuse. Hongrie. ☞
glaucue. Alpes. ☞
lisse. ☞
à graines noires. ☞
des Alpes. ☞

tubulée. Alpes. ☞

des marais. Alpes. ☞
à f. de Lampsane. Pyrénées. ☞
à f. de préanthes. Alpes. ☞
globuleuse. ☞

de Jacquin. Alpes. ☞

des murailles. F. ☞
des bois. F. ☞

à feuil. de Brunelle. Alpes. ☞
à feuil. de poireau. Alpes. ☞
hérissée. Hongrie. ☞

2. Tige nue à plusieurs fleurs.

couleur de feu. Alpes. ☞ (orn.)
de Florence. ☞
à feuil. de piloselle. Alpes. ☞
corymbifère. Alpes. ☞.

repens.
auricula L. }
dubium L. }

3. *Caule nudo unifloro.*

pilosella L.
aureum Willd. sp. }
Leontodon aureum L. }
bulbosum Willd. sp. }
Leontodon bulbosum L. }

CREPIS

sibirica L.
hieracium sibiricum Willd. sp. }
parviflora.
coronopifolia Desf. Atl.
albida Vill. Delph.
alpina L.
rubra L.
pauciflora.
nemausensis Couan. Ill. }
Andryala nemausensis Vill. }
Delph.
foetida L.
pulchra L. }
prenanthes hieraciifolia }
Willd. sp. }
hispida Wald. et Kitt. Hung.
Dioscoridis Thuil. Fl. (non L.)
patula.
tectorum L. }
virens Vill. Delph. }
biennis L.
taurinensis Willd. sp. }
Barkhausia taraxacifolia Dec. }
Fl.
rigida Wald. et Kitt. Hung.
aspera L.

DREPANIA

barbata. }
crepis barbata L. }
— pallida.

HYOSERIS.

1. *Caule ramoso.*

Hedypnois L.
Rhagadioloïdes L.
cretica L.

rampante. ℥
auriculée. F. ℥

3. Tige nue à une fleur.

piloselle. F. ℥
orangée. Alpes. ℥
bulbeuse. F. ℥

CRÉPIS

de Sibérie. ℥
à petites fleurs. orient. ⊙
à f. de corne-de-cerf. barb. ⊙
blanc. Alpes. ℥
des Alpes. ⊙
rouge. F. ⊙ (orn.)
à fleurs rares. Égypte. ⊙
à tige nue. F. ⊙
fétide. F. ⊙
à feuil. de Lampsane. F. ⊙
hérissé. Hongrie. ⊙
de Dioscoride. F. ⊙
étalé. ⊙
des toits. F. ⊙
bisannuel. F. ♂
de Turin. F. ⊙
roide. Hongrie. ℥
piquant. orient. ⊙

DRÉPANIA

barbu. F. m. ⊙
— à fleurs pâles.

HYOSÉRIS.

1. Tige rameuse.

dormeuse. F. ⊙
rhagadiole. F. ⊙
de Crète. ⊙

2. *Caule nudo simplici.*

radiata L.
 lucida L. Mant.
 scabra L.
 foetida Gouan. Monsp. }
 Lampsana foetida Willd. sp. }
 minima L. }
 Lampsana minima Dec. Fl. }
 taraxacoides Vill. Delph. }
 trincia hispida Dec. Fl. }

ZACINTHA

verrucosa Willd. sp. }
 Lampsana zacintha L. }

TARAXACUM

— { dens-leonis Desf. Atl. }
 — { Leontodon taraxacum L. }
 obovatum.
 Leontodon obovatus Willd. sp. }
 palustre Dec. syn. }

APARGIA

alpina Willd. sp. }
 Leontodon pyrenaicum }
 Gouan. Ill. }
 autumnalis Willd. sp. }
 Leontodon autumnale L. }
 hastilis Willd. sp. }
 Leontodon hastile L. }
 hispida Willd. sp. }
 Leontodon hispidum L. }
 crista Willd. sp. }
 Leontodon crispum Vill. }
 Delph. }

PICRIS

hieracioides L. }
 sprengeriana. }
 hieracium sprengerianum L. }
 integrifolia. }
 globulifera. }
 crepis dioscoridis Dec. Ic. }

HELMINTIA

echioides Willd. sp. }
 picris echioides L. }

SCORZONERA

— hispanica L.

2. *Tige nue simple.*

rayonnée. F. ☉
 luisante. orient. ♂
 rude. Italie. ☉

fétide. F. ☉

petite. F. ☉

commune. F. ☿

ZACINTHA

tuberculeux. orient. ☉

TARAXACUM

dent-de-lion. F. ☿

ovale renversé. Esp. ☿

des marais. F. ☿

APARGIA

des Alpes. ☿

d'automne. F. ☿

lancéolé. F. ☿

hérissé. F. ☿

crépu. F. ☿

PICRIS

épervière. F. ♂

de Sprenger. F. ☉

à feuilles entières. ☉

globuleux. F. ☉

HELMINTIA

hérissé. F. ☉

SCORSONÈRE

d'Espagne. ♂ (alim.)

angustifolia L.
 austriaca willd. sp.
 humilis L.
 laciniata L.
 calcitrapifolia vahl. symb.
 villosa scop. carn.
 eriosperma willd. sp.

à feuilles étroites. F. ♀
 d'Autriche. ♀
 petite. F. ♀
 laciniée. F. ♂
 à f. de chausse-trape. orient. ⊙
 velue. carniole. ♂
 laineuse. F. m. ♀

PICRIDIUM

vulgare Desf. Atl.
 scorzonera picroides L.
 sonchus picroides willd. sp.
 tingitanum Desf. Atl.
 scorzonera tingitana L.
 sonchus tingitanus willd. sp.

PICRIDIUM

commun. F. ⊙ (alim.)
 de Tanger. ⊙

TRAGOPOGON

pratensis L.
 major Jacq. Austr.
 undulatus Jacq. Ic.
 mutabilis Jacq. Ic.
 porrifolius L.
 crocifolius L.

CERCIFIX

des prés. F. ♂ (alim.)
 élevé. Autriche. ⊙
 ondulé. orient. ♂
 à fl. changeantes. Sibérie. ♂
 à feuilles de poireau. F. ♂
 à feuilles de safran. F. m. ♂

UROSPERMUM

dalechampii.
 tragopogon dalechampii L.
 arnopogon dalechampii
 willd. sp.
 picroides.
 tragopogon picroides L.
 arnopogon picroides willd.
 sp.

UROSPERMUM

de Dalechamp. F. ♂
 hérissé. F. ⊙

III. Receptaculum villosum aut paleaceum.

III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.

GÉROPOGON
 glaber L.

GÉROPOGON
 glabre. Italie. ⊙

HYPOCHÆRIS
 maculata L.
 heivetica Jacq. Ic.
 glabra L.
 radicata L.

HYPOCHÆRIS
 tacheté. F. ♀
 de Suisse. ♀
 glabre. F. ⊙
 à longues racines. F. ♀

SÉRIOLA
 æthnensis L.
 cretensis L.

SÉRIOLA
 de l'Etna. Italie. ⊙
 de Crète. ⊙

ANDRYALA
 integrifolia L.

ANDRYALA
 à feuilles entières. F. ♂

sinuata L.
lanata L.
ragusina L.
cheirauthifolia *l'her. stirp.*

sinué. F. ♂
laineux. F. ♀
de Raguse. or. ♀
à f. de giroflée. mère. or. ♂

CATANANCHE
cœrulea L.
lutea L.

CATANANCHÉ
bleu. F. ♂ (orn.)
jaune. F. m. ⊙

CICHORIUM
intybus L.
endivia L.
— crispa.
pumilum *Jacq. obs.*
spinosum L.

CHICORÉE
sauvage. F. ♀ (méd. alim.)
endive. ♂ (alim.)
— crépue.
naine. ⊙
épineuse. F. m. ♂

SCOLYMUS
maculatus L.
hispanicus L.

SCOLYMUS
panaché. italie. ⊙
d'Espagne. ♂

ORDO II.

ORDRE II.

FLOSCULOSÆ.

FLOSCULEUSES.

I. *Receptaculum setosum aut paleaceum ; semen papposum ; flores flosculosi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)*

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes ; graines aigrettées ; tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale.)

CNICUS.

CNICUS.

I. *Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.*

I. Feuilles sessiles ou embrassantes.

centauroides *willd. sp.*
cernuus *willd. sp.*
oleraceus *willd. sp.*
tataricus *willd. sp.*
ochroleucus *willd. sp.*
uliginosus *Marsch. cauc.*
erisithales *willd. sp.*
semipectinatus *encycl.*
rivularis *willd. sp.*
pratensis *willd. sp.* }
carduus anglicus *encycl.* }
tuberosus *willd. sp.*
serratuloides *willd. sp.*
munitus *Marsch. cauc.*
arachnoideus *Marsch. cauc.*
ferox *willd. sp.*
spinosissimus *willd. sp.*

à feuilles de centaurée. F. ♀
penché. sibérie. ♀
des prés. F. ♂
de Tartarie. ♂
jaunâtre. F. ♀
des marécages. caucase. ♀
erisithales. Alpes ♂
semipectiné. Tartarie. ♀
des ruisseaux. Autriche. ♀
des prés. F. ♀
tubéreux. F. ♂
à feuilles de sarrète. F. ♀
armé. caucase. ♀
arachnoïde. caucase. ♀
hérissé. Alpes. ♂
très-épineux. suisse. ♀

ciliatus willd. sp.
eriphorus willd. sp.
diacantha bill. dec.
casabonæ willd. sp.
stellatus willd. sp.
syriacus willd. sp.
acaulis willd. sp.
fruticosus.

2. *Foliis decurrentibus.*

arvensis. }
serratula arvensis L. }
lanceolatus willd. sp.
acarna willd. sp.
palustris willd. sp.
monspessulanus willd. sp.
pyrenaicus willd. sp.
canus willd. sp.

CARDUUS

leucographus willd. sp.
arabicus willd. sp.
argentatus willd. sp.
candicans wald. et kitt. hung.
crispus willd. sp.
personata willd. sp. }
arctium personata L. }
acanthoides willd. sp.
pycnocephalus willd. sp.
carlinoides gouan. ill.
medius gouan. ill.
desfloratus willd. sp.
nutans willd. sp.
glaucophyllus.
marianus willd. sp.
 — *viridis.*

ONOPORDON

acanthium L.
 — *viride.*
illyricum L.
arabicum L.
acaulon L.

CINARA

scolymus L.
cardunculus L.
humilis L.

cilié. sibérie. ℥
à tête laineuse. F. ♂
à doubles épines. syrie. ♂
casabon. eur. austr. or. ♂
étoilé. orient. ⊙
de Syrie. ⊙
sans tige. F. ℥
arbrisseau. or. ♪

2. Feuilles décurrentes.

des champs. F. ♂
lancéolé. F. ♂
acarna. esp. ⊙
des marais. F. ℥
de Montpellier. F. ℥
des Pyrénées. ℥
blanchâtre. autriche. ℥

CHARDON

panaché. F. m. ⊙
d'Arabie. ⊙
argenté. égypte. ⊙
blanchâtre. hongrie. ♂
crépu. F. ⊙
fausse bardane. Alpes. ⊙
à feuilles d'acanthé. F. ⊙
à fleurs tombantes. F. ⊙
fausse carline. pyrénées. ℥
intermédiaire. pyrénées. ℥
défleuri. Alpes. ℥
à tête penchée. F. ♂
à feuilles glauques. ℥
Marie. F. ♂
 — *vert.*

ONOPORDON

à feuilles d'acanthé. F. ♂
 — *vert.*
d'Illyrie. ♂
d'Arabie. ♂
sans tige. pyrénées. ♂

ARTICHAUT

cultivé F. m. ℥ (alim.)
cardon. barbarie. ℥ (alim.)
nain. Alger. or. ℥

LEUZEIA

conifera *dec. fl.* }
centaurea conifera *L.* }

CARLINA

subacaulis *dec. fl.* }
chamæleon *vill. delph.* }
caulescens *encycl.* }
acanthifolia *all. ped.* }
lanata *L.*
corymbosa *L.*
aggregata *willd. sp.*
vulgaris *L.*

ATRACYLIS

cancellata *L.*

CARTHAMUS

— tinctorius *L.*
lanatus *L.*
creticus *L.*
cœruleus *L.*
mitissimus *L.*
corymbosus *L.*
brotera corymbosa *willd. sp.* }
salicifolius *L. f.* }
carlowisia salicifolia *dec.* }
ann.

ARCTIUM

Lappa *L.*
— tomentosa.
grandiflora.

STÆHELINA

dubia *L.*
chamæpeuce *s. veg.* }
serratula chamæpeuce *L.* }

SERRATULA

centauroides *L.*
tinctoria *L.*
quinquefolia *Marsch. cauc.*
coronata *L.*
heterophylla *Desf. Atl.*
pinnatifida.
carduus radiatus *Wald. et* }
Kitt. Hung. }
alata.

LEUZÉIA

conifere. Alpes. \mathcal{Z}

CARLINE

à tige courte. Alpes. \mathcal{Z}

à f. d'acanthé. Alpes. \mathcal{V} (alim.)
laineuse. *F. m.* \odot
corymbifère. Italie. or. \mathcal{V}
fasciculée. Croatie. \mathcal{V}
commune. *F.* σ

ATRACYLIS

chardon-prisonnier. *F. m.* \odot

CARTHAME

des teinturiers. Égypte. \odot
laineux. *F.* \odot
de Crète. \odot
bleu. esp. \mathcal{Z}
sans épines. *F.* \mathcal{V}

corymbifère. Tunis. or. \mathcal{V}

à f. de saule. Canaries. or. \mathcal{V}

BARDANE

officinale. *F.* σ (méd.)
— cotonneuse.
à grandes fleurs. *V.* σ

STÆHÉLINA

à f. de romarin. *F. m.* or. \mathcal{V}
chamepeucé. orient. or. \mathcal{V}

SARRETTE

laciniée. Sibérie. \mathcal{Z}
des teinturiers *F.* \mathcal{V}
à cinq folioles. Perse sept. \mathcal{Z}
couronnée. Sibérie. \mathcal{V}
à feuilles variables. Alpes. \mathcal{V}
pinnatifide. Hongrie. \mathcal{Z}
aillée. \mathcal{V}

II. *Receptaculum setosum aut paleaceum; flosculi steriles in ambitu; semen papposum. (Polygamia frustranea.)*

ZOEGERA

leptaurea L. Mant.

CENTAUREA:

1. *Squamæ calicinæ laeves, nec ciliatæ, nec spinosæ.*

crupina L.

Lippii L.

Amberboi Encycl.

suaveolens Willd. sp. }

moschata L.

rhutenica Encycl.

— *centaurium L.*

alpina L.

africana Encycl.

2. *Squamæ calicinæ serrato-ciliatæ.*

phrygia L.

Jacea L.

nigra L.

nigrescens Willd. sp.

uniflora L. Mant.

pullata L.

montana L.

axillaris Willd. sp. }

seusana Vill. Delph. }

variegata Encycl. }

— *cyanus L.*

paniculata L.

spinosa L.

ragusina L.

candidissima Encycl.

cinerea Encycl.

dealbata Willd. sp.

decumbens Pers. syn.

scabiosa L.

3. *Squamæ calicinæ aridæ, scariosæ, ciliato-serratæ.*

atropurpurea Wald. et Kitt. Hung.

orientalis L.

balsamita Encycl.

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines couronnées d'aigrettes; fleurons stériles à la circonférence. (Polygamie frustranée.)

ZOÉGÉA

d'Orient. ☉ (orn.)

CENTAURÉE.

1. Ecailles du calice lisses, ni ciliées, ni épineuses.

à f. de condrille. F. m. ☉

de Lippi. Egypte. ☉

odorante. orient. ☉ (orn.)

musquée. orient. ☉ (orn.)

de Russie. ☿

grande. Italie. ☿

des Alpes. ☿

d'Afrique. Barbarie. ☿

2. Ecailles du calice dentées et ciliées,

plumeuse. Alpes. ☿

Jacée. F. ☿

noire. F. ☿

brune. Autriche. ☿

à une fleur. F. m. ☿

à collerette. F. m. ☿

de montagne. Alpes. ☿

axillaire. Alpes. ☿

bluet. F. ☉ (orn.)

paniculée. F. ☉

épineuse. orient. or. ☿

de Raguse. orient. or. ☿

très-blanche. Italie. or. ☿

cechrée. Italie. or. ☿

blanchâtre. Ibérie. ☿

couchée. Alpes. ☿

scabieuse. F. ☿

3. Ecailles du calice desséchées, ciliées, dentées en scie.

noire-pourpre. Hongrie. ☿

d'Orient. or. ☿

à f. de balsamite. orient. ☉

4. *Squamæ calicinae scariosæ, integræ vel lacerae.* 4. Écailles du calice desséchées, entières ou déchirées.
- glastifolia* L.
alata Encycl.
alba L.
picris Willd. sp.
splendens L.
rhapontica L.
macrocephala Willd. sp.
5. *Spinæ calicinae palmatae.* 5. Épines du calice palmées.
- sonchifolia* L.
ferox Desf. Atl.
seridis L.
aspera L.
napifolia L.
sphærocephala L.
prolifera Vent. H. cels. }
straminea Willd. sp. }
melitensis L.
sicula L.
solstitialis L.
6. *Spinæ calicinae compositæ.* 6. Épines du calice rameuses.
- verutum* L.
apula Encycl.
eriphora L.
benedicta L.
calcitrapa L.
7. *Squamæ calicinae ciliatæ, spinâ terminatæ.* 7. Écailles du calice ciliées, terminées par une épine.
- diffusa* Encycl.
multifida Pers. syn. }
pubescens Willd. sp. }
collina L.
diluta H. K.
8. *Squamæ calicinae integræ; spinâ simplicibus.* 8. Écailles du calice entières; épines simples.
- salmantica* L.
pumila L.
crocodylium L.
muricata L.
galactites L.
galactites tomentosa Dec. }
 Ann.
- à f. de pastel. orient. ℥
 ailée. Tartarie. ♀
 blanche. esp. ♀
picris. orient. or. ℥
 luisante. suisse. ♂
rhapontic. Alpes. ℥
 à grosse tête. ibérie. ℥
- à feuilles de Laitron. F. m. ⊙
 hérissée. Alger. ♀
 à feuilles de chicorée. esp. ♀
 rude. F. m. ♀
 à feuilles de navet. orient. ⊙
 à tête ronde. Barbarie. ⊙
- prolifère. égypte. ⊙
 de Malte. ⊙
 de Sicile. ⊙
 du solstice. F. ⊙
- à longues épines. orient. ⊙
 de la Pouille. ⊙
 à tête laineuse. Alger. ⊙
 chardon-bénit. F. m. ⊙ (méd.)
 chausse-trape. F. ♂
- étalée. orient. ℥
 laciniée. ♀
 des collines. F. ♀
 rose-pâle. Eur. m. ⊙
- de Salamanque. F. m. ℥
 naine. égypte. or. ♂
 à f. de vulnéraire. égypte. ⊙
 à fleurs de bluet. esp. ⊙
- panachée. F. m. ♂

III. *Flosculi calice proprio cincti.*
(*Polygamia segregata.*)

ELEPHANTOPUS
scaber L.

SPHERANTHUS
indicus L.

LAGASCEA
mollis Willd. Enum.

OEDEIRA
prolifera L.

ECHINOPS
sphærocephalus L.
nitro L.
strigosus L.

IV. *Receptaculum nudum; semina absque
pappo; flosculi omnes hermaphroditi.*
(*Polygamia aequalis.*)

BALSAMITA
ageratifolia.
chrysanthemum flosculo-
sum L. }
suaveolens. }
tanacetum balsamita L. }
annua. }
tanacetum annuum L. }

FLAVERIA
contrayerba Willd. Enum. }
milleria contrayerba. Encycl. }

ETHULIA
conyzoides L.

HUMEA
elegans Smith. Exot. Bot. }
calomeria amaranthoides }
Vent. Malm. }

V. *Receptaculum nudum, villosum aut
paleaceum; semina nuda; flosculi femi-
nei in ambitu.* (*Polygamia superflua.*)

HIPPIA
frutescens L. f.

GYMNOSTYLES
anthemifolia Juss. Ann.

III. Fleurons entourés d'un calice partiel.
(Polygamie séparée.)

ELÉPHANTOPUS
rude. inde. s. ch. ♀

BOULETTE
des Indes. s. ch. ♀

LAGASCÉA
velouté. cuba. ⊙

OEDEIRA
prolifère. cap. s. ch. ♀

ECHINOPS
à grosse tête. F. ♀
azuré. F. m. ♀
à feuilles rudes. esp. ⊙

IV. Réceptacle nu; graines sans aigrettes;
tous les fleurons hermaphrodites. (Poly-
gamie égale.)

BALSAMITE
à f. d'ageratum. crête. or. ♀

odorante. F. m. ♀

annuelle. esp. ⊙

FLAVERIA
contrayerba. Pérou. ⊙

ETHULIA
fausse conyse. inde. ⊙

HUMEA
élégant. n. holl. or. ♂

V. Réceptacle nu, velu ou garni de pail-
lettes; graines nues; fleurons femelles à
la circonférence. (Polygamie superflue.)

HIPPIA
arbrisseau. cap. or. ♀

GYMNOSTYLE
à f. d'anthémis. n. holl. ⊙

TANACETUM

suffruticosum L.
vulgare L.
— crispum.
sibiricum L.

CARPESIUM

cernuum L.
abrotanoides L.

GRANGEA

latifolia *Encycl. suppl.*
maderaspatana *Encycl. suppl.* }
Artemisia maderaspatana L. }
cotula maderaspatana *Willd.* }
sp. }
minima *Encycl. suppl.* }
Artemisia minima L. }
cotula minima *Willd. sp.* }

ARTEMISIA.

1. *Herbaceæ; calices oblongi.*

capillifolia *Encycl.*
vulgaris L.
palmata *Encycl.*
maritima L.
suaveolens *Encycl.*

2. *Herbaceæ; calice hemispharico.*

austriaca *Jacq. Austr.*
annua L.
leucanthemifolia.
campestris L.
neglecta *Willd. Enum.*
dracunculus L.
inodora *Willd. Enum.*
biennis *Willd. sp.* }
zeelandica *Encycl.* }
pectinata *Pallas, itin.*
sivertiana *Willd. sp.*
violacea.
tanacetifolia L.
glacialis L.
rupestris L.
insipida *Vill. Delph.*
Absinthium L.
pontica L.

TANAISIE

sous-arbrisseau. cap. or. ♀
commune. F. ψ (méd.)
— crépue.
de Sibérie. ζ

CARPESIUM

penché. F. ♂
à fl. d'Aurone. chine. s. ch. ζ

GRANGÉA

à larges feuilles. inde. ⊙

à feuilles sinuées. inde. ⊙

petit. inde. ⊙

ARMOISE.

1. Tiges herbacées; calices oblongs.

capillaire. chine. or. ζ
commune. F. ψ (méd.)
palmée. Esp. or. ζ
maritime. F. ζ
odorante. F. ζ

2. Tiges herbacées; calice hémisphérique.

d'Autriche. ζ
annuelle. sibérie. ⊙
à f. de Leucanthème. ψ
des champs. F. ψ
de Sprengel. sibérie. ζ
Estragon. tartarie. ψ (écon.)
inodore. Daourie. ζ

bisannuelle. N. zélande. or. ♂
pectinée. Daourie. ⊙
fausse Absinthe. sibérie. ♂
à fleur violette. ζ
à feuil. de Tanaisie. Alpes. ζ
des glaciers. Alpes. ζ
des rochers. Alpes. ψ
insipide. Alpes. ψ
Absinthe. F. ψ (méd.)
de Pont. ψ (méd.)

3. *Fruticosæ.*

cœrulescens L.
 corymbosa *Encycl.*
 valentina *Encycl.*
 Abrotanum L.
 afra *Willd. sp.*
 chinensis L.
 argentea *Her. sert.*
 arborescens L.

MICROPUS

erectus L.
 supinus L.
 pygmæus. }
 filago pygmæa L. }

VI. *Receptaculum nudum, rarius paleaceum; semina papposa; flosculi feminei in ambitu. (Polygamia superflua.)*

FILAGO

montana L.
 germanica L.
 gallica L.
 pyramidata L.
 Leontopodium L.

XERANTHEMUM

annuum L.
 inapertum L.

ELICHRYSUM

fulgidum *Willd. sp.*
 xeranthemum fulgidum L. f. }
 retortum *Willd. sp.* }
 xeranthemum retortum L. }
 bracteatum *Willd. Enum.* }
 xeranthemum bracteatum }
Vent. Malm.

GNAPHALIUM.

1. *Chrysocoma.*

stæchas L.
 — minor.
 crassifolium *Encycl.* (non L.)
 ovatum.
 crassifolium L. *Mant.* }
 cymosum L.
 orientale L.

— *multicaule.*

3. Tiges ligneuses.

bleudtre. italie. ♀
 corymbifère. italie. ♀
 de Valence. esp. or. ♀
 citronnelle. F. m. ♀ (méd.)
 d'Afrique. cap. or. ♀
 moxa. chine. or. ♀ (méd.)
 argentée. canaries. or. ♀
 en arbre. F. m. or. ♀

MICROPUS

à tige droite. F. ⊙
 couché. F. ⊙
 nain. F. ⊙

VI. Réceptacle nu, rarement garni de paillettes; graines aigrettées; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

FILAGO

de montagne. F. ⊙
 dichotome. F. ⊙
 de France. ⊙
 pyramidal. F. ⊙
 pied-de-lion. Alpes. ♀

XÉRANTHÈME

annuel. F. ⊙ (orn.)
 fermé. F. ⊙

ELICHRYSUM

éclatant. cap. or. ♂ (orn.)
 contourné. cap. or. ♀
 à grandes bractées. N. Holl. or.
 ♂ (orn.)

IMMORTELLE.

1. Fleurs jaunes.

stéchas. F. m. or. ♀ (méd.)
 — naine.
 à feuilles épaisses. or. ♀
 à feuilles ovales. cap. or. ♀
 corymbifère. cap. or. ♀
 d'Orient. or. ♀ (orn.)

- arenarium L.
 — luteo-album L.
 — foetidum L.
 patulum L.

2. *Argyrocoma.*

- diosmæfolium Vent. Malm.
 teretifolium L.
 undulatum L.
 spathulatum Encycl.
 glomeratum.
 serpyllifolium Encycl.
 margaritaceum L.
 dioicum L.
 leyseroides Desf. Atl.
 supinum L.
 alpinum L.
 sylvaticum L.
 uliginosum L.

CONYZA et BACCHARIS

- neriifolia. }
 Baccharis neriifolia L. }
 ivæfolia. }
 Baccharis ivæfolia L. }
 halimifolia. }
 Baccharis halimifolia L. }
 dioscoridis. }
 Baccharis dioscoridis L. }
 odorata L.
 candida L.
 asteroides.
 gouani. }
 Erigeron gouani L. }
 thapsioides Marsch. cauc.
 paniculata.
 ægyptiaca Willd. sp. }
 Erigeron ægyptiacum L. }
 Mant.
 squarrosa L.
 rupestris L. Mant.
 sordida L. Mant.
 saxatilis L.

TUSSILAGO

- alpina L.
 farfara L.
 alba L.
 petasites L.
 fragrans Vill. Delph.

- des sables. Allem. ☉
 jaune-blanche. F. ☉
 fétide. cap. ☉
 étalée. cap. or. ♃

2. Fleurs blanches.

- à f. de Diosma. cap. or. ♃
 à feuell. cylindriq. cap. or. ♃
 ondulée. Antilles. ☉
 en spatule. ☉
 agglomérée. N. Holl. or. ♄
 à f. de serpolet. cap. or. ♃
 des jardins. Am. s. ♄ (orn.)
 pied-de-chat. F. ♄ (méd.)
 à feuell. de Leysera. Tunis. ☉
 petite. Alpes. ♄
 des Alpes. ♄
 des bois. F. ♂
 des marais. F. ☉

CONYSE

- à f. de Nérium. cap. or. ♃
 à feuilles d'iva. Am. s. or. ♃
 à feuilles d'halime. Am. s. ♃
 de Dioscoride. syrie. or. ♃
 odorante. Antilles. s. ch. ♃
 blanche. candie. or. ♃
 à feuilles d'aster. s. ch. ♃
 de Gouan. canaries. or. ♄
 à feuell. de Molène. caucase. ♄
 paniculée. ☉
 d'Egypte. or. ♄
 rude. F. ♂
 des rochers. barbarie. or. ♃
 à fleurs ternées. F. m. or. ♃
 à une fleur. F. m. or. ♃

TUSSILAGE

- des Alpes. ♄
 pas-d'âne. F. ♄ (méd.)
 blanc. F. ♄
 pétasite. F. ♄
 odorant. ♄ (orn.)

VII. Receptaculum nudum; semen pap-
posum; flosculi omnes hermaphroditi.
(Polygamia æqualis.)

CACALIA.

1. Fruticosæ.

laciniata Jacq. ic. }
articulata L. f. }
papillaris L.
Anteuphorbium L.
kleinia L.
ficoides L.
cylindrica Encycl.
repens L. Mant.
odorata.
reticulata Vahl. symb.

2. Herbacæ.

linaria Cav. ic.
porophyllum L.
suaveolens L.
senecioides.
petasites Encycl.
tomentosa Encycl.
alliariæfolia Encycl.
atriplicifolia L.
sagittata Willd. sp.

CHRYSOCOMA

dichotoma L. f.
coma-aurea L.
cernua L.
biflora L.
dracunculoides Encycl. }
Linosyris L.
juncea.
graminifolia L.

VERNONIA

novæboracensis Willd. sp. }
serratula novæboracensis L. }
præalta Willd. sp. }
serratula præalta L. }
anthelmintica Willd. sp. }
conyza anthelmintica L. }

LIATRIS

spicata Willd. sp. }
serratula spicata L. }
squarrosa Willd. sp. }
serratula squarrosa L. }

VII. Réceptacle nu; graine aigrettée; tous
les fleurs hermaphrodites. (Polyga-
mie égale.)

CACALIA.

1. Tiges ligneuses.

lacinié. cap. s. ch. ♀
mamelonné. cap. s. ch. ♀
à feuilles ovales. cap. s. ch. ♀
kleinia. canaries. s. ch. ♀
ficoïde. cap. s. ch. ♀
cylindrique. cap. s. ch. ♀
rampant. cap. s. ch. ♀
odorant. N. Holl. or. ♀
à réseau. ile de F. s. ch. ♀

2. Tiges herbacées.

à f. linéaires. N. Esp. s. ch. ♂
à f. poreuses. Antilles. s. ch. ♀
suave. Am. s. ♂
à fleurs de seneçon. ♂
à f. de russilage. Alpes. ♂
cotonneux. Alpes. ♂
à f. d'Alliaire. Alpes. ♂
à f. d'Arroche. Am. s. ♂
à f. hastées. Java. ☉ (orn.)

CHRYSOCOME

dichotome. canaries. or. ♀
dorée. cap. or. ♀
penchée. cap. or. ♀
à deux fleurs. sibérie ♂
Linosyris. F. ♂
jonciforme. ♂
à f. de Gramen. Am. s. ♂

VERNONIA

de Newyork. ♂ (orn.)
gigantesque. Am. s. ♂ (orn.)
anthelmintique. inde. s. ch. ♂

LIATRIS

à épis. Am. s. ♂
rude. Am. s. ♂

EUPATORIUM.

1. *Calix imbricatus*, 3 ad 9 florus.*Houstonia* L.*Mikania Houstonia Willd. sp.* }*Dalea* L.*scandens* L.*Mikania scandens Willd. sp.* }*altissimum* L.*cannabinum* L.*Syriacum Jacq. Ic.**sessilifolium* L.*purpureum* L.*maculatum* L.2. *Calix imbricatus*, decemflorus et
ultra.*atriplicifolium Vahl. symb.**deltoideum Jacq. H. Sch.**perfoliatum* L.*aromaticum* L.*coelestinum* L.*ageratoides L. f.**fruticosum.*

STEVIA

*serrata Cav. Ic.**Ageratum punctatum Ortega,*
Dec. }*ivæfolia Willd. Enum.**purpurea Willd. Enum.**Eupatoria Willd. Enum.**pedata Cav. Ic.**Ageratum pedatum Ortega,*
Dec. }

KUHNTIA

*rosmarinifolia Vent. H. Cels.**Eupatorium canescens Or-*
tega, Dec. }

PIQUERIA

trinervia Cav. Ic.

AGERATUM

*conyzoides L.**cœruleum.*

CEPHALOPHORA

glauca Cav. Ic.

EUPATOIRE.

1. Calice imbriqué, renfermant 3-9 fleurs.

*de Houston. Am. s. s. ch. ♃**de la Jamaïque. s. ch. ♃**grimpeuse. Am. s. or. ♄**élevée. Am. s. or. ♄**à f. de chanvre. F. ℥ (méd.)**de Syrie. ♄**à feuilles sessiles. Am. s. ℥**pourpre. Am. s. ♄**maculée. Am. s. ℥*2. Calice imbriqué, renfermant 10 ou un
plus grand nombre de fleurs.*à f. d'Arroche. Ant. s. ch. ♃**deltoïde. s. ch. ℥**perfoliée. Am. s. ♄**aromatique. Am. s. ℥**à f. de scorodonia. Am. s. ♄**agératoïde. Am. s. ♄**ligneuse. or. ♃*

STÉVIA

*à f. en scie. Mexique. or. ℥**à f. d'iva. Mexique. or. ℥**pourpre. Mexique. or. ♄**fausse Eupatoire. Mexiq. or. ♄**en pédale. Cuba. ☉*

KUHNTIA

à f. de romarin. Cuba. s. ch. ♃

PIQUÉRIA

à trois nervures. Mexiq. s. ch. ℥

AGÉRATUM

*fausse conyse. Antilles. ☉**à fleurs bleues. Antilles. ☉*

CÉPHALOPHORA

glauque. Chili. or. ♄

VIII. *Receptaculum villosum aut paleaceum; semen nudum aut subnudum.*

CALEA

aspera Jacq. ic.

TARCHONANTHUS

camphoratus L.

ATHANASIA

annua L.

trifurcata L.

crithmifolia L.

parviflora L. Mant.

tricuspis.

DIOTIS

maritima Desf. Atl.

Athanasia maritima L.

SANTOLINA

chamæcyparissus L.

rosmarinifolia L.

tomentosa.

eriosperma Pers. syn.

pinnata Riv. Fragm.

ANACYCLUS

aureus L. Mant.

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes; graines sans aigrette.

CALÉA

à feuilles rudes. Antilles. ☉

TARCONANTE

camphré. cap. or. ♃

ATHANASIA

annuel. F. m. ☉

trifurqué. cap. or. ♃

à f. de bacelle. cap. or. ♃

à petites fleurs. cap. or. ♃

à trois pointes. cap. or. ♃

DIOTIS

maritime. F. m. or. ♃

SANTOLINE

commune. F. m. ♃

à f. de romarin. esp. or. ♃

cotonneuse. esp. or. ♃

à tête laineuse. Italie. or. ♃

ANACYCLUS

jaune. F. m. ☉

ORDO III.

RADIATÆ.

I. *Receptaculum nudum; pappus nullus.*

COTULA

aurea L.

anthemoides L.

coronopifolia L.

turbinata L.

Lidbeckia turbinata Willd.

sp.

BELLIS

annua L.

perennis L.

MATRICARIA

parthenium L.

parthenioides.

ORDRE III.

RADIÉES.

I. Réceptacle nu; graines sans aigrette.

COTULA

jaune. esp. ☉

à feuilles d'anthémis. esp. ☉

corne-de-cerf. cap. ☉

conique. cap. ☉

PAQUERETTE

annuelle. F. ☉

vivace. F. ♃ (orn.)

MATRICAIRE

officinale. F. ♃ (méd.)

inodore. ♃

chamomilla L.
suaveolens L.
capensis L. Mant.

camomille. F. ☉
odorante. F. ☉ (méd.)
du Cap. ☉

CHRYSANTHEMUM.

1. *Leucanthema**Fruticosa.*

frutescens L. }
pyrethrum frutescens Willd. }
sp. }
pinnatifidum L. f. }
grandiflorum. }
pyrethrum grandiflorum }
Willd. Enum. }
asteroides. }

Herbacea.

præaltum Vent. H. cels. }
pyrethrum partheniifolium }
Willd. Enum. }
pulverulentum. }
pyrethrum pulverulentum }
Willd. Enum. }
corymbosum L. }
pyrethrum corymbosum }
Willd. sp. }
tenuifolium. }
pyrethrum tenuifolium Willd. }
Enum. }
coccineum Willd. sp. }
pyrethrum roseum Willd. }
Enum. }
serotinum L. }
pyrethrum serotinum Willd. }
sp. }
leucanthemum L. }
maximum Ramond. Bull. }
Phil. }
pyrethrum latifolium Willd. }
grandiflorum Lapeyr. Pyr. }
ceratophylloides All. Ped. }
arcticum L. }
montanum L. }
balsamita L. }
pyrethrum balsamita Willd. }
sp. }

CHRYSANTHÈME.

1. Fleurs blanches ou roses.

Tiges ligneuses.

arbrisseau. canaries. or. ☽
pinnatifide. canaries. or. ☽
à grandes fl. canaries. or. ☽
astéroïde. s. ch. ☽

Tiges herbacées.

à f. de matricaire. caucase. ☿
pulvérulente. ibérie. ☿
corymbifère. F. ☿
à feuilles menues. caucase. ☿
rose. ibérie. ☿
d'automne. Am. s. ☿
grande Marguerite. F. ☿
à larges feuilles. pyrénées. ☿
à feuilles cornues. Alpes. ☿
du Caucase. ☿
des montagnes. F. ☿
balsamite. or. ☿

multifidum.
 pyrethrum pinnatifidum }
willd. sp.
 matricaria tanacetifolia *En-*
cycl. Excl. syn. Tourn. }
 monspeliense *L.*
 alpinum *L.*
 pyrethrum alpinum *willd.* }
sp.
 carinatum *schousb. Maroc.*

lacinié. Ψ
 de Montpellier. *F.* Ψ
 des Alpes. Ψ
 caréné. *Maroc.* \odot

2. *Chrysanthema.*

miconis *L.*
 segetum *L.*
 coronarium *L.*
 — { roxburghii.
 pyrethrum indicum *H. K.* }

2. Fleurs jaunes.
 à feuilles entières. *F.* \odot
 des moissons. *F.* \odot
 des jardins. *F. m.* \odot
 de Roxburgh. *Inde.* \odot

CALENDULA

arvensis *L.*
 — officinalis *L.*
 stellata *Cav. Ic.*
 hybrida *L.*
 pluvialis *L.*
 fruticosa *L.*
 chrysanthemifolia *Vent. Malm.*
 flaccida *Vent. Malm.*

SOUCI

des champs. *F.* \odot
 cultivé. *F.* \odot (écon.)
 étoilé. *Esp.* \odot
 hybride. *cap.* \odot
 des pluies. *cap.* \odot
 arbrisseau. *cap. s. ch.* Ψ
 à f. de chrysanthème. *cap.*
or. Ψ
 à fleurs rougeâtres. *cap. or.* Ψ

MADIA

viscosa *Cav. Ic.*

MADIA

visqueux. *chili.* \odot

OSTEOSPERMUM

— moniliferum *L. Vel pis. Jacq. m.*
 spinosum *L.*
 pinnatifidum *Vher. stirp.*

OSTÉOSPERME

à colliers. *cap. or.* Ψ
 épineux. *cap. or.* Ψ
 pinnatifide. *cap. or.* Ψ

MILLERIA

quinqueflora *L.*

MILLÉRIA

à cinq fleurs. *Am. m.* \odot

ERIOCEPHALUS

africanus *L.*

ÉRIOCÉPHALE

d'Afrique. *cap. or.* Ψ

II. *Receptaculum nudum ; semina papposa.*

II. Réceptacle nu ; graines aigrettées.

BELLIUM

bellidioides *L. Mant.*

BELLIUM

fausse paquerette. *italie.* \odot

HELENIUM

autumnale *L.*
 quadridentatum *Bill. soc. nat.*

HÉLÉNIUM

d'automne. *Am. s.* Ψ
 à quatre dents. *Am. s.* Ψ

PECTIS

prostrata *Cav. Ic.*

PECTIS

couché. *N. Esp. s. ch.* Ψ

SCHKUHRIA

abrotanoides *roth. cat.*
 pectis multifida *ortega, dec.*
 pectis bipinnata *Lamk.*
Journ. d'Hist. nat.

SKURIA

à f. d'aurône. mexique. ☉

TAGETES

erecta *L.*
 — patula *L.*
 lucida *cav. 1c.*
 tenuifolia *cav. 1c.*
 minuta *L.*

TAGÉTÈS

œillet-d'inde. mexiq. ☉ (orn.)
 touffu. mexique. ☉ (orn.)
 luisant. n. esp. or. ☿
 à feuilles étroites. pérou. ☉
 à petites fleurs. chili. ☉

BOEBERA

chrysanthemoides *willd. sp.*
 tagetes papposa *vent. H. cels.*

BOEBÉRA

à f. de chrysanthème. am. s. ☉

DORONICUM

pardalianches *L.*
 plantagineum *L.*
 Arnica
 Arnica montana *L.*
 bellidiastrum *L.*
 Arnica bellidiastrum *willd.*
sp.

DORONIC

pardalianchès. Alpes. ♁
 à feuilles de plantain. f. ♁
 Arnica. f. ♁ (méd.)

à fleurs de paquerette. Alpes. ♁

GORTERIA

ringens *L.*
 peclinata *willd. sp.*

GORTÉRIA

à grandes fl. cap. or. ♁ (orn.)
 à f. pennées. cap. or. ♁ (orn.)

GRINDELIA

inuloides *willd. Enum*

GRINDÉLIA

à fleurs d'aunée. mexiq. or. ♃

INULA

Helenium *L.*
 verbascifolia.
 bifrons *L.*
 oculus-christi *Encycl. (non L.)*
 britannica *L.*
 dysenterica *L.*
 pulicaria *L.*
 arabica *L. Mant.*
 crispa.
 gnapholodes *vent. H. cels.*
 aster crispus *Forsk. Fl.*
 squarrosa *L.*
 spiræifolia *Encycl.*
 salicina *L.*
 ensifolia *L.*
 crithmoides *L.*
 hirta *L.*
 montana *L.*

AUNÉE

officinale. f. ♁ (méd.)
 à feuilles de molène. ♁
 decurrente. f. ♁
 œil-de-christ. f. ♁
 britannique. f. ♁
 dysentérique. f. ♁
 pulicaire. f. ☉
 d'Arabie. or. ♁

crépue. égypte. ☉

rude. f. ♁

à feuilles de saule. f. ♁

ensiforme. f. ♁

criste marine. f. ♃

velue. f. ♁

de montagne. f. ♁

cinerea *Encycl.* }
 vaillantii *All. ped.* }
 viscosa. }
 erigeron viscosum *L.* }
 graveolens. }
 erigeron graveolens *L.* }
 tuberosa. }
 erigeron tuberosum *L.* }
 glutinosa. }
 aster glutinosus *Cav. Ic.* }

cendrée. F. ☿

visqueuse. F. m. or. ♀

fétide. F. ☉

tubéreuse. F. m. or. ☿

glutineuse. Mexique. or. ♀

ERIGERON

canadense *L.*
 siculum *L.*
 linifolium *Willd. sp.* }
 bonariense. }
 longifolium.
 annuum. }
 aster annuus *L.* }
 delphinifolium *Willd. Hort.*
Ber.
 philadelphicum *L.*
 amplexicaule.
 alpinum *L.*
 villarsii *Bellardi, App.* }
 atticum *Vill. Delph.* }
 acre *L.*
 foetidum *L.*
 — { viscosum.
 psidia glutinosa *Jacq. H.*
Sch. }

ERIGERON

de Canada. F. ☉

de Sicile. F. m. ☉

à feuilles de Lin. ☉

à longues feuilles. Am. s.

à fleurs blanches. Am. s. ☉

à f. de delphinium. Am. m.
 s. ch. ♂

de Philadelphie. ♀

amplexicaule. Am. s. ♀

des Alpes. ♀

de Villars. Alpes. ♀

âcre. F. ☉

fétide. cap. or. ♂

visqueux. Antilles. s. ch. ♀

BOLTONIA

asteroides *L'Her. sert.*
 glastifolia *L'Her. sert.*

BOLTONIA

à fleurs d'aster. Am. s. ♀

à feuilles de pastel. Am. s. ♀

ASTER

liratus *Bot. Magaz.*
 argophyllus *Bill. n. Holl.*
 tomentosus *Willd. sp.* }
 dentatus *Andr. Rep.* }
 cymbalariae *H. K.*
 fruticosus *L.*
 argenteus *Mich. Fl.* }
 sericeus *Vent. H. Cels.* }
 lithospermifolius.
 tenellus *L.*
 chrysocomoides.
 conyza chrysocomoides. *Desf.* }
Atl.

ASTER

sillonné. N. Holl. or. ♀

blanchâtre. N. Holl. or. ♀

cotonneux. N. Holl. or. ♀

cymbalaire. cap. or. ♀

arbrisseau. cap. or. ♀

satiné. Am. s. ♀

à feuilles de crémil. ☿

fragile. cap. ☉

changeant. Barbarie. or. ♀

- tripolium L.
 alpinus L.
 pyrenæus.
 amellus L.
 amygdalinus *encycl.*
 leucanthemus.
 carolinianus *willd. sp.*
 linifolius L. ?
 acris L.
 trinervis.
 æstivus *willd. sp.*
 punctatus *willd. sp.*
 dracunculoides *encycl.*
 diversifolius *mich. fl.*
 adulterinus *willd. enum.*
 amplexicaulis *encycl.*
 decorus.
 novæ-angliæ L.
 cordifolius L.
 corymbosus *willd. sp.*
 patulus *encycl.*
 rubricaulis *encycl.*
 lævigatus *encycl.*
 longifolius *encycl.*
 amœnus *encycl.*
 concinnus *willd. enum.*
 novi-belgii L.
 paniculatus *encycl.* }
 salignus *willd. sp.*
 versicolor *willd. sp.*
 subulatus *mich. fl.*
 inflexus.
 salicifolius *encycl.*
 strictus.
 tradescanti L.
 macrophyllus L.
 coridifolius *mich. fl.*
 ericoides L.
 vimineus *encycl.*
 tenuifolius L.
 fragilis *willd. sp.*
 rigidulus.
 grandiflorus L.
 chinensis L.
 miser L.
- maritime.* F. ♂
des Alpes. ♀
des Pyrénées. ℥
Amelle. F. ♀ (orn.)
à f. d' amandier. AM. S. ♀
à fleurs blanches. ♀
de Caroline. ℥
à feuilles de Lin. AM. S. ♀
âcre. F. m. ♀
à trois nervures. ♀
d'été. AM. S. ♀
ponctué. Hongrie. ♀
à feuilles d' Estragon. ℥
à feuilles variables. AM. S. ♀
adultérin. AM. S. ℥
amplexicaule. AM. S. ♀ (orn.)
d'ornement. ℥
de la Nouv.-Anglet. ♀ (orn.)
à f. en cœur. AM. S. ♀ (orn.)
corymbifere. AM. S. ♀
étalé. AM. S. ℥ (orn.)
à tige pourpre. AM. S. ♀
glabre. AM. S. ♀ (orn.)
à feuilles longues. AM. S. ♀
luisant. AM. S. ♀
à grappes serrées. AM. S. ℥
paniculé. AM. S. ♀
de Hongrie. ♀
bigarré. AM. S. ♀
en alêne. AM. S. ♀
courbé. ℥
à feuilles de saule. AM. S. ℥
ramassé. ℥
de Tradescant. AM. S. ℥
à larges feuilles. AM. S. ℥
à feuilles de coris. AM. S. ♀
à feuil. de Bruyère. AM. S. ℥
flexible. AM. S. ℥
à feuilles minces. AM. S. ♀
fragile. AM. S. ♀
à feuilles rudes. ℥
à grandes fl. AM. S. ♀ (orn.)
reine-marguerite. chine. ☉
 (orn.)
gréle. AM. S. ♀

1. *Ramuli secundi patuli.*

sempervirens L.
 elliptica *Encycl.* (an *willd.* ?)
 canadensis L.
 glabra.
 nutans.
 procera H. K.
 aspera H. K.
 conferta *Encycl.*

2. *Racemi erecti.*

integrifolia.
 multiflora.
 mexicana L.
 latifolia L.
 bicolor L. *Mant.*
 flexicaulis L.
 virga-aurea L.
 alpestris *Wald. et Kitt. Hung.*
 corymbosa.
 minuta L.
 rigida L.
 petiolaris *Willd. sp.*
 hirta *Willd. Enum. ?*
 arenaria.
 gracilis *Encycl.*

CINERARIA

geifolia L.
 lobata *L'Her. sert.*
 alpina *Willd. sp.*
 amelloides L.
 maritima L.
 populifolia *L'Her. sert.* }
 appendiculata L. f. }
 aurita *L'Her. sert.*
 lanata *L'Her. sert.*
 cruenta *L'Her. sert.*
 alliariaefolia.
 præcox *Carv. ic.*

SENECIO.

1. *Flores flosculosi.*

— { cernuus L. f. }
 { rubens *Jacq. Hort.* }
 hieracifolius L.
 vulgaris L.

1. Grappes unilatérales étalées.

toujours verte. AM. S. ℥
 elliptique. AM. S. ℥
 de Canada. ♀ (orn.)
 glabre. AM. S. ♀ (orn.)
 à tête penchée. AM. S. ℥ (orn.)
 élevée. AM. S. ♀ (orn.)
 rude. AM. S. ♀ (orn.)
 à grappes serrées. ℥

2. Grappes redressées.

à feuilles entières. AM. S. ♀
 à fleurs nombreuses. ♀
 du Mexique. ℥
 à larges feuilles. AM. S. ♀
 de deux couleurs. AM. S. ℥
 tortueuse. AM. S. ♀
 des bois. F. ♀
 des rochers. HONGRIE. ℥
 corymbifère. ℥
 petite. F. ♀
 à feuilles dures. AM. S. ♀
 à feuilles pétiolées. AM. S. ℥
 velue. AM. S. ♀
 des sables. ♀
 grêle. ℥

CINÉRAIRE

à feuilles de Geum. cap. or. ℥
 lobée. cap. or. ♪
 des Alpes. ♀
 à fleurs d'Amelle. cap. or. ♪
 maritime. F. ℥
 à f. de peuplier. canar. or. ♀
 auriculée. canaries. or. ♪
 laineuse. canaries. or. ♪
 pourpre. or. ♀
 à feuilles d'Alliaire. or. ♀
 précoce. mexique. s. ch. ♪

SENEÇON.

1. Fleurs flosculeuses.

à fleurs penchées. inde. ⊙
 à f. d'épervière. AM. S. ⊙
 commun. F. ⊙

arabicus *L. Mant.*
 reclinatus *L'Her. stirp.*
 discolor.
 glomeratus.

2. Flores radiati; ligulis revolutis.

ægyptius *L.*
 — sylvaticus *L.*
 viscosus *L.*
 coronopifolius *Desf. Atl.*

3. Flores radiati; radio patente; foliis pinnatifidis.

chrysanthemifolius *Encycl.*
 elegans *L.*
 — Jacobæa *L.*
 erucifolius *L.*
 lycopifolius.
 tenuifolius *s. Veg.*
 parviflorus *All. ped.*
 incanus *L.*
 nebrodensis *L.*

4. Flores radiati; radio patente; foliis indivisis.

paludosus *L.*
 saracenicus *L.*
 nemorensis *L.*
 doria *L.*
 coriaceus *H. K.*
 doricum *L.*
 longifolius *L.*
 halimifolius *L.*
 rigidus *L.*

OTHONNA

cheirifolia *L.*
 coronopifolia *L.*
 pectinata *L.*

III. Semina non papposa; receptaculum paleaceum.

ANTHEMIS.

1. Floribus radio albo.

cota *L.*
 altissima *L.*
 rigescens *Willd. Enum.*
 maritima *L.*

d'Arabie. égypte. ☉
 recliné. cap. or. ☿
 de deux couleurs. or. ♃
 aggloméré. n. Holl. ☉

2. Fleurs radiées; demi-fleurons réfléchis.

d'Égypte. ☉
 des bois. F. ☉
 visqueux. F. ☉
 corne-de-cerf. barbarie. ☉

3. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles pinnatifides.

à f. de chrysanthème. sicile. ☉
 violet. cap. ☉ (orn.)
 Jacobée. F. ☿
 à feuilles de roquette. F. ☿
 à feuilles de Lycopus. ☿
 à feuilles menues. F. ☿
 à petites fleurs. Alpes. ☿
 blanc. Alpes. ☿
 à feuell. de paquerette. esp. ☉

4. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles entières.

des marais. F. ☿
 traçant. F. ☿
 des forêts. F. ☿
 doria. F. m. ☿
 à f. de Limonium. orient. ☿
 doric. Alpes. ☿
 à feuilles longues. cap. or. ♃
 à feuell. d'Halime. cap. or. ♃
 rude. cap. or. ♃

OTHONNA

spatule. tunis. ☿
 corne-de-cerf. cap. or. ♃
 pectiné. cap. or. ♃

III. Graines sans aigrette; réceptacle garni de paillettes.

ANTHÉMIS.

1. Demi-fleurons blancs.

piquante. italie. ☉
 élevée. F. m. ☉
 à feuilles rudes. caucase. ☿
 maritime. F. ☿

mixta L.
 montana L.
 arvensis L.
 clavata Desf. Atl.
 cotula L.
 nobilis L.
 austriaca Jacq. Austr.

2. Floribus radio luteo aut violaceo.

tinctoria L.
 valentina L.
 — bicolor.
 arabica L.
 grandiflora Ramatuelle, }
 Journ. d'hist. nat. }
 artemisiæfolia Willd. sp. }
 chrysanthemum indicum }
 Bot. Magaz. (non L.) }
 ovalifolia Ortega, Dec. }
 bupthalmoides Willd. sp. }
 globosa Ortega, Dec. }
 triloba Ortega, Dec. }

ACHILLEA.

1. Corollis radio luteo.

santolina L.
 falcata L.
 tenuifolia Encycl.
 Ageratum L.
 ægyptiaca L.
 bipinnata L.
 tanacetum myriophyllum }
 Willd. sp. }
 pubescens L.
 pauciflora Encycl.
 decumbens Encycl.
 abrotanifolia L.

semipectinata.
 filipendulina Encycl.
 partheniifolia.
 velutina.
 pectinata Willd. sp. }
 ochroleuca Wald. et Kitt. }
 Hung. }
 flosculosa Pers. syn.

2. Corollis radio albo aut purpureo.
 macrophylla L.

corne-de-cerf. F. ⊙
 des montagnes. Alpes. ♀
 des champs. F. ⊙
 en massue. Barbarie. ⊙
 fétide. F. ⊙
 camomille. F. ♀ (méd.)
 d'Autriche. ♀

2. Demi-fleurons jaunes ou violets.

des teinturiers. Alpes. ♀
 de Valence. F. m. ⊙
 — de deux couleurs.
 d'Arabie. Alger. ⊙

à grandes fleurs. Chine. ♀
 (orn.)

à f. ovales. Pérou. s. ch. ♀

globuleuse. Mexique. or. ♀

à trois lobes. N. esp. or. ♀

MILLEFEUILLE.

1. Demi-fleurons jaunes.

santoline. orient. or. ♀
 falciforme. orient. or. ♀
 à f. menues. orient. or. ♀
 Eupatoire. F. m. ♀ (méd.)
 d'Égypte. orient. or. ♀

bipennée. orient. ♀

pubescente. orient. ♀

à fleurs rares. orient. ♀

tombante. ♀

à feuil. de citronnelle. orient.
 or. ♀

semipectinée. ♀

à f. de Filipendule. orient. ♀

à feuilles de Parthenium. ♀

veloutée. ♀

pectinée. Hongrie. ♀

flosculeuse. ♀

2. Demi-fleurons blancs ou pourpres.

à grandes feuilles. Alpes. ♀

- sambucifolia.
 chrysanthemum macrophyl- }
 lum *Wald. et Kitt. Hung.* }
 dracunculoides. }
 Leucanthema *Pers. syn.* }
 clavennæ *L.*
 herba-rotæ *L.* }
 cuneifolia *Encycl.* }
 serrata *Retz. obs.*
 decolorans *Willd. Enum.*
 speciosa *Willd. Enum.*
 ptarmica *L.*
 alpina *L.*
 sibirica.
 impatiens *L.*
 magna *All. ped.* }
 compacta *Encycl.* }
 nana *L.* }
 lanata *Encycl.* }
 nobilis *L.*
 ligustica *All. ped.*
 setacea *Wald. et Kitt. Hung.*
 — millefolium *L.*
 — purpureum.
 — rosea.
 aspleniifolia *Vent. H. cels.* }
- à feuell. de sureau. Hongrie. ℥
 à f. d'Estragon. caucase. ℥
 corne-de-cerf. Alpes. ℥
 cunéiforme. Alpes. ℥
 à feuilles en scie.
 décolorante. ℥
 élégante. ℥
 sternutatoire. F. ℥ (méd.)
 des Alpes. ℥
 de Sibérie. ℥
 pectinée. Sibérie. ℥
 compacte. Alpes. ℥
 naine. Alpes. ℥
 odorante. Alpes. ℥
 fasciculée. Alpes. ℥
 sétacée. Hongrie. ℥
 commune. F. ℥ (méd.)
 — pourpre. (orn.)
 rose. Am. s. ℥ (orn.)
- PARTHENIUM
 — hystero-phorus *L.*
 — integrifolium *L.*
- BUPHTALMUM
 frutescens *L.*
 arborescens *L.*
 sericeum *L. f.*
 cordifolium *Wald. et Kitt.* }
Hung. }
 inula caucasica *Pers. syn.* }
 aquaticum *L.*
 maritimum *L.*
 spinosum *L.*
 grandiflorum *L.*
 procumbens.
- SIGESBECKIA
 — orientalis *L.*
 flosculosa *L'Her. stirp.*
- ECLIPTA
 erecta *s. Veg.*
 prostrata *L. Mant.*
 — *Egyptiacæ.*
- PARTHENIUM
 lacinié. Antilles. ☉
 à feuell. entières. Am. s. or. ℥
- BUPHTALMUM
 arbrisseau. Am. s. or. ☽
 arbre. Antilles. s. ch. ☽
 satiné. canaries. or. ☽
 à feuilles en cœur. Hongrie. ℥
 aquatique. F. ☉
 maritime. F. ℥
 épineux. F. ☉
 à grandes fleurs. F. ℥
 couché. ℥
- SIGESBECKIA
 d'Orient. inde. ☉
 flosculeux. Pérou. ☉
- ECLIPTA
 à tige droite. inde ☉
 couché. inde. ☉
 d'Egypte.

BALTIMORA
erecta *L. Mant.*

DYSODIUM
divaricatum *Pers. syn.*

ALCINA
perfoliata *Cav. Ic.*

DAHLIA
superflua.
georgina superflua *Dec. Ann.* }
georgina variabilis *Willd.* }
Enum.
— purpurea.
— rubra.
— lilacina.
— pallida.
— flavescens.
frustranea.
georgina frustranea *Dec. Ann.* }
— crocea.
— flava.

MELAMPODIUM
longifolium *Willd. Enum.*

POLYMNIA
Uvedalia *L.*

ENCELIA
halimifolia *Cav. Ic.* }
pallasia grandiflora *Willd. sp.* }
canescens *Cav. Ic.* }
pallasia halimifolia *Willd. sp.* }

XIMENESIA
encelioides *Cav. Ic.*

SCLEROCARPUS
africanus *Jacq. Ic.*

SILPHIUM
laciniatum *L.*
terebinthaceum *Jacq. Hort.*
perfoliatum *L.*
connatum *L. Mant.*
trifoliatum *L.*
ternatum.
scabrum.

COREOPSIS
auriculata *L.*

BALTIMORA
à tige droite. *Am. s.* ☉

DYSODIUM
étalé. *Am. m.* ☉

ALCINA
perfolié. *Mexique.* ☉

DAHLIA
superflue. *Mexique.* ♀ (orn.)
— pourpre.
— rouge.
— lilas.
— pâle.
— jaunâtre.
frustranée. *Mexique.* ♂ (orn.)
— safranée.
— jaune.

MELAMPODIUM
à feuil. longues. *Mexique.* ☉

POLYMNIA
à larges feuilles. *Am. s.* ♀

ENCELIA
à f. d'halime. *N. Esp. s. ch.* ♀
à f. blanches. *Mexiq. s. ch.* ♀

XIMENESIA
à f. d'encelia. *Mexique.* ☉

SCLEROCARPE
d'Afrique. ☉

SILPHIUM
lacinié. *Am. s.* ♂ (orn.)
à f. en cœur. *Am. s.* ♀ (orn.)
perfolié. *Am. s.* ♂
à feuilles réunies. *Am. s.* ♀
à feuilles ternées. *Am. s.* ♂
trifolié. *Am. s.* ♀
à feuilles rudes. *Am. s.* ♂

COREOPSIS
auriculé. *Am. s.* ♂

tripteris L.
 verticillata L.
 — delphinifolia *Encycl.*
 ferulæfolia *Jacq. H. sch.*
 alternifolia L.
 alata *Cav. Ic.*

COSMOS

bipinnata *Cav. Ic.*

RUDBECKIA

laciniata L.
 — angustifolia.
 pinnata *Vent. H. cels.* }
 digitata *Willd. sp.* }
 aspera. }
 chrysomela *Mich. Fl.* }
 triloba L.
 hirta L.
 purpurea L.
 amplexicaulis *Bosc. Soc. Nat.* }
 perfoliata *Cav. Ic.* }

SANVITALIA

villosa *Cav. Ic.* }
 Lorantea atropurpurea *Ortega, Dec.* }

IV. *Semina papposa; receptaculum paleaceum.*

HELIANTHUS

annuus L.
 — multiflorus L.
 tuberosus L.
 mollis *Encycl.* }
 pubescens *Vahl. symb.* }
 canescens *Mich. Fl.* }
 tubæformis *Jacq. H. sch.*
 atrorubens *Encycl. (non L.)*
 altissimus L. }
 virgatus *Encycl.* }
 giganteus L.
 angustifolius L.
 strumosus *Encycl. (an L.?)*
 divaricatus L.
 lævis L. }
 vuphtalmum helianthoides L. }
 heliopsis lævis *Pers. syn.* }
 procumbens *Pers. syn.*
 dentatus *Cav. Ic.*

à trois ailes. AM. S. ℥
 verticillé. AM. S. ℥
 à f. de delphinium. AM. S. ♀
 à f. de férule. MEXIQ. OR. ℥
 à feuilles alternes. AM. S. ℥
 ailé. MEXIQUE. OR. ℥

COSMOS

bipenné. MEXIQUE. ⊙

RUDBECKIA

lacinié. AM. S. ℥ (orn.)
 — à feuilles étroites.
 à feuilles pennées. AM. S. ℥
 rude. AM. S. ♀
 trilobé. AM. S. ♂
 velu. AM. S. ♂
 pourpre. AM. S. OR. ℥ (orn.)
 amplexicaule. MEXIQUE. ⊙

SANVITALIA

velu. N. ESP. ⊙

IV. Graines aigrettées; réceptacle garni de paillettes.

SOLEIL

cultivé. RÉGOU. ⊙ (orn.)
 à fleurs nombr. AM. S. ♀ (orn.)
 topinambour. BRÉSIL. ℥ (alim.)
 cotonneux. AM. S. ♀
 renflé. MEXIQUE. ⊙
 noir-pourpre. AM. S. ♀ (orn.)
 élevé. AM. S. ♀
 gigantesque. AM. S. ♀
 à feuilles étroites. AM. S. ♀
 fusiforme. AM. S. ♀
 étalé. AM. S. ♀
 lisse. AM. S. ♀
 couché. RÉGOU. OR. ℥
 denté. MEXIQUE. OR. ♀

GALARDIA

pulchella *Fougeroux, Acad.* }
virgilia helioides *L'Her. Gen.* }

GALINSOGA

parviflora *Cav. Ic.*
triloba *Cav. Ic.*

PASCHALIA

glauca *Ortega, Dec.*

BALBISIA

elongata *Willd. Sp.*
amellus pedunculatus *Ortega, Dec.* }

AMELLUS

lychnitis *L.*

ZINNIA

pauciflora *L.*
multiflora *L.*
verticillata *Andr. Rep.*
 — { *violacea* *Cav. Ic.* }
 { *elegans* *Jacq. Ic.* }
revoluta *Cav. Ic.* }
tenuiflora *Jacq. Ic.* }

VERBESINA

gigantea *Jacq. Ic.*
atriplicifolia *Encycl.*
fruticosa *L.*
serrata *Cav. Ic.*
alata *L.*
nodiflora *L.*
synedrella nodiflora *Gærtn.* }
Fruct.
mutica *L.*
wedelia carnosa *Persoon. Syn.* }
buphtalmum repens *Willd.* }
sp.

HETEROSPERMA

pinnata *Cav. Ic.*

BIDENS

tripartita *L.*
cernua *L.*
 — *frondosa* *L.*
pilosa *L.*
bullata *L.*

GALARDIA

élégante. *Louisiane.* ⊙ (orn.)

GALINSOGA

à petites fleurs. *Pérou.* ⊙
à trois lobes. *N. Esp.* ⊙

PASCHALIA

glauque. *Chili. S. Ch.* ⊕

BALBISIA

à longs pédoncules. *Mexiq.* ⊙

AMELLUS

bleu. *cap. or.* ⊕

ZINNIA

à fleurs rares. *Pérou.* ⊙ (orn.)
à fleurs nombr. *Louis.* ⊙ (orn.)
verticillé. *Mexique.* ⊙
violet. *Mexique.* ⊙ (orn.)
à fleurs renversées. *Mexiq.* ⊙
 (orn.)

VERBÉSINA

gigantesque. *Antilles. S. Ch.* ⊕
à feuilles d'arroche. *S. Ch.* ⊕
arbrisseau. *Antilles. S. Ch.* ⊕
à f. en scie. *Mexiq. S. Ch.* ⊕
ailée. *Curacao. S. Ch.* ⊕
nodiflore. *Am. M.* ⊙

rampante. *Antilles. S. Ch.* ⊕

HÉTÉROSPERME

à feuilles pennées. *N. Esp.* ⊙

BIDENS

trifolié. *F.* ⊙
penché. *F.* ⊙
feuillu. *Am. S.* ⊙
velu. *Antilles.* ⊙
bulleux. *Italie.* ⊙

nivea <i>L.</i>	}	à fleurs blanches. AM. s. ☉
melananthera hastata <i>Mich.</i> <i>Fl.</i>		
bipinnata <i>L.</i>	}	bipenné. AM. s. ☉
multifida.		
pauciflora <i>Encycl. suppl.</i>	}	lacinié. ☉
serrulata.		
coreopsis serrulata <i>Encycl.</i> <i>suppl.</i>	}	à feuilles en scie. ☉
heterophylla <i>orteg. Dec.</i>		
SPILANTHUS		SPILANTHUS
— oleracea <i>s. Veg.</i>		cressonde <i>Para. inde.</i> ☉ (méd.)
fusca.		brun. AM. m. ☉ (méd.)
Alcmella <i>L. Mant.</i>		Alcmella. <i>inde.</i> ☉
AGRIPHYLLUM		AGRIPHYLLUM
spinosum.	}	épineux. cap. or. ♃
Gorteria spinosa <i>L.</i>		
Berckeya incana <i>Willd. sp.</i>	}	cilié. cap. or. ♃
Rohria incana <i>Thunb. Prodr.</i>		
ciliare.	}	
Gorteria ciliaris <i>L.</i>		
Berckeya ciliaris <i>Willd. sp.</i>	}	
Rohria ciliaris <i>Thunb. Prodr.</i>		
ARCTOTIS		ARCTOTIS
tristis <i>L.</i>		à fleurs pâles. cap. ☉
plantaginea <i>L.</i>		à f. de plantain. cap. or. ♃
reptans <i>Jacq. H. Sch.</i>		rampant. cap. or. ♃
aspera <i>L.</i>		à feuilles rudes. cap. or. ♃
grandiflora <i>Jacq. H. Sch.</i>		à grandes fleurs. cap. or. ♃
revoluta <i>Jacq. H. Sch.</i>		recourbé. cap. or. ☉

CLASSIS XI.

CLASSE XI.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(Corolla epigyna ; antheræ
distinctæ.)(Corolle sur le pistil ; anthères
distinctes.)

ORDO I.

ORDRE I.

DIPSACEÆ.

DIPSACÉES.

MORINA
persica *L.*MORINE
de Perse. ♃ (orn.)

DIPSACUS

sylvestris willd. sp.
fullonum willd. sp.
laciniatus L.
pilosus L.

SCABIOSA.

1. *Corollis quadrifidis.*

alpina L.
tatarica L.
rigida L.
syriaca L.
dichotoma Encycl. }
centauroides Encycl.
corniculata Wald. et Kitt.
Hung.
leucantha L.
succisa L.
arvensis L.
sylvatica L.
montana Marsch. cauc.
integrifolia L.

2. *Corollis quinquefidis.*

columbaria L.
ochroleuca L.
banatica Wald. et Kitt. Hung.
suaveolens Dec. Fl.
lucida Vill. Delph.
setifera Encycl.
uniseta Savi.
urceolata Desf. Atl. }
rutæfolia Valh. symb. }
divaricata Encycl. }
argentea L.
sicula L. Mant. }
divaricata Jacq. Austr. }
stellata L.
parviflora Desf. Atl. }
dichotoma Cirillo, Dec. }
prolifera L.
 — *atropurpurea L.*
africana L.
caucasica Marsch. cauc.
cretica L.
graminifolia L.
palæstina L. Mant.

— *Roze.*

DIPSACUS

sauvage. F. ♂
chardon-bonnetier. F. ♂ (arts.)
lacinié. F. ♂
velu. F. ⊙

SCABIEUSE.

1. *Corolles à 4 divisions.*

des Alpes. F. ℥
de Tartarie. ♂
à feuilles dures. cap. or. ♀
de Syrie. ⊙
fausse centaurée. F. m. ℥
cornue. Hongrie. ℥
à fleurs blanches. F. m. ℥
tronquée. F. ℥ (méd.)
des champs. F. ℥ (méd.)
des bois. F. ℥ (méd.)
de montagne. caucase. ♂
à feuilles entières. F. ⊙

2. *Corolles à 5 divisions.*

colombaire. F. ℥
jaune-pâle. F. ♂
de Hongrie. ♂
odorante. F. ℥
luisante. Alpes. ℥
sétifère. Italie. ⊙
à une soie. Italie. ℥
urcéolée. Barbarie. ℥
argentée. orient. or. ℥
de Sicile. ⊙
étoilée. F. m. ⊙
à petites fleurs. Barbarie. ⊙
prolifère. orient. ⊙
des jardins. inde? ⊙ (orn.)
d'Afrique. or. ♀
du Caucase. ℥ (orn.)
de Crète. or. ♀
à feuilles de gramin. F. Alpes.
de Palestine. or. ℥

— *Roze.*

KNAUTIA

orientalis L.
plumosa L. Mant.

KNAUTIA

d'Orient. ☉
plumeux. orient. ☉

ORDO II.

VALERIANEÆ.

VALERIANA

— rubra L.
angustifolia All. ped.
calcitrapa L.
dioica L.
officinalis L.
phu L.
tripteris L.
montana L.
tuberosa L.
celtica L.
saxatilis L.
pyrenaica L.

FEDIA

cornucopiæ vahl, sp.
olitoria vahl, sp.
vesicaria vahl, sp.
coronata vahl, sp.
echinata vahl, sp.
sibirica vahl, sp.

ORDO III.

RUBIACEÆ.

SHERARDIA

arvensis L.
muralis L.

ASPERULA

arvensis L.
odorata L.
galioides marsch. cauc.
taurina L.
cynanchica L.
tinctoria L.
calabrica L. f.

ORDRE II.

VALÉRIANÉES.

VALÉRIANE

rouge. F. ♀ (orn.)
à feuilles étroites. F. ♀
chausse-trape. orient. ☉
dioïque. F. ♀
officinale. F. ♀ (méd.)
phu. F. ♀
à feuilles ternées. Alpes. ♀
de montagne. Alpes. ♀
tubéreuse. Alpes. ♀
nard-celtique. Alpes. ♀
des rochers. Alpes. ♀
des Pyrénées. ♀

FÉDIA

corne-d'abondance. barb. ☉
mâche. F. ☉ (alim.)
vésiculeuse. orient. ☉
couronnée. F. ☉
hérissée. F. ☉
de Sibérie. ♂

ORDRE III.

RUBIACÉES.

I. Fructus dicoccus dispermus; stamina
sépè 4.

I. 2 graines accolées; ordinairement 4
étamines.

SHÉRARDIA

des champs. F. ☉
des murailles. F. ☉

ASPÉRULE

des champs. F. ☉
odorante. F. ♀
à f. de caillelait. caucase. ♀
de Turin. Alpes. ♀
à l'esquinancie. F. ♀
des teinturiers. F. ♀
de Calabre. or. ♀

1. *Fructu glabro.*

palustre L.
 uliginosum L.
 læve Dec. Fl. }
 umbellatum Encycl. }
 bocconi All. ped. }
 nitidulum Thuil. Fl. }
 verum L.
 rubrum L. }
 purpureum Dec. Fl. (non L.) }
 rubrum Dec. Fl. }
 purpureum L. }
 mollugo L.
 provinciale Encycl.
 lucidum Pers. syn. (excl. syn.)
 megalospermum Dec. Fl. }
 arenarium Lois. Fl. }
 tyrolense Willd. Enum.
 spurium L.
 glaucum L.
 rubioides L.
 — sylvaticum L. }
 linifolium Encycl. }
 pumilum Encycl. }
 trichophyllum All. ped. }
 anglicum Smith, Fl.
 divaricatum Encycl.
 tricorne Smith, Fl.

2. *Fructu hispido aut aspero.*

rotundifolium L.
 Aparine L.
 hispidum Willd. Enum. }
 scaberrimum Horn. cat. }
 vaillantii Dec. Fl.
 parisiense L. }
 litigiosum Dec. Fl. }
 maritimum L.
 villosum Encycl.
 boreale L.

CRUCIANELLA

angustifolia L.
 latifolia L.
 ciliata Encycl.
 maritima L.

1. *Fruit glabre.*

des marais. F. Ψ
 aquatique. F. ℥
 lisse. F. ℥
 de Boccone. F. Ψ
 jaune. F. Ψ (méd.)
 pourpre. F. ℥
 rouge. F. ℥
 blanc. F. Ψ
 de Provence. Ψ
 luisant. F. Ψ
 des sables. F. Ψ
 du Tyrol. ℥
 faux Gratteron. F. ⊙
 glauque. F. ℥
 à feuilles de garence. F. ℥
 des bois. F. Ψ
 à feuilles de Lin. F. Ψ
 nain. Alpes. ⊙
 d'Angleterre. F. ⊙
 étalé. F. ⊙
 à trois cornes. F. ⊙

2. *Fruit hérissé ou rude.*

à feuilles rondes. F. Ψ
 Gratteron. F. ⊙
 hérissé. Égypte. ⊙
 de Vaillant. F. ⊙
 de Paris. F. ⊙
 maritime. F. ℥
 velu. Esp. ℥
 du Nord. F. Ψ

CRUCIANELLE

à feuilles étroites. F. ⊙
 à larges feuilles. F. ⊙
 ciliée. orient. ⊙
 maritime. F. or. ♄

VALANTIA

muralis L.
hispida L.
glabra L.
articulata L.
aparine L.
galium saccharatum Dec. fl. }
cruciata L.

RUBIA

tinctorum L.
lucida s. *veg.*
angustifolia L. Mant.
cordifolia L. Mant.

ANTHOSPERMUM

æthiopicum L.

II. *Fructus dicoccus dispermus; stamina*
 4, rarius 5 aut 6.

HOUSTONIA

coccinea Andr. rep.
ixora americana Jacq. H. }
sch.
bouvardia triphylla H. K.

SPERMACOCE

verticillata L.
tenuior L.
rubra Jacq. H. sch.

PHYLLIS

nobla L.

III. *Fructus monocarpus bilocularis*
polyspermus; stamina 5.

RANDIA

aculeata L.

PINCKNEIA

pubens Mich. fl.

RONDELETIA

triflora Vahl. symb.
americana L.

GARDENIA

florida L.
thunbergia H. K.
spinosa Thunb. Diss.
radicans Thunb. Diss.
longiflora H. K. ?

VALANTIA

des murailles. F. ☉
velu. F. ☉
glabre. F. ☉
articulé. orient. ☉
à gros fruit. F. ☉
croisette. F. ☿

GARENCE

des teinturiers. F. ☿ (arts.)
luisante. barbarie. or. ♀
à f. étroites. minorque or. ♀
à feuilles en cœur. russie. ☿

ANTHOSPERMUM

d'Ethiopie. s. ch. ♀

II. 2 graines accolées; 4 étamines, rarement
 5 ou 6.

HOUSTONIA

écarlate. mexiq. s. ch. ♀ (orn.)

SPERMACOCÉ

verticillé. antilles. s. ch. ♀
grêle. am. m. ☉
à fleurs rouges. ☉

PHYLLIS

à f. ternées. canaries. or. ♀

III. Un fruit à deux loges polyspermes;
 5 étamines.

RANDIA

épineux. antilles. s. ch. ♀

PINCKNÉIA

pubescent. am. s. or. ♀

RONDELÉTIA

à trois fleurs. antilles. s. ch. ♀
d'Amérique. antilles. s. ch. ♀

GARDÉNIA

à grandes fl. cap. or. ♀ (orn.)
de Thunberg. cap. s. ch. ♀
épineux. chine. s. ch. ♀
rampant. japon. s. ch. ♀
à long. fl. sierra-leona. s. ch. ♀

IV. *Fructus monocarpus bilocularis*
dispermus ; stamina 4.

IXORA

- *coccinea L.*
- *alba L.*

V. *Fructus monocarpus bilocularis*
dispermus ; stamina 5.

SERISSA

- *foetida.*
- *lycium foetidum L. f.*
- *lycium indicum Retz. obs.*
- *lycium japonicum Thunb. Jap.*
- *buchosia coprosmoides P'Her. gen.*

CHIOCOCCA

- *racemosa L.*

PSYCHOTRIA

- *undulata Jacq. H. sch.*

COFFEA

- *arabica L.*

PÆDERIA

- *foetida L. Mant.*

VI. *Fructus monocarpus multilocularis ;*
loculis monospermis ; stamina 4, 5, aut
plura.

GUETTARDA

- *scabra Vent. ch. de pl. }*
- *matthiola scabra L. }*

PLOCAMA

- *pendula H. K.*

VII. *Fructus monocarpus multilocularis ;*
loculis polyspermis ; stamina 5.

HAMELLIA

- *patens L.*
- *lucida ?*

VIII. *Flores aggregati supra receptaculum*
commune.

MITCHELLA

- *repens L.*

OPERCULARIA

- *ligustrifolia Juss. Ann.*

CEPHALANTHUS

- *occidentalis L.*

Mussaenda sanguinea - Muscaenda sanguinea
Mussaenda rotundifolia
Mussaenda verticillata
Sida acuta - Sida acuta
Melastoma verticillata
Pennisetum purpurascens
Mussaenda verticillata
Mussaenda verticillata

IV. Un fruit à deux loges monospermes ;
4 étamines.

IXORA

- *écarlate. inde. s. ch. ♀ (orn.)*
- *blanc. inde. s. ch. ♀*

V. Un fruit à deux loges monospermes ;
5 étamines.

SÉRISSA

fétide. japon. s. ch. ♀

CHIOCOCCA

- *à grappes. Antilles. s. ch. ♀*

PSYCHOTRIA

- *ondulé. Antilles. s. ch. ♀*

CAFÉ

- *d'Arabie. s. ch. ♀ (écon.)*

PÆDERIA

- *fétide. inde. s. ch. ♀*

VI. Un fruit à plusieurs loges mono-
spermes ; 4, 5 ou un plus grand nombre
d'étamines.

GUETTARDA

- *rude. Antilles. s. ch. ♀*

PLOCAMA

- *incliné. canaries. or. ♀*

VII. Un fruit à plusieurs loges poly-
spermes ; 5 étamines.

HAMELLIA

- *étalé. Antilles. s. ch. ♀*
- *à feuilles luisantes. s. ch. ♀*

VIII. Fleurs aggrégées sur un réceptacle
commun.

MITCHELLA

- *rampant. Am. s. ♀*

OPERCULARIA

- *à f. de troëne. N. Holl. or. ♀*

CÉPHALANTE

- *d'Occident. Am. s. ♀ (orn.)*

ORDO IV.

CAPRIFOLIA.

I. *Calix caliculatus aut bracteatus ; stylus 1 ; corolla monopetala.*

LINNÆA

borealis L.

TRIOSTEUM

perfoliatum L.

SYMPHORICARPOS

parviflora.

Lonicera symphoricarpos L. }

DIERVILLA

lutea.

Lonicera diervilla L. }

LONIGERA.

1. *Caule volubili.*

parviflora Encycl. }

dioica H. K. }

caprifolium L.

periclymenum L.

sempervirens L.

— *japonica Thunb. Jap.*

2. *Caule recto ; pedunculis bifloris.*

tatarica L.

pyrenaica L.

nigra L.

cœrulea L.

xylosteum L.

alpigena L.

II. *Calix caliculatus aut bracteatus ; stylus 1 ; corolla subpolypetala.*

VISCUM

album L.

III. *Calix bracteatus ; stylus 0 ; stigmata 3 ; corolla monopetala.*

VIBURNUM

tinus L.

— *latifolius.*

rigidum Vent. Malm.

ORDRE IV.

CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées ; 1 style ; corolle monopétale.

LINNÉE

boréale. Alpes. ♀

TRIOSTEUM

perfolié. Am. s. ♂

SYMPHORINE

à petites fl. Am. s. ♀ (orn.)

DIERVILLA.

jaune. Am. s. ♀ (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

1. Tige sarmenteuse.

à petites fleurs. Am. s. ♀ (orn.)

des jardins. F. m. ♀ (orn.)

des bois. F. ♀ (orn.)

toujours vert. Am. s. ♀ (orn.)

du Japon. Or. ♀

2. Tige droite ; pédoncules à deux fleurs.

de Tartarie. ♀ (orn.)

des Pyrénées. F. ♀ (orn.)

à fruit noir. Alpes. ♀ (orn.)

à fruit bleu. Alpes. ♀ (orn.)

velu. Alpes. ♀ (orn.)

des Alpes. ♀ (orn.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées ; 1 style ; corolle presque polypétale.

GUI

blanc. F. ♀ (méd.)

III. Calice accompagné de bractées ; style 0 ; 3 stigmates ; corolle monopétale.

VIORNE

Laurier-tin. esp. ♀ (orn.)

— *à larges feuilles.*

à feuilles rudes. madère. Or. ♀

nudum L.
 lentago L.
 prunifolium L.
 pyrifolium *Encycl.*
 cassinoides L.
 puniceifolium
 Lantana L.
 — canadensis.
 dentatum L.
 — longifolium.
 acerifolium L.
 opulus L.
 — sterilis.

SAMBUCUS

ebulus L.
 canadensis L.
 nigra L.
 — virescens.
 — laciniata.
 racemosa L.

IV. Calix simplex; stylus 1; corolla subpolypétala.

CORNUS

sanguinea L.
 alba L. *Mant.*
 stricta l'her. corn. }
 paniculata l'her. corn. }
 racemosa *Encycl.* }
 sericea l'her. corn. }
 amomum *Miller. dict.* }
 cœrulea *Encycl.* }
 circinata l'her. corn. }
 rugosa *Encycl.* }
 florida L.
 mas L.
 — flava.
 alternifolia L. f.

HEDERA

helix L.

nue. AM. S. ♀ (orn.)
 luisante. AM. S. ♀ (orn.)
 à feuell. de prunier. AM. S. ♀
 à feuell. de poirier. AM. S. ♀
 à f. de cassiné. AM. S. OR. ♀
 à f. de Grenadier. AM. S. OR. ♀
 cotonneuse. F. ♀
 — de Canada.
 dentée. AM. S. ♀
 — à longues feuilles.
 à f. d'Érable. AM. S. ♀ (orn.)
 obier. F. ♀ (orn.)
 — Boule-de-neige. (orn.)

SUREAU

hièble. F. ♂ (méd.)
 de Canada. ♀
 noir. F. ♀ (méd.)
 — à fruit vert.
 — lacinié.
 à grappes. F. (orn.)

IV. Calice simple; 1 style; corolle presque polypétale.

CORNOUILLER

sanguin. F. ♀ (orn.)
 blanc. AM. S. ♀ (orn.)
 élançé. AM. S. ♀ (orn.)
 paniculé. AM. S. ♀ (orn.)
 à fruit bleu. AM. S. ♀ (orn.)
 à f. rondes. AM. S. ♀ (orn.)
 à grandes fl. AM. S. ♀ (orn.)
 mâle. F. ♀ (orn.)
 — à fruit jaune.
 à f. alternes. AM. S. ♀ (orn.)

LIERRE

commun. F. ♀ (méd. écon.)

CLASSIS XII.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(Stamina epigyna.)

ORDO I.

ARALIÆ.

CUSSONIA

thyrsoides *Thunb. Diss.*

ARALIA

capitata *Swartz. Prodr.*
Hedera capitata Smith. Ic. }
pict.
 arborea *L.*
 spinosa *L.*
 racemosa *L.*
 hispida *Michx. Fl.*
 nudicaulis *L.*

PANAX

quinquefolium L.
aculeatum H. K.
zanthoxylum trifoliatum L. }
fruticosum L.

ORDO II.

UMBELLIFERÆ.

ÆGOPODIUM

podagraria *L.*

PIMPINELLA

saxifraga *L.*
 magna *L. Mant.*
 — rubens.
 dissecta *Retz. Obs.*
 peregrina *L.*
 dioica *L. Mant.*
 villosa *Schousb. Maroc.* }
 bubonoides *Brotero, Fl.* }

— *Dichotomus*

CLASSE XII.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(Etamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARALIES.

CUSSONIA

à fleurs en thyrses. cap. or. 3

ARALIA

à fl. en tête. Antilles. s. ch. 3

arbre. Antilles. s. ch. 3

épineux. Am. s. 3

à grappes. Am. s. 7

velu. Am. s. 3

à tige nue. Am. s. 7

PANAX

ginseng. Am. s. 7 (méd.)

épineux. Chine. or. 3

lacinié. Amboine. s. ch. 3

ORDRE II.

OMBELLIFÈRES.

ÆGOPODIUM

Podagraire. F. 7

BOUCAGE

saxifrage. F. 7

élevé. F. 7

— rouge.

lacinié. Suisse. 7

étranger. Italie. 7

dioïque. F. 7

velu. Maroc. or. 7

- glauca willd. sp.*
ANISUM L.
- CARUM
carvi L.
- APIUM
petroselinum L.
— crispum.
— tuberosum.
graveolens L.
— celeri.
prostratum Bill. N. holl.
- ANETHUM
segetum L. Mant.
graveolens L.
fœniculum L.
- SMYRNIUM
olusatrum L.
perfoliatum L.
integerrimum L.
- PASTINACA
sativa L.
divaricata.
opopanax L.
lucida L. Mant.
- THAPSIA
villosa L.
garganica L. Mant.
- SESELI
montanum L.
annuum L.
ammoides L.
elatum L.
leucospermum Wald. et Kitt.
Hung.
petræum Marsch. cauc.
tortuosum L.
- IMPERATORIA
ostruthium L.
sylvestris.
angelica sylvestris L. }
verticillata Encycl. }
angelica verticillata Jacq. }
hort. }
- CHEROPHYLLUM
sylvestre L.
- glaucæ. F. ♂*
ANIS. orient. (écon. méd.)
- CARVI
cultivé. F. ♂ (écon. méd.)
- APIUM
persil. sardaigne. ♂ (écon.)
— crépu.
— tubéreux.
des marais. F. ♂
— céleri. (écon.)
couché. N. holl. or. ℥
- ANET
des moissons. Portugal. ⊙
fétide. esp. ⊙
fenouil. F. ℥ (écon. méd.)
- MACERON
à feuilles ternées. F. ♂
perfolié. orient. ♂
non denté. Am. s. ℥
- PANAIIS
cultivé. F. ♂ (alim. méd.)
étalé. ♂
opopanax. sicile. ♀ (méd.)
luisant. mahon. ♂
- THAPSIA
velu. F. m. ♀
lisse. F. m. ℥
- SÉSÉLI
de montagne. F. ♀
annuel. F. ♂
à feuilles d'Ammi. Portugal. ⊙
tuberculeux. F. ♀
à graines blanches. Hongr. ℥

des rochers. caucase. ♀
tortueux. F. m. or. ℥
- IMPÉRATEIRE
des Alpes. ♀ (méd.)
des prés. F. ♀
verticillée. F. ℥
- MYRRHIS
sauvage. F. ℥

bulbosum L.
 temulum L.
 aromaticum L.
 aureum L.
 hirsutum L.
 coloratum L. Mant.
 tuberculosum.

bulbeux. F. ♂
 tacheté. F. ♂
 aromatique. Autriche. ℥
 jaune. F. ℥
 velu. F. ℥
 coloré. illyrie. ♂
 tuberculeux. ♀

SCANDIX

odorata L.
 pecten L.
 australis L.
 pinnatifida Vent. H. cels.
 cerasifolium L.
 Anthriscus L.

CERFEUIL

musqué. Alpes. ℥
 peigne-de-Vénus. F. ⊙
 austral. F. m. ⊙
 pinnatifide. perse. ⊙
 cultivé. F. ⊙ (écon. méd.)
 hérissé. F. ⊙

CORIANDRUM

sativum L.
 testiculatum L.

CORIANDRE

cultivée. orient. ⊙ (écon. méd.)
 bilobée. eur. austr. ⊙

ÆTHUSA

cynapium L.
 meum s. veg. }
 Athamanta meum L. }
 bunius s. veg.

ETHUSA

petite ciguë. F. ⊙ (vénéen.)
 meum. Alpes. ℥ (méd.)
 à feuilles de coriandre. F. ♂

CICUTA

virosa L.
 maculata L.

CIGUE

aquatique. F. ℥ (vénéen.)
 tachetée. Am. s. ♀ (vénéen.)

PHELLANDRIUM

aquaticum L.
 mutellina L.

PHELLANDRIUM

aquatique. F. ♀ (vénéen.)
 des Alpes. ♀

OENANTHE

fistulosa L.
 crocata L.
 prolifera L.
 globulosa L.
 peucedanifolia Pollich. Pal.
 pimpinelloides L.

OENANTHÉ

fistuleux. F. ♀
 à feuilles de persil. F. ♀
 prolifère. sicile. ♀
 globuleux. F. ♂
 à f. de peucedanum. Allem. ♀
 à feuilles de boucage. F. ℥

CUMINUM

cyminum L.

CUMIN

officinal. orient. ⊙ (méd.)

BUBON

macedonicum L.
 galbanum L.
 gummiferum L.

BUBON

de Macédoine. ♂
 galbanum. cap. or. ♀ (méd.)
 gommifère. cap. or. ♀

SISON

segetum L.

SISON

des moissons. F. ♂

Amomum L.
canadense L.
ammi L.
inundatum L.
verticillatum L.

Amomum, F. ♂
de Canada. ℥
ammi, orient. ⊙
aquatique, F. ⊙
verticillé, F. ℥

SRUM

angustifolium Jacq. Austr.
latifolium L.
nodiflorum L.
repeus L. f.
sisarum L.
falcaria L.
siculum L.

BERLE

à feuilles étroites, F. ♀
à feuilles larges, F. ♀
nodiflore, F. ℥
rampante, F. ℥
chervi, F. ℥ (alim.)
falciforme, F. ℥
de Sicile. ♀

ANGELICA

Archangelica L.

lucida L.
aquilegifolia.
Laserpitium aquilegifolium }
Jacq. Austr.

ANGÉLIQUE

de Bohême, Alpes. ♂ (écon.
méd.)
luisante, Am. s. ♂

à feuell. d'ancolie, Autriche. ♀

LIGUSTICUM

Levisticum L.

peloponense L.
pyrenæum Gouan. ill. }
selinum seguieri Willd. sp. }
apiifolium Encycl. }
cicutæfolium Vill. Delph. }
austriacum Jacq. Austr.
peregrinum s. Veg.

LIVÈCHE

officinale, Alpes. ℥ (écon.
méd.)

cicutaire, Carniole. ♀

des Pyrénées, F. ℥

à feuilles de persil, Alpes. ℥

d'Autriche, F. ℥

à feuell. de céleri, Portugal. ♂

HERACLEUM

sphondylium L.
longifolium Jacq. Austr.
alpinum L.
pumilum Vill. Delph.
laciniatum.
sibiricum L. Mant.
amplifolium Lapeyr. Fl. }
pyrenaicum Dec. Fl. }

BERCE

des prés, F. ♀ (écon. méd.)

à feuilles longues, F. ℥

des Alpes. ℥

naine, Alpes. ♀

laciniée, Sibérie. ℥

de Sibérie. ℥

à grandes feuilles, Pyrénées. ♀

LASERPITIUM

latifolium L.
gallicum L.
— crispum.
siler L.
triquetrum Vent. H. cels.

LASER

à larges feuilles, F. ℥

cunéiforme, F. ℥

— crépu.

lancéolé, F. ♀

triangulaire, Asie. or. ℥

FERULA

communis L.
 ferulago L.
 tingitana L.
 nodiflora L.
 sibirica.
 peucedanum sibiricum }
 wald. et kitt. hung. }

PEUCEDANUM

officinale L.
 italicum L.
 gallicum.
 parisiense Dec. Fl. }
 album.
 minus Encycl. (an L. ?) }
 tenuifolium Encycl.
 silaus L.
 tauricum Marsch. cauc.
 alsaticum L.

CACHRYS

tomentosa Desf. Atl.
 panacisfolia Vahl, symb. }
 libanotis L.
 sicula L.

CRITHMUM

maritimum L.

ATHAMANTA

libanotis L.
 condensata L.
 sibirica L. Mant.
 cervaria L.
 latifolia Viviani Frag.
 oreoselinum L.
 matthioli Jacq. Ic.
 sicula L.
 cretensis L.

SELINUM

chabræi Jacq. Austr.
 sylvestre Dec. Fl.
 Athamanta flexuosa H. Par. }
 palustre L.
 pyrenæum Couan, Ill. }
 seseli pyrenæum L. }
 peregrinum Willd. Enum.
 peucedanoides.

FÉRULE

commune. Eur. austr. ψ
 luisante. barbarie. ℥
 de Tanger. ℥
 nodiflore. orient. ℥
 de Sibérie. ℥

PEUCÉDANUM

officinal. F. ℥
 d'Italie. ψ
 des bois. F. ℥
 à fleurs blanches. ψ
 à feuilles menues. ℥
 des prés. F. ψ
 de la Tauride. ψ
 d'Alsace. F. ψ

CACHRYS

cotonneux. barbarie. or. ℥
 libanotis. sicile. or. ψ
 de Sicile. or. ℥

CRITHMUM

maritime. F. ℥ (écon.)

ATHAMANTA

libanotis. Allem. ℥
 à fleurs serrées. sibérie. ψ
 de Sibérie. ℥
 à feuilles luisantes. F. ℥
 à larges feuilles. F. ℥
 oreoselinum. F. ψ
 de Matthiolo. carinthie. ψ
 de Sicile. or. ℥
 de Crète. Alpes. ψ

SÉLINUM

de Chabrés. F. ℥
 tortueux. F. ψ
 des marais. F. ψ
 des Pyrénées. ψ
 étranger. ψ
 à feuilles de peucedanum. ψ

austriacum Jacq. Austr.
 carvifolia Jacq. Austr.
 monnierí L.
 elegans Balbis.
 latifolium Marsch. cauc.
 decipiens Willd. sp.

CONIUM

maculatum L.

BUNIUM

bulbocastanum L.

AMMI

majus L.
 visnaga. }
 daucus visnaga L. }

DAUCUS

meoides.
 ammi meoides Pers. syn. }
 ammi anethifolium Encycl. }
 — carota L.
 crinitus Desf. Atl.

CAUCALIS

grandiflora L.
 daucoïdes L.
 latifolia s. veg.
 platicarpus L.
 humilis Jacq. Hort.
 maritima Cav. Ic.
 hispida.
 orientalis Willd. sp.
 anthriscus Willd. sp. }
 tordylium anthriscus L. }
 arvensis Willd. sp.
 nodosa Willd. sp. }
 tordylium nodosum L. }

TORDYLIUM

syriacum L.
 officinale L.
 apulum L.
 maximum L.

BUPLEVRUM.

1. Herbacea.

rotundifolium L.
 longifolium L.
 stellatum L.

d'Autriche. Ψ
 à feuilles de carvi. F. Ψ
 de le Monnier. F. m. \odot
 à feuilles menues. Ψ
 à larges feuilles. caucase. Ψ
 arbrisseau. or. Ψ

CONIUM

ciguë des jardins. F. σ (vén.)

BUNIUM

terre-noix. F. Ψ

AMMI

officinal. F. \odot (méd.)
 bisnâgre. F. \odot

CAROTTE

à feuilles de méum. Ψ
 cultivée. F. σ (alim. méd.)
 chevelue. barbarie. or. Ψ

CAUCALIS

à grandes fleurs. F. \odot
 à feuilles de carotte. F. \odot
 à larges feuilles. F. \odot
 à gros fruit. F. \odot
 à feuilles menues. F. \odot
 maritime. F. \odot
 hérissée. \odot
 d'Orient. or. Ψ
 anthriscus. F. \odot
 des champs. F. \odot
 nodiflore. F. \odot

TORDYLIUM

de Syrie. \odot
 officinal. F. m. \odot
 d'Italie. \odot
 lancéolé. F. m. \odot

BUPLÈVRE.

1. Tige herbacée.

à feuilles rondes. F. \odot
 à feuilles longues. Alpes. Ψ
 étoilé. Alpes. Ψ

petræum L.
 ranunculoides L.
 falcatum L.
 semicompositum L.
 odontites L.
 junceum L.
 tenuissimum L.
 rigidum L.

2. Fruticosa.

spinosum L. f.
 fruticosum L.
 coriaceum *Vher. stirp.*
 gibraltarium *Encycl.*
 obliquum *Vahl, symb.*
 arborescens *Jacq. Ic.*

ECHINOPHORA
 tenuifolia L.

ASTRANTIA
 major L.
 minor L.
 caucasica *Fischer.*
 heterophylla *Marsch. cauc.*

SANICULA
 europæa L.
 marylandica L.

ERYNGIUM
 planum L.
 aquaticum L.
 dichotomum *Desf. Atl.*
 pusillum L.
 alpinum L.
 asperifolium *Laroché, Eryng.*
 oliverianum *Laroché, Eryng.*
 spina-alba *Vill. Delph.*
 campestre L.
 dilatatum *Encycl.*
 bourgati *Gouan. Ill.*
 maritimum L.
 tenue *Desf. Atl.*
 corniculatum *Encycl.*

HYDROCOTYLE
 vulgaris L.
 sibthorpioides *Encycl.*

des rochers. Alpes. \mathcal{L}
renoncule. Alpes. \mathcal{L}
falciforme. F. Ψ
demi-composé. F. m. \odot
odontites. F. m. \odot
jonciforme. F. \odot
filiforme. F. \odot
à feuilles dures. F. m. or. \mathcal{L}

2. Tiges ligneuses.

épineux. Esp. or. \mathfrak{h}
arbrisseau. F. m. \mathfrak{h} (orn.)

coriace. Barbarie. or. \mathfrak{h}

ECHINOPHORA
 à petites feuilles. orient. Ψ

ASTRANTIA
 à grandes fl. Alpes. \mathcal{L} (orn.)
 à petites fleurs. Alpes. Ψ
 du Caucase. \mathcal{L}
 à feuilles variables. cauc. Ψ

SANICLE
 d'Europe. F. \mathcal{L} (méd.)
 de Maryland. Ψ

ERYNGIUM
 à feuilles planes. F. σ
 aquatique. Am. s. Ψ
 dichotome. Alger. \odot
 petit. Barbarie. or. Ψ
 des Alpes. \mathcal{L} (orn.)
 à feuilles rudes. \mathcal{L}
 d'olivier. orient. or. \mathcal{L}
 à épines blanches. Alpes. \mathcal{L}
 des champs. F. Ψ (méd.)
 dilaté. Maroc. Ψ
 bourgati. F. m. Ψ
 maritime. F. \mathcal{L}
 filiforme. Alger. \odot
 cornu. Portugal. or. Ψ

HYDROCOTYLÉ
 Ecuelle-d'eau. F. Ψ
 à f. de sibthorpiæ. île de Fr.
 s. ch. Ψ

spananthe *willd. sp.*
spananthe *paniculata Jacq.*
IC.

barbu. caracas. ☉

LAGOECIA
cuminoides *L.*

LAGOËCIA
à feuilles de cumin. *F. m.* ☉

CLASSIS XIII.

CLASSE XIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(*Stamina hypogyna.*)

(Etamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

RANUNCULACEÆ.

RENONCULACÉES.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

I. Capsules monospermes, ne s'ouvrant pas.

CLEMATIS.

CLÉMATITE.

1. Scandentes.

1. Tiges sarmenteuses.

viorna *L.*
viticella *L.*
crispa *L.*
florida *Thunb. Jap.*
orientalis *L.*
vitalba *L.*
virginiana *L.*
flammula *L.*
cirrhosa *L.*
triternata.
calicina *H. K.*
balearica *Encycl.* }

viorne. *Am. s.* ♪
bleue. *esp.* ♪ (orn.)
crépue. *caroline.* ♪
à grandes fl. *Jap. or.* ♪ (orn.)
d'Orient. ♪
brûlante. *F.* ♪ (vénén.)
de Virginie. ♪
odorante. *F. m.* ♪ (orn.)
à vrilles. *Alger.* ♪ (orn.)
triternée. ♪

2. Erectæ.

2. Tiges droites.

erecta *L.*
integrifolia *L.*

droite. *F. m.* ♯
à feuilles entières. *Autr.* ♯

ATRAGENE

ATRAGÉNÉ

alpina *L.*
— flava.
indica.

des Alpes. ♪
—jaune.
des Indes. *s. ch.* ♪

THALICTRUM

PIGAMON

saxatile *Vill. delph.*

des rochers. *Alpes.* ♯

foetidum L.
 sibiricum L. ?
 minus L.
 majus Jacq. Austr.
 nigricans Jacq. Austr.
 angustifolium L.
 crenatum.
 flavum L.
 angulosum.
 glaucum. }
 speciosum Encycl. }
 rugosum.
 elatum Jacq. Hort.
 cinereum.
 medium Jacq. Hort.
 atropurpureum Jacq. Hort. }
 aquilegifolium L. }

ANEMONE

hepatica L.
 vernalis L.
 pulsatilla L.
 alpina L.
 apiifolia Willd. sp.
 coronaria L.
 pavonina Encycl.
 stellata Encycl. }
 hortensis L. }
 sylvestris L.
 virginiana L.
 dichotoma L.
 trifolia L.
 nemorosa L.
 ranunculoides L.
 narcissiflora L.
 Thalictroides L.

ADONIS

æstivalis L.
 autumnalis L.
 vernalis L.

ANAMENIA

coriacea Vent. Malm. }
 Adonis capensis L. }

RANUNCULUS.

1. *Folii simplicibus.*
 flammula L.

fétide. F. ☞
 de Sibérie. ☞
 des bois. F. ☞
 élevé Autriche. ☞
 noirâtre. Autriche. ☞
 à feuilles étroites. F. ☞
 crénelé. ☞
 des prés. F. ☞
 anguleux. ☞
 glauque. ☞
 ridé. ☞
 élevé. Hongrie. ☞
 cendré. ☞
 moyen. Hongrie. ☞
 à feuell. d'Ancolie. Alpes. ☞

ANÉMONE

Hépatique. Eur. ☞ (orn.)
 printanière. F. ☞
 Pulsatille. F. ☞
 des Alpes. ☞
 à feuilles de persil. Alpes. ☞
 des jardins. orient. ☞ (orn.)
 OEil-de-paon. orient. ☞ (orn.)
 étoilée. F. m. ☞ (orn.)
 sauvage. F. ☞
 de Virginie. ☞
 dichotome. Canada. ☞
 à trois feuilles. F. ☞
 des bois. F. ☞
 Renoncule. F. ☞
 à fleurs de Narcisse. Alpes. ☞
 à f. de Pigamon. Am. s. ☞

ADONIS

d'été. F. ☉
 d'automne. F. ☉
 printanier. Alpes. ☞

ANAMÉNIA

à feuilles coriaces. cap. or. ☞

RENONCULE.

1. Feuilles simples,
 petite douve. F. ☞

lingua L.
 gramineus L.
 nodiflorus L.
 ophioglossoides Vill. Delph.
 pyrenæus L. Mant.
 amplexicaulis L.
 parnassifolius L.
 ficaria L.
 thora L.

2. Foliis dentatis et divisis.

creticus L.
 lacerus Bellardi, App.
 auricomus L.
 sceleratus L.
 pennsylvanicus L. f. }
 canadensis Jacq. Ic. }
 aconitifolius L.
 platanifolius L. Mant.
 asiaticus L.
 glacialis L.
 abortivus L.
 nivalis L.
 alpestris L.
 hirsutus Curt. Fl. }
 pallidior Vill. Delph. }
 philonotis Retz. obs. }
 tuberosus Lapeyr. Fl.
 bulbosus L.
 — repens L.
 acris L.
 lanuginosus L.
 polyanthemos L.
 chærophyllos L.
 arvensis L.
 muricatus L.
 trilobus Desf. Atl.
 parviflorus L.
 falcatus L.
 hederaceus L.
 aquatilis L.
 — circinatus.
 peucedanifolius Desf. Atl. }
 fluviatilis Willd. sp. }

MYOSURUS

minimus L.

lancéolée. F. ☞
 à feuilles de gramin. F. ☞
 nodiflore. F. ☞
 à f. d'ophioglosse. Alpes. ☞
 des Pyrénées. ☞
 amplexicaule. Alpes. ☞
 à feuil. de Parnassia. Alpes. ☞
 petite chélidoine. F. ☞ (méd.)
 Thora. Alpes. ☞ (vén.)

2. Feuilles dentées et découpées.

de Crète. ☞ (orn.)
 lacérée. Alpes. ☞
 printanière. F. ☞
 scélérate. F. ☞ (vén.)
 de Pensylvanie. ☞
 à feuilles d'aconit. Alpes. ☞
 à feuilles de platane. Alpes. ☞
 d'Asie. ☞
 des glaciers. Alpes. ☞
 arborescente. Canada. ☞
 des neiges. Alpes. ☞
 des Alpes. ☞
 velue. F. ⊙
 tubéreuse. Pyrénées. ☞
 bulbeuse. F. ☞
 rampante. F. ☞
 âcre. F. ☞
 lanugineuse. F. ☞
 multiflore. F. ☞
 à feuilles de cerfeuil. F. ☞
 des champs. F. ⊙
 hérissée. F. ⊙
 trilobée. Alger. ⊙
 à petites fleurs. F. ⊙
 falciforme. F. m. ⊙
 à feuilles de lierre. F. ☞
 aquatique. F. ☞
 — arrondie.
 à feuil. de peucedanum. F. ☞

MYOSURUS

queue-de-souris. F. ⊙

II. Capsulæ polyspermæ.

TROLLIUS

asiaticus L.
europæus L.

HELLEBORUS

hyemalis L.
niger L.
viridis L.
fœtidus L.
lividus H. K.

ISOPYRUM

thalictroides L.
fumarioides L.

NIGELLA

— damascena L.
sativa L.
arvensis L.
hispanica L.
orientalis L.

GARIDELLA

nigellastrum L.

AQUILEGIA

vulgaris L.
alpina L.
viridiflora H. K.
canadensis L.

DELPHINIUM.

1. *Unicapsularia.*

consolida L.
ajacis L.

2. *Capsulæ 3 ad 5.*

ambiguum L.
peregrinum L.
grandiflorum L.
puniceum L. f.
revolutum.
elatum L.
— hirsutum.
staphisagria L.

ACONITUM.

1. *Corolla flava.*
lycoctonum L.

II. Capsules polyspermes.

TROLLIUS

d'Asie. ℥ (orn.)
d'Europe. Alpes. ψ

HELLÉBORE

d'hiver. Alpes. ψ
noir. Alpes. ψ (orn.)
vert. F. ψ
pied-de-Griffon. F. ψ (méd.)
livide. corse. ℥

ISOPYRUM

à feuilles de pigamon. F. ⊙
à feuilles de fumeterre. F. ⊙

NIGELLE

à involucres. F. m. ⊙ (orn.)
cultivée. orient. ⊙
des champs. F. ⊙
d'Espagne. ⊙
d'Orient. ⊙

GARIDELLE

de Provence. ⊙

ANCOLIE

des jardins. F. ℥ (orn.)
des Alpes. ℥
à fleurs vertes. sibérie. ℥
de Canada. ℥ (orn.)

DELPHINIUM.

1. Une capsule.

des moissons. F. ⊙
d'Ajax. suisse. ⊙ (orn.)

2. 3 à 5 capsules.

de deux couleurs. Maroc. ⊙
étranger. barbarie. ⊙
à grandes fleurs. sibérie. ψ
ponceau. sibérie. ℥
à feuilles recourbées. ℥
élevé. sibérie. ψ (orn.)
— velu.
staphisaigre. F. m. ♂ (vén.
méd.)

ACONIT.

1. Corolle jaune.
tue-loup. Alpes. ψ (vén.)

pyrenaicum L.
 Anthora L.

2. Corolla cœrulea.

napellus L.
 cammarum L.

CALTHA

palustris L.

PÆONIA

moutan Bot. Mag.

mascula L.

corallina Retz. obs. }

fœmina L. }

officinalis Retz. obs. }

villosa. }

humilis Retz. obs. }

lobata.

albiflora Pallas, Ross.

anomala L. Mant.

tenuifolia L.

ZANTHORHIZA

apiifolia L'Her. stirp.

III. Germen 1; bacca unilocularis,
 polysperma.

ACTÆA

spicata L.

— alba.

— rubra.

racemosa L.

PODOPHYLLUM

peltatum L.

ORDO II.

PAPAVÉRACEÆ.

I. Stamina indefinita; anthera filamentis
 adnatæ.

SANGUINARIA

canadensis L.

ARGÉMONE

— mexicana L.

PAPAVÉR.

1. Capsulis hispidis.

hybridum L.

des Pyrénées. ψ (vén.)

Anthora. Alpes. ζ

2. Corolle blene.

Napel. Alpes. ζ (vén.)

à grandes fleurs. F. Alpes. (vén.)

CALTHA

des marais. F. ψ (orn.)

PIVOINE

en arbre. chine. or. ϣ (orn.)

mâle. suisse. ψ (orn. méd.)

femelle. Alpes. ψ (orn. méd.)

velue. esp. ψ (orn.)

lobée. ψ

à fl. blanches. sibérie. ζ (orn.)

laciniée. sibérie. ψ (orn.)

à f. menues. sibérie. ψ (orn.)

ZANTHORHIZA

à feuilles de persil. Am. s. ϣ

III. Un seul ovaire; baie à une loge
 polysperme.

ACTËA

des Alpes. ζ (méd.)

— à fruit blanc.

— à fruit rouge.

à grappes. Am. s. ψ

PODOPHYLLUM

en bouclier. Am. s. ψ

ORDRE II.

PAPAVÉRACÉES.

I. Etamines indéfinies; anthères attachées
 le long du bord des filets.

SANGUINAIRE

de Canada. ζ

ARGÉMONE

du Mexique. ⊙

PAVOT.

1. Capsules hérissées;

hybride. F. ⊙

Argemone L.
alpinum L.
nudicaule L.

2. *Capsulis glabris.*

rhæas L.
dubium L.
cambricum L.
orientale L.
somniferum L.
 — *nigrum.*

CHELIDONIUM

glaucium L.
corniculatum L.
hybridum L.
majus L.
 — *quercifolium.*

II. *Stamina definita.*

BOCCONIA

frutescens L.
cordata Willd. sp.

HYPECOUM

procumbens L.

FUMARIA

cucullaria L.
bulbosa L.
solida Smith, fl.
nobilis s. Veg.
fungosa H. K.
sempervirens L.
aurea Willd. Enum.
lutea L. Mant.
vesicaria L.
parviflora Encycl.
 — *officinalis L.*
capreolata L.
claviculata L.
spicata L.

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. *Siliquosa.*

RAPHANUS

sativus L.

Argémone. F. ⊙
des Alpes. ℥
à tiges nues. Alpes. ℥

2. *Capsules glabres.*

coquelicot. F. ⊙ (méd.)
à long fruit. F. ⊙
jaune. Alpes. ℥
d'Orient. ℥ (orn.)
des jardins. F. ⊙ (orn. méd.)
 — *à graines noires.*

CHÉLIDOÏNE

glaucue. F. ♂
cornue. F. m. ⊙
hybride. F. m. ⊙
officinale. F. ℥ (méd.)
 — *à feuilles de chêne.*

II. *Etamines définies.*

BOCCONIA

arbrisseau. Antilles. s. ch. ♀
à f. en cœur. chine? s. ch. ♀

HYPÉCOUM

tombant. F. ⊙

FUMETERRE

capuchon. Am. s. ℥
bulbeuse. F. ℥ (orn.)
solide. F. ℥ (orn.)
odorante. Sibérie. ℥
fongueuse. Am. s. ℥
toujours verte. Am. s. ⊙
dorée. Canada. ♂
jaune. Barbarie. ℥
vésiculeuse. cap. ⊙
à petites fleurs. F. ⊙
officinale. F. ⊙ (méd.)
à vrilles. F. m. ⊙
claviculée. F. m. ⊙
à épis. F. m. ⊙

ORDRE III.

CRUCIFÈRES.

I. *Siliqueuses.*

RAIFORT

cultivé. chine. ⊙ (alim.)

— rotundus.
 — niger.
 raphanistrum L.
 tenellus *Pallas*, *itin.*
 chorispermum tenellum *H.K.* }

SINAPIS

— arvensis L.
 alba L.
 nigra L.
 incana L.
 pubescens L. *Mant.*
 pyrenaica L.
 hispida *Schousb.* *Maroc.*
 hastata.
 integrifolia *Willd.* *Hort.*
 lævigata L.
 juncea L.
 erucoïdes L.

BRASSICA

cheiranthus *Vill.* *Delph.*
 ERUCA L.
 ERUCASTRUM L.
 Tournesortii *Gouan*, *Ill.*
 alpina L. *Mant.*
 vesicaria L.
 oleracea L.
 — sylvestris.
 — sabellica.
 — gongliodes.
 — botrytis.
 — viridis.
 — capitata.
 — rubra.
 rapa L.
 napus L.
 asperifolia sylvestris *Encycl.*
 arvensis L. *Mant.*
 campestris L.
 orientalis L.

TURRITIS

glabra L.
 hirsuta L.
 Arabis hispida *Encycl.* }
 hispida. }
 Arabis hispida L. *f.* }
 bellidifolia. }
 Arabis bellidifolia L. *Mant.* }

— radis.
 — noir.
 des moissons. F. ⊙
 délicat. sibérie. ⊙

MOUTARDE

des champs. F. ⊙
 blanche. F. ⊙
 noire. F. ⊙ (écon.)
 incane. F. ♂
 pubescente. sicile. or. ♀
 des Pyrénées. F. ♀
 hérissée. Maroc. ⊙
 à feuilles hastées. N. Holl. ⊙
 à feuilles entières. ⊙
 lisse. Esp. ⊙
 jonciforme. chine. ⊙
 fausse roquette. F. ⊙

CHOU

à fleur de cheiri. Alpes. ♂
 roquette. F. ⊙
 fausse roquette. F. ⊙
 de Tournesort. F. ⊙
 des Alpes. ♀
 vésiculeux. Esp. ⊙
 commun. F. ♂ (alim.)
 — sauvage.
 — frisé.
 — rave.
 — fleur.
 — vert.
 — pommé.
 — rouge.
 Turneps. F. ♂ (alim.)
 navet. F. ♂ (alim.)
 navette. F. ⊙ (écon.)
 violet. F. ♀
 des champs. F. ⊙
 d'Orient. F. ⊙

TOURETTE

glabre. F. ♂
 velue. F. ♂
 hérissée. Alpes. ♀
 à f. de paquerette. Alpes. ♀

verna. }
 Arabis alpina L. }
 — minor.
 saxatilis. }
 Arabis saxatilis All. ped. }
 Thaliana. }
 Arabis Thaliana L. }
 pendula. }
 Arabis pendula L. }

HESPERIS

matronalis L.
 tristis L.
 lyrata *Encycl.*
 africana L.
 laxa *Encycl.*
 verna L.
 maritima. }
 cheiranthus maritimus L. }
 chia. }
 cheiranthus chius L. }
 linifolia. }
 cheiranthus linifolius pers. }
 syn. }

HELIOPHILA

pendula *Willd. sp.*

CHEIRANTHUS

cheiri L.
 mutabilis *L'Her. stirp.*
 longifolius *Vent. Malm.*
 semperflorens *Schousb. Maroc.*
 scoparius *Willd. Enum.*
 fenestralis L.
 sinuatus L.
 incanus L.
 annuus L.
 græcus. }
 Hesperis æstiva *Encycl. var. B.* }
 littoreus L.
 tristis L.
 cuspidatus *Marsch. cauc.*
 parviflorus *Willd. sp.*
 tricuspидatus L.

ERYSIMUM

officinale L.
 barbarea L.
 præcox *Smith, Fl.*
 alliaria L.

printanière. Alpes. ♀

— à petites fleurs.

des rochers. Alpes. ⊙

paniculée. F. ⊙

pendante. Alpes. ♂

JULIENNE

cultivée. Alpes. ♂ (orn.)
 à fleurs brunes. Autriche. ♂
 à feuilles en lyre. Sibérie. ⊙
 d'Afrique. F. m. ⊙
 à fleurs lâches. Tartarie. ⊙
 printanière. F. m. ⊙
 de Mahon. ⊙ (orn.)
 de Chio. orient. ⊙
 à feuilles de Lin. esp. or. ♀

HÉLIOPHILA

à fruit pendant. cap. ⊙

GIROFLÉE

jaune. F. ♂ (orn.)
 changeante. canaries. or. ♀
 à long. feuil. canar. or. ♀
 de tous les mois. Maroc. or. ♀
 à balais. canaries. or. ♀
 fenestrelle. ♂ (orn.)
 sinuée. F. ⊙
 incane. esp. ♀
 quarantain eur. austr. ⊙ (orn.)
 grecque. orient. ⊙ (orn.)
 des rivages. F. m. ♂
 brune. F. m. or. ♀
 à long style. caucase. ♂
 à petites fleurs. Maroc. ⊙
 à trois pointes. F. m. ⊙

ERYSIMUM

officinal. F. ⊙ (méd.)
 à feuilles en lyre. F. ♀
 printanier. F. ♂
 alliaire. F. ♂ (méd.)

repandum L.	}	festonné. F. ⊙
cheiranthus paniculatus EN- cycl.		
cheiranthoides L.	}	à petites fleurs. F. ⊙
hieracifolium L.		à feuilles d'épervière. F. ♂
helveticum.	}	d'Helvétie. ℥
cheiranthus helveticus Jacq. Hort.		
sylvestre.	}	sauvage. F. ℥
cheiranthus sylvestris ENCYCL.		
cheiranthus erysimoides L.	}	des Alpes. ℥
alpinum.		
cheiranthus alpinus L.	}	à long style. sibérie. ℥
quadrangulum.		
cheiranthus quadrangulus L'Her. stirp.	}	
cheiranthus cornutus ENCYCL.		

SISYMBRIUM.

1. *Siliquis declinatis, brevibus.*

nasturtium L.	}	
palustre Willd. sp.		
terrestre Smith, Fl.	}	
sylvestre L.		
amphibium L.	}	
pyrenaicum L.		
tanacetifolium L.	}	
tenuifolium L.		
erysimifolium.	}	
Allioni Pers. syn.		

2. *Siliquis sessilibus, axillaribus.*

polycerastium L.	}	
supinum L.		
bursifolium L.	}	

3. *Caule nudo.*

murale L.	}	
erucastrum Couan, Ill.		
vimineum L.	}	
arenosum L.		

4. *Foliis pinnatis.*

nitidum Zea.	}	
sophia L.		
altissimum L.	}	
asperum L.		
irio L.	}	

CRESSON.

1. *Siliques courtes et abaissées.*

de fontaine. F. ℥ (alim. méd.)	}	
des marais. F. ⊙		
sauvage. F. ⊙	}	
amphibie. F. ℥		
des Pyrénées. ℥	}	
à feuil. de Tanaisie. Alpes. ℥		
fausse roquette. F. ℥	}	
à feuilles de vélar. F. ♂		

2. *Siliques sessiles, axillaires.*

à siliques nombreuses. F. ⊙	}	
couché. F. ⊙		
à feuilles de Tabouret. F. ⊙	}	

3. *Tige nue.*

des murailles. F. ⊙	}	
gréle. F. ⊙		
des sables. Alpes. ⊙	}	

4. *Feuilles pennées.*

à feuilles luisantes. ⊙	}	
sophia. F. ⊙		
élevé. F. ⊙	}	
à fruit rude. F. ℥		
irio. F. ⊙	}	

columnæ Jacq. Austr.
Lœselii L.
obtusangulum Willd. sp.

5. Foliis integris.

strictissimum L.
junceum.
erysimum junceum Willd. sp. }

CARDAMINE.

1. Foliis simplicibus.

alpina Willd. sp. }
bellidifolia All. ped. }
asarifolia L.

2. Foliis ternatis.

resedifolia s. Veg.
trifolia L.

3. Foliis pinnatis.

chelidonia L.
impatiens L.
hirsuta L.
parviflora L.
pratensis L.

DENTARIA

enneaphylla L.
pinnata Encycl. }
heptaphyllos Vill. Delph. }
pentaphyllos L.

II. Siliculosa.

RICOTIA

ægyptiaca L.

LUNARIA

rediviva L.
annua L.

BISCUTELLA

auriculata L.
lævigata L. Manl.
apula L. Mant.
depressa Willd. Enum.
leiocarpa Dec. Ann.
obovata Dec. Ann.
raphanifolia Desf. Atl.
cichoriifolia Dec. Ann.

CLYPEOLA

jonthlaspi L.

de Colonna. F. ☉
de Loesel. F. ☉
à angles obtus. Alpes. ☉

5. Feuilles entières.

ramassé. Alpes ☉
jonciforme. Hongrie. ♂

CARDAMINÉ.

1. Feuilles simples.

des Alpes. ♀
à feuilles d'Asarum. Alpes. ♂

2. Feuilles ternées.

à feuilles de Réséda. Alpes. ♂
à feuilles ternées. F. ♀

3. Feuilles pennées.

à feuilles de chélidoine. F. ♂
élastique. F. ♂
velu. F. ☉
à petites fleurs. F. ☉
des prés. F. ♀

DENTAIRE

à neuf feuilles. Alpes. ☉
pennée. Alpes. ♂
à cinq feuilles. Alpes. ♂

II. Siliculenses.

RICOTIA

d'Égypte. ☉

LUNAIRE

vivace. F. ♀ (orn.)
annuelle. F. ☉ (orn.)

BISCUTELLE

auriculée. F. ☉
à fruit lisse. F. ☉
à fruit rude. F. ☉
d'Égypte. ☉
à petit fruit. F. ☉
ovale renversé. F. ☉
à feuilles de rai, ort. F. ☉
à f. de chicorée. pyrénées. ♀

CLYPÉOLA

jonthlaspi. F. m. ☉

maritima L. Mant.*Alyssum maritimum* Willd. }
sp.

alliacea. }

Peltaria alliacea L. }*maritime*. F. ♂

à odeur d'ail. Autriche. ♀

ALYSSUM.

1. *Fruticulosa.**spinosum* L.*saxatile* L.*alpestre* L. Mant.2. *Herbacea.**argenteum* Willd. sp.*incanum* L.*montanum* L.*campestre* L.*calicinum* L.*clypeatum* L.3. *Siliculis inflatis.**deltoideum* L.*sinuatum* L.*utriculatum* L. Mant.

DRABA.

1. *Caule nudo.**aizoides* L. Mant.*alpina* L.*verna* L.*pyrenaica* L.2. *Caule folioso.**muralis* L.*hirta* L.*incana* L.

COCHLEARIA

officinalis L.*danica* L.*armoracia* L.*draba* L.*glastifolia* L.

CORONOPUS

vulgaris. }*cochlearia coronopus* L. }

ALYSSON.

1. Tige ligneuse.

épineux. F. m. ♀*des rochers*. orient. ♀*des Alpes*. ♀

2. Tige herbacée.

argenté. Alpes. ♀*blanc*. F. ♂*des montagnes*. Alpes. ♂*des champs*. F. ⊙*à petites fleurs*. F. ⊙*en bouclier*. Liban. or. ♂

3. Silicules renflées.

deltoïde. syrie. or. ♀*sinué*. esp. ♂*à utricules*. orient. ♀

DRABA.

1. Tige nue.

aizoïde. Alpes. ♀*des Alpes*. F. ♀*printanier*. F. ⊙*des Pyrénées*. F. ♂

2. Tige feuillue.

des murailles. Alpes. ♀*hérissé*. F. ♀*blanc*. Alpes. ♂

COCHLÉARIA

officinal. F. ♂ (méd.)*de Danemark*. ♂*cran de Bretagne*. F. ♀ (écon.
méd.)*draba*. F. ♀*à feuilles de pastel*. F. ♂

CORONOPUS

commun. F. ⊙

SENEBIERA

pinnatifida *Dec. soc. phil.* }
Lepidium didymum *L. Mant.* }

SENEBIÈRA

pinnatifide. *Asie.* ♂

IBERIS

semperflorens *L.*

sempervirens *L.*
saxatilis *L.*
gibraltarica *L.*
rotundifolia *L.*
amara *L.*
umbellata *L.*
pinnata *L.*
linifolia *L.*
nudicaulis *L.*

IBÉRIS

de tous les mois. *sicile.* or. ♀
 (orn.)
toujours verte. *Alpes.* ♀
des rochers. *Alpes.* ♀
de Gibraltar. or. ♀
à feuilles rondes. *Alpes.* ♂
amère. *F.* ⊙ (orn.)
ombellifère. *Esp.* ⊙ (orn.)
pennée. *F. m.* ⊙
à feuilles de Lin. *F. m.* ♂
à tige nue. *F.* ⊙

THLASPI

arvense *L.*
campestre *L.*
alliaceum *L.*
montanum *L.*
perfoliatum *L.*
alpestre *L.*
hirtum *L.*
ceratocarpon *L. f.*
bursa-pastoris.
 — { *sativum.*
Lepidium sativum *L.* }
 — *latifolium.*
 — *crispum.*
nudicaule.
Lepidium nudicaule *L.* }
rudérale.
Lepidium rudérale *L.* }

THLASPI

à grandes siliques. *F.* ⊙
pubescent. *F.* ♂
alliaccé. *F.* ⊙
de montagne. *Alpes.* ♂
perfolié. *Alpes.* ♂
des Alpes. ⊙
velu. *F. m.* ♂
à fruit cornu. *sibérie.* ⊙
bourse-à-berger. *F.* ⊙
cresson alénois. ⊙ (écon.)
 — *à larges feuilles.*
 — *crépu.*
à tige nue. *F.* ⊙
sans pétales. *F.* ⊙

LEPIDIUM

perfoliatum *L.*
subulatum *L.*
procumbens *L.*
alpinum *L.*
petraeum *L.*
latifolium *L.*
iberis *L.*
cardamines *L.*
vesicarium *L.*

LÉPIDIUM

perfolié. *orient.* ⊙
en alène. *Esp.* ♀
couché. *F.* ⊙
des Alpes. *F.* ♂
des rochers. *F.* ⊙
passerage. *F.* ♂
ibéris. *F.* ♂
à feuilles lyrées. *Esp.* ♂
vésiculeux. *orient.* ⊙

ANASTATICA

hierochuntica *L.*

ANASTATICA

rose de Jériko. *orient.* ⊙

VELLA

pseudocytisus L.
annua L.

MYAGRUM

perenne L.
orientale L.
rugosum L.
perfoliatum L.
sativum L.
paniculatum L.
saxatile L.

BUNIAS

spinosa L. Mant.
erucago L.
ægyptiaca L.
balearica L. Mant.
orientalis L.
syriaca Willd. sp. }
anastatica syriaca L. }

CAKILE

maritima. }
bunias cakile L. }

CRAMBE

maritima L.
tataria Jacq. Ic.
cordifolia Fischer.
hispanica L.
filiformis Jacq. Ic.

ISATIS

tinctoria L.
lusitanica L. ?

VELLA

faux cytise. orient. or. ♀
annuel. barbarie. ⊙

CAMELINE

vivace. F. ♄
d'Orient. ⊙
ridée. F. m. ⊙
amplexicaule. F. ⊙
cultivée. F. ⊙
paniculée. F. ⊙
des rochers. Alpes. ♄

BUNIAS

épineux. égypte. ♂
tétragone. F. m. ⊙
d'Égypte. ⊙
de Mahon. ⊙
d'Orient. ♄
de Syrie. ⊙

CAKILÉ

maritime. F. ⊙

CRAMBÉ

maritime. F. ♄ (écon.)
de Tartarie. ♄
à feuilles en cœur. russie. ♄
d'Espagne. ⊙
filiforme. ♄

PASTEL

des teinturiers. F. ♂ (arts.)
de Portugal. ⊙

ORDO IV.

CAPPARIDÆ.

CLEOME

gigantea L. Mant.
— *pentaphylla* L.
spinosa L.
dodecandra L.
icosandra L.
arabica L. Dec.
viscosa L.
ornithopodioides L.

ORDRE IV.

CAPRIERS.

CLÉOMÉ

gigantesque. guinée. s. ch. ♀
à cinq feuilles. inde. ⊙
épineux. Antilles. ⊙
à douze étamines. inde. ⊙
à vingt étamines. ceylan. ⊙
d'Arabie. égypte. ⊙
visqueux. ceylan. ⊙
pied-d'oiseau. orient. ⊙

CRATÆVA

- fragrans Bot. Magaz. }
capparoides Andr. Rep. }

CAPPARIS

- spinosa L.
- longifolia Swartz.
- saligna Wahl, symb.
- glandulosa.
- frondosa L.
- cynophallophora L.
- tenuisiliqua Jacq. Am.

RESEDA

- Luteola L.
- glauca L.
- sesamoides L.
- alba L.
- lutea L.
- undata L.
- mediterranea L. Mant.
- phyteuma L.
- odorata L.
- canescens L.

DROSERA

- rotundifolia L.
- longifolia L.

PARNASSIA

- palustris L.

Calyptachium pauciflorum

ORDO V.

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM

- halicacabum L.

PAULLINIA

- pinnata L.

SERJANIA

- triternata Willd. sp. }
paullinia triternata L. Mant. }

KOELREUTERIA

- paullinioides L'Her. sert. }
koelreuteria pauciculata En- }
cycl. }

SAPINDUS

- saponaria L.

Quercus brachyloba

CRATÆVA

- odorant. sierra-leona. s. ch. ♪

CAPRIER

- épineux. F. m. ♪ (écon. orn.)
- à long. feuil. Antilles. s. ch. ♪
- à f. de saule. Antilles. s. ch. ♪
- glanduleux. s. ch. ♪
- feuillu. Antilles. s. ch. ♪
- à long fruit. Antilles. s. ch. ♪
- à fruit grêle. Antilles. s. ch. ♪

RÉSÉDA

- gaude. F. ♂ (teint.)
- glauque. Pyrénées. ♂
- sésamoïde. F. ⊙
- blanc. Esp. ⊙
- jaune. F. ♣
- à trois styles. Esp. ♣
- de la Méditerranée. orient. ⊙
- à grand calice. F. ⊙
- odorant. Alger. ⊙
- velu. orient. or. ♣

ROSSOLIS

- à feuilles rondes. F. ⊙
- à feuilles longues. F. ⊙

PARNASSIA

- des marais. F. ♣

ORDRE V. N. 5.

SAVONNIERS.

CARDIOSPERME

- pois-de-merveille. inde. ⊙

PAULLINIA

- à f. pennées. Antilles. s. ch. ♪

SERJANIA

- triterné. Antilles. s. ch. ♪

KOELREUTÉRIA

- paniculé. chine. ♪

SAVONNIER

- commun. inde. s. ch. ♪ (écon.)

rigida *vahl, symb.*
 — indica.
Allophylus indica Swartz.
ALLOPHYLUS
racemosus swartz. prodr.
smidelia occidentalis swartz. }
Fl. ind.

lit-chi.
EUPHORIA
 — { *sapindus edulis vahl, symb.* }
 — { *dimocarpus lit-chi willd. sp.* }

longicauda
AMIROLA
 — { *nitida pers. syn.* }
 — { *lagunea nitida fl. per.* }

miliaceae diversifolia
CUPANIA
 — *glabra swartz. prodr.*

ORDO VI.

ACERA.

ÆSCULUS
 — *hippocastanum L.*
 — *flava H. K.*
 — *pavia L.*
 — *macrostachya mich. fl.* }
 — *parviflora H. K.* }
 — *oiotensis mich. arbr.*

ACER
 — *negundo L.*
 — *pensylvanicum L.* }
 — *striatum Encycl.* }
 — *montanum H. K.* }
 — *spicatum Encycl.* }
 — *tataricum L.*
 — *rubrum L.*
 — *eriocarpon mich. fl.*
 — *saccharinum L.*
 — *platanoides L.*
 — *lacinosum.*
 — *pseudo-platanus L.*
 — *campestre L.*
 — *opalus willd. sp.*
 — *opulifolium vill. delph.*
 — *monspessulanum L.*
 — *creticum L.*

à f. roides. Antilles. s. ch. ♀
 des Indes. s. ch. ♀

Allophylus
ALLOPHYLUS
 — *à grappes. Antilles. s. ch. ♀*

EUPHORIA
 — *lit-chi. chine. s. ch. ♀ (alim.)*

longicauda
AMIROLA
 — *à f. luisantes. Pérou. s. ch. ♀*

CUPANIA
 — *glabre. Antilles. s. ch. ♀*

ORDRE VI.

ÉRABLES. *Pinus Boyer*

ÆSCULUS
 — *marronnier d'Inde. Asie. ♀*
 — (orn.)
 — *pavia jaune. Am. s. ♀ (orn.)*
 — *pavia rouge. Am. s. ♀ (orn.)*
 — *à long. grappes. Am. s. ♀ (orn.)*
 — *de l'Oio. Am. s. ♀ (orn.)*

ÉRABLE
 — *à f. de Frêne. Am. s. ♀ (orn.)*
 — *jaspé. Am. s. ♀ (orn.)*
 — *de montagne. Am. s. ♀*
 — *de Tartarie. ♀ (orn.)*
 — *rouge. Am. s. ♀ (orn.)*
 — *à fr. cotonneux. Am. s. ♀ (orn.)*
 — *à sucre. Am. s. ♀ (écon.)*
 — *plane. F. ♀ (orn.)*
 — *lacinié.*
 — *sicomore. F. ♀ (orn.)*
 — *champêtre. F. ♀*
 — *opale. Alpes. ♀*
 — *à feuilles d'obier. Alpes. ♀*
 — *de Montpellier. ♀ (orn.)*
 — *de Crète. ♀*

HIPPOCRATEA
volubilis L.

HIPPOCRATÉA
sarmenteux. Antilles. s. ch. ♪

Suisse Bojer. ORDO VII.

ORDRE VII.

MALPIGHIACEÆ.

MALPIGHIACÉES.

BANISTERIA
laurifolia L.
ciliata *encycl.*
tomentosa.
periplocæfolia.

BANISTÉRIA
à f. de Laurier. Ant. s. ch. ♪
cilié. Brésil. s. ch. ♪
cotonneux. Antilles. s. ch. ♪
à f. de périploca. Ant. s. ch. ♪

— hystrix
GYROCARPOS
gyrocarpos Jacquin, *roxb.*
corom.

GYROCARPOS
de Jacquin. inde. s. ch. ♪

TRIOPTERIS
jamaicensis L. ?

TRIOPTÉRIS
de la Jamaïque. s. ch. ♪

MALPIGHIA
glabra L.
punicifolia L.
myrtifolia.
urens L.
nitida L.
macrophylla.
— coccifera L.
aquifolia L.
glandulifera *Jacq. ic.*

MALPIGHIA
glabre. Antilles. s. ch. ♪
à f. de Grenadier. Ant. s. ch. ♪
à f. de Myrte. Antilles. s. ch. ♪
brûlant. Antilles. s. ch. ♪
luisant. Antilles. s. ch. ♪
à grandes f. Antilles. s. ch. ♪
à f. de Kermès. Ant. s. ch. ♪
à f. de Houx. Antilles. s. ch. ♪
glanduleux. Antilles. s. ch. ♪

ERYTHROXYLUM
X = — hypericifolium *encycl.*
— longifolium.
— laurifolium.

ERYTHROXYLUM
à f. d'hypericum. île de fr.
— s. ch. ♪ *— longifolium.*
— laurifolium.

ORDO VIII.

ORDRE VIII.

Suisse Bojer. HYPERICA.

MILLEPERTUIS.

ASCYRUM
hypericoides L.

ASCYRUM
à f. de millepertuis. Am. s. ♪

HYPERICUM.
1. Trigyna.
ægyptiacum L.
scabrum L.
coris L.
nummularium L.
pulchrum L.
tomentosum L.

MILLEPERTUIS.
1. 3 styles.
d'Égypte. or. ♪
rude. orient. or. ♪
verticillé. Alpes. ♪
à f. de Nummulaire. Alpes. ℥
élégant. F. ℥
cotonneux. F. m. or. ℥

— tomentosum.

— longifolium.

elodes L.
 crispum L. Mant.
 humifusum L.
 montanum L.
 hirsutum L.
 perforatum L.
 quadrangulare L.
 delphinense Vill. Delph. }
 dubium Smith, Fl. }
 canariense L.
 Androsæmum L.
 hircinum L.
 elatum Encycl.
 prolificum L. Mant.

2. Styli 5.

richeri Vill. Delph. }
 fimbriatum Encycl. }
 amplexicaule Encycl.
 calicinum L. Mant.
 — { chinense Encycl. }
 — { monogynum L. }
 balearicum L.

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA
 rosea L.
 flava L.
 MAMMEA
 — americana L.

ORDO X.

AURANTIA.

I. Fructus monospermus.

BALANITES
 ægyptiaca Delile, Fl. }
 xymenia ægyptiaca L. }

COOKIA
 — punctata Willd. sp.

des marais. F. ℥
 crépu. Alger. ψ
 couché. F. ⊙
 de montagne. F. ℥
 velu. F. ψ
 officinal. F. ψ (méd.)
 tétragone. F. ψ
 du Dauphiné. ℥
 des Canaries. or. ♪
 androsème. F. ♪ (méd.)
 fétide. orient. ♪
 élevé. Am. s. ♪
 prolifique. Am. s. ♪ (orn.)

2. 5 styles.

de Richer. Alpes. ψ
 amplexicaule. ℥
 à grand calice. orient. ♪ (orn.)
 de Chine. or. ♪ (orn.)
 de Mahon. or. ♪

ORDRE IX.

GUTTIERS.

CLUSIA
 rose. Antilles. s. ch. ♪
 jaune. Antilles. s. ch. ♪
 MAMMÉA
 d'Amérique. Antilles. s. ch. ♪
 (écon.)

ORDRE X.

ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE
 d'Égypte. s. ch. ♪

COOKIA
 ponctué, île de Fr. s. ch. ♪

II. *Fructus polyspermus baccatus.*

MURRAYA

- { *exotica* L. *Mant.*
chalcas paniculata L. *Mant.*
marsana buxifolia *sonn.* *itin.* }

CITRUS

medica L.

- *acida.*
 — *cedra.*
 — *tuberosa.*
 — *balotina.*
 — *limon.*
 — *florentina.*
Aurantium L.

- *amarum.*
 — *olyssiponense.*
 — *violaceum.*
 — *multiflorum.*
 — *lunatum.*
 — *bergamium.*
decumana L.

- sinensis.*
triptera.
hystrix *Dec. cat.*
emarginata.

LIMONIA

trifoliata L.III. *Fructus polyspermus capsularis.*

TERNSTROMIA

- elliptica* *swartz*, *prodr.*
meridionalis L. *f. ?*

THEA

bohea L.

CAMELLIA

japonica L.— *holosericea* *Swartz*, *prodr.*

II. Une baie polysperme.

MURRAYA

Buis de Chine. s. ch. ♪

CITRONNIER

commun. inde. or. ♪ (écon. méd.)

- *aigre.*
 — *cédra.*
 — *poncire.*
 — *Balotin.*
 — *Lime douce.*
 — *de Florence.*
oranger. *Asie.* or. ♪ (orn. méd. écon.)
 — *amer.*
 — *de Portugal.*
 — *violet.*
 — *riche dépouille.*
 — *turc.*
 — *Bergamotte.*
pampelmouse. inde. or. ♪ (orn.)
de Chine. or. ♪
à feuilles ternées. s. ch. ♪
hérissé. s. ch. ♪
échancré. s. ch. ♪

LIMONIA

à f. ternées. inde. s. ch. ♪

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA

- elliptique.* Antilles. s. ch. ♪
d'Amérique. Antilles. s. ch. ♪

THÉ

bou. chine. or. ♪ (écon. méd.)

CAMELLIA

du Japon. or. ♪ (orn.)

ORDO XI.

MELIACEÆ.

I. Folia simplicia.

WINTERANIA
canella L. f.

AYTONIA
capensis L. f.

II. Folia composita.

PORTESIA
ovata Cav. Diss. }
Trichilia pallida Swartz, }
 prodr. }

TRICHILIA
spondioides Swartz, prodr.

MELIA
— azedarach L.

SWIÉTENIA
mahogoni L.

CEDRELA
odorata L.

ORDO XII.

VITES.

CISSUS
orientalis Lamk. Ill.
acida L.
— quadrangularis L. Mant.
sicyoides L.
quinquefolia. }
vitis hederacea Willd. sp. }
hedera quinquefolia L. }
ampelopsis quinquefolia }
 Mich. Am. }
antarctica Vent. ch. de pl.
vitiginea L.

VITIS
vinifera L.

ORDRE XI.

AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA
cannelle blanche. Antill. s. ch.
 } (méd.)

AYTONIA
du Cap. or. }
 }

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA
à feuilles ovales. Ant. s. ch. }
 }

TRICHILIA
à f. de monbin. Ant. s. ch. }
 }

MÉLIA
Azédarac. inde. or. } (orn.)
 }

SWIÉTÉNIA
mahogoni. Acajou à meubles.
Antilles. s. ch. } (arts.)
 }

CÉDRÉLA
odorant. Acajou à planches.
Antilles. s. ch. } (arts.)
 }

ORDRE XII.

VIGNES.

CISSUS
d'Orient. perse. or. }
acide. Antilles. s. ch. }
quadrangulaire. inde. s. ch. }
à f. dentées. Antilles. s. ch. }
 }

vigne vierge. Am. s. } (orn.)
 }

antarctique. N. Holl. or. }
cotonneux. inde. s. ch. }
 }

VIGNE
cultivée. Asie. } (écon, méd.)
 }

laciniosa L.
 vulpina L.
 Labrusca L.
 cordifolia Mich. Fl.
 virginiana.
 arborea L.
 Ampelopsis bipinnata Mich. }
 Fl.

laciniée. 5 (écon.)
 de renard. Am. s. 5
 cotonneuse. Am. s. 5
 à feuilles en cœur. Am. s. 5
 de Virginie. 7

à f. de persil. Antilles. s. ch. 5

ORDO XIII.

GERANIA.

PELARGONIUM

fulgidum Willd. sp.
 — inquinans Willd. sp.
 — roseum.
 hybridum Willd. sp.
 flabellatum.
 zonale Willd. sp.
 — variegatum.
 acetosum Willd. sp.
 glaucum Willd. sp.
 Geranium lanceolatum Cav. }
 Diss.
 diversifolium Willd. sp.
 canum. }
 tomentosum Andr. Rep. }
 peltatum Willd. sp.
 grandiflorum Willd. sp.
 cortusæfolium Willd. sp.
 melananthon Willd. sp.
 sanguineum.
 pilosum H. K.
 hirtum Willd. sp.
 hamatum. }
 echinatum Bot. Mag. }
 tetragonum Willd. sp.
 reniforme Bot. Mag.
 papilionaceum Willd. sp.
 australe Willd. sp.
 vitifolium Willd. sp.
 acerifolium Willd. sp.
 penicillatum Willd. H. Ber.
 beaufortianum.
 cucullatum Willd. sp.
 ribifolium Willd. sp.

ORDRE XIII.

GÉRANIUM.

PÉLARGONIUM

couleur de feu. cap. or. 5
 (orn.)
 écarlate. cap. or. 5 (orn.)
 — rose.
 hybride cap. or. 5
 en éventail. cap. or. 5
 à zones. cap. or. 5 (orn.)
 — panaché.
 acide. cap. or. 5

 glauque. cap. or. 5

 à feuilles var. cap. or. 5
 à feuil. blanches. cap. or. 5
 en bouclier. cap. or. 5
 à grandes fleurs. cap. or. 5
 à f. de cortusa. cap. or. 5
 à fleurs brunes. cap. or. 7
 sanguin. cap. or. 5
 velu. cap. or. 7
 hérissé. cap. or. 7
 à crochets. cap. or. 5
 tétragone. cap. or. 5
 réniforme. cap. or. 5
 papilionacé. cap. or. 5
 austral. N. Holl. or. 5
 à feuilles de vigne. cap. or. 5
 à feuilles d'érable. cap. or. 5
 moucheté. cap. or. 5
 de Beaufort. cap. or. 5
 capuchon. cap. or. 5
 à feuil. de ribés. cap. or. 5

- tomentosum willd. sp.*
rigidum willd. sp.
cordatum willd. sp.
blattarium willd. sp.
tricolor willd. sp.
geranium violarium Jacq. ic. }
betulinum willd. sp.
formosissimum.
capitatum willd. sp.
jatrophaefolium Dec. cat.
glutinatum l'her. ger. }
geranium viscosum Cav. Diss. }
quercifolium willd. sp.
terebinthinaceum. }
graveolens l'her. ger. }
radula willd. sp.
scabrum willd. sp.
tricuspidatum l'her. ger.
bicolor willd. sp.
quinquevulnerum Andr. Rep.
carnosum willd. sp.
gibbosum willd. sp.
ceratophyllum l'her. ger.
exstipulatum willd. sp.
crispum willd. sp.
fragile willd. sp.
ternatum willd. sp.
trifidum Jacq. H. Sch. }
tripartitum willd. sp. }
adulterinum l'her. ger.
incisum willd. sp.
suaveolens.
tabulare willd. sp. }
geranium elongatum Cav. }
Diss. }
alchimilloides willd. sp.
odoratissimum willd. sp.
astragalifolium. }
pinnatum H. K. }
multicaule. }
geranium multicaule Jacq. ic. }
coriandrifolium willd. sp.
rapaceum willd. sp. }
geranium selinum Andr. Rep. }
myrrhifolium willd. sp.
lacerum willd. sp.
grossularioides willd. sp.
carneum willd. sp.
- drapé. cap. or. 5*
à feuilles dures. cap. or. 5
à feuilles en cœur. cap. or. 5
blattaire. cap. or. 5
tricolore. cap. or. 5 (orn.)
à f. de bouleau. cap. or. 5
élégant cap. or. 5 (orn.)
à fleurs en tête. cap. or. 5
à f. de Jatropha. cap. or. 5
glutineux. cap. or. 5
à feuilles de chêne. cap. or. 5
térébinthinacé. cap. or. 5
radula. cap. or. 5
rude. cap. or. 5
à trois pointes. cap. or. 5
bicolore. cap. or. 5
à cinq taches. cap. or. 5
charnu. cap. or. 5
gibbeux. cap. or. 5
à feuilles cornues. cap. or. 5
sans stipules. cap. or. 5
crépu. cap. or. 5
fragile. cap. or. 5
trilobé. cap. or. 5
trifide. cap. or. 5
adultérin. cap. or. 5
incisé. cap. or. 5
suave. cap. or. 5

à longs pédoncules. cap. or. 5
à f. d'Alchimille. cap. or. 5
odorant. cap. or. 5
à f. d'Astragale. cap. or. 5
à tiges nombreuses. cap. or. 5
à f. de coriandre. cap. or. 5
rave. cap. or. 5
à f. de Myrris. cap. or. 5
lacéré. cap. or. 5
à f. de Groseillier. cap. or. 5
à petites fleurs. cap. or. 5

lobatum *willd. sp.*
 triste *willd. sp.*
 daucifolium. }
 flavum *willd. sp.* }
 abrotanifolium *willd. sp.*
 tenuifolium *willd. sp.*

ERODIUM

alpinum *willd. sp.*
 petraeum *willd. sp.*
 cicutarium *willd. sp.*
 romanum *willd. sp.*
 moschatum *willd. sp.*
 hirtum *willd. sp.*
 laciniatum *willd. sp.*
 maritimum *willd. sp.*
 pulverulentum *willd. sp. ?*
 malacoides *willd. sp.*
 glaucophyllum *willd. sp.*
 ciconium *willd. sp.*
 gruinum *willd. sp.*
 geifolium.
 hymenodes *willd. sp.* }
 geranium triphyllum *cav.* }
 diss.
 pusillum. }
 geranium pusillum *L.* }
 chamædryoides *willd. sp.* }
 geranium Reichardi *syst.* }
 veget.
 incarnatum *willd. sp.* }
 punctatum *cav. diss.* }

GERANIUM

pyrenaicum *L. mant.*
 tuberosum *L.*
 macrorrhizum *L. mant.*
 anemonæfolium *l'her. ger.* }
 geranium palmatum *cav.* }
 diss.
 phæum *s. veg.*
 roseum *l'her. mss.*
 reflexum *L. mant.*
 lividum *l'her. ger.*
 nodosum *L.*
 striatum *L.*
 aconitifolium *l'her. ger.*
 sylvaticum *L.*
 maculatum *L.*

lobé. cap. or. \mathcal{L}
 à fl. brunes. cap. or. Ψ (orn.)
 à f. de carotte. cap. or. \mathcal{L}
 à f. d'aurone. cap. or. \mathfrak{h}
 à feuilles menues. cap. or. \mathfrak{h}

ERODIUM

des Alpes. \mathcal{L}
 des rochers. pyrénées. Ψ
 cicutaire. *F.* \mathcal{L}
 romain. *F.* \odot
 musqué. *F.* \odot
 pubescent. Egypte. or. \mathcal{L}
 lacinié. Alger. \odot
 maritime. *F.* \mathcal{L}
 pulvérulent. esp. or. \mathcal{L}
 malacoïde. *F. m.* \odot
 à f. glauques. Égypte. or. \odot
 Bec-de-cigogne. *F.* \odot
 Bec-de-grue. *F.* \odot

à f. de Géum. barbarie. or. Ψ

petit. *F.* \odot

à f. de chamédrys. corse. or. Ψ

incarnat. cap. or. \mathfrak{h}

GÉRANIUM

des Pyrénées. \odot
 tubéreux. italie. \mathcal{L}
 à grosses racines. italie. \mathcal{L}
 à f. d'anémone. madère. or. \mathfrak{h}
 brun. Alpes. \mathcal{L}
 rose. Alpes. \mathcal{L}
 réfléchi. Alpes. Ψ
 livide. Alpes \mathcal{L}
 nouveaux. Alpes. \mathcal{L}
 réticulé. italie. \mathcal{L} (orn.)
 à feuilles d'aconit. Alpes. \mathcal{L}
 des bois. Alpes. \mathcal{L}
 maculé. Am. s. Ψ

pratense L.
 varium *L'her. ger.* }
 cineraceum *Lapeyr. fl.* }
 incanum L.
 argenteum L.
 robertianum L.
 lucidum L.
 bohemicum L.
 divaricatum *Willd. sp.*
 carolinianum L.
 lanuginosum *Jacq. H. sch.* }
 molle L.
 columbinum L.
 dissectum L.
 rotundifolium L.
 sibiricum L.
 sanguineum L.

MONSONIA

speciosa s. veg.

Genera Geraniis affinia.

TROPÆOLUM

— majus L.
 — multiplex.
 minus L.

IMPATIENS

balsamina L.
 noli-tangere L.

OXALIS.

1. *Foliolis binatis.*

crispa *Jacq. ox.*
 asinina *Jacq. ox.*
 leporina *Jacq. ox. ?*

2. *Foliolis ternatis ; scapo unifloro.*

fabæfolia *Jacq. ox.*
 acetosella L.
 purpurea *Jacq. ox.*
 — laxula.
 breviscapa *Jacq. ox.*
 speciosa *Jacq. ox.*
 — sigillata.
 — rigidula.

des prés. f. ψ

cendré. pyrénées. ℥

incane. cap. or. ψ

argenté. f. m. ψ

herbe-à-Robert. f. ♂ (méd.)

luisant. f. ⊙

de Bohême. ⊙

étalé. Hongrie. ⊙

de Caroline. ⊙

velouté. f. ⊙

colombin. f. ⊙

découpé. f. ⊙

à feuilles rondes. f. ⊙

de Sibérie. ⊙

sanguin. f. ℥

MONSONIA

élégant. cap. or. ψ

Genres qui ont de l'affinité avec les
Géranium.

CAPUCINE

cultivée. pérou. ⊙ (orn. écon.)

— à fleurs doubles. s. ch. ℥

à petites fleurs. pérou. ⊙

BALSAMINE

des jardins. inde. ⊙ (orn.)

des bois. f. ⊙

OXALIS.

1. *Folioles deux à deux.*

crépu. cap. or. ψ

cartilagineux. cap. or. ℥

pied-de-lièvre. cap. or. ψ

2. *Folioles ternées ; hampe à une fleur.*

à feuilles de Fève. cap. or. ℥

des bois. f. ψ

pourpre. cap. or. ψ

— lâche.

à hampe courte. cap. or. ℥

à grandes fleurs. cap. or. ℥

— sigillé.

— hérissé.

3. *Foliolis ternatis, rarius quaternis; scapo multifloro.* 3. Folioles ternées, rarement quaternées; hampes à plusieurs fleurs.
- compressa Jacq. Fragm.*
tetraphylla Cav. Ic.
— *violacea L.*
maculata.
cernua Jacq. ox.
quinquepunctata.
- comprimé. cap. or. ♀*
à quatre folioles. Mexique. ♀
violet. Am. s. ♀
tacheté. cap. or. ♀
penché. cap. or. ♀
à cinq glandes. cap. or. ♀
4. *Caulescentes; foliis ternatis; pedunculis unifloris.* 4. Une tige; folioles ternées; pédoncules à une fleur.
- versicolor Jacq. ox.*
— *gracilis.*
elongata Jacq. ox.
rubella Jacq. ox.
polyphylla Jacq. ox.
multiflora Jacq. ox.
rosacea Jacq. ox.
incarnata L.
- bigarré. cap. or. ♀*
— *grêle.*
allongé. cap. or. ♀
rouge. cap. or. ♀
à feuilles nombr. cap. or. ♀
à plusieurs fleurs. cap. or. ♀
rosacé. cap. or. ♀
incarnat. cap. or. ♀
5. *Foliolis ternatis; pedunculis multifloris.* 5. Folioles ternées; pédoncules à plusieurs fleurs.
- corniculata L.*
stricta L.
- cornu. F. ♀*
ramassé. F. ♀
6. *Foliis digitatis.* 6. Feuilles digitées.
- pectinata Jacq. ox.*
flava Jacq. ox.
labellifolia Jacq. ox.
digitata.
- pectiné. cap. or. ♀*
jaune. cap. or. ♀
éventail. cap. or. ♀
digité. cap. or. ♀

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

I. *Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus multicapsularis, capsula capitata.*

PALAVIA

malvifolia Cav. Diss.
malope parviflora L'Her. stirp. }

MALOPE

malacoides L.
trifida Cav. Diss.

KITAIBELIA

vitifolia Willd. sp.

ORDRE XIV.

MALVACÉES.

I. *Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; plusieurs capsules réunies en tête.*

PALAVIA

à feuilles de mauve. Pérou. ☉

MALOPÉ

à feuilles ovales. Alger. or. ♂
à trois lobes. Afr. s. ☉

KITAIBÉLIA

à feuilles de vigne. Hongr. ♀

II. *Stamina in tubum corolliferum connata; fructus multicapsularis; capsulae in orbem dispositae aut in unam coalitae.*

II. *Étamines réunies en un tube adhérent à la corolle; plusieurs capsules disposées circulairement, ou réunies en une seule.*

MALVA.

1. *Foliis indivisis.*

spicata L.
 polystachya Cav. Diss.
 scoparia Cav. et l'Her.
 scabra Cav. Diss.
 americana L.
 angustifolia Cav. Diss.

2. *Foliis angulatis.*

asperrima Jacq. H. Sch.
 miniata Cav. Ic.
 fragrans Cav. Diss.
 capensis Cav. Diss.
 virgata Cav. Diss.
 abutiloides L.
 vitifolia Cav. Ic.
 umbellata Cav. Ic.
 peruviana L.
 limensis L.
 caroliniana L.
 sherardiana L.
 parviflora L.
 verticillata L.
 mareotica Delile, Ægyp.
 rotundifolia L.
 — sylvestris L.
 crispa L.
 Alcea L.
 moschata L.
 ægyptia L.

LAVATERA.

1. *Caule fruticoso.*

arborea L.
 micans L.
 olbia L.
 pseudo-olbia.
 unguiculata.
 triloba L.
 lusitanica L.
 maritima Gouan, Ill.
 acerifolia Dec. Cat.
 phœnicea Vent. Malm.

MAUVE.

1. Feuilles entières.

à épis. Am. m. s. ch. ♪
 à plus. épis. Pérou. s. ch. ♪
 à balais. Pérou. s. ch. ♪
 rude. Pérou. s. ch. ♪
 d'Amérique. Antilles. ⊙
 à feuil. étroit. Mexiq. s. ch. ♪

2. Feuilles anguleuses.

rapeuse. Cap. or. ♪
 rouge. s. ch. ♪
 odorante. Cap. or. ♪
 du Cap. or. ♪
 effilée. Cap. or. ♪
 à f. d'Abutilon. Ant. s. ch. ♪
 à f. de vigne. Mexique. or. ♪
 ombellifère. Mexique. s. ch. ♪
 du Pérou. ⊙
 de Lima. ⊙
 de Caroline. ⊙
 de Sherard. Italie. or. ♂
 à petites fleurs. Barbarie. ⊙
 verticillée. Chine. ⊙
 maréotique. Égypte.
 à feuilles rondes. F. ℥ (méd.)
 sauvage. F. ♂ (méd.)
 crépue. Orient. ⊙
 Alcée. F. ℥
 musquée. F. ℥
 d'Égypte. ⊙

LAVATÉRA.

1. Tige ligneuse.

arbre. Italie. or. ♪
 brillant. Esp. or. ♪
 olbia. F. m. or. ♪
 faux olbia. or. ♪
 onguiculé. or. ♪
 à trois lobes. F. m. or. ♪
 de Portugal. or. ♪
 maritime. F. m. or. ♪
 à f. d'érable. Canaries. or. ♪
 à fl. pourpres. Canaries. or. ♪

2. *Caule herbaceo.*

punctata *All. Auct.*
 cretica *L.*
 thuringiaca *L.*
 trimestris *L.*

ALTHEA et ALCEA

rosea *Willd. sp.*
 — *sinensis.*
 ficifolia *Willd. sp.*
 officinalis *L.*
 narbonensis *Cav. Diss.*
 cannabina *L.*
 ludwigii *L. Mant.*
 hirsuta *L.*

MALACHRA

capitata *L.*
 alceæfolia *Jacq. Ic.*
 triloba.

PAVONIA

— *urens Cav. Diss.*
 cuneifolia *Cav. Diss.*
 hibiscus præmorsus *L. f.* }
 spinifex *Cav. Diss.* }
 hibiscus spinifex *L.* }
 — *aristata.*
 zeylanica *Willd. sp.* }
 hibiscus zeylanicus *L.* }
 parviflora.
 columella *Jacq. H. Sch.*

URENA

— *lobata L.*
 sinuata *L.*
 — *multifida.*

NAPÆA

scabra *L.*
 sida dioica *Cav. Diss.* }
 levis *L.* }
 sida napæa *Cav. Diss.* }

SIDA

spinosa *L.*
 frutescens *Cav. Diss.*
 carpinifolia *L. f.*
 rhombifolia *L.*
 alnifolia *L.*
 unilocularis *V. Her. stirp.*

— *humbilis.*
 — *coarctata.*
 — *foetida.*

2. *Tige herbacée.*

ponctué. nice. ⊙
 de Crète. ⊙
 de Thuringe. ⊙
 à opercule. f. m. ⊙ (orn.)

ALTHEA

rose trémière. chine. ♂ (orn.)
 — *de Chine.*
 à f. de Figuier. sibér. ♂ (orn.)
 officinal. f. z (méd.)
 de Narbonne. ♀
 à feuilles de chanvre. f. m. ♀
 de Ludwig. sicile. ⊙
 velu. f. ⊙

MALACHRA

à fleurs en tête. Antilles. ⊙
 à feuilles d'Alcée. caracas. ⊙
 à trois lobes. ⊙

PAVONIA

piquant. île de fr. s. ch. ♀
 cunéiforme. cap. or. ♀
 épineux. Antilles. s. ch. ♀
 — à longues arêtes.
 de Ceylan. ⊙
 à petites fleurs. s. ch. ♀
 de Bourbon. s. ch. ♀

URENA

à f. lobées. chine. s. ch. ♀
 à f. sinuées. Antilles. s. ch. ♀

NAPÆA

rude. Am. s. ♀
 lisse. Am. s. z

SIDA

épineux. Antilles. ⊙
 arbrisseau. s. ch. ♀
 à f. de charme. canar. or. ♀
 rhomboïdal. inde. s. ch. ♀
 à feuilles d'une. inde. ⊙
 à une loge. île de fr. ⊙

— *humbilis.*
 — *coarctata.*
 — *foetida.*

retusa L.
 viscosa L.
 angustifolia Cav. Diss.
 umbellata L.
 triquetra L.
 virgata Cav. Ic.
 periplocifolia L.
 nutans L'Her. stirp.
 fragrans L'Her. stirp.
 ricinoides L'Her. stirp. }
 palmata Cav. Diss. }
 nudiflora L'Her. stirp. }
 stellata Cav. Diss. }
 crassifolia L'Her. stirp.
 glauca Cav. Ic.
 tricuspis.
 mollissima Cav. Diss.
 arborea L. f. }
 peruviana Cav. Diss. }
 reflexa Cav. Diss. }
 retrorsa L'Her. stirp. }
 tiliæfolia.
 gigantea Jacq. H. Sch.
 palmata Cav. Diss. }
 jatrophioides L'Her. stirp. }
 Abutilon L.
 indica L.
 occidentalis L.
 asiatica L.
 hirta Cav. Diss. }
 pilosa L'Her. stirp. }
 mollis Ortega, Dec.
 mauritiana L'Her. stirp.
 triloba Jacq. H. Sch.
 hastata Willd. sp. }
 Anoda hastata Cav. Diss. }
 cristata. }
 Anoda cristata Cav. Diss. }
 parviflora. }
 Anoda parviflora Cav. Diss. }

III. Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus simplex, multilocularis.

HIBISCUS

solandra L'Her. stirp. }
 solandra lobata Syst. Veget. }
 palustris L.

— Suratifensia.
 — Indisic.
 — Cincipis.

émoussé. inde. ☉
 visqueux. Antilles. s. ch. ☽
 à f. étroit. île de Bourbon. s. ch. ☽
 ombellifère. Antilles. ☉
 triangulaire. Antilles. s. ch. ☽
 effilé. Pérou. s. ch. ☉
 à f. de périploca. Ant. s. ch. ☽
 à fl. penchées. Pérou. s. ch. ☽
 odorant. Antilles. s. ch. ☽
 à feuilles de ricin. Pérou. ☉
 à fleurs nues. Antilles. s. ch. ☽
 à f. épaisses. Antilles. s. ch. ☽
 glauque. Sénégal. s. ch. ☽
 à trois pointes. s. ch. ☽
 velouté. Pérou. s. ch. ☽
 arbre. Pérou. s. ch. ☽
 réfléchi. Pérou. s. ch. ☽
 à f. de tilleul. Ant. s. ch. ☽
 gigantesque. Antilles. s. ch. ☽
 à feuilles palmées. Pérou. ☉
 Abutilon. Suisse. ☉
 des Indes. s. ch. ☽
 d'Occident. Antilles. ☉
 d'Asie. inde. ☉
 hérissé. inde. ☉
 à f. molles. Pérou. s. ch. ☽
 de l'île de France. s. ch. ☽
 à trois lobes. Cap. or. ☽
 hasté. Mexique. ☉
 à crête. Mexique. ☉
 à petites fleurs. Mexique. ☉

III. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; une capsule à plusieurs loges.

HIBISCUS

à trois lobes. île de Bourbon. ☉
 des marais. Am. s. ☽ (orn.)

Ketchic de l'Inde.

- moscheutos L.
- speciosus H. K.
- pentacarpos L.
- militaris Cav. Diss.
- + populneus L. *vel T. spesia populneus.*
- tiliaceus L.
- mutabilis L.
- Rosa-sinensis L.
- phœniceus L. f.
- syriacus L.
- scaber *Encycl.*
- ficulneus Cav. Diss. (non L.)
- diversifolius Willd. sp. }
- manihot L.
- heterophyllus Vent. Malm.
- cannabinus L.
- digitatus Cav. Diss.
- Abelmoschus L.
- esculentus L.
- sabdariffa L.
- tubulosus Cav. Diss.
- vitifolius L. Mant.
- pedunculatus L. f.
- trionum L.

MALVAVISCUS

- arboreus Cav. Diss. }
- Achania malvaviscus H. K. }
- hibiscus malvaviscus L. }

LAGUNEA

- squamea Vent. Malm. }
- hibiscus patersonius Andr. }
- rep. }

GOSSYPIUM

- herbaceum L.
- arboreum L.
- hirsutum L.
- vitifolium *Encycl.*
- purpureum.

IV. Stamina basi in urceolum sessilem connata; omnia fertilia, definita aut indefinita.

MELOCHIA

- pyramidata L. }
- corchorifolia L. }
- ovata. }
- broiera ovata Cav. Ic. }
- tomentosa L.

- moscheutos. Am. s. Z (orn.)
- à fl. pourpres. Am. s. Z (orn.)
- à cinq fruits. Italie. V
- à f. hastées. Louisiane. or. V
- à f. de peuplier. Inde. s. ch. V
- à f. de tilleul. Inde. s. ch. V
- à fl. changeantes. Inde. s. ch. V
- rose de Chine. s. ch. V (orn.)
- rose. Inde. s. ch. V
- mauve en arbre. orient. V (orn.)

à feuell. rudes. ceylan. s. ch. V

- à grandes fleurs. Inde. s. ch. V
- à feuell. var. N. Holl. s. ch. V
- à feuilles de chanvre. Inde. ⊙
- digité. Mexique. s. ch. V
- Abelmosc. Inde. s. ch. V
- comestible. Inde. ⊙ (alim.)
- oseille de Guinée. Inde. ⊙
- tubulé. Inde. ⊙
- à f. de vigne. Inde. s. ch. V
- à longs pédoncules. cap. or. V
- vésiculeux. Italie. ⊙

MALVAVISCUS

en arbre. Antilles. s. ch. V

LAGUNÉA

écailleux. N. Holl. or. V

COTONNIER

- de Malte. orient. or. V (orn.)
- en arbre. Inde. s. ch. V
- velu. Antilles. s. ch. V
- à f. de vigne. Inde. s. ch. V
- pourpre. Antilles. s. ch. V

IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.

MELOCHIA

- pyramidal. Brésil. s. ch. Z
- à feuilles de cocréte. Inde. ⊙
- à f. ovales. N. Esp. s. ch. V
- cotonneux. Antilles. s. ch. V

STUARTIA

malacodendrum L.
pentagyna l'her. stirp

GORDONIA

lasianthus l'her. stirp.
pubescens l'her. stirp.

BOMBAX

ceiba L.

ADANSONIA

baobab L.

Theobroma cacao

V. Stamina basi in urceolum sessilem connata; sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.

PENTAPETES

phœnicea L.

ABROMA

fastuosa Jacq. hort.
ambroma augusta L. f. }

GUAZUMA

— { ulmifolia.
theobroma guazuma L.
bubroma guazuma Willd. sp. }

DOMBEYA

— ferruginea Cav. Diss.
— acutangula Cav. Diss.

BYTTNERIA

ovata Encycl.

VI. Stamina basi in urceolum germini arcte circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumque definita et fertilia.

AYENIA

pusilla L.

HELICTERES

althæifolia Encycl.

STERCULIA

monosperma Vent. Malm.
platanifolia L. f.
fœtida L.

STUARTIA

monostyle. caroline. or. ♀
à cinq styles. virginie. or. ♀

GORDONIA

à f. glabres. caroline. or. ♀
pubescent. caroline. or. ♀

BOMBAX

ceiba. inde. s. ch. ♀

ADANSONIA

digité, pain-de-singe. Afr. s. ch. ♀

V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.

PENTAPÈTES

écarlate. inde. ☉

ABROMA

à larges feuilles. inde. s. ch. ♀

GUAZUMA

à f. d'orme. Antilles. s. ch. ♀

DOMBEYA

ferrugineux. île de F. s. ch. ♀
à angles aigus. île de F. s. ch. ♀

BYTTNERIA

à feuell. ovales. Pérou. s. ch. ♀

VI. Étamines ordinairement définies et fertiles; filets réunis à la base autour de l'ovaire en un godet porté sur un pédicelle.

AYÉNIA

petit. Antilles. s. ch. ♂

HELICTÈRES

à f. d'Althéa. Antilles. s. ch. ♀

STERCULIA

monosperme. inde. s. ch. ♀
à f. de platane. chine. or. ♀
fétide. inde. s. ch. ♀

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIAM

floridanum *L. Mant.*
parviflorum *Vent. H. cels.*

MAGNOLIA

grandiflora *L.*
glaucæ *L.*
acuminata *L.*
tripetala *L.*
umbrella *Encycl.* }
macrophylla *Mich. Fl.*
auriculata *Mich. Fl.*
yulan.
purpurea *Bot. Mag.* }
obovata *Willd. sp.*
discolor *Vent. Malm.* }
pumila *Andr. rep.*

LIRIODENDRUM

tulipifera *L.*

Genera Magnoliis affinia.

DILLENIA

scandens *Willd. sp.*
volubilis *Vent. Malm.*
speciosa *Bot. Mag.*
hibbertia volubilis *Andr. rep.* }

ORDO XVI.

ANNONÆ.

JAMBOLIFERA

pedunculata *L. ?*

ANNOA

— squamosa *L.*

cherimolia *Encycl.* }
tripetala *H. K.*
glabra *L.*
triloba *L.*
orchidocarpon arietinum }
Mich. Fl.

reticulata.
Annona hamata.
microtha.

ORDRE XV. n^o.

MAGNOLIERS.

BADIANE

de la Floride. or. ♀ (écon.)
à petites fleurs. floride. or. ♀

MAGNOLIA

à grandes fl. Flor. or. ♀ (orn.)
glaucæ. virginie. ♀ (orn.)
à f. aiguës. Am. s. ♀ (orn.)

ombrelle. Am. s. ♀ (orn.)

à grandes f. Am. s. ♀ (orn.)
auriculé. Am. s. s. ch. ♀ (orn.)
yulan. chine. or. ♀ (orn.)

pourpre. chine. or. ♀ (orn.)

nain. chine. or. ♀ (orn.)

TULUPIER

de Virginie. ♀ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les
Magnoliers.

DILLÉNIA

sarmenteux. N. Holl. or. ♀

ORDRE XVI.

ANNONES.

JAMBOLIFÉRA

pédonculé. inde. s. ch. ♀

ANNONE

écailleuse, pomme-cannelle.

ind. s. ch. ♀

cherimolia. Pérou. s. ch. ♀
(alim.)

glabre. caroline. s. ch. ♀

à trois lobes, Assiminier. Am.
s. ♀

laureola.

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS
pareira L.

MENISPERMUM
canadense L.
virginicum L.
carolinum L.

SCHISANDRA
coccinea Mich. Fl.

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS
vulgaris L.
— rubra.
— violacea.
— canadensis.
crelica L.
sibirica Willd. sp.
sinensis.

NANDINA
domestica Bot. Magaz.

EPIMEDIUM
alpinum L.

HAMAMELIS
virginiana L.

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monodelpha definita.

WALTHERIA
— { americana L.
arborescens Cav. Diss. }
— { indica Jacq. Ic. }

HERMANNIA
denudata L. f.
hyssopifolia L.

ORDRE XVII.

MÉNISPERMES.

CISSAMPÉLOS
pareira-brava. Antilles. s. ch. ♪
(méd.)

MÉNISPERME
de Canada. ♪
de Virginie. ♪
de Caroline. ♪

SCHISANDRA
écarlate. Am. s. ♪

ORDRE XVIII.

VINETTIERS.

BERBÉRIS
épine-vinette. F. ♪ (écon. méd.)
— à fruit rouge.
— à fruit violet.
— de Canada.
de Crête. ♪
de Sibérie. ♪
de Chine. ♪

NANDINA
de Chine. s. ch. ♪

EPIMÉDIUM
des Alpes. ♪

HAMAMÉLIS
de Virginie. ♪

ORDRE XIX.

TILIACÉES.

I. Étamines définies, réunies à la base.

WALTHÉRIA
d'Amérique. Antilles. s. ch. ♪

HERMANNIA
lisse. cap. or. ♪
à f. d'hysope. cap. or. ♪

lavandulæfolia L.
 althæifolia L.
 cuneifolia Jacq. H. sch.
 alnifolia L.
 micans schrad. sert. }
 latifolia Jacq. H. sch. }
 rotundifolia Jacq. Ic. }
 disticha Willd. sp. }
 angularis Jacq. H. sch.
 trifoliata L.
 pulverata Andr. rep.
 scabra Jacq. H. sch.
 multiflora Jacq. H. sch.

MAHERNIA

pinnata s. veg.
 glabrata L. f.
 verticillata L. Mant.

II. Stamina distincta, plerumque indefinita; fructus multilocularis.

CORCHORUS

hirsutus L.
 siliquosus L.
 tridens L. Mant.
 trilocularis L.
 olitorius L.
 hirtus L.
 æstuans L. Mant.

HELIOCARPUS

americanus L.

TRIUMFETTA

Lappula L.

FLACURTIA

— ramontchi P'her. stirp.

GREWIA

nitida Juss. Ann.
 occidentalis L.
 carpinifolia Juss. Ann.
 asiatica L. Mant.

TILIA

— { sylvestris. vil. L. }
 — { microphylla Vent. Inst. }
 — platiphyllos Vent. Inst.
 — villosa.
 — pubescens Vent. Inst.

à f. de Lavande. cap. or. ♀
 à f. d'Althéa. cap. or. ♀
 cunéiforme. cap. or. ♀
 à feuilles d'Aune. cap. or. ♀
 à feuell. brillantes. cap. or. ♀
 à feuilles rondes. cap. or. ♀
 anguleux. cap. or. ♀
 trifolié. cap. or. ♀
 pulvérulent. cap. or. ♀
 rude. cap. or. ♀
 à fleurs nombr. cap. or. ♀

MAHERNIA

à feuilles pennées. cap. or. ♀
 glabre. cap. or. ♀
 verticillé. cap. or. ♀

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies; fruit à plusieurs loges.

CORCHORUS

velu. Antilles. s. ch. ♀
 siliquieux. Antilles. s. ch. ♀
 à trois dents. inde. ☉
 à trois loges. inde. ☉
 cultivé. Afr. s. ☉
 hérissé. Antilles. ☉
 à six pointes. Antilles. ☉

HÉLIOCARPUS

d'Amérique. Antilles. s. ch. ♀

TRIUMFETTA

hérissé. Antilles. s. ch. ♀

FLACURTIA

ramontchi. inde. s. ch. ♀

GRÉWIA

à feuilles luis. chine. s. ch. ♀
 d'Occident. cap. or. ♀
 à f. de charme. Guin. s. ch. ♀
 d'Asie. s. ch. ♀

TILLEUL

sauvage. F. ♀ (orn. méd.)
 de Hollande. F. ♀ (orn. méd.)
 — velu.
 pubescent. Am. s. ♀ (orn.)

americana L. }
 glabra Vent. Inst. }
 canadensis Mich. Fl. }
 argentea. }
 rotundifolia Vent. Inst. }
 alba Willd. sp. }

d'Amérique. ♪ (orn.)

argenté. Hongrie. ♪ (orn.)

BIXA

— orellana L.

Rocou

cultivé. Antilles. s. ch. ♪ (arts.)

ORDO XX.

ORDRE XX.

CISTI.

CISTES.

CISTUS.

CISTE.

1. Corolla alba aut flavescens.

populifolius L.
 laurifolius L.
 ladaniferus L.
 — maculatus.
 monspeliensis L.
 salvifolius L.

1. Corolle blanche ou jaune.

à f. de peuplier. esp. or. ♪
 à f. de Laurier. F. m. or. ♪
 ladanifère. Alger. or. ♪
 — maculé.
 de Montpellier. or. ♪
 à f. de sauge, F. m. or. ♪

2. Corolla rosea.

2. Corolle rose.

symphytifolius Encycl. }
 vaginatus H. K. }
 purpureus Encycl.
 villosus S. Veg.
 complicatus Encycl.
 incanus L.
 albidus L.
 crispus L.
 creticus L.

à f. de consoude. canar. or. ♪
 pourpre. orient. or. ♪
 velu. esp. or. ♪
 plissé. orient. or. ♪
 incane. orient. or. ♪
 cotonneux. F. m. or. ♪
 crépu. F. m. or. ♪
 de Crète. or. ♪ (méd.)

HELIANTHEMUM (CISTUS Lin.).

HELIANTHÈME.

1. Exstipulata fruticosa.

umbellatum L.
 halimifolium L.
 ocymoides Encycl.
 alyssoides Encycl.
 lævipes L.
 fumana L.
 marifolium L.

1. Tiges ligneuses ; point de stipules ;

ombellifère. F. ♪
 à f. d'halime. F. m. or. ♪
 à f. de basilic. esp. or. ♪
 à feuilles d'alysson. F. ♪
 glauque. F. m. or. ♪
 fumana. F. ♪
 à feuilles de marum. F. ♪

2. Stipulata fruticosa.

2. Tiges ligneuses ; feuilles accompagnées de stipules.

squamatum L.
 Lippii L. Mant.

écailleux. esp. or. ♪
 de Lippi. Égypte. or. ♪

lavandulæfolium *Encycl.* }
 syriacum *Jacq. Ic.* }
 serpyllifolium *L.*
 thymifolium *L.*
 pilosum *L.*
 vulgare.
 — latifolium.
 mutabile *Jacq. Ic.*

3. *Exstipulata herbacea.*
 guttatum *L.*

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*
 salicifolium *L.*
 niloticum *L. Mant.*
 ægyptiacum *L.*

Genera Cistis affinia.

*Fructus trivalvis; valvis seminiferis;
 stamina definita.*

IONIDIUM.

polygalæfolium *vent. Malm.* }
 viola verticillata *ortega, dec.* }

VIOLA.

1. *Acaules.*

hirta *L.*
 palustris *L.*
 odorata *L.*
 palmata *L.*

2. *Caulescentes; stipulis indivisis.*

canina *L.*
 mirabilis *L.*
 striata *H. K.*
 canadensis *L.*
 montana *L.*
 biflora *L.*
 arborescens *L.*

3. *Stipulis pinnatifidis.*

tricolor *L.*
 — hortensis.
 rhotomagensis.
 grandiflora *L. Mant.*
 calcarata *L.*
 cornuta *L.*

à f. de Lavande. F. m. or. ♪

à feuilles de serpolet. F. ♪

à f. de Thym. F. m. or. ♪

velu. F. ♪

commun. F. ♪

— à larges feuilles.

à fl. changeantes. F. m. ♪

3. Tiges herbacées; point de stipules.
 maculé. F. ⊙

4. Tiges herbacées; fenilles accompagnées
 de stipules.

à feuilles de Iédum. F. m. ⊙

à feuilles de saule. F. m. ⊙

du Nil. ⊙

d'Égypte. ⊙

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Cistes.

3 valves séminifères; étamines définies.

IONIDIUM

à f. de polygala. N. esp. or. ℥

VIOLETTE.

1. Tige nulle.

velue. F. ℥

des marais. F. ℥

odorante. F. ℥ (orn.)

palmée. virginie. ℥

2. Une tige; stipules entières.

de chien. F. ℥

sans corolle. F. ℥

striée. Am. s. ℥

de Canada. ℥

de montagne. Alpes. ℥

à deux fleurs. Alpes. ℥

arbrisseau. esp. or. ♪

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. F. ⊙ (orn.)

— des jardins.

de Rouen. F. ℥

à grandes fl. pyrén. ℥ (orn.)

à long éperon. Alpes. ℥

cornue. pyrénées. ℥

ORDO XXI.

RUTACEÆ.

I. *Folia stipulacea, sæpiùs opposita.*

TRIBULUS

terrestris L.

cistoides L.

FAGONIA

cretica L.

ZYGOPHYLLUM

fabago L.

morgsana L.

album L.

GUAIAACUM

sanctum L.

LARREA

nitida *cav. ic.*

PORLIERA

hygrometra *fl. peruv.*

BORONIA

pinnata *smith, soc. lin.*

CORREA

alba L.

virens *smith, exot. bot.*

CROVEA

saligna *smith, soc. lin.*

RUTA

sylvestris.

legitima *Jacq. ic.*montana *H. K.*

graveolens L.

chalepensis L. *Mant. ?*

linifolia L.

pinnata L. *f.*

PEGANUM

harmala L.

DICTAMNUS

albus L.

ORDRE XXI.

RUTACÉES.

I. Feuilles ordinairement opposées,
accompagnées de stipules.

TRIBULUS

hérissé. F. ☉

à fleurs de ciste. Antilles. ☉

FAGONIA

de Crète. or. ♂

FABAGELLE

commune. orient. ☿

membraneuse. cap. or. ☿

à fleurs blanches. barb. or. ♃

GAIAC

commun. Ant. s. ch. ♃ (méd.
arts.)

LARRÉA

à f. Luis. Buenos-ayres. s. ch. ♃

PORLIÈRA

hygrométrique. Pérou. s. ch. ♃

BORONIA

à f. pennées. N. Holl. or. ♃

CORRÉA

à fl. blanches. N. Holl. or. ♃

à fl. vertes. N. Holl. or. ♃

CROVÉA

à f. de saule. N. Holl. or. ♃

RUE

sauvage. barbarie. or. ♃

puante. F. ☿ (méd.)

ciliée. orient. or. ♃

à feuilles de Lin. Esp. or. ♃

à f. pennées. canaries. or. ♃

PÉGANUM

harmala. barbarie. ♃

FRAXINELLE

cultivée. F. m. ♃ (orn.)

*Genera Rutaceis affinia.***MELIANTHUS**

major L.
minor L.
comosus *vahl*, *symb.*

DIOSMA

rubra L.
purpurea.
virgata *encycl.*
deflexa.
ciliata L.
prolifera.
BUCCO prolifera *wendl.* }
hirsuta L.
uniflora L.
glandulifolia uniflora *wendl.* }
sert.
acuminata.
BUCCO acuminata *wendl.* }

ORDO XXII.**CARYOPHYLLÆ.**

I. Calix partitus ; stamina 3 ; stylus 1
aut 3.

ORTEGIA

hispanica L.

HOLOSTEUM

umbellatum L.

POLYCARPON

tetraphyllum L.

MOLLUGO

verticillata L.

MINUARTIA

campestris L.
dichotoma L.

POLYCARPEA

teneriffæ *encycl.*
mollia diffusa *willd. H. Ber.* }

QUERIA

canadensis L.

Genres qui ont de l'affinité avec les
Rutacées.**MÉLIANTHUS**

à larges feuilles. cap. or. ♀
à feuilles étroites. cap. or. ♀
velu. cap. or. ♀

DIOSMA

rouge. cap. or. ♀
pourpre. cap. or. ♀
effilé. cap. or. ♀
à feuell. abaissées. cap. or. ♀
cilié. cap. or. ♀
prolifère. cap. or. ♀
velu. cap. or. ♀
à une fleur. cap. or. ♀
acuminé. cap. or. ♀

ORDRE XXII.**CARYOPHYLLÉES.**

I. Calice partagé ; 3 étamines ; 1-3 styles.

ORTÉGIA

d'Espagne. ☉

HOLOSTÉUM

ombellifère. F. ☉

POLYCARPON

à quatre feuilles. F. ☉

MOLLUGO

verticillé. Am. s. ☉

MINUARTIA

des champs. esp. ☉
dichotome. esp. ☉

POLYCARPÉA

de Ténériffe. ☉

QUÉRIA

de Canada. ☉

II. *Calix partitus; stamina 4; styli 2-4.*

BUFONIA

tenuifolia L.

SAGINA

procumbens L.

erecta L.

III. *Calix partitus; stamina 5 ad 8; styli 2 ad 4.*

ALSINE

media L.

segetalis L.

mucronata L.

PHARNACEUM

cerviana L.

MOEHRINGIA

muscosa L.

ELATINE

hydropiper L.

alsinastrum L.

IV. *Calix partitus; stamina 10; styli 3 aut 5.*

SPERGULA

nodosa L.

arvensis L.

pentandra L.

saginoides L.

CERASTIUM.

1. *Capsulis oblongis.*

perfoliatum L.

vulgatum smith, Fl. }

viscosum curt. Fl. }

semidecandrum curtis, Fl.

viscosum smith, Fl. }

vulgatum curtis, Fl. }

dichotomum L.

arvense L.

alpinum L.

2. *Capsulis subrotundis.*

tomentosum Encycl. }

repens willd. Enum. (an L. ?) }

latifolium L.

aquaticum L.

II. Calice partagé; 4 étamines; 2-4 styles.

BUFONIA

à feuilles menues. F. ⊙

SAGINA

couché. F. ⊙

droit. F. ⊙

III. Calice partagé; 5-8 étamines; 2-4 styles.

ALSINÉ

des oiseaux. F. ⊙

des moissons. F. ⊙

pointu. F. ⊙

PHARNACÉUM

filiforme. esp. ⊙

MOÉHRINGIA

touffu. Alpes. ℥

ELATINÉ

à feuilles de serpolet. F. ⊙

verticillé. F. ⊙

IV. Calice partagé; 10 étamines; 3 ou 5 styles.

ESPARGOUTTE

noueuse. F. ℥

des champs. F. ⊙

à cinq étamines. F. ⊙

à feuilles de sagina. F. ℥

CÉRASTIUM.

1. Capsules oblongues.

perfolié. orient. ⊙

aggloméré. F. ⊙

à cinq étamines. F. ⊙

commun. F. ℥

dichotome. esp. ⊙

des champs. F. ℥

des Alpes. F. ℥

2. Capsules arrondies.

cotonneux. F. ℥

à larges feuilles. Alpes. ℥

aquatique. F. ℥

CHERLERIA

sedoides L.

ARENARIA

peploides L.

tetraquetra L.

biflora L. Mant.

trinervia L.

ciliata L.

serpyllifolia L.

balearica *P. Her. stirp.*

montana L.

rubra L.

media L.

dianthoides *Smith, ic. ?*cucubaloides *Smith, ic.*

saxatilis L.

striata L.

verna L. Mant.

tenuifolia L.

fasciculata *Jacq. ic.*

triflora L. Mant.

STELLARIA

nemorum L.

holostea L.

graminea L.

uliginosa *Curt. Fl.* }alsine *Willd. sp.* }

V. Calix tubulosus; stamina 10; styli 2-5.

GYPSOPHILA

repens L.

prostrata L.

viscosa s. *veg.*

paniculata L.

— grandiflora.

glomerata *Marsch. cauc.*

altissima L.

struthium L.

fastigiata *Encycl. (an Lin. ?)*

perfoliata L.

muralis L.

saxifraga L.

SAPONARIA

officinalis L.

vaccaria L.

ocymoides L.

lutea L.

CHERLÉRIA

sédoïde. Alpes. \mathcal{L}

ARÉNARIA

à feuilles de péplis. F. \mathcal{V} tétragone. F. m. \mathcal{L} à deux fleurs. Alpes. \mathcal{L} à trois nervures. F. \odot cilié. Alpes. \mathcal{L} à feuilles de serpolet. F. \odot de Mahon. \mathcal{V} de montagne. F. \mathcal{V} rouge. F. \odot membraneux. F. \odot à fleurs d'œillet. orient. \mathcal{V} à fleurs de béhen. orient. \mathcal{L} des rochers. F. \mathcal{L} strié. F. \mathcal{V} printanier. F. \mathcal{V} à feuilles menues. F. \odot fasciculé. F. \odot à trois fleurs. F. \mathcal{V}

STELLULAIRE

des bois. F. \mathcal{V} des haies. F. \mathcal{V} à feuilles de Gramen. F. \mathcal{L} des marais F. \odot

V. Calice en tube; 10 étamines; 2-5 styles.

GYPSOPHILA

rampant. Alpes. \mathcal{V} couché. Alpes. \mathcal{V} visqueux. orient. \odot paniculé. sibérie. \mathcal{V}

— à grandes fleurs.

aggloméré. caucase. \mathcal{V} élevé. sibérie. \mathcal{V} struthium. esp. or. \mathcal{D} corymbifère. Alpes. \mathcal{V} perfolié. esp. \mathcal{L} des murailles. F. σ caliculé. F. \mathcal{V}

SAPONAIRE

officinale. F. \mathcal{V} (méd.)anguleuse. F. \odot à feuilles de basilic. F. \mathcal{L} jaune. Alpes. \mathcal{V}

orientalis L.
porrigens Jacq. hort.

d'Orient. ☉
à longs pédoncules. orient. ☉

DIANTHUS.

1. Flores aggregati.

barbatus L.
carthusianorum L.
Armeria L.
prolifer L.
atrorubens All. ped.
ferrugineus L. Mant.
collinus Wald. et Kitt. Hung.
aggregatus Encycl. suppl.
capitatus Wald. et Kitt. Hung.

2. Flores solitarii plures in eodem caule.

corymbosus Encycl. suppl.
caryophyllus L.
— ruber.
moschatus Mayer. }
plumarius Dec. Fl. }
monspessulanus Dec. Fl.
superbus L.
chinensis L.
deltoides L.
attenuatus Smith, Soc. Lin. }
longiflorus Encycl. }
leptopetalus Marsch. cauc.
bicolor Wald. et Kitt. Hung.
squarrosus Marsch. cauc.
arenarius L.
dubius Dec. Cat.
biflorus Delongch. Journ. de
Bot.
ochroleucus Pers. Syn.
rhutenicus Encycl. suppl.
caucasicus Marsch. cauc.
serotinus Wald. et Kitt. Hung.

3. Caule subunifloro, herbaceo.

alpinus L.

4. Caule fruticoso.

rigidus Marsch. cauc.
involucratus Encycl. suppl.
arboreus L.

— chinensis.

OEILLET.

1. Fleurs aggrégées.

de poète. F. ♂
à trois nervures. F. ♀
velu. F. ☉
prolifère. F. ☉
brun-pourpre. Alpes. ♂
rouillé. Italie. ♂
des collines. Hongrie. ♀
à fleurs serrées. ♀
à fleurs en tête. Hongrie. ♀

2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbifère. ♀ (orn.)
des jardins. F. ♀ (orn.)
— ratafiat.
mignardise. ♀ (orn.)
de Montpellier. ♀ (orn.)
superbe. Alpes. ♀ (orn.)
de Chine. ☉ (orn.)
deltoïde. F. ♀
à long calice. F. m. ♀
à pétales linéaires. caucase. ♀
bicolor. Hongrie. ♀
rude. caucase. ♀
des sables. F. ♀
douteux. ♀
biflore. F. ♀
jaune-pâle. orient. ♀
de Russie. ♀
du Caucase. ♀
tardif. Hongrie. ♀

3. Tige herbacée, à une fleur.

des Alpes. ♀

4. Tige ligneuse.

à feuilles roides. caucase. ♀
à involucre. or. ♀
à f. épaisses. orient. or. ♀

— chinensis.

SILENE.

SILÉNÉ.

1. Floribus solitariis, lateralibus.

lusitanica L.
 quinque vulnere L.
 gallica L.
 hispida Desf. Atl.
 tridentata Desf. Atl.
 nocturna L.
 sericea All. Ped.

2. Floribus lateralibus, confertis.

arenaria Desf. Atl.
 gypsophila
 tricuspidata.
 nutans L.
 paradoxa L.
 ocymoides.
 suffruticosa.
 fruticosa L.
 longiflora Willd. sp.
 buplevroides L.
 gigantea L.
 viridiflora L.
 chlorantha Willd. sp.

3. Floribus ex dichotomia caulis,

sedoides Desf. Atl.
 conoidea L.
 conica L.
 behen L.
 dichotoma Wald. et Kitt. Hung.
 pendula L.
 bellidifolia Jacq. Hort.
 noctiflora L.
 maritima Willd. sp.
 antirrhina L.
 inaperta L.
 polyphylla L.
 portensis L.
 apetala Willd. sp.
 cretica L.
 glauca Zea.
 muscipula L.
 rubella L. ?
 ornata H. K.
 bipartita Desf. Atl. }
 hispanica Jacq. Fragm. }
 stricta L.

1. Fleurs solitaires, latérales.

de Portugal. ☉
 à cinq taches. F. ☉
 sans dents. F. ☉
 hérissé. Barbarie. ☉
 à trois dents. Barbarie. ☉
 nocturne. F. m. ☉
 soyeux. F. m. ☉

2. Fleurs latérales, ramassées.

des sables, Barbarie. ☉
 à feuilles de gypsophila. ℥
 à trois pointes. ☉
 à fleurs penchées. F. ℥
 odorant. Italie. ℥
 à feuilles de basilic. ℥
 sous-arbrisseau. ℥
 arbrisseau. Sicile. or. ℥
 à longues fleurs. Hongrie. ℥
 à f. de buplevre. orient. ℥
 gigantesque. Afr. or. ♂
 à fleurs vertes. Alpes. ♂
 verdâtre. Carinthie. ℥

3. Fleurs dans la bifurcation des tiges.

à feuilles de sédum. Barbar. ☉
 à gros fruit. F. ☉
 conique. F. ☉
 faux behen. orient. ☉
 dichotome. Hongrie. ☉
 à fleurs pendantes. Crète. ☉
 à feuilles de paquerette. ☉
 noctiflore. Suisse. ☉
 maritime. F. ℥
 à feuilles linéaires. Am. s. ☉
 fermé. Eur. austr. ☉
 à feuilles nombreuses. All. ☉
 paniculé. Portugal. ☉
 apétole. ☉
 de Crète. ☉
 glauque. ☉
 gobe-mouche. F. m. ☉
 incarnat. orient. ☉
 à fleurs pourpres. Cap. or. ♂
 à fleurs roses. Alger. ☉ (orn.)
 à fleurs serrées. F. m. ☉

4. *Floribus terminalibus.*

chloræfolia *smith*, *ic.*
picta *Pers. syn.*
flavescens *Wald. et Kitt. Hung.*

— *Armeria* *L.*

Atocion *Jacq. Hort.* }
orchidea *L. f.* }

rupestris *L.*

quadridentata *Dec. Fl.* }
alpestris *Jacq. Austr.* }

saxifraga *L.**vallesia* *L.**acaulis* *L.*

CUCUBALUS

stellatus *L.**bacciferus* *L.**Behen* *L.*— *alpinus.*— *angustifolius.**roseus.**fabarius* *L.**tataricus* *L.**sibiricus* *L.**multiflorus* *Willd. sp.**cæspitosus.**viscosus* *L.**catholicus* *L.**fimbriatus* *Marsch. cauc.**otites* *L.**volgensis* *Willd. Enum. suppl.*

LYCHNIS

grandiflora *Jacq. ic.* }*coronata* *Thunb. Jap.* }*chalcedonica* *L.**flos-cuculi* *L.**viscaria* *L.**alpina* *L.**dioica* *L.*— *rubra.*

GITHAGO

— { *segetum.*
Agrostemma *Githago* *L.* }

AGROSTEMMA

coronaria *L.*

4. Fleurs terminales.

à f. de chlora. orient. or. ♀*à réseau.* F. m. ♂*à fleurs jaunes.* Hongrie. ♀*à bouquets.* F. ⊙ (orn.)*Atocion.* orient. ⊙*des rochers.* Alpes. ♂*à quatre dents.* Alpes. ♀*saxifrage.* Alpes. ♂*du Valais.* ♀*sans tige.* Alpes. ♂

BÉHEN

étoilé. Am. s. ♀*baccifère.* F. ♀*commun.* F. ♂— *des Alpes.*— *à feuilles étroites.*— *à fleurs roses.**dichotome.* sicile. or. ♂*de Tartarie.* ♀*de Sibérie.* ♀*à fleurs nombr.* Hongrie. ♂*touffu.* ♂*visqueux.* Italie. ♂*de Rome.* F. ♀*lacinié.* caucase. ♀*dioïque.* F. ♂*du Volga.* ♂

LYCHNIS

à grandes fl. Jap. or. ♀ (orn.)*croix-de-Jérusalem.* Russie. ♀

(orn.)

des prés. F. ♀*visqueux.* F. ♂*des Alpes.* ♀*dioïque.* F. ♀— *rouge.*

GITHAGO

Nielle-des-blés. F. ⊙

AGROSTEMMA

coquelourde. F. ♂ (orn.)

flos-jovis L.
 coeli-rosa L.
 parviflora Cav. Ic.

rose. Alpes. ♀ (orn.)
 maritime. F. ⊙. (orn.)
 à petites fleurs. Esp. ⊙

VI. Calix tubulosus; stamina pauciora
 quam 10; styli 2-3.

VI. Calice en tube; moins de 10 étamines;
 2-3 styles.

VELEZIA
 rigida L.

VÉLÉZIA
 à feuilles roides. Esp. ⊙

Genera Caryophylleis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Caryophyllées.

FRANKENIA
 levis L.
 pulverulenta L.
 hirsuta L.
 virens.

FRANKÉNIA
 lisse. F. ♀
 pulvérulent. F. ⊙
 velu. orient. ♀
 verdâtre. ♀

LINUM.

LIN.

1. Floribus caeruleis, albis aut rubentibus.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

usitatissimum L.
 perenne L.
 narbonense L.
 austriacum L.
 hirsutum L.
 tenuifolium L.
 alpinum Jacq. Austr.
 catharticum L.
 radiola L.

cultivé. ⊙ (écon. méd.)
 vivace. Sibérie. ♀ (écon.)
 de Narbonne. ♀
 d'Autriche. ♀
 velu. Autriche. ♀
 à feuilles menues. F. ♀
 des Alpes. ♀
 cathartique. F. ⊙ (méd.)
 radiola. F. ⊙

2. Floribus luteis.

2. Fleurs jaunes.

gallicum L.
 strictum L.
 suffruticosum L.
 africanum L.
 trigynum Bot. Magaz.
 quadrifolium L.
 maritimum L.
 campanulatum L.

à petites fleurs. F. ⊙
 rude. F. m. ♂
 sous-arbrisseau. Esp. or. ♀
 d'Afrique. cap. or. ♀
 à trois styles. Inde. or. ♀
 à f. quaternées. cap. or. ♀
 maritime. F. ♀
 campanulé. F. m. or. ♀

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(*Stamina perigyna.*)

ORDO I.

SEMPERVIVÆ.

TILLÆA

muscosa L.

BULLIARDA

<i>vaillantii Dec. fl.</i>	}
<i>tillæa aquatica L.</i>	
<i>tillæa vaillantii Willd. sp.</i>	

CRASSULA.

1. *Herbaceæ.*

<i>glomerata L. Mant.</i>	
<i>ciliata L.</i>	
<i>calicina.</i>	
<i>acutifolia Encycl.</i>	
<i>rubens L. f.</i>	}
<i>sedum rubens L.</i>	
<i>orbicularis L.</i>	
<i>lycopodioides Encycl.</i>	}
<i>muscosa L.</i>	

2. *Fruticosæ.*

<i>coccinea L.</i>	
<i>scabra L.</i>	
<i>perfoliata L.</i>	
<i>perfossa Encycl.</i>	
<i>tetragona L.</i>	
<i>obvallata L. Mant.</i>	
<i>cultrata L.</i>	
<i>falcata H. K.</i>	}
<i>rochea falcata Dec. pl. gr.</i>	
<i>portulacea Encycl.</i>	}
<i>obliqua H. K.</i>	
<i>lucida Encycl.</i>	}
<i>spathulata Thunb. prodr.</i>	

CLASSE XIV.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(*Étamines attachées au calice.*)

ORDRE I.

JOUBARBES.

TILLÉA

nain. F. ☉

BULLIARDA

de Vaillant. F. ☉

CRASSULE.

1. *Tiges herbacées.*

<i>agglomérée. cap. ☉</i>
<i>ciliée. cap. or. ☿</i>
<i>à grand calice. N. Holl. or. ☿</i>
<i>à feuilles aiguës. cap. or. ☿</i>
<i>rouge. F. ☉</i>
<i>orbiculaire. cap. or. ☿</i>
<i>Lycopode. cap. or. ☿</i>

2. *Tiges ligneuses.*

<i>écarlate. cap. or. ♃ (orn.)</i>
<i>rude. cap. or. ♃</i>
<i>perfoliée. cap. or. ♃</i>
<i>enfilée. cap. or. ♃</i>
<i>tétragone. cap. or. ♃</i>
<i>à feuilles en scie. cap. or. ♃</i>
<i>en serpe. cap. or. ♃</i>
<i>falciforme. cap. or. ♃ (orn.)</i>
<i>à f. de pourpier. cap. or. ♃</i>
<i>luisante. cap. or. ♃</i>

cordata *L. f.*
 lactea *H. K.*
 cotyledon *Jacq. miscell.*

COTYLEDON

coccinea *Carv. ic.*
 orbiculata *L.*
 hemisphærica *L.*
 unguolata *Encycl.*
 tuberculosa *Encycl.*
 hispida *Encycl.* }
 viscosa *Vahl, symb.* }
 hispanica *L.*
 umbilicus *L.*
 lusitanica *Encycl.* }
 lutea *H. K.* }

KALANCOE

— { laciniata *Dec. pl. gr.* }
 — { cotyledon laciniata *L.* }
 spathulata *Dec. pl. gr.*
 ægyptiaca *Dec. pl. gr.*
 crenata.
 verrea crenata *Andr. rep.* }
 cotyledon crenata *Vent.* }
Malm. }

SEDUM.

1. Planifolia.

rhodiola. }
 rhodiola rosea *L.* }
 telephium *L.*
 — purpureum.
 — maximum.
 Anacampseros *L.*
 — longifolium.
 Aizoon *L.*
 stellatum *L.*
 hybridum *L.*
 populifolium *L. f.*
 cepæa *L.*

2. Teretifolia.

dasyphyllum *L.*
 reflexum *L.*
 virens *H. K.*
 rupestre *L.*
 altissimum *Encycl.* }
 sempervivum sedifolium }
Jacq. hort. }

en cœur. cap. or. ♪
 blanche. cap. or. ♪
 cotylédon. cap. or. ♪

COTYLÉDON

safrané. s. ch. ♪
 orbiculaire. cap. or. ♪
 hémisphérique. cap. or. ♪
 ongulé. cap. or. ♪
 tuberculeux. cap. or. ♪
 hispide. barbarie. ☉
 d'Espagne. ☉
 NombriL-de-Vénus. ♀. ☿
 corymbifère. Angleterre. ♀

KALANCOÉ

lacinié. inde. s. ch. ♪
 en spatule. chine. s. ch. ♪
 d'Égypte. s. ch. ♪
 crénelé. cap. or. ♪

SÉDUM.

1. Feuilles aplaties.

odorant. Alpes. ♀
 orpin. ♀. ☿ (méd.)
 — pourpre.
 — à larges feuilles.
 Anacampséros. ♀. ☿
 — à feuilles longues.
 Aizoon. sibérie. ♀
 étoilé. ♀. ☉
 hybride. tartarie. ♀
 à f. de peuplier. sibérie. ☿
 cépéa. ♀. ☉

2. Feuilles cylindriques.

à feuilles courtes. Alpes. ♀
 penché. ♀. ☿
 verdoyant. Portugal. ☿
 des rochers. ♀. ♀
 élevé. eur. ♀

hispanicum L.
 album L.
 sexfidum Marsch. cauc.
 glaucum Wald. et Kitt. Hung.
 saxatile Dec. syn.
 acre L.
 sexangulare L.
 anglicum H. K.
 villosum L.
 nudum H. K.
 cruciatum.
 monregalense Balbis. }

d'Espagne. or. ☿
 blanc. F. ☉
 à six divisions. caucase. ☿
 glauque. Hongrie. ♂
 des rochers. pyrénées. ☉
 vermiculaire. F. ☿
 hexagone F. ☿
 d'Angleterre. ☿
 velu. F. ☉
 à tiges nues. canaries. or. ♃
 à feuilles en croix. Alpes. ☿

SEMPERVIVUM

arboreum L.
 canariense L.
 glutinosum H. K.
 tortuosum H. K.
 villosum H. K.
 aizoides Encycl.
 tectorum L.
 globiferum L.
 hirtum L.
 inontanum L.
 arachnoideum L.
 monanthos H. K.

JOUBARBE

en arbre. barbarie. or. ♃
 des Canaries. or. ♃
 glutineuse. canaries. or. ♃
 tortueuse. canaries. or. ♃
 velue. canaries. or. ♃
 Aizoïde. canaries. or. ♃
 des toits. F. ☿ (méd.)
 à globules. F. ☿
 hérissée. Alpes. ☿
 de montagne. Alpes. ☿
 arachnoïde. Alpes. ☿
 à une fleur. canaries. or. ☿

PENTHORUM

sedoides L.

PENTHORUM

à grappes. Am. s. ☿

ORDO II.

SAXIFRAGÆÆ.

I. Fructus superus; capsularis birostris.

HEUCHERA

americana L.

HEUCHÉRA

d'Amérique. Am. s. ☿

SAXIFRAGA.

1. Foliis integris; caule subnudo.

longifolia Lapeyr. Fl.
 pyramidalis Lapeyr. Fl.
 cotyledon L.
 pensylvanica L.
 stellaris L.
 umbrosa L.
 hirsuta L.

ORDRE II.

SAXIFRAGÉES.

I. Ovaire supère; une capsule à deux pointes.

SAXIFRAGÈ.

1. Feuilles entières; tige presque nue.

à longues f. pyrén. ☿ (orn.)
 pyramidale. pyrén. ☿ (orn.)
 cotylédon. Alpes. ☿
 de Pensylvanie. ☿
 étoilée. Alpes. ☿
 ombreuse. Alpes. ☿
 velue. Alpes. ☿

œcum L.
cuneifolia L.
crassifolia L.
sarmentosa L. f.

2. *Foliis integris; caule folioso.*

rotundifolia L.
oppositifolia L.
aizoides Willd. sp.
autumnalis Fl. Dan. (non L.) }
aspera L.

3. *Foliis lobatis.*

granulata L.
geranioides L.
tridactylites L.
cespitosa L.
hypnoides L.
furcata Lapeyr. Fl. ?
palmata Smith, Fl. }
decipiens Ehrhart. }

TIARELLA

cordifolia L.
biternata Vent. Malm.

MITELLA

diphylla L.
nuda L.

II. *Fructus inferus; capsularis aut baccatus.*

CHRYSOSPLENIUM

oppositifolium L.
alternifolium L.

ADOXA

moschatellina L.

HYDRANGEA

arborescens L.
nivea Mich. Fl. }
radiata Willd. sp. }
quercifolia H. K.

HORTENSIA

opulifolia Encycl.
hydrangea hortensis Willd. }
 sp. }

CALLICOMA

serrata Andr. rep.

œcum. Alpes. Ψ
cunéiforme. Alpes. Σ
 à f. épaisses. Sibérie. Ψ (orn.)
sarmenteuse. Japon. Ψ

2. Feuilles entières; tige feuillue.

à feuilles rondes. Alpes. Ψ
 à feuilles opposées. Alpes. Σ
Aizoïde. Alpes. Ψ
rude. Alpes. Σ

3. Feuilles lobées.

grenue. F. Ψ
 à f. de *Geranium*. Pyrénées. Σ
 à trois pointes. F. \odot
touffue. Alpes. Ψ
hypnoïde. Alpes. Σ
fourchue. Pyrénées. Σ
palmée. Alpes. Σ

TIARELLE

à feuilles en cœur. Am. s. Σ
biternée. Am. s. Ψ

MITELLA

bifoliée. Am. s. Σ
 à tige nue. Asie. Ψ

II. Ovaire infère; une capsule ou une baie.

DORADILLE

à feuilles opposées. F. Σ
 à feuilles alternes. F. Σ

ADOXA

Moschatelle. F. Ψ

HYDRANGÉA

en arbre. Am. s. Ψ
cotonneux. Am. s. Ψ
 à feuilles de chêne. Am. s. Ψ

HORTENSIA

à f. d'obier. Chine. Ψ (orn.)

CALLICOMA

à feuilles en scie. Or. Ψ

ORDO III.

CACTI.

I. Petala et stamina definita.

RIBES.

1. Inermia.

rubrum L.

— album.

petræum Jacq. ic.

nigrum L.

prostratum l'Her. stirp. }

glandulosum H. K. }

pensylvanicum Encycl. }

floridum l'Her. stirp. }

alpinum L.

2. Aculeata.

cynosbati L.

diacanthum L. f.

orientale.

grossularia L.

uva-crispa L.

— rubra.

II. Petala et stamina indefinita.

CACTUS.

1. Opuntia caule plano.

— opuntia L.

— ficus indica.

— tuna.

— nana.

— inermis.

cochinillifer L.

curassavicus L.

brasiliensis Willd. Enum. suppl.

spinosissimus Encycl.

speciosus Bonpland, Malm.

(non Willd.)

phyllanthus L.

pereskia L.

2. Echinato melocacti, subrotundi.

mamillaris L.

pseudomamillaris.

ORDRE III.

CIERGES.

I. Pétales et étamines définis.

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

commun. F. ♪ (écon. méd.)

— blanc.

des rochers. Alpes. ♪

cassis. F. ♪ (écon.)

couché. Am. s. ♪

de Pensylvanie. ♪

des Alpes. ♪

2. Tiges épineuses.

cynosbati. Am. s. ♪

à deux épines. Russie. ♪

du Liban. ♪

épineux. F. ♪ (écon.)

à maquereau. F. ♪ (écon.)

— rouge.

II. Pétales et étamines indéfinis.

CIERGE.

1. Opontias à tige aplatie.

opontia. Afr. s. s. ch. ♪ (écon.)

— Figuier-d'inde.

— tuna.

— petit.

— sans épines.

à cochenille. Am. m. s. ch. ♪

de Curaçao. s. ch. ♪

du Brésil. s. ch. ♪

très-épineux. s. ch. ♪

rose. Am. m. s. ch. ♪

scolopendre. Am. m. s. ch. ♪

pereskia Am. m. s. ch. ♪

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamillaire. Antilles. s. ch. ♪

mamelonné. s. ch. ♪

stellatus *Willd. Enum. suppl.*
 coronatus *Willd. Enum. suppl.*
 melocactus *L.*

3. *Erecti, cylindrici.*

cylindricus *Encycl.*
 serpentinus *Willd. Enum. suppl.*
 heptagonus *L.*
 tetragonus *L.*
 peruvianus *L.*
 monstruosus.
 abnormis *Willd. Enum. suppl.* }
 royeri *L.*
 multangularis *Willd. Enum. suppl.*

4. *Repentes.*

grandiflorus *L.*
 flagelliformis *L.*
 parasiticus *Dec. pl. gr.* }
 pendulus *Willd. sp.* }
 funalis.
 speciosissimus.
 speciosus *Willd. Enum. suppl.* }
 triangularis *L.*
 proteiformis.
 triqueter (non *Willd.*)

ORDO IV.

PORTULACEÆ.

I. *Fructus unilocularis.*

PORTULACA

pilosa *L.*
 — oleracea *L.*

TALINUM

anacampseros *Willd. sp.* }
 portulaca anacampseros *L.* }
 patens *Willd. sp.*
 reflexum *Cav. ic.*
 trichotomum.
 fruticosum *Willd. sp.* }
 portulaca paniculata *L.* }

TURNERA

cistoides *L.*
 — *Elegans vel multinervis.*

étoilé. Am. m. s. ch. 5
 couronné s. ch. 5
 mélocacte. Antilles. s. ch. 5

3. Tiges droites, cylindriques.

cylindrique. Pérou. s. ch. 5
 sarmenteux. s. ch. 5
 heptagone. Am. m. s. ch. 5
 tétragone. Am. m. s. ch. 5
 du Pérou. s. ch. 5

monstrueux. s. ch. 5

de Royen. Am. m. s. ch. 5
 multangulaire. s. ch. 5

4. Tiges rampantes.

à grandes fl. Antilles. s. ch. 5
 serpentin. Am. m. s. ch. 5

parasite. Antilles. s. ch. 5

à tiges grêles. s. ch. 5

éclatant. s. ch. 5

triangulaire. s. ch. 5

protéiforme. s. ch. 5

à trois angles. s. ch. 5

ORDRE IV.

PORTULACÉES.

I. Fruit à une loge.

POURPIER

velu. Antilles. ☉
 cultivé. F. ☉ (écon.)

TALINUM

anacampseros. cap. or. 5
 paniculé. Am. m. s. ch. 5
 à fl. jaunes. Am. m. s. ch. 5
 trichotome. s. ch. 5
 ligneux. Am. m. s. ch. 5

TURNÉRA

à fl. de ciste. Antilles. s. ch. 5
 à feuilles d'ozone.

MONTIA
fontana L.

TAMARIX
gallica L.
germanica L.

TELEPHIUM
imperati L.

CORRIGIOLA
littoralis L.

SCLERANTHUS
annuus L.
perennis L.

TRIANTHEMA
monogyna L. Mant.

CLAYTONIA
virginica L.
cubensis Bonpl. Equin. }
perfoliata Willd. Enum. }

PORTULACARIA
afra Jacq.
claytonia portulacaria L. }
Mant. }

ORDO V.

FICOIDEÆ.

REAUMURIA
vermiculata L.

NITRARIA
schoberi L.
tridentata Desf. Atl.

SESUVIUM
portulacastrum L.
revolutifolium Willd. Enum.

AIZOON
canariense L.
hispanicum L.

GLINUS
lotoïdes L.

MESEMBRYANTHEMUM.
1. Foliis planis.
cristallinum L.

MONTIA
aquatique. F. ☉

TAMARIX
de France. ♀ (orn.)
d'Allemagne. ♀ (orn.)

TÉLÉPHIUM
d'Impérati. F. ♀

CORRIGIOLA
des sables. F. ☉

SCLÉRANTHUS
annuel. F. ☉
vivace. F. ♀

TRIANTHÉMA
monogyne. Antilles. ☉

CLAYTONIA
de Virginie. ♀
de Cuba. ☉

PORTULACARIA
d'Afrique. cap. or. ♀

ORDRE V.

FICOÏDES.

RÉAUMURIA
à feuil. de sédum. barb. or. ♀

NITRARIA
à feuilles entières. Russie. ♀
à trois dents. Barbarie. or. ♀

SÉSUVIUM
à f. de pourpier. Inde. s. ch. ♂
à f. roulées. Cuba. s. ch. ♂

AIZOON
des Canaries. ☉
d'Espagne. ☉

GLINUS
lotoïde. esp. ☉

FICOÏDE.
1. Feuilles planes.
cristalline. mère. ☉

linguiforme *L.*
 tortuosum *L.*
 expansum *L.*
 pinnatifidum *L. f.*
 cordifolium *L. f.*
 cuneifolium *Jacq. Ic.* }
 limpidum *H. K.* }
 helianthoides *H. K.*

2. *Foliis subtus convexis.*

ciliatum *H. K.*
 geniculiflorum *L.*
 noctiflorum *L.*
 pallens *H. K.*
 bicolorum *L.* }
 coccineum *Dec. Pl. Gr.* }
 tuberosum *L.*
 tenuifolium *L.*
 violaceum *Dec. Pl. Gr.*
 stipulaceum *L.*
 corniculatum *L.*
 loreum *L.*
 veruculatum *L.*
 echinatum *H. K.*
 viridiflorum *H. K.*
 splendens *L.*
 villosum *L.*
 micans *L.*
 rostratum *L.*
 caninum *Dec. Pl. Gr.*
 felinum *Dec. Pl. Gr.*
 tigrinum *Haw.*
 testiculare *Jacq. Fragn.*

3. *Foliis teretibus.*

nodiflorum *L.*
 brachiatum *H. K.*
 hispidum *L.*
 striatum *Dec. Pl. Gr.*
 barbatum *L.*
 stellatum *Dec. Pl. Gr.*
 calamiforme *L.*

4. *Foliis triquetris.*

falcatum *L.*
 reptans *H. K.*
 spinosum *L.*
 glomeratum *L.*

linguiforme. cap. or. \mathcal{L}
 tortueux cap. or. \mathcal{L}
 ouvert. cap. or. \mathfrak{h}
 pinnatifide. cap. \odot
 en cœur. cap. or. \mathfrak{h}
 cunéiforme. cap. \odot
 à fleur de soleil. cap. \odot

2. Feuilles convexes en-dessous.

cilié. cap. or. \mathfrak{h}
 géniculiflore. cap. or. \mathfrak{h}
 de nuit. cap. or. \mathfrak{h}
 pâle. cap. or. \mathfrak{h}
 écarlate. cap. or. \mathfrak{h}
 tubéreux. cap. or. \mathfrak{h}
 à feuilles menues. cap. or. \mathfrak{h}
 violet. cap. or. \mathfrak{h}
 à stipules. cap. or. \mathfrak{h}
 cornu. cap. or. \mathfrak{h}
 courroie. cap. or. \mathfrak{h}
 à feuilles lisses. cap. or. \mathfrak{h}
 hérissé. cap. or. \mathfrak{h}
 à fleurs vertes. cap. or. \mathfrak{h}
 luisant. cap. or. \mathfrak{h}
 velu. cap. or. \mathfrak{h}
 argenté. cap. or. \mathfrak{h}
 bec-de-grue. cap. or. \mathcal{L}
 gueule-de-chien. cap. or. \mathcal{L}
 gueule-de-chat. cap. or. \mathcal{L}
 gueule-de-tigre. cap. or. \mathcal{L}
 bilobé. cap. or. \mathcal{L}

3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. barbare. or. \mathfrak{h}
 étalé. cap. or. \mathfrak{h}
 hispide. cap. or. \mathfrak{h}
 strié. cap. or. \mathfrak{h}
 barbu. cap. or. \mathfrak{h}
 étoilé. cap. or. \mathfrak{h}
 doigt-d'enfant. cap. or. \mathfrak{h}

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap. or. \mathfrak{h}
 rampant. cap. or. \mathfrak{h}
 épineux. cap. or. \mathfrak{h}
 aggloméré. cap. or. \mathfrak{h}

glaucum *L.*
 spectabile *Willd. sp.*
 aureum *Willd. sp.*
 serratum *L.*
 scabrum *L.*
 uncinatum *L.*
 — minus.
 pugioniforme *L.*
 filamentosum *L.*
 acinaciforme *L.*
 lacerum *H. K.*
 deltoïdes *L.*
 albidum *L.*
 bellidiflorum *L.*
 dolabriforme *L.*

TETRAGONIA

decumbens *Dec. pl. Gr.*
 echinata *H. K.*
 expansa *Syst. veget.*
 cristallina *L'Her. stirp.*

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. *Styli plures.*

MYRIOPHYLLUM

spicatum *L.*
 verticillatum *L.*

PROSERPINACA

palustris *L.*

CERCODIA

erecta *Murr. Gœtt.*
 ludwigia *Cercodia Jacq. ic.*
 halogaris *Cercodia H. K.*
 tetragonia *ivæfolia L. f.*

II. *Stylus 1; fructus capsularis; stamina petalis numero æqualia aut pauciora.*

TRAPA

natans *L.*

LOPEZIA

racemosa *Cav. ic.*
 hirsuta *Jacq. coll. suppl.*
 miniata *Dec. cat.*

glauque. cap. or. 5
 à grandes fleurs. cap. or. 5
 doré. cap. or. 5
 denté. cap. or. 5
 rude. cap. or. 5
 à crochet. cap. or. 5
 — petit.
 en poignard. cap. or. 5
 filamenteux. cap. or. 5
 en sabre. cap. or. 5
 lacéré. cap. or. 5
 deltoïde. cap. or. 5
 blanc. cap. or. 7
 à fl. de paquerette. cap. or. 7
 en doloire. cap. or. 5

TÉTRAGONIA

tombant. cap. or. 5
 hérissé. cap. or. 6
 étalé. N. zél. 6
 cristallin. Pérou. 6

ORDRE VI.

ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU

à épis. F. 7
 verticillé. F. 7

PROSERPINACA

des marais. Am. s. 7

CERCODIA

à tige droite. N. zél. or. 5

II. Un style; une capsule; étamines en nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE

flottante. F. 7 (alim.)

LOPÉZIA

à grappes. Mexique. 6 (orn.)
 velu. Mexique. 6
 arbrisseau. Mexique. s. ch. 5
 (orn.)

CIRCÆA

- lutetiana L.
alpina L.

LUDWIGIA

- macrocarpa Michx. Fl. }
alternifolia L. }

III. Stylus 1; fructus capsularis; stamina
petalorum dupla.

JUSSIÆA

- erecta L.

OENOTHERA.

1. Capsulis teretibus.

- biennis L.
— grandiflora Willd. sp.
parviflora L.
muricata s. Veg.
longiflora Jacq. Hort.
— mollissima L.
odorata Jacq. Ic.
nocturna Jacq. Ic. }
albicans Encycl. }
sinuata s. Veg.

2. Capsulis angulatis.

- tetraptera Cav. Ic.
purpurea Roth. Mag.
rosea Willd. sp.
pumila L.

GAURA

- biennis L.
fruticosa Jacq. Ic.
mutabilis Cav. Ic.

- tripetala Cav. Ic.
undulata

EPILOBIUM

- angustifolium Encycl. }
angustissimum H. K. }
spicatum Encycl. }
angustifolium H. K. }
hirsutum Willd. sp.
pubescens Roth. Germ.
montanum L.
palustre L.

CIRCÉE

- des bois. F. ♀
des Alpes. ♀

LUDWIGIA

- à gros fruit. Virginie. ♀

III. Un style; une capsule; étamines en
nombre double des pétales.

JUSSIÉA

- à tige droite. Antilles. ☉

OENOTHÉRA

1. Capsules cylindriques.

- commun. F. ♂
à grandes fleurs. Am. s. ♂
à petites fleurs. Am. s. ♂
tuberculeux. Am. s. ♂
à long. fl. Buenos-Ayres. s. ch. ♂
velouté. Buenos-Ayres. s. ch. ♂
odorant. Magellan. ♂
noctiflore. cap. ☉
sinué. Am. s. or. ♂

2. Capsules anguleuses.

- à quatre ailes. N. Esp. s. ch. ♀
pourpre. Am. s. ☉
rose. Pérou. or. ♀
nain. Am. s. ♀

GAURA

- bisannuel. Am. s. ♂
arbrisseau. Antilles. s. ch. ♀
à fleurs changeantes. Mexiq.
s. ch. ♀
à trois pétales. or. ♀
ondulé. ♀

EPILOBIUM

- à feuilles étroites. F. ♀
à grappes. F. ♀ (orn.)
velu. F. ♀
pubescent. F. ♀
de montagne. F. ♀
des marais. F. ♀

tetragonum L.
 dodonæi Vill. Delph.
 alpinum L.

FUCHSIA

magellanica Encycl. }
 coccinea H. K. }
 lycioides Andr. Rep.

MENTZELIA

hispida Willd. sp. }
 aspera Cav. Ic. (non Lin.) }

ORDO VII.

MYRTI.

MELALEUCA

thymifolia Smith, Soc. L. }
 coronata Andr. Rep. }
 guidiæfolia Vent. Malm. }
 hypericifolia Smith, Soc. L.

myrtifolia Vent. Malm. }
 squarrosa Smith, Soc. L. }
 armillaris H. K. }
 ericæfolia Vent. Malm. }

stypelioides Smith, Soc. L.
 diosmæfolia Andr. Rep.
 gibbosa Labill. N. Holl.

linarifolia Smith, Soc. L. }
 metrosideros hyssopifolia }
 Cav. Ic.

neriifolia Andr. Rep.

LEPTOSPERMUM

scoparium Smith, Soc. L.
 ambiguum Smith, Soc. L.
 myrtifolium.

thea Willd. sp. }
 flavescens H. K. }
 melaleuca thea Sert. Hann. }

pubescens Willd. sp.
 juniperinum Smith, Soc. L.
 lanigerum Smith, Soc. L.

FABRICIA

lævigata Smith, Soc. L.

METROSIDEROS

saligna Smith, Soc. L.

tétragône. F. L
 de Dodoens. F. V
 des Alpes. V

FUCHSIA

écarlate. Chili. or. ♀ (orn.)
 à f. de Lycium. Ant. s. ch. ♀

MENTZÉLIA

hérissé. Mexique. s. ch. L

ORDRE VII.

MYRTES.

MÉLALÉUCA

à f. de Thym. N. Holl. or. ♀

à f. d'hypericum. N. Holl. or.
 ♀ (orn.)

à f. de Myrte. N. Holl. or. ♀

armillaire. N. Holl. or. ♀

à f. de Stypélia. N. Holl. or. ♀

à f. de Diosma. N. Holl. or. ♀
 gibbeux. N. Holl. or. ♀

à f. d'hysope. N. Holl. or. ♀

à f. de Nérium. N. Holl. or. ♀

LEPTOSPERMUM

de la N. Zélande. or. ♀

à long. étamines. N. Holl. or. ♀

à f. de Myrte. N. Holl. or. ♀

Théa. N. Holl. or. ♀

pubescent. N. Holl. or. ♀

à f. de Genévrier. N. Holl. or. ♀

laineux. N. Holl. or. ♀

FABRICIA

lisse. N. Holl. or. ♀

MÉTROSIDÉROS

à f. de saule. N. Holl. or. ♀

Iophanta Vent. H. cels. }
lanceolata Smith, Soc. L. }
glandulosa.
corifolia Vent. Malm.
pinifolia Wendl. collect.
linearis Smith, Soc. L. }
melaleuca linearis Sert. Hann. }
floribunda Vent. Malm.

lancéolé. N. Holl. or. ♀ (orn.)
glanduleux. N. Holl. or. ♀
à f. de coris. N. Holl. or. ♀
à f. de pin. N. Holl. or. ♀
à feuell. étroites. N. Holl. or. ♀
à fleurs nombr. N. Holl. or. ♀

EUCALYPTUS

robusta Smith, Soc. L. ?
oppositifolia.
obliqua L'Her. Sert.
amygdalina Will. N. Holl.
piperita H. K.
discolor.

EUCALYPTUS

gigantesque. N. Holl. or. ♀
à f. opposées. N. Holl. or. ♀
oblique. N. Holl. or. ♀
à f. d'Amancier. N. Holl. or. ♀
poivré. N. Holl. or. ♀
de deux couleurs. N. Holl. or. ♀

PSIDIUM

pyriferum L.
montanum Swartz. Prodr.

GOYAVIER

poire. Inde. or. ♀
de montagne. Ant. s. ch. ♀

MYRTUS

communis L.
 — *bœtica.*
 — *romana.*
 — *tarentina.*
 — *belgica.*
 — *mucronata.*
pimenta L.

MYRTE

commun. F. or. ♀ (orn. méd.)
 — *d'Andalousie.*
 — *romain.*
 — *de Tarente.*
 — *moyen.*
 — *pointu.*
pimento, tout-épice. Antilles. s. ch. ♀ (écon.)
cotonneux. Chine. s. ch. ♀
horizontal. Am. m. s. ch. ♀

tomentosa H. K.
horizontalis Vent. Malm.

EUGENIA

— *uniflora* L.
 — *jambos* L.
 — *malaccensis* L.
baruensis Jacq. Ic.

EUGÉNIA

à une fleur. Brésil. s. ch. ♀
Jamrose. Inde. s. ch. ♀
de Malaca. Inde. s. ch. ♀
de Baru. s. ch. ♀

CALYPTRANTHES

zuzygium Swartz. Prodr. }
myrtus zuzygium L. }

CALYPTRANTÈS

zuzygium. Antilles. s. ch. ♀

DECUMARIA

barbara L.

DÉCUMARIA

sarmenteux. Caroline. ♀

PUNICA

— *granatum* L.
 — *nanum.*
 — *flayum.*

GRENADIER

cultivé. Tunis. or. ♀ (écon.)
 — *nain.*
 — *jaune.*

X *Eugenia montana.*
 — *elliptica.*
 — *Mimusylen angustatum.*
 — *Splachnaceum.*

Eugenia des montagnes.
 — *elliptique.*

PHILADELPHUS
coronarius L.
— nanus.
inodorus L.

obtusum calycis lobis ovatis subrotundis

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

BLAKEA
trinervia L.

MELASTOMA
elæagnoides swartz. prodr.
cymosa willd. sp.

ORDO IX.

SALICARIÆ.

LAGERSTROEMIA
— indica L.

LAWSONIA
— { inermis L. }
— { spinosa L. }

LYTHRUM
salicaria L.
virgatum L.
hyssopifolia L.

CUPHEA
viscosissima Jacq. hort. }
lythrum cuphea L. f. }

ISNARDIA
palustris L.

GLAUX
maritima L.

PEPLIS
portula L.

ORDO X.

ROSACEÆ.

I. *Germen simplex inferum ; polystylum ;
pomum calycino limbo umbilicatum ;
multiloculare.*

MALUS
communis,

SERINGAT
odorant. F. ♀ (orn.)
— nain.
inodore, caroline. ♀ (orn.)

ORDRE VIII.

MÉLASTOMES.

BLAKÉA
à trois nervures. ant. s. ch. ♀

MÉLASTOME
à f. d'éléagnus. ant. s. ch. ♀
corymbifère. ant. s. ch. ♀

ORDRE IX.

SALICAIRES.

LAGERSTROÉMIA
des Indes. or. ♀ (orn.)

LAWSONIA
d'Orient. or. ♀ (orn. teint.)

SALICAIRE
commune. F. ♂ (orn.)
effilée. autriche. ♂ (orn.)
à feuilles d'hysope. F. ⊙

CUPHÉA
visqueux. Brésil. ⊙

ISNARDIA
des marais. F. ♀

GLAUX
maritime. F. ♀

PÉPLIS
aquatique. F. ⊙

ORDRE X.

ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère ; plusieurs styles ;
une pomme à plusieurs loges, terminée
par un ombilic couronné par le calice.

POMMIER
commun. F. ♀ (écon.)

— sylvestris.
— prasomila.
— paradisiaca.
— castanea.
— apiosa.

coronaria.

pyrus coronaria H. K. }

sempervirens. }

pyrus angustifolia H. K. }

hybrida. }

pyrus hybrida Willd. sp. }

baccata. }

pyrus baccata L. Mant. }

spectabilis. }

pyrus spectabilis H. K. }

japonica Andr. Rep.

PYRUS

communis L.

— pyraster.

— pompeiana.

— rufescens.

— liquescens.

polveria L. Mant.

sinai Thouin, Ann.

salicifolia L. f.

CYDONIA

vulgaris.

— lusitanica.

sinensis Thouin, Ann.

CRATÆGUS

torminalis L.

latifolia Encycl.

Aria L.

— longifolia.

chamæmespilus. }

humilis Encycl. }

arbutifolia Encycl.

glabra H. K.

pyrifolia Encycl.

spicata Encycl.

racemosa Encycl.

Amelanchier. }

rotundifolia Encycl. }

SORBUS

aucuparia L.

americana.

— sauvage.

— de reinette.

— de paradis.

— de châtaignier.

— d'apis.

odorant. Am. s. ♀

toujours vert. Am. s. ♀

hybride. ♀

baccifère. Sibérie. ♀

à bouquets. Chine. ♀ (orn.)

du Japon. ♀

POIRIER

commun. F. ♀ (écon.)

— sauvageon.

— Bon-chrétien.

— de rousselet.

— de beuré.

cotonneux. F. ♀

du mont Sinai. ♀

à feuilles de saule. Sibérie. ♀

COIGNASSIER

commun. F. ♀ (écon.)

— de Portugal.

de Chine. ♀

ALISIER

des bois. F. ♀ (écon.)

à larges feuilles. F. ♀

Allouchier. F. ♀

— à feuilles longues.

nain. Alpes. ♀

à f. d'arbousier. Am. s. ♀

glabre. Chine. or. ♀

à f. de poirier. Am. s. ♀

à épis. Am. s. ♀

à grappes. Am. s. ♀

Amelanchier. F. ♀

SORBIER

des oiseleurs. F. ♀ (orn.)

d'Amérique. Am. s. ♀ (orn.)

domestica L.
hybrida L.

cormier. F. ♪ (écon.)
de Laponie. ♪ (orn.)

MESPILUS

oxyacantha.
— plena.
— rubra.
monogyna Jacq. Austr.
azarolus.
— aronia.
sanguinea.
spathulata Mich. Fl.
tanacetifolia Encycl.
tomentosa L.
corallina. }
acerifolia Encycl. }
coccinea.
pyrifolia. }
cornifolia Encycl. }
linearis.
prunifolia Encycl.
crus-galli Encycl.
pyracantha L.
cotoneaster L.
germanica L.
— japonica Thunb. Jap.

NÉFLIER

aubépine. F. ♪ (orn.)
— double. (orn.)
— rose. (orn.)
monogyne. F. ♪
azerole. F. ♪ (écon.)
— d'Orient.
sanguin. Am. s. ♪
en spatule. Am. s. ♪
à f. de Tanaïsie. orient. ♪
cotonneux, pinchaw. Am. s. ♪
petit-corail. Am. s. ♪
écarlate. Am. s. ♪
à f. de poirier. Am. s. ♪
à feuilles étroites. Am. s. ♪
à f. de prunier. Am. s. ♪
pied-de-coq. Am. s. ♪
buisson-ardent. F. ♪ (orn.)
cotoneaster. F. ♪
cultivé. F. ♪
du Japon. ♪ (écon.)

II. Germina indefinita, calice urceolari
supra coarctato tecta, singula mono-
styla.

II. Ovaires indéfinis renfermés dans un
calice étranglé à son sommet, surmontés
chacun d'un style.

ROSA.

1. Fructibus subglobosis.

berberifolia Pall. Act. Petr.
eglanteria L. }
lutea H. K. }
— punicea.
sulphurea H. K.
spinosissima L.
scotica.
cinnamomea L.
arvensis L. Mant.
carolina L.
parviflora Willd. sp.
lucida Willd. sp.
villosa L.
— sinica.
kamtchatica Vent. ch. de P.

ROSIER.

1. Fruits presque ronds.

à une feuille. perse. or. ♪
églantier. Allem. ♪ (orn.)
— ponceau. (orn.)
jaune. orient. ♪ (orn.)
hérissé. F. ♪
d'Ecosse. ♪
cannelle. Alpes. ♪
des champs. ♪
de Caroline. ♪
à petites fleurs. Am. s. ♪
luisant. Am. s. ♪
velu. F. ♪
de Chine. ♪
du Kamtchatka. ♪

2. *Fructibus ovatis.*

- remensis.
 burgundiaca.
 damascena *Willd.* sp.
 centifolia *L.*
 — unguiculata.
 muscosa *H. K.*
 maxima.
 semperflorens (non *Willd.*) }
 sempervirens *H. K.* }
 turbinata *H. K.* }
 francofurtensis. }
 gallica *L.*
 bracteata *Vent. H. Cels.*
 alba *L.*
 collina *Jacq. Austr.*
 rubiginosa *L. Mant.*
 canina *L.*
 glauca.
 rubrifolia *Vill. Delph.* }
 alpina *L.*
 pendulina *L.*
 moschata *H. K.*
 — { diversifolia *Vent. H. Cels.* }
 { semperflorens *Jacq. H. Sch.* }
 sempervirens *L.*

III. *Germina plura definita (rarius unum), calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla; semina totidem.*

POTERIUM

- sanguisorba *L.*
 polygamum *Willd.* sp.
 hybridum *L.*
 ancistroides *Desf. Atl.*
 caudatum *H. K.*
 spinosum *L.*

SANGUISORBA.

- officinalis *L.*
 media *L.*
 canadensis *L.*

ANCISTRUM

- ascendens *Vahl, sp.*
 repens *Vent. H. Cels.*

WALDSTEINIA

- geoides *Willd.* sp.

2. Fruits ovales.

- de Champagne. ♪ (orn.)
 de Bourgogne. ♪ (orn.)
 de Damas. ♪ (orn.)
 à cent feuilles. (orn.)
 — onguiculé.
 mousseux. ♪ (orn.)
 de Hollande. ♪ (orn.)
 de tous les mois. ♪ (orn.)
 à gros calice. ♪ (orn.)
 de Provins. Eur. ♪ (orn. méd.)
 de Macartney. Chine. ♪ (orn.)
 blanc. Eur. ♪ (orn.)
 des collines. F. ♪
 odorant. F. ♪
 de chien. F. ♪
 glauque. Alpes. ♪
 des Alpes. ♪
 à fruit pendant. ♪
 musqué. Barbar. ♪ (orn. écon.)
 du Bengale. ♪ (orn.)
 toujours vert. Allem. ♪

III. Ovaires en nombre défini (rarement un seul), surmontés chacun d'un style, renfermés dans un calice étranglé au sommet; autant de graines.

PIMPRENELLE

- des jardins. F. ℥ (écon. méd.)
 polygame. Hongrie. ℥
 hybride. F. m. ℥
 à f. d'ancistrum. Alger. or. ♪
 à grappes. madère. or. ♪
 épineuse. orient. or. ♪

SANGUISORBE

- officinale. F. ℥ (écon.)
 moyenne. Am. s. ℥
 de Canada. ℥

ANCISTRUM

- à tige montante. magellan. ℥
 rampant. Pérou. or. ♪

WALDSTEINIA

- à f. de cérum. Hongrie. ℥

AGRIMONIA

- eupatoria L.
— alba.
— odorata.
repens L.
agrimonioides L.

CLIFFORTIA

- ilicifolia L.
tridentata Willd. sp.
ruscifolia L.

ALCHEMILLA

- vulgaris L.
hybrida L.
alpina L.
pentaphyllea L.
aphanes.
aphanes arvensis L. }

SIBBALDIA

- procumbens L.

IV. Germina indefinita supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla; semina totidem nuda aut rarius baccata.

TORMENTILLA

- erecta L.
reptans L.

POTENTILLA.

1. Foliis pinnatis.

- fruticosa L.
anserina L.
multifida L.
supina L.
bifurca L.
rupestris L.
pensylvanica L. Mant.

2. Foliis digitatis.

- recta L.
laciniosa Wald. et Kitt. Hung.
pedata Nester, pot.
obscura Marsch. cauc.
canescens Besser, fl. }
ascendens Vill. delph. }
recta Jacq. Austr. }

AIGREMOINE

- officinale. F. ψ (méd.)
— à fleurs blanches.
— odorante.
rampante. orient. ψ
à feuilles ternées. Italie. ψ

CLIFFORTIA

- à feuil. de houx. cap. or. ψ
à trois dents. cap. or. ψ
à f. de fragon. cap. or. ψ

ALCHÉMILLE

- commune. F. ψ (méd.)
hybride. Alpes. ψ
satinée. Alpes. ψ
à cinq feuilles. Alpes. ψ
perche-pierre. F. ○

SIBBALDIA

- couché. Alpes. ψ

IV. Ovaires supères et indéfinis, attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style; autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE

- droite. F. ψ
rampante. F. ψ

POTENTILLE.

1. Feuilles pennées.

- arbrisseau. Sibérie. ψ
Argentine. F. ψ
laciniée. F. ψ
couchée. F. ○
bifurquée. Sibérie. ψ
des rochers. Alpes. ψ
de Pensylvanie. ψ

2. Feuilles digitées.

- droite. Alpes. ψ
laciniée. Hongrie. ψ
en pédale. ψ
obscur. caucase. ψ

blanchâtre. F. ψ

hirta L.
 argentea L.
 verna L.
 alchimilloides Lapeyr. Fl.
 aurea L.
 intermedia L.
 incisa Nester, Pot.
 alba L.
 lupinoides Willd. sp. }
 valderia Vill. Delph. }
 caulescens L.

3. Foliis ternatis.

grandiflora L.
 monspeliensis L.
 norvegica L.
 parviflora.
 fragaria sterilis Willd. sp. }
 emarginata. }
 vaillantii Nester, Pot. }

FRAGARIA

vesca L.
 — monophylla Willd. sp.
 — efflagellis.
 — semperflorens.
 — moschata.
 — nigra.
 — viridis.
 — virginiana Willd. sp.
 — chilensis Willd. sp.
 — ananassa.

COMARUM

palustre L.

GEUM

urbanum L.
 virginianum L.
 album Willd. Enum. }
 canadense Jacq. Hort. }
 canadense Murr. Goett. }
 strictum Willd. sp. }
 alepicum Jacq. Ic. }
 rivale L.
 nutans Encycl.
 pyrenaicum Willd. sp.
 montanum L.
 reptans L.

hérissée. F. m. ℥
 argentée. F. ℥
 printanière. F. ℥
 à f. d'Alchimille. Pyrénées. ℥
 dorée. Alpes. ℥
 moyenne. Alpes. ℥
 incisée. ℥
 blanche. Alpes. ℥
 à feuilles de Lupin. Alpes. ℥
 montante. F. ℥

3. Feuilles ternées.

à grandes fleurs. Alpes. ℥
 de Montpellier. ℥
 de Norvège. ℥
 à petites fleurs. F. ℥
 échancrée. F. ℥

FRAISIER

des bois. F. ℥ (écon. méd.)
 — à une feuille.
 — sans coulans.
 — de tous les mois.
 — capiton.
 — noir.
 — vert.
 — de Virginie.
 — du Chili.
 — ananas.

COMARUM

des marais. F. ℥

BENOITE

officinale. F. ℥ (méd.)
 de Virginie. ℥
 à fleurs blanches. Am. s. ℥
 de Canada. ℥
 des ruisseaux. Alpes. ℥
 penchée. F. ℥
 des Pyrénées. ℥
 de montagne. Alpes. ℥
 rampante. Alpes. ℥

DRYAS

octopetala L.

RUBUS.

1. Fruticosi.

idæus L.

occidentalis L.

villosus H. K. }

vulpinus. }

fruticosus L.

— inermis.

laciniatus Willd. H. Ber.

— rosæfolius Smith, 1c.

cæsius L.

— crispus.

odoratus L.

2. Herbacei.

saxatilis L.

arcticus L.

chamæmorus L.

V. Germina plura supera definita; capsulæ
totidem mono aut polyspermæ.

SPIRÆA.

1. Herbaceæ.

Filipendula L.

aruncus L.

ulmaria L.

lobata s. Veg.

trifoliata L.

2. Fruticosæ.

sorbifolia L.

salicifolia L.

lævigata L.

tomentosa L.

hypericifolia L.

crenata L.

chamædrifolia L.

opulifolia L.

— lanceolata.

VI. Germen 1 monostylum; nux mono aut
disperma, nuda vel drupacea.

PRUNUS.

1. Cerasi. Nucleo subrotundo.

caroliniana H. K.

DRYAS

à huit pétales. Alpes. ♀

RONCE.

1. Tiges ligneuses.

Framboisier. F. ♀ (écon.)

d'Occident. Am. s. ♀ (écon.)

velue. Am. s. ♀

des haies. F. ♀ (écon. méd.)

— sans épines.

laciniée. ♀

à f. pennées. île de F. s. ch. ♀

à fruit bleu. F. ♀ (écon.)

— crépue.

odorante. Am. s. ♀

2. Tiges herbacées.

des rochers. F. ♂

du Nord. suède. ♀ (écon.)

des marais. suède. ♂ (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini; au-
tant de capsules renfermant une ou plu-
sieurs graines.

SPIRÆA.

1. Tige herbacée.

Filipendule. F. ♀ (orn.)

à grappes. F. ♀ (orn.)

ulmaire. F. ♂

à feuilles lobées. Am. s. ♂

à trois folioles. Am. s. ♀ (orn.)

2. Tiges ligneuses.

à f. de sorbier. sibér. ♀ (orn.)

à f. de saule. sibér. ♀ (orn.)

à feuilles lisses. sibérie. ♀

cotonneux. Am. s. ♀ (orn.)

à f. d'hypericum. F. ♀ (orn.)

à feuilles crénelées. sibérie. ♀

à f. de chamédrys. sibér. ♀

à f. d'obier. Am. s. ♀ (orn.)

— lanceolata.

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style;
une noix nue ou recouverte d'une pulpe,
renfermant 1-2 graines.

PRUNIER.

1. Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. or. ♀

Laurocerasus L.

lusitanica L.

padus L.

— rubra.

virginiana L.

serotina Willd. sp.

pumila L. Mant.

chamæcerasus Jacq. ic.

mahaleb L.

semperflorens Willd. sp. }

serotina Roth. cat. }

cerasus L.

— nana.

— ruberrima.

— suavissima.

— juliana.

avium L.

— sylvestris.

— nigra.

— bigarella.

persicifolia.

2. Pruni. Nucleo ovato, subcompresso.

spinosa L.

sinensis.

Amygdalus pumila L. }

prostrata Bill. Dec. }

insititia L.

brigantiaca Vill. Delph.

domestica L.

— cerea.

— cereola.

— damascena.

— hungarica.

— claudiana.

myrobalana. }

cerasifera Willd. sp. }

hiemalis Mich. Fl.

3. Armeniacæ. Nucleo orbiculari, compresso.

Armeniaca L.

— dulcis.

— nigra.

— macrocarpa.

AMYGDALUS

persica L.

Laurier-cerise. F. ♪ (orn. vén.)

Azarero. Portugal. ♪ (orn.)

à grappes. F. ♪ (orn.)

— à fruit rouge.

de Virginie. ♪ (orn.)

tardif, Virginie. ♪

Ragouminier. Am. s. ♪

chamæcerasus. Austr. ♪

Mahaleb. F. ♪ (orn.)

de la Toussaint. ♪

cerisier. F. ♪ (écon.)

— nain.

— de Montmorenci.

— royal ou chériduc.

— Guignier à fruit noir.

Merisier. F. ♪ (écon.)

— des bois à fruit rouge.

— à fruit noir.

— Bigarotier.

à feuilles de pêcher. ♪

2. Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.

épineux ou Prunellier. F. ♪

de Chine. ♪ (orn.)

couché, orient. ♪

sauvage. F. ♪

de Briançon. ♪

cultivé. F. (écon.)

— de Sainte-Catherine.

— de mirabelle.

— de Damas.

— de Damas noir.

— de reine Claude.

de myrobolan. Am. s. ♪ (écon.)

d'hiver. Am. s. ♪

3. Abricotiers. Noyau orbiculaire, comprimé.

Abricotier, orient. ♪ (écon.)

— Alberge.

— à fruit noir.

— pêche.

AMANDIER

Pêcher, perse. ♪ (écon.)

communis L.

— plena.

— amara.

nana L.

georgica.

orientalis H. K. }

argentea Encycl. }

cultivé. Asie. ♪ (écon.)

— double. (orn.)

— amer. (vénéen.)

nain. sibérie. ♪ (orn.)

de Géorgie. ♪

satiné. Perse. ♪

CALYCANTHUS

floridus L.

lævigatus Willd. Enum. }

ferax Mich. Fl. }

præcox L.

CALYCANTHUS

de Virginie. ♪ (orn.)

à feuilles lisses. Am. s. ♪

du Japon. ♪ (orn.)

BLACKWELLIA

— axillaris Lamk, ill. vel *Blackwellia ovata* axillaire. Ile de F. s. ch. ♪

BLACKWELLIA

HOMALIUM

racemosum Jacq. Am.

à grappes. Antilles. s. ch. ♪

HOMALIUM

ORDO XI.

ORDRE XI.

N^o 7.

LEGUMINOSÆ.

LÉGUMINEUSES.

I. Corolla regularis, quandoque nulla; stamina distincta.

I. Corolle régulière, quelquefois nulle; étamines distinctes.

ACACIA.

ACACIE.

1. Foliis simplicibus.

1. Feuilles simples.

verticillata Willd. sp.

verticillée. N. Holl. or. ♪

juniperina Willd. sp.

à f. de Genévrier. N. Holl. or. ♪

linifolia Willd. sp.

à f. de Lin. N. Holl. or. ♪

floribunda Willd. sp.

à fl. nombr. N. Holl. or. ♪

sophoræ Bill. N. Holl. ?

sophora. N. Holl. or. ♪

obliqua Wendl. obs. }

oblique. N. Holl. or. ♪

falcata Willd. sp. }

dodonæifolia Pers. syn.

à f. de dodonée. N. Holl. or. ♪

longifolia Willd. sp.

à long. feuell. N. Holl. or. ♪

suaveolens Willd. sp.

triangulaire. N. Holl. or. ♪

stricta Willd. sp.

ramassée. N. Holl. or. ♪

latifolia. }

melanoxydon H. K. }

à larges feuell. N. Holl. or. ♪

paradoxa Dec. cat.

ondulée. s. ch. ♪

armata H. K.

épineuse. N. Holl. or. ♪

2. Foliis conjugatis simulque pinnatis.

2. Feuilles conjuguées et pennées.

pulchella H. K.

élégante. N. Holl. or. ♪

strombulifera Willd. sp.

tire-bouchon. Pérou. s. ch. ♪

coronillæfolia.

à feuilles de coronille. s. ch. ♪

furcata.

bifurquée. s. ch. ♪

3. *Foliis duplicato-pinnatis.*a. *Aculeata aculeis sparsis.*

sarmentosa.
 uncinella.
 trinervia.
 ceratonia willd. sp.
 rhodacantha.

b. *Spinosa; spinis axillaribus.*

juliflora willd. sp.
 guayaquilensis.
 mauroceana.
 senegal willd. sp.
 nilotica. }
 vera willd. sp. }
 indica.

— farnesiana willd. sp.

— eburnea willd. sp.

cornigera willd. sp.

c. *Inermes.*

muricata willd. sp.
 portoricensis willd. sp.

— { leucocephala.
 mimosa leucocephala *encycl.* }

lophantha willd. sp.

arborea willd. sp.

mimosa filicifolia *encycl.* }

tetragona willd. sp.

julibrisin willd. sp.

decurrens willd. sp.

peregrina willd. sp. }

angustifolia *encycl.* }

— Lebbek willd. sp. dit mimosa lebbek.

trichodes willd. sp.

scandens willd. sp.

botrycephala. }

discolor willd. sp. }

lentiscifolia.

— { angustisiliqua.
 desmantis virgatus willd. sp. }

pubescens. }

mimosa pubescens *vent.* }*Malm.*

glandulosa willd. sp.

punctata. }

desmantis punctatus willd. }

sp.

3. Feuilles deux fois pennées.

a. *Aiguillons épars.*

sarmenteuse. s. ch. 5
 à crochets. s. ch. 5
 à trois nervures. s. ch. 5
 à f. de caroubier. Ant. s. ch. 5
 à épines de rosier. s. ch. 5

b. *Épineuses; épines axillaires.*

à chatons. Jamaïque. s. ch. 5
 de Guayaquil. s. ch. 5
 de Maroc. s. ch. 5
 Sénégal. Afr. s. ch. 5
 du Nil. s. ch. 5

de l'Inde. s. ch. 5
 de Farnèse. s. ch. 5
 à épines blanches. s. ch. 5
 à grosses épines. s. ch. 5

c. *Tiges sans épines.*

tuberculeuse. Antilles. s. ch. 5
 de Porto-Rico. s. ch. 5

à tête blanche. Ant. s. ch. 5

en panache. N. Holl. or. 5

en arbre. Antilles. s. ch. 5

tétragone. Caracas. s. ch. 5

arbre de soie. 5 (orn.)

décurrente. N. Holl. or. 5

à f. étroites. Antilles. s. ch. 5

Lebbek. Inde. s. ch. 5

barbue. Pérou. s. ch. 5

grimpante. Inde. s. ch. 5

à grappes. N. Holl. or. 5

à feuil. de lentisque. Mexiq.
s. ch. 5

à gousses étroites. Ant. s. ch. 5

pubescente. s. ch. 5

glanduleuse. Am. s. or. 5

ponctuée. Antilles. s. ch. 5

lycopodioides.
lacustris.
desmantus lacustris willd. }
sp. }

à f. de tycopode. s. ch. ♀
aquatique. Mexique. s. ch. ♂

MIMOSA
sensitiva L.
pudica L.
asperata L.

SENSITIVE
sensible. Brésil. s. ch. ♀
commune. Antilles. ☉
rude. Antilles. s. ch. ♀

SCHRANKIA
uncinata willd. sp. }
mimosa horridula Mich. Fl. }

SCHRANKIA
hérissé. Am. s. or. ♀

INGA
— { vera willd. sp. } vel Dulcis.
mimosa inga L. }
punctata willd. sp. }
mimosa fagifolia Jacq. Am. ? }
unguis-cati willd. sp. }
foetida willd. sp. }
mimosa foetida Jacq. Fragm. }

INGA
ailé. Antilles. s. ch. ♀
ponctué. Antilles. s. ch. ♀
ongle-de-chat. Ant. s. ch. ♀
fétide. Mexique. s. ch. ♀

GLEDITSIA
triacanthos L.
— lævis.
monosperma H. K. }
caroliniensis Encycl. }
sinensis Encycl. }
ferox.
caspica.

FÉVIER
à trois pointes. Am. s. ♀ (orn.)
— sans épines.
monosperme. Am. s. ♀
de Chine. ♀
à grosses épines. Chine. ♀
de la mer Caspienne. ♀

GYMNOCLADUS
canadensis Encycl. }
guilandina dioica L. }

GYMNOCLADUS
de Canada. ♀ (orn.)

CERATONIA
siliqua L.

CAROUBIER
commun. F. m. ♀ (écon.)

TAMARINDUS
— indica L.

TAMARINIER
des Indes. s. ch. ♀ (méd.)

PARKINSONIA
— aculeata L.

PARKINSONIA
épineux. Antilles. s. ch. ♀

SCHOTIA
speciosa Jacq. Ic. }
guaiacum afrum L. }

SCHOTIA
écarlate. Cap. or. ♀

CASSIA
thora L.
— bicapsularis L.
viminea L.

CASSE
à fruit grêle. Antilles. ☉
à deux loges. Ant. s. ch. ♀
sarmenteuse. Ant. s. ch. ♀

— pulchella.
— javanica.

élégant.
de Java. 14

- akata L.
 corymbosa *encycl.*
 falcata L. ?
 — occidentalis L.
 stipulacea H. K.
 fistula L.
 latifolia.
 atomaria *willd. sp. ?* }
 grandiflora.
 corymbosa *ortega, dec.* }
 biflora L.
 tomentosa L. f.
 brasiliana *encycl.*
 hirsuta L.
 glandulosa L.
 — chamæcrista L.
 marylandica L.
- SPANDONCEA
 tamarindifolia *desf. dec. phil.* }
 cadia purpurea *forsk. ægypt.* }
- HOFFMANSEGGIA
 falcaria *cav. ic.* }
 larrea glauca *ortega, dec.* }
- MORINGA
 — { nux-ben. vel. *Saniculato.* }
 { guilandina *moringa L.* }
 { hyperanthera *moringa vahl,* }
 { *ymb.* }
- HÆMATOXYLUM
 — campechianum L.
- ADENANTHERA
 — pavonina L.
- POINCIANA
 — { pulcherrima L. }
 { cæsalpinia pulcherrima }
 { *swartz. obs.* }
- CÆSALPINIA
 — sappan L.
 bahamensis *encycl.*
 vesicaria *encycl.*
 — paniculata.
- GUILANDINA
 — bonduc L.
 bonducella.
- ailée. Antilles. s. ch. ☽
 corymbifere. Brésil. or. ☽
 falciforme. Antilles. ☉
 puante. Ant. s. ch. ☽ (méd.)
 à grand. stipules. Chili. s. ch. ☽
 des boutiques. Inde. s. ch. ☽
 à larges feuell. Ant. s. ch. ☽
 à grandes fl. Mexiq. s. ch. ☽
 à deux fleurs. Ant. s. ch. ☽
 cotonneuse. Chili. s. ch. ☽
 du Brésil. s. ch. ☽
 velue. Antilles. s. ch. ☽
 glanduleuse. Antilles. ☉
 chamæcrista. Antilles. ☉
 de Maryland. ☾
- SPANDONCÉA
 à f. de tamarin. Afr. s. ch. ☽
- HOFFMANSEGGIA
 falciforme. Pérou. ☾
- MORINGA
 noix-de-ben. Indes. s. ch. ☽
 (écon. méd.) *Sanicule,*
- CAMPÉCHE
 commun. Ant. s. ch. ☽ (teint.)
- ADÉNANTHÉRA
 glabre. Inde. s. ch. ☽
- POINCILLADE
 élégante. Inde. s. ch. ☽ (orn.)
- CÆSALPINIA
 sappan. Inde. s. ch. ☽ (arts.)
 de Bahama. s. ch. ☽
 vésiculeux. Antilles. s. ch. ☽
 paniculé. s. ch. ☽
- QUENIQUIER
 bonduc. Inde. s. ch. ☽
 sarmenteux. Inde. s. ch. ☽

HYMENÆA

courbaril L.

BAUHINIA

divaricata *Encycl.* (non *Lin.*)

porrecta H. K.

— tomentosa *Encycl.*

aculeata L.

rufescens *Encycl.*

II. Corolla papilionacea; stamina distincta; legumen uniloculare bivalve.

CERCIS

siliquastrum L.

canadensis L.

ANAGYRIS

foetida L.

SOPHORA

alopecuroides L.

flavescens H. K.

occidentalis Swartz.

japonica L. Mant.

microphylla H. K.

tetraptera H. K.

PODALYRIA

capensis Willd. sp. }

sophora capensis L. Mant. }

aurea Willd. sp. }

virgilia aurea *Encycl.* }

robinia subdecandra L'Her. stirp. }

genistoides Willd. sp. }

sophora genistoides L. }

australis Willd. sp. }

sophora australis S. Veg. }

tinctoria Willd. sp. }

sophora tinctoria L. }

alba Willd. sp. }

sophora alba S. Veg. }

lupinoides Willd. sp. }

sophora lupinoides L. }

cuneifolia Vent. H. Cels.

biflora *Encycl.*

styracifolia Bot. Magaz.

VIRGILIA

lutea Mich. Arbr.

HYMÉNÉA

courbaril. cayenne. s. ch. ♀

BAUHINIA

divergent. s. ch. ♀

allongé. Antilles. s. ch. ♀

cotonneux. inde. s. ch. ♀

épineux. Antilles. s. ch. ♀

à petites f. île de F. s. ch. ♀

II. Corolle papilionacée; étamines distinctes; gousse bivalve à une loge.

GAINIER

de Judée. orient. ♀ (orn.)

de Canada. ♀ (orn.)

ANAGYRIS

fétide. F. m. or. ♀

SOPHORA

queue-de-renard. orient. ♂

jaune. sibérie. ♂

d'Occident. Antilles. s. ch. ♀

du Japon. ♀ (orn.)

à petites f. N. Holl. or. ♀

à quatre ailes. N. zél. or. ♀

PODALYRIA

du Cap. or. ♀

à fl. jaune. Abyssinie. s. ch. ♀

génistoïde. cap. or. ♀

de Caroline. ♂

des teinturiers. Am. s. ♂ (teint.)

à fleurs blanches. caroline. ♂

à f. de Lupin. kamtchatka. ♂

cunéiforme. cap. or. ♀

à deux fleurs. cap. or. ♀

à f. de styrax. cap or. ♀

VIRGILIA

à bois jaune. Am. s. ♀

CHORIZEMA
nana H. K.

VIMINARIA
denudata H. K.
daviesia denudata Vent.
choix de pl. }

SPHÆROLOBIUM
vibineum H. K.

OXYLOBIUM
cordifolium Andr. rep.

EUTAXIA
myrtifolia H. K.
dilwinia obovata Bill. N.
holl. }

CALLISTACHYS
lanceolata Vent. Malm.
elliptica Vent. Malm.

III. Corolla papilionacea ; stamina 10
mona aut diadelpha ; legumen unilocu-
lare , bivalve.

ULEX
europæus L.
minor Rhot. cat. }
nanus Smith, Fl. }

PLATYLOBIUM
formosum Smith, N. Holl. spec.
scolopendrium Andr. rep. }
bossiæa scolopendrium H. K. }

BORBONIA
crenata L.

GENISTA.

1. Spinosa.

anglica L.
germanica L.
hispanica L.

2. Inermes.

pilosa L.
sagittalis L.
tinctoria L.
sibirica L. Mant.
canariensis L.

CHORIZÉMA
nain. N. Holl. or. 5

VIMINARIA
dénudé. N. Holl. or. 5

SPHÉROLOBIUM
à tige grêle. N. Holl. or. 5

OXYLOBIUM
à f. en cœur. N. Holl. or. 5

EUTAXIA
à f. de Myrte. N. Holl. or. 5

CALLISTACHYS
lancéolé. N. Holl. or. 5
elliptique. N. Holl. or. 5

III. Corolle papilionacée ; 10 étamines mo-
nadelphes ou diadelphes ; gousse bivalve,
à une loge.

AJONC
marin. F. 5 (écon.)
petit. F. 5

PLATYLOBIUM
élégant. N. Holl. or. 5
ailé. N. Holl. or. 5

BORBONIA
crénelé. cap. or. 5

GENET.

1. Tiges épineuses.

d'Angleterre. F. 5
d'Allemagne. F. 5
d'Espagne. 5

2. Tiges sans épines.

tuberculeux. F. 5
ailé. F. 5
des teinturiers. F. 5
de Sibérie. 5
des Canaries. or. 5

candicans L.
 juncea.
 spartium junceum L. }

SPARTIUM.

1. Inermia.

sphærocarpon L.
 monospermum L.
 cinereum Willd. sp. }
 genista scoparia Vill. Delph. }
 album Desf. Atl. }
 multiflorum L'Her. stirp. }
 genista alba Encycl. }
 multicaule. }
 genista multicaulis Encycl. }
 purgans L.
 scoparium L.
 triquetrum. }
 genista triquetra Willd. sp. }
 nubigenum H. K. }
 fragrans Encycl. }
 patens s. Veg. }
 cytisus pendulinus L. f. }
 virgatum H. K.
 parviflorum Vent. H. cels.
 radiatum L.
 umbellatum Desf. Atl.
 linifolium Desf. Atl. }
 genista linifolia L. }

2. Spinosa.

horridum Vahl, symb.
 aspalatoides Desf. Atl.
 ferox Desf. Atl.
 — scorpius L.
 spinosum L.
 lanigerum Desf. Atl.
 creticum.
 aspalatus cretica L. ? }

CYTISUS

sessilifolius L.
 nigricans L.
 Laburnum L.
 — latifolium.
 — cajan L. Vell. Cajanus bicolor.
 — ~~luteum~~ luteum.
 hirsutus L.

blanchâtre. F. m. or. ♪
 jonciforme. F. m. ♪ (orn. écon.)

SPARTIUM.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. Barbarie. or. ♪
 monosperme. F. m. or. ♪
 cendré. F. ♪
 à fleurs blanches. Alger. or. ♪
 à tiges nombr. Mahon. or. ♪
 purgatif. F. ♪
 à balais. F. ♪ (écon.)
 triangulaire. Esp. or. ♪
 odorant. canaries. or. ♪
 étalé. F. m. or. ♪
 effilé. F. m. or. ♪
 à petites fleurs. orient. or. ♪
 à rayons. Italie. or. ♪
 ombellifère. Alger. or. ♪
 à feuilles de Lin. Alger. or. ♪

2. Tige épineuse.

hérissé. F. ♪
 aspalat. Alger. or. ♪
 à grosses épines. Alger. or. ♪
 scorpius. F. m. or. ♪
 épineux. F. m. or. ♪
 laineux. Alger. or. ♪
 de Crète. or. ♪

CYTISE

à f. sessiles. Esp. ♪ (orn.)
 noirci. F. ♪ (orn.)
 faux ébénier. F. ♪ (orn.)
 — à larges feuilles.
 cajan ou pois d'Angole. Ant. ambro.
 s. ch. ♪
 velu. F. m. ♪

anagyrius *L'her. stirp.*
austriacus *L.*
divaricatus *L'her. stirp.* }
spartium complicatum *L.* }
leucanthus willd. ?
proliferus *L. f.*
foliolosus *L'her. stirp.*
triflorus *L'her. stirp.*
biflorus *L'her. stirp.*
supinus *s. veg.*
argenteus *L.*
volgaricus *L. f.* }
pinnatus *Pallas, Ross.* }

CROTALARIA.

1. *Foliis ternatis.*

arborescens *Encycl.* }
incanescens *L. f.* }
incana *L.*
purpurascens *Encycl.*
purpurea *Vent. Malm.*

2. *Foliis simplicibus.*

sagittalis *L.*
juncea *L.*
semperflorens *Vent. H. cels.*
retusa *L.*
benghalensis *Encycl.*
verrucosa *L.* }
angulosa *Encycl.* }
cœrulea *Jacq. Ic.* }
styracifolia.

GOODIA

lotifolia *Bot. Mag.*

RAFNIA

retusa *Vent. Malm.* }
templetonia retusa *H. K.* }

LUPINUS

varius *L.*
angustifolius *L.*
luteus *L.*

ONONIS.

1. *Flores purpurei aut albi.*

antiquorum *L.*
spinosa *L.*
arvensis *s. veg.* }
hircina *Willd. sp.* }

Anagyris. *esp. or. ♀*
d'Autriche. ♀

étalé. *F.* ♀

à fleurs blanches. *Hongrie.* ♀

prolifère. *canaries. or.* ♀

feuillu. *canaries. or.* ♀

à fleurs ternées. *F. m. or.* ♀

à deux fleurs. *Hongrie.* ♀

couché. *F.* ♀

argenté. *F.* ♀

du Volga. ♀

CROTALAIRE.

1. *Feuilles ternées.*

en arbre. *île de F. s. ch.* ♀ (orn.)

blanche. *Antilles.* ⊙

rougêtre. *île de F.* ⊙

pourpre. *cap. or.* ♀

2. *Feuilles simples.*

sagittée. *Brésil.* ⊙

jonciforme. *Inde.* ⊙

toujours fleurie. *Inde. s. ch.* ♀

émoussée. *Inde. s. ch.* ⊙

du Bengale. ⊙

tuberculeuse. *Inde.* ⊙

à feuilles de styrax. *s. ch.* ♂

GOODIA

à f. de Lotier. *N. Holl. or.* ♀

RAFNIA

émoussé. *N. Holl. or.* ♀

LUPIN

bigarré. *F. m.* ⊙ (orn.)

à feuilles étroites. *F.* ⊙

jaune. *Alger.* ⊙ (orn.)

ONONIS.

1. *Fleurs rouges ou blanches.*

Arrête-bœuf. *F. ℥* (méd.)

épineux. *F. ℥*

des champs. *F. ℥*

altissima *encycl.*
 mitissima *L.*
 cenisia *L. Mant.*
 alopecuroides *L.*
 cherleri *L.*
 rotundifolia *L.*
 fruticosa *L.*
 tridentata *L.*
 hirta.

2. Flores lutei.

viscosa *L.*
 natrix *L.*
 parviflora *encycl.*
 minutissima *Jacq. (non L.)*
 columnæ *All. ped.*
 subocculta *Vill. delph.*

ARACHIS

— hypogea *L.*

EBENUS

cretica *L.*

ANTHYLLIS.

1. Fruticosa.

barba-jovis *L.*
 cytisoides *L.*
 hermanniæ *L.*
 erinacea *L.*

2. Herbacea.

cornicina *L.*
 montana *L.*
 tetraphylla *L.*
 vulneraria *L.*
 — purpurascens.

DALEA

violacea.
 petalostemum violaceum }
Mich. Fl.
 candida.
 petalostemum candidum }
Mich. Fl.
 linnæi *Mich. Fl.*

PSORALEA

pinnata *L.*

élevé. *Allem. ℥*
 à fleurs serrées. *F. m. ℥*
 du mont Cénis. *℥*
 queue-de-renard. *Esp. ⊙*
 de Cherler. *F. m. ℥*
 à feuilles rondes. *Alpes. ℥*
 arbrisseau. *Alpes. ♀ (orn.)*
 à trois dents. *Esp. or. ♀*
 hérissé. *orient. or. ℥*

2. Fleurs jaunes.

visqueux. *F. m. ⊙*
 natrix. *F. ℥*

à petites fleurs. *F. ♂*

ARACHIS

pistache-de-terre. *Antilles. ⊙*
 (écon.)

EBENUS

de Crète. *or. ♀*

ANTHYLLIS.

1. Tiges ligneuses.

satiné. *orient. or. ♀*
 à fleurs de cytise. *F. m. or. ♀*
 d'Orient. *or. ♀*
 épineux. *Esp. or. ♀*

2. Tiges herbacées.

cornu. *Esp. ⊙*
 de montagne. *F. ℥*
 à quatre feuilles. *F. m. ⊙*
 vulnérable. *F. ℥*
 — pourpre.

DALÉA

violet. *Am. s. or. ℥*

blanc. *Am. s. or. ℥*

de Linné. *Am. s. ℥*

PSORALÉA

à feuilles pennées. *cap. or. ♀*

odoratissima Jacq. H. Sch.
 verrucosa Willd. sp. }
 angustifolia Jacq. H. Sch. }
 aphylla L. Mant.
 bituminosa L.
 palestina Gouan, Ill.
 pubescens Pers. syn.
 glandulosa L.
 americana L.
 bracteata L. Mant.
 corylifolia L.

— MELILOTUS

cœrulea.
 indica.
 — minor.
 officinalis.
 alba.
 dentata.
 trifolium dentatum Wald. }
 et Kitt. }
 polonica.
 italica.
 cretica.
 messanensis.
 sulcata Desf. Atl.
 ornithopodioides. }
 Trigonella ornithopodioides }
 Dec. Fl. }

TRIFOLIUM.

1. *Lotoidea. Leguminibus tectis, polyspermis.*
 lupinaster L.
 strictum L.
 angulatum Wald. et Kitt. Hung.
 vaillantii Encycl.
 michelianum Savi, Itin.
 repens L.
 — alpinum L.
 involucreatum Willd. sp.
 2. *Lagopoidea. Calicibus villosis.*
 subterraneum L.
 cherleri L.
 lappaceum L.
 rubens L.
 pratense L.
 diffusum Wald. et Kitt. Hung.

odorant. cap. or. ♀
 tuberculeux. cap. or. ♀
 sans feuilles. cap. or. ♀
 bitumineux. F. m. or. ♀
 de Palestine. or. ♀
 pubescent. or. ♀
 glanduleux. Pérou. or. ♀
 d'Amérique. s. ch. ♀
 à grandes bractées. cap. or. ♀
 à feuell. de Noisetier. inde. ⊙

MÉLILOT

bleu. Bohême. ⊙ (écon.)
 des Indes. ⊙
 — petit.
 officinal. F. ♀ (méd. econ.)
 blanc. Sibérie. ♂ (écon.)
 denté. Hongrie. ⊙
 de Pologne. ⊙
 d'Italie. ⊙
 de Crète. ⊙
 de Messine. ⊙
 sillonné. Alger. ⊙
 pied-d'oiseau. F. ⊙

TRÈFLE.

1. *Lotoïdes. Gousses polyspermes, recouvertes par le calice.*
 à feuilles de lupin. Sibérie. ♀
 serré. F. ⊙
 anguleux. Hongrie. ⊙
 de Vaillant. F. ♀
 de Micheli. Italie. ♀
 rampant. F. ♀
 des Alpes. ♀
 à involucre. ♀
 2. *Lagopodes. Calices velus.*
 souterrain. F. ⊙
 de Cherler. F. m. ⊙
 Bardane. F. ⊙
 rouge. F. ♀ (écon.)
 des prés. F. ♀ (écon.)
 étalé. Hongrie. ♂

bracteatum *Willd. Enum.*
 alpestre *L.*
 flexuosum *Jacq. Fl. Austr.* }
 medium *Willd. sp.* }
 pictum *Roth. Cat.*
 pannonicum *L. Mant.*
 ochroleucum *s. Veg.*
 pallidum *Wald. et Kitt. Hung.*
 squarrosum *L.*
 incarnatum *L.*
 — pallidum.
 angustifolium *L.*
 arvense *L.*
 gracile *Thuil. Fl.*
 ligusticum *Savi Itin.*
 maritimum *Willd. sp.*
 stellatum *L.*
 clypeatum *L.*
 alexandrinum *L.*
 scabrum *L.*
 glomeratum *L.*
 parviflorum *Willd. sp.*
 striatum *L.*
 suffocatum *L. Mant.*
 albidum *Willd. sp.*

3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*

spumosum *L.*
 tomentosum *L.*
 fragiferum *L.*
 resupinatum *L.*

4. *Lupulina. Vexillis corollae inflexis.*

montanum *L.*
 agrarium *Willd. sp.* }
 aureum *Pollich. Palat.* }
 spadiceum *L.*
 procumbens *Smith, Fl.*
 filiforme *Smith, Fl.*

MEDICAGO.

1. *Leguminibus lunatis.*

arborea *L.*
 radiata *L.*
 circinata *L.*
 sativa *L.*
 falcata *L.*
 lupulina *L.*

à grandes bractées. Maroc. ☉
 à deux têtes. Alpes. ☿

tortueux. Alpes. ☿

tacheté. ☉

de Hongrie. ☿

jaunâtre. F. ☿

pâle. Hongrie. ☉

hérissé. F. ☉

incarnat. F. ☉

— pâle.

à feuilles étroites. F. ☉

des champs. F. ☉

grêle. F. ☉

d'Italie. ☉

maritime. Angleterre. ☉

étoilé. F. m. ☉

bouclier. orient. ☉

d'Alexandrie. ☉

rude. F. ☉

aggloméré. F. ☉

à petites fleurs. Hongrie. ☉

strié. F. ☉

nain. F. m. ☉

blanc. ☉

3. *Vésiculeux. Calices renflés.*

écumeux. F. ☉

cotonneux. F. ☉

Fraise. F. ☿

renversé. F. ☉

4. *Lupulins. Étendard de la corolle abaissé.*

de montagne. F. ☿

agraire. F. ☉

brun. F. ☉

tombant. F. ☉

filiforme. F. ☉

LUSERNE.

1. *Gousses falciformes.*

en arbre. orient. or. ♀

radiée. Italie. ☉

pennée. Italie. ☉

cultivée. ☿ (écon.)

falciforme. F. ☿

des prés. F. ♂

2. *Leguminibus cochleatis.*

prostrata *L. f.*
 glutinosa *Marsch. cauc.*
 marina *L.*
 orbicularis *L.*
 tornata *L.*
 — minor.
 elegans *Willd. sp.*
 tuberculata *Willd. sp.*
 aculeata *Willd. sp.*
 rigidula *L.*
 intertexta *L.*
 globulifera.
 tribuloides *Encycl.*
 murex *Willd. sp.*
 ciliaris *L.*
 maculata *Willd. sp.* }
 arabica *L.* }
 distans.
 coronata *L.*
 denticulata *Willd. sp.*
 apiculata *Willd. sp.*
 minima *L.*
 laciniata *L.*

TRIGONELLA.

1. *Flores in pedicello communi.*

platycarpus *L.*
 hybrida *Dec. Fl.*
 corniculata *L.*
 cancellata.
 prostrata. }
 hamosa *L.* }
 laciniata *L.*

2. *Flores sessiles.*

monspeliaca *L.*
 spinosa *L.*
 polycerata *L.*
 fœnum-græcum *L.*

LOTUS

edulis *L.*
 — siliquosus *L.*
 tetragonolobus *L.*
 conjugatus *L.*
 peregrinus *L.* }
 oligoceros *Encycl.* }

2. *Gousses en limaçon.*

couchée. Hongrie. ☞
 glutineuse. caucase. ☞
 maritime. F. m. or. ☞
 orbiculaire. F. ☉
 Barillet. F. ☉
 — petit Barillet.
 élégante. sicile. ☉
 tuberculeuse. F. m. ☉
 à aiguillons. ☉
 rude. ☉
 entrelacée. F. m. ☉
 à globules. ☉
 à grosses pointes. barbarie. ☉
 Murex. ☉
 ciliée. F. m. ☉
 tachée. F. ☉
 distante. ☉
 couronnée. ☉
 denticulée. F. m. ☉
 à petites pointes. ☉
 velue. F. ☉
 laciniée. F. ☉

TRIGONELLE.

1. *Fleurs portées sur un pédicelle commun.*

à gousses larges. sibérie. ☉
 hybride. F. m. ☞
 cornue. F. ☉
 pied-d'oiseau. ☉
 couchée. orient. ☉
 laciniée. égypte. ☉

2. *Fleurs sessiles.*

de Montpellier. ☉
 épineuse. crète. ☉
 à gousses longues. F. m. ☉
 fœnu-grec. F. m. ☉ (méd.)

LOTIER

comestible. orient. ☉
 à grosses gousses. F. ☞
 à quatre ailes. orient. ☉
 conjugué. F. ☉
 étranger. barbarie. ☉

diffusus willd. sp.
hispidus dec. cat.
arabicus L. Mant.
coimbrensis willd. sp.
creticus L.
jacobæus L.
ornithopodioides L.
corniculatus L.
 — *major.*
 — *angustifolius.*
varians Desvaux, Journ.
hirsutus L.
rectus L.
Dorycnium L.
Dorycnium monspeliense
willd. sp.
fruticulosus.

DOLICHOS

= *Lablab L.*
 — *albus.*
sinensis L.
sesquipedalis L.
unguiculatus L.
luteolus Jacq. Hort.
articulatus Encycl.
minimus L.
lignosus L.
urens L.
 — { *ensiformis L.*
acinaciformis Jacq. Ic. }
gladius Jacq. Ic.
soja L.
biflorus L.

PHASEOLUS

vulgaris L.
 (*coccineus Encycl.*)
 (*multiflorus willd. sp.*)
lunatus L.
vexillatus L.
caracalla L.
paniculatus Mich. Fl.
 (*radiatus Encycl.*)
semirectus L. Mant.
nanus L.
 (*stipularis Encycl.*)
 (*sphaerospermus L.*)

étalé. F. ☉
hérissé. F. m. ☉
d'Arabie. or. ☿
de Coïmbre. ☉
argenté. orient. or. ♃
à fleurs brunes. Afr. or. ☿
comprimé. Esp. ☉
pied-d'oiseau. F. ☿
 — *élevé.*
 — *à feuilles étroites.*
à fleurs chang. orient. or. ♃
velu. F. m. or. ♃
à tige droite. F. m. ☿

Dorycnium. F. m. or. ♃

sous-arbrisseau. or. ♃

DOLIC

Lablab. égypt. ☉ (orn.)
 — *à fleurs blanches.*
de Chine. ☉
à longues gousses. Antilles. ☉
onguiculé. Antilles. ☉
jaunâtre. Antilles. ☉
articulé. Antilles. s. ch. ☿
nain. Antilles. s. ch. ☿
ligneux. inde. s. ch. ♃ (orn.)
brûlant. Antilles. s. ch. ♃
pois-sabre. Ant. s. ch. ♃
à grandes gousses. Ant. s. ch. ♃
soja. Japon. ☉
à deux fleurs. inde. ☉

HARICOT

commun. inde. ☉ (écon.)
écarlate. Antilles. ☉
arqué. inde. ☉ (écon.)
à grand étendard. Antilles. ☉
caracolle. inde. s. ch. ♃ (orn.)
paniculé. Am. s. ☿
à rayons. ceylan. ☉
pourpre. Antilles. ☉
nain. inde. ☉
à grandes stipules. inde. ☉
à graines rondes. inde. ☉

ERYTHRINA

- herbacea L.
 corallodendrum L.
 abyssinica *encycl.*
 aculeatissima.
 crista-galli *willd. sp.* }
 laurifolia *Jacq. obs.* }

— *indica.*
CLITORIA

- ternatea L.
 — alba.
 — heterophylla *encycl.*
 brasiliana L.
 virginiana L.
 glabella
 galactia glabella *mich. fl.* }

GLYCINE

- monoica L.
 caribæa *Jacq. ic.*
 tomentosa L.
 bituminosa L.
 apios L.
 frutescens L.
 rubicunda *bot. mag.*
 kennedia rubicunda *vent.* }
 malm.
 bimaculata *bot. mag.*
 kennedia monophylla *vent.* }
 malm.
 coccinea *bot. mag.*
 kennedia coccinea *vent.* }
 malm.

ABRUS

- preicatorius *s. veg.* }
 glycine abrus L. }

AMORPHA

- fruticosa L.
 pumila *mich. fl.*

PISCIDIA

- erythrina L.

ROBINIA

- pseudo-acacia L.
 inermis.
 viscosa *vent. n. cels.*
 hispida L. *mant.*
 altagana *l'her. stirp.*

ERYTHRINA

- herbacé. caroline. or. ♀
 arbre de corail. ant. s. ch. ♀
 d'Abyssinie. s. ch. ♀
 très-épineux. s. ch. ♀
 crête-de-coq. Brésil. s. ch. ♀

— *indica.*
CLITORIA

- Vois. page 269.*
 de Ternate. inde. s. ch. ♂
 — à fleurs blanches.
 à feuilles var. inde. s. ch. ♀
 du Brésil. ☉
 de Virginie. ☉
 glabre. am. s. ♀

GLYCINÉ

- monoïque. am. s. ♀
 des Antilles. s. ch. ♀
 cotonneux. am. s. ♀
 bitumineux. cap. or. ♀
 apios. am. s. ♀
 arbrisseau. am. s. ♀ (orn.)
 à fl. rouges. n. holl. or. ♀ (orn.)
 à deux taches. n. holl. or. ♀
 écarlate. n. holl. or. ♀

ABRUS

- à chapelet. antilles. s. ch. ♀

AMORPHA

- faux indigo. am. s. ♀ (orn.)
 nain. am. s. ♀

PISCIDIA

- erythrina. antilles. s. ch. ♀

ROBINIA

- faux acacia. am. s. ♀ (orn.)
 sans épines. ♀ (orn.)
 visqueux. am. s. ♀ (orn.)
 acacia rose. am. s. ♀ (orn.)
 altagana. daourie. ♀ (orn.)

caragana L.
 pygmæa L.
 frutescens L.
 chamlagu l'Her. stirp.
 spinosa L. Mant.
 halodendron L. f.
 squamata Vahl, symb.

COLUTEA

arborescens L.
 alepica Encycl. }
 pocockii Willd. sp. }
 orientalis. Encycl. }
 cruenta H. K. }
 media Willd. Enum.
 frutescens L.

LESSERTIA

perennans Dec. Astr. }
 colutea perennans s. Veg. }
 annua Dec. Astr. }
 colutea herbacea L. }

PHACA

boëtica L.
 astragalina Dec. Astr. }
 Astragalus alpinus L. }
 alpina L.

OXYTROPIS.

campestris Dec. Astr. }
 Astragalus campestris L. }
 pilosa Dec. Astr. }
 Astragalus pilosus L. }
 deflexa Dec. Astr. }
 Astragalus deflexus Pallas, }
 Astr. }
 hians Jacq. Ic. }
 parviflorus Encycl. }

ASTRAGALUS.

1. Stipulis caulinis ; floribus rubris.

austriacus L.
 annularis Forsk. Egypt. }
 maculatus Encycl. }
 subulatus Desf. Atl. }
 stella s. Veg.
 sesameus L.

caragana. sibérie. ♀ (orn.)
 grêle. sibérie. ♀
 arbrisseau. sibérie. ♀
 chamlagu. chine. ♀ (orn.)
 épineux. sibérie. ♀
 satiné. sibérie. ♀
 écailleux. Antilles. s. ch. ♀

BAGUENAUDIER

en arbre. F. m. ♀ (orn.)
 d'Alep. orient. ♀ (orn.)
 d'Orient. ♀ (orn.)
 hybride. ♀
 d'Ethiopie. cap. or. ♂ (orn.)

LESSERTIA

vivace. sibérie. ♀
 annuel. cap. ☉

PHACA

de Portugal. or. ♀
 faux Astragale. F. ♀
 des Alpes. ♀

OXYTROPIS

des champs. F. ♀
 velu. Alpes. ♀
 à fruit pendant. sibérie. ♀

ASTRAGALE.

1. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs rouges.

d'Autriche. F. m. ♀
 annulaire. Afr. s. ☉
 étoilé. F. m. ☉
 à fleurs sessiles. F. m. ☉

vesicarius L.
 pentaglottis L. Mant.
 purpurens Encycl.
 hypoglottis L. Mant.
 glaux L.
 onobrychis L.
 — major.
 hispidulus Dec. Astr.
 sulcatus L.

vésiculeux. Alpes. ☞
 pentaglotte. Barbarie. or. ☞
 pourpre. F. m. ☞
 hypoglotte. F. ☉
 glaux. Esp. ☉
 onobrychis. F. ☞
 — de Sibérie.
 hérissé. Égypte.
 sillonné. Sibérie. ☞

2. *Stipulis caulinis ; floribus ochroleucis.*

boeticus L.
 depressus L.
 epiglottis L.
 contortuplicatus L.
 trimestris L.
 hamosus L.
 reptans Willd. H. Ber.
 glycyphyllos L.
 cicer L.
 galegiformis L.
 asper Jacq. Ic. }
 chloranthus Pallas Astr. }
 canadensis L.
 uliginosus L.
 odoratus Encycl.
 falcatus Encycl.
 christianus L.
 tomentosus Encycl.
 alopecuroides L.
 narbonensis Gouan, Ill.

2. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs d'un blanc jaune.

de Portugal. ☉
 déprimé. F. ☞
 épiglote. F. ☉
 recroquevillé. Sibérie. ☉
 hâtif. Égypte. ☉
 en hameçon. F. m. ☉
 rampant. Mexique. or. ☞
 à feuilles de réglisse. F. ☞
 à gousse ronde. F. ☞
 galéga. Sibérie. ☞

rude. Sibérie. ☞

de Canada. ☞
 des marais. Sibérie. ☞
 odorant. Orient. ☞
 falciforme. Russie. ☞
 de Judée. or. ☞
 cotonneux. Égypte. or. ☞
 queue-de-renard. Sibérie. ☞
 de Narbonne. F. m. ☞

3. *Stipulis petiolo adhærentibus ; inermes.*

caprinus L.
 exscapus L.
 incanus L.
 monspesulanus L.

3. Stipules adhérentes au pétiole ; feuilles non épineuses.

odorant. Barbarie. or. ☞
 sans tige. Suisse. ☞
 blanc. F. m. ☞
 de Montpellier. ☞

4. *Spinescentes.*

longifolius Encycl.
 massiliensis Encycl. }
 tragacantha L. }
 sempervirens Encycl. }
 aristatus V'Her. stirp. }
 tragacantha Vill. }
 Delph.

4. Feuilles terminées en épine.

à long. feuilles. Orient. or. ☞
 de Marseille. F. m. ☞

toujours vert. F. ☞

BISERRULA
pelecinus L.

GLYCYRRHIZA
echinata L.
glabra L.
foetida Desf. Atl.

GALEGA
officinalis L.
orientalis Encycl.
rosea Encycl.
pulchella scop. insub. }
stricta H. K. }
cinerea L.
coronillæfolia.
caribæa Jacq. Am.
pubescens Encycl.
longifolia Jacq. Ic. }
clitoria micrantha scop. ins. }

INDIGOFERA
viscosa Encycl.
— tinctoria L.
Anil L. Mant.
argentea l'her. stirp. }
glauca Encycl. }
psoraloides Willd. sp.
cytisoides s. Veg.
macrostachya Vent. Malm.
australis Willd. sp.
enneaphylla L. Mant.

LATHYRUS.

1. *Pedunculis unifloris.*

Aphaca L.
Nissolia L.
axillaris Encycl. }
sphæricus Retz. obs. }
Cicera L.
sativus L.
setifolius L.
tumidus Encycl.

2. *Pedunculis bifloris.*

clymenum L.
articulatus L.
— odoratus L.
tingitanus L.
annuus L.

BISERRULA
en rateau. barbarie. ⊙

RÉGLISSE
hérissée. tartarie. ♄
officinale. F. ℥ (méd.)
fétide. barbarie. or. ℥

GALÉGA
officinal. F. ♄
d'Orient. ♄
rose. cap. or. ♃
élégant. cap. or. ♃
cendré. Antilles. ⊙
à feull. de coronille. s. ch. ♃
des Antilles. s. ch. ♃
pubescent. Antilles. s. ch. ♃
à long. feuilles. Ant. s. ch. ♃

INDIGOTIER
visqueux. Antilles. s. ch. ♄
des teintur. inde. s. ch. ♃ (écon.)
Anil. inde. s. ch. ♂ (écon.)
argenté. orient. or. ♃ (écon.)
faux psoraléa. cap. or. ♃
faux cytise. cap. or. ♃
à grands épis. chine. or. ♃
austral. N. Holl. or. ♃
à neuf feuilles. inde. ⊙

GESSE.

1. *Pédoncules à une fleur.*

Aphaca. F. ⊙
de Nissole. F. ⊙
axillaire. F. m. ⊙
sillonnée. esp. ⊙
cultivée. F. ⊙ (écon.)
à feuilles étroites. F. m. ⊙
renflée. ♄

2. *Pédoncules à deux fleurs.*

d'Espagne. ⊙
articulée. F. m. ⊙
odorante. ceylan. ⊙ (orn.)
de Tanger. ⊙
jaune. F. m. ⊙

3. *Pedunculis multifloris.*

hirsutus L.
tuberosus L.
pratensis.
sylvestris L.
latifolius L.
palustris L.

PISUM

sativum L.
 — *ecorticatum.*
 — *umbellatum.*
arvense L.
maritimum L.
ochrus L.

OROBUS

lathyroides L.
vernus L.
luteus L.
tuberosus L.
varius Bot. Magaz.
albus L. f.
sylvaticus L.
niger L.
tomentosus.
Lathyrus tomentosus Cav. ic. }
vicia fruticosa Willd. sp. }

VICIA.

1. *Pedunculis elongatis.*

pisiformis L.
dumetorum L.
sylvatica L.
cracca L.
onobrychioides All. ped.
atropurpurea Desf. Atl.
benghalensis L.
monanthos.
ervum monanthos L. }
ervilia Willd. sp. }
ervum ervilia L. }

2. *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

sepium L.
sativa L.
 — *angustifolia.*
peregrina L.

3. Pédoncules à plusieurs fleurs.

velue. F. ⊙
tubéreuse. F. ♀ (écon.)
des prés. F. ♂
sauvage. F. ♂
à larges feuilles. F. m. ♀
des marais. F. ♂

POIS

cultivé. F. ⊙ (écon.)
 — *sans parchemin.*
 — *à bouquets.*
des champs. F. ⊙
maritime. F. ♀
ailé. F. ⊙

OROBE

à feuilles de gesse. Sibérie. ♂
printanier. F. ♀
jaune. Alpes. ♀
tubéreux. F. ♀
bigarré. Italie. ♂
blanc. Autriche. ♀
des bois. Alpes. ♂
noir. F. ♂

cotonneux. Pérou. s. ch. ♀

VESCE.

1. Pédoncules allongés.

pisiforme. F. ♀
des buissons. F. ♀
des bois. F. ♀
à fleurs nombreuses. F. ♀
à feuil. de sainfoin. Alpes. ⊙
brun-pourpre. Barbarie. ⊙
du Bengale. ⊙
à une fleur. F. ⊙

ERS. F. ⊙

2. Fleurs axillaires, presque sessiles.

des haies. F. ♂
cultivée. F. ⊙ (écon.)
 — *à feuilles étroites.*
étrangère. F. ⊙

torulosa.
 lathyroides L.
 ervum soloniense L. (ex Willd.) }
 lutea L.
 hybrida L.
 pannonica Jacq. Austr.
 narbonensis L.

FABA

major.
 — minor.
 — viridis.

ERVUM

hirsutum L.
 tetraspernum L.
 lens L.
 cicer lens Willd. sp. }
 — minor.

CICER

arietinum L.

(IV. Legumen articulatum ; articulis
 monospermis.

SCORPIURUS

veimiculata L.
 muricata L.
 sulcata L.

ORNITHOPUS

perpusillus L.
 compressus L.
 scorpioides L.

HIPPOCREPIS

unisiliquosa L.
 multisiliquosa L.
 comosa L.
 balearica Jacq. Ic.

CORONILLA

emerus L.
 valentina L.
 stipularis Encycl. }
 glauca L.
 juncea L.
 minima L.
 varia L.
 globosa Encycl.
 cretica L.
 securidaca L.

bosselée. ☉

printanière. F. ☉

jaune. F. ☉

hybride. F. ☉

de Hongrie. ☉

de Narbonne. ☉

FÈVE

de marais. perse. ☉ (écon.)

— féverole.

— verte.

LENTILLE

velue. F. ☉

à quatre graines. F. ☉

cultivée. F. m. ☉ (écon.)

— petite.

CICER

pois-chiche. orient. ☉

IV. Gousse articulée ; articulations
 monospermes.

CHENILLETTE

écailleuse. F. m. ☉

hérissée. F. m. ☉

sillonnée. F. m. ☉

PIED-D'OISEAU

petit. F. ☉

comprimé. F. m. ☉

queue-de-scorpion. F. m. ☉

HIPPOCRÉPIS

à gosses solitaires. F. m. ☉

à plusieurs gosses. F. m. ☉

des champs. F. ♀

de Mahon. or. ♂

CORONILLE

éméris. Alpes. ♂ (orn.)

à grandes stipules. F. m. or. ♂

glauque. F. m. or. ♂

jonciforme. F. m. or. ♂

petite. F. ♂

bigarrée. F. ♂ (orn.)

globuleuse. orient. or. ♂

de Crète. ☉

à gosses plates. F. ☉

PTEROCARPUS
 ecastaphyllum willd. sp.

SECURIDACA
 scandens L. }
 volubilis willd. sp. }

ORDO XII.

TEREBINTHACEÆ.

Germen simplex; fructus unilocularis,
 monospermus.

ANACARDIUM
 — occidentale L.

MANGIFERA
 — indica L.

RHUS.

1. Foliis pinnatis.

coriaria L.
 typhinum L.
 glabrum H. K.
 vernix L.
 copallinum L.
 semialatum syst. veg.
 javanicum L.

2. Foliis ternatis.

Toxicodendrum L.
 aromaticum H. K.
 tomentosum L.
 dentatum Thunb. prodr.
 cuneifolium L. f.
 glaucum.
 thezera Desf. Atl. }
 rhamnus pentaphyllum L. }
 oxyacanthoides.
 angustifolium L.
 virginale H. K.
 heterophyllum.
 levigatum L.
 lucidum L.
 villosum L. f.
 undulatum Jacq. π. sch.
 nervosum.

PTÉROCABPUS
 à feuilles simples. Ant. s. ch. ♀

SÉCURIDACA
 sarmenteux. Antilles. s. ch. ♀

Voir en Sup. page 269. l'article

ORDRE XIII.

TÉRÉBINTHACÉES.

I. Un seul ovaire; fruit à une seule loge
 monosperme.

ANACARDE
 d'Occident ou noix d'acajou,
 Antilles. s. ch. ♀ (écon.)

MANGUIER
 cultivé. Inde. s. ch. ♀ (écon.)

SUMAC.

1. Feuilles pennées.

des corroyeurs F. m. ♀ (écon.)
 de Virginie. ♀ (orn.)
 glabre. Am. s. ♀ (orn.)
 vernis. Am. s. ♀
 ailé. Am. s. ♀
 semi-ailé. Inde. s. ch. ♀
 de Java. s. ch. ♀

2. Feuilles ternées.

vénéneux. Am. s. ♀
 aromatique. Am. s. ♀
 cotonneux. Cap. or. ♀
 denté. Cap. or. ♀
 cunéiforme. Cap. or. ♀
 glauque. Cap. or. ♀
 Thézéra. Alger. or. ♀
 à f. d'aubépine. Orient. or. ♀
 à feuilles étroites. Cap. or. ♀
 flexible. Cap. or. ♀
 à feuilles variables. or. ♀
 lisse. Cap. or. ♀
 luisant. Cap. or. ♀
 velu. Cap. or. ♀
 ondulé. Cap. or. ♀
 veiné. Cap. or. ♀

n°.

3. Foliis simplicibus.

cotinus L.

CNEORUM
tricoccum L.COMOCLADIA
ilicifolia swartz. prodr.AMYRIS
polygama cav. ic.
maritima Jacq. Am.SCHINUS
molle L.PISTACIA
terebinthus L.
trifolia L. }
vera L. }
chia.
atlantica Desf. Atl.
lentiscus L.BURSERA
gummifera L.SPONDIAS
monbin s. veg. }
purpurea L. }
- { cytherea Encycl. }
dulcis Willd. sp. }
myrobalanus s. veg. }
lutea L. }

II. Germen multiplex ; fructus multicapsularis.

AYLANTUS
glandulosa Desf. Acad.BRUCEA
ferruginea L'Her. stirp.FAGARA
pterota L.
microphylla.ZANTHOXYLUM
fraxineum Willd. sp. }
cauliflorum Michx. Fl. }
clava-herculis L.- *Cnestrif glaberr.*

3. Feuilles simples.

Fustet. F. ♪ (orn. teint.)

CNÉORUM
à trois coques. F. m. ♪COMOCLADIA
à f. de Houx. Ant. s. ch. ♪AMYRIS
polygame. Chili. s. ch. ♪
maritime. Antilles. s. ch. ♪SCHINUS
mollé. Pérou. or. ♪ (orn.)PISTACHIER
Térébinthe. F. m. ♪
cultivé. orient. or. ♪ (écon.
méd.)
de Chio. or. ♪
de l'Atlas. or. ♪ (écon.)
Lentisque. orient. or. ♪ (écon.)BURSERA
gommifère. Antilles. s. ch. ♪SPONDIAS
monbin. inde. s. ch. ♪
Arbre de Cythère. île de Fr.
s. ch. ♪
jaune. Antilles. s. ch. ♪

II. Plusieurs ovaires ; autant de capsules.

AYLANTE
glanduleux. Japon. ♪ (orn.)BRUCÉA
ferrugineux. Afr. s. ch. ♪FAGARA
à f. de Jasmin. Ant. s. ch. ♪
à petites feuilles. Ant. s. ch. ♪ZANTHOXYLUM
à feuilles de Frêne. Am. s. ♪
à gros aiguillons. Ant. s. ch. ♪

PTELEA
trifoliata L.

DODONÆA
— { viscosa L. f. }
— { ptelea viscosa L. }
— angustifolia L. f.
— triquetra Willd. sp.

AVERRHOA
— bilimbi L.

JUGLANS
— regia L.
— serotina.
— fraxinifolia Encycl.
— alba L.
— olivæformis H. K. }
— cylindrica Encycl. }
— cinerea L.
— nigra L.

— *Cordulia inermis*.

ORDO XIII.

RHAMNOIDEÆ.

I. *Stamina petalis alterna; fructus capsularis.*

STAPHYLÆA
— pinnata L.
— trifoliata L.

EVONYMUS
— europæus L.
— latifolius L.
— americanus L.
— atropurpureus Jacq. hort.
— verrucosus Jacq. Austr.

CELASTRUS
— scandens L.
— cassinoides L'Her. sert.
— octogonus L'Her. sert.
— lucidus L'Her. sert. }
— cassine concava Encycl. }
— buxifolius L.
— pyracantha L.
— senegalensis Encycl. }
— phyllacanthus L'Her. sert. }
— multiflorus Encycl.

— *undulata*.

PTÉLÉA
— à trois feuil. Am. s. ♀ (orn.)

DODONÆA
— visqueux. inde. s. ch. ♀
— à feuil. étroites. inde. s. ch. ♀
— triangulaire. N. Holl. or. ♀

AVERRHOA
— bilimbi. inde. s. ch. ♀

NOYER
— cultivé. Asie. ♀ (écon.)
— tardif.
— à feuilles de Frêne. Asie. ♀
— blanc. Am. s. ♀
— pacanier. Am. s. ♀ (écon.)
— cendré. Am. s. ♀
— noir. Am. s. (écon.)

ORDRE XIII.

RHAMNOÏDES.

I. *Étamines alternes avec les pétales; une capsule.*

STAPHYLÆA
— à feuilles pennées. F. ♀ (orn.)
— à f. ternées. Am. s. ♀ (orn.)

FUSAIN
— d'Europe. F. ♀ (écon. orn.)
— à larges feuilles. F. ♀ (orn.)
— d'Amérique. Am. s. ♀
— noir-pourpre. Am. s. ♀
— galeux. Autriche. ♀

CÉLASTRUS
— grim pant. Am. s. ♀
— à f. de cassiné. canar. or. ♀
— octogône. Pérou. s. ch. ♀
— luisant. cap. or. ♀
— à feuilles de buis. cap. or. ♀
— à épines rouges. cap. or. ♀
— du Sénégal. s. ch. ♀
— à fleurs nombr. cap. or. ♀

— *ondulé*.

II. *Stamina petalis alterna*; drupa aut
bacca.

RUBENTIA
mauritiana.

CASSINE
capensis L. Mant.
maurocena L.
xylocarpa Vent. choix de pl.

ILEX
aquifolium L.
— crassifolium.
— ferox.
— serratum.
— variegatum.
balearica.
maderiensis *encycl.* }
perado H. K. }
cassine L.
canadensis Mich. Fl.
— angustifolia.
æstivalis *encycl.* }
prinoides H. K. }
vomitoria H. K. }
cassine peragua L. }

PRINOS
verticillatus L.
glaber L.
lucidus H. K.

III. *Stamina petalis opposita*; fructus
drupaceus.

RHAMNUS.

1. *Spinosi.*

catharticus L.
infectorius Willd. sp.
theezans L. Mant.
lycioides L.
oleoides L.
saxatilis Jacq. Austr.
erythroxylum Pallas, Ross.

2. *Inermes.*

frangula L.
colubrinus L.

II. Étamines alternes avec les pétales; un
drupe ou une baie.

RUBENTIA
bois d'olive. île de F. s. ch. ♪

CASSINÉ
du Cap. or. ♪
à f. convexes. cap. or. ♪
à fruit osseux. Ant. s. ch. ♪

HOUX
commun. F. ♪ (orn. écon.)
— à feuilles épaisses.
— hérisson.
— en scie.
— panaché.
de Mahon. ♪

de Madère. or. ♪
à f. de Laurier. carol. or. ♪
de Canada. ♪
— à feuilles étroites.
d'été. caroline. or. ♪
purgatif, Apalachine. Floride.
or. ♪

PRINOS
verticillé. Am. s. ♪
glabre. Am. s. ♪
luisant. ♪

III. Étamines opposées aux pétales; un
drupe.

NERPRUN.

1. Tiges épineuses.

purgatif. F. ♪ (arts, méd.)
graine d'Avignon. F. m. ♪
(teint.)
de Chine. or. ♪
à f. linéaires. F. m. or. ♪
à feuil. d'olivier. Esp. or. ♪
des rochers. Alpes. ♪
à longues feuilles. Sibérie. ♪

2. Tiges sans épines.

bourgène. F. ♪ (arts.)
ferrugineux. Antilles. s. ch. ♪

hybridus *l'her. sert.* }
 burgundiacus. }

alpinus *L.*

alnifolius *l'her. sert.*

pumilus *Jacq. ic.*

glandulosus *H. K.*

ellipticus *H. K.*

ceanothus reclinatus *l'her. sert.* }

Alaternus *L.*

— angustifolius.

— hispanicus.

— rotundifolius.

— variegatus.

— *Lucida.*
 ZIZYPHUS

sinensis *Encycl.*

inguanea *Encycl.*

— *Urophylla.*

Lotus *Desf. Atl.*

sativa. }

vulgaris *Encycl.* }

spina-christi.

volubilis *L. f.*

— *Zizyphus.*
 PALIURUS

aculeatus.

PITTOSPORUM

undulatum *Vent. H. cels.*

coriaceum *Andr. rep.*

revolutum *H. K.*

Tobira *H. K.*

Evonymus tobira *Willd. sp.* }

sinense.

— *Sinensis undulata.*

ELÆODENDRUM

orientale *Jacq. ic.* }

rubentia longifolia. }

australe *Vent. Malm.*

Argan *Retz. obs.*

— *Indicum.*
 IV. *Stamina petalis opposita; fructus tricoccus.*

POMADERRIS

apetala *Bill. N. Holl.*

COLLETIA

ephedra *Vent. ch. de pl.*

hybride. }
 des Alpes. F. }
 à feuilles d'aune. Am. s. }
 nain. Alpes. }
 glanduleux. canaries. or. }

elliptique. Antilles. s. ch. }

Alaterne. F. m. } (orn.)

— à feuilles étroites.

— d'Espagne.

— à feuilles rondes.

— panaché.

— *Lucida.*
 JUJUBIER

de Chine. or. }

des Inguanes ou croc-de-chien.

Antilles. s. ch. }

des Lotophages. Tunis. or. }

cultivé. orient. } (écon. méd.)

Napéca. Égypte. s. ch. } (écon.)

sarmenteux. Am. s. }

— *Tomense. Willd.*
 PALIURUS

épineux. F. m. }

PITTOSPORUM

ondulé. N. Holl. or. }

coriace. madère. or. }

recourbé. N. Holl. or. }

Tobira. chine. or. }

de Chine. or. }

— *Barbado.*
 ELÆODENDRUM

d'Orient. madagascar. s. ch. }

austral. N. Holl. or. }

Argan. Maroc. or. } (écon.)

— *Indicum.*
 IV. Étamines opposées aux pétales; fruit à trois coques.

POMADERRIS

apétale. N. Holl. or. }

COLLÉTIA

sans feuilles. Pérou. or. }

CÉANOTHUS

africanus L.
americanus L.
azureus.
discolor *vent. Malm.*
macrophyllus.

PHYLICA

ericoides L.

axillaris Lamk, *ill.*
linearis.
plumosa L.
pubescens H. K.
squarrosa.
myrtifolia *encycl.* }
paniculata *willd. sp.* }
cordata L.
thymifolia *vent. Malm.*

Genera Rhamnoides affinia.

BRUNIA

lanuginosa L.
capitata.

LASIOPETALUM

ferrugineum *Andr. rep.*

GOUANIA

integrifolia *encycl.*

AUKUBA

japonica *Thunb. Jap.*

CÉANOTHUS

d'Afrique. cap. or. ♪
d'Amérique. Am. s. ♪
azuré. ♪
de deux couleurs. N. Holl. or. ♪
à larges feuilles. ♪

PHYLICA

bruyère du Cap. cap. or. ♪
(orn.)
axillaire. cap. or. ♪
à feuilles linéaires. cap. or. ♪
plumeux. cap. or. ♪
pubescent. cap. or. ♪
à feuilles roides. cap. or. ♪
à feuilles de myrte. cap. or. ♪
à feuilles en cœur. cap. or. ♪
à f. de thym. N. Holl. or. ♪

Genres qui ont de l'affinité avec les Nerpruns.

BRUNIA

lanugineux. cap. or. ♪
à fleurs en tête. cap. or. ♪

LASIOPÉTALUM

ferrugineux Bot. Bay. or. ♪

GOUANIA

à feuilles entières. s. ch. ♪

AUKUBA

du Japon. ♪

CLASSIS XV.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(Stamina idiogyna.)

ORDO I.

EUPHORBIACEÆ.

I. Styli plures definiti, sæpius 3.

MERCURIALIS

perennis L.

CLASSE XV.

DICOTYLÉDONS

APÉTALES.

(Fleurs unisexuelles.)

ORDRE I.

EUPHORBIACÉES.

I. Plusieurs styles définis, souvent trois.

MERCURIALE

vivace. F. 16

annua L.
 tomentosa L.
 elliptica *Encycl.*

annuelle. F. ☉ (méd.)
 cotonneuse. F. m. ☽
 elliptique. Portugal. or. ☽

EUPHORBIA.

1. *Herbaceæ; umbella bifida aut nulla.*

— hypericifolia L.
 maculata *Jacq. Hort.*
 picta *Jacq. Ic.*
 pilulifera L. }
 capitata *Encycl.* }
 thymifolia L.
 canescens L.
 chamæsyce L.
 replis L.
 prunifolia *Jacq. H. Sch.*

2. *Herbaceæ; umbella trifida.*

micrantha *Willd. sp.*
 replis L.
 falcata L.
 exigua L.

3. *Herbaceæ; umbella quadrifida.*

Lathyris L.

4. *Herbaceæ; umbella quinquefida.*

purpurata *Thuil. Fl.*
 flavicoma *Dec. cat.*
 alepica L.
 segetalis L.
 Helioscopia L.
 serrata L.
 verrucosa L.
 platiphylla L.
 litterata *Jacq. Ic.*
 buplevroides *Desf. Atl.*
 orientalis L.
 hyberna L.
 sylvatica L.

5. *Herbaceæ; umbella multifida.*

esula L.
 virgata *Wald. et Kitt. Hung.*
 illyrica *Encycl.*
 linariæfolia *Encycl.*

EUPHORBE.

1. Tiges herbacées; ombelle bifide ou nulle.

à f. d'hypericum. inde. ☉
 tacheté. Am. s. ☉
 panaché. Am. m. s. ch. ☿
 à globules. inde. ☉
 à feuilles de thym. inde. ☉
 blanchâtre. esp. ☉
 chamésycé. F. m. ☉
 péplis. F. m. ☉
 à feuilles de prunier. ☉

2. Tiges herbacées; ombelle à trois rayons.

à petites fleurs. perse. ☉
 péplus. F. ☉
 falciforme. F. ☉
 menu. F. ☉

3. Tiges herbacées; ombelle à quatre rayons.

épurge. F. ♂ (méd.)

4. Tiges herbacées; ombelle à cinq rayons.

purpurin. F. ☉
 jaune d'or. F. ☿
 d'Alep. syrie. or. ☿
 des moissons. F. ☉
 réveille-matin. F. ☉
 en scie. F. ☿
 tuberculeux. F. ☿
 à feuilles larges. F. ☉
 bariolé. ☉
 à f. de buplevre. Alger. or. ☿
 d'Orient. ☿
 à feuilles de Lauréole. F. ☿
 des bois. F. ☿

5. Tiges herbacées; ombelle à plus de cinq rayons.

ésule. F. ☿
 effilé. Hongrie. ☿
 de Dalmatie. ☿
 à feuilles de linaires. F. ☿

pinifolia *Encycl.*
 cyparissias *L.*
 palustris *L.*
 salicifolia *Dec. Itin.*
 myrsinites *L.*
 amygdaloides *Encycl.* }
 nicensis *Jacq. Ic.* }

6. *Caule suffruticoso aut fruticoso.*

characias *L.*
 paralias *L.*
 pithyusa *L.*
 spinosa *L.*
 mauritanica *L.*
 virgata.
 dendroides *L.*
 atropurpurea *Dec. cat.*
 longifolia *Encycl.* }
 mellifera *H. K.* }
 linearis *Retz. obs. et Encycl.*
suppl.
 cotinifolia *L.*
 verticillata.
 heterophylla *L.*

7. *Carnosæ inermes.*

— { tithymaloides *L.* }
 — { myrtifolia *Encycl.* }
 lophogona *Encycl.*
 caput-medusæ *L.*
 tridentata *Encycl.* }
 anacantha *H. K.* }

8. *Carnosæ spinosæ.*

uncinata *Dec. Pl. Gr.*
 canariensis *L.*
 histrix *Jacq. H. Sch.* }
 loricata *Encycl.* }
 neriifolia *L.*
 officinarum *L.*
 mamillaris *L.*
 polygona.

— *PHYLLANTHUS.*1. *Fruticosæ.*

grandifolia *L.*
 brasiliensis *Encycl.*
 reticulata *Encycl.*

à feuilles de pin. *F. ℥*
 petit cyprès. *F. ℥*
 des marais. *F. ℥*
 à feuilles de saule. *F. ℥*
 myrsinitès. *F. m. ℥*
 à feuilles d'Ammandier. *F. ℥*

6. Tige ligneuse ou presque ligneuse.

à fleurs brunes. *F. m. ℥*
 maritime. *F. ℥*
 à feuilles de Genévrier. *F. ℥*
 piquant. *F. m. or. ℥*
 de Mauritanie. *or. ℥*
 effilé. *Afr. or. ℥*
 en arbre. *Barbarie. ℥*
 noir-pourpre. *canaries. or. ℥*
 mellifère. *canaries. or. ℥*
 linéaire. *Antilles. s. ch. ℥*
 à f. de Ruset. *Ant. s. ch. ℥*
 verticillé. *Antilles. s. ch. ℥*
 à feuilles var. *Ant. s. ch. ℥*

7. Tiges charnues, sans épines.

à feuilles ov. *Ant. s. ch. ℥*
 à crêtes. *Madagascar. s. ch. ℥*
 tête-de-Méduse. *cap. s. ch. ℥*
 à trois dents. *cap. s. ch. ℥*

8. Tiges charnues, épineuses.

à crochets. *s. ch. ℥*
 des Canaries. *s. ch. ℥*
 hérissé. *cap. s. ch. ℥*
 à f. de Nérium. *Inde. s. ch. ℥*
 des boutiques. *cap. s. ch. ℥*
 mamillaire. *cap. or. ℥*
 polygone. *cap. or. ℥*

PHYLLANTHUS.

1. Tiges ligneuses.

à grandes feuell. *Ant. s. ch. ℥*
 du Brésil ou Bois enivrant.
s. ch. ℥
 à réseau. *île de F. s. ch. ℥*

Les phyllanthus en graine sont de cette espèce, et sont en effet le Phyllanthus
à grandes feuilles, voir à la page 254.

2. *Herbacæ.*

↳ *niruri* L.
carolinensis Mich. Fl.

KIRGANELIA
phyllanthoides.
virginæa *Encycl. suppl.*
phyllanthus kirganelia *willd.* }
sp. }

XYLOPHYLLA
falcata *swartz, prodr.*
angustifolia *swartz, prodr.*
latifolia *swartz, prodr.*
ramiflora H. K.
obovata *willd. Enum.* }
phyllanthus lucidus. }

KIGGELLARIA
africana L.

CLUTIA
pulchella L.
alaternoides L.
polygonoides L.
daphnoides *willd. sp.*

ANDRACHNE
telephioides L.

AGYNEIA
impubes L. *Mant.*

BUXUS
sempervirens L.
— *suffruticosa.*
— *angustifolia.*
balearica *Encycl.*

SECURINEGA
— *nitida* *Pers. syn.*

ADELIA
acitodon L. ?
acuminata *Mich. Fl.*
ovata.

RICINUS
communis L.
— *rutilans.*
viridis *willd. sp.*
inermis *Jacq. ic.*
— *integerrima.*

2. Tiges herbacées.

niruri. inde. ⊙
de Caroline.

KIRGANÉLIA
à f. de *phyllanthus.* île de Fr.
s. ch. ♪

XYLOPHYLLA
falciforme. Antilles. s. ch. ♪
à f. étroites. Antilles. s. ch. ♪
à f. larges. Antilles. s. ch. ♪
à fleurs axillaires. Sibérie. ♪
ovale renversé. s. ch. ♪

KIGGELLARIA
d'Afrique. cap. or. ♪

CLUTIA
élégant. cap. or. ♪
à feuill. d'Alatérne. cap. or. ♪
à f. de *polygonum.* cap. or. ♪
daphnoïde. cap. or. ♪

ANDRACHNÉ
couché. orient. ♂

AGYNÉIA
glabre. chine. ⊙

BUIS
toujours vert. F. ♪ (arts, orn.)
— *nain.*
— à feuilles étroites.
de Mahon. ♪

SÉCURINÉGA
à f. luisantes. île de F. s. ch. ♪

ADÉLIA
acitodon. Antilles. s. ch. ♪
acuminé. Am. s. ♪
ovale.

RICIN
commun. inde. ⊙ (méd. écon.
orn.)
— *pourpre.*
vert. inde. ⊙
à fruit lisse. inde. s. ch. ♪
à feuilles entières.

JATROPHA

- *cucacas* L.
- *multifida* L.
- napæifolia* *encycl.*
- gossypifolia* L.
- acuminata* *encycl.*
- panduræfolia* *Andr. rep.* }

LOUREIRA

- cuneifolia* *cav. ic.*
- mozinna spatulata* *ortega, dec.* }

ALEURITES

- moluccana.*
- ambinux* *pers. syn.*
- croton moluccanum* L. }

CROTON.

1. *Fruticosa.*

- *sebiferum* L.
- penicillatum* *vent. ch. de pl.*
- ciliato-glanduliferum* *ortega,*
- dec.*
- punctatum* *Jacq. ic.*
- balsamiferum* L. *Mant.*
- lacerum.*

2. *Herbacea.*

- dioicum* *cav. ic.*
- argenteum* L.
- tinctorium* L.

lobatum L.

ACALYPHA

- virginica* L.
- alopécuroïdea* *Jacq. ic.*
- cuspidata* *Jacq. H. sch.*
- virgata* L.
- scabrosa* *swartz, prodr.*

II. *Stylus unicus.*

TRAGIA

- volubilis* L.
- involutrata* L.
- plumosa.*

SAPIUM

- laurocerasum.*

— *Cicca distichas.*

JATROPHA

- pignon-d'inde.* s. ch. ♀ (méd.)
- lacinié.* Antilles. s. ch. ♀
- à f. de napéa.* Ant. s. ch. ♀
- à f. de cotonnier.* Ant. s. ch. ♀
- à f. pointues.* Cuba. s. ch. ♀

LOUREIRA

- cunéiforme.* Mexique. s. ch. ♀

ALEURITÈS

- Noix de Bancoul.* Inde. s. ch. ♀

CROTON.

1. *Tige ligneuse.*

- Arbre à suif.* Inde. s. ch. ♀
- (écon.)

pénicillé. Cuba. s. ch. ♀

- ponctué.* Antilles. s. ch. ♀
- balsamique.* Antilles. s. ch. ♀
- lacéré.* s. ch. ♀

2. *Tige herbacée.*

- dioïque.* Mexique. ♀
- argenté.* Antilles. ⊙
- des teinturiers* ou *Tournesol.*
- F. m. ⊙ (écon.)
- lobé.* Antilles. s. ch. ♂

ACALYPHA

- de Virginie.* ⊙
- queue-de-renard.* ⊙
- en pointe.* Caracas. s. ch. ♀
- effilé.* Antilles. s. ch. ♀
- à feuilles rudes.* Ant. s. ch. ♀

II. *Un style.*

TRAGIA

- sarmenteux.* Inde. s. ch. ♀
- à involucre.* Inde. s. ch. ♀
- plumeux.* Antilles. s. ch. ♀

SAPIUM

- à f. de Laurier-cerise.* Antilles,
- s. ch. ♀

Arbrimbellet de Choisy.

HURA

crepitans L.

DALECHAMPIA

villosa *Encycl.* }

scandens L. }

ORDO II.

CUCURBITACEÆ.

GRONOVIA

scandens L.

SICYOS

angulata L.

BRYONIA

dioica *Jacq. Austr.*

africana L.

palmata L.

laciniosa L.

pubescens.

MELOTHRIA

pendula L.

MOMORDICA

charantia L.

— luffa L.

balsamina L.

— elaterium L.

CUCUMIS

colocynthis L.

prophetarum L.

anguria L.

acutangulus L.

melo L.

— saccharinus.

— cantalou.

— viridis.

chate L.

nudaim L.

sativus L.

— minor.

flexuosus L.

CUCURBITA

leucantha.

— lagenaria.

— latior.

SABLIER

élastique. Antilles. s. ch. ☉

DALÉCHAMPIA

sarmenteux. Antilles. s. ch. ☉

ORDRE II.

CUCURBITACÉES.

GRONOVIA

sarmenteux. vera-cruz. ☉

SICYOS

anguleux. Am. s. ☉

BRYONE

dioïque. F. ☿ (méd.)

d'Afrique. cap. or. ☿

palmée. ceylan. s. ch. ☿

laciniée. ceylan. s. ch. ☿

pubescente. s. ch. ☿

MÉLOTHRIA

à fruit pendant. Am. s. ☉

MOMORDICA

charantia. inde. ☉

luffa. ceylan. ☉

balsamine. inde. ☉

concombre sauvage. F. m. ☉

CONCOMBRE

coloquinte. Barb. ☉ (méd.)

des prophètes. Arabie. ☉

d'Amérique. ☉

à angles aigus. inde. ☉

melon. Asie. ☉ (alim. méd.)

— brodé.

— cantalou.

— vert.

Abdélaoui. égypte. ☉

orange. Afr. s. ☉

commun. ☉ (alim.)

— petit.

serpentin. inde. ☉

COURGE

à fleur blanche. Am. m. ☉

— cougourde.

— courde.

— pyrotheca.

— longa.

pepo *L.*

— luteus.

— viridis.

melopepo *L.*

— verrucosus.

— aurantiiformis.

— pyriformis.

— clypeatus.

— radiatus.

citrullus *L.*

TRICHOSANTHES

anguina *L.*

ORDO III.

PASSIFLORÆ.

PASSIFLORA.

1. Foliis simplicibus.

maliformis *L.*laurifolia *L.*quadrangularis *L.*alata *H. K.*serratifolia *L.*cuprea *L.*

2. Foliis bilobis.

normalis *L.*tuberosa *Jacq. H. Sch.*rùbra *L.*biflora *Encycl.*

3. Foliis trilobis.

ciliata *H. K.*punctata *L.*lutea *L.*suberosa *L.*minima *L.*heterophylla *H. K.*angustifolia *Willd. sp.*longifolia *Encycl.*glaucà *Jacq. H. Sch.*Adiantum *Willd. Enum.*glabra *Wendl. collect.*

— poire-à-poudre.

— calebasse.

pepon. ☉ (alim.)

— jaune.

— vert.

Mélopepon. ☉ (alim.)

— tuberculeux.

— orange.

— pyriforme.

— Bonnet-d'électeur.

— Arichaux.

pasteque. orient. ☉ (alim.)

TRICHOSANTHÈS

anguina. chine. ☉

ORDRE III.

GRENADILLES.

GRENADILLE.

1. Feuilles simples.

à gros fruit. Antilles. s. ch. ☽
(alim.)à f. de Laurier. surin. s. ch. ☽
quadrangulaire. Antilles. s. ch.
☽ (orn.)

ailée. inde. s. ch. ☽ (orn.)

à feull. en scie. surin. s. ch. ☽
cuivrée. bahama. s. ch. ☽

2. Feuilles bilobées.

à lobes tronqués. Am. m. s. ch. ☽

tubéreuse. Am. m. s. ch. ☽

rouge. Antilles. s. ch. ☽

à deux fleurs. Ant. s. ch. ☽

3. Feuilles trilobées.

ciliée. Antilles. s. ch. ☽

ponctué. Pérou s. ch. ☽

jaune. Virginie. or. ☽

fongueuse. Antilles. s. ch. ☽

à petites fleurs. Ant. s. ch. ☽

à feuilles var. Ant. s. ch. ☽

glaucue. cayenne. s. ch. ☽

Adiantum. s. ch. ☽

holosericea L.
peltata Cav. Diss.
foetida L.
incarnata L.

4. Foliis multilobis.

cœrulea L.
filamentosa Cav. Diss.

CARICA

— papaya L.
monoica. Desf. Ann.
microcarpa Jacq. H. Sch.
cauliflora Jacq. H. Sch.

ORDO IV.

URTICÆ.

I. Flores in communi involucre monophyllo
reconditi.

FIGUS

carica L.
— violacea.
— mauritiana Encycl.
ulmifolia Encycl.
symphytifolia Encycl.
macrophylla
nymphæifolia L. Mant.

laurifolia Encycl. }
martinicensis Willd. sp. }
citrifolia Encycl. (non Willd.)
crassinervia

benghalensis L.
rubiginosa Vent. Malm. }
australis Willd. sp. }
populnea Willd. sp.
— religiosa L.
— racemosa L.
— vestita.
— phytolaccæfolia.
— glaucophylla. }
— cordata Thunb. Prodr. }
— undulata.
— pyrifolia.
— arbutifolia. }
— microcarpa. L. f. }

— indicæ vel duntax.
— nitida.
— umbra.
— hirta, umbra.

veloutée, Mexique. s. ch. 5
en bouclier. Antilles. s. ch. 5
fétide. Antilles. s. ch. 5
incarnate. Brésil. s. ch. 5

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil. or. 5 (orn.)
filamenteuse. Antilles. s. ch. 5

PAPAYER

commun. Inde. s. ch. 5
monoïque. s. ch. 5
à petit fruit. Caracas. s. ch. 5
à tige fleurie. Caracas. s. ch. 5

ORDRE IV.

ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre
monophylle.

FIGUIER

cultivé. F. (écon.)
— violet.
de l'île de France. s. ch. 5
à f. d'orme. Inde. s. ch. 5
à f. de consoude. Inde. s. ch. 5
à grandes f. N. Holl. or. 5
à f. de Nymphéa. Caracas. s.
ch. 5

à f. de Laurier. Ant. s. ch. 5
à f. de Citronnier. Ant. s. ch. 5
à grosses nervures. Antilles. s.
ch. 5
du Bengale. s. ch. 5

rouillé. N. Holl. or. 5
à f. de Peuplier. Ant. s. ch. 5
des pagodes. Inde. s. ch. 5
à grappes. Inde. s. ch. 5
écailleux. s. ch. 5
à f. de Phytolacca. s. ch. 5

glauc. Cap. s. ch. 5
ondulé. Antilles. s. ch. 5
à feuilles de Poirier. s. ch. 5
à f. d'Arbousier. Ant. s. ch. 5

des Indes.

vingt.

pumila L.
scandens *Encycl.* }
stipulata *Willd. sp.* }

à réseau. chine. s. ch. ♪
sarmenteux. Antilles. s. ch. ♪

DORSTENIA

contrayerva L.

DORSTENIA

contrayerva. Pérou. s. ch. ♣
(méd.)

II. Flores receptaculo communi multifloro
impositi, aut squamis involucrentibus
capitati, aut distincti sparsi.

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou
réunies en une tête accompagnée d'é-
cailles, ou distinctes et éparses.

CECROPIA

peltata L.

CÉCROPIA

en bouclier. cayenne. s. ch. ♪

ARTOCARPUS

— integrifolia L. f.

ARTOCARPUS

à f. entières. Antilles. s. ch. ♪

MORUS

alba L.
italica *Encycl.*
constantinopolitana.
nigra L.
rubra L.

MURIER

blanc. Asie min. ♪ (écon.)
d'Italie. ♪ (écon.)
de Constantinople. ♪ (écon.)
noir. Asie min. ♪ (écon.)
rouge. Am. s. (écon.)

BROUSSONETIA

papyrifera *Willd. sp.* }
morus papyrifera L. }

BROUSSONÉZIA

mûrier à papier. chine. ♪
(écon.)

URTICA.

1. Foliis alternis.

baccifera L.
nivea L.
canadensis L.

ORTIE.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Antilles. s. ch. ♪
cotonneuse. chine. or. ♪
de Canada. ℥

2. Foliis oppositis.

pumila L.
crassifolia *Willd. sp.*
— cylindrica L. *vel Boehmeria*
cannabina L.
dioica L.
urens L.
pilulifera L.
nodartii L.

2. Feuilles opposées.

naine. Am. s. ♣
à f. épaisses. Ant. s. ch. ♪
cylindrique. Am. s. ℥
de Sibérie. ♣ (écon.)
dioïque. F. ℥
grièche. F. ⊙
à globules. F. ⊙
de Dodart. F. ⊙

FORSKALEA

tenacissima L. *Mant.*
angustifolia *Willd. sp.*

FORSKALÉA

à larges feuilles. barbarie. ⊙
à feuilles étroites. Afr. ⊙

PARIETARIA

officinalis L.
arborea *Her. stirp.* }
urtica arborea L. f. }

PARIÉTAIRE

officinale. F. ♣ (méd.)
en arbre. canaries. or. ♪

HUMULUS
lupulus L.

CANNABIS
sativa L.

THELIGONUM
cynocrambe L.

DATISCA
cannabina L.

Genera urticis affinia.

PIPER
medium Jacq. ic. }
plantagineum Encycl. }
aduncum L. }
scabrum Encycl. }
discolorum.
umbellatum L.
celtidifolium
tuberculatum Jacq. ic.
cuneifolium Jacq. ic.
magnoliæfolium Jacq. ic.
— portulacoides Lmk ill.
pereskiaefolium Jacq. ic.
blandum Jacq. ic.
rhomboidale.
suaveolens.
nitens.
pulchellum H. K.

IVA
frutescens L.

AMBROSIA
bidentata Mich. Fl.
artemisiæfolia L.
maritima L.
trifida L.
arborescens Encycl.
xanthium fruticosum L. f. }
franseria ambrosioides Cav. }
ic.

XANTHIUM
strumarium L.
orientale L.
— spinosum L.

HOUBLON
cultivé. ℥ (écon.)

CHANVRE
cultivé. inde. ⊙ (écon.)

THÉLIGONUM
cynocrambé. F. ⊙

DATISCA
chanvre de Crète. orient. ℥

Genres qui ont de l'affinité avec les
Orties.

POIVRE
moyen. Antilles. s. ch. ♪
crochu. cayenne. s. ch. ♪
de deux couleurs. Ant. s. ch. ♪
ombellifère. Antilles. s. ch. ♪
à feuilles de celtis. s. ch. ♪
tuberculeux. Am. m. s. ch. ♪
cunéiforme. Antilles. s. ch. ♪
à f. de magnolia. Ant. s. ch. ♪
à f. de pourpier. ile de Fr.
s. ch. ℥
à f. de péreskia. Ant. s. ch. ℥
à longs épis. Ant. s. ch. ℥
rhomboidal. s. ch. ℥
odorant. s. ch. ℥
vernissé. s. ch. ℥
élégant. Antilles. s. ch. ℥

IVA
arbrisseau. virginie. or. ♪

AMBROISIE
à deux dents. Am. s. ℥
à feuilles d'Armoise. Am. s. ℥
maritime. F. ℥
à trois lobes. Am. s. ⊙

en arbre. Pérou. or. ♪

LAMPOURDE
commune. F. ⊙
d'Orient. ⊙
épineuse. F. m. ⊙

ORDO V.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditæ.

FOTHERGILLA

alnifolia L. f.
— lanceolata.

ULMUS

campestris L.
— latifolia.
— suberosa.
pedunculata Foug. Acad. }
effusa Willd. sp. }
americana L. }
rubra Mich. Arb. }
fulva Mich. Fl. }
chinensis. }
parvifolia Jacq. H. Sch. }

PLANERA

ulmifolia Mich. Fl.
crenata.
richardi Mich. Fl. }
ulmus polygama Encycl. }
rhamnus carpinifolius Pall. }
ROSS.

II. Flores unisexuales.

CELTIS

australis L.
occidentalis L.
cordata. }
crassifolia Encycl. }
— Tournefortii Encycl. Vulgi orni monticola.
sinensis Bosc. Dict.
aspera.
mississippiensis Bosc, Dict.

SALIX.

1. Folia glabra.

helix L.
triandra L.
hermaphroditica L.
pentandra L.
purpurea L.
rubra Smith, Fl.
vitellina L.

ORDRE V.

AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA

à feuilles d'aune. Am. s. ♀
— lancéolé.

ORME

champêtre F. ♀ (arts.)
— à larges feuilles.
— jongueux.

pédonculé. F. ♀

d'Amérique. ♀

rouge. Am. s. ♀

de Chine. or. ♀

PLANÉRA

à feuilles d'orme. Am. s. ♀

à feuilles crénelées. sibér. ♀

II. Fleurs unisexuelles.

MICOUCOULIER

de Provence. ♀ (arts, orn.)

de Virginie. ♀ (arts, orn.)

à feuilles en cœur. Am. s. ♀

de Tournefort. orient. ♀

de Chine. ♀

rapeux. Am. s. ♀

du Missisipi. ♀

SAULE.

1. Feuilles glabres.

hélix. F. ♀

à trois étamines. F. ♀

hermaphrodite. F. ♀

à cinq étamines. F. ♀

pourpre. F. ♀

rouge. F. ♀

osier jaune. F. ♀

nigra willd. sp.
fragilis L.
præcox willd. sp.
amygdalina L.
babylonica L.
pontederana willd. sp.
myrsinites L.
retusa L.

2. *Folia villosa.*

reticulata L.
incubacea L.
fusca L.
incubacea Encycl. }
lanata.
arenaria L. ? }
riparia willd. sp. }
lavandulæfolia Lapeyr. Fl. }
alba L.
viminalis L.
acuminata Smith, Fl.
aurita L.
aquatica Smith, Fl.
caprea L.

POPULUS

alba L.
 — *grisea.*
tremula L.
grandidentata Mich. Arbr.
græca H. K.
fastigiata
dilatata willd. sp. }
nigra L.
hudsoniana Mich. Arbr.
virginiana
molinifera H. K. }
canadensis Mich. Arbr.
angulata H. K.
marilandica Bosc, Dict.
heterophylla L.
argentea Mich. Arbr. }
balsamifera L.
candicans willd. sp.

MYRICA

galé L.
cerifera L.
pensylvanica
caroliniensis willd. sp. }

noir. Am. s. }
fragile. F. }
précoc. F. }
à feuilles d'amanier. F. }
pleureur. orient. }
de Pontédéra. Alpes. }
myrsinites. Alpes. }
émoussé. F. }

2. Feuilles velues.

à réseau. Alpes. }
des dunes. F. }
brunâtre. F. }
laineux. Alpes. }
à f. de Lavande. Pyrénées. }
blanc. F. }
à longues feuilles. F. }
acuminé. F. }
auriculé. F. }
aquatique. F. }
marceau. F. }

PEUPLIER

blanc. F. }
 — *grisaille.*
Tremble. F. }
à grandes dents. Am. s. }
d'Athènes. orient. or. }
d'Italie. }
noir. F. }
de la baie de Hudson. }
suisse. Am. s. }
de Canada. }
anguleux ou de Caroline. }
de Mariland. }
argenté. Am. s. }
Baumier. Am. s. }
blanchâtre. Am. s. }

MYRICA

galé. F. }
cirier de la Louis. } (écon.)
de Pensylvanie. } (écon.)

cordifolia L.
 quercifolia L.
 serrata *Encycl.*
 Faya H. K.
 trifoliata. }
 Rhus suaveolens L. }

à feuilles en cœur. cap. or. ♪
 à feuilles de chêne. cap. or. ♪
 à feuilles en scie. cap. or. ♪
 Faya. mère. or. ♪
 à feuilles ternées. Am. s. ♪

BETULA

alba L.
 populifolia Mich. Arbr.
 nigra H. K.
 lutea Mich. Arbr.
 papyrifera Mich. Fl.
 lenta L.
 excelsa Willd. sp.
 nana L.
 pumila L.

BOULEAU

blanc. F. ♪ (écon.)
 à feuil. de peuplier. Am. s. ♪
 noir. Am. s. ♪
 jaune. Am. s. ♪
 à papier. Am. s. ♪
 Merisier. Am. s. ♪
 élevé. Am. s. ♪
 nain. Sibérie. ♪
 à feuil. de Marceau. Am. s. ♪

ALNUS

communis. }
 glutinosa Willd. sp. }
 — laciniata.
 subrotunda
 incana Willd. sp.
 serrulata Willd. sp.
 cordata.

AUNE

commun. F. ♪
 — lacinié
 à feuilles arrondies. Am. s. ♪
 blanc. Alpes. ♪
 à feuilles en scie. Am. s. ♪
 à feuilles en cœur. ♪

CARPINUS

betulus L.
 — quercifolius.
 americana L.
 virginiana L.
 ostrya virginiana Willd. sp. }
 ostrya L. }
 ostrya vulgaris Willd. sp. }
 — americana.

CHARME

commun. F. ♪
 — à feuilles de chêne.
 d'Amérique. ♪
 de Virginie. ♪
 Houblon. Italie. ♪
 d'Amérique.

FAGUS

sylvatica L.
 purpurea
 ferruginea Willd. sp. }

HÊTRE

des bois. F. ♪
 pourpre. Am. s. ♪ (orn.)

CASTANEA

vesca Willd. sp. }
 fagus castanea L. }
 pumila Willd. sp. }
 fagus pumila L. }

CHATAIGNIER

commun. F. ♪ (écon.)
 chincapin. Am. s. ♪ (écon.)

QUERCUS.

1. Foliis perennantibus.

ilex L.

CHÊNE.

1. Feuilles persistantes.

Yeuse. F. ♪

— integrifolia.
— longifolia.
suber L.
ballota Desf. Atl.

coccifera L.
cinerea Mich. Arbr.
virens Mich. Arbr.

2. Foliis deciduis.

phellos L.
pseudo-suber Desf. Atl.
ægylopiifolia Encycl.
crinita Bosc, Dict.
cerris L.
Tauza Bosc, Dict. }
pubescens Willd. }
lusitanica Bosc, Dict.
infectoria Oliv. Itin.
prasina Bosc. Dict.
rubra L.
coccinea Mich. Arbr.
catesbæi Mich. Arbr.
obtusiloba Mich. Arbr.
aquatica L.
pannosa Bosc. Dict. }
discolor Mich. Arbr. }
tinctoria Mich. Arbr.
Prinus Mich. Arbr.
alba L.
robur L.
pedunculata Willd. sp.
fastigiata Encycl.
apennina Encycl.

CORYLUS

rostrata H. K.
americana Mich. Arbr.
avellana L.
tubulosa Willd. sp.
colurna L.
bizantina

LIQUIDAMBAR

styraciflua L.
imberbe H. K.

COMPTONIA

asplenifolia H. K.

— à feuilles entières.
— à feuilles longues.
Liège. F. m. or. ♀ (écon.)
ballote ou à glands doux. Alger. or. ♀ (écon.)
au kermès. F. m. ♀
cendré. Am. s. ♀
verdoyant. Am. s. ♀

2. Feuilles tombantes.

à feuilles de saule. Am. s. ♀
faux Liège. Alger. ♀
à feuilles d'Égyptes. F. ♀
crinite. F. ♀
cerris. F. ♀
Tauzin. F. ♀
de Portugal. ♀
à la noix de galle. perse. ♀
prase. Portugal. ♀
rouge. Am. s. ♀
écarlate. Am. s. ♀
de Catesby. Am. s. ♀
à lobes obtus. Am. s. ♀
aquatique. Am. s. ♀
velouté. Am. s. ♀
quercitron. Am. s. ♀ (écon.)
Prinus. Am. s. ♀
blanc. Am. s. ♀
rouvre. F. ♀
pédonculé. F. ♀
pyramidal. Portugal. ♀
des Apennins. ♀

NOISETIER

cornu. Am. s. ♀
d'Amérique. ♀
avelinier. F. ♀
avelinier rouge. F. ♀
glabre. orient. ♀
de Byzance. ♀

COPALME

d'Amérique. ♀
d'Orient. ♀

COMPTONIA

à f. d'Asplénium. Am. s. ♀

PLATANUS

- orientalis L.
— acerifolia.
occidentalis L.

PLATANE

- d'Orient. ♪ (orn. écon.)
— à feuilles d'érable.
d'Occident. Am. s. ♪ (orn.
écon.)

ORDO VI.

CONIFERÆ.

EPHEDRA

- monostachya L.
distachya L.
altissima Desf. Atl.

EPHÉDRA

- à un épi. sibérie. ♪
à deux épis. F. ♪
élevé. barbarie. ♪

CASUARINA

- equisetifolia L. f.
torulosa H. K.
stricta H. K.
distyla Vent. H. cels. }
quadridentata. }

CASUARINA

- à f. de préle. inde. s. ch. ♪
tuberculeux N. Holl. or. ♪
ramassé. N. Holl. or. ♪
à quatre dents. N. Holl. or. ♪

TAXUS

- baccata.

PODOCARPUS

- *Japon cap. et une épine*
elongata L'Her. Mss. }
taxus elongata H. K. }

IF

- commun F. ♪ (écon.)
Japon et en Chine

PODOCARPUS

- allongé. cap. or. ♪

JUNIPERUS

- communis L.
— suecica.
oxycedrus L.
bermudiana L.
virginiana L.
phoenicea L.
sabina mas C. B.
sabina foemina C. B.
thurifera H. K.
prostrata Mich. Fl.
excelsa Willd. sp. }
hermanni Pers. syn. }

GENÉVRIER

- commun. F. ♪ (écon.)
— de Suède.
cade. F. ♪ (écon.)
des Bermudes. ♪ (écon.)
de Virginie. ♪ (orn. écon.)
de Phénicie. F. m. or. ♪
sabine mâle. F. ♪ (méd. orn.)
sabine femelle. F. ♪ (méd.)
à l'encens. Espagne. ♪
couché. Am. s. ♪
élevé. orient. ♪

CUPRESSUS

- sempervirens L.
— horizontalis.
pendula L'Her. stirp. }
lusitanica Mill. Dict. }
thyoides L.
juniperoides L.

CYPRÈS

- pyramidal. crête. ♪ (écon.)
— horizontal.
pendant. Goa. or. ♪
faux thuya. Am. s. ♪ (écon.)
faux genévrier. cap. or. ♪

SCHUBERTIA *mirbel.*

disticha.
cupressus disticha L. }

THUYA

occidentalis L.
orientalis L.
articulata Vahl, symb.

PINUS

sylvestris L.
 — *genevensis.*
 — *rubra.*
laricio Encycl.
mughus Willd. sp.
pumilio Willd. sp.
maritima Encycl.
pinea L.
halepensis Willd. sp.
mitis Mich. Fl.
tæda L.
rigida Mich. Arbr.
inops Mich. Arbr.
palustris Willd. sp. }
australis Mich. Arbr. }
strobilus L.
adunca Bosc.
cembro L.

ABIES

taxifolia. }
pinus picea L. }
balsamea L.

canadensis Mich. Arbr.

nigra Mich. Arbr.
alba Mich. Arbr.
picea. }
pinus abies L. }
columbaria.

LARIX

europæa }
pinus larix L. }
americana Mich. Fl.
pinus microcarpa Lambert, }
pin. }
cedrus. }
pinus cedrus L. }

SCHOUBERTIA

cyprès chauve. ♪ (écon.)

THUYA

d'Occident. Am. s. ♪ (orn.)
de la Chine. ♪ (orn.)
articulé. Barbarie. or. ♪ (écon.)

PIN

sauvage. ♪
 — *de Genève.*
 — *rouge.*
Laricio. Corse ♪
Mugo. Alpes. ♪
pumilio. Carinthie. ♪
maritime F. ♪ (écon.)
à pignons. F. M. ♪ (écon.)
d'Alep. F. ♪
jaune. Am. s. ♪
Téda. Am. s. ♪
épineux. Am. s. ♪
chétif. ♪

de marais. Am. s. ♪

de Weimouth. Am. s. ♪ (écon.)
de Monteray. ♪
cembro. Alpes. ♪

SAPIN

argenté. F. ♪ (écon.)
baumier de Gilead. Am. s. ♪
 (méd.)
Hémelock-spruce. Am. s. ♪
 (orn.)
sapinette noire. Am. s. ♪
sapinette blanche. Am. s. ♪

epicia. F. ♪ (écon.)

hérissé, île Norfolk. or. ♪

MÉLÈZE

d'Europe. Alpes. ♪ (écon.)

d'Amérique. ♪

cèdre du Liban. Asie min. ♪
 (orn.)

Genera incertæ sedis.

- POLLICHIA
campestris H. K.
nekeria campestris Cmel. }
syst.
- ARDISIA
crenulata Vent. ch. de pl.
- CHLORANTHUS
inconspicuus l'Her. sert.
- AZIMA
tetracantha Encycl.
monetia barlerioides l'Her. }
stirp.
- MONOTROPA
hypopitys L.
- EUCLEA
racemosa L. f.
- ARISTOTELIA
macqui l'Her. stirp.
- SARRACENIA
purpurea L.
flava L.
- BEGONIA
nitida H. K.
obliqua l'Her. stirp. }
minor Jacq. ic.
purpurea Swartz, prodr. }
dichotoma Jacq. ic.
suaveolens.
humilis Willd. sp.
hirsuta Aublet, Guyan.
discolor H. K.
- COMMERSIONIA
echinata L. f.
- ANTIDESMA
alexiteria L.
- POGONIA
debilis Andr. rep.
scabra.
- BALANOPTERIS
tothila Cærtm. fruct.

Genres non classés.

- POLLICHIA
des champs. cap. or. ♂
- ARDISIA
crénelé. Antilles. s. ch. ♀
- CHLORANTHUS
à petites fleurs. chine. s. ch. ♀
- AZIMA
à quatre épines. inde. s. ch. ♀
- MONOTROPA
hypopitys. F. ℥
- EUCLEA
à grappes. cap. or. ♀
- ARISTOTELIA
macqui. chili. or. ♀
- SARRACENIA
pourpre. am. s. ♀
jaune. am. s. ℥
- BÉGONIA
luisant Antilles. s. ch. ♀
dicotome. caracas. s. ch. ♀
odorant. s. ch. ♀
nain. inde. s. ch. ♂
hérissé. cayenne. s. ch. ♂
discolor. chine. s. ch. ℥
- COMMERSIONIA
à fruit hérissé. otaiti. s. ch. ♀
- ANTIDESMA
alexitére. ile de fr. s. ch. ♀
- POGONIA
à tiges grêles. n. holl. or. ♀
à feuilles rudes. n. holl. or. ♀
- BALANOPTÉRIS
tothila. inde. s. ch. ♀

CONDALIA
microphylla Cav. Ic.

CONDALIA
à petites feuilles. chili. s. ch. ♪

SAMYDA
serrulata L.

SAMYDA
à feuilles en scie. Ant. s. ch. ♪

CORIARIA
myrtifolia L.

REDOUL
à feuell. de myrte. F. ♪ (écon.)

PANDANUS
odoratissimus Jacq. Fragm. }
utilis Willd. Enum. }

VACOVA
odorant. madagascar. s. ch. ♪

GINKGO
biloba L. Mant. }
salisburia adiantifolia Smith, }
Soc. L. }

GINKGO
bilobé. chine. ♪ (écon.)

- ~~... (faint handwritten text)~~ (ind.)
- Agatophyllum moniticum (Laminac.) 46.
 - Melanthera verticillata - Rubiac. 135.
 - Danis. f. ... - D. - 161.
 - ... - D. - 16.
 - ... - Guttifera. 161.
 - ... - F I N. 1.
 - Cythropspermum ... - 176.
 - ... - 15.
 - ... - 93.
 - ... - 93.
 - ... - 161.
 - ... - 207.
 - ... - 198.
 - ... - 1.
 - ... - 207.
 - ... - 135.
 - ... - 93.
 - ... - 135.
 - ... - 41.
 - ... - 161.
 - ... (ind.)
 - ... - 199.
 - ... - 21.
 - ... - 26.
 - ... - 135.
 - ... - 64.
 - ... - 231.
 - ... - 93.

INDEX GENERUM.

A

Abies.	Page 247	Alcina.	Page 127
Abroma.	173	Aletris.	28
Abrus.	220	Aleurites.	236
Acacia	207	Alisma.	26
Acalypha.	236	ALISMACEÆ.	<i>Ibid.</i>
ACANTHÆÆ.	61	Allamanda.	93
Acanthus.	<i>Ibid.</i>	Allium.	32
Acer.	159	Allophyllus.	159
ACERA.	<i>Ibid.</i>	Alnus.	244
Achillea.	125	Aloe.	28
Achras.	94	Alopecurus.	11
Achyranthes.	53	Alsine.	181
Aconithum.	148	Alstroemeria.	53
Acorus.	7	Althæa.	170
Acrostichum.	2	Alyssum.	155
Actæa.	149	AMARANTI.	52
Adansonia.	173	Amarantus.	<i>Ibid.</i>
Adelia.	235	Amaryllis.	34
Adenantha.	210	Ambrosia.	241
Adiantum.	4	Ambrosinia.	6
Adonis.	146	Amellus.	129
Adoxa.	190	AMENTACEÆ.	242
Ægilops.	16	Amethystea.	66
Ægiphila.	64	Amirola.	159
Ægopodium.	138	Anmi.	143
Æschinomene.	226	Amomum.	39
Æsculus.	159	Amorpha.	220
Æthusa.	140	Amygdalus.	206
Agapanthus.	33	Amyris.	228
Agave.	<i>Ibid.</i>	Anacardium.	227
Ageratum.	116	Anacyclus.	117
Agrimonia.	203	Anagallis.	57
Agriphyllum.	130	Anagyris.	211
Agrostemma.	185	Anamenia.	146
Agrostis.	13	Anarrhinum.	78
Agyneia.	235	Anastatica.	156
Aira.	16	Anchusa.	87
Ajuga.	69	Ancistrum.	202
Aizoon.	193	Andrachne.	235
Albuca.	31	Andromeda.	97
Alchimilla.	203	Andropogon.	15

Androsace.	Page 57	AROIDEÆ.	Page 6
Andryala.	105	Artemisia.	112
Anemone.	146	Artocarpus.	240
Anethum.	139	Arum.	6
Angelica.	141	Arundo.	21
Anigozanthos.	34	Asarum.	45
Anona.	174	Asclepias.	95
ANONÆ.	174	Ascyrum.	160
Anthemis.	124	ASPARAGINEÆ.	25
Anthericum.	29	Asparagus.	<i>Ibid.</i>
Antholiza.	38	Asperugo.	87
Anthospermum.	134	Asperula.	152
Anthoxanthum.	10	Asphodelus.	30
Anthyllis.	215	Aspidium.	2
Antidesma.	248	Asplenium.	3
Antirrhinum.	78	Asprella.	18
Apargia.	104	Aster.	121
Aphyllantes.	25	Astragalus.	221
Apium.	139	Astrantia.	144
APOCYNÆ.	92	Athamanta.	142
Apocynum.	<i>Ibid.</i>	Athanasia.	117
Aquilegia.	148	Atractylis.	108
Arachis.	215	Atragene.	145
Aralia.	158	Atraphaxis.	47
ARALIÆ.	<i>Ibid.</i>	Atriplex.	51
Arbutus.	97	ATRIPLICEÆ.	49
Arctium.	108	Atropa.	81
Arctotis.	130	Aucuba.	252
Ardisia.	248	Avena.	21
Arduinia.	95	Averrhoa.	229
Arenaria.	182	AURANTIA.	161
Aretia.	57	Axyris.	52
Argemone.	149	Ayenia.	175
Aristida.	14	Aylantus.	228
ARISTOLOCHIÆ.	42	Aytonia.	165
Aristolochia.	<i>Ibid.</i>	Azalea.	95
Aristotelia.	248	Azima	248

B

Baccharis.	114	Banksia.	45
Balanites.	161	Barleria.	61
Balanopteris.	248	Basella.	50
Balbisia.	129	Bauhinia.	211
Ballota.	75	Beckmannia.	12
Balsamita.	111	Befaria.	96
Baltimora.	127	Begonia.	248
Banisteria.	160	Bellis.	117

Bellium.	Page 119	Boronia.	Page 179
BERBERIDES.	175	Bosea.	49
Berberis.	<i>Ibid.</i>	Botrychium.	1
Beta.	50	Brassica.	151
Betonica.	72	Briza.	21
Betula.	244	Bromelia.	35
Bidens.	129	Bromus.	18
Bignonia.	90	Broussonetia.	240
BIGNONIÆ.	90	Browallia.	79
Billardiera.	84	Brucea.	228
Biscutella.	154	Brunia.	252
Biserrula.	223	Brunnichia.	47
Bistropogon.	71	Brunsfelsia.	84
Bixa.	177	Bryonia.	237
Blackwellia.	207	Bubon.	140
Blakea.	199	Bucida.	43
Blechnum.	5	Budleia.	76
Blitum.	52	Bufonia.	181
Bocconia.	150	Bulliarda.	187
Boebera.	120	Bunias.	157
Boerhaavia.	55	Bunium.	143
Boltonia.	121	Buphthalmum.	126
Bombax.	173	Buplevrum.	143
Bonplandia.	89	Bursera.	228
Bontia.	84	Butomus.	26
BORAGINEÆ.	84	Buxus.	255
Borago.	87	Byttneria.	173
Borbonia.	212		

C

Cacalia.	115	Calycanthus.	207
Cachrys.	142	Calyptranthes.	198
CACTI.	191	Calyxymenia.	55
Cactus.	<i>Ibid.</i>	Camellia.	162
Cæsalpinia.	210	Cameraria.	92
Cakile.	157	Campanula.	98
Caladium.	6	CAMPANULACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Calceolaria.	78	Camphorosma.	49
Calea.	117	Canarina.	98
Calendula.	119	Canna.	59
Calla.	6	Cannabis.	241
Callicarpa.	64	CANNÆ.	59
Callicoma.	190	Cantua.	89
Calligonum.	48	CAPPARIDÆÆ.	157
Callistachys.	212	Capparis.	158
Callitriche.	5	Capraria.	76
Caltha.	149	CAPRIFOLIA.	136

Capsicum.	Page 83	Chelone.	Page 90
Cardamine.	154	Chenopodium.	51
Cardiospermum.	158	Cherleria.	182
Carduus.	107	Chiococca.	135
Carex.	7	Chionanthus.	63
Carica.	259	Chironia.	91
Carlina.	108	Chlora.	<i>Ibid.</i>
Carpesium.	112	Chloranthus.	248
Carpinus.	244	Chloris.	15
Carthamus.	108	Chondrilla.	101
Carum.	139	Chondrosium.	15
CARYOPHYLLÆ.	180	Chorizema.	212
Caryota.	22	Chrysanthemum.	118
Cassia.	209	Chrysocoma.	115
Cassine.	230	Chrysophyllum.	94
Castanea.	244	Chrysosplenium.	190
Casuarina.	246	Cicer.	225
Catabrosa.	16	Cichorium.	106
Catananche.	106	Cicuta.	140
Caucalis.	143	Cinara.	107
Ceanothus.	232	Cineraria.	123
Cecropia.	240	Cinna.	10
Cedrela.	163	Circæa.	196
Celastrus.	229	Cissus.	163
Celosia.	53	CISTI.	177
Celsia.	79	Cistus.	<i>Ibid.</i>
Celtis.	242	Citharexylum.	65
Cenchrus.	15	Citrus.	162
Centaurea.	109	Claytonia.	193
Centunculus.	56	Clematis.	145
Cephalanthus.	135	Cleome.	157
Cephalophora.	116	Cleonia.	76
Cerastium.	181	Clerodendrum.	64
Ceratonia.	209	Clethra.	97
Ceratophyllum.	5	Cliffortia.	203
Cerbera.	93	Clinopodium.	74
Cercis.	211	Clitoria.	220
Cercodia.	195	Clusia.	161
Cerithe.	85	Clutia.	235
Cestrum.	84	Clypeola.	154
Ceterach.	2	Cneorum.	228
Chærophyllum.	139	Cnicus.	106
Chamærops.	22	Cobœa.	89
Chamagrostis.	14	Coccoloba.	46
Chara.	5	Cochlearia.	155
Cheilanthes.	4	Coffea.	135
Cheiranthus.	152	Coix.	22
Chelidonium.	150	COLCHICACEÆ.	27

Colchicum.	Page 27	Cratægus.	Page 200
Colletia.	231	Cratæva.	158
Collinsonia.	68	Crepis.	103
Columnea.	78	Crescentia.	84
Colutea.	221	Crinum.	54
Comarum.	204	Crithmum.	142
Commelina.	26	Crocus.	58
COMMELINEÆ.	<i>Ibid.</i>	Crotalaria.	214
Commersonia.	248	Croton.	236
Comocladia.	228	Crovea.	179
Comptonia.	245	Crucianella.	133
Condalia.	249	CRUCIFERÆ.	150
CONIFERÆ.	246	Crypsis.	11
Conium.	143	Cucubalus.	185
Convallaria.	24	Cucumis.	237
CONVOLVULACEÆ.	88	Cucurbita.	<i>Ibid.</i>
Convolvulus.	<i>Ibid.</i>	CUCURBITACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Conyza.	114	Cuminum.	140
Cookia.	161	Cupania.	159
Corchorus.	176	Cuphea.	199
Cordia.	84	Cupressus.	246
Coreopsis.	127	Curcuma.	40
Coriandrum.	140	Cuscuta.	89
Coriaria.	249	Cussonia.	158
Coris.	57	Cyanella.	51
Corispermum.	52	CYCADEÆ.	4
Cornucopiæ.	11	Cycas.	<i>Ibid.</i>
Cornus.	137	Cyclamen.	58
Cornutia.	64	Cydonia.	200
Coronilla.	225	Cymbidium.	41
Coronopus.	155	Cynanchum.	93
Correa.	179	Cynodon.	12
Corrigiola.	193	Cynoglossum.	87
Cortusa.	58	Cynosurus.	17
Corylus.	245	CYPEROIDEÆ.	7
Cosmos.	128	Cyperus.	10
Costus.	40	Cypripedium.	41
Cotula.	117	Cyrilla.	97
Cotyledon.	188	Cyrthantus.	34
Cranbe.	157	Cytisus.	215
Crassula.	187		

D

Dactylis.	17	Dalea.	215
Dahlia.	127	Dalechampia.	237
Dais.	44	Danthonia.	20
Dalbergia.	226	Daphne.	44

Dalisco.	Page 241	DIPSACEÆ.	Page 139
Datura.	80	Dipsacus.	131
Davallia.	4	Dirca.	44
Daucus.	143	Disandra.	60
Daviesia.	212	Disodium.	127
Decumaria.	198	Dodartia.	77
Delphinium.	148	Dodecatheon.	58
Dentaria.	154	Dodonæa.	229
Dianella.	23	Dolichos.	219
Dianthus.	185	Dombeya.	175
Diasia.	38	Doriantes.	33
Dichondra.	85	Doronicum.	120
Dictamnus.	179	Dorstenia.	240
Diervilla.	136	Draba.	155
Digitalis.	78	Dracæna.	23
Digitaria.	12	Dracocephalum.	75
Dillenia.	174	Dracontium.	7
Dineba.	17	Drepania.	103
Dioscorea.	25	Drimmia.	30
Diosma.	180	Drosera.	158
Diospyros.	94	Dryas.	205
Diotis.	117	Duranta.	65

E

Ebenus.	215	Epidendrum.	42
Echeandia.	29	Epigæa.	97
Echinaria.	16	Epilobium.	196
Echinophora.	144	Epimedium.	175
Echinops.	111	Epipactis.	41
Echiooides.	87	EQUISETACEÆ.	4
Echium.	86	Equisetum.	4
Eclipta.	126	Erianthus.	14
Ehretia.	84	Erica.	96
Ehrharta.	22	ERICÆ.	<i>Ibid.</i>
ELÆAGNEÆ.	43	Erigeron.	121
Elæagnus.	<i>Ibid.</i>	Erinus.	60
Elæodendrum.	231	Erioccephalus.	119
Elatine.	181	Eriogonum.	49
Elephantopus.	111	Eriophorum.	9
Eleusine.	17	Eriospermum.	31
Elichrysum.	113	Erodium.	166
Ellisia.	85	Ervum.	225
Elymus.	17	Eryngium.	144
Embothrium.	45	Erysimum.	152
Empetrum.	98	Erythrina.	220
Encelia.	127	Erythronium.	27
Ephedra.	246	Erythroxyllum.	160

Ethulia.	Page 111	Eupatorium.	Page 116
Eucalyptus.	198	Euphorbia.	233
Euclea.	248	EUPHORBIAEÆ.	252
Eucomis.	30	Euphoria.	159
Eugenia.	198	Euphrasia.	60
Evolvulus.	89	Eutaxia.	212
Evonymus.	229		

F

Faba.	225	Flacurtia.	176
Fabricia.	197	Flaveria.	111
Fagara.	228	FLOSCULOSÆ.	106
Fagonia.	179	Fontanesia.	63
Fagus.	244	Forskalea.	240
Fedia.	152	Fothergilla.	242
Ferraria.	56	Fragaria.	204
Ferula.	142	Frankenia.	186
Festuca.	19	Fraxinus.	62
FICOIDEÆ.	193	Fritillaria.	27
Ficus.	239	Fuchsia.	197
Filago.	113	Fumaria.	150
FILICES.	I		

G

Galanthus.	35	Geum.	204
Galardia.	129	Ginkgo.	249
Galaxia.	58	Githago.	185
Galega.	223	Gladiolus.	38
Galenia.	49	Glaux.	199
Galeobdolon.	72	Glecoma.	72
Galeopsis.	<i>Ibid.</i>	Gleditsia.	209
Galinsoga.	129	Glinus.	193
Galium.	133	Globba.	59
Gardenia.	134	Globularia.	58
Garidella.	148	Glycine.	220
Gastridium.	15	Glycyrrhiza.	223
Gaultheria.	97	Gnaphalium.	113
Gaura.	196	Gnidia.	44
Genista.	212	Gomphrena.	53
Gentiana.	91	Goodenia.	100
GENTIANEÆ.	<i>Ibid.</i>	Goodia.	214
Geoffrea.	226	Gordonia.	173
GERANIA.	161	Gorteria.	120
Geranium.	166	Gossypium.	172
Geropogon.	105	Gouania.	232
Gesneria.	99	GRAMINEÆ.	10

Grangea.	Page 112	Guettarda.	Page 135
Gratiola.	79	Guilandina.	210
Grewia.	176	GUTTIFERÆ.	161
Grindelia.	120	Gymnocladus.	209
Gronovia.	257	Gymnostyles.	111
GUAIACANÆ.	94	Gypsophila.	182
GUAIACUM.	179	Gyrocarpos.	160
Guazuma.	175		

H

Hæmanthus.	33	Hippocrepis.	225
Hæmatoxylum.	210	Hippophae.	43
Hakea.	45	Hippuris.	5
Halesia.	95	Hoffmenseggia.	210
Halleria.	76	Holcus.	15
Hamamelis.	175	Holosteum.	180
Hamellia.	135	Homalium.	207
Hebenstreitia.	66	Hopea.	95
Hedera.	157	Hordeum.	18
Hedychium.	40	Horminum.	75
Hedysarum.	226	Hornemannia.	78
Helenium.	119	Hortensia.	190
Helianthemum.	177	Hottonia.	57
Helianthus.	128	Houstonia.	134
Heliconia.	39	Humea.	111
Helicteres.	175	Humulus.	241
Heliocarpus.	176	Hura.	257
Heliophila.	152	Hyacinthus.	30
Heliotropium.	85	Hydrangea.	190
Helleborus.	148	HYDROCHARIDÆÆ.	42
Helmintia.	104	Hydrocharis.	<i>Ibid.</i>
Helonias.	27	Hydrocotyle.	144
Hemerocallis.	33	Hydroglossum.	1
Hemitomus.	79	Hydrophyllum.	85
Heracleum.	141	Hymenea.	211
Hermannia.	175	Hyosciamus.	80
Hernandia.	46	Hyoseris.	103
Herniaria.	54	Hypecoum.	150
Hesperis.	152	HYPERICA.	160
Heterosperma.	129	Hypericum.	160
Heuchera.	189	Hypochæris.	105
Hibiscus.	171	Hypoxis.	35
Hieracium.	102	Hyptis.	72
Hippia.	111	Hyssopus.	70
Hippocratea.	160		

I

Jambolifera.	Page 174	Iresine.	Page 53
Jasione.	100	IRIDEÆ.	36
JASMINEÆ.	62	Iris.	<i>Ibid.</i>
Jasminum.	65	Isatis.	157
Jatropha.	236	Isnardia.	199
Iberis.	156	Isopyrum.	148
Ilex.	230	Itea.	96
Illecebrum.	53	Iva.	241
Illicium.	174	Juglans.	229
Impatiens.	167	JUNCEÆ.	25
Imperatoria.	139	Juncus.	<i>Ibid.</i>
Indigofera.	225	Juniperus.	246
Inga.	209	Jussiaea.	196
Inula.	120	Justicia.	61
Ionidium.	178	Ixia.	57
Ipomœa.	88	Ixora.	135

K

Kæmpferia.	40	Kirganelia.	255
Kalankoe.	188	Kitaibelia.	168
Kalmia.	95	Knautia.	132
Kiggellaria.	255	Koelreuteria.	158
Killingia.	10	Kuhnia.	116

L

LABIATÆ.	66	Laserpitium.	141
Lachenalia.	31	Lasiopetalum.	252
Lachnea.	44	Latania.	25
Lactuca.	101	Lathræa.	61
Lagasca.	111	Lathyrus.	225
Lagerstromia.	199	Lavandula.	70
Lagoecia.	145	Lavatera.	169
Lagunea.	172	LAURINEÆ.	46
Lagurus.	14	Laurus.	<i>Ibid.</i>
Lamarkia.	17	Lawsonia.	199
Lanium.	72	Ledum.	95
Lampsana.	100	Leersia.	11
Lantana.	65	LEGUMINOSÆ.	207
Larix.	247	Lemna.	5
Larrea.	179	Leonurus.	73

Lepidium.	Page 156	Lobelia.	Page 99
Leptospermum.	197	Lolium.	17
Lessertia.	221	Lomandra.	25
Leucoium.	55	Lonicera.	156
Leuzea.	108	Lopezia.	195
Liatris.	115	Lotus.	218
Ligusticum.	141	Loureira.	236
Ligustrum.	64	Ludolphia.	15
LILIACEÆ.	27	Ludwigia.	196
Lilium.	28	Lunaria.	154
Limodorum.	41	Lupinus.	214
Limonia.	162	Luzula.	25
Limosella.	57	Lychnis.	185
Linaria.	77	Lycium.	83
Lindernia.	79	Lycopersicum.	81
Linnaea.	156	Lycopsis.	87
Linum.	186	Lycopus.	66
Liquidambar.	245	Lygeum.	22
Liriodendrum.	174	Lysimachia.	57
Lithospermum.	86	LYSIMACHIÆ.	56
Littorella.	55	Lythrum.	199

M

Madia.	119	Medeola.	25
Magnolia.	174	Medicago.	217
MAGNOLIÆ.	<i>Ibid.</i>	Melaleuca.	197
Mahernia.	176	Melampodium.	127
Maianthemum.	24	Melampyrum.	60
Malachra.	170	Melastoma.	199
Malaxis.	41	MELASTOMÆ.	<i>Ibid.</i>
Malope.	168	Melia.	163
Malpighia.	160	MELIACEÆ.	<i>Ibid.</i>
MALPIGHIACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Melianthus.	180
Malva.	169	Melica.	16
MALVACEÆ.	168	Melilotus.	216
Malvaviscus.	172	Melissa.	74
Malus.	199	Melittis.	75
Mammea.	161	Melochia.	172
Mangifera.	227	Melotria.	237
Manulea.	60	MENISPERMA.	175
Maranta.	40	Menispermum.	175
Marrubium.	73	Mentha.	71
Marsilea.	4	Mentzelia.	197
Martynia.	90	Menziezia.	96
Massonia.	50	Menyanthes.	58
Matricaria.	117	Mercurialis.	252

Merendera.	Page 27	Momordica.	Page 237
Mesembryanthemum.	195	Monarda.	66
Mespilus.	201	Monotropa.	248
Messerschmidia.	85	Monsonia.	167
Methonica.	27	Montia.	195
Metrosideros.	197	Moræa.	57
Michauxia.	98	Morina.	150
Micropus.	115	Moringa.	210
Milium.	15	Morus.	240
Milleria.	119	Murraya.	162
Mimosa.	209	Musa.	59
Mimulus.	79	MUSÆ.	<i>Ibid.</i>
Minuartia.	180	Muscari.	50
Mirabilis.	55	Myagrum.	157
Mitchella.	135	Myosotis.	87
Mitella.	190	Myosurus.	147
Mœrenghia.	181	Myrica.	245
Mogorium.	65	Myriophyllum.	195
Molinia.	16	Myrsine.	94
Mollugo.	180	MYRTI.	197
Molucella.	74	Myrtus.	198

N

NAIADES.	5	Nerium.	92
Naias.	<i>Ibid.</i>	Nicandra.	81
Nandina.	175	Nicotiana.	80
Napæa.	170	Nigella.	148
NARCISSEÆ.	55	Nitraria.	195
Narcissus.	<i>Ibid.</i>	Nolana.	87
Nardus.	22	Notelæa.	65
Narthecium.	27	NYCTAGINEÆ.	55
Nemesia.	78	Nymphæa.	42
Neottia.	41	Nyssa.	45
Nepeta.	70		

O

Ocymum.	75	Onopordon.	107
OEdera.	111	Onosma.	86
OEnanthe.	140	Opercularia.	135
OEnothera.	196	Ophioglossum.	1
Olea.	65	Ophrys.	41
ONAGRÆ.	195	Ophyoxylum.	95
Onoclea.	5	ORCHIDÆÆ.	40
Ononis.	214	Orehis.	<i>Ibid.</i>

Origanum.	Page 74	Osmunda.	Page 2
Ornithogalum.	51	Osteospermum.	119
Ornithopus.	225	Osyris.	45
Orobanche.	60	Othonna.	124
Orobus.	224	Oxalis.	167
Orontium.	7	Oxylobium.	212
Ortegia.	180	Oxytropis.	221
Oryza.	22		

P

Pæderia.	155	Perilla.	70
Pæonia.	149	Periploca.	92
Palavia.	168	Peronia.	40
Paliurus.	231	Persoonia.	46
Pallasia.	49	Petiveria.	49
PALMÆ.	22	Peucedanum.	142
Panax.	138	Phaca.	221
Pancratium.	55	Phalangium.	29
Pandanus.	249	Phalaris.	11
Panicum.	12	Pharnaceum.	181
Papaver.	149	Phaseolus.	219
PAPAVERACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Phellandrium.	140
Parietaria.	240	Philadelphus.	199
Paris.	23	Phillyrea.	63
Parkinsonia.	209	Philyca.	252
Parnassia.	158	Phleum.	11
Paronychia.	53	Phlomis.	73
Parthenium.	126	Phlox.	89
Paschalia.	129	Phœnix.	22
Paspalum.	12	Phormium.	31
Passerina.	44	Phyllanthus.	254
PASSIFLORÆ.	238	Phyllis.	154
Passiflora.	<i>Ibid.</i>	Physalis.	81
Pastinaca.	139	Phyteuma.	99
Paullinia.	158	Phytolacca.	49
Pavonia.	170	Picridium.	105
Pectis.	119	Picris.	104
PEDICULARES.	58	Pilularia.	4
Pedicularis.	60	Pimpinella.	138
Peganum.	179	Pinguicula.	58
Pelargonium.	164	Pinkneia.	134
Penicillaria.	14	Pinus.	247
Pentapetes.	173	Piper.	241
Penstemon.	90	Piqueria.	116
Penthorum.	189	Piscidia.	220
Peplis.	199	Pisonia.	55

Pistacia.	Page 228	Pomaderris.	Page 251
Pisum.	224	Pontederia.	38
Pitcairnia.	28	Populus.	245
Pittosporum.	251	Porliera.	179
Planera.	242	Portesia.	165
PLANTAGINEÆ.	54	Portulaca.	192
Plantago.	<i>Ibid.</i>	Portulacaria.	195
Platanus.	246	PORTULACEÆ.	192
Platilobium.	212	Potamogeton.	5
Plectrantus.	75	Potentilla.	205
Plocama.	135	Poterium.	202
PLUMBAGINEÆ.	56	Pothos.	7
Plumbago.	<i>Ibid.</i>	Prasium.	76
Plumiera.	92	Prenanthes.	101
Poa.	20	Primula.	57
Podalyria.	211	Prinos.	250
Podocarpus.	246	Priva.	65
Podophyllum.	149	Proserpinaca.	195
Pogonia.	248	Protea.	45
Poinciana.	210	PROTEACEÆ.	<i>Ibid.</i>
POLEMONIACEÆ.	89	Prunella.	76
Polemonium.	<i>Ibid.</i>	Prunus.	205
Polianthes.	35	Psidium.	198
Pollichia.	248	Psoralea.	215
Polycarpea.	180	Psychotria.	155
Polycarpon.	<i>Ibid.</i>	Ptelea.	229
Polycnemum.	49	Pteranthus.	49
Polygala.	58	Pteris.	3
Polygonatum.	24	Pterocarpus.	227
POLYGONEÆ.	46	Pulmonaria.	86
Polygonum.	47	Punica.	198
Polymnia.	127	Pyrola.	97
Polypodium.	2	Pyrus.	200
Polypogon.	14		

Q

Quercus.	244	Queria	180
----------	-----	--------	-----

R

RADIATÆ.	117	RANUNCULACEÆ.	145
Rafnia.	214	Ranunculus.	146
Rajania.	24	Raphanus.	150
Ramonda.	80	Ravenala.	59
Randia.	154	Rauvolfia.	95

Reaumuria.	Page 195	Robinia.	Page 220
Reseda.	158	Rondeletia.	154
Rhagadiolus.	100	Rosa.	201
RHAMNOIDEÆ.	229	Rosaceæ.	199
Rhamnus.	250	Rosmarinus.	67
Rhapis.	25	Rottbollia.	16
Rheum.	48	Royena.	95
Rhinanthus.	60	Rubentia.	250
RHIZOSPERMÆ.	4	Rubia.	154
RHODODENDRA.	95	RUBIACEÆ.	152
Rhododendrum.	<i>Ibid.</i>	Rubus.	205
Rhodora.	<i>Ibid.</i>	Rudbeckia.	128
Rhus.	227	Ruellia.	61
Ribes.	191	Rumex.	47
Ricinus.	255	Ruppia.	5
Ricotia.	154	Ruscus.	24
Rindera.	87	Ruta.	179
Rivina	49	RUTACEÆ.	<i>Ibid.</i>

S

Sabal.	22	Satureia.	70
Saccharum.	14	Saururus.	5
Sagina.	181	Saxifraga.	189
Sagittaria.	26	SAXIFRAGÆ.	<i>Ibid.</i>
SALICARIÆ.	199	Scabiosa.	151
Salicornia.	52	Scandix.	140
Salix.	242	Scheuchzeria.	26
Salsola.	50	Schinus.	228
Salvia.	67	Schizandra.	175
Sambucus.	157	Schkuhria.	120
Samolus.	58	Schœnus.	9
Samyda.	249	Schrankia.	209
Sanguinaria.	149	Scilla.	51
Sanguisorba.	202	Scirpus.	9
Sanicula.	144	Scleranthus.	195
Sanseveria.	28	Sclerocarpus.	127
Santolina.	117	Scolopendrium.	5
Sanvitalia.	128	Scolymus.	106
SAPINDI.	158	Scoparia.	76
Sapindus.	<i>Ibid.</i>	Scorpiurus.	225
Sapium.	256	Scorzonera.	104
Saponaria.	182	Schottia.	209
SAPOTÆ.	94	Scrophularia.	76
Saracha.	81	SCROPHULARIÆ.	<i>Ibid.</i>
Sarothra.	91	Scutellaria.	75
Sarracenia.	248	Secale.	18

Securidaca.	Page 227	Solidago.	Page 122
Securinega.	255	Sonchus.	101
Sedum.	188	Sophora.	211
Selago.	66	Sorbus.	200
Selinum.	142	Sorghum.	14
SEMIFLOSCULOSÆ.	100	Spaendoncea.	210
SEMPERVIVÆ.	187	Sparganium.	7
Sempervivum.	189	Spartina.	16
Senebiera.	156	Spartium.	213
Sanecio.	125	Spergula.	181
Serapias.	41	Spermacoce.	134
Serjania.	158	Sphæranthus.	111
Seriola.	105	Sphærolobium.	212
Serissa.	155	Spielmannia.	65
Serratula.	108	Spigelia.	92
Sesamum.	90	Spilanthus.	150
Seseli.	159	Spinacia.	50
Sesleria.	17	Spiræa.	205
Sesuvium.	105	Spondias.	228
Sherardia.	152	Stachys.	72
Sibbaldia.	205	Stachytarpheta.	65
Sibthorpia.	60	Stæhelina.	108
Sicyos.	257	Stapelia.	92
Sida.	170	Staphylea.	229
Sideritis.	71	Statice.	56
Sideroxylum.	94	Stellaria.	182
Sigosbeckia.	126	Stellera.	44
Silene.	184	Sterculia.	175
Silphium.	127	Stevia.	116
Sinapis.	151	Stipa.	14
Sison.	140	Stratiotes.	42
Sisymbrium.	155	Strelitzia.	59
Sisyrrinchium.	56	Struthiola.	44
Sium.	141	Stuartia.	175
Smilacina.	24	Styphelia.	98
Smilax.	<i>Ibid.</i>	Styrax.	95
Smyrnum.	159	Swertia.	91
Solandra.	81	Swietenia.	163
SOLANÆ.	79	Symphoricarpos.	156
Solanum.	82	Symphitum.	86
Soldanella.	58	Syringa.	62

T

Tabernæmontana.	92	Tamarindus.	209
Tagetes.	120	Tamarix.	195
Talinum.	192	Tamnus.	25

Tanacetum.	Page 112	Tradescantia.	Page 26
Taraxacum.	104	Tragia.	236
Tarchonanthus.	117	Tragopogon.	105
Taxus.	246	Tragus.	15
Telephium.	195	Trapa.	195
TEREBINTHACEÆ.	227	Trianthema.	195
Terminalia.	43	Tribulus.	179
Ternstroemia.	162	Trichilia.	165
Tetragonia.	195	Trichodium.	15
Teucrium.	69	Trichosanthes.	238
Thalictrum.	145	Trientalis.	57
Thapsia.	139	Trifolium.	216
Thea.	162	Triglochin.	26
Theligonum.	241	Trigonella.	218
Theophrasta.	93	Triguera.	80
Thesium.	43	Trillium.	23
Thlaspi.	156	Triopteris.	160
Thuya.	247	Triosteum.	136
Thymbra.	74	Triplaris.	48
THYMELEÆ.	44	Tripsacum.	15
Thymus.	74	Triticum.	18
Tiarella.	190	Tritoma.	28
Tigridia.	36	Triumfetta.	176
Tilia.	176	Trollius.	148
TILIACEÆ.	175	Tropæolum.	167
Tillæa.	187	Tulipa.	27
Tillandsia.	35	Turnera.	192
Tordylium.	145	Turritis.	151
Tormentilla.	203	Tassilago.	114
Tournefortia.	85	Typha.	7
Trachelium.	99	TYPHÆ.	7

U

Ulex.	212	Urtica.	240
Ulmus.	242	URTICEÆ.	259
UMBELLIFERÆ.	138	Usteria.	78
Uniola.	21	Utricularia.	58
Urena.	170	Uyularia.	27
Urospermum.	105		

V

Vaccinium.	97	Vallisneria.	42
Valantia.	134	Vanilla.	42
VALERIANEÆ	132	Varronia.	85
Valeriana.	<i>Ibid.</i>	Velezia.	186

Vella.	Page 157	Viminaria.	Page 212
Veltheimia.	28	Vinca.	92
Veratrum.	27	Viola.	178
Verbascum.	79	Virgilia.	211
Verbena.	66	Viscum.	156
Verbesina.	129	Visnea.	95
Vernonia.	115	VITES.	163
Veronica.	59	Vitex.	64
Viburnum.	136	VITICEÆ.	64
Vicia.	224	Vitis.	163
Vieusseuxia.	37	Volkameria.	64
Villarsia.	91		

W

Wachendorfia.	38	Westeringia.	67
Waldsteinia.	202	Winterania.	163
Waltheria.	175	Woodwardia.	3

X

Xanthium.	241	Ximenesia.	127
Xeranthemum.	113	Xylophylla.	235

Y

Yucca.	28		
--------	----	--	--

Z

Zacintha.	104	Zea.	22
Zamia.	4	Zinnia.	129
Zanichellia.	5	Ziziphora.	66
Zanthorhiza.	149	Ziziphus.	251
Zanthoxylum.	228	Zoegea.	109
Zappania.	65	Zygodphyllum.	179

~~... .. Rubiacies. 109.~~
~~+ Gouania barbonica. Combretaceis. quinquiescens 207.~~
~~... .. Liliaceis. 1.~~
~~... .. Sterculiaceis. 229.~~
~~... 227.~~
~~... .. Sapindaceis. 139.~~
~~... .. Guttiferiaceis. 173.~~
~~... 1.~~
~~... .. Dan. ibid.~~
~~... .. 162.~~
~~... .. 20.~~
~~... .. 27.~~

Liste des genres qui ne sont pas compris dans cet Ouv.

- Celtis pedata*. — Cucurbitacées. — Page 228. *vel Joliffia africana*.
Desmodium etropium — Legumineuses. — 226.
Composita coccinea. — Verbenacées. — 66.
Leonotis mauritiana. — Labiées. — 76.
Nuxia verticillata. — Rubiacées. — 139. *Scrophulariacées. ou Nuttaliacées.*
Nyctophilum calicinum. — Crassulacées. — 188.
Zornia strobilifera. — Legumineuses. — 226.
Cuscuta glabra. — Scrophulariacées. — 228.
Demaria cylindrica, vel utica. — Urticées. — 240.
Nephrodium splendens. — Fongées. — 1.
Quisquina heterophylla. — Sapindacées. — 158.
Hyptis tetraptera. — Santalacées. — 160.
Mussaenda rotundata. — Rubiacées. — 139.
Grangeria borbonica. — Compositacées. — 207.
Stricta macrophylla. — Liliacées. — 1.
Coddalia inanis. — Scrophulariacées. — 229. *vel Scopolia*.
Glychena burmanni. — Fongées. — 4.
Simocarpus anacardium. — Scrophulariacées. — 227.
Statmanina discroxylum. — Sapindacées. — 159.
Trichetta triflora. — Nuttaliacées. — 173.
Cyathra arborea. — Fongées. — 1.
Diplanum bulbiferum. — Idées. — 1.
Trifolium aurantiola. — Graminées. — 162.
Arcaea alba. — Salicées. — 22.
Tritonia longiflora. — Indées. — 37.
Agatophyllum aromaticum. — Lamiacées. — 46.
Melania verticillata. — ~~Rubiacées~~ — 139. *Nelovaceae ou Nuttaliacées.* — 173.
Dania's Fungus. — Idées. — 139.
Misonium multiflora. — Idées. — 139.
Imbricaria *Suttifera*. — 161.
Laumaria hemiptera. — Fongées. — 1.
Erythrospermum leptocarpum. — Stacourtiacées. — 176.
Anatherum mauricatum. — Graminées. — 19.

- Wellia varians*. — Campanulacées. — 99.
Stychnos Voutac. — Apocynacées. — 93.
Nuxia heterophylla. — Guttifères. — 161.
Virola coccinea. — Combretacées. — 207.
Ameylon angulatum — myrtacées ou Melastomacées. — 198.
Actinophium borianum. — Fongées. — 1.
Smekia ovata. — Anacardées. — 207. voir la *K. Willd.*
Chazelia pycnostrioides. — Rubiacées. — 135.
Cryptostegia grandiflora. — Apocynacées. — 93.
Vangueria dubis. — Rubiacées. — 135.
Synorchis latifolia. — Orchidées. — 41.
Ingrucum elatum. — Idem. — 41.
Fucus ~~algues~~ *Vaccu*. — 1.
Amborn amplifolia, vel *nithridiathoea*. — Urticacées. — 240.
Baronja paniculata. — Hypnicacées. — 161.
Datomia ou *Daringtonia speciosa*. — Myrtacées. — 199.
Anthistonia ciliata. — Graminées. — 21.
Cicca disticha. — Euphorbées. — 236.
Diplomeris longum. — Rubiacées. — 135.
Tectona grandis. — Guttifères. — 64.
Senecio undulata. — Anamnoïdées. — 251.
Salaxis abertia. — Myricées. — 98.
Usna. ~~muscu~~. — 1.
Lycopodium phlegmaria. — Idem. — 1.
Alpinia nutans. — Zingibéracées. — 40.
Thunbergia alata. — Acanthacées. — 61 et 274 Supplément.
Nyctanthe arbor tristis. — Jasmincées. — 63.
Trichostema mauritiana. — Labiacées. — 75.
Mimusops elengi. — Sapotillacées. — 94.
Ornithopus mauritiana. — Sapindacées. — 159.
Melicocca diversifolia. — Idem. — 159.
Tephrosia purpurea. — Légumineuses. — 223. voir *Saligna*.
Cryptumobile. — Idem. — 226. voir *bedysarum*.
Agati vel *Archinonum*. — Idem. — 226.
Solmskioidia sanguinea. — Idem. — 227. Urticacées. — 64.

- Strantheus laurifolia*. — Laurineae. — 46.
Vidia guazumatolia. — Suttineae. — 173.
Ylistatomentosa. — Leguminosae. — 219.
Decasentia grandiflora. — Apocynaceae. — 93.
Scavola plumiera. — Lobeliaceae. — 100.
Vidia javanica. — Suttineae. — 161.
Arceuthobium celebica. — Idem. — 161.
Myristica moschata. — Laurineae ou Myristicaceae. — 46.
Coronaca hastata. — Alceaceae. — 63.
Atuna elastica. — Asclepiadaceae. — 93.
Polylechium panduriformis. — Cappariaceae. — 158.
Amorium commune. — Bérberidaceae. — 228.
Theobroma cacao. — Malvaceae ou Burseriaceae. — 173.
Pandacium pinnatum. — Bignoniacae. — 91.
Caryophyllus aromaticus, vel *Eugenia caryophyllata*. — Caryophyllaceae. — 180.
Tanghinia veneniflora, vel *Cerbera tanghin*. — Apocynaceae. — 93.
Lamgia trichettra, vel *Stemmingia trinervia*. — Leguminosae. — 226 et 269 Supp.
Cocos nucifera. — Palmaceae. — 22.
Carpinus populnea, vel *hibiscus populnea*. — Malvaceae. — 172.
Allystegia lupiana. — Convolvulaceae. — 88.
Ptilotum triquetrum, vel *Arunkandia dichotoma*. — Lycopodiaceae. — 1.
Conoclinium hastata. — Anonaceae. — 174.
 ——— *uncinata*. — idem. — 16.
Michelia champaca. — Magnoliaceae. — idem.
Andisia. — Myrsinaceae. — 94 et 248.

[The page contains extremely faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

- MALVA VISCUS mollis. }
 ACHANIA mollis H. K. }
 MANULEA alternifolia, p. 60. }
 BUCHNERA foetida Jacq. H. Sch. }
 MELALEUCA chlorantha Bonpl. }
 malm.
 MELOCHIA varroniaefolia.
 MESPILUS carolina *encycl.*
 celsiana dum. cours. suppl.
 elliptica Bosc.
 eriocarpa Dec. syn. }
 tomentosa Willd. sp. }
 fissa Bosc.
 flabellata Bosc.
 flavescens Bosc.
 heterophylla Flugge, Ann.
 lobata Bosc.
 lucida dum. cours. bot. cult.
 nigra Willd. sp.
 obovata Bosc.
 odorata Andr. rep.
 oliveriana dum. cours. B. cult.
 orientalis Bosc.
 parvifolia. }
 cratægus parvifolia Willd. sp. }
 pectinata dum. cours. bot. cult.
 prunellifolia Bosc.
 purpurea Bosc.
 quinqueloba Bosc.
 trifoliata Bosc.
 METROSYDEROS crassifolia *dum.*
 cours. suppl.
 citrina.
 MIRABILIS hybrida *Willd. Enum.*
 MORUS tartarica *L.*
 NARCISSUS polyanthos *Delongch.*
 sav. Etr.
 subalbidus Delongch. sav. Etr.
 NAUENBURGIA trinervata *Willd. sp.* }
 BROTERA contrayerva *Schrad.* }
 Journal.
 NICOTIANA humilis.
 OCHROMA lagopus *Willd. sp.*
 OENOTHERA salicifolia.
 OLEA exasperata *Jacq. H. Sch.*
 ORNITHOPUS lotoides *Viviani,*
 Fragn.
 OSMUNDA struthiopteris *L.* }
 STRUTHIOPTERIS germanica *Willd.* }
 sp. }
- MALVA VISCUS velouté. s. ch. ♀
 MELALEUCA à fleurs blanches. n.
 Holl. or. ♀
 MÉLOCHIA à f. de varronia. s. ch. ♀
 de Caroline. ♀
 de Cels. orient. ♀
 elliptique. Am. s. ♀
 à fruit velu. F. ♀
 incisée. Am. s. ♀
 en évantail. ♀
 jaunâtre. ♀
 à feuilles variables. ♀
 lobée. Am. s. ♀
 luisante. Am. s. ♀
 à fruit noir. Sibérie. ♀
 ovale-renversée. ♀
 odorante. ♀
 d'olivier. perse. ♀
 d'Orient. ♀
 à petites f. pinchaw. Am. s. ♀
 pectinée. orient. ♀
 à feuil. de prunellier. Am. s. ♀
 pourpre. ♀
 à cinq lobes. Am. s. ♀
 trifoliée. orient. ♀
 MÉTROSYDÉROS à feuil. épaisses.
 n. Holl. or. ♀
 à fleurs pâles. n. Holl. or. ♀
 MIRABILIS hybride. ♀
 MURIER de Tartarie. ♀
 NARCISSÉ à fleurs nombreuses. F. ♀
 blanchâtre. F. ♀
 NAUENBURGIA à trois nervures.
 Am. m. ☉
 NICOTIANE petite. ☉
 OCHROMA lagopus. Antilles. s. ch. ♀
 ONAGRE à feuilles de saule. ♂
 OLIVIER tuberculeux. cap. or. ♀
 ORNITHOPUS à feuilles de lotier.
 Italie. ☉
 OSMONDE d'Allemagne. ♀

- PACHYSANDRA procumbens* Mich. *PACHYSANDRA* à tige tombante.
Fl. Am. s. π
PANCRATIUM parviflorum. *PANCRATIUM* à petites fleurs. π
PAULLINIA caracasana Jacq. H. sch. *PAULLINIA* de Caracas. s. ch. \mathfrak{h}
cauliflora Jacq. *ic.* cauliflore. caracas. s. ch. \mathfrak{h}
PEUCEDANUM petroselinum. *PEUCÉDANUM* à feuell. de persil. π
PHYLLANTHUS ellipticus. *PHYLLANTHUS* à f. elliptiq. s. ch. \mathfrak{h}
ovatus. à feuilles ovales. s. ch. \mathfrak{h}
PINUS tournefortii. *PIN* de Tournefort. Asie. \mathfrak{h}
PITTOSPORUM sinense, p. 251. }
PITTOSPORUM viridiflorum Bot. }
magaz. }
PICRIS sprengeriana, p. 104. }
PICRIS pauciflora Willd. sp. }
POA cristata L. p. 20. }
KOELERIA cristata Pers. syn. }
POGOSTEMON plectranthoides Desf. *POGOSTÉMON* à feuilles de plec-
mém. du Mus. tranthus. s. ch. \mathfrak{h} (labiées).
POPULUS tremuloides Mich. Arbr. *PEUPLIER*, faux tremble. Am. s. \mathfrak{h}
POTHOS digitata Jacq. *ic.* *POTHOS* digité. caracas. s. ch. π
lanceolata L. lancéolé. barbade. s. ch. π
PRENANTHES hispida, p. 101, chondrillæ species.
PRINOS ambiguus Mich. *Fl.* *PRINOS* de Caroline. \mathfrak{h}
lanceolatus. lancéolé. \mathfrak{h}
longifolius. à longues feuilles. \mathfrak{h}
prunifolius. à feuilles de prunier. \mathfrak{h}
PRUNUS acuminata Mich. *Fl.* *PRUNIER* acuminé. Am. s. \mathfrak{h}
chicasa Mich. *Fl.* *chicasaw*. caroline. \mathfrak{h}
pensylvanica Willd. sp. } *de Pensylvanie.* \mathfrak{h}
borealis Mich. Arbr. }
pendula. *pendant.* \mathfrak{h}
sphærocarpa Mich. *Fl.* à fruit rond. Am. s. \mathfrak{h}
susquihana Dum. cours. suppl. *susquihana.* Am. s. \mathfrak{h}
PTEROSPERMUM acerifolium Cav. *PTÉROSPERME* à feuilles d'érable.
Diss. inde. s. ch. \mathfrak{h}
PULMONARIA mollis Schrad. Dec. *PULMONAIRE* veloutée. Allem. \mathfrak{h}
cat.
PULTENÆA daphnoides Smith, Soc. *PULTENÆA* à feuilles de daphné.
Lin. N. Holl. or. \mathfrak{h}
PYRUS michauxii Bosc. Dict. *POIRIER* de Michaux. Am. s. \mathfrak{h}
QUERCUS banisteri Mich. Arbr. *CHÉNE* de Banister. Am. s. \mathfrak{h}
prinus monticola Mich. Arbr. *prinus* de montagnes. Am. s. \mathfrak{h}
RHAMNUS latifolius P'her. sert. *NERPRUN* à larges feuell. Açores. \mathfrak{h}
RHODODENDRUM azaloides. *RHODODENDRUM* à feuilles d'aza-
léa. \mathfrak{h} (an species hybrida).
catesbæum Dum. cours. suppl. *de Catesby.* Am. s. \mathfrak{h}
RHUS elegans H. K. *SUMAC* élégant. Am. s. \mathfrak{h}
RIBES palmatum. *GROSEILLIER* à feuilles palmées. \mathfrak{h}
ROSA corymbosa Bosc. Dict. *ROSIER* corymbifère.
damascena Willd. spec. *de Damas.* E. \mathfrak{h}

- evratina *Bosc. Dict.*
 montana *Vill. Delph.*
 pensylvanica *Mich. Fl.*
 pimpinellifolia.
 rubrispina *Bosc. Dict.*
 sulphurea minor.
 trifoliata *Bosc. Dict.*
 turgida *Pers. syn.* }
 rapa *Bosc. Dict.* }
- SANTOLINA pinnata *Viviani, Fragm.* distincta species a *S. eriophora*,
 p. 117.
- SARACHA procumbens. }
 ATROPA procumbens *Cav. Ic.* }
 SAXIFRAGA ajugæfolia *L.*
- aquatica *Lapeyr. Fl. Pyren.* }
 petræa *Couan. Ill.* }
 ascendens *Willd. sp.* }
 aretioides *Lapeyr. Fl. Pyren.* }
 groelandica *L.* }
 luteo-purpurea *Lapeyr. Fl.*
 Pyren.
- nervosa *Lapeyr. Fl. Pyren.*
 ranunculoides.
- SCUTELLARIA orientalis *L.*
 SALIX acutifolia *Willd. sp.* }
 violacea *Andr. Rep.* }
 aquatica *Smith, Fl.*
 aurita *Smith, Fl.*
 bicolor *Willd. sp.*
 caroliniana *Mich. Fl.* }
 nigra *Willd. sp.* }
 cinerea *L.*
 discolor *Willd. sp.*
 forbyana *Willd. sp.*
 lambertiana *Smith, Fl.*
 malifolia *Willd. sp.*
 phylicifolia *L.*
 prunifolia *Smith, Fl.*
 repens *Smith, Fl.*
 russeliana *Willd. sp.*
 sphacelata *Willd. sp.*
 spathulata *Willd. sp.*
 starkeana *Willd. sp.*
 undulata *Willd. sp.*
- SALVIA clusii *Jacq. H. Sch.*
 forskalæi *L. Mant.*
- SIDA crispa *L.*
 pseudo-abutilon.
 pulchella *Willd. Enum.*
- d'Evrath. caroline. ♪
 de montagne. Alpes. ♪
 de Pensylvanie. ♪
 à feuil. de pimprenelle. F. ♪
 à épines rouges. Am. s. ♪
 jaune petit. ♪
 trifolié. chine. ♪
 turneps. écosse. ♪
- SARACHA à tiges tombantes. Mexi-
 que. ☉
- SAXIFRAGE à feuilles d'ajuga. Py-
 rénées. ☿
- aquatique. pyrénées. ☿
- arétioïde. pyrénées. ☿
 du Groëland. pyrénées. ☿
 jaune-pourpre. pyrénées. ☿
- à nervures. pyrénées. ☿.
 à feuilles de renoncule. ☿
- SCUTELLAIRE d'Orient. or. ☿
- SAULE violet. ♪
- aquatique. F. ♪
 auriculé. F. ♪
 bicolor. Allem. ♪
 de Caroline. ♪
 cendré. F. ♪
 de deux couleurs. Am. s. ♪
 Forbyana. Angleterre. ♪
 de Lambert. Angleterre. ♪
 à feuil. de pomnier. Angl. ♪
 à feuilles de phylica. ♪
 à feuilles de prunier. écosse. ♪
 rampant. F. ♪
 de Russel. F. ♪
 sphacélé. F. ♪
 en spatule. F. ♪
 de Starke. silésie. ♪
 ondulé. Allem. ♪
- SAUGE de l'Ecluse. orient. or. ♪
 de Forskal. orient. ☿
- SIDA crépu. Antilles. ☉
 faux abutilon. ☉
 élégant. N. Holl. or. ♪

SISYMBRIUM erysimifolium, p. 155, deletur syn. SISYMBRIUM allioni pers. syn.

SONCHUS acuminatus willd. sp. }
 pinnatifidus. }
 virgatus. }
 prænanthes virgata mich. fl. }

SPIRÆA acutifolia willd. Enum. }
 alpina willd. sp. }
 oblongifolia wald. et Kitt. }
 ulmifolia willd. sp. }

STEVIA laxiflora dec. mss. }
 ovata willd. sp. }

THALICTRUM rugosum, p. 146, dele, et TH. vaginatum subjice.

THUYA australis. Bosc. }
 inæqualis. }

THUNBERGIA fragrans willd. sp. 61. }
 TILIA rubra dec. cat. }
 mississippiensis Bosc. dict. }

TORDYLIUM sulcatum. }
 TRIFOLIUM suaveolens willd. H. Ber. }
 ULMUS viscosa. }
 striata Bosc. dict. }

VACCINIUM arboreum mich. fl. }
 arctostaphylos Andr. rep. }
 frondosum L. }
 glaucum mich. fl. }
 ligustrinum L. }
 myrsinites mich. fl. }
 nigrum. }
 nitidum Andr. rep. }
 resinosum mich. fl. }

VIBURNUM acuminatum. }
 edule mich. fl. }

ERVUM gracile dec. suppl. }
 VICIA gracilis Lois. fl. }

VICIA serratifolia Jacq. Austr. }
 VIOLA pedata L. }

YUCCA boscii Hort. paris. quæ floruit in horto dicto Litta juxta Milanum, est genus novum AGAVE affine. Balbis in litteris.

LAITRON à f. pointues. Am. s. ☉
 pinnafide MADÈRE ? or. ☽
 effilé. Am. s. ☉

SPIRÆA à feuilles aiguës. ☽
 lancéolé. russie. ☽
 à feuell. oblongues. hongrie. ☽
 à feuell. d'orme. carniole. ☽

STÉVIA à fl. lâches. mexique. or. ☿
 à feuell. ovales. mexique. or. ☿

THUYA des terres australes. or. ☽
 à écailles inégales. ☽

THUNBERGIA odorant. inde. s. ch. ☽

TILLEUL rouge. F. ☽
 du Misissipi. ☽

TORDYLIUM sillonné. ☿

TRÈFLE odorant. perse. ☉

ORME visqueux. Am. s. ☽
 strié. Am. s. ? ☽

MYRTILLE arborescent. Am. s. ☽
 d'Orient. ☽
 feuillu. Am. s. ☽
 glauque. Am. s. ☽
 à feuilles de Troëne. Am. s. ☽
 myrtoïde. Am. s. ☽
 à fruit noir. ☽
 luisant. Am. s. ☽
 résineux. Am. s. ☽

VIORNE acuminée. Am. s. ☽
 comestible. Am. s. ☽

LENTILLE grêle. F. m. ☉

VESCE à feuell. en scie. autriche. ☉

VIOLETTE digitée. Am. s. ☿

Handwritten mark

Handwritten text: L'effluve pointu... L'arborescent...

Handwritten text: L'arborescent... 226.

Handwritten text: L'arborescent... 66.

Handwritten text: L'arborescent... 76.

Handwritten text: L'arborescent... 135.

Handwritten text: L'arborescent... 186.

Handwritten text: L'arborescent... 226.

Handwritten text: L'arborescent... 228.

Handwritten text: L'arborescent... 240.

F I N.

Handwritten mark

SUPPLÉMENT.

Nota. Ce Supplément renferme plusieurs plantes que le Jardin royal a acquises depuis la publication de mon Tableau, et autres que j'avois omises. J'y indique aussi un nombre assez considérable d'espèces cultivées dans les pépinières du Roi, près Versailles, dans les jardins de MM. Cels, Noisette et autres, qui manquent à la collection du Jardin des Plantes, et que l'on pourra facilement se procurer par des échanges.

Je me fais un devoir et un plaisir de déclarer ici que mon collègue, M. Bosc, m'a beaucoup aidé dans ce travail, en me communiquant des observations qu'une longue expérience lui a acquises sur plusieurs arbres et arbrisseaux étrangers, dont il a enrichi les pépinières du Roi, et qu'il y cultive avec un grand succès.

ACER hybridum <i>Bosc. dict.</i>	ERABLE hybride. Am. s. ♪
nigrum <i>Mich. arbr.</i>	noir. Am. s. ♪
ACOSMUS pruriens <i>Desvaux.</i>	ACOSMUS piquant. s. ch. ♪
ADELIA acuminata, p. 255. }	
BORIA acuminata <i>Willd. sp.</i> }	
ligustrina <i>Mich. fl.</i> }	à feuell. de troëne. Am. s. ♪
BORIA ligustrina <i>Willd. sp.</i> }	
AGRIPHYLLUM grandiflorum. }	AGRIPHYLLUM à grande fleur. cap.
RHORIA grandiflora <i>Thunb. prodr.</i> }	or. ♪
BERCKHEIA grandiflora <i>Willd. sp.</i> }	
ALNUS macrophylla.	AUNE à grandes feuilles. ♪
oblongata <i>Willd. sp.</i>	à feuell. oblongues. Europe. ♪
rubra.	rouge. ♪
ANDROMEDA acuminata <i>H. K.</i>	ANDROMEDA acuminé. Am. s. ♪
canescens.	velouté. Am. s. ? ♪
lanceolata.	lancéolé. Am. s. ? ♪
ANNONA grandiflora. }	ANNONE à grandes fleurs. Am. s. ♪
ORCHIDOCARPON grandiflorum }	
Mich. fl. }	
ANNONA parviflora. }	à petites fleurs. Am. s. ♪
ORCHIDOCARPON parviflorum }	
Mich. fl. }	
ANNONA pygmæa <i>Mich. fl.</i> }	petite. Am. s. ♪
ORCHIDOCARPON pygmæum }	
Mich. fl. }	
ANTHEMIS elongata.	ANTHÉMIS à longs pédoncules. ☉
ARALIA pubescens <i>Dec. cat.</i>	ARALIA pubescent. N. esp. s. ch. ♪
ARCTOTIS anthemoides <i>L.</i>	ARCTOTIS anthémoïde. cap. ☉
ARISTOLOCHIA tomentosa <i>Bot. Mag.</i>	ARISTOLOCHE cotonneuse. Am. s. ♪
ARTEDIA squamata <i>L.</i>	ARTÉDIA écailleux. orient. ☉
ARUM pumilum.	ARUM petit. Am. s. ♪
ARUNDO ægyptia.	ROSEAU d'Égypte. ♪
ASCLEPIAS angustifolia <i>Willd. H.</i>	ACLÉPIAS à f. étroites. Mexique ?
ber.	s. ch. ♪
ASPARAGUS amarus <i>Dec. cat.</i>	ASPERGE à gros fruit. F. ♪
ASTER canus <i>Jacq. hort.</i>	ASTER incane. Allem. ♪
ericoides, p. 123, <i>Deleat. L.</i> }	
et <i>Mich. fl. subjice.</i> }	
multiflorus <i>Willd. sp.</i> }	

- heterophyllus willd. Enum.*
leptophyllus.
lithospermifolius H. P. }
altaicus willd. Enum. }
paniculatus willd. sp.
panonicus wald. et kitt.
hung.
pendulus willd. sp. ?
reflexus L.
secundiflorus.
sparsiflorus mich. fl.
ASTRAGALUS micranthus Desvauz,
Journ.
ATRAGENE sibirica Bot. Magaz. }
alpina Pallas, Ross. }
ATRIPLEX salina Desvauz, Journ.
BALLOTA discolor.
parvifolia.
 + **BARLERIA lactea.** *Sage 614.*
BETONICA stricta H. K. (an varietas).
BETULA fructicans Pallas, Ross.
pontica.
pubescens willd. sp.
rubra mich. arbr.
BUCHNERA viscosa H. K.
CACALIA villosa Jacq. Ic. }
SENECIO purpureus willd. sp. }
CALADIUM pinnatifidum willd. sp. }
ARUM pinnatifidum Jacq. H. Sch. }
CALYCANTHUS nanus Dum. Cours.
Bot. cult.
CAMPANULA lactiflora Fischer.
versicolor Smith, fl. Græcæ,
Prodr.
CARDUUS tenuiflorus Smith, fl.
CASSIA sulcata Dec. Cat.
CHRYSANTHEMUM Broussonetii }
Pers. syn. }
PYRETHRUM grandiflorum willd. }
Enum. }
CINERARIA heterophylla.
platanifolia.
CNICUS araneosus.
semipinnatus. }
carduus pratensis Encycl. }
COMMELINA pallida willd. H. Ber. }
rubens Red. Lil. }
stricta.
CORCHORUS japonicus willd. sp.
CORNUS canadensis L.
- à feuill. changeantes. Am. s. ℥*
à feuilles grêles. ℥
à feuill. de Grémil. Sibérie. ℥
paniculé. Am. s. ℥
de Hongrie. ℥
à rameaux inclinés. Am. s. ℥
recourbé. cap. or. ℥
à grappes unilatérales. ℥
à fleurs éparses. Am. s. ℥
ASTRAGALE à petites fleurs. ℥
ATRAGÉNÉ de Sibérie. ℥
ARROCHE des marais. F. ☉
BALLOTA discolor. or. ℥
à petites feuilles or. ℥
BARLÉRIA à fl. blanches. s. ch. ℥
BÉTOINE à fleurs serrées F. ℥
BÉTULA arbrisseau. Russie. ℥
de Pont. ℥
pubescent. F. ℥
rouge. Am. s. ℥
BUCHNÉRA visqueux. cap. or. ℥
CACALIA velu. cap. or. ℥
CALADIUM pinnatifide. Caracas.
s. ch. ℥
CALYCANTHUS nain. Am. s. ℥
CAMPANULA à fl. blanche. Russie. ℥
versicolor. orient. or. ℥
CHARDON à fleurs menues. F. ☉
CASSE sillonnée. s. ch. ℥
CHRYSANTHÈME de Broussonet.
canaries. or. ℥
CINÉRAIRE à feuilles variables. ℥
à feuilles de platane. s. ch. ℥
CNICUS à tête cotonneuse. ♂
pinnatifide. F. ℥
COMMÉLINE à fleur pâle. Am. m.
s. ch. ℥
ramassée. s. ch. ℥
CORCHORUS du Japon. or. ℥
CORNOUILLER de Canada. ℥

- CRASSULA dejecta Jacq. H. sch. CRASSULE étalée. cap. or. ♪
 GRATÆGUS sorbifolia. ALISIER à feuilles de cormier. ♪
 CROTON lineare Jacq. Am. CROTON à f. linéaires. Ant. s. ch. ♪
 CROTON punctatum Jacq. Dele, et CROTON mucronatum Willd. sp. sub-
 jice, p. 256. à cinq lobes. s. ch. ♪
 quinquepartitum. panaché. inde. s. ch. ♪
 variegatum L. CONCOMBRE strié. cayenne. ☉
 CUCUMIS lineatus Bosc. Journ. d'Hist. nat.
 CUPRESSUS disticha L. p. 247. }
 TAXODIUM distichum Richard, }
 Ann. du Mus.
 CURTISIA faginea H. K. CURTISIA à f. de hêtre. cap. or. ♪
 CYCLAMEN coum Willd. sp. CYCLAMEN de Cos. or. ☿
 CYTISUS albidus Dec. Cat. CYTISE blanc. or. ♪
 alpinus Willd. Enum. des Alpes. ♪.
 purpureus Scop. Carn. pourpre. carniolle. ♪
 DALEA purpurea Vent. H. Cels. DALEA à fl. pourpres. Am. s. ☿
 DAPHNE altaica Pallas, Ross. DAPHNE de Sibérie. ♪
 oleoides L. Mant. à feuil. d'olivier. orient. or. ♪
 DIOSCORÆA waltheri. DIOSCORÆA de Walther. Am. s. ☿
 DOMBEYA erithroxylum Willd. sp. DOMBEYA de deux couleurs. île
 sainte-Hélène. s. ch. ♪
 DONIA fruticosa.
 glutinosa H. K. }
 inula glutinosa, p. 121. }
 doronicum glutinosum Willd. }
 sp. }
 squarrosa Bot. Magaz. }
 DRABA fladnizensis Jacq. Miscel. DRABA de Fladniz. ☿
 ECHIUM parviflorum Willd. Enum. VIPÉRINE à petites fleurs. Maroc. ☉
 EQUISETUM variegatum Willd. sp. }
 ramosum Dec. Fl. }
 ERODIUM lucidum Lapeyr. Fl. Pyren. ERODIUM luisant. Pyrénées. ☿
 ERYTHRINA velutina Willd. sp. p. 220. ERYTHRINA velouté. Carac. s. ch. ♪
 EXACUM viscosum Smith. Ic. Pict. EXACUM visqueux. Canaries. or. ☿
 FAGUS comptoniifolia (varietas) HÊTRE à feuilles de comptonia. ♪
 FESTUCA multiflora Walther. FESTUCA à fl. nombreuses. Am. s. ♪
 FLEMINGIA trinervia. FLÉMINGIA à trois nervures. île de
 Fr. s. ch. ♪ (légumineuses).
 FRAXINUS caroliniana Willd. sp. FRÊNE de Caroline. or. ♪
 lancea Bosc. Dict. à feuilles en lance. Am. s. ♪
 longifolia Willd. sp. à longues feuilles. Am. s. ♪
 nigra Bosc. Dict. noir. Am. s. ♪
 pallida Bosc. Dict. vert-pâle. Am. s. ♪
 parvifolia Encycl. à petites feuilles. Esp. ♪
 richardi Bosc. Dict. de Richard. Am. s. ♪
 viridis Mich. Arbr. vert. Am. s. ♪
 FUMARIA formosa H. K. FUMETERRE à gr. fleurs. Am. s. ☿
 GALIUM ellipticum Willd. En. Suppl. CAILLELAIT elliptique. ☿

- GOODIA** lotifolia *H. K.* } **GOODIA** à feuell. de lotier. *N. HO*
 or. ♪ (légumineuses).
- GRINDELIA** inuloides, *p. 120.* }
INULA serrata *Pers. syn.* }
HELIANTHEMUM alpestre. }
CISTUS alpestris *Jacq. fl. Austr.* } **HÉLIANTHÈME** des Alpes. ♪
 celandicus Jacq. ibid. (an lin.) }
HERMANNIA flammea *Jacq. H. Sch.* } **HERMANNIA** couleur de feu. cap.
 tenuifolia Bot. Magaz. } or. ♪
 à feuilles menues. cap. or. ♪
HIERACIUM foliosum *Willd. sp.* } **EPERVIÈRE** feuillue. Hongrie. ℥
 lævigatum Willd. H. Ber. } lisse. ℥
 ramosum Willd. sp. } rameuse. Hongrie. ℥
 scabrum. } à tiges rudes. ℥
 tubulosum, p. 102, species distincta ab H. intybaceo. }
- HIBBERTIA** crenata *Andr. Nep.* } **HIBBERTIA** à f. crenelées. *N. HOLL.*
 grossulariæfolia Bot. Magaz. } or. ♪
- HYOSCIAMUS** ægyptiacus. }
 senecionis Willd. Enum. } **JUSQUIAME** d'Égypte. or. ℥
- IBERIS** nudicaulis, *p. 156.* }
GUEPINIA iberis *Bastard, fl. suppl.* }
TEESDALIA nudicaulis *H. K.* }
- ILEX** dahoon *Mich. Fl.* } **Houx** dahoon. caroline. or. ♪
 opaca H. K. } opaque. Am. s. ♪
IRIS triflora *Balbis, Add.* } **IRIS** à trois fleurs. ℥
IXORA americana *Jacq. H. Sch.* } **IXORA** d'Amérique. Mexiq. s. ch. ♪
JUGLANS amara *Mich. Arbr.* } **NOYER** amer. Am. s. ♪
 aquatica Mich. Arbr. } aquatique. Am. s. ♪
 squamosa Mich. Arbr. } écailleux. Am. s. ♪
JUNCUS bicornis *Mich. Fl.* } **Jonc** à deux cornes. Am. s. ℥
JUNIPERUS rigida. } **GÉNÉVRIER** à feuilles roides. *N.*
 holl. or. ♪
- LAURUS** diospyroides *Mich. Fl.* } **LAURIER** à feuilles de diospyros.
 glaucescens. } Am. s. ♪
 glaucescent. ♪
- LEONURUS** multifidus. } **LÉONURUS** lacinié. ⊙
LINARIA viscosa. }
ANTIRRHINUM viscosum *Bot. Ma-* } **LINAIRE** visqueuse. esp. ⊙
 gaz. (an lin.). }
LITHOSPERMUM dispernum *L.* }
 dec. } **GREMIL** à deux graines. Sibérie. ⊙
 retortum Pallas, Itin. (eadem }
 Marsch.). }
- LOBELIA** alata *Bill. N. Holl.* } **LOBÉLIA** ailé. *N. holl. or. ℥*
 lutea L. } à fleurs jaunes. cap. or. ℥
LONICERA balearica. }
CAPRIFOLIUM balearicum *Dum.* } **CHÈVREFEUILLE** de Mahon. ♪
 couis. Bot. cult. }
- LUPINUS** perennis *Bot. Magaz.* } **LUPIN** vivace. Am. s. ℥
MADIA mellosa *Jacq. H. Sch.* } **MADIA** à fl. pédonculées. Chili. ⊙

