Formulario magistral y memorial farmaceútico ... / enriquecido de notas por [Etienne] Pariset.

Contributors

Cadet de Gassicourt, C.-L. 1769-1821.

Publication/Creation

Mexico : J.B. de Arizpe, 1821.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/yyjyemud

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

Unable to display this page

M. 30

317494 Amer. Coll.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE
AMERICAN ROOM

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29299317

FORMULARIO MAGISTRAL

Y

MEMORIAL FARMACEÚTICO.

RECOLECTADO

POR EL CABALLERO CADET DE GARSSICOURT,

doctor en estas ciencias, miembro de la Legion de honor Farmaceútico, secretario del Consejo de sanidad de la ciudad de París, socio corresponsal de las Academias de Madrid, Turín y Florencia, de las sociedades de Bruselas, Lieja, Strasburgo, Leon, Ruan, Orleans, &c. &c.

Y ENRIQUECIDO DE NOTAS

POR Mr. PARISET,

médico del departamento para las epidemias, médico de la Casa Real de Bicetré, y miembro del Consejo de sanidad.

CUARTA EDICION.

REVISADA Y AUMENTADA

EN PARÍS AÑO DE 1818,

Y TRADUCIDA AL CASTELLANO

POR D. NICOLÁS MOLERO

EN MÉXICO AÑO DE 1820.

MEXICO 1821.

Impreso en la oficina de D. Juan Bautista de Arizpe.

AVISO

A LOS SEÑORES MEDICOS Y CIRUJANOS.

Aunque todos los farmaceúticos pueden ejecutar regularmente las fórmulas contenidas en esta recoleccion, el autor previene que se encontrarán constantemente preparadas en su casa calle de S. Honorato núm. 108 en París.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

AL Sr. Dr. D. VICENTE CERVANTES, catedrático de la Universidad y jardin botánico de México, alcalde examinador de Farmacia en el tribunal del Proto medicato, socio de la Academia médica de Madrid y del colegio de boticarios, consultor de la sociedad económica de Goatemala y corresponsal de la de Puebla.

¿A quién con mas justicia ofreceré, caro amigo, este imperfecto trabajo hijo de mi insuficiencia que á vd., cuya dignidad y elegancia en la farmacia y botánica es pública? Vd. arranca á la naturaleza el gran arcano de las propiedades medicinales que envuelve en uno de los ramos mas preciosos de sus producciones; animado de un espíritu filantrópico penetra en el palacio vegetal para imprimir en cada uño de los individuos de este reino aquel sello que distinguiendo las especies de un mismo género debe desterrar toda confusion; alcanza con sus indagaciones las propiedades físicas, químicas y medicinales de los seres de los tres reinos para hacerlos contribuir con aquellas partes propias á llenar el grandioso fin de socorrer á la humanidad aflijida en las turbulencias de las enfermedades. De nada serviría que prescribiese el

médico el antídoto con que debia contrariar un síntoma morboso si la destreza del farmaceútico no le daba la preparacion oportuna. Si los venenos se hacen medicamentos por el tino práctico con que los juega el médico á la cabecera del enfermo, las medicinas tambien se convierten en aquellos, cuando una sábia direccion en el farmaceútico no cuida de la exactitud en las preparaciones que exigen. Vd. en fin, embriagado con el dulce nectar de la sabiduria ha consagrado sus preciosos dias al estudio de ciencia tan benéfica contribuyendo en gran manera al fin que se han propuesto los médicos en el tratamiento de sus enfermos. Oficioso con los ricos, caritativo con los pobres y escrupuloso con todos, ha merecido, justamente, ser considerado en este reino como el primero en su profesion.

Dignaos, pues, recibir este corto homenage, ú tosco y desordenado producto sincero de la gratitud y amistad que le profesa su apasionado amigo y servidor Q. S. M. B.

Nicolás Molero.

PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.

Homine imperito nunquam quiequam injustius,
qui, nisi quod ipse, nihil rectum putat.
Ter. in Adelphis.

„No hay cosa mas despreciable, dice Terencio, que la „ignorancia de un hombre á quien nada parece bueno „sino lo que el hace."

Esta verdad inconcusa se hace aun mas visible en quienes la ignorancia se halla unida hasta un cierto punto con un orgullo inmoderado, union frecuente por nuestra desgracia, y cuyos estragos extensivos á todas materias no reservan aun al precioso y útil ramo de la literatura.

El ignorante orgulloso está siempre alerta para asestar sus tiros á los escritores, él incapaz de otra cosa desvirtúa la débil potencia de su cerebro mal organizado, en abortivas procreaciones contra sus obras y lanzando críticas picantes y las mas voraces sátiras quisiera impávido destruir, si le fuese concedido, todo trabajo ageno. El sabio por el contrario, se gloria con la lectura de una nueva produccion, donde con un animo imparcial aplaude lo que tiene de buena y limita sus deseos á una juiciosa correccion en aquella parte que encuentra defectuosa.

Si hubiera tenido en consideracion unicamente la escasez de mis conocimientos, no hay duda que habria desistido del empeño de traducir y publicar la presente obra; pero animado de un sentimiento mas noble cual es el de ser útil, tal cual me lo permitan mis fuerzas, á mis semejantes, me dejé seducir por el alhago de tan

encantadora idea, y no obstante que el poco tiempo que me dejaba libre para su dedicacion, el desempeño de mis serias obligaciones queria ofrecerme un nuevo obstáculo, superé empero tamaño inconveniente sin desatender aquellas, robando á mi descanso el tiempo mas precioso como tambien el mas bien empleado.

El mundo literario á cuyo criterio la expongo, me redimirá de hacer la apología de una obra cuya utilidad se presenta á primera vista si su juicio se acomoda con el que tengo hecho de ella, facilmente decidirá que una coleccion de fórmulas que abraza tanto las que usaron los antiguos cuanto aquellos que con sucesos los mas felices practican los modernos, no puede menos que producir un beneficio visible á la humanidad: el farmaceutico que la reuna á sus farmacopeas, suplirá con ella la falta de innumerables autores, cuya reunion seria dificil á unos é imposible á otros, mientras que por otro si encontrará en ella con la mayor facilidad la fórmulá que se le pide, fenómeno muy interesante y que no tendria lugar de otro modo, sino despues de haber perdido mucho tiempo en requerir y consultar los autores que se le citasen, dado caso que se hallasen en posesion de ellos. El médico y cirujano á quienes inconvenientes de la misma categoría deberian negar la consecucion de dichos autores, gozarán por una razon análoga la primera ventaja, al paso que les proporcionará una obra orientandose fielmente de las mixtiones y maridages que hacian los antiguos y siguen los modernos en los simples para asegurar los efectos que esperaban de su aplicacion. El conocimiento teórico y practico de los lectores les hará entre sacar y escoger las que la análisis de su sana razon les presente como mas ventajosas, quedandoles siempre tiempo para desechar aquellas que estimen por ineficaces, ya porque no sean compatibles con los actuales conocimientos químicos, ya en fin porque no se acomoden á lo que su práctica les haya enseñado.

El autor dice juiciosamente en sus advertencias que este libro no puede menos que ser perjudicial en manos de aquellos temerarios que sin otra educacion facultativa ni principios sólidos en la materia quieran solo con su posesion y lectura hacerse profesores; yo agrego que aun nosotros mismos debémos usarlo haciendo en la administracion de las fórmulas todàs aquellas precisas variaciones que tan imperiosamente reclaman para el acierto en la medicina las relaciones de clima &c.; pues á la manera que el inmortal Baglivio nos repite á cada paso en su obra *Romae scribro, et in acre Romano*, debémos tener consideracion (sirviendome de sus mismas expresiones) de que estas fórmulas se escribieron en distintos climas, y que tenémos que usarlas en México.

No parecerá nimia escrupulosidad el presentar á los lectores estas reflexiones si se atiende á que tratamos de una ciencia que abraza un objeto tan plausible y en la que todas sus partes repugnan el estudio superficial por cuanto cada una en su perfeccion posible es como forma el todo que se dirige á la conservacion del hombre, fin grandioso y que nunca sabrá apreciarse justamente. Pero la terapeutica aquella parte de la medicina que trata de curar las enfermedades y que incluye en sí el arte de recetar que no es mas que una parte conmutativa de ella, exige escrupulosísimas reflexiones y meditaciones las mas detenidas como sabiamente se manifiestan en los prolegómenos que sirven de introduccion al tratado de terapeutica del célebre Alibert.

¿Cuán reprehensible no seria la conducta del médico que colocado en la cabecera de su enfermo y hecho cargo de su dolencia tratase de aplicar la misma medicina y en las mismas dósis con que los autores mas esclarecidos asegurasen haber curado enfermedades de aquel género en otros dolientes?

La edad, el clima, el sexo, los diferentes estados de este en el bello, y la idiosyncracia producirán infinitas variedades á que deberá estár atento el profesor, y

sin cuya precisa consideracion y la de los cambios que ellas exijan, la medicina seria inútil y las mas veces arriesgada.

Acaso pueda decirse que ésta, siendo de tanto aprecio, es una de las reflexiones mas sencillas comparada con otras que igualmente deben estar al alcance del médico. En efecto, todo el mundo sabe que Hipócrates cuando trata de la administracion de los remedios insiste nerviosamente sobre la eleccion de la ocasion, Galeno y Bordeau hablan tambien advirtiendo la necesidad que hay de tener cuidado con respecto á los periodos de la enfermedad. Un medicamento tomado inopinadamente léjos de obrar como tal, se convierte en un veneno, que presentando un terrible obstáculo, contraría las benéficas terminaciones y tendencias con que naturaleza próvida poniendose al frente de las enfermedades las supera, ora sea sola, ora bien auxiliada del arte.

El simple ó compuesto que está indicado al fin de una enfermedad, no puede convenir en el principio, aumento ó estado de ella, si se desprecia esta consideracion é indistinta y tumultuosamente se aplican medicinas; si antes que una haya producido aquella accion de que debemos esperar el benéfico efecto se le interrumpe á veces y á veces se le contraría con la propinacion de otra ú otras muchas; y si por último no se observa la marcha paulatina que fija naturaleza en las crónicas y la rápida con que se precipitan las agudas para arreglar á este inalterable órden el dietético y farmaceútico, ¿cómo podrá llamarse este sistéma curativo? El médico en este caso será un criminal homicida de su enfermo á quien deberémos acordar el nombre de víctima sacrificada á tan indiscreta y exterminadora conducta, con la que aglomerará y redoblará parosismos, desenvolverá síntomas nuevos, y cambiando de tal modo la enfermedad, se le presentará ésta desconocida, se separará del primer diagnóstico que formó, dudará, no sabrá caracterizarla, interrumpirá una crísis benéfica, y cual piloto timido que

receloso de zozobrar practica sin examen maniobras que lo sumerjen en el insondable piélago, anticipandole su ruina; asi, pues, la muerte prematura del doliente será el triste resultado de su poca reflexion.

Tan nocivo es aplicar medicinas sin consideracion del tiempo de la enfermedad en que deben usarse, como el emplearlas en aquellos afectos que no necesitan de su auxilio. No en todas las enfermedades estamos precisados á echar mano de los recursos farmaceúticos, hay algunas en que éstos saliendo de la esfera de inútiles se acercarian al grado de perjudiciales; en esta debe recurrir el médico á otra fuente de medicinas que no se encuentran en la botica. Galeno, á quien en justicia no se le puede negar la gloria de haber meditado con fruto en las verdades mas preciosas del arte de curar, advirtió la grande diferencia que presenta el hombre con respecto al resto de los animales; la misma naturaleza que lo ha facultado para el doble comercio de trasmitir sus ideas y recibir las de sus semejantes, lo ha expuesto en trueque de esta ventaja á mil pasiones devorantes sujetándolo por su medio á infinidad de tormentos; para él están reservadas las escenas mas lastimeras en cuyos tristes bastidores se presentan las desgracias, el odio insoportable, la devoradora ambicion, la emulacion detestable, el torpe tédio y la perplexidad fastidiosa. Esta misma fuerza, esta superioridad de razon es infinitas ocasiones la causa de sus afecciones, él se agita por instantes en un destino cuyos límites le parecen estrechos y que pretende agrandar á toda costa. Aquí es donde se ve precisado el médico á socorrer el afecto moral á la manera que está obligado á hacerlo con el fisico, y á imitacion del médico de Cos debe consolar al enfermo en sus aflicciones, para lo que se necesita que esté dotado de una alma grande y llena de caridad, en una palabra que tenga un caudal de sana moral que es una de las condiciones indispensables para ser buen facultativo.

*

A mas de esto ¿cuántas ocasiones se han presentado para observar la necesidad en que estamos de excitar las pasiones en las enfermedades largas y peligrosas? La bulliciosa inquietud de la alegria ocasionada por una noticia agradable, la inesperada vista de un objeto amado, el placer de ver saciado un gran deseo, un cambio repentino de los sentimientos que agovian un corazon, una pronta sorpresa, una conmocion extraordinaria del sistema intelectual han producido muchas veces revoluciones las mas felices en el orden, marcha, é intensidad de los síntomas morbosos. El vulgo mismo expectador de algunos de estos hechos, accidentalmente presentados, ha observado y con la conviccion de la experiencia vocifera, que las calenturas intermitentes que conoce bajo el nombre de frios se destierran cuando los enfermos que los arrostran son sorprendidos por algunos de estos afectos. La curiosa historia de las afecciones morales forma, pues, una doctrina de la que se vé el médico precisado á hacer un constante estudio, sin el cual la medicina no seria otra cosa mas que una ciencia seca, árida é insuficiente.

Tales son las consideraciones y conocimientos que deben acompañar al que quiera hacer un benéfico uso de esta obra; circunstancias que no pueden darse mas que en los verdaderos profesores y de ningun modo en los profanadores del templo de Esculapio.

ADVERTENCIA

SOBRE ESTA NUEVA EDICION.

No habria cosa mas fácil que aumentar este formulario agregando á cada edicion las prescripciones que de una á otra edicion se han presentado en las obras recientes de medicina apoyadas en la recomendacion de los prácticos esclarecidos que las han usado con suceso; pero haciéndose esta recoleccion voluminosa dejaria de ser portátil y manuable y no llenaria el fin con que se ha escrito. Me limito, pues, á hacer en esta edicion algunas correcciones y supresiones que se me han indicado en la crítica de los diarios de medicina, crìtica juiciosa que no tiene otro objeto que hacer esta obra mas útil. Reemplazo las fórmulas suprimidas con un número poco mas ó menos igual de otras selectas, empeñandome especialmente en colocar con mas método y regularidad el Memorial Farmaceútico; *pero advierto escrupulosamente al comun de los lectores que no se debe considerar esta parte de recoleccion mas que como una tabla de materia hecha para recordar á los médicos algunas ideas que puedan*

haber olvidado, y en la que aquel que no tuviese conocimientos en medicina no encontrará mas que indicaciones propias para descaminarlo. El imprudente que buscase en este Memorial un orden cualesquiera de tratamiento expondría la vida de su enfermo, y en caso que lo curase no deberia este suceso mas que á una casualidad muy peligrosa. Aunque he presentado esta observacion en el prefacio, me he creido, no obstante, en la obligacion de reproducirla aqui.

C. L. C. de G.

PREFACIO.

Aquel vivo deseo de aliviar ó de evitar los males que todo hombre está condenado á sufrir desde que nace, ha creado precisamente aquel arte con cuyo auxilio se conocen en la naturaleza las sustancias que ya en su estado de simplicidad ó de mixtion, ya puras ó modificadas pueden servir de remedio. El empirismo fué la primera guia, la credulidad el primer juez, y en esta ciega experiencia el observador extraviado en el principio, por las ideas supersticiosas que atribuian la mayor parte de los males á la maligna influencia de los astros ó de las divinidades; ha buscado para oponerle aquello que en el sistema de los cultos parecia contrario á su maligna influencia. La farmacia y la medicina nacieron al mismo tiempo, y estuvieron largo espacio confundidas. (1) Poco importa que su cuna la haya tenido en Egipto, China ó en la Caldea; el arte de curar estuvo en los principios entre las manos de los párrocos, poetas y charlatanes. Los enfermos eran conducidos á los templos, y en sus columnas se apuntaban en Egipto los remedios que habian producido buen suceso. La administracion de estos remedios iba siempre acompañada de ceremonias, conjuraciones y de deprecaciones; ya se diesen sustancias inertes ya activas. Todavia se encuentra en la India esta medicina primitiva y religiosa.

Es tal el imperio de las preocupaciones que los progresos de las ciencias fisicas no han podido desterrar de la materia médica un gran número de remedios insignificantes que fueron admitidos en otro tiempo por la preocupacion supersti-

---

(1) *Entre los griegos y en el tiempo de Epicuro se daba á los boticarios el nombre de médicos sedentarios, porque sentados en sus boticas esperaban á los enfermos. Aristóteles, dice James, ejerció algun tiempo este oficio* (*Dict. de Medicina tom.* 1 *pág.* 52). *Este fué tambien el de* Eudamus *y el de un cierto* Chariton *de quien Galeno ha sacado algunas descripciones de medicamentos.*

ciosa. Se ha convenido en desechar como medios curativos á la disposicion de los hombres, las ceremonias, súplicas y conjuraciones; pero no se ha abandonado aun en los tratados mas recientes, el nombre de muchas sustancias sin propiedades conocidas ó especiales: *los nidos de alciones, las piedras de aguila ó de golondrinas, los ojos de cangrejos, las uñas de la gran bestia, el bezár, la orchilla, la jada, las lágrimas de ciervos*, y muchas otras que hace mucho tiempo debian haber desaparecido. Muy recientemente es cuando se han sometido á una análisis bastante exacta los remedios heroicos elegidos entre los medicamentos simples. La quina, el opio, la hipecacuana, las cantáridas y algunos otros se conocen mejor que se conocian. Sin embargo no se han aplicado todavia á la clínica los resultados de estos exámenes químicos y las análisis que no han podido confirmar las observaciones prácticas no pueden ser miradas como completas.

Cuando se lee la historia de la medicina se ve la materia médica (esta parte del arte de curar que consiste en clasificar los medicamentos simples y sus propiedades despues de haber trazado su historia natural) que toma ya una forma regular en los escritos de Dioscorides donde no se encuentran las idéas fabulosas de Nicandro. Sigue despues Galeno y dá grandes impulsos á la farmacia, cuyas fórmulas compuestas se multiplicaron bajo Actio y Rhasis, Avicena, Averroes y otros que adoptaron la Polifarmacia de los Egipcios y de los Arábes. El renacimiento de las letras y de la medicina hipocrática indujo algunos cambios en la preparacion de los medicamentos, pero no los ha simplificado. La alchimia por el contrario, enseña nuevas combinaciones y desde Paracelso hasta Shtal y Boerhave se complicó mas y mas la farmacia. Se creyó en un principio que mientras mas compuesto era un medicamento, mas propiedades tenia. Despues de haber acumulado sustancias sin conseguir mayores resultas cayeron los médicos en el extremo opuesto y han alabado exclusivamente á las sustancias simples, no hay cosa mas razonable, sin duda que la opinion de los prácticos que juzgan que el medio mas cierto de apreciar la accion de los medicamentos en otros órganos es el de simplificarlos. Es necesario convenir en ella, la teoría de todas las ciencias fisicas indica esta marcha; ¿pero para seguirla se debe proscribir enteramente la polifarmacia? ¿no vale mas esclarecerla? En la medicina, asi como en la política, todas las revoluciones para no ser funestas deben obrarse con mucha lentitud. Es necesario ir paso por paso, guiado siempre por la experiencia, reformar prudentemente y no dejarse seducir por la evi-

dencia de las verdades teóricas, porque muchas veces la práctica no corresponde á la teórica. Las antiguas opiniones dificiles de desterrar piden prudencia. Los sucesos incontestables que han seguido los mas célebres médicos con el empleo de las medicinas compuestas, convidan á seguir el método que les ha producido ventaja, y tal es la debilidad humana que un médico está siempre mas ó menos obligado á condescender con las voluntades, caprichos, ó supersticiones de la mayor parte de los enfermos impacientes, que no estando al alcance de los conocimientos modernos, se figuran que se les desprecia ó que no se conocen sus males cuando no se les prescriben mas que medicinas simples. En el mundo la mayor parte de las gentes acomodadas se jactan de poseer conocimientos generales; creen á la medicina tan firmemente como el enfermo de Demolier, juzgan la ciencia y capacidad de sus médicos por la multiplicidad de las recetas que prescribe, tanto que un práctico muy esclarecido que se desdeñaba de hacer á sus enfermos un romance de sus enfermedades, se ha visto disminuir rápidamente de crédito porque ha restringido sus proscripciones á un pequeño número de medicamentos cuyos efectos pueden ser previstos, calculados y mirados como ciertos.

Pero dirán, el médico que conoce sus debéres, que honra su profesion guiado siempre por el amor de la humanidad, no cede á las consideraciones del interés personal; el no sigue mas que su conciencia, no ordena mas á sus enfermos que los medicamentos que conoce y cuyas propiedades ha estudiado: pero en fin se juzga que siempre es mas fácil determinar la accion de un medicamento simple que el de un compuesto. Sobre este principio es sobre el cual los antagonistas de la polifarmacia han establecido todo su sistema. Antes de combatirlo y para apreciar su justo valor será conducente producir sus objeciones en toda su fuerza.

» La mezcla y la confusion de los medicamentos, di-
» cen (1) es uno de los mayores obstáculos que tiene que su-
» perar la medicina para su adelantamiento. Mientras que
» se haga uso de los remedios compuestos de la farmacopéa Gale-
» nica, no se podrá saber cosa acerca de sus verdaderas propieda-
» des. La antigua escuela de Cos empleaba remedios simples. (2)

---

(1) *Fourcroy (del arte de conocer y de emplear los medicamentos) tom. 1. pág. 446.*

(2) *Se encuentran en Hipócrates muchas preparaciones compuestas.*

» no presentaba al enfermo mas que un solo medicamento, y » no los administraba sino uno despues de otro cuando las cir- » cunstancias exigian que se variase su naturaleza. Sino se re- » nuncia á este lujo peligroso, permanecerá la ciencia en el es- » tado en que se halla, agoviada de pretendidas riquezas no » podrá hacer ninguno uso de ellas. En lugar de electuarios » famosos, de decocciones compuestas, de preciosas opiatas, de » multiplicadas píldoras, una materia mineral, vegetal ó ani- » mal en sustancia, sales cuya naturaleza es bien conocida, al- » gunas preparaciones químicas simples, es lo que debe cons- » tituir la materia médica."

Algunos médicos aseguran que con doce ó quince sustancias simples y tales como las presenta la naturaleza, pueden tratar todas las enfermedades, crónicas, agudas internas y externas... Tratar debe entenderse curar. Siendo esto asi, la medicina no tiene mas progresos que hacer y la terapeutica no será un estudio muy dificil. Es necesario felicitarnos de tan grande descubrimiento, quemar todos los formularios, todas las farmacopéas, cerrar todos los laboratorios, las oficinas y conservar solamente en cada ciudad un droguista decente que vendiese por mayor y menor las quince sustancias dotadas de tan bellas propiedades. Pero como muchos prácticos respetables no conocen todavia el beneficio de esta grande simplificacion; como ésta *oligo-farmacia* no tiene el asentimiento general, se puede aun examinar y preguntar á sus partidarios lo que ellos entienden por remedio simple.

No hay equivocacion si se designa por ella el ejercicio en sus diferentes especies, la aplicacion ó substraccion del calórico de la luz de la electricidad del magnetismo (suponiendoles una accion sobre nuestros órganos) las fricciones secas, las lociones con el agua pura, los baños &c., pero cuando se cita una sustancia orgánica ó mineral cualesquiera, elquimista os replica y dice: no hay medicamento alguno simple. Tal preparacion muy compuesta en apariencia, no admite otros elementos, otros principios que aquellos que se contienen en una sola sustancia tomada aisladamente. La accion de un medicamento simple, quiere decir, de una sustancia única, es siempre mixta, bien que especial; y muchas veces un medicamento compuesto obra como obraria un medicamento simple que tuviera la misma propiedad. Puede que fuera tan dificil sustituir una medicina simple á la teriaca como una compuesta al mercurio. La accion es una, de una y otra parte; y relativamente á la accion todos los medicamentos podrian considerarse como simples. En la Dynamica vemos una esfera arrebatada por dife-

rentes cuerpos á la vez, colocar siempre una diagonal sea que ella obedezca á dos ó á veinte impulsiones simultáneas, del mismo modo en la accion de los medicamentos; las causas son multiplicadas, el efecto uno.

Para aclarar mas esta importante cuestion aplicarémos lo que se acaba de decir á cualquiera sustancia mirada como simple en medicina, á un gas á una sal..... ¿Se sabe si un gas obra por su radical ó por el calórico, la luz y la electricidad que contiene, si es una sal, tal como el nitro, la accion es debida al oxígeno, al azoe ó á la potasa? El modo de obrar de los medicamentos es tan misterioso cuando se usan las sustancias solas como cuando las compuestas. (1) No se puede encontrar la razon de esto en la accion particular de los elementos componentes. Esta accion se modifica siempre por la fuerza vital, de lo que resulta que no hay verdaderamente sustituyentes en medicina asi como en las lenguas no hay perfectos sinónimos.

La análisis química ha servido hasta el presente de poco socorro con especialidad cuando ha sido aplicada á los medicamentos sacados del reino vegetal que son los mas. En efecto ¿de qué utilidad es para la medicina el saber que el opio, la cicuta, el euforbio, la quina asi como el azucar, la goma y la harina ofrecen por último resultado oxigeno, carbon é hidrogeno, y que las propiedades tan diferentes de estas sustancias dependen de las proporciones variadas de este principio? (2) ¿Qué debe concluirse de semejantes hechos sino es que los medicamentos deben ser admitidos ó rechazados despues de la experiencia médica, y que si esta regla es recibida y practicada para los remedios simples no hay motivo para que no lo sea para los compuestos?

No estamos tampoco en el tiempo en que se creia que

---

(1) *Los mas sábios médicos no han encontrado mejor razon del efecto narcótico del opio, que aquella dada por el famoso cómico:* opium facit dormire quia est in eo virtu dormitiva.

(2) *No por esto debe creerse que la análisis química sea enteramente inutil á la medicina, ella le ha hecho grandes servicios. Se le debe la teoria de la respiracion, el conocimiento de la formacion de los cálculos, el de las alteraciones que sufren la orina y los huesos &c. La química á explicado algunas propiedades de los vegetales análogos; y como la analisis vegetal hace diariamente nuevos progresos se deben esperar de esta, aplicaciones aun mas útiles.*

*

en una mezcla farmaceútica cada cuerpo obraba segun sus propiedades particulares y especificas; que el uno iba á reanimar el cerebro mientras el otro fortificaba el estomago y que un tercero depuraba la sangre &c. Tampoco pensamos que hay siempre necesidad de componer una formula con una base agente principal, uno ó dos adyudantes, un correctivo y un excipiente. Estas ideas sistemáticas se han abandonado; pero se sabe que medicamento puede ser modificado en sus efectos por uno otro, que el opio y la quina, por ejemplo, cuando ellos se juntan obran de un modo diferente que cuando están separados, que el emético se hace purgante cuando se mezcla con una otra sal. El empirismo ha comprobado que las preparaciones muy complicadas tales como la teriaca, el diascordio y el jarabe anti-escorbutico, tienen propiedades que no se encuentran en ninguna sustancia simple, de lo que debe concluirse que es necesario en medicina como en la química admitir esta ley: los compuestos tienen propiedades nuevas y diferentes de sus componentes.

Para proceder con método y formarse una buena teoría sobre los medicamentos seria necesario ensayar todas las sustancias miradas como simples, combinar despues las indicaciones dos á dos, tres á tres para ver sus compuestos. ¿Qué resultaria? Se sabe sobre esto bastante para poder afirmar con anticipacion que no hay analogía entre la accion de los componentes, y la de los compuestos; no se podria inferir de lo uno, lo otro y todo se reduce en ambos casos á acciones propias individuales, independientes y especiales aunque mixtas. De lo que se sigue necesariamente que los sucesos obtenidos por los medicamentos compuestos muchas veces experimentados pueden considerarse como otras tantas experiencias hechas y como nosotros miramos la experiencia médica como el solo arbitrio que puede decidir la cuestion, habiendo la experiencia sancionado los remedios compuestos, nos parece que estamos suficientemente autorizados para emplearlos en la práctica (1).

---

(1) *Mi opinion coincide perfectamente con aquella que M. el Dr. Macartan y M. Planche han manifestado en una disertacion que han leido en la sociedad médica de Paris en enero de 1812. Ellos han dicho:*

La experiencia enseña que un medicamento mezclado á otro, parte sus propiedades ó no las goza mas que en un grado inferior y es muchas veces mas útil que empleado aisladamente y á mas

Concluyese de todo lo precedente que es permitido, que es lícito y útil el hacer una eleccion de formulas acreditadas por el largo uso de prácticos célebres. Sin duda es necesario reformar la Polifarmacia, es preciso hacer desaparecer de las fórmulas las sustancias inertes que la ignorancia y la supersticion habian colocado en ella, es menester no emplear mas que las sustancias conocidas y de buena eleccion, no asociando aquellos que se destruyen mutuamente; pero es fuerza conservar y respetar los remedios compuestos que han producido sucesos constantes en las manos de los grandes prácticos á lo menos hasta que la experiencia haya dado medios mas seguros y mas simples.

Las farmacopeas actuales son muy numerosas y muy variadas; cada pais, cada escuela tiene la suya; las hay muy voluminosas, pero no hay alguna que reuna las fórmulas de los medicos modernos, formulas esparcidas en las memorias, en los tratados particulares ó en las obras periodicas. Muchas de es-

---

fuertes dosis. Se observa por ejemplo que una fiebre intermitente rebelde á la quina sola, cede frecuentemente mezclandole á este febrifugo el tartrite antimoniado de potasa, el acetate ó muriate de amoniaco, el carbonate, el nitrate ó el sulfate de potasa, el polvo de manzanilla romana &c. segun las circunstancias. Se observa que en los casos de fiebres intermitentes de clorosis, de amenorreas, blenorreas, de ciertas leucorreas atónicas &c. donde el sulfate de hierro recomendado con razon por M. Maraecura; es alguna veces mas ventajoso mezclandose la mirra y con especialidad el carbonate de potasa como lo hacia el Dr. Griffith. En esta última circunstancia hay descomposicion y combinacion. El ácido sulfúrico abandona el hierro para formar con la potasa una sal ligeramente laxante que impide la constipacion ordinariamente producida por este metal y se encuentra este precipitado en el estado de oxido carbonizado muy dividido.

La experiencia prueba tambien que la esperanza de llenar muchas indicaciones á la vez lejos de ser siempre quimérica es á ocasiones real. ¿Quién de nosotros no ha observado que en una fiebre adynamica cuando hay calor en las extremidades, sequedad en la lengua y la piel, hipo, susulto de tendones, coma, constipacion tenaz ó diarrea &c. la quina dada sola agraba ordinariamente el mal, mientras que prescripta con los ácidos, con el acetate de amoniáco á fuertes dosis, el alcanfor, los licores fermentados, los anti-espasmodicos, á veces el mercurio dulce, algunos granos del ruibarbo ó el carbonate de cal, despues de las diversas indicaciones disipa en muchos casos estos sintomas alarmantes?

tas prescripciones están en boga y han adquirido una reputacion fundada en la de sus inventores, y poco á poco han caido en olvido ó se han alterado porque no se les ha colectado cuidadosamente en un cuaderno. Los médicos que quieren prescribirlas no saben muchas veces de donde tomarlas, ellos las ordenan con frecuencia bajo el simple nombre de sus autores, y el farmacéutico que no siempre tiene una gran biblioteca á su disposicion se halla embarazado para encontrar la fórmula y despacharla. Es, pues, hacer un servicio igual á los prácticos y boticarios el reunir aquellas que se piden con mas frecuencia.

Sería un volumen inmenso si se quisiera publicar una coleccion completa de las prescripciones magistrales que han sido impresas separadamente preconizadas y recomendadas; pero la abundancia sería aquí mas perjudicial que la escasez, y es fuerza limitarse á una eleccion razonable. Esta eleccion ha sido hecha mas de las preparaciones que se han abogado en la oficina de mi padre y en la mia desde cuarenta años, que de las obras de los médicos, tales son aquellas de Maloet, Zoaque, Taonchin, Buovart, Barther &c. Pero en leyendo los escritos de los médicos extrangeros se conocerá que de ellos he recolectado las de Franck, Brown, Huxham, Wilis, Pringle, Quarin, Swediaur &c. Ellas estaban poco repartidas en las oficinas, muchas sin embargo adoptadas por algunas boticas se miraban como propias de ellas. En nuestra profesion no debe haber nada secreto y léjos de que lleven á mal ejemplo que yo doy me atrevo á creer que los farmaceúticos, juzgarán de él favorablemente y lo seguirán.

Como esta recoleccion no es una farmacopea metódica y si un simple compendio, cuyo único fin es evitar á los médicos y farmaceúticos el registrar largo tiempo libros, sigo como mas cómodo el órden alfabetico y para no hacer de esta obra un manual popular donde todo enfermo podria elejir y preparar el medicamento que creyese le convenia; he entrado lo menos posible en los detalles de la preparacion ó manipulacion á fin de que estas fórmulas no puedan ser empleadas mas que por los médicos y preparadas por los farmaceúticos que con la sola enunciacion de las sustancias deben saber cuales son las operaciones necesarias para la ejecucion de lo mandado.

Para facilitar el uso de este formulario he pensado que sería necesario juntarle tres tablas: la primera la de los autores á quienes se debe la fórmula, la segunda la de las prescripciones, la tercera la de las enfermedades á que los médicos las han destinado con especialidad. Asi para dar un ejem-

plo la pocion anti-emética del Dr. Riverio se encontrará en la primera tabla bajo el nombre de Riverio; en la segunda en el lugar de las pociones, y en la tercera en el artículo vómito.

Me he apresurado para colocar en seguida de este formulario el memorial farmaceútico que le termina. Temo que no se me crítique el haberme injerido en un arte que me es extraño; y de osar indicar un modo de tratamiento señalando los medicamentos para las enfermedades. Yo no he tenido esta pretension ridícula y peligrosa, digo á los que lean este memorial, como si se consultase un libro de medicina que se expondrán á los mas funestos errores. Es necesario ser médico ejercitado para elejir con discernimiento en una série de medicamentos afectados á un género de enfermedad aquel que convenga á la especie que se quiere tratar. Un remedio excelente en tal fiebre, tal flemacia, es inútil y peligroso en una enfermedad del mismo género si hay contra indicaciones ó complicaciones que no puede juzgar el que no es médico. Por otra parte la edad, el sexo, el clima, el temperamento y muchas otras consideraciones pueden hacer modificar la dósis de una prescripcion. Para que los médicos solos puedan servirse de esta parte de la obra prevengo al lector que no sigo en el órden del memorial algun rejimen curativo, primero porque no me pertenece, y por último porque esto no entra en mi plan. No he querido en esta nomenclatura mas que ayudar á los prácticos cuya memoria por feliz que sea no puede tener siempre presente la série de los métodos empleados en todas las enfermedades, y sobre todo las diferentes dósis á que se les prescribe. He querido recordarles las diferentes preparaciones contenidas en este formulario y darles á los farmaceúticos conocimiento de aquellas que se les pueden pedir. Yo pienso que esta especie de cuadro no será inutil á los estudiantes de medicina, porque comparando las diferentes preparaciones indicadas para los mismos casos, señalará las sustancias en que se tiene mas confianza, aquellas que se le asocian mas comunmente y las formas variadas, bajo las cuales se les presentan á los enfermos. Este aproximamiento puede dar á los médicos las ideas de reforma ó de perfeccion. La clasificacion de las medicinas para las enfermedades no es una cosa nueva; muchas farmacopeas ofrecen el ejemplo; yo no he hecho mas que imitarlas y los médicos que cito son los que me han dado las indicaciones. He creido poder decir: los prácticos prescriben ordinariamente en la Hemotisis, la conserva de rosas, el elixir de Minsicht, el extracto de cachunde &c. Pues que en los formularios donde se dá el modo de preparacion de estos medi-

camentos, no dejan de unir los médicos que ellos son empleados en la Hemotisis.

Insisto sobre esta explicacion porque el mayor disgusto que podria darme la malevolencia, seria el criticar que me excedia en mis escritos ingiriendome en materia de medicina. Como no hay mérito alguno en publicar una simple recoleccion de fórmulas que he tomado de cien autores no puedo proponerme otro fin que la utilidad pública sin sacar gloria alguna de un trabajo que no pide mas que paciencia y exactitud.

FORMULARIO MAGISTRAL.

FÓRMULAS.

BAÑO DE AGUA MINERAL SULFÚREA ARTIFICIAL, imitando las de Valletria.

De hydro sulfuro de potasa líquido y bien saturado . . . . . VIII onzas.
De sulfuro de potasa seco. . . . . II idem.
De sulfuro de cal líquido y bien saturado VIII idem.
De agua comun. . . . . VIII idem.

Se disuelve el sulfureto de potasa seco en la cantidad de agua indicada arriba. Se une esta disolucion á los otros dos licores precedentes y luego se forma un precipitado que se separará por la filtracion.

Dos onzas de este líquido bastan para un baño de doce viages de agua. Cuando se empieza el uso de los baños sulfurosos no se emplea ordinariamente mas que onza y media, y despues se va aumentando sucesivamente hasta dos y media onzas.

M. M. Planche y Boullay farmaceúticos de París, han indicado otro método para imitar las aguas de Valletria. He aqui su fórmula.

Sulfureto hydrogenado de Sosa concentrado á 25° del Hydrom. . . . . X onzas.
Solucion salina gelatinosa. . . . . IV idem.

Se mezcla el todo al agua del baño al tiempo mismo de usarlo. Se compone la solucion salina gelatinosa con:

De sulfate de Sosa . . . . . } a IV dracmas.
De Muriate de Sosa . . . . . }
De carbonate de Sosa. . . . . } a I idem.
De cola de Flandes . . . . . }
De petroleo rectificado. . . . . XX gotas.
De agua destilada. . . . . I libra.

Se disuelve y se filtra.

Los baños de agua de Baregés convienen en las enfermedades de la piel, en las úlceras y fistulas, en las enfermedades nerviosas atónicas, y en las paralisis y reumatismos crónicos. Se administran estas aguas en duchas para disolver los tu-

mores artríticos, los exostores y anquiloses. Se usan interiormente en las afecciones de pecho catarrales crónicas, en el asma, las obstrucciones de las entrañas y las afecciones venéreas que han resistido á los remedios generales. Son incisivas y diuréticas. Su dósis es de medio azumbre á dos pintas por dia, segun las circunstancias y fuerzas del enfermo.

BÁLSAMO DE GENEVIEVE.

De aceite de olivas . . . . . III libras.
De cera amarilla en pequeños pedazos. } a VIII onzas.
De agua de rosas. . . . . }
De sándalo rojo en polvo. . . . . II onzas.
De buen vino tinto. . . . . III libras.

Se pone todo en un lebrillo de barro vidriado: se deja hervir durante media hora moviendolo bien con una espátula de palo.

Se agrega

De trementina de Venecia fina. . . . I libra.

Se incorpora todo con la espátula durante uno ó dos minutos, se aparta la basija del fuego y cuando el bálsamo está un poco frio se le añade:

De alcanfor en polvo . . . . . II onzas

Se remueve con la espátula, se cuela en seguida el bálsamo al través de un lienzo y se deja reposar hasta la mañana siguiente, se esprime el agua que podria contener y se coloca en un bote de loza para conservarlo.

Se aplica este bálsamo sobre las úlceras, las partes gangrenadas, contusas y heridas: se cubre la herida con papel de estraza y se renueva la aplicacion dos veces cada dia. Se usa mucho en Inglaterra.

BÁLSAMO DE RICOUR.

(*Veáse unguento.*)

BÁLSAMO SAJÓN.

De aceite destilado de alucema. . . } a. I y $\frac{1}{2}$ dracma.
De succino . . . . . }
De orégano. . . . . } a. I dracma.
De mejorana. . . . . }

De salvia. . . . . } a. I dracma.
De romero. . . . . }
De macias. . . . . }
De yervabuena. . . . . } a. II escrúpulos.
De ruda. . . . . }
Concreto de nuez noscada. . . . . IV onz y I dracma.

Se mezclan en frio.

Sirve este bálsamo para frotar los miembros de los niños débiles: á veces se les hacen tomar algunas gotas en azucar para facilitar la digestion.

BÁLSAMO ACUSTICO.

De aceite de almendras dulces. . . . I dracma.
De hiel de buey . . . . . II idem.
De bálsamo de Fioraventi. . . . . media idem.

M. S. A.

Se introduce este bálsamo en el oido á la ayuda de un lechino en el caso de sordera accidental.

BÁLSAMO DE OPODELDOC. (1)

Toménse huesos, contundanse y pongánse á hervir en s. q. de agua hasta que se presente en su superficie un cuerpo untuoso de la naturaleza de la grasa: pásese por tamíz la decoccion y pongásele en un vaso de barro. Por el enfriamiento la gelatina de los huesos se precipita y se separa la grasa. Hagase fundir esta última á un dulce calor y filtrése. Mas.

De potasa del comercio. . . . . I libra.
De cal viva . . . . . II idem.
De agua s. q.

Hagáse una fuerte legía, filtrése, reduzcáse el licor hasta que un frasco conteniendo tres onzas de agua, pese cuatro onzas con este licor.

De grasa obtenida de los huesos . . I libra.
De potasa cáustica . . . . . VII onzas.

---

(1) *Hay muchas fórmulas del bálsamo de Opodeldoc: ésta adoptada por Mr. Klaproth, parece la mejor y ha producido mejores efectos.*

*

Mezclése poco á poco á un fuego suave hasta que esté bien formado el jabon, y que resfriado se disuelva completamente en el agua.

Disuelvanse en seguida en tres pintas de agua hirviendo.

De sal marina. . . . . VI onzas.

Filtrése y hágase fundir en ella el jabon. Cuando se enfrie córtese en pedazos cuadrados, que se dejarán puestos al aire durante algun tiempo para quitarle la humedad.

De jabon indicado arriba. . . . . II onzas.
De alcohol rectificado. . . . . I libra.
De agua destilada. . . . . II onzas.
De alcanfor purificado. . . . . VI dracmas.

Hagáse s. l. la mezcla en un matras: cubráse con una vejiga teniendo cuidado de perforarla para dejar salida al aire.

Hecha fundir la mezcla en el baño de Maria, filtrese estando caliente, resfriese un poco y agréguese.

De esencia de romero. . . . . } II dracmas y II escrúpulos
De tomillo. . . . . II escrúpulos.
De amoniaco líquido. . . . . II dracmas.

En este estado cuelese en frascos largos.

El bálsamo de Opodeldoc se emplea en fricciones en las relajaciones, en las torceduras y dolores reumáticos.

NOTA. Algunos farmaceúticos son de opinion que se debe suprimir en esta preparacion el agua destilada y destilar las esencias con el alcohol, con lo que dicen ellos que obtienen el bálsamo mas blanco.

BÁLSAMO DEL CABALLERO DE LABORDA

Ó DE FOURCROY.

De aceite de olivas. . . . . IV libras.
De polvos de raiz de angélica . . . .
De scorzorena. . . . . } a II onzas.
De hipericon. . . . . }
De ballas de yedra. . . . . .

Puestas á cocer en un fuego lento se dejan macerar durante la noche; vuelvanse á poner al fuego por la mañana, y cuando empiece á hervir el aceite añadase:

De teriaca. . . . . }
De azafrán. . . . . } a. II dracmas.
De extracto de enébro. . . . . }
De aloes. . . . . I idem.

Despues que hayan cocido cuélense por un lienzo, déjense reposar por algunas horas, apliquénse de nuevo al fuego y añadánse:

De trementina. . . . . X onzas.

Caliéntese hasta que no manifieste olor á trementina, entonces apartése del fuego y agréguese:

De incienso macho. . . . . } a. I dracma y I escrúpulo.
Storaque. . . . . }
Benjui . . . . . }

Remuevase hasta que se enfrie el bálsamo, déjese aclarar durante dos ó tres dias, cuélese por una servilleta y guardense en botellas bien tapadas.

Es esencial remover constantemente este bálsamo mientras esté en el fuego, con una espátula de palo. (Se emplea exteriormente para curar los infartos glandulares de los pechos, las grietas de la piel, las quebrajaduras, las torceduras, úlceras, sabañones y dolores reumáticos: se aplica con pinceles ó compresas. P.)

BÁLSAMO ANTI-ARTRÍTICO

DEL Dr. SANCHEZ.

De jabon animal aromático (1). . . . I onza.
De espíritu de alucema rectificado. . . IV idem.
De alcanfor. . . . . II dracmas.
De aceite esencial de yervabuena con sabor de pimienta. . . . . I dracma.
De canela. . . . . }
De alucema. . . . . }
De nuez noscada. . . . . } a. XV gotas.
De clavo de comer. . . . . }
De zazafras. . . . . }
De éter acético. . . . . I onza.

F. S. L.

Se emplea este bálsamo en fricciones sobre las partes adoloridas cuando no hay fuerte irritacion.

---

(1) *El jabon animal aromático se prepara con seis partes de yema de huevo, una parte de esperma de ballena, una parte de aceite concreto de nuez noscada y de la lejia de la sosa cáustica.*

BÁLSAMO OPHTHALMICO

DE SAINT-YVES.

De manteca reciente sin sal.	III onzas.
De cera blanca.	IV dracmas.
De precipitado rojo de mercurio. . .	II dracmas y I escrúpulo.
De oxido de Zinc	I dracma.
De alcanfor disuelto en aceite de huevo.	II escrúpulos y V granos.

Mezclése en un mortero de marmol despues de haber derretido anticipadamente la cera y la manteca.

Se coloca sobre el borde de los párpados en una cantidad igual á la de un grano de trigo y se hace una ligera friccion en las optalmias escrofulosas crónicas &c.

BÁLSAMO TRANQUÍLO DEL Dr. CHOMEL.

De hojas verdes de beleño.	a. I lib.
De lengua de perro.	
De nicociana	

Hagánse hervir en tres pintas de vino, hasta que no queden mas que cerca de dos, pasese y esprimase fuertemente, agréguese á este jugo otro tanto de aceite de olivas. Hervido el todo en un fuego suave hasta que se reduzca á la mitad, moderese el fuego para que el aceite no se queme y se ennegrezca. Viértase en seguida este aceite en un lebrillo. Se dejará enfriar y se decantará el aceite claro que se conservará en botellas.

Se untan con unas plumas finas las glándulas de la garganta cada dos horas en las esquinancias; se emplea tambien en fricciones en los dolores reumáticos y nerviosos.

BÁLSAMO ACETICO ALCANFORADO

DEL Dr. PELLETIER.

De jabon animal.	a. I dracma.
De alcanfor.	
De esencia de tomillo	X gotas.

De éter acético. . . . . I onza.

Mezclése primero el alcanfor y la esencia al jabon animal y disuelto todo en el éter al calor del baño de Maria filtrese.

Este bálsamo se usa en fricciones en las afecciones reumáticas, en la ceáticas y en los dolores artríticos.

BÁLSAMO ANODINO DE BATH.

De opio sin limpiar. . . . . I onza.
De jabon blanco (1). . . . . V idem.
De alcohol rectificado (2) . . . . . II libras.
De alcanfor. . . . . III dracmas.
De aceite esencial de romero. . . . . IV idem.

Se digiere el opio y el alcohol durante tres dias, se filtra y se le agrega el alcanfor y el aceite esencial, se agita fuertemente para conseguir una completa mezcla.

Se emplea exteriormente este bálsamo para calmar los dolores artríticos o reumáticos crónicos.

Se toma interiormente en el cólico nervioso en dósis de 20 á 50 gotas.

BÁLSAMO DE LA VIDA DE LELIEVRE

Ó ELIXIR DE SPINA.

De agárico. . . . . } a. II dracmas.
De raiz de cedoaria. . . . . } a. II dracmas.
De mirra. . . . . } a. II dracmas.
De aloes. . . . . } a. I onza.
De teriaca. . . . . } a. I onza.
De ruibarbo. . . . . VI dracmas.
De raiz de genciana. . . . . IV idem.
De azafrán. . . . . II idem.
De azúcar. . . . . IV idem.
De aguardiente. . . . . II libras.

Este elixir es un vermífugo muy fuerte, un estomáqui-

---

(1) *Algunos farmacéuticos prescriben diez onzas disueltas en*
(2) *Treinta y dos onzas de alcohol.*

co muy caliente, provoca un poco la traspiracion; la dósis es de una á tres cucharadas cada dia á largos interválos.

BÁLSAMO DE LA VIDA, DE HOFFMAN.

De aceite esencial de alucema.	a. I escrúpulo.
De mejorana.	
De clavo de comer.	
De macias.	
De canela.	
De limon.	
De ruda.	
De succino rectificado.	a. ½ idem.
De ambar gris.	
De alcohol.	X onzas.

Se mezcla en un matras, se deja digerir el todo agitándolo de tiempo en tiempo hasta que se disuelva el ambar, se filtra y se conserva en un frasco cerrado.

Se emplea este bálsamo exteriormente para fortificar los músculos; se dá algunas veces al interior en los cólicos disentéricos, la dósis es desde diez gotas hasta media dracma.

En los cólicos disentéricos ligeros producidos especialmente por las supresiones de traspiracion, este remedio debe ser favorecido por el blando calor de la cama. (Veáse Stoll.)

BÁLSAMO ABSTRINGENTE DE RICHARD.

De aceite de trementina.	IV onzas.
De ácido sulfúrico.	IV dracmas.
De alcohol.	III onzas.

Esta formula se encuentra en la farmacopéa de Edimburgo.

Se emplea en la Hemótisis á la dósis de uno á dos escrúpulos en una bebida apropiada.

BÁLSAMO DE LA VIDA, EXTERNO.

(*Veáse linimento estimulante Inglés.*)

CERVEZA ESTOMACAL INGLESA.

De raiz de gentiana.	IV onzas.

De corteza de limon. . . . . III idem.
De canela. . . . . II dracmas.
De aile (1) . . . . . VIII pintas.

Córtense estos ingredientes en pequeños pedazos y pónganse á infundir en frio durante dos ó tres dias.

La dósis es un vaso, de mañana y tarde.

CERVEZA DIURETICA INGLESA.

De granos de mostaza. . . . . } a. VIII onzas.
De ballas de enebro contusas. . . . . }
De granos de dauco chirivia. . . . . VI idem.
De la pequeña aile reciente. . . . . XXXX pintas.

Esta bebida se prescribe en las enfermedades de la vegiga y en las hidropesias insípientes.

CERVEZA PURGANTE INGLESA.

De sen . . . . . IV onzas.
De aile. . . . . XXXX pintas.

Se toma un medio cuartillo dos veces al dia para poner el vientre libre.

CERVEZA ANTI-ESCORBUTICA

Ó DE ESCARAMUJO.

De hojas recientes de coclearia. . . . } I onza y medio escrúpulo.
De raiz de rabano. . . . . II onzas.
De vástagos de abeto. . . . . I idem.

---

(1) *Aile: especie de cerveza cuyo uso es muy comun en Inglaterra. Se distingue el aile de la cerveza propiamente dicha, por el tiempo que se ha dejado fermentar, de modo que aile es una cerveza poco fermentada.*

Quien quiera instruirse á fondo de las justas diferencias del aile y de la cerveza, así como de sus virtudes, lea las observaciones que ha hecho Lemery acerca de estos licores. = El Traductor.

De cerveza. . . . . IV libras.

La dósis es de dos onzas por dia y algo mas en el escorbuto.

CERVEZA PURGANTE DE STDENHAN.

De polipodio de China	I libra.
De rapóntico	a. IV onzas.
De sen limpio.	
De pasas.	
De ruibarbo en trozos.	
De rábano.	a. III idem.
De hojas de coclearia.	
De salbia.	a. VI idem.
Naranjas cortadas	
De aile.	XXXXV pintas.

CERVEZA ANTI-ESCORBUTICA DE BUTLER.

De betónica.	a. I puñado.
De salvia.	
De agrimonía.	
De coclearia.	
De ajenjo romano.	
De raiz de álamo blanco.	a. IV onzas.
De rábano	
De cerveza reciente.	XVI pintas.

Se meten las yervas y las raices en un saco de lienzo que se sumerje en la cerveza mientras que ella fermenta.

Esta cerveza purga blandamente, se dá en la dósis de una pinta en la mañana durante quince dias, en los embarazos de las víceras abdominales, en la cachexia escorbútica biliosa, reumática &c.

CERVEZA CEFALICA INGLESA.

De raiz de valeriana silvestre . . .	X onzas.
De semilla de mostaza entera.	VI idem.
De serpentaria virginiana	II idem.
De romero ó salbia.	III idem.
De cerveza blanca reciente.	LXXX libras.

Se dá esta bebida en la paralísis, epilepsias y vertigos, bebiendo el enfermo 4 ó 5 cuartillos por dia. Pero importa distinguir cual es la verdadera causa de estas paralisis ó enfermedades. Este remedio solo conviene cuando se trata de excitar y hacer revolucion.

CERVEZA DE QUINA DE MUTIS

DICHA PROFILÁCTICA. (1)

De quina roja.	a. IV onzas.
— Gris	
— Amarilla	VIII idem.
De canela.	IV dracmas.
De nuez noscada.	núm. I.
De azucar.	VIII libras.
De cerveza.	C idem.

Esta cerveza es destinada á los convalecientes despues de las enfermedades agudas.

BIZCOCHOS PURGANTES.

De xalapa.	V dracmas y medio espúlo.
De azúcar.	IV onzas.
De harina.	IV dracmas.
De huevos	núm. VI.

Para 15 bizcochos..

Se dá uno de estos bizcochos á un niño de cuatro á cinco años para purgarlo. Se pueden dar dos á un adolecente.

BIZCOCHOS VERMIFUGOS.

De azúcar en polvo.	media libra.
De harina	II onzas.
De raices de ajenjos en polvos. . . .	I dracma.
De huevos	núm. VI.
De esencia de limon.	XV gotas.

Para 24 bizcochos.

---

(1) *De yo preservo yo garanto.*

Se dá uno de estos bizcochos por la mañana y otro por la tarde á los niños que tienen lombrices.

BEBIDA ANTIFLOJISTICA

DE STOLL. (1)

De cebada mondada. . . . . II onzas.

Hiervase en una s. q. de agua hasta que se reviente y añádase á la coladura que debe ser de dos libras.

De nitráte de potasa. . . . . dracma y media.
De jarave de vinagre. . . . . II onzas.

Se toma una taza cada hora.

Conviene esta bebida en las fiebres inflamatorias, la equinancia &c. Es muy análoga á la tipsana de Tizot.

BEBIDA ANTI-NARCÓTICA DEL Dr. VAN-MONS.

De café tostado. . . . . III dracmas.
De vinagre de vino. . . . . XII idem.

Calientese junto hasta que hierva, pásese en seguida y agréguese:

De azúcar. . . . . II dracmas.

Se dán dos cucharadas calientes, cada cuatro horas á los que han abusado del opio.

BOLO DIAFORÉTICO (2) *INGLÉS.*

De resina de guayaco en polvo. . . X granos.
De flores de azufre. . . . . } a. I escrúpulo.
De cremor de tártaro. . . . . }
De jarave comun q. s. . . . . .

Se toma este bolo en dos dósis en el dia. Conviene en los dolores de reumatismo y en las enfermedades de la piel; se prescribe tambien en la equináncia.

---

(1) *Este término es sacado de la antigua química, tiene por raices contra y yo inflamo. Se dá el epiteto de antifloxisticos á los remedios, refrigerantes.*

(2) *Del griego que equivale á favorecer la transpiracion.*

Con especialidad conviene en los reumatismos crónicos y en la equináncia inflamatoria.

BOLO FORTIFICANTE DE DESBOIS.

De polvos de genciana.	a. XII granos.
De zedoaria.	
De azafrán.	
De bálsamo de copaiba.	II dracmas.
De elixir de propiedad.	XX gotas.
De jarave de yervabuena c. s.	para hacer 24 bolos.

Se dán seis cada dia compartiéndolos en tres dósis, conviene en las gonorreas que están al acabar, en las flores blancas crónicas, y en la debilidad de estómago.

BOLOS CARMINANTES DE DESBOIS

DE ROCHEFORT.

De extracto de centaura menor. . . .	a. XXXV granos.
De teriaca	
De raiz de genciana.	a. XII granos pulverizados.
De angélica	
Anis en polvo.	XVI granos.
De castor	VI idem.
De aceite esencial de anis.	X a XII gotas.
De canela.	IV idem.
De jarave de yervabuena q s. . . .	

Divídase en treinta bolos, de los que se tomarán tres cada cuatro horas.

BOLO ESTOMÁQUICO DE PARMENTIER.

De azafrán en polvo.	VI granos.
De canela pulverizada.	III idem.
De magnesia pura.	VIII idem.
De jarave de azúcar q. s.	

Mezclése y hágase un bolo.

BOLO ANTI-ESPASMÓDICO (1)

DE BUCHAN.

De serpentaria virginiana . . . . . media dracma.
De asa fétida. . . . . XII granos.
De alcanfor. . . . . VI idem.
Hágase un bolo c. s. q. de jarave de azafrán.

OTRO DEL MISMO.

De serpentaria virginiana en polvo. . I dracma.
De alcanfor. . . . . } a. X granos.
De asa fétida . . . . . }
De extracto gomoso de opio. . . . . I grano.
De rob de sauco q. s.

Se dán estos bolos en dósis de cinco á seis, en los vapores histéricos, las afecciones nerviosas, y los vértigos.

BOLO DIGESTIVO DE SMITH.

De hipecacuana. . . . . De V á VI granos.
De polvos de diaromatón (2) . . . . . X granos.

---

(1) *De contra y yo retiro. Anti espasmódico quiere decir contra la contraccion involuntaria de los músculos producida por una afeccion nerviosa.*

(2) *Es el nombre de un antídoto del que Nicólas Myrepsi sect. s. c. 454 habla despues de Galeno. De el sin duda se ha tomado la idea de la especie Dianthus que el colegio de Lóndres prescribe del modo siguiente.*

Tómese:

De flores de romero . . . . . I onza.
De rosas encarnadas. . . . . } a. VI dracmas.
De regalis. . . . . }
De clavos de especería. . . . . }
De alucema. . . . . }
De nuez noscada . . . . . }
De galanga. . . . . } a. IV escrúpulos.
De canela. . . . . }
De gengible. . . . . }

De jarave de canela q. s. para hacer un bolo que se toma á la hora de acostarse.

Este bolo conviene á las personas que tienen arruinado el estómago despues de una dispeccia (1) ó indigestion.

De cedoaria. . . . . .
De macias. . . . . .
De aloes. . . . . . } *a. IV escrúpulos.*
De cardomomo. . . . . .
De semillas de eneldo. . . . . .
De anis. . . . . .

Pulvericese todo junto.

Zwelfer alaba en extremo este remedio para la cardialgia, las fluxiones y debilidades que provienen de indigestion. Es sin duda excelente esta composicion para todas las indicaciones nerviosas y no ocasiona las enjermedades que son consecuencias del uso que se hace de aquellos aromaticos en que entran el almizcle y alcanfor. Ella fortifica el cerebro y evita las enfermedades que se siguen á la vigilia como la apoplegia, epilepsia, paralisis, falta de memoria &c. Calienta el estomago, los intestinos y toda la masa de los humores. Los remedios de esta especie son de una utilidad singular en los hábitos cachecticos donde se han empobrecido los humores por los detersivos y catárticos violentos, y debilitadas las fibras á causa de que ellos fortifican los sólidos, los reaniman y procuran una vibracion y circulacion tan vigorosa á los unos y á los otros que la digestion y la separacion de las partes recrementicias se hacen en seguida como es necesario lo que evita toda recaida. Estas preparaciones son de una necesidad indispensable en las hidropesias despues de la purgacion y deben darse en los intervalos. Por ignorar esta circunstancia sucede que en la mayor parte de aquellos en quienes se confia todo á los purgantes violentos no consiguen la curacion ni pueden evitar la recaida. = Diccionario. = (a)

(a) *El traductor que para dar á conocer la palabra diaromatón ha vaciado en este sitio el parrafo anterior traducido del citado diccionario esta muy convencido de que los lectores despreciaran un lenguage que (cual el de la explicacion de sus virtudes) no se acomodó á los conocimientos actuales, pero no obstante conoce que presentándolo, se penetrarán de la otra con que lo administraban nuestros antepasados y los efectos que producia en la economia animal. = El Traductor.*

---

(1) *Yo digiero con dificultad.*

BOLO DE SWEDIAUR CONTRA LA PARALISIS.

De semilla de mostaza molida. . . . . media dracma.
De alcaravea. . . . . } a. IV granos.
De canela. . . . . }

Pulverícese y agréguese:

De jarave de gengible q. s. (1) para hacer un bolo.

Se dan dos cada dia, y á ocasiones se agregan algunas gotas del aceite esencial de trementina.

CANDELILLAS DE DARAN.

De hojas de cicuta. . . . . }
De nicociana. . . . . } a. un puñado.
De corona de rey olorosa. . . . . }
De flores de hipericon. . . . . }
De aceite de nuez. . . . . X libras.
De estiercol de oveja. . . . . II idem.

Se aplasta el estiercol, se le deluye en el aceite y se hacen hervir en él las plantas indicadas arriba, se aparta la decoccion oleosa, y se le vuelve á poner al fuego con

Enjundia. . . . . } a. III libras.
Sebo de carnero. . . . . }

Caliéntase, y cuando la mezcla está caliente y bien líquida se le mezcla:

De litargirio en polvo. . . . . VIII libras.

Cuando está perfectamente incorporado se agrega:

De cera amarilla. . . . . II idem.

Se continúa moviendo hasta que el todo quede homogeneo.

Se empapan en esta composicion los lienzos que quieran hacerse candelillas.

Veáse las modificaciones de esta receta en la tabla de las materias de la medicina doméstica de Buchan.

---

(1) *El jarave de gengible se prepara por infusion como el de cortezas de naranjas.*

CATAPLASMA ANTI-HERMÍTICA. (1)

De hojas de agenjos. . . . . } a. III onzas.
De atanasia. . . . . }
De goma gutta . . . . . }
De aloes sucotrino. . . . . } a. I onza, IV dracmas y 1 escrúpulo.
De incienso macho . . . . . }
De aza fétida. . . . . }

Pulvericense separadamente cada una de estas sustancias, agréguese, si hay necesidad, una corta cantidad de polvos de agenjos, á fin de poder pulverizar mas facilmente el aza fétida, mezclése en seguida el todo, y unáse una cantidad suficiente de aceite de espliego para una cataplasma de consistencia un poco firme.

CATAPLASMA ISQUIATICA (2) *DE WILIS.*

De granos de mostaza. . . . . VIII onzas.
De pimienta blanca . . . . . } a. I dracma.
De gengible. . . . . }
De oximiel *simple* q. *s.* para hacer una cataplasma.

Se emplea esta cataplasma en la ceática; es una especie de rubefaciente que muchas veces hace flictenas en la piel.

CÁUSTICO DE FRAT COSME.

Veáse polvo anti-calcinomatoso de F. Cosme.

CERATO DEL Dr. HUFELAND.

De cerato de esperma de ballena. . . I onza.
De oxide de sinc sublimado y lavado. } a. XXXVI granos.
De licopodio en polvo. . . . . }

Mezclese para formar una pomada que se conservará en un sitio fresco.

Se emplea en la exulceracion de los párpados ó para secar algunas heridas ligeras.

---

(1) *De contra y lombrices.*
(2) *De la nalga.*

CERATO DE TURNER.

De aceite de olivas . . . . . III libras.
De cera blanca . . . . . } a VI onzas.
De piedra calaminar porfirizada. . . . }

Fundida en el aceite la cera y cuando la mezcla ha tomado un poco de consistencia unáse la piedra calaminar, y para que se mezcle bien meneese bastante tiempo.

Este cerato se aplica contra las quemaduras y escoriaciones cualquiera que sea la causa.

Despues de la inflamacion.

CERATO DE POTT.

De litargirio. . . . . I libra.
De vinagre. . . . . VIII idem.
De jabon blanco. . . . . VIII onzas.

Mezclése todo junto y pongase á cocer la mezcla hasta que se disipe toda la humedad, teniendo cuidado de moverlo continuamente; en seguida agréguese:

De aceite de olivas. . . . . } a. I libra.
De cera amarilla. . . . . }

Este cerato se emplea sobre las fracturas y las úlceras.

CERATO DE RECHOUX.

De carbonate de amoniaco concreto. I dracma.
De cerato de Galeno sin agua. . . . I onza.

Triturése en un mortero de marmol para formar una mezcla exacta y uniforme.

Se emplea en fricciones sobre el cuello á la dósis de una dracma cada cuatro horas en los casos de angina en los niños.

CERATO MERCURIAL DE FALCK.

De precipitado rojo . . . . . IV dracmas.
De mercurio dulce . . . . . II onzas.

Porfirícese este polvo, mezclése y juntésele:

De acetate de plomo cristalizado. . I onza.

Mezclése de nuevo é incorporese todo en un cerato hecho con:

De cera fina. . . . . I onza.
De aceite de nuez. . . . . VI idem.
De aceite esencial de alucema. . . . XXX gotas.

Se pone este cerato sobre las úlceras venereas y sobre algunos herpes tenaces.

CERATO DE KIRKLAND.

De greda preparada. . . . . } a. IV onzas.
De vinagre destilado . . . . . } a. IV onzas.
De aceite de olivas. . . . . } a. IV onzas.
De diaquilon simple. . . . . VIII onzas.
De acetate de plomo líquido. . . . . XIV idem.

Pongase el vinagre con la greda en una vasija pequeña, y cuando haya pasado la efervescencia agréguese el acetate y el emplasto que se funde á un dulce fuego moviéndolo continuamente con una espátula de palo. Cuando la liquidacion se ha completado se separa la vasija del fuego; y cuando empieza á resfriarse la mezcla se hecha poco á poco el acetate de plomo líquido, agitando el todo hasta que enteramente se resfrié y la mezcla este exacta.

Este cerato es desecante.

CERATO OPIADO DEL Dr. LAGNEAU.

De cerato simple . . . . . II onzas.
De opio sucio. . . . . { De XXV granos á I dracma.
Yemas de huevo. . . . . Núm. 1.

Diluyase el opio en la yema del huevo y despues mezclése el todo con el cerato. Puede á veces ser ventajoso el agregar á esta mezcla una dracma de alcanfor.

Se usa para los rasgades, úlceras y cancros dolorosos.

CEROMEL DEL Dr. AITKEN.

De cera blanca ó amarilla . . . . . I onza.
De miel. . . . . IV onzas.

Haganse liquidar y mezclése. Esta mezcla es preferible a muchos unguentos para deterjer y limpiar las úlceras.

*

COLLAR DE MORAND.

Para las escrófulas.

Este collar se hace de tafetan negro sobre el que se pone una calda de algodon, y sobre esta calda se extienden los polvos siguientes:

De muriate de amoniaco. . . . . }
De muriate de sosa decrepitado. . . } a. II dracmas.
De esponja calcinada sin estár lavada. }

Se cubre el todo con una muselina que se corta en cuadros ó en rombos.

Se aplica este collar sobre la escrófula por el lado de la muselina.

No debe quitarse de dia ni de noche, y renovar los polvos todos los meses poco mas ó menos.

COLIRIO DEL Dr. SCARPA.

De acetate de plomo líquido. . . . . III granos.
De agua destilada de llanten. . . . . VI onzas.
De mucilago de goma de alquitira. . IV dracmas.
De alcohol alcanforado, algunas gotas.

Este colirio se usa tibio en el principio y despues frio en el segundo periodo de la optalmia (1) aguda.

COLIRIO DE BRUN.

De aloes hepático en polvo . . . . . I dracma.
De vino blanco. . . . . }
De agua de rosas . . . . . } a. I ½ libra.
De tintura de azafrán. . . . . XXX gotas.

Se hace hervir el aloes en el vino blanco y se filtra el licor, al cual se agrega el agua de rosas y la tintura.

Este colirio deterge los pequeñas úlceras de los párpados.

COLIRIO SECO DEL Dr. LAGNEAU.

De azucar cande en polvo. . . . . }
De tucia ó nitrate de potasa. . . . . } a I ½ dracma

---

(1) *Ó inflamacion del ojo.*

Se emplea para quitar las manchas de la cornea, en seguida de las optalmias venereas. Es necesario que el polvo sea muy fino, se le sopla dentro del ojo por medio del cañon de una pluma.

COLIRIO DE JANIN.

De agua de llantén. . . . . IV onzas.
De sulfate de sinc. . . . . V granos.
De mucilago de semillas de membrillo. IV dracmas.

Este colirio conviene en la inflamacion crónica de los párpados.

COLIRIO DE GIMBERNAT.

De agua destilada . . . . . I onza.
De potasa caústica. . . . . II granos.
M.

Se introducen algunas gotas en el ojo de tiempo en tiempo para quitar las manchas. Se laba en seguida el ojo con una decoccion mucilaginosa.

COLIRIO DEL Dr. NEWMANN DE DRESDE.

De flores de arnica . . . . . I onza.
De vinagre destilado . . . . . I libra.

Se hace hervir y digerir durante veinte y cuatro horas, y en seguida se añade q. s. del carbonate de amoniaco hasta la perfecta saturacion.

Se emplea este colirio contra la catarata haciendo uso interiormente de la infusion de arnica.

CONFECCION DEL JAPON.

De cachunde en polvo. . . . . III onzas.
De raiz de tormentila . . . . . } a. II idem.
De nuez noscada . . . . . }
De incienso. . . . . }
De opio disuelto en s. q. de vino de Portugal. . . . . I½ dracma.

De jarave de azucar . . . . . } a. IV onzas.
De conserva de rosas. . . . . }

Mezclese el todo y hágase electuario.

Se ordena este remedio desde veinte y cuatro granos hasta una dracma. Puede suplir al de Diascordio: es fortificante, estomacal, calmante y ligeramente abstringente.

CONFECCION DEL JAPON.

Segun la farmacopéa de Edimburgo.

De cachunde purificado . . . . . IV onzas.
De goma kino . . . . . III idem.
De canela. . . . . } a. I idem.
De nuez noscada. . . . . }
De extracto de opio . . . . . I½ dracma.
De jarave de canela q. s.

Tres dracmas de este electuario deben contener un grano de opio.

Se pulveriza separadamente el cachunde, el kino, la canela, y la nuez noscada para formar un polvo, se hace fundir el opio en s. q. de vino blanco de España: despues se mezcla y se incorpora el todo con suficiente cantidad de jarave de canela que se hace espesar hasta la consistencia de miel.

CONFECCION DE ZUMAQUE

Farmacopéa de Lóndres.

De hojas secas de zumaque . . . . . } a. I½ onza.
De semilla de alcaravea . . . . . }
De ballas de laurel. . . . . }
De sagapeno. . . . . IV dracmas.
De pimienta negra . . . . . II idem.
De miel. . . . . VI onzas.

Se pulverizan las sustancias secas y se incorporan en la miel.

Calefaciente, estomacal, resolutivo, sudorífico, diurético, emenagogo y carminativo. Es util para los de temperamentos frios inertes linfaticos, en la clorosis, afecciones verminosas, &c

CONSERVA ANTI-ESCORBUTICA DEL Dr. SELLE.

De coclearia. . . . .]
De berros de fuente. . . . . |
De trevol de agua . . . . . } a. I½ dracma.
De jugo reciente de rabáno . . . . . |
De jugo de naranja agria . . . . . |
De azúcar blanca q. s. . . . .]

Hágase una conserva.

Se dán dos ó tres dracmas cada dia.

CREMA PECTORAL DE TRONCHIN.

De manteca de cacao . . . . . II onzas.
De azucar blanca. . . . . IV dracmas.
De jarave de bálsamo de tolú. . . . . } a. I onza.
De culantrillo. . . . . }

M.

Se toma esta crema á cucharadas de café en las toses tenaces.

OTRA DE M. JEANET DE LONGROIS.

De manteca de cacao. . . . .]
De jarave de amapolas. . . . . } a. I onza.
De agua de flores de naranja . . . . . |
De aceite de almendras dulces. . . .]

M.

Se toma del mismo modo que el precedente.

DECOCCION ANTI-ARTRITICA DE QUARIN.

De zarza parrilla. . . . . IV onzas.
De antimonio encerrado en una muñequilla . . . . . } VI dracmas.

Háganse hervir en once libras de agua hasta quedar en la mitad y agréguese:

De regalis. . . . . I onza.
De anis. . . . . VI dracmas.

La dósis varía segun la constitucion del enfermo y la duracion del mal.

DECOCCION DE ALOES COMPUESTA

FARMACOPEA DE LÓNDRES.

De extracto de regalis. . . . . IV dracmas.
De carbonate de potasa. . . . . II escrupúlos.
Extracto de aloes . . . . . }
De mirra. . . . . } a. I dracma.
De azafrán. . . . . }
De agua. . . . . I libra.

Hágase hervir hasta la reduccion de doce onzas y despues agréguese: de la tintura de cardomomo compuesta cuatro onzas.

(*Véase en la tabla esta tintura.*)

Esta decoccion es estimulante, estómacal, emenagóga hemorroydal, puede convenir en las obstrucciones inveteradas. Es muy enérgica. Se emplea en dósis moderadas que se van aumentando poco á poco.

DECOCCION ANTI-SEPTICA DE BOHERHAVE.

De hojas de escordio. . . . . }
De aliaria. . . . . } a. II onzas.
De manrubio blanco . . . . . }

Despues de hervirlas en cuatro cuartillos de agua, añádase:

De oximiel escilítico. . . . . VIII onzas.
De nitrate de potasa. . . . . III dracmas.
De vinagre teriacal . . . . . I onza.

Se dá esta decoccion en la pleurecia en dósis de dos onzas cada cuarto de hora. Ella solo conviene cuando han calmado los síntomas inflamatorios en los temperamentos húmedos ó en las pleurecias putridas.

DECOCCION BLANCA DE SIDENHAN.

De carbonate de cal pura (1) . . . . VI dracmas.

---

(1) *Ó cuerno de ciervo calcinado.*

De miga de pan. . . . . III onzas.
De agua hirviendo. . . . . II libras.
De agua de canela . . . . . IV dracmas.
De azucar. . . . . III onzas.

Esta decoccion se dá en las diarreas crónicas hasta la declinacion de las disenterias y despues de los envenenamientos que han irritado los intestinos. Se dá un vaso cada hora.

DIGESTIVO DE PLENCK.

De trementina clara. . . . . II onzas.
De yema de huevo. . . . . núm. I.
De miel comun. . . . . II idem.
De agua de fuente. . . . . } a. IV idem.
De alcohol . . . . . }

Este digestivo acelera la supuracion. Como es líquido se inyecta en los senos de las heridas.

AGUA DE LA VIDA DE ALEMANIA.

De jalapa contusa . . . . . VIII onzas.
De escamonea. . . . . II idem.
De raices de turbit. . . . . I idem.
De aguardiente á 21 g.° . . . . . VI libras.

Hágase hervir el todo á 20 g.° de temperatura por 24 horas y filtrese.

Esta tintura es purgante, se dá desde dos dracmas hasta dos onzas, segun la constitucion del enfermo.

En Alemania se emplea este remedio en las enfermedades reumáticas y artríticas. Algunas farmacopeas agregan á esta preparacion, media dracma de iris de florencia, una dracma del carbonate de potasa, y otra de azafrán, por pinta.

AGUA DE LA VIDA PURGANTE DE M. MEZAIZE.

De jalapa. . . . . III y media libras.
De ruibarbo. . . . .]
De escamonea. . . . .] a. III y media on-
De calamo aromático. . . . . } zas.
De canela. . . . .]

De ballas de enebro . . . . . X½ onzas.
De nitrate de potasa. . . . . VIII idem.
De azucar negra. . . . . VIII libras.
De aguardiente a 20 g.° . . . . . XXVIII pintas.

Infúndanse por ocho dias y filtrese. Este licor purga á la dósis de onza y media.

AGUA DE TREVEZ.

De emético. . . . . Medio grano.
De sal de sedlitz. . . . . I onza.
De agua. . . . . II libras.

Se dá como agua mineral purgante á la dosis de una pinta.

AGUA DE QUERCETAN.

De jugo de puerro. . . . . } a. II libras.
De cebolla. . . . . }
De rábano. . . . . }
De parietária . . . . . } a. VIII onzas.
De limon . . . . . }

Se dá á la dósis de una ó dos onzas en las enfermedades, crónicas de los riñones y vejiga.

AGUA DIURÉTICA ALCANFORADA.

De agua de parietária. . . . . II libras.
De nitrate de potasa . . . . . IV onzas.
De alcanfor . . . . . VI dracmas.
De ácido acético. . . . . IV onzas.
De alcohol . . . . . VIII idem.

Hágase disolver el alcanfor en el alcohol, mezclése al resto, meneese largo tiempo y filtrese.

Esta agua se emplea en las enfermedades agudas é inflamatórias, en las fiebres pútridas y en las enfermedades sifilíticas.

AGUA DICHA OXIGENADA DE ALION.

De ácido nítrico puro. . . . . I dracma.
De agua. . . . . II libras.

Se dá esta agua en las enfermedades de la piel y en la sifilis á la dósis de dos ó tres vasos en la mañana.

AGUA MERCURIAL DE PIDERÍT.

De mercurio destilado. . . . . I onza.
De ácido nítrico. . . . . II idem.

Se hace la disolucion á un dulce calor. En seguida tómese una onza y media y agreguese:

De jugo exprimido de la grancelidonia. }
De decoccion ó raiz de aristoloquía } a. VI idem.
redonda. . . . . }

Mezclese al calor y filtrese.

Se emplea esta agua al exterior para lavar las úlceras venereas.

AGUA VEGETO-MERCURIAL DE PASSAVIN.

De oxide de mercurio roxo. . . . . XIII$\frac{1}{2}$ dracmas.
De mercurio fluido . . . . . XII$\frac{1}{2}$ onzas.
De subtartrite de potasa. . . . . X$\frac{1}{2}$ dracmas.
De agua q. s. para formar una pasta.

Triturese largo tiempo en un mortero de vidrio colocado sobre cenizas calientes. Despues de la extincion del mercurio, y habiendo tomado la mezcla un color blanco, agréguesele agua hirviendo para operar la disolucion, filtrese y evaporese hasta la película.

Se emplea en la sifilis, á la dósis de media onza, seis dracmas, y aun una onza en el jarave simple, se reitera la dosis dos ó tres veces al dia.

AGUA ETHEREA ALCANFORADA DE PLANCHE.

De alcanfor purificado . . . . . IV dracmas.
De eter sulfúrico muy rectificado. . . I$\frac{1}{2}$ onza.

Métanse en un frasco el eter y el alcanfor y agítese para ayudar á la solucion. Viertase en seguida este eter en

un frasco tubulado en su base y que contenga de antemano 28 onzas de agua destilada. Al tubo inferior se adopta un tornillo. Al cuello del frasco se aplica un pequeño tubo que se le abarca con un cilindro de alcornoque enlodado. Cuando se quiere usar esta composicion se abre el tubo superior y se hace salir el líquido por el tornillo. (1)

Se dá esta agua eterea pura en cucharadas, ó con un poco de azucar, ó jarave cualesquiera; conviene en las afecciones espasmódicas.

AGUA CORDIAL DE COLADON.

Se quitan las cortezas de muchas naranjas é infundiéndolas en aguardiente se les destila en el baño de Maria. Se le agrega al espíritu de limon, algunas gotas de la tintura de ambar, y de almizcle y se endulzará con el jarave de azucar muy blanca.

M. Coladon tiene tan justas proporciones, que en su licor no se pueden distinguir ni el ambar ni el almizcle, y el limon que domina, está muy extendido.

Esto es lo que la hace distinguir de la contrahecha y que nunca vende el agua, sino á los tres ó cuatro años de estar preparada.

Esta agua es mas un licor de mesa que un remedio.

AGUA DE ARCABUZAZO DE THEDEN.

De vinagre sin olor. . . . . } a. III libras.
De alcohol rectificado. . . . . }
De ácido sulfúrico débil. . . . . X onzas.
De azucar blanca comun. . . . . I libra.

Se mezcla, se filtra y se conserva en un frasco.

Esta agua sirve para deterger las úlceras saniosas moderar la supuracion de las heridas y contener las hemorragias. Se aplican tambien compresas sobre las contusiones fracturas, y luxaciones.

---

(1) *Se encuentra la descripcion de este pequeño aparato en la farmacopea de Brugnatelli. Traducida por M. Planche tom. 2 pág. 210 p. l. 1. fig. 32.*

En las enfermedades pútridas se usa interiormente á la dósis de veinte á treinta gotas, en un vehículo apropocionado.

AGUA ESPIRITUOSA DE ANHALT.

De trementina de terebinto.	VIII onzas.
De incienso.	I½ idem.
De clavo de comer	a. VI idem.
De nuez noscada	
De cubeba.	
De canela	
De ballas de laurel	a. media id.
Semillas de hinojo.	
Palo de aloes	III dracmas.
De azafrán	II½ idem.
De alcohol	V libras.
De almizcle	XXV granos.

Se dá á la dósis de dos á tres dracmas, como estomacal diurético y anti apoplético.

Cuando la apoplejia es puramente serosa, como sucede algunas veces, en una edad avanzada y en los temperamentos humedos.

AGUA DE MAGNANIMIDAD.

De hormigas.	II libras.
De alcohol rectificado	III idem.

Háganse macerar durante cinco ó seis dias, destílese al baño de Maria hasta la sequedad y entonces agrega:

De canela.	I onza.
De clavo de comer.	a. VI dracmas.
De cardomomo menor.	
De cubebas.	IV idem.
De cedoaria.	X idem.

Hágase macerar por tres dias en el alcohol arriba destilado, destílese de nuevo en el baño de Maria hasta la sequedad.

Esta agua espirituosa se recomienda en la debilidad de nervios, se emplea en fricciones, y se dá tambien interiormente á la dósis de dos dracmas.

AGUA DE M.ma DE LA VRILLIERE.

Para los dientes.

De canela.	II onzas.
De clavo de comer.	VI dracmas.
De cortezas recientes de limon.	XII idem.
De rosas encarnadas secas.	I onza.
De cochearia	VIII idem.
De alcohol	III libras.

Se mezcla la canela y los clavos de comer, se parten las rosas y las cáscaras de limon, se despedaza la cochearia y macera el todo en el alcohol por espacio de veinte y cuatro horas y se destila al baño de Maria.

AGUA DE M. LE PREMIER.

De bálsamo de Fioravente.	Media libra.
De esencia de vulneraria.	II dracmas.

Esta agua se emplea en las contusiones del cuerpo y de la cabeza; alivia los dolores de reumatismo crónico, se frotan las partes dañadas ó se aplican compresas empapadas en ellas.

AGUA DE BONFERME.

De nueces noscadas. . . . . }	a. IV dracmas.
De clavos de comer. . . . . }	
De flores de granada. . . . . }	a. III idem.
De canela. . . . . }	
De alcohol	VIII onzas.

Se contunden todas estas sustancias, se les hace macerar por ocho dias en el alcohol, en seguida se cuela con expresion, se filtra y se conserva para el uso.

Se emplea esta agua para los golpes en la cabeza.

Se le hace respirar al enfermo, y se le frotan las partes dañadas, sobre las que se le aplican compresas embebidas en ella las que se renuevan con mucha frecuencia.

AGUA ANTI HERPETICA

DEL CARDENAL DE LUYNES.

De sublimado corrosivo.	I½ dracmas.
De ceruza.	IV idem.

De sulfate de alumbre. . . . . III idem.
De clara de huevo. . . . . núm. I.
De agua de rosas. . . . . VIII onzas.

Mezclése y agítese antes de usarla. Se usa en lociones; se empapan compresas en ella y se aplican sobre las partes.

Pero no se deben despreciar los remedios generales tomados interiormente.

AGUA PARA LOS OJOS

POR EL Dr. TVÉL.

De azafrán. . . . . XX granos.
De sulfate de sinc. . . . . III dracmas.
De sulfate de cobre. . . . . I idem.
De alcanfor. . . . . II escrupúlos.

Pulverícese el todo, y puesto en una vasija en una pinta de agua, infúndase por 24 horas á un fuego suave y muevase de tiempo en tiempo. Déjese reposar y decantese. Se bañan los ojos con esta agua cuando están engurgitados los párpados, y que segregan un humor mucoso.

AGUA OPTALMICA FORTIFICANTE

DEL Dr. SELLE.

De agua destilada de manzanilla. . . . VIII onzas.
De acetate de plomo líquido. . . . .
De alcohol alcanforado. . . . . } a. II dracmas.
De sulfate de sinc. . . . . I idem.

Se emplea esta agua como colirio en la epífora (1) y en la lippitudo (2) causadas por relajacion.

AGUA DE GONDRÁN.

De ácido muriático. . . . . IV onzas.

---

(1) *Lagriméo.*

(2) *Trasudacion de humor que segregan las glándulas de Meibomio, de lippitudo lagaña.*

De aceite de petróleo blanco. . . . . I dracma.

Mezclése agitando la botella; esta dósis es para un baño parcial en los reumatismos.

AGUA DE ALIBOUR.

De sulfate de cobre. . . . . V dracmas.
De sinc . . . . . } II onzas VI dracmas y media.
De azafrán. . . . . I dracma.
De alcanfor . . . . . II y media idem.
De agua comun. . . . . IV libras.

Metanse estas sustancias en un matras de capacidad suficiente, agitese la mezcla, dejese digerir durante 20 dias, filtrese.

Se emplea esta agua en las escoriaciones y contusiones, se lavan con ellas las heridas purulentas y fétidas, se usa en las quemaduras para acelerar la cicatriz cuando ha pasado la inflamacion y contra las optalmias crónicas.

ELECTUARIO DE QUARIN, CONTRA LA HIDROPESIA.

De rob de yeso . . . . . } a II onzas.
De enebro . . . . . }
De oximiel escilitico. . . . . I idem.
De raiz de jalapa. . . . . IV dracmas.
De sulfate de potasa. . . . . II idem.
De jarave de espino cerbal q. s.

Se toma una dracma en cortos intervalos hasta que se consigan suficientes cámaras.

OTRO DEL MISMO.

Despues de la evacuacion de las aguas.

De quina . . . . . VI dracmas.

De limaduras de fierro no relucientes. } a. II dracmas.
De teriaca diatesarón (1). . . . . }
De jarave de canela q. s.
Se toma igualmente una dracma de mañana y tarde.

OTRO DEL MISMO.

Para cuando la hidropesia se junta á la fiebre cuartana.

De quina roja en polvo. . . . . I onza.
De raiz de genciana. . . . . }
De muriate amoniacal de fierro su } a. I dracma.
blimado . . . . . }
De oximiel escilítico. . . . . }
De jarave de cinco raices aperitivas. } a. q. s.
Se dán dos dracmas cada tres horas.

ELECTUARIO HIDRAGOGO DEL Dr. FOUQUIER.

De escamonea de alepo. . . . . } a II dracmas.
De raiz de jalapa. . . . . }
De escamas de scila. . . . . I½ dracma.
De resina de jalapa. . . . . ½ idem.
De jarave de espino cerbal q. s.
Se da en las hidropesias asténicas á la dósis de 12 á 24 granos confingidos en bolos. Purga fuertemente.

ELECTUARIO BALSÁMICO ABSTRINGENTE DE BARTHEZ.

De conserva de rosas. . . . . IV onzas.

---

(1) *Nombre de una composicion que se llama asi de los cuatro ingredientes que entran en ella y es como sigue:*

Tómense. — De raiz de genciana. . . . . }
De ballas de laurel . . . . . } a. II onzas.
De aristoloquia redonda . . . . }
De miel. . . . . . II libras.
Hágase un electuario.
Cuando se agregan dos onzas de raspaduras de marfil se llama Diapente *ó composicion de cinco ingredientes.*

De jarave de tolú. . . . . I dracma.
De adormideras. . . . . II idem.

Mezclése y hágase un electuario.

Conviene en los esputos de sangre, se dá en la dósis de cinco á seis cucharadas por dia de hora en hora.

Pero no deben despreciarse los remedios generales que están indicados.

ELECTUARIO ANTI-CACHECTICO

DEL Dr. WARD.

De raiz de álamo blanco en polvo. II onzas.
De semilla de hinojo. . . . . III idem.
De pimienta negra. . . . . I idem.

Mezclése en un mortero y agréguese

De azucar blanca . . . . . } a. II idem.
De miel . . . . . }

Se hacen tomar dos ó tres veces al dia una ó dos dracmas de este electuario en la cachexia, hemorroydal, en la dispeccia ó en el catarro de las entrañas.

ELECTUARIO SEDATIVO ABSTRINGENTE

DE EDIMBURGO.

Véase confeccion Japónica

ELECTUARIO ANTHELMÍNTICO

DE VOGLER.

De semen-contra (1) . . . . . II dracmas.
De raiz de jalapa. . . . . I idem.
De mercurio dulce bien lavado. . . VI á XI granos.
De agua de canela. . . . . ½ dracma.
De jarave de flores de durazno q. s.

Se dá este electuario á las personas que tienen ascárides, lombrices ó la tenia.

---

(1) *Nombre que dán los franceses á la raiz de ajenjos de Judea.*

La dósis para los niños de dos á cuatro años, es la duodécima parte de la masa indicada para los de 5 á 8 años, la octava, para los adultos, la cuarta. Se dá por las mañanas envuelta en un pedazo de hostia, y encima se bebe una taza de infusion amarga.

ELECTUARIO VERMIFUGO DE SPIELMAN.

De estaño puro. . . . . } a. I onza.
De mercurio líquido destilado. . . . }

Hágase una amalgama s. l. y añádase.

De carbonate de cal purificado . . . . } a. I idem.
De magnesia inglesa . . . . . }

Mezclese exactamente é incorporese el todo en =
Conserva de ajenjos . . . . . III idem.

Jarave de yerbabuena q. s. para dar á la mezcla consistencia de electuario.

Se dá una dracma por la mañana y otra á la tarde todos los dias.

ELECTUARIO ANTHELMÍNTICO DE HEÍSTER.

De mercurio vivo . . . . . IV dracmas.

Se apaga cuidadosamente con una onza de mucilago de la goma arábiga y se le agrega =
De quina en polvo. . . . . I onza.

Jarave de yerbabuena q. s. para darle al todo la consistencia de electuario. La dosis varía segun la edad del enfermo, regularmente se dá un bolo del grueso de una avellana mañana y tarde.

ELECTUARIO ANTI-FEBRIL

Farmacopea de Viena.

De conserva de ajenjos. . . . . }
—De cochearia . . . . . } a. VII dracmas.
De quina en polvo . . . . . }

*

De jarave de fumaría q. s.

Se dá á la dósis de tres á cuatro dracmas al dia.

ELECTUARIO DE MAGNESIA.

Formacopea de Copenhague.

De carbonate de magnesia. . . . . VI dracmas.
De polvos de semillas de anis verdes. IV idem.
De azafrán en polvo . . . . . I idem.

De jarave de chicorias q. s. para hacer s. a. un electuario.

Se usa en los niños cuando tienen agrios. La dósis es segun la edad, desde media hasta dos dracmas.

ELECTUARIO ANTI-FEBRIL DE BOHERHAVE.

De confeccion alkermes . . . . . I dracma.
De gengible curtido. . . . . VI onzas.
De raiz de contrayerba . . . . . } a I idem.
De serpentaria virginiana. . . . . }
De jarave de cinco raices aperitivas s q.

Se toma media dracma cada cuarto de hora en las fiebres adinámicas é intermitentes.

ELECTUARIO ANTI-ARTRÍTICO DE BUCHAN.

De conserva de rosas . . . . . II onza.
De cinabrio de antimonio. . . . . 1½ idem.
De resina de guayaco en polvo. . . . I idem.
De jarave de gengible q. s.

Se dá este electuario á la dósis de una cucharada de café, dos veces al dia en los dolores agudos de reumatismo cuando no se acompañan de calentura.

ELECTUARIO ANTI-HEMORROIDAL

DE REUSS.

De maná en lágrima . . . . . II onzas.

De sulfate de potasa . . . . . }
De nitrate de potasa. . . . . } a. I dracma.
De magisterio de azufre . . . . . }

De miel blanca q. s. para dar á la mezcla la consistencia conveniente. Se le prescribe á dos ó tres dracmas por dia.

ELECTUARIO ANTI-DISENTÉRICO DE BUCHAN.

De confeccion saponacea . . . . . II onzas.
De bálsamo de lucatel. . . . . }
De ruibarbo en polvo. . . . . } a. I idem.

De jarave de malvavisco q. s. m. y f. electuario.

Se toma un bolo del tamaño de una nuez noscada dos ó tres veces al dia segun la urgencia del caso.

Este electuario solo conviene hácia el fin de la disenteria.

ELECTUARIO ANTI-DISENTÉRICO DE WIRKINSON.

De angustura en polvo. . . . . IV dracmas.
De canela en polvo. . . . . XXXVI granos.
De miel blanca q. s.

Se dá este electuario á la dósis de una dracma mañana y tarde.

Conviene en la diarrea, en la fiebre adinámica en la hictericia, y en la disenteria ligera.

ELECTUARIO ANTI-EPILECTICO DE MEAD.

De quina en polvo . . . . . I onza.
De estaño en polvo. . . . . }
De raiz de valeriana. . . . . } a. IV dracmas.

De jarave de azucar, ó de miel q. s.

Se dá este electuario á la dosis de una dracma tarde y mañana durante tres meses interrumpiendo por 24 horas el uso de este remedio, cada nueve dias.

ELIXIR DE LA VIDA DE MATIOLE.

De raiz de galanga menor.	a. IV dracmas.
De gengiole	
De cedoaria	
De calamo aromático.	a. II dracmas.
De hojas de mejorana	
De yerbabuena.	
De tomillo.	
De serpol.	
De salvia.	
De romero	
De flores de rosas.	
De semillas de anis	
De hinojo.	
De canela	I onza.
De clavos de comer.	a. media onza.
De nuez noscada.	
De macias.	
De cubeba.	a. I idem.
De palo de aloes.	
De sandalo citrino	
De pequeño cardomomo.	
De cortezas recientes de limon.	I½ idem.
De alcohol á 30 gs.	VI libras.

Este elixir se usa en la epilepsia, es cordial y vulnerario, la dósis es desde una á cuatro dracmas.

ELIXIR ALKERMES DE LOS ITALLANOS.

De nuez noscada	a. I dracma.
De clavos de comer.	
De canela.	
De macias.	
De alcohol	IV pintas.

Se contunden todas estas sustancias y se maceran en el alcohol durante siete á ocho dias; en seguida se hace infundir en cuatro pintas de agua.

De azucar. . . . . IV libras.

Se mezclan estos dos licores y se les colora con el jarave de alkermes ó con

Alumbre. . . . . I½ dracma.

De cochinilla. . . . . I idem.

Se filtra y se conserva para el uso.

Este elixir se da á la dosis de un pequeño vaso de ratafia. Se aconseja en las indigestiones, en las debilidades del estómago, en los cólicos ventosos. Cuando se quiere hacer mas delicado al gusto es necesario destilar la infusion alcoholica y aumentar una cuarta parte de azucar.

ELIXIR DE DROGAS AMARGAS DE LOS INDIANOS.

De aloes . . . . . III libras.
De mirra . . . . . II idem.
De almáciga en lagrima . . . . . II onza.
De incienso. . . . . I libra.
De azafrán . . . . . IV dracmas.
De aguardiente . . . . . L pintas

Se contunden todas estas sustancias separadamente á excepcion del azafrán que se parte lo mas menudo posible. Se macera el todo en el aguardiente agitando frecuentemente la mezcla durante seis meses. Despues de este tiempo se destila para obtener las dos terceras partes del aguardiente empleado. Se le agrega s. q. de azucar para formar un licor agradable que se usará despues de la comida.

El residuo de la destilacion filtrado, se emplea á la dósis de un pequeño vaso de licor por la mañana en ayunas como tónico, ó en una dósis mas fuerte como purgante.

ELIXIR DE MITHIE.

De canela. . . . . }
De pimienta larga . . . . . } a. II dracmas.
De pequeña galanga. . . . . }
De gengible. . . . . I½ idem.
De nuez noscada . . . . . I idem.
De pequeño cardomomo . . . . . I escrúpulo.
De clavos de comer . . . . . I dracma.
De alcohol . . . . . VI onzas.

F. S. A.

Este elixir es estomacal, se da á la dósis de dos á cuatro dracmas.

ELIXIR ÁCIDO AROMATICO DE BRUGNATELLI.

De alcohol	II libras.
De ácido sulfurico	III onzas.
De canela	III dracmas.
De clavos de comer De gengible	a. III dracmas.
De hojas de yerbabuena piperina De yerbabuena crespa	a. IV idem.

Se pone primeramente el ácido y el alcohol en un balon que se coloca sobre el baño de arena en una temperatura de treinta y cinco grados, y que se le sostiene de este modo dos dias: se le agregan en seguida las otras sustancias, y se infunden á la temperatura atmosferica por cinco y seis dias, se cuela en seguida, con expresion, se filtra y se conserva el licor en un frasco de cristal herméticamente cerrado.

Se da este elixir en las hemorragias pasivas, y en las fiebres asténicas, á la dosis de doce á cuarenta gotas en un vehiculo apropiado.

ELIXIR PECTORAL INGLÉS.

De raiz de álamo blanco De iris de Florencia De escamas secas de Scila	a. III onzas y I dracma.
De raiz de regalis De semillas de anis	a. I id. XVIII grs.
De azafran	XVIII granos.
De benjui	II dracmas.
De mirra	I id. y XVIII grs.
De goma amoniaco	II escrúpulos.
De aguardiente á XXII grados	I libra y X onzas.

Pongáse á macerar el todo por quince dias en un matrás, agítese de tiempo en tiempo y filtrese.

Este elixir es estomacal y pectoral. La dósis es desde media dracma hasta dos, en una taza de infusion apropiada. Conviene con especialidad en los catarros cronicos.

ELIXIR BALSÁMICO ESTOMACAL,

Y TEMPERADO DE HOFFMAN.

De extracto de agenjos.	a. I onza.
De cardo bendito	
De centaura menor.	
De genciana.	
De cortezas de naranjas agrias . . .	IV idem.
De vino de España	II libras.
De tintura de cortezas de naranjas agrias.	II onzas.
De carbonate de potasa	I idem.

Pongáse á digerir esta mezcla por ocho dias, agítese frecuentemente el matras y filtrése.

Este elixir conocido tambien con el nombre de vino amargo alcahalizado es un poderoso estomacal antermintico y febrífugo. Excita el apetito, la dósis es desde una á dos dracmas.

ELIXIR BALSÁMICO DE WERLHOFF.

De quina.	I½ onza.
De extracto de cardo bendito	a. II dracmas.
De genciana	
De mirra electa.	
De cortezas de naranjas agrias . . .	I½ onza.
De azafrán	1 dracma.
De carbonate de potasa.	IV idem.
De vino de España	I libra.

Este elixir tiene los mismos usos que el temperado de Hoffman.

ELIXIR FORTIFICANTE DEL Dr. SELLE.

De extracto de cascarilla	a. I dracma.
De genciana	
De agua de yerbabuena piperita . . .	IV libras.
De tintura de Marte abstringente. .	IV onzas.

Se dan en el dia algunas cucharadas de este elixir en la debilidad de estomago y de los intestinos en seguida de las enfermedades adinamicas.

ELIXIR ESTOMACAL DE SOUGTHON.

De los cogollos de agenjos secos.	
De camedrios	a. I onza.
De raiz de genciana.	
De cortezas de naranjas agrias . .	
De cascarilla.	I dracma.
De ruibarbo.	IV idem.
De aloes	I idem.
De alcohol.	II libras.

Este elixir es estomacal y vermífugo. La dosis es desde diez gotas hasta una dracma, en una taza de tipsana apropiada.

ELIXIR SAGRADO.

De ruibarbo contuso	X dracmas.
De aloes sucotrino en polvo	VI idem.
De semillas de cardomomo	IV idem.
De aguardiente francés.	I pinta.

Déjese dos ó tres dias en infusion y cuélese. Se da este elixir estomacal y purgante en la dosis de una á una y media onza. Conviene á los temperamentos humedos.

ELIXIR UTERINO DE CROLLIUS.

De extracto de artemisa.	I onza.
De azafrán	IV dracmas.
De castor.	I onza.
De carbonate de potasa.	I dracma.
De aceite de anis	
— De comino	a. media idem.
— De angélica	
De alcohol.	XX onzas.

Este elixir es carminante, nervino, emenagogo. Su dósis es de una á dos dracmas.

ELIXIR DE RAULIN.

De raiz de genciana.	a. II onzas.
De cortezas de naranjas agrias. . . .	

De cogollos de agenjos secos . . .
— De camedrios . . . . . } a. II onzas.
De ruibarbo . . . . . .
De hojas de sen . . . . . .
De cascarilla . . . . . } a. I dracma.
De aloes sucotrino . . . . . .
De aguardiente á XXV grados. . . . IV libras.

Se hace una infusion en frio durante ocho ó doce dias y se filtra.

Su dósis es una cucharada regular, que ordinariamente se toma antes de comer ó cenar.

Si esta dósis tomada una sola vez no produjese cámara alguna, se reitera la mañana siguiente.

Conviene este elixir en las enfermedades linfáticas y escrofulosas.

ELIXIR ANTI-ESCORBÚTICO DEL Dr. SELLE.

De extracto acuoso de trebol . . . .
De centaura menor . . . . . } a. IV dracmas.
De fumaria . . . . . .
De grama . . . . . .
De agua destilada de manzanilla . . IV libras.
De espíritu de coclearia . . . . . II onzas.
De ácido sulfúrico concentrado. . . . II dracmas.

Se da á la dósis de dos cucharadas cada dia

ELIXIR ANTI-ESCORBUTICO DE BOHERHAVE.

De semillas de mostaza . . . . . .
De rábanos . . . . . .
De jaramago . . . . . } a. I onza.
De erysimo . . . . . .
De berros . . . . . .
De hojas de coclearia . . . . . .
De mastuerzo . . . . . } a. II puñados.
De rábanos . . . . . .

Contundanse en un mortero de palo y agréguese:
De flores de hombrecillo . . . . . I onza.
De alcohol q. s. Destílese.

Se da este elixir en el escorbuto á la dósis de una á dos dracmas en una bebida apropiada.

*

ELIXIR ANTI-ESCROFULOSO DE PETRITHE.

De aguardiente . . . . . II libras.
De carbonate de amoníaco. . . . . II dracmas.
De raiz de genciana. . . . . I onza.

Pongase á digerir por veinte y cuatro horas y déjese en él la raiz de genciana durante muchos dias. Filtrese.

Se da una cucharada dos ó tres veces al dia.

ELIXIR ANTI-VENEREO DE LEMORT.

De bálsamo de copaiba . . . . . I dracma.
De raiz de guayaco . . . . . II idem.
De aceite volatil de zazafras. . . . Media idem.
De alcohol rectificado. . . . . IV½ onzas.

Se hace infundir el todo á una suave temperatura, se filtra y se conserva en un frasco bien tapado.

Este elixir se da á la dósis de una dracma en una infusion apropiada ó con azucar en polvo.

ELIXIR SUDORÍFICO DEL Dr. WILLIS.

De hipecacuana. . . . . } a. I onza.
De bálsamo de tolu. . . . . }
De flores de benjui. . . . . }
De opio purificado. . . . . } a. II dracmas.
De azafrán . . . . . }
De alcanfor. . . . . II escrúpulos.
De aceite esencial de anis . . . . . I dracma.
De alcohol rectificado. . . . . II libras.

Se da este elixir á la dósis de una ó dos dracmas para excitar la transpiracion. Media onza contiene dos granos de opio.

ELIXIR ANTI SÉPTICO Ó FEBRIFUGO DE HUXHAM.

De quina. . . . . II onzas.
De cortezas de naranjas. . . . . I½ onza.

De serpentaria virginiana. . . . . III dracmas.
De azafrán . . . . . I idem.
De cochinilla . . . . . II escrúpulos.
De alcohol á 20 grados. . . . . XX onzas.

Hágase infundir por seis dias. Algunas veces Huxham agrega doce granos de alcanfor por onza y llama entonces á esta preparacion elixir alcanforado.

Se da este elixir á la dósis de dos á cuatro dracmas en las fiebres intermitentes despues del uso de los remedios generales que estén indicados.

ELIXIR RESOLUTIVO DEL Dr. SELLE.

De tártaro purificado. . . . . II onzas.
Saturese con el vinagre escilítico y agréguese.
De extracto acuoso de fumaria . . .
De la yerba de S. Juan . . . . . } a. IV dracmas.
De trebol acuatico. . . . . .
De cardo bendito . . . . . .
De agua destilada de manzanilla . . IV libras.
De tintura de antimonio de Jacobo. } a. I onza.
De marte aperitivo . . . . . .
Mezclése y filtrese.

Se emplea esta mixtion en las enfermedades cachecticas, en la hidropesia. La dósis es una pequeña cucharada cada dos horas.

ELIXIR ANTI-ASMATICO DE BOHERHAVE.

De raiz de ázaro . . . . . XVIII granos.
De cálamo aromático. . . . . } a. II escrúpulos.
De énula campanula. . . . . .
De iris de florencia. . . . . Media dracma.
De regalis. . . . . 1½ idem.
De semillas de anis . . . . . Media idem.
De alcanfor . . . . . VI granos.
De alcohol rectificado . . . . . VIII onzas.

La dósis es desde dos hasta treinta granos en una taza de té ó de tipsana apropiada.

Este elixir conviene especialmente en el asma humeda.

ELIXIR PAREGÓRICO DE LÓNDRES. (1)

De ácido benzóico sublimado. . . . .
De azafrán. . . . . } a. III dracmas.
De aceite esencial de anis. . . . . ½ idem.
De extracto seco de opio. . . . . II idem.
De amoniaco . . . . . I libra.

Dijierase por cuatro dias y filtrese.

Este elixir calma los dolores que provienen de las congestiones catarrales humedas, calma la tos y disminuye la dificultad de respirar, se dán de 50 á 60 gotas. Se debe considerar este elixir como diaforético incisivo y calmante.

ELIXIR PAREGÓRICO DE EDIMBURGO.

De ácido benzoico. . . . . IV dracmas.
De extracto seco de opio. . . . . II idem.
De espíritu volatil aromático. . . . . I libra.

Dijierase por cinco dias y filtrese á una temperatura baja.

Tiene el mismo uso que el anterior.

ELIXIR ANTI-APOPLÉTICO DE JACOBINO DE ROUEN.

De sándalo rojo pulverizado. . . . . VI dracmas.
Del blanco . . . . . }
Del cetrino. . . . . } a. V idem.

---

(1) *Se encuentra en la farmacopea inglesa una tintura alcoholica de opio anisado que lleva tambien el nombre de elixir paregórico.*

Se compone del modo siguiente.

De extracto seco de opio. . . . . }
De ácido benzoico sublimado . . . . . } a. I dracma.
De alcanfor purificado. . . . . XXVI granos.
De aceite volatil de anis. . . . . II escrúpulos.
De alcohol á 24 grados . . . . . XXIII onzas.

De semillas de anis. . . . . } a. I onza.
De ballas de enebro . . . . . }
De canela . . . . . I onza y V dracmas.
De macias . . . . . }
De regalis. . . . . }
De galanga. . . . . } a VIII idem.
De imperatoria . . . . . }
De clavos de comer. . . . . }
De s milias de angélica. . . . . }
De contrayerba. . . . . } a. V idem.
De polvos de víboras. . . . . }
De alcohol rectificado (1). . . . . VII libras.

Hágase digerir por espacio de un mes y filtrese.

Este elixir sería peligroso en las constituciones pletóricas y conviene solo en las humedas.

ELIXIR FEBRIFUGO DE WHIT.

De quina gris. . . . . III onzas.
De raiz de genciana. . . . . } a. II idem.
De corteza de naranjas. . . . . }
De alcohol rectificado. . . . . I libra.
De agua de canela ordeada. . . . . VIII onzas.

Infúndanse por veinte y cuatro horas y filtrese.

Este elixir se dá á la dosis de media onza en las fiebres adinámicas, la leucorrea, y hectiricia.

ELIXIR FETIDO DE FULDE.

De castor. . . . . IV dracmas.
De asa fetida. . . . . II idem.
De opio. . . . . XXXVI granos.
De espíritu de cuerno de ciervo. . I dracma.

---

(1) *Despues de M. D. . . . farmaceútico de Rouen, el agua ó elixir de los jacobinos contiene á mas:*

De casia lignea. . . . . III dracmas.
De anis molido. . . . . IV idem.
De palo de aloes. . . . . } a. I idem.
De raiz de imperatoria. . . . . }

De alcohol rectificado. . . . . IV onzas.

Se digiere el todo por cuatro dias y se filtra. Conviene este elixir en los espasmos y afecciones histéricas: la dósis es de una á una y media dracma en una bebida apropiada, ó solo.

ELIXIR AMERICANO DE COURCELLES.

De flores de hipericon.	VIII libras.
De sauco.	V idem.
De hojas de naranjo.	VI idem.
De raices de enula campanula.	XVI idem.
De caña de provenza. . . . . } De granos de enebro. . . . . }	a. II idem.
De flores de tilia.	II½ idem.
De romero	II idem.
De hojas de bálsamo.	IV idem.
De raices de azaro.	I idem.
De opio.	II idem.
De alcohol.	CXX pintas.

De agua q. s. para que el licor quede á 24 grados. Esto debe dar doscientas pintas de elixir que se le colora con la amapola. (1)

---

(1) *Como es imposible en Francia preparar el elixir americano, tal como Courcelles lo ha compuesto, no habiamos dado en la primera edicion mas que la fórmula reformada, pero añadiremos aqui el verdadero para los que estén en América.*

De raices de azaro. . . . . De palmitos (cocos aculcatus) . . . . . De calabazas . . . . . }	*a. I onza.*
De opio puro.	*II½ idem.*
De corteza de madera de hierro (erythroxilum. . . . . }	*VI idem.*
De justitia asurgens	*II idem.*
De hojas de avocaties	*II libras.*
De flores de hipericon.	*I idem.*
De sauco.	*VIII onzas.*
De hojas de naranjo.	*IV idem.*
De flores de idem.	*II idem.*
De raiz de énula campanula.	*IV libras.*

El elixir americano se dá á la dósis de una fuerte cucharada de café, que segun los casos puede reiterarse dos ó tres veces al dia, se toma solo ó en un vaso de tipsana apropiada.

El elixir de Courcelles ha gozado la mayor reputacion, puede que se hayan exagerado sus propiedades, se daba en los dolores de parto, en las enfermedades lacteas, en las diarreas, en las leucorreas, supresiones, en los vomitos, las debilidades de estómago &c.

ELIXIR ANTI-ARTRÍTICO DE LA ISLA DE FRANCIA.

De aloes sucotrino . . . . . X dracmas.
De mirra. . . . . XII idem.
De resina de guayaco. . . . . X idem.

Se reducen estas sustancias en polvos finos, y se disuelven separadamente cada una, en una pinta de alcohol á 21 gs. se mezclan en seguida estas tinturas a partes iguales.

Este elixir es estomacal, emenagogo, y vermifugo, excita la transpiracion, provoca las orinas y disipa los dolores de reumatismo, y gota.

Su dósis es de una á dos cucharadas en ayunas; una hora despues se toma una infusion de té, de azucar, de tilia ó de flor de naranja.

De caña de azucar. . . . . }
De aristoloquia rotunda. . . . . } a. III libras.
De arundo donax . . . . . II idem.
De ballas de enebro. . . . . III onzas.
De flores de tilia. . . . . }
De sumidades de romero. . . . . } a. II idem.
De crotón balsamiferum. . . . . IV idem.
De alcohol à 32 gs. . . . . }
De aguardiente á 21. . . . . } a. IV libras.

Despues de haber macerado todas las plantas en el alcohol, y colado la tintura, se quema el residuo y se infunden las cenizas en el licor, con cinco onzas de flores de amapolas, y con tres onzas de rubia, y se filtra.

EMPLASTO DE FOUQUET.

De manteca sin sal. . . . . II onzas.
De diapalma. . . . . IV idem.
De cera blanca. . . . . II idem.
Disuelvanse y agreguese.
De minio. . . . . II idem.

Este emplasto es resolutivo y se aplica sobre los hombros.

EMPLASTO ANTI-HISTÉRICO.

De galvano . . . . . III onzas.
De tacamahaca en polvo. . . . . } a. I½ idem.
De cera virgen. . . . . }
De trementina de Venecia. . . . . } a. I idem.
De comino en polvo. . . . . }

Se extiende una suficiente cantidad en un pedazo de badana, y se aplica sobre la boca del estómago. Puede rociarse con treinta ó cuarenta gotas de láudano líquido.

EMPLASTO DE GOMA ELASTICA

DE SWEDIAUR.

De resina elástica dividida en pequeñas láminas. . . . . } IV onzas.
De aceite volatil de trementina rectificado. . . . . } XV½ idem.
De aceite de olivas. . . . . } a. II idem.
De cera blanca. . . . . }

Se hace fundir en un dulce calor la resina elástica en el aceite de trementina. Cuando está concluida la solucion, se agregan la cera y el aceite, y se hacen hervir igualmente hasta que se haya evaporado todo el aceite volatil, y cuando se enfria la masa, se le conserva en un bote de loza.

Este emplasto muy aglutinante, consolida las heridas y las pone á cubierto del contacto del aire.

EMPLASTO ANTIVENEREO DE BOHERHAVE.

De flores de azufre. . . . . II onzas.

Apáguense en ellas dos dracmas de mercurio vivo y agreguese.

De sal de saturno. . . . . III dracmas.

Mezclése exactamente é incorporese todo en=

De emplasto de meliloto . . . . .
De galvano. . . . . } a. IV idem.
De amoniaco. . . . . .

Se aplica este emplasto sobre los bubones venereos, ó en los testículos inflamados, por una afeccion sifilítica.

EMPLASTO DE PELITRE

DE FULLER.

De galvano. . . . . .
De sagapeno. . . . . } a. I onza.
De goma amoniaco. . . . . .
De raiz de pelitre en polvo. . . . } a. IV dracmas.
De granos de mostaza. . . . . .
De cera amarilla. . . . . I onza y IV dracmas.
De trementina q. s.

Se liquidan á un fuego moderado con la trementina, y se agregan en seguida las gomas resinas que han sido purificadas por la solucion en el vino, ó en el alcohol débil, y reducidas á una consistencia mole y viscosa, y cuando la masa emplastica está medio enfriada, se incorporan el pelitre y la mostaza, que se reducen en polvo muy fino.

Este emplasto es fundente, estimulante, resolutivo, incisivo, y se aplica sobre los tumores indolentes.

EMPLASTO DE CANET.

De diaquilón . . . . . .
De diapalma. . . . . } a. VIII onzas.
De colcortar. . . . . .
De aceite de olivas q. s.

Se deshace el colcortar sobre un pórfido con un poco de aceite y se mezcla en seguida á los emplastos fundentes.

Este emplasto es madurativo, tira á la supuracion y deseca juntamente.

EMPLASTO FUNDENTE DE LA MOTHE.

De cera amarilla. . . . . IV onzas.

*

De aceite de olivas. . . . . II libras.
De minio en polvo muy fino. . . . I idem.
De alcanfor. . . . . II dracmas.
De olivano en polvo. . . . . }
De almacíga. . . . . } a. III idem.
De mirra . . . . . }
De alumbre de piedra. . . . . }
De trementina de Venecia. . . . . } a. I½ onza.
De piedra iman. . . . . }
F. S. A.

Se recomienda este emplasto contra los panadizos.

Se le emplea con suceso en los engurgitamientos glandulosos de los pechos. Se extiende sobre lienzo.

EMPLASTO ESTIPTICO

DE SWEDIAUR.

De oxido de fierro rojo . . . . . } a. IV dracmas.
De pez de Borgoña . . . . . }
De aceite de olivas q. s. para hacer un emplasto.
De opio. . . . . II escrúpulos.

Este emplasto se aplica sobre los lomos en la leucorrea y en la debilidad dorsal.

EMPLASTO DEL ABATE DOTÉN.

De aceite de hipericon. . . . . } a. I libra.
De minio . . . . . }
De pez resina . . . . . IV onzas.
De incienso macho . . . . . II idem.
De jabon blanco. . . . . I½ idem.
Hágase un emplasto. s. a.

EMPLASTO AMONIACO MERCURIAL

DEL Dr. SELLE.

De mercurio. . . . . III onzas.
De bálsamo de azufre simple. . . . I dracma.

Mezclése exactamente y agreguese poco á poco=

De goma amoniaco líquida. . . . . II libras.

Este emplasto es un excelente resolutivo de las congestiones de naturaleza sifilítica.

EMULCION DE QUARIN.

Contra la ceatica lombar.

De aceite de almendras dulces. . . I ½ onza.
De jarave de malvavisco. . . . . II idem.
De yemas de huevo q. s.

Despues de haber incorporado todas estas sustancias se agrega.

De agua comun. . . . . X idem.
De carbonate de potaza. . . . . ½ dracma.

Se toma esta emulcion en tres vasos con media hora de distancia el uno del otro.

Cuando la enfermedad es debida al abuso de los ácidos.

EMULCION DEL Dr. WILLIS.

Contra las afecciones reumáticas.

De raiz fresca de manto de Sta. Maria. } a. II dracmas.
De goma arábiga . . . . . }
De esperma de ballena. . . . . II escrúpulos.
De agua comun. . . . . V onzas.
De agua de nuez noscada. . . . . IV dracmas.
De jarave de corteza de naranja. . . IV idem.

Hágase fundir la goma en una parte de agua de modo que se forme un mucilago que se agitará con la esperma de ballena para hacer una pasta mole. Agréguese la raiz de manto de Santa Maria que antes se habrá reducido en pulpa, triturese el todo para hacer una mezcla exacta. Echese poco á poco el agua y el jarave y cuelese la emulcion.

EMULCION DE CADET. (1)

Para terminar las gonorreas inveteradas.

De bálsamo de copaiba. . . . . } a. I onza.
De jarave de tolú. . . . . }

---

(1) *El cirujano.*

De agua de rosas. . . . . VI onzas.
De goma arábiga . . . . . I idem.
De espíritu de nitro dulce. . . . I dracma.
M. F. S. A.

Se toma la mitad de esta emulcion al tiempo de acostarse y al despertar la otra mitad. Se reitera cuatro ó cinco dias seguidos.

EPILATORIO DE PLENHC.

De cal viva. . . . . I libra.
De almidon . . . . . X onzas
De sulfureto de arsénico . . . . . I idem.

Se mezclan los polvos y se les agrega suficiente cantidad de agua para formar una pasta muy mole que se aplica sobre las partes del cuerpo que se quieren limpiar de pelos. Cuando se seca la pasta se lava con agua tibia ó fria.

ESPECIES VERMIFUGAS.

El agenjo marino (abstintium seriphium gallicum Lin.) . . . . . III partes.
— Atanasia . . . . . }
— Manzanilla . . . . . } a. partes iguales.
— Graciola . . . . . }

Cortado el todo muy menudo y dividido en pequeños paquetes de una onza, se hacen infundir en vino blanco.

Se hacen beber uno ó dos vasos diarios antes de comer.

ESPÈCIES QUE SUSTITUYEN AL TÉ.
De la farmacopéa Austriaca.

— Hojas de verónica . . . . . }
De hiedra terrestre. . . . . } a. III onzas.
De tusilago . . . . . }
De escabiosa. . . . . }
De toronjil . . . . . }
De salvia . . . . . } a. media idem.

Se les corta y se les hace infundir del mismo modo y en la misma dósis que el té: se toman cuatro ó cinco tazas en ayunas en las reumas y los catarros.

ESPIRITU DE OLLIN DE REUS.

Destílese con cuidado el ollin negro compacto y brillante, separado de la llama del aceite empirreumático, y destílese de nuevo.

Este licor se administra á la dósis de veinte á treinta gotas en un vehiculo apropiado. Se le prescribe en las afecciones histéricas y nerviosas.

ESPÍRITU ETEREO AROMÁTICO.

De la farmacopéa de Lóndres.

De canela contusa	III dracmas.
De semillas de cardomomo.	I½ idem.
De pimienta larga.	I idem.
De gengible.	I idem.
De espíritu de éter (1) sulfúrico.	I libra.

Hágase macerar durante cuatro dias en una basija de barro cerrada y filtrése.

ESENCIA SCILÍTICA DE KEUP.

De carbonate de potasa	IV dracmas.
De vinagre scilitico preparado con el vinagre destilado.	I libra.

Mezclése y hecho evaporar hasta la consistencia de miel, agréguese.

De alcohol á 36 grados	VI onzas.

Hágase digerir por algunos dias y decántese. Se da esta esencia en el asma y la hidropesía; á la dósis de cuarenta á sesenta gotas en un vehiculo apropiado.

ESENCIA DULCE DE HALLER.

De acetate de potasa	II dracmas.
De azucar muy blanca	II onzas.
De agua de rio.	I½ idem.

---

(1) *El espíritu de eter es una mezcla de una parte de eter sulfúrico y dos de alcohol.*

Se hace hervir esta mezcla en un cazo de plata ó porcelana hasta que el todo parezca negro, y se agrega cuando esté frio:

De alcohol á 30 grados. . . . . I libra.

Se funde la azucar acaramelizada y el acetate de potasa, agitando de tiempo en tiempo el licor y se filtra.

Esta esencia se prescribe á la dosis de veinte gotas en una bebida diurética. Conviene en algunas enfermedades de la vejiga para provocar la orina.

ESENCIA CARMINATIVA DE WEDELIUS.

De raiz de cedoaria	I onza.
De carolina.	a. media idem.
De cálamo aromático.	
De galanga	
De flores de manzanilla romana . .	a. II dracmas.
De semillas de anís	
De alcaravea.	
De clavos de comer	a. I½ idem.
De ballas de laurel	
De macias	I idem.
De cortezas de naranjas secas. . .	II idem.
De espíritu de limon.	I libra.
De nitro	V dracmas.

F. S. A.

Esta tintura es estomacal, carminante y emenagoga.

La dósis es desde media hasta una dracma.

ESENCIA ALEXIFARMACA DE STHAL.

De raiz de imperatoria.	a. IV dracmas.
De carolina.	
De angélica	
De pinpinela blanca	
De contrayerba.	a. I onza.
De énula campánula.	
De dictamo blanco.	
De asclepias.	
De valeriana silvestre	

De alcohol rectificado q. s.

Los prácticos alemanes prescriben este remedio en las

fiebres lentas, y muchas veces en las exantemáticas, en la viruela, sarampion. La dósis es de 20 á 30 gotas ó mas cuando hay tendencia á la adynamia. P.

ESENCIA DE WARD.

De alcanfor . . . . . I onza.
De espíritu volátil aromático de Silvio. VIII idem.

Se emplea esta esencia en fricciones en los casos de paralísis, de reumatismos crónicos, en la cefalargias y convulsiones.

ESENCIA ANTI-HISTERICA DE LEMORT.

De castor. . . . . IV dracmas.
De asa fetida. . . . . II idem.
De aceite volatil de sabina. . . .
De ruda . . . . . } a. ½ idem.
De luccino . . . . . I idem.
De alcohol rectificado . . . . . X onzas.

Macérese, destílese, y agréguese al producto.

De alcanfor . . . . . I dracma.
De carbonate aceitoso de amoniaco . II onzas.

Destílese de nuevo hasta la sequedad, ó bien hágase macerar algunos dias y filtrése.

Se dá esta á la dósis de 20 á 40 gotas en un vehiculo apropiado. Conviene en las afecciones nerviosas del utero.

ETER ACÉTICO ACERADO DE KLAPROTH.

De acetate de fierro líquido. (1). IX onzas.
De eter acético . . . . . }
De alcohol . . . . . } a. II idem.

M.

Se da este eter como anti-espasmodico á la dósis de 15 á 40 gotas.

---

(1) *Disolucion saturada de oxide de fierro rojo en el ácido acético concentrado.*

ETER MURIATICO DE BRUGNATELLI.

De muriate de potasa oxigenado. . X onzas.
De alcohol concentrado. . . . . V idem.
Mezclése y agréguese poco á poco.
De ácido sulfúrico. . . . . V idem.

Déjese digerir en frio toda la noche, y la mañana siguiente decántese el eter sobre nadante. Si conserva ácido sulfúrico, agréguese una porcion de muriate sobre oxigenado de potasa y filtrese, ó destílese á un fuego suave sobre la potasa líquida. Como esta preparacion no es muy exacta me parece conveniente dar la siguiente.

ETER MURIATICO DE THENARD.

Se ponen en una retorta, capaz solamente de contener en su vientre la mezcla, partes iguales en volumen, de ácido muriatico y de alcohol lo mas concentrado posible, se le agita bien para poner en contacto todas sus moléculas; hecho esto, se echan en la retorta tres ó cuatro granos de arena para evitar los saltos que sin esta precaucion podia verificarse en el curso de la operacion: despues se le coloca en un fuego desnudo sobre un hornillo ordinario enmedio de una rejilla de alambre, y se adapta á ella un tubo de Welter, que va á introducirse en un frasco de tres tubos, doble en capacidad que la retorta que se emplea, y medio lleno de agua á 20 ó 25 grados, de modo que el tubo penetre en el agua á la profundidad de siete á ocho dedos, en seguida se introduce en la segunda tubulosidad un tubo derecho de seguridad, y en la tercera se introduce uno curbo que va á introducirse bajo los frascos llenos de agua al mismo grado que la precedente. Cuando el aparato está dispuesto de esta manera se calienta poco á poco la retorta, y á cosa de veinte ó veinte y cinco minutos despues que está aplicado el fuego se ven levantarse volvoritos de la parte inferior del liquido y con especialidad de la superficie de los granos de arena. Estos volvoritos no tardan en multiplicarse y en breve se obtiene un gas etéreo. Pasan al mismo tiempo ácido, alcohol y agua; pero quedan en el primer frasco. De quinientas dracmas de ácido concentrado y de un volumen de alcohol igual al de quinientas dracmas de ácido se pueden sacar hasta treinta litres de eter muy puro.

Este gas es absolutamente sin color, el olor es fuertemente etéreo y el sabor sensiblemente dulce.

No tiene accion alguna ni sobre la tintura de tornasol, ni sobre el jarave de violeta, ni sobre el agua de cal. A 18 grados del termómetro centigrado y á 75 de presion el agua disuelve su volumen. A 11 grados de temperatura el gas etéreo se hace líquido. Es de una trasparencia distinguible. Derramado sobre la mano entra súbitamente en evolucion y produce un frio considerable.

ETER BALSÁMICO DE TOLÚ DE Mr. MOREAU.

De eter sulfúrico . . . . . II onzas.
De balsámo de tolú electo . . . . III dracmas.

Se pulveriza el bálsamo y se le hace digerir en el eter que le disuelve en frio casi en su totalidad. Se filtra prontamente.

Se emplea el eter balsámico bajo forma de vapor por medio de un frasco conocido bajo el nombre de inspiratorio. (1)

Se usa en los catarros faringeos ó pulmonares, en la afonia, en las irritaciones nerviosas del pulmon, sufocaciones, opresiones, &c.

ETER ACÉTICO CANTARIDADO DEL Dr. DOUBLE.

De eter acético rectificado . . . . II onzas.
De cantáridas en polvo. . . . . I dracma.

Se pone á digerir en un frasco bien tapado durante muchos dias, filtrése prontamente y á una temperatura muy baja para evitar la evaporizacion.

Este eter se usa en fricciones en seguida de la apoplejía, de la paralísis, el engurgitamiento lento del tejido celular en los reumatismos crónicos y sin inflamacion. Obra como rubefaciente y su accion es muy pronta.

---

(1) *Se encuentra la descripcion de este aparato en el boletin de farmacia (año de 1811 pág. 485); sirve para la inspiracion de varios eteres compuestos, sea con el de tolú, sea con el bálsamo de azufre anisado, la digital purpuréa, la cicuta, el opio, &c.*

Se encuentra este frasco en casa de M. Desrochen tocero y frasquero, calle 77 Rouseau frente del hospital de las Postas.

ETER SULFÚRICO CALIBEADO.

Vèase tintura nervino-tónica de Bestuchef.

ETER NÍTRICO THEREBENTINADO.

De alcohol de vino . . . . . II libras.

Mézclese con aceite de trementina q. s. muévase con cuidado y agréguese poco á poco.

De ácido nítrico concentrado . . . II libras.

Destílese á un suave calor y saquése la mitad de la mezcla.

Usos. Los cálculos biliarios, la ictiricia tenaz, las obstrucciones hepáticas y los reumatismos.

Se administra interior y exteriormente.

La dósis es de 20 á 40 gotas mezclado con miel ó en una yema de huevo confitada.

ETHIOPE ANTIMONIAL DE HUXAM.

De antimonio crudo preparado. . . III onzas.
De mercurio revivificado de cinabrio. IV idem.
De flores de azufre . . . . . II idem.

Mezclénse perfectamente estas sustancias en un mortero de barro ó de agata, y triturese hasta que el mercurio se apague completamente que no se perciba con el lente el mas mínimo globo. Para facilitar esta extincion perfecta, rociese de tiempo en tiempo el mercurio con un poco de agua.

Este polvo es un poderoso vermífugo. Se da á la dósis de ocho á diez granos. Se prescribe en la de uno á dos escrúpulos á los adultos, en los engurgitamientos linfáticos, en los tumores glandulosos del cuello, en la atrofia y la sarna venérea. Se emplea contra los depósitos artríticos, la amaurosis, el carsinóma, &c.

Se usa exteriormente para limpiar las úlceras sifilíticas.

ETHIOPE VEGETAL DE RUSSEL.

Tómese la vara llamada roble marino (fucen vesiculosus), quémese en una basija descubierta, y se obtendrá un polvo negro y fino.

Se toma á la dósis de una dracma, como fundente y resolutivo en los engurgitamientos glandulosos contra los lamparones.

En mezclandole partes iguales de azucar muy fina se obtiene un dentrífico, para disipar la relajacion escorbútica de las ensias, y para afirmar los dientes.

Con la misma vara se prepara la jalea de fucus de Russel. (*Véase esta fórmula en la tabla.*)

EXTRACTO DE COLOQUINTIDA COMPUESTO.

Farmacopéa de Lóndres.

De pulpa de coloquintidas	VI dracmas.
De extracto de aloes	I½ onzas.
De escamonea	IV dracmas.
De semillas de cardomomo	I idem.
De javon de almendras.	III idem.
De agua caliente.	I libra.

Macérese la pulpa de la coloquintida en el agua á un dulce calor por cuatro dias: cuélese el licor y agréguesele el aloes, la escamonea y el javon; evaporese hasta la consistencia conveniente y al fin échese la semilla de cardomomo.

Este extracto es un drástico fuerte, y no se debe emplear mas que en pequeñas cantidades.

FEBRIFUGO DEL Dr. AUDOUART.

De opio en bruto purgado de sus partes leñosas.	I dracma.
De alcanfor	a. media idem.
De aloes sucotrino.	

Tritúrese el todo en un mortero y agréguese una conserva ó un jarave simple para formar una masa de píldoras de las que se forman sesenta bolos.

Se dan estos bolos de uno en uno con el intermedio de dos horas entre los parosismos ó con mas frecuencia segun la urgencia. La dósis es de cuatro, ocho ó diez en el dia. El médico debe arreglarse segun las fuerzas, los abscesos, y el estado del enfermo Cada bolo debe considerarse como que reemplaza una dracma de quina. Inmediatamente despues de cada bolo se hace tomar un vaso de vino aguado ó de infusion de flores ó de hojas anti-espasmódicas.

FEBRIFUGO DEL Dr. MARC.

Agua mineral.

De sulfate de fierro . . . . . I dracma.
De agua de fuente. . . . . II libras.

Se toma desde medio hasta un vaso de dos en dos horas entre los abscesos en las fiebres intermitentes.

El sulfate de fierro conviene únicamente á las personas húmedas.

BOLOS.

De sulfate de fierro. . . . . I dracma.
De raiz de valeriana en polvo. . . . II idem.

Miel q. s. para formar ocho bolos que se dán cada dos horas en número de uno á dos entre los abscesos.

FOMENTO RESOLUTIVO

DE RICHTER.

De agua . . . . . X libras.
De vinagre . . . . . I idem.
De nitrate de potasa. . . . . IV onzas.
De muriate de amoniaco. . . . . II idem.

Se empapan compresas en esta disolucion y se aplican sobre las contusiones, equimósis, luxaciones y fracturas.

FOMENTOS DEL Dr. JUSTAMOND.

De muriate de amoniaco. . . . . I idem.
De espíritu de romero. . . . . I libra.
M.

Se aplican lienzos empapados en este licor sobre los tumores lacticinosos de los pechos; los que se renuevan con mucha frecuencia.

Las mas veces estos tumores lacteos no requieren tratamiento alguno particular, el tiempo y un régimen conveniente es quien los cura. Sin embargo puede emplearse esta fomentacion cuando el tumor es indolente y que tarda mucho en resolverse.

FOMENTO DEL Dr. RICHARD.

Contra la gangrena.

Hágase una decoccion con una onza de quina en cuarenta y ocho onzas de agua hasta que se reduzcan á treinta y dos y agréguense.

De flores de manzanilla romana. . .
De atanasia. . . . . } a. IV dracmas.

Cuando dé un hervor cuélese la decoccion y cuando se enfrie mezclésele.

De alcohol alcanforado. . . . . II onzas.
De ácido muriático. . . . . I idem.

FRONTAL SONNIFERO.

De hojas de veleño. . . . . .
De flores de adormideras encarnadas . } a. I idem.

Frótense estas plantas secas hasta reducirlas en polvos y agréguese.

De opio en bruto disuelto en s. q. de vinagre 6 granos.

Hágase una pasta que se aplicará sobre la cabeza del enfermo entre dos lienzos en las fuertes cefalargias.

GARGARISMO DE QUARIN.

En la paralisis de la lengua.

De raiz de pelitre pulverizada . . . $I\frac{1}{2}$ dracma.
De muriate de amoniaco . . . . . II idem.
De agua de salvia. . . . . VIII onzas.
De espíirtu de coclearia . . . . . VI idem.

Póngase en digestion por toda la noche y por la mañana agréguese despues de colarse.

De miel. . . . . IV dracmas.

Con esto se lavará la boca el enfermo.

JALEA DE FUCO DE RUSSEL.

De fuco (1). . . . . } a. II libras.
De agua de mar. . . . . }

Pónganse en maceracion por quince dias y se formará una especie de jalea de consistencia de miel colada.

Se emplea con suceso para frotar las glándulas tumefactas y engurgitadas cuando los remedios internos han empezado á resolver estos tumores.

Este fuco seco se dá tambien interiormente á la dósis de un grano como fundente. La planta debe cojerse por el mes de julio, en cuyo tiempo están llenas de un jugo galetinoso.

JALEA DE COLES ROJAS. (2)

De coles rojas. . . . . X onzas.
De cola de pescado . . . . . II idem.
De azucar. . . . . I½ libra.

Se hacen hervir las coles en s. q. de agua: se echa en ella la cola despues de haberla remojado sobre las cenizas calientes en muy poca agua, cuando la cola está fundida se cuela la decoccion, se vuelve á aplicar al fuego y se le agréga la azucar. Se le clarifica con clara de huevos: se le cuela y se junta el todo con consistencia de jalea.

Conviene en los reumáticos y tísicos: se dá á la dósis de una hasta cuatro onzas al dia.

JALEA DE LICHÉN.

De lichén islándico. . . . . III onzas.
De cola de esturion grande. . . . I½ dracma.
De azucar. . . . . VII onzas.

Conviene esta jalea en las personas amenazadas de tisis pulmonal.

---

(1) *Véase Ethiope vegetal.*

(2) *Entre las varias especies de coles, la roja ha sido mirada como un especifico admirable contra las enfermedades del pulmon, principalmente bajo la preparacion de jarave.*

Se dá por las mañanas en ayunas á la dósis de tres á cuatro cucharadas.

JALEA VERMIFUGA.

De musgo de Córcega.

De musgo de Córcega	VI½ libras.
De vino rojo.	XII pintas.
De azucar prieta.	XXIV libras.

Póngase el musgo en el baño de Maria, echese por sima el vino tinto, déjese en infusion veinte y cuatro horas, hiervase, cuelese, agreguese el azucar y vuelvase á poner al fuego. Clarifiquese y vuelvase á colar, reduzcasele en seguida hasta cerca de treinta libras; se reduce á jalea en enfriandola.

Esta jalea conviene en los niños que tienen gusanos, se les dán tres cucharadas cada dia, cada una una hora antes de cada comida, se continúa por tres ó cuatro dias.

GOTAS DE ELLER

Ó LICOR ANTI-ARTRÍTICO.

De licor anodino mineral de Hoffman. De espíritu de cuerno de ciervo succinado.	a. II dracmas.

Se prescriben de veinte á cuarenta gotas en los reumatismos crónicos, accesos de gotas, espasmos &c.

Nota. El licor de cuerno de ciervo succinado se hace mezclando exactamente una onza de sal volatil de succino en una suficiente cuantidad de cuerno de ciervo hasta que se complete la solucion.

ACEITE BEZOÁRDICO DE WEDEL.

Esta preparacion no es otra cosa que el aceite alcanforado de los farmacéuticos.

ACEITE CARMINATIVO ETEREO

DE DANOIS.

De aceite destilado de manzanilla . De menta piperita	a. II onzas.

De alcarábea. . . . . .
De cominos. . . . . } a. XXXVI gotas.
De anis. . . . . }
De hinojo. . . . . .

Mezclése con cuidado.

Se emplea exteriormente para hacer fricciones sobre el vientre en el cólico ventoso ó catarral.

Interiormente se usa tambien á la dósis de seis á ocho gotas mezcladas con azucar ó con la yema de un huevo.

ACEITE ALOÉTICO BATAVE.

Se pone en una retorta de barro bien tapada una libra de aloes hepático en polvo, se mezcla con dos onzas de mirra y cuatro dracmas de incienso; en seguida se procede segun arte á la destilacion en el baño de arena y se obtiene un licor cargado de aceite amargo, cuya aplicacion tópica ha sido recomendada contra las lombrices de los niños.

ACEITE ACÚSTICO.

De aceite de ruda por ligera infusion. IV dracmas.
De bálsamo tranquilo. . . . . II idem.
De aceite de trementina sulfurado . ┐
De tintura de asa fetida. . . . . │
De ambar gris. . . . . } a. X gotas.
De castor . . . . . │
De aceite de succino rectificado. . ┘

Este aceite fortifica el órgano del oido, se introduce en las orejas por medio de un algodon empapado en él.

ACEITE VERDE DE METZ.

Ó DE FEUILLET.

De oxido de cobre verde . . . . . } a. $I\frac{1}{2}$ dracma.
De sulfate de sinc. . . . . }
De aceite de lino. . . . . } a. VI onzas y II
De olivas. . . . . } dracmas.
De trementina . . . . . II onzas.
De aloes sucotrino. . . . . II dracmas.

De aceite volatil de gengible . . . IV dracmas.
De clavos de comer. . . . . I idem.

Este aceite no se emplea mas que exteriormente, corroe las carnes fungosas, deterge las úlceras, cicatriza y evita la gangrena. (Se llama tambien esta preparacion bálsamo de Metz.)

INFUSION DE HOLLIN COMPUESTA DE PIDERIT.

De cenizas graveoladas. . . . . III onzas.

Cuélese con una infusion de flores de sauco en cantidad de 36 onzas y agréguese.

De muriate de amoniaco. . . . . I onza.
De hollin compuesto y reluciente. . II idem.

Se dá esta infusion á la dósis de una dracma en una onza de buen vino dos ó tres veces cada dia para facilitar las menstruaciones ó reproducir en el cutís una erupcion cutanea suprimida. Se prescribe contra las obstrucciones engurgitaciones linfáticas, el asma, la ictericia, la cachexia, los dolores artríticos, y las cuartanas.

INJECCION DEL Dr. PRINGLE.

De sulfate de sinc. . . . . } a. IV dracmas.
De alumbre calcinado. . . . . }
De agua pura . . . . . II libras.

Mezclése y hágase la solucion.

Se emplea esta injeccion en la leucorrea. La dósis es de una onza á la véz.

Cuando la enfermedad se acerca á su fin entonces suele ser perjudicial esta injeccion.

INJECCION DEL Dr. TUNGC.

De acetate de plomo líquido. . . . II dracmas.
De vinagre destilado . . . . . VIII onzas.
De agua de rosas destilada. . . . $1\frac{1}{2}$ libras.

M.

Se usa como la precedente.

*

INJECCION DEL Dr. CLARE.

De oxido gris de plomo. . . . . XX granos.
De sulfate de sínc. . . . . VI idem.
De agua de rosas. . . . . IV onzas.
Mezclése y agítese.
Se emplea esta injeccion en la blenorrágia.
La observacion precedente es aplicable á esta preparacion.

INJECCION SEDATIVA

DEL Dr. HAMILTON.

De extracto de opio. . . . . } De I á III dracmas.
De agua caliente. . . . . I libra.
Despues de la solucion agréguese.
De acetate de plomo líquido. . . De I á III dracmas.
Tiene el mismo uso que la precedente.

JULEPE NOSCADO DE FULLER.

De agua de rosas. . . . . VI onzas.
De azahar. . . . . I idem.
De canela ordeáda. . . . . II idem.
De peonia compuesta. . . . . $I\frac{1}{2}$ idem.
De almizcle . . . . . } a. II granos.
De ambar gris. . . . . }
De carbonate de amoniáco. . . . . }
De azafrán. . . . . I escrúpulo.
De esencia de clavo. . . . . I gota.
De confeccion de alkermes. . . . . II dracmas.
De jarave de claveles. . . . . $I\frac{1}{2}$ onza.
M. et f. s. a.
Se dá este julepe á la dósis de cinco cucharadas cada tres horas en las afecciones espasmódicas y en las fuertes contracciones del estómago.

JULEPE ESCOCES PARA LA ANGINA

INFLAMATORIA.

De agua de poleo. . . . . III onzas.

De jarave de malvavisco. . . . . } a. I onza.
De tolú. . . . . .

M.

Se dá á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

Este julepe es solo un corto auxilio, el que no debe excluir el uso de los remedios que exige esta enfermedad como son la sangria, los eméticos, los vejicatórios, los baños, las fricciones, los anti-espasmódicos mas enerjicos &c.

LEXIA LITHONTRITICA

DE SAUNDER.

De escamas de ostras calcinadas. . XXIV onzas.
De potasa recientemente calcinada. . VIII idem.
De agua hirviendo. . . . . III libras.

Filtrese el licor despues de haber reposado un dia.

Se dán tres dracmas por dia en una infusion de semillas de lino, á la que se agrega=

De magnesia calcinada. . . . . XV granos.

LINIMENTO DE AJO.

Se le prepara machacando el ajo en un mortero con partes iguales de unto sin sal, se frotan con él las plantas de los pies dos ó tres veces al dia, pero el mejor modo de usarlo es extenderlo sobre un lienzo y aplicarlo en forma de un emplasto. Se renueva tarde y mañana por que el ajo pierde prontamente su virtud.

Es un buen remedio contra el coqueluc y contra muchas toses pertinaces. (Extractado de Buchán.)

LINIMENTO CARMINANTE DE WHIT.

De bálsamo anodino de bates. . . . I onza.
De aceite de macias. . . . . IV dracmas.
Esencial de yerbabuena. . . . . II idem.

Mezclése perfectamente.

Se toma cerca de una cucharada ordinaria con lo que se le unta al enfermo hacia la region del estómago cuando se acuesta.

LINIMENTO DE MUSTARD.

De unguento epispástico. . . . . I onza.
De esencia de trementina. . . . . III dracmas.
De alcanfor. . . . . IV idem.
M.
Se emplea en la gota y reumatismo.

LINIMENTO RESOLUTÍVO DE POTT.

De aceite esencial de trementina. . II onzas.
De ácido muriático. . . . . I idem.
M.
Se usa en los reumatismos y dolores artríticos, se frotan las lupias y tumores enquistados.

LINIMENTO DE HUFELAND.

Contra los tumores glandulosos y con especialidad contra los que provienen de un vicio escrofuloso.

De unguento de altea. . . . . I onza.
De hiel de buey reciente. . . . .
De javon blanco . . . . . } a. III dracmas.
De aceite de petroleo. . . . . II idem.
De sal volatil de cuerno de ciervo. ½ idem.
De alcanfor. . . . . I idem.
M.
Se emplea en fricciones á la dósis de una cucharada de café cada tres horas.

LINIMENTO CONTRA LAS HEMORROIDES

POR EL Dr. ANDRYS.

De aceite de olivas. . . . . .
De miel de narbona . . . . . } a. I onza.
De trementina de Venecia. . . . .
F. Linimentum s. a.

LINIMENTO ANTI-OPTÁLMICO

DE PLENCK.

De sulfate de alumbre en polvo. . . I dracma.
De clara de huevo . . . . . núm. 1.
De agua de rosas. . . . . I onza.

Infundase el alumbre en el agua, agréguese la clara de huevo y cuélese la mezcla.

Se aplica sobre los ojos en la optalmia húmeda por medio de pequeñas compresas empapadas en él.

LINIMENTO SAPONÁCEO

DE KAEMPE.

De javon alcalino de sosa . . . . . I onza .
De alcohol á 30 gs . . . . . IV idem.
De alcanfor . . . . . LX granos.

Se rapa el javon y se mete en una basija con el alcohol, despues se le pone al fuego agitando la mezcla con una espátula de barro, y cuando el alcohol se enfrie se le mezcla exactamente el alcanfor.

Esta preparacion análoga al bálsamo de opodeldoc, tiene los mismos usos.

LINIMENTO ANTI-ARTRITICO

DE HOME.

De alcanfor. . . . . I escrúpulo.

Disuélvase en dos dracmas de aceite de trementina y agréguese.

De sal volatil de cuerno de ciervo succinado . . . . . } XV gotas.
De semillas de cominos en polvo. . II dracmas.
De unguento nervino. . . . . IV idem.
De javon negro comun. . . . . I onza.

M. et F. Linimentum.

Se usa en fricciones en las afecciones reumáticas prolongadas y particularmente en la ceática nerviosa.

LINIMENTO ANTI-ARTRÍTICO

DE DESBOIS DE ROCHEFORT.

De aceite. . . . . I onza.
De amoniaco líquido . . . . . II dracmas.
De agua teriacal. . . . . I onza.
De laudáno . . . . . I dracma.

LINIMENTO VOLATIL DE PLENCK.

De aceite de almendras dulces. . . I onza
De amoniaco líquido. . . . . I dracma.
De alcanfor . . . . . XXXVI onzas.

Se hacen con este linimento ligeras friegas sobre el abdomen en la perineumonia, pleurecia, en la inflamacion del bajo vientre, el colico ventoso y la timpanitis.

Se dán fricciones tambien en el cuello en la angina del pecho.

LINIMENTO DIURÉTICO

DE KUSER.

De aceite de trementina. . . . . I onza.
De yemas de huevo frescas ó cocidas. II idem.

Se agitan en un morteró de barro hasta que se mezcle perfectamente, despues se le vá echando poco á poco sin dejar de agitarlo.

De agua de yerbabuena piperita . . III onzas.

Se hacen fricciones sobre la region inguinal con este linimento. Se emplea contra la isguria espasmódica.

LINIMENTO ANTI-ESPASMÓDICO

DEL Dr. SELLE.

De ungento de altea . . . . . II onzas.

De alcanfor. . . . . } a. I dracma.
De laúdano líquido de sydeham. . . }

Este linimento es muy eficaz en todos los movimientos espasmódicos de los intestinos. Se frota el bajo vientre todos los dias con algunas dracmas, en diferentes veces y se cubre con una lanilla caliente.

LINIMENTO SAPONACEO ALCANFORADO

DE FERRIAR.

De unguento digestivo amarillo . . I onza.
De jabon verde ó de trementina. . IV dracmas.
De alcanfor . . . . . II idem.
M.

Tiene los mismos usos que los dos precedentes.

LINIMENTO ESTIMULANTE INGLÉS.

Ó BÁLSAMO DE LA VIDA EXTERNO.

De jabon medicinal. . . . . VIII dracmas.
Dividase y agréguese=
De aceite esencial de trementina. . VIII onzas.
De espíritu de serpol. . . . . IV libras.
De amoniaco líquido . . . . . De II á VIII onzas.

Algunas ocasiones se le agrega una libra de agua para hacer una embrocacion resolutiva.

Se emplea el bálsamo de la vida externo en la paralisis, la falsa anquilosis, los tumores frios, la arthrodynia &c.

LINIMENTO DE RONCALLÍ.

Se toma una vejiga de hiel de buey entera, se agrega á la bilis que contiene tres onzas de muriate de sosa en polvo y tres cucharadas de aceite de nuez, se agita la mezcla y se pone esta vejiga durante algun tiempo á un dulce calor.

Se embeben hilas en este linimento y se aplican dos ó tres veces al dia sobre los tumores escrofulosos. El provoca la resolucion ó supuracion de estos tumores con tal que tambien se haga uso de algunos remedios internos.

Estos son los que de ordinario se emplean: se purga primero al enfermo con la jalapa y el cremor de tártaro y se le pone al uso de un cocimiento de la raiz de baldana y de polipodio.

En seguída se les prescriben unas píldoras compuestas con el jabon, la goma amoniaco y el ruibarbo partes iguales de estas dos últimas sustancias. Estas píldoras y la bebida deben continuarse por algunas semanas.

Si los tumores escrofulosos pareciesen muy inflamados, se suspende el uso del linimento y se aplican por cima algunos tópicos suaves ó cataplasmas emolientes.

Hay tambien necesidad algunas veces de aplicar sobre los tumores indolentes de estas escrófulas el remedio hongrois compuesto de goma amoniaco disuelta en el vinagre y espesada hasta la consistencia de emplasto.

LICOR AMONIACAL ANISADO.

Farmacopéa de Berlin.

De alcohol.	I libra.
De amoniaco líquido.	III onzas.
De aceite volatil de anis.	IV dracmas.

La dósis es de diez gotas para los adultos mañana y tarde y cinco para los niños.

Se prescribe este licor en las enfermedades adinámicas y con especialidad en el asma espasmodica.

LICOR ANTI-NEFRITICO

DEL Dr. ADAMS.

De cabezas de adormideras	VI onzas.
De agua de fuente.	II libras.

Hágase hervir hasta que se reduzcan á ocho onzas, esprimase muy bien y despues de colarlo agreguese.

De nitrate de potasa.	I onza.

Se dán dos dracmas mañana y tarde, en un vaso de una decoccion tibia de granos de lino ó de malvavisco.

Se emplea este licor en las afecciones dolorosas de las vias urinarias.

LICOR CAUSTICO DE PLENCK.

De mercurio sublimado corrosivo. . } a. II onzas.
De sulfate ácido de alumbre . . . }
De alcanfor . . . . . } a. II dracmas.
De cerusa. . . . . }
De vinagre concentrado. . . . . } a. XXIV onzas.
De alcohol rectificado . . . . . }

Hágase la mezcla s. l.

Este licor destruye los condilomas las escrecencias venereas sin alterar la piel sana; se le aplica dos veces al dia por medio de una compresa ó una planchuela de hilas. Aplicado del mismo modo cicatriza los rasgades.

LICOR DEL Dr. SWEDIAUR.

Para las aptas.

De borax en polvo. . . . . II dracmas.
De tintura de mirra . . . . . } a. I onza.
De agua de rosas destilada . . . . }
De miel rosada . . . . . II idem.

Se empapa un hisopo en este licor y se tocan las aptas muchas veces al dia.

LICOR DE PRESSAVIN.

Se toman partes iguales de tartitre ácidulo de potasa y de mercurio precipitado de su nitrate por la potasa. Se disuelve esta mezcla en veinte veces de su peso de agua destilada y se filtra el licor.

Este tartrite de mercurio líquido se emplea á la dósis de dos cucharadas en medio azumbre de agua destilada, se toman tres ó cuatro vasos por dia con una tipsana apropiada.

El licor de Pressavin es anti-herpetico y anti-venereo.

LOHC DE ALMIDON.

Farmacopéa de Edimburgo.

De almidon . . . . . II dracmas.

De cachunde. . . . . I dracma.
De jarave de tolú . . . . . }
De clara de huevo batida en un po- } a. I onza.
co de agua. . . . . }
Hágase un lohc s. a.
Se emplea en las diarreas rebeldes.

LOHC SAPONACEO.

Farmacopéa de Edimburgo.

De jabon medicinal. . . . . I dracma.
De aceite de almendras dulces. . . I onza.
De jarave de limon. . . . . $I\frac{1}{2}$ dracma.
Mezclése y hágase un lohc.

LOHC DE GORDON.

De jarave de col roja . . . . . I libra.
De azafrán gatinois (1) . . . . . III dracmas.
De agua. . . . . VIII onzas.
Hágase hervir un momento y cuélese. Se dá á cucharadas en el asma húmeda, en las reumas y enfermedades de pecho.

LOCION ODONTALGICA DE PLENCK.

De raiz de pelitre. . . . . II dracmas.
De muriate de amoniaco . . . . . I idem.
De extracto de opio. . . . . II granos.
De agua destilada de espliego . . . }
De vinagre destilado . . . . . } a. II onzas.
Digiérase por algunos dias esta mezcla y filtrese.

---

(1) *Gatinois término derivado de la palabra francesa Gatine con la que expresan un mineral que se encuentra en las minas de fierro y que lo hace mas facil de fundir. Gatine en algunas provincias de la Francia significa árido y de esto verosimilmente se ha deducido el nombre gatinois.*= El Traductor.

En los dolores se toma de tiempo en tiempo en la boca una cucharada de esta locion. Se tiene cuidado de no tragarla.

LOCION CONTRA LA TIÑA.

De sosa sulfurada.	VI onzas.
De jabon blanco.	III dracmas.
De agua de cal.	XVIII onzas.
De aguardiente	VI dracmas.

M. s. a.

Cada dos dias se envuelve la cabeza con un lienzo empapado en esta preparacion.

CONSERVA DE TRONCHIN.

De pulpa de casia.	a. I onza.
De maná en lágrima	
De aceite de almendras dulces. . .	a. IV dracmas.
De jarave de violetas.	
De agua de azahar.	II idem.

Se toma á cucharadas de hora en hora por la mañana: la mitad un dia y la otra el dia siguiente. Se toma encima un caldo ligero.

Esta conserva es un purgante dulce que conviene á las personas delicadas en las enfermedades catarrales.

CONSERVA DE ZANETTI.

De maná en lágrima.	II onzas.
De jarave de malvavisco	I½ idem.
De casia cocida.	a. I idem.
De aceite de almendras dulces. . .	
De manteca de cacao	VI dracmas.
De agua de azahar.	I½ onza.
De kermes mineral.	IV granos.

Se administra como minorativo en las reumas. Puede suplir á la conserva de Tronchin. Se prescribe á la dósis de una dos ó tres cucharadas de café segun la edad del enfermo y la intencion del médico.

MIXTURA PECTORAL DE QUARIN.

De goma amoniaco disuelta en una yema de huevo. . . . . } II dracmas.
De extracto de énula campánula . . II escrúpulos.
De agua de hisopo. . . . . VIII onzas.
De oximiel escilítico . . . . . } a. I½ dracma.
De jarave de hisopo . . . . . }

Se administra á cucharadas esta mixtura en la apoplejía acompañada de tos, con silvido y dificultad de volver una materia pituitosa y tenaz que amenaza sofocacion.

MIXTURA PECTORAL

DE BOHERHAVE.

De vinagre escilítico . . . . . VI dracmas.
De oximiel escilítico. . . . . III onzas.
De sulfate de sosa . . . . . I dracma.
De cocimiento de cebada. . . . . VIII onzas.
De agua destilada de hisopo. . . . IV idem.

Se dá una onza de esta mixtura tibia cada media hora en la perineumonia.

Cuando la espectoracion es abundate y un poco dificil.

MIXTURA ANTI-LETARGICA

DEL Dr. FRANCK.

De espíritu de menta piperita . . . VI onzas.
De láudano líquido de sydenam. . IV dracmas.
De eter sulfúrico. . . . . VI idem.

Mezclése y hágase tomar al enfermo cada cuarto de hora una cucharada de café de esta mezcla.

Es necesario suponer que este letargo se produce por una debilidad nerviosa profunda.

Para emplear este medicamento el médico debe consultar la observacion del Dr. Franck.

MIXTURA DE QUARIN EN LA ICTERICIA.

De extracto líquido de diente de Leon. } a. IV dracmas.
De acetate de potasa . . . . . }
De extracto de cicuta. .. . . . . { Desde X hasta XX granos.
De agua de hinojo. . . . . VI onzas.
De jarave de cinco raices. . . . . I idem.
Se dán dos cucharadas cada tres ó cuatro horas.

MIXTURA ANTI-SIFILÍTICA DE SIRILLO.

De miel egipciaca . . . . . II½ dracmas.
De agua pura. . . . . II onzas.
M.
Se aplica dos veces cada dia sobre las úlceras venereas una compresa empapada en esta mixtura.

MIXTURA RESOLUTIVA DEL Dr. SELLE.

De muriate de amoniaco. . . . . } a. II dracmas.
De vino emetico. . . . . }
De oximiel simple . . . . . II onzas.
De agua de manzanilla destilada. . X idem.
M.
Se dá esta mixtura á la dósis de media taza cada hora en las fiebres donde hay que combatir éstasis tenaces.

MIXTURA ANTI-CATARRAL RUSA.

De elixir paregórico inglés . . . . V onzas.
De tintura de scila. . . . . I idem.
Se toma á cucharadas de café por mañana y tarde.

MIXTURA HYDRAGOGA

DE VAN-SWIETEN.

De rob de enebro. . . . . IV onzas.

Diluyase en una pinta de agua destilada de bayas de enebro y agréguese=

De espíritu de enebro . . . . . II onzas.

Se dá cuatro ú ocho veces cada dia, desde media cucharada hasta dos. Cuando las enfermas están muy alteradas se agregan algunas veces á la mixtura cuatro dracmas de espíritu de nitro dulce.

MIXTURA ODONTALGICA

DE CADET.

De eter sulfúrico. . . . . } a. I dracma.
De láudano líquido. . . . . }
De bálsamo del comendador. . . . }
De aceite esencial de clavo . . . . XX gotas.

M.

Se empapa un poco de algodon en esta mixtura y se aplica sobre el diente afecto.

MIXTURA ANTI-ASMATICA

DE BRUNER.

De goma amoniaco muy pura. . . II dracmas.
Disuelvase en agua destilada de hisopo. . . . . } IV onzas.
De vino del Rhin ó blanco generoso. II idem.

M.

Se dá esta mixtura á la dósis de una onza tres veces al dia.

MIXTURA CATHARTICA ARABE.

De sulfureto de antimonio pulverizado. XII granos.
De escamonea en polvo. . . . . I escrúpulo.

De jarave de limon . . . . . I onza.
Mezclése para una dósis.
Esta fórmula es útil en la hidropesia ascitis.

MIXTURA RESINO-JABONOSA DE PLENCK..

De resina de guayaco . . . . . } a. I onza.
De jabon de almendras. . . . . }
De alcohol rectificado . . . . . VIII idem.
Hágase una tintura s. a. y filtrése.
Se emplea esta tintura líquida ó se le hace evaporar hasta su sequedad. Se dá el jabon seco á la dósis de diez y ocho granos, ó la tintura á la dósis de una dracma en una bebida apropiada. Conviene este remedio en la gota y el reumatismo.

MIXTURA SAPONACEA PURGANTE DEL MISMO.

Se prepara como la precedente empleando la jalapa en lugar del guayaco.
Purga á los niños sin promover dolores de vientre. Se dá á la dósis de una á una y media dracma líquida, y de diez á veinte granos seca.

MIXTURA DE QUARIN.
Contra la hémotisis.

De agua de flor de amapola . . . VIII onzas.
De goma arábiga . . . . . IV dracmas.
De sulfate ácido de alumbre y de potasa . . . . . } Media idem.
De jarave de diacodion. . . . . I onza.
Se usa á cucharadas
Solo debe usarse en las hemotisis pasivas. En los casos contrarios deben preceder los remedios generales, la sangría, &c.

MIXTURA DE BOYLE.
Contra las aptas.

De jugo de la grande siempre viva. } a. I onza.
De miel . . . . . }

De sulfate ácido de alumbre . . . I escrúpulo.

Se lavan las aptas diariamente

MIXTURA DE WHITT.

Contra los cálculos biliarios.

De eter sulfúrico. . . . . I onza.
De esencia de trementina. . . . . IV dracmas.

Se dan de doce á veinte gotas ó algo mas en un terron de azucar, se hace beber encima una taza de suero clarificado ó de agua de cebada. Se debe continuar este remedio durante muchos meses. Si irrita se prescribe un régimen refrigerante.

Este remedio es el que recomendaba Durande, médico de Dijon. Cullen le cree sin virtud contra los cálculos biliarios; pero muchos prácticos lo emplean con suceso, y Quarín recomienda que se ensaye.

MIXTURA LITONTRITICA DE DURANDE.

De eter sulfúrico. . . . . VII dracmas.
De esencia de trementina. . . . . IV idem.

Algunas veces el médico asociaba al eter la yema de huevo, otras veces aumentaba ó disminuia la proporcion del aceite volatil de trementina ó le asociaba el jarave de violetas ó de corteza de naranja y á veces el jarave de diacodion ó el de amapolas.

El remedio de Durande muy análogo al de Whitt no se emplea mas que como disolvente de los cálculos biliarios.

Se toman doce ó veinte y cuatro gotas por la tarde en un poco de azucar.

MIXTURA BALSÁMICA DE FULLER.

De bálsamo de copaiba. . . . . IV dracmas.
De yemas de huevos . . . . . núm. 2.
De jarave de azucar blanca. . . . II onzas.
De vino blanco . . . . . VIII idem.

Se da esta mixtura á la dósis de una cucharada mañana y tarde en la tos catarral crónica y en la blenorrea crónica.

MIXTURA FUNDENTE DE MUTZEL.

De tartitre de potasa . . . . . IV dracmas.
De extracto de genciana . . . . . } a. II idem.
De centaura . . . . . }
De agua . . . . . VIII onzas.

Se da media onza cada dos horas á los enfermos que tienen obstrucciones en el higado.

MIXTURA DE MIRRA ALCALIZADA DE GRIFFIHT.

De mirra electa. . . . . II dracmas.
De carbonate de potasa. . . . . I idem.
Tritúrese con exactitud y agréguese.
De agua de yerbabuena . . . . . VIII onzas.
De alcohol de idem . . . . . I½ idem.
De sulfate de fierro . . . . . De XX á XXV gs.
De jarave de tolú. . . . . I idem.
M.

Se toman cuatro cucharadas tres veces al dia á saber: en la mañana, dos horas despues de comer, y al acostarse.

Conviene en la caquexia hidrópica, en la debilidad que sigue á las fiebres adinámicas, en la leucorrea &c.

MIXTURA PARA LA ANGINA INFLAMATORIA.

De asa fétida. . . . . II dracmas.
De espíritu de mindereros . . . . I onza.
De agua de amapola . . . . . III idem.

Se dá esta mixtura á cucharadas todas las horas, cuando han empleado los remedios generales.

MIXTURA ÁCIDA DEL Dr. SELLE.

De ácido sulfúrico. . . . . I dracma.

*

De oximiel simple. . . . . IV onzas.
De agua pura. . . . . XX idem.

En las fiebres pútridas se toman cada hora una taza llena de esta mixtura. En la sarna se empieza por menor dósis.

MIXTURA DIAFORÉTICA DEL MISMO.

De antimonio diaforético lavado. . II dracmas.
De espíritu de mindereros . . . . IV idem.
De agua de flor de sauco . . . . VIII onzas.
M.

Se emplea esta mixtura en las fiebres agudas, en las que se procura facilitar la traspiracion y refrescar.

Se dá media taza cada hora.

MURIATE DE AMONIACO CUPREO.

DEL Dr. VAN-MONS.

De muriate de cobre. . . . . } a. partes iguales.
De idem de amoniaco . . . . . }

Disuelvase en agua y agréguese gota á gota el amoniaco líquido que baste hasta que se forme un precipitado, lávese y séquese.

Se emplea en la epilepsía mezclado con la valeriana silvestre.

Dósis. Desde dos granos hasta veinte ó treinta cada dia, al menos que no excite nausea.

MURIATE DE AMONIACO Y DE FIERRO.

De sulfate de fierro. . . . . } a. partes iguales.
De muriate de amoniaco . . . . . }

Hágase disolver en q. s. de agua hirviendo, cuando se enfrié y precipíte la disolucion por el amoniaco líquido se lava el precipitado.

Se usa en las escrófulas, la caquexia, la raquitis y en las enfermedades linfáticas.

Dósis. De doce á veinte y cuatro granos.

MURIATE DE SOSA Y DE ORO.

De oro muy puro. . . . . } a. partes iguales.
De muriate de sosa . . . . . }

Disuelvase el oro en el ácido nitro muriático, agréguese el muriate de sosa, filtrése y evapórese á un fuego suave hasta la sequedad. Se emplea contra la tisis que sigue á las enfermedades venereas ó se administra cuando el mercurio deja de ser útil.

Dósis. De tres, seis, doce ó diez y ocho granos por dia incorporado con el jarave de goma arábiga.

MURIATE CALIBEADO DE MERCURIO DE HARTMANN.

De muriate de mercurio dulce . . III partes.
De muriate de fierro amoniacal. . . I idem.

Tritúrese y mézclese exactamente.

Se dá este polvo á la dósis de veinte á treinta granos en las enfermedades escrofulosas, en los engurgitamientos linfáticos y contra las lombrices intestinales.

UNGUENTO DE MONTPELLIER.

De unguento de altea . . . . .]
Del rosado . . . . . } a. II onzas.
Del de populeon. . . . . }
De miel. . . . .]

Mézclese exactamente.

Este unguento se emplea contra las hemorroides.

UNGUENTO BLANCO ALCANFORADO.

De la Farmacopéa de Viena.

De blanco de ceruza . . . . . II onzas.
De enjundia. . . . . IV libras.

Se derrite y agita hasta que la masa tome consistencia de unguento, y se agrega.

De alcanfor en polvo. . . . . { II onzas y seis dracmas.

Se mezcla y se guarda el unguento.

Se emplea contra las quemaduras y contusiones seguidas de inflamacion.

UNGUENTO EPISPÁSTICO SIN CANTÁRIDAS.

De semillas de mostaza. . . . . IV idem.
De pelitre . . . . . } a. I idem.
De estafisagra . . . . . }
De pimienta larga. . . . . }
De euforbio. . . . . I escrúpulo.
De unguento basalicón . . . . . IV onzas.
De trementina q. s.

Se emplea este unguento para sostener la supuracion de un exuntorio. No extiende su accion á la vejiga como las cantáridas.

UNGUENTO DE PIDERIT.

De miel amarilla y granujienta. . . } a. VII onzas.
De pulpa de cebolla cocida . . . . }
De cera amarilla. . . . . } a. I onza y III dracmas.
De resina ordinaria. . . . . }
De jabon negro. . . . . }

Despues de haber cocido la cebolla bajo cenizas y de haberle sacado la pulpa, se derrite la cera y la resina, despues se le agréga la miel, la pulpa de la cebolla y el jabon negro.

Se sostiene al fuego hasta que se evapore toda la húmedad, y se remueve continuamente la mezcla con una espátula de palo, hasta que se resfrie enteramente.

UNGUENTO DE PROPOLIS (1) *DE CADET.*

De propolis purificado en agua hirviendo. . . . . } IV onzas.
De aceite de olivas. . . . . I½ libra.

Se disuelve el propolis en el aceite á un dulce calor y despues de haberlos mezclado bien se cuéla el unguento caliente.

---

(1) *Entiéndese por propolis una especie de betun con que las abejas tapan las colmenas.*

Se emplea para las úlceras antiguas y en el tratamiento de las hemorroides.

UNGUENTO DEL Dr. PLENCK.

Contra los sabañones.

De pella de puerco . . . . . }
De sebo de buey . . . . . } a. II onzas.
De aceite de laurel. . . . . }
De cera . . . . . }

Derrítase á un fuego lento y cuando se enfrie agréguese.

De alcanfor disuelto en . . . . . IV dracmas.
Alcohol rectificado . . . . . II onzas.

Mezclése exactamente s. l.

UNGUENTO DE FALK.

Contra los tumores hemorroidales.

De limaduras de estaño puro . . . } a. II dracmas.
De mercurio vivo. . . . . }

Hágase una mezcla y agréguese.

De unguento rosado. . . . . I onza.
De mercurio precipitado rojo . . . II dracmas.
De aceite destilado de menta piperita. XX gotas.

Este unguento se aplica en una planchuela sobre los tumores hemorroidales.

UNGUENTO MERCURIAL BLANCO DE ZELLER.

De mercurio precipitado blanco . . I dracma.
De cerato ó pomada de rosas. . . I onza.

Mezclése exactamente.

Se emplea este unguento como coméstico, y en las enfermedades cutanéas, psoricas, herpeticas, ó venereas, se hacen ligeras fricciones á la dósis de una dracma ó menos segun las circunstancias.

UNGUENTO DE RICOUR.

De aceite rosado. . . . . XII onzas.
De cera blanca. . . . . VIII idem.
De ceruza. . . . . IV idem.
De litargírio. . . . . II onzas.
Agréguese al fin de la mezcla en caliente.
De bálsamo del Perú líquido . . . IV dracmas.

Se aplica este unguento sobre las úlceras indolentes.

UNGUENTO PARA LA TIÑA.

De harina de trigo. . . . . } a. V libras.
De pez negra . . . . . }
De pez de Borgoña. . . . . }
De vinagre destilado . . . . . XXX idem.

Se diluye al calor la harina en el vinagre y se le agréga la pez negra y la de Borgoña fundida.

Se extiende este unguento sobre una badana y se aplica tibio sobre las partes afectas de tiña, se levanta al cabo de doce horas, se lava la herida y se sigue el tratamiento racional seguido en esta enfermedad.

UNGUENTO CONTRA LA TIÑA.

De carbon de madera. . . . . } a. IV onzas.
De flor de azufre . . . . . }
De sebo. . . . . II idem.

Mezclése despues de haberlo pulverizado bien.

De manteca de puerco. . . . . XV onzas.

Cada tres dias se unta la cabeza por mañana y tarde despues de haberla lavado con el agua de jabon.

UNGUENTO DE LA ABADIA DE BÉE.

De enjundia . . . . . } a. I libra.
De pez de Borgoña . . . . . }
De resina. . . . . } a. V onzas.
De brea . . . . . }
De cera amarilla . . . . . X idem.

De olivano en polvo . . . . . X dracmas.
F. S. A.

Este unguento tiene el mismo uso que el de Ricour.

UNGUENTO DEL DUQUE.

De aceite de nuez. . . . . VIII onzas.
De flor de azufre. . . . . II dracmas.

Póngase todo en el baño de arena por media hora ó hasta que el azufre se disuelva y se enrojesca el aceite, entonces se le funde y se le colora con q. s. de buglosa encarnada:

Se le agróga.

De enjundia . . . . . VIII onzas.
De cera amarilla. . . . . I idem.

Se pasa por un lienzo y se pone el unguento en un mortero de marmol donde se le mezcla con el bálsamo de azufre indicado arriba.

UNGUENTO DEL Dr. SWEDIAUR.

Para las rasgades.

De almendras amargas mondadas. . VIII onzas.
De miel . . . . . VI idem.
De alcanfor . . . . . IV dracmas.
De mostaza en polvo. . . . . I½ onza.
De alumbre calcinado. . . . . } a. II idem.
De olivano en polvo.. . . . . }
Tres yemas de huevo.

Mezclése y formese una pasta.

Hácense con esta preparacion ligéras fricciones sobre los rasgades y se lava algunos momentos despues con el agua tibia, ó lo que es mejor póngase unos guantes ó bayetas encima.

Las inmersiones frecuentes en el agua caliente y las lociones en el aguardiente alcanforado y la tintura de benjui son medios equivalentes sino preferibles, lo que no excluye el uso de los guantes.

UNGUENTO OHPTÁLMICO DE SMELLOME.

De alcanfor disuelto por el alcohol. }
De oxido blanco de sinc . . . . . } a. VI dracmas.

De oxido verde de cobre. . . . . II dracmas.

Despues de haberlo triturado y mezclados agréguesele en un mortero caliente sin dejar de agitarlo.

De manteca de puerco. . . . . VI onzas.
De clara de huevo. . . . . núm. VI.
F. S. A.

Se aplica un poco sobre el borde de los párpados en las optalmias crónicas.

OPIATA FEBRIFUGA DE Dr. C.

De diaprun (1) disuelto . . . . . I onza.
De jarave de flores de duraznos. . .
De quina roja en polvo. . . . . } a. I onza.
De muriate de amoniaco . . . . . I escrúpulo.

Hágase una opiata que deberá dividirse en doce tomas,

Se toma una en la mañana, otra á la tarde, y una hora despues se toma un caldo.

OPIATA CONTRA LA LEUCORREA DE TISSOT.

De conserva de rosas encarnadas. . III onzas.
De conserva de romero. . . . . .
De quina. . . . . } a. I idem.
De macias. . . . . .
De cachunde. . . . . } a. II dracmas.
De esencia de canela. . . . . III gotas

Incorpórese c. s. q. de jarave de cortezas de naranjas.

Se dá esta opiata á la dósis de dos dracmas mañana y tarde.

OPIATA ESTOMATICA DE HERVECIO.

De limon confitado. . . . . I onza.
De nuez noscadas confitadas. . . . III dracmas.
De clavos de comer confitados. . . 1 onza.

---

(1) *Nombre que dán los franceses, á una especie de electuario en que entra la pulpa de las ciruelas.*

De gengible confitado. . . . . II idem.
De opiata de salomón. . . . . IV dracmas.
De canela. . . . . III idem.
De cascarilla. . . . . ½ idem.
De aceite esencial de canela . . . X gotas.
De clavos de comer. . . . . II escrúpulos.
De jarave de claveles q. s. . . .

Este estomático es afrodisiáco. La dósis es desde un escrúpulo hasta una dracma.

OPIATA FEBRIFUGA DE TISSOT.

De polvos de centuara . . . . . } a. I onza.
De mirra . . . . . }
De ajenjos. . . . . }
De conserva de enebro. . . . . }

De jarave de ajenjos q. s. para hacer una opiata espesa.

La dósis es de dos dracmas.

OPIATA DEL Dr. LARREY.

De bálsamo de copaiba. . . . . } a. VI onzas.
De azucar . . . . . }
De goma arábiga . . . . . I½ idem.
De laca carminante. . . . . I dracma.

De agua de yerbabuena piperita q. s.

Esta opiata termina las gonorreas rebeldes. Se toma mañana y tarde una ó dos dracmas envueltas en pedazo de hostia. Durante el uso de esta opiata es necesario comer pocó, abstenerse de crudezas y moverse.

OPIATA Ó PASTA DEL Dr. WARD.

Para las hemorroides.

De raiz de énula campánula. . . . } a. III libras.
De tomillo . . . . . }
De pimienta negra . . . . . I idem.

Redúzcanse estas sustancias en polvo fino y pásense por

un tamiz de seda, incorpórense en una mezcla con dos libras de miel y otro tanto de azucar.

La dósis es el grueso de una nuez noscada que se toma tres veces por dia, tomando encima un vaso de tipsana apropiada.

OPIATA VERMIFUGA DE MALOET.

De sal de seignet en polvo. . . . .
De jalapa en idem. . . . . } a. I dracma.
De valeriana idem . . . . . .
De oximiel scilítico. . . . . IV onzas.

Mezclése exactamente.

Se dá de media á una onza por dia á las personas atormentadas de gusanos y lo mismo para la tenia.

OSMAZÓME DE THENAR.

Se elije un músculo sin grasa, se pica muy bien y se derrama encima poco á poco, agua fria y se le amasa, se pasa esta agua al través de un lienzo fino y se hierve, se espuma al principio y despues se le filtra y se evapora hasta la consistencia de extracto.

La osmazóme dada á la dósis de una dracma excita por su sabor, los órganos digestivos y los dispone á absorver los principios digestivos. Sirve á excitar el apetito en los convalecientes sin sobre cargar sus estómagos.

Se prepara con esta sustancia un polvo nutritivo muy cómodo para los caminantes.

Del modo siguiente.

De osmazome seco. . . . . } a. I onza
De jelatina desecada . . . . . .
De goma arábiga . . . . . II dracmas.
De clavos de comer. . . . . }
De pimienta contusa. . . . . } a. XII granos.
De semillas de apio . . . . . }
De chirivia. . . . . .

Se hierven tres onzas de este polvo en una pinta de agua, se le agréga un poco de sal, se cuéla y se forma un caldo muy agradable y muy sano.

OXIMIEL PECTORAL DE DANOIS.

De raiz de parietária. . . . . I onza.
De iris de Florencia. . . . . IV dracmas.

Se parten estas raices y se hacen hervir en 36 onzas de agua de fuente. Se cuéla la decoccion y se le agréga.

De miel blanca . . . . . I libra.
De goma amoniaco. . . . . I onza.

Disuelta en s. q. de vinagre.

Se aplica nuevamente el todo al fuego y se hierve hasta la consistencia de jarave.

Esta preparacion se dá en el asma húmeda y la tos, á cucharadas de tiempo en tiempo.

OXIMIEL PECTORAL DE EDIMBURGO.

De goma amoniaco. . . . . I onza.
De raiz de énula campánula . . . . } a. IV dracmas.
De lirio de Florencia . . . . . }
De miel. . . . . VIII onzas

Despues de haber mondado, cortado y contundido las raices del lirio y de la énula campánula, se le hierven en 20 onzas de agua hasta la reduccion de 7 onzas. Por otra parte se hace disolver la goma amoniaco en tres onzas de buen vinagre. Se mezcla esta disolucion al cocimiento de las raices, despues se decanta, se cuela al través de un lienzo denso, se agréga por último la miel y se hierve hasta la consistencia conveniente.

Se prescribe este oximiel á la dósis de una á una y media onza por dia en las afecciones catarrales.

PASTILLAS DE MONSIEUR CHAUSIER.

Para la tisis laringéa y angina inflamatoria.

De alcanfor. . . . . XXI granos.
De opio. . . . . VI idem.
De azucar . . . . . III dracmas.
De mucilago q. s.

Se comparte esta dósis en pastillas 50 y se dán de cuatro á seis diariamente al enfermo. Cada una contiene medio grano de opio.

PASTILLAS DE ÉNULA CAMPANULA.

De polvos de énula campánula. . . ½ onza.
De lirio. . . . . I dracma.
De azucar . . . . . I libra.
De mucilago q. s.

Se dán estas pastillas á la dósis de media onza por dia en el escorbuto, la hidropesia y la clorosis.

PASTILLAS DEL MOGOL.

De azucar. . . . . III½ onzas.
De goma arábiga. . . . . I idem.
De clavo de comer. . . . . } a. II½ dracmas.
De macias . . . . . }
De nuez noscada. . . . . }
De extracto seco de opio. . . . . VII idem.
De almizcle . . . . . V granos.
De agua de rosas q. s.

Se hacen las pastillas ó píldoras de seis granos.

Estas pastillas se toman despues de las comidas á la dósis de una ó dos para facilitar la digestion y excitar las fuerzas.

PASTILLAS VERMÍFUGAS DE BARTHEZ.

De azucar. . . . . I libra.
De mercurio dulce. . . . . II dracmas.
De mucilago q. s.

Háganse pastillas de la magnitud de una moneda de 20 sueldos.

Estas pastillas se dán á los niños, atacados de lombrices á la dósis de una ó dos por dia, los adultos pueden tomar de seis á ocho.

PASTILLAS DE PELITRE DEL Dr. LACOMBE.

De infusion alcoholica de pelitre. . I onza.
De azucar pulverizada. . . . . X idem.

De mucilago de goma tragacanto q. s. para formar una masa mole y homogenea que se divide en 150 pastillas.

La dosis es de cuatro á nueve por dia en la angina gutural, la laringea, el catarro pulmonal, la neumonia cronica, el asma, el coqueluc y la disposicion á la tisis, por último en todos los casos en que el defecto de espectoracion depende de la atonia de las membranas mucosas sin fiebre y sin lesion orgánica de los pulmones.

PASTILLAS DE GENG-SENG (Especie de panax).

De geng-seng en polvo.	V onzas.
De bainilla	X idem.
De esencia de ambar.	X gotas.
De tintura de cantáridas	V dracmas.
De aceite de canela.	X gotas.
De azucar.	X libras.
De mucilago q. s.	

Divídase en pastillas de veinte y cuatro á treinta granos.

Estas pastillas excitantes dicen que sirven para reanimar los órganos de la generacion. Se toman de cuatro á cinco con una hora de distancia.

PASTILLAS DE MERCURIO SACARINO

DEL Dr. LAGNEAU.

De mercurio revivificado de cinabrio	II onzas.
De goma arábiga	I idem.
De bainilla	I dracma.
Obien de esencia de vergamota. . .	VIII gotas.
De azucar en polvo.	X onzas.

Háganse s. a. 566 pastillas que cada una contiene dos granos de mercurio.

PASTILLAS DEL Dr. DUBOIS.

Para las engurgitaciones de los cartilagos Tyroydes.

De esponja quemada en polvo. . . 1 onza.

De carbonate de sosa. . . . . IV dracmas.
De polvo de canela. . . . . II idem.
De jugo de orosur. . . . . { II onzas y VI dracmas.

De mucilago de goma tragacanto q. s.

Háganse s. a. pastillas de diez granos para dar una cada tarde.

PASTILLAS PECTORALES INCISIVAS

Y CALMANTES DEL Dr. A. JOBARD.

De hipecacuana . . . . . II dracmas.
De opio gomoso . . . . . I idem.
De escamas de scila secas . . . . LXIV granos.
De oxide de antimonio sulfurado rojo. LXII idem.
De azucar blanca. . . . . III dracmas.
De mucilago de goma tragacanto q. s.

De esta cantidad deben hacerse como 400 pastillas; pero es necesario hacerlas mas pequeñas para los niños. Se toma una cada hora.

PASTA PECTORAL DE PARMENTIER.

De arrope de ubas. . . . . XXVIII onzas.
De goma arábiga. . . . . II libras.
De agua de azahar. . . . . III dracmas.
De agua comun q. s.

Despues de haber echado la goma arábiga en el agua se le agrega el arrope de ubas, se evapora el todo hasta la consistencia de jarave espeso, se le aromatiza con el agua de azahar, y se pone este jarave en los moldes de hoja de lata que se colocan en una estufa para acabar la evaporacion y se le dá la consistencia de pasta.

PASTA CONTRA LOS RASGADES.

De almendras amargas mondadas . . VIII onzas.
De miel. . . . . VI dracmas.
De alcohol saturado de alcanfor . . $\frac{1}{2}$ onza.
De harina de mostaza negra . . . IV dracmas.

De alumbre quemado. . . . . } a. II onzas.
De olivano en polvo. . . . . }
De yemas de huevo . . . . . num. 8.

M. S. A.

Se toma de mañana y tarde como el grueso de una nuez de esta composicion, se frota la piel afecta mezclandole un poco de agua, en seguida se lava con agua tibia ó bien despues de frotarse las manos se ponen unos guantes durante un cuarto de hora.

Puede usarse mientras que los rasgades no están abiertos.

PÍLDORAS FEBRIFUGAS INGLESAS.

De tártaro stibiado. . . . . XVIII granos.
De sal de ajenjos . . . . . } a. I dracma.
De muriate de amoniaco. . . . . }
De quina . . . . . I onza.
De jarave de quina q. s. . . . .

Formese del todo doce bolos de los que se tomarán cuatro cada dia antes del absceso, á la mayor distancia posible del absceso próximo.

PÍLDORAS DE SCILA COMPUESTAS.

Farmacopéa de Lóndres.

De cebolla albarrana seca. . . . . I dracma.
De gengible. . . . . } a. III idem.
De jabon medicinal. . . . . }
De goma amoniaco. . . . . II idem.

Mezclense juntamente los polvos, incorporense con el jabon agregando la s. q. de jarave para dar á la mezcla una consistencia pilular.

Se emplean con suceso estas píldoras en las afecciones catarrales crónicas de las vias aereas &c. á la dósis de doce, quince, diez y ocho ó veinte y cuatro granos por dia, segun la edad y estado del enfermo. Puede aumentarse la dósis.

PÍLDORAS TÓNICAS DE BACHER.

De extracto de eléboro negro . . . } a. I onza.
De mirra electa . . . . . }

De cardo bendito en polvo. . . . . I onza I dracma.

Se toman del eléboro negro de Suiza una onza cinco drácmas se le despedaza y pone en un matráz con 4 libras de alcohol débil y cinco y media onzas de agua que tenga en disolucion tres drácmas y media de potasa carbonada. Despues de 24 horas de infusion se cuéla al través de un lienzo, se filtra la coladura y se conserva aparte, en seguida se toma el residuo que queda en el lienzo y se pone en el mismo matráz con vino del Rhin ó de grave hasta que se sobrenaden como dos traveses de dedo, se deja en infusion por 48 horas, despues de este tiempo se pasa el licor, se exprime el residuo, se reunen los licores y se evaporan hasta la consistencia de píldoras. Con este extracto, agregando el cardo bendito y la mirra reducidos en polvo muy fino, es con lo que Bacher componia sus píldoras.

Nota. Es importante emplear el eléboro negro que crece en Suiza ó todavia mejor el *elleborus hyemadis.*

PÍLDORAS UTERÍNAS DE STAHL.

Contra el catarro de esta entraña.

De extracto de cardo bendito. . .	a. I dracma.
De idem de fumaria.	
De goma amoniaco disuelta en vinagre scilítico.	
De la mejor mirra	a. I escrúpulo
De aloes sucotríno.	
De goma de yedra.	I escrúpulo ó ½ dracma.
De azafrán pulverizado	XV granos.

Mezclese y con la cantidad suficiente de jarave comun háganse píldoras de á grano.

Su dósis quince píldoras al dia.

Los buenos efectos que Stahl ha conseguido en muchos casos con estas píldoras, las han hecho recomendar por los autores en varias disertaciones publicadas en Alemania.

PÍLDORAS STOMAQUICAS DE CADET.

De aloes.	a. VIII granos.
De sal esencial de quina	
De resina de guayaco.	

De jabon medicinal. . . . . XXIV granos.
De goma amoniaco. . . . . VI idem.
De eptiope marcial. . . . . IV idem.

Para doce píldoras que toman dos al sentarse á la mesa.

PÍLDORAS TÓNICAS DE STOLL.

De limaduras de fierro. . . . . } a. II dracmas.
De extracto de centaura menor. . . }
De goma amoniaco. . . . . }

PÍLDORAS ANTI-DISENTÉRICAS DEL Dr. WILLIS.

De cera amarilla. . . . . IV idem.
De esperma de ballena. . . . . } a. I idem.
De cachunde. . . . . }
De aceite esencial de canela. . . . XII gotas.

Háganse píldoras de seis granos.

Se emplea este medicamento en las disenterias crónicas pasivas. Se toman tres píldoras cada dia.

PÍLDORAS ABSTRIGENTES DE CAPURON.

De cachunde . . . . . XII granos.
De alumbre . . . . . VI idem.
De opio . . . . . II idem.

Mezclése y háganse píldoras de cinco granos.

Se toman una ó dos cada dia en las gonorreas que están á su fin.

PÍLDORAS DE ALUMBRE DE HERVECIO.

De alumbre de roca. . . . . II onzas.
De sangre de drago en polvo. . . I idem.

Se liquída el alumbre en una cuchara de fierro, y se agrega la sangre de drago y se forma una pasta que se divide en píldoras de á tres granos, mientras que la masa se conserva caliente.

Estas pildoras son abstringentes se dán de seis, doce y hasta 36 granos en las grandes deperdiciones, hemorrageas

Se dán tres por la mañana á los enfermos afectados de obstrucciones y tres una hora antes de comer.

PÍLDORAS DE ACONITO MERCURIZADAS

DEL Dr. DOUBLE.

De extrato de acónito napelo . . . I escrúpulo.
De sublimado corrosivo. . . . . II granos.

Tritúrese largo tiempo en un mortero de barro para conseguir una mezcla muy exacta y dividase en 20 píldoras iguales.

Convienen estas píldoras contra los herpes inveterados complicados con afecciones psórica y venerea contra las enfermedades venereas antiguas los engurgitamientos linfáticos, las escrofúlas &c.

Se dán á la dósis de una píldora por mañana y tarde. Cada diez dias se aumenta una píldora.

PÍLDORAS DEL Dr. MERAT.

Contra la danza de S. Vito.

De nitrate de plata fundido. . . . VI granos.
De extracto de opio gomoso. . . . I dracma.
De almizcle en polvo. . . . . II escrúpulos.
De alcanfor . . . . . IV idem.

F. S. L. ochenta y seis píldoras.

Cada píldora contiene
$\frac{1}{10}$ granos de nitrate de plata.
$\frac{3}{4}$ grano de opio.
$\frac{1}{2}$ grano de almizcle.
1 grano de alcanfor.

Se dán dos diarias al principio de la curacion una por la mañana y otra á la tarde, mas adelante se pueden dar tres y cuatro. Se bebe al mismo tiempo una tipsana anti-espasmódica cualquiera.

Se podrian emplear estas píldoras contra ciertas epilepsias.

pasivas y flujo hemorroydal inmoderado, en el esputo y vómito de sangre pasivos.

PÍLDORAS ANTI-HISTERICAS DE BUCHAN.

De aloes sucotríno . . . . . }
De ruibarbo. . . . . } a. I dracma.
De jabon medicinal. . . . . }
De jarave comun q. s.

Háganse píldoras de cinco á seis granos.

Se dán de cinco á seis, dos ó tres veces al dia en la ictericia despues del periódo del espasmo.

PÍLDORAS DE GREDIN.

Contra la ictericia.

De extracto de belladama. . . . . XXIV granos.
De polvos de hojas de la misma planta. XV idem.

Háganse píldoras de medio grano.

Se dán dos todos los dias una por la mañana y otra por la tarde. Los enfermos experimentarán un calor considerable en todo el cuerpo, una frecuencia en el pecho, una especie de embriaguez y sudores. Estos síntomas se acompañan con cámaras verdosas y abundancia de orinas, la curacion se completa con el ruibarbo y el sulfate de magnesia.

Extracto de Quarin.

PÍLDORAS FUNDENTES DE LEMONNIER.

Médico del Rey.

De azafrán de marte aperitívo . . . II escrúpulos.
De mirra electa. . . . . }
De goma amoniaco. . . . . } a. I idem.
De gálvano. . . . . }
De aloes sucotríno. . . . . }
De muriate de mercurio dulce. . . }
De azufre dorado de antimonio. . . } a. XII granos.

Incorpórese todo c. s. q. de jarave de cinco raices aperitivas y háganse píldoras de tres granos cada una.

PÍLDORAS ORIENTALES.

De opio purificado. . . . . }
De azafrán. . . . . }
De canela. . . . . } a. partes iguales.
De nuez noscada . . . . . }
De cardomomo. . . . . }
De jarave de azahar q. s.

Se hacen píldoras de tres granos.

Se emplea esta preparacion para procurar un sueño acompañado de desvarios estáticos.

Se dán dos ó tres de ellas por la tarde una hora antes de acostarse.

PILDORAS MARCIALES DE SIDENHAM.

De limaduras de hierro porfirizadas. II onzas.
De extracto reciente de agenjos q. s.

Se forma una masa de píldoras á la que á veces conviene agregarle, segun la prescripcion del médico, una dracma de canela en polvo, y á veces media idem de aloes.

Estas píldoras son tónicas fortificantes, se toman á la dósis de un escrúpulo dos veces al dia en la hipocondría, histérico, caquexias, &c.

PÍLDORAS ANTI-ESPASMÓDICAS DE PIDERIT.

De asa fétida. . . . . } a. I dracma.
De castor . . . . . }
De ácido succino concreto. . . . . XXXVI granos.
De aceite animal de Dippel. . . . XX gotas.
De tintura de mirra q. s.

Se forma s. a. una masa que se divide en píldoras de cinco granos.

Se agrega algunas veces, segun la prescripcion del médico, una cierta cantidad de extracto de opio.

La dósis es de doce á treinta y seis granos.

PILDORAS DE LOS TRES DIABLOS DE MAETZIUS.

De trosiscos de alhandal . . . . . } a. IV granos.
De escamonea de alep. . . . . }
De muriate de mercurio dulce . . . VIII granos.
De jarave comun q. s.

Háganse s. a. cuatro píldoras que segun el autor es la dósis mas alta que puede tomar el mas robusto.

Maetzius prescribe estas píldoras en la gonorrea para relajar el vientre, disminuir la inflamacion del canal de la uretra y favorecer la crisis; no pueden emplearse estos medios derivativos sino con la mayor precaucion.

Las mas veces son inútiles.

PÍLDORAS ANTI-CATARRALES DEL Dr. PARISET.

De tartrite antimoniado de potasa. } a. III granos.
De opio gomoso . . . . . }
De goma arquitira. . . . . X granos.

Agréguese la suficiente cantidad de conserva de rosas para hacer sesenta píldoras, de las que se tomarán dos por la mañana y dos á la tarde.

Esta preparacion produce preciosos efectos, con especialidad en los catarros envejecidos que por exceso de irritacion se resiste al tiempo y á los remedios.

PÍLDORAS ANTI-CATARRALES Y CALMANTES DEL Dr. PETIT.

De manteca de cacao. . . . . } a. II escrúpulos.
De goma arábiga. . . . . }
De extracto gomoso de opio . . . XII granos.
De jarave de hipecacuana q. s.

Háganse píldoras de cinco granos que se impregnarán de polvo de raiz de malvavisco.

Se dá una todas las tardes al tiempo de acostarse.

PÍLDORAS ANTI-SIFILÍTICAS DE ALIBERT.

De muriate de mercurio dulce. . . } a. II onzas.
De resina de guayaco. . . . . }
De malvavisco en polvo . . . . . IV idem.
De jarave de membrillos q. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.
La dósis es de cinco á seis píldoras por dias.

PÍLDORAS LAXANTES Y FUNDENTES DEL Dr. SANCHEZ.

De sublimado corrosivo . . . . . } a. VIII granos.
De turbit mineral. . . . . }
De mercurio sublimado dos veces. . X idem.
De alcanfor . . . . . } a. ½ escrúpulo.
De almizcle . . . . . }
De raiz de gengibre . . . . . } a. II dracmas.
De azucar. . . . . }

Tritúrese exactamente en un mortero de vidrio, y agréguese:

De extracto de jalapa. . . . . } a. II idem.
Catártico de la farmacopéa de Lóndres. }
De píldoras de Rufo. . . . . }
De gálvano. . . . . } a. I idem.
De extracto de orosul. . . . . }
De asa fétida . . . . . } a. I½ idem.
De sal de duobus . . . . . }
De bálsamo del Perú. . . . . ½ idem.
De elixir de propiedad no ácido q. s.

Hágase una masa de píldoras, la que se dividirá en píldoras de cuatro granos.

Se tomarán á la dósis de cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince cada dia aumentandolas graduadamente.

Cada píldora contiene $\frac{1}{11}$ de sal mercurial.

PÍLDORAS MERCURIALES DE MOSCATI.

De mercurio soluble de moscati. (1).	II escrúpulos.
De extracto reciente de quina. . .	II dracmas.
Gomoso de opio	XII granos.

Háganse veinte píldoras, de las que se tomará una por la mañana y otra á la tarde.

Si el enfermo goza de una buena constitucion, y no ha experimentado tialismo durante la administracion de las otras preparaciones mercuriales, prescribe el Dr. Moscati cuatro escrúpulos de oxide de mercurio, un escrúpulo de opio y media onza de extracto de quina, y divide la masa en veinte bolos que se toman del mismo modo mañana y tarde. Si el sugeto, por el contrario es debil y ha sufrido el tialismo, M. Moscati restringe la prescripcion á un solo escrúpulo de oxide de mercurio, doce granos de opio, con media onza del extracto de la quina.

Otro medicamento que M. el Dr. Franhc ha visto contribuir de un modo notable á los buenos efectos del oxide de Moscati es la decoccion de la corteza del mesereon; él aconseja que tambien se le prescriba de este modo.

De corteza de raiz de mesereon. . II granos.

Hiervásele en una pinta de agua y cuélese. Agréguese á la coladura tres onzas del jarave de altea.

Se toma esta decoccion en las veinte y cuatro horas. Si produjese calor en el paladar ó estómago, se reducirá la dósis de mesereon á una sola dracma para la misma cantidad de agua, ó bien se le agrega un poco de leche de goma arábiga, de raiz de orosul, de malvavisco ó zarzaparrilla, segun lo exigiese el caso.

PÍLDORAS PURGANTES FUNDENTES DEL Dr. SAIFFERT.

De extracto de genciana. . . . . IV dracmas.

---

(1) *Se puede emplear el mercurio de Hahenmaun ó el de Mozett. (Véanse estos nombres en la tabla.)*

De hiel de buey. . . . . III dracmas.
De escamonea . . . . . II idem.

Mezclése y dividase en ciento sesenta y dos píldoras.

Se dan de cuatro á seis en ayunas ó antes de comer todos los dias.

PÍLDORAS UTERINAS DE KÆMPE.

De gálvano purificado. . . . . } a. I onza.
De muriate de amoniaco . . . . . }
De asa fétida . . . . . }
De sulfate de potasa. . . . . } a. IV dracmas.
—De hierro. . . . . }
De vinagre scilítico . . . . . XXIV onzas.

Pongáse todo al fuego y agítese hasta que espesada la mezcla adquiera la consistencia de extracto.

Agréguense á la masa resfriada cuarenta y ocho gotas de aceite de succino, mézclese y dividase en píldoras de á cuatro granos.

Se dán á la dósis de doce, veinte, treinta y treinta y seis granos al dia en la caquexia y en la clorosis.

PÍLDORAS SUDORIFICAS CALMANTES

DEL Dr. DUMERIL.

De extracto de beleño . . . . . II dracmas.
Gomoso de opio. . . . . XII granos.
De oxido de antimonio sulfurado naranjado . . . . . } a. XXIII granos.
De hidro sulfuro rojo . . . . . }

Háganse s. a. setenta y dos píldoras iguales.

La dósis es de dos á cuatro, mitad en la mañana y mitad á la tarde, segun la edad y el estado del enfermo: estas píldoras son anti-espasmodicas, y convienen en las toses nerviosas tenaces; promueven el sudor.

PÍLDORAS DE BOULLAY.

Contra la gonorrea.

De jabon medicinal. . . . . I onza.

De nitro. . . . . } a. IV dracmas.
De alcanfor. . . . . }
De extracto acuoso de opio . . . I idem.
De jarave de ninfa q. s.

Para hacer s. a. píldoras de cuatro granos cada una.

Se dán de dos á seis granos por ella.

PÍLDORAS FUNDENTES DE H. SMITH.

De goma amoniaco. . . . . } a. I½ dracma.
De jabon medicinal. . . . . }
De raiz de scila. . . . . } a. ½ idem.
De polvo de diaromatón.. . . . . }
De aceite volatil de gengibre . . . XX gotas.
De jarave de cortezas de naranja q. s.

Háganse píldoras de cinco granos.

Cada tres dias se toman cuatro de estas píldoras y encima se beben cuatro onzas de una decoccion de rubia.

Conviene en la ictericia y afecciones hepáticas.

PÍLDORAS FUNDENTES DE RICHTER.

De goma amoniaco. . . . . } a. II dracmas.
De asa fétida. . . . . }
De jabon medicinal. . . . .]
De raiz de Valeriana. . . . . } a. II idem.
De flores de arnica montánica. .]
De tartrite de potasa antimonial disuelto en agua. . . . . De VIII á X granos.

Se dán estas píldoras en los mismos casos que las precedentes, cada tres ó cuatro dias.

PÍLDORAS INCISIVAS DEL Dr. J. J. DE ROUX.

De scila en polvo . . . . . I dracma.
De extracto gomoso de opio. . . . VI granos.
De kermes mineral. . . . . VIII idem.
De manteca de cacao q. s. para hacer treinta y seis píldoras.

Convienen estas píldoras en las afecciones catarrales, en las que se dán tres ó cuatro diarias.

PÍLDORAS DE LA DIGITAL DE WITHRING.

De hojas secas de la digital purpúrea. } a. I dracma.
De asa fétida. . . . . }

Se dán una ó dos de estas píldoras todas las mañanas en las afecciones hipocondriacas.

PÍLDORAS PURGANTES DE HAEN.

De extracto católico. (1). . . . . I onza.
De jalapa. . . . . } a. IV idem.
De escamonea. . . . . }
De alcohol para ablandar las sustancias q. s.

Se hacen píldoras de cuatro granos.

Este violento drástico no se dá mas que á la dósis de diez á veinte granos en la hidropesía y en las enfermedades asténicas.

PÍLDORAS DE PLUMIER.

De muriate dulce de mercurio. . . } a. III dracmas.
De azufre dorado de antimonio. . . }
De jugo depurado de orosul. . . . II idem.
De mucilago de goma arábiga q. s.

Formense píldoras de seis granos.

Se toman estas píldoras á la dósis de dos ó tres mañana y tarde en las enfermedades de la piel ó en las enfermedades sifilíticas. Se bebe sobre cada dósis un vaso de decoccion de los leños sudoríficos ó de zarzaparrilla.

---

(1) *El extracto católico se hace con*
Extracto de aloes . . . . . I onza.
—De eléboro negro. . . . . II dracmas.
—De coliquintidas. . . . . I idem.
De resina de jalapa. . . . . } De cada cosa I½
De escamonea. . . . . } dracma.

Algunas veces se emplea para purgar á la dósis de diez á diez y ocho granos, pero este drástico violento no conviene mas que á los temperamentos flemáticos.

PÍLDORAS ESCOCESAS.

Hay muchas fórmulas que llevan el nombre de píldoras escocesas en los recetarios ingleses. La receta del Dr. Anderión es la siguiente.

De goma guta. . . . . } a. II dracmas.
De aloes sucotrino. . . . . }
De aceite volatil de anis . . . . . XXX gotas.
De jarave simple q. s.

Se hacen píldoras de cuatro granos. Ellas purgan á la dósis de tres á cuatro. Cuando solo se quiere tener el vientre libre se toma una sola al acostarse. Los ingleses llaman tambien á estas píldoras *Scotch pills.*

OTRA RECETA.

De goma guta . . . . . }
De aloes sucotrino. . . . . } a. I dracma.
De polvo de canela compuestos . . }
De jabon medicinal. . . . . II idem.

OTRA RECETA.

De tártaro emético. . . . . De ½ á I grano.
De aloes sucotrino. . . . . XVI idem.
De mucilago de goma tragacanto s. q.

Háganse del todo cuatro píldoras que se envolverán en polvos de iris.

Estas píldoras se hacen muchas veces vomitivas y fatigan á los enfermos. Debe darse solamente el nombre de píldoras escocesas á las dos primeras fórmulas que tienen mucha analogía.

Ellas son purgantes, se dán á la dósis de una ó dos.

PÍLDORAS EMÉTICAS DE BOHERHAVE.

De emético. . . . . IV granos.
De miga de pan q. s.

Háganse cuatro píldoras.

Se toman en las fiebres intermitentes. La dósis es de una á dos antes de los paroxismos.

PÍLDORAS RELAJANTES DE BUCHAN.

De jabon blanco. . . . . I½ dracma.
De sagapeno. . . . . I escrúpulo.
De extracto de diente de leon. . . II idem.
De aloes sucotrino. . . . . I idem.

Mezclése y háganse píldoras de tres granos cada una.

La dosis de estas píldoras que se dán en la constipacion es de tres á nueve que se toman en dos veces mañana y tarde.

PÍLDORAS HIDRAGOGAS DE JANIN DE LEON.

De sen. . . . . I libra.
De ácido tartaroso. . . . . II onzas y I½ dracma
De agárico. . . . . }
De mechoacán. . . . . }
De ruibarbo. . . . . } a. VI onzas y II
De escamonea. . . . . } dracmas.
De raiz de brionia . . . . . }
De hermodactilo . . . . . }
De turbith gomoso. . . . . }
De goma guta. . . . . }
De trosiscos de alhaldal . . . . . } a. II onzas.
De muriate de mercurio dulce. . . }
De tartrite de potasa antimoniado. }
De carbonate de fierro. . . . . } a. VIII y ½ idem.
De nitrate de potasa. . . . . }
De jalapa. . . . . } a. I libra.
De aloes sucotrino. . . . . }
De sulfureto negro de mercurio . V onzas.
De agua comun . . . . . VI libras.

Hiérvanse el sen y el ácido tartaroso por un cuarto de hora en seis libras de agua, cuélese en seguida con fuerte expresion, póngase el licor en una olla de fierro que se aplicará al fuego, agréguense poco á poco las otras sustancias que deberán haberse porfirizado y mezclado exactamente, agítese esta mezcla sin interrupcion, y déjesele á un dulce fuego hasta que haya adquirido una consistencia pilular, quítese del fuego la olla y divídase la masa en píldoras de cuatro granos. Envuelvase en el polvo de jalapa y déjense desecar.

Son muy purgantes: la dósis es relativa á la edad y temperamento del enfermo.

PÍLDORAS SCILÍTICAS.

De la farmacopéa de Edimburgo.

De jabon medicinal. . . . . I dracma.
De scila pulverizada . . . . . } a. ½ dracma.
De nitrate de potasa. . . . . }
De bálsamo de copaiba q. s.

Fórmese una masa que se divide en píldoras de á cuatro granos.

Se dán en la hidropesía, y retenciones de orina.

La dósis es de tres á cuatro en ayunas.

PÍLDORAS INCISIVAS DE CADET.

De hipecacuana . . . . . II dracmas.
De scila en polvo . . . . . IV idem.
De extracto gomoso de opio. . . . XV granos.
De manteca de cacao. . . . . I onza.
De jarave de goma q. s.

Convienen estas píldoras en las reumas y en los catarros. Se dán dos de mañana y tarde.

PÍLDORAS ANTI-ARTRITICAS DE VICG-DE ASIR.

De raiz de guayaco. . . . . } a. I dracma.
De muriate dulce de mercurio. . . }
De jabon medicinal. . . . . IV idem.
De extracto de hiel de buey desecado. II idem.
De guayaco en polvo q. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.

La dósis es de dos á cuatro, mitad en la mañana y mitad á la tarde.

PÍLDORAS FUNDENTES DEL MISMO.

De extracto de hiel de buey desecado. } a. III idem.
De centuara menor. . . . . }

De corteza de Winter . . . . . } a. I dracma.
De eptiope marcial. . . . . }

Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se prescriben en las obstrucciones. La dósis es de cuatro á seis diarias.

PÍLDORAS STENICAS DE BROW.

De kermes mineral. . . . . XV granos.
De opio puro . . . . . } a. X idem.
De muriate dulce de mercurio . . }
De bálsamo del Perú q. s.

Para hacer píldoras de un grano de las que se toman una ó dos por la mañana é igual cantidad á la tarde.

El Dr. Brow aconseja estas píldoras en la tísis pulmonal, la hidropesía y el asma.

PÍLDORAS INCISIVAS PECTORALES DE BUCHAN.

De cebolla albarrana seca. . . . . }
De goma amoniaco. . . . . } a. II dracmas.
De granos de cardomomo . . . . . }
De jarave comun q. s. para píldoras de cuatro granos.

Se dán tres ó cuatro de estas píldoras, dos ó tres veces al dia en la tisis incipiente.

PÍLDORAS DE KEYSER

De acetate de mercurio. . . . . II onzas.
De azucar. . . . . VI idem.
De goma arábiga . . . . . I idem.
De malvavisco en polvo . . . . . } a. IV dracmas.
De almidon . . . . . }

De mucilago de goma arábiga q. s.

Háganse píldoras de un grano que se envolverán en azucar.

La dósis es de dos á cuatro diarias, en las enfermedades sifilíticas.

PÍLDORAS MERCURIALES DE RENOU.

De mercurio destilado . . . . . V dracmas.

De aloes sucotrino. . . . . V dracmas.
De ruibarbo. . . . . III idem.
De escamonea . . . . . II idem.
De agárico blanco . . . . . I idem.
De sasafrás. . . . . } a. I escrúpulo.
De canela. . . . . }
De macias . . . . . }
De miel de narbona q. s.

Convienen estas píldoras en las enfermedades de la piel, son un poco purgantes, La dósis es desde doce hasta cuarenta y ocho granos.

PÍLDORAS MERCURIALES DE BRUGNATELLI.

De mercurio purificado. . . . . } a. I onza.
De conserva de rosas. . . . . }
De almidon. . . . . II idem.

Apáguese el mercurio en la conserva, agréguese si hay necesidad un poco de mucilago, únase á él el almidon y divídase la masa en cuatrocientas ochenta píldoras iguales.

Cada cuatro granos contienen uno de mercurio.

Se dán en las enfermedades sifilíticas.

PÍLDORAS MERCURIALES DE PLENK.

De mercurio destilado. . . . . I dracma.
De mucilago de goma arábiga. . . VI idem.

Apáguese exactamente el mercurio y en seguida agréguese.

De extracto de cicuta. . . . . I idem.

Háganse píldoras de dos granos.

Se dán cuatro á seis de estas píldoras al dia, en las enfermedades venereas.

PÍLDORAS MERCURIALES DEL Dr. SEDILLOT AINE.

De pomada mercurial. . . . . III onzas.
De jabon medicinal. . . . . II idem.
De almidon ó polvo de regalis. . . I idem.

Mezclése y háganse píldoras de cuatro ó seis granos.

Se toman dos ó tres cada dia en las enfermedades venereas graves.

PÍLDORAS MERCURIALES DE CADET.

De mercurio fluido y purificado. . II onzas.
De trementina . . . . . }
De flores de azufre. . . . . } a. II dracmas.
De goma guta . . . . . }
De maná en lágrimas . . . . . I onza.
De jalapa en polvo. . . . . IV idem.
De jarave de espino serval s. q.

Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se dán estas píldoras á la dósis de tres á seis cada dia, en las afecciones venereas ó herpéticas.

PÍLDORAS DE QUARIN CONTRA EL ASMA.

De esponja marina calcinada . . . . IV dracmas.
De extracto de fumaria. . . . . }
De goma amoniaco . . . . . } a. II idem.
De flores de azufre. . . . . }
De sulfure de antimonio. . . . . I idem.

Hagánse píldoras de tres granos.

Se toman seis y por grados hasta diez ó doce tres veces al dia.

Conviene especialmente en el asma causada por las escrófulas ó en el asma húmeda.

PÍLDORAS ANTI-EPILEPTICAS INGLESAS.

De nitrate de plata. . . . . I grano.
De miga de pan. . . . . I dracma.

Mezclése exactamente y divídase en veinte píldoras de modo, que cada una no contenga mas que la vigésima parte de grano.

Se dá una solamente.

PÍLDORAS DE QUARIN CONTRA LA EPILEPSIA.

De raiz de valeriana silvestre . . . VI dracmas.

De gálvano. . . . . } a. I½ dracma.
De sagapeno. . . . . }
De asa fetida. . . . . I idem.

Háganse píldoras de tres granos.

Se dán de dos á cuatro á las mugeres histéricas que padecen abscesos de epilepsía.

PÍLDORAS BLANCAS DE BARTHEZ.

De jalapa . . . . . ½ onza.
De azafrán de marte . . . . . II dracmas.
De muriate de mercurio dulce. . . ½ idem.
De cochinillas. . . . . II escrúpulos.
De jarave de cinco raices q. s.

Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se dán dos de estas píldoras al dia en las enfermedades escrofulosas.

PÍLDORAS CARMINANTES DEL MISMO.

De asa fétida. . . . . II dracmas.
De aloes sucotrino . . . . . }
De sal de marte. . . . . } a. I idem.
De gengibre en polvo . . . . . }
De elixir de propiedad q. s.

Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se dán cuatro ó cinco todas las tardes al tiempo de acostarse el enfermo.

PÍLDORAS ANTHELMINTICAS DE SCHMUCHER.

De semillas de cevadilla. . . . . } a. IV dracmas.
De miel. . . . . }
De aceite volatil de hinojo. . . . IX gotas.

Háganse píldoras de cinco granos.

La dósis es para los adultos de seis de mañana y tarde, para los niños una ó dos.

PÍLDORAS ANTI-CAQUECTICAS DE HAEN.

De jabon medicinal. . . . . IV dracmas.

*

De goma amoniaco . . . . . III dracmas.
De la masa de píldoras de rufo. . ½ idem.
De tintura de mirra q. s.
Se hacen píldoras de tres granos.

Se dán cuatro cada tres dias en la palidéz del rostro y supresion de los menstruos.

PÍLDORAS STOMAQUICAS DE SMITH.

De resina de aloes sucotrino. . . .
De sagapeno. . . . . } a. I dracma.
De ruibarbo en polvo. . . . . .
De polvos de diaromatón. . . . .
De aceite esencial de yerbabuena . } a. X gotas.
De clavo de comer. . . . . .
De bálsamo líquido del Perú q. s.
Háganse píldoras de á cuatro granos.

Se dán tres ó seis de estas píldoras todas las tardes en la dispepcia é indigestiones.

PÍLDORAS TÓNICAS DEL Dr. HULN

Ó PILDORAS DE MOSCOU.

De extracto de raiz de columbo. .
De raiz de genciana. . . . . } a. II dracmas.
De leño de quasia. . . . . .
De hiel de buey. . . . . .
De polvo de genciana q. s.
Divídanse en píldoras de á cuatro granos.

Se dá este remedio á la dósis de una ó dos píldoras inmediatamente despues de comer. Se bebe encima una taza de infusion de quasia fria.

Conviene en las debilidades de estómago y digestiones trabajosas.

PILDORAS CUPREAS DE SWEDIAUR.

De sulfate de cobre amoniacal . . XVI granos.
De miga de pan . . . . . IV escrúpulos.
De carbonate de amoniaco líquido q. s.

Se divide la masa en 86 píldoras. Cada píldora debe contener una sexta parte de grano de sal de cobre.

Se dán dos ó tres diariamente en la epilepsia y en las enfermedades rebeldes.

PILDORAS DEL Dr. SANTA MARIA PARA TERMINAR LA GONORREA.

De conserva de rosas encarnadas.	IV onzas.
De sangre de drago.	IV dracmas.
De muriate de mercurio dulce. . .	I idem.
De bálsamo de copaiba.	I onza.

M.

Se dá media dracma dos veces al dia, se puede aumentar hasta dos escrupúlos en las personas robustas. El uso del agua acerada ó cortada con un cuarto ó una mitad de buen vino, en las principales comidas favorece perfectamente los efectos de este remedio.

PILDORAS DE QUARIN.

Para terminar las gonorreas.

De goma arábiga	IV dracmas.
De almásiga en lágrimas	II idem.
De extracto de tormentila.	I idem.
De trementina cocida q. s.	

Hágase píldoras de á cuatro granos.

Se toman de cinco á seis por la mañana, é igual número á la tarde.

PILDORAS ANTI-HISTÉRICAS DEL Dr. SELLE.

De gálbano.	a. IV dracmas.
De asa fétida.	
De extracto de angélica.	
De castor.	a. I idem.
De azafrán	
De opio.	½ idem.

C. s. q. de esencia de castor; háganse píldoras de á dos granos.

Se pueden dar desde cinco hasta ocho antes y despues de comer en los espasmos histéricos.

PÍLDORAS BÁLSAMICAS DE BOHERHAVE.

De mirra. . . . . II dracmas.
De esperma de ballena. . . . . IV idem.
Mezclése exactamente y agréguese.
De trementina de chió. . . . . IV idem.
De polvo de oliváno q. s. para hacer píldoras de tres granos.

Se toma una cada tres horas en la tisis pulmonal.

PÍLDORAS TARTÁREAS DE SCHRODER.

De extracto seco de aloes preparado con el ácido tartaroso . . . . . } IV onzas.
De goma amoniaco en lágrimas . . I½ idem.
De sulfate de fierro. . . . . } a. IV dracmas.
De extracto de azafrán. . . . . }
De acetate de potasa. . . . . I onza.
De extracto de genciana . . . . . VI dracmas.
De tintura de fierro tartarizada. q. s.
Háganse píldoras de á seis granos.

Se prescriben estas píldoras en las fiebres intermitentes, la ictirecia, la clorosis y las obstrucciones.

La dósis es de cuatro á ocho. Purgan ligeramente.

PÍLDORAS DEL Dr. DUPUY CONTRA EL HIDROTORAX.

De polvos de digital purpúrea. . . . } a. I dracma.
De asa fétida. . . . . }
De extracto de trebol de agua. . . } a. I½ idem.
De polvo de cebolla albarrana . . . }

Mezclése exactamente y háganse ciento ocho píldoras.

El enfermo tomará cuatro á la mañana y cuatro á la tarde.

Se auxilia el efecto de estas píldoras, con una bebida de parietaria nitrada, y á veces se le hace mas activa agregándole tres veces al dia media onza de oximiel scilítico.

PÍLDORAS ANTI-ICTERICAS DEL Dr. GOEROLT.

De calomelanos. . . . . I dracma.
De extracto de saponaria. . . . . II idem.

Mézclense, y háganse setenta y dos píldoras, de las que tomará el enfermo una ó dos diariamente.

POMADA ANTI-OPHTÁLMICA DE M. DESAULT.

De oxide rojo de mercurio . . . .
De óxide semividrioso de plomo. . . } a. I dracma.
De tucia preparada. . . . . .
De alumbre calcinado. . . . . .
De muriate sobre oxigenado de mercurio. . . . . } XII½ granos.

Mezclése todo sobre el porfido, incorpórese con la s. q. de unguento rosado, ó con cerato no lavado. Se puede colorar la pomada con

Cinabrio. . . . . I onza.

Nota. Para aplicar convenientemente esta pomada en las enfermedades de los ojos y los hérpes, es necesario leer lo que M. Alibert dice á cerca de la teoría de las ophtalmias. (Véase su tratado de materia médica.)

POMADA DE LEON PARA LOS OJOS.

De unguento rosado. . . . . I onza.
De oxide de mercurio rojo. . . . . ½ dracma.

Se extiende ligeramente esta pomada sobre el borde de los parpados engurgitados que trasudan un humor mucoso y que se pegan durante el sueño.

POMADA OPHTÁLMICA DE JANIN.

De unto sin sal. . . . . IV dracmas.
De tucia. . . . . } a. II idem.
De bolo arménico. . . . . }
De precipitado blanco. . . . . I idem.

Se lava muchas veces el unto sin sal en el agua de

rosas y se mezcla exactamente en un mortero de vidrio, las drogas bien pulverizadas.

POMADA DE GRANDJEAN.

De unguento populeon. . . . . I½ libra.
De cera amarilla. . . . . IX onzas.
De aceite de olivas. . . . . I libra.
De cantáridas. . . . . XII dracmas.

F. S. A. Una pomada.

Esta pomada es epispástica, se le aplica tras de las orejas para atraer la fluccion que se presenta en los ojos.

POMADA DEL Dr. FABRE.

De enjundia. . . . . I onza.
De muriate de amoniaco . . . . . I dracma.
De emético. . . . . ½ idem.
De alconfor . . . . . XXV granos.
De almizcle . . . . . s . X idem.

Tritúrese con cuidado.

Se emplea esta pomada en los infartos indolentes del hígado, y otras obstrucciones análogas.

Se hacen fricciones con ellas sobre la region del hígado. Se empieza por la cuarta parte de una dracma y se aumenta sucesivamente segun el grado de sensibilidad de la piel.

POMADA OXIGENADA DE ALION.

De enjundia . . . . . I libra.
De ácido nítrico. . . . . ½ onza.

Derrítase la enjundia y agréguese poco á poco el ácido agitándolo con celeridad. Póngase al fuego la mezcla hasta la ebulicion. Déjese resfriar.

Esta pomada es anti herpética.

POMADA MERCURIAL.

Con la manteca de cacao.

De mercurio purificado . . . . . } a. I onza.
De manteca de cacao muy reciente. . }
De aceite de huevo idem. . . . . XX gotas

Esta pomada cuya formula es debida á M. Planche, y cuya preparacion está descripta cuidadosamente en el diario de Farmacia Coct. 1815 pág. 453, es muy útil para las fricciones, no se enrancia y tiene un olor muy agradable.

POMADA MERCURIAL DE CIRILLO.

De muriate sobre oxigenado de mercurio. . . . . } I dracma.
De enjundia . . . . . I onza.

Mezclése y triturese en un mortero de vidrio por espacio de seis ó diez horas, á la última hora agreguese.

De muriate de amoniaco en polvo. . X granos.

Se hacen frieciones con esta pomada en las plantas de los pies, á la dósis de una dracma; pero es necesario que el enfermo no se haya debilitado mucho antes de tomar este remedio.

POMADA DE LA CONDESA Ó POMADA VIRGINAL.

De agallas de roble . . . . . .
De nueces de ciprés. . . . . } a. II dracmas.
De cascaras de granadas . . . . .
De hojas de mirra. . . . . .
De sumaque. . . . . } a. III idem.
De sulfate de sinc . . . . . IV idem.

Pulvericense estas sustancias separadamente, mézclense y pásense por un tamiz muy fino, incorpórese con la s. q. de unguento rosado.

Otros prescriben la conserva de rosas en lugar del unguento; pero entonces debe llamarse á esta preparacion opiata, y no pomada.

Se emplea esta preparacion abstringente para constringir los orificios muy dilatados.

POMADA DE LA SULTANA.

De cera blanca. . . . . III dracmas.
De esperma de ballena . . . . . I onza.
De aceite de almendras dulces. . II idem.
De bálsamo de la meca . . . . . XII gotas.

De leche virginal en agua de rosas. I dracma.

Se derrite la cera y la esperma de ballena, se pone el todo en un mortero de marmol y se le agréga la leche virginal y el bálsamo, y se bate hasta que la pomada quede muy blanca.

Ablanda la piel y quita el rubor de ella.

POMADA DE TURBIT DEL Dr. ALIBERT.

De turbit mineral. . . . . II onzas.
De manteca de puerco. . . . . II libras.

Se reduce á polvo muy fino el turbit mineral, se derrite la manteca á un dulce calor, se incorpora con ella el polvo, y se le remueve con la mano del mortero hasta que se enfrie completamente la grasa, se le pone en un bote de loza y se conserva para el uso.

Esta pomada ha producido algunas ventajas en algunos hérpes. (1)

POMADA ANTI-PSORICA DEL Dr. ALIBERT.

De sub-carbonate de potasa. . . . I onza.
De flores de azufre. . . . . II idem.
De manteca de puerco. . . . . IV idem.

Triturense primero la potasa y el azufre, agréguese despues la manteca y mézclese exactamente.

POMADA DEL Dr. BOTER.

De jugo de siempre viva. . . . .
De enjundia lavada. . . . . } a. III onzas.
De aceite de almendras dulces . . IV idem.
F. S. A.

Esta pomada es dulcificante y refrigerante, calma las irritaciones de la piel.

---

(1) *Vease la obra del Dr. Alibert sobre las enfermedades de la piel observadas en el hospital de S. Luis ó Hérpes.*

POMADA DEL Dr. AUTENRIETH.

Contra la coqueluche.

De tartrite de potasa antimoniado. V partes.
De enjundia. . . . . XVI partes.

Se toma de ella un volumen igual al de una avellana y se hace una friccion sobre el epigastrio. Sobrevienen sobre la parte frotada unas pústulas semejantes á la viruela volante, pero el Dr. Autenrieth asegura que con este remedio han cesado los mas tenaces romadizos.

POMADA ANITI-PSORICA DEL Dr. THOMANN.

De polvo de carbon recientemente preparado . . . . . } II dracmas.
De manteca fresca. . . . . } a. III onzas.
De enjundia. . . . . }

Se tritura hasta que la mezcla sea íntima. Despues que se haga tomar un baño tibio al enfermo, se le frota la mañana siguiente con dos dracmas de esta pomada: despues se le lava con una disolucion de jabon tibia. El dia siguiente se hace una nueva friccion, y al fin de cinco á seis dias debe extinguirse la sarna.

POMADA DE THIERRY.

De unguento populeon . . . . . VIII onzas.
De basalicon . . . . . III idem.
De cera amarilla . . . . . II idem.

Derritase el todo, muevase, y agréguese.

De cantáridas bien pulverizadas . . IV draemas.

Esta pomada es epispastica y sirve para reanimar los vejicatorios.

POCION DIURÉTICA DE Mr. HALLER.

De agua de las tres nueces. . . . IV onzas,
De agua destilada de yerbabuena . I idem.
De oximiel scilítico. . . . . IV dracmas,

M. S. A.

*

Se dá al enfermo una cucharada cada hora.

POCION DEL Dr. AUDRY.

De mercurio crudo . . . . . VI granos.
De agua de rosas. . . . . } a. I onza.
De jarave de adormideras. . . . }
De agua de azahar. . . . . II idem.

Apáguese el mercurio en el jarave y mézclese en seguida con el agua.

Se dá una cucharada mañana y tarde en la cardialgía gastrodinia y los vómitos espasmódicos.

POCION BALSÁMICA DE CHOPPART.

De agua destilada de yerbabuena. .
De alcohol. . . . . } a. II onzas.
De bálsamo de copaíba. . . . . .
De jarave de culantrillo. . . . . .
De agua de azahar. . . . . } a. I dracma.
De espíritu de nitro dulce . . . .

M.

Tómense dos cucharadas por la mañana, otra al medio dia, y otra á la tarde, contínuese su uso por doce dias.

Conviene este remedio en la blenorrágia, en la leucorrea y gonorrea sifilítica aun en el periodo agudo. El enfermo debe mover la botella cada vez que quiera usarla.

POCION DE HIPECACUANA DE HALLER.

De hipecacuana en polvo. . . . . I½ dracma.
De cortezas de naranjas. . . . . I idem.
De cremor de tártaro. . . . . XXXVI granos.

Hiervánse en cuatro onzas de agua de fuente, cuéle se y agréguese á la coladura media onza de oximiel scilítico.

Se dá esta pocion á cucharadas en las indisposiciones gástricas, en la ictericia, fiebres intermitentes, en el asma, la tos estomacal y en la hidropesía.

POCION DIURETICA DE BUCHAN.

De cocimiento de cebada. . . . . ½ azumbre.
De jarave de malvavisco . . . . . XI onzas.
De aceite de almendras dulces . . IV dracmas.
De nitrate de potasa. . . . . IV onzas.
M.

Se dá á tazas de cuatro á cuatro horas en la disuria ó en la estranguria.

POCION DE Mr. JEANROY CONTRA EL COQUELUCHE.

De raiz de hipecacuana. . . . . I onza.
De hojas de sén . . . . . II dracmas.

Infúndase en una pocion de agua hirviendo, cuélese y agréguese.

De oximiel scilítico . . . . . } a. I onza.
De jarave de hisopo . . . . . }

Se dá esta pocion á los niños á la dósis de seis cucharadas de café, en el espacio de la mañana.

POCION ANTI-SCORBUTICA DEL Dr. FRANCK.

De cocimiento de quina. . . . . V onzas.
De extracto de quina. . . . . VI dracmas.
De agua espirituosa de canela. . . II onzas.
De jarave de adormideras blancas. . I idem.

Tómese á cucharadas de media en media hora.

Se usa esta pocion cuando el escorbuto ha llegado á un alto grado.

POCION LAXANTE DE VIENA.

De hojas de sén. . . . . VI dracmas.
De pasas de corinto . . . . . } a. II escrúpulo.
De polipodio. . . . . }
De cilantro. . . . . ½ dracma.
De cremor de tártaro. . . . . I idem.
De maná en lágrimas. . . . . I onza.
De agua . . . . . X onzas.

Reduzcánse á seis.

Esta pocion purga muy bien.

POCION CONTRA LA AFO-NIA DEL Dr. MONGENOT.

De té . . . . . } a. II dracmas.
De yedra terrestre. . . . . }
De flores de gordolobo . . . . . I idem.
De iris de Florencia. . . . . II escrúpulos.

Echense sobre el todo seis onzas de agua hirviendo, déjese en infusion hasta que se resfrie cuélese y agréguese.

De rom . . . . . } a. I onza.
De jarave de jaramago . . . . . }
De jarave de tolú . . . . . IV dracmas.
De tintura de canela. . . . . I escrúpulo.

Se toman dos cucharadas de esta pocion cada dos horas en el catarro bronquinal, el asma, la afonia &c.

POCION CATARTICA DEL Dr. MENDÉ.

De sulfate de sosa . . . . . } a. IV dracmas.
De maná en lágrimas. . . . . }
De tartrite de potasa antimoniado. . II granos.

Disuélvase en cuatro onzas de agua destilada.

Agréguese en seguida.

De oximiel scilítico. . . . . I onza.

Se dá una cucharada cada dos horas.

POCION EMENAGOGA DE DESBOIS.

De agua destila de artemisa. . . . V onzas.
De azahar. . . . . IV dracmas.
De aceite esencial de ruda. . . . } a. VI gotas.
De sabina . . . . . }
De jarave de azahar . . . . . I½ onza.

Se toma á pequeñas cucharadas.

POCION DE QUARIN.

Contra la tos sufocante.

De oximiel scilítico. . . . . }
De aceite de almendras dulces . . } a. X dracmas.
De jarave de malvavisco . . . . . }

De goma amoniaco. . . . . I dracma.
De yema de huevo q. s.

Despues de haber mezclado estas sustancias con toda exactitud agréguese.

De agua de hisopo. . . . . VI onzas.

La dósis es una onza cada tres ó cuatro horas.

POCION DE HUFELAND.

Contra las hidropesías spasmódicas.

Hiérvanse cuatro dracmas de raiz de scila en diez onzas de agua de fuente que se disminuirá por la ebulicion, hácia el fin agréguese.

De polvo de raiz de valeriana. . . II dracmas.

Cuélese la decoccion y agréguesele.

De goma resina de guayaco en polvo. II idem.
De mucilago de goma arábiga. . . III idem.
De tintura ácre de antimonio. . . . II idem.
De laúdano líquido de sydehan. . . XX gotas.
De espíritu de nitro dulce . . . . II dracmas.
De corteza de naranja . . . . . I onza.

Se dá una cucharada de dos en dos horas.

POCION DEL Dr. ANDRY.

Contra los envenenamientos por los ácidos minerales.

De agua comun. . . . . IV onzas.
De jarave de altea . . . . . I idem.
De magnesia. . . . . I dracma.
De jabon medicinal. . . . . III idem.

Se dán tres cucharadas al enfermo cada 7 minutos.

Cuando han calmado los vómitos, se dá un lohc hecho con aceite de almendras dulces, jarave de altea, goma arábiga, magnesia y agua destilada.

POCION CONTRA EL COQUELUCHE

POR EL Dr. ROBERT-THOMAS DE SALISBURY.

De acetate de plomo cristalizado. . De II á V granos.

De agua de rosas. . . . . II onzas.
De jarave de violetas. . . . . II dracmas.
M. S. A.
Se dá una cucharada de cuatro en cuatro horas.

POCION CONTRA LA TENIA.

De aceite volatil de trementina . . III onzas.
De miel. . . . . VI dracmas.
De agua destilada de yerbabuena. . III idem.
M.
Se toma la tercera parte de esta bebida, en la mañana, y los otros dos tercios algun tiempo despues.

POCION PURGANTE Y VERMIFUGA DEL Dr. MACARTAN.

De agua de menta piperita . . . . III onzas.
De aceite de ricino. . . . . II idem.
De jarave de culantrillo. . . . . IV dracmas.
De carbonate de potasa. . . . . I escrúpulo.

Se tritura primero en un mortero de vidrio el carbonate de potasa y el aceite de ricino, se le agrega en seguida el jarave y cuando está hecha la mistion se diluye con el agua de yerbabuena.

Se toma esta pocion en dos veces con media hora de distancia.

POCION ANTI-TETANICA DEL Dr. TOURNIER.

De almizcle puro. . . . . } a. I dracma.
De alcanfor . . . . . }
De agua de luce. . . . . II idem.
De infusion muy fuerte de flores de arnica. . . . . } IV onzas.

Hagáse una pocion que se tomará á cucharadas de bora en hora.

Se le pueden agregar dos, tres y hasta cuatro escrúpulos de nitro, segun el estado del aparato urinario.

Se dá esta pocion en el tetanos traumático.

POCION ANTI-NEFRITICA DEL Dr. WILLAMS.

NORFORD.

De decoccion de cebada perlada. . . II libras.
De goma arábiga . . . . . III onzas.
De agua de ballas de enébro compuesta (1). . . . . } II idem.
De jarave de altea . . . . . I½ onza.

Se dá la mitad de la dósis al dia en los cólicos nefríticos.

POCION COPAIBADA DADA POR WILLIS.

De bálsamo de copaiba . . . . . III onzas.
De aceite de enébro. . . . . XXX gotas.
De agua comun . . . . . VI onzas.
De alcohol . . . . . } a. I idem.
De jarave de altea. . . . . }
De mucilago de goma arábiga q. s.

La dósis es de dos cucharadas dos veces al dia.

Se administra esta mixtura como diurética en los casos de nefritis crónica, y como detersiva contra las úlceras de la uretra.

POCION DE JUSIEU CONTRA LOS ESPUTOS CRUENTOS.

De agua de llanten. . . . . } a. II onzas,
De buglosa. . . . . }
De jarave de consuerda mayor. . . I dracma.
De esencia de rabel . . . . . III gotas.
De agua de azahar. . . . . ½ dracma.

M.

Hágase una pocion que se tomará en dos dósis.

---

(1) *Véase la farmacopéa de Londrés.*

POCION DE SPIELMANN CONTRA LOS DOLORES DE VIENTRE DE LOS NIÑOS.

De agua de yerbabuena destilada. .
De agua de manzanilla destilada. . } a. II onzas.
De jarave de flores de adormideras.
De jarave de manzanilla . . . . . } a. IV dracmas.

M.

Se dá esta pocion á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

POCION PURGANTE DEL Dr. ANDRY.

De agua de azahar. . . . . .
De jarave de flores de durazno. . . } a. I onza.
De espíritu de romero. . . . . I dracma.
De diagridio . . . . . VII granos.

Conviene esta pocion con especialidad, á las personas que tienen repugnancia á tomar medicamentos ordinarios compuestos de maná, sén, y sales.

POCION ANTI-EMETICA DE RIVERIO.

De carbonate de potasa. . . . . I escrúpulo.

Disuélvase en cuatro dracmas de agua de fuente.

Se le agréga al irlo á tomar el enfermo cuatro dracmas del zumo de limon y un poco de azucar blanca.

Algunos prefieren el jarave tartaroso.

Esta pocion calma los accidentes ocasionados por la gran violencia de los eméticos. (1)

---

(1) *M. Chaucier aconseja preparar la pocion emética del modo siguiente.*

De ácido tartárico en polvo . . . . I dracma.
De carbonate de potasa cristalizado y pulverizado . . . . . } II idem.
De azucar blanca en polvo . . . . I onza.

Mézclese exactamente para una dósis que se diluye en

POLVO ANTI-ARTRÍTICO DEL Dr. MARC.

De Rhododendrum Chrysantum (1). X granos.
De polvo de regalis. . . . . II dracmas.

Mézclese y divídase en diez partes.

Se dá este polvo á la dósis de un paquete en la mañana y otro á la tarde. Se aumenta diariamente un paquete hasta que se produzca un sudor abundante ó que se aumente la secrecion de la orina. Algunas veces hay necesidad de administrar hasta treinta granos por dia. Es digno de observarse que en muchos individuos que hacen uso de este remedio los sudores adquieren un olor aromático que se semeja al de estos polvos.

POLVO ANTI-PSORICO.

Hágase fundir el azufre en canuto, en un crisól. Cuando esté líquido agréguesele una décima parte de cal viva en polvo; remuévasele sobre una placa de bronce. Cuando esté frio y endurecido reduzcasele en polvo y pásesele por un tamiz de seda.

Se forma en esta operacion un sulfureto de cal y un oxide de azufre, si se le puede llamar asi al azufre rojo, próximo á pasar al estado de ácido sulfuroso.

Se usa este polvo del modo siguiente.

Los sugetos que tengan sarna cojerán un polvo (como cuando se coge un polvo de tabaco) lo echan en la pal-

---

un vaso de tipsana ó de agua destilada apropiada y se hace tomar en el instante ó bien.=

De ácido cítrico. . . . . I dracma.
De carbonate de sosa pulverizado. . . II idem.
De azucar blanca . . . . . I onza.

Puede tambien emplearse el ácido oxalico concreto y mezclado con diferentes carbonates alcalinosos terreos segun el objeto que se propone el médico.

(1) *Rhododendrum Chrysante planta perteneciente á la de candria monoginia crece en Siveria. Los rusos la emplean para la curacion de los hérpes, de la sarna del cancer, de las enfermedades venereas, y reumáticas, su uso no está todavia adaptado en Francia.*

*

ma de la mano izquierda, y echando dos ó tres gotas de aceite de olivas forman una especie de pomada, entonces con la palma de la otra mano hacen, por un frotamiento activo, penetrar esta mezcla en la piel. Se ponen despues unos guantes por espacio de una hora, despues de la que pueden lavarse las manos.

Esta simple aplicacion del polvo en las manos continuada mañana y tarde por diez ó doce dias basta para curarse la sarna cuando no está complicada.

Esta preparacion, que no ensucia la ropa, puede aromatizarse al agrado de los enfermos. Se debe agregar el uso de las bebidas apropiadas.

POLVO ARSENICAL DE JUSTAMOND.

De sulfate de antimonio. . . . . I onza.
De oxide blanco de arsénico . . . IV dracmas.

Mézclese y fundase en un crisol: cuando se resfrie la masa pulvericese y agréguesele.

De extracto de opio. . . . . II½ idem.

Se polvorean con esta composicion las escrecencias, las úlceras fungosas y rebeldes.

POLVO ANTI-CARCINOMATOSO DE F. COSME.

De cinabrio. . . . . II dracmas.
De cenizas de suelas viejas de zapatos. VIII granos.
De sangre de drago . . . . . XII idem.
De oxide blanco de arsénico . . . II escrúpulos.

Se mezcla y se hace un polvo muy fino.

Se empapa este polvo con un poco de agua y se extiende con un hisopo sobre las úlceras cancerosas que se tapan con un lienzo. Al fin de tres ó cuatro dias cae la escara.

POLVO ARSENICAL DE PLUNCQUET.

De renúnculo flammule . . . . . I onza.
De manzanilla hedionda . . . . . ½ idem.
De flores de azufre. . . . . I dracma.
De oxide blanco de arsénico. . . II idem.

Hágase un polvo muy fino.

Se mezcla una parte con un poco de clara de huevo y se empapan de esta mezcla las úlceras ó los carcinomas. Al fin de cuarenta y ocho horas cae la escara.

POLVO ANTI-SEPTICO DE SWEDIAUR.

De polvos de raiz de arnica montánica.
De quina . . . . . } a. partes iguales.
De alcanfor. . . . . .

M.

Se aplica sobre las úlceras rebeldes ó que están atacadas de gangrena.

POLVO DEL PRINCIPE.

Este polvo empleado en Inglaterra en las enfermedades sifilíticas y escrofulosas no es otra cosa que el mercurio precipitado per se, ó de otro modo el oxide rojo de mercurio perfectamente lavado y despojado de todo lo que pudiese contener de salino y de soluble tanto en el agua como en el alcohol.

Su uso es principalmente externo, se pone en uso para curar las úlceras sifilíticas, callosas ó fungosas y la optalmia crónica.

POLVO FEBRÍFUGO Y PURGANTE DE HERVECIO.

De quina.	IV dracmas.
De sulfate de potasa.	I onza.
De nitrate de potasa.	I dracma.
De azafrán	a. XII granos.
De goma guta.	
De diagridio	IV dracmas.
De tartrite acídulo de potasa. . .	XIV idem.
De emético	II idem.
De sulfureto rojo de mercurio . .	VI granos.
De jalapa.	II onzas.
De jugo de ajo	I idem.

Se da este polvo á la dósis de diez y ocho granos hasta media dracma en las fiebres intermitentes.

Se emplea tambien como vermífugo.

POLVO FEBRÍFUGO DE BOULLEMER.

De ojos de cangrejos . . . . . I dracma.
De muriate de amoniaco . . . . . ½ idem.
De mirra . . . . . I escrúpulo.

Se pulverizan y se mezclan estas sustancias, se les divide en tres partes iguales que tomará el enfermo en tres dias; la primera dósis dos horas antes del parosismo, la segunda la mañana siguiente á la misma hora, y al otro dia la tercera.

POLVOS DE GTMS Ó JAMES. (1)

De sulfate de antimonio. . . . . II dracmas.
De fosfate de cal calcinado. . . . I½ idem.
De nitrate de potasa. . . . . IV idem.

Se dan estos polvos en las fiebres adynamicas á la dósis de una ó una y media dracma.

POLVOS DE GRTMALDI.

De escamonea. . . . . II onzas y I dracma.
De oxide amarillo de fierro . . . II onzas y I½ dracma
De magnesia blanca. . . . . } a. IV dracmas.
De cremor de tártaro . . . . . }
De negro humo . . . . . VI idem.
De perlas finas preparadas. . . . } a. VIII idem.
De besár oriental . . . . . }

---

(1) *Esta fórmula se hizo despues de la análisis publicada por M. Pearion y despues de la de M. Pulles (análes de química, tomo 56, pág. 77); pero en el diario de medicina inglés se ha publicado ultimamente una fórmula del polvo de James que difiere mucho de las que he dicho. Es así.*

De antimonio diaforético bien lavado. . { *De XII á XXIV dracmas.*
De muriate dulce de mercurio sublimado seis veces . . . . . } *I dracma.*
Mezclese exactamente.

De aceite esencial de enebro . . .
De bálsamo de copaiba. . . . . } a. III dracmas.

Se dá este polvo á la dósis de cuarenta y ocho granos en las enfermedades de la piel y en ciertas fiebres.

POLVO CORROBORANTE DE WERLHOFF.

De corteza perubiana. . . . . ½ dracma.
De canela. . . . . VI granos.
M.

Hágase un polvo para una dósis.

Werlhoff lo hacia tomar á los convalecientes de las fiebres intermitentes.

POLVO CÁUSTICO DE KRUGER.

De muriate de mercurio sobre oxigenado . . . . . } a. X granos.
De sulfate de cobre . . . . . }
De nitrate de plata. . . . . VI idem.

Pulvericese y mézclese.

Se pone un poco de este polvo sobre las berrugas ó escrecencias sifilíticas que se quieren destruir, y se humedecen con un hisopo.

POLVO DEL CONDE DE WARWICK.

De diagridio sulfurado . . . . . II onzas.
De antimonio diaforético . . . . . I idem.
De cremor de tártaro. . . . . IV dracmas.
M.

Este polvo es purgante á la dósis de doce á veinte y cuatro granos.

POLVO ANTI-CATARRAL.
De la farmacopéa de Viena.

De goma arábiga . . . . . .
De regalis . . . . . } a. I escrúpulo.
De almidon . . . . . .

De iris de Florencia. . . . . } III dracmas I escrúpulo.
De flor de azufre . . . . . I dracma y I escrúp.
De azafrán oriental . . . . . I dracma.
De azucar. . . . . III onzas.

Se dá este polvo á la dósis de una ó dos dracmas.

POLVO VOMITIVO DE HERVECIO.

De emético. . . . . I onza.
De hipecacuana . . . . . IV dracmas.
De cremor de tártaro . . . . . VIII onzas.

Se trituran cuidadosamente estas tres sustancias mezcladas y se pasa la mezcla por un tamiz de seda.

Se dá á la dósis de diez y ocho granos para excitar el vómito sin sacudidas violentas. Á veces es purgante.

POLVO STOMAQUICO DE BIRCKMANN.

De raiz de aro . . . . . II onzas.
De cálamo aromático. . . . . } a. I idem.
De saxifraga. . . . . }
De piedras de cangrejos . . . . . IV dracmas.
De canela fina . . . . . III idem.
De sulfate de potasa. . . . . II idem.
De muriate de amoniaco . . . . . I escrúpulo.

Se dan de dos á cuatro dracmas en las debilidades de estómago ocasionadas por las saburras mucosas.

POLVOS PECTORALES DE WEDELIUS.

De raiz de orosur. . . . . } a. II dracmas.
De iris de Florencia. . . . . }
De flor de azufre . . . . . IV idem.
De ácido benzoico. . . . . I escrúpulo.
De azucar blanca. . . . . II onzas
De aceite volatil de anis. . . . . } a. X gotas.
De hinojo. . . . . }

Mézclese y hágase un polvo.

En los catarros neumonicos crónicos, se dan uno ó dos escrúpulos.

POLVO OLOROSO DE INGLATERRA.

De canela. . . . . II onzas.
De semillas de cardomomo . . . .
De raiz de gengible . . . . . } a. I onza.
De nuez noscada. . . . . .

Mezclese y hágase un polvo.

Se dan de cinco á veinte granos en la dispeccia sin calor, las flatuosidades, eructos y la astenia general.

POLVO ANTI-CAQUECTICO DE HARTMANN.

De carbonate de fierro. . . . . IV dracmas.
De canela. . . . . I½ onza.
De azucar. . . . . II idem.

Se dá este polvo desde media hasta dos dracmas en la caquexia.

Conviene con especialidad en la caquexia mucosa.

POLVO ANODINO DE HERVECIO.

De opio. . . . . IV dracmas.
De mirra . . . . . I½ libra.
De cascarilla . . . . . I idem.
De bolo arménico . . . . . IV onzas.
De canela. . . . . I libra.
De coral rojo preparado . . . . . IV onzas.

Se prescribe en las disenterias, en los cólicos de estómago, en las pleuresias. La dósis es desde diez y ocho granos hasta dos escrúpulos.

Con respecto á la disenteria no se debe emplear este polvo ni al principio ni en el estado de esta enfermedad, y si solo hacia el fin.

POLVO DE HALT.

De semillas de membrillos . . . .
De adormideras blancas. . . . . } a. I dracma.
De almidon. . . . . .
De almendras dulces peladas . . . II idem.
De azucar cande. . . . . VI idem.

De goma arábiga . . . . . } a. I dracma.
De tragacanto. . . . . }
De orosur. . . . . ½ idem.

Hágase un polvo y mézclese bien.

Se dá en los esputos de sangre, en las diarreas y debilidades de estómago. La dósis es desde media dracma á dracma y media en el dia.

Este polvo no se puede conservar largo tiempo: solo debe prepararse la cantidad que se ha de usar en pocos dias.

POLVO SEDATIVO DE WETZLER.

De polvos de raiz de belladona . . I escrupulo.
De azucar en polvo. . . . . } I dracma y I escrúpulo.

Mézclese exactamente y divídase en ochenta y seis tomas.

Cada toma contiene la cuarta parte de un grano de la belladona.

Este remedio es mirado por Mr. Schaeffer, Mr. Hufeland, y Mr. Wetzler como un específico en el coqueluche de los niños. Mr. Maré que lo ha usado con suceso en París cita treinta y cinco curaciones de esta enfermedad obtenidas de ocho á quince dias.

Se administra este polvo á la dósis de una toma mañana y tarde á los niños de menos de dos años y de cuatro tomas para los niños de tres á cuatro años y de seis á los de cuatro á seis. Se va aumentando por graduacion de modo que la dósis para los niños de mas edad sea de doce tomas en veinte y cuatro horas, quiere decir de grano y medio de belladona.

Este remedio produce tambien buen efecto en la tos nerviosa de los adultos.

POLVO DE ANTIMÓNIO MARCIAL DIAFORÉTICO DE KEUP.

De limaduras de fierro. . . . . } a. VIII onzas.
De sulfate de antimonio nativo. . . }

Muélase, mézclese y póngase en un crisol á fuego rojo y muévase con una espátula de fierro hasta que tomen la exterioridad de escoria, apártese del fuego y cuando esté fria

la masa muélase nuevamente con tres veces su peso de nitro seco y échese á cucharadas el polvo en un crisol escandecente, cuando la combustion y calcinacion se hayan terminado, póngase este material en la s. q. de agua para disolver las sales que contiene.

Los óxidos se precipitan bajo la forma de un polvo amarillo. Se agrega una gran cantidad de agua para hacerla mas ligera y separar lo mas pesado de lo mas sutil. Recojida esta última por el filtro se seca con cuidado.

Se dá á la dósis de cinco á seis granos en la caquexia, la ictericia y en la debilidad de los intestinos.

POLVO INCISIVO DEL Dr. MONGENOT.

De emético	I grano.
De kermes.	II idem.
De iris de Florencia.	I escrúpulo.
De azucar . . . . . }	a. I dracma.
De goma arábiga . . . . . }	

Divídase en veinte y cuatro tomas, se dá una de media en media hora.

En las afecciones catarrales con sofocacion por defecto de esputos ó por atonia.

POLVO TEMPERANTE LAXATIVO DEL Dr. BOUILLON DE LA GRANGE.

De nitro bien pulverizado.	III libras.
De ácido boracico	I idem.
De tartrite de potasa.	IV$\frac{1}{2}$ idem.

Mézclense estas tres sustancias y pásense al través de un tamiz de seda muy fina.

Para una pinta de agua se toman.

De sulfate de sosa esflorecido . .	II$\frac{1}{2}$ dracmas.
De polvo atemperante dicho arriba. .	$\frac{1}{2}$ idem.

Se funde y se filtra.

Nota. Si los farmaceúticos quieren preparar este agua mineral, pueden servirse del sulfate de sosa ordinario.

Entonces se ponen para una pinta de agua.

De sulfate de sosa.	VI dracmas.
De polvo temperante laxativo. . . .	$\frac{1}{2}$ idem.

*

Se emplea con suceso este polvo en las enfermedades linfáticas y otras donde se lleva intencion de dividir los humores sin irritar mucho el canal intestinal.

Un paquete ó papel de estos polvos disuelto en una pinta de agua y tomado en cuatro vasos con media hora de distancia purga convenientemente.

A la dósis de un vaso cada mañana, se le emplea con suceso en algunas afecciones catarrales y en ciertas detenciones de orina.

POLVO DE TUNQUIN REUSS.

De almizcle	XVI granos.
De raiz de valeriana en polvo. . .	I escrúpulo.
De alcanfor	VI granos.

Hágase un polvo.

Se dá á la dósis de doce granos en las enfermedades convulsivas, histéricas, epilépticas, espasmódicas, en la mania é hidrofobia.

POLVO DE ROSENSTEIN PARA LAS NODRIZAS.

De magnesia inglesa.	I onza.
De cortezas de naranja en polvo. . }	a. I dracma.
De semillas de hinojo en polvo. . . }	
De azucar blanca.	II idem.

Mézclese exactamente y divídase en tomas de una dracma.

Se dán dos ó tres por dia. Este polvo aumenta la leche en las nodrizas, impide que se agrie y facilita las digestiones.

POLVO FEBRIFUGO DE JUNCKER.

De azufre dorado de antimonio. . .]	
De magnesia . . . . . }	a. I½ dracma.
De sulfate de potasa . . . . . .]	

Divídase este polvo en cuatro partes que se tomarán á iguales distancias durante la apireccia.

Estos polvos recomendados por Unzer (dez. Arzt. XII pág. 106) como suplentes á la quina, no producen otro efecto sensible que el de disminuir y en fin hacer cesar la fiebre; y si

este efecto no se consigue al cabo de algunos dias, es indicio de que hay necesidad de recurrir á los evacuantes, como en los casos en que se administra la quina muy pronto. En seguida se vuelve al uso de los polvos antifebriles. (1)

POLVOS DE SCILA COMPUESTOS DE STALL.

De escamas de scila recientes . . .
De raiz de asclepias vencetosigo. . .
} a. I½ dracma.

Contúndase la scila en un mortero de marmol, cuando se haya reducido á pulpa, agréguese el polvo de asclepias. Deséquese el todo á la estufa; pulvericese de nuevo, y pásese por tamiz.

Se dá este polvo á la dósis de 3 á 5 granos en el asma; la hidropesía, y el catarro pulmonal crónico.

POLVO DEL CONDE DE PALMA.

De polvo de sentinelli. . . . . .
De polvo de valentini. . . . . .
De polvo de zwinger. . . . . .
De panacéa inglesa. . . . . .
} Segun la indicacion.

Se aconseja bajo estos diferentes nombres el uso del carbonate de magnesia.

POLVO VERMIFUGO DE BRUGNATELLI.

De estaño de Málaga en limaduras. III onzas.
De azufre sublimado . . . . . I idem.

Fúndase esta mezcla en un crisol sobre carbones ardiendo hasta que se presente una llama muy viva: apártese del fuego el crisol, cubrásele, déjesele enfriar, pulvericese y tamícese el sulfureto. Consérvesele en una vasija de vidrio.

Se dá este polvo sea solo ó mezclado con azucar ó magnesia. Se le prescribe á la dósis de media á una dracma cuatro veces al dia á las personas que tienen lombrices, ó la tenia.

---

(1) *Ensayo sobre los medios de disminuir el consumo de la quina por Mr. Lauth profesor de la facultad de Strasbourg.*

POLVO DE KINO COMPUESTO.

Farmacopéa de Londrés

De kino . . . . . I onza y II dracma.
De canela. . . . . IV dracmas.
De opio. . . . . I idem.

Pulverícese separadamente cada sustancia y mézclese.

Este polvo es stíptico y abstringente Contiene cuatro granos de opio en cada dracma. Se le prescribe á la dósis de un escrúpulo en las hemorragias internas.

POLVO DEL Dr. ODIER.

De oxido bismuto . . . . . I dracma.
De magnesia calcinada. . . . . } a. X idem.
De azucar. . . . . }

Hágánse papeles de veinte granos cada uno.

Se dá uno cada tres horas en la gastrodinia y la dispepsia. (Véase bibliot. medica, marzo 1816 pág. 366.)

POLVO DE GREDA COMPUESTO.

Farmacopéa de Londres.

De greda preparada. . . . . VIII onzas.
De canela. . . . . IV idem.
De raiz de tormentila. . . . . } a. III idem.
De goma acacia . . . . . }
De pimienta larga . . . . . IV idem.

Se pulveriza separadamente este polvo, y cada sustancia y se mezclan con exactitud.

Se prescribe este polvo á la dósis de seis á doce granos tres veces al dia en los embarazos mucosos del estómago y en las diarreas.

POLVO DE SCILA NITRADO DE VANHELMOT.

De escamas de scila desecadas. . . I dracma.
De raiz de asclepias vencetosigo . . V½ idem.

De nitrate de potasa purificado. . . { VII dracmas y I escrúpulo.

Se hace un polvo homogeneo y muy fino. Como que la scila aunque muy seca atraé con mucha facilidad la húmedad de la atmósfera, es necesario tener cuidado de hacer desecar el nitrate de potasa para quitarle una parte de su agua de cristalizacion.

Se prescribe este polvo á la dósis de doce granos dos veces al dia en la ascitis.

POLVO STIPTICO DE CORBATCH Ó ESPECÍFICO ABSTRINGENTE DE MAETZIO.

De disolucion saturada de muriate de fierro. . . . . } IV onzas.

Hágasele evaporar hasta la mitad, y agréguesele un peso igual de acetate de plomo seco, contínuese la evaporacion á un dulce calor hasta la sequedad; pulvericese y tamícese.

Es necesario preservar este polvo del contacto del aire porque atrae la húmedad.

Se le emplea interior y exteriormente para toda especie de hemorragias. Se dá interiormente á la dósis de cuatro á doce granos.

Es necesario administrar este remedio con mucho tino y precaucion, el plomo que contiene puede hacerlo muy dañoso.

POLVO DE PLUMMER.

De muriate dulce de mercurio. . . . } a. Partes iguales.
De azufre dorado de antimonio. . . }

Se toma á la dósis de cinco á seis granos por mañana y tarde bebiendo encima uno ó dos vasos de una decoccion de zarzaparrilla.

Conviene en las enfermedades sifilíticas y escrofulosas.

POLVO DE MERCURIO SACARINO DEL Dr. LAGNEAU.

De mercurio vivo. . . . . II dracmas,
De azucar blanca. . . . . IV idem.

Triturese hasta la extincion completa del mercurio y divídase en treinta partes iguales.

Se emplea en la sífilis de los niños ó de las personas delicadas, á los cuales se les dá en una taza de chocolate ó de café. La dósis es de diez granos.

POLVO VERMIFUGO PURGANTE DE BALL.

De ruibarbo . . . . . } a. I dracma.
De escamonea . . . . . }
De muriate dulce de mercurio . . }
De azucar muy fina . . . . . III idem.

La dosis para un niño es de diez á doce granos una ó dos veces por semana; para un adulto una dracma.

POLVO VERMIFUGO DE ESTAÑO.

De estaño réducido en polvo muy fino. I onza.
De etiope mineral. . . . . II dracmas.

Mézclese y divídase en seis tomas iguales.

Se dá una de estas dósis en un poco de jarave de miel ó de triaca dos veces al dia.

POLVO TÓNICO INCISIVO DEL Dr. LASSONE.

De kermes . . . . . II granos.
De hipecacuana. . . . . IV idem.
De carbonate de sosa. . . . . } a. XII idem.
De etiope marcial . . . . . }
De cachunde. . . . . }
De de canela . . . . . } a. I escrúpulo.
De iris. . . . . }
De polvo de regalis . . . . . I dracma.

Se usa este polvo en los embarazos gastricos del modo siguiente: despues de haber dividido la masa en veinte y cuatro ó treinta dosis se toman tres dosis con un trago de agua y un poco de hostia humedecida, dejando siempre de una á otra dosis un cuarto de hora de distancia.

El tiempo de tomarla es una ó dos horas antes de la comida.

POLVOS DE DOWER.

De sulfate de potasa. . . . . } a. I onza.
De nitrate de potasa. . . . . }
De hipecacuana. . . . . } a. II dracmas.
De opio desecado. . . . . }

Se usa en las reumas y dolores reumáticos desde medio, á un escrúpulo.

Este polvo es diurético, diaforético, calmante, y ligeramente purgante.

POLVO ANTI-ARTRÍTICO DE PERARD.

De semillas de cardo bendito. . . . } a. I onza y II
—De cartámo. . . . . } dracmas.
De cremor de tártaro. . . . . } a. IV dracmas.
De sén. . . . . }
De canela fina. . . . . I idem.
De escamonea. . . . . }
De raiz de zarzaparrilla . . . . . } a. II idem.
De palo de guayacán . . . . . }

Hágase un polvo s. a.

La dósis es una dracma todos los meses para evitar los ataques de la gota.

POLVOS DE QUARIN CONTRA LA TOS CONVULSIVA.

De flores de azufre. . . . . I dracma.
De goma arábiga. . . . . } a ½ idem.
De arquitira. . . . . }
De extracto de orozur. . . . . } a. II idem.
De azucar. . . . . }
De kermes mineral. . . . . De II á IV granos.

El enfermo tomará media dracma cada cuarto de hora.

POLVO DEL Dr. MARC.

Contra el coqueluche y el catarro nervioso.

De raiz de belladona en polvo . . III granos.

De polvo de orozur . . . . . I escrúpulo.
De azucar. . . . . I dracma.
Para doce tomas.

POLVO APERITIVO DEL Dr. SELLE.

De magnesia inglesa . . . . . } a. IV dracmas.
De cremor de tártaro. . . . . }
De flores de azufre. . . . . }
De ruibarbo en polvo. . . . . }
De flores de manzanilla en polvo . }
De oleo sacaro de hinojo . . . . }

Este polvo produce muy buenos efectos en las obstrucciones y debilidades de las víceras del bajo vientre con especialidad cuando hay una plétora abdominal. Como ellos producen el flujo hemorroydal, no se administran mas que en los casos en que este flujo puede ser útil. La dósis es de una cucharada de té que se dá diferentes veces al dia.

POLVOS DE LA PRINCESA CARIGNAN.

De visco cuercino. . . . . } a. I onza y III dracmas.
De raiz de dictamo blanco . . . . }
De cuerno de ciervo preparado. . . }
De raiz de peonia . . . . . } a. V idem.
De carbonate de amoniaco . . . . }
De succino preparado. . . . . II½ onzas.

Este polvo que se emplea en las convulsiones de los niños se dán en leche, en caldo ó en agua de azahar, la dósis es de 18 granos para un niño de un año ó menos, de treinta y seis para los de dos años, de dos escrúpulos para los de tres años, y de una dracma para los de cuatro años en adelante.

POLVO DE VERNIX.

De sulfate de sinc. . . . . } a. I onza.
De cobre . . . . . }
De alumbre calcinado . . . . . }
De cerusa. . . . . }
De tierra sellada. . . . . }

Se emplea este polvo exteriormente para contener la sangre.

POLVO DE KNOX.

De muriate sobre oxigenado de cal. . III partes.
De muriate de sosa pulverizado. . . VIII idem.

Se conserva este polvo en un frasco bien tapado, cuando se echan una ó dos onzas en un vaso de agua abandona bastante cantidad de gas ácido muriático oxigenado para hacerse un anti-contagioso muy útil; pero el desprendimiento sería mucho mas considerable si se echasen algunas gotas del ácido sulfúrico en el agua que tiene el polvo en disolucion.

Los ingleses la miran como un excelente preservativo del contagio sifilítico, por cuya razon la emplean en locion antes y despues del acto venereo.

POLVO CONTRA EL CANCER DE Mr. ROUSSELOT.

De sulfate de mercurio. . . . . I onza.
De sangre de drago . . . . . IV dracmas.
De oxide de arsénico . . . . . $\frac{1}{2}$ idem.

Se rocia éste polvo sobre las úlceras cancerosas, pero es necesario mucha moderacion en el empleo de este remedio, la aplicacion del arsénico al exterior no deja de tener su riesgo cuando en las partes donde se aplican hay vasos linfáticos absorventes, tales son los lugares afectados de cánceres.

POLVO CONTRA LA GASTRODINIA DEL Dr. ROBET THOMAS.

De oxide de bismuto. . . . . De III á X granos.
De goma tragacanto. . . . . I escrúpulo.
M.
Se repite esta dósis tres veces al dia.

PURGANTE DEL Dr. WILSON.

De vidrio de antimonio pulverizado. IV onzas.
De ácido sulfúrico concentrado. . . I libra.

*

Téngase en digestion la mezcla durante cuarenta y ocho horas.

Destílese en seguida al baño de arena y lávese el polvo que quede en la retorta hasta que haya perdido toda su acritud, hágasele secar, mézclese con un peso igual de sulfate de sosa y con el doble de sulfate de potasa. Póngase esta mezcla en un crisol. Téngasele en infusion un cuarto de hora y pulvericese en seguida.

Se dá esta preparacion en las enfermedades sifilíticas escrofulosas y herpéticas desde dos hasta diez granos.

Nota. Este procedimiento es defectuoso, pero yo debo presentarlo tal cual lo dá el autor.

RATAFIA DEL COMENDADOR DE CAUMARTIN.

Contra el mal de piedra.

De raices de gatuna.	a. II onzas.
De cynnorrhodon.	
De malvabisco.	
De grama nudosa.	
De cabezuela.	
De grande consuerda.	I onza.
De nuez noscada.	VI dracmas.
De semillas de anis.	I idem.
De ballas de enébro	I onza.
De aguardiente	X lib. y III onzas.
De azucar.	II id. y V dracmas.

Se maceran las raices en el aguardiente por quince dias, se cuela con expresion, se disuelve el azucar en el licor y se filtra.

La dósis es un pequeño vaso en la mañana y otro á la tarde. Se ayuda esta medicina con el uso de una infusion de hinojo marino.

RATAFIA DE LOS CARIBES.

De resina de guayaco.	II onzas.
De mistela.	III pintas.

Contundase la resina y póngase á digerir en la mistela durante quince dias.

Se emplea este remedio contra la gota á la dósis de media onza por dia.

Endulzando y aromátizando esta ratafia resulta un licor agradable.

REMEDIO DE MADAMA NOUFFER.

Contra la tenia ó lombriz solitaria.

La víspera en la tarde debe tomar el enfermo una sustancia de pan. En la mañana siguiente toma tres dracmas de helecho macho en polvo muy fino y diluido en tres onzas de tipsana del mismo helecho ó de flores de tilia; echa dos ó tres veces de la misma tipsana en el vaso para no dejar nada de polvos. Dos horas despues toma un bolo purgante compuesto.

De panacéa mercurial. . . . . } a. X granos.
De resina de escamonea. . . . . }
De goma guta. . . . . VI idem.
De confeccion de jacintos q. s.

Se divide esta cantidad en dos ó tres tomas que tomará con la distancia de un cuarto de hora, y encima una ó dos tazas de té.

Cuando el enfermo es niño se proporciona el bolo purgante á su edad.

REMEDIO ANTI-SIFILÍTICO Ó MERCURIO SOLUBLE DE HANEMANN MODIFICADO POR MOSCATI.

Pongase en una redoma de vidrio.
De muriate de mercurio. . . . . IV dracmas.
De disolucion de sosa cáustica . . IV onzas.

Colóquese la redoma sobre cenizas calientes, durante media hora, la sal, de blanca y cristalina, se pone negra, se oxida y empieza á reducirse en polvo.

Este mercurio oxidado ad minimum, se dá á la dósis de dos, cuatro, ó seis granos, ya en polvo ya en píldoras en las enfermedades venéreas. El Dr. Franch ha obtenido sucesos en casos desesperados asociandolo á la quina ó al opio, segun las circunstancias.

MERCURIO SOLUBLE.

Segun el método del profesor Moretti.

Se toman seis onzas de ácido sulfúrico concentrado

y cinco onzas de mercurio purificado, se ponen estas dos sustancias en una retorta de vidrio que se coloca en el baño de arenas, se le adopta un recipiente y se procede á la destilacion.

Se vá aumentando el fuego por grados hasta que no se desprendan vapores: es oportuno advertir que hácia el fin de la operacion el fuego debe ser un poco fuerte á fin de que todo el sulfate mercurial llegue al maximum de oxidacion. Concluida esta primera operacion se deja resfriar la vasija y se saca la sal de la retorta, se echa esta sal en un mortero de vidrio ó de marmol, y se tritura con otras cinco onzas de mercurio metálico hasta que se combine completamente.

Se hierve la masa pardusca que resulta con s. q. de lejía cáustica ó potasa pura disuelta en agua, despues se filtra el todo: si el oxide contiene aun un poco de sulfate de mercurio sin descomponer se le hace hervir de nuevo con la potasa, hasta que tomando una pequeña porcion del oxide de mercurio y haciendole hervir con el ácido acético se disuelva completamente en este ácido, entonces se lava bien el precipitado con el agua pura y se seca á la sombra.

REMEDIO CONTRA LA TENIA. (1)

De raiz de elecho macho. . . . . IV onzas.
De agua comun . . . . . III libras.

Hágase hervir hasta que la decoccion se reduzca á dos libras, y agréguese.

De jarave de coralina de Córcega . . II onzas.

Tal és la bebida de que hará uso el enfermo.

Tres horas despues de la comida tomará el bolo siguiente.

De muriate de mercurio dulce . . } a. II granos.
De cuerno de ciervo calcinado . . }
De conserva de rosas q. s.

En la tarde se dá una onza de aceite de almendras dulces, la mañana siguiente tomará el enfermo un purgante compuesto de

Escamonea en polvo . . . . . XVIII granos.
De raiz de elecho macho pulverizado. I onza.

---

(1) *Esta fórmula es extractada de los elementos de terapeútica y de materia médica del Dr. Alibert.*

De goma guta. . . . . } a. XIX granos.
De mercurio dulce. . . . . }

Este purgante se divide en tres tomas.

Se modifica el remedio segun la edad del enfermo y segun que la tenia resiste mas ó menos á su accion.

REMEDIO DEL Dr. BARLOW.

Contra la tiña.

De sulfureto de sosa reciente. . . III onzas.
De jabon medicinal . . . . . I½ dracma.
De agua de cal. . . . . VIII½ onzas.
De alcohol rectificado. . . . . II dracmas.

Mézclese exactamente y filtrése.

Se lava muchas veces la cabeza del enfermo con esta agua mañana y tarde, se le deja secar sin tocarle. Las costras se levantan, caen y dejan las partes subyacentes enteramente sanas: no hay necesidad de cortar los cabellos ó sajar la cabeza para hacer uso de esta agua.

REMEDIO DEL Dr. BICKER.

Contra la tiña.

De azufre dorado de antimonio. .
De mercurio dulce. . . . . } a. partes iguales.
De azucar blanca . . . . . .

Se dá este polvo á la dósis de medio á un grano mañana y tarde.

Se hacen igualmente fricciones mañana y tarde en las partes afectas con el unguento siguiente.

De cardenillo. . . . . }
De mercurio dulce . . . . . } a. I escrúpulo.
De pomada reciente . . . . . } X dracmas y II escrúpulos.

Las costras caen con prontitud frotandolas con una brocha ordinaria. Se lavan en seguida los niños con el agua tibia con un poco de jabon y del sulfureto de potasa. Se ordena una dieta conveniente.

Cuando ha desaparecido la tiña debe lavarse la cabeza durante largo tiempo, con una disolucion tibia del carbonate de potasa.

REMEDIO ANTI-SPÓRICO DEL Dr. JADELOT.

Este remedio es un baño sulfuroso muy análogo al del agua de Vallatria artificial, pero mas simple.

Se compone con el sulfureto de potasa seco ó líquido.

Si se emplea el sulfureto seco la proporcion es de gramma por arroba de agua, ó cuatro ó cinco onzas por ciento cincuenta libras de agua, quiere decir, setenta y cinco azumbres.

Si se usa el sulfureto líquido señalando treinta y cinco grados en el areometro, de las sales se echan ocho onzas ó doscientas cincuenta y seis grammas en nueve ó diez cubos de agua.

Los enfermos afectados de sarna reciente ó antigua se curan regularmente despues de haber tomado cinco, diez ó mas de estos baños. Es necesario permanecer en ellos de una á una y media hora.

Deben tener una temperatura de veinte y seis á treinta grados de (Reaumur.)

REMEDIO DEL Dr. CHESTON.

Contra el cancer de los labios y las úlceras malignas.

Derrámese sobre cuatro onzas de hojas recientes de laurel real dos libras de agua hirviendo, déjese enfriar y agréguese á la coladura cuatro onzas de miel colada.

Esta composicion se aplica al exterior en locion y por medio de compresas.

REMEDIO DE LA CARIDAD.

Para el cólico de los pintores.

Cuando la enfermedad es reciente (importa mucho atacarla desde los principios) se pone al enfermo una lavativa compuesta con suficiente cantidad de buen vino y de aceite de nuez mezclados y bien batidos. Una ó dos horas despues se le pone otra compuesta de este modo.

De sen. . . . . II dracmas.
De electuario de diafenicon. . . . I onza.

De benedicta laxativa. . . . . IV dracmas.
De miel mercurial. . . . . II onzas.
La pulpa de una coloquintida.

Se hierven todas estas sustancias en un azumbre de agua y se cuela.

Despues del efecto de esta lavativa se repite la del aceite y el buen vino. El dia siguiente se hace vomitar al enfermo con tres ó cuatro granos de emético lavado, y en seguida de la accion del vomitivo se le hace tomar una dracma de la triaca con un grano de láudano opiado.

Al tercero dia de enfermedad se repiten las lavativas y se le hace vomitar de nuevo, el cuarto dia se purga con la medicina siguiente.

De sén. . . . . } a. I onza.
De tamarindo. . . . . }
De sal de epson. . . . . }
De cremor de tártaro . . . . . II idem.

Se hierve el todo en una pinta de agua, se cuela y se disuelve en la coladura.

De electuario de diafenicón. . . . } a. IV dracmas.
De jarave de espino serval . . . . }

Se da esta pocion purgante en muchos vasos á tres cuartos de hora de distancia uno de otro en la mañana.

Se sostendrán los remedios que acabamos de indicar con la media dracma de teriaca y el grano de laudano opiado dado todas las tardes y por la tipsana sudorífica siguiente. (1)

De palo de guayacán . . . . . } a. II idem.
De zazafras. . . . . }
De raiz de china . . . . . }
De zarzaparrilla . . . . . } a. II onzas.
De bardana . . . . . }

---

(1) *Segun M. Merat de Raumartoire la tipsana sudorifica laxante debe componerse del modo siguiente.*

De guayaco, raiz de china y zarzaparrilla. . . . . } De cada cosa una dracma.

Hiérvase durante una hora en tres pintas de agua, reduzcase á dos y agréguese

De zazafras . . . . . I onza.
De sén y regalis. . . . . De cada cosa $\frac{1}{2}$ onza.

Hiérvase ligeramente y cuelese. (Véase disertacion sobre cólico metálico por M. Merat 1 volum. en octavo. París 1813 en casa de Rigot librero).

Se macerará el todo durante doce horas en una vasija de barro barnizado y en tres azumbres de agua que se dejará hervir y reducir á dos.

Los enfermos beberán muchos vasos al dia.

Cuando las fuerzas del enfermo están muy abatidas se dará tambien la pocion cordial siguiente.

De agua de mellisa simple. . . . } De cardo bendito . . . . . }	a. I onza.
De las tres nueces	II idem.
De confeccion de jacintos.	III dracmas.
De jarave de claveles.	I onza.

M.

La dósis de esta pocion es una cucharada ordinaria por hora.

Cuando se ha atacado á la enfermedad desde los primeros dias de su existencia se obtiene las mas veces la curacion al fin de una semana. Si entonces no están enteramente calmados los dolores es preciso continuar la marcha que acabamos de indicar y repetir los purgantes con toda la frecuencia que permitan las fuerzas del enfermo.

En los dias de intermedios de las purgas se pueden dar los bolos siguientes.

De aloes sucotrino. . . . . } De extracto de ruibarbo . . . . . }	a. X granos.
De eleboro . . . . . } De diagridio (1) . . . . . } De jalapa . . . . . }	a. XIV idem.

De jarave de espino serval q. s. para hacer cinco ó seis bolos, que el enfermo la víspera del purgante tomará.

REMEDIO DE QUARIN.

Contra la disenteria.

De polvo de salicaria.	$I\frac{1}{2}$ dracma.
De agua de flores de amapolas. .	XVI onzas.
De jarave de altea	I idem.

Se agita la mezcla y se toman tres y media onzas cada tres horas.

En el principio y cuando se trata de demulcir.

---

(1) *Diagride — Diagredio = Escamonea preparada con el zumo de limon.*

OTRO DEL MISMO EN LA DISENTERIA MALIGNA.

De agua de torongil. . . . . VIII onzas.
De cachunde (1) . . . . . III dracmas.
De alcanfor triturado con goma arábiga . . . . . } VIII granos.
De jarave de kermes. . . . . I onza.

Se dá á cucharadas de hora en hora.

Cuando el cuerpo ha sido convenientemente purgado; y no hay inflamacion.

OTRO DEL MISMO CUANDO LOS PRECEDENTES SON INSUFICIENTES.

De conserva de rosas encarnadas. . } a. VI dracmas.
De jarave de arrayán. . . . . }
De polvo de raiz de tormentila . . I idem.
De hipecacuana. . . . . ½ idem.
De opio purificado . . . . . IV granos.

Mézclese exactamente.

Se toma una dracma cada hora ó cada dos horas.

Cuando las cámaras son casi colicuativas.

REMEDIO CONTRA EL ENVENENAMIENTO POR LOS HONGOS.

Publicado por órden de Mr. el prefecto de policia sobre la declaracion del consejo de Sanidad.

Extracto.

La primera indicacion que debe llenarse es la de la salida de los hongos venenosos. Asi es que debe emplearse un vomitivo tal como el tártaro emético; pero para que este remedio

---

(1) *Cáchou; ó cachunde: mezcla del almizcles ambar, orosur que con el catecú, y el mucilago de tragacanto forman para hacer polvos ó trociscos.*

sea eficáz es necesario darlo á una dósis suficiente, y asociarlo á una sal propia á excitar la accion del estómago á diluir y dividir el humor gleroso y mucoso, cuya secrecion se hace mas abundante por la impresion de los hongos.

Se disolverá pues en medio azumbre de agua caliente cuatro ó cinco granos de tartrite de potasa antimoniada con dós ó tres dracmas de sulfate de sosa.

Se hará beber al enfermo esta disolucion á vasos tibios con mas ó menos frecuencia, aumentando la dósis hasta que haya evacuaciones. En los principios el vómito es suficiente algunas veces para arrastrar los hongos y calmar los accidentes, pero si se han diferido los socorros convenientes, si no se han presentado los accidentes sino mucho tiempo despues de haberlos comido, se debe presumir que parte de los hongos venenosos han pasado á los intestinos, en cuyo caso es necesario recurrir á los purgantes, á las lavativas hechas con la casia, el sén y alguna sal neutra para determinar evacuaciones prontas y abundantes. Se empleará en este caso con suceso una mistura hecha con aceite de resino y jarave de durazno, que se aromatizará con algunas gotas del licor anodino de Hoffman, y que se tomará á cucharadas con mas ó menos aproximacion.

Despues de estas evacuaciones que son de una necesidad indispensable, es necesario para remediar los dolores é irritacion producida por el veneno recurrir al uso de los mucilaginosos y demulcentes que se asociarán á los fortificantes y nervinos.

Tambien se prescribirán á los enfermos el agua de arroz gomada, una ligera infusion de flores de sauco mediadas con leche, á la que se agregará el agua de azahar, el agua de yerbabuena simple y un jarave. Se emplearán tambien con ventajas las emulciones, las pociones oleosas aromatizadas con una cierta cantidad de eter sulfúrico. En algunos casos hay precision de recurrir á los tónicos, á las pociones alcanforadas, y cuando haya tension dolorosa de vientre, será preciso emplear las fomentaciones emolientes, y á veces aun los baños y sangrias, pero el uso de estos remedios solo debe determinarse por el médico que los modificará segun las circunstancias particulares; por que la eficacia del tratamiento consiste esencialmente, no en los específicos ó antídotos de que se abusa muchas veces, y sí en la justa y competente administracion de los remedios simples igualmente bien conocidos.

REMEDIO DEL Dr. MEGLIN.

Para curar el tic (1) doloroso de la cara.

De extracto de beleño negro . . .
De raïz de valeriana silvestre. . . } a. II escrúpulos.
De oxido de sinc sublimado. . . .

Háganse segun arte píldoras de tres granos.

Empezarán los enfermos por una y sucesivamente aumentarán hasta seis, despues hasta ocho mañana y tarde, teniendo cuidado de contener la progresion cuando ellas causan nauseas. Se continúa en seguida la misma dósis mañana y tarde hasta que hayan calmado los dolores.

REMEDIO DE PURMANN.

Contra los tumores blancos de las articulaciones.

De solucion de muriate de sosa. .	II libras.
De vinagre concentrado	I idem.
De hojas de salvia.	II puñados.
De sulfate de cobre	XII dracmas.
De sulfate de alumbre.	V½ idem.

Hiérvase la mezcla por media hora.

Se aplica tibia al rededor de la articulacion tumefacta.

REMEDIO ANTI-LACTISINOSO DEL Dr. WEISS.

Gallium lecteum . . . . . .
De flores de sauco . . . . . } a. I escrúpulo.
De hipericon. . . . . .
De tila. . . . . .
De hojas de sén. . . . . } a. I dracma.
De sulfate de sosa. . . . . .

---

(1) *Los franceses llaman tic á una enfermedad de los caballos que consiste en morder los pesebres, á mi me ha parecido aplicarla al trismo.* = El Traductor.

Se infunda todo en medio azumbre de suero hirviendo, al cabo de una hora se cuéla el licor.

El enfermo toma este remedio por la mañana en tres vasos con media hora de distancia por espacio de doce ó quince dias.

REMEDIO ODONTÁLGICO DE VOGLER.

De almáciga.	a. II dracmas VIII granos.
De oro pimentel.	
De sangre de drago electa	XXXVI granos.
De opio desecado.	I onza.
De aceite volatil de romero. . . .	VIII gotas.
De espíritu de coclearia q. s.	

Despues de haber pulverizado separadamente la almáciga, el oro pimentel, la sangre de drago y el opio se les humedece con el aceite volatil de romero, se les agita en un mortero de marmol agregando poco á poco el espíritu de coclearia en suficiente cantidad para formar una masa uniforme de consistencia mole, emplástrica y semi-ductil.

Se usa contra los dolores de muelas extendiendo sobre la encia una porcion de esta masa emplástrica del grueso de un guisante.

REMEDIO ANTI-VENEREO DEL Dr. PETRICHE.

De hojas de torongil.	IV onzas.
De hojas de sén	½ idem.
De agua comun	XXIV libras.

Infúndase á un dulce calor en una vasija tapada durante una hora, cuélese y tómese.

De la infusion dicha.	I idem.
Disuélvase en ella de azucar blanca.	IV onzas.

Póngase este medio jarave en una botella de medio azumbre y agréguese.

De carbonate de amoniáco puro . .	I dracma ó dracma y media.

Se divide segun las circunstancias esta cantidad en cuatro dósis ó en mas.

REMEDIO CONTRA LA TENIA.

Publicado por órden del colegio de médicos de Prusia.

A.

De limaduras de estaño puro de cornualia . . . . . } I onza.
De polvos de raiz de helecho macho VI dracmas.
De semillas de ajenjos de judea . . IV idem.
De polvos de raiz de jalapa . . . } a. I idem.
De sulfate de potasa. . . . . }
De miel q. s. para dar á la mezcla la consistencia de electuario.

M. S. L.

B.

De raiz de jalapa en polvo . . . } a. II escrúpulos.
De sulfate de potasa . . . . . }
De polvos de escamonea de alep. . I escrúpulo.
De goma guta en polvo. . . . . X granos.
De miel q. s.

El enfermo debe tener una dieta durante el uso de este remedio, evitar los alimentos salados y no tomar mas que pan, sustancia de pan y legumbres ligeras.

Se dá cada dos horas una cucharada de tomar café del electuario A, y se continúa de este modo por dos ó tres dias hasta que experimente en los intestinos las sensaciones determinadas ordinariamente por la presencia de la lombriz.

Entonces se hace tomar el electuario B. del mismo modo que el precedente hasta que se arroje la lombriz. En el caso en que esta expulsion no tenga lugar se le excita por medio de algunas cucharadas del aceite de resino ó bien se pone una lavativa con una onza de dicho aceite.

Se debe en general reglar la dósis de estos remedios segun la edad, el sexo y la constitucion del enfermo.

REMEDIO DEL Dr. KUTTINGER

Contra la tenia.

Este remedio es el mismo que el de Mr. Mathieu far-

maceútico de Berlin; consiste en dos electuarios. Se compone el primero del modo siguiente.

De limaduras de estaño puro . . . I onza.
De raiz de helecho macho . . . . VI dracmas.
De semillas de ajenjos de judea. . IV idem.
De raiz de jalapa en polvo. . . . . } a. I idem.
De sulfate de potasa. . . . . }

Se dá este electuario de dos en dos horas á la dósis de una cucharada de café: se pone al enfermo á cubierto de un alimento salado y muy nutritivo. Despues de tres dias de este tratamiento se dá el segundo electuario compuesto de

Jalapa pulverizada. . . . . } a. II escrúpulos.
De sulfate de potasa. . . . . }
De raiz de escamonea de alep . . . I idem.
De goma guta. . . . . X granos.
De miel q. s.

Se administra este electuario como el primero con atencion siempre á la edad y fuerzas del enfermo.

REMEDIO.

Contra los accidentes ocasionados por las setas dañosas.

De aloes sucotrino P. P. . . . . XX dracmas.
De mirra. . . . . XII idem.
De resina de guayaco. . . . . X idem.

Métanse estas sustancias cada una aparte en
Aguardiente á 22° . . . . . I libra.

Agitense con frecuencia las botellas durante doce ó quince dias, en seguida decantense los licores y mézclense. (1)

Luego que se resienta la menor incomodidad despues de haber comido las setas se toma un vaso de los que se usan para licor, de este remedio y cada vez que se vomite se toma un medio vaso. Algun tiempo despues que ha cesado el vómito se toma té con mucha azucar. Conviene tambien este elixir en las indigestiones y cólicos del estómago y bajo vientre, en la supresion de las reglas por debilidad y de la trans-

---

(1) *Las heces de esta mezcla son buenas para curar las heridas y contusiones.*

piracion. Es vulnerario y se emplea contra la gota y dolores reumáticos.

REMEDIO.

Contra el ptyalismo.

De sulfate de sosa . . . . . L partes.
De carbón. . . . . X idem.
De azufre. . . . . VI idem.

Fúndase en un crisol cubierto, lávese, filtrese, y cristalicese.

Se dá este remedio á la dósis de un escrúpulo repetido cuatro veces al dia. Hace cesar la excesiva salivacion causada por el mercurio.

Se emplea tambien en las enfermedades crónicas del hígado.

JABON MERCURIAL DEL Dr. CHAUSSIER.

De unguento mercurial doble . . . III½ onzas.
De solucion de sosa caústica. . . . III idem.

Se pone en un mortero de vidrio el unguento mercurial. Se le tritura en el, echando poco á poco la solucion de sosa, se continua, la trituracion hasta que la mezcla haya adquirido la mayor tenacidad, entonces se le pone en un molde ó caja de cartón y adquiere con el tiempo la consistencia que le es propia.

Sirve este jabon para hacer con el fricciones en las enfermedades venereas, psóricas y herpéticas.

JABON ACETICO ETEREO DEL Dr. PELLETIER.

De jabon animal. . . . . I dracma.
De éter acético . . . . . I onza.

Disuélvase el jabon en el éter acético al calor del baño de Maria y filtrese.

Se emplea este jabon en fricciones en los dolores reumáticos.

SAL DE GUINDRE.

De sulfate de sosa en polvo . . . VI dracmas.

De nitrate de potasa . . . . . XII granos.
De emético . . . . . ½ grano.

Para una dósis.

Se funde ó disuelve esta mezcla en un azumbre de tipsana ó caldo de yerbas para purgarse.

JARAVE PECTORAL DULCIFICANTE DEL Dr. SELLE.

De jugo de orozuz. . . . . I onza.
De agua destilada de manzanilla. . II libras.
De jarave de altea. . . . . VIII onzas.

Se dá este jarave en la tisis cuando hay mucha sensibilidad en el parings. Lubrifica las partes y favorece la expectoracion.

JARAVE PECTORAL RESOLUTIVO DEL MISMO.

De goma amoniaco. . . . . } a. II dracmas.
De muriate de amoniaco. . . . . }
De oximiel scilítico . . . . . I onza.
De vino emético. . . . . II dracmas.
De jarave pectoral indicado arriba. VIII onzas.

Se dá este jarave con suceso en la tisis siempre que la expectoracion se hace con dificultad, que es fuerte la fiebre, y el vientre está bastante libre. La dósis es una cucharada cada hora.

JARAVE PECTORAL PARA LA COQUELUCHE.

De oximiel scilítico . . . . . I½ onza.
De jarave de hipecacuana . . . . . } a. II idem.
De diacodion . . . . . }
De azahar . . . . . IV dracmas.

Se toma este jarave á la dósis de dos cucharadas de hora en hora en una taza de infusion de las cuatro flores pectorales.

OTRO CITADO POR RIVET.

De quina electa . . . . . } VI onzas y II dracmas.

De sumidades de centaura menor . } I onza y IV½ dracmas.
De sén de la Paltha. . . . . } a. IX onzas y III idem.
De raiz de orozuz . . . . . }
De anis verde . . . . . V onzas.
De flores de sauco . . . . . } III onzas y I dracma.
De hipecacuana. . . . . V dracmas.
De extracto gomoso de opio . . . IV½ idem.
De azucar blanca . . . . . VIII libras.
De agua comun q. s.

Hágase una infusion prolongada de todas estas sustancias excepto del opio y de la azucar. Cuélese con expresion, disuelvase en seguida la azucar y el opio y acábese s. a.

La dósis es desde una cucharada de café hasta una ordinaria en media taza de infusion de hisopo.

JARAVE PECTORAL INGLÉS.

De agua . . . . . XVI libras.
De dátiles. . . . . II idem.
De azufaifas. . . . . I idem.
De raiz de altea . . . . . IV onzas.
De raiz de orozuz. . . . . VIII idem.
De culantrillo de canada . . . . . } a. IV idem.
De cabezas de adormideras blancas. }

Hágase una decoccion, cuélesele y agréguensele ocho libras de azucar y evapórese hasta la consistencia de jarave.

JARAVE PECTORAL BALSÁMICO DE CHARLES.

De hipecacuana contundida . . . . II½ dracmas.
De vino tinto de borgoña . . . . . I libra.
De infusion de amapolas . . . . . I idem y II onzas.
De extracto de opio . . . . . XX granos.
De infusion alcoholica de bálsamo de tolú . . . . . } III dracmas.
De azucar contundida. . . . . II libras.

Se dá á la dósis de una á una y media onza en una taza de infusion pectoral. Conviene en las toses tenaces, en el coqueluche y en los catarros agudos.

*

JARAVE PECTORAL DE BOUVART.

De pasas de corinto. . . . . II libras.
De azucar. . . . . II½ idem.
Asaduras de becerro. . . . . núm. 2.
De goma arábiga. . . . . IV onzas.
De agua. . . . . VI azumbres.

Se hierve el todo por espacio de seis horas, se cuéla y se evapora hasta la consistencia de jarave. Se toman dos cucharadas ordinarias mañana y tarde en una taza de agua tibia.

JARAVE DEL Dr. DESESSARTS.

Contra la tos de los niños.

De hipecacuana . . . . . I onza.
De sén mondado. . . . . III idem.

Macérese por dos horas en veinte y cuatro onzas de vino blanco, decántese, filtrese el licor separadamente.

Agréguese al residuo.
De sulfate de magnesia. . . . . III idem.
De sumidades de serpol. . . . . I idem.
De flores de amapolas . . . . . IV idem.
De agua hirviendo. . . . . VI libras.

Déjese cuatro horas en infusion, decantese, filtrese el licor al que se le agregará.

De agua de azanar. . . . . II libra.
De azucar blanca . . . . . XV idem.
Y el vino blanco de la maceracion.

Mezclése y disuélvase en frio. La dósis es de una á dos onzas.

JARAVE DEL Dr. GARDANNE.

Contra la tos.

De hipecacuana contusa. . . . . } V dracmas y I escrúpulo.
De vino blanco. . . . . I libra.

Infúndase por un cuarto de hora y agreguese
De sén. . . . . IV onzas.

Contínuese la infusion durante dos horas y agréguese

De serpol . . . . . VI dracmas.
De cortezas de naranjas agrias . . . V id. y I escrúpulo
De sal vegetal. . . . . IV onzas.
De agua hirviendo. . . . . IV libras.

Déjese en infusion por cuatro horas, cuélese y agréguese

De jarave de altea. . . . . II libras.
De agua de azahar. . . . . XII onzas.

Se dá este jarave á los niños á la dósis de dos cucharadas de café al dia, la primera una hora antes del desayuno, y la segunda una hora antes de comer.

JARAVE DE COCHINILLAS.

De raices de espárragos. . . . . } a. II dracmas.
De orozuz . . . . . }
De pasas. . . . . }
De hojas de parietaria. . . . . }
De malvas. . . . . }
De azucar. . . . . XII onzas.

Hágase un jarave, despues agréguese

De jugo de borraja. . . . . } a. II idem.
De buglosa . . . . . }
De cochinillas. . . . . I½ idem.

Se machacan las cochinillas, se le diluyen en el jugo, y se les filtra. Sobre cuatro onzas de este jugo agréguese

De azucar . . . . . VIII onzas.

Fúndase en el baño de Maria y mézclese este jarave con el primero.

Conviene en la tos y coqueluche de los niños.

JARAVE PECTORAL DEL Dr. MALOET.

De azufaifas . . . . . } a. I onza.
De dátiles . . . . . }
De ubas de corinto . . . . . }
De raiz de orozuz . . . . . II dracmas.
De culantrillo. . . . . IV idem.
De extracto de opio. . . . . VI granos.
De azucar prieta . . . . . II libras.

Hágase un jarave s. a.

Se dá á la dósis de una onza en una taza de una infusion pectoral.

JARAVE DE HIGADO DE AZUFRE.

De sulfureto de potasa. . . . . II dracmas.
De agua de hinojo. . . . . VIII onzas.
De azucar . . . . . I libra.
F. S. A.

Este jarave debe contener seis granos de sulfureto de potasa en cada onza.

Se dá en los herpes, en las enfermedades de la piel, la angina inflamatoria, los catarros y la tisis pulmonal.

La dosis es de media á una onza.

JARAVE DE COCINERO.

De zarzaparrilla . . . . . II libras.
De flores de borraja. . . . . } a. II onzas.
De rosa . . . . . }
De sén. . . . . } a. II dracmas.
De anis. . . . . }
De miel. . . . . IV libras.

El médico agrega á este jarave la cantidad de sublimado corrosivo que juzgue necesaria desde tres granos hasta ocho.

Se designa el número de granos con el nombre de cochura, asi se dice de jarave de la tercera de la cuarta cochura para decir que contiene tres ó cuatro granos de sublimado.

JARAVE DEPURATIVO DEL Dr. LARRET.

De jarave de zarzaparrilla . . . . } a. III libras.
De cocinero. . . . . }
De sublimado corrosivo. . . . . }
De amoniaco. . . . . } a. XX granos.
De extracto gomoso de opio. . . . }
De licor mineral de Hofman. . . II dracmas.

Se dá este jarave á la dósis de una onza por la mañana en ayunas, una taza de cocimiento de zarzaparrilla.

Conviene en las afecciones venereas constitucionales ó degeneradas, en las enfermedades herpéticas y otras afecciones de la piel,

JARAVE CONTRA LA COQUELUCHE POR BOULLAT.

De hipecacuana en polvo. . . . . IX dracmas.
De quina en polvo. . . . . VI onzas.
De opio en bruto. . . . . I dracma.

Prepárese en la s. q. de agua fria para quitar las partes solubles y hágase disolver en el licor filtrado.

De azucar. . . . . VI libras.

Evapórese en seguida al calor del baño de Maria hasta la consistencia de jarave.

Se dá este jarave desde una cucharada de café hasta una ordinaria, repetido muchas veces al dia segun la edad de los niños.

JARAVE VERMIFUGO DE BOULLAT.

De musgo de Córcega lavado. . . . XII onzas.

Hiervase con la s. q. de agua para espesarlo, cuélese.

Agréguese media botella de vino blanco, una clara de huevo, cuatro libras de azucar y una mezcla de

36 granos de cochinillas y
24 idem de alumbre.

Désele un hervor, filtrese y hágasele cocer hasta la consistencia conveniente.

Se dá este jarave á cucharadas, extendiendolo en un volumen de agua.

JARAVE ANTI-ARTRÍTICO Y ANTI-HIDRÓPICO.

De escamonea pulverizada. . . . . IV dracmas.
De azucar en polvo . . . . . IV onzas.
De aguardiente refino . . . . . VIII idem.

Coloquese el todo en una vasija conveniente, enciendase el aguardiente y déjese quemar la materia agitandolo de tiempo en tiempo.

Cuelese con expresion al través de un lienzo y agréguese cuatro onzas de jarave de violetas. La dósis es de una á dos dracmas en seis onzas de agua de peregil.

JARAVE DEPURATIVO AMARGO DEL Dr. BOVILLON DE LA GRANGE.

De raiz de rábano . . . . . II libras.

Seca de genciana . . . . . I libra.
De hojas de coclearia . . . . . III idem.
De trebol febrino. . . . . II idem.
De vino blanco . . . . . XVI idem.

Macérese por algunos dias y entonces póngase

De azucar. . . . . I libra XII onzas.
Del mismo vino dicho arriba . . . I libra.

Hiérvase á un dulce calor.

Se unirá á cada libra de este jarave una onza de jarave hecho con el espíritu de coclearia.

Este jarave depurativo menos calefaciente que el jarave anti-escorbutico de Codex, se prescribe en los mismos casos y á las mismas dósis.

JARAVE VINOSO CARDIACO DE WIRTEMBERG.

De canela de Ceilan. . . . . III dracmas.
De clavos de comer . . . . . ½ idem.
De gengibre. . . . . I escrúpulo.
De agua de rosas . . . . . } a. XIII dracmas.
De vino generoso . . . . . }
De azucar blanca. . . . . }

Se infunden las sustancias aromáticas en un balon con el agua de rosas y el vino blanco por treinta ó treinta y seis horas. Se filtra en seguida el licor y se disuelve el azucar al calor del baño de Maria.

Se dá este jarave á la dósis de una ó dos onzas en la convalecencia de las enfermedades adynamicas, en la tendencia á la caquexia, en una palabra, en todos los casos en que se quieren animar las fuerzas del sistema digestivo. Se extiende este jarave en una infusion apropiada.

JARAVE PURGANTE DE Mr. MAJAUTT.

R. De jabonera . . . . . IV onzas.
De ballas de enébro. . . . . }
R. De alcaparras. . . . . } a. II dracmas.
De china. . . . . }
De aro. . . . . I onza.
De hojas de arnica . . . . . }
De trebol febrino . . . . . } a. IV idem.
De fumaria. . . . . }

De flores de sauco. . . . . }
De rasuras de guayaco . . . . . } a. II onzas.
De sasafras . . . . . }
De vino tinto. . . . . XII azumbres.

Hiérvase y agréguese.

De azucar prieta. . . . . XV libras.

Se cuela y se evapora hasta la consistencia de jarave.

Cuando está concluido el jarave se le agrega á cada azumbre media dracma de álcali volatil.

Se dá desde dos dracmas hasta onza y media en las enfermedades escrofulosas, herpéticas, psoricas y sifilíticas.

JARAVE DE BELET.

De nitrate de mercurio perfectamente puro y hecho al frio. . . $I\frac{1}{2}$ dracma.
De eter nítrico rectificado. . . . . $\frac{1}{2}$ idem.
De jarave de azucar blanca. . . . I libra.

Se deshace el nitrate de mercurio en un mortero de vidrio con la menos agua posible y se mezcla esta solucion con el jarave frio y el eter nítrico, agitandolo en la botella donde se debe conservar.

Esta fórmula es la que Mr. Bovillon Lagrange ha publicado en el boletín de farmacia y es la mas exacta.

Se dá este jarave de Belet á la dósis de una cucharada ordinaria por la mañana en medio vaso de agua.

JARAVE DE MERCURIO GOMOSO DEL Dr. LAGNEAU.

De mercurio vivo. . . . . I escrúpulo.
De goma arábiga . . . . . I dracma.
De jarave de chicorias con ruibarbo q. s.

Tritúrese en un mortero de vidrio, y cuando el mercurio esté bien dividido y mezclado á las otras sustancias agréguese.

De jarave de chicorias con ruibarbo. $I\frac{1}{2}$ onza.

JARAVE ANTI-ESCORBUTICO DEL Dr. PORTAL.

De raiz de genciana. . . . . IV dracmas.
De rubia . . . . . }
De quina . . . . . } a. II idem.

De raiz de rábano silvestre. . . . ½ onza.
De berro de fuente. . . . . } a. q. s.
De coclearia. . . . . }
De muriate oxigenado de mercurio. II granos.

Se hacen hervir las raices con la quina en dos libras de agua hasta que se reduzcan á una, se cuela la decoccion y se agrega libra y media de azucar, se clarifica con dos claras de huevo, se hace hervir esta mezcla hasta la consistencia de jarave y se cuela.

De otra parte se machacan en un mortero las hojas de berros, de coclearia y las raices de rábanos, se exprimen para sacar seis onzas de zumo que se filtran en frio, se agrega onza y media de azucar pulverizada, se calienta al baño de Maria hasta que el azucar se disuelva, se cuela y se agrega este jarave al primero.

Por último se disuelve el sublimado en cerca de una dracma de alcohol y se mezcla exactamente con el jarave.

Se dá este jarave á la dósis de una onza á dos en una tipsana apropiada, conviene en las enfermedades de la piel, en las afecciones escrofulosas, escorbúticas y en las enfermedades venéreas inveteradas.

JARAVE VERMÍFUGO Y PURGANTE.

De sén. . . . . I onza.
De raices de agenjos de Judéa . .
De carolina de Córcega . . . . . } a. IV idem.
De ruibarbo. . . . . .
De cortezas de naranjas . . . . . II idem.
De canela. . . . . I idem.
De azucar. . . . . XXVI libras.

Se dá este jarave á la dósis de una á una y media onza.

JARAVE ANTI-ASMÁTICO.

De goma amoniaco electa. . . . . II onzas.
De vino de chablis primera cualidad. VIII idem.

Despues de haber molido la goma amoniaco se le disuelve en el vino triturandola en un mortero de marmol, se cuela al través de un lienzo, se pone el vino en el baño de Maria con una libra de azucar, y se calienta hasta la consistencia de jarave.

Se dá este jarave desde una dracma á una onza.

JARAVE DE WILLIS.

De sulfureto de potasa. . . . . II onzas.
De vino de España . . . . . III libras.
De azucar . . . . . II idem.

Se digiere por el espacio de veinte y cuatro horas el sulfureto de potasa en el vino, en seguida se filtra y se disuelve el azucar. Se evapora el jarave en el baño de Maria hasta la consistencia competente.

Se dá este jarave á la dósis de una cucharada ordinaria mañana y tarde en las flemacías del pecho. (1)

JARAVE CALIBEADO DE WILLIS.

De sulfate de fierro muy verde. . I onza.
De agua hirviendo. . . . . VIII idem.

Hecha la disolucion y filtrado agréguese.

De goma arábiga. . . . . II dracmas.
De azucar blanca. . . . . I libra.

Hágase un jarave s. a.

Se emplea como tónico y abstringente en la clorosis, la hidropesía, las cachexias y la leucorrea. La dósis es de una á dos onzas.

SOLUCION ANTIVENEREA DE WEIKAR.

De sublimado corrosivo. . . . . } De cada cosa AI
De muriate de amoniaco . . . . . } granos.
De agua destilada . . . . . II onzas.
De laudano líquido. . . . . XXXVI gotas.
De aceite volatil de canela. . . . I gota.

M.

---

(1) *El Dr. Chaussier ha modificado la fórmula de Willis El juzga con razon que el vino debe descomponer una parte del sulfureto de potasa: él aconseja para preparar el jarave con el agua conforme á las proporciones siguientes.*

De sulfureto de potasa. . . . . $I\frac{1}{2}$ dracma.
De agua destilada de hisopo. . . . VI onzas.
De azucar blanca contundida. . . . X idem.

Se dá esta solucion á la dósis de treinta á cuarenta gotas mañana y tarde en una agua de goma ó en leche. Conviene con especialidad esta preparacion mercurial á las personas delicadas cuyos estómagos no pueden soportar el licor de Wan Swieten y los otros remedios mercuriales.

SOLUCION CITRO-MURIÁTICO FEBRÍFUGA DE BROUSSONET.

Se disuelve muriate de sosa en jugo exprimido de limon hasta la perfecta saturacion y se filtra.

En las fiebres adinámicas se dá á los enfermos una cucharada de hora en hora.

SOLUCION ARSENICAL DE PRUSIA.

De oxido de arsénico sublimado y bien pulverizado	a. IV granos.
De sub-carbonate de sosa.	
De agua destilada.	XII onzas.

Calientese el licor en un baño de arena, filtrése y conservese la solucion en una botella bien tapada.

Los médicos de Berlín lo emplean en las fiebres intermitentes tenaces; no debe tomarse de una vez mas que la vigésima parte de un grano.

NOTA. Las preparaciones arsenicales son tan peligrosas que no se podrán tomar las precauciones suficientes para administrar este remedio.

SPADRAPO ABSTRINGENTE DE COUSTONAU.

De cerusa	a. I½ dracma.
De piedra calaminar	
De cera amarilla.	IV onzas.
De aceite de olivas	VI idem.

Se liquida sobre un fuego muy suave la cera con el aceite, se le mezclan exactamente los polvos preparados, y se extiende este emplasto sobre unas tiras de lienzo muy fino.

Este spadrapo se usa cuando se quiere disminuir la secrecion muy abundante de las úlceras de los cauterios ó vejigatorios.

AZUCAR NARANJADA PURGANTE.

De jalapa en polvo . . . . . II onzas.
De azucar . . . . . XIV idem.
De tartitre acídulo de potasa soluble. IV dracmas.
De aceite esencial de naranjas. . . II idem.

Hágase un oleo sacaro y mezclesele la sal y la jalapa.

La dósis es de dos á tres dracmas en medio azumbre de naranjada cocida para purgar á las personas que repugnan los medicamentos.

SUPOSITORIO FORTIFICANTE DE REUSS.

De raiz de tormentila . . . . . } a. II dracmas.
De corteza de encino . . . . . }

Pulvericense estas sustancias y agréguese la suficiente cantidad de miel para poder hacer ocho supositorios. Se emplean estos supositorios en la procedencia del recto, en la debilidad de este intestino y despues de las hemorragias.

SUPOSITORIOS CONTRA LAS HEMORROIDES.

De alcornoque quemado . . . . . I dracma.
De manteca fresca. . . . . II idem.
De cera. . . . . I idem.

Hágansе s. a. tres supositorios.

TABLILLAS ANTI-CATARRALES DE TRONCHIN.

De goma arábiga en polvo. . . . VIII onzas.
De kermes mineral. . . . . } a. I idem y I es-
De semillas de anís . . . . . } crúpulo.
De extracto de orozuz por infusion. II onzas.
De azucar blanca . . . . . II libras.
De extracto gomoso de opio . . . XII granos.
De mucilago de goma arquitira q. s.

Hágansе segun arte tablillas del peso de seis granos. Se tomarán seis ú ocho en el curso de la mañana.

TINTURA DE DAFFTS.

De sén . . . . . I onza.
De jalapa. . . . .]
De cilantro. . . . . } a. IV dracmas.
De cremor de tártaro. . . . .]
De aguardiente . . . . . Quartillo y medio.
De azucar. . . . . VI onzas.

Se dá este purgante agradable á la dósis de una hasta tres onzas esperando un largo intervalo de una toma á otra.

TINTURA DE RUIBARBO DE SPIELMANN.

De ruibarbo contuso. . . . . I onza.
De agua destilada . . . . . IX idem.
De acetate de potasa . . . . . I dracma.

Mézclese todo, déjese en infusion por cuatro horas, filtrese. Se dá en los erutos, y flatuosidades para fortificar el estómago á la dósis de media onza en un vehículo apropiado, conviene tambien en la ictericia.

TINTURA SAGRADA.

De aloes. . . . . I onza.
De pimienta de la Jamaica (1) . . } a. I dracma.
De gengibre. . . . . }
De vino de España . . . . . VIII onzas.

Macérese por ocho dias y filtrese.

Se dá en la dyspeccia, en las indigestiones y en la descompostura del estómago á la dósis de una cucharada en un vehículo apropiado.

TINTURA FEBRIFUGA DE CLUTTÓN.

De ácido sulfuroso . . . . .]
Del sulfurico. . . . . } a. II onzas.
De muriate de sosa. . . . .]

---

(1) *Es una especie de nitro.*

De alcohol . . . . . III onzas.

Se deja en digestion por espacio de un mes, en seguida se destila hasta la sequedad. Se agrega al licor destilado.

De angelica . . . . . }
De aristolóquia. . . . . } a. I½ idem.
De semillas de cardomomo. . . . . }

Hágase digerir por ocho dias y filtrese. En cinco ó seis libras de agua edulcorada con miel ó un jarave se agrega á esta tintura lo bastante para darle una acidéz agradable.

Se dá á pasto á los enfermos que tienen una fiebre arreglada cualquiera.

TINTURA DE LAVANDA (1) COMPUESTA DE LÓNDRES.

De espíritu de espliego . . . . . III libras.
De romero . . . . . I idem.
De canela . . . . . }
De nuez noscada . . . . . } a. I½ onza.
De sandalo rojo. . . . . I idem.

Dijierase seis dias y filtrese.

Se dá á la dósis de diez gotas á una dracma con dos dracmas de azucar en la debilidad nerviosa.

TINTURA NERVINO-TÓNICA DE BESTUCHEF.

Tómense limaduras de fierro puro, disuelvanse en suficiente cantidad de ácido muriático, al que se agrega una cuarta parte de ácido nitrico, filtrese la disolucion que debe estar en términos que no quede ni una porcion de fierro sin disolverse. Evaporese en una retorta de porcelana en el baño de arena. Expóngase la masa desecada en una bóveda, ella atrae la humedad y se liquída con el nombre del aceite de marte. Filtrese este licor, mézclese con doble de su peso de éter sulfúrico, agítese hasta que despues de dejarlo reposar haya tomado el éter un color amarillo de oro, decantese el éter y mézclese con doble de su peso de alcohol muy rectificado, agitándose la mezcla en un frasco tapado herméticamente.

---

(1) *Lavanda espliego.*

Se dá esta tintura á la dósis de veinte á treinta gotas en un vehículo acuoso. Conviene en las enfermedades espasmódicas y asténicas.

TINTURA DE HOLLIN.

Farmacopéa de Edimburgo.

De hollin brillante. . . . . I onza.
De asa fetida. . . . . IV dracmas.
De alcohol debil. . . . . I libra.

Se prescribe esta tintura contra los vientos, flatuosidades, en las convulsiones sintomáticas causadas por la denticion y en las enfermedades histéricas.

La dósis es de quince á treinta gotas en una bebida apropiada.

TINTURA ANISADA DEL Dr. ALIBER.

De polvos de hipecacuana. . . . . I onza.
Digierase en cuatro onzas de espíritu de anis.
Se le agrega alguna vez un poco de azucar.

La dósis de esta tintura es de una á dos onzas en las reumas.

Es muy conveniente para las niños, porque el perfume que le acompaña entorpece el mal gusto de la hipecacuana.

TINTURA VOLATIL DE GUAYACO DE LONDRÉS.

De resina de guayaco. . . . . I onza.
De espíritu volatil aromático de Silvio. VI idem.

Se dá en la gota, caldiagia, cólico nefrítico, y disuria.

La dósis es de una dracma á media onza, en una taza de leche ó agua tibia, dos veces al dia.

TINTURA DE JACOBO, DE ANTIMONIO.

Se hierve una fuerte legia de escorias recientes de régulo de antimonio con un aceite graso recientemente esprimido hasta que el todo haya adquirido la consistencia de un ja-

bon se disuelve este jabon en la tintura acre de antimonio que se le llama ordinariamente azufre líquido de antimonio, se filtra.

Esta tintura es resolutiva y diurética. La dósis depende del modo con que ella ha sido preparada. Se empieza por algunas gotas y se aumenta succesivamente la dósis segun lo exijan las circunstancias. Se dá en las gonorreas crónicas y en las obstrucciones de las visceras abdominales.

TINTURA DE MALATE DE FIERRO.

De la Farmacopéa Austriáca.

De limaduras de fierro porfirizadas. I libra.
De jugo reciente de manzanas agrias. (1) . . . . . } III idem.

Déjese algun tiempo sobre el metal este jugo teniendo cuidado de agitarlo con frecuencia. Cuando parezca el jugo saturado se le decanta y se agrega otro nuevo hasta que se haya disuelto todo el fierro, se juntan estas disoluciones y se hacen evaporar hasta reducirlas á la mitad de su peso, entonces se pone una parte de alcohol sobre seis de la disolucion; se dijiere por algun tiempo la mézcla y se filtra.

Se dá esta tintura en la clorosis, la debilidad de estómago, y en el carreau ú obstrucciones mesentericas de los niños.

TINTURA DE ALMACIGA COMPUESTA.

De la Farmacopéa Austriaca.

De almaciga en lágrimas . . . . .
De mirra . . . . . } a. II onzas y IV dracmas.
De olívano. . . . . .
De alcohol rectificado. . . . . IV libras.

Se dijieren las resinas hasta que la tintura parezca completa, y se filtra.

Se emplea para los sabañones, las grietas y rasgades.

Es necesario que precedan al uso de esta tintura los pedilubios, manilubios calientes &c.

TINTURA NERVINA Y TÓNICA.

De la Farmacopéa de Berlin.

De valeriana . . . . . } a. I½ onza.
De menta piperita. . . . . .

(1) *Se puede sustituir con ventaja el jugo de membrillos.*

De alcohol . . . . . II libras
De castor . . . . . I onza.
De azafrán . . . . . IV dracmas.
De esencia de yerbabuena . . . . I idem.
F. S. S.

Se dá á la dósis de veinte á treinta gotas en los espasmos y debilidades del estómago.

TINTURA ANTI-ESPASMÓDICA DE KEUP

De raiz de valeriana . . . . . I onza.
De licor anodino mineral de Hofman. IV idem.

Mézclese, infúndase durante quince dias y decantese.

Se dá esta tintura en el cólico ventoso, y se le mezcla mitad de esencia de corteza de naranja, y despues de haberlo mezclado bien se dán todas las horas cuarenta gotas en un vaso de infusion de manzanilla.

TINTURA DE RUIBARBO INGLESA.

De ruibarbo de China . . . . . II onzas.
De semillas de cardomomo . . . . IV dracmas.
De alcohol. . . . . II½ libras.

Dijiérase por ocho dias y filtrese.

Se dá esta tintura á la dósis de media á una onza en un vehículo apropiado; conviene para disipar las flatuosidades y restablecer las digestiones perezosas.

TINTURA TEBAICA DE BAMBERG.

De opio en bruto. . . . . II onzas.
De clavos de comer. . . . . I dracma.
De agua de canela ordeada. . . . VIII onzas.
De alcohol . . , ... IV idem.

Se macera el todo por seis dias y se filtra.

Esta es una especie de laudano que se puede sustituir al de Sideham.

TINTURA LIXIVIAL DE VOGLER.

De raiz de genciana . . . . . VI onzas.
De cortezas secas de naranja . . . II idem.
De cenizas graveoladas. . . . . XV idem.
De agua hirviendo . . . . . XI idem.

Dijierase por dos dias y agréguesele.

De alcohol rectificado . . . . . II onzas.

Filtrese.

Se dá una dracma dos ó tres veces al dia en la atrofia, los engurgitamientos glandulosos, en la estranguria y gonorrea cuando son atónicas.

TINTURA ESTOMÁQUICA DE MOSCATI.

De cortezas de naranjas agrias . . . I onza.
De cascarilla pulverizada. . . . . } a. ½ idem.
De hojas secas de chamedrios. . . }
De agua destilada de cortezas de limon. }
De hojas de ajenjos. . . . . } a. VIII idem.
De alcohol á 32° . . . . . }

Infúndase por tres dias á un dulce calor y filtrese.

La dósis es de media onza á seis dracmas al dia antes de almorzar y comer.

TINTURA ESTOMÁQUICA AMARGA.

De Edimburgo.

De raiz de genciana. . . . . II onzas.
De cortezas secas de naranjas agrias. I idem.
De canela blanca . . . . . IV dracmas.
De cochinillas. . . . . ½ idem.
De alcohol débil . . . . . } I libra y VII onzas.

Infúndase por cuatro dias y filtrese. La dósis es de cuatro á seis dracmas por la mañana en ayunas, ó una hora antes de comer.

TINTURA DE CARDOMOMO COMPUESTA.

Farmacopéa de Londrés.

De semillas de cardomomo. . . . }
De alcaravea. . . . . } a. II dracmas.
De cochinillas . . . . . }
De canela . . . . . IV idem.
De pasas sin huesos. . . . . IV onzas.

*

De alcohol . . . . . I libra.

Macerese por cuatro dias y filtaese.

Se dá una cucharada pequeña en un vehículo apropiado en la debilidad y pereza de la digestion &c.

TINTURA ETEREA DE KLAPROTH.

(*Véase éter acético ferruginoso de Klaproth.*)

Se prepara esta tintura con el óxide de fierro ad maximum el que le dá un color rojo. Cuando el acetate de fierro es ad minimum la tintura es verde.

TÉ DE LA SALUD.

De Mr. de San-German. (1)

De semillas de anis. . . . . } a. I libra.
De raspaduras de álamo blanco . . }
De sándalo blanco. . . . . } a. VIII onzas.
Del rojo . . . . . }
De semillas de verdolagas. . . . . II libras.
De sén. . . . . I idem.
Hágase un polvo s. b.

Este polvo fortificante y al mismo tiempo laxante se da á la dósis de una cucharada de café para seis tazas de agua hirviendo que se edulcora con azucar y se bebe por la mañana en ayunas.

TIPSANA DE VINACHE.

De zarzaparrilla. . . . . }
De raiz de china . . . . . } a. I½ onza.
De guayaco. . . . . }

---

(1) *Mr. de San-German no era médico, era muy celebre en clase de curandero y parece que esta infusion produjo entre sus manos buenos efectos.*

De sasafras . . . . . } a. IV dracmas.
De sén. . . . . }
De sulfureto de antimonio . . . . II onzas.

Se pone el sulfureto pulverizado en una muñeca de trapo, se le hace hervir con la zarzaparrilla, la china y el guayaco en tres azumbres de agua; cuando está la decoccion reducida á una tercera parte se le agrega el sén y el sasafras. Se cuela, se deja depositar y se decanta.

Conviene esta tipsana purgante y sudorifica en las enfermedades de la piel y en la sifilis.

TIPSANA REAL.

De tamarindos . . . . . II onzas.
De sén . . . . . } a. IV dracmas.
De sulfate de sosa . . . . . }
De anis. . . . .]
De cilantro . . . . . } a. I puñado.
De velesa. . . . . }
De pinpinela. . . . .]

Se echa sobre el todo un azumbre de agua hirviendo, se deja media hora en infusion cuidando de agitarlo con frecuencia y se cuela. Esta tipsana purga muy bien.

TIPSANA DE FELTZ.

De zarzaparrilla . . . . . II onzas.
De raiz de china . . . . . I idem.
De sulfureto de antimonio . . . . IV idem.
De cola de pescado . . . . .]
De corteza de box. . . . . } a. $1\frac{1}{2}$ idem.
De yedra. . . . .]
De agua comun . . . . . XII libras.

Póngase el sulfureto de antimonio en una muñeca de lienzo claro y hágase s. a. una decoccion que se prolongará hasta la evaporacion de la mitad del licor.

Cuélese al traves de una estameña, dejése reposar algunos minutos, decántese y disuelvase en la coladura.

De sublimado corrosivo . . . . . III granos.

Se emplea esta tipsana en las enfermedades venereas á la dósis de un azumbre al dia.

TIPSANA DE BUCHAN.

De cebada perlada . . . . . II onzas.

Hiérvase en cuatro azumbres de agua y agréguese.

De pasas. . . . . ⎫
De higos . . . . . ⎬ a. II onzas.
De raiz de orozuz. . . . . ⎭

Continuese hirviendo hasta que se reduzca á la mitad y disuelvanse dos granos de nitro.

Esta tipsana es emoliente y pectoral.

TIPSANA DE VIGAROUX.

De raiz de zarzaparrilla . . . . . V½ dracmas.
De iris de Florencia . . . . . ⎫
De aristoloquia larga . . . . . ⎪
De raeduras de guayaco . . . . . ⎬ a. VIII½ idem.
De sasafrás. . . . . ⎪
De jalapa. . . . . ⎪
De polipodio. . . . . ⎭
De raiz de china. . . . . ⎫
De cremor de tartaro. . . . . ⎬ a. VII½ idem.
De sulfureto de antimonio. . . . . ⎪
De semillas de anis. . . . . ⎭
De nueces frescas con las cascaras quebrantadas. . . . . } núm. 12.

Pónganse todas estas sustancias á infundir en una vasija de suficiente capacidad, pónganse encima dos azumbres de vino blanco, tápese y déjese en infusion por seis horas, echense entonces en la misma vasija cinco azumbres de agua hirviendo. Cubrase la vasija y metase esta en otra media llena de agua hirviendo, prolónguese la infusion por doce horas, cuélese entonces, y colóquese en botellas que se rotularán núm. 1.

Echese sobre el residuo un azumbre de vino blanco, déjese en infusion como anteriormente, agreguense cinco azumbres de nueva agua hirviendo, procédase del mismo modo que anteriormente, cuélese y colóquese en botellas que se rotularán núm. 2.

Se emplea esta tipsana en los dolores reumáticos y en los que son ocasionados por las enfermedades venereas inveteradas mal tratadas. Se empiezan á usar las botellas rotuladas núm. 2. Cuando se concluye una de estas se continua por las del núm. 1 y se sigue alternandolas de este modo hasta que el médico crea oportuno interrumpirlas ó suspenderlas.

TROSISCOS DEL Dr. CHAUSSIER.

De alcanfor . . . . . I dracma.
De opio. . . . . I escrúpulo.
De goma tragacanto. . . . . ½ idem.
De azucar. . . . . IX dracmas.
De agua q. s.

Para hacer ciento cincuenta trosiscos.

Se dá á la dósis de cuatro á seis por dia en la tisis laringea ó en la angina.

VEGIJATORIOS DEL Dr. LOUYER VILLERMAY.

Tómese:
De pez de Borgoña . . . . . I onza.
De resina. . . . . III dracmas.
De cera amarilla . . . . . I onza y V dracmas.
De trementina . . . . . ½ onza.
De unguento basalicón. . . . . } a. I onzas.
De cantáridas en polvo impalpable . }

Aromatícese con q. s. de esencia de espliego.

OTRO.

Tómese:
De pez negra . . . . . IV onzas.
De cera amarilla. . . . . } a. I½ libra.
De colofonia. . . . . }
De aceite de olivas . . . . . II id. y VIII onzas.
De cantáridas en polvos muy finos. X onzas.
F. S. A.

Agréguese de nuevo
De cantáridas . . . . . I onza y II dracmas.
De esencia de espliego. . . . . ½ onza.

OTRA.

De cantáridas en polvo fino . . . II½ onzas.
De cera amarilla. . . . . X idem.
De pez negra . . . . . I½ onza.

De resina . . . . . II onzas.
De enjundia.. . . . . VIII idem.

M. Louyer Viyermay prefiere estos vejicatorios porque ellos no tienen los inconvenientes que el de Cádiz que obra sobre las vias urinarias.

VEJIGATORIO PERPETUO DE JANIN.

De cantáridas en polvo muy fino. . I onza.
De euforbio . . . . . ½ dracma.
De almaciga. . . . . } a. III onzas.
De trementina. . . . . }

Hágase un emplasto s. a.

VEJIGATORIO INGLÉS.

Se prepara al modo ordinario que los tafetanes con la cola de pescado, como el tafetán dicho inglés y en lugar de una tintura de bálsamo del Perú se aplican sobre la cola muchas capas de tintura de cantáridas hecha con el alcohol debilitado á diez y ocho ó veinte grados.

VEJIGATORIO DE M. WAUTERS.

De olívano pulverizado . . . . . V dracmas.
De semillas de pimienta negra . . III idem.
De muriate de sosa pulverizado. . III dracmas.
De jabon blanco. . . . . } VI onzas y II dracmas.

Dijiérase esta mezcla en siete onzas de alcohol hasta que este disuelto el jabon, se cuece por algunos minutos y se agita con una espátula. Se extiende este unguento sobre una badana y se renueva todos los dias la curacion.

Este remedio es un rubefaciente que obra en dos ó tres dias. Es util en los reumatismos. En algunas personas obra con bastante energia y en otras son lentos sus efectos.

VEJIGATORIO DE Mr. BONVOISÓN.

Se toma un pedazo de tafetán de Inglaterra del ta-

maño que se quiera dar al vejigatorio, se ablanda por el lado que está gomado con el ácido acético muy concentrado y se aplica sobre la piel.

VEJIGATORIO DE LECOMTE.

De cera amarilla . . . . . X onzas.
Derrítase y agréguese.
De trementina. . . . . VI idem.
De cantáridas pasadas por un tamíz muy fino. . . . . VI dracmas.

Aromatícese á voluntad con una mezcla hecha de aceite de espliego y de vergamota.

VEJIGATORIO AMONIACAL.

Se hace con agua de cal y el aceite de jabon calcareo que tiene la consistencia de crema, y se le agrega el álcali volatil.

Se empapa un lienzo de esta mezcla y se aplica sobre la piel en el sitio donde se quiere hacer una flictena. Es muy bueno irritar antes la piel frotandola con un pedazo de franela. Es necesario cortar en redondo el lienzo que se quiere empapar en la mezcla. (1)

VINO DE HUXAN.

De vino de Málaga. . . . . I onza.
De emético . . . . . I grano.

Se dá á la dósis de treinta á cuarenta gotas en las enfermedades ocasionadas por la supresion de la transpiracion.

---

(1) *Cuando este vejigatorio no contiene mas álcali que el necesario para ser rubefaciente, lo aplican los ingleses en las muñecas en los que padecen fiebres intermitentes antes del poroxismo. Algunos farmaceúticos hacen este jabon con partes iguales de enjundia derretida y amoniaco líquido. Él obra en un cuarto de hora como rubefaciente, y en tres horas como vejigatorio.*

VINO FEBRÍFUGO DE S.....

De quina roja.	a. V dracmas y XVIII granos.
De cortezas secas de naranjas. . .	
De raiz de genciana.	
De flores de manzanilla	
De vino de España	II libras.
De alcohol á 20°.	I onza.

Se prescribe en las fiebres intermitentes á la dósis de una ó dos onzas por mañana y tarde.

VINO AMARGO Ó ELIXIR DE DUBOIS.

De genciana	I½ onza.
De carbonate de potasa.	I dracma.
De aguardiente.	I azumbre.

Dijierase por quince dias y filtrese para usarlo.

Se dan una, dos, tres ó cuatro cucharadas de café ú ordinarias segun la edad.

VINO FEBRÍFUGO.

De vino de España	II libras.
De alcohol á 35 g°.	VIII onzas.
De quina roja contundida.	II idem.
De palo de la isla de Surinan . .	I dracma.

Macérese durante ocho dias. Se dá á la dósis de una á dos onzas por la mañana en ayunas.

VINO AMARGO.

De raiz de genciana	VIII dracmas.
De quina.	a. II idem.
De cortezas de naranjas.	
De cortezas de Winter.	I idem.
De alcohol.	IV onzas.
De vino de España.	II libras.

Macérese por cuatro dias y filtrese. Se dá en los mismos casos y en las mismas dósis que el vino de quina.

VINO STOMAQUICO DE PLENCK.

De quina electa contundida. . . . IV dracmas.
De raiz de genciana seca y cortada en láminas muy finas. . . . VI idem.
De vino tinto de buena cualidad. . II libras.

Macérese por cuatro dias, cuélese, filtrése y conservese para el uso.

Se dá este vino á la dósis de una á dos onzas en las fiebres adinámicas, intermitentes, en las debilidades de estómago y en las enfermedades agudas.

VINO ANTI-HIDRÓPICO DE FULLÉR.

De iris de Florencia. . . . . II dracmas.
De énula campánula . . . . . } a. I½ onzas.
De scila . . . . . }
De cortezas de sauco. . . . . } a. I onza.
De yesgo . . . . . }
De cortezas de Winter. . . . . II idem.
De sén . . . . . }
De eleboro negro . . . . . } a. II dracmas.
De jalapa . . . . . }
De agarico . . . . . }
De vino blanco . . . . . IV libras.

Infundanse en frio.

La dósis es de cuatro onzas por la mañana en ayunas.

VINO ANTI-LEUCORREAHICO.

De quina gris. . . . . VI onzas.
De azafrán . . . . . III idem y I escrúp.
De quasia amarga . . . . . } a. I½ onza.
De cálamo aromático. . . . . }
De canela. . . . . } a. VI dracmas.
De flores de sauco . . . . . }
De alcohol . . . . . III libras.
De tintura de Marte . . . . . XII onzas.
De agua pura. . . . . XVIII libras.
De jarave comun . . . . . VI onzas.
De agua de azahar . . . . . I½ libra.

*

Se dá á la dósis de dos onzas mañana y tarde en la leucorrea y blenorragia.

VINO SCILITICO DE RICHART.

De scila. . . . . I onza.
De cortezas de naranja. . . . . } a. II dracmas.
De cálamo aromático. . . . . }
De vino blanco . . . . . XXIV onzas.

Póngase en digestion por tres dias y agréguese.

De oximiel scilítico . . . . . II idem.

Se dá este vino á la dósis de tres á cuatro cucharadas al dia en la hidropesía.

VINO AMARGO Y DIURÉTICO DE M. CORVISAT.

De quina en polvo . . . . . I onza.
De corteza de Winter . . . . . } a. II idem.
De limones . . . . . }
De raiz de asclepias . . . . . }
De angélica . . . . . } a. I idem
De scila seca . . . . . }
De hojas secas de agenjos . . . . } a. ½ dracma.
De torongíl. . . . . }
De ballas de enébro . . . . . } a. II idem.
De macias. . . . . }
De vino blanco . . . . . IV libras.
De alcohol á 36.° . . . . . II onzas.

Contundase todo y metase en una botella, dijierase al baño de arena á una suave temperatura durante veinte y cuatro horas agitandolo de tiempo en tiempo. Cuélese, esprimase y filtrése en papel de estraza, dividase el licor en cuatro partes y tápese bien.

La dósis es cuatro cucharadas al dia una antes de cada comida.

VINO ANTI-APOPLECTICO.

De raices de rábanos . . . . . I½ onza.
De jalapa . . . . . IV dracmas.
De canela. . . . . II idem.

De nitrate de potasa. . . . . ½ dracma.
De ruibarbo. . . . . II idem.
De vino blanco . . . . . II½ libras.

Dijierase en frio por cuatro dias, filtrese y agréguese.

De espíritu aromático aceitoso de Silvio. II dracmas.

La dósis es de tres á cuatro onzas por la mañana en ayunas.

VINO AMARGO Y DIURÉTICO DE LA CARIDAD.

De iris de Florencia. . . . . VI dramas.
De raiz de álamo blanco. . . . .
De scila . . . . . } a. III onzas.
De manrubio . . . . . .
De sén mondado. . . . . I idem.
De agarico blanco . . . . . I½ dracma.
De gengibre . . . . . II escrúpulos.
De cremor de tártaro . . . . . III dracmas.
De vino blanco . . . . . III libras
De tintura de genciana. . . . . III dracmas.

F. S. L.

Se dá á la dósis de una onza ó dos por mañana y tarde.

VINO DEL Dr. FORDYCE.

De quina en polvo. . . . . II onzas.
De clavos de comer . . . . . ½ dracma.

Infundase en una libra de vino generoso durante dos dias, en seguida decántese. Echese sobre el polvo una libra de agua hirviendo, macérese por dos horas, filtrese y mezclese esta infusion con el vino.

Se dan cuatro cucharadas al dia á las personas afectas de blenorragia que se ha hecho crónica.

VINO DE RUIBARBO COMPUESTO.

De ruibarbo en polvo. . . . . II onzas.
De canela blanca. . . . . I dracma.
De alcohol . . . . . II onzas.
De vino de España . . . . . I libra.

Macérese por siete dias y filtrese.

Se dá en las diarreas y en las debilidades de estómago á la dósis de una ó dos onzas.

VINO ANTI-ICTERICO.

De vino blanco generoso	I libra.
De naranjas agrias.	Núm. 2.
De azafrán.	I dracma.

El enfermo tomará cuatro cucharadas ordinarias en ayunas é igual cantidad una hora antes de comer, hacia el fin de la ictericia.

VINO DIURÉTICO INGLÉS.

De raiz de zedoaria.	II dracmas.
De escamas secas de scila.	a. I idem.
De ruibarbo en polvo	
De ballas de enébro	
De canela en polvo	III idem.
De carbonate de potasa.	$I\frac{1}{2}$ idem.

Infundase en un azumbre de vino blanco añejo. Filtrese.

Se dá en la hidropesía á la dósis de tres ó cuatro vasos al dia.

VINO DE GUAYACO ELEBORADO DEL Dr. LEWIS.

De raeduras de guayaco	a. II onzas.
De raiz de eleboro negro.	
De granos del pequeño cardomomo.	a. I dracma.
De cortezas secas de naranja . . .	
De vino blanco.	IV libras.

Infúndase por una semana ó mas, en seguida cuélese el vino. Este vino estimulante y desostruente se emplea contra la hidropesía y las reumas, se toma de parte de tarde en pequeñas dósis.

VINAGRE COLCHICO DE REUSS.

De raiz de colchico fresco en pedazos y cortado en otoño	I onza.

De vinagre bueno . . . . . XII idem.

Macérese durante cuatro dias, esprimase ligeramente la raiz y agréguese al licor.

De alcohol . . . . . VI dracmas.

Filtrese y guardese este vinagre en un frasco.

Se dá este remedio desde una dracma hasta una onza en la hidropesía ascitis.

Se le mezcla algunas veces con el laudano, y se edulcora con un jarave.

VINAGRE ALCANFORADO DE SPIELMANN.

De alcanfor . . . . . I dracma.

Pulvericese en un mortero de marmol agregandole veinte gotas de alcohol. Tritúrense con el dos onzas de azucar, echense encima diez onzas de buen vinagre, agítese hasta que el licor se sature todo lo posible, filtrese y conservese este vinagre en un frasco herméticamente cerrado.

Se emplea este remedio en las fiebres malignas, pútridas y en los exântemas. Se dá á la dósis de media onza.

Se usa exteriormente como anti-séptico para combatir la gangrena.

VINAGRE BEZOARDICO DE BERLIN.

De raiz de angélica	} a. IV onzas.	
De valeriana.		
De yerbabuena		
De flores de manzanilla.		
De ballas de enébro.		
De laurel.		
De azafrán oriental.	} a. I dracma.	
De alcanfor		
De vinagre blanco		VI idem.

Déjese en digestion y cuélese en seguida.

Se emplea este vinagre en las fiebres malignas y nerviosas, en la peste y otras enfermedades contagiosas, y en el escorbuto.

Se empieza por una dracma dada varias veces al dia y se le aumenta en seguida segun que se juzga oportuno.

WAKAKA DE LAS INDIAS.

De cacao mondado. . . . . I½ onza.
De azucar. . . . . IV idem.
De bainilla . . . . . VI dracmas.
De canela. . . . . } a. I idem.
De achiote seco . . . . . }
Hágase un polvo s. a.

Este polvo aromático y fortificante reanima el apetito de los viejos y de los convalecientes. Se pone una cucharada ordinaria en una sopa de arroz, de fideos, ó en una taza de leche. Los españoles lo toman á la dosis de una dracma en una taza de chocolate.

FIN DEL FORMULARIO MAGISTRAL.

MEMORIAL FARMACEÚTICO.

De los principales medicamentos internos clasificados por sus usos en las enfermedades mas ordinarias.

Conviene leer lo que se ha dicho en el prefacio sobre este memorial.

AFECCIONES LACTEAS.

Medicamentos y dósis.

MEDIOS GENERALES.

Minorativos y sudoríficos.

MEDIOS PARTICULARES.

Espíritu de mindereros . . . Media dracma.
Elixir de courcellas. . . . . De una á dos idem.

AFECCIONES HISTERICAS. (*Histérico.*)

MEDIOS GENERALES.

Infusion de valeriana . . . . De dos á cuatro dracmas por azumbre.
Enemas laxantes con adicion de asa fétida ó de castor.
Pocion éterea con aceite de succino.
Tintura amoniacal de valeriana.
Aguas minerales tónicas.
Éter combinado con el almizcle, con el opio y con el alcanfor.

MEDIOS PARTICULARES.

Píldoras marciales de Sydenham	Dos escrúpulos al dia.
Polvos de Tunquin.	De doce á veinte y cuatro granos al dia.
Píldoras anti-histéricas del Dr. Selle.	De cinco á ocho.
Pocion emenagoga de Desbois.	

AFECCIONES NERVIOSAS. (*Véanse spasmos, vapores.*)

AGRIOS DE ESTÓMAGO. ACESCENCIA GÁSTRICA.

Magnesia calcinada	Media dracma en un vaso de agua con azucar ó en una taza de leche.
Píldoras de jabon.	De dos á cuatro por mañana y tarde.
Marfil calcinado	De doce granos á dos escrúpulos.
Cuerno de ciervo calcinado .	De doce granos á media dracma.
De electuario de magnesia . .	De media á dos dracmas.
Lilio ó licor confortativo de Paracelso.	De diez á treinta gotas en medio vaso de infusion de flores de tilia ó en una taza de té.
Espíritu carminativo de Silvio.	De doce gotas á una dracma, en un vehículo apropiado.
Polvos de Kent.	De doce granos á media dracma
Confeccion de hyacintos. . .	De diez y ocho granos, á dracma y media.
Pastillas de hojos de cangrejos.	De una á cuatro dracmas.

AMENORREA. (*Véase supresion de las Reglas.*)

ANASARCA. (*Hidropesia del tejido celular.*)

MEDIOS GENERALES.

Escarificaciones.
Cauterio por debajo de las rodillas.
Eméticos, purgantes, diaforéticos, y diuréticos.

MEDIOS PARTICULARES.

Baños de estufa muy calientes.

Fricciones secas y linimento volatil.
Pediluvios calientes y salados.
Digital purpurea en infusion ó tintura.
Tartaro soluble.
Espíritu de nitro dulce . . . De media á una dracma en una pocion diurérica.
Tintura de tabaco. . . . . De un escrúpulo á una dracma.
Píldoras de Bacher.
Esencia de trementina. . . . Seis veces al dia tres gotas.

(*Véase el artículo general hidropesia.*)

ANGINA TONSILAR.

MEDIOS GENERALES.

Sanguijuelas detrás de las orejas.
Emético. . . . . Uno, dos ó tres granos.
Laxantes suaves sales purgantes
Exuntorios á la nuca, si es considerable la inflamacion.
Gargarismos ligeramente abstringentes y acidulos.

MEDIOS PARTICULARES.

(*Cuando se manifieste la afeccion febril.*)

Diaforéticos.
Suero de leche, agua de cebada. Cataplasmas emolientes al cuello.

ANGINA MALIGNA.

MEDIOS GENERALES.

Una dracma de quina de dos en dos horas.
Gargarismos anti-septicos.
Hipecacuana en pequeñas dósis unida á los diaforeticos.
Bebidas vinosas y acidulas.

MEDIOS PARTICULARES.

El Dr. Tomas de Salisbury aconseja contra la angina gangrenosa una decoccion de pimienta cayenna (dos cucharadas para un azumbre de agua hirviendo) uniéndole medio cuartillo

de vinagre. La dósis es de dos cucharadas de esta mezcla cada media hora.

ANGINA TRAQUEAL (*Vèase angina inflamatoria.*)

AFONIA.

Éter bálsamico de Tolú
Pocion del Dr. Mongenot.

APOPLEGIA SANGUINEA. (1)

MEDIOS GENERALES.

Sangrias de las yugulares.
Purgantes drásticos.
Enemas estimulantes.
(*Cuando se presenta la apoplegia en seguida de una indigestion se emplea el emético.*)

MEDIOS PARTICULARES.

Vino de Huxam.	De dos á tres onzas en enemas.
Electuario diacolocynthidos (2)	De una dracma á una onza. Este es un purgante muy fuerte.
Electuario diafénico.	De una dracma á una onza; es mas suave que el anterior.
Píldoras de Rudius.	De doce granos á dos escrúpulos. Purgan con mucha fuerza.
Gotas cefálicas de Inglaterra.	De diez gotas á media dracma.
Agua teriacal.	De una á cuatro dracmas.
Agua general.	De dos á cuatro dracmas.
Elixir de los jacobinos de Rowen	De media á dos dracmas.
Vino anti-apoplectico . . .	De tres á cuatro onzas.
Éter acetico cantaridado . .	De dos á tres dracmas.
Mixtura pectoral de Quarin	A cucharadas cada cuarto de hora.
Agua espirituosa de Anhalt	De dos á tres dracmas.

---

(1) *Véase la tabla de los remedios extérnos.*
(2) *Farmacop. de Palacios.*

APOPLEGIA SEROSA.

MEDIOS GENERALES.

No deben usarse sangrias, á lo menos si se hacen, con grande reserva y solo en los casos particulares.
Purgantes drásticos.
Estornutatorios.
Vejigatorios á la cabeza, al dorso, ó á los miembros.
Sinapismos á los pies.
(*Despues del ataque*) Elixires cefalicos.
Purgantes amargos.
Vino anti-apoplectico.

ASCITIS-MEDIOS GENERALES.

Drásticos diúreticos.
Fricciones de aceite sobre el vientre.
De tiempo en tiempo un emético.

MEDIOS PARTICULARES.

(*Véase el articulo general Hidropesia.*)

ASMA.

MEDIOS GENERALES.

Magnesia unida con el ruibarbo. . . . . Seis granos de cada cosa.
Lavativas emolientes.
Hipecacuana como vomitivo.
Éter opiado.
Goma amoniaco y scila.
Pediluvios calientes.

MEDIOS PARTICULARES.

Opio y carbonate de cal combinados.
Tintura de la digital . . . Quince gotas dos veces al dia.
Quina é infusiones amargas.
Sulfate de fierro.

Tintura de castor y azafrán	De cada cosa media dracma en un vaso de infusion de valeriana.
Agua de brea.	Tres vasos al dia, por la mañana, al medio-dia, y á la tarde, no debe comerse hasta pasadas dos horas
Píldoras de asa fetida y de goma amoniaco (partes iguales, de cuatro á cinco al dia.)	
Vino scilítico	De una á tres onzas mitad en la mañana y mitad á la tarde.
Vino de énula campánula. .	De cuatro dracmas á tres onzas.
Elixir anti-asmático de Boherhave.	De veinte á treinta gotas en una taza de tipsana pectoral.
Elixir paregorico Inglés . .	De cincuenta á cien gotas.
Extracto de aristoloquia . .	De seis granos á media dracma.
Extracto de scabiosa. . . .	De seis á veinte y cuatro granos.
Extracto de álamo blanco .	De ocho granos á media dracma.
Oximiel scilitico	De una dracma á una onza.
Pocion de hipecacuana de Haller.	
Polvos de scila de Sthal . .	De tres á cinco granos.
Infusion de hollin de Piderit.	De una dracma á una onza en vino.
Mixtura de Bruner	Una onza tres veces al dia.
Agua de Villatria artificial .	De uno á dos azumbres al dia.
Jarave de calabria.	De ocho dracmas á una onza en una infusion pectoral.
Pastillas de azufre.	De dos dracmas á una onza.
Píldoras de cinoglosa . . .	De tres á seis granos.
Jarave de nicociana	De dos dracmas á dos onzas; es purgante.
Trosiscos de scila.	De un escrúpulo á tres dracmas.
Jarave anti-asmático	De una dracma á una onza.
Píldoras de Quarin	De cinco á doce.
Esencia scilítica de Kemp .	De cuarenta á sesenta gotas.
Looch de Gordon.	

BLENORREA.

Mixtura balsámica de Fuller.	Una cucharada mañana y tarde.
Vino del Dr. Fortice . . .	Cuatro cucharadas al dia.
Pocion balsámica de Choppart.	

CACHEXIA. (*Véase Marasmo.*)

CALCULOS BILIARIOS.

Mixtura de Wiitt . . . . . De doce á veinte gotas en azucar.

CALCULOS DE LA VEJIGA.

Cerveza diurética Inglesa. . . De dos á tres vasos.

CANCER.

Píldoras de acónito del Dr. Double . . . . . Una á mañana y tarde.
Píldoras mercuriales . . . . Dos al dia.
Extracto de cicuta . . . . . De uno á cuatro granos. Se aumenta poco á poco la dósis hasta doce y mas.

ENFERMEDADES CANCEROSAS Y ESCROFULOSAS.

Elixir anti-escrofuloso de Peyrelh . . . . . Una cucharada ordinaria.

CARDIALGIA.

Tintura de guayaco de Lóndres . . . . . De una dracma á media onza.

(1) CARREAU DE LOS NIÑOS.

Tintura de malate de fierro. De un escrúpulo á una dracma.

CATARRO. (*Véase Romadizo.*)

MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada acidula con el jarave de limon (*Si hay diatesis inflamatoria, sangria ó sanguijuelas.*)

---

(1) *Obstrucciones mesentéricas de los niños.*

Antimoniales y diaforéticos á pequeñas dósis.
Bebidas mucilaginosas aciduladas.
Espíritu de mindereros. . . . Media onza tomada en dos horas.
Oximiel scilítico. . . . . Media onza.
Looch endulzado con el jarave de Tolú.
Emulcion con la goma amoníaco el opio &c.

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de digital. . . . . Treinta gotas.
Mirra scila y goma amoniáco combinados.

CATARRO CRÓNICO. (*Véase tabla de las enfermedades.*)

Elixir pectoral Inglés. . . . De media á dos dracmas en una taza de infusion de las cuatro flores.
Elixir paregórico . . . . . De cincuenta á cien gotas.
Looch de Gordon. . . . . A cucharadas.
Conserva de Tronchin. . . . A cucharadas de hora en hora.
Píldoras del Dr. J. J. Leroux. De tres á cuatro al dia.
Píldoras anti-catarrales del Dr. Pariset . . . . . Dos de mañana y tarde.
Píldoras anti-catarrales del Dr. Petit. (*Véase su uso en este volumen.*)
Mixtura anti-catarral Rusa. . A cucharadas de café
Polvo anti-catarral de Viena. De una á dos dracmas.
Polvo de Wedelio . . . . . De uno á dos escrúpulos.
Jarave pectoral Inglés. . . . De una á dos onzas en una infusion apropiada.

Tipsana de Buchan.

CATARRO LARINGEO.

Éter balsámico de tolú del Dr. Moreau.

CATARRO DE LA VEJIGA. (*Véase mal de piedra.*)

CEFALARGIA JAQUECA DOLOR DE CABEZA.

(*Véanse remedios externos.*)

CLOROSIS. (*Color pálido.*)

MEDIOS GENERALES.

Emético.
Infusion de genciana y de quasia.
Preparaciones marciales.
Aguas minerales ferruginosas.
Purgantes drásticos á pequeñas dósis.

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de quina de muriate de fierro y de cantáridas.	Mezclados en proporcion conveniente.
Limaduras de fierro porfirizado.	De dos á 24 granos. Se diluye la limadura de fierro ó en un vino generoso ó en una tipsana amarga.
Azafrán de marte ó eptiope marcial.	De dos á 24 granos.
Pastillas de enula campanula.	Media onza.
Vino calibeado.	De dos dracmas á dos onzas. Se dá solo en una infusion apropiada.
Tintura de ajenjos.	Diez gotas ó una dracma en un vaso de tipsana.
Pastillas marciales del código.	Dos al dia.
Píldoras tónicas de Stoll . .	De cuatro á seis.
Píldoras tartareas de Sehrodéz.	De un escrúpulo á dracma y media.
Píldoras calibeadas	De seis granos á media onza.
Píldoras marciales de Koempf.	De doce á treinta y seis granos al dia.
Confeccion de ruda.	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Elixir americano.	Tres cucharadas de café al dia.

CÓLICO DE ESTÓMAGO.

Gotas amargas.	De dos á ocho en una infusion de plantas estomáquicas.
Elixir teriacal.	De diez á treinta gotas.
Polvos de coral de Hervecio.	De diez y ocho granos á dos escrúpulos.

Teriaca de Venecia	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Contra veneno.	De diez y ocho granos á una dracma.
Diascordio.	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Mitridato.	De doce granos á una dracma.
Filonio romano	De una á dos dracmas.

CÓLICO BILIOSO.

MEDIOS GENERALES.

Infusion de manzanilla.
Lavativas laxantes.
Purgantes con jarave de espino serval, jalapa y calomelanos.
Pocion calmante con un grano de opio.
Franelas calientes é impregnadas en una decoccion emoliente aplicadas en el hipogastrio.

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura anodina de coral de Hervecio.	De veinte gotas á media dracma.
Agua generala.	De dos á cuatro dracmas.
Miel mercurial.	De una á cuatro onzas en lavativas.
Jarave de amapola.	De dos dracmas á onza y media.
Teriaca diatessarón (1) . . .	De doce granos á dos dracmas.
Mitridato.	De doce granos á una dracma.
Filonio romano	De media á dos dracmas.
Bálsamo tranquilo	De media á dos onzas en lavativas.
Bálsamo de la vida de Hofman.	De diez gotas á media dracma.
Laúdano de Sydeham	De diez gotas á una dracma.
Opio de Rousseau.	De dos á diez gotas.

CÓLICO VENTOSO.

MEDIOS GENERALES.

Agua de yerbabuena y de azahar.
Agua de anis.

---

(1) *Farmacopéa de Palacios.*

Jarave de diacodion.
Enemas calmantes.
Fomentos calientes sobre el addomen.
Tintura de jalapa y de sén compuesta.

CÓLICO DE LOS PINTORES.

Remedio de la caridad.

CÓLICO HISTÉRICO.

MEDIOS GENERALES.

Pocion anti-espasmódica con la tintura de castor, el éter sulfúrico, la tintura de opio, el agua de azahar, el aceite animal de Dippel.

MEDIOS PARTICULARES.

Aceite de risino.	De media á dos onzas con una onza de jarave de limon.
Éter sulfúrico.	De diez á treinta gotas.
Tintura de Bestucheff. . . .	De quince á cuarenta gotas.

CÓLICO MISERERE.

(*Cólera Morbo.*)

MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada ó semillas de lino.
Agua de pan ó de harina de avena.
Tipsana de pollo.
Fomentos sobre el estómago con una decoccion de adormideras y una cuarta parte de aguardiente alcanforado.
Píldoras de opio . . . . . Medio grano cada hora.
Lavativas opiadas.
Baño caliente.
(*Hacia el fin.*) Vino de quina, polvos de columbo, ruibarbo.

CÓLICO NEFRÍTICO.

Espíritu de nitro dulce. . . Una cucharada de café, con mi-

tad de laudano en un vaso de tipsana de parietaria.

Agua imperial.	De dos á cuatro dracmas.
Licor anti-nefrítico de Adams.	Dos dracmas mañana y tarde.
Bálsamo de butua brava. . .	De media á dos dracmas.
Jarave de altea compuesto. .	De una á cuatro dracmas en un vaso de tipsana.

Pocion del Dr. Norford.

Balsamo de Fioraventi. . . .	De cinco á diez gotas en té.
Espíritu de nitro dulce. . .	De veinte á sesenta gotas.
Pocion capivi	A cucharadas de media en media hora en una tipsana diurética.

CONSTIPACION.

Electuario lenitivo..	De una á tres dracmas.
Mermelada de Tronchin. . .	Una cucharada todas las tardes.
Píldoras relajantes de Buchan.	De tres á nueve mañana y tarde.

CONVULSIONES DE LOS NIÑOS.

Magnesia calcinada.	De ocho á diez granos. Se mezcla á otro tanto de ruibarbo en una tipsana anti-espasmódica.
Tintura de hollin.	De doce á trece gotas.
Polvo de la Princesa de Carigna.	De diez y ocho granos á una dracma.
Teriaca.	De diez á veinte granos.

CONVULSION DE LOS ADULTOS.

Extracto de estramonio. . .	De medio á dos granos dos veces al dia.
Extracto de beleño	De uno á tres granos.
Polvo anti-espasmódico. . .	De un escrúpulo á una dracma.
De guteta	De dos granos á una dracma.
Dorado de Zell	De seis granos á un escrúpulo.
De Tunquin.	Doce granos.
Teriaca diatessarón.	De diez y ocho granos á dos dracmas.

COQUELUCHE.

MEDIOS GENERALES.

Vejigatorios volantes sobre el pecho, ó pomada del Dr. Autenrieth.
Laxantes suaves.
Emético á pequeñas dósis repetidos.

Oximiel scilítico.
Almizcle, castor, alcanfor, aceite de succino.
Embrocaciones de éter opiado sobre el pecho.

MEDIOS PARTICULARES.

Digital unida al opio.
Decoccion de la quina.

Jarave de ruibarbo.	A cucharadas de café dos ó tres veces al dia
Kermes mineral	La cuarta parte de un grano ó un medio grano mezclado con s. q. de jarave diluido en un poco de agua.
Jarave de adormideras . . .	De una á cuatro dracmas en una taza de infusion de hisopo ó de poleo.
Tintura anisada de Alibert .	Una onza á pequeñas cucharadas. Se mezcla esta tintura con un poco de jarave pectoral y un poco de agua.
Jarave del Dr. Desessarts. .	Una onza por cucharadas en un poco de tipsana pectoral.
Jarave del Dr. Maleot. . .	A cucharadas de hora en hora en una taza de infusion de hisopo de flores pectorales.
Jarave de Rivet.	Idem.
Jarave para el coqueluche. .	Idem.
Jarave de dátiles	Idem.
Jarave contra la tos. . . .	Idem.
Polvo sedativo de Wetzler.	(*Véase su uso en este volumen.*)
Jarave de Boulay	Á cucharadas tres ó cuatro veces en la mañana.
Polvos del Dr. Marc.	
Pocion de Dr. Jeanroy. . .	Seis cucharadas en la mañana.
Elixir paregórico inglés . .	De cincuenta á cien gotas. (1)

GOLPES Y CAIDAS. (2)

Especies vulnerarias. . . .	Un puñado en infusion.
Aguas vulnerarias. De esmeraldas, de la generala, de torongil, de colonia	De dos á cuatro dramas en la in-

(1) *Véase la tabla de los remedios externos.*
(2) *Véase la tabla de los remedios externos.*

fusion indicada arriba. Se hacen fricciones con estas aguas espirituosas sobre las partes ofendidas, sobre las sienes y frente. Se respira fuertemente.

ESPUTO DE SANGRE. (*Hemoptysis.*)

MEDIOS GENERALES.

Bebidas acídulas y abstringentes.
Laxantes. Como el tamarindo, el fosfate de sosa, sulfate de potasa.
Tinturas de kino, de cachunde, y de opio mezcladas.

Sulfate de fierro y de opio.	De cada cosa dos granos en doce granos de conserva de rosas.
Digital purpúrea en polvo. .	A la dósis de un grano en diez granos de conserva de rosas.

MEDIOS PARTICULARES.

Mixtura de Quarin	Á cucharadas.
Píldoras de alumbre de Hervecio	De seis á doce.
Conserva de rosas.	De tres á cuatro onzas al dia.
Laudano líquido.	De diez á doce gotas en un vaso de agua de cebada.
Elixir vitriólico de Minsicht.	De diez á cuarenta gotas en un vehiculo apropiado.
Jarave de grande consuerda.	De dos dracmas á una y media onza.
Polvo abstringente.	De doce granos á una dracma.
Píldoras abstringentes . . .	De seis granos á un escrúpulo.
Hockiac.	De un escrúpulo á una dracma en una bebida pectoral.
Alumbre de Hervecio . . .	De seis granos á media dracma.
Píldoras de elecho compuestas.	De seis granos á media dracma.
Trosiscos de Karave	De doce granos á una dracma.
Pocion de Jussieu.	En dos dósis.
Polvo de Haly	De media dracma á dracma y media.
Polvo de kino compuesto . .	Un escrúpulo.
Bálsamo abstringente de Richard	De uno á dos escrúpulos.
Electuario balsámico y abstringente de Barthes. . .	De cinco á seis cucharadas al dia.
Extracto de cachunde. . . .	De medio escrúpulo á una dracma.

CALAMBRES DEL ESTÓMAGO

Almizcle.	Diez granos en media dracma de teriaca.
Julepe moscado de Fullér.	De cuatro á cinco onzas á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.
Polvos de Haly	De media á una y media dracma.

ANGINA TRAQUEAL.

MEDIOS GENERALES.

La sangría, el émetico.

Vejigatorios al pecho ó á la parte anterior del cuello, ó bien fricciones ligeras sobre el cuello con un linimento alcanforado, al que se le agrega algunas gotas de tintura de cantáridas.

Minorativos para sostener el vientre libre.

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de digital purpúrea.	Cinco gotas cada cuarto de hora.
Fricciones sobre el pecho con una mezcla de éter y de tintura de opio á partes iguales.	
Tintura de scila.	Media dracma.
Vino de hipecacuana . . .	Media onza.
Julepe escocés.	De cuatro á cinco onzas.
Mixtura para la angina inflamatoria.	Á cucharadas.
Sulfureto de potasa	De uno á seis granos diluidos en el jarave de hipecacuana.
Muriate dulce de mercurio.	Un grano en un bolo con miga de pan y azucar. Se repite cada dos horas este remedio.
Jarave de higado de azufre.	De media á una onza.
Pastillas de Mr. Chaussier .	De cuatro á seis al dia.

TOS SOFOCATIVA.

Mixtura para la angina inflamatoria.

Pocion de Quarin . . . . . Una onza cada tres horas.

TOS CONVULSIVA.

Polvo de Quarin . . . . . Media dracma cada cuatro horas.

Elixir paregórico . . . . . De cincuenta á cien gotas.

BAILE DE S. BITO.

Píldoras del Dr. Merat . . De dos á cuatro al dia.

HERPES. ENFERMEDADES DE LA PIEL. (1)

Sulfureto de antimonio . . . De doce á diez y ocho granos mezclados con partes iguales de azucar para tomar de una vez.

Nitrate de potasa . . . . . De media dracma á una al dia en una infusion de fumaria.

Bolo diaforético inglés.

Licor de Presarvin . . . . De uno á tres vasos de ratafia al dia.

Píldoras de Plumier . . . . Seis al dia en dos tomas.

Píldoras de aconito del Dr. Double. . . . . Una mañana y tarde.

Polvos de Grimaldi. . . . . Cuarenta y ocho grados. (*Purgante.*)

Jarave de higado de azufre. De una á dos onzas.

Depurativo de Majault. . De una á dos onzas.

Tipsana de vinache . . . . Un azumbre.

Extracto de fumaria. . . . De un escrúpulo á una dracma.

De scabiosa. . . . . De seis granos á un escrúpulo.

Jarave de fumaria . . . . De dos dracmas á una y media onza.

De espino serval . . . . . De dos dracmas á dos y tres onzas. (*Purgante.*).

Jarave de Vellet. (*Véase la tabla de las fórmulas.*)

Confeccion de Hamec. . . . De una dracma á una onza. (*Purgante.*)

Pastillas antimoniales de Kunckel. . . . . De una á cuatro dracmas.

Pastillas de azufre . . . . De una dracma á una onza.

Píldoras de panacea mercurial. De seis granos á un escrúpulo.

Píldoras de Belloste . . . . Dos al dia, seis á ocho para purgar.

Píldoras de Renaudot . . . De doce á cuarenta y ocho granos.

Purgante del Dr. Wilson . De dos á diez granos.

Agua oxigenada de Alion . . Dos ó tres vasos en la mañana.

(*Véase la tabla de las enfermedades.*)

---

(1) *Véase la tabla de los remedios externos.*

DESFALLECIMIENTO. (1)

Agua de la reina de Ungría, de la generala, de colonia, de torongil, vulnerarias, de esmeraldas . . . . . De dos dracmas á una onza dilatadas en un poco de agua. Con ellas puras se frotan las sienes y la frente del enfermo.

DIABETES.

MEDIOS GENERALES.

Los antimoniales unidos al opio.
Vejigatorios sobre las regiones lombares.
Goma kino, cachunde, sulfate de zinc.
Ácidos sulfúrico y nitrico.
Quina, hierro y mirra mezclados.

MEDIOS PARTICULARES.

Dieta puramente animal, y sin ningun alimento vegetal.
Píldoras saponaceas aloeticas.
Sulfureto de amoniaco. . . . De tres á cuatro gotas cuatro veces al dia en un vehiculo apropiado.
Limonada nítrica.

DIARREA.

MEDIOS GENERALES.

Dósis ligeras de hipecacuana.
Ruibarbo y canela mezclados.
Polvos de James.
Cocimiento de cebada, de arroz, de malva, de cuerno de ciervo.
Agua de goma arábiga, agua panada.
(*Si hay agrios en el estómago*) los absorventes unidos á los opiados.

MEDIOS PARTICULARES.

Sulfate de sosa y de magnesia.

(1) *Idem.*

Fosfate de sosa.
Aceite de risino y tintura de opio.
Quina, conserva de Cinorrhodon. Preparaciones marciales, cachunde.
Goma kuino. Cuando la enfermedad proviene de una acrimonia tenáz.
Cuando se han ingerido sustancias venenosas.
Cuando hay asenia general ó local.
Agua de cal, leche y goma arábiga. En la diarrea crónica.

Marfil calcinado.	De doce granos á dos escrúpulos.
Cuerno de ciervo calcinado.	Idem.
Tintura de coral anodina de Hervecio	De veinte gotas á media dracma.
Rob de sauco.	De un escrúpulo á una dracma.
Extracto de ciento en rama.	De doce á cuarenta y ocho granos.
Miel de nenufar. (1) . . .	De una á cuatro onzas.
Miel rosada.	De una dracma á una onza en una enema.
Jarave de ninfa.	De dos dracmas á una y media onza.
Jarave de rosas secas. . . .	Idem.
Jarave de grande consuelda.	Idem.
Jalea de cuerno de ciervo.	De dos, á cuatro, y seis onzas.
Conserva de rosas y de cinorrhodon.	De dos dracmas á una onza.
Polvos de Kent	De doce granos á media dracma.
De coral de Hervecio . . .	De diez y ocho granos á dos escrúp.
Confeccion de jacintos . . .	De diez y ocho granos á dracma y media.
Orvietarum (2) Proctancius. .	De doce granos á una dracma.
Diascordio.	De un escrúp. á dracma y media.
Polvos de greda compuestos .	De seis á doce granos tres veces al dia.

(1) *Nenufar, dán los franceses este nombre á una planta que crece en los mares y lagos. Una parte de sus raices se nutre en el fondo del agua y la otra nada por encima. La medicina emplea sus frutos raices y con especialidad las flores: su virtud es narcótica* = El traductor.

(2) Orvietarum. *Nombre de un antídoto célebre asi llamado, segun Lemery de Orvieto, villa de Italia, donde fué inventado ó segun otros de Geronimo Cerrantes Orvietan, célebre charlatán que fué su inventor. Véase la preparacion en la Palestra farmaceútica de Palacios.* = El traductor.

Catolicón doble	De dos dracmas á dos onzas.
(*Minorativo.*)	
Píldoras de helecho compuestas	De seis granos á media dracma.
Trosiscos de Karave	De doce granos á una dracma.
Aceite de almaciga	De media á una onza en enemas.
Electuario anti-disenterico. .	De una á tres dracmas.
Polvos de Haly	De media á una y media dracma.
Cocimiento blanco de Sideham.	Un vaso cada hora.
Looch de almidon.	
Píldoras anti-disentéricas de Wilis.	Tres.
Remedio de Quarin	Tres y media onzas cada tres horas.

DISENTERIA.

MEDIOS GENERALES.

Emético.
Laxantes suaves.
Hipecacuana mezclada con un polvo aromático.
Enémas, emolientes y opiadas.
Bebidas mucilaginosas, leche y jarave de goma.
Agua de arroz.

EN EL SEGUNDO PERIODO.

El ruibarbo y el opio combinados.
El beleño.
Opio y quina mezclados.
El cachunde, la goma kuino.
Vino mezclado al cocimiento de palo campeche y cortezas de granadas, leche terciada con agua de cal.

MEDIOS PARTICULARES.

Sulfate de zinc unido al opio.
(*Véase el artículo diarrea.*)

DISPECCIA.

MEDIOS GENERALES.

Magnesia y ruibarbo.

Agua de yerbabuena y laudano.
Laxantes suaves combinados con los aromáticos.
(*Si hay caldiargia y vómitos*) Rubefacientes al estómago.

Para establecer el tono del estómago.

Infusion de genciana con tintura de mirra y cardomomo.
Quina, canela, y raiz de columbo.
Cocimiento de hombrecillo y de raiz de ratania con corteza de naranja.
Aguas minerales ferruginosas.
Aguas de Selso de Pyrmont.

MEDIOS PARTICULARES.

(*Véase el artículo indigestion.*)

DISURIA, STRANGURIA.

Pocion diurética de Buchan. .	Una taza de cuatro en cuatro horas
Trosiscos de vejiga de perro. (*Planta*)	De doce granos á una dracma.
Pocion diurética del Dr. Halle.	

LAMPARONES. (*Véanse escrófulas.*)

EMBARAZO GÁSTRICO.

SABURRAS EN LAS PRIMERAS VIAS.

(*Necesidad de purgar.*)

Tártaro estibiado	De uno á tres granos como vomitivo.
Pulpa de Casia	De una á una y media onza.
Pulpa de tamarindos. . . .	De dos dracmas á una onza (1)
Catolicón doble	De dos dracmas á dos onzas.
Electuario de zarza purgante simple	De tres dracmas á dos onzas.
Zarza purgante solutivo. . .	De dos dracmas á una onza.

---

(1) *Conviene el tamarindo en las estaciones calientes cuando conviene al mismo tiempo purgar y refrescar al enfermo.*

De escorzonera	De una á seis dracmas.
Pastillas de citrón	De dos á seis dracmas.
De diacartamo	De tres dracmas á una onza.
Píldoras anti-cibum.	De doce granos á una y media dracma. (*Purgante suave.*)
Angélica.	Idem.
Panchymagogu.	De diez granos á media dracma.
Purgantes de Hervecio. . .	Idem.
Aloeticas.	Idem.
Hidragogas de Boncio . . .	Idem.
De Rudio	De medio á dos escrúpulos.
Cerveza purgante inglesa . .	Medio cuartillo dos veces al dia.
Bizcochos purgantes	Número 1.
Aguardiente purgante de Mezaize.	Una y media onza (1)
Pocion laxante de Viena. .	De una á cinco onzas.
De hipecacuana de Haller.	
Purgante del Dr. Andry.	
Mermelada de Zanetti . . .	De dos á cuatro cucharadas de café.
Extracto de coloquintidas compuesto.	De diez granos á media dracma.
Aguardiente aleman	De dos dracmas á dos onzas. (2)
Agua de Trevis.	Un azumbre.
Elixir sagrado	De una á diez y media onzas.
Visceral de Hofman	De una á dos dracmas.
Jarave de Rhamnus catarticus, de flor de durazno, de nicociana, de rosas compuesto, de chicorias compuesto, magistral abstringente. . .	De dos dracmas á dos onzas.
Polvo cornáquino.	De media á dos dracmas. (3)
Vomitivo de Hervecio . . .	Diez y ocho granos.
De Grimaldi	Cuarenta granos.
Del conde de Warwick. . .	De doce á veinte y cuatro granos.
Electuario lenitivo.	De cuatro dracmas á una y media onza.

(*Se usa tambien en lavativas.*)

---

(1) *Este purgante conviene solo á las personas flemáticas.*

(2) *Idem que el anterior.*

(3) *Es preciso abstenerse de él en las enfermedades inflamatorias.*

Sal de Guindre.	Seis y media dracmas.
De azucar naranjada purgante.	De dos á tres dracmas.
Tipsana real	Un cuartillo.
Tintura de Affy.	De una á tres onzas.
Sagrada	De una á dos dracmas.
Píldoras escocesas.	De una á una y media dracma.
Polvo tónico é incisivo del Dr. Lasione. (*Véase la fórmula*)	
Purgante del Dr. Wilion. .	De dos á diez granos.

ENVENENAMIENTOS.

Por los oxidos metálicos.

Emético.	De dos á tres granos.
Hipecacuana	De veinte y cuatro á veinte y ocho granos.
Vinagre scilitico.	De tres á cuatro cucharadas.
Carbonate de sosa de potasa.	Una dracma, un azumbre de agua.
Sulfureto de potasa	Seis granos en un vaso de agua ó en píldoras.
Sulfate de fierro.	De diez á doce granos.
Tinta	Una cucharada en un azumbre de agua.

Por las sales metálicas.

Amoniaco líquido	Treinta gotas en un vaso de bebida.
Agua de cal.	De seis á diez y seis onzas.
Quina	De una á cuatro dracmas.
Bálsamo de azufre.	De una á dos dracmas.
Trementina	De un escrúpulo á una dracma.

POR EL PLOMO.

Remedio de la caridad.

POR LOS ÁCIDOS.

Agua de jabon	De un cuartillo á un azumbre.
Magnesia calcinada	De un escrupúlo á una dracma.
Pocion del Dr. Andry.	
Teriaca.	De una á dos dracmas.

Jarave de diacodion. . . . . De cuatro dracmas á una onza.

POR EL OPIO.

Limonada vegetal y mineral. De un cuartillo á un azumbre.
Éter. . . . . De un escrúpulo á una dracma.

POR LOS HONGOS.

Tratamiento indicado. (*Véase la tabla de las fórmulas.*)

ENTERITIS (*Véase inflamacion de los intestinos.*)

EPILEPSÍA.

MEDIOS GENERALES.

La epilepsia puede ser fruto del estímulo que induce la dentición, puede tambien producirse por la supresion de una evacuacion, por sahurra intestinal, por un tumor, por una lesion oculta de algunos nervios &c.

Su tratamiento varia segun la causa.

(*Cuando hay pletora.*) Sangrias locales exuntorios.
Digital á la dósis de un grano.
Opio y valeriana . . . . . Dos granos en el principio y despues dos dracmas.
Almizcle y opio.
Éter, aceite de succino, aceite animal de Dippel, Arnica montánica, belladona y beleño.
Flores de zinc . . . . . De tres á cuatro granos en píldoras.
Almizcle . . . . . De cinco á doce granos en píldoras con el extracto del musgo quercino.
Alcanfor. . . . . De ocho á diez y seis granos.
Castor . . . . . De tres á diez y seis granos. (1)
Asa fétida. . . . . De medio á un escrúpulo.

---

(1) *Sustancias simples que se usan solas ó mezcladas.*

MEDIOS PARTICULARES.

Quina.	
Fierro amoniacal.	
Flores de zinc	Cinco granos en píldoras.
Nitrate de plata.	Tres granos en veinte píldoras de las que se tomarán dos al dia.
Elixir anti-epileptico.	
De vida de Matiolo	De una á cuatro dracmas interiormente. Se frotan tambien las sienes y debajo de la nariz.
Elixir vitriólico de Minsicht.	De veinte á cuarenta gotas en un vehículo aquoso.
Gotas anodinas inglesas. . .	De diez gotas á media dracma.
Gotas cefálicas de Inglaterra.	Idem.
Extracto de extramonio . . .	De medio á dos granos.
De beleño.	De uno á tres granos.
De valeriana	De doce á cuarenta y ocho granos.
Polvo anti-espasmódico . . .	De un escrúpulo á una dracma.
De euttela.	De dos granos á una dracma segun la edad.
De oro de Zell.	De seis granos á un escrúpulo.
De Tunquin	Doce granos.
Teriaca diatesarón.	De doce granos á dos dracmas.
Electuario diacoloquintidos.(1)	De una dracma á una onza.
Aceite animal de Dippel. . .	De cinco á treinta gotas mezcladas con éter.
Alcohol amoniacado	De veinte á cuarenta gotas en un vehículo apropiado.
Éter sulfúrico, nitro muriático.	De diez á veinte gotas con azucar.
Cerveza cefálica inglesa . .	De cuatro á cinco vasos al dia.
Píldoras anti-epilepticas inglesas	Una de cada vez.
Del Dr. Merat.	De dos á tres al dia.
Cupreas de Swediaur. . . .	De dos á tres.
De Quarin	De dos á cuatro.
Electuario del Dr. Mead. .	Una dracma de mañana y tarde.

(1) *Farmacopéa de Palacios, llamase asi por entrar como principal ingrediente la coloquintida.*=El traductor.

ERUPTOS (*Véanse flatuosidades.*)

Polvo diaromatón . . . . . De cinco á veinte granos.
Elixir fortificante de Selle . }
Carminativo de Wedelius. . } a, una dracma.
Tintura de ruibarbo de Spielman, media onza en un vehiculo apropiado.
De Bestuchef . . . . . De veinte á treinta gotas

ESQUINANCIA ANGINA, MAL DE GARGANTA.

(*Véanse remedios externos.*)

Pulpa de tamarindos. . . . De dos dracmas á una onza.
Oximiel simple . . . . . Idem.
Miel rosada . . . . . De una dracma á una onza.
Jarave de moras . . . . . De dos dracmas á onza y media.
De vinagre. . . . . De dos dracmas á una onza.
Polvo temperante de Stahl . Doce granos.
Bebida anti-floxística de Stholl. Una taza cada hora.
Bolos diaforéticos ingleses . Dos al dia.

EXTINCION DE LA VOZ. (*Véase aphonia.*)

DEBILIDAD DE ESTÓMAGO, POSTRACION DE FUERZAS.

ATONIA.

Vino de ruibarbo compuesto. De una á dos onzas.
Amargo. . . . . Idem.
Stomaquico de Plench . . . Idem.
Wakaka de las Indias . . . De una dracma á una onza.
Vino de quina . . . . . De tres á cuatro onzas á la hora de comer, lo mismo á la tarde.
De ajenjos . . . . . De dos á seis onzas id. id.
De énula campánula . . . . De cuatro dracmas á cuatro onzas.
Bálsamo de la vida de Leliebre. De una á tres cucharadas con una hora de intermedio.
Esencia de Wedelio . . . . De media á una dracma.
Elixir de la vida de Mathiolo De una á cuatro dracmas.
Visceral de Hofman . . . . De una á dos dracmas.

De Stoughton	De diez gotas á una dracma en una taza de té.
Extracto de ajenjo.	De medio escrúpulo á una dracma.
De centaura menor.	De medio escrúpulo á media dracma.
Licor de Paracelso.	De diez á treinta gotas en un vehículo estomacal.
Extracto de genciana . . .	De medio escrúpulo á media dracma.
De ruibarbo	Idem.
De enebro	De un escrúpulo á dos dracmas.
De aloes	De dos á cuatro granos.
Agua teriacal	De una á cuatro dracmas.
Jarave de ajenjos	De dos dracmas á una y media onza.
De quina.	Idem.
De kermes	De dos dracmas á una onza.
De yerbabuena	De dos dracmas á una y media onza.
Elixir de Garux	Idem.
Tintura estomaquica de Moscati.	De cuatro á seis dracmas dos veces al dia.
Stomaquica amarga de Edimburgo	De cuatro á cinco dracmas.
De cardomomo compuesta (Lond.)	De dos á cuatro dracmas.
Agua espirituosa de Anhalt .	De dos á tres dracmas.
Polvo de diarrhodon	De un escrúpulo á una dracma.
De los tres sándalos. . . .	Idem.
Letifiante.	Idem.
De ambar compuesto. . . .	Idem.
De aro de Berckman.	
Confeccion de jacintos . . .	De diez y ocho granos á una y media dracma.
De alkermes	De un escrúpulo á una idem.
Teriaca.	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Orvietan	De diez y ocho granos á dos dracmas.
Mitridato (1).	Idem.

(1) *Contra veneno, medicina compuesta de varias drogas.* = El traductor.

Diascordio	De un escrúpulo á dracma y media.
Filonio romano	De treinta y seis granos á una dracma.
Opiata de Salomon	De un escrúpulo á una dracma.
Electuario de hiera piera. .	De una á seis dracmas.
Pastillas de bainillas . . .	De una dracma á una onza en el discurso del dia.
De clavos de comer. . . .	De una á cuatro dracmas.
De canela	Idem.
De cachunde	Idem.
De mogoles.	Idem.
De ruibarbo	Idem.
Píldoras balsámicas de Sthall.	De dos á doce granos.
De Bacher	Idem.
Calibeadas	De seis granos á un escrúpulo.
Polvo de antimonio marcial de Keap	De cinco á seis granos.
Tintura de ruibarbo inglesa .	De media á una onza
Vino amargo de la Caridad.	De una á dos onzas mañana y tarde.
Trosiscos de Cypheos. . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Bálsamo Sajon.	Quince gotas en un terron de azucar.
Cerveza estomatica inglesa	Un vaso mañana y tarde.
Cerveza de quina de Mutis.	Un azumbre al dia.
Bolos fortificantes de Desbois	Seis al dia.
Confeccion Saponacea. . . .	De uno á dos escrúpulos.
Elixir de Mithie	De dos á cuatro dracmas.
Alkermes de los italianos .	De dos á tres dracmas.
Opiata estomatica de Hervecio	De un escrúpulo á media dracma.
Polvo de Haly	De media dracma á dracma y media.
Corrovorante de Werlhoff. .	Cuarenta y dos granos.
Tintura nervino tónica de Berlin.	De una á dos dracmas.
Bolo digestivo de Smith.	
Agua de Magnanimidad . .	De una á dos dracmas.
Elixir sagrado	De una á una y media onza.
Polvo diaromatón	De cinco á veinte granos.
Tintura de ruibarbo de Spielman	Media onza en un vehículo apropiado.

Bolo estomático de Parmentier.	
Tintura de malate de fierro.	De un escrúpulo á media dracma.
Píldoras del Dr. Huln . . .	De una á dos.
Tintura sagrada.	Una cucharada en un vaso de agua con azucar. (*Véase la tabla de las enfermedades.*)

DEBILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA GENERACION.

Pastillas de gens-eng . . .	(1) Cuatro ó cinco con una hora de distancia.

---

(1) *Gens-eng ó Gins-Emg, ó Ging-Seng. Los naturalistas botánicos no han decidido si el gens-eng y el ninzin son dos plantas diferentes ó bien una misma; pocos de los viageros que han estado en la China y en el Canadá de donde son indígenas estas plantas, estan acordes entre sí. M. Geoffrós en su materia médica tom. 2 pág. 192 dice que estas plantas, son de diferente género y que solo se asemejan en su figura y virtudes. Agrega tambien que los médicos europeos usan poco estas plantas y por último que la raiz del gens-eng es mas preciosa que la del ninzin. He consultado todo lo que sobre este objeto se ha escrito y presentaré al lector el extracto de lo que se lee en las cartas edificantes y curiosas tom. X pág. 172, en la pequeña obra del P. Lafitean dirigida al regente de Francia en 1718 y en la thesis de medicina de M. Vardemonde sostenidas en los colegios de la facultad de París en 1736. Pondré en seguida del gens-eng la descripcion del ninzin á fin de que acompañandolas el lector forme su juicio. Indicaré tambien el modo de preparar las raices, los lugares en que ellas crecen, y el órden y método que observan los que quieren cogerlas.*

DESCRIPCION DEL GENS-ENG.

Esta planta que los chinos llaman pet-si y los iróquios garentoquen *(estos dos términos significan en las dos lenguas piernas de hombre) se ha conocido en Francia desde que los embajadores de Siam se la llevaron á Luis XIV. El gens-eng tiene una raiz de dos pulgadas de largo y casi el mismo grueso que el dedo pequeño, un poco aspero, brillante y como medio trasparente, las mas veces dividido en dos ramas, y á ocasiones en mas; fibro-*

Wakaka de las Indias . . . De cuatro dracmas á una onza.

---

so hácia la base, rosado exteriormente y por dentro amarillo de un gusto ligeramente acre, un poco amargo y aromático, su olor despide un aroma no desagradable. El cuello de la raiz es un tupido tortuoso de nudos, donde se descubren oblicua y alternativamente, tanto de uno como de otro lado los vestigios de diferentes tallos que arroja cada año. El tronco del gens-eng es de la altura de un pie, liso de un rojo obscuro. De lo alto del tallo se elevan tres ó cuatro ramas cóncavas á modo de gotieras y dispuestas en rayos, cada una de las cuales sostiene cinco hojas desiguales y dentadas, el reves de las hojas tiene algunos nervios que se entrelazan. Del sitio donde nacen las hojas se eleva un pedumculo simple, desnudo y casi seis pulgadas de largo, terminado por un ramo de pequeñas flores amarillas cuyo caliz es muy pequeño, los petalos y estambres son en número de cinco, el estilo de la flor está separado por un estigma y colocado, sobre un embrion redondo, que cuando perece se convierte en una balla esferica, canalada y partida en tres ó cuatro ballas, cada una de las cuales contiene una semilla aplastada y en forma de piñon.

Si se cree la obra china titulada Pensau-Kam-Mou-Li-Tchi-Sin; las virtudes de la raiz del gens-eng, son admirables, los Asiáticos creen que es una panacea soberana, y los chinos echan mano de ella para todas sus enfermedades como último recurso, los médicos han escrito volumenes enteros acerca de este especifico, que ellos llaman con el título de simple espirituoso, espíritu puro de la tierra, y receta de inmortalidad. Pero citaré algunas propiedades de esta raiz; no hay diarrea, debilidad de estómago, desorden intestinal, engurgitamientos, paralisis ni convulsiones, que no cedan al gens-eng. Esta raiz segun ellos es maravillosa para reparar instantaneamente las fuerzas debilitadas, aumentar la respiracion, reanimar la vejéz y aun á los agonizantes retardar la muerte, afirmar la médula de los huesos y todos los miembros, en fin para reparar rapidamente las pérdidas que ocasionan los placeres de Venus y reproducirlos con prontitud con tal de que se coma y beba sobriamente. Es de admirar que no se haya unido á este panegírico del gens-eng el que cure las enfermedades venereas. Los médicos holandeses la recomiendan en las convulsiones, el síncope, los vértigos, y para fortificar la memoria, pero es necesario evitar el abusar de ella por que inflama la sangre.

FIEBRE ADINAMICA.

Electuario anti-febril de Boerhave. . . . . Media dracma cada cuatro horas.

DESCRIPCION DEL NINZIN.

Difiere el ninzin del gens-eng en que el que nace en el Japon y en la Corea es mas espeso, mas mole háeia dentro, é inferior en propiedades.

Kampfer designa esta planta del modo siguiente. = Sisarum montanum Cordense, radice non tuberosa. *Dice que la planta del ninzin cuando es nueva no tiene mas que una pequeña raiz simple semejante á la del nabo redondo, de tres pulgadas de largo y el grueso de un dedo pequeño, guarnecida de algunas fibras capilares ó bellosas, carnosa blanca, entre cortada de pequeños anillos y dividida á veces en dos ramas de donde le viene el nombre de nin zin que significa planta cuya raiz tiene en la tierra la figura de los muslos de un hombre: esta raiz tiene un gusto de chirivia y olor de nabo. Cuando es mas antigua adquiere la altura de un pie, su raiz es muchas veces doble, y gruesa: del cuello de su raiz nacen dos tallos que en seguida se convierten en ramas y se cambian en raices, su tallo se eleva á la altura de cerca de dos pies y es casi del grueso del dedo pequeño acanalado y lleno de espinas como el rosal, de cada uno de sus nudos nacen ramos. Este tallo es sólido en su base pero hueco en el resto y en las ramas; las hojas que abrazan los nudos son ligeramente canaladas y cóncavas, muy semejantes à las del nabo, en el último acrecentamiento de la planta se hallan divididas en tres lobulos.*

Los pedunculos de las flores que terminan los ramos están llenos en su base de pequeñas hojas estrechas y dispuestas en parasol.

A cada flor sucede un fruto que en cayendo se parte en dos granos aplastados de un lado desnudos, semejantes á los de anis rojos en su madurez teniendo el gusto de la raiz con un ligero calor.

En las axilas de los ramos nacen botones redondos verdes carnosos de un gusto dulzon, los cuales cuando cae la planta ó ellos sobre la tierra producen una planta de su genero que segun Haller es umbelifera.

El ninzin es despues del gens-eng y el té la mas célebre de todas las plantas del oriente á causa de la utilidad de

Elixir de salud . . . . . Una onza.

---

su raiz. La planta del ninzin que se ha llevado de Corea al Japon y que se cultiva en los jardines de la ciudad de Meaco, se cria mejor que en su misma patria, pero no tiene virtud; ella tiene poco menos las mismas que el gens eng. El ninzin que nace en las montañas de Kataja, (en la provincia de Siamsai) y en la de Corea donde el aire es muy frio, dura mucho tiempo, su raiz es viva pero sus hojas caen en el otoño. En el Japon produce en poco tiempo tallos cargados de frutos y muere las mas veces en un año. En el Canadá donde ella se llama garont ó gen, es bastante gruesa. Los japones y chinos pretenden que las principales virtudes de la raiz de ninzin son las de fortificar y nutrir, ellos la hacen entrar en todos los remedios á falta del gens eng principalmente en todos los cordiales; pero antes de usarla la preparan como el gens-eng.

RECORTA DEL GENS-ENG, SU VENTA EN CHINA &c.

En el invierno es el tiempo en que se arranca el ninzin y el gens-eng. Cuando este tiempo se apróxima se ponen guardias en todas las entradas de la provincia de Siamsai para evitar que lo roben.

Los lugares donde crecen las raices del gens-eng se hallan situados entre los treinta y nueve y cuarenta y siete grados de latitud septentrional y entre diez y veinte de longitud oriental contando desde el meridiano de Pekim. En este largo intervalo se descubren largas montañas y espesas florestas que lo rodean poniendolo casi impenetrable. En el espesor de estas montañas y florestas, sobre el borde de los rios, al rededor de las peñas, al pie de los árboles y en medio de toda especie de yerbas se encuentra la planta gens-eng. Esta planta es enemiga del calor y crece siempre á la sombra. No es de admirar que se encuentre en el Canadá, cuyas florestas y montañas son bastante semejantes á las de la China principalmente hácia los cincuenta y siete grados. Los sitios donde crece el gens-eng se hallan enteramente separados de la provincia de Canton llamada Leaotong en las antiguas cartas chinas, por una barrera de bosques que circunda toda esta provincia y á cuyo alrededor rondan continuamente los guardas para impedir que vayan los chinos á buscar la raiz. Sin embargo por mas vigilancia que haya la animosidad que induce la ganancia hace cerrar los ojos á los peligros. Este cebo ha hecho encontrar á los chinos el secret de deslinzarse en ciertos desiertos, á veces en número de dos y tres

Febrífugo de Witte . . . . Media onza.
Solucion febrífuga de Brous-
sonet . . . . . De una dracma á media onza.

---

mil, á pique de perder la libertad y el fruto de su trabajo si son sorprehendidos saliendo de la provincia ó volviendo á entrar en ella. Diez mil tártaros están encargados de hacer la recorta del gens-eng, y despues que este ejército de hervolarios dividen el terreno en varias partes cada tropa ó número de ciento ó doscientos se colocan en una misma línea hasta un punto señalado guardando de diez en diez una cierta distancia y buscan con cuidado y al traves de yerbas y espinos la planta de que se trata, abandonandose insensiblemente sobre un mismo rumbo, de cuyo modo recorren en ciertos dias el terreno que se les ha señalado. Cuando se ha concluido el término los mandarines colocados en sitios propios para que puedan comer sus caballos mandan visitar á las cuadrillas por intimidarles sus órdenes, é informandose si está completo el número, en el caso de faltar alguno como muchas veces sucede bien por haberse perdido en aquellos intrincados desiertos ó por haber sido devorado por las bestias, se le busca unos ó dos dias y se vuelve á empezar como anteriormente. Los tártaros experimentan las mayores fatigas en esta expedicion, no llevan cubiertas ni camas, solo van cargados de carnes asadas al horno para comer durante todo su viage. Se dán por contentos con acostarse debajo de los árboles cubriéndose con hojas ó con las cortezas que encuentran. Los mandarines les mandan algunas ocasiones varios huevos y caza que ellos dejan. De este modo pasan estos diez mil hombres seis meses del año desde fin á principio del otoño hasta el fin de la primavera, para buscar una raiz cuya principal virtud es verdaderamente producir una crecida renta al Emperador de la China. Se reserva para este principe la que ha sido cortada sobre las montañas de Tsu-Tvang-Seng-, como la mejor. Aunque entre nosotros se han hecho algunas tentativas para hacer venir el gens-eng en grano no se ha podido conseguir.

Todo el gens eng que se reune en Tartaria cada año y cuyo total nos es desconocido debe llevarse á la aduana del Emperador de la China que saca dos onzas por los derechos de capitacion de cada uno de los tártaros que se emplean en esta recorta; en seguida el Emperador paga el resto á un cierto precio y hace revender el que no quiere á un precio mucho mas alto en su imperio donde no se vende mas que en su nombre y este despacho es siempre seguro por este medio, es como las naciones europeas que trafican en la China se proveen y en particular la compañia holandesa de las Indias orientales que vende casi todo el gens-eng que se consume en Europa.

Mistura de mirra de Griffith. Cuatro cucharadas tres veces al dia.

El precio del gens-eng es tan caro entre los chinos que venden la libra de él por tres de plata. Los holandeses lo venden á peso de oro y lo distribuyen á los europeos bajo el nombre de ginggeng y á los japones bajo el gens eng, por este motivo es tan raro el gens eng. El de los comerciantes de la Europa está muchas veces mezclado con el ninzin que es mas comun, y entonces produce una ganancia mas alta y un despacho mas seguro. Se pretende que los holandeses lo han plantado en el cabo de Buena Esperanza. Pasemos à su preparacion.

PREPARACION DEL GENS-ENG.

Los tártaros llaman al gens-eng orotha, que quiere decir primera de las plantas. Para conservar la raiz entierran en un mismo sitio toda la que pueden juntar en diez, doce ó quince dias, mondan y limpian cuidadosamente estas raices cuando las sacan de la tierra con un cuchillo hecho de una especie de caña de la India, porque evitan religiosamente el tocarlo con acero. Algunas veces separan la tierra con una brocha, la empapan en seguida en un cocimiento de mijo ó de arroz, en seguida la secan con cuidado al humo de una especie de mijo amarillo que está encerrado en un vaso con un poco de agua, entonces tienden las raices sobre pequeños pedazos de madera colocados sobre el vaso y se secan poco á poco bajo un lienzo ó con otro vaso que las cubre. Algunas veces se hacen secar estas raices sosteniendolas al vapor de una caldera cubierta y colocada sobre el fuego la cual contiene el agua del mijo amarillo y del arroz. Por estos procedimientos las raices adquieren cuando están secas un color amarillo ó rojo con una especie de dureza y parecen como resinosas y medio trasparentes. Despues de haber secado bien estas raices se retraen sus fibras y cuando corre viento del norte tienen cuidado de colocarlas en seco en vasos de cobre bien á proposito y que fermenten bien. Se hace un extracto de muchas pequeñas raices y se conservan las hojas de las plantas para unirlas con el té.

Diccion Univ. de Hist. Natural de M. Valmont de Bomare.=Tom. 4 pág. 57 y siguientes.

RAIZ DE GINSENG.

Esta raiz era en otro tiempo un objeto de comercio el mas

Polvo de Gyms . . . . . De una á una y media dracma.
Vino amargo . . . . . De dos á tres onzas.

FIEBRE INTERMITENTE (2)

(Durante el primer periodo del frio.)

Hipecacuana . . . . . De veinte á treinta granos ó tártaro emético de uno á tres.

---

precioso para los chinos. Los misioneros jesuitas habian contribuido, con especialidad, á establecer su alta reputacion. Fumberg dice que aun al presente es muy solicitada por los japones que hacen de ella mucho aprecio.

Historia natural. *Los bótanicos convienen con mucha generalidad en reducir la raiz del ginseng al panax quinque folium de Lineo (Poligamia Dioecia) de la familia de las umbeliferas. Crece esta planta en las partes septentrionales de la China, se le coge en las montañas de la Tartaria. Se encuentra con abundancia en el Canadá.*

Propiedades fisicas. *La raiz del ginseng se vende por fragmentos fuciformes, compactos del espesor del dedo pequeño, su color es de un blanco que tira á amarillo, está revestido de una corteza rugosa y señalada por anulaciones. No tiene olor. Tiene un sabor agradable ligeramente amargo.*

Propiedades químicas. *La ciencia no poseé algun conocimiento sobre la analisis química del ginseng.*

Propiedades medicinales. *La raiz del ginseng se ha mirado como un remedio cierto para reanimar las fuerzas vitales, pero hay mucha inexactitud en los hechos que se han alegado para atestiguar sus virtudes.*

Modo de administrarla. *Esta raiz pulverizada se toma á la dósis de una ó dos dracmas, puede darse hasta media onza en cocimiento. Se usa á veces en tintura ó en extracto.*

Nuevos elementos deterapeútica y materia médica por J. J. Alibert, edicion cuarta tom. 1 *pág.* 100 *y* 101. =El traductor.

(2) *No es de tan poca consideracion, el fijarse en uno ú otro de los dos eméticos que indica el autor y si por el contrario la justa preferencia del uno ó el otro segun las circunstancias, es quien salva ó redime á los enfermos de la penosa repeticion de estas calenturas.*

Ademàs de suponer con Home de que una atonia predominante en el grandioso sistema digestivo es la causa próxima de

Cordiales diaforéticos, tales como el vino antimoniado, y alcanforado, pocion cordial y sudorífica.

(*Durante el principio de los accesos.*)

---

las intermitentes, debemos convenir en que ora se considere como un efecto de esta debilidad ó bien quiera atribuirse á otra causa, el resultado es que una exaservacion biliosa se acompaña siempre con estas calenturas, con las tercianas especialmente; el amargor de la boca, el gusto amargo que imprime en ella, los materiales que en caso de vómitos llegan á precipitarse, las cualidades físicas de estos &c. no dejan duda en la asercion.

En este caso la indicacion de hacer vomitar se acompaña de la idea de destruir este material bilioso de que se ha hablado y para lo que sin disputa el tártaro estibiado debe preferirse por cuanto se ha reconocido en el una accion disolvente sobre la bilis.

Mas de una vez en mi corta práctica he observado que propinando esta prepafacion, y haciendola tomar al enfermo al mismo tiempo de hacerse sensible el frio, se ha sofocado la accesion del calor y un blando sudor provocado por el vómito ha juzgado la enfermedad.

Cuando no ha tenido lugar este benéfico efecto he sostenido á los enfermos durante el paroxismo à una dieta ténue y he prescrito, el electuario siguiente.

De corteza perubiana, buena y bien pulverizada	} *onza y media.*
De serpentaria de virginia en polvo .	*Media onza.*
De cremor de tártaro pulverizado. .	*Dos dracmas.*
De canela en polvo	*Un escrúpulo.*

M. y C. S. Q. de jarave de corteza de cidra F. E S. A., despues de haberlo mezclado agréguese. De éter sulfúrico y licor A. M. de H. á escrúpulo y medio.

Hago llevar á la casa del enfermo este electuario ordenando que inmediatamente pase el sudor se someta á su uso el enfermo en esta forma. Cada hora debe tomar una cucharada de él diluido en un pocillo de naranjada preparada con la naranja de la China, una taza de caldo á la hora siguiente y otra cucharada á la que se le sigue sin que este orden se interrumpa hasta la total conclusion del electuario.

Han sido tan felices los resultados que he obtenido con este tratamiento que no habiendo engañado mi esperanza ocasion alguna, aun en los casos de inveteracion de estas calenturas que

Éter sulfurico.	De un escrúpulo á una dracma.
Tintura de opio	De 30 á 40 gotas. (D. Lind.)

(Durante las intermisiones.)

Quina	Dos escrúpulos cada dos ó tres horas. Se dá en infusion ó decoccion, en polvo ó en enemas en diferentes dósis.
Quasia	Una dracma en infusion.
Angustura.	De una á dos dracmas para decoccion.
Corteza de Winter.	Idem.
Salix caprea.	Idem.
Raiz de Ratania.	Veinte granos en polvo.
Corteza de sauce blanco. . .	Dos dracmas para dos tomas á dos horas de distancia.
De castaño de Indias. . . .	Dos dracmas infundidas en cuatro onzas de cardo bendito.
De cerasus padus.	Una dracma.
De fresno	Dos dracmas en una taza de infusion de hojas del mismo, cada cuatro horas.
Serpentaria de virginia. . .	Idem.

PREPARACIONES PARTICULARES.

Vino de quina.	Un vaso mañana y tarde.
Febrifugo de S.	Una ó dos onzas en la mañana.

---

he asegurado siempre á los enfermos que me han solicitado en semejantes afectos que haciendo el debido uso de este plan, se verán redimidos de la invasion siguiente, lo que con doble satisfaccion de profesor y enfermo se ha visto verificado en Cadiz, Veracruz y México que han sido los principales teatros donde he ejercido la medicina.

Por dos ocasiones he experimentado en mi mismo los preciosos efectos de esta preparacion, una en Veracruz, en el mes de agosto de 1815 donde fui atacado de una esquisita terciana, y otra en México en los mismos dias en que me ocupaba en esta traduccion, por haber sido atacado de igual afecto, y en uno y otro punto el dia en que me sometí á este plan fué el mismo en que se desterraron los accesos. = El traductor.

Elixir febrifugo de Witt . . Media onza.
Anti-septico de Huxam . . De dos á cuatro dracmas en una bebida apropiada.

Febrífugo del Dr. Audouard.
Del Dr. Marc.
Jarave de quina . . . . . De dos dracmas á una y media onza.
Solucion de muriate de potasa. De dos á doce gotas.

(*El Dr. Fowler, el Dr. Darwin.*)

Esencia alexifarmaca de Sthall. De veinte á treinta gotas.
Mistura ácida del Dr. Selle. . Una taza cada hora.
Resolutiva del Dr. Selle. . . . Media taza cada hora.
Tintura febrifuga de Cluttón . En una tipsana hasta una ligera acidéz.
De quina compuesta de Huxam. De dos á cuatro dracmas.
Extracto de centaura menor. .
De genciana. . . . . } De seis á doce granos.
Seco de quina. . . . . .
Electuario de psyllium . . . De una dracma á seis. (Es purgante.)
Anti-febril de Boherhave. . . Media dracma cada cuarto de hora
Opiata febrífuga de Tisot. . Dos dracmas.
Febrífugo del Dr. C. (*Véase la fórmula.*)
Píldoras febrífugas inglesas. Cuatro al dia antes de los accesos.
Eméticas de Boherhave . . . De una á dos.
Tartáreas de Scroder . . . . De cuatro á ocho.
Polvo de Grimaldy. . . . . Cuarenta granos. (*Es purgante.*)
Febrífugo y purgante de Hervecio. . . . . De diez ocho granos á media dracma.
Polvo de Boullemer. . . . . Cuarenta y cuatro granos al dia por tres dias.
De James . . . . . De una á una y media dracma.
Febrífugo de Juncher. . . . Dracma y media en cuatro tomas.
Corrovorante de Worlhoff. . Cuarenta y dos granos.

FIEBRE REMITENTE. MEDIOS GENERALES.

(*En los primeros paroxismos.*)

Limonada agua de tamarindo.
Cremor de tártaro soluble . . De una á dos dracmas.

Emético. . . . . De uno á tres granos.
Minorativos, ó enémas purgantes.
Muriate de mercurio dulce. De seis á doce granos.

(*En la mayor intensidad del paroxismo.*)

Afusiones de agua fria, aspersiones de agua y vinagre.

(*Durante la remitencia.*)

La quina en decoccion acídula con el ácido sulfúrico débil, ó la quina en polvo. A la dósis de una y media onzas ú dos dracmas en intervalos determinados.

MEDIOS PARTICULARES.

La solucion arsenical de Fowler. . . . . Ocho ó doce gotas.

FIEBRES CONTINUAS,

MEDIOS GENERALES.

Decoccion de cebada ó de simiente de lino.
Limonada ó suero
Ligeras infusiones de yerbabuena ó manzanilla.
Hipecacuana. . . . . De veinte á treinta granos.
Mercurio dulce unido á algunos granos de jalapa.
Infusion de tamarindos, nitrada.
Diaforeticos, tales como el vino de antimonio, el polvo de james &c.
Anti-espasmódicos, como el éter, el alcanfor, el almizcle, amoniaco; solos ó mezclados.
Ácido nitrico alcoholizado.
Quina en infusion ligeramente acidulada.
Quasia . . . . . Dos dracmas en infusion en doce onzas de agua; si hay alguna accion purgante se agrega á la infusion de la quina seis gotas de tintura de opio ó media dracma de tintura de cachunde.

FIEBRE INFLAMATORIA.

MEDIOS GENERALES.

Despues de las sangrias se aplican sobre la frente compresas de agua fria, de éter.
Digital purpurea. . . . . Dos dracmas en infusion.
(*Si hay nauseas.*) Pocion emética.
(*Si hay constipacion.*) Laxantes suaves.
Limonada nitrada ó dos dracmas de cremor de tártaro soluble.

(*Medios externos segun el estado del enfermo.*)

Los amargos y la quina durante la convalecencia.

PREPARACIONES PARTICULARES.

Bebida anti-floxistica de Stoll. Una taza cada hora.
Mixtura diaforética de Selle. Media taza cada hora.

FIEBRE NERVIOSA. (*Tifus ligero.*)

MEDIOS GENERALES.

(*Estos varian segun los estados que presenta la enfermedad.*)
(*Si hay nauseas.*) Se facilita el vómito.
(*Si hay constipacion.*) Laxantes suaves.
Afusiones de agua fria durante el paroxismo.
(*Si se presenta diarrea.*) Se dá el cachunde, la goma, Kino, el agua de canela, la tintura de opio.
El vino de quina hácia el fin de la enfermedad.
Los anti-espasmódicos como el almizcle, el amoniáco, el alcanfor y el opio.

FIEBRE PUTRIDA Y MALIGNA. (*Tifus confirmado.*)

MEDIOS GENERALES.

Hipecacuana. . . . . Quince granos con uno de emético en una infusion de manzanilla.
Purgantes suaves calomelanos.
Abluciones de agua fria, seguidas en un vaso de vino caliente.

Pocion infusion de columbo. Onza y media; tintura de opio cinco gotas; ácido muriático, doce gotas.

La quina á la dósis de media onza en decoccion, con tres dracmas de serpentaria de virginia en libra y media de agua. Se le agréga una onza de tintura de canela.

Las aguas acídulas gaseosas.

La angustura . . . . . De una á dos dracmas en cocimiento.

La genciana. . . . . Idem.

MEDIOS PARTICULARES.

Espíritu volatil y aromático de Silvio. . . . . De seis á treinta gotas.

Solucion febrífuga de Broussonnet.

Agua diuretica alcanforada de Fullér . . . . . De una á dos onzas.

Esencia alexifarmaca de Sthall. De veinte á treinta gotas.

Elixir anti-septico de Huxam. De media á una dracma.

De Mithie. . . . . Idem.

Vino amargo . . . . . De dos á tres onzas.

Febrífugo de S. . . . . De tres á seis onzas.

Bálsamo de Vincequerro. . . De ocho á diez gotas en azucar.

Orvietanum prostantius . . . De un escrúpulo á una dracma.

Polvo de Werlhoff. . . . . Dos escrúpulos.

FIEBRE ESCARLATINA.

MEDIOS GENERALES.

Tipsana diluyente acídula.

Hipecacuana. . . . . De veinte á treinta granos.

Laxantes calomelanos. . . . Cinco granos, ruibarbo doce granos.

Lavativas purgantes.

Diaforéticos suaves.

MEDIOS PARTICULARES.

Decoccion de quina. (*En la escarlatina anginosa.*)

Pocion amoniacal alcanforada.

FIEBRE MILIAR.

MEDIOS GENERALES.

Enemas laxantes.
Minorativos.
Vino de quina á pequeñas dósis.
Mixtura alcanforada. (*Farmacopéa de Londrés.*)

FIEBRE ORTIGOSA.

Emético.
Cremor de tártaro soluble. . De una á una y media onza.

FLATUOSIDADES, VIENTOS ERUPTOS.

Éter sulfúrico	De quince á treinta gotas.
Laudano de Sideham. . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Agua de Menta piperita. .	De cuatro dracmas á una onza.
Quina	De doce á diez y ocho granos.
Tintura de ruibarbo Inglesa.	De media á una onza.
Píldoras carminantes de Buchan.	De cuatro á cinco al acostarse.
Confeccion del Japon. . . .	De treinta y seis á cuarenta y ocho granos.
Tintura de ajenjos.	De diez gotas á una dracma en un vaso de infusion de anis.
Elixir de propiedad de Paracelso.	De seis gotas á media dracma.
Opiata de Salomón.	De un escrúpulo á dos dracmas.
Electuario de ballas de Laurel.	Idem.
Esencia de Wedelius	De media á una dracma.
Tintura de Ollin	De quince á treinta gotas.
Vino de ruibarbo compuesto. Amargo.	De dos á tres onzas. Idem.
Tintura de ruibarbo de Spielman	Media onza.

FLORES BLANCAS.

(*Véase Leucorrea.*)

FLUXION DE PECHO.

(*Vèase Perineumonia.*)

FLUJO INMODERADO DE LA REGLA.

(*Menorragia.*)

MEDIOS GENERALES.

Laxantes poco irritantes.
Limonada nitrada ó agua de tamarindos.
Compresas empapadas en oxicrato aplicadas al dorso y á las partes de la generacion.
El alumbre, el cachunde, la goma kino, el bolo arménico, el sulfate de zinc.
Inyecciones abstringentes en la vagina.

MEDIOS PARTICULARES.

Digital purpurea.	A la dósis de un grano.
Opio un grano mezclado con cinco de ruibarbo.	
Quina amarilla.	
Angustura.	
Mirra y oxido de fierro.	
Aguas minerales ferruginosas.	

SARNA.

Flores de azufre.	De diez á diez y ocho granos
Cremor de tártaro soluble. .	De dos escrúpulos á una dracma
Extracto de escabiosa. . . .	De seis á veinte y cuatro granos
Jarave de fumaria.	De dos dracmas á una y media onza.
De zarzamora	De dos dracmas á tres onzas (*Purgante.*)
Confeccion Hamech	De dracma á onza. (*Purgante.*)
Pastillas antimoniales de Kunckel.	De una á cuatro dracmas.
Píldoras de panacea mercurial	De seis granos á un escrúpulo.
Jarave de hígado de azufre.	De una á dos onzas. (1)

GASTRITIS.

)*Véase la inflamacion del estómago.*(

LAMPARON, INFARTO GLANDULOSO.

Eptiope vegetal de Russel .	Una dracma.

(1) *Véase la tabla de las enfermedades externas.*

Jalea de musgos de Russel.	Una dracma. (1)
Infusion de ollin de Piderit.	De una dracma á una onza en vino.
Tintura lexivial de Wogler. .	Una dracma, dos ó tres veces al dia.

GONORREA VIRULENTA.

MEDIOS GENERALES.

Agua de cebada ó de semilla de lino. Solucion de goma arábiga en leche. Decoccion de raiz de altea.
Laxantes suaves.
Enemas emolientes con la adicion de cabezas de adormideras.
Baños tibios.
Sanguijuelas al perineo.
Inyecciones sedativas.

MEDIOS PARTICULARES.

Píldoras de alcanfor y de nitro.	Seis ó doce granos al dia.
De calomelanos y trementina.	De cinco á seis.
Trementina cocida	De un escrúpulo á una dracma (2) en las gonorreas inveteradas.
Jabon de Starkey.	De medio escrúpulo á una id. en las gonorreas inveteradas.
Bolos fortificantes de Desbois.	Seis al dia id.
Píldoras abstringentes de Capuron.	Una ó dos al dia.
De Boullar.	De dos á seis al dia.
Pocion balsámica de Choppart.	
Emulcion de Cadet.	
Opiata del Dr. Larrey. . .	De dos á cuatro dracmas al dia.
Píldoras de Quarin	De cinco á seis en la mañana.
De Maetzio.	De dos á cuatro al dia.
Del Dr. Santa Maria . . .	Media dracma dos veces al dia.
Tintura de antimonio de Jacobo	De diez á veinte gotas.

(1) *Véase la tabla de las enfermedades externas.*
(2) *Para sesenta píldoras.*

*

GOTA.

MEDIOS GENERALES.

Ligeros diaforéticos. Bebidas diluyentes.
Laxantes y minorativos.

MEDIOS PARTICULARES.

Confeccion opiada de la farmacopéa de Londrés, á la dósis de un escrúpulo ó de una dracma.

Quina	De media dracma á media onza.
Elixir de guayaco.	De media á una dracma.
Extracto de guayaco. . . .	De medio escrúpulo á media dracma.
Polvo amargo.	Idem.
Aguardiente Aleman	De una á dos onzas para purgar.
Polvo de Perard	Una dracma.
Electuario Cariocostin . . .	De una á seis dracmas para purgar.
Tablillas antimoniales de Kunckel	De una á cuatro dracmas.
Ratafia de Caribes.	Dos cucharadas pequeñas en la mañana.
Elixir de la Salud.	De una á tres dracmas.
Anti-artrítico de la Isla de	Francia.
Píldoras de Vick-de Azir .	De dos á cuatro al dia.
Decoccion anti-artrítica de Quarin.	De uno á tres vasos.
Electuario anti-artrítico de Buchan.	Una cucharada, de café dos veces al dia.
Gotas anti-artríticas de Eller	De veinte á treinta.
Tintura volatil de guayaco.	De una dracma á media onza en una taza de leche.
Mixtura resino-jabonosa de Plenck.	Una dracma en una bebida apropiada.

PIEDRA DE LA VEJIGA.

Agua de cal	Un cuartillo.
Potasa caústica	De treinta á cuarenta gotas en un azumbre de agua, mucilaginosa.
Trementina cocida.	De un escrúpulo á una dracma.

Espíritu de nitro dulce. . .	De diez á veinte gotas en un vehiculo apropiado.
De coclearia	De quince gotas á una dracma.
Jarave de cinco raices aperitivas.	De dos dracmas á una onza.
Ratafia del comendador de Caumartin.	Un pequeño vaso por la mañana en ayunas.
Bálsamo de butua brava . .	De media á dos dracmas.
Remedio de Stephens. (*Véase la farmacopéa de Baumé.*)	
Extracto de énula campánula.	De ocho granos á media dracma.
Jabon de Starkey	De doce granos á una dracma.
Lejia de Saunder	Tres dracmas al dia.
Agua real	De una á cuatro dracmas.
Bálsamo de Fioraventi . . .	De cinco á diez gotas en una bebida diurética.

HEMATEMESIS.

(*Véase vómito de sangre.*)

HEMATURIA.

(*Véase orina cruenta.*)

HEMORRAGIAS.

Píldoras cupreas de Swediaur.	De dos á tres.
Aluminosas de Hervecio. .	De seis á doce.
Polvo estiptico de Colbateh. .	De cuatro á doce granos.
De kino compuesto	Un escrúpnlo.
Elixir ácido aromático de Brugnatelli	De doce á cuarenta y ocho granos.

HEMORROIDES.

MEDIOS GENERALES.

Laxantes ligeros, como electuario lenitivo, aceite de ricino cremor de tártaro.
Sanguijuelas aplicadas al ano.
Unguento emoliente, tal como el populeon ó cerato opiado.
Bebidas ligeramente nitradas y sulfurosas.

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de digital.	De treinta á cuarenta gotas en la mañana.
Inyecciones abstringentes.	
Conserva de rosas.	De una á tres onzas.
Quina.	Media dracma.
Electuario lenitivo.	De una tres dracmas.
De Reus.	De una á tres dracmas al dia.
Alumbre apagado de Hervecio.	De seis granos á un escrúpulo.
Píldoras abstringentes. . . .	Idem.
Trosiscos de Karave	De doce granos á una dracma.

HEMOTIPSIS.

(*Véase esputo cruento.*)

HEPATITIS.

(*Véase inflamacion del hígado.*)

HIDROPESÍA.

Scila en polvo	De seis á ocho granos con veinte y cuatro de nitro en un vaso de agua de canela.
Vino diurético inglés. . . .	Tres ó cuatro vasos al dia.
Kermes mineral	Un grano dos ó tres veces al dia.
Rob de zarza purgante. . .	De un escrúpulo á una y media dracma.
Extracto de cohombro silvestre.	De uno á seis granos.
De eleboro negro	De uno á doce granos.
Resina de Jalapa	De cuatro á doce granos en píldoras.
De scamonea	Idem.
De turbit.	Idem.
Pocion de hipecacuana de Hallér.	
De Hufeland	Una cucharada cada dos horas.
Polvo de scila de Sthal. . .	De tres á cinco granos.
Vinagre colchico de Reus . .	De una dracma á una onza.
Electuario de Quarin . . .	Una dracma
Espíritu de coclearia. . . .	De quince gotas á una dracma.

Vinagre scilítico.	De una á cuatro dracmas.
Miel de cohombro silvestre.	De una dracma á cuatro onzas en enemas.
Oximiel colchico.	Una dracma dos veces al dia en una infusion.
Electuario diaphenix. . . .	De una dracma á una onza.
Jarave de zarzamora. . . .	De dos dracmas á tres onzas. (*Para purgar.*)
Polvo hidragogo.	De medio escrúpulo á dos.
Píldoras de Starkey. . . .	De seis á ocho granos.
Tónicas de Bacher. . . .	De tres á seis granos. Se toman por la tarde.
Hidragogas de Boncio . . .	De medio escrúpulo á media dracma
De Rudio	De doce granos á dos escrúpulos.
Trosiscos de Alhandal . . .	De dos escrúpulos á una dracma.
Cerveza diurética inglesa . .	Un azumbre al dia en la invasion de la enfermedad.
Vino de Fullér	Cuatro onzas por la mañana en ayunas.
Píldoras hidragogas de Janin.	De doce granos á media dracma.
Sténicas de Breum.	De una á dos en la mañana.
Jabon de Starkey.	De ocho á diez granos.
Electuario de Quarin. . . .	Una dracma cada hora hasta que no se haya evacuado suficiente mente.
Polvo de scila nitrado de Vanhelmont.	Doce granos dos veces al dia.
Mixtura hidragoga de Vans-Wieter.	Una cucharada cuatro ó seis veces al dia.
Catartica arabe.	
Vino scilítico de Richart. .	De tres á cuatro cucharadas.
Elixir resolutivo del Dr. Selle.	Una cucharada de café cada dos horas.
Píldoras purgantes de Haen.	De diez á veinte granos.
De Wilhering	De uno á dos.
Vino de guayaco elevorado de Lewis.	Un vaso pequeño de parte de tarde.
Electuario hidragogo de Fouquier.	De doce á veinte y cuatro granos.
Pastillas de énula campánula .	Media onza.

HIDROPESÍA DEL ABDOMEN.

(*Véase acitis.*)

HIDROPESÍA DEL PECHO.

(*Véase hidrotorax.*)

HIDROPESÍA DEL TEJIDO CELULAR.

(*Vèase anasarca.*)

HIDROFOBIA.

Pocion anti-lyssica del Dr. Selle.
Polvo de Cob. . . . . Cuarenta granos. (*Véase rubia.*)

HIDROTORAX, HIDROPESÍA DE PECHO.

MEDIOS GENERALES.

Tónicos y diuréticos combinados.
Preparaciones scilíticas.
Cremor de tártaro combinado con la digital.
Preparaciones antimoniales diaforéticas.
Vejigatorios al pecho.
Opio en pequeñas dósis.

MEDIOS PARTICULARES.

Mezcla del aire atmosférico y del oxigeno dado á respirar.
Proporciones: aire vital $\frac{4}{5}$. aire ordinario $\frac{1}{5}$.
Pildoras del Dr. Dupuy. . . Cuatro mañana y tarde.

HIPOCONDRÍA.

MEDIOS GENERALES.

Minorativos carminantes, eter, almizcle y opio combinados.
Asa fétida, alcanfor, valeriana y aceite de succino mezclados.
Agua de Vichy y sus análogas. Aguas de Sedlite.
Baños, fricciones secas, ejercicio.
Infusiones de yerbabuena ó de Salvia.

MEDIOS PARTICULARES.

Quina	De doce á treinta y seis granos entre dos comidas.
Píldoras calibeadas.	De seis granos á media dracma.
Tónicas de Stoll.	De cuatro á seis granos.
Extracto de eleboro negro .	De uno á doce granos.
Polvo absolvente.	De seis granos á media dracma.
Píldoras tónicas de Bucher.	De tres á seis granos de tarde.
De Rudio	De doce granos á dos escrúpulos.
Splenicas inglesas	De tres á seis idem.
Marciales de Sideham . .	Dos escrúpulos al dia.

INDIGESTION.

Elixir de Garux.	De dos dracmas á una y media onza.
Bolo digestivo de Smith.	
Electuario del Dr. Ward . .	De una á dos dracmas.
Píldoras estomáquicas de Smith	De tres á seis
Tónicas de Huln.	De una á dos idem. (*Véase dispepsia.*)

HISTÉRICO.

(*Véase afecciones histéricas*)

ICTERICIA.

(*Véase amarilléz.*)

INFLAMACION DEL ESTÓMAGO.

Gastritis.

MEDIOS GENERALES.

Sangrias, vejigatorios sobre el epigastrio.
Enemas emolientes y laxantes.
Baño caliente y pediluvios.
Bebidas mucilaginosas.

MEDIOS PARTICULARES.

Pocion anti-emética de Riverio.

Disolucion de acetate de sosa.
Opio gomoso á pequeñas dósis.

INFLAMACION DEL HIGADO. (*Hepatitis.*)

MEDIOS GENERALES.

Sangrias ó sanguijuelas y ventosas escarificadas.
Calomelanos unidos á la jalapa ó á otro catartico.
Vejigatorios sobre el lugar adolorido.
Enemas emolientes.
Pediluvios, diaforéticos suaves.
Pulpa de tamarindo . . . . De una dracma á una onza.
Nitrate de potasa . . . . . De seis á doce granos en una tipsana diurética.
Espíritu de nitro dulce. . . De seis á ocho gotas en una tipsana diurética.

MEDIOS PARTICULARES.

(*Cuando hay síntomas de supuracion.*). . . . . Una dracma de quina cada dos horas.

(*En la hepatitis aguda cuando se sospecha la formacion de un escirro.* . . . . . Fricciones mercuriales sobre la region del higado. Píldoras mercuriales al interior.

(*En la convalecencia.*). . . . La quina, la genciana, la raiz de columbo unida á la sal de Sedlitz.

INFLAMACION DE LOS INTESTINOS.

(*Enteritis.*)

MEDIOS GENERALES.

Sangrías, sanguijuelas sobre el abdomen, laxantes suaves, tales como el aceite de risino, el sulfate de magnesia, el ruibarbo.
Enémas emolientes, fomentos calientes al abdomen.
Vejigatorios sobre la parte afecta.
Semi-cupios.

Cuando hay constipacion. Calomelanos . . . . . Doce granos en píldoras muy pequeñas dadas mañana y tarde.

INFLAMACION DE LOS RIÑONES.

(*Nefritis.*)

MEDIOS GENERALES.

Sangría, aplicacion local de sanguijuelas, cataplasmas emolientes.
Enémas emolientes, bebidas diluyentes tales como el agua de cebada, la semilla de lino, infusion de malvas, laxantes ligeros, baños calientes, diaforéticos suaves.

MEDIOS PARTICULARES.

Decoccion de hojas secas de durazno, de uba ursi.
Agua ferruginosa y quinada.

INFLAMACION DE LA VEJIGA.

(*Cistitis.*)

MEDIOS GENERALES.

Laxantes refrigerantes, inyecciones emolientes y opiadas.
Opio al interior á pequeñas dósis.

MEDIOS PARTICULARES.

Bálsamo del Canadá.
Píldoras de cicuta ó de beleño.

INSOMNIO.

Jarave de diacodion . . . . De media á una onza.
Opio de Rousseau. . . . . De dos á diez gotas en una infusion de flores de amapolas.
Laudano de Sideham. . . . De diez gotas á una dracma en una pocion calmante.
Píldoras orientales. . . . . De dos á tres por tarde.

ISCURIA.

(*Véase retencion de orina.*)

*

AMARILLÉZ.

MEDIOS GENERALES.

Sangria (si el enfermo es pletórico, y se queja de dolor en la region del hígado, si ha habido suprecion de reglas, ó de hemorroides; si hay síntomas de inflamacion.)
Vómitivos. Hipecacuana. . . Treinta granos.
Píldoras sapono-aloeticas. . . De cinco á seis al dia.
Fomentos, y fricciones sobre el estómago é hígado.
Aguas termales sulfureas, cremor de tartaro soluble.

MEDIOS PARTICULARES.

Cañamones. . . . . Dos onzas en decoccion en dos azumbres de cerveza edulcorada con azucar: medio cuartillo todas las mañanas.
Spíritu de trebol febrino. . De una dracma á una onza.
De angélica compuesta . . . De treinta á sesenta gotas.
Tintura de Bestuchef. . . . De quince á cuarenta gotas.
Bolo digestivo de Smith.
Electuario del Dr. Wald.
Pocion de hipecacuana de Haller.
Polvo de antimonio marcial de Keup. . . . . De cinco á seis granos.
Diaromatón. . . . . De cinco á veinte granos.
Tintura sagrada . . . . . Una cucharada en vaso de agua de azucar.
Spíritu de nitro dulce . . . De veinte á sesenta gotas en un vaso de una bebida diurética.
Mixtura de Quarin. . . . . Dos cucharadas cada tres horas.
Píldoras anti-histericas de Buchan. . . . . Cinco á seis al dia.
De Greding . . . . . Una de mañana y tarde.
De Starkey. . . . . Seis á ocho granos.
Fundentes de Vicq-de Azyr. De dos á cuatro al dia.
Cremor de tartaro soluble. . De una á dos dracmas.
Extrato de trifolio febrino . De doce á veinte y cuatro granos.
Spíritu de coclearia. . . . . De quince gotas á una dracma.
Electuario de Zaragatona. . . De una á seis dracmas.

Elixir de Witt. . . . . Media onza.
Vino anti-histérico. . . . . Cuatro cucharadas al dia.

LETARGO.

Agua de la generala. . . . De dos á cuatro dracmas.
Electuario diacolocyntidos. . De una dracma á una onza. (*Como purgante.*)
Píldoras de Rudio. . . . . De doce granos á dos escrúpulos.
Mixtura del Dr. Franck. . Una cucharada de café de cuarto en cuarto de hora.

LEUCORREA.

MEDIOS GENERALES.

La quina, los ferruginosos, el ácido sulfúrico.
Los baños frios locales.
Inyecciones con el sulfate de zinc ó de alumbre una dracma en un azumbre de agua.
Catecú y goma kuino.
Bálsamo de copaiba y del Canadá.
Píldoras de aloes y de mirra.
Vinos generosos. Alimentos nutritivos.
Aguas minerales ferruginosas.

MEDIOS PARTICULARES.

Jabon de Starkey. . . . . De ocho á diez granos.
Vino del Dr. Fordyce. . . Cuatro cucharadas al dia.
Quina . . . . . De un escrúpulo á una dracma.
Ruibarbo. . . . . Una dracma en píldoras con el jarave de zarza purgante.
Agua de Boule. . . . . Una onza mezclada con vino.
Pocion bálsamica de Choppart.
Vino anti-leucorreatico. . . Dos onzas mañana y tarde.
Emplastro stiptico de Swediaur.
Polvo diarrhodon . . . . . De doce granos á una dracma.
Píldoras calibeadas. . . . . De seis granos á media dracma.
Abstringentes . . . . . De seis granos á un escrúpulo.
Píldoras de helecho compuestas. . . . . Idem.
Tónicas de Stoll . . . . . De cuatro á seis.
Bolo fortificante de Desbois. Seis al dia.

Elixir de Witt	Media onza.
Americano	De media á dos dracmas.
De Garux	De dos dracmas á una onza.
Opiata de Tissot	Dos dracmas mañana y tarde.
Anti-leucorreica	De dos á cuatro escrúpulos.

MAL CADUCO.

(*Véase epilepsia.*)

ENFERMEDADES DE LA PIEL.

(*Véanse herpes, sarna, tiña &c.*)

ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS.

Agua de Quercetan	De una á dos onzas.
Esencia dulce de Halles . .	Veinte gotas en una bebida diurética.
Lexia de Saunder.	Tres dracmas al dia.
Licor anti-nefrítico del Dr. Adams	Dos dracmas mañana y tarde.

MAL DE GARGANTA.

(*Véase equinancia.*)

ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS.

(*Véase vapores.*)

(*Spasmos convulsiones.*)

MANIA.

Polvo de Junquin.	Doce granos.

MARASMO CACHEXIA, ATONIA, GENERAL.

Electuario anti-cachetico de Ward	De una á dos dracmas tres veces al dia.

Elixir fortificante del Dr. Selle.	Una cucharada pequeña de dos en dos horas.
De Mithye.	Idem.
Jarave vinoso cardiaco de Wirtemberg.	De una á dos onzas.
Elixir resolutivo del Dr. Selle	Una onza ó dos cucharadas.
Infusion de ollin de Piderit	Una dracma á una onza de buen vino.
Elixir pectoral	De media á dos dracmas en una taza de infusion.
Mixtura de mirra de Griffith	Cuatro cucharadas tres veces al dia.
Osmazóme de Thenar . . .	De una á dos dracmas.
Píldoras de Haen.	Cuatro cada tres dias.
Marciales de Sideham . .	Dos escrúpulos al dia.
Marciales de Kocmpf . .	De doce á treinta y seis granos al dia.
Polvo antimonial de Keup .	De cinco á seis granos.
Corrovorante de Werlhoff.	Dracma y media.
De diaromatón.	De cinco á veinte granos.
Tintura de Labandula compuesta	De diez gotas á una dracma.
Polvo de Hartmann	De media á dos dracmas.

MENORRAGIA.

(*Véase flujo inmoderado de las reglas, y perdida de sangre del utero.*)

NEFRÍTICO.

(*Véase cólico.*)

NEFRITIS.

(*Véase inflamacion de los riñones.*)

OBSTRUCCIONES.

Mixtura fundente de Murtiel.	Media onza cada hora.
Polvo Ecoprotico del Dr. Selle	De dos á cuatro cucharadas de café al dia.

Tintura de antimonio de Jacobo.	De diez á veinte gotas.
Jarave de nicociana. . . .	De dos dracmas á dos onzas.
Conserva de coclearia . . .	De una á seis dracmas.
Polvo de los tres Santaux.	De doce granos á una dracma.
De aro de Berckman . . .	Idem.
Electuario de fiere piera. .	De una á seis dracmas
Benedicto laxante	De una dracma á una onza.
Opiata mesenterica	De media á dos dracmas.
Píldoras de Starkey. . . .	De seis á ocho granos.
Píldoras tartareas de Schoder.	De un escrúpulo á una y media dracma
Balsámicas de Sthal. . . .	De uno á doce granos.
Scosezas	De dos á cuatro al dia.
Vino calibeado	De dos dracmas á dos onzas, se le dá muchas veces en una infusion de artemisa.
Tintura de Marte de Ludovico.	De cinquenta á ochenta gotas.
Extracto de chicoria silvestre.	De seis granos á dos dracmas.
De berros	De doce granos á media dracma.
De fumaria.	De un escrúpulo á una dracma.
De hombrecillo	Idem.
Oximiel scilítico.	De una dracma á una onza.
Jarave de coclearia	De dos dracmas á una y media onza.
De berros	Idem.
De perifollo	Idem.
De cinco raices aperitivas.	Idem.
De flores de durazno . .	Idem. *Como purgante.*
Píldoras de Lemonier . . .	Seis al dia en dos tomas.
Infusion de ollin de Piderit.	De una dracma á una onza en vino.
Agua de Barage artificial .	De uno á dos azumbres al dia.

Decoccion de aloes compuesta de la farmacopéa de Londrés.

COLOR PÁLIDO.

(*Véase clorosis.*)

PALPITACION DE CORAZON.

(*Véase enfermedades de los nervios spasmos, y afecciones histéricas.*)

Polvos absorventes.	De seis granos á media dracma.

Letificante	De doce granos á una dracma.
Confeccion alkermes	De un escrúpulo á una dracma.

PARALISIS.

MEDIOS GENERALES.

(*Si la enfermedad se origina de causas que producen la apoplegia.*) Sangrias y purgantes.
(*En todos los casos.*) Fricciones secas, sinapismos y rubefacientes.
Urticacion baños calientes, estimulantes al interior como semilla de mostaza, ajos, rábanos, sales volatiles alcalinos

MEDIOS PARTICULARES.

Alcohol amoniacado	De veinte á cuarenta gotas en un vehículo apropiado.
Éter sulfúrico	De diez á treinta gotas.
Tintura de Bestuchef . . .	De quince á cuarenta gotas.
Cerveza cefálica inglesa . .	Cuatro ó cinco vasos al dia.
Bolo de Swediaur.	Dos al dia.
Gargarismo de Quarin . . .	Para la paralisis de la lengua.
Emético.	De uno á tres granos en enemas.
Electuario lenitivo.	De cuatro dracmas á una y media onza.
Amoniaco líquido	Doce gotas, tarde y mañana.
Vino emético.	De dos dracmas á cuatro onzas.
Espíritu volatil aromático de Silvio.	De seis á veinte gotas.
Rob de zarza purgante. . .	De un escrúpulo á dracma y media para purgar.
Agua teriacal.	De una á cuatro dracmas.
Electuario diacolocynthidos .	De una dracma á una onza. (*Purgante enérgico.*)
Diahpenix	Idem purgante.

PERDIDA DE SANGRE DEL UTERO.

Jarave de Simphytum majus.	De dos dracmas á una y media onza.
Elixir vitriolico	De ocho á veinte gotas en una bebida abstringente.
Píldoras abstringentes . . .	De seis granos á un escrúpulo.

Alumbre apagado de Hervecio	De seis granos á media dracma.
Píldoras de elecho compuestas.	Idem.
Trosiscos de Karave	De doce granos á una dracma.

VIRUELA.

(*Véase esta enfermedad.*)

PERINEUMONIA.

MEDIOS GENERALES.

Sangrias del brazo. Sanguijuelas al pecho.
Vejigatorios al punto adolorido.
Vapores de una decoccion de plantas emolientes y de antimoniales en pequeñas dósis.
Cocimiento de cebada ligeramente acidulado con el jugo de limon.
Pedilubios.

MEDIOS PARTICULARES.

Oximiel scilítico.	De una á una y media onza en bebida pectoral.
Píldoras nitrosas alcanforadas.	De seis á doce granos.
Píldoras cinoglosas.	De tres á seis granos.
Cocimiento anti-septico de Boherhave.	Dos onzas cada cuatro horas.
Mixtura pectoral del mismo.	Una onza cada media hora.
Jarave de Willis.	Una cucharada mañana y tarde.
Emulcion de almendras. . .	De tres á cuatro onzas.

PERINEUMONIA FALSA.

(*El mismo tratamiento que para la perineumonia verdadera.*)

FRENITIS.

(*Inflamacion del cerebro y de sus membranas.*)

MEDIOS GENERALES.

Despues de la sangria, hielo y oxicrato en la cabeza.
Purgantes enérgicos. Pedilubios calientes rubefacientes y sinapismos, bebidas frias y acídulas. Enémas laxantes.

MEDIOS PARTICULARES.

(*En la frenitis sintomática.*) Bolo diaforético.
Extracto ó polvo digital purpurea. . . . . De un escrúpulo á media dracma.

TISIS LARINGEA.

(*Véase angina laringea.*)

Éter bálsamico de Tolú.
Julepe Escosez á cucharadas.
Mixtura para la angina inflamatoria.
Pastillas del Dr. Chaussier. . De cuatro á seis al dia.

TISIS PULMONAL.

MEDIOS GENERALES.

(*Periodo inflamatorio.*) Sangrias laxantes suaves y bebidas anti-floxisticas.
Leche de burra, de muger, de vaca.
Camisas de franela.
Aguas termales sulfureas.
Vejigatorios volantes.

MEDIOS PARTICULARES.

La respiracion de los vapores de éter.
Digital purpurea, á pequeñas dósis en tintura ó cocimiento.
Sulfate de cobre dado como vomitivo en el primer periodo, de tres á seis granos, mezclados con otro tanto de hipecacuana.
Bebida compuesta de agua de cebada, de jarave de tolú goma amoniaco, y vinagre escilítico.
Lichen islandico
Ácido bensoico . . . . . De ocho á diez y seis granos cada dos dias.
Píldoras incindentes de Buchan. . . . . De tres á cuatro en la invasion de la enfermedad.

Píldoras bálsamicas de Boerhave.	Una cada tres h oras.
Jarave pectoral del Dr. Selle.	Una onza cada hora.
Leche de goma amoniaco. .	De cuatro á ocho cucharadas al dia.
Jarave de Simphytum majus.	De una á una y media onza.
Conserva de rosas.	De tres á cuatro onzas al dia.
Quina	Un escrúpulo cada tres horas.
Elixir vitriolico.	De veinte á treinta gotas en un vaso de vino.
Vino calibeado	Tres cucharadas al dia.
Azufre lavado.	De doce granos á una dracma.
Polvos de goma tragacanto.	De seis granos á una dracma.
Pastillas de azufre.	De una dracma á una onza.
Píldoras de cinoglosa. . . .	De seis á ocho granos.
De Moston	De uno á seis granos.
Bálsamo de Lucatel	De media á dos dracmas.
Elixir pectoral	Idem.
Jalea de Lichen islandico. .	De dos á ocho onzas.
Chocolate de Lichen. . . .	Quatro onzas.
Píldoras estenicas de Breun.	De una á dos en la mañana.
Jarave de higado de azufre.	De media á una onza.
Agua de cal	De una á cuatro onzas. Se le da en leche ó mezclada con el jarave pectoral.
Agua de brea.	De dos á seis onzas. Idem.
Jarave bálsamico de tolú, de lombarda, de tortuga de caracol, pectoral ingles. .	De dos dracmas á una y media onza.

PIEDRA DE LA VEJIGA.

(*Véase mal de piedra.*)

ORINA CRUENTA (*Hematuria.*)

MEDIOS GENERALES.

Solucion de goma arábiga, cocimiento de cebada y malvas mezclados.

Enemas emolientes, agua alcalina gaseosa, alcanfor y opio mezclados.

MEDIOS PARTICULARES.

Cocimiento de uva ursi.
Idem de hojas de durazno.

PITUITA.

Mixtura balsámica de Fullér.	Una cucharada mañana y tarde.
De mirra de Griffith . . .	Cuatro cucharadas tres veces al dia.
Elixir anti-asmático de Boherhave.	De dos á treinta gotas en una infusion pectoral.
Cordial de Paracelso. . . .	De diez á treinta gotas en un vehiculo apropiado.
Polvo de goma tragacanto.	De seis granos á una dracma.
De iris compuesto. . . .	De doce granos á media dracma.
Píldoras de cinoglosa . . .	De tres á seis granos.
De Moston.	De uno á seis granos.
Trosiscos de agárico. . . .	De un escrúpulo á una dracma.

PLEURECIA.

MEDIOS GENERALES.

Sangrias. Pedilubios y diaforéticos en el principio.
Bebidas emolientes, pectorales, y mucilaginosas. Vejigatorios sobre el punto del dolor. Media leche nitrada.

MEDIOS PARTICULARES.

Laxantes suaves. Pocion hecha con una onza del aceite de olivas cuatro onzas de mucilago, tres dracmas de oximiel escilítico, dos onzas de agua de poleo.

(*Véase el articulo perineumonia.*)

RACHITIS.

MEDIOS GENERALES.

Immersiones en agua fria. Fricciones con franelas secas.

Regimen nutritivo, vino acerado. Hierro amoniacal y oxíde de zinc mezclados. Quina de una dracma á cuatro al dia.

MEDIOS PARTICULARES.

Fosfates de cal y de sosa. . Un escrúpulo al dia.
Lociones con media onza de potasa, en una libra de agua.

RABIA.

(*Véase hydrofobia.*)

MEDIOS GENERALES.

Incisiones, cauterio actual, ventosas escarificadas, y vejigatorios sobre la herida.
Fricciones mercuriales. Opio á altas dósis.
Alcali volatil . . . . . Doce gotas en un vaso de agua cada tres horas.
Vinagre ó vino con exceso. (*Si el enfermo no puede beber*) se le dá el ácido tartarico ó citrico en polvo.

MEDIOS PARTICULARES.

Seis granos de pimienta larga envueltos en hostia. (*No hay mas que un remedio seguro: la cauterizacion.*)
Cinabrio. . . . . Un escrúpulo.
Almizcle . . . . . Diez y seis granos, mezclese en un vaso de aguardiente.
Asafétida . . . . . De doce granos á un escrúpulo.
Alcanfor. . . . . De diez á doce granos.
Opio. . . . . Uno, dos ó tres granos.
Quina. . . . . Media dracma tres veces al dia.

ATRASO DE LAS REGLAS.

MEDIOS GENERALES.

Fumigaciones emolientes. Aplicaciones de vejigas llenas de agua caliente
Tintura de sabina y de castor.
Tintura de ollin, de mirra y de cantáridas, mezcladas en proporciones convenientes, y tomadas en pequeñas dósis.

MEDIOS PARTICULARES.

Tintura de eléboro blanco. . .	De una á dos cucharadas de café al dia.
Elixir de propiedad de paracelso	De seis gotas á media dracma.
Espíritu volatil aromático de Silvio.	De seis á treinta gotas.
Bálsamo del Comendador. . .	De diez á cuarenta gotas.
Extracto de berro de ajenjo, de artemisa, de aristoloquia.	De doce granos á media dracma.
Infusion de ollin de Piderit.	De una dracma á una onza en vino.
Extrato de cohombro	De un escrúpulo á media dracma.
De azafrán	De cuatro á veinte y cuatro granos.
De valeriana.	De doce á cuarenta y ocho granos.
De vincetoxicum.	De medio escrúpulo á media dracma.
Elixir americano.	De una á dos dracmas.
Agua de yerbabuena compuesta.	De una á cuatro dracmas.
Espíritu de coclearia.	De quince gotas á una dracma.
Píldoras de Haen.	Cuatro cada tres dias.
Carminantes de Buchan. . .	De cuatro á cinco al acostarse.
Tartareas de Schroder. . . .	De un escrúpulo á una y media dracma
De Fullér.	Dos en la mañana y dos en la tarde
Balsimicas de Sthal.	De dos á doce granos.
Tónicas de Bucher.	De tres á seis granos.
Histericas.	De seis granos á media dracma.
Calibeadas.	De seis granos á un escrúpulo.
Trosiscos de mirra.	De un escrúpulo á una dracma.
Histéricos.	De doce granos á una dracma.
Pocion emenagoga de Desbois.	Á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.
Jarave de calabria.	De dos dracmas á una onza.
Jarave de canela, de ajenjo, de artemisa	De dos dracmas á una y media onza.
Teriaca.	De doce granos á dos dracmas.
Orvietan	De diez y ocho granos á una dracma.

Electuario de ballas de Laurel.	De un escrúpulo á dos dracmas.
De hiera picra.	De una á seis dracmas.
Venedicto laxante.	De una dracma á una onza, se usa tambien en enemas.
Pastillas marciales.	Dos al dia.
De azafrán	De una á cuatro dracmas.
Limaduras de fiero porfirizadas.	De dos á veinte y cuatro granos, se le mezclan con una opiata amarga ó purgante. Tambien se dán divididas en vino de España.
Azafrán de Marte	De uno á diez y ocho granos.
Vino de ajenjos.	De una á seis onzas en ayunas.
Calibeado.	De dos dracmas á dos onzas con una infusion de artemisa.
Tintura de ajenjos	De diez granos á una dracma en una taza de té.
Esencia de Wedelio.	De media á una dracma.
Elixir teriacal	De diez á treinta gotas.
Miel de cohombro silvestre. .	De una dracma á cuatro en enemas.
Elixir uterino de Crollius. .	De una á dos dracmas.

RETENCION DE ORINA HISCURIA.

MEDIOS GENERALES.

Opiados diuréticos y dulcificantes en bebidas y enemas.
Medios quirurjicos, sondas y candelillas.

Tintura de muriate de fierro. .	A la dósis de diez gotas de cuarto en cuarto de hora.

Píldoras de opio y de calomelanos y alcanfor mezclados.

MEDIOS PARTICULARES.

Espíritu de nitro dulce . . .	De cinco á seis gotas en una pocion emoliente.
Jabon medicinal.	Una drama en píldoras.
Pulpa de casia	De una á una y media onzas.
De tamarindo.	De dos dracmas á una onza.
Ratafia del comendador de Caumartin.	Un vaso pequeño, por la mañana en ayunas.
Polvo temperante de Sthal.	Doce granos.

Cerveza diuretica inglesa. .	Un azumbre al dia.
Vino diurético amargo de Corvisart	Cuatro cucharadas al dia.
Vino amargo de la Caridad.	De una dracma á dos onzas, mañana y tarde.
Esencia dulce de Hallér. . .	Veinte gotas.
Pocion diuretica del Dr. Hallér.	Una cucharada cada hora.
De Buchan.	Una taza cada cuatro horas.
Agua de Quercetán	De una á dos onzas.
Píldoras scilíticas de Edimburgo	De tres á cuatro.
Linimento diurético de Kuser.	

REUMATISMO AGUDO.

MEDIOS GENERALES.

Sanguijuelas aplicadas sobre el sitio del dolor.
Tintura digital. . . . . De diez á veinte gotas cada cuatro horas.
Enemas laxantes ó ligeros minorativos.
Vejigatorios volantes ó linimentos rubefacientes.
Diaforeticos á pequeñas dósis.

MEDIOS PARTICULARES.

Polvos de hipecacuana compuestos. (*Farmacop. de Lond*) De diez á doce granos.
Polvo antimonial. (*Formacop. de Lond.*)
Quina, á la dósis de una dracma, mezclada con diez granos de nitro.
Calomelanos mezclados al opio.
Fricciones con el éter acetico.

Decoccion de tamarindos . .	Un cuartillo.
Espíritus de mindereros. . .	De doce á treinta gotas en una bebida calmante.
Cremor de tártaro soluble. .	De una á una y media dracma.
Goma de guayaco	De un escrúpulo á media dracma en un vaso de suero.
Laúdano líquido	De quince á veinte gotas.
Extracto de trebol de agua.	De medio escrúpulo á media dracma.
De aguardiente alemán. . .	De una á dos onzas para purgar.

Rob de sauco	De un escrúpulo á una dracma.
De zarza purgante. . . .	De un escrúpulo á una y media dracma
Extracto de guayaco. . . .	De doce granos á media dracma.
Píldoras de Vick de Aziz. .	De dos á cuatro mañana y tarde.
Bolo diaforético inglés. . .	Dos al dia.
Licor anti-artrítico de Eller.	De veinte á cuarenta gotas.
Polvos de Dower	Media dracma.
Emulcion del Dr. Willis.	
Tipsana de Vigaroux . . .	Un azumbre.
Vino de guayaco eleborado de Leuwis	Un vaso pequeño por la tarde.
Emulcion de Quarin.	
Cerveza de Sideham.	Un azumbre en la mañana.

REUMATISMO CRÓNICO.

MEDIOS GENERALES.

Diaforéticos enérgicos, tales como el vino antimonial. Tintura de guayaco antimonial.
Opio combinado á los calomelanos, y al polvo antimonial.
Infusion de Rhododendrón. (1)
Baños de vapores. Duchas.

ROMADIZOS CATARRALES.

Tipsana de Tissot	Una pinta.
Especies pectorales.	Un puñado infundido en agua hirviendo edulcorado con la miel.
Tipsana de Buchan.	Un azumbre.
Jarave pectoral bálsamico de Charles.	De una á una y media onza.
Miel scilítica.	De dos dracmas á una onza.

---

(1) *Rhododendrum. La rosa en griego se llama Rhodon y el laurel Daphne, de donde el Nerio se vino á llamar Rhododaphne ó Rhododendro: por que sus flores se parecen á las rosas y en sus hojas se asemeja al laurel. Se llama en las boticas esta planta comunmente Oleander y en Castilla tiene por nombre Adelfa.*
Andrés de Laguna sobre Dioscorides Anazabreo fol. 429.

Hidromel simple.	Un azumbre.
Jarave de violetas, de crisimo compuesto, de tusilago, de culantrillo, de malvavisco, de borraja, de buglosa, de lombarda, de tortuga, de cabrito, de vaca, de caracoles, pectoral inglés, de Desessarts de Maloet, de Bouvart, de Rivet, de dátiles.	De dos dracmas á onza y media.
Pastillas vechicas de Spitzley, de malvavisco, de goma arabiga, de iris.	Ad libitum.
Anti-catarrales de Tronchin. .	De seis á ocho al dia.
De hipecacuana.	Idem.
Mixtura bálsamica de Fullér.	Una cucharada mañana y tarde.
Pastillas del Dr. Jobard . .	Dos cada hora.
Píldoras incisivas del Dr. Leroup.	De tres á cuatro.
Polvo pectoral de Wedelio.	De uno á dos escrúpulos.
Anti-catarral de Viena. .	De una á dos dracmas.
Manteca de cacao.	De dos á cuatro dracmas mezcladas con azúcar.
Azucar rosada	De una á seis dracmas.
De cebada, de manzanas. .	Ad libitum.
Pasta pectoral de Parmentier.	Ad libitum.
Oximiel pectoral de Danois. .	A cucharadas todas las horas.
Pectoral de Edimburgo . . .	De una á una y media onza.
Pasta de malvavisco, de jarave de ubas.	Idem.
Jugo de regaliz, de Blosi, de regaliz, de anisado, de regaliz blanco	Idem.
Crema pectoral de Tronchin.	Idem.
Píldoras de cinoglosa . . .	De tres á seis granos.
Bálsamicas de Morton . .	De una á seis.
De scila compuestas . . .	De doce á veinte y cuatro granos al dia segun la edad.
Jarave de Wilis	Una cucharada mañana y tarde.
Jalea de lombarda.	De dos á cuatro onzas.
Mermelada de Tronchin. . .	Onza y media á cucharadas de hora en hora.

*

Polvo de Dower	Media dracma.
Pocion de Jeanroy.	Seis cucharadas de café.
Crema pectoral del Dr. Jeannet de Longrois.	Á cucharadas de café cada media hora.

SARANPION.

MEDIOS GENERALES.

Enemas emolientes y laxantes suaves.

(*Cuando hay opresion de pecho.*) Un rubefaciente entre las dos escapulas.

(*Si hay tos frecuente.*) Pocion calmante, cocimiento de cebada, pedilubios.

Antimoniales ligeramente opiados.

Tintura de digital purpurea. De diez á doce gotas.

MEDIOS PARTICULARES.

Emulcion de almendras. . .	De tres á cuatro onzas con un poco de jarave de adormideras
Agua de la Generala	De dos á cuatro dracmas.
Bálsamo de Vincequerro. . .	Ocho ó diez gotas, en azúcar.
Esencia Alexifarmaca de Sthal.	De veinte á treinta gotas.

SCIATICA.

(*Véase reumatismos.*)

ESCORBUTO.

Tipsana de rábanos de coclearia, de berros, desde un vaso hasta un azumbre.

Cocimiento de abeto. . . .	Una pinta al dia.
Conserva anti-escorbútica del Dr. Selle.	De dos á tres dracmas.
Agua de Beaufort	De cuatro dracmas á una onza en un vehiculo apropiado.
Elixir anti-escorbutico del Dr. Selle.	Dos cucharadas al dia.

Anti-escorbútico de Boerhave.	De una á dos dracmas en una tipsana.
Pocion anti-escorbútica del Dr. Franck.	Á cucharadas.
Vino anti-escorbútico. . . .	De cuatro á seis onzas en ayunas.
Gotas anodinas inglesas . .	De diez gotas á media dracma.
Cefálicas inglesas	Idem.
Espíritu volátil aromático de Silvio	De seis á treinta gotas.
Tintura de goma seca. . .	De diez gotas á media dracma.
Extracto de berros.	De doce granos á media dracma.
De fumaria.	De un escrúpulo á una dracma.
Espíritu de coclearia . . .	De quince gotas á una dracma.
Jarave de coclearia, de berros, de perifolio, anti-escorbútico.	De dos dracmas á una y media onza.
Conserva de coclearia . . .	De una á seis dracmas.
Píldoras de panacéa mercurial.	De seis granos á un escrúpulo.
Jarave del Dr. Portal.. . . .	Una onza.
Depurativo de Majaulk . .	De una á dos onzas.
Cerveza anti-escorbútica. . .	Dos vasos al dia.
Pastillas de énula campánula.	Media onza al dia.

ESCRÓFULAS.

MEDIOS GENERALES.

Baños frios, baños del mar.
Calomelanos mezclados con el tartrite de antimonio.
Sulfureto de mercurio . . . Á la dosis de quince granos.
Píldoras de Plummer.
Decoccion de guayaco, de zarzaparrilla, de zazafras y de mereon mezclados. (*Dicha tipsana de Lisboa.*)
Muriate barítico líquido. . . De tres á doce gotas.
Extracto de cicuta.
Decoccion fuerte de hojas de tucilago.
Agua de cal combinada con la quina.
Carbonate de Sosa. . . . . De un escrúpulo á una dracma.
Columbo, cascarilla y genciana, mezclados con los aromáticos.
Limonada nítrica.
Preparaciones marciales, agua mineral ferruginosa.

MEDIOS PARTICULARES.

Resina de guayaco.	Seis granos en tres tomas al dia.
Extracto de cicuta.	De dos granos á una y dos dracmas graduadamente.
Confeccion Tiames.	De una dracma á una onza. (*Purgante.*)
Píldoras de panacéa mercurial	De seis granos á un escrúpulo.
De Beloste	De dos á tres al dia, de seis á ocho para purgar.
De aconito del Dr. Double .	Una por mañana y tarde.
Elixir de Raulin	Una cucharada antes de comer.
Eptiope antimonial de Huxam.	De ocho á diez granos.
Elixir aurífico de Rotrou. . .	De seis á doce gotas.
De Peyrillu.	Una cucharada.
Jarave depurativo de Majaulf.	De una á dos onzas.
Anti-escorbutico	De cuatro dracmas á una onza al dia.

ESPASMO.

Extracto de azafrán	De cuatro granos á un escrúpulo.
De valeriana	De doce á cuarenta y ocho granos.
De almizcle.	De uno á tres granos.
De agua de yerbabuena compuesta	De una á cuatro dracmas.
De la Generala.	De dos á cuatro idem.
Eter sulfúrico.	De doce á veinte y cuatro gotas en un pedazo de azucar.
Polvo anti-espasmodico . . .	De un escrúpulo á una dracma.
Bolo anti-espasmodico de Buchan.	Seis al dia.
Píldoras anti-espasmodicas de Piderit	De doce á treinta y seis granos al dia.
Tintura anti-espasmodica de Kemp	Cuarenta y ocho gotas cada media hora.
Tebaica de Bambert. . .	De diez y seis á cuarenta gotas.
Julepe moscado de Fullér .	De dos á seis onzas.
Píldoras stenicas de Brown.	De una á dos por la mañana.

Tintura nerviosa tónica de Berlín	De una á dos dracmas.
Polvo de Guteta.	De dos granos á una y media dracma.
De oro de Zell	De seis granos á un escrúpulo.
Extracto de artemisa . . .	De doce granos á media dracma.
Aceite volátil de succino. .	De diez á doce gotas.
Eter sulfúrico	De diez á treinta gotas.
Muriático.	Idem.
Tintura de Bestuchef. . . .	De diez y seis á cuarenta gotas.
Eter acético acerado de Klaproth.	De quince á cuarenta gotas.
Polvo anti espasmódico de Sthal	Treinta granos mañana y tarde.
Sedativo de Wetzlez. . .	(*Véase su uso en esta obra.*)
De Tunquin	De doce á veinte y cuatro granos.
Espíritu de ollin de Reus .	De veinte á treinta gotas.
Agua eterea alcanforada de Planché	Á cucharadas con el jarave de azahar.

STRANGURIA.

(*Véase disuria.*)

SUPRESION DE LA TRANSPIRACION.

Elixir sudorífico de Willis.	De una á dos dracmas.
Infusion de ollín de Piderit.	Una dracma en una onza de buen vino.

SUPRESION DE LAS REGLAS.

(*Véase atraso de ellas.*)

SINCOPE.

(*Véase desfallecimiento.*)

Tintura de castor	Una ó dos cucharadas de café.
Confeccion de alkermes. . .	De un escrúpulo á una dracma.
Agua de la Reina de Ungría.	De diez á veinte gotas.

TIÑA.

Extracto de hombrecillo . .	De veinte y cuatro granos á media dracma.

De scabiosa. . . . . De seis á veinte y cuatro granos.
Confeccion Hamech. . . . . De una dracma á una onza. (*Como purgante.*)
Píldoras de panacéa mercurial. De seis granos á un escrúpulo.
Remedio de Barlow.
Remedio del Dr. Bircher. (1)

TETANOS TRAUMATICO.

Pocion anti-tetánica de Fournier.

TRISMO DOLOROSO DE LA CARA.

Píldoras del Dr. Meglin. . De una á diez y ocho.

DOLORES DE VIENTRE.

Elixir americano. . . . . De una á dos dracmas.
Pocion de Spielman . . . . Á cucharadas.

DOLORES DE VIENTRE DE LOS NIÑOS.

Pocion de Spielman . . . . Á cucharadas cada cuarto de hora.

TOS SOFOCANTE.

(*Véase angina traqueal y la tabla de las enfermedades.*)

TUMORES SCIRROSOS.

Píldoras mercuriales . . . . De dos á tres al dia.
Jarave de zarzaparrilla. . . De una á una y media onza.
Extracto de cicuta. . . . . De dos á tres granos Se aumenta la dósis graduadamente todos los dias. (2)

TIMPANITIS.

Enémas purgantes. Laxantes unidos con los aromáticos.

---

(1) *Véase la tabla de las enfermedades externas.*
(2) *Idem.*

Asafétida y eter. Infusion de rábanos y gengible.
Hielo aplicado sobre el vientre. Fricciones con la trementina, los aceites y el alcanfor.

ÚLCERAS INTERNAS.

Trementina hervida	De un escrúpulo á una dracma en píldoras.
Bálsamo de Meca, del Perú y de Tolú.	Idem. (1)

VAPORES, ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS.

NEUROSES.

Elixir vitriólico.	De quince á treinta gotas.
Cremor de tártaro soluble .	De dos dracmas á media onza en agua de avena.
Píldoras nitroso alcanforadas.	De diez á treinta granos.
Almizcle	De cinco á veinte granos.
Gotas anodinas de Inglaterra.	De diez gotas á media dracma.
Polvo anti-espasmodico . . .	De un escrúpulo á una dracma.
De guteta	De dos granos á una y media dracma. Segun la edad del enfermo. (*Véase espasmo*)

VAPORES HISTÉRICOS.

Píldoras de asafétida. . . .	De ocho á diez y ocho granos dos veces al dia.
Polvo de Tunquin.	De doce á veinte y cuatro granos.
Elixir de propiedad de Paracelso.	De seis gotas á media dracma.
Espíritu volatil y aromático de Silvio.	De seis á treinta gotas.
Extracto de artemisa . . .	De doce granos a media dracma.
De valeriana.	De doce á cuarenta y ocho granos.
Agua de yerbabuena compuesta.	De una á cuatro dracmas.

(1) *Véase la tabla de las enfermedades externas.*

De la Generala.	Idem.
Jarave de artemisa	De dos dracmas á una y media onza.
Electuario de ballas de laurel.	De un escrúpulo á dos dracmas.
Píldoras histéricas.	De seis granos á media dracma.
Anti-espasmodicas de Buchan	De cinco á seis.
Píldoras anti-histericas del Dr. Selle.	De cinco á ocho mañana y tarde.
Tintura de ollín.	De quince á treinta gotas.
Esencia anti-histerica de Lemort	De veinte á cuarenta gotas.

VIRUELA.

MEDIOS GENERALES.

Eméticos, enémas emolientes, bebidas dulces, suero, laxantes suaves.

MEDIOS PARTICULARES.

Antimoniales á pequeñas dosis.

Elixir teriacal.	De diez á treinta gotas en una bebida cordial.
Espíritu volátil y aromático de Silvio.	De seis á treinta gotas.
Bálsamo del Comendador . .	De diez á cuarenta gotas en azucar.
Agua de la Generala . . .	De dos á cuatro dracmas.
Jarave de claveles compuesto.	De dos dracmas á una y media onza.
Elixir de Garux.	De dos dracmas á una onza.
Confeccion de jacintos . . .	De diez y ocho granos á una y media dracma.
Espíritu de nitro dulce. . .	Una cucharada de café en una bebida diurética.
Esencia alexifarmaca de Sthal.	De veinte á treinta gotas.

VIENTOS.

(*Véase flautosidades.*)

SIPHILIS.

Jarave de Cocinero.	De dos dracmas á una y media onza.
De Bellet.	De dos dracmas á una onza.
Píldoras de Beloste.	De dos á tres al dia.
Licor de Vans Wiettem. . .	Una cucharada de café en una bebida apropiada.

Píldoras mercuriales. . . .	Dos por mañana y tarde.
Gragea de Kaycer	Idem.
Píldoras del Dr. Sedillot . .	Idem.
Jarave de zarzaparrilla. . .	De dos dracmas á una y media onza.
Depurativo del Dr. Larrey.	Una onza en la mañana.
Solucion de Veikar	Treinta ó cuarenta gotas mañana y tarde.
Rob anti-sifilítico	De una á dos onzas.
Licor de Presavin.	De tres á cuatro vasos pequeños al dia.
Tipsana de Vinache	De tres á cuatro vasos.
De Zeltz	Un azumbre al dia.
Agua oxigenada de Alion .	Dos ó tres vasos en la mañana.
Mercurio soluble de Hanheman	De uno á diez y seis granos.
Píldoras mercuriales de Brugnatelli	De dos á cuatro.
De acónito del Dr. Double	Una por mañana y tarde.

Pastillas de mercurio sacarino del Dr. Lagneau.
Polvo de mercurio del mismo.
Remedio anti-venereo de Peyrilhe.

Píldoras de Alibert.	De cinco á seis al dia.
De Moscati.	Una por mañana y tarde.

Jarave de mercurio gomoso del Dr. Lagneau.

LOMBRICES INTESTINALES.

Aceite de ricino.	De media á dos onzas con jarave de limon.
Píldoras de Schmucher. . .	Seis mañana y tarde.
Opiata vermífuga de S. . .	De media á una onza.
Pocion del Dr. Marcaton. .	En dos veces una hora de distancia
Pocion contra la tenia.	Agua hervida con mercurio. (1)
Extracto de agenjos	De dos dracmas á una y media onza.
De flor de durazno	Idem como purgante.

---

(1) *Los experimentos del Dr. Cervantes prueban que la accion de esta medicina es ninguna, y que el azogue no comunica parte alguna al agua donde se hierve.* = El traductor.

Vermífugo y purgante. . .	De dos dracmas á una y media onza.
Azucar vermífuga	De seis á veinte y cuatro granos.
Polvo vermífugo	De seis granos á una dracma.
Pastillas de ruibarbo. . . .	De una á cuatro dracmas.
Píldoras de Beloste.	De dos á tres al dia: seis ú ocho para purgar.
Bizcochos vermífugos. . . .	Uno al dia.
Polvos de Bouvard.	Doce granos.
Remedio de madama Nouffer.	
Musgo de Córcega en jalea. .	Tres cucharadas al dia.
Vino de agenjos.	De dos á seis onzas en ayunas.
Bálsamo de la vida de Leliebre	De una á tres cucharadas.
Extracto de aristoloquia . .	De doce granos á media dracma.
De centaura menor . . .	Idem.
De genciana	De veinte y cuatro granos á una dracma.
De ruibarbo	De doce granos á media dracma.
De aloes	De doce granos á media dracma.
Píldoras de panacéa mercurial.	De seis granos á un escrúpulo.
Polvo de estaño	De dos escrúpulos á una dracma.
Pastillas vermífugas. . . .	Dos al dia.
Elixir visceral de Hoffman. .	De una á dos dracmas.
Electuario antelmíntico de Vogler. (*Véase la fórmula.*)	
Pastillas vermífugas de Barther..	De una á dos al dia.
Polvo vermífugo de Brugnatelli	De media dracma á una cuatro veces al dia.
Remedio de Prusia contra la tenia. (*Véase la fórmula.*)	
Jarave vermífugo de Boullay.	Á cucharadas tres ó cuatro veces al dia.
Electuario vermífugo de Spielman.	Una dracma mañana y tarde.
Antelmintico de Heister. .	Una dracma mañana y tarde.

VÉRTIGOS.

Cerveza cefálica inglesa .	Cuatro ó cinco vasos al dia.
Bolos anti-espasmodicos de Buchan.	De cuatro á seis al dia.

VÓMITOS.

Espíritu carminativo de Silvio	De doce gotas á una dracma.

Conserva de rosas. . . . . De dos dracmas á una onza.
Polvo diarrhodon . . . . . De doce granos á una dracma.
Opiata de Salomon . . . . De un escrúpulo á dos dracmas.
Abstringente . . . . . Idem.
Pocion de Riverio. . . . . En dos tomas.
Vino de Quina. . . . . De una á tres onzas.
Elixir Vitriólico. . . . . De quince á veinte gotas en un vaso de vino.

VOMITO DE SANGRE.

MEDIOS GENERALES.

Bebidas abstringentes y aciduladas.
Ligeros laxantes como el aceite de ricino.
Tintura de muriate de fierro. Treinta gotas en un poco de agua fria, dada todas las horas.

MEDIOS PARTICULARES.

Tres cucharadas de la pocion siguiente cada cuatro horas.
De esperma de ballena. . Media onza. Claras de huevos q. s.
Triturese en un mortero y agréguese.
De agua de poleo. . . . . Una onza.
De fuente. . . . . Cinco onzas.
De nitro . . . . . Una dracma.
Jarave de Tolú. . . . . Dos idem.
Tintura de opio. . . . . Una gota.

DE LOS MEDICAMENTOS EXTERNOS.

ABCESOS.

Cataplasmas emolientes de harina, de lino, y raiz de altea.
Pulpa de cebolla cruda.
Unguento de Lamere.
De Piderit.
De basalicón.
Bálsamo de Genevieve.

ANCHILOSIS FALSO.

Linimento estimulante inglés.

APHTAS.

Licor del Dr. Swediaur.
Mixtura de Boyle.
Vinagre alcanforado.

APOPLEXÍA.

Bálsamo nervino.
Opodeldoc.
Éter acético cantaridado del Dr. Double.

BLENORREA REBELDE.

Inyeccion del Dr. Clare.
Abstringente.
De J. Hamiltón.
De nitrate de plata. (*Dilatado en agua.*)
De licor de Vans-Wietem. (*Dilatado en agua.*)

QUEMADURAS.

Cerato de Furner.
Unguento blanco alcanforado de Viena.
Pupuleon.
Blanco de Bhasis.
Balsamo de Genevieve.
Agua de Alibour.
Jabon amoniaco calcareo.

BUBONES. (*Falsos.*)

Emplasto de cicuta.
De los cuatro fundentes.
De Canet.
Amoniáco mercurial del Dr. Selle.

BUBONES VENEREOS.

Cataplasmas de cebolla mezcladas con basalicón.
Emplasto de vigo con mercurio.
Antivenereo de Boherhave.

Emplasto de jabon, polvoreado con sal de amoniaco.
Amoniaco mercurial del Dr. Selle.

CANCER.

Cataplasma de chirivia pulposa.
Emplasto de cicuta.
De vigo con mercurio.
Unguento populeon.
Tintura de muriate de fierro.
Polvos de Plunequet.
Arsenical de Justamond. (1)

CATARATA.

Colirio de Newmann.

CARNOSIDADES DE LA URETRA.

Candelillas y sondas de goma elastica. Emplasticas de Darán.

CAUTERIOS.

El moxa.
El papel caústico.
El lienzo de Gautier.

CEFALARGIA.

Frontal hypnotico.
Bálsamo hypnotico.
Tabaco de los Vosges.
Polvo capital de S. Angel.
Agua para la emicranea.
Esencia del Dr. Ward.

---

(1) *El empleo de este polvo y el unguento arsenical de Fray Cosme, debe acompañarse de la mayor precaucion, poniendolo en las pequeñas ulceras á muy cortas dósis, se han visto algunos envenenamientos causados por estos tópicos.*

CANCROS.

(*Véase ulceras venereas.*)

DIVIESOS.

Emplastro de Richter.
Fundente de la Motte.
De Canet.

CONTUSIONES, LUXACIONES, TORCEDURAS.

Bálsamo de Genevieve.
De Arcogus.
Vulnerario.
Opodeldoc.
Nervino.
De Fourcroy.
Agua de Alibour.
Fomentos de Richter.
De Justamond.
Aromático (cocimiento de ajenjos, de laurel y romero.)
Unguento blanco alcanforado de Viena.
Fomentos de brionia (cocimiento de raiz de brionia con adicion de vinagre y sal marina.)
Emplasto de Andrés de la Cruz.
De vetónica.
Divino.
Esencia del Dr. Ward.
Aguardiente alcanforado.
Espíritu de Mindereros.
Linimento volatil.
Espíritu aromático de Silvio.

CÓLICO VENTOSO.

Aceite carminativo etereo de Danois.

TOS FERINA.

Linimento de ajo.
Pomada del Dr. Autenrielh.

GOLPES EN LOS PIES.

Emplasto de cera verde.
De diaquilon.

GOLPES EN LA CABEZA.

Agua de Bonferme, respirada y aplicada con compresas.
Fomentacion de Richter.

HUNDIMIENTO DEL PECHO, Y DE LAS MANOS.

Aceite de huevo en linimento.
Unguento populeon.
Bálsamo de Fourcroy.

ANGINA INFLAMATORIA.

Cerato de Rechour.

HERPES CORROSIVOS.

Cataplasma de pulpa de chirivia.
Unguento de nicociana.
Emplasto de jabon, y de betonica (colocado entre las espaldas, cuando los herpes están en el rostro.)
Pomada oxigenada.
Agua del cardenal de Luynes.
Unguento mercurial blanco de Fullér.
Jabon mercurial del Dr. Chaussier.
Baños de agua mineral sulfurea. (Berage.)

DESFALLECIMIENTOS.

Agua de Luc. . . . . }
Amoniáco líquido. . . . . } Para respirar.
Éter. . . . . }
Vinagre radical . . . . . }

DOLORES ARTRÍTICOS.

Bálsamo Opodeldoc.

De acero.
Nervino.
Aceite de laurel.
Unguento rosado.
Linimento saponaceo de Koempt.
Linimento de Homé.

ESCROFULAS.

(*Véanse tumores y ulceras escrofulosas.*)

DESOLLADURAS. LIGERAS ESCORIACIONES.

Cerato de Furner.
Agua vegeto mineral.
Polvo de Lycopodio.
De corteza de roble.
Bálsamo del Comendador.

SABAÑONES.

MEDIOS GENERALES.

(*Antes de la ulceracion.*) Baños estimulantes, agua animada con el ácido muriático, ó con la mostaza.
Fricciones con el espíritu de romero, ó la esencia de trementina.
Aplicacion de compresas empapadas en aguardiente alcanforado, ó bálsamo de Opodeldoc.
Unguento del Dr. Swediaur.
Pomada para los sabañones.
Tintura de almáciga compuesta. (*Farmacop. Austriaca.*)
Licor del Dr. Swediaur.
Solucion del sulfate de ácido de alumbre.
Cocimiento de Beleño.
Cerato de Furner.
Unguento de tucia.
Emplasto de cerusa.
Bálsamo de genevieva, cuando están ulcerados.
Tranquilo.
De Fourcroy.

ENGURGITAMIENTOS GLANDULOSOS.

LAMPARONES.

Collar del Dr. Morand.

Linimento de Hufeland.
De Roncali.
Bálsamo del caballero Laborda.
Emplasto de jabon, polvoreado con sal amoniáco.
Jalea de musgos de Russel.
Emplasto fundente de la Motte.

INFARTOS LACTEOS.

Espíritu volatil de sal amoniáco (extendido en agua.)
Linimento volatil.
Fomentos de Justamond.

EQUINANCIA.

Bálsamo tranquilo de Chomel, en fricciones al cuello.

ESCRECENCIAS CARNOSAS, FUNGOSIDADES DE LAS ULCERAS.

Alumbre calcinado en polvo.
Licor caústico de Plenk.

ESCRECENCIAS VREENEAS.

Licor caústico de Plenk.
Polvo de Rurger.

DEBILIDAD MUSCULAR.

Bálsamo de Saxonia.
De Fioraventi.
De Opodeldoc.
Nervino.
De la vida de Hofman.
Agua de magnanimidad,
Bálsamo bulnerario.
Unguento marciato.
Emplasto exycroceo.
Stiptico de Crolio.
Aguardiente alcanforado.

DEBILIDAD DEL OIDO.

Bálsamo acústico, aceite acustico, en inyeccion.

DEBILIDAD DORSAL.

Emplasto stiptico de Swediaur.

DEBILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA GENERACION.

Locion de agua fria.

FISTULA DEL ANO.

Unguento populeon.
Opiata ó pasta del Dr. Ward.

FRACTURAS.

Agua de Alcabusazo.
Fomentacion de Richter.

SARNA.

Unguento citrino mercurial.
Pomada antipsorica del Dr. Thomann.
Polvo anti-psorico.
Jabon mercurial del Dr. Chaussier.
Azufre lavado. Partes iguales, con la enjundia, para formar una pomada.
Infusion de eleboro blanco, agua mercurial en lociones.

GANGRENA.

Bálsamo de Opodeldoc.
De Arcocus.
De storaque.
De Genevieva.
Unguento egipciaco.
Emplasto de Nuremberg.
Tintura de quina.
Vinagre alcanforado.

Emplasto de triaca.
Unguento basalicon diluido con aceite de trementina.
Fomento del Dr. Richard. (1)

RASGADES.

Bálsamo de Fourcroy. Cerato de Turner. Pomada de nata de leche. De cohombro, de caracoles. Para los labios. Cerato de Galeno aceite de huevo.

GRANDES ENGURGITAMIENTOS, LUPIAS, LAMPARONES

(*Véase tumores.*)

Emplasto de diavotano. De cicuta. Bálsamo tranquilo. De Chomel. Collar de Morand. Linimento de Hufeland. De Roncali.

GONORREA.

Inyeccion calmante.
Tonica.
Abstringente.
Del Dr. Pringle.
Del Dr. Young
Solucion de piedra admirable.

GOTA.

(*Véase Reumatismo.*)

Bálsamo de acero.
Tranquilo.

---

(1) *El carbon molido y aplicado sobre las partes gangrenadas, ayuda mucho en la naturaleza á la limitacion y desprendimiento de la parte caida en mortificacion. Este experimento repetido siempre con suceso en el colegio de Cádiz, se acredita aun con los hechos domésticos; un pedazo de carne de vaca ó ternera que principia á manifestar por su olor, un principio de putrefaccion, lo destierra luego que se hierve encerrada en una bolsa de lienzo, que contenga carbon molido.*

Del Dr. Sanchez.
Bálsamo acetico alcanforado de Pelletier.

HEMORROGIAS.

Agarico de China.
Polvo de goma de enebro.
Stiptico de Colbatch.

HEMORROIDES.

Manteca de cacao en supositorios.
Unguento de Montpeller.
Opiata y pasta del Dr. Ward.
Locion de zinc alcanforada.
Unguento populeon ó unguento rosado. (1)
Linimento del Dr. Andry.
Unguento de Falck.
Supositorios de corcho quemado.

HIDROPESIA.

Unguento de artanita.

INFLAMACIONES DE LA PIEL COMEZONES.

Pomada de nata de leche.
Cerato opiado.
Unguento de pompholigo. (2)
Locion de opio.
Agua de Goulard.

LEUCORREA FLORES BLANCAS.

Inyeccion de Prīngle.
De Young.
Emplasto estiptico del Dr. Swdiaur. Aplicado sobre la region lombar.

---

(1) *Linimento compuesto de dos onzas de populeon, cuatro dracmas de laudano y dos yemas de huevo.*

(2) *Ó de Tucia. Nicolai. Alx. Farmacop. de Palacios página 452.*

LUPIAS.

Linimento resolutivo de Pott.

LUJACIONES.

(*Véase contusiones.*)

Bálsamo nervino. De opodeldoc. Emplasto de Andrés de la Cruz. Oxicroceo (1) Fomentos aromáticos. aguardiente alcanforado.

MALES CASUALES.

(*Véase golpes Panadizos.*)

MAL DE CABEZA.

(*Véase Cefalargia.*)

MAGULLAMIENTOS.

Agua de M. Lepremier.

Esencia del Dr. Ward. (*Véase Contusiones.*)

OBSTRUCCIONES.

Unguento de agrippa.
Emplasto de cicuta.
Pomada del Dr. Fabre.

ODONTALGIA.

Elixir odontalgico de Lerroy.
Espíritu de coclearia.
Mixtura para los dientes.
Laúdano.
Opio gomoso aplicado sobre la carie.

---

(1) *De Nicolao Farmacop. Aug. Ren. Palacios pág.* 492.

OPHTALMIA.

MEDIOS GENERALES.

(En la ophtalmia aguda.)

Sanguijuelas en las sienes, ó ventosas escarificadas.
Minorativos cada tres ó cuatro dias.
Pedilubios calientes.
Colirios refrigerantes, y abstringentes, al que se agregan cuarenta ó cincuenta gotas de tintura vinosa de opio.

(En la ophtalmia purulenta.)

Cataplasmas hechas con el albumen y alumbre, ó con la pulpa fresca de criadillas de tierra o de nabos raspados.
Colirio del Dr. Ward; hecho con dos onzas de agua celeste y de agua alcanforada, dilatado en cuatro onzas de agua destilada.

MEDIOS PARTICULARES.

Bálsamo de Sanives.
Agua del Dr. Ivel.
Fortificante de Selle.
Colirio de Hervecio.
Seco de Lagneau.
De Scarpa.
De Janin.
De Gimbernat. Para las manchas.
De Brun.
Pomada de Grandjeam. Como epispastico detras de las orejas.
De Janin.
De Leon.
De Desarlt.
Unguento de Tucia.
Linimento anti-optalmico de Plenk.
(Cuando depende la ophtalmia de un vicio venereo, es necesario recurrir á los mercuriales. Si es escrofulosa se emplean la quina los tónicos &c.)

PANADIZO. MAL CASUAL.

Bálsamo de Genevieva.

Emplasto de Lamotte.

PARÁLISIS Y LETARGO.

Bálsamo de Opodeldoc.
Nervino.
Aceite de laurel.
Agua de Bernaval.
Tintura de cantáridas.
Linimento estimulante inglés.
Éter acético cantáridado del Dr. Double.

HERIDAS SIMPLES Y RECIENTES.

Emplasto de resina elástica.
De diapalma.
De musilago.
De minio.
Agua Stiptica.
Emplasto aglutinante.
Esencia vulneria.
Agua roja para las heridas.
De Ebuli. (1)
Bálsamo de Genevieva.
Del Comendador.
Polvo de Vernix.
Básamo de Lucatel.
Unguento de basalicón.
Nutrito.
De la Mére.
De Vigo simple.

HERIDAS ANTIGUAS

Detercivos de apio.
Digestivos de Plenhc.
Unguento de Pompholigo.
Bálsamo de Arceo.
Unguento de Propoles de Cadet.

---

(1) *Farmacopéa de Palacios pág.* 509.

De storaque.
Cerato de Saturno.
Unguento blanco de Rhasis.
Agua aluminosa de Bates.

HERIDAS EN LA CABEZA.

Emplasto de vetónica.

PIOJOS GUSANOS.

Unguento gris.
Polvo de Stafisagria.

RASGADES.

Licor caústico de Plenhc.

REUMATISMOS.

Bálsamo Opodeldoc en fricciones.
Anodino de Bates. Idem.
Aceite de Laurel.
Éter acético cantaridado.
Linimento de Homé.
De Debois de Rochefort.
Agua de Gordran en baños.
Bálsamo acético alcanforado de Pelletier.

CEATICA.

Detercivos de apio.
Tintura de cantáridas.
Bálsamo Nervino.
Acético alcanforado de Pelletier.
Emplasto de vetonica.
Jabon de Stalkey.
Linimento volátil.
Emplasto de pez de Borgoña.
Unguento martiatum. (1)
Cataplasma ixquiatica de Willis.

---

(1) *De Nicolao. Farmacop. de Palacios pág.* 450.

Linimento de Mustard.
De Ferrier.
Agua de Gordran.
De M. Lepremier.
Éter acetico cantaridado del Dr. Double.

ESPASMO.

Linimento del Dr. Selle.

STRANGURIA.

Inyeccion oleosa. Candelillas emolientes.

SORDERA ACCIDENTAL.

Bálsamo y aceite acusticos.

MANCHAS EN EL OJO.

Colirio de Gimbernat.

TIÑA.

Infusion de raiz de Veratrum, en locion.
Lociones de agua de jabon.
De agua de cal.
Emplasto de pez negra.
Unguento de la Pitie.
Alumbre calcinado. Sobre los bordes fungosos.
Sulfate de cobre Idem.
Remedio del Dr. Bicner.

TUMORES.

Emplasto de Canet.
Unguento de Brionia.
Emplasto de betonica,
De melifloto.
De cicuta.
De jabon.
De diaquilón.
Divino.

*

De manus Dei.
De Vigo simple.
De Fouquet.
De pelitre de Fullér.

TUMORES INFLAMATORIOS.

Cataplasmas emolientes.
Embrocaciones oleosas.

TUMORES SIFILÍTICOS.

Aceite de laurel.
Unguento de nicociana.
Emplasto de vigo con mercurio.
Amoniaco mercurial del Dr. Selle.

TUMORES SCIRROSOS.

Emplasto de belladona.

TUMORES ESCROFULOSOS.

Unguento marciatum.
De estoraque.
Digestivo.
Basalicón activado con el precipitado rojo.
Emplasto de cicuta.
Magnetico.
Espíritu volátil aromático de Silvio.
Emplasto de pelitre de Fullér.

TIMPANITIS.

Linimento volátil de Plenhc.

ÚLCERAS..

Bálsamo de Genevieva, aplicado sobre un papel de estraza.
Cerato de Pott.
De Kirkland.
Emplasto fundente de la Mott.
De Fouquet.
Del Abad Doyen.

Aceite verde de Metz.
Unguento de Ricour. Cuando están indolentes.
De la abadia de Bec.
Bálsamo de Lucatel.
Unguento de Nicociana.
Mundificantes de apio.
Unguento egipciaco.
Supurante de Piderit.
Emplasto de esperma de ballena.
Magnetico
De diapalma.
De minio.
De Nuremberg.
De ceruza.
Agua de Alibour.

ÚLCERA CANCEROSA.

Polvo de Rouselot.

ÚLCERA BENIGNA.

Agua de Goulard.
Encerado del Dr. Ailhen.
Cerato del Dr. Huffeland.

ÚLCERAS DE MAL.

CARÁCTER.

Locion alcanforada.
Linimento arsenicál. (1)
Solucion de sublimado corrosivo.
Polvo arsenical de Justamond. . .
Arsenical de Pluncquer. . . } (2)
Anti-carsinomatoso de Fr. Cosme.

---

(1) *De arsénico blanco . . . Dos granos.*
De aceite de olivas. . . Una onza.
(2) *Véase acerca de estos polvos la nota de la página.*

Disolucion de muriate de cobre amoniacal.
Disolucion de nitrate de plata.
Agua de cal en lociones.
Polvo de carbon.

ÚLCERAS FÉTIDAS.

Cataplasmas farinaceas, hechas con partes iguales de polvo de carbon.

ÚLCERAS INVETERADAS.

Polvo de corteza de Xanthoxylon aplicados á la superficie.

ÚLCERA ESCROFULOSA.

Agua fagadenica.

ÚLCERA PÚTRIDA DE LA GARGANTA.

Tintura de arnica en gargarismo.

ÚLCERAS VENÉREAS.

Unguento Bruno.
Mercurial blanco de Zeller.
Cerato mercurial de Falck.
Opiado de Lagneau.
Agua de Piderit.
De cal.
Mercurial.
Fagadenica.

VAPORES HISTÉRICOS.

Bálsamo histérico. En friccion.
Emplasto anti-histérico.

BUBAS.

Unguento napolitano en fricciones.
Emplasto amoniaco mercurial del Dr. Selle.
Pomada mercurial de Cirillo. En fricciones.

Manteca de cacao.
Jabon mercurial del Dr. Chaussier.

LOMBRICES INTESTINALES.

Cataplasma anti-helmintica.
Unguento de artánita.
Aceite de betabel aloetizado.

FIN DEL MEMORIAL FARMACEUTICO.

SUPLEMENTO

AL FORMULARIO MAGISTRAL.

Fórmulas usadas con suceso en esta Ciudad.

BÁLSAMO DE GONZALEZ.

Rp. Enjundia de gallina . . . Una libra.
Bálsamo de calabaza . . . } De cada uno dos libras.
Aceite de huevo. . . . . }
Bálsamo anodino . . . . . } De cada uno ocho onzas.
Espíritu de sal amoniaco. . }
Mezclese.
Uso. Antipleuritico.

BÁLSAMO DE GOATEMALA Ó DEL OBISPO.

Rp. Semilla de bálsamo. . . . Dos onzas.
Espíritu de vino. . . . . Una libra.
Triturese la semilla, infundase por seis ú ocho dias en el espíritu, filtrése y guárdese en basijas bien tapadas.
Uso. Anti-epileptico.

POMADA OXIGENADA.

Rp. Manteca de puerco. . . . Una libra.
Ácido nítrico . . . . . Dos onzas.
Derrítase la grasa, mezclésele el ácido agitandolo con frecuencia con un tubo de vidrio, mantengase en el fuego hasta la ebulicion, dejese enfriar y guárdese para el uso.

POMADA ESTIBIADA.

Rp. Tártaro estibiado . . . . . Una onza.

Manteca de puerco. . . . Una libra.

Mezclése en un mortero hasta la perfecta incorporacion.

POMADA OPTALMICA.

Rp. Unguento rosado. . . . . Una onza.
Precipitado rojo . . . . . Doce granos.
Alcanfor. . . . . Seis idem.
Mezclése.

EMPLASTO DE LARRIVA.

Rp. Minio. . . . . Ocho onzas.
Aceite de olivas . . . . . Catorce idem.
Cera amarilla. . . . . Una libra.
Sebo. . . . . } De cada uno cuatro escrúp.
Alcanfor. . . . . }

Pongase á coser al fuego lento el minio con el sebo y el aceite en la cantidad suficiente de agua hasta la consistencia de emplasto, añádase la cera y el alcanfor y formense magdaleones.

POLVOS DE SANDOVAL.

Rp. Rosa rubia. . . . . Una libra.
Cebolleja. . . . . Ocho onzas.
Haganse polvo y mezclese.
Uso. Errhino.

JARAVE DE GOMA MANGLE.

Rp. Mucílago de dicha goma. . Ocho onzas.
Azucar. . . . . Diez y seis idem.
Hagase jarave S. A.
Uso. Pectoral.

UNCION FUERTE PARA ALBEITARES.

Rp. Unguento de altea . . . . }
De Zacarias . . . . . } De cada uno una libra.
De Aragon . . . . . }

Polvos de cantáridas . . . } De cada uno cuatro onzas.
De pimienta larga . . . }
De euforbio . . . . . Dos idem.
Mezclése.
Uso. Escarótico

UNGUENTO DE MARAVILLA.

Rp. Raiz de dicha planta, limpia y cortada en taleolas. Una libra.
Manteca de puerco. . . . Dos idem.
Pongase á fuego lento hasta que consuma la humedad.

UNGUENTO Ó INTENCIONES DE LOPEZ.

Rp. Unguento de calabaza. . . } De cada uno una libra.
De rosa. . . . . }
Derritanse al fuego lento y añádase separado de él y medio frio.
Precipitado rojo . . . . . Cuatro onzas.
Minio . . . . . Una idem.
Mezclése.
Uso. Optálmico.

UNGUENTO DE JUBERA.

Rp. Aceite de agenjos . . . .
De almáciga. . . . . } De cada uno una libra.
De yerbabuena. . . . .
Rosado . . . . . .
Cera amarilla . . . . . Una libra y cuatro onzas.
Polvos de yerba buena . . } De cada uno una onza.
De agenjos. . . . . }
De diarrodon . . . . . } De cada uno dos y media id.
Aromáticos. . . . . }
Derrítase la cera con los aceites, cuélese y agreguense los polvos mezclandolos exactamente.
Uso. Estomacal.

UNGUENTO DE OSORIO.

Rp. Sebos. . . . . } a. seis libras.
Manteca. . . . . }

*

Estoraque líquido. . . . . Seis onzas.
Bº negro. . . . . Ocho idem.
Aceite esencial de espliego. } a. dos dracmas.
Idem de romero . . . . }
Uso. Estomacal.

TABLETAS DE BARTOLACHE.

Rp. Etiope marcial. . . . . Cuatro onzas.
Azucar en polvo. . . . . Una libra.
Canela . . . . . Veinte escrúpulos.
Mucílago de goma arábiga. Q. S.
Mezclénse y haganse tabletas.

JARAVE DE ZANETI.

Rp. Maná en lágrima . . . . Dos onzas.
Jarave de altea. . . . . Una y media idem.
Cocimiento de Sén. . . . Una idem.
Aceite de almendras dulces. Idem.
Manteca de cacao . . . . Tres dracmas.
Mezclése á fuego lento y añádase.
Kermes mineral. . . . . Cuatro granos.
Uso. Pectoral.

CERATO AROMÁTICO DE PIÑA.

Rp. Emplasto de tacamaca. . . Una onza.
Aceite de tomillo . . . . } a. seis gotas.
De succino blanco . . . }
Mezclése.

VINO ANTI-EPILEPTICO.

Rp. Vino de Jeréz. . . . . Seis onzas.
Agua de canela espirituosa } a. cuatro idem.
Idem rosada . . . . . }
Sumo de grana Kermes . . Una idem.
Azucar blanco . . . . . Dos idem.
Polvos letificantes de Galeno. Dos dracmas.
Hojas de oro . . . . . Número 4.
Esencia de nuez moscada . Cuatro gotas.
Mezclése.

PURGA PARA LOS NIÑOS DE PECHO.

Rp. Magnesia pura . . . . . Veinte y cuatro granos.
Jabon de España. . . . . Ocho idem.
Esencia de anís. . . . . Dos gotas.
Mezclése.

TINTURA DE DRIMIS.

Rp. Espíritu de vino. . . . . Una libra.
Corteza de drimis . . . . Dos onzas.
Triturese la corteza, infundase en el espíritu por ocho dias y filtrése.

POLVOS ANTI-EPILEPTICOS.

Rp. Polvos de quina. . . . .]
De serpentaria . . . . . } a. media onza.
De valeriana. . . . .]
De cálamo aromático . . Una dracma.
De succino . . . . . Un escrúpulo.
Mezclénse y dividanse en papeles del peso de nueve granos.

CERATO DE MAZO.

Rp. Cera amarilla . . . . . Una onza.
Pez griega. . . . . Dos idem.
Sebo. . . . . Media idem.
Mezclése.

Notas para la mejor instruccion de esta obra.

Semen contra: es la raiz de agenjos de Judea.
Nerprum-Rhamnus catarticus. Zarza purgante.
Psyllium. Zargatona.
Consoude. Symphitum.
Chou-rouga. Lombarda.
Bezár. Piedra que se cria en las entrañas de ciertas cabras de las Indias.
Orchilla. Musgo que sirve para tinte.
Jada. Especie de esmeralda baja de color.

FIN DEL SUPLEMENTO.

TABLA

DE LOS AUTORES CITADOS

EN EL FORMULARIO MAGISTRAL.

Pág.

A.

Adams. Licor anti-nefritico . . . . . 84.
Aitken. Encerado . . . 29.
Alibert. Píldoras anti-sifiliticas . . . . 114.
=Pomada de Turbith. . 132.
=Pomada anti-psorica. . 132.
=Remedio contra la tenia. 170.
=Tintura anisada. . . 186.
Alibour. Agua vulneraria. 42.
Alyon. Agua oxigenada. 36.
=Pomada oxigenada . . 130.
Anderson. Píldoras escocesas . . . . . 119.
Andry. Pocion contra los envenenamientos. . . 137.
=Pocion purgante. . . 140.
=Linimento contra las hemorroides. . . . . 80.
Anhalt. Agua espirituosa. 39.
Audouart. Febrífugo. . 71.
Authenrieth. Pomada contra el coqueluche . . 133.

B.

Bacher. Píldoras tónicas. 107.
Ball. Polvo vermífugo purgante . . . . 154.
Bamberg. Tintura tebaica. 188.
Barlow. Remedio contra la tiña. . . . . 161.
Barthez. Electuario balsámico abstringente . 43.
=Pastillas vermífugas. . 104.
=Píldoras blancas . . 125.
=Píldoras carminativas . 125.
Bath. Bálsamo anodino . 17.
Belet. Jarave mercurial . 179.
Bestuchef. Tintura nervino tónica . . . . 185.
Bicker. Remedio contra la tiña . . . . . 161.
Birckmann. Polvo estomáquico . . . . . 146.
Boherhave. Cocimimiento anti-séptico . . . 34.
=Electuario anti-febríl . 46.
Bonferme. Agua estimulante . . . . . 40.
Boherhave. Elixir anti-escorbútico . . . . 53.
=Elixir anti-asmático. . 55.
=Emplasto anti-venereo . 60.
=Mixtura pectoral . . 88.
=Píldoras eméticas . . 119.

Pág.
=Píldoras balsámicas. . 128.
Birckmann. Polvo estomáquico . . . . . 146.
Bonvoisin. Vejigatorio . 194.
Borde ó el caballero la Borda. Bálsamo contra el reumatismo . . . 14.
Bovillon de Lagrange. Polvo temperante laxativo. 149.
=Jarave depurativo amargo 177.
Boullay. Método para imitar las aguas de Vallatria . . . . . 11.
=Píldoras contra la gonorrea . . . . . 116.
=Jarave contra la tos convulsiva. . . . . 177.
=Jarave vermífugo . . 177.
Boullemer. Polvo vermífugo 144
Bouvart. Jarave pectoral. 174.
Bouyer. Pomada dulcificante . . . . . 132.
Boyle. Mixtura contra las aphtas. . . . . 91.
Broussonnet. Solucion citro-muriática . . . 182.
Brown. Píldoras esténicas. 122.
Brugnatelli. Elixir ácido aromático . . . . 50.
=Éter muriático. . . . 68.
=Píldoras mercuriales . 123.
=Polvo vermífugo . . 151.
Bruner. Mixtura anti-asmática. . . . . 90.
Brun. Colirio. . . . . 30.
Buchan. Bolos anti-espasmódicos. . . . . 24.
=Electuario anti-artrítico. 46.
=Electuario anti-disenterico . . . . . 47.
=Linimento de ajo . . 79.

Pág.
=Píldoras anti-hictericas. 111.
=Píldoras relaxantes. . 120.
=Píldoras incisivas pectorales . . . . 122.
=Pocion diurética . . 135.
=Tipsana pectoral. . 192.
Butter. Cerveza anti-escorbútica . . . . 20.

C.

Cadet. Emulcion para terminar las gonorreas inveteradas . . . 63.
=Mixtura. Odontálgica . 90.
=Unguento de Propolés . 96.
=Píldoras estomáquicas. . 108.
=Píldoras incisivas. . 121.
=Píldoras mercuriales . 124.
Canet. Emplasto madurativo . . . . . 61.
Capurón. Píldoras abstringentes . . . . . 109.
Carignan. (Princesa de) Polvos. . . . . 156.
Caumartin. (Ratafia del Comendador de) . . 158.
Charles. Jarave pectoral balsámico . . . 173.
Chaussier. Pastillas para la angina inflamatoria. 103.
Jabon mercurial . . 171.
Trosiscos . . . 193.
Cheston. Remedio contra el cáncer de los labios. 162.
Chomel. Bálsamo tranquilo. 16.
Choppart. Pocion balsámica . . . . 134.
Cirillo. Mixtura anti-sifilitica . . . . 89.
=Pomada mercurial. . 131.
Clare. Inyeccion. . . 78.

Pág.

Clutton. Tintura febrífuga . . . . . 184.
Coladon. Agua cordial . 38.
Colbatch. Polvo Stiptico. . . . . 153.
Corvisart. Vino amargo diurético . . . 198.
Cosme. Polvo anti-carcinomatoso . . . 142.
Courcelles. Elixir americano . . . . . 58.
Cocinero. Jarave depurativo . . . . . 176.
Crollius. Elixir uterino . 52.

D.

Daffys. Tintura purgante. 184.
Danois. Oximiel pectoral. 103.
Darand. Candelillas medicinales. . . . . 26.
Danois. Aceite carminativo . . . . . 75.
Desault. Pomada anti-optalmica. . . . . 129.
Desbois. Bolo fortificante. 23.
Linimento arti-artritico. 82.
=Bolos carminantes. . 23.
=Pocion emenagoga. . 136.
Dessesarts. Jarave contra la tos . . . . . 174.
Double. Éter acético cantaridado. . . . . 69.
=Píldoras de acónito mercuriales. . . . . 110.
Doyen (el abad) Emplasto fundente. . . . . 62.
Dower. Polvos. . . . 155.
Dubois. Pastillas contra las engurgitaciones del cartilago tiroides. . . 105.
=Vino amargo. . . 196.

Pág.

Dumeril. Píldoras sudoríficas calmantes . . 116.
Dupuy. Píldoras contra el hidrotorax . . . 128.
Durande. Mixtura lithontrítica . . . . . 92.

E.

Ellér. Licor anti artrítico. 75.

F.

Fabre. Pomada . . 130.
Falk. Unguento para las hemorroides . . . 97.
=Cerato mercurial . . 28.
Feltz. Tipsana antivenerea. 191.
Ferriar. Linimento saponaceo alcanforado. . 83.
Feuillet. Aceite verde de Metz . . . . . 76.
Fordice. Vino compuesto. 199.
Fouquet. Emplasto resolutivo . . . . . 60.
Fouquier. Electuario hidragogo . . . . 43.
Fourcroy. Bálsamo contra el reumatismo . . . 14.
Fournier. Pocion anti tetánica . . . . . 138.
Frank. Mixtura anti-letargica . . . . . 88.
=Pocion anti-escorbótica . 135.
=Emplasto de pelitre. . 61.
=Julepe moscado . . 78.
Mixtura balsámica . . 92.
=Vino anti-hidrópico. . 197.

G.

Gardanne. Jarave contra la tos . . . . . 174.

Pág.
Gimbernat. Colirio . 31.
Georoly. Píldoras anti-hicterícas . . . 129.
Gondran. Agua anti-artrítica . . . 41.
Gordón. Lohc . . . 86.
Grandjean Pomada para los ojos. . . 130.
Greding. Píldoras contra la hictericia. . . 111.
Griffith. Mixtura de mirra alcalizada . . 93.
Grimaldi. Polvo febrífugo. 144
Guindre. Sal purgante . 171.
Gyms ó James. Polvo febrifugo . . . 144.

H.

Haen. Píldoras purgantes. 118.
=Píldoras anti-caquecticas. 125.
Haller. Esencia dulce. . 65.
Hallér. Pocion diurética . 133.
Haller. Pocion hipecacuana, . . . 134.
Haly. Polvo calmante. . 147.
Hamilton. Inyeccion sedativa. . . . 78.
Hartmann. Polvo anti-caquectico. . . 147.
=Muriate de mercurio calibeado . . . 95.
Hervecio. Opiata estomáquica . . . 100.
=Píldoras de alumbre. . 109.
=Polvo anodino . . 147.
=Polvo febrífugo y purgante . . . 143.
=Polvo vomitivo. . 146.
Heister. Electuario antelmintico . . . 45.
Hoffman. Bálsamo de la vida. . . . . 18.
=Elixir balsámico, estomáquico y temperado. . 51.
Home. Linimento anti-artrítico . . . 81.
Hufeland. Cerato. . 27.
=Linimento contra los engorgitamientos . . 80.
=Pocion contra la hidropesía. . . . 137.
Huln. Píldoras tónicas. . 126.
Huxam. Elixir anti-séptico. . . . 54.
=Eptiope anti-monial. . 70.
=Vino emético . . 195.

J.

Jacobo. Tintura de antimonio. . . . 186.
Jacobinos de Rouen. Elixir anti-apoplético. . 56.
Jadelot. Baños anti-psoricos . . . 162.
Janin. Colirio . . 31.
=Píldoras hidragogas. . 120.
=Pomada optálmica. . . 129.
=Vejigatorio perpetuo. . 194.
Jeanet de Longrois. Crema pectoral . . 33.
Jeanroy Pocion contra el coqueluche. . . 135.
Jobard. Pastillas pectorales y calmantes. . 106.
Junker. Polvo febrífugo. 150.
Justamond Fomentos. . 72.
=Polvo arcenicál. . 142.
Jussieu. Pocion contra el esputo de la sangre. . 139.

K.

Kenp. Esencia scilítica . 65.

Pág.

=Polvo de antimonio Marcial. . . . 148.
=Tintura anti-espasmódica 188.
Kæmpe. Píldoras uterinas. 116.
Keyser. Píldoras anti-venéreas . . . 122.
Kirkland. Cerato. . 29.
Klaproth. Eter acético ferruginoso. . . 67.
=Bálsamo Opodeldoc. . 13.
=Tintura éterea . . 190.
Knox. Polvo preservativo. 157.
Kaempf. Linimento saponaceo. . . . 81.
Kruger. Polvo caústico. . 145.
Kuser. Linimento diurético. 82.
Kuttenger. Baños contra la tiña. . . . 169.

L.

Laborda. Bálsamo anti-artrítico . . . 14.
Lacombe. Pastillas de pelitre. . . . 104.
Lagneau. Cerato opiado . 29.
=Colirio seco. . . 30.
=Pastillas de mercurio sacarino . . . 153.
=Polvos de mercurio sacarino . . . 105.
=Jarave de mercurio . 179.
Lamothe. Emplasto fundente . . . 61.
Larrey. Opiata contra la gonorrea . . 101.
=Jarave depurativo. . 176.
Laseone. Polvo tónico incisivo . . . 154
Le Comte. Vejigatorio . 195
Leliebre. Bálsamo de la vida . . . 17.

Pág.

Leroux (J. J.) Píldoras incisivas . . . 117.
Lemonier. Píldoras fundentes . . . 111.
Lemort. Elixir anti-venéreo. . . . 54.
=Esencia anti-histérica. . 67.
Lewis. Vino de guayaco eleborado. . . 200.
Loustonau. Encerado abstringente . . 182.
Louyer. Villermay. Vejigatorios. . . 193.
Luynes. Agua anti-herpetica . . . 40.

M.

Macartán. Pocion purgante y vermífuga. . 138.
Maetzio. Píldoras de los tres diablos. . . 113.
Polvo stiptico . . 153.
Majault. Jarave purgante. 178.
Maloet. Opiata vermífuga. 102.
=Jarave pectoral. . 175.
Marc. Febrífugo. . 72.
=Polvo anti-artrítico. . 141.
=Polvo contra el coqueluche . . . 155.
Mathiole. Elixir de la vida. . . . 48.
Mead. Electuario anti-epileptico . . . . 47.
Meglin. Remedio contra el trismo doloroso de la cara. 167.
Mende. Pocion catártica. 136.
Merat. Píldoras contra el baile de S. Vito. . 110.
Mesaise. Agua de la vida purgante . . 35.
Mithie. Elixir estomático 49.

*

Pág.

Morand. Collar contra los lamparones . . . 30.
Mereau. Eter balsámico de tolú . . . . 69.
Moretti. Mercurio soluble . . . . 159.
Moscati. Píldoras mercuriales. . . . . 115.
=Tintura estomaquica. . 189.
Mongenot. Pocion contra la afonia . . 136.
=Polvo incisivo . . 149.
Mustard. Linimento. . 80.
Mutis. Cerveza de quina. 21.
Mutzel. Mixtura fundente. 93.

N.

Newmann. Colirio. . 31.
Noufer. Remedio contra la tenia. . . 169.
Norford. Pocion anti-nefrítica . . . 139.

O.

Odier. Polvo. . . 152.
Opodeldoc. Bálsamo. . 13.

P.

Parizet. Píldoras anti-catarrales . . . 113.
Parmienter. Bolo estomáquico . . . 23.
=Pasta pectoral . . 106.
Passavin. Agua vegeto mercurial. . . 37.
Pelletier. Bálsamo acético alcanforado. . . 16.
=Jabon acético étereo. . 171.
Perard. Polvo anti-artritico . . 155.

Pág.

Petit. Píldoras anti-catarrales . . . 113.
Peyritthe. Elixir anti-escrofuloso . . 54.
=Remedio anti-venereo . 168.
Piderit. Agua mercurial. 37.
=Infusion de ollín compuesta . . . 77.
=Unguento supurante. . 96.
=Píldoras anti-espasmódicas . . . 112.
Planche. Método para imitar las aguas de Bareges. 11.
=Pomada mercurial con la manteca de cacao . 130.
=Agua etérea alcanforada. . . . 37.
Plenk. Digestivo. . 35.
=Epilatorio. . . 64.
=Linimento anti-optálmico . . . 81.
=Linimento volátil. . 82.
=Licor caústico. . 85.
=Locion odontalgica. . 86.
=Mixtura recino-jabonosa. 91.
=Mixtura saponacea purgante . . . 91.
=Unguento contra los sabañones . . . 97.
=Píldoras mercuriales. . 123.
=Vino estomáquico. . 197.
Plumier. Píldoras anti-sifilíticas . . . 118.
Plummer. Polvo anti-venereo . . . 153.
Plunequet. Polvo arcenicál. . . . 142.
Portal. Jarave anti-escorbutico . . . 179.
Pott. Cerato. . . 28.
=Linimento resolutivo. . 80.
Premier. Agua vulneraria. 49.

Pág.
Presavin. Licor mercurial . . . 85.
Principe. (Polvo del) . 143.
Pringle. Inyeccion. . 77.
Purmann. Remedio contra los tumores crónicos. . 167.

Q.

Quarin. Decoccion arti-artrítica . . . 33.
=Electuario contra la hidropesía. . . 42.
=Emulcion contra la ciática . . . 63.
=Gargarismo contra la parálisis de la lengua. . 73.
=Mixtura pectoral . 88.
=Contra la hictericia . 89.
=Contra la hemotisis. . 91.
=Píldoras contra el asma. 124.
=Contra la epilepsía. . 124.
=Para terminar las gonorreas . . . 127.
=Pocion contra la tos sofocante . . . 136.
=Polvo contra la tos convulsiva . . . 155.
=Remedio contra la disenteria . . . 164.
Remedio contra la disenteria maligna . . 164.
Quercetan. Agua diurética: 36.

R.

Raulin. Elixir. . . 52.
Rechoux. Cerato . . 28.
Renou . Píldoras mercuriales . . . . 122.
Reuss . Electuario antihemorroydal. . . 46.

Pág.
=Spíritu de ollin. . . 65.
=Polvo de tunquin. . 150.
=Supositorios fortificantes. . . . . 183.
=Vinagre Cholchico. . 200.
Richard . Bálsamo abstringente. . . . 18.
=Fomentos contra la gangrena. . . . . 73.
=Vino scilitico. . . 198.
Richter. Fomentos resolutivos. . . . 72.
=Píldoras fundentes. . 117.
Ricour. Unguento. . . 98.
Rivet. Jarave pectoral. . 172.
Riverio. Pocion anti-emética . . . . . 140.
Robet Thomas. Pocion contra la coqueluche. . . 137.
=Polvo contra la gastrodinia. . . . . 157.
Roncalli. Linimento antiescrofuloso. . . . 83.
Roscinstein. Polvos para las nodrizas. . . . 150.
Roux. Píldoras incisivas. 117.
Rousselot. Polvo contra el cancer. . . . . 157.
Russel. Eptiope vegetal. 70.
=Jalea musgo. . . . 74.

S.

Saiffert. Píldoras purgantes fundentes. . . 115.
San German. The de la salud. . . . . 190.
Santa Maria. Píldoras contra lo gonorrea. . . 127.
Saint Yves. Bálsamo ophtálmico. . . . . 16.
Sanchez. Bálsamo anti-artrítico. . . . . 15.

Pág.

=Píldoras laxantes fundentes. . . . . 114.
Saunder. Lexia litontrítica . . . . . 79.
Scarpa. Colirio. . . . 30.
Schmucher. Píldoras antelminticas. . . . . 125.
Schroder. Píldoras tartareas. . . . . 128.
Sedillot. Píldoras mercuriales. . . . . 123.
Selle. Conserva anti-escorbutica. . . . . 33.
—Agua ophtalmica. . . 41.
=Elixir fortificante . . 51.
=Elixir anti-escorbutico. 53.
=Elixir resolutivo. . . 55.
=Emplato amoniaco mercurial. . . . . 62.
=Linimento anti-espasmódico. 82
=Mixtura resolutiva. . 89.
=Mixtura acida . . 93.
=Mixtura diaforetica. . 94
—Píldoras anti-septicas . 127.
—Polvo aperitivo. . 156.
—Jarave pectoral. . 172.
Smellome. Unguento ophtálmico. . . 99
Smith Bolo digestivo . 24.
—Píldoras fundentes. . 117
—Píldoras estomáquicas . 126.
Schmucher. Píldoras anthélminticas. . . 125.
Spielman. Electuario vermifugo. . . . . 45.
—Pocion para los dolores de vientre. . . 140.
—Tintura de Ruibarbo . 184
=Vinagre alcanforado. . 201.
Spina. Elixir de vida. . 17.

Pág.

Sthal. Esencia alexifarmaca. . . . 66.
=Polvo de scila compuesto. . . . 151.
Stholl. Bebida anti-floxistica. . . . . 22.
Stholl. Píldoras tonícas . 109.
Sougthon. Elixir estomáquico . . . . 52.
Syhenham. Cervesa purgante . . . . 20.
=Cosimiento blanco. . 34.
=Píldoras marciales . . 112.
Swediaur Bolo contra la paralisis. . . . 26.
=Emplasto de recina elastica . . . . 60.
=Emplasto stiptico. . 62.
=Licor contra las aptas. 85.
=Unguento para los rasgades. . . . 99.
=Píldoras cupreas. . 126.
=Polvo anti-septico. . 143.
Sthal. Píldoras contra el catarro uterino. . 108.

T.

Thedén. Agua de alcabusaso. . . . 38.
Thenard. Éter muriático. 68.
=Ozmazome . . . 102.
Thierry. Pomada epispástica. . . . 133.
Thomann. Pomada antipsorica. . . . 133.
Tournier. Pocion anti-tenica. . . . 138.
Tisot. Opiata anti-leucorreica. . . . 100.
=Opiata febrifuga . . 101.
Treves. Agua purgante . 36.
Tronchin. Crema pectoral. 33.

Pág.

=Mermelda purgante. . 87.
Turner. Cerato. . . 28.

V.

Vanhelmon. Polvo de scila nitrado. . . 152.
Van-Swieten. Mistura hidragoga . . . 90.
Van-mons. Bebida antinarcotica. . . 22.
=Muriate de amoniaco cupreo . . . 94.
Vernix. Polvo abstringente. . . . 156.
Vicq-de-Azir. Píldoras anti-artriticas . . 121.
=Píldoras fundentes. . 121.
Vigaroux. Tipsana. . 192.
Vinache. Tipsana purgante. . . . 190.
Vogler. Electuario anthelmintico. . . . 44.
=Remedio odontálgico. . 168.
=Tintura lexivial. . . 188.
Vrillere. (Madama de la) Agua para los dientes. 40.

W.

Ward. Electuario anticaquectico. . . . 44.
=Esencias. . . . 67.
=Opiata para las hemorroydes. . . . 101.
Warwick. Polvo purgante. 145.
Wauters. Vejigatorio . 194.
Wedel. Aceite Besoárdico. 75.
Wedelio. Esencia carminativa. . . . 66.

Pág.

=Polvo pectoral. . . 146.
Weikar. Solucion antivenerea. . . 181.
Weiss. Remedio anti-lactisinoso. . . 167.
Werlhoff. Elixir balsámico. 51.
=Polvo corroborante. . 145.
Wetzler. Polvo sedativo. 148.
Whitt. Elixir febrifugo . 57.
=Linimento carminante . 79.
Willams. Pocion anti-nefritica. . . 139.
=Mistura contra los cálculos biliarios. . 92.
Wilkinson. Electuario anti-dissenterico. . . 47.
Willis. Cataplasma isquiatica. . . . 27.
=Elixir sudorífico . . 54.
=Emulcion anti-artritica. 63.
=Píldoras anti-dissentericas. . . . 109.
=Pocion Copaibada. . 139.
=Jarave sulfuroso. . 181.
=Jarave caliveado. . 181.
Wilson. Purgante. . 157.
Withering. Píldoras de digital. . . . 118.

Y.

Young. Inyeccion . 77.
Yvel Agua para los ojos. 41.

Z.

Zanetti. Mermelada purgante. . . 87.
Zeller. Unguento mercurial blaneo. . . 97.

TABLA

DE LAS FÓRMULAS CONTENIDAS EN EL FORMULARIO MAGISTRAL.

Pág.

A.

Azucar naranjada purgante. . . . 183.
Aguardiente de Alemania. 35.
=Purgante de Mezaise . 35.
Agua de Treves. . 36.
=De Quercetan . . 36.
=Diurética alcanforada de Fuller . . . 36.
=Oxigenada de Alion . 36.
=Mercurial de Piderit. . 37.
=Vegeto mercurial de Passavin . . . 37.
=Éterea alcanforada de Planchet . . 37.
=Cordial de Coladon . 38.
=De alcabusazo de Theden. . . . 38.
=Espirituosa de Anhalt. . 39.
=De magnanimidad. . 39.
=De Madama de Villiere. . . . 40.
=De M. Leprimier. . 40.
=De Bonforme y de Armagnac . . . 40.
=Anti-herpética de Luynes . . . 40.
=Optálmica . fortificante del Dr. Selle . . 41.

Pág.

=Para los ojos del Dr. Yvel. . . . 41.
=De Alibour. . . 42.
=De Godrán . . . 41.
Aceite besoardico de Wedel. . . . 75.
=Carminativo étereo. . 75.
=De vetabel aloetisado. 76
=Acustico. . . . 76.
=Verde de Metzo de Zaullet. . . . 76

B.

Baños. De agua mineral sulfurosa artificial imitando á los de Vallatria. 11.
=Anti-psoricos del Dr. Jadelot. . . . 162.
Bálsamo de Genevieva. . 12.
=Saxon. . . . 12.
=Acustico. . . . 13.
=Opodeldoc . . . 13.
=Del caballero Laborda ó de Fourcroy. . . 14.
=Anti-artrítico del Dr. Sanchez. . . . 15
=Ophtalmico de S. Yves. 16.
=Tranquilo de Chomel. . 16.

Pág.

=Acético alcanforado de Pelletier. . . 16.
=Anodino de Balh. . 17.
=De la vida de Leliebre. 17.
=De la vida de Hoffman. 18.
=Abstringente de Richard . . . 18.
=De Ricour. (Véase unguento.) . . 98.
=De la vida externo. (Véase linimento estimulante. 18.
Cerveza. Diurética inglesa. 19.
=Purgante . . 19.
=Estomáquica inglesa. . 18.
=Anti-escorbútica. . 19.
=Purgante de Sydehan. . 20.
=Anti-escorbútica de Butler . . . 20.
=Cefálica inglesa. . 20.
=De quina de Mutis . 21.
Bizcochos. Purgantes. . 21.
=Vermífugos . . 21.
Bebida. Anti-floxistica de Stoholl. . . 22.
=Anti-narcótica de Vans-Mons . . . 22.
Bolos. Diaforéticos ingleses. . . 22.
=Fortificante de Desbois. 23.
=Carminantes del mismo. 23.
=Anti-espasmódico de Buchan . . . 24.
=Stomaquico de Parmentier . . . 23.
=Digestivo de Smith. . 24.
=Contra la parálisis. De Swediaur . . 26.

C.

Candelillas de Daran. . 26.
Cataplasma anthelmintica. 27.
=Isquiatica de Wills. . 27.
Cerato del Dr. Hulfeland. 27.
=De Turner. . . 28.
=De Pott. . . 28.
=De Rechoux. . . 28.
=Mercurial de Falck. . 28.
=De Kirklan . . 29.
=Opiado de Lagneau. . 29.
Ceromel ó encerado del Dr. Aitken . . . 29.
Collar de Morand contra los lamparones. . 30.
Colirio de Brun. . 30.
=Seco de Lagneau. . 30.
=De Gimbernat . . 31.
=De Janin . . 31.
=De Newman. . . 31.
Confeccion japónica. . 31.
Conserva anti-escorbútica de Selle. . . 33.
Crema pectoral de Tronchin . . . 31.
=De Jeanet de Longrois. 31.

D.

Decoccion anti-artrítica de Quarin. . . 33.
=De aloes compuesta . 34.
Decoccion anti-séptica de Boherhave . . 34.
=Blanca de Sydeham. . 34.
Digestivo de Plenk. . 35.
Droga amarga de los indianos (Véase elixir.). 49.

E.

Electuario de Quarin contra la hidropesia. . 42.
=Hidragogo del Dr. Fouquier . . . 43.

Pág.

=Balsámico abstringente De Barthec . . . 43.
=Anti-caquético del Dr. Ward . . . . 44.
=Antelmintico de Vogler. 44.
=Vermífugo de Spielman. 45.
=Anthelmintico de Heister. 45.
=Anti-febríl de Viena. . 45.
=De magnesia de Copenhague . . . . 46.
=Anti-febríl de Boherhave. 46.
=Anti-artrítico de Buchan. 46.
=Anti-disenterico de Wilkinson . . . . 47.
=Anti-epileptico del Dr. Mead . . . . 47.
=Anti-hemorroidal de Reus. 46.
=Anti-disentérica de Buchan . . . . 47.
Elixir de Mathiole. . 48.
=Alkermes de los italianos . . . . 48.
=De drogas amargas de los indianos . . 49.
=De Mithse . . 49.
=Ácido aromático de Brugnatelli . . . . 50.
=Pectorál inglés. . 50.
=Balsámico stomáquico y temperado de Hoffman. 51.
=Balsamico de Werfiot. . 51.
=Fortificante del Dr. Selle. 51.
=Sagrado. . . . 52.
=Stomaquico de Stoughton . . . . 52.
=Uterino de Crollio. . 52.
=De Raulin . . . 52.
=Anti-escorbútico del Dr. Selle . . . . 53.
=De Boherhave . . . 53.
=Anti-escrofuloso de Peirilne . . . . 54.

Pág.

=Anti-venéreo de Lemort. 54.
=Sudorífico de Willis. . 54.
=Anti-séptico de Huxan. 54.
=Anti-asmático de Boherhave . . . . 55.
=Resolutivo de Dr. Selle. 55.
=Paregorico inglés . 56.
=Anti-apoplético de los jacobinos de Rousen. 56.
=Paregorico de Edimburgo . . . . 56.
=Febrífugo de Whit. . 57.
=Fétido de Fulde. . 57.
=De Desbois. (Véase vino amargo). . . 57.
=Americano de Courcelles. 58.
=Anti artrítico de la isla de Francia . . 59.
Emplasto anti-histérico. . 60.
=De Fouquet . . 60.
=Anti-venéreo de Boherhahave . . . . 60.
=De resina clastica del Dr. Swediaur. . . 60.
=De pelitre de Fuller. . 61.
=De Canet. . . 61.
=Fundente de Lamotte. 61.
=Del Abad Doyen. . 62.
=Stiptico de Swediaur. 62.
=Amoniaco mercurial del Dr. Selle. . . 62.
Emulcion de Quarin contra la ciatica . . 63.
=Del Dr. Willis contra el reumatismo . . 63.
=De Cadet para terminar la gonorrea . . 63.
Epilatorio de Plenk. . 64.
Species vermífugas . 64.
=Prothe . . . 64.
Espíritu de ollín de Reus. 65.
Espíritu etéreo aromático. 65.

Pág.

Esencia escilítica de Keup. 65.
=Dulce de Halér. . 65.
=Carminativa de Wedelio. 66.
=Alexifarmaca de Sthal. 66.
=Anti-histérica de Lemot. 67.
=De Wadar . . 67.
Eter acético ferruginoso de Klaproth . . 67.
=Muriático de Brugnatelli. 68.
=Muriático de Thenard. 68.
=Balsámico de tolú de Moreau . . . 69.
=Acético cantaridado de Double . . . 69.
=Sulfúrico ferruginoso de Sthal . . . 70.
Eptiope antimonial de Huxham . . . 70.
=Vegetal de Russel . 70.
Extracto de coloquintidas compuesto . . 71.

F.

Febrífugo de Dr. Audouart . . . 71.
=Del Dr. Maret. . 72.
Fomentos resolutivos de Richter . . . 72
=Del Dr. Justamond. . 72.
=Del Dr. Richard. . 73
Frontal sipnotico. . 73.

G.

Gargarismo de Quarin en la parálisis . . 73.
Gotas anti-artríticas de Eller . . . 75.

I.

Inyeccion de ollín compuesta de Piderit. . 77.

Pág.

Inyeccion de Dr. Clare. 73.
=Del Dr. Pringle. . 77.
=Del Dr. Young. . 77.
=De Hamilton. . . 78.

J.

Julepe moscado de Fullér. 78.
=Escocés para la angina inflamatoria . . 78.
=De fucos de Russel. . 74.
=De Lichen islándico. . 74.
Vermífugo de musgo de Corcega. . . 75.
Jabon mercurial del Dr. Chaussier. . . 171.
=Acético etéreo del Dr. Pelletier. . . 171.
Jarave pectoral dulcificante del Dr. Selle. . 172.
=Pectoral resolutivo del mismo . . . 172.
=Para el coqueluche. . 172.
=Otro citado por Rivet. 172.
=Pectoral balsámico de Charles . . . 173.
=Pectoral inglés . . 173.
=Pectoral Bouvart. . 174.
=Del Dr. Dessesarts. Contra la tos. . . 174.
=Del Dr Gardanne. . 174.
=De cochinillas. . 175.
=De higado de azufre. 176.
=Pectoral del Dr. Maleot. 175.
=Depurante del Dr. Larrey . . . 176.
=De Cocinero . . 176.
=De Boullay contra la coqueluche . . 177.
=Vermífugo del mismo . 177.
=Anti-artrítico y anti-hidrópico . . . 177.

Pág.
=Depurativo amargo de Bouillon. . . 177.
=Vino cardiaco de Willemberg . . . . 178.
=Depurativo de Mr. Majault . . . 178.
=De Bellet. . . 179.
=De mercurio gomoso del Dr Lagneau . . 179.
=Anti-escorbútico del Dr. Portal . . . 179
=Anti-asmático. . . 180.
=Vermífugo y purgante. 180.
=De Willis. . . 181.
=Calibeado del mismo . 181.

L.

Lejía litontrítica de Saunders . . . 79.
Liniment o carminativo de Wiitt . . . 79
=De ajo. . . 79
=De Mustard. . . 80
=Resolutivo de Pott. . 80.
=De Hufeland. Contra los engurgitamientos . 80.
=Contra las hemorroides de Andry. . . 80.
=Anti-optálmico de Plenke. 81.
=Saponaceo de Koempf. 81
=Volátil de Plenk . 82.
=Anti-artrítico de Home. 81.
=Anti-artrítico de Desbois de Rochefort. . 82
=Anti-espasmódico de Selle . . . 82.
=Diurético de Kuser. . 82.
=Saponaceo alcanforado de Ferriar . . . 83.
=Estimulante inglés. . 83.
=Anti-escrofuloso de Roncalli . . . 83.

Pág.
Licor anti-nefrítico de Adams . . . 84.
=Amoniacal anisado. . 83.
=Cáustico de Plenk . 85.
=Anti-venéreo de Prersavin . . . 85.
=Del Dr. Swediaur para las aptas . . 85.
Lohc de almidón. . 85.
=De Gordón. . . 86.
=Saponaceo. . . 86.
Locion odontálgica de Plenke . . . 86.
=Contra la tiña . . 87.

M.

Mermelada de Tronchin . 87.
=De Zanetti . . 87.
Mixtura pectoral de Boherhave. . . 88.
=Pectoral de Quarin . 88.
=Anti-letárgica de Franck. 88.
=De Quarin en la hicteri-cia . . . 89.
=Anti-sifilítica de Cirillo. 89.
=Anti-catarral rusa. . 89.
=Resolutiva del Dr. Selle. 89.
=Hidragoga de Van-Swieten . . . 90.
=Odontálgica de Cadet. 90.
=Resino saponacea de Plenk 91.
=Anti-asmática de Bruner. 90.
=Catártica arabe. . 90.
=De Quarin contra la hemotisis . . . 91.
=Saponacea purgante de Plenk . . . 91.
=De Boile contra las aptas . . . 91.
=De Whit contra los cálculos biliarios . . 92.

Pág.
=Litontrítica de Durande. 92.
=Balsámica de Fuller. . 92.
=Fundente de Mutzel . 93.
=De mirra alcalizada de Griffeth. . . 93.
=Para la angina inflamatoria . . . 93.
=Ácida del Dr. Selle. . 93.
=Diaforética del mismo . 94.
Muriate de amoniaco cupreo de Van-mons. . 94.
=De amoniaco y de fierro. 94.
=Sosa y de oro . . 95
=De sén mercurisado de Hartman. . . 95.

O.

Opiata anti-leucorreatica de Tisot . . . 100
=Febrífuga del Dr. C. . 100.
=Febrífuga de Tisot . 101.
=Stomaquica de Helvecio. 100.
=Del Dr. Larrey. . 101.
=Del Dr. Ward, para las hemorroydes . . 101.
=Vermífuga de Maleot. 102.
Osmazome. De Thenard. 102
=Miel pectoral de Danois. 103.
=Idem de Edimburgo. . 103.

P.

Pastillas de énula campánula . . . 104.
=De Dr. Chaussier para la angina inflamatoria . 103.
=Vermífugas de Barther. 104
=Mogoles. . . 104
=De pelitre de Lacombe. 104.
=De Gens-seng . . 105.
=De mercurio sacarino del Dr. Lagneau . . 105.
=Pectoral del Dr. Jobard. 106.

Pág.
=Del Dr. Dubois. . 105.
Pasta pectoral de Parmentier . . . 106.
=Contra los Rasgades. . 106.
Píldoras febrífugas inglesas . . . 107.
= De Scila compuestas. (*Farmacopea de Lóndres.*) 107.
=Tónicas de Bucher. . 107.
=Estomáquicas de Cadet. 108.
=Anti-disentéricas de Willis . . . 109.
=Abstringente de Capurón . . . 109.
=De alumbre de Hervecio . . . 109.
=Anti-hictericas de Buchan . . . 111.
=Idem de Gredín. . 111.
=De acónito mercuriales. Del Dr. Double. . 110.
=Fundentes de Lemonier. 111.
=De Merat, contra el baile de S. Vito, . 110.
=Orientales. . . 112.
=Uterinas de Stal. . 108.
=Mercuriales de Sydehan. 112.
=Anti-espasmódicas de Piderit . . . 112.
=De los tres diablos de Maetzio. . . 113.
=Anti-catarrales del Dr. Pariset . . . 113.
=Anti-sifilíticas del Dr. Alibert . . . 114.
=Laxantes del Dr. Sanchez . . . 114.
=Anti catarrales del Dr. Petit. . . . 113.
=Mercuriales de Moscati. 115.
=Purgantes del Dr. Saiffert . . . 115.

Pág.
=Matricales de Koempf. 116.
=De Boullay contra la gonorrea . . . 116.
=Sudoríficas del Dr. Dumeril . . . 116.
=Fundentes de Richter. 117.
=Fundentes de H. Smith. 117.
=De digital de Wittherîng. 118.
=Incisivas del Dr. J. J. Leroux . . . 117.
=Purgantes de Haen. . 118.
=Plumier . . . 118.
=Escosesas del Dr. Anderion . . . 119.
=Relaxantes de Buchan. 120.
=Emeticas de Boherhave 119.
=Hidragogas de Janin. . 120.
=Scilíticas de Edimburgo. 121.
=Anti-artríticas de Vicq de Azir . . . 121.
=Fundentes del mismo . 121.
=Incisivas de Cadet. . 121.
=Incisivas pectorales de Buchan . . . 122.
=Estenicas de Brun. . 122.
=De Keyser. . . 122.
=Mercuriales de Renou. 122.
=Mercuriales de Brugnatelli . . . 123.
=Idem de Pleak. . 123.
=Idem de Sedillot. . 123.
=Idem de Cadet. . 124.
=Anti-epilepticas inglesas. 124.
=De Quarin contra el asma. 124.
=Del mismo contra la epilepsia . . . 124.
=Blancas de Bartez. . 125.
=Carminantes del mismo. 125.
=Antelminticas de Schmucher . . . 125.
=Anti caquecticas de Haen. 125.
=De Moscw . . 126.
Pág.
=Stomáquicas de Smilh. 126.
=Tónicas de Huln. . 126.
=Cupreas de Swediaur. 126.
=De Santa Maria contra la gonorrea . . 127.
=De Quarin para terminar la gonorrea . . 127.
=Anti-histéricas del Dr. Selle . . . 127.
=Balsámicas de Boherhave. 128.
=Tartáreas de Schroeder. 128.
=Del Dr. Dupuy contra el hidrotorax . . 128.
Pomada anti optálmica de Desault . . . 129.
=Optálmica de Jeanin. . 129.
=De Leon para los ojos. 129.
=De Grandjean . . 130.
=Del Dr. Fabre. . 130.
=Mercurial de Cirillo . 131.
=Idem o de manteca de cacao . . . 130.
=Oxigenada de Alion. 130.
=De la Sultana . . 130.
=De la condesa ó pomada virginal. . . 130.
=De Turbit del Dr. Alibet. 132.
=Anti-psoricas del mismo. 132.
=Idem del Dr. Boyer. . 132.
=Anti hicterica de Goeroly . . . 129.
=Antip-sorica de Thomann. 133.
=Del Dr Autheurieth contra el coqueluche. . 133.
=De Thierry . . 133.
Pocion balsámica de Choppart . . . 134.
=Diurética de Dr. Hallér. 133.
=De hipecacuana de Hallér . . . 134.
=De M. Jeanrroy contra el coqueluche . . 135.

Pág.

=Diuréticas de Bucham. . 135.
=Anti escorbútica del Dr. Franhe . . . 135.
=Laxante de Viena. . 135.
=Del Dr. Mongenot, contra la afonia . . 136.
=Catárticas del Dr. Mende . . . 136.
=De Quarín contra la tós sofocante . . 136.
=Emenagogas de Desbois. 136.
=De Huffeland, contra la hidropesía . . 137.
=Del Dr. Andry contra los envenenamientos por los ácidos minerales. . 137.
=Contra la coqueluche de Dr. Rover Thomas. . 137.
=Purgante y vermífuga del Dr. Marcatan . . 138.
=Contra la tenia. . 138.
=Anti-stanica del Dr. Norford . . . 139.
=Anti-nefrítica del Dr. Tournier. . . 138.
=Capivi dado por Willis. 139.
=De Jussieu contra el esputo de sangre. . 139.
=Anti-emética de Riverio. 140.
=De Spielman contra los torminos . . 140.
=Purgante de Dr. Andry. 140.
Polvos anti psoricos. . 141.
=Arsenicál de Justamond. 142.
=Anti-carcinomatoso de Fr. Cosme . . . 142
=Arsenicál de Pluncquet. 142
=Anti-artrítico del Dr. Marc . . . 141.
—De la Princesa. . 143.
—Anti-séptico de Swediaur . . . 143.

Pág.

—Febrífugo y purgante de Hervecio . . 143.
—Febrífugo de Boullemer. 144.
—De Gins ó James. . 144.
—Cáustico de Kruger. . 145.
—Corroborante de Werlhoff . . . . 145.
—De Grimaldi. . . 144.
—Vomitivo de Hervecio . 146.
—Anti-catarral de la Farmacopea de Viena. . 145.
—Del conde de Warwick. 145.
—Pectoral de Wedellio. . 156.
—Stomáquico de Birckmann . . . 146.
—Anti-caquectico de Hartmann . . . 148.
—Diaromatón inglés. . 148.
—De Haly. . . 148.
—Anodino de Hervecio. 148.
—Sedativo de Wetzler. . 148.
—De antimonio marcial de Kemp . . 148.
—Incisivo del Dr. Mongenot . . . 149.
—Temperante laxativo de M. Bovillon de Lagrange 149.
—De Tunquin. (Reuss.) 150.
—De Roseinstein, para las nodrizas . . 150.
—Febrífugo de Juncker. 150.
—De scila compuesto de Sthal . . . 151.
—Vermífugo de Brugnatelli . . . 151.
—Del conde de Palma . 151.
—De greda compuesto. . 152.
—De Odier. . . 152.
—De kino compuesto. (Farmacopea de Londres.) . 152.
—De scila nitrados, de Vanhelmont . . 152.

Pág.
—Stítico de Colbatch. . 153.
—Vermífugo purgante de Ball. . . . 154.
—De mercurio sacarino del Dr. Lagneau . . 153.
—De Plummer . . 153.
—Tónico incisivo del Dr. Lasonet . . . 154.
—Vermífugo de estaño. . 154.
—De Dower. . . . 155.
—Anti-catarral del Dr. Marc . . . 155.
—Anti-artrítico de Perard. 155.
—De Quarín contra la tós convulsiva. . . 155.
—Esfractico de Selle. . 156.
—De la Princesa de Carignan . . . 156.
—De Knox. . . 157.
—De Vernix. . . 156.
—De Rouselot, contra el cáncer . . . 157.
—De Roberto Tomás, contra la gastrodinia. . 167.
—Purgante de Dr. Wilson. 167.

R.

Ratafia del Comendador de Caumartin contra la piedra de la vejiga. . 158.
—De los caribes. . 158.
Remedio de Madama Nouffer contra la tenia. . 159.
—Anti-sifilitico de Hanemann . . . 159.
—Contra la tenia. . 160.
—Del Dr. Baslow contra la tiña . . . 161.
—Del Dr. Bicker, idem. . 161.
—Anti-psorico del Dr. Jadelot . . . 162

Pág.
—Del Dr. Chestón contra el cáncer de los labios y las úlceras malignas . 162.
—De la caridad para el cólico de los pintores . 162.
—De Quarín contra la disenteria. . . 164.
—De Quarín contra la disenteria maligna. . 165.
—Contra el envenenamiento por los hongos. . 165.
—Del Dr. Meglin el trismo doloroso . . 167.
—Anti-lactisinoso del Dr. Weiss . . . 167.
—De Purmann contra los tumores crónicos de las articulaciones . . 167.
—Odontálgico de Vogler. 168.
—Anti-venéreo del Dr. Peirilhe . . . 168.
—Contra la tenia por el colegio de médicos de Prusia . . . 169.
—Contra la tenia por Kuttinger . . . 169.
—Contra los accidentes ocasionados por los hongos . . . 170.
—Contra el tialismo. . 171

S.

Solucion anti-venérea de Weikart. . . 181.
—Citro muriática de Broussonnet . . . 182.
—Arsenicál de Prusia . 182.
Sparadrap abstringente de Coustonau. . . 182.
Supositorio fortificante de Reuss . . . 183.

Pág.
=Contra las hemorroydes. 183.
Sal de Guindre. . 171.

T.

Tablillas anti-catarrales de Tronchin . . 183.
Tintura de Daffys. . 184.
=De ruibarbo de Spielman. . . . 184.
=Sagrada . . . 184.
=De lavándula compuesta. (De Lóndres.) . 185.
=Febrífuga de Clutton. 184.
=Nervino tónica, de Bestuchef . . . 185.
=De ollín de Edimburgo. 186.
=Anisada del Dr. Alibert. 186.
=De antimonio de Jacobo. 186.
=Volátil de Guayaco. (De Lóndres.) . . 186.
=De malate de fierro . 187.
=De almáciga compuesta. 187.
=Nervino tónica de Berlín . . . 187.
= Anti-espasmódica de Keup . . . 188.
=De ruibarbo inglesa. . 188.
=Tebaica de Bemberg. . 188.
=Lexivial de Vogler. . 188.
=Stomáquica de Moscati. 189.
=Stomáquica amarga de Edimburgo . . 189
=Éterea de Klaproth. . 190.
=De cardomomo compuesta. (Lóndres.) . 189.
Thé de sanidad de M. de S. German . . 190.
Tipsana de Vinache. . 190
=Real. . . . 191
=De Feltz. . . 191.
=De Vigaroux. . . 192

Pág.
Trosiscos del Dr. Chaussier . . . 193.

V.

Vejigatorio de M. Wauters. . . . 194.
=Perpetuo de Janin. . 195.
=Inglés . . . 195.
=Del Dr. Louyer Villermay . . . 193.
=Amoniacal. . . 195.
=De M. Vonvoisin. . 194.
Vino de Huxham. . 195.
=Febrífugo de S. . 196.
=Amargo. . . 196.
=Amargo ó elixir de Dubois . . . 195.
=Febrífugo. . . 196.
=Anti-hidrópico de Fullér. 197.
=Estomáquico de Plenk . 197.
=Anti-leucorreaico. . 197.
=Scilítico de Richard. . 198.
=Amargo diurético de Corvisat. . . 198.
=Anti-apoplectico. . 198.
=Anti-hicterico ó contra la amarillés. . . 200.
=Amargo y diurético de la caridad . . 199.
=Del Dr. Fordice. . 199.
=De ruibarbo compuesto. 199.
=De guayaco eleborado del Dr. Lewis . . 200.
=Diurético inglés. . 200.
Vinagre colchico de Reus. 200.
=Alcanforado de Spielman. 201.
=Bezoardico de Berlín. . 201.
Unguento de Mompellier. 95.
=Blanco alcanforado de Viena . . . 95.
=Epispastico sin cantáridas . . . 96.

	Pág.
=Supurante de Piderit.	96.
=De propoles de Cadet.	96.
=De Falck contra los tumores hemorroidales.	97.
=Del Dr. Plenk contra los sabañones.	97.
=De Ricour	98.
=Mercurial blanco de Zeller.	96.
=De la Pitie contra la tiña	98.
=Del Abad de Bec.	98.
=Del Duque.	99.
=Del Dr. Swediaur contra las Rasgades	99.
=Optálmico de Smellome.	99.

W.

Wakalka de los indianos.	299.

TABLA

DE LAS ENFERMEDADES

Pág.

A.

Abcesos . . . 279.
Afecciones lacteás. . 203.
=Nerviosas. . . 204.
=Uterinas. . . 203.
Agrios del estómago. . 204.
Amenorrea. . . 204.
Anasarca . . . 204.
Angina. . . . 205.
=Tonsilar. . . 205.
=Maligna. . . 105.
=Tracheal. . . 217.
Ankilosis falso . . 279.
Angina inflamatoria. . 283.
Aphonia . . . 206.
Aptas . . . 280.
Apoplejía sanguinea. . 206.
=Serosa . . . 207.
Ascitis. . . . 207.
Asma. . . . 207.
Atraso de las reglas. . 264.

B.

Blenorrea . . . 208.
Bubones venéreos. . 280.

C.

Cachexia . . . 209.
Cálculos biliarios. . 209.
=De la vejiga . . 209.
Cancer . . . 209.
Cardialgia. . . 209.
Carnosidades en el canal de la uretra . . 281.
Catarata . . . 281.
Catarro agudo. . . 209.
=Laringeo . . 210.
=Crónico. . . 210.
=De la vejiga . . 210.
Cauterios . . . 281.
Cefalargia. . . 210.
Clorosis . . . 210.
Condilomas. . . 285.
Cólico de estómago. . 211.
=Bilioso . . . 212.
=Miserere. . . 213.
=Nefrítico. . . 213.
=Nervioso. . . 213.
=De los pintores. . 213.
=Ventoso. . . 212.
=Histérico. . . 213.
Constipacion. . . 214.
Contusiones. . . 282.
Convulsiones de los adultos. . . . 214.
=De los niños. . . 214.
Coqueluche. . . 214.
Caidas y golpes. . 215.
Calambres del estómago . 217.
Cistitis . . . 253.

*

Pág.

D.

Danza de S. Vito. . 218.
Debilidad de estómago. . 227.
=Del oido. . . 286.
=De los miembros. . 286.
=De los nervios. . 285.
=De los órganos de la generacion. . . 230.
=Dorsal . . . 286.
Desfallecimiento . . 219.
Depósitos artríticos. . 283.
Diarrea . . . 219.
Diviesos. . . . 282.
Dolores artríticos. . 283.
=De las articulaciones . 283.
Dispepcia . . . 221.
Disenteria. . . 221.
Disuria. . . . 222.

E.

Esputo cruento . . 216.
Escrofulas . . . 284.
Estrechamiento del canal de la uretra . . 281.
Embarazo gástrico. . 222.
Envenenamientos . . 224.
Engurgitaciones glandulosas . . 284.
Epilepsía . . . 225.
Eruptos. . . . 227.
Esquinancia. . . 227.
Escoriaciones. . . 284
Escressencias. . . 285.
Esputo de sangre. . 216.
Enteritis . . . 252.
Emotisis . . . 248.

F.

Fiebre adinámica. . 232.
=Inflamatoria. . . 241.
=Intermitente . . 236.
=Pútrida . . . 241.
=Exantemática. . . 242.
=Quartana . . 236.
Fistula del ano . . 286.
Flatuosidades. . . 243.
Flores blancas. . . 243.
Fracturas. . . 286.

G.

Golpes . . . 283.
Gangrena . . . 286.
Gastritis . . . 251.
Glándulas engurgitadas . 284.
Gonorrea . . . 245.
Gota. . . . 246.
Grietas . . . 237.

H.

Heridas . . . 291.
=De la cabeza. . . 292.
=Fungosas. . . 285.
=Inveteradas. . . 291.
=Simples. . . 291.
Hundimiento . . 283.
Hematuria. . . 247.
Hemorroides. . . 247.
Hepatitis . . . 248.
Herpes . . . 252.
Hidrofobia. . . 250.
Hidropesía. . . 248.
Hidrotorax. . . 250.
Hipocondría. . . 250.
Histérico . . . 203.

I.

Itericia . . . 251.
Indigestion . . 251.
=Del estómago . . 251.

Pág.

=De higado . . 252.
=De los riñones. . 253.
=De la vejiga. . . 253.
Insonnio . . . 253.
Iscuria . . . 252.

L.

Lamparones. . . 222.
Letargo . . . 255.
Leucorrea . . . 255.
Lobanillos . . . 289.
Luxaciones . . 282.
Lombrices intestinales. . 277.

M.

Mal caduco. . . 256.
Manchas en el ojo. . 293.
Mania . . . 256.
Marasmo . . . 256.
=De los oidos . . 293.
Magullamientos . . 289.

N.

Nefrítico. (Cólico.) . 257.
Nefritis . . . 253.

O.

Obstrucciones. . . 257.
Odontalgia . . 289.
Optalmia . . . 290.
Obstrucciones mesentéricas de los niños . . 209.

P.

Palpitacion . . 258
Panadizo . . . 290
Parálisis . . . 259.
Perineumonia . . 260.
Pérdidas de sangre. (Hemorragias.) . . 247.
Piedra en la vejiga. . 246.
Phtisis pulmonar . . 261.
=Laringea. . . 261.
Phrenesi . . . 260.
Piedra de la vejiga. . 246.
Pituita . . . 263.
Pleurecía . . . 263.
Piojos lombrices . . 292.

Q.

Quemadas . . . 280.

R.

Raquitis . . . 263.
Rabia. . . . 264.
Retencion de orina. . 266.
Rasgades . . . 287.
Reumatismo. . . 292.
Romadizo. . . 268.

S.

Sarna . . . 244.
Sarampion . . . 270.
Sciatica . . . 270.
Scorbuto . . . 270.
Scrofulas . . . 271.
Spasmos nerviosos. . 293.
Stranguria. . . 273.
Supresion de la transpiracion . . 273.
=De las reglas . . 273.
Sordera . . . 293.
Síncope . . . 273.

T.

Tiña. . . . 273.
Tetano . . . 274.

	Pág.
Trismo doloroso.	274.
Tós convulsiva	271.
Tós ferina.	282.
Tumores.	293.
=Sifilíticos.	294.
=Lacteos	285.
=Indolentes.	294.
=Inflamatorios	294.
=Scrofulosos.	294.
=Scirrosos	274.
Timpanitis.	274.
Torminos	274.

U.

Ulceras	294
=Cancerosas	294.
=Indolentes.	296.
=Rebeldes.	296.
=Sifilíticas.	296.

V.

Vapores histéricos.	296.
Viruela	276.
Vientos.	276.
Vicios sifilítico.	276.
Vértigos	278.
Vomitos.	278.
Vomitos de sangre	279.

FIN.

FÉ DE ERRATAS

Pág.	*Lín.*	*Dice.*	*Léase.*
		EN LA DEDICATORIA.	
Plana 2ª.	16.	ú tosco. . . .	*si tosco*
		EN EL PRÓLOGO.	
Plana 1ª.	2.	quiequam . . .	*quicquam*
Id. id.	8.	nise quod ipse nihil .	*nisi quod ipse facit nihil*
Plana 2ª.	12.	aquellos	*aquellas*
Id. id.	26.	proporciorá . . .	*proporcionará*
Id. id.	27.	una obra . . .	*una otra*
Plana 3ª.	11.	acre	*aere*
		EN EL PREFACIO.	
2	24.	Actio	*Aetio*
5	34.	virtu	*virtus*
8	16.	abogado. . . .	*elaborado*
285	17.	escrecencias vreeneas.	*venereas.*

NOTA. Las páginas desde 157 hasta 172 deben ser de 147 hasta 162.

En la pág. 321, columna segunda, las líneas desde 17 á 20 dicen 148, léase 147.

FIN DE ERRATAS.