

Descripcion que hace el doctor Pinel sobre la varicele.

Contributors

Pinel, Philippe, 1745-1826.

Publication/Creation

[Buenos Aires?] : La pública el Dr. Segurola, 1819?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/sfpu95gs>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.





Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



A.10

6





ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS
DOCTOR PINEL

Miembro del Instituto real y de la legacion de honor
profesor en la escuela de medicina de Paris
medico en jefe del hospicio de la Salpetriere

S O B R E

LA

PARICUTILLA

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

J. K. Molinari (1943) described this ss. from A. Zenny (1875)
as an imprint of 1819.

DESCRIPCION

QUE HACE EL

DOCTOR PINEL

*Miembro del Instituto real y de la legion de honor,
profesor en la escuela de medicina de Paris,
médico en jefe del hospicio de la Salpetriere &c.*

S O B R E

LA

V A R I C E L E.

HAY una inflamacion pustulosa de la piel que se ha confundido frecuentemente con la viruela, y este error ha contribuido á retardar los progresos de la inoculacion. Esta afeccion es la varicéle ó viruela falsa, y fue descubierta en el siglo 16, y puede ser que aun anteriormente. Antes que la vacunacion fuese conocida en Europa, se habian dado ya descripciones propias para distinguirla de la viruela maligna ó de la verdadera viruela. Zinguer médico de Basiléa la ha descrito segun la epidémia que observó durante la primavera de 1712; Maret de Djon, Cullen y otros la han distinguido tambien de la viruela. Dezoteux y Mr. Valentin han dado muy particularmente una descripcion extensa de ella en el tratado de la inoculacion."

"Se distingue la varicéle que los médicos ingleses llaman *Chicken pox* (pustulas de pollo) y *Swine pox* (pustulas del chanco) en que en la primera los botones son poco elevados, muy pequeños, y contienen un humor absolutamente claro y sin color. En la segunda los botones son mas gruesos y mas llenos, contienen tambien un líquido mas espezo, que blanquea y se acerca mas á verdadero pus. Esta última es la que puede confundirse con la viruela, por que en algunos casos se deja ver una areola en la base de las pustulas, pero no tienen la forma cónica, sino que se acercan mas á la esférica, y no á la lenticular, mas largas en el cuerpo que en la base, y mas blandas. Tampoco se apercibe en el centro ese punto obscuro, y cierta deprecion que son señales características de la viruela lejitima. La disecacion se verifica mas tarde; las pustulas al secarse forman una película, cuya caida deja una mancha en el cutis menos viva que en la viruela, y algunas veces deja tambien señales.—PINEL NOSOGRAFIA tom. 2º. pág. 52. §. 49 y 50."

La publica el Dr. Segurola

DOCTOR PINEL

Miembro del Instituto real y de la legion de honor,
profesor en la escuela de medicina de Paris,
médico en jefe del hospicio de la Salpêtrière &c.

SOBRE

LA

VARIOLA

HAY una inflamacion pustulosa de la piel que se ha confundido frecuentemente con la viruela, y este error ha contribuido à retardar los progresos de la inoculacion. Esta afeccion es la variola ó viruela falsa, y fue descubierta en el siglo 18, y puede ser que aun anteriormente. Antes que la vacunacion fuese conocida en Europa, se habian dado ya descripciones propias para distinguirla de la viruela maligna ó de la verdadera viruela. Ningun médico de Basilea la ha descrito segun la epidemia que observó durante la primavera de 1712; Marc de Dijon, Collen y otros la han distinguido tambien de la viruela. Desobry y Mr. Valentin han dado muy particularmente una descripcion extensa de ella en el tratado de la inoculacion.

Se distingue la variola que los médicos ingleses llaman Cowpox por (pustulas de pollo) y Zweis por (pustulas del chuncho) en que en la primera los botones son poco elevados, muy pequeños, y contienen un humor absolutamente claro y sin color. En la segunda los botones son mas gruesos y mas llenos, contienen tambien un líquido mas espeso, que blanquea y se acerca mas à verdadero pus. Esta última es la que puede confundirse con la viruela, por que en algunos casos se deja ver una areola en la base de las pustulas, pero no tienen la forma cónica, sino que se acercan mas à la esférica, y no à la lenticular, mas largas en el cuerpo que en la base, y mas blandas. Tampoco se abre en el centro ese punto obscuro, y cierta depression que son señales características de la viruela legitima. La disolucion se ve tambien mas tarde; las pustulas al secarse forman una pellicula, cuya caída deja una mancha en el cutis menos viva que en la viruela, y algunas veces deja tambien se-

Baker-Pinel Nosografía tom. 2.º pag. 63. §. 49 y 50.

La publica el Dr. Sigmunda



