

**Illustrationes Theophrasti in usum botanicorum praecipue peregrinantium
/ Auctore Joh. Stackhouse.**

Contributors

Stackhouse, John, 1742-1819.

Publication/Creation

Oxonii : E. Typographeo Clarendoniano, 1811.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/tc3k3m8h>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




49438/B

36403.







ILLUSTRATIONES
THEOPHRASTI

IN USUM

BOTANICORUM

PRÆCIPUE PEREGRINANTIUM.

AUCTORE

JOH. STACKHOUSE, ARM.


SOC. LINN. LOND. HIST. NAT. MOSC.

(COLL. EXON. OXONII OLIM)

SOCIO.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO.

MDCCCXI.



ILLUSTRATIONS

THEOPHRASTUS

BOTANICORUM

PARCOURT PÉRIODIQUES

NON STABILIS

TO THE EDITOR OF THE JOURNAL OF THE



PRÆFATIO.

THEOPHRASTUS, omnium, si Salomonem excipias, antiquissimus rei herbariæ investigator, plantas circiter quadringentas, ut in variis peregrinationibus se forte ei obtulissent, enumeravit; paucas quidem obiter, utpote omnibus sui temporis notissimas, plurimas vero accuratissime: individuas illas fane, nulloque ordinis methodici vel Nomenclaturæ systematicæ respectu habito. Quotiescunque vel de habitu aliqujus plantæ, vel de partibus ejus sermo erat, et præcipue quando vires medicæ quædam indagandæ erant, toties fasciculos, ut ita dicam, breves plantarum affinium in diversis operis sui libris collegit; quo fit ut eadem sæpius recurrat species. Hinc fastidium enatum Botanicis superioris sæculi, cui forsan addendæ sunt, cum ex lingua technica et insolita, tum ex textûs corruptione ortæ difficultates.

THEOPHRASTI nimirum ubique textus corruptissimus; et, si codices MSS. litteris confluentibus ex-

aratos, et vocum compendiis ubique scatentes, inspicias, minime mirum videbitur rem ita se habere; præsertim si scientiæ Botanicæ ignaros omnino fuisse eorum exscriptores memineris. Omnium quidem ακριβέστατος est HOMERI textus, metro quippe heroico, omnium auribus accommodato scriptus; adeo ut alienam vocem locum non suum occupare, salva soni concordia, vix possibile fuerit. At Botanico cuivis THEOPHRASTI descriptiones assidue volventi, et plantas ipsas in agris simul investiganti simile quoddam, ni fallor, eveniet: specimen ipsum sub oculis erit textûs commentarium, locisque corruptis, ut plurimum, medelam suppeditabit.

Inter errores innumeros libet exemplum depromere; ubi, speciminibus cum descriptione comparatis, ex meris tenebris vera elucebit lectio. Generis Ελατη Linn. duæ enumerantur species; E. αρρήνη: E. Ξηλεια, l. iii. c. 10. Prior describitur “foliis magis pungentibus και επεσρωμμενοις,” (ita scriptum in cod. Basil. in aliis επεσρωμμενοις, quod nullo modo convenit foliis Pinûs :) quæ descriptio apte convenit P. Abieti Linn. (“Spruce Fir” nobis,) cujus folia *coacervantur*. Vid. Tab. fig. A. Ελατη Ξηλεια, e contra, folium habet ως πτερυγας (pinnae alae) και επ’ ελαττον (sensim sese diminuens) ώστε την ὅλην μορφην Σολοειδη ειναι, και παρομοιον μαλιστα ταις Βοιωταις κυνεαις. (in marg. ed. Budæi legitur κυνθαϊς.) Locum hunc ita vertit THEODORUS: “folium pinnatum, et “ in angustias tendens, ut tota facies concamerata vi-

“deatur, similisque potissimum galeis Bœotorum ap-
 “pareat.” THEOPHRASTUM haud ita scripsisse facile
 quivis, ne dicam Botanicus, affirmabit; THEODORUM
 vero ignotum per ignotius Latine interpretari. Vox
 Tholus (Gr. *Θολος*) occurrit apud VARRONEM in de-
 scribendo Ornithone Turdis fervandis et faginandis
 constructo. VARR. l. iii. c. 5. “Tholus camera in-
 “terior *denſe* columnata; exterioribus lapideis, inte-
 “rioribus ex Abiete tenuibus,” sc. densis adeo, ut par-
 vulæ hæ aves minime transire queant. Ex structura
 Tholi clathrato-columnata, conjicere licet *Θολον* quod-
 dam clathratum significare. *Θολος*, ceu Cella penaria,
 HOMERI Od. xxii. lignis crebris parallelis construc-
 tus videtur, quo aer facilius permeet; sicut et *Θολος*,
 five vaporarium in balneis. Hinc si ramulus, vel fur-
 culus extremus aliquis *P. Piceæ* L. cum foliis den-
 sissime ex opposito inspiciatur, similitudo apta *της*
μορφης Θολοειδους occurret. (vid. Tab. fig. B.) Quod si
 vocem *κυνεαις* consideremus, nihil omnino cum ramo
 abietino commune habet. Substituo levi immutatione
 unius literæ vocem *κτανεαις*. Vox *κτανεα* quidem ipsa
 non reperitur, sed *κτενος* gen. a *κτεις*, pecten, est notif-
 sima, Dorice *κτανος*; et ex inspectione ramuli *Ελατης*
Θηλειας, ceu Pinus Piceæ, cujus iconem exhibui, Tab.
 fig. B. licet conjicere *κτανεαν Βοιωτιαν* dentibus utrinque
 ex adverso instructam fuisse, ut in buxeis et eburneis
 nostris, Angl. “a double-toothed comb.” Notandum
 etiam est vocem *πτερυγα* pinnam alæ, æque ac alam

significare; (vid. Hesych.) unde folium *alatum* superioris ævi Botanicorum; est folium *pinnatum* Linnei. Voces ἀρρήν, Θηλεία, quæ in describendis plantis frequenter apud THEOPHRASTUM occurrunt, fertilitatem vel sterilitatem, habitumve plus vel minus robustum, indicare videntur, ut et vox ἵππος plantæ nomini in compositione præfixus; et hîc loci notatu dignum est, Ελατην ἀρρένα raro ante provectiorem ætatis annum femina maturare. In aliis vero ejusdem auctoris locis distinctio hæc in Mares et Fœmineas v. g. in Palmis et Ficubus, clare indicatur. Methodum Palmas fœmineas polline masculino fœcundandi libet hîc subjicere. Γίνεται δὲ τὸνδε τὸν τρόπον· ὅταν ἀνδρὶ τὸ Ἀρρὲν, ἀποτεμνοντες τὴν σπᾶδην, ἀφ' ἧς τὸ ἀνδρὸς, εὐθὺς ὥσπερ ἔχει, τὸν τε χνόν, καὶ τὸ ἀνδρὸς (forf. legend. τοῦ ἀνδρὸς. V. χνόν) καὶ τὸν κονιορτὸν, ΚΑΤΑΣΕΙΟΥΣΙ κατὰ τοῦ καρποῦ τῆς Θηλείας, κ' ἂν τοῦτο παδῇ, διατηρεῖ, καὶ οὐκ ἀποβάλλει. l. ii. ad finem.

In Tabula Systematica secundum Linnei methodum ordinanda mendas plurimas occursuras fatis scio: veniam tamen mihi dabit Lector, utpote qui opus tantæ molis aggredi primus ausus sim; observationibus autem illorum qui plantas loco natali crescentes investigaverint, et progressu operis celeberrimi, Flor. Græcæ, ita auspicato apud nos inchoatæ, Plantarum THEOPHRASTI Catalogus, indies, ut spero, accuratior evadet.

Nuperrime mihi in manus venit opusculum, cujus

titulus “ Tentamen in historiam plantarum THEO-
 “ PHRASTI, Auct. I. I. P. Moldenhawer, Hamburgi,
 “ 1791. Occasionem hujus Auctoris libello, ut ipse
 “ ait, præbuit exemplar editionis Aldinæ primæ, His-
 “ toriæ Plantarum Theophrasti, et de Causis Plan-
 “ tarum, variis lectionibus auctum, in Bibliotheca
 “ Regia Havniæ, una cum manuscriptis Alberti Fa-
 “ bricii. In eo nempe cum occupatus fuerit, ut
 “ utrumque opus commentario, notisque criticis il-
 “ lustratum ederet, *summo Theophrasti acumine per-*
 “ *culsus, et plura illum, quam vulgo opinantur, vidisse*
 “ *perspiciens*, Tentamen hoc, ut specimen hujus insti-
 “ tuti peritis tradit, ut illorum suffultus judicio ratio-
 “ nem operis moderaretur.” Quatuor tantummodo
 primi libri *περι φυτων* capitula ibi prelo mandantur; ad-
 ditis emendationibus textûs, investigationibus planta-
 rum quæ in his continentur, et quæ de partibus
 plantarum, et de earum interna structura perspecta
 habuit THEOPHRASTUS. Apud nos etiam miscellaneo
 opere tractatûs varios Historiæ Naturalis continente
 cel. vir GUL. FALCONER, M. D. plantas Theo-
 phrasti et Dioscoridis, aliorumque scriptorum apud
 Græcos, additis Bauhini et Linnei synonymis, edi-
 dit, Cantabrigiæ, A. D. 1793. Ob variam fane Cl.
 scriptoris doctrinam, et inprimis summam Græcæ lin-
 guæ peritiam, “ Tabulam Plantarum in priscis Scrip-
 “ toribus Græcis maxime repertarum,” cuius Naturæ
 inquisitori operæ pretium erit studiose perpendere;

non tamen hujus instituti est discrepantia nomina plantarum Theophrasti et Dioscoridis, aliorumque in concordiam redigere, sed tantummodo ex descriptionibus suis in unum collatis Tabulam systematicam Plantarum THEOPHRASTI Lectori exhibere.

Non autem tanquam Auctor systematicus, uti recte admonet LINNEUS, contemplandus est THEOPHRASTUS, etsi inter Physicos vix magistro ejus Aristoteli sit posthabendus. Comparatione scilicet (l. i. c. i. *περί φυτῶν*) instituta inter animalia et vegetabilia, *τα μέρη, τα παθή, τοὺς βίους, τὰς γενέσεις*, arborum sedulo definit. Vires medicas etiam, et varias culturæ methodos incredibili fide ac cura persequitur, ut magis rem quotidiani usûs legere videamur quam longinqua vetustate abditam. Cujus rei exempla pauca liceat hoc loco proferre: 1. Methodum uvas sine acinis producendi. 2. Infita ex duobus Vitis, *Viniferæ* L. varietatibus in unum conjungendi, ut albæ et nigræ in eodem racemo inveniantur uvæ. 3. Luxuriam nimiam, fissio stipite, *calculo interposito* reprimendi. 4. Amygdalorum sterilitatem, ope fistulæ ferreæ in truncum circumactæ, quo succus nimius effluat, corrigendi. 5. In quamplurimis fructiferis arboribus corticem auferendo, vel circumscindendo: optime enim noverat vir acutissimus, quod quidem sæpius diserte monuit, fertilitatem ex debilitate, sterilitatem ex robore provenire.

CATALOGUS ALPHABETICUS
PLANTARUM THEOPHRASTI,

DESCRIPTIONIBUS SINGULARUM

IN UNUM COLLECTIS,

ET

IN GENERA ET SPECIES,

JUXTA

SYSTEMA LINNEI,

QUOAD FIERI POTUIT, DISPOSITIS.

PLANTARUM THEOPHRASTI
CATALOGUS ALPHABETICUS

DESCRIPTIONES SINGULARIUM

IN GENERA ET SPECIES

SYSTEMA LINNÆI

ORDINE FLORE ET FRUCTU

CATALOGUS ALPHABETICUS

PLANTARUM THEOPHRASTI.

A.

ABPOTONON. *Syngen*^a.

Una cum Ruta, Origano, &c. ut sempervirens, i. 15. caulis lignosus, foliis parvis, vi. 1. ex radice vel furculis propagatur, rarius ex femine; planta frigoris impatiens; radices lignosæ, profunde in terram agentes, vi. 7.

ΑΓΝΟΣ. *Didynam*.

Cultura et tempore ad arboris magnitudinem accedit, i. 5. cum Paliuro et Hedera enumeratur, ibid. flores superi, *Bot.* ut Pyri, Punicæ, i. 22. fructificatio in summitatibus, i. 23.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ. *Triandr*.

Culmus nodosus, i. 10, radix nodosa, repens; ad nodos radículas et stolones emittens; cum Cypero enumeratur inter paludosos, iv. 11. Sæpius non occurrit.

ΑΓΧΟΤΣΑ. *Pentandr*.

Genus herbaceum, (πωδης,) vii. 9. foliis radicalibus, caule nudo; cum Plantagine et Anthemio enumeratur; radix rubra, ib.

ΑΔΙΑΝΤΟΝ. *Cryptog*.

Folia hyemem durant, nullo certo germinandi tempore, vii. 10.

^a Vide Tabulam Systematicam.

folia humorem repellunt, unde nomen, vii. 13. duæ species numerantur, 1. Α. λευκον, 2. Α. μελαν, cujus usus ad capillos nutriendos, fucco oleo mixto, ib.

AEIZON. *Dodecand.*

Foliis carnofis, (σαρκοφυλλον,) i. 16. folium viride et succulentum, etiam in locis aridis; folia succulenta, lævia, oblonga, vii. 14. Habitat in arvis, in summis murorum, et super figulas.

AIGEIPΟΣ. *Polygam.*

Cortex carnosus, i. 8. species peculiaris ex insula Creta memoratur, ii. 3. in pratis abundat, iii. 4. antiquitus arbor sterilis vocata; in Creta fructifera, iii. 5. arbor præcox, iii. 6. juxta aquas crescit, και ευαυξης εστι, "is of quick growth," iii. 7. species unica datur, arbor procera, iii. 14. βραχυβιος, "short lived," iv. 14.

1. ΑΙΓΙΑΩΨ—δρυς. *Monæc.*

Species hæc glandem maxime amaram fert; habitat in M. Ida; arbor omnium procerrima, cortice maxime omnium lævi, ligno solidissimo; raro in agris cultis, iii. 9.

2. ΑΙΓΙΑΩΨ—gramen. *Polygam.*

Semina annis successive proveniunt, vii. 12. folia pubescentia et nitentia vere, viii. 7. inter segetes hordei frequentissime, viii. 8. terram maxime exhaurit. Radicibus et caulibus numerosissimis, viii. 9. fermen non germinat, nisi cito fatum; nec occultari terra amat, sed inter gramina germinat; arenosa amat et culta, viii. 11.

AIMAΔΩPON. *Didyn.*

Spec. parasitica; nasc. ex radice Cumini, caule unico simplici; capite amplo, obtuso; radice orbiculari, viii. 8. semel occurrit.

AIPA, *Triandr.*

Caulis tegumen simplex sine tunicis, (μονολοπος,) i. 8. fermen noxium, capitis dolorem inducens, viii. 5. sterilitatem inducit agris, viii. 9. folia angusta, pubescentia, Bot. (δασσα) nitentia præcipue tempore verno, viii. 7. Triticum et Hordeum dicuntur degenerare in αιραν cultus negligentia.

1. AKANΘA. *Syngen.*

Gummifera; gummi Illyrico, odore et colore, fimilis. Hab. reg. Aria dict. iv. 5.

2. AKANΘA—ΑΦΥΛΛΟΣ. *Syngen.*

Μία ακανθα εφ' ἐκαστῶ των οζῶν, spec. ignota, cujus succus expressus oculis perniciosus, iv. 5.

3. AKANΘA ΔΙΨΑΣ. *Syngen.*

Desc. nulla. Hab. in arenosis Arabiæ prope mare Rubrum, iv. 8.

4. AKANΘH INΔIKH. *Syngen.*

(Id. q. Ακανθη gummifera, iv. 5.) quæ vocatur Ατρακτυλις. (vid. vi. 3, 4.) ix. 1, cujus gummi, coloris sanguinei.

5. AKANΘA KEANΩΘΟΣ. *Syngen.*

Vid. Κεανωθος.

6. AKANΘA ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΟΖΟΣ. *Syngen.*7. AKANΘA 'ΗΡΑΚΛΕΙΑ. *Syngen.*

Ex hujus caule baculi fiunt; caulis succo plenus, spec. ignota, iv. 5.

8. AKANΘA ΧΑΛΚΕΙΟΣ. *Syngen.*

Ita dicta ex colore floris; semel occurrit, vi. 3.

AKANΘΟΣ. *Polygam.*

Hab. in arvis, non in montibus, Macedoniæ, iii. 4. spinosa per totum; magn. ampla, lignum utile. Species duæ; 1. A. albus; 2. A. ater. 1^{ma}. ligno molli, ευστηπτῶ, “quickly decaying.” 2^{da}. lig. duro, αστηπτῶ; loti ligno simili; fructu lobato, coriariis utili; flore specioso in fertis usitato, arbor gummosa, sylvam cæduam formans. Hab. Thebaide, iv. 3.

AKAPNA. }

AKOPNA. }

Syngen.

Foliis spinosis, i. 16. pl. herbosa, et inter spinosas cum carduis

enumeratur, vi. 3. Cnico affinis fativo? (ἡμερω) colore subflavo, et foliis nitentibus, (λιπαροῖς.)

AKONITON.

Polyand.

Folio Cichorii, radice tuberculata, bulbis nuciformibus, venenosis; ceteræ partes innoxiae: habitat in Ακοναῖς, pago quodam Mariandunorum, unde nomen, ix. 16. N. B. Textus forsan corruptus; ακονη enim cos; εν ακοναῖς (locis saxosis) pagi, &c.

AKOPOS.

Hexandr.

Flos infidet femini, semel occurrit sine descriptione, cum Cnico, i. 22.

AKTH.

AKTEOS.

Pentand.

Lignum tortuosum, (λοξον) i. 8. sine medulla secundum quosdam, i. 9. secundum alios medulla carnosæ, ib. lignum enode, i. 13. in udis crescit, et in umbra; lignum laxum, leve, medulla tenera in junioribus, parte interna cava in adultis; unde ex levitate baculi fiunt, radices superficiales paucæ, folia περι ένα μισχον, (pinnata,) παχυ, ινωδες, (pedunculo crasso, strigoso,) τα μεν ενθεν, τα δ' ενθεν, (opposita,) κατα γονυ και συζυγίαν, (ad nodos et juncturas,) εχοντα δ' εν, (φυλλον) επ' ακρον, (terminata folio impari Bot.) ανθος λευκον εκ μικρων λευκων πολλων, (umbella alba, ex flosculis albis numerosis,) επι μισχου σχισει, κηριωδες, (ad divisuram pedunculi formam exhibens favi, sc. cavitatibus florum in plano, vid. Κηριωδης Lex. Theophr.) odor liliaceus; bacca lentis magnitudine, immatura, purpureo-rubra, (ομφακωδης) matura, nigra, iii. 13. Sambuci desc. accuratissima. Lign. solidum album, iv. 4.

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ. *Dicæcia.*

Fructum fert super folium, ex rachi, vel vena intermedia; eodem modo ac Κεντρομυρρίνη, (Ruscus aculeatus,) ambo enim Rusci L. species, iii. 17.

ΑΛΘΑΙΑ.

Monadelph.

Ab aliis Malva sylvestris; hab. Arcadia, Macedonia; planta medicinalis, ix. 15. foliis Malvæ, sed majoribus, et magis pubescen-

tibus; caules etiam pubescentes; flore luteo; fructu Malvæ; radice fibrosa alba: succus gustu similis caulis Malvæ; usus adv. hernias, et morbos pulmonum, et ulcera externa, oleo mixtus, ix. 19.

ΑΛΙΜΟΝ το.

Polygam.

Sp. Salicorniæ, ex qua sal Kali, "Barilla" dict. ex Europa Australi; plantas alias necat ex abundantia salis muriæ in succo, iv. 20. de C. Pl. v. ἐν ἀλμυρῶσι φρεται. de Caul. Pl. vi.

ἈΛΙΦΛΟΙΟΣ. Vid. Δρυς. *Monæc.*

ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ.

Triandr.

Spec. σταχυώδης, μαλακός, χνόωδεςερος (vid. Χνῆς) ὁμοίος τῶν Αλωπεκῶν θραῖς. Descriptio hæc satis convenit graminei Alopecuro Linn. item ἡ ἀνθησις χνόωδης (flores apetalæ Bot.) καθάπερ τε Σίτῃ, vii. 10. N. B. Textus hic corruptus valde: nec satis liquet quare Αλωπεκούρος cum Στελεφῶρῳ (Plantagine L.) et Θρυαλλίδι (Verbasco L.) ut planta affinis et Σταχυώδης enumeratur. De significatione voc. στελεφῶρος, vid. Lex. Theoph. Σταχυς Θρυαλλίδος (Thyrfus Botanicorum) οὐκ ὄξυς, οὐδὲ ἀθέρωδης (barbatus Bot. vid. Lex.) ἀλλ' ἀπλα καὶ μονοειδής, quibus satis distinguitur Verbasci Thyrfus a Spica graminea. N. B. In Fasc. 2^{do}. Flor. Græc. extat Spec. Phleum crinitum dict. t. 62. spica caudam vulpinam referente.

1. ΑΜΑΡΑΚΟΣ.

Didynam.

Pl. herbacea, sempervirens, i. 15. ramulis lignosis, foliis parvis, vi. 1. πολυσπερμός, fragrans, foliis mollioribus Abrotano; radice fibrosa, superficiali, vi. 7. vires aromaticæ, ix. 7.

2. ΑΜΑΡΑΚΟΣ.

Hexand.

Spec. duæ; 1. Α. φρυγίος; 2. Α. ποθός; quorum prior flore Hyacinthis simili, alter αχρῶς, λευκός (an οχρο-λευκός, albidus,) cujus usus ad funera ornanda, vi. 7.

1. ΑΜΠΕΛΟΣ.

Pentand.

Cortex laceratus, i. 8. medulla carnosæ, i. 9. folia ampla, i. 16. succus aquosus, i. 19. flores staminei, i. 21. flor. inferi, Bot. i. 22. furculi recentes fructum ferunt. 1. 23. Varietates occur-

runt plurimæ, i. 24. propagatur ex ramis junioribus, ii. 1. ferendo degenerat, ii. 3. var. Α. καπνιος dicta, cujus racemi variegantur albo et nigro, (εκ μελανος βοτρυος λευκον, και εκ λευκου μελαν φερει) ii. 4. Hab. in Tmolo monte, et Olympo. Α. μανομενα. de C. Pl. i.

2. ΑΜΠΕΛΟΣ ΑΓΡΙΑ.

Radix Vitis sylvestr. caustica, depilatoria.

3. ΑΜΠΕΛΟΣ ΙΔΑΙΑ. *Pentandr.*

Fruticosa spec. ramulis parvis; racemis lateralibus; uvis Pisi magn. gustu suavi; acinis mollibus; foliis parvis, rotundis, indivisis, iii. 17.

4. ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Species 2. littoralis et pelagica, sed fructus pelagici major; vesiculæ rotundæ, F. bacciferi et natantis L. pro fructu accipiebantur, cujus forma haud inepte uvam refert.

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ. *Icosandr.*

Nux cum putamine statim enascitur, i. 18. femina oleosa, i. 19. flos petalis instructus, amplus, i. 21. fructum fert in furculis biennibus, i. 23. mos succum extrahendi ope paxilli in lignum inducti, quo fructifera evadat, ii. 3. flores prodeunt ante folia, vii. 12. arbor gummosa, ix. 1.

ΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

Ex Media transfertur, item ex India; cum Cardamomo enumeratur: sed unguentum solum memoratur, ix. 6, 7.

ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ. *Class. incert.*

Spec. Epidendri peculiaris. de Cauf. Pl. v.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ. *Decandr.*

Sempervirens, i. 15. montana sp. hab. Macedonia, iii. 4. duæ species enumerantur, quæ simul germinant, iii. 6. ευαυξης, (cito crescit,) iii. 7. foliis Κομαρου (Arbuti), cortice lacero, et sese abiciente, (ὡς ε αποπιπτειν,) i. 8. albedo, fructu Arbuti, iii. 16. lignum tornatile, et ad fusos usitatum, v. 8.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΥΣ. }
ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. } *Polygam.*

Satio post solstitium autumnale, vii. 1. semen post octo dies emergit, ib. semen latum, membrana cinctum, (φυλλωδες) vii. 3. radix fusiformis, vii. 2. Species una saltem: semina non durant, vii. 6.

ΑΝΔΡΥΑΛΙΑ. *Syngen.*

Semel inter λαχανα occurrit, quæ usibus culinariis inserviunt; inter κιχωριωδη cum Αφακη, Ὑποχοιριδι, Ηριγεροντι enumeratur, vii. 7.

1. ΑΝΕΜΩΝΗ. *Polyandr.*

Floret post primum tempus pluviale, vii. 8. Desc. nulla.

2. ΑΝΕΜΩΝΗ ΛΕΙΜΩΝΙΑ. *Hexandr.*

Spec. Narcissi sylvestris, quæ floret cum Ελειοχρυσω, Ξιφιω, Ὑακινθω; vi. 7. ανθη εαρινα. ib.

ΑΝΗΘΟΝ. }
ΑΝΗΣΟΣ. } *Pentandr.*

Species gymnosperma, (vid. Γυμνοσπερμος Lex. Theophr.) cum Cumino, Coriandro, Fœniculo. (N. B. Non Gymnosp. Linn.) i. 18. planta fragrans, i. 19. αμαυροκαρπος, (fructus parvus latens?) ex axillaribus ramis fructum fert, ut ferula, vi. 2. feminatur bis in anno, vii. 1. Κοριαννον, Μαραθρον, Ανηθον, γυμνοσπερματα: vid. divisionem in γυμνοσπ. εμφοιοσπ. et παπποσπερματα, vii. 3. femina inter unguentaria, ix. 7.

ΑΝΘΕΜΟΣ. }
ΑΝΘΕΜΟΝ. } *Syngen.*
ΑΝΘΕΜΙΟΝ. }

Flos femini infidet, i. 22. foliis radicalibus, radicem cingentibus, vii. 9. flores ad apicem primo florent: forma floris, το εν κυκλω ανθος λευκιν, (radii circulares floris, albi,) το δ' εν μεσω χρυσος, (discus floris luteus, vel aureus,) vii. 13.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΝ.

Hexandr.

Planta herbacea, quæ vel in aridis vel in uliginosis et paludibus marinis provenit, ut Scylla, i. 7. planta fistulosa, cum Conio, Fæniculo, &c. enumeratur. N. B. Distinctio fumitur illarum quæ caule sunt lævi, ut Mandragoras, Conium, Helleborus, Anthericum; et quæ caule nervoso et striato, ut Fæniculum, &c. vi. 2.

ΑΝΤΙΠΠΙΝΟΝ.

ΑΝΤΙΠΠΙΖΟΝ.

Class. incert.

Dicitur esse simile Aparines, ix. 21.

ΑΠΑΡΙΝΗ.

Tetrandr.

Caulis scandens, vii. 8. adhæret vestibis δια την τραχυτητα, nec facile abstrahitur; flos dicitur innasce in aspero pericarpio, inconspicuus, Bot. et in seipso fructificans, ut ovum, vii. 14. Ervi fegetes infestat, viii. 8.

ΑΠΑΘΗ.

Class. incert.

Επιγειοφυλλος cum Αβρογλωσσω, vii. 9.

ΑΠΙΟΣ.

Icosandr.

Arbor mediæ magn. i. 4. folium περιφερές, in medio turgidum, P. mali L. folio rotundius, i. 16. succus, (χυλος) "the sap," aquosus, i. 19. flores πεταλωδεις, (petalis distinctis) i. 21. ex furculis biennibus vel annuis floret, i. 23. Varietates cultæ maxime differunt a sylvestribus, i. 24. ferendo degenerat, ii. 3. propagatur infitione, ii. 7. sylvestres spec. validiores, sed minus fructiferae, iii. 3. fructum fert ex furculis extremis, et ex lateralibus, Ang. "spurs," iii. 7. optimi circa Pantacapæum, in Ponto, iv. 6. Distinctio inter Απιον et Αχραν, sylvestrem sc. et cultam, iv. 11. Sylvestris spec. minus obnoxia vermibus, iv. 16.

ΑΡΑΚΟΣ.

Diadelph.

Planta infestans fegetes Ervi; herba aspera, fragilis, (σκληρος) viii. 8. N. B. Hinc forsitan vox Latina cracca, nomen triviale Viciæ spec. Linn.

ΑΡΑΚΟΥ ΟΜΟΙΟΣ.

Diadelph.

Cum Αραχιδνα enumeratur, i. 11. vid. Αραχιδνα.

APAXIDNA.

Diadelph.

Fructu vel tuberculo sub terra : cum Ουιτω enumeratur, i. 1. radix simplex carnosā ; ceteris fibrosis, super quibus fructūs, vel tubercula, i. 11.

APIA.

Icosandr.

Fructus maturatur hyeme ineunte, iii. 6. Dorica spec. *Αρια* vocata, *Πρινω* affinis, cujus lignum intermedium inter *Πρινον* et *Δρυν* λευκοτερον του *Πρινου*, οινωποτερον της *Δρυος*, “ lighter coloured than the first, darker than the last,” iii. 16. folia *Πρινου* : fructus vocatur *Ακυλον*, ib. lignum hyeme cæditur, v. 1. durum, fragile, v. 4. incorruptum, v. 5. *δυσεργον*, ut quercūs lignum, v. 6.

ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ.

Gynandr.

Fructus fragrans odore, etsi gustu amarus ; foliis Alfinēs, sed angustioribus ; radice nigra : planta medicinalis valde, ix. 13. Hab. in Arcadiæ et Laconix montibus : in Pelio, Clitoria, Tegea, &c. ix. 15. radix magna, atra, amara, sed fragrans ; foliis rotundis, radicalibus, ib.

ΑΡΚΕΥΘΟΣ.

Diæcia.

Sempervirens, i. 15. spec. montana, iii. 4. *ενιαυτοφορος* (fructus maturatur anno 2^{do}.) iii. 6. cito crescit, iii. 7. habitat cum *Ελατη* in montium lateribus, non in fummis, iv. 1. lignum usitatum in ædificando cum *Ελατη* et *Κεδρω*, vi. 8.

ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ.

Tetran.

Foliis coronam radicis cingentibus : *επιγειοφυλλον*, vii. 9. spica floret *κατα μέρος*, (successive) vii. 10.

ΑΡΟΝ.

Gynandr.

Radix magna, carnosā, i. 9. simul cum *Cypero*, i. 10. radix lævis, mollis, sine cortice, vii. 9. radix edulis cum aceto : quo radix crescat magnitudine, *circumvertunt* radicem ne foliis luxurietur, et alios generet radiculos, vii. 11. folia subtus cava, et lata, vii. 12. plant. *ακαυλος*, vii. 12.

ΑΣΙΝΗ.

Class. incert.

Cum *Έρπυλω* enumeratur semel. de C. Pl. ii.

ΑΣΚΙΟΝ.

Cryptog.

Tuberis spec. cum subterraneis Ὕδρω, Ουιπω, vel Ουιγγω enumeratur, ὡν ουδενι εστι ῥιζα, i. 10.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ.

Pentandr.

Panaceæ species, sic dicta ab Æsculapio; radix σπιθαμιαίος, alba, crassa, cortice valde crasso; ἀλικωδεις? (i. e. fucco falino) caulis nodosus, foliis θαψιας, sed crassioribus, ix. 12. Vid. Πα-
νακες.

ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ.

Class. incert.

Inter odoriferas, ix. 8.

ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ.

Hexandr.

Planta aphylla, spinosa, i. 16. spinis solum, ut Σκορπιος, vi. 1. floret autumno, vi. 3. producit aliquod clavæforme, (κορυ-
νωδες,) parvum, ex quo prodit flos parvus, ib. radices profundæ et numerosæ; stolones εκ της Ασφαραγίας, ("the Asparagus bed,") edules; unde liquet antiquis usum plantæ notum esse, ib.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ.

Hexandr.

Foliis radicalibus, i. 16. radix glandiformis, (βαλανωδης) vii. 9. radix edulis, vii. 11. foliis longis, angustis, nitentibus, ib. πολυκαρ-
πος; femine lignoso, triquetro, in pericarpio rotundo, infero, Bot. dehiscente per maturitatem; floret succæffive; caulis supra ra-
mosus? (αποφυσεις ανωθεν εχων,) vii. 12. Vid. αποφυσεις.

ΑΤΡΑΓΕΝΗ.

Polyandr.

Semel cum Corylo *Avellana* occurrit: lignum ad πυρειας εσχά-
ραν utile: (vide πυρεια,) v. 10.

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ.

Syngen.

Spinis in caule et foliis, ακανοις etiam (perianthiis vel capi-
tulis spinosis) cum Κνικω, Ονοπορδω, aliisque Carduis enumera-
tur, vi. 3. λευκοτερα πασων, (foliis magis canis,) succus san-
guineus: vocatur Ακανθα φονος: odor gravis; fero floret, vii. 4.
succus sanguineus, ix. 1.

1. ΑΦΑΚΗ.

Diadelph.

Οψισπερμος, viii. 1. legumen latum, viii. 5. cito germinat,
viii. 10.

2. ΑΦΑΚΗ. }
ΑΠΑΤΗ. } *Syngen.*

Planta κιχωριωδης; floret successive, vii. 10. spec. amara et inedulis; cito senescit et in pappum abit; flos pallide luteus, vii. 11. germinat πρωτοις υετοις, vii. 8. floret per totam æstatem, vii. 11.

ΑΦΑΡΚΗ. *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. hab. in montibus Macedoniæ, iii. 4. spec. sylvestris et culta germinant simul, iii. 6. lignum utile ad vallos et fudes, v. 8.

ΑΦΙΑ. *Class. incert.*

Planta κιχωριωδης, quæ semel memoratur, vii. 8. floret statim cum prima germinatione. N. B. Forſan error textûs pro Αρια.

ΑΧΡΑΣ. *Ifocandr.*

Καλλικαρποτερος Απιου, i. 7. differt max. a culta spec. i. 24. hab. in planis, iii. 4. floret post cultam, iii. 6. ευαυξης, (cito crescit,) iii. 7. maxima inter Αχραν et Απιον differentia, iv. 14.

ΑΧΥΝΩΨ. *Incertum.*

(Baf. χυνωψ,) cum Αρνογλωσσω, Στελεφουρω floribus spicatis, cylindricis. vii. 10. N. B. Censeo legendum Εχινωψ, vel forſan Κυνωψ, spec. flore ringenti. Bot. Vid. vii. 8.

ΑΨΙΝΘΙΟΝ. *Syngen.*

Succus amarus ut Centaurium, i. 9. inter odoriferas quæ frigora amant, iv. 6. folia amara, sed utilia, vii. 9.

B.

ΒΑΛΑΝΟΣ ἡ. *Class. incert.*

Nux in cortice coriaceo, i. 17. gustu dulci, melleo, i. 19. arbor ita vocata ex fructu glandiformi, iv. 2. Hab. Ægypto; folio Myrti vel angustiore; arbor fatis ampla, ramis tortuosis. Unguentarii nucibus et pericarpis simul utuntur, ambo enim odoriferæ: nux forma et magnitudine similis Καππαριος, lignum navibus fruendis utile, iv. 2.

ΒΑΛΣΑΜΟΝ. *Class. incert.*

Gummi sponte fluit ut lachryma, ix. 1. excisione apud Syros colligitur, ix. 2. Habit. εν αυλωνι της Συριας, (inter Libanon et Antilibanon,) arbor magnitudine Punicæ L. ramosissima, foliis rutaceis, sed magis incanis; sempervirens; fructu simili Τερεβινθου. Gummi hujus arboris omnium pretiosissimum abraditur a cortice ονυξι σιδηροις, (instrumentis unguiformibus) sæpe adulteratur, ix. 6. inter aromatica recensetur, ix. 7.

ΒΑΤΟΣ ἡ. *Ifocandr.*

Cum Paliuro, ut frutex, i. 4. cum eodem ut frutex spinosus, i. 8. caules spinosi, i. 16. sempervirens, cum Paliuro, iii. 17. genera plura: 1. erecta; 2. repens, cujus ramuli όταν συναπτωσι τη γη ριζονται παλιν. (N. B. Species hæc vocatur optime, Χαμαισατος) 3. Κυνοσβατος fructu rubro simili rosæ, sc. Rosa canina L. folio Viticis, agni casti L. iii. 18. spec. λοχμωδης vocatur ἡ Βατος, cum Παλιουρω, ut in paludibus et aquosis crescens, iv. 9. ib. iv. 13. πτορθακανθος, ramis spinosis, vi. 1. N. B. Βατος ὁ an sp. diversa, de Cauf. Pl. 1.?

ΒΛΗΚΩΣ. *Didynam.*

Id. q. Γληχων, Mentha pulegium Linn. ? semel occurrit, ix. 16. ubi Dictamni folia τη Βληχοι comparatur.

ΒΑΙΤΟΝ. *Polygam.*

Ακροκαρπον, και πλαγιοκαρπον, una cum Ανδραφαξει et 'Ραφανω, i. 23. feritur mense Martio, vii. 1. radices agit fibrosas, vii. 2. radices lignescunt, vii. 3. femina membrana obvoluta (εμφλοισσπερματα) vel cortice tecta? ib. Genus simplex, vii. 4.

ΒΟΛΒΟΚΩΔΙΟΝ. *Hexandr.*

Vocatur βολβου κωδιον duobus verbis: florens post Narcissum; nec sæpius memoratur, vi. 7.

1. ΒΟΛΒΟΣ. *Class. incert.*

Radix cortice tecta et tunicata; cum Scylla, et Allio cера L. i. 10. folia fine pediculo, (αμισχα) i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. radix tunicata, (λεπυρωδης) vii. 9. folia linearia, παντελως σενα, (per totum angusta.) Spec. hæc εχει καυλον του ανθους μονον, (i. e. scapum Bot.) vii. 12.

2. ΒΟΛΒΟΣ ΕΡΙΟΦΟΡΟΣ. *Class. incert.*

Γενος ιδιωτατον, (maxime peculiare,) hab. in arenosis maris; pars lanosa sub primis tunicis; pars interior edulis, in Taurico Cherfoneſo, vii. 13. lana, goſſipina, non fericea, ib. N. B. Hyacinthi Peruviani mentio fit sub nomine Bulbi eriophori. Act. Soc. Horticult. Lond. v. 1. p. 47.

ΒΟΛΒΙΝΗ. *Hexandr.*

Simul occurrit cap. eodem, vii. 13. dicitur infestare fegetes; an bulbus Hyacinthi *Botryoidis* L.?

ΒΟΥΚΕΡΑΣ. *Gynandr.*

Nihil æque aridum, recenti ſtatu, viii. 8.

ΒΟΥΜΕΛΙΑ. *Diandr.*

Arbor excelsa, cortice lævi; hab. Macedonia in planis, iii. 11. in Ægypto abundant Μελία et Βουμελία, iv. 9. in aquosis, ib. non occurrit in Græcia. Vid. Fl. Græc. Fasc. 1^{mum}.

ΒΟΥΠΡΗΣΤΙΣ. *Class. incert.*

Planta cichoracea, cum Aphaca et Κυνωπι, germinans cum pluviis primis, vii. 8.

ΒΟΥΤΟΜΟΣ. *Monæc.*

Caulis εχων ὀμαλωτητα ιδιαν, (lævitatem fingularem,) vid. Ὀμαλος. Nervo acuto folium transcurrente, γωνιοφυλλος, vid. γωνια, i. 16. inter fluviatiles, iv. 9. fructus ater, similis fructui Σιδης. pl. masculina inutilis; pl. fæmina πλοκαμοις utilis, iv. 11.

ΒΡΟΜΟΣ. *Triandr.*

Fructus, i. e. spica, omnium maxime paleacea, (πολυλοπος,) viii. 4. ὁμοιοπυρος, (i. e. tritici affinis habitu) terram exhaurit maxime post Ζειαν, πολυκαλαμος ων, και πολυρριζος.

Γ.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. *Pentandr.*

Aliis Χαλβανον: gummi solum occurrit, ix, 1. Planta forſitan γαλβανος?

ΓΗΘΥΟΝ.

ΓΗΤΕΙΟΝ.

ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ.

} *Hexandr.*

Κοιλοφυλλον, (folio cavo intus,) i. 16. anno secundo maturat fructum, vii. 1. 2^{da}. fatio mens. Munychione. κεφαλον, και ὡς περ αυχενι μακρω? sæpius fecatur, (Porrum *scétile* L.) propagatur ex radice, vii. 4. amat loca irrigua, vii. 5. ου μεταφεται, ib. semen minime durat, vii. 6.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Syn. Ζυγιας. Vid. iii. 4.

ΓΛΗΚΩΝ.

Didynam.

Inter λαχανα fine descr. utpote notissima enumeratur; Φιλοκοπρα vocatur, et multo melius transplantatione provenit. N.B. Sæmel occurrit, et ibi apud Aldum Γλισχος legitur, sed male. vii. 5. Vid. Βληχως.

ΓΛΥΚΤΣΙΔΗ.

Polyandr.

Παιωνια ab aliis vocata, ix. 9. Vid. Παιωνια.

ΓΟΓΥΛΙΣ.

Tetradyn.

Radix carnosæ, i. 9. corticata, i. 10. feritur cum primis pluviis, vii. 1. radix magna, bulbosa; cortex avulso facilis, vii. 2. πλαγιονκαρπος, (opp. ακροκαρπω, cujus fructus in apicibus,) vii. 3. duæ sp. masc. et fœm. vii. 4. non transplantatur, vii. 5. bulbos corticatus, vii. 9.

Δ.

ΔΑΥΚΟΝ ΔΑΦΝΟΕΙΔΕΣ. *Class. incert.*

Pl. pharmaceutica, succus solum describitur, crocei coloris, xi. 15. Δαυκον an spec. eadem? Hab. Arcadia juxta Laconiam, singularis species radicem habens nigram, succo *θερμαντικῶ* διαφεροντως, (omnium calidissimo) ix. 22. cum Πευκεδανῶ jungitur.

1. ΔΑΦΝΗ.

Enneandr.

Λεπτοφλοιος, i. 8. radice ανωμαλει, (an scabra, an inæqualis

magnitudine? vid. ὀμαλος) i. 9. Arbor ανοζος, (enodis,) cum Συκη, Ακτη, i. 13. sempervirens, i. 15. iii. 4. baccæ oleosæ, i. 19. species plurimæ, i. 24. pullulat cum zephyris, iii. 6. baccæ in racemo, iii. 8. Hab. in Olympo M. iv. 6. Inimica Viti, iv. 20. Baculi fenibus ex illa fiebant ob levitatem, v. 8. usus ad τρυπανον πυρειας, (vid. Lex. Theoph.) v. 10.

2. ΔΑΦΝΗ ΑΓΡΙΑ. *Enneandr.*?

Semel occurrit inter sempervirentes. An spec. peculiaris? i. 15.

3. ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. *Diæcia.*

(Vid. Κεντρομυρρίνη) επιφυλλοκαρπος; fructificatio super folium, i. 16. Hab. M. Ida, iii. 17.

4. ΔΑΦΝΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Corallina.*

iv. 8.

1. ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Foliis Βληχου, (vid. supra) ramulis gracilioribus? succus gustu Menth. *Pulegii* L. similis? Vires ad partus utilissimæ; folia solummodo in usu, succus sc. expressus et aqua mixtus. Hab. Creta, ix. 16.

2. ΨΕΥΔΟΔΙΚΤΑΜΝΟΣ foliis similibus, ramis minoribus. Vires inferiores, ib.

ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ. *Decandr.*

Planta ποωδης, (herbacea,) sed caulis lignescens, μικροφυλλος, vi. 1. in fertis usitata, ib. ανοσμος, vi. 6. fero æstate floret, vii. 7.

ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. *Monæc.*

Non eget cultura respectu fructûs, iii. 3. Hab. in montibus Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur olim de flore masculo, vel ιουλω, (amento, *Bot.*) iii. 6. germinat initio veris, ib. καρχρυωδης, Juliferus, *Bot.* (καρχρυς id. quod ιουλος,) iii. 7. Hab. M. Tmolo et Olympo, iv. 6.

ΔΟΛΙΧΟΣ. *Diadelph.*

Arbores scandit, viii. 3. femina cito germinant, viii. 10.

ΔΟΝΑΞ.

Triandr.

Spec. omnium maxime communis : λοχυμωδης, i. e. fruticosus, (vid. Λοχυμος,) iv. 12.

ΔΡΥΣ.

Monæc.

Τραχυφλοιος, (cortice scabro,) i. 8. ακρορρίζα, (radice superficiali,) βαθυρρίζα, (unica profunda fusiformi,) i. 9. οζωδης, (nodosa arbor,) item κραδαις obnoxia, (vid. Κραδη,) i. 13. foliis εντομας εχουσι, (lobatis Bot.) i. 16. Hab. in planis Macedoniae, iii. 4. Amentum βρυον vocatur, iii. 6. item καχρυς, iii. 7. primo vere apparens, ib. Species variæ, iii. 9.

1. δ. ήμερις.

4. δ. φηγος.

2. δ. αιγιλωψ.

5. δ. αλιφλοιος.

3. δ. πλατυφυλλος.

6. δ. φελλος. vid. φελλος.

1. Sp. parva, humilis, ramosissima, sine trunco; ramis inflexis, iii. 9.

2. Sp. maxime procera et recta, cortice lævi, ligno ισχυρω, (solido,) in incultis crescens, ib.

3. Sp. inter primam et secundam proceritate et magnitudine; ligno ad usus architectonicos minus utili; ad carbones et igniaria prorsus inutili, utpote laxo et poroso, ib.

4. Sp. ουκ ορθοφυης, (fruticosa species,) ligno firmissimo, incorrupto, ramis numerosis; ή φυτεια περικομος, (capite rotundo, vel valde folioso,) ib.

5. Sp. trunco crasso, brevi, sæpius intus cavo; ligno minus utili; sine corde.

6. Sp. trunco erecto; cortice duplici. *Quercus Suber* L.

N. B. Gallæ 1mæ. spec. solum εις δερματα (ad usus coriarios) utiles. Spec. 2^{da}. fert Lichenem Φασκον dictum. (vid. Φασκος.) Species hæc hab. in Ponto, iv. 6. lignum σκληρον και βαρυ, v. 5. sub aqua dulci durat; falsa tamen σηπεται, ib. Carbones optimi ad usum argentariorum. Divisiones *Quercus* alibi, iii. 9, 10. sic notantur:

1. ετυμοδρυς, gl. dulci.

2. πλατυφυλλος gl. amara.

3. φηγος gl. rotunda.

4. οσπρις gl. rara, ineduli.

ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ. *Gynandr.*

Caule variegato, ut serpentis maculæ; radix bona ad βηχας, (tusses,) ix. 22.

E.**ΕΒΕΝΟΣ ἡ.** *Diadelph.*

Lignum ponderosum; enumeratur cum ligno Buxeo, i. 8. durities extrema, ut Loti, i. 10. Hab. India. Spec. duæ: prima; arbor speciosa, ligno utili, quæ rara est: secunda fruticosa, inutilis, iv. 5. lignum solidissimum, in aqua subfidens: gravitatis lignorum hi notantur gradus. 1. Εξενος, πυξος. 2. Λωτος. 3. Μελανδρυον (Heart of Oak.) 4. Κυτισος (Cyt. Laburnum.) 5. Τερμινδος, v. 4. Lignum ασαπες, (fine succo,) v. 5. Ufus ad morbos oculorum statu arido, ακονη τριβομενον, (ope cotis attritum,) ix. 22.

ΕΛΑΙΑ. *Diandr.*

Lign. αθραυσον, (tenax, Angl. "tough,") i. 8. fine corde; secundum alios, totum cor, i. 9. radicibus scabris? nodosis et δυσανωδεσι, (fasciculis fibrarum ad nodos, vid. δυσανοι,) ib. arbor nodosa, spec. sylvestris tamen (Κοτινος dicta) nodosior Ελαια, in trunco innascitur γογγρος, (vid. γογγρος,) i. 13. sempervirens, i. 15. σρεφονται τα ὑπτια (partes superiores foliorum) μετα τροπας σερινας, (i. e. "the upper parts of the leaves turn up;") folia incana, angusta, pediculo brevi, i. 16. fructus carnosus, i. 17. oleosus, i. 19. flos πεταλωδης, (petalis distinctis Bot.) i. 21. fructus ex furculis anni prioris; differentia maxima inter sylvestrem et cultam, (Κοτινον et Ελαιαν,) i. 23. infitione propagatur, ii. 7. Κοτινος validior Ελαια, iii. 3. maxime abundat in Libya, Cyrenæa, iv. 3. spec. intermedia, sterilis in India, iv. 5. Arbor celebris Athenis, iv. 14. maxime vivax, iv. 15. Cultura fit καλλιω, iv. 19. lignum solidum album, v. 4. optimum juxta radices, v. 5. amat maris littus, vi. 2.

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ. *Diæcia.*

Fruticosa sp. Αγρω vel Vitici agno casto L. similis, foliis Μηλεας,

fed mollibus; floribus apetalis, ut Populi; καρπῶ οὐδενί. Hab. in palude juxta Lacum Orchomenis, iv. 11.

1. ΕΛΑΘΗ.

Monœcia.

Nunquam culta, i. 6. Procera spec. cortex πολυλοπος, (vid. λοπος,) i. 8. cor, vel medulla lignea, ολιγορρίζα vel μονορρίζα· απα-
ραῖλασος, (non emittens furculos,) i. 9. mares nodosiflores fœmi-
nis; πενταρζος, (ramulis horizontalibus 4. uno erecto.) N. B. οἶοι
tumores ad bafin ramorum, qui apte dicuntur εμπεπηγοτες, i. 13.
μονοσελεχης, (trunco simplici,) i. 14. sempervirens, i. 15. foliis
ακανθωδεσιν ἐξ ακρου, (apice pungentibus,) i. 16. arbor picea,
i. 19. ἀνθει κόκκινῳ, vel forsan legendum κροκινῳ, ut apud quos-
dam, (amentis croceo Bot.) i. 21. propagatur femine solum, ii. 2.
iii. 1. Hab. in M. Macedoniæ, iii. 4. floret vere, iii. 6. germi-
natio conspicua δια το σοιχειν τα γονατα, και ἐξ ἴσου τοὺς οἶους
εχειν; (de modo crescendi regulari; angulos enim rectos cum
trunco faciunt, nodis 4 invicem oppositis, pari intervallo,) iii.
6, 7. καχουας εχει, (Iulum fert,) βαθυρρίζος, iii. 7. nunquam
pullulat post cæsuram, iii. 8. Genera 2: 1. E. αρρήν. 2. E. θε-
λεια. 1. Pin. *Abies* L. 2. P. *Picea*, (vid. Præfat.) ἐν κωνῳ του αρρέ-
νος, καρυα (femina) ολιγα ἐπ' ακρον· ξυλον ἰνωδες κουφον· οἶοι
σκληροτατοι, iii. 10. amant umbrosa, iv. 1. decacuminatione mo-
riuntur, iv. 19. decorticandæ vere, ut lignum diutius duret, v. 1.
lignum fibrosum, ασαρκον, βαρυ, αδαδον (non inflammabile;
opp. ligno πευκης,) οἶοι κερατωδεις, (duri instar cornu;) trunci ju-
niorum ad κεραιας (antennas) navium, v. 2. lignum proprium ad
onera sustentanda vi elastica, v. 7. etiam ad usus navales ex levi-
tate; et ad ædificandum, v. 8. refina δακρυωδης (in guttis) ex
vulnere stillat, ix. 1.

2. ΕΛΑΘΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Spec. προσγειος, (in æstuariis, aut prope littus,) φυεται ἐπὶ λιθοῖς
και οστρακοῖς· ὅλη μορφη ορθη, (habitus totus erectus,) summita-
tibus etiam erectis, iv. 7.

ΕΛΕΒΟΡΟΣ. }
ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ. }

Polyandr.

Amat loca frigida, iv. 6. pl. ναρθηκωδης, (caule fistuloso,) cum

Conio, Fæniculo, &c. vi. 2. odor radicis gravis stomacho etiam in effodiendo, qua de causa Cepam prius comedunt, ix. 9. Spec. duæ: 1. E. μελας. 2. E. λευκος, quæ vel colore radicum vel foliorum differunt. Sp. prioris fol. δαφνωδη, "dark green;" posterioris πρασωδη, "light or grass green?" foliis *profunde incis*is; caule ανθερικωδει, (vid. ανθερικος,) brevissimo, ex corona radicis: επιγειοφυλλος, (fol. radicalibus,) radicibus plurimis λεπταις; in quibus vis narcotica. Sp. 1. E. μελας, communis. 2. E. λευκος, rara: maxime in M. Oeta, Ponto, Elea, Massalia; in vineis. Crescit item in M. Parnasso et in Ætolia, sed vires deteriores, ix. 11, 15.

ΕΛΕΒΟΡΙΝΗ.*Gynandr.*

Ποαριον, (parvula species, herbosa,) foliis minimis; femina una cum succo Hellebori in usu ὅπως ευεμεση, (ut vomitum sine dolore fiat,) vii. 6. Nulla descr.

ἙΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ.*Pentandr.*

Tres Σελινου species apud Theophr. l. vii. 6. Ἑλειοσελινον, Ἰπποσελινον, Ορεοσελινον, (vid.) Spec. hæc hab. in rivulis, vel ductibus aquæ, μαυροφυλλος, (foliis raris,) Σελινου fimilis odore, succo, habitu, vii. 6. Semel occurrit.

ἙΛΕΙΟΧΡΥΣΟΣ.*Class. incert.*

Pl. coronaria, cum Cœnanthe, Anemone, &c. æstate media florens, vi. 7. foliis tenuibus albidis; flore aureo; femine tenui, duro, (σκληρῶ,) radicibus horizontalibus. Planta boni ominis apud antiquos, ix. 21.

ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ.*Diandr.*

Πωδης, (pl. herbacea,) inter non spinosas, quas difficile est distinguere, cum Origano, Thymbro, Cisto, &c. ponuntur Σφακος, Ελελισφακος, vi. 1. Σφακος vel Σφακελος species culta; Ελελισφακος spec. sylvestris, foliis magis scabris; odore graviori. (vid. Σφακος, Σφακελος,) vi. 2.

ἙΛΕΝΙΟΝ.*Class. incert.*

Φρυγανον ξυλωδης, caule lignescente, foliis parvis, cum Sifym-

brio, Abrotano, et multis aliis, vi. 1. flore et foliis fragrantibus, ἀπλὸς τοῖς εἰδεσιν, (nullæ occurrunt varietates?) vi. 6. Semina aiunt nunquam maturari Ελενίου, Ἑρπυλλοῦ, Σισυμβρίου, Μινθου, sed furculis plantas propagari, falso tamen, quia semen parvitate sua latet, vi. 7. radicibus multis, divaricatis, ταρῶδεσι, (implicatis corbis modo, vid. ταρῶς) lignosis, ib.

1. ἙΛΙΞ. *Pentandr.*

Περιολλοκαυλός, (planta scandens,) θάμνωδης, cum Smilace occurrit, sine descriptione; videtur Hederæ varietas, vii. 8.

2. ἙΛΙΞ. *Pentandr.*

Κιττού (Hederæ) tertia species; varietates maximæ occurrunt respectu magn. foliorum et formæ angulosæ: ἑλικὸς folia magis angulosa, et foliis τοῦ Κιττοῦ similia; fructus rarus. Var. tres: 1. foliis læte viridibus. 2. foliis albis vel canis. 3. foliis variegatis. N. B. Hedera dicitur ἀποκιττούσθαι, quando per ætatem folia minus angulosa fiunt, iii. 18.

ΕΛΥΜΟΣ. *Triandr.*

Ελυμός, Κεγχρός, Σησαμόν παρ' αὐτά, (divisio separata et habitu diversa a frumentaceis et leguminosis, σιτωδεσὶ καὶ χεδροποις,) viii. 1. grana Ελυμοῦ et Κεγχροῦ maxime durant, viii. 10.

ΕΝΘΟΥΣΙΚΟΝ. *Incertum.*

Semel occurrit in loco corrupto cum Caucalide et Ἡδυοσμῶ inter λαχανά inedulia, vii. 7.

ΕΠΙΜΕΝΙΔΕΙΟΣ. Vid. Σκυλλά.

ΕΠΙΠΕΤΡΟΝ. *Class. incert.*

Ὅλως ἀνανθές! Flores inconspicui Bot. Semel occurrit, vii. 8.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ. *Diadelph.*

Leguminosus, viii. 1. οψισπόρος, ib. πλαγιοκαυλός, (caule ramofo,) viii. 3. legumen rotundum, viii. 5. prominens hilum Bot. ex femine, ut in Vicia, Faba L. ib. Spec. tres: 1. Ε. μέλας. 2. Ε. λευκός. 3. Ε. πυρρός, quorum posterior fero ferendus; in udis lo-

cis, viii. 6. omnium leguminosorum citissime fructum perficit, viii. 7. amat terram mollem, levem, (ψαφαρην) viii. 9. illæsus ver-
mibus ob amaritudinem, viii. 10. N. B. Species occurrit sub no-
mine Κερασβολον, ita dict. ob duritiem feminis. De Cauf.
Pl. iv.

EPEIKH.*Oclandr.*

Ακροκαρπος, (flores et femina in apicibus ramorum,) semel oc-
currit, i. 23.

EPINEOS.*Polygam.*

Sylvestris spec. της Συκης, i. 24. sed plane diversa, nec cultura
mutans: accuratissime, Ficus enim genus Triæcium. Mutatio
Ερινεου in Συκην dicitur portentofum esse, i. 4. Ερινεα προαπ-
τωτα, (fructus sc. mas Ερινεου) comparantur amento Quercûs,
Pinûs, &c. pullulat primo vere, iii. 6. Sexus Ερινεου et Συκης
distinguitur, iv. 14. Lignum excellens ad εργα πολυτελη, v. 7.

EPIOΦΟΡΑ.*Monadelph.*

Folliis vitis; Pericarpium εν ᾧ το εριον, (in quo gossypium con-
tinetur,) ἡλικον μηλον εαρινον, (magnitudine mali verni,) συμμε-
μυκος, (apice connivens,) ὅταν δε ωραιον η, (quando maturatur,)
εκπεταννυται, (expanditur,) και εξαιρεται το εριον, (et aufertur
gossypium.) N. B. Descriptio accurata admodum. Hab. India,
Arabia, iv. 9.

ΕΡΙΨΥΛΛΟΣ.*Didyn.*

Sempervirens, i. 15. Φρυγανικος; caule lignoso, foliis parvis,
vi. 1. Pl. coronaria, cum Ἐλενιῳ enumerata, ὡς ἅπλος τοις ειδεσιν
etiam ὡς αγρια φυσις αυτου: floret maxime sine cultura. Hab.
M. Hymetto, Athenis, &c. &c. montes totos operit, vi. 6, 7.
Radix επιπολαιος, et in spatium longum repens, vi. 7. ταρῶδης,
(vid.) ξυλωδης, ib. Duæ spec: 1. E. ορεινη. 2. E. ευοσμος, apud
sylvestres ολιγο-ὕδροτατος, ib.

ΕΡΥΘΕΔΑΝΟΝ.*Tetrandr.*

Φρυγανικον, ανακανθες, (frutex inermis;) plures numerantur ge-
nera, quæ sunt difficilia separari, ex habitu, et varietate foliorum;

vi. 1. radix rubra, vii. 9. foliis Ωχρου, Pifi *Ocbri* L. fed rotundioribus, κυκλιδον (habitu verticillato, *Bot.*) caulis repens; vires diureticæ, ix. 14.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ. *Tetradyn.*

Cum Sefamo enumeratur, foliis fine nervis, vel venis, viii. 3. caulis subfistulosus, ib. semen non comeditur crudum, utpote nec Lupini; spec. affinis Σησαμου, et oleo abundans, viii. 7.

ΕΣΠΕΡΙΣ.

Νυκτος οζει μαλλον, unde nomen. Desc. nulla. De C. Pl. vi.

ΕΤΤΜΟΔΡΥΣ. Vid. Δρυς. *Monæc.*

ΕΥΒΟΙΚΗ. Vid. Καρυα. *Monæc.*

ΕΥΖΩΜΟΝ. *Didynam.*

Cum Ocymo enumeratur, rad. lignosa, i. 9. επισπορος, (sp. fæpius ferenda in anno?) vii. 1. radix lignosa, vii. 3. semen durat, vii. 6.

ΕΥΗΠΙΑΤΟΝ. *Pentandr.*

Syn. Στροχνου, (vid. Στροχον,) vii. 7.

ΕΥΩΝΤΜΟΣ. *Class. incert.*

Arbor Punicæ *Granati* L. flore et foliis similis. Ex infula Lesbo; odor floris gravis, iii. 18.

Z.

ΖΕΙΑ. *Triandr.*

Σιτωδης, (frumentacea, spec.) πρωισπορος, (primo sationis tempore ferenda,) viii. 1. multis et profundis radicibus; multicaulis: καρπος κουφοτατος, (spica maxime paleacea,) προσφιλης πασι τοις ζωοις, (pecoribus omnibus gratissima,) viii. 9.

ΖΥΓΙΑ. *Monæc.*

Hab. montibus Macedoniæ, iii. 4. germinat ante equinoctium.

vernum, iii. 6. ευαυξής, (cito crescit,) iii. 7. hyeme cæditur, v. 1.
lign. σκληρον, (durum, fragile,) v. 4.

H.

ἩΔΥΟΣΜΟΣ. *Class. incert.*

Cum Ενθουσιακῷ femel occurrit, vii. 7.

ἩΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ. *Pentandr.*

Επετειοκαυλος, (caule quotannis sese renovante,) vii. 8. successive floret, vii. 9. sempervirens, vii. 10. flos ακουλουθει τα ασρα, (annon το ασρον Solem?) inde nomen.

ἩΜΙΟΝΟΣ ἡ. *Cryptog.*

Φυλλοις σκολοπενδρου, (pinnis sc. dense stipatis utrinque, ut Scolopendri pedes?) radix tenuis: vires in morbis splenis, ix. 19.

ἩΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ. *Monæc.*

Foliis εντομας (ferraturas) εχων cum Πτελεα, i. 16. Julifera arbor, iii. 7, 8. Sp. duæ: 1. H. αγρια, *Corylus Avellana* L. φυλλοις κεχαραγμενοις, (ferratis;) καρπιμωτερος, κατακοπτομενος τας ραβδους· καρπος στρογγυλος· πολυκαρπος, εν ταις φοραις· ραβδοις ανευ μασχαλων, (furculis simplicibus, non ramosis.) Sp. 2. H. ἡμερα, καρυν προμακρω, εκλευκοτερῳ, (pulvere sc. farinaceo ad basin nucis,) *Corylus Colurna* L. Ang. "Filbert," iii. 15. φλοιῳ ιδιας σιγµας λευκας εχοντι. N. B. Optime de cortice maculato, Coryli, ib.

ἩΡΑΚΛΕΙΑ. Vid. Μηκων. *Polyandr.*

ΗΡΙΓΕΡΩΝ. *Syngen.*

Pl. κιχωριωδης: inter λαχανα, αρουραια vocata, foliis Cichorii, vii. 7. floret longum tempus, primo vere εκκαυλει, και ανθει· ορθοκαυλος και νευροκαυλος, vii. 8.

Θ.

ΘΑΨΙΑ.

Pentand.

Planta venenosa; odor idcirco vitandus in colligendo, ix. 9. vires medicinales in radice et succo; pars radice dicitur vomitum ciere, pars alia purgare alvum; foliis Fæniculi, sed amplioribus; caule fistuloso; radice alba, ix. 10. emetica; succus ὑπωπίας αἰρει, (fugillationes.) Hab. Attica.

ΘΕΡΜΟΣ.

Diadelph.

Annon dantur sylvestres et cultæ species? i. 6. enumeratur cum Capparide, ib. femina εν ὕλῃ βαθεῖα, (in densa materie, remotum a terra,) radicem emittit et germinat, i. 12. non eget cultura; cum Capparide et Σιλφίω, iii. 3. immediate ex ἄλῳ ferendum, viii. 1. βλασάνει (το σπέρμα) εκ του αυτου, (radiculam, et plumulam, Bot. ex eodem puncto profert. Vid. Monocotyled. Bot.) viii. 2. femina inedule sine coctione? viii. 7. femina durat, viii. 10. De Cauf. Pl. iii. 4.

ΘΗΛΥΚΡΑΝΕΙΑ.

Tetrandr.

Hab. in Macedonia montibus, iii. 4. germinat προ Ζεφυρου, (vere primo?) iii. 6. differt a Κρανεία μαλακοτήτι foliorum, cavitate ligni medullari, et fructus magnitudine: plures baccæ ex communi pediculo umbellatim dispositæ, inedules, (vid. Κρανεία,) radices validi, iii. ουκ οζωδεις, ὡς κρανείας, i. 13.

ΘΗΛΥΠΤΕΡΙΣ.

Cryptog.

Φυλλον μονοκωλον, (simplex, sine lobis, Bot.) radix magna, nigra; remedium vermifugum, præcipue adversus tænias, vino vel melle sumptum, ix. 20.

ΘΗΛΥΦΟΝΟΝ. Vid. Σχορπιον.

ΘΗΣΕΙΟΝ.

Class. incert.

Radix gustu amara; alvum solvit; enumeratur cum Aro, Dracontio, et Xiphio, vii. 11.

ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ.*Pentandr.*

Radix επιπολαιότη, (forſan quia creſcit in udis?) enumeratur cum Κοκκυμηλεα et Σποδια, iii. 7. radices numeroſæ; amat maxime umbroſa loca, iv. 1. una cum Taxo et Pado.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ.*Syngen.*

Caulis folioſus, i. 16. ſuccus ὕδαρης, i. 19. επιſπορος (ſpec. culta; bis, vel ſæpius ſerenda,) vii. 1. παπποſπερμος, (ſemine pappoſo Bot.) Spec. duæ: 1. Θρ. λευκη. 2. Θρ. μελαινα, quarum prior γλυκυτερα, απαλωτερα, vii. 4. Cultæ var. Θρ. λευκης tres, ib.

1. Θρ. πλατυκαυλος.
2. Θρ. ſτρογγυκαυλος.
3. Θρ. Λακωνικος.

Caules prioris latiffimi adeo ut θυραις κηπωρικαῖς inferviant. Spec. tertię folia ſκολυμου. Var. Θριδακινης μελαινης reſpectu foliorum, ib.

1. Θρ. πυκνοφυλλος.
2. Θρ. ουλοφυλλος.
3. Θρ. δαſυφυλλος.
4. Θρ. μανοφυλλος.

Reſpectu caulis, ib.

1. λευκοκαυλος.
2. πορφυροκαυλος.
3. ποικιλοκαυλος.

N. B. Infectum Πρασοκουρις dict. Θριδακινη proprium, vii. 5.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ ΑΓΡΙΑ. *Syngen.*

Φυλλοῖς βραχυτεροις, caulis per maturitatem ακανθουται, (ſpinofus fit,) ſuccus auſterus, medicinalis; habitat inter ſegetes. Uſus in hydrope levando, et in morbis oculorum, vii. 6.

ΘΡΙΔΑΞ.*Syngen.*

Differentia in caulibus παλιελαſοις, (vid.) vii. 2. βραχυρριζα, vii. 3. melius ex ſemine, (ου μεταφυτευθειſα,) vii. 5. pappoſo ſemine, vii. 3. Forſan ſyn. Θριδακινης αγριας.

ΘΡΥΑΛΛΙΣ.*Pentandr.*

Inter ανθουντας κατα μερος, (quæ in ſpica vel thyrſo florent

successive,) cum Plantagine enumeratur, et semel occurrit sine descriptione, vii. 10.

ΘΥΙΑ. }

ΘΥΙΟΝ. }

Monœc.

Sempervirens, i. 15. οψικαρποτερος παντων, iii. 6. cum Taxo, ib. Hab. in cacuminibus montis, iv. 1. habitus Cupressi; foliis, ramis, trunco; etiam fructu: frequens in Cyrenæa, regione prope Ammonis templum: lignum incorruptibile; radicis præcipue, ex qua simulacra et alia pretiosa, v. 5.

ΘΥΜΒΡΑ. }

ΘΥΜΒΡΟΝ. }

Didynam.

Succus δριμυς, (astringens, pungens,) i. 19. Inter perennes, ανακανθους, (sine spinis,) cum Origano, Thymo, &c. vi. 1. differt a Thymo, ότι σπέρμα έχει φανερόν, absmile Θυμῳ, (sed hic error notandus, ambo enim gymnospermæ, sed Thymi semina minutissima,) vi. 2. Seritur τριτῷ αἰσῳ mense Maio, vii. 1. Semina durant, vii. 6.

ΘΥΜΟΝ.

Didynam.

Succus similis Thymbræ δριμυς, i. 19. semen invisibile, (ὡς ανθος μονον,) iii. 2. Frequentissime in desertis Libyæ, iv. 4. Spec. duæ: 1. Thymus alba; 2. nigra: ambo floribus luxuriant æstate: flores apibus gratissimi: semen minimum, calycibus occultatum, vi. 2.

ΘΥΜΟΝ ΛΙΘΟΕΙΔΕΣ. *Coral.*

iv. 8.

I.

ΙΑΣΙΩΝΗ.

Pentandr.

Monopetala: ανθος διαγραφην εχον, μονον ον, των πλειονων, (etfi flos monopetalus fit, expansionem habet floris polypetali Bot.) i. 21.

ΙΔΑΙΑ. Vid. Ἀμπελος.

ΙΔΑΙΑ. Vid. Πευκη.

ΙΚΜΗ. }
ΙΚΑΜΗ. } *Class. incert.*

Planta palustris in lacu Orchomeni, cujus descriptio nulla, iv. 11.

ΙΞΙΑ. *Diæcia.*

In trunco Quercûs, iii. 9. amat Boreale latus, iii. 15. Spec. gummosa, ix. 1. De C. Pl. ii. 5.

ΙΞΙΝΗ. *Class. incert.*

Forſan Cardui ſp. ſic dicta, vi. 3. ῥιζοφυλλος, (radicem ex folio agens,) et ex folii medio ακανον, (pericarpium ſpinoſum, vid. ακανος) producens, magnitudine mali, foliis involutum, vi. 4. Gummi Maſtiche ex caule, ix. 1.

ΙΟΝ. *Syngen.*

Sempervirens, i. 15. Spec. duæ: 1. Ιον λευκον. 2. Ιον μελαν, vi. 6. Ιον μελαν, ſæpe uno verbo Μελανιον, differt ab Ιω λευκω, ὅτι πλατυφυλλον, εγγειοφυλλον και ſαρκοφυλλον εſτι, ib. ευοσμοτερον τε λευκου, ib. item vi. 7. N. B. Vid. infr. Ιωνια.

‘ΙΠΠΟΝ. }
‘ΙΠΙΝΟΝ. } *Class. incert.*

Planta palustris cum priore enumerata, et ex eodem lacu, ſed diverſa. N. B. Si ex nomine ‘Ιππος conjicere liceat, forſan Hippuris, vel Equiſetum L. ambo fluviatiles.

‘ΙΠΠΟΜΑΝΗΣ. Syn. Τιθυμαλλον. ix. 15.

‘ΙΠΠΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδες, νευροκαυλον, (caule fiſtuloſo, ſtriato,) ſemel occurrit, vi. 1.

ἸΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. radix carnosā, vii. 3. magnitudine differt ab Ἐλειοσελινῶ: caulis maximus; radix magnitudine Raphani sativi, nigra: femina nigra familia Ὀροξου, fed majora; folia familia Ἐλειοσελίνου, δασέα, &c. (pubescentia) vires diureticæ, vii. 6. fucus gummosus in radice, ut Scammonia, ix. 1.

**ἸΠΠΟΦΕΩΣ. }
ἸΠΠΟΦΥΤΟΝ. }** *Tetrandr.*

Planta spinosa, cum Τριβόλῳ, Ὀνωνιδί, vi. 3, 4. Vid. Φεως, etiam φουσέος ακανθικής et desc. vi. 3. differt a φλεως. Vid. *Triandr.*

ΙΡΙΣ. *Triandr.*

Æstate floret, vi. 7. cum Ασφοδελῳ enumeratur; folio καλαμωδεσέρῳ, (angustiore et rigidiore?) καυλῳ ανδρους μονον (pl. acaulis, scapo prædita Bot.) fed minore et rigidiore; radix optima, suaveolens, iv. 6. ix. 7.

ΙΣΧΑΙΜΟΣ. *Polygam.*

Ex India; spec. cujus vires stypticæ mirabiles. Def. nulla, ix. 15.

ΙΣΧΑΣ. *Class. incert.*

Plant. pharmaceutica: radix emetica et cathartica, cum Θαψια enumeratur; foliis rutaceis, parvis; caulibus repentibus 3. vel 4. radice Asphodeli, fed λεπυρωδῆ, (tunicata.) Hab. in montosis et calcareis locis, ix. 10.

ΙΤΕΑ. *Diæcia.*

In paludosis, i. 17. (βραχυσελεχης) lign. leve, i. 8. βλασανει απο παρασπαδων, (furculos emittit,) iii. 1. ωλεσικαρπος, (femina copiosissime per aerem spargens. Hom. II. vid. ωλεσικαρπος) iii. 2. πρωελασος, (primo vere germinans,) iii. 6. ευαυξης, (cito crescens,) iii. 7. πολυειδης (var. plurimæ.) 1. I. μελας, cortice subnigro, φοινικῳ, (atro rufo.) 2. I. λευκη, cortice albo. 3. I. ἐλικη apud Arcades καρπῳ γονιμῳ, (opponitur ωλεσικαρπῳ, sc. fructum immaturum spargens, secundum Theophr.) iii. 13. spec. peculiaris in Hæmo monte, iv. 7. In palude Orchomeni lacûs, iv. 11. βραχυβιος, iv. 14. arbor succifa Philippis iterum fur-

rexit, iv. 19. scutis faciendis, opus textile sc. v. 8. fed et ex ligno ipso, quod συμμυει πληγγεν, (quando perforatur coalescit,) v. 5.

ΙΦΤΟΝ. }
ΙΦΤΣΟΝ. }

Didynam.

Inter flores coronarios æstivos, cum Iride, Lychni, &c

ΙΦΟΣ.

Incertum.

Omnium οψιβλαστοτατος cum Aria et Τετραγωνια, iii. 6. Semel occurrit.

ΙΩΝΙΑ.

Syngen.

Spec. duæ: 1. λευκη, spec perennis annos tres durans, ætate ελαττουμενη, λευκοτερη, vi. 7. 2. μελαινα ακλονητος (non ramosa) προσριζοφυλλος· αειφυλλος διολε φερων το ανθος, (ex omni parte florens,) vi. 6. Vid. Ιωνια Lex. Theophr. N.B. Ex locis supradictis, ubi solummodo occurrit vox hæc, colligi potest vocem Ιωνια plantam ipsam æque ac violetum indicare. Vid. Ροδωνια, Κριωνια, Lex. Theophr.

K.

ΚΑΔΥΤΑΣ.

Claff. Incert.

Βοτανον Συριακον, super truncis arborum. De C. Pl. ii.

ΚΑΚΤΟΣ.

Icosandr.

Hab. in Sicilia solum; omnium maxime singularis planta; immediate ex radice emittit caulem peculiarem, κακτον vocatum, latum, densum, spinis obfitum; cocti hi et decorticati, edules sunt, et conservantur in άλμη, "brine." Ex cacto hoc alius assurgit caulis, vocatus περνιξ, edulis etiam; in quo fita est fructificatio spinosa, pappo involuta, Palmæ εγκεφαλω similis, quæ vocatur σκαλια, vi. 4.

ΚΑΛΑΜΟΣ.

Triandr.

Ινοφλοιος, (cortice fibroso,) μονολοπος, (cortice simplici,) γονατω-

δης, (caule nodoso.) i. 8, 10. μητρα ὑμενωδης, (pars interior membranis divisa,) i. 9. radice fibrosa, i. 10. γωνιοφυλλος, (nervo acuto longitudinali prominente,) (vid. γωνια) i. 16. λοχμωδης, (vid.) cum Cypero, iv. 9. Species Calami quinque: 1. K. αυλητικός. 2. K. πλοκιμος. 3. K. χαρακίας. 4. K. ζευγίτης (affinis K. χαρακίας, si non idem, ex arefactione lacûs proveniens.) 5. K. βομβυκίας, qui omnium aridissimus, folio latiore, et magis cano, iv. 11. spica minore. Dissertatio de K. αυλητικῷ et methodo fistulas formandi, in hoc capite occurrit: optimi ex Cephiso flumine. Divisio alia: 1. K. πυκνος. 2. K. μανος. 3. K. κοίλος (συριγξ voc.) 4. K. σερρεος, (πληρης.) 5. βραχυς. 6. ὑψηλος. 7. παχυς. 8. λεπτος. 9. πολυφυλλος. 10. ολιγοφυλλος. 11. μονοφυλλος. 12. K. δοναξ, maxime communis spec. et maxime lignosa. 13. K. τοξικός, spec. peculiaris; arcubus, an potius sagittis proprius. 14. K. Λακωνικός (variegatus.) 15. K. επιγείος, spec. repens, folio faligno, ad spicula propria. Hab. fluvio Acefine, iv. 12. folia amplexicaulia, vi. 2.

ΚΑΛΑΜΟΣ. Σχοινος, (vid. Σχοινος,) ix. 7.

ΚΑΠΝΙΟΣ. Vid. Αμπελος.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ. *Polyandria.*

Nunquam colitur, i. 6. iii. 3. foliis et caule spinosis, vi. 3. foliis spinosis; radice simplici; caule repente: æstate florens in arenosis, vi. 5. επετειοκαυλος, (perennis,) vii. 8.

ΚΑΡΔΑΜΟΣ. }
ΚΑΡΔΑΜΟΝ. } *Tetradyn.*

Succus aufterus, i. 19. planta λαχανωδης, cum Ανηθῷ, Κοριανθῷ, εν πρωτοις αροτοις (olera quæ feruntur hyemali solititio,) vii. 1. genus simplex, vii. 4. semen durat, vii. 6.

ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

N. B. Planta forsan Καρδαμωμος: sed unguentum solum memoratur inter aromata, ix. 7.

ΚΑΡΤΑ.

Monæcia.

Περσική. }
 βασιλική. } Syn. Juglandis, *Regiæ*. L.
 Ευβοϊκή. }

Ξυλον ασαπες, (incorruptum,) v. 5. item in aqua durans ; cum Οξύη, (Fago,) ib. item v. 8. optimum ad carbinationem, iii. 7. arbor non germinat ex apice furculorum ; fed εκ των πλαγιων προωθεται αυτο το ὑπαρχον, ὥσπερ και αυτο το σελεχος, (ex lateribus propelluntur incrementa, pari modo, ac in trunco evenit,) iii. 7. Carbones optimi ex ligno hujus arboris, v. 10. Fructus maturatur μετ' οπωρον, (ineunte hyeme,) iii. 6. το Καρυον pro nuce arboris ? iv. 6. Hab. Tmolo, et Olympo Myfio, ib.

ΚΑΣΙΑ.

Enneandr.

Cum Σμυρνῇ et Ολιβανῶ, in Arabia ; spec. ramosissima ; ramulis parvis, fed latioribus Cinnamomo ; cortice fibroso ligno firmiter adhærenti : vires eædem cum Cinnamomo ; methodus singularis partem interiorem furculi destruendi, ope vermium, ix. 4.

ΚΑΤΚΑΛΙΣ.

Pentandr.

Oleris genus ; semel cum Ανδρουαλία, Ὑποχοιριδι, &c. vocantur κιχωρη, quia foliis similibus instruuntur ; desc. nulla.

ΚΕΑΝΩΘΟΣ. Vid. Ακανθα. *Syngen.*

Ῥίζα γονατωδης, (nodis abundans) εξ ἑκάστου γονατος αφησι ανω βλαστον, κατω ριζαν ; fed non καλαμωδης, iv. 11.

ΚΕΓΧΡΟΣ.

Polygamia.

Hymenosperrmus, cum Πυρρῶ, i. 18. ανωνυμος κοινή προσηγορία, (differens habitu, etfi cum σιτωδεσι conjunctus,) viii. 1. cum Ελυμῶ et Σησαμῶ, ib. feritur æstivæ ineunte, μη δυναμενος φερειν τον χειμωνα, ib. καυλος καλαμωδης, viii. 3. πολυκαρποτατος, (feminibus maxime abundans,) femina durant, viii. 10.

ΚΕΔΡΙΣ. }
ΚΕΔΡΙΑ. }

Diæcia.

Θαμνωδης (fruticosus;) τι μικρον, ὃ ου δενδρoutαι, i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ.

Diæcia.

Ξυλου φλοιος ασαρκης, i. 8. sempervirens, i. 15. foliis apice acuminatis, i. 16. radice superficiali, iii. 7. Gen. duo: K. λυκια. K. φοινικη. ambo fimiles Juniperi, sed differunt foliis magis pungentibus, et rigidis. Alii distinguunt ita. 1. Κεδρος. 2. Οξυκεδρος. Lign. incorruptum το πλειστον εγκαρδιον, (totum fere cor,) rubri coloris, *fragrans*; bacca flava, myrti magnitudine, fragrans, gustu dulcis; annum totum in arbore durans: trium annorum proventus simul in arbore, προπερυσινος, περυσινος, νεος: cortice Cypressi, sed magis scabro. Hab. in montosis, saxosis, iii. 12. in montibus Thraciæ, iv. 6. et Phryg. ib. εαν επικοπη το ακρον, φθειρεται, iv. 19. Statuæ fiebant ex ejus ligno, v. 5. Lignum minime ponderosum et ad navalia utile, v. 8. Cedri in Syria magnitudine tali, ut tres homines amplecti nequeant: long. 13 ulnarum, ex quo ενδεκηρης ναυς, (navis quindecim-remis,) an Cedr. *Libani* L. ? v. 9. οπος δακρυωδης, (succus resinofus.)

KENTATPION.

Syngen.

Succo amaro, cum Αψινθιω, i. 19. amat frigida loca, iv. 6. folia amara, sed utilia, vii. 9.

KENTATPIS TPIOPXIS. *Class. incert.*

Planta spinis venenosis, ut videtur, ix. 9.

KENTATPIS.

An idem cum Κενταυριω? radix crassa, pinguis, ix. 15.

KENTHPIA.

Class. incert.

Syn. ατρακτυλιδης; (a κεντεω) οπος αιματωδης.

KENTPOMTPPINH.

Diæcia.

Επιφυλλοκαρπος, (fructificatione super folium,) una cum Δαφνη Αλεξανδρεια; ambo Rusci L. iii. 17.

ΚΕΡΑΣΒΟΛΟΝ. Vid. Ερεβινθος.

ΚΕΡΑΣΟΣ. *Icosandr.*

Ορδοφυης, (procera arbor) μεγαθει μεγας· και γαρ εις τεσσαρας και εικοσι πηχεις, (sc. circumferentia ramorum,) circumferentia trunci ipsius διπηχυς: lignum durum valde; cortex similis Tiliæ et ad eisdem usus; methodus peculiaris decorticandi, adeo ut pars interior illæsa maneat, iii. 13. flos albus, Pyri similis, εκ μικρων ανθων συγκειμενον, (umbella ex multis floribus, κηρωδης, (quorum superficies plana favi aperturas imitatur; vid. Lex. Theophr.) fructus rubri coloris, Diospyri similis; magn. Κυαμου, (Pisi antiquorum.) N. B. Italis "Maraschino?" (nucleus Διοσπυρου, σκληρος; Cerasi, μαλαχος.) Hab. in irriguis ad ripas fluvium, iii. 13. arbor gummosa, ix. 1.

ΚΕΡΚΙΣ. *Decandr.*

Arbor Populi albi similis canitie foliorum: folium Hederæ simile; αγωνιον εκ του αλλου, μερους? (vid. γωνια,) την δε μιαν, (γωνιαν,) venam sc. intermediam folii prominentem, (προμηκη,) color superioris et inferioris folii partis idem; pedunculis foliorum longis, tenuibus, unde folia inclinantur; cortex scaber, maculatus, iii. 14. N. B. Forsan spec. alia *Class. incert.*

ΚΕΡΩΝΙΑ. *Polygam.*

Fructus in filiqua, i. 18. fructificatio in apicibus, i. 23. arbor in Ionia sic dicta; ex caudice summo fructificans; item ex apicibus, iv. 2.

ΚΗΛΑΣΤΡΟΝ. }
ΚΥΛΑΣΤΡΟΝ. } *Pentandr.*

Frutex sempervirens, i. 15. incultus, i. 6. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructus ante hyemem decidit, iii. 6. amat frigida loca, iv. 1. cum Junipero; usus ad baculos, "the Staff-tree," Ang. v. 3.

ΚΗΡΙΝΘΟΝ. *Pentandr.*

Inter flores æstivos cum Lychnide, et Diantho *Armeria*. Desc. nulla, vi. 7.

KINNAMOMOS. *Enneandr.*

Hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. Fruticosa species, ib. cum Olibano et Casia enumeratur, ix. 4. frutices ambo ramulis Viticis, *Agni casti* similibus; cortex furculorum optimus, ix. 5. inter aromata recensetur, ix. 7.

ΚΙΣΤΟΣ. *Polyandr.*

Φρύγανον ανακανθες, (frutex inermis,) cum Spiræa, Cneoro, &c. vi. 1. Spec. duæ: ἀρρήν. Σηλυσ. 1. folio majore, rigidiores, magis nitente; flore purpurascens, haud ab simili flore Rosæ, *caninæ*; ἀμφω αἰσμοί, vi. 2.

ΚΙΤΤΟΣ. *Pentandr.*

Frutex, i. 4. sempervirens, folia juniora angulosa; annosa, subrotunda, i. 15. pedunculis longis, ib. flos stamineus, i. 21. peculiari modo, i. 22. δένδρουται χαρακος παγουσης, (si palum admoveas, brevi crescit sine fulcro.) (N. B. Hoc expertus sum,) ii. 1. bacca inedulic, iii. 6.

Genera 3: 1. Κ. λευκος. 2. Κ. μελας. 3. Κ. ἐλιξ. Spec. 1^{ma}. baccis albis? 2^{da}. foliis minoribus, fructu laxo corymbofo, vel in sphaeram collecto, (κορυμβία dict.) spec. secunda minus variat. spec. tertia (ἐλιξ) maxime ab aliis differt parvitate, et ευρυθμία foliorum, et raritate fructûs; ουκ αποκιττουται, (non habitum amittit, vid.) Spec. Ἐλικος tres. 1. Ἐ. χλοερα, η ποωδης. 2. Ἐ. λευκη. 3. Ἐ. ποικιλη, vel Thracica. Κιττος εκ των βλασων αφιησιν αι ριζας ανα μεσον των φυλλων, αἰς, ὥσπερ ενδυεται τοις δένδροις, και τοις τειχοις, (radiculæ caulinae,) bacca Κιττου λευκου επιγλυκος; Κιττου μελανος, σφοδρα πικρος, iii. 18. lign. θερμον; opp. ψυχρον.

Κιττου λευκου σπερμα προς το γονιμον ειναι, (adversus sterilitatem,) ix. 19.

KIXΩPION.	}	<i>Syngen.</i>
KIXΩPH.		

Folia radicalia, i. 16. λαχανον αρουραιον, (cultâ? an inter fegetes?) vii. 7. vere caulescit et floret, vii. 8. επικαυλοφυλλος, ἀματαις εκφυσεσι ακρεμόνικαις, (simul ex divaricatione ramorum ad apices,) εκφυει και τ' ανθος, (florem producit,) vii. 9. successive

floret, vii. 10. caulis magnus, ad apicem αποφυσειs emittens, radice magna, vii. 11.

ΚΛΗΘΡΑ.

Monæc.

In humidis æque ac in aridis, i. 7. in planis Macedoniæ, iii. 4. quibusdam in locis ακαρπος, iii. 5. βλαστανει μετα ζεφυρον, (fructificat autumnò,) iii. 6. cito crescit, iii. 7. Sp. simplex, sterilis; lignum molle, medulla intus; furculi tenues, cavi intus: folia Pyri, sed majora, et magis nervosa: cortex scaber; interior ruber, tinctorius: radices super terram, in aquosis, iii. 14. cum Salice, iv. 9.

ΚΑΤΜΕΝΟΝ.

Diadelph.

Pl. medicinalis; καρπος colligendus primo mane πριν ηλιον επι-βαλλειν, ix. 9. radix ad abortiones, ix. 19.

ΚΝΕΩΡΟΝ.

Octandr.

Frutex crassifolius, i. 16. ανακανθης cum Cisto, Spiræa, &c. vi. 8. Spec. duæ: 1. K. λευκον. 2. K. μελαν. Sp. 1^{ma}. foliis coriaceis, oblongis, Oleæ foliis similibus. Planta humilis, fragrans. Sp. 2^{da}. foliis Myricæ; habitus elatior, odor nullus: florent ambo æquinoctio autumnali: flos durat; radices magni; ramuli densi, vi. 2.

ΚΝΗΚΟΣ. }
ΚΝΙΚΟΣ. }

Syngenes.

Flos femini infidet, i. 22. ακανθωδη φυσιν εχει, (in ceteris partibus spinosa est,) το δε σπερματικον, (ακανον, pericarpium) ουχ ομοιωs, (non similiter spinosum,) vi. 3. αποφυσειs εχει, (caulis supra ramosus,) ib. Spec. duæ: 1. K. αγρια. 2. K. ημερα. Prioris etiam sp. duæ. 1^{ma}. ευθυκαυλοτατη; adeo ut πηνιοιs (fufis) mulieribus inferviat; καρπω (pericarpio) magno, nigro, amaro. 2^{da}. villosa, caule Sonchi; foliis procumbentibus, vi. 4.

ΚΟΙΞ.

Monæc.

Καλαμοφυλλος, i. 16. Planta bulbosa; recte Κοιξ scribitur sed Ald. Lect. κυιξ. forf. vox Ægyptia?

KOKKOS KNIDIOS. *Class. incert.*

Fructus rotundus, ruber, grano Piperis major, ισχυροτερος πολυτη θερμότητι, adeo ut succus urat fauces: an Capficum, *baccatum*? ix. 22.

KOKKYPIA.*Pentandr.*

Cum Arbuto et Andrachne enumeratur; foliis Ανδραχνης, δένδρον μικρον καρπος εκπαππουμενος, (fructificatione *rapposa*,) ιδιον τρυτο, (peculiare hoc est,) ουδ' αφ' ενός ακηκοαμεν αλλου δένδρου; recte, iii. 16.

KOKKYMHEA.*Icosandr.*

Fructus carnosus, i. 18. succus fructus aquosus, i. 19. flos quinquepetalus, i. 21. superus, i. 22. radices super terram numerosæ, iii. 7. arbor maxima; Mespili habitu: πυρηνι στρογγυλω, (bacca rotunda,) floret vere; maturat fructum Octobri; arbor semper-virens. Hab. Thebais.

KOLOKYNΘH.*Monæc.*

Cum Cucumere enumeratur, succus υδαρης, (aquosus,) i. 19. flores superi, i. 22. semen pullulat 6 vel 7 diebus, vii. 1. βραχυρριζα, vii. 3. varietates plurimæ; semina non durant longum tempus, vii. 6. inter culta enumeratur.

KOLOYTEA.*Diadelph.*

Sp. 1. Arbor filiquosa, i. 18. foliis εγγυθεν τοις της Ιτεας? ramofissima: ib. καρπος ελλοβος, ωσπερ τα χεδροπα λοβοις πλατεσι, ου σενοις, (i. e. secundum species diversas,) semine parvo, molliusculo; filiquis sparsis; arbor rara, iii. 14. Hab. M. Ida.

Sp. 2. Species peculiaris juxta Liparam. Arbor ευμεγεθης: semine in lobis magnitudine φακου, (Fabæ,) cujus usus in pecoribus faginandis mirus, et ideo feritur.

Sp. 3. fruticosa πολυμασχαλος, (vid.) foliis Lauri, sed rotundioribus, et Pyri *Mali* fimilioribus; parte superiore viridibus; inferiore glaucis, venis multis, cortice Vitis, sine flore, vel fructu, sed solummodo καχυι κορυνωδει. Desc. obscura, si non textus corruptus.

ΚΟΜΑΡΟΣ. }
ΚΩΜΑΡΟΣ. }

Decandr.

Ῥηξιφλοιός, ὥς ἐκπιπτειν, (cortice lacerato, decidente,) i. 8. fem-pervirens, i. 15. φερεὶ μιμαιοκυλά εἰδιμα (fraga, fc.) Arb. med. magn. cortice tenui, instar Myricæ; folio inter Prinum et Lau-rum; floret Octobri; flores ἀπο μίας κρεμασρας, (ex uno pedi-culo penfili,) ἐπ' ἀκρον, βοτρυδον (in apice, racematim dispositi,) floris Myrti magn. ἀφυλλοὶ δὲ, (fc. monophylli,) καὶ κοιλοὶ, ὥσπερ ὠν ἐκκεκολλημένον, (ut ovum excavatum,) τὸ σομα δὲ ἀνεωγμένον· ὅταν δ' ἀπανθήσῃ, ἡ προσφυσις τετρυπῇται, (flore delapso, fructus enascens fligmate perforatus,) τὸ δ' ἀπανθήσαν (fructificatio, flore delapso) λεπτόν, ὥσπερ σφινδύλος περὶ ἀτρα-κτόν, (ut verticillus circa fufum,) ἡ Καρυεὶς Δωρικός, (vid. καρν.) fructus ἐνιαυτῷ πεπαινέται ὥς συμῆται αἶμα τοῦτον δ' εἶναι, καὶ τὸν ἕτερον ἀνθεῖν; optime, iii. 16.

ΚΟΜΗ ἡ.

Syngen.

Radice fusiformi, Bot. gustu dulci: foliis Croci, sed longioribus: caule brevi; καλυκὶ μεγάλῳ, (perianthio magno,) πωγωνί ἐξ ἀκρου πολίῳ, (de capitulo papposo, unde nomen τραγοπωγων,) vii. 8.

ΚΟΝΤΖΑ.

Syngen.

Inter ποώδη ἀνακάνθη cum Thymbra, Origano, &c. vi. 1. Spec. duæ: 1. Κ. ἀρρήν. 2. Κ. θηλεία. 1. foliis majoribus, caule amplo, (παχέι,) magis ramoso; flore speciosiore; odore pungenti. 2. foliis tenuioribus: habitus συνεσηκώς, (compressus Bot.) odor βαρύς; adversus insecta utilis, vi. 2.

ΚΟΡΙΑΝΝΟΣ.

Pentandr.

Ποώδης· feritur cum Ἀνηθῷ καὶ Καρδαμῷ ἐν πρώταις ἀροτοῖς, (vid.) vii. 1. radix lignosa, γυμνοσπέρμος, (vid.) vii. 3. genus sim-plex, vii. 4. semen durat, vii. 6.

ΚΟΡΟΝΟΠΟΥΣ.

Tetrandr.

Ἐπιγείοφυλλος, cum Anthemio, Anchusa, &c. vii. 9.

ΚΟΡΧΟΡΟΣ.

Syngen.

Inter λαχανα ἄριστα· proverbialiter amarus, vii. 7.

ΚΟΣΤΟΣ. *Monandr.*

Inter aromata Indica, ix. 7.

ΚΟΤΙΝΟΣ. *Diandr.*

Sylvestres meliores, i. 7. κραδας in trunco generat, (vid.) κοιλο-
τητες ιδιοι in trunco, i. 13. opp. Ελαια, i. 24. ii. 3. iv. 14. lign.
densum album, v. 4. incorruptum, v. 5. aptum malleis, και τερε-
τρισις πυρειας, (vid.) v. 9.

ΚΟΨΙΜΟΣ ἡ. *Claff. incert.*

Affinis Κραταιγου· καρπῷ στρογγυλῷ. Vel spec. diversa, iii. 15.

ΚΟΥΚΙΟΦΟΡΟΣ. *Palma.*

Similis Φοινικί trunco et foliis; sed capite diviso, ῥαβδοις
(spathis) brevibus, raris; fructus χειροπληθης, rotundus, flavus,
gustu dulcis; non congregatim sed separatim; nucleo durissimo
intus: lign. a Palma valde diversum: sc. non fibrosum, sed
solidum ponderosum. Hab. Persia.

ΚΡΑΝΕΙΑ. *Tetrandr.*

Lign. durum, i. 9. in maribus nodosum, i. 13. in planis Ma-
cedoniæ, iii. 4. Germinat προ ζεφυρου; fructum maturat περι τρο-
πας θερinas, iii. 6. cito crescit, iii. 7. Spec. duæ: 1. ἀρρήν. 2. Ση-
λεια: habitu solum differentes, ambo foliis Amygdali, sed pinguio-
ribus, et magis crassius; cortice tenui fibroso; trunco subgracili;
οζοις similibus Viticis, Agni casti. Lign. Θηλυκρανειας molle, me-
dulla intus nulla. Ἀρρήν ακαρπος; Θηλυκρανεια, καρπιμος, drupa
edulis; nucleo intus, instar Olivæ, duro; fructus racemosus.
N. B. Duæ certe species diversæ, et ita a Linneo enumerantur,
vid.

ΚΡΑΝΙΟΝ. *Cryptog.*

Fungus; cum Hydno, i. 9.

ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝ. }
ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΣ. } *Didyn.*

Fructus solum numeratur inter roborativa; sine desc. N. B. Fa-
bulosa forsan planta. Vires generativæ, ut nomen græcum denotat.
Vid. Ger. em. ix. 19.

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. }
ΚΡΑΤΑΙΓΩΝ. }

Icosandr.

Folio Mespili τετανω, (rigido; vid. τετανος) latiore, longiore; margine simplici, non ferrato; arbor mediæ magn. lign. subflavum, ποικιλον, (maculatum?) cortice Mespili: καρπω (drupa Bot.) σρογγυλω, simili Κοτινου, per maturitatem arefacto in arbore; et nigro, iii. 15.

ΚΡΙΘΗ.

Triandr.

Πυκνορρίζα, i. 9. πρωϊσπορος, viii. 1. αναφύεται μονοφυλλα, (monocotyledon Bot.) viii. 2. maturat semen 40 dies post inflorescentiam, viii. 3. γυμνη, (non glumis involuta,) σοιχειωδης, (grana in ordine collocata,) sc. δισιχοι, τρισιχοι, &c. viii. 4. amat solum ψαφαρες (vid.) Κ. Ετεοκριθη. de C. Pl. iii.

ΚΡΙΝΟΝ.

Hexandr.

Inter σεφανωτικά cum Narcisso: coloribus variant, item habitu; μονοκαυλα· δικαυλα σπανως; sed in eodem scapo flos unus, vel plures: radix ampla, σαρκωδης, (carnosa,) καρπος æque ac radix ad propagandum inserviens, vi. 6.

ΚΡΙΟΙ.

Diadelph.

Κρ. οροβιαιοι var. Οροβου, viii. 5.

ΚΡΟΚΟΣ.

Triandr.

Radix σαρκωδης, (bulbus non tunicatus?) i. 10, 11. foliis σενοις, (linearibus,) τριχοφυλλος, ευδus άμα τοις φυλλοις το ανθος (optime,) φιλει πατεισθαι, (conculcari,) vi. 6. Inter flores autumnales. Spec. duæ: 1. Κ. ορεινος, ευοσμος. 2. Κ. ήμερος. vi. 7. radix βαλανωδης, (glandiformis,) ήμαλης, vii. 9. καυλω ανθους, (scapo Bot.) forfan Cr. aureus Fl. Græc. t. 35. var. Κρ. ορεινης. Inter aromata, ix. 7.

ΚΡΟΜΜΥΟΝ.

Hexandr.

Bulbus tunicatus. i. 8. corticatus etiam, i. 10. folia radicalia, intus cava, i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. ακροκαρπον, vii. 3.

Var. cultæ: 1. Κ. Σαρδιον. 2. Κνιδιον. 3. Σαμοθρακικον. 4. Σητανιον. 5. Σχισον. 6. Ασκαλονικον. N. B. Posteriores tres dif-

ferunt ab aliis : n. 4. μικρον, et γλυκυ ευ μαλα. n. 5. κατω σχι-
ζεται. n. 6. αγονος (bulbos non producit) επι ταις ριζαις, Allium
Scbænoprasum, Ang. "Cives," vii. 4. amat loca irrigua, iv. 5.
λειοκαυλος, (vid.) iv. 8.

ΚΡΟΤΩΝ.

Monæc.

Folia junioris plantæ rotunda, fenioris angulofa; contrarium
evenit in Hedera, i. 16. annon Ricini spec. arborefcens. de C.
Pl. ii.

1. ΚΥΑΜΟΣ.

Gynandr.

Species paludofa et fluviatilis : caulis 4 cubitos altus, magn.
dactyli; καλαμοειδης, mollis, non geniculatus διαφυσεσιν ενδον, (ca-
vitatibus medullosis,) in apice caulis κωδια, (pericarpium,) παρο-
μοια σφηκιω περιφερει, (vespæ nido,) και εν ἐκαστω των κυτταρων,
(in singulis cellulis,) κυαμος, (femen,) μικρον ὑπεραιρον αυτου, (le-
viter supereminens in receptaculo,) feminum numerus circiter 30.
Flos papaveraceus, coloris rosei, aquis innatat; folia ampla lo-
ricæ Thettalicæ, fimilia; radix ampla; planta edulis. Hab. Æ-
gypto.

2. ΚΥΑΜΟΣ.

Diadelph.

Πρωδης, πολυχρονιος τη ανθησει, vii. 3. cum Ερεβινθω et
Πισω, viii. 1. πρωισπορος, (vid.) Dicotyledon, viii. 2. foliis subro-
tundis; caule lignoso; ramis ex lateribus: solus inter χεδροπα
ερδοκαυλος, (optime,) viii. 3. corculum feminis Bot. prominens,
viii. 5. ου ταχυ βλασανει, v. 10.

ΚΥΚΑΣ.

Palma.

Hab. Æthiopia; species θαμνωδης, truncis pluribus simul
junctis ad basim: ραβδοις (spathis?) cubitalibus: foliis latis, ὡσπερ
εκ δυοιν συγκειμενοις, (plicatis,) καρπω σρογγυλοτερω, μειζονι, ἥττον
γλυκει· maturatur anno tertio: ex his conficiuntur panes, ii. 8.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ.

Pentandr.

Bulbus cortice tectus, vii. 9. Vires medicæ in morbis pulmo-
num; mulieribus εν προσθετοις; (vid.) adversus ulcera, και προς
τω μεθυσκειν, (ad providendum adversus ebrietatem,) ix. 10.
Desc. nulla.

ΚΥΜΙΝΟΝ.

Pentandr.

Γυμνοσπερμον, cum Anetho ; semen *σενον*, γραμμωδες, (lineare Bot.) δειν καταραν σπειραντας ! vii. 3. variat, vii. 4.

ΚΥΝΟΡΟΔΟΝ.

Icosandr.

Το όλον φυτον ὁμοιον τοις Κυνοροδοις, iv. 5. syn. pr. Κυνοσζατου vel Rosa, *canina* L.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ.

Icosandr.

Ορθοφυης, και ὑψος εχων, καρπων ὑπερυθρων ὁμοιω τῇ τῆς ῥοδης, δενδρου και θαμνου μεταξυ. Rosa, *Canina*, "Dog-rose, or Hip-tree," Angl. Fructus κατ' ανεμον colligendus; ει μη κινδυνον ειναι των οφθαλμων; anne ex filis quæ grana involvunt; an spec. peculiaris, ix. 1.

ΚΥΝΩΨ.

Tetrandr.

Pl. κιχωριωδης, cum Aphaca et Buprestis, vii. 8. βλαστανει αμα τοις πρωτοις υετοις, ib. an diversus ab Αχυνωψ, vii. 10. Error, ut suspicor, textus in hoc loco.

ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ.

Monæc.

Procera arbor, i. 8. radicibus horizontalibus, i. 9. *μονοσελεχης*, i. 14. sempervirens, i. 5. *σαρκοφυλλος*, i. 16. maxime in Ida, iii. 3. et in Cyrenaica, iv. 3. Creta, Lycia, Rhodo, iv. 6. ex ligno fiebant statuæ una cum Cedro, v. 5. Lign. incorruptum, ib.

ΚΥΠΕΙΡΟΣ.

Triandr.

Cum Sparganio ὁμαλοτητι ιδια, (polita maxime,) radice singulari, i. 10. *γωνιοφυλλος*, (vid. *γωνια*,) i. 16. planta locustis *λοχυωδης*, (vid.) iv. 9. In Lacu Orchomeni, iv. 11. radice maxime singulari, sc. inæqualis magnitudinis; pl. *δυσολεθρος*, ib.

1. ΚΥΤΙΣΟΣ.

Diadelph.

i. 9. lign. durissimum, arbor vivax, iv. 20. lignum Ebeni simile, colore excepto, v. 4.

2. ΚΥΤΙΣΟΣ.

Diadelph.

Species parasitica vel scandens, quæ plantas alias crescendo enecat: a quibusdam Cytifus Maranta dicta, Medicago, *arborea*, L. Semel occurrit, iv. 20.

ΚΩΜΑΚΟΣ. }
 ΚΩΜΑΚΟΝ. } *Class. incert.*

Fructus et succus Κωμακου solum occurrit, ix. 7.

ΚΩΝΕΙΟΝ. *Pentandr.*

Caulis carnosus, i. 8. ναρθηκωδης, (fistulosus item,) vi. 2. οπος
 lethalis, ix. 8. Hab. Sufis, ix. 15.

Λ.

ΛΑΘΥΡΟΣ. *Diadelph.*

Inter χεδροπα: foliis longioribus, viii. 3. επιγειοκαυλος, (pl.
 repens,) ib. femina obnoxia vermi, σκωληκι dicto, όταν υγρανθωσι,
 viii. 10.

ΛΑΚΑΘΗ. *Icosandr.*

In planis Macedoniæ, iii. 4. Sine desc.

ΛΑΚΑΡΑ, vel Λευκαρά. *Class. incert.*

An idem cum præcedente? Arbor cito crescens, cum Φηγγω,
 Αρκευθω, Σφενδαμνω, in udis crescens, iv. 7. Error forsan textus.

ΛΑΠΑΘΟΣ. }
 ΛΑΠΑΘΟΝ. } *Hexandr.*

Caulis carnosus, i. 8. μονορριζος; pl. επισπορα: feminatur cum
 Τευτλιω, Θριδακι &c. Spec. culta; an Rumex acetosa? vii. 1. radix
 1½ ped. longa, vii. 2. carnosæ vel potius ξυλωδης, vii. 3. genus
 simplex, vii. 4. crudæ inedules, vii. 7.

ΛΕΙΜΩΝΙΑ, Ανεμωνη.

Vid. Ανεμωνη, vi. 7.

1. ΛΕΙΡΙΟΝ, vel Ναρκισσος. *Hexandr.*

Foliis radicalibus, Asphodeli fimilibus, sed latioribus; scapo
 nudo, viridi; flore spatha membranacea involuto in apice, vi. 7.
 Floret vere.

2. ΛΕΙΠΙΟΝ.

Hexandr.

Λειριον ἕτερον dict. planta autumnalis, cum Croco montano, vi. 7.

ΛΕΜΝΑ.

Monæc.

Ὁ προσαγορευουσι Λεμνα. Spec. fluviatilis. Τοῦτο πλεον το καθ' ὕδατος εἶν, (aquis pars major supernatat,) sine desc. ut maxime omnium communis, iv. 11.

ΛΕΥΚΑΚΑΝΘΑ.

Syngen.

Inter spinosas capitulo, (ακανῶ) inermi? vi. 6. foliis solummodo spinosis, ib.

ΛΕΥΚΗ.

Diæcia.

Folia juniorum diversæ formæ a foliis seniorum, i. 16. σρεφε τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, ib. Vid. Ελαια, p. 19. amat irrigua loca: propagatur απο παρασπαδων, (vid.) vel καταπηγνυμενος, iii. 1. in planis Macedoniæ, iii. 4. πρωϊλασος, iii. 6. in aquosis cito crescens, iii. 7. Spec. montana, iii. 10. cum Populo, cui affinis habitu; ανανθη αμφω, iii. 14. βραχυειος, iv. 14. Historia mirabilis Λευκης εν Σταγειροις, εν τῷ Μουσείῳ, iv. 19.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ.

Hexandr.

Planta bulbosa cum Sifyrinchio; bulbis rotundis, tunicatis, vii. 13. Ν. Β. Λωτος λευκοιος, alia planta cum Anthemio enumerata, vii. 9. vid. Λωτος. Diadelph.

ΛΕΥΚΟΙΟΥ ανθη δενδρον. *Class. incert.*

Semel occurrit, iv. 9.

ΛΙΒΑΝΟΣ.

Class. incert.

Οπος δακρυωδης; cum Cedro, Abiete, Pinu, ix. 1. An idem cum sequente?

1. ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ. }

ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. }

Class. incert.

Odorifera pl. ex India, Arabia, Syria, cum Σμυρνη, Cafia, &c.

iv. 6. Gummi obtinetur post germinationem, ix. 2. in M. Arabum; arbor med. magn. ramosissima, folio Απιε, sed minore; sature viridi, ut Πηγανου: φλοιος λειος, ως Δαφνης, ix. 4.

2. ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. *Pentandr.*

ix. 12. N. B. Libanoti spec. duæ: 1. Λ. καρπιμος. 2. Λ. ακαρπος. Prioris fructus in usu; posterioris, radix: fructus vocatur καχυς.

1. Folio Ἐλειοσελινου, sed majore; caule cubitali; radice crassa, alba; odore Libanoti; fructus albus, scaber, oblongus.

2. Folio Θριδακινης amaræ, sed magis scabro; radice brevi, ix. 12.

ΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Φυλλα λιπαρα, (pinguia, nitentia,) viii. 7.

ΛΙΝΟΣΠΑΡΤΟΝ. *Triandr.*

Cortex πολυλοπος, cum Tilia, Vite, &c. i. 8. (vid.)

ΛΥΧΝΙΣ. *Decandr.*

Inter flores æstivos cum Diantho *Armeria*, *Lavandula*, &c. vi. 7.

1. ΛΩΤΟΣ. arb. *Polygam.*

Cortex trunci ασαρκος, cum Cedro et Cypresso, i. 8. medulla ligni dura, i. 9. lignum præ duritie enode, i. 13. Arbor in Libya frequens et optima, iv. 3. magnitudine Pyri; foliis εντομας εχουσι πρινωδεις, (marginibus ferratis,) lignum nigrum: fructus magn. Κυαμου, mutans colorem in maturando, ut uva; situ alternus, instar baccarum Myrti; dulcis gustu; cibus Lotophagorum. Species plures, iv. 4. lign. Ebena prox. v. 4. ex quo statuæ, v. 5.

2. ΛΩΤΟΣ. *Nymphæa. Polyandr.*

Caulis similis Ari, *Colocasia*, και οι πετασοι (folia, ita ex forma πετασου, vid. vocata,) ὡσαντως, πλην ελαττης, επιφύεται δ' ὁμοίως ὁ Λωτος τῷ τῷ Κυαμῷ, (error, ut suspicor, textus: vid. ex desc. Κυαμῷ supr.) παραφύεται δὲ φυλλον μεγα παρ' ἑκάστου των κυαμων: flos albus, petalis angustis, liliaceis, dense stipatis, quæ cum fol occultatur intus sese inflectunt, et discum floris occultant, μετ' απανθησιν καταδυει, iv. 10. inter aromat. ix. 7.

3. ΛΩΤΟΣ. herb. *Diadelph.*

Πωδης cum Picride et Anthemio, επικαυλοφυλλος, vii. 19. genera plura, quæ differunt caulibus, floribus, foliis. Qu. an Lotus Linn. vel Trifolium, *Melilotus* ejusdem, vii. 14.

M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ. *Class. incert.*

Vox Ægyptia; cum Σιλφιω enumeratur. Vires medicæ in radicibus, i. 11.

ΜΑΛΑΧΗ. *Monadelp.*

Cultura δεινδρεται, (Lavatera forsan arborea L.) i. 4. inter αρβραιας quæ λαχανη vocantur: δει πυρωσεως, (igni coquatur necesse est,) cum Τευτλιδι et Λαπαθω, vii. 7. επετειοκαυλος, vii. 8.

ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ. *Triandr.*

Foliis Cyperi; radix bulbosa, magnitudine Mespili, sine nucleo, vel cortice crasso; gustu dulcis; edulis, vel cocta in jure, vel in τραγημασι, (bellariis.) Hab. Ægypt. iv. 10.

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδης, cum Helleboro, vi. 2. Vires foliorum in ulceribus; radicis ad morbos cutaneos; succûs in podagra, ix. 10.

ΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Γυμνοσπερμον, i. 18. vii. 3. succus fragrans, i. 19. ναρθηκωδες, (caule fistuloso,) νευροκαυλον, (ftriato,) vi. 1. cum Κωνειω et Mandragora, vi. 2.

ΜΕΛΑΜΠΥΡΟΣ Ποντικός. *Didynam.*

Crescit una cum Tritico, viii. 8.

ΜΕΛΑΝΙΟΝ. *Syngen.*

Vid. Ιον, Ιωνια. Inter σεφανωτικα ποωδη, vi. 6. inter æstivos flores, cum Oenanthe, vi. 7.

ΜΕΛΕΑ.

Diand. et Polygam.

Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructificat æstate, cum Σφενδαμνῷ, iii. 6. cito crescit, iii. 7. πυκνορρίζα, ib.

Spec. duæ : 1^{ma}. M. ευμηκής. 2^{da}. M. ταπεινότερα. iii. 11. folia amborum, φυλλορρόεντα ἀφ' ἑνὸς μισχοῦ, (pinnata, cum lobis decidencia,) φυλλα (lobi finguli) Lauri fimiles, apice acutiores, et margine ferrato, περι μίαν, οἷον κατὰ γόνυ, συζυγίαν, (ex adverso, pedunculo communi juncta,) τὰ φυλλα δὲ καθ' ἑκάστον πεφυκε, (lobi separatim producuntur,) συχῶν ισχυρῶν τῶν συζυγιῶν, (crebris paribus loborum,) ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς Οἰγῆς. Fructus in lobo tenui compresso, φέρει δ' ἕτερόν τε ἀλλὰ, οἷον βρύα· ἑκάστα καθ' αὐτό σφαιροειδῆ, (sc. flores masculi,) τὰ μὲν περι τῶν καρπῶν· τὰ δ' ἀπηρτημένα πολὺ, (valde distantia.) N. B. Fraxinus secundum Linn. floribus hermaphroditis et fœminis; apud Botánicos recentiores, ut Genus Diandrum.

1. M. ευμηκής· ξυλῶ, λευκῶ, εὐίνῳ, (vid.) ανοζοτέρῳ, σκληρῳ.

2. M. ταπεινότερα, ἥττον ευαυξής, ξυλῶ ξανδοτέρῳ τραχυτέρῳ.

N. B. Prior vocatur Βεμελία, Fl. Græca, fasc. 1.

ΜΕΛΙΑΣ ΣΙΤΟΣ.

Octandr.

Inter ποωδή cum Loto L. semel occurrit; variat habitu secundum loca, vii. 14.

ΜΕΛΙΑΩΤΟΣ.

Diadelph.

Enumeratur cum Loto; herba varians habitu secundum loca, vii. 14. de C. Pl. l. vi.

ΜΕΛΙΝΟΣ.

Triandr.

Inter σιτωδή, cum Cenchro, viii. 3.

ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ.

Polyandr.

Inter ποωδεις ανακανθας, quæ foliis maxime differunt, cum Conyza, &c. vi. 1.

ΜΕΣΠΙΛΗ.

Icosandr.

Spec. tres. 1. M. ανθηδων. 2. M. σητανειος. 3. M. ανθηδονοειδης.

1. Drupa major, luteo-alba, laxa, (χαυνα.)

2, 3. Drupa minore, saporis melioris, sed fucco astringenti. Omnium flores amygdalini, albi; folia πολυσχιδη, (lobata,) και επ' ακρω σελινοειδη, μειζοσι σχημασι, τετανα, (divisuris σελινου, sed majoribus) περιεχαραγμενα όλον, (undique ferrata,) pedunculo tenui, longo: lign. firmum; folia rubescunt valde autumnno, iii. 12.

ΜΗΔΙΚΗ. *Diadelph.*

Μισοκοπρος, viii. 8.

ΜΗΚΩΝ. *Polyandr.*

Sempervirens, i. 15 Αγγειοσπερμος, 1. 18. succus spissus, (οπωδης,) i. 19.

ΜΗΛΕΑ ΜΗΔΙΚΗ. *Polyadelph.*

Ανδρες ηλακατη, (pistillo Bot.) in medio, i. 22.

ΜΗΛΕΑ ΠΕΡΣΙΚΗ. *Polyadelph.* i. 22.

ΜΗΛΕΑ. *Icofandr.*

Arbor μονοσελεχης, (trunco simplici,) αγωγή μονόν, ("by training,") i. 5. cortice lævi, i. 8. medulla carnosæ; ολιγορριζα και επιλολαιορριζα, i. 19. οζοι όμοιοι θηριων προσωποις, (in venis ligni, ut videtur? vel facie externa) εις μεγαίςος και περι αυτον, πλειονες, i. 13. foliis carnosis, Pyri longioribus, i. 16. flos φυλλωδης, (polypetalus,) i. 21. flos superus, Bot. i. 22. fructificatio εκ των ένων κλαδων, (ex furculis prioris anni,) i. 23. varietates plurimæ, cultæ, i. 24. Spec. duæ, verna et ferotina, ii. 1. ferendo degenerat, ii. 3. προμοσχευεται επ' αυτων των δενδρων, (infusione propagatur,) ii. 7. Hab. in planis Macedoniae, iii. 4. οψιελαςος, ib. fructus maturatur άμα πρωτοις ψυχροις, iii. 6. Lignum vermibus minus obnoxium, iv. 16. Hab. Ponto, iv. 4.

ΜΗΛΩΘΡΟΝ. *Class. incert.*

Inter φρυγανα ανακανθα, cum Cisto; fine desc. vi. 1.

ΜΗΝΙΑΝΘΕΣ. *Pentandr.*

Palustre gen. in paludibus lacûs Orchomeni, iv. 11. fine desc.

ΜΙΛΟΣ. *Diæcia.*

In montibus Macedoniae, iii. 4. οψιελαςος, iii. 6. magn.

maximæ, iii. 7. Genus simplex, foliis Ελατης, (Fir-tree,) πολυµασχαλος, (vid. µασχαλη,) lignum flavo-rubescens, totum cor; fructus ruber, Piso major, tener: folia equis lethalia; non tamen pecoribus, iii. 10. amat umbrosa loca, iv. 1. lign. ad opera sculptilia, v. 8.

MINΘΑ.

Didynam.

Cum Sisymbrio et aliis, quorum folia et ramuli odoriferi, vi. 7.

MΝΑΣΙΟΝ.

MΝΑΥΣΙΟΝ.

} *Class. incert.*

Pl. ποωδης, edulis, gustu dulcis: affinis Σαρι, iv. 9. N. B. Ambo voces Ægyptiacæ.

ΜΥΑΚΑΝΘΟΣ.

Class. incert. vi. 4.

ΜΥΚΗΣ.

Cryptog.

Caulis όµαλης? forsan lævis et fungosus. Spec. Agarici, vel Boleti stipitati, cum Hydno, i. 8.

ΜΥΚΗΣ λιθινος.

Lithoph.

Απολιθεται ύπο τῃ Ἡλιῳ. Hab. Mare Rubrum, iv. 8.

ΜΥΟΦΟΝΟΝ.

Class. incert.

Caulis fistulosus, vi. 2. Μαραθρου affinis species, ib.

ΜΥΡΙΚΗ.

Diæcia.

Sempervirens, i. 15. iii. 4. crassifolia, i. 16. N. B. Species arborea occurrit in insula Maris Rubri, Τυλος dict. v. 6.

ΜΥΡΡΙΣ.

Class. incert.

Λαχανον ευσομον; enumeratur cum Anetho et Feniculo; de C. Pl. vi.

ΜΥΡΡΙΝΟΣ.

ΜΥΡΤΟΣ.

} *Icosandr.*

Frutex, i. 4. sempervirens, 1. 15. flores superi, Bot. i. 22. in

furculis anni prioris, i. 23. var. plurimæ, i. 24. germinat εκ τῆς ἀκρῆς καὶ εκ τῶν πλαγιῶν, iii. 7. baccæ vinosæ. Spec. Μικρομυρτός dict. de C. Pl. vi.

ΜΩΛΥ.

Hexandr.

Radix bulbosa, instar Κρομμυς; foliis Scyllæ. Hab. M. Cyllenio, et ad Pheneum, ix. 15.

N.

ΝΑΙΡΟΣ.

Class. incert.

Hinc fit unguentum ναιρον dict. ix. 7. Differt a Ναρδῳ, quia in eodem catalogo simul recensentur, ib.

ΝΑΠΥ.

Tetradyn.

Succus δριμύς, (austerus, pungens,) i. 19. spec. επισπορά, (vid.) vii. 1. ελλοξοσπερμον, (angiospermus,) cum 'Ραφανιδι καὶ Γογγυλιδι, vii. 3.

ΝΑΡΔΟΣ. }
ΝΑΡΤΟΣ. }

Polygam.

Andropogonis spec. ex India: vid. Act. Soc. Reg. Londini 1790. Semel occurrit. Unguentum ναρτη dict. ix. 7.

ΝΑΡΘΗΞ.

Pentandr.

Pl. affinis Καλαμου, μητρά ὑμενωδει, (medulla caulis diffipimentis divisa,) caule fistuloso striato; μονοκαυλος, γονατωδής; foliis amplexicaulibus, πολυσχιδεσι, (profunde et multum divisis,) ὥς εἶναι τριχωδῇ, (linearia Bot.) Flores lutei, parvi, Anethi similes. Caulis ἐξ ἀκροῦ σχίζεται, (sursum ramosus est,) καρπῳ ἐν τοῖς παρακαυλίζουσι, (ramulis lateralibus?) radix fusiformis Bot. vi. 2.

ΝΑΡΘΗΚΤΙΑ.

Pentandr.

Affinis, sed minor, vi. 2.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ.

Hexandr.

Affinis Λειριου; foliis radicalibus Asphodeli similibus, sed lati-

oribus ; καυλος (scapus) αφυλλος, ανθει εξ ακρου εν υμεινι τινι, (spatha membranacea Bot.) καθαπερ εν αγγειω καρπος (pericarpium) magnum, oblongum ; radix carnosa, oblonga, vi. 6. floret vere primo cum Λειριω και Βολβοκωδιω, vi. 7. vii. 12.

ΝΗΛΕΙΑ ?

Class. incert.

N. B. Semel occurrit. Suspicio ibi legendum pro Ανδραχνη, Νηλεια ; Ανδραχνη ελεια ; A. paludosa, i. 8.

ΝΗΠΕΝΘΕΣ.

Class. incert.

Nomen Poeticum, ut videtur : Plantæ narcoticæ, forsan Papaveris, somniferi Linn. Hab. Τυρρηνια, ix. 15.

ΝΥΜΦΑΙΑ.

Polyandr.

Succus dulcis : hab. in lacubus et aquosis Orchomeni, Creta, Bæotia &c. ab Ægyptiis Μαδωναϊν vocatur. Bulbus edulis ; folia rotunda, natantia ; vires stypticæ, ix. 13.

Ξ.

ΞΕΙΡΙΣ. }
ΞΙΡΙΣ. }

Triandr.

Vid. Ιρις, ix. 9. si non Genus diversum.

ΞΙΦΙΟΝ. }
ΞΙΦΟΣ. }

Triandr.

Enumeratur cum Asphodelo : folia ensiformia ; radix bulbosa, vii. 12.

Ο.

ΟΗ. }
ΟΙΗ. }
ΟΥΗ. }

Icosandr.

Fervori solis exposita ακαρπος γινεται, ii. 3. statu sylvestri fructus dulcior, iii. 3. επιπολαιοριζος, iii. 7. Spec. duæ : 1. Ο. αρ-

ῥγν. 2. Ο. Σηλεια. Fructus variat figura, oblonga, ovata, rotunda; folia pinnata; flores in racemo, iii. 12.

OINANΘΗ.

Hexandr.

Spec. ποωδης. Inter σεφανωτικά cum Ιωνία, Διος ανθει, Ἡμεροκαλλιδι, vi. 7.

OINAPΟΣ ?

Class. incert.

Affinis Andrachnes, sempervirens, ramorum partibus inferioribus nudis, i. 15. Forſan legendum Ανδρ. οйнаρος.

OINOΘΗΡΑ.

Class. incert.

Foliis Amygdali, ſed latioribus; floribus rubris, vel roſaceis; radice magna, rubra. Radix exſiccata vinum olet, unde nomen, ix. 21. Hab. in montibus, ib.

ΟΙΣΟΣ, vel Ισος.

Pentandr.

Spec. duæ: 1. Ο. μελας. 2. Ο. λευκος; ita dict. a colore fructus, iii. 17. foliis et ramulis tenuioribus, ib. N. B. In Cod. Aldini legitur Ισον.

ΟΚΙΜΟΣ. }

ΟΚΤΜΟΣ. }

Didyn.

Radix lignoſa, i. 9. caulis folioſus, i. 16. inter επιſπορα τριτοῖς αροτοις, (quæ ſeruntur ter in anno,) vii. 1. propagatur απο βλαστων, ("ſlips,") vii. 2. radix fuſiformis, ib. floret ſucceſſive; τα κατω πρωτον, vii. 3. εμφοιοισπερμος, (vid.) vii. 3, 6.

ΟΛΙΒΑΝΟΣ.

Class. incert.

Enumeratur inter plantas baſſamiferas Arabiæ, ix. 4. Forſan legendum ὁ Λιβανος. Gummi vocatur Olibanum.

ΟΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. vid. Σχοινος.

ΟΛΤΡΑ.

Triandr.

Habitu Tritici, πρωῖσπορος, viii. 1. καρπος πολυλοπος, (femen

glumis numerosis tectum,) cum Τιφη, viii. 4. μαλακωτερα και ασθενεστερα Βρομου και Ζειας, viii. 9.

ONOKIXΛΗΣ. *Class. incert.*

Pl. ποωδης : cum Αφακη et Κιχωριω : floret succeffive, vii. 10.

ΟΝΩΝΙΣ. *Diadelph.*

Caule spinoso, πτορθακανθος, (spinis caulinis,) foliis πηγανωδεσι, (rutæformibus,) ὡς περ σεφανου την ὁλην μορφην, (radiatim, coronæ ad instar,) flore papilionaceo ; femine lobato, lobis sine dissepimento, Bot. N. B. Planta Agricolis infesta, vi. 1, 4, 5.

ΟΞΤΑ. *Monæc.*

Λεπτορριζος, iii. 7. cortex lævis ; truncus enodis : lignum ευχρουν, (bene coloratum,) firmum, venosum ; folia indivisa, apice acuminata, (unde forsan nomen,) fructus lævis, βαλανωδης· εν εχινω, (pericarpio setaceo,) πλην ουχ ὡς Διος βαλανος, (non aculeis ; aut non æque rigidis ac Fagi, Castaneæ,) iii. 10. ξυλον ὑγροτατον, cujus usus εις κλιναρια ενδιδοντα, (lectulos elasticos?) v. 8.

ΟΞΤΑΚΑΝΘΑ. *Icosandr.*

Sempervirens i. 15. hab. in planis Macedoniæ ; floret primo vere ; fructum maturat προς Πλειαδων δυσιν, iii. baccæ speciosæ, et in fertis usitata, vi. 7.

ΟΠΟΒΑΔΣΑΜΟΝ. *Class. incert.*

Cum Libanoto, Smyrna, &c. iv. 6. N. B. Forfan vox composita ex οπος (succus) et βαλσαμον. Vid. Βαλσαμον.

ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentand.*

Differt ab Ἰπποσελινω et Ἐλειοσελινω, foliis similibus Κωνειου ; radice tenui ; fructu Anethi simili, vii. 6.

ΟΡΙΓΑΝΟΣ. *Didyn.*

Sempervirens, i. 15. succus δριμυς, (acris, astringens,) i. 19. ποωδης, ανακανθος, vi. 1.

Spec. duæ : 1. Ο. λευκη, καρπιμη.

2. Ο. μελαινα, ακαρπος.

Semen germinat 30 diebus, vii. 1. propagatur etiam a ramulis, vii. 2.

‘OPMHNON. }
‘OPMINON. } *Diandr.*

Seritur vere cum Cenchro, &c. viii. 1. semen nigrum Cumini simile, amarum, viii. 7.

ΟΡΟΒΑΓΧΗ. *Claff. incert.*

Φθειρει Οροβους δια το περιπλεκεσθαι, (circumvolvendo suffocat;) ut spec. quædam herbaceæ scandentes, sc. Polyganum, Fumaria, &c. Semel occurrit. de C. Pl. l. v.

ΟΡΟΒΟΣ. *Diadelph.*

Pl. σιτωδης, leguminosa, οψισπερμος, viii. 1. femina proxime collocata in legumine, (συμψαυουσι αλληλους,) viii. 5.

N. B. Infecti species Φαλαγγιον dicta, Orobi peculiaris, viii. 10. Siliqua cylindrica, viii. 5.

ΟΡΟΒΙΑΙΟΙ ΚΡΙΟΙ. *Diadelph.*

Genus intermedium inter Ερεσινθον et Οροβον, viii. 5. nisi textus fit corruptus: hinc Linnei, Cicer, *Arietinum*, ib.

ΟΡΥΞ.

Syn. Αρνογλωσσου, vii. 10.

ΟΡΥΖΟΝ. *Hexandr.*

Pl. Indica, ζων πολυν χρονον εν υδατι, (diu sub aquis vivens,) εξ ου το εψημα, (juscum vel pulmentarium Indicum conficitur;) semen simile Ζεας, εν φοβη (gluma) bivalvi; valvula exteriore cava, (vid. annot. in Ελυμον,) iv. 5. non spicata, ut Κεγχρος.

ΟΡΧΙΣ. *Gynandr.*

Foliis Scillæ; radice duplici, bulbiformi: quorum major mas, minor fœmina vocatur, ix. 19.

ΟΣΤΡΥΑ. }
ΟΣΤΡΥΙΣ. } *Monæc.*

Arbor trunco nodofo, i. 13. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4.

ευανξης, iii. 7. affinis Fagi; folia Pyri similia, πολυῖνα, (costata, "ribbed,") fermen parvum grano hordei simile: lignum durum, iii. 10.

ΟΥΗ. Vid. Οη, Ουη.

ΟΥΙΓΓΟΣ. *Class. incert.*

Fructu sub terra cum Arachidna, i. 1. radix magna carnosā; βλασος βραχυς (statura humilis,) καρπος (tuberculum) in deliciis apud Ægyptios, i. 11.

ΟΥΙΠΠΟΣ? }
ΟΥΙΤΤΟΣ? } *Class. incert.*

Syn. prioris, i. 10. N. B. Pronuntiandum forsan Vingos, Vippos; voces Ægyptiacæ. Error textûs, ut videtur.

Π.

ΠΑΔΟΣ. *Icosandr.*

Umbra gaudet, ut Μίλος, iv. 1. Semel occurrit.

ΠΑΛΙΟΥΤΡΟΣ. *Pentandr.*

Frutex, i. 4. caule spinoso, i. 8. ramulis etiam spinosis, i. 16. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. pullulat primo vere, iii. 6. καρπος εν λοβῳ τινι, (loculo quodam,) granis 3 vel 4; folia et λοβοι προς βηχας, (adversus tussēs,) iii. 17. optimi in Libya, iv. 3. folia Loti vel Cercidis similia: fructu rotundo, rubro, iv. 4. in paludosis, iv. 9, 13. cum Βατω, (πτορθακανθος,) vid. vi. 1.

ΠΑΝΑΚΕΑ. }
ΠΑΝΑΚΕΣ. } *Pentandr.* ix. 12, 15.
ΠΑΝΑΞ. }

Spec. tres: 1. π. Ασκληπειον.

2. π. Ἡρακλειον.

3. π. Χερωνειον.

π. 1. Foliis Θαψιας, crassis; caule nodoso: radice longa, simplici; vires eædem, ac Θαψιας.

π. 2. Foliis latioribus; radice dactyli magn. δικρανη η τρικρανη, (bi- vel tri-cipiti,) fuccus pharmaceuticus, adv. ἱεραν νοσον, (Epilepsiam.)

π. 3. Foliis Λαπαθου hirsutis; flore aureo; radice longa, tenui, ix. 12.

Hab. Psophidi in saxosis. N. B. Παναξ forsan succus inspissatus.

ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ. *Class. incert.*

Planta spinosa cum Ononide, Tribulo: sine desc. vi. 4.

ΠΑΠΥΡΟΣ. *Triandr.*

Planta aquatica in profundis fluvii Nili crescens, radice carpo manūs magn. praelonga; caule (Παπυρος vocato) triquetro, 4 cubitos longo; κομη (panicula, Bot.) αχρεια, ασθενει καρπω ουδενι: usus varii; ad victum humanum, ad navigia, vela, vestimenta, fragula, funes, &c. iv. 9. ναρθηκωδης (fistulosus) modo peculiari, vi. 2.

ΠΕΛΕΚΙΝΟΣ. *Diadelph.*

Species affinis Αφακης; ita dict. ex forma filiquæ πελεκεως simili, i. e. viii. 8.

ΠΕΝΤΑΠΕΤΕΣ. } *Icosandr.* ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. }

Foliis Vitis, sed minoribus; caule tenui, repente; κνημαις πυκναις, (flexuris numerosis,) radice rubra, quadrangulari, ix. 14.

ΠΕΠΕΡΙ. *Diandr.*

Spec. duæ: 1. fructu rotundo: κελυφει (pericarpio) σαρκωδει, ερυθρω. 2. fructu oblongo, nigro; seminibus papaveraceis. N. B. Ambo θερμαντικα σφοδρα, ix. 22. Ufus in medicina cum Κωνειω, ib.

ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ. *Polygam.*

Genus herbaceum; radice magna, carnosa, fibris numerosis: affinis Σπαλακος et Κροκου, i. 11. N. B. Ita vocatur quia perdices amant εγκυλισθαι αυτω, ib. Nomen hodiernum Græc. Περδικακι, Fl. Græc. Prodrum.

ΠΕΡΣΕΑ.

Class. incert.

Δενδρον μεγα και καλον εν Αιγυπτω, simile Pyri foliis et flore ; sempervirens, και πασαν ωραν καρπον πεπαινει, (fructus successive maturatur,) iv. 2. Enumeratur cum Συκαμινω, Βαλανω, Ακανθω, ib. fructus oblongus magn. Pyri, viridis, nucleo intus, saporis dulcis, et maxime salutaris. Lignum, ut Loti, nigrum, ib.

ΠΕΡΣΙΚΑ μηλεα.

Polyadelph.

Foliis Ανδραχνης : spinis Απιου, vel Οξυακανθης, lævissimis tamen et prælongis. Pomum quod fert inedule, sed valde fragrans, utpote et folia, quæ, cum vestibus sint reposita, vermes arcent : fructus successive maturatur. N. B. Hab. Medea, Persia. Spec. altera Μηλεα Μηδικα dicta, iv. 4. N. B. Vid. Μηλεα Μηδικα, p. 49.

ΠΕΡΣΙΚΑ ΚΑΡΥΑ. Vid. Καρυα.

ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΝ.

Pentand.

Pl. pharmaceutica : hab. in M. Pelio, Parnasso, Laconia, Tegea, Clitoria, Telethrio, ix. 15. semen inutile ; sed succus in usu : Δερμαντικός valde, ix. 22.

ΠΕΥΚΗ.

Monæc.

Sylvestris naturæ, i. 6. ορδοφυης, οζωδης, (vid. οζος,) i. 8, 13. μητρα ξυλωδης· μονορριζος, μια ριζα μεγαλη, μικραις δ' απο ταυτης πλειοσι· απαραβλαστικός, i. 9. sempervirens, i. 15. σπαθοφυλλος, (foliis basi vaginatis,) i. 16. apice pungentibus, ib. femina oleosa, succus resinofus, i. 19. propagatur solum ex femine, ii. 2. iiii. 1. non degenerat ferendo, ii. 3. iiii. 3, 4. Dubia res apud antiquos an flos ullus, sed κυτταρου (iuli, vel amenti, Bot.) mentio, iiii. 6. etiam καχρυος, iiii. 7. αποκοπεισα ου βλασανει, i. 8.

Spec. duæ : 1. π. αγρια.

2. π. ήμερα.

II. αγριας. Etiam varietates duæ.

1. π. Ιδαια.

2. π. Παραλιας.

1^{ma}. Arbor procera magis et ampla.

2^{da}. Foliis tenuioribus, cortice læviore : strobilo rotundiore, cito dehiscente, iiii. 10. N. B. Var. alia ακαρπος dicta ab Arcadibus

Πιτυς, ib. Folia Πευκης αυχμωδη, πεφρικοτα, (arida, erecta,) lign. ad navium latera, v. 8. etiam ad carbonēs, v. 10. οπος δακρυωδης, ix. 1. ῥητινη optima, ix. 2.

ΠΕΥΚΗ κωνοφορος.

iii. 10. de C. Pl. l. i. Spec. peculiaris; forsan Pinus, *Cedrus* L.

ΠΕΥΚΗΣ τι γενοσ. *Monœc.*

Spec. decidua, i. 15. N. B. In hoc capite Πευκης τι γενοσ (quædam species Pinûs) αειφυλλον: ergo datur species decidua. Pinus, *Larix* L.

ΠΗΓΑΝΟΝ. *Decand.*

Δενδρολαχανον, i. 4. sempervirens, i. 15. propagatur απο βλα-
των, (vid.) vii. 2. nullæ species, vii. 4. μισοκοπος, vii. 5.

ΠΙΚΡΙΣ. *Syngen.*

Πωδης, cum Anthemio et Cichorio; επικαυλοφυλλος, vii. 9. floret per totam ætatem: succus gustu amarus valde, unde nomen, viii. 1.

ΠΙΛΟΣ. *Cryptog.*

Σφαιριον εριωδες μαλακον, iii. 8.

ΠΙΝΗ. *Cryptog.*

N. B. Πινη ut nomen generale Fungi. de Cauf. Pl. l. iii.

ΠΙΣΟΣ. *Diadelph.*

Αρχη (principium germinationis in femine) εκ του αυτου, (sc. Corculum et Plumula, *Bot.* ex eodem puncto,) viii. 1. επιγειο-
καυλος, foliis oblongis, viii. 3. λοζος αδιαφρακτος, (filiqua sine
diffipimento, feminibus alternatim utrinque,) viii. 5. obnoxius
vermi, σκωληχι, (vid.) viii. 10.

ΠΙΤΥΣ. *Monœc.*

Μητρα ξυλωδης, i. 9. arbor sempervirens, i. 15. σπαθοφυλλος,
(foliis 2 vel 3 basi vaginatis,) apice pungentibus, i. 16. femina

oleosa, i. 19. propagatur ex femine, ii. 2. non degenerat ferendo, ii. 3. arbor Julifera Bot. iii. 6, 7. succisa perit, iii. 8. folia instar Πευκης (vid. supr.) Conus minor, i. 10. Usus ligni ad navium latera et carbones, v. 10. ῥητινη (succus "Tar" dict.) εντομαϊς (incisionibus) extrahitur, ix. 1, 2. N. B. Πευκη κωνοφορος ita dicta forsan ex magn. Coni. Πιτυς φθαιοφορος ex parvitate, ii. 3. de C. Pl. l. i.

ΠΙΤΥΙΝΗ.

Class. incert.

Περιαλλοκαυλος, (planta scandens,) cum Ακαρινη, vii. 8.

ΠΙΤΤΟΥΣΑ. }

ΠΙΤΤΩΝ. }

Class. incert.

Inter βολβωδη cum Βολβινη, Σισυριγχιω &c. vii. 13.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ.

Monæc.

In aquosis, i. 7. κραδαις (vid.) obnoxia; πλατοφυλλος, i. 16. βλασανει απο παρασπαδων, ("cuttings,") iii. 1. πρωϊβλασος, iii. 6. arbor rara in Italia, iv. 7. et in Ægypto, iv. 9. Specimen celebre ab Agamemnone plantatum, iv. 14. cortice ablato non moritur, (N. B. Ipse expertus sum,) ib. Lign. ψυχρον, v. 4. ad τορνεϊας navium, (vid.) v. 8.

ΠΟΑ.

Triandr.

Pl. paludosa in Ægypto miræ fertilitatis, iv. 10.

ΠΟΛΙΟΝ.

Class. incert.

Σαρκοφυλλον, i. 16. sempervirens; cum Heliotropio enumeratur. N. B. Nomen ex canitie foliorum.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ.

Cryptog.

Radix hirsuta, habens κοτυληδονας, (tentacula,) ὡσπερ Πολυποδος πλεκταναι, (cirrhi,) ix. 14. folia Πτεριδος, (vid. infr. Πτερις) ου φυει σπερμα: sc. nudo oculo visibile, ix. 22.

ΠΡΑΣΙΟΝ.

Didyn.

Θαμνος πολυκλαδος, ὑποδασυς, (foliis sub-pubescentibus,) λευκος, (incanis,) foliis εντομας βαδειας (ferraturas profundas) εχουσι ραβδοις τετραγωνοις: ανθεσιν εκ διασηματων επι των καυλων,

(floribus ad intervalla verticillatim dispositis,) vi. 1, 2. Var. duæ: 1. π. πωωδης, foliis majoribus. 2. π. αυχμωδης, foliis minoribus, glaucis, ib.

ΠΡΑΣΟΝ. *Hexandr.*

Affinis Γηθου et Κρομμυου; bulbis propagatur, vii. 1.

ΠΡΑΣΟΝ ΠΟΝΤΙΟΝ. *Cryptog.*

Πλατυφυλλον παλαισιαιον, θαυμασου μεγεθους, iv. 7.

ΠΡΙΝΟΣ. *Monæc.*

Μητρα σκληροτερα, i. 9. sempervirens, i. 15. foliis παρακανθιζουσι, (margine spinosis,) i. 16. Hab. montibus Macedoniæ, iii. 4, 5. ενιαυτοφορος, iii. 6. βαθυριζοτατος, iii. 7. κοκκος (galla) rubra? iii. 8. cortex λειοτερος, (aliis) lign. compactum, tenax; fructus βαλανωδης, sed minor glande Quercûs; ο νεος περικαταλαμβανει τον ενον, (fructus recens prodit antequam fructus prioris anni deciderit,) φερει παρα την βαλανον κοκκον φοινικουν, (v. supr.) iii. 16. v. 7. lignum ad axes, et alia, v. 8.

**ΠΡΟΤΜΝΟΣ. }
ΠΡΟΤΜΝΗ. }** *Icosandr.*

Gummofa arbor, ix. 1. οπος δακρυωδης hujus arboris, cum Κερσῳ et aliis, ib.

ΠΤΕΛΕΑ. *Pentandr.*

Truncus κραδαις (vid.) obnoxia, i. 13. σρεφονται τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, i. 16. vid. Ελαια. Spec. φιλυδρα βλασανει απο παρασπαδων, (furculos ex radicibus emittit,) iii. 1. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur de fructu Πτελεας, utpote et Salicis et Populi, iii. 6. πρωιβλασος, ib. παρυδρα, και ευαυξης, iii. 7. præter folia fert βοτρυν, και θυλακωδες τι, (Perianthium monophyllum turbinatum Linn. G. Pl. 316.) primo vere, antequam folia prodeant. N. B. Θυλακος folliculus, iii. 3.

Spec duæ: 1. Πτελεα.

2. Ορειπτελεα.

ex loco natali. Folia Ulmi κεχαραγμενα ησυχη, (leviter ferrata,)

τραχεα δέ, και ου λιαν, (sub-aspera.) Arbor magna, ligno flavo, firmo, fibroso; γλισχρω (lento) totum cor; variis usibus inferviens. Spec. sterilis, αλλ' εν κωρυκεσι, (id. q. θυλακοις?) το κομμι, και θηρια αττα κωνωποειδη, (vid. Κωνωψ,) τας δε καχυς ιδιας εχει πολλας, μικρας, μελαινας· εν δε ταις αλλαις χωραις ουκ επισκεπτεται, iii. 14. lignum ασραβεσατον, (vid.) ασαπες εν αερι, qu. v. 4, 5. ad cardines ligneos, v. 8. οπος δακρυωδης εν κωρυκεσι, ix. 1.

ΠΤΕΡΙΣ.

Cryptog.

Μισοκοπρος· απολυται δε επικοιμωμενων των προβατων, viii. 8. radix pulverifata adversus tæniam, ("tape-worm.") Hab. Ægyptia, Arabia, &c. ix. 22. Desc. nulla, sed nomen certe ex forma folii πτερυγα æmulante.

ΠΥΓΟΣ ?

Class. incert.

Semel occurrit, et, ut videtur, ex errore textûs, pro Φηγος. Enumeratur cum Πυξω, iii. 4.

1. ΠΥΞΟΣ.

Monæc.

Lign. ponderosum, i. 8. fine μητρα, i. 9. ανοζος, i. 13. semper-virens, i. 15. ευαυξης, iii. 4, 7. foliis Myrti, iii. 15. amat frigida et montuosa loca, ib. Flores abundant melle, sed pravi saporis, ib. Lign. in aqua subsidens, v. 4. utile ad flatuas faciendas, v. 5. item εις αξονας, και ἐλκηθρα τοις αροτοις, (vid.) v. 8.

2. ΠΥΞΟΣ.

Cryptog.

Cum Μυκητι, (Agarico L.) Κρανιω, (Lycoperdoni L.) i. 9.

ΠΥΡΟΣ.

Triandr.

Caulis ινσφλοιος, (cuticula fibrosa,) i. 8. πυκνορριζος, i. 9. ενυμενισπερμος, (femen in gluma membranacea,) i. 18. mutatio fabulosa in Αιραν, ii. 5. πρωϊσπορος, viii. semen germinat ἑκατερον εξ ἑκατερου του ακρου, (Corculum ex uno apice, plumula ex altero Bot.) viii. 2. maturatur semen 40 dies μετ' απανθησιν, viii. 3. semen εν χιτωσι πολλοις, (glumis) σαχυς ασοιχος, (opp. ordine regulari feminum in spica hordeacea,) viii. 11. Var. cultæ Tritici hæ.

π. Λιβυκος.

π. Αλεξανδρειος.

π. Ποντικός.

π. Ασσυριος.

π. Θρακικός.

π. Αιγυπτίος.

π. Καγχουρίας.

π. Σικελικός.

N. B. π. Σικελικός omnium βαρυτάτος, viii. 4, 5. Grana Πυ-
ρου fervantur 30 vel 40 annos.

P.

ΠΑΜΝΟΣ ἥ.

Pentandr.

Fruticosa. Spec. duæ: 1. ῥ. λευκή. 2. ῥ. μελαινα; fructus co-
lore discrepantes: ambo spinosæ, iii. 17. αειφυλλος. de C. Pl. i.
Lignum durum ad εσχαραν πυρείας utile, (vid.) v. 10.

ΠΑΦΑΝΙΣ.

Tetradyn.

Δένδρου φύσιν ἔχων, i. 4. radix σαρκώδης, i. 9. vii. 3. corticata,
i. 10. inter λαχανα culta, cujus satio μετα τροπας χειμερίνας,
vii. 1. radix μια, μακρά, παχέα, ὀρθή, ἀποφύσσει μικραῖς, (radi-
culis lateralibus,) vii. 2. φλοιός ἀφαιρετός, (avulso facilis,) ib.
caulis πλαγιοκαρπός, (fructum ferens in ramulis lateralibus,) vii.
3. Var. cultæ plurimæ.

1. ῥ. Καρινθία.

4. ῥ. Κλεωνία.

2. ῥ. Λειοθαλασσία.

5. ῥ. Ευζώμος.

3. ῥ. Βοιωτία.

N. 1. Ευαυξέσατης, ῥίζα γυμνή, i. e. ἐξω τῆς γῆς.

N. 2. Aliter λειοθαλία vel Θρακικά; var. ισχυρός adversum
hyemem.

N. 3. Radice orbiculari, succo dulci.

N. 4. Radice μακρά, (longa.)

N. 5. Foliis Ευζώμου.

N. B. Species, foliis lævioribus, dulciōres. vii. 4.

ΠΑΦΑΝΟΣ.

Tetradyn.

Μεγορρίζος, (sed non σαρκορρίζος,) i. 9. sempervirens, i. 15.

σαρκοφυλλος, i. 16. αλλον τροπον σαρκωδης· εν πλατει, ουκ εν
 στρογγυλοτητι, (folia carnosā, cum expansione,) ακροκαρπος, και
 πλαγιοκαρπος, i. 23. odor noxius Viti, iv. 20. feritur μετα πρω-
 τοις αροτοις, vii. 1. Var. tres.

1. ῥ. ουλοφυλλος.

2. ῥ. λειοφυλλος.

3. ῥ. αγρια.

Foliorum προσθεσις πλατεια, (ima pars pedunculi folii expan-
 ditur, et caulem amplectitur,) vii. 6.

‘ΡΟΔΟΝ. }
 ‘ΡΟΔΩΝΙΑ. } Icosandr.

Frutex sempervirens, i. 15. Flores superi Bot. i. 22. πτορθα-
 κανθος, (ramis spinosis,) vi. 1. propagatur quandoque ex semine :
 sæpius κατακυπτοντες τον καυλον εμφυτευουσι, vi. 6. Var. plu-
 rimæ.

1. πενταφυλλα.

3. εικοσιφυλλα.

2. δωδεκαφυλλα.

4. εκατονταφυλλα.

‘ΡΟΔΟΥ ανθει δενδρον. Class. incert.

Arbor πολυφυλλος, flore Rosæ, nocte clauditur ; unde dicitur
 καθευδειν, iv. 9.

‘ΡΟΙΑ. }
 ‘ΡΟΑ. } Icosandr.

Arbor mediæ magn. cum Μηλεα, i. 4. βραχυσελεχης, i. 8.
 μητρα σαρκωδης ; radices horizontales, i. 9. truncus parte supe-
 riore major, i. 14. στροφυλλος, i. 16. fapor fructus acidus, i. 19.
 flores punicei, i. 21. superi, i. 22. floret in furculis prioris anni,
 i. 22, 23. Pericarpium vel fructus, humidus, εχων τα ανω μυ-
 χωδη, (de loculamentis Pericarpium. L. G. Pl. 618^a.) Var. plurimæ.
 Serendo degenerat, ii. 3. Germinat bis in anno, iii. 7. βραχυ-
 σιος, iv. 14. πτορθακανθος statu fylvestri, vi. 1.

^a Φανερωτατα δε τη χειρισθαι τα (περικαρπια) της ‘Ροιας, (de Pomo Puni-
 sæ novemloculari L. G. Pl. 618.) i. 18.

ῬΟΥΣ.

Pentandr.

Spec. duæ : 1. ῥ. ἀρρήν. 2. ῥ. θηλεία. Folia amborum ὁμοία Πτελέας, sed longiora, pubescentia, τῶν δεξιῶν τῶν νεῶν ἐξ ἰσου τὰ φύλλα εἰς δύο, (foliis pinnatis per paria opposita,) καταλλήλα δὲ, (folia ipsa alterna,) βαπτουσι τῆτοις οἱ σκυτοδεψικοὶ τὰ λευκά δερμάτα, (coriarii utuntur hisce ad coria depilanda,) ὀλιγορρίζος, ἐπιπολαιόριζος. Lign. fine medulla, iii. 18.

ῬΥΤΡΟΣ.

Class. incert.

Planta ἀκανθώδης, Κνίκου affinis, ἀνωθεν ἀποφυσεὶς ἔχων, (vid. ἀποφυσίς,) semel occurrit, vi. 3.

Σ.

ΣΑΡΙ ΤΟ.

Triandr.

Vox Ægyptia : Pl. palustris, cum Παπυρῶ et Μνασίῳ ; nascitur post Nili inundationem : radix dura, contorta ; caulis (σαρίον dict.) bicubitalis, magn. pollicaris, triqueter. Panicula laxa, instar Papyri : succus dulcis, manducando ab incolis expressus : radix ad carbonandum optima, iv. 9.

ΣΕΛΙΝΟΝ.

Pentandr.

Sempervirens, i. 15. caulis foliosus, i. 16. εὐωδής, i. 19. affinis Anethi et Fænicali ; radix fusiformis, i. 9. Planta herbacea, loca irrigua amans, iv. 9. feritur μεθ' ἡλίου τροπᾶς, δευτέροις αἰστοῖς, (autumno,) semen δυσφύεσθαι παντῶν, (tardissime germinans,) vii. 5. non transplantatur, ib.

ΣΕΣΕΛΙ.

Pentandr.

Enumeratur cum Aristolochia et Hippofelino : vires pharmaceuticæ. Hab. montibus Arcadiæ, Tegeæ, Clitoriae, Telethrii, ix. 15.

ΣΗΜΥΔΑ.

Monæc.

Arbor mediæ magn. cum Alnò: foliis Coryli, sed angustioribus: cortex verficolor: lignum leve ad baculos faciendos, iii.

14.

ΣΗΣΑΜΟΝ.

Didyn.

Pericarpium peculiare, i. 18. Inter ανωνυμα κοινή προσηγόρεια cum Κεγχρω et Ελυμω, viii. 1. semen germinat cito; cum Eryfimo enumeratur, ut affinis, ανθεί φυλλωδει, (flore monopetalo, in quo differt a Κεγχρω, cujus flos χνοωδης,) πολυκαρποταπος, viii. 3. femina non comeduntur cruda, viii. 7.

ΣΙΔΗ.

Class. incert.

Species aquatica, ita vocata ex similitudine fructûs σιδιω, vel pomo Mali, granati. Pericarpium desc. ως κυτινωδες τι τοιουτον πλην μειζω, (vid. κυτινος,) μεγαθει δε όλος ό ογκος ήλικον μηλον· φυλλοις ποωδεσι εξωθεν παραπλησια τοις των Ροδων, τετταρα τον αριθμον. Intus κοκκας ερυθρους εχει, rotundos, parvos; succus aquosus. Flos όμοιος Ροδου καλυκι, (q. an calyci?) sed duplo major, aquis innatans utpote et folium. Pericarpium maturum κατακλινει εις το ύδωρ και συναπτει επι τη γη, unde femina germinant, iv. 11.

ΣΙΚΥΤΑ.

Monæc.

Δενδρου ύψος εχει, (sp. habitu valde luxurians et altissime scandens loco natali.) de C. Pl. l. v. Cum Σικυω, i. 22.

ΣΙΚΤΟΣ.

Monæc.

Succus aquosus, i. 19. flores superi, l. 22. feritur æstare, vii. 1. semen germinat diebus sex, ib. βραχυριζος, (radicibus tenuibus,) floret longum tempus, και επιβλασανει, (ramulos novos profert,) vii. 3. Var. cultæ.

1. σ. Λακωνικη.

2. σ. Σκυταλας.

3. σ. Βοιωτικη.

Irrigatione gaudet, vii. 4, 5. κονιορτώ maturatur. Vid. κονιασις, de C. Pl. iii.

ΣΙΚΤΟΣ αγριος. *Monæc.*

Spec. perennis, vii. 10.

ΣΙΑΦΙΟΝ. *Pentandr.*

Radix magna, carnofa, pharmaceutica, i. 11. fylvestr. naturæ, iii. 3. Hab. Cyrene, iv. 3. caulis fistulosus peculiari modo: habitus Papyri, vi. 2. radix cubitum longa: folia, μασπετα dict. Σελινου similia, sed majora: semina lata, φυλλωδη, (membrana cincta,) vii. 3. επετειοκαυλον, (perenne.) Vere comeditur salutis causa, cruda, vel cocta. Porcos mire faginat. Succus duplex respectu virium; caulinus et radicalis. Athenis in vasibus farina mixtus venditur. Hab. Libya περι την Συρτιν, ὑπ' Ευεσπεριδων, vi. 3. semen latum Ανδραφαξυος simile, membrana ad margines, vii. 3.

ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ. *Tetrandr.*

Ανθος ἄπλον τοις εἰδεσι, (forfan unicolor, vel herbaceus,) enumeratur cum Ἐρφυλλω et Ἐλεγιω, vi. 6. raro provenit ex femine, vi. 7.

ΣΙΣΥΡΙΓΧΙΟΝ. *Triandr.*

Enumeratur cum Asphodelo; folia radicalia, i. 16. Planta bulbosa, bulbis non tunicatis: affinis Leucojo, vii. 13.

ΣΙΤΟΣ. *Triandr.*

Πρωσει τη ὑπαρχουση αυξανεται, (sensim, et fine nova germinatione, εξ ακρου sese producit crescendo,) iii. 7. Vid. Πυρος.

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ. *Pentandr.*

Amat loca frigida; enumeratur cum Abfinthio, Helleboro, et aliis montanis, iv. 6. φαρμακωδης τη ριζα, ib. radix gummosa, ix. 1. gummi, vel σπος inter medicamenta, ix, 10, 22.

ΣΚΑΝΔΙΞ.

Pentandr.

Planta herbacea, επετειοκαυλος, (perennis,) cum Σικυω αγριω, vii. 8.

ΣΚΙΛΛΑ. }

ΣΚΥΛΛΑ. }

Hexandr.

In marinis, et arenosis prope mare, i. 7. radix corticata et tunicata, i. 10. vii. 9. folia αμισχα, (seffilia, Bot.) longa, nitentia, Asphodeli latiora, ευδιαιρετα, vii. 12. Spec. duæ: 1. σ. φαρμακωδης. 2. σ. επιμενιδειος, vii. 11.

ΣΚΟΛΤΜΟΣ.

Syngen.

Foliis non spinosis, vi. 3. radix edulis cruda et cocta: optima hyeme, vi. 4. floret vere cum Σικυω αγριω, viii. 10. ακολουθα τα ασρα, ut Heliotropium, vii. 14.

ΣΚΟΛΤΜΩΔΗΣ τις. *Class. incert.*

Οπος εκστατικος, (maniam inducens.) Hab. Tegea, ix 13.

ΣΚΟΡΟΔΟΝ.

Hexandr.

Enumeratur cum Κρομμυω, Σκιλλα, &c. i. 16. Var. plurimæ, distinguendæ foliis et radicibus, vii. 4. sc.

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. σκ. πρωϊον. | 4. σκ. ανευ γελγιδων, ib. |
| 2. σκ. οψιμον. | 5. σκ. λειοκαυλον. vii. 8. |
| 3. σκ. Κυπριον. | |

ΣΚΟΡΠΙΟΣ.

Class. incert.

Cum Asparago sylvestri enumeratur, florens autumnō: flos εν τω σαρκωδει τω εξοιδεντι υπο το ακρον της ακανου, (textus corruptus: forf. επι το ακρον, sc. ex summitate Pericarpīi,) vi. 3. flores primo albi, dein purpurascētes: radix simplex brevis, intorta Scorpii caudæ similis, unde nomen. Vires alexipharmacæ, ix. 14.

ΣΚΥΘΙΚΗ 'PIZA. *Class. incert.*

Forfan Glycyrrhiza L. succus dulcis; *Ευδυγλυκεια* alio nomine; vires ad asthma et tuſſes. Hab. Mæotis. Desc. nulla, ix. 13.

1. ΣΜΙΛΑΞ. *Diæcia.*

Species *επαλλοκαυλος*, (vid.) caule spinoso; spinis rectis; foliis hederaceis; νοτηρῶ τινι κατὰ τὴν τῆ μισχῆ προσφυσιν, (glandula ad basin pedunculi?) ἰδίον δὲ, ὅτι τὴν δια μέσθ ῥαχιν (nervum folii intermedium) ἔχει, καὶ τὰς στήμνιθς διαληψείς, (nervos stamineos, vel intermedios,) ἐκ ἀπο ταύτης, (non pervenientes ex ipso nervo centrali,) ἀλλὰ περὶ αὐτὴν περιφερῶς ἡγμένας, (lineis concentricis ductos,) ἰουλος ἑλίκτος, (cirrhus volubilis,) ἀνθὸς ευωδὲς, λειρίνον· καρπὸς σφυγνθ, in summis ramulis, iii. 18. folia εἰς ὄξυ προηκόντα παρακάνθιζοντα, i. 16.

2. ΣΜΙΛΑΞ. *Diæc.*

Spec. Quercus ab Arcadibus sic dicta; *ἀναμέσον Πρινθ καὶ Δρυος*, iv. 7.

ΣΜΥΡΝΑ. *Class. incert.*

Arbor odorifera maxime; hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. ὁπὸς δακρυώδης, (gummosus,) ix. 1. colligitur ὑπὸ Κυνά, ("in the Dog-days,") ix. 2. cum succo Λιζανώτθ: arb. mediæ magn. trunco nodoſo, flexuoso; furæ magn. cortice spinoso, scabro: folio Oleæ-formi, ix. 4, 7.

ΣΟΓΧΟΣ. *Syngen.*

Planta ακανθώδης, ακανῶ (capitulo) lævi, affinis Στρεβθίου, vi. 3. radix carnoſa, edulis; ακανὸς oblongus, post florescentiam *ἐκπαπθμενός*, (pappo coronatus,) folium arefactione διαχέεται, (laxum fit,) καὶ οὐ κεντεῖ, iv. 4.

ΣΠΑΛΑΞ. *Class. incert.*

Enumeratur cum Croco et Περδικίῳ, radice magna, carnoſa, i. 11. an id. quod Ασπαλαθός? cujus succus aromaticus, ix. 7.

ΣΠΕΙΡΑΙΑ.

Class. incert.

Spec. ἀνθοκαρπος cum Ερεικα, i. 23. affinis Marrubii, &c.
vi. 1.

ΣΠΟΔΙΑ. Syn. Κοκκυμηλίας.

ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ.

Triandr.

Spica cylindrica, æquali, florens simul per totam spicam, ut
Triticum; nomen ex figura spicæ: enumeratur cum Alopecuro,
vii. 10.

ΣΤΕΛΙΣ.

Class. incert.

Cum Ιξία et Ὑφεατι. de C. Pl. ii. p. 155.

ΣΤΟΙΒΗ.

Syngen.

Foliis carnosiss, i. 16. παρ' ακανθαν ἐτερον εχων φυλλον, a qui-
busdam dicta Φεως, vi. 1. Enumeratur cum Ononidi, Tribolo,
ib.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ.

Class. incert.

Species φυλλακανθωδης: capitulo lævi, ut Σογχος, vi. 3.

ΣΤΡΥΧΝΟΣ.

Pentandr.

Ab aliis Ευηπατον radix edulis cocta et cruda, vii. 6. Var.
tres.

1. Fr. dulci, eduli.

2. Fr. narcotico.

3. Fr. lethali, vel maniam ind. vii. 14.

N. 1. non describitur.

N. 2. Radix recens alba; arefacta rubra: foliis Tithymalli
vires in cortice radicis.

N. 3. Dicta Θρυος, radice magna, intus cava, ix. 12. Hab.
M. Pelion, Ossa, Tegea.

ΣΤΥΡΑΞ.

Monæc.

Enumeratur inter aromata Mediæ et Indiæ. Fructus, vel Gum-
mi solum occurrit, ix. 7.

ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ.

Monæc.

Μητρα σκληροτάτα, utpote et lignum totum; instar Ebeni et Loti, i. 9. arbor decidua, bacca οινώδει, i. 19. flos flamineus, i. 21. εν αυτοις τοις ὅλοις περικαρπιοις; non in apicibus, ουδ' εν τοις περι-ειληφοσι καθ' ἑκαστον, ἀλλ' εν τοις παραμεσον, ib. Textus hic corruptus valde. De fructu tenello Mori, *nigræ* L. cum flosculis fæmineis granulis singulis infidentibus? Comparatur cum Hedera, i. 22. ex ligno *θερμῷ* (vid.) arb. hujus fiunt terebra *πυρρείας*, (vid.) *ικρία* navium, (opera sculptilia,) και *σεφαναι*, v. 7, 8.

1. ΣΥΚΗ.

Polygam.

Amputatione eget, i. 5. *βραχυσελεχης*, *λειοφλοιος*, cortice *μονολοπῶ*: (vid.) lignum carnosum, molle, porosum, i. 8. Medulla carnosā; radix horizontalis, i. 9, 11. lignum trunci sine nodis, i. 13. *πλατυφυλλος*, i. 16. fructus saporis mellei, *οπωδης*, (*spissus*,) ut Papaveris, i. 19. fructificat ex furculis ejusdem anni, i. 23. Cultura eget, ut aliæ fructiferæ spec. i. 22. Serendo degenerat, ii. 3. *προμοσχευεται* ἐπ' αὐτῶν τῶν δένδρων, (inferendo cultæ species propagantur,) *φυτευεται* δε (etiam furculis propagatur, vel ex ramis, vel *κράδαις* trunci, ii. 7.) secunda germinatio *ευδηλος*, iii. 6, 7. Differentia inter *Συκην* et *Κοτινον*, (*sylvestrem* et *cultam*,) iv. 14. Lign. minus obnoxium vermibus, iv. 16. Si truncus scindatur, non perit, iv. 19. lign. *ισχυρον*, v. 7. de C. Pl. l. v. ubi tres differentiæ occurrunt.

1. σ. *Λακωνικη*.2. σ. *Λευκόμφαλιος*.3. σ. *Οπισθοκαρπιος*.De C. Pl. l. v. morbus peculiaris *ψωριασις*, vid.

2. ΣΥΚΗ Αιγυπτια.

Polygam.

Καρποφορει εκ του *σελεχους*, i. 23. habitus prioris; differt tamen modo fructificandi; fructus magn. *ficūs*, *fucco* dulcedine *ολιγδοις* simili, sine granis: *επικνισθεις* (vid.) maturatur citius, arbor *πολυσπος σφοδρα*; lign. utile, si statim submergatur, iv. 2.

3. ΣΥΚΗ Κυπρια.

Polygam.

Species affinis Σ. Αιγυπτιας, sed non fructificans εκ *σελεχους*, ἀλλ' εκ *βλαστοις* *αφυλλοις*, ("spurs;") *δένδρον* *μεγα*, iv. 2.

4. ΣΤΚΗ *Ινδική.**Dodecand.*

Radices agit ex ramis summis, i. 12. Radices hæ terram attin-
gentes sursum sese attollunt, ποιουντες ὥσπερ δρυφρακτον, (sepi-
mentum,) ὥς τε γινεσθαι καὶ θαπερ σκηνην; hoc modo arbor exten-
ditur ἐπὶ δυο σταδια: folia ampla orbiculata, clypei parvi magn.
fructus συκοειδης parvus, iv. 5. Hab. Fluvio Acefine.

5. ΣΤΚΗ *Ποντια.**Mollusc.*

Αφύλλος, μεγεθει ου μεγαλη, iv. 7.

ΣΦΑΙΡΙΟΝ.

1. σφ. πιλος vocat. εριωδες, μάλακον, περι πυρηγος σκληροτε-
ρον, (forf. περιπυρηγιον σκληρ. Ald.) ὃ χρωνται προς τους λυχνους,
iii. 8.

2. σφ. κομην εχον (vid.) αχρειον τ' αλλα, επιβαπτον δε χυλω
μελιτηριω κατα την ἀφην, (morbum cutis, an Lepra?) και γευσιν,
(vid.) ib.

3. σφ. αμισχον, η κοιλομισχον ιδιον και ποικιλον τας γαρ
εσπανηκοτας ομφαλους (εχει) επιλευκους, η επισιγμενους μελανι,
και το αναμεσον κοκκοβαφες, (sensus obscurus; sed ομφαλοι for-
san cancelli) Clathrus, cancellatus hic describi videtur, ib. Vid.
Bull. Fungi.

4. σφ. φυλλικον, συμπεπιλημενον, προμηκες, (super foliis nas-
cens? dense stipatum.)

5. σφ. λευκον, διαυγες (pellucidum) ὕδατωδες ὅταν ἀπαλόν η
(primo statu gelatinosum) τελειουμενον δε σκληρυνεται, ut sæpe fit
in Boletis &c. ib.

ΣΦΑΚΕΛΟΣ.

Diandr.

Inter φρυγανα λαχανηρα fine spinis, cum Ελελίσφακω, Θυμ-
ερα, Κονυζω, vi. 1. Σφακελος, foliis minoribus, odore minus acri,
(Salvia officinalis?) Ελελίσφακος e contra folio majore, odore βα-
ρυτερω. (Vid. not. ad Tab. System.) vi. 2.

ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ.

Polygam.

Hab. in montibus Macedoniæ, cum Ζυγία, iii. 4. spec. sylves-
tris dicitur αναλθη ειναι, iii. 6. ευαυξης, iii. 7. ολιγορριζος, ib.
Spec. tres:

1. σφ. αγρια.
2. σφ. ζυγια.
3. σφ. κλινοτροχος.

N. 1. Lign. inutile.

N. 2. Lign. flavum, ελον, (molle? tortuosum?)

N. 3. Lign. album ευιον, (opp. ελψ, fibris rectis,) foliis omnium lobatis instar Platani, τετανοις, (rigidis?) fed non æque carnosif, iii. 11. apice acuminatis, ib. cortice haud æque lævi ac Tiliæ, &c. υποπελιω, (leviter maculato,) radicibus paucis, horizontalibus. Hab. in locis irriguis circa Idam; flos incognitus: fructus Παλιερε fimilis. N. 3. aliter Γλενος, voc. hyeme cæditur, v. I, 4.

ΣΧΟΙΝΟΣ. }

ΣΧΙΝΟΣ. }

Triandr.

Planta ενυδρος. Species tres:

1. σχ. αρρήν.....οξύς, ακαρπος.

2. σχ. μελαγκρανιος } καρπιμος.
μελαγκρανις }

3. σχ. ολοσχοινος....ευσαρκης, (folio rotundo craffo,) cujus ufus maxime προς πλεγματα, ("platted Rush-work,") κορυνα δε ο καρπιμος, (sc. n. 2.) εξ αυτου του γραμμωδους εξοιδησας, (ex medio scirpi linearis intumescens,) κα'πειτα εκτικτει καθαπερ ωα, η σρογγυλοτητας, επισχαζουσας, (Pericarpia subglobosa apicehiantia,) femen nigrum ακιδωδης, (cuspidi sagittæ simile, triquetrum, acuminatum Linn. G. Pl. 67.) radix longa, craffa, iv. 13.

2. ΣΧΟΙΝΟΣ Καλαμος. Hexandr.

Radix miræ suavitatis. Hab. in Lacu Orchomeni et in Αυλωνι της Συριας, ix. 7. N. B. Σχοινος καμ Καλαμος ut genera diversa notantur. de C. Pl. l. vi.

3. ΣΧΟΙΝΟΣ Λιθινος. Corall.

Haud dignoscendus a Σχοινω ipfo, iv. 8.

T.

TEPEBINΘΟΣ. }
TERMINΘΟΣ. }

Diæcia.

Species duæ : 1. τ. ἀρρήν, ἀκαρπός.

2. τ. θηλεία,

N. 1. Arbor excelsa. Hab. mont.

Macedoniæ.

} fempervirentes, i. 15.

N. 2. Arb. humilis.

φυλλοῖς περι ἓνα μισχόν πλειοσι, (foliis pinnatis, paribus numerosissimis,) κατὰ συζυγίαν ἀγωνιωτερόν τῆς Οἰῆς, (vid. γωνία) τὸ ἐξ ἀκροῦ περιττόν, (folio impari, Bot.) ἀνθεῖ τῷ τῆς Ελαίας? sed coloris rubri. Ligno γλίσχρῳ (vid.) utpote et fructu; fucco refinoso; φερεῖ δὲ κωρυκωδὴ τινὰ κοίλα καδαπερ ἡ Πτελεα, (de amento laxo squamulis ovatis Linn. G. Pl. 1108.) τινὶ ῥήτινωδὲ ἐντος, sed non inde Refina officinarum colligitur, iii. 15. ῥήτινῃ ἀπεπτός λευκῇ, ib. Germinat primo vere, iii. 6. lignum resinofum ad alia inutile, v. 8. Incisione æstate media refina obtinetur. Mons tota in Syria Terebinthis cooperta, ix. 2.

TERMINΘΟΥ ὅμοιος. *Class. incert.*

Similis Τερμινθε, fructu excepto. Fructus amygdaloides, gustu gratus, iv. 5.

TETPAΓΩΝΙΑ. *Pentandr.*

Οψιβλαστότατος· enumeratur cum Aria, iii. 6. sic dictus a forma quadrangulari Pericarpīi, ib.

TETPAΛΙΞ. *Class. incert.*

Cardui species ex ordine loborum folii per paria opposita, Bot. æstate florens cum Ιξινῇ, vi. 3.

ΤΕΥΤΛΟΣ.

ΤΕΥΤΛΟΝ.

ΤΕΥΤΛΙΟΝ.

ΤΕΥΤΛΙΣ.

} *Pentandr.*

Cultura lignescit, i. 15. caulis carnosus, i. 8. radix fusiformis,

i. 9. folia *carnosa*, fucco dulci, i. 16. *επισπορος*, (vid.) vii. 1. *εμ-φλοισσπερμος*, (feminibus membranaceis tenuibus, compressis calyce involutis, Linn. G. Pl. 310.) Var. plurimæ inter cultas, vii. 4. coctione eget ad usus culinariorum, vii. 6, 7.

ΤΙΤΡΙΝΟΝ *ξύλον*. *Class. incert.*

Ex insula *Τυλώ* in Arabia: *βαρυ σφοδρα*: striis in ligno, ut in pelle *Tigridis*. Usus ad baculos, v. 6.

ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΣ. *Dodecand.*

Spec. quatuor: 1. *τ. παραλιας*. 3. *τ. μυρτιτις*.

2. *τ. αρρήν*. 4. *τ. Συριακος*.

omnes communi nomine ut plantæ *πανακεις* cum *Στρυχνω*, sc. οἱ *Στρυχνοί*, καὶ οἱ *Τιθυμάλλοι*, ix. 12. *τ. παραλιας* vocatur *κοκκος*, folio subrotundo; caule magn. *σπιθαμης*; fructu albo, ib. *τ. αρρήν*, folio *Oleæ*; altitudo caulis *διπηχυαιος*, (bicubitalis.) *τ. μυρτιτις*, aliis *τ. λευκος*, folio *Myrti* magn. apice spinoso: ramulis sparsis per terram: fructus vocatur *καρυον*, ix. 12. *τ. Συριακος*, alias *Πανακης*, hab. Syria: vires *φαρμακευτικαὶ σφοδρα*, ix. 8. Hab. n. 1, 2, 3. *Pelion*, *Offa*, *Tegæa*, *Telethrium*, ix. 15.

ΤΙΦΗ. *Triandr.*

Enumeratur cum *Πυρω* ut *πυκνορρίζος*, i. 9. mutatio fabulosa, ii. 5. *πρωῖσπορος* æque ac *Πυρος*, *Ζεια*, *Κριθή*, viii. 1. maturat semen 40 dies μετ' *ἀπανθήσιν*, viii. granum (vel forsan spica) omnium maxime leve, ib.

ΤΙΦΤΟΝ. Vid. *Ιφνον*.

ΤΟΞΙΚΟΣ. Vid. *Καλαμος*.

ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΑ. *Diadelph.*

Enumeratur cum *Ιξία*, ut species gummifera, ix. 1. Gummi sponte fluit, ix. 8. Hab. *Laconia*, ix. 15.

ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ. *Syngen.*

Caule brevi; perianthio magno; barba (*πωγων*) pappo longo, *πολιω*, Bot. vii. 7.

1. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Tetrandr.*

Species fluviatilis, εν ελωδεσι των ποταμων, (in profundis et limosis fluviorum,) folia aquis innatant, in quorum medio fructus: folia similia Πτελεας, pedunculis longissimis: caulis superne crassus, inferne tenuis, εχων αποπεφυκοτα τριχωδη, (stipulas Bot. lineares,) τα μεν πλειστα παραλληλα, (opposita,) τα δε και παραλλαττωντα, (alterna,) το μεν παραβλασημα εστι, ωσπερ καυλος αλλος, (caules secundarii magn. æquales primario,) fructus ater, και σκληρος σφοδρα, iv. 11.

2. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Decandr.*

Provenit in novalibus, iii. 1. εχων παρ' ακανθον φυλλα, (spinis a folio separatis,) vi. 1. spinis ad caules, et in foliis, vi. 3. επετειοκαυλος, (species perennis,) vii. 8.

ΤΡΙΟΖΟΣ. Vid. Ακανθα.

ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ. *Class. incert.*

Planta pharmaceutica decantata ab Homero et Hesiodo. Radix in usu, quæ nocte effodienda est εις παν πρᾶγμα σπουδαιον (antequam res magni momenti aggredienda sit.) Desc. nulla, ix. 21.

ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. *Cryptog.*

Caule Adianti nigri; folia parva admodum, και πυκνα.

ΤΥΦΗ. *Monæc.*

Caulis αδιαφρακτος, (sine nodis,) hab. in Lacu Orchomeni, i. 8. enumeratur cum Σχοινω ιδιωτατον γενος; foliis nullis; radicibus paucis; εχων εις τα κατω την ὀρμην, (profunde radicata,) iv. 11.

Υ.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ. *Hexandr.*

Inter σεφανωτικα. Species duæ:

ὁ. αγρια.

ὁ. σπαρτη.

Flos διαμενει, vi. 7. Hab. in montosis.

ΥΑΝΟΝ.

Cryptog.

Sub terra degit, cum Ασκιω, Ουιτω, fine radice, i. 9, 10.

ΥΛΗΜΑ ΤΙ.

Polygam.

Παθος συμβαινον αυτω ιδιον, (sensibilitas, vel irritatio peculiaris,) εαν τις άψηται των κλωνιων, τα φυλλα, ωςπερ αφαναινομενα συμπιπτει, ετα μετα τινα χρονον αναβιωσκει, και θαλλει. (Descriptio accuratissima του παθους *Mimosæ*, *sensitivæ* L.) folia pinnata, ramis spinosis, iv. 3.

ΥΠΟΧΟΙΡΙΣ.

Syngen.

Inter olera culta κιχωριωδη, vii. 7. foliis lævibus; succo haud æque amaro ac Cichorii: successive floret; semina φοβη (capsula vid.) involuta. Spec. ad usus humanos, vii. 11.

ΥΦΕΑΡ.

Class. incert.

Species parasitica, in arborum truncis. Enumeratur cum Ιξια, ut affinis. Amat meridionale latus; Ιξια προς βορραν, iii. 16.

Φ.

1. ΦΑΚΟΣ.

Diadelph.

Leguminis gen. Indicum, ita a Græcis sub Alexandro magno vocatum, iv. 5.

2. ΦΑΚΟΣ.

Diadelph.

Leguminis gen. οψισπορος, viii. 1. πλαγιοκαυλος: enumeratur cum Erebintho et Οροβω: omnium πολυκαρποτατος, viii. 3.

Spec. duæ: 1. φ. λευκος.

2. φ. μελας.

Prioris semina dulciora, viii. 5.

ΦΑΣΓΑΝΟΝ. Vid. Ξιφιον, vii. 11, 12.

ΦΑΣΚΟΣ.

*Cryptog.*Ὁμοιος τοῖς βραγχίοις ἰχθύων, ("Gills,") *Anne Lichen* ? iii. 9.

ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ. }

ΦΕΛΛΟΣ. }

Monæc.

Cortice aspero, i. 8. *sempervirens*, i. 15. σρεφονται τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, (vid. *Ελαια*, p. 19. et *Lex. Theophrast.*)

Spec. duæ: 1. φ. *Αρκαδων*.

2. φ. *Τυρρηνων*.

N. 2. *arbor decidua*, iii. 16. *cortex duplex*; *exteriore αφαιρομενω* ευθενει το δενδρον, iv. 18.

ΦΕΩΣ.

Class. incert.

Caule et foliis spinosis, vi. 3. *folio carnosio*, cum *Ononide*, *Tribulo* &c. vi. 4.

ΦΗΓΟΣ. Vid. *Δρυς*.

ΦΙΛΑΤΡΑ.

Diandr.

Sempervirens, i. 15. λεπτοφλοιος· σρεφει τα ὑπτια των φυλλων, (vid. *Ελαια*, p. 19.) i. 16.

ΦΙΑΤΚΗ.

Class. incert.

Species sempervirens, i. 15. hab. in mont. *Macedoniæ*, iii. 4. fero germinat, iii. 6. lign. ευεργοτατον, μαλακον, v. 7.

ΦΙΑΤΡΑ.

Polyand.

Lign. ευκαμπτον, i. 8. folia gustu dulcia, fructus autem αξρωτος, i. 20. Καχρυας εχει, (vid. infra) iii. 7.

Spec. duæ: 1. φ. *αερίην*.

2. φ. *θηλεια*.

N. 1. fine fructu; ligno duro, enodi.

N. 2. ανθος καλυκωδες (*apetalus*) παρα τον του φυλλου μισχον, (ex pedunculo folii enascens,) και παρα την εις νεωτα καχρυον εφ' ετερον μισχον, (an de calyce deciduo? *Linn. G. Pl.* 660.)

Fructus pisiformis; pedunculo longo: γωνίαι πεντε, (eminentiis, Angl. "ridges?") οἷον ἰνεσι προεχουσais, femina intus plura, parva; folia subrotundo-acuminata, πλὴν ἐκ προσαγωγῆς μαλλον ἢ περιφέρεια, καὶ τὸ πρὸς μισχὸν κυρτοτάτον, (inferior pars versus basin brevior,) iii. 10. folia margine ferrato, ib. hyeme lign. cæditur, substantia μαλα, (porosa,) v. 4, 6. πρὸς σανιδώματα νεων, (vid.) v. 8.

ΦΛΟΓΙΜΟΝ.

Class. incert.

Forfan ex colore flammeo? οἱ σεφανηπλοκοὶ χρωνται πολὺ ἐκτρέχει τῶν ἀλλῶν, (omnium præcocißimum,) vi. 7.

ΦΛΟΜΟΣ.

Class. incert.

Species Φλομβ, μελαινα dicta. Obiter mentio fit per comparisonem, ix. 15.

ΦΛΟΞ.

Class. incert.

Inter σεφανωτικά αοσµα cum Δίος ἀνθεῖ, vi. 6.

1. ΦΟΙΝΙΞ.

Palmæ.

Amat maris littus, i. 7. ἀπαράβλαστος, i. 13. τραχυφλοιος, ξυλωῖν ὠδεῖ, i. 8. μητρα nulla, i. 9. μονοσελεχος, εἰς μῆκος μόνον ἀυξητικός, (magn. fere æquali,) i. 14. sempervirens, i. 14, 15. καλαμοφυλλος, καὶ γωνιοφυλλος, (vid.) i. 16. εὐδὺς σπέρμα μετὰ τὸ περιέχον, (nucleus immediate infra corticem,) succus fructûs μελιτώδης, i. 19. ἀκροκαρπος, i. 23. propagatur σπέρμασι μόνον, ii. 2, 3. amat arenosa salina. Spec. sex:

1. φ. Βασιλικός.

4. φ. Αἰγυπτίος.

2. φ. Κυπρίος.

5. φ. Κυκας.

3. φ. Βαβυλωνίος.

6. φ. Χαμαιρεφής.

N. B. Dantur etiam species διφυεῖς καὶ τριφυεῖς, (bi-tri-cipites, ii. 8.) Hab. Nafamone juxta Hammonis templum, iv. 3. et Inf. Delos, iv. 14. Decacuminatione moriuntur, iv. 19. lign. in usu ad statuas faciendas, v. 4. lign. ἰσχυρόν, ἀναπαλιν γὰρ ἢ καμψίς, ἡ τοῖς ἀλλοῖς, (de elasticitate ligni?) τὰ μὲν γὰρ εἰς τὰ κατὼ καμπεταί· ὁ δὲ Φοινῖξ εἰς τὰ ἀνω, v. 7. δυσκαπνὸς ἰδίᾳ φύσει, (an

ad ignem concipiendum, vel respectu carbonationis ?) v. 10. methodus propagandi ex spatha. de C. Pl. i.

2. ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΝΤΙΟΣ. *Lithoph.*

Βραχυσελεχης σφοδρα. εκφυσεις ραβδων (ramuli secundarii) ευθειαι & κυκλοθεν, καθαπερ των ραβδων οι ακρεμονες· αλλ' ως εν πλατει, (habitus sursum complanatus, Bot.) κατα μιαν συνεχεις, (serie continua,) iv. 7.

ΦΥΚΟΣ. *Cryptog.*

Nomen generale plantarum marinarum. Dividuntur in προσγεια (littoralia) et ποντια (pelagica :) item in πλατυφυλλα et τριχοφυλλα.

1. Πλατυ τετανοειδες, radice tunicata, hirsuta, iv. 7.
2. Δρυς ποντια, επι λιθοις προσπεφυκυια, sine radice ; ωςπερ λεπαδες ad basin caulis, ib.
3. Ελατη ποντια σαρκοφυλλα ; fed ramis longioribus, ib. v. 20.
4. Αμπελος ποντια, fructu rotundo, uvæ magn. ib. v. Vid. supr.
5. Πρασον ποντιον, affine, n. i. ib. Vid. supr.
6. Έτερον πρασον ποντιον, cujus longitudo bicubitalis ad columnas Herculis, ib.
7. Φυκος βαπτικος. Hab. in littoribus Cretæ, ib.
8. Φ. ωςπερ Μαραθρον, ib.
9. Φ. όμοιον Αγρωσει, caule nodoso, ib.
10. Φ. όμοιον Θριδακιναις, πλην ρυτοδεσερον (rugosiofrem.) spec. acaulis, ib.
11. Συκη ποντια, αφυλλος, μεγαθει & μεγα, coloris φοινικης. Vid. supr. p. 72.
12. Φοινιξ ποντια, ib. N. B. n. 11. inter Molluscas Linn. n. 12. inter Lithophyta ? Vid. supr. p. 79.

ΦΥΛΛΟΝ το. *Class. incert.*

Spec. duæ : φ. αρρενογονον.
φ. θηλυγονον.

X.

ΧΑΛΒΑΝΗ.

Pentandr.

Planta gummosa, cujus odor βαρύς, ix. 7. Gummi vocatur Χαλβανόν, item Γαλβανόν, ix. 1.

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ.

Didynam.

Foliis Quercûs, fragrantibus : species humilis ; vires alexipharmacæ, ix. 10. folia tunsa ulceribus applicantur αργεμασι, (vid.) fructus καθαιρει χολόν, ib. Alt. σπιθαμιαίος.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ.

Syngen.

Affinis Atractylidis, Cnici, &c. & φυλλακανθής, vi. 3.

Species duæ : 1. χ. λευκός.

2. χ. μελᾶς.

N. 1. Foliis Σκολυμβ' ακανῶν (pericarpio) μεγαλῶ' ὅπῳ γλυκεῖ, vi. 3.

N. 2. Foliis similibus, sed minoribus ; radice crassa, coloris flavi ; ὅπῳ βαρεῖ. Hab. in montosis frigidis. Canes et fues necat, ix. 13.

ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. Vid. Φοινῖξ.

ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατός.

Spec. repens ; ἔρπων ἐπὶ τῆς γῆς, ἥ συναπτει.

ΧΑΡΑΚΙΑΣ. Vid. Καλαμός.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ.

Polyandr.

Affinis Heliotropii et Scolymi, ἅμα τῇ Χελιδωνίᾳ ἀνθεῖ· ἡ αἰτία φυσικὴ, ἡ συμπτωματολογικὴ, vii. 14.

ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ.

Syngen.

Inter λαχανα, vii. 11.

Ψ.

ΨΕΤΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Dictamni affinis. Hab. in asperis montium Cretæ, ix. 16.

Ω.

ΩΚΙΜΟΝ. Vid. Οκιμον.

ΩΧΡΟΣ. *Diadelph.*

Species leguminosa, folio longiore, cum Piso, Lathyro, viii. 3.
 επιγειοκαυλος, ib. obnoxius σκωληκι, viii. 10.

Vegetabilia, Græco sermone, fere semper Masculini, vel Feminæi generis ; Fructus autem, Gummi, Succus, aliudve quoddam inde natum, semper Generis neutri. Exempla quæ sequuntur ex Theophrasto, et inter legendum occurrentia, sisto.


ΑΜΥΓΔΑΛΗ, Arb.	KINNAMOMON, Cortex vel
ΑΜΥΓΔΑΛΟΝ, Nux.	Oleum.
ΑΠΙΟΣ, Arb.	KPANEIA, Arb.
ΑΠΙΟΝ, Fructus.	KPANION, Fructus.
ΕΛΑΙΑ, Arb.	MHAEA, Arb.
ΕΛΑΟΝ, Fructus.	MHΛΟΝ, Fructus.
ΕΡΙΝΕΟΣ, Arb.	ΟΥΗ, Arb.
ΕΡΙΝΟΝ, Fructus.	ΟΟΝ, Fructus.
ΙΩΝΙΑ? Planta.	ΠΑΝΑΚΗΣ, Planta.
ΙΟΝ, Flos.	ΠΑΝΑΞ, Succus inspissatus.
ΚΑΡΔΑΜΟΣ, Planta.	ΟΛΙΒΑΝΟΣ? Arb.
ΚΑΡΔΑΜΟΝ, Semen.	ΟΛΙΒΑΝΟΝ, Gummi.
ΚΑΡΥΑ, Arb.	ΡΟΙΑ, Arb.
ΚΑΡΥΟΝ, Nux.	ΡΟΟΝ, Fructus.
ΚΑΣΤΑΝΟΣ, Arb.	ΡΟΔΩΝΙΑ? Planta.
ΚΑΣΤΑΝΟΝ, Nux.	ΡΟΔΟΝ, Flos.
KINNAMOMOS, Arb.	

vegetabilia, Graeco sermone, seu semper Malesia, vel Pe-
 ninsulæ gentes; Indus autem, Guntal, Indus, alius
 quodam inde natus, semper Guntal natus. Exemplum
 quod sequitur ex Theophrasto, et inter legumina even-
 ventis, sibi.

KINNAMOM, Codex vel	AMTTAAH, Arb.
Oleum.	AMTTAAON, Nux.
KTANIA, Arb.	ANIOZ, Arb.
KPANION, Fructus.	ANION, Fructus.
MHAEA, Arb.	KAAIA, Arb.
MHON, Fructus.	KAAON, Fructus.
OTH, Arb.	EPINEOZ, Arb.
GOZ, Fructus.	EPINON, Fructus.
PANAKHE, Planta.	IZIA, Planta.
PANAE, Succus insipidus.	ION, Flor.
QAIKANON, Arb.	KAPKANON, Fructus.
QAIKANON, Guntal.	KAPKANON, Semen.
TOLA, Arb.	KAPTA, Arb.
TOON, Fructus.	KATON, Nux.
POZONIA, Planta.	KAZTANON, Arb.
TOZON, Flor.	KAZTANON, Nux.
	KINNAMOM, Arb.



Pinus Abies L.



Pinus Picca L.



Adiantum



Adiantum

TABULA SYSTEMATICA,
LINNEANA,
PLANTARUM THEOPHRASTI.
TABULA SYSTEMATICA,
LINNEANA,
PLANTARUM THEOPHRASTI.

TABULA SYSTEMATICA

LINNEANA

PLANTARUM THEOPHRASTI

TABULA SYSTEMATICA,
LINNEANA,
PLANTARUM THEOPHRASTI.

Monandria.

'ΑΛΙΜΟΝ. *Salicornia*, *fruticosa* ? iv. 20. de C. Pl. vi.
ΑΜΩΜΟΝ^a. ΑΜΟΜΟΝ ? ix.
6, 7.
ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ^b. *Amomum*,
Cardamomum ? ix. 7.
ΚΟΣΤΟΣ. *Costus*, *Arabicus*,
ix. 7.

Diandria.

ΒΟΥΜΕΛΙΑ. *Fraxinus*, *excel-*

sior, iii. 11. iv. 9.

ΕΛΑΙΑ. *Olea*, *Euroæa*, i. 4, 7,
8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21,
23. ii. 7. iii. 3, 5, 8. iv. 15,
19. v. 4, 5. vi. 2.

ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ^c. *Salvia*, *offi-*
cinalis, vi. 1, 2.

ΚΟΤΙΝΟΣ^d. *Olea*, *sylvestris*, i.
7, 13, 24. ii. 3. iv. 14. v.
4, 9.

ΜΕΛΙΑ^e. *Fraxinus*, *Ornus*, iii.
4, 6, 7, 11. iv. 14. v. 8.

^a Fructus solum inter unguentaria memoratur.

^b Incertum an A. *Cardamomum* L. cujus nulla apud Bauhinum mentio : forf. A. gran. Paradisi Bauh. Pin. 413. An id. cum priore ?

^c *Salvia* L. genus amplissimum, cujus in Syft. Pl. Linn. ed. 3. spec. 32 ; in ed. D. Willdenow, A. D. 1797. 76 enumerantur. Spec. duæ solum apud Theophr. occurrunt, Ελελισφακος et Σφακελος. Flor. Græc. fasc. 1^{mo}. 13. *Salviæ* species accuratissime delineantur. Notandum est *Salvias* scabritie foliorum, nec non odore, adeo inter se convenire, ut non, nisi a Botanicis systematicis, ita subtiliter eas partiri opus fuerit.

^d Nulla specifica differentia inter Ελαιαν et Κοτινον in Syft. Linn.

^e Vid. Flor. Græc. fasc. 1. t. 4. N. B. Nulla mentio Βουμελίας in hoc opere.

ὈΡΜΙΝΟΝ. <i>Salvia, borminum</i>, viii. 1, 7. ΠΕΠΕΡΙ. <i>Piper, nigrum</i>, ix. 22. ΣΦΑΚΕΛΟΣ. <i>Salvia, bortenfis</i>? vi. 1, 2. ΦΙΛΛΥΡΑ^a. <i>Phillyrea, latifolia</i>, i. 8, 15. ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ^b. <i>Veronica</i>, <i>Chamædrys</i>, ix. 10. <i>Triandria.</i> ΑΓΡΩΣΤΙΣ^c. <i>AGROSTIS</i>, i. 10. iv. 11^d. ΑΙΓΙΛΩΨ. <i>Avena, fatua</i>, vii. 7, 8, 9, 11, 12. ΑΙΡΑ. <i>Lolium, temulentum</i>, i. 8. viii. 4. 9.	ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ^e. <i>ALOPEC- CURUS</i>? vii. 10. ΒΡΟΜΟΣ^f. <i>Secale, Cereale</i>, iv. 9. viii. 4, 11. ΔΟΝΑΞ^g. <i>Arundo, Donax</i>, iv. 12. ΕΛΥΜΟΣ. <i>PANICUM</i>, viii. 10. ΖΕΙΑ^h. <i>Triticum, monococcum</i>, viii. 1, 9. ΙΡΙΣⁱ. <i>Iris, Florentina</i>? iv. 6. vi. 7. vii. 12. ix. 7. ΚΑΛΑΜΟΣ. <i>ARUNDO</i>, i. 8, 9, 10, 16. iv. 9, 12. vi. 2. ix. 5. <i>κ. αυλητικός.</i> <i>κ. βομβυκίας^k.</i> <i>κ. επιγίαιος.</i> <i>κ. δοναξ.</i> <i>κ. πλοκίμος^l.</i>
---	--

^a Diosc. Φιλλυρία, unde nomen Latinum; vid. iconem nitidiff. Flor. Græc. t. 2.

^b Inter Veronicas L. extat gen. V. Chamædrys dict. inter Φαρμακώδεις recensetur. (vid. Didynam.) apud Linn. Teucris gen. Chamædrys vocatur.

^c Nomen graminis generale αγρα-στis, (campi vestis,) sed l. iv. 11. spec. paludosa Ægypti describitur.

^d ΑιγίλωνΨ Dioscor. aliud genus. Vid. Fl. Gr. t. 93. Spec. hæc Βρομος Diosc.

^e Ex forma spicæ; sed non Alopecurus Linn. In Fl. Græc. sub nomine Phlei, *criniti*, delineatur spec. cujus spica caudam Vulpinam accurate refert.

^f Bromus Theophr. differt a Bromo L. ut ex descriptione constat. Inter σιτωδεις enumeratur; spica omnium maxime paleacea, viii. 4. Ὁμοισπυρος vocatur, viii. 9. (spica simplici, non paniculata, Bot.)

^g Vid. Καλαμος.

^h Vox Zea occurrit inter syn. Tritici, *Speltæ*, et *Monococci*. Zea monococcos et dicoccos. Bauh. Pin. 21. 22.

ⁱ Iridis spec. octo in Græcia occurrunt; quarum tres barbatae; quinque imberbes: prioribus annumeranda Iris hæc: posterioribus Σισυριγγιον. Vid. Prodr. Fl. Græc. N. B. In fasc. 1^{mo}. Fl. Græc. Irides barbatae, I. *Florentina*, et I. *Germanica*: imberbes, I. *tuberosa*, et I. *Sisyrinchium*, accurate delineantur.

^k In Classi sexta, Bambusa, *arundinacea* L.

^l Arundo, *Phragmitis*.

κ. τοξικός.	ΛΙΝΟΣΠΑΡΤΟΝ. Lygeum,
κ. χαρκαίας.	<i>spartum</i> , i. 8.
ΚΝΕΩΡΟΝ. CNEORUM ? i. 16.	ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ ^c . Cyperus,
vi. 1, 2.	<i>esculentus</i> , iv. 8.
ΚΡΙΘΗ ^a . Hordeum, <i>vulgare</i> ,	ΜΕΛΙΝΟΣ ^f . Panicum, <i>Itali-</i>
i. 9. viii. 1, 2, 3, 4.	<i>cum</i> ?
κρ. δισυχος.	ΞΙΡΙΣ. Vid. viii. 1, 3. An <i>Iris</i> ?
κρ. τρισυχος.	ix 9.
κρ. τετρασυχος.	ΞΙΦΟΣ ^g . } GLADIOLUS, vii.
κρ. πιντασυχος.	ΞΙΦΙΟΝ. } 12.
κρ. ἑξασυχος.	ὈΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. Vid. Σχοῖνος.
κρ. παραβλασικός.	ΟΛΤΡΑ ^h . Hordeum, <i>Zeocriton</i> ?
κρ. εἰσοκριθης. de C. Pl. iii.	viii. 1, 4, 9.
ΚΡΟΚΟΣ ^b . CROCUS, i. 9. vi. 6,	ΠΑΠΥΡΟΣ ⁱ . Cyperus, <i>Papyrus</i> ,
7. vii. 9, 12. ix. 7.	iv. 9. vi. 12.
κρ. ορεινος.	ΠΟΑ ^k . Ποα ? nomen generale.
κρ. ἡμερος.	ΠΟΑ. Spec. palustris, iv. 10.
ΚΥΠΕΙΡΟΣ ^c . Cyperus, <i>longus</i> ,	in Ægypto.
i. 8, ^d 10, 16, iv. 9, 11. ix. 7.	ΠΥΡΟΣ. Triticum, <i>æstivum</i> , i.

^a Hordei culti apud L. species 4: H. *vulgare*, H. *distichon*, H. *hexastichon*, H. *zeocriton*. Gramina hordeacea 4. N. B. Κριθὴ παραβλασικός, forsan Triticum *compositum* L.

^b Croci L. species duæ: sativus et vernus. Var. officinalis a Theophr. sub nomine κρ. ἡμερος indicari videtur. Inter unguentaria aromatica, ix. 7. occurrit; pistillum sc. Extat icon Croci *aurei*, fasc. i. t. 35. Flor. Græc. An. Κρ. ἡμερος Theophr. (vid. καυλὸν ἀνθους,) vii. 9.

^c Cyperi L. spec. quatuordecim, apud Græcos decem. Prodr. Fl. Græc.

^d Ex singulari habitu radicis, i. 10. C. *comosus* Flor. Græc. i. t. 44. innui videtur.

^e Forsan Μαλοναθαλλὰ ex forma tuberis: a Plinio vocatur Malum Anthallium.

^f Forsan Milium *paradoxum*, sed inter σιτωδὴ culta recensetur: nomen ex gustu melleo feminis.

^g Vid. Fl. Græc. t. 37. N. B. Var. occurrit ibi Gladioli, t. 38. labiis inferioribus litteris A. A. signatis. Vid. Athen. Deipnos. 15.

^h Spec. σιτωδὴς ὁμοιοπυρος (spica simplici) apud Homerum ut pabulum equinum occurrit, una cum Κρι (κριθὴ) λευκῇ. A quibusdam Secale, *Cereale* L.

ⁱ Aliis Βίβλος.

^k Vox ποα pro viridi, vel herbacea plantæ parte: quandoque pro gramine in genere.

8, 9, 18. ii. 5. viii. 1, 2, 3,
4, 5, 10, 11.

π. Αλιζανδρείας.

π. Αιγυπτίος.

π. Ασσυρίος.

π. Θρακικός.

π. Καρχηδονίας.

π. Λιβυκός.

π. Ποντικός.

π. Σικελικός.

ΣΙΣΤΡΙΓΧΙΟΝ^a. Iris, *Sisyrinchium*, i. 16. vii. 13.

ΣΙΤΟΣ. Vid. Πυρός.

ΣΧΟΙΝΟΣ. } SCHÆNUS, i. 8.

ΣΧΙΝΟΣ. } iv. 9, 13. ix. 7.

σχ. σχοίνος^b.

σχ. ἑλσχοίνος.

σχ. μελαγκρανιον.

ΤΙΦΗ^c. Triticum, *Spelta*, ii. 5.
viii. 1, 3, 9.

ΦΑΣΓΑΝΟΝ. Iris, *Xiphium*,
vii. 11, 12.

ΦΛΕΩΣ^d. SCIRPUS, iv. 9, 12.

Tetrandria.

ΑΠΑΡΙΝΗ. Galium, *verrucosum*, vii. 8, 14. viii. 8^e.

ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ^f. Plantago,
major, vii. 10.

ΕΡΤΘΕΔΑΝΟΝ. Rubia, *tinctorum*, vi. 1. vii. 19. ix. 14.

ΘΗΛΑΤΚΡΑΝΕΙΑ. Cornus, *sanguinea*, i. 13. iii. 4, 6, 11, 12.

ἸΠΠΟΦΕΩΣ ^g . ἸΠΠΟΦΥΟΝ.	{	Dipsacus,
		<i>Fullonum</i> ?
		vi. 3, 4.
		ix. 14.

ΚΡΑΝΕΙΑ. Cornus, *mas*, i. 9, 13. iii. 4, 6, 7, 12. v. 8^h.

ΚΟΡΟΝΟΠΟΥΣⁱ. Plantago,
Coronopus, vii. 9.

ΚΤΝΩΨ^k. Plantago, *Cynops*,
vii. 8, 10.

^a Extat icon Fl. Græc. t. 42. radice supra fobolifera, ut apud Theoph. vii. 13.

^b Schœnus mariscus ex descriptione. N. B. Holoschœnus usurpatur ut triviale nomen, a Linn. Sc. *mucronatus* solum delineatur, Fl. Græc. t. 43. σχ. μελαγκρανιον incert.

^c Librariorum incuria duo genera confunduntur, Τίφη et Τυφή; quorum posterior Typha *latifolia* L. Vid. Monœc. N. B. In Abyffinia colitur hodie frumenti gen. "Teff" dict. testibus Bruceo et D. Valentia: forsan nativa vox antiquorum.

^d Differt a Φίσφ, planta spinosa: sed forsan textus corruptus.

^e Flor. Græc. t. 133.

^f Ab aliis Στελεφουρος, vii. 10. (Spica cylindrica, vid. Lex. στελεφουρος.)

^g Genus certe spinosum: an affine Φίσφ. vid. Alii legunt Ἰπποφύον. N. B. Dipsacus, *sylvestris*: Διψακος Diosc. Mallem igitur plantam hanc inter incertas numerare.

^h Flor. Græc. t. 151.

ⁱ Nomen ex habitu inditum, foliis radiatim super terram.

^k Forf. Plantago, *Psyllium*. Fl. Græc. t. 149.

ΣΙΣΤΜΒΡΙΟΝ^a. *Sisymbrium*? ii. 5. vi. 6.
ΤΡΙΒΟΛΟΣ^b. *Trapa, natans*,
iv. 11.

Pentandria.

ΑΓΧΟΥΣΑ. *Anchusa, tinctoria*,
vii. 9.

ΑΚΤΗ^c. { *Sambucus, nigra*,
i. 8, 9, 13. iii.
ΑΚΤΕΟΣ. { 6, 13, 14. v.
4.

ΑΜΠΕΛΟΣ. *Vitis, vinifera*, i.
8, 9, 16, 19, 21, 22, 23, 24.
ii. 3, 4, 7. iii. 7. 11. iv. 6, 7,
14. v. 4. ix. 21.

α. αγρία^d.

α. ἡμερῆ.

α. ἰδαία.

α. καπνία.

α. λευκομυαλία.

α. μανομείνα. de C. Pl. i.

ΑΝΗΘΟΝ. { *Anethum, bor-*
tense, i. 17. vi.
ΑΝΗΣΟΝ. { 2. vii. 1, 3. ix.
21.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΙΣ.
ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ.

{ *Chenopo-*
dium, Bo-
nus Henri-
cus, i. 23.
vii. 1, 2, 3,
4, 6.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ^e. *Thapsia, Af-*
clepium, ix. 12.

ΑΦΑΡΚΗ^f. *Rhamnus, Alater-*
nus.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Vid. Χαλβανον.
ΕΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ^g. *Apium*,
graveolens? vii. 6.

ΕΛΙΞ^h. *Hedera, Helix*, iii. 18.
vii. 8.

i. ποικίλη.

i. ποώδης.

i. χλοῖρα.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ. *Heliotropi-*
um, Europæum, vii. 8, 9, 10,
14.

ΘΑΨΙΑⁱ. *Thapsia*? ix. 9,
10, 22.

ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ. *Viburnum, O-*
pulus, iii. 7. iv. 1.

ΘΡΥΑΛΛΙΣ^k. *Verbascum*?

^a *Menthæ species videtur, et idcirco inter Didynamias.*

^b Vox τριβόλος, *Tribulum* terrestrem indicans, occurrit inter Decandrias.

^c Forfan *Samb. racemosa*.

^d Haud satis constat ex desc. an spec. diversæ sub nomine Α. αγρίας et ἰδαίας; folia enim non lobata. N. B. Haud crediderim cum Linn. *Vaccinii* speciem esse.

^e Vox Ασκληπίας; ut trivialis *Panaces*, L. vid. Πανακη: forfan *Asc. vince-toxicum* L. vel potius *Thapsia, Asclepium*, Prodr. Fl. Græc.

^f Forfan *Celastrus Clusii*.

^g Tria occurrunt Σελίνα, quorum duo ex loco natali nominata; Ελειο, Ορεε; N. B. Ἰπποσελίνον, forfan *Selinum palustre* L. et Bauh.

^h An gen. diversum a Κιστῶ? Vid. infr.

ⁱ Sefeli, *turpith*. L. et Bauh. 148.

^k Genus ex orbe novo sub nomine *Thryallis* apud Linn. parum caute enumeratur.

ΙΑΣΙΩΝΗ ^a . <i>Convolvulus, sepium?</i> i. 21.	<i>num</i> , i. 18. vii. 3, 4. viii. 10.
ΪΠΠΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. <i>Ferula, communis</i> , vi. 1.	ΚΩΝΕΙΟΝ. <i>Conium, maculatum</i> , i. 8. vi. 2. ix. 1, 8, 15, 18.
ΪΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ. <i>Smyrnum, olusatrum</i> , i. 15. vii. 6. de C. Pl. v.	ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. (herba) ΑΘΗΑΜΑΝΘΑ.
ΚΑΥΚΑΛΙΣ. <i>CAUCALIS</i> , vii. 7.	λ. καρπιμος.
ΚΗΛΑΣΤΡΟΣ. <i>CELASTRUS</i> , i. 6, 15. iii. 2, 6. iv. 1. v. 8.	λ. ακαρπος.
ΚΗΡΙΝΘΟΝ. <i>Cerithe, aspera</i> , vi. 7.	ΛΙΝΟΝ ^c . <i>Linum, usitatissimum</i> , viii. 7.
ΚΙΤΤΟΣ ^b . <i>HEDERA</i> , i. 4, 15, 16, 22. ii. 1. iii. 6, 18, 20. v. 4. vi. 1. ix. 19.	ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. <i>Atropa, Mandragoras</i> . vi. 2. ix. 10.
κ. λευκη.	ΜΑΡΑΘΡΟΝ ^d . <i>Anethum, Fæniculum</i> , i. 18, 19. vi. 1, 2. vii. 3.
κ. μελαινα.	ΜΗΝΙΑΝΘΗΣ. <i>Menyanthes, trifoliata</i> , iv. 11 ^e .
κ. ιλιξ.	ΝΑΡΘΗΚΤΙΑ ^f . { <i>Ferula, Ferulago?</i> i. 9. vi. 1, 2.
κ. επιγειος.	ΝΑΡΘΗΞ. }
ΚΟΚΚΥΤΡΙΑ. <i>Rhus, Cotinus</i> , iii. 16.	ΟΙΣΟΣ. } <i>Ribes, Grossularia</i> , iii. 17.
ΚΟΡΙΑΝΝΟΝ. <i>Coriandrum, sativum</i> , vii. 1, 3, 4, 6.	ΙΣΟΣ. }
ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ. <i>Cyclamen, Euroæum</i> , vii. 9. ix. 10.	ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ ^g . <i>Athamanta, Oreoselinum</i> , vii. 6.
ΚΥΜΙΝΟΝ. <i>Cuminum, cymi-</i>	ΠΑΛΙΟΤΡΟΣ ^h . <i>Rhamnus, Spina Cbristi</i> , i. 4, 8, 16. iii.

^a Aliis *Aquilegia vulgaris*; sed petalum expresse dicitur *μονον ειναι*. Vid. Dioscor. item Cat. Alph. p. 28.

^b Genus *Hedera* L. spec. duas continet: *H. Helix*, *H. quinque-folia*: var. tamen tres enumerantur: *H. Poetica*, *H. sterilis*, *H. humi repens*. N. B. *H. Helix* Theophrasti, syn. *H. sterilis Bauhini*. *H. επιγειος*, syn. *H. humi repentis* ejusdem: *Hederæ* fructu albo apud Theophr. iii. 18. mentio fit sub nomine *Κιττου λευκης*: de qua inquirendum.

^c Lin. *sativum* Bauh.

^d Forfan var. β. Linn. *Fæniculum vulgare, Italicum*, Bauh.

^e Forfan M. *Nymphæoides*: vid. Prodr. Fl. Græc.

^f Genus ita denominatum ex caule nodoso, fistuloso. Antiqui internodiis caulinis *Ferulæ* vice phialarum utebantur. *Ναρθηξ* major; *Ναρθηκνία* minor.

^g Vid. supr. notam in *Ἐλεοσελινον*.

^h Forf. Rh. *Palmarum* L.

4, 6, 17, iv. 3, 4, 9, 13. vi. 1.	‘ΡΟΥΣ ^z . <i>Rhus</i> , <i>Coriaria</i> , iii. 18.
ΠΑΝΑΚΕΑ ^a . } LASERPITI- ΠΑΝΑΚΕΣ. } UM, ix. 12, 15.	ῥ. ἀρρήν. ῥ. θηλυσ.
π. Ασκληπιας ^b . π. Ἡρακλεια. π. Χειρωνειον.	ΣΕΛΙΝΟΝ ^h . <i>SELINUM</i> ? i. 9, 15, 16, 19. iv. 9. vii. 1, 5. ΣΕΣΕΛΙ. <i>Tordylium, officinale</i> , ix. 15.
ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΝ ^c . <i>Peucedanum, officinale</i> , ix. 15, 22.	ΣΙΛΦΙΟΝ ⁱ . <i>Laserpitium, latifolium</i> , i. 11. iii. 3. iv. 3. vi. 2, 3. vii. 3. ix. 1, 2.
ΠΙΤΥΙΝΗ ^d . <i>Cressa, erratica</i> ? vii. 8.	ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ. <i>Convolvulus, Scammonia</i> , iv. 6. ix. 1, 10, 22.
ΠΤΕΛΕΑ. <i>Ulmus, campestris</i> , i. 13, 16. iii. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14. iv. 7. v. 4, 5, 8. ix. 1.	ΣΚΑΝΔΙΞ ^k . <i>Scandix, Pecten</i> ? vii. 8.
πτ. πτελεια. πτ. ορειπτελεια ^e .	ΣΤΡΥΧΝΟΣ ^l . <i>SOLANUM</i> ? vii. 6, 14. ix. 12, 15, 21.
‘ΡΑΜΝΟΣ ^f . <i>RHAMNUS</i> ? iii. 17. v. 10.	ς. ἡμερος, vel φονικος. ς. μελας, vel ὑπνωτικος. ς. θουρος, vel μανικος.
ῥ. μελαινα. ῥ. λευκη.	

^a Prior forsan planta; posterior gummi. Vid. Obs. ad fin. tab.

^b Vid. Ασκληπιας sup. N. B. π. Ἡρακλεια, *Heracleum, Panaces*. π. Χειρωνειον *Laserpitii spec.*?

^c An *P. officinalis* var. β?

^d *Chamaepetys, incana* forsan *Bauhini*.

^e *Ulmus, campestris* var. nullæ apud Linn. Attamen recenter *Ulmus, Abellisæ* mentio fit Aët. Linn. Lond. v. 9. ex specimine in Herbario Linn. a cl. Prof. J. E. Smith, et in Prodr. Fl. Græc.

^f *Rhamni, cathartici* baccæ nigræ. ‘Ραμνος Græcorum hodie *Lycium, Europæum*. Vid. Prodr. Fl. Græc. 155.

^g Nullæ var. ap. Linn. An spec. duæ?

^h Vid. sup. ‘Ελειοσελινον, &c. forsan *Selinum, sylvestre* L. Anne *Apium, Petroselinum* antiquis notum inter λαχανα?

ⁱ Nulla *Silphii* mentio ap. Linn. forsan ex desc. *Ferulæ spec. F. podiflora*, vel *F. Assafœtida*.

^k Semel occurrit sine desc.

^l Στρυχνου tres species Theophr. tria genera Linn. constituunt: 1. σρ. ἡμερος, *Solanum, Melongena*. σρ. ὑπνωτικος, *Physalis, somnifera*. σρ. μανικος, *Atropa, Belladonna*. Vid. Prodr. Fl. Græc.

TETΡΑΓΩΝΙΑ^a. Euonymus,
Euroæus, iii. 6.

ΤΕΤΤΑΙΟΝ. { Beta, *vulgaris*, i.
 5, 8, 9, 16. vii.
 ΤΕΤΤΑΟΝ. { 1, 3, 4, 6, 7.

ΧΑΛΒΑΝΗ^b. Bubon, *Galbanum*, ix. 1.

Hexandria.

ΑΚΟΡΟΣ^c. Acorus, *Calamus* ?
 i. 22.

ΑΜΑΡΑΚΟΣ. ASPHODELUS,
 vi. 7.

ΑΝΕΜΩΝΗ *Λειμωνία*^d. Narcissus, *Pseudo-Narcissus*, vi.
 7.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΣ. Asphodelus, *luteus*, i. 7. vi. 2.

ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ. { Asparagus,
 ΑΣΦΑΡΑΓΟΣ. { *aphyllus*, i.
 16. vi. 1, 3.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ^e. Asphodelus,
ramosus, i. 16. vii. 9, 11,
 12.

ΒΟΛΒΙΝΗ. Scilla, *unifolia*, vii.
 13.

ΒΟΛΒΟΚΩΔΙΟΝ^f. Bulbocodium, *vernum*, vi. 8.

ΓΗΘΥΟΝ. } ALLIUM, i. 4, 5,
 ΓΗΤΕΙΟΝ. } 16. vi. 1, 3.

ΚΡΙΝΟΝ^g. Liliium, *album*, vi.
 6, 8.

ΚΡΟΜΜΥΟΝ. Allium, *Cepa*,
 i. 8, 10, 16. vii. 2, 3, 4, 5,
 8.

κρ. Ασκαλονικον^h.

κρ. Κνιδιον.

κρ. Σαμοθρακικον.

κρ. Σαρδιον.

κρ. Σησανειον.

κρ. Σχισον.

ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ. ALLIUM, iv. 7.

ΛΑΠΑΘΟΣ. Rumex, *acetosa*,
 i. 8, 9. vii. 1, 2, 3, 4, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝ. vid. *Ναρκισσος*, vi.
 6, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝⁱ *ἑτερον*, vi. 6.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ. Leucodium, *vernum*, vii. 9, 13.

ΜΩΛΥ. Allium, *Moly*, ix. 15.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. NARCISSUS ? vi.
 6, 7. vii. 12.

ΟΙΝΑΝΘΗ. CONVALLARIA,
 vi. 7.

ΟΡΥΖΟΝ. Oryza, *fativa*, iv. 5.

^a Ex forma fructus quadrangulati.

^b Gummi χαλβανον vel γαλβανον.

^c Ex situ cum Cnico, suspicor genus hoc Carduis affine esse, sed ita a Linn. acceptum.

^d *Ανιμωνη*, simpliciter, Anemonem L. indicat; vid. Polyandr.

^e Ασφοδελος et Ανθερικον proxime stant in Syst. Linn.

^f Forfan Narcissus minor L. vel bulbocodium. Datur etiam Ixiæ spec. *bulbocodium* dict. L. Flor. Græc. t. 56. N. B. Omnes (ex voce κωδια) bulbis lanosis, vel gossypinis extus.

^g Genus Crinum L. antiquis ignotum.

^h Ang. "Shallott," sono Græcæ vocis retento. N. B. Haud satis liquet respectu κρ. γησειον, et κρ. σχισον, an All. *ampeloprasum*, et *schænoprasum*.

ⁱ Forfan Narcissus, *Poeticus*, vel *Pseudo-Narcissus* L.

ΠΡΑΣΟΝ. Allium, Porrum, vii.
4, 8.

ΣΚΙΛΛΑ. { SCILLA, i. 7, 10,
ΣΚΤΛΛΑ. { 16. vii. 9, 12.

σκ. Διοσκ. Scilla, *maritima*.

σκ. Επιμανιδεία, Scilla, *Italica*.

ΣΚΟΡΟΔΟΝ^a. Allium, Scorodoprasum, vii. 4, 8.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ^b. Hyacinthus, *comosus*?

Heptandria.

Mirum videbitur nullam Æsculi *Hippocastani* L. apud Theophrastum mentionem incidisse: Clusius refert Constantinopoli Viennam delatam.

Octandria.

ΕΡΕΙΚΗ^c. ERICA, i. 23.

ΚΝΕΩΡΟΝ^d. Daphne, *Cneorum*? i. 16. vi. 1, 2.

κν. λευκον.

κν. μελαν.

ΜΕΛΙΑΣ^e ΣΙΤΟΣ. Polygonum,

Fagopyrum, vii. 14.

Enneandria.

ΔΑΦΝΗ. Laurus, *nobilis*, i. 8, 9, 13, 5, 19, 24.1 iii. 4, 6, 8. iv. 6, 8, 20. v. 3, 4, 8, 10.

ΔΑΦΝΗ^f αγρία, iv. 8.

ΚΑΣΙΑ. Laurus, *gracilis*^g, ix. 4, 5.

ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΣ^h. Laurus, *Cassia*, ix. 7.

ΘΗΣΕΙΟΝⁱ. Rheum, *Rhaponticum*, vii. 11.

Decandria.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ. Arbutus, *Andrachne*, i. 8, 15. iii. 4, 6, 7, 16. v. 8.

α. αγρία.

α. ήμια.

ΒΑΛΑΝΟΣ. ή. Guilandina, *Bonduc*, i. 17. iv. 2.

ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ^k. Dianthus *Caryophyllus*? vi. 1, 6, 7

^a Forfan A. Scorodopras. var. β.

^b Spec. Hyacinthi apud L. 13; quarum 10 Bauhino notæ. Forfan Hyacinthus Theophrasti? H. *Poeticus* L. apud nos frequentissima. N. B. Omnium pulcherrima species in hortis nostris H. *orientalis*, antiquis ignota.

^c Semel occurrit ut frutex apice florifero: nomen usurpatur a Bauhino, Clusio, et Linn.

^d Incertum an Daphne: forfan Cneorum L. Chamælea Bauh. Vid. Triandr.

^e Ex colore grani: forfan P. *Convolvulus*; Convolv. niger Dodon.

^f L. *nobilis* nulla datur var. Spec. hæc Viburnum, *Tinus* Bauh. rectius Viburnum *Lantana*; vid. Prodr. Fl. Græc.

^g Laurus, *Cinnamomum* antiquis ignota.

^h Cortex, vel oleum solum inter unguentaria.

ⁱ Mallem fane Rheum, *palmatum* Thefei nomine insigniri, sed locus natalis prohibere videtur.

^k Aliis Agrostemma *Flos Jovis* L. vel *coronaria* L.

ΚΕΡΚΙΣ. *Cercis, filiquastrum*,
iii. 14.

ΚΟΜΑΡΟΣ. *Arbutus, Unedo*,
i. 8, 15. iii. 16. v. 10.

ΛΥΧΝΙΣ^a. *LYCHNIS*.

ΠΗΓΑΝΟΝ. *Ruta, graveolens*,
i. 4, 15. vii. 2, 4, 5, 9.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΝ. *Gypsophila*,
Struthium.

ΤΡΙΒΟΛΟΣ^b. *Tribulus, ter-*
restris.

Dodecandria.

ΑΕΙΖΩΟΝ. *Sempervivum, ar-*
boreum, i. 16. vii. 14.

ΣΤΚΗ ΙΝΔΙΚΗ^c. *RHIZO-*
PHORA, i. 12. iv. 4.

ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΝ^d. *EUPHOR-*
BIA, ix. 8, 12, 15.

τ. παραλιος.

τ. αργην.

τ. μυρτιτις.

Icosandria.

ΑΜΥΓΔΑΛΗ.	{	<i>Amygdalus,</i>
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ.		<i>communis</i> , i.
		18, 19, 21,
		23. ii. 3. vii.
		12. ix. 12.

ΑΠΙΟΣ. *Pyrus, communis*, 1, 4,
16, 19, 21, 23, 24. ii. 3, 7.
iv. 6, 14, 16.

ΑΡΙΑ. *Cratægus, Aria*, iii. 6,
16. v. 1, 4, 5, 6, 10.

ΑΧΡΑΣ^e. *Pyrus, sylvestri sta-*
tu, i. 7, 24. ii. 3. iii. 4, 6,
7. iv. 14.

ΒΑΤΟΣ^η. *RUBUS*, i. 2, 8, 15,
16. iii. 18.

β. ερδοφους. *R. fruticosus*.

β. χαμαιδατος. *R. Chamæmorus*.

β. κυνιδαιτος. *R. Idæus*.

ΚΑΚΤΟΣ. *Cactus, Opuntia*, vi.
4.

ΚΕΡΑΣΟΣ. *Prunus, Cerasus*,
iii. 13. ix. 1.

1. ΚΟΚΚΥΜΕΛΙΑ^f. *Prunus,*
Laurocerasus ? i. 18, 19, 21,
22. iii. 7. iv. 3.

2. Κ. ΣΠΟΔΙΑ, iii. 7. *incert*.

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. *Cratægus, tormi-*
nalis, iii. 15.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ. *Rubus, Idæus*,
iii. 18. Vid. Βατος.

ΛΑΚΑΘΗ. *Prunus, Mabaleb*,
iii. 4.

ΜΕΣΠΙΑΗ. *MESPILUS*, iii. 12.

^a Ex medulla in caule lucernis apta ?

^b Duo sub nomine τριβολος occurrunt genera. Vid. Tetrand.

^c Incertum an *Rh. conjugata*, vel *gymnorhiza* L.

^d Plurima dantur genera apud antiquos sub nominibus *Tithymalus*, *Efula*, *Apios*, *Peplus*. Vid. Ger. em. 498. Sp. 1^{ma} *Euph. Paralias*: 2^{da} *Euph. Amygdaloides* Dioscor. 3^{ta} *Euph. Myrsinitis*.

^e P. Pyrafter L. P. sylvestris Bauhin. Οχνη.

^f Incertum ex desc. nulla tamen vocis Κοκκυμελιας apud Bauh. vel Clu-
sum mentio. N. B. *Prunus, Laurocerasus* L. Anglice "Laurel" vocatur; Lau-
rus autem nobilis L. "Sweet Bay." Κ. σποδια spec. sylvestris, ignota.

μ. ανθηδων. Cratægus Azarota.

μ. σατανειος. M. Germanica.

μ. ανθηδωνοιδης. Crat. Oxyacantha.

ΜΗΛΕΑ^a. Pyrus, *malus*, i. 4, 8,
9, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24.
ii. 1, 3, 7. iii. 4, 6. iv. 16,
19.

μ. οψια.

μ. ιαρινη.

ΜΥΡΡΙΝΗ. { Myrtus, *commu-*
nis, i. 4, 15,
ΜΥΡΡΙΝΟΣ. { 16, 22, 23,
24. iii. 4, 6, 7.

ΜΥΡΤΟΣ. id. i. 9.

ΟΞΥΑΚΑΝΘΑ. Cratægus, *Py-*
racantha, i. 15. iii. 4, 6. vi.
7.

ΟΥΗ. } Sorbus, *domestica*, ii. 3.

ΟΗ. } iii. 3, 7, 12.

ΠΑΔΟΣ. Prunus, *Padus*, iv. 1.

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. { TORMEN-
TILLA,
ΠΕΝΤΑΠΕΤΗΣ. { ix. 4.

ΠΡΟΤΜΝΗ. Prunus, ix. 1.

ῬΟΔΟΝ^b. } Rosa, i. 15, 22.

ῬΟΔΩΝΙΑ. } vi. 1, 6, 7.

ῤ. πενταφυλλ. vel κυνοροδον. R. *Ca-*
nina.

ῤ. δεκαφυλλ. incert.

ῤ. ιικοσιφυλλ. R. *Cinnamomea*.

ῤ. εκατονταφυλλ. R. *Centifolia*.

ῬΟΙΑ. { Punica, *granata*, i. 4,
8, 9, 14, 16, 19, 21,
ῬΟΑ. { 22, 23, 24. iii. 7. iv.
6, 14. vi. 1

ΣΤΡΟΥΘΙΟΝ. Pyrus, *Cydonia*,
ii 3^c.

ΣΠΟΔΙΑ. vi. 3. Vid. Κοκκυ-
μηλια.

ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατος.

Polyandria.

ΑΚΟΝΙΤΟΝ. Aconitum, *Ly-*
coctonum, ix. 16, 17.

ΑΝΕΜΩΝΗ^d. ANEMONE, vi.
7. vii. 8.

ΑΤΡΑΓΕΝΗ^e. Clematis, *Ori-*
entalis?

ΓΛΥΚΥΣΙΔΗ. Vid. Παιωνια,
ix. 9.

ἙΛΕΒΟΡΟΣ. HELLEBORUS,
iv. 6. vi. 2. ix. 9, 11, 15.

i. μελας^f.

i. λευκος.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ. Capparis, *spinosa*,
i. 6. iii. 3, 5, 1. vii. 8.

^a Pyrus, *malus* statu sylvestri non notatur (Ang. "Crab-tree.")

^b Rosa, *canina* L. Κυνοροδον Theophr. N. B. Vox Ῥοδωνια fere semper *rosetum* indicat, ut et *Ιωνια* violetum; sed quandoque, ut suspicor, plantam ipsam.

^c Στρουθίου genera duo, quorum alterum *Gypsophila*, *Struthium*, L. Vid. Decandria.

^d Vid. Ανιμωνη Λειμωνια Hexandr. sed secundum alios Ανιμωνη simpliciter, *A. hortensis*. Α. λειμωνια, *A. pratensis* vel *nemorosa*.

^e Genus Atragene Linn. apud Bauhin. vocatur Clematis. N. B. Planta hæc forf. Clematis, *Vitalba* L.

^f Icones nitidissimæ plantarum Corollarii Tournefortiani, ab ipso depictæ in Annalibus Musei Hist. Nat. Parisiis nuperrime prodire. Inter has *H. niger*, *Orientalis*, vel *H. niger* Theophrasti accurate delineatur, "foliis Pla-

ΚΙΣΤΟΣ^a. *Cistus*, vi. 2.
 ΛΩΤΟΣ^b. *Nymphæa*, *Lotus*,
 iv. 10.
 ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ^c. *Melitis*,
Melissophyllum.
 ΜΗΚΩΝ. *Papaver*, *Oriente*,
 i. 15, 18, 19.
 ΝΥΜΦΑΙΑ^d. *Nymphæa*, *Nelumbo*,
 ix. 13.
 ΦΙΛΥΡΑ^e. *Tilia*, *Europæa*, i.
 16, 20. iii. 4, 6, 7, 9, 10.
 v. 1, 4, 6, 8.
 ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ. *Chelidonium*,
majus, vii. 14.

Didynamia.

ΑΓΝΟΣ. *Vitex*, *agnus castus*, i.
 4, 21, 22, 23.
 ΑΙΜΑΔΩΡΟΝ^f. *OROBANCHE*?
 viii. 8.
 ΑΜΑΡΑΚΟΣ. *Origanum*, *Ægyptiacum*.
 ΓΛΗΧΩΝ. } *Mentha*, *Pule-*
 ΒΛΗΚΩΝ. } *gium*, vii. 5.

ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Origanum*,
Dictamnus, ix. 16.
 ΕΡΠΥΛΛΟΝ. *Thymus*, *serpyllum*,
 i. 15. vi. 1, 6, 7.
 ΕΥΖΩΜΟΝ^g. *Satureia*, *bortensis*,
 i. 9. vii. 1, 3, 6.
 ΘΥΜΒΡΑ^h. } *Thymbra*, vi.
 ΘΥΜΒΡΟΝ. } 1, 2. vii. 1, 6.
 ΘΥΜΟΝ. *Thymus*, *vulgaris*,
 i. 19. vi. 1, 2. viii. 1, 6.
 ΙΦΤΟΝ. } *Lavandula*, *spica*?
 ΙΦΤΣΟΝ. } vi. 7.
 ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝⁱ. *Euphrasia*,
odontitis? ix. 19.
 ΜΕΛΑΜΠΥΡΟΣ. *Melampyrum*,
arvense, viii. 8.
 ΜΙΝΘΑ^k. *MENTHA*, vi. 7.
 ΟΚΙΜΟΝ. } *Ocimum*, *Basilicum*,
 ΟΚΤΜΟΝ. } i. 9, 16. vii. 1, 2, 3, 6.
 ΟΡΙΓΑΝΟΣ. *Origanum*, *majorana*,
 i. 19. vi. 1.
 δ. λευκη.
 δ. μελαινα.

tani, sed divisuris pluribus," Turcis hod. "Zopteme." Operæ pretium erit descriptionem cel. Desfontaines perlegere, Ann. Mus. A. vi. fasc. 4. p. 278.

^a In ed. Bas. legitur Κιστος.

^b Tres Λωτοι. Vid. Diadelph. et Polygam.

^c Rectius forsan *Melissa*, *officinalis* Didyn.

^d *Nymphæa Lotus* et *N. Nelumbo* spec. ejusdem generis. Nescio an recte nominantur; ambo crescunt in Lacu Orchomeni, et in Nilo fluvio.

^e Vox Φιλύρα Phillyream indicat, duplici λ. Vid. Diandr.

^f Parasitica pl. radici vel cauli adnascens. N. B. Vox *Orobanche* minus proprie a Linn. usurpatur. Vid. Pl. Class. incert.

^g *Eruca* quorundam. Ex suavitate et usu in jure condiendo nomen Græcum. Angl. "Winter Savoury," quod id. significat ac vox Gr.

^h An *Hyssopus*, *officinalis* L. vel *Satureia*, *Thymbra*.

ⁱ Nulla *Κραταιογονου* apud Linn. mentio inter synonyma. Forf. *Melampyrum*, *album* Ger. em.

^k *Menthæ* 14 spec. Linn. Sp. Pl. 204.

ΠΡΑΣΙΟΝ. Marrubium, *album*,
vi. 1, 2.

ΣΗΣΑΜΟΝ^a. Sefamum, *Ori-*
entale, i. 18. viii. 1, 3, 4, 7

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ^b. Teucrium,
Chamædrys ? ix. 10.

ΨΕΤΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. Ori-
ganum, *Ægyptiacum*, ix. 16.

Tetradynamia.

ΓΟΓΓΥΛΙΣ. Brassica, *Rapa*, i.
9, 10. vi. 7. vii. 1, 2, 3, 4, 5,
9.

γ. ἡμικρα.

γ. αγρια. vii. 6.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ^c. Erysimum, *offi-*
cinale, viii. 3, 7.

ἙΣΠΕΡΙΣ. Hesperis, *matrona-*
lis. de C. Pl. vi.

ΚΑΡΔΑΜΟΝ. Sifymbrium, *Na-*
sturtium, i. 19. vii. 1, 4

ΝΑΠΥ. Sinapi, *nigrum*, i. 19.
vii. 1, 4.

ῬΑΦΑΝΙΣ. Raphanus, *sativus*,
i. 4, 9, 10. vii. 2, 3, 4.

ῥ. Καρινθια.

ῥ. Λευθαλασσια.

ῥ. Κλιωνια.

ῥ. Βοιωτικα.

ῬΑΦΑΝΟΣ. Brassica, *oleracea*,

i. 9, 15, 16, 23. iv. 20. vii.
1, 4.

ῥ. κυλοφυλλος, "curled Savoy."

ῥ. λειοφυλλος, "smooth Cabbage."

ῥ. αγρια, *B. arvensis*.

Monadelphia.

ΑΛΘΑΙΑ. Lavatera, *arborea*, ix.
15. 19.

ΕΡΙΟΦΟΡΑ. Gossypium, *arbo-*
reum, iv. 9.

ΜΑΛΑΧΗ^d. Althæa, *officina-*
lis.

Diadelphia.

ΑΡΑΚΟΣ^e. Vicia, *cracca* ? viii.
8.

ΑΡΑΧΙΔΝΑ^f. Lathyrus, *am-*
phicarpus, i. 1. 11.

ΑΦΑΚΗ. Lathyrus, *Arbaca* ? i.
5, 6, 10.

ΔΟΛΙΧΟΣ. Phaseolus, *vulga-*
ris, viii. 3, 10.

ΕΒΕΝΟΣ^g. Ebenus, *Cretica*,
i. 8, 9. iv. 5. v. 4, 5. ix. 22.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ^h. Ervum, *Lens*,
viii. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

ΘΕΡΜΟΣⁱ. LUPINUS, i. 6, 12.
iii. 3. viii. 1, 2, 7, 10.

^a Sefamum inter Σιτωδη Αλωνυμα; semina forsan ad usus culinariorum.

^b Veronicæ species sub nomine triviali *Chamædrys*. Vid. Diandr.

^c Inter plantas *Αρουραιας* cum Sefamo. Forfan *E. barbarea*.

^d Affinitas satis arcta inter *Αλθαϊαν* et *Μαλαχην*. Posterior forsan nominanda *Μαλακη* ex mollitie foliorum.

^e Ex sono vocis forfan Linn. nomen triviale inditum. Var. *Αρακου ομοιος* dict.

^f Error videtur textus; forsan scribendum *Αρακιδνα* ab *Αρακα*, quia habitu affines ambo: occurrit *Αρακου ομοιος* cum *Arachidna*, i. 11.

^g Quare *Ebenus Cretica* L.? antiquis spec. certe nota. Vid. desc.

^h Inter culta *Αρουραια*.

ⁱ Lupinorum apud antiquos mentio frequens in cibis: forfan *L. sativus* flore albo Bauh.

2. ΑΚΑΝΘΑ ΑΦΤΛΛΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.	ΑΦΙΑ. <i>Caltha, palustris</i> , vii. 8.
3. ΑΚΑΝΘΑ, ΔΙΨΑΣ ^a . Spec. ignota, iv. 8.	ΑΨΙΝΘΙΟΝ. <i>Artemisia, Ab-</i> <i>sinthium</i> , i. 19. iv. 6. vii. 9.
4. ΑΚΑΝΘΑ ΙΝΔΙΚΗ. Vid. <i>Ακανθα</i> n. i.	ΕΛΕΙΟΧΥΤΣΟΣ. <i>Caltha, pa-</i> <i>lustris?</i> vi. 7. ix. 21.
5. ΑΚΑΝΘΑ ΚΕΑΝΩΘΟΣ. <i>Serratula, arvensis</i> , iv. 5, 11.	ΗΡΙΓΕΡΩΝ. <i>Erigeron, graveo-</i> <i>lens</i> , vii. 7, 8.
6. ΑΚΑΝΘΑ ΤΡΙΟΖΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.	ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ. { <i>Lactuca, sati-</i> <i>va</i> , i. 16, 19.
7. ΑΚΑΝΘΑ ΉΡΑΚΛΕΙΑ. Spec. ignota, iv. 5.	ΘΡΙΔΑΧ. { vii. 2, 3, 4, 5, 6. ix. 8.
8. ΑΚΑΝΘΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ. vi. 3.	ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ <i>αγρια</i> . <i>Lactuca,</i> <i>sylvestris</i> .
ΑΚΑΡΝΑ. } <i>Carduus, Acarna,</i> ΑΚΟΡΝΑ. } i. 16. vi. 3, 4.	ΙΞΙΝΗ ^e . <i>CARDUUS</i> , vi. 3, 4. ix. 1.
ΑΝΔΡΥΑΛΙΑ ^b . <i>Andryala, inte-</i> <i>grifolia?</i> vii. 7.	ΙΟΝ. } <i>Viola, odorata</i> , i. 15.
ΑΝΘΕΜΙΟΝ ^c . { <i>ANTHEMIS?</i> i. ΑΝΘΕΜΟΣ. { 22. vii. 9, 12, 13.	ΙΩΝΙΑ ^f . } vi. 1, 6, 7. viii. 6.
ΑΤΡΑΚΤΤΑΙΣ. Vid. <i>Ακανθα</i> 1.	<i>ι. λευκη.</i> <i>ι. μελαινα</i> g.
ΑΦΑΚΗ ^d . <i>Leontodon, Taraxi-</i> <i>cum</i> .	KENTATPEA. { <i>Centaurea,</i> <i>Centauri-</i> KENTATPION. { <i>um</i> , i. 19. iv. 6. vii. 9. ix. 1.
	KIXΩΡΙΟΝ. <i>Cichorium, Inty-</i> <i>bus</i> , i. 16. vii. 7, 8, 9, 11.

^a In Lybiæ arenosis, aridissimis; herba prorsus deficiente. N. B. Spec. octo *Ακανθων* huc referuntur, etsi forsitan nonnullæ nihil habeant affinitatis cum *Carduis*, spinis exceptis. A peregrinantibus sedulo investigandæ sunt hæ species.—*Ακανθα* Nov. Test. perperam interpretatur "thorn."

^b Nulla *Andryaliæ* mentio inter synonyma Linn. Forf. *Sonchus, asper* Linn.

^c Forsan *Matricariæ*, vel *Cotulæ*, spec.

^d Datur *Lathyri* species *Αφακη* dict. vid. *Diadelph.* aliis *Απατη* dict.

^e Spec. Gummi mastiche ferens. N. B. *Ixine* Fabii Columnæ. 1.

^f Vid. not in *Ροδωνια* Cl. Icosandr.

^g Purpureo-nigra, "the dark blue double violet," Ang.

ΚΝΙΚΟΣ. } CNICUS? i. 22. vi.	vii. 7, 11.
ΚΝΗΚΟΣ. } 3, 4.	XAMAIAEΩN. CARLINA? vi.
ΚΟΜΗ ῥ. Tragopogon, <i>Orien-</i>	3. ix. 13.
<i>tale</i> ? vii. 7 ^a .	χ. λευκος. C. acaulis.
ΚΟΝΤΖΑ ^b . CONYZA? vi. 1, 2.	χ. μελας. Carthamus, <i>corymbo-</i>
ΚΟΡΚΟΡΟΣ. Hieracium, <i>mu-</i>	<i>pus</i> .
<i>rorum</i> .	XONΔΡΙΛΛΑ ^b . Chondrilla,
ΛΕΤΚΑΚΑΝΘΑ ^c . Onopor-	<i>junceae</i> , vii. 11.
dum, <i>Acanthium</i> , vi. 3.	
ΜΕΛΑΝΙΟΝ. Vid. Iov, vi, 6,	<i>Gynandria</i> .
7.	ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ. ARISTOLO-
ΠΙΚΡΙΣ ^d . PICRIS? vii. 9,	CHIA, ix. 13, 15, 22.
11.	ΑΡΟΝ. Arum, <i>Dracunculus</i> , i.
ΣΚΟΛΥΜΟΣ ^e . Scolymus, <i>Hif-</i>	9, 10. vii. 9, 12.
<i>panicus</i> , vi. 3, 4. vii. 10, 14.	ΒΟΥΚΕΡΑΣ. Ophrys, <i>nidus a-</i>
ΣΟΓΧΟΣ. Sonchus, <i>oleraceus</i> ,	<i>vis</i> ? viii. 8.
vi. 4, 3.	ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ. Arum, <i>macu-</i>
ΣΤΟΙΒΗ ^f . Centaurea, <i>Stæbe</i> ,	<i>latum</i> , ix. 22.
i. 16. vi. 1.	ΕΛΛΕΒΟΡΙΝΗ ⁱ . Serapias,
ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ. Vid. Κομη	<i>Helleborine</i> , ix. 11.
<i>supra</i> , vii. 7.	ΚΥΑΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑ ^k . Arum,
ΤΥΠΟΧΟΙΡΙΣ ^g . HYPOCHÆRIS?	<i>Colocasia</i> , iv. 9. vii. 3.
	ΟΡΧΙΣ ^l . ORCHIS.

^a Κατ' ἐξοχὴν ita dict. N. B. Ex voce κομη, rectius forsan Geropogon, *glaber*. Vid. infra, Τραγοπωγων.

^b Conyzæ Linn. spec. 19. valde affines Erigerontis: in loco natali investigandæ.

^c Spina alba Bauhini.

^d Ita dict. ab amaritudine; nescio an Picris Linn.

^e Radix edulis. N. B. Cynara, *Scolymus* Linn. Angl. "the Artichoke." Theophr. ignota, ut videtur.

^f Genus Stæbe non occurrit apud Linn. sed Bauhinum et Clusium sequor.

^g Bis occurrit inter Cichoracea.

^h Plures Chondrillæ inter pl. affines: Sonchus, Prenanthes, Leontodon, Hieracium, Lapfana, Erigeron, Centaurea. Videant Peregrinatores.

ⁱ Forfan Satyrium.

^k Κυαμος simpliciter Vicia, *faba*. Vid. Diadelph.

^l Inter 32 species Orchidis difficillimum foret feligere; maxime communis, Orchis, *morio* L.

Monœcia.

ΑΙΓΙΑΩΨ^a. Quercus, *Ægilops*, iii. 9.

ΒΑΙΤΟΝ. Amaranthus, *Blitum*, i. 23. vii. 1, 2, 3, 4.

ΒΟΥΤΟΜΟΣ^b. SPARGANIUM? i. 8, 16. iv. 9, 11.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Vid. Ζυγία, iii. 4.

ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. Fagus, *Castanea*, iii. 3, 4, 6, 7. iv. 6.

ΔΡΥΣ^c. QUERCUS, i. 8, 9, 13. 16. iii. 4, 6, 7, 9. iv. 6. v. 5, 6, 10.

1. δ. ἡμεις. q. Robur.

2. δ. αἰγίλωψ. (supr.) q. *Ægilops*.

3. δ. πλατυφυλλος.

4. δ. φηγος. q. *Esculus*.

5. δ. ἀλιφλοιος.

6. δ. φελλος. q. *Suber*.

7. δ. εὑμοδους.

8. δ. οσπρις. q. *Cerris*?

ΕΛΑΤΗ^d. PINUS, i. 6, 8, 9, 13, 15, 16. iii. 8, 10. iv. 1, 6, 7, 19. v. 1, 2, 4, 7, 8. vi. 2. ix. 1.

1. ἀρβην. P. *Abies*.

2. θηλειά. P. *Picea*.

ΖΥΓΙΑ. Carpinus, *Betulus*, iii. 4, 6, 7. v. 1, 4.

ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ, καρυα. CORYLUS, i. 4, 16, 17, 19. iii. 3, 4, 6, 7, 8.

ἡ. ἡμεις. C. *Colurna*.

ἡ. αγρία. C. *Avellana*.

ΘΥΙΑ. Thuja, *arbylla*, i. 15. iii. 6. iv. 1.

KAPTA ^e Ευβοϊκή.	{ Juglans, <i>Regia</i> , iii. 6, 7. iv. 6. v. 5. 8, 10.
KAPTA Περσική.	
KAPTA Βασιλική.	

ΚΛΗΘΡΑ. Betula, *Alnus*, i. 7. iii. 4, 5, 6, 7, 14. iv. 9.

ΚΟΙΞ. Coix, *Lacryma Jobi*, i. 16.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ. Cucumis, *Colocynthis*, i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 6.

ΚΡΟΤΩΝ. Ricinus, *Palma Christi*, i. 16.

ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ. Cupressus, *sempervirens*, i. 8, 9, 13, 14, 15, 16. iii. 3. iv. 3, 6. v. 5.

ΛΕΜΝΑ. Lemna, *triscula*, iv. 11.

^a *Ægilops graminis* spec. v. Polygamia.

^b Spec. affinis Cyperi: non Butomus L.

^c Quercus spec. apud Linn. Sp. Pl. enumerantur 14; inter quas Q. Phellus. N. B. Vox Phellus minus proprie generi novi orbis attribuitur a Linneo, δρ. ἀλιφλοιος forsan αλλοφλοιος, (cortice duplici,) fyn. Q. *Suberis*, εὑμοδους forsan. Q. *Robur*. N. B. An Q. *Ilex* L.?

^d Genus Pinus L. dividitur in species foliis simplicibus Ελατη; et species foliis basi unitis σπαστοφυλλοις, ut Πευκη, Πιτυς. vid.

^e Καρυον neutr. gen. Nux. Vid. not. ad finem Cat. Alph.

ΟΞΥΤΑ^a. *Fagus, sylvatica*, i. 16.
iii. 6, 7. v. 5, 8. vii. 13.

ΟΣΤΡΥΑ. } *Carpinus, Betulus*,
ΟΣΤΡΥΙΣ. } i. 13. iii. 4, 7, 10.
ΟΣΠΡΙΣ. Vid. Δρυς.

ΠΕΤΚΗ^b. *Pinus, Pinea*, i. 6, 8,
9, 13, 15, 16, 19. ii. 2, 3.
iii. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. iv.
1, 6, 19. v. 1, 2, 7, 8, 9. ix.
1, 2.

π. παραλίας. *P. Pinaster*.

π. ἰδαία. qu.

1. ΠΙΤΥΣ. *Pinus, sylvestris*, i. 9,
15, 16, 19. ii. 2, 3. iii. 1, 4,
6, 8, 10. iv. 1, 6, 19. v. 1,
2, 7, 8, 9. ix. 1, 2.

2. ΠΙΤΥΣ Κωνοφόρος. iii. 10.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ. *Platanus, Orient-
talis*, i. 7, 13, 16. iii. 1, 6, 7.
iv. 7, 9, 14, 18. v. 4, 8.

ΠΡΙΝΟΣ^c. *Quercus, Prinus*,
i. 9, 15, 16. iii. 4, 5, 6, 7, 8,
15. v. 7, 8. ix. 4.

ΠΥΞΟΣ. *Buxus, sempervirens*,
i. 8, 9, 13, 15. iii. 4, 7, 15.
v. 4, 5, 7, 8.

ΣΗΜΥΔΑ. *Betula, alba*, iii.
14.

ΣΙΚΤΑ. *CUCURBITA*, de C. Pl.
v.

ΣΙΚΤΟΣ^d. *Cucumis, sativus*,
i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 5, 6,
8, 10. ix. 10, 15.

ΣΙΚΤΟΣ αγριος. *MOMORDICA*,
vii. 10.

ΣΜΙΛΑΞ. *Quercus spec. ita*
ab Arcadibus vocata, iv. 7.

ΣΤΥΡΑΞ. *Liquidambar, styra-
ciflua*, ix. 7.

ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ^e. *Morus, nigra*,
i. 19, 21, 22. v. 4, 5, 7,
8.

ΤΥΦΗ^f. *Typha, latifolia*, i. 8.
iv. 11.

ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ. } Vid. Δρυς.
ΦΕΛΛΟΣ. }

ΦΗΓΟΣ. Vid. Δρυς.

Diœcia.

ΑΙΓΕΙΡΟΣ. *Populus, nigra*, i.
8. ii. 3, 4, 5, 6, 7, 14. iv.
14.

ΑΡΚΕΤΘΟΣ. *Juniperus, com-
munis*, i. 15. iii. 4, 6, 7. iv. 1.
v. 8.

^a Folio rigido acuto, unde nomen.

^b Difficile admodum ex Theophr. verbis distinguere inter Πευκην et Πιτυν: annon prior *P. Pinea* vel *Cembra*? *P. Larix* obscure innuitur i. 15. ubi inter αειφυλλα, πικνης τι γινος occurrit; necesse est igitur aliud genus esse deciduum.

^c Species hæc non enumeratur inter *Quercus* Theophrasti, sed ut genus diversum, foliis utrinque acuminatis.

^d Nulla *Cucumeris Melonis* L. apud Theophrastum mentio, cujus hab. ignotum.

^e Occurrit *Ficus spec.* apud Linneum sub nomine *F. Morus*. Vid. etiam Συκαμινος Αιγυπτια. *Polygam.*

^f Occurrit hîc vox τυφη, vitio textûs, in codd. quibusdam. Vid. Τυφη Triandr.

ΔΑΦΝΗ^a *Ἀλεξανδρεία*. *Ruscus*,
hypophyllum, i. 16. iii. 7.

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ^b. *Myrica*, *Gale*,
iv. 11.

ΙΞΙΑ^c. *Viscum*, *album*, iii. 9,
16. ix. 1.

ΙΤΕΑ. *SALIX*, i. 7, 8. iii. 1, 2,
4, 6, 7, 13. iv. 7, 11, 14, 19.
v. 8, 4.

i. λευκή.

i. μελαινα.

i. ἑλκή.

ΚΕΔΡΙΣ. } *Juniperus*, *Sabina*,
ΚΕΔΡΙΑ. } i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ^d. *Juniperus*, *Oxyce-*
drus, i. 8, 15, 16. iii. 7, 12.
iv. 6, 19. v. 5, 8, 9. ix. 1.

ΚΕΝΤΡΟΜΥΡΡΙΝΗ. *Ruscus*,
aculeatus, iii. 17.

ΛΕΥΚΗ^e. *Populus*, *alba*, i. 16.
iii. 1, 4, 6, 7, 10, 14. iv. 14,
19.

ΛΙΒΑΝΟΣ^f. *Juniperus*, *Lycia*?
ix. 1.

ΜΙΛΟΣ. *Taxus*, *baccata*, iii. 4,
6, 7, 10. iv. 1. v. 8.

ΜΥΡΙΚΗ^g. *Myrica*, *Cordifolia*,
i. 15, 16. iii. 4. iv. 7. v.
6.

ΣΜΙΛΑΞ. *Smilax*, *aspera*, i.
15, 16, 18. vii. 8.

ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ. } *Pistacia*, *Te-*
ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ. } *rebintbus*, i.
15. iii. 4,
6, 15. v.
8. ix. 1, 2.

Polygamia.

ΑΙΓΙΛΩΨ. *Ægilops*, *ovata*, vii.
12. viii. 7, 8.

ΑΚΑΝΘΟΣ^h. *Mimosa*, *Nilo-*
tica, iii. 4. iv. 3. vi. 1.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΥΣ. } *ATRIPLEX*,
ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. } i. 23. vii. 1,
2, 3, 4, 6.

ΕΡΙΝΕΟΣ. *Ficus*, *Caprificus*,
(vid. *Συκή*, p. 22.) i. 24. ii.
3, 4, 6. iii. 6. iv. 14. v. 7.

ΙΣΧΑΙΜΟΣ. *Andropogon*, *If-*
cbænum, ix. 15.

ΚΕΡΩΝΙΑⁱ. *Ceratonia*, *filiqua*,
i. 18, 23. iv. 2.

^a Vide infr. *Κεντρομυρρίνη* ambo sub nomine, *Ruscus* L.

^b *Chamæleagnus* Dodon.

^c *Fructus* *Ιξίως* expresse vocatur diversus a fr. *Ἰφιατος*. Vid. *Class.* incert.
p. 29.

^d *Cedri* species omnes sub genere, *Juniperus* L.

^e Vid. *Αιγείρος* supr. Forfan *Populus tremula* L. nisi *Europæ* frigidioribus
propria.

^f Notam dubitationis adjeci. *Refina* *Juniperi* cujusdam vel *Pinus* antiqui-
tus in usu inter suffimenta. N. B. Vox *λίβανον* (*refina*) solummodo occurrit,
ix. 1.

^g Vid. *Ελεάγνος*.

^h Hodie sub nomine *Acacia* in hortis et alibi; arbor speciosa.

ⁱ Observandum *Ceratoniam* et *Ficum* ordinis *Triæcii*. L.

ΛΩΤΟΣ^a. *Celtis, Australis*, i. 8,

9, 13. iv. 3, 4.

NAPΔΟΣ^b. } *Andropogon*,

NAPTH^c. } *Nardus*, ix. 7.

ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ^d. *Parietaria, officinalis*, i. 11.

1. ΣΥΚΗ^e. *Ficus, Carica*, i. 5, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 23, 24. ii. 3, 7. iii. 6, 7, 17. iv. 2, 6, 14, 16, 19. v. 7.

2. ΣΥΚΗ^f Αιγυπτια. *Ficus, Religiosa*, i. 23. iv. 2.

3. ΣΥΚΗ Κυπρια. ib.

ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ^g. *Acer, campestre*, iii. 4, 6, 7, 11. v. 1, 4.

ΥΑΗΜΑ τι^h. *Mimosa, sensitiva*, iv. 3.

Palmæ.

ΚΟΥΚΙΟΦΟΡΟΣⁱ. An *Cocos*?

iv. 2.

ΚΥΚΑΣ. *Cycas, revoluta*, ii. 8.

ΦΟΙΝΙΞ. *Phoenix, Dactylifera*, i. 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23. ii. 2, 3, 8.

ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. *CHAMÆROPS*, ii. 8.

Cryptogamia.

Filices.

ΑΔΙΑΝΤΟΝ^k. *ADIANTUM*.

ΉΜΙΟΝΟΣ^l. *Asplenium, Hemionitis*, ix. 19.

ΘΗΛΥΠΤΕΡΙΣ^m. *Acrosticum, Thelypteris*, ix. 20.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝⁿ. *POLYPODIUM*.

^a Vid. *Polyand. et Diadelph.*

^b Unguentum Ναρθος folum memoratur. Spec. Graminis diu latens, cujus radix et spica odoratissima. Vid. Act. Reg. Soc. Lond. 1790.

^c Ναρτη unguenti spec. diversa a Ναρθη. Vid. ix. 7. et Ναισον, *Class. incert.*

^d Nomen adhuc servatur apud Græcos hodiernos Περδικακι. Vid. Prodr. Fl. Græc.

^e Vid. *Epinos*, p. 21. N. B. Genus *Ficus*, ordinis Tricæcii, L. Theophrastus recte observat ὅλως πολυειδὲς εἶναι τὸ γένος τῶν Συκῶν. de C. Pl. v. Genus *Ficus* in hac Classe collocatur, etsi proprie Genus Tricæcium. N. B. Συκη Ἰνδικὰ *Rhizophora* L. Vid. *Dodecandr.*

^f Arbor hæc perperam vocatur Συκαμινος, i. 23. Vid. *Class. Monœc.*

^g Forfan A. *Pseudo-Platanus* L.

^h *Mimosa sensitiva* L. etsi sine nomine, descriptione tamen habitus, et præcipue ιδιοτητι του παθους inter plantas Theophrasto notas proculdubio enumeranda est. v. p. 77.

ⁱ An *Cocos* a Κουκι? *Palma, Thebaica*, *Coryphæ* affinis L. Ang. "Doom Tree," Bruce's Trav. v. 45. N. B. Non enumeratur inter sex species *Palmarum*, ii. 8.

^k *Adiantum* genus L. 19 species continens: ex textura folii humorem repellente, nomen Græcum.

^l *Hemionitis* L. Genus novi orbis.

^m Non occurrit Genus *Thelypteris* apud Linn. Planta hæc fronde indivisa (μονοκωλ.) Vid. *Lex. Theophr.*

ⁿ Nomen ex lobis frondis pedes Πολυπόδος referentibus.

ΠΤΕΡΙΣ^a. PTERIS.ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. Adiantum,
Trichomanes.*Musci*.ΦΑΣΚΟΣ^b. Lichen, *pulmona-*
ris.*Algæ*.ΑΓΡΩΣΤΙΣ Ποντια. Zoftera,
marina, iv. 7.ΑΜΠΕΛΟΣ Ποντια. Fucus, *na-*
tans, vel *bacciferus*, ib.ΔΡΥΣ Ποντια, F. *vesiculofus*, ib.ΕΛΑΤΗ Ποντια. F. *Abies ma-*
rina Gmel, ib.ΠΡΑΣΟΝ Ποντιον. F. *nodofus* ?
ib.ΠΡΑΣΟΝ ἑτερον. F. *loreus* ? ib.ΦΥΚΟΣ^c Βαπτικον. F. *palma-**tus*, ib. &c.ΦΥΚΟΣ Θριδακινη. *Ulva*, *Lac-*
tuca, ib.ΦΥΚΟΣ πλατυ, τετανωδης. F.
digitatus, vel F. *polyschides*, ib.ΦΥΚΟΣ Μαραθρον. F. *fænicu-*
laceus, ib.*Fungi*.

ΑΙΔΟΙΟΙΔΕΣ τι. PHALLUS.

ΑΣΚΙΟΝ^d. TUBER, i. 10.ΚΡΑΝΙΟΝ. Lycoperdon, *Bo-*
vista.

ΜΥΚΗΣ. AGARICUS ?

ΠΕΖΙΣ^e. PEZIZA ? de C. Pl.

ΠΙΝΗ. de C. Pl. iv.

ΠΥΞΟΣ. An ΠΥΓΟΣ ?

ΣΦΑΙΡΙΟΝ. PEZIZA^f ? iii. 8.

ΥΔΑΝΟΝ. HYDNUM ?

^a Α. πτερυξ, frons alato-pinnata.^b Καθαπιδρυχος οδονιον in truncis arborum. N. B. φασκος item Galla.^c Ω, βαπτουσιν ερια περι Κρητην. Hinc Latini *fucare* pro tingere.^d In umbra, vel sub terra proveniens.^e Hinc Linnei, et aliorum nomen: synonym. videtur Πυξου apud Ald.^f Quinque enumerantur species fungorum in foliis et truncis arborum crescentium, iii. 8.

ERRATA ET OMISSA.

ΑΜΠΕΛΟΣ, Ἰδαία^a. Vaccinium, *Vitis Idæa*, iii. 17.

ΑΠΑΘΗ. Syn. Αφακής, p. 17.

ΚΑΛΑΜΙΝΘΑ. (vid. Μινθα, p. 14.) de C. Pl. ii.

ΚΕΓΧΡΟΣ^b. CENCHRUS, viii. 1, 2.

ΚΥΔΩΝΙΟΣ. Pyrus, *Cydonea*, ii. 3.

ΜΗΛΕΑ αγρία. P. *Malus*, fyl-

vestri ftatu: Angl, "Crab-tree." de C. Pl. vi.

ΟΙΣΟΣ. Salix, *viminalis*, vi. 2.

ΟΡΜΙΝΟΝ αγριον. Salvia, *Schblarea*. de C. Pl. vi.

ΟΧΝΗ. Syn. Αχράς, p. 12.

ΣΤΡΙΓΞ. Species Arundinis, p. 4.

ΧΑΝΔΡΑΣ. Syn. Χονδριλλας, p. 18.

^a Vid. Αμπελος, p. 7. N. B. Locus natalis περι φαλακρας καλουμινας Ἰδης, iii. 17. saxosis et calvis M. Idæ cacuminibus; utpote et altitudo πυγονιαιος, Vaccinii speciem indicant, non obstante sententia in notula, p. 7. expressa.

^b Rectius Panici spec. cujus semen inter αριυραια et σιτηρα.

PLANTÆ CLASSIS INCERTÆ.

A.

ΑΔΩΝΙΣ. v. *Ονωνις* ?
 ΑΙΓΕΙΠΥΡΟΣ ? ii. 9.
 ΑΚΑΛΥΦΗ ^a. vii. 7.
 ΑΚΑΝΟΣ ^b. ix. 13.
 ΑΚΑΡΝΙΚΟΣ ^c. iii. 18.
 ΑΛΣΙΝΗ. ix. 13.
 ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ ^d. de C. Pl. v.
 ANTIPPINON ^e. } ix. 21.
 ANTIPPIZON. }
 ΑΠΑΡΓΙΑ. vii. 9.

ΑΠΙΟΣ ^f.

ΑΣΙΝΗ ^g. de C. Pl. ii.

ΑΣΠΑΛΑΞ ^h. } i. 11.
 ΣΠΑΛΑΞ. }

ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ ⁱ. ix. 7.

ΑΦΥΛΛΑΝΘΕΣ. vii. 9.

ΑΧΥΝΩΨ ^k.

B.

ΒΑΛΣΑΜΟΣ ^l. ix. 2, 6, 7

ΒΟΛΒΟΣ ^m. i. 10, 16. vii. 2.

^a Spec. *πωδης* cum *Τρυτλιδι*; edulis post coctionem.

^b Vox *ακανος* pericarpium Carduorum indicat; sed semel, ut syn. *Χαμοι-
 λειοντος λευκης*.

^c Forfan *Hederæ* spec. nomen Gentilitium. Vid. *Hederæ* varietates, p. 8.

^d Semel occurrit; *Αναδενδρας* et *Συκη* συντροφαι αλληλαις, ib. An *Parafita*
trunco Ficus innascens?

^e Forfan planta magica, και γαρ αι ποιει ευκλειαν. forma floris ως *μοσχου
 ρίνος*.

^f Videtur *Euphorbiæ* spec. Vid. *Απιος*. *Pyrus, communis*, p. 12.

^g Cum *Έρπυλλω*, ut species repens; an error textus pro *Απαρινη*?

^h Semel occurrit, ubi radix crassa memoratur.

ⁱ Defc. nulla, sed inter *Aromata* vox occurrit: an fructus vel *σπος Ασπαλα-
 κος*. Vid. *Σπαλαξ*.

^k Forfan legendum *Κυνωψ*. Vid.

^l Forfan *Amyris, Gileadensis*, *Encycl. Brit.*

^m Allii L. genus radice bulbosa: vel *Scilla unifolia Falc.* syn. *Βολβινη*.
Hexandr.

ΒΟΛΒΟΣ ^a Εριοφορος. vii. 13ΒΟΤΠΡΗΣΤΙΣ ^b. vii. 8.

Γ.

ΓΛΕΙΝΟΣ ^c. iii. 4.

Δ.

ΔΑΤΚΟΝ ^d Δαφνοειδης. ix. 15,
22.ΔΕΝΔΡΟΝ ^e Τηγρινον. v, 4.
6.ΔΡΥΠΙΣ ^f.

Ε.

ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ ^g. iv. 6.ΕΛΕΙΟΛΕΙΜΩΝΙΑ ^h. vi. 4.ΕΛΕΝΙΟΝ ⁱ. vi. 6, 7.ΕΛΞΙΝΗ ^k. vii. 7.ΕΠΙΜΕΝΙΔΕΙΟΣ ^l. vii. 11.ΕΝΘΟΥΣΙΚΟΝ ^m. vii. 7.ΕΠΙΠΕΤΡΟΝ ⁿ. vii. 8.ΕΥΩΝΥΜΟΣ ^o. iii. 18.

Η.

ΗΔΤΟΣΜΟΣ ^p. vii. 7.

Θ.

ΘΗΛΥΦΟΝΟΝ ^q. ix. 19.

Ι.

ΙΕΣΙΑ ^r. de C. Pl. v.ΙΚΑΜΗ ^s. } iv. 11.

ΙΚΜΗ. }

^a Spec. incognita, Hyacintho Peruviano forsan affinis, cujus bulbus *ιχνη*
το κριον υπο τους πρωτους χιτωνας. vii. 13.^b A quibusdam Bupleurum, *rigidum*.^c Spec. Ζυγίας· εν τη ορει Ζυγία· εν δε πεδιω Γλεις. Vid. Ζυγία Monæc.^d Spec. venenosa, sine desc. forf. Thapsia L.^e Arbor, cujus lignum densum et pulchre variegatum.^f Δρυπιψ usurpatur de fructibus deciduis: vid. Lex. Theophr. Hic planta spi-
nosa designatur. N. B. Vox Drupa, Bot. Bacca, nucleo intus.^g Enumeratur in Catalogo cum Helleboro et Scammonia; forf. Momor-
dica, *Elaterium* L.^h Aliis Λυλειμωνια, palustris planta; textus certe corruptusⁱ Differt ab Helenio L.^k An Polygoni scandentis spec. vel Fumaria claviculata, vel capreolata.^l Nomen triviale spec. Σκυλλας. Vid. Cl. *hexandr*.^m Cum 'Ηδυοσμων enumeratur: anne Thymus, *maslichina* L. ex odore pun-
genti.ⁿ Forfan Alchemilla, *arvensis* L.^o Semel occurrit. Planta fausti ominis, ut nomen indicat. Differt ab Euo-
nymo L. fructus similis Sefami, εν φολω.^p Species tota fragrans, ut videtur, caule sc. et foliis.^q Syn. Σκορπιου. Vid. infra.^r Forf. error textus pr. Ιξια.^s Planta palustris, cum 'Ιπνω: vox derivari videtur ab *ικμας*, humor.

ἵΠΠΟΝ^a. }
ἵΠΠΟΝ. } iv. 11.

ἵΠΠΟΜΑΝΕΣ^b. ix. 15.

ΙΣΧΑΣ^c. ix. 10.

ΙΨΟΣ^d. iii. 6.

K.

ΚΑΔΥΤΑΣ^e. de C. Pl. ii.

ΚΕΝΤΑΥΡΙΣ^f τριόρχις.

ΚΟΚΚΟΣ^g Κνιδίος. ix. 22.

ΚΟΨΙΜΟΣ^h. iii. 15.

ΚΤΝΩΨⁱ. vii. 8, 10.

ΚΩΜΑΚΟΣ^k. ix. 7.

Λ.

ΛΑΚΑΡΑ^l. iii. 7.

ΛΕΙΜΟΔΩΡΟΝ^m. de C. Pl. vi.

ΛΕΙΜΩΝΙΑ. v. ΕΛΕΙΟΛΕΙΜΩ-
νία.

ΛΕΥΚΟΙΟΥⁿ ανθει δένδρον, iv.
9.

ΛΙΒΑΝΩΤΙΣⁿ. } iv. 6. ix. 2,
ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ. } 4, 12.

ΛΙΜΝΩΔΕΣ^o τι.

M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ^p. i. 11. vi. 3.

ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΟΝ^q τι σφο-
δρα.

ΜΗΛΩΘΡΟΝ^r. vi. 1.

ΜΝΑΣΙΟΝ^s. } iv. 9.
ΜΝΑΤΣΙΟΝ. }

^a In aquis nascens, cum priore. N. B. Ex nomine conjicere libet Equifitum L. vel Hippurim indicari.

^b Τιθυμαλλου species, (vid.) si non succus inspissatus.

^c Legitur Ισχας Απιος, vel Ισχας, η Απιος. forf. synon.

^d Desc. nulla, nec apud Botánicos vox occurrit; planta forfan venenosa, ab ιπτω.

^e Vox Syriaca, spec. parasiticam indicans.

^f Forf. species Centauriæ. Vid. p. 17. Ex radice facile distinguenda.

^g Forfan Capsicum, frutescens.

^h Affinis Cratægi fructu rotundo.

ⁱ An Echinops? vel ex forma floris ringenti, Bot. Antirrhini spec. Angl. "Snap-dragon." Vid. Αχυνωψ, p. 26.

^k Arbor fructu aromatico L. Myrobalano affinis. A quibusdam Myristicæ, spec.

^l Forf. Λακαδη. Vid. Icosandr.

^m Ευθυς τη ρίζη παραφθομένην. Parasitica spec. An error textûs pro Αίμαδωρον? Vid. Didyn. Affinis videtur Βουκκρατος, vel potius syn. Λειμωδωρον το Βουκκρας. de C. Pl. v.

ⁿ Arbor Thurifera nondum clare investigata; ab aliis herba: Athamanta, vel Ligusticum.

^o An Hottonia, palustris? Vid. desc. floris et foliorum, Cat. Alph.

^p Laferpitii spec. ut videtur. Vox Æthiopica?

^q An Mangifera, Indica L. item ἡδυκαρπος σφοδρα.

^r Fruticis inermis spec. cum Cisto, et Eruthedano.

^s Vox Ægyptiaca speciem palustrem indicans, cujus nulla in synon. Linn. mentio.

ΜΥΤΑ ^a. vi. 8.
 ΜΥΤΑΚΑΝΘΟΣ ^b. vi. 4.
 ΜΥΔΙΟΝ ^c. vi. ?
 ΜΥΟΦΟΝΟΣ ^d. vi. 1, 2. vii.
 10.

ΜΥΡΡΙΣ ^e.

N.

ΝΑΙΡΟΣ ^f. } ix. 7.
 ΝΑΡΤΗ. }

ΝΗΛΕΙΑ ^g i. 8.

ΝΗΠΕΝΘΕΣ ^h. ix. 15.

O.

ΟΙΝΑΡΟΣ ⁱ. i. 15.

ΟΙΝΟΘΗΡΑ ^k. ix. 21.

ΟΙΝΟΡΑΝΘΗΣ ^l. de C. Pl. vi.

ΟΛΙΒΑΝΟΣ ^m. ix. 4.

ΟΝΟΚΙΧΛΗΣ ⁿ. vii. 10.

ΟΝΟΠΤΥΞΟΣ. De C. Pl. vi.

ΟΞΤΑΚΑΡΠΑ ^o. } iii. 6.
 ΟΞΤΚΑΡΠΑ. }

ΟΡΟΒΑΓΧΗ ^p. de C. Pl. v.

ΟΥΙΓΓΟΣ ^q. } i. 10, 11.
 ΟΥΙΤΟΣ. }

Π.

ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ ^r. vi. 4.

ΠΕΡΣΕΑ ^s. } iv. 2.
 ΠΕΡΣΙΟΝ. }

^a Cum Celastro. Forf. error textus.

^b A quibusdam Asparagus sylvestris: ab aliis 'Ιαποφείας syn. v. p. 6.

^c Arbor quædam glandifera, forsan Quercus species.

^d Inter umbelliferas, cum Ναρθηκί et Μαράθρου.

^e An id. q. Μυρρίνη.

^f Unguentum Ναιρον una cum Ναρτή memorantur. V. Ναρδος, p. 22.

^g Error, ut videtur, pro Ελεία, palustri. Ανδραχνη Νηλεία, ib. pr. A. Ελεία.

^h An succus inspissatus Papaveris, Somniferi, Angl. "Opium," vel Papaveris species? Vires ab Homero decantatæ.

ⁱ Cum Andrachne; si non nomen triviale.

^k Vires ικσατικές; odor vinosus: affinis Στρυχνου, vel Οναγρας Falc^r.

^l Forf. legend. Οινανθης.

^m Mentio fit Gummi, Olibanum. Anne scribendum ὁ Λιβανος? Vid. Λιβανος, p. 21.

ⁿ Cum Cichorio.

^o An error textus? Forfan legendum οξυακανθα, syn. Cratægi?

^p Amplexu et luxuria plantas necat, ut Polygonum, Fagopyrum; minime Orobanche, L. Moldenhauer conjicit vocem hanc gentilitiam esse Ari, Colocasia. V. Tentamen in Theophr. p. 60.

^q Pronuntiandum Vingos. Vox Ægyptiaca. Species sub terra radice tuberosa.

^r Nullibi occurrit. Forf. nomen gentilitium.

^s Non Laurus Persea L. sed forf. Persea arbor; Ger. em. 1606. Forf. το Πισ-
 σιον fructus Amygdali, Persicæ. L.

ΠΙΛΟΣ ^a ? iii. 8.	ΣΜΥΡΝΑ ^l . iv. 6. ix. 1, 2, 4, 7.
ΠΙΤΥΩΝ ^b . vii. 13.	ΣΠΑΛΛΑΞ. vid. Ασπαλαξ.
ΠΙΤΥΙΝΗ ^c .	ΣΠΕΙΡΑΙΑ ^m . i. 23. vi. 1.
ΠΟΛΙΟΝ ^d .	ΣΤΕΛΙΣ ⁿ . de C. Pl. ii.
P.	ΣΤΛΕΓΝΙΣ ^o , vel Σιλίγνις.
ΡΟΔΟΥ ^e ανθει δένδρον. iv. 9.	ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ ^p . vi. 3.
ΡΥΤΡΟΣ ^f . vi. 3.	T.
Σ.	ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ ^q ὁμοιος. iv. 5.
ΣΙΔΗ ^g . iv. 11.	ΤΕΤΡΑΛΙΞ ^r . vi. 3.
ΣΚΟΛΥΜΩΔΗΣ ^h τῆς. ix. 13.	ΤΙΓΡΙΝΟΝ ^s ξυλον. v. 6.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ⁱ . vi. 3. ix. 14.	ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ ^t . ix. 21.
ΣΚΥΘΙΚΗ ^k ῥίζα. ix. 13.	Υ.
	ΤΦΕΑΡ ^u . iii. 16.

^a Incertum an Galla, vel Fungus.

^b Species bulbosa. N. B. Ambo ita dicti ex foliis Pini? Vox Pithyusa occurrit inter syn. Euphorbiæ.

^c An genus diversum? vel forf. Ajuga, *Chamæpitys*.

^d Polium, *Creticum* Bauhin?

^e An Hybiscus L.

^f Certe Cardui affinis genus. N. B. Vox Ritro occurrit inter synonyma Linnei, sc. Echinops, *Ritro*.

^g Planta aquatica. Vid. *Μαστιον*. Pericarpio globoso instar mali granati, unde nomen.

^h Affinis Scolymi Linn. sed lethalis.

ⁱ A quibusdam Genista, sed male; *ακανου* enim mentio. Foliis Cyclaminis; radice revoluta. N. B. Spec. alia aphylla, forf. Ulex. L.

^k Ex dulcedine succûs Glycirhiza videtur innui.

^l Arbor myrrhifera Arabiæ.

^m An Spiræa L? non si licet conjicere ex descriptione.

ⁿ Spec. parasitica in truncis arborum. Cum Visco et Τφιασι.

^o Forfan tritici var.

^p Duo Στρουθιοι occurrunt. 1. Cardui affinis pericarpio lævi, ut Sonchus. Vid. Στρουθιον, p. 12. 2. Pyr. *Cydonia*, sylvestri statu: sic αντι Κυδωνίας Στρουθιον, vi. 3. Apud Varronem enumerantur Mala Struthia, et Mala Cotonea: qu? i. c. 59.

^q Vid. Τερμινθος. Claff. Diœc.

^r An Carduus Eriophorus? vel foliorum habitu affinis planta? N. B. Inter Ericas Linn. nomen occurrit triviale Tetralix.

^s Vid. Δενδρ. Τιγρινον. p. 25.

^t Spec. pharmaceutica ab Homero decantata. An After, *tripolium* L?

^u Cum Στελιδι et Ιξια in truncis arborum.

Φ.	ΦΛΟΓΙΜΟΝ ^c . vi. 7.
ΦΕΩΣ ^a . vi. 3, 4, 5.	ΦΛΟΜΟΣ ^d μελαινα. ix. 13.
ΦΙΑΤΚΗ ^b . i. 15. iii. 4, 6.	ΦΛΟΞ ^e . vi. 6.
	ΦΥΛΛΟΝ ^f το. ix. 18.

^a Planta spinosa, cum Capparide, Ononidi, Πανταδουση. N. B. Vox Φλειως apud Aldum, errore textûs; Φλειως enim Scirpus. vid. p. 6. Apud Falc^r, Papyrus Syriacus. Vox Φειως synonyma apud quosdam Στοιβης. Vid. *Syngeu*.

^b An Rhamnus, *Alaternus* L.? vid. Desc.

^c Ex colore flammeo forsan Erythronium, *Dens canis* L. etiam si libet conjicere ex præcocitate floris.

^d Phlomis Genus L. sed diversum a Φλομω. Obiter notatur in desc. Papaveris nigri. N. B. Φλομος μελαινα Diosc. Verbascum, *sinuatum* L. φλ. λευκη. Verb. *plicatum*. Prodr. Fl. Græc. 150.

^e Inter flores coronarios cum *ἄλως ανθει* an Agrostemma, *flos Jovis* L. N. B. Phlox Linn. Genus novi orbis.

^f Forsan Mercurialis, *perennis*. Spec. duæ; φ. αρρηνογονον, et φ. θηλυγονον; ex forma fructûs διπρω, vel geminata. Vid. Ger. em. p. 333. de Arrenogono et Thelygono.

QUÆ IN REGNI ANIMALIS SEX CLASSIBUS
LINNEI OBITER A THEOPHRASTO
NOTANTUR.

CLASSIS PRIMA.

MAMMALIA.

ΔΟΡΚΑΣ. *Capra, Dorcas*; vel *C. Gazella*.

Hab. Εν τη μη υόμενη γη. (Vid. infr. Πτωξ.)

ΕΛΑΦΟΣ. *Cervus, Elaphus*? an *C. Capreolus*.

Ὡς τα περι τας Ελαφους, αἱ τους Εχεις εσθιουσιν, ὑφ' ὧν τα
αλλα θνησκουσι. de C. Pl. iv.

ἼΠΠΟΣ. *Equus, Caballus*.

Λοφουρος a Theophrasto sæpius vocatur; cauda sc. cristis usitata.
Στελεφουροι e contra, cauda, stipitis instar, cylindrica, æquali; Bos,
Ovis, Cervus.

ΚΥΩΝ. *Canis, familiaris*.

Κυν και Ὑς μονοι των θερμων πολυτοκει, (sc. 12, 15, 20. uno
partu.) de C. Pl. i.

ΛΑΓΩΣ. *Lepus, timidus*.

Τα ιχνη των Λαγων ευοσμοτερα, (the scent lies better) ψε-
κασθεντα μαλακως. Μεταπωρου καιρος κυνηγιας, όταν αἱ οσμαι
των ανδρων ου παρενοχλουσι. de C. Pl. l. vi. Superfætatio Le-
poris occurrit in historia plantarum.

ΠΑΡΔΑΛΙΣ. *Felis, Pardus*.

Solus ευοσμος (odore fragranti delectatur.) de C. Pl. vi. Obser-

vatur a Theophrasto animalia in genere averfari odores. N. B. Species nonnullæ generis Felis L. ευωδεσι delectantur ; e. g. Felis, *Rattus* L. oleo Rhodii, utpote et Felis, *Lutra*.

ΠΤΩΞ. Mus, *Jaculus*.

Εν τῇ μὴ ὑομένη, (in partibus Libyæ ubi pluit nunquam,) ἰδια πλειὼ γινεσθαι· καὶ Πτωκα, καὶ Δορκαδα, καὶ Στρουθιον, iv. 4.

ῚΣ. Sus, *Scrofa*.

Cum Cane ; μουνος των δερμων πολυτοκει, (vid. Κυων.) de C. Pl. iv.

CLASSIS SECUNDA.

AVES.

ΑΕΤΟΣ. Falco, *Cbrysaëtos*.

Mentio fit in plantis magicis colligendis, Αετον φυλαττεσθαι, ix. 9. respectu augurii boni.

ΓΥΨ. Vultur, *Percnopterus*.

Αναιρεται ὑπο των μυρων. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΣ. Picus, *martius*, ix. 9.

Νυκτωρ κελευουσιν ορυττειν τας ῥιζας της Παιωνιας· εαν γαρ οφθῃ ὑπο Δρυοκολαπτου, κινδυνευειν τοις οφθαλμοις, ib.

ΙΚΤΙΝ. Falco, *Milvus*.

N. B. Ex voce αἴσσω conjicere licet Ικτινα inter Falcones rapidi volatûs, locum obtinere.

ΚΙΤΤΑ. Sitta, *Europæa*. de C. Pl. ii. p. 155. B.

Ορυττει η Κιττα θησαυριζομενη τας βαλανους.

ΚΟΚΚΥΞ. Cuculus, *canorus*. de C. Pl. ii. 155. B.

Ου δῃ του Κοκκυγος (φυσις), ει μη ην Ὑπολωις· (vid.) καὶ εἰς την νεοττιαν τα ωα τιθῃσιν.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ. Struthio, *Camelus*, iv. 4.

Εν τῇ μὴ ὑομένη (γῇ) γινεται.

ΥΠΟΛΩΙΣ. *Motacilla, modularis*, vel *Curruca antiquorum*. Vid. sup. Κοκκυξ.

ΧΑΡΤΟΔΡΑ ? }
ΧΑΡΑΔΡΙΑ ? }

Κοπρος ανθρωπου και Χαρτοδρας δριμυτατη, ii. 8. an *Fimus Columbinus* ? *cujus vires notissimæ*.

CLASSIS TERTIA.

AMPHIBIA.

ΕΧΙΣ. *COLUBER* ; nomen Genericum.

Vid. Ελαφος, qui dicitur *Serpentibus vesci*. de C. Pl. iv.

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ. *CROCODILUS*.

Ῥιζα του κυαμου (vid. Κυαμος Αιγυπτια, p. 18.) ισχυρα, και επακανθιζουσα· διο και ο Κροκοδειλος φευγει μη προσκοψη τω οφθαλμω, iv. 10.

ΟΦΙΣ. *COLUBER*.

Αναιρουνται υπο των Σκορπιων. de C. Pl. iv. animal αποτον, (fine aqua vivens,) iv. 4.

Οφεις μικροι σφοδρα, συσπειρομενοι, ("coiled up,") iv. 5.

ΣΑΤΡΟΣ. *LACERTA*. Genus αποτον in aridis Libyæ vivens, iv. 4.

CLASSIS QUARTA.

PISCES.

ΚΑΡΧΑΡΙΑ. *Squalus, Carcharias*.

Ἡ δε θαλαττα (Ερυθρα) θηριωδης, και πλεισους εχει τους Καρχαριας, ωσε μη ειναι κολουμνησαι, iv. 8.

CLASSIS QUINTA.

INSECTA.

ΑΤΤΕΛΑΒΟΣ. *ATTELABUS*.

Καταβρωθεντων των εργων αμπελου, (i. e. *furculis Vitis eros*is,) υπ' Αττελαβων, ii. 4.

N. B. Genus *Attelabus* a Linneo fistitur, S. N. 619.

ΚΑΜΠΗ. *Eruca*. Inter *Lepidoptera*.

N. B. *Metamorphoseων* *Insectorum* clarissima extant indicia apud Theophrastum. de C. Pl. l. v. Αἱ μεταβολαὶ κατὰ τὴν γεννησιν· οἷον ἐπ' αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν καλουμένων *Ψυχῶν*· ἐκ *Καμπῆς* γὰρ *Χρυσάλλης*, (*Chrysalis* vel *Pupa* L.) εἶτ' ἐκ ταύτης ἡ *Ψυχή*, (*Imago* L.) vocantur *τριγωνήσαντα*. de C. Pl. i.

ΚΑΝΘΑΡΙΣ. *Curculio*, *granarius* ?

Επιγίνεται ἡ *Κανθάρης* ἐν τοῖς πυροῖς, viii. 10.

KENTIS. }
KENTRIS. } *Ichneumon* parvum non descriptum.

Εἷσι καὶ ἕτερον γένος τῶν *Ψήνων* (vid.) ὃ καλοῦσι *Κεντίνας*· οὗτοι δ' ἀργοὶ, ὥσπερ *Κηφήνες*, (*Apis*, *mas* L.) τοὺς εἰσδυομένους κτείνουσιν, ii. 9. N. B. De *Ψήνι* *Ficûs* sermo est; forf. *Cynips*, *Pfenès*. L. S. N. 919.

ΚΕΡΑΣΤΗΣ. Inter *Coleoptera*.

Ἰδίον τι περὶ τὸν καλούμενον *Κεραστὴν* συμβαίνει· ἐν τῇ *Ελαίᾳ* γίνεται, ἐν δὲ τῇ *Συκῇ* ἐντίκτει. de C. Pl. v. *Σκωληκας* ἐντίκτομενους πάντας, (*erucas*), εἰς *κεραστὴν* ἀποκαθίσασθαι; φθεγγόνται δ' οἷον *τριγμὸν*, (de *stridore alarum* inter volandum, ib.) de C. Pl. v.

ΙΨ. CYNIPS.

Οἱ *ἰπες*, οἱ ἐν τοῖς κυάμοις ἐγγινομένοι, καὶ ἄλλοι ἐν ἄλλοις, ὥσπερ ἐν τοῖς δένδροις καὶ ξυλοῖς ἐλεχθῇ. N. B. Animal a frequente diversum ex modo victûs, quod sæpe innuitur, viii. 10.

ΚΝΙΨ. APHIS.

Εγγινοῦνται δὲ *Κνίπες* ἐν τισὶ τῶν δένδρων...καὶ δοκοῦσιν ἐκ τῆς ὑγροτήτος συνίστασθαι, τῆς ὑπὸ τὸν φλοιὸν· αὕτη δ' εἷσι *ΓΑΤΚΕΙΑ*· γινοῦνται δὲ καὶ ἐν *λαχανοῖς*, iv. 7.

ONINNOΣ. }
ONISΚΟΣ. } ONISCUS.

Εν καυλοῖς τῆς *Δρυὸς* καὶ *Ελάτης* ποντίας ἐνδεκυκοτές οἱ *Ονιννοί*, καὶ τὸ ὅμοιον *Πολυποδί*, iv. 7.

ΟΝΟΣ. *Oniscus*, *Afellus*.

Πολυποῦν τι, καὶ μελὰν συσπειρομένον εἰς ἑαυτοῦ, (in se circumvolutum,) frequens in *Libyæ arenis*, iv. 4.

ὍΜΟΙΟΝ Πολυποδι. (Vid. supr.) Nereis, vel Scolopendra in Nereide Britannica descripta, in caulibus Fuci Tamariscifolii nidulans, iv. 7.

ΠΡΑΣΙΚΟΥΡΙΣ. Cimex, *prasinus* L. 722.

Εν τοις πρασοις, και εν αλλοις πλειοσι αἱ Πρασικουριδες, vii. 5.

N. B. Hinc forsan vox Anglica, "Lady Cow."

ΣΗΠΑΙ? }
ΣΗΤΑΙ. } Genus ignotum.

Animal noxium quoddam mordens cum Εχει et Φαλαγγιω, (Aranea, *Avicularia* L. vel Tarantula.) Χρωνται Πανακη Χειρωνειω προς τους Εχεις και τα Φαλαγγια, και τας Σητας, και τ'αλλα ἐρπετα, ix. 12.

N. B. Ex voce ἐρπετα licet conjicere Σητας vel Σηπας reptilia quædam. Animal aliud Σης.

ΣΚΟΛΟΠΙΑ. Scolopendra, *Electrica* L.

Γηθουου ριζαις χαιρει, ut colligi potest ex textu corrupto, vii. 11.

ΣΦΟΝΔΥΛΗ. Iulus L.

Ῥιζας δριμειας ουδεν αλλο θηριον ἀπτεται, ἡ δε Σφονδυλη πασων, ix. 14.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ. SCORPIO.

In aridis nascitur. Vid. quæ dicitur de Scorpione et Serpente. v. Οφεις, p. 33.

ΦΑΛΛΑΓΓΙΟΝ. ARANEA.

A. *Avicularia* L. vel A. *Tarantula*, ix. 12. Vid. supr. Σηται.

ΦΘΕΙΡ. Pediculus, *humanus*.

Οἱ Φθειρες συγγενεις εἰσι αίματος· ἐξ οὗ διαφθαρεντος, ἡ γεγενεσις. de C. Pl. ii.

ΨΗΝ. Cynips, *Pfenes* L. L. S. N. 919.

Οἱ δε Ψηνες εκδυονται εκ του ερινεου· γινονται δε εκ των κεγχραμιδων. σημειον δε τουτου λεγουσι, ὅτι επειδαν εκδυωσιν, ουκ ενεῖσι κεγχραμιδες· εκδυονται δ' οἱ πολλοι εγκαταλειποντες, η ποδα η πτερον, ii. 9.

ΨΥΛΛΑ. Tenthredo, *Rapæ?* L. S. N. 926.

Θηρια δε γινεται ταις μεν 'Ραφανισι, Ψυλλαι, vii. 7.

CLASSIS SEXTA.

VERMES.

Mollusca.

ΕΛΜΙΣ πλατεια. *Tænia, lata.*

Ἡ δε ῥιζα της Πτεριδος (vid.) μονον Ἐλμινθα την πλατειαν εκβαλλει· ἡ δ' Ἐλμινθ συμφυτον ενιοις εθνεσιν· εχουσι γαρ, ὡς επιπαν, οἱ Αἰγυπτιοι, ix. 22.

ΙΝΕΣ? *Afcarides, vermiculares?*

Φασι δε μονον (ῥιζαν Ελατηριου) φαρμακον ὑπερ ινων ανω. αυτη μεν ουν ιδιοτης της δυναμεως. N. B. Textus videtur corruptus, ix. 14. Alii legunt ὑπερινον una voce.

ΚΟΧΛΙΑ Συκης.

Animalculum testaceum in truncis arborum; frequens in viridariis, iv. 16. Nescio an descriptum.

ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ Ζωα. TESTACEA.

Mentio fit Οστρακοδερμων in apicibus Fuci, *Serrati*, et *Vesiculosi*. N. B. Serpulæ præcipue, et juniores Cochleæ illic nidulantur. iv. 7.

ΠΟΛΥΠΟΥΣ. ASTERIAS.

Ἡ του Πολυποδιου (vid. Tab. Syft. p. 22.) ῥιζα δασεια, και εχουσα κοτυληδονας (vid. Lex. Theophr.) ὡσπερ αἱ του Πολυποδος πλεκταναι (*Asteriæ tentaculæ*,) ix. 14.

ΠΛΥΣΙΑ. *Laplyfia, depilans?*

Ἡ Σπογγια, και αἱ Πλυσιαι καλουμεναι εν θαλαττα ἑτεραν εχουσι φύσιν, (i. e. Zoophytis, non Plantis adnumerandæ,) iv. 7.

ΣΚΩΛΗΞ. *Lumbricus, terrestris.*

Ad radices 'Ραφανιδων, vii. 5. N. B. Σκωληξ nomen generale Vermium et Erucarum, &c. ut Σκωληξ Μεσπιλου, iii. 12. Σκ. Συκης. de C. Pl. v. &c.

ΣΠΟΓΓΙΑ. SPONGIA.

Cum Πλυσια, ut naturæ a plantis diversæ.

ΣΥΚΗ ποντια. *Alcyonium, Ficus* ?

Αφυλλος· μεγεθει ου μεγαλη, χρωματι φοινικω.

ΤΕΡΗΔΩΝ. *Teredo, navalis*.

Ου γινεται Τερηδων αλλ' εν θαλασση, v. 5. φασι δε Πευκην Ελατης μαλλον υπο Τερηδονος εσθιεσθαι, ib.

ΛΕΠΑΣ. *PATELLA*.

Προσπεφυκυια πετραις· optime, iv. 7.

LITHOPHYTA.

ΜΥΚΗΣ λιθινος. *Madrepora, Fungites*.

Suspiciatur Theophr. ότι αφ' Ηλιου απολιθουνται, iv. 8.

ZOOPHYTA.

ΔΕΝΔΥΦΙΑ κερατινα. *Gorgoniæ, vel Ifidis species*.

Τοις οξοις τραχεα, και επ' ακρου πυρρα· item fragilia, nec igni combustibilia, sed in igne candentia, ut ferrum, iv. 8.

N. B. Ex apicibus cortice nudatis, coccineis, *Gorgonia, Nobilis* indicari videtur.

ΦΟΙΝΙΞ ποντια. *Gorgonia, flabellum* ?

Βραχυσελεχης σφοδρα· εκφυσεσι των ραβδων ευθειαις· κατωθεν κυκλοθεν ως ραβδων· ακρεμονες δ' ωςπερ εν πλατει, καταμιαν συνεχεις, (apices expansi et complanati, partibus inter sese inofculantibus ?)

ΣΧΟΙΝΟΙ λιθινοι. *SERTULARIÆ*.

N. B. Species quædam ramis simplicibus: pluribus ex uno disco.

SYNOPSIS. Alphonse, 1854, p. 10. —
Alphonse, 1854, p. 10. —

TERMINI. Terminis, 1854, p. 10. —
On quodam terminis, 1854, p. 10. —
Terminis, 1854, p. 10. —

ANAL. ANAL. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —

MYTH. MYTH. —
Myth. 1854, p. 10. —
Myth. 1854, p. 10. —
Myth. 1854, p. 10. —

ANALYSIS. ANALYSIS. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —

ANALYSIS. ANALYSIS. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —

ANALYSIS. ANALYSIS. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —

ANALYSIS. ANALYSIS. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —

ANALYSIS. ANALYSIS. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —

ANALYSIS. ANALYSIS. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —
Anal. 1854, p. 10. —

LEXICON THEOPHRASTI.

LEXICON THEOPHRASTI.

LEXICON THEOPHRASTI.

LEXICON THEOPHRASTI.

ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΟΣ. Angiospermus, *Bot.* cujus femina perianthio laxo involvuntur. Vid. Γυμνοσπερμος, vii. 3.

ΑΓΚΥΡΑ. Instrumentum rusticum bi- vel tri-dentatum.

ΑΓΝΩΔΗΣ. Agni, *casti* similis. Vid. Αγνος, Tab. Syft. p. 14.

ΑΓΟΝΙΟΣ. } Vid. Γωνια.
ΑΓΩΝΙΟΣ. }

ΑΓΩΓΗ. Ordinatio ramorum arboris, Angl. "training," i. 14.

ΑΔΡΟΣ. Firmus, validus, crassus : opp. τῷ λεπτῷ, vii. 4.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ. Impossibilitas, δυνασθαι την αδυναμιαν, Græcismus, ix. 19.

ΑΕΠΙΣΠΟΡΟΣ. Vid. Επισπορος, vii. 1.

ΑΘΕΡΩΔΗΣ. Aristatus, *Bot.* vii. 10.

ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ. Tenax, Angl. "tough." de ligno, i. et pass.

ΑΘΡΙΠΕΔΗΣ. Non erofus vermibus, a Θριψ. v.

ΑΘΥΡΟΣ. Forf. αχυρος. Paleaceus, *Bot.* de C. Pl. iv.

ΑΙΓΙΣ. Trunci pars in pinu, ad nodos, tabulis pictoriis, vel scriptoriis usitata, iii. 10. etiam ad clypeos, ib. N. B. Quandoque cor totum trunci. *Mold.*

ΑΙΜΑΣΙΑ. Sepes ex spinis, quæ corpus vulnerant, unde nomen. pass.

ΑΙΝΟΣ. Sine fibris (vid. Ινες,) de ligno. hinc ευῖνος. pass.

ΑΙΡΩΔΗΣ. Loliaceus *Bot.* Lolio infestatus. de segete, v. 5.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ. Oris palatum. de C. Pl. vi.

ΑΙΤΙΑΙ αἰ. Effectus, proprietates, vel "potestates herbarum." pass. Hinc titulus Libri Περὶ Φυτῶν Αἰτιῶν, vel, ut Varro rectius scribit, Περὶ Φυτικῶν Αἰτιῶν, l. i. 5.

ΑΚΑΝΟΣ. Pericarpium vel capitulum in Carduis, &c. &c. etiam Cardui spec. v. p. 25.

ΑΚΑΝΙΖΩ. supr.

ΑΚΑΡΔΙΟΣ. Vid. Καρδια, Bot.

ΑΚΙΔΩΔΗΣ. Triangulari-acutus : similis cuspidis sagittæ ; de forma feminis Σχοινοῦ. Vid. iv. 13.

ΑΚΙΣ. supr.

ΑΚΜΑΙ αἱ. Tempora convenientia. Αἱ ακμαι πρὸς τὴν τομὴν, "the exact season," v. 1.

ΑΚΝΙΣΟΣ. Scaber, non rufus. Σωμα ακνισον. de C. Pl. ii.

ΑΚΟΝΑΙ αἱ. 1. Rupes calcariae ; ab ακονη, cos, "a whetstone," ix. 16. 2. Nomen loci.

ΑΚΟΠΟΣ. Vermibus intactus. de vestibis, feminibus &c. iv. 4. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΑΤΗΣ. 1. Immoderatus, p. 2. immixtus, crudus : γῆ ἀκρατής. de C. Pl. v.

ΑΚΡΕΜΟΝΕΣ οἱ. Rami majores, vel superiores, i. 4.

ΑΚΡΟΔΡΥΤΑ τα. Fructus spec. quæ putamine teguntur Cass. Bass. ῥοῖα, πισαχία, κασανα. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΟΥ. ἐξ ἀκρ. περιττον. de folio pinnato, impari Bot.

ΑΚΡΟΠΡΙΖΟΣ. Radice horizontali Bot.

ΑΚΤΙΝΟΣ. Sambucinus. Vid. Ακτῆ.

ΑΚΥΛΟΣ. Ilicis glans, ii.

ΑΛΕΑ. Calor Solis. de C. Pl. i.

ΑΛΕΕΙΝΟΣ. Calidus, foli expositus : opp. τῷ ψυχρῷ.

ΑΛΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine tunicis. Vid. Λεπίς, vii. 4.

*ΑΛΙΚΟΙ οἱ. Paludes falsæ, iv.

*ΑΛΙΚΩΔΗΣ. Supr. ix. 12.

*ΑΛΙΦΛΟΙΟΣ. Cortice, gustu salino ? N. B. Spec. Quercûs, ita vocatur, sed forf. error textûs pro αλλοφλοιος, pro cortice duplici Q. Suberis L. alii ab ἄλις.

*ΑΛΚΥΩΝΙΔΕΣ οἱ. Dies Halcyonis. Vid. Myth. Antiq. ix.

*ΑΛΜΑΙ αἱ. Vid. αἱ ἄλικοι, supr.

ΑΛΦΟΣ. Scabies ; morbus cutaneus in pecoribus, div. a ψωρα, ix. 12.

ΑΜΑΞΑ μονοτροφος, vel μονοτροχος. Currus rota unica ; an manibus accommodata, c. g. "a wheel-barrow?" v. 8.

ΑΜΒΛΩΣΙΣ οφθαλμων. Abortio gemmarum, Bot. iv.

ΑΜΒΛΩΨ. Morbus ipse, ib.

ΑΜΕΝΗΝΟΣ. Debilis, periturus ; αμενηνα σπερματα, iii.

ΑΜΕΡΓΩ. Succo privo ; όταν αμερσωσι τον καρπον, ix. 8.

ΑΜΟΡΓΑ. Amurca : Olei expressi recrementum. de C. Pl. vi.

ΑΜΗΣ. Placenti genus. de C. Pl. vi.

ΑΜΙΣΧΟΣ. Vid. Μισχος.

ΑΜΦΑΥΞΙΣ. } Intumescencia
ΑΜΦΙΦΥΑ. } in trunco Abietis post decacuminationem. Vid. desc. accuratam, iii. 8.

ΑΜΦΙΕΡΓΟΣ. Inutilis ; de solo fationi inepto præ humore. de C. Pl. iii.

ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ῥιζῶν. *Hort.* "the uncovering the roots." de C. Pl. iii.
 ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΙΣ. Exhalatio.
 ΑΝΑΛΟΓΟΝ. adv. Pari ratione, viii. 5.
 ΑΝΑΚΛΑΣΙΣ. Actio circumvertendi, ανακλασις προς τον ἥλιον, i. 16.
 ΑΝΑΚΑΥΛΟΣ. Caulis secundarius; οἱ του βολβου ανακαυλοι, i. 10.
 ΑΝΑΣΤΗΜΑ. Incrementum fursum, vel altitudo plantæ, ix. 10.
 ΑΝΑΤΡΕΠΩ. *Agric.* Solum evertō: ανατρεπειν κυαμους, "to plough in the crop," viii. 9.
 ΑΝΔΗΡΟΙ οἱ τειχῶν. Propugnacula, "the ramparts," vii. 14.
 ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ Inefficiens, ix. 17.
 ΑΝΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine incremento. de C. Pl. iv.
 ΑΝΘΕΡΙΚΟΝ. 1. Planta. 2. Pericarpium in Liliaceis, vii. 12.
 ΑΝΘΗΛΗ. Panicula *Bot.* de Arundine; Cypero, *Papyro*, &c. iv. 11, 12.
 ΑΝΘΗΡΑ τα. Tempora florendi. de C. Pl. iii.
 ΑΝΘΙΚΩΣ. adv. ab ανθος, viii. 9.
 ΑΝΘΡΑΞ. Carbo lignarius, "charcoal." Antiqui artem carbonandi apprime callebant, v. 10.
 ΑΝΘΩΔΕΣ ανθος. Flos compo-

situs, *Bot.*
 ΑΝΙΜΑΩ. Aquam e puteo haurio, ἱμαντι, (fune coriario,) sc. machina quadam, iv. 17.
 ΑΝΙΩΔΗΣ. Gustu ingratus, vel odore. de C. Pl. vi.
 ΑΝΟΖΟΣ. Vid. οζος.
 ΑΝΤΙΔΙΗΡΗΜΙΝΟΣ. Separatus a se invicem. Plantæ αντιδιηρημεναι καθ' ἑκαστον (quæ sub genere communi specialiter discriminantur.)
 ΑΝΤΙΑΜΒΑΝΩ. 1. Succedo. 2. Sustento.
 ΑΝΤΙΑΨΙΣ. Fulcrum.
 ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΩ. Pono vice alius, ix. 9.
 ΑΝΤΩΘΕΩ. Vi elastica repello. N. B. Opp. ενδιδοναι, recedere, v.
 ΑΝΩ καθαρειν. Vomitus excitare, ix. 10.
 ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ αἱ αερος. Vicissitudines aeris, iii.
 ΑΞΑΡΙΚΟΙ. Granaria.
 ΑΠΑΛΛΑΤΤΩ. Eneco, ix. 15.
 ΑΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. Vid. Παραβλαστος.
 ΑΠΕΜΦΕΡΗΣ. Dissimilis. Vid. Εμφερης, vii. 8. p.
 ΑΠΕΡΑΣΙΣ. Imperfectio. de C. Pl. i.
 ΑΠΕΡΥΣΙΒΩ. Rubiginem genero. de C. Pl. v.
 ΑΠΕΡΙΤΤΩΤΟΣ. Vid. Περιττωμα. de C. Pl. vi.
 ΑΠΕΥΚΟΣ. Non resinofus, iii.
 ΑΠΕΧΟΜΕΝΟΙ οἱ παρ Ινδοις. Brachmani, iv. 5.

ΑΠΗΡΩΤΟΣ. Non mutilatus. de ligno. de C. Pl. iii.

ἈΠΛΟΣ. Simplex. ἅπλον ανθος, an de structura monopetala, vel de flore concolore? Alibi ἅπλον τοις ειδεσι.

ΑΠΙΚΜΑΩ. Exsicco, humorem (ικμαδα) abstergo. de C. Pl. iv.

ΑΠΟΚΑΥΛΟΣ. Non regermians? ut Abies, &c.

ΑΠΟΚΛΙΝΩ. Deorsum tendo, vi. 2.

ΑΠΟΚΙΤΤΟΜΑΙ. Habitum hederæ amitto: sc. respectu formæ foliorum.

ΑΠΟΚΛΥΖΩ. Aquam copiose perfundo.

ΑΠΟΛΗΨΙΣ. Absorptio. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΛΟΧΜΟΩΜΑΙ. Fruticesco, vi. 6.

ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ. Secernor; όταν αποκριθῇ το ὑδατωδες. de C. Pl. vi.

ΑΠΟΜΑΓΜΑΤΑ δακτυλιων, "the paring of the nails." de C. Pl. vi.

ΑΠΟΡΙΑΙ αἱ. Quæstiones solvendæ. "Quere's." de C. Pl. iv.

ΑΠΟΡΡΟΗ ανθων. "A blight:" item απ. βλασησεως. de C. Pl. v.

ΑΠΟΠΡΕΜΝΟΣ. Vid. Πρεμνος, ii. 7. ramus minor?

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ αἱ. Hort. Intervals. de C. Pl. iii.

ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΩ. } De uvis
ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΟΟΜΑΙ. } arefac-

tis in arbore. de C. Pl. ii. Vid. Ασταφιδες.

ΑΠΟΣΤΙΦΩ. Condensio. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΤΙΚΤΩ. Demo. Fructum amitto. de C. Pl. v.

ΑΠΟΤΙΣ γη. Ubi aqua deficit. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΦΥΣΙΣ. Aliquod adnatum extus. αποφυσεις καυλων in Carduis, (pedunculi foliorum decurrentes, amplexicaules Bot.) Vid. Ὑποφυσεις.

ΑΠΟΧΥΣΙΣ. Effluvium, vel jactura succi in plantis, όταν ὁ Σκωληξ εσθιει τον καλαμον του Πυρου, εκκιαζεται την αποχυσιν, viii. 10.

ΑΠΟΨΙΔΩΣΕΙΣ αἱ, αμπελου. Hort. "the thinning out the branches."

ΑΠΥΡΗΝΟΣ. Vid. Πυρην.

ΑΡΑΧΝΙΟΝ. Morbus Oleæ proprius. N. B. Nidus forsan animalculi cujusdam textorii. de C. Pl. v.

ΑΡΓΙΛΟΣ. Argilla, gustu amara. de C. Pl. vi.

ΑΡΤΟΣ. Crudus, ix. 4. de terra, incultus, "fallow" Angl.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ὡς αριθμος, Prov. de magno numero, vii. 2.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Arcturus. Stella primæ magn. Sideris Arctophylacis vel Bootis: sc. in cauda Uræ majoris. N. B. Tempora anni notantur ortu et occasu hujus stellæ, utpote

et Caniculæ et Pleiadum.

μετ' Ἀρκτουρον, μετα Κυνα.
Accuratiorem qui velit hujus
rei notitiam, adeat Gemini
Observationes Astronomicas,
vel Calendarium Theophrasti
Hist. Plant. accommodatum
in Opere miscellaneo^a, cujus
mentionem feci.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ. Inter segetes cref-
cens, fativa planta, vii. 7.
et passim.

ΑΡΟΤΟΙ. Tempora feminandi.

N. B. Τρεις ώραι του σπορου
apud Theophrast.

1. περι Πλειαδος δυσιν, (m. Oc-
tobri.)
2. Ηρος αρχομενου, (m. Mar-
tio.)
3. Αροτος Θερινος, (m. Julio.)
viii. 1.

ΑΡΡΑΓΗΣ. Compactus, sine ri-
mis vel fissuris. de ligno, v.
5.

ΑΡΡΗΝ. Mas. N. B. Plantæ a
Theophrasto in ἀρρήνας et
θληείας quandoque dividun-
tur; nulla differentia sexuali:
v. g. Ελάτη, Κρανεία. Spec.
robustior, et quæ tarde fruc-
tificat, ἀρρήν vocatur, et con-
tra, θληεία. Sexualis distinctio
occurrit in Φοινίκι, et alibi,
ii. 8.

ΑΡΤΙΟΣ. de plantis adultis et
perfectis.

ΑΡΧΙΝΙΟΝ? Error textûs? v.

Ἀραχνιον, iv.

ΑΡΧΗ. Principium vitæ, ii. 8.
Hinc Bot. Corculum feminis,
et plumula, viii. 1, 2. Vid.
desc. germinationis feminum
diverforum, viii. 1.

ΑΡΩΜΑΤΑ. Odores antiquo-
rum. Catalogum odorum an-
tiquitus in usu εν μυροις fisco.
1. Κασία. 2. Κινναμωμον.
(Vid. Tab. Syft.) 3. Καρδα-
μωμον. 4. Ναρδος. 5. Ναιρον.
6. Βαλσαμον. 7. Ασπαλαθον.
8. Στυραξ. 9. Ιρίς. 10. Ναρτη?
11. Κατωρ. 12. Πανακες. 13.
Κροκος. 14. Σμυρνη. 15. Κυ-
πριδος. 16. Σχινος. 17. Κα-
λαμος. 18. Αμαρακος. 19. Λω-
τος. 20. Ανησον, ix. 7.

ΑΣΠΗΣ. Clypeus, olim ex vimi-
nibus salignis; ut et ex ligno
ejusdem arboris, v. 8.

ΑΣΤΑΦΙΣ. Uva passa, "a rai-
fin." v. p. 44.

ΑΣΤΡΑΒΗΣ. Non tortuosus, ξυ-
λον αστραβεις, "ftrait-grained
wood," iii. 10.

ΑΣΤΡΑΒΕΩ. id.

ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΤΟΣ. } Planta-
ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΣΙΑ. } rum in-
juria ex cœli intemperie, o-
lim sideribus attributa. de C.
Pl. v.

ΑΣΤΡΟΝ το. Sirius, Canicula:
περι το αστρον, "the Dog-
days," ii. 7. Plantæ dicun-
tur ακολουθειν τοις αστροις,

^a G. Falconer, M. D. Vid. Præf. operis.

(tempora observare in germinando,) vii. 14.

ΑΣΦΑΡΑΓΙΑ. "An asparagus bed," vi. 4.

ΑΤΕΡΑΜΝΟΣ. Vid. Τεραμων.

ΑΥΛΟΝΙΣΚΟΣ. Dim. ab αυλων. Vallis, ix. 7.

ΑΥΣΤΗΡΟΣ. Astringens: fucci plantarum denominantur αυστηροι, γλυκεις, οξει, respectu gustûs. Ang. "rough."

ΑΥΧΜΑΙ αἰ. "The Droughts."

ΑΥΧΜΑΙΟΣ. Æstivus; εργα αυχμαιο. de C. Pl. iii.

ΑΥΧΜΗΡΟΣ. De odore; folia Salviæ ἡττον αυχμηρα. V. Βαρυς.

ΑΦΑΝΕΣ. adv. Occulto, ix. 12.

ΑΦΑΝΕΣ το. Vapor, gas, ib.

ΑΦΕΛΚΟΩ. } Penetro, per-
ΑΦΕΛΚΟΟΜΑΙ. } foro? ix. 12.
fanor. de C. Pl. v.

ΑΦΟΡΟΣ. Sterilis. de C. Pl. iii.

ΑΦΥΛΛΟΣ. De flore monopetalô usurpatur.

ΑΧΡΟΥΣΤΕΡΟΣ. Minus coloratus. Vid. χροομαι, κεχρωσμενος.

ΑΧΥΡΟΝ. 1. Palea, gluma, Bot. αχυρον πυρινον. α κριθον, viii. 1.
2. Siliqua Fabæ. de C. Pl. iv.

ΑΩΡΕΙΑΙ. Tempora minus propitia, "bad seasons." de C. Pl. v.

B.

ΒΑΛΑΝΟΣ ἡ. Nux arboris βαλανου. Vid. Tab. Syft. p. 11.

et Μυροβαλανον.

ΒΑΛΑΝΗΡΟΣ. Glandifer.

ΒΑΛΛΩ. Germino, ix. 22.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ τα. Nuces Juglandis.

ΒΑΛΣΑΜΟΝ το. "Balsam of Mecca or Tolu," (vid. p. 25.) ix. 7.

ΒΑΦΗ χαλκυος. Acies ferri, cuius manipulatio antiquis haud ignota, v. 4.

ΒΕΧΟΣ. Instrumentum rusticum. de C. Pl. iv.

ΒΗΜΑ. Mensura, Passus, "a pace."

ΒΙΟΙ φυτων. 1. stationes, L. i. 7, 23. 2. effectus foli, aëris, &c. respectu sanitatis et durationis vitæ in arboribus, iv. 1, 13, 14.

ΒΛΑΣΤΟΣ. Surculus primus ex radice, i. 5. παραβλαστος, furculus secundarius ex ramis.

ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ. Prima germinatio. Vid. Calendarium Βλασησιων, iii.

ΒΛΑΣΤΟΛΟΓΙΑ. Pampinatio in vite. N. B. Tres αμπελουργιαι. 1. τομη. 2. διακαθαρσις. 3. βλαστολογια. 1. amputatio generalis hyeme. 2. amputatio furculi teneri. 3. avulsio gemmarum ope manuum, &c.

ΒΛΟΣΤΡΟΣ. 1. Fæculentus. πιττα βλοσυροτερα. 2. de furculis; turgidus, ὅσαι λιμναιαι, βλοσυροτεραι. de C. Pl. v.

ΒΟΛΒΙΤΟΣ. Fimus bubulus, v. 7.

ΒΟΛΒΟΣ. Bulbus plantæ.

ΒΟΛΗ. Lapsus uvarum imma-
turus. de C. Pl. i.

ΒΟΡΒΟΡΩΔΗΣ. Fæce vel ter-
ra mixtus.

ΒΟΤΑΝΙΖΩ. Herbas noxias e-
vello, "to weed." de C. Pl.
iii.

ΒΟΤΡΥΣ. Racemus uvarum,
item racemus quivis, vel col-
lectio baccarum vel florum.
Βοτρὺς Πτελεας, fructif. iii. 6.
Generatur βοτρὺς ἐν ἀμπι-
λοις ἐκ μητρὸς κλήματα ἐκ
τοῦ περιεχόντος. de C. Pl.
iii.

ΒΟΤΡΥΟΝ. id. Βοτρυὸν τῆς Δαφ-
νῆς, iii.

ΒΟΤΡΥΧΙΟΝ. dim. de C. Pl.
iii.

ΒΟΤΡΥΟΕΙΔΗΣ. ἀπο μίας κορυ-
νῆς, καὶ πολλῶν μισχῶν. de
umbella floris. Bot. iii. 12.

ΒΡΑΓΧΙΟΣ. Branchiæ, "the
gills of fishes," iii. 9.

ΒΡΑΔΥΣ εἰς τροφήν. Concoctu
difficilis. opp. ἐγγυτερά τῆς
τροφῆς. de C. Pl. iv.

ΒΡΑΧΕΙΣ. Madefactus, a βρεχω,
"steeped in water," v.

ΒΡΥΟΝ. 1. Amentum Quer-
cūs, &c. a βρυω, abundo, iii.
6. 2. Thyrsus florum, ut
Thymi Diosc.

ΒΡΥΣΟΔΕΨΙΚΗ. per transp.
pro βυρσοδεψικῇ, Ars coria-
ria.

ΒΡΥΤΟΝ. Cerevisiæ sp. βρυτ.
ἀπο Κριδῶν, "Ale." N. B.

Ἄν ζῆθος spec. divers. vel
statu effervescenti? Vid.

Γ.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Gummi Bubonis,
Galbani L.

ΓΑΛΕΑΤΡΑ. Tendicula captan-
dis feris. ex ligno duro Πτε-
λεας, &c. "a hutch trap." v.
8.

ΓΑΝΩΔΗΣ. Fertilis: γῆ γανωδῆς,
vi.

ΓΕΛΓΙΣ. Divisio capituli Allii;
"a clove of garlick."

ΓΕΛΓΙΟΟΜΑΙ. id.

ΓΕΝΕΣΙΣ. Propagatio planta-
rum, i. 4.

ΓΕΝΕΣΕΙΣ αἱ. Proventus arbo-
rum. de C. Pl. iv.

ΓΕΝΝΩΜΕΝΑ μέρη τὰ. In arbo-
ribus partes fructiferæ. Mold.
i. 4.

ΓΕΝΟΣ, apud Theophr. spe-
ciem vel varietatem indicat,
pass.

ΓΕΡΑΝΔΡΥΑ τὰ. Annosæ arbo-
res. Quercus nodosæ ætate,
iii. 12.

ΓΕΥΟΜΑΙ. Gustu experimen-
tum facere, ix. 2.

ΓΕΥΣΙΣ. id. item morbus simi-
lis αφῆς.

ΓΙΓΑΡΤΟΝ. Acinus uvæ: ἐξαι-
ρουμένης τῆς μητρὸς ἀγιγαρτοί.
de C. Pl. v.

ΓΛΙΣΧΡΟΣ. Tenax. de ligno,
ὅσα γλίσχρα εὐκαμπῆ, v. 6.

de C. Pl. iv. de fructu, τα γλισχρα πλειονος πεψεως δειται. de C. Pl. iv. differentia inter γλισχρος et λιπαρος, priore ex humido, posteriore ex oleoso? lign. Platani exemplum γλισχροτητος peculiare, v. 4.

ΓΛΙΣΧΡΟΤΗΣ των καρπων. id. de C. Pl. iv.

ΓΛΟΙΟΣ. Debilis, cariosus: opp. τω ισχυρω. de lignis, v. 5.

ΓΛΥΚΥΣΤΡΥΦΝΟΣ. Astringens cum dulcedine. Vid. Στρυφνος, ix. 22.

ΓΛΩΤΤΑ. Lingula in fistulis, "the tongue-piece," iv. 12.

ΓΟΓΓΡΟΣ. Morbus in truncis et ramis majoribus: forsan canceri spec. Radix videtur ignota, i. 12.

ΓΟΝΥ. Nodus in caulibus gramineis, &c. item flexura.

ΓΟΝΑΤΩΔΗΣ. id. i. 6.

ΓΡΑΜΜΩΔΗΣ. Linearis, Bot. γραμμωδεις μισχοι (tenues) σπερματα γραμμωδη, iv. 13.

ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Nudo femine, de feminibus umbelliferarum; minime Gymnopus Linn.

ΓΥΡΟΙ. Foveæ circulares arboribus plantandis destinatae. de C. Pl. iii.

ΓΥΡΩΜΑΤΑ. Venarum circumvolutiones, vel gyri in ligno; præcipue ad nodos, v. 6.

ΓΩΝΙΑ. 1. Eminentia acuta, "a

ridge," folium κυπριου (vid.) desc. ως γωνιοφυλλος' εκ δυοιν συνθετον, και το μεσον οιον τροπις, (carina,) i. 16. 2. angulus: sic de folio Hederæ, γωνιοφυλλος' ουδεν σχημα περικαρπιου γωνιας εχει? i. 18.

ΓΩΝΙΟΕΙΔΗΣ. id.

Δ.

ΔΑΔΟΟΜΑΙ. de pice extrahenda. de C. Pl. v. Vid. δαϊς, δας, tæda.

ΔΑΔΟΦΟΡΕΩ. Picem genero, ix. 2.

ΔΑΔΩΔΗΣ et ενδαδος. de ligno et radicibus, Gen. Pinus L. refinofum, ib.

ΔΑΙΣ, δας. Lignum fissile Pinus; εξαιρουμενης της δαδος, και καιομενης, η της πιττας εκρη, ix. 2. Vid. manipulationem ibi exacte descriptam.

ΔΑΚΡΥΑ τα. Refina in globulos concreta, ii. 16. vi. gummi etiam sponte fluens.

ΔΑΚΕΤΑ τα. Morfus venenosi Viperæ &c. ix. 21.

ΔΑΦΝΙΣ. Lauri bacca; drupa, Bot.

ΔΑΦΝΩΔΗΣ. Sature viridis. N. B. Tres occurrunt coloris viridis varietates; Angl. "shades of green." 1. δαφνωδης. 2. πρασωδης. 3. χλοερως. Vid. ix. 11.

ΔΕΙΝΟΣ. Efficax, "strong," οι

- χυλοι των ῥιζων δεινότεροι του των φυτων, i. 11.
- ΔΕΝΔΡΑ τα. Vegetabilium divisio quadruplex. 1. Δένδρα. 2. Φρυγανικα. 3. Θαμνοι. 4. Ποωδεις. N. B. Distinctio inter 2dam et 3tiam haud factis constat: an Θαμνοι idem quod επετειοι, perennes? Alibi λοχυμωδης occurrit, de calamo, &c. Frutex paludofus? (vid.)
- ΔΕΝΔΡΑΔΗΣ. syn. δένδρωδης. de C. Pl. iii.
- ΔΕΝΔΡΥΦΙΟΝ. Arbusculum. Dim. Corallinis applicatur, iv. 8.
- ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ. Proxime succedens; εν τῷ δεχομενω ετει, και τῷ τριτω, vii. 1.
- ΔΗΚΤΙΚΟΣ. Pungens: de fucco, vi.
- ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ. Cerealis. δημητριος καρπος. de C. Pl. iii.
- ΔΙΑΔΥΝΑΜΑΙ. Valde efficio, iii.
- ΔΙΑΚΑΘΑΡΣΙΣ. Operatio, horticulturæ. Vid. Βλαστολογία.
- ΔΙΑΚΟΡΗΣ. Satus valde, i.
- ΔΙΑΚΤΟΡΙΑ. Cantus vehementior, vel acutior. Hinc Mercurius apud Homerum διακτορος Αργειφοντης. Τίβια γλωττα συμμυει τῷ χρόνῳ, (per ætatem contrahitur,) et inde χρησιμος προς την διακτοριαν. N. B. Forf. ἡ διακτορια in scena antiqua cantus prælu-
- dens, Angl. "overture," iv. 12.
- ΔΙΑΠΑΤΤΟΜΕΝΟΣ. Conculcatus, viii. 11.
- ΔΙΑΠΛΗΣ. Saturè plenus. de C. Pl. ii.
- ΔΙΑΠΙΑΙΝΟΜΑΙ. Saturor ex omni parte. de C. Pl. vi.
- ΔΙΑΠΝΟΗ. Evaporatio. Vid. Διατμιζω. de C. Pl. vi.
- ΔΙΑΠΤΥΣΣΩ. Expando. κοπτοντες εν τῷ ὀλμῳ, και διαπτυσαντες λεπτα, και επιπαττοντες εφ' ἰδωρ. Methodus præparandi Cicutam, ix. 17.
- ΔΙΑΠΥΡΟΣ. Fervidè candens, "red hot," iv. 8.
- ΔΙΑΡΡΕΩ. Late evagor. de Nilo. de C. Pl. vi.
- ΔΙΑΣΤΟΛΗ. Intervallum, *hort.* de C. Pl. iii.
- ΔΙΑΤΜΙΖΩ. Evaporare facio. τα μεν χυλων εκκρινει, η διατμιζει τα δε παχυνει και συνησι. de C. Pl. vi.
- ΔΙΑΦΕΡΟΝ το. Excellens quoddam, ix. 14.
- ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ. Eximie.
- ΔΙΑΦΟΡΗ. Excellentia, iv. 4.
- ΔΙΑΦΟΡΟΝ. id. si non error textus.
- ΔΙΑΦΥΣΕΙΣ αι. Internodia caulina, *Bot.* iv. 10.
- ΔΙΑΦΥΩ. *act.* Penetro. de C. Pl. v.
- ΔΙΑΦΥΩ. *pass.* Minus apte, vel loco alieno nascor, de C. Pl. iii.
- ΔΙΑΦΩΝΕΩ. Discrepo, iii. 10.

ΔΙΑΧΕΩ. de diffusionem per coctionem, ix. 15. opp. τῷ συναγεῖν, "to coagulate."

ΔΙΑΧΥΣΙΣ. Diffusio æqualis: de coctione fabarum et pisorum, "when they are reduced to a smooth paste."

ΔΙΕΝΝΑΘΗΡΙΣ. Novennium, iv. 12.

ΔΙΕΝΝΑΕΘΡΗΣ. Novennis.

ΔΙΕΥΡΥΝΟ. Dilato. de C. Pl. v.

ΔΙΗΘΗΣΙΣ. Percolatio, ib.

ΔΙΗΚΩΝ. Quod transversim pervadit? ἐν τῷ διηκοντι τῆς γελγίδος. Vid. de C. Pl. vi.

ΔΙΗΡΘΡΩΜΕΝΟΣ. Nodos transiens, permeans.

ΔΙΘΥΡΟΙ. Januæ bivalves, viii. 2.

ΔΙΚΑΡΙΟΣ. Fructus duorum annorum simul gerens. de arb. quibusdam, iii. 6.

ΔΙΚΕΛΛΑ. Instrumentum rusticum: ligo biceps. Angl. "a double hoe." de C. Pl. iii.

ΔΙΚΡΑΝΗΣ. Biceps, cacumine fissio, ix. 12.

ΔΙΜΕΡΗΣ. Bi-partitus, viii. 2.

ΔΙΞΟΟΣ. Duplici venarum cursu. Vid. μονοξοός et κτηδών, v. 2.

ΔΙΠΑΛΑΙΣΤΗΣ. Duas palmas altus, iv. 12.

ΔΙΦΟΡΟΣ. Vid. δικαρπος.

ΔΙΩΚΩ. simpl. (pro διωκω βίον) Vivo. πρὸς ἑτέρῳ διώκει, de pl. scandente, Bot. de C. Pl. ii.

ΔΟΡΑ. Cortex arboris, ix. 2.

ΔΟΧΟΣ. Facile suscipiens: δοχος οὐσα ὑγροῦ + θερμοῦ. de C. Pl. ii.

ΔΡΙΜΥΣ. Acris, pungens. de odore, vi. 7.

ΔΡΟΣΟΒΟΛΟΣ. Roridus: ubi rores abundant. δροσοβολαί χωραί. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΠΕΤΗΣ. Vid. δρυπίψ. de C. Pl. ii.

ΔΡΥΠΕΨ. 1. Fructus maturus et deciduus, pass. N. B. Δρυς pro quavis arbore. 2. Bacca Oleæ, iv. 17.

ΔΡΥΠΙΣ. Fructus quidam. (Hinc forsan Drupa Linn.) ακατος, δρυπίς.

ΔΡΥΦΡΑΚΤΟΝ. Ager sepibus cinctus? iv. 5.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ αἱ. Vires plantarum.

ΔΥΣΜΟΙ οἱ. Occidens, ἀνεμος ἀπὸ δυσμῶν, κλαυθμος dict. (forf. καυθμος,) "the Sirocco." de C. Pl. v.

ΔΥΣΡΙΤΟΣ. Frigoris impatiens, vi. 7.

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ. Aliquod ingratum respectu saporis. de C. Pl. vi.

E.

ΕΓΓΕΙΟΣ. de terra; opp. τῇ ἐνυδρῷ, iv. 7.

ΕΓΓΥΣ πρὸς. Proxime accedens ad: κατ' εὐωδίαν οὐκ ἐγγυς πρὸς ἐκείνον, "not near so fragrant as." de C. Pl. vi.

ΕΓΚΕΝΤΡΙΖΩ. Perforo: dicitur de actione succum vel refinam extrahendi e truncis arborum, ii. 3.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΟΜΑΙ. Ramis luxurio. de C. Pl. iii.

ΕΓΧΥΛΟΣ. Succulentus; opp. τῷ δυσχυλῶ. de C. Pl. vi.

ΕΔΑΦΗ ἢ ε. Varietates foli; *Agricult.* de C. Pl. ii.

ΕΔΑΦΙΕΩ. Solum complano, ix. 4.

ΕΔΡΑ. Εκπιπτειν την ἰδραν. de prolapsu ani, ix. 9.

ΕΙΛΗΘΥΙΑ. Σφαιριῶδες τι, vel forsan pistilliforme in trunco Abietis: in magicis usitatur. de C. Pl. v.

ΕΚΑΤΕΡΟΙ. Utrique; (dicitur de duobus paribus.)

ΕΚΑΤΕΡΩΤΗΣ? Qualitas; forsan error. de C. Pl. vi. vid. supr.

ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΙΣ. Secunda germinatio; "Michaelmas shoot." iii. 7.

ΕΚΒΛΟΣΥΡΟΣ. Vid. βλοσυρος.

ΕΚΘΑΜΝΕΟΜΑΙ. Fruticesco.

ΕΚΙΔΟΝ. Oblique, iii. 13.

ΕΚΚΟΛΑΠΤΩ. Tundendo evacuο, ὡν ἐκκεκολληµενον, iii. 16.

ΕΚΚΡΙΝΩ. Secerno.

ΕΚΚΡΙΝΟΜΑΙ. Secernor.

ΕΚΚΡΙΤΙΚΟΝ το. id.

de C. Pl. v. vi.

ΕΚΑΥΤΟΣ. Languidus: succo privatus. de C. Pl. iv.

ΕΚΜΑΣΣΟΜΑΙ. Abstergor, aridus fio. de C. Pl. v.

ΕΚΠΑΠΠΟΟΜΑΙ. In pappum abeo. *Bot.* iii. 18.

ΕΚΠΑΝΞΙΣ. De arboribus; Sideratio. Vid. ατρεβολησεις, ib.

ΕΚΠΝΕΥΣΙΣ φλεγμονων. Exhalationes ulcerum, i. e. ad virus extrahendum, ix. 10.

ΕΚΣΤΑΣΙΣ. Degeneratio, ab εξίστημι, infr.

ΕΚΤΗΚΩ. Emacero, ix. 3.

ΕΚΤΟΠΟΣ. Climati proprius: χειμων εκτοπος εν Θρακη. de C. Pl. vi. N. B. Forf. legendum εντοπος.

ΕΚΦΥΣΑΩ. Tumescō. de C. Pl. iii.

ΕΚΦΥΣΗ ἢ. Tumor. de C. Pl. iii.

ΕΚΦΥΣΙΣ. Degeneratio plantæ. de C. Pl.

ΕΚΧΥΛΟΣ. Subtilis, tenuis: de succo. de C. Pl. vi.

ΕΛΑΙΟΝ. N. B. Usus Olei occurrit in maturandis Ficibus. de C. Pl. ii. item ad enecandas radices arborum, ib.

ΕΛΙΞ. Cirrhus; *Bot.* i. 3.

ΕΛΚΗΘΡΟΝ. Buris aratri, vi.

ΕΛΚΟΜΑΙ. Distorqueor, "to be warped." de ligno, v. 7.

ΕΛΚΟΟΜΑΙ. Perforor. N. B. Ἐλκος foramen in trunco Abietis, per quod refina fluit, iv. 19.

ΕΛΛΟΒΟΣ. Siliquosus, viii. 1.

ΕΛΜΙΣ πλατεια. Tænia lata: Angl. "tape-worm," ix.

ΕΜΒΙΩΣΑΣ. Vitam pertrahens, vi. 7.

ΕΜΒΟΘΡΟΝ. adv. plane? in

- puteo. ουκ εμβοδρον (τιδεασι)
αλλα τας σχιζας "the bil-
lets," ορθας προς αλληλας, (fur-
fum inclinantes,) ix. 3. sed
forsan textus corruptus.
- EMBOΛΗΤΟΣ. Gleba involutus.
de C. Pl. v.
- EMBOΛΟΣ. Navis rostrum æra-
tum, vi. 8. ab εμβάλλω, ex
modo pugnae navalis.
- EMBRYON, in plantis το μελλον
βλασειν. N. B. Vox βρυον
(amentum Bot.) de racemo
flosculorum fugacium. de C.
Pl. i.
- EMMΗΤΡΟΣ. Medullam ha-
bens, i. 9.
- ΕΜΦΥΤΕΙΑ. Infitio, horticult.
"grafting." de C. Pl. i. vid.
ενοφθαλμισμος.
- ΕΜΦΥΤΕΥΩ. ii. 1.
- ΕΝΑΕΝΑ τα. Annua: διενα, bi-
ennia.
- ΕΝΔΑΔΟΣ. Pice abundans, ix.
4.
- ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ. imperf. ουκ ενδε-
χεται λαβειν, non admittit
convenienter, iv.
- ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ το, quod con-
venit, ii. ib.
- ΕΝΔΙΔΩΜΙ. Cedo: κλιναρια εν-
διδοντα, an lectuli elastici?
- ΕΝΕΙΛΕΩ. Obvolvo? ενειλαντες
εν γλυκει, ix. 9.
- ΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΟΣ. De arbore
cujus fructus annum durat in
arbore; aliter δικαρπος.
- ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ. Infitio
gemmae (οφθαλμου) in arbo-
ribus; Ang. "budding?"
Vid. εμφυτεια. de C. Pl. i,
N. B. Ex descr. apud Theo-
phr. l. c. εμφυτεια videtur in-
fitio per incisionem, και ξυ-
λου σχισιν, "cleft-grafting;"
ενοφθαλμισμος infitio, per re-
laxationem corticis, "rind-
grafting."
- ΕΝΤΑΥΘΑ. Hac de causa, pass.
- ΕΝΤΕΡΙΩΝΗ. Pars interior,
five medulla ligni, iii. 8.
- ΕΝΤΟΜΑ τα. Insecta: hinc εν-
τομολογια. de C. Pl. vi.
- ΕΝΤΟΜΗ. Folii incisura, vel di-
visio in lobos, i. 16.
- ΕΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΜΑ. Hymeno-
sperma L. semine membrana
incluso, vel pericarpio laxo,
viii. 7.
- ΕΞΑΔΥΝΑΤΕΩ. Elanguesco, iv.
- ΕΞΑΙΤΕΙΡΟΜΑΙ. De Populo,
(Αιγειρω) habitum mutare,
de C. Pl. ii.
- ΕΞΑΜΒΛΩΣΙΣ. Abortio, ix. 9.
- ΕΞΑΝΘΗΣΙΣ. Deflorescentia.
- ΕΞΕΛΑΙΟΟΜΑΙ. Super satura-
tus sum Oleo: unde efflu-
vium fit; de C. Pl. vi.
- ΕΞΕΠΙΤΗΔΕΣ. Consulto. de C.
Pl. v.
- ΕΞΕΣΜΕΝΟΣ. Rafus, a ξεω, ib.
iii.
- ΕΞΙΚΜΑΩ. Humorem perdo,
vii. 5.
- ΕΞΙΝΟΩ? Evacuo.
- ΕΞΙΣΤΗΜΙ. Degenero. de C.
Pl. v.
- ΕΞΥΒΡΙΖΩ. Luxurio. de arb. ii.

- ΕΠΑΚΑΝΘΙΖΩ. Leviter spinosus sum, ix. 4.
- ΕΠΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule scandenti, *Bot.* iii. 8.
- ΕΠΑΜΑΟΜΑΙ. Accumulo, iv. 15.
- ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ. Recupero. de C. Pl. iii.
- ΕΠΑΦΗΣ. Tactu sensibilis.
- ΕΠΕΣΘΙΩ. Edo post aliquod, insuper edo.
- ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Planta caule caduco, radice perenni, Angl. "a perennial plant," vii. 7.
- ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΕΩ. id.
- ΕΠΕΧΩ. Duro, continuo. de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΒΑΛΛΩ. Attribuo. καὶ ὅσον ἐπιβάλλειν τοῖς γενεαῖς, viii. 5.
- ΕΠΙΒΛΑΣΤΑΝΕΙ. De germinatione Autumnali, vii. 2.
- ΕΠΙΒΡΟΧΟΣ. Madidus. γῆ ἐπιβροχος, viii. 6.
- ΕΠΙΓΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule prostrato. *Bot.*
- ΕΠΙΓΕΙΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis radicalibus, *Bot.* vii.
- ΕΠΙΔΟΞΑΖΟΜΕΝΟΣ. Suspictus; per conjecturam. de C. Pl. i.
- ΕΠΙΔΟΣΙΣ. Incrementum, proventus, i. 5. de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΘΕΤΑ τα. Commentitia. τα ἐπιθετα, καὶ πορῶθεν, "far fetched, and with additions," ix. 9.
- ΕΠΙΚΑΥΛΟΦΥΛΛΟΣ. Folioso caule, vii.
- ΕΠΙΚΑΩ. Inuro. N. B. Vox καίω usitatur de effectu frigoris, utpote et caloris; item de morfu venenoso pecorum. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΚΗΡΟΣ. Morbo obnoxius. Angl. "tender," vi. 7.
- ΕΠΙΚΝΙΖΩ. Unguibus vello, "to nip off." de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΚΟΠΗ. Succisio, decacumination. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΚΥΤΣΚΟΜΑΙ. Actus superfætationis; utpote in leporibus. de C. Pl. i.
- ΕΠΙΚΥΠΤΩ. Declinare facio, "to weigh down." de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΝΕΩ. Supernato, ut lignum. in aqua, vi. 3.
- ΕΠΙΞΥΝΔΕΩ. Strictius alligo. de C. Pl. ii.
- ΕΠΙΠΑΤΤΩ ἐφ' ὕδαρ. Sensim in aqua tractando, manibus miscere, ix. 17.
- ΕΠΙΠΟΛΑΖΩ. In superficie fluito.
- ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ, ab ἐπιπολής, superficialis; de radicibus opp. βαθεῖ.
- ΕΠΙΡΡΥΤΟΣ. Inundatus: γῆ ἐπιρῦτος, *Agric.* "flooded ground."
- ΕΠΙΣΙΝΗΣ. Noxius.
- ΕΠΙΣΠΑΣΙΣ. Attractio. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΣΠΟΡΑ. Secunda fatio. ἐπισπορα τα de plantis quæ sæpius in anno feruntur, vii. 1.

- ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ. Continuatio habitus : opp. *εκστασις*. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΣΥΝΑΓΚΑΙ. Valles quædam Asiæ. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΣΧΙΖΩΝ. Ab imo divisus. de C. Pl. v. N. B. *Δενδρα επισχιζοντα* opp. *μονοσελεκεσι*.
- ΕΠΙΤΑΣΙΣ. Impulsus. de C. Pl. ii.
- ΕΠΙΦΑΝΗΣ. Violens. *αηρ θολερος και επιφανης*. de C. Pl. v. sic *χειμων επιφανης* ατος. Polyb.
- ΕΠΙΦΟΡΑ. Proventus secundus. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΧΡΟΙΣΙΣ. Levis coloratio, "a light staining." de C. Pl. ii.
- ΕΠΟΥΔΟΣ. Vid. *ουλος*, iii. 10.
- ΕΠΩΤΙΔΕΣ. Prominentiæ laterales utrinque ex puppi, ubi navis nomen inscribatur. Poll. v. 7.
- ΕΡΓΑΣΙΑ. Manipilatio. *ε. της πιττης*, ix. 2.
- ΕΡΕΨΙΜΟΣ. Ad tecta facienda. *ξύλον ερεψιμον*, "roof timber," v. 4.
- ΕΡΙΝΟΝ το. Fructus Ficus, *sylvestris*.
- ΕΡΙΟΛΑΜΒΑΝΩ. Percolare operlanæ; "to strain through wool," ix. 8.
- ΕΡΥΣΙΒΗ. Robigo; morb. Forf. Uredo, Perfoonii. Fungi species. de C. Pl. iii.
- ΕΣΧΑΡΑ. Pars plana *Πυρρειας*, (vid.) fovea circularis, ubi circumagitur το *τερετριον* ad accendendum ignem, v. 10.
- ΕΣΧΑΤΕΥΟΝΤΑ τα. Apices ramorum, &c. de C. Pl. v.
- ΕΤΟΣ *φερει ουκ αρουρα*. Adagium vetus : plus cælo quam terræ tribuendum, viii. 8.
- ΕΥΑΤΜΩΤΟΣ. Volatilis. de C. Pl. ii.
- ΕΥΑΥΡΟΣ. Bene situs, bene ventilatus, viii. 11.
- ΕΥΑΦΗΣ. Tractabilis. *γη ευαφης*. de C. Pl. ii.
- ΕΥΔΙΑΙΝΟΣ. *τοπος κοιλος και ευδαινος*, "a well sheltered mild situation," iii. 4.
- ΕΥΕΜΕΩ. Vomitus ciere fine dolore, ix. 11.
- ΕΥΕΘΗΡΙΑ. Anni prosperitas, viii. 8.
- ΕΥΗΚΩΣ. Facilis, pronus; ab *ακουω*. *ευηκοτα προς μεταβολην*. de C. Pl. ii.
- ΕΥΘΥΠΟΡΕΩ. De arboribus, "to grow straight."
- ΕΥΚΤΗΔΩΝ. Vid. *κτηδων*.
- ΕΥΟΓΚΟΣ. Levis, portatu facilis, ix. 17.
- ΕΥΟΔΕΩ. Luxurio, i. 9.
- ΕΥΣΤΟΜΟΣ. Gratus palato, "relishing."
- ΕΥΤΟΝΟΣ *προς*. Aptus ad. de C. Pl. v.
- ΕΥΧΥΔΟΣ. Succulentus, viii. 10.
- ΕΥΩΔΙΑ. Gratus odor. N. B. *τυπες* averfantur odores; apibus etiam nocivi sunt; nec datur animal, homine excepto, *εωδια* gaudens *αυτης* *χαριν*. de C. Pl. vi.

ΕΦΑΛΜΑ το. Morbus arb. ex nimio sale? de C. Pl. v.

ΕΦΗΛΙΔΕΣ. Solis maculæ, "freckles," ix. 22.

ΕΦΗΜΕΡΟΝ φαρμακον. Venenum quod cito enecat (eodem die,) ix. 6.

ΕΧΙΝΟΣ. 1. Placentæ genus ex farina cruda. 2. morbus ex ejus usu. de C. Pl. iv.

ΕΧΟΜΕΝΑ τα. Quæ succedunt, i. 1.

ΕΩΜΕΝΟΣ. "Left to itself," vi. 6.

Z.

ΖΗΘΟΣ. Cerevisia (a ζεω ferveo, "to mantle." Αρχαιοιου φυσικως ζηθου εκ τεχνης. de C. Pl. vi. N. B. An differentia inter ζηθον et βρυτον? Vid.

ΖΥΓΙΝΟΣ. Carpineus, v. 6.

H.

ΗΘΙΚΟΣ. Percolatus. οινοι ηθικοι. de C. Pl. vi.

ΗΛΟΣ. 1. Clavus; 2. Innatum quoddam in trunco Oleæ coni instar acuti? An Schlerotium, vel Hypoxylon? Bot. N. B. Semel vidi specimen ex Portugallia, iv. 16.

ΗΛΙΟΣ εκνεφελος. (fine nubibus) Obstat aliquando arboribus,

viii. 10.

ΗΜΕΡΟΥΝΤΕΣ οι. Qui terras incultas subigunt. de C. Pl. v.

ΗΜΕΡΩΜΑΤΑ τα. Animalia mansuefacta, pecora, ib.

ΗΜΙΒΡΑΧΗΣ. Sub-madidus. de C. Pl. iii.

ΗΜΙΗΛΟΣ. Sub-folanus, ib.

ΗΡΙΝΟΣ. id. q. ιρινος, ab ιρις, Iris, viii. 7.

Θ.

ΘΑΛΑΜΩΔΗΣ. Foraminosus. N. B. Vox θαλαμος, apertura narium; λιθοι θαλαμωδεις (porosi.) de C. Pl. vi.

ΘΑΛΕΙΑ. } 1. Ramulus tener
ΘΑΛΛΙΑ. } herbaceus. de C. Pl. v. 2. Frondescentia, vel frondosus rami vestitus.

ΘΑΜΝΟΙ. Plantarum divisio. Vid. δεινδρον.

ΘΕΡΜΟΣ συμφυτος. Calor innatus; vitalis Mold. i. 3. ξυλα θερμα. Vid. ξυλον, πυρεια.

ΘΗΛΥΣ. Vid. αρεην supr. N. B. Non semper de sexu in Dicaeiiis pl. N. B. Hinc ελατης spec. θηλεια vocatur, i. e. minus robusta. Alibi vox ut distinctio sexualis occurrit.

ΘΗΡΙΔΙΑ. Animalcula.

ΘΟΛΕΡΟΣ. Turbidus. H. de differentia inter animalia et plantas dicitur ὅσω θαλερωτε-

ρα και ψυχροτερα, (τα φυτα,) τοσσητον απεχειν του ζωα ειναι : forfan minus cocti.

ΘΟΛΟΕΙΔΗΣ. Cancellatus, clathratus. (Vid. Præfat. operis.) iii. 10.

ΘΟΡΟΣ. Piscis masculi lac feminine ; "the milt." 'Ο αρσεν ην ιχθυς επιρραινει τοις ωοις αποτικτομενοις του θορον. de C. Pl. ii.

ΘΡΑΥΟΜΑΙ. Lacero : de effectu falis in enecandis plantis. de C. Pl. vi.

ΘΡΙΟΝ. Folium ficulneum. de C. Pl. v.

ΘΥΣΑΝΟΙ. fimbriæ ; filamentorum fasciculi, "a fringed edge," "tassels."

ΘΥΣΑΝΩΔΗΣ. Fimbriatus.

I.

ΙΔΙΟΣ. Peculiaris, extraordinarius, *pass.*

ΙΔΙΟΤΗΣ. *supr.*

ΙΘΜΟΣ. forf. diversus ab ιθματι ? διεισιν ως ιθμος, (transit per aquam ut atomus ?) ουκ εχον ω̄ σεγει, (non inveniens unde suspendatur.) de C. Pl. vi.

ΙΚΜΑΣ. Succus feminalis, vel simpliciter humor, vi. 4.

ΙΚΡΙΑ τα. Opera sculptilia in navibus ; ornamenta lignea domuum. Συκαμινου ξυλον εις τα ικρια, και τας σεφανας, και ολως προς τον κοσμον, v. 7.

ΙΝΕΣ. 1. ξυλου. Fibræ. N. B. Libro i^{mo}. c. 3, 4. comparatio instituitur inter animalia et vegetabilia : ut in prioribus *ινες και φλεβες*, (arteriæ et venæ,) sic in posterioribus *ωσπερ ινες*, &c. *Ινες* describuntur *συνεχεις*, *σχιστοι*, *επιμηκεις* (congesti, vel fasciculati ; divisibiles ; in longitudinem procurentes ;) *απαρβλητοι*, (non confusi inter sese) *αβλαστοι*, (non ramosi.) Congruunt hi cum canalibus capillaceis, vel lymphæductibus Grewii, Lewenhoek, aliorumque. Quod ad *φλεβας*, vel vasa spiralia, vid. *φλεψ*. 2. Vermes. Ascarides in corp. humano, ix. 14.

ΙΝΩΔΗΣ. *supr.*

ΙΟΣ το. Gas, vapor ex fermentatione. τοσουτον ιος υφισταται τω οινω σακκιζομενω, ω̄τε και εσθαι υπο των λυχων. De C. Pl. vi.

ΙΟΥΛΟΣ. Iulus, amentum, Bot. iii. 6.

ΊΠΠΟΜΑΝΕΣ. Succus lethalis του Τιθυμαλλου, (vid. p. 12.) ix. 15.

ΙΣΟΠΟΔΙΑΙΟΝ. de triangulo æquilaterali. de C. Pl. vi.

ΙΣΧΑΣ. Fructus Απιου ισχαδος, ix. 10.

ΙΩΝΙΑ. Violetum ; N. B. A Theophrasto aliquando Violæ planta ; utpote *ιος* flos ejus, vi. 6.

K.

ΚΑΘΑΙΡΩ. *Pbarm.* Purgo. κ. κατω, per alvum. κ. ανω, vomitum cieo.

ΚΑΘΑΣΤΩΣ δ. Oppositum aliquod. de C. Pl. iii.

ΚΑΘΥΓΡΟΣ. Sub-madidus, i. 7. opp. καταξηρω: forf. intentionem indicat.

ΚΑΜΠΗ. Larva, Linn. vid. Tab. Systematicam; ubi transformationes insectorum accurate notantur a Theophrasto, sc. Καμπη, Χρυσαλλις, Ψυχη, Larva, Pupa, Imago L. de C. Pl. v. N. B. Σκωληξ etiam Larva quandoque ὅς εἰς ἄλλο μεταβάλλει Ζωὸν πτηνόν, vii. 12.

ΚΑΝΑ. pr. κανης. Canistrum, v. 8.

ΚΑΠΤΗΡ. } Corbis spec. vas
ΚΑΜΠΤΗΡ. } ex ligno flexili.
de C. Pl. v.

ΚΑΠΝΙΟΣ. "Smoaky coloured;" "grey." Αμπελος καπνιος, vitis helvola, Columella. Varro de Re Rustica. Apud nos extat spec. "grey Frontignac" dicta, ii. 4.

ΚΑΡΔΙΑ ξύλου. Pars interna trunci dura: "the heart of wood." opp. τῷ περιεληφότη, "the Alburnum," Bot.

ΚΑΡΚΙΝΟΟΜΑΙ. De ramis, et radicibus; implicor instar pedum cancri? "to tiller." Agric. i. 9. de C. Pl. i. 2.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Cancer, morbus arb. de C. Pl. i.

ΚΑΡΝΕΙΟΣ. Pila lanæ? iii. 16.

ΚΑΡΠΙΖΟΜΑΙ. Exhaustio, viii. 9.

ΚΑΡΥΗΡΟΣ. Nucifer, i. 16.

ΚΑΣΤΑΝΑΙΚΟΝ καρυν. Nux. Castaneæ, iv. 10.

ΚΑΣΤΟΣ? Occurrit inter aromata, ix. 7. Forf. legend. Κοστος. Tab. Syst. p. 3.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ. Semino, viii. 5. 11.

ΚΑΤΑΒΟΡΟΣ. Edax: de sterili solo, "hungry land." de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΔΕΩ. Incanto, vi. 2.

ΚΑΤΑΚΑΡΠΙΟΝ. Syn. περικαρπίου, iv. 11.

ΚΑΤΑΚΟΡΗΣ. Sator; de colore, iv. 10.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Congruens. ουδεν καταλογόν τούτων, το ανω προς το κατω, vii. 3.

ΚΑΤΑΠΑΤΕΩ. Pedibus conculco: καταπατμενος, και συμπατουμενος, (N. B. Vox posterior conculcationem plurimorum indicat) viii. 7.

ΚΑΤΑΠΟΘΕΙΣ αἱ. Voragines cænosæ: a καταπινω. de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΡΡΥΗΚΩΣ. Delapsus. ib. ii.

ΚΑΤΑΣΚΛΗΜΙ. Aresco, flaccidus fio. τα ανθη κατεσκληκε, πως, ελλελειπτος του οικειου θεριμου. de C. Pl. vi.

ΚΑΤΑΣΠΑΣΜΑΤΑ. Vibratio-

- nes. κατασπασματα τας γλωτ-
τας εχειν, de lingulis fistulæ,
iv. 12.
- ΚΑΤΑΣΤΑΜΝΙΣΜΕΝΟΣ. In ur-
ceolis fervatus: de vino; vid.
σαμνισκος. de C. Pl. ii.
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Temperamen-
tum. καταστασις ετους, viii. 8.
- ΚΑΤΑΤΡΑΓΩ. id. q. κατατρωγω.
Comedo, ix. 12.
- ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΑΙ. Deorsum fe-
ror, deterior fio, iv. 15.
- ΚΑΤΑΧΑΣΜΩΜΕΝΟΣ. Hians,
ringens, Bot. de C. Pl. vi.
- ΚΑΤΕΡΓΟΣ γη. Terra bene
subacta: opp. γη αργη. de C.
Pl. v.
- ΚΑΥΘΜΟΣ. 1. Uredo, Scal.
morbus arborum ex nimio
calore. 2. Ventus calidus,
"Sirrocco," iv. 17.
- ΚΑΧΡΥΤΑΙΟΝ. } Oleum aqua
ΚΑΧΡΥΑΙΟΝ. } mistum. de
C. Pl. v. Forfan fæces olei.
- ΚΑΧΡΥΣ. Amentum, Bot. "Cat-
kin," vi. 1. ix. 12.
- ΚΕΓΧΡΑΜΙΣ. Semen Ficûs, ii.
3.
- ΚΕΔΡΙΣ. Juniperis, Cedri, L.
bacca. de C. Pl. vi.
- ΚΕΚΑΙΜΜΕΝΟΣ. Flaccidus,
procumbens; de foliis, iii. 10.
- ΚΕΛΥΦΑΝΩΔΗΣ. An α κελυφας,
ανος? vel error pro κελυφω-
δης? de C. Pl. i.
- ΚΕΛΥΦΟΣ. Putamen nucis, te-
gumentum filiquæ, iii. et
pass.
- ΚΕΝΤΡΑ τα. Nuclei in lapil-
lis. v. 3.
- ΚΕΡΑΙΑ τα. Antennæ navium.
iv. 1.
- ΚΕΡΑΜΙΟΝ. Amphora figulina.
de C. Pl. vi.
- ΚΕΡΜΗΣΤΙ. Minutatum, v. 3.
- ΚΕΦΑΛΟΡΡΙΖΟΣ. Radice bul-
bosâ, vii. 2. vel forf. fusifor-
mi. Bot. vid. infr.
- ΚΕΦΑΛΩΔΗΣ. Radice fusifor-
mi, Bot. cujus apex κεφαλη
vocatur, ix. 8.
- ΚΗΡΙΩΔΗΣ. Alveolatus; ex si-
militudine alveolarum favi.
N.B. Dicitur de situ florum,
in plana superficie pl. um-
belliferarum, iii. 12.
- ΚΙΒΔΟΣ? syn. Βιβλου. sed forf.
error textus, iv. 9.
- ΚΙΒΩΤΙΟΝ. Dim. cymbula, v.
- ΚΙΝΕΩ. De ascensu succûs. de
C. Pl. i.
- ΚΙΣΣΗΡΙΣ. Pumex; lapidis ge-
nus, ix. 19.
- ΚΙΣΣΗΡΟΙΔΕΣ. id.
- ΚΛΑΣΙΣ. Methodus ordinandi
vites; vid. διακαρσις, βλαστο-
λογία.
- ΚΛΑΥΘΜΟΣ. Ventus calidus,
forfan pr. καυθμος, supr.
N.B. Aliter Olympias ven-
tus: ex ambiguo sensu vocis
καιω forfan ventus frigidus
ex monte niveo, "Vent de
Bise." Fr.
- ΚΛΗΜΑΤΙΔΕΣ. Dim. ramuli.
de C. Pl. iii.
- ΚΛΙΝΑΡΙΑ ενδιδοντα. Lectuli e-
lastici ex ligno flexili, v. 8.

ΚΛΙΝΗ. Receptaculum in floribus compositis. *Bot.* ii. 8.

ΚΛΙΝΗΣ. Pronus, declivis: opp. *ορθῶς*. de C. Pl.

ΚΛΩΝ. Ramus major: an *κλημα* id. vel ramus secundarius? i. 1.

ΚΝΗΜΗ. Flexura, genuflectio in caule, ix. 14.

ΚΝΗΜΟΠΑΧΗΣ. Suræ crassitudine, ix. 4.

ΚΝΙΠΕΡΙΣ. Folliculus, *Bot.* a *κνίψ*, qui ibi nidulatur, ii. 9.

ΚΟΓΧΗ. 1. Mensura 2 cochlearium. 2. Bivalvis cujusdam testa ad mensuram usitata, ix. 6.

ΚΟΚΚΟΣ. Granum: semen Mali Punici. de C. Pl. v.

ΚΟΛΟΒΟΣ. Curtus, imperfectus. *ανθος κολοβον*, alias *κολοβοανθης*, flos papilionaceus, *Bot.* viii. 3.

ΚΟΛΟΥΣΙΣ. Amputatio: *κολων των ῥιζων* Αμυγδαλης προς το γλυκαίνειν. de C. Pl. ii.

ΚΟΜΗ ἡ. 1. Pappus Tragopogonis, vii. 7. 2. Caput frondosum arboris. de C. Pl. iii. 3. Frondes in genere.

ΚΟΝΙΑΣΙΣ *τειχους*. Dealbatio muris calce soluta, "white-washing," iv. 11.

ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ. 1. Pollen, *Bot.* ii. 8. ubi fœcundatio Palmæ fœminæ accurate describitur. 2. Collectio staminum in flore; hinc *κονιορτωδες ανθος*, de flore stamineo. vid. *χρους*,

ΚΟΠΑΔΕΣ αἱ. "Coppices of wood," voce retenta.

ΚΟΠΡΟΣ. Fimus. *Agric.* Qualitates et genera *κοπρου* accurate discriminantur. de C. Pl. v.

ΚΟΠΤΟΜΑΙ. Corrodor a vermicibus, viii. 10.

ΚΟΡΜΟΣ. Truncus ligni: *κορμοι οἱ*, "Billets."

ΚΟΡΕΙΟΝ. Radix Loti, sic dicta, iv. 10. Vox Ægyptiaca.

ΚΟΡΥΜΒΑ. Corymbus, *Bot.* *Κίττε κορυμβά εις σφαιραν*, iii. 18.

ΚΟΡΥΝΗ. Inflorescentia thyrsiformis; ut Pruni, *Lauro cerasi* L.

ΚΟΡΥΝΑΩ. id.

ΚΟΤΥΛΗΔΩΝ. 1. Umbilicus 2. Cavities in radice Poly-podii; vel potius tentacula, ix. 14.

ΚΟΥΡΑ. } De tonsuris arborum, ii. 2.

ΚΟΥΡΙΖΩ. }
ΚΟΧΛΑΚΩΔΗΣ. Terra cochleis abundans; de fratis terræ, testaceis fossilibus, ix. 10.

ΚΡΑΔΑΙ αἱ. Verrucosæ intumescentiæ magnæ molis, in truncis arborum, i. 13.

ΚΡΑΔΑΩ. id.

ΚΡΑΔΗ. Ramus major. vid. *κλων*. de C. Pl. vi.

ΚΡΑΔΟΣ. Morbus in truncis vel ramis, *ὅταν μελανθωσι*, iv. 16.

ΚΡΑΜΒΟΣ. Morbus Oleæ, vid. desc. de C. Pl. v.

- ΚΡΑΣΙΣ. Temperamentum ex mixtura: κρasis αἰρος, temperamentum aeris. de C. Pl. iv.
- ΚΡΑΥΡΟΣ. Fragilis: opp. τῷ γλισχρῷ. i. 8.
- ΚΡΕΙΤΤΩΣΙΣ. Morbus affinis ερυσιῆς.
- ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ τα. Pedunculi penfiles florum Arbuti, iii. 16.
- ΚΡΙΝΙΟΣ. Liliaceus, a κρινον, iv. 10.
- ΚΡΟΤΗΤΟΙ οἱ. Viæ tritæ, vi. 6.
- ΚΤΑΝΕΑ? Pectinis spec. (vid. Præf.) iii. 10.
- ΚΤΗΔΩΝ. Cursus venarum in ligno, v. 2. vid. μονοξοος.
- ΚΥΑΜΟΝ το. Fructus Κυαμου, iv. 10.
- ΚΥΕΩ. Fructifico.
- ΚΥΗΜΑ. Pericarpium, Bot. vi. 4.
- ΚΥΡΙΟΝ το. Principium: hinc κυριον του ζην. de C. Pl. v.
- ΚΥΤΙΝΟΣ. Pericarpium globosum Punicæ; vel potius Calyx carnosus, εν τῷ κυτινῷ το ανθος Ποιας, i. 22.
- ΚΥΤΤΑΡΟΝ. 1. Strobilus in Pinu. 2. Cavea in receptaculo Loti, Heleotropii, &c. iii. 6.
- ΚΥΩΝ δ. Canis major, fidus, i. 15.
- ΚΩΔΙΑ. Papaveris pericarpium, ix. 13.
- ΚΩΜΥΘΕΣ. "Beds of reeds," vox Ægypt. iv. 2.
- ΚΩΝΟΣ. Strobilus. vid. κυτταρος, i. 18.
- ΚΩΡΥΚΗ. Folliculus. De floribus Ulmi, iii. 14, 15.

Λ.

ΛΑΒΗ. Manubrium: αἱ λαβæ των εγχειριδιων, vi. 4.

ΛΑΓΑΡΟΣ. Laxus. Pharm. de alvo, ix. 11.

ΛΑΧΑΝΑ. Olera: τα προς ἡμετεραν χρεϊαν, vii. 7.

ΛΑΧΑΝΗΡΟΣ. } Divisio plan-
ΛΑΧΑΝΩΔΗΣ. } tarum esculentarum in λαχανωδη, και σιτωδη, vii. 1.

ΛΕΑΝΤΙΚΟΣ. Lævis: item de succo molli, oleoso. Χυμος λεαντικός ἢ λεπτός, ἢ λείος. de C. Pl. vi.

ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ. Pratenfis? Distinguitur solum in λειμωνιον, pratenfe; ελειον, palustre; λιμνωδη inundatum: γη λειμωνια. de C. Pl. ii.

ΛΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule lævi: opp. τῷ νευροκαυλῷ, vii. 2.

ΛΕΙΡΙΩΔΗΣ. Respectu odoris, iii. 12.

ΛΕΙΧΗΝΙΑΩ. Lichenibus infestor; de truncis arborum; "to grow mossy." de C. Pl. v.

ΛΕΚΙΘΩΔΗΣ. Instar pulmenti, iv. 10. a λεκιθος.

ΛΕΜΜΑ. Cortex arundinis, iv. 11.

ΛΕΠΙΔΕΣ αἱ. Ramenta: particulæ minutæ in aëre, "motes."

iv. 19. ὅταν αἰθρίας οὐσης (hyemis tempore) αἱ λεπίδες καταφέρονται, ὥσπερ ξυσματα, πλὴν πλατυτέρα. N. B. Forf. particulæ glaciales, ib.

ΛΕΠΤΟΓΕΩΝ. Terra levis: de qualitate foli. Angl. "a light soil."

ΛΕΠΤΟΙΝΟΣ. Fibris tenuibus, de ligno, "fine grained." vid. ις, iii. 10.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ. De particulis primordiis. Aqua pura sic dicta. de C. Pl. vi.

ΛΕΠΤΥΝΩ. Lævigo: Differt ab ἀληθινῷ, molo. de C. Pl. iv.

ΛΕΠΥΡΙΑ τα. 1. Squamæ piscium; 2. Squamæ in corticibus et frondibus Fucorum, iv. 7.

ΛΕΠΥΡΩΔΗΣ. id. vii. 9.

ΛΕΥΚΑ τα. In ligno; album, Bot. iii. 10.

ΛΕΥΚΟΓΑΙΟΣ. Inter soli varietates: opp. μελαγγειῶ. de C. Pl. ii.

ΛΙΘΙΑΩ. Pharm. calculo laboro, vii. 6.

ΛΙΘΟΣ ἡ. Magnes. Forf. Lapis Lydius, "touch-stone." ix. 19.

ΛΙΠΑΡΟΣ. Oleosus, nitens: vid. γλισχρός. de C. Pl. iv.

ΛΙΠΑΩ. De fluxu, vel ascensu succi in arboribus: παν το δένδρον, ὅταν βλαστῇ, λιπαῖ,

iii. 6. δια το λιπαῶν υπεραιεριστος ὁ φλοιος. ib.

ΛΙΠΟΣ. Fluxus succi.

ΛΙΠΟΤΗΣ. Morbus ex nimio fluxu. de C. Pl. v.

ΛΟΒΟΣ. Siliqua: hinc ἑλλοβος lobatus, μακρολοβος, &c. &c.

ΛΟΓΟΥ δεομαι. phrasis; Solutione egeo. de C. Pl. v.

ΛΟΠΑΣ. Morbus in radicibus ex nimio humore; οἶον μαδισις, vid. λιπαῶ: præcipue in Ficu. de C. Pl. v.

ΛΟΠΕΩ. Vid. infr. λοπος, iv. 18.

ΛΟΠΙΑ. } Tempus decorticationis,
ΛΟΠΗΤΑΣ. } candi, v. 1.

ΛΟΠΙΟΣ. Tunica corticis: hinc cortex μονολοπος, πολυλοπος, i. 8.

ΛΟΥΣΣΟΝ το. In trunco Abietis nodus similis αἰγιδος: (vid.) sed albus, το λευκον λουσσον; Αἰγίς autem ευχρῶς δια το ενδαδον, iii. 10. N. B. id. q. αἰγίς in Pinu.

ΛΟΦΟΥΡΟΙ οἱ. Equi, Afini? Vox λοφερος, cristæ-caudatus, ex usu caudæ equinæ ad galearum cristas: opp. τοις σελεφεροις, Ovibus, Capreis, Damis, &c. quorum cauda cylindrico-æqualis, instar stipitis, iii. 10. p.

ΛΟΧΕΙΑ. Parturitio, item met. in arboribus. de C. Pl. iii.

ΛΟΧΜΗ. Dumetum paludosum: "a jungle."

ΛΟΧΜΩΔΗ τα. Frutices ibi crescentes, iv. 9.

ΛΥΠΡΟΤΗΣ. Ariditas, macies :
forſan a λυπηρος, triftis. de
C. Pl. v.

ΛΥΤΙΚΟΣ. Φαρμακον λυτικον, an-
tidotum, ix. 16.

M.

ΜΑΔΑΩ. infr.

ΜΑΔΙΣΙΣ. Morbus Ficûs ad ra-
dices, ex nimio humore, iv.
16.

ΜΑΚΕΔΩΝΙΑ. Montes hujus
regionis arboribus variis ſca-
tent: Ελατη, Πευκη, Πιλυς, Π.
αγρια, Φιλυρα, Φηγος, Πυξος,
Ζυγια, Ανδραχνη, Μιλος, Αρ-
κευθος, Τερμινθος, Ερινεος, Φι-
λυκη, Αφαρκη, Καρυα, Διος βα-
λανος, Πρινος, iii. 4.

ΜΑΛΑΚΟΣ. Reſpectu temperi-
ei cœli: αηρ μαλακος, "a ſoft
air," vi. 7. reſpectu ſaporis
vini: opp. αυστηρ. de C. Pl.
ii.

ΜΑΛΑΣΣΩ. Tundendo mollio,
de C. Pl. v.

ΜΑΝΟΣ. 1. Rarus reſpectu fi-
tûs: φυλλα μανα opp. πυκ-
νοις, v. 3. 2. laxus, poroſus ;
γη μανα, και ευδιοδος, i. 8.
ξύλον μανον, i. 6.

ΜΑΝΟΤΗΣ, id.

ΜΑΣΑΩ. } De actione man-
ΜΑΣΗΜΑ. } ducandi: "chew-
ΜΑΣΗΣΙΣ. } ing," iv. 9.

ΜΑΣΠΕΤΟΣ. Folium Silphii,
vi. 3. N.B. Vox Syriaca ?

ΜΑΣΧΑΛΗ. Axilla rami, vel
folii, Bot. iii. 9.

ΜΑΤΙΑΙΟΣ. Per contractionem
pr. ναματιαιος: ὕδωρ ματιαιον,
aqua fontinalis, ii. 8.

ΜΕΛΑΓΓΕΙΟΣ. } Soli ſpec. Α-
ΜΕΛΑΓΓΕΩΣ. } gric. γη πειρα
και μελαγγειος, "a rich black
mould." de C. Pl. ii.

ΜΕΛΑΝΔΡΥΟΝ. Cor ligni quer-
cûs, vel generaliter; Δρυς
enim vox generalis: opp. τοις
λευκοις. (vid. τα λευκα) i. 9.

ΜΕΛΑΣ. } De colore; ob-
ΜΕΛΑΝΙΑ. } ſcuritatem quan-
dam indicat; ita apud nos,
"dark coloured," v. 4. et paſſi.

ΜΕΛΙ. Methodus edulcorandi
ſpecies quaſdam infuſione
feminum in melle. de C.
Pl. v.

ΜΕΛΙΤΤΑ. Averſatur unguenta
pretioſa. de C. Pl. vi.

ΜΕΛΙΤΤΟΥΤΑ. Placenta farrea
melle condita: παγκαρπος
μελιττουτα, in qua ſαφιδες,
aliique fructus paſſi: "a
plum cake."

ΜΕΡΟΣ. κατα μέρος' ανα μέρος,
ſucceſſive, vii. 3. et p.

ΜΕΣΟΓΟΝΙΟΝ. Internodium,
iv. 12.

ΜΕΤΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Iterum
germino: δένδρα αυτοματως
μεταβλαſτανει, μεταβολης τινος
γινομενης εκ των ουρανιων, ii. 7.

ΜΕΤΑΛΛΑ τα. Fodinæ metal-
licæ, ix. 13.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΑ τα. Mi-

- neræ crudæ; "Ores." de C. Pl. vi.
- METEΩΡΟΣ. Superficialis; de radicibus, iii. 11.
- MΗΑΙΝΟΕΙΣ. Subflavus, iii. 11.
- MΗΑΙΝΟΣ, a μηλον. Flavus. de C. Pl. ii.
- MΗΡΙΚΑΖΩ. } Rumino. N. B.
MΗΡΥΚΑΖΩ. } Animalia distinguuntur in μηρυκαζούια, et λοφουρα, (vid.)
- ΜΗΤΡΑ. 1. Medulla, pars cava, vasculosa in truncis et ramis: το μεταξύ του ξυλου, τριτον απο φλοιου, i. 3. 2. Interior pars trunci in adultis, aliter καρδια, εγκαρδιον, εντερικωνη. N. B. evanescit ætate ἢ μητρα. In quibusdam, ut observat Theoph. est ὑμενωδης, (vasculosus,) in aliis σαρκωδης, in aliis ξυλωδης, i. 9. Μητρα μαλιστα ζωτικον. de C. Pl. v. Hinc cel. Linn. in Amœnit. "vita plantarum in substantia medullari consistit;" forf. in junioribus: sed de hoc inquirendum.
- ΜΙΔΑΣ. Morbus in Fabis, Pis, &c. Forf. Puccinea, *Pbafcolorum* Hedw. fil. Fung. ined. t. 19. vel Uredo, *appendiculata* var. β, Persoon, Syn. 222. Fungi hi minutissimi folia et plantas totas quandoque cooperiunt, unde ex aureo colore nomen forsitan a fabula inditum.
- ΜΙΚΡΟΠΗΝΟΣ. Per contract.
- a πυρη, nucleo parvo. de C. Pl. i.
- ΜΙΣΧΟΣ. 1. Pedunculus, *Bot.* p. ὃ συνηρτηται το φυλλον. 2. Ligonis spec. forf. tridens quoddam. vid. δικελλω. de C. Pl. iii.
- ΜΟΛΥΝΣΙΣ. Tarda concoctio. de C. Pl. iv.
- ΜΟΝΑΧΟΥ. Uno in loco, ix. 10.
- ΜΟΝΟΚΩΛΟΣ. Simplex, *Bot.* non lobatus, de folio, ix. 20.
- ΜΟΝΟΞΟΣ. De cursu venarum in ligno; "the grain." N. B. Haud facile intelligendus sensus auctoris respectu κτηδονων in ligno; (vid.) 1. μονοξοα, vel μονοζοα, (*Bot.*) πλειω εισι των αλλων ξυλων. (v. 2.) 2. Διξοα εχουσι κτηδονα μιαν εφ' ἑκατερα της εντερικωνης· και ταυτας εναντιας αλληλαις, ib. 3. Δενδρα τετραξοα, ὅσοις εφ' ἑκατερα της εντερικωνης δυο κτηδονες εισι εναντιαν εχουσαι την φυσιν. ib. N. B. Lign. Pinus exemplum præbet posterioris, ex singulari modo crescendi, sc. quatuor ramis horizontalibus; hinc κληδονων, vel cursuum venarum in ligno dispositio.
- ΜΟΝΟΠΙΖΟΣ τη παχεια. Radix fusiformis. *Bot.* vi. 7.
- ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΟΣ. Rota simplici; μονοστροφος αμαξα, v. 8.
- ΜΟΝΟΦΥΗΣ. Homogeneous. de C. Pl. i.

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΣ. Respectu germinationis feminum; Monocotyledonus. *Bot.* viii. 2.

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ τα. Surculi: opp. φυτευμασι, plantis ex femine. de C. Pl. vi.

ΜΟΣΧΕΥΩ. Propago per furculos. 1. simpl. "to plant cuttings or suckers;" 2. μοσχευειν vel προμοσχευειν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ δένδρου, "to graff." ii. 7. et p.

ΜΟΧΘΗΡΟΣ. Met. sterilis; γη μοχθηρα, ii. 3.

ΜΥΡΙΟΠΟΥΣ? Leg. αμαυροπους, de Triangulo inæquilaterali. opp. ισοποδιας. de C. Pl. vi.

ΜΥΡΙΣ. Vas unguentarium: "a perfume pot."

ΜΥΟΧΟΔΟΙ. Rectius Μυοδόχοι. 1. Cavities murium. 2. Terebrellum, "a gimlet;" cuius actio denotatur δια το περιστραφεισθαι, v. 5.

N.

ΝΑΙΡΟΝ. Unguenti pretiosi spec. ix. 7.

ΝΑΜΑΤΙΟΣ. } Fontinalis. vid.
ΝΑΜΑΤΙΑΙΟΣ. } per contractionem ματιαιος, supr. N. B. ναμ. ὕδωρ, opp. ὕδατι ἐκ διος, ("rain water,") viii. 7.

ΝΑΡΔΟΣ. Ung. Vid. Ναρδος, *Tab. Syst.* p. 22. "spike-nard," ib. N. B. Andropo-

gon *Schoenantbus* L. accurate delineatur et describitur in opere egregio apud Gallos "Jardin de Cels" dicto. *Tab.* 89.

ΝΑΡΘΗΞ. Internodium. 1. Ferula pl. (v. *Syst.*) 2. Internodium caulinum. N. B. Το κοίλον ναρθηκος, vice phialæ apud antiquos in usu, ix. 16.

ΝΑΡΤΗ. Forſan præparatio diverſa ναρδου, ſupr. ſeparatim enumeratur in *Cat.* ix. 7.

ΝΕΑΩ. De actione novandi agros: "to fallow."

ΝΕΙΟΣ. } Novale. νειος εαρινος.
ΝΕΙΟΝ. } νειος χειμερινος, viii. 6.

ΝΕΜΟΜΕΝΟΣ. Excavatus: νεμομενα ἑλκη, ulcera profunda, inveterata, ix. 12.

ΝΕΟΔΕΡΟΣ. Recens exco-riatus, ix. 15. met. de cortice in arboribus.

ΝΕΩΤΑ. Εἰς νεωτα, in annum proximum.

ΝΗΠΙΟΣ. *metaph.* de plantis junioribus, viii. 1.

ΝΗΣΟΙ πλοαδες. Fluitantes. Frequens mentio in lacubus et fluviis. L. Orchomeni, ix. 13.

ΝΙΤΡΟΝ. Sal nitrum: singularis usus ejus ad edulcorandos Raphanos. de C. Pl. iii.

ΝΟΣΤΙΜΟΣ. Gustu dulcis, a νοσος. Ρβαυ. σπιγματα ευχολοτερα, νοστιμοτερα. de C. Pl. iv.

Ξ.

ΞΥΛΟΝ. Pars solida trunci et ramorum, constans ex partibus quæ *ινες*, *φλεβες*, *σαρξ* vocantur. (vid.) N.B. Ξύλα antiquitus in *δερμα* και *ψυχρα* dividebantur respectu usus in *πυρεταίς*. Ξύλα *δερμα* frictione, calida evadunt, et hebetant aciem telorum; hujus generis *Κιττος*, *Δαφνη*, *Συκαμινος*, v. 4.

ΞΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ. *Met.* Manfuefactus sum, de plantis cultura amelioratis. de C. Pl. i.

ΞΥΝΕΙΣΤΗΚΩΣ. Compressus, vi. 2.

ΞΥΡΟΣ? An error pro *ξηρος*? *ξηρος* και *ξύλωδης*.

ΞΥΩ. Rado: *ξύειν εν οίνω*, "scraping a root into wine," ix. 12.

Ο.

ΟΓΚΟΣ. 1. Tumor. 2. Pericarpium globosum rosæ, i. 22.

ΟΖΟΣ. Nodus in arbore, ubi ramus oritur. N.B. Fibræ (*ινες*) ibi deflectuntur, et in orbem circumferuntur: (vid. *κτηδων*, *μονοξοος*.) *εσι γαρ οζος αρχη τις του κλαδου*. Hinc *τριοζα* *δενδρα*, *τετροζα*, *πενταοζα*, i. 13. N.B. Οζοι præcipue conspiciuntur in Pinu et Abiete L.

ΟΙΚΕΙΟΣ. Conveniens, moderatus, consentaneus.

ΟΙΚΗΜΑ. Receptaculum in Compositis. *Bot.* de C. Pl. iv.

ΟΙΝΑΡΟΝ. Vitis folium. de C. Pl. vi.

ΟΙΝΟΣ. Vinum: potestates variae in diversis vini generibus. *οινος αγονος*, (sterilitatem inducens,) ix. 12. *οινος ύπνωτικός* *οινος εκστατικός*. N.B. Vini usus ad arcendos vermes ex feminibus. de C. Pl. iii.

ΟΙΝΩΔΗΣ. Purpureo-ruber respectu coloris; *ύγρασια οινώδης τη οψει*, iii. 13.

ΟΙΝΩΨ. } Id. N.B. Lig-
ΟΙΝΟΧΡΩΣ. } num *Αριας λευκοτερον του Πριου*, *οινωποτερον της Δρευος*, "darker coloured," iii. 16. *υνα οινοχρωτες*, και *ερυθροι*, ix. 3.

ΟΛΙΒΑΝΟΝ. Fructus vel gummi *Ολιβανου*. Vid. *Tab. Syst.* p. 28.

ΟΛΙΓΟΧΟΟΣ. Parcius fructum ferens: opp. *πολυχωρ*, viii. 4.

ΟΛΚΗ. Pondus: ab *ὀλκω*, (vergo,) ix. 17.

ΟΛΚΟΝ το. Vis attractiva, ab *ὀλκω*, (traho): *τουτο το ὀλκον της τροφης*. de C. Pl. iv.

ΟΛΜΟΣ. Mortarium: *κοπτοντες εν ὀλμῳ*, "pounding in a mortar," ix. 16.

ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Ventus ex M. Olympo, iv. 17. vid. *καυδμος*.

ΟΛΥΝΘΑΖΩ. Ab ολυνθος, caprifico. N. B. Caprificationis methodus et notitia sexûs plantarum Theophrasto cognitæ. Investigatione instituta de influentia aëris respectu fructificationis, de C. Pl. ii. ita pergit Auctor: καὶ τῶν τοιούτων ἐν τῇ προσαρτησεί τε, καὶ τοῖς οὔχοις (in appendice florali et pericarpis) ἡ αἰτία (causa vel modus impregnationis:) τῶν δὲ Συκῶν καὶ Φοινίκων οὐκ ἐν τοῦτοις ἐστὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ διαστάσει αὐτῶν, (etiam quando arbores ipsæ fitu separentur,) διὸ καὶ ἐρινάζουσι τὰς Συκάς· τούτο δὲ ποιεῖ οὕτως οἱ Ψήνεις (Cynips Pfenes) οἱ ἐκ τῶν Ἐρινῶν (vid.) ἐπιχρεμάννυμενων γινόμενοι διοίγῃσι τὰ ἐπὶ τῆς Συκῆς.

ΟΜΑΛΗΣ. Lævis, homogeneus; texturæ simplicis: opp. λεπυρωθεῖ, tunicato, vii. 9.

ΟΜΟΙΟΜΕΡΗΣ. In partes fimiles divisibilis, ut aqua &c. N. B. Opp. ἀνομοιομερεῖ, ut truncus arboris in corticem, lignum, fibras, succum, i. 2.

ΟΜΟΣΤΙΧΟΣ. Serie simplici: vid. διστίχος, &c. de C. Pl. vi.

ΟΜΦΑΚΩΔΗΣ. Color fature purpureus: hinc bacca Sambuci, nigri L. ita vocatur, iii. 12.

ΟΜΦΑΞ. Succus uvæ inspissatus.

ΟΜΩΝΥΜΙΑ. Synonymia.

ΟΜΩΝΥΜΟΣ. Synonymus, Bot. vii. 14. id.

ΟΞΥΒΑΦΟΝ. Acetabulum, mensura, ix. 12.

ΟΟΝ. } Fructus Sorbi, ii. 3.
ΩΟΝ. }

ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΟΝ. Gummi Amyridis, Giliadensis L. Vid. Tab. Syst.

ΟΠΙΣΜΟΣ. Collectio succi sponte fluentis: opp. χυλίσμῳ, succo expresso. vid.

ΟΠΟΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ. Oleum Cinnamomi, iv.

ΟΠΟΣ. Succus sponte fluens: opp. χυλῳ, succo expresso. N. B. Οπος coagulatus aliquando δακρυον vocatur, i. 3.

ΟΠΩΔΗΣ. Aqueus: opp. γαλακτωδεῖ, πιττωδεῖ, i. 19.

ΟΡΓΑΝ. Intumescō: ὅταν οργᾶται σπέρματα, antequam germinent. de C. Pl. ii. γῆ ὀργῶσα, ἐνίκμος, ib. iii.

ΟΡΕΟΤΥΠΟΙ. Lignarii, ib. vi.

ΟΡΜΗ. Excitatio, tendentia: opp. τῇ φθορᾷ respectu odorum. de C. Pl. vi.

ΟΡΝΙΘΕΣ. Ætate progrediente dissimiles sibi, plumarum colore mutato. de C. Pl. v.

ΟΡΟΣ. } 1. Serum lactis,
ΟΡΡΟΣ. } "whey." 2. Serum sanguinis. 3. Succus tenuis serofus, iii. 10. ix. 2.

ΟΡΡΩΔΗΣ. Serofus.

ΟΣΜΗ. Διήθησις τοῦ ξηροῦ διατῆ ὑγροῦ, de C. Pl. vi. ubi sub-

tilis admodum Demetrii Philosophi occurrit disquisitio de differentiis odorum ex forma particularum.

ΟΣΤΑΥΓΞ. } 1. Tentaculum.
ΟΣΤΑΙΓΞ. } Nat. Hist. 2. Cirrhus, Bot.

ΟΥΛΟΣ. 1. Crispus, cirrhatus; de coma capitis apud Afros. 2. Fibrarum distorsiones in ligno, (αἱ συσφαιτῶν ξύλων, v. 6.) 3. Curvitates ramorum, iii. 17. 4. De rugoso Brassicæ folio. (vid. ῥαφανός, Tab. Syst. p. 15.)

ΟΥΛΟΤΗΣ. Id.

ΟΥΡΟΝ. Usus urinæ in edulcorandis amygdalis. de C. Pl. iii.

ΟΥΟΝ. Vid. ΟΟΝ.

ΟΦΘΑΛΜΟΣ. Gemma. Bot. Hinc οφθαλμιζω, Hort. et οφθαλμισμός. (vid.)

ΟΥΙΟΣ. ὕδατα οψία in calidis regionibus, "Tropical rains" dict.

Π.

ΠΑΓΚΑΡΠΙΟΣ. Fructibus omnigenis farctus. παγκ. μελιτόντα. vid.

ΠΑΓΟΙ οἱ. Tempus glaciale, iv. 17.

ΠΑΘΗ τα. Proprietates, vires, respectu plantarum; sic apud Virg. "Scire potestates herbarum," i. 1.

ΠΑΙΔΕΙΑ φυτῶν. Hort. "the training of trees." de C. Pl. iii.

ΠΑΛΑΘΗ. Massa fructuum conditorum, præcipue Ficum; hoc modo facta; ξηραίνοντες τὸν καρπὸν, (τῆς Κοκκυμηλίας) καὶ τοὺς πυρήνας εξαίρουντες κοπτοῦσι, (tundunt) καὶ ποιοῦσι παλαδάς. Angl. "Marmalade." iv. 9.

ΠΑΛΙΒΛΑΣΤΟΣ. Iterum germinans: de germ. autumnali, "the autumn shoots," hort.

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΣ. Reciprocus; sibi invicem succedens. de C. Pl. iii.

ΠΑΝΑΞ το. Succus inspissatus Πανακείας. vid.

ΠΑΠΠΟΣ. Lanugo; pappus, Bot.

ΠΑΠΠΩΔΗ σπέρματα. Papposa; pappo coronata. Bot. vi. 4.

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Germino ex radice: i. e. "by the side of the trunk."

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. Ang. "a sucker," i. 9.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ. Apud Orientes. Septa spatiosa arboribus confita, feris omnigenis servandis. vid. Desc. v. 9. ix. 6.

ΠΑΡΑΚΑΘΙΗΜΙ. vid. παρακατασάνω, viii. 2.

ΠΑΡΑΚΑΝΘΙΖΩ. Juxta folium spinosus sum? vel forf. spinulis, ex margine vel rachi folii, i. 17.

ΠΑΡΑΚΑΤΛΙΖΩ. De fruticibus
ab imo caulescentibus : opp.

μονοκαυλιζω. *Bot.* vi. 2.

ΠΑΡΑΚΙΝΕΩ. Infanire facio,
ix. 20.

ΠΑΡΑΛΙΘΑΖΩ. Lapidescō : de
concretionē in fructu Pyri,
iii. 10.

ΠΑΡΑΛΛΑΞ. Alternatim.

ΠΑΡΑΛΛΑΤΤΩΝ. Alternans.
Bot.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ. Oppositus. *Bot.*

ΠΑΡΑΠΑΝΤΩ. Distorqueo, v.
3.

ΠΑΡΑΠΛΗΘΙΑ. Abundantia.
de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΠΟΙΕΩ. Perperam facio.
de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΣΠΑΔΕΣ. Rami avulsi ad
propagandum : "fets." N.B.
Rami abscissi apud nos voc.
"cuttings," ii. 2.

ΠΑΡΑΤΕΜΝΩ. Intempestive
cædo, vi. 3.

ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ. id. q. παρα-
ελαστοί.

ΠΑΡΑΦΥΩ. Pullulo eodem tem-
pore; vel act. emitto radices,
furculos, &c. vii. 2.

ΠΑΡΙΗΜΙ. Debilitor. de C. Pl.
iii.

ΠΑΡΙΣΤΗΜΙ. id. quod ἐξίστημι,
de vino. de C. Pl. vi. "to
turn sour." Οἱ λεπτοὶ οἶνοι
ευδαίεις, καὶ θάπτον παρῖστα-
μενοι. ib.

ΠΑΡΥΔΡΟΣ. Juxta aquas cref-
cens : ενυδρὸς, in aquis, iv.
13.

ΠΑΡΩΡΟΣ. Intempestivus. de
C. Pl. iii.

ΠΑΤΤΑΛΟΣ. Paxillum : "a
peg." π. σιδηρὸς, ii. 3.

ΠΑΤΤΩ. Complano, premo.
de C. Pl. vi. Calco pedibus.
Hinc

ΠΑΤΟΣ. Via calcata : Angl.
voce fere retenta, "a path,"
vi. 6.

ΠΕΠΕΙΡΟΣ. syn. πεπαιγμένος, ma-
turus. de C. Pl. iii.

ΠΕΡΙΑΛΕΙΦΩ. Circumluto, v.
9.

ΠΕΡΙΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule
scandente. *Bot.* viii. 8.

ΠΕΡΙΒΩΘΡΩΜΕΝΟΣ. *Hort.*
"trenched round." de C.
Pl. v.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ. Circumscindo;
notas circum incido, ix. 9.

ΠΕΡΙΚΑΘΑΙΡΩ. *Hort.* vid. κα-
θαίρω.

ΠΕΡΙΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Successio
continuata florum vel fruc-
tuum.

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΟΣ. Ambitus
capitis; mensura, iii. 13.

ΠΕΡΙΚΟΜΟΣ. Frondosus val-
de, iii.

ΠΕΡΙΜΗΤΡΙΟΣ. De ligno. vid.
μητρα, iii. 10.

ΠΕΡΙΟΧΗ. Tegmen; cuticula
pericarpium. *Bot.* de C. Pl. i.

ΠΕΡΙΠΑΤΤΩ. vid. παττω, ii. 8.

ΠΕΡΙΠΙΠΤΩ. Undique decido;
de cortice arbuti, i. 8.

ΠΕΡΙΠΝΟΥΣ. "An eddy of
wind," v. 2.

ΠΕΡΙΣΑΤΤΩ. } Circumstipo.
ΠΕΡΙΣΑΞΙΣ. } Vid. σαττω. de
C. Pl. v.

ΠΕΡΙΣΚΕΛΗΣ, α σκελλω. Ari-
dus, durus: de radice Helle-
bori: σκληρον και περισκελη,
ix. 11. item de vento, Angl.
“a dry parching wind.” de
C. Pl. ii.

ΠΕΡΙΤΤΟΣ. 1. Extraordinarius,
excellens, ix. 7. 2. Superflu-
us, ἐξ ακρου περιττος, de folio
pinnato, extremo impari. Bot.
iii. 15.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ. Superflua;
excrementa: N. B. Animalia,
τα περιττωματα, per alvum
ejiciunt, non tamen plantæ,
quæ idcirco απεριττωτοι, i. 4.
de C. Pl. vi.

ΠΕΡΙΦΕΡΩ. Sustineo: de viri-
bus stomachi ad digerendum,
ix. 13.

ΠΕΡΝΙΞ. Pars fructifera Cacti,
opuntiae L. vi. 4.

ΠΕΡΥΣΙΝΟΣ. Prioris anni; de
fructu. ὁ καρπος (Juniperi)
διαμενει εις ενιαυτον· ειθ' ὅταν
ὁ αλλος επιφυη, ὁ περυσινος
αποπιπτει, iii. 12.

ΠΕΣΣΟΣ. Pharm. “a tent for
a wound,” ix. 22.

ΠΕΤΑΣΟΙ οἱ. Folia Ari, colocas-
siae, ex similitudine.

ΠΗΓΝΥΩ. Planto manibus. Bot.
vii. 1.

ΠΗΚΤΙΚΟΣ. Congelans.

ΠΗΞΙΣ. Concretio gummosa,
ix. 1. αἱ Πηξεις de tempore

pruinoso.

ΠΗΝΙΟΝ. Fufus: “spindle.”
forf. ex voc. Græc. vii. 3.

ΠΗΡΩΣΙΣ. met. οφθαλμων, in
arboribus, “a blight,” iv.
16.

ΠΙΕΣΑΓΓΑΙ. } Anginae pecto-
ΠΙΕΣΑΓΧΑΙ. } ris. de C. Pl. iv.
ΠΙΛΗΣΙΣ. Conspitatio. de C.
Pl. ii.

ΠΙΛΟΣ ἡ. Pars floccosa, iv. 10.

ΠΙΛΩΝ. Coarctio. ὁ χειμων πι-
λοι και καρκινοι (vid.) τας ῥι-
ζας. de C. Pl. iii. 4.

ΠΙΤΤΟΚΑΥΤΕΩ. De actione
ligna Abietina comburendi
ad extrahendam picem. vid.
Desc. ix. 2.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΡΠΙΟΣ. Fructu late-
rali, vii. 3.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule hori-
zontali: opp. ορθοκαυλω, viii.
3.

ΠΛΑΚΟΥΝΤΩΔΗΣ. Placenta-
ceus, iv.

ΠΛΑΚΩΔΗΣ. Schistofus. Geo-
log. γη υπαργιλος και πλακω-
δης, ix. 4.

ΠΛΑΣΙΣ. επει εις την πλασιν με-
τεβησαν, (quando coeperunt
fistulas formare,) συν πλασ-
ματι, iv. 12.

ΠΛΑΣΜΑ. “the mouth-piece
of the fistula.” οἱ μετα
πλασματος αυλοντες: vid. et-
iam γλωττα, iv. 12.

ΠΛΕΚΤΑΝΑΙ. Tentacula: πο-
λυποδος πλεκταναι, ix. 14.

ΠΛΙΝΤΡΙΣ. Latericius, figuli-

- nus. γη πλιντεις. de C. Pl. iii.
- ΠΛΟΑΔΕΣ. (νησοι) Infulæ fluitantes, iv. 11.
- ΠΛΟΚΑΜΟΣ. Textilis: Καλαμου ἱpec. iv. 11.
- ΠΝΕΥΜΑ το. Vapor, gas. εν οινω ζειοντι, ix. 18.
- ΠΝΙΓΗ τα. Calor æstivus, ix. 5.
- ΠΟΑ. 1. Pars herbacea plantæ, ix. 16. 2. Vires vel succi plantarum. τας φυλλωδεις δυναμεις ποας καλουσι, ix. 8.
- ΠΟΑΣΜΟΣ. Sarculatio; actus averruncandi: "weeding." de C. Pl. iii. vid. σκαλισις.
- ΠΟΔΙΑΙΟΣ. vid. ισοποδιαιος.
- ΠΟΛΛΟΥ δια, respectu loci, longo intervallo. de C. Pl. iii.
- ΠΟΛΥΛΟΠΟΣ. vid. λοπος, μοβολοπος.
- ΠΟΛΥΜΑΣΧΑΛΟΣ. vid. μασχαλη, iii. 17.
- ΠΟΛΥΝΟΣΤΟΣ. Fæcundus valde, viii. 8.
- ΠΟΛΥΧΟΟΣ. id. de C. Pl. ii.
- ΠΟΝΕΩ. Marcesco, debilis sum. de C. Pl. iii.
- ΠΟΩΔΗΣ. Herbaceus: divisio plantarum, viii. 1.
- ΠΡΑΝΗΣ. Supinus: inferior folii superficies: opp. τω ὑπτιω, i. 14, 16.
- ΠΡΕΜΝΟΝ. 1. Surculus major; stipes, ii. 1. 2. morbus, seu intumescencia in ramo, i. 13.
- ΠΡΙΟΝΩΔΗΣ. Serratus, Bot. iii. 14.
- ΠΡΙΣΙΣ. Actio ferræ, v. 6.
- ΠΡΙΣΜΑΤΑ τα. Particulæ ligneæ ex ferratura: "fawdust," v. 8.
- ΠΡΟΑΠΤΩΤΟΣ. Immature decidens: ερινια προαπτωτα, iii. 5.
- ΠΡΟΒΟΛΑΙ αι. Primæ germinationes. de C. Pl. v.
- ΠΡΟΔΡΟΜΑΙ αι. Fructus præcox Ficûs. de C. Pl. v.
- ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Præparatio arundinum ad fistulas faciendas.
- ΠΡΟΔΑΜΒΑΝΩ. Prævenio; magico sensu. καταδεν και προλαμβανειν, vi. 2.
- ΠΡΟΣΑΓΩ. Applico remedium, ix. 13.
- ΠΡΟΣΑΦΕΨΕΩ. De præparatione ad coquendum: προσαφεψηθεντα εν οξει, (prius infusa et cocta in aceto,) vii. 11.
- ΠΡΟΣΔΕΝΔΡΟΝ. Parasita. Bot. de C. Pl. ii.
- ΠΡΟΣΘΕΤΑ τα. Menses muliebres, ix. 10.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ Recens: χλωρος και προσφατος. de C. Pl. vi.
- ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ κατα. De cibo idoneo ad fumendum. de C. Pl. vi.
- ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ. Conveniens, viii. 6.
- ΠΡΟΣΦΥΣΙΣ. 1. Infertio, i. 18. adhæfio, viii. 2. 2. Receptaculum in Compositis, Bot. vii. 13.

ΠΡΟΤΕΡΕΩ. Præcedo: *πρῶτε-
ρειν διμνην*, de præcitate
florum in Ægypto, vi. 7.

ΠΡΟΤΡΙΤΑ. Adv. tertio. de C.
Pl. iii.

ΠΡΟΩΘΕΟΜΑΙ. Sursum impel-
lor, iii. 7.

ΠΡΟΩΡΟΣ. Præcox, vii. 12.

ΠΡΩΡΑ. Bot. Apex vel fasti-
gium rami, &c. ii.

ΠΤΕΡΝΙΞ. Caulis Cacti, *opun-
tiæ* L.

ΠΤΕΡΩΔΗΣ. Pinnatus. Bot. ii.

ΠΤΙΣΣΩ. Tundo, item decor-
tico, ii. 5.

ΠΤΟΡΘΑΚΑΝΘΟΣ. Ramis spi-
nosis, vi. 1.

ΠΥΓΩΝ. Cubitus; mensura, iv.
6.

ΠΥΘΜΗΝ. Corona radices fusi-
formis. Bot. iv. 12.

ΠΥΚΝΟΣ. De ligno; solidus,
densus: opp. *μανῶ*. vid.

ΠΥΡΕΙΑ. } Instrumentum igni

ΠΥΡΕΙΟΝ. } accendendo vi fric-
tionis: partes sunt, 1. *σχά-
ρα*, (lignum planum foveâ in

medio;) 2. *τροπανον*, (tere-
bra; pistillum obtusum ex
ligno duro,) v. 10. N.B. Mos
adhuc obtinet in India oc-
cidentalī.

ΠΥΡΗΝ. 1. Bacca, vel drupa,
Bot. 2. Nucleus in medio
lapilli, vel calculi. 3. Granum
in baccis. de C. Pl. ii.

ΠΥΡΩ. Torreo: igni coquo:
de C. Pl. vi.

ΠΥΡΩΣΙΣ (a *Πυρως*). Panifici-

um. de C. Pl. iv.

ΠΩΡΟΟΜΑΙ. In tophum con-
vertor: de cortice arboris,
iv. 18.

P.

ΠΑΒΔΟΙ οἱ. Venæ minerales,
ῥαβδοὶ μεταλλων. de C. Pl. iv.

ΠΑΒΔΟΣ Φοινίκος. Spatha, Bot.
ii. 8.

ΠΑΓΑΔΗΣ. } A *ῥαξ*, acinus:

ΠΑΓΩΔΗΣ. } de fructu Man-
dragoræ acinis pleno, vi. 3.
de p. Punicæ. de C. Pl. v.

ΠΑΧΙΣ. Rachis, Bot. nervus
intermedius folii; pedunculi
continuatio, iii. 8.

ΠΕΙΝ το. Morbus vitis, ex ni-
mio succo. de C. Pl. v.

ΠΗΓΜΑΤΑ τα. Fracturæ. Med.
vii. 11.

ΠΗΤΙΝΗ. } Propr. Terebinthi-

ΠΥΤΙΝΗ. } na fluido statu:
hinc vox Angl. "refin," de
concreto, iii. 15.

ΠΗΤΙΝΩΔΗΣ. Refinosus, ut-
pote lignum Abietinum.

ΠΙΖΟΤΟΜΙΑ. Anni tempus
herborifando proprium, ix. 8.

ΠΙΖΟΤΟΜΟΣ. Herbarius, iv. 5.

ΠΙΖΟΦΥΛΛΟΣ. De plantis, fo-
liis radicalibus. Bot. vii. 10.

ΡΟΑΔΕΣ αἱ. Grana vel semina
Mali Punici, iv. 11.

ΡΟΑΣ. } Morbus vitis. Syn. τῷ

ΡΟΙΑΣ. } *ῥεῖν*. de C. Pl. v.

ΡΟΔΩΝΙΑ. 1. Rosa planta
2. Rosetum.

ῬΟΠΗ. 1. Inclination, propensio, iv. 4. 2. Vis insita. de C. Pl. iv.

ῬΟΠΟΙ? An id. ῥοποι μασχαλίδος. a ῥέπω, iv.

ῬΟΥΣ Succus fruticis. (vid. *Tab. Syst.*) Ῥοός, inspissatus, iii. 18.

ῬΟΩΔΗΣ. Irriguus, γη ῥοωδής. de C. Pl. iii.

ῬΥΠΤΙΚΟΣ. Abstergens; de C. Pl. v.

ῬΥΠΤΟΜΑΙ. Abstergor: τροχίσσαι της τρυγος, (vid.) οἷς ῥυπτομεθα, (quorum usus in abstergendis fordibus, ut hodie saponis,) ix. 10.

ῬΥΤΟΝ ἰδωρ. Aqua rivularis: occurrunt etiam 2. ἰδ. ναματιαίον, "spring-water," 3. ἰδ. ἐκ Διός, "rain-water," ii. 3.

Σ.

ΣΑΚΚΙΖΟΜΕΝΟΣ. In sacco vel utri servatus. σινος σακκιζόμενος. de C. Pl. vi. N. B. Ασκού mentio fit vinis servandis apud Homerum, Il. iii. 247. item apud Herod. lib. ii. c. 121. sæpius apud LXX. in V. T. etiam in N. T. Matth. ix. 17. Luc. v. 37, 38.

ΣΑΡΙΣΣΑ. Hasta prælonga, Macedonica. N. B. Altitudo Corni, *fæminæ* L. comparatur ὑψει της σαρίσσης, unde quivis Κρανείαν θηλείαν statu natu-

rali investigans longitudinem celebris istius teli assequetur.

ΣΑΡΚΟΡΙΖΟΣ. Radice carnosâ; distinctio inter plantas, vii. 11.

ΣΑΡΚΟΦΥΛΛΟΣ. Crassifolius, *Bot.* "Plantes grasses," *Gall.*

ΣΑΡΞ. In plantis, pars intermedia inter ἰνας et φλέβας. (vid.) Constat laminulis flexilibus in cellulas orbiculares vel ovales dispositis, i. iv. Qui accuratiorem hujus rei velit scientiam, consulat Grewium, Malpighium, Duhamel. N. B. Caro fructûs Citri Aurantii, monente illo, nudo oculo vascula exhibet, alibi ope Microscopii ægre conspicienda. L. c. 4. p. 24. Vid. etiam Hillium de structura ligni, l. ii. c. 4.

ΣΗΜΕΙΟΝ. Punctum. ἀφ' ἑνός σημείου οἱ μισχοί, iii. 18.

ΣΗΠΩ. In aqua macero, iv. 10.

ΣΗΤΑΝΕΙΟΣ. } Ex voce Dor.
ΣΑΤΑΝΕΙΟΣ. } σατες, annuus, vii. 4. N. B. Apud Romanos vox synon. hornus, ab hora.

ΣΙΔΙΟΝ. Fructus Punicæ, *Granati*, L. etiam pl. aquaticæ Nymphææ affinis. de C. Pl. v.

ΣΙΝΔΩΝ. Vestis tenuis goffypina, "mullin," æque ac lintea. N. B. Vox ερίον apud Theophr. goffypium æque

- ac lanam amplectitur. Εριον ἐξ οὐ σινδονες εὐτελεις, "coarse muslins," πολυτελεις, "fine muslins," (vid. Εξιοφορα *Tab. Syst.* p. 15.) iv. 9.
- ΣΙΝΟΣ. Detrimentum, injuria. de C. Pl. ii.
- ΣΚΑΔΙΑ. Pericarpium Caeti, *opuntiae* L. de C. Pl. v.
- ΣΚΑΔΙΣΙΣ. } Sarculatio, "rak-
ΣΚΑΛΣΙΣ. } ing," *bort.* σκαλι-
σις καὶ ποασμος. de C. Pl. iii.
- ΣΚΑΝΔΙΚΩΔΗΣ. vid. Σκανδιξ, *Tab. Syst.* p. 9.
- ΣΚΙΝΘΟΣ. Urinator, "a diver," iv. 6.
- ΣΚΛΗΡΟΣ. 1. Rigidus; "stiff;" opp. ευκαμπτῶ: de ligno Arbuti, iii. 10. 2. De qualitate vini annoſi. Angl. "dry." de C. Pl. vi.
- ΣΚΛΙΟΜΑΙ. syn. σκλημι, dureſco, i. ix.
- ΣΚΟΛΟΠΩΔΗΣ. Cruciformis, *Bot.* a σκολοψ, i. 16.
- ΣΚΥΤΑΛΙΟΝ. Scutica: "a thong whip," iv. 5.
- ΣΠΑΘΗ. Palmes fructui inferviens; *Spatha*, *Bot.* ii. 8.
- ΣΠΑΘΟΦΥΛΛΟΣ. Folio vaginato, *Bot.* i. 16.
- ΣΠΑΡΤΟΣ. Satus, fativus, *Bot.* opp. αργίω, vi. 7.
- ΣΠΕΙΡΑ. συσροφη του ξυλου: venæ in ligno in orbem circumactæ ad nodos. v. 3.
- ΣΠΕΡΜΑ. Semen: ovo comparatur: ὡς εχον εν ἑαυτῷ το ἕγρον καὶ θερμον συμφυτον' ὧν ἐκλιποντων αγονον γινεται, i. 18.
- ΣΠΙΛΑΣ. adj. γη σπιδας, terra glareosa. de C. Pl. i.
- ΣΠΙΝΘΕΡΙΖΩ. Scintillas interurendum emitto, iii. 10.
- ΣΠΟΔΙΟΣ. Cinereus de colore. Κοκκυμηλια σποδια, iii. 7. Αμπελος σποδια.
- ΣΠΟΡΗΤΟΙ οἱ. Sementes, vel tempora ferendi: Anglice, "seed-time," viii. 3.
- ΣΠΟΡΟΙ οἱ. id.
- ΣΤΑΘΕΥΩ. Lente coquo: hinc derivata forſan vox Angl. "to stew," vii. 12.
- ΣΤΑΜΝΙΣΚΟΣ. Urceolus vinis fervandis: οἶνον εξαμνισμενον, ex verb. *σταμνισκομαι*. de C. Pl. ii.
- ΣΤΑΣΙΜΟΝ το. Situs loci. de C. Pl. v.
- ΣΤΕΓΝΟΣ. Astringens, densus. de C. Pl. vi.
- ΣΤΕΓΩ. Suffineo; fixus sum; opp. τῷ συμμυειν, vi. 8.
- ΣΤΕΛΕΦΟΣ? id. cum στελεχος, stipes.
- ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ. 1. Cylindrico-caudatus, ut Bos: opp. λοφουρω, cristæ-caudato, ut Equus. 2. De spica Phlei L. aliorumque, et Plantaginis, vii. 10.
- ΣΤΕΡΕΟΣ. Firmus: dicitur de qualitate uvarum: Anglice, "firm, fleshy." de C. Pl. iii.

- ΣΤΕΡΕΩΜΑ.** Rostrum navis, cum ligneis firmamentis, ad impetum faciendum, vi. 8.
- ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΙΚΟΣ.** } De
ΣΤΕΦΑΝΗΠΛΟΚΟΣ. } plantis
ΣΤΕΦΑΝΩΤΙΚΟΣ. } ad coronas usitatis; "garland flowers," vi. 7.
- ΣΤΙΛΒΗΔΩΝ.** Splendor; "a glossy polish." vi. 5.
- ΣΤΛΕΓΓΥΣ?** spec. Tritici, Catalogo Specierum inferenda *Tab. Syst.* p. 6. Vox Ægyptiaca? viii. 4.
- ΣΤΟΙΧΕΩ.** Ordinatum, vel in serie (στοιχῶ) dispono, iii. 16.
- ΣΤΡΑΒΗ.** Distortio: hinc ξυλον αστραβες, "frait-grained timber," vi. 2.
- ΣΤΡΑΓΞ.** Gutta: κατα στραγγα, guttatim, ix. 19.
- ΣΤΡΕΦΕΙΝ** τα ὑπτια. De versura foliorum in quibusdam arboribus autumn tempore, sæpius occurrit mentio apud Theophrastum: sic quoque M. T. Varro de Re Rustica, l. i. c. 46. "Admiranda discrimina sunt naturalia, quod ex quibusdam foliis propter eorum *versuram*, quod sit anni tempus, dici possit, ut Olea, et Populus alba, et Salix."
- ΣΤΡΙΦΝΟΣ.** Strigosus, macilentus; hinc *metaph.* de ligno dicitur ξυλον αστραβες, στριφνον, vi. 2.
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ.** Cylindricus, vi. 7.
- ΣΤΡΟΦΙΓΞ.** Cardio: antiquitus ex ligno duro, vi. 7.
- ΣΤΡΥΦΝΟΣ.** Austero-acerbus, astringens: uva πρωτον ὑδατωδης, μετα ταυτα στρυφνος· εἰτ' οξυς· εἰτ' εσχατον γλυκυσ. de C. Pl. vi.
- ΣΤΥΓΕΣ αἶ.** Venti gelidissimi ex antris montium: αἶς ουκ εστι φυλαξασθαι, ουδ' εν τοις στρωμασι κατακειμενον. de C. Pl. v.
- ΣΤΥΠΤΗΡΙΩΔΗΣ.** Astringens, stypticus. De aquis aluminosis. de C. Pl. ii.
- ΣΥΓΚΛΑΩ.** Confringo, iv. 8.
- ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ.** Judicium ex comparatione. iv. 14.
- ΣΥΖΥΓΙΑ.** Conjunctio: κατα συζυγίαν, de paribus lorum folii pinnati ex opposito, Bot. iii. 15.
- ΣΥΜΜΕΤΡΟΣ.** Sibi accommodatus, gratus.
- ΣΥΜΜΕΤΡΟΟΜΑΙ.** id. Hinc Ang. vox "fymmetry."
- ΣΥΜΠΑΤΕΩ.** Quando multitudo vel exercitus conculcat: opp. καταπατειν, viii. 7.
- ΣΥΜΠΕΠΤΩΚΟΣ.** Connivens, Bot. opp. ανεωγμενος. de C. Pl. i.
- ΣΥΜΠΙΑΕΟΜΑΙ.** Constipor: σφαιριον φυλλικον συμπεπιλημενον. τη ῥαχει του φυλλου, iii. 8.

ΣΥΜΦΥΣΙΣ. Generatio novi ligni, ix. 1.

ΣΥΜΦΥΤΟΣ. 1. Innatus: το θερμον συμφυτον, i. 18. 2. Confectus, vulgaris. ἡ ἑλμς (tænia) συμφυτον ἐνίοις ἐδνεσι, ix. 22.

ΣΥΝΑΓΚΕΙΑ. Vallis continuata. de C. Pl. ii.

ΣΥΝΑΙΤΙΑ. Causa infuper. vid. αἰτια, ix. 6.

ΣΥΝΑΠΤΩ εἰς το αὐτο. Conglutino, ix. 19.

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ. vid. ξυνανθρωπευομαι.

ΣΥΝΕΚΡΑΙΝΩ. Sensim effluo, iii. 13.

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ. Compactus. de C. Pl. iv.

ΣΥΝΕΡΕΦΩ. Una tectum efficio: de tecto frondoso fylvæ, iii. 2.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Continuatio, continuata successio, vi. 7.

ΣΥΝΘΑΛΩ. Comprimendo unire: όταν συνθλωσιν ἑκατέρου κλαδους το ἡμισυ, de unione duorum furculorum post sectionem longitudinalem. de C. Pl.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ. } Compositio me-
ΣΥΝΤΙΘΗΜΙ. } dicamenti: "to make up a prescription," ix. 16.

ΣΥΝΤΑΡΡΟΣ. Ramis implicatis, corbis in modum, vid. ταρρός. de C. Pl. iii.

ΣΥΝΤΗΚΩ. Una marcesco, maceror. de C. Pl. vi.

ΣΥΡΜΑΤΙΤΙΣ. In acervum congestus, undique attractus, a συρω. Κοπρος συρματιτις, Quisquilæ, Scal. vii. 5.

ΣΥΡΡΟΗ δακρυωδης. Coagmentatio resinosa, iv. 6.

ΣΥΣΣΗΠΩ. Una marcesco. de C. Pl. iii.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ. 1. Coagulatio: opp. διαλυσις. 2. ἡ πρώτη συστασις, embryo plantæ. de C. Pl. v.

ΣΥΣΤΡΟΦΑΙ αἱ. Circumvolutiones, v. 6. (vid. Σπειρα.)

ΣΦΑΚΕΛΗ. } Gangræna
ΣΦΑΚΕΛΙΣΜΟΣ. } in arboribus, iv. 16.

ΣΦΗΚΙΟΝ. Favus Vesparum, iv. 10.

ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ. Cuneiformis, de C. Pl. i.

ΣΦΥΡΑ μεγαλη. "a large wooden mallet," v. 9.

ΣΦΥΡΙΓΞ. Pedunculus obtusus malleiformis? Bot. vii. 4.

ΣΦΥΡΙΟΝ. dim. Σφυρας. Σφυριον plerumque ex Κοτινου: sc. ligno præduro, ib.

ΣΧΕΔΙΑ. Navis tumultuarie facta ex lignis vel trabibus, "a raft." Mentio fit σχεδιας ἡ ἐχρησαντο πεντηκοντα ἱσοις, vi. 9.

ΣΧΕΛΟΜΑ. Pars navis juxta rostrum: το σχελομα και τας επωτιδας, (vid.) v. 8.

ΣΧΗΜΑ. Habitus plantæ, vii. 6.

ΣΧΗΜΑΠΟΙΕΩ. Notas inuro, ix. 4.

ΣΧΙΖΑ ἡ. "A billet of wood,"

ix. 3.

ΣΧΙΣΜΑΤΑ φυλλων. Lobi. Bot.

iii. 11.

ΣΧΟΙΝΙΑ ἡ. Juncetum: "a bed of rushes," iv. 13.

ΣΩΜΑΤΩΣΙΣ. Induratio humidi: reductio in solidum. de C. Pl. vi.

T.

ΤΑΛΑΡΟΣ. Calathus. N. B.

Antiqui femina Cucumeris, aliorumque id genus, εν ταλαροις (vasibus fictilibus, an corbibus?) durante hyeme, locis apricis, tectis, ferebant: "garden-pots?" de C. Pl. v.

TANEIA. Antenna navis, a τεινω, "the yard of a ship on which the sails are spread," iv. 1. Differt a κεραια, sed quomodo? ambo simul occurrunt.

ΤΑΡΙΧΕΙΑ τα. Radiculæ vel fibrillæ caulinae, Hederæ propriæ: N. B. Succidia Gloss. vet. sed quære: an radices succedaneæ? Mallem scribere duplici ε, utpote ex ταρῶν derivatum.

ΤΑΡΡΟΣ. 1. Crates ex ligno textili, unde συνταρῶς implicatus. N. B. Antiquitus ταρσος a τερσω, quia casei super illis impositi exsiccabantur.

2. Implicatio ramorum vel fibrarum radice, ουκ ενοχλει τῷ ταρῶν δια την βραχυρριζιαν. de C. Pl. iii.

ΤΑΡΡΩΔΗΣ. Implicatus. Ἐρπυλος και Σισυμβριον εχουσι ῥιζας πολλας και ταρῶδεις, vi. 7.

ΤΕΛΟΣ. Perfectio; εν τελει γενοσθαι. de C. Pl. vi.

ΤΕΡΑΜΝΟΤΗΣ. Mollities.

ΤΕΡΑΜΝΩΝ. Tener; de qualitate Pisorum, &c. post cotionem; τεραμονες vel ατεραμονες, ("they boil hard or soft,") viii. 9.

ΤΕΡΕΤΡΙΩΝ. Pars πυρρειας. (vid.) ex duro ligno, sc. Κοτινου, v. 8.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ τα περι τροπας. Dies antiquitus insignes, æque ac Halcyonii, etfi numero impares. de C. Pl. v.

ΤΕΤΑΝΟΕΙΔΗΣ. supr. iv. 7.

ΤΕΤΑΝΟΣ. Rigidus, tensus: de foliis, iii. 18.

ΤΕΤΡΑΞΟΟΣ. Vid. μοναξοος. N. B. Vox ξοος, a ξυω, rado. Εστι γαρ πολυλλοπος ἡ ἑλατη, διο και τας κωπας ξυοντες αφαιρειν πειρωνται καδ' ενα και ὁμαλως, ("they work with the grain of the wood,") v. 2.

ΤΕΤΡΙΧΩΜΕΝΟΣ πηλος. Lutum capillis mixtum ad opera cæmentitia, ut apud nos. de C. Pl. i.

ΤΙΘΑΣΙΑ. Manfuefactio, iii. 3.

ΤΜΗΤΙΚΟΣ. Acie acuta: dicitur de glacie: ἡ παχὺν τμητικώτερα της χιονος. de C. Pl. v.

ΤΟΡΝΕΙΑ ἡ. Opus tornatile; "carved work, or turnery," v. 8.

ΤΡΑΓΑΩ. Luxurio, met. ex libidine hirci: hinc τραγᾶν dicitur de morbo vitis ex nimia luxurie; articulatio; Plin. xvii. 24. "a swelling of the joints." de C. Pl. v.

ΤΡΑΓΗΜΑ. Bellaria; "sweetmeats." N.B. Hinc vox Gallica "dragées."

ΤΡΙΓΜΟΣ. Stridor alarum infecti; "buzzing:" φθεγγονται οἷον τριγμον. de C. Pl. v.

ΤΡΙΓΟΝΕΩ. De triplici metamorphosi insectorum, τριγωνησαντες μεταβαλλεσι. vid. Καμπη.

ΤΡΙΜΜΑΤΑ τα. ῥιζων sc. Pharm. "powders of roots in medicine?" ix. 9. 12.

ΤΡΙΟΖΟΣ. Ramis terna serie, iv. 5.

ΤΡΙΟΡΧΙΣ. Radicibus bulbofis ternis, ix. 9.

ΤΡΙΧΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis tenuibus, linearibus, ut Pinûs, &c. iii. 10.

ΤΡΟΠΑΙ αἱ. Solstitia. τρ. εαριναι, τρ. χειμεριναι.

ΤΡΟΧΙΣΚΟΣ. Trochiscus. Ang. "lozenge:" antiquitus radicis medicinalis frustulum ita

appellabatur, ix. 9.

ΤΡΟΧΜΑΛΟΣ. 1. Acervus lapidum: 2. adj. lapideus, calculis plenus, γη τροχμαλος. de C. Pl. iii.

ΤΡΥΓΗ ἡ. Fæx vini, cujus usus vice saponis, ix. 10.

ΤΡΥΠΑΝΟΝ. id. q. Τερετριον. (vid.) v. 10.

ΤΡΩΞΑΝΑ τα, α τρωξ. Radices fibrosæ? furculi juniores femesi a vermibus? de C. Pl. iii.

ΤΥΠΩ εν. Quodammodo: τυπω λαβειν, pbras. ut ita loquar.

ΤΥΦΛΟΣ οφθαλμος. De arbore læso; "blighted;" οφθαλμος enim gemma, i. 13.

ΤΥΧΩΝ. Ordinarius: γη τυχεσα, communis, viii. 7.

Υ

ΥΓΡΑ ἡ. Tempus pluviale. de C. Pl. iv.

ΥΓΡΑΣΙΑ. Humiditas, fuccus, iii. 13.

ΥΔΑΡΗΣ. Aquosus: opp. πυκνός, in fuccis, ix. 1.

ΥΔΑΤΑ τα. Anni tempestas pluviosa in calidis regionibus, ix. Υδατα θερμα πηγνυσι θάττον, optime. de C. Pl. v.

Υδρεπεπης? forf. υδρεπεψις. Succus aquosus. de C. Pl. vi.

ΥΛΗ. Materies primaria.

ΥΛΗΜΑ. Frutex, i. 9.

- *ΥΔΙΚΟΙ. Foramina. Vasa fibrosa succum haurientia; "sap vessels." de C. Pl. vi.
- *ΥΔΙΣΜΟΣ. Percolatio. ib.
- *ΥΜΕΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Ab ὕμην; cujus semen capsula membranacea tectum. Hymenospermus. Bot.
- *ΥΜΕΝΩΔΗΣ. Membranaceus: N. B. Μητρα vasculosa Sambuci ita vocatur, sc. vasculis membranaceis, i. 3.
- *ΥΠΑΡΓΙΛΛΟΣ. Sub-argillaceus, de solo, ix. 3.
- *ΥΠΑΡΟΩ. Leviter aro, viii. 11.
- *ΥΠΕΡΠΥΡΟΣ. Calidus valde. de C. Pl. i.
- *ΥΠΕΡΡΙΖΩΝ. Valde radicans. de C. Pl. iii.
- *ΥΠΕΡΤΑΖΩ. } Leviter, et
*ΥΠΕΡΤΑΖΟΜΑΙ. } superficiem
tenuis aro: εαν μιν ὑπερίαζωνται και κινήσωσι την γην, iii. 2.
- *ΥΠΝΟΣ. met. Somnus plantarum; hinc dicuntur, καθευδεν νυκτος.
- *ΥΠΟΒΑΛΛΩ. Oblique planto: opp. ορθοβάλλειν, ii. 7.
- *ΥΠΟΖΥΓΙΑ. Ex usu antiquitus distinguebantur Boves aratorii a lactariis. Βουσι και ἵπποις και τοῖς ὑποζυγίοις, ("cows, horses, and working cattle,") iv. 4.
- *ΥΠΟΚΑΤΩΡΥΧΙΑ. Surfum, deorsum fossio: "trenching ground." de C. Pl. v.
- *ΥΠΟΚΟΝΙΣΙΣ. Methodus maturandi uvas et cucumeres pulvere superinjecto, ii. 8. de C. Pl. iii.
- *ΥΠΟΚΟΝΙΩ. id. ii. 8.
- *ΥΠΟΛΗΨΙΣ ἢ. Fætura floris? "the setting of blossoms." de C. Pl. v.
- *ΥΠΟΝΕΩ. Vid. νεω, iii. 2.
- *ΥΠΟΠΤΕΡΟΣ. Volatilis; de odore. de C. Pl. vi.
- *ΥΠΟΠΤΙΣΣΩ. Vid. πτισσω, iv. 10.
- *ΥΠΟΡΕΙΑ. Pars subjacens monti, ix. 1.
- *ΥΠΟΦΕΡΩ. vid. ὑποληψις.
- *ΥΠΟΦΕΥΓΩ. Devito, quasi ab horreo, ix. 15.
- *ΥΠΟΦΥΣΙΣ. Quod subtus crescit: distinguitur a προσφυσις φλοιου, vi. 3.
- *ΥΠΤΙΑ τα. Superior pars folii: opp. τῷ πρᾶναι, i. 16.
- *ΥΠΤΙΟΝ τεμνω. Hort. "to prune with the cut upwards." de C. Pl. v.
- *ΥΠΩΠΙΑ. Cavitates sub oculis: τα ὑπωπια, fugillationes, "a black eye," vulgo, ix. 22.
- *ΥΣΤΕΡΕΩ. De plantis Serotinis: opp. τῷ προτερεῖν, vi. 7.
- *ΥΣΤΑΙΓΞ. 1. Tentaculum in Molluscis. Linn. 2. Cirrus in arboribus, iii. 18.
- *ΥΦΙΣΤΗΜΙ. Subfido; de fluidis. de C. Pl. iv.
- Φ.
- ΦΑΙΟΣ. Color: εκ λευκου και μελανος, "grey." de C. Pl. vi.

ΦΑΚΟΣ. Legumen φακου, viii.

5. Αν φακον?

ΦΑΡΜΑΚΕΤΤΙΚΟΣ. Medicinalis. de C. Pl. iii. Opp. φαρμακωδεις.

ΦΑΡΜΑΚΟΝ εναιμον. Medicamentum stypticum, iv. 8.

ΦΑΡΜΑΚΩΔΗΣ. Venenosus: φαρμακωδεις δυναμεις ασθενεσθαι τοις ειθισμενοις. Ita Poeta, "Effecit potō Mithridates sæpe Veneno, Toxica ne poterint sæva nocere sibi."

ΦΑΥΛΙΑ? τα. Olivæ minutæ inutiles, ii. 3.

ΦΙΛΗΔΕΩ. Sibi placeo: δια το φιληδειν, (voluptatis causa,) ix. 16.

ΦΙΛΟΖΩΟΣ. Vivax: φιλοζωα τα κεφαλορριζα, (quia hyemem durant,) vii. 12.

ΦΛΕΒΕΣ. Apud Theophrastum vasa spiralia. Vide Grewium, ii. c. 4. iii. 3. Hilium de structura ligni, ii. c. 2, 3. ubi multa de lactiferis, resiniferis, et gummosis enumerantur; etiam Malpighii Anat. t. 7. f. 30. Vid. etiam Ives, i. iv.

ΦΛΕΒΙΚΑ τα. Superficies papillosa cutis. de C. Pl. vi.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Inflammatio: vid. εκπνευσεις φλεγμονων, ix. 10.

ΦΛΟΙΟΣ. Cortex plantæ. 1. φλ. κυριος. 2. φλ. επιπολης. quorum posterior sæpius, ut in Arbuto, et Platano, αυτοματως εκπιπτει. 3. φλ. adsciti-

tius, utpote φελλος, iv. 18. p.

ΦΟΒΗ. Loculus, capsula minutata; Bot. viii. 3. hinc Angl. "a fob."

ΦΟΡΑ. Proventus, feges, iii. 14.

ΦΡΥΓΓΑΝΟΝ. Ξυλωδες, και μικροφυλλον, vi. 1. Divisio generalis, Δενδρων, Θαμνων, Φρυγανικων, Ποωδων, vi. 1. Φρυγανα dividuntur in ανακανθα (inermia, Bot.) και ακανθωδη, (spinosa:) posteriora etiam in ακανθωδη αφυλλα, φυλλακανθα, (foliis spinosis,) πλορδακανθα, (ramis spinosis,) ib.

ΦΥΛΛΟΝ. Indefinite pro folio et petalo, Bot. Lobi etiam in pinnatis φυλλα vocantur; sed semel observat το ολον, folii pennati, φυλλορρισειν, διοπερ αν τις ειποι το ολον φυλλον ειναι, iii. 12.

ΦΥΛΛΟΣΚΕΠΗΣ. De arbore valde frondosa, adeo ut folis radios arceat. de C. Pl. i.

ΦΥΜΑΤΑ. Tumores, pustulæ, ix. 12.

ΦΥΣΑΙ. id.? An inflatio totius corporis, in pecoribus, "being hosed," ix. 10.

ΦΥΣΙΜΟΣ. Generativus, generando aptus. de C. Pl. iv.

ΦΥΤΕΥΜΑΤΑ τα. Plantæ ex femine: opp. μοσχευμασι.

ΦΩΛΕΥΩΝ. Nidificans: τα φωλευοντα, aves in genere: sed rectius quando plumas exuunt, a φωλειω, quia tunc

temporis latebras quærunt :
“ moulting birds.”

X.

ΧΑΡΑΓΜΟΣ. Serratura folii.

Bot. iii. 10.

ΧΑΡΑΞ. Sudes, vallum, ii. 1.
de C. Pl. v.

ΧΑΤΝΟΣ. Laxus, porofus, iii. 6.

ΧΕΙΜΩΣΠΟΡΕΩ. Hyeme fero.
de C. Pl. iv.

ΧΕΛΥΣΜΑ. Statumen navis gubernaculi ; roborandi gratia.
Poll. v. 8.

ΧΕΙΡΟΠΛΗΘΗΣ. Manipulus, manipuli instar, ii. 7.

ΧΛΟΕΡΟΣ. } Luteo-viridis : fo-

ΧΛΩΡΟΣ. } lia Platani vo-

cantur χλωρα, “ pea-green.”

Varietates alibi occurrunt ;

e.g. 1. ποωδης, “ grafs-green ;”

2. πρασινος, “ green as a

leek ;” 3. δαφνωδης, “ dark-green.”

ΧΛΟΗ. Vox generalis, pars herbacea : εκ του κατω κρομμυον εκ του ακρου χλοη, vii. 4. viii. 2.

ΧΝΟΥΣ. } 1. Pollen. Bot. 2.

ΧΟΥΣ. } Villi in pericarpio
Rosæ, vi. 6. 3. Staminum congeries in floribus.

ΧΝΟΩΔΗΣ. De floribus flamineis, apetalis, ut Vitis, Hederae, &c. viii. 3.

ΧΟΑ. Mensura, viii. 3.

ΧΟΓΧΗ. Eadem ; ex Concha testacea. Duo cochlearia continet, ix. 6.

ΧΟΝΔΡΟΣ. Far, Phav. sed rectius Tritici vel Hordei cujusdam massa farinacea. de C. Pl. iv.

ΧΥΛΕΥΩ. Viridi herba pascō : “ to foil cattle.” de C. Pl. ii.

ΧΥΛΟΣ. } Succus plantæ ex-

ΧΥΜΟΣ. } pressus. vide σπορος, succus sponte fluens, i. 3. sapor, i. 19.

ΧΥΛΙΣΜΟΣ. Succus expressio : differt ab σπισμος, ix. 8.

ΧΥΛΩΩ. Succo abundo.

ΧΡΩΜΑΙ. Coloror : ανδρος χετ χρωμενον ανδρικως : opp. ανδρεις λευκοις, vii. 9.

Ψ.

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. Instrumentum musicum lyræforme, cui ζυγον (pars curvata instar cornu) proprium, v. 8.

ΨΕΚΑΔΕΣ ΑΙ. Τίνα πλατεια αττα φερομενα μεν φανερὰ ἀλλ' ου διαμενει. ψεκαδες και δροσοι. de C. Pl. iv. όταν ύπουσης ύγροτητος μετα τας ψεκαδας ύποκαυση ο ήλιος. de C. Pl. v. ου γινεται πληθος ύδατος, ἀλλ' ως επι το πολυ, ψεκας. Pruinæ particulæ glaciales hic per τίνα πλατεια αττα videntur describi, nisi textus sit corruptus.

ΨΙΛΩΘΡΟΣ. Calvities : radix Αμπελου αγριας εις ψιλωθρον, (vis depilatoria,) ix. 22.

ΨΙΝΕΣΘΑΙ. An ψησθαι. Erodi

vermibus ψηρες vocatis. vid.
Tab. Syst. p. 35. N. B. Το
ψινεσθαι, morbus Punicæ,
Granatæ, L. iv. 16.

ΨΥΧΗ. Theoph. Papilio. vid.
Metamorphoses Insectorum.
Tab. Syst. p. 34.

ΨΥΧΡΟΣ. Qualitas lignorum
quorundam: opp. θερμός. vid.
θερμός, Πυρεΐα, v. 4.

ΨΩΡΑ. Morbus in truncis ar-
borum scabiei similis, præci-
pue in Ficubus, iv. 16.

ΨΩΡΙΑΩ. id. de C. Pl. v.

Ω.

ΩΛΕΣΙΚΑΡΠΟΣ. Epithetum
Homeri Ιτέα (Salici L.) pro-
prium, δια το ταχυ προκατα-
βαλλειν προ του τελειως αδρυναι,
και πεψαι τον καρπον, iii. 2.
N. B. Sensum Homeri haud

plane intellexisse videtur
Theophrastus, qui verbo hoc
immenfam substantiæ pap-
posæ diffusionem solummodo
indicat. Botanicis fatis no-
tum est flores masculos et
fœmineos in Salicibus calyce
papposo instructos esse. Na-
turæ saltem incongruum est
immatura femina spargere,
nisi morbo, vel aëris vitio.
Cuius autem, μετ' απανθησιν
Ιτέας, videre licet aërem to-
tum materie papposa reple-
tum; amentis sc. utriusque
sexûs dilabentibus, et unde-
quaque circumfufis.

ΩΡΑ. Tempus anni; "the
season of the year:" ώρα δια-
γελωσα, "the smiling spring."
de C. Pl. i.

ΩΡΑΙΟΣ. Tempestivus: καρποι
ώραιοι, iv. 5.

CATALOGUS ALPHABETICUS

PLANTARUM LINNEI

QUÆ APUD THEOPHRASTUM OCCURRUNT.

	Tab. Syst. Pag.		
A.		ALOPECURUS	4.
		Althæa, <i>officinalis</i>	15.
Abies, <i>marina</i>	23.	Amaranthus, <i>Blitum</i>	19.
Acer, <i>campestre</i>	22.	AMOMUM	3.
Aconitum, <i>Lycoclonum</i>	13.	Amomum, <i>Cardamomum</i>	ib.
Acorus, <i>calamus</i>	10.	Amygdalus, <i>communis</i>	12.
Acrosticum, <i>Tbelypteris</i>	22.	Amygdalus, <i>Persica</i>	28.
ADIANTUM	ib.	Amyris, <i>Gileadensis</i>	25.
Adiant. <i>Trichomanes</i> .	23.	Anchusa, <i>tinctoria</i>	7.
Ægilops, <i>ovata</i>	21.	Andropogon, <i>Ischæmum</i>	21.
AGARICUS	23.	Andropogon, <i>Nardus</i>	22.
Agrostemma, <i>Flos Jovis</i> ^a	11.	Andryala, <i>integrifolia</i>	17.
AGROSTIS	4.	ANEMONE	13.
Ajuga, <i>Cbamaepitys</i>	29.	Anethum, <i>bortense</i> ,	7.
Alchemilla, <i>arvensis</i> ^b	26.	Anethum, <i>fœniculum</i>	8.
ALLIUM : <i>spec. sex</i>	10.	ANTHEMIS	17.
Allium, <i>Cepa</i>	ib.	ANTIRRHINUM	27.
Allium, <i>Moly</i>	ib.	Apium, <i>graveolens</i>	7.
Allium, <i>Porrum</i>	11.	Aquilegia, <i>vulgaris</i> ^c	8.
Allium, <i>Scorodoprasum</i>	ib.	Arbutus, <i>Andrachne</i>	11.

^a Vid. not. p. 11.

^b Vid. not. p. 26.

^c Vid. not. p. 9.

Arbutus, <i>Unedo</i>	12.	Buxus, <i>sempervirens</i>	20.
ARISTOLOCHIA	18.		
Arum, <i>Dracunculus</i>	ib.	C.	
Arum, <i>Colocasia</i>	ib.	Cactus, <i>Opuntia</i>	12.
Arum, <i>maculatum</i>	ib.	Caltha, <i>palustris</i>	17.
Arundo <i>Donax</i> ,	4.	Capparis, <i>spinosa</i>	13.
ARUNDO : <i>spec. septem</i>	ib.	Capficum, <i>frutescens</i>	27.
Artemisia, <i>Absyntbium</i>	17.	Carduus, <i>Acarna</i>	17.
Asclepias, <i>vincetoxicum</i> ^a	7.	CARDUUS : <i>spec. sex</i>	17.
Asparagus, <i>aphyllus</i>	10.	Carduus, <i>Eriophorus</i>	29.
ASPHODELUS	ib.	Carlina, <i>acaulis</i>	18.
Asphodelus, <i>ramosus</i>	ib.	Carpinus, <i>Betulus</i>	19.
Asphodelus, <i>luteus</i>	ib.	Carpinus, <i>Ostrya</i> ^c	20.
Asplenium, <i>Hemionitis</i>	22.	Carthamus, <i>corymbosus</i>	18.
After, <i>Tripolium</i> ?	29.	CAUCALIS	8.
Astragalus, <i>Tragacantha</i>	16.	CELASTRUS	ib.
ATHAMANTA : <i>spec. duæ</i>	8.	Celtis, <i>Australis</i>	22.
Athamanta, <i>Oreofelinum</i>	8.	CENCHRUS	24.
Atractylis, <i>gummifera</i>	16.	Centaurea, <i>Centaurium</i>	17.
ATRIPLEX ^b	21.	Centaurea, <i>Stœbe</i>	18.
Atropa, <i>Mandragoras</i>	8.	Ceratonia, <i>filiqua</i>	21.
Atropa, <i>Belladonna</i> ^c	9.	Cercis, <i>filiquastrum</i>	12.
Avena, <i>fatua</i>	4.	Cerinthe, <i>aspera</i>	8.
		CHAMÆEROPS	22.
B.		Chelidonium, <i>majus</i>	14.
Bambusa, <i>arundinacea</i> ^d	4.	Chenopodium <i>Bon. Henricus</i>	7.
Beta, <i>vulgaris</i>	10.	Chondrilla, <i>junceæ</i>	18.
Betula, <i>alba</i>	20.	Cicer, <i>Arietinum</i>	16.
Betula, <i>Alnus</i>	19.	Cichorium, <i>Intybus</i>	17.
Brassica, <i>oleracea</i>	15.	CISTUS	14.
Brassica, <i>Rapa</i>	ib.	Citrus, <i>Medica</i>	16.
Bubon, <i>Galbanum</i>	10.	Citrus, <i>Aurantium</i>	ib.
Bulbocodium, <i>vernum</i>	ib.	Clematis, <i>Orientalis</i>	13.
Bupleurum, <i>rigidum</i>	26.	Clematis, <i>Vitalba</i> ^f	

^a Vid. not. p. 7.^b Vid. omiffa ad finem.^c Vid. not. p. 9.^d Vid. not. p. 4.^e Vid. omiffa ad finem.^f Vid. not. p. 13.

CNEORUM	5.	D.	
CNICUS	18.	Daphne, <i>Cneorum</i>	11.
Cocos, <i>nucifera</i> ?	22.	Dianthus, <i>Caryophyllus</i>	ib.
Coix, <i>Lachryma Jobi</i>	19.	Dipsacus, <i>Fullonum</i>	6.
COLUTEA : <i>tres species</i>	16.		
Conium, <i>maculatum</i>	8.	E.	
CONVALLARIA	10.	Ebenus, <i>Cretica</i>	15.
Convolvulus, <i>Scammonia</i>	9.	Echinops, <i>Ritro</i> ?	29.
Convolvulus, <i>sepium</i>	8.	EQUISETUM	26.
CONYZA	18.	ERICA	11.
Coriandrum, <i>sativum</i>	8.	Erigeron, <i>graveolens</i>	17.
Cornus, <i>mas</i>	6.	Erythronium, <i>Dens Canis</i>	30.
Cornus, <i>sanguinea</i>	ib.	ERVUM	16.
Coronilla, <i>securidaca</i>	16.	Ervum, <i>Lens</i>	15.
Corylus, <i>Avellana</i>	19.	Erysimum, <i>officinale</i>	15.
Corylus, <i>Colurna</i>	ib.	Euonymus, <i>Europæus</i>	10.
Costus, <i>Arabicus</i>	3.	EUPHORBIA : <i>spec. tres.</i>	12.
COTULA ^a	17.	Euphrasia, <i>odontitis</i>	14.
Cratægus, <i>Aria</i>	12.		
Cratægus, <i>torminalis</i>	ib.	F.	
Cratægus, <i>Azarola</i>	13.	Fagus, <i>Castanea</i>	19.
Cratægus, <i>Oxyacantha</i>	ib.	Fagus, <i>Sylvatica</i>	20.
Cratægus, <i>Pyracantha</i>	13.	Ferula, <i>communis</i>	8.
Cressa, <i>erratica</i>	9.	Ferula, <i>Ferulago</i>	ib.
CROCUS : <i>spec. duæ</i>	5.	Ferula, <i>Affasætida</i> ^b	9.
Cucumis, <i>Colocynthis</i>	19.	Ficus, <i>Caprificus</i>	21.
Cucumis, <i>sativus</i>	20.	Ficus, <i>Carica</i>	22.
CUCURBITA	ib.	Ficus, <i>Religiosa</i>	ib.
Cuminum, <i>cuminum</i>	8.	Fraxinus, <i>excelsior</i>	3.
Cupressus, <i>sempervirens</i>	19.	Fraxinus, <i>Ornus</i>	ib.
Cycas, <i>revoluta</i>	22.	FUCUS : <i>spec. octo</i>	23.
Cyclamen, <i>Europæum</i>	8.	Fumaria, <i>capreolata</i> ?	26.
Cyperus, <i>longus</i>	5.		
Cyperus, <i>esculentus</i>	ib.		
Cyperus, <i>Papyrus</i>	ib.		
Cytifus, <i>Laburnum</i>	16.		

^a Vid. not. p. 17.^b Vid. not. p. 9.

G.

<i>Galium, verrucosum</i>	6.
<i>Geropogon, glaber</i> ^a ?	18.
GLADIOLUS	5.
GLYCYRRHIZA	29.
<i>Gossypium, arboreum</i>	15.
<i>Guilandina, Bonduc</i>	11.
<i>Gypsophila, Struthium</i>	12.

H.

HEDERA : <i>spec. quatuor</i>	8.
<i>Hedera, Helix : spec. tres</i>	7.
<i>Heliotropium, Europæum</i>	ib.
HELLEBORUS : <i>spec. duæ</i>	13.
<i>Heracleum, Panaces</i> ^b ?	9.
<i>Hesperis, matronalis</i>	15.
<i>Hieracium, murorum</i>	18.
HIPPURIS ?	27.
<i>Hordeum, vulgare : var. septem</i>	5.
<i>Hordeum, Zeocriton</i>	ib.
<i>Hottonia, palustris</i> ^c ?	27.
<i>Hyacinthus, comosus</i>	11.
HYDNUM	23.
HYPOCHÆRIS	18.

I.

<i>Iris, Florentina</i>	4.
<i>Iris, Sisyriumbium</i>	6.
<i>Iris, Xiphium</i>	ib.
<i>Juglans, Regia</i>	19.
<i>Juniperus, communis</i>	20.
<i>Juniperus, Oxycedrus</i>	21.

<i>Juniperus, Lycia</i>	21.
<i>Juniperus, Sabina</i>	ib.
<i>Ixia, bulbocodium</i> ^d ?	10.

L.

<i>Lactuca, sativa</i>	17.
<i>Lactuca, sylvestris</i>	ib.
<i>Laserpitium, latifolium</i>	9.
<i>Laserpitii var. tres</i>	ib.
<i>Lathyrus, amphicarpus</i>	15.
<i>Lathyrus, Afbaca</i>	ib.
<i>Lathyrus, Clymenum</i>	16.
<i>Lathyrus, sativus</i>	ib.
<i>Laurus, nobilis</i>	11.
<i>Laurus, gracilis</i>	ib.
<i>Laurus, Cassia</i>	ib.
<i>Lavandula, spica</i>	14.
<i>Lavatera, arborea</i>	15.
<i>Lemna, trifolca</i>	19.
<i>Leontodon, Taraxicum</i>	17.
<i>Leucoium, verum</i>	10.
<i>Lichen, pulmonarius</i>	23.
<i>Lilium, album</i>	10.
<i>Linum, usitatissimum</i> ,	8.
<i>Liquidambar, styraciflua</i>	20.
<i>Lolium temulentum</i>	4.
<i>Lotus, Melilotus</i>	16.
LUPINUS	15.
LYCHNIS	12.
<i>Lycium, Europæum</i> ^e	9.
<i>Lycoperdon, Bovista</i>	23.
<i>Lygeum, spartum</i>	5.

^a Vid. not. p. 18.^b Vid. not. p. 9.^c Vid. not. p. 27.^d Vid. not. p. 10.^e Vid. not. p. 9.

M.		Nymphæa, <i>Lotus</i>	14.
		Nymphæa, <i>Nelumbo</i>	ib.
Mangifera, <i>Indica</i> ?	27.	O.	
Marrubium, <i>album</i>	15.	Ocimum, <i>Basilicum</i>	14.
Marrubium, <i>Pseudo-dictamnus</i> ^a	ib.	Olea, <i>Europæa</i>	3.
MATRICARIA ^b	17.	Olea, <i>sylvestris</i>	ib.
Medica, <i>fativa</i>	16.	Ononis, <i>Antiquorum</i>	16.
Medicago, <i>arborea</i>	16.	Onopordum, <i>Acanthium</i>	18.
Melampyrum, <i>arvense</i>	14.	Ophrys, <i>nidus avis</i>	ib.
Melissa, <i>officinalis</i> ^c	14.	ORCHIS	ib.
Melittis, <i>Melissophyllum</i>	14.	Origanum, <i>Ægyptiacum</i>	15.
MENTHA	ib.	Origanum, <i>Dictamnus</i>	14.
Mentha, <i>Pulegium</i>	ib.	Origanum, <i>Majorana</i> : var.	
Menyanthes, <i>trifoliata</i>	8.	<i>duæ</i>	ib.
Menyanthes, <i>Nymphæoides</i> ^d ?	ib.	OROBANCHE	ib.
Mercurialis, <i>perennis</i>	30.	OROBUS	16.
Mespilus, <i>Germanica</i>	13.	Oryza, <i>fativa</i>	10.
MILIUM ^e ?	5.	P.	
Mimosa, <i>Nilotica</i>	21.	Palma, <i>Tbebaica</i>	22.
Mimosa, <i>sensitiva</i>	22.	PANICUM	4.
MOMORDICA	20. 27.	Panicum, <i>Italicum</i>	5.
Morus, <i>nigra</i>	ib.	Papaver, <i>Orientale</i>	14.
Myrica, <i>Gale</i>	21.	Parietaria, <i>officinalis</i>	22.
Myrica, <i>Cordifolia</i>	ib.	Peucedanum, <i>officinale</i>	9.
Myrtus, <i>communis</i>	13.	PEZIZA ?	23.
N.		PHALLUS	ib.
NARCISSUS	10.	Phaseolus, <i>vulgaris</i>	15.
Narcissus, <i>Pseudo-Narcissus</i>	ib.	Phillyrea, <i>latifolia</i>	4.
Narcissus, <i>Poeticus</i>	ib.	PHLEUM ? ^g	
Narcissus, <i>Bulbocodium</i> ^f	ib.		

^a Vid. omiffa ad finem.^b Vid. not. p. 17.^c Vid. not. p. 14.^d Vid. not. p. 8.^e Vid. omiffa ad finem, et not. *Meleses*, p. 5.^f Vid. not. p. 10.^g Vid. omiffa ad finem; etiam not. p. 4.

Phœnix, <i>Dactylifera</i>	22.	Pyrus, <i>sylvestri</i> statu	24.
Phyllanthus, <i>Emblica</i> ^a	27.	Pyrus, <i>Cydonia</i>	13. 24.
Phyfalís, <i>somnifera</i> ^b	9.		
PICRIS	18.	Q.	
Pinus, <i>Abies</i>	19.	QUERCUS: <i>spec. octo</i>	19.
Pinus, <i>Cembra</i> ^c	20.	Quercus, <i>Prinus</i>	20.
Pinus, <i>Picea</i>	19.	Quercus, <i>Ægilops</i>	19.
Pinus, <i>Pinea</i>	20.		
Pinus, <i>Pinaster</i>	ib.	R.	
Pinus, <i>sylvestris</i>	ib.	Raphanus, <i>sativus</i> : var.	
Pinus, <i>Larix</i> ^d	ib.	<i>quatuor</i>	15.
Piper, <i>nigrum</i>	4.	RHAMMUS: <i>spec. duæ</i>	9.
Pistacia, <i>Terebinthus</i>	21.	Rhamnus, <i>Alaternus</i>	7. 30.
Pisum, <i>sativum</i>	16.	Rhamnus, <i>Paliurus</i> ^f	8.
Pisum, <i>Ocbrus</i>	ib.	Rhamnus, <i>Spina Christi</i>	8.
Plantago, <i>major</i>	6.	Rheum, <i>Rhaponticum</i>	11.
Plantago, <i>Coronopus</i>	ib.	RHIZOPHORA	12.
Plantago, <i>Cynops</i>	ib.	Rhus, <i>Coriaria</i> : <i>spec. duæ</i>	9.
Plantago, <i>Psyllium</i> ^e	ib.	Rhus, <i>Cotinus</i>	8.
Platanus, <i>Orientalis</i>	20.	Ribes, <i>Grossularia</i>	ib.
POA	5.	Ricinus, <i>Palma Christi</i>	19.
Polygonum, <i>Fagopyrum</i>	11. 28.	ROSÆ: var. <i>quatuor</i>	13.
POLYPODIUM	22.	RUBI <i>spec. tres</i>	12.
Populus, <i>nigra</i>	20.	Rubia, <i>tinctorum</i>	6.
Populus, <i>alba</i>	21.	Rubus, <i>Idæus</i>	12.
PRUNUS	13.	Rumex, <i>acetosa</i>	10.
Prunus, <i>Laurocerasus</i>	12.	Ruscus, <i>hypophyllum</i>	21.
Prunus, <i>Padus</i>	13.	Ruscus, <i>aculeatus</i>	ib.
Prunus, <i>Cerasus</i>	12.	Ruta, <i>graveolens</i>	12.
Prunus, <i>Mabaleb</i>	ib.		
PTERIS	22.	S.	
Punica, <i>granata</i>	13.	Saccharum, <i>Ravennæ</i> ^g	
Pyrus, <i>communis</i>	12.	Salicornia, <i>fruticosa</i>	3.
Pyrus, <i>sylvestri</i> statu	ib.		
Pyrus, <i>malus</i>	13.		

^a Myrobalanus Bauh.^b Vid. not. l. p. 9.^c Vid. not. p. 20.^d Vid. not. p. 20. item Cat. Alph. p. 59.^e Vid. not. p. 6.^f Vid. not. p. 8.^g Vid. omiffia ad finem.

SALIX : <i>spec. tres</i>	21.	T.	
Salix, <i>viminialis</i>	24.	Taxus, <i>baccata</i>	21.
Salvia, <i>borminum</i>	4.	Teucrium, <i>Chamædrys</i>	15.
Salvia, <i>bortensis</i>	ib.	THAPSIA	7.
Salvia, <i>officinalis</i>	3.	Thapsia, <i>Asclepium</i>	ib.
Salvia, <i>Sclarea</i>	24.	THYMBRA	14.
Sambucus, <i>nigra</i>	7.	Thymus, <i>vulgaris</i>	ib.
Santolina, <i>Rosmarinifolia</i>	16.	Thymus, <i>serpyllum</i>	ib.
Satureia, <i>bortensis</i>	14.	Thymus, <i>masticina</i> ?	26.
Satureia, <i>Thymbra</i> ^a	ib.	Thuja, <i>apbylla</i>	19.
SATYRIUM ^b	18.	Tilia, <i>Europæa</i>	14.
Scandix, <i>Pecten</i>	9.	Tordylium, <i>officinale</i>	9.
SCHÆNUS : <i>spec. tres</i>	6.	TORMENTILLA	13.
Scilla, <i>unifolia</i>	10.	Tragopogon, <i>Oriente</i>	18.
SCILLA : <i>spec. duæ</i>	11.	Trapa, <i>natans</i>	7.
SCIRPUS	6.	Tribulus, <i>terrestris</i>	12.
Scolymus, <i>Hispanicus</i>	18.	Trifolium, <i>officinale</i>	16.
Secale, <i>Cereale</i>	4.	TRITICUM : <i>var. octo.</i>	6.
SELINUM	9.	Triticum, <i>monococcum</i>	4.
Selinum, <i>palustre</i> ^c	7.	Triticum, <i>Spelta</i>	6.
Sempervivum, <i>arboreum</i>	12.	TUBER	23.
Serapias, <i>Helleborine</i>	18.	Typha, <i>latifolia</i>	20.
Serratula, <i>arvensis</i>	17.		
Sesamum, <i>Oriente</i>	15.	U.	
Sinapi, <i>nigrum</i>	ib.		
SISYMBRIUM	7.	ULEX	29.
Sisymbrium, <i>Nasturtium</i>	15.	Ulmus, <i>campestris</i>	9.
Smilax, <i>aspera</i>	21.	Ulmus, <i>montanus</i>	ib.
Smyrniacum, <i>olusatrum</i>	8.	Ulva, <i>Lactuca</i>	23.
SOLANUM : <i>spec. tres</i>	9.		
Sonchus, <i>asper</i> ^d	17.	V.	
Sonchus, <i>oleraceus</i>	18.		
Sorbus, <i>domestica</i>	13.	Vaccinium, <i>Vitis Idæa</i>	24.
SPARGANIUM	19.	VERBASCUM	7.
		Veronica, <i>Chamædrys</i>	4.

^a Vid. not. p. 14.^b Vid. not. p. 18.^c Vid. not. p. 7.^d Vid. not. p. 17.

Viburnum, <i>Opulus</i>	7.	Vitex, <i>agnus castus</i>	14.
Viburnum, <i>Lantana</i> ^a	11.	Vitis, <i>vinifera</i> : <i>var. sex</i>	7.
Vicia, <i>cracca</i>	15.		
Vicia, <i>Faba</i>	16.		
VIOLA : <i>var. duæ</i>	17.	Z.	
Viscum, <i>album</i>	21.	Zosteræ, <i>marina</i>	23.

^c Vid. not. Δαφνῆ ἀγρία. p. 11.

CORRIGENDA ET OMISSA.

CATALOGUS ALPHABETICUS.

Αιγυριος. <i>Diæc.</i>	Ἰπποφισως. <i>Tetradyn.</i>
1. Αιγυλωψ. <i>Triandr.</i>	Κυδωνιος. <i>Icosandr.</i>
2. Αιγυλωψ. <i>gram. Polygamia.</i>	Λακαρα. <i>Icosandr.</i>
Ἄλιμον, το. <i>Polygamia</i> , lege <i>Monandr.</i>	Λειμωδωρον. <i>Class. incert.</i>
Απατη. <i>Class. incert.</i> lege <i>Syngenes.</i>	Λιθανον. <i>Class. incert.</i> lege <i>Diæc.</i>
Syn. Αφακης.	Λιμνωδεις τι. <i>Class. incert.</i>
Βαλανος. <i>Class. incert.</i> lege <i>Decandr.</i>	Μυα? an error textûs? id.
Βλιτον. <i>Polygam.</i> lege <i>Monæc.</i>	Μυδιον? id.
Δινδρον τιγρινον. <i>Class. incert.</i>	Ναρτη. <i>vid. Ναρδος. Polygam.</i>
Δρυς ποντια. <i>Crypt.</i>	Οινοθηρα. <i>Hexandr.</i>
Ελατηριον. <i>Class. incert.</i>	Οινορανθης? de C. Pl. vi. <i>Class. incert.</i>
Ελιολιμωνια. <i>Class. incert.</i>	Οξυακαρπα. iii. 6. an pro Οξυακανθα?
Ελιοχρυσος. <i>Class. incert.</i> lege <i>Syngen.</i>	Οσπρις. <i>vid. Δρυς.</i>
Ἐλξινη. <i>Class. incert.</i>	Παιωνια. <i>Polyandr. syn. Γλυκυσιδης.</i>
Ἐσπρις. <i>Tetradyn.</i>	Πιλος. <i>Class. incert.</i>
Θησιον. <i>Class. incert.</i> lege <i>Enneand.</i>	1. Στρουθιος. <i>Icosandr.</i>
Ιξινη. <i>Class. incert.</i> lege <i>Syngenes.</i>	2. Στρουθιος. <i>Class. incert.</i>

TAB. SYSTEMATICA.

Σαρι το. <i>Saccharum, Ravennæ, Fl.</i>	Οχνη. <i>Icosandr.</i>
Græc. <i>Triandr.</i> <i>Vid. Cat. Alph. p. 65.</i>	Ψευδο-Δικταμνος, lege <i>Marrubium</i>
Στιλιφουρος. <i>Triandr. Gramen Phleum.</i>	Pseudo-dictamnus
Sed textus corruptus. <i>Vid. Cat.</i>	Κιντηρια. <i>Syngenes. syn. Ατρακτυλιδος.</i>
Alph. p. 70.	Οφρυα. <i>Carpinus, Ostrya.</i>
Ορτυξ <i>Tetrandr. syn. Αρνεγλωσσου.</i>	Κιγχρος, <i>Cenchrus, Polygam.</i> nisi for-
Ευηπατον. <i>Pentandr. syn. Στρυχνου.</i>	san <i>Milium vel Panicum.</i>
Ανδραφαξ. } <i>Inter Pentandr. et Poly-</i>	Πιλος inter <i>Fungos</i> , ut affinis Σφαιρις.
Ατραφαξ. } <i>gam. occurrit. Incertum</i>	Δαφνη ποντια. <i>Tab. Syst. p. 37. infe-</i>
videtur an <i>Chenopodium vel Atri-</i>	renda.
plex.	Θυμον λιδοιδεις. <i>Tab. Syst. p. 37. infe-</i>
Σχοινος, <i>Καλαμος. Hexandr.</i>	rend.

ERRATA TYPOGRAPHICA.

CATAL. ALPHABETICUS.

Pag.

14. l. 21. *lege comparantur*

18. l. antepenult. *lege πλατυφυλλος*

24. l. 2. *lege κυκλῆδον*

32. l. 27. *lege solstitio*

35. l. 13. *lege fluviorum*

55. l. 9. *lege Polygonum*

TAB. SYSTEMATICA ET LEX.

Pag.

11. not. b. *lege frequentissimus*

19. col. 2. l. ult. *lege trifulca*

43. col. 2. l. 8. *lege Αντιδισημειος*

48. col. 1. l. 30. *lege Gymnospermus*

50. col. 1. l. 11. *lege Διευρυνω*

63. col. 2. l. 6. *lege δικιλλα*

