

Traité des fièvres pernicieuses intermittentes / [Jean-Louis-Marie Alibert].

Contributors

Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837.

Publication/Creation

Paris : Caille & Ravier, 1820.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/seb2wbrg>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.





Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



- 1510 4

10646/B





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29321554>

TRAITÉ
DES
FIÈVRES PERNICIEUSES
INTERMITTENTES.

TRAITE
DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.
PAR
M. DE LAUNAY
INTENDANT

551

TRAITÉ

DES

FIÈVRES PERNICIEUSES

INTERMITTENTES,

PAR J. L. ALIBERT,

Chevalier de plusieurs Ordres, premier Médecin ordinaire du Roi, Médecin en chef de l'Hôpital Saint-Louis et du Collège d'Henri IV, Membre de la Société de l'École et de celle de Médecine de Paris, de la Société médicale d'Émulation, des Académies de Turin, Madrid, Vienne, Saint-Pétersbourg, etc.

CINQUIÈME ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.

Medicus, curatione februm, ut alunt methodicè institutâ, se gerit ut inspector morbi et minister naturæ, curatione vero per Kinam-Kinam, se gerit ut arbiter morbi et instaurator naturæ.

TORTI.

A PARIS,

CHEZ CAILLE ET RAVIER, LIBRAIRES,

RUE PAVÉE SAINT-ANDRÉ-DES-ARCS, n° 17.

1820.



AU PROFESSEUR

PINEL,

MON MAÎTRE ET MON AMI,

POUR LES PROGRÈS

QUE LUI DOIT

LA MÉDECINE CLINIQUE.

J. L. ALIBERT.

AVERTISSEMENT.

DE quelque prix que soient à mes yeux les travaux déjà publiés sur les Fièvres pernicieuses intermittentes, par des hommes justement célèbres, je pense qu'on peut ajouter encore à leurs découvertes, et surtout disposer dans un meilleur ordre les faits nombreux qu'ils ont recueillis. Dans cette matière, ainsi que dans presque toutes celles dont traite notre art, il est une multitude de points de doctrine qui ont été oubliés; d'autres, qui ont été mal vus ou trop peu approfondis. L'unique moyen de les éclairer est de procéder à la recherche des phénomènes par la voie de l'analyse. Cette méthode, qu'Hippocrate et les plus grands maîtres de l'antiquité suivoient en quel-

que sorte à leur insu et par la seule impulsion de leur génie, dont Galien surtout avoit pressenti la nécessité et dont on développe si bien les principes dans les Écoles de Médecine de nos jours ; cette méthode, dis-je, doit être le secret des praticiens observateurs, comme elle a été le secret de quelques philosophes modernes, qui ont tant agrandi le domaine des sciences.

Celui qui aspire à bien ordonner ses idées ne se bornera donc pas à fixer attentivement chaque élément de la maladie, avant d'en étudier l'ensemble ; il apprendra à séparer habituellement, par la pensée, les affections primitives qui s'unissent pour s'offrir simultanément à ses regards, et s'exercera ensuite à rassembler les symptômes de divers ordres, pour en former des affections complexes ou composées. Telle est du moins la voie que j'ai cru devoir suivre, lorsque je me

suis livré à l'étude des Fièvres pernicieuses intermittentes.

Persuadé d'ailleurs qu'il faut exposer les vérités d'une science dans le même ordre qu'on les a conçues, je ne me suis pas contenté d'imiter les naturalistes, qui notent avec exactitude tous les attributs des objets qu'ils veulent faire connoître. J'ai tracé le tableau des pernicieuses intermittentes sporadiques avant celui des mêmes Fièvres épidémiques, parce que celles-ci se déclarent ordinairement avec un appareil de symptômes plus compliqués. J'ai ensuite abrégé en quelque manière les observations déjà faites, ou plutôt j'en ai donné le résultat dans ce que j'ai dit sur le caractère, le diagnostic et le pronostic de ces maladies. J'ai passé de là à la théorie des causes dont il est naturel que l'on s'enquière, quand on a attentivement considéré les effets. J'ai indiqué, enfin, les règles de

traitement qui doivent se déduire des phénomènes bien constatés et de l'expérience réitérée des praticiens.

Cette manière simple de procéder dans les différentes recherches que s'impose notre esprit, me paroît aussi la plus lumineuse. Elle découle d'ailleurs des lois propres de notre organisation. La médecine ne cessera d'être discréditée que lorsque les hommes qui la cultivent auront recours à cette méthode rigoureuse qui assigne à chaque fait observé le rang et la valeur qu'il doit avoir; qui sépare avec sévérité les faits exactement démontrés des faits douteux, et même des faits qui ne sont que vraisemblables, et vers lesquels la seule analogie conduit. Alors seulement l'art qui peut devenir le plus utile, sera aussi le plus respecté.

AVANT-PROPOS.

LORSQUE je publiai mes premières recherches sur les Fièvres pernicieuses intermittentes, mon unique but étoit d'offrir à l'école savante où j'avois puisé l'instruction, un foible témoignage de ma gratitude et de mon zèle; et j'étois loin d'espérer, je l'avoue, que j'aurois autant de lecteurs en si peu de temps. J'ai attribué, sans doute, cette faveur inattendue, plutôt à la nature de mon sujet qu'à la manière dont il est traité; mais je n'en ai pas moins été averti, qu'en livrant pour la cinquième fois mon ouvrage à l'impression, je devois le rendre plus digne du suffrage qu'on a bien voulu lui accorder.

J'y ai fait, en conséquence, plusieurs additions importantes, parmi lesquelles je compte principalement l'indication de plusieurs variétés non encore admises par les médecins, et fondées sur le résultat de mon expérience particulière, ou sur des observations éparses et comme isolées dans

les livres de l'art. Le propre de ces fièvres étant de se masquer sous une multitude de formes différentes, rien n'est plus nécessaire que de signaler leurs nombreuses métamorphoses, pour qu'on ne puisse se méprendre sur leurs funestes effets. Je ne doute pas, du reste, que ceux qui viendront après moi n'ajoutent un jour aux faits que j'ai rassemblés, comme j'ai ajouté moi-même à ceux que j'ai trouvés consignés dans les ouvrages de mes prédécesseurs. Les sciences ne s'achèvent que par les travaux réunis des observateurs qui se succèdent dans la durée des siècles; et il n'est pas donné à un seul homme d'approfondir entièrement un point quelconque des connoissances humaines.

Dans cette édition de mon livre, ainsi que dans les précédentes, j'ai eu le soin de m'abstenir de ces raisonnemens théoriques, auxquels il n'est que trop ordinaire que l'on s'abandonne, lorsqu'on traite des sujets d'une aussi haute importance. Je n'ignore pas combien l'usage des hypothèses a été pernicieux dans la démonstration des vérités qui appartiennent aux sciences phy-

siques. Le spectacle des erreurs commises par quelques hommes, d'ailleurs très-recommandables, est une leçon continuelle pour les écrivains de notre art, qui leur impose la plus scrupuleuse réserve; et depuis que Bacon, Locke et Condillac nous ont transmis de si utiles préceptes sur la manière d'interpréter la nature, on n'est plus excusable, ce me semble, lorsqu'on se laisse entraîner par cette curiosité toujours inquiète de notre esprit, qui le porte sans cesse à dépasser les limites des perceptions de nos sens, et à se perdre dans le vague des conjectures. Si je me suis permis, en conséquence, de rendre raison de plusieurs des symptômes qui caractérisent essentiellement les Fièvres pernicieuses intermittentes, c'est en ne partant que de quelques faits généralement constatés par une multitude d'expériences : je veux parler de ceux qui tiennent à la théorie actuelle de la sensibilité et de l'irritabilité. Ces faits seuls, d'après mon opinion, doivent servir à l'explication des autres; c'est en cherchant leur liaison, c'est en étendant convenablement leurs rapports, qu'on peut arriver à une bonne théorie médicale, et pénétrer la nature des causes sans

nombre qui altèrent le système de l'organisation et de la vie.

En exposant ma manière d'envisager les symptômes des Fièvres vulgairement connues sous le nom de pernicieuses intermittentes, j'ai dû pareillement rendre compte des motifs qui m'avoient déterminé à les rapporter à l'ordre naturel des névroses. Persuadé de l'utilité des classifications nosologiques, je pense qu'il faut employer de préférence celles qui éclairent véritablement l'art de guérir. La meilleure distribution sera, sans contredit, celle qui sera fondée d'après la connaissance d'un plus grand nombre d'affinités et de rapports des maladies entre elles. J'entends par là que les médecins doivent tendre à introduire, dans la disposition méthodique de nos affections morbifiques, la même perfection que les botanistes portent aujourd'hui dans celle des végétaux. Ils doivent, à leur exemple, ne plus recourir à ces expressions fausses de *chaînes*, de *séries*, dont on a usé jusqu'à présent pour rapprocher des objets qui s'avoisinent par leurs qualités ou leurs attributs. Ces expressions, en effet,

ne sont point conformes à leur manière d'être dans la nature. Les maladies, ainsi que les plantes, n'existent point les unes à la suite des autres; elles se touchent et se répondent de toutes parts par une foule d'analogies et de similitudes, en sorte que souvent deux affections placées aux deux extrémités d'un cadre nosologique, ont des points de contact qu'il est avantageux de rechercher. Ce n'est pas du reste ici le lieu d'exposer, dans toute leur étendue, les idées qui me sont propres sur le meilleur mode de classification nosologique; idées que je me propose de reproduire ailleurs avec les développemens dont elles sont susceptibles.

Je passe à ce que j'ai dit dans ce *Traité*, non sur les causes premières, dont l'étude me paroît presque toujours vaine et surperflue, mais sur les causes directes, dont la connoissance est si profitable pour prévenir les ravages des Fièvres pernicieuses intermittentes, lorsqu'elles règnent épidémiquement dans un pays. J'ai donné beaucoup de latitude à l'histoire des influences maréca-geuses, parce que les ouvrages où cette matière se

trouve discutée, sont incomplets et insuffisans. Les progrès rapides de la chimie pneumatique, les travaux de plusieurs physiciens sur l'eudiométrie depuis quelques années, ont dû nécessairement montrer beaucoup de lacunes dans le *Traité* même de Lancisi, qui est encore le meilleur qu'on ait publié sur un objet aussi important d'hygiène publique.

Tout le monde sait que le quinquina est le seul remède que l'on puisse opposer efficacement aux Fièvres pernicieuses intermittentes. J'avois peu insisté d'abord sur l'histoire physique de cette écorce, parce que je n'avois rien à ajouter aux faits contenus dans nos livres de matière médicale. Mais depuis ce temps, j'ai eu occasion de puiser de nouvelles lumières dans les entretiens particuliers de M. Zéa, dont l'amitié m'est aussi honorable que précieuse; et j'ai pu enrichir mon ouvrage des recherches que l'illustre Mutis a continuées pendant plus de trente-cinq années à Santa-Fé de Bogota, ce pays tant vanté par le célèbre Smith, et que la nature a comblé de ses dons. Que ne devons-nous pas attendre encore des savans de tous

les pays, depuis que la paix a fait renaître les communications fraternelles, et qu'il s'est établi entre les différentes nations de l'Europe un commerce libre de travaux et de gloire ! L'Espagne surtout est singulièrement propre à hâter les progrès des sciences par la nature de son sol, favorisé du soleil, et où il seroit facile d'acclimater les plus précieuses productions de la terre, par l'heureuse position de ses colonies, enfin, par le génie particulier des Espagnols, singulièrement porté à l'observation et aux découvertes. Que ne devoit-on pas espérer des expéditions savantes qui ont lieu simultanément dans divers climats, et notamment de celle qui étoit si utilement dirigée par les infatigables auteurs de la Flore péruvienne, sans les troubles politiques qui sont venus en interrompre le cours ! Quels avantages n'auroit-on pas retiré des travaux de l'illustre Mutis, si la mort ne l'avoit frappé au milieu de sa gloire et de ses précieuses recherches !

Comme rien n'est plus essentiel que de bien distinguer les diverses espèces officinales de quinquina, dans l'application que l'on en fait à la cure

des Fièvres pernicieuses intermittentes, on ne sauroit assez vivement désirer l'exportation de cette écorce salutaire de Santa-Fé de Bogota. On s'étonne, en effet, qu'elle ait totalement disparu du commerce, après avoir été autant recommandée par les académiciens de Paris et de Londres. J'ai été moi-même à portée d'éprouver son efficacité en me servant des échantillons que M. Zéa, dont je me plais à citer le nom dans cet ouvrage, a bien voulu me remettre; et j'aurois étendu davantage mes essais, si j'en avois eu une plus grande quantité. Combien ne seroit-il pas à désirer que beaucoup d'autres médecins pussent avoir les mêmes avantages que moi! (1)

(1) La science doit un hommage de gratitude à M. d'Her-vas, ancien conseiller de S. M. C. le roi d'Espagne, qui n'a rien négligé pour répandre ce quinquina en France, et pour favoriser les expériences. Cette exportation seroit du reste un grand bienfait pour l'Europe; car le quinquina étant très-abondant à Santa-Fé de Bogota, et plus à notre portée, on a calculé qu'il reviendroit à un quart même du prix de celui qu'on nous apporte du Pérou. On prétend que ce sont ces mêmes avantages qui l'ont fait proscrire du

Quant à ce qui concerne la dernière partie de mon ouvrage, où j'établis les règles qui doivent diriger constamment le médecin dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes, je n'ai presque rien ajouté à ce que j'en avois dit dans ma première édition, parce que la méthode curative de ces fièvres est à peu près parvenue à sa perfection par l'expérience et les longs travaux de mes prédécesseurs, et qu'on peut aujourd'hui transiger en quelque sorte sur ce point de doctrine avec la précision exacte et rigoureuse du calcul.

Si j'avois mis en œuvre tous les matériaux qui me restent, j'aurois pu sans doute offrir au public un ouvrage bien plus volumineux; mais j'ai aspiré surtout à ne rien écrire qui ne fût utile; et à l'exemple de certains hommes, dont je m'honore de suivre les traces, j'ai vu mon sujet se resserrer par l'effet d'une longue méditation. Heureux

commerce espagnol, sous le vain prétexte qu'il n'est point utile à la médecine, quoique l'expérience journalière dépose en faveur de ses vertus.

s'il n'y a rien encore à retrancher de mon livre, et si je suis parvenu à être aussi court qu'il le falloit et que je l'ai désiré!

Cette concision austère et philosophique, qui néglige, pour ainsi dire, les mots pour ne s'occuper que des choses, et que j'ai tant ambitionnée dans le cours de cet ouvrage, a été le partage des plus célèbres observateurs. Elle peut seule avancer les progrès de cette grande et sublime science, que les Grecs appeloient divine, à laquelle ils dressèrent des autels : honneurs qu'elle mérita surtout du temps d'Hippocrate, et qu'elle obtiendra encore parmi nous, si les efforts unis de plusieurs savans pour lui rendre l'éclat qu'elle a perdu, ont tout le succès qu'on peut en attendre dans un siècle aussi éclairé que le nôtre.

TABLE DES CHAPITRES

CONTENUS DANS CET OUVRAGE.

CHAPITRE PREMIER.

FAITS relatifs à l'Histoire des Fièvres pernicieuses intermittentes. — Certitude des moyens curatifs de la médecine dans le traitement de ces fièvres. — Difficultés que présente la détermination de leur véritable caractère. *Page* 1

Auteurs modernes qui ont le mieux traité de ces fièvres, imparfaitement connues des anciens. 2

Affections multipliées sous lesquelles peut se masquer la Fièvre pernicieuse intermittente, et qui en font autant de variétés. 3

Fièvre pernicieuse intermittente, cholérique ou dysentérique. 6

— hépatique ou atrabilaire. 15

— cardialgique. 16

— diaphorétique. 22

— syncopale. 27

— algide. 29

— soporeuse. 35

— délirante. 46

— péripneumonique ou pleurétique. 57

— rhumatismale. 62

— néphrétique. 63

— épileptique. 65

— convulsive. 66

— céphalalgique. 68

— dyspnéique. 75

Fièvre pernicieuse intermittente hydrophobique. <i>Page</i>	81
— aphonique.....	89
— catarrhale.....	90
— ictérique.....	98
— exanthématique.....	99
De quelques variétés de Fièvres pernicieuses, non encore bien constatées.....	102
Des Fièvres pernicieuses intermittentes qui tendent à devenir continues.....	109
Des Fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques.	113
Fièvres observées à Rome, par Lancisi, en 1695...	114
— à Modène, par Ramazzini.....	118
— à Luxembourg, par Lautter.....	119
Détails historiques sur les Fièvres pernicieuses intermittentes observées à Pithiviers.....	124
Fièvres observées aux environs d'Abbeville.....	128
Épidémie observée à Grenoble et dans ses environs.. <i>ibid.</i>	
— à Boulogne-sur-Mer et dans ses environs.....	131

CHAPITRE II.

CONSIDÉRATIONS SUR la nature des Fièvres pernicieuses intermittentes. — Du type le plus ordinaire des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	137
Applications physiologiques à la théorie des symptômes qui caractérisent les Fièvres pernicieuses intermittentes.....	140
De la dénomination attribuée aux Fièvres pernicieuses intermittentes.....	152
Caractères principaux qui distinguent les Fièvres pernicieuses intermittentes des autres Fièvres.....	157
Complication des Fièvres pernicieuses intermittentes.	164
De l'opinion de ceux qui ont attribué un caractère contagieux aux Fièvres pernicieuses intermittentes.....	169

Des rechutes des Fièvres pernicieuses intermittentes. <i>P.</i>	171
Des lumières que les ouvertures cadavériques peuvent fournir sur la nature des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	<i>ibid.</i>

CHAPITRE III.

CONSIDÉRATIONS sur le diagnostic des Fièvres pernicieuses intermittentes. — Du diagnostic considéré d'après le caractère des paroxysmes.....	175
Du diagnostic considéré d'après le caractère des intermissions.....	176
Analogie des Fièvres pernicieuses intermittentes avec la Fièvre soporeuse des vieillards.....	177
Signes établis par Lautter pour fonder le diagnostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	180
Signes établis par Médecus pour fonder le diagnostic des mêmes fièvres.....	183
Opinions d'Aurivill et de Sénac sur le même sujet..	186
Des signes qui indiquent la tendance des Fièvres pernicieuses vers le type de continuité.....	189

CHAPITRE IV.

CONSIDÉRATIONS sur le pronostic dans les Fièvres pernicieuses intermittentes.....	192
Nécessité d'avoir égard à l'état des forces vitales, pour fonder le pronostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	<i>ibid.</i>
De l'irrégularité des actes propres aux forces vitales, comme signe du danger principal des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	193
Le désaccord des phénomènes sympathiques constitue en	

grande partie le danger des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	Page 196
Du pronostic fondé sur le mode d'altération des propriétés vitales dans les Fièvres pernicieuses intermittentes.....	198
— sur la considération des phénomènes de l'organe cérébral.....	199
— de la respiration.....	200
— des organes de la digestion.....	201
— des déjections et des excrétiions.....	203
— du pouls.....	204
— des trois périodes de frisson, de chaleur et de sueur.	205
— des exanthèmes.....	206
— des pétéchies.....	<i>ibid.</i>
— des organes du mouvement.....	208
— des traits de la face.....	209
— de divers âges.....	210
— sur la forme des paroxysmes.....	211
Connaissances acquises par les anciens sur le pronostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	212

CHAPITRE V.

DES causes directes des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	216
C'est un fait rigoureusement démontré par l'expérience et l'observation, que les exhalaisons marécageuses influent éminemment sur la naissance et le développement des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	219
Les observations les plus authentiques ont également fait voir que le temps de la nuit, la saison de l'été, et surtout celle de l'automne, favorisent particulièrement l'action des vapeurs marécageuses dans la production des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	225

- Les marais situés dans les lieux élevés, exposés au nord, et balayés par les vents, n'exercent qu'une influence très-légère sur la naissance et le développement des Fièvres pernicieuses intermittentes. Page 229
- Les marais, les étangs, les lacs, etc., contribuent moins essentiellement à la production des Fièvres pernicieuses intermittentes, par la quantité d'eaux qui stagnent dans leur intérieur, que par le dépôt plus ou moins infect, mis en contact avec l'atmosphère, après la retraite ou l'évaporation de ces mêmes eaux. 231
- L'action des vents seconde puissamment, dans quelques circonstances, l'influence des miasmes marécageux dans la production des Fièvres pernicieuses intermittentes. 233
- Les pluies qui surviennent dans un temps très-chaud, peuvent influer sur la production des Fièvres pernicieuses intermittentes, en dégageant les vapeurs putrides, retenues dans le sein de la terre durcie. 238
- C'est surtout dans les pays chauds que les terrains marécageux deviennent nuisibles à la santé de l'homme, et sont favorables au développement des Fièvres pernicieuses intermittentes 239
- L'habitude peut affoiblir jusqu'à un certain point l'influence des émanations marécageuses sur l'économie vivante, et les rendre moins efficaces pour la production des Fièvres pernicieuses intermittentes. 242
- Les miasmes marécageux favorisent d'autant plus l'invasion des Fièvres pernicieuses intermittentes, que le système vivant a déjà été affoibli par des causes sédatives 244
- La question que Lind a voulu résoudre, en recherchant combien de temps les effets d'un air vicié pouvoient rester cachés dans le corps humain, sans manifester

leur existence par le développement de la Fièvre , reste encore imparfaitement déterminée.....	Page 246
L'état actuel de nos connoissances ne nous permet pas d'établir d'une manière certaine , quel est le mode d'action des miasmes marécageux sur l'économie vivante , pour effectuer la production des Fièvres pernicieuses intermittentes	248
On n'a point encore assez de faits pour déterminer jusqu'à quel point les phases lunaires , les marées , l'électricité de l'atmosphère , les météores , etc. , peuvent fortifier l'influence des émanations marécageuses , dans la production des Fièvres pernicieuses intermittentes...	249
La présence des végétaux vivans dans les lieux infectés par l'air des marais , tempère son influence pernicieuse , et diminue son activité dans la production des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	250
Toutes les matières susceptibles d'éprouver une décomposition plus ou moins putride , impriment une qualité délétère aux eaux stagnantes , et les rendent propres à la production des Fièvres pernicieuses intermittentes .	268
Les notions que nous fournit l'eudiométrie actuelle , ne jettent aucune lumière sur les qualités physiques de l'air , le plus propre à développer les Fièvres pernicieuses intermittentes	273
Les médecins observateurs ont établi des signes certains qui servent à faire reconnoître les pays marécageux , et les plus propres à favoriser le développement des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	380
Les vapeurs élevées du corps de l'homme , et long-temps renfermées dans le même lieu , peuvent quelquefois , mais très-rarement , faire naître et développer des Fièvres pernicieuses intermittentes.....	282

- Des expériences modernes démontrent que les acides , et spécialement l'acide muriatique oxigéné , sont des agens très-efficaces pour la désinfection de l'air ; et sous ce point de vue , on peut l'employer avec un extrême avantage , pour détruire les causes qui favorisent le développement des Fièvres pernicieuses intermittentes Page 283
- Quoique les Fièvres pernicieuses intermittentes doivent presque toujours leur origine aux émanations délétères des marais , on est fondé néanmoins à avancer , d'après des faits bien observés , que d'autres causes sédatives , telles , par exemple , que la mauvaise qualité des eaux , un froid excessif ou des affections vives de l'âme , etc. , peuvent aussi leur donner lieu 286
- Les effets des grandes plaies , souvent même d'autres maladies , imprimant un caractère perniciosus aux Fièvres intermittentes qui se manifestent dans certaines épidémies 289

CHAPITRE VI.

- CONSIDÉRATIONS sur le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes 302
- Le Quinquina en substance doit être préféré à toutes les autres préparations de ce remède , dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes 305
- Pour que le Quinquina produise un effet convenable dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes , il faut le donner dans la distance la plus éloignée du paroxysme que l'on se propose d'arrêter 309
- L'administration du Quinquina n'est généralement convenable que dans le temps de l'intermission ou de la rémission 312
- Si la Fièvre perniciose à type intermittent est manifeste-

- ment sub-intrante , ou si les accès s'étendent au point de se toucher , il convient de placer de préférence le Quinquina dans la déclinaison dès accès ou des redoublemens *Page* 313
- La quantité de vingt-quatre grammes (six gros) de Quinquina , ou de trente-deux grammes (une once) au plus , suffit communément pour arrêter les paroxysmes d'une Fièvre pernicieuse intermittente , arrivée à son plus haut degré d'intensité 315
- Dans les cas ordinaires des Fièvres pernicieuses intermittentes , la première prise ou celle qui est donnée dans le temps le plus éloigné de l'accès , doit être la plus forte ; on débute communément par la moitié de la dose , dont le reste est donné ensuite en portions successivement décroissantes , et dans un intervalle plus ou moins considérable , selon la nature de la Fièvre , et la distance réciproque des paroxysmes entre eux 317
- L'action du Quinquina est d'autant plus énergique dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes , qu'une plus grande quantité de cette substance est administrée dans un temps plus court 318
- Lorsque la Fièvre pernicieuse intermittente s'annonce par des symptômes alarmans , le Quinquina doit être administré sans délai , et sans aucune préparation préalable de l'individu 319
- Lorsque la Fièvre pernicieuse intermittente débute par des symptômes si graves , si néanmoins un de ces symptômes prédomine constamment sur les autres , et si la nature de l'épidémie régnante donne lieu de soupçonner le danger de la Fièvre , il faut administrer le Quinquina sans différer davantage 321
- Toutes les fois que la Fièvre pernicieuse intermittente se

- déclare en double-tierce , il n'y a ordinairement que l'un des accès alternant en tierce , qui soit véritablement pernicieux ; l'autre est léger et moins à craindre : c'est donc spécialement vers le premier qu'il faut diriger les moyens curatifs. Page 322
- On peut , dans quelques cas , à l'aide d'une méthode moins énergique , changer le caractère pernicieux des Fièvres pernicieuses intermittentes , et les éteindre ensuite graduellement , par l'heureux emploi des fébrifuges indigènes. 323
- Lorsque , par le secours de la méthode la plus convenable , on est parvenu à supprimer les paroxysmes d'une Fièvre pernicieuse intermittente , pour éviter les rechutes , il est nécessaire d'insister quelque temps sur l'usage du Quinquina. 326
- Futilité des objections généralement faites contre l'administration du Quinquina. 328
- Conjectures émises sur la manière d'agir de ce remède. 329
- De l'emploi de quelques autres moyens nécessités par les circonstances particulières où se trouve le malade. . 334
- Cas où le médecin est appelé au milieu d'un accès caractérisé par les accidens les plus funestes , qui mettent la vie du malade en danger. 335
- Ce qu'il faut faire lorsqu'un état particulier d'irritation de l'estomac fait constamment rejeter le Quinquina , par la voie du vomissement. 336
- De l'emploi des émétiques et des évacuans , avant l'administration du Quinquina , lorsque les Fièvres pernicieuses intermittentes se compliquent d'un embarras des premières voies. 338
- De l'importance qu'il y a de joindre au Quinquina les remèdes analogues à la nature des différentes complications 339

De l'efficacité du Quinquina , lorsque la diathèse vermineuse se combine avec les fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques.....	Page 340
Circonstances particulières où la saignée peut devenir nécessaire au malade.....	344
Lorsque la déglutition est impossible , et que le danger est imminent, les lavemens et les bains de Quinquina ont pu être administrés avec avantage dans certains cas de Fièvres pernicieuses intermittentes.....	347

APPENDICE

SUR les espèces de Quinquina qu'on peut employer
pour la guérison des Fièvres pernicieuses intermit-
tentes..... Page 353

ARTICLE PREMIER.

Histoire du Quinquina brun..... 360

ARTICLE II.

— du Quinquina orangé..... 364

ARTICLE III.

— du Quinquina rouge..... 372

ARTICLE IV.

— du Quinquina jaune..... 378

ARTICLE V.

— du Quinquina blanc..... 382

Ces cinq espèces de Quinquina remplissent des indications
différentes..... 386

Écorce du tronc et des grosses branches préférable à celle
des petites écorces..... *ibid.*

ARTICLE VI.

Espèces de Quinquina qui agissent à un degré inférieur. 389

Cinchona lanceolata..... 390

— ovata..... *ibid.*

— acutifolia..... *ibid.*

— hirsuta..... *ibid.*

Cinchona rosea.....	Page 391
— purpurea.....	<i>ibid.</i>
— grandiflora.....	<i>ibid.</i>
— micrantha.....	392
— dichotoma.....	<i>ibid.</i>
— grandulifera.....	<i>ibid.</i>
— acutifolia.....	393
— de Huanuco.....	<i>ibid.</i>

ARTICLE VII.

Des différentes espèces de Quinquina des Antilles...	395
Cinchona floribunda.....	396
— caribæa.....	397
— spinosa.....	398

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

TRAITÉ

DES

FIÈVRES PERNICIEUSES INTERMITTENTES.

CHAPITRE PREMIER.

*Faits relatifs à l'histoire des Fièvres pernicieuses
intermittentes.*

I. **P**EU de maladies, sans doute, constatent mieux le pouvoir de la médecine et la certitude de ses moyens, que les fièvres qui font le sujet de ce Traité. Mais rien n'est généralement plus difficile à démêler que leur véritable caractère au milieu de leurs anomalies et des formes trompeuses qu'elles revêtent. Aussi les plus anciens maîtres de l'art ont-ils imparfaitement connu leur nature, et totalement ignoré le mode de traitement qui leur convient.

II. C'est aux modernes qu'étoit réservée la gloire de saisir et de discerner la marche propre d'une

affection qui, jusqu'à eux, s'étoit dérobée à l'œil attentif de tant d'habiles observateurs (1). Parmi ceux qui en ont fait l'objet spécial de leurs méditations, Mercatus, Hérédia, Morton, occupent un rang honorable. Dans des temps plus modernes, Torti, Werlhof, Lautter, Senac, Cleghorn, Medicus, Comparetti, en ont donné une connoissance plus exacte et plus approfondie. Le premier

(1) Quoique les anciens n'aient point approfondi l'histoire des fièvres pernicieuses intermittentes, il paroît pourtant qu'elles ne leur étoient pas tout-à-fait inconnues. C'est à tort que Morton s'est attribué la gloire de les avoir observées le premier, lorsqu'il a dit : *Operæ pretium duxi exempla aliquot hujusmodi febrium, quas nuperrime observavi, seligere, scriptis mandare atque publici juris facere. Atque equidem hoc pensum eo lubentiùs aggredior, quia nemo adhuc (quantum scio) hoc subjectum tractavit, cujus cultura ad praxim medicinalem promovendam maximi momenti mihi esse videtur.* Sans parler ici de Salius Diversus, de Ludovicus Mercatus, de Michael Hérédia, qui avoient précédé l'auteur dans cette carrière, on peut assurer qu'Hippocrate et Cælius Aurelianus chez les Grecs, Avanzoar, Averroès et Avicenne chez les Arabes, avoient indiqué ces fièvres dans leurs ouvrages. Mais ce qu'on ne peut véritablement disputer aux modernes, c'est d'avoir en quelque sorte créé le traitement des pernicieuses intermittentes, qui n'ont été combattues avec quelque efficacité que depuis Morton et ses successeurs. Il est peu de découvertes en médecine qui aient été plus manifestement utiles à l'humanité.

de ces derniers surtout, s'éclairant du flambeau de l'analyse, a su isoler les symptômes majeurs, qui, dans quelques circonstances, impriment à la maladie une sorte de physionomie particulière, et a signalé avec sagacité ses principales métamorphoses. Mais à l'époque actuelle des progrès de la médecine d'observation, son livre ne suffit point à la science. Dans cette matière intéressante, de nouveaux faits ont donné lieu à de nouveaux aperçus. Torti, d'ailleurs, a terni l'éclat et la vérité de ses immortelles descriptions, par une théorie hypothétique, qui doit nécessairement faire place aux notions plus rigoureuses et plus exactes de la physiologie expérimentale de nos jours.

III. On sait que le célèbre praticien de Modène a présenté la fièvre pernicieuse intermittente sous divers points de vue, que l'œil du médecin instruit ne pourroit trop s'exercer à découvrir et à bien distinguer. Ainsi, par exemple, dans le premier cas, il se manifeste des vomissemens bilieux et un flux de ventre véhément, semblable, tantôt à celui du cholera-morbus, tantôt à celui de la dysenterie; dans le deuxième cas, c'est un flux hépatique, ou quelquefois noirâtre; dans le troisième, il y a cardialgie avec des efforts inutiles pour rejeter les matières contenues dans l'estomac; dans le quatrième, une sueur abondante, qui n'apporte aucun

soulagement; dans le cinquième, ce sont des syncopes réitérées; dans le sixième, c'est un froid continu qui augmente par degrés et qui n'est point suivi de chaleur; dans le septième cas enfin, c'est une affection soporeuse grave, et qui diffère peu de l'apoplexie. A ces variétés de la fièvre pernicieuse intermittente, toutes connues de Torti, je joindrai celle qui est décidée par la prédominance d'un délire tranquille, et dont j'ai été à même de vérifier l'existence d'après les premières observations du professeur Pinel; celle qui est marquée par une irritation spéciale de la membrane muqueuse du poumon et des fosses nasales; celle qui est caractérisée par les symptômes d'ictère intermittent; enfin celle qui est signalée par une éruption exanthématique, éruption qui suit régulièrement la marche et l'exacerbation des paroxysmes. Ce dernier cas s'est offert à mon observation dans l'intérieur de l'hôpital Saint-Louis.

IV. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il faille autant restreindre, à l'exemple de Torti, le nombre des pernicieuses ainsi signalées par un symptôme majeur et prédominant. D'après les descriptions fidèles qui nous ont été transmises par Morton et quelques autres médecins, dont le témoignage est authentique, on ne sauroit douter que cette fièvre ne puisse se masquer encore sous d'autres affections

aussi redoutables. On l'a vue dans plusieurs cas simuler la pleurésie ou le rhumatisme ; on a vu des douleurs intolérables de la vessie et des reins , des attaques d'épilepsie et de paralysie , des convulsions insolites , des céphalalgies violentes , des gênes suffocantes dans les organes de la respiration ; dans un cas même , tous les accidens de l'hydrophobie , caractériser périodiquement les paroxysmes , et ne disparoître qu'avec eux. Les faits divers qu'on a recueillis suffisent sans doute pour qu'on soit fondé à en faire , non des espèces , mais des variétés nouvelles.

V. Afin de procéder avec ordre , et de n'introduire dans cet ouvrage que le langage clair , rigoureux et précis des sciences physiques , je vais les décrire successivement telles qu'elles s'offrent à l'observateur dans les lieux et les hôpitaux où elles règnent. J'exposerai ensuite ce que l'on peut avancer aujourd'hui de plus certain sur leur nature , leur diagnostic , leur pronostic et sur les causes qui concourent à leur production. Je terminerai enfin par établir les règles positives qui doivent , dans toutes les circonstances , en diriger le traitement.

ARTICLE PREMIER.

Fièvre pernicieuse intermittente cholérique ou dysentérique.

VI. Cette fièvre a été manifestement connue d'Hippocrate, lorsqu'il parle de l'influence pernicieuse de l'automne sur la production des cholera-morbus, et des fièvres intermittentes qui acquièrent un mauvais caractère. J'ai eu occasion de voir cette variété de la pernicieuse intermittente dans une épidémie funeste qui ravageoit un hôpital; mais le malade mourut dans l'accès même où je le vis pour la première fois.

Elle est le plus ordinairement tierce, selon la remarque de Torti, et il est excessivement rare qu'elle affecte un autre type. Son début est caractérisé par des vomissemens bilieux ou des déjections de même nature, d'une couleur verte-poracée, qui se déclarent avec abondance.

A ces vomissemens, à ces déjections, viennent se joindre des anxiétés et des ardeurs de l'estomac, une sueur visqueuse autour du front, le hoquet, une voix aiguë, comme glapissante, quelquefois rauque. La langue est sèche et aride, l'urine épaisse et rouge, la respiration anhéleuse et pénible. Les yeux sont caves, le pouls est petit et foible, les

extrémités sont froides et livides ; on y observe, d'ailleurs, tous les phénomènes qui accompagnent le cholera-morbus. La pernicieuse intermittente diffère néanmoins de cette dernière affection, en ce que son symptôme prédominant a plus d'intensité encore, et que, pour me servir de la comparaison de Torti, ce symptôme suit le mouvement et les périodes de la fièvre, comme l'ombre suit le corps.

L'auteur que je viens de citer donne l'histoire de trois malades atteints d'une tierce cholérique qui a constamment présenté ce caractère. Dans un cas seulement la matière des vomissemens et des déjections étoit très-peu abondante, et ne s'échappoit qu'avec beaucoup d'efforts. Je citerai l'observation la plus remarquable : un homme âgé de soixante-quatre ans fut attaqué d'une fièvre tierce simple, accompagnée de vomissemens bilieux et de déjections de même nature. Ces symptômes avoient plusieurs fois compliqué les affections que le malade avoit éprouvées à différentes époques de sa vie. Torti fut porté, d'après cette remarque particulière, à lui administrer les moyens qui lui avoient procuré quelque soulagement dans des circonstances semblables. Mais au quatrième ou au cinquième accès, les accidens se montrèrent avec une intensité effrayante. Vomissemens violens et copieux, déjections qui se renouveloient presque

sans aucun intervalle ; inquiétudes extrêmes à chaque fois que le malade vomissoit ou alloit à la selle. Refroidissement général, pouls foible, respiration anhéleuse, hoquet, yeux caves, coucher en supination, impossibilité presque absolue d'exécuter le moindre mouvement. Dans cet état alarmant, il étoit probable que la déglutition seroit très-difficile, ou que si le malade pouvoit avaler quelque chose, il le rejetteroit aussitôt. Le danger étoit pressant ; on éprouvoit les plus vives craintes ; le malade fut administré : quoique tout parût annoncer une mort prochaine, Torti se déterminâ à administrer le quinquina à fortes doses et souvent répétées ; d'abord les symptômes ne diminuèrent point, et l'état du malade étoit toujours très-critique ; cependant il n'y eut point de nouveaux paroxysmes : le pouls commença peu à peu à se relever ; le quinquina qui fut continué à haute dose pendant plusieurs jours, et l'usage du vin (que le malade pouvoit à peine garder dès les premiers jours) rétablirent peu à peu la chaleur, ranimèrent ses forces presque entièrement éteintes. C'est ainsi que cet homme fut dans peu de temps rappelé, pour ainsi dire, de la mort à la vie.

Je rapprocherai de ces faits une observation consignée dans l'excellent ouvrage de Comparetti (*Riscontri medici delle febbri larvate, etc.*). Cet

auteur a suivi les traces d'Hippocrate. La marche analytique des anciens médecins grecs brille dans ses écrits. Une femme septuagénaire, d'un tempérament bilieux et sanguin, d'une habitude de corps grêle, d'une stature élevée, d'une fibre molle, d'un esprit vif, avoit éprouvé des douleurs vives à l'estomac, avec gonflement du même organe, et à l'utérus quoiqu'elle n'eût jamais été grosse : cette femme avoit eu aussi des chagrins et des affections tristes.

En 1789, au printemps, elle fut attaquée d'une colique qui se manifesta à l'hypocondre gauche, qui occupa ensuite l'hypocondre droit. On combattit cette colique par la saignée, par l'usage de l'huile de graine de lin, les fomentations sur le ventre, etc. ; et ensuite, pendant l'intermission des douleurs, elle prit du quinquina en lavemens ; on lui en fit pareillement avaler plusieurs doses.

La colique disparut graduellement ; mais il resta pendant l'été une légère douleur à la vessie et au foie ; la malade éprouva aussi une certaine difficulté de rendre les urines et les excréments, accidens qui réclamèrent les soins d'un médecin.

Au commencement d'octobre, ayant mangé à souper des herbes, il se manifesta, durant la nuit, un vomissement très-considérable, avec évacuation abondante par les selles. La malade ressentoit des

horripilations vagues ; elle passa une nuit fort inquiète , et dans un état de torpeur.

Le premier jour, au matin, Comparetti fut appelé; il trouva le pouls petit, peu fréquent et foible, quelquefois inégal, la chaleur douce, le cholera-morbus persistant toujours, l'urine rouge et terne, la langue humide et nette, le ventre tendu. Pendant la visite de ce médecin, il survint une défaillance, une syncope, avec respiration haute, les yeux fermés, quelques mouvemens convulsifs des bras. Cet état dura pendant quelques minutes, et il y avoit un changement remarquable dans la face, qui étoit devenue pâle et comme cadavéreuse, avec perte de la parole, et abolition totale des fonctions sensitives. On apprit qu'elle avoit essuyé une autre attaque pendant la nuit, et que dans le premier moment, elle éprouvoit un resserrement aux tempes, aux mâchoires, et qu'elle se trouvoit dans l'impuissance de parler. Cette sensation pénible descendoit et montoit à différens intervalles, puis passoit aux muscles du col et du thorax, et traversoit de derrière en devant; ensuite elle se manifestoit aux jambes : enfin il y succédoit une lassitude générale. Dans cette circonstance, on eut recours au vinaigre, et à divers stimulans appliqués aux narines; ensuite on prescrivit une mixture avec le diascordium, la liqueur anodine minérale, l'eau

distillée de cerise et de tilleul qu'elle prit pendant la journée. Le soir on ajouta la décoction de quinquina avec la liqueur anodine.

Le second jour, la fièvre revint avec douleur dans les membres; les défaillances furent plus fréquentes pendant la nuit; la malade fit usage de la mixture et de la décoction de quinquina tour à tour. La chaleur se développa. Le vomissement se calma, ainsi que le flux de ventre. Le matin le pouls étoit mou, un peu rare et foible. Au commencement de la défaillance il s'embarrassoit, disparaissoit, et puis se relevoit. Dans le cours de la journée, il y eut plusieurs attaques. Le choléra diminuant, la quantité de l'urine augmentoit.

Le troisième jour, la fièvre anticipa soudainement de plusieurs heures. Mouvemens convulsifs le soir et la nuit. Décoction de quinquina avec le sirop de pavot blanc.

Le quatrième jour, au matin, il y avoit une rémission manifeste; mais les défaillances existoient, de manière que dans le cours de vingt-quatre heures, on en compta dix. On substitua au sirop le laudanum liquide de Sydenham, et l'eau de citron distillée. On obtint du repos.

Le cinquième jour, la fièvre revint le matin par anticipation, avec le pouls moins petit et moins

mou. Les accidens furent moindres; elle passa la nuit en continuant la décoction de quinquina.

Le sixième jour, la fièvre revint de même au matin; les défaillances cessèrent, le froid augmenta, ainsi que la fréquence du pouls et la chaleur, qui bientôt se modéra. La nuit fut tranquille.

Le septième jour, il n'y eut point d'accès; il parut une sueur partielle, avec une urine copieuse.

Les jours suivans, il y eut cessation de la fièvre, ensuite récédive sans le choléra; mais il subsistoit encore des défaillances, des spasmes à la poitrine et aux jambes. On reprit l'usage du quinquina sous diverses formes. Enfin la fièvre disparut.

Quelque temps après, la douleur à l'hypocondre droit se réveilla; cette douleur, semblable à une morsure de chien, étoit si forte, que la malade étoit obligée de tenir les jambes dans un état de rétraction. Au toucher on sentoit un gonflement, une tension, une dureté à la région antérieure du foie. On fit des fomentations; on administra des clystères. La malade prit de l'huile et de la magnésie avec du quinquina. Pendant les attaques spasmodiques, elle tenoit les mains plongées dans l'eau froide, ce qui la soulageoit un peu.

Dans les différentes vicissitudes de la fièvre, et

des autres affections qui eurent lieu pendant tout le cours du printemps, la malade eut une évacuation copieuse par les selles, qui, produisant une prostration de forces, et une langueur des organes vitaux, faisoit craindre une issue mortelle. Dans ces circonstances, le quinquina seul avec le diascordium eut du succès. Ce remède calma la fièvre et la trop grande abondance des excrétiens.

Enfin, on substitua la décoction de camædris, de verveine et d'autres plantes amères et apéritives, auxquelles on ajouta la fumeterre, etc. On s'en tint ensuite à cette dernière plante, en observant le régime le plus exact. Dans le même mois, on eut recours au bouillon de vipère et de grenouille. A l'usage de ce remède on joignit l'application d'un emplâtre émollient et résolutif sur l'hypocondre. Bientôt après la douleur dans cette partie cessa, les forces se relevèrent, et la malade entra en pleine convalescence.

D'autres fois le période fébrile s'accompagne d'un flux comme dysentérique; c'est-à-dire que les matières rendues sont muqueuses et sanguinolentes. Leur expulsion se fait avec un tenesme et des épreintes intolérables. Leur âcreté est telle, qu'on diroit qu'elles corrodent le rectum. L'estomac est tourmenté de douleurs atroces, comme si ses membranes étoient arrachées ou déchirées.

Torti a pourtant remarqué que le plus communément cette espèce d'évacuation est suivie de moins de danger que la première que nous avons décrite. La fièvre, quoique paroissant plus intense, est en quelque sorte ici moins concentrée.

On peut lire, dans l'ouvrage de cet auteur, l'observation d'une double tierce pernicieuse, avec excrétion continuelle d'une mucosité sanguinolente, semblable à celle de la dysenterie : il y avoit néanmoins cette différence, que l'excrétion avoit lieu aussi par la voie du vomissement, ce qui n'arrive pas dans cette dernière maladie, et que, quoique les intestins ne fussent pas exempts de tranchées, le siège principal des souffrances étoit dans l'estomac.

Au surplus, si l'on a égard au *cholera-morbus*, considéré comme indépendant de la fièvre pernicieuse intermittente, aucune affection peut-être n'a été décrite avec des couleurs plus vraies, plus énergiques, que dans les épidémies d'Hippocrate; et parmi les modernes, Bianchi surtout a profondément médité la doctrine des anciens à ce sujet. (*Hist. hep. tom. 1, p. 595.*)

ARTICLE II.

Fièvre pernicieuse intermittente hépatique ou atrabilaire.

VII. Quoique cette variété ait été observée chez des individus robustes qui ont résisté à ses atteintes, le plus communément elle doit être considérée comme mortelle, si on n'applique à temps et à propos les moyens de l'art. Le symptôme prédomnant qui la constitue est un flux de ventre copieux et fréquent, semblable à de la lavure de chair, et désigné sous le nom de flux *hépatique* par les anciens. Il se manifeste d'abord sans aucune incommodité bien fâcheuse en apparence pour le malade; mais il conduit bientôt à une prostration extrême du système des forces. Le pouls devient petit et foible; la voix est aiguë, et parfois éteinte. Il y a un refroidissement notable du corps et des extrémités. Le malade a une telle propension à la défaillance, qu'elle a lieu toutes les fois qu'il veut se lever du lit. Les fonctions de l'entendement néanmoins sont sans altération. (Voyez *la cinquième et la sixième observation de Torti, lib. 4, cap. 1.*)

Quelquefois la matière des excrétiens est un sang noirâtre, tantôt liquide et tantôt concret, tantôt moitié coagulé, tantôt moitié dissous. Si

cette déjection, mentionnée souvent par Hippocrate, et appelée vulgairement *atrabilaire*, est excessive et répétée, elle est accompagnée bientôt des symptômes les plus alarmans, tels que l'oblitération du pouls, la froideur et la lividité des membres, la face hippocratique, etc. (Voyez la septième et la huitième observation de Torti, lib. 4, cap. 1).

Les recueils des observateurs contiennent beaucoup d'exemples de fièvres intermittentes hépatiques. Raimond-Restaurand en cite une qu'il combattit par l'administration du quinquina, à une époque où ce médicament étoit encore peu répandu. (1)

ARTICLE III.

Fièvre pernicieuse intermittente cardialgique.

VIII. Il paroît que les fièvres cardialgiques ont été observées par les anciens. Hippocrate, *De morbis popularibus*, a décrit de semblables accès, comme Comparetti en a très-bien fait la remarque.

Le symptôme de cardialgie, qui signale constamment cette fièvre, se déclare communément au début de l'accès, lorsque le malade est encore dans le frisson, ou lorsque la chaleur commence. Alors le

(1) De l'usage du china-china pour la guérison des fièvres, 1680.

malade éprouve un sentiment de mordication à l'orifice de l'estomac, avec des vomissemens ou des nausées; il est sujet à de fréquentes lipothymies. Son pouls est presque insensible; sa vue est plus ou moins obscurcie, sa face est pâle, cadavéreuse; ses tempes sont affaissées, etc. Ce sentiment de mordication, qui constitue le principal caractère de la fièvre, est quelquefois si violent, qu'il arrache des cris et de profonds gémissemens au malade. Torti parle d'une femme chez laquelle ce symptôme de cardialgie s'étoit accru à un tel point, qu'il lui sembloit que son estomac étoit mordu et rongé par des chiens. (Voyez sa neuvième observation, lib. 4, cap. 1.)

C'est à la fièvre pernicieuse intermittente cardialgique qu'il faut rapporter la fièvre dite *syn-copale*, par Forestus, et que ce médecin habile observa chez une femme en 1563 (1). Les paroxysmes qui suivoient le type de la tierce, caractérisés par un pouls petit, rare, des urines crues, etc., ne tardèrent pas à se manifester tous les jours, et dès lors une douleur excessive se fit sentir à l'estomac. Forestus a recueilli quelques autres faits analogues à ce dernier.

(1) *De febr. intermitt., lib. 3, obs. xxix, nam prius in ventriculo, ipsa valde conquerebatur.*

On trouve dans une Dissertation latine d'Aurivill (1), l'exemple d'une fièvre pernicieuse intermittente cardialgique, qui fut heureusement arrêtée par le quinquina. Le premier accès ressembloit à ceux d'une fièvre intermittente ordinaire, excepté qu'il y avoit peu de sueur. Le jour suivant, jour de l'intermission, grande foiblesse. Le troisième, l'accès débutant par un léger frisson, fut plus alarmant; il se termina par une très-petite sueur, et le quatrième jour il n'y eut point d'apyrexie. Le cinquième jour la fièvre avança. Le malade, au lieu du froid, n'éprouva que des frissonnemens, auxquels la chaleur succédant, il fut saisi d'un sentiment violent de constriction, dont on rapporta le siège à la région inférieure de la poitrine, à cause de la suffocation qui menaçoit à chaque instant sa vie. D'ailleurs, prostration des forces; défaillances; grandes anxiétés; tristesse sombre; distorsion des yeux et trouble de la vue; nausées et vains desirs de vomir, ou rejection d'un peu de matière bilieuse; douleurs intercurrentes de l'ischion, qui se répandoient sur presque tout le côté. Le sang tiré par la saignée n'avoit rien d'extraordinaire; l'urine, après un accès très-grave, étoit trouble, noirâtre, fétide; on voyoit une pellicule à sa surface, et elle déposoit un sédiment blanc. Le même auteur rap-

(1) *Dissert. de febr. intermitt. malig.* 1765.

porte un second exemple de cette variété de la fièvre pernicieuse, remarquable par la nature de la cause qui l'a produite : nous aurons occasion d'en parler dans le cours de ce Traité.

L'ouvrage de Comparetti contient une observation de fièvre intermittente cardialgique. Cette observation a été faite sur un homme âgé d'environ quarante-cinq ans, d'un tempérament bilieux et d'une complexion forte, point sujet aux maladies. Dans le mois d'août, en 1786, le malade se transporta, pour la première fois, à Trieste, par mer : ayant ainsi resté quelques jours dans un air très-variable, il perdit en partie l'appétit et le sommeil, ses urines couloient difficilement.

Il partit de là avec la fièvre, et s'en retourna également par mer ; le passage fut de deux jours : pendant ce temps, le malade éprouvoit un froid continuel, ainsi qu'une sensation de resserrement et de constriction à la région de l'estomac. Il arriva à Venise, où on lui fit prendre quelques boissons nitrées.

Le troisième jour, aussitôt qu'il fut rendu chez lui, il prit, de son propre mouvement, de la casse, de l'eau avec le suc de limon, et un pédiluve. La nuit se passa dans l'insomnie ; l'urine continua d'être peu abondante.

Le quatrième jour au matin, le pouls étoit tendu; la douleur cardialgique étoit plus incommode. On ouvrit la veine du bras et du pied; cette saignée ne procura aucun soulagement: il prit peu de nourriture dans le jour, mais il but beaucoup d'eau avec le suc d'orange. Le soir, le pouls étoit encore fréquent, contracté, un peu de chaleur: on prescrivit et il prit une émulsion d'huile d'amandes douces, avec la semence de pavot blanc; il passa la nuit comme la précédente; il ne put dormir; la douleur de l'estomac persistant, l'urine rare et rouge.

Le cinquième jour au matin, on donna du petit-lait clarifié avec le tartrite acidule de potasse, qui excita médiocrement les déjections alvines. A midi le pouls devint plus petit et plus serré, avec peu de fréquence et peu de chaleur. Le soir, le pouls étoit plus souple, plus mou et moins fréquent; peu de nausées et de soif, la langue paroisoit blanche et sale. Il continua d'éprouver la douleur, et d'avoir les urines rares.

Le sixième jour, il prit le matin une potion de manne, avec l'eau de citron distillée; augmentation de la soif, grands borborygmes du ventre, selles liquides, urines plus rares et plus colorées, quoique le malade eût pris beaucoup de boisson. Le soir, le pouls étoit beaucoup plus développé et plus fréquent; la douleur de l'estomac augmenta,

la face devint rouge , céphalalgie ; l'état de rêve se changea en une somnolence inquiète ; sorte de loquacité.

Le septième jour au matin , intensité alarmante dans les phénomènes. La figure étoit noirâtre et difforme , les yeux fermés , la respiration difficile et laborieuse , le coucher oblique , le pouls foible , la chaleur diminuée , la langue desséchée et tremblante , l'urine presque noire. On eut recours au quinquina , à la dose de huit grammes (deux gros) , dans l'eau , et on réitéra plusieurs fois son administration. Le soir , le pouls étoit plus fréquent et moins mou , la chaleur plus prononcée , la douleur à l'estomac cessée : la prise du quinquina produisit peu de repos durant la nuit , mais commença à provoquer l'urine et la sueur.

Le huitième jour, il y avoit une rémission des principaux symptômes ; toutes les excrétions étoient augmentées , le pouls moins foible , plus régulier et moins fréquent , la respiration libre , la peau plus chaude et plus molle , la langue plus humide , l'urine copieuse et de couleur citrine. On continua le quinquina à la même dose , toutes les deux heures. Le matin , il ne parut aucun signe de nouvel accès ; le soir , grande rémission de la fièvre et de tous les symptômes qui la caractérisoient. La nuit fut calme.

Le neuvième jour, la fièvre cessa; l'appétit commença, et le malade entra en convalescence : il prit le quinquina deux fois le jour pendant quelque temps; il n'y eut aucune récurrence.

Je puis aussi citer l'exemple d'une fièvre cardialgique dont fut atteinte une jeune fille de seize ans, logée près d'un égout voisin de la rue du Four, à Paris. Les accès de cette fièvre, d'abord méconnue et traitée par des purgatifs, étoient marqués par une cardialgie vive et souvent intolérable, une respiration laborieuse et inégale, des anxiétés extrêmes. Un des élèves du professeur Pinel, qui logeoit dans la même maison, reconnut le caractère de cette fièvre, qui fut d'abord supprimée en donnant le quinquina à la dose de quatre grammes (deux gros), dans l'intervalle des accès. Ils se renouvelèrent encore huit jours après, et ils furent de nouveau guéris à l'aide du même remède, secondé par des doses réitérées d'un vin généreux.

ARTICLE IV.

Fièvre pernicieuse intermittente diaphorétique.

VII. Elle est regardée comme étant éminemment insidieuse, sans doute parce qu'elle se déclare sans aucune apparence funeste, par des tremblemens et des frissons, auxquels il succède de la chaleur et des sueurs précoces, qui semblent

devoir la juger au premier aspect. Mais le danger de la fièvre croît réellement à mesure que les sueurs deviennent plus abondantes et plus générales. L'organe cutané paroît être dans un état complet d'atonie. Tous les pores ouverts laissent échapper une sueur épaisse, visqueuse, souvent froide, qui pènètre jusque dans l'intérieur des matelas. Le malade se fond et se résout, pour ainsi dire, en liquide. Ce symptôme ne se déclare dans quelques circonstances que sur le déclin de l'accès, et n'en est pas pour cela moins pernicieux. En général, le pouls est fréquent, petit et foible; la respiration est anhéleuse; tout le système des forces est dans la langueur; il n'y a que les facultés intellectuelles qui n'éprouvent aucune lésion : le malade se sent peu à peu anéantir.

L'ouvrage de Rivière contient une observation de cette variété de la fièvre pernicieuse intermittente, qui mérite d'être rappelée (1). Un homme étoit occupé à quelque ouvrage dans son jardin, lorsqu'il fut saisi d'une douleur grave et subite à la région épigastrique. Ne pouvant se tenir debout, il se rendit dans sa maison, qui n'étoit qu'à une très-petite distance, et se coucha. La fièvre ne fut pas d'abord très-violente; mais le lendemain son

(1) Observ. comm. xxviii.

corps fut couvert d'une sueur abondante et spontanée, qui apaisa les douleurs du diaphragme. Cette sueur qui inondoit le malade, et qui alloit toujours en augmentant, ne céda à aucun moyen; les forces s'éteignirent peu à peu, et la mort survint, sans qu'aucun autre symptôme eût donné lieu de la prévoir.

Il seroit, du reste, difficile de donner un tableau à la fois plus détaillé et plus fidèle de la fièvre dont il s'agit, que celui qu'en a retracé l'illustre médecin de Modène, d'après les symptômes qu'il avoit lui-même éprouvés, et sur lesquels il avoit profondément médité. Elle avoit débuté par deux paroxysmes légers, et qui n'avoient rien d'alarmant. Ce ne fut que vers la fin du troisième, qu'une sueur copieuse commença à se manifester sur la poitrine, les bras, le col et le front; il supporta d'abord assez bien cette évacuation, mais il éprouva soudainement une douleur si atroce dans les cuisses, qu'il lui sembla qu'elles étoient coupées transversalement et d'un seul coup. Cette sensation se continua un certain temps; les autres organes d'ailleurs n'étoient point altérés, l'entendement étoit parfaitement sain, le pouls étoit bon, le visage et les yeux ne s'éloignoient pas de l'état naturel, et cependant il croyoit sentir l'approche de la mort. Les souffrances néanmoins se calmant peu

à peu, la sueur s'accrut, et avec elle la fièvre; le pouls devint petit et fréquent, les forces s'affaïssèrent : ces symptômes firent des progrès. Il se manifesta des anxiétés, et une chaleur ardente à la région précordiale; mais rien n'étoit plus laborieux pour lui que le sommeil, auquel succédoient des tremblemens, des inquiétudes et un malaise inexplicable; aussi évitoit-il soigneusement de dormir.

Sur le déclin de cette fièvre, qui dura onze jours, et qui fut efficacement combattue par le quinquina, le malade ne se levoit de son lit qu'avec la plus grande difficulté. Il ressentait un poids dans ses jambes, comme si elles eussent été recouvertes de plomb, ce qui lui faisoit craindre une rechute, laquelle eut effectivement lieu après sa première sortie. Mais la fièvre ayant pris d'abord le type de double-tierce sous-continue, sans être accompagnée de sueurs ni d'aucun symptôme prédominant, acquit peu à peu un caractère aigu, et céda aux remèdes convenables.

Il est à remarquer que, quoique l'illustre malade fût radicalement guéri depuis quelques mois, et qu'il se fût déjà livré à la chasse et à d'autres exercices laborieux, il ne pouvoit néanmoins appuyer ses pieds sur le pont de sa voiture, sans que la douleur excessive qu'il avoit ressentie dans le milieu des cuisses, dès le troisième paroxysme de la fiè-

vre, ne se renouvelât; ce qui le contraignoit à placer continuellement ses jambes dans une position horizontale.

L'exactitude presque minutieuse avec laquelle Torti a noté jusqu'aux moindres symptômes qui lui étoient survenus, doit nous convaincre que, pour arriver à une connoissance parfaite du diagnostic, tout doit être scrupuleusement recueilli dans l'observation des maladies. (1)

Sauvages rapporte dans sa Nosologie, qu'il a eu occasion de voir deux fois cette fièvre (2). Le premier cas a été observé sur un homme de quarante ans, d'un tempérament mélancolique. Il éprouvoit de deux jours l'un des sueurs si abondantes, qu'on étoit forcé de le changer de linge jusqu'à neuf fois par nuit. Il étoit continuellement dans un état de moiteur. Le malade résista à la purgation, et à la saignée qu'on lui administra mal à propos. Le sujet de la deuxième observation étoit une femme.

(1) *Cæterum nil magis ad veritatem axiomatum conducit, quam exacta, ac prorsus austera symptomatum omnium ut ut minimorum, ut ut vilium, ac penè inutilium in morbo observatorum descriptio.* Baglivi. *prax. med.* lib. 11, fol. 176.

(2) *Nosolog. méthod.*, tom. 1, class. 2, *Tritæoph. typh.* fol. 335.

La fièvre étoit accompagnée d'anxiétés , de boulimie , et d'une foiblesse extrême ; la sueur étoit de huit heures ; le moindre refroidissement provoquoit le retour des paroxysmes tous les jours.

Je ne dois point omettre de parler ici d'une fièvre intermittente comateuse, d'abord guérie par le quinquina, à la dose de trente-deux grammes (une once), puis renouvelée le douzième jour sous la forme de diaphorétique, avec tous les symptômes décrits par Torti, et supprimée de nouveau par le même remède, suivant la notice que m'en a donnée le professeur Pinel. Cet exemple d'une fièvre qui, suivant les nosologistes, devrait être rapportée à deux espèces différentes, fait bien voir que les formes nombreuses que prennent les fièvres pernicieuses, ne tiennent point à un caractère spécifique et constant, mais à de simples variétés.

ARTICLE V.

Fièvre pernicieuse intermittente syncopale.

VIII. On a vu que dans les variétés déjà décrites, il pouvoit se manifester accidentellement des défaillances ; mais dans celle-ci elles sont un symptôme essentiel et primitif. Le moindre mouvement paroît les provoquer ; il suffit pour cela que le malade veuille se tourner d'un côté, ou qu'il veuille

mouvoir le bras ou la main. Il a besoin d'être constamment soutenu par des odeurs stimulantes. Aucune partie du corps n'est spécialement affectée; le malade languit sans aucune cause manifeste; la nature semble à chaque instant se refuser au travail des fonctions; le pouls est petit, déprimé, fréquent; le front et le col sont baignés de sueur; les yeux sont caves, troublés, etc.; la prostration des forces est universelle. Tous ces symptômes sont généralement très-dangereux, quoique l'intermission soit assez tranquille.

Rivière parle d'une femme atteinte d'une double-tierce, caractérisée par des lipothymies réitérées qui faisoient craindre pour sa vie (1). La fièvre, combattue par les cordiaux, ne fut ni mortelle, ni de longue durée.

Rien ne prouve mieux combien les secours de l'art, habilement administrés, peuvent être efficaces dans les cas même les plus désespérés de cette affection, que l'observation d'une intermittente syncopale, traitée par Torti, et dont on peut lire les détails dans son ouvrage (2). Lorsqu'il fut appelé, le malade étoit couché, sans mouvement; la face étoit plombée et cadavéreuse; les yeux demi-

(1) *Observ.* xxxvi. Cent. 4.

(2) *Therap. spec.*, lib. 4, cap. 11, fol. 319.

fermés, ne laissoient voir que le blanc; la respiration étoit stertoreuse; les pulsations du pouls étoient inégales et à peine perceptibles. Les syncopes avoient constamment prédominé. Je n'ai vu qu'un cas malheureux de fièvre pernicieuse syncopale, où les défaillances entraînèrent le malade à la mort, parce qu'on avoit méconnu le véritable caractère de la maladie, et négligé l'administration du quinquina.

ARTICLE VI.

Fièvre pernicieuse intermittente algide.

IX. Il survient quelquefois un froid continu qui, loin de s'évanouir et d'être remplacé par de la chaleur, se prolonge et occupe la plus grande partie du paroxysme. Indépendamment de ce symptôme primitif, le malade éprouve de la soif, des anxiétés; il pousse des plaintes; sa voix est entrecoupée, sa langue âpre; son urine abondante et claire, ou d'un rouge foncé et en petite quantité; son aspect est cadavéreux; plusieurs de ces symptômes persistent quelquefois durant le temps de l'intermission.

On lit dans le recueil de Rivière l'histoire d'une femme très-avancée en âge, qui éprouvoit tous les jours les accès d'une fièvre algide (1). Le refroi-

(1) Obs. LVI. Cent. 4.

dissement universel qui caractérisoit ces accès, duroit douze ou quinze heures. L'intermission n'étoit jamais complète, et la prostration des forces étoit considérable, à cause d'une lenterie opiniâtre qui compliquoit cette affection. Ces symptômes, combattus par les toniques, cédèrent le onzième jour.

Cette même fièvre est quelquefois observée à la Salpêtrière. La portière de cet hospice, âgée d'environ trente-six ans, en a été manifestement atteinte. Au premier accès, froid des pieds et extrême prostration des forces. Au deuxième, augmentation du froid, qui se propagea jusqu'au-dessus des genoux. Le troisième paroxysme eût été probablement mortel, si le professeur Pinel n'eût profité de l'intermission pour arrêter la fièvre en faisant prendre à la malade une dose convenable de quinquina et d'excellent vin de Bordeaux. (1)

(1) Le professeur Pinel fut d'autant moins trompé sur le caractère pernicieux de cette fièvre, qu'il avoit vu un semblable fait chez un homme avancé en âge, dans une campagne aux environs de Montpellier. Le froid des pieds seulement caractérisa le premier accès; le deuxième fut marqué par le froid des parties et de la jambe en même temps; le troisième par celui de toutes les extrémités inférieures. Le malade succomba au quatrième paroxysme, faute d'avoir pu se procurer le quinquina nécessaire pour supprimer la fièvre.

Un fait absolument analogue a été observé plus récemment encore dans le même hospice. Une femme âgée de soixante-deux ans fut saisie tout d'un coup, sans avoir éprouvé aucun symptôme précurseur, d'un froid glacial des pieds et des mains, avec perte de sentiment. Après les quatre premiers accès de cette fièvre algide, qui avoit pris le type de double-tierce, le froid des pieds monta jusqu'aux genoux, celui des mains s'étendit jusqu'au coude : l'abattement fut alors plus considérable. Dans l'intervalle du quatrième au cinquième accès, le quinquina fut administré à la dose de huit grammes (deux gros), en y mêlant six décigrammes (douze grains), de cannelle en poudre, pour augmenter son efficacité, et en secondant son action par quelques doses de vin d'absinthe. L'accès suivant fut celui d'une fièvre tierce bénigne, qui se soutint encore six jours en diminuant par degrés : elle disparut enfin par le seul usage continué du vin d'absinthe. (1)

(1) On ne doit point, à l'imitation de certains observateurs (Heredia, *De febr. pern.*, tom. 1. Sauvages, *Nosol. method.* tom. 1), ranger parmi les pernicieuses, comme étant primitives et essentielles, la fièvre épiale de Galien (*De inæq. intemp.*), et la lyprienne du même auteur. De ces deux affections, la première doit incontestablement être rapportée à l'algide intermittente (*Gorræi definit.*), n'étant que la modification de son phénomène principal ;

M. Lanoix, médecin instruit autant que modeste, et doué d'une sagacité rare pour l'observation, a recueilli deux faits de fièvre intermittente algide, durant le cours de l'épidémie qui ravagea plusieurs communes de l'arrondissement de Pithiviers, sur la fin de l'an x, et dans les premiers mois de l'an xi. Je m'empresse de les

la deuxième peut en dépendre dans quelques circonstances; mais elle est le plus souvent, ou un accident particulier de la *meningo-gastrique*, portée au plus haut degré, ou le produit d'une inflammation interne (Vallesius, 4^e *controv. cap.* 23). Quelques auteurs ont noté cette dernière comme un symptôme de la fièvre continue maligne. *Ma sciò, che sembrami più notabile in questa sorte di febbri, si è, che alcune volte membri estremi dell' indisposto sembrano quasi gelati, nell' alto stesso ove le viscere avampano di caldo.* (Aless. Pascoli. *Dell. febr. et prat.*)

Il faut pareillement regarder comme une sous-variété de l'algide intermittente, la fièvre désignée le plus communément par les anciens sous le nom de *querquera*, et sur laquelle ils ont tant discuté. (Apulée, *Apolog.* c. 1; Arnobe, l. 1; Aulugelle, n^o A. LXX, c. 1; Lucilius, *Fragm. satyr.*; Plaute, *Fragm. frivol.*) Cette affection, qui a la plus grande analogie avec les précédentes, est marquée à la fois par des frissons, des chaleurs et des tremblemens considérables; elle prend le plus ordinairement le type des quartes. On peut consulter à ce sujet une dissertation très-curieuse insérée dans la collection des thèses d'Allemagne, et qui a pour titre : *Comment. de febr. querquerá ex antiquitate erutá.*

consigner ici, d'après la communication qu'il m'en a faite.

Première observation. Le nommé Dumain, jardinier, âgé de 65 ans, après quelques accès de fièvre tierce ordinaire, et après quelques jours d'une convalescence douteuse, éprouva un frisson violent; tout à coup ses extrémités devinrent froides; il perdit connoissance, s'agita dans son lit, sa figure devint cadavéreuse, une sueur froide la couvrit, ses yeux restèrent à demi ouverts, déglutition impossible, langue sèche et d'un rouge brun, respiration libre, pouls concentré et à peine sensible, urines supprimées.

On croyoit le malade mort. M. Lanoix fut appelé sur-le-champ. Il le trouva dans l'état qu'on vient de décrire. Le malade sortit néanmoins de ce premier accès au bout de douze heures; la chaleur des extrémités se rétablit un peu, la connoissance revint; mais la voix étoit si foible, qu'on ne pouvoit entendre le malade, qui se trouvoit dans un accablement extrême; il y eut une intermission de dix heures.

Les quatre accès suivans furent marqués par les mêmes symptômes et par le froid glacial des extrémités; cependant le cinquième accès fut moins long et sans perte de connoissance. La fièvre coupée

au sixième accès : rétablissement de la chaleur animale aux extrémités ; ensuite , accès de fièvre tierce simple , comme précédemment ; convalescence de quatre mois. Le malade n'avoit presque pas le sentiment du froid qu'il éprouvoit , tant il étoit foible , et tant les fonctions intellectuelles étoient abattues. Le quinquina , donné à fortes doses , combiné avec la confection d'hyacinthe , les potions avec l'éther vitriolique , les frictions sur la colonne vertébrale avec la teinture de cantharides et le camphre , l'application réitérée des vésicatoires , préservèrent ce malheureux , qui , comme on le voit , étoit condamné à une mort prochaine.

Deuxième observation. Mademoiselle Venard l'aînée , âgée de soixante-cinq ans , éprouvoit la même ardeur que Dumain au moment de l'accès ; froid excessif des extrémités , figure cadavéreuse , pouls insensible , battemens de cœur foibles , dévoiement fétide et excessif , perte de connoissance , oblitération de la mémoire , insensibilité absolue , langue noire et sèche , urines rares. M. Lanoix vit cette demoiselle au troisième accès. Les assistans lui attestèrent que depuis le premier accès , elle n'avoit plus recouvré la chaleur des extrémités , et que ce froid glacial existoit encore dans l'intervalle des accès. Il s'en assura par lui-même , et fut

convaincu de la vérité du rapport de ceux qui la soignoient. Les accès continuèrent malgré tous les stimulans intérieurs et extérieurs. Vers le huitième, l'état intermittent disparut, et fut remplacé par un appareil de symptômes adynamiques, qui mirent la vie de la malade en danger : elle fut soustraite à la mort par le courage qu'elle eut de prendre le quinquina à forte dose, et tous les stimulans extérieurs qu'on avoit prescrits.

ARTICLE VII.

Fièvre pernicieuse intermittente soporeuse.

X. Le symptôme d'assoupissement dont cette pernicieuse est accompagnée, survient tantôt dans le commencement, tantôt dans l'augmentation du paroxysme. Il s'accroît, décline et disparoît avec la fièvre. L'intermission néanmoins est souvent marquée par une sorte de propension au sommeil. Presque toujours, il y a lésion ou même oblitération complète de la mémoire. Le malade oublie soudain ce qu'il vient de demander. Si on lui donne le vase à uriner, il ne se souvient plus de l'usage qu'il vouloit en faire et se rendort. Quelquefois il balbutie, altère les mots en les prononçant, ou les emploie l'un pour l'autre, comme si la langue étoit paralysée. Lorsque l'affection comateuse a fait des progrès, le malade devient insensible aux plus

forts excitans, tels que les vésicatoires, les ventouses, etc., à l'application même du feu. Le danger est communément d'autant plus grave, que l'assoupissement est plus profond. Le hoquet surtout est un symptôme sinistre, et lorsqu'il se manifeste, le malade succombe vers le troisième ou le quatrième accès.

Toutes les soporeuses observées par Werlhof, étoient du genre des tierces, les unes simples, les autres doubles (1); le carus avoit lieu le plus communément le cinquième jour, depuis l'invasion; quelquefois il survenoit plus tard. Le pouls étoit fréquent chez le plus grand nombre de malades. Il fut constamment très-lent chez l'un d'eux, durant l'espace de neuf jours, époque à laquelle la mort survint. Hors du paroxysme, il étoit naturel chez quelques-uns; chez d'autres il étoit dur et intermittent.

Les malades, d'ailleurs, absolument privés de la faculté de sentir et de se mouvoir pendant le paroxysme, ne donnoient des signes apparens de vie que par l'acte de la respiration. Cette fonction s'exécutoit chez plusieurs d'entre eux avec des hoquets et une sorte de ronflement, qui est un des signes principaux auxquels les auteurs ont

(1) *Observ. de febr. fol. 14.*

recours pour distinguer le carus de la vraie apoplexie. Le malade dont Eugalenus, cité par Werlhof, décrit l'accès, résistoit à tous les moyens d'excitation. Il entr'ouvroit parfois ses paupières, et les refermoit soudain; quelquefois aussi ses yeux étoient demi-fermés, ou ils restoient ouverts, mais immobiles et sans le sentiment de la vision. Ces symptômes revenoient et cessoient avec les paroxysmes de la fièvre. Les sens étoient obtus dans l'intermission.

En général l'affection carotique devenoit meurtrière à mesure que les accès se multiplioient. Elle fut mortelle pour plusieurs dès les premiers temps de son invasion; elle fut quelquefois accompagnée de catalepsie, d'envies fréquentes et pénibles d'uriner, de mouvemens convulsifs.

Rembert Dononæus cite deux faits d'une fièvre intermittente avec assoupissement (1). Il observe fort bien que ce symptôme paroît et disparoît avec elle, et qu'il ne faut songer à y remédier que dans le temps de l'intermission. *Si etenim tempore paroxysmi pleraque temere tententur, non raro in ipsâ accessione æger deficit.* Dans l'un de ces cas la mémoire a resté long-temps lésée après la convalescence.

(1) *Exemp. medic. observ. fol. 7 et 8.*

Charles Pison a aussi tracé une description très-détaillée de la fièvre pernicieuse intermittente soporeuse, sous le nom de *parapoplexie*, ou de fièvre *tritæophie* comateuse (1). Un homme âgé de 63 ans, fut pris dès le matin, et dans un temps froid, d'un frisson avec de grandes lassitudes, une soif véhémence et le trouble de la vue. Sa face devint rouge et presque livide, les urines étoient abondantes, mais ténues et limpides comme de l'eau claire : ces symptômes durèrent tout le jour. A l'approche de la nuit, somnolence, état de torpeur et de stupeur, perte de mouvement, taciturnité, perte de la mémoire, sorte de démence. Le malade ouvroit et fermoit tour à tour les yeux, ne parloit que lorsqu'on l'interrogeoit, disant un mot pour l'autre, s'avancant la tête baissée et le dos voûté, se mettant à table, ne prenant que d'une main mal assurée les alimens, les jetant sur la nappe au lieu de les mettre sur son assiette, ne pouvant boire comme à l'ordinaire, à cause de la difficulté et de la lenteur de la respiration, et gardant un silence inaccoutumé durant le repas, etc.

S'étant levé de table, à peine pouvoit-il se tenir debout ; sa marche étoit lente ; il tenoit son chapeau dans sa main, contre son habitude, le laissoit

(1) *Select. observ. et consil., etc. fol. 78.*

tomber par terre , et quand on le lui avoit rendu , il falloit l'avertir de le placer sur sa tête , etc.

Pendant que tous ceux qui l'environnoient étoient dans le plus profond étonnement , il s'éveille et revient à lui , mais ne se rappelle rien de ce qui lui est arrivé. Alors le pouls est développé , fréquent et inégal ; soif vive , état d'inquiétude pendant le reste de la nuit.

Le jour suivant , il se manifesta des sternutations violentes avec toux et enrouement ; la fièvre s'affoiblit ensuite pour renaître le jour d'après. Augmentation du pouls , extrémités froides ; urine toujours copieuse , mais claire ; enfin , chaleur considérable , etc. La fièvre garda ce caractère jusqu'au quinzième jour.

Dans l'une des rechutes qu'éprouva le malade , il y avoit une telle lésion du mouvement , que le malade paroissoit cataleptique toute la journée dans son lit.

L'accès le plus fort fut remarquable par un grand refroidissement des extrémités , par la perte de la mémoire , le délire , l'émission involontaire des urines , des insomnies , la perte de la voix et des sens ; le malade est devenu si lourd , que ses domestiques le remuoient avec la plus grande peine. Sa déglutition étoit empêchée , et il étoit insen-

sible à tous les stimulans, à l'action même des ventouses. Respiration fréquente et difficile; le pouls, qui étoit d'abord développé et rénitent, étoit petit, fréquent et inégal; visage enflammé, effusion de larmes; durée de symptômes, depuis midi jusqu'à neuf heures du soir, apparition d'une abondante sueur. Le malade revint ensuite à lui, reconnut les assistans, répondit aux questions qu'on lui fit, mais il ne tarda pas à être saisi d'une chaleur plus violente. Le matin du jour suivant, le malade se plaignit d'une douleur vive dans les fesses, où se forma un abcès gangréneux, et il ne put résister au quatrième accès, qui l'emporta.

La fièvre pernicieuse intermittente soporeuse est la plus commune à l'hospice de la Salpêtrière; mais elle ne s'y montre pas ordinairement avec ce degré d'intensité que Torti et Werlhof ont retracé dans leurs descriptions. On n'y remarque pas généralement cette insensibilité profonde aux stimulans extérieurs, cette interception de la vue, de l'ouïe et des autres sens, cette petitesse du pouls, ces traits du visage hippocratique, ces accidens nerveux, qui caractérisent éminemment les affections de ce genre, observées par ces deux célèbres médecins. Plusieurs cas néanmoins ont paru dignes d'être comparés avec les tableaux qu'ils nous ont transmis. M. Richerand, mon ami et mon collègue à l'hô-

pital Saint-Louis, aujourd'hui professeur dans l'École de médecine de Paris, conserve l'histoire d'une intermittente carotique, très-curieuse dans ses détails. Les deux côtés du corps présentoient des symptômes différens; le droit étoit affecté de paralysie, le gauche étoit cataleptique. Parmi les nombreux exemples de cette fièvre, qui se sont offerts à nos yeux, nous nous bornerons à exposer le suivant.

La nommée Morand, sexagénaire, éprouva, dans la soirée du 27 fructidor de l'an VI, un violent frisson, suivi d'un chaud brûlant; ce qui la détermina à se rendre dans une des salles de l'infirmierie de la Salpêtrière. Les trois accès qui succédèrent furent marqués par les mêmes symptômes; mais le premier vendémiaire, le paroxysme se déclara par un froid intense, dont la durée fut d'une heure et demie environ; le délire survint, et fut bientôt suivi de l'état soporeux. La respiration étoit stertoreuse, la langue aride et brunâtre, le pouls irrégulier et foible; la chaleur de la peau excessive, mais n'augmentant point par le toucher, comme dans la fièvre bilieuse; les sueurs étoient accablantes, et la prostration des forces extrême.

Le 2 du mois, point de rémission; le soir il y eut une exacerbation marquée par la perte de connaissance, des déjections involontaires, des sou-

bresauts de tendons, des mouvemens convulsifs des lèvres; l'haleine étoit fétide, la face décomposée, et le carus plus profond.

Le 3, mêmes phénomènes, auxquels vint se joindre la paralysie des extrémités.

Le 4 au matin, l'accès duroit encore; les symptômes étoient cependant légèrement diminués; car la malade pouvoit remuer les mains: elle répondoit à quelques questions, quoique d'une manière vague; elle avaloit plus facilement l'eau vineuse qu'on lui administroit: la chaleur étoit moins vive, la rémission devint un peu plus sensible, au point qu'entre deux et trois heures après midi on put donner huit grammes (deux gros) de quinquina, et appliquer deux forts vésicatoires aux jambes. La nuit il y eut des selles copieuses, et la malade fut un peu soulagée.

Le 5, vers les six heures du matin, il y eut un frisson suivi de chaleur, mais sans délire et sans assoupissement. La langue, auparavant sèche et glabre, commença à s'humecter vers sa pointe et sur ses bords. Il survint pourtant des maux de tête et des lassitudes extrêmes dans tous les membres. Quelques taches gangréneuses se manifestèrent aux plaies des vésicatoires.

Le 6, symptômes gastriques, bouche mauvaise,

céphalalgie, sentiment douloureux dans l'épigastre, soif vive. Le soir, refroidissemens vagues, remplacés par des chaleurs et des sueurs. Les escarres des ulcères commencèrent à se détacher; le fond des plaies étoit pâle, blafard, peu animé, les extrémités furent affectées d'un commencement d'œdématie.

Le 7, le 8, le 9, le 10, jusqu'au 15 inclusivement, état douteux, grand affoiblissement, vives douleurs dans les plaies des jambes, pansées avec la poudre de quinquina; absence du sommeil.

Le 16, sentiment de colique avec évacuation des matières séreuses, extrêmement fétides, pouls petit et misérable; ulcérations étendues au coccx, résultant du coucher continuel en supination. Ces ulcérations exigeant des pansemens fréquens, la malade fut transportée dans les salles de chirurgie, où elle mourut par le dévoiement colliquatif, que tous les fortifiens ne purent arrêter.

Qui peut méconnoître, dans cette observation, une sub-intrante comateuse? N'est-ce point au moment où la rémission, plus marquée, permit de placer le quinquina avec espoir de quelques succès que ce fébrifuge fut administré? Mais comme le caractère sub-intrant de la fièvre n'avoit pas permis de le donner plus tôt, et que la prostration du sys-

tème rendoit le danger imminent, on y joignit le vésicatoire, dont l'action est communément certaine et prompte. La fièvre a véritablement été supprimée; et si, dans la suite de sa convalescence, cette femme épuisée par l'âge et des infirmités antécédentes, a succombé, on n'en doit pas moins reconnoître l'effet avantageux qu'a eu l'administration de l'écorce du Pérou. Ce cas est l'exemple d'une crise parfaite, suivie de la mort de la malade, qui, trop épuisée, n'a pu en quelque sorte ressaisir la vie.

Nous ajouterons aux divers faits que nous venons de rappeler, celui d'une double-tierce avec état comateux, que le professeur Pinel a fait insérer dans le n° 32 de la *Gazette de Santé*, 1785. Le sujet de l'observation est un jeune homme de seize ans, qui s'étoit rendu de Paris à Corbeil, où étoit sa maison de campagne. La fièvre préluda par des frissons violens, et par un froid intense, qui se faisoit spécialement sentir dans les jambes. Elle avoit lieu pendant la nuit. Les plus grands accès étoient marqués par le délire, par une vive chaleur et par beaucoup d'agitations. Durant les petits accès, mêmes symptômes, mais à un moindre degré.

Le huitième accès commença à être seulement caractérisé par l'affection carotique; dès lors les accidens ne marchèrent plus qu'en augmentant de

violence , à compter du jour où l'assoupissement s'étoit manifesté. Le sixième jour, depuis cette même époque, l'accès fut on ne peut plus grave : froid invincible des jambes et des cuisses, aspect cadavéreux, insensibilité profonde. Le lendemain cependant, retour de la chaleur, et libre exercice des sens. Le professeur Pinel ayant été appelé, déclara que l'écorce du Pérou, qu'on avoit donnée jusqu'à ce moment en apozème, étoit insuffisante pour arrêter la fièvre; il fit administrer ce même remède en poudre, à la dose de quarante - huit grammes (une once et demie). Le paroxysme suivant n'eut pas lieu, et la nuit fut assez tranquille. Le lendemain le malade ne se plaignoit que d'une grande foiblesse; on le soutint par des bouillons restaurans et par quelques cuillerées de bon vin. Sa convalescence fut longue; mais il se rétablit parfaitement. On eut recours aux bains pour dissiper quelques douleurs et des crampes que le malade ressentoit dans le gras des jambes, qui le fatiguoient lorsqu'il vouloit marcher.

Nous avons eu occasion d'observer la fièvre pernicieuse intermittente soporeuse à l'hôpital Saint-Louis, chez le nommé Pierre-Charles Genevière, âgé de seize ans. Au début de l'accès, frissons considérables, avec tremblemens, douleurs dans les membres, état de spasme des muscles grands pec-

toraux ; ensuite respiration difficile et laborieuse , légère carpalogie , soubresauts de tendons , pouls très-fréquent , mais petit , face décomposée , langue tremblante et retirée en arrière , pupilles dilatées , état de stupeur , nulle réponse aux questions qu'on lui faisoit , déjections involontaires des matières fécales et des urines. Cet état dura pendant plus d'une heure ; ensuite chaleur brûlante avec sécheresse de la peau , face colorée , pouls développé et fréquent , état soporeux très-prononcé. L'accès se prolongea bien avant dans la nuit ; enfin , les symptômes disparurent jusqu'au deuxième paroxysme , qui arriva le troisième jour , à la même heure ; mêmes accidens , avec une tendance singulière au sommeil. Heureuse administration du quinquina dans l'intervalle du deuxième au troisième accès , et suffocation du caractère pernicieux de la fièvre. J'observai ce fait dans tous ses détails avec M. Magendie , qui étoit alors un des élèves les plus distingués des hôpitaux civils de Paris.

ARTICLE VIII.

Fièvre pernicieuse intermittente délirante.

XI. Nous croyons qu'on peut nommer ainsi cette variété où s'observe un délire qui en est le symptôme primitif , et qui suit , avec une sorte de régularité , le début , l'augmentation et le déclin des

paroxysmes. C'est ce que nous avons eu occasion de remarquer chez une femme âgée de soixante-huit ans, dans l'une des salles de l'hospice de la Salpêtrière. Chaque accès de cette fièvre, qui prit le type de tierce, fut manifestement caractérisé par le trouble des fonctions intellectuelles. Des accidens secondaires, tels que les sueurs, l'émission involontaire des urines, la soif ardente, la chaleur de la peau, etc., subirent une multitude de variations. Les jours d'intermission, la malade se trouvoit très-bien; elle ne conservoit aucun souvenir de ce qu'elle avoit éprouvé la veille. Cette fièvre s'affoiblit graduellement par le quinquina dans l'espace d'un mois. M. Landré-Beauvais, médecin-adjoint du même hospice, qui observe avec autant de sagacité que de zèle, m'a également communiqué un fait qui se rapproche beaucoup de celui que je viens de citer.

Nous sommes d'autant plus portés à admettre cette variété nouvelle de la fièvre pernicieuse intermittente, qu'elle a été constatée plus récemment encore par deux observations du professeur Pinel, absolument semblables. Dans ces deux derniers cas, même lésion très-grave de la faculté de la mémoire, même foiblesse du pouls dans le premier temps de l'accès, même relâchement du sphincter de la vessie, qui donnoit lieu à une évacuation

involontaire de l'urine, mais seulement durant le frisson. Les malades s'agitoient continuellement pour sortir de leur lit; le paroxysme se terminoit sans sueurs, et par une sorte d'assoupissement. Cette fièvre a également cédé à l'emploi du quinquina, à la dose de huit grammes (deux gros), en secondant son efficacité par le vin d'absynthe.

Torti, du reste, a aussi relaté dans son ouvrage l'exemple d'une double-tierce où le délire prédominoit. *Huic nullum erat valdè formidandum peculiare symptoma præter delirium aliquod, cum remittente tamen febre evanescens* (1). Nous aurons occasion de reparler de ce fait, lorsque nous en serons aux fièvres pernicieuses intermittentes qui tendent au type de continuité.

Il faut regarder comme une sous-variété de la précédente, la fièvre pernicieuse intermittente avec délire frénétique, dont Lautter rapporte une observation.

Le sujet de cette histoire est un homme de cinquante ans, d'un tempérament sec, enclin aux maladies aiguës et aux toux catarrhales, principalement en hiver; cet homme ayant été, le 25 janvier de 1761, long-temps exposé à l'action d'un

(1) *Therap. spec. lib. 4, cap. 6, fol. 426.*

froid rigoureux , eut vers le soir un tremblement général , auquel succéda une grande fièvre , accompagnée de beaucoup de chaleur , de toux fréquentes , de prostration bien marquée des forces.

Le 26 janvier au soir , fièvre sans frisson qui la précédât , chaleur , soif , toux. Le malade se fit saigner. Le sang se couvrit de cette croûte qu'on nomme *inflammatoire*.

Le lendemain 27 , le malade passa assez bien la journée ; mais le soir , tous les symptômes plus haut énoncés reparurent , seulement avec moins d'intensité que la veille.

Le 28 janvier , le soir , après le coucher du soleil , l'accès fut d'une violence extrême , la chaleur brûlante ; rêve , fureur , délire , anxiété de la poitrine , toux extrêmement fatigante. Le malade se fit saigner ; peu de temps après , on fit appeler Lautter ; il trouva le malade avec une fièvre violente , dans le délire , sans sueur , avec une soif ardente , la langue blanche , sèche , tremblante : ne pouvant obtenir des renseignemens suffisans pour l'aider à déterminer le caractère de fièvre , il fut obligé d'attendre des symptômes plus caractéristiques ; il se contenta de donner pour boisson une décoction d'orge avec de l'oxymel et du nitre , et une décoction pectorale , afin de calmer l'inten-

sité de la toux ; il fit appliquer les épispastiques à la plante des pieds.

Le lendemain 29, le malade se sentoit un peu mieux, la fièvre et la toux étoient moindres, l'expectoration se faisoit avec facilité ; la matière de l'expectoration étoit abondante, épaisse, et comme ayant subi une sorte de coction ; la respiration ne différoit pas de celle d'un homme bien portant ; cependant, voyant que l'urine laissoit déposer un sédiment briqueté, le médecin fit de nouvelles questions au malade, ainsi qu'à ceux qui l'avoient entouré depuis le commencement de cette affection ; il en obtint les renseignemens que nous avons déjà exposés ; ce qui lui fit soupçonner une fièvre rémittente, observant le type de tierce doublée : cependant, comme le paroxysme de la veille avoit été peu marqué, il attendit celui qui devoit suivre, pour acquérir une certitude plus entière. Ce paroxysme fut beaucoup plus violent que Lautter ne l'avoit prévu ; car une chaleur subite ayant commencé à se manifester, le malade tomba dans un délire complet ; il se leva du lit, et seroit sorti de la chambre, sans l'opposition des personnes qui se trouvoient à temps pour l'en empêcher ; il les reconnoissoit, les maltraitoit, se mettoit dans une colère telle qu'il tomboit de fatigue ; puis il se relevoit, il frappoit de côté et d'autre, crioit ; il passa

dans cet état toute la nuit et le jour suivant ; son extérieur étoit le même que celui que l'on observe dans les accès de la frénésie ; son pouls , loin d'être dur et plein , n'avoit que de la foiblesse et de la vitesse ; comme la rémission étoit prochaine , on ne pratiqua point de nouvelle saignée ; on attacha le malade , afin qu'il ne pût sortir de son lit ; on appliqua de forts épispastiques aux jambes , on prescrivit quatre-vingt-seize grammes (trois onces) de sirop diacode ; le malade en prit une de suite ; il devoit prendre la seconde le soir , au cas que le délire subsistât toujours : lorsque ce délire auroit cessé , il devoit prendre seize grammes (une demi-once) d'extrait de quinquina , délayé dans de l'eau de citron , et édulcoré avec ce même sirop diacode. Le délire dura tout le jour ; et quoique l'on donnât le soir le sirop diacode , comme il avoit été prescrit , ce symptôme persévéra pendant tout le cours de la nuit ; c'étoit le moment du retour de l'accès qui avoit continué d'être moindre ; malgré cela , le délire fut d'une violence extrême. Enfin , le premier jour de février , quelques instans après que sa femme lui eût fait prendre la dernière once de sirop diacode , ses yeux commencèrent à se fermer , et il dormit paisiblement l'espace de deux heures. Ce fut dans cet état que Lautter le trouva ; le malade s'éveilla pendant qu'il étoit encore auprès de lui , parla quelques minutes avec bon sens , mais re-

tomba bientôt dans un délire si grave, qu'on pouvoit à peine le retenir dans son lit : comme on avoit à craindre ce jour-là le retour de l'accès, qui avoit continué d'être plus fort, et qu'il eût été possible que le malade pérît pendant sa durée, on prescrivit l'extrait de quinquina à la dose de quatre cuillerées à toutes les heures. Jusqu'alors on n'avoit pu déterminer le malade à en prendre, mais à force de menaces, de promesses, etc., Lautter parvint à lui faire avaler les quatre premières cuillerées ; il prescrivit ensuite trente-deux grammes (une once) de sirop diacode avec vingt gouttes de laudanum liquide de Sydenham ; et quoique le malade pût tomber dans un profond sommeil, il recommanda de le réveiller pour lui faire prendre toutes les heures sa dose de quinquina. Après avoir usé de ce remède assoupissant, le malade cessa de délirer ; il ne s'endormit pas, mais il devint calme, et prit dans la soirée tout ce qui restoit de l'extrait de quinquina ; l'exacerbation suivante fut à peine sensible, du moins en comparaison des précédentes ; la chaleur, la soif furent moindres ; il toussa beaucoup, mais expectora avec une grande facilité ; il eut peu de délire, et pendant la nuit il goûta quelques heures d'un sommeil tranquille.

Le 2 février presque point de fièvre ; sueur assez peu marquée avec un délire à peine sensible ; il

étoit extrêmement abattu par tout ce qu'il avoit éprouvé. On prescrivit encore le quinquina, mais à de plus longs intervalles; un opiat pour le soir, et de temps en temps de l'excellent bouillon, et pour boisson du petit lait et un peu de vin; la nuit suivante, le malade dormit paisiblement; plus d'exacerbation, plus de délire, et dans quelques jours, devenu convalescent, il ne lui resta qu'une grande débilité dans le système des forces, un affoiblissement de la mémoire, un peu de toux.

Lautter prescrivit une tisane pectorale et un régime analeptique. (1)

Le médecin Lanoix a recueilli deux observations de fièvre pernicieuse intermittente avec délire, pendant le cours de l'épidémie de Pithiviers: elles méritent de trouver place à la suite de celles que je viens de citer. *Première observation.* Marie Gombaud, garde-malade, âgée de quarante-cinq ans, ayant d'abord éprouvé quelques accès de fièvre intermittente bénigne, éprouva un matin un frisson qui dura pendant cinq heures. Après le frisson, délire, gesticulations, ris et pleurs alternatifs, figure rouge et animée, langue d'un rouge brun au milieu, et bordée de deux bandelettes jaunes; soif vive; à chaque verre de boisson, vo-

(1) *Hist. medic. bienn. morbor. rural. Casus xxiv.*

missemens affreux d'une bile verte et porracée ; resserrement spasmodique de l'épigastre , désigné machinalement par la malade ; respiration gênée , pouls serré et petit , urines rares et limpides , anxiétés , soupirs ; paroxysme de dix-huit heures , terminé par un assoupissement profond. Après l'accès , oubli de ce qui s'étoit passé ; vomissemens calmés , mais nausées fréquentes ; respiration libre , pouls développé , sueurs abondantes ; légère altération de la mémoire , aux quatre autres accès , mêmes symptômes , avec délire constant ; au sixième , langue plus noire et plus sèche ; accès de vingt-quatre heures , plus d'apyrexie , altération générale des traits de la figure , vomissemens et nausées remplacés par un dévoiement fétide et bilieux , peau brûlante et sèche , pouls intermittent , délire sourd , soubresauts dans les tendons , hoquet , mort au seizième jour de la maladie.

Deuxième observation. Chevillard , cordier , âgé de quarante-huit ans : invasion précédée par des douleurs de tête affreuses , par une dyspepsie qu'on attribuoit à l'état d'hypocondrie où il étoit depuis quinze mois : tout à coup frisson violent pendant quarante-huit heures ; bientôt désordre dans les idées , impuissance de se lever malgré sa volonté , figure rouge , respiration anhéleuse , anxiété , pouls concentré , soif vive , nausées , urines limpides ,

cessation de l'accès après neuf heures, accablement extrême ; cessation du délire, apyrexie, oubli de ce qui s'étoit passé pendant l'accès : cinq autres accès semblables, avec un délire constant, sixième accès coupé par le quinquina uni à l'opium. Il n'est pas inutile d'ajouter que plusieurs semaines après, la dysenterie est venue se joindre aux fièvres régnantes : elle a sévi principalement contre les enfans, lesquels, affoiblis déjà par les accès de fièvre long-temps prolongés, sont devenus la plupart hydropiques par l'impossibilité de leur faire suivre un traitement quelconque, et ont péri victimes de cette nouvelle complication.

M. le docteur Coutanceau a recueilli deux observations analogues à celles que je viens de rapporter. Il les a consignées dans une notice intéressante qu'il a publiée sur les *fièvres pernicieuses* qui ont régné épidémiquement à Bordeaux en 1805. *Première observation.* Dans le premier cas, il s'agit d'un jeune homme, doué d'une constitution caractérisée par la prédominance sanguine, d'une susceptibilité nerveuse très-irritable. Le frisson du troisième accès fut suivi d'un délire si violent, que le malade voulut s'arracher la vie ; on parvint néanmoins à le contenir. Toutes les facultés intellectuelles étoient troublées et bouleversées. Pour diminuer cette exaltation extraordinaire survenue

dans ses idées , on chercha d'abord à le dérober aux effets stimulans de la lumière , en fermant avec soin les fenêtres de l'appartement ; on administra les remèdes convenables. Le délire dont il s'agit dura quatre heures ; une abondante sueur lui succéda. Une once de quinquina administrée , diminua l'intensité de l'accès. Le paroxysme suivant fut marqué par des idées tristes et mélancoliques ; son âme étoit frappée d'épouvante ; et la mort qu'il avoit auparavant bravée lui causoit une frayeur extraordinaire. Pendant huit jours , il conserva cette idée si pénible , même après cet accès qui fut totalement supprimé par l'écorce du Pérou. *Seconde observation.* M. Coutanceau cite pareillement l'histoire d'une fièvre tierce qui d'abord s'étoit manifestée avec des symptômes peu intenses. Il fut atteint d'un délire grave qui le porta au suicide , avec tant de violence , que n'ayant devant lui aucun moyen de se détruire , il cassa une bouteille de verre qui se trouva sous sa main , et se fit une blessure considérable à la partie latérale droite du cou. On arrêta l'hémorrhagie par un appareil contentif ; on administra quinze gouttes de laudanum liquide de Sydenham ; ce remède fut suivi du sommeil le plus paisible. L'écorce du Pérou donnée à la dose convenable , prévint l'apparition des nouveaux accès , et les facultés intellectuelles n'éprouvèrent aucune altération.

ARTICLE IX.

*Fièvre pernicieuse intermittente péripleurétique
ou pleurétique.*

XII. Morton avoit fréquemment observé ce masque particulier de la fièvre pernicieuse intermittente. Ce grand médecin cite, entre autres, l'exemple d'un homme qui fut pris un matin d'un violent frisson, et d'une douleur si intense dans la région de la plèvre et des poumons, que la respiration en étoit pour ainsi dire interceptée; un froid universel s'étoit répandu sur tous les membres du malade; la foiblesse étoit extrême, le pouls étoit petit et formicant. Malgré ces symptômes, Morton crut devoir remédier à l'état spasmodique du système par la saignée du bras; il eut aussi recours à des fomentations, à des linimens appropriés. Mais comme d'après la nature et le retour des paroxysmes, il n'avoit pas tardé à reconnoître le caractère pernicious de la fièvre déguisée sous les apparences d'une péripleurésie, il fit du quinquina la base principale de son traitement, qui fut couronné du succès. (1)

Je placerai ici deux autres faits qu'on trouve

(1) *Historia* XXI.

consignés dans l'ouvrage de Lautter (1). Un ouvrier de Luxembourg, âgé de trente ans, d'un tempérament sec, étant occupé à battre le blé, fut saisi d'abord d'un frisson, ensuite d'un froid violent, auquel succédèrent une courte chaleur et une soif intense; le symptôme principal étoit une douleur excessive au côté gauche, qui gênoit considérablement la respiration. Forcé d'abandonner son travail, il alla se mettre dans son lit; la fièvre persista à peu près dix-huit heures dans le même état, et il y eut enfin une rémission sensible; le surlendemain au matin, le malade se trouva mieux encore. Quoiqu'il fût un peu foible, que le point de côté persévérât, et qu'il restât sans doute un peu de fièvre, il se remit à l'ouvrage; mais vers le soir, tous les accidens reparurent, il regagna sa maison et son lit. Lautter fut appelé; il trouva le malade avec une fièvre très - considérable; le pouls étoit dur, la respiration étoit douloureuse, pénible et presque éteinte; le point de côté étoit très-aigu, il n'y avoit ni toux, ni efforts pour la provoquer. D'après l'histoire de la maladie, le médecin reconnut aussitôt une fièvre pernicieuse intermittente, marquée par le symptôme qui prédomine dans la pleurésie; ne pouvant de suite attaquer de front cette fièvre, parce que l'exacerbation étoit alors à

(1) *Hist. medic. bienn. morb. rural., etc. Casus v et ix.*

son plus haut degré de vigueur, il s'occupa de tempérer la violence des accidens; il fit tirer du bras situé au côté affecté dix onces de sang, qui se couvroit de la croûte phlogistique; il fit appliquer sur la partie douloureuse un cataplasme émollient, qu'on avoit soin de renouveler. Intérieurement, il administra une décoction d'orge avec l'oxymel simple et le nitre, etc. : le malade fut soulagé, sa respiration devint plus facile, le point de côté diminua; la nuit cependant se passa dans l'insomnie, avec une chaleur et une soif excessives.

Le jour suivant le pouls manifesta, à la vérité, moins de fréquence; il ne fut pas dur; il y eut cependant beaucoup de fièvre; la douleur de côté persista; l'urine très-rouge déposa un sédiment briqueté, les symptômes étoient très-adoucis; mais comme ils n'avoient pas cessé, on continua l'usage des précédens remèdes. Le soir, le malade retomba totalement dans son premier état: le lendemain au matin, il n'y avoit encore aucun changement notable, excepté que la douleur aiguë du côté droit disparut pour un instant; mais elle ne tarda pas à reprendre son siège; l'urine n'avoit pas changé depuis la veille, la peau étoit toujours froide, etc. Lautter reconnut bientôt le caractère pernicieux de la fièvre; il profita de la rémission pour adminis-

trer trente-deux grammes (une once) de quinquina dans l'espace de vingt-quatre heures; le redoublement qui suivit fut très-modéré; et en continuant d'administrer la même substance, le malade se trouva radicalement guéri.

Une femme sexagénaire, ayant le corps très-échauffé à la suite d'un violent exercice, s'exposa imprudemment à la fraîcheur de la soirée; elle éprouva un frisson suivi d'une chaleur véhémence. Une douleur forte du côté droit s'étendoit jusqu'à l'épine du dos; une toux sèche et fréquente en augmentoit la vivacité; la respiration étoit courte et laborieuse, la nuit qui succéda fut sans sommeil. Lautter fut appelé; il trouva le pouls très-agité, plein et dur, la langue étoit blanche, sèche. Ne doutant plus de la présence d'une pleurésie, il fit tirer du sang au bras du côté affecté, et poser un cataplasme émollient sur le côté douloureux; le sang qui sortit de la veine se couvrit de la croûte inflammatoire. Les symptômes s'adoucirent.

Le même jour, à une heure après midi, le frisson reparut avec un léger froid; la chaleur de la fièvre, la toux, la douleur, etc., augmentèrent; le pouls étoit aussi plein et aussi dur qu'auparavant; on pratiqua en conséquence une deuxième saignée, et le sang présenta encore la croûte phlogistique. Il y eut une rémission dans les symptômes de la

fièvre. Le lendemain au soir, le frisson recommence, la douleur, la chaleur, la toux, etc., augmentent considérablement; ce qui rendit la nuit très-laborieuse à la malade.

Le jour d'après, il y eut une rémission; l'après midi, l'exacerbation débuta de nouveau par un frisson. On se contenta de renouveler l'application des cataplasmes, et d'administrer des boissons rafraîchissantes. On cessa de recourir à la saignée, parce que les forces étoient entièrement tombées, et parce que, d'après la marche de l'affection et le sédiment abondant de l'urine, il n'étoit pas difficile de reconnoître une fièvre double-tierce rémittente, revêtue du masque de la pleurésie. Lautter donna trente-deux grammes (une once) d'une mixture de quinquina à prendre avant le retour du paroxysme, qui étoit très-prochain. La nuit suivante, la malade ressentit seulement une grande chaleur; mais la toux et le point de côté n'augmentèrent point: le jour d'après, le remède fut continué, et il survint à peine une ombre d'exacerbation. Par l'emploi réitéré du quinquina, la malade ne tarda pas à être tout-à-fait rétabli.

Cette même variété de la fièvre pernicieuse intermittente, a été observée à Paris dans les premiers mois de l'an 9. Un jeune étudiant en médecine en fut frappé après une application

forcée à des travaux anatomiques. Nous n'en rapporterons ici que les principaux phénomènes. Une douleur sourde occupoit d'abord tout le système pulmonaire, et gênoit considérablement la respiration; cette gêne augmentoit surtout par l'état de somnolence auquel le malade se sentoit continuellement porté, au point que, redoutant la suffocation, il avertissoit les assistans de l'empêcher de dormir. Sur la fin de la fièvre, la douleur changea de siège, et se fixa spécialement à la partie latérale de la poitrine. Parmi les autres symptômes qui se manifestèrent, les plus remarquables furent une sensibilité extrême de l'ouïe et de l'odorat. Cette affection fut efficacement combattue par le vin et le quinquina.

ARTICLE X.

Fièvre pernicieuse intermittente rhumatismale.

XIII. Un teinturier, après avoir été exposé plusieurs fois au froid, avoit éprouvé, à la suite, une douleur rhumatismale qui se faisoit sentir tantôt à une partie, tantôt à une autre. Cette douleur étant devenue atroce, il fit appeler Morton. Ce médecin ayant observé que les urines du malade étoient très-rouges; qu'exposées à l'air elles laissoient déposer un sédiment briqueté; ayant appris de plus que ces douleurs étoient périodiques, et qu'à leur retour, il y avoit une sorte d'exacerba-

tion, toutes ces circonstances lui firent conjecturer l'existence d'une fièvre intermittente cachée sous une forme rhumatismale ; une saignée, un vomitif, et surtout l'usage du quinquina, à la dose de quatre grammes (un gros) toutes les quatre heures, et continué pendant seize heures, firent disparaître le spasme rhumatismal, rendirent les urines et l'appétit à leur état naturel ; il ne resta qu'un air de stupéfaction, sans doute causé par le laudanum que Morton avoit entremêlé à son traitement ; le malade en fut délivré par l'application des vésicatoires ; la douleur rhumatismale ayant reparu quatorze jours après, elle céda, comme cela s'observe communément, à la saignée et au quinquina. (1)

ARTICLE XI.

Fièvre pernicieuse intermittente néphrétique.

XIV. Une veuve d'une constitution robuste, avoit depuis quelques années une affection hystérique ; elle éprouvoit aussi des douleurs néphrétiques qui revenoient à de longs intervalles, et avoit même rendu quelques calculs de rein : à l'âge de quarante ans, elle eut une suppression qui dura un an. Vers la fin de ce laps de temps, elle éprouva aux lombes des douleurs cruelles ; elle avoit des spasmes dont elle

(1) Morton, hist. xxii.

ne pouvoit rapporter le siège à aucun endroit bien fixe ; on la traita , mais en vain , tantôt pour sa suppression , tantôt pour ses douleurs néphrétiques. Comme les douleurs augmentoient d'intensité , que même les extrémités étoient devenues froides , on se décida à appeler Morton. Ne présumant pas quelle pouvoit être la véritable cause de cette affection , tous les remèdes qu'il administra ne produisirent aucun résultat favorable ; mais ayant observé à trois fois différentes que l'urine étoit rougeâtre , et qu'elle laissoit précipiter une matière briquetée ; que , de plus , durant le spasme , les extrémités devenoient glacées , il soupçonna la présence d'une fièvre intermittente ; l'usage du quinquina toutes les quatre heures , diminua considérablement les douleurs au bout de trente heures , rendit aux urines leur couleur naturelle : dès ce moment le danger fut passé. Morton prescrivit un traitement propre à chasser les calculs que les reins pouvoient contenir , et à rappeler les règles supprimées ; il rapporte que la guérison la plus complète en fut le résultat.

L'auteur cite encore la cure d'un homme affecté de spasmes causés par la présence de pierres rénales , et accompagnés de fièvre intermittente. (1)

(1) Morton , hist. xxviii.

C'est ici le cas de rappeler la fièvre intermittente pernicieuse cystique dont M. Coutanceau a fait mention, et qui fut traitée par feu M. Jonquet. C'étoit un homme âgé d'environ quarante-deux ans, et chirurgien de profession, lequel du reste étoit sujet à quelques affections de la vessie. La fièvre avoit été d'abord cardialgique, mais bientôt elle fut caractérisée par des coliques abdominales, et par une dysurie perpétuelle et fort douloureuse. Hors des paroxysmes, cet accident n'avoit plus lieu; le malade urinoit copieusement et avec liberté. On avoit d'abord vainement employé les demi-bains émoulliens, les fomentations et des boissons délayantes. On profita de l'intervalle que laissoit la fièvre pour recourir au quinquina, dont on ne donna qu'une très-petite dose, et pourtant l'accès suivant fut totalement comprimé. Mais le malade n'ayant pas continué régulièrement le quinquina, éprouva bientôt une rechute; il fallut donc revenir au même moyen, pour arrêter totalement les douleurs vésicales.

ARTICLE XII.

Fièvre pernicieuse intermittente épileptique.

XV. Une fille, âgée de six ans, fut saisie d'un frisson, auquel succéda un froid de peu de durée; il survint ensuite un chaud violent et un état con-

vulsif de tous les membres. La malade avoit la bouche écumante , et finissoit par tomber dans un profond sommeil. Lorsque Lautter fut appelé, il la trouva éveillée , prise néanmoins d'une fièvre assez considérable ; elle étoit dans une débilité extrême , et se plaignoit beaucoup de la tête. Il traita d'abord cette affection comme une véritable épilepsie ; le jour suivant , la jeune malade fut très-bien ; mais le troisième jour , Lautter apprit, d'après le rapport des parens , que les symptômes s'étoient manifestés à la même heure , et avoient fini de même ; il changea donc son diagnostic , et soupçonna que c'étoit une fièvre pernicieuse qui avoit pris le masque de l'affection épileptique ; seize grammes de quinquina , administrés dans l'intervalle du troisième au quatrième paroxysme , firent disparoître tous les accidens. (1)

ARTICLE XIII.

Fièvre pernicieuse intermittente convulsive.

XVI. Cette variété s'observe surtout chez les enfans. Morton cite l'exemple d'une petite fille âgée de treize mois , chez laquelle il eut occasion de remarquer cette fièvre particulière (2) ; ses mou-

(1) Lautter, *hist. med. bienn. morb. rural. Casus* II.

(2) *Hist.* XIV.

vemens convulsifs étoient accompagnés de plusieurs autres symptômes non moins alarmans , tels que la gêne considérable de la respiration , la petitesse extrême du pouls , etc. La fièvre avoit pris d'abord le type quotidien ; elle se changea en tierce , et céda à des remèdes où la poudre de quinquina se trouvoit incorporée.

M. Coutanceau rapporte un cas très-intéressant d'une intermittente pernicieuse , convulsive , avec des phénomènes comateux. C'étoit un enfant de quatre ans , qui n'avoit éprouvé d'abord que deux paroxysmes d'une fièvre tierce , laquelle n'avoit rien d'alarmant. Le troisième accès fut caractérisé par un état de somnolence très-profonde , ce qui fit prescrire l'écorce du Pérou , que la mère ne voulut point administrer. Au quatrième paroxysme , la disposition comateuse fut encore plus prononcée , et de plus , les pupilles se dilatèrent ; les mâchoires furent frappées d'un serrement tétanique ; la bouche et les yeux étoient agités par des mouvemens convulsifs. L'accès fut d'ailleurs très-prolongé ; la mère avoua qu'elle avoit omis de donner le quinquina. On ordonna dès lors le fébrifuge à la dose de quatre gros qu'on partagea en huit prises. Aussi le cinquième accès fut-il , pour ainsi dire , imperceptible. Enfin , la fièvre cessa de reparoître , et la continuation du spécifique confirma la guérison.

ARTICLE XIV.

Fièvre pernicieuse intermittente céphalalgique.

XVII. Hippocrate a indiqué ces sortes de fièvres dans ses Prénotions Coaques, lorsqu'il parle de la fièvre jointe au vertige dès le commencement de la maladie, à la pulsation des artères de la tête, à l'urine crue, au délire, etc. Le même auteur indique également une céphalalgie avec horripilation et fièvre erratique, avec douleur aux yeux, altération de la vision, vertiges, difficulté de supporter la lumière, tintement d'oreilles et incommodité déterminée par le bruit.

J'ai eu occasion de donner mes soins à une femme âgée d'environ trente ans, atteinte d'une fièvre pernicieuse intermittente, où ce symptôme prédominoit à un point extrême d'intensité. Cette fièvre ne céda qu'aux préparations de camomille et de quinquina. Souvent la douleur n'occupe que la moitié de la tête. Morton en donne deux exemples, et il a été lui-même l'objet de la première observation.

Le célèbre Comparetti nous a conservé un exemple de cette même fièvre qui se manifesta chez un homme âgé d'environ trente-quatre ans, né à Vérone, d'un tempérament bilieux, d'une complexion forte, d'un esprit vif, se livrant avec

passion à l'étude. Après avoir passé plusieurs années dans un autre climat, il vint à Venise en 1769, pour y exercer une profession honorable. Il éprouva de vives inquiétudes, des aliénations d'esprit, s'abandonna aux excès de la table au milieu d'un air humide et relâchant. Il éprouva une fièvre tierce dans la saison de l'été, fièvre dont on réprima bientôt les paroxysmes par la saignée, les purgatifs, et surtout par le quinquina. Les deux années suivantes, et aux mêmes époques, il fut atteint d'une affection analogue, qui céda aux moyens précédemment employés.

En 1774, la fièvre revint au printemps, avec le type de double-tierce, accompagnée d'une grande douleur de tête. L'emploi des vomitifs n'ayant pas servi pour la combattre, l'écorce du Pérou fut de nouveau invoquée. Dans le cours de l'été, récidives fréquentes, par la négligence que le malade apportoit dans le régime, et spécialement par l'air frais de la nuit auquel il s'exposoit, etc. Dans le commencement de l'automne, le 26 septembre, on pratiqua deux saignées vers le déclin de la fièvre : le malade se trouvait alors dans un état de sueur qui ne tarda pas à se supprimer ; il y succéda des vertiges ; le malade croyoit avoir un voile qui couvroit et comprimoit la région frontale. Le matin suivant, on le purgea avec l'eau de Modène,

on le mit à un meilleur régime , et aussitôt on lui fit faire usage des sels neutres apéritifs.

Le 7 octobre, la sensation incommode de la tête persistant, on fit appliquer plusieurs sangsues aux vaisseaux hémorrhoidaux; comme il en éprouva peu de soulagement, on appliqua les ventouses à l'occiput, et enfin on ouvrit la veine jugulaire, qui donna un peu de sang. Le lendemain il n'eut point d'accès; mais le mal de tête persévéroit.

Le neuvième jour, une légère horripilation avec une espèce de vertige, indiqua le retour de la fièvre, dans le cours de laquelle on prescrivit de nouveau la saignée du bras, du pieds, de la veine jugulaire, et l'administration des lavemens émoulliens. Ces moyens, loin de diminuer, augmentèrent la pesanteur de tête, les vertiges et l'insomnie. De plus, il survint un tintement d'oreilles, le malade ne pouvoit supporter aucune espèce de bruit; il éprouvoit un resserrement de la gorge et une aliénation d'esprit.

Le dixième jour, on donna inutilement une mixture fortifiante; on répéta trois fois la saignée du bras et du pied, de manière qu'en quatre jours on tira quatre livres de sang. Tous les symptômes augmentant, le malade passa la nuit la plus orageuse.

Le onzième jour au matin, il éprouvoit une

grande prostration et une langueur dans tous les sens, quand bientôt se développa un grand froid et une douleur de tête des plus atroces, qui, pendant quelques heures, réduisit le patient à un évanouissement total. On sentoit déjà reparoître une certaine chaleur, quand tout à coup il survint un profond assoupissement, avec convulsions et roideur tétanique de tout le corps. On appliqua les sinapismes aux pieds, et les vésicatoires à la nuque. Il se réveilla après être resté pendant quatorze heures dans la plus profonde stupeur.

Le douzième jour, un léger assoupissement continua; cet assoupissement ayant cessé, on donna le quinquina à grandes doses par la bouche et sous forme de lavement. La fièvre n'eut pas une exacerbation très-remarquable.

Le treizième jour, la fièvre vint plus tard; elle n'offrit aucun symptôme alarmant. Les jours suivans, le malade prenant le quinquina en grande abondance, la fièvre se manifestoit le soir avec de semblables symptômes, c'est-à-dire avec lassitude et vertige, avec une chaleur médiocre, un pouls plus accéléré, ce qui empêchoit le sommeil et rendoit la nuit insupportable. Le vingt-quatrième jour, la fièvre commença à diminuer, ainsi que tous les autres symptômes, pendant que le malade prenoit, outre le quinquina, l'acétate de potasse.

Il survint ensuite diverses rechutes dont il importe de faire mention. C'est ainsi, par exemple, qu'un grand froid étant survenu le 6 de novembre, le malade éprouva une douleur et un gonflement de la partie droite de la face; il fermoit les paupières, tordoit la bouche, et il éprouvoit en outre des douleurs vagues et errantes dans d'autres parties. Les fomentations faisant peu d'effet, on tira du sang du pied, et le soir on administra le laudanum liquide de Sydenham.

Le 23, nouvel accès, avec grande douleur de tête, qui se termina par beaucoup de sueur. Au moyen du quinquina administré plus souvent et à grande dose, la fièvre fut bientôt guérie.

Le 31, l'affection rhumatique revint à la même partie avec les mêmes symptômes. On fit l'épreuve de quelques remèdes mercuriaux, parce qu'on soupçonna la présence d'un virus syphillitique; mais on ne tarda pas à y renoncer, parce qu'on en vit le danger, et on reprit les médicamens accoutumés.

Le 18 de décembre, autre accès fébrile, avec une plus grande douleur de tête, qui provoquoit des cris. Cette fièvre diminuant les jours suivans, la douleur atroce se calmoit. Ces symptômes furent remplacés par un sentiment de *tiraillement* aux

membranes du cerveau , qui forçoit de recourir à l'opium.

Le 26 , la fièvre revint avec de plus vives céphalalgies ; et dans le calme de ces symptômes , il resta un tintement d'oreilles , avec un sentiment de plénitude et d'embarras de la tête , une surdité , et des douleurs très-aiguës dans les jambes. La fièvre diminuant , les sueurs parurent ; on continua l'emploi des fomentations , qui obtinrent le plus grand succès. On se borna à l'usage du quinquina pendant quelques jours ; ensuite on passa à l'usage du petit lait avec la rhubarbe ; et à l'eau de Modène , sans oublier pourtant quelques doses d'écorce du Pérou.

Le 6 de janvier , la fièvre revint à la manière ordinaire : toute espèce de remède ayant été abandonnée pendant l'espace de dix jours , on se détermina à faire usage de quelques émulsions de semences froides ; le malade regagna le sommeil.

Le seizième jour , ayant repris l'usage de l'eau de Modène , la fièvre se réveilla avec un sentiment de *distraction* des méninges , qui se terminoit par une sensation de plénitude et de sifflement d'oreilles. On essaya la teinture tonique d'Huxham. La fièvre revint avec horripilation et douleur aux tempes. Par l'usage de l'émulsion , on obtint du sommeil et

de la sueur ; on eut encore recours au quinquina. Le soir, la fièvre s'exaspéroit avec une douleur gravative et une sorte de tiraillement à la nuque, aux tempes, au sommet de la tête. La nuit, insomnie opiniâtre. Le matin et dans le jour, la fièvre déclinait, ainsi que tous les autres symptômes. Le plus léger attouchement au péricrâne faisoit éprouver une douleur qui se dissipoit peu à peu. Il restoit néanmoins un sentiment de pesanteur.

Le 6 de février, la fièvre reparut, après avoir quitté le malade pendant vingt jours, tandis qu'il faisoit encore usage de l'infusion amère des fèves de Saint-Ignace, de fer, et d'une décoction de plantes anti-scorbutiques.

Au milieu de tous ces remèdes, de cette grande vicissitude de symptômes et de récidives à différens intervalles, Comparetti ayant constamment remarqué l'affection douloureuse de la tête à la partie droite, examina attentivement le conduit auditif ; il en vit sortir une matière purulente blanche et sans mauvaise odeur. Portant ses regards plus intérieurement, il découvrit une petite tumeur blanche et noirâtre au sommet. Il apprit ensuite que cette oreille avoit déjà été affectée par des sons violens qui l'avoient frappée ; que le malade y éprouvoit depuis quelque temps des sensations incommodes, et entendoit difficilement. Le malade

dit que , pendant la fièvre , il ressentoit dans le conduit auditif une douleur comme rongeante , et d'autres douleurs vagues sous l'angle de la mâchoire inférieure , derrière les condyles , etc. La vision étoit altérée ; il croyoit apercevoir , autour de la flamme de la chandelle , une zône bleue , et on remarquoit un mouvement variable dans la pupille. Les grandes souffrances du malade n'altéroient en aucune manière son embonpoint ; la douleur de tête étoit supérieure au degré de la fièvre , et la sensibilité étoit telle , qu'à une température très-peu élevée , il éprouvoit les effets d'un grand froid , etc. Je passe sous silence d'autres détails qui sont superflus pour déterminer le vrai caractère de cette fièvre ; il est à remarquer que , dans son long cours , le quinquina n'exerça qu'une action très-foible sur la répression de ses symptômes , et que , dans la suite , le malade ne retira un véritable soulagement que de l'exercice modéré qu'il fit en plein air , des récréations douces qu'il se procura , ainsi que de son retour de Venise à Vérone , etc.

ARTICLE XV.

Fièvre pernicieuse intermittente dyspnéique.

XVIII. J'appelle ainsi la fièvre que le célèbre docteur Galeazzi désigne sous le nom d'*asthmaticque* , et qu'il a cherché à établir sur les deux ob-

servations suivantes (1). Un homme septuagénaire, d'un tempérament bilieux-sanguin, d'une habitude de corps assez robuste, et doué d'un certain embonpoint, adonné au vin, fut attaqué d'une fièvre intermittente, caractérisée par une si grande difficulté de respirer, et par des quintes de toux si violentes, que ne pouvant rester couché, il étoit obligé de se tenir à chaque instant assis sur son lit; le pouls étoit dur et fréquent, la langue aride, la voix languissante et rauque; la toux n'étoit suivie d'aucune expectoration. On tira du sang deux ou trois fois, et sans aucun soulagement; on remarqua seulement que la fièvre, la difficulté de respirer, ainsi que l'assoupissement qui l'accompagnoient, éprouvoient une légère rémission le matin, ce que l'on attribua à la saignée; mais l'après-midi tous les symptômes augmentèrent de nouveau; le malade ne pouvoit parvenir à cracher la matière retenue dans le poumon; les urines étoient en petite quantité; elles étoient troubles et rouges; il n'y avoit point de sueur, etc. La périodicité des redoublemens qui se manifestoient, fit soupçonner la présence d'une fièvre intermittente pernicieuse. L'auteur de cette observation pensa qu'il falloit la combattre par le quinquina. Le premier jour, il profita

(1) *De Bonon. scient. et art. instit. atque acad. comment., tom. v.*

de la rémission de la fièvre pour administrer au malade douze grammes (trois gros) de quinquina en infusion dans l'eau de violette; le jour suivant il réitéra la même dose; le malade eut à peine avalé cette seconde prise, que la fièvre et la difficulté de respirer s'apaisèrent; il eut une expectoration de matière bilieuse et sanguinolente, qu'aucun autre médicament n'avoit pu susciter; continua l'usage de l'écorce du Pérou, en diminuant successivement la dose jusqu'à quatre, ou même deux grammes (un gros ou un demi-gros). Le malade prit en tout environ trois onces de quinquina. La matière des crachats devint meilleure; la quantité des urines augmenta considérablement; l'orthopnée et tous les symptômes de la fièvre disparurent.

Galeazzi cite pareillement l'observation d'une femme âgée de quarante ans, habituée à vivre à la campagne, qui d'abord avoit été atteinte d'une tierce simple, dont elle avoit été délivrée par le quinquina; mais ayant négligé de faire un usage ultérieur de cette substance, et ayant repris trop tôt ses occupations et sa vie laborieuse, elle fut saisie d'une toux opiniâtre, et d'une telle difficulté de respirer, que la malade étoit continuellement forcée de se tenir assise sur son lit, ou de se coucher seulement sur un côté. A ces symptômes se joignoit une fièvre considérable, dont les exacer-

bations avoient lieu la nuit ; la malade crachoit quelquefois avec peine , mais abondamment , une matière épaisse , assez semblable à du pus. On administra vainement la saignée , et plusieurs remèdes émolliens , expectorans et édulcorans. Comme il y avoit une extrême prostration de forces , et une maigreur universelle , en sorte que le médecin qui l'avoit soigné prenoit cette affection pour une phthisie commençante , par le conseil de Galeazzi , on fit prendre à cette femme l'écorce du Pérou , à la quantité de huit grammes (deux gros) chaque matin , aux heures les plus éloignées de l'exacerbation , sans négliger les médicamens qui pouvoient favoriser l'expectoration. La malade avoit pris à peine trente-deux grammes (une once) de quinquina , que la difficulté de respirer s'apaisa considérablement ; la fièvre et les quintes de toux diminuèrent , et enfin la malade ne tarda pas à se rétablir parfaitement , après avoir continué l'usage de l'écorce du Pérou quelques jours après la cessation des paroxysmes , etc.

M. Boullon , médecin d'Abbeville , a observé une fièvre pernicieuse intermittente dyspnéique. Cette fièvre s'est manifestée chez un individu âgé d'environ soixante ans , d'une constitution forte , et n'ayant d'autre indisposition habituelle que la goutte. Les cinq premiers accès de cette fièvre , qui avoient

eu lieu tous les jours depuis l'invasion, ne différoient par de ceux d'une fièvre intermittente ordinaire, et le malade, continuant de vaquer à ses occupations dans l'intervalle des paroxysmes, s'étoit borné à quelques doux laxatifs, et à l'usage d'une décoction de plantes chicoracées. Mais le sixième jour, il sort, et s'expose à la pluie dans l'enclos de son jardin : dès lors, accélération du retour de l'accès. Il fut marqué par un étouffement extrême, qui se soutint pendant les deux périodes de chaud et de froid. La face étoit violette et les lèvres livides : la respiration étoit si pénible, que le malade ne pouvoit rester couché. Cette suffocation imminente se termina par des sueurs partielles, et par l'émission d'une urine rare et presque sanguinolente. Deux jours se passèrent sans qu'il survint de nouveaux paroxysmes. Il resta une grande lassitude, et une gêne constante dans la respiration. L'individu espéroit n'avoir plus de fièvre ; mais le troisième jour, à l'heure ordinaire, l'étouffement recommença avec une intensité nouvelle, et il se manifesta en même temps un sentiment de douleur obtuse au côté gauche de la poitrine. Le médecin Boullon fut appelé, et fit appliquer, sans aucun retard, un large vésicatoire sur la partie souffrante. Il parvint ensuite, de concert avec un autre médecin-consultant, à administrer le quinquina d'après la méthode accoutumée, malgré la résistance du ma-

lade , qui croyoit n'avoir éprouvé qu'une attaque d'asthme ; quoique auparavant il n'eût jamais été sujet à une semblable maladie. Le malade prit également quelques loochs béchiques , propres à faciliter l'expectoration. Le troisième accès ne parut point ; mais il arriva dans ce cas , rapporté par M. Boullon , ce que j'ai observé moi-même quelquefois à l'hôpital Saint-Louis , c'est-à-dire que le symptôme capital persista , du moins en partie. Il se manifesta de la toux , de l'oppression ; les fonctions digestives ne se rétablirent point. Le pouls étoit foible , surtout celui du côté gauche ; les selles et les urines restèrent rares. La prostration des forces devint telle , que le malade tomba dans une fièvre adynamique , qui nécessita l'application des vésicatoires aux jambes , et l'administration d'une boisson vineuse au bout de quelques jours. Le malade parut entrer de nouveau en convalescence ; mais la lésion du côté gauche ne fut pas réparée. Dans l'espace de deux mois , tout ce côté s'infiltra et se tuméfia ; l'abdomen se remplit de sérosité , et le malade succomba victime de tous les accidens d'une hydropisie consécutive.

Barthez , dans son *Traité des Maladies goutteuses* , observe que dans l'asthme convulsif dû à une cause rhumatique-goutteuse , il arrive souvent que les accès reviennent périodiquement , et sont

marqués par un sentiment de suffocation très-violente. Il cite un cas de cette espèce : il dit expressément « que chez un homme sujet depuis long-temps à des douleurs vagues de rhumatisme à la poitrine et aux bras, il survint tout à coup de semblables accès de suffocation avec d'extrêmes douleurs de la poitrine ; et ces accès eurent des retours bien marqués en tierce jusqu'au quatrième accès, qui fut prolongé et mortel. »

M. Barthez remarque avec raison que la véritable méthode curative dans une semblable maladie, étoit d'administrer le quinquina à hautes doses dans les intervalles des accès périodiques, soit que ces accès se manifestassent sans fièvre ou avec fièvre ; il ajoute que, durant les accès même de cette maladie, qui en étoient les temps redoutables, il étoit urgent de modérer les symptômes par de puissans anti-spasmodiques. (Barthez, *Traité des maladies goulteuses*, tom. II, pag. 404.)

ARTICLE XVI.

Fièvre pernicieuse intermittente hydrophobique.

XIX. Aucun auteur avant nous n'avoit fait mention de cette variété ; nous n'avons pu nous refuser à l'admettre, parce qu'elle a été soigneusement observée par Dumas durant le siège de Lyon.

Ce professeur communiqua à la Société médicale de Montpellier une observation intéressante de cette fièvre, que nous exposerons avec quelques détails. Il seroit difficile de citer un symptôme plus grave et plus menaçant associé à la fièvre pernicieuse intermittente. Plusieurs praticiens avoient déjà eu occasion de le remarquer dans des affections analogues ; mais Dumas paroît être celui qui les a observées avec le plus d'attention, en 1793, à l'hôpital civil de Lyon. Nous allons présenter ici une courte esquisse de ce tableau.

L'individu atteint d'une semblable fièvre étoit âgé de quarante-cinq ans. Il étoit d'une constitution nerveuse, mélancolique, très-irritable, d'un caractère emporté, d'une habitude de corps maigre et sèche, accoutumé à se livrer aux excès les plus extraordinaires. Contraint de passer plusieurs nuits sous la tente militaire, il s'endormit un soir sur un terrain humide : c'étoit le 26 du mois d'août. A son réveil, éblouissemens et vertiges, atroce céphalalgie, anxiétés universelles. Mais ce fut surtout le soir que le frisson se décida d'une manière intense : chaleur peu considérable, découragement et anéantissement total des forces.

Le 27, continuation d'une douleur de tête presque intolérable ; contraction musculaire de l'estomac, qui rejeta beaucoup de matières verdâtres.

Le 28, dans la soirée, invasion d'un nouveau frisson, chaleur très-intense, soif vive, irritation du gosier, qui rendoit difficile l'acte de la déglutition; délire peu prononcé. Dès lors emploi de quelques boissons émulsionnées et nitrées.

Le 29, on trouva le malade dans un état d'apyrexie; il n'y avoit plus qu'un état particulier d'abattement et de somnolence, et une sorte de gêne dans les muscles du col. Le soir néanmoins, on observa de l'irrégularité dans le pouls, et un mouvement de chaleur fébrile, qui ne fut ni précédé par le frisson, ni suivi de sueur. Continuation des mêmes moyens.

Mais le 30, la fièvre intermittente se caractérisa d'une manière très-prononcée: chaud violent, fureur maniaque, agitation convulsive des lèvres et des muscles du col, gêne extrême de la déglutition; resserrement et spasme du gosier, augmentés par l'impression des médicamens liquides; langue aride, noire dans son milieu, d'un rouge vif sur ses bords; prolongement de l'accès bien avant dans la nuit. Emulsions camphrées, fomentations aux jambes avec des linges trempés dans le vinaigre, application des sangsues aux deux malléoles.

Le 1^{er} septembre, un état de calme succéda à ces phénomènes sinistres. Le malade néanmoins

manifestoit une aversion singulière pour les substances liquides , et une extrême difficulté d'avalier : d'ailleurs il n'y avoit pas d'autre symptôme.

Mais ce fut surtout le 2 septembre que cette fièvre ne laissa plus aucun doute sur son caractère, et que les véritables symptômes de l'hydrophobie se déployèrent dans toute leur intensité. D'abord convulsions universelles dans tous les membres, soubresauts des tendons, muscles abdominaux violemment contractés, déglutition empêchée, aliénation furieuse, efforts extrêmes pour mordre, bouche écumante. Le malade ayant été enchaîné, s'agitoit continuellement malgré son impuissance, grinçoit effroyablement des dents, et dans sa rage furieuse, lançoit des flots de salive sur les personnes qui l'assistoient : mais surtout horreur invincible pour tous les liquides, et refus constant de les avaler. Le seul contact de l'eau fraîche, à laquelle on avoit voulu recourir d'abord pour apaiser sa soif, lui fit éprouver un frémissement universel, et il lui fut impossible d'en avaler une seule goutte. D'ailleurs, on remarqua que ce symptôme prédominant d'hydrophobie croissoit progressivement avec tous les autres, à mesure que la violence du paroxysme augmentoit, et qu'il diminuoit de même à mesure que le paroxysme s'affoiblissoit ; en sorte que vers la fin de l'accès, il parvint à avaler une petite quan-

tité de liquide, mais non sans avoir été en proie aux angoisses les plus douloureuses. Application de deux sangsues à chaque malléole, synapismes, potion anti-spasmodique avec le sirop diacode et le laudanum liquide de Sydenham, que le malade refusa de prendre : dès lors pilules composées avec le nitre, le camphre, la valériane et l'opium : enfin, affoiblissement progressif des phénomènes fébriles.

Le 3 septembre, il y eut une rémission qui ne permit plus de douter du caractère de la maladie. Il y avoit néanmoins dans cet état d'apyrexie un trouble, une irrégularité dans les idées, et une prostration de forces considérable. Prescription du quinquina d'après les règles ordinaires. Dans la distribution du fébrifuge, on avoit seulement associé à chaque prise quelques gouttes de liqueur anodine d'Hoffman, et de laudanum liquide de Sydenham ; on avoit mis un peu de sirop diacode dans sa tisanne.

Le 4 septembre, même violence dans les symptômes ; mais le paroxysme ne fut pas d'une aussi longue durée.

Le 5, même dose de quinquina qui avoit été administrée le 3. Il y avoit d'ailleurs une apyrexie, sans malaise et sans foiblesse.

Le 6, début de l'accès par un coma profond,

phénomène qui fut suivi du délire et de tous les symptômes ordinaires de la fièvre. Cependant, chacun de ces symptômes se manifesta avec moins d'intensité. Le paroxysme ne dura que quatre ou cinq heures.

Le 7, le malade fut assez tranquille. Le quinquina fut dès lors administré dans une proportion moindre. Cependant le paroxysme arriva; il anticipa même de deux heures; amendement des autres symptômes; mais continuation des symptômes hydrophobiques dans toute leur intensité. Pendant toute la durée de l'accès, le malade manifestoit la même envie de mordre ceux qui l'entouroient, et il continuoit toujours d'avaler avec une difficulté extrême; mais il témoignoit surtout une horreur insurmontable pour les liquides, horreur qui persistoit dans les instans même où son esprit étoit entièrement calme. Ce symptôme étoit entièrement indépendant du délire.

On profita de l'intermission du 8 pour revenir au quinquina, et l'administrer à fortes doses; quarante-huit grammes de ce médicament, distribués de manière que le malade en prenoit quatre grammes toutes les heures, les derniers seize grammes réservés pour le moment de l'accès sueur copieuse, état comateux.

Le 9, le paroxysme se réduisit à un léger mouvement fébrile ; l'accès, qui fut très-modéré en comparaison des précédens, fut suivi de quelques sueurs et d'un sommeil tranquille.

Enfin, le 10 septembre, abattement, somnolence, soif extrême, peu d'appétit pour les alimens solides. Dumas fit administrer encore du quinquina ; mais il en diminua les doses, et les sépara par de plus longs intervalles. Les jours qui suivirent, le malade entra en pleine convalescence, qui fut confirmée par l'usage quelque temps continué de l'écorce du Pérou.

Les divers recueils contiennent peu de cas aussi intéressants, et mieux dirigés par les principes de l'art.

M. Boullon a pareillement observé une fièvre pernicieuse intermittente hydrophobique, durant l'épidémie d'Abbeville. Ce médecin fut appelé auprès d'un malade de la ville d'Eu, dans une journée d'hiver très-rigoureuse, où la terre étoit couverte de frimats. Le malade avoit déjà subi trois accès et les symptômes s'étoient déclarés avec la plus extrême violence. D'après le rapport qu'on lui fit, l'invasion des accès s'étoit faite sans aucun frisson préalable : d'abord le malade étoit dévoré par une soif ardente presque intolérable ; il éprouvoit ensuite un sentiment d'ardeur excessive au palais, à

l'œsophage , dans l'intérieur de l'estomac , et dans tout le trajet du tube alimentaire. « Accélération » et irrégularité du pouls , agitation extrême , hockets , vomissemens bilieux , léger délire , syncopes , tenesmes brûlans , impossibilité de boire , même d'avaler sa salive sans des tortures semblables à celle de la brûlure ; horreur de l'eau « presque convulsive. » M. Boullon examina le malade deux heures avant le temps où l'accès étoit attendu. Il rapporte qu'il n'avoit rien pris depuis quatre jours , qu'il n'avoit pas même avalé sa salive. Apyrexie complète , mais extrême prostration de forces ; œil inquiet et exprimant la terreur. On soupçonna l'impossibilité où il étoit de rien prendre ni par la bouche ni par la voie des lavemens. Dans cette conjoncture fatale , M. Boullon le fit plonger dans un bain chaud , et fit pratiquer des frictions universelles sur tout le corps avec une brosse rude. L'accès suivant ne reparut point. Le malade commença la nuit à avaler sa salive. La nuit d'après , qui fut assez tranquille , effrayé par le souvenir de ce qu'il avoit souffert , il ne vouloit pas boire ; mais M. Boullon l'ayant exhorté à délayer sa salive avec un peu d'eau tiède , le procédé réussit : dès lors on lui administra de l'eau de poulet , etc. La convalescence se confirma de plus en plus. Quelques jours après , il prit une douce purgation avec de la manne.

ARTICLE XVII.

Fièvre intermittente pernicieuse aphonique.

Une observation intéressante de cette espèce de fièvre a été recueillie par M. le docteur Double. Il fut appelé pour donner des soins à un jeune homme âgé de vingt-sept ans environ, d'une constitution lymphatique. Il le trouva dans la chaleur d'un violent accès. L'un des symptômes les plus remarquables étoit la privation totale de la voix. Au rapport des assistans, un semblable phénomène avoit eu lieu l'avant-veille. Dans l'accès qui suivit, l'aphonie fut encore plus intense. Le malade étoit en proie à des inquiétudes universelles; douleur et pesanteur ardente; beaucoup d'altération; les traits de la face étoient rendus difformes par la convulsion; langue brûlée; urines limpides pendant l'accès, chargées et sédimenteuses dans l'apyrexie. M. Double reconnut bientôt à de pareils symptômes l'existence d'une fièvre pernicieuse. Il pensa avec raison que de tels accidens entraîneroient le danger le plus imminent, et qu'il falloit se presser de les combattre. Il songea dès lors à administrer le quinquina aussitôt après le déclin de l'accès. Il en prescrivit six gros que le malade devoit prendre en quatre doses, dans un mélange égal de vin et d'eau. Ces doses, dont la

première étoit la plus forte, furent successivement administrées de quatre en quatre heures. Ce remède opéra un si bon effet, que le quatrième jour de cette affection, le paroxysme ne se montra presque point. Le malade n'éprouvoit qu'un peu de lassitude, et un mouvement fébrile presque imperceptible; mais il n'y avoit point d'aphonie. On continua l'écorce du Pérou. Cependant, il y eut un autre accès avec le symptôme prédominant, quoique moins intense que les autres. Durant cet accès, on prescrivit une légère potion calmante. On redonna ensuite l'écorce du Pérou comme auparavant: le malade en avala environ six gros. Il n'y eut pas de fièvre le sixième jour de la maladie. Le septième jour, frisson léger et court; aphonie moins prononcée; potion calmante durant l'accès; quinquina hors de l'accès. Le neuvième jour, l'accès manqua. Le malade ne ressentit qu'un léger embarras dans la voix; mais d'ailleurs la fièvre parut entièrement jugée. On administra encore du quinquina. On en donna aussi le onzième jour qui correspondoit au paroxysme, pour prévenir la rechute, ainsi que l'art le prescrit.

ARTICLE XVIII.

Fièvre pernicieuse intermittente catarrhale.

XX. Cette fièvre avoit été observée avant moi par Comparetti; les symptômes par lesquels elle est

spécialement caractérisée, sont la rougeur de la face et des yeux, de la gorge, une toux sèche qui augmente le soir, la douleur de tête jointe à celle de la poitrine et du dos, avec dépravation de l'organe du goût; le pouls est vibrant et prompt, la respiration irrégulière, etc. Pour la mieux faire connoître, consignons ici l'observation suivante : l'individu qui en est l'objet étoit âgé d'environ vingt-un ans, d'un tempérament bilieux-sanguin, d'une habitude de corps médiocre, d'une fibre molle, quoique exercée, et très-enclin à suer. Il avoit éprouvé des rhumes très-fréquens.

Vers la fin d'août, en 1791, après une marche très-rapide, qui produisit une sueur copieuse, il commença à se sentir mal; la fièvre survint avec une douleur de tête qui se manifestoit principalement vers le soir, et duroit toute la nuit. Le matin, le malade suoit, et la douleur se dissipoit. Ce ne fut que vers le septième jour de cette fièvre qu'il survint une toux sèche; le malade prit de l'huile de graine de lin, et continuoit de vaquer à ses affaires, observant toujours le même genre de vie; mais bientôt les symptômes s'aggravèrent, au point qu'il fut forcé de s'aliter.

Le premier jour que Comparetti le visita, il le trouva avec une toux fort incommode, une respiration laborieuse, une douleur fixe vers le milieu

du sternum ; une autre douleur plus forte encore aux lombes , avec un pouls fréquent et plein. On pratiqua une saignée du bras , le malade fit usage de l'huile de graine de lin , et d'une boisson d'eau miellée et nitrée.

Le deuxième jour , comme le sang tiré étoit rouge et écumeux , et que le pouls vibroit avec force , le chirurgien ouvrit la veine du pied. Il y eut plusieurs évacuations alvines ; l'urine étoit rouge et peu abondante ; la fièvre s'exaspéra vers le soir , avec une chaleur extraordinaire , une toux fréquente , et une douleur inégale , et pendant la nuit , qui fut assez inquiète , il y eut un peu de transpiration.

Le troisième jour , le malade prit la casse avec le tartrite acidule de potasse , qui procura plusieurs déjections de matière liquide ; mais la même fièvre persistoit avec une légère rémission ; il y avoit une toux sèche , une sueur inégale.

Le quatrième jour au matin , il prit quatre-vingt-seize grammes (trois onces) d'huile , sans soulagement de la douleur et de la toux. L'huile n'ayant produit aucune évacuation dans le cours de la journée , mais une chaleur très-grande se manifestant , le malade avala , de son propre mouvement , trente-deux grammes (une once) de casse , d'où

résultèrent , pendant la nuit , des évacuations copieuses.

Le cinquième jour , il y avoit un peu de rémission de la fièvre , la toux persistant toujours et revenant très-fréquemment , il n'y eut pas de sueur. On continua l'usage de l'hydromel nitré. La fièvre redoubla le soir ; le malade passa une nuit très inquiète.

Le sixième jour , la toux se calma , la sueur reparut avec abondance : le pouls devint très-foible , mou ; le malade eut quelques envies de vomir ; la diarrhée se manifesta de nouveau sans soulagement vers le soir ; le changement du pouls et de la toux , et quelques autres symptômes , indiquèrent qu'on devoit recourir le plus tôt possible au quinquina.

Dans la matinée du septième jour , il y avoit une rémission bien remarquable ; toute douleur étoit cessée , la toux avoit disparu , l'élévation du ventre étoit modérée. Le malade rendoit des matières liquides et noires ; l'urine étoit terne , point de chaleur , une légère moiteur. Mais bientôt après , la fièvre s'éleva avec beaucoup d'oppression à la région précordiale , et embarras à l'estomac ; les extrémités se refroidirent le malade perdit l'usage de ses sens , les convulsions les plus fortes se développè-

rent , le pouls devint petit , fréquent , irrégulier , la peau froide et pâle ; la face livide , les yeux saillans et tournés de travers , larmoyans , la bouche étroitement fermée , et quelques attaques de hoquet. On essaya , mais vainement , de faire avaler une mixture cordiale. On fit prendre du quinquina en lavement ; on en pratiqua des fomentations sur toutes les parties. Après que le malade eut pris neuf lavemens , il eut une évacuation alvine : les convulsions se camèrent , mais l'assoupissement persista.

Le huitième jour , il prit une cuillerée de mixture , faite avec la confection alkermès , dissoute dans l'eau de cerise noire , avec quelques gouttes de liqueur anodine minérale. Les convulsions cessèrent , le hoquet et l'assoupissement persistèrent. On continua à administrer des lavemens pendant la journée.

Le neuvième jour , le hoquet devint plus rare , le coma moins profond ; il y eut quelques excréctions alvines. Même traitement.

Le dixième jour , on avoit donné dix-huit lavemens ; on réussit à faire prendre une mixture avec le kermès minéral et le camphre. Ce remède diminua l'assoupissement. On put ensuite administrer quelques doses de quinquina par la bouche.

Le onzième jour , après avoir passé une bonne

Le malade se trouvoit le matin dans une meilleure disposition; et le soir, il commença à recouvrer ses facultés intellectuelles; les évacuations s'effectuoient; celles du ventre étoient cependant très-peu copieuses; les mouvemens devinrent libres et faciles. Il passa une bonne nuit.

Le douzième jour, le matin et le soir, il prit de la quina en poudre, dissous dans l'eau. On lui donna fréquemment des alimens très-nutritifs. Les forces se ranimoient de plus en plus; le pouls prenoit plus de force; il étoit moins mou et plus égal: les excrétions devinrent naturelles.

Le treizième jour, la fièvre cessa, le pouls devint moins fréquent, plus vibrant et parfaitement égal; l'appétit se réveilla. On continua l'usage du quina.

Le dix-septième jour, le malade avoit recouvré presque toutes ses forces: il fit encore usage d'une décoction d'herbes amères.

Le vingtième jour, il reprit toutes ses fonctions ordinaires; il n'y eut pas de récidive.

La fièvre pernicieuse intermittente catarrhale s'est manifestée à l'hôpital Saint-Louis. Un habitant de campagne avoit travaillé quelque temps dans une tannerie, non loin de la rivière des Gobelins.

Dans l'automne de l'an XI, ayant éprouvé un grand chaud, il rentra chez lui baigné de sueur, et accablé d'un malaise inaccoutumé. Il se coucha; mais pendant la nuit son sommeil fut constamment interrompu par une douleur de tête très-pesante, et par des quintes de toux qui gênoient singulièrement chez lui l'exercice de la respiration.

Le lendemain, il fut pris d'un violent frisson et d'une toux violente; pouls tendu, serré; chaleur excessive, sueur accablante. Comme ce malade avoit d'ailleurs une affection dartreuse, dont il étoit affligé depuis long-temps, il fut envoyé à l'hôpital Saint-Louis.

Le second jour, céphalalgie lourde et gravative; corysa, toux fréquente et laborieuse, lipothymies alarmantes, horripilations vagues répandues dans tous les membres, délire, soubresauts, chute rapide des traits de la face, émission involontaire des urines.

Malgré ces symptômes, je voulus m'assurer encore davantage du caractère pernicieux de cette fièvre, et j'osai attendre le paroxysme suivant; mais les accidens furent si graves, que nous faillîmes perdre le malade: douleur au front aussitôt que l'accès reparut, angoisses à la région précordiale, respiration douloureuse, sorte de déchire-

ment dans l'intérieur de la poitrine. J'eus recours au quinquina, d'après la méthode de Torti; la plus forte quantité au déclin de l'accès, et ensuite à des doses successivement décroissantes.

Le paroxysme suivant fut moins fort; il y eut un léger assoupissement, mais sans un grand froid, et sans une grande chaleur. La pesanteur de l'estomac, la tension de la poitrine, la toux, etc., subsistoient néanmoins toujours.

Le cinquième et le sixième paroxysme se passèrent comme le précédent, malgré la continuation du quinquina. Les symptômes se soutenoient, mais à un degré très-inférieur.

Au septième accès, tout s'améliora complètement; légère somnolence, expectoration facile de crachats, céphalalgie presque nulle; dès lors diminution de la quantité prescrite de quinquina, qu'on ne donna plus qu'en décoction, en y ajoutant un look d'huile d'amandes douces et de sirop de gomme arabique.

Dans le courant de l'an XI et même de l'an XII, on a vu souvent des constitutions entières de fièvres, porter leur impression irritante sur la membrane muqueuse de la gorge, des fosses nasales et du poumon: ce phénomène a eu lieu principalement dans les fièvres ataxiques continues, ainsi que

nous l'avons observé au sein de l'hôpital Saint-Louis. Or, ces fièvres ont tant de rapports avec les intermittentes pernicieuses ! Les principaux symptômes que nous remarquions étaient les suivans : surdité complète, rougeur de la face, inflammation légère de la conjonctive, angle interne des yeux retiré vers la racine du nez, convulsions partielles des muscles de la face, pouls petit et fréquent, soubresauts des tendons, délire continu sans agitation, expectoration laborieuse des mucosités épaissies, langue blanchâtre et enduite d'un sédiment, mais surtout écoulement muqueux de l'intérieur des narines, exsudation d'une matière sébacée aux angles des paupières, et quintes de toux pénibles et réitérées, etc. M. Legouas, qui étoit alors élève de l'hôpital Saint-Louis, suivoit avec zèle la marche des symptômes.

ARTICLE XVIII.

Fièvre pernicieuse intermittente ictérique.

XXI. Je ne connoissois point cette variété, dont aucun auteur n'a parlé avec détail. Je dois à feu M. Gilbert, médecin en chef des armées françaises, d'avoir présenté à mon observation un cas de ce genre très-intéressant. Instruit que je m'étois occupé d'une manière particulière des fièvres pernicieuses intermittentes, il eut la complaisance de m'engager

à faire une visite avec lui chez un homme âgé d'environ soixante ans, qui s'étoit rendu à Paris après avoir habité plusieurs mois un pays malsain et marécageux. Les paroxysmes se prolongeoient considérablement. La couleur jaune disparoissoit dans les intervalles des paroxysmes de la fièvre. Gilbert, dont le talent observateur étoit connu, administra le quinquina d'après les règles prescrites, et le malade ne tarda pas à se rétablir.

M. Louyer-Villermay, dans une excellente dissertation sur la jaunisse, considérée comme une affection toujours symptomatique et jamais essentielle, a fait voir qu'il n'est point de maladie qui ne puisse se compliquer de ce symptôme; M. Batt, habile médecin de Gênes, avoit déjà fait la même remarque. (*Voyez Memorie della Societa medica di emulazione di Genova, etc.*) Il n'est pas étonnant qu'on ait observé la même prédominance dans la fièvre pernicieuse intermittente.

ARTICLE XIX.

Fièvre pernicieuse intermittente exanthématique.

XXII. Comparetti donne un exemple de cette fièvre qui mérite d'être conservé. Dans le mois d'octobre de l'an 1789, une dame âgée d'environ vingt-cinq ans, d'un tempérament sanguin, d'une habitude de corps médiocre, nouvellement ma-

riée , éprouva des bâillemens , un sentiment d'horripilation , etc. Il survenoit une douleur , un resserrement à l'estomac , et quelquefois un vomissement avec soif , des convulsions dans toutes les parties ; la peau étoit froide ; pâleur , anxietés irrégulières , soupirs fréquens ; ensuite , éruption à la peau de taches rougeâtres ; enfin une chaleur universelle , qui calmoit la douleur interne et les mouvemens convulsifs.

Le troisième jour , tandis que la fièvre commençoit , Comparetti fut appelé en consultation avec le médecin ordinaire , qui n'avoit connu ni le genre , ni l'espèce de fièvre qu'il avoit à combattre. Il arriva pendant l'attaque spasmodique , à l'époque où la malade se plaignoit de la plus vive douleur , d'un resserrement à l'estomac , d'une inquiétude intérieure , avec anxiété à la région précordiale. Elle avoit le pouls petit , serré , fréquent , la face et les lèvres pâles , la peau froide. On administra aussitôt quelques cuillerées d'eau de fleur d'orange , avec la liqueur anodine , et un peu de diascordium. Lorsque les plus graves symptômes furent calmés , les taches rouges disparurent ; le pouls se développa , devint mou , ample et moins fréquent ; tout mouvement convulsif cessa de se manifester. La chaleur augmentant graduellement , ainsi que la chaleur à la face , la sueur parut sur le déclin.

Il survint encore un autre accès, à l'issue duquel on s'empessa de donner le quinquina, qui fit disparoître la fièvre le cinquième jour : au quinquina on joignit une décoction de plantes amères. On n'observa pas de rechute.

La fièvre pernicieuse intermittente exanthématique s'est manifestée une fois chez une jeune fille âgée de vingt-deux ans, couturière de profession, qui s'étoit exposée aux émanations de la voirie de Montfaucon. Elle fut transportée à l'hôpital Saint-Louis durant l'automne de l'an x, parce qu'on la crut atteinte du scorbut. Je fus témoin de son second accès : tous les symptômes étoient alarmans ; la peau étoit couverte d'une éruption rougeâtre : le pouls étoit petit, inégal ; la respiration étoit, pour ainsi dire, interceptée, et on entendoit un bruit stertoreux dans la poitrine. Il y avoit délire, torpeur de la langue ; les extrémités étoient frappées d'un froid glacial : il y avoit des mouvemens convulsifs des tendons. Le frisson avoit été très-prolongé ; tout le corps avoit été agité d'un trémoussement extraordinaire. Nous redoutions la mort : cependant la rémission arriva ; nous en profitâmes pour faire prendre à la jeune malade quelques gouttes de teinture de quinquina ; il eût été impossible de faire avaler ce remède sous toute autre forme. On lui fit prendre un clystère de quinquina : effort inutile.

Le lendemain, l'accès anticipa d'une heure avec une intensité plus violente encore que la veille : long frisson ; le pouls s'anéantit , le corps de la malade se couvrit de larges taches d'une teinte violette ; la face devint difforme, la respiration s'intercepta , et la malade mourut. Il fut impossible de procéder à l'ouverture du cadavre , parce qu'il avoit été réclamé par les parens , pour les devoirs de la sépulture.

ARTICLE XX.

De quelques variétés des Fièvres pernicieuses , non encore bien constatées.

XXIII. En compulsant avec soin les différens recueils consacrés aux observations médicales , il seroit aisé d'établir une multitude d'autres variétés de la fièvre pernicieuse intermittente : c'est ce que remarque judicieusement Casimir Medicus, qui avoit principalement éclairé ce point de pratique , et qui en auroit éclairé beaucoup d'autres , s'il avoit cultivé plus long-temps un art auquel il étoit si bien appelé par ses talens. On pourroit donc encore placer dans le tableau que nous venons de présenter à nos lecteurs, la fièvre pernicieuse dont les paroxysmes étoient spécialement caractérisés par des atteintes de paralysie , qui ne se manifestoient que durant les accès (*Molitor, Haller, Dissert.*

ad morb. hist.), ainsi que la fièvre double-tierce pernicieuse , dont la goutte - sereine signaloit les divers accès , observée à Pise par M. Vacca-Berlinghieri (*saggio intorno alle principali et più frequenti malattie, etc.*), et ultérieurement par moi à Paris. Mais il suffira d'avertir les médecins qu'ils doivent toujours être attentifs à épier ces innombrables métamorphoses. M. Gaillard , médecin de l'hospice des Incurables de Poitiers , a fait parvenir dans le temps à la Société de Médecine de Paris , une observation de fièvre pernicieuse accompagnée d'une contraction spasmodique de l'estomac , et d'une perte de sang qui se continuoit encore , quoique affoiblie dans les temps de l'intermission. La chaleur succédoit au frisson , sans qu'on ait vu diminuer l'intensité des autres symptômes. Le troisième jour de l'invasion de la fièvre , nouveaux frissons , nouveaux vomissemens , nouvelles coliques , augmentation de la perte sanguine , abattement , pâleur , langue blanchâtre , pouls petit , concentré , fréquent , tension et douleur de l'abdomen. La moindre potion rappeloit la contraction de l'estomac et le flux de l'utérus. Pour apaiser cette extrême sensibilité de l'épigastre , application d'un emplâtre thériacal sur la région de l'estomac , forces refocillées avec du vin vieux et de l'eau sucrée. Le quatrième jour , la fièvre reparut encore , et les coliques se manifestèrent : potion composée

avec la mélisse, le laudanum liquide de Sydenham, et la liqueur anodine d'Hoffmann. Le cinquième jour, frissons, coliques intenses; la malade éprouva des vomissemens d'une matière bilieuse, abondante; mais l'hémorragie fut suspendue: addition de deux grains d'opium et d'un peu de vin à l'emplâtre de thériaque. Même boisson continuée. Le sixième jour, la malade avoit recouvré ses forces, et on n'observoit plus le moindre symptôme fâcheux; il ne restoit, pour ainsi dire, aucun vestige de fièvre. Pour prévenir l'accès du lendemain, M. Gaillard ordonna à la malade trente-deux grammes (une once) d'écorce du Pérou, partagée en quatre doses. La nuit suivante, léger redoublement. Le septième jour, redoublement plus intense encore, avec des coliques et des vomissemens; mais l'accès ne dura que quatre heures. Le huitième jour, la malade n'eut absolument que de la foiblesse: on continua l'écorce du Pérou jusqu'au douzième jour par doses successivement décroissantes. Rétablissement complet de la malade. Le médecin avoit en quelque sorte préparé l'action médicamenteuse du quinquina, en apaisant le spasme de l'estomac, par le secours des boissons calmantes.

Il est des circonstances dans lesquelles la fièvre pernicieuse porte tous ses effets sur le cœur, et simule souvent tous les phénomènes propres aux

affections organiques de cet organe. Feu M. Jonquet avoit observé plusieurs fois cette variété, et M. Coutanceau a consigné ces faits dans la notice qu'il a publiée : une dame âgée de trente-huit ans, d'une maigreur affreuse, portoit depuis plusieurs années une tumeur squirreuse à l'ovaire, et étoit sujette à des palpitations qui devenoient très-violentes à l'époque de la menstruation. La malade étoit rétablie de ces diverses maladies, lorsqu'elle fut prise au temps de l'épidémie de palpitations violentes, et d'une douleur insupportable vers la région du cœur, de défaillances suivies de véritables syncopes, pendant lesquelles perte absolue de l'usage de tous ses sens, excepté de l'ouïe, foiblesse extrême du pouls et de la respiration. Cette dame avoit déjà eu deux accès de fièvre tierce très-foibles, et ce ne fut qu'à l'invasion du troisième qu'elle éprouva les symptômes alarmans que je viens de mentionner. La durée de ce premier accès pernicieux fut de dix heures. Le quatrième accès s'annonça par les mêmes symptômes portés à une intensité très-grave, et se prolongea pendant vingt heures. Le cinquième, quoique aussi long, fut cependant un peu diminué par le quinquina qu'on lui donna dans la rémission ; ce fut le dernier. M. Coutanceau cite deux autres observations de la pernicieuse carditique, qui ont une grande analogie avec celle-ci. Au surplus cette variété offre plu-

sieurs traits de ressemblance avec la syncopale, et on doit attendre d'autres faits, pour l'adopter comme une variété distincte.

XXIV. On a eu raison sans doute de contester l'existence de la fièvre pernicieuse intermittente puerpérale, que M. Osiander, savant médecin de Gottingue, dit avoir observée en 1781, et qu'il a voulu désigner sous le titre de *febris puerperalis intermittens perniciosa*. Nous ne pouvons rapporter ici que très-succinctement les symptômes dont cet observateur fait mention. Cette maladie, dit-il, qui a été aussi deux fois observée par le docteur Stein, se fait reconnoître par les phénomènes suivans : à son début, frissons très-intenses, froid glacial aux pieds et aux mains, et le long du dos, tremblemens extraordinaires dans les membres et dans la mâchoire inférieure, pouls petit et d'une extrême fréquence : à ce froid qui se continue quelquefois l'espace d'une heure, succède un chaud violent ; le pouls devient plein sans perdre de sa vitesse, et enfin une sueur copieuse vient baigner tout le corps de la malade accouchée. Telle étoit à peu près la marche de la fièvre que M. Osiander eut occasion de remarquer chez une femme de Cassel, affectée auparavant de rachitis et d'un catarre chronique utérin. L'enfantement avoit été très-laborieux, puisqu'on avoit été obligé de recou-

vir au forceps. Cette fièvre se déclara entre le troisième et le quatrième jour après les couches, et sept jours après l'invasion du premier accès, la malade succomba. On procéda à l'ouverture du cadavre. On trouva des traces d'inflammation dans la trompe et l'ovaire de la partie droite de la matrice, tandis que la partie gauche adhéroit à l'intestin rectum et au péritoine. L'ovaire gauche étoit presque totalement détruit, et sa surface étoit couverte de pus. Il me semble toutefois que cette affection n'a aucun rapport d'analogie avec les fièvres essentielles dites perniciosus. Tous les médecins observateurs ne doivent-ils pas la considérer comme une simple fièvre de suppuration, telles qu'on en voit fréquemment dans les hospices? Les prétentions de M. Oslander sont d'autant moins solidement appuyées, qu'il avoue lui-même que le quinquina est de nul effet dans cette espèce de fièvre, et qu'il propose de remédier aux accidens par des moyens mécaniques et opératoires. C'est ainsi, par exemple, qu'il propose de pratiquer une incision au bas-ventre de l'accouchée, à l'endroit même où siège la douleur, pour donner une issue à la matière purulente. On sent combien un pareil moyen est incertain et périlleux.

XXV. Je viens de tracer le tableau des fièvres principales qu'il a paru convenable de distinguer

par le symptôme grave et capital qui les accompagne, auquel tous les autres paroissent en quelque manière subordonnés; je ne pense pas qu'on doive les considérer, à l'exemple de Torti, comme formant autant d'espèces, mais plutôt comme de simples variétés de la même affection. La similitude des causes qui les produisent, et des moyens dont on use pour les combattre, suffit pour nous convaincre que leur nature est identique. On sait d'ailleurs (et le professeur Pinel l'a très-bien remarqué dans sa *Nosographie philosophique*); on sait, dis-je, que les fièvres qui paroissent si différentes au premier aspect, peuvent se succéder l'une à l'autre dans les rechutes qu'éprouvent fréquemment les malades. C'est ainsi que l'on a vu une fièvre pernicieuse intermittente comateuse, efficacement traitée par le quinquina, récidiver en diaphorétique; et cette dernière remplacer, dans un autre cas, la pernicieuse délirante.

XXVI. Nous croyons utile d'observer que ces variétés nombreuses de la fièvre pernicieuse intermittente, se compliquent dans quelques circonstances, et que deux ou plusieurs symptômes peuvent y prédominer au même degré. Morton, par exemple, donne l'histoire de deux femmes atteintes d'une fièvre pernicieuse, caractérisée à la fois par une violente cardialgie et par des sueurs colliqua-

tives (*Hist. x et xi*). La dissertation de Lautter renferme divers exemples de cette prédominance de deux, de trois ou de plusieurs symptômes qui se manifestent dans le même temps et au même degré d'intensité (*Hist. bienn. cas. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXI*).

ARTICLE XXI.

Fièvres pernicieuses intermittentes qui tendent à devenir continues.

XXVII. Hippocrate est sans contredit le premier qui ait reconnu cette tendance manifeste de certaines intermittentes vers le type de continuité, avec complication de symptômes insolites et pernicieux (1). Torti en a fait une espèce particulière, et il les a désignées sous le nom de *sous-continues malignes*. Il remarque que les symptômes primitifs, tels que la cardialgie, les syncopes, l'affection carotique, etc. s'y montrent sans doute, mais à un degré moins imminent, et qu'ils n'y prédominent jamais au point de pouvoir donner une dénomination particulière à la fièvre. Un de leurs caractères

(1) *Cholericæ affectiones magis in æstate fiunt et febres intermittentes, et quibus horrores accedunt. Hæ quandoque malignæ fiunt, et ad morbos acutos deveniunt. Verum cavere oportet. Popular. lib. 7, Vander-Linden interprete.*

les plus évidens est la durée relative du temps de la vigueur de l'accès, qui est beaucoup plus considérable que celle du temps du début ou de la rémission (1). Quoique ces fièvres marchent et exercent leurs ravages avec moins de célérité que les fièvres pernicieuses purement intermittentes, leurs accidens sont très-sinistres, et elles ne se déclarent presque jamais sans un grand péril, si l'art ne vient à bout d'arrêter leurs progrès.

L'excellent Traité du praticien de Modène contient plusieurs descriptions de la fièvre pernicieuse sous-continue, dont on peut resserrer les détails dans un langage plus laconique et plus précis que celui de cet auteur.

Première observation. La fièvre avoit débuté par un léger frisson. Anticipation de l'accès suivant; accroissement des symptômes, dont le principal étoit un état comateux; stupeur continuelle, réponses vagues et confuses, perte de la mémoire, urine rouge et en petite quantité, vomituritions réitérées, anxiétés à la région de l'estomac, ardeur précordiale, rapprochement successif et rapide des exacerbations.

Deuxième observation. Intus-susception des pa-

(1) Grimaud, *Cours des Fièvres*, t. III, p. 294.

roxysmes, pouls petit et déprimé, langue aride et scabreuse, sans aucune envie de boire; urine claire, lésion des facultés de l'esprit. Le troisième jour, le malade sortit de son lit et se coucha par terre, où il fut trouvé sommeillant, cette position lui ayant paru agréable. Le quatrième jour, s'étant levé pour aller à la selle, même accident, qui se répéta ensuite plusieurs fois durant le cours de la maladie. D'ailleurs, amaigrissement rapide de la face, joint à plusieurs autres signes, qui annonçoient que la fièvre prenoit un caractère aigu.

Troisième observation. Double-tierce très-intense, accès sub-intrans, délire grave et prédominant, n'existant pas dans le temps de la rémission; soif, sécheresse de la langue, agitation, chaleur des entrailles, urines rouges et en petite quantité, insomnies et autres symptômes qui démontroient une véritable convergence de la fièvre vers le type de continuité.

Quatrième observation. État analogue au précédent, langue aride et âpre, léger délire, respiration anhéleuse, limpidité des urines, affection grave de la tête, jetant le malade dans la stupeur; tremblemens des mains, oppression de tout le système nerveux, etc., chez un homme avancé en âge, et considérablement affoibli par des maladies antérieures.

Cinquième observation. Symptômes ordinaires. La fièvre ne commença à devenir aiguë que dans le temps de son augmentation.

Sixième observation. Symptômes ordinaires. La fièvre tendoit à la continuité dès son début.

Septième observation. Lipothymies fréquentes, avec une douleur vive à l'estomac, une prostration considérable des forces, une grande dépression du pouls; plaintes, gémissemens, spasmes, sueurs froides, oblitération de la faculté mémorative, etc.

Huitième observation. Double-tierce très-grave chez une femme parvenue au quatrième mois de la gestation, sueurs colliquatives qui n'étoient suivies d'aucun soulagement; affaissement extrême, urines rouges, flamboyantes, et en petite quantité, etc.

XXVIII. Dans les épidémies de fièvres pernicieuses intermittentes, il arrive souvent que des fièvres, qui, dans les premiers temps de leur apparition, n'avoient été marquées par aucun symptôme sinistre, se convertissent soudainement en continues adynamiques ou ataxiques, avec un grand danger pour les malades. C'est surtout dans ces circonstances qu'il importe de combattre puissamment les premiers accès, pour prévenir une dégénérescence aussi funeste dans ses résultats.

XXIX. D'après le tableau de ces fièvres, presque toujours remarquables par la co-existence d'un symptôme majeur et prédominant, il est facile de juger que la division que Torti a voulu faire des fièvres pernicieuses *in comitatas* et *in solitarias*, est plus imposante que solide, ou que du moins elle n'est point applicable à tous les cas. Cette tendance des intermittentes pernicieuses vers le type continu, est un simple accident qui ne peut absolument servir de base à aucune vraie distinction, quoiqu'il apporte nécessairement des modifications particulières dans les procédés curatifs.

ARTICLE XXII.

Fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques.

XXX. Nous n'aurions donné qu'une histoire bien imparfaite des fièvres intermittentes pernicieuses, si nous nous bornions à les décrire telles qu'on les voit régner sporadiquement dans les saisons et les circonstances favorables à leur développement, chez des individus soumis plus ou moins longtemps à des influences sédatives. Mais ces fièvres se montrent avec un appareil de symptômes plus meurtriers encore, lorsqu'à la suite de causes graves et extraordinaires elles surviennent épidémiquement dans les constitutions médicales. Alors même elles se compliquent le plus fréquemment, ou d'une

affection particulière des premières voies, ou de quelques-uns des accidens qui sont essentiellement propres aux rémittentes adynamiques. Le professeur Fouquet fait mention d'une fièvre rémittente pernicieuse qui parut à Batavia, avec un tel caractère de férocité, que les malades, saisis subitement du délire, succomboient le plus communément dès le premier accès, et toujours avant le quatrième. Les moindres blessures ou égratignures se convertissoient en ulcères putrides avec une étonnante rapidité. (1)

Nous devons nous proposer ici comme un modèle de vérité et de précision, le tableau des tierces pernicieuses, tracé par l'immortel Lancisi, et qui infestèrent plusieurs faubourgs de Rome, en 1695 (2). Le cinquième jour, elles convergeoient vers le type continu; le septième ou le onzième, les malades mouroient; peu prolongeoient leur vie jusqu'au quatorzième, à moins que la maladie ne se convertît chez quelques-uns en fièvre chronique ou en un flux dysentérique, qui duroit ensuite tout l'automne, ou même l'hiver. Le visage de ceux qui en étoient affectés devenoit d'abord jaunâtre; ils

(1) Consultez les notes qu'il a ajoutées aux Mémoires de Lind, sur les Fièvres et la Contagion.

(2) *De nox. palud. affluv. lib. 2.*

éprouvoient des dégoûts et des douleurs gravatives à la tête ; ensuite grand frisson avec éruclation de matières aqueuses et d'une bile dégénérée, et de diverses couleurs. Les malades rendoient quelquefois de petits vers par la bouche ; enfin, il y avoit une chaleur et une altération considérables.

Souvent la fièvre avoit une telle rémission après deux paroxysmes caractérisés par des sueurs abondantes, que les malades se croyant à l'abri de tout danger, non-seulement se levoient le quatrième jour, mais commençoient à sortir de leur maison. Durant ce temps néanmoins, les urines étoient safranées, épaisses, troublées, la fièvre reparoissoit le cinquième jour avec de grandes anxiétés dans la région précordiale, de manière que son caractère pernicieux étoit de toute évidence ; la langue d'ailleurs étoit aride et noirâtre, le pouls varioit : il étoit souvent petit et inégal. Les membres refroidis étoient agités de mouvemens convulsifs ; éruptions livides sur la peau, face cadavéreuse, défaillances fréquentes, délire, ventre tendu et tuméfié, selles fétides et d'un pâle bilieux, souvent sanguinolentes, contenant des vers morts dans le commencement de la maladie ; enfin, grave assoupissement, sueurs froides, urines limpides : gonflement des parotides. Les malades succomboient le septième ou le neuvième jour ; ils alloient rarement jusqu'au

douzième, avant qu'on eût trouvé le remède propre à combattre les accidens qui se manifestoient.

L'ouverture des cadavres fit voir de grands désordres dans les viscères de l'abdomen, qui étoient presque tous livides; le foie étoit d'un brun très-obscur, la bile cystique étoit noire; les intestins sphacelés de toutes parts, contenoient des excréments très-fétides, et une grande quantité de vers. On y apercevoit çà et là quelques taches noirâtres circulaires, dans le centre desquelles on croyoit distinguer les traces des érosions produites par ces vers, etc.

Lancisi a décrit une deuxième épidémie de fièvres pernicieuses intermittentes qui dura plusieurs années: elles prenoient également le type des tierces: leur invasion commençoit par un frisson et une sueur très-abondante; elles observoient une intermission très-décidée dans les premiers temps, elles dégénéroient néanmoins en continues vers le septième jour, et causoient la mort à beaucoup de malades. Il se manifestoit depuis leur commencement des vomissemens bilieux et des déjections abondantes; douleurs de tête et de lombes, cardialgies; tension des hypocondres et tranchées, ce que Lancisi regardoit comme l'indice de la présence des vers. Quoique ces fièvres gardassent à peu près la même marche, la chaleur alloit en augmentant,

et la sueur diminoit ; l'affoiblissement étoit ensuite si considérable , que les malades , totalement refroidis, mouroient le cinquième ou le septième jour.

On peut rapprocher de ces constitutions épidémiques de Lancisi, celle qui a régné à Turin en 1720, et que Richa a si bien décrite (1). Cette dernière présente aussi les effets funestes de cette convergence de la fièvre pernicieuse intermittente vers la continuité. Le danger étoit d'autant plus à redouter, que cette convergence avoit lieu plus tard. Certains malades étoient en proie à des douleurs de tête intolérables ; d'autres se plaignoient des chaleurs vives et des lassitudes qu'ils éprouvoient dans tout le corps. Les uns étoient dévorés par la soif, et continuellement tourmentés par des insomnies ; plusieurs étoient accablés par un assoupissement profond et insurmontable, etc. Il y avoit une éruption de pétéchies qui se faisoit le quatrième ou le septième jour ; on les apercevoit d'abord sur le dos, le col et la poitrine, et elles s'étendoient ensuite aux extrémités, jusqu'aux ongles des pieds. On remarqua que peu de malades affectés de ces taches dès les premiers jours, échappèrent à la fièvre. Un soldat qui en avoit été atteint le troisième jour, mourut presque soudainement.

(1) *Thom. Sydenh. op., tom. II, fol. 381.*

Ce qu'il y eut d'intéressant à remarquer, c'est que les déjections de diverse nature, qui, dans la plupart des ataxiques sporadiques, augmentent avec la violence de la fièvre, marchent en sens inverse, et alternent avec elle dans un cas observé par Richa. Sur la fin de cette affection, qui avoit le type de double-tierce, le malade rendoit tous les jours par les selles une quantité prodigieuse d'un sang féculent et noir; ce qui étoit suivi d'un mieux réel dans son état.

Le célèbre Ramazzini dit également avoir vu à Modène des constitutions où les tierces, qu'il nomme *malignes*, d'après beaucoup d'auteurs, s'établissent avec la plus grave intensité (1). Vers le quatrième ou cinquième accès, le froid étoit si vif, que les malades finissoient par ne plus se réchauffer; tout le corps étoit comme glacé; le pouls étoit concentré, et la mort ne tarδοit pas à survenir.

L'histoire des maladies de Breslaw contient deux descriptions de ces fièvres, exposées avec la même méthode et la même fidélité (2). L'intermission, qui étoit d'abord assez apparente, cessoit ensuite d'être distincte pour se manifester de nouveau après

(1) *De abus. chinæ-chinæ dissert.*

(2) *Hist. morb. uratisl.* ANN. M. DCIX et M. DCCII.

quelques jours ; quoiqu'elles fussent le plus souvent tierces , elles prirent quelquefois le type des quartes. La langue étoit couverte d'une mucosité visqueuse ; quelques malades vomissoient ; d'autres tentoient des efforts inutiles pour rejeter les matières contenues dans l'estomac. Les premiers tomboient en syncope au moindre mouvement ; les autres étoient en proie aux plus violentes cardialgies. D'ailleurs , dégoûts , aversion pour les boissons , céphalalgies atroces , insomnies opiniâtres , urine naturelle dans le commencement , ensuite rouge et trouble ; constipation , inquiétudes incroyables , etc.

Lauter a très-bien décrit les fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques , et déjà nous avons eu occasion de citer plusieurs observations très-intéressantes de cet auteur. Ces fièvres , qui avoient régné à Luxembourg dans l'automne de 1759 , renaquirent au mois de mars de l'an 1760. Le médecin observateur dont nous parlons fut lui-même frappé d'une tierce très-grave , qui simuloit la continue dans son principe , et dont on peut voir les détails dans son excellente relation (*Hist. medic. bienn. morbor. rural. , etc.*). Il n'est pas inutile de remarquer que les rechutes furent surtout très-fréquentes durant cette deuxième année , et que peu de malades en furent exempts. Elles avoient principalement lieu chez les femmes enceintes , et non sans danger de

perdre la vie. Ainsi on vit une dame , âgée de vingt ans , au cinquième mois de sa grossesse , être saisie d'une fièvre tierce , dont les symptômes furent très-violens. Elle fut guérie par trente-deux grammes (une once) de quinquina , pris sous forme d'électuaire. C'étoit au milieu du mois de juin. Trois semaines après , sans cause apparente , elle fut de nouveau attaquée , et de nouveau guérie. Au commencement d'août , elle retomba encore : cette fois-ci les accidens étoient légers , et disparurent par les plus simples préparations. Peu de jours après , la fièvre revint , augmenta de force , et dégénéra en une double-tierce rémittente. (La femme étoit alors au huitième mois de sa gestation.) Les paroxysmes , qui débutoient par un frisson à peine remarquable , étoient suivis d'une chaleur plus vive que celle qui se manifeste dans les fièvres les plus aiguës. La douleur de tête étoit énorme , la pointe de la langue étoit aride et brûlante , la soif étoit inextinguible : elle éprouvoit une ardeur excessive à l'hypogastre , et des douleurs vives au voisinage de l'utérus ; le fœtus étoit dans une forte et continuelle agitation , en sorte qu'on craignoit que la malade n'accouchât avant terme. Ce qu'il y avoit de plus funeste , c'est que les paroxysmes anticipoient l'un sur l'autre , l'intervalle qui constituoit la rémission devint presque nul. Lutter , appelé au temps du premier accès , trouvant la respiration de la malade excessivement

gênée, le pouls très-dur, fit tirer du sang de la veine du bras; il fit appliquer sur le ventre un cataplasme émollient, et les sinapismes à la plante des pieds; il administra une boisson rafraîchissante, et apaisa ainsi la férocité des symptômes. Il ordonna ensuite qu'on employât le quinquina sous forme d'électuaire durant la rémission. Mais comme la malade ne pouvoit l'avalier de cette manière, un autre paroxysme non moins violent se manifesta; on donna une mixture de quinquina, à la dose d'environ vingt-quatre grammes (six gros); les accès diminuèrent d'intensité, et disparurent enfin par l'emploi réitéré de ce médicament. En peu de jours cette femme eut entièrement recouvré ses forces, et elle accoucha au temps marqué d'une fille très-bien portante.

Ces fièvres, que Lautter crut pouvoir caractériser du nom de *malignes*, furent en grand nombre cette année; elles différoient des précédentes relativement à leur début, aux symptômes qui les accompagnoient, et aux affections qu'elles simuloient; le frisson, qui d'abord étoit très-court, se convertit ensuite en un froid glacial et véhément, en sorte que le tronc du corps restoit immobile pendant plusieurs heures, et qu'on avoit continuellement besoin de le ranimer par des fomentations et l'application des linges chauds; quelquefois les extrémités

inférieures étoient glacées jusqu'au gras des jambes ; et les extrémités supérieures jusqu'au carpe , tandis que le reste de ces parties se trouvoit dans un état ordinaire de chaleur (*Casus XIII*).

Les symptômes pernicioeux qui accompagnoient ces fièvres étoient de grandes anxiétés à la région précordiale , des oppressions douloureuses de poitrine , des nausées continuelles et très-incommodes, la réjection laborieuse d'une bile jaunâtre et porracée, des vomissemens d'un sang grumelé , de violens mouvemens hystériques et convulsifs, une cardialgie déchirante qui conduisoit à la défaillance, et ensuite à une vraie syncope, augmentant et diminuant avec l'accès, ce qui avoit lieu aussi pour les autres symptômes.

Le pouls, dans le début de l'accès, étoit foible, petit, inégal, presque nul durant la lipothymie et la syncope ; dans la vigueur du paroxysme et lorsqu'il n'y avoit plus de défaillances, il devenoit rapide et serré ; chez quelques malades, il étoit fort et plein ; dans le temps de la rémission, il acquéroit de la mollesse et de la flaccidité.

Par la même raison, la respiration étoit tantôt courte, rapide, élevée, et manquoit pour ainsi dire ; tantôt elle étoit laborieuse, fréquente, anhéleuse.

Quelques-uns des malades avoient un délire féroce, d'autres un délire tranquille; certains d'entre eux éprouvoient des soubresauts et des mouvemens convulsifs; plusieurs, plongés dans une sorte de stupeur, pouvoient à peine répondre aux questions qu'on leur adressoit; ils balbutioient, hésitoient dans leurs discours, s'arrêtoient au milieu d'une phrase; on en voyoit qui, profondément plongés dans un état comateux, n'ouvroient les yeux que lorsqu'on les agitoit, ou qu'on les appelloit à très-haute voix.

Les forces étoient dans un tel état de prostration après un petit nombre d'accès, que les malades pouvoient à peine se mouvoir dans leur lit. Leurs yeux étoient tristes et troublés, leur face vultueuse et livide. Il se manifestoit au début des paroxysmes, des sueurs abondantes et froides, et quelquefois des exanthèmes sur la fin de ces mêmes exacerbations.

Il paroît, dit Lautter, que les fièvres pernicieuses de la première année de l'épidémie, étoient spécialement aiguës et inflammatoires, et que celles de la seconde année prenoient le masque des affections éminemment septiques et malignes; toutes se rapprochoient par leur caractère le plus essentiel, qui étoit d'être intermittentes, et de ne céder absolument qu'à l'action du quinquina. Les remèdes

secondaires exigèrent néanmoins quelques différences. La saignée qui, dans la première année de l'épidémie, dut nécessairement être pratiquée, ne put être employée dans la seconde. Les analeptiques, les cardiaques, les stimulans, furent substitués aux anti-phlogistiques, etc.

A ces différentes relations sur les fièvres pernicieuses épidémiques, je joindrai quelques détails historiques sur celles qui ont régné à Pithiviers, dans le département du Loiret, et dont j'ai déjà eu occasion de faire mention. Ces fièvres ne pouvoient manquer d'être bien connues; à l'époque où elles se manifestèrent, l'École de Médecine de Paris y envoya l'élite de ses élèves. Ces jeunes médecins, déjà mûrs dans l'art d'observer, dirigés d'ailleurs par les lumières des professeurs Desgenettes et Duméril, firent des recherches exactes sur les causes, sur la nature et les effets de l'épidémie; mais avant leur arrivée, M. Lanoix, qui honore ce département par l'excellence de sa pratique, avoit déployé un zèle digne des plus grands éloges.

Ce fut vers la fin de thermidor de l'an x, que des fièvres intermittentes, en apparence bénignes, se manifestèrent dans plusieurs communes de l'arrondissement de Pithiviers. Elles se propagèrent bientôt avec une effrayante rapidité: elles attaquèrent, dans l'espace d'un mois, la moitié de la po-

pulation des bourgs et villages situés sur les bords de la rivière de l'Essone. Tant qu'elles conservèrent le caractère des fièvres intermittentes simples, on ne fut frappé que de la multiplicité des individus atteints : mais lorsqu'on vit qu'elles devenoient meurtrières, on réclama des secours de toutes parts.

La voix publique désignoit comme les principaux foyers de l'épidémie les faubourgs situés à l'est et au sud de la ville de Pithiviers. Jamais un spectacle aussi affligeant n'avoit attristé les regards ; chaque maison sembloit métamorphosée en hôpital. Tout ce que la douleur et l'indigence peuvent offrir de plus affreux se trouvoit réuni dans ces habitations : adultes, vieillards, femmes, enfans, la fièvre dévorait tout sans distinction. Le pauvre, abandonné à sa position déplorable, n'avoit pour soulagement à tant de maux, que de mauvais médicamens, plus dangereux qu'utiles, et une nourriture modique et malsaine.

Dans l'intérieur de la ville, la consternation étoit générale ; la rapidité avec laquelle l'épidémie se propageoit, la mort inattendue d'un grand nombre de vieillards et d'enfans, de quelques chefs de famille, de plusieurs femmes enceintes, avoient répandu une alarme d'autant plus grande, que chaque jour amenoit encore des malheurs nouveaux.

Ces fièvres étoient essentiellement intermittentes ; en général, les types tierce et double-tierce dominoient. Les types quotidien et quartenaire étoient moins communs. Ces divers types offroient, dans un grand nombre d'individus, une foule de variétés, relatives à la durée des paroxysmes, à leur retour, etc. Toutes ces fièvres se prononçoient avec un caractère frappant de débilité : un seul accès de fièvre terrassoit l'homme le plus robuste, et ne lui permettoit plus de quitter le lit. L'intermission de la fièvre ne rétablissoit pas les forces, et les fiévreux étoient d'autant plus foibles, que les fonctions digestives étoient le plus souvent nulles, même avant l'invasion de la fièvre, et long-temps après sa disparition. Deux symptômes généraux étoient encore remarquables pendant la durée des paroxysmes ; c'étoient des céphalalgies horribles et des douleurs abdominales qui ne cessoient même pas toujours avec l'accès, et qui tourmentoient encore les malades dans les courts instans de l'apyrexie. En général, ces fièvres épidémiques avoient une grande tendance à changer promptement de type, et à devenir tour à tour rémittentes, continues bilieuses et pernicieuses continues.

Relativement à la dégénération des intermittentes en continues, on observa que chez le plus grand nombre des malades, les derniers accès se prononçoient

sans frisson marqué ; les malades éprouvoient uniquement un froid léger : ce symptôme annonçoit presque toujours le changement des intermittentes en continues. Quelquefois l'accès , au lieu de douze ou quinze heures , duroit trente-six heures , et toute apyrexie s'effaçoit.

Telles étoient en général les dégénérations des fièvres régnantes ; mais la nature la plus grave de ces fièvres se trouvoit dans les intermittentes pernicieuses : tantôt leur invasion étoit subite ; tantôt ces symptômes pernicieux se manifestoient après quelques symptômes de fièvres intermittentes bénignes, ou pendant la convalescence de ces fièvres, tout à coup ces malades étoient frappés d'un frisson violent : bientôt perte de connoissance, aphonie, figure le plus généralement livide, déglutition difficile, respiration ronflante, pouls plein et irrégulier ; quelquefois soubresauts dans les tendons, urine rare ou limpide, inquiétés, soupirs profonds, insensibilité générale, anéantissement des forces. Les accès duroient quinze ou dix-huit heures. A la fin de l'accès, recouvrement de l'usage des sens, respiration moins stertoreuse, pouls plus régulier et plus foible, urines abondantes et sédimenteuses, parole foible, ignorance absolue de ce qui s'étoit passé durant l'accès ; accablement extrême, apyrexie pendant dix ou douze heures, plus ou moins.

La cause essentiellement productrice de tous ces ravages, paroît devoir être rapportée à la production des miasmes marécageux qui enveloppèrent pendant près de quatre mois l'atmosphère de Pithiviers et des communes situées sur les bords de l'Essone. Cette rivière fut sujette, durant le cours de l'an x, à une inondation extraordinaire telle, que les prairies qui bordent son lit étoient couvertes d'eau. Les eaux stagnantes, qui ont formé un marais accidentel, dont les miasmes ont été développés par les chaleurs brûlantes de l'été, suffisent donc pour rendre compte de l'origine des fièvres épidémiques qui ont désolé si long-temps ce malheureux pays. Les fastes de l'humanité et la voix de la reconnoissance nationale, doivent consacrer à jamais le nom chéri de mademoiselle de Neufcarre, dont les soins si compatissans et si généreux contribuèrent à adoucir les horreurs de cet horrible fléau. L'éloge de cette femme vertueuse s'associe naturellement à celui de M. Maret, préfet du département, et à celui de M. le docteur Lanoix, qui, au sein de ces calamités publiques, déployèrent tant de zèle, tant de lumières et tant de philanthropie !

On a vu pareillement les fièvres intermittentes pernicieuses sévir, avec une extrême férocité, durant le cours des épidémies qui ravagèrent les en-

virons d'Abbeville pendant les années VIII, IX, X et XI de la république française. M. Boullon, qui les a décrites avec beaucoup d'exactitude, observe que le symptôme le plus commun qui les caractérisoit étoit la léthargie. Il ajoute que certains malades étoient en proie, dans leurs paroxysmes, à des convulsions, des vomissemens bilieux, des flux dysentériques, des délires furieux ou paisibles; mais le phénomène qu'il remarqua d'une manière particulière, fut une éruption partielle cutanée, souvent pâle ou noirâtre, qui signaloit les accès de la fièvre, et qui étoit presque toujours accompagnée d'un développement extraordinaire de vers lombricoïdes dans le conduit intestinal.

Enfin, M. Comte, docteur en médecine, a décrit avec détail et exactitude des fièvres intermittentes pernicieuses, qu'il vit régner à Grenoble et aux environs de cette ville, dans le courant de l'an XII. Cette épidémie avoit été précédée d'un état très-doux de l'atmosphère, auquel avoit succédé un froid subit avec chute abondante de neige, sous les vents du nord et du nord-ouest. On soupçonne facilement que ces transitions inattendues dûrent contribuer particulièrement à favoriser le développement des affections catarrhales.

M. Comte rapporte qu'on les observa principalement dans le bourg de Sassenage. Ce bourg se

trouve à l'ouest de la ville de Grenoble ; il est continuellement en butte aux influences perfides du vent du nord. Masqué par une montagne du côté du sud, il cesse de recevoir les rayons du soleil presque aussitôt après midi. D'autres causes locales paroissent entretenir une humidité continuelle dans l'air atmosphérique : le pays est rempli d'eaux stagnantes dans des fossés et de nappes marécageuses. Ces fièvres intermittentes pernicieuses attaquoient indifféremment tous les âges et tous les sexes. La plupart étoient soudainement saisis d'une douleur vive dans le côté, qui gênoit l'exercice de la respiration : ils expectoroient laborieusement un sang qui étoit tantôt pur, tantôt muqueux ; céphalalgie gravative. La fièvre, d'ailleurs peu considérable pendant le jour, redoubloit le soir, et c'est alors que l'oppression de la poitrine augmentoit.

On remarquoit en outre que ces fièvres pernicieuses catarrhales n'avoient point une marche uniforme. Tantôt un phénomène pernicious signaloit leur apparition, et dès-lors le malade étoit emporté au troisième accès. Tantôt elles débutoient par des paroxysmes simples, auxquels succédoient des paroxysmes funestes. Souvent ces fièvres étoient purement insidieuses, sans être marquées d'aucune complication ; souvent, avec leur type dangereux, elles se combinoient avec des maladies étrangères,

comme par exemple avec des adynamies, avec des ataxies, etc., sans perdre néanmoins le caractère spécial de maladies catarrhales. L'écorce du Pérou, abondamment distribuée, détruisoit pour l'ordinaire à la fois la fièvre et le catarrhe.

On pourroit citer plusieurs épidémies dans lesquelles le caractère soporeux a été le caractère prédominant. M. Janin de Saint-Just, mon élève à l'hôpital Saint-Louis, jeune médecin qui donne les plus grandes espérances, en observa une de ce genre, pendant le cours des premières études qu'il fit à Turin. Sa propre sœur faillit en être la victime. La fièvre qui l'atteignit se manifestoit par trois accès de coma par jour. On pouvoit à peine profiter de quelques intervalles lucides pour lui administrer le quinquina à grandes doses et par le secours d'un entonnoir. Ce procédé la tira du danger imminent où elle se trouvoit. Les journaux de médecine ont publié dans le temps plusieurs observations recueillies par M. Bailly, à Boulogne-sur-Mer, dans les mois d'août, septembre et octobre de 1807. La cause spéciale qui avoit influé sur le développement de ces pernicieuses intermittentes, provenoit d'une inondation qui s'étoit effectuée sur le terrain voisin de la rivière de la Liane. La plupart de ces malades étoient dans un état de prostration extraordinaire. Ils perdoient l'u-

sage des sens et des facultés intellectuelles. Lorsque l'accès étoit fini, les malades éprouvoient la plus grande difficulté à se mouvoir : ils conservoient le visage bouffi, le regard hébété, répondoient en balbutiant aux questions diverses qu'on leur adressoit. Leur voix étoit presque éteinte. Le malheur voulut que plusieurs d'entre eux prissent en aversion les médicamens et particulièrement le quinquina. L'état comateux se prolongeoit même pendant l'apyrexie. C'étoit un affaissement inconcevable dans tous les instans de la journée. La fièvre intermittente cardialgique, la délirante et la diaphorétique, se montrèrent aussi quelquefois dans cette épidémie, mais bien plus rarement que la soporeuse, qui étoit vraiment l'affection dominante. M. Bailly observa que plus les intermittentes étoient franches, et se déclaroient avec des intermissions nettes et sans mélange d'accablement, plus elles cédoient avec promptitude aux doses réitérées de quinquina qu'on leur administroit.

C'est encore dans les ouvrages de Cleghorn (1), de Sarcone (2), et de quelques autres observateurs non moins recommandables, que les praticiens doivent méditer sur le génie propre des épidémies

(1) *Observations on the epidemical diseases of Minorca.*

(2) *Istoria raglionata de mali osservati in Napoli.*

relatives aux fièvres dont nous traitons. C'est en rapprochant et en comparant leurs relations fidèles, qu'ils apprendront que rien n'agrandit autant les vues pratiques de l'art que d'unir, à l'exemple d'Hippocrate, la science des lieux à celle des maladies, de balancer sans cesse les influences et les effets, les ressources et les moyens employés.

XXXI. On doit présumer qu'il est certaines constitutions médicales propres à produire de préférence telle ou telle variété de la fièvre pernicieuse intermittente ; et de longues recherches à ce sujet seroient aussi utiles que curieuses. Leroy observe que les tierces cholériques furent épidémiques à Montpellier dans l'automne de 1765 (*Mémoire sur les fièvres aiguës*). Sydenham avoit aussi remarqué des épidémies où prédominoient les intermittentes carotiques (*Epist. ad Rob. Brady*). Il est du reste probable que le plus communément c'est le genre de tempérament propre à chaque individu, ou la débilité relative des systèmes organiques, qui portent spécialement l'action de la fièvre vers une partie déterminée du corps, et qui décident ainsi ou une pernicieuse cholérique, ou une pernicieuse cardialgique, ou une pernicieuse comateuse, etc.

XXXII. Il est difficile de s'assurer si les symptômes particuliers qui prédominent ainsi dans les pernicieuses intermittentes, sporadiques ou épidé-

miques, sont essentiels à la maladie, ou s'ils y surviennent d'une manière purement accidentelle. Torti recommande d'examiner avec soin s'ils suivent exactement le période de la fièvre, s'ils arrivent et s'éclipsent avec elle. Je pense que cette considération est insuffisante, et qu'il faut en outre faire une attention sérieuse à l'état antérieur et aux affections habituelles du malade. Il peut arriver en effet que les traces d'une irritation ancienne soient uniquement renouvelées par le paroxysme, et que les phénomènes morbifiques qui en résultent, s'exprimant alors avec plus d'intensité, cessent néanmoins de se manifester aussitôt que le paroxysme est fini, et que le système vivant n'est plus dans le même état d'excitation. Cette remarque, généralement trop négligée par les médecins, me paroît propre à faire éviter une multitude d'erreurs dans le choix et l'application des procédés curatifs.

XXXIII. Il est une vérité annoncée par Sénac, et qui résulte nécessairement ici de la contemplation des fièvres pernicieuses intermittentes; c'est que, dans les maladies aiguës, le trouble extrême des fonctions organiques, les douleurs qui se manifestent dans tel ou tel viscère de l'économie, n'annoncent pas toujours une inflammation des parties qui en sont le siège; car dans les fièvres larvées ou intermittentes pernicieuses, les malades

paroissent tantôt furieux et frénétiques, tantôt ils éprouvent tous les accidens de la péripneumonie ou de la pleurésie; tantôt l'action de l'estomac et des intestins est entièrement bouleversée, etc. En un mot, le péril paroît souvent aussi grand que dans une forte inflammation, dans une plaie considérable, ou dans une atteinte grave portée au principe de la vie; et cependant tous ces symptômes qui nous semblent si redoutables, disparaissent d'ordinaire dans un très-court espace de temps; ces effets doivent être soigneusement observés dans la pratique de la médecine, afin d'éviter les plus funestes erreurs. (1)

XXXIV. Une autre vérité non moins importante, c'est que les intermittentes pernicieuses participent constamment du caractère des autres maladies régnantes. C'est ainsi que, selon la remarque de Lautter, les fièvres observées à Luxembourg, en 1759, portoient essentiellement l'empreinte des affections inflammatoires; elles s'accompagnoient d'une chaleur vive et mordicante. La peau et la langue étoient dans un état de sécheresse; le paroxysme, à son déclin, ne présentoit ni sueur, ni moiteur; les malades étoient en proie à une soif inextinguible, à des douleurs pleurétiques très-

(1) *De nat. feb. recond.*, cap. 6.

intenses, au délire; le pouls étoit dur et fort, la respiration pénible; la saignée étoit indiquée, et le sang tiré de la veine se couvroit d'une croûte blanchâtre; les autres moyens anti-phlogistiques n'étoient pas moins convenables. Mais l'année suivante (en 1760), les fièvres pernicieuses intermittentes avoient spécialement le génie de celles putrides ou adynamiques, ce dont il étoit aisé de se convaincre par la grande prostration des forces, les défaillances fréquentes, les oppressions, les anxiétés à la région précordiale, les sueurs qui se manifestoient au début des accès, la froideur des membres, etc. La face étoit livide et énormément changée; le pouls étoit petit, contracté, inégal, etc. La cure de la fièvre s'opéroit par les fortifiants et les cordiaux. (1)

(1) *Hist. medic. bienn. morb. rural., etc.*

CHAPITRE II.

Considérations sur la nature des Fièvres pernicieuses intermittentes.

XXXV. POUR bien approfondir la nature des fièvres pernicieuses, il importe de les considérer successivement sous le rapport de leur type ; sous le rapport des symptômes propres qui les constituent, et dont la théorie doit être éclairée par les connoissances physiologiques modernes ; sous le point de vue du rang qu'elles doivent occuper dans les cadres nosologiques ; de leur mode d'invasion ; de leurs rechutes, etc. Il importe enfin d'apprécier comme il convient les points d'analogie ou de dissemblance qui les rapprochent ou les éloignent des autres fièvres, ainsi que leurs complications réciproques.

ARTICLE PREMIER.

Du type le plus ordinaire des fièvres pernicieuses intermittentes.

XXXVI. Le type intermittent que nous assignons à ces fièvres, est-il véritablement celui qu'elles affectent le plus fréquemment ? Quelques auteurs

sans doute les ont regardées comme étant presque toujours rémittentes. La marche obscure et irrégulière des paroxysmes dans un grand nombre de cas, empêche de déterminer, d'une manière positive, jusqu'à quel point l'assertion de ces auteurs est fondée. On peut assurer pourtant qu'ils sont tombés dans de fréquentes méprises, et que leur doctrine a été trop généralisée : car, ainsi que l'ont observé avec beaucoup de raison Sydenham et Torti, certains effets de la fièvre subsistent souvent, lorsque la fièvre ne subsiste plus. Il n'est pas rare de voir les malades anéantis en quelque sorte par les fatigues qu'ils ont essuyées, rester froids avec un pouls fréquent, petit, irrégulier, etc., sans qu'on doive considérer ces accidens comme une extension de paroxysme.

XXXVII. Une solution complète de ce problème n'apporterait, du reste, aucun changement notable dans les principes qui dirigent le traitement des affections dont il s'agit. Des praticiens instruits ont parfaitement démontré l'analogie qui existe entre les fièvres intermittentes et les rémittentes, et ils ont fait voir que leur différence essentielle ne consiste que dans la plus ou moins grande activité de la cause identique qui les produit. (1)

(1) Consultez le Mémoire du professeur Baumes sur

XXXVIII. L'observation a prouvé que les fièvres intermittentes marquées par des symptômes pernicieux, suivent d'ordinaire le période tierce ; on trouve néanmoins dans les recueils des maîtres de l'art, beaucoup d'exemples qui constatent qu'elles peuvent affecter d'autres types. Bianchi a parlé d'une constitution remarquable par quelques fièvres quartes qui dégénéroient en continues, avec les caractères les plus funestes (1). Horstius cite pareillement l'histoire d'une fièvre semblable chez un individu âgé de cinquante ans, robuste et d'une vie habituellement sédentaire. Le pouls étoit rare, lent et inégal ; il se manifestoit des coliques et des vomissemens, etc. (2). On a vu une intermittente syncopale avec le type quotidien. (3)

l'emploi du quinquina dans les fièvres rémittentes ; et la Dissertation latine d'Aurivill sur les fièvres intermittentes malignes : *Qui ad morborum autem veram sub artis exercitio elucentem affinitatem, magis attenderit, intermittentis præferet nomen, aut remittentis saltem approbato nomine distinctum rejiciet genus.*

(1) *Hist. hepat. pars tert. fol. 751.* Voyez aussi *Foersterus*, l. 4, *observ. xxxix.*

(2) *Observ. medic. singul., lib. 1. de febr. observ. xii.* Voyez encore Torti, *Therap. spec., lib. 3, cap. vi.* Lautter, *Hist. medic. bienn. rural., fol. 155.* Charles Pison, *Select. observ. et consil., etc., fol. 447.*

(3) *Madai. Abhandlung von den Wechselfiebern. §. 157.*

ARTICLE II.

Applications physiologiques à la théorie des symptômes qui caractérisent les fièvres pernicieuses intermittentes.

XXXIX. Les médecins, frappés de l'anomalie et de l'étonnante variété des symptômes dont s'accompagne la fièvre pernicieuse intermittente, ont cherché dans tous les temps à les ramener à des théories physiologiques. C'est ainsi, par exemple, que le célèbre praticien de Modène les rapporte à deux états très-distincts de l'économie vivante, celui de la *colliquation* et celui de la *coagulation*. Le premier état comprend la cholérique ou dysentérique, l'hépatique, la cardialgique, la diaphorétique et la syncopale; le deuxième comprend l'algide et la soporeuse. Grimaud, accommodant ces idées de Torti à une autre hypothèse, a considéré ces mêmes symptômes comme dépendant les uns d'un état dominant de condensation ou de spasme, les autres d'un état d'expansion ou d'atonie. Baldinger, au contraire, abjurant tout esprit de système et s'éclairant des découvertes modernes, avoit envisagé les symptômes par lesquels s'exprime la malignité dans les fièvres, comme des lésions plus ou moins profondes des principales facultés de la

force vitale (1). Nous marcherons sur les traces de cet auteur, et étendant ses idées, nous appliquerons sa méthode à l'étude des phénomènes dont se composent les pernicieuses intermittentes.

XL. Adoptant pour cet objet les divisions physiologiques établies par le professeur Chaussier, nous considérerons les spasmes, les convulsions, les soubresauts, les tremblemens, le hoquet, le pouls fréquent, tendu ou contracté, mou ou développé, la respiration précipitée ou rare et stertoreuse, l'occlusion des paupières, le coucher en supination, les taches noires, les gangrènes, etc.; la paralysie des membres, et surtout des sphincters, comme le produit d'une augmentation ou d'une diminution excessive des principaux modes de la motilité; les insomnies, le délire, la stupeur de l'âme, l'affoiblissement de la mémoire, les défaillances, les douleurs cardialgiques, l'oblitération de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, etc., comme des atteintes graves portées à la sensibilité. Enfin, les altérations diverses de la caloricité animale, se montrent évidemment par ce froid glacial qui caractérise l'algide pernicieuse, par cette ardeur brûlante de l'estomac, ainsi que par cette chaleur âcre et mordicante qui s'observe dans d'autres variétés

(1) *Opuscula medica.*

de la pernicieuse intermittente. Pour mieux se convaincre de la possibilité et des avantages de cette application de la physiologie à la contemplation des maladies (que je me contente d'indiquer), qu'on examine ce qui se passe dans les fièvres syncopales. Ici les phénomènes de la motilité, de la sensibilité et de la caloricité, semblent se suspendre à la fois. La chute de la tonicité se reconnoît à l'état souple et flasque de la peau ; l'altération de la myotilité à la flexibilité des articulations, à l'interruption spontanée et générale du mouvement de tous les membres, etc. En troisième lieu, la faculté de percevoir les objets est nulle et comme ensevelie sous une multitude de résistances. Enfin, la surface extérieure du corps se couvrant d'une sueur visqueuse, se refroidit plus ou moins (1), etc. C'est ainsi que la méthode analytique apprend à distinguer les altérations de la puissance motrice des altérations de la puissance sensible, et qu'il

(1) *Syncope affici dicuntur, qui variis ex causis, tum externis tum internis subito concidunt; cum virium jacturâ summâ pulsûs et respirationis, si non omnimodo suppressione, notabili tamen obscuratione et imminutione, sensus item et motus interceptione, sudoris etiam frigidi hinc inde in corporis ambitu eruptione, adeoque actionum omnium, animalium, vitalium et naturalium læsione manifestâ. Jo. lud. Apini. Dissert. medic. inaug. de Syncope.*

suffit pour cela de jeter un coup d'œil sur la série des divers phénomènes qui se manifestent.

XLI. Pour peu qu'on médite sur les autres variétés de la fièvre pernicieuse intermittente, on verra que leurs symptômes prédominans tiennent également à une lésion plus ou moins profonde des systèmes moteur et sensitif. Les déjections fréquentes de diverse nature qui s'observent surtout dans la cholérique et l'hépatique, résultent manifestement des spasmes et des mouvemens convulsifs qui ont lieu dans une partie ou même dans tout le trajet du canal alimentaire. Rien ne prouve mieux que l'irritabilité est essentiellement atteinte, que cette action irrégulière et désordonnée de l'organe de la digestion. Quelquefois, et surtout à l'heure de la mort, il s'établit des paralysies locales qui occasionnent un relâchement général dans tous les points de ce système ou dans les sphincters. Les glandes, affoiblies ou troublées, arrêtent leurs sécrétions; la partie nutritive des alimens n'étant plus pompée par les vaisseaux lactés, passe avec ce qui est impropre à la nutrition, et ce mélange exhale une odeur infecte, qui est constamment de mauvais augure.

XLII. Si nous portons maintenant notre attention sur la fièvre intermittente diaphorétique, où les malades sont épuisés par des sueurs excessives,

qui se prolongent durant tout le paroxysme , au point de produire une sorte de dévoiement de l'organe de la peau ; si on examine , dis-je , soigneusement cette affection , il n'est pas difficile de se convaincre qu'un pareil désordre provient de l'état d'atonie universelle où tombe le système cutané. Ceux qui prétendent que l'action des vaisseaux exhalans augmente au contraire dans la circonstance que nous indiquons , me paroissent être dans une erreur que démontre aisément l'observation des autres maladies. En effet , les sueurs qui terminent les accès des fièvres intermittentes ordinaires , celles qui suivent les attaques des convulsions de l'hystérie , etc. , ne surviennent jamais que lorsque le combat de la réaction vitale contre la cause débilitante est , pour ainsi dire , terminé , et dans le temps où le malade se trouve le plus affoibli. Ne sait-on pas d'ailleurs que cette excrétion est constamment le résultat d'une impression sédative sur le système vivant ? La souveraine efficacité du quinquina , qui fait cesser ces sueurs énervantes , ne vient-elle pas en outre à l'appui de ce que nous avançons ?

XLIII. Il est inutile d'étendre plus loin cette application des notions acquises sur la physiologie du corps humain à la théorie des fièvres pernicieuses intermittentes. Ceux qui savent observer

la nature, feront aisément cette application aux cas divers qu'ils pourront rencontrer dans l'exercice de l'art, et se convaincront que c'est par elle seule qu'on peut parvenir à débrouiller l'obscurité de tant de phénomènes pathologiques.

XLIV. Cette altération spéciale de l'irritabilité et de la sensibilité dans les fièvres pernicieuses intermittentes, a été très-bien aperçue par le docteur Fodéré, comme on peut le voir dans son intéressant travail sur le climat et les maladies du Mantouan. Ce praticien remarque que ces deux facultés se détruisent surtout avec une rapidité aussi funeste qu'étonnante. « On voit, dit-il, ces guer-
» riers naguère si terribles, étendus sur leurs gra-
» bats, les bras et les jambes pendans; et souvent,
» s'ils veulent se lever pour quelque besoin, ils
» tombent à terre sans connoissance. Dans le mois
» de prairial, le feu avoit pris à la cheminée de
» l'hôpital, et sembloit menacer une salle dans
» laquelle il y avoit un de ces malades qui com-
» mençoit à mieux aller; la frayeur détruisit en
» un instant le peu d'irritabilité qui lui restoit; il
» voulut se lever pour fuir, mais dès qu'il eut pris
» la position verticale, il mourut subitement. » Cette lésion de l'irritabilité et de la sensibilité est même si profonde, qu'elle subsiste quelque temps encore après que les paroxysmes de la fièvre ont disparu. Le sens du goût et celui de l'ouïe ne se

réparent qu'avec lenteur chez les convalescens ; la vue reste foible et languissante ; la pupille se dilate et ne se contracte qu'avec difficulté, etc. Chez quelques autres individus, on voit que le système musculaire et locomoteur n'est pas moins essentiellement atteint que le système nerveux par les furoncles et autres éruptions cutanées qui se manifestent. (1)

XLV. On connoît la distinction de deux vies dans les corps animés, adoptée par certains physiologistes, distinction aussi ingénieuse que fondée (2). L'une n'exerce en eux que des fonctions purement intérieures ; les fonctions de l'autre sont extérieures, et lient l'organisation de l'animal à tout ce qui l'environne et est relatif à ses besoins. Étendant nos vues d'après cette considération, ne pourrions-nous pas distinguer les variétés de la fièvre pernicieuse intermittente, d'après le siège qu'elles occupent, en deux ordres parfaitement séparés ? Nous rangerions dans le premier ordre la cholérique, l'hépatique, la cardialgique, l'algide, la diaphorétique, la pleurétique, la rhumatique, la néphrétique, la céphalalgique, l'aphonique, la dyspnéique, la

(1) Mémoires de Médecine-Pratique, an VIII.

(2) Voyez les *Recherches sur la vie et la mort*, par Xavier Bichat, et les *Nouveaux Éléments de Physiologie*, par Anthelme Richerand. La première idée de la distinction des deux vies est due à Buffon et à Grimaud.

catharrhale, l'ictérique et l'hydrophobique, qui frappent d'une manière spéciale les fonctions dont se compose la vie intérieure ou essentiellement organisante de l'individu, telles que la digestion, les sécrétions, les excréctions, etc.; et dans le deuxième ordre, nous placerions la syncopale, la délirante, la léthargique, la convulsive et l'épileptique, dans lesquelles, par un effet d'une lésion plus prononcée des nerfs et du cerveau, la vie extérieure et intelligente, ou plutôt la vie de relation, est en quelque sorte plus directement menacée. Il y a néanmoins une connexion si intime entre tous les phénomènes de l'économie vivante, que les désordres qui se manifestent dans chacun d'eux, coïncident le plus souvent pour donner naissance à la même affection; et si la pensée isole ces phénomènes par l'analyse, c'est pour mieux saisir leur caractère et l'espèce de trouble qu'ils occasionnent dans l'exercice des fonctions.

XLVI. Les médecins qui ont fait avec le plus de succès l'application de nos connoissances physiologiques à la théorie des affections vulgairement appelées *malignes*, ont cherché surtout à déterminer le degré d'affoiblissement et le mode d'altération que peuvent éprouver les forces radicales du système vivant; ils ont distingué les cas où ces forces sont en quelque sorte détruites ou anéanties,

de ceux où elles ne sont qu'oppressées et embarrassées par un obstacle qui s'oppose à leur développement et à leur action. Le professeur Barthez a principalement indiqué cette distinction de forces *résoutes* et de forces *opprimées*, dans ses *Nouveaux Éléments de la Science de l'Homme*, et a fait voir que les auteurs ne l'avoient point marquée jusqu'à ce jour d'une manière satisfaisante. Mais personne peut-être n'a plus étendu cette idée que M. Richerand, dans le compte qu'il a rendu de la première édition de mon ouvrage (1); et je crois nécessaire de consigner ici les développemens utiles qu'il lui a donnés, en l'appliquant à l'ordre des fièvres. Après avoir exprimé son vœu sur la nécessité qu'il y a de caractériser, par des termes spécifiques, les différens états de la dynamique humaine, considérée dans toutes nos affections morbifiques, il pense que notre langue étant moins riche et moins fertile en nuances que les langues anciennes, c'est à ces dernières qu'il faudroit emprunter ces dénominations caractéristiques, si avantageuses, comme il le dit lui-même, dans une science qui a pour but de représenter les dérangemens de notre économie, sous les couleurs les plus vraies et dans les termes les plus voisins de la nature. Le lecteur verra sans

(1) Magasin encyclopédique des Sciences, cinquième année, tome v.

doute avec intérêt le premier cadre tracé avec tant de précision par ce physiologiste :

In febre inflammatoriâ seu synocho simplici (angeio-tenicâ)..... *Oppressio virium.*

In febre biliosâ seu ardente (meningo-gastricâ)..... *Fractura virium.*

In febre pituitosâ seu morbo mucoso (adeno-meningeâ).. *Languor virium.*

In febre putridâ (adina-micâ)..... *Prostratio virium.*

In febre pestilentiali (adeno-nervosâ)..... *Syderatio virium.*

In febribus malignis seu (atactis)..... *Ataxia virium.*

1°. Il est aisé de voir que le premier terme appliqué à la fièvre inflammatoire, rend avec la plus grande vérité cet état particulier de l'économie animale, où elle est pour ainsi dire empêchée par l'excès de ses forces, et forcée de succomber sous sa propre puissance. L'auteur pense judicieusement qu'on pourroit s'en servir, en le modifiant toutefois d'une manière convenable, pour exprimer quelques genres de phlémasies, et aux hémorrhagies dites *actives* par les pathologistes.

2°. Il n'est personne qui n'ait observé ce sentiment de contusion universelle et de brisement des

membres , dans la fièvre vulgairement appelée *bilieuse* , affection si bien décrite par Stoll et par beaucoup d'autres célèbres praticiens ; et le mot employé plus haut exprime parfaitement l'état des forces dans cette circonstance.

3°. La langueur des forces caractérise manifestement la fièvre pituiteuse et toutes les maladies lymphatiques.

4°. Mais dans les fièvres putrides ou adynamiques , le système des forces est plutôt dans un état réel de prostration , expression très-usitée parmi les médecins , et dont on fait souvent de fausses applications. Cet état de prostration se reconnoît aisément à la presque cessation , ou à la lésion notable de toutes les fonctions confiées aux organes musculaires , comme le mouvement volontaire , la respiration , la circulation , la digestion , l'excrétion des urines , etc.

5°. On emploie le mot *syderatio* , lorsqu'on veut exprimer l'état des forces dans le typhus et la peste d'Orient , parce que les malades sont en quelque sorte foudroyés par cette terrible maladie.

6°. Enfin , il est un ordre de fièvres où on n'observe que des phénomènes irréguliers. Tout s'y succède d'une manière anormale , et il n'y a absolument aucun accord dans les efforts que fait la

nature pour résister à la destruction ; ce qui est très-bien rendu par le mot *ataxia*, déjà mis en usage par quelques auteurs, et dont on pourroit également se servir pour exprimer les symptômes propres à un grand nombre de maladies nerveuses.

XLVII. Plusieurs médecins modernes ont utilement agrandi ces différens points de vue. C'est ainsi qu'indépendamment de toutes ces diverses considérations déjà énoncées, on a parfaitement distingué, par exemple, l'état de *stupéfaction* qu'introduit dans le système des forces vitales, l'impression délétère des poisons et des miasmes, l'état de *déviaton* de ces mêmes forces, qui provient de leur inégale répartition, et qui s'observe si souvent dans le cours des fièvres dont nous traitons, et surtout l'état de *consomption* des forces, état déplorable, où l'énergie des organes diminue et s'éteint graduellement, sans jamais se réparer. Mes élèves et moi avons vu, à l'hôpital Saint-Louis, un homme qui, un mois après la suppression d'une fièvre pernicieuse intermittente par le quinquina, subit une effrayante émaciation qui l'entraîna vers la mort par des degrés lents et successifs. Il expira sans délire, et se croyant dans une position très-rassurante. Cet état s'observe encore dans le cours des fièvres hectiques, soit symptomatiques, soit essentielles.

ARTICLE III.

*De la dénomination attribuée aux Fièvres
pernicieuses intermittentes.*

XLVIII. En nous occupant ainsi de la nature des intermittentes, qui marchent avec un appareil de symptômes graves et rapidement funestes, nous remarquerons que la dénomination de *malignes*, qui leur est communément attribuée par les pathologistes, est trop vague et trop indéterminée, parce qu'elle est journellement appliquée à des maladies d'un genre différent (1). La dénomination d'*ataxiques*, que Selle avoit déjà imposée aux fièvres continues de ce caractère, et que le professeur Pinel a adoptée pour celles dont il est ici question, nous avoit paru d'abord plus propre à exprimer la confusion, le trouble et le génie opposé des symp-

(1) *Iis nempè non vivimus temporibus, quibus maligni nomine incognitos quosque morbos periculosos et lethales non bene exploratos, includere solebant medici vulgares, ut titulo saltem morbi experientiam præ se ferrent.* (Sam. Aurivillii *Dissert. de febr. intermitt. malign.*) *Esta voz Malignidad, refugio de ignorantes que ha producido muchos prejuicios, etc.,* (Amar, *Instrucción curativa de las calanturas, etc.*) *Abusus accusandi fictam quamdam in morbis malignitatem, est simiola quæ frequenter rudioribus medicis imponit.* (Baglivi, *Praxis medica.*)

tômes dont elles se composent. En effet, si la fièvre est éminemment nerveuse, n'y observe-t-on pas quelquefois, à côté du calme apparent et insidieux du système vasculaire, une sorte de précipitation dans les phénomènes de la motilité, qui se manifeste par des convulsions fortes, fréquentes et soutenues? N'y voit-on pas une sécrétion désordonnée de la bile, à côté d'une sécrétion bien ordonnée des urines? un assoupissement profond remplacé par des insomnies opiniâtres, la sécheresse de la langue avec le manque de soif, une chaleur âcre et brûlante dans certaines parties, un froid glacial dans d'autres, un délire gai au moment où la vie est le plus en péril, le passage brusque de l'indifférence du malade sur son état, à des pressentimens sinistres qui ne cessent de l'épouvanter? Mais ce que personne ne me paroît avoir assez examiné, c'est l'opposition des symptômes avec des remèdes qui semblent devoir les combattre, tels que le danger de la saignée au milieu de l'irritation la plus inflammatoire du système (Home); celui des émétiques et des purgatifs, dans des vomissemens d'une matière dépravée ou dans des flux analogues (Werlhof); le danger des acides au milieu de la plus effrayante septicité (Ludwig). Quelles fautes ne commet point ici le médecin vulgaire trop habitué à interpréter la nature d'après les phénomènes les plus apparens?

XLIX. Toutefois de semblables considérations prouvent tout au plus que les phénomènes de l'ataxie prédominent le plus souvent dans la marche des affections dont il s'agit ; mais comme des phénomènes d'un autre ordre s'y manifestent pareillement d'une manière assez constante , la dénomination générale de *fièvres pernicieuses* , déjà adoptée par le plus grand nombre des praticiens , paroît être la seule qu'il convient de conserver dans l'état actuel des progrès de nos connoissances à ce sujet. M. Fizeau , qui a commencé sa carrière médicale par des succès , et qui déjà avoit publié des recherches intéressantes , pour servir à l'histoire des fièvres intermittentes , a très-judicieusement démontré qu'il existe des ataxiques de ce type , qui ne sont point essentiellement pernicieuses ; que ces fièvres ataxiques ont une marche et des caractères qui les font toujours distinguer , et qui n'appartiennent qu'à elles-mêmes ; qu'enfin les fièvres pernicieuses , ainsi que nous venons de le remarquer , ne sont pas seulement signalées par des symptômes ataxiques , qu'elles peuvent l'être encore à un degré analogue , par des symptômes gastriques et adynamiques.

L. Cette opinion , émise dans un mémoire où brille la méthode la plus philosophique et la plus lumineuse , est appuyée par des observations très-

concluantes. Nous nous sommes déterminés à l'admettre avec d'autant plus d'empressement, que ma pratique particulière dans l'hôpital Saint-Louis, m'a fourni l'occasion de recueillir plusieurs faits qui la confirment. Je me borne à citer le plus récent. Le nommé Thiébault, âgé de quarante-deux ans, d'une forte constitution, ayant travaillé quelque temps au canal de l'Ourcq, fut saisi d'une fièvre intermittente, qui, d'après son rapport, paroissoit avoir été une double-tierce bénigne. Cette fièvre, qui avoit duré plusieurs semaines, s'étoit ensuite terminée spontanément. Quinze jours après, nouvelle invasion des paroxysmes. Le malade alla chercher des secours à l'hôpital de la Charité, où il fut traité pendant dix jours avec des infusions amères. Durant ce temps, une éruption psorique s'étant manifestée sur son corps, il fut transporté à l'hôpital Saint-Louis. Il y entra le 24 vendémiaire an XII. Il avoit alors le teint pâle et terreux, l'air abattu, la langue muqueuse, de l'anorexie, le dévoiement et une toux très-incommode, avec difficulté de respirer. Les accès de fièvre qu'il éprouva, offrirent dès lors les symptômes les plus manifestes d'ataxie : ils suivoient le type de double-tierce. Leur invasion avoit lieu entre onze heures et minuit, par des frissons violens et irréguliers, qui se faisoient sentir principalement entre les épaules : le pouls alors devenoit extrêmement petit et concentré, la respi-

ration laborieuse. A ces frissons succédoit une chaleur intense, sèche et âcre au toucher, en même temps, sueur à la face, respiration rare et stertoreuse, soif ardente, pouls irrégulier, tantôt plein et fort, tantôt petit et serré, toujours très-fréquent; prostration des forces, convulsions, soubresauts des tendons, émission involontaire des urines, léger assoupissement, insensibilité du malade sur sa position, toujours délire avec agitation, vertiges, hoquet, etc. Cet état se terminoit au bout de quatre heures. Dans l'intervalle des accès, apyrexie complète, foiblesse du pouls, abattement général, toux forte et fréquente. Avoir décrit ce paroxysme, c'est avoir fait connoître tous ceux qui eurent lieu pendant deux mois consécutifs, sans subir aucune variation. Au bout de ce temps néanmoins, par l'effet des doses multipliées de quinquina, il fut entièrement délivré de sa fièvre; mais sa figure conserva un mauvais aspect, le pouls resta foible, et il fut long-temps sans force. Au surplus, les observations pareilles à celle-ci sont assez fréquentes, et j'aurois pu en alléguer plusieurs autres, si l'auteur que j'ai cité d'abord n'avoit déjà établi l'opinion énoncée dans ce paragraphe, par les preuves les plus complètes et les plus décisives.

ARTICLE IV.

Caractères principaux qui distinguent les pernicieuses intermittentes des autres Fièvres.

LI. Par l'histoire détaillée que nous avons déjà donnée des fièvres pernicieuses intermittentes, on voit qu'un de leurs principaux caractères est de marcher avec un appareil de symptômes inaccoutumés et rapidement funestes. On voit en outre que le danger toujours extrême de ces affections consiste dans un symptôme dont l'imminence est constamment remarquable au milieu de tant d'autres qui luttent ensemble contre la vie, et frappent à la fois les différens systèmes de l'organisation animale. Mais ce n'est pas seulement par ces deux caractères qu'elles diffèrent des fièvres intermittentes ordinaires; elles s'en distinguent encore par la dissonance et le peu de rapport des symptômes entre eux. C'est surtout une remarque très-judicieuse de Mercatus, que les trois périodes du paroxysme s'y exécutent d'une manière moins uniforme et moins régulière. Les symptômes s'y groupent au lieu de s'y succéder. La fièvre trompe les regards de l'observateur, en déclinant dans le temps où devoit se faire son augmentation; quelquefois aussi elle prend un nouvel accroissement lorsqu'elle est parvenue à son état, et qu'on s'at-

tend à la voir s'amortir; souvent enfin elle tombe subitement, pour se relever ensuite avec la même promptitude.

LII. Les fièvres, soit pernicieuses, soit uniquement ataxiques intermittentes, ayant des rapports avec les fièvres adynamiques, et les phénomènes appartenant à chacune d'elles, se compliquant dans le plus grand nombre de cas, il est avantageux de les séparer les uns des autres par le secours de la méthode analytique, à l'imitation de la savante école de Gottingue, afin d'en conserver une idée claire et distincte. C'est ainsi qu'il faut regarder les diarrhées fétides, les hémorragies diverses sans soulagement, la flaccidité des membres et la perte du mouvement, les meurtrissures, les gangrènes qui surviennent aux extrémités, etc., comme appartenant spécialement à l'ordre des fièvres adynamiques, tandis que les agitations, la stupeur, la subversion des facultés mentales, les délires, la perte de la mémoire, le trouble des sens, la voix aiguë et rauque, les gesticulations des mains, les spasmes, les convulsions, etc., sont des signes propres et caractéristiques des fièvres ataxiques (1).

(1) Lisez, pour les signes qui constituent la véritable malignité dans les fièvres, la Thèse contenue dans la collection de Stahl, qui a pour titre : *Disput. medic. patholog. pract. de malignitatis præcipuæ febrilis indole, etc.*

Les solutions même de ces deux sortes d'affections sont essentiellement différentes, ainsi que le remarquent judicieusement Baldinger (*Opuscula medica*), et le professeur Pinel (*Nosographie philosophique*). On sait, en effet, qu'au lieu des crises qui jugent ordinairement les fièvres adynamiques, les ataxiques proprement dites sont quelquefois terminées par des métastases vers les articulations et les glandes, par des lésions plus ou moins durables de la sensibilité dans le système cutané, par l'affoiblissement de la vue, du goût, de l'odorat, de l'ouïe, etc. On peut donc établir, comme une proposition générale, que les fièvres adynamiques portent plus particulièrement le désordre dans les phénomènes qui tiennent à la motilité, et que les fièvres ataxiques tendent spécialement à altérer la sensibilité physique.

LIII. Hippocrate avoit surtout approfondi les signes distinctifs de ces dernières fièvres, et il seroit difficile de citer un seul de ces signes qui ait échappé à son attention; les symptômes les plus légers en apparence, et presque toujours méconnus par le médecin peu exercé, tels que l'abattement extrême, les terreurs imaginaires, la physionomie taciturne, l'air méditatif, la tranquillité du malade en contraste avec ses habitudes ordinaires, etc., ont été souvent pour lui le sujet des pronostics les plus fâcheux.

LIV. Une ligne de démarcation non moins sensible, me paroît exister entre les pernicieuses intermittentes et les ataxiques continues, malgré la difficulté qu'on éprouve à la déterminer. Quoique ces deux genres de fièvres ne paroissent différer, au premier aspect, que par leurs effets périodiques ou permanens; quoiqu'elles se manifestent par les mêmes symptômes et se chargent des mêmes épiphénomènes, il semble cependant qu'il n'y ait point une discordance aussi frappante dans les élémens dont se composent les pernicieuses à type intermittent ou rémittent. Les mouvemens de la nature y sont plus liés dans le temps des accès et des reprises, et tendent d'une manière plus directe à vaincre la cause formelle de la maladie. Quelque formidable que soit l'appareil de leurs symptômes, on n'y observe pas en général ce pouls naturel qui caractérise particulièrement certaines ataxiques continues, et regardé avec raison comme un des accidens les plus dangereux, en ce qu'il annonce, suivant la pensée d'un praticien célèbre de nos jours, « une séparation si parfaite des forces du principe » de la vie dans les organes qui sont principalement » affectés, que l'irritation ne s'étend point au système artériel. » (1)

(1) Nouveaux Élémens de la Science de l'homme.

LIV. Il est d'ailleurs hors de doute que l'économie animale est moins radicalement énercée dans les pernicieuses, et même dans les ataxiques intermittentes. C'est ce que prouve l'efficacité du quinquina dans leur traitement, tandis que son emploi est si souvent incertain contre les ataxiques continues. Ce n'est donc pas sans motif qu'on a présenté ces dernières fièvres comme un triste témoignage de l'insuffisance de notre art, tandis que celles dont nous traitons dans cet ouvrage, démontrent évidemment sa puissance et ses ressources.

LVI. Le célèbre Casimir Medicus a cherché à déterminer les affinités qui rattachent les maladies périodiques aux fièvres d'accès en général, et particulièrement aux pernicieuses intermittentes (1). Il fonde ces affinités, qui sont réellement existantes, 1°. sur l'identité des symptômes qui constituent ces maladies périodiques, et qui peuvent signaler en même temps les pernicieuses intermittentes; 2°. sur ce que des symptômes périodiques succèdent quelquefois à des fièvres d'accès, et que des fièvres d'accès peuvent succéder à des symptômes périodiques; 3°. sur les intervalles ou les intermittences que présentent ces deux ordres de maladies; 4°. sur les urines que rendent les malades

(1) *Geschichte periodische krankheiten*, 1764.

dans les deux cas, et qui déposent un sédiment briqueté ; 5°. enfin sur ce que le même genre de traitement leur convient. Mais il nous semble que Casimir Medicus n'a point suffisamment approfondi ce point important de pathologie. En effet, il n'a point marqué la différence précise qui sépare les affections périodiques, de celles qu'on est convenu de nommer fièvres intermittentes ou fièvres d'accès. Nous allons en conséquence exposer notre opinion à ce sujet ; et pour qu'elle soit mieux entendue, nous la ferons précéder de quelques-unes de nos vues théoriques sur la nature des fièvres, parce qu'elles jettent du jour sur la question qui nous occupe.

LVII. Il nous paroît d'abord de toute évidence que toutes les affections de l'économie vivante, désignées sous le nom de *fièvres essentielles* par les pathologistes, ont essentiellement leur siège dans le système nerveux ; et si nous avons à les ranger dans un cadre nosologique, nous les fixerions dans la classe des névroses. Cependant, par une suite nécessaire de la connexion sympathique qui unit si étroitement le système nerveux au système vasculaire, celui-ci est presque toujours secondairement affecté, ce qui introduit un désordre quelconque dans la circulation ; il peut arriver néanmoins que par une cause que nous ne cher-

cherons point à déterminer, les vaisseaux ne participent point à la lésion primitive des nerfs ; il s'établit alors une névrose périodique simple, qui prend divers noms ou suscite divers phénomènes, suivant les divers sièges qu'elle peut occuper. C'est ainsi qu'on observe des céphalalgies, des pleurodynies, des coliques, et mille autres douleurs ou accidens qui se manifestent régulièrement à des époques fixes, sans qu'il survienne aucune irrégularité dans les fonctions du système vasculaire.

LVIII. Mais ces affections particulières qui ne s'étendent pas jusqu'aux vaisseaux, n'en sont pas moins des mouvemens de la nature, dont le but est de réparer quelque désordre caché dans les lois organiques du corps humain ; et si ce but n'est atteint qu'avec une lenteur extrême, si ces affections sont le plus communément chroniques, c'est précisément parce que le système vasculaire auquel les crises et les solutions des maladies paroissent particulièrement attribuées, n'y prend aucune part, et que la résistance vitale se trouve trop foible ; ce qui le prouve, c'est que, dans le cas contraire, la même affection, aidée de la réaction vasculaire, marche rapidement à son heureuse ou fâcheuse solution.

LIX. En me résumant donc, et cherchant à établir une conclusion d'après tout ce que j'ai dit dans

cet article, je pense que la plus grande affinité existe entre les maladies périodiques nerveuses et les fièvres pernicieuses intermittentes; que celles-ci n'en diffèrent que par leur marche plus rapide et par le péril plus imminent qu'elles entraînent. Je pense en second lieu, que la rapidité de leur marche tient aux deux lésions réunies du système nerveux et du système vasculaire; et ce qui constitue principalement leur danger, c'est qu'elles contiennent elles seules tous les élémens et tous les symptômes corrélatifs aux autres névroses; ainsi, en les décomposant par l'analyse, on y voit le délire qui appartient aux vésanies, les soubresauts et les spasmes qui caractérisent les maladies convulsives, le carus et l'assoupissement qui les rapprochent des apoplexies, etc. J'aurois beaucoup d'autres vues à ajouter à celles que j'expose ici; mais une plus longue digression m'entraîneroit hors de mon sujet.

ARTICLE V.

Complication des fièvres pernicieuses intermittentes.

LX. Après avoir établi les différences qui existent entre les pernicieuses intermittentes et les intermittentes ordinaires, entre les adynamiques et les ataxiques, entre celles de ce dernier ordre qui sont continues, et celles qui suivent le type intermittent,

entre ces mêmes fièvres et les maladies nerveuses périodiques sans pyrexie, nous devons fixer nos regards sur les complications variées qu'elles peuvent manifestement subir ; car on a vu, d'après les tableaux que nous en avons donnés en commençant ce Traité, qu'elles ne se montrent pas toujours dans un état de simplicité à l'observation du médecin. Il n'arrive que trop souvent, dans les épidémies par exemple, qu'indépendamment des symptômes qui constituent leur propre essence, elles se chargent de quelques symptômes secondaires qui appartiennent au genre des rémittentes putrides. C'est ce qu'a prouvé l'histoire des fièvres rapportée par Lancisi, Richa, etc.

Mais pour nous éclairer complètement sur la nature de ces maladies, il importe d'avertir que les phénomènes adynamiques prédominent quelquefois sur les phénomènes ataxiques. On s'en convaincra aisément, si on se rappelle l'épidémie qui régna à Copenhague en 1652, et dont Thomas Bartholin nous a conservé la relation. (1)

On y remarquoit sans doute un délire continu et des céphalalgies intolérables ; mais il se manifestoit à un plus haut degré encore des taches pétéchiales qui paroissoient à chaque accès et

(1) *Hist. anat. rar. cent. 11. Hist. LVI.*

s'effaçoient à chaque intermission; des diarrhées excessivement déliées, des abcès, etc. La dissection des cadavres montrait en outre l'estomac et le duodénum affectés de gangrène. Une fièvre entièrement semblable sévissoit à Leyde en 1669. Les désordres nerveux étoient peu remarquables à chaque paroxysme; mais Sylvius de Leboë, qui la raconte, fait mention de taches livides sur la peau, d'hémorrhagies qui avoient lieu par le nez et les veines hémorrhoidales, de l'urine qui étoit fétide, etc. (1)

Il est évident que l'histoire de ces dernières fièvres rentre spécialement dans la théorie des adynamiques à type intermittent ou rémittent. Beaucoup d'auteurs néanmoins semblent les confondre avec les fièvres dont nous traitons. Selle, lui-même, n'a-t-il pas placé les pernicieuses intermittentes dans le genre des intermittentes bilieuses putrides? (2)

LXI. Il est un autre cas de complication de ces fièvres, sur lequel je pense qu'il n'est pas moins utile d'attirer l'attention; c'est celui où une intermittente ordinaire se combine avec la fièvre vulgairement dite *putride-maligne*. C'est ce cas qu'a

(1) *Prax. med. appen. Tract. x.*

(2) *Rudimenta pyretologiæ, fol. 350.*

voulu relater Ruecker, dans une thèse qu'il a soutenue à ce sujet. (1)

Un jeune homme âgé de près de vingt ans, d'un tempérament bilieux et mélancolique, éprouvoit les accès d'une tierce très-régulière dans son invasion et dans son cours. Il est probable que cette maladie auroit eu sa terminaison ordinaire, sans un accident malheureux qui vint accabler le malade au moment où il étoit encore dans le chaud de la fièvre, et que la sueur alloit commencer. Ce dernier symptôme se continua la nuit et le jour suivant, qui étoit celui de l'intermission. Dès lors le malade se plaignit d'un spasme dans toute la périphérie du corps, d'anxiétés à la région précordiale, d'une prostration considérable des forces: le délire survint; l'appétit, qui s'étoit assez bien conservé pendant que la tierce étoit seule, s'affoiblit entièrement. Pouls débile, perte de la mémoire, céphalalgie, selles fétides, cardialgies, respiration luctueuse. Le cou se couvrit d'efflorescences et de petites taches d'un rouge obscur. On appliqua les vésicatoires; on administra les acides et les toniques; les signes de coction parurent le onzième jour par l'inspection des urines. La solution de la

(1) *De feb. intermitt. complicatione cum malignâ casu quodam illustratâ.* Christianus-Zacharias Ruecker.

maladie eut lieu le quatorzième. La fièvre tierce, qui avoit parcouru régulièrement ses périodes, cessa aussi à la même époque ; mais cette dernière ayant reparu quelques jours après, sans complication, parce que le convalescent fit un écart de régime, elle céda de nouveau à des remèdes appropriés.

Cette circonstance, alléguée par Ruecker, n'est pas aussi rare qu'on le croit. La fièvre de Hongrie, décrite par Sennert, n'est, suivant la remarque de Pringle, qu'une combinaison de la fièvre automnale avec la fièvre d'hôpital (1). Est-il étonnant que ce phénomène se remarque dans un pays très-marécageux, où des nuits excessivement froides succèdent à des jours excessivement chauds ? Ces mélanges d'affections morbifiques doivent aussi s'observer dans nos hospices et dans nos hôpitaux, où des individus, déjà atteints de la fièvre intermittente, viennent vivre dans une autre sphère de contagion non moins active.

On voit d'après cela combien la méthode de l'analyse est avantageuse pour débrouiller le chaos où nos livres de pyrétologie jettent à la fois les maîtres et les disciples. Stoll, dont le nom célèbre

(1) *On the diseases of the Army,*

s'offre naturellement à moi quand il s'agit de désigner ceux qui ont le plus perfectionné la doctrine des maladies aiguës; Stoll, dis-je, s'est plaint expressément de cette confusion embarrassante. Il avoit vu que des maladies marquées par le même nom, quoique essentiellement différentes, trompoient souvent le médecin, en se masquant par des symptômes identiques et communs. Il avoit vu enfin qu'en leur appliquant la même méthode curative, le malade ne tarδοit pas à souffrir d'un mauvais système de classification. (1)

ARTICLE VI.

De l'opinion de ceux qui ont attribué un caractère contagieux aux Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXII. Les ravages prompts et étendus de ces fièvres dans les saisons et les climats où elles se développent avec le plus de facilité, ont fait soupçonner à quelques praticiens qu'elles pouvoient être de nature contagieuse. Raymond observe que cette assertion est sans aucune espèce de fonde-

(1) *Methodum enim medendi eamdem sæpenumerò diversissimis febribus, sed eodem vocabulo insignitis quasi semper eidem morbo adaptant. Tunc malam docentis divisionem æger immeritus luit. Ratio medendi, pars XI, cap. 10.*

ment solide ; car les individus qui prennent soin des malades, qui ont avec eux le commerce le plus intime, qui couchent dans le même lit, n'en sont point atteints, s'ils n'ont déjà reçu l'infection extérieure, qui produit seule la maladie. Les femmes même qui en sont attaquées, allaitent leurs enfans sans aucun danger pour eux. Raymond continue de remarquer que ce qui a donné lieu à cette méprise, c'est qu'à Middelbourg, par exemple, et dans toute la Zélande, où ces fièvres sont comme endémiques, les mêmes causes agissent sur un grand nombre d'individus à la fois, n'épargnant ni âge, ni sexe, ni aucune condition de la vie, au point que des familles entières en sont fréquemment attaquées, et peuvent à peine se prêter des secours l'une à l'autre. (1)

(1) *Hoc primo certum est, ut jam monui, morbum non esse contagiosum; nam fœminæ lactantes infantem suum durante morbo toto, si modo lactis copia suppetat, sine noxâ nutriunt, quod communi apud nos praxi confirmatur; neque qui eodem in lecto cum ægrotis commorari coguntur, aut aliud intimum commercium habent, præter curæ incommoda ullum abinde morbum lucrantur.* Jo. Raymond. *Dissert. exhib. descrip. febr. intermitt. autum. quotannis Mittelburgi et in vicinis Zelandiæ Batavæ locis grassantium* 1767.

ARTICLE VII.

Des rechutes des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXIII. C'est un des caractères les plus constans des fièvres pernicieuses intermittentes, d'exposer les individus qu'elles attaquent à des rechutes réitérées, alors même qu'elles sont combattues par les moyens les plus énergiques. C'est à l'expérience à confirmer par des faits plus nombreux l'observation aussi belle qu'importante du célèbre Werlhof, d'après laquelle il conste que ces rechutes ont lieu le plus ordinairement dans les semaines paroxystiques.

ARTICLE VIII.

Des lumières que les ouvertures cadavériques peuvent fournir sur la nature des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXIV. On n'a pu procéder jusqu'à ce jour qu'à un très-petit nombre d'ouvertures cadavériques chez les individus frappés des symptômes propres aux fièvres intermittentes pernicieuses, par deux raisons principales : la première qu'on peut alléguer, est que ces affections, quelque redoutables qu'elles soient, se terminent néanmoins d'une ma-

nière favorable, lorsqu'elles sont régulièrement traitées par un médecin instruit; la seconde, c'est que, quand le malade succombe par l'inexpérience de l'homme de l'art, ce dernier n'est guère porté à s'appliquer à ce genre de recherches. Au surplus, les lumières que l'autopsie pourroit fournir ne seroient guère plus instructives que celles que nous procurent les dissections des sujets morts à la suite des fièvres ataxiques continues. Cet assemblage de phénomènes nerveux, cette réunion étonnante de symptômes divers, opposés et anomaux, qui sévissent avec véhémence tant que la vie subsiste, et qui sont le résultat d'une sorte de fonction pathologique, s'éclipse assez constamment, sans laisser aucune trace physique de son existence: souvent, d'ailleurs, il n'y a aucun rapport direct entre les lésions organiques que l'on rencontre, et les dérangemens morbifiques qui ont eu lieu. Toutefois il a paru, dans quelques circonstances, que ces lésions étoient relatives au symptôme grave, capital et prédominant, qui avoit signalé la fièvre pernicieuse, et constitué son véritable danger. On sait aujourd'hui ce que l'on doit penser des épanchemens trouvés dans le crâne à la suite des fièvres pernicieuses; et M. le docteur Coutanceau a fort bien prouvé que les symptômes nerveux qui coïncident avec ces phénomènes, s'y observent indépendamment de toute lésion anatomique de cette

nature. (Voyez ses observations sur *les Épanchemens dans le crâne pendant le cours des fièvres essentielles.*)

Un homme mourut à l'hôpital Saint-Louis d'une fièvre intermittente pernicieuse soporeuse, infructueusement combattue par le quinquina. Il étoit resté dans un état de somnolence continuelle, un délire tranquille, une foiblesse considérable, une insensibilité extrême de temps à autre : ces phénomènes amenèrent la mort. Nous procédâmes à l'ouverture du cadavre, dont la peau étoit de couleur citronnée, et dont l'aspect annonçoit une infiltration générale. L'ouverture de la tête nous offrit deux onces de sérosité, épanchée entre la dure-mère et l'aracnoïde. Cette sérosité étoit jaunâtre et transparente. Le tissu cellulaire qui unit l'aracnoïde à la pie-mère, étoit gorgé d'un liquide semblable à celui de l'épanchement. Le cerveau étoit sain et de consistance assez ferme. On observoit une légère désorganisation à la partie moyenne, postérieure et inférieure du cervelet, près de l'éminence vermiculaire. Il n'y avoit dans cet endroit aucune altération de couleur ni de densité dans la substance du cervelet, mais simplement une petite excavation d'une ligne de profondeur, et d'un pouce carré de largeur. Les côtes qui formoient l'enceinte de la poitrine étoient minces et fragiles. Dans chaque

cavité des plèvres, il y avoit un demi-setier de sérosité parfaitement semblable à celle du crâne. Le tissu cellulaire du cœur étoit infiltré, particulièrement vers la base et la pointe. Rien de particulier dans les poumons, les bronches et la trachée-artère. Dans l'abdomen, le foie étoit de volume ordinaire, mais d'une couleur noire assez foncée; la vésicule du fiel étoit remplie d'une bile brunâtre, au milieu de laquelle nageoient en grande quantité des molécules de couleur brune, tirant sur le rouge. Ces molécules étoient presque insensibles au tact, et s'écrasoient avec la plus grande facilité. La rate étoit volumineuse, et d'un tissu si semblable au foie, qu'il étoit impossible de distinguer deux lambeaux de ces organes mis à côté l'un de l'autre. Le reste des viscères abdominaux étoit dans l'état sain. Le tissu cellulaire sous-cutané étoit généralement rempli d'un liquide jaunâtre et limpide, de nature identique avec celui déjà indiqué. On voit que la plupart des altérations organiques observées dans le cadavre dont il s'agit, n'ont aucun rapport avec la fièvre essentielle dont le malade a péri. Il n'est pas inutile d'observer que le malade avoit été précédemment sujet à une fièvre intermittente quarte d'un autre caractère, qui avoit duré plus de trois mois, et avoit déterminé cet œdème universel, dont le malade se trouvoit affecté lors de l'invasion de la fièvre pernicieuse qui l'emporta.

CHAPITRE III.

Considérations sur le diagnostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXV. LA connoissance du diagnostic des fièvres pernicieuses intermittentes repose sur un certain nombre de considérations importantes, que nous exposerons dans les articles suivans.

ARTICLE PREMIER.

Du diagnostic considéré d'après le caractère des paroxysmes.

LXVI. On a dit avec raison que les formes très-variées qu'empruntent ces fièvres les rendent généralement très-difficiles à reconnoître, surtout par la tendance qu'elles ont à s'éloigner du type de l'intermittence, pour prendre la forme des continues. Il est rare sans doute qu'on se méprenne, si un paroxysme évident a éclaté avec violence, si les deux qui suivent sont annoncés par le frisson ou par une sorte de *rigor*, si l'urine est tant soit peu briquetée, etc. Mais s'il n'y a aucun de ces signes, et si le médecin ne peut observer la fièvre dès son début, il doit rester dans l'incertitude, et

ne pas se presser de définir la maladie d'après des commencemens qui sont communs à d'autres.

ARTICLE II.

Du diagnostic considéré d'après le caractère des intermissions.

LXVII. Mercatus a prétendu établir le diagnostic de la fièvre pernicieuse, d'après un signe qui paroît très-incertain. Il pense qu'on doit la présumer telle, toutes les fois que les symptômes qui la caractérisent n'abandonnent point entièrement le malade durant le jour de l'intermission; toutes les fois, par exemple, qu'il reste dans les intervalles des traces de délire, de la propension au sommeil, des langueurs, des inquiétudes, de la soif, etc.; mais combien, ainsi que le remarque Lautter, n'est-il pas de fièvres de mauvais caractère, où dans l'intervalle des paroxysmes, il ne se manifeste absolument aucun de ces symptômes! Non-seulement les malades quittent leur lit, mais encore ils se promènent, et vaquent à leurs affaires, comme dans l'état de santé, quoique la mort les surprenne à l'accès suivant. Lautter cite à ce sujet une observation de Werlhof, qui est décisive. Une femme âgée d'environ cinquante ans, avoit été dans la rue au-devant de ce dernier, pour lui demander s'il ne viendrait pas la voir le jour d'après, parce qu'elle

attendoit son troisième paroxysme ; le paroxysme eut effectivement lieu ; mais les accidens furent si graves qu'elle succomba. Dans les lieux malsains de l'Italie , on a souvent occasion d'observer des faits analogues. Durant le régime de la terreur , je me livrois à l'étude des maladies dans un hôpital de province , où les fièvres intermittentes pernicieuses sévirent avec la plus grande fureur. Les intervalles qui séparoient les accès étoient entièrement libres chez tous les individus qui en furent atteints , et cependant des accidens imprévus ne tardoient pas à faire périr les malades , au moment où ils se jugeoient eux-mêmes dans une parfaite sécurité.

ARTICLE III.

Analogie des Fièvres pernicieuses intermittentes, avec la Fièvre soporeuse des vieillards.

LXVIII. Pour se faire un diagnostic certain dans l'étude des pernicieuses intermittentes , il est utile de comparer souvent les descriptions exactes que nous en avons , avec les affections qui leur sont plus ou moins analogues. C'est faute de s'être aidé de ces rapprochemens lumineux , que Morgagni , par exemple , paroît avoir établi une similitude parfaite entre la fièvre intermittente comateuse , décrite par Morton et Torti , et la soporeuse des vieillards ; quoique , sous plusieurs rapports , ces deux fièvres

doivent être distinguées l'une de l'autre (1). Aussi Leroy, éclairé du flambeau de ses propres observations, a-t-il cherché à fixer les différences qui les séparent :

1°. *D'après leur nature.* Suivant cet auteur, la fièvre désignée communément sous le nom de *fièvre maligne* ou de *fièvre soporeuse* des vieillards, est sporadique dans tous les cas. La pernicieuse carotique n'est sporadique au contraire que dans les lieux malsains, et exposés aux influences des émanations marécageuses. Ailleurs elle suit les épidémies des fièvres intermittentes.

(1) *Nec vero si æger non senex sit, ejus modi febris immunem fore, credito propterea quia doctis viris ipsam nunc placeat febrim intermittentum senum soporosam vocare. Et si eâ ætate sæpius contingit et septuagenario erat major tum cardinalis de quo modo dictum est, tum generosus comes M. Ant. Trento, quem annis ante eum quinque ab eâdem feбри periclitantem eodem remedio curaveram, eorum neutro, quod minus frequens est, in febrim recidente; tamen et Mortonus puerum duocennem et Tortus puellum teneræ ætatis, nedum alium in medio adolescentiæ cursu his, quas lethargicas appellabat, febribus laborantes proposuere. De Morb. sed. et caus., tom. III, epist. XLIX, fol. 17. Etmuller n'a-t-il pas manifestement confondu le choléra-morbus avec la fièvre tierce cholérique, lorsqu'il a dit de cette première maladie : *Periodum observat tertianariam?**

2°. *D'après les redoublemens et les accès.* Dans la soporeuse des vieillards, les redoublemens sont marqués par un simple refroidissement des membres supérieurs et inférieurs, et on n'y remarque aucun frisson. Dans l'intermittente carotique, les accès commencent d'ordinaire par le frisson.

3°. *D'après leur marche.* La marche de la première est moins vive que celle de la seconde, et son type n'a point un caractère aussi insidieux.

4°. *D'après l'état du pouls.* Dans la soporeuse des vieillards, il est petit, inégal et foible. Dans la pernicieuse intermittente, il a cette force et cette plénitude qui se remarquent dans l'apoplexie.

Je pense du reste que ce dernier signe pris de la manière d'être du pouls, ne sauroit avoir la certitude des précédens, puisqu'on n'ignore pas que dans la comateuse intermittente les désordres de la circulation sont sujets à des anomalies fréquentes.

Peut-être l'action du quinquina, qui, d'après l'aveu des praticiens, est bien plus efficace dans cette dernière fièvre que dans la soporeuse des vieillards, forme-t-elle un caractère qui ne doit pas être négligé.

On voit, par ce que j'ai exposé, combien sont fondés en raison les auteurs qui conseillent d'isoler

et de distinguer les fièvres, non-seulement d'après les symptômes qu'elles manifestent, mais même d'après le traitement qu'elles exigent; et qu'ainsi que l'a fort sagement remarqué le médecin que je viens de citer, c'est véritablement perfectionner l'art que de tracer continuellement des descriptions séparées de ces maladies.

ARTICLE IV.

Signes établis par Lautter pour fonder le diagnostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXIX. Lautter, après avoir démontré dans sa relation l'insuffisance des signes établis par différens auteurs pour signaler les pernicieuses intermittentes, fonde lui-même son diagnostic sur les considérations que nous allons rapporter : (1)

1°. Si ces fièvres, dit-il, après s'être déclarées avec peu d'intensité dans le commencement de leur invasion, manifestent à leur troisième, quatrième ou cinquième paroxysme, un symptôme grave et inaccoutumé, comme, par exemple, un coma très-profond, des vomissemens, des défaillances, ou une diarrhée opiniâtre, une prostration considérable du système des forces, etc., soit que

(1) *Histor. medic. bienn. morb. rural., etc.*

ce symptôme disparoisse avec chaque paroxysme de la fièvre, soit qu'il persiste dans l'intermission, soit que l'urine charrie un peu plus ou un peu moins de sédiment, soit qu'il règne ou qu'il ne règne pas d'épidémie de ces fièvres, il ne faut pas balancer, et donner sur-le-champ le quinquina : un plus long retard seroit nuisible.

2°. Si, comme cela arrive fréquemment, la maladie débute par un violent vomissement, une excessive diarrhée, un état de somnolence, un délire tranquille ou frénétique, des syncopes, des spasmes épileptiques, et que ces symptômes éprouvent une rémission le jour d'après, ou cessent totalement, on ne pourra pas sans doute annoncer, d'après cet unique signe, la présence d'une fièvre pernicieuse intermittente, à moins que l'urine ne dépose un sédiment briqueté, et qu'il règne alors une épidémie de cette nature ; mais lorsque le troisième ou le quatrième jour, les symptômes déjà énoncés reparoissent, pour avoir ensuite leur rémission, le médecin n'a plus rien à considérer ni à attendre pour assurer son diagnostic ; il doit administrer de suite le quinquina.

3°. Lorsque ces fièvres s'annoncent sous un aspect inflammatoire, avec une douleur aiguë de côté, un pouls dur, une toux incommode, et que le sang tiré de la veine présente la croûte phlogistique ;

lorsque toutefois les urines charrient un sédiment, et qu'il y a une épidémie régnante de ces sortes de fièvres, le médecin est inexcusable, s'il diffère à combattre ces accidens par le quinquina.

4°. Si un homme déjà bien portant est soudainement saisi d'une forte apoplexie ou d'un violent choléra-morbus, et que le jour suivant ces symptômes ne se manifestent point, mais qu'il lui reste seulement une difficulté de langage et une certaine stupeur des sens, quoique le vomissement devienne plus rare, si le signe de l'urine sédimenteuse se manifeste, et s'il règne une épidémie de fièvres pernicieuses intermittentes, rien n'est plus important pour faire cesser ces accidens, que de recourir à l'écorce du Pérou.

5°. On peut aussi juger que les fièvres intermittentes ont un caractère perniciosus, lorsque des symptômes très-graves, tels que les vomissemens, la diarrhée, les flux dysentériques, les douleurs rhumatismales, les migraines, etc., tourmentent quelque temps les malades, sans céder aux plus puissans remèdes, hormis au quinquina, quoique d'ailleurs il n'y ait rien de bien régulier relativement au paroxysme et à l'intermission. Il suffit, pour porter son diagnostic, que l'urine déposé un sédiment briqueté, et qu'il règne à cette époque des pernicieuses intermittentes épidémiques, pour

qu'on soit fondé à soupçonner la présence d'une fièvre intermittente larvée.

ARTICLE V.

Signes établis par Medicus pour fonder le diagnostic des mêmes Fièvres.

LXX. On peut se servir avec avantage, pour reconnoître le caractère intermittent des fièvres pernicieuses, des signes distinctifs indiqués par le savant et profond Medicus, dans son Histoire des maladies périodiques (1). Il faut donc faire la plus sérieuse attention :

1°. *A l'accès même qui se déclare.* Quand un symptôme quelconque survient soudainement chez un individu, qu'il dure quelques heures, décline ensuite peu à peu, ou disparoît d'une manière spontanée, le praticien observateur doit, sans doute, craindre le retour prochain de ce symptôme. En effet, il n'est guère vraisemblable qu'une affection morbifique se développe et se détruisse en un si court espace de temps. Le médecin de Manheim avertit avec raison que ce signe est le plus important, puisqu'il avertit du danger et des mesures à prendre pour le prévenir. Ne peut-il pas arriver

(1) *Geschichte periodische krankheiten.*

que des fièvres pernicieuses soient mortelles à leur second paroxysme ?

2°. *A la récurrence de l'accès.* Si la fièvre revient à une pareille heure et à un jour déterminé, on ne doit plus douter qu'elle n'ait pris le type intermittent. Ce signe est celui d'après lequel on peut se diriger avec le plus de certitude au lit des malades ;

3°. *Aux affections régnantes.* Cette considération est de la plus grande utilité. En effet, si nous parcourons les descriptions qu'on nous a transmises, des différentes épidémies, nous nous assurerons que les fièvres pernicieuses intermittentes règnent le plus fréquemment dans le même temps que les autres fièvres d'accès, ou en concurrence avec d'autres maladies périodiques ; souvent ce sont les mêmes fièvres qui se compliquent ou redoublent d'intensité, en raison de la gravité des causes d'où elles émanent ;

4°. *Au sédiment briqueté de l'urine.* Les plus célèbres médecins se sont attachés à ce signe distinctif pour reconnoître le génie intermittent des fièvres régnantes. L'illustre Sydenham, surtout, dont le nom est d'un si grand poids dans la médecine d'observation, s'explique formellement à ce sujet dans une lettre à Robert Brady, sur les maladies épidémiques qui se manifestèrent depuis

l'an 1675 jusqu'en l'an 1680. Les fièvres intermittentes dont il lui rend compte avoient pris le masque de l'apoplexie ; mais il les reconnut principalement à l'inspection de l'urine, qui étoit excessivement colorée, et qui déposoit un sédiment briqueté (1). Cependant, comme le remarque très-judicieusement Lautter, ce signe ne peut devenir de quelque secours qu'autant qu'il est réuni à plusieurs autres signes ; car il n'existe pas toujours dans les fièvres intermittentes pernicieuses. Souvent l'urine est trouble, d'autres fois elle est claire, et d'autres fois il n'y a rien de changé dans son état naturel. D'ailleurs, quand ce signe seroit infallible, on n'est pas toujours à portée de l'examiner.

(1) *Hic autem commemorare libet, quod sub primos hujus constitutionis annos, symptoma quoddam insigne febribus intermittentibus quandoque supervenerit. Nempe earum paroxysmi non cum rigore et horrore, quas postea febris excipit, invadebant, sed æger iisdem planè symptomatis tentabatur, ac si apoplexiâ verâ laborasset, quæ tamen nihil aliud esset, utcunque hunc affectum æmularetur; quam ipsa febris caput impetens: ut ex aliis signis, ita ex colore urinæ satis liquebat: quæ in intermittentibus ut plurimum rubore saturato extat, qualis cernitur in urinâ eorum qui ictero laborant, utsi non adeò intensè rubet, et pariter sedimentum deponit pulverem laterum ferè referens. Sydenh. op. epist. 1, respons. ad Rob. Brady.*

ARTICLE VI.

Opinion d'Aurivill et de Sénac sur le diagnostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXXI. Samuel Aurivill pense que la célérité des changemens qui s'opèrent dans le mode de la rémission ou dans celui du renouvellement de l'accès, est très-propre à éclairer sur le caractère plus ou moins pernecieux des fièvres pernecieuses intermittentes. (1)

Selon la remarque de Sénac, il est peu de fièvres continues qui, dans la rigueur, soient *homotones*, c'est-à-dire que dans aucune le pouls ne se soutient avec la même intensité; il y a des exacerbations et des rémissions, etc.; d'après cette considération, il est utile de déterminer les signes qui séparent ou rapprochent les rémittentes des vraies continues; c'est ce que l'auteur que nous venons de citer a fait avec cette sagacité qui lui étoit propre. (*De nat. febr. recond. lib. II, cap VIII.*)

(1) *Ex binis vero accessionibus attentius observatis, haud dubiè colligi potest morbi indoles; videlicet ex remissionis modo et novæ pariter accessionis, quarum utraque et subitanea magis, et evidentior, à mutationibus lentioribus majorum æque gravium in remittentibus cæteris sese distinguit. Dissert. de febr. intermitt. malign.*

Il observe d'abord qu'il y a plusieurs points de similitude qui unissent ces deux ordres de fièvres : dans les continues, les accidens se manifestent souvent avec moins de violence un jour que dans l'autre ; on observe même quelquefois quatre exacerbations dans l'espace de vingt heures ; les intervalles qui séparent ces exacerbations sont tantôt plus longs, tantôt plus courts. Lorsque les accidens s'aggravent, la maladie est, pour ainsi dire, entraînée dans son cours, et ne suit aucune marche régulière. Il y a néanmoins, toutes les trois ou quatre heures, des paroxysmes qui ne tardent pas à renaître, dès qu'une fois ils ont décliné. En second lieu, lorsqu'il y a deux ou trois paroxysmes, ces paroxysmes ne sont pas égaux ; il en est un qui domine en quelque sorte sur les autres. Sénac parle d'une épidémie de fièvres malignes où cette prédominance étoit très-manifeste. Il y avoit une rémission le matin ; mais vers les dix heures il survenoit une exacerbation, qui s'apaisoit dans l'espace de trois ou quatre heures. Cette rémission n'étoit pas de longue durée ; car vers les neuf heures tous les symptômes renaissent, et continuoient avec violence pendant toute la nuit. On ne peut donc juger des symptômes qui appartiennent proprement aux fièvres rémittentes, ni d'après le temps, ni d'après le nombre des exacerbations. Ce qui surtout embarrasse le médecin observateur, c'est lorsque les accès chevauchent et

s'engrènent en quelque sorte les uns avec les autres, au point de présenter un état de fièvre permanent. On observe ce phénomène dans toutes les graves épidémies.

LXXII. Les mouvemens fébriles procèdent néanmoins d'une toute autre manière dans les fièvres continues que dans les fièvres intermittentes. En général, leurs paroxysmes n'ont point lieu à une heure déterminée. Leurs rémissions ne présentent point un mieux bien sensible; la peau ne présente point cet état de moiteur, ce relâchement particulier qui laisse un cours facile aux excrétions et aux sécrétions; les urines ne subissent aucun changement; elles ne déposent aucun sédiment briqueté, et il n'y a point d'évacuation alvine; il n'y a ni froid ni refroidissement. Le début des exacerbations est d'ailleurs très-différent, on les voit se déclarer graduellement; on observe d'abord une certaine dépression dans le pouls, en sorte que les malades paroissent agités d'un mouvement intérieur, et la chaleur s'accroît ensuite peu à peu. Dans les intermittentes, au contraire, elle se déclare soudainement; mais une principale différence, assignée par Sénac, c'est qu'il n'y a point dans les continues une aussi notable disproportion entre les exacerbations et les rémissions, etc. Il faut du reste un long apprentissage dans les hôpitaux pour bien discerner toutes ces nuances.

ARTICLE VII.

Des signes qui indiquent la tendance des Fièvres vers le type de continuité.

LXXIII. La nécessité de varier ou de modifier les procédés de l'art, toutes les fois que la fièvre pernicieuse intermittente tend vers le type continu, a dû faire rechercher attentivement les signes qui indiquent cette dégénération. On doit la présumer :

1°. *Relativement à son invasion.* Si elle se fait sans ou avec presque point de frisson, ou si elle se manifeste par un sentiment de chaleur ;

2°. *Relativement aux accès.* S'ils vont en augmentant de force et de durée ; si l'intervalle qui les sépare devient de jour en jour plus court ;

3°. *Relativement à l'intermission.* Si pendant qu'elle a lieu on observe du désordre dans le pouls, une aridité mordicante à la peau, la sécheresse de la langue, de l'altération, de la soif, des agitations, des céphalalgies ; en un mot, tous les signes qui annoncent la disposition du système à un état d'irritation inflammatoire ;

4°. *Relativement aux excréments.* Si l'urine est en petite quantité, si elle est rouge ou safranée,

si on ne remarque aucun dépôt dans le vase qui la recoit ;

5°. *Relativement aux fonctions du sensorium.*
Si le délire survenu dans le paroxysme persiste après ce même paroxysme, pendant que la fièvre diminue et s'affoiblit ;

6°. *Relativement à l'état de certains organes.*
S'il se manifeste dans l'intérieur de la bouche du malade des ulcérations croûteuses qui gênent la déglutition, et si à cet accident se joignent un pouls petit, une voix aiguë, le hoquet, etc.

7°. *Relativement à la nature des symptômes.*
Tous les symptômes familiers aux fièvres ataxiques continues doivent être regardés comme des signes indicateurs de la tendance de la fièvre vers le type de continuité.

LXXIV. Mais souvent cette conversion de la fièvre en continue se fait d'une manière brusque et inespérée ; ou souvent même elle a fait trop de progrès pour que le médecin puisse sur-le-champ la reconnaître. Alors, sans doute, il doit être attentif à épier jusqu'au moindre phénomène ; alors, comme le dit le judicieux Voulonne (1), le simple refroidisse-

(1) Mémoire sur les Fièvres intermittentes.

ment de quelques parties, la pâleur de la face, des quintes de toux qui surviennent inopinément, un pouls qui devient petit, fréquent et concentré, des bâillemens, des pandiculations, le renouvellement d'un symptôme particulier, d'une douleur de tête ou d'une sensation de cardialgie, des urines avec sédiment, etc., le plus léger trait enfin, suffisent pour la faire soupçonner. Quelquefois même on peut établir son opinion d'après la seule inégalité de la marche de la fièvre, surtout si elle se montre plus violente dans le moment où elle avoit coutume d'avoir lieu : cette remarque est des plus importantes, parce qu'elle sert à déterminer si l'écorce fébrifuge peut être administrée avec espoir de succès.

CHAPITRE IV.

Considerations sur le pronostic dans les Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXXV. L'OBSERVATION pratique démontre que les fièvres pernicieuses intermittentes peuvent acquérir différens degrés d'intensité, ce qui rend l'étude du pronostic infiniment importante.

ARTICLE PREMIER.

Nécessité d'avoir égard à l'état des forces vitales, pour fonder le pronostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXXVI. Depuis que les théories médicales sont basées sur l'étude approfondie des forces vitales, la science du pronostic dans ces sortes de fièvres devient plus exacte et plus solide. Il importe par conséquent de s'instruire de toutes les causes qui peuvent affoiblir ou dépraver ces facultés essentielles de l'économie vivante.

Il faut principalement s'assurer de l'état de ces forces pendant la durée des accès. Si la fièvre se montre sous le type de tierce, il faut, selon la re-

marque de Leroy, avoir égard aux paroxysmes qui se correspondent de deux jours l'un. On ne doit pas cependant se presser toujours de porter un pronostic quelconque dans le cours de ces fièvres, parce qu'il arrive souvent que les premiers paroxysmes n'ont rien d'alarmant, tandis que les suivans sont très-dangereux.

ARTICLE II.

De l'irrégularité des actes propres aux forces vitales, comme signe du danger principal des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXXVII. Le grand rapport des fièvres pernicieuses intermittentes avec les fièvres ataxiques continues, doit déterminer les praticiens à fonder la doctrine de leur pronostic sur la même théorie, et les convaincre qu'elles sont d'autant plus dangereuses, qu'elles se rapprochent davantage de ces dernières par l'intensité de leurs symptômes.

Or, le pronostic de ces affections est le plus communément très-fâcheux, si l'art ne vient à bout d'arrêter les progrès du mal. « Les lésions des » organes qui ont lieu dans une maladie maligne » (observe avec sagacité le professeur Barthez), » sont dangereuses et difficiles à guérir, parce » qu'elles n'excitent que des symptômes irrégu-

» liers , et divers de ceux qu'on auroit lieu d'at-
» tendre de la forme primitive et apparente de
» cette maladie , et parce qu'elles ne peuvent dé-
» terminer , dans un système énervé , le concours
» puissant d'un grand nombre d'organes , qui est
» nécessaire pour opérer les solutions naturelles
» de ces lésions. » (1)

LXXVIII. C'est donc dans la distribution irrégulière des mouvemens vitaux, et dans l'action désordonnée des organes , que consiste la malignité et le péril des fièvres dont nous traitons. Pour opérer une défense effective , la nature doit concentrer ses forces ; il se forme au contraire dans cette circonstance une multitude de points inégaux d'irritation , d'où résultent constamment des symptômes anomaux. Il n'y a point entre les fonctions ce commerce réciproque , nécessaire pour établir une certaine unité dans les efforts de l'économie animale ; au moment où quelques systèmes résistent avec énergie , d'autres n'opposent qu'une réaction foible et languissante ; en un mot , la vie individuelle de chacun de ces systèmes se sépare de la vie générale , qui cesse de les parcourir , et qui , elle-même , se trouve ainsi partiellement étouffée dans les centres principaux où elle réside.

(1) Nouveaux Éléments de la Science de l'Homme.

LXXIX. Il est un autre accident qui constitue principalement le danger des affections malignes , et auquel il me semble que les médecins ne font pas assez d'attention ; c'est qu'il y a souvent augmentation d'irritabilité , et diminution de sensibilité ; et rien n'est plus funeste que ce défaut de concert entre deux facultés qui doivent être en harmonie , et agir , pour ainsi dire , en commun ; car si l'action de la puissance contractile diminue , et si l'action de la puissance nerveuse augmente , il y a changement de rapport dans toutes les fonctions. Ce défaut de correspondance d'action dans l'appareil des puissances de l'économie animale forme un caractère très-pernicieux.

LXXX. J'observe en outre que tout mouvement dans le système de notre économie , pour qu'il soit régulier et conforme aux lois de la vie , doit être dirigé par l'influence suprême de l'organe cérébral ; les spasmes , les convulsions qui ont lieu dans les pyrexies malignes , sont des phénomènes d'autant plus sinistres , qu'ils ne sont pas suscités par la volonté dont le siège spécial est dans le cerveau.

ARTICLE III.

Le désaccord des phénomènes sympathiques constitue en grande partie le danger des Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXXXI. On n'a point encore assez examiné l'altération des sympathies du corps vivant, et les rapports que cette altération peut avoir avec la théorie du pronostic dans les maladies aiguës. On conçoit néanmoins, d'après ce que nous avons déjà dit, combien elle doit être funeste. En effet, dans une affection maligne aucun système ne souffre par une suite de sa correspondance sympathique avec un autre système, puisque la vie est à la fois atteinte dans tous les points de l'organisation. Or, les différentes lésions ne se propageant point d'un organe à l'autre, les mouvemens et les résistances ne sauroient être synergiques : de là vient que des parties qui, dans l'état de santé, sont unies entre elles par la connexion la plus étroite, s'isolent en quelque sorte les unes des autres ; et cet isolement annonce l'altération la plus grave dans les nerfs qui sont les agens et les moyens de leurs communications réciproques et naturelles. C'est ainsi qu'on voit souvent le danger des fièvres pernicieuses consister dans un défaut de liaison entre les forces motrices et les forces sensibles. D'autres fois il y a

défaut de sympathie entre le système nerveux et le système vasculaire, et le mouvement péristaltique des vaisseaux artériels qui constitue le pouls se répète régulièrement, malgré l'affaissement extrême de l'organe cérébral, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut en parlant de la nature propre des fièvres ataxiques continues. D'autres fois certains viscères, dont les fonctions ont un but analogue, rompent leur mutuelle dépendance. Le système rénal, par exemple, se détache du reste du système digestif, et l'urine est bonne, tandis que les déjections alvines présentent le plus mauvais caractère. Dans certaines circonstances, enfin, les lois de la sympathie paroissent interrompues dans des organes qui ont entre eux la plus grande analogie de structure; c'est ainsi que dans le même membre, des parties se trouvent glacées par le froid, tandis que d'autres sont brûlées par la chaleur. J'ai vu un malade chez lequel la sensibilité des nerfs qui se distribuent à l'ouïe étoit extraordinairement augmentée, tandis que celle des nerfs qui se distribuent aux autres sens, étoit presque anéantie, etc. On sent combien la considération attentive des phénomènes pathologiques pourroit étendre les vues que je viens de présenter. C'est à ce bouleversement des lois sympathiques dans l'universalité de l'économie qu'il faut rapporter, jusqu'à un certain point, l'impuissance de tant de remèdes adminis-

trés pour combattre les symptômes qui se déclarent. Remarquons néanmoins qu'une semblable subversion a moins souvent lieu dans les fièvres pernicieuses intermittentes que dans les fièvres ataxiques continues.

ARTICLE IV.

Du pronostic fondé sur le mode d'altération des propriétés vitales dans les Fièvres pernicieuses intermittentes.

LXXXII. Comme la science du pronostic repose sur une connoissance approfondie des causes de la mort, les phénomènes dont s'accompagne la destruction du corps vivant dans les diverses maladies, doivent être un grand objet de méditation pour le médecin observateur. Ainsi, par exemple, dans les fièvres pernicieuses qui se rapprochent des fièvres ataxiques, la nature commence toujours la mort par l'anéantissement de la sensibilité animale; de là vient que les plus grands désordres surviennent dans le cerveau et le système nerveux, tandis que le calme règne souvent dans le système vasculaire; au contraire, dans les fièvres pernicieuses qui se rapprochent des fièvres adynamiques, la mort s'opère d'abord par l'anéantissement de l'irritabilité, et il survient constamment un dérangement quelconque dans la circulation, quoiqu'il n'y ait pas de délire; mais souvent, à la vérité, ces deux ordres

de fièvres se compliquent , et confondent en quelque sorte les phénomènes propres à chacun d'eux. J'ai observé que les fièvres où il survenoit une augmentation extrême de la faculté sensitive , étoient moins dangereuses , et moins rebelles aux moyens curatifs , que celles où l'action de cette même faculté est extrêmement diminuée ou pervertie.

ARTICLE V.

Du pronostic fondé sur la considération des phénomènes de l'organe cérébral.

LXXXIII. Il y a danger dans les fièvres pernicieuses intermittentes , quand l'effet délétère de ces fièvres se dirige particulièrement vers les organes les plus importants de l'économie animale , vers le cerveau. Le coma tient à un défaut d'action de cet organe , et de tout le système nerveux : il est par conséquent d'un très-mauvais présage. De là vient que les fièvres léthargiques , apoplectiques , sont mortelles dans un temps très court ; surtout quand l'affaissement de l'organe cérébral se joint à l'affoiblissement de la contractilité du cœur , des artères , etc. Le sentiment gravatif de la tête avec le tintement d'oreilles , avec une trop grande sensibilité de la vue , de l'ouïe , avec la stupeur , le vertige , etc. , sont des phénomènes sinistres. Il faut distinguer la céphalalgie qui se manifeste avec

un pouls foible , de celle qui se manifeste avec un pouls fort. Dans la fièvre céphalalgique , l'écume à la bouche , la couleur livide , les mouvemens convulsifs de la face , annoncent une mort prochaine.

ARTICLE VI.

Du pronostic fondé sur la considération des phénomènes de la respiration.

LXXXIV. L'embaras de l'organe pulmonaire , qui s'annonce par une respiration rare et stertoreuse , par la turgescence livide du visage , est un des symptômes les plus dangereux , en ce qu'il indique une lésion profonde de l'irritabilité du système pulmonaire , système par lequel , suivant l'opinion de Galien , commence toujours la mort de l'individu.

LXXXV. Le hoquet qui survient dans le déclin des paroxysmes des fièvres pernicieuses intermittentes , sans signe de coction ou de crise , est très-funeste , surtout s'il est accompagné de délire , de convulsions et d'aphonie. Il ne l'est pas moins s'il est accompagné de l'inflammation du foie , du diaphragme , et des autres viscères abdominaux. Il est fatal lorsqu'il succède à la subite disparition des exanthèmes , qui , comme nous l'avons déjà observé , peuvent signaler quelquefois les fièvres pernicieuses.

ses intermittentes. Il ne l'est pas moins lorsqu'il est produit par un épuisement quelconque, comme par la dysenterie, la diarrhée, etc. Les opinions des médecins ont beaucoup varié sur les causes productrices du hoquet, phénomène qui n'est pas aussi connu qu'on le présume; et Stoerzel soutint jadis une thèse sur ce sujet. Les congestions qui se forment dans le moment de la mort, aux environs du diaphragme, peuvent très-bien provoquer les contractions forcées de cet organe. Cette convulsion est souvent produite par les affections de l'œsophage et de l'estomac, ce qui a souvent lieu par sympathie de contiguité de ces parties avec le péricrâne; en effet, cette membrane paroît être un moyen de transport pour les irritations sympathiques, comme le prouve une expérience de Bichat, qui provoqua le hoquet à l'aide d'une injection stimulante dans l'abdomen d'un animal vivant. La communication plus ou moins directe qui existe entre les nerfs concourt aussi à la production du même phénomène.

ARTICLE VII.

Du pronostic fondé sur la considération des organes de la digestion.

LXXXVI. L'insensibilité des organes internes, comme, par exemple, des muscles de la dégluti-

tion, de l'œsophage, du tube intestinal, etc., est du plus funeste présage; elle révèle à l'observateur que la vie s'est, pour ainsi dire, retirée de l'intérieur à l'extérieur, où elle achève de se consumer par l'acte réitéré de la convulsion. Quand le ventre est excessivement tendu et météorisé, et que le malade ne peut y supporter ni le contact de la main, ni l'approche des couvertures, il faut envisager ce signe comme très-funeste. Il faut redouter les spasmes et les congestions des hypocondres. L'altération des propriétés vitales dans le canal intestinal se démontre par la tension, la tuméfaction et l'élévation du ventre, par le poids et l'oppression de l'estomac, par la formation de divers gaz qui s'engendrent dans les organes digestifs. Quand l'irritation occasionnée par la fièvre est principalement fixée à l'estomac, la maladie est très-dangereuse, à cause de la sympathie interne de ce viscère avec tous les systèmes organiques, dont il est, pour ainsi dire, le régulateur. La douleur cardialgique doit être regardée comme pernicieuse, surtout si elle se déclare avec pulsation à la région précordiale, avec refroidissement fébrile et sueur. Si elle survient chez un vieillard, elle peut devenir soudainement mortelle.

ARTICLE VIII.

Du pronostic fondé sur la considération des déjections et des excrétions.

LXXXVII. Les selles fétides et colliquatives donnent lieu de croire que le malade ne tardera pas à succomber; elles sont principalement occasionnées par de petits mouvemens convulsifs, qui s'excitent dans tout le trajet des intestins; les physiologistes qui ont expérimenté sur les animaux vivans, ont vu ces mouvemens redoubler dans les intestins à l'heure de la mort. L'état des urines, dans les fièvres pernicieuses, exige une grande attention. C'est ainsi que la diminution de cette excrétion, et sa couleur noire, forment un signe pernicieux. M. Boullon, dans l'épidémie d'Abbeville, dit que les malades étoient ordinairement dans le plus grand danger, lorsqu'on observoit dans leurs urines un sédiment membraniforme et de nature muqueuse, qui couvroit, en manière de voûte, une matière glaireuse; mais il faudroit un plus grand nombre de faits pour confirmer une semblable assertion. Les urines présentent un signe non moins fatal, lorsqu'elles s'échappent involontairement de la vessie.

ARTICLE IX.

Du pronostic fondé sur la considération du pouls.

LXXXVIII. Le pouls petit et irrégulier est un mauvais signe ; on doit même redouter le pouls intermittent ; cependant, selon la remarque et l'expérience de quelques observateurs, il n'est pas toujours fâcheux, si la nature y supplée par une grande fréquence. Dans toutes sortes de fièvres, il est très-avantageux que, durant le cours du paroxysme, le pouls se maintienne développé ; il faut au contraire regarder comme des signes funestes sa faiblesse et son inégalité. Le pouls contracté, rapide, vibrant, est dangereux, lorsqu'il s'unit à une respiration gênée, à des anxiétés de la région précordiale ; mais c'est principalement dans les intermittentes soporeuses qu'un pareil phénomène est pernicieux, surtout si l'on s'aperçoit que le pouls devient plus mauvais à chaque paroxysme, et si en même temps l'assoupissement devient plus profond. Leroy remarque qu'alors on a lieu de craindre que le malade succombera. (*Du pronostic dans les maladies aiguës.*) Dans ces sortes de fièvres, le pouls qui conserve sa plénitude, n'annonce pas moins de danger. (1)

(1) *When drowsy lethargick symptoms come on (the*

ARTICLE X.

Du pronostic fondé sur la considération des trois périodes du frisson, de la chaleur et de la sueur.

LXXXIX. Cleghorn a observé que les paroxysmes les plus terribles sont ceux qui ne sont pas précédés de frisson, et qui commencent par une chaleur brûlante. Rien de plus intéressant à étudier que le période de frissonnement et d'horripilation. J'ai vu à l'hôpital Saint-Louis une femme qui provoquoit ce période toutes les fois qu'elle prenoit une boisson froide, ce qui n'arrivoit pas lorsqu'elle usoit des boissons tièdes; alors elle n'enduroit que le période de chaleur. Le frisson est un phénomène de la contractilité fibrillaire; c'est un resserrement subit des fibres vivantes, qui envahit toute la périphérie du système cutané. Ce symptôme est particulièrement funeste dans les fièvres algides, où aucune chaleur ne réagit. Il survient quelquefois avec une telle violence, qu'il a presque la férocité d'un accès épileptique, selon la remarque de Wiener, qui, autrefois, a disserté sur cet objet, quoique d'une

pulse) of ten resembles that of a person in full health, though the sick is in the utmost danger. Cleghorn, Observat. on epid. diseases of Minorca.

manière très-vague. Les sueurs froides, visqueuses, gluantes, et qui persistent avec excès, sont à craindre; elles constituent le principal danger des fièvres intermittentes diaphorétiques.

ARTICLE XI.

Du pronostic fondé sur la considération des exanthèmes.

XC. Le pronostic que l'on doit tirer des exanthèmes est constamment heureux, lorsqu'ils surviennent avec la vigueur et le mouvement augmenté des organes naturels. Au contraire, l'éruption est d'un fâcheux augure, lorsque la fièvre et les autres symptômes qui l'accompagnent, augmentent en même temps de violence. M. Boullon a vu le péril imminent de la fièvre être constamment annoncé par l'apparition soudaine d'une éruption partielle durant le cours d'un paroxysme, surtout lorsque cette éruption étoit pâle et noirâtre.

ARTICLE XII.

Du pronostic fondé sur la considération des pétéchies.

XCI. On a considéré avec raison, comme très-fâcheuses, les taches pétéchiales qui surviennent quelquefois dans le cours des fièvres pernicieuses

intermittentes, parce qu'elles annoncent une complication grave de ces fièvres, avec les symptômes propres aux fièvres adynamiques. C'est à tort que plusieurs médecins ont voulu regarder ces éruptions comme critiques. Les subintrantes tierces, ou doubles-tierces, que J.-L. Apinus eut occasion d'observer à Herspruch, dans la Norique (en 1694 et en 1695), ne furent jamais plus terribles dans leurs ravages, que lorsque ce symptôme se déclara sur la fin de l'épidémie. Les pétéchie livides et de forme inégale, sont surtout les plus dangereuses; elles décèlent une lésion profonde de l'irritabilité, lésion qui se joint dans cette circonstance à tous les désordres du système nerveux. (1)

(1) Le Recueil des médecins de Breslaw, que nous avons déjà eu occasion de citer au commencement de cet ouvrage, renferme l'histoire de quelques fièvres intermittentes de mauvais caractère, où ce funeste symptôme prédomina constamment. On y remarquoit presque toujours des éruptions vésiculaires pourprées ou miliaires. Il restoit souvent après la cessation de ces divers exanthèmes une couleur sale et livide, avec prurit et tumeur œdémateuse des pieds. Il paroît que dans ces fièvres, manifestement ataxico-adynamiques, les effets délétères s'étoient particulièrement dirigés vers les muscles et le système cutané. Il y est question d'une femme âgée de quarante ans, atteinte d'une rémittente, qui fut jugée pour une desquamation universelle de l'épiderme. Au surplus, la considé-

ARTICLE XIII.

Du pronostic fondé sur la considération des organes du mouvement.

XCII. Lorsqu'un malade atteint d'une fièvre pernicieuse intermittente ne peut, durant le paroxysme, changer à son gré les extrémités supérieures et inférieures de position; lorsque successivement déplacé par des soubresauts et de petits mouvemens convulsifs, il tend involontairement à se jeter hors de son lit, on doit juger que la faiblesse est à son comble; la carpalogie surtout doit être regardée comme un symptôme précurseur de la mort; c'est la dernière lutte des muscles fléchisseurs contre les muscles extenseurs, dont ces premiers vont triompher; elle annonce l'extinction totale et très-prochaine des forces vitales.

ration attentive de ces épidémies est très-propre à renforcer les traits d'analogie que plusieurs praticiens ont cru trouver entre la fièvre vulgairement nommée putride et le scorbut. *Febrium harum quibus scorbuticarum cura requirit omninò antiscorbutica, quibus ea voto debellantur.* (*Hist. morb. uratisl. ann. M. DCXCIX et M. DCCII, fol. 344.*)

ARTICLE XIV.

Du pronostic fondé sur la considération des traits de la face.

XCIII. Il importe beaucoup de suivre le conseil d'Hippocrate, qui recommande expressément de s'attacher aux signes pris de l'inspection attentive de l'état de la physionomie dans le pronostic des maladies aiguës. Le plus souvent elle est un miroir très-fidèle, parce qu'elle fait connoître l'état de langueur des puissances motrices (1). L'air d'abattement et de désespoir qui est exprimé par les traits du malade, annonce un péril imminent; et la face plus ou moins altérée rend, pour ainsi dire, en abrégé, les affections les plus intérieures et les plus cachées du corps humain. Il faut surtout porter son attention sur le caractère particulier des regards; et j'ai constamment vu que la contraction spasmodique du grand oblique de l'œil, qui dirige

(1) *Considerare oportet in acutis morbis, vultum ægrotantis, sit ne similis benè valentium, et potissimum sui, ita enim optimus erit: si verò quàm maximè sibi contrarius est, malum signum est. Pred. 3.* On trouve dans les livres les plus anciens de notre art, des documens précieux sur la physiognomonie pathologique. Les modernes ont traité ce sujet avec la même importance.

la pupille en bas et en dedans, au point de ne laisser paroître que le blanc de cet organe, étoit un symptôme très-fatal.

ARTICLE XV.

Du pronostic fondé sur la considération des divers âges.

XCIV. On n'a peut-être pas assez apprécié ce que peuvent sur la forme des fièvres les divers âges. Nicolas Esmarch a soutenu autrefois, sous la présidence de Michel Alberti, disciple de Stahl, une dissertation inaugurale sur ce qu'il nommoit, *Febris intermittens lethifera senum*. Dans cette dissertation, la partie qui concerne le traitement de cette fièvre est absolument insignifiante. On voit que l'auteur ne se doute pas même de la puissance du quinquina dans une semblable affection, dont la théorie doit naturellement être ramenée à celle des pernicieuses intermittentes. Or ces dernières fièvres sont plus funestes chez les vieillards, parce qu'ils manquent de forces naturelles. Hippocrate a eu raison de dire que la décrépitude offre un vaste champ aux maladies. L'augmentation morbifique des mouvemens organiques, épuise chez eux les sources de la vie. On a vu, chez les vieillards, le danger de la fièvre s'exprimer par le sommeil profond, une certaine ivresse gravative

de la tête, une compression inaccoutumée de poitrine, une urine crue, grasse comme l'eau de lessive, d'une couleur noirâtre, d'une odeur fétide, accompagnée de dysurie et de strangurie; par une douleur suffocante et cardialgique; par un pouls variable, inégal, quelquefois dur, palpitant, d'autres fois intermittent; par une diminution extraordinaire des forces, qui laisse dans un état de stupeur. Si au milieu de toutes les complications qui peuvent intervenir dans les fièvres pernicieuses des vieillards, ils échappent, ce qui est rare, au danger d'une mort subite, on ne peut prédire ni une longue vie, ni une santé intègre, dit Prosper Alpin; car rien n'est plus fatal aux vieillards que la fièvre intermittente, liée aux phénomènes de l'apoplexie. Il arrive très-souvent que les deux premiers paroxysmes se passent sans aucun présage funeste; mais au troisième paroxysme, il n'est pas rare de voir qu'une apoplexie foudroyante, ou une suffocation inattendue, font mourir à l'improviste des malades qu'on croyoit pouvoir conserver.

ARTICLE XVI.

Du pronostic fondé sur la forme des paroxysmes.

XCV. Le paroxysme qui anticipe n'est pas toujours un mauvais signe, et le paroxysme qui retarde n'est pas toujours un bon signe, comme

quelques auteurs le soutiennent. Au contraire, le premier montre que la nature a des forces, tandis que le second montre sa foiblesse. Certains observateurs signalent comme très-suspecte la fièvre pernicieuse où les jours impairs n'ont qu'un accès léger ou aucun accès, et qui a des paroxysmes très-violens les jours pairs (Torti et Cleghorn). Les fièvres pernicieuses se changent quelquefois en quartes, et cette mutation est salutaire; car l'intermission de deux jours rend la fièvre moins dangereuse en elle-même. Cette mutation annonce seulement que la maladie sera longue; mais on doit redouter alors des affections chroniques des viscères du bas-ventre. Le symptôme prédominant qui continue de se manifester durant l'intermission, est surtout pernicieux; ou, ce qui est la même chose, le danger des fièvres pernicieuses intermittentes croît en raison directe de leur tendance vers le type de continuité.

ARTICLE XVII.

Connoissances acquises par les Anciens sur le pronostic des Fièvres pernicieuses intermittentes.

XCVI. Les anciens, si avancés dans la connoissance du pronostic, n'ont pas manqué de noter dans leurs écrits, comme des signes d'un très-funeste présage, les vomissemens et les déjections d'une

matière bilieuse, jaunâtre, poracée, noire, fétide (1), les flux hépatiques (2), atrabilaires (3), sanguinolens, les cardialgies mordicantes (4), les

(1) *Si vomitus exigui biliosique fuerint, malum. Prorrhhet. text. 36. Si verò vomitio fuerit porracea aut livida, nigra, quicumque ex his fuerit color, malum esse censendum est. Text. 40. Alvi turbata erant biliosis, paucis, meris, tenuibus, mordacibusque et frequenter desidebant. In epid. com. 1, c. text. 25.*

(2) *Si ex ventre tenuia non sentienti ægro exierint, si extra se non sit, malum; cujusmodi sunt quæ in hepaticis fiunt. Prorrhhet. text. 78. Ventris valdè rubens profluvies, mala in omnibus morbis. Prorrhhet. text. 2. Malum verò, ventris valdè rubens profluvies, eoque magis, si hepatis vitio, ut in hepaticis fit, tales dejiciuntur. In coac. præd. text. 330.*

(3) *Dejectiones nigræ, qualis est sanguinis niger, sponte venientes, sive cum febre, sive sine febre, pessimæ.*

(4) *In febribus circa ventriculum fortis æstus, et oris ventriculi dolor, malum. Aph. LXIV, sect. 4. Stomachi dolor, cum hippochondrio contento, dolorque capitis, malignum. Prorrhhet. text. 79. Dolores, qui cum febre, fiunt circa lumbos, et inferas sedes, si precordia attigerent, inferas, relinquentes sedes, exitiales admodum sunt. Progn. libr. 3. Ex lumborum dolore ad os ventriculi recursiones febriles, cum horrore, aquosa, tenuia, et multa evomentes, mente aberrantes, voce privati, nigra vomentes, moriuntur. Prorrhhet. text. 58.*

synopes (1), le froid glacial des membres (2), les divers délires (3), les affections carotiques (4), les sueurs immodérées qui se répandent sur le front,

(1) *Qui frequenter ac fortiter absque causâ manifestâ exsolvuntur, derepente moriuntur. Aph. XLIV, sect. 2.*

(2) *Frigebant his multum extremitates, ac vix calor his revocari poterat. Epidem. liber 1, text. 28. Refrigeratio autem si ita violenta fuerit, ut tota omninò refrigerentur corpora, indurescantque, extinctionis signum existit. Prorrh., lib. 1. Galen. in com. 11, text. 5.*

(3) *In febribus insaniciæ vehementes silente ægro, sed non etiam privato voce, lethale. In coac. præc. text. 65. Mente ob melancholiam aberrantibus tremores supervenientes, maligni. Prorrh. text. 14. Qui jam fractis viribus, delirant, pessimè habent. In coac. præc. text. 101. Extremæ partes undique subfrigidæ, aliquantum delirabat, omnium obliviscebatur, quæ locutus esset. In epidem. ægr. 13.*

(4) *Nullus autem phreneticorum vehementer insanivit, ut in aliis, sed alia quidem veteriosa in somnum delatione capite gravati moriebantur. In 3 epid. text. 20. Qui comate oppressi, ab initio exsudarunt leviter, urinis coctis ardentes citrà judicium refrigerantes brevibus intervallis, ardore redeunte, torpidi, oppressi comate, convulsione subinde capti, perniciosè habent. Coac. præc. text. 180. Quemadmodum somnus in accessionum declinatione, est utilis, si juvet ægrotum, ita si ipsum lædat, esse lethalem. Galen. in comm. aphor. Hipp.*

sur la poitrine (1), les dyspnées (2), les catarrhes suffocans et les oppressions, comme si l'organe pulmonaire étoit rempli d'un mucus épais; les céphalalgies vives, fixes et lancinantes, etc. (3), quelle que soit la maladie où ces phénomènes se présentent. Dès les premiers temps de l'observation, ces divers signes ont paru sinistres aux praticiens.

(1) *Sudores frigidi cum acutâ febre, lethales. Cum mitiori verò, longitudinem morbi significant. Judicat. §. 8.*

(2) *Collige, magis horrendam esse respirationis, quam pulsuum interceptionem, dummodò respiratio non lædatur instrumentorum culpâ, sed facultatis. Stephani Roderici Castrensis syntax. Prædict. medic.*

(3) *Capitis dolores fortes, et continui, cum febre, siquidem lethaliû signorum quid accesserit, perniciosi valdè sunt. Hipp. prænot. §. 22.*

CHAPITRE V.

Des causes directes des fièvres pernicieuses intermittentes.

XCVII. ON n'ignore pas que dans tous les temps les tentatives des médecins pour découvrir les causes prochaines des fièvres, n'ont enfanté que des théories ténébreuses. C'est à l'orgueil d'une fausse expérience qu'il faut attribuer ce que l'on a généralement écrit sur cet objet. « Il faut, comme l'a dit Reil, savoir se contenter de la connoissance historique des fièvres, les étudier simplement d'après leurs signes, leurs accidens, les causes physiques qui les engendrent; car tout le reste nous est inconnu. » La saine physique doit rejeter tout ce que Mercatus a avancé sur l'épaississement, la ténuité, la condensation, la congélation, la concrétion et l'inégale effervescence des humeurs, considérées comme causes prochaines des fièvres pernicieuses intermittentes. Les efforts du savant Hérédia pour réfuter ou commenter les opinions de Mercatus, ne sont d'aucun profit pour la science, parce qu'à l'exemple de son prédécesseur, il a parlé le langage des écoles de son temps. La dégénérescence des esprits animaux, admise par Morton,

n'est pas moins illusoire, et Torti lui-même ne nous paroît pas avoir entièrement répudié les obscures divagations des auteurs qui l'ont devancé, sur les causes prochaines des fièvres intermittentes pernicieuses. Que penserons-nous de quelques modernes qui, ressuscitant une hypothèse de Willis, depuis long-temps abandonnée, n'ont pas balancé à les rapporter au défaut, à l'excès ou à des altérations du fluide nerveux ?

Cet écrit n'admettant rien qui ne soit autorisé par les preuves de la démonstration la plus rigoureuse, il faut en bannir pareillement ces expressions vagues de *tension* et d'*oscillation* augmentées des nerfs, dont plusieurs médecins ont fait dépendre toutes les causes prochaines des fièvres malignes. Ces termes hasardés ne sont propres qu'à donner des idées fausses de l'état pathologique du solide vivant, et sont d'ailleurs des cris de ralliement pour les systématiques qui ont tant retardé les progrès de la médecine.

Voulant donc éviter les écarts de tous ces auteurs, qui ont trop sacrifié à leur goût dominant pour des spéculations vaines et gratuites, je me crois fondé à déduire les causes prochaines des fièvres pernicieuses intermittentes, d'une altération, plus ou moins profonde, des trois propriétés caractéristiques de la force vitale, telles que la

motilité, la sensibilité et la caloricité. Ce que j'ai dit en faisant l'application des notions physiologiques déjà acquises à la théorie de ces fièvres, doit être regardé comme une preuve décisive et irréfutable de mon assertion.

Tout système de pathologie, pour offrir en effet quelque certitude, doit reposer sur la connoissance des phénomènes qui dérivent de ces trois propriétés, que je considère comme étant en quelque sorte les premiers élémens de la vie. C'est au retard et à la négligence qu'on a apportés dans leur étude, qu'il faut attribuer les erreurs qui ont si longtemps entravé la marche de notre art.

XCVII. Peut-être n'avons-nous pas de matériaux suffisans pour donner une histoire complète de toutes les causes qui concourent directement à produire les nombreuses variétés de la fièvre pernicieuse intermittente. En général les praticiens ne se sont point assez attachés à détailler les circonstances qui ont précédé les cas particuliers qu'ils ont observés. Les recherches faites jusqu'à ce jour permettent cependant d'établir quelques vérités générales propres à nous éclairer sur un point aussi important de l'histoire des maladies. Je me bornerai à les énoncer, en y ajoutant les preuves majeures qui les constatent.

PREMIÈRE PROPOSITION.

C'est un fait rigoureusement démontré par l'expérience et l'observation , que les exhalaisons marécageuses influent éminemment sur la naissance et le développement des fièvres pernicieuses intermittentes.

XCIX. REMARQUES. Il est inutile de prouver combien est dépourvue de fondement l'opinion de Vanelsacker , qui , niant toute action de la part des causes extérieures, attribue l'origine de semblables fièvres , au trouble , à l'interception de l'humeur transpiratoire , au vice des digestions et à la dégénération de la bile , qui , par son acrimonie , tend à désorganiser les principaux viscères de l'abdomen. Il est évident que de pareils désordres ne doivent tout au plus être envisagés que comme des effets secondaires des influences funestes que j'ai indiquées. Les recherches de l'immortel Lancisi ont réfuté d'avance les doutes que l'on pourroit élever sur ce que j'avance. Il suffira de rappeler ici que les pernicieuses intermittentes des épidémies qu'il eut occasion d'observer , s'exprimoient avec des symptômes d'autant plus funestes , que les logemens des malades étoient plus voisins des lieux infectés (1). Ce même auteur a très-bien fait voir

(1) *De noxiis palud. effluv. lib. 11.* Galien n'avoit pas

que les lieux de l'Italie, exempts de ces sortes de fièvres, étoient précisément ceux qui étoient à l'abri des miasmes exhalés par les eaux croupissantes et corrompues, et l'on sait que le dessèchement des marais qu'il fit opérer dans les environs de plusieurs villes, suffit pour leur rendre la salubrité.

Zimmermann, dans son beau *Traité de l'expérience* (1), rapporte que les fièvres intermittentes se manifestent très-fréquemment dans la Suisse, le long des lacs, des étangs, etc., et qu'elles y prennent quelquefois le caractère le plus pernicieux. Il cite l'exemple d'une tierce maligne qui ravagea un bourg du canton d'Underwald, très-voisin d'un marais, et qui faisoit périr les malades au deuxième accès. Il allègue plusieurs autres observations, qui sont absolument conformes à cette dernière. Mais rien ne démontre mieux l'action délétère de ces sortes d'émanations sur l'économie du corps vivant, que ce que Lind a consigné dans son *Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds* (2), au sujet d'un vaste et magnifique hôpital qui avoit été construit dans le climat de la

méconnu cette puissante influence des marais sur la production des fièvres. *De febr. diff.*, lib. 1.

(1) Tom. II de la Traduct. de Lefebvre de Villebrune.

(2) Tom. I, Traduction de Thion de la Chaume.

Jamaïque. Cet édifice étoit pourvu d'ailleurs de toutes les commodités nécessaires au rétablissement des malades.

« Malheureusement, dit-il, il fut bâti près d'un
» marais, sur un terrain extrêmement malsain.
» Qu'en arriva-t-il ? c'est que les fièvres les plus
» simples, les intermittentes les plus bénignes,
» les indispositions les plus légères, se changèrent
» souvent en fièvres malignes, en flux de sang ou
» toute autre maladie mortelle. On remarqua que
» la fièvre jaune y dominoit presque toujours, et
» entraînoit des pertes de sang considérables, par
» le vomissement, les selles, et même tous les pores
» de la peau, tandis que ce symptôme ne se voyoit
» jamais chez les personnes qui se trouvoient en
» pareilles circonstances, et obtenoient la permis-
» sion de rester à leur bord. Le rétablissement des
» malades étoit long, pénible et incertain dans cet
» hôpital; le moindre écart ou la plus petite irrégularité dans le régime, déterminoient une rechute. Le flux ayant été arrêté pendant quelques jours, l'usage d'un aliment quelconque, susceptible de se corrompre, suffisoit quelquefois pour faire revenir la fièvre, en très-peu d'heures, avec tous ces fâcheux symptômes. Dans certains cas, une seule écuelle de bouillon produisoit cet effet.
» On ne pouvoit pas dire que cela vînt d'une source

» de contagion existante dans cet hôpital , ou de
» ce qu'on rassembloit trop de malades dans les
» salles , puisque les mêmes accidens arrivoient ,
» lorsqu'il n'y en avoit qu'un petit nombre placé
» dans l'air le moins insalubre en apparence , et les
» endroits les mieux choisis. La mortalité fut si
» prodigieuse dans cette maison , et sa cause si pal-
» pable , qu'on s'est vu contraint à l'abandonner.
» Depuis il a été remplacé par un autre , élevé en
» meilleur air. »

Si je voulois grossir ce Traité d'une multitude de faits analogues , je pourrois puiser dans beaucoup d'auteurs , qui , marchant sur les traces d'Hippocrate , ont si bien apprécié les influences de l'air , des eaux et des lieux ; il me suffiroit même de jeter un coup d'œil sur la topographie médicale des départemens de la France , et sur l'histoire physique des différentes contrées du globe ; mais ces sortes de digressions m'éloigneroient trop de mon sujet ; il est entièrement superflu de reproduire ici ce qui a été recueilli dans tant d'autres ouvrages , et d'insister encore sur des variétés qui trouvent aujourd'hui si peu de contradicteurs. (1)

(1) Les poètes les plus anciens ont parlé du danger des influences marécageuses. « Et toi , ô Ducomar ! tu étois » fatal comme les exhalaisons du marécageux Lano , lors-

Contentons-nous seulement d'observer que les fièvres pernicieuses intermittentes qui règnent à la

» qu'elles s'étendent sur les plaines de l'automne, et
 » qu'elles portent la mort parmi les nations. » *Poés. d'Os-
 sian, Fingal, chant 1.* Mais nous devons citer de préfé-
 rence les réflexions faites antérieurement par Hippocrate,
 et qu'il a consignées dans son beau *Traité des airs, des
 eaux et des lieux.* Ce grand homme, après avoir observé
 que les habitans du Phase vivent habituellement sous un
 ciel humide et au milieu des marais, que les eaux dont ils
 font usage sont stagnantes et putréfiées, que l'atmosphère
 est constamment chargée de brouillards, etc. ne balance
 pas à rapporter à ces causes la couleur jaune, l'obésité, et
 les autres altérations de la constitution physique de ces
 peuples.

Περὶ δὲ τῶν ἐν Φάσι, ἡ χώρα ἐκείνη ἐλάδης ἐστὶ, καὶ Φερμῆ,
 καὶ ὕδατεινῆ, καὶ δασείῃ· ὄμβροι τε αὐτόθι γίνονται πᾶσαν
 ἄρην πολλοί τε καὶ ἰσχυροί. Ἡ τε δίαιτα τοῖσι ἀνθρώποισι ἐν
 τοῖσι ἔλεσι ἐστὶ, τὰ τε οἰκήματα ξύλινα καὶ καλάμινα ἐν τοῖσι
 ὕδασι μεμηχανημένα. Ὀλίγη τε χρέονται (τῇ) βαδίσει, κατὰ τὴν
 πόλιν καὶ τὸ ἐμπόριον, ἀλλὰ μονοξύλοισι διαπλείουσι ἄνω καὶ
 κατω· διαρυγες γὰρ πολλαὶ εἰσι. Τὰ δὲ ὕδατα, Φερμὰ καὶ
 εἰσιμα πίνουσι ὑπὸ τε τοῦ ἡλίου σηπόμενα, καὶ ὑπὸ τῶν ὀμβρῶν
 ἐπαυξόμενα· αὐτός τε ὁ Φάσις εἰσιμάτατος πάντων τῶν ποτα-
 μῶν καὶ ῥιῶν ἡπιώτατα. Οἷ τε καρποί (οἱ) γιγνόμενοι αὐτέοισι,
 πάντες ἀναλδέες εἰσὶ καὶ τεθηλυσμένοι, καὶ ἀτελέες ὑπὸ που-
 λοπληθῆϊος τοῦ ὕδατος· διὸ καὶ οὐ πεπαίνονται. Ἡρ τε πολὺς
 κατέχει τὴν χώραν ἀπὸ τῶν ὑδάτων.

Διὰ ταύτας δὲ τῶς προφάσις τὰ εἶδεα ἀπηλλαγμένα τῶν

maison de la Salpêtrière , doivent indubitablement leur naissance aux émanations putrides de l'égout que l'on aperçoit au bas de ses murs , du côté du nord , et qui va se mêler avec les eaux de la Bièvre. Ceux qui ont pratiqué la médecine dans cet hospice, savent que c'est spécialement sur les femmes qui habitent la portion du bâtiment que je désigne, que les fièvres dont il s'agit exercent leurs ravages.

Le plan de travaux proposé dans le temps par le professeur Hallé, au sujet des changemens à faire dans la disposition du lit et des canaux de la rivière des Gobelins(1), contient des vues qui seroient très-propres à réprimer ces funestes influences , et tout bon citoyen doit former des vœux pour qu'on ne tarde pas à l'exécuter.

Les projets louables de Boncerf, de Saint-Victor, etc., n'étoient donc pas moins avantageux à l'art

λοιπῶν ἀνδράπων ἔχουσι οἱ Φασιηνοί. Τὰ σε γὰρ μεγαθεα μεγάλοι, τὰ πάχεά τε ὑπερπαχέες· ἄρθρον τε κατάδηλον οὐδὲν οὐδέ φλέψ. Τήν τε χροίην ἄχεήν ἔχουσι, ὥσπερ ὑπὸ ἰκτέρου ἐχύμενοι. Φθέγγονται τε βαρύτατον ἀνθρώπων, τῷ ἡέρι χρεύμενοι οὐ λαμπρῶ, ἀλλὰ χνοῶδεῖ τε καὶ διερω.

(1) Voyez son rapport sur l'état actuel des eaux de cette rivière, *Mémoires de la Société royale de Médecine*, t. x, publiés par l'École de Médecine de Paris.

de guérir qu'à l'agriculture (1). Dans tous les temps, du reste, on a senti combien le voisinage des eaux stagnantes contribuoit à la production des maladies; et rien n'étoit plus sage que cette loi ancienne qui affranchissoit de tout impôt celui qui parvenoit à opérer le dessèchement d'un marais.

DEUXIÈME PROPOSITION.

Les observations les plus authentiques ont également fait voir que le temps de la nuit, la saison de l'été, et surtout celle de l'automne, favorisent particulièrement l'action des vapeurs marécageuses dans la production des fièvres pernicieuses intermittentes.

C. REMARQUES. Lancisi avoit parfaitement observé cette plus grande activité des émanations marécageuses, qui augmentent aussitôt après le coucher du soleil; et il a donné une excellente explication de ce phénomène, quoiqu'à l'époque où il a écrit, on manquât encore des données nécessaires pour saisir toutes les causes qui favorisent l'affinité réciproque de l'air et de l'eau, et l'ascen-

(1) *Mémoires de la Société royale de Médecine*, 1786. On y lit le rapport fait par Mauduyt, Tillet, Hallé, Fourcroy, Vicq-d'Azyr et Saillant, sur le projet de Boncerf, relativement au dessèchement des marais.

sion des miasmes dont ce premier est le véhicule. Il prétend qu'alors ces émanations sont moins écartées dans la masse atmosphérique. Rien ne s'accorde mieux avec les notions des physiciens modernes. Aucun d'entre eux ne conteste aujourd'hui que le point de saturation de l'air (qui tend continuellement à dissoudre l'eau corrompue des marais), ne s'élève ou s'abaisse à proportion que sa température s'accroît ou diminue. La retraite subite d'une certaine quantité de calorique, doit en conséquence occasionner le rapprochement des miasmes, et rendre par ce moyen leur influence plus active et plus malfaisante.

Sans nous livrer, du reste, à des développemens plus étendus, nous pouvons avancer que le fait énoncé dans notre proposition se vérifie constamment à l'hospice de la Salpêtrière. Si l'on se transporte à diverses heures près de l'égoût où stagnent les ordures et les immondices de cette vaste maison, on se convaincra que l'odeur qu'il exhale n'est jamais plus infecte qu'à l'entrée de la nuit, ou même lorsqu'elle est un peu avancée. Le professeur Pinel et moi avons fait plusieurs fois cette remarque importante.

Lancisi ajoute que l'état de sommeil qui, durant la nuit, surprend quelquefois les voyageurs dans les lieux malsains de l'Italie, les dispose particu-

lièrement à recevoir l'impression délétère des miasmes, soit à cause de l'inertie des muscles, soit à cause du mouvement ralenti du sang dans la circulation, d'où résulte nécessairement une certaine foiblesse dans la réaction du système vivant.

Ce célèbre médecin avoit également remarqué que les températures de l'été et de l'automne étoient plus favorables à la décomposition des substances animales et végétales; et il est inutile de dire que les registres des hôpitaux prouvent que c'est surtout dans ces deux saisons que les fièvres pernicieuses intermittentes se montrent avec le plus de fureur. Nous transcrivons néanmoins un nouveau passage de l'ouvrage de Lind, parce qu'il confirme d'une manière démonstrative ce que nous venons d'établir.

« En 1766, seize familles protestantes françai-
» ses, composées de soixante personnes, furent en-
» voyées, aux frais du gouvernement anglais, à la
» Floride occidentale; on leur assigna un terrain
» situé sur le coteau d'une montagne environnée de
» marais, vers l'embouchure de la rivière Scambie.
» Ces nouveaux planteurs débarquèrent en hiver,
» et continuèrent à se bien porter jusqu'à la saison
» dangereuse qui a lieu dans ce pays en juillet et
» août. A cette époque, huit habitans d'une ville
» voisine (c'est de l'un d'eux que je tiens ces dé-

» tails), vinrent à cet établissement solliciter des
» voix pour l'élection d'un représentant, dont on
» alloit s'occuper dans l'assemblée générale de cette
» province. Quoiqu'ils n'y eussent passé qu'une
» nuit, chacun d'eux essuya une fièvre intermit-
» tente très-violente. Celui qui aspirait à être re-
» présentant, et un second, en furent les victimes.
» Le jour suivant, sept autres personnes se rendi-
» rent dans la même vue à cet endroit malsain ;
» mais en étant parties avant la nuit, elles furent
» assez heureuses pour éviter le sort des premières,
» et conservèrent leur bonne santé. La fièvre, qui
» a coutume de sévir tous les ans dans ce climat,
» fut si fatale pendant ce mois aux Français établis
» sur ce canton, que de soixante qu'ils étoient, il
» n'en resta pas plus de quatorze. Ceux même qui
» survécurent à cette épidémie, se virent très-ma-
» lades en septembre et en octobre suivant. » (1)

(1) Tom. I, p. 295. Traduction déjà citée.

TROISIÈME PROPOSITION.

Les marais situés dans des lieux élevés, exposés au nord, et balayés par les vents, n'exercent qu'une influence très-légère sur la naissance et le développement des fièvres pernicieuses intermittentes.

CI. REMARQUES. Il est prouvé aujourd'hui que, pour que les matières putrides, qui émanent du sein des marais, soient véritablement préjudiciables à la santé des hommes, il faut nécessairement qu'elles stagnent dans des lieux bas et peu aérés, où l'humidité se trouve sans cesse combinée avec une certaine quantité de chaleur. Parmi les faits nombreux qui viennent appuyer cette opinion, je citerai celui que rapporte feu le professeur Bosquillon (dans ses annotations à la Médecine-pratique de Cullen), d'après Targioni Tozzetti, médecin italien. Ce dernier parle d'une fièvre épidémique très-meurtrière, engendrée par des exhalaisons marécageuses, et n'attaquant que des moissonneurs qui travailloient dans la vallée où régnoit l'épidémie, tandis que les personnes qui se trouvoient dans des endroits plus élevés n'en étoient point atteintes, et fournissoient impunément un asile aux malades (1).

(1) Tom. 1, p. 79.

Zimmermann, en insistant sur le danger que présentent les émanations des lieux marécageux, rappelle que les fièvres tierces, si communes sur les bords des lacs de la Suisse, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, y sont néanmoins très-rares, lorsque ces lacs ne se trouvent point dans des enfoncemens, et sont avantageusement exposés. Il ajoute que dans le Tyrol, lorsque l'Adige se déborde, les habitans parviennent à se garantir efficacement de l'influence des eaux croupissantes qui infectent l'atmosphère, en se retirant dans les maisons qu'ils ont sur les montagnes (1).

Enfin, pour ne parler que des faits qui sont sous nos yeux, nous rappellerons une observation importante qui se trouve consignée dans le rapport du professeur Hallé, sur l'état actuel du cours de la Bièvre (2). Ce savant a fait voir que l'influence pernicieuse des exhalaisons fétides de cette rivière, est nulle dans les lieux ouverts où l'air suit avec facilité sa direction la plus salutaire.

(1) *Traité de l'Expérience*, tom. II, p. 391.

(2) *Mémoires de l'ancienne Société de Médecine*, tom. I.

QUATRIÈME PROPOSITION.

Les marais, les étangs, les lacs, etc., contribuent moins essentiellement à la production des fièvres pernicieuses intermittentes, par la quantité d'eaux qui stagnent dans leur intérieur, que par le dépôt plus ou moins infect, mis en contact avec l'atmosphère, après la retraite ou l'évaporation de ces mêmes eaux.

CII. REMARQUES. Nous avons déjà eu occasion de parler des fièvres qui régnèrent à Batavia à l'époque de la dernière guerre. Lind remarque qu'elles ne furent jamais plus pernicieuses qu'après la cessation des pluies, et lorsque, les fossés ayant été desséchés par les ardeurs du soleil, la boue commença à paroître à nu à la surface interne (1). Tout le monde a connoissance du fait cité par Sénac, au sujet d'une ville environnée d'un lac vaste et profond, qui recevoit depuis quarante ans toutes les immondices des maisons et des rues. Tant que ces matières putréfiées restèrent cachées dans le sein de l'eau, il n'en résulta aucun mal; mais lorsque, par leur accroissement et la diminution respective des eaux, elles furent en contact avec l'air, une

(1) *Mémoires sur les Fièvres et sur la Contagion.* Voyez les notes du traducteur.

fièvre terrible se manifesta. Ses ravages furent si grands, qu'il périt à cette époque près de deux mille hommes, tandis qu'auparavant il n'en mouroit à peu près que quatre cents chaque année. (1)

M. Cassan observe que les marais sont peu pernicieux dans les Antilles, tant qu'ils sont couverts par des bois touffus qui empêchent l'accès du soleil; les voisins n'en éprouvent alors d'autre inconvénient que celui qui résulte ordinairement du voisinage d'un air extrêmement humide; mais lorsqu'on abat les bois, et qu'on met le terrain en contact immédiat avec les rayons solaires, des fièvres pernicieuses (dans lesquelles l'abondance et l'exaltation de la bile paroissent jouer le principal rôle), désolent alors toutes les habitations environnantes, et font périr le plus grand nombre des malheureux qui ont travaillé au défrichement.

(1) *Erat ad magnæ urbis mœnia stagnum latissimum profundumque, in illud à quadraginta annis omnium domorum et vicorum confluebant purgamenta; quandiu vero putridæ hæ feces aquâ immersæ latuerunt, nil mali inde prodit; sed cum in molem auctæ ad aquæ superficiem se extulissent, sævit horrenda febris per vicina urbis loca, et deinde latius se diffudit; tanta fuit ejus vis, ut cum quadringenti tantummodo aliis temporibus, quolibet anno efferrentur, duo hominum millia tunc interciderent. De nat. febr. recond., lib. 1, cap. 7, fol. 34 et 35.*

CINQUIÈME PROPOSITION.

L'action des vents seconde puissamment, dans quelques circonstances, l'influence des miasmes marécageux dans la production des fièvres pernicieuses intermittentes.

CIII. REMARQUES. On lit dans Lancisi que trente personnes de la première distinction, de Rome, ayant été se promener, par partie de plaisir, vers l'embouchure du Tibre, le vent souffla tout à coup du midi sur des marais infects, et qu'aussitôt vingt-neuf d'entre elles furent atteintes de la fièvre tierce (1). Sénac parle d'un village où une cause analogue donnoit pareillement naissance à des fièvres rebelles; ces fièvres dominoient surtout quand les marais étoient agités par certains vents. Les miasmes qui s'en exhaloient étoient alors si dangereux, que les individus même chez lesquels les paroxysmes avoient été supprimés, en éprouvoient de nouveaux, après deux ou trois jours, ou souvent plus tôt. Plusieurs, qui d'abord en avoient été exempts, ne tarديوient pas à en être attaqués. (2)

(1) *De nox. palud. effluv.*

(2) *Si moveantur paludosæ aquæ, graviùs inficiuntur hęc putredine vicina loca; est pagus in quo sæviunt febres ex ejusmodi causá oriundæ; grassantur eæ imprimis cum qui-*

Il seroit à désirer que les médecins étudiassent davantage la nature des vents, relativement à la propriété qu'ils ont de dégager plus ou moins de vapeurs recélées dans le sein de la terre. Lind, cet habile observateur, fait remarquer que les épidémies extraordinaires de fièvres rémittentes et intermittentes, qui eurent lieu en 1765 et en 1766, dans la Grande-Bretagne, furent occasionnées en grande partie par le vent d'est. Il s'est assuré, par l'expérience, que ce vent charrie continuellement dans cette île, non-seulement les brouillards de la mer, mais la vase et les miasmes de tous les endroits marécageux; on voit souvent ces exhalaisons s'élever dans l'atmosphère sous la forme d'une épaisse fumée. « J'ai, dit-il, deux viviers dans mon voisinage, l'un d'eau douce, l'autre d'eau salée; aux approches du vent d'est, il en sort une vapeur dense, pareille à celle qui sortiroit d'un pot d'eau bouillante.

» La personne qui voudra voir distinctement ce phénomène, n'aura qu'à se tenir à environ cent

busdam ventis perflantur stagna; quæ tunc deferuntur in eum locum ita noxia sunt ut post duos tresve dies, aut aliquandò citiùs, recidant in febrem qui eâ defuncti fuerant; multi prætereà, antea intacti, eâ corripuntur. Op. et lib. jam cit., fol. 37.

» verges de distance des terrains limoneux , ou des
» étangs. Si le soleil luit quand le vent tourne à l'est,
» elle verra une colonne de vapeurs , qui s'en élè-
» veront à la hauteur d'environ treize pieds , tandis
» que l'air ambiant restera pur et serein. Comme
» la vapeur ou le brouillard qui partent d'autres
» endroits , glissent sur la surface de la terre , et
» sont portés aux marais par le vent d'est , elle sera
» toujours à même de distinguer , pendant quelque
» temps , surtout si le soleil luit encore , ne fût-ce
» que foiblement , les vapeurs montant perpendi-
» culairement au-dessus des étangs , d'avec celles
» qui sont charriées par le vent en direction hori-
» zontale.

» L'évaporation que produit le vent d'est paroît
» se manifester également par ses effets , tant sur
» le thermomètre que sur le corps humain : le ther-
» momètre suspendu sur un terrain humide , tandis
» que les brouillards ou les exhalaisons s'en élè-
» vent , peut indiquer un degré de froid qui soit
» au-dessous de la congélation.

» Celui qui se fait sentir d'une manière aussi
» frappante quand on est dans cette position , me
» paroît venir de la même cause , et produire des
» sensations à peu près semblables à celles qu'on
» éprouve en entrant dans une chambre dont le
» plancher vient d'être arrosé.

» Mais les vents ne produisent pas toujours les
» mêmes effets; quelquefois le temps est chaud
» avec le vent du nord; quelquefois il l'est très-peu
» avec celui du midi. Il en est de même des brouil-
» lards; ils ne sont pas toujours inséparables du vent
» d'est, et l'évaporation dont nous avons parlé, ne
» s'aperçoit pas dans tous les cas.

» Je sais parfaitement qu'on peut prendre le
» change là-dessus, et qu'au lieu de supposer que
» la quantité des vapeurs qui s'exhalent est aug-
» mentée par le vent d'est, on peut imaginer que
» sa fraîcheur les condense et les rend visibles. Mais
» cette idée même peut être combattue par de
» fortes objections; car nos vents du nord, qui
» sont très-froids, ne produisent jamais, ou du
» moins bien rarement, cet effet, et sont ordinai-
» rement suivis d'un temps sec et serein.

» Quoi qu'il en soit, le vent d'est est ordinaire-
» ment accompagné d'une vapeur froide, humide
» et mal-saine, qui, d'après l'observation, nuit au
» règne végétal et animal, et dans plusieurs lieux,
» donne naissance à des fièvres intermittentes opi-
» niâtres, ainsi qu'à des rechutes réitérées.

» Dans quelques endroits de l'île basse et humide
» de Portsey, souvent la fièvre intermittente, et
» quelquefois le flux, règnent pendant l'automne.

» Ces maladies y sont plus communes et plus vio-
» lentes dans certaines années que dans d'autres.
» On remarque que les étrangers, ou ceux qui ont
» auparavant habité des endroits plus secs et plus
» élevés, en sont toujours frappés plus vivement.

» L'année 1765 fut mémorable par la durée ex-
» traordinaire du vent d'est, et la chaleur exces-
» sive. Ces maladies sévirent avec beaucoup plus
» de violence, et plus généralement qu'elles ne
» l'avoient fait depuis bien des années. Pendant les
» mois de mai, juin et juillet, l'hôpital d'Haslar
» contint rarement moins de trente ou quarante
» personnes atteintes de fièvres tierces régulières,
» ayant de vraies intermittences. Dans ce nombre,
» plusieurs en avoient été attaquées à bord des
» vaisseaux garde-côtes, ancrés dans le havre, près
» de la vase; mais la majeure partie étoit des sol-
» dats de marine employés à Portsmouth. » (1)

(1) *Essai sur les Maladies des Européens dans les pays chauds.*

SIXIÈME PROPOSITION.

Les pluies qui surviennent dans un temps très-chaud, peuvent influer sur la production des Fièvres pernicieuses intermittentes, en dégageant les vapeurs putrides, retenues dans le sein de la terre durcie.

CIV. REMARQUES. Au rapport des voyageurs, pendant plusieurs mois de l'année, le climat du Sénégal ne le cède à aucun autre par sa salubrité; mais aussitôt que les pluies arrivent, les Européens sont foudroyés par une fièvre maligne nerveuse du genre des rémittentes. Cette affection s'annonce par des contractions spasmodiques de l'estomac et par des vomissemens de bile très- considérables, etc. Rien n'est donc plus généralement funeste qu'une sécheresse qui a long-temps régné dans un pays. Le retrait des rivières qui abandonnent une partie de leur lit, fournit cette terre dure exposée au soleil, ainsi que l'observe Lind. Aussitôt qu'il survient un orage, la glaise s'amollit, et le sol, qui auparavant étoit inodore, exhale une odeur insupportable. Les bords des fleuves couverts d'un limon infect et dardé par les rayons du soleil ardent, les lieux plantés de rivières, etc., deviennent également très-funestes, lorsqu'ils sont arrosés par des

pluies, après des chaleurs plus ou moins prolongées.

SEPTIÈME PROPOSITION.

C'est surtout dans les pays chauds que les terrains marécageux deviennent nuisibles à la santé de l'homme, et sont favorables au développement des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CV. REMARQUES. On conçoit, en effet, sans peine, que la chaleur du climat accélérant la décomposition des végétaux, et celle de toutes les matières putrescibles, doit accroître considérablement la quantité et l'énergie délétère des miasmes. On conçoit aussi que l'action évaporatrice du soleil, qui est très-forte sous la zône torride, se joignant à la force attractive et dissolvante de l'air atmosphérique, doit singulièrement favoriser l'exhalaison, soit des gaz pernicioeux, qui sont le résultat de la putréfaction dont il s'agit, soit des molécules même de toutes les substances décomposées, qui s'élèvent et restent suspendues dans l'atmosphère. M. Cassan, observateur très-recommandable, dit que cet effet du soleil étoit principalement remarquable dans le temps de l'hivernage, qui est, dans les contrées de la zône torride, la saison la plus chaude et la plus humide de l'année.

Il ajoute que les exhalaisons des marais sont surtout funestes dans tous les pays chauds, lorsqu'on creuse des fossés qui doivent servir à leur dessèchement, et qu'on ouvre le terrain pour la première fois avec la charrue ou avec la houe. Une expérience de deux siècles a appris que leurs ravages sont alors aussi terribles et aussi prompts que ceux de la peste; surtout si on laisse les ouvriers passer la nuit sur les lieux qu'ils ont semencés et plantés pendant le jour. Lorsque M. Casan étoit médecin en chef des hôpitaux militaires de l'île Sainte-Lucie, qui passe pour la plus malsaine des Antilles, il eut occasion d'observer un exemple funeste des effets dont nous venons de parler. Vingt-huit soldats de la garnison du *Morne-Fortuné* avoient obtenu la permission d'aller travailler pour deux colons qui défrichoient des terrains dans un endroit très-humide et très-marécageux qu'on appelle le *grand cul-de-sac*. Ils avoient entrepris de faire un certain ouvrage pour une somme déterminée, et le désir de parvenir à leur but, les porta à se livrer au travail avec une ardeur qui ne leur permit pas de calculer leurs forces et le danger auquel ils étoient exposés. En moins d'une semaine, ces vingt-huit soldats, sans exception d'un seul, furent portés à l'hôpital. Trois moururent en fort peu de jours du *cholera-morbus*; cinq d'une dysenterie sanguine et bilieuse, qui fut accompagnée

jusqu'à la mort des épreintes les plus cruelles ; quatre périrent d'une fièvre adynamique , dans laquelle tout leur corps , devenu jaune , exhaloit une odeur si infecte , qu'on ne pouvoit approcher de leur lit sans avoir la respiration étouffée. Les autres enfin , après avoir éprouvé des fièvres pernicieuses plus ou moins graves , se rétablirent ; mais ils eurent une convalescence extrêmement pénible , qui ne se termina que par un voyage aux eaux minérales. Le compte que M. Cassan rendit de cette catastrophe , fit sur-le-champ proclamer une ordonnance par laquelle il étoit défendu d'accorder de nouvelles permissions aux soldats pour aller travailler chez les habitans de l'île.

Les fièvres pernicieuses intermittentes sont très-fréquentes en Égypte , ainsi que l'assure M. Pignet (*Mémoires sur les fièvres pestilentielle et insidieuses du Levant*). Ce médecin a très-bien établi l'identité qui existe entre ce genre d'affection et ce qu'on nomme , en langue du pays , le *dem-el-mouïa*. Il paroît que Prosper Alpin avoit observé plusieurs fois ces fièvres , mais qu'il les avoit imparfaitement déterminées. M. Pignet le prouve en rapprochant et en comparant , avec beaucoup de sagacité , les observations consignées dans l'ouvrage de cet auteur avec celles qu'il a eu occasion de faire lui-même à l'hôpital d'Ibrahim-Bey.

HUITIÈME PROPOSITION.

L'habitude peut affoiblir jusqu'à un certain point l'influence des émanations marécageuses sur l'économie vivante, et les rendre moins efficaces pour la production des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CVI. REMARQUES. Cette proposition est appuyée sur les observations de tous les siècles, et nous savons que des peuples entiers habitent des contrées marécageuses, sans en éprouver des atteintes fâcheuses. Lancisi remarque en outre, que ceux qui se rendent pour la première fois dans des lieux malsains, sont d'autant plus affectés qu'ils ont été plus long-temps habitués à un air pur (1). Les voyageurs attestent aussi que la fièvre si éminemment pernicieuse, désignée communément par le nom de fièvre *jaune*, ou maladie de *Siam*, et si bien décrite par Lind, Rouppe, Hyllary, Bruce, Robertson, Valentin, Delmas, Volney, etc., n'attaque presque jamais que les Européens qui se rendent aux Indes occidentales. Les habitans indigènes sont communément épargnés. (2)

(1) *At verò qui è puro cælo ad palustre se conferunt, eò deterius afficiuntur, quo feliciori assueverint, et connutriti fuerint. De nox. palud. effluv.*

(2) On peut lire, dans le Voyage du lord Macartney,

Thomal Raynal, en décrivant le climat de la Basse-Louisiane, observe que ce pays est couvert de brouillards dans la saison du printemps et dans celle de l'automne. Malgré les pluies qui y règnent tout l'hiver, malgré les forêts épaisses qui couvrent le sol, et le rendent inaccessibles aux rayons du soleil, malgré la multitude des eaux croupissantes et marécageuses, les habitans y sont peu sujets aux maladies. Le philosophe que je viens de citer, se demande à quoi il faut attribuer cette salubrité; si c'est aux orages qui sont si fréquens dans cette contrée, à la nature des vents qui y soufflent, ou

un exposé des ravages que les fièvres intermittentes pernicieuses exercent sur les étrangers nouvellement arrivés à Batavia, et qui ne sont point habitués au climat, tandis que les naturels sont épargnés. Il paroît qu'elles y sont le plus souvent mortelles, après deux ou trois paroxysmes. Ces fièvres, d'après le rapport du docteur Gillan, y sont spécialement marquées par un délire continuel et par une altération profonde des fonctions du cerveau. Mais par une fatalité difficile à concevoir, les médecins qui pratiquent l'art dans ces climats n'ont aucune notion des véritables méthodes médicales; ils négligent entièrement l'administration du quinquina. Ils n'ont d'autres remèdes à opposer à la fièvre qu'une solution de camphre dans l'esprit-de-vin. Ils en mettent de temps en temps une cuillerée dans un verre d'eau, pour la faire avaler aux malades; aussi quand les fièvres intermittentes n'y sont pas rapidement funestes, elles s'y perpétuent plusieurs années.

à des feux qu'on a coutume d'y allumer pour opérer la combustion des roseaux et autres productions végétales, nuisibles à la naissance et à l'accroissement des plantes utiles (1). Mais il paroît que ce phénomène doit être spécialement rapporté à l'habitude des peuples qui sont familiarisés avec l'influence de cet atmosphère; ce qui le prouve, c'est que les étrangers y sont sujets à tous les inconvéniens de la localité.

NEUVIÈME PROPOSITION.

Les miasmes marécageux favorisent d'autant plus l'invasion des Fièvres pernicieuses intermittentes, que le système vivant a déjà été affoibli par des causes sédatives.

CVII. REMARQUES. C'est ainsi que les fièvres tierces pernicieuses observées par Lancisi, et dont il a été question au commencement de ce Traité, attaquoient principalement les indigens qui usoient d'une mauvaise nourriture, et qui avoient été sujets aux obstructions des viscères avant que l'épidémie eût commencé; c'est ainsi qu'au rapport du docteur Wind, dans la Zélande occidentale, ravagée par les

(1) *Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les Deux-Indes*, tom. VIII.

fièvres doubles - tierces , vers la fin d'août et au commencement de septembre , ceux qui ne font aucun écart dans le régime , qui sont aussi bien logés que bien vêtus , et qui font un usage habituel du vin , échappent mieux aux dangers de la saison que les personnes indigentes , affoiblies par la disette , et exposées sans cesse aux intempéries de l'air. Lind lui-même a vu que les fièvres les plus funestes attaquoient de préférence les individus qui avoient de la tendance au scorbut. Il est inutile d'exposer de nouveau , dans cet ouvrage , combien des impressions aussi débilitantes que la crainte et la tristesse , par exemple , disposent singulièrement aux atteintes des miasmes et de la contagion. Il est peu d'épidémies où ce phénomène ne soit observé , et un médecin de Bergame a montré beaucoup de philosophie en composant un livre entier , dont le but est d'apprécier l'influence du courage dans le traitement des maladies. Le même sujet a été traité par un élève de l'hôpital Saint-Louis. Van-Helmont, Gaubius , Willis , Cheyne , Fuller , Werlhof , et beaucoup d'autres observateurs , citent les faits les plus concluans. J'ai vu régner des fièvres ataxiques continues et des fièvres pernicieuses intermittentes parmi des personnes dont le genre de vie avoit été absolument différent : c'étoient des ecclésiastiques et des militaires , la plupart proscrits pour leurs opinions politiques. Ceux qui avoient le

plus d'espoir de recouvrer leur liberté, furent en général ceux qui furent le moins atteints. Les soldats, peu accessibles à la peur, étoient aussi plus facilement garantis de l'infection. Tout porte à croire que les peines et les souffrances de l'âme exercent sur le principe de l'irritabilité une action qui n'a pas été profondément étudiée, et qu'elles disposent ainsi directement le système humain à recevoir les atteintes des causes destructives qui l'environnent.

DIXIÈME PROPOSITION.

La question que Lind a voulu résoudre, en recherchant combien de temps les effets d'un air vicié pouvoient rester cachés dans le corps humain, sans manifester leur existence par le développement de la fièvre, est encore imparfaitement déterminée.

CVIII. REMARQUES. Il résulte des observations de Lind à ce sujet, que quelques individus ont éprouvé sur-le-champ des nausées, ou sont tombés dans le délire; que d'autres n'ont été frappés de ces accidens qu'après avoir passé deux ou trois jours à bord; que plusieurs n'ont été que foiblement indisposés les cinq ou six premiers jours, et que certains malades (à la vérité en petit nombre) n'ont commencé à ressentir des dérangemens que vers le

dixième ou le douzième jour. Ces faits, d'après l'assurance de Lind, ont été remarqués sur beaucoup de personnes qui avoient quitté leurs bâtimens pour coucher à terre pendant la mauvaise saison, et qui, d'après cela, ont été les seuls qu'on ait vus malades parmi tous les individus composant l'équipage d'un vaisseau mouillé dans une rade bien ouverte. (1)

M. Baumes, professeur à l'école de médecine de Montpellier, s'est aussi occupé de ce problème. Il a pensé, d'après des faits observés qui lui sont propres, que dans les corps affectés par des miasmes marécageux, les paroxysmes de la fièvre se déclaroient durant les quinze premiers jours, et principalement vers le cinquième ou le septième jour chez les uns, et vers le douzième ou le quatorzième chez les autres. (2)

Au surplus, il est probable qu'indépendamment des lois particulières de l'économie vivante qui peuvent exciter les mouvemens de la fièvre à une époque déterminée depuis l'infection, les données qui doivent servir à la solution du problème pro-

(1) *Essai sur les Maladies des Européens dans les pays chauds*, tom. I.

(2) Consultez le Mémoire où il a traité des *Effets des émanations marécageuses sur l'économie vivante*.

posé, dépendent en grande partie du degré de virulence de la matière de l'infection, de la voie qu'elle prend pour s'introduire dans l'économie animale, et spécialement du degré de susceptibilité des individus.

ONZIÈME PROPOSITION.

L'état actuel de nos connoissances ne nous permet pas d'établir d'une manière certaine quel est le mode d'action des miasmes marécageux sur l'économie vivante, pour effectuer la production des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CIX. REMARQUES. Quelques médecins ont avancé que les miasmes marécageux agissoient directement sur le système nerveux, pour en diminuer l'énergie; d'autres ont prétendu que ces miasmes opéroient en décidant la diathèse septique du sang et des humeurs; il est des auteurs qui, leur attribuant une affinité chimérique avec la bile, veulent que par leur mélange avec elle, ils en dérèglent les fonctions, etc. La bonne méthode de philosopher ne sauroit admettre des assertions aussi vagues et aussi hasardées. Le vrai médecin se maintient sobre de théories, et se borne à la simple considération des phénomènes de l'état maladif. Nous observerons seulement que les symptômes qui se manifestent dans les lieux où ces fièvres se portent au plus

haut degré de violence, tels que le délire subit, les contractions et les vomissemens forcés de l'estomac, les convulsions, la chute rapide du système des forces, l'altération physique de la peau, etc., font du moins conjecturer que la première impression des miasmes se porte immédiatement sur le principe de la sensibilité. Par suite de cette impression, les parties molles sont souvent frappées d'un état de phlegmasie et de décomposition septique, comme dans la fièvre des camps et des armées. (1)

DOUZIÈME PROPOSITION.

On n'a point encore assez de faits pour déterminer jusqu'à quel point les phases lunaires, les marées, l'électricité de l'atmosphère, les météores, etc., peuvent fortifier l'influence des émanations marécageuses, dans la production des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CX. REMARQUES. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'on a du moins observé que ces phénomènes agissent sensiblement sur l'état des malades, et qu'on a souvent cru pouvoir prédire d'après cette considération l'instant auquel ils devoient succomber. C'est ainsi qu'au Bengale, et d'après le rapport de Lind, la mort arrive fréquemment une heure

(1) *Henrici scretæ de febre castrensi malignâ seu partium mollium inflammatione, etc.*

après la cessation de la marée. Cette remarque, du reste, est plus importante qu'on ne l'imagine; elle prouve l'avantage qu'il y a d'administrer le quinquina aux époques de la pleine lune et au renouvellement des phases de cet astre (1). Quant à ce qui concerne l'influence de l'électricité, si l'on songe qu'elle accompagne presque toujours les brouillards et les exhalaisons qui s'élèvent des marécages, qu'elle enfante les météores, qu'elle préside à la formation des pluies, etc., on ne peut alors disconvenir qu'elle ne soit digne de toute l'attention des médecins. Le célèbre Achard, de Berlin, a publié un mémoire curieux, où il a pour objet de démontrer la nécessité de cet examen, pour la certitude et les progrès des observations météorologiques. (2)

TREIZIÈME PROPOSITION.

La présence des végétaux vivans dans les lieux infectés par l'air des marais, tempère son influence pernicieuse, et diminue son activité dans la production des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXI. REMARQUES. Lancisi n'est pas le premier qui ait insisté sur l'utilité de la plantation des fo-

(1) *Des Malad. des Européens dans les pays chauds*, t. I.

(2) *Journal de Physique de l'abbé Rozier*, tom. XXIII.

rêts, pour rétablir la salubrité de l'atmosphère. Cette opinion a été celle des premiers observateurs. Changeux, habile physicien, remarque qu'elle est fort ancienne en Asie, surtout chez les Persans, qui, dans cette vue, cultivent des arbres et spécialement des platanes, aux environs et au milieu de leurs villes. (1)

Les expériences des modernes, et particulièrement les travaux du physicien Ingenhouzs, ont jeté du jour sur ce phénomène; mais personne n'a traité plus amplement ce sujet intéressant que feu M. Senebier de Genève, dans le troisième volume de son excellent ouvrage sur la physiologie végétale (2). Nous croyons devoir relater ici les belles expériences qu'il a tentées sur cet objet, l'art de purifier l'atmosphère devant devenir un jour un des principaux moyens de l'art de guérir.

Les feuilles des végétaux immergées dans l'eau, et exposées ainsi aux rayons du soleil (après avoir été préalablement purgées de toute espèce d'air, à l'aide de lotions réitérées et de l'appareil pneumatique), laissent échapper des bulles qu'on peut recueillir à la surface de l'eau, et constater comme

(1) *Journal de Physique de l'abbé Rozier*, tom. VII.

(2) Tom. III, pag. 184.

étant du gaz oxigène. M. Senebier a prouvé que ce gaz qui s'échappe émane véritablement des végétaux, et non du fluide dans lequel ils sont plongés; qu'il est le résultat d'un travail organique qui a lieu dans leur économie. Pour démontrer cette assertion, il a commencé par rechercher la nature de l'air qui étoit adhérent à la surface de leurs feuilles; ayant en conséquence éprouvé cet air pris sur des feuilles de pêcher ou des feuilles de choux, il a trouvé qu'il étoit même inférieur en pureté à l'air commun ou air atmosphérique, puisqu'il contenoit une assez grande quantité d'acide carbonique.

Le physiologiste de Genève pense, en second lieu, que c'est du parenchyme vert que provient l'air obtenu des végétaux plongés dans l'eau et exposés au soleil. Il le prouve par l'expérience suivante: il enleva l'épiderme d'une feuille de joubarbe (*sempervivum*) et le plongea dans l'eau; il n'obtint pas des bulles d'air; il immergea alors le parenchyme écorché de cette même feuille, et des bulles d'air se dégagèrent avec abondance. Il agit de la même manière avec des feuilles auxquelles il n'avoit laissé que des nervures, et il ne réussit pas.

En troisième lieu, la production du gaz oxigène par les feuilles sous l'eau, semble s'opérer par l'intermède de l'acide carbonique. Les travaux de

Senebier tendent à vérifier ce fait. « Je fus cu-
» rieux , dit ce savant , de constater l'influence de
» l'acide carbonique dissous dans l'eau sur la végé-
» tation par une expérience. Je pris quatre plantes
» de menthe , égales et semblables ; je coupai leurs
» racines , et je laissai à leurs sommités le même
» nombre de feuilles ; je les mis dans quatre bou-
» teilles de la même forme et de la même capacité :
» elles avoient des cols étroits , presque fermés par
» les plantes qui y étoient placées ; j'en remplis
» une avec l'eau commune qui contenoit de l'acide
» carbonique , et dont je remplaçois toutes les
» douze heures l'eau sucée et évaporée ; j'en rem-
» plis une seconde avec la même eau que je vidois
» toutes les douze heures pour la renouveler en-
» tièrement ; j'en remplis une troisième avec l'eau
» bouillie dont je remplaçois le *déficit* avec la
» même eau toutes les douze heures. Enfin , je
» remplis la quatrième avec l'eau bouillie , que je
» renouvelois entièrement deux fois dans les vingt-
» quatre heures. Tout cela fut disposé de cette
» manière au milieu de prairial , et subsista jusqu'à
» la fin de vendémiaire. La première et la troisième
» eurent des racines cinq ou six jours après ; la se-
» conde n'en montra qu'au bout du dixième jour ,
» et la quatrième au bout du quinzième ; mais en-
» suite les progrès de la seconde furent plus rapides
» et plus considérables que ceux de toutes les

» autres, dont la première étoit encore fort éloignée.
» La quatrième eut toujours un air malade, et la
» troisième annonçoit plus de vigueur, parce qu'il
» s'étoit formé de l'acide carbonique par la disso-
» lution ou l'altération des racines, qui n'avoit pu
» produire un effet aussi grand sur l'eau de la qua-
» trième si souvent renouvelée. Si la seconde, au
» contraire, offrit une si belle végétation, n'est-ce
» point parce que le renouvellement de l'eau occa-
» sionnoit un renouvellement d'acide carbonique? »

Senebier appuie en outre son assertion sur la quantité de charbon que les plantes fournissent. Ce charbon résulte de la décomposition de l'acide carbonique qui pénètre facilement leur substance. Sans cela comment le charbon pourroit-il être dissoluble dans l'eau ?

D'autres faits concourent à prouver la théorie de Senebier. Les produits végétaux les plus élaborés, tels que les résines, les huiles, sont aussi ceux qui contiennent le carbone en plus grande proportion. On en trouve surtout dans la partie colorante des feuilles des plantes. Leur substance corticale en donne plus que leur substance ligneuse, etc. Que les physiiciens portent leur attention sur les plantes que l'on fait croître dans l'eau ou sous l'eau, ils trouveront qu'elles renferment presque une aussi grande quantité de carbone que les autres, malgré

que ce principe ne puisse leur être fourni que par l'acide carbonique du liquide dans lequel elles se trouvent plongées. Il est aisé de voir que l'air atmosphérique est pour elles une source intarissable de ce principe si nécessaire à leur existence ; aussi ne tardent-elles pas à périr lorsqu'elles cessent de communiquer avec l'atmosphère.

Il est un nombre infini de plantes dont les feuilles sont beaucoup plus grandes que les racines , telles , par exemple , que celles que l'on désigne communément sous le nom de plantes *grasses* , elles végètent et prospèrent sur le sol le plus aride. Lorsqu'on les a privées de leurs racines , elles croissent même encore quelque temps , parce que leurs feuilles très-étendues suppléent à cet organe , et continuent de prendre dans l'air atmosphérique le gaz acide carbonique qui sert à leur développement.

Au surplus , un Mémoire de M. de Saussure le fils est très-propre à démontrer l'utilité de cet acide carbonique contenu dans l'air , sur la végétation. Ses résultats sont les suivans : il conste que les plantes végètent vigoureusement au soleil , dans une atmosphère qui contient un douzième de son volume d'acide carbonique , et qu'en même temps ces plantes augmentent de poids. D'une autre part , l'acide élaboré et décomposé par les organes végétaux , diminue d'une manière con-

sidérable. En effet, ce mélange d'air ordinaire avec l'acide carbonique, dont nous venons de parler, devient plus pur que l'air commun lui-même. Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'on expose les plantes à l'ombre; alors la plus petite quantité d'acide carbonique mêlée à l'air commun devient préjudiciable à leur végétation; ce qui provient, d'après l'idée de Senebier, de ce que les végétaux placés à l'obscurité, diminuent considérablement la proportion de l'oxigène de l'atmosphère, leur carbone se combinant avec ce principe, ainsi que le prouve la diminution même de cette atmosphère.

La nécessité de l'acide carbonique dans l'air commun pour la végétation, est en outre clairement démontrée au moyen de l'expérience suivante, faite par M. de Saussure : elle consiste à introduire en pleine campagne, et dans un grand ballon, dont on aura tapissé intérieurement la surface inférieure avec de la chaux éteinte par l'eau distillée et séchée à l'air, une branche de chèvrefeuille, tenant au terrain et ne touchant pas la chaux; on ferme soigneusement le ballon. On place en même temps dans un ballon semblable, mais qui n'est point intérieurement tapissé de chaux, une seconde branche de chèvrefeuille, et on ferme le ballon avec la même exactitude. A l'époque où M. de Saussure tenta cette expérience, il vit au bout de douze jours le rameau

du premier ballon se dépouiller de ses feuilles, et la chaux se saturer d'acide carbonique : l'autre branche au contraire resta verte et conserva toute sa vigueur. Or, la chute des feuilles du rameau introduit dans le premier ballon, dont nous avons parlé, prouve bien manifestement qu'elles avoient perdu un aliment essentiel dans l'acide carbonique de l'air ambiant, qui, dans cette circonstance, s'étoit combiné avec la chaux éteinte du premier ballon.

L'acide carbonique pénètre-t-il dans les racines et les feuilles des végétaux sous forme de gaz, ou passe-t-il étant préalablement dissous dans l'eau? Les essais de Senebier l'ont déterminé à adopter le dernier avis. La circulation d'un fluide gazeux et élastique étant donc très-difficile dans les plantes, il n'est pas étonnant qu'on les voie périr quelquefois, lorsqu'on les expose à l'action de l'acide carbonique, tandis qu'au contraire ce même gaz favorise très-bien leur développement, lorsqu'il est charrié par l'eau qui le dépose dans les vaisseaux capillaires des plantes. On explique ainsi comment ce jardin, arrosé par les eaux du Vésuve, pouvoit prospérer merveilleusement au rapport de della Torre; et Senebier présume avec fondement, que les eaux qui roulent sur les volcans, acidulées par l'acide carbonique, doivent coopérer en grande partie à

cette belle végétation qu'on admire au pied du mont Etna, dont les éruptions sont si célèbres.

Senebier examine dans son ouvrage une autre question non moins intéressante pour le physicien. Il y cherche à déterminer si l'acide carbonique préalablement dissous dans l'eau, pénètre le pétiole des feuilles pour arriver jusqu'à elles. Après avoir tenté plusieurs essais pour résoudre ce problème, il imagina de faire passer dans des récipients pleins d'eau chargée d'acide carbonique des branches de pêcher avec leurs feuilles, de manière que les unes fussent plongées par leurs sommités dans une bouteille vide, où elles étoient soudées avec un lut qui empêchoit l'eau de pénétrer : il introduisit ensuite une autre branche de pêcher absolument semblable à la première, dans une bouteille d'eau chargée d'acide carbonique, qu'il luta avec la même précaution. « Tout, dit le physiologiste de Genève, » étoit parfaitement semblable dans les rameaux, » dans l'exposition au soleil, dans la capacité des » récipients, etc. Au bout de dix heures, le rameau » plongeant dans la bouteille sèche, me fournit un » volume de gaz oxigène égal à celui de 134,546 » grammes, ou 2,535 grains d'eau ; le rameau qui » plongeait dans la bouteille pleine d'eau chargée » d'acide carbonique, me donna un volume de gaz » oxigène égal à celui de 255,559 grammes, ou

» 4,815 grains d'eau , avec une diminution de l'eau
» de la bouteille assez remarquable. J'ai répété sou-
» vent cette expérience , et j'ai toujours eu un vo-
» lume d'air plus grand du rameau plongeant dans
» la bouteille pleine d'eau aérée que de celui qui
» plongeait dans la bouteille vide , mais avec des
» proportions différentes , suivant la nature des
» eaux employées , pour servir de milieu et remplir
» la petite bouteille. Il paroît donc que l'acide car-
» bonique passe avec l'eau dans la feuille par son
» pétiole , qu'il la pénètre par ses pores , et que la
» feuille le décompose. »

En rendant ainsi compte dans cette dissertation du beau travail de Senebier , sur une partie aussi intéressante de la physiologie végétale , nous ne devons pas oublier de faire mention des objections qu'on lui a faites , et de la manière dont il les a résolues. Je n'ai pas besoin de rappeler à mes lecteurs que Spallanzani , dont le nom est pour la science un objet d'admiration et de regrets , s'étoit assidument occupé de semblables recherches dans les dernières années de sa vie. Ce grand observateur avoit remarqué que quelques végétaux , et notamment les plantes grasses , ne laissoient pas de donner de l'oxygène sous l'eau , quoique ce liquide eût été préalablement purgé d'acide carbonique par le secours de l'eau de chaux.

Il présuma dès lors que le dégagement de ce gaz pourroit bien ne pas provenir de la décomposition de l'acide carbonique de l'eau, qui n'en contenoit plus. Il fit part de ce fait au naturaliste de Genève, qui chercha aussitôt à le constater par une multitude d'expériences dont il seroit trop long de consigner ici les détails. Il en résulte néanmoins que le gaz oxigène fourni par les plantes exposées au soleil sous l'eau privée d'acide carbonique par l'eau de chaux, ou sous l'eau préalablement soumise à l'ébullition, provient de l'acide carbonique que renferme le parenchyme des feuilles, parenchyme qui a communément beaucoup de consistance dans les végétaux, chez lesquels un pareil phénomène se manifeste. Il est aisé de voir cet acide carbonique se dégager lorsqu'on procède à l'expérience avec l'eau de chaux sous l'appareil pneumatique.

« Cette probabilité augmente, dit l'auteur, quand
» on considère que la quantité du gaz oxigène pro-
» duit par les feuilles exposées sous l'eau chargée
» d'acide carbonique, n'est point proportionnelle à
» la quantité d'air qu'elles contiennent individuel-
» lement, mais à une certaine quantité du gaz acide
» carbonique dissous dans l'eau ; de sorte que cette
» augmentation du gaz oxigène rendu doit avoir
» une cause ; mais comme on ne peut la trouver,
» suivant mes expériences, ni dans la feuille, ni

» dans l'eau, il faut qu'elle soit dans l'acide carbo-
» nique décomposé. Cette considération devient
» plus pressante, quand on voit que la quantité
» d'air rendu au soleil par les feuilles, dans l'eau
» bouillie, diminue chaque fois en les changeant
» d'eau au bout de quelques heures, parce que la
» source de cet air se tarit à mesure qu'elle s'é-
» coule. Cependant lorsqu'elle a été ainsi épuisée,
» on la renouvelle à volonté, en introduisant de
» l'acide carbonique dans cette eau, ou en faisant
» passer la feuille dans une eau chargée de cet
» acide : alors le gaz oxigène reparoît au soleil,
» comme si la feuille n'avoit pas cessé d'en fournir.
» D'ailleurs, on remarque l'influence directe de
» l'acide carbonique dissous dans l'eau, sur la
» feuille qu'on y place, puisque les feuilles qui
» gagnent le fond de l'eau bouillie, par leur éva-
» cuation naturelle au soleil, ou par celle que la
» pompe pneumatique opère, surnagent au bout
» de quelques minutes, quand on les place dans
» l'eau chargée d'acide carbonique ; mais si elles
» donnent alors du gaz oxigène au soleil, n'est-il
» pas bien probable que celui qu'elles ont rendu
» d'abord dans l'eau bouillie, est comme celui
» qu'elles rendent alors dans l'eau chargée d'acide
» carbonique, le produit de la décomposition de
» cet acide, que ces feuilles contenoient avec abon-
» dance dans leur épais parenchyme ? Cela me

» paroît d'autant plus vrai , que ces feuilles , qui ne
» donnent plus de gaz oxigène sous l'eau bouillie ,
» en fournissent de nouveau dans cette eau , quand
» elles ont été mises dans l'eau chargée d'acide car-
» bonique.

» Les feuilles de cette espèce qui ont donné le
» plus d'air étoient d'abord gonflées , sans rides ,
» et surnageoient ; elles contenoient donc l'air
» qu'elles ont rendu , où il étoit combiné dans
» l'acide carbonique. Ces feuilles ont donc rendu
» au soleil, dans l'eau bouillie , l'oxigène qui fai-
» soit partie de cet acide ; aussi elles s'enfoncent
» dans cette eau quand elles l'ont perdu , parce
» qu'elles ne peuvent plus le renouveler ; tandis
» que les mêmes feuilles placées dans l'eau chargée
» d'acide carbonique, surnagent bien plus long-
» temps , quoiqu'elles fournissent beaucoup plus
» d'air, parce qu'elles reprennent de l'acide carbo-
» nique dans l'eau à mesure qu'il s'y décompose ;
» mais elles gagnent aussi le fond lorsqu'elles se
» désorganisent , et elles sont alors flasques et
» ridées. »

Hassenfratz avoit pareillement combattu la théo-
rie de Senebier, par plusieurs argumens qu'il
n'est pas inutile de faire connoître (1). Il ob-

(1) Voyez les *Annales de Chimie*, juin 1792.

jecte 1°. que les végétaux que l'on fait croître dans l'eau saturée d'acide carbonique ne fournissent pas une plus grande quantité de carbone que les autres, lorsqu'on les soumet à l'analyse chimique ; 2°. que l'air pur qui se dégage, résulte plutôt de la décomposition de l'eau que de celle de l'acide carbonique ; 3°. que si dans la végétation il y avoit réellement décomposition de l'acide carbonique, et dégagement de gaz oxigène dans l'atmosphère, il s'en suivroit qu'en plaçant une plante sous une cloche contenant une très-petite quantité d'air commun, l'air de cette cloche devroit en très-peu de temps augmenter de volume ; et que cependant il conste, par l'expérience, que cet air n'est ni accru, ni amélioré par cette opération.

Senebier répond à la première objection, que chaque plante ne peut se combiner qu'avec une quantité donnée de carbone, quantité qui est constamment relative à son organisme particulier. Il est bien vrai que les végétaux que l'on fait croître dans l'eau fournissent les mêmes produits que ceux qui croissent dans la terre ; mais ils ont aussi beaucoup moins de vigueur, sans doute, parce qu'ils ne peuvent point assimiler à leur économie tous les élémens qui leur conviennent ; elles reçoivent par conséquent une moindre proportion de carbone. D'une autre part, les végétaux aquatiques qu'on voit

se développer et fleurir dans l'eau pure des fontaines, et sur un sable purement silicieux et perpétuellement lavé, présentant à l'analyse la même quantité de carbone qu'ils n'ont pu prendre que dans l'acide carbonique contenu dans l'air atmosphérique, etc. Quant à la deuxième objection du professeur Hassenfratz, qui tend à établir qu'il n'y a point d'acide carbonique décomposé par la végétation, et que l'air pur obtenu est produit par la décomposition de l'eau, il n'est pas facile de l'admettre, parce qu'elle n'est fondée que sur une simple conjecture, tandis que l'assertion de Senebier repose sur des faits constatés. Le troisième fait, allégué par Hassenfratz, est d'un plus grand poids. Mais le physiologiste de Genève, après plusieurs essais réitérés, a constamment remarqué que l'air contenu dans des cloches de verre, sous lesquelles on avoit placé quelques branches de végétaux, devenoit meilleur après qu'avant l'introduction de ces branches. Cet air devenoit bien plus pur lorsqu'on renouveloit les branches, et qu'on ne les laissoit point sous les cloches pendant la nuit, surtout lorsque le rameau introduit dans le vase continuoit de tenir au végétal.

Non content de ces résultats, Senebier raconte qu'il tenta d'autres expériences. Il fit passer dans des récipients de gaz hydrogène et de gaz azote très-

pur , plusieurs branches de végétaux , et il s'assura ensuite , par les essais eudiométriques , que ces gaz étoient devenus plus respirables. Le premier , en effet , détonnoit dans le pistolet de Volta , et le second faisoit brûler une bougie avec beaucoup de vivacité ; ce qui n'auroit pas eu lieu , s'ils n'avoient pas reçu des rameaux des plantes une quantité déterminée de gaz oxigène. Ces expériences ayant été faites avec l'air commun , ce dernier s'améliora aussi d'une manière sensible.

Senebier n'adopta pas non plus l'opinion de Hassenfratz , qui croit que le carbone s'introduit en grande partie dans les plantes , par le moyen des graines et des oignons. Ceci , dit-il , seroit plus compréhensible pour les oignons ; toutefois , comme on les voit végéter uniquement par leurs feuilles , lorsqu'on les tient immergées et en plein air , et comme alors le gaz oxigène s'échappe continuellement de ces feuilles , Senebier présume que l'oignon est presque passif dans cette végétation singulière , et que la plante vit plutôt aux dépens des feuilles , etc. Hassenfratz avoit pareillement avancé dans son Mémoire , que le carbone contenu dans le fumier et suspendu dans l'eau , pouvoit bien aussi passer jusque dans l'intérieur des végétaux ; mais outre que le charbon est indissoluble dans l'eau , les calibres des vaisseaux des plantes ont trop peu de capacité pour l'admettre dans cet état.

Après une réfutation étendue et complète des faits opposés par Hassenfratz , notre habile expérimentateur examine , dans le même chapitre de son ouvrage , plusieurs autres points de physiologie végétale que nous omettons , parce qu'ils n'ont point un rapport assez direct avec l'objet spécial que nous cherchons à éclaircir. Nous nous hâtons d'arriver à l'article où il cherche à s'assurer si réellement le gaz oxigène que les végétaux répandent constamment dans l'atmosphère, est un des moyens dont la nature se sert pour réparer les nombreuses altérations qu'elle peut subir. Il avoue qu'il avoit procédé d'abord à une multitude d'expériences , en essayant les divers gaz émanés des végétaux , soit pendant le jour , soit pendant la nuit , soit à l'ombre , soit à la lumière du soleil , et qu'il n'y avoit pas trouvé une différence bien sensible. Mais dans la correspondance scientifique qu'il entretenoit avec Spallanzani , ce dernier lui apprit que s'étant occupé de ce point particulier de physique végétale , il avoit assez constamment reconnu que l'atmosphère des plantes soumises à l'action de la lumière solaire avoit plus de pureté que l'atmosphère de celles qui étoient exposées à l'ombre ; que par conséquent l'air de la nuit est inférieur par ses qualités à celui du jour.

Senebier émet à ce sujet quelques idées ingé-

nieuses qu'il importe de placer ici ; il fait remarquer que ce moyen de purifier l'atmosphère a nécessairement un effet moins puissant pendant l'hiver ; mais qu'aussi dans cette saison les causes de l'altération de l'air sont plus rares et bien moins énergiques. Dans les pays chauds, au contraire, où ces mêmes causes sont aussi actives qu'abondantes, on observe une multitude de plantes qui, végétant toute l'année, réparent perpétuellement l'atmosphère par l'oxigène qu'elles dégagent. Dans nos climats même, cette ressource féconde dans la nature est bien loin d'être épuisée pendant l'hiver : nos plantes vertes continuent de fournir du gaz oxigène. Dans ce nombre, il faut surtout compter les nombreuses familles des graminées vivaces, des mousses, des fougères, des tremelles, des conferves, etc.

On sait que c'est surtout aux premières recherches du célèbre Priestley, que nous devons nos connoissances sur la purification de l'atmosphère par les végétaux. Le physicien Changeux, que nous avons cité en commençant cet article, ne croit pas qu'on puisse toujours rapporter ce phénomène aux causes qu'on lui a jusqu'ici assignées. Il fait remarquer que les plantes soit odorantes, soit inodores, ont toujours leurs esprits recteurs, et que leurs émanations se combinant avec les vapeurs dange-

reuses qui s'élèvent des marécages, ou que la chaleur dégage du sol, peuvent en neutraliser la pernicieuse influence. D'après sa manière de voir, les végétaux agissent par deux modes divers, sur les exhalaisons qui tendent à infecter l'atmosphère. Les végétaux odorans, par exemple, agissent plus par leurs émanations que par absorption. Ces émanations se mêlent à l'air que nous respirons, et en corrigent les différens vices par les qualités qui leur sont particulières. Les végétaux inodores, au contraire, agissent plus par leur faculté absorbante que par leurs émanations : ils déchargent l'air des vapeurs qui l'infectent, etc. (*Voyez l'expérience dont Changeux appuie son assertion.*) (1)

QUATORZIÈME PROPOSITION.

Toutes les matières susceptibles d'éprouver une décomposition plus ou moins putride, impriment une qualité délétère aux eaux stagnantes, et les rendent propres à la production des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXII. REMARQUES. Au rapport de Lancisi, Charles Leigh s'est aidé du microscope, pour soumettre l'eau des marais à l'examen le plus attentif, et il

(1) *Journal de Physique*, tom. VI, pag. 211.

a vu qu'elle étoit remplie d'un mélange de feuilles, d'herbes, de fleurs, de racines, de semences, de fruits, etc., d'insectes et de débris de différens animaux putréfiés.

Quoique les émanations qui résultent de ces diverses plantes en fermentation ne soient pas encore appréciées avec toute l'exactitude qu'on doit désirer, un médecin qui a fait quelques recherches sur leurs effets, augure que leurs élémens consistent dans une combinaison de gaz hydrogène, de gaz acide carbonique, de gaz azote, et peut-être de gaz ammoniacal. (1)

D'une autre part, des chimistes et des physiciens célèbres ont entrepris des travaux précieux sur les atmosphères marécageuses. Ils ont aperçu quelques différences dans les produits qu'ils ont obtenus, suivant que les fonds des eaux stagnantes contenoient plus de substances végétales ou plus

(1) Le professeur Baumes. *Voyez son Mémoire déjà cité sur les Effets des émanations marécageuses*, etc. Consultez aussi le *Tableau du climat et du sol des États-Unis d'Amérique*, par C.-F. Volney. Cet illustre voyageur a eu occasion d'observer combien le gaz hydrogène carboné, qui se dégage des matières végétales et animales putréfiées, est propre à favoriser le développement des fièvres intermittentes dans un pays couvert de marais, de flaques d'eau, de fondrières inondées, etc.

de substances animales en putréfaction (1). On ne peut douter que ces découvertes ajoutées à d'autres, ne soient un jour de la plus grande utilité

(1) Le gaz qui se dégage le plus naturellement des endroits marécageux, est de l'hydrogène qui tient en dissolution du carbone, et qui paroît contenir en outre quelque chose d'huileux et de nature animale. (Berthollet, *Leçons de l'Ecole normale*, tom. v.) Ce gaz a été l'objet d'une multitude d'observations et d'expériences par le célèbre Alexandre Volta. Ce physicien vit près du lac Majeur, près de celui de Côme, etc., qu'il suffisoit, pour en obtenir, d'agiter légèrement le fond de l'eau avec un bâton : ce gaz se manifestoit aussitôt à la surface, par des bulles sans nombre, et il étoit aisé de s'en saisir, à mesure qu'il s'échappoit, avec des carafes renversées. Il reconnut bientôt, par la seule odeur, que ce gaz étoit de nature inflammable ; il brûloit avec lenteur, et sa flamme étoit d'une belle couleur bleue. Pour que l'expérience réussisse, il est bon d'employer des vaisseaux dont l'orifice soit très-large. Dans le cas contraire, la bougie allumée n'y excite que de petites explosions, à peine perceptibles. Volta se servoit d'un vase cylindrique de verre, de trois à quatre pouces de hauteur, et d'un pouce de diamètre ; l'orifice avoit un demi-pouce.

Volta chercha à déterminer quels étoient les endroits les plus propres à dégager le gaz inflammable. Les fonds qui en donnent une plus grande quantité, sont ceux qui se composent d'un amas de plantes putréfiées, et mêlées d'une terre visqueuse et légère. Les eaux stagnantes et gâtées par les détrimens des substances végétales et animales, en

pour acquérir la connoissance parfaite de l'une des causes les plus communes des fièvres pernicieuses intermittentes.

recèlent une proportion très-considérable. Volta ne se borna point à l'examen des diverses eaux ; il fit des recherches sur les terrains fangeux qui les entouroient ; il y pratiquoit différens trous , les emplissoit d'eau , qui , à la moindre agitation , laissoit échapper le gaz inflammable. Il enfonça ensuite avec violence sa canne dans un lieu couvert d'herbes pourries , la retira soudainement pour placer devant le trou la lumière d'une bougie. Il raconte qu' aussitôt il se manifesta une flamme de couleur bleue , dont une partie s'élevoit dans l'air , tandis que l'autre plongeoit dans le fond de l'ouverture nouvellement formée. Lorsqu'il creusoit rapidement un certain nombre de trous peu distans les uns des autres , et qu'il en approchoit une chandelle allumée , c'étoit , dit-il , un spectacle merveilleux de voir la flamme courir et se propager successivement de l'un à l'autre , tantôt même s'élever à la fois de chacun d'eux. Ce phénomène explique aisément celui qui se manifeste sur plusieurs terrains , où le seul contact d'une allumette embrasée développe une flamme qui , d'après ses expressions , lèche , en les parcourant , toute leur superficie. Volta a donné le nom d'*air inflammable , natif des marais* , à ce gaz , dû le plus ordinairement à la décomposition des végétaux et des animaux , mêlés et macérés dans la vase , lequel se distingue des autres airs inflammables naturels ou factices ; par son odeur particulière facilement reconuë des chimistes accoutumés à manipuler sur les divers gaz ; par la couleur de sa flamme , qui est

Toutefois nous devons aussi ranger parmi les exhalaisons productrices des fièvres dont il s'agit, celles qui résultent du chanvre et du lin que l'on met à rouir dans des eaux croupissantes. Forestus, Salius Diversus, Benedictus, Kirker, Rivière, et une multitude d'autres auteurs, ont parlé de ces dangereuses influences. La deuxième épidémie de fièvres pernicieuses intermittentes dont Lancisi fait mention, avoit été précisément produite par cette cause; et Ramazzini, dans son *Traité des maladies des artisans*, n'a pas manqué d'insister sur le danger qu'entraîne la préparation de ces objets de commerce et d'industrie (1). Une opinion contraire ayant été émise par certains médecins, Lancisi a cherché à la concilier avec la précédente, en observant que la macération de ces substances ne présente plus les mêmes inconvéniens lorsqu'elle s'opère dans des eaux courantes.

d'un bel azur; enfin, par la lenteur avec laquelle cette flamme se déploie en formant des ondulations. (*On peut consulter le Précis des lettres d'Alexandre Volta, sur l'air inflammable des marais, dans le tome onzième du Journal de Physique de Rozier.*)

(1) *De morbis artificum diatriba.*

QUINZIÈME PROPOSITION.

Les notions que nous fournit l'eudiométrie actuelle ne jettent aucune lumière sur les qualités physiques de l'air le plus propre à développer les Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXIII. REMARQUES. On doit sans doute regarder comme étant d'un grand prix pour les progrès ultérieurs de cette partie de la physique médicale, les travaux et les inventions de Priestley, Landriani, Magellan, Gérardin, Fontana, Schéele, Gattay, de Saussure, Volta, Achard, Reboul, Seguin, Guyton-Morveau, Humboldt, etc. Mais les moyens proposés par ces savans célèbres, dans la vue d'apprécier la salubrité de l'air, n'indiquant que la quantité relative de gaz oxigène contenue dans l'atmosphère, ainsi que l'ont fait voir Jurine et Gattoni (1), ne sauroient atteindre en aucune manière la nature des corpuscules putrides charriés par ce même air, et que je regarde comme la source d'une multitude de maladies. Qui sait si le gaz oxigène réputé la plus pure portion de la masse atmosphérique, qui vient se décomposer à la surface du

(1) Les Mémoires donnés par ces deux savans se trouvent insérés dans le tome dixième des *Mémoires de l'ancienne Société de Médecine*.

corps, ou dans l'organe pulmonaire, n'en est pas lui-même le véhicule? Comment reconnoître par le secours des eudiomètres usités (1), non-seulement les émanations des substances putréfiées, mais encore les aromes particuliers de tant de corps divers, les débris et les semences d'un nombre infini de plantes microscopiques, les insectes de même nature, etc., que les corps vivans peuvent absorber?

Ajoutons que l'air des lieux bas, humides et marécageux, soumis à l'épreuve de l'eudiomètre, n'offre pas des résultats différens que celui des lieux bien exposés, qui est regardé comme le plus salubre; c'est ce qui est prouvé par une observation

(1) Les eudiomètres les plus connus sont celui de Fontana, à air nitreux, et celui de Volta, à air inflammable. On sait que plusieurs physiciens ont eu recours à la combustion du phosphore, et que Schéele employoit un mélange humecté de deux parties de limaille de fer, et d'une partie de soufre en poudre. En dernier lieu, le professeur Guyton-Morveau a proposé un eudiomètre à sulfure de potasse dont l'appareil paroît aussi simple qu'ingénieux. (*Journal de l'Ecole polytechnique*, tome II, p. 166.) Mais ayant déjà annoncé dans ma proposition générale que ces divers instrumens n'accusent aucune véritable cause des fièvres pernicieuses intermittentes, il n'est dans mon sujet, ni de les décrire, ni de discuter leurs avantages réciproques.

très - importante consignée dans le Mémoire de Gattoni , et que nous allons extraire textuellement. Elle fut faite le 15 août , en 1779 , sur l'air stagnant des marais putrides du fort de Fuentes , à l'embouchure de la Valteline.

« Quiconque (dit l'auteur) ose dormir en été
» dans ce pays-là , est sûr d'y gagner la fièvre. Or ,
» cet air fut mis en comparaison avec celui de la
» haute cime du mont Légnone , toujours couvert
» de neiges , formant chaîne avec les hautes mon-
» tagnes des Grisons , et dont l'élévation au-dessus
» du niveau de la mer est , selon le savant profes-
» seur de Milan , le P. Pini , de $4701 \frac{39}{48}$ brasses mi-
» lanaises (1440 t. ou 2880 m.) environ. En con-
» frontant donc ces deux airs dans l'eudiomètre à
» air inflammable , avec l'exactitude la plus scru-
» puleuse , l'air marécageux , contre toute attente ,
» fut trouvé de deux degrés meilleur que celui du
» Haut Légnone , me servant dans cette expérience
» d'un tube divisé en quatre cents parties égales ou
» degrés. On réitéra plusieurs fois la même expé-
» rience , en y changeant quelques circonstances de
» temps , de saison , etc. Poussée jusqu'à la quin-
» zième fois , l'on eut encore les mêmes résultats.
» Ayant ensuite confronté l'air marécageux avec
» celui de la plaine ouverte et libre de notre ville ,
» on a trouvé que l'air de la cime de Légnone avoit

» environ deux degrés de respirabilité de moins que
» le premier, qui, à l'épreuve de l'eudiomètre,
» étoit précisément au degré des airs appelés com-
» munément *salubres*. »

On ne se borna point à cette première expérience. On fit un examen comparatif de l'air des montagnes où croissoient beaucoup de végétaux, avec l'air recueilli dans onze lieux différens, tous marécageux ou remplis d'eaux stagnantes. Ceux-ci parurent être au même degré de salubrité que le premier, et analogues à l'air ordinaire (1). Cependant ces airs influent sensiblement sur la santé des habitans, au point de les rendre presque tous cachectiques, en proie aux fièvres intermittentes les plus dangereuses, tandis que les hommes des montagnes vivent sains et vigoureux.

Puisqu'il est reconnu que la salubrité de l'air n'est point généralement proportionnelle à la quantité d'oxigène qu'il contient, il est évident que quelque perfection que l'on parvienne à donner aux instrumens eudiométriques employés jusqu'à ce jour, on n'atteindra jamais le principe matériel qui influe d'une manière spéciale sur la production

(1) M. de Saussure même a, comme l'on sait, éprouvé que la production d'azote étoit plus abondante sur les montagnes que dans les plaines.

des fièvres pernicieuses intermittentes. Il convient donc de diriger plus particulièrement les recherches sur l'eau corrompue qui entre perpétuellement en combinaison avec les couches d'air qui environnent les marécages (1). C'est pour arriver à ce résultat que je tentai autrefois un grand nombre d'essais pendant que je suivais les leçons de mon excellent maître M. Pinel, à l'hospice de la Salpêtrière. Ce fut le voisinage impur de la rivière des Gobelins qui me suggéra cette idée. Je crus qu'il seroit aisé de soumettre les vapeurs malfaisantes qui s'en exhaloient à des expériences dans les temps du jour et de l'année où l'élévation de température a augmenté la capacité dissolvante de l'atmosphère.

On se serviroit , pour cet objet , d'un instrument

(1) En effet , les fièvres pernicieuses intermittentes sont plus communes dans tous les lieux bas où la dissolution aqueuse est plus considérable ; cette dernière assertion est surtout prouvée par l'expérience de d'Arcet , qui , ayant exposé un alcali caustique sur le sommet du pic du midi , le trouva encore sec et pulvérulent une heure et demie après ; tandis qu'au pied de cette montagne , il étoit chargé d'humidité après l'espace d'une heure , etc. Il seroit curieux de déterminer jusqu'à quel point la compression de l'atmosphère peut influer sur son degré de saturation.

analogue à celui gravé dans la planche ci - jointe (fig. 1.), dont la confection est aussi simple que peu dispendieuse (1) Il est conçu sur le même principe que celui dont les membres de l'académie *del Cimento* faisoient usage pour mesurer le degré d'humidité de l'air, et n'en diffère absolument que par plus de simplicité dans son appareil (2). Il consiste dans un cône de cristal *A* renversé et creux, ouvert seulement à sa grosse extrémité, dont la pointe est reçue dans un vase *B* qui est aussi de cristal, et suspendu par une même corde au même point d'appui. On pourroit aussi avoir recours au cône tronqué *C* placé dans la cuvette *D* (fig. 2). On rempliroit l'un ou l'autre de ces cônes de neige ou de glace triturée, et on les couvriroit ensuite à l'aide d'un plateau.

Je n'ai pas besoin d'observer que la surface extérieure du verre étant plus froide que l'atmosphère, l'humidité ambiante viendra s'y condenser en pe-

(1) M. Vassalli, physicien distingué, de l'Académie des Sciences de Turin, avec lequel j'ai conféré de cet instrument, m'a dit en avoir indiqué un à peu près semblable dans son ouvrage, qui a pour titre : *Physices experim. lineam. ab. subalp.* Tom. II. *Institut. de aere.*

(2) *Saggi di naturali esperienze fatte nell' academia del Cimento in Firenze.* M. DC. XCI.

Fig. 1.






Fig. 2.





tites gouttelettes, qui, tombant et s'accumulant peu à peu dans le récipient inférieur, seront ensuite éprouvées par les réactifs chimiques, ou scrupuleusement examinées avec le microscope. Sans oser promettre ici de grandes lumières de ces sortes d'*hygro-eudiomètres*, on peut assurer au moins que ces instrumens nous conduiront plus directement à l'objet de nos recherches, et nous fourniront des vérités plus médicales. Car il est à présumer, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, que les marais influent moins sur la production des fièvres pernicieuses intermittentes, par les divers gaz émanés de la décomposition des substances animales et végétales qui fermentent dans leur intérieur, que par des portions même de ces substances putréfiées, suspendues et divisées à l'infini dans l'eau que l'atmosphère tient en dissolution.

L'instrument proposé ne seroit pas moins utile pour recueillir et analyser la matière des brouillards dont l'odeur souvent infecte annonce, selon l'observation de Berthollet, qu'ils ne sont pas seulement dus à une combinaison de l'air et de l'eau, avec excès de ce dernier principe, mais à des matières putréfiées tenues en dissolution dans l'atmosphère.

On pourroit, au besoin, multiplier les appareils, les exposer, à différentes hauteurs, sur les bords des fossés, des étangs, de tous les lieux enfin où les

eaux croupissent et se corrompent, et faire ensuite, à l'aide des moyens indiqués plus haut, un examen comparatif du contenu des divers récipients.

SEIZIÈME PROPOSITION.

Les médecins observateurs ont établi des signes certains qui servent à faire reconnoître les pays marécageux, et les plus propres à favoriser le développement des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXIV. REMARQUES. On a judicieusement pensé que les mutations promptes et subites qui ont lieu dans l'atmosphère, sont l'indice le plus certain d'un sol infecté par des marécages. Ce phénomène doit nécessairement résulter de l'union de la chaleur et de l'humidité. Un deuxième signe non moins important se tire de la présence des brouillards aux approches de la nuit; ils sont formés par la prompte condensation des vapeurs suspendues dans l'air, et raréfiées par la chaleur du jour. Les brouillards doivent si bien leur origine aux marais stagnans, que l'observation et l'analyse ont constamment prouvé qu'ils participoient des qualités de ces derniers. Le professeur Pallas nous apprend qu'il est peu d'endroits dont l'habitation soit plus pernicieuse à l'espèce humaine, que Gourief et ses environs,

et que les brouillards qui y règnent ainsi que la rosée, sont de nature saline, nature qui est absolument analogue à celle des marais répandus dans ce lieu. (1)

On remarque aussi que les insectes s'y multiplient à l'infini, et l'on sait que leur apparition a toujours été envisagée par les physiciens comme un phénomène indicateur de la constitution marécageuse d'un climat. D'après le rapport de l'illustre voyageur dont je viens d'invoquer le témoignage, les édifices et les maisons de Gourief sont peuplés de cloportes et de tarakanes, qui semblent se plaire dans un air constamment chargé d'exhalaisons putrides.

On doit enfin juger qu'un pays est malsain si les métaux s'y oxident, et si les viandes s'y décomposent avec promptitude : la théorie de ces deux phénomènes est trop connue aujourd'hui pour qu'il soit nécessaire d'ajouter aucun développement à notre assertion. Je pourrois encore parler des signes que peut fournir l'inspection attentive des végétaux sur lesquels les vapeurs qui s'élèvent des marécages ont certainement une action marquée. Mais cette partie de la phy-

(1) *Voyages en différentes provinces de l'empire de Russie, et dans l'Asie septentrionale*, tom. 1.

sique n'est point suffisamment éclairée à l'heure où j'écris. Il seroit utile d'acquérir des notions précises sur les maladies que les plantes peuvent contracter par l'influence sédative des miasmes, etc. Toaldo, professeur de l'université de Padoue, a publié dans le temps un Mémoire où cette question n'est que foiblement abordée; et tous les vrais observateurs doivent sentir la nécessité de reprendre en sous-ordre son travail, pour l'étendre ou le perfectionner. (1)

DIX-SEPTIÈME PROPOSITION.

Les vapeurs élevées du corps de l'homme, et longtemps renfermées dans le même lieu, peuvent quelquefois, mais très-rarement, faire naître et développer des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXV. REMARQUES. En effet, presque toujours ces sortes d'exhalaisons ayant un degré d'énergie et de virulence supérieur à celui des miasmes marécageux, les fièvres qui en proviennent se montrent avec un type continu; toutefois cela n'arrive pas d'une manière constante. Sans doute qu'alors la force particulière du tempérament,

(1) Voyez le *Journal de Physiq.* du mois d'octobre 1778.

chez les individus frappés de la contagion, tempère et affoiblit l'action sédative des vapeurs humaines. Ce qu'il y a de positif, c'est que j'ai vu sévir des fièvres pernicieuses intermittentes dans les hôpitaux qui n'avoient aucun marais dans leur voisinage, et où l'on ne pouvoit soupçonner d'autre infection que celle qui résulte de l'accumulation d'un trop grand nombre d'hommes dans leur voisinage.

DIX-HUITIÈME PROPOSITION.

Des expériences modernes démontrent que les acides, et spécialement l'acide muriatique oxygéné, sont des agens très-efficaces de la désinfection de l'air, et sous ce point de vue on peut les employer avec un extrême avantage, pour détruire les causes qui favorisent le développement des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXVI. REMARQUES. Cette découverte est une des plus importantes du siècle, puisqu'elle est un bienfait pour l'humanité : elle immortalisera le nom de M. Guyton-Morveau. En 1773, ce chimiste célèbre proposa, pour la première fois, de substituer le gaz acide muriatique aux différentes substances aromatiques, résineuses, bitumineuses, etc., dont on avoit usé jusqu'alors pour ar-

rêter la contagion des miasmes putrides, et détruire les effets qui résultent de la trop grande accumulation d'hommes ou de malades dans les prisons ou les hôpitaux. On sait que les premiers essais qui furent exécutés dans une église et dans les prisons de Dijon, furent suivis d'un plein succès : dès lors plusieurs savans étrangers s'empressèrent d'adopter et de mettre à profit cette découverte.

On avoit aussi cherché à employer d'autres vapeurs acides ; mais en procédant à des expériences comparées, Guyton-Morveau s'est convaincu que le gaz muriatique doit être adopté de préférence, puisque étant plus expansif que le gaz nitrique, par exemple, il convient mieux, pour corriger une plus grande masse d'air infecté ; il agit d'ailleurs d'une manière plus prompte et plus efficace. On se souvient de quelle utilité fut cette substance dans les vaisseaux qui transportèrent les Français en Égypte, ainsi que M. Berthollet eut occasion de le remarquer. Aucun chimiste peut-être n'étoit plus en droit que ce dernier de prononcer sur les avantages d'une semblable découverte. (Voyez son *Rapport fait à la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut.*) Il y prouve que le gaz muriatique oxigéné, est celui des acides le plus propre

et le plus applicable à la désinfection de l'atmosphère.

Pour ce qui concerne M. Guyton-Morveau, ce savant a rendu sa théorie d'une application aussi facile qu'elle est avantageuse, par l'invention ingénieuse de quelques appareils de poche, assez analogues aux flacons qui contiennent des eaux odorantes. Ces appareils sont destinés à contenir et à conserver les matériaux qui, par leur combinaison, peuvent opérer la confection de l'acide muriatique oxigéné. Ces matériaux sont l'oxide de manganèse et l'acide nitro-muriatique. Ce sont, en quelque sorte, des foyers portatifs de désinfection, dont on dégage, à son gré, des vapeurs salutaires.

Pour purifier de vastes hôpitaux ou de grandes prisons, on dégage communément le gaz acide muriatique du muriate de soude par l'acide sulfurique. La manière la plus régulière de procéder est de mettre quinze parties d'acide sulfurique sur douze de sel marin. Au surplus, je me borne ici à une simple indication des procédés; pour apprendre à les varier selon les circonstances, l'étendue des lieux, etc., nous renvoyons nos lecteurs à l'ouvrage même de Guyton-Morveau, qui a pour titre : *Traité des moyens de désinfecter*

l'air, de prévenir la contagion, et d'en arrêter les progrès. Paris, an XI.

DIX-NEUVIÈME PROPOSITION.

Quoique les Fièvres pernicieuses intermittentes doivent presque toujours leur origine aux émanations délétères des marais, on est fondé néanmoins à avancer, d'après des faits bien observés, que d'autres causes sédatives, telles, par exemple, que la mauvaise qualité des eaux, un froid excessif ou des affections vives de l'âme, etc., peuvent aussi leur donner lieu.

CXVII. REMARQUES. Raymond attribue principalement les fièvres pernicieuses intermittentes qui dominant à Middelbourg et aux environs, à la qualité de l'eau que l'on y boit habituellement (1). En effet, l'île de Walkeren, dont cette ville est la capitale, est plus basse que la mer, et manque absolument de ruisseaux et de fontaines. On n'a, pour les usages domestiques, que l'eau de pluie conservée dans des citernes. Si on néglige d'en prendre soin, elle ne tarde pas à se corrompre par le mélange des insectes, des vers, des germes

(1) *Dissert. exhib. feb. intermitt. autumn. quotannis Mittelb. et in vicin. Seeland. Batav. loc. grassant., etc.*

ou d'autres substances qui s'y putréfient. Cette eau provient d'ailleurs le plus ordinairement des toits des maisons, couverts et imprégnés de la poussière qui s'élève des places, des rues, des chemins, etc. De plus, la fumée qui émane des cuisines, les exhalaisons des animaux et des végétaux vénéneux, les évaporations de la mer, peuvent d'abord s'attacher aux toits et se mêler ensuite avec la pluie. La nature des conduits métalliques de l'eau, faits de plomb et de cuivre, contribue aussi beaucoup à diminuer sa salubrité.

Pour ce qui regarde les fièvres de cette espèce occasionnées par le froid, le chagrin, etc., ces sortes de cas étant les plus rares, il est nécessaire de les appuyer de faits authentiques. Je ne citerai que l'exemple d'une fièvre cardialgique, que je trouve consigné dans la Dissertation d'Aurivill. (1)

Au commencement de l'hiver, un jeune homme se fiant à la glace d'une rivière, voulut la traverser à pied. Il tomba dans l'eau, d'où on ne tarda pas à le retirer; saisi néanmoins par le froid, et frappé de terreur à l'aspect du danger qu'il venoit de courir, il éprouva le premier accès d'une fièvre tierce, qui s'annonçoit par des oppressions et des

(1) *Dissert. de febr. intermitt. malign.*

constrictions vives dans la région du colon. Les quatre ou cinq paroxysmes qui suivirent ne furent pas très-alarmans ; mais un soir la fièvre se déclara avec plus d'intensité. La nuit, cardialgie violente, sorte de fureur, visage horrible, plaintes, agitations continuelles, etc. Il tomba enfin dans un profond assoupissement, et le surlendemain il expira. L'ouverture du cadavre ne présenta rien de remarquable, si ce n'est une couleur jaunâtre répandue dans l'abdomen, et des points enflammés épars en grand nombre dans le mésentère, l'épiploon et les intestins.

Nous avons cité dans ce Traité l'histoire d'une fièvre pernicieuse intermittente occasionnée par un abus des travaux anatomiques. Il seroit sans doute à désirer qu'on recueillît soigneusement toutes les observations qui concourent à prouver que les fièvres pernicieuses intermittentes peuvent être engendrées par d'autres causes que par l'influence d'un air marécageux.

VINGTIÈME PROPOSITION.

Les effets des grandes plaies, souvent même d'autres maladies, impriment un caractère pernicieux aux Fièvres intermittentes ou rémittentes, qui se manifestent dans certaines épidémies.

CXVIII. REMARQUES. Dumas a déterminé la véritable nature de l'espèce de fièvre rémittente ou intermittente, qui accompagne les grandes plaies; il a prouvé qu'elle a tous les caractères essentiels des fièvres pernicieuses auxquelles on peut l'assimiler; il en a donné une description exacte, qui présente tous les principaux traits de l'état pernicieux. Plusieurs circonstances se réunissent pour décider cet état, soit après une commotion violente, soit après une blessure profondément étendue dans l'épaisseur des chairs, soit après l'amputation d'un membre, soit après une large section des parties molles par un instrument tranchant, ou par l'explosion d'une arme à feu. La fièvre qui survient alors manifeste les caractères suivans :

1°. Elle s'annonce à chaque accès par un assoupissement profond;

2°. Elle contrarie le travail de la suppuration, et altère les plaies;

3°. Elle tend à la continuité.

Cette fièvre doit sa nature pernicieuse à différentes causes, parmi lesquelles le professeur Dumas compte :

1°. La commotion imprimée à tout le système nerveux ;

2°. La douleur fixée sur l'endroit de la blessure ;

3°. Le spasme qui en est la suite ;

4°. La disposition des parties blessées, et le changement de leur tissu ;

5°. La tendance des mouvemens de toutes les parties du corps vers celle qui devient le siège de la plaie.

A ces procédés, l'auteur du Mémoire ajoute l'effet du traitement qu'il a déjà employé contre la fièvre rémittente des grandes plaies, et qui, semblable à celui des fièvres intermittentes pernicieuses, consiste dans l'usage du quinquina, donné à des doses suffisantes pour empêcher, le plus tôt possible, le retour des redoublemens ou des accès. L'auteur termine son Mémoire par une série d'observations, dont la lecture suffit pour démontrer combien sa méthode de traitement est préférable à celle jusqu'à présent employée dans

les mêmes cas, et l'heureux succès qu'on doit en attendre, lorsqu'on la réduira en pratique. Nous allons joindre à cet extrait quelques-unes des observations qu'il a publiées et qui nous ont paru les plus marquantes.

Première observation. Un homme avoit une blessure à la partie antérieure et supérieure de la jambe, produite par une balle qui avoit passé entre le ligament de la rotule et du tibia. On fit usage des moyens curatifs appropriés. Le huitième jour, on s'aperçut qu'il s'étoit formé un dépôt considérable, qui communiquoit avec la plaie; on l'ouvrit, mais on ne put le faire qu'en faisant de larges incisions dans la profondeur des chairs; le malade éprouva un léger frisson immédiatement après l'opération. Il n'y eut pas d'apparence de fièvre avant le cinquième jour; alors elle se manifesta avec des redoublemens réglés. Au deuxième paroxysme, le malade tomba dans un assoupissement profond, dont l'intensité augmentant à l'approche du paroxysme suivant, fit craindre pour sa vie. L'affection soporeuse ayant encore augmenté durant le troisième paroxysme, et résistant à tous les moyens employés pour la modérer, le professeur Dumas résolut de traiter cette fièvre à la manière des intermittentes pernicieuses: il prescrivit le quinquina à la dose de huit grammes

(deux gros), en laissant l'intervalle de quatre heures entre l'administration des doses. Le quatrième paroxysme fut moins intense; il y eut moins d'assoupissement; la tête du malade fut plus libre; l'usage du quinquina fut continué jusqu'au neuvième paroxysme, qui fut le dernier; depuis le quatrième paroxysme jusqu'au neuvième, la violence des paroxysmes avoit diminué graduellement.

Seconde observation. Elle a pour sujet un homme auquel un éclat d'obus avoit causé une plaie considérable, dont le siège étoit la région lombaire. La suppuration s'établit d'une manière heureuse; mais le neuvième jour il y eut de légers symptômes de fièvre, qui augmentèrent dans le second accès avec une intensité effrayante, et avec tous les signes propres aux fièvres malignes. Le type de la fièvre étoit celui de tierce. La plaie prit dès lors un tout autre aspect: on se détermina à donner le quinquina dès la fin du second accès, et à la dose de douze grammes (trois gros). Le malade en prit quatre grammes (un gros), de six heures en six heures, et quelque temps avant l'invasion du troisième accès, il en prit encore douze grammes (trois gros). Comme il n'y eut pas de mieux bien marqué à la suite de ce régime, on porta le quinquina à la dose de quarante-huit

grammes (une once et demie), distribuée dans l'intervalle de la rémission. Ce mode d'administration fut suivi du succès le plus complet, et on le continua jusqu'à l'entière extinction de la fièvre, qui eut lieu au septième accès.

Troisième observation. Dumas rapporte qu'à la suite d'une fracture du pariétal droit d'un jeune homme de vingt-deux ans, produite par une balle, il y eut un accès de fièvre le onzième jour qui suivit cette fracture. Un autre accès ayant eu lieu le lendemain, on donna le quinquina à forte dose, et la fièvre disparut après cinq paroxysmes, qui portoient avec eux tous les caractères de la malignité.

Quatrième observation. Il s'agit également d'un jeune homme dont une balle avoit légèrement fracturé le pariétal gauche. La plaie touchoit à sa fin, lorsqu'il se manifesta une fièvre rémittente, avec type de double-tierce, et des redoublemens alternativement forts et foibles; l'usage du quinquina la fit disparaître dans l'espace de quelques jours.

Cinquième observation. L'auteur a retiré le plus grand fruit de l'administration du quinquina, dans les fièvres rémittentes survenues à la suite des plaies, soit de tête, soit dans les articulations produites par des armes à feu.

Sixième observation. Un homme avoit eu l'articulation du bras avec l'avant-bras fracassés par un coup de feu; l'amputation fut jugée nécessaire, et exécutée. Sept jours après l'opération, la fièvre intermittente se manifesta; le quinquina fut donné entre le premier et le deuxième accès; mais comme le malade étoit d'une constitution très-irritable, Dumas joignit à l'usage de ce médicament, celui du laudanum et du sirop diacode; le malade éprouva un mieux très-marqué. La dose du médicament fut doublée dès la fin du deuxième accès, et portée à quarante grammes (dix gros), avant l'invasion du troisième; la fièvre cessa, et le malade fut laissé en pleine convalescence.

Septième observation. L'auteur y rapporte la cure d'une fièvre intermittente survenue à un marin, à la suite d'une amputation de la cuisse, nécessitée par le délabrement complet des articulations du genou et du pied, produit par un coup de feu. Cinq jours après l'opération, il y eut dessèchement de la plaie, apparition d'un pus grisâtre à sa surface; le soir même il eut froid, puis un second accès de fièvre. Le professeur Dumas conseilla l'usage du quinquina comme dans les fièvres intermittentes pernicieuses: les paroxysmes disparurent, et le malade guérit. Enfin, ce qui

mérite une considération toute particulière, c'est que le professeur Dumas a vu constamment périr les blessés qui, ayant des fièvres rémittentes, furent traités avec les émétiques, les purgatifs ou la saignée, etc.

Feu M. Marquis, observateur exact, a eu souvent occasion d'observer ce genre de fièvres pendant les années qu'il a été chirurgien en chef des armées françaises, et spécialement durant le siège de Toulon. M. Pontanier, chargé de l'ambulance de la division Victor, en l'an VII, à l'armée d'Italie, a recueilli pareillement des observations sur ce point; je me bornerai à citer les deux suivantes, dont l'issue a été funeste.

Un aide-de-camp polonais fut blessé devant Alexandrie, en Piémont, à la partie supérieure de la cuisse. Sur le champ de bataille, dilatation de la plaie, extraction de la balle, plaie pansée à sec. Arrivé à l'hôpital d'Alexandrie, à la visite du soir, on trouva la partie environnante enflammée et gonflée; le pouls étoit fort et élevé, et le malade étoit frappé de crainte. On pansa la plaie avec des cataplasmes émolliens, et l'on pratiqua une saignée du bras. Rien de nouveau jusqu'au cinquième jour, où il y eut suppuration et fièvre qui se manifesta par des alternatives de froid et de chaud.

Premier jour de la fièvre. Le matin, suppuration bien établie ; le soir, suppuration diminuée, mais frisson suivi de chaleur, inquiétude, langue rouge et ardente, couverte d'inégalités à sa surface ; pouls foible. *Deuxième jour.* Suppression totale de la suppuration, plaie bien blafarde, pansée avec l'eau-de-vie camphrée, et des cataplasmes émoulliens : d'une autre part, tristesse, morosité, trouble dans les idées, crainte d'une mort prochaine. A sept heures du soir, carus profond, sensibilité presque éteinte, peau aride, brûlante, contraction de la mâchoire inférieure. (Vésicatoire aux jambes et sur la plaie). *Troisième jour.* Fond de la plaie gangréné, et d'une odeur infecte ; pansement avec l'eau-de-vie camphrée, et cataplasmes : délire taciturne, yeux fixes ou fermés, pouls alternativement foible et déprimé, naturel, dur, chaleur brûlante, mais avec des anomalies, respiration tantôt naturelle et précipitée. *Quatrième jour.* Mêmes phénomènes. *Cinquième jour.* Le fond et les lèvres de la plaie frappés de la dégénérescence gangréneuse. Un peu de calme le matin ; le soir, affection comateuse. (Éther nitrique dans l'eau.) *Sixième jour.* Même état de la plaie, même pansement ; soubresauts des tendons, déglutition difficile, sueurs froides suivies de la mort.

Un commis du bureau de l'ambulance reçut un

coup de sabre à la partie antérieure et supérieure de l'épaule , qui divisa obliquement le deltoïde : de suite , réunion de la plaie par les moyens usités. Le quatrième jour , l'appareil étant levé , on trouva les bords de la plaie récente gonflés et tuméfiés. On pansa le malade par les procédés chirurgicaux ordinaires , pendant trois jours , suppuration abondante et de bonne consistance. Le malade éprouva une douleur sous-orbitaire , sensibilité à l'épigastre , langue muqueuse et bouche amère. (Deux grains de tartrite de potasse antimonié en lavage.) Ce remède produisit un vomissement copieux de matière biliforme , et quelques selles ; les symptômes gastriques disparurent : la plaie suivit sa marche ordinaire , mais le malade ayant fait un excès dans le boire et le manger , éprouva , dans la nuit même du jour où il s'étoit livré à cet excès , un frisson auquel succéda un grand chaud. Le lendemain , la suppuration fut moindre ; céphalalgie , abattement. Le troisième jour , les symptômes de la plaie s'aggravèrent : presque point de suppuration : altération des traits de la face , vue égarée , rire sardonique , confusion dans les idées. Le quatrième jour , point de suppuration , odeur fétide ; face livide , impossibilité d'articuler des sons , variations fréquentes du pouls ; symptômes spasmodiques du tronc. Mort le cinquième jour depuis le développement de la fièvre.

On doit être surpris que, dans les deux cas que nous venons de rapporter, on n'ait point administré le quinquina d'après les principes de pratique générale. Mais souvent, dans ces tristes occasions, les praticiens sont induits en erreur sur la vraie nature des fièvres pernicieuses qui se présentent à leur observation. Ces méprises surviennent particulièrement lorsque ces fièvres succèdent à d'autres maladies plus ou moins graves, ou lorsqu'elles se déclarent pendant ces mêmes maladies. M. Biett, mon ancien élève, et moi, donnions des soins, il y a plusieurs années, à un commerçant indien, qui, déjà en proie aux accidens d'un catarrhe très-intense de la vessie, fut pris subitement d'une fièvre intermittente pernicieuse avec prédominance d'un état comateux. Le quinquina avoit singulièrement modéré les paroxysmes de cette fièvre, et le malade ne succomba qu'à l'affection organique dont il étoit atteint depuis si long-temps.

C'est ici le cas de rappeler aux praticiens les fièvres pernicieuses qui se déclarent à la suite des couches laborieuses, quand le péritoine s'est trouvé subitement atteint de phlegmasie. J'en pourrois citer plusieurs exemples. M. Matussière a publié un fait de ce genre. Une jeune femme, après un enfantement qui n'avoit pas été très-douloureux, fut

attaquée d'un assoupissement extraordinaire, qui dura trente-six heures. Les deux accès qui suivirent ne furent pas moins sinistres, et ne laissèrent aucun doute sur le danger imminent où se trouvoit la malade. M. Matussière fit administrer six gros de quinquina en poudre auxquels il associa quelques grains de sel de nitre, et un grain et demi de kermès minéral, etc. Le redoublement qui suivit donna encore les plus vives craintes; la malade respiroit avec la plus grande difficulté; sa bouche béante laissoit voir une langue noire et fuligineuse; sa face étoit tout-à-fait décolorée. Toutefois, par le seul effet du remède administré, bientôt les forces se ranimèrent. Elle recouvra l'usage des sens et de la parole. On continua le quinquina : on avoit, dans le commencement de cette fièvre, vainement appliqué des synapismes à la plante des pieds : on fit apposer des vésicatoires aux jambes. Tous ces moyens, aidés les uns par les autres, eurent une pleine réussite. Les lochies coulèrent régulièrement, tandis qu'auparavant elles se trouvoient totalement supprimées. M. le docteur Matussière remarque judicieusement que cette guérison surprenante dut véritablement être attribuée au quinquina, seul remède qui triomphe en pareil cas.

M. Laënnec a publié des observations touchant les intermittentes pernicieuses qui se manifestent

pendant la durée ou à la suite d'autres maladies. Il fait mention d'une pernicieuse hystérique avec hémiplégie survenue dans un jour intercalaire, à l'issue d'une pleuro-peripneumonie. Il a vu aussi une pneumonite suivie d'une pernicieuse hystérico-apoplectique : il a vu enfin cette même fièvre larvée ou pernicieuse chez une dame violemment atteinte du scorbut. M. Laënnec ajoute à ces observations des remarques fort utiles, qui sont utiles à rappeler. Il dit que ce qui rend surtout le diagnostic des fièvres pernicieuses très-difficile à bien saisir, c'est qu'elles simulent, par leur nature, des symptômes qui appartiennent essentiellement à d'autres affections morbifiques. On démêle, en effet, avec beaucoup de difficulté, le caractère périodique des accès, lorsque l'intermission est à peine sensible, et que la fièvre, par exemple, a le type quotidien, ou le type de la double-tierce ; d'ailleurs combien n'y a-t-il pas de maladies spasmodiques et convulsives, qui ont des accès régulièrement périodiques comme les fièvres intermittentes pernicieuses ? Ce qui trompe encore les regards de l'observateur, c'est que les fièvres dont il s'agit peuvent très-bien intervenir dans les mêmes circonstances qui favorisent d'autres maladies dont elles prennent quelquefois le masque, etc. Cette réflexion rappelle un flux dysentérique qui se manifesta, durant le règne de la terreur, dans

quelques départemens méridionaux de la France. Il y eut alors des fièvres intermittentes qui, ayant emprunté leur caractère pernicieux de l'épidémie régnante, furent d'abord méconnues par des praticiens très-éclairés; ce qui occasionna une grande mortalité. D'ailleurs, à cette époque désolante pour notre histoire, le quinquina manquoit, ou se trouvoit être de fort mauvaise qualité. Ajoutez à cette circonstance le concours de tant de causes débilitantes, et l'impéritie des médicastres qui se mêlèrent d'exercer notre profession.

CHAPITRE VI.

*Considérations sur le traitement des Fièvres
pernicieuses intermittentes.*

CXX. **D**ANS ces sortes de fièvres, les indications sont de la plus grande évidence, et l'art y procède avec une certitude presque géométrique. La gravité des symptômes qui se manifestent repousse la méthode d'expectation, et le soin le plus pressant du médecin doit être de s'opposer au retour de l'accès. Aussi Mercatus avoit-il déjà entrevu la nécessité de se hâter dans leur traitement. « Celui, » dit Leroy, qui, dans une fièvre intermittente » maligne, négligeant l'usage du quinquina, s'at- » tendroit à la voir terminer par une crise, soit » proprement dite, soit par voie de solution; ce- » lui-là, dis-je, seroit évidemment téméraire, et » dépourvu de toute connoissance de cette mala- » die (1). » Aucun motif valable ne sauroit donc l'empêcher d'agir.

CXXI. En second lieu, les témoignages des observateurs s'accordent pour regarder le quin-

(1) *Du pronostic dans les maladies aiguës.*

quina comme le seul remède à opposer aux fièvres pernicieuses intermittentes (1). Les autres moyens proposés sont de nul effet, ou ne remplissent que des vues secondaires de curation. La médecine doit donc placer au rang de ses époques les plus glorieuses, celle qui a été marquée par la découverte de ce médicament, et par son heureux emploi dans le traitement des fièvres pernicieuses intermittentes.

CXXII. Lorsque j'établis que le quinquina peut seul lutter avec efficacité contre le danger des

(1) *Nosotros, que tan solamente atendemos a socorrer el vicio de malignidad, decimos que en estas calenturas el principal remedio, y aun unico, es la quina, de la que à mas de las muchas observaciones que cita dicho torti, tenemos repetidas experiencias tercianas, que son las mas regulares de las perniciosas con casi todos los symptomas expuestos: de modo, que se si logra dar la cantidad de una onza de quina, siempre he visito el efecto de curarse aun mejor que las intermitentes no perniciosas.* AMAR. *Instruccion curativa de las calenturas, etc., n° 186.* Comparetti observe que Morton est peut-être le premier qui ait démontré la vertu du quinquina dans la fièvre périodique avec dysenterie, assoupissement et suffocation spasmodique. Il essaya les astringens, les antispasmodiques, etc. Mais il n'eut pas d'effet supérieur à celui qu'il obtint, ou du quinquina seul, ou de ce remède joint au laudanum, au diascordium, ou à quelque autre calmant.

fièvres pernicieuses intermittentes, on sent que je veux parler de celles qui se distinguent facilement à la véhémence et à l'apparition précipitée de leurs symptômes, et non de celles qui, quoique chargées des mêmes accidens que les précédentes, les manifestent pourtant à un moindre degré, et semblent former ainsi une nuance intermédiaire entre celles-ci et les intermittentes ordinaires, dites *bénignes* par le commun des auteurs. Cette distinction est importante, parce qu'elle fixe les circonstances où le quinquina peut, avec succès, être remplacé par les remèdes indigènes.

CXXIII. J'avertis, en outre, que, quoique l'administration du quinquina soit, en général, seule indiquée pour prévenir ou arrêter les paroxysmes des fièvres pernicieuses intermittentes, je ne nie pas que son action ne puisse être efficacement secondée par quelques moyens auxiliaires, spécialement dirigés contre des symptômes prédominans, comme, par exemple, les grandes foiblesses, les cardialgies intolérables, le carus profond, etc. Toutefois ces moyens auxiliaires variant à l'infini, et n'influant que d'une manière secondaire sur le plan essentiel de traitement, nous n'en parlerons qu'après avoir exposé la méthode qui doit diriger le médecin dans le choix et l'administration du quinquina.

CXXIV. Il importe d'abord que le médecin, à l'aide de l'histoire naturelle et de la chimie, s'éclaire suffisamment sur les qualités physiques, les principes et les matériaux immédiats du quinquina qu'il doit employer. Cette précaution est d'autant plus nécessaire, que le mauvais succès de ce remède dépend presque toujours du mauvais choix des écorces. Ce n'est que lorsqu'on n'a absolument rien à désirer sur l'excellence de ce remède et sur la certitude de son action, qu'on doit en diriger l'emploi d'après les règles que nous allons établir. Nous nous bornerons à celles qui sont sanctionnées par une longue expérience et par des succès multipliés.

PREMIER THÉORÈME PRATIQUE.

Le quinquina en substance doit être préféré à toutes les autres préparations de ce remède, dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXXV. REMARQUES. On a long-temps attribué des effets plus énergiques à l'extrait de cette écorce; mais l'expérience les a démentis. Le professeur Fourcroy attribue cette plus grande activité du quinquina en poudre, à ce que la substance extracto-résineuse n'ayant point été altérée par les divers modes de préparation, et n'absorbant plus d'oxygène, porte et conserve toute l'énergie qui

la distingue dans les premières voies où elle subit l'action des sucs de l'estomac et des intestins. (1)

M. Coutanceau remarque très-bien que dans les fièvres pernicieuses épidémiques qui ont régné à Bordeaux, lorsqu'on donnoit le quinquina de toute autre manière qu'en substance, la fièvre étoit imparfaitement arrêtée. D'ailleurs le corps humain s'accoutumoit à l'impression de ce précieux médicament, en sorte qu'il finissoit par n'avoir plus la même vertu.

Il est cependant des circonstances où le quinquina ne sauroit être administré sous cette forme, et on est contraint de recourir à l'extrait qui réussit toutes les fois qu'il est préparé avec la meilleure écorce de quinquina. C'est ce qu'attestent, par exemple, les nombreuses observations de Joseph de Jussieu, qui l'employa dans ses voyages, et même en France, avec des succès toujours nouveaux. On doit alors (et Torti en a fort bien fait la remarque) faire prendre au malade autant de quinquina en extrait, qu'il en faut pour égaler la quantité requise du même médicament en poudre.

Ceci peut s'appliquer aux décoctions et aux infusions de cette écorce, qui ne sont pourtant

(1) *Annales de Chimie*. Février 1791.

d'aucun avantage pour combattre les fièvres pernicieuses intermittentes parvenues au plus haut degré d'intensité, à moins que la difficulté de la déglutition n'oblige d'administrer le remède en lavement. Leur inefficacité dépend sans doute fréquemment, d'après l'opinion de Fourcroy, du mode défectueux de leur préparation. Sydenham et plusieurs autres médecins veulent qu'on laisse infuser le quinquina pendant quelques jours, avant d'en faire usage. Certains auteurs, comme Lewis, le soumettent à des décoctions prolongées. Dans ces deux cas, le professeur Fourcroy a fait voir que la matière résino-extractive devoit devenir moins soluble, et se précipiter enfin tout entière, à mesure qu'elle se combinait avec l'oxygène atmosphérique; qu'il importe par conséquent de prescrire le quinquina dans des infusions ou des décoctions très-rapides, dans des vases clos ou d'étroite ouverture; que lors même que ces préparations sont terminées, il est utile de les garantir du contact de l'air, pendant que les malades en font usage, afin de ne pas donner lieu à de nouveaux dépôts, etc. (1)

Mais en revenant à la meilleure manière de donner le quinquina, c'est-à-dire, en substance, nous n'oublierons pas que Sydenham a prononcé qu'il

(1) Voyez le Mémoire déjà indiqué.

devoit être administré seul et sans autre véhicule que celui qui est nécessaire pour le transmettre dans les voies digestives. Quelques-uns ont prétendu qu'il empruntoit un surcroît d'énergie des substances auxquelles on l'a successivement associé. C'est ainsi qu'Hoffmann et Galeazzi l'ont uni avec succès aux aromatiques, telles que la cascarille et la cannelle; c'est ainsi que le célèbre Casimir Medicus l'a mêlé avec des astringens décidés, tels que l'alun et le cachou (dans la pernicieuse dysentérique), et Sarcône avec l'opium (dans une pernicieuse pleurétique); certains, avec la moutarde en poudre; d'autres, avec des alcalis ou des terres absorbantes, etc.

Ces différens mélanges que paroissent solliciter des circonstances particulières, méritent peu néanmoins de fixer l'attention, quand la fièvre se déclare avec une intensité propre à faire pronostiquer une mort prompte. Il faut alors s'en tenir aux procédés les plus sûrs et les mieux constatés pour arrêter les paroxysmes, et s'opposer à leur retour. (1)

(1) Cette pratique d'administrer le quinquina en substance, dont les médecins européens ont si bien constaté les avantages, n'a point réussi au docteur Mutis. Il est persuadé que la fermentation est le meilleur moyen d'extraire la partie active de ce remède, et de l'appropriier à l'estomac des malades. Il propose en conséquence, pour l'usage mé-

DEUXIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

Pour que le quinquina produise un effet convenable dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes, il faut le donner dans la distance la plus éloignée du paroxysme que l'on se propose d'arrêter.

CXXVI. REMARQUES. Cullen, au contraire, s'est formellement déclaré contre cette opinion, et a

dicinal, une sorte de bière de quinquina, composée d'une livre de cette écorce, de huit livres de miel ou de sucre, et quatre-vingt-dix ou cent livres d'eau. M. Zea, qui nous a fait connoître cette préparation, observe qu'elle ne réussit que lorsqu'elle est exécutée en grand, et les proportions que nous venons d'établir sont les plus petites possibles. La fermentation vineuse étant terminée, on fait en sorte que la liqueur soit bien imprégnée du principe actif médicamenteux du quinquina. Pour cet objet, on décante la partie supérieure du liquide toujours moins chargée que l'inférieure; ou l'on remue légèrement le tonneau qui le contient. On peut opérer trois ou quatre fermentations successives, sans ajouter d'autre écorce, et en se bornant à renouveler l'eau et le sucre, à mesure que la masse entière diminue.

Après toutes ces opérations préalables, si l'on ajoute du sucre et de l'eau au sédiment qui reste, dans des proportions convenables, on fait passer la liqueur par tous les degrés de la fermentation, et on obtient un vinaigre excellent pour les usages économiques, lorsqu'il a été décanté

établi, comme un principe général, que l'écorce du Pérou doit être administrée le plus près possibles du paroxysme. Quand bien même cette erreur ne seroit pas suffisamment démontrée par les observations journalières des médecins, il suffiroit

dans sa partie supérieure; le reste du liquide fournit, en outre, un bon vinaigre que la médecine peut employer avec fruit.

Enfin, M. Zea nous apprend qu'on prépare aussi une tisane de quinquina en mettant, dans une petite quantité d'eau, une partie d'écorce pulvérisée grossièrement avec du sucre, dans la proportion déjà ci-dessus terminée. Cette eau doit à peine couvrir la masse, pour entretenir la fermentation sucrée : on prend la quantité nécessaire de cette pâte, et on la délaie dans de l'eau, du vin, ou dans tout autre véhicule qu'on préfère, pour préparer la tisane qui doit se faire à un feu doux au bain de sable.

M. Mutis se sert de ces trois préparations pour remplir toutes les indications du remède; et elles sont les mêmes, quelle que soit l'espèce officinale que l'on emploie. Au surplus, quels que soient les avantages que puisse nous présenter cette nouvelle manière d'administrer le quinquina, nous ne pensons pas qu'on doive l'adopter dans le traitement des fièvres pernicieuses intermittentes, avant d'avoir long-temps expérimenté sur cet objet. En effet, nous ignorons absolument quels sont les cas où M. Mutis a pu y recourir avec un plein succès; et la méthode aujourd'hui usitée parmi nous a une certitude qui ne doit jamais la faire abandonner.

de lui opposer les expériences de Home (1), alléguées avec avantage par le professeur Baumes, qui a émis une opinion analogue à la nôtre.

Home, en effet, a vu que le fébrifuge n'est jamais plus certain que lorsqu'on l'administre aussitôt après la chute du paroxysme, ou quarante heures avant qu'il se déclare de nouveau. C'est ce qui a été constaté chez cinq malades, dont les accès ont été complètement supprimés. Huit, au contraire, ont pris le remède immédiatement avant le frisson, et la fièvre n'a point cédé; au contraire, elle a acquis dans ce cas une intensité plus grande, et deux d'entre eux ont éprouvé des vomissemens. Home a vu, en outre, que chez trois individus qui avoient avalé le quinquina peu de temps avant l'accès, le paroxysme imminent n'a point été arrêté, mais que le suivant n'a pas eu lieu; ce qui l'a porté à conclure que ce médicament a besoin d'un temps déterminé pour agir.

La même observation avoit été faite par Torti; ce dernier même avoit très-judicieusement remarqué que de petites doses de quinquina, données loin de l'accès, agissoient plus efficacement que de fortes doses données dans un temps très-voisin de ce même accès. Il ajoute pourtant que ce fébrifuge, administré d'après ce dernier mode, peut

(1) *Clinical experiments. Sect. I.*

influer avec avantage sur les paroxysmes subse-
quens.

TROISIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

*L'administration du quinquina n'est générale-
ment convenable que dans le temps de l'in-
termission ou de la rémission.*

CXXVII. REMARQUES. Un danger pressant peut néanmoins exiger l'emploi du quinquina durant le cours du paroxysme, ainsi que l'a observé l'illustre Senac. Alors on peut et l'on doit même ne pas différer son administration, pourvu que la fièvre ne soit pas trop violente, qu'il y ait au contraire de la foiblesse dans le pouls, et une grande prostration de forces, que l'estomac et le canal intestinal soient exempts de toute irritation; et enfin que ce remède ne soit contre-indiqué par aucun symptôme (1); car, malgré le génie inter-

(1) *De nat. febr. recond. lib. 14, cap. 13. Et quidem si motus febrilis intensior non sit, sed contra adsit virium prostratio et pulsus debilitas, si non magna urgeat in ventriculo aut intestinis irritatio, si denique per symptomatum vim liceat, non liquet profectò quare in re tam ancipiti, non exhiberi possit cortex, aut solus, aut cum aliis conjunctus remediis, etc.* Selle a administré avec succès la thériaque à la dose de quatre jusqu'à huit grammes (un gros jusqu'à deux gros), durant l'accès même d'une fièvre pernicieuse intermittente.

mittent de la fièvre , dans des circonstances aussi douteuses , il est difficile de prévoir quelles seront sa durée , sa terminaison et ses suites.

QUATRIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

Si la Fièvre pernicieuse à type intermittent est manifestement sub-intrante , ou si les accès s'étendent au point de se toucher , il convient de placer de préférence le quinquina dans la déclinaison des accès ou des redoublemens.

CXXVIII. REMARQUES. Une semblable règle est naturellement déduite de ce que nous avons exposé précédemment sur la nécessité de donner le quinquina hors le temps de l'exacerbation de la fièvre , et le plus loin possible de l'accès à prévenir. Voullonne a eu raison de l'indiquer. (1)

Il seroit superflu de s'attacher à prouver que les médecins qui ont prétendu que , sans avoir égard aux intermissions ou aux rémissions qui surviennent , on pouvoit administrer le quinquina dans tous les temps de la fièvre pernicieuse intermittente , ont commis une erreur infiniment dangereuse pour les malades. D'autres , sans doute , ont émis une opinion plus sage , lorsqu'ils ont prescrit

(1) *Mémoires sur les Fièvres intermittentes.*

d'épier avec soin le court instant de l'intermission, pour faire un emploi avantageux du quinquina; mais ce précepte est le plus souvent impraticable; car, dans ces sortes de cas, les paroxysmes, par leur anticipation, leur extension ou leur mélange, offrent rarement entre eux le moindre intervalle de lucidité.

Le précepte trop vague donné par Reichard, de combattre préalablement les causes qui allongent les paroxysmes et abrègent les intermissions, qu'il attribue soit à la pléthore, soit à un épaissement gratuitement supposé du sang qui dispose le système soit à l'inflammation, soit à la saburre des premières voies, etc., ne sauroit avoir ici son application. (1)

Toutefois si, dans le cas dont il s'agit, on n'a pas assez de temps pour administrer la quantité nécessaire du fébrifuge, il ne faut pas continuer de le faire prendre dans l'accès qui suit, mais attendre la déclinaison de ce même accès (Voullonne).

(1) *Disput. inaug. med. de peruviani corticis in plurium generum febribus exhibendi opportunitate. Gotingæ, 1768.*

CINQUIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

La quantité de vingt-quatre grammes (six gros) de quinquina , ou de trente-deux grammes (une once) au plus , suffit communément pour arrêter les paroxysmes d'une Fièvre pernicieuse intermittente arrivée à son plus haut degré d'intensité.

CXXIX. REMARQUES. Cette dose indiquée par Torti nous paroît celle qui convient dans le plus grand nombre de cas. Nous supposons toujours que le quinquina est donné en substance, mode de préparation que nous avons regardé comme le préférable. Le professeur Pinel obtient même très-fréquemment un plein succès avec une moindre quantité à l'hospice de la Salpêtrière (1). Cepen-

(1) Je puis en citer un exemple dont j'ai été le témoin. Une femme âgée de soixante-treize ans éprouva le sentiment d'un froid violent avec faiblesse et lassitude dans les jambes ; une demi-heure après il se développa une chaleur intense avec un état soporeux alarmant ; elle fut transportée à l'infirmerie , où des symptômes gastriques déterminèrent l'usage d'un évacuant. Le 23 , à deux heures après midi , la maladie se manifesta de la manière la moins équivoque ; sentiment d'un froid très-vif avec tremblemens , ensuite chaleur très-forte , état soporeux profond , et perte totale de connoissance ; le len-

dant Baumes fixe la dose à quarante-huit grammes (une once et demie). Sims l'a portée quelquefois jusqu'à cent soixante grammes (cinq onces).

Galeazzi a vu fréquemment que le quinquina donné à la dose prescrite par Torti est insuffisant, et ne produisoit point le moindre effet. Il a vu des fièvres qui étoient sujettes à des récidives fréquentes, s'il n'employoit cent soixante ou quatre-vingt-douze grammes (cinq ou six onces) de quinquina, ou même davantage. Il cite l'exemple d'un homme auquel il fallut donner une livre entière de cette substance, dans l'espace d'environ quarante jours, pour anéantir totalement les symptômes qu'il éprouvoit. C'est surtout dans l'hémitritée, dans la fièvre tierce rémittente sub-intrante, et dans celles que Torti désigne par le nom de sous-continues,

demain l'accès retarda, mais les symptômes furent également très-intenses; le quinquina fut donné à la dose de huit grammes (deux gros); les deux jours suivans, l'accès eut lieu, mais seulement accompagné d'un assoupissement léger; on se borna à administrer du vin d'absynthe; l'état soporeux s'étant encore renouvelé, le quinquina fut administré derechef à la dose de huit grammes (deux gros), et les accès diminuèrent par degrés, en donnant le vin d'absinthe; la malade fut radicalement guérie le huitième jour, à compter de la dernière administration du quinquina.

que Galeazzi a remarqué la nécessité d'administrer une grande dose de quinquina. Il est aussi certaines fièvres dont Torti n'a point parlé, qui prennent d'abord le type continu, pour devenir ensuite intermittentes pernicieuses; dans ces sortes d'affections, on ne doit pas négliger d'administrer le fébrifuge à plus forte dose, et son effet est alors très - prompt. (1)

SIXIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

Dans les cas ordinaires des Fièvres pernicieuses intermittentes, la première prise, ou celle qui est donnée dans le temps le plus éloigné de l'accès (deuxième théorème), doit être la plus forte; on débute communément par la moitié de la dose, dont le reste est donné ensuite en portions successivement décroissantes, et dans un intervalle plus ou moins considérable, selon la nature de la Fièvre et la distance réciproque des paroxysmes entre eux.

CXXX. REMARQUES. On voit, d'après ce théorème, que la réussite du fébrifuge dépend moins de sa quantité que de la façon dont on l'administre. Au surplus, si, comme l'observe Torti, le

(1) *De Bonon. Scient. art. instit. atque acad. comment.*

paroxysme imminent est très-peu éloigné, et que la prise subite de seize grammes (une demi-once) soit insuffisante à cause du danger où se trouve le malade, et de la brièveté de l'intermission, on pourra administrer jusqu'à vingt-quatre grammes (six gros) de quinquina en une seule fois; cette méthode lui a souvent réussi.

SEPTIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

L'action du quinquina est d'autant plus énergique dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes, qu'une plus grande quantité de cette substance est administrée dans un temps plus court.

CXXXI. REMARQUES. Torti a fait voir que les médecins qui prescrivent le quinquina à la dose même de quatre-vingt-seize ou cent vingt-huit grammes (trois ou quatre onces), l'administrent infructueusement, lorsque les malades les prennent par petites prises et dans l'espace de plusieurs jours. Il ajoute que non-seulement il importe de prescrire le quinquina en grande quantité dans un très-court espace de temps, mais encore dans la proportion qui a déjà été assignée; en sorte que, si deux malades ont pris, dans un temps égal, une égale portion de quinquina, l'un peut guérir et l'autre succomber, uniquement parce

qu'on aura donné au premier seize grammes (une demi-once) tout d'un coup, tandis que l'autre n'en aura pris que quatre grammes (un gros), toutes les trois heures, selon la méthode de quelques médecins. Car, d'après ce dernier mode d'administration, le quinquina agit trop foiblement dans les premières heures qui sont les plus éloignées du paroxysme futur, etc. C'étoit là le défaut de la méthode de Morton qui, partageant la dose en parties égales, en donnoit trop en finissant.

HUITIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

Lorsque la Fièvre pernicieuse intermittente s'annonce par des symptômes alarmans, le quinquina doit être administré sans délai et sans aucune préparation préalable de l'individu.

CXXXII. REMARQUES. En effet, la plus urgente indication est ici d'arrêter la fièvre. Lind surtout a insisté sur cette pratique, parce qu'il en a obtenu les plus heureux succès en Angleterre, dans les épidémies meurtrières de 1765, de 1766 et 1767 (1). Il éprouva sur lui-même et sur deux cents de ses malades, que, toutes les fois qu'il par-

(1) Voyez l'appendice sur les fièvres intermittentes, dans le tome deuxième de son *Essai sur les Maladies des Européens dans les pays chauds*.

venoit à supprimer la fièvre par la prompte administration du quinquina, la cessation de la fièvre n'avoit aucune suite fâcheuse. Dans le cas contraire, si l'emploi du quinquina étoit négligé ou différé, l'hydropisie, la jaunisse, des douleurs de tête habituelles, etc., ne tarديوient pas à se manifester. Lind observe qu'il est souvent nécessaire de faire prendre le quinquina dès la première intermission. Il fait mention de quelques fièvres intermittentes, qui se déclarent avec un tel caractère de violence dans quelques lieux malsains de l'Angleterre, que le deuxième accès amène souvent la mort.

Torti, du reste, est un des premiers qui ont sapé le préjugé général qui faisoit donner des purgatifs et pratiquer des saignées avant l'administration du quinquina, et Grant remarque fort bien que toute fièvre d'accès doit être arrêtée aussitôt qu'il se manifeste le moindre signe de malignité. (1)

(1) *Recherches sur les Fièvres*, tom. I.

NEUVIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

Lorsque la Fièvre pernicieuse intermittente débute par des symptômes peu graves, si néanmoins un de ces symptômes prédomine constamment sur les autres, et si la nature de l'épidémie régnante donne lieu de soupçonner le danger de la Fièvre, il faut administrer le quinquina sans différer davantage.

CXXXIII. REMARQUES. Cette règle est fondée sur la promptitude avec laquelle la fièvre pernicieuse intermittente prend, dans quelques circonstances, le caractère pernicieux. L'observation a prouvé que le danger des symptômes n'augmente pas graduellement, mais qu'un paroxysme mortel peut succéder à un ou à plusieurs paroxysmes qui n'ont eu rien d'alarmant. C'est en vain que l'on prétendrait dans cette circonstance, qu'il est peut-être dangereux d'arrêter une fièvre dont les mouvemens dépurateurs peuvent avoir un but avantageux pour l'économie animale. On doit admettre tout au plus une proposition semblable pour des fièvres dont la cause est intérieure et cachée, et qui ne sont ou ne peuvent être l'effet d'une réaction salutaire de la nature; mais en est-il ainsi des intermittentes qui tirent leur origine de causes physiques extérieures, comme, par exemple, des miasmes

qui s'exhalent des lieux marécageux, ou infectés par d'autres principes non moins funestes !

DIXIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

Toutes les fois que la Fièvre pernicieuse intermittente se déclare en double-tierce, il n'y a ordinairement que l'un de ses accès alternant en tierce, qui soit véritablement pernicieux ; l'autre est léger et moins à craindre ; c'est donc spécialement vers le premier qu'il faut diriger les moyens curatifs.

CXXXIV. REMARQUES. Ceci pourtant n'est pas sans exception. Le Mémoire de Voulonne contient l'observation d'une double-tierce avec affection soporeuse, dans laquelle l'accès subalterne se montra réellement plus intense qu'un premier accès pernicieux qui avoit précédé. Il se prolongea, sans aucune sorte de rémission, jusqu'à l'arrivée du paroxysme suivant auquel le malade ne put résister. (1)

(1) *Mémoire sur les fièvres intermittentes.*

ONZIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

On peut, dans quelques cas, à l'aide d'une méthode moins énergique, changer le caractère pernicieux des Fièvres pernicieuses intermittentes, et les éteindre ensuite graduellement par l'heureux emploi des fébrifuges indigènes.

CXXXV. REMARQUES. Cette méthode mutatrice qui n'est qu'indiquée dans l'excellent ouvrage de Werlhof (1), a été perfectionnée par le professeur Pinel et par moi. Chez plusieurs malades atteints en divers temps, de la fièvre pernicieuse intermittente soporeuse, et traités par le vin d'absinthe et des bols faits avec la poudre de gentiane (*gentiana centaurium*, LINN.), des fleurs de camomille (*matricaria camomilla*, LINN.), le nitrate de potasse et le sirop de miel, nous sommes parvenus à convertir des paroxysmes assez graves en paroxysmes ordinaires, ou tels qu'ils se présentent dans les intermittentes bénignes, et à les faire disparaître ensuite peu à peu. Mais je dois observer que ces essais n'ont été tentés qu'à l'hospice de la Salpêtrière et dans l'hôpital Saint-Louis, où, en général, ainsi que nous l'avons déjà dit en commençant ce Traité, les fièvres pernicieuses à type intermit-

(1) *Observ. de febrib.*

tent ont des causes occasionnelles moins intenses que dans les lieux très-marécageux , et que dans deux cas de ces fièvres accompagnées de symptômes alarmans , le quinquina a été employé à la dose de trente-deux grammes (une once). Dans le traitement de cette maladie , comme dans celui de beaucoup d'autres , il faut faire une attention particulière aux localités , et déterminer par là les modifications à apporter dans l'usage des médicamens. (1)

(1) Mosca , médecin italien , a proposé le sirop fébrifuge suivant , qui pourrait convenir dans les cas où les symptômes des fièvres dont il s'agit , auraient peu d'intensité. On prend égales parties de suc dépuré de scordium , de chardon béni , de camomille et de petite centaurée ; on y ajoute une quantité suffisante de sucre blanc : ensuite on prépare le sirop selon les préceptes de l'art. On exprime le suc de chacune de ces plantes séparément. On choisit les plantes dans leur pleine vigueur , c'est-à-dire quelque temps avant la floraison. A défaut de ces sucs , on peut faire le sirop avec de l'eau distillée , ou bien avec une forte décoction de ces plantes ; mais il faut observer qu'alors l'effet est moindre , et l'expérience a démontré qu'il faut renouveler la dose ; car l'eau distillée étant très-foible , il en doit être de même du sirop. Ses effets , du reste , ne sont jamais si constans que lorsqu'on le prépare avec le suc de toutes les plantes ci-dessus. Si la camomille et la petite centaurée ne donnent pas une grande quantité de suc naturellement , on peut y suppléer par une forte décoction de ces plantes , non sèches , mais bien vertes. La dose de ce sirop est de trente-deux grammes (une once) pour les

J'ajouterai d'ailleurs que cette méthode, quelle que soit sa conformité avec les lois de la nature, ne pourra jamais être mise en usage que par des praticiens extrêmement familiarisés avec la marche particulière des fièvres pernicieuses intermittentes; car leur caractère insidieux et l'extrême irrégularité qui se remarque dans l'accroissement des symptômes et des paroxysmes, induiroit fréquemment en de funestes erreurs.

adultes, et de seize grammes (une demi-once) pour les enfans.

Comme certains malades ont de la répugnance pour les médicamens liquides, on peut donner ce fébrifuge sous une autre forme, et le faire avaler d'une manière beaucoup plus commode. A l'aide d'un feu très-lent, on rend ce même suc plus épais, jusqu'à consistance d'extrait, en sorte qu'on peut en former des pilules; cet extrait étant préparé avec soin, il conserve les mêmes vertus. La dose est depuis quatre grammes (un gros) jusqu'à huit.

On pourrait aussi substituer avec avantage, dans certaines circonstances, la cascarille au quinquina. On sait que cette substance fut administrée, avec un succès extraordinaire, dans une épidémie de fièvres sub-intrantes, observée à Herzpruch et aux environs, par Apinus, et dont ce médecin a publié la relation en 1697, quoiqu'on voie bien, d'après sa description, qu'il a méconnu leur caractère. Nous en avons déjà parlé au commencement de ce Traité.

DOUZIÈME THÉORÈME PRATIQUE.

Lorsque, par le secours de la méthode la plus convenable, on est parvenu à supprimer les paroxysmes d'une Fièvre pernicieuse intermittente, pour éviter les rechutes, il est nécessaire d'insister quelque temps sur l'usage du quinquina.

CXXXVI. REMARQUES. Pour remplir de semblables vues, le professeur de Modène conseille de donner le quinquina comme prophylactique, à la dose de quatre grammes (un gros) tous les jours, pendant trois jours, et de le donner ensuite à la dose de deux grammes (un demi-gros) deux fois le jour, pendant le même espace de temps; il veut aussi qu'après un repos de six jours, on en administre encore seize grammes, par deux grammes chaque jour; et il ajoute qu'il est rare que la fièvre reparaisse, lorsqu'elle a été ainsi subjuguée.

Les médecins, du reste, ont communément remarqué que les rechutes de la fièvre pernicieuse intermittente supprimée par le quinquina, se manifestent rarement avec cet appareil de symptômes formidables, qui caractérisent la première invasion; qu'elles cèdent aux plus petites doses de

quinquina , ou même au seul emploi des plus foibles fébrifuges.

On ne sauroit trop exhorter les médecins à vérifier l'observation importante de Werlhof, qui a vu que la fièvre récidivoit spécialement dans les troisièmes ou dans les quatrièmes semaines, selon que la fièvre est tierce ou quarte. Dans ce cas, je ne pense pas, comme cet auteur, qu'il faille donner de préférence le quinquina dans les semaines paroxystiques, mais plutôt dans celles qui les précèdent, fondé sur ce que ce fébrifuge n'agit jamais plus efficacement que lorsqu'il est administré d'une manière prophylactique, comme nous l'avons déjà démontré dans notre deuxième théorème.

Ces interruptions, ainsi prescrites dans l'usage du quinquina, sont d'une utilité majeure, parce qu'elles empêchent le système vivant de s'habituer à ce puissant remède, et de rendre ainsi nulle son action médicameuteuse.

Malgré ces précautions, il est des rechutes opiniâtres qui résistent à des doses réitérées de quinquina; et alors, selon le précepte de Sydenham, il faut recourir à d'autres médicamens. On n'ignore pas avec quel succès Hamilton donnoit le sel d'absinthe dans l'eau minérale de Spa, et quels

avantages d'autres praticiens retiroient des alcalis fixes, etc.

CXXXVII. Nous devons rejeter, comme étant de nulle valeur, toutes les objections généralement faites contre l'administration du quinquina dans le traitement des fièvres pernicieuses à type intermittent ou rémittent. Ramazzini et Stoll citent, à la vérité, des exemples où ce remède a été sans succès. Mais ces praticiens célèbres n'ont pas assez vu : 1°. qu'il peut exister des phénomènes de malignité indépendans du génie intermittent ; 2°. que les pernicieuses épidémiques surtout peuvent se compliquer d'une multitude d'accidens qui ne tiennent point à la périodicité de la fièvre, telles, par exemple, que certaines dégénérescences des viscères qui persistent souvent après que les paroxysmes ont cessé ; 3°. que le quinquina enfin n'a aucune prise sur des symptômes provenant de circonstances étrangères à la nature du mal ; j'ajouterai aussi que les méthodes vicieuses qui ont si souvent réglé l'administration du fébrifuge ont seules déterminé ses funestes effets, ainsi qu'on l'a observé chez des individus qui ont succombé à la fièvre, pour avoir pris le quinquina immédiatement avant l'accès (*Epist. ad Rob. Brady*). Ce n'est donc jamais à l'insuffisance du remède qu'il faut attribuer l'issue fâcheuse de quelques fièvres

pernicieuses intermittentes , mais au défaut d'observation des médecins qui ne discernent point avec assez de précision les circonstances où il doit et ne doit point être administré.

CXXXVIII. Après avoir exposé les principales règles qui doivent diriger les médecins dans l'administration du quinquina , il seroit superflu et contraire à la sévère exactitude que je me suis imposée de prétendre éclairer sur sa manière d'agir dans le corps vivant , en comparant ou en balançant à ce sujet les diverses conjectures de quelques écrivains. Disons-nous , en effet , avec Brown et ses ardens zélateurs , que ce médicament agit comme un stimulant énergique , qu'il remonte les forces de l'économie ? Mais alors , pourquoi des toniques non moins puissans , les boissons éminemment spiritueuses , par exemple , ne jouissent-elles pas de la même prérogative ? Faut-il lui attribuer une action anti-spasmodique ? Mais les liqueurs éthérées possèdent cette faculté à un bien plus haut degré ; et cependant elles seroient presque nulles dans le traitement des fièvres pernicieuses intermittentes. Disons-nous , avec quelques autres , qu'il neutralise le levain prétendu de la fièvre par les matières salines qu'il contient , ou qu'il influe sur le solide vivant par une faculté purement oxigénante ? Avancerons-nous avec plus de vraisemblance , d'a-

près le soupçon d'un chimiste célèbre , que la vertu du quinquina réside dans le principe tannin , très-abondant dans cette écorce , et que c'est à ce même principe qu'il faut rapporter la propriété fébrifuge de nos écorces indigènes , telles que l'écorce de chêne , d'aulne , de marronnier d'Inde , de saule , etc. ? D'après l'état actuel de nos connoissances , il est sans doute plus sage de se borner à la considération des effets salutaires du médicament , sans chercher à démêler comment ces effets s'opèrent , en attendant que de nouvelles observations nous aient plus complètement éclairés.

CXXXIX. Nous ne saurions néanmoins terminer cet article , sans agiter un point de doctrine intéressant , dont plusieurs médecins recommandables se sont occupés. Beaucoup d'entre eux ont prétendu que le quinquina opéroit ses effets les plus salutaires , sans exciter aucune évacuation critique. Mais Albertini est bien loin d'adopter une semblable assertion (1). Il soutient n'avoir vu aucune fièvre efficacement combattue par ce remède , qui n'ait été suivie d'une crise analogue à celle que la nature , ou , si l'on veut , d'autres remèdes ont coutume de provoquer. Ces crises surviennent même dans les fièvres longues et obstinées , et

(1) *De Bonon. Scient. et art. instit. atque acad. comment.*

qui ne cèdent qu'à des prises réitérées de cette substance médicamenteuse ; mais elles sont plus tardives et plus difficiles, et on les distingue à peine des autres excrétions. Il est vrai que, pour être témoin de ce phénomène, il ne faut pas terminer son observation avec la maladie. Il faut suivre les malades dans leur convalescence, et après qu'ils sont totalement revenus à la santé.

D'après cette manière de voir, il est aisé de se rendre compte de toutes ces différentes affections imparfaitement guéries dans lesquelles les crises manquent, ou sont tardives et insuffisantes, en sorte que l'individu ne se rétablit qu'avec une extrême difficulté, et après un temps très-long ; ou qui se convertissent enfin en d'autres affections secondaires, remarque qui n'avoit point échappé au père de la médecine. On explique pourquoi certains auteurs ont écrit que des personnes ayant recouvré leur santé par l'usage du quinquina, ont éprouvé néanmoins des sueurs très-copieuses pendant plusieurs nuits. D'autres ont vu les urines s'échapper avec abondance après l'administration d'un pareil remède. Sydenham a cru apercevoir que cette substance purgeoit quelquefois comme un violent cathartique, etc.

Albertini n'attribue pas seulement au quinquina la faculté d'exciter les sueurs, les selles et les uri-

nés, mais d'augmenter en outre la transpiration insensible; ce qu'il confirme par une multitude de faits. Il remarque effectivement que, si les malades qui ont pris une certaine quantité de quinquina, n'ont point de crise apparente, ils ont parfois une haleine fétide, qui va jusqu'à exciter des nausées, et dont le médecin s'aperçoit aisément lorsqu'il s'approche d'eux, et qu'il soulève la couverture qui les couvre. Il confirme ce qu'il avance par l'observation qui suit : Durant la saison de l'automne, un homme étoit atteint d'une fièvre subintrante double-tierce, dont le caractère étoit très-grave. On lui administra le quinquina. La fièvre disparut; mais, peu de jours après, le malade commença à exhaler une odeur si forte, que ses amis pouvoient à peine la supporter. Cette odeur persista jusqu'à ce que, s'étant levé de son lit quelques jours après, il fut repris par ses paroxysmes fébriles. Il eut de nouveau recours à l'écorce du Pérou; et, après en avoir avalé plusieurs doses, il éprouva des sueurs nocturnes, et enfin une abondante évacuation d'urine, qui termina entièrement la maladie.

D'après Albertini, les crises qui suivent l'administration du quinquina diffèrent de celles qui suivent l'usage des autres remèdes. Les uns, en effet, provoquent régulièrement les sueurs, d'autres les

urines, plusieurs suscitent les selles, et d'autres les crachats. Mais le quinquina produit tantôt l'une, tantôt l'autre de ces évacuations. Souvent même ces évacuations critiques, loin d'être uniformes, se succèdent l'une à l'autre, en sorte qu'on peut dire que le quinquina pousse par toutes les voies. Elles n'ont pas non plus un temps fixe et déterminé; elles arrivent plus tôt ou plus tard. Quelquefois elles se prolongent jusqu'au temps où l'individu convalescent a commencé de sortir. Albertini rapporte qu'il a souvent rencontré dans les promenades des personnes qui se plaignoient de ces crises, et c'est ce qui a attiré son attention.

Enfin, de toutes ces considérations ci-dessus exposées, Albertini avoit déduit trois corollaires majeurs, qu'il appliquoit à la pratique de la médecine. 1°. Si, lorsqu'on a donné le quinquina, on voit survenir des crises louables, et telles que la nature de la maladie les demande, il est superflu d'administrer de nouvelles doses de ce fébrifuge. 2°. Si des évacuations critiques suivent l'administration du quinquina, le convalescent peut adopter un régime moins sévère, s'exposer à l'air, et prendre, s'il est nécessaire, quelques légers purgatifs, attendu que les rechutes sont moins à craindre. 3°. Il faut faire prendre plus ou moins souvent le quinquina, suivant que les crises s'effectuent

plus tôt ou plus tard, et d'une manière plus ou moins convenable. Nous n'ajouterons rien à ces réflexions particulières d'Albertini, qui sont le résultat de sa propre expérience, et qui nous ont paru mériter d'être présentées à la méditation des médecins de nos jours. Peut-être que des recherches ultérieures parviendront à les confirmer, ou à les modifier, ou à les étendre.

CXL. Il est des moyens auxiliaires propres à remplir les indications relatives aux symptômes qui constituent chaque variété de la fièvre pernicieuse intermittente. Quelques circonstances particulières peuvent même en déterminer l'emploi, quoique les phénomènes généralement liés à la marche de la fièvre, dérivent d'un principe unique, et cessent de se manifester avec elle, lorsqu'elle est à temps et à propos combattue par des doses convenables de quinquina. C'est ce dont il sera facile de se convaincre, pourvu qu'on réfléchisse sur les divers cas que nous avons rapportés au commencement de cet ouvrage.

PREMIÈRE CIRCONSTANCE.

Il peut arriver que le médecin soit appelé au milieu d'un accès caractérisé par les accidens les plus funestes, que le malade soit menacé d'une mort prochaine, parce qu'on aura omis de donner le quinquina; alors, sans doute, le but du médecin doit être de modérer ces accidens, pour prolonger la vie jusqu'au prochain paroxysme, et combattre ensuite la fièvre par les doses prescrites du fébrifuge.

CXLI. REMARQUES. Si, dans cette circonstance, par exemple, le malade est froid et cadavéreux; si ses forces sont considérablement abattues, si son pouls est presque éteint, si l'affection comateuse est au plus haut degré, etc., on pourra s'aider avec avantage des stimulans et des cordiaux. On remplira l'indication énoncée par l'application des sinapismes, des vésicatoires, par l'approche des substances odorantes (dans les fièvres léthargiques), par des fomentations spiritueuses et chaudes (dans les fièvres algides), etc.

Dans des cas opposés, lorsque la réaction des forces vitales est extrême, comme dans les fièvres marquées par des cardialgies, des convulsions, etc.,

l'opium pourroit convenir. Les vives céphalalgies surtout cèdent à l'action de ce remède, selon la remarque de J.-P. Frank, à moins que ces douleurs ne viennent d'un état de pléthore; dans cette dernière conjoncture, il conseille la position élevée de la tête, et sa dénudation, des lotions froides, etc. (1)

DEUXIÈME CIRCONSTANCE.

Quelquefois à cause d'un état particulier d'irritation de l'estomac, le quinquina est constamment rejeté par la voie du vomissement (spécialement dans la cholérique), à quelque dose qu'il soit administré. Rien n'est plus pressant alors que d'obvier à cet accident, par les remèdes les plus énergiques.

CXLII. REMARQUES. On doit apaiser cette irritation en combinant, à l'imitation de l'habile praticien Sarcone, l'opium avec le quinquina. On sait d'ailleurs que Storck avoit coutume de donner ce narcotique dans toutes les fièvres intermittentes où prédominoient les symptômes nerveux et convulsifs, et qu'Hoffmann et Rivière l'employoient avec un grand succès pour apaiser les mouvemens spasmodiques de l'estomac, qui s'opposoient à

(1) *De curand. homin. morb. epitome.*

l'admission de l'écorce du Pérou. C'est par ce seul moyen qu'on parvient à arrêter ces évacuations tumultueuses qui épuisent la nature sans la soulager. Plusieurs médecins observèrent que dans une épidémie qui régna à Bordeaux, on prévenoit avec succès le vomissement par huit à dix gouttes de laudanum liquide de Sydenham, ou par une petite quantité de thériaque qu'on ajoutoit aux différentes prises de quinquina qu'on avoit prescrites. Si la thériaque excitoit à vomir, on la déguisoit en la faisant prendre en bol, dans un pruneau cuit, de manière à ce que les malades ne pussent en apercevoir la saveur. Mais personne, peut-être, n'a employé l'opium avec plus de succès que Barthez, dans le traitement des fièvres pernicieuses intermittentes avec prédominance des symptômes nerveux. Je regrette que les circonstances n'aient pas permis à ce praticien, qui fut si long-temps la lumière de nos écoles, de rédiger avant sa mort des observations précieuses qu'il avoit bien voulu promettre de me communiquer sur cet objet.

TROISIÈME CIRCONSTANCE.

Les Fièvres pernicieuses intermittentes peuvent se compliquer d'un embarras des premières voies, qui nécessite l'emploi des émétiques et autres évacuans, avant l'administration du quinquina.

CXLIII. REMARQUES. Finke cite un cas semblable. La fièvre étoit soporeuse. Au jour de l'exacerbation, le malade, dit cet auteur, étoit frappé de tous les symptômes si bien décrits par le célèbre Werlhof. Il se rétablit parfaitement en ne prenant le quinquina qu'après que la bile fut entièrement évacuée (1). Sénac rapporte que, dans une épidémie, il faisoit succéder les vomitifs à la saignée dès le commencement de la fièvre, avec un plein succès.

Dans une autre constitution, où l'action de la fièvre se portoit principalement vers la tête, le symptôme comateux disparoissoit par le seul usage des mêmes remèdes (2). Raymond remarque que, dans les pernicieuses intermittentes de Middelbourg, les émétiques étoient très-bien indiqués

(1) *De morbis biliosis anomalis.*

(2) *De nat. febr. recond.*

dans le commencement , et qu'ils secundoient merveilleusement la nature , en facilitant l'expectoration de l'humeur bilieuse. On administroit de préférence l'ipécacuanha , parce qu'il produisoit des effets moins violens que le tartre-stibié. (1)

QUATRIÈME CIRCONSTANCE.

Si , par un effet de l'influence du climat ou de l'épidémie régnante , les Fièvres pernicieuses intermittentes se combinent avec quelque autre maladie , il importe de joindre au quinquina les remèdes analogues à la nature des différentes complications.

CXLIV. REMARQUES. C'est ainsi que , dans le climat de Middelbourg , la fièvre pernicieuse intermittente se trouve souvent unie au scorbut. Cette complication se reconnoît à la fétidité , à la flaccidité , à l'érosion des gencives , à la couleur foncée de l'urine , aux exanthèmes , etc. On joint alors , avec avantage , à l'écorce du Pérou , l'usage des acides , et notamment de l'acide sulfurique ; car , ainsi que l'observe Raymond , les acides végétaux sont rarement assez forts pour résister aux symptômes de la tendance à la putridité.

(1) *Dissert. exhib. descript. febr. intermitt. automn. quottannis Mittelburgi, etc.*

CINQUIÈME CIRCONSTANCE.

La diathèse vermineuse s'étant combinée quelquefois avec les fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques, on a proposé de recourir à l'helminthocorton et aux drastiques usités en pareil cas, afin de combattre séparément ce symptôme. Mais des observations exactes ont prouvé qu'il cédoit à l'action du quinquina. (1)

CXLV. REMARQUES. Il paroît que le quinquina agit ici en rétablissant le ton du canal intestinal;

(1) Voyez Rammazzini, *const. de 1689*, Lancisi, *de nox. palad. effluv.* Heister *Practisches medicinisches*, etc. Quoiqu'il en soit, pour donner encore plus de perfection à nos méthodes de traitement, on doit vivement désirer que les historiens de maladies, se montrant aussi naturalistes que médecins, décrivent avec précision les vers observés dans les différentes épidémies. Il n'est pas douteux qu'il n'y ait certaines constitutions de l'air, et certains états morbifiques des premières voies, particulièrement propres à faire éclore et croître de préférence telle ou telle espèce de vers. C'est ainsi que le trichuride (*trichuris Wagleri et Rædereri*) s'est principalement montré sous les influences qui avaient produit la maladie muqueuse de Gottingue, quoiqu'il ait pu également se développer dans d'autres circonstances, selon la remarque de Wrisberg. (*Descrip. trich.*) Il paroît, du reste, que des vers appartenant à diverses espèces ou à divers gen-

car, d'après l'observation de Boerhaave et de beaucoup d'autres médecins, l'affoiblissement de cet organe favorise d'une manière spéciale le développement des vers dans l'intérieur de sa cavité. De là vient que l'affection vermineuse qui n'est qu'un produit secondaire de la fièvre (1), se ma-

res, comme l'ascaride lombricoïde (*lumbricus intestinalis*, Pallas. *Ascaris lumbricoides*, Bloch, etc.), l'ascaride vermiculaire (*pollicaris*, LINNÆUS. *Ascaris vermicularis*, Bloch.), le tænia ou ver solitaire (*tænia solium*, etc. LINNÆUS), la fasciole (*fasciola intestinalis*, LINNÆUS, etc.), peuvent exister ensemble, et se mêler même dans l'intérieur du tube intestinal. On trouve des exemples de ce fait dans une dissertation très-savante, publiée à Turin, par le docteur Buniva, qui s'est occupé des vers sous le triple rapport de l'histoire naturelle, de la physiologie et de la médecine pratique. Pour ce qui regarde les épidémies des fièvres pernicieuses vermineuses, on ne sauroit trop méditer et comparer entre elles les constitutions décrites par Lancisi, déjà cité plus haut, par Degner, Klockhoff, Vandesbosch, etc.

(1) Je ne regarde le symptôme vermineux que comme un produit secondaire de la fièvre, parce qu'il conste, d'après les observations d'Hoffmann, de Vandesbosch, de Bianchini, etc., que les vers intestinaux périssent par l'effet d'un mouvement fébrile violent. Aussi les anciens avoient-ils remarqué que ces animaux ne se manifestoient le plus communément que dans les affections chroniques où la réaction du système est modérée ou foible. *Lumbricus, qui latus appellatur, in his qui febre carent abundat, et in longis*

nifeste le plus communément chez les personnes indigentes, qui font usage d'une mauvaise nourri-

ac diuturnis enascitur morbis. Aëtius, *Tetrab.* III, *Serm.* I.

On verra, d'après ce que nous venons de dire, combien sont dépourvues de fondement les idées hypothétiques de Moreali, qui n'a pas balancé à rapporter la cause des fièvres malignes pétéchiales, observées à Reggio en 1734 et en 1735, à la présence des vers dans les intestins. (*Delle febbri maligni e contagiose nuovo sistema, etc.*) Nous ne parlons ici de cette production pleine d'erreurs et d'assertions hasardées, que pour montrer dans quels écarts pernicieux peut parfois entraîner l'esprit de système. Après un examen diffus de la question, si long-temps et si inutilement agitée sur l'origine des vers dans le corps de l'homme, l'auteur prononce que ce n'est ni à leur accumulation excessive dans l'intérieur du tube digestif, ni à l'irritation qu'ils peuvent occasionner dans cet organe, qu'il faut attribuer la cause des affections dont il traite; mais plutôt à un état véritablement maladif de ces animaux, provenant de la nature des alimens dont l'individu se nourrit. Cet état pathologique doit entraîner des altérations dans les sécrétions de leur économie, dans leurs excréments. Ceux-ci alors s'écoulent dans les intestins grêles, se mêlent au chyle, lui impriment des qualités nuisibles, passent dans la masse du sang où leur présence détermine le développement de la fièvre, dont l'intensité est proportionnelle à la quantité des parties morbifiques charriées dans le système de la circulation. Quand on fait le premier pas dans le vague des hypothèses, il est rare que l'on s'arrête. On est entraîné, on marche de vision en vi-

ture , ou d'une eau malsaine (1). De là vient aussi que cette affection se complique particulièrement

sion , au gré de l'imagination et des conjectures. Ce n'étoit pas assez pour Moreali d'avoir déterminé la cause des fièvres malignes ; il falloit trouver un remède qui pût guérir les maladies dont les vers intestinaux sont susceptibles , et il n'en connoit pas de meilleur que le mercure. Il rapporte plusieurs cas où ce remède paroît avoir été favorable à la guérison de ces fièvres : mais devoit-il conclure de là que les fièvres malignes dépendent essentiellement de l'affection primitive des vers intestinaux ? Ne falloit-il pas auparavant prouver qu'aucune autre cause ne pouvoit déterminer le développement de ces maladies ; que les vers des intestins peuvent réellement éprouver les altérations morbifiques dont il est question , et surtout s'assurer , par une multitude de dissections anatomiques , de l'existence de ces animaux dans tous les individus qui avoient péri de la fièvre maligne ? Au surplus , on se contente rarement d'alléguer des faits , on veut leur assigner des causes , et on veut encore déterminer leur manière d'agir. Nous nous abstiendrons de consigner ici une foule d'autres argumens non moins insoutenables , auxquels l'auteur a recours pour prouver que le mercure guérit secondairement la fièvre maligne , non en tuant les vers , mais en délivrant ces animaux des maladies dont eux-mêmes sont atteints. L'ouvrage du docteur Moreali doit être voué à l'oubli , ou cité comme un affligeant témoignage des erreurs auxquelles l'esprit humain peut se livrer lorsqu'il s'éloigne du flambeau de l'observation et du sentier de l'expérience.

(1) Les vers se développent aussi plus facilement dans

avec les fièvres pernicieuses épidémiques , qui , presque toujours , introduisent une débilité remarquable dans le système des voies digestives.

SIXIÈME CIRCONSTANCE.

Dans les Fièvres pernicieuses intermittentes qui se déclarent aux approches du printemps, chez des sujets vigoureux et robustes, et qui suscitent une irritation grave et profonde de certains viscères, la saignée peut devenir nécessaire au malade.

CXLVI. REMARQUES. C'est ce qu'on observe principalement dans les fièvres pernicieuses intermittentes qui tendent au type de continuité. Sénac cite des fièvres tierces caractérisées par un pouls si dur, des céphalalgies si violentes, des douleurs si vives de l'estomac et des intestins, des impressions

l'âge et le sexe le plus foible. C'est pourquoi il arrive que les enfans en sont plus souvent attaqués. Nous ajouterons que sur environ cent soixante-quatre observations recueillies par Pallas, on remarque quatre-vingt-dix femmes atteintes de vers, et seulement soixante-quatorze individus appartenant au sexe masculin. Werner a trouvé que ce rapport étoit de trois à un. Pallas a pareillement constaté que chez les poissons et les quadrupèdes, on rencontre plus fréquemment des vers dans les femelles que dans les mâles, etc.

telles de poitrine, qu'on étoit contraint de faire ouvrir la veine plusieurs fois. Les autres moyens curatifs luttoient vainement contre ces symptômes (1). Sarconne fait mention d'une fièvre pernicieuse sous-continue, qui dirigeoit particulièrement ses effets vers l'organe pulmonaire, et qui nécessitoit l'emploi de la saignée dans le fort de l'accès et dès le commencement de l'invasion.

Casimir Médicus a fort bien décrit une fièvre intermittente maligne, qui fut épidémique à Manheim pendant un été excessivement chaud. Cette fièvre, lorsqu'elle étoit funeste, se terminoit par un tétanos universel. Dans cet état, chez quelques sujets, la déglutition étoit empêchée, et les liquides ressortoient par la bouche à mesure qu'on les y versoit, comme si le gosier eût été fermé. Chez d'autres malades, le fond de la bouche sembloit paralysé : la boisson paroissoit tomber dans le passage, ou bien être poussée par des convulsions qui la chassoient tantôt en bas, et tantôt en dehors. La poitrine étoit aussi relevée vers la gorge avec violence ; et cet état convulsif subsistoit même après la mort. Le bas-ventre étoit retiré et aplati d'une manière surprenante. Les intestins

(1) *De nat. febr. recond.*

étoient violemment contractés, comme il paroissoit d'abord par la difficulté qu'on avoit de faire retenir les lavemens, et ensuite par l'inspection anatomique des cadavres. La peau étoit tellement sèche et raccornie, que l'huile dont on vouloit la frotter ne pénétoit pas.

Médecus ayant trouvé dans les cadavres de ceux qui périrent de cette fièvre maligne, que l'estomac et la vésicule du fiel renfermoient beaucoup de bile noire et épaisse qui teignoit profondément les membranes voisines, combattoit par le moyen suivant le caractère pernicieux de cette fièvre périodique. Il faisoit saigner selon l'indication du pouls, et évacuoit ensuite la bile avec grand succès par de petites doses d'ipécacuanha. (Ce médicament, d'après son opinion, procuroit le vomissement tout aussi bien que s'il avoit été administré à des doses plus fortes. Il avoit même l'avantage d'agir sans irriter l'estomac et sans exciter des convulsions générales.) Médecus donnoit ensuite le quinquina, dont il faisoit prendre toutes les heures vingt grains avec six grains de nitre dans du lait d'amandes. Par cette méthode, il triomphoit des affections les plus graves.

SEPTIÈME CIRCONSTANCE.

Lorsque la déglutition est impossible, et que le danger est imminent, les lavemens et les bains de quinquina ont pu être administrés avec avantage dans certains cas de Fièvres pernicieuses intermittentes.

CXLVII. REMARQUES. Comparetti cite un exemple de fièvre catarrhale intermittente que nous avons déjà rapporté, et dans lequel l'écorce du Pérou, administrée par cette voie, a parfaitement réussi. Les clystères étoient composés de seize grammes (une demi-once) de quinquina en poudre, avec cent vingt-huit grammes (quatre onces) d'eau pure. Les médecins de Montpellier, devenus si célèbres par la perfection de leur clinique, ont fait beaucoup d'observations analogues. Les bains avec les décoctions de quinquina avoient été conseillés par Barthez; une jeune fille qui lavoit habituellement du linge dans un lieu marécageux et malsain, essuya une fièvre pernicieuse cardialgique, dont les deux premiers accès se développèrent avec une extrême violence. On s'aperçut du danger que couroit la malade, et l'on ne balança pas à administrer l'écorce du Pérou; mais ce médicament fut toujours rejeté par les vomissemens les plus douloureux et les plus pénibles. Dans ce cas funeste,

L'illustre professeur que je viens de nommer ne vit d'autre parti à prendre que de plonger la malade dans un bain que l'on composoit avec une décoction astringente de quinquina. Ce moyen fut merveilleusement salutaire. Les vomissemens spasmodiques cessèrent, et le paroxysme fut singulièrement mitigé. M. Mestivier, médecin français, qui a pratiqué l'art à Moscow avec beaucoup de célébrité et de distinction, en a obtenu un succès complet, chez une princesse russe qui se trouvoit dans une situation très-alarmante. (1)

CXLVIII. On voit que ces cas particuliers que je viens de désigner, et qui sont eux-mêmes susceptibles de varier à l'infini, n'apportent que quelques légères modifications aux théorèmes généraux que j'ai précédemment établis, et que les principes que j'ai énoncés n'en sont ni moins positifs ni moins incontestables.

CXLIX. Plusieurs médecins ont prétendu que

(1) Comment ne pas recourir à tous les moyens qui peuvent faciliter l'action du quinquina sur l'économie animale, puisque le salut des malades tient à l'emploi de cette inappréciable écorce ! Le célèbre praticien Bouvard ne craignit point de faire casser les dents incisives à un malade atteint d'un resserrement tétanique des mâchoires, pour faciliter l'introduction du quinquina dans l'estomac.

le quinquina pouvoit être heureusement suppléé par d'autres remèdes dans le traitement des fièvres pernicieuses intermittentes. Dans ces derniers temps surtout, on n'a cessé de recommander les préparations opiacées. On n'a pas même excepté les cas d'assoupissement, de carus et d'apoplexie, quoique Sénac ait essentiellement expérimenté qu'elles pouvoient être funestes lorsqu'elles étoient administrées dans la prédominance d'un pareil symptôme. Joseph Frank rapporte une observation de fièvre penicieuse intermittente comateuse, faite par Hoffmann, et relatée dans une dissertation de Wirtenson (1). Les symptômes avoient l'apparence la plus redoutable. Hoffmann versa dans la bouche de la malade quatre - vingt - quinze gouttes de laudanum liquide de Sydenham, que celle - ci avala au bout de quelque temps. Le pouls se releva soudain, et tous les symptômes s'amendèrent. Le paroxysme suivant fut de même tempéré par l'administration du laudanum, ainsi que le troisième. Elle prit ensuite une infusion de quinquina dans le vin, et se rétablit parfaitement. (2)

CL. Quelle que soit l'authenticité de ce fait,

(1) *Dissert. inaug. demonst. opium vires cordis debilitare, et motum tamen sanguinis augere.* 1774.

(2) *Ricerca sullo stato della medicina secondo i prin-*

je pense qu'on s'en est saisi avec beaucoup trop d'empressement pour le faire plier à l'esprit de système; et que les vrais praticiens doivent s'en tenir au quinquina qui, dans le plus grand nombre de cas, supplée tous les médicamens, sans être presque jamais efficacement suppléé par aucun; peut-être que les travaux de la chimie plus avancés nous fourniront les moyens d'extraire, des autres végétaux, la substance purement médicinale qui réside au degré le plus éminent dans l'écorce précieuse dont il s'agit; et on a tout lieu de l'espérer. Alors seulement on verra se réaliser les avantages d'une proposition faite par M. Marabelli, chimiste très-ingénieur de l'Italie, qui vouloit que l'on procédât à la confection d'un quinquina artificiel, en combinant habilement les principes élémentaires qui constituent son écorce. Plusieurs médecins français ont tenté de mettre à exécution le même projet; mais un pareil travail réclame de nouvelles recherches de la part des chimistes et des praticiens. Déjà les médecins et les chimistes de France ont procédé à quelques expériences qui n'ont pas été sans succès.

cipj della filosofia induttiva con un appendice contenente varj casi pratici con refflessioni del dott. Roberto Jones. Traduzione dell' inglese coll' aggiunta di alcune note di Giuseppe Frank, etc.

CLI. J'achève ici ce que j'avois à exposer sur l'histoire, la nature, les causes et le traitement curatif des fièvres pernicieuses intermittentes. J'ai choisi de préférence ce sujet de dissertation, parce que les points de doctrine qu'il renferme peuvent se démontrer avec cette évidence de fait, qui seule constate le progrès des sciences; parce que, sans donner carrière aux spéculations et aux subtilités théoriques, ce sujet d'ailleurs atteste éminemment la puissance de l'art contre une espèce de fièvres presque toujours mortelles avant la découverte du quinquina.

CLII. Les connoissances acquises sur cette matière sont d'une telle certitude, qu'elles répondent de reste aux sophismes et aux vaines déclamations des détracteurs de la médecine. Qui oseroit en effet la présenter comme une science douteuse et conjecturale, si, dans tous les cas, elle étoit fondée à présumer les mêmes succès de ses tentatives et de ses efforts?

CLIII. Au surplus, en exécutant le plan que je m'étois tracé pour la confection de ce travail, j'en ai écarté avec sévérité toutes les assertions hasardées, toutes les inductions trompeuses, tirées de quelques analogies peu confirmées; en un mot, toutes les questions futiles qui occupent les loisirs du théoricien, mais qui ne sauroient être du res-

sort du médecin clinique; profondément convaincu que les seuls ouvrages qui contribuent à la perfection de l'art, sont ceux où l'on n'avance rien qui ne soit déduit des expériences les mieux constatées, et des plus rigoureuses observations.

FIN DU TRAITÉ DES FIÈVRES.

APPENDICE

SUR

LES ESPÈCES DE QUINQUINA

QU'ON PEUT EMPLOYER POUR LA GUÉRISON

DES FIÈVRES PERNICIEUSES INTERMITTENTES.

I. IL est bien démontré aujourd'hui que l'imperfection de nos connoissances, tant sur la nature que sur le véritable caractère des différentes espèces de quinquina, a souvent entraîné les médecins dans des fautes graves, relativement à son administration; que les écrivains même les plus éclairés de notre art, sont tombés dans des contradictions frappantes, parce qu'ils n'avoient été dirigés que par des expériences tentées au hasard (1); qu'il importe par conséquent de débrouiller ce mé-

(1) Tandis qu'on voit Sydenham, Morton, et beaucoup d'autres écrivains non moins recommandables, préconiser les vertus suprêmes du quinquina, on voit Etmuller, Baglivi, Ramazzini, le célèbre Stahl, même Juncker, s'élever avec force contre ce fébrifuge, condamner et repousser son usage, et se plaindre avec amertume des effets funestes qui ont suivi son administration.

lange d'erreurs et de vérités, dont se trouvent remplis les différens ouvrages publiés sur la matière médicale, et de refaire, en un mot, dans son entier, l'histoire de ce médicament célèbre, en procédant d'après des faits mieux vus et mieux constatés. Comme je suis le premier médecin européen qui ai fait usage des notions acquises sur cet intéressant objet, par les voyageurs les plus éclairés et les plus recommandables, j'ai cru devoir les développer à la fin de ce Traité, avec toute l'étendue dont elles sont susceptibles.

II. Aucun sujet de matière médicale n'est plus digne de nous occuper. Les propriétés souveraines du quinquina rappellent sans cesse aux praticiens la certitude et les grands moyens de leur art. A l'instant où j'écris cet article, de nouveaux naturalistes se livrent à de savantes incursions sur les hautes et majestueuses montagnes des Andes, ou dans les plaines riantes de Quito. Assis à l'ombre de ces arbres salutaires, ils ajoutent peut-être de nouveaux matériaux à l'histoire que je ne fais qu'esquisser.

III. C'est aux longs travaux de Mutis, directeur de l'expédition botanique de Santa-Fé; c'est au patriarche des naturalistes du Nouveau-Monde, dont la science regrette la perte récente, et qui, pendant trente-sept années, n'a cessé d'observer

les diverses espèces de l'arbre qui nous fournit un si utile médicament, et d'expérimenter sur leurs propriétés particulières (1); c'est aux communica-

(1) On peut lire dans les Annales d'Histoire naturelle, publiées à Madrid par feu le savant Cavanilles, un article intéressant sur Joseph-Célestin Mutis, qui doit occuper un rang distingué parmi nos plus célèbres botanistes. Il est né à Cadix, et passa à Santa-Fé en 1760. Doué d'un talent supérieur et d'un zèle infatigable, il a cultivé avec un égal succès la médecine, les mathématiques, la physique, la zoologie, la minéralogie, et spécialement la botanique. Il a observé avec soin les marées atmosphériques, et a composé sur cette matière un ouvrage aussi neuf qu'utile. Il s'est occupé des fourmis du nouveau royaume de Grenade, a examiné l'anatomie de chaque espèce, a observé les mœurs et le gouvernement de celles que l'on désigne communément en Espagne sous le nom de *arrieras*, leurs mouvements, leurs chasses, leurs moyens d'attaque et de défense; il a fait des remarques curieuses sur les quadrupèdes, les oiseaux, les insectes de ce pays, et en a fait exécuter les dessins; on lui doit des observations importantes sur les maladies du climat, et sur l'affection lépreuse appelée *mal de saint Lazare*. Il a rédigé plusieurs Mémoires sur les mines de tous les métaux et les pierres précieuses de ce royaume, sur l'agriculture, l'exportation des fruits, la culture des bananiers et du riz. Après plus de quarante années d'étude, il est parvenu à compléter la Flore de la Nouvelle-Grenade, qui est composée aujourd'hui de quatre mille figures, et d'autant de descriptions. Les botanistes verront avec plaisir dans son ouvrage des fructifications singulières et des

tions animales , et aux entretiens réitérés du savant et modeste M. Zéa , son disciple et son digne collaborateur , que je suis redevable de l'inestimable avantage que j'ai de pouvoir disserter sur un semblable sujet avec quelque exactitude. J'ai dû pareillement puiser des lumières dans les ouvrages de MM. Vahl, Humboldt et Bonpland, ainsi que dans ceux de MM. Ruiz et Pavon. Ces naturalistes célèbres , indépendamment de leurs observations intéressantes , ont publié des dessins exacts , qui peuvent être d'une utilité infinie pour les médecins qui

parties nouvelles des végétaux , auxquelles il a fallu donner de nouvelles dénominations. On lira avec intérêt ce qu'il a écrit sur le sommeil des plantes , la polygamie et les fécondations hybrides. La modestie de l'auteur , et le peu de confiance qu'il avait en ses moyens , ont mis sans doute des obstacles à la publication de ses ouvrages. Tant de travaux divers , dont chacun sembleroit exiger le temps d'un seul homme , seroient encore ignorés , si ses disciples les plus instruits n'en avoient porté les fruits en Europe. Linnæus et Smith ont aussi contribué à le faire connoître en enrichissant leurs ouvrages de plusieurs descriptions et dessins de M. Mutis. Il a aussi fait passer à Cavanilles , qui nous a fourni ces renseignemens , quelques espèces rares , le plus habilement figurées , que le botaniste de Madrid s'est empressé de publier , etc. Mais rien n'est plus digne de l'attention des médecins que sa *Quinologie de Bogota* , dont cet appendice offrira les principaux résultats.

veulent acquérir une connoissance parfaite des espèces officinales du quinquina. Personne n'ignore que les contestations les plus vives se sont élevées entre les botanistes de la Nouvelle-Grenade, et les auteur de la Flore péruvienne. J'ai dû rester étranger à ces querelles, ainsi qu'aux motifs qui les ont suscitées. La vérité seule est l'objet de mes recherches : elle naît souvent des contradictions et des disputes; c'est à nous de la discerner.

IV. J'avertis d'abord que mon intention n'est point de m'étendre sur l'histoire de la découverte de ce médicament célèbre, et sur son premier emploi dans la médecine-pratique. On peut voir dans les auteurs qui se sont successivement copiés, les circonstances majeures qui ont signalé sa vogue dans divers temps; son importation en Europe en 1640; sa grande renommée en Italie en 1649; et, quelques années après, son discredit et sa proscription, par le mode défectueux qui dirigea son administration; enfin, ses nouveaux triomphes en 1679, où Robert Talbot le fit revivre, et perfectionna ses préparations.

V. Je passe de suite à la détermination des espèces de quinquina, dont l'art de guérir peut user avec avantage. Il importe d'autant plus de distinguer ces espèces, que, suivant l'observation

de Mutis, les propriétés de chacune d'elles sont des différences remarquables, et que par conséquent, le mélange vicieux qu'on en fait journellement dans le commerce, peut donner lieu à des inconvéniens graves, et faire échouer le traitement.

VI. Le quinquina ou *cinchona* forme un genre très-naturel dans la famille des rubiacées. Ce genre admet plusieurs espèces, dont cinq jusqu'à ce jour sont officinales. Mais qui sait si des recherches ultérieures n'en feront pas connoître un plus grand nombre; c'est ce que l'on doit présumer quand on étudie les ouvrages de MM. Ruiz et Pavon, auteurs de la Flore péruvienne. (1)

VII. Il importe de savoir que les espèces du genre *cinchona* sont très-susceptibles de varier, selon les qualités particulières du terrain. Il est, par conséquent, nécessaire, non-seulement d'observer sur les lieux ces espèces, mais encore de recourir à certaines épreuves, pour s'assurer, dans le commerce, de la vraie nature des écorces.

VIII. L'imperfection de la nomenclature botanique a pu influencer beaucoup, sans doute, sur les

(1) *Annales de historia natural, mes de setiembre, de 1800.*

erreurs qu'on a commises dans la classification des différentes espèces de quinquina. Les savans qui ont eu occasion de parcourir les pays où ce végétal croît avec abondance, assurent que, dans la même province, la même espèce est fréquemment désignée par une multitude de noms vulgaires; que plus fréquemment encore, le même nom est attribué à différentes espèces. Il est aisé de comprendre dans quels inconvéniens pouvoit entraîner une pareille confusion. C'est aux savans que j'ai déjà nommés, qu'étoit réservée la gloire de dissiper tant d'obscurité; et nous nous empressons de mettre à profit les recherches et les découvertes qui leur sont dues, dans l'exposition suivante des faits relatifs à l'histoire des espèces officinales renfermées dans le genre *cinchona*.

ARTICLE PREMIER.

Première espèce officinale.

(Voyez la planche 1.)

IX. Quinquina brun. *Cinchona officinalis*. LINNÆUS. *Sp. pl. Cinchona condaminea*. BONPLAND, *Plant. équinox*. Les caractères botaniques de cette plante se trouvent exposés dans le bel ouvrage de MM. de Humboldt et Bonpland.

RAMEAUX opposés, qui sont couverts d'une écorce de couleur cendrée, tirant sur le vert. On observe dans les rameaux inférieurs une disposition horizontale ; les autres se relèvent à leur extrémité.

FEUILLES ovales - lancéolées, luisantes : on remarque sur ces feuilles et dans l'aisselle de chaque principale nervure, un très-petit enfoncement, lequel renferme une liqueur d'un goût astringent.


PÉTIOLÉS courts, aplatis d'un côté, convexes de l'autre.

STIPULES caduques, parsemées de poils à leur partie externe.

PÉDONCULES cylindriques et soyeux, recouverts d'une substance pulvérulente.



ANUQUINQUINA brun.



BRACTÉES persistantes aiguës.

CALICE persistant, soyeux, divisé en cinq dents.

COROLLE en entonnoir, caduque, ayant le tube garni de poils soyeux, partagée à son limbe en cinq découpures égales, lesquelles sont recouvertes de nombreux poils blancs.

ÉTAMINES courtes et attachées au tube de la corolle, dont les filets sont également très-courts, anthères grandes et de forme oblongue.

OVAIRE qui tient au calice, glabre et de forme ovale. Style droit et long, stygmate à deux divisions aiguës et divergentes.

FRUIT, dont la capsule est biloculaire.

SEMENCES nombreuses dans chaque loge, de forme lenticulaire; elles sont garnies d'un bord membraneux et large, lequel est denté à sa partie supérieure.

RECEPTACLE allongé et comprimé dans le sens de sa longueur.

X. Nous devons à MM. de Humboldt et Bonpland les détails les plus intéressans sur cette espèce de quinquina, qui, d'après les recherches de ces illustres voyageurs, est absolument la même que

celle qui avoit été d'abord décrite et figurée par La Condamine. Quoique les premiers observateurs aient fort mal décrit les premières écorces dont on s'est servi pour combattre les fièvres intermittentes, tout porte à croire que le quinquina dont il s'agit est le quinquina primitivement employé, et que ce n'est point le quinquina orangé, ainsi que l'ont avancé plusieurs bonanistes.

XI. M. Bonpland a comparé lui-même les échantillons qu'il a rapportés du Pérou, avec ceux envoyés autrefois de Loxa, par Joseph de Jussieu, et avec celui de La Condamine, et il s'est convaincu que leur espèce est absolument identique. C'est même pour rendre un hommage durable à la gloire de ce célèbre observateur, qu'ils ont jugé convenable de la désigner sous le nom de *condaminea*, et de supprimer la dénomination trop vague d'*officinalis*, qui peut d'ailleurs convenir à plusieurs espèces. Elle est communément appelée *Cascarilla fina* par les naturels du pays où on la rencontre. Le caractère spécifique est fondé sur un petit enfoncement qu'offrent ses feuilles dans l'aisselle de chaque nervure principale.

XII. Le quinquina de La Condamine se trouve sur les montagnes des Andes, au Pérou, près de Loxa, de Guancabamba et d'Ayavaca. C'est un arbre élevé, d'un port élégant. Lorsqu'on pratique

des incisions à son écorce , on en fait sortir un suc jaune et astringent.

XIII. M. Bonpland m'ayant confié des échantillons du *cinchona condaminea* , j'ai eu occasion de comparer cette espèce avec les autres espèces officinales qui se trouvent dans ma collection. Mais comme je n'ai pu disposer d'une quantité considérable d'écorces , je n'ai pu constater sa supériorité par des faits nombreux. On doit espérer néanmoins que ce quinquina reprendra un jour dans la thérapeutique la place éminente qu'il occupoit dès les premiers temps de sa découverte. S'il était plus abondant dans le commerce , c'est l'espèce que l'on préféreroit choisir dans tous les cas où il faudroit arrêter les progrès des fièvres pernicieuses intermittentes.

ARTICLE II.

Deuxième espèce officinale.

(Voyez la planche 2.)

XIV. Quinquina orangé. *Chinchona lancifolia*.
MUTIS. *period. de Santa-Fé prosp. Cinchona tunita*. D. LOPEZ. *M. S. Cinchona nitida*. RUIZ et PAVON. *Flor. Péruv. et Chil.* Cette espèce a été très-bien caractérisée par M. Vahl. (*Om slaegten cinchona og dens Arter.*)


RAMEAUX couverts d'une écorce d'un brun pourpre , quelquefois lisse , plus souvent creusée de fentes transversales et obliques , et alors rude au toucher ; marquée de cicatrices formées par la chute des feuilles.

FEUILLES opposées , très - rapprochées vers le sommet des rameaux , qui ne produisent point de fleurs ; horizontales , pétiolées , ovales en lance , aiguës , veineuses ou d'un vert pâle en dessous , glabres et lisses sur chaque surface ; longues de deux pouces.

PÉTIOLÉS convexes en dehors , sillonnés intérieurement , ridés et rudes au toucher vers leurs bases , longs d'un demi-pouce.



QUINQUINA Orange.



STIPULES situées entre les pétioles, opposées, en lance, aiguës, très-petites.

PANICULE au sommet des rameaux, ouverte, trichotome.

PÉDONCULES parsemés d'un léger duvet, à une fleur.

BRACTÉES très-petites, situées à la base des pédoncules et de leur partie moyenne.

CALICE adhérent à l'ovaire dans presque toute son étendue, libre à son limbe, qui est divisé en cinq dents très-courtes.

COROLLE à peine de la longueur d'un ongle, drapée en dehors, divisée à son limbe en cinq découpures aiguës, laineuses en dedans, plus courtes que le tube.

ÉTAMINES, filets très-courts; anthères de la longueur du tube.

OVAIRE, adhérent au calice. Stigmate dilaté à son sommet, et deux divisions courtes.

CAPSULE oblongue, glabre, parsemée de stries peu apparentes, longue d'un demi-pouce.

XV. Le quinquina orangé est très-rare, tant à Santa-Fé de Bogota qu'au Pérou, et, d'après Mutis, on doit craindre que cette espèce ne se perde entièrement. Plusieurs savans qui ont fait

de très-longues incursions dans ce pays , n'en ont apporté qu'une très - petite provision ; certains d'entre eux n'ont même pu la rencontrer. D'après les échantillons que j'ai sous les yeux, et qui m'ont été communiqués par M. Zéa, rien n'est plus aisé que de confondre son écorce avec celle du quinquina jaune , dont nous aurons bientôt occasion de parler. C'est en vain qu'on prétendrait les distinguer par l'aspect et la cassure, lorsqu'elles sont mélangées dans le commerce. Il est, par conséquent , indispensable de les pulvériser et de les comparer avec la poudre et la teinture qu'on en retire , pour obtenir des caractères sûrs et constans, d'après le conseil que donne Mutis.

XVI. On reconnoît donc l'écorce du quinquina orangé aux caractères suivans :

1°. Sa couleur intérieure est d'un jaune foncé et tirant sur le fauve.

2°. Lorsqu'on le mouille , sa couleur devient plus intense , et proprement fauve.

3°. Sa couleur , loin de s'affoiblir par la pulvérisation , augmente d'intensité , et est peu susceptible d'être altérée par l'air.

4°. Une quantité déterminée de cette poudre mise en infusion à froid , dans une quantité déterminée d'eau , pendant vingt-quatre heures , produit

une teinture foible , presque sans écume , et semblable à celle de l'écorce mouillée : elle a beaucoup d'amertume.

5°. La même infusion exposée au feu , et poussée jusqu'au degré de l'ébullition , donne une teinture plus chargée , et d'une couleur plus vive ; elle manifeste un principe amer , plus actif encore.

6°. La poudre de la même écorce , infusée dans l'esprit-de-vin , donne une teinture absolument analogue à la précédente.

7°. Lorsqu'on mâche quelque temps l'écorce , on lui trouve non-seulement cette amertume propre à tous les quinquina , mais encore une saveur aromatique qui est propre à son espèce.

8°. La salive prend une teinte fauve ; elle devient déliée et écumeuse.

9°. L'écorce ne cause point d'astiction sur la langue , le palais et les lèvres.

10°. Lorsqu'on examine la cassure du quinquina avec la lentille , on y aperçoit des fibres longitudinales , parallèles , en forme d'aiguilles.

11°. La couleur intérieure est d'un jaune pâle.

12°. On aperçoit , dans les interstices du bois , la poudre agglomérée , sèche et de couleur fauve.

XVII. C'est dans cette espèce de quinquina, dont nous venons de décrire les principaux caractères pharmaceutiques, que réside (d'après l'opinion de Mutis) la propriété fébrifuge par excellence. Il y a ordinairement dans les substances dont on fait usage en médecine, un principe particulier qui prédomine en quelque sorte sur les autres, et duquel émanent toutes leurs vertus médicinales. La qualité majeure du quinquina orangé est d'être éminemment balsamique, ainsi que le remarque le savant botaniste de Santa-Fé. Or, il est possible que, par cette qualité, il agisse d'une manière spéciale sur le système nerveux qui, comme nous l'avons déjà dit dans ce Traité, est le principal siège des fièvres pernicieuses intermittentes. Du moins est-il démontré que les écorces qui appartiennent aux autres espèces, n'attaquent ce genre d'affection ni avec la même énergie, ni avec la même certitude; et que l'effet de celle-ci est, pour ainsi dire, infaillible. Au surplus, on ne doit pas conclure de ce que nous venons d'avancer, que le quinquina orangé de Mutis soit préférable aux trois autres dans toutes les circonstances, et dans toutes les maladies où un pareil remède est indiqué. La préférence qu'on peut lui donner est relative à la nature du mal que l'on veut combattre. Car il est certaines épidémies et certaines complications de fièvre que l'expérience pourra déterminer où le

quinquina gris ou brun, le *quinquina orangé*, le *quinquina rouge*, le *quinquina jaune* et le *quinquina blanc*, peuvent être plus convenablement administrés. Toutefois, cette espèce est une des plus utiles en thérapeutique. Il seroit donc important qu'on s'occupât à la propager, et à la rendre plus commune dans les pays où les voyageurs ont eu occasion de la rencontrer. La culture plus soignée de cette plante pourroit fournir à toutes les nations de l'Europe une branche de commerce aussi étendue que profitable. Il n'est pas vrai que ce quinquina soit le quinquina primitif, comme on l'a prétendu. Cette méprise venait sans doute des effets merveilleux qu'on lui avait vu produire sur quelques malades. Mais tous les auteurs affirment au contraire que le quinquina primitif étoit, dans l'intérieur de sa substance, d'une couleur rouge foncé ou brunâtre, et assez analogue à la couleur de la canelle. C'est ce que MM. Ruiz et Pavon assurent aussi très-bien dans la réfutation qu'ils ont publiée des assertions de Mutis. Il faut donc placer le quinquina orangé après le quinquina gris ou brun.

XVIII. MM. Ruiz et Pavon, voyageurs très-recommandables par leur zèle pour les progrès de la botanique, ont bien voulu me faire parvenir des écorces de quinquina orangé du Pérou, qui diffèrent, par quelques caractères physiques, de celles

que M. Zéa a apportées de Santa-Fé de Bogota. Ce sont de petites écorces d'une amertume très-active, marquées par un nombre plus ou moins grand de fentes transversales, dont la surface extérieure est d'un clair obscur, avec des taches noires, grises et blanches, et dont la surface intérieure est d'un roux de miel plus ou moins prononcé. On observe que ces écorces sont très-roulées sur elles-mêmes; ce qu'on ne remarque point dans le quinquina orangé de la Nouvelle - Grenade. Est-ce au climat qu'il faut attribuer cette variété de forme que présentent les échantillons qui me sont parvenus? Est-ce à la manière dont on les coupe quand on les recueille pour le commerce? (Consultez *Suplemento a la Quinologia, etc., por don Hipolito Ruiz y don Josef Pavon. Madrid, anno de M. D. CCCI.*)

On a beaucoup parlé de la propriété aromatique du quinquina orangé. MM. Mutis et Zéa ont été les premiers à lui attribuer cette propriété spéciale dans leurs ouvrages. J'avoue toutefois qu'il étoit impossible de la reconnoître sur les échantillons qui ont été apportés en Europe par la voie du commerce. Sans doute ce principe, dont on a tant loué les effets sur le système nerveux, est tellement volatil et fugitif, qu'il faut le constater dans les écorces le plus fraîchement recueillies. Si ce

que nous avançons a quelque fondement , le quinquina dont il s'agit; perdrait beaucoup dans le transport, et serait souvent sans aucune énergie lorsqu'il serait employé dans nos hôpitaux. Heureusement que les autres principes ne s'évanouissent pas, et que, dans l'état actuel de la science, nous sommes hors d'état d'apprécier quels sont véritablement les principes fébrifuges qui existent dans telle ou telle espèce de quinquina.

XIX. Un pharmacien très-éclairé de Paris, a fait, à ma sollicitation, quelques essais chimiques sur un petit nombre d'écorces de quinquina orangé de Santa-Fé, que je lui avois remises. Il a expérimenté que ce quinquina étoit très-analogue au quinquina jaune; qu'il étoit seulement un peu moins amer et plus résineux; son infusion aqueuse est moins foncée en couleur que celle de ce dernier; mais elle se comporte d'une manière absolument analogue avec le sulfate de fer, la gélatine, le tartrite de potasse antimonié, la noix de galle. Le précipité, que sa teinture alcoolique fait avec l'eau rougeâtre, est plus abondant.

ARTICLE III.

*Troisième espèce officinale.**(Voyez la planche III.)*

XX. QUINQUINA ROUGE. *Cinchona oblongifolia*.
MUTIS. *Cinchona magnifolia*. RUIZ et PAVON. *Flor.*
Pér. et Chil. Nous allons consigner ici les caractères
botaniques qu'en donnent les savans botanistes du
Pérou.


RAMEAUX cylindriques, lisses, de couleur brune;
jeunes rameaux relevés de quatre angles obtus et
peu saillans, feuilles d'un rouge clair.

FEUILLES opposées, pétiolées, oblongues et ova-
les, relevées en dessous de nervures rameuses et
purpurines; munies, dans les aisselles de chaque
nervure, de soies nombreuses et rapprochées en
faisceaux; les plus grandes, longues d'un à deux
pieds.


PÉTIOLÉS convexes en dehors, planes en dedans,
de couleur pourpre, longs d'un à deux pouces.

STIPULES situées entre les pétioles opposées,
droites, réunies à leurs bases, ovales renversées,
pointues, tombant promptement.

PANICULE, au sommet des rameaux, droite,
feuillée, longue d'un pied.



QUINQUINA Rouge.



PÉDONCULES opposés en croix, allongés, divisés, à plusieurs fleurs.

FLEURS presque disposées en corymbes, portées chacune sur un pédicule particulier.

BRACTÉES, à la base des pédicules, solitaires, ovales, aiguës, très-petites, tombant promptement.

CALICE adhérent à l'ovaire dans presque toute son étendue, de couleur pourpre, divisé à son limbe en cinq dents très-courtes.

COROLLE, de la longueur d'un pouce, blanchâtre, répandant une odeur agréable; limbe ouvert, parsemé intérieurement de quelques poils courts.

ÉTAMINES insérées au-dessous du milieu de la corolle; filets très-courts; anthères ne s'élevant point au-dessous de l'orifice, oblongues, fendues à leur base.

CAPSULE longue de six pouces, légèrement courbée, parsemée de stries peu apparentes.

SEMENCES ovales, de couleur fauve, entourées d'un rebord large et déchiré.

Cette espèce s'élève à une très-grande hauteur, et se termine en une cime vaste. L'écorce qui recouvre le tronc et les branches est lisse, d'un

brun cendré en dehors et de couleur fauve en dedans; sa saveur est amère, légèrement acide, et assez agréable au goût.

XXI. Le quinquina rouge, ainsi que nous l'apprennent les auteurs de la Flore péruvienne, se trouve le plus communément au voisinage des torrens, près de *Chinchao*, *Cuchero* et *Chacahuasi*. Ses fleurs répandent une odeur très-suave, et analogue à celle de la fleur de l'oranger. Il est très-abondant dans les forêts de Santa-Fé de Bogota, d'où son exportation en Europe seroit un grand bienfait pour l'humanité. Les expériences nombreuses, faites à Londres et à Paris, attestent sa grande efficacité.

XXII. M. Zéa observe que, quoique la couleur de l'écorce de ce quinquina soit sujette à beaucoup d'altération, il y a néanmoins des caractères assez constans, qui servent à la faire reconnoître.

1°. L'écorce bien sèche et sans altération accidentelle présente, dans son intérieur, une couleur rougeâtre;

2°. Mouillée et comparée avec l'écorce sèche, elle manifeste une couleur plus intense;

3°. Lorsqu'on la réduit en poussière, elle conserve une couleur plus uniforme;

4°. L'infusion à froid donne une teinture plus chargée que le quinquina orangé, presque sans écume, de couleur rouge, semblable à celle de l'écorce mouillée, d'une amertume qui lui est particulière ;

5°. L'infusion à chaud donne une teinture plus chargée encore, sans écume, d'un rouge plus vif, assez semblable à la couleur du sang, d'une amertume plus considérable ;

6°. Son infusion dans l'esprit-de-vin fournit une teinture analogue à la précédente ;

7°. Lorsqu'on mâche l'écorce, elle a une saveur amère analogue à son espèce, et qui a quelque chose d'austère ;

8°. La salive devient rougeâtre, déliée, et offre peu d'écume ;

9°. Cette écorce cause une astriction et une sorte d'aspérité sur la langue et le palais, et plus sensible sur les lèvres, lorsqu'on les frotte avec la langue ;

10°. Lorsqu'on examine sa cassure à la loupe, elle présente ses fibres longitudinales parallèles, en forme d'aiguilles, beaucoup plus rapprochées que celles du quinquina orangé ;

11°. Sa couleur est pâle et rougeâtre ;

12°. Sa poudre, agglomérée dans les interstices du bois, est d'un rouge plus vif.

XXIII. Aux qualités que possèdent les autres espèces de quinquina, celle-ci joint la faculté d'être éminemment astringente : aussi occupe-t-elle le premier rang parmi nos remèdes anti-septiques ; et beaucoup de médecins l'ont utilement employée pour arrêter les progrès de la gangrène et autres affections de cette nature. Il paroît que son action se dirige plus directement sur le système musculaire. On voit, par conséquent, de quelle utilité elle peut devenir dans toutes les fièvres adynamiques, soit intermittentes, soit continues. La propriété corroborative, qui dépend d'une sorte de ton qu'elle imprime à la fibre, a dû en faire un médicament pernicious dans beaucoup de circonstances, notamment dans les fièvres angioténiques, et dans toutes les affections qui dépendent d'une exaltation du système des forces vitales. Il est en outre aisé d'apercevoir que ce quinquina est spécialement approprié à certains tempéramens ; qu'il ne convient point aux personnes d'une constitution ardente et bilieuse, mais plutôt à celles qui sont affectées d'une sorte de relâchement dans les solides. Mutis croit avoir observé que c'est celui dont l'administration, long-temps continuée, dispose le plus ordinairement aux dégénérescences des vis-

cères , à la jaunisse, à l'hydropisie. Cette espèce a immédiatement succédé au quinquina orangé qui, comme nous l'avons dit , est excessivement rare dans le commerce.

XXIV. Il paroît démontré que le quinquina rouge a été très - anciennement employé par les médecins. Dès les premiers temps de ses voyages, Joseph de Jussieu lui accorda la prérogative sur tous les autres , et en prépara un extrait dont l'énergie s'est conservée jusqu'à ce jour. J'ai eu occasion de montrer aux élèves qui assistent à mes leçons de *thérapeutique et de matière médicale*, un échantillon de cet extrait préparé sur les lieux avec l'écorce fraîche , et qui m'avoit été remis par M. Antoine de Jussieu, célèbre professeur de botanique au Jardin des plantes de Paris. Tout le monde connoît le beau travail chimique que Fourcroy a publié sur le quinquina rouge, en comparant les principes qui le constituent avec ceux du quinquina de Saint-Domingue. M. Westring, médecin suédois, homme doué d'une sagacité rare et d'un savoir profond, s'en est aussi occupé. Mais nous devons particulièrement rappeler à nos lecteurs la dissertation de M. Guillaume Saunders, associé du collège royal de Londres. Son but est de prouver l'excellence de cette écorce, et la préférence qu'on doit lui accorder. Il étaie

ses propres expériences de celles qui ont été faites par M. Skéète de l'île des Barbades, qui a constaté les propriétés éminemment anti-septiques du quinquina rouge dans l'hôpital de la Guiane.

ARTICLE IV.

Quatrième espèce officinale.

(Voyez la planche iv.)

XXV. QUINQUINA JAUNE. *Cinchona cordifolia*. MUTIS. *Cinchona pubescens*. VAHL. *Om slaegten cinchona og dens Arter*. *Cinchona micrantha*. RUIZ et PAVON. *Flor. Péruv. et Chil.* M. Vahl lui donne les caractères que nous allons exposer.

RAMEAUX pubescens dans leur partie supérieure.

FEUILLES pétiolées et se prolongeant sur le pétiole, ovales, obtuses, relevées en dessous de nervures rameuses et pubescentes; longues de 14 centimètres et larges de 8.


PÉTIOLE convexe en dehors, plane en dedans, pubescent, long de 2 pouces.

PANICULE terminale, pubescente, rameaux opposés en croix, plusieurs fois divisés.

FLEURS portées sur des pédicules très-courts, et munies à leur base de bractées très-petites.



QUINQUINA Jaune.



CALICE et COROLLE, comme dans l'espèce précédente. Tube renflé dans sa partie moyenne.

ÉTAMINES et PISTIL, comme dans le C. orangé.

CAPSULE longue d'un pouce, cylindrique, un peu amincie à chacune de ses extrémités.

XXVI. L'usage du quinquina jaune a été introduit dans la médecine en 1740. M. Zéa observe que sa ressemblance avec l'espèce primitive, fit long-temps croire que c'étoit la même, quoique son écorce n'offrît point la même activité. En effet, c'est une de celles dont la vertu agit avec le moins d'énergie.

XXVII. Nous avons fait remarquer que rien n'étoit plus facile que de confondre l'écorce du quinquina jaune avec celle du quinquina orangé ; les caractères qui suivent, servent pourtant à l'en faire distinguer :

1°. L'écorce bien sèche présente, dans son intérieur, une couleur d'un jaune paille ;

2°. L'écorce mouillée dans l'eau, et comparée avec la sèche, manifeste une couleur plus intense ;

3°. Lorsqu'on réduit ce quinquina en poudre, il acquiert une couleur plus pâle, qui, par l'action

de l'air, devient à sa surface semblable à celle de l'écorce ;

4°. Son infusion à froid fournit une teinture foible, presque sans écume, d'une couleur de paille, plus pâle que celle de l'écorce même, d'une amertume qui lui est particulière ;

5°. L'infusion à chaud donne une teinture plus chargée, sans écume, d'une couleur plus vive, et se rapprochant beaucoup de l'infusion à froid faite avec la poudre de quinquina orangé ;

6°. L'infusion à l'esprit-de-vin donne une teinture semblable ;

7°. Lorsqu'on mâche cette écorce, on lui trouve une saveur amère, particulière à cette espèce ;

8°. La salive est d'un jaune paille, déliée, et a peu d'écume ;

9°. L'écorce ne cause aucun sentiment d'astiction et d'àpreté sur la langue et au palais ;

10°. Lorsqu'on examine la cassure à la loupe, on y voit des fibriles longitudinales, parallèles, en forme d'aiguilles, séparées par des intervalles à peu près semblables à ceux qui se rencontrent dans le quinquina orangé ;

11°. Sa couleur d'un jaune paille est plus pâle ;

12°. La poudre agglomérée est d'un jaune paille;

XXVIII. Mutis regarde l'amertume comme le caractère distinctif de cette espèce. Il pense aussi que ce quinquina exerce un empire particulier sur les humeurs; qu'il peut arrêter plus efficacement qu'une autre espèce leur tendance à la décomposition; qu'il a enfin, dans quelques circonstances, une propriété laxative: comme, dans aucun cas elle ne produit les mauvais effets du quinquina rouge, on peut le substituer avec plus d'avantage au quinquina orangé.

XXIX. M. Marabelli, chimiste de Pavie, a publié une analyse très-détaillée du quinquina jaune. J'aurai occasion de faire connoître ce travail intéressant, dans mes *nouveaux Éléments de Thérapeutique et de Matière médicale*. J'ai remis plusieurs écorces de cette espèce à M. Cadet de Gassicourt, qui a constaté son extrême amertume, et sa moindre astringence, en l'examinant sous des rapports comparés avec les autres espèces de quinquina. Nous devons aussi rappeler à nos lecteurs une excellente dissertation de M. Westring, sur le *cinchona flava*, communiquée par cet habile médecin à l'Académie royale des Sciences de Stockholm.

ARTICLE V.

*Cinquième espèce officinale.**(Voyez la planche v.)*

XXX. QUINQUINA BLANC. *Cinchona ovalifolia*.
MUTIS. *Cinchona macrocarpa*. VAHL. *Om slaegten*
cinchona og dens Arter.

RAMEAUX articulés, velus et drapés, de la grosseur d'une plume de cygne.

FEUILLES pétiolées, oblongues, coriaces, lisses et glabres en dessus, relevées en dessous de nervures drapées, longues de 8 centimètres. Les plus jeunes, velues sur chaque surface, et surtout le long des nervures.

PÉTIOLE convexe en dehors, plane en dedans, long d'un pouce.


STIPULES réunies à leur base, droites, en lance, glabres en dedans, plus longues que le pétiole, tombant promptement.

PANICULE au sommet des rameaux, pubescente, formée de rameaux opposés et trichotomes.

PÉDONCULES comprimés, à trois fleurs, longs d'un demi-pouce.



QUINQUINA Blanc.



FLEURS presque sessiles.

BRACTÉES de deux sortes, les unes linéaires et en lance, longues d'un pouce, situées sur chaque côté des divisions du pédoncule universel; les autres en alène très-petites, solitaires à la base de chaque fleur.

CALICE en cloche, pubescent en dehors, soyeux en dedans, divisé à son limbe par cinq ou six dents peu apparentes.

COROLLE coriace, soyeuse, longue d'un pouce et demi, divisée à son limbe par cinq ou six découpures, en lance, obtuses et de la longueur du tube.

ÉTAMINES insérées au milieu du tube. Filets très-courts, anthères linéaires, s'élevant un peu au-dessus de l'orifice.

OVAIRE pentagone, adhérent au calice. Stigmate bifide.

CAPSULE cylindrique, glabre, un peu rétrécie à sa base. Ces caractères sont empruntés de M. Vahl.

XXXI. Cette espèce est nouvelle en médecine. Elle a été prônée et discréditée alternativement par divers savans. On ne l'a point trouvée au Pérou. M. Zéa observe que quand les écorces ne

sont pas très-minces, son aspect seul suffit pour la faire distinguer des autres espèces de quinquina.

XXXII. On reconnoît l'écorce du quinquina blanc aux caractères que nous allons exposer.

1°. L'écorce bien sèche et sans altération accidentelle, offre, dans son intérieur, une couleur blanchâtre et presque basanée;

2°. Par son immersion dans l'eau, elle perd davantage sa blancheur pour une couleur plus basanée;

3°. Réduite en poudre, sa couleur est plus uniforme, et elle est plus blanchâtre que basanée;

4°. L'infusion à froid donne une teinture plus forte que les teintures des autres espèces : couverte d'écume sur toute sa surface, elle a un principe amer assez actif;

5°. Son infusion à chaud fournit une teinture plus chargée, et beaucoup d'écume qui se dissipe difficilement;

6°. L'infusion dans l'esprit-de-vin donne une teinture moins forte que celle de l'eau froide; elle donne moins d'écume que dans les deux opérations précédentes;

7°. L'écorce mâchée manifeste une amertume très-active, plus acerbe et plus agréable que celle des autres espèces ;

8°. La salive est de couleur basanée ; elle se charge de beaucoup d'écume ;

9°. Cette écorce ne cause ni astringtion ni âpreté sur la langue ; elle communique au contraire une sorte de relâchement aux solides ;

10°. Sa cassure, examinée à la lentille, présente des fibrilles moins ligneuses, déliées, plus fragiles, longitudinales, parallèles, et un peu moins rapprochées que dans le quinquina rouge ;

11°. Sa couleur blanchâtre tire sur le basané ;

12°. Son suc est plus concret, plus épais, plus abondant que dans les autres espèces, d'un blanc pâle.

XXXIII. Mutis regarde cette espèce comme jouissant d'une propriété savonneuse. Il préconise son excellence dans les fièvres intermittentes rebelles, et dans les maladies chroniques. Selon cet observateur, l'action de ce quinquina se dirige particulièrement sur les glandes et sur le système lymphatique ; elle influe d'une manière puissante sur le rétablissement des sécrétions. Mutis observe avec raison que sa foible astringence doit la

faire préférer dans le traitement des fièvres inflammatoires, toutes les fois qu'il convient de faire usage de ce médicament.

XXXIV. Telles sont les cinq espèces officinales de quinquina que le médecin peut employer utilement dans ses prescriptions : il importe de leur rapporter toutes leurs variétés : car, quel que soit le changement qu'elles éprouvent, celles-ci possèdent au même degré les vertus qui sont propres à chacune des espèces.

XXXV. C'est sans fondement que l'on dit assez communément qu'une espèce de quinquina est préférable à une autre. La meilleure est sans doute celle qui est le plus en rapport avec l'affection que l'on veut combattre. Ce qu'il importe surtout, c'est de ne pas se méprendre sur l'espèce qui convient le mieux à la maladie qui se déclare.

XXXVI. On connoît les résultats des observations intéressantes faites par Mutis et son disciple Zéa, touchant le choix des écorces les plus propres à être employées pour combattre les fièvres intermittentes. Ces deux naturalistes sont convaincus que ces écorces sont d'autant plus énergiques, que l'arbre qui les fournit a plus d'ancienneté; ils soutiennent, en second lieu, qu'il convient de préférer celles du tronc à celles des branches et

des rameaux. Ils ajoutent, enfin, que plus on garde le quinquina, plus il manifeste d'activité, pourvu qu'on ait soin de le garantir de l'humidité atmosphérique qui doit nécessairement affoiblir ses vertus. MM. les auteurs de la Flore péruvienne ont adopté des opinions contraires; ils prétendent que les vieux arbres ne sauroient fournir que des sucs inertes et dégénérés; et cette assertion n'est pas sans quelque vraisemblance. Ils préfèrent, par conséquent, faire recueillir les écorces sur des arbres parvenus à un âge moyen, parce qu'à cette époque de leur existence, ils sont plus sapides et plus vigoureux. MM. Ruiz et Pavon ne croient pas non plus que le quinquina puisse augmenter de vertu, par l'effet d'une longue dessiccation, comme l'ont avancé MM. Mutis et Zéa. Ils envisagent, au contraire, comme très-probable, que cette écorce conserve ses qualités spécifiques lorsqu'elle est encore dans son état d'humidité et de fraîcheur. Ils regardent enfin les opinions de leurs antagonistes comme contraires à la physique des arbres et à toutes les observations faites jusqu'à ce jour. L'expérience seule prononcera sur ces différentes contestations, qui sont toujours utiles pour la science.

XXXVII. M. Félix Asti a publié une dissertation sur les différentes espèces de quinquina recueillies

dans le royaume de Santa-Fé : ce savant leur donne une préférence marquée sur celles du Pérou, parce que leur arrivée en Europe est plus prompte, et que, par ce moyen, on peut obtenir des écorces dans un état plus frais et plus récent. Cette assertion nous paroît toutefois un peu exagérée. Il fait des vœux pour que ce commerce s'établisse, étant moins dispendieux et plus facile. Ces mêmes vœux avoient été déjà exprimés par l'ancienne Société de Médecine. (Voyez le tom. III de ses Mém., 1782.) M. Asti fait observer que Santa-Fé est couvert d'arbres qui portent cette écorce merveilleuse ; il fait voir que ce pays, situé à quatre degrés et demi au plus de latitude de l'équateur, est frappé par des influences à peu près analogues ; et il en tire cette conséquence naturelle, qu'il n'est pas étonnant que les mêmes productions se remarquent dans des climats semblables. En même temps il donne de justes éloges à la Quinologie de M. Mutis ; ouvrage qui embrassera toute la doctrine d'un remède aussi salutaire. (*Memoria o Dissertazione sopra la nuova china-china del regno de Santa-Fé, nell' America meridionale, etc. Secunda edizione. In Venezia, M. DCC. XCI.*)

XXXVIII. Les Mémoires de l'ancienne Société royale de Médecine (tom. III, déjà cité) contiennent le résultat de quelques recherches chimiques

sur deux espèces de quinquina de Santa-Fé, par Buquet et Cornette. J'ai aussi remis il y a quelques mois une certaine quantité de ce quinquina à deux chimistes habiles, qui ont bien voulu l'analyser, et qui ont très-bien constaté qu'il pouvoit remplacer avantageusement les quinquina du Pérou et de Saint-Domingue, qui sont aujourd'hui les plus communs dans le commerce. Plusieurs autres savans ont fait la même observation.

ARTICLE VI.

De quelques autres espèces de quinquina qui agissent moins énergiquement que les précédentes dans le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes.

XXXIX. Il est à présumer que les cinq espèces officinales de quinquina, avec les variétés qui s'y rapportent, sont les seules qu'on puisse employer utilement à la guérison des fièvres pernicieuses intermittentes. Ce qui me donne lieu de concevoir cette opinion, ce sont les essais cliniques qui ont été vainement entrepris dans divers hôpitaux avec des échantillons appartenant à d'autres espèces, que MM. Ruiz et Pavon ont bien voulu me faire parvenir. Je pense néanmoins qu'il faudroit procéder à de nouvelles tentatives.

XL. Parmi les nombreuses espèces de quinquina que nous avons été à même de soumettre à notre examen, il faut principalement distinguer, 1°. le *cinchona lanceolata* : écorce brune chagrinée, et parsemée de plaques grises ou blanchâtres. Cassure ligneuse, ne présentant aucun point brillant et résineux; saveur aromatique et d'une amertume très-légère. L'intérieur de l'écorce, et la poudre de ce quinquina, ont la couleur jaune de la cannelle; 2°. le *cinchona ovata* : écorce épaisse, grise, blanchâtre à l'extérieur, couverte d'un épiderme lisse et blanc, cassure à moitié ligneuse, moitié nette, présentant à la loupe des points brillants et résineux, l'intérieur couleur de cannelle claire, saveur aromatique, sans amertume sensible, poudre rouge-orangée; 3°. le *cinchona acutifolia* : écorce mince, fibreuse; extérieur gris-brun, parsemé de taches blanchâtres, brunes, grises, noirâtres, couleur châtain sous l'épiderme, ayant des gerçures fines; intérieur brun, rougeâtre, comme l'acajou, ou mieux encore, comme la cannelle de Manila, ainsi que M. Tafalla l'observe; un peu plus obscur; cassure ligneuse, saveur légèrement aromatique, amère, styptique, très-désagréable; poudre d'un fauve foncé; 4°. le *cinchona hirsuta* : écorce mince, brune, très-roulée, derme chagriné et fendillé, cassure ligneuse, surface intérieure jaune-brune, ou couleur de feuille morte, saveur

de bois sans arôme et sans amertume , poudre grise-brune ; 5°. le *cinchona rosea* : écorce mince , d'un rouge-violet , fibre très-serrée , cassure nette , d'apparence résineuse , saveur ligneuse , sans amertume : la poudre est d'un brun rosacé ; 6°. le *cinchona purpurea* : écorce mince , très-fibreuse , extérieur gris-brun , intérieur rouge-brun , cassure ligneuse , saveur extractive sans arôme , et presque sans amertume , poudre grise-brune , légèrement rougeâtre. Les divers caractères physiques que nous venons d'exposer , prouvent assez que les écorces de ces différentes espèces de quinquina agissent avec peu d'énergie sur l'économie animale. Nous n'avons point été à même de procéder à l'examen des écorces du *cinchona grandiflora* , qu'on trouve dans les forêts brûlantes des Andes , vers les bords du fleuve Pozuzo.

XLI. Les recherches récemment faites par quelques chimistes mènent aux mêmes conclusions : il est à souhaiter que ces recherches soient portées à leur complément. Toutefois il paroît , d'après les essais déjà faits , que ces écorces de quinquina ne contiennent point , ou contiennent en très-petite proportion , les principes auxquels on a voulu attribuer la propriété fébrifuge du quinquina. C'est ainsi que la plupart de ces écorces sont dépourvues

de tannin, d'acide gallique, du principe amer, etc., et n'ont qu'une astringence et une amertume très-peu perceptibles.

XLII. Il importeroit de soumettre à des épreuves les espèces nouvelles du quinquina découvertes au Pérou sur les montagnes des Andes par M. Taffalla, disciple estimable de MM. Ruiz et Pavon. Ces espèces sont : 1°. le *cinchona micrantha* : cet arbre est représenté comme ayant trente pieds de hauteur, et une cime très-rameuse. Son écorce est roussâtre extérieurement, plus rouge antérieurement. Il croît dans les hautes montagnes des Andes du Pérou ; 2°. le *cinchona dichotoma* : de dix-huit pieds de longueur, à cime très-rameuse ; l'écorce de ses branches est fauve, tachetée de blanc. Il a une saveur amère, avec un acide assez agréable ; croît dans les forêts des Andes du Pérou, près de *Pueblo-Nuovo*, aux environs de *Chicoplaya* ; 3°. le *cinchona glandulifera* : arbrisseau de douze pieds de hauteur, formé de trois ou quatre troncs de trois pouces de diamètre, et d'une cime très-rameuse. L'écorce est de couleur cendrée, tachetée de blanc, d'un fauve clair dans sa fracture : saveur très-amère, cependant agréable, acidule, styptique, aromatique. On le trouve sur les montagnes des Andes, appelées *Carpales de Chicoplaya*. Il y est recouvert par d'autres ar-

bres et arbrisseaux. Les lieux où il vient ne sont pas à une très-grande hauteur, ni très-élevés en température ; 4°. le *cinchona acuti-folia* : j'ai parlé plus haut de l'écorce de ce quinquina, dont les auteurs de la Flore péruvienne ont bien voulu me faire parvenir des échantillons. C'est un arbre de vingt-quatre pieds de hauteur, à tronc solitaire, à cime vaste et touffue. Son écorce, dans l'état frais, est raboteuse, d'un maron foncé, cendrée et noirâtre, d'une saveur très-désagréable. Il a été découvert par M. Tafalla, près du fleuve du Tase, dans les montagnes des Andes.

XLIII. Il faut encore mentionner ici un nouveau quinquina, dont il a été question sous le nom de quinquina de *Huanuco*, dans un journal espagnol. MM. Ruiz et Pavon nous ont fourni quelques connoissances sur ces écorces, dont cent quatre-vingts caisses arrivèrent, en 1799, au port de Santander, sur la frégate la *Veloz*. Huanuco est une ville célèbre, éloignée de Lima de près de soixante lieues. MM. Ruiz et Pavon n'ont point observé ce quinquina dans leurs incursions vers cet endroit ; ce qui donne lieu de croire que c'est peut-être un mélange d'écorces appartenant à différentes espèces de quinquina. Les recherches actuelles de MM. de Humboldt et Bonpland, ainsi que celles de M. Tafalla, éclairciront peut-être ce fait. Les au-

teurs de la Flore péruvienne représentent les écorces comme ayant une superficie très-scabreuse , avec des fentes transversales , un épiderme d'un brun clair , avec des taches blanchâtres , noirâtres et grisâtres ; leur couleur intérieure est d'un jaune doré assez foncé. Elles se roulent très-facilement en cylindres simples , quelquefois doubles , d'une consistance un peu forte et difficile à casser , ayant une odeur aromatique , peu sensible , mais qui s'aperçoit davantage , quand elles sont dans l'eau bouillante. Leur saveur est peu amère , très-styptique , et peu acide.

XLIV. Le *cinchona laccifera* est peut-être une des productions les plus précieuses du Pérou ; mais ce quinquina intéresse davantage les arts que la médecine. Son écorce est d'un noir gris , tachée irrégulièrement des mêmes couleurs , plus ou moins sombres. L'épiderme enlevé présente une foible couleur de carmin. La couleur intérieure de ce quinquina est semblable à la lacque en pâte ; son odeur est aromatique , et devient beaucoup plus sensible par décoction ; sa saveur est légèrement amère , et n'est pas désagréable. Le *cinchona laccifera* vient dans les bosquets et vallées de Chicoplaya ; du côté du fleuve Monzon , dans la province des Haumalies , voisine des montagnes *Panathuas* , d'où M. Tafalla l'a envoyée en 1798 : on l'a reçu

en 1800. Les écorces de cette espèce sont celles (parmi tous les quinquina rouges du commerce) qui ont la couleur plus foncée, et sous ce point de vue, elles sont précieuses pour les teintures, comme le bois de Campêche. M. Tafalla dit, dans sa lettre du 21 février 1798, qu'en râclant avec un couteau la partie intérieure de ce quinquina, au moment où il vient d'être coupé, on recueille un suc qui, épaissi à la chaleur du soleil, peut être employé en place de la lacque et de la cochenille à la teinture, et c'est pour cela que le père Gonzalès l'a envoyé de Lima sous le nom de *lacque cinchonique*.

ARTICLE VII.

De quelques espèces de quinquina recueillies dans les Antilles, et que certains auteurs ont employées pour le traitement des Fièvres pernicieuses intermittentes.

XLV. Il est des botanistes qui prétendent que ces espèces, connues et usitées depuis quelques années, constituent elles seules un genre voisin du *cinchona*, mais ne lui appartiennent point. Ce fait est loin encore d'être convenablement éclairci, et réclame de nouvelles recherches.

XLVI. Celui de ces quinquina dont on a fait le plus fréquent usage est le *quinquina-piton*, ou

des montagnes. *Cinchona floribunda*, WARTZ ; *cinchona montana*, BADIÉ. Il est indigène de Sainte - Lucie , de la Guadeloupe , de la Martinique , etc. Ce quinquina est bien distinct du *cinchona caribæa*, avec lequel Davidson l'avoit confondu. Badier l'apporta en France en 1777 , et M. Mallet , médecin de Paris , chercha à le mettre en crédit. Anderson l'observa à Sainte - Lucie en 1780. Sa couleur est grisâtre ou d'un gris-brun foncé , couverte çà et là de taches blanches , et comme provenant de lichens. Son amertume est extrême. Le *cinchona floribunda* a près de quarante pieds de hauteur ; il se plaît sur les mornes des montagnes , ce qui l'a fait appeler *quinquina-piton*. Indépendamment de sa propriété tonique on lui attribue une propriété émétique et purgative ; mais ces deux effets n'ont point été remarqués lorsqu'on en a fait usage à l'hospice de la Salpêtrière , sous la pratique du professeur Pinel. Depuis cette époque , j'ai néanmoins constaté cette propriété émétique , lorsque j'ai procédé à plusieurs essais avec des échantillons qui m'avoient été adressés par M. Dubuc , ancien intendant de la Martinique , homme d'un mérite supérieur , dont l'administration étoit un bienfait pour cette colonie , et dont le nom sera toujours aussi cher à la science qu'à l'humanité.

XLVII. Immédiatement après l'emploi et l'es-

sai du *cinchona floribunda*, ou *quinquina-piton*, M. Levavasseur a proposé en France deux autres espèces de quinquina, indigènes de l'île de Saint-Domingue. Le premier est le *cinchona caribæa*, dont Wright a donné la description dans les Transactions philosophiques de Londres. Cet arbre croît spontanément aux îles Caraïbes. M. Guersent a bien voulu me remettre des échantillons de ce quinquina, que M. Cadet de Gassicourt a soumis à un examen attentif. Leur écorce étoit roulée, d'un jaune verdâtre à l'intérieur, et couverte d'un épiderme grisâtre et lisse, comme celle des bois blancs; sa cassure étoit nette et d'apparence résineuse; sa saveur, d'abord mucilagineuse et sucrée comme la réglisse, étoit ensuite très-amère, colorant promptement la salive en un jaune verdâtre; la poudre étoit d'un gris jaunâtre : elle avoit une odeur herbacée.

XLVIII. On a soumis le *cinchona caribæa* à des expériences chimiques. Son infusion aqueuse est d'un rouge-brun, d'une saveur très-amère. Elle ne rougit point la teinture du tournesol; elle se trouble légèrement par le repos; elle donne une belle couleur noire avec le sulfate de fer. L'infusion récente de noix de galle et l'acide gallique y forment un précipité d'un brun rougeâtre. La dissolution de colle-forte y fait un précipité fauve

floconeux. La teinture alcoolique de cette écorce est de couleur citrine. Elle ne précipite pas l'eau ; elle précipite en vert le sulfate de fer. En résultat , cette espèce de quinquina paroît contenir un principe amer, du tannin et de l'acide gallique , mais point de résine.

XLIX. L'autre quinquina , dont on doit la connoissance à M. Levavasseur , est le quinquina épineux , *cinchona spinosa*. Il a été découvert par le baron de Beauvois , correspondant de l'ancienne Académie des Sciences , et associé national de la Société royale du Cap. (Voyez le *Journal de Physique* de l'abbé Rozier , tom. xxxvii , où sa description se trouve consignée , ainsi que celle du quinquina caraïbe.) Il reste à déterminer si les deux espèces dont nous venons de parler font véritablement partie du genre CINCHONA ; et peut-être la science réclame-t-elle des recherches nouvelles sur cet objet.

L. Telles sont les différentes espèces de quinquina qu'il importoit de faire connoître à nos lecteurs. C'est principalement à la chimie qu'il appartient de nous guider sur le choix des meilleures écorces , et de nous fournir des lumières nécessaires sur les meilleurs modes de leur préparation. Elle saura un jour , comme le remarque très-judicieusement M. Zéa , nous éclairer sur les

combinaisons multipliées que l'on peut faire des principales espèces officinales, lesquelles, se ressemblant par quelques qualités communes, possèdent cependant chacune, au plus haut degré, leurs vertus caractéristiques. Quels remèdes énergiques et salutaires ne doit-on pas attendre de ces combinaisons ! Et qui sait, ajoute M. Zéa, si les succès extraordinaires qu'obtient quelquefois le quinquina, ne sont pas dus au hasard de quelque mélange heureux !

LI. Jusqu'à présent on n'a appliqué à la guérison des fièvres intermittentes, que les écorces fournies par le précieux arbre du quinquina. Il seroit utile de savoir si les feuilles possèdent le même avantage. Plusieurs voyageurs recommandables ont déjà voulu s'occuper de ce fait intéressant pour la science. On a également préconisé la racine dans ces derniers temps, sous le rapport de ses propriétés fébrifuges. Ce seroit sans contredit un grand mal qu'on la préférât aux écorces dont personne aujourd'hui ne conteste les effets salutaires, et qui alors deviendroient plus rares dans le commerce. Un savant du premier ordre, M. Laubert, pharmacien en chef de nos armées, a déjà procédé à quelques essais sur la racine de quinquina. (*Voyez le tome v du Recueil de Mémoires de médecine, de chirurgie militaires, etc.*)

LII. Quoique cet Appendice sur les différentes espèces de quinquina soit une sorte de digression dans notre principal sujet, on sent combien cette digression étoit autorisée, et par l'importance de la matière, et par la nécessité qu'il y a de diriger avec certitude le plan de curation des Fièvres pernicieuses intermittentes. Nous sommes d'ailleurs parvenus à cette époque glorieuse de la médecine, où toutes les sciences physiques doivent contribuer de leurs richesses et participer chacune à ses progrès. On n'ignore pas combien la marche de cet art sublime a été retardée par l'abandon et la négligence des puissans moyens qu'elles lui offrent.

FIN DE L'APPENDICE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPALES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

A

ACIDES MINÉRAUX, peuvent convenir quand la fièvre pernicieuse intermittente a une tendance au caractère adynamique ou putride, *page* 339.

ADYNAMIQUE. La fièvre pernicieuse intermittente peut se compliquer des symptômes propres à la fièvre adynamique, 158.

ALGIDE. Fièvre pernicieuse intermittente algide, 29. — Observée à l'hôpital de la Salpêtrière, 310. — Elle a été observée par le docteur Lanoix dans l'épidémie de Pithiviers, 32.

ANALYSE. Son utilité dans l'étude de la pyrétologie, 168.

APHONIQUE. Cette variété de fièvre a été observée par M. le docteur Double, à Paris, 89.

ATAXIQUES. Fièvres qui méritent proprement cette dénomination, 152. — Leurs symptômes prédominent souvent dans les pernicieuses, 154. — Fièvres ataxiques ne sont pas essentiellement pernicieuses, *ibid.* — Fait observé à l'hôpital Saint-Louis, et qui vient à l'appui de cette assertion, 155. — État des forces, exprimé par le mot *ataxia*, 149.

ATRABILAIRE. Flux atrabilaire; caractérise quelquefois la fièvre pernicieuse intermittente, 15.

AUTOPSIES CADAVÉRIQUES. Lumières qu'elles peuvent répandre sur la nature des fièvres intermittentes pernicieuses, page 172.

B

BAINS de quinquina, conseillés par Barthez, et administrés avec beaucoup de succès par M. Mestivier, 347.

BIÈRE de quinquina, proposée par le docteur Mutis, 309.

C

CANNELLE, unie avec succès au quinquina, 308.

CARDIALGIQUE. Symptômes de la fièvre pernicieuse intermittente cardialgique, 16. — Observations qui constatent cette variété, 18 et 19.

CARDITIQUE, observée par M. Jonquet, 105.

CARPOLOGIE. Pourquoi il faut regarder ce symptôme comme précurseur de la mort, 208.

CASCARILLE, unie avec succès au quinquina, par Hoffmann et Galeazzi, 308.

CATARRHALE. Fièvre pernicieuse intermittente catarrhale, observée par Comparetti, 90. — A été observée à l'hôpital Saint-Louis, 95.

CATHARRE de la vessie, suivi d'une fièvre pernicieuse comateuse, 298.

CÉPHALALGIQUE. Fièvre pernicieuse intermittente céphalalgique, observée par l'auteur, 68. — Autre exemple pris de l'ouvrage de Comparetti, *ibid.*

CHALEUR brûlante, dangereuse lorsqu'elle n'est pas précédée de frisson, 205.

CHANVRE. Danger du chanvre que l'on met à rouir dans des eaux croupissantes, et son influence pour la production des fièvres pernicieuses intermittentes, *page* 272.

CHOLÉRIQUE. Fièvre pernicieuse intermittente, et le plus ordinairement tierce, selon la remarque de Torti; symptômes qui la caractérisent, 6.

CONTAGIEUX. Pourquoi on a attribué un caractère contagieux aux fièvres pernicieuses intermittentes, 169.

CONTINUES. Fièvres pernicieuses intermittentes qui tendent au type de continuité, 109. — Signes qui font reconnoître que les Fièvres pernicieuses intermittentes dégénèrent en continues, *ibid.*

CONVULSIONS. Pourquoi ce symptôme est dangereux dans les fièvres pernicieuses intermittentes, 208.

CONVULSIVE. Fièvre pernicieuse intermittente convulsive, observée surtout chez les enfans. Exemple de cette fièvre, cité par Morton, 66. — Observée par M. Coustancéau, 67.

CRISES. Crises particulières des fièvres pernicieuses intermittentes, 150.

CYSTIQUE. Fièvre pernicieuse, observée par M. Jonquet, 65.

D

DIAGNOSTIC. Nécessité qu'il y a de comparer les fièvres pernicieuses intermittentes avec les maladies analogues, pour se faire un diagnostic certain, 175. — Signes établis par Mercatus pour fonder le diagnostic, 176. — Signes donnés par Lautter, 180. — Signes distinctifs indiqués par Médicus, 183. — Causes qui rendent le

diagnostic difficile à saisir. Observations de M. Laennec à ce sujet, *page* 299.

DÉLIRANTE. Fièvre pernicieuse intermittente délirante. A été observée par l'auteur à l'hôpital de la Salpêtrière, 47. — Par le docteur Lanoix à Pithiviers, 53. — Par le docteur Coutanceau à Bordeaux, 55.

DIAPHORÉTIQUE. Fièvre pernicieuse intermittente diaphorétique, très-bien décrite par Torti, 22.

DYSPNÉIQUE. Cette variété a été établie par le docteur Galéazzi, 75. — Observée par M. Boullon, médecin à Abbeville, 78. — Observation du professeur Barthez à ce sujet, 80.

DYSENTÉRIQUE. Flux dysentérique; caractérise souvent la fièvre pernicieuse intermittente, 6. — Observation par Comparetti, 8.

E

EAUX. La mauvaise qualité des eaux de Middelbourg et des environs influe sur le développement des fièvres pernicieuses intermittentes, 286.

ÉPIALE. Fièvre épiale de Galien. Doit être rapportée à la fièvre algide intermittente, 31.

ÉPIDÉMIQUES. Fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques, 113. — Observées par Lancisi en 1796 à Rome, 114. — Constitution épidémique qui a régné à Turin en 1720, et qui a été décrite par Richa, 117. — Histoire des fièvres pernicieuses de Breslaw, 148. — Histoire de celles de Luxembourg, 119. — Tableau de l'épidémie de Pithiviers, près d'Orléans, 124.

ÉPIDÉMIES observées dans les environs d'Abbeville..... pendant les années VIII, IX, X et XI, 129.

ÉPIDÉMIES observées à Grenoble et dans ses environs, dans le courant de l'an XII, page 129. — A Boulogne-sur-Mer, 131.

ÉPILEPTIQUE. Lautter a eu occasion de traiter une fièvre pernicieuse intermittente épileptique, 65.

EUDIOMÉTRIE. Elle n'a répandu jusqu'ici aucune lumière sur les qualités physiques de l'air le plus propre à développer les fièvres pernicieuses intermittentes, 273. — Projet d'un nouvel instrument pour apprécier la pureté de l'air, 277 et 278.

EXANTHÉMATIQUE. Exemple de cette fièvre, rapporté par Comparetti, 103. — Autre exemple observé par l'auteur à l'hôpital Saint-Louis, 105.

F

FIÈVRES. Ont essentiellement leur siège dans le système nerveux, et devroient être rangées dans la classe des névroses, 162.

FIÈVRES simples qui se convertissent soudainement en fièvres de mauvais caractères, 163.

FORCES. Distinguées en forces *résoutes* et en forces *oppri-
mées*. Nécessité d'apprécier l'état des forces dans les divers ordres des fièvres, et cadre tracé sur cet objet par M. Richerand, 148.

FROID. Influence du froid sur les fièvres pernicieuses intermittentes, et observations à ce sujet, 286.

FUMIGATIONS acides. Grands avantages retirés de l'usage des procédés de Guyton-Morveau, pour la désinfection des hôpitaux, des prisons, etc., dans les cas où il existe des fièvres intermittentes pernicieuses, 283.

G

GOUTTE-SEREINE. La goutte-sereine peut compliquer quelquefois la fièvre pernicieuse intermittente, *page* 103.

H

HÉPATIQUE. Fièvre pernicieuse intermittente hépatique, considérée comme très-dangereuse, 15.

HOQUET. Ce que c'est, 200.

HYDROPHOBIQUE. Fièvre pernicieuse intermittente hydrophobique, observée par le professeur Dumas, 81. — Par M. Boullon, dans l'épidémie d'Abbeville, 87.

I

ICTÉRIQUE. Fièvre pernicieuse ictérique, observée par l'auteur, 98.

IRRITABILITÉ. Application des connoissances acquises sur l'irritabilité à la théorie des fièvres pernicieuses intermittentes, 142. — Altération spéciale de cette faculté dans les fièvres pernicieuses intermittentes, 143.

L

LAUDANUM. Employé par Hoffman dans une fièvre pernicieuse intermittente comateuse, 349. — Administré pour prévenir le vomissement, 397.

LAVEMENS. Lavemens de quinquina peuvent convenir, 347.

LYPYRIE. Ce symptôme est le plus souvent un accident

particulier de la fièvre meningo-gastrique, ou le produit d'une inflammation interne, *page* 31.

M

MARAI. Influence des exhalaisons marécageuses sur la naissance et le développement des fièvres pernicieuses intermittentes, 219. — Leur action favorisée par le temps de la nuit, la saison de l'été et celle de l'automne, 225. — Marais situés dans des lieux élevés ou balayés par les vents, n'exercent qu'une influence légère sur le développement des fièvres pernicieuses intermittentes, 229. — Ils contribuent moins à la production des fièvres pernicieuses intermittentes par la quantité d'eaux qui stagnent dans leur intérieur, que par le dépôt plus ou moins infect, mis en contact avec l'atmosphère, après la retraite ou l'évaporation de ces mêmes eaux, 231. — Comment l'action des vents peut détruire l'influence des miasmes des marais, 233. — Influence des pluies sur le dégagement des vapeurs des marais, 238. — L'habitude affoiblit l'action des vapeurs marécageuses, 242. — L'affoiblissement antérieur du système vivant dispose à l'action des miasmes marécageux, 244. — Les émanations marécageuses agissent-elles spontanément ou après un temps déterminé, 246. — Mode d'action des miasmes n'est point encore bien apprécié, 248. — Influence des phases lunaires, des marais, de l'électricité atmosphérique, etc., sur l'activité des miasmes marécageux, 249. — Nature du gaz qui se dégage le plus ordinairement des endroits marécageux, 269. — Signes certains pour reconnoître les pays marécageux et les plus propres à favoriser le développement des fièvres pernicieuses intermittentes, 274.

MOTILITÉ. Augmentation ou diminution des principaux modes de la motilité, *page* 141.

N

NÉPHRÉTIQUE. Veuve attequée d'une fièvre pernicieuse intermittente néphrétique, dont il s'agit dans l'ouvrage de Morton, 63.

O

OPIUM. Peut être combiné avec le quinquina, employé avec beaucoup de succès par le professeur Barthez, dans le traitement des fièvres pernicieuses intermittentes, 337.

P

PARALYSIE. Fièvre pernicieuse caractérisée par la paralysie, 102.

PERNICIEUSES. Motif qui justifie cette dénomination, 154.

PÉRIPNEUMONIQUE. La fièvre pernicieuse intermittente péripneumonique a été fréquemment remarquée par Morton, 57. — Exemple de cette fièvre, observée par Lauter, 58.

PÉTÉCHIES. Très-fâcheuses lorsqu'elles surviennent dans le cours des fièvres pernicieuses intermittentes, parce qu'elles annoncent une complication grave de ces fièvres avec les symptômes propres aux fièvres adynamiques, 206. — Fièvres pernicieuses intermittentes pétéchiâles observées par Apinus, 207. — Fièvres pernicieuses intermittentes avec pétéchies, consignées dans le recueil des médecins de Breslaw, *ibid.*

PLAIES. Caractères pernicieux qu'elles impriment aux fièvres intermittentes ou rémittentes dans certaines épidémies, *page* 289.

PRONOSTIC. Doit être fondé sur une étude approfondie des forces vitales, 192. — Du pronostic fondé d'après les phénomènes de l'organe cérébral, 199. — D'après les phénomènes de la respiration, 207. — D'après les organes de la digestion, 211. — D'après les déjections et les excréments, 203. — Du pouls, 215. — D'après les périodes de chaleur et de sueur, 204. — D'après la nature des exanthèmes, 206. — D'après la nature des pétéchies, *ibid.* — D'après la considération des organes du mouvement, 208. — D'après les traits de la face, 209. — D'après les divers âges, 210. — D'après la forme des paroxysmes, 211. — Connoissances des anciens sur le pronostic des fièvres pernicieuses, 212.

PUERPÉRALE. Erreur de M. Oslander, qui a voulu établir l'existence d'une fièvre pernicieuse puerpérale, 106.

Q

QUINQUINA. Seul remède qui puisse combattre avec certitude les fièvres pernicieuses intermittentes ; obscurité qui a régné jusqu'à ce jour sur les notions acquises relativement au quinquina, 353. — Expériences du docteur Mutis, et lumières qu'il a répandues sur la détermination du genre et des espèces, 354. — De l'espèce de quinquina désigné sous le nom de *quinquina brun*, 360. — Caractères propres à la faire reconnoître, *ibid.* — Est la même que celle qui a été décrite par La Condamine, 362. — On n'a pas encore constaté sa supériorité sur les autres espèces, 363. — De l'espèce de quinquina dési-

gnée sous le nom de *quinquina orangé*, p. 364. — Signes propres à faire reconnoître son écorce, 366. — Sa propriété balsamique, et son influence particulière sur le système nerveux, 368. — Du *quinquina rouge*, 372. — Ses principaux caractères pharmaceutiques, 374. — Sa propriété antiseptique, et son action spéciale sur le système musculaire, 376. — Du *quinquina jaune*; caractères qui servent à le faire distinguer, 378. — Son amertume excessive et son empire particulier sur les humeurs, 381. — Du *quinquina blanc*, 382. — Exposition de ses caractères distinctifs, 384. — Sa propriété savonneuse, et son action sur les glandes et sur le système lymphatique, 385. — Écorce des grosses branches du quinquina, plus active que celle des petites, et ses vertus d'autant plus énergiques qu'elle est plus ancienne, 386. — De quelques autres espèces de quinquina du Pérou, que l'on pourrait employer à la guérison des fièvres pernicieuses intermittentes, 389. — De quelques espèces de quinquina recueillies dans les Antilles, 395. — Lumières que la chimie peut répandre sur l'administration du quinquina, et sur les combinaisons de ses quatre espèces officinales, 398. — La meilleure préparation du quinquina est d'être donnée en substance, 305. — Opinion contraire de Mutis, qui pense que le meilleur moyen d'extraire sa partie active est la fermentation, 308. — Doit être donné dans la distance la plus éloignée de l'accès que l'on se propose d'arrêter, 309. — Son administration plus convenable dans le temps de la rémission ou de l'intermission, 312. — Doit être placé dans la déclinaison des accès, lorsque la fièvre est subintrante, 313. — Dose de quinquina nécessaire pour arrêter les paroxysmes d'une fièvre pernicieuse inter-

mittente parvenue à son plus haut degré d'intensité, page 315. — Manière de distribuer cette dose, 317. — Action du quinquina d'autant plus énergique qu'on en administre une plus grande quantité dans un temps plus court, 318. — Son administration n'exige aucune préparation préalable, 319. — Il doit être administré, quoique la fièvre pernicieuse intermittente débute par des symptômes peu graves, 321. — Manière de placer le quinquina quand la fièvre pernicieuse intermittente se déclare en double-tierce, 322. — Comment on peut changer le caractère pernicieux des fièvres pernicieuses intermittentes, en substituant au quinquina des fébrifuges indigènes, 323. — Nécessité qu'il y a d'insister sur l'usage du quinquina, après que les paroxysmes ont été supprimés par ce même remède, 326. — Futilité des objections faites contre l'administration du quinquina dans le traitement des fièvres pernicieuses intermittentes, 328. — Conjectures des auteurs sur la manière d'agir du quinquina, 331.

R

RECHUTES. L'expérience n'a point décidé si elles avoient principalement lieu dans les semaines paroxystiques, 171.

RESPIRATION. Embarras de la respiration est un signe très-funeste dans les fièvres pernicieuses intermittentes, 200.

RHUMATIQUE. Exemple d'une fièvre pernicieuse intermittente, vue chez un teinturier, par Morton, 62.

S

SAIGNÉE. Peut devenir nécessaire au malade dans les fièvres pernicieuses intermittentes qui se déclarent au

printemps chez des sujets vigoureux et robustes, et qui suscitent une affection grave de certains viscères, *page* 344. — A été pratiquée par Médecus dans un cas particulier de fièvre pernicieuse intermittente, 346.

SENSIBILITÉ. Lois de la sensibilité perverties dans les fièvres pernicieuses intermittentes, 141.

SOPOREUSE. Symptômes de cette fièvre. Observation curieuse d'une fièvre soporeuse intermittente, recueillie par Richerand, 40. — Soporeuse des vieillards; signes qui la font distinguer de l'intermittente comateuse, 177.

SYMPATHIES. Sympathies des organes; sont altérées dans les fièvres pernicieuses intermittentes, 196.

SYNCOPALE. Description exacte de cette variété de la fièvre pernicieuse intermittente, 27.

SIROP. Fébrifuge de Mosca, 324.

T

THÉRIAQUE. Donnée comme antispasmodique pour faciliter la prise du quiquina et prévenir le vomissement, 337.

TRISMUS. Dans un cas de trismus, Bouvard fit casser les dents incisives à un malade pour faciliter l'introduction du quinquina dans l'estomac, 348.

TYPE. Types divers que peuvent affecter les fièvres pernicieuses intermittentes, 137.

V

VAPEURS humaines peuvent occasionner quelquefois les fièvres pernicieuses intermittentes , *page* 282.

VARIÉTÉS des fièvres pernicieuses non encore bien constatées , 102.

VÉGÉTAUX. Leur influence sur la salubrité de l'atmosphère a été très-connue des anciens , 250. — Expériences pour prouver que les feuilles des végétaux , immergées dans l'eau et exposées au soleil , laissent échapper des bulles de gaz oxigène , résultat du travail organique des plantes , 251. — Ce gaz provient du parenchyme vert des plantes , et sa production semble s'opérer par l'intermède de l'acide carbonique , 252. — Mémoire de M. de Saussure , qui prouve l'utilité de cet acide carbonique contenu dans l'air , sur la végétation , 255. — Essais de Sénéquier , qui tendent à prouver que l'acide carbonique est préalablement dissous dans l'eau lorsqu'il pénètre les racines et les feuilles des végétaux , 257. — Pénètre-t-il le pétiole des feuilles , 258. — Travaux de Spallanzani , qui combattent la théorie de Sénéquier , 259. — Objections du physicien Hassenfratz , et réponse du physiologiste de Genève , 262. — Le gaz oxigène que les végétaux répandent constamment dans l'atmosphère est-il un des moyens dont la nature se sert pour réparer les nombreuses altérations ; opinion du physicien Changeux sur cet objet , 267.

VERS. Paroissent quelquefois dans les fièvres pernicieuses intermittentes , 345. — Le quinquina les combat en rétablissant le ton du canal intestinal , *ibid.* — Les vers ne doivent être considérés que comme un produit secon-

daire de la fièvre, et non comme la cause de cette affection, page 341. — Se manifeste chez les personnes indigentes, et qui font usage d'une mauvaise nourriture, 342. — Idées hypothétiques de Moréali, qui rapporte la cause des fièvres malignes pétéchiales observées à Reggio en 1734 et en 1735, à la présence des vers dans les intestins, *ibid.*

VOMITIFS. Peuvent convenir dans les fièvres pernicieuses intermittentes, 338.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

