

Relation chirurgicale des événemens de juillet 1830, à l'Hôpital Militaire du Gros-Caillou / par Hippolyte Larrey. [Repr. from Rec. Mém. Méd. Chir. Pharm. milit., vol. XXX].

Contributors

Larrey, Félix Hippolyte, baron, 1808-1895.
Dupuytren, Guillaume, 1777-1835.

Publication/Creation

Paris : chez Béchet et chez l'auteur, 1831.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/npz7zrgs>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

HISTOIRE CHIRURGICALE
DU SIÈGE
DE
LA CITADELLE D'ANVERS;
PAR HIPPOLYTE LARREY,

(EX-AIDE-MAJOR DES AMBULANCES DE L'ARMÉE DU NORD), DOCTEUR EN MÉDECINE,
CHIRURGIEN-AIDE-MAJOR DE L'HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION DE PARIS,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE ET DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS MÉDICALES.

Je ne juge pas, je raconte.

MONTAIGNE.

EXTRAIT DES MÉMOIRES DE MÉDECINE MILITAIRE, T. XXXIV.

PARIS,
IMPRIMERIE DE M^{me} HUZARD (NÉE VALLAT LA CHAPELLE),
Rue de l'Eperon, n^o 7.

1835.

THE HISTORY OF
THE CATHOLIC CHURCH

IN CIVILISATION
THE MARCHES

BY JAMES LATHAM

IN TWO VOLUMES

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

A mon collègue Montlouïe
Fournis l'amitié. Bzarr.

Aux Chirurgiens

DES AMBULANCES

DE L'ARMÉE DU NORD.

Hippolyte Larrey.

— HISTOIRE CHIRURGICALE

DU CHIRURGIEN

LA SÉNATORIAT

DE L'ANNEE DU NORD

AVANT-PROPOS

La morte d'une suive issus en partie de
bous le siège de la citadelle d'Alvarez, et ces
épisode militaire d'une grande action belli-
que est déjà extrémité dans l'histoire. C'est
bien complété ce qui a été fait, sous le rapport
critique, de la guerre de l'empereur
Napoléon : Je m'a étais décidé des le commencement
du siège ; j'en sais très peu de l'engag-
ement formel, d'après l'invitation de Mr. le co-
mte de Tocqueville, et c'est ce qui
assemblé du chef de l'armée, le 25 juillet 1808. Les
six mois d'attente de l'assemblée semblaient
un second rétard de temps nécessaire à

HISTOIRE CHIRURGICALE
DU SIÉGE
DE
LA CITADELLE D'ANVERS.

AVANT-PROPOS.

La moitié d'une année laisse en arrière de nous le siège de la citadelle d'Anvers, et cet épisode militaire d'une grande action politique est déjà enregistré dans l'histoire. C'est pour compléter ce qui a été fait, sous le rapport chirurgical, que j'ai entrepris de publier cette relation : je m'y étais décidé dès le commencement du siège ; j'en avais pris ensuite l'engagement formel, d'après l'invitation de M. le chirurgien en chef de l'armée ; et c'est cet engagement que j'accomplis aujourd'hui. Les six mois qui viennent de s'écouler semblaient m'accorder largement le temps nécessaire à

l'exécution de ce travail : oui, sans doute, s'il n'avait fallu qu'un choix d'observations ; mais il s'agissait pour moi d'obtenir un ensemble complet, des conclusions générales et autant de résultats partiels, définitifs, que de faits isolés ; tel était, du moins, mon but. Je n'ai négligé aucun moyen d'y parvenir ; j'ai pris note une à une des blessures, pendant toute la durée du siège, soit à l'ambulance de tranchée, soit à l'ambulance générale ou à l'hôpital d'Anvers. Je dois de vraies obligations à deux de nos sous-aides, MM. Thomassin et Périer, qui ont consacré à ces recherches une grande partie de leur séjour en Belgique : ce ne serait pas assez pour moi de le dire en termes simples, comme un remerciement, si je savais le dire en termes relevés, comme un témoignage public d'estime pour M. Périer, que son activité de tous les jours et ses veilles de toutes les nuits ont fait tomber dangereusement malade ; je désire que ces quelques mots lui prouvent le souvenir d'un camarade et d'un ami, qui sait l'apprécier.

Le chirurgien en chef, M. Zinck, et le chirurgien-major, M. Forget, ont bien voulu me donner quelques conseils ; ainsi que mon père, mon premier maître. Plusieurs de nos confrères, MM. Letulle, Petitot, Montcour-

rier, Michel Levy et d'autres, m'ont communiqué des observations intéressantes. Des officiers de santé belges, M. Limauge de Bruxelles, et MM. Decondé, Molitor, Soulikowski et Corbier d'Anvers, m'ont fourni des notes ; mon collègue et ami de l'hôpital de Lille, M. Léonard fils, m'a rendu compte enfin de l'état consécutif de quelques uns de nos blessés.

Je n'ai pas assez de termes à ma disposition pour adresser à chacun une part de remercimens ; et malgré cet espace de six mois, malgré tous ces documens, quelques observations restent incomplètes dans leurs résultats, tant parce que je n'ai pu me les procurer tous, que parce qu'ils ne sont pas encore parvenus à leur fin. Mais j'ai dû hâter la publication de ce travail, pour qu'il ait encore de l'à-propos et pour satisfaire à certaines exigences : si c'est à refaire plus tard, je n'aurai plus autant de droits à l'indulgence que je réclame aujourd'hui.

Avant d'énoncer une seule proposition ou un seul fait, je dois dire quelque chose de la relation qui a été publiée sur le même sujet par mon collègue et ami le docteur Paillard, un des élèves distingués du professeur Dupuytren. Je me fais un plaisir de rappeler que mon

père a fait à l'Institut un rapport très favorable sur ce livre, que j'ai consulté avec profit. M. Paillard, entraîné vers nous par un zèle d'observation chirurgicale, n'est arrivé que la veille de la capitulation ; et s'il n'a pas assisté, sur le terrain, aux premiers effets des grandes blessures et à la chirurgie des ambulances, il en a étudié les suites, à l'hôpital d'Anvers, avec soin et habitude de discernement : c'était pour M. Paillard une occasion de reproduire quelques unes des théories de nos grands-maîtres modernes sur les plaies d'armes à feu ou sur les faits de leur pratique ; il s'est adressé plus spécialement à l'expérience de MM. Dupuytren et Larrey.

J'ai cru devoir suivre un tout autre plan que celui de M. Paillard ; c'est à dire faire l'histoire chirurgicale du siège de la citadelle, dans son ensemble, dans ses détails, abstraction faite de tout ce qui s'est passé ailleurs qu'à Anvers. Je ne conteste point pour cela l'intérêt d'analogie que certaines blessures du siège peuvent présenter avec d'autres ; mais cette œuvre serait longue, difficile, imparfaite, et les recherches de compilation nuiraient peut-être aux recherches d'observations nouvelles.

C'est pour ce motif que je n'emprunterai

rien, par exemple, à l'ouvrage récent de M. Jobert sur les plaies d'armes à feu (1) : je n'ai pas la moindre prétention de faire, comme on dit, de la science ; je veux simplement faire de l'histoire, et déjà cette tâche est assez difficile.

Il y aurait mauvaise grâce de ma part à relever quelques erreurs de faits dans la relation de M. Paillard, parce qu'il n'a pu, comme nous, observer la plupart des blessures à l'instant même, en constater exactement les causes et les effets, en connaître tous les résultats.

La précision et la clarté sont les seules qualités de style que j'aie ambitionnées en racontant les observations ; j'ai exposé celles-ci avec toutes les abréviations dont elles étaient susceptibles.

Voici l'ordre des matières :

Considérations historiques : organisation chirurgicale de l'armée, ambulances, évacuations de blessés, hôpitaux belges, chirurgiens belges, blessés belges, blessés hollandais, blessés français et pertes de l'armée, maladies, état moral des blessés.

(1) On ne pourrait rien ajouter à l'analyse exacte, ou plutôt à la critique si bien raisonnée que M. Bégin a faite de ce livre, dans le *Journal hebdomadaire de médecine*.

Considérations chirurgicales : blessures du siège en général; blessures d'armes à feu, mutilations, blessures multiples, complications graves, projectiles, débridemens, opérations chirurgicales, pansemens, traitement général.

OBSERVATIONS :

Blessures de la tête : contusions, plaies simples ou compliquées de la face et du crâne.

Blessures du cou.

Blessures de la poitrine : contusions, plaies superficielles ou pénétrantes.

Blessures de l'abdomen : contusions, plaies superficielles ou pénétrantes.

Blessures de la partie postérieure du tronc : contusions, plaies.

Blessures des membres : contusions, luxations, plaies simples ou compliquées, fractures simples ou compliquées, des membres supérieurs, des membres inférieurs, des articulations.

Amputations en général :

- Amputations scapulo-humérales ;
- humérales ;
- radio-cubitales ;
- carpiennes ;

Amputations coxo-fémorales;

— **fémorales;**

— **tibio-péronières;**

— **tarsiennes.**

Résections.

Résumé.

Cette méthode descriptive est à peu près la même que celle de notre *Relation chirurgicale des blessés de juillet*.

CHAPITRE PREMIER.

CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES.

Service chirurgical de l'armée.

L'organisation du service chirurgical de l'armée était en rapport avec le nombre de ses divisions ; savoir : un corps d'avant-garde, quatre divisions d'infanterie active, une division d'infanterie de réserve, deux divisions de cavalerie, et les différentes troupes réunies du génie, de l'artillerie, du train et des équipages. A chacune de ces divisions, comme au corps d'avant-garde, était attachée une ambulance, composée d'un chirurgien-major, d'un aide-major et de quatre sous-aides. Chaque régiment avait, comme dans tous les temps, son chirurgien-major et ses deux aides-majors. Notre excellent et digne maître, M. Zinck, était chirurgien principal de l'armée ; sa longue expérience datait de l'expédition d'Égypte, et s'était agrandie successivement à travers les grandes batailles de l'Empire : c'est lui qui dirigeait, à Berchem, le service chirurgical de l'ambulance du quartier général, dont M. Forget se trouvait le chirurgien-major.

Deux aides-majors, M. Corbin et moi, et douze sous-aides, complétaient le personnel chirurgical de cette ambulance. Le nombre des officiers de santé aurait été insuffisant plus tard, sans les mesures qu'avait prises le chirurgien en chef.

Notre service actif, commencé le 30 novembre, presqu'en même temps que l'ouverture de la tranchée, a cessé le 24 décembre, le lendemain de la prise de la citadelle.

Nous avons encore passé quelque temps en Belgique pour accompagner les premières évacuations des blessés sur la France, et puis nous y sommes rentrés à notre tour.

M. le chirurgien-major Forget est resté à Anvers avec deux sous-aides, MM. Thomassin et Périer, jusqu'à ce que le plus grand nombre des blessés fût entièrement évacué sur la France, c'est à dire jusqu'à la fin du mois d'avril 1833.

Pendant ce long séjour, ils se sont adjoints aux chirurgiens belges, et ont essentiellement contribué avec eux au soulagement des blessés, qui n'étaient plus entièrement séparés de leurs compatriotes. M. Forget a partagé la direction du service chirurgical avec MM. Seutin et Gouzé; il les a même remplacés seul assez long-temps, tandis que MM. Thomassin et Périer ont continué de montrer le zèle et l'acti-

vité dont ils avaient fait preuve aux ambulances.

Indépendamment du personnel chirurgical officiellement organisé pour les ambulances, plusieurs de nos collègues des régimens nous ont prêté leur aide. J'ai regret de ne pouvoir les nommer tous ; mais je citerai spécialement l'aide-major du 1^{er} régiment du génie, M. Brouillard, qui a bien voulu faire avec nous le service de l'ambulance de tranchée ; son exemple a été suivi par M. Sousselier, médecin-adjoint, qui avait auparavant été aide-major : merci à eux bien cordialement d'avoir diminué nos fatigues, en les partageant.

Si les opérations stratégiques ont entraîné un grand nombre de curieux vers Anvers, les opérations de la chirurgie militaire ont aussi attiré quelques jeunes praticiens français ou étrangers ; mais presque tous sont arrivés à la fin du siège, comptant sans doute qu'il se prolongerait plus long-temps : ils ont pu du moins suivre l'état des blessés à l'hôpital d'Anvers, et assister aux opérations consécutives. Ainsi sont venus nos compatriotes, MM. Delâtre et Paillard ; quatre jeunes chirurgiens anglais, recommandés par le célèbre Astley Cooper, et deux chirurgiens-majors de l'armée prussienne, adressés par l'inspecteur général,

M. Wiebel, à son collègue de Belgique, M. Wlemincks.

Ambulances.

Il serait peut-être peu convenable à moi de vantter l'institution des ambulances volantes et ses avantages si multipliés ; je ne dirai que ce qui a trait aux ambulances de l'armée du Nord.

L'intendant général, M. de Delaneuville, l'administrateur principal, M. Dubois, et le chirurgien en chef, M. Zinck, ont dirigé, avec une surveillance habile, l'organisation des ambulances, dans leur ensemble et dans leurs détails.

Outre l'ambulance générale, deux ambulances secondaires, dépendant, l'une du quartier général, l'autre de la quatrième division, devaient former les ambulances de tranchée.

Les ambulances actives ont été celles du quartier général et de la quatrième division, et les deux ambulances de tranchée. Des officiers d'administration dirigeaient les infirmiers dans leur service.

Rien ne manquait à l'approvisionnement nécessaire pour les pansemens et les opérations chirurgicales. Lorsque des dons de linge ou de charpie nous étaient adressés, on délivrait un bon de remerciemens, formulé ainsi par le chi-

rurgien en chef : « Bien que les ambulances de l'armée soient abondamment pourvues de tout ce qui leur est nécessaire , nous ne recevons pas moins avec plaisir et reconnaissance les dons offerts pour les blessés. »

Le local était une maison autant spacieuse et commode que possible , avec des lits de paille et des couvertures ; des matelas avaient été fournis par l'hôpital d'Anvers pour l'ambulance du quartier général. Un nombre proportionné de brancards avait été réparti à chaque ambulance. Enfin , tout le matériel nécessaire avait été convenablement disposé , et les autorités belges , administratives ou chirurgicales , ont contribué par leur empressement à rendre l'organisation de nos ambulances aussi parfaite que possible , et à y assurer plusieurs parties du service.

Ambulance de tranchée.

La nuit du 29 novembre venait de présider en silence aux travaux mémorables du génie ; l'ouverture de la tranchée avait été faite , et les manœuvres habiles de nos troupes avaient déjoué la surveillance des Hollandais. Nous pouvions perdre dans cette nuit beaucoup de monde , et pas un seul homme n'a été tué , pas un seul

n'a été blessé. La journée du lendemain ne pouvait finir avec autant de sécurité ; il fallait prévoir les dangers, hâter les secours. L'ambulance de réserve n'était pas assez près du centre des opérations ; une autre ambulance plus directe était indispensable, pour recevoir les blessés sur le terrain : cette ambulance fut improvisée aussitôt, dans la matinée du 50. On avait choisi l'emplacement où se réunissait l'état-major du général de brigade commandant la tranchée : c'était en arrière de la petite église Saint-Laurent, adossée elle-même aux batteries de la première parallèle, à une petite distance du fort. Le service chirurgical de cette ambulance devait être fait par un aide-major et deux sous-aides, pendant vingt quatre heures, et renouvelé à tour de rôle : on m'avait désigné pour la première garde. Le canon se fait entendre vers midi et donne le signal de l'attaque ; cependant le feu ménagé des Hollandais n'atteint pas un seul homme de notre côté. Nous manquions d'abri pour recevoir et panser les blessés ; l'église Saint-Laurent était là, mais close et déserte. Le soir était venu, et nos feux de bivouac à demi éteints par la pluie, conservaient assez de lueurs au milieu de l'obscurité pour attirer l'inquiétude et le canon des Hollandais ; déjà deux boulets avaient fait brèche à la petite

église : l'ordre fut donné d'éteindre aussitôt les feux. Comment les blessés auraient-ils été pansés dans une position si peu favorable ? J'obtins du général commandant la tranchée l'autorisation de faire enfoncer la porte : nous voilà bientôt à l'abri dans l'église Saint-Laurent, qui devint dès lors l'emplacement de l'ambulance de tranchée : cette ambulance, que l'on pourrait appeler aussi ambulance des *premiers secours*, n'avait effectivement d'autre destination que d'apporter aux blessés les secours d'urgence, arrêter les hémorragies, extraire les corps étrangers mobiles, et appliquer des appareils d'attente aux blessures les plus graves.

Il était expressément convenu que l'on ne ferait à l'ambulance de tranchée aucune opération majeure, susceptible d'être ajournée. Donc aucune amputation n'a été faite là, lors même que les membres étaient complètement mutilés ou emportés en totalité. La grande chirurgie était réservée pour l'ambulance générale.

On a fait observer que cette mesure devait multiplier les opérations chirurgicales, et par conséquent les souffrances des blessés. Oui, sans doute, si l'on ne considère pas quel était le seul but qu'on s'était proposé, savoir de ne donner absolument que les secours d'urgence

à la tranchée; car, sans cette disposition sage, combien d'accidens funestes auraient résulté du transport direct à Berchem ou à Anvers, assez éloignés, pour qu'une hémorragie, par exemple, pût devenir mortelle dans le trajet, tandis qu'elle pouvait être arrêtée sur-le-champ.

Néanmoins, il me semble que l'on aurait bien fait de réunir l'ambulance de Berchem à celle de l'église Saint-Laurent, et de n'en former qu'une seule, rapprochée du centre des opérations du siège, et qui aurait permis de pratiquer toutes les opérations chirurgicales avec plus de facilité, parce que le local était vaste; mais ce local était aussi exposé au feu de la citadelle, et les voûtes de l'église, en grossissant le bruit des pièces d'artillerie, auraient troublé davantage les premiers instans de repos si nécessaires aux blessés.

Une seconde ambulance de tranchée fut organisée un peu plus tard à Oboken, située à l'extrême gauche et en arrière de la première parallèle. M. Letulle, chirurgien-major, et son aide-major, M. Montcourrier, furent attachés à cette ambulance, qui ne reçut qu'une soixantaine d'hommes.

Avant même que les premiers soins pussent être donnés à l'ambulance de tranchée, il fallait les secours du moment, il fallait des mains pour

relever les blessés, pour les placer sur des bran-
cards et les aider à faire quelques pas jusqu'à
nous : des infirmiers étaient chargés de ce service
périlleux ; deux d'entr'eux y ont été blessés et
un autre tué. Je n'ai pas besoin d'en dire da-
vantage pour faire l'éloge de leur dévouement.

Si les infirmiers d'ambulances n'arrivaient pas
à temps pour transporter les blessés jusqu'à
nous, leurs plus proches camarades s'empres-
saient de les relever et de les mettre à l'abri.
Soldats, officiers, tous voulaient seconder
les chirurgiens de l'ambulance : c'est par un
semblable dévouement que quelques vivan-
dières se sont distinguées, comme Antoinette
Morand, qui parcourait sans cesse les tranchées,
la tête haute et d'un pas joyeux : ni les bombes,
ni les boulets, ni les avertissements, ni les or-
dres mêmes, rien ne pouvait l'arrêter; elle allait
toujours au secours des blessés, offrant à chacun
l'exemple du courage et le petit verre d'eau
de vie. Un des plus fidèles soldats de la tran-
chée, c'était la vivandière.

Ambulance de réserve.

Située d'abord à l'extrémité du long village
de Berchem, près du camp, l'ambulance de ré-
serve, ou ambulance générale, n'était autre chose

qu'une assez petite maison à deux étages, pouvant contenir tout au plus une centaine de blessés ; l'entassement y était néanmoins difficile, à raison des évacuations successives à Anvers ou à Malines. Les blessés les plus graves, et surtout ceux des membres inférieurs, étaient placés en bas ; une chambre, pourvue de tous les appareils et instrumens nécessaires, était consacrée aux amputations.

Les autres opérations étaient pratiquées sans déplacement des blessés, c'est à dire sur leurs lits, terre-à-terre et bien à l'étroit : cette position était quelquefois excessivement pénible pour nous.

Le médecin-bourgmestre de Berchem, toujours empressé à être utile aux Français, nous procura, après quelque temps, un local plus commode pour l'ambulance générale : c'était la première maison à l'entrée du village, tout près de l'ouverture de la tranchée. On épargnait ainsi aux blessés, ainsi qu'à leurs porteurs, le long trajet qu'il fallait faire auparavant : c'était également rapprocher d'Anvers ceux que leurs blessures graves devaient y faire conduire.

Évacuations des blessés.

La chirurgie militaire n'a pas seulement pour tâche de donner aux blessés les secours de l'art, quel que soit le genre de guerre, quel que soit le champ de bataille; elle doit encore les préserver de nouvelles blessures, les mettre à l'abri du danger, surveiller leur transport, assurer leur retraite, surtout en pays ennemi. L'empereur, dont l'immense génie veillait partout, s'assurait toujours par lui-même du sort des blessés, à la fin d'un combat; il leur aurait donné ses équipages, si les moyens de transport leur avaient manqué; mais les ambulances volantes n'étaient jamais en retard.

Dans un siège, les ambulances volantes sont remplacées sur le terrain par des brancards à bras: c'est de cette manière qu'à Anvers les blessés étaient rapportés des tranchées aux ambulances; les distances étaient si rapprochées de l'ambulance de tranchée à celle du quartier général, qu'il n'était pas besoin d'un officier de santé pour accompagner chaque homme; et, d'ailleurs, il aurait fallu en multiplier beaucoup trop le nombre. Pour y suppléer en quelque sorte, nous avions l'habitude d'écrire sur un billet: *pansement définitif* ou *pansement provisoire*.

soire ; c'était indiquer s'il était nécessaire ou non de le renouveler à l'ambulance générale : là, on savait ainsi à quoi s'en tenir, sans renseignement verbal de la part des chirurgiens de la tranchée.

Les blessés , une fois reçus à l'ambulance générale , n'y restaient jamais plus de douze heures; ce temps, à peu près, leur était accordé pour prendre un peu de repos à la suite des différentes opérations : c'est alors que les blessés les plus graves avaient pour destination Anvers et les autres Malines seulement , car Boom n'était pas dans la direction de Berchem. Deux évacuations par jour avaient lieu pour chaque hôpital , l'une le matin , l'autre le soir. La distance de Berchem à Malines exigeait toujours des voitures , tantôt de simples carrioles , tantôt des fourgons d'ambulance.

La plupart des blessés dirigés sur Anvers étaient portés sur des brancards ou sur des litières reconverties ; car, indépendamment des moyens de transport propres aux ambulances , d'autres avaient été fournis par le bourgmestre d'Anvers , M. Legrèle , et par l'inspecteur général , M. Wlemincks.

Quatre infirmiers d'ambulance portaient un brancard deux à deux , en se relayant ; leur nombre , insuffisant pour ce double service , fut

augmenté de plusieurs infirmiers de l'hôpital militaire, et d'hommes de corvée envoyés par la ville. Quelquefois, les soldats eux-mêmes étaient chargés de porter leurs camarades ; souvent aussi des habitans de Berchem ont servi aux transports.

Un ou deux chirurgiens-sous-aides, munis de quelques appareils de pansemens, dirigeaient chaque évacuation, selon qu'elle comprenait plus ou moins de blessés, afin de leur administrer les secours qui pouvaient devenir nécessaires pendant le trajet. Je dirai, à cette occasion, que mes jeunes camarades ont fait coura-geusement leur devoir, sans jamais reculer, alors que des boulets de canon traversaient souvent la route de Berchem à Anvers; toutes les maisons en étaient criblées, du côté des deux moulins: c'est par là que plusieurs hommes ont été blessés et qu'une femme a été tuée.

L'évacuation sur les hôpitaux de France a eu lieu à différentes époques, selon qu'il y avait un certain nombre de blessés parvenus à peu près en même temps au terme de la guérison. D'autres cependant demandaient à revenir en France, sans être guéris, tant ils avaient à cœur de se retrouver dans leur patrie.

C'était ordinairement par dix, douze, quinze hommes que les convois se faisaient, avec des

voitures louées aux frais de l'administration de l'armée. Il a fallu des voitures suspendues tout exprès, pour le transport de certains blessés encore éloignés de la guérison.

Les principales évacuations sur France ont été faites par des aides-majors. La dernière de toutes, comprenant le colonel Morlet, a été dirigée par le chirurgien-major M. Forget, qui ne laissait plus un seul blessé à Anvers vers la fin d'avril.

Il est inutile de dire que l'on a fait séjournier les blessés dans les principales villes de Belgique et de France, depuis Anvers jusqu'à Paris, et que dans chacun des hôpitaux ils ont retrouvé les soins les plus empressés, à Bruxelles et à Lille notamment.

Hôpitaux belges.

Si un acte des conditions établies entre les deux Gouvernemens n'avait pas spécifié que les hôpitaux belges donneraient asile à nos blessés, on aurait sans doute suivi la mesure proposée par notre Conseil de santé, c'est à dire l'évacuation directe sur les hôpitaux de France, ou bien on aurait pu improviser en Belgique même un grand hôpital français. Plus de dix-huit cents lits étaient en réserve à cet effet par les

soins prévoyans de l'intendant en chef M. De-laneuville.

Mais il en fut autrement : l'inspecteur général du service de santé de l'armée belge, M. Wlemincks, fit disposer, avec un louable empressement, tout le matériel nécessaire à l'admission de nos blessés dans les hôpitaux d'Anvers, de Malines, et il pourvut ensuite à leur évacuation sur les hôpitaux de Bruxelles, de Gand, de Louvain : M. Wlemincks a exercé partout la surveillance la plus active.

Le médecin principal de l'hôpital militaire d'Anvers, M. Gouzé, quoique très jeune, a donné des preuves d'expérience : il était parfaitement guidé lui-même par le médecin en chef de l'armée, M. Seutin, qui a pratiqué la plus grande partie des opérations consécutives.

Le service s'est fait à l'hôpital d'Anvers à peu près comme dans nos hôpitaux militaires, avec zèle et précision de la part des jeunes chirurgiens belges chargés des pansemens de nos blessés. Je n'entrerai, du reste, dans aucun des détails du service, d'autant que quelques uns trouveront place ailleurs.

Je dois dire deux mots sur l'hôpital civil d'Anvers, dont on aurait pu, au besoin, faire une succursale de l'hôpital militaire; le bourgmestre avait déjà proposé aux officiers de santé

en chef de notre armée d'y organiser une centaine de lits à cet effet. Un riche propriétaire des environs, et ancien militaire de l'empire, avait offert toute sa maison pour y recevoir des blessés; mais la place ne leur manquait pas encore, et le maréchal remercia dignement celui qui, en lui adressant cette offre généreuse, s'était réservé l'anonyme. Le chirurgien en chef de l'hôpital civil, M. Sommé, est un homme de beaucoup de mérite et très en réputation dans toute la Belgique (1); c'est à ses soins qu'ont été confiés les deux malheureux ouvriers belges, amputés à la suite de mutilations par des boulets.

Que seraient devenus, cependant, l'hôpital militaire et les blessés, s'il avait pris fantaisie au général Chassé de tirer sur la ville? Je m'arrête à cette simple question.

L'hôpital de Malines a reçu la plupart des blessés dont l'état n'était pas inquiétant: contusions, plaies simples, etc. Le chirurgien-major français de la 3^e division, M. Lefebvre, était chargé de la surveillance du service chirurgical, confié à ses aides. Même mesure avait été prise à Boom.

(1) M. Sommé a publié une Notice sur les blessés de la révolution belge.

Le chirurgien-major, M. Petitot, avait pour aide-major M. Michel Lévy, un des jeunes officiers de santé les plus distingués de l'armée.

Ainsi, on n'avait pas réservé exclusivement aux chirurgiens belges le traitement consécutif des blessures, et je suis bien aise d'en faire la remarque.

Chirurgiens belges.

Ce fut d'abord un sentiment pénible de songer que tous les blessés français, une fois pansés ou opérés par nous, allaient appartenir en quelque sorte aux chirurgiens belges, comme propriété domiciliaire. Oui, je l'avoue pour ma part, et ma franchise dût-elle déplaire à quelques susceptibilités, j'ai éprouvé une véritable peine à me séparer de nos premiers blessés ; quelques uns déjà venaient d'être amputés par moi : je m'étais tout de suite attaché à eux, et les quitter, c'était comme une séparation d'amis, c'était comme un adieu pour long-temps, comme un adieu pour toujours peut-être.

Notre Conseil de santé voulut bientôt après modifier cette mesure ; il demandait, ou l'admission dans les hôpitaux belges de chirurgiens français en nombre convenable, ou bien la trans-

lation immédiate des blessés sur les hôpitaux de France; mais des dispositions contraires étaient déjà arrêtées entre les autorités supérieures des deux gouvernemens : il fallut s'y soumettre.

Si la première impression morale fut triste pour nous, elle s'effaça peu à peu par la certitude que les chirurgiens belges donnaient à nos blessés tous les soins possibles et toutes les marques d'intérêt. Nous allions souvent à Anvers pour nous en assurer; et si quelques braves regrettaiient encore de nous avoir quittés, ou de n'être pas retournés de suite en France, c'était par un sentiment national, par un souvenir de la patrie; car presque tous étaient contens de leur bien-être en Belgique.

Nous devons nous-mêmes, chirurgiens français, reconnaissance et fraternité aux chirurgiens belges pour le zèle aussi persévérant qu'empressé avec lequel ils ont concouru à la guérison de la plupart de nos blessés. Je ne puis mieux témoigner à tous l'expression de ce sentiment de notre part qu'en reproduisant la lettre suivante :

« C'était comme au début l'oubli. Je n'oublierai pas ce que j'ai vu à Anvers. C'est une ville magnifique, et je suis sûr que les Belges sont de bons hommes. Mais je ne sais pas si je pourrai jamais oublier les horreurs de la guerre. C'est une chose que je ne pourrai jamais oublier. »

Le chirurgien principal de l'armée française du Nord, à M. SEUTIN, médecin en chef de l'armée belge, à Bruxelles.

Mon cher camarade,

Au moment de rentrer en France avec l'armée, il me reste un devoir bien doux à remplir, c'est celui de vous offrir mes remerciemens pour l'empressement avec lequel vous êtes accouru nous prêter les secours de votre talent et de votre expérience. Nos blessés de l'hôpital d'Anvers n'oublieront pas plus que moi les soins assidus et affectueux que vous leur avez prodigues. M. l'intendant de notre armée, notre Conseil de santé savent déjà quelle part active vous avez prise à nos pénibles travaux, et en les en informant, je n'ai été que juste à votre égard.

Veuillez, mon cher camarade, recevoir, avec mes adieux, l'expression de mes sentimens de reconnaissance, d'estime et d'attachement.

ZINCK.

Blessés belges.

Les Belges, ne pouvant prendre part aux opérations du siège, ne s'exposaient pas non plus

au feu des Hollandais ; aucun militaire , parmi eux, ne reçut la moindre atteinte : quelques citoyens cependant furent blessés, par leur imprudence , ou par un funeste hasard. Des habitans d'Anvers , soit dans les rues, soit dans leurs maisons, reçurent des ricochets d'éclats de bombes ou d'obus. Un pauvre marchand, assis à son comptoir, fut tué de cette manière ; une femme aussi fut tuée sur la route , tout près des deux moulins , par le boulet ; un ouvrier eut la cuisse arrachée, sur la même route de Berchem à Anvers, à côté de l'ambulance générale ; et sur le chemin de Berchem à Saint-Laurent, tout près de l'ambulance de tranchée, un boulet encore emporta la jambe d'un autre ouvrier. Tous ces blessés ont été reçus à l'hôpital civil.

Blessés hollandais.

Les Hollandais, d'après les rapports du général Chassé, ont eu plus d'hommes tués que les Français, mais moins de blessés, en proportion.

Pendant toute la durée du siège, une centaine de Hollandais de la citadelle ont été tués, quatre cents à peu près ont été blessés ; plus de cent hommes encore ont été tués au combat de Doël , et parmi eux l'officier supérieur qui commandait le débarquement sur la plage, l'amiral

Leuwe Van Auduward : sa mort est une véritable perte pour la Hollande.

La plus grande partie des blessés transportables pendant le siège étaient transférés de la citadelle à la Tête de Flandre, et de là, successivement, dans l'intérieur de la Hollande, à Berg-op-Zoom. Du linge et de la charpie avaient été demandés par le général Chassé au maréchal Gérard, qui s'empessa d'envoyer ce secours matériel aux blessés hollandais : c'était un don généreux et digne des sentimens nobles du maréchal.

L'entassement des hommes dans les casemates, les intempéries de l'air, la fatigue excessive, les privations de tout genre, devaient être autant de causes morbides pour ces malheureux, et cependant il y a eu peu de malades : c'est un rapprochement à faire avec la position de nos soldats au milieu des tranchées remplies de boue, car parmi eux aussi très peu de maladies sont survenues.

Mais des influences pernicieuses paraissent s'être ajoutées aux blessures graves chez les Hollandais ; les amputations, par exemple, ont eu des résultats funestes, dont nous allons, du reste, analyser les causes : le 8 janvier, dix-huit amputés de la citadelle avaient déjà succombé, à Anvers. Il est hors de doute que le

mauvais état de leurs moignons ne fut pas la seule cause de ces déplorables résultats : la réaction morale y eut une grande part.

Les premiers blessés hollandais qui furent transportés à nos ambulances avaient été faits prisonniers dans le fort Saint-Laurent. Presque tous, très jeunes encore, faisaient peine à voir, tant leurs forces étaient épuisées : ils s'étaient endormis sur les brancards, et s'ils se réveillaient quelques instans, c'était plutôt pour nous demander de la nourriture ou du sommeil que du soulagement à leurs blessures. Ils supportaient ensuite toutes les opérations avec un courage impassible, comme s'ils n'avaient même plus assez de force pour sentir la douleur. J'ai cité l'observation si intéressante du Hollandais qui avait eu l'épaule droite et la main gauche fracassées par des coups de feu, et la poitrine, le ventre, le dos percés de plusieurs coups de baïonnette. Il n'exprima pas une seule plainte pendant la double amputation du poignet et du bras à l'épaule, et se rendormit après le pansement. Ce malheureux, atteint, en outre, d'une maladie de poitrine, a survécu à tant de complications.

Les quelques autres blessés du fort Saint-Laurent avaient reçu plus de coups de baïonnette que de coups de feu.

Tous nous témoignèrent une confiance absolue dans les soins que nous avions à leur donner. Deux nous intéressaient plus que les autres; ils étaient frères jumeaux et soldats du même régiment, décorés de la croix de bronze, blessés en même temps et couchés sur le même lit d'ambulance, ils s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre.

Dès la reddition de la citadelle, les chirurgiens en chef belge et français, MM. Seutin et Zinck, s'empressèrent d'envoyer des officiers de santé pour procéder à la translation des blessés hollandais à Anvers; mais la plupart devaient être transportés à Berg-op-Zoom, d'après un article de la capitulation. On avait organisé un vaste local, servant à l'école mutuelle, pour en faire la succursale de l'hôpital militaire.

Les blessés hollandais, transportés dès le 24 à Anvers, étaient au nombre de soixante environ, dans un état d'épuisement et de malpropreté extrêmes. Presque tous étaient amputés; quelques uns même avaient subi de doubles amputations; mais ces opérations, ainsi que les pansemens, rappelaient à peine les principes de la chirurgie. J'avais obtenu du chef d'état-major, le général Saint-Cyr, la permission d'entrer dès le lendemain dans la citadelle, pour

reconnaitre dans quel état s'étaient trouvés les blessés hollandais, et obtenir de leurs chirurgiens les renseignemens que je pouvais désirer (1).

On sait l'aspect qu'offrait alors la citadelle en ruines : pas un seul bâtiment qui ne fût détruit de fond en comble ; pas un pan de muraille encore debout qui ne fût criblé de projectiles ; partout des éboulemens et des toitures défoncées ; plus de chemins praticables ; tout le terrain jonché de balles et de boulets, d'éclats de bombes et d'obus, de poutres et de pierres, de cendres et de cadavres. Quelques feux de bivouac, épars ça et là, semblaient encore des foyers mal éteints de la ruine et de l'incendie.

En parcourant à pas lents cette scène de désastre, au milieu des soldats hollandais désarmés, amaigris, épuisés par la fatigue, mais courageusement résignés à leur sort, je rencontre enfin le chirurgien principal de la garnison, M. Croissant, qui autrefois avait servi dans les ambulances de la Garde impériale : il sait le

(1) Le malheureux colonel Deg*** m'avait prié de remettre en même temps une lettre au général Chassé : c'est la dernière qu'il avait pu dicter ; car, la nuit suivante, il fut atteint de tétanos, à la suite de ses onze blessures, et il succomba le troisième jour.

sujet qui m'intéresse le plus dans la citadelle, et me conduit d'abord devant les ruines du grand hôpital, où les blessés n'avaient pu trouver un asile sûr ; plusieurs même avaient été tués dans leurs lits par nos projectiles ou par des écroulements de murs. On voyait encore au milieu de ces débris de pierres, des débris d'hommes putréfiés, des troncs sans têtes, ou plusieurs têtes à côté d'un seul cadavre, et des membres épars. Nous allons à l'ambulance, qui avait remplacé l'hôpital ; mais cette ambulance, quel triste aspect elle présente à son tour ! Elle est reléguée dans des casemates étroites, basses, obscures et malsaines ; la lumière du jour n'y pénètre pas, une ou deux lampes éclairent à demi des grabats resserrés les uns sur les autres et tout tachés de sang. C'est là que sont couchés encore des blessés hollandais, c'est là que les chirurgiens ont dû accomplir leur pénible tâche, déplaçant un homme pour pouvoir approcher d'un autre, et obligés de se tenir courbés, à genoux par terre, et dans les positions les plus fatigantes. L'explosion des bombes et des obus tout autour des casemates d'ambulance et sur leurs blindages même, déjà défoncés dans plusieurs endroits ; le sifflement et le choc des balles et des boulets, lancés de nos batteries ; les décharges continues de l'artillerie

de la citadelle ; l'enseombrément, les craintes, l'anxiété des blessés ; les mouvements convulsifs des membres mutilés qu'il fallait couper ; le mauvais état ou la perte des instruments de chirurgie, ainsi que des appareils de pansement ; enfin les dangers de mort pour tous : telles étaient, en aperçu, les conditions déplorables où se trouvaient les chirurgiens hollandais, en présence de trois cent cinquante blessés entassés dans ces casemates d'ambulance.

Devra-t-on reprocher encore à nos malheureux camarades d'avoir fait une mauvaise chirurgie ? Devra-t-on les accuser aussi impitoyablement d'une coupable ignorance ? Ce n'est plus à moi à répondre.

Pertes de l'armée.

Dans aucune guerre, peut-être, on ne fit moins de pertes, en proportion de la multitude de projectiles lancés par la poudre à canon ; il faut en faire honneur surtout à l'habileté des opérations du génie : c'est le génie, en effet, qui a écarté une des causes de pertes les plus redoutables ; je veux parler de cette première nuit, qui pouvait devenir désastreuse pour nos travailleurs, tout à découvert, si l'ouverture de la tranchée n'avait pas été faite à l'insu des Hol-

landais. Deux autres circonstances de pertes pour l'armée étaient à craindre : d'abord le passage du fossé, dès que la brèche aurait été tout à fait praticable, et puis l'assaut. La capitulation a heureusement prévenu cette fin.

Il n'y a pas eu mille hommes tués ou blessés ; c'est un chiffre bien inférieur à celui qu'avaient donné quelques journaux mal informés. Le nombre des morts sur le terrain a été de cent six, celui des blessés de sept cents et quelques. D'après la moyenne proportionnelle, chaque journée mettait à peu près une trentaine d'hommes hors de combat. Il y a eu une centaine de morts et près de cinq cents blessés jusqu'au 20 décembre. Plus d'officiers ont été tués en proportion que de soldats, et plus d'officiers aussi ont été tués que blessés. MM. Grand***, Gan***, Cout***, Cor***, Gav*** et quelques autres ont éprouvé le funeste sort de la guerre.

Si le corps du génie a plus agi qu'aucun autre, c'est lui qui a essuyé aussi, proportionnellement, le plus de pertes. Tous les régimens, du reste, qui ont pris part au siège, ont eu à souffrir plus ou moins.

Il faut compter pour très peu de chose les pertes de l'armée par les attaques des Hollandais ; car la plus forte sortie d'une garnison, qui comptait près de cinq mille combattans, ne

fut pas de cent hommes, et ces sorties n'étaient jamais poussées loin. La journée du 4 décembre fut une des plus désastreuses pour nos soldats : la citadelle ne cessa, pendant dix heures consécutives, de lancer sur les ouvrages, mitraille, obus, bombes et boulets : c'était peut-être pour les Hollandais une réjouissance militaire, afin de fêter l'anniversaire de la naissance du prince d'Orange.

Les deux journées qui suivirent l'assaut du fort Saint-Laurent furent également meurtrières de notre côté : il y eut plus de cinquante blessés graves, et parmi les morts deux officiers du génie.

Au combat de Doël, nous eûmes une soixantaine de blessés, quelques uns très grièvement; cinq succombèrent peu d'instans après leur arrivée à l'ambulance de Béveren, et deux autres le lendemain. Plusieurs furent évacués de suite sur la France, et au bout de quelques jours on conduisit les autres à Anvers. Douze à quinze hommes de la division Sébastiani avaient été tués.

Inhumations.

Une mesure sage prescrivait d'apporter à l'ambulance de tranchée tous les hommes tués, pour que leur mort y fût constatée. Les mêmes civières,

placées de distance en distance dans les tranchées pour le transport des blessés, servaient à l'enlèvement des cadavres ou des débris mutilés.

On procédait ensuite à l'inhumation : Un petit cimetière, adossé à l'église Saint-Laurent, était favorable à cet effet : c'est là qu'ont été déposés presque tous les cadavres des soldats tués sur le coup, et il arrivait qu'en creusant la terre pour placer ceux-ci, on trouvait souvent d'anciens cercueils en possession du terrain; et même l'ouverture de la tranchée, dans cet endroit, avait mis à découvert des crânes et d'autres portions de squelette.

Il n'était pas toujours possible de transporter au cimetière les cadavres des soldats tués très loin de là ; on les enterrait alors dans les tranchées mêmes ou tout auprès.

Le règlement qui prescrivait d'apporter les cadavres à l'ambulance de tranchée refusait leur admission à l'ambulance générale.

Il serait à regretter que le temps et les localités ne nous aient point permis de faire les ouvertures cadavériques, si la nature des blessures n'avait pas suffi, généralement, pour expliquer la mort immédiate.

Mais, plus tard, à l'hôpital d'Anvers, on a peut-être négligé de faire les nécropsies dans

des cas qui pouvaient offrir beaucoup d'intérêt.

Maladies.

Un fait très important à noter, c'est que, pendant toute la durée du siège, il n'y a eu que fort peu de malades: excepté des fièvres intermittentes, nous n'observâmes point de maladies de poitrine ou autres. On pouvait craindre l'ophthalmie, puisqu'elle est généralement considérée comme endémique dans les Pays-Bas (1); mais il n'en fut rien, et néanmoins les travailleurs avaient presque continuellement les pieds dans l'eau et dans la boue. Si le siège s'était prolongé davantage avec les fatigues, les privations et la mauvaise nourriture, on aurait peut-être eu à redouter des épidémies de fièvres graves, ou de dysenterie; la division Sébastiani, sur la rive gauche de l'Escaut, aurait pu souffrir plus qu'une autre par l'inondation des polders, et quelles conséquences graves n'auraient pas résulté de là!

On n'a compté que mille seize malades dans toute l'armée, dont trois cent cinq fiévreux.

(1) J'ai recueilli sur cette maladie des observations que je publierai plus tard.

Etat moral des blessés.

Une des causes qui contribuent essentiellement à la terminaison heureuse ou funeste des blessures, c'est sans contredit l'influence morale : ses effets ont été très remarquables parmi les blessés d'Anvers. Tout le monde a parlé du courage de cette jeune armée, mise à l'épreuve par un genre de guerre inaccoutumé : eh bien ! ce courage, qui faisait face au danger, en soutenait aussi bien les conséquences. Combien j'aurais à citer d'exemples de force d'ame et de brave résignation ! Combien d'hommes ont subi les opérations chirurgicales les plus douloureuses avec un calme impassible, et quelquefois avec une gaîté à faire peine ! Je me rappelle un canonnier, qui se mit à chanter *la Parisienne* au moment de se faire couper la jambe. Un autre soldat, auquel nous venions de couper la cuisse, s'étonnait ensuite que cela ne fit pas plus de mal. Ceux-ci causaient avec nous pendant l'amputation, ceux-là nous demandaient pardon de crier ; presque tous, enfin, ont montré du courage à leur manière, du courage d'exaltation, ou du courage muet, résigné : celui-ci valait mieux. Les officiers, d'après leur plus haute intelligence, calculaient davantage les chances

de leur position, et se soumettaient avec plus de regret aux grandes opérations chirurgicales.

Une circonstance rare dans les combats, et qui a influé favorablement sur le moral des blessés, c'était la proximité des secours. J'ai vu à l'ambulance de tranchée beaucoup de soldats atteints de blessures légères, et qui nous demandaient l'autorisation de retourner à leurs batteries aussitôt après le pansement ; plusieurs même refusaient de venir à l'ambulance pour continuer leur service de tranchée. Sch***, sergent de grenadiers au 18^e, n'a pas voulu abandonner son poste, quoique blessé successivement au bras gauche et au bras droit. Schl***, grenadier du 25^e, a persévétré aussi à ne pas quitter la place, malgré une blessure grave, et la veille il avait eu son frère tué à côté de lui dans la tranchée. D'autres fois, les blessures les plus désespérées semblaient même exalter le courage de ces braves. Un jeune soldat est atteint d'un éclat de bombe, qui lui déchire le ventre ; il va expirer, et trouve assez de force pour faire entendre ces mots : « Je regrette mon vieux père, mes camarades et mon capitaine..... Je meurs !..... Vive la France !..... » Un autre du 18^e avait eu la cuisse emportée jusqu'au bas-ventre par un boulet ; il comprend sa position désespérée, donne la main à un de ses camarades, et s'ap-

prête à expirer, en s'écriant : « C'est de l'honneur d'être blessé comme moi ! » On retrouve encore toute cette énergie morale chez la plupart des vieux soldats invalides.

Quelques causes secondaires ont influé favorablement sur l'état moral des blessés : les dons de toute espèce, qui ont eu un mérite double de la part des anonymes, les récompenses, les pensions, les croix, les mentions honorables dans les ordres du jour. On avait promis officiellement les Invalides à tous les amputés ; mais la plupart ont préféré des pensions, parce qu'ils sont jeunes et tiennent à ne pas se séparer de leurs pays, ou de leurs affections de familles.

Il est une cause qui a produit des influences diverses sur l'état moral des blessés ; je veux parler des différentes visites qui leur ont été faites, soit aux ambulances, soit aux hôpitaux, et plus particulièrement à Anvers. Ces visites furent quelquefois trop nombreuses ou trop fréquentes : c'était une cause de gêne et de dérangement continuels pour les blessés. MM. les officiers s'en sont plaints ; et il a fallu une consigne sévère pour éloigner les indiscrets.

Les visites du roi des Belges, des princes français, du maréchal Gérard et de tous les officiers généraux, apportèrent constamment aux

blessés des encouragemens, des consolations ou des récompenses. Ces visites solennelles furent parfois suivies d'émotions vives ; mais c'étaient des émotions de plaisir et de reconnaissance.

— Ce n'est pas à nous de dire que les visites des chirurgiens français étaient toujours bien accueillies par les blessés. Le séjour de MM. Forget, Thomassin et Périer à Anvers a produit l'influence morale la plus heureuse comme la plus salutaire sur l'état des blessures, sans rien diminuer pour cela de la part l'honorable et bienfaisante qui revient à MM. les officiers de santé belges.

CHAPITRE II.

CONSIDÉRATIONS CHIRURGICALES.

Blessures en général.

Presque toutes les blessures du siège ont été produites par les armes à feu : boulets de canon, bombes, obus, biscaïens, balles et mitraille. Les plaies par armes blanches n'ont eu lieu que dans les sorties des assiégés, ou à la prise du fort Saint-Laurent.

Tous les Hollandais transportés à nos ambulances étaient atteints de coups de sabre, et plus souvent encore de coups de baïonnette : l'un de ces malheureux en était pour ainsi dire lardé, après avoir été frappé de deux coups de feu qui lui avaient fracassé l'épaule droite et la main gauche.

Sont rangées parmi les plaies d'armes à feu celles qui ont été faites par des éclats de bois ou de pierre ; car ces projectiles étaient mis en mouvement par la poudre à canon ; leurs effets n'étaient cependant pas les mêmes et pouvaient permettre la réunion des plaies.

Plusieurs hommes ont été assez grièvement blessés par des fragmens de terre ; quelques uns

ont perdu la vue par la force de la commotion.

Des blessures ont été faites par maladresse ou par mégarde : des coups de feu, des explosions de poudre, des confusions, des chutes, etc. Je n'en dirai rien, non plus que de quelques blessures en duel.

Quant aux blessures supposées volontaires chez quelques uns de nos soldats, soit dans le but de les faire valoir à leur avantage, soit par un sentiment de crainte en présence de l'ennemi, je pourrais prouver que c'est une insinuation calomnieuse, si mon père n'avait lui-même honorablement réfuté une accusation de ce genre, dans une circonstance solennelle.

Blessures d'armes à feu.

Les plus dangereuses des plaies contuses, les blessures par armes à feu, sont encore les plus variées, les plus singulières, et souvent les plus nouvelles ; car, malgré les nombreux écrits que nous possédons sur la chirurgie militaire, il est encore difficile de connaître, dans toutes leurs particularités, les effets des projectiles lancés par la poudre à canon. Les chocs directs, indirects, en retour ou par ricochet, déterminent des lésions que l'on ne peut expliquer toujours ; c'est principalement dans les cavités os-

seuses, comme le crâne, le thorax, le bassin, que les projectiles sont susceptibles des déviations les plus extraordinaires.

Les blessures d'armes à feu sont variées à l'infini, selon l'espèce de projectile, la vitesse ou la force d'impulsion, la distance, les parties atteintes, la position du corps, et les obstacles intermédiaires de toutes sortes.

Il est inutile de répéter ici des détails exposés dans les ouvrages de chirurgie militaire : l'attrition des parties molles, l'escharre pathognomonique, la cessation spontanée des hémorragies, etc., sont des phénomènes depuis long-temps observés et décrits. J'ai été à même de constater un fait indiqué déjà, c'est que très souvent les lésions les plus légères sont celles qui causent les plus vives douleurs; tandis que les lésions les plus graves ne sont presque jamais proportionnées à la souffrance, tant il y a de commotion, de stupeur: c'est pour cela que j'appellerais volontiers *blessures latentes* celles qui n'offrent aucune trace extérieure, et ne se déclarent par aucun signe de douleur. Nous avons remarqué que les plaies à découvert inspiraient aux blessés plus de confiance dans les rigueurs de la chirurgie, que des lésions plus profondes, mais inappréciables pour eux.

Les blessures observées sur nos soldats ont

été, jusqu'à un certain point, en rapport avec les opérations du siège. Les boulets de canon, par exemple, étaient plus à redouter, dans les premiers jours, que les bombes et les obus, parce que toutes les tranchées, n'étant pas pratiquées, laissaient davantage nos hommes à découvert, exposés aux boulets, et leur permettaient de se garantir plus au large des éclats de bombes et d'obus. Il est vrai aussi que ces derniers projectiles ont été ménagés d'abord ; le contraire a eu lieu pendant la suite du siège. Vers la fin, ou à petite distance, il y a eu un grand nombre de blessés par les fusils de rempart et les petits mortiers, qui ont fait beaucoup de mal. Enfin, les fusils de munition ont presque seuls agi à l'affaire de Doël. Nous avons eu bien plus de blessés le matin que le soir, parce que les assiégés redoublaient alors leur feu, afin de détruire nos travaux de la nuit, et parce qu'ils profitaient de l'heure à laquelle nos troupes étaient relevées.

C'est à la partie supérieure du corps, et plus souvent à gauche qu'à droite, que la majorité des blessures a été observée, pendant toute la durée du siège.

Les blessures observées sur nos soldats ont

Brûlures (1).

Les explosions de poudre ont causé des brûlures aux premier, deuxième et troisième degrés. La face et les mains, étant les seules parties exposées à l'air, ont le plus souffert. Le traitement général de ces brûlures a été fort simple : quelques saignées, des pansemens rares, des boissons émollientes et un régime sévère ont ordinairement suffi. La suppuration a été assez abondante dans certains cas, et presque toujours les brûlures du visage ont été suivies d'une bouffissure lente à disparaître. Elles laissaient des marques indélébiles de grains de poudre, implantés dans la peau, parce que cette portion de la poudre non enflammée est mise en mouvement par celle qui s'enflamme et agit comme corps étranger, avec cette différence qu'on ne peut l'extraire. On a comparé ces marques indélébiles à celles du tatouage.

Plusieurs de nos soldats étaient réunis dans un petit fort abandonné par les Hollandais,

(1) Je regrette que le plan de ce travail ne me permette que de citer les savantes leçons du professeur Dupuytren sur les brûlures.

qui, en se retirant, avaient caché sous la paille une longue traînée de poudre : elle fit explosion au feu du bivouac ; cinq hommes furent plus brûlés que les autres. (Voir *blessures de la face.*)

Mutilations.

Si la chirurgie possède de grandes ressources, elle est réduite quelquefois à la triste alternative de rester dans une impuissance absolue, ou d'accélérer une mort inévitable. Soit un boulet de canon, qui arrache un membre du tronc, ouvre la poitrine, déchire le ventre ; soit une bombe, ou un obus qui éclate sur un seul homme, et le couvre de blessures : mutilations épouvantables, mélange affreux de lambeaux qui laissent encore aux victimes de la guerre un reste de vie ; mais ce reste de vie n'est que l'horreur de se sentir mourir ; et la mort, ce n'est pas la perte du sang, car toute hémorragie peut cesser spontanément au milieu de ces plaies larges et profondes ; ce n'est pas non plus la mutilation elle-même : c'est la secousse violente, c'est le choc qui ébranle, qui renverse comme un coup de massue ; c'est enfin la commotion au plus haut degré, la commotion qui la donne.

Oui, très peu d'hommes y survivent : heureux encore s'ils n'ont plus la conscience de leurs derniers instans ! J'ai vu, à la tranchée, un artilleur que l'on nous apportait sur un brancard recouvert. « Coupez-moi le bras, s'écria-t-il, je souffre en damné ; coupez-moi le bras !... Pour quoi chercher ailleurs ? Je n'ai pas d'autre blessure. » Ce malheureux avait eu effectivement l'avant-bras emporté par un boulet de canon ; mais il avait eu aussi le ventre ouvert ; les intestins retombaient sur ses cuisses et il ne s'en apercevait pas. Il a survécu cinq heures.

Que faire dans ces pénibles circonstances ? La médecine opératoire devient inutile ; il faut de la médecine morale, des paroles de consolation et d'encouragement pour ces pauvres mutilés, qui ont souvent plus de courage que l'on n'ose leur en demander.

Je dirais que la mort d'un tétanique me paraît seule plus affreuse, si le téanos ne venait pas quelquefois compliquer ces mutilations elles-mêmes, comme chez le colonel Deg***.

Il ne s'ensuit pas pourtant que toutes les grandes blessures soient inaccessibles aux ressources de l'art. On voit des mutilations affreuses de la face se simplifier et guérir entre les mains d'un chirurgien habile, et par les efforts si puissans de la nature. L'observation

de L***, amputé d'un membre et mutilé au visage, en est la preuve la plus remarquable. Des mutilations ou arrachemens des membres parviennent aussi à une guérison sûre, après l'amputation secondaire. Tel fut le sort du lieutenant d'artillerie Ch***, qui eut un bras emporté par un boulet et le moignon a mputé. Je pourrais indiquer ici d'autres faits analogues, que je préfère laisser à leur place dans cette relation.

Je ne citerai que les principaux cas de mutilations mortelles.

Bon***, 61^e de ligne, 12 décembre. Arrachement de la totalité de l'épaule droite par un boulet; détritus du scapulum et de l'humérus; éclat de mitraille à l'œil gauche.

C***, 52^e de ligne, 7 décembre. Fracture de l'articulation du coude; contusion violente à l'hypocondre droit; plaie large et profonde à la cuisse gauche; lambeau triangulaire de six pouces de long sur quatre de large, comprenant toute l'épaisseur des muscles de la cuisse, au niveau du fascia lata, par un éclat de bombe.

Cr***, 18^e de ligne, 9 décembre. Arrachement de la cuisse gauche en totalité, jusqu'au col du fémur, par un boulet.

Gr***, capitaine d'artillerie, 22 décembre. Abla-

tion de la partie supérieure droite du thorax et de toute l'épaule, par un boulet.

Ha***, 61^e de ligne, 20 décembre. Dilacération complète de la cuisse gauche, à son quart supérieur, jusqu'au milieu de la fesse, par un éclat de bombe.

P***, 18^e de ligne, 9 décembre. Ablation totale de l'avant-bras droit, par un boulet; événtration complète de l'une à l'autre crête iliaque; hernie des viscères abdominaux restés intacts. (Les tégumens étaient aussi nettement découpés que pour une autopsie cadavérique.)

Pro***, 18^e de ligne, 18 décembre. Fracas de l'articulation coxo-fémorale gauche, et dilacération des parties molles jusqu'au bas-ventre, par un boulet de canon.

Un canonnier du 1^{er} d'artillerie. Dilacération des deux cuisses à leur tiers supérieur et interne, par un éclat de bombe; arrachement des tissus, sans fracture ni hémorragie, malgré la section complète des deux artères fémorales par le projectile.

Tous ces hommes sont morts presque immédiatement.

Je n'ai pas à parler de ceux qui ont été tués sur le coup, tels que les officiers Cor***, Cou***, Gan***, Gav***.

Blessures multiples.

Un seul homme peut être atteint de plusieurs blessures : à la tête, à la poitrine, à l'abdomen, aux membres ; dans quelle catégorie rangerait-on l'observation chirurgicale qui le concerne ? Sa place, il me semble, doit être déterminée d'après la lésion la plus grave.

De toutes les blessures multiples, il n'en est pas de plus compliquées que celles du colonel Deg***. Dans des cas analogues, ce sont de véritables mutilations, parce que leur conséquence est presque toujours la mort. Nous avons néanmoins constaté rarement cette funeste terminaison des blessures multiples ; les plus fréquentes ont été celles des membres par la mitraille. Les blessés hollandais en ont été atteints plus souvent que les nôtres ; et la raison de ce fait, c'est que les soldats hollandais ne quittaient point la place pour être remplacés. Presque tous les blessés de la lunette Saint-Laurent avaient reçu, chacun, plusieurs coups de baïonnette. Nous avons cité quelques uns de nos braves qui, après une première blessure, ayant refusé d'abandonner leur poste de tranchée, avaient été frappés d'un nouveau coup de feu.

Je rapporte ici la seule observation qui ne puisse trouver place ailleurs.

M. Deg***, colonel d'état-major de l'armée hollandaise, fait prisonnier avec la garnison, et transporté à l'hôpital d'Anvers. Taille colossale, embonpoint énorme. Blessé le 22 au soir par plusieurs éclats de bombe, il avait été, antérieurement, atteint d'une forte contusion au genou. Onze blessures à la fois : plaie traversant le tiers moyen et externe de la cuisse gauche par un éclat d'obus ; ouverture d'entrée arrondie au tiers inférieur et externe ; ouverture de sortie inégale, déchirée à l'union du tiers supérieur avec le tiers moyen. Écorchure large comme la paume de la main, au mollet de la jambe droite. Dilacération, avec perte considérable de substance, à la partie postérieure et interne de la cuisse droite, depuis le jarret. Autre plaie large, profonde de quatre pouces environ, inégale, déchirée, fortement contuse, à peu de distance de la précédente, au dessus du genou. Plaie contuse de l'avant-bras droit, à sa partie antérieure, dans toute l'étendue de son diamètre transversal. Forte contusion du coude. Plaie contuse, peu étendue, à la partie latérale droite et inférieure du thorax ; enfin, plusieurs contusions dans d'autres parties du corps ; mais, chose singulière, pas un seul os fracturé. Transport

à l'hôpital militaire d'Anvers, le 23; pansement des blessures par M. Seutin, aidé d'un jeune chirurgien hollandais. Pas d'accident notable pendant quatre jours. Le 28 décembre au soir, hémorragie abondante par l'artère radiale; ligature de ce vaisseau. Quelques heures après, trismus violent; resserrement des mâchoires; renversement du cou en arrière; contracture des muscles du visage; progrès effrayans du tétanos: tout le système musculaire de la face, du cou, de la poitrine, du ventre, du dos et des membres est saisi de raideur et de contractions tétaniques. Emploi inutile des anti-phlogistiques et des opiacés. Mort au milieu de la nuit, dans les plus cruelles souffrances.

Je regrette de ne pouvoir donner plus de détails à cette observation, intéressante sous plusieurs rapports, savoir : la multiplicité des blessures par la même cause vulnérante; leur nature identique, contusions ou plaies contuses; point de fractures, point d'accidens primitifs; l'invasion du tétanos traumatique, et sa terminaison aussi rapide que funeste.

J'ai vu le colonel Deg***, le lendemain de sa translation à Anvers; il paraissait calme et résigné à son sort. Sa perte sera long-temps regrettable pour l'armée hollandaise.

Complications.

Une transition simple nous amène à parler des accidens qui ont compliqué les blessures par armes à feu, soit avant, soit après les grandes opérations chirurgicales.

Inflammations locales. L'étranglement des tissus a eu lieu, surtout lorsque les débridemens avaient été incomplets. J'ai parlé ailleurs de l'étranglement spécial des moignons par la constriction forcée des bandelettes agglutinatives. (Voir *Amputations.*) Les inflammations locales se sont terminées le plus ordinairement par résolution ou par suppuration. Quelques cas de suppurations colliquatives ont compliqué des fractures graves.

Inflammations sympathiques. Une des complications inflammatoires le plus souvent fatales, et sur laquelle Guthrie, après plusieurs de nos compatriotes, a fixé l'attention des chirurgiens d'armée, c'est l'inflammation profonde de certains viscères, le poumon, la rate, et plus spécialement le foie. La cause de cette réaction n'a pas encore été expliquée d'une manière satisfaisante.

On a aussi constaté à Anvers des inflammations graves des voies digestives, déterminées par des écarts de régime.

Gangrène traumatique. Cette fâcheuse complication a été rare parmi nos blessés; M. Larrey, qui a beaucoup observé la gangrène traumatique, a exposé les signes différentiels de cette gangrène et de la pourriture d'hôpital. Nous rapportons une observation fort remarquable qui a offert à la fois quelques uns des signes de ces deux complications. (Voir l'observation de Ma*** : *Plaies de la cuisse.*)

Pourriture d'hôpital. Un assez grand nombre de blessures ont été compliquées de pourriture d'hôpital à différens degrés : suppressions passagères ou prolongées de la suppuration; aspect grisâtre, consistance couenneuse, odeur fétide de la matière purulente; développement d'un point gangreneux au centre de la plaie, et progrès d'extension vers les bords, qui se tuméfient, prennent une teinte violacée ou rougeâtre, et deviennent le siège de douleurs vives : tels sont les signes que la pourriture d'hôpital a présentés le plus fréquemment chez nos blessés. Il est inutile de dire ici que cette complication peut revêtir différentes autres formes, signalées dans les traités de chirurgie.

L'encombrement des blessés, considéré comme cause déterminante de la gangrène d'hôpital, ne paraissait pas exister à Anvers. L'emploi du chlorure d'oxyde de sodium a suffi, dans la plu-

part des cas, pour prévenir ses fâcheuses conséquences.

Contusions. Plus étendues, plus profondes, en général, que les contusions produites par d'autres causes, les contusions par armes à feu cachent souvent des lésions très compliquées, sans traces extérieures. Il existe une foule de nuances, depuis la contusion la plus légère, qui s'efface et disparaît, jusqu'à la contusion la plus forte, qui ébranle tout le corps et tue tout à coup. Nous avons été à même d'observer ces effets si divers de la contusion : douleurs à tous les degrés, engourdissement, gonflement inflammatoire, ecchymose, épanchemens, infiltrations et tumeurs sanguines, étranglemens et déchirures, attrition profonde des tissus sous-cutanés, fractures de tout genre, abcès, ulcérations, gangrènes des tégumens, suppurations abondantes, et tous les accidens de réaction.

Des chirurgiens militaires, M. Gama, par exemple, prétendent que certaines plaies d'armes à feu ne sont accompagnées d'aucune contusion ; il serait difficile d'analyser ces cas dans un simple aperçu.

Commotion. Elle n'atteint pas seulement les parties lésées, elle peut retentir dans toute l'économie ; et ses effets sont d'autant plus dangereux qu'ils portent sur des organes plus essen-

tiels, tels que le cerveau, la moelle épinière. Depuis Ambroise Paré, qui, le premier, a fait connaître ce qu'est la commotion, on a beaucoup étudié ses phénomènes nombreux et variés; car il est bien important de rechercher dans une blessure par arme à feu autre chose que la lésion apparente, soit plaie, soit fracture ou hémorragie, etc. : il faut rechercher les effets de la commotion, les troubles fonctionnels qui surviennent dès lors en sont presque toujours la conséquence. C'est donc à une médication rationnelle de seconder le traitement local de la blessure. Les grandes opérations chirurgicales doivent être différées tant que dure l'état de stupeur résultant de la commotion, ou, en d'autres termes, jusqu'à ce que la réaction se fasse par les efforts de la nature ou par le secours de l'art. Ce précepte, donné par nos grands-maîtres, a été suivi à Anvers.

Je ne rapporterai pas de fait spécial à propos de la commotion, puisqu'elle est elle-même une conséquence de la plupart des blessures par armes à feu. Un grand nombre de nos observations signalent ses effets, qui pourraient être confondus parfois avec ceux de la contusion.

Tétanos. Il n'est pas de complication des plaies plus souvent imprévue dans son inva-

sion, plus rapide dans sa marche, plus fatale dans sa terminaison, que ne l'est généralement le tétanos. Malgré la multitude des recherches nécroscopiques, on n'a pu préciser encore le siège de cette effrayante maladie, et malgré le grand nombre de moyens thérapeutiques essayés, on ne possède pas de médication sûre à lui opposer. Il est de fait néanmoins que la mort des tétaniques n'est pas aussi certaine aujourd'hui qu'elle l'était autrefois. On compte dans la science des cas de guérison remarquables, et nos grands-maîtres dans la chirurgie militaire peuvent en revendiquer une partie. Nous rapportons un des faits les plus extraordinaires de ce genre, c'est l'observation de Len***.

Il ne s'est présenté aucun cas de tétanos pendant toute la durée du siège, tandis qu'après il en est survenu six bien caractérisés. Il faut croire que les variations brusques de la température, à cette époque, ont déterminé le développement de cette funeste complication.

Nous rappelons que le colonel hollandais, M. Deg***, a succombé dans le tétanos à ses onze blessures. Gris** avait eu toute la moitié de la face emportée par un éclat de bombe: il était parvenu au dixième jour sans aucun accident fâcheux; il fut saisi alors d'opisthotonos, et mourut au bout de quelques heures.

Lé***, amputé de la jambe ; Gaut***, atteint d'un coup de feu à l'articulation du coude, et d'un autre à la jambe ; Len***, amputé du bras ; et Bret***, amputé de la cuisse : ceux-là encore ont été atteints de tétonos. Tous les six se sont trouvés à l'hôpital d'Anvers à des époques différentes ; tous les six ont reçu des officiers de santé belges les secours indiqués ; mais tous les six semblaient destinés à périr. Un seul, avons-nous dit, a survécu ; un seul, et ce n'est pas parce que la maladie était moins violente que chez les autres, c'est parce qu'elle a été plus hardiment combattue. Quatre saignées syncopales, cent trente sangsues sur le rachis, au niveau des vertèbres cervicales, et plus de cent cinquante grains d'acétate de morphine, administrés par la méthode endermique : telle fut la base du traitement qui a sauvé la vie au malheureux amputé du bras, et l'honneur de cette cure appartient à M. Forget. Cette observation a été rédigée avec le plus grand soin par M. Périer. (Voir *Amputations humérales, Obs. de Len****.)

Hémorrhagies. Un préjugé très répandu dans le monde fait croire que les plaies d'armes à feu ne saignent pas immédiatement ; mais si des faits réels confirment cette opinion, combien d'autres prouvent le danger des hémorrhagies pri-

mitives à la suite de ces blessures ! Et bien plus, il y a souvent alors des hémorragies presque immédiates , sans que des artères considérables aient été lésées.

L'hémorragie est plus forte si une artère principale est divisée partiellement que si elle a été tout à fait rompue, parce que , dans ce dernier cas, le vaisseau éprouve une sorte de torsion et de refoulement par la force contondante ou l'attrition ; sa tunique interne se déchire et se tortille en tire-bouchon , de manière à oblitérer l'orifice de l'artère. Ce résultat ne s'explique pas seulement d'après la théorie et les expériences nombreuses qu'on a pu faire sur la torsion , mais d'après la simple observation des faits. Nous avons pu nous en convaincre dans quelques cas de mutilation des membres , après avoir reconnu qu'il n'y avait pas eu d'hémorragie primitive. Le fait le plus intéressant, en ce genre, est celui-ci : Un canonnier ayant les jambes écartées près d'une pièce, qu'il s'apprêtait à écouvillonner , est atteint d'un éclat de bombe , qui passe entre ses deux cuisses , d'arrière en avant, et déchire , dans leur tiers moyen , toutes les parties molles du côté interne et postérieur de ces membres , sans fracturer un seul des fémurs. Aucune hémorragie n'a lieu, et néanmoins les deux artères fémorales, complé-

tement divisées, apparaissent au milieu de ce délabrement des chairs, avec des mouvements tout à fait érectiles; les pulsations de l'une et de l'autre étaient très perceptibles dans le bout supérieur jusqu'à trois ou quatre lignes de son extrémité: là se faisait sentir une sorte de résistance à la pression, comme si un corps étranger bouchait l'orifice des deux artères: c'était une véritable torsion. On aurait pu se dispenser de tout autre moyen hémostatique; M. Forget crut plus prudent de faire la ligature des deux artères, et il y parvint sans la moindre difficulté. J'en séparai les bouts, et, après les avoir fendus, je reconnus le phénomène exact de la torsion, tel que me l'avait démontré M. Amusat; mais la mutilation était mortelle, le malheureux artilleur n'y survécut pas plus d'un jour.

Les hémorragies consécutives ont ordinairement lieu à une époque d'affaiblissement; tantôt elles sont spontanées, imprévues, tantôt on les observe à la chute des escharres, ou bien elles surviennent à la levée de l'appareil, pendant des mouvements inconsidérés, par des tractions forcées sur les fils de quelques ligatures, comme il est arrivé deux fois à l'hôpital d'Anvers, sans conséquence fâcheuse.

Ces hémorragies ne se font pas toujours en

jets saccadés; elles sont fréquentes par suintement, quoiqu'elles proviennent des artères, et ce sont ces hémorragies en nappe qui sont souvent les plus dangereuses, parce qu'étant difficiles à arrêter, elles épuisent davantage les blessés.

L'hémorragie consécutive peut être exclusivement veineuse: j'ai eu occasion de l'observer à la suite des amputations.

L'hémorragie peut provenir d'une artère nourricière, sans qu'il soit possible de l'arrêter immédiatement. C'est la complication qui s'est offerte chez Bret***, amputé de la cuisse, ayant qu'il fût atteint du tétanos.

Quelle que soit, du reste, l'hémorragie, artérielle ou veineuse, primitive ou consécutive, elle réclame les secours les plus prompts et les mieux dirigés; il importe de surveiller les blessés, et d'avoir sous la main des moyens hémostatiques variés, pour suppléer à l'insuffisance des uns par l'efficacité des autres: je crois inutile de les mentionner ici,

Projectiles.

Les boulets, les bombes, les obus, la mitraille (morceaux de fer, de bois, de pierre), les pots à feu, les biscaïens et balles de rempart, et les balles de différens calibres, tels sont les

projectiles dont nous avons observé les funestes effets : disons quelques mots de chacun d'eux.

Tout le monde sait que les blessures par le boulet sont fatales, lorsqu'elles atteignent le tronc ; elles peuvent ne pas l'être quand elles frappent les membres. Il faut tenir compte de la direction et de la force d'impulsion : les boulets lancés à plein fouet ou par ricochet sont ceux qui font le plus de ravages. Les blessures mortelles sont fréquentes, sans lésion apparente, et l'on a reconnu combien est fausse la théorie du vent du boulet. Levacher l'avait déjà démontré par des raisonnemens qu'une foule de faits ont confirmés depuis, malgré des assertions contraires. En effet, les désordres des organes intérieurs, sans lésion des téguments, ne sont-ils pas admissibles par deux raisons évidentes ? Et d'abord l'élasticité de la peau et des tissus sous-cutanés cède à une force contondante, comme celle du boulet ; tandis que les parties plus profondément situées, plus adhérentes entre elles, plus fermes, ne peuvent s'affaïssoir et se déchirent ; tandis que les os, privés d'élasticité, se rompent, se brisent en morceaux. Et en second lieu, un boulet n'emporte-t-il pas une partie du corps plus saillante que les autres, sans que celles-ci éprouvent aucune atteinte que de la commotion directe ? Il

n'est pas besoin d'insister davantage sur cette ancienne théorie, aussi fausse que celle de l'échauffement des projectiles.

Le boulet fait assez de mal par lui-même sans qu'on doive ajouter à son action celle d'une cause imaginaire. Le même boulet a blessé le lieutenant-colonel Ma***, de l'artillerie, tué le chef d'escadron Gan***, tué le capitaine Gra***, et blessé un canonnier. Il est de fait que les artilleurs hollandais pointaient avec une justesse effrayante. Deux de nos soldats ont été tués par un boulet, en marchant le long de l'épaulement des tranchées, au lieu de descendre dans le boyau. J'avais imprudemment pris le même chemin, quelques instants avant eux, pour revenir à l'ambulance.

Presque toutes les mutilations des membres ont été produites par le boulet. Le lieutenant Char*** a eu le bras droit emporté; deux malheureux ouvriers belges, inoffensifs, ont eu la jambe et la cuisse arrachées par des boulets; d'autres encore que nous citons ailleurs.

Entre toutes les contusions mortelles sur le coup par le boulet, je ne fais que rappeler le nom du capitaine Cout***, qui succomba au choc d'un boulet à la poitrine, sans lésion extérieure.

Les bombes et les obus, en éclatant, ont fait des ravages. Une chance bizarre, par ses con-

trastes, se faisait remarquer : trois bombes et un obus tombent une fois, tout en même temps, dans une tranchée remplie de monde, et personne n'est blessé. Une autre fois, une seule bombe de nos batteries éclate dans la citadelle, atteint deux Hollandais et fait onze blessures au colonel Deg***.

Les plaies par éclats de bombes et d'obus offrent plus de dangers que celles qui sont produites par des projectiles arrondis, parce qu'il y a dislocation des tissus; ces éclats, quoique très volumineux, peuvent s'arrêter dans l'épaisseur des chairs. On a fait, à l'ambulance de tranchée l'extraction d'un énorme éclat de bombe, entièrement caché dans la cuisse d'un soldat du 65^e: un cas à peu près semblable s'est rencontré à l'ambulance de Berchem.

Les éclats de mitraille présentent moins de volume que les éclats de bombes et d'obus, et ils ont une surface plus irrégulière, qui déchire les tissus: morceaux de bois, morceaux de fer de toute espèce, clous, serrures, clefs, etc., pierres, fragmens d'autres projectiles, voilà la mitraille des Hollandais. Les petits mortiers, les pots à feu, les pierriers ont fait beaucoup de mal de part et d'autre.

Les biscaïens et les balles de différens calibres laissent une cavité dans les os, une

bres en fer ou en plomb (1) ont produit des blessures toutes différentes, c'est à dire qu'elles traversaient de part en part, sans dilacérations profondes. Nous avons pu vérifier un fait reconnu aujourd'hui, c'est que l'ouverture d'entrée est proportionnée au volume de la balle, quelquefois même plus étroite, et que l'ouverture de sortie est plus grande. Doué en effet de toute sa force, le projectile pénètre sans obstacle, tandis que pour sortir il a perdu de son impulsion, et presse devant lui quelque portion des tissus qui tendent eux-mêmes à déchirer les bords de l'ouverture de sortie. Cependant le contraire peut avoir lieu; contentons-nous de l'admettre comme fait, parce que l'examen de la théorie exigerait trop de détails.

Les deux ouvertures ne sont pas toujours diamétralement opposées; elles peuvent exister dans un point très-rapproché, ou bien à des distances inouïes, et sans le moindre rapport de direction. Rien n'est plus varié, plus inattendu que les déviations de ces projectiles. Nous l'avons dit, et tous les traités de plaies d'armes à feu en

(1) Je ne crois pas que l'on ait fait usage de balles de cuivre ni de balles de pierre, comme nous l'avions vu à la révolution de juillet.

donnent des explications plus ou moins satisfaisantes.

Une seule ouverture indique la présence d'un corps étranger, qui, pourtant, peut être ressorti. Différentes ouvertures peuvent être faites par différentes balles ou bien par les éclats d'une seule; une portion peut rester, l'autre sortir. Un fusilier du 8^e de ligne, à Doël, placé au premier rang, un genou en terre, est frappé à l'autre genou fléchi par une balle qui se sépare en deux sur la rotule; les deux portions du projectile pénètrent dans la cuisse, l'une d'elles en ressort, et l'autre s'y arrête; elle en fut extraite. Ce fait singulier n'est pas unique: une autre blessure, assez bizarre, est celle de M***. La balle perfora d'abord la main, puis les tégumens de l'aine et l'épaisseur de la fesse gauche; il en résultait six ouvertures.

Des balles d'un petit calibre causent parfois des blessures plus graves que des balles plus fortes. Nous avons vu des fractures comminutives par des balles de fusil, et des fractures simples par des biscaïens et des éclats de bombes.

Les portions de vêtement poussées par les projectiles, et surtout par les balles, qui s'en coiffent, pour ainsi dire, et forment ce qu'on appelle le doigt de gant, peuvent les contenir jusqu'au

fond des tissus. La blessure du sous-lieutenant Mag*** en est un exemple remarquable. *avant*
ajoutons que près de soixante mille projectiles de gros calibre ont été lancés de nos batteries sur la citadelle, et trente-deux mille des batteries hollandaises sur les tranchées; qu'une soixantaine de bombes ou d'obus sont tombés dans l'intérieur de la ville, et ont causé plusieurs accidens funestes; que quelques boulets lancés à plein fouet ont été perdus au delà des tranchées, du côté du camp, à l'extrémité de Berchem; d'autres, dans l'Escaut; plusieurs enfin, dans la campagne environnante.

Débridemens.

La nécessité des débridemens n'est pas encore reconnue par quelques praticiens, tels que des chirurgiens anglais, d'après Hunter, Hennen, Thomson, etc., et plusieurs de nos chirurgiens modernes, d'après M. Lisfranc; mais un bien plus grand nombre d'autorités chirurgicales donnent un avis contraire, et recommandent les débridemens dans toutes les circonstances suivantes:

Plaies superficielles avec ecchymose; déchirure des tégumens; attrition des tissus sous-cutanés;

plaies profondes, avec ou sans complications primitives ; lésions des nerfs, des tendons, des aponevroses, et leur étranglement ; déchirure des parties musculaires ; épanchemens ou infiltrations de sang, de pus ; hémorragies primitives ou consécutives ; plaies compliquées de fractures ; enfin présence évidente ou supposée de corps étrangers, projectiles, portions de vêtement, esquilles, etc. C'est dans cette dernière circonstance que les débridemens sont le plus indispensables ; nous en avons acquis la preuve. Ils n'ont pas seulement pour avantage de produire des dégorgemens salutaires, de prévenir des accidens consécutifs, de faciliter l'extraction des corps étrangers ; ces débridemens sont encore une ressource pour la conservation de quelques membres qu'autrement il faudrait amputer. On ne doit pas craindre de débri-der largement et d'une main assurée ; faute de ce soin, nous avons constaté quelques accidens nerveux ou inflammatoires dus à l'étrangle-ment des tissus. Je me rappelle un voltigeur du 65^e qui avait reçu un coup de feu au genou gauche ; la plaie paraissait tout à fait simple, on se contenta de la débrider à demi et superficiellement. Des accidens locaux fixèrent bien-tôt notre attention ; un débridement plus com-plet fut pratiqué : il y avait une balle enclavée

dans le condyle interne du fémur; l'extraction en fut faite, et les accidens disparurent peu à peu.

Extraction des corps étrangers.

Le plus puissant motif des débridemens étant l'extraction des corps étrangers, celle-ci doit être tentée primitivement, mais jamais avec trop d'efforts, il en résulterait des dangers; on fait quelquefois mieux d'attendre, ou d'en laisser le soin au travail de suppuration. Les doigts, autant que possible, ou les pinces ordinaires, sont préférables à tous les instrumens, trop multipliés à cet effet. La sonde cannelée ou la sonde de femme est aussi très utile pour reconnaître le siège et les rapports du corps étranger, qui peut changer de place et se perdre dans l'épaisseur des tissus. J'ai cité une blessure de la cuisse, toute simple en apparence, et qui renfermait un énorme éclat d'obus. Une autre fois, fut extrait un gros morceau de bois informe, entièrement caché dans l'épaisseur de la fesse.

On ne peut, dans certains cas, ajourner les tentatives d'extraction, quelque difficile qu'elle soit. M. Forget a eu assez de peine à extraire une balle qui s'était enclavée dans la grosse tubérosité du tibia. (Voir *l'Obs. de Did***.*) Un jeune

sous-officier du génie fut atteint à la figure d'un fragment de biscaïen, qui s'enclava dans l'os de la pommette; j'étais à l'ambulance de tranchée, et, malgré le débridement, je ne parvins qu'avec difficulté à faire l'extraction du projectile. Une autre fois, je dus employer des efforts pour extirper du tibia un grand clou qui s'y était implanté perpendiculairement. Or, il est évident que, dans des cas analogues, on ne saurait trop tôt extraire les corps étrangers.

Il est, du reste, un fait d'observation notable, c'est que nous avons eu très peu de projectiles à extraire, non seulement en proportion de tous ceux qui ont été lancés, mais même en proportion de tous ceux qui ont porté coup. La raison de ce fait, c'est que presque toutes les plaies étaient pénétrantes de part en part.

Les circonstances qui exigent des débridemens nécessitent souvent des contre-ouvertures; mais n'insistons pas davantage sur ce sujet.

Opérations chirurgicales.

Il faut rapporter à trois points principaux les opérations chirurgicales du siège. Et d'abord, avons-nous dit, on n'a fait à l'ambulance de tranchée que la petite chirurgie de champ de bataille : débridemens; incisions, ligatures

d'artères et applications d'appareils. L'aide-major de tranchée partageait ce service avec deux sous - aides. Les chirurgiens des régimens de garde s'adjoignaient quelquefois à eux ; car il était impossible d'agir au milieu même des tranchées.

Les grandes opérations de la chirurgie militaire, telles que les amputations primitives, étaient destinées presque toutes à l'ambulance du quartier général. Notre honorable chirurgien en chef, M. Zinck, s'était modestement réservé la surveillance à peu près passive de la plupart des opérations ; laissant à M. le chirurgien-major l'occasion de mettre en évidence son talent et sa dextérité. M. Zinck n'a pratiqué que trois amputations , c'est dire qu'il les a pratiquées en maître. La plus grande partie des amputations primitives , c'est M. Forget qui les a faites ; il me confiait habituellement les ligatures. J'ai eu, pour compte, une quinzaine d'amputations à pratiquer ; elles m'avaient été confiées par le chirurgien en chef. Une seule amputation a été faite par le second aide-major, M. Corbin , qui n'a pas moins rendu de grands services aux ambulances, par son activité de tous les instants.

D'autres amputations primitives ont été pratiquées à l'ambulance de la quatrième division.

Le chirurgien-major, M. Letulle, a amputé la cuisse dans l'articulation coxo-fémorale; c'est le seul cas qui se soit présenté. L'aide-major M. Montcourrier, a fait deux amputations.

Quelques sous-aides ont été chargés d'opérations secondaires : débridemens, extraction de corps étrangers, application d'appareils de fractures, etc.

M. Stobbenz, jeune médecin de Berchem, a souvent partagé leur service dans les pansements.

C'est à l'hôpital d'Anvers qu'ont été pratiquées presque toutes les amputations consécutives et autres opérations, par MM. les officiers de santé belges, à la tête desquels figurait M. Seutin par sa place, par son zèle, par son adresse chirurgicale. Il fut remplacé, après le siège, par M. Forget.

Je viens de citer les noms des opérateurs, afin de ne pas les reproduire sans cesse dans la série des observations; car il y a peu d'intérêt à savoir par qui une amputation ordinaire a été faite. Je ne manque pas cependant de le dire pour tous les cas remarquables.

Aucune opération majeure n'a été exécutée sans une nécessité bien reconnue et bien constatée par tous les chirurgiens que l'on pouvait requérir.

Je rappelle ce fait, afin de répondre aux assertions mensongères qui accusent les chirurgiens d'armée de ne pas calculer assez les chances favorables à la conservation d'un membre ; et je dirai plus, c'est que nous n'avons pas fait assez d'amputations, comme le prouvent plusieurs fâcheux résultats de fractures compliquées.

Des opérations chirurgicales ont été faites en grand nombre à la lumière ; il n'était pas rare de pratiquer les amputations, le soir ou au milieu de la nuit : ce fait nous semble digne de remarque.

Je ne dirai rien des procédés opératoires, puisqu'il en est question au sujet des amputations en général, et de chaque amputation en particulier.

Pansemens.

Il n'est pas hors de propos de rappeler les principes établis pour le pansement des plaies d'armes à feu, quoiqu'ils aient subi à Anvers des modifications.

Le premier pansement se compose de linge fenêtré enduit de cérat ou d'onguent-styrax, de charpie, de compresses et de bandages appropriés. On interpose quelquefois une mèche de charpie dans les lèvres de la plaie pour

en prévenir la réunion ; mais c'est à tort que l'on adopte la méthode des pansemens fréquens. En effet, cette réunion ne peut avoir lieu dans les premiers jours, à cause de l'escharre qui ne doit se détacher qu'après. Il faudrait que le premier pansement fût borné à la superficie de la plaie. On a reconnu l'avantage d'imbiber les compresses d'un liquide réfrigérant, d'eau vinaigrée et camphrée, ou d'eau fraîche simplement : c'est ce dernier topique que nous avons employé. On ne devrait pas serrer fortement l'appareil ni faire usage des bandes roulées, qui donnent des secousses à chaque tour. Les grandes compresses à quatre chefs pour les membres, et des bandages pour le tronc, sont préférables ; les pansemens rares nous semblent plus avantageux que les pansemens fréquens. Il faut éviter l'abus des émolliens, qui augmentent quelquefois l'inflammation locale au lieu de la diminuer ; mais aussi les réfrigérans conviennent moins à l'époque de la suppuration ; on peut revenir plus tard à leur application, en ayant soin d'observer ses effets ; car ils peuvent être contraires, dans certains cas, au lieu d'être utiles.

Les saignées locales par les sanguins nous paraissent nuisibles : il est rare que les saignées locales soient prescrites quand on n'a point né-

gligé de recourir aux débridemens primitifs, proportionnés à l'état de la plaie et au dégorge-
ment à produire.

Je ne dirai rien de l'emploi du séton et autres exutoires, si rarement indiqué.

Traitemen^t général.

Les blessures par armes à feu étant de nature à déterminer des effets très variés de réaction, c'est à combattre ou à prévenir ceux-ci que s'applique le traitement général. La médica-
tion la plus simple, adoptée dès le début, est souvent la plus salutaire : la diète pendant les premiers jours, le repos et des soins tout hygiéniques peuvent suffire à écarter des com-
plications générales. Quant aux remèdes phar-
maceutiques, ils sont alors ordinairement inu-
tiles; ils ne manquaient point aux ambulances,
mais ils n'ont presque pas servi : boissons rafraî-
chissantes, limonade, tisane d'orge, voilà tout ce qu'il fallait à nos blessés, jusqu'à ce qu'ils furent évacués aux hôpitaux, où tous les remèdes nécessaires leur étaient administrés.

La saignée générale a été ménagée primi-
tivement, à cause de l'état de fatigue dans le-
quel se trouvaient la plupart des blessés. Les plaies de tête et les plaies de poitrine nécessi-

taient néanmoins dès le début la saignée du bras ; les modifications essentielles de ce genre étant indiquées à la suite de chaque observation, je n'en dirai pas davantage sur le traitement général.

CHAPITRE III.

Après avoir essayé de tracer l'histoire générale des blessures du siège de la citadelle, je vais exposer le compte rendu des faits et des opérations chirurgicales en particulier.

Il est inutile de rappeler la méthode descriptive, puisqu'il suffit de feuilleter les pages suivantes, pour voir qu'elle est fondée sur les principales régions du corps, la tête, la poitrine, l'abdomen, la partie postérieure du tronc et les membres.

Procéder, pour chaque région, des blessures les plus simples aux blessures les plus compliquées, en précisant à mesure le genre de lésion, tel est le plan que, d'abord, j'avais en vue, comme le plus rationnel; mais il m'a paru défectueux, en ce sens, que des blessures légères en apparence ou d'après leurs signes peuvent être graves en réalité ou d'après leurs effets: c'était confondre les contusions, les plaies, les fractures, pour rechercher exclusivement les différents degrés de lésions produites par les causes vulnérantes. Je me suis décidé à conserver la

division qui range à part les contusions, les plaies, les fractures de chaque région, de chaque membre.

Je ne rapporte que les observations dignes de quelqu'intérêt, les unes très en détail, les autres fort abrégées, s'il est nécessaire; et, malgré le temps écoulé depuis l'expédition d'Anvers, plusieurs blessés sont éloignés du terme de leur guérison: il est même douteux que quelques uns puissent y parvenir. Voilà donc autant d'observations qui n'auront pas de résultat définitif; c'est le très petit nombre à la vérité: elles appartiennent à la classe des fractures compliquées ou à celle des amputations.

Certains faits encore manquent de détails et de complément, faute de renseignemens, qu'il m'a été impossible de me procurer, les blessés n'ayant fait, pour ainsi dire, que passer sous nos yeux.

D'autres lésions, enfin, sans caractère spécial, n'exigeaient que quelques lignes de récit; car je ne connais rien de plus monotone, en chirurgie comme en médecine, que la lecture d'une observation trop longue, trop détaillée, quand elle est commune et vide d'intérêt.

Le style qui emploie le moins de mots en exprimant le plus de choses m'a paru le meilleur pour le compte rendu des observations; il fixe

davantage l'attention, donne plus de suite à la succession des phénomènes pathologiques, et abrège le travail. Cependant une multitude de faits, rapportés de cette manière, auraient une forme sèche et nue : c'est pourquoi chaque groupe d'observations est précédé de remarques générales qui ont le plus de rapports avec elles ; et chaque observation en particulier est suivie de quelques lignes relatives, soit au blessé lui-même, soit à sa blessure et aux conséquences que l'on peut en déduire.

Entre toutes les observations, il s'en trouve de fort remarquables : les annoncer d'avance ici, ce serait peut-être diminuer l'intérêt qu'elles doivent présenter à leur place ; ce serait encore plus, faire tort aux observations d'un ordre secondaire. J'ai dû néanmoins indiquer dans les considérations générales quelques faits qui ne pouvaient être rangés dans la série des observations.

§ 1^{er}. BLESSURES DE LA TÊTE.

Nous comprenons sous ce titre les blessures de la face et celles du crâne, depuis les plus simples contusions jusqu'aux plaies les plus compliquées. On a remarqué, avons-nous dit, que les blessures de la tête avaient été très fré-

quentes, et plus communes à gauche qu'à droite, à cause de la position des travailleurs à découvert.

Les blessures de la face étant distinctes de celles du crâne, nous les ferons connaître séparément.

Blessures de la face.

Il y aurait peu d'intérêt à parler des blessures légères de la face, telles que contusions partielles, sans commotion cérébrale. Les éclats amortis de bombes et d'obus, les éclaboussures de terre et d'autres corps contondans, en voilà les causes.

Les contusions des yeux ont été fréquentes ; l'amaurose est survenue avec ou sans complication, sans altération apparente dans les membranes ou les humeurs de l'œil. Chez les uns, elle a disparu ; chez les autres, elle a persisté peut-être pour toute la vie.

A***, 18^e de ligne : contusion des deux yeux par éclat de terre ; amaurose double : guérison au bout de quelques jours.

Lar***, 19^e léger : contusion des deux yeux par éclat de terre, et plaie contuse à la main par éclat de mitraille ; affaiblissement de la vue ; céphalalgies fréquentes.

Il serait sans intérêt de citer tous les résultats

variés des contusions des yeux. Quelques hommes ont totalement perdu la vue par des éclats de bombes ou d'obus, tantôt sans complication, tantôt avec réaction violente sur l'encéphale; d'autres ont été tués sur coup. Un officier du 19^e léger est mort subitement par le choc d'une balle dans l'œil gauche.

Les contusions de la face dans d'autres parties que les yeux, étant moins graves, n'offrent aucun intérêt. Prenons un seul fait : Va***, 18^e de ligne : contusion violente de la mâchoire inférieure, sans plaie ni fracture, par un éclat de bombe. Commotion cérébrale; perte immédiate de connaissance; état comateux prolongé pendant deux jours; affaiblissement de l'intelligence; amélioration sensible par l'effet d'une saignée générale; guérison assez prompte.

Nous avons parlé des brûlures par explosion de poudre, à la face et aux mains; voici en deux mots quelques faits dont les détails auraient peu de valeur.

Plusieurs hommes du 25^e de ligne, réunis dans un petit fort de la Tête de Flandre, abandonné par les Hollandais, ont eu la figure et les mains brûlées par l'explosion d'une traînée de poudre cachée sous la paille. C'étaient chez presque tous des brûlures au premier ou au deuxième degré; d'autres étaient plus profondément at-

teints. L'un d'eux offrait cela de singulier, c'est que toute la face s'était couverte d'une multitude de petites phlyctènes presque aussi multipliées que les boutons d'une variole confluente : guérison par les résolutifs.

Bil***, blessé par explosion de poudre dans les travaux de désarmement : brûlure de toute la face au second degré ; accidens inflammatoires assez intenses ; anti-phlogistiques ; amélioration ; chœmosis de l'œil droit ; destruction de la cornée ; évacuation des humeurs de l'œil , guérison avec perte de cet organe.

Presque tous ont conservé une multitude de grains de poudre sous-épidermiques.

Plaies de la face.

Quant aux blessures de la face avec solution de continuité, elles ont été plus fréquentes que ne semble l'annoncer le nombre des faits indiqués, parce que souvent mortelles, sur le coup, elles ne nous laissaient plus de recherches à faire. Telles étaient ces grandes plaies dont j'ai essayé de décrire l'horrible aspect ; telle était la mutilation de cet officier d'artillerie chez lequel la face tout entière avait été séparée du reste de la tête par un boulet de canon ; telles étaient les blessures à peu près semblables chez plu-

sieurs soldats dont nous avons vu les cadavres à la tranchée.

Quelques hommes n'ont pas succombé de suite à des mutilations de la face ; ils ont survécu assez de temps pour nous laisser souvenir d'eux. Le suivant, par exemple, Gri***, 58^e de ligne : plaie large, profonde et déchirée au côté gauche de la face, par un éclat de bombe, le 19 décembre. Solution de continuité étendue de la région sous-orbitaire au menton, fracture comminutive de la branche de l'os maxillaire inférieur ; commotion cérébrale ; accidens nerveux primitifs ; suture de la plaie : pansement contentif. Le 21 décembre, invasion et progrès du tétanos, depuis la rigidité des mâchoires jusqu'à l'opisthotonus complet ; insuccès des anti-phlogistiques et des opiacés ; mort dans la nuit du 1^{er} au 2 janvier.

Beaucoup de plaies de la face, n'intéressant au contraire que des parties superficielles et exemptes de complications, permettaient aux blessés de reprendre leur service après le premier pansement.

Voilà donc un nombre indéterminé d'observations dont nous n'avons pas à rendre compte.

Del***, caporal au 1^{er} régiment de génie : fragment de biscaïen enclavé dans la joue droite, au niveau de l'aile du nez, au dessus de la com-

missure labiale ; plaie linéaire, sans déchirure, et plus étroite que le plus petit diamètre du projectile ; forte adhérence de celui-ci à l'os maxillaire supérieur, sans fracture ni perforation. Légère difformité de la face ; débridement de l'angle supérieur de la plaie ; projectile enchassé dans l'os ; extraction difficile ; réunion immédiate, sans suture ; pansement simple, renouvelé rarement : guérison franche, cicatrice régulière.

Ce fait, simple en lui-même, m'avait intéressé à cause de l'étroitesse de la plaie, en rapport avec le diamètre du projectile, et à cause de la difficulté que j'ai eue à en faire l'extraction. Le jeune blessé n'avait d'autre inquiétude que de ne pouvoir retourner à la tranchée. Je l'ai rencontré, dans la citadelle, dont il dessinait les ruines.

Hu***, 65^e de ligne, blessé le 5 décembre par un éclat de bombe : petites plaies contuses et multiples de la face. Commotion cérébrale, état de stupeur prolongé pendant plusieurs heures ; forte saignée à Oboken ; amélioration notable ; cessation des accidens généraux ; cicatrisation des petites plaies. L'une d'elles consistait dans une disjonction des os propres du nez, fendu lui-même longitudinalement. Le rap-

prochement a été assez facile au moyen d'un bandage contentif.

Ma***, 52^e de ligne : plaie contuse et déchirée de l'oreille droite par un éclat de bombe; division oblique, étendue du bord antérieur de l'hélix au lobule : trois points de suture; cicatrisation régulière. Ce fait peut s'ajouter à ceux qui prouvent en faveur de la suture des cartilages.

Let***, 11^e d'artillerie : éclat d'obus à la joue gauche; plaie étendue du lobule de l'oreille à la commissure des lèvres et à l'aile du nez; division des parties molles, sans lésion des os; point d'hémorragie, tuméfaction de la face, occlusion des paupières; gonflement et rougeur livide des lèvres; douleur peu intense; intégrité des sens et des facultés intellectuelles. Réunion immédiate de la plaie; accidens inflammatoires combattus par les anti-phlogistiques; cicatrisation assez prompte et sans la moindre difformité. Ce résultat est notable.

Pou***, 58^e de ligne, blessé le 7 décembre par un coup de feu à l'œil gauche : destruction du globe oculaire, entièrement vidé des humeurs; déchirure du rebord de la paupière supérieure. Symptômes de commotion cérébrale; sensibilité très vive; douleur sympathique dans

toute la région cervicale, et surtout à la partie antérieure, dans la direction des voies œsophago - laryngiennes. Le blessé croit fermement que le projectile est à demi avalé. Aucun signe de la présence d'un corps étranger dans le larynx ou l'œsophage; respiration et déglutition faciles; expulsions de sang, mais point de traces de lésions à la cavité buccale. Perquisitions ajournées pour laisser du repos au blessé; légère excision du rebord palpébral supérieur, pour le régulariser; issue d'une portion de la cornée transparente; occlusion continue des paupières, qui ne peuvent être écartées sans de vives douleurs. Disparition graduelle des accidens généraux; même sensation à la gorge; nouvelles recherches du projectile sans plus de réussite. Vers le quinzième jour, développement d'une petite tumeur derrière l'angle droit de l'os maxillaire inférieur, volume d'un œuf, couleur rouge, consistance ferme et douloureuse à la pression des doigts. Incision, écoulement d'une faible quantité de sérosité sanguinolente; exploration; présence d'une petite tumeur enkystée, mais point de projectile. État général toujours satisfaisant; sensation plus confuse dans la région cervicale, diminuée ensuite, et puis disparue dans le courant de février.

Comment expliquer, d'après la blessure, cette

singulière sensation de la présence d'un corps étranger dans les voies pharyngo-laryngiennes? car une balle avait évidemment atteint et désorganisé l'œil, sans pénétrer dans le crâne. Serait-il possible qu'elle se fût logée derrière la paupière inférieure, qu'elle eût glissé, par son propre poids et par l'extensibilité des téguments, entre eux et les muscles de la face, jusqu'au point de parvenir à la région cervicale, de s'y cacher dans les interstices musculaires, et de comprimer le larynx et l'œsophage? Le fait nous semble admissible, de même que le projectile pourrait se montrer plus tard dans quelque partie plus ou moins éloignée de celle où il avait paru se manifester d'abord.

Per***, 50^e de ligne: fracture comminutive et compliquée de l'os maxillaire inférieur, près de la symphyse, dans l'étendue d'un pouce environ, par un éclat de mitraille. Débridement, extraction de plusieurs esquilles; excision des bords déchirés de la plaie; réunion immédiate, appareil contentif. Aucun accident; pansemens rares; extraction de petites esquilles: cicatrisation normale et guérison au bout d'un mois.

J'indique ce fait si simple par opposition au suivant, dont les complications graves et le résultat heureux offrent un grand intérêt.

L***, canonnier au 2^e régiment d'artillerie,

âgé de vingt-deux ans, blessé, dans la tranchée, le 6 décembre, par un éclat de bombe. Ablation par arrachement de la mâchoire inférieure, et fracture anti-brachiale.

Le projectile, attaquant la face externe gauche des mâchoires, a enlevé la presque totalité du maxillaire, dont il ne reste que le bord postérieur de l'apophyse coronoïde et le condyle. À droite, l'extrémité du corps de cet os est conservée jusqu'à la première grosse molaire; les alvéoles et les dents du sus-maxillaire gauche sont en partie brisés, les palatins fracturés, le corps de l'hyoïde dénudé; le conduit parotidien gauche est déchiré, et la langue sillonnée, du même côté, par une plaie profonde.

La vaste solution de continuité s'étend, à gauche, de l'apophyse zygomatique à l'échancreure antéro-supérieure du cartilage thyroïde, aux dépens de presque toutes les parties molles de la joue, et d'une grande portion de la lèvre supérieure, de ce côté; et à droite, de ce même cartilage au niveau des derniers alvéoles sus-maxillaires et au buccinateur, à quatre ou cinq centimètres du lobule de l'oreille. Son centre est occupé par la voûte et le voile palatins, l'ouverture œsophagienne de la bouche, quelques débris des glandes sous-maxillaires et des muscles hyo-glosses et génio-glosses; par la lan-

gue, enfin, quadruplée de son volume normal, sur le premier plan. Cet organe, inférieurement disséqué jusqu'à sa base, par le choc vulnérant, à défaut de ses points d'appui naturels, tombe par son propre poids au devant du larynx ; l'ensemble de la lésion offre de la ressemblance avec le mufle béant de certains animaux.

Le même projectile, après cette dévastation, rencontrant l'avant-bras droit, l'avait profondément contus et brisé comminutivement, à son tiers moyen.

Le blessé, transporté à Oboken : M. Letulle, chirurgien-major, extrait des esquilles et pratique ensuite plusieurs points de suture aux tégumens des régions sus-maxillaires et à ceux du cou, c'est à dire en haut et en bas de la solution de continuité, afin de diminuer sa surface. Pansement méthodique.

Amputation anti-brachiale pratiquée par le même opérateur. Réunion immédiate.

Symptômes de réaction générale, peu intenses, en raison de la gravité des lésions, fièvre, insomnie, céphalalgie légère, vives douleurs locales. Diète absolue. Plaies de la face, considérablement tuméfiées, douloureuses, pansées chaque jour, sans nul incident remarquable ; sutures détachées et le premier appareil de l'avant-bras levé le 11 décembre.

Le 12, évacuation du malade sur l'ambulance de Boom. (Chirurgien-major, M. Petitot). Aux jours suivans, même pansement, même régime. Suppuration de bonne nature au moignon, et d'un aspect peu favorable à la face, dont elle élimine graduellement de nombreux lambeaux frappés de mort. On détache quelques esquilles de l'extrémité libre des fragmens maxillaires ; les principaux accidens de la réaction s'amendent ; mais, du 20 au 25, les deux lésions paraissent sous l'influence de complications graves, que tous les soins ne peuvent prévenir.

Les plaies de la face revêtent un caractère blasfard et gangreneux ; la suppuration paraît plus sanieuse et fétide ; les pansemens sont plus que jamais douloureux. Moignon devenu le siège d'un gonflement inflammatoire considérable, bandelettes emplastiques enlevées ; phlegmasie, combattue par l'application de cataplasmes émolliens : mais, par suite de cet accident, extrémités osseuses dénudées, saillantes à travers les parties molles, auprès des lèvres de la plaie, et leur mortification, dès lors, inévitable. Exercice des fonctions organiques de nouveau troublé. Le 2 janvier, transport de Boom à Anvers. Cicatrisation de la plaie sur quelques points, les plus distans de son centre : toute sa surface

pâle et cendrée ; suppuration acre , nauséeuse, assez consistante et fortement adhérente aux tissus.

Langue recouverte d'un enduit grisâtre et visqueux , sans diminution de volume ; l'extrémité fracturée à gauche, située profondément sous le masséter , ne paraît pas devoir s'exfolier ; celle de droite, au contraire , qui fait saillie au dehors, est dépouillée de son périoste, et frappée de nécrose dans une assez grande étendue ; douleurs aiguës. La plaie du moignon suppure peu ; les surfaces des sections osseuses , légèrement saillantes , après avoir perforé les tégumens , sont noires , et devront être éliminées par le travail de l'exfoliation. État général trèsgrave ; lividité , maigreur , affaiblissement extrême , toute l'économie profondément altérée ; pronostic des plus fâcheux.

Du 2 au 20 janvier. Pansemens à l'aide du chlorure d'oxyde de sodium , renouvelés chaque jour. Suppuration des plaies de la face encore plus irritante et phagédénique ; bords tuméfiés, taillés à pic, ulcérés , s'étendant de jour en jour, sans que l'énergie du traitement employé arrête les progrès de la gangrène d'hôpital.

Du 15 au 20. Surface de la lésion plus favorable ; ses bords se dépouillent de leurs saillies anguleuses , et du putrilage ; le pus perd ses

propriétés corrosives, et les accidens locaux et généraux font place à une amélioration marquée. Le moignon n'offre rien de notable; le travail de l'exfoliation continue lentement; plusieurs abcès sont ouverts par le bistouri; conditions de l'économie améliorées progressivement. L'alimentation ne consiste d'abord qu'en doses légères de bouillon maigre; plus tard, limonade vineuse et bouillon de veau; enfin, gelées végétales et animales: déglutition de ces substances, toujours très difficilement administrées, au moyen d'étroites cuillers destinées à cet usage.

25. Complication inattendue; vaste collection purulente, dont le malade ne s'était jamais plaint, au pli de la fesse droite. Incision immédiate, sortie d'environ une pinte de liquide, qui n'a aucun rapport avec une affection vertébrale.

Du 25 janvier au 9 février. Progrès de l'amélioration locale et générale. Les bords de la grande plaie s'affaissent, au niveau de sa surface, qui se déterge, et prend une teinte vermeille; le pus devient consistant et louable; bourgeons charnus; travail de la cicatrisation du périmètre au centre; la langue n'a plus que le double de son volume normal; élimination graduelle des fragmens osseux. La portion nécrosée du radius, sous la forme d'une rondelle fort mince, tombe enfin le 9 février; de nombreuses parcelles foliacées

du cubitus s'étaient détachées les jours précédens. Alimens légers, demi-liquides, portés dans l'ouverture œsophagienne à l'aide de biberons. Constitution restaurée visiblement; les forces reparaissent, et le malade, sauvé du péril, est en voie de guérison.

10. On prend le moule en plâtre de la face, si bizarrement défigurée, et assez cicatrisée pour que cette opération ne soit pas douloureuse.

Du 10 au 25, Travail de la cicatrisation faisant des progrès rapides. La glossite se résout entièrement. Le voile du palais, ses piliers, les amygdales et la luette, long-temps le siège d'une inflammation vive, reviennent à leur état naturel; phénomènes de la déglutition de plus en plus réguliers. Largeur de la voûte palatine encore rétrécie par un épaississement très dense des bords latéraux de sa membrane. Parotide gauche atrophiée; la sécrétion salivaire s'opère par celle du côté droit. L'affection de l'os suit sa marche lentement progressive. Tissu vasculaire développé graduellement à l'extrémité des fragmens osseux du moignon, dont la surface est presque entièrement cicatrisée. État général de la plus heureuse convalescence. Intégrité des organes de la phonation: l'articulation des sons est imparfaite, à raison de l'absence des parois de la

bouche. Toutefois, la faculté de la parole n'est point entièrement anéantie ; les voyelles simples et mixtes sont émises très naturellement ; la plupart des consonnes sont assez distinctement prononcées : la seule habitude d'entendre le malade rend son langage intelligible.

25, quelques tentatives d'ébranlement, pour séparer le fragment nécrosé, parviennent à détacher toute la portion de l'os qui gênait le malade et s'opposait à l'application exacte d'une mâchoire artificielle. Quatre jours après, le séquestre est extrait des parties vivantes. Il est formé, en avant et en bas, par toute l'épaisseur du corps de l'os maxillaire ; en haut, par la lame qui divise les cinquième et sixième alvéoles ; en dehors par tout le feuillet externe du corps et de la branche de cet os, y compris sa ligne oblique, qui ne se termine en arrière qu'à l'apophyse coronoïde. Conservation, de ce côté, des trois grosses molaires : la première, implantée à moitié dans un demi-alvéole, forme, avec l'une des bifurcations de sa racine, la paroi antéro-supérieure du fragment maxillaire. Du 1^{er} au 15 mars. Bourgeons vasculaires se développant à la surface de l'os ; formation d'un nouveau tissu sur tous les points. Cicatrices de la face et du moignon consolidées de plus en plus. Alimentation augmentée de plusieurs mets nu-

tritifs et de digestion facile : la guérison générale et locale est considérée comme parfaite. Appétit prononcé davantage; biberon remplacé par un vase semi-pyriforme, dont le prolongement en bec de canne est destiné à verser les alimens dans l'ouverture postérieure de la bouche. Il est curieux d'observer que cette autre sorte de bol alimentaire n'est nullement imprégnée ni pénétrée de sucs salivaires, mais seulement de mucosités sécrétées par les cryptes folliculaires des parois de la cavité buccale ainsi que de la surface de la langue, et que cependant les fonctions assimilatrices et la nutrition s'opèrent avec une telle régularité, que le sujet acquiert, de jour en jour, un embonpoint remarquable.

Application de la mâchoire nouvelle, en argent, dont l'exécution avait été confiée par M. Forget à un artiste habile de la ville d'Anvers, M. VERSGHUYLEN, auquel nous devons des éloges pour le zèle et le talent qu'il a su appliquer à la confection de cette machine.

L'observation de L***, rédigée longuement et avec le plus grand soin par M. Périer, et que cependant j'ai dû restreindre aux circonstances essentielles, nous offre une des preuves les plus irrécusables de l'efficacité des ressources de l'art, unies aux efforts si puissans de la nature. Placé successivement entre les mains des trois

chirurgiens-majors, MM. Letulle, Petitot et Forget, le blessé a reçu de chacun d'eux et de leurs aides les secours les plus empressés. M. Letulle, en pratiquant à propos l'amputation de l'avant-bras, n'avait pas désespéré des suites de l'horrible mutilation de la face; et M. Forget, en secondant avec habileté le travail merveilleux de la nature, a eu l'honneur de ce succès, qui a fait du bruit en Belgique.

Il faudrait de longs détails pour donner une idée même incomplète du masque de L***, et déjà cette observation occupe une large place parmi les autres. Qu'il nous suffise de dire que ce masque, aussi ingénieusement conçu qu'habilement exécuté, n'est nullement incommodé; il est d'un grand secours, en retenant dans une petite cavité mentonnière les excréptions salivaires et muqueuses; il est indispensable en partie pour la préhension et la mastication des alimens; il dissimule, sous des moustaches postiches et sous une forme toute naturelle, presque agréable, une des plus hideuses mutilations de la face; il prête enfin une figure humaine au pauvre L***, et le rapproche de la Société, dont il paraissait séparé pour toujours. Ce jeune soldat de la tranchée d'Anvers vient de trouver sa place d'honneur à l'Hôtel des Invalides, à côté des vieux braves d'Austerlitz et d'Eylau.

Blessures du crâne.

Bien mieux appréciées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient autrefois, dans leurs causes, dans leurs symptômes, dans leurs complications et dans leur traitement, les plaies de tête en général, et surtout les plaies d'armes à feu, sont une preuve des services rendus à l'art par la chirurgie militaire. Il serait superflu de citer ici ceux de nos maîtres qui ont le plus contribué à ces succès; je ne veux pas non plus emprunter à leurs livres les résultats de leur expérience, parce que je les reproduirais peut-être imparfaitement. Je ne m'arrêterai qu'à la question majeure, qui se rattache aux plaies de tête, à cette question du trépan, si souvent renouvelée, mais qu'une sage pratique tend à écarter de plus en plus.

Nous savons à présent que les blessures les plus graves de la tête sont susceptibles de guérir par des moyens plus simples que la trépanation. Des plaies contuses avec épanchement, des plaies même de la substance cérébrale, des fractures compliquées du crâne, avec enfouissement des fragmens, etc., sont autant de lésions qui peuvent avoir une heureuse issue, sous la seule influence d'un traitement ordinaire, mé-

thodiquement dirigé. Je ne prétends pas dire pour cela que le trépan doive être réprouvé tout à fait : non , certes ; mais je puis affirmer, d'après plusieurs de nos autorités chirurgicales, que la majorité des plaies de tête , auxquelles on aurait autrefois appliqué sans succès l'opération du trépan , sont susceptibles de céder à l'emploi bien combiné des anti-phlogistiques et des révulsifs.

Il importe, avant tout , de remédier aux effets immédiats de la blessure , d'opérer les débridemens et les incisions , d'extraire toutes les esquilles sous-jacentes , de relever et de détacher les portions osseuses enfoncées , etc. : ce traitement, bien raisonné , est souvent plus efficace que le trépan , appliqué pour ainsi dire à tâtons , au petit bonheur. Il ne faudrait donc avoir recours à ce moyen extrême qu'avec toute la certitude possible de réussir ; car l'une des plaies de tête les plus graves , c'est peut-être l'opération elle-même du trépan.

Quelques unes des blessures d'Anvers viennent à l'appui de cette proposition , et peuvent s'ajouter à tant de faits , consignés dans les ouvrages des praticiens qui nous ont frayé la route de l'observation.

Le chirurgien en chef de l'armée avait pris une mesure sage en faveur des hommes blessés au crâne : tous les hommes atteints de lésions pro-

fondes à la tête étaient pansés immédiatement, avec soin, à l'ambulance de tranchée ; mais comme il y avait à craindre la fatigue et les secousses d'un double transport de là à l'ambulance de Berchem, et de celle-ci à l'hôpital d'Anvers, après plusieurs heures d'attente ; comme il y avait à craindre la complication d'un nouveau pansement à Berchem, on conduisait ces hommes directement à Anvers, ou bien, si on les faisait passer par Berchem, c'était sans s'y arrêter. Il a résulté de là que les succès obtenus ont été en grande partie l'œuvre des chirurgiens belges.

Ces succès paraîtraient peut-être minimes, si je citais tous les cas graves des plaies de tête ; mais il est une remarque essentielle à faire, et qui ne détruit pas pour cela ce que nous avons avancé, c'est que la plupart de ces blessures pouvaient être considérées comme mortelles, tant par la lésion elle-même que par l'effet des accidens cérébraux. Ce que nous avons dit à ce sujet, en parlant des mutilations de la face, peut s'appliquer aux plaies de la tête. Quelques hommes ont eu toute une portion de la calotte du crâne emportée par des éclats de bombes ou d'obus, sans succomber sur-le-champ ; M. Ma***, lieutenant de voltigeurs du 18^e de ligne, avait eu le sinciput et la portion supérieure des lobes cérébraux enlevés par un biscaïen, dans l'éten-

due de six travers de doigt, et il a survécu dans une agonie de cinq heures à cette mutilation affreuse.

Cor***, grenadier du 58^e, a eu également le sinciput enlevé par un éclat de bombe, ainsi que la partie supérieure des lobes cérébraux : il nous a été apporté dans un coma profond, et n'a expiré qu'au bout de sept heures, dans un râle continu.

La commotion cérébrale peut suffire, sans lésion extérieure, pour déterminer la mort. En voici un exemple entre plusieurs. Un grenadier du 52^e éprouve une contusion violente de la région frontale gauche, sans plaie ni fracture, par un boulet amorti. Phénomènes immédiats d'une apoplexie foudroyante : mort au bout de quelques instans.

Nous retrouverons d'autres observations de plaies de tête, suivies d'un résultat funeste.

Ce serait une énumération dépourvue d'intérêt que de citer toutes les blessures de la tête qui n'ont aucun caractère notable. Je ne dirai donc rien des contusions simples ou des plaies contuses sans réaction cérébrale ; le nombre en a été assez considérable. Quelques unes de ces lésions simples de la tête ont été compliquées de blessures aux membres, soit par le même projectile, soit par un autre.

Sa***, sapeur du 2^e régiment du génie, a eu la poitrine, le bras droit et la tête frappés par le même biscaïen, qui n'a fait qu'une plaie légèrement contuse au niveau du pariétal droit; la poitrine et les bras ont été simplement contus.

L'efficacité des débridemens a été appréciable, non seulement dans les cas de plaies graves de la tête, mais aussi dans les cas de plaies simples, en prévenant les accidens susceptibles de se développer : c'était d'ailleurs le moyen le plus sûr de diagnostic.

Mé***, voltigeur au 58^e de ligne, avait été atteint d'un coup de feu sous le rempart de la demi-lune : une petite plaie contuse, au sommet de la tête, faisait craindre une fracture ; le débridement prouva que la plaie était simple.

Quelques blessures de la tête ont été accompagnées de circonstances singulières qui ont prévenu un résultat funeste.

Kl***, grenadier du 61^e de ligne, est renversé par un obus, qui tombe d'à-plomb sur son schakot, le traverse obliquement et retombe sur le bras gauche. On nous apporte cet homme dans un état d'exaltation mentale, pareil à l'ivresse, mais qui lui permet de répondre à nos questions et de nous assurer qu'il est tout étourdi seulement du choc qu'il vient de recevoir, et

bien étonné lui-même d'éprouver les vertiges de l'ivresse. Une saignée du bras, des fomentations émollientes et un peu de repos suffirent pour dissiper cet état : il n'y avait pas de trace de contusion à la tête. Voici à quelle cause singulière ce soldat devait sans doute la vie : il portait dans son schakot la moitié d'un pain de munition, qui, en amortissant le choc de l'obus, avait été fortement comprimé par ce projectile.

Certaines blessures de la tête, tantôt superficielles, tantôt profondes, ont été accompagnées de réactions sympathiques sur le canal intestinal, et surtout sur l'estomac, d'où ont résulté des vomissements spasmodiques.

D'autres blessures du même genre ont été suivies, immédiatement ou plus tard, de douleurs, tantôt dans le cou, tantôt dans le dos, et jusqu'au bas des reins.

Les plaies compliquées de fracture, avec enfoncement des fragmens, n'ont pas toujours offert des symptômes de compression, et, dans quelques cas même, il ne s'est pas développé le moindre accident.

Un voltigeur du 19^e léger : fracture comminutive et compliquée du coronal, par une balle restée dans la plaie; enfoncement de l'os à trois ou quatre lignes; débridement, extraction du pro-

jectile; redressement des pièces osseuses avec la spatule; extraction de deux esquilles, saignée, révulsifs, pansement simple; pas le moindre accident primitif ou consécutif: guérison franche, comme celle d'une plaie simple.

Plusieurs blessures de la région temporale, contusions, plaies, fractures, nous ont fourni de nouvelles preuves contre le préjugé répandu dans le monde, savoir: que les lésions de cette partie de la tête sont plus souvent mortelles que d'autres. Je choisis un ou deux exemples.

Du***, voltigeur du 61^e de ligne, est atteint d'un coup de boulet amorti, qui frappe le côté gauche de la tête à la région temporale, après avoir déformé le schakot, retombe sur l'épaule, et de là sur la cuisse, qui furent plus fortement contuses que ne l'avait été la tête. Rien de grave.

M. B***, capitaine de voltigeurs au 19^e léger, blessé par un éclat de bombe, le 18: plaie contuse à l'arcade sourcilière droite et à la tempe correspondante, sans fracture; aucun accident primitif ou consécutif: guérison prompte.

J'ai indiqué la méthode anti-phlogistique comme base du traitement employé à Anvers contre les plaies de tête. On a, dans quelques cas, administré des potions purgatives ou émétiques; mais je puis dire, d'après des ren-

seignemens positifs, que cette médication n'a pas eu généralement tout le succès que l'on croyait en obtenir : serait-ce parce qu'elle aurait été employée mal à propos ou en excès, ou bien parce qu'elle aurait été insuffisante ? Je m'abstiens de décider le fait, parce que je ne l'ai pas constaté.

Il est à regretter que l'on n'ait pu faire, même à l'hôpital d'Anvers, la nécropsie de tous les blessés qui ont succombé à des plaies de tête ; on aurait étudié le rapport des lésions avec les symptômes ; on aurait recherché jusqu'à quel point il est vrai que les abcès du foie coïncident avec les plaies de la tête, etc. L'exigence du service auprès des blessés s'opposait, plus que toute autre cause, aux autopsies cadavériques. Le petit nombre de celles qui ont été faites nous laissent regretter que ce soit par exception.

M. Périer, qui s'est occupé de phrénologie, a constaté, dans certains cas, des lésions cérébrales tout à fait en rapport avec les dérangemens qu'il avait observés dans l'altération des facultés.

Le phénomène qui s'est offert le plus communément, c'est l'abolition des sens correspondans au côté blessé de la tête, et la paralysie du côté opposé, paralysie du mouvement plus encore que du sentiment. Ce phénomène était primitif, et plus instantané que persistant.

Presque tous les blessés au crâne ont eu des

pertes partielles des facultés cérébrales, ou un affaiblissement notable de l'intelligence; plusieurs ont conservé jusqu'à ce jour un air d'hébétude, qui s'accompagne d'une lenteur très manifeste dans la formation des idées, et de la difficulté à les exprimer convenablement.

Fracture comminutive et compliquée du coronal; forte contusion au genou. Gui***, sapeur au 1^{er} régiment du génie, blessé le 16, par un éclat de mitraille, à la partie antérieure de la tête: fracture comminutive de la face latérale droite du coronal et de la voûte sus-orbitaire, au niveau du sinus frontal; fissure et dépression du coronal, vaste plaie à lambeau des tégumens du front, hernie de la substance cérébrale.

Cette blessure était compliquée d'une contusion profonde à l'articulation fémoro-tibiale droite, par un autre éclat de mitraille; cependant aucun accident immédiat ne survint: point de symptôme de commotion ou de compression du cerveau; céphalalgie intense vers le soir, agitation; pouls fréquent, dur; chaleur à la peau, fièvre traumatique.

Levée de l'appareil provisoire le même jour, exploration de la blessure, débridement, large incision en T; dénudation du crâne dans une assez grande étendue; fracture comminutive, avec enfoncement déjà indiqué, au dessous de la

bosse frontale droite jusqu'à l'arcade orbitaire inférieurement, et latéralement jusqu'à la suture sagittale d'une part, de l'autre jusque près de la paroi orbitaire externe, dans une direction à peu près elliptique. Extraction de huit ou dix esquilles, dont plusieurs appartiennent à la table interne du sinus frontal; dénudation et hernie du cerveau sur ce point. Pansement simple avec des plumasseaux, pour soutenir les lambeaux tégumentaires et faciliter la suppuration. Diète, boissons rafraîchissantes : fomentations sur le genou. 18 et 19, rien de notable; état satisfaisant; point d'accidens cérébraux, sauf un coma léger; suppuration établie les jours suivans. Le 22, pansement renouvelé; suppuration abondante. Le 25, état fébrile, céphalalgie, constipation; médication simple: guérison apparente du genou, malgré la difficulté des mouvements, qui persiste encore. Le 30, continuation de la fièvre, quelques symptômes cérébraux graves se manifestent. Malgré l'indocilité extrême du blessé pour se soumettre au régime, on le maintient à une diète sévère, qui produit de l'amélioration.

Du 5 au 15 janvier, mêmes soins; suppuration diminuée, cicatrisation graduelle; mouvements de l'articulation du genou moins douloureux, mais changement dans les rapports de cette

partie du membre inférieur. La tubérosité externe du tibia paraît déjetée en dehors; le condyle interne du fémur fait saillie en dedans; augmentation du diamètre transversal de l'articulation; tuméfaction osseuse à la partie la plus inférieure du corps du fémur, simulant le chevauchement d'une fracture, quoique le membre ait conservé sa longueur normale.

Progrès continué de la cicatrisation pour la blessure du crâne, sans autre accident notable; intégrité parfaite des facultés intellectuelles, malgré un peu de lenteur dans la conception des idées. Guérison au cinquante-deuxième jour; mouvements du membre restés difficiles et peu étendus; disparition à peu près complète du gonflement.

Cette observation n'est pas seulement remarquable à raison de la plaie de tête et de sa guérison, mais aussi sous le rapport de la blessure du genou et de sa singularité. La déviation du membre et la difformité qu'on y remarqua furent, sans doute, le résultat d'une lésion profonde dans les ligaments qui affermissent la jointure, et qui a permis au tibia d'obéir aux tractions musculaires. Un cas analogue s'est présenté, il y a quelques années, au Val-de-Grâce. Quant à l'existence d'une périostose ou de la tuméfaction et du ramollissement des surfaces ar-

ticulaires, par l'effet de la contusion, l'absence de tous les signes de l'arthrite chronique éloigne la supposition de ces lésions, insuffisante d'ailleurs pour expliquer la luxation imparfaite dont il s'agit.

Fracture comminutive et compliquée du coronal; encéphalocèle. Mich***, voltigeur au 19^e léger, blessé le 10 décembre, par un éclat de bombe, à la partie antérieure de la tête. Perte de connaissance, transport immédiat à Anvers. Exploration de la blessure, débridement crucial, dans une assez grande étendue, qui fait reconnaître une plaie contuse à lambeau de la largeur de la main aux tégumens, la dénudation du coronal, une fracture comminutive de la partie supérieure gauche de cet os, près de la suture sagittale, avec enfoncement profond de plusieurs fragmens dans le cerveau. Extraction immédiate d'une dizaine d'esquilles avec la spatule et les pinces, déchirure de la dure-mère. On aperçoit alors un trou d'un pouce et demi de diamètre, et une encéphalocèle de la grosseur d'un œuf d'oie, agitée de pulsations très appréciables. Légère compression, à l'aide de charpie mollette.

Céphalalgie intense, pouls petit et fréquent, coma, regard fixe, mouvemens automatiques. Large saignée, renouvelée dans les vingt-quatre heures, diète, boissons acidulées; l'état comateux

dure jusqu'au lendemain. Les 12, 13 et 14, une amélioration sensible survient dans l'état général ; même régime et potion purgative ; second pansement, compression légère continuée avec une lame de plomb, concave et très lisse. Mieux soutenu les jours suivants ; mêmes soins : la suppuration s'est établie ; elle devient moindre du 25 au 30 ; la plaque de plomb est maintenue ; séparation, à chaque pansement, d'une portion de substance cérébrale, sous la forme de détritus pultacé ; état satisfaisant du reste.

Le 5 janvier, hernie plus considérable, extrême indocilité du malade, régime aussi sévère. Le 10, diminution de la hernie jusqu'au niveau de la surface du crâne ; même appareil contenant ; alimentation légèrement augmentée. Jours suivants : surface dénudée du cerveau recouverte peu à peu par des bourgeons charnus ; la suppuration se tarit progressivement. Le 26, diminution de l'étendue de la solution de continuité ; pansemens journaliers, avec des compresses fenêtrées et des plumasseaux de charpie mollette ; commencement de cicatrisation ; humeur toujours acariâtre du blessé ; alimentation plus substantielle. Le 30 janvier, guérison à peu près complète, continuation de l'appareil contenant. Évacuation sur la France dans l'état suivant : pupilles dilatées, pas de changement notable dans

les facultés intellectuelles, si ce n'est une indocilité insupportable; cicatrice terminée. Séjour à l'hôpital de Lille: quelques accidens locaux; incision de deux ou trois petits trajets fistuleux, exfoliations partielles de l'os; nouvelle cicatrisation définitive; surdité complète de l'oreille gauche; tremblemens convulsifs assez fréquens, provoqués par des congestions cérébrales; plusieurs saignées. Amélioration sensible; guérison complète dans les premiers jours de juin seulement; maintien d'une plaque de plomb appliquée sur la cicatrice, afin de la garantir des chocs extérieurs, et de prévenir son soulèvement.

Le sujet de cette observation a conservé sa méchante humeur; il était, avant sa blessure, d'un caractère doux et bon; il est devenu presque intraitable: rien ne semble satisfaire ses exigences et ses caprices; il en convient lui-même. L'organe cérébral, si profondément lésé chez cet homme, est effectivement, d'après Gall, l'organe de la bonté: c'est un fait qui peut acquérir encore beaucoup d'intérêt par la suite.

Quant à sa blessure, parvenue enfin à guérison, malgré les signes fâcheux qu'elle a présentés, il est probable que si la compression mécanique de l'encéphalocèle n'avait pas été employée avec autant de modération et de prudence, elle pouvait provoquer des accidens funestes au lieu de les éloigner.

Fracture du pariétal. Math***, du 18^e de ligne, blessé le 8 décembre, par un éclat d'obus, au côté gauche de la tête. Perte de connaissance, transport à Anvers : débridement, exploration de la plaie, qui est étroite. On reconnaît la dénudation du pariétal gauche et sa fracture en deux portions, perpendiculaires à la suture lambdoïde ; enfoncement circulaire et superficiel du fragment inférieur, dans l'étendue d'un pouce. Pansement simple, à sec, bandage contentif, saignée générale plusieurs fois renouvelée, révulsifs aux extrémités. L'état comateux se développe et persiste jusqu'au lendemain : anxiété, face rouge, peau chaude, pouls lent, délire : nouvelle saignée, diète, potion purgative, comme moyen de révulsion ; bientôt, mieux notable, moins d'anxiété, moins de délire, un peu d'appétit ; bouillon, continuation des pansemens simples. Amélioration soutenue, très prononcée le 24 décembre ; plus de précision dans les idées et dans les paroles ; suppuration bien établie, abondante ; pansemens journaliers. Le 1^{er} janvier, la suppuration diminuée, disparition graduelle des symptômes de compression ; quart d'aliment, un peu d'exercice. Guérison commençant quelques jours après, et à peu près complète vers la fin de janvier. Mais il reste un affaiblissement notable de tous les muscles de la face, et une paralysie des paupières du côté correspondant à

la blessure, ainsi que de la lenteur dans les paroles et les idées.

Quelques phénomènes persévérauts de congestion et de compression cérébrales, ou du moins une grande susceptibilité encéphalique, que conserve le blessé, nous font craindre que sa guérison ne soit point encore définitive.

Fracture du pariétal. Bou***, sapeur au 1^{er} régiment du génie, attaché au service du commandant Paulin; blessé le 14 décembre, au sommet de la tête, par un éclat de bombe. Après avoir exploré la partie et débridé la plaie, on découvre une fracture oblique du pariétal gauche, avec enfoncement peu sensible (une ligne à peu près); dénudation de l'os. Bientôt la tête devient pesante et douloureuse; ecchymose et tuméfaction des paupières; pouls plein. On prescrit des fomentations astringentes, la diète absolue, des boissons émollientes, un pansement simple, et l'on pratique une saignée; point d'extraction d'esquilles. Mieux, les jours suivans; mêmes médications; nouvelle saignée; occlusion des paupières jusqu'au 17; suppuration alors commençante; révulsion dirigée sur l'estomac et les intestins au moyen de quelques purgatifs; pansement tous les deux jours; résolution du gonflement des paupières; suppuration abondante; état général satisfaisant. Le 1^{er} janvier, le tra-

vail de cicatrisation commence; on accorde des alimens légers; les pansemens deviennent plus rares; guérison à peu près complète au 40^e jour.

Il n'y avait pas d'esquilles à extraire, et, malgré l'enfoncement osseux, les symptômes n'ont point persisté: il est donc probable que la table interne du pariétal est restée intacte.

Fracture comminutive et compliquée des deux pariétaux. Mel***, du 65^e, blessé le 21 décembre, au sommet de la tête, par un éclat d'obus: perte momentanée de connaissance. Les premiers soins sont donnés à l'ambulance de tranchée. Il existe une petite plaie contuse à la région sincipitale, au niveau de la suture sagittale. Fracture comminutive et enfoncement des pariétaux, près de leur suture, à quatre lignes à peu près de profondeur. Débridement crucial; pansement simple; évacuation sur Anvers. Aucun accident primitif; point d'exploration nouvelle; pansement d'une plaie simple. Vers le huitième jour, perte des mouvements du membre abdominal gauche, sans atteinte à la sensibilité; intégrité des autres membres et de tous les sens; quelques signes de compression du cerveau; tête pesante, état de torpeur; air hébété, intelligence intacte, mais lente; réponses difficiles; exploration attentive de la plaie; redressement, extraction des esquilles enfoncées dans

les membranes et la substance cérébrales (au nombre de neuf, étroites, anguleuses). Lésion du sinus longitudinal, ouvert et déchiré par ces esquilles. L'hémorragie, comprimée par leur présence, se manifeste immédiatement après leur extraction. Un morceau d'éponge, d'un demi-pouce de diamètre environ est porté, afin de l'arrêter, dans l'ouverture du crâne, qui est inégale, et anguleuse à son pourtour. Pansement simple. Amélioration notable.

Le lendemain, 28, disparition des symptômes de compression cérébrale ; mouvements graduels de la jambe gauche. Pansemens journaliers ; suppuration moindre ; resserrement de l'ouverture du crâne ; bourgeons charnus se développant à la surface du cerveau et de ses membranes ; suppuration nulle à la fin de janvier ; alimentation graduelle ; progrès vers la guérison. Entré à l'hôpital de Lille, le 2 avril, cet homme est dans l'état suivant : cicatrisation complète de la plaie ; altération des facultés intellectuelles ; apathie extrême ; facies hébété ; pupilles dilatées ; vue affaiblie, surtout du côté opposé à la lésion. Dépression très sensible du crâne au niveau de la blessure.

Il nous semble que la compression hématostatique, exercée conséutivement, pouvait déterminer des accidens graves, surtout si on avait

différé davantage la levée de l'appareil. Si l'hémorragie eût été produite par la lésion d'une artère isolée, il aurait mieux valu peut-être cauteriser isolément le vaisseau, que de recourir à la compression ; mais le sinus longitudinal ne saurait se prêter à ce procédé. Quoi qu'il en soit, les effusions sanguines qu'il fournit ne sont jamais dangereuses : un appareil léger suffit pour les faire cesser, si même elles ne s'arrêtent d'elles-mêmes. Quant à la compression cérébrale traumatique et à ses effets consécutifs, elle est évidemment le résultat de l'enfoncement des pièces osseuses. Mais serait-il à propos de chercher maintenant à les relever par l'application du trépan ? Le succès serait fort douteux, et entraînerait peut-être la mort. Nous avons du reste exprimé notre opinion à cet égard, en parlant des plaies de tête en général, et il serait inutile d'y revenir. L'usage persévérant d'un traitement anti-phlogistique et révulsif; le repos, le régime sévère et les autres moyens employés contre les encéphalites chroniques, suffiront d'ailleurs, probablement, pour dissiper les restes d'irritation cérébrale que Mel*** conserve encore.

Une blessure du même genre eut un résultat funeste et imprévu : j'en vais rapporter les principales circonstances.

Fracture du crâne à son sommet , par une petite bombe à la Cohorn ; enfouissement des pariétaux à quelques lignes de profondeur , dans une étendue égale à la paume de la main ; débridement ; extraction des esquilles ; ouverture énorme du crâne ; déchirure du sinus longitudinal ; hémorragie veineuse très abondante réprimée par une compression méthodique. Point d'accidens primitifs ; état très satisfaisant jusqu'au cinquième jour. Levée de l'appareil ; nouvelle hémorragie ; même moyen hématostatique , qui réussit aussi bien qu'auparavant. État satisfaisant du blessé , qui fait un effort imprudent pour prendre un objet éloigné de sa portée ; chute violente sur la tête dans le point même de la blessure ; mort subite.

Fracture compliquée du coronal et du pariétal.
 Bon***, carabinier au 16^e léger, blessé le 11 , par un éclat de bombe , à la partie antérieure et supérieure de la tête. Les effets de la compression cérébrale se prononcent presqu'immédiatement : gémissements , délire , face rouge , regard fixe , pouls plein , perte de connaissance. Plaie contuse , à lambeau , au dessus de la bosse pariétale gauche. L'exploration et le débridement font reconnaître une fracture simple du coronal et du pariétal gauche , avec dépression des fragmens à deux lignes , et dénudation des os:

pansement simple ; saignée , révulsifs appliqués aux extrémités ; diète. Amélioration légère, les jours suivans ; cependant, le délire est presque continu ; nouvelle saignée ; même régime. Encore du mieux ; le blessé balbutie quelques mots ; délire plus passager, intermittent ; peu de suppuration ; potion purgative. Mieux soutenu. Le 18, diminution progressive des symptômes de compression. Cessation complète du délire. Le 20 décembre, l'intelligence reparaît entière ; l'appétit se prononce : bouillon ; pansemens simples ; potion purgative renouvelée ; parole encore difficile et lente ; paralysie légère de la main droite ; même régime ; liniment volatil. Suppuration abondante ; pansemens fréquens. Le 24, on observe encore de l'hésitation dans la mémoire et de la lenteur dans la parole ; amélioration surprenante dès le lendemain. État satisfaisant , le 31 décembre ; mouvements de la main plus libres ; parole lente , mais naturelle ; mêmes soins. Accès épileptiformes vers midi , à des jours plus ou moins rapprochés, depuis le 4 janvier ; durée des accès de cinq minutes environ. Réapparition de quelques symptômes de compression cérébrale ; affaiblissement ; nouvelle diète ; mêmes pansemens simples ; potion acidulée. Amélioration générale vers le 10 janvier ; cessation de la paralysie partielle ; mieux

soutenu, du 10 au 20; un peu d'exercice; quart d'aliment; cicatrisation complète de la plaie, du 20 au 30 janvier.

L'état consécutif est caractérisé par la dilatation des pupilles, l'affaiblissement de la vue, surtout de l'œil gauche, et la perte d'une partie de la sensibilité du pouce droit. Le blessé a en même temps l'air hébété, l'intelligence difficile, la parole lente, et les mouvements apathiques. Les accès épileptiformes reparaissent à des époques variables, assez éloignées.

Fracture comminutive et compliquée du coronal et du pariétal; plaie de la main. Co***, du 18^e de ligne, blessé le 8 décembre par un éclat d'obus à la tête: perte de connaissance. Après les premiers secours, cet homme est évacué sur Anvers, où la plaie est attentivement explorée; elle est contuse, et correspond à la partie inférieure et latérale gauche du coronal. Fracture comminutive de cet os, avec enfoncement, dans l'étendue de deux pouces de diamètre, jusqu'au près de la voûte orbitaire; fracture du pariétal près de son bord antérieur, avec enfoncement comme au coronal; déchirure de la dure-mère, de l'arachnoïde, et du cerveau à sa superficie; issue d'une portion de substance cérébrale en détritus. Un débridement crucial est pratiqué: extraction de huit esquilles, pansement simple,

légère compression, saignées générales plusieurs fois renouvelées, diète sévère. L'état comateux se développe, et persiste pendant trente-six heures; délire sourd, parole nulle. Au bout de ce temps, retour graduel de la connaissance et des mouvemens. Des purgatifs légers sont administrés comme révulsifs, tous les trois ou quatre jours; boissons délayantes et rafraîchissantes.

Amélioration soutenue, mais excréptions involontaires de l'urine et des matières fécales. Le 13, second pansement; une compression légère est exercée sur la plaie. Amélioration plus sensible; le 20, appétit, bonillon. Suppuration bien diminuée; le 1^{er} janvier, cicatrisation déjà opérée sur plusieurs points. Mieux soutenu du 1^{er} au 15: mêmes soins, alimentation plus substantielle, progrès vers la guérison.

Du 15 au 30, la surface du cerveau se recouvre de bourgeons charnus, la suppuration se tarit. Etat général satisfaisant, mais faiblesse extrême; facies empreint d'un air stupide. La guérison semble cependant complète le 12 février, au soixante-cinquième jour, bien que le blessé conserve de l'affaiblissement dans l'ouïe et dans la vue du côté de la blessure, ainsi qu'une altération peu sensible des facultés intellectuelles.

Ajoutons que le même homme avait eu la

main droite légèrement blessée par le même éclat d'obus. C'était une plaie simple de l'éminence thénar ; la cicatrisation s'en est faite assez promptement.

Je regrette de ne pouvoir rapporter aussi en détail les faits dont les résultats ont été funestes, car je suis bien convaincu qu'il y aurait autant d'intérêt à les connaître ; mais les documens me manquent, à raison de la rapidité avec laquelle les blessés ont succombé, et du défaut de nécropsies.

Je ne puis donc présenter sur ces blessures que des indications sommaires, qui, du reste, suffiront pour justifier le pronostic fâcheux qu'on en avait d'abord porté.

Fractures du coronal. Un grenadier du 25^e de ligne est atteint de fracture comminutive et compliquée au côté gauche du coronal, avec plaie large, profonde et enfoncement des fragmens osseux dans la substance cérébrale, à plusieurs lignes de profondeur. Un débridement proportionné est pratiqué ; on opère l'extraction d'une large esquille. Hernie du cerveau, symptômes de compression au plus haut degré, saignée à chaque bras, révulsifs aux extrémités, pansement simple, accidens faisant des progrès, coma profond, mort le lendemain.

Gim***, sapeur du 1^{er} régiment du génie :

fracture comminutive et compliquée de la bosse frontale droite, par un morceau de mitraille, enfouissement des fragmens, état désespéré, malgré tous les soins nécessaires ; mort quelques heures après.

Fracture du temporal. Jul***, grenadier du 18^e de ligne : fracture simple du temporal gauche par un éclat d'obus ; enfouissement sans esquille ; plaie étroite, profonde et fortement contuse ; symptômes de compression, délire pendant le pansement, accidens comateux ; mort le second jour.

Fractures des pariétaux. Ric***, sapeur au 1^{er} régiment du génie : fracture comminutive des deux pariétaux, sans plaie ; enfouissement profond des fragmens ; incision cruciale, extraction de plusieurs esquilles ; soulagement momentané ; mort au bout de quelques heures.

Ver***, canonnier au 1^{er} régiment d'artillerie, blessé, le 22 décembre, à la partie supérieure de la tête, par un éclat de bombe, qui lui fait une plaie contuse de trois pouces d'étendue : débridement crucial, fracture comminutive du pariétal gauche, enfouissement de l'os à trois lignes et demie, extraction de cinq esquilles, pansement simple. Accidens convulsifs d'abord, ensuite accidens comateux : saignée copieuse. Le 25, peu d'amélioration et

délire; tuméfaction des paupières, dilatation des pupilles; pouls plein, dur, fréquent; respiration forte, stertoreuse; gémissements, agitation extrême. La saignée est renouvelée; diète absolue, potions purgatives. Le 25, même état à peu près; anxiété continue, pouls fort, fréquent; pupilles immobiles, dilatées; délire. Une surveillance active est exercée sur le blessé; révulsifs aux extrémités, nouvelle saignée. Ces médications procurent, les jours suivans, un peu plus de calme. Le 28, on renouvelle le pansement; la suppuration est abondante et fétide; état comateux, excréptions involontaires; diète, mêmes prescriptions. Le 29, respiration stertoreuse, très sonore; bouche écumueuse; pouls petit, fréquent; occlusion permanente des paupières, agonie et mort vers le soir.

Tour***, soldat au 2^e régiment du génie, entré à l'hôpital militaire d'Anvers, le 9 décembre: plaie contuse à la partie supérieure de la tête, avec enfoncement d'une portion des deux pariétaux, par un éclat d'obus. Au moment de l'accident, aucun symptôme de commotion du cerveau ne se manifesta; le débridement est suivi d'une hémorragie assez considérable, qu'on arrête au moyen d'un bandage compressif; rien d'alarmant n'existe d'ailleurs dans l'état général du ma-

la de p diète absolue, ab boissons rafraîchissantes.

Le 11, l'appareil est levé : enfouissement des deux pariétaux à l'endroit de la suture sagittale, formant une assez profonde concavité. Les portions osseuses étant enlevées, il en résulte une ouverture au crâne, de deux pouces de diamètre. Le sinus longitudinal supérieur est ouvert par l'extraction des esquilles; nouvelle hémorragie; application d'un bandage compressif, qui n'est suivie d'aucun phénomène morbide grave.

Pendant les premiers jours, aucun symptôme de compression du cerveau, aucune irritation sympathique des viscères ne se manifesta. Les jours suivants, extraction de quelques éclats d'os: agitation, insomnie, engourdissement des extrémités inférieures, irrégularité du pouls, point de fièvre. Régime sévère, boissons et lavemens laxatifs.

Le 14, nouveau pansement, point de suppuration, sortie d'une portion de substance cérébrale ramollie; mêmes moyens curatifs; mort durant la nuit du 14 au 15, par accident, en tombant du lit, sur la tête.

Examen cadavérique. Extravasation sanguine entre les téguments et les os du crâne, face vultueuse, sortie de sang et d'écume par les narines; dure-mère largement ouverte, substance cérébrale ramollie sur tout l'hémi-

sphère gauche, en grande partie en suppuration; ventricules contenant du liquide séro-purulent; lobe droit également lésé, injection des vaisseaux cérébraux, grande quantité de sang dans les fosses occipitales.

Un voltigeur du 5^e de ligne est atteint de fracture, compliquée de plaie contuse au pariétal droit, par un éclat de bombe, le 9 décembre: accidens de compression; débridement, exploration de la blessure, enfouissement à peine appréciable; aucune esquille à extraire. Pansement simple, saignées, révulsifs; amélioration temporaire, réapparition des accidens, le 12, avec plus d'intensité; médications anti-phlogistiques et révulsives sans effet; mort le quatrième jour de la blessure.

Fractures de l'occipital. Un grenadier du 58^e, blessé le 6, présente une fracture de l'occipital, dans l'étendue d'un demi-pouce, produite par un éclat d'obus; point de plaie, ni même de contusion apparente aux téguments; légère dépression de l'os. Accidens primitifs peu inquiétants. Incision cruciale, écoulement de sang épanché sous le derme chevelu; pansement simple; saignée, révulsifs, diète. Soulagement immédiat et soutenu pendant quatre jours. Alors, apparition des accidens comateux; réaction sympathique sur l'estomac et les intestins; vomis-

semens, diarrhée colliquative; mort le 14, au huitième jour.

Her***, voltigeur du 52^e: fracture comminutive et compliquée de l'occipital, produite par un éclat de bombe; perte de la substance osseuse dans l'étendue de deux pouces, hernie du cervelet à travers les membranes déchirées, hémorragie abondante. Extraction de plusieurs esquilles et d'une portion de la substance encéphalique. L'état de ce malheureux était désespéré: aussi n'a-t-il survécu que vingt-quatre heures, dans un coma profond.

Tels sont les considérations et les faits que j'avais à présenter sur les blessures de la tête; passons au compte rendu des blessures du cou, de la poitrine et de l'abdomen.

§ II. BLESSURES DU COU.

C'est peut-être à tort que j'ai annoncé des blessures du cou, tant elles ont été rares et simples; je n'en excepte que le fait suivant:

Go***, canonnier au 8^e d'artillerie, est atteint, le 18 décembre, d'un éclat d'obus à la partie postérieure du cou, sans aucune plaie extérieure. Le choc réagit fortement sur la tête, et l'ébranle au point de faire perdre au blessé l'équilibre et la connaissance; cet état dure quelques instans,

et ne cesse que pour faire place à une paralysie complète des extrémités supérieures. Le blessé, tout étourdi, a l'air hébété; il ne peut rendre compte de ce qu'il éprouve. Une saignée du bras est pratiquée de suite, et contribue seulement à dissiper les effets de la stupeur; mais la paralysie persiste, sans la moindre amélioration. Les fomentations résolutives, les topiques émolliens ne changent rien à cet état, qui ne cesse qu'au bout de quatre jours. On applique plusieurs ventouses scarifiées, qui déterminent immédiatement un soulagement notable, et dont l'emploi, continué à diverses reprises, dissipe peu à peu, et tout à fait enfin, la paralysie, le onzième jour de la blessure (1).

Quant aux plaies pénétrantes du cou par des balles, elles offrent, en général, un phénomène singulier, c'est d'être rarement suivies d'accidens hémorragiques, alors même que les projectiles frappent au niveau des gros vaisseaux, parce qu'ils semblent glisser sur eux, comme s'il y

(1) Nous aurions beaucoup à dire sur l'efficacité des ventouses scarifiées, non seulement dans des cas analogues, mais encore dans une foule de circonstances, si mon père, dans sa longue pratique, n'avait signalé depuis long-temps les effets remarquables de ce moyen thérapeutique.

avait là une élasticité préservatrice : j'en ai vu deux exemples à Anvers.

§ III. BLESSURES DE LA POITRINE.

On aurait lieu de s'étonner, d'après les observations que nous allons rapporter, que les blessures de la poitrine aient été peu fréquentes, si l'on ne songeait qu'en général elles furent mortelles presque sur le coup, et que ce ne pouvait être autrement à de si faibles distances des bouches à feu. La mort a eu lieu ou par commotion, ou par déchirure des poitrines, ou par lésion du cœur. Quelques blessés ont pourtant survécu à la violence de la commotion, et à des plaies pénétrantes du tissu pulmonaire ; il n'en est aucun qui n'ait succombé à des blessures du cœur, quoique le contraire soit possible, d'après des faits épars dans les annales de la science.

Nous avons vu, à la tranchée, le cadavre d'un homme qui avait eu la poitrine ouverte par un éclat de bombe : le cœur était coupé nettement en deux portions transversales ; quelques fibres seulement des parois du ventricule gauche se trouvaient épargnées.

Contusions.

La contusion qui accompagne les blessures d'armes à feu a eu des effets tout divers, et même, en quelque sorte, opposés, à la poitrine, malgré la similitude apparente des causes qui les produisirent. Un soldat du 5^e de ligne est atteint, dans le côté gauche de la région thoracique, d'un coup de boulet amorti; la contusion est légère, et n'empêche pas ce militaire de reprendre son service peu de jours après. M. Co***, capitaine du génie, est apporté, au contraire, mourant à l'ambulance de tranchée: un boulet, à la fin de sa course, l'a frappé à la partie inférieure du côté droit de la poitrine, sans la moindre trace de lésion extérieure, sans une seule déchirure aux habits; mais les parties molles sous-jacentes à la peau paraissent profondément attrites; le foie semble rompu; les quatrième, cinquième, sixième et septième côtes sont brisées; la plus petite pression cause des douleurs vives, malgré l'état de suffocation et d'anéantissement du blessé. Toute recherche devient inutile, et le malheureux officier expire peu d'instans après: ses camarades le croyaient tué par le vent du boulet. Nous n'avons pas fait l'autopsie du cadavre, parce que le corps fut

demandé par le régiment du génie auquel le capitaine appartenait, et dont il a été vivement regretté.

J'ai cité ces deux faits à raison du contraste qu'ils présentent; je pourrais en ajouter d'autres, s'il était nécessaire.

Les contusions de l'épaule peuvent s'étendre par contre-coup à la poitrine. Un soldat du 7^e de ligne, et un autre du 58^e, ont succombé à des contusions de cette cavité, déterminées par le choc de projectiles sur l'omoplate, sans fracture constatée.

Il est inutile d'expliquer que les contusions de la poitrine, plus que d'autres peut-être, sont d'autant plus graves que la surface contuse est plus étendue, le projectile plus volumineux, et lancé avec plus de force.

Voici trois faits qui démontrent les effets divers de ces contusions.

Vill***, soldat du 18^e, renversé le 19 décembre par un éclat de bombe: contusion à la partie antérieure gauche de la poitrine, au dessous de la clavicule, sans lésion des téguments ni fracture des côtes. Saignée immédiate, transport à l'hôpital. Empâtement et sensibilité très vive à la partie contuse; pâleur, froid général, engourdissement, crachement de sang, toux, oppression. On pratique une saignée de seize

onces, et l'on applique des fomentations résolutoires sur la poitrine.

Le 19, oppression moins forte, crachement de sang un peu moindre; la chaleur et le pouls sont relevés; douleurs vives dans la région contuse; cessation de l'hémorragie pulmonaire: nouvelle saignée. Le 20 et le 21, respiration régulière et facile; encore un peu de douleur, rien de notable depuis; amélioration graduelle, guérison prompte.

Au ***, voltigeur au 50^e de ligne, blessé le 16 décembre, par un éclat de bombe: fracture, sans déplacement, des cinquième, sixième et septième côtes sternales du côté droit; traces de contusions, sans plaie aux téguments; commotion violente du poumon; crachement de sang en abondance; dyspnée; douleurs vives, lancinantes; hoquet; anxiété extrême. Large saignée immédiate, fomentations émollientes; bandage contentif; repos absolu, diète sévère. Faible amélioration, le soir. On renouvelle la saignée; mieux sensible; diminution des douleurs, de la dyspnée et du crachement de sang: même régime. Troisième saignée, le 19; le mieux se soutient: cessation complète de l'hémorragie pulmonaire; progrès notables vers la guérison; consolidation des côtes sans déplacement; guérison au quarantième jour.

Ce fait prouve, d'une part, l'efficacité du simple bandage contentif pour la consolidation des fractures de côtes, et, d'autre part, le succès de la saignée générale, faite immédiatement, et renouvelée à propos, contre l'hémorragie traumatique du poumon. Mais il nous semble que des saignées locales par les ventouses scarifiées auraient heureusement contribué à détruire les effets de la contusion et de la commotion des parties extérieures, ainsi que du poumon lui-même. L'expérience a prononcé depuis long-temps sur ce point de pratique.

Lem***, brigadier du 8^e d'artillerie, blessé le 22 décembre à la poitrine par un éclat de bombe : contusion violente à la partie postérieure droite du thorax, sans solution de continuité extérieure ; épanchement sanguin considérable sous les téguments ; point de fracture appréciable. Perte de connaissance ; dyspnée extrême ; douleurs vives dans toute l'étendue de la partie contuse ; érachement de sang en abondance. On pratique une large saignée immédiate ; une incision longue et profonde est faite au foyer sanguin, et procure un écoulement considérable. Dès lors, amélioration passagère dans l'état général ; mais, le 24, apparaissent des symptômes de lésion profonde des organes pulmonaires, du côté correspondant à la bles-

sure. Une pleuro-pneumonie intense se développe. Saignée renouvelée; application de topiques émolliens et résolutifs; formation d'une nouvelle collection de liquide. Une seconde incision donne issue à une quantité assez considérable de pus mêlé de sang; suppuration fétide, accroissement des symptômes; amaigrissement progressif; fièvre hectique; et enfin, mort le 28 décembre, sixième jour de la blessure.

Nécropsie. Fracture de l'épine et de l'angle postérieur de l'omoplate; fracture et carie des apophyses épineuses et transverses des cinquième, sixième et septième vertèbres dorsales, ainsi que des côtes correspondantes; carie commençante des apophyses épineuses des quatrième et sixième vertèbres dorsales; épanchement considérable de sang et de pus dans la cavité droite du thorax; inflammation sur-aiguë de la plèvre costale et pulmonaire; déchirure et atrophie du poumon correspondant.

On voit par cette observation combien auraient été utiles les nécropsies, si toutes avaient pu être faites, non seulement pour constater des lésions déjà diagnostiquées, mais encore pour montrer celles qui auraient été méconnues. C'est ce que l'on a vérifié ici à propos de la fracture multiple de l'omoplate, des vertèbres et des côtes, sans qu'aucun signe l'ait fait apprécier

avant la mort. Les pièces fracturées ont été conservées par M. Thomassin. Ce qui frappe, en outre, dans cette observation, est la rapidité extrême avec laquelle se succéderent les accidens, les effrayans progrès de la maigreur, la promptitude remarquable de l'exhalation purulente, du développement de la carie des os, et de ces lésions profondes qui ne laissèrent aucune chance favorable au traitement le plus actif.

Plaies.

Les plaies de poitrine, comme celles de l'abdomen, par armes à feu, ne sont pas toujours mortelles, par cela seul qu'elles sont pénétrantes ; elles peuvent au contraire, dans certains cas, devenir funestes lorsqu'elles sont superficielles : les accidens dépendent alors de la commotion.

Hunter pensait que les plaies de poitrine par armes à feu sont moins graves que les mêmes plaies produites par des instrumens piquans, et il se fondait sur ce que l'hémorragie n'a pas lieu généralement par la première cause, tandis que le sang ne trouve pas une issue aussi facile à travers la plaie qui résulte d'une simple piqûre.

Nous ne redirons pas ce qui est mieux décrit ailleurs sur les effets si variés des projectiles, et surtout sur ceux des balles, relativement aux

plaies de poitrine: perforation simple ou double; trajet direct, oblique, recourbé, dévié dans tous les sens; issue du projectile, aidée par l'art, ou spontanée, prompte ou tardive; lésions apparentes ou réelles des organes pulmonaires et quelquefois du cœur, etc., etc.; telles sont les particularités les plus souvent notées des plaies de ce genre.

Le premier soin, après le pansement d'une plaie supposée grave à la poitrine, qu'elle soit ou non pénétrante, c'est d'obvier aux accidens inflammatoires. Le traitement anti-phlogistique, basé sur l'emploi raisonné de la saignée générale et locale, est éminemment propre à remplir la première indication qui se présente.

Répétons encore combien il est à regretter que, dans quelques cas, on n'ait pas pratiqué de saignées locales révulsives à l'aide des ventouses scarifiées.

Le débridement doit être beaucoup plus mesuré à la poitrine que dans toute autre partie, afin de faciliter davantage la réunion exacte de la plaie, de prévenir le contact et l'infiltration de l'air, ainsi que l'épanchement de sang dans la cavité thoracique. Des pansemens rares, un régime très sévère, le repos absolu et la position, tels sont les soins généraux que réclament les lésions de ce genre; tel est le traitement qui a

été mis en usage chez les hommes qui en ont été atteints devant Anvers.

Quelques larges plaies, pénétrantes ou non, ont été réunies par des points de suture.

R***, voltigeur du 25^e de ligne, est frappé par un éclat de bombe à la partie latérale gauche du thorax : fracture comminutive et compliquée des sixième et septième côtes; plaie pénétrante, de quatre pouces d'étendue et de trois travers de doigt de large. On procède à l'extraction des esquilles; réunion de la division par trois points de suture; pansement simple; bandage contentif. Accidens graves; insuccès des moyens thérapeutiques; mort le sixième jour.

La suture était manifestement contre-indiquée dans cette circonstance.

Plusieurs Hollandais du 10^e régiment, faits prisonniers à l'assaut du fort Saint-Laurent, avaient reçu des coups de baïonnette dans la poitrine; mais parmi ceux qui ont été transportés à l'ambulance, aucun n'a offert les signes de quelque lésion profonde. Il est vrai de dire que leurs habits étaient rembourrés solidement, et que nos braves du 65^e, une fois maîtres des remparts, n'ont plus eu d'autre but que d'obliger l'ennemi à cesser de combattre.

L'hémorragie primitive d'une des artères intercostales a eu lieu dans un seul cas, à notre

connaissance , et encore le blessé , qui appartenait au 19^e léger, a-t-il succombé peu d'instans après , moins par la perte du sang que par suite de la commotion ; il avait été atteint d'un éclat de bombe au côté gauche du thorax , avec plaie fortement contuse.

L'hémorragie du poumon fut une des suites les plus fréquentes des blessures de la poitrine , tant par la commotion profonde que par la lésion directe du tissu pulmonaire. Nous avons déjà indiqué , à cet égard , l'efficacité de la saignée générale , renouvelée à propos.

Les plaies pénétrantes de la poitrine ne présentent pas seulement des phénomènes locaux très variés ; il en est qui peuvent déterminer des accidens généraux assez remarquables.

Desm***, fusilier du 8^e régiment de ligne, est atteint , le 23 décembre , d'une balle qui traverse le côté gauche de la poitrine , entre les septième et huitième côtes , et ressort au niveau de l'apophyse transverse de la neuvième vertèbre dorsale. Tous les accidens des plaies pénétrantes de poitrine se manifestent bientôt , et de plus , il survient une paralysie des membres inférieurs et de la vessie. Le blessé ne peut survivre plus de vingt-quatre heures à cette lésion , malgré l'activité des médications anti-phlogistiques. Il avait été transporté à l'ambulance

de Beveren, où nous n'avons pu l'examiner.

Parmi les plaies non pénétrantes de la poitrine, en voici une assez singulière :

Ra***, soldat au 10^e régiment hollandais, blessé à la lunette Saint-Laurent, par un éclat d'obus, qui lui avait enlevé une partie des tégumens de la poitrine du côté droit, sans contusion ni fracture, portait une plaie, parfaitement régulière et elliptique. Elle paraissait faite par un instrument tranchant, et ressemblait en tout à celle qui résulte de l'ablation du sein chez la femme (1). On réunit ses bords sans suture, et la guérison ne se fit pas long-temps attendre.

Il n'est pas toujours facile de déterminer si une plaie de poitrine est pénétrante ou non, quels que soient les moyens d'investigation dont on fait usage. Un canonnier du 1^{er} régiment d'artillerie est atteint d'une balle, qui pénètre par le creux de l'aisselle droite, sans léser aucun vaisseau, et ressort entre les deux épaules; aucun symptôme de pénétration ne se manifeste; la blessure guérit comme la plaie la plus simple, et sa direction seule indique qu'elle a du être pénétrante.

Les fragmens de mitraille qui entrent dans la

(1) On sait que les projectiles lancés par la poudre à canon agissent quelquefois comme les armes blanches.

cavité thoracique, étant, par leurs aspérités, moins susceptibles que les balles de ce que j'appellerais volontiers des *déviations salutaires*, doivent produire des lésions plus profondes, des plaies plus déchirées.

F***, du 28^e de ligne, atteint, le 15 décembre, d'un coup de feu dans le côté droit de la poitrine : accidens immédiats ; forte dyspnée ; toux ; crachement de sang ; large saignée du bras. A l'examen de la blessure, on trouve une seule plaie, à bords frangés ; débridement ; fracture des 6^e et 7^e côtes ; épanchement ; extraction d'un éclat de mitraille et de quelques esquilles. On procède à la réunion de la plaie à l'aide d'un pansement simple ; nouvelle saignée ; diète sévère ; amélioration momentanée. Accidens plus intenses, vers le cinquième jour ; dyspnée, toux, crachement de sang ; suppuration abondante ; affaiblissement graduel ; mort par épuisement.

Il y a eu quelques cas d'emphysème partiel dont les détails seraient sans intérêt. Ron***, du 25^e de ligne, et le Hollandais Waymans, du 10^e, ont eu, pendant plusieurs jours, la poitrine emphysémateuse.

Les fractures de côtes ont été très fréquentes ; tantôt simples, tantôt avec fracas, et le plus souvent sans déplacement. La consolidation, dans ce dernier cas, a été prompte et facile, à l'aide d'un simple bandage contentif et de la position.

Les extrémités des côtes fracturées ont été réséquées dans le cas suivant :

Heimann, soldat hollandais, blessé au fort Saint-Laurent : plaie contuse et déchirée à la partie moyenne, antérieure et externe de la poitrine, du côté droit, par un éclat de mitraille; fracture comminutive de la partie moyenne des cinquième et sixième côtes, issue des fragmens à travers la plaie, hernie du poumon. On pratique la résection des fragmens anguleux des côtes, dans quelques lignes d'étendue, seulement ; extraction des esquilles, réunion des lèvres de la plaie par deux points de suture⁽¹⁾ et des bandelettes ; point d'hémorragie par les artères intercostales ; saignée consécutive, renouvelée à diverses reprises ; état satisfaisant, mais accident funeste six jours après, par une intempérance imprévue ; violente indigestion, péritonite sur-aiguë ; mort vingt-quatre heures après, septième jour de la blessure.

J'étais de service à la tranchée lorsque ce blessé a été opéré par M. Forget, qui n'a pu me donner d'autres renseignemens.

Bouch***, du 5^e régiment de ligne, blessé le 3 décembre : plaie à la partie inférieure gauche

(1) Il faut bien le répéter ici, la suture n'est presque jamais indiquée pour la réunion des plaies de la poitrine, si étendues ou irrégulières qu'elles soient.

Les extrémités des côtes fracturées ont été de la poitrine, compliquée de fracture des neuvième et dixième côtes; la balle, entrée près du rebord libre des côtes, est sortie par la région lombaire gauche; débridement, extraction des esquilles.

Le 5, crachement de sang, dureté, accélération du pouls, oppression, dyspnée, fièvre.

Jusqu'au 15, peu de diminution dans les symptômes; saignées au nombre de neuf ou dix, pour combattre une exacerbation qui se renouvelle chaque soir. Pansement simple, diète sévère. Vers le quatrième jour, suppuration établie, et successivement plus abondante.

Le 16, le crachement de sang est remplacé par une expectoration muqueuse, purulente; l'état du malade devient de plus en plus inquiétant.

Le 18, respiration fréquente, laborieuse, altération des traits de la face, petitesse du pouls, abattement, mort.

Autopsie. Fracture comminutive des neuvième et dixième côtes, avec un grand nombre d'esquilles; épanchement considérable de sérosité purulente dans la poitrine; cavités droites du cœur hypertrophiées; plèvre épaisse, lardacée; poumon gauche désorganisé, réduit au tiers de son volume ordinaire, ayant l'aspect et la densité du foie; inflammation chronique de l'intestin grêle, intégrité des autres organes.

Cette observation n'a d'intérêt que par la nécropsie, en ce sens que les altérations des organes thoraciques pouvaient remonter à une époque antérieure, et ne pas dépendre uniquement de la blessure. L'entérite chronique a dû contribuer aussi au funeste résultat.

Vinc***, tirailleur du 19^e léger, est blessé le 15 décembre par un coup de feu dans la poitrine : entrée de la balle à la partie latérale droite du thorax, au dessous de la première côte sternale, sans lésion de la clavicule ; trajet au dessous de cet os, à travers la plèvre, le sommet du poumon, le muscle sous-scapulaire, la fosse sous-scapulaire, et arrêt du projectile entre les fibres du muscle sous-épineux. Accidens primitifs comme dans les cas analogues, dyspnée, toux, douleurs, crachement de sang : large saignée du bras, débridement de la plaie, exploration, réunion, pansement simple, position sur le côté blessé, régime sévère. Faible amélioration jusqu'au lendemain, douleurs dans la direction qu'a parcourue le projectile, et au niveau du scapulum. Incision profonde au dessous de l'épine de l'omoplate, extraction de la balle ; ce qui diminue les douleurs locales ; mêmes accidens du côté de la poitrine. Nouvelle saignée, crachats striés de sang, toux opiniâtre. On a recours à la saignée locale par les sang-

sues : diète, boissons adoucissantes ; un peu de mieux au bout de quatre jours ; suppuration abondante, amaigrissement ; régime sévère, médication palliative, repos absolu. Sous l'influence de ces moyens, amélioration sensible, cessation des crachats striés de sang, toux moindre, etc. cicatrisation graduelle de la blessure et de l'incision, guérison au trente-huitième jour.

Ce fait se rapporte à ce que nous avons dit de certaines blessures du cou par des balles qui traversent les interstices musculaires, en glissant sur les vaisseaux, sans les léser.

Une blessure presque semblable a eu lieu chez N***, du 1^{er} régiment du génie. Aucun accident n'est survenu, si ce n'est une douleur au niveau de l'omoplate, d'où la balle a été extraite par incision : elle avait probablement contourné les côtes.

Chez Lég***, du 25^e, la même blessure encore n'a pu être suivie de l'issue du projectile qui paraissait logé dans la fosse sous-scapulaire.

M. Che***, lieutenant du 8^e régiment d'artillerie, blessé le 21 décembre par une balle : Plaie pénétrante du côté droit de la poitrine, d'arrière en avant, entre les quatrième et cinquième côtes sternales, assez près de leur angle; perforation du poumon, et issue de la balle à trois travers de doigt au dessous du mamelon

droit. Exploration superficielle faite d'abord à l'ambulance de Saint-Laurent : extraction, sans débridement, d'un fragment métallique de la giberne, engagé dans la plaie postérieure ; la balle est trouvée dans les vêtemens, à la partie antérieure du tronc. Transport immédiat à Berchem ; exploration profonde de la plaie, débridement ; extraction de quelques petites esquilles des quatrième et cinquième côtes, par l'ouverture antérieure ; pansement ; évacuation à Anvers ; accidens pendant la nuit, anxiété, agitation, crachats sanguinolens, dyspnée. On oppose à ces symptômes la diète, les boissons gommeuses, et une saignée de 12 onces ; amélioration le lendemain, 22. Le 23, douleurs vives dans le trajet de la blessure, dyspnée ; saignée de 8 onces, diète ; oppression augmentée dans la nuit, crachats purulens, expectoration douloureuse et difficile ; le 24, nouvelle saignée, soulagement notable, crachats moins abondans, toux presque aussi fréquente, expectoration plus facile ; les 25 et 26, amélioration soutenue, diète continuée.

Le 27, douleur vive ; nouvelle saignée ; constipation opiniâtre depuis plusieurs jours ; lavemens sans effets ; un suppositoire savonneux procure plusieurs selles.

Le 1^{er} janvier, cessation presque complète des

symptômes de la lésion pulmonaire; cicatrisation de la plaie postérieure, suppuration normale par la plaie antérieure, état général satisfaisant; alimentation proportionnée.

Le 9, issue par la plaie postérieure d'une esquille mince et allongée. Le 16, dilatation de l'ouverture antérieure avec de l'éponge préparée. Le 25, cette plaie est frappée de gangrène d'hôpital: pansemens avec le chlorure d'oxyde de sodium. Le 1^{er} février, amélioration notable. Le 6, séparation des escharres, plaie complètement détergée. Le 12, la cicatrisation est presque terminée: évacuation du blessé sur la France. Il est permis de croire que si l'on s'était abstenu des pansemens fréquens, et surtout si la double plaie avait été réunie immédiatement après le débridement et les explorations nécessaires, on aurait probablement écarté plusieurs des accidens qui sont survenus chez ce blessé.

Cette observation n'en est pas moins une des plus intéressantes, par ces accidens mêmes, et par leur terminaison heureuse; elle complète ce que nous avions à dire des plaies de poitrine.

§ IV. BLESSURES DE L'ABDOMEN.

Les blessures de l'abdomen ont été plus rares à la fin du siège qu'au commencement, à cause,

peut-être, de l'escarpement des tranchées. Elles ont été moins fréquentes encore que les blessures de la poitrine, parce que les hommes, presque toujours courbés pour leur service de tranchée, comme pour se mettre à l'abri des projectiles, se trouvaient ainsi moins exposés à être atteints dans le ventre. Un certain nombre, néanmoins, ont été tués sur coup par des boulets, des éclats de bombes et d'obus à cette région : plusieurs cadavres, apportés à l'ambulance de tranchée, ont offert à nos yeux ces horribles éven-trations que nous avons essayé de décrire.

Contusions.

Les contusions du bas-ventre sont moins dangereuses que celles de la poitrine, quoique la cavité thoracique soit plus solidement protégée que la cavité abdominale ; mais les poumons et le cœur sont, par leur nature, par leurs rapports et par leurs fonctions, des organes plus impressionnables aux effets des contusions violentes que ne le sont les viscères abdominaux : c'est un fait qui n'exige pas d'autre preuve, et que l'observation nous a fait confirmer à Anvers, comme il est avéré pour tous les chirurgiens. Je n'ai vu qu'un seul homme tué presque sur le coup par une contusion de l'abdomen ; c'était un mi-

neur du 1^{er} régiment du génie : il fut frappé à l'hypogastre par un boulet amorti. Nous n'avons pas eu le temps de faire l'ouverture du cadavre : la vessie avait sans doute été rompue, et l'épanchement d'urine s'était fait dans la cavité péritonéale.

La commotion viscérale qui suit instantanément les contusions assez fortes de l'abdomen m'a fait constater, dans plusieurs cas, une constipation symptomatique d'une durée variable. L'effet contraire, c'est à dire le flux diarrhéique, est survenu chez un seul homme.

Dans une autre circonstance, la contusion abdominale, au flanc gauche, fut suivie d'une paraplégie incomplète des membres inférieurs, qui disparut deux jours après, sous l'influence d'une saignée, des fomentations émollientes, d'une potion purgative et du repos.

Un soldat du 25^e fut atteint, étant à une grande distance, il est vrai, de plusieurs éclats de mitraille, à la poitrine et au ventre : il eut autant de contusions et pas une seule plaie.

Voici un cas de contusion mortelle, compliquée d'une fracture de l'avant-bras.

Leg***, grenadier au 52^e, est blessé le 19 par un biscaïen : fracture complète des os de l'avant-bras gauche, avec plaie aux téguments de la face antérieure de ce membre; contusion violente du

flanc gauche; perte de connaissance. Transporté à l'hôpital, le 20, cet homme offre les signes d'une lésion profonde des organes abdominaux : pâleur, froid général, pouls petit, accéléré; vive sensibilité du bas-ventre, surtout au côté atteint, mais aucune trace de contusion ; hématurie ; toux, respiration difficile, exaspérant les douleurs. Douze sanguines sont placées sur l'abdomen, cataplasmes émolliens, potion anodine; ensuite un appareil de fracture est appliqué à l'avant-bras.

Le 21, vomissements noirâtres, hoquet, soif vive, douleurs abdominales exaspérées par la moindre pression ; l'hématurie continue ; pouls petit, très accéléré ; large ecchymose à l'endroit contus ; douze sanguines encore sur l'abdomen, fomentations émollientes, saignée, diète sévère.

Le 22, surcroît d'intensité dans les symptômes ; affaiblissement de la voix, dyspnée intense, délire ; mort.

Autopsie cadavérique.—Épanchement de sang dans l'abdomen, mêlé à une grande quantité de pus jaunâtre, fétide, assez consistant. Le péritoine, du côté gauche, a une couleur rouge foncé. Le colon descendant et l'intestin iléon présentent une injection très vive, brunâtre, dans une grande partie de leur étendue; estomac sain, très volumineux. La rate, le rein droit et la vessie

elle-même sont sans altération; mais il existe une déchirure oblique de la scissure du rein gauche: cette dernière circonstance rend compte de l'hématurie continue qui fut observée.

Cette blessure était sans doute mortelle de sa nature, à raison surtout de la déchirure du rein; on peut cependant faire observer que les évacuations sanguines auraient pu être employées avec plus d'énergie pour combattre les accidens qu'elle détermina.

Plaies de l'abdomen.

Il serait erroné d'émettre en principe absolu que les plaies superficielles de l'abdomen n'entraînent pas d'accidens graves. Ne sait-on pas qu'une contusion violente peut compliquer une plaie légère et ainsi déterminer la mort? Cette circonstance suffit à pour réclamer la surveillance attentive de toutes les plaies de l'abdomen, quelles qu'elles soient. Débrider et réunir méthodiquement les plaies pénétrantes, rien de plus d'abord; l'expectation est alors une méthode très rationnelle. Il faut éviter les recherches forcées des corps étrangers perdus dans la cavité abdominale. Les seuls efforts de la nature sont merveilleux dans les blessures de ce genre. Il est inutile d'ajouter que le traitement anti-phlogistique est tout à fait indiqué.

Nous avons déjà dit que les plaies d'armes

blanches ont été fort rares pendant le siège. Quelques Hollandais du fort Saint-Laurent ont eu des coups de baïonnette dans le ventre comme dans la poitrine. Un seul a succombé à une plaie pénétrante, qui avait intéressé l'estomac et le diaphragme.

Le coup, porté chez un autre à l'hypogastre, immédiatement au dessus du pubis, paraissait, d'après sa direction, avoir perforé la vessie; mais aucun symptôme ne confirma ce diagnostic.

Revenons aux plaies d'armes à feu. Les parois abdominales ont été entamées plusieurs fois par divers projectiles, ou perforées par des balles, à la manière d'un séton, sans qu'aucun viscère ait été lésé, ou du moins sans qu'aucun symptôme en ait indiqué la lésion.

Vi***, grenadier du 61^e, fut atteint d'une balle qui traversa ainsi les parois abdominales, depuis le côté gauche de la région ombilicale jusqu'à l'aine du côté droit, sans autre effet que celui d'une double plaie simple.

Les projectiles qui pénètrent dans la cavité abdominale, sans en ressortir, offrent plus de difficulté à leur extraction que dans toute autre partie, et peuvent y séjourner long-temps avec ou sans déplacemens consécutifs.

Bu***, sapeur du 1^{er} régiment du génie, fut blessé le 7 décembre par un coup de feu dans le flanc gauche : forte plaie contuse, pénétration de la balle dans le petit bassin, sans lésion de la

vessie; *accidens* passagers; exploration inutile de la plaie; traitement ordinaire: guérison, malgré la présence du corps étranger, qui se fera peut-être jour plus tard.

Il n'est pas seulement difficile de trouver les projectiles perdus dans la cavité abdominale, il l'est souvent encore de les extraire quand on les a trouvés.

P***, voltigeur au 25^e de ligne, blessé le 17 décembre par un éclat d'obus à l'aine gauche: plaie fortement contuse, inégale, déchirée, profonde; dénudation des muscles et des vaisseaux; implantation du projectile dans le fond de la plaie; débridement, exploration. Les tentatives d'extraction du corps étranger avec les doigts et les pinces offrent une difficulté extrême; les précautions prises contre la lésion des vaisseaux restent vaines; hémorragie abondante par la partie inférieure de la veine iliaque externe: tamponnement, appareil compressif; cessation momentanée de l'hémorragie. Au second pansement, seconde hémorragie, et de même jusqu'au cinquième pansement, et de même ensuite dans l'intervalle de chacun d'eux. Épuisement progressif; mort vers le quinzième jour.

Ce fait démontre donc en même temps le danger des hémorragies consécutives. (Voir *Hémorragies.*)

Les petits saignements sont le résultat courant de la

Les hernies des organes contenus dans l'abdomen sont une conséquence grave de certaines plaies pénétrantes : celles des intestins ou de l'épiploon sont les plus communes ; mais quand elles sont produites par les armes à feu, elles entraînent des suites d'autant plus funestes.

Ber***, mineur au 2^e régiment du génie, blessé le 13 décembre par un coup de feu : plaie de la partie inférieure et latérale gauche de la poitrine, près de l'hypochondre, perforation de la région iliaque et issue du projectile à travers l'épaisseur de la fesse du même côté. Accidens primitifs, hernie de l'épiploon dans l'étendue d'un pouce et demi ; aucun signe de lésion intestinale ; débridement, réduction assez facile de la hernie. Un point de suture est pratiqué ; pansement simple, soutenu par un bandage contentif. Diète, régime sévère, médication anti-phlogistique ; cessation des accidens primitifs ; travail de cicatrisation des plaies ; guérison vers le vingt-cinquième jour.

La suture pratiquée dans ce cas n'était pas d'une nécessité absolue, et il me semble qu'à moins de plaie très étendue des parois abdominales, avec ou sans lésion des viscères, la gastrorraphie a plus d'inconvénients que d'avantages, parce que, malgré leur rapprochement, les points de suture permettent fréquemment à quelqu'une des

parties contenues dans l'abdomen, telles que l'épiploon ou l'intestin, de s'étrangler entre leurs interstices, et qu'ils peuvent déterminer des accidens inflammatoires susceptibles de devenir funestes. Un pansement simple, ou de larges et longues bandelettes agglutinatives, un bandage contentif, la position et le repos suffisent ordinairement pour maintenir en contact les plaies de l'abdomen, dont les tégumens sont d'ailleurs si extensibles.

L***, fusilier au 8^e de ligne, blessé à la digue de Doël, le 25 décembre, par une balle : plaie contuse, pénétrant de haut en bas, et d'avant en arrière, les plans de muscles situés à la partie antérieure et inférieure du flanc gauche, à quelques lignes de l'épine iliaque antéro-supérieure ; perforation du muscle et de la fosse iliaques ; saillie du projectile sous la peau, à travers les muscles fessiers du côté correspondant.

Débridement de la plaie pratiqué à Beveren ; incision sur le corps étranger, qui est extrait, ainsi que quelques débris de vêtement ; pansement simple, bandage contentif : accidens consécutifs ; douleurs dans la région iliaque ; légère tuméfaction de la plaie antérieure ; formation d'un abcès dans l'espace compris entre les deux plaies. Ouverture à maturation ; médication simple ; fin des accidens ; point de signes de lésion

viscérale; suppuration normale; travail de cicatrisation; guérison complète au trentième jour.

Ce fait, d'ailleurs simple, ne permet de remarquer que le trajet du projectile sous les tégumens, et l'élasticité de ceux-ci, qui forment souvent un point d'arrêt au lieu d'être perforés.

Sal***, caporal au 1^{er} régiment du génie, blessé, le 19 décembre, par une balle de fusil de rempart : plaie contuse traversant les parois tegumenteuses du thorax, au niveau des cartilages des sixième et septième côtes sternales du côté gauche; trajet du projectile sous la peau jusqu'au flanc du même côté; ouverture de sortie et perforation nouvelle à un pouce et demi au dessous, en contournant la crête iliaque de dedans en dehors, et en érodant la lèvre externe de cette partie osseuse; issue du projectile à travers le muscle grand fessier. Débridement des plaies, pansement simple, transport à Anvers. Vives douleurs pendant les quatre ou cinq premiers jours, au niveau des deux plaies intermédiaires; écoulement de la suppuration et d'une petite quantité de matières sterco-rales. Pansement à fond, le 23; aspect noirâtre et maché de ces plaies, entourées d'un cercle inflammatoire assez prononcé; suppuration très abondante par l'ouverture de sortie; dif-

ficulté dans les mouvemens du tronc ; douleurs continues ; fièvre traumatique : topiques et lavemens émolliens ; cataplasmes laudanisés ; écoulement par la plaie principale d'une petite quantité d'eau des lavemens. Amélioration notable vers le 28, diminution des douleurs et de la suppuration ; cessation complète de l'écoulement de matières stercorales ; travail de cicatrisation , plus d'accidens ; locomotilité normale : guérison complète le 25 janvier, au trente-huitième jour.

Cette blessure , plus remarquable que la précédente , par le trajet sous-cutané du projectile et les doubles perforations qu'il a faites , était compliquée de la lésion de l'S iliaque du colon , ainsi que l'indique l'écoulement des matières mêlées à la suppuration , et de l'eau des lavemens. La position à demi-courbée en avant , lorsque le projectile a frappé , explique la direction qu'il a suivie.

D***, voltigeur au 8^e de ligne , blessé le 25 décembre par une balle de fusil de munition : perforation de haut en bas de la partie inférieure et postérieure de la poitrine , entre les huitième et neuvième côtes. Il n'existe qu'une seule plaie , assez étroite : débridement , pansement simple. Accidens primitifs ; douleurs vives dans toute la région abdominale ; application de sang.

sues, cataplasmes, lavemens, demi-bains, fomentations émollientes. Amélioration à peine sensible; paralysie des extrémités inférieures et de la vessie; nécessité du cathétérisme pour opérer l'émission des urines; météorisme du ventre, nouvelles douleurs, constipation opiniâtre, mais ni hoquets, ni nausées, ni rapports, ni vomissements. Diète, régime sévère, médication émolliente; état stationnaire jusqu'au onzième jour de la blessure. Alors une selle volontaire, et quelques autres, les jours suivans: de là, une amélioration notable; mouvements d'abord peu sensibles des membres inférieurs, puis plus prononcés, ensuite plus faciles. Quelques pressions graduées sur l'hypogastre suffisent pour faire couler l'urine, sans continuer l'introduction de la sonde dans la vessie. Cessation des douleurs abdominales et du météorisme, cicatrisation de la plaie; guérison à peu près complète dans les derniers jours de janvier.

Cette observation pouvait être rangée parmi les plaies de poitrine, puisque c'est là qu'a été faite la blessure; mais sa direction de haut en bas, et les accidens qui sont survenus la rapprochent plutôt des plaies de l'abdomen.

Les symptômes de paralysie nous ont porté à croire que la balle avait pu atteindre la colonne vertébrale, s'y enclaver peut-être, et léser la

moelle épinière par compression directe ou médiante. Améliorations belles. Améliorations émollientes.

La femme Gr***, âgée de vingt-quatre ans, cantinière au 61^e régiment de ligne, est frappée dans le ventre d'un coup de feu, le 19 décembre au soir ; elle tombe sans connaissance et est transportée à l'ambulance de la 4^e division. La balle, lancée d'une très petite distance, avait pénétré au dessous de l'appendice xiphoïde et était ressortie directement à la partie postérieure droite du tronc, en fracturant l'apophyse transverse de la douzième vertèbre dorsale. Le chirurgien-major, M. Letulle, s'empresse de donner ses soins à cette pauvre femme, qui perdait encore du sang par les deux plaies. Il reconnaît de suite tout le danger de cette funeste blessure, et parvient à arrêter l'hémorragie par le tamponnement et une compression modérée. L'évanouissement cesse, mais d'autres accidens se déclarent ; des hoquets convulsifs, des nausées, des vomissements de matières bilieuses et alimentaires, sans mélange de sang ; une dyspnée intense, des douleurs violentes dans le trajet de la blessure et dans toute la région abdominale, fortement distendue par une grossesse avancée ; des contractures spastiques des mains et des pieds, et enfin une anxiété extrême suivie de convulsions. Quels secours apporter à cette hor-

rible situation? Une saignée du bras, des fomentations émollientes, des frictions sèches sur les membres, un lavement opiacé, une potion calmante et la position: voilà tout ce qu'il était permis de faire, dans un état si grave et qui ne pouvait finir que par une mort prochaine. De-
vait-il donc durer quatorze heures, et la vic-
time de tant de souffrances devait-elle se sen-
tir vivre dans une si longue agonie? c'est ainsi
qu'il en a été.

Le premier devoir à accomplir après la mort de cette femme fut de s'assurer si son enfant n'avait pas péri avec elle. La dilatation du col de la matrice était appréciable au toucher, ainsi que la position du fœtus, qui était sans mouvement. M. Letulle se décide aussitôt à l'ex-
traire par l'opération césarienne, qu'il pratique latéralement, en présence de son aide-major, M. Montcourrier, et d'un médecin belge, pré-
sent par hasard; mais l'enfant (c'était une fille) était mort à la fin du huitième mois, par réac-
tion de la fatigue de sa mère, et depuis plu-
sieurs jours sans doute; car il exhalait une odeur de putréfaction commençante.

Voici quelles étaient, chez cette femme, les lésions cadavériques: le lobe moyen et le petit lobe du foie avaient été perforés par la balle qui, en passant au dessus de la petite courbure de

l'estomac, avait pénétré dans l'arrière-cavité des épiploons ; la veine-cave inférieure avait été ouverte au niveau de la douzième vertèbre dorsale, et le pilier droit du diaphragme traversé. Un épanchement considérable occupait une partie de la cavité abdominale, et un caillot de douze à quinze onces obstruait l'orifice de la veine au dehors et au dedans : ce caillot s'était probablement formé sous plusieurs influences, la syncope, le tamponnement, l'appareil contentif et la compression directe des viscères abdominaux, surtout de la matrice à son plus haut point de développement ; c'était sans doute aussi la cessation de l'hémorragie qui avait retardé de quelques heures la mort inévitable de la malheureuse cantinière.

§ V. BLESSURES DES PARTIES GÉNITALES.

Il n'y a rien à dire des contusions des testicules, et des orchites qui leur sont consécutives, ce serait sans le moindre intérêt.

Un soldat du 58^e a eu, par un éclat de mitraille, une portion du scrotum totalement enlevée, dans l'étendue d'un pouce à peu près, sans lésion des testicules. La plaie, qui semblait faite par un instrument tranchant, s'est cicatrisée rapidement.

Chez *Dest*, du 6^{me}, une portion du bord libre du prépuce a été aussi nettement coupée par un éclat de mitraille, qui avait fait une petite plaie contuse à la jambe.

Il est un phénomène notable, qui se rapporte aux blessures de la tête, mais qui doit nécessairement trouver place ici, c'est que, dans quelques cas de contusions ou de plaies contuses de la région occipitale, il est survenu, soit immédiatement, soit peu d'instans après, vers les parties génitales, des effets sympathiques, caractérisés par des érections douloureuses. J'ai eu deux fois surtout la certitude de ce fait, et quelques autres blessés m'ont dit avoir éprouvé la même sensation ; mais je regrette de n'avoir pu en constater toutes les nuances, savoir si les érections étaient toujours douloureuses, instantanées, durables ou récidivées, suivies ou non de désirs vénériens, proportionnées aux lésions de l'occiput, etc. C'est du reste un phénomène bien en rapport avec les observations de Gall; il y aurait d'intéressantes recherches à faire sur ce sujet.

§ VI. BLESSURES DE LA PARTIE POSTÉRIEURE

DU TRONC.

On est assez porté à croire, dans le monde,

que les blessures reçues dans le dos et dans les reins ne laissent pas des cicatrices aussi hono-
rables que les blessures de la partie antérieure du tronc ; mais s'il s'agissait de démontrer que cette opinion n'est qu'un préjugé insultant pour l'honneur militaire, il suffirait de dire que, sur un champ de bataille, durant les évolutions des troupes, les armes à feu peuvent atteindre les plus braves soldats dans le dos comme à la poitrine : c'est surtout dans un siège qu'il en arrive ainsi, alors que chaque homme voit tomber autour de lui une grêle de projectiles, et qu'il attend presque son tour d'être frappé ; mais n'insistons pas davantage.

Les blessures de la partie postérieure du tronc, c'est à dire des régions dorsales, lombaires, sacrées, iliaques et fessières ; ces blessures ont été fréquentes, par des causes spéciales, quoique secondaires.

Les travailleurs, les tirailleurs et les hommes du génie et de l'artillerie, presque tous, enfin, n'avaient que l'habit de leur arme, sans sac ni fourniment, pour faire leur service avec plus d'agilité et être moins embarrassés dans la tranchée ; ils étaient donc exposés déjà par derrière à tous les chocs des projectiles.

Des veilleurs, des factionnaires et des gardes de tranchée annonçaient par un cri la chute

des bombes et des obus, et à ce signal on se baissait davantage, ou tout à fait jusqu'à terre, et si le projectile éclatait au milieu de tous, ses éclats étaient lancés par dessus la tête ou retombaient sur le dos des travailleurs.

Contusions.

Il faudrait faire un nécrologue s'il était indispensable de citer tous les hommes qui ont succombé à la violence des contusions et des commotions de la moelle épinière; car c'est évidemment à la lésion de cette partie que doivent être rapportés les effets les plus funestes des contusions de la partie postérieure du tronc. Nous avons vu, à la tranchée, des soldats tués ainsi sur le coup, et sans traces extérieures, par des boulets arrivés à la fin de leur course, ou par des éclats de bombes et d'obus.

Les contusions avec ecchymose, infiltrations et tumeurs sanguines, ont été plus communes à la partie postérieure du tronc que partout ailleurs.

D***, tirailleur du 19^e léger, atteint d'un éclat d'obus à la partie supérieure du dos : contusion très violente, entre les deux omoplates; large ecchymose, étendue de l'une à l'autre épaule; fluctuation manifeste, infiltration sanguine considérable, accroissement rapide de la tumeur et

distension des tégumens; décoloration générale, syncope instantanée; menaces de suffocation dans la station assise; mouvemens automatiques; dilatation et immobilité des pupilles; paralysie du sentiment dans les extrémités supérieures; râle spumeux; mort une heure après.

Une contusion semblable a eu un résultat aussi funeste, par des effets différens et consécutifs, chez un autre soldat.

Ga***, canonnier du 8^e régiment d'artillerie, d'une constitution robuste, blessé le 22 décembre: forte contusion par un éclat de bombe, entre les deux épaules, au niveau des premières vertèbres dorsales; aucune plaie ni lésion extérieure, légère tuméfaction ecchymosée, mais point d'épanchement de sang. Chute du blessé et paralysie immédiate des mouvemens des membres, sans abolition de la sensibilité, sans perte de connaissance; excréptions volontaires de l'urine et des matières fécales; respiration libre; intégrité des facultés intellectuelles, douleurs assez vives, dans l'étendue de la contusion, et le long de la colonne vertébrale.

Saignées générales, saignées locales par les sanguines et par les ventouses scarifiées; révulsifs sur le canal intestinal; amélioration des symptômes de compression; douleurs moins vives, mais persistance de la paralysie des mouvemens.

Etat stationnaire pendant dix jours; même médication renouvelée sans effet. Invasion spontanée d'accidens graves, le 2 janvier : fièvre, délire, orthopnée ; mort par asphyxie, le même jour.

Il est dommage que l'autopsie cadavérique n'ait point été faite; il y avait sans doute fracture de la colonne vertébrale et compression de la moelle épinière, peut-être à sa partie antérieure. Un mouvement inappréhensible, soit du rachis en totalité, soit de l'un des fragmens, aura pu déterminer les derniers accidens.

Les contusions de la région lombaire, et à plus forte raison, celles de la région sacro-lombaire, ont été moins funestes, toutes choses égales d'ailleurs, que les contusions de la région dorsale. Le diamètre plus étendu, et la mobilité moindre des vertèbres lombaires et du sacrum; l'éloignement du centre de la moelle épinière, l'épaisseur plus considérable des muscles et la densité des aponévroses de la région sacro-lombaire, telles sont les causes de la différence d'effets des contusions.

Les cas que nous pourrions citer sont trop simples, et nous n'en dirons rien : quelques uns cependant ont été funestes, mais plutôt par contre-coup que par choc direct; d'autres, après avoir offert des accidens primitifs fort graves,

se sont terminés heureusement : les médications anti-phlogistiques et révulsives en ont eu l'honneur.

Enfin, les contusions de la région fessière doivent tout au plus être indiquées, tant leurs effets ont été simples ; je n'en citerai que deux exemples.

Mar***, grenadier du 61^e, est frappé d'un éclat de bombe entre les deux cuisses, à la partie postérieure : la contusion directe de la région fessière réagit fortement sur toute l'étendue de la colonne dorsale, et les membres sont paralysés instantanément.

Le contre-coup fut mortel chez le suivant. R***, du 5^e de ligne, frappé par un boulet : contusion violente de la fesse gauche, sans fracture de l'os coxal. Contre-coup dans la région dorso-lombaire ; fracture des deux dernières vertèbres dorsales et de la première lombaire ; paralysie immédiate du mouvement et de la sensibilité des membres inférieurs ; mort au bout de quelques instans, par compression de la moelle.

Les remarques qui viennent d'être faites pour les contusions de la partie postérieure du tronc sont applicables, à peu près en tout, aux plaies de

cette même région, puisqu'elles sont essentiellement contuses.

Il est à propos de noter que la suture a été employée dans quelques cas de plaies larges et étendues; les résultats de ce moyen en confirment pour nous l'avantage dans cette circons-tance, parce que les tégumens de la partie pos-térieure du tronc n'ont pas une extensibilité suffisante pour permettre la réunion par les moyens contentifs ordinaires; le fait suivant le démontre.

Mour**, fusilier au 18^e de ligne, blessé le 24, par un éclat de bombe, à la région sacro-lom-baire gauche: plaie contuse, profonde et déchi-rée, étendue de cinq pouces, dans une di-rection presque perpendiculaire à la colonne vertébrale. Peu d'accidens primitifs, demi-paralysie des mouvemens des extrémités inférieures.

Trois points de suture entre-coupée; bandelettes agglutinatives intermédiaires, charpie, compresses graduées, bandage contentif; posi-tion déclive sur le ventre. Accidens consécutifs, vers le quatrième jour; douleurs, insomnie, tu-méfaction, épanchement sanguin sous-cutané; incision près de la plaie; amélioration notable, mais persistance de la paraplégie. Travail de suppuration; et dès lors, quelques faibles mou-vemens dans les membres inférieurs; rappro-

chement naturel des lèvres de la plaie ; pansement simple ; progrès de la locomotilité, cicatrisation avancée au quarantième jour ; guérison complète de la blessure et de la paralysie, vers le cinquante-cinquième.

C'est une circonstance notable, dans ce cas, que l'influence salutaire du travail de la suppuration sur l'état paraplégique.

Lav***, sapeur au 1^{er} régiment de génie, blessé le 11, par un éclat de bombe, à la hanche droite : fracture comminutive et compliquée de la partie postérieure de la crête de l'os iliaque ; dénudation du bord supérieur, décollement de la peau, depuis la partie moyenne de l'os, au dessus de l'articulation coxo-fémorale, jusqu'à trois travers de doigt au delà des apophyses épineuses des dernières vertèbres lombaires et du sacrum. Point d'accident immédiat. Pansement à Berchem ; excision des lambeaux contus et déchirés ; extraction de plusieurs esquilles ; saillie du projectile à trois pouces, en bas du fond de la plaie, sous les tégumens de la fesse droite ; contre-ouverture, extraction, forme inégale de l'éclat de bombe, équivalant au calibre d'un gros biscaïen. Quatre points de suture sont faits à la plaie ; pansement simple, appareil contentif. Transport à Anvers, le 12. Accidens primitifs : fièvre traumatique, réaction sur l'encéphale, agi-

tation, délire. Saignée, potion anti-spasmodique; diète. Amélioration, le 13; pas d'accident nouveau. Le 15, collection purulente au côté gauche, près du décollement; large incision; écoulement d'une grande quantité de pus sanguinolent. Le 16, fièvre, céphalalgie; chaleur, soif ardente; nouvelle saignée, boissons rafraîchissantes, diète continuée. Le 19, mieux, suppuration très abondante jusqu'aux premiers jours de janvier. Très bon état, le 6 janvier: alimentation légère. Le 15, presque plus de suppuration, disparition complète du gonflement, réunion de la plaie très avancée, bandelettes agglutinatives, cicatrisation graduelle. Le 6 février, premiers mouvements d'exercice; le 19, un seul point de suppuration au niveau de la lésion de l'os; évacuation sur France, au soixante-onzième jour. De nouveaux accidents surviennent à l'hôpital de Lille; la suppuration se ranime, des trajets fistuleux s'organisent et nécessitent autant d'incisions; sortie de quelques esquilles; affaiblissement extrême pendant cette période, d'un mois et demi. Soins multipliés; régime analeptique; retour graduel des forces; marche et station impossibles sans un bâquillon. (Mois de juin.)

La guérison si lente, si difficile de cette profonde blessure n'est pas moins un résultat des

plus notables, dû presque tout entier aux secours immédiats de la chirurgie et à des soins consécutifs multipliés.

D'aussi larges plaies, qu'on les réunisse ou non immédiatement, ne guérissent quelquefois qu'avec des cicatrices adhérentes, qui peuvent devenir douloureuses et nuisibles aux mouvements des membres correspondans.

Du***, caporal au 65^e, a ressenti les effets d'une cicatrice adhérente, à la suite d'une plaie contuse, large et profonde de la fesse gauche, mais dont les suites n'ont pas été autrement fâcheuses.

Il en a été de même chez G***, du 5^e de ligne, qui avait eu une blessure à peu près semblable, avec contre-coup et commotion dans la région sacro-lombaire du côté gauche. La cicatrice adhérente est, pour cet homme, une cause de gêne et de pesanteur douloureuse dans le membre abdominal correspondant, surtout pendant la progression, et sous l'influence des changemens de température. Il n'est pas impossible que des douleurs rhumatismales se fixent plus tard dans l'étendue de la cicatrice.

Les coups de feu directs dans la région fessière la traversent assez difficilement de part en part, à cause de l'épaisseur des parties graisseuses et musculaires, et les projectiles ont plus

de tendance à s'y arrêter que partout ailleurs.

Mau***, du 5^e de ligne, blessé le 10 décembre par un coup de feu dans la fesse gauche : plaie déchirée, profonde, mais peu étendue ; saillie du projectile sous les tégumens, près du pli postérieur de la cuisse ; contre-ouverture, extraction d'un morceau de bois informe, dentelé, long de deux pouces sur un de largeur ; quelques balles ou éclats de mitraille implantés de même ont été extraits sans plus de difficulté.

Nous ne pouvons établir une ligne de démarcation entre certaines blessures de la région fessière et celles de la partie postérieure de la cuisse.

§ VII. BLESSURES DES MEMBRES.

Somme toute, les blessures des membres ont été les plus fréquentes, et par conséquent les plus variées : contusions, luxations, brûlures à tous les degrés, plaies simples et compliquées, fractures simples, compliquées ou comminutives, mutilations par écrasement ou par arrachement, tel est l'ensemble varié que ces lésions nous ont présenté. Toutes ont été produites par les armes à feu ; car les armes blanches, telles que les coups de baïonnette, ont atteint plutôt la poitrine et le ventre.

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit des brûlures.

Les membres inférieurs, offrant plus de surface, plus de prise que les membres supérieurs, ont été lésés plus fréquemment, et avec des conséquences plus graves.

Si les coups de feu ont rarement pénétré de part en part, ce fait s'applique aux blessures du tronc plutôt qu'à celles des membres. Les effets des projectiles ont, du reste, été aussi variés pour les unes que pour les autres. Les difficultés de diagnostic ne se rencontrent pas moins dans les lésions des membres que dans les autres, et de tous les projectiles, les balles en sont la cause la plus commune. Elles peuvent dévier dans l'épaisseur des membres, comme dans l'intérieur des cavités placentaires. Nous avons vu de doubles plaies directes au niveau des os, sans fracture. Les hémorragies compliquent les blessures des membres plus souvent que celles du tronc, par des raisons anatomiques qu'il est inutile d'indiquer. Je ne reviendrai pas sur des faits déjà rapportés, ou qui doivent trouver place ailleurs.

Ce que nous avons dit des blessures multiples est surtout applicable aux membres : il en est à peu près de même des mutilations avec ablation complète ou incomplète de ces parties ; nous en

parlerons d'ailleurs au sujet des amputations, en même temps que des blessures qui n'offrent aucune chance de guérison sans ce moyen extrême.

Rappelons ici que la suture a été employée pour réunir aussi quelques grandes plaies des membres ; les blessures de la cuisse en offrent un exemple notable.

Le traitement général des blessures des membres n'étant qu'une application des principes que nous avons exposés d'après nos maîtres, sur les plaies d'armes à feu, nous n'avons rien à dire de plus, si ce n'est que la saignée générale a été beaucoup plus ménagée que pour les blessures du tronc, et de la tête, ou de la poitrine en particulier.

Engourdissement instantané, paralysies partielles : voilà les deux phénomènes primitifs de la plupart des blessures des membres, avec contusion forte; l'effet ultérieur des lésions profondes, près d'une articulation, a été l'ankylose complète ou incomplète de cette articulation et l'atrophie du membre.

Luxations.

La plupart des luxations étaient le résultat de contusions violentes, opérées par de gros projectiles amortis et à la fin de leur course,

ou par des chutes dans les tranchées : cette dernière cause agit assez fréquemment. Du reste, nous n'avons rien à dire des luxations en général ; leurs phénomènes particuliers se rapportent aux différentes observations où nous en rapporterons des exemples.

Fractures.

Presque toutes les blessures profondes des membres, avec ou sans plaies, ont été compliquées de fractures, qui constituaient la lésion principale. Fractures directes et par contre-coup, fractures transversales, obliques, simples, compliquées, comminutives, avec ou sans déplacement des fragmens. Le diagnostic a été difficile dans certains cas, qui ne présentaient aucun signe pathognomonique. Nous avons constaté des fractures longitudinales ; mais quant à celles que j'ai vues moi-même, elles m'ont paru dépendre de fractures transversales ou obliques, c'est à dire que l'os brisé par le choc du projectile ne s'était fendu dans la longueur de sa diaphyse, qu'à partir du point même de sa fracture transversale ou oblique. Il me semble que l'on n'a pas assez bien établi si une fracture longitudinale pouvait exister seule, indépendamment

de toute autre. Il faudrait de plus grandes dénudations des os pour bien observer cette variété des fractures, quoiqu'elle semble aujourd'hui moins contestable qu'autrefois.

Nous avons rencontré des perforations osseuses, assez nettes et sans éclats de fragmens, tantôt avec enclavement du projectile et un seul trou, tantôt avec une double ouverture ou perforation de part en part. Je doute que cet effet puisse avoir lieu dans les portions compactes des os : je ne l'ai vu que dans leurs portions spongieuses (1).

Des cas nouveaux nous ont prouvé combien était absurde la théorie de la commotion de l'air, autant pour les fractures sans plaies que pour les autres lésions profondes, sans traces extérieures. Ambroise Paré l'avait démontré le premier, et Levacher, Dufouard, John Bell, Thomson, Samuel Cooper, Larrey, Dupuytren et beaucoup d'autres ont confirmé, depuis, que l'opinion des anciens, à ce sujet, était erronée.

Je m'abstiendrai de considérations générales

(1) Nous avons rapporté dans notre relation chirurgicale de juillet un des faits les plus remarquables de ce genre que possède la science : il s'agissait d'une perforation de la tête de l'humérus.

sur les fractures des membres , parce qu'elles se trouvent partout et dépasseraient les limites de ce travail ; rappelons seulement que les fractures par armes à feu ont , comme toutes les blessures produites par la même cause , des effets plus graves en proportion ; ce qui a fait dire , peut-être avec exagération , que , dans les fractures compliquées par armes à feu , on perd , en n'amputant pas les parties , plus de blessés qu'on ne sauve de membres .

Il y a eu , en effet , plus de fractures compliquées et comminutives , que de fractures simples , parce que les projectiles étaient lancés ou éclataient à de faibles distances , et que ce n'est pas en raison du volume de leur cause que les fractures sont simples ou compliquées .

Les premières offrent trop peu d'intérêt pour qu'il en soit question .

Quant au traitement des fractures , j'éprouve , je l'avoue , un véritable embarras pour m'expliquer , parce que je me suis placé entre certaines convenances , d'une part , et mes convictions de l'autre : il n'est qu'un moyen d'y satisfaire à la fois , c'est d'énoncer la question franchement et en peu de mots . La campagne d'Anvers me semblait une occasion favorable d'employer l'appareil inamovible , adopté par mon père depuis tant d'années ; j'avais précisément soutenu ma thèse

sur ce sujet (1) trop peu connu en pratique : j'avais essayé, par une analyse détaillée, de démontrer les avantages de ce mode de pansement sur l'appareil renouvelé, et j'avais même reçu l'approbation de mes juges ; mais, à Anvers, je n'ai pu agir comme je l'aurais voulu, non pas que le chirurgien en chef y ait mis opposition, puisque lui-même avait été témoin si souvent à l'armée de l'efficacité de l'appareil inamovible. Le principal obstacle était dans l'opinion contraire des officiers de santé belges, qui ne voulaient pas accepter la responsabilité des blessures sans les reconnaître eux-mêmes et sans les traiter ensuite d'après leurs principes : voilà le fait général qui a annulé l'application de l'appareil inamovible, et un fait particulier plus que tout autre le fit rejeter. Il s'agissait d'une fracture comminutive et compliquée de la cuisse à son tiers moyen par une balle de gros calibre, enclavée dans l'épaisseur des fragmens, qui chevauchaient. La nécessité de l'amputation n'était douteuse pour personne ; mais le blessé s'y était refusé formellement : on se contenta d'appliquer un appareil provisoire. Les accidens primitifs

(1) *Traitemenit des fractures des membres par l'appareil inamovible.* Paris, 1832.

eurent tout le temps de se développer, puisque ce fut seulement le surlendemain que la plaie fut débridée, le foyer de la fracture exploré, et l'extraction des esquilles ainsi que du projectile faite, avec beaucoup de difficulté. On crut bien faire d'employer ensuite l'appareil inamovible; mais, au bout de peu de jours, des accidens survinrent; l'appareil fut levé et renouvelé désormais. Nous rapportons en détail les fâcheux résultats de cette blessure. (Voir l'*Observation du commandant M***.*)

Or, je le demande, était-ce essayer à propos l'appareil inamovible, puisqu'il s'agissait de la nécessité de l'amputation? M. Larrey n'a jamais prétendu que sa méthode de traiter les fractures fût applicable aux cas d'amputation, et il avait rendu à la chirurgie un service assez signalé, en traitant par l'appareil inamovible toutes les fractures susceptibles de guérison par quelque méthode que ce fût.

L'appareil renouvelé a donc été employé à Anvers, et les résultats ont confirmé pour nous les inconvénients de cette méthode. La suppuration fut d'autant plus abondante que les pansemens ont été plus fréquens : de là, affaiblissement, épuisement des forces; de là, exigence de soins multipliés, quelquefois insuffisants; de là, enfin, longueur, difficulté des pansemens,

douleurs et accidens consécutifs, surtout dans le transport des blessés. Des abcès ont compliqué presque toutes les fractures graves ; la consolidation a été lente ou même nulle, et l'ankylose est survenue dans les articulations les plus rapprochées. Les résultats les plus incomplets ou les plus fâcheux de toutes les blessures du siège en général, ce sont les résultats des fractures. Je n'ai plus qu'à présenter le résumé des observations, sans me permettre d'autre critique envers une méthode que je désapprouve par intime conviction, et sans la moindre prévention filiale.

Plaies des articulations.

On avait établi en principe la nécessité de l'amputation dans tous les cas de plaies pénétrantes des articulations par armes à feu, et ce principe, malgré quelques faits exceptionnels, s'est développé de jour en jour par l'expérience. L'articulation du genou semble plus fréquemment lésée qu'aucune autre, et réclame plus absolument l'amputation.

C'est pour des plaies d'articulations que l'on a pratiqué à Anvers une grande partie des ablations de membres. Presque toutes ces plaies étaient non seulement pénétrantes, mais compliquées de fractures des extrémités articulaires,

de dénudation des surfaces, de dilacération des tissus environnans ; elles présentaient enfin la réunion des lésions les plus graves aux parties molles et des désordres les plus profonds aux parties osseuses.

Blessures de l'épaule.

Protégée contre les chocs extérieurs par une masse musculaire assez épaisse, l'épaule était encore garantie par l'épaulette et les buffleteries : c'est peut-être par cette raison secondaire que les blessures profondes de cette région ont été aussi rares. Toute cause vulnérante qui, ailleurs, aurait déterminé une plaie, une fracture, n'occasionnait ordinairement qu'une contusion de l'épaule. Il serait sans intérêt d'en citer plusieurs exemples. Cette contusion a été quelquefois assez forte pour produire l'engourdissement de tout le membre ou une paralysie instantanée.

M. Lévy, à Boom, a vu un cas dans lequel la paralysie complète des mouvements du membre, survenue immédiatement, avait été suivie peu à peu de la paralysie de la sensibilité.

La réaction du choc sur la poitrine a eu lieu presque toujours ; elle a même été suivie d'accidents funestes.

V***, du 50^e de ligne, frappé le 18 décembre

par un coup de boulet à la partie supérieure de l'épaule gauche , sans signe appréciable de lésion extérieure : symptômes immédiats de lésion pulmonaire ; dyspnée ; toux ; crachement de sang : saignée générale , renouvelée sans amélioration ; mort le jour même par suffocation. Le tissu pulmonaire avait sans doute été contus , déchiré profondément.

La contusion de l'épaule , portée au plus haut degré , a quelquefois fracturé l'humérus par contre-coup ; la luxation aussi en a été la suite : nous en rapportons plus loin un exemple remarquable par ses complications.

Dans un autre cas , la contusion a été tellement grave , qu'il a fallu amputer le bras à l'article.

Les plaies de l'épaule ont été ou tout à fait simples , au point de n'offrir aucun intérêt , ou tellement compliquées , que l'amputation du bras dans l'articulation a encore été nécessaire.

Contusions.

Le général Saint-Cyr Nugues , chef d'état-major de l'armée , parcourait les batteries dans la nuit du 19 décembre , avec des officiers supérieurs et ses aides-de-camp. La boue qui encombrerait les tranchées embarrassait leur mar-

che et les empêchait presque de la poursuivre plus loin ; mais le général, malgré l'extrême fatigue et son âge avancé, malgré les dangers auxquels il s'expose sous le feu de l'ennemi, monte hardiment le premier sur l'escarpement de la tranchée, pour continuer l'inspection. Arrivé avec son état-major sur un plateau en vue de la citadelle, il s'arrête quelques instans ; mais bientôt les pots à feu éclairent le groupe des officiers français, et plusieurs obus sont lancés contre eux. L'un de ces projectiles éclate sur le plateau même et ne blesse qu'un seul homme, c'était le général Saint-Cyr. On le fait redescendre aussitôt dans la tranchée, et pendant qu'on le ramène à Berchem, un de ses aides-de-camp précède en toute hâte et vient m'appeler. Je ne savais pas si la blessure du général était grave et si mes soins lui suffiraient. Quoiqu'il n'en eût point réclamé d'autres, c'était une convenance d'en prévenir le chirurgien-major, M. Forget, qui n'hésite pas à m'accompagner, et nous arrivons ensemble auprès du général. Un éclat d'obus l'avait atteint à l'épaule gauche ; l'épaulette, à gros grains, très durs et très serrés, avait été écrasée fortement sur son bord postérieur. L'épaule aurait été peut-être fracassée sans cet heureux incident ; mais elle n'avait

qu'une contusion , assez forte à la vérité , douloureuse , avec tuméfaction , et compliquée de quelques symptômes de commotion.

Un pansement simple fut fait et renouvelé tous les jours par M. Forget , qui s'empressa dès lors de donner ses soins au général. Les accidens de la blessure n'ont eu rien d'inquiétant ni de durable.

Le peu de détails qui précèdent l'indication de cette blessure légère ne sont peut-être pas sans intérêt , puisqu'ils ont rapport à l'un des chefs les plus honorables de l'armée.

D***, 5^e de ligne , frappé à l'épaule gauche par un coup de boulet amorti , le 5 décembre : transport direct à Anvers. Tuméfaction légère , douleurs obscures , impossibilité de porter l'avant-bras dans la supination et d'effectuer aucun mouvement de l'articulation scapulo-humérale : aucun signe de fracture , cependant , soit au col , soit à la tête de l'humérus , ni à l'apophyse coracoïde. Réaction générale : facies abattu ; réponses lentes ; compréhension difficile ; respiration haute , accélérée ; douleurs à la partie inférieure du côté gauche du thorax : vingt-cinq sangsues sur le point douloureux ; topiques émolliens , diète. Aucune amélioration ; symptômes de la commotion plus caractérisés le soir ; céphalalgie

gravitative; pouls fréquent, un peu élevé; chaleur générale, vertiges; langue enduite de muco-sités; abdomen indolore; constipation de quatre jours: saignée du bras; révulsifs aux extrémités; lavemens émolliens; boissons délayantes; diète. Amélioration notable; cessation graduelle des symptômes de réaction générale et des douleurs locales; liberté des mouvemens de l'articulation scapulo-humérale; état très satisfaisant le 10 décembre; en voie de guérison, le 15.

Il me semble qu'un traitement énergique, employé dès le début, aurait prévenu la série des accidens de la commotion: ils sont parvenus à un degré tel, que l'on pouvait ne pas espérer un résultat aussi heureux.

Luxation scapulo-humérale compliquée.

Br***, sapeur au 2^e génie, blessé, le 8 septembre, par un éclat de bombe: luxation scapulo-humérale en avant et en bas; violente contusion à la partie supérieure et postérieure de l'épaule gauche. Luxation réduite à Berchem; vaste épanchement sous les tégumens de la région contuse; issue du liquide par une incision. Pansement simple, bras en écharpe. Fièvre, agitation; saignée, et mieux le 12; quelques symptômes de pleuro-pneumonie; fièvre, dysp-

née, et nouvelle saignée; suppuration, pansements compressifs: amélioration. Le 24 décembre, très vive douleur sous l'aisselle gauche; douze sangsues et saignée sans effet; constipation; lavemens, sangsues à l'anus, mieux. Le 1^{er} janvier, quatrième saignée contre la douleur du membre; gémissemens continuels; immobilité complète; décubitus sur le côté. Le 4, vésicatoire volant au coudé, pansement avec un grain d'acétate de morphine; décroissance des douleurs. Mieux pendant deux jours; mouvements possibles; aucune réaction du médicament sur le cerveau. Le 8 janvier, deuxième vésicatoire sur le moignon de l'épaule; disparition des accidens; 15 janvier, point pleurétique sans suites fâcheuses, beaucoup de faiblesses seulement; jours suivans: amélioration graduelle; alimentation. Le 30 janvier, seulement un peu de gêne dans les mouvements de l'articulation luxée, et le 8 février, guérison à peu près parfaite, au cinquante-deuxième jour.

Les douleurs traumatiques dépendaient, sans doute, de la contusion et de la distension qu'avait éprouvée le plexus brachial par la tête luxée de l'humérus. L'emploi de l'acétate de morphine, s'il avait été fait sans ménagement, pouvait déterminer des effets funestes.

La***, canonnier du 11^e d'artillerie, a eu éga-

lement une luxation de l'humérus droit en avant et en bas, produite par un éclat de bombe sur le moignon de l'épaule, mais il n'est pas survenu le moindre accident.

Blessures du bras.

Il n'y a pas eu de contusion forte du bras, sans fracture. Des coups de feu ont traversé ce membre, sans autre effet que ceux d'une double plaie contuse. Quelques solutions de continuité ont été assez singulières.

Bar***, tirailleur du 19^e léger, a eu l'extrémité inférieure du bras droit fracturée par un éclat de mitraille et une plaie longitudinale, au côté externe, de trois pouces environ, aussi étroite, aussi linéaire que si elle avait été faite par incision.

Nous avons dit que des fractures du bras ont eu lieu par contre-coup, par suite de contusions de l'épaule. Hu***, du 18^e, a eu l'acromion brisé par le choc direct d'un éclat d'obus et l'humérus fracturé par contre-coup. Arrivons de suite à quelques unes des fractures compliquées.

Fractures compliquées de l'humérus. Duc***, tirailleur du 19^e léger, blessé au bras droit, le 9 décembre, par une balle de fusil de rem-

part : fracture comminutive de l'extrémité inférieure de l'humérus et du condyle externe, à quelques lignes de l'articulation ; plaie déchirée, profonde, étendue obliquement d'un pouce et demi, à la face externe du membre. Débridement, extraction du projectile à la tranchée ; appareil provisoire. Cas d'amputation immédiate, refus du blessé ; pansement simple ; bandage roulé ; attelles latérales, écharpe ; diète, etc. Bientôt se développent des douleurs vives dans le bras, de la fièvre traumatique et un gonflement considérable. Saignée ; topiques émolliens ; potion calmante ; boissons rafraîchissantes ; bandage de Scultet ; position demi-fléchie ; repos absolu ; régime sévère. Amélioration, gonflement moindre, suppuration commençante, douleurs dans les mouvements du membre ; état général assez bon, jusqu'au 20. Le 24, ouverture d'un abcès à la partie inférieure du bras ; pus abondant ; aucun travail de consolidation ; immobilité du membre dans une gouttière couverte. Du 25 au 30, suppuration considérable ; pus sanieux et grisâtre ; indices d'une carie de l'épicondyle. Amputation proposée de nouveau au blessé, refus opiniâtre ; affaiblissement, quelques atteintes de nostalgie ; peu d'amélioration locale ; régime analeptique ; retour graduel des

forces. Le 8 février (au soixante-deuxième jour de la blessure), évacuation sur France, à la demande instantée du blessé.

Je n'ai pas eu de ses nouvelles; mais s'il n'a pas éprouvé quelque accident funeste, je crains qu'il ne se décide trop tard à la nécessité de l'amputation.

Tif***, canonnier au 1^{er} régiment d'artillerie, blessé au bras par une balle, le 19 décembre : perforation d'arrière en avant; ouverture d'entrée au dessous de l'épine de l'omoplate, à travers le muscle sous-épineux; trajet oblique de bas en haut, et de dedans en dehors; fracture du col de l'humérus au niveau des insertions tendineuses, et saillie du projectile sous les téguemens, à la partie supérieure de la face antérieure du bras. Transport à Berchem. Incision longitudinale pour extraire la balle; débridement de la plaie d'entrée; réduction de la fracture; pansement et appareil; immobilité du membre fléchi et maintenu par une écharpe. Accidens consécutifs; douleurs vives, fièvre traumatique, insomnie. Saignée, diète, tisane rafraîchissante; pansement renouvelé. Légère amélioration, les jours suivans; suppuration très abondante; pansemens journaliers; tuméfaction très douloureuse du membre; nouvelle saignée; peu de change-

ment. Le 10 janvier, foyer purulent découvert à la face interne du bras; ouverture, le 15; grande quantité de pus, soulagement immédiat. Amélioration soutenue du 15 au 25. Progrès vers la guérison; alimentation plus substantielle. Le 31 janvier, ouverture d'un nouvel abcès à la face antérieure du membre; issue de quelques débris de vêtement et de deux petites esquilles, par le moyen d'un séton; mêmes pansemens, mêmes soins. Du 1^{er} au 10 février; cicatrisation avancée de la plaie, et consolidation de la fracture au cinquante-cinquième jour environ.

Entrée à l'hôpital de Lille, le 12 mars. Inflammation vive de l'épaule par la présence continue du séton; douleurs lancinantes dans l'articulation scapulo-humérale; réaction fébrile très intense: séton supprimé; trois saignées successives; topiques émolliens; régime sévère. Amélioration notable. Nouvelles douleurs dans l'épaule; trois ou quatre points de fluctuation se manifestent et nécessitent autant d'incisions; sortie d'une nouvelle esquille, et de plusieurs autres parcelles de vêtement mêlées à la matière purulente. Soulagement marqué après chaque incision. Progrès plus certains vers la guérison; travail de cicatrisation définitive;

ankylose de l'articulation scapulo-humérale et atrophie du membre. (Mois de juin.)

La blessure de Tif***, sans être aussi grave que celle qui suit , offre cependant le même résultat, et nous ne pouvons affirmer s'il n'y aura pas des accidens ultérieurs. Quoi qu'il en soit, je me permettrai de blâmer l'emploi du séton, qui a eu des effets plus nuisibles qu'avantageux, d'après les renseignemens exacts que m'a fournis M. Léonard fils.

Mat***, fourrier au 8^e de ligne , blessé au bras droit , le 8 décembre , sur la rive gauche de l'Escaut, par un boulet des canonnières hollandaises: arrachement de la face externe du deltoïde; dilatération des bords externes des muscles biceps, brachial antérieur et triceps; plaie étendue depuis un pouce au dessous de l'apophyse acromion jusqu'à deux pouces au dessus du coude; mais intégrité de la partie interne du bras; aucune lésion de l'artère ou du plexus brachial; position et rectitude naturelles du membre; aucune apparence de fracture. Exploration plus attentive à Beveren ; amputation jugée nécessaire , mais différée par le refus du blessé. Plaie régularisée par quelques excisions , réunion modérée , pansement simple. Diète , boissons délayantes. Suppuration établie le cinquième jour de la bles-

sure. Pansemens journaliers. Le 11, quelques points gangreneux apparaissent à la surface de la plaie; pansemens avec les plumasseaux enduits de cérat et saupoudrés de quinquina camphré continués jusqu'au 18. Certitude alors d'une fracture comminutive de l'humérus, près de son col; issue d'un morceau de drap par la plaie; extraction différée d'une esquille assez forte, encore adhérente; accidens locaux; formation d'un abcès en arrière et en haut de la plaie; topiques émolliens; suppuration abondante; double pansement par jour, sous l'influence duquel la plaie devient rouge et saignante. Un seul pansement, ensuite, avec des compresses imbibées d'eau de mauve chlorurée; amélioration progressive jusqu'au 25; assez bon aspect de la blessure; disparition des accidens généraux; sommeil et appétit; alimens légers; mieux soutenu. Coaptation des fragmens osseux; bandage et attelles; évacuation sur Anvers, le 8 janvier. Pansement renouvelé à fond; position du membre en demi-flexion. Le 15, ouverture d'un abcès. Symptômes graves de réaction générale. Saignée, diète, boissons rafraîchissantes. Le 24, séparation des premières esquilles de l'humérus; le 26 et le 27, extraction de plusieurs autres; perte de substance à l'os, d'un pouce et

demi environ. Amélioration consécutive, mais toujours un peu de fièvre; douleurs continues; suppuration abondante. Bandage secondé de do- loires inamovibles pour soutenir et fixer l'avant-bras et le bras contre la poitrine, sans s'opposer aux pansemens; grande écharpe. Le 4 février, suppuration moindre; mieux notable; disparition des accidens généraux; cicatrisation com- mençante; extraction totale de quinze esquilles. Le 12, évacuation sur la France, après soixante jours de traitement; séjour à l'hôpital de Lille; derniers progrès de cicatrisation, mais retard de la guérison définitive par le développement de plusieurs abcès au pourtour de l'articulation du bras; quelques accidens symptomatiques. Trai- tement rationnel. Guérison, avec ankylose complète de l'articulation scapulo-humérale; atrophie du membre; sortie dans le courant d'avril.

Voilà donc une fracture comminutive de l'ex-trémité supérieure de l'humérus, fracture compliquée de plaie profonde et dilacérée, fracture suivie d'accidens graves; fracture guérie enfin, sans amputation: et cependant nous persistons à croire que l'opération était indiquée, non seu- lement d'abord par la blessure elle-même, mais ensuite par ses complications. Que le ré-

sultat n'ait pas été funeste, c'est par une chance tout exceptionnelle ; et sans compter combien peu est utile un bras atrophié et ankylosé complètement à son articulation scapulo-humérale, il n'est pas encore dit que des accidens ultérieurs ne détruiront un résultat si favorable en apparence.

Fracture de l'articulation huméro-cubitale.

M. de Mag***, lieutenant de grenadiers au 25^e de ligne, blessé au bras droit, le 6 décembre, par une balle : fracture comminutive de l'extrémité articulaire inférieure de l'humérus et de l'extrémité supérieure du cubitus. Le projectile avait traversé l'articulation huméro-cubitale et était ressorti par la partie antérieure de l'avant-bras, à quatre travers de doigt au dessous du pli du coude.

Plaie de la partie postérieure du talon droit, avec perte de substance à la grosse tubérosité du calcanéum, par un éclat de mitraille.

Nécessité de l'amputation du bras; refus absolu de la part du blessé. Débridement de la plaie; extraction de plusieurs esquilles. Évacuation à Anvers. Le 8, premier pansement; douleurs continues; tuméfaction de tout le membre; diète, boissons acidulées. Le 10, gonflement moindre; suppuration établie aux deux

plaies. Le 13, suppuration abondante; issue de quelques esquilles; bras placé dans une gouttière de carton, pour être maintenu dans une immobilité absolue. Plaie du talon en bon état. Jusqu'au 20, pansemens journaliers. Le 21, douleurs vives dans le bras. Extraction par l'ouverture postérieure d'une facette articulaire, appartenant à la poulie, intermédiaire à l'épicondyle et à l'épitrochlée. Le 26, exfoliation d'une partie du tendon d'Achille. Formation d'un foyer purulenta au côté interne de l'ouverture de sortie du projectile de la plaie du coude. Compression pour l'évacuation du pus. Le 29, développement de la collection purulente. Le 5 janvier, ouverture par incision. Soulagement immédiat. Travail de cicatrisation à la plaie du talon. Etat stationnaire de celle du bras. Du 10 au 32, occlusion presque complète de l'ouverture d'entrée; suppuration limpide et peu liée par la plaie antérieure. Exploration attentive. Aucun corps étranger. Le 29, progrès de cicatrisation à la plaie du talon. Le 6 février, tuméfaction douloureuse de la partie interne de l'avant-bras; topiques émolliens. Le 12, issue de quelques débris de vêtement et d'esquilles restés dans la plaie. Suppuration presque tarie à la fin du mois. Le 7 mars, guérison complète de la plaie du talon; état

encore presque stationnaire de la plaie du coude; carie des fragmens.

Évacuation sur la France. Peut-être le blessé se décidera-t-il plus tard ou même trop tard à l'amputation.

Blessures de l'avant-bras.

Des blessures de l'avant-bras, avec ou sans fractures, ont été compliquées d'hémorragies. M. Saint-L***, lieutenant au 5^e de ligne, a l'avant-bras fracturé à son extrémité inférieure, par une balle qui le traverse, et déchire l'artère cubitale; une hémorragie primitive et abondante a lieu, et n'est arrêtée que quelques instans après par le temponnement. Cette complication n'a pas eu d'influence fâcheuse sur la guérison.

Il n'en a pas été de même d'une hémorragie consécutive de l'artère radiale, dans un cas, il est vrai, beaucoup plus compliqué.

Les blessures de l'avant-bras ont été trois fois accompagnées de lésions beaucoup plus graves, et trois fois elles ont nécessité l'amputation, savoir : chez L***, mutilé de la face; chez Mor***, amputé du bras droit dans l'articulation scapulo-humérale; et chez J*** P***, mort de suites d'une plaie pénétrante de l'abdomen.

Les fractures comminutives de l'avant-bras sont moins susceptibles de déplacement que celles du bras, d'après la disposition des os; mais la dilacération des tissus réclame peut-être plus impérieusement l'amputation.

Nous n'avons à citer que deux cas de fractures graves, dans lesquels ce moyen extrême n'a pas été employé, et qui le nécessiteront peut-être tard.

Dub***, tirailleur du 19^e léger, blessé à l'avant-bras droit par une balle de fusil de rempart, le 17 décembre : fracture comminutive des deux os, compliquée de plaie au tiers moyen et à la face antérieure du membre. Débridement; extraction de quelques esquilles; aucune trace du projectile, repoussé peut-être par la même ouverture. Incertitude sur la nécessité de l'amputation; pansement simple de la blessure; bandage de Scultet. Peu de réaction immédiate, pansement renouvelé deux jours après; tuméfaction considérable du membre; douleurs vives; suppuration commençante; topiques émolliens et résolutifs; amélioration assez sensible; mêmes soins; état général satisfaisant; lenteur extrême du travail de consolidation; cicatrice avancée; développement d'un abcès sur son bord externe; extraction d'une esquille radiale; état

stationnaire jusqu'au 15 janvier. Formation tardive du cal ; mouvemens de l'articulation huméro-cubitale très pénibles et très bornés. Cal solide enfin, le 8 février ; cicatrisation à peu près complète, sauf un point fistuleux ; ankylose incomplète de l'articulation du coude. On pourrait craindre que le point fistuleux, quoique imperceptible, n'annonçât un travail de carie dont on a déjà soupçonné l'existence.

Urb***, sapeur du 1^{er} régiment du génie, blessé le 10 décembre : fracture comminutive des deux os de l'avant-bras gauche par un boulet ; point de solution de continuité ; aucun accident primitif ; application de l'appareil ; point d'accident consécutif non plus, mais aucun travail de consolidation au sixième mois ; mobilité des fragmens ; pronostic fâcheux.

Blessures de la main.

Contusions, brûlures par explosion de poudre, plaies simples et compliquées, cicatrisation et consolidation promptes des fractures partielles, tel est le résumé des blessures de la main.

La plus grave de toutes, c'était celle de **Mo*****,

déjà cité souvent. Il avait eu la main gauche dilacérée presque entièrement par une explosion de mine.

Pot***, du 5^e de ligne, a eu l'avant-bras droit fracassé par un éclat de bombe, ainsi que la main, par ricochet du même projectile. (Voir *Ampu-tations de l'avant-bras.*) Un autre aurait éprouvé le même sort s'il n'avait été garanti par son fusil.

Jab***, du 58^e, brûlé à la figure par une explosion de poudre ; dans le même instant, un éclat de bombe frappe son fusil qu'il tenait de la main droite, brise le bois, la batterie, fend et tord le canon, et ne déchire que les tégumens des trois premiers doigts de la main.

Blessures de la cuisse.

De toutes les blessures des membres, celles de la cuisse ont été les plus fréquentes et les plus graves.

Les contusions seules n'ont pas eu des effets aussi compliqués en général qu'à tout autre membre, à raison de la force des aponévroses, de l'épaisseur de la masse musculaire qui enve-loppé le fémur, de la solidité de cet os, etc. Le

résultat des contusions était ordinairement la douleur, l'engourdissement, et quelquefois la demi-paralysie instantanée du membre.

Fr***, du 1^{er} régiment du génie, a eu, pendant plusieurs jours, un tremblement nerveux des membres pelviens, à la suite d'un coup de boulet à la partie inférieure et postérieure des deux cuisses.

L'articulation coxo-fémorale et l'articulation tibio-fémorale ont éprouvé des effets de contre-coup.

R***, tirailleur du 19^e léger, a eu un engorgement du genou droit, à la suite d'une contusion forte de la partie supérieure de la cuisse correspondante.

Les plaies de la cuisse, tantôt simples, et plus souvent compliquées, sont, en proportion, d'autant plus graves, qu'elles se rapprochent davantage de l'une ou l'autre articulation, surtout de la supérieure. L'inflammation consécutive du genou a eu lieu fréquemment.

Toutes les plaies de la cuisse n'étaient pas pénétrantes de part en part ; des projectiles, d'un calibre même volumineux, se sont cachés dans l'épaisseur des muscles ; nous en avons déjà dit quelques mots, et cité deux exemples.

La déviation des projectiles retrouve encore

ici son application : un biscaïen brise le fusil d'un soldat du 58^e, rebondit à quelques pas de là, et fait une plaie contuse à la cuisse d'un autre.

Quelques plaies du tiers supérieur de la cuisse, à la face interne, ont été suivies instantanément de douleurs dans les parties génitales.

Les plaies compliquées de la cuisse exigent des débridemens plus larges et plus profonds que les plaies de tout autre membre ; les motifs en sont faciles à comprendre. Dans une plaie large, étendue, déchirée, on peut avoir recours à la suture ; des adhérences de la cicatrice s'observent quelquefois.

Des plaies, avec lésion des nerfs ou des attaches tendineuses des muscles, peuvent être suivies de claudication ; chacune de ces propositions est appuyée par des faits : de toutes les plaies de la cuisse, il n'en est pas, je crois, qui puisse offrir des complications plus graves, plus multipliées, plus singulières que la blessure de Ma***, dont il sera parlé plus loin.

Presque toutes les fractures de la cuisse ont été comminutives et compliquées de plaies ; les plus graves ont été soumises à l'amputation ; quelques unes, au contraire, y ont été soustraites ; mais les unes et les autres n'ont fait que

confirmer pour nous le principe établi par nos maîtres dans la chirurgie militaire : *Amputez la cuisse dans tous les cas de fracture comminutive et compliquée de plaie par arme à feu.* Il est cependant de rares exceptions, difficiles à préciser dans un livre, et que l'on discerne mieux sur le terrain. On peut voir aussi de ces lésions fort graves échapper, comme par miracle et sans amputation, à un résultat funeste ; mais, dans la plupart des cas de ce genre, la conservation du membre a été achetée au prix de tant de souffrances, son raccourcissement est si prononcé, sa conformation si vicieuse, ou ses mouvements si difficiles, si bornés, qu'il fait regretter encore qu'on ne l'ait pas retranché. De tous les faits rapportés par nous, il n'en est pas un seul qui ne prouve cette nécessité extrême ; les chances de guérison existent d'autant moins, que la fracture a lieu dans un point plus élevé du fémur.

Nous ne citerons pas les hommes qui sont morts primitivement ; c'est assez de donner les détails des autres observations.

Triple plaie de la main, de l'abdomen et de la cuisse. M***, sapeur au 1^{er} régiment du génie, blessé, le 18, par une balle : triple plaie contuse : 1^o perforation de la main droite, avec fracture du

cinquième métacarpien ; 2^o plaie d'entrée dans le flanc gauche, à deux pouces environ au dessus de l'épine iliaque antérieure et supérieure, et plaie de sortie à quelques lignes au dessus de cette ouverture ; puis, retour du projectile sur lui-même, dévié dans son trajet par quelque portion des vêtemens, et 3^o nouvelle perforation des parties molles, après avoir contourné la lèvre externe de l'épine iliaque ; arrêt et saillie de la balle sous les tégumens de la partie supérieure et externe de la cuisse, un peu au dessus du grand trochanter. Débridemens multiples ; contre-ouverture sur la saillie tégumenteuse du projectile ; issue facile, pansement simple des plaies, après l'extraction de quelques esquilles du métacarpien ; bandage improvisé ; appareil renouvelé le septième jour ; développement d'un abcès entre les deux dernières ouvertures ; incision ; écoulement de la matière purulente, et issue d'un lambeau de capote qui formait le doigt de gant. Aucun accident consécutif ; suppuration normale des six plaies ; travail de cicatrisation régulier, parvenu à son terme vers la fin du deuxième mois.

Voilà un fait que l'on pourrait rapporter aux blessures de la main, ou à celles de l'abdomen, aussi bien qu'aux blessures de la cuisse ; nous

l'avons rangé dans cette dernière catégorie, parce que c'est à la cuisse que la dernière plaie a été faite. La déviation qu'a éprouvée la balle près de l'épine iliaque est une des plus singulières.

Plaies contuses et compliquées de la cuisse.

M. Guil***, capitaine de grenadiers au 65^e, blessé, le 12 décembre, à la cuisse gauche, par un éclat d'obus: plaie contuse, large et profonde à la partie supérieure et externe de ce membre, à quelques lignes au dessus du grand trochanter, sans fracture; dilacération des muscles grand et moyen fessiers, jusque près de leur insertion tendineuse. Traitement à Berchem, dans une maison particulière. Excision des bords inégaux de la plaie; extraction de quelques morceaux de vêtement, réunion; pansement simple; bandage contentif, position horizontale; repos absolu; saignée, régime sévère. Gonflement consécutif; douleurs étendues à l'articulation coxo-fémorale; formation d'un abcès en haut et en dehors; incision; écoulement de pus, autres débris de drap et de linge entraînés avec la suppuration; soulagement immédiat; incision d'un second abcès; quelques autres accidens peu notables; cicatrisation de la plaie au bout d'un mois et demi environ; mais douleurs fréquentes dans le haut de la cuisse, dif-

ficulté de certains mouvemens de l'articulation de la hanche ; claudication prolongée.

Je suis venu de la Belgique avec le capitaine G***, qui regrettait beaucoup de n'avoir pas été blessé deux jours plus tard, en montant à l'assaut du fort Saint-Laurent, avec sa compagnie.

Del***, chasseur au 19^e léger, blessé le 10, par une balle, à la partie interne et moyenne de la cuisse droite, à trois travers de doigt au dessus du condyle interne du fémur : débridement de la plaie; aucune trace du projectile. Le 11, tuméfaction du membre; accidens inflammatoires; agitation fébrile; face rouge, vultueuse; pouls fréquent, peau chaude. Nouvelles recherches de la balle, sans plus d'effet; saignée, topiques émolliens; diète. Ces moyens procurent de l'amélioration. Du 14 au 16, suppuration établie; issue de plusieurs caillots de sang. Le 17, douleur vive à la partie externe de l'ischion; nouvelle exploration; présence reconnue du projectile; longue incision au niveau du pli de la fesse; extraction de la balle; soulagement immédiat. Le 21, suppuration très abondante; régime sévère. Le 4 janvier, formation d'une collection purulente au tiers supérieur de la cuisse, au dessous de la contre-ouverture. Incision de

l'abcès ; écoulement de pus ; appareil contentif avec des compresses graduées. Amélioration progressive. Le 1^{er} mars , évacuation sur la France. Guérison à peu près complète.

Les résultats consécutifs de cette blessure , constatés à l'hôpital de Lille, ont été l'adhérence de la principale cicatrice, l'atrophie et l'ankylose du genou.

Per***, fusilier au 25^e, blessé , le 11 décembre , à la cuisse droite, par un éclat de bombe : déchirure presque transversale des tégumens et des muscles de la région externe et inférieure de la cuisse ; décollement d'un large lambeau de peau, avec dénudation du fémur , dans l'étendue d'un pouce et demi , sans fracture; commotion violente de tout le membre, et contre-coup dans les articulations. Exploration de la blessure ; aucun corps étranger; réunion immédiate par cinq points de suture entre-coupée ; bandelettes agglutinatives dans les intervalles ; compresses graduées sur les bords de la plaie, bandage roulé, position horizontale.

Aucun accident consécutif; premier pansement au septième jour; section des points de suture; suppuration normale; pansemens fréquens; travail régulier de cicatrisation ; bande-

lettres maintenues jusqu'à la fin. Cicatrice linéaire dans les premiers jours de février. Transport et séjour d'un mois et demi à l'hôpital de Lille, pour une contracture douloureuse et permanente du genou; mais peu d'amélioration définitive à cet état, entretenue peut-être aussi par l'adhérence de la cicatrice dans toute son étendue.

Ma***, sergent au 1^{er} régiment du génie, dont nous avons déjà parlé, blessé le 19 par un boulet: vaste plaie contuse, avec ablation, par arrachement, d'un énorme lambeau tégumentaire à la face antéro-supérieure de la cuisse gauche. Dilacération des ganglions lymphatiques inguinaux, des feuillets aponévrotiques de cette région, et des fibres musculaires sous-jacentes; décollement très étendu des téguments voisins; dénudation des nerfs et des vaisseaux fémoraux, jusqu'à leur passage derrière l'arcade crurale. Hémorragie en nappe. Premiers secours à l'ambulance de tranchée. Pansement simple; évacuation directe sur Anvers. Réaction générale. Médication anti-phlogistique; un peu de mieux. Le 21, levée du premier appareil, excision de quelques portions de peau sphacélées au pourtour de la plaie. Tuméfaction considérable de la cuisse. Amélioration graduelle. Le 25, re-

froidissement subit du gros orteil, qui devient insensible à la pression, et présente une teinte livide, bleuâtre. Mortification successive des autres orteils et du métatarsé, cyanose, atrophie des parties molles correspondantes, desséchées, noircies de plus en plus et comme mortifiées. Malgré l'invasion subite de cette fâcheuse complication, elle n'a qu'une progression lente ; du 20 au 25, la gangrène est bornée au niveau de la seconde rangée des os du tarse. Médication expectante ; soins hygiéniques. Pansemens journaliers ; séparation de quelques escharres gangreneuses. Suppuration très abondante, saigneuse et fétide. Ulcération des bords phlogosés de la plaie ; gonflement inflammatoire de tout le membre. Enduit grisâtre et blafard à la surface des masses musculaires. Écoulement d'un pus plus abondant, ichoreux et fétide, jusqu'au 18 janvier.

La gangrène d'hôpital est alors tout à fait établie. Emploi exclusif du chlorure d'oxide de sodium. Intégrité des nerfs et des vaisseaux au milieu de la désorganisation des autres tissus. Suppuration toujours fort abondante ; dessication journalière de la plaie par l'aspiration d'une seringue. Alors seulement, première influence sur toute l'économie. Tumé-

faction plus considérable du membre. Intensité de tous les symptômes gangreneux. Le 1^{er} février, l'étendue de la plaie est triplée dans ses principaux diamètres. Sa forme est à peu près elliptique ; elle se prolonge, de bas en haut, du quart fémoral supérieur inclus, à la hauteur de l'ombilic, sur l'abdomen ; et latéralement, du scrotum au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure. Fétidité extrême exhalée du foyer de la plaie ; lotions chlorurées ; isolement du blessé du 10 au 15 février. Épuisement progressif des forces par la fièvre lente, des sueurs, de la diarrhée, etc. Altération des facultés intellectuelles. OEdème de l'extrémité inférieure de la jambe droite. Anxiété extrême ; insomnie, vomissements spasmodiques. Adynamie, marasme, et délire. Mort imminente. Soins hygiéniques multipliés ; amélioration lente, mais réelle ; meilleur aspect de la plaie. Détersion de sa surface et de ses bords ; suppuration plus louable, et beaucoup moins fétide. Amendement des complications générales ; retour graduel des forces morales et intellectuelles. Pendant tout ce temps, état presque stationnaire de la gangrène du pied.

Dès lors, du 15 au 20 février, nouvelle période dans l'état de la blessure, période d'élimination ; tendance à la séparation entre les par-

ties saines et l'extrémité sphacélée. Le 25 février, séparation complète; dénudation de l'articulation tarso-métatarsienne. Constitution générale bien améliorée; retour à une nouvelle existence. Alimentation sagement prescrite. Cependant, quelques accidens nouveaux dépendant de l'élimination continue de la gangrène du pied se manifestent; infiltration de pus, et formation d'un clapier auprès de la malléole externe; de là un nouvel ulcère gangreneux. Sections journalières de quelques débris tendineux et ligamenteux. Le 4 mars enfin, séparation complète des cinq orteils, de quatre métatarsiens et des trois cunéiformes; et, plus tard, du cinquième métatarsien, ainsi que du cuboïde. Large ulcération des parties molles du talon et de la malléole externe.

Le 6 mars, gonflement œdémateux, avec douleurs lancinantes, de toute l'extrémité supérieure gauche; quelques taches cyanosées apparaissent au niveau de l'articulation huméro-cubitale. Liniment camphré. Rémission des douleurs, les jours suivans. Mouvements moins difficiles. Disparition des taches cyanosées. Point pleurodynique au côté droit de la poitrine: topiques émolliens. Mieux. Diarrhée ensuite. Régime sévère.

Du 10 au 15, plaie en bon état; suppuration

assez louable; travail de cicatrisation prononcé à la cuisse, mais ne faisant que peu de progrès au pied. Dénudation du scaphoïde et du cuboïde, corrosion profonde du calcanéum. Fusion du pus entre les surfaces articulaires. Emploi exclusif et continu du chlorure de sodium. OEdème du bras, étendue à l'avant-bras et à la face dorsale de la main; douleurs vives; frictions sèches. Diarrhée presque continue. Nouvel épuisement; maigreur; fièvre quotidienne; alimentation légère et tonique; sulfate de quinine.

Pendant la nuit du 15 au 16, douleurs lancinantes dans le pied droit; quatre ecchymoses violacées et insensibles au toucher, avec œdème de la jambe. Nouveau pronostic fâcheux. Emploi de la position élevée du membre. Efficacité de ce moyen simple, diminution graduelle de l'engorgement œdémateux et des douleurs; état stationnaire des taches gangreneuses.

Le 20 mars, progrès de cicatrisation de la grande plaie; mais destruction graduelle des parties molles du pied, par la sanie ulcéreuse; dénudation de l'articulation péronéo-astragalienne. Ressources abandonnées sagement à la nature. Mêmes soins, mêmes pansemens. Disparition de l'œdème du membre supérieur, revenu à peu près à l'état normal. Infiltration

de tout le membre inférieur droit. État général des plus graves. Pouls petit, fréquent; altération profonde de la face; sécheresse de la peau; émaciation extrême; prostration complète, insomnie; diarrhée colliquative; fièvre hectique. Rien de nouveau dans le traitement. Le sulfate de quinine, restant sans effet à l'intérieur, est appliqué sur la plaie à la dose de dix ~~grammes~~ ^{francs}. Rémission subite des symptômes fébriles. Résignation morale affligeante. Le 25, cicatrisation entravée dans la grande plaie, qui est sèche, pâle, blaflarde; signes de résorption du pus, plusieurs points grisâtres et cendrés à la surface dénudée; épine iliaque antérieure et supérieure rugueuse et nécrosée. Sanie du pied presque nulle; état stationnaire des surfaces osseuses. Volume considérable de tout le membre. Distension nouvelle de l'extrémité supérieure gauche par l'infiltration séreuse. Immobilité absolue de l'articulation du coude. Taches du pied transformées en extravasations sanguines, indolentes et stationnaires. État général plus alarmant que jamais; pouls très petit et accéléré; fièvre et diarrhée continues. Les toniques, les opiacés, les révulsifs, sont sans effet durable.

Le 30, la suppuration des plaies est tout à

fait tarie. OEdème extrême des trois membres. Infiltration à peu près générale du tissu cellulaire. Enfin, trouble profond des fonctions intellectuelles : mort dans la nuit. Le malheureux Ma*** n'avait cessé de montrer une résignation morale digne d'un meilleur sort.

L'autopsie cadavérique a été faite par MM. Thomassin et Périer avec le plus grand soin : en voici le résumé.

Rien de notable dans la tête, la poitrine et l'abdomen, sauf un peu de sérosité sanguinolente dans les ventricules du cerveau; épanchement pleurétique du côté droit, avec adhérences et hépatisation du poumon correspondant; engorgement de sang noir du poumon gauche; sérosité dans le péricarde, et atrophie du cœur, qui n'est aucunement malade du reste, non plus que l'orifice de ses gros vaisseaux; ramollissement de la rate et du foie.

Dégénérescence des portions musculaires à la surface et sur les bords de la plaie du membre abdominal gauche; clapiers purulens sous la peau et dans les interstices des muscles; carie de l'épine et de la crête iliaques; adhérences des tissus de la face antérieure et supérieure de la cuisse; transformation de ces tissus en une matière lardacée sur plusieurs points. In-

tégrité des nerfs et des artères au milieu de cette désorganisation, sauf l'artère fémorale, qui, depuis l'arcade jusqu'à la naissance de la musculaire profonde, est très friable et se détache, par la traction, en anneaux assez analogues à ceux des bronches. Cette singularité n'existe nulle part ailleurs; enfin, infiltration séreuse des deux membres abdominaux et du membre thoracique gauche.

Veine fémorale transformée, au niveau de la blessure, en un cordon homogène de couleur grisâtre, de consistance assez ferme à la pression, oblitéré complètement par une matière de couleur analogue, de texture fibreuse et tapissée par de fausses membranes. Cette altération se prolonge dans les deux tiers supérieurs de la veine, c'est à dire dans une étendue correspondante à celle de la plaie. Les veines poplitées, tibiales, péronières et saphènes sont remplies d'un caillot rouge orangé, en cordon continu, avec des nodosités correspondant aux valvules. Altération analogue dans les veines du membre droit, à un degré d'autant plus prononcé qu'on l'examine plus haut. Les veines iliaques et la veine-cave abdominale contiennent une matière stéatomateuse, diversement colorée. Rien de notable dans le système de la veine-porte. Les

veines superficielles, et surtout les veines profondes du bras malade, sont oblitérées par des caillots à peine adhérens de consistance et de teintes variées. La veine jugulaire externe de chaque côté est gorgée d'un sang rouge-orangé, fluide, poisseux, en consistance de gelée; phlogose des parois du vaisseau. L'altération déjà indiquée existe dans la veine jugulaire interne, ainsi que dans les veines qui s'y abouchent; analogie du sang contenu dans quelques unes avec le sang des cholériques. La veine sous-clavière est oblitérée par la même matière, en consistance grumeleuse et pultacée. La veine-cave supérieure est altérée au même degré dans plusieurs points de son étendue, ainsi que les veines qu'elle reçoit. Enfin, les veines pulmonaires offrent le même état pathologique. Oblitération capillaire du poumon droit surtout, qui est privé d'air, et tout à fait hépatisé. La présence du pus n'a été constatée dans aucune veine et dans aucun viscère.

En résumant cette observation, on y remarque les particularités suivantes :

Plaie vaste et profonde à la cuisse gauche; accidens locaux et généraux, primitifs et consécutifs; gangrène spontanée du pied gauche; métastase sur le membre abdominal droit; réaction grave; mort imminente; soins multipliés de

l'art ; travail de la nature ; élimination progressive de la gangrène ; état de la blessure long-temps stationnaire ; amélioration générale ; retour à la vie ; nouveaux accidens ; insuffisance des forces vitales ; métastase sur le membre thoracique gauche, puis sur la poitrine ; complications mortelles. Combien de choses n'y aurait-il pas à dire sur chacun de ces phénomènes morbides ; combien se pressent dans l'esprit, au sujet des phénomènes nécroscopiques , et spécialement des altérations si remarquables du système veineux !

Mais cette analyse excéderait de beaucoup les pages que nous pourrions ajouter à celle-ci ; c'est d'ailleurs une tâche qui appartient presque de droit à M. Périer. Il a étudié attentivement tous les effets de la blessure ; il a fait l'autopsie du cadavre, et il a conservé quelques unes des pièces pathologiques , pour rédiger au complet cette intéressante observation.

J'ai cependant un mot à dire au sujet du traitement. Pourquoi n'a-t-on pas employé contre la gangrène le cautère actuel, au lieu de se contenter du chlorure d'oxide de sodium ? On aurait peut-être arrêté ainsi les progrès du mal , et prévenu une terminaison funeste. Il fallait, selon nous , une surveillance chirurgicale plus active , une médication plus énergique.

Perforation du fémur. Mar***, voltigeur au 8^e de ligne, blessé le 23, à la cuisse droite, par une balle : transport à Beveren. Perforation du condyle externe du fémur, dans son diamètre transversal; enclavement du projectile, entre les ligamens croisés de l'articulation. Débridement de la plaie; contre-ouverture dans l'espace poplité; extraction de la balle; pansement simple; cataplasmes émolliens; position demi-fléchie; repos absolu; diète; régime. Accidens primitifs : tuméfaction du genou; douleurs vives, lancinantes; fièvre, insomnie; douleurs exaspérées par les moindres mouvemens. Trente sanguines sont appliquées sur le genou; cataplasmes; diète plus sévère. Rien de notable ne survient pendant huit jours; rémission des symptômes inflammatoires; suppuration bien établie; suppression des cataplasmes. Le 4 janvier, débris de vêtement entraînés par la suppuration; soulagement plus marqué; état général satisfaisant; cessation complète des symptômes inflammatoires; retour du membre à son volume ordinaire. Le 8, transport à Anvers; fatigue; nouveaux accidens, le 10; douleurs très vives; suppression de la suppuration; sensibilité extrême; topiques émolliens; soulagement consécutif. Le 21, la suppuration est rétablie, et les jours suivans, le

mieux se soutient ; exercice des mouvemens de flexion de la jambe ; plus de suppuration du 25 au 30 ; mouvemens plus faciles ; mêmes soins. Guérison à peu près complète au quarante-sixième jour , sauf de la difficulté encore dans les mouvemens.

Il n'est pas impossible que plus tard l'articulation du genou soit ankylosée , malgré les mouvemens graduels qu'on lui a imprimés.

Ce n'est pas moins jusqu'à présent un heureux résultat pour une blessure qui pouvait nécessiter l'amputation.

Un cas à peu près semblable, chez un voltigeur du 61^e, a eu un résultat funeste : la balle , enclavée dans le condyle externe du fémur, n'a été extraite qu'avec beaucoup d'efforts et après plusieurs tentatives inutiles ; le blessé a succombé deux jours après.

Fractures simples et compliquées du fémur.

Her***, soldat au 65^e, blessé le 10 décembre par un éclat de bombe , éprouve une forte contusion à la partie supérieure de la face externe de la cuisse gauche , avec fracture du grand trochanter, sans déplacement. Le 11 (à Anvers), incision qui donne issue à une collection sanguinolente très abondante de la région contuse. Fomentations résolutives. Diète , boissons

acidulées. Le 12, teinte brunâtre de la peau, qui semble frappée de sphacèle ; excision de cette portion tégumentaire ; prolongement de l'incision primitive en haut et en bas. Le 15, suppuration abondante ; pansemens journaliers. Le 25 janvier, suppuration diminuée ; bourgeons vasculaires à la surface de la plaie. Le 6 février, teinte ictérique ; constipation ; ténesme ; 12 sanguines à l'anus ; diète, etc. Aucune influence de cet incident. Cicatrisation graduelle. Le 1^{er} mars, état assez satisfaisant ; mouvemens, progression à l'aide de béquilles. Evacué le 18 mars. Adhérence de la cicatrice aux tendons des muscles fessiers ; ankylose à peu près complète de l'articulation coxo-fémorale, et atrophie de tout le membre : tels sont les résultats ultérieurs de cette blessure.

Ch***, sergent au 8^e de ligne, blessé le 23 décembre, à la partie supérieure et antérieure de la cuisse droite, par une balle : pansement à Beveren. Une seule plaie, à un pouce et demi environ du pli de l'aine ; fracture du tiers supérieur du fémur ; large débridement ; recherches infructueuses du projectile ; tuméfaction du membre ; application différée de l'appareil ; pansement simple, topiques émolliens ; position demi-fléchie ; suppuration bientôt abondante ;

douleurs occasionées dans le membre blessé par la moindre pression, par le moindre mouvement ; application de l'appareil différée encore jusqu'au 4 janvier. Alors réduction de la fracture avec assez de difficulté ; issue d'une grande quantité de matière purulente par la pression du bandage ; pansement renouvelé douze heures après ; écoulement nouveau de pus, épanché dans les interstices musculaires ; gonflement diminué au troisième pansement. Le 9 janvier, évacuation sur Anvers. Tuméfaction nouvelle par l'effet du transport ; douleurs vives dans le foyer de la blessure ; fluctuation purulente à la partie postérieure et supérieure de la cuisse, au dessous du pli de la fesse, dans la direction de la plaie ; incision du foyer purulent, écoulement de pus ; entraînement du projectile par la même ouverture. Soulagement immédiat : rien de notable pendant un mois environ, mais déformation graduelle du membre, qui est porté en dehors ; incision de trois autres dépôts consécutifs, deux à la partie externe et moyenne de la cuisse ; le troisième à la partie supérieure de la hanche. Suppuration par ces diverses ouvertures ; cicatrisation lente ; évacuation sur Lille dans le courant d'avril. Consolidation vicieuse de la fracture ; difformité énorme du membre, raccourci

de cinq pouces et fortement déjeté en dehors ; atrophie de la jambe et du pied.

Le gonflement primitif et la présence du projectile devaient-ils faire ajourner d'une douzaine de jours l'application de l'appareil ? et quoique le membre ait été conservé, n'eût-on pas mieux fait de l'amputer ?

P***, fusilier du 8^e de ligne, blessé le 23 décembre, à la cuisse gauche, par une balle : plaie à la partie supérieure et antérieure de la cuisse, sans issue du projectile ; fracture du col du fémur et du grand trochanter. Débridement immédiat ; recherches inutiles, à différentes reprises, pour extraire la balle. Tuméfaction peu considérable de la cuisse, mais réduction de la fracture et application de l'appareil différée par ce seul motif ; pansement simple ; large cataplasme, pendant cinq jours ; disparition complète du gonflement ; plaie en bon état ; aucun signe de la présence d'un corps étranger dans le membre ; aucun symptôme de réaction traumatique ; mais application de l'appareil différée encore, sans motif appréciable, jusqu'au 6 janvier. Réduction de la fracture ; bandage et attelles ; évacuation sur Anvers, le 8. Le 10, suppuration fort abondante ; pansemens journaliers jusqu'au 23. Le 25, formation d'un

foyer purulent presque au niveau du grand trochanter; incision; écoulement de pus; mobilité d'une portion osseuse assez considérable, dépendant du grand trochanter, et semblant unie au reste de l'os par une fausse articulation. Aucun indice sur le projectile. Le 10 février, premiers mouvemens de totalité du membre, mais conformation vicieuse; convexité externe de la cuisse; appareil à attelles remplacé par un bandage roulé; exercice avec des béquilles; raccourcissement du membre de deux pouces et quelques lignes; consolidation incomplète. Le 26, à la veille de l'évacuation sur la France, vives douleurs, spontanément occasionées par la présence du projectile à la partie postérieure et supérieure de la cuisse, dans l'épaisseur des muscles fessiers. Topiques émolliens; extraction de la balle le 4 mars, par une contre-ouverture. Douleurs consécutives; tuméfaction du membre; ulcération des cicatrices; pansemens simples; cataplasmes; suppuration abondante; amélioration sensible et progressive. Le 20, volume naturel de la cuisse. Le 29 mars, transport à Lille; exploration des trois plaies, non cicatrisées; esquilles mobiles à extraire plus tard; suppuration continue; affaiblissement des forces; pâleur et bouffissure générales; régime analeptique; con-

solidation encore incomplète de la fracture, malgré le raccourcissement et la difformité.

Cette observation, qui a de l'analogie avec la précédente laisse encore à regretter que la réduction et le maintien de la fracture n'aient pas été tentés primitivement; car le gonflement était léger, et la présence du projectile ne se serait peut-être pas manifestée plus tôt; et c'est une circonstance notable qu'il n'ait été extrait qu'au troisième mois. Les accidens consécutifs, l'épuisement des forces morales et physiques, la suppuration continue, la consolidation incomplète, le raccourcissement et la difformité du membre, sont autant de raisons d'un fâcheux pronostic.

Néd***, mineur au 1^{er} régiment du génie, blessé le 16 décembre, à la cuisse gauche, par un boulet: fracture comminutive du tiers supérieur du fémur, avec plaie arrondie des tégumens. Cas d'amputation; refus du blessé. Débridement de la plaie, qui est d'abord attribuée à la perforation des tissus par le fragment inférieur, lors de la chute du blessé. Point de projectile dans le foyer de la fracture; extraction de quelques esquilles; conformation assez facile du membre par la déperdition de substance osseuse; pansement simple; bandage à attelles. Rien de notable jus-

qu'au 24, sauf les pansemens fréquens, et les déplacemens de la fracture par l'indocilité du sujet; suppuration abondante; formation d'un dépôt au côté externe de la plaie; incision; écoulement de sérosité purulente. Pronostic fâcheux pour la consolidation de la fracture; lit mécanique, afin de maintenir le membre plus convenablement. Travail assez régulier de cicatrisation, terminé aux deux plaies le 15 février; suppression des attelles, le 1^{er} mars; bandage roulé; consolidation irrégulière de la fracture, le 15. Déviation du membre en dehors; peu de raccourcissement.

Je n'ai pas eu d'autres nouvelles de ce blessé, depuis son retour en France; mais il pourra regretter plus tard de ne pas avoir consenti à l'amputation.

Jean***, sergent au 8^e de ligne, blessé le 23 décembre, à la cuisse droite, par un biscaïen: plaie d'entrée à la partie moyenne et interne du membre; plaie de sortie à la partie externe; fracture comminutive du fémur, au niveau des plaies, sans lésion de l'artère fémorale; plaie déchirée des tégumens, au côté interne de la cuisse gauche, par le même projectile. Pansement provisoire, sur le terrain, par le chirurgien-major. Arrivée à Beveren, le 25. Ap-

pareil laissé en place, quoique incomplet, et levé au cinquième jour de la blessure. Alors, accidens fébriles intenses; suppuration assez abondante, fétide et mêlée de sang; mauvais aspect de la blessure; teinte livide des chairs; déchirure des muscles à la plaie d'entrée, qui est plus large que la plaie de sortie. Pansement avec la charpie enduite de cérat et saupoudrée de quinquina, dans l'espoir de conserver le membre; mais accroissement des symptômes graves; suppuration plus abondante et de mauvaise nature; pansemens renouvelés deux fois par jour; épuisement progressif des forces; altération sympathique des facultés morales; fièvre ardente et continue; délire; mort, le 30.

La succession assez rapide des accidens chez ce blessé, et leur terminaison fatale, n'auraient peut-être pas eu lieu, si l'appareil avait été appliqué méthodiquement dès le principe, ou bien si l'amputation avait été pratiquée en temps opportun.

Fr***, soldat au 25^e de ligne, blessé, le 22 décembre, à la cuisse gauche, par un boulet: fracture oblique et compliquée du fémur, à l'union de son tiers moyen avec son tiers inférieur; plaie large et profonde, à la partie supérieure de la face externe du membre. Ex-

ploration de la plaie à Berchem; incision des lambeaux contus et meurtris; application d'un appareil convenable. Évacuation sur Anvers. Légère réaction, le soir. Le 28, premier pansement; état général satisfaisant; suppuration abondante et fétide; séparation de quelques escharres. Pansemens journaliers. Aucun accident jusqu'au 15 janvier. Alimentation légère. Abcès considérable près de la plaie; ouverture par incision, écoulement de pus abondant. Le 20, douleurs vives; tuméfaction considérable du genou correspondant. OEdème de la partie inférieure du membre; topiques émolliens; élévation du pied, à l'aide de coussins. Suppuration toujours abondante. Le 5 février, abcès au dessous de l'articulation fémo-ro-tibiale, à la face antérieure du tibia. Douleurs vives. Le 12, incision; issue de la matière purulente. Guérison prompte de cet abcès. Décollement de la face interne de la cuisse; compression méthodique; écoulement du pus par la plaie. Le 20 février, cal formé; exercice des premiers mouvemens d'ensemble dans le membre, ce qui n'empêche pas de continuer l'emploi des attelles. Cicatrisation graduelle de la plaie. Suppuration moindre. Le 15 mars, état général très satisfaisant; suppuration presque en-

tièrement tarie. Le 28, évacuation sur la France. Séjour à l'hôpital de Lille : difformité de la cuisse gauche, avec un raccourcissement de trois pouces, et consolidation incomplète; plaie longitudinale d'une étendue de quatre pouces, à la partie antérieure et inférieure de la cuisse, par suite des abcès profonds; autre plaie à la partie antérieure et supérieure de la jambe par la même cause. Nouveaux soins; tentatives inutiles d'extension du membre; pansement simple des plaies; cicatrisation assez lente.

L'état de ce blessé lui fait regretter à lui-même de n'avoir pas eu la cuisse amputée.

M. M***, âgé de quarante-six ans, commandant de l'état-major du génie, blessé le 5 décembre au soir, dans les tranchées, par une balle : fracture oblique, comminutive et compliquée de la cuisse droite, de dehors en dedans, à l'union du tiers moyen avec le tiers inférieur; projectile implanté entre les fragmens osseux. Nécessité de l'amputation; le blessé s'y refuse d'une manière absolue. Application d'un appareil. Évacuation, le 6 au matin, sur Anvers. Le 7, levée de l'appareil; exploration de la plaie, débridement opéré par MM. Zinck et Seutin; extraction difficile de la balle, enclavée entre deux fragmens osseux; extraction de plusieurs esquilles.

Application de l'appareil inamovible. Réaction sur les organes digestifs; diète sévère, boissons rafraîchissantes. Le 12, pansement, suppuration peu abondante. Le 15, pleurodynie, combattue par des cataplasmes laudanisés: diète, eau gommeuse. Le 16, pansement, suppuration peu abondante et de bonne nature; légère irritation gastrique. Le 22, nouveau point pleurodynique; cataplasmes landanisés; suppuration plus abondante. Le 23, impression morale vive par l'effet d'une nouvelle triste; réaction générale. Pouls petit, accéléré; agitation, insomnie: potion opiacée; diète, etc. Le 24, douleur dans la région lombaire, quelques coliques; lavemens sans effet. Le 25, plaie en assez bon état; suppuration louable; constipation depuis une vingtaine de jours, malgré l'emploi des lavemens et des laxatifs. Une once d'huile de ricin en potion; extraction des matières fécales avec la curette: jusqu'au 31, rien de notable.

Le 1^{er} janvier, suppuration diminuée; tuméfaction considérable et douloureuse du membre. Cataplasmes laudanisés. Même état jusqu'au 6. Le 7, travail de résolution; suppuration plus abondante. Douleurs diminuées; encore de l'œdème. Le 18, suppression des cata-

plasmes. Quelques accès de fièvre. Constipation continue. Lavemens; régime végétal. Le 25, tuméfaction œdémateuse, traitée par des fomentations résolutives camphrées, efficaces d'abord, nulles ensuite. Le 28, infiltration de la jambe; douleurs par la plus légère compression. Cataplasmes landanisés.

Le 4 février, fièvre intermittente tierce, combattue par le sulfate de quinine en lavemens. Fomentations émollientes substituées aux cataplasmes. Le 13, même état, même médication. Le 22, accroissement des douleurs du membre, réaction sur tout l'organisme; bourdonnet saupoudré de sulfate de morphine, introduit dans la plaie. Douleurs moins vives. Plaie dilatée par l'éponge préparée; exploration attentive; formation du cal, tout à fait incomplète; mobilité de plusieurs fragmens de la face externe; époque de la guérison fort incertaine encore.

La nécessité de l'amputation consécutive paraît alors aussi bien démontrée que l'avait été celle de l'amputation primitive. État stationnaire prolongé jusqu'à la fin d'avril; affaiblissement par l'abondance de la suppuration et le flux diarrhétique; mêmes soins multipliés, sans autre résultat qu'un effet palliatif; tristesse profonde; irritabilité, inquiétudes; nostalgie. Transport en France dans une voiture suspendue,

confectionnée tout exprès; voyage pénible, à petites journées, sous la conduite de M. Forget.

Arrivée à Lille le 2 mai, dans un état d'abattement et de maigreur extrêmes; douleurs vives, lancinantes dans le membre blessé; gonflement du pied; diarrhée plus forte encore; ventre douloureux à la pression; pouls petit, mais très agité. Un peu de repos et de sommeil; amélioration, le lendemain. Pansement de la blessure; amaigrissement de la cuisse elle-même, excepté au pourtour de la lésion; gonflement et rougeur des bords de la plaie, arrondie et rétrécie au diamètre du petit doigt, cicatrices du débridement primitif, extrémité d'une esquille mobile au fond de la plaie; suppuration abondante, mais d'assez bonne nature. Membre placé sur un plan légèrement incliné du talon vers le bassin; pansement simple, avec une mèche enduite de cératet de deux grains d'acétate de morphine; compresses arrosées de chlorure d'oxide de sodium, bandage à fracture légèrement contentif. Même appareil, du reste, qu'en Belgique; usage de l'acétate de morphine supprimé à diverses reprises; changemens de position du corps; mais nécessité de maintenir chaque chose dans le premier état, à cause de l'intensité des douleurs; lotions toniques et spiritueuses sur le membre; alimentation légère et

de facile digestion; eau de riz édulcorée; potions gommeuses et anti-spasmodiques.

Amélioration très sensible dès les premiers jours; douleurs moins vives; cessation de la diarrhée; pouls plus régulier, visage plus animé, état moral plus calme, plus heureux, fonctions générales assez bien réglées. Mieux soutenu jusque vers la fin d'avril. Tentatives d'extraction des esquilles; dilatation de la plaie au moyen de l'éponge préparée, sans le secours du bistouri.

Apparition de nouveaux accidens; diarrhée plus intense que jamais; fièvre réglée, en tierce; douleurs aiguës dans le foyer de la blessure et dans le genou, exaspérées à la moindre pression; tuméfaction du genou; commencement de fluctuation au niveau des faces latérales de la rotule. Cataplasmes émolliens, double foyer purulent en communication par dessous le ligament rotulien; abcès du côté droit plus considérable; incision de celui-ci; pression méthodique sur l'autre. Écoulement d'une assez grande quantité de pus. Soulagement immédiat; cessation des douleurs locales; disparition de la fièvre; appétit, calme, bien-être de nouveau; la diarrhée seule persiste; mieux soutenu pendant une partie du mois de mai.

Le 28, débridement assez profond de la plaie, en haut et en bas, sur la cicatrice du dé-

bridement primitif; dissection et extraction de l'esquille la plus forte, obstruant le passage des plus petites : celle-là longue de deux pouces; les autres, au nombre de cinq. Cette opération est supportée avec calme. L'état du blessé reste aussi satisfaisant que les jours précédens ; la diarrhée est remplacée par la constipation. Suppuration bien établie et de bonne nature, mais tuméfaction et douleurs continues dans le genou, sans cause appréciable; pronostic fâcheux sur l'articulation.

Le 3 juin, violent accès de fièvre survenu spontanément après l'alimentation du matin; nouvelle série d'accidens. Douleurs exaspérées dans le foyer de la blessure et dans le genou; insomnie, anxiété extrême pendant plusieurs jours; soins multipliés sans effet; épuisement complet des forces, maigreur profonde, fièvre hectique; mort dans la nuit du 21 juin.

Autopsie du cadavre. Maigreur générale extrême; amincissement presque membranetix des muscles du thorax; saillie des côtés, avec dépression des muscles intercostaux du côté droit. La cavité crânienne n'a pas été ouverte. Les viscères du thorax sont sans altération notable.

Dans l'abdomen, le péritoine est intact; grand épiploon gris, noirâtre et rugueux; estomac vide,

parsemé de taches d'un rouge violacé; membrane muqueuse diffluente du côté de la grosse tubérosité. Duodénum dépouillé de ses membranes muqueuse et musculaire. Jéjunum d'un gris ardoisé dans toute son étendue, flasque et ulcéré. Iléon, atteint de la même altération jusqu'à son embouchure dans le cœcum. Colon et rectum dans l'état sain, malgré les symptômes de colite opiniâtre pendant la vie. Foie induré, sec et granuleux dans son parenchyme, jaunâtre à sa surface. Vésicule remplie d'une bile poisseuse et noirâtre. Rate atrophiée. Pancréas, reins et vessie dans l'état normal.

Infiltration complète du membre abdominal blessé. Plaie vers le milieu de sa partie externe. Communication directe de cette plaie avec le foyer de la blessure; quelques esquilles mobiles enveloppées de parties molles; pus noirâtre, abondant, et mal lié. Tous les muscles pâles, flasques, infiltrés, friables; tissu cellulaire rougeâtre et lardacé. Trois esquilles extraites, dont l'une de deux pouces de longueur; toutes nécrosées; déperdition considérable de substance osseuse; fémur sondé dans une longueur de six lignes seulement, et rompu par une légère secousse. Fragmens baignés par le pus, et taillés obliquement dans une étendue de quatre pouces. Cavité médullaire détruite

et sa membrane désorganisée. Genou tuméfié; plaie résultant de l'incision au côté externe de la rotule, et communiquant avec l'articulation. Carie de la face articulaire de la rotule, ainsi que des condyles externes du fémur et du tibia; destruction des cartilages diarthrodiaux et du ligament semi-lunaire externe. Articulation remplie de pus. Taches violacées, d'apparence scorbutique, sur toute l'étendue des tégumens de la jambe et du pied. Deux cicatrices adhérentes au calcanéum; l'une à sa face externe, l'autre au point d'insertion du tendon d'Achille, résultats d'un coup de feu reçu en 1813.

Je dois à mon ami, M. Léonard fils, les derniers détails de cette observation intéressante; il a fait lui-même la nécropsie et a conservé les fragmens du fémur. Quelques unes des remarques suivantes lui appartiennent autant qu'à moi, et du reste autant qu'à ceux qui connaissent le fait. Celui-ci, plus que tout autre, confirme ce qui a été dit de la nécessité d'amputer la cuisse, dans tous les cas de fractures comminutives et compliquées de ce membre par armes à feu. Mais il est déplorable que les blessés ne comprennent pas toujours cette nécessité, si bien reconnue aujourd'hui par les chirurgiens; il est déplorable que des craintes insurmontables, qu'une obstination absolue, abusent à ce point un seul

homme, contre tous les autres, sur la question de sa vie ou de sa mort : car non seulement le commandant M*** s'est refusé à l'amputation immédiate envers et contre les chirurgiens de l'armée française et ceux de l'armée belge, envers et contre ses compagnons d'armes, ses amis, qui le suppliaient de se résigner à l'opération ; mais encore il a déclaré formellement que plus tard il ne s'y soumettrait pas davantage, quels que fussent les accidens qui pourraient survenir ; et malheureusement il n'a que trop persisté dans ce refus opiniâtre. M. M***, cependant, ne manquait pas de courage ; il a supporté ses souffrances sans se plaindre à peine, et avec une résignation morale plus affligeante pour tous ceux qui l'entouraient que s'il avait cédé à l'expression de la douleur. Quelle était donc la cause si dominante qui l'empêchait de se laisser amputer ? la voici : M. M*** avait reçu, en 1813, un coup de feu au talon du même membre ; un chirurgien, le seul qui fut consulté, croyait nécessaire d'amputer la jambe ; mais le blessé s'y refusa, et il parvint à guérir de sa blessure. Qu'en devait-il résulter plus tard ? c'est que M. M*** préjugerait une fausse analogie entre une blessure du talon et une blessure de la cuisse, c'est qu'il se refuserait encore à l'amputation, quelque nécessaire

qu'elle fût, et dont l'abandon devait le faire succomber. L'autopsie cadavérique a sanctionné le fatal pronostic; et, en supposant que la mort ne fût pas survenue par les complications, par la suppuration colliquative, par l'épuisement des forces, par de si longues et si cruelles souffrances, par les altérations viscérales, était-il possible d'espérer le moindre travail de consolidation entre deux fragmens obliques, séparés l'un de l'autre par une déperdition considérable de substance, par des esquilles mobiles, nécrosées, baignées dans la suppuration? Le cal ne se serait point formé, et à sa place, peut-être, aurait existé une fausse articulation, comme on en voit quelques exemples aux invalides.

Supposons bien plus encore, c'est que la blessure de la cuisse ait guéri, d'une façon ou d'une autre; il n'en eût pas été de même, sans doute, de la lésion consécutive du genou, puisque déjà l'articulation était envahie par le pus et par la carie de ses surfaces osseuses: c'était donc encore une nécessité d'amputer la cuisse. Quant à cette lésion du genou, elle a paru toute symptomatique de la blessure de la cuisse, et provoquée probablement par le contre-coup de la commotion.

On aurait dû peut-être, dès le principe, tenter l'extraction de toutes les esquilles, pour préve-

nir la formation des abcès, faciliter l'accolement immédiat des portions musculaires environnantes sur les extrémités fracturées, qui n'auraient peut-être pas été baignées dans une aussi abondante suppuration, pour préparer enfin la formation du cal; mais était-il possible d'extraire primitivement toutes les esquilles? On l'aurait essayé, vraisemblablement, si toutes eussent été mobiles et séparables du foyer de la fracture; et si l'extraction n'en a été faite qu'à différentes reprises et à des intervalles même assez éloignés, puisqu'au sixième mois encore des esquilles ont été retirées, c'est que toutes n'étaient point parvenues en même temps à un degré suffisant de mobilité, c'est que toutes n'étaient point séparées à la fois des fragmens (1).

Blessures du genou.

Le principe chirurgical qui prescrit l'amputation de la cuisse, pour les fractures comminutives et compliquées de plaies par armes à feu, ce principe est applicable aux plaies pénétrantes

(1) Voilà une application de la théorie professée par M. Dupuytren sur les esquilles primitives, secondaires et tertiaires.

de l'articulation fémoro-tibiale par la même cause : c'est pour des lésions de ce genre que plusieurs amputations de cuisse ont été pratiquées. Dans un des cas suivans, l'issue a été funeste, parce qu'on avait tenté la conservation du membre.

Quant aux lésions superficielles, elles sont quelquefois simples en apparence, et peuvent déterminer des accidens fâcheux. Certaines contusions, par exemple, sont dans ce cas : c'est ainsi qu'un sapeur du 1^{er} régiment du génie a succombé en peu de jours aux accidens inflammatoires développés dans l'articulation, par suite d'une contusion du genou, qui paraissait simple. On ne saurait apporter trop d'attention à prévenir, plus encore qu'à combattre, les effets de ces blessures.

Flelm***, caporal au 18^e, blessé, le 9 décembre, au genou et à l'avant-bras droits, par un éclat d'obus : plaie contuse à la partie antéro-supérieure de l'articulation fémoro-tibiale, sans fracture ; contusion de l'avant-bras par ricochet du projectile. Accidens primitifs ; tuméfaction du genou ; douleurs ; fièvre ; quarante-huit sanguines en deux jours, sans effet notable. Extension du gonflement à tout le membre ; encore vingt-quatre sanguines et cataplasmes, sans plus d'amélioration. Douleurs continues, insom-

nie, anxiété; quatrième application desang-sues tout aussi vainement. Point pleurétique; deux saignées en vingt-quatre heures; diète, repos absolu; premier degré d'amélioration, pansemens simples, émolliens, mais douleurs toujours vives, soulagées par la sortie spontanée d'une certaine quantité de sérosité avec la suppuration. Le 20, formation d'un dépôt circonscrit, en dehors de la plaie; incision; écoulement considérable de sérosité purulente; dégorgement graduel; pansemens simples, fomentations émollientes; bandage roulé; amélioration soutenue; cicatrice retardée par des efforts de mouvement dans l'articulation. Guérison à peu près complète, vers le cinquante-cinquième jour.

Cette blessure aurait guéri bien plus promptement, si l'invasion des accidens eût été prévenue, après le débridement préalable, par un appareil méthodiquement contentif, et laissé à demeure. Les quatre applications successives de sanguines sont restées sans effet; il nous semble même qu'elles ont pu entretenir la tuméfaction inflammatoire, en ce sens que, ne suffisant pas au dégorgement, elles ont peut-être provoqué un afflux de sang plus considérable.

J***, soldat au 7^e de ligne, blessé, le 18 décembre, par un éclat de mitraille: plaie contuse,

peu étendue, à la partie externe et antérieure du genou droit. Exploration de la plaie à Berchem; débridement; ni esquilles, ni corps étrangers; dénudation du condyle externe du fémur; articulation ouverte dans son quart externe. Projet d'amputation; mais changement d'avis; pansement simple; évacuation sur Anvers. Formation d'un abcès considérable au tiers inférieur de la face externe de la cuisse. Douleurs vives, topiques émolliens. Le 23, ouverture par incision; écoulement de pus et de sang extravasé. Diminution notable des douleurs. Gonflement considérable de l'articulation; suppuration très abondante; douleurs vives à la moindre pression. Le 15, abcès formé au creux du jarret; incision. Le 20 janvier, décollement de la face externe de la cuisse, étendu jusqu'à la partie moyenne; nouvelle incision. Le 1^{er} mars, état général assez satisfaisant; tuméfaction toujours douloureuse du genou. Le 8, siège principal de la douleur à la face interne de l'articulation; la moindre pression est intolérable; peau tendre et violacée. Le 10, écoulement abondant de pus par l'ouverture du jarret; tuméfaction un peu diminuée. Le 12, assez de calme; alimentation augmentée. Du 16 au 22, travail de résolution. Le 26, douleurs très vives dans l'articulation; issue de la

matière purulente par la face interne ; soulagement consécutif Le 30, état général assez satisfaisant ; époque de la guérison encore incertaine.

Le même projectile avait fracturé comminutivement la première phalange de l'auriculaire de la main droite ; l'amputation immédiate en fut faite, sans le moindre accident consécutif.

On voit que la lésion du genou, peu étendue, peu profonde et sans complication primitive, a été suivie d'accidens graves. L'amputation n'a pas été pratiquée ; mais elle sera peut-être inévitable plus tard, si déjà elle n'a été faite à notre insu ; car nous n'avons pas eu de renseignements définitifs sur l'état de ce blessé.

Cha***, canonnier au 2^e d'artillerie, blessé, le 18 décembre, au genou droit, par un éclat de bombe : plaie pénétrante de l'articulation, par son côté interne. Aucun accident immédiat, si ce n'est un peu de tuméfaction ; mais, au bout de quelques jours, tension douloureuse ; rougeur des tégumens, gonflement plus considérable ; réaction fébrile assez intense ; avis partagé sur la nécessité de l'amputation primitive ; pansemens continués ; suppuration abondante ; mêmes accidens. Plusieurs applications de sanguines ; cataplasmes ; soulagement

passager; progrès de l'inflammation interne; douleurs lancinantes, exaspérées par la moindre pression ou par les plus légers mouvemens de l'articulation; gonflement continu; suppuration mêlée de sanie fétide. Le blessé se refuse à l'amputation consécutive; nouvelles saignées locales, cataplasmes laudanisés, fomentations émollientes; position horizontale; bandage légèrement contentif. Amélioration notable, moins de gonflement, moins de suppuration, moins de douleurs, travail de cicatrisation, pronostic plus favorable, cicatrice fort avancée; transport à l'hôpital de Lille, dans le courant d'avril.

La fatigue du voyage détermine une tuméfaction douloureuse du membre. Dès lors, nouvelle série d'accidens inflammatoires; formation successive de six dépôts au pourtour du genou, et nécessité de pratiquer autant d'incisions; mélange d'une certaine quantité de synovie à la matière purulente; état fébrile compliqué d'une irritation gastro-intestinale; oedématie croissante du genou et de la jambe; demi - flexion obligée. Accidens inflammatoires de plus en plus intenses dans le foyer de la blessure; épuisement graduel des forces; mort, le 14 juin.

Nécropsie. Rien de notable dans les organes

splanchniques. Infiltration de toute l'étendue du membre blessé; engorgement du pied; décollement de la peau dans toute la partie antérieure et interne du genou; gangrène de sa partie postérieure; plusieurs plaies fistuleuses communiquant avec l'articulation; ligament latéral interne presque détruit; carie profonde du condyle correspondant du fémur, et de la face postérieure de la rotule; destruction des fibro-cartilages, des ligamens croisés, ainsi que de la membrane synoviale; épanchement de pus dans la cavité articulaire; enfin, fusées purulentes dans les interstices musculaires de la cuisse et de la jambe, à quatre travers de doigt au dessus et au dessous de la lésion.

Ce fait encore démontre la nécessité de l'amputation de la cuisse, pour toutes les plaies pénétrantes de l'articulation du genou par armes à feu.

Blessures de la jambe.

Les contusions de la jambe et les plaies sans fractures de ce membre n'ont offert aucun phénomène particulier; il y avait, tantôt une seule ouverture, tantôt une double, à travers l'espace inter-osseux ou l'épaisseur des muscles du mol-

let. L'atrophie du membre a été souvent la conséquence de ces blessures; la complication la plus commune fut la formation de foyers purulens. C'est un fait également applicable aux fractures. Presque toutes les amputations de la jambe ont été nécessitées par des fractures comminutives et compliquées. Les fractures moins graves, traitées par l'appareil renouvelé ont été suivies de divers accidens, dont les observations rendent compte. Les fractures du tiers supérieur ont été suivies de l'ankylose du genou; et l'ankylose de l'articulation tibio-tarsienne a été fréquemment le résultat définitif des fractures du tiers inférieur. May***, du 65^e: fracture compliquée du tibia et du péroné à leur tiers supérieur; Tha***: fracture compliquée de l'extrémité inférieure du péroné; plusieurs autres, encore, cités ou non, dans les observations, ont été atteints d'ankylose.

Guil***, voltigeur au 39^e, blessé le 6 décembre, à la jambe droite, par une balle: double plaie de la partie postérieure, à travers les muscles jumeaux, de haut en bas et d'avant en arrière, sans fracture. Débridement, pansement simple; accidens consécutifs; tension douloureuse; gonflement assez considérable; étranglement musculaire; fièvre traumatique; dé-

bridement des deux plaies; topiques émolliens pendant quelques jours; amélioration; pansemens à plat. Le 25 décembre, suppuration normale; cessation des accidens; travail apparent de cicatrisation; mais, le 19 janvier, décollement spontané de la peau intermédiaire aux deux plaies et au delà; infiltration intermusculaire du pus; compression inutile. Le 22, incision; écoulement d'une quantité considérable de matière purulente; pansement à plat; bandage méthodiquement compressif; diminution graduelle de la suppuration; cicatrisation définitive, le 29; développement des bourgeons charnus, le 5 février; guérison complète, le 22.

Le seul résultat de cette blessure, c'est l'amagrissement du membre, et la difficulté des mouvements d'extension; et le seul fait notable, c'est le décollement de la peau et l'infiltration purulente, à l'époque où la cicatrisation définitive paraissait commencer. Le débridement primaire n'avait pas été fait assez largement.

Bou***, canonnier au 1^{er} régiment d'artillerie, blessé le 22 décembre, à la partie postérieure et inférieure de la jambe gauche, par un éclat de bombe: déchirure transversale des parties molles; section nette et entière du tendon d'Achille à sa réunion musculaire; hémorragie

primitive produite par la lésion de l'artère tibiale postérieure ; perte de sang assez considérable ; syncope prolongée ; tamponnement de la plaie ; pansement provisoire. Exploration de la blessure ; point de débridement à faire ; nouvelle hémorragie instantanée ; ligature de l'artère dans le fond de la plaie ; pansement simple, extension du pied par des attelles et un bandage unissant. Le 24, quelques accidens ; douleurs vives dans la plaie, par la contention trop forte du membre ; exsudation sanguinolente ; maintien de l'appareil ; diète et régime sévères ; douleurs moindres. Le 27, levée du premier appareil ; suppuration bien établie et de bonne nature ; état général assez satisfaisant. Le 29, même état ; pied maintenu dans l'extension. Le 6 janvier, suppuration diminuée ; alimentation légère ; le 12, bourgeons charnus sur toute la surface de la plaie, mais pendant quelque temps état stationnaire ; cicatrisation lente, à cause de la difficulté de maintenir le pied dans une extension parfaite. Le 22 février, cicatrice complète ; extension du pied continuée, au moyen d'une sandale à peu près semblable à celle de J.-L. Petit.

Cette blessure nous a paru assez remarquable, en ce que la section du tendon d'Achille

était si nette, si régulière, qu'elle semblait faite par un instrument tranchant. Cette circonstance a sans doute favorisé la cicatrisation; il n'est resté que de la raideur dans le membre, et de la difficulté dans la marche, mais sans claudication.

Di***, voltigeur au 8^e de ligne, blessé le 23 à la jambe gauche, par une balle: plaie pénétrante de la partie supérieure du membre à sa face antérieure; enclavement du projectile dans la grosse tubérosité du tibia. Exploration; débridement de la plaie, impossibilité d'extraire la balle; tentatives à diverses reprises, tout aussi vainement; introduction d'une mèche de charpie dans la plaie; pansement provisoire; bandage contentif. Le 3 janvier, extraction du projectile après des pressions lentes et graduées depuis le fond jusqu'à l'ouverture de la plaie; demi-perforation de l'os, sans fracture; pansement avec une nouvelle mèche de charpie, des plumasseaux, des compresses, et un bandage roulé. Accidens consécutifs; tuméfaction douloureuse du genou; impossibilité des mouvements de flexion; état fébrile; topiques émolliens; fomentations; diète. Amélioration soutenue, le 20 janvier; pansemens simples et à plat jusqu'au 1^{er} février. Issue de la matière purulente par la compression graduée des par-

ties molles de la face postérieure de la jambe. Sortie simultanée de trois petites esquilles; le 3 février, nouveau gonflement, mêmes soins et même efficacité; position demi-fléchie, repos et régime sévère; évacuation sur l'hôpital de Lille. Suppuration beaucoup moindre, mais continue, pendant un mois; périostose du tibia, par suite de l'inflammation; mouvements de flexion du pied presque nuls, par suite de la lésion des muscles jambier postérieur et fléchisseur; tension très douloureuse dans l'articulation fémorotibiale.

Les tentatives fréquentes et prolongées d'extraction du projectile, surtout par des moyens mécaniques, pouvaient déterminer des accidens plus graves; il semble alors plus rationnel de laisser agir la nature et d'abandonner au travail de suppuration l'issue du corps étranger, quand il est enclavé aussi fortement dans une extrémité articulaire.

Ma***, caporal de grenadiers au 25^e, blessé, le 5 décembre, par un éclat de bombe: plaie et fracture comminutive du tibia gauche, à l'union du tiers supérieur avec le tiers moyen de la jambe. Débridement; extraction des esquilles; application d'un appareil. Évacuation sur Anvers. Réaction générale peu intense.

Le 10, premier pansement; suppuration éta-

blie. Le 18, douleurs vives, tuméfaction assez considérable au pourtour de la plaie. Cataplasmes émolliens. Le 24, amélioration sensible. Le 26, suppuration plus abondante; pansemens journaliers. Le 8 janvier, suppuration diminuée; développement du tissu vasculaire. Le 15, cicatrisation commençante. Le 24, pas encore de consolidation. Le 29, douleurs vives à la partie interne de la jambe : cataplasme. Le 2 février, ouverture d'un abcès sur ce point. Le 15, cicatrice boursouflée; pus ichoreux; signes de carie. Le 20, issue d'une esquille friable. Le 10 mars, introduction d'un morceau d'éponge préparé dans la plaie: celle-ci se distend et favorise la sortie de plusieurs esquilles semblables à la première. Le 26, plaie en bon état et aussi profonde que l'épaisseur de l'os. Le 28, cal imparfait. Séjour à l'hôpital de Bruxelles; extraction de plusieurs esquilles; transport à Lille, le 25 avril. Cicatrisation de la plus grande partie de la plaie; cal encore incomplet; la suppuration, assez louable d'abord, devient féttide; emploi du chlorure d'oxide de sodium; mieux; travail enfin régulier de consolidation, et cal définitif dans les derniers jours de mai.

M. Forget avait été d'avis, dès le principe, d'amputer la jambe; mais le chirurgien en chef

l'en avait dissuadé ; tous deux, cependant, pouvaient avoir raison , à en juger , d'une part, d'après la série des accidens consécutifs, et, d'autre part, d'après le résultat heureux de cette blessure.

Gr***, grenadier au 5^e de ligne, blessé, le 11 décembre, par un éclat d'obus : fracture comminutive du tibia droit, à sa région moyenne, avec plaie peu étendue à la partie interne de la jambe. Transport à Berchem. Débridement ; extraction des esquilles mobiles ; application d'un appareil à fracture. Évacuation sur Anvers. Douleurs vives pendant la nuit. Topiques réfrigérans sur l'appareil. Diète ; boissons acidulées. Le 16, premier pansement ; suppuration peu abondante ; douleurs encore vives ; fomentations émollientes ; même régime. Le 21, second pansement, suppuration normale. Le 29, abcès à la partie interne du membre, douleurs vives : cataplasmes. Le 1^{er} janvier, ouverture de l'abcès par incision ; écoulement de pus en abondance. Soulagement immédiat. Pansemens journaliers pendant le mois de janvier. Le 4 février, cal formé. Le 5, exfoliation d'un fragment du bord antérieur du tibia. Le 15, cicatrisation de la plaie très avancée ; suppression des attelles ; plus de douleurs dans le membre. Le 1^{er} mars, plusieurs mouvements faciles. Le 28 mars, le blessé est en voie de

guérison. Transport à Lille; par suite de la fatigue du voyage, gonflement du membre; incisions successives de plusieurs abcès; affaiblissement par l'abondance de la suppuration, ainsi que par une bronchite symptomatique; mais enfin, retour graduel des forces; consolidation de la fracture dans le courant de mai.

Le blessé a conservé beaucoup de faiblesse, ainsi que de la raideur et de la difficulté dans les mouvemens du membre; le cal, quoique définitif, ne paraît pas avoir une grande solidité.

Gi***, grenadier du 5^e de ligne, blessé, le 11, par un éclat de bombe: fracture complète de la jambe gauche, à son quart inférieur, avec plaie linéaire étendue jusqu'au niveau de la malléole externe. Appareil de fracture appliqué à Berchem. Évacuation sur Anvers. Le 13, fièvre; céphalalgie; douleurs vives dans tout le membre; saignée de douze onces; diète. Le 14, amélioration sensible; diète encore. Le 16, pansement; suppuration abondante; plaie en bon état; alimens légers. Le 22, quelques escharres sont entraînées par la suppuration. Le 25, rien de notable. Le 1^{er} janvier, tuméfaction de tout le membre; douleurs à la partie externe de la plaie. Le 4, douleurs moindres; suppuration

augmentée; topiques émolliens. Le 8, mieux sensible. Progrès vers la guérison. Le 1^{er} février, consolidation de la fracture; plaie diminuée d'étendue. Le 10, plaie réduite à un point fistuleux, qui donne issue à une suppuration ichoreuse et à quelques parcelles d'os. Le 25, suppression des attelles. Le 6 mars, introduction d'un morceau d'éponge préparé dans le trajet fistuleux pour le dilater, et faire reconnaître s'il y a carie au tibia. Le 12, formation d'un abcès énorme au côté interne de la jambe; douleurs vives: cataplasmes. Le 15, fluctuation manifeste. Ouverture par incision. Issue d'une grande quantité de pus mêlé de caillots sanguins. Le 17, disparition du gonflement. Le 22, amélioration notable; exercice. Le 28, évacuation sur la France. Extraction de plusieurs esquilles par deux plaies fistuleuses; suppuration encore abondante; fracture; en voie de consolidation à l'hôpital de Lille, le 2 avril.

Au moment où nous avons reçu ce blessé à l'ambulance, j'avais mis en note que l'amputation consécutive deviendrait peut-être indispensable; je n'ai pas eu de renseignemens ultérieurs.

M. Pau***, chef de bataillon au 1^{er} régiment du génie, blessé dans les tranchées, le 19 dé-

cembre, par une balle : double plaie à la partie inférieure de la jambe gauche, oblique de haut en bas, de dedans en dehors et d'arrière en avant; fracture comminutive du péroné dans une étendue de trois travers de doigt. Transport à Berchem; débridement double; extraction des esquilles; appareil contentif; évacuation sur Anvers. Le 23, premier pansement: suppuration abondante; séparation de quelques caillots de sang et de portions de tissu cellulaire converties en escharres. Douleurs vives par les moindres mouvemens; irritabilité extrême pendant les pansemens. Suppuration abondante et sanguinolente. Le 1^{er} janvier, stagnation du pus à la partie interne de la jambe; prolongement du débridement postérieur; foyer mis à découvert; issue d'une grande quantité de matière purulente. Le 7, tuméfaction de la partie supérieure du membre; topiques émolliens, point de fluctuation dans l'espace poplité; compression méthodique; écoulement du pus par la plaie supérieure. Le 15, compression insuffisante pour expulser toute la matière purulente contenue dans l'espace poplité: incision dans cette région. Du 16 au 20, suppuration par les trois ouvertures; décollement considérable des tégumens de la face postérieure et

externe du membre. Application d'un appareil expulsif à demeure, au moyen de compresses graduées et de larges bandelettes agglutinatives ouvertes au niveau des plaies. Resserrement de cet appareil en proportion de la réduction de volume du membre; diminution graduelle de la suppuration; suppression successive des bandelettes, pendant les premiers jours de mars. Le 10, premiers mouvemens de marche, à l'aide de béquilles; sortie de l'hôpital d'Anvers le 20 mars, en voie de guérison certaine.

Les accidens consécutifs de cette fracture grave ont été exaspérés par l'irritabilité extrême du blessé, qui ne pouvait supporter les moindres pressions dans les pansemens. La guérison a été due tout entière aux ressources de l'art et aux soins les plus empressés, les plus constants.

M. Bru***, capitaine au 11^e régiment d'artillerie, blessé le 21 décembre, dans les tranchées, par un éclat de bombe: fracture comminutive du péroné dans son tiers moyen, avec large plaie à la face externe et postérieure de la jambe gauche. Dilacération des tégumens, de tout le muscle jumeau externe et du tendon d'Achille, avec perte de substance de cinq pouces environ. Transport à Berchem; exploration de la plaie,

extraction des esquilles ; évacuation sur Anvers. Peu de douleur, point de réaction. Le 22, pansement ; suppuration presque nulle ; plaie couverte d'escharres. Le 25, séparation de ces escharres par la suppuration ; légère réaction fébrile ; diète, boissons rafraîchissantes. Le 30, suppuration bien rétablie ; soutien du mollet avec des compresses longuettes et des bandlettes agglutinatives, pour rapprocher les lèvres de la plaie. Rien de notable du 3 au 15 février. Le 20, suppuration bien diminuée, cicatrisation commençante. Le 8 mars, consolidation de la fracture ; mouvemens faciles ; aspect grisâtre et blafard de la plaie, fort rétrécie du reste ; emploi du chlorure. Le 10, progrès lents de la cicatrisation. Le 20, guérison avancée, complète le 3 avril ; évacuation sur la France.

Le capitaine Bru*** s'est placé dans des conditions bien plus favorables que le commandant Pau*** ; sa blessure était cependant plus grave, et elle n'a pas été compliquée d'accidens, parce que la force morale semblait une garantie de la guérison.

V***, du 18^e de ligne, blessé le 14 décembre, au pied droit, par un éclat de bombe : plaie contuse, de deux pouces de diamètre, au niveau de la malléole externe ; fracture du péroné ; débri-

dément ménagé, à cause du voisinage de l'articulation; extraction de quelques petites esquilles, pansement simple; appareil de fracture. Point d'accidens primitifs; pansemens à divers intervalles, mais état presque stationnaire de la blessure; évacuation sur l'hôpital de Lille. Le 25 janvier, après la fatigue du transport, douleurs vives dans le membre; levée de l'appareil; tuméfaction douloureuse du pied, étendue au tiers moyen de la jambe; ulcération de la plaie; teinte rougeâtre, violacée de ses bords; suppuration abondante et de mauvaise nature: application de sangsues; cataplasmes émolliens; pansemens simples; position; repos absolu; régime sévère. Amélioration consécutive; diminution du gonflement et des douleurs; réaction générale moins forte, mais suppuration continue de la plaie; aucun travail de consolidation du péroné; aspect syphilitique de la blessure; lividité des bourgeons charnus; élévation des bords de la plaie, qui sont taillés à pic, caractères de plus en plus prononcés: au bout de plusieurs jours, traitement anti-vénérien par les sudorifiques et les mercuriaux; efficacité notable sur l'état de la blessure; travail de cicatrisation de la plaie, et consolidation de la fracture, après 28 doses de sirop sudorifique et de

solution de deuto-chlorure de mercure, à un demi-grain. Guérison complète, à la fin du mois de mai.

Les accidens consécutifs de cette blessure, son état stationnaire pendant long-temps, la suppuration abondante et continue, le caractère spécial de la plaie, étaient autant d'indices pour faire supposer une cause syphilitique. M. Léonard s'en est assuré d'après les renseignemens mêmes du malade, qui n'avait subi qu'un traitement anti-phlogistique; enfin, l'influence du virus vénérien sur la guérison a été prouvée par le succès d'un traitement plus rationnel.

Et ce n'est pas dans cette seule circonstance que la remarque en a été faite parmi quelques uns de nos blessés d'Anvers (1).

(1) La question mériterait, du reste, d'être examinée plus attentivement, à l'effet de préciser les divers degrés de cette influence syphilitique sur la guérison des blessures, et pour ne pas attribuer à des symptômes récents de la maladie certains effets qui ne peuvent guère en dépendre, si elle n'est pas ancienne ou constitutionnelle.

Blessures du pied.

Des contusions, des plaies des diverses parties du pied, avec ou sans fractures, n'offrent pas assez d'intérêt pour qu'il en soit question; et même je ne rapporte que deux cas de blessures graves de cette extrémité du membre pelvien, pour lesquelles l'amputation n'a pas été pratiquée: les résultats, sans avoir été funestes, ne sont pas beaucoup plus favorables aux tentatives qui ont été faites pour conserver le membre.

L'observation de Man^{**} présente une lésion consécutive du pied, fort remarquable, mais que nous ne rappellerons pas ici. (Voyez *Plaies de la cuisse*).

Pl^{***}, soldat au 5^e de ligne, blessé, le 11 décembre, par un boulet à ricochet, qui était vers la fin de sa course: luxation complète du pied gauche; rupture des ligamens latéraux externes; érosion des parties molles correspondantes: le pied, séparé de son articulation, est renversé sur la face interne de la jambe. Douleurs extrêmement vives; impossibilité d'appuyer le membre sur le sol. Réduction assez facile, à l'ambulance de Berchem: cessation immédiate des douleurs; appli-

cation d'un bandage à fractures, avec semelle. Évacuation sur Anvers. Le 17, premier pansement : point d'accidens locaux ni de réaction générale; suppression des attelles. Le 20, mouvement fébrile, avec céphalalgie; diète, saignée. Le 21, suppuration abondante; douleurs nouvelles; déviation du pied en dedans; topiques émolliens. Le 30, collection purulente au dessus de la malléole interne; incision, écoulement de beaucoup de pus. Le 5 janvier, nouvel abcès à la partie postérieure du tendon d'Achille; ouverture, et issue de la matière purulente. Application d'un nouveau bandage avec attelles; tégumens violacés, tendus; plaies fongueuses; nécessité de l'amputation proposée au blessé, qui s'y refuse; suppuration très abondante.

Le 15 février, premiers degrés d'amélioration; suppuration diminuée; régime proportionné. Le 20, nouvel abcès, près de la malléole externe; ouverture spontanée dans la plaie. Le 1^{er} mars, état assez satisfaisant; quelques mouvements possibles dans l'articulation. Le 15, suppuration de mauvaise nature; sanie fétide, indiquant un travail de carie. Évacuation sur la France, le 28 mars: trois plaies en suppuration pendant fort long-temps à Lille; ankylose de l'articulation tibio-tarsienne; atrophie des orteils; émacia-

tion de la jambe ; station impossible sur le membre blessé.

Cette luxation grave, qui nous a paru d'une espèce assez rare, n'aurait peut-être pas été suivie de complications aussi fâcheuses si l'on n'avait point fait usage des attelles, qui comprimaient le membre trop fortement. Ne sera-t-il pas nécessaire plus tard de pratiquer l'amputation ?

Xa***, carabinier au 65^e, blessé, le 11 décembre, au pied gauche, par un éclat de bombe : fracture comminutive du calcanéum, à sa face inférieure, avec plaie déchirée ; débridement ; extraction immédiate de quelques esquilles ; pansement simple ; accidens consécutifs ; tuméfaction étendue progressivement à la totalité du pied ; douleurs dans le foyer de la blessure ; difficulté des moindres mouvemens jusque dans l'articulation tibio-tarsienne ; réaction fébrile très intense ; topiques émolliens ; suppuration abondante et continuée pendant fort long-temps. Ensuite, diminution lente et incomplète du gonflement inflammatoire ; formation et ouverture successives de trois abcès au pourtour de la plaie, près des malléoles ; amaigrissement du membre ; guérison éloignée.

Évacuation sur l'hôpital de Lille, le 2 avril :

séjour prolongé. Suppuration toujours abondante de la plaie; formation et ouverture de trajets fistuleux consécutifs aux abcès; extraction de six esquilles; décollement d'une portion des téguimens; amélioration immédiate; premier travail de cicatrisation franche, terminé à la fin du mois de juin.

Les résultats définitifs de cette blessure laissent beaucoup à désirer: tout le membre est amaigri, atrophié; l'articulation tibio-tarsienne et les articulations partielles du pied sont ankylosées; la station et la marche sont pénibles et compliquées de claudication. La santé générale du blessé est fort affaiblie: il est sujet à des bronchites assez intenses, et sa constitution lymphatique le prédispose à de nouveaux accidents, qui pourront nécessiter plus tard l'amputation de la jambe.

§ VII. AMPUTATIONS.

Les témoignages en faveur de l'amputation immédiate l'ont toujours emporté sur les témoignages opposés, et aujourd'hui plus que jamais, l'expérience a confirmé ce fait irrévocablement. Je pourrais invoquer d'anciennes autorités, telles que Duchesne, Ledran, Wisman, Ranby,

Lamartinière, Boucher, Thomson, Hennen, Schmucker, Pott, John Bell, Richter et tant d'autres qui ont combattu l'opinion de Faure, Hunter, Bilguer, et quelques autres. Je pourrais trouver des argumens favorables à l'amputation primitive chez ceux-mêmes qui ont cherché à faire prévaloir l'amputation consécutive. Faure convient de l'avantage d'amputer de suite dans certaines circonstances, qui forment précisément la grande majorité des cas d'amputation immédiate. Mais pourquoi reproduire la discussion banale de ces vieux procès de la chirurgie? pourquoi en appeler à des témoignages aussi éloignés de nous? Cette haute question a été décidée par des chirurgiens militaires plus modernes, pendant la longue série des batailles de l'empire; elle a été confirmée, depuis, par les chirurgiens civils, en 1814, en 1830, en 1831. Que l'on me permette de citer mon père, et je dirai qu'à lui seul, il a souvent fait, dans le même combat, une centaine d'amputations, et la grande conclusion qu'il a tirée de cette immense pratique, c'est l'avantage incontestable des amputations primitives.

Je sais que quelques partisans des amputations secondaires ont allégué en faveur de leurs principes certains exemples de blessures

fort graves, gémieries sans amputation, envers et contre tous ceux qui l'avaient proposée; ils ont même porté l'esprit de prévention et de jalousie jusqu'à dire que les chirurgiens militaires n'ont aucun scrupule de couper un membre, parce qu'ils ont l'habitude de voir couler le sang: eh bien! que ceux-là qui parlent ainsi viennent aux ambulances d'un champ de bataille, qu'ils prennent note des amputations faites ou à faire, et ils verront tôt ou tard les résultats; qu'ils pèsent chacun d'eux, et ils verront que la majorité des amputations primitives est *toujours* dans la balance de guérison, tandis que la majorité des amputations consécutives est *toujours* dans la balance de mort. Que l'on compare aussi le succès des amputations primitives et la terminaison funeste d'un grand nombre de fractures graves, et l'on retrouvera une proportion analogue. Plusieurs de nos observations en font foi.

Je dirai encore que beaucoup de fractures compliquées, auxquelles l'amputation primitive était applicable, ne parviennent, après bien du temps et des peines, qu'à une fausse guérison, c'est à dire que les membres conservés sont souvent tout à fait inutiles et même à charge, tellement que les malheureux auxquels

on avait voulu épargner l'amputation, ou qui s'y étaient refusés eux-mêmes, la demandent ensuite instamment. Les exemples en sont assez nombreux aux Invalides : de là, un genre d'amputations consécutives que l'on désigne sous le titre d'amputations de complaisance, et dont on reconnaît de jour en jour les chances généralement funestes. M. Dupuytren, pour sa part, y a presque renoncé. Une transition simple m'amène à la première des propositions spéciales qui doivent précéder les faits ; elle prouvera encore que les chirurgiens militaires ne se décient pas légèrement à amputer.

Les blessures graves des membres étant bien constatées, fractures comminutives et compliquées, plaies pénétrantes d'articulations, dilatations profondes ou étendues des parties molles, etc., etc., ce n'était pas assez pour nous, chirurgiens des ambulances, de reconnaître la nécessité des amputations, nous voulions qu'elle fût constatée par tous les officiers de santé que nous pouvions requérir, tels que des chirurgiens des corps, des chirurgiens belges et des chirurgiens étrangers. Cette sage mesure avait été prise par notre digne chef, dans l'intérêt des blessés d'abord, et ensuite dans l'intérêt de la chirurgie militaire. Qu'en résultait-

il ? confiance entière des blessés dans la décision des chirurgiens. L'amputation une fois résolue était pratiquée immédiatement, presque toujours sans réclamation, et comme s'il n'y avait pas eu de partie intéressée. Cinq blessés seulement ont opposé un refus formel et opinionnaire à la proposition instantanée de subir l'amputation. De ces cinq militaires, trois étaient soldats ; deux sont morts ; les deux autres étaient officiers ; un seul a survécu, et la guérison de l'autre n'est pas définitive. Aucune réflexion n'ajouterait à des faits aussi concluans ; et combien n'en pourrait-on pas citer d'autres encore !

Du reste, la nécessité de chaque amputation est prouvée par le compte rendu de chaque lésion. J'ai dit que je ne ferai pas l'énumération des blessures considérées aujourd'hui comme cas d'amputation primitive. Cette question a été détaillée assez souvent.

Faut-il, d'après l'opinion de Bilguer, abandonner aux seuls efforts de la nature les membres amputés par le boulet ? Nous ne le pensons pas, toutes les fois qu'il en résulte un moignon difforme et dilacéré, parce que des complications graves accompagnent presque toujours ces plaies irrégulières. Ainsi, des hémorragies

consécutives, des accidens nerveux et même le tétanos; des caries, des nécroses, ou tout au moins des conicités du moignon, après une cicatrisation extrêmement lente, leur succèdent dans la plupart des cas. Si cependant l'amputation par le boulet est nette et régulière, si elle a été faite à un membre volumineux comme la cuisse, et près de son articulation supérieure, si, enfin, aucun accident primitif ne s'est déclaré, on peut se contenter de prévenir les accidens consécutifs par les moyens les plus convenables, tels que la ligature de l'artère principale du membre et des autres vaisseaux à portée d'être saisis, etc., sans courir les chances d'une amputation secondaire; mais ce serait peut-être encore hasarder le succès. Le principe le plus sage, c'est d'amputer le moignon s'il donne assez de prise dans la continuité, ou même d'en faire la désarticulation: ce dernier cas ne s'est point présenté à Anvers.

Quant aux amputations secondaires du moignon, c'est à dire les amputations faites pour la seconde fois par le chirurgien, aucune n'a été pratiquée pendant ou après le siège: c'est une des opérations les plus défavorables, et heureusement les plus rares.

Il y a eu parmi les blessés hollandais seule-

ment plusieurs cas d'amputation double ; l'un d'eux est fort remarquable par ses complications et par sa guérison inespérée. Voyez l'observation de M***, soldat hollandais, amputé du bras droit dans l'article et du poignet gauche.

La méthode circulaire, en un seul ou en plusieurs temps, a été employée presque exclusivement pour toutes les amputations. On n'a eu recours à la méthode à lambeaux que par nécessité, ou dans quelques cas d'amputations du bras à l'article.

Nous avons fait souvent la ligature des veines principales, comme le recommande M. Larrey. Si nous avions opéré dans les hôpitaux d'où nos amputés ne fussent sortis qu'au terme de leur guérison, nous aurions tenté quelques essais comparatifs de la ligature et de la torsion des artères; mais les évacuations parurent un obstacle à l'emploi de cette méthode; elle n'en est pas moins, je crois, très efficace dans certaines circonstances.

Ici, se présente une question importante pour les amputations : quels sont les avantages et les inconvénients de la réunion immédiate? ou plutôt, en résumant tout à fait la question, convient-il d'employer la réunion immédiate comme méthode générale pour les amputations primi-

tives? En principe, je le crois; mais, en fait, je dirai qu'il peut en résulter souvent des désavantages. Je m'explique d'après l'observation pratique. Une amputation primitive est faite suivant les préceptes les plus rationnels; et on a soin surtout d'arrêter tout à fait le sang, jusqu'à ce qu'on soit certain que l'hémorragie ne puisse avoir lieu conséutivement par le moindre vaisseau (1): cela étant, on veut réunir la plaie du moignon par *première intention* (je regrette que nous manquions d'un terme plus juste que celui-là); or, pour obtenir cet effet, on emploie généralement les bandelettes agglutinatives, car je ne parle pas de la suture, si préconisée cependant par feu le professeur Delpech et son école. On applique donc les bandelettes de manière que les deux faces du moignon soient maintenues dans un contact parfait sur toute l'étendue de leurs bords; on ménage ou non un hiatus aux deux angles de la plaie, ou bien à l'angle inférieur seulement, pour l'écoulement de la suppuration et le passage des ligatures; puis, la charpie, les compresses et la bande forment un appareil contentif destiné à soutenir l'effet des bandelettes: voilà sommairement la méthode générale de réunion immédiate.

(1) Je rappellerai, à ce sujet, la méthode expectante employée avant le pansement par M. Dupuytren.

Ce serait un moyen parfait, si la plaie du moignon ne devait pas éprouver des changemens notables; mais la période d'inflammation adhésive doit survenir; elle est très souvent précédée d'un gonflement assez considérable, dont les effets deviennent alors nuisibles. Le travail inflammatoire ne pouvant pas se développer librement, à cause de la constriction qu'exercent les bandelettes, tend à les écarter, à les disjoindre: de là des douleurs d'étranglement dans le moignon, et une réaction générale. Si les bandelettes ne cèdent pas en partie à la tuméfaction inflammatoire, les accidens s'aggravent; le gonflement s'étend à tout le membre, des érysipèles se développent; des abcès, des décollement surviennent, et des complications plus graves que je ne citerai pas, parce qu'on me taxerait d'exagération, compromettent la vie du sujet.

Or, ces complications fâcheuses sont d'autant plus fréquentes, que la constriction exercée par les bandelettes agglutinatives est plus forte: il faudrait donc avoir toujours soin de la ménager autant que possible, et se contenter d'une réunion à peu près immédiate, ou d'une demi-réunion, qui a, selon nous, les avantages et non les inconveniens des deux méthodes opposées, sa-

voir la réunion immédiate et la réunion médiate ou par seconde intention, car je pense que cette dernière n'est généralement applicable qu'aux amputations consécutives ; et, à l'appui de ces considérations générales, je dirai les résultats que nous a fournis cette méthode à Anvers, où nous avons employé, depuis le commencement du siège jusqu'à la fin, la réunion immédiate.

Quelques accidens, il est vrai, sont survenus chez plusieurs de nos amputés, et nous avons reconnu au bout de quelque temps qu'ils dépendaient de la constriction trop forte exercée par les bandelettes agglutinatives. Le chirurgien en chef proposa, dès lors, le mode de réunion mixte et nous en démontra les avantages : c'est de mettre simplement en rapport et non en contact serré les bords de la plaie du moignon. Les bandelettes s'appliquent de même, et sans traction forcée ; mais il importe qu'une suffisante étendue de tégumens ait été ménagée. J'ajouterais que les retards de la cicatrisation ont été très notables dans les cas de réunion trop immédiate, comme le démontre, du reste, la série de nos observations.

D'ailleurs, abstraction faite des accidens primitifs, cette méthode n'atteint pas toujours le but qu'on lui suppose, savoir une cicatrisation

instantanée⁽¹⁾; et je suis porté à croire que l'on exagère, en général, la rapidité des succès qui lui sont attribués. Appliquée aux amputations primitives, elle peut nuire toutes les fois qu'elle est forcée ou trop immédiate, tandis qu'elle jouit d'incontestables avantages quand elle est modérée ou à demi immédiate, c'est à dire intermédiaire à la réunion immédiate proprement dite et à la réunion médiate; car je ne veux pas désigner cette méthode mixte par l'expression plate et banale qui court les rues aujourd'hui.

Quant aux complications indépendantes de la cause que nous venons d'expliquer, il en est quelques unes que je ne ferai qu'indiquer.

Notons tout d'abord un accident qui s'est reproduit chez plusieurs amputés, et a retardé plus ou moins l'époque de leur guérison; je veux parler des chutes sur le moignon, d'où résultaient des contusions de la plaie, des déchirures de la cicatrice, des hémorragies, des abcès.

(1) M. Forget a imaginé un moyen ingénieux de donner de l'extensibilité aux bandelettes agglutinatives. Ce moyen consiste simplement à interposer et à fixer aux deux bouts de chaque bandelette de petites lanières en gomme élastique, au nombre de trois, quatre ou cinq, et séparées les unes des autres, de manière à laisser à jour la plaie avec laquelle on les a mises en contact.

Les retards de la cicatrisation m'ont paru dépendre souvent aussi de la présence des ligatures dans la plaie : c'est pourquoi je pense que la demi-réunion est plus rationnelle encore. La raison en est évidente, car la réunion tout à fait immédiate n'est-elle pas un contre-sens chirurgical, s'il y a le moindre corps étranger dans la plaie ?

Chez quelques amputés de l'ambulance d'O-boken, des clapiers se sont formés aux angles du moignon, parce que, dans les premiers panssemens, on n'avait point protégé suffisamment toute la surface de la plaie.

Quelques hémorragies consécutives ont eu lieu spontanément, ou par des tractions forcées faites sur les fils des ligatures. J'ai été à même de constater deux cas de ce genre à l'hôpital d'Anvers ; mais les suites de cet accident n'ont pas été funestes, et les ligatures ont pu être réappliquées immédiatement.

La pourriture d'hôpital s'est manifestée chez quelques amputés, sans résultat funeste, en général.

Le tétanos enfin s'est déclaré chez trois d'entre eux ; un seul a survécu, après avoir été pendant long-temps fort en danger.

Les complications générales, indépendantes de toute complication locale, ont été rares, sauf

la fièvre traumatique , et quelques cas d'irritations gastro-intestinales , attribuées surtout à des écarts e régime. On a observé plusieurs éruptions cutanées.

On a prétendu que les militaires étant, en général, jeunes, robustes, bien constitués, et hommes d'élite, en un mot, supportent les grandes opérations chirurgicales , spécialement les amputations , avec beaucoup plus de succès que les blessés des hôpitaux civils , qui sont ordinairement placés dans des conditions contraires, ou que l'on opère consécutivement. Ce fait n'est pas douteux quant aux opérations pratiquées en temps de paix ; mais, à l'armée, aux ambulances d'un champ de bataille, les militaires, irrités ou épuisés par la fatigue, les privations , les scènes des combats, les effets des blessures, sont-ils dans des conditions aussi favorables? On ne peut plus le prétendre.

Soixante-six amputations ont été pratiquées à Anvers ou aux ambulances , savoir : huit scapulo-humérales, onze humérales, six radio-cubitales , deux interradio-carpériennes , une coxo-fémorale, quinze fémorales , vingt-deux tibio-péronières, et une inter-tarsienne, sans tenir compte des amputations de doigts ou d'orteils.

De ces soixante-six amputations , cinquante-sept ont été primitives , et neuf consécutives.

Des cinquante-sept primitives, quarante-neuf ont été suivies de guérison ; tandis que, sur les neuf amputations consécutives, cinq ont eu un résultat funeste, et les quatre autres des suites plus ou moins fâcheuses, avant de parvenir à la guérison.

Amputations dans l'articulation scapulo-humérale.

Les amputations du bras dans l'articulation scapulo-humérale ont eu, en proportion, un succès aussi constant que les amputations dans la continuité du membre ; et, avant que ce fût pour nous un fait d'observation , c'était un fait établi en principe par plusieurs praticiens , et par M. Larrey plus que par tout autre ; car, dans le cours de sa longue carrière chirurgicale , il a fait plus de cent trente amputations du bras à l'article. Je ne décrirai point son procédé opératoire , parce qu'il est assez connu du monde chirurgical (1), et parce que ce n'est pas le seul

(1) Je ferai seulement une remarque, qui a été approuvée par mon père, au sujet de l'incision préalable à la section des lambeaux : on a critiqué cette incision comme une complication inutile et douloureuse; mais c'est à tort, selon nous ; car, indépendamment de la facilité qu'elle donne à l'opérateur de tailler les lambeaux , elle me semble avoir pour avantage essentiel de mettre d'abord à nul la surface de l'arti-

d'ailleurs qui ait été employé à Anvers. M. Forget, par exemple, a eu recours à la méthode circulaire, d'après MM. Groeffe et Sanson aîné. Elle nous a offert de bons résultats. Chez un des amputés, la cicatrice était si parfaitement régulière et si imperceptible, qu'elle simulait un état congénial.

Sur les huit amputations pratiquées dans l'articulation scapulo-humérale, dont cinq primitives et trois consécutives, il y a eu deux décès parmi ces dernières, et encore l'opération avait-elle été faite chaque fois dans les conditions les plus défavorables. Faut-il compter au rang des succès la troisième amputation consécutive, puisqu'il a fallu plus de cent jours à la guérison ? La moyenne proportionnelle du terme de la cicatrisation a été de cinquante-cinq jours. Une seule observation manque de détails, c'est celle de Bon*** amputé à Anvers, conséutivement, le 13 décembre, par M. Seutin, et mort le 19, au septième jour. Les sept autres observations sont assez complètes.

culation scapulo-humérale, pour reconnaître plus sûrement le désordre des parties, et dispenser de finir l'opération, si elle ne paraissait plus nécessaire, tandis que par tout autre procédé il n'y a plus à rétrograder dès que le couteau a pénétré.

Gar***, fusilier au 25^e de ligne, frappé au bras droit, le 15 décembre, par un coup de boulet amorti : fracture comminutive du col chirurgical de l'humérus, compliquée de plaie profonde et déchirée au tiers supérieur du membre ; issue des fragmens, et hernie musculaire à travers cette plaie.

Amputation primitive dans l'articulation par M. Zinck, d'après le procédé de M. Larrey, sauf le mode de pansement ; demi-réunion ; aucun accident primitif ou consécutif ; levée du premier appareil, le 18 décembre ; suppuration normale ; cicatrisation franche, complète au quarante-cinquième jour.

Ca***, du 11^e d'artillerie, mutilé du bras droit par un boulet, le 22 décembre : ablation du membre ; déchirure des parties molles dans toute leur étendue, jusqu'au niveau du col de l'humérus, avec toute la régularité d'une dissection anatomique ; un seul lambeau des tégumens adhère encore par un pédicule étroit. Amputation immédiate dans l'article, par M. Forget ; dissection prolongée circulairement ; le seul lambeau restant comprenait le paquet vasculaire ; pas de compression préalable ; désarticulation facile ; sections du lambeau ; ligatures ; plaie étroite et circulaire ; réunion à peu près immédiate ou semi-primitive ; aucun accident pendant les premiers jours.

Le 25, léger accès de fièvre, saignée, diète, régime ; bien. Le 28, levée du premier appareil ; plaie en bon état ; suppuration abondante ; léger gonflement du moignon ; topiques émolliens ; mieux. Rien de notable du 1^{er} au 10 janvier ; cicatrisation normale ; alimentation légère. Du 10 au 20, chute des ligatures ; suppuration diminuée peu à peu ; cicatrisation complète et guérison au quarantième jour.

Bar***, voltigeur au 25^e de ligne, blessé au bras gauche, le 15 décembre, par un éclat de bombe : fracture comminutive de toute l'étendue de l'humérus, avec arrachement de plusieurs fragmens et de la presque totalité des parties molles de l'articulation scapulo-humérale ; hémorragie assez abondante ; affaiblissement. Amputation immédiate par M. Forget : artère axillaire, isolée et liée profondément ; solution de continuité circonscrite par deux incisions semi-elliptiques, étendues, en avant, du sommet de la poitrine à trois travers de doigt du bord interne du deltoïde, et, en arrière, à la même distance de l'attache externe du grand pectoral ; dissection de la peau ; section des muscles et désarticulation ; ligatures ; recouvrement de la surface de la plaie avec un lambeau emprunté aux faces interne et postérieure du bras ; réunion par quatre points de suture entre-coupée ; bande-

lettes agglutinatives dans les intervalles des points de suture; matelas de charpie; compression légère par le bandage. Transport à Anvers, le même jour: suintement sanguinolent assez considérable à travers les pièces d'appareil.

Le 17, fièvre, insomnie, douleurs vives dans le moignon; saignée, diète, boissons délayantes. Le 18, mieux; levée du premier appareil; gonflement peu considérable; pas de suppuration; lèvres de la plaie en contact parfait; état satisfaisant; nourriture légère. Le 21, levée du second appareil; suppuration commençante, bien établie le 24; ablation des fils de suture; renouvellement des bandelettes; réunion exacte; pansements journaliers; ablation des bandelettes, le 5 janvier. Du 10 au 20, suppuration presque nulle; aucun accident consécutif; alimentation graduellement augmentée; cicatrice complète au quarante-cinquième jour.

Il eût été difficile de suivre un autre procédé pour cette désarticulation, à cause de l'étendue de la blessure: l'emploi de la suture, que l'on aurait droit de critiquer sans cette condition, a favorisé la cicatrisation du lambeau d'emprunt. Ce fait, notable sous le rapport du procédé opératoire, auquel M. Forget a donné le nom d'*omoplastie*, est intéressant encore par ses heureux résultats.

Ph***, sapeur au 2^e régiment du génie, frappé, le 17 septembre, à l'épaule gauche, par un boulet : ablation de la totalité du moignon de l'épaule; déchirure de toute la partie antérieure des tégumens et du muscle deltoïde; attrition de toutes les parties molles; section de l'attache du grand rond et du muscle grand dorsal, qui pendent avec une longue portion charnue; fracture comminutive du tiers supérieur de l'humérus; dénudation et fracture de la tête osseuse elle-même, détachée en partie de la cavité glénoïde; fracture de l'apophyse coracoïde sans déplacement; hémorragie peu abondante; excision de quelques portions des parties molles; pansement provisoire à la tranchée.

Amputation immédiate par M. Forget, avec les modifications suivantes : isolement et ligature préalable de l'artère axillaire dans la profondeur de la plaie; section des tégumens externes depuis l'acromion jusqu'à quelques lignes au dessous de l'aisselle (impossibilité de tailler un lambeau interne); section des muscles, en passant le couteau derrière la tête de l'humérus, détachée en même temps; compression des artères circonflexes; autre incision semi-elliptique, en sens inverse, sur les bords externes de la plaie, pour les rafraîchir; réunion médiate, au moyen du lambeau tégumentaire.

mentaire externe ; réduction de la perte de substance à cinq ou six lignes de diamètre transversal ; pansement simple ; appareil légèrement contentif.

Transport à Anvers, le même jour : réaction forte ; douleurs vives, délire, saignée, diète, boissons rafraîchissantes, potion laudanisée ; point d'amélioration. Le 20, symptômes aggravés ; nouvelle saignée, même médication. Le 21, levée du premier appareil ; assez bon état de la plaie ; suppuration établie ; nouveaux accidens, le soir ; troisième saignée ; peu d'amélioration. Le 23, suppuration très abondante ; fusées purulentes entre les muscles pectoraux ; pansemens journaliers. Le 24 et le 25, assez mauvais état ; mêmes soins. Le 26, rémission sensible ; collection purulente au dessus de la clavicule. Le 27, incision ; écoulement de pus ; amélioration lente ; régime sévère. Le 2 janvier, quelques symptômes de pneumonie ; pouls fréquent ; douleurs thoraciques ; expectoration de crachats sanguinolens ; saignée, sanguines à l'épigastre ; boissons mucilagineuses, diète. Le 3, contre-ouverture à la base du lambeau externe, devenu le siège d'un abcès profond. Du 5 au 15, chute des ligatures ; plaie en bon état ; suppuration normale ; nouvel abcès à la partie la plus déclive de la cicatrice ; nou-

velle incision. Du 15 au 25, état général satisfaisant; cessation complète des accidens du côté de la poitrine; suppuration beaucoup moindre; alimentation augmentée. Les jours suivans, progrès de la cicatrisation des différentes plaies, et, le 15 février, guérison complète au soixantième jour.

Cette mutilation semblait, au premier abord, n'offrir aucune chance favorable au succès de l'opération; mais M. Zinc, qui en avait vu tant d'autres, ne désespéra point de la guérison. Les modifications employées par M. Forget dans le procédé opératoire lui ont paru nécessitées par le désordre des parties. Les accidens consécutifs, et surtout la formation successive des abcès, ont dépendu peut-être des tractions éprouvées par le lambeau.

Mor***, jeune soldat au 10^e régiment de ligne hollandais, blessé à la prise d'assaut de la lunette de Saint-Laurent, le 14 décembre, par l'explosion d'une mine, par deux balles, et par plusieurs coups de baïonnette: fracture comminutive de l'humérus droit, depuis le tiers supérieur jusqu'au col, et de l'articulation radio-carpienne du même côté, avec attrition et déchirure des parties molles correspondantes, par deux balles lancées à bout portant. Mutilation de la main gauche, presque entièrement dilacé-

rée et brûlée par l'explosion de la mine. Plusieurs coups de baïonnette dans la poitrine, dans le ventre et dans le dos ; enfin, une contusion à la tête.

Ce malheureux, ainsi criblé de blessures, baigné dans son sang et foulé aux pieds, fut, pendant quelque temps, laissé pour mort au milieu de quelques cadavres de ses compagnons, et sur les ruines de la brèche ; il dut enfin à quelques signes de vie d'être transporté à notre ambulance de tranchée, où il reçut les premiers secours. C'est dans cet état exsangue et d'affaiblissement complet que ce pauvre soldat fut apporté ensuite à Berchem. Sa position semblait d'autant plus désespérée, que la poitrine était malade depuis plusieurs années. Après une consultation sur le parti qu'il fallait prendre, les avis se réunissent en faveur des chances chirurgicales. La double amputation est résolue, et pratiquée immédiatement par M. Forget.

Amputation du bras droit dans l'article, par la méthode circulaire ; dissection prolongée des tégumens ; section des muscles, en ménageant le côté des vaisseaux axillaires ; désarticulation de la tête de l'humérus, et section dernière des vaisseaux, bien comprimés par un aide ; ligatures ; réunion immédiate, et pansement : courage impassible du mutilé pendant tout le temps de l'opération.

Quelques instans de repos lui sont offerts, mais il demande lui-même la seconde opération. Amputation du poignet gauche dans l'articulation radio-carpienne, par la même méthode circulaire, en faisant rétracter très fortement les tégumens de l'avant-bras : réunion immédiate. Pas un cri, pas une plainte de la part de ce brave, qui demande ensuite avec calme si tout est fini, parce qu'il veut dormir.

Pansement des plaies par la baïonnette; aucune d'elles n'est pénétrante, et n'offre de caractère grave. Repos et sommeil prolongé jusqu'au soir : aucun accident immédiat. Évacuation sur Anvers. Le 15 décembre, point de réaction ; pouls petit, concentré ; teint livide ; sueurs abondantes ; râle muqueux ; affaissement profond. Du 16 au 18, exaltation des symptômes de phthisie ; anxiété extrême : diète absolue, sédatifs et mucilagineux. Le 20, levée des premiers appareils ; pansements consécutifs tous les deux ou trois jours ; travail normal de suppuration ; amélioration proportionnée des symptômes de phthisie. Alors seulement, premier espoir de sauver la vie à ce malheureux : quelques bouillons d'abord, puis une alimentation légère. Le 4 janvier, légère rechute par un écart de régime ; suppuration tarie momentanément ; retour des accidens du côté de la poitrine ; diète, régime,

traitement général ; topiques émolliens aux moignons : résultat efficace. Guérison des plaies assurée au bout de quelques jours ; amélioration aussi progressive dans l'état des poumons ; retour de l'appétit et des forces ; travail de cicatrisation franche. Le 22 janvier, guérison des deux plaies par amputation ; la cicatrice de l'épaule est remarquable surtout par son étroitesse ; elle ressemble plutôt à la séparation congéniale du membre qu'au résultat d'une amputation. État général satisfaisant. Évacuation sur la Hollande.

Nous pourrions ajouter plusieurs réflexions à ce fait ; mais ce qu'il offre d'intéressant nous paraît assez en relief, pour que chacun sache apprécier surtout l'efficacité des secours de la chirurgie dans les blessures multiples les plus désespérées.

Moug***, sapeur au 1^{er} régiment du génie, blessé dans la tranchée, pendant la nuit du 18 décembre, par une balle : perforation de l'épaule gauche, d'avant en arrière et de haut en bas ; fracture de l'humérus à son col chirurgical ; issue du projectile par la partie supérieure de la face postérieure du bras ; débridement ; transport direct à Anvers. Le 20, tentative pour conserver le membre, en faisant la résection de la portion d'os fracturée ; débridement de l'ouverture antérieure du projectile dans l'étendue de cinq ou six travers de doigt ; mais le prolonge-

ment de la fracture s'oppose à cette résection. Désarticulation scapulo-humérale par M. Seutin, d'après la méthode de M. Larrey; réunion immédiate. Le 23, premier pansement, peu de suppuration; agitation légère, mais continue; diète, boissons acidulées. Le 26, second pansement, plaie en bon état; commencement de réunion à la partie supérieure; suppuration assez abondante. Le 28, sueurs nocturnes; insomnie jusqu'au 31; plaie en bon état. Le 2 janvier, cessation des sueurs; légers frissons, anorexie; diète, boissons gommeuses. Même état, mêmessoins jusqu'au 8. Alors, symptômes d'irritation gastrique: langue sèche, pouls fréquent, chaleur à la peau; épigastre douloureux à la pression. Plaie en bon état; douze sanguins à l'épigastre, cataplasmes émolliens, diète. Le 10, amélioration notable. Le 15, plus d'accidens; suppuration bien diminuée, chute des ligatures. Le 20, douleurs vives dans le moignon, un peu de rougeur et de tuméfaction à sa partie interne; topiques émolliens. Le 22, abcès dans le point douloureux; ouverture par incision. Le 24, plus un seul accident; dès lors, cicatrisation graduelle, mais lente. Évacué tout à fait guéri le 18 mars, c'est à dire au troisième mois.

L'amputation immédiate n'aurait pas été compliquée de cette série d'accidens, si on ne s'était

fondé sur les signes extérieurs de la blessure, pour tenter la conservation du membre. Il est probable encore que la réunion immédiate a exercé une traction trop forte sur les lambeaux, et il me semble enfin que le procédé de M. Larrey aurait été suivi plus exactement, si le pansement de la plaie eût été moins fortement unissant.

Thé***, grenadier au 58^e de ligne, atteint d'un coup de boulet à l'épaule droite, le 20 décembre : contusion violente, luxation en haut de l'extrémité acromiale de la clavicule; fracture du col de l'humérus, tuméfaction considérable et très douloureuse de l'épaule; incertitude sur la nécessité de l'amputation primitive; topiques émolliens; bandage légèrement contentif. Accidens inflammatoires plus intenses; amputation décidée le 23, c'est à dire au quatrième jour, et pratiquée sans plus de délai par M. Seutin; réunion immédiate; accidens de réaction violente; suppuration fétide et fort abondante; affaiblissement graduel des forces; mort le 31 décembre, au septième jour.

Amputations du bras dans la continuité.

Une des opérations les plus simples, les plus faciles de la chirurgie, l'amputation du bras dans la continuité, m'a mis à même de vé-

rifier une remarque faite par mon père depuis long-temps ; c'est qu'il y a des inconvénients à couper le membre trop près de son articulation scapulo-humérale. En effet, si la section est faite au delà de l'attache inférieure du deltoïde, la rétraction graduelle et même continue de ses fibres musculaires vers les attaches supérieures cause des tiraillements tellement douloureux quelquefois, que les amputés regrettent d'en avoir pas été opérés dans l'articulation : M. Larrey, qui en a vu plusieurs exemples, préfère alors désarticuler le bras ; on ne saurait, d'après lui, alléguer en compensation le faible avantage d'un moignon, trop court pour les usages que l'on prétendrait lui résERVER.

Onze amputations de bras ont été faites dans la continuité : neuf primitives, et deux consécutives ; une seule primitive et une consécutive ont eu un résultat funeste. La seconde amputation consécutive a été compliquée de téтанos au plus haut degré. La moyenne proportionnelle du traitement a été de cinquante jours.

Une seule observation reste sans détails : il s'agit d'un grenadier du 65^e, qui a été amputé à Oboken, et qui est mort, six semaines après, d'une pneumonie ; le moignon était presque cicatrisé. Le second cas mortel est relaté dans l'observation suivante. Ajoutons que presque toutes les amputations du bras ont été faites

pour des fractures compliquées de l'articulation huméro-cubitale.

Ler***, grenadier au 7^e de ligne, blessé, le 11 décembre, par un éclat de bombe, au bras gauche et au genou droit : fracture comminutive et compliquée de plaie à l'articulation huméro-cubitale; forte contusion avec gonflement considérable du genou. Amputation immédiate du bras, réunion par première intention, topiques émolliens sur le genou. Le 12, agitation extrême; fièvre traumatique; saignée, ventouses scarifiées sur le genou, cataplasmes; amélioration. Le 14, levée de l'appareil, peu de suppuration; presque plus de douleur dans le genou, facilité des mouvements de la jambe. Le 16, moignon en bon état. Le 17, nouvelles douleurs du genou, tuméfaction plus forte; épanchement de synovie dans l'articulation; trente sanguines, cataplasmes ladanisés; diète. Le 18, point d'amélioration; mêmes moyens. Le 19, intensité des symptômes; anxiété, délire, sueurs abondantes; face rouge; peau chaude; pouls accéléré; toux sèche et fréquente; expectoration difficile, excréptions involontaires; diète absolue; topiques émolliens; potions gommeuses.

Le 20, pas de changement, rien de notable dans le moignon. Le 22, exaspération instantanée des accidens. Le 24, légère hémorragie consécutive, arrêtée facilement. Le 27, sensation de

froid le long de la colonne vertébrale. Le 28, épanchement de sang dans le bras amputé; fièvre traumatique plus intense. Le 29, hémorragie assez abondante, mais en nappe, et sans source apparente ou appréciable; nouvelle ligature de l'artère brachiale; compression du membre et de la surface du moignon, un peu mieux jusqu'au 7 janvier : fluctuation au dessus du genou; symptômes d'oppression du côté de la poitrine; toux plus forte, dyspnée; application d'un vésicatoire, saignée, potion calmante, etc. Le 8, fluctuation plus manifeste au genou; topiques résolutifs; bandage roulé, sans effet; incision, écoulement d'une énorme quantité, seize onces au moins, de pus fétide, sanieux, d'une couleur jaunâtre, mêlée de gris. Ouverture d'un autre abcès presque aussi considérable dans la région lombaire du même côté; amélioration instantanée; pansemens simples et fréquens. Le 9, nouveaux accidens; fièvre ardente, délire, transpiration abondante vers le soir, et ainsi pendant quelques jours, à peu près à la même heure; affaiblissement graduel; douleurs générales; suppuration continue des deux abcès, quelques selles involontaires; médication palliative; pronostic funeste.

Le 13, fièvre continue, exacerbation des accidens généraux, moignon en très bon état cependant; suppuration légère et normale. Le 14, toux

presque continue, douloureuse; expectoration de mucosités mêlées de pus fétide, jaunâtre, en grande quantité; épuisement définitif; mort le 15 janvier. L'autopsie n'a pas été faite.

Plusieurs complications ont déterminé le fatal résultat de cette amputation. Ler*** était d'une faible constitution; il avait eu antérieurement des maladies de poitrine qui le prédisposaient à des récidives, voilà pour la complication constitutionnelle et morbide; la contusion du genou avait été assez violente pour être suivie des accidens multipliés que nous avons décrits, voilà pour la complication traumatique; enfin les accidens locaux, hémorragiques ou autres, n'ont pas été sans influence sur la fin malheureuse; et cependant le moignon s'est maintenu en bon état, jusque dans les derniers temps, tandis que les complications prenaient un caractère plus grave, sous la forme intermittente et sous la forme continue.

Mar***, voltigeur au 18^e de ligne, blessé, le 18 décembre, au bras gauche par un éclat de bombe: fracture comminutive et compliquée de l'articulation huméro-cubitale. Amputation immédiate, ligature de la veine brachiale qui donnait beaucoup de sang; réunion; aucun accident primitif; réaction tardive, sans caractère grave; suppuration normale, mais long-temps

prolongée ; cicatrisation lente, terminée seulement au quarante-cinquième jour.

Ter***, caporal au 1^{er} régiment du génie, blessé au bras droit, le 21 décembre, par un éclat de mitraille : fracture comminutive, avec plaie contuse, de l'articulation huméro-cubitale. Amputation primitive ; réunion immédiate ; aucun accident ; chute des ligatures, du 8 au 10 janvier ; guérison complète au quarantième jour.

M. Forget avait songé à faire la résection des fragmens, pour tenter la conservation du membre ; mais il fut sagement détourné de ce projet par le chirurgien en chef.

Pin***, voltigeur au 61^e de ligne, atteint au bras gauche, le 19 décembre, par un boulet : fracture comminutive, avec plaie contuse, de l'articulation huméro-cubitale. Amputation, le lendemain ; réunion immédiate ; peu de réaction ; bien pendant quelques jours ; accidens consécutifs, mais instantanés. Levée de l'appareil, le 27 ; suppuration normale ; plaie en bon état ; le 30, suppuration abondante ; bandelettes renouvelées en partie ; le 5, suppuration diminuée ; cicatrisation commençante ; progrès rapides vers la guérison ; le 20, chute de la dernière ligature ; cicatrice complète au quarante-cinquième jour.

Pi***, grenadier au 65^e, blessé le 13 décembre, au bras droit, par un éclat de mitraille : fracture comminutive des deux os de l'avant-bras, et compliquée d'une plaie profonde, étendue jusqu'à l'articulation huméro-cubitale. Amputation primitive ; réunion immédiate ; aucun accident, sauf une suppuration abondante et long-temps entretenue par la chute tardive d'une ligature, qui n'est tombée qu'au delà du cinquantième jour. La cicatrisation n'a été complète qu'à la fin de février.

Baud***, du 25^e de ligne, blessé le 22 décembre, au bras gauche, par un éclat de bombe : fracture comminutive du tiers inférieur de l'humérus, avec plaie profonde ; attrition des chairs ; décollement des tégumens ; déchirure de l'artère et de la veine brachiales. Amputation primitive ; réunion immédiate. Aucun accident consécutif, mais cicatrisation encore lente, et complète seulement au quarantième jour.

Il eût été sans intérêt de donner plus de détails aux cinq observations qui précédent, puisqu'elles n'ont offert aucune circonstance notable ; mais un fait qui les caractérise toutes, c'est que la cicatrisation définitive s'est fait attendre assez long-temps.

Four***, carabinier au 19^e léger, blessé au

bras droit, le 3 décembre, par un éclat d'obus : fracture comminutive de l'humérus, dans son tiers inférieur, à quelques lignes de l'articulation huméro-cubitale; petite plaie contuse; tuméfaction considérable du membre; infiltration du tissu cellulaire; attrition profonde des chairs; douleurs vives; anxiété; fatigue extrême. Amputation immédiate au niveau du tiers moyen, réunion par première intention. Le 5, forte réaction générale; saignée, diète sévère; amélioration. Le 8, levée de l'appareil; contact parfait des lèvres de la plaie. Le 11, point de suppuration; léger suintement par l'hiatus des ligatures; état général très satisfaisant; alimentation plus substantielle. Rien de notable pendant quelques jours. Le 20, accidens inattendus; douleurs assez vives dans le moignon; tuméfaction des tégumens de sa partie interne. Levée des bandelettes; suppuration établie; cessation graduelle des accidens; travail lent, mais définitif de cicatrisation, pendant tout le mois de janvier. Chute tardive de la principale ligature; le 1^{er} février, écoulement d'un pus brun et fétide; emploi efficace du chlorure d'oxide de sodium. Guérison à peu près complète dans le courant de février.

Il est assez remarquable que les accidens primitifs de réaction n'aient point porté sur le moi-

gnon, qui a paru d'abord dans les conditions les plus favorables à une cicatrisation prompte ; et c'est à l'époque la plus imprévue que ces accidens ont fait présager le contraire : le succès de la réunion immédiate a été détruit, et une nouvelle période a dû s'établir et se prolonger pour l'achèvement de la cicatrisation.

Napol*** Col***, voltigeur au 61^e de ligne, blessé au bras droit, le 9 décembre, par un biscaïen : fracture comminutive de l'extrémité supérieure de l'humérus, depuis le niveau de l'attache du deltoïde, jusque près du col chirurgical ; plaie dilacérée des parties molles de la face externe correspondante. Amputation immédiate dans la continuité, près du col; réunion par première intention : rien de notable dans l'opération. Réaction vive, le jour même ; pouls fréquent, céphalalgie, douleurs; anxiétés, un peu de délire ; saignée, boissons rafraîchissantes, diète ; amélioration. Le 13, douleurs dans le moignon, pansement simple, régime sévère ; le 15, mêmes accidens, nouvelle saignée ; le 17, suppuration normale, état général satisfaisant, alimentation légère ; le 20, rien de nouveau ; le 22, chute de quelques fils de ligature, suppuration moindre ; le 26, accidens d'une autre nature : toux sèche, fréquente, dyspnée, pleurodynie à gauche ; application de sanguines, régime

convenable, amélioration, suppuration normale ; le 29, éruption psoriique spontanée, traitement par les frictions sulfureuses ; inflammation de la surface du moignon, topiques émolliens ; le 6 janvier, cessation des accidens inflammatoires locaux ; mais, le 8, formation d'un abcès à l'aisselle du membre amputé, incision deux jours après, écoulement d'une grande quantité de pus ; le 20, encore de la dyspnée, toux sèche et fréquente, digestion pénible, cicatrisation lente, difficile, nostalgie commençante.

Etat presque stationnaire jusqu'au 15 février, disposition morale plus satisfaisante alors ; travail de cicatrisation ; mieux notable dans l'état de la poitrine. Le 20, suppuration peu abondante, cicatrisation avancée, suintement purulent par ce point. Évacuation sur la France, à la fin de février, après quatre-vingts jours environ de traitement.

Les résultats de cette opération se réduisent, selon nous, à cet argument : il aurait été préférable d'amputer le bras dans l'articulation scapulo-humérale ; car toutes les complications qui sont survenues, réaction sur les organes pulmonaires et cérébraux, accidens inflammatoires du moignon, et particulièrement formation des abcès, lenteur presque indéfinie de

la cicatrisation ; toutes ces complications dépendent sans doute de l'amputation dans un point trop élevé de la continuité du membre. La cicatrice n'a été complète effectivement qu'à la fin d'avril ; le blessé se trouvait cependant placé dans les conditions morales les plus heureuses. C'était un jeune volontaire, qui n'avait pas l'âge pour être soldat, mais qui en avait tout le courage ; il fut le premier à dire : « que » l'on me coupe le bras, je n'ai pas peur ; je » suis un combattant de juillet, et je serai digne » d'avoir été baptisé du nom de Napoléon. »

Cha***, lieutenant au 1^{er} régiment d'artillerie, atteint au bras droit, le 23 décembre, par un boulet lancé à plein fouet : ablation assez nette et assez régulière de la totalité du membre, jusqu'au delà de son tiers moyen, point d'hémorragie primitive ; amputation immédiate, à un demi-pouce au dessus de la section faite par le boulet, c'est à dire au dessus de l'attache du deltoïde ; rien de notable dans l'opération, réunion par première intention. Le 24, fièvre, agitation, insomnie, dyspnée, douleurs vives dans le moignon ; saignée, diète, boissons rafraîchissantes, potion laudanisée. Le 25, même état, même prescription ; mieux. Le 28, premier pansement, tuméfaction légère du moignon, douleurs continues, suppuration séro-

sanguinolente ; nouvelle saignée , fomentations émollientes. Le 30 , suppuration bien établie , amélioration sensible , alimens légers ; mieux soutenu , état satisfaisant le 12 janvier ; mais , le 14 , nouveaux accidens , tuméfaction douloreuse du moignon. Le 20 , chute des ligatures , soulagement immédiat. Le 30 , bien en général ; cicatrisation avancée , complète dans les premiers jours de février ; retour en France.

L'amputation dans l'articulation scapulo-humérale aurait peut-être prévenu les accidens consécutifs qui , pendant quelques jours , ont excité des inquiétudes pour la vie du blessé. Le pauvre lieutenant Cha*** nous fut amené par deux de ses compagnons d'armes , qui les soutinrent dans leurs bras jusqu'à la fin de l'opération. Lui , pâle , affaibli autant par la fatigue que par sa blessure , eut un courage morne , impassible , et quand ce fut terminé , il nous tendit , en signe d'amitié , la main qui lui restait. Un funeste présentiment , nous a-t-il dit , le préoccupait dans le moment même qu'il eut le bras emporté , au dernier jour du siège , et par un des derniers boulets lancés de la citadelle.

Leu*** , canonnier au 11^e régiment d'artillerie , atteint au bras gauche , le 19 décembre , par un éclat de bombe : fracture comminutive du tiers inférieur de l'humérus , avec plaie contuse de

l'articulation huméro-cubitale. Pansement provisoire. Amputation rigoureusement nécessaire, mais refusée obstinément par le blessé; débridement, extraction des fragmens d'os; pansement simple; écharpe; évacuation à Anvers. Accidens inflammatoires; topiques émolliens; amputation consentie, enfin, par le blessé, et pratiquée le 2 janvier, sans circonstance particulière. Disposition favorable du moral, marche régulière de la plaie; présage d'un succès assuré; mais soudain, dix jours après l'opération, à la suite de l'exposition à l'impression du froid, sentiment de douleur et de constriction à la gorge, et d'une raideur insolite des muscles maxillaires et cervicaux: c'était le trismus.

Pour plus de méthode et de clarté, l'observation, rédigée dans tous ses détails par M. Périer, divise la maladie en trois périodes, dont chacune a des caractères qui lui sont propres; nous ne pouvons en donner que le résumé.

1^o. *Période d'invasion et d'acuité*: pouls variable; trismus violent; douleurs lancinantes dans le moignon; facies et décubitus pathognomoniques; sueurs froides; parole laborieuse et soufflée; dyspnée; spasme du tronc et des membres; déglutition des liquides à peine possible; œdème des extrémités inférieures; fréquence des paroxysmes douloureux; symptômes de

l'opisthotonos; strangurie; diarrhée. == Douze jours de durée: cent vingts sanguines; quatre saignées; quatorze grains et demi d'acétate de morphine à l'extérieur; diète absolue; limonade végétale.

2°. *Période d'oscillation*: pouls variable encore; moindre rigidité musculaire des membres et du tronc; la bouche s'entr'ouvre; constipation, diurèse; œdème diminué; expression du facies et attitude revenues graduellement à l'état normal, mais nouveaux symptômes alarmans; trismus; deuxième apparition de l'opisthotonos; incurvation en arrière de la tête et du tronc; membres pelviens œdématisés de nouveau; douleurs intenses; amélioration instantanée; relâchement plus ou moins prononcé de tous les muscles du tronc; la constipation cesse, l'infiltration séreuse disparaît; plaie sans altération notable, sous l'influence de la maladie. = Quinze jours de durée: soixante-trois grains et demi d'acétate de morphine à l'extérieur, dont l'addition à quatorze grains et demi primordialement employés, égalent la somme de soixante-dix-huit grains, administrés dans l'espace de vingt-sept jours. Diète; boissons diverses.

3°. *Période d'amendement et de terminaison*: pouls régulier; sommeil; amélioration locale

et générale ; progrès de jour en jour plus appréciables ; cicatrice de la plaie consolidée : le malade se promène seul ; alimentation progressivement augmentée. — Six jours de durée : ce nombre, ajouté aux précédens, donne à la maladie la durée générale de trente-trois jours.

De tout ce qui précède, il résulte, en quelques mots : que, pendant la période aiguë, la violence et la marche hâtée des symptômes ont été combattues avec un avantage inespéré par les émissions sanguines, locales et générales, et l'acétate de morphine, énergiquement combinés ; que, pendant la période d'oscillation, toute d'alternatives de mieux et de pire, cette médication a été exclusivement opposée aux progrès du mal, et, seule, a suffi pour opérer la transition de cet état si grave à l'état suivant ; qu'enfin la méthode curative de la période terminale n'a consisté que dans l'application d'une diététique appropriée, sous l'influence de laquelle les derniers caractères de l'affection se sont presque entièrement évanouis. On voit que ce traitement, sauf le mode d'emploi de l'opium, a été fondé sur les bases données par M. Larrey ; quant à la période de convalescence qui vient naturellement s'ajouter aux autres, elle n'est, à proprement parler dans ce cas, que la continuation de celle qui l'a précédée.

Au 10 mars enfin, tout le moignon, et particulièrement sa face interne, était encore le siège d'une dureté égale à celle du liège, sinon du bois : ce dernier et indolent témoignage de l'affection ne s'efface qu'avec une grande lenteur, et ne s'oppose point à l'exercice des mouvements musculaires de cette région.

Le militaire qui fait le sujet de cette observation remarquable est aujourd'hui concierge à l'école d'artillerie de Vincennes; il aurait sans doute été soustrait à la complication grave qui a menacé ses jours, s'il s'était résigné à l'amputation primitive.

Amputations de l'avant-bras.

Nous avons fait aux amputations de l'avant-bras l'application de la méthode circulaire que l'on préfère généralement aujourd'hui à toute autre. M. Forget a tenté avec succès l'extirpation de la tête du radius, en se fondant sur quelques unes des données qui ont fait admettre l'extirpation de la tête du péroné comme une méthode rationnelle dans certains cas; mais la critique pourrait s'emparer de cette analogie pour la combattre.

Il y a eu six amputations d'avant-bras, toutes

primitives, et un seul décès, dans un cas compliqué de plaie mortelle à l'abdomen.'

La sixième observation, qui n'est pas reproduite ici, est celle de L***, si horriblement mutilé de la face, et qui est parvenu à la guérison malgré cette blessure grave, et malgré l'amputation de l'avant-bras.

Bon ***, grenadier au 65^e de ligne, blessé le 3 décembre, à l'avant-bras gauche, par une balle : fracture comminutive des deux os, à leur tiers moyen ; plaie contuse et étroite au niveau de la face externe ; arrêt du projectile dans l'épaisseur du bord postérieur du biceps, à quatre travers de doigt au dessus de l'articulation scapulo-humérale, sans signe de fracture à l'humérus ; contre-ouverture, extraction du projectile et du doigt de gant ; amputation immédiate ; méthode circulaire ; réunion primitive ; légère réaction ; point d'accident notable ; cicatrisation normale, à peu près complète au 10 janvier.

Le seul fait à indiquer dans cette observation, c'est le trajet qu'a dû suivre le projectile et son extraction.

Pot***, fusilier au 5^e de ligne, blessé le 10 décembre, à l'avant-bras gauche, par un boulet : fracture comminutive des deux os, dans leur tiers moyen, compliquée de dilacération des

parties molles de l'articulation radio-carpienne, amputation immédiate, très près de l'articulation huméro-cubitale ; extirpation de la tête du radius fortement ébranlée ; réunion par première intention ; aucun accident primitif ou consécutif ; cicatrisation régulière et complète au vingt-cinquième jour.

La réunion de la plaie du moignon a été assez modérée pour ne déterminer aucun accident, et la cicatrisation a dû être plus prompte, parce que la tête du radius n'existant plus, il en résultait moins de surface.

And***, fusilier au 61^e de ligne, blessé, le 7 décembre, à l'avant-bras gauche, par un éclat d'obus : fracture comminutive des deux os, compliquée de plaie par arrachement, dans l'étendue de deux pouces environ, à la face postérieure du tiers moyen. Amputation immédiate au tiers supérieur de l'avant-bras ; réunion par première intention ; hémorragie capillaire sans résultat inquiétant : rien de notable jusqu'au 15. Le 16, formation d'une collection sanguinolente vers l'angle inférieur de la plaie ; douleurs vives dans le moignon ; constriction du membre ; levée des bandelettes agglutinatives ; soulagement consécutif ; évacuation du foyer sanguin ; topiques émolliens ; pansemens simples ; travail de cicatrisation, terminé à la fin du même mois.

Encore un fait contre la réunion immédiate forcée.

Ri***, canonnier au 1^{er} régiment d'artillerie, atteint d'un éclat d'obus à l'avant-bras droit, le 5 décembre : fracture comminutive du cubitus seul à son tiers supérieur ; dilacération des muscles de la région postérieure jusqu'à près de l'articulation. Amputation immédiate de l'avant-bras, à un pouce au dessous de l'articulation huméro-cubitale ; extirpation de la tête du radius, mobile dans la plaie ; réunion immédiate : aucun accident primitif. Levée de l'appareil, le 9 : plaie réunie incomplètement ; hernie de quelques portions musculaires ; compression manifeste de tout le bras par les bandelettes agglutinatives ; suppression de ces bandelettes ; pansement simple, comme pour les plaies qui suppurent : toutes les fonctions dans l'état normal. Le 17, suppuration bien établie ; rapprochement des chairs, au moyen d'un bandage circulaire ; développement rapide des bourgeons charnus. Dans les premiers jours de janvier, cautérisation de la surface de la plaie avec le nitrate d'argent. Le 7, chute des ligatures ; cicatrisation avancée. Le 22, presque à la veille de l'évacuation, un point de la cicatrice devient brunâtre ; fourmillement, démangeaisons dans tout le membre amputé. Le blessé cache son état pour sortir pendant

quelques heures. Le 24, moignon frappé de gangrène d'hôpital ; lotions, et pansemens avec l'eau chlorurée : bon aspect de la plaie au bout de huit à dix jours ; suppuration normale ; travail définitif de cicatrisation ; progrès vers la guérison, qui est effectuée à peu près complètement le 25 février, après plus de quatre-vingts jours de traitement.

Guérison *à peu près* complète, disons-nous, parce qu'il était à craindre, à cette époque si tardive, qu'une ouverture fistuleuse ne se formât à l'angle inférieur du moignon, qui n'était pas encore cicatrisé parfaitement, et de là, peut-être, la carie de l'articulation huméro-cubitale. C'en'est, du reste, qu'une supposition, car nous n'avons pas eu de renseignemens ultérieurs sur ce blessé. Quant à l'amputation elle-même, il semble que l'extirpation de la tête du radius aurait pu être motivée par une complication de luxation ou de rupture des ligamens articulaires, plutôt que par la mobilité de cette portion osseuse. Il est manifeste que la compression produite par les bandelettes agglutinatives est devenue trop forte, et a déterminé les accidens qui ont retardé si long-temps la cicatrisation.

J***, grenadier au 18^e régiment de ligne, mutilé, le 9 décembre, par un éclat de bombe : plaie pénétrante au côté gauche de l'abdomen,

avec dilacération des parois de cette cavité, dans l'étendue de trois pouces environ; fracture comminutive par écrasement du poignet droit. Amputation immédiate de l'avant-bras : rien de notable dans l'opération; accidens graves; réaction générale, fièvre, délire, douleurs vives; médication anti-phlogistique sans effet; péritonite par épanchement consécutif de sang; mort, le lendemain.

Il est évident que la plaie du bas-ventre a déterminé, dans ce cas, le résultat funeste que l'on ne saurait attribuer à l'amputation.

Amputations du poignet et de diverses parties de la main.

Nous n'avons aucune remarque générale à présenter sur ce sujet, parce qu'on n'a pratiqué que deux amputations du poignet : l'une, par la méthode circulaire, chez le Hollandais Mor***, amputé aussi du bras dans l'articulation scapulo-humérale; et l'autre, par la méthode à lambeaux, dont voici l'observation :

Mig***, voltigeur au 52^e de ligne, atteint, à la main droite, le 20 décembre, par un boulet: fracture comminutive, avec plaie contuse, du carpe et du métacarpe; dénudation des tendons de l'extenseur des doigts, et plaie étendue sur la face dorsale du poignet, jusqu'au delà du niveau

de son articulation. Amputation radio-carpienne, le jour même, par M. Forget, d'après la méthode à lambeaux ; réunion immédiate ; quelques accidens inflammatoires peu intenses ; cicatrisation complète au vingt-septième jour.

On aurait été tenté de faire l'amputation de l'avant-bras, à cause de l'étendue de la plaie ; mais la désarticulation du poignet était plus rationnelle, afin de conserver la totalité de l'avant-bras. La méthode à lambeaux était seule praticable pour recouvrir la surface de la solution de continuité ; le lambeau a été taillé aux dépens des parties molles de la face antérieure du carpe. L'extirpation aurait encore été préférable, alors même qu'il n'y aurait pas eu de lambeau, pourvu que les deux os de l'avant-bras fussent intacts. M. Larrey a pratiqué plusieurs fois cette opération dans des cas semblables ; et son principe de ne jamais employer la réunion immédiate trouvait alors une application rigoureuse.

Vient enfin l'observation succincte d'un cas d'amputation partielle de la main.

Pav***, caporal au 61^e de ligne, blessé, le 13 décembre, à la main droite, par une balle : fracture comminutive des troisième et quatrième métacarpiens, avec plaie déchirée aux par-

ties molles. Amputation immédiate de ces deux os ; réunion modérée : rien de notable d'abord ; mais, au second jour, impression morale vive ; réaction sur le membre blessé ; développement spontané d'un érysipèle phlegmoneux sur la totalité de l'avant-bras ; topiques réfrigérans ; disparition prompte de cette complication , et cicatrisation de la plaie produite par l'amputation partielle.

L'indication de ce fait prouve encore l'influence morale sur l'état des blessures ; car l'érysipèle phlegmoneux survint presque immédiatement après la nouvelle inattendue , pour ce militaire , de la mort de son père.

Amputation dans l'articulation coxo-fémorale.

Une des opérations les plus hardies de la chirurgie , l'amputation de la cuisse dans l'articulation coxo-fémorale , a été tentée une seule fois au siège de la citadelle. Quelques amputations dans la continuité de la cuisse ont été pratiquées assez près du bassin , pour simuler plus tard des cicatrices de désarticulation ; et Thomson va trop loin , en disant que toutes les fractures compliquées de l'extrémité supérieure du fémur , par armes à feu , nécessitent l'extirpation de la cuisse. Si M. Forget avait eu l'occasion de

faire cette opération, c'est à la méthode circulaire qu'il aurait encore donné la préférence, d'après Abernethy, Krimer, Weitch et Grœffe ; mais passons de suite au fait dont il s'agit.

Mic***, canonnier au 11^e régiment d'artillerie, mutilé à la cuisse gauche, le 13 décembre, par un boulet : très large plaie contuse à la partie supérieure et latérale externe du membre ; déchirure des tégumens, dans l'étendue de six pouces ; dilacération des muscles tenseur de l'aponévrose, triceps crural, demi-tendineux, demi-membraneux et biceps ; fracture comminutive du fémur, à un pouce du grand trochanter ; pas d'hémorragie inquiétante ; stupeur incomplète ; point de circonstances contraires à l'opération. Amputation immédiate, pratiquée à l'ambulance d'Obocken par le chirurgien-major M. Letulle, avec son aide-major M. Montcourrier. Ligature préalable de l'artère fémorale presque dénudée ; section d'un lambeau interne aux dépens des parties saines, et d'un lambeau postérieur, seul praticable, quoique très court : demi-réunion immédiate ; symptômes primitifs de réaction cérébrale, combattus avantageusement par les anti-phlogistiques. Appareil levé deux fois jusqu'au 20 décembre. Rapprochement assez exact des lambeaux ; point de complications. Transport à Boom, en assez bon

état. Pansement, le 21 : pièces de l'appareil imprégnées d'un pus noirâtre, liquide, exhalant une odeur fétide, presque gangreneuse ; décollement des bandelettes agglutinatives sur plusieurs points ; disjonction des lambeaux de la plaie dans un intervalle de trois pouces ; aspect jaunâtre, et consistance lardacée des chairs ; sécrétion de pus très abondante, refluant en arrière jusqu'à la région lombaire ; lotions de chlorure d'oxide de sodium ; pansement, avec une compresse fenêtrée enduite de cérat, de la charpie, des compresses immédiates, et un bandage contentif, sans tours de bande ; lipothymies instantanées ; pouls fréquent et petit ; face décolorée ; air de stupeur et de fixité dans le regard ; respiration accélérée ; agitation des membres ; par intervalles, cris vagues, inarticulés, et contractions du visage ; insomnie : durée de cet état pendant vingt-quatre heures à peu près. Le lendemain matin, 22 décembre, hoquet intermittent ; intelligence assez nette, mais pas de réponse aux questions ; décoloration de la face ; yeux caves et ouverts ; respiration fréquente, pouls concentré. Pansement renouvelé : même aspect, même fétidité de la suppuration, mêmes soins ; amélioration dans la journée ; phonation libre ; respiration moins pénible ; pouls toujours

très petit, mais altération plus profonde de la face; fièvre hectique; dernier degré d'épuisement; mort, à onze heures du soir.

Le simple exposé de cette observation nous a suggéré les remarques suivantes:

L'amputation de la cuisse dans l'article était tout à fait indiquée, parce que la mutilation s'étendait à un point trop rapproché du bas-ventre, pour que l'opération pratiquée dans la continuité fût suffisante. La mutilation n'était pas assez grave cependant pour qu'il fallût désespérer de la vie du blessé, et s'abstenir de toute opération, par pitié pour lui.

La ligature primitive de l'artère fémorale nous paraît d'autant plus rationnelle, que ce vaisseau se trouvait à nu, et que l'opération commençait par la section du lambeau interne.

Le parti que l'opérateur a dû tirer des tissus sains, pour la formation des lambeaux, indique que, dans des mutilations semblables, il serait difficile de préciser le procédé opératoire à préférer, d'après les principes établis.

La réaction était inévitable à la suite d'une opération aussi grave; et encore cette réaction n'a-t-elle pas été très forte.

La première période passée, c'est à dire la période des huit premiers jours, donnait déjà lieu d'espérer un résultat heureux, lorsque l'in-

vaison presque spontanée des accidens a détruit toutes les chances de succès.

Il est possible que le transport pénible d'une ambulance à l'autre ait déterminé les funestes complications qui l'ont suivi, car il n'en existait point d'autre cause appréciable.

Quoi qu'il en soit du développement rapide et de la multiplicité de ces accidens, puisqu'en moins de quarante-huit heures une terminaison fatale est survenue, le fait que nous venons de rapporter prendra place parmi les plus intéressans de la chirurgie; et, s'il ne sert pas d'encouragement à nous, jeunes chirurgiens militaires, il ne sera pas du moins défavorable, l'occasion se présentant de tenter, comme M. Letulle, une opération qui ne compte pas seulement des revers.

Amputations de la cuisse dans la continuité.

Les fractures comminutives et compliquées de la cuisse par armes à feu nécessitent l'amputation. C'est presque un principe établi désormais dans la chirurgie militaire, depuis la grande expérience de nos maîtres modernes. Ravaton, Bilguer, Percy, Guthrie, Ribes, et d'autres qu'il n'est pas besoin de nommer, affirment n'avoir jamais vu de guérison sans amputation dans les cas de fractures compliquées, par de gros projectiles, et surtout par le boulet.

Les faits exceptionnels sont dus au hasard, à des circonstances toutes particulières et inexplicables; ils sont d'ailleurs tellement rares, que l'on serait peut-être embarrassé d'en citer quelques uns qui fussent bien avérés, bien authentiques; car il ne faut pas oublier qu'il s'agit de *fractures comminutives et compliquées de la cuisse, par armes à feu.* Aussi le chirurgien en chef de l'armée a-t-il insisté auprès de nous sur cette règle, réduite, pour ces cas, à un seul mot: *l'amputation.*

Voici le rapport des amputations de cuisse dans la continuité: total, quinze: amputations primitives, douze, sur lesquelles dix guérisons et deux décès; amputations consécutives, trois, qui ont fourni deux guérisons et un décès.

Parmi les douze amputations primitives, trois n'ont été faites que le lendemain; c'est une de ces dernières qui a eu un résultat funeste; et, des trois amputations consécutives, les deux qui sont parvenues à la guérison ont été compliquées d'accidens graves.

Chaque série d'observations, aussi bien que la masse générale, confirme donc ce qui a été dit des chances incontestables en faveur de l'amputation primitive.

J'ai ouï dire qu'un caporal du 65^e a été amputé de la cuisse pour une mutilation du genou

par le boulet; mais où, par qui, et comment? Je n'ai pu le savoir, non plus que le résultat. Ce serait la seizième observation; mais je ne la compte pas comme telle, parce qu'il n'y a pas certitude pour moi. Quant au quinzième fait constaté, c'est celui de V***, amputé consécutivement, le 13 décembre, et mort le 17, quatre jours après; les détails en ont été perdus: passons donc aux observations complètes, et rangeons-les d'après l'époque de la guérison.

B***, canonnier au 1^{er} régiment d'artillerie, mutilé à la jambe gauche, le 9 décembre: ablation de la totalité du membre jusqu'au genou, par un éclat de bombe. Amputation immédiate de la cuisse; réunion. Aucun accident primitif, si ce n'est une hémorragie médullaire; application d'une rondelle d'agaric à la surface du fémur. Le 14, levée du premier appareil; réunion incomplète. Le 16, suppuration médiocre: rien de notable jusqu'au 21. Le 22, tuméfaction de l'angle externe du moignon; topiques émolliens pendant trois jours; fluctuation sur ce point; incision; écoulement de pus; cicatrisation assez franche néanmoins. Du 26 au 30, chute des ligatures. Du 15 au 20 janvier, guérison complète, après une quarantaine de jours.

La rondelle d'agaric apposée sur l'extrémité de l'os, et placée entre les lèvres de la plaie, pour

arrêter l'hémorragie médullaire, formait là un corps étranger bien évidemment contraire à l'effet de la réunion immédiate : il aurait été possible de parvenir au double but, en employant le cautère actuel comme moyen hématostatique.

Par***, canonnier au 8^e régiment d'artillerie, blessé, le 18 décembre, au genou droit : fracture compliquée de l'articulation fémoro-tibiale ; dénudation complète des condyles du fémur et de la rotule ; plaie large, profonde ; délabrement des tissus ; hémorragie primitive. Amputation immédiate, au tiers moyen de la cuisse ; hémorragie veinense ; ligature de plusieurs veines ; réunion par première intention. Du 19 au 22, rien de notable ; peu de réaction. Levée de l'appareil ; suppuration médiocre ; réunion incomplète ; état général satisfaisant. Le 26, suppuration abondante. Le 29, accès fébrile instantané. Le 7 janvier, chute de deux ligatures. Le 11, nouvel état fébrile, affectant le type intermittent quotidien ; sulfate de quinine, administré avec succès. Un peu de douleur et de tuméfaction dans le moignon ; topiques émolliens ; mieux. Le 14, bandage légèrement contentif, pour prévenir les fusées. Le 18, chute de la dernière ligature. Cicatrisation à peu près complète, au quarante-cinquième jour.

Deux faits secondaires apparaissent dans cette

courte observation ; c'est, d'une part, le succès de la ligature des veines qui donnent du sang, et d'autre part l'efficacité du sulfate de quinine dans la fièvre traumatique.

Dug***, voltigeur au 7^e de ligne, blessé, le 8 décembre, à la cuisse gauche, par un éclat d'obus : fracture compliquée du fémur, à son tiers supérieur ; déchirure assez étendue des parties molles de la région postérieure du membre. Amputation immédiate au tiers supérieur ; réunion immédiate. Forte réaction, le soir même ; saignée ; diète ; mieux. Rien de notable pendant trois jours. Le 11, levée de l'appareil ; adhésion incomplète ; suppuration presque nulle. Le 15, elle s'établit et, le 18, devient abondante. Le 22, renouvellement des bandelettes ; chute de quelques ligatures ; travail de cicatrisation régulière, très avancée à la fin de décembre, et complète vers la fin de janvier, au cinquantième jour.

Il n'est pas étonnant que l'adhésion des lèvres de la plaie ait été difficile à obtenir primitivement dans ce cas, comme dans quelques autres d'amputation de la cuisse, à cause de la contractilité des muscles et de la largeur du moignon. Le résultat de cette amputation dans la continuité simulait encore une désarticulation.

Gaul***, grenadier au 25^e de ligne, blessé, le 5 décembre, à la cuisse droite, par une balle :

fracture comminutive du tiers moyen du fémur, et plaie contuse assez étendue; attrition profonde; gonflement considérable, contraire à l'amputation immédiate, et même à l'application d'un appareil convenable; flexion forcée de la cuisse; extension impossible sans les plus vives douleurs; pansement provisoire. Le lendemain, conditions plus favorables; amputation dans la continuité de la cuisse, assez près du grand trochanter; réunion immédiate. Réaction vive; douleurs lancinantes; saignée; régime; mieux. Levée du premier appareil; quatre jours après, suppuration peu abondante; assez bien. Le 15, nouveaux accidens; tension très douloureuse dans le moignon; gonflement; ablation des bandelettes, supplées par un bandage contentif. Soulagement; rien de notable pendant plusieurs jours. Le 29, diminution progressive de la suppuration; travail de cicatrisation définitive, complète le 25 janvier, c'est à dire au cinquantième jour.

Cette blessure semblait, à quelques avis, un cas d'amputation dans l'articulation coxo-fémorale; mais la tuméfaction primitive en imposait peut-être pour cette prétendue nécessité: c'était, du reste, un motif de différer l'amputation immédiate. Les accidens consécutifs, dépendant en grande partie de la constitution pléthorique

du sujet, ont été, sous ce rapport, comme une récidive des accidens primitifs.

Ce militaire, d'une beauté remarquable, a été aussi brave sur son lit de souffrance qu'il l'avait été dans la tranchée.

Blan***, grenadier au 58^e de ligne, blessé à la cuisse gauche, le 6 décembre, par un éclat de mitraille : fracture comminutive, compliquée de plaie, au tiers moyen du membre ; état de stupeur contraire à l'amputation immédiate ; pansement provisoire ; accidens primitifs ; amputation le 8, deux jours après ; réunion immédiate : rien de notable pendant les premiers jours. Le 11, levée de l'appareil ; suppuration normale ; état satisfaisant, jusqu'au 25 ; travail régulier de cicatrisation. Le 26, érysipèle à la face, sans cause appréciable. Diète ; boissons rafraîchissantes. Le 27, érysipèle étendu au derme chevelu, sans influence sur la plaie du moignon. Le 30, diminution graduelle de l'érysipèle. Le 6 janvier, disparition complète ; mais alors, douleurs dans le moignon, avec gonflement ; topiques émolliens ; fusées commençantes, réprimées par des compresses graduées et de larges bandelettes. Le 15, suppuration diminuée ; commencement de cicatrisation. Le 26, plaie réunie dans une assez grande partie de son étendue. Abcès à la face interne du fémur ; nouvel emploi des émolliens ; ouver-

ture de l'abcès; cicatrisation définitive. Guérison complète, le 10 février, au soixante-cinquième jour seulement.

Il était rationnel de différer l'amputation, à cause de l'état de stupeur: car si l'on n'en tenait pas compte, c'est alors que les amputations primitives présenteraient moins de succès; c'est alors que leurs adversaires auraient presque raison, si toutefois elles comptent encore beaucoup de partisans. Le développement spontané de l'érysipèle n'a rien de surprenant. Cette complication traumatique n'est pas rare; mais sa disparition a coïncidé d'une manière assez singulière avec le retour des accidens inflammatoires.

Mar***, canonnier au 1^{er} régiment d'artillerie, blessé, le 12 décembre, au genou droit, par un éclat de bombe: écrasement de l'articulation fé-moro-tibiale, et déchirure des parties molles; hémorragie primitive assez forte. Amputation immédiate de la cuisse, au tiers inférieur; réunion par première intention; affaissement d'abord, puis réaction vive vers le soir; douleurs lancinantes dans le moignon; fièvre traumatique; diète; boissons acidulées. Au cinquième jour, levée de l'appareil; suppuration commençante; plaie en bon état; assez bien, en général. Le 26, renouvellement des bandelettes; suppuration peu abondante; progrès rapides de

guérison. Le 10 janvier, plus de suppuration. Le 30, cicatrice complète; mais chute du blessé sur le moignon; déchirure de la cicatrice; tension inflammatoire, combattue par les topiques émolliens. Guérison définitive, quoique retardée, le 12 février, au soixantième jour.

Voici, de toutes les amputations de la cuisse, celle qui paraissait parvenue à la cicatrisation la plus prompte, lorsque l'accident que nous avons signalé, la chute sur le moignon, a retardé le résultat.

Cah***, grenadier au 22^e de ligne, blessé, le 25 décembre, à la cuisse droite, par une balle: fracture comminutive du tiers moyen du fémur; plaie assez étendue à la face antérieure de la cuisse; hernie musculaire, tuméfaction du membre; nécessité de l'amputation immédiate, refusée d'abord par le blessé; pansement simple, bandage contentif; accidens inflammatoires, réaction sur l'encéphale, état comateux pendant vingt-quatre heures; consentement à l'amputation, pratiquée deux jours après, c'est à dire le 27, à Anvers, par un des aides de M. Seutin. Opération laborieuse, réunion immédiate; lipothy-mie prolongée; accidens consécutifs de réaction sur l'encéphale; douleurs dans le moignon; gonflement par la constriction des bandelettes; levée de l'appareil, le quatrième jour (1^{er} jan-

vier); plaie en assez bon état, cependant. Le 5, second pansement; le 8, suppuration abondante, chute d'une ligature; aucun accident consécutif. Cicatrisation complète vers la fin de février, au soixantième jour.

Une circonstance fâcheuse a été la cause de cette blessure, car elle ne pouvait être faite par un coup de feu de l'ennemi, puisque c'était le 25 décembre. Cah*** venait d'être placé en faction au milieu de la nuit, sur la rive droite de l'Escaut, à peu de distance d'une autre sentinelle française qui lui demanda le mot d'ordre; Cah*** l'avait oublié, il s'avance vers son camarade, qui, le prenant pour un Hollandais, le couche en joue, et lui tire un coup de fusil presque à bout portant. Ce malheureux était dans un état de faiblesse extrême au moment de l'opération: il éprouve encore aujourd'hui, au septième mois, la sensation commune à tous les amputés; il s'imagine, par moments, avoir encore sa jambe et faire mouvoir son pied. Je ne croyais pas auparavant que cette sensation pût se prolonger aussi long-temps; mais j'en ai la certitude aujourd'hui, d'après le rapport même de cet amputé auquel j'ai donné des soins. Il est fils d'un ancien président de la Cour royale de Paris.

Col***, mineur au 1^{er} régiment du génie, blessé, le 16 décembre, à la cuisse droite, par

un éclat d'obus : fracture comminutive de la partie moyenne du fémur, avec déchirure des parties molles, dans l'étendue de trois pouces. Amputation immédiate, à l'union du tiers moyen avec le tiers supérieur du membre ; hémorragie par l'artère nourricière de l'os ; compression au moyen d'une boulette de charpie sur la substance médullaire du fémur ; réunion par première intention. Le soir même, forte réaction ; fièvre, céphalalgie intense ; saignée, mieux. Le 22, levée du premier appareil ; suppuration commençante, réunion imparfaite. Le 26, état plus satisfaisant. Le 30, suppuration très abondante, disjonction des lèvres de la plaie ; ablation des bandelettes, bande roulée autour du moignon. Le 8 janvier, chute d'une ligature ; suppuration moindre, mais quelques accidens inflammatoires ; formation d'un abcès, topiques émolliens. Le 18, chute de la ligature, cause de l'abcès. Le 20, aspect brunâtre de la plaie ; pus sanieux, fétide ; moignon frappé bientôt de pourriture d'hôpital ; lotions de chlorure d'oxyde de sodium étendu d'eau. Le 31, suppuration louable, mêmes soins pendant quelques jours. Le 8 février, cicatrice commençante, bande autour du moignon. Le 23, état très satisfaisant ; cicatrice presque complète au soixante-dixième jour.

Cet autre exemple d'hémorragie médullaire

porterait à croire que si elle n'avait pas été comprimée immédiatement, la réaction consécutive n'aurait peut-être pas été aussi forte. La gangrène d'hôpital n'est parvenue qu'à un faible degré ; elle a été efficacement combattue par les lotions chlorurées. Quant à la tendance des bords de la plaie à se rétracter, il est bon de signaler l'emploi avantageux que l'on a fait de la bande roulée, non seulement dans ce cas, mais dans quelques autres.

Nag***, scieur de bois, âgé de 24 ans, blessé, le 19 décembre au soir, sur la chaussée de Berchem, près de l'ambulance : arrachement de la cuisse droite presque en totalité, dans son tiers supérieur, par un boulet perdu, tiré à toute volée. Dilacération jusqu'à quelques lignes du grand trochanter, hémorragie de quelques rameaux des artères et veines fémorales. Urgence de l'amputation immédiate, pratiquée d'après la méthode circulaire dans la continuité, presque au niveau du grand trochanter, séparé dans la section de l'os ; ligature, réunion immédiate et transversale ; la longueur du moignon n'excède pas deux travers de doigt. Évacuation presque immédiate sur l'hôpital civil d'Anvers. Réaction très vive, fièvre traumatique, céphalalgie, douleurs fortes dans le moignon, anxiété extrême, médication anti-phlogistique. Le 26, second pansement,

parties molles tuméfiées, douloureuses et d'un mauvais aspect. Relâchement de quelques bandeslettes trop distendues, pansement journalier, amélioration, suppuration normale, alimentation légère. Le 7 janvier, nouveaux accidens fébriles combattus par le sulfate de quinine. Nouvelle amélioration, sans autre obstacle. Le 26, en voie de guérison ; elle est complète au premier mars, soixante-dixième jour, et simule absolument une désarticulation de la cuisse.

L'amputation dans l'article paraissait inévitable au premier abord, tant la partie supérieure du membre était dilacérée ; l'amputation dans la continuité ne pouvait se faire selon la méthode à lambeaux par la même cause, et il était bien difficile de manier le moignon pour l'amputer circulairement. M. Forget s'y décida cependant, et ce fut de sa part un tour de force et d'adresse, d'autant plus que le blessé ajoutait aux difficultés de l'opération, par des plaintes, des cris, des secousses violentes, et des soubresauts à nous faire lâcher prise, ou à exposer nos doigts sous le tranchant du couteau : jamais peut-être amputation n'a été plus laborieuse ; elle était finie, que le malheureux criait encore. Il avait été apporté dans une brouette jusqu'à l'ambulance, et soutenu par la brave vivandière Antoinette Morand.

Lié***, voltigeur au 8^e de ligne, mutilé, le 8 décembre, à la cuisse gauche, par un boulet : fracture comminutive du fémur à son tiers moyen ; dilacération profonde des chairs ; plaie contuse à la partie antérieure de la cuisse droite, dans une chute du haut de la digue. Amputation immédiate de la cuisse gauche ; réunion tentée par première intention, mais difficile, à cause du gonflement traumatique ; accidens primitifs par la constriction trop forte ; levée de l'appareil ; relâchement des bandelettes. Le 17, nouveau pansement ; décollement très étendu de la peau ; aspect brunâtre des chairs ; suppuration très abondante et de mauvaise nature ; saillie de l'os ; tendance à la formation de foyers purulens ; application d'une bande roulée pour prévenir cette complication et rapprocher les chairs ; lotions chlorurées ; pansemens simples pendant une huitaine de jours ; amélioration ; recouvrement graduel de la saillie osseuse, sur laquelle on remarque deux points de nécrose ; travail avancé de cicatrisation. Transport d'Obo-ken à Anvers, le 8 janvier. Suppuration peu abondante ; nouvelle saillie du fémur au centre de la plaie ; douleurs spontanées à la fesse et à la partie supérieure de la cuisse droite ; topiques émolliens. Le 15, foyer purulent dans le point douloureux ; incision, écoulement considérable

de pus ; soulagement ; pansemens à plat ; bandage légèrement contentif ; cicatrisation graduelle et complète de ce côté, vers la fin de janvier ; recollement difficile des bords de la plaie du moignon, à cause de la saillie osseuse ; état général assez bien, mais atteinte de nostalgie. Évacuation prématurée sur l'hôpital de Lille, dans les premiers jours de mars ; secousses durant le transport ; rétraction nouvelle des chairs ; saillie plus prononcée de l'extrémité du fémur ; nécrose consécutive de toute l'épaisseur de la portion dénudée ; section de cette virole osseuse ; cicatrisation enfin définitive, dans le courant d'avril seulement, vers le cent quinzième jour.

Le gonflement primitif, qui avait fait différer l'amputation, devait s'opposer aussi à la trop forte constriction des bandelettes. La bande roulée a été appliquée à propos pour prévenir les fusées purulentes.

Il paraît que la section de l'os n'avait pas été faite assez au niveau de la rétraction des chairs : car, malgré une première excision faite dix jours après avec les tenailles incisives ; malgré la résection dernière de la portion nécrosée, il est resté encore une saillie osseuse et une conicité du moignon, qui laissent à craindre des ulcerations nouvelles de la cicatrice et des compli-

cations ultérieures. L'extrémité d'os nécrosée, longue d'un pouce à peu près, m'a été envoyée par M Léonard fils.

Jui***, voltigeur au 58^e de ligne, blessé, le 22 décembre, à la cuisse et à la jambe gauches, par deux éclats de bombe : délabrement du membre jusqu'à trois pouces du bassin ; fracas des os ; dilacération des parties molles. Amputation immédiate au quart supérieur de la cuisse ; difficultés de l'opération et de la réunion immédiate ; réaction très forte, le jour même ; fièvre, délire, agitation, soubresauts ; état inquiétant ; saignée de l'artère temporale, glace sur la tête ; potion anti-spasmodique ; amélioration prononcée. Le 26, premier pansement ; pas de suppuration ; bords de la plaie contus, noirâtres ; commencement de gangrène ; ablation des bandelettes ; pansement à plat ; pièces de l'appareil imbibées de chlorure d'oxide de sodium étendu d'eau. Les jours suivans, séparation des parties sphacélées ; plaie vermeille, mais plus étendue par la perte de substance résultant de la gangrène ; saillie de l'os ; état général satisfaisant. Du 5 janvier au 10, rien de nouveau ; chute des ligatures, suppuration diminuée ; cicatrisation commençante ; bandage légèrement compressif ; nécrose de la rondelle d'os saillante, et détachée à la fin de janvier. Guérison complète, le 20 fé-

vrier, au soixante-dixième jour. Retour en France; fatigue de la route; ulcération de la cicatrice. Entrée au Val-de-Grâce, le 11 mai; tuméfaction légère; plaie circulaire de vingt-deux lignes de diamètre au moignon; autre petite plaie de quinze lignes de diamètre à la partie antérieure et interne, en avant et en dehors de la plaie principale; saillie sous-cutanée du fémur; cicatrisation graduelle des deux plaies; état général satisfaisant: cicatrice et guérison définitive au commencement de juin, vers le cent soixantième jour.

Le traitement employé contre la réaction encéphalique (saignée à la temporale, glace sur la tête, etc.) est en grande partie adopté par M. Larrey dans beaucoup de blessures de la tête et dans l'encéphalite. La gangrène dépendait peut-être, en partie, des secousses violentes éprouvées pendant le trajet; et la chute de l'escharre, en agrandissant la surface de la plaie, a pu favoriser la saillie de l'os, et sa tendance à la nécrose. La cicatrice, telle que nous l'avons vue au Val-de-Grâce, ne paraît pas susceptible d'acquérir jamais une grande solidité.

Des***, grenadier au 61^e de ligne, blessé, le 9 décembre, par une balle: plaie pénétrante de l'articulation fémoro-tibiale gauche; érosion du condyle externe du fémur. Exploration à Ber-

chem ; débridement, pansement simple. Évacuation sur Anvers : douleurs vives ; débridement élargi ; hémorragie de l'artère articulaire supérieure externe ; cataplasmes émolliens ; douleurs diminuées ; épanchement consécutif dans l'articulation. Le 15, suppuration très abondante. Le 19, douleur vive dans l'espace poplité, clapier profond ; œdème de la jambe et du pied ; compression méthodique. Le 23, séparation d'escharres au pourtour de la plaie ; dénudation de l'articulation ; nécessité de l'amputation, qui est pratiquée, le 24, au tiers inférieur de la cuisse, par M. Seutin ; réunion immédiate.

Le 25, douleurs dans le moignon, sans gonflement ; topiques émolliens. Le 28, hémorragie artérielle ; tamponnement, topiques réfrigérans sur le moignon. Le 30, hémorragie nouvelle pendant le pansement ; ablation des bandelettes ; recherche et ligature du vaisseau ; conséquences graves ; nouvelle application de bandelettes ; douleurs vives et profondes dans tout le membre ; suppuration abondante. Le 12 janvier, chute des ligatures ; point d'amélioration ; formation de plusieurs abcès au dessus du moignon ; ouvertures successives de trois foyers considérables pendant les premiers jours de février ; épuisement par l'abondance de la suppuration ; maigreure extrême ; état stationnaire de

la plaie; petite quantité de riz au lait pour toute alimentation. Le 15 mars, légère amélioration; suppuration moins abondante; alimentation. Le 22, fluctuation étendue à la face interne du moignon; nouvelle incision. Évacuation sur France, ajournée d'un mois encore et au delà, par de nouvelles complications du même genre, c'est à dire de nouveaux abcès et deux hémorragies. Entrée à l'hôpital de Lille, dans les premiers jours de mai: trois ouvertures fistuleuses suppurant encore abondamment; moignon irrégulier, difforme; saillie sous-cutanée du fémur, et déviation du centre; impossibilité de porter le cuissard, à cause des vives douleurs; constitution fort affaiblie; bouffissure générale; pouls petit; sueurs fréquentes; médication analeptique; cicatrisation des plaies fistuleuses, incertaine encore dans le courant du mois de juin; plus de nouvelles depuis.

Il est de toute évidence que, si l'amputation primitive avait été pratiquée, cette longue série d'accidens ne serait pas survenue; car il n'était point nécessaire que l'articulation fût largement ouverte pour opérer de suite. Mais je crois me rappeler que le blessé s'était refusé à l'amputation primitive; et cette circonstance met la chirurgie à l'abri de toute responsabilité chirurgicale. Je me permettrai de dire cependant, parce-

que je le pense, tout en me trompant peut-être, que la réunion immédiate, faite et refaite après l'amputation consécutive, a été, chaque fois, et en grande partie, la cause des complications. Les hémorragies successives et les abcès multiples qui se sont développés ont peut-être ajourné bien loin la cicatrisation définitive, puisqu'elle était incertaine encore au delà du septième mois.

Bre***, grenadier au 65^e, blessé, le 13 décembre, au genou gauche, par un éclat de bombe : fracture compliquée de l'articulation fémoro-tibiale; dénudation complète des surfaces articulaires. Amputation immédiate de la cuisse; réunion par première intention; aucun accident primitif de nature inquiétante; réaction légère sur l'encéphale; saignée du bras, diète, régime; état satisfaisant: rien de notable pendant une dizaine de jours; contact des bords de la plaie; suppuration établie; aucun trouble des fonctions générales. Le 24, invasion spontanée du téтанos; trismus très prononcé; extension successive des contractions tétaniques au cou, à la poitrine et au dos; marche graduelle, mais lente, de l'opisthotonos; emploi de l'acétate de morphine à l'intérieur, en pilules, en potion, en lavement; et, à l'extérieur, par la méthode endermique; suspension du progrès de

la maladie par cette médication , mais refroidissement subit ; assez bien jusqu'au 2 janvier, neuvième jour de la maladie ; alors , apparition nouvelle du tétonos ; mort au troisième jour de cette récidive.

C'est un phénomène remarquable que cette invasion spontanée du tétonos , à une époque assez avancée, et lorsque tous les accidens primitifs étaient dissipés , lorsqu'enfin la cicatrisation définitive se prépareit. Mais une circonstance qui n'est pas moins notable dans cette observation , c'est la cessation des accidens tétoniques , et leur réapparition subite sous l'influence atmosphérique. Nous avons signalé , à propos d'un fait intéressant , l'efficacité de l'acétate de morphine dans le traitement de cette grave complication. Je regrette de ne pas posséder plus de détails sur ce dernier fait.

Ha***, sergent au 58^e de ligne, blessé, le 7 décembre , à la cuisse et à la jambe gauches , par un double éclat d'obus : fracture comminutive et compliquée de plaie au tiers inférieur de la cuisse ; saillie du fragment supérieur à travers les muscles de la région interne ; fracture compliquée du tiers supérieur de la jambe ; commotion violente de l'articulation fémoro-tibiale par contre-coup. Amputation immédiate de la cuisse ; réunion par première intention ; accidens pri-

mitifs et consécutifs assez graves ; fièvre traumatique prolongée ; céphalalgie, insomnie, quelquefois du délire ; constipation de plusieurs jours ; état néanmoins assez satisfaisant du moignon, sauf un peu de tuméfaction douloureuse, tant par l'extension de la cause vulnérante que par la constriction trop forte des bandelettes agglutinatives ; médication anti-phlogistique ; saignée générale, saignées locales révulsives ; topiques réfrigérans sur la tête ; potion purgative ; diète, régime sévère ; amélioration notable ; cessation graduelle des accidens généraux ; travail de suppuration, mais apparition de nouveaux accidens par une forte émotion morale ; fièvre, inquiétude, anxiété, céphalalgie, délire, accès frénétiques ; mort, le 25.

Quelle était donc l'impression morale qui, après la cessation des accidens primitifs, causa ce funeste résultat ? Ce fut la visite inattendue d'un prêtre, qui, croyant le blessé dans un état inquiétant, venait l'exhorter à mourir dans des sentiments religieux. Le pauvre Ha*** éprouva une secousse si violente, qu'il n'y survécut pas même un jour ! Il avait été blessé dans la tranchée, à peu de distance du Prince royal, qui s'intéressait beaucoup à son sort.

Amputations de la jambe.

Généralement, les plus fréquentes à l'armée, les amputations de la jambe, sont aussi les plus difficiles de celles qui se pratiquent dans la continuité des membres. La ligature des vaisseaux entraîne souvent des lenteurs qu'une grande habitude même ne peut faire éviter. Ce n'est pas difficulté d'appliquer la ligature, mais difficulté de saisir l'artère qui donne du sang; et j'ai observé que la cause accidentelle la plus commune peut-être, c'est la précipitation avec laquelle on fait la section des muscles inter-osseux (1). Les amputations de la jambe surtout contre-indiquent une réunion forcée ou trop immédiate, parce que les parties molles sont moins mobiles, moins extensibles, plus adhérentes qu'aux autres membres. Par conséquent, la période du gonflement inflammatoire est plus susceptible de déterminer quelques uns des accidens que nous avons vus, tels que la compression douloureuse du moignon par les bandelettes agglutinatives, les tiraillements de la peau, l'étranglement des tissus sous-cutanés, des érythèmes,

(1) Mon collègue du Val-de-Grâce, M. Sédillot, a publié, dans la *Gazette médicale*, un mémoire qui se rapporte à ce sujet, sur l'amputation de la jambe.

des érysipèles et des abcès, sans parler de la réaction générale de ces phénomènes sur l'organisme. L'amputation de la jambe dans l'épaisseur des condyles du tibia a été faite plusieurs fois; la tête du péroné a été extirpée dans quelques cas. M. Larrey a prouvé depuis long-temps que l'on exagère les suites dangereuses de cette opération, plus simple et plus facile que dans le lieu d'élection, et qu'il était bien préférable et plus rationnel d'agir ainsi, que de remonter jusqu'à la cuisse. M. Velpeau a préconisé l'amputation intermédiaire, opération déjà pratiquée autrefois, c'est à dire, qu'il se décide en faveur de l'amputation de la jambe dans l'articulation fémoro-tibiale; M. Forget avait presque résolu de recourir une fois à cette méthode, mais il a changé d'avis, et l'amputation a été faite dans les condyles.

Je termine ces quelques lignes sur l'amputation tibio-péronière par indiquer que la section de la crête du tibia a été faite presque toujours, on sait dans quel but; et cependant je dois dire que, dans trois circonstances, il est survenu au même niveau une altération des tégumens. J'en conclus qu'il ne faudrait scier la crête du tibia que si elle était trop saillante, trop angulaire, et si les tégumens étaient trop dépourvus de tissu cellulaire graisseux.

Amputations de jambe, vingt-deux, savoir : vingt primitives et deux consécutives. Sur ce nombre, nous avons eu cinq décès, dont quatre amputations primitives et une consécutive ; ce qui ne détruit en rien les avantages incontestables de l'amputation primitive, pour peu que l'on tienne compte de la proportion, et puis encore des conditions défavorables dans lesquelles ont été pratiquées les amputations suivies d'un résultat funeste. La moyenne proportionnelle du traitement a été de soixante-dix jours.

Des vingt-deux observations rapportées ici, il n'en est qu'une qui nous soit restée inconnue dans tous ses détails : l'amputation avait été faite primitivement par M. Rénoucci, à l'ambulance de la division Achard, mais sans succès ; l'amputé est mort peu de temps après.

Bu***, sapeur du 1^{er} régiment au génie, mutilé le 10 décembre à la jambe droite, par un éclat d'obus : arrachement du membre à son tiers inférieur ; hémorragie primitive assez abondante ; affaiblissement extrême ; état de stupeur. Amputation différée de quelques heures, jusqu'à la réaction salutaire. Rien de notable dans le procédé ; réunion immédiate ; rien de bien notable non plus dans l'état consécutif. Levée de l'appareil, le 14 ; suppuration normale ; au troisième pansement, ablation d'un

caillot de sang à l'angle inférieur de la plaie. Du 20 au 25, suppuration plus abondante; du 25 au 30, chute des ligatures; cicatrisation complète le 15 janvier, au trente-cinquième jour. Ce blessé ne se trouvait pas cependant dans des dispositions morales bien favorables à un résultat aussi promptement heureux. Il était d'une apathie extrême, toujours plongé dans l'abattement, et tout entier à une seule crainte, celle de mourir. Combien est inconstant dans ses effets ce qu'on appelle les prédispositions!

Tar***, fusilier au 18^e de ligne, mutilé, le 16 décembre, à la jambe droite, par un boulet: fracture comminutive, avec dilacération des parties molles du tiers inférieur; fracas de l'articulation tibio-tarsienne. État de stupeur profonde contre-indiquant l'amputation immédiate; transport à Anvers; quelques heures de repos; opération, le même jour; réunion par première intention: point d'accident primitif ou consécutif. Le 20, levée de l'appareil; suppuration établie; contact régulier des lèvres de la plaie; du 5 au 15 janvier, chute des ligatures; progrès de la cicatrice, qui est entièrement consolidée le 20 janvier, au trente-cinquième jour.

Il est à regretter que le résultat de la plupart des amputations n'ait pas été aussi promptement heureux.

Ter***, carabinier au 18^e de ligne, mutilé, le 18 décembre, à la jambe droite, par un boulet : dilacération complète du membre, à son tiers inférieur ; os et muscles confondus par le broiement. Amputation dans le lieu d'élection, deux heures après ; demi - réunion ; aucune espèce d'accidens primitifs ou consécutifs de nature inquiétante. Levée de l'appareil, le 24 ; période normale de suppuration ; travail régulier de cicatrisation ; chute de la dernière ligature, le 23 janvier ; progrès assez rapides vers la guérison, qui est effectuée complètement au quarantième jour.

Ce fait n'a de notable non plus que son résultat on ne peut plus favorable.

Aus***, 2^e régiment du génie, blessé, le 8, dans la tranchée : plaie contuse au bord extérieur de la main droite, avec dilacération des tégumens et des muscles de l'éminence hypothénuse, au niveau du cinquième métacarpien. Amputation du doigt auriculaire. Fracture comminutive de la jambe, à l'extrémité inférieure, par le même éclat de bombe ; dilacération des parties molles. Amputation immédiate dans le lieu d'élection ; réunion par première intention. Le soir même, douleurs fortes dans le moignon ; diète, fomentations émollientes. Rien de notable jusqu'au quatrième jour. Levée du premier appareil : tuméfaction, rougeur du moi-

gnon; réunion imparfaite; disjonction de quelques bandelettes; suppuration à peine établie; aucun trouble, du reste, dans les fonctions générales. Le 17, quatrième pansement; abcès dans le tissu cellulaire de la face extérieure du moignon; douleurs vives; ouverture de l'abcès: emploi de la réunion demi - immédiate; chute des ligatures. Amélioration très notable, les jours suivans. Le 10 janvier, cicatrice de l'amputation du doigt; suppuration presque nulle du moignon de la jambe, tarie complètement du 10 au 20; cicatrisation rapide; guérison complète, le 30 janvier, au cinquante-troisième jour.

Les accidens causés par la réunion trop immédiate ont nécessité conséutivement l'emploi de la demi-réunion, dont le résultat a été très favorable. L'amputation d'un doigt de la main est une opération trop peu importante, après l'amputation de la jambe, pour que ce fait soit considéré comme un cas d'amputation double. Aus***, blessé dans la tranchée auprès du Roi des Belges, reçut de lui-même la première croix de son ordre.

Fon***, carabinier au 19^e léger, blessé, le 7 décembre, par plusieurs éclats de bombe: écrasement du pied droit; dénudation complète de l'articulation tibio-tarsienne; déchirure des tendons et des ligamens; légères contusions au bras

gauche , à l'épaule droite et à la poitrine ; contusion plus forte à l'œil gauche ; plaie transversale de la paupière supérieure ; gonflement ; amaurose consécutive. Amputation immédiate de la jambe droite dans le lieu d'élection ; réunion primitive. Rien de notable pendant les premiers jours. Le 13 , suppuration médiocre. Le 16 , formation d'un abcès à la face interne du moignon ; ouverture ; aucun accident jusqu'au 25 ; suppuration abondante. Le 26 , céphalalgie spontanée ; sanguins aux tempes ; lavement laxatif ; plus rien ensuite ; travail régulier de cicatrisation , terminé vers la fin de janvier , au cinquante-quatrième jour.

Une complication traumatique assez grave a eu lieu. La face latérale gauche du crâne a reçu une contusion violente par un autre éclat de bombe. Un coma profond pendant les premiers jours , avec céphalalgie et refroidissement des extrémités , tel a été le caractère de la réaction cérébrale ; des saignées déplétives et révulsives , et une purgation , tel a été le traitement suivi avec succès. Quant aux contusions du bras gauche , de l'épaule droite et de la poitrine , il suffit de les indiquer , parce qu'elles ont été légères.

Dor*** , mineur au 1^{er} régiment du génie , blessé , le 13 , à la jambe droite , par un éclat de bombe : fracture comminutive du tiers du mem-

bre inférieur, avec perte de substance assez considérable. Commotion violente ; état de stupeur ; refroidissement complet des extrémités. Opération différée d'une couple d'heures ; repos nécessaire à la réaction. Amputation, le même jour, dans le lieu d'élection ; réunion mixte, ou demi-immédiate ; aucun accident primitif. Le 18, état général satisfaisant ; bords de la plaie mis en contact par des bandelettes agglutinatives ; travail normal de suppuration. Le 2 janvier, bords de la plaie couverts de bourgeons charnus ; cicatrisation commençante. Le 15, chute de la dernière ligature. Le 4 février, presque à la veille du transport en France, chute sur le moignon ; rupture de la cicatrice dans une assez grande étendue ; hémorragie abondante ; tuméfaction douloureuse ; cessation spontanée de l'hémorragie ; topiques émolliens ; amélioration graduée ; cicatrice définitive, et guérison, le 18 février, au soixante-cinquième jour.

La stupeur primitive, avec refroidissement complet des extrémités, était portée chez Dor*** à un très haut degré ; elle n'a cependant pas nui au succès de l'opération, parce que celle-ci a été différée à propos ; et sauf l'accident imprévu qui a retardé la cicatrisation complète, on voit par ce fait, comme par quelques autres, que la demi-

réunion ou la réunion mixte n'a pas les inconvénients de la réunion forcée ou trop immédiate.

Ca***, grenadier au 52^e, blessé, le 9 décembre, au pied gauche, par un éclat d'obus : fracas de l'articulation tibio-tarsienne; dilacération des parties molles. Amputation immédiate de la jambe dans le lieu d'élection ; réunion primitive; aucun accident pendant les premiers jours. Le 15, levée de l'appareil; suppuration normale bien établie. Le 17, rougeur, tuméfaction à l'angle antérieur du moignon par la constriction de l'une des bandelettes, au niveau de la crête du tibia; ablation de cette bandelette; soulagement. Le 19, nouveau pansement. Le 21, léger écartement des lèvres de la plaie, par suite du relâchement des bandelettes; réunion plus exacte au moyen d'une bande roulée. Le 27, nouvelles douleurs; lotions émollientes. Le 28, accès fébrile, point pleurétique; saignée; diète. Amélioration, les jours suivans. Le 9 janvier, éruption spontanée d'une varicelle; expectation; régime sévère. Nouvelle tuméfaction simultanée du moignon; topiques émolliens; mieux. Le 20, terminaison bénigne de la varicelle. Du 24 janvier au 6 février, état satisfaisant; cicatrisation progressive, excepté à l'angle antérieur. Le 9, abcès dans ce point. Le 10, incision; petite es-

quille mobile détachée du tibia et entraînée par la suppuration ; progrès de cicatrisation définitive ; guérison complète au soixante-dixième jour.

Ce fait nous a offert un exemple de fracture longitudinale, depuis le foyer de la blessure, c'est à dire, que le tibia, fracassé dans sa surface articulaire inférieure, était fendu longitudinalement, dans l'étendue de trois pouces environ. Les accidens locaux ont alterné, la première fois, avec la complication du point pleurétique, et la seconde fois avec la varicelle.

Bel***, fusilier au 25^e de ligne, blessé le 7 décembre : arrachement du pied droit par un boulet. Amputation immédiate dans le lieu d'élection, et réunion par première intention ; hémorragie veineuse, arrêtée par l'imbibition de l'appareil avec de l'eau froide ; réaction assez vive ; anti-phlogistiques ; amélioration, le troisième jour. Levée du premier appareil, le 13 ; un peu de tension douloureuse des tégumens, suppuration normale. Le 16, très bien. Le 18, refoulement des parties molles vers le moignon, au moyen d'une bande circulaire ; progrès vers la guérison. Le 24, réapplication des bandelettes agglutinatives. Cependant, le 1^{er} février, reste encore le fil de la ligature de la tibiale antérieure. Le 12, consolidation de la cicatrice, sauf

le point fistuleux de la ligature : guérison définitive au soixante-douzième jour.

Bel*** était au camp de Berchem, à deux cents pas au delà de l'extrémité du village, lorsqu'un boulet perdu, lancé à plein fouet, lui emporta le pied. Il avait reçu les premiers secours de son frère, qui ne voulait pas le quitter, même pendant l'opération, et qui, en le soutenant dans ses bras, l'exhortait au courage.

Sab***, brigadier au 11^e régiment d'artillerie, blessé, le 13 décembre, aux deux jambes, par un boulet : fracture comminutive et compliquée du tiers inférieur des deux os de la jambe droite, avec dilacération des tissus ; plaie profonde de la jambe gauche ; déchirure du muscle jumeau interne ; érosion du tibia dans son tiers moyen, sans lésion du péroné. Amputation immédiate de la jambe droite ; réunion par première intention ; pansement et bandage contentif à la jambe gauche ; aucun accident de réaction primitive. Le 17, levée de l'appareil, constrictions un peu trop forte du moignon ; suppuration normale ; blessure de la jambe gauche dans de bonnes dispositions. Le 20, suppuration abondante. Le 22, hémorragie en nappe, causée par une secousse involontaire ; ablation des bandelettes ; tamponnement avec l'agaric et la charpie. Le 24, suppuration abondante et

sanieuse. Le 29, détersion de la plaie ; suppuration normale ; cicatrisation complète de la plaie du moignon , et presque simultanée de la plaie de l'autre jambe, vers le 25 février, au soixante-quatorzième jour.

L'état ultérieur présente : un moignon parfaitement solide et régulier ; une forte adhérence de la cicatrice au tibia. Quant à l'autre jambe, il y reste un engorgement indolent de l'articulation tibio - tarsienne, et une atrophie du pied.

Peu de blessés d'Anvers , même parmi les plus braves , ont eu autant de courage que celui-ci : non seulement il a supporté l'opération sans la moindre plainte , mais même il nous obligeait à rire par l'expression comique de ses idées. L'amputation de la jambe droite était à peine terminée , qu'il voulait encore qu'on lui coupât l'autre; et le malheureux nous disait merci en pressant nos mains teintes de sang.

Sti***, sapeur au 1^{er} régiment du génie, blessé, le 3 décembre, à la jambe et à la cuisse gauches, par un éclat de bombe : fracture comminutive et compliquée du tiers supérieur de la jambe ; plaie déchirée de la cuisse, dans une étendue de trois pouces , à sa face antérieure et moyenne ; hémorragie primitive ; état syncopal ; vomissement sympathique. Amputation immédiate de

la jambe dans l'épaisseur des condyles du tibia, au dessous du ligament rotulien; désarticulation de la tête du péroné; réunion par première intention; exploration de la plaie de la cuisse; aucun corps étranger; rapprochement des bords; pansement simple; bandage contenant; sauf une légère réaction vers le soir, point d'accident primitif. État très satisfaisant jusqu'au 8; réunion incomplète des parties molles; enfoncement de l'un des bords de la plaie par une bandelette tortillée sur elle-même; suppuration plus abondante sur ce point. Le 6, chute sur le moignon; hémorragie peu abondante. Mais, le 7, aspect brunâtre de la plaie; pus sanguinolent; commencement de pourriture d'hôpital; efficacité des lotions chlorurées; travail régulier de cicatrisation; suppuration normale; ouverture d'un petit abcès; guérison avancée, à la fin de décembre, tant de l'amputation de la jambe que de la plaie de la cuisse; cicatrice définitive, le 20 février, au soixante-quinzième jour.

On ne pouvait guère s'attendre à un résultat aussi prompt, aussi heureux même, à l'époque de la blessure, lorsque cette double lésion laissait un instant d'incertitude sur le parti qu'il fallait prendre, amputer la cuisse ou la jambe; et cependant il n'y avait pas à différer, parce que la vie du blessé était en danger, sous l'influence

d'une hémorragie et d'une syncope prolongées. L'amputation dans les condyles a concilié toutes les incertitudes, et ses suites sont une preuve de plus en faveur de cette opération. La dissection du membre amputé a fait découvrir dix-sept fragments du tibia et du péroné. Je note ce fait, parce qu'il est rare qu'une fracture soit plus comminutive.

Rem***, journalier, âgé de vingt-huit ans, mutilé, le 21 décembre, à la jambe droite, par un boulet : fracture comminutive, avec arrachement, et attrition profonde de l'articulation tibio-tarsienne et du pied ; pansement provisoire à l'ambulance de tranchée, contention du pied sur la jambe par un bandage. Amputation immédiate à Berchem, dans le lieu d'élection ; réunion par première intention. Évacuation sur l'hôpital civil d'Anvers : accidens de réaction ; dangers pendant les premiers jours ; efficacité des moyens anti-phlogistiques ; levée du premier appareil. Le 29, suppuration commençante, d'assez mauvaise nature ; état général inquiétant ; médication appropriée ; amélioration lente, mais progressive ; formation et ouverture d'un abcès au niveau de l'angle antérieur de la plaie ; chute de la dernière ligature, le 28 janvier ; dès lors, aucun accident ; état général et

local très satisfaisant, le 1^{er} mars; guérison complète, le 10, au quatre-vingtième jour.

Ce malheureux ouvrier traversait la chaussée de l'église Saint-Laurent, à quelques pas de notre ambulance de tranchée, et il exerçait une périlleuse industrie de circonstance, en récoltant des projectiles hollandais, lorsqu'il fut ainsi mutilé par l'un d'eux (1).

Pér***, voltigeur au 9^e léger, mutilé, le 7 décembre, à la jambe gauche, par un boulet: arrachement de ce membre à son tiers moyen; douleurs atroces d'abord, remplacées par un état de torpeur. Amputation, pratiquée après quelques heures seulement, pour favoriser la réaction salutaire; réunion immédiate; accidens nerveux et inflammatoires, le même jour; saignée; potion calmante; diète sévère; amélioration; rien à dire jusqu'au 12. Alors, second pansement; rougeur des bords de la plaie; tuméfaction des tégumens au niveau de la crête du tibia; relâchement consécutif des bandelettes; rétraction des chairs. Le 15, plus de traces d'inflammation; bande circulaire sur le moignon. Le 16, condition favorable. Le 24, chute de

(1) M. Larrey a vu des mutilations produites par la même cause, chez quelques uns des soldats français qui, au siège de Saint-Jean-d'Acre, allaient ramasser les boulets anglais.

quelques ligatures ; travail de cicatrisation , depuis les premiers jours de janvier jusqu'au 20 , mais formation d'un abcès assez considérable à l'angle postérieur de la plaie ; émolliens ; incision ; suppuration d'assez longue durée. Le 10 mars enfin , cicatrisation , terminée au quatre-vingt-troisième jour.

— Nous voyons , par ce fait , que la bande circulaire a suffi pour ramener graduellement les chairs , rétractées par suite du relâchement des bandelettes.

M. Ya***, sous-lieutenant au 25^e régiment de ligne , blessé , le 22 décembre , par un éclat de bombe , à la jambe droite : fracture comminutive et compliquée de plaie profonde au tiers inférieur. Amputation immédiate , à Berchem , par le chirurgien en chef ; rapprochement des bords de la plaie du moignon , sans contact ; beaucoup de courage de la part du blessé. Évacuation sur Anvers : symptômes d'une maladie chronique de la poitrine : depuis long-temps , ce militaire portait une hypertrophie du cœur. Le 23, quelques vomissements spasmodiques , dyspnée , palpitations , saignées , diète sévère ; boissons mucilagineuses et laudanisées. Le 24 , point d'amélioration. Le 25, douleurs lacinantes et tiraillements dans le moignon ; levée de l'appareil ; suppuration en retard ; lotions sédatives.

Les 27 et 28, moins de douleurs ; réaction sur les organes pulmonaires ; toux fréquente et douloureuse ; saignée de huit onces ; potion calmante. Le 29, nouveau pansement ; suppuration bien établie ; plaie en bon état. Le 30, mêmes symptômes du côté de la poitrine ; toux sèche et fréquente ; saignée ; diète continuée ; peu de changement jusqu'au 8 janvier. Le 8, chute des ligatures, rapprochement des bords de la plaie.

Le 10, dyspnée, palpitations. Le 15, sanguines à la région précordiale. Le 18, travail de cicatrisation ; persistance des palpitations ; digitale pourprée à l'intérieur ; influence fâcheuse sur l'estomac ; meilleurs effets de la teinture de digitale étendue sur des cataplasmes et appliquée sur la région précordiale. Du 1^{er} au 10 février, cessation des battemens de cœur ; suppression de l'emploi de la digitale.

Du 10 au 20, cicatrisation très avancée, mais état général inquiétant ; faiblesse extrême. Le 21, réaction légère vers le cœur ; douze sanguines ; nouveaux cataplasmes, arrosés de teinture de digitale ; amélioration les jours suivans. Le 28, retour graduel des forces ; alimentation proportionnée. Le 15 mars, moignon entièrement cictré. Le 20, sortie de l'hôpital ; en voie de guérison complète, le quatre-vingt-cinquième jour. La complication grave de la blessure a contri-

bué bien évidemment à en retarder la guérison. La maladie du cœur, en s'exaspérant, a réagi elle-même sur les organes pulmonaires ; et l'estomac, à son tour, a éprouvé une influence fâcheuse de l'emploi à l'intérieur de la digitale pourprée.

D***, grenadier au 52^e, blessé, le 15 décembre, par un fragment de mitraille : double plaie à la face dorsale du pied gauche ; fracture comminutive du premier métatarsien ; dénudation de l'astragale ; gonflement primitif peu considérable. Refus du blessé à l'amputation primitive : débridement modéré des deux plaies ; extraction de quelques esquilles, et d'un petit fragment de fer, informe ; pansement simple ; bandage contentif. Évacuation sur Malines : accidens consécutifs ; tuméfaction douloureuse et considérable du pied ; suppuration abondante ; dénudation plus étendue de l'articulation tibio-tarsienne ; commencement de carie articulaire ; insuffisance des moyens thérapeutiques employés.

Le 27 décembre, amputation de la jambe dans le lieu d'élection ; réunion immédiate ; nouveaux accidens, au bout de quelques jours, hémorragies, abcès, décollement de la peau ; rétraction des chairs ; saillie, et nécrose de la portion dénudée du tibia et du péroné ; épuisement des forces ; pronostic fâcheux ; mais, après bien des soins et

surtout bien du temps, amélioration graduelle; cessation des accidens, et guérison définitive au centième jour.

Je suis réduit à donner cet aperçu incomplet de l'observation, parce que je n'ai pas eu sur le blessé d'autres renseignemens; mais il y en aurait assez encore pour parler contre les chances défavorables des amputations consécutives.

Tur***, maréchal-des-logis au 11^e régiment d'artillerie, blessé, le 6 décembre, au pied, par un éclat de bombe: écrasement de l'articulation tibio-tarsienne; hémorragie inquiétante, sans apparence de l'orifice du vaisseau. Amputation immédiate de la jambe, dans le lieu d'élection, à Oboken; tentative de réunion primitive; réaction assez forte; fièvre traumatique; céphalalgie, anxiété; deux saignées successives; amélioration. Transport à Boom: levée de l'appareil, le 11; rétraction des chairs; point de réunion possible, à cause d'une saillie osseuse; suppuration abondante; pansement à plat, renouvelé deux fois par jour; transsudation séro-sanguinolente. Le 17, aspect changé du moignon; suppuration normale; cessation instantanée des accidens primitifs. Le 20, irritation de la surface du moignon; séjour prolongé du pus; ablation définitive des bandelettes, remplacées par une bande roulée; pansement méthodique

des plaies qui suppurent. Le 23, hémorragie veineuse instantanée. Le 25, aucune trace de cicatrisation, malgré la coloration vermeille des chairs; état général satisfaisant jusqu'au 27; dès lors, pouls fréquent; céphalalgie intermittente; embarras gastrique. Le 28, affaiblissement du moral. Transport à Anvers, le 2 janvier; longue période d'accidens variés: tension douloureuse dans le moignon; mauvais état des chairs; suppuration tantôt abondante, tantôt tarie presque tout à coup, mais plus souvent abondante; formation successive de plusieurs abcès; décollement de la peau dans quelques points; lenteur excessive de la cicatrisation, entravée sans cesse par les accidens et par la saillie des os nécrosés; influence pernicieuse sur la santé générale; trouble des fonctions; affaiblissement progressif; découragement profond; fâcheux pronostic; mais, enfin, cessation graduelle des complications; influence favorable d'une médication hygiénique, à l'hôpital de Lille; séparation de la portion nécrosée du tibia dans la longueur d'un demi-pouce; rapprochement et cicatrisation des chairs; rétablissement de la santé générale; cicatrice terminée, quoique fort mince; guérison, regardée comme complète, au cent quarantième jour.

J'ai dû m'en tenir à l'aperçu général de cette

observation, parce que les détails circonstanciés ne me sont point parvenus; ce qui en est rapporté suffit cependant pour faire voir les conséquences graves de certaines amputations. Cette opération a été critiquée amèrement et même avec malveillance, par des personnes qui se croyaient en droit d'apprécier ses difficultés et d'être appelées comme juges; mais on ne devait en appeler, en pareil cas, qu'à la compétence la plus respectable pour nous tous, à la compétence du chirurgien en chef, qui m'a autorisé à transcrire sa déclaration; la voici:

« J'ai vu à l'hôpital d'Anvers l'artilleur qui » a subi l'opération: je conviens avec douleur » qu'elle a été mal faite; l'imperfection du pro- » cédé opératoire a été l'effet, non de l'igno- » rance, mais d'un défaut d'expérience et d'aides, » comme d'une nécessité impérieuse; car M. M..., » que j'ai interrogé à ce sujet, m'a déclaré, sur » son honneur, que se défiant de ses forces, il » n'avait amputé que pour arrêter une hémor- » rhagie qui entraînait une mort imminente. »

Mor***, caporal au 65^e de ligne, blessé, le 13 décembre, à la jambe droite, par un éclat de bombe: fracture comminutive et compliquée des deux os, à leur tiers moyen; infiltration séreuse de tout le membre. Amputation immédiate; réunion mixte: aucun accident primi-

tif. Le 18, premier pansement; plaie en bon état; suppuration assez abondante, et diminuée du 1^{er} au 20 janvier, sans incident notable. Cicatrisation avancée, mais gonflement inflammatoire spontané, par une secousse violente du moignon; topiques émolliens, sans effet favorable; ulcération de la cicatrice; pourriture d'hôpital; lotions chlorurées, chute de l'escharre gangreneuse. Amélioration graduelle jusqu'au 10 février; cicatrisation avancée, le 28; cependant, état nostalgique assez prononcé; évacuation prématuée sur l'hôpital de Lille.

Le 2 avril, rupture d'une partie de la cicatrice, pendant le transport; suppuration abondante, teinte blafarde des chairs; aspect syphilitique, d'après la forme de l'ulcération, déprimée au centre, relevée sur les bords, taillés à pic; bouffissure générale, œdème du membre abdominal gauche; nul doute sur la nature de la complication, d'après les renseignemens obtenus; symptômes syphilitiques antérieurs; phimosis, adénite, ulcérations de la gorge, etc. En conséquence, traitement anti-vénérien par les sudorifiques et les mercuriaux, à l'intérieur et à l'extérieur: amélioration notable, au neuvième jour; retour graduel des forces; fonctions mieux réglées; suppuration normale de la plaie, devenue plus vermeille, plus régulière; enfin

cicatrisation complète à la fin de mai seulement, vers le cent soixantième jour.

Est-il beaucoup de complications capables d'entraver aussi long-temps la guérison d'un amputé? Cet homme avait été traité, pendant deux mois, en 1831, à l'hôpital même de Lille, par la méthode anti-phlogistique, et ce pendant on ne peut éléver aucun doute, selon nous, contre les conséquences fâcheuses de la maladie syphilitique : nous en avons déjà cité un exemple assez remarquable; le traitement mercuriel et sudorifique a seul réussi à détruire l'influence du virus, aussi bien dans un cas que dans l'autre. Je dois encore les notes relatives à ce nouveau fait à l'obligeance de M. Léonard fils.

Thu***, carabinier au 19^e léger, blessé, le 23 décembre, à la jambe droite, par un éclat d'obus: fracture comminutive du tiers supérieur des deux os; plaie profonde, mais peu étendue; contusion forte du genou; amputation immédiate dans l'épaisseur des condyles; désarticulation du péroné; réunion semi-complète. Point d'accident primitif; travail de suppuration normale, fonctions bien réglées; cicatrisation commençante; chute de deux ligatures; état satisfaisant : rien de notable pendant un mois.

Le 20 janvier, douleurs vives dans tout le bras droit, impossibilité des mouvemens; articulation

huméro-cubitale surtout sensible et douloureuse, quelques symptômes d'affection gastrique ; diète, boisson gommeuse, émolliens. Le 25, pas d'amélioration ; vésicatoire sur le coude, avec un grain d'acétate de morphine en poudre sur le vésicatoire ; efficacité au troisième jour. Le 29, colique, diarrhée, ténesme, par un écart de régime, douze sangsues à la marge de l'anus ; émolliens, eau de riz gommée. Le 31, nouvelles douleurs dans le bras, nouveau vésicatoire, sans effet notable ; émaciation considérable du membre. Le 4 février, ventouses scarifiées. Le 12, vomissemens fréquens et douloureux de matières porracées ; amaigrissement considérable ; aucune boisson ne peut être supportée ; quelques morceaux de sucre candi pendant quatre jours ; opium administré en pilules ; effets très salutaires. Le 20, ptyalisme abondant ; affaissement considérable. Le 25, plus de diarrhée ; le ptyalisme continue ; moins de douleurs dans le bras. Le 2 mars, large emplâtre de poix de Bourgogne stibiée sur l'épigastre ; cessation du ptyalisme. Le 6, un peu de repos ; amélioration ; mouvemens du bras toujours douloureux ; suppuration de la plaie peu abondante, mais cicatrisation très lente. Le 18, progrès généraux vers la guérison. Le 20, alimentation substantielle ; retour des forces. Le 25, plaie du moignon en

voie de guérison; évacué sur Bruxelles, le 28 mars; quelques nouveaux accidens; douleurs dans le moignon, symptomatiques de la formation d'un abcès sur le bord de sa face interne; incision à maturité; topiques émolliens; amélioration passagère. Transport à Lille, le 25 avril; suppuration abondante de la plaie du coude; engorgement, tension douloureuse; exploration avec un stylet; carie dans quelques points des surfaces articulaires; escharre de quatre travers de doigt au sacrum; constitution détériorée par la suppuration et la fièvre traumatique; quelques selles colliquatives; tous les moyens mis en usage, presque sans effet; nouveau point de fluctuation sur le coude, ouverture de l'abcès par la potasse caustique. Amputation du bras impraticable, à raison de l'état de débilité extrême, et sans chances probables de succès; cicatrisation incomplète de la plaie du moignon; aspect blafard des bourgeons charnus.

Nous n'avons pas eu de nouvelles de cet amputé depuis la fin du mois de mai. La contusion forte du genou compliquant la fracture de la jambe m'avait paru indiquer l'amputation de la cuisse plutôt que celle de la jambe, avec désarticulation du péroné. La période du premier mois, sans accident, est un fait d'autant plus notable, que la complication survenue au membre supé-

rieur était tout à fait imprévue; elle pouvait être due à une chute primitive sur le coude. La réaction gastro - intestinale, et plus encore le ptyalisme abondant, sont à noter; les accidens du bras se sont manifestés en raison inverse des autres accidens, et la plaie du moignon a été long-temps stationnaire. La dégénérescence de la maladie du membre supérieur était une nécessité d'amputation; mais les complications secondaires et surtout l'épuisement des forces s'opposaient à cette opération. A-t-elle été ou sera-t-elle pratiquée plus tard? c'est ce qu'il faut croire, si déjà n'est pas survenu un plus funeste résultat.

Ber***, voltigeur du 25^e de ligne, blessé, le 6 décembre, à la cuisse et au pied droits, par deux éclats d'obus: fracture comminutive et compliquée de l'articulation tibio-tarsienne; dénudation complète des surfaces articulaires; plaie de la cuisse à la face externe et moyenne, dans l'éten-
due de deux pouces et demi; déchirure aponé-
vrotique; hernie musculaire. Etat de stupeur
prolongé. Amputation immédiate dans le lieu
d'élection; réunion primitive; pansement de la
plaie de la cuisse, après réduction de la hernie
musculaire. Accidens comateux continus; in-
sensibilité complète; pronostic fâcheux. Mort,
le soir même.

Dans ce cas, malgré la gravité de la blessure, il y a eu trop de précipitation à amputer, parce que la réaction naturelle n'a pas eu le temps de se développer et de dissiper l'état primitif de stupeur; ce reproche de ma part ne s'adresse pas ici à d'autre qu'à moi-même, puisque c'est moi qui ai fait l'amputation.

Math***, voltigeur au 58^e de ligne, blessé, le 20 décembre, à la jambe gauche et à l'avant-bras droit, par deux balles : fracture comminutive du tibia dans son tiers moyen, avec double plaie étroite d'avant en arrière, sans lésion du péroné. Plaie contuse à la face latérale externe de l'avant-bras, sans présence de corps étranger. Aucune nécessité apparente d'amputation primitive; expectation; débridement des plaies; extraction de plusieurs esquilles du tibia; pansement simple; bandages contentifs, appropriés aux deux blessures. Point d'accident, le jour même; mais, le lendemain, douleurs vives dans la jambe; fièvre traumatique; céphalalgie; saignée; diète; pas d'amélioration; levée de l'appareil, le 23; tuméfaction douloureuse du membre fracturé; cercle érysipélateux autour de la plaie; exploration; déchirure de plusieurs portions musculaires; esquilles mobiles.

Amputation résolue, et pratiquée seulement le lendemain 24; réunion primitive; accidens

continus, exaspérés graduellement; douleurs excessives dans le moignon; anxiété, insomnie, délire; fièvre ardente. Mort le lendemain, 25 décembre, au cinquième jour de la blessure.

Il n'y a pas eu faute du diagnostic chirurgical, pour n'avoir point amputé la jambe primitive-ment. La blessure ne paraissait réellement pas exiger ce moyen extrême; mais il y a eu peut-être faute à différer même d'un jour l'amputation con-sécutive, dès qu'elle fut reconnue indispensable.

Lég***, canonnier au 11^e régiment d'artillerie, atteint de plusieurs blessures, le 13 décembre, par une bombe tombée dans un magasin à pou-dre :

1^o. Écrasement du pied et dilacération de l'extrémité inférieure de la jambe droite, soute-nue seulement par le tendon d'Achille et un lambeau des tégumens;

2^o. Contusion violente de la jambe gauche à sa partie postérieure et externe; déchirure des muscles longs péronier et extenseur des orteils; fracture du péroné par écrasement, à un pouce au dessus de la malléole; destruction des liga-mens de l'articulation tibio-tarsienne; érosion du tibia;

3^o. Fracture de l'extrémité externe de la clavicule, de l'apophyse coracoïde et du col de l'hu-mérus, du côté droit.

Amputation immédiate de la jambe droite, par M. Montcourrier, dans le lieu d'élection; réunion primitive. Refus de la part du blessé à l'amputation de la jambe gauche; exploration de la blessure; extraction de plusieurs esquilles et de la portion inférieure du péroné, saillante, mobile et renversée à l'ouverture de la plaie. Rapprochement des bords de la plaie; pansement simple; appareil des fractures. Bandage contentif pour la triple fracture de l'épaule. Accidens primaires graves; réaction vive; pouls petit, très faible; teinte ictérique de toute la surface cutanée; affaiblissement extrême; état comateux; médication palliative; soins hygiéniques; un peu de mieux. Transport à Boom, le septième jour de l'amputation. Levée de l'appareil du moignon et de celui de la fracture; pus sérieux, grisâtre et d'une odeur fétide, de l'un et de l'autre côté; aspect blafard des chairs du moignon; renouvellement de toutes les pièces d'appareil; lotions d'eau chlorurée. Maintien du bandage appliqué primivement à la fracture de l'épaule. Épuisement graduel des forces; pâleur de la face, expression d'anxiété dans les traits; trouble des facultés intellectuelles; respiration courte et fréquente; pouls petit et irrégulier. Le 27, exacerbation des symptômes; fièvre hectique; mort dans la nuit, au quinzième jour.

Il fallait s'attendre à ce funeste résultat, d'après les blessures multipliées et graves dont ce militaire était atteint ; il fallait s'y attendre, surtout, à raison du refus du blessé de subir la seconde amputation ; il fallait s'y attendre, enfin, d'après les complications fâcheuses qui sont survenues. La même bombe, en éclatant dans le magasin à poudre, avait blessé un autre soldat, et tué sur le coup un troisième.

R***, voltigeur au 52^e de ligne, mutilé, le 10 décembre, à la jambe gauche, par un boulet : arrachement de la presque totalité du membre à son tiers inférieur. Amputation immédiate, dans le lieu d'élection ; réunion primitive. Aucun accident le jour même ; mais, le surlendemain, 12, forte réaction générale ; céphalalgie, fièvre, anxiété, insomnie ; saignée ; diète. Amélioration. Le 14, mieux soutenu ; suppuration peu abondante. Le 15, nouveaux symptômes alarmans ; saignée renouvelée. Le 16, nouvelle amélioration, soutenue jusqu'à la fin de décembre ; suppuration normale ; fonctions assez bien réglées ; mais tout à coup, le 2 janvier, et par une cause inappréciable, seconde récidive des accidens, avec exacerbation ; fièvre continue ; céphalalgie intense ; anxiété, délire ; constipation opiniâtre ; mort, le 7 janvier, au vingt-huitième jour.

La réaction avait affecté une singulière forme,

en cessant trois fois pour reparaître de nouveau. C'était assez pour faire croire à un résultat plus heureux , après chaque rémission.

Amputations partielles du pied.

On s'étonnera peut-être qu'une seule amputation tarsienne ait été pratiquée au milieu de toutes les causes vulnérantes qui devaient multiplier la nécessité de cette opération. Ainsi, dira-t-on, les éclats de bombes et d'obus ont dû produire assez de blessures graves du pied pour que l'on fût dans l'obligation d'amputer. Sans doute, répondrons-nous; mais c'est la gravité même de ces lésions, qui toujours exigeait plus qu'une amputation partielle du pied , parce qu'elles s'étendaient en même temps à la partie inférieure de la jambe, si ce n'est au delà : l'exposé des cas d'amputations de ce dernier membre en fournit d'ailleurs la preuve.

Men***, fusilier au 18^e de ligne, blessé, le 9 décembre , au pied gauche , par un boulet : choc direct; fracture comminutive , avec plaie contuse, du métatarsé et des cunéiformes, les orteils restant cependant intacts ; amputation par M. Forget, selon le procédé de Chopart; section de la face antérieure du calcanéum, qui était fracturée; réunion immédiate ; saignée ; hé-

morrhagie consécutive, sans résultat fâcheux, et arrêtée par la compression; gonflement inflammatoire du moignon, dissipé par les émolliens; suppuration abondante, un peu de fièvre, réaction cérébrale, saignée, amélioration; guérison au trente-sixième jour.

Une particularité s'ajoute à cette amputation partielle du pied; c'est la section de la face antérieure du calcanéum: la guérison a été assez prompte, malgré l'indocilité extrême de l'amputé, qui s'agitait sans cesse.

Il serait sans intérêt de citer quelques faits d'amputation des orteils, parce que le résultat en a été fort simple. Un soldat du 65^e, qui a eu le gros orteil du pied droit amputé, avait eu une plaie profonde et déchirée de la cuisse, du même côté, par contre-coup du même éclat d'obus, depuis le niveau du condyle interne jusqu'au tiers supérieur du membre. Cette complication a guéri elle-même assez facilement.

Résections.

La résection des parties osseuses articulaires est une des opérations chirurgicales qui n'ont pas encore acquis la sanction de tous les praticiens, malgré des exemples de succès assez mul-

tipliés. L'amputation complète du membre paraît généralement préférable. Il est cependant des lésions tellement limitées et circonscrites, que la résection devient alors une ressource réelle et digne d'être conservée en chirurgie. La grande difficulté de l'application de cette méthode, c'est l'appréciation exacte et raisonnée des cas; appréciation soumise presque entièrement au tact du chirurgien, et qui ne saurait s'astreindre à des règles fixes, à une théorie souvent facile à produire, mais rarement facile à appliquer. Aussi n'ai-je pas la moindre prétention de préciser les circonstances avantageuses ou nuisibles à la résection; je voudrais plutôt ajouter quelques faits nouveaux à la masse de ceux que l'on possède déjà, afin que chacun d'eux, suivi de conclusions en sa faveur ou à son désavantage, pût servir plus tard à fonder sur ce sujet des principes plus positifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je regrette donc de ne rapporter qu'un seul cas de résection articulaire: le résumé lui-même en fait presque le commentaire ou plutôt la critique.

Résection du femur.

Lis***, soldat au 25^e de ligne, blessé, le 5 décembre, à la cuisse droite, par un coup de fusil

de rempart : entrée de la balle par la partie externe et supérieure de la cuisse, au dessus du grand trochanter, de dehors en dedans; sortie du projectile par le périnée. Effets primitifs de la commotion; exploration de la plaie; débridement profond en dehors; fracture comminutive du col du fémur et du grand trochanter; peu de désordre néanmoins dans l'épaisseur des parties molles. Effets continuos de la commotion; état de stupeur incomplète; prostration des forces, etc. Consultation chirurgicale à l'hôpital d'Anvers; avis de la majorité pour l'extirpation immédiate de la cuisse; mais le chirurgien en chef belge, M. Seutin, croyant que la résection partielle de l'os est praticable et beaucoup moins dangereuse que l'ablation complète du membre, s'y décide et opère le 8 décembre, en présence de notre chirurgien en chef et de plusieurs d'entre nous.

Procédé opératoire : incision longitudinale et profonde, étendue de la crête iliaque à trois pouces au dessous du grand trochanter, et pénétrant jusqu'à l'os; adduction du membre; exploration de la plaie; autre incision cruciale ou perpendiculaire à la première, étendue de deux pouces et demi environ, en avant et en arrière, au niveau du grand trochanter; dissection, écartement des lambeaux; nou-

velle exploration de la plaie ; extraction des esquilles mobiles (une quinzaine environ) ; saillie forcée du fragment inférieur du fémur à travers la plaie ; résection immédiatement au dessous du dernier éclat de l'os. Enclavement *cotyloïdien* de la tête du fémur, rompue précisément à son col anatomique, sans saillie au dehors de la cavité cotyloïde ; extraction longue et difficile, résection totale de six pouces. Point d'hémorragie possible, pendant cette opération, qui ne dure que quelques minutes seulement. Rapprochement des lèvres de la plaie ; pansement simple ; appareil légèrement contentif ; demi-flexion du membre sur un double plan incliné. Aucun accident primitif. Affaiblissement le 10, fièvre ; tuméfaction graduelle de la totalité du membre, devenu peu à peu froid, insensible, emphysémateux ; signes évidens de gangrène ; déperissement général. Mort, le 12, quatrième jour de l'opération.

Nécropsie. Dégénérescence pultacée des chairs environnant la plaie ; infiltration de matière sanguineuse ; intégrité des vaisseaux et des nerfs ; tuméfaction du membre dans toute son étendue.

Météorisme de l'abdomen ; flatuosités intestinales, épanchement séreux dans le petit bassin, emphysème du bas-ventre, fusion purulente dans les veines iliaques.

Cette opération a fait du bruit dans le monde chirurgical , et d'Anvers à Paris , elle s'est annoncée rapidement. C'était une opération toute nouvelle , quoiqu'elle eût été proposée par White , et approuvée , sans plus d'exécution , par Vermandois , Petit-Radel , Rossi et Chaus-sier ; c'était aussi une opération hardie , et qui a pu en imposer d'abord pour une tenta-tive heureuse. J'avoue , pour mon compte , que j'ai été , dans les premiers instans , tout à l'illu-sion , lorsque j'ai vu , d'un côté , la portion articulaire du fémur , et d'un autre , une simple plaie , la cuisse conservée tout entière , et l'o-péré en bon état ; mais en raisonnant ensuite les conséquences de cette opération , tout pro-nostic favorable devenait impossible , et le fu-neste résultat l'a prouvé. Fallait-il donc plutôt amputer la cuisse dans l'articulation ? Je n'ose me prononcer , et cependant il me semble que , sans aborder ce moyen extrême , on aurait peut-être réussi à conserver le membre par l'extrac-tion simple des fragmens mobiles et par l'appli-cation méthodique d'un appareil à fractures (1) , quel que dût être le raccourcissement consécutif ,

(1) C'est à dire , selon nous , par l'appareil inamovible de M. Larrey .

ou la fausse articulation. Mais , était-il bien nécessaire d'aller désarticuler , avec tant de peine , la tête du fémur tout à fait intacte dans sa cavité , et si nécessaire pour former le chapiteau de la colonne de sustentation ? Je ne le pense pas non plus.

On pouvait , enfin , amputer seulement la cuisse dans sa continuité , et détacher ensuite , avec toutes les précautions nécessaires , le fragment inférieur du fémur et les esquilles. N'avons-nous pas cité des exemples d'amputations de cuisse dans la continuité , tellement près du bassin , que le moignon simulait le résultat d'une désarticulation ?

M. Seutin , en faisant cette résection du fémur , a cru pouvoir se fonder , surtout , sur les résultats généralement funestes de l'amputation de la cuisse dans l'articulation coxo-fémorale ; mais , comme ses raisons n'étaient expliquées nulle part , il a cherché à répondre aux critiques , en faisant insérer dans le *Bulletin thérapeutique* l'observation tout entière de Lis*** , telle qu'il l'avait rédigée lui-même.

Ici finit la tâche que je m'étais imposée. J'avais encore en vue de présenter un résumé

complet des différentes parties de ce travail , et d'indiquer ainsi le nombre total des blessés et des morts ; les nombres partiels des blessures de chaque région ; le genre , les différens degrés , la terminaison , toutes les diversités enfin de ces blessures , etc. Un motif bien simple m'a détourné de cette idée première , c'est que chaque série d'observations est assez distincte dans ses résultats , pour qu'il soit inutile de les reproduire ; d'autant plus que l'œuvre ne me paraît ni assez étendue ni assez importante pour exiger de nouvelles recherches , qui ajourneraient encore cette publication.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS CE VOLUME.

	Page
AVANT-PROPOS.	1
CHAPITRE I ^{er} . CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES.	8
CHAPITRE II. CONSIDÉRATIONS CHIRURGICALES.	42
CHAPITRE III. OBSERVATIONS.	78
§ I. BLESSURES de la tête.	80
§ II. —— du cou.	126
§ III. —— de la poitrine.	128
§ IV —— de l'abdomen.	145
§ V. —— des parties génitales.	159
§ VI. —— de la partie postérieure du tronc. . . .	160
§ VII. AMPUTATIONS.	259
—— dans l'articulation scapulo-humérale. 272	
—— du bras dans la continuité.	284
—— de l'avant-bras.	299
—— de la main.	304
—— dans l'articulation coxo-fémorale. . . .	306

Amputation de la cuisse dans la continuité.	310
— de la jambe.	332
— partielles du pied.	362
Résections.	363
TABLE DES MATIÈRES.	371

FIN.

RELATION CHIRURGICALE
DES
ÉVÉNEMENS DE JUILLET 1830,

A L'HOPITAL MILITAIRE DU GROS-CAILLOU.

PARIS. — IMPRIMERIE DE COSSON,
Rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9.

Mon amie l'amante ma
RELATION CHIRURGICALE

DES

ÉVÉNEMENS DE JUILLET 1830,

A L'HOPITAL MILITAIRE DU GROS-CAILLOU;

Par Hippolyte Larrey,

CHIRURGIEN-SOUS-AIDE-MAJOR.

Pateant certantibus campi; jām corpora procumbunt
humi truncata; membra latè dispersa sternuntur; manat
undique crux; salus una restat moribundis; vocant ho-
minis amicum. Ecce chirurgus.

Theses in Parisinis chirurgiae scholis, anno 1763.

(EXTRAIT DES MÉMOIRES DE MÉDECINE, DE CHIRURGIE ET DE
PHARMACIE MILITAIRES, TOME XXX.)

SECONDE ÉDITION,

PRÉCÉDÉE DU RAPPORT DE M. DUPUYTREN A L'INSTITUT.

A PARIS,

CHEZ BÉCHET, PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N° 4;
ET CHEZ L'AUTEUR, QUAI DE CONTI, PRÈS LA MONNAIE.

1831.

A Monsieur

Le baron Dupuytren,

CHIRURGIEN EN CHEF DE L'HOTEL-DIEU,

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Hommage de respect et de reconnaissance.

Hippolyte Larrey.

• *Monteith's mod. 2.*

RAPPORT DE M. DUPUYTREN

A L'INSTITUT.

« L'ACADEMIE m'a chargé de lui faire un rapport verbal sur un ouvrage qui lui a été récemment offert par M. Hippolyte Larrey, et qui a pour titre : *Relation chirurgicale des événemens de juillet 1830, à l'hôpital militaire du Gros-Caillou.*

» L'Académie n'a pas oublié, sans doute, que notre confrère M. le baron Larrey, cédant au zèle et à l'activité dont il a si souvent fourni des preuves dans sa longue et brillante carrière, lui a déjà donné, sous le même titre, une relation des mêmes faits. L'ouvrage de M. Hippolyte Larrey a pour but de rectifier et de compléter ce que, faute de temps, l'ouvrage de son illustre père contenait de moins exact et de moins complet.

» Ainsi, il fait connaître que le nombre total des blessés, reçus à l'hôpital militaire du Gros-Caillou, a été de 266, et que le nombre total des morts a été de 20, c'est-à-dire d'un treizième des malades admis. Ce succès, moins grand que

celui qui avait d'abord été annoncé, est encore assez beau pour qu'on puisse l'avouer et même le proclamer avec orgueil.

» Après avoir fait connaître ces nombres, M. Hippolyte Larrey entre dans les détails des faits les plus remarquables qui ont été observés à l'hôpital militaire du Gros-Caillou. Je regrette de ne pouvoir suivre l'auteur dans ces détails, qui ne sauraient manquer d'intéresser vivement les chirurgiens, mais qui sont trop étrangers aux habitudes de l'Académie, pour que j'aie cru pouvoir les lui exposer.

» Je ne saurais terminer cette courte indication du sujet de l'ouvrage qu'elle m'a envoyé, sans appeler l'attention de l'Académie sur le zèle, le dévouement, le bon esprit et les connaissances de M. Hippolyte Larrey.

» J'ai l'honneur de proposer à l'Académie de remercier M. Larrey, et de déposer honorablement l'ouvrage de ce jeune savant dans la bibliothèque de l'Institut.

» 25 avril 1831.

» DUPUYTREN. »

RELATION CHIRURGICALE

DES

ÉVÉNEMENS DE JUILLET 1830,

OBSERVÉS A L'HOPITAL MILITAIRE DU GROS-CAILLOU.

Pateant certantibus campi; jām corpora procumbunt
humi truncata; membrā latē dispersa sternuntur; manat
indiquè crux; salus una restat moribundis; vocant ho-
minis amicum. Ecce chirurgus.

Theses in Parisinis chirurgiae scholis, anno 1763.

Considérations préliminaires.

DEPUIS les événemens à jamais mémorables de la grande semaine, de nombreuses relations historiques ont été publiées, la plupart pour célébrer la gloire des braves Parisiens, quelques unes seulement pour exposer la conduite de l'ex-garde royale, et la justifier dans ses principes, sinon dans ses conséquences. Mais ce n'est pas uniquement sous le point de vue politique qu'a dû être envisagée la révolution de 1830. Tous les Français blessés, ou morts des suites de leurs

blessures, ont acquis leur part à l'intérêt général. En recevant de la chirurgie civile et de la chirurgie militaire les soins d'un égal empressement, ils étaient destinés encore à renouveler les souvenirs et les regrets, alors que les différens chefs d'hôpitaux se sont occupés de faire connaître, par voie de publicité, les résultats de la bataille de Paris. Cette tâche déjà remplie par MM. Dupuytren, Roux et quelques autres chirurgiens civils, l'avait été aussi par M. Larrey, dans un rapport qu'il lut à l'Académie des sciences et à celle de médecine. Mais comme à cette époque il n'avait pu présenter qu'un aperçu général, c'est pour reprendre et terminer le travail de mon père que je me suis engagé à publier cette relation.

Je m'abstiendrai de toute considération historique étrangère au sujet chirurgical que j'ai en vue de traiter.

Pour les faits généraux, tels que le mouvement des blessés, le nombre total et les nombres partiels des grades, des régimens, des professions et des diverses blessures, j'ai consulté les registres de l'hôpital, et plusieurs relevés qui ont été rédigés, notamment par M. Bastard de Lestang, officier supérieur d'état-major.

Pour les détails particuliers, j'ai noté avec exactitude l'état de nos blessés à l'instant de

leur entrée à l'hôpital; j'ai recherché avec soin ce qui leur était survenu depuis leurs blessures, en m'aidant de renseignemens fournis par eux-mêmes ou par leurs conducteurs, ou par les chirurgiens de leurs régimens, et les chirurgiens d'ambulances.

Ensuite j'ai tenu compte jour par jour des différentes circonstances des plaies graves, des opérations qu'elles ont nécessitées et de leur terminaison. Pour tous les cas d'incertitude, j'ai eu recours à l'obligeance de mes collègues, que je ne saurais trop remercier des documens utiles et des conseils qu'ils m'ont donnés.

Des différens points assez connus du champ de bataille, ceux qui ont fourni à l'hôpital du Gros-Caillou le plus de blessés sont les environs du Palais-Royal, une partie des boulevarts et des quais, le Louvre, la caserne de Babylone et le quartier des Invalides. Il n'est arrivé que quelques blessés de la place de Grève et des autres lieux éloignés.

Beaucoup de militaires que l'on avait adressés à l'hôpital du Gros-Caillou, et principalement la plupart de ceux qui nous étaient envoyés par nos confrères de l'ambulance du Carrousel, furent conduits soit à l'hôpital Beaujon, soit à la Charité, dont la distance était beaucoup moindre pour leurs conducteurs.

M. Larrey a fait observer que le nombre 500, indiqué dans son rapport d'après les relevés de l'administration, comprenait à la fois les blessés accessoires et les blessés de juillet qui sont restés à l'hôpital jusqu'à l'issue de leur guérison.

Le tableau suivant, dont le travail a été fait par M. de Bastard avec la plus grande exactitude, indique les nombres effectifs, généraux et partiels des militaires et des citoyens blessés pendant les journées des 27, 28 et 29 juillet, et entrés à l'hôpital du Gros-Caillou, soit primitivement, soit conséutivement, pour y rester jusqu'à la terminaison de leurs blessures. C'était aussi pour attendre cette époque définitive, que j'ai différé jusqu'à ce jour la publication de mon Mémoire.

(*Mars 1831.*)

TABLEAU DES BLESSÉS DE JUILLET 1850, À L'HÔPITAL DU GROS-CAILLOU.

EX-GARDE ROYALE.		LIGNE,		GARDE NATIONALE.		Total des Officiers et Adjudans-Sous-Officiers.					
Cavalerie.		Infanterie.									
1 ^{er} .		1 ^{er} .									
2 ^e		2 ^e									
3 ^e		3 ^e									
5 ^e		5 ^e									
6 ^e		6 ^e									
7 ^e (Suisse).		7 ^e (Suisse).									
2 ^e Grenadiers.		2 ^e Grenadiers.									
1 ^{er} Chirassiers.		1 ^{er} Chirassiers.									
Dragons.		Dragons.									
Chasseurs.		Chasseurs.									
Lanciers.		Lanciers.									
Artillerie.		Artillerie.									
LIGNE.		50 ^e									
GARDE NATIONALE.		15 ^e lég.									
TOTAUX.		14		1		5					
14		1		5		3					
3		2		2		2					
TOTAUX.		11		11		11					
4		4		4		4					
23		23		23		23					
5		5		5		5					
34		34		19		19					
19		134		134		15					
15		266									
Blessés des trois jours entrés primitivement ou consécutivement à l'hôpital.				266, dont							
				12 évacués des hôpital. civils. 3 évacués des maisons de médecins.							

On voit, d'après ce tableau, que les régimens qui ont le plus souffert sont le 1^{er}, le 3^e, le 6^e des grenadiers et surtout le 7^e des Suisses. Ce sont peut-être en même temps ceux qui nous ont présenté les blessures les plus dangereuses.

Passant à l'énumération des armes employées par les citoyens, je les rappellerai d'après les lésions qu'elles ont produites.

Les boulets de canon ne nous ont pas offert d'exemple de leurs effets meurtriers.

La mitraille n'a pas dû non plus faire beaucoup de ravages parmi les troupes, bien que nous ayons extrait de plusieurs plaies quelques morceaux informes de fer et de plomb, des graviers, des parcelles de bois, etc.

Les balles de plomb de calibre et les plus petites appelées chevrotines sont, de tous les projectiles, ceux qui ont produit le plus grand nombre des blessures parmi les militaires.

Mais il n'est pas vrai que, de part ou d'autre, il y ait eu, comme on l'a dit, des balles mâchées. On aura sans doute regardé comme telles des balles déformées, aplatis par des contre-coups ou des chocs sur des corps durs. Car, sans rappeler qu'il faudrait une force de mastication bien grande, pour denteler en quelque sorte des balles de plomb, il ne serait pas encore juste

d'admettre qu'ainsi façonnées elles pussent causer plus de mal qu'étant arrondies. Il n'est pas vrai non plus que l'on ait employé à cet effet des instrumens compresseurs. Et puis d'ailleurs comment des balles irrégulières auraient-elles pu se trouver ensuite de calibre ?

La supposition des balles empoisonnées est aussi tout-à-fait dénuée de fondement.

Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de balles de plomb d'un calibre trop fort pour les fusils de chasse, ont été réduites en lingots proportionnés. On m'a garanti la certitude de ce fait, que je n'ai pas eu l'occasion d'observer moi-même.

Quant aux balles de cuivre dont on a aussi parlé (parce que l'on supposait peut-être qu'elles devaient faire plus de mal que les balles de plomb), c'est encore un fait aussi illusoire que celui des balles mâchées. Il aurait fallu plus de peine et plus d'argent pour couler quelques douzaines de ces balles de cuivre que des centaines en plomb, et les Parisiens n'avaient pas de temps à perdre pour fabriquer des projectiles.

Mais se serait-on attendu que l'un des jouets de l'enfance aurait servi de défense à des citoyens armés pour leur indépendance ? Les billes des écoliers ont été employées à Paris comme au Caire, en guise de balles de plomb ; et leurs

effets ont même été tels , d'après la remarque de M. Larrey , qu'elles ont déterminé des lésions proportionnellement plus graves que les balles ordinaires.

Nous avons observé un assez grand nombre de plaies produites par des grains de plomb.

Les projectiles lancés par la poudre à canon ne sont pas les seuls dont se soient servis les citoyens : d'autres constituaient , pour ainsi dire , des armes domiciliaires : je veux désigner ici les meubles , les bûches , les tuiles , et surtout les pavés , dont les effets auraient été désastreux , si tous avaient porté coup : aussi les militaires redoutaient-ils beaucoup cette guerre par les fenêtres. Nous n'en avons reçu cependant que quelques-uns grièvement blessés par ces projectiles massifs.

Quant aux plaies par armes blanches , elles ont été moins communes et moins funestes que les plaies par armes à feu. Nous n'avons même pansé que des plaies simples par la baïonnette , le sabre et l'épée ; mais je rapporterai l'observation assez curieuse d'une plaie intestinale produite par la baguette en fer ou sonde des commis aux barrières.

Telles sont les différentes armes dont nous avons constaté les effets chez les militaires reçus à l'hôpital du Gros-Caillou.

J'ajouteraï seulement que la plupart des coups de feu avaient été tirés en général à très-petite distance, ou même à bout portant; d'où il est résulté, d'après la remarque de M. Larrey, des blessures plus dangereuses qu'à l'armée, où l'on ne combat corps à corps qu'avec l'arme blanche.

Tant de moyens d'attaque et de défense, les avantages du nombre et du terrain, la tactique toute militaire des phalanges parisiennes dirigées par l'intrépidité de la jeunesse française et par la vieille expérience de quelques anciens soldats du grand capitaine; enfin la cause elle-même de sa liberté, imprimant le mouvement à la nation entière, et réunissant à elle des forces sans cesse renaissantes, tout devait en assurer le triomphe.

La situation éloignée de l'hôpital du Gros-Caillou, les difficultés de transport, et dans quelques cas le danger des blessures ont dû nécessiter pour beaucoup de militaires les secours de la chirurgie civile. Aussi en a-t-on recueilli un assez grand nombre dans les divers hôpitaux. Partout ils ont été traités avec le dévouement et les soins que réclamait leur état, et que savent toujours inspirer les sentimens de l'humanité et le caractère français. A l'Hôtel-Dieu, par exemple, non-seulement on a dû faire abnégation entière de toute opinion politique, en donnant asile aux

militaires blessés, mais encore on est parvenu à les réconcilier eux-mêmes avec leurs adversaires, devenus leurs compagnons de douleurs. Ainsi, au lieu de les placer dans des salles distinctes, où, désunis encore, ils auraient pu conserver du ressentiment au delà même de l'hôpital, on a eu le bon esprit de rapprocher les soldats de l'ex-roi et les soldats de la nation. Environnés des mêmes soins, tous ont compris leur nouvelle position: les vaincus ne se sont pas irrités de la gloire des vainqueurs, mais ils n'ont éprouvé aussi aucune insulte à leur défaite; tous enfin se sont retrouvés français après trois jours d'oubli.

Quelques ambulances stationnaires ont de même secouru tous les blessés, sans distinction de parti, pendant que des ambulances mobiles servies par le zèle actif et ingénieux des citoyens parcouraient les lieux du combat pour en délivrer les victimes, et représentaient dans nos murs les ambulances volantes imaginées autrefois par le chirurgien en chef de la grande armée.

Combien de maisons n'ont-elles pas aussi été ouvertes aux militaires hors d'état de chercher ailleurs un asile? Combien de médecins dévoués ne leur ont-ils pas prodigué tous les soins? Je regrette de n'avoir pu connaître le nom de l'un d'eux, qui a reçu chez lui un soldat du 1^{er} régiment atteint d'une blessure profonde à la cuisse,

est parvenu à le guérir complètement, après deux mois de soins habiles et non interrompus, lui a donné un habillement complet, et 100 fr. pour se nourrir et se loger, en attendant que cet homme pût reprendre du service ou trouver un emploi. Un si beau trait n'a pas besoin d'éloges (1).

Du 10 au 13 août, le ministre de la guerre ordonna que les militaires blessés qui se trouvaient dans les hôpitaux civils fussent transférés à ceux du Gros-Caillou et du Val-de-Grâce.

Tous ces hôpitaux ont enfin cessé de renfermer dans leur enceinte les victimes de juillet, pour redevenir l'asile des souffrances ordinaires.

Je me confie maintenant à l'indulgence des lecteurs de cette relation ; j'ai fait mes efforts pour l'écrire avec méthode et surtout avec vérité, à défaut d'érudition et de talent. Le seul mérite réel est dû à l'intérêt chirurgical des blessures, et à l'heureuse terminaison du plus grand nombre.

Le tableau descriptif que j'ai adopté est celui de tous les ouvrages classiques ; ainsi je rapporterai les détails des observations dans l'ordre

(1) J'ai su depuis que cet estimable médecin philantropie est M. Piojet, demeurant rue de Sèvres, n° 133.

suivant : plaies de la tête et du cou , plaies de la poitrine , plaies de l'abdomen et plaies des membres. A la plupart de ces observations je joindrai les moyens thérapeutiques les plus spécialement adoptés par M. Larrey , et je rendrai compte des différentes amputations. J'essaierai enfin d'exposer les diverses influences qui ont pu favoriser les heureux résultats obtenus , à l'hôpital du Gros-Caillou , chez la plupart des blessés de juillet.

PLAIES D'ARMES A FEU.

Peut-être serait-il à propos , avant d'entrer en matière , de présenter quelques considérations générales sur les plaies d'armes à feu ; mais ce serait répéter ce que nos maîtres ont dit. Les nombreux et utiles écrits publiés jusqu'à nos jours sur ce sujet important (1) , ceux qui devront encore leur célébrité aux combats de Pa-

(1) On peut citer notamment : Bell , Bilguer , Bordenave , Boucher , Boyer , Cannac , Chevalier , S. Cooper , Delamartinière , Delpech , Dessault , Duchesne , Dufouart , Faure , Gama , Græfe , Guthrie , Hennen , J. Hunter , Hutchinson , Larrey , Ledran , Levacher , Lombard , A. Paré , Percy , Ranby , Ravaton , Richerand , Richter , Roux , Schmucker , Thompson .

ris, et surtout les savantes leçons de M. le professeur Dupuytren (1), fournissent aujourd'hui assez de documens positifs pour fixer les bases d'une connaissance approfondie sur les plaies d'armes à feu.

Je me contenterai d'exposer la méthode générale de traitement employée par M. Larrey dans ces grandes circonstances, et telle que sa longue expérience des champs de bataille lui en a démontré les avantages.

Il s'attache essentiellement à débrider presque toutes les plaies par armes à feu, et spécialement celles qui constituent les cas suivans :

1^o Plaies superficielles avec ecchymose ;

2^o Plaies superficielles avec déchirure des tegumens ;

3^o Plaies profondes sans complication primitive, mais qui peuvent faire craindre des accidens nerveux ou inflammatoires ;

4^o Lésion des nerfs, telle que leur déchirure ou même leurs simples contusions, mais qui, après s'être bornées aux parties lésées, sont susceptibles de déterminer par extension des accidens funestes, tels que le tétranos ;

(1) MM. Marx et Paillard doivent les publier incessamment.

5° Arrachement des tendons et des parties charnues, suivi d'engorgement inflammatoire, d'étranglement plus ou moins profond, de symptômes nerveux, d'épanchemens purulens et d'infiltration sanguine, quelquefois même de sphacèle;

6° Hémorrhagies primitives ou consécutives;

7° Plaies compliquées de fractures;

8° Corps étrangers, soit projectiles, esquilles ou autres. Dans beaucoup de cas de ce genre, un simple débridement semble même à M. Larrey bien plus exempt d'inconvénients que des tentatives prolongées d'extraction, surtout au moyen d'instrumens tels que les tire-fonds, les tire-balles, dont l'emploi doit être fort restreint.

Les débridemens jugés utiles étant pratiqués, les bords des plaies ont été rapprochés et maintenus par des pansemens simples. Ceux-ci ont été légèrement toniques et compressifs, afin, d'une part, de rétablir le jeu de la circulation autour de la plaie, de faciliter la chute des escarres, et de dissiper les symptômes généraux de commotion; et, d'une autre part, afin de mettre obstacle à un gonflement consécutif trop considérable et de prévenir l'éréthisme local. Les moyens employés à ce double effet ont été simplement de l'onguent styrax étendu sur du linge fenêtré, de la charpie, des compresses

imbibées de vinaigre camphré froid, et une bande méthodiquement serrée.

Ce mode de pansement a généralement si bien réussi, que très-peu d'accidens inflammatoires ont nécessité l'emploi des antiphlogistiques. Dans beaucoup de cas cependant, on a eu recours à la saignée générale, mais plutôt par prudence que par indication absolue. Il est même des circonstances qui la contre-indiquent entièrement, selon M. Larrey ; c'est, par exemple, lorsqu'il y a stupeur à la suite d'une commotion violente, ou syncope après une hémorrhagie, parce qu'alors la saignée augmente le collapsus, et soustrait souvent le peu de forces vitales nécessaires pour rétablir l'équilibre des fonctions.

Quant aux saignées locales, il n'est presque aucun cas dans lequel ce praticien ait recours aux sanguines. Il a observé qu'elles favorisent le plus ordinairement la congestion sanguine, au lieu de la diminuer ; nécessitent la levée de l'appareil, qui doit être presque toujours inamovible, et ne fournissent suffisamment de sang que lorsqu'elles sont assez multipliées, auquel cas l'écoulement est fort long et s'oppose par conséquent au pansement des plaies, aux opérations nécessaires, au repos des blessés. Il a reconnu aussi que les piqûres de sanguines sont quelquefois tellement profondes, qu'elles en-

tament des artéries ou des veines, dont l'hémorragie devient difficile à arrêter, forment souvent autant de petits foyers purulens, de points d'ulcération; et qu'en coupant des filets nerveux, elles peuvent occasioner des accidens attribués plutôt à d'autres causes. Tels sont les principaux inconvénients que l'on peut avec raison reprocher à l'emploi des sanguines.

Pour y suppléer avec avantage, M. Larrey a, depuis fort long-temps, adopté une méthode toute spéciale de soustraire du sang en telle quantité qu'il soit nécessaire, très-vite, et presque à toutes les parties du corps. Cette méthode, dite révulsive, s'opère à l'aide des ventouses scarifiées. On se sert, à cet effet, d'une cucurbite de verre, dans laquelle on brûle un peu d'étoupe, et que l'on applique aussitôt sur le point où l'on veut attirer du sang et produire la révulsion. L'air se raréfie sous la ventouse par la combustion de l'étoupe; les vaisseaux capillaires deviennent le siège d'une congestion locale très-manifeste; on enlève la ventouse, et à l'aide d'un rasoir, on scarifie légèrement toute la surface des vaisseaux engorgés, en effleurant à peine le derme, et, autant que possible, dans une direction parallèle aux filets nerveux de la peau. Il se forme autant de petites traces de sang; on applique de nouveau la ventouse, et l'air, en

se raréfiant encore, détermine en quelques minutes l'afflux sanguin, et la saignée révulsive se trouve opérée. Elle est proportionnée à la grandeur de la ventouse; elle peut être multiple, et dans tous les cas elle offre un moyen bien simple de faire des saignées locales. C'est même la simplicité de cette méthode qui la rend préférable aux ventouses à pompe, trop pesantes et difficiles à se procurer en toute occasion. C'est aussi à cause de plusieurs des inconvénients qu'il attribue aux sangsues, que le même praticien rejette l'emploi du scarificateur allemand, dont les incisions sont trop courtes, trop profondes et difficiles à diriger.

Je m'excuserai maintenant de cette digression sur les saignées locales, en faisant observer que cette méthode, devant se reproduire presque à chaque observation, me semblait réclamer une explication préliminaire.

Quant à la levée de l'appareil, elle a été faite le plus tard possible; et c'est encore là une des spécialités de la pratique de M. Larrey. Ainsi, pour les plaies simples, le premier pansement n'a été renouvelé que du quatrième au huitième jour. Pour les plaies compliquées sans fractures, il l'a été un peu plus tôt. Il ne l'a été que fort tard, au contraire, pour les plaies compliquées de fractures. C'est principalement dans ces cas,

et bien plus encore lorsqu'il y a fracture sans complication, que la méthode des appareils permanens ou inamovibles est employée avec avantage. Elle demanderait quelques détails, si elle n'était généralement connue. Il me suffira de dire qu'alors on ne lève le premier appareil que du quarantième au soixantième jour, selon la gravité de la fracture, d'autant plus tard qu'il lui faut plus de temps pour se consolider.

Cette méthode a pour principaux avantages,

1^o D'éviter la fréquence du contact de l'air sur les plaies;

2^o Dedenminuerbeaucoup l'abondance de la suppuration, dont les effets sont si souvent funestes;

3^o De maintenir la coaptation;

4^o De faciliter et de multiplier les soins auprès des autres blessés, si le nombre en devient trop considérable, comme le cas s'en est présenté pendant les journées de juillet, et comme il arrive toujours à l'armée;

5^o De permettre aux blessés le transport d'un lieu à un autre, même fort éloigné, sans nécessiter aucun pansement pendant l'intervalle. Et des faits nombreux pourraient démontrer cet avantage, que ne sauraient infirmer des théories fondées sur la résorption du pus ou sur d'autres accidens quelquefois exagérés.

Je dirai même par anticipation, d'après mon

père, et d'après ce que nous avons tous vérifié à l'hôpital du Gros-Caillou, que les pansemens rares doivent être regardés comme exerçant une grande influence sur l'heureuse terminaison de la plupart des blessures et des plaies résultant des amputations.

Les différentes complications des plaies devant trouver place dans la série des observations nombreuses que je rapporte, je me réserve d'indiquer à mesure les moyens thérapeutiques employés par le chirurgien en chef. J'ajouterais seulement qu'il s'est conformé au conseil qu'il donne lui-même et qu'il a toujours suivi, quant aux plaies multiples plus ou moins graves, savoir : de panser d'abord les plus simples, afin de mieux disposer les blessés aux opérations que nécessitent les plus compliquées.

Je me hâte de terminer ces considérations préliminaires, pour arriver aux faits.

Plaies de la tête.

Je ne mentionnerai pas quelques observations de plaies déchirées du derme chevelu sans altération notable, ce serait un détail dépourvu d'intérêt. Il suffira d'indiquer que, dans tous les cas de ce genre, la pratique de M. Larrey consiste à raser le pourtour de la plaie, à débrider

ses bords, à les réunir immédiatement à l'aide de bandelettes agglunitatives, à panser ensuite avec un linge fenêtré enduit d'onguent styrax, de la charpie, des compresses trempées dans du vinaigre camphré froid, et le bandage de Galien, à laisser enfin cet appareil en place pendant six ou huit jours, au bout desquels la cicatrisation est commencée. Il importe de ne pas exercer une compression trop forte, parce que c'est souvent à cette cause qu'il faut attribuer les complications des plaies même les plus simples, comme l'érysipèle du derme chevelu, et les accidens nerveux ou inflammatoires de l'encéphale, complications auxquelles la méthode révulsive est applicable. M. Larrey a recours alors à la glace sur la tête, à la saignée de la temporale ou de la jugulaire, aux ventouses scarifiées à la nuque, à l'épigastre, à l'hypocondre droit, aux boissons rafraîchissantes, et dans quelques cas rares à de légers purgatifs.

Parmi les plaies du crâne, deux seulement nous ont offert des symptômes consécutifs assez remarquables pour que je croie devoir en rapporter les observations avec détail.

Première observation. — T***, brigadier aux chasseurs de l'ex-garde, fut atteint, dans la journée du 28, d'un pavé à la tête, et renversé de son cheval par ce choc violent. Le schako

n'avait amorti que légèrement le poids de ce projectile (1), et la tête fut grièvement blessée. Ce militaire n'entra cependant à l'hôpital que le 3 août, après avoir été pansé simplement; mais il fut apporté dans un état presque léthargique, tant la stupeur et la commotion étaient fortes. Peu à peu cet état fut dissipé, et l'on n'eut plus à s'occuper que de la plaie. Elle présentait environ deux pouces d'étendue, ses bords étaient frangés, le derme chevelu avait été déchiré sur le sinciput, au niveau de la suture sagittale.

Le crâne ainsi dénudé ne paraissait pas néanmoins fracturé, et la plaie, qui n'offrait plus aucune complication, semblait devoir se cicatriser sans beaucoup d'effort; le blessé était même presque à la veille de sortir de l'hôpital quand il se trouva réveillé, dans la nuit du sixième jour, par une hémorragie subite et abondante. J'étais de garde, et, averti aussitôt, je fus très-étonné qu'une hémorragie extérieure pût avoir lieu si tardivement, puisque la cicatrice était déjà commencée, et que d'ailleurs on n'avait reconnu aucune lésion au crâne. Ayant aussitôt enlevé l'appareil inondé de sang, pour en dé-

(1) Un pavé pèse assez ordinairement de quarante à cinquante livres.

couvrir la source, je vis que l'hémorragie avait lieu à la fois par suintement et par un double jet, à l'un des angles de la plaie. Une seule ligature fut praticable, c'était à une petite artère épicrânienne, mais elle diminua peu la quantité du sang. Fallait-il fendre avec le bistouri la cicatrice déjà commencée? Je voulus tenter auparavant les effets de la compression, au moyen d'un tampon de charpie, d'une compresse graduée, de deux autres, trempées dans du vinaigre camphré froid, et d'une capeline. L'hémorragie cessa effectivement; mais le lendemain elle se renouvela à la levée de l'appareil.

La plaie fut alors débridée par le chirurgien en chef, qui appliqua une autre ligature à une artériole épicrânienne, et rétablit le même appareil. Le 14 août, l'hémorragie, dont il avait été impossible de déterminer positivement la source, se reproduisit avec des symptômes inquiétans, tels qu'un affaiblissement considérable, un coma profond et un érysipèle du derme chevelu, lequel s'était déjà propagé aux épaules. La plaie fut de nouveau agrandie par une incision cruciale, qui, en mettant à découvert une assez grande étendue du crâne, prouva qu'il n'était point fracturé. Les artères profondes du péri-crâne n'avaient pu se rétracter assez pour cesser de fournir du sang, sans doute à cause des fortes

adhérences qui les retiennent ordinairement sous le derme chevelu. Elles étaient en effet la source de ces hémorragies. Ce fut alors que M. Larrey eut recours à un moyen énergique, il est vrai, mais dont il avait constaté depuis long-temps l'efficacité contre l'érysipèle traumatique, comme d'autres, bien avant lui, l'avaient constaté contre certaines hémorragies; je veux dire le cautère actuel. Il fut apposé à plusieurs reprises dans le fond de la plaie et sur ses bords, ainsi que sur toute la surface de l'érysipèle. Ce moyen, secondé de l'application de la glace sur la tête et d'une saignée révulsive à l'épigastre, parvint effectivement à dissiper l'érysipèle, mais l'hémorrhégie se reproduisit encore une quatrième, une cinquième et même une sixième fois. Les forces du blessé s'épuisaient de plus en plus; cependant une dernière cautérisation avec le fer rouge, l'application continuée de la glace sur la tête, un appareil légèrement compressif, une position élevée et presque immobile, un régime sévère, composé uniquement de boissons rafraîchissantes, réussirent enfin à détruire sans retour ces hémorragies si fréquentes, et dont les effets menaçaient d'être mortels. Le blessé est sorti de l'hôpital dans les premiers jours de septembre, pour reprendre du service dans les chasseurs de la ligne.

Cet exemple est assurément l'un de ceux qui démontrent le mieux la fréquence et le danger des hémorragies consécutives aux plaies de tête, quelle que soit d'ailleurs l'intégrité du crâne; il fait voir en outre l'insuffisance des moyens hémostatiques ordinaires et les heureux effets qu'on peut obtenir du cautère actuel.

Deuxième observation.—P***, artilleur de l'ex-garde, fut renversé, le 29, par un coup de feu qui l'atteignit près de l'oreille droite; on le transporta immédiatement au Gros-Caillou. Cette blessure assez singulière présentait une plaie d'entrée au niveau de l'apophyse mastoïde, et deux plaies de sortie, l'une à travers l'anthélix, et l'autre plus en avant, au niveau de l'arcade zygomatique. C'était probablement, comme l'a imaginé M. Larrey, le résultat de deux chevrotines séparées l'une de l'autre dans leur trajet. L'apophyse mastoïde avait été échancrée à sa base, et la portion écailleuse du temporal fracassée. Les symptômes primitifs indiquaient une commotion violente et la compression du cerveau. Aussi, le chirurgien en chef s'empressa-t-il de débrider les plaies et d'extraire quelques esquilles enfoncées dans le crâne: l'une d'elles figurait presque une petite couronne de trépan, et l'ouverture qu'elle laissa libre donna issue à du sang épanché; ce qui procura au blessé un

soulagement immédiat. La dure-mère ainsi dénudée permettait au doigt de percevoir les pulsations du cerveau. Un séton fut passé d'une plaie à l'autre pour faciliter l'écoulement du pus au dehors; on pansa simplement et on appliqua de la glace sur la tête. Aucun accident immédiat n'eut lieu: les symptômes de compression avaient sensiblement diminué; mais il existait cependant une altération notable des facultés intellectuelles; l'oreille correspondante à la blessure était tout-à-fait sourde, et lors même que l'on parvenait à se faire entendre du blessé, il ne répondait pas ou répondait d'une manière incohérente, et seulement avec un souvenir confus de ce qu'il avait éprouvé. Tous ses membres étaient en même temps engourdis. Quelques saignées révulsives à la nique, entre les épaules et à l'épigastre, une saignée générale, des cataplasmes émolliens, la conservation de la glace sur la tête et des boissons rafraîchissantes avaient beaucoup allégé ces symptômes, lorsqu'au 1^{er} septembre ils reparurent avec une nouvelle intensité, par l'effet d'un accident imprévu.

P*** fit une chute en allant à la selle, et ressentit au même instant une commotion si violente dans l'encéphale qu'il en résulta une véritable apoplexie, suivie bientôt de la mort,

malgré l'emploi des moyens indiqués en pareille occasion.

À l'autopsie cadavérique, faite vingt-quatre heures après, en présence de M. Ribes, nous découvrîmes les lésions suivantes :

Tête. Épanchement de pus sanguinolent dans le sinus longitudinal supérieur; rupture des parois membraneuses du sinus latéral droit; injection des veines cérébrales; épanchement séro-sanguinolent dans les ventricules latéraux, à la surface du cervelet et à l'entrée du canal rachidien. Les symptômes primitifs de compression du cerveau devaient sans doute leur cause à cet épanchement; mais aussi ne s'est-il pas accru au point de devenir mortel, par la chute qu'avait faite le blessé, d'autant que jusqu'alors son état général s'était fort amélioré et que les plaies étaient parvenues à leur cicatrisation?

Poitrine. Pleuro-pneumomie du côté gauche, adhérences, épanchement. Cette altération, qui dénotait un caractère chronique, ne s'était manifestée depuis la blessure que par de la toux et de la dyspnée; mais l'année précédente P*** avait été traité à l'hôpital d'une pneumonie aiguë.

Abdomen. Apparences d'inflammation symptomatiques de l'estomac. Le foie n'a offert aucune trace de suppuration; aussi n'est-ce pas un fait qui pourrait convenir à la théorie des abcès.

du foie, dans les cas de plaies de tête. Il confirme au contraire beaucoup d'autres faits observés par M. Larrey, qui a vu tantôt des plaies de tête sans abcès au foie, tantôt des abcès au foie sans plaies de tête, ou bien des plaies graves à d'autres parties, à d'autres organes, avec ou sans abcès au foie, indistinctement.

Troisième observation. — Je crois à propos de faire connaître aussi un fait très-curieux, bien qu'il n'ait pas été observé à l'hôpital même du Gros-Caillou; mais comme il appartient à l'un de nos collègues, M. Magistel, qui a bien voulu me permettre de le publier, il se rapporte ainsi aux faits de la chirurgie militaire. En voici l'exposé :

M***, ouvrier serrurier, se croyant suivi de ses compagnons, s'élance seul au milieu d'un escadron de grenadiers à cheval, et est frappé aussitôt à la tête de huit ou dix coups de sabre. On le relève immédiatement et on le transporte dans une maison voisine, où il est pansé de ses blessures : plusieurs lambeaux existaient, dont l'un retombait sur l'oreille droite, en comprenant une large portion du pariétal droit, et laissait à nu la dure-mère dans une étendue de deux pouces de longueur sur un de largeur. Un second lambeau supérieur avait sa base en bas et tenait peu aux tégumens. Un troisième, s'étendant en ar-

rière au dessus de l'oreille gauche, avait dénudé la partie correspondante du crâne, et offrait un sillon transversal de deux pouces de long et de deux lignes de profondeur ; la dure-mère n'avait point été lésée ; les pulsations du cerveau étaient très-évidentes, et l'éclat d'os était entièrement détaché de la boîte osseuse. Le blessé s'agaitait beaucoup, et proférait des paroles incohérentes ; son pouls était très-faible ; il but de l'eau à diverses reprises et eut une selle. M. Magistel, qui avait secouru le blessé dès les premiers instans, fit la ligature d'une artère qui fournissait beaucoup de sang par l'un de ses lambeaux. Il détacha de l'autre l'éclat du pariétal, ainsi que quelques esquilles éparses sur la dure-mère et à la face interne des tégumens ; enfin, il réunit par trois points de suture les deux lambeaux supérieurs, et rapprocha les autres à l'aide de bandelettes agglutinatives. Après avoir pansé toutes les plaies le plus méthodiquement possible dans un cas aussi chanceux, il fit transporter le blessé à l'hôpital Beaujon, où MM. Marjolin et Blandin lui donnèrent tous leurs soins. Une encéphalite a cédé en quelques jours à un traitement convenable ; une hémorragie abondante n'a pu être arrêtée que difficilement ; enfin l'on a donné issue à de la matière purulente qui s'était amassée dans un

petit foyer au dessus de la dure-mère. Cet homme, si heureusement sauvé, a commencé à prendre des alimens le 24 août, et est entré à la maison de convalescence de Saint-Cloud dans les premiers jours de septembre.

Ce fait est sans contredit l'un des plus remarquables que l'on ait rencontrés de ce genre (1).

Plaies de la face.

Quand elles sont profondes, étendues, inégales, M. Larrey a soin de les débrider méthodiquement, selon les régions de la face où le bistouri doit agir; il rafraîchit les bords de ces plaies, afin qu'elles soient linéaires et susceptibles d'adhésion, et il emploie essentiellement la suture pour obtenir une réunion exacte. C'est une pratique qu'il a depuis long-temps adoptée, et à laquelle il a reconnu bien plus d'avantages que d'inconvénients. Les tissus de la face étant lâches, extensibles, élastiques, se prêtent sans peine aux tractions des fils, s'enflamment difficilement par cette seule cause mécanique, et présentent en dernier résultat la cicatrice régulière, et même peu apparente d'une plaie

(1) Le blessé a été présenté à l'Académie de Médecine, où il a été l'objet d'observations physiologiques intéressantes.

souvent large, profonde et difforme. D'après le précepte de Dessault, M. Larrey conseille la suture enchevillée et entortillée pour les plaies par arme à feu, afin d'agir graduellement sur toute l'épaisseur des bords de ces solutions de continuité et d'en prévenir la déchirure.

Je rapporte deux cas intéressans auxquels cette méthode a été heureusement applicable, mais auparavant je vais citer trois observations de plaies du globe oculaire, et puis une autre de la joue sans complication.

Plaies des yeux.

Première observation. — M. D***, capitaine au 50^e régiment de ligne, a perdu la vue du côté droit par un grain de plomb qui avait perforé la cornée transparente, l'iris et la membrane hyaloïde, sans déterminer l'évacuation des humeurs et sans faire perdre à l'œil sa forme naturelle.

C'est un fait qui a fixé l'attention de M. Larrey. Il est survenu du côté de l'encéphale quelques accidens nerveux et inflammatoires qui ont été dissipés par une saignée générale, des ventouses scarifiées à la nuque et au cou, une saignée à la temporale, des bains de pieds et la diète.

Deuxième observation. — M. J***, sous-lieutenant au 7^e régiment, a eu l'œil gauche entièrement désorganisé par un coup de feu, sans que les paupières aient été endommagées ; aussi, l'occlusion de l'orbite a-t-elle lieu sans difformité. L'état consécutif de cette blessure a offert des symptômes inquiétans, par la persistance d'un érysipèle qui s'est emparé successivement du côté gauche, du côté droit de la face, et du cou. Cet érysipèle commençait même déjà à prendre un caractère phlegmoneux ; la douleur devenait de plus en plus vive ; la fièvre traumatique était continue, avec exacerbation, sous l'influence des moindres agens extérieurs, et l'anxiété générale était extrême. Le chirurgien en chef ne parvint à sauver le blessé de cet état presque désespéré, qu'en appliquant plusieurs fois le cautère actuel sur toute la surface érysipélateuse, et seconde par les antiphlogistiques l'efficacité de cette médication énergique.

Troisième observation. — P***, soldat au 6^e régiment, nous a offert un exemple de fracture de la paroi externe de l'orbite du côté gauche, avec entière destruction du globe oculaire. Cette blessure, résultant d'une balle, n'a déterminé d'ailleurs aucun accident consécutif dont il importe de faire mention. Dans ce cas également les paupières n'ont point été en-

tamées ; le petit angle , qui avait été déchiré , s'est cicatrisé régulièrement.

Plaie de la joue.

H*** , ouvrier , qui , lors de son entrée à l'hôpital , s'était dit soldat au 3^e régiment , avait été atteint d'une balle par contre-coup au côté droit de la face. Le projectile , en pénétrant dans la bouche , au dessus du muscle orbiculaire des lèvres , avait fracturé plusieurs dents , déchiré le muscle masséter , et s'était arrêté dans l'épaisseur de la joue , au niveau de l'angle de l'os maxillaire inférieur , sans intéresser la glande parotide. L'extraction en fut faite immédiatement ; mais il était resté de cette blessure une douleur vive dans les mouvements de la mâchoire , qui fut paralysée en partie , et une boursouflure considérable de la joue. La première de ces affections a été guérie par l'application de deux moxas derrière la mâchoire , et des cataplasmes émolliens ont fait disparaître la tuméfaction de la joue. La bouche est cependant restée dans une légère abduction à droite.

Ce fait nous a offert l'un des exemples de contre-coups de projectiles lancés par la poudre à canon. Celui-ci , par son choc direct , avait traversé l'épaisseur de la cuisse , et , par un choc en

retour sur une pierre , avait conservé une force d'impulsion assez grande pour blesser le même homme à la face.

Fracture des os maxillaires.

De toutes les plaies de la face , les plus dangereuses peut-être sont les fractures comminutives et compliquées des mâchoires par armes à feu. Débrider les angles des plaies ; extraire les esquilles mobiles , et , autant que possible , tous les corps étrangers ; exciser les bords irréguliers des plaies ou les lambeaux désorganisés ; lier les artères qui fournissent du sang ; rapprocher exactement les lèvres de ces plaies , et les maintenir en contact , à l'aide de points de suture plus ou moins multipliés ; appliquer un appareil contentif et inamovible pendant la première période de huit , dix ou douze jours : tel est l'ensemble des moyens adoptés par M. Larrey dans les fractures compliquées des mâchoires. Il a reconnu que la consolidation des fragmens , d'autant plus facile et plus prompte qu'elle a lieu chez de plus jeunes sujets , ne s'opère point par le développement d'une substance intermédiaire de nouvelle formation , mais par le rapprochement de ces fragmens et l'abouchement de leurs

vaisseaux nourriciers ; et la meilleure preuve de cette assertion c'est qu'il existe dans la mâchoire une réduction proportionnée à la déperdition de substance osseuse : si cette déperdition de substance est trop étendue, il reste un vide plus ou moins considérable.

Les observations qui suivent présentent quelques applications à ces généralités.

Première observation. — M. M***, âgé de cinquante-six ans, capitaine au 7^e régiment des Suisses, commandait, le 20 au soir, près du Louvre, lorsqu'il fut frappé, à dix pas de distance, d'un gros projectile de fer qui lui fracassa la mâchoire inférieure du côté droit. Transporté aussitôt à l'hôpital, il réclama les soins de M. Larrey. L'aspect de cette blessure était hideux ; la figure couverte de sang, la bouche béante et fortement rétractée en bas faisaient reconnaître, même à distance, toute l'étendue de la plaie. L'épaisseur de la joue était dilacérée, plusieurs branches des paires cervicales ainsi que la veine jugulaire externe avaient été coupées, et le corps de l'os maxillaire inférieur était fracturé en éclats dans presque toute son étendue. Cependant, malgré la violence de la commotion et la gravité de sa blessure, M. M***, aguerri déjà par vingt autres qu'il avait reçues dans les cam-

pagnés mémorables de l'empereur (1), semblait moins effrayé que nous tous. Le chirurgien en chef commença par raviver les bords de la plaie, et extraire toutes les esquilles mobiles, dont l'une avait plus de deux pouces de longueur; ensuite il fit la ligature de l'un des rameaux de l'artère faciale, rapprocha exactement les lambeaux, et les maintint en contact au moyen d'un grand nombre de points de suture entrecoupée, et d'un bandage unissant. Un traitement général approprié a prévenu tout accident primitif, et la cicatrisation a commencé le 15 août; mais elle a été ralentie par divers accidens consécutifs qui ont nécessité de nouveaux soins. Ainsi il a fallu extraire des esquilles secondaires, ouvrir des abcès, renouveler plusieurs points de suture, arracher quelques dents cassées, formant autant de points d'irritation, et recourir enfin au cautère actuel pour détruire un érysipèle traumatique assez étendu. La suppuration a été fort abondante et a persisté long-temps. Cependant, à force de soins, la cicatrisation s'est terminée dans le courant du mois d'octobre sans entraî-

(1) On voyait même à la joue du côté opposé la cicatrice d'un coup de feu.

ner de difformité, puisque de cette plaie large, profonde, déchirée, il est résulté une réunion exacte et linéaire. La mâchoire inférieure a éprouvé une réduction proportionnée à la déperdition de substance osseuse, mais ne gênant aucune des fonctions de la bouche. M. M*** a depuis long-temps quitté l'hôpital pour retourner en Suisse.

Deuxième observation. — M***, âgé de cinquante et quelques années, sapeur au 3^e régiment de l'ex-garde, fut frappé, le 29, au matin, d'une balle qui lui fracassa les mâchoires. A son arrivée à l'hôpital, on s'empessa de lui donner les soins que réclamait la vue seule de sa blessure. Le projectile avait perforé le côté droit de la lèvre supérieure, de telle sorte qu'il y avait une perte de substance proportionnée à la balle, de quatorze lignes de diamètre environ; ainsi se trouvait à découvert une partie de l'arcade dentaire supérieure; le bord libre de la lèvre n'avait pas été divisé, mais la moitié postérieure de l'os maxillaire supérieur avait été fracassée, ainsi que l'angle correspondant de l'os maxillaire inférieur du côté droit; plusieurs dents avaient été emportées et quelques branches des artères maxillaires interne et externe coupées, ainsi que les rameaux antérieurs des premiers nerfs cervicaux. La balle s'était arrêtée

et enclavée sur l'apophyse mastoïde. Cette horrible blessure, l'état de stupeur et tous les signes d'une violente commotion faisaient à peine compter sur les ressources de l'art. Cependant le chirurgien en chef chargea aussitôt un aide de raser la barbe épaisse et imbibée de sang, puis il procéda lui-même au pansement long et délicat de cette plaie compliquée. Au lieu de compléter la division de la lèvre et d'en exciser les bords, dans le but de produire une réunion linéaire, mais qui aurait réduit beaucoup, par la suite, l'ouverture de la bouche et gêné ses fonctions, M. Larrey, conformément à son expérience, excisa légèrement les inégalités attrites de cette plaie, en rapprocha les bords circulairement et les maintint en contact au moyen de la suture entrecoupée et à points par dessus. Il s'occupa ensuite de l'extraction de la balle et des esquilles : il fit, à cet effet, une incision, comprenant l'épaisseur du muscle sterno - mastoïdien, tout près de son attache supérieure, et saisit sans difficulté le projectile, déprimé dans son point de contact avec l'apophyse mastoïde. Plusieurs fragmens des os maxillaires furent enlevés en même temps ; l'un d'eux, appartenant à la branche de la mâchoire inférieure, avait deux pouces et demi d'étendue. Il est inutile de dire que cette extraction fut faite avec tout le ména-

gement qu'exigeait la perforation de la lèvre. Il suffit de deux ligatures pour arrêter l'hémorragie et en prévenir le retour, et un appareil contentif pour seconder les effets de la stuture, et favoriser ainsi la cicatrisation des parties molles et la consolidation des fragmens osseux. La première levée de cette appareil n'a été faite qu'au septième jour, et renouvelée ensuite aussi rarement que possible. C'est d'ailleurs, comme je le rappellerai encore, à cette méthode des pansemens rares que M. Larrey attribue une grande part de ses succès. L'état du blessé dont je viens de rendre compte a été toujours satisfaisant; aucun accident primitif ou consécutif à la commotion ne s'est déclaré, il ne fut même pas nécessaire de recourir au traitement révulsif ou antiphlogistique; seulement quelques esquilles secondaires sont devenues mobiles et ont été extraites, et aucune autre gène ne s'est manifestée, si ce n'est la salivation abondante, qui, dans toutes les blessures de ce genre, vient se mêler à la suppuration (1).

(1) Mon père a présenté à l'Académie ce sujet parfaitement guéri, ainsi que quelques autres qui méritaient de fixer l'attention.

Plaies du cou,

Nous avons eu à traiter un très-petit nombre de plaies du cou, encore étaient-elles superficielles. La seule qui soit digne d'intérêt est celle-ci :

M***, soldat au 7^e régiment, avait été atteint au cou d'une balle lancée de très-près d'arrière en avant. Dans son trajet, le projectile traversa l'épaisseur des muscles extenseurs de la tête, échancra les apophyses transverses gauches des deuxième et troisième vertèbres cervicales sans atteindre l'artère vertébrale, et ressortit entre le muscle sterno-mastoïdien, les nerfs et vaisseaux cervicaux du même côté. Les accidens consécutifs furent une névrose et une paralysie du bras gauche, qui auraient pu faire craindre le tétonos, si l'application du moxa n'en avait prévenu le développement, et n'avait été secondée dans ses puissans effets révulsifs par quelques ventouses scarifiées entre les épaules. La guérison a été assez prompte.

Les nerfs cervicaux sont si multipliés qu'il serait presque impossible que quelques-unes de leurs ramifications n'aient pas été lésées par la balle. Il serait presque aussi inconcevable qu'il

n'y ait pas eu d'hémorragie, si on ne savait combien les vaisseaux du cou sont mobiles et cèdent à certaines pressions; car les plaies d'armes blanches, comme les plaies d'armes à feu, le démontrent, notamment dans les tentatives de suicide.

Plaies de poitrine.

D'après le recensement des cadavres apportés à la Morgue ou dans d'autres lieux, et, d'après les tableaux de mortalité des divers hôpitaux, surtout à l'Hôtel-Dieu, on a constaté que les plaies les plus communes et en même temps les plus funestes, avaient été les plaies de poitrine. Nous avons observé le même résultat à l'hôpital du Gros-Caillou; cependant d'une quinzaine de plaies pénétrantes, dont huit ont été suivies d'accidens fâcheux, une seule a été mortelle; encore était-elle compliquée d'une autre blessure qui avait nécessité l'amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale: il en sera fait mention plus loin. Je ne crois pas devoir parler de deux autres hommes morts de plaies pénétrantes de la poitrine, l'un avant son entrée même à l'hôpital, et l'autre quelques instans après, parce que les secours de la chirurgie n'avaient pas été praticables.

Abstraction faite des indications particulières

pour chacune de ces plaies pénétrantes, toutes ont été soumises à la méthode générale de traitement usitée depuis long-temps par M. Larrey, savoir :

1°. Débridemens proportionnés à l'étendue et à la profondeur des blessures, pour les rendre linéaires et plus susceptibles de cicatrisation, produire un dégorgement local, prévenir les accidens nerveux et inflammatoires et les infiltrations de sang, faciliter enfin la recherche et l'extraction des corps étrangers.

2°. Réunion immédiate et entière des plaies, pour les préserver du contact prolongé de l'air, empêcher ainsi l'emphysème, et autant que possible l'épanchement de pus dans la cavité thoracique.

3°. Pansemens simples et rares pour favoriser les effets de la réunion immédiate, et hâter la cicatrisation.

4°. Saignée générale, selon les indications; saignées révulsives locales, au moyen des ventouses scarifiées, bien préférables aux sanguines dans la plupart des cas, ainsi que nous l'avons exposé précédemment.

5°. Régime très-sévere, position élevée de la poitrine, repos absolu.

Les faits suivans présentent quelques-unes des complications communes à la plupart des

plaies pénétrantes de poitrine; ils sont propres à faire apprécier les avantages de la méthode thérapeutique que l'on a employée.

Première observation. — M***, soldat au 1^{er} régiment, a été très-grièvement blessé dans la poitrine par son propre fusil, qu'il venait de livrer à un lâche adversaire. La balle, lancée presque à bout portant, après avoir traversé l'épaisseur du moignon de l'épaule gauche, avait échancré la clavicule correspondante, lésé le plexus brachial, pénétré dans la poitrine en déchirant le tissu du poumon gauche, et était ressortie entre les troisième et quatrième côtes, tout près du bord postérieur de l'omoplate du même côté. Ce blessé, lorsqu'il fut apporté à l'hôpital, était menacé d'une suffocation mortelle, par la formation spontanée d'un épanchement de sang; le collapsus, l'anxiété augmentaient de plus en plus et nous faisaient craindre l'inutilité des ressources de l'art. Cependant le chirurgien en chef s'empressa de débrider les plaies, et favorisa ainsi l'issue d'une certaine quantité de sang; il les ferma ensuite exactement, afin d'empêcher l'entrée de l'air et la complication d'un emphysème, et chercha enfin à favoriser la résorption à l'aide de plusieurs ventouses scariées sur toute la surface de la poitrine. Il réussit par ces moyens à diminuer la suffocation

mais les symptômes de l'épanchement se déclarèrent avec plus d'intensité vers le troisième jour : la dyspnée, la toux menaçaient encore le blessé d'étouffement; il cherchait à se soulager un peu en se couchant sur le côté de la poitrine qui était le siège de l'épanchement, ou bien en se tenant assis sur son lit. La dilatation de cette partie du thorax était manifeste par l'écartement et l'élévation des côtes; les mouvements en longueur sur le dos ou le changement de position déterminaient contre les parois thoraciques le choc du liquide, appréciable même pour le blessé; en un mot tous les signes d'un épanchement considérable dans la poitrine ne laissaient plus de doute sur le parti extrême qu'il fallait prendre.

M. Larrey était au moment de pratiquer l'opération de l'empyème, lorsque le danger imminent de la suffocation elle-même détermina un violent effort de toux, et immédiatement une expectoration abondante de sang noir mêlé de sérosité purulente. Dès lors, survint le premier soulagement à un état aussi alarmant; il ne s'agissait plus que de seconder cet effet salutaire de la nature en favorisant la résorption du reste de sang épanché : on y parvint heureusement au moyen d'une nouvelle application de ventouses scarifiées sur le côté gauche de la poitrine;

et en quelques jours les symptômes disparurent peu à peu, à mesure que l'expectoration se renouvela.

Ces accidens graves ne furent pas les seuls. Il y eut aussi une paralysie complète du mouvement dans le bras gauche, par la lésion de quelques rameaux du plexus brachial; la sensibilité s'y trouvait au contraire fort exaltée. Un grand nombre de faits analogues, observés par M. Larrey, lui avaient démontré l'efficacité des moxas; il en prescrivit donc l'application: le premier fut placé au dessus de la clavicule; un second sous le mamelon, et plusieurs autres ainsi successivement au pourtour de la plaie. Chaque application a été suivie d'une diminution notable de la névrose et de la paralysie, qui ont cédé presque complètement à l'action remarquable de ce puissant révulsif.

La marche générale de la guérison a été entravée encore par plusieurs incidens, tels qu'une fièvre traumatique fort longue, de la diarrhée, du délire; mais enfin tant de complications fâcheuses ont été successivement dissipées par un traitement rationnel et des soins multipliés. Ce blessé intéressant est sorti de l'hôpital dans le courant d'octobre et tout-à-fait guéri.

*Deuxième observation. — S***, soldat au*

1^{er} régiment, a eu la poitrine traversée par une balle qui avait perforé l'épaisseur des muscles du bras droit près du tendon du grand pectoral, pénétré dans la cavité thoracique, entre les troisième et quatrième côtes correspondantes, déchiré vraisemblablement le poumon droit; elle était passée derrière le sternum à travers le médiastin antérieur, et ressortie entre les cartilages des quatrième et cinquième côtes gauches, en effleurant le péricarde. Pansé immédiatement par le chirurgien en chef, ce blessé a néanmoins été fort en danger de périr par les effets d'un épanchement de sang considérable. Pendant vingt-quatre heures on avait même désespéré de son état; mais il a eu, comme le nommé M***, une expectoration salutaire qui a décidé le commencement de sa guérison, secondée ensuite par la méthode de traitement et les soins que j'ai indiqués déjà pour les blessés du même genre, et qu'il serait superflu de détailler de nouveau.

Troisième observation. — S***, soldat au 7^e régiment, atteint d'une blessure analogue à celle de M***, n'a pas été pourtant, à beaucoup près, exposé à un danger aussi grand, peut-être parce qu'il avait une constitution plus robuste. La balle, après avoir perforé l'épaisseur du muscle deltoïde au niveau de l'articulation

scapulo-humorale, avait lésé l'une des branches de l'artère circonflexe antérieure, plusieurs rameaux du plexus brachial, fracturé incomplètement l'extrémité acromiale de la clavicule, et traversé la poitrine en déchirant sans doute le lobe supérieur du poumon gauche (1). Épanchement de sang, névrose, hémiplégie, dyspnée, toux, expectoration, fièvre, anxiété morale; tous ces accidens se sont manifestés comme chez le nommé M***, mais avec des nuances plus faibles. Aussi les ressources de la nature et de l'art ont-elles été moins nécessaires à la guérison, qui s'est opérée vers le quarantième jour.

(1) Il faut cependant se garder de prononcer quelquefois trop affirmativement sur la lésion du tissu pulmonaire, dans certains cas de plaies pénétrantes de la poitrine par armes à feu. La déviation des projectiles est si fréquente, et en même temps si remarquable, que l'on s'est assuré par des faits qu'une balle pouvait traverser la cavité thoracique d'un côté à un autre sans léser l'un des poumons; c'est qu'alors cette balle, au lieu de suivre sa force directe d'impulsion, parcourt la *trajectoire* ou courbure des côtes, et ressort même quelquefois par le côté de la poitrine où elle avait pénétré.

Pour diagnostiquer une lésion du poumon, c'est donc plus encore par la nature des symptômes que par le siège extérieur de la blessure qu'il faut se guider. Or, presque toutes les observations ci-jointes semblent confirmer la lésion du tissu pulmonaire.

Quatrième observation. — Z***, soldat au 7^e régiment, a eu à peu près la même blessure que les deux précédens, avec cette différence que la balle n'était point ressortie de la poitrine et n'a pu même en être extraite. Des symptômes d'épanchement de sang se sont aussi déclarés, quoique avec moins d'intensité. Il n'y a pas eu d'épanchement de pus, malgré la présence du projectile dans la cavité thoracique. Nous ne pouvons dire qu'il n'en surviendra point par la suite, toujours est-il que la guérison s'est effectuée avant le trentième jour.

Cinquième observation. — C***, caporal au 1^{er} régiment, avait été atteint d'une balle dans le côté droit de la poitrine. Le projectile en y pénétrant au niveau de l'insertion thoracique du grand pectoral, entre les troisième et quatrième côtes, s'était perdu dans cette cavité, d'où il n'a pu être extrait. Un point douloureux, fixe et augmenté par la pression vers le bord inférieur du muscle grand dentelé, nous a fait penser que la balle s'était sans doute arrêtée entre les deux arcs postérieurs des côtes correspondantes. Quoi qu'il en fût, une expectoration de sang noir, survenue presque aussitôt que l'expiration était accélérée, indiquait une lésion du tissu pulmonaire. Le traitement indiqué déjà fut mis en usage avec tout le suc-

cès qu'il était permis d'en attendre, bien qu'il soit resté un peu de gène dans la respiration et de la raideur dans les mouvemens du bras droit.

Dans ce cas comme dans le précédent, il est à présumer qu'au bout de quelque mois ou de quelques années, la balle perdue dans la poitrine y déterminera inflammation, suppuration et épanchement, comme il en est plus d'un exemple. Alors, des dangers pourront résulter de la collection purulente dans laquelle sera flottant ce corps étranger, si l'on n'y porte secours à temps. C'est dans des cas semblables à celui qu'il faut supposer, que M. Larrey a procuré l'issue du projectile, en faisant la résection d'une côte avec le couteau lenticulaire de la boîte du trépan : et c'est ainsi que la cause de la suppuration cessant d'exister, les parois du foyer purulent tendent à se déterger, à se rapprocher et à former une cicatrisation définitivement durable.

Sixième observation. — H****, soldat au 7^e régiment des Suisses, fut atteint, à peu de distance, d'une balle qui perfora l'extrémité supérieure du sternum dans une étendue équivalente à celle d'une pièce de monnaie, déchira le médiastin antérieur, et ressortit sous le tendon du grand pectoral droit, après avoir

fracturé la première côte. A en juger par le trajet de la balle et les effets qu'elle a produits, le poumon a dû être lésé. Après avoir débridé légèrement les deux plaies, le chirurgien en chef fit l'extraction de plusieurs esquilles du sternum ; il réunit ensuite par première intention, et fit appliquer un appareil simple, mais contentif et permanent. Pendant les premiers jours, il est survenu des symptômes d'épanchement de sang dans la poitrine. Une saignée générale et quelques saignées locales révulsives sur le thorax, entre les épaules et à l'épigastre, des cataplasmes émolliens, la diète et le repos absolu les dissipèrent peu à peu. Pendant long-temps la plaie du sternum a fourni une suppuration fort abondante ; la cicatrisation a été encore d'autant plus lente qu'il y avait déperdition de substance ; enfin elle s'est opérée tout-à-fait dans le courant d'octobre.

Septième observation. — M***, soldat au 7^e régiment, a eu, comme les précédens, une plaie pénétrante de poitrine. La balle, après avoir traversé le milieu du muscle biceps au bras droit, avait pénétré dans la cavité thoracique sous le muscle grand pectoral, et en était ressortie entre les cartillages des troisième et quatrième côtes gauches. La dyspnée, la toux, quelques accès de suffoca-

tion et l'expectoration d'une certaine quantité de sang noir ne pouvaient laisser de doute sur l'existence d'un épanchement. Même traitement, mêmes soins que chez les blessés précédens. Néanmoins une complication de gastro-entérite aurait peut-être mis obstacle à la guérison, si l'emploi des saignées révulsives ne l'avait heureusement assurée.

Huitième observation. — M. de L***, capitaine au 6^e régiment, fut frappé, dans le côté gauche de la poitrine, d'une balle de marbre, qui traversa le hausse-col, et fractura la clavicule à sa portion sternale, ainsi que l'extrémité correspondante de la première côte. Il était résulté de cette blessure une tuméfaction assez considérable de la région cervicale jusqu'à l'épaule; l'une des branches thoraciques du plexus brachial, qui avait été lésée, occasiona une névrose partielle et une paralysie incomplète du mouvement dans le bras gauche. Plusieurs esquilles furent extraites à différentes époques, même assez distantes les unes des autres. Les antiphlogistiques et les révulsifs combinés ont remédié aux accidens primitifs. Ils ont réussi également contre quelques accidens secondaires, tels qu'une gastrite aiguë survenue après le quinzième jour, par un écart de régime, plusieurs accès de fièvre et un délire éphémère. La suppuration de la

plaie, aussi fort abondante, s'est enfin tarie complètement, et la cicatrisation a été terminée dans les premiers jours de novembre.

Plaies pénétrantes de l'abdomen.

Avant de citer des faits, je vais indiquer quelques-uns des résultats pratiques constatés par M. Larrey.

Si la plaie pénétrante n'a intéressé que les parois abdominales, sans léser les viscères, la réunion immédiate et un pansement simple suffisent à la cicatrisation. Lorsque cette plaie provient d'un coup de feu, la seule indication de plus, c'est de débrider méthodiquement dans la direction des fibres musculaires.

Si l'étendue de la plaie a occasioné l'issue de quelque portion des organes flottans dans la cavité abdominale, le premier soin est de réduire cette hernie.

Dans tous les cas, dès qu'il s'agit de réunir la solution de continuité, M. Larrey accorde bien plus d'avantages à la position, à un bandage contentif et au repos absolu qu'à la gastrorraphie, dont il considère l'emploi comme inutile et dangereux. Ainsi s'est-il assuré que les points de suture, quelque rapprochés qu'ils soient, n'empê-

chent pas toujours les organes de faire saillie dans leurs interstices : de là , irritation , inflammation , étranglement , météorisme , tiraillement des tégumens , rupture des points qui ont été cousus , fièvre traumatique , et même quelquefois péritonite suraiguë , gangrènes partielles , et mort.

Le même praticien juge les plaies intestinales bien plus susceptibles de guérison qu'on ne le pense en général. Il ne s'inquiète pas de rechercher la portion lésée d'intestin , dans la crainte de donner lieu à un épanchement de sang et à une péritonite mortelle. Pour les blessures de ce genre , la nature fait plus que l'art : on se contente de débrider la plaie des parois abdominales , en respectant les adhérences établies. Le pansement doit être simple , le régime très - sévère et secondé par la saignée générale , les saignées locales révulsives , les embrocations huileuses sur le ventre , les bains tièdes , les lavemens émolliens , les boissons mucilagineuses froides , et quelquefois par un léger laxatif. Dans la première période , les escharres se forment ; elles se détachent dans la seconde et livrent passage aux matières qui coulent de plus en plus pendant un temps variable , jusqu'à ce que , dans la troisième période , elles diminuent en même proportion et cessent complètement de s'épancher au de-

hors. Dans la quatrième, enfin, s'opère la réunion de la plaie; les parties similaires se mettent en rapport et se cicatrisent de l'intérieur à l'extérieur; les adhérences primitives s'effacent, et il n'existe en dernier lieu qu'un léger rétrécissement de la portion intestinale qui avait été blessée.

Cette théorie est fondée d'ailleurs sur les deux faits suivans.

Première observation. — B***, soldat au 1^{er} régiment, avait reçu dans le flanc gauche, et d'avant en arrière, une balle qui pénétra sous le dernier cartilage des fausses côtes, traversa la cavité péritonéale, perfora l'S romaine du colon, et ressortit par la région lombaire du même côté. Pendant deux jours, les liquides ingérés dans l'estomac s'écoulèrent avec du pus par la plaie abdominale. Lorsque la matière purulente devint plus abondante, elle s'évacua seule, et n'offrit plus de dangers à la récidive d'un anus contre nature. Mais survinrent alors tous les symptômes d'une péritonite intense, qui fut cependant combattue avec succès par les saignées générales, les saignées locales révulsives, des embrocations d'huile d'amandes douces et un régime sévère. Au commencement de septembre, les deux plaies étaient cicatrisées et leur complication avait disparu.

L'un des généraux les plus distingués de la mémorable expédition d'Égypte, M. le comte Belliard, avait été atteint d'une blessure tout-à-fait semblable pendant la révolte du Caire, et pansé par M. Larrey.

Deuxième observation. — B***, soldat au 6^e régiment, étant tombé entre les mains de plusieurs commis aux barrières, fut maltraité sans pitié, et atteint même de plusieurs blessures : on en comptait dix, mais presque toutes assez légères ; pourtant l'une d'elles eut des suites fâcheuses, elle était le résultat d'un coup de sonde (1) qui avait percé le flanc droit. Transporté seulement le lendemain aux Invalides, ce militaire y reçut tous les soins provisoires les mieux dirigés. Le colon ascendant, se trouvant perforé, établit un anus artificiel, qui donna issue durant neuf jours aux lavemens. Cet état grave était accompagné de fièvre, de douleurs très-vives dans la région lombaire, et d'une anxiété extrême. Le blessé avait déjà été saigné deux fois avant d'entrer aux Invalides, il le fut plusieurs fois encore dans les salles du chirurgien en chef, M. Yvan. Enfin des

(1) C'est la tige en fer avec laquelle les employés de la douane sondent en effet les ballots de marchandises.

pansemens simples avec de la charpie fine, des cataplasmes, des lavemens, une alimentation toute liquide, et les ressources de la nature, si puissante dans les lésions de ce genre, firent cesser peu à peu l'écoulement des matières par la plaie et les symptômes concomitans. Envoyé à l'hôpital du Gros-Caillou, ce militaire y a séjourné aussi quelque temps, jusqu'à sa guérison complète. Il éprouvait encore des douleurs dans les lombes, et de la difficulté dans les fonctions digestives. La continuation des cataplasmes, des lavemens et des bains émolliens, ainsi que l'application révulsive de plusieurs ventouses scarifiées, ont fait disparaître enfin sans retour tous les accidens consécutifs de cette blessure, unique peut-être quant à l'arme qui l'avait produite.

Plaie de la vessie.

I***, soldat au 7^e régiment des Suisses, fut atteint, le 28, d'une balle qui était entrée par l'aine droite, et ressortie par la fesse gauche. A l'arrivée de ce blessé à l'hôpital, la direction de la plaie, mais bien plus encore les symptômes immédiats firent reconnaître que la vessie et le rectum avait été traversés. En effet l'écoulement des urines eut lieu presque aussitôt par les deux ouvertures et par le rectum

tout à la fois. Quoique M. Larrey eût rencontré dans sa pratique plusieurs faits contraires à l'aphorisme d'Hippocrate : *Cui perfecta vesica, lethale*, il ne jugea pas moins de tout le danger de cette blessure; et convaincu que les accidens les plus à redouter seraient l'écoulement continu des urines par l'aine et par la fesse, ainsi que leur infiltration dans le tissu cellulaire du bassin, surtout à la chute des escharres, il recourut aussitôt au moyen capable de ramener cet écoulement par le canal de l'urètre. Mais avant d'y placer une sonde de gomme élastique, il débrida les deux plaies pour prévenir l'engorgement et l'inflammation, suppléer, par cette saignée locale, à une saignée générale qui, selon lui, ne peut toujours avoir une influence aussi prompte, faire détacher les escharres et faciliter la cicatrisation ultérieure. Après ce débridement, il fit un pansement simple avec du linge fin fenêtré, enduit de cérat, de la charpie mollette, des compresses, un bandage contenant, et immédiatement il plaça à demeure dans le canal de l'urètre la sonde de gomme élastique; car, en différant davantage, il n'aurait peut-être pu y parvenir, à cause de l'engorgement symptomatique du col de la vessie. La sonde favorisa en effet le cours naturel des urines, mais ne suffit pas néanmoins pour les entraîner complétement.

ment. Les premiers jours, il y eut même des accidens inflammatoires vers le bas-ventre; des douleurs cuisantes, de la fièvre, de l'insomnie et du dévoiement. Alors, le chirurgien en chef jugea à propos la saignée générale; il prescrivit ensuite des embrocations d'huile d'amandes douces sur le bas-ventre, des cataplasmes émolliens, des demi-lavemens, des boissons rafraîchissantes et mucilagineuses, la diète, le repos absolu, la position, surtout une extrême propreté, et même, pour ce cas exceptionnel à sa pratique, la fréquence dans les pansemens. Selon son attente, cette médication calma les effets primitifs de l'inflammation. Pendant les dix premiers jours, les urines, mêlées de suppuration, coulèrent encore par les deux ouvertures, en même temps que par le rectum et par l'urètre, mais peu à peu elles finirent par ne plus s'épancher et reprirent leur voie naturelle. Le 29 août l'écoulement par l'aine était réduit à un faible suintement, et la plaie semblait même presque cicatrisée. C'est environ à cette époque que M. Larrey, en rendant compte à l'Académie des blessés du Gros-Caillou, avait heureusement présumé de la guérison de celui-ci; un incident léger en apparence entraîna cependant de funestes résultats. Éprouvant un peu de gène par la présence de la sonde, le blessé s'imagina

qu'il n'y aurait nul inconvenient à la retirer; mais en voulant la replacer lui-même, il déchira un peu la membrane muqueuse du canal de l'urètre dans sa portion bulbeuse, où il se forma un petit pertuis, et bientôt une fistule urinaire. Vainement espéra-t-on, en rétablissant la sonde, ramener l'écoulement des urines. Il s'accrut dès lors par la plaie de l'aine, dont la cicatrice fut promptement détruite et ulcérée; et, au lieu de changemens progressifs de guérison, il n'y eut plus que des changemens rétrogrades. Les symptômes généraux et locaux d'inflammation repururent avec une nouvelle intensité; la suppuration se renouvela très-abondamment; et la plaie inguinale devenue profonde, d'un aspect livide et d'une odeur infecte, réclamait un véritable dévouement dans les pansemens minutieux, renouvelés plusieurs fois en vingt-quatre heures. Les dernières forces du blessé se sont épuisées de jour en jour, malgré tous les soins dont il a été entouré. Ce triste état s'est compliqué encore d'une large escarre, qui a dénudé le sacrum; l'amaigrissement était presque appréciable à vue d'œil; enfin la gangrène s'empara de la plaie, et des douleurs lancinantes dans toute la région abdominale vinrent déceler une péritonite suraigüë; qui se termina promptement par la mort: c'était à la fin d'octobre.

L'autopsie cadavérique, faite vingt-quatre heures après, démontre une désorganisation gangreneuse de la plaie de l'aine; un épanchement urinaire dans le tissu cellulaire du bassin; une déchirure d'un pouce environ de diamètre à la partie moyenne de la paroi latérale droite de la vessie, qui était considérablement épaisse, resserrée sur elle-même et fortement enflammée. La plaie du rectum n'était pas apparente, celle de la fesse s'était cicatrisée en partie. Une circonstance notable, c'est qu'il se trouva dans la vessie quelques petites esquilles provenant d'une fracture au pubis. Si la mort n'avait pas eu lieu, ces fragmens osseux auraient sans doute formé le noyau d'un ou de plusieurs calculs. Enfin le péritoine était le siège d'une inflammation vive et très-étendue.

Plaie des parties génitales.

P***, jeune soldat au 3^e régiment, fut atteint d'une balle qui perçut le prépuce, emporta une portion du gland, et puis traversa le scrotum, le centre même du testicule droit et l'épaisseur de la cuisse, au niveau du troisième muscle adducteur. Cette plaie singulière fut pansée aussitôt, mais simplement, bien que, dans des cas à peu près analogues, l'ablation

du testicule ait été jugée indispensable et pratiquée même immédiatement. On aurait pu craindre des accidens nerveux ou inflammatoires, quelque abcès, une fistule séminale, la désorganisation du testicule, ou tout au moins une altération notable dans les facultés viriles. Rien de tout cela n'eut lieu; la cicatrice des parties s'est faite presque seule, sans aide artificiel, et, le 25 août, la guérison complète permit au blessé de sortir de l'hôpital : aussi nous disait-il, la veille de son départ, qu'il se sentait pourvu comme auparavant. Le seul effet consécutif que nous ayons observé, c'est une légère rétraction du cordon des vaisseaux spermatiques.

Cette blessure nous a paru curieuse par sa nature, son innocuité et sa prompte guérison. M. Larrey avait déjà depuis long-temps vu plusieurs cas analogues, qu'il avait même comparés à certaines plaies des mamelles chez la femme. C'est ainsi que quelques-unes des Égyptiennes qui combattaient au siège de Jaffa, atteintes de coups de feu aux seins, ont été promptement guéries sans qu'il s'ensuivît la moindre altération des fonctions locales.

Plaies des membres.

Plus multipliées encore, et proportionnellement aussi graves que les plaies de poitrine, les plaies des membres nous ont fourni des exemples de leurs nombreuses variétés. Plaies simples et plaies compliquées des continuités et des articulations; *accidens* primitifs et *accidens* consécutifs, le plus souvent en proportion avec la gravité des blessures, et, dans quelques cas, en raison inverse. Presque toujours c'était le résultat des armes à feu, très-rarement des armes blanches. Toutes les plaies simples ont été pansées aussi simplement. Les plaies compliquées ont toutes été débridées méthodiquement, traitées d'après les lésions spéciales qu'elles présentaient, ramenées ensuite à l'état de plaies simples, et pansées rarement, selon la méthode de M. Larrey. Plusieurs même, quelque profondes qu'elles fussent, ont été très-heureusement guéries sans amputation; mais une vingtaine l'ont nécessitée, dont sept sans succès; et de ce nombre (sept), une seule amputation avait été primitive, les six autres avaient été consécutives.

Les quarante et quelques observations rapportées ci-après donneront tous les détails de ce que j'indique seulement ici, et seront peut-être

mises en ligne de compte pour décider surtout la grande question de l'opportunité des amputations.

Plaies de l'épaule et du bras.

C'est une plaie de l'épaule, assez simple, même en apparence, qui a fait naître la complication la plus redoutable des plaies d'armes à feu, le té-tanos. C'est aussi le seul exemple qu'en aient offert les événemens de juillet à l'hôpital du Gros-Caillou : ce té-tanos n'aurait peut-être pas été suivi de mort, si le chirurgien en chef avait été prévenu à temps de son invasion. Dans le cours de sa longue pratique aux armées, il a souvent observé cette funeste complication des plaies, et plusieurs fois il a complètement réussi à détruire ses symptômes mortels par un traitement énergique, dont sa méthode révulsive constituait la base. C'est ainsi qu'il associait aux moyens ordinaires, tels que les antiphlogistiques et les antispasmodiques, des débridemens et des incisions locales, des ventouses scarifiées, des moxas le long du rachis, le cautère actuel sur le bord et dans le fond des plaies. Il favorisait ensuite la suppuration, et entretenait la transpiration cutanée, à l'aide de fréquentes embrocations d'huile chaude de camomille camphrée.

La cure la plus remarquable qu'il ait obtenue de ce genre est celle d'un opisthotonus complet, survenu avec une rapidité effrayante chez un grenadier de la garde impériale nommé Demaré, qui ayant eu le sommet de l'épaule déchiré par un boulet de canon. J'indique ce fait, qui se trouve détaillé dans la *Clinique chirurgicale* de M. Larrey, parce qu'il a du rapport avec l'observation suivante, si ce n'est par le résultat, au moins par la nature et le siége de la blessure.

Première observation.— D***, soldat au 3^e régiment, fut atteint, à l'épaule droite, d'une balle qui était entrée près du bord postérieur de l'omoplate, en fracturant cet os en travers, et était ressortie par l'épaisseur du muscle deltoïde. L'état primitif ne présenta pas le moindre caractère inquiétant, et la plaie paraissant tout-à-fait simple fut traitée comme telle; mais bientôt des douleurs très-vives se déclarèrent dans son trajet; sans cause accessoire bien appréciable; elles furent intolérables et ne tardèrent pas à prendre une forme tétanique: la suppuration avait cessé presque entièrement; les chairs constituant les lèvres des deux plaies étaient devenues boursouflées, brunâtres et presque sèches; les douleurs, profondes, lancinantes, s'étendaient vers la poitrine et dans le dos, et s'exaspéraient à la moindre pression ou au contact

des corps extérieurs; tous les muscles et principalement ceux du bras correspondant éprouvaient des contractions spasmodiques, déjà le corps se renversait brusquement en arrière, et le malheureux patient n'avait plus d'autre faculté que celle de sentir et de calculer ses souffrances. Quelques heures avaient suffi à la progression de ces phénomènes précurseurs de la mort; en vain le chirurgien en chef avait-il débridé largement les deux plaies, extrait quelques esquilles du côté de l'omoplate, et pratiqué de fortes saignées locales au moyen des ventouses scarifiées; en vain avait-on ouvert les veines du bras plusieurs fois, employé des cataplasmes émolliens, des fomentations et des bains, et fait prendre à l'intérieur quelques boissons antispasmodiques et opiacées : la marche des symptômes eut une rapidité effrayante; au bout de vingt heures tout était fini.

A l'autopsie cadavérique, nous avons trouvé les membres contractés avec raideur; et les mâchoires serrées l'une contre l'autre violemment. Les deux bords de l'omoplate, fracturés irrégulièrement, offraient les dentelures d'une scie; plusieurs esquilles libres ou encore adhérentes s'étaient enfoncées dans les chairs; les cordons nerveux qui, de la plaie, se rendaient au rachis présentaient une teinte rougeâtre assez mar-

quée, ainsi que les ganglions des trous de conjugaison; enfin, un épanchement sanguin existait dans toute la longueur du cordon rachidien, entre les deux feuillets de l'arachnoïde, et la substance médullaire était elle-même infiltrée de sang. Le cerveau n'a pas été examiné. Les autres viscères n'étaient le siège d'aucune altération notable.

Le tétanos avait eu sans doute pour cause l'irritation excessive produite par le frottement contre les chairs des fragmens aigus de l'omoplate et la présence des esquilles dans l'épaisseur des parties molles.

Deuxième observation. — G***, soldat au 7^e régiment, fut frappé, à l'épaule droite, d'un coup de feu qui traversa l'épaisseur du deltoïde, et lésa le plexus brachial; il en était résulté une paralysie du mouvement dans tout le membre, laquelle n'a cédé qu'à l'application réitérée des moxas autour de la plaie.

Les personnes qui, les jeudis, suivaient la clinique, ont pu se convaincre de l'efficacité immédiate de ce moyen, non-seulement chez le sujet de cette observation, mais encore chez beaucoup d'autres affectés de paralysies incomplètes. Par exemple, dans le cas noté ci-dessus, chaque fois que la combustion du moxa avait lieu, les mouvemens partiels des doigts et ceux

du bras en totalité se manifestaient de plus en plus, et la paralysie diminuait d'autant.

Troisième observation. — L***, caporal au 6^e régiment, atteint d'une balle qui avait traversé l'épaisseur du biceps, au niveau de l'attache deltoïdienne, sans qu'aucun accident primitif se soit déclaré, fut affecté, plus de trois semaines après, d'un érysipèle phlegmoneux, qui débuta par l'épaule et passa peu à peu par dessus la plaie, pour envahir l'avant-bras, le poignet et la main. La fièvre symptomatique fut très-intense et accompagnée de délire; cependant avec la cause cessa l'effet; le fer rouge, appliqué à toute la surface de l'érysipèle, le détruisit entièrement, et assura ainsi la guérison.

Cette observation nous montre comme circonstances peut-être dignes d'attention: 1^o l'apparition d'un érysipèle phlegmoneux près d'un mois à la suite d'une blessure qui n'avait offert aucun signe alarmant; 2^o son passage de l'épaule à l'avant-bras sans comprendre le pourtour de la plaie; 3^o enfin sa guérison immédiate par le cautère actuel.

Quatrième observation. — M***, soldat au 3^e régiment, reçut, au bras gauche, un coup de feu à bout portant. La balle, lancée d'avant en arrière, avait fracturé en éclats l'extrémité supérieure de l'humérus, dans toute l'épaisseur

de son cylindre jusqu'à son col. L'artère et les nerfs brachiaux avaient cependant été épargnés. Aussi le chirurgien en chef, loin de songer sur-le-champ à l'amputation du membre dans l'article, voulut au contraire en tenter la conservation. Après avoir débridé largement la plaie d'entrée et la plaie de sortie, il fit l'extraction des esquilles nombreuses, dont l'assemblage équivalait à une déperdition de substance d'un pouce et demi; le bras, dépourvu de force et de soutien, était incapable d'aucun mouvement, et semblait indiquer, encore plus qu'avant l'extraction des esquilles, la nécessité de l'extirpation. Néanmoins M. Larrey voulut poursuivre sa tentative d'expectation, il pensa convenablement les deux plaies, et appliqua un appareil composé de plusieurs compresses imbibées de vinaigre camphré, de deux autres à quatre chefs, d'une seule attelle de carton à la partie interne du bras, d'un coussin conique à large base, correspondant au coude, et dont le sommet s'adaptait à l'aisselle, enfin d'une grande bande. Le bras était ainsi fortement écarté de la poitrine; l'avant-bras fut tenu en demi-flexion par une longue écharpe. Jusqu'au vingt-cinquième jour, il ne survint aucun accident nerveux ou inflammatoire; cependant une vive démangeaison qu'éprouvait le blessé vers l'é-

paule nécessita la première levée de l'appareil. La cause en fut bientôt reconnue : c'était une multitude de vers pullulant sur les bords et dans le fond même de la plaie. Cette circonstance, qui nous semblait fâcheuse, ne devait nullement le devenir, selon M. Larrey; car, dans plusieurs cas analogues observés par lui en Syrie, il s'est constamment assuré que non-seulement la présence des vers n'est pas nuisible aux plaies, mais qu'elle leur est peut-être même favorable, en ce que ces larves rongent les escharres, dont ils hâtent ainsi la chute, et semblent surtout avides des matières putrescibles, sans entamer les parties pourvues de vitalité. On prévient leur développement nouveau, toujours très-prompt, en apposant sur les plaies qui en sont le siège, des compresses trempées dans une dissolution de camphre ou de toute autre liqueur antiseptique : on eut recours à ce moyen dans le cas dont il s'agit ici. Le pansement, terminé ensuite avec tout le soin exigé par la gravité de cette lésion, fut suivi de l'application d'un appareil semblable au premier.

Il ne fut renouvelé que trois fois jusqu'à la fin du mois d'août, et dès lors l'amélioration s'est prononcée de plus en plus dans la force, dans les mouvements du bras et dans l'état de la plaie. Les pansemens consécutifs ont été plus

fréquens, et enfin journaliers, jusqu'à l'époque de la cicatrisation complète et de la soudure exacte des fragmens de l'humérus : c'est ce qui s'est effectué dans le courant du mois d'octobre. Le seul inconvénient, bien léger, résultant de cette large blessure, c'est un raccourcissement du membre d'un pouce et quelques lignes, raccourcissement proportionnel à la déperdition de substance du cylindre de l'humérus.

Ce fait pourrait, à juste raison, être ajouté aux preuves que les chirurgiens militaires ne font pas des mutilations sans nécessité, comme on a pu l'imaginer et le dire.

*Amputation du bras dans l'articulation
scapulo-humérale.*

Avant de rapporter les deux cas pour lesquels M. Larrey a pratiqué cette amputation, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler succinctement sa méthode opératoire, telle qu'il l'a si souvent pratiquée, à quelques légères modifications près, suivant l'état de désorganisation de l'épaule.

Le sujet convenablement assis sur un tabouret, et maintenu par des aides dont l'un surtout est chargé d'avance de relever les lambeaux et de comprimer ensuite les vaisseaux et les nerfs axillaires au moment de la section complète,

M. Larrey fait d'abord une incision longitudinale, étendue de l'acromion à un pouce environ au dessous du col de l'humérus, et qui divise le deltoïde jusqu'à l'os en deux parties égales. Il forme ensuite un lambeau antérieur et un lambeau postérieur, par deux sections obliques de haut en bas et de dedans en dehors. On relève ces lambeaux, et l'on comprime en même temps les artères circonflexes coupées : toute l'articulation se trouve ainsi à découvert. Alors l'opérateur fait passer circulairement le couteau entre la tête de l'humérus et la capsule articulaire, qui s'en sépare avec les ligamens correspondans; puis il écarte la tête de l'os un peu en dehors, et dès qu'il est sûr de la compression bien exacte des vaisseaux axillaires, il porte en arrière et en dedans le tranchant du couteau, au niveau des angles inférieurs des deux lambeaux et au devant des doigts de l'aide, et il achève l'amputation.

Par ce procédé aussi sûr que facile et prompt à exécuter, il n'y a pas la moindre hémorragie; on lie aussitôt l'artère axillaire sans faire cesser la compression, puis les artères circonflexes, et l'opération est terminée.

Première observation. — F***, soldat au 6^e régiment, avait été atteint, à bout portant, d'une balle qui lui fracassa l'os du bras droit et tra-

versa la poitrine. L'extrémité supérieure de l'humérus était fracturée en éclats jusqu'à un pouce de son col; le projectile avait pénétré dans la cavité thoracique, un peu au dessous du mamelon droit, et était ressorti entre les cinquième et sixième côtes gauches. Les lésions produites par cette blessure profonde furent la déchirure du poumon droit et du médiastin antérieur, la fracture d'un côté, et la dénudation du péricarde dans l'étendue d'un pouce environ, au niveau de la pointe du cœur: on distinguait son enveloppe à travers la plaie, et le doigt, appliqué immédiatement, en percevait toutes les pulsations; cependant il importait de remédier à la désorganisation principale, avant d'examiner les détails. Le chirurgien en chef commença par débrider les plaies du bras, dont il enleva ensuite les esquilles; de leur extraction résultait une déperdition de substance de trois pouces environ; le membre abandonné à lui-même paraissait entièrement privé de soutien et de vie, comme dans l'observation rapportée précédemment. M. Larrey, espérant néanmoins le conserver, le plaça dans un appareil méthodiquement compressif, semblable à celui dont nous avons déjà parlé. Mais auparavant, il débrida de même les deux plaies de poitrine, pour en faciliter la réunion par première intention, et il pansa sim-

plement. Malgré le danger d'une telle blessure, il ne survint aucun accident primitif; le troisième jour seulement, la suppuration de la plaie du bras était devenue considérable, et traversait toutes les pièces de l'appareil; des démangeaisons vives s'y faisaient sentir: il fallut donc en reconnaître la cause. C'était encore une grande quantité de vers remplissant le pourtour de la plaie et le creux de l'aïselle. Dès qu'ils furent détachés, à l'aide du vinaigre camphré, on put aisément examiner l'état du membre; la suppuration était fort abondante, mal liée, d'une odeur fétide, et s'était déjà frayé un trajet vers le coude par le décollement des muscles. Il ne fallait plus dès lors espérer la conservation du bras; et il semblait d'autant plus opportun d'en faire l'extirpation que la plaie de poitrine ne présentait encore aucun symptôme inquiétant; d'ailleurs le blessé lui-même s'y résignait avec courage.

L'amputation dans l'articulation scapulo-humérale fut donc pratiquée, le 7 août, par le chirurgien en chef, selon son procédé. Elle ne fut suivie primitivement d'aucun événement fâcheux: ainsi pas d'hémorragie, pas d'accident nerveux ou inflammatoire; tout allait bien; la plaie même de la poitrine, dont la gravité pouvait paraître une contre-indication à toute am-

putation , cette plaie était également dans un état très-satisfaisant ; l'amputé , seulement fort affaibli , avait besoin des précautions les plus minutieuses pour parvenir à une guérison dont on entrevoyait déjà les chances favorables. Malheureusement il n'en fut pas ainsi ; le 13 , il survint du malaise , du frisson , de la fièvre et de la diarrhée , par suite d'un refroidissement pendant la nuit. Le 14 , la fièvre avait déjà affecté le caractère adynamique ; la dyspnée se déclara en même temps , avec de la toux et des suffocations qui ne laissaient aucun doute sur l'existence d'un épanchement dans la poitrine ; enfin le râle et bientôt la mort.

La nécropsie , faite le lendemain , nous montra un épanchement de sang d'un litre et demi environ dans le côté droit de la poitrine , surnageant à un épanchement de pus moins considérable ; une dépression notable du poumon droit déchiré ; et quelques granulations à sa surface ; une péricardite très-prononcée , et une exsudation albumineuse sur les parois du cœur. La plaie par amputation était intacte.

Deuxième observation. — P*** , âgé de vingt-et-un ans , fusilier au 7^e régiment suisse , avait reçu , le 29 , à l'épaule gauche , un coup de feu à bout portant d'avant en arrière. Transporté immédiatement à l'hôpital , ce militaire semblait

légèrement blessé; une seule plaie simple et de forme arrondie existait au tiers supérieur du bras, au niveau de l'attache du tendon du muscle grand-pectoral, au bord interne du deltoïde, sans aucune complication apparente ni à l'humérus ni à l'articulation, car les mouvements du bras étaient libres et s'exécutaient en totalité sans autre douleur que celle de la plaie; et il n'y eut non plus aucun accident primitif, en sorte que ce cas fut regardé comme tout-à-fait simple par le chirurgien chargé du pansement, et qui ne jugea même pas nécessaire de faire voir le blessé à M. Larrey. La balle n'était point ressortie, et l'on ne pouvait se guider d'après des données exactes pour reconnaître le point où elle était enclavée; elle nous paraissait pourtant fixée dans la fosse sous-épineuse de l'omoplate. Quoi qu'il en fût, la première période se passa sans incident notable, si ce n'est une douleur vive causée à la moindre pression, et quelques symptômes inflammatoires communs à beaucoup de plaies simples: ils prirent néanmoins de l'intensité, et l'avis du chirurgien en chef fut réclamé. Celui-ci s'assura en effet que la plaie n'était pas aussi légère qu'on l'avait supposé; car elle était le siège d'une tension dououreuse, qui avait causé la fièvre traumatique; de plus, en palpant le bras selon la direc-

tion de l'humérus, il sentit manifestement une fluctuation profonde semblant environner le cylindre de l'os. Certain alors qu'il rencontrerait une lésion jusque là méconnue, il commença par débrider la plaie plus largement qu'elle ne l'avait été, et livra ainsi passage à une assez grande quantité de matière purulente; ensuite il en chercha le foyer, mais cette première tentative ne put lui en faire reconnaître la source, et il dut se contenter d'établir un séton pour faciliter l'écoulement du pus; le pansement ordinaire, une saignée générale, la diète et des boissons délayantes, telle fut la prescription d'attente. Cependant le séton ne put suffire à entraîner au dehors toute la suppuration, dont l'écoulement continual aggravait les douleurs locales et réagissait sur tout le système nerveux; la fièvre traumatique avait affecté un type continu; l'affaiblissement augmentait de plus en plus, et le danger était imminent. Une nouvelle recherche faite par M. Larrey avec le plus grand soin, lui fit découvrir enfin une lésion à la tête de l'humérus, qui représentait, à la sonde et même au toucher, une sorte d'érosion avec perte de substance et un commencement de nécrose sur ses bords. Nul doute alors que ce ne fût la source de la collection purulente, et que la balle ne se fût engagée dans un point

de l'omoplate rapproché de la cavité articulaire. Malgré l'état de prostration et de maigreur dans lequel se trouvait le jeune blessé , il était urgent de lui amputer le bras à l'article. L'opération étant donc bien démontrée indispensable , elle fut aussitôt pratiquée par le chirurgien en chef le 27 août. Son exécution fut prompte , facile , et supportée avec courage par le patient , qui s'y était déterminé sans hésitation. M. Larrey chercha immédiatement , mais en vain , le projectile , et acheva l'opération par le pansement simple , qu'il recommande en général après cette opération , sans employer de réunion trop immédiate.

La dissection du membre , faite aussitôt après , démontra des fusées purulentes très-étendues qui avaient désuni tous les muscles du bras et dénudé une partie de l'humérus ; mais la tête de cet os offrait la lésion la plus remarquable , celle enfin que l'on avait si long-temps méconnue : cette éminence osseuse avait été perforée par la balle dans toute l'épaisseur de son col sans qu'il y eût fracture : et il en était résulté un canal cylindrique de plusieurs lignes de diamètre , proportionné au volume du projectile. Déjà la tête de l'humérus , dénudée de son cartilage diarthrodial , était frappée de vermoulure à sa périphérie et menacée de nécrose.

Vingt-quatre heures après l'amputation , il

survint un suintement de sérosité sanguinolente tellement considérable , qu'il fallut enlever l'appareil et le renouveler aussitôt , en l'aïdant d'une légère compression. Vers le troisième jour, il apparut un paroxysme fébrile qui fut heureusement combattu par une petite saignée du bras , des boissons adoucissantes et la diète. Le septième , l'appareil fut levé entièrement ; la plaie semblait en bon état : elle fut pansée dès lors journellement , à cause de l'abondance de la suppuration ; elle s'est détergée pourtant peu à peu , et les ligatures sont tombées du neuvième au treizième jour. Quelques légers accidens sont encore arrivés pendant cette période : ainsi une irritation sympathique de l'estomac , laquelle céda à une saignée révulsive , et un abcès formé dans la fosse sous-épineuse , et qui fut ouvert. Il s'agissait encore de découvrir le point où la balle serait enclavée ; son trajet semblait indiqué par une fusée purulente dont on distinguait la fluctuation au côté externe de la plaie ; mais la sonde ne fit reconnaître aucun corps étranger ; et l'on ne voulut faire nulle tentative forcée pour l'extraire. Ce fut seulement au trente-septième jour que l'amputé se plaignit au bas de l'épaule d'une douleur fixe , augmentée par la pression. Nous vîmes en effet une légère saillie au bord antérieur de la fosse sous-

épineuse de l'omoplate, et nous fûmes certains, par le toucher, de la présence de la balle. Pour l'extraire, M. Larrey fut obligé d'inciser à son niveau la couche épaisse des muscles grand-dorsal et sous-épineux, et alors il la détacha sans peine. Dès ce moment la marche de la cicatrisation s'est faite sans autre incident et d'une manière régulière, de l'angle supérieur à la partie déclive, et de la circonférence au centre. Au bout d'une vingtaine de jours, elle était entièrement terminée : l'état général s'est rétabli aussi progressivement.

Ce fait nous paraît offrir quelques circonstances notables : ainsi la simplicité apparente de la plaie, la difficulté du diagnostic, l'invasion tardive des symptômes graves, le succès de l'opération consécutive, malgré ses chances défavorables; enfin la singularité de la lésion faite à l'os par la balle, et l'extraction ultérieure de ce projectile (1).

(1) Mon père a présenté le sujet de cette observation et la la pièce pathologique à l'Académie des sciences, en même temps qu'un ancien militaire qui avait été atteint autrefois d'une blessure fort remarquable à la poitrine : c'était une balle lancée à bout portant au dessous du mamelon gauche, au niveau de la pointe du cœur, et qui, en traversant la cavité thoracique de part en part et en ligne droite, était

Amputations du bras dans la continuité.

Trois seulement ont été pratiquées à l'hôpital même, et une quatrième à une ambulance : deux ont été primitives et suivies d'un succès complet; les deux autres, consécutives, ont échoué. Si l'on n'était bien convaincu maintenant de l'avantage des amputations immédiates, principalement dans les cas de plaies d'armes à feu, ces quatre faits notoires pourraient s'ajouter à une foule d'autres que les blessures des combats de Paris ont rendus décisifs pour tous les chirurgiens.

ressortie entre la colonne vertébrale et l'angle inférieur de l'omoplate; tout les symptômes d'une lypothimie et d'une syncope mortelle durèrent plusieurs heures, et pendant deux jours on s'attendait d'instant en instant à voir expirer ce malheureux. Il fut cependant rappelé peu à peu à la vie par le traitement général qu'emploie M. Larrey dans les cas de plaies pénétrantes de la poitrine, et enfin conduit à une guérison complète. Le siège de la blessure, la direction de la balle et surtout les symptômes mortels survenus immédiatement, font présumer à M. Larrey que le péricarde a dû être traversé par le projectile, si ce n'est même la surface des parois du cœur, vers sa pointe. On peut d'ailleurs voir tous les détails de cette observation dans sa *Clinique chirurgicale*, tom. II, page 305.

Avant de les mentionner, j'indiquerai seulement une modification apportée par M. Larrey aux amputations générales dans la continuité des membres. Après la section de l'os ou des os, il ne manque jamais de faire deux courtes incisions aux angles supérieur et inférieur de la peau, afin d'en favoriser le rapprochement, de fournir un hiatus aux fils des ligatures et à l'écoulement de la suppuration, et de préparer enfin une cicatrisation linéaire.

Pour des raisons qu'il a longuement détaillées, il ne réunit jamais par première intention les plaies du moignon, à la suite d'une maladie chronique ou d'une plaie qui a nécessité l'amputation consécutive.

Première observation. — T***, soldat au 6^e régiment, faisait partie d'un détachement retranché, le 29, dans une maison de la rue de Richelieu. Au moment où il se vit forced, ainsi que ses camarades, de céder à l'invasion d'une multitude armée, il fut frappé à bout portant, d'un coup de feu au bras droit, et transporté le lendemain à l'hôpital, dès la pointe du jour. L'articulation du coude avait été fracassée, et l'aspect seul de la blessure indiquait l'urgence de l'amputation. Tout le monde sait d'ailleurs que c'est presque un axiome chirurgical de couper le bras pour tous les cas de plaies péné-

trantes de l'articulation du coude, par armes à feu. Dès que ce jeune militaire fut prévenu de la nécessité de l'opération, il s'y décida sans hésiter. Je la pratiquai immédiatement sous les yeux de mon père, qui avait bien voulu m'en charger. La section des tégumens fut faite aussi loin que possible de l'épaule, afin de ménager un moignon plus allongé; après celle des muscles et de l'os, et après les ligatures, j'incisai les angles de la peau, et je réunis par première intention. Nous avons surveillé avec le plus grand soin l'état consécutif; il n'est pas survenu le plus léger accident: le travail de la cicatrisation, commencé le huitième jour, a été entièrement terminé au bout d'un mois. La cicatrice est tout-à-fait linéaire, et donne au moignon une régularité complète (1).

Deuxième observation. — L***, soldat au 6 régiment, était du même détachement que T***. Blessé grièvement au bras droit par deux coups de feu tirés d'une fenêtre voisine, il fut aussitôt transporté à une ambulance du Carrousel. L'une des balles avait fracturé en éclats l'extré-

(1) Ce fait et plusieurs autres m'ont donné l'idée de publier plus tard un Mémoire sur la cicatrisation des plaies par amputation.

mité inférieure de l'humérus, et ouvert l'articulation du coude; l'autre avait fracturé les deux os de l'avant-bras. Une blessure aussi compliquée ne laissait aucun doute sur la nécessité de l'amputation primitive. Elle fut pratiquée le soir même à l'ambulance par M. Torchez, élève interne des hôpitaux civils. Conduit le lendemain matin à l'hôpital du Gros-Caillou, cet amputé y a séjourné tout le temps nécessaire à sa guérison, qui s'est effectuée très-promptement et sans obstacle. La cicatrice reste cependant irrégulière, parce que l'on avait conservé peut-être trop de tégumens et réuni trop immédiatement au centre du moignon, en sorte que ses deux angles sont courbés en dedans: c'est d'ailleurs un inconvénient léger.

Troisième observation.—C***, soldat au 3^e régiment, avait eu la seconde rangée des os du carpe de la main gauche fracassée par une balle qui n'était point ressortie et que l'on ne put extraire. On espérait conserver le membre sans amputation partielle, et l'on pansa la plaie simplement; mais au bout de quelques jours, la main, le poignet et l'avant-bras furent successivement le siège d'un gonflement considérable tendant à devenir érysipélateux, avec des douleurs vives, de la fièvre, et une anxiété générale. Malgré l'emploi des moyens susceptibles de re-

médier à ces accidens, loin de céder, ils s'accru-
rent et furent même compliqués de plusieurs
fusées purulentes étendues jusqu'au coude. En
vain eut-on recours aux incisions, aux contre-
ouvertures, pour faciliter l'écoulement du pus
et arrêter l'infiltration , il n'y eut pas le
moindre amendement. Aucune autre ressource
ne semblait désormais certaine, si ce n'est l'am-
putation du bras , qui fut pratiquée, le 15 août,
par M. Poirson, chirurgien major de l'hôpital (1);
mais une série de symptômes inflammatoires et
nerveux, dus en partie à une forte réaction sur
l'encéphale, entraîna la mort du sujet.

Quatrième observation. — M. S*** (Louis),
âgé de vingt-deux ans, élève en pharmacie chez
M. Raullin, rue Saint-Honoré, consacrait avec
lui tous ses soins au soulagement des blessés,
lorsque l'un et l'autre furent atteints de deux
balles dans le moment qu'ils donnaient asile à
une femme frappée elle-même d'un coup de feu.
La blessure de M. Raullin fut légère; elle avait
seulement intéressé les parties molles de l'avant-
bras droit; mais celle de son élève, en lésant

(1) M. Poirson exerce actuellement les fonctions de chi-
rurgien en chef, depuis que l'on a restitué à M. Larrey sa
place d'inspecteur du service de santé des armées.

aussi l'avant-bras gauche , avait porté plus profondément. La balle, entrée à deux pouces au dessous du pli du coude , s'était enclavée entre les deux os. Les premiers secours furent dus à M. le docteur Florence, qui débrida la plaie, et tenta, mais inutilement , l'extraction de la balle. Au bout de quelques jours, il survint des douleurs très-vives dans tout le membre , une tuméfaction assez étendue et de la fièvre. Cependant M. S*** voulut avoir l'avis de M. Larrey, qui le fit entrer à l'hôpital du Gros-Caillou le 18 août. En examinant attentivement la plaie, le chirurgien en chef en reconnut toute la gravité; il pensa néanmoins que l'amputation pourrait être évitée, et se contenta d'appliquer un appareil simple. Toutefois le gonflement devint plus considérable , et la fièvre augmenta; un point de fluctuation avait paru en dehors , on y fit une incision qui donna passage au pus et au projectile (c'était une balle de plomb); une petite hémorragie artérielle fut arrêtée par une ligature. Pendant trois ou quatre jours, la plaie prit un caractère plus satisfaisant; mais des mouvemens inconsidérés du membre firent développer de nouveau les accidens inflammatoires. M. Larrey, en sondant l'articulation , s'assura qu'elle était pénétrée par une fusée purulente : tout le pourtour était le siége d'une tuméfaction

énorme, avec éréthisme, fièvre, agitation, insomnie et surtout suppuration abondante. Tant de symptômes dangereux, menaçant de s'exasperer encore, ne laissaient plus l'espoir de conserver le bras. Ce fut avec une peine extrême que notre intéressant blessé put se décider à l'amputation : les préparatifs de l'opération, l'idée de perdre le membre le plus utile à sa profession, l'inquiétude de son sort, de son avenir, tout lui faisait envisager avec effroi la cruelle nécessité. Enfin le meilleur raisonnement qu'il put comprendre, ce fut la guérison prompte du jeune militaire que j'avais amputé, et qui vint l'encourager lui-même. M. S*** se soumit donc à l'opération, qui fut pratiquée en un instant par M. Larrey, et exempte de tout accident primitif. Mais au onzième jour, une transpiration salutaire ayant été supprimée brusquement, il survint du frisson, de la fièvre et un commencement de délire. L'estomac semblait aussi affecté sympathiquement. Une saignée générale et une saignée révulsive à l'épigastre, des cataplasmes émolliens et la diète avaient déjà produit un soulagement notable. Jusqu'au 8 septembre tout était assez bien, quand un nouveau refroidissement, joint à un écart de régime, ranima les symptômes inflammatoires avec plus d'intensité: la fièvre, qui n'avait offert qu'un type intermit-

tent, devint continue, ainsi que le délire; les sueurs étaient abondantes; l'amaigrissement, la prostration des forces, la dyspnée et un flux dysentérique étaient autant de présages d'un résultat funeste. Enfin, le 11, vers midi, la visite inattendue d'un prêtre empressé d'administrer l'extrême-onction à cet infortuné jeune homme, qui s'abusait tout seul sur le danger de sa position, fut pour lui l'arrêt de mort. Un ictère symptomatique se déclara subitement, et cinq minutes après, celui qui s'était dévoué au soulagement des blessés mourait victime de son dévouement et regretté de nous tous. (L'autopsie n'a pu être faite).

Plaies de l'avant-bras.

De toutes celles observées par nous, une seule a été accompagnée de symptômes qui semblaient exiger une cinquième amputation du bras; cependant la chirurgie expectante a encore prévalu dans cette circonstance, et la guérison s'est très-heureusement effectuée. (V. la quatrième observation.)

La plupart des plaies de l'avant-bras ont été le résultat de balles qui avaient traversé seulement l'épaisseur des muscles, soit en dehors, soit par l'espace interosseux, sans déterminer

de lésions remarquables. Quelques exemples néanmoins se sont offerts de fractures du radius ou du cubitus; je me contenterai d'en citer deux ou trois.

Aucune plaie de la main, du poignet ou de l'extrémité inférieure de l'avant-bras n'a nécessité l'amputation.

Première observation. — G***, soldat au 7^e régiment, fut blessé, le 29, d'un coup de feu à la partie supérieure de l'avant-bras gauche. La balle avait pénétré par la face cubitale, et était ressortie au bord externe du pli du coude, en fracturant le radius. Les plaies, débridées, ont été pansées simplement; un appareil compressif et inamovible a établi le rapport des fragmens, qui se sont promptement consolidés. Le seul inconvénient ultérieur de cette blessure a été une grande difficulté dans les mouvemens de supination.

Deuxième observation. — M. P***, officier-porte-étendard des lanciers, a été atteint, le 28, d'un coup de feu à l'avant-bras droit au moment où il franchissait à cheval le quai du Louvre. Il fut l'un des premiers blessés arrivés à l'hôpital du Gros-Caillou. La balle, en pénétrant par la face cubitale, très-près de l'olécrâne, était restée cachée dans l'espace interosseux, d'où elle n'a pu être extraite. Les tendons des muscles fléchisseurs

paraissaient avoir été fortement contus, car le membre éprouve encore de la faiblesse et un peu de raideur dans les mouvemens de flexion. La complication la plus notable de cette plaie fut un érysipèle phlegmoneux dont la durée a été passagère et n'a exigé aucune modification au traitement.

Troisième observation. — P***, soldat au 7^e régiment, avait l'arme au bras lorsqu'il reçut une balle, qui frappa successivement les deux coudes sans les léser grièvement; l'olécrâne du côté droit fut seulement fracturé, et l'extrémité supérieure du cubitus gauche violemment contuse, avec plaie simple. Il n'est résulté aucun accident remarquable de cette blessure assez singulière néanmoins pour être citée.

Quatrième observation. — K***, jeune soldat du 7^e régiment, avait eu, le 28, l'avant-bras droit traversé par une balle. Celle-ci, en pénétrant par la face cubitale, à deux pouces au dessous de l'olécrâne, avait fracturé le cubitus près de son tiers supérieur, déchiré les muscles interosseux sans intéresser aucun vaisseau ou nerf important, et était restée enclavée entre les deux os. La plaie fut débridée et pansée méthodiquement. Mais dès les premiers jours, la suppuration fut considérable et donna lieu à

la formation d'un épanchement, qui s'infiltra jusqu'àuprès de l'articulation du coude. Il fallut pratiquer une contre-ouverture pour faciliter l'issu de la matière purulente, dont l'écoulement continu avait causé de la fièvre. M. Larrey, en sondant la plaie, crut qu'elle ne tarderait pas à établir entre elle et l'articulation un trajet purulent, et que l'on serait sans doute obligé de couper le bras; il voulut néanmoins attendre des indices plus pressans. La suppuration était toujours fort abondante; un autre épanchement partiel s'était développé au tiers supérieur du bord radial de l'avant-bras, il fallut faire une nouvelle incision. Quelques jours après, un point d'irritation un peu au dessous du pli du coude, sans fluctuation, mais avec douleur, annonça la présence de la balle; une troisième incision fut pratiquée, et le projectile extrait, avec le doigt de gant formé par un morceau de la chemise et du drap. Il y avait ainsi quatre ouvertures à l'évacuation permanente de la suppuration, qui avait épuisé en grande partie les forces du blessé, et entraîné quelques complications, telles qu'une irritation de l'estomac, de la fièvre, de la diarrhée. Cependant la santé générale s'est rétablie à mesure que les plaies ont cessé de supurer. L'emploi des topiques émolliens et des révulsifs, un soin minutieux dans les pansemens, la

position fléchie et en supination, enfin un régime convenable parvinrent, avec beaucoup de temps et d'efforts, à garantir la conservation du membre.

Plaies de la main.

De toutes les plaies de la main, une seule mérite d'être détaillée pour sa gravité elle-même, qui aurait pu indiquer l'extirpation d'un doigt, pour les plaies secondaires que le même cas a présentées, et pour leurs phénomènes concorditans.

M. C***, lieutenant au 6^e régiment, commandait l'un des détachemens retranchés, le 29, dans quelques maisons de la rue Saint-Honoré. Poursuivi de plus près encore que ses soldats, il fut atteint de plusieurs coups de feu à la fois, dont un à l'épaule, un autre au bras et un troisième à la cuisse. Menacé par les cris d'autres assaillans qui franchissaient les escaliers, il ne voit de salut qu'en se précipitant par la fenêtre d'un troisième étage sous laquelle se trouvait un toit, à plus de vingt pieds de distance. Mais à peine a-t-il franchi la rampe, qu'il est blessé, presque à bout portant, à la main droite, et tombe sur la toiture avec d'autant plus de violence, qu'il était d'une haute et forte stature. Secouru à temps, il se fit transporter dans

une maison voisine, chez l'un de ses amis. Les premiers soins lui furent donnés par le docteur Lebreton, ancien élève de l'hôpital du Gros-Caillou. Les trois coups de feu que cet officier avait reçus avant sa chute étaient assez légers, mais la blessure de la main était beaucoup plus sérieuse; le second os métacarpien avait été fracturé et les tendons correspondans des muscles fléchisseurs avaient été fortement contus, même un peu déchirés. Le chirurgien fit un débridement méthodique à la plaie, enleva plusieurs esquilles, et appliqua un appareil contentif. La violence de la chute avait déterminé une commotion générale, caractérisée principalement par la stupeur, l'ébranlement du cerveau, l'engourdissement et la raideur de tous les membres, surtout dans le bras gauche et les pieds. Deux jours après le blessé, ayant réclamé les soins de M. Larrey, fut transporté à l'hôpital du Gros-Caillou. On remédia premièrement aux désordres généraux par une saignée du bras, une saignée révulsive entre les épaules, et un régime convenable. On renouvela ensuite l'appareil de la main, dont la plaie s'est cicatrisée sans incident remarquable; mais il restera long-temps sans doute de la gêne dans les mouvements de flexion.

Cependant tous les symptômes de la commotion n'étaient pas terminés; dans les premiers jours

de septembre, il se forma , sans aucune cause secondaire, un vaste abcès à la marge de l'anus, dans l'épaisseur de la fesse droite, et sans qu'aucun signe local bien certain l'annonçât. Il n'y avait ni rougeur ni fluctuation appréciables, la fixité de la douleur et la fièvre étaient absolument les seuls indices. Le chirurgien en chef, convaincu néanmoins de l'existence et du siège de cet abcès, fut obligé de faire une incision de deux pouces de profondeur , et parvint seulement en ce point à donner issue à la collection de pus , qui était considérable ; pour prévenir toute infiltration ultérieure, il rendit l'incision cruciale, et y fit interposer une mèche de charpie. Dès lors l'amélioration fut notable , et les suites de la commotion diminuèrent peu à peu. Nous sommes parvenus, par des pansemens simples, à obtenir une cicatrisation complète.

— Ce fait est assurément un exemple qui prouve le développement des abcès symptomatiques de la commotion.

Amputations des doigts.

Plusieurs amputations totales ou partielles des doigts ont été pratiquées , soit par le chirurgien en chef, soit par ses aides, avec d'heureux ré-

sultats. Il serait inutile de parler des amputations des dernières phalanges; je ne citerai que les trois faits suivans :

Première observation. — R***, caporal au 6^e régiment, eut la main droite traversée par une balle, qui avait dilacéré les muscles palmaires, fracassé le premier os métacarpien et divisé l'artère collatérale de l'index. L'hémorragie fut primitive et abondante; de plus, la contusion violente que semblaient avoir éprouvée les tendons fléchisseurs, ayant occasionné des accidens nerveux susceptibles de s'aggraver, on n'hésita point à faire l'amputation complète du doigt indicateur dans l'articulation carpo-métacarpienne, et l'on prévint ainsi les suites fâcheuses de cette plaie.

Deuxième observation. — V***, brigadier des lanciers, a eu le médius et l'annulaire de la main droite amputés dans leurs articulations métacarpo-phalangiennes, pour un coup de feu qui avait fracassé ces deux doigts. Une tuméfaction considérable avait suivi de près la blessure, et menaçait de se propager à l'avant-bras, la désorganisation de la main était telle que l'on avait hésité d'abord à désarticuler le poignet. La cicatrisation s'est faite pourtant sans obstacle, et il reste encore l'usage de trois doigts.

Troisième observation. — D***, caporal au 15^e léger, avait eu la première phalange du médius de la main droite fracturée par une balle : il a été amputé dans l'articulation métacarpo-phalangienne, sans le plus léger accident primitif ou consécutif.

Plaies de la cuisse.

Aussi variées par les lésions que par les symptômes qu'elles ont produits, les plaies de la cuisse nous ont offert un grand nombre de cas dont je me contente de rapporter les trois suivans, comme les plus dignes de fixer l'attention. Ils concourent puissamment à prouver les succès généraux obtenus à l'hôpital du Gros-Caillou, et en même temps ils rappelleront que les amputations ont été aussi épargnées que l'ont conseillé la prudence chirurgicale et l'intérêt des blessés.

Première observation. — M. de Saint-C***, chef de bataillon au 1^{er} régiment, avait été renversé, le 29, près du Carrousel, par un coup de feu à la cuisse droite. Assailli aussitôt par plusieurs ouvriers, il allait peut-être périr victime de leur animosité, si l'un de nos braves camarades, M. Briand, n'était parvenu, par son influence et son dévouement, à faire transporter cet officier à l'hôpital du Gros-Caillou, où il reçut de

suite les soins du chirurgien en chef. Le projectile (c'était une bille de marbre) avait pénétré obliquement dans l'épaisseur de la cuisse droite, à son tiers supérieur et un peu en arrière. Le débridement fait, la plaie fut pansée simplement, et trois jours après un point dououreux, fixé à deux pouces environ au dessus de la rotule, indiqua la présence de la balle, qui fut extraite par une contre-ouverture. Cette blessure, légère en apparence, fut cependant compliquée d'un vaste érysipèle menaçant de s'étendre vers le bassin. L'extrémité supérieure de la jambe et le genou étaient ecchymosés, et toute la cuisse, envahie par l'affection érysipélateuse, était en même temps le siège d'une énorme tuméfaction. Cet incident fâcheux, survenu brusquement, avait déterminé de la fièvre et du délire. Le moyen énergique si souvent employé avec succès par M. Larrey contre l'érysipèle traumatique, le cautère actuel, ne réussit pas moins dans cette circonstance, et fut secondé dans ses effets par l'application d'un appareil compressif sur tout le membre; les accidens secondaires disparurent en même temps, et la cicatrisation a dès lors suivi une marche régulière. Dans les premiers jours de septembre, M. de Saint-C*** est sorti de l'hôpital tout-à-fait guéri.

Sans faire de réflexion sur les complications

des blessures légères, nous dirons que ce fait est propre à confirmer l'assertion de M. Larrey sur les effets comparatifs des balles de plomb et des balles de pierre, savoir : que celles-ci, toutes choses égales d'ailleurs, ont occasioné des lésions plus profondes, en raison de leur plus grande élasticité, et de la résistance des tissus, plus facilement étranglés, distendus; tandis que des projectiles de métal, plus pesans et beaucoup moins élastiques, les traversaient sans peine et occasionnaient ainsi moins d'ébranlement et des blessures plus régulières. D'ailleurs, M. de Saint-C*** lui-même, pouvant en juger par expérience personnelle, nous disait que, de toutes les balles dont il avait été atteint dans le cours de sa longue carrière militaire, aucune ne semblait lui avoir fait autant de mal que cette bille de pierre. Je l'avais présentée à M. le professeur Dupuytren, qui en a parlé dans ses leçons au sujet des divers projectiles lancés par la poudre à canon.

Deuxième observation. — R***, soldat au 50^e régiment de ligne, avait été atteint, le 29, d'une double blessure à la cuisse gauche, l'une résultant de la chute d'un pavé, qui produisit une contusion violente avec plaie sans fracturer le fémur, et l'autre d'une balle qui traversa l'épaisseur du membre : on en fit aisément l'extrac-

tion, dès que ce blessé eut été apporté à l'hôpital. Le jour même, il fut exposé aux dangers les plus imminens; la commotion du membre s'était propagée dans tout le corps, devenu raide et engourdi; l'agitation morale était extrême, elle devint bientôt délirante, et la fièvre traumatique, très-intense, s'accrut bien plus encore par le développement presque immédiat d'un vaste érysipèle phlegmoneux. Toute la cuisse envahie par cette inflammation était énormément tuméfiée, fort douloureuse et immuable; l'extension du mal menaçait incessamment le bas-ventre; tous les symptômes secondaires s'étaient exaspérés, et l'existence de ce malheureux nous paraissait à son terme. Sans tarder un instant, M. Larrey pratique deux incisions longues et profondes dans l'épaisseur de la cuisse, donne issue à une abondante quantité de pus et applique aussitôt après un large cautère incandescent sur les bords des plaies et à toute la surface de l'érysipèle, en n'épargnant pas un seul point. On sera peut-être tenté de dire que c'est là une chirurgie effrayante; mais aussi on sera forcé de convenir que c'est une chirurgie positive, une chirurgie qui sauve la vie. Sans des ressources aussi puissantes, la mort allait infailliblement suivre ce cortége d'accidens funestes: ils se sont immédiatement apaisés, et ont fini par

disparaître entièrement. Les plaies seules, en raison de leur profondeur et de leur étendue, ont nécessité plusieurs mois pour se cicatriser; il est survenu dans les derniers temps une hémorragie assez forte, produite par une artère musculaire; comme il restait de la tuméfaction, cette hémorragie a été ainsi plus utile que nuisible, en opérant un dégorgement salutaire. Une escarre fort large a encore compliqué les lenteurs de la guérison, qui s'est effectuée enfin parfaitement par les soins assidus et multipliés de notre condisciple M. Tisserand, chargé spécialement de cette tâche méritoire.

Troisième observation. — H**, soldat au 7^e régiment, fut renversé, le 28, par un coup de feu tiré à bout portant dans la cuisse gauche. La balle, en traversant l'épaisseur du membre à son tiers supérieur, de dehors en dedans et d'avant en arrière, avait fracassé le corps du fémur très-près du petit trochanter, sans léser l'artère crurale. M. Larrey commença par débrider largement les deux plaies, et procéda ensuite à l'extraction de toutes les esquilles mobiles, dont l'une avait près de deux pouces de longueur. La déperdition de substance était donc considérable; les effets de la commotion avaient été immédiats, et le blessé fut apporté dans un état de stupeur générale. La première

idée du chirurgien en chef fut d'amputer le membre; néanmoins, en songeant à la possibilité de le conserver, au moyen de son appareil inamovible (1), il se décida de suite à l'employer et le laissa en place pendant cinquante jours: il n'en résulta ni gène ni douleur, ni aucune complication traumatique. On aurait dû le maintenir tel

(1) Il suffit sans doute de rappeler que cet appareil se compose des différentes pièces suivantes: 1^o un drap ployé en plusieurs doubles, placé sous le membre, dépassant le talon, et dans lequel on roule les fanons, aussi est-il appelé le *drap-fanon*; 2^o ces *fanons* sont deux cylindres d'un pouce ou deux d'épaisseur, formés de paille, serrés fortement par des ficelles, et moins longs que le drap-fanon. Ils font l'office d'attelles, mais sont plus avantageux par leur élasticité, qui se prête bien mieux aux inégalités du membre et le comprime plus uniformément; 3^o les deux coussins ou *remplissages*, d'une longueur égale à celle des fanons, et disposés comme dans les appareils ordinaires; 4^o la *talonière*, c'est un petit coussin placé sous le tendon d'Achille, sans porter sur le talon; 5^o trois compresses superposées, à six chefs; 6^o des compresses simples, et, s'il y a plaie, de la charpie et du linge fenêtré enduit de cérat ou d'onguent *styrax*; 7^o une petite bande destinée à maintenir le pied, et une compresse longuette servant d'étrier; 8^o une pièce de toile appelée *tibiale* dont on recouvre tout l'appareil; 9^o enfin, plusieurs liens en ruban de fil. Pour les détails et les nombreux avantages de cet appareil inamovible, voyez la *Clinique chirurgicale*.

quinze ou vingt jours de plus; mais M. Larrey en fit la levée le 16 septembre, presque malgré lui, et pour céder à la demande de quelques chirurgiens étrangers, curieux de voir le travail de la consolidation du fémur et l'état extérieur du membre. A leur grande surprise, ils trouvèrent la cuisse dans une rectitude parfaite; les fragmens osseux s'étaient rapprochés l'un de l'autre très-exactement: ce qui le prouvait, c'était le racourcissement proportionné de la jambe, d'un pouce et demi environ. Les deux plaies avaient fourni une suppuration assez abondante, épanchée au pourtour de la cuisse et dans les pièces de l'appareil; elles ne contenaient d'ailleurs aucune esquille secondaire. Satisfait d'un résultat aussi remarquable, le chirurgien en chef appliqua un nouvel appareil moins compliqué, et destiné également à rester inamovible pendant plusieurs jours encore, parce que la consolidation, commencée seulement, avait besoin de soutien. Malheureusement le blessé, ayant été transporté dans une autre salle sans des précautions suffisantes, et même à l'insu de M. Larrey, reçut dans la cuisse quelques secousses qui déterminèrent le déplacement et le chevauchement des pièces fracturées. On ne pouvait plus, si tard, tenter une nouvelle coaptation, et dès lors la cuisse a pris une courbure qui, en la rendant

difforme, a augmenté de beaucoup le raccourcissement.

Ainsi fut détruit pour toujours le succès entier de cette guérison primitive, qui aurait offert un exemple rare de conservation de la cuisse sans difformité, à la suite d'une fracture comminutive et compliquée par arme à feu.

Plaies de l'articulation du genou.

D'accord à cet égard avec tous les praticiens, M. Larrey pense que dans tous les cas où l'articulation du genou a été largement ouverte par un coup de feu, il ne faut pas hésiter à amputer la cuisse.

Mais il arrive souvent que la lésion du genou est tout-à-fait superficielle en apparence, même malgré les précautions convenables pour en suivre le trajet; l'état primitif n'offre aucun caractère grave; néanmoins, au bout d'un temps plus ou moins long, apparaissent des symptômes d'inflammation latente, des accidens nerveux, des infiltrations et des foyers de pus; la fièvre traumatique se déclare, et la marche des complications devient quelquefois si rapide que l'on n'a pas même le temps de lui opposer les moyens indiqués pour recourir ensuite à l'amputation; il est trop tard alors, le blessé est destiné à périr.

Le fait suivant, le seul heureusement qui se soit présenté, est une application de cette triste vérité.

C***, soldat au 50^e régiment de ligne, reçut un coup de feu au genou gauche, et fut transporté sans délai à l'hôpital du Gros-Caillou. Le condyle interne du tibia paraissait seul lésé; c'était une simple échancrure, et la sonde, introduite à l'entrée de la plaie, n'indiquait pas qu'il y eût pénétration. Aussi les premiers jours furent exempts de tout incident fâcheux; mais vers le septième il se déclara de la tension et de la douleur au pourtour de l'articulation du genou, un point de fluctuation, et l'on découvrit une infiltration de pus. Bientôt le genou devint le siège d'une tuméfaction considérable, propagée à la cuisse et douloureuse sous la moindre pression. Des saignées locales et une saignée générale, des cataplasmes émolliens furent vainement employés. La complication de cette plaie, simple d'abord, se compliqua, pour ainsi dire, elle-même de pneumonie, de gastrite aigüë, de réaction inflammatoire sur l'encéphale, et enfin d'une ictere symptomatique. Tant de désordre, dûs peut-être à la résorption purulente, et surajoutés aux dangers consécutifs de la blessure, devaient se terminer par la mort, qui eut lieu le 25 août. On n'a pu faire l'autopsie cadastrique.

Amputation de la cuisse.

Nécessitée non-seulement toutes les fois que l'articulation du genou a été fracassée par un coup de feu, ou bien largement ouverte (1), mais encore pour les fractures comminutives et compliquées du fémur, l'amputation de la cuisse, comme la plupart des amputations en général, a des conséquences d'autant plus favorables qu'elle est pratiquée moins tardivement. M. Larrey attribue beaucoup plus d'avantages à la méthode circulaire qu'à la méthode à lambeaux, qui doit être employée uniquement dans certains cas indiqués par la désorganisation des parties molles; aucun des cinq faits suivans n'a exigé ce dernier mode opératoire. De ces cinq amputations, deux ont été primitives et suivies de succès, et les trois autres consécutives, dont une seule a eu un résultat funeste.

Première observation. — M. C***, officier au 6^e régiment, avait ordre de partir de la Madeleine, avec un faible poignée d'hommes, pour se rendre aux Tuileries, au moment où l'on

(1) Bien entendu qu'il n'est nullement question ici des maladies chroniques de l'articulation du genou.

fit sur eux une décharge imprévue ; l'officier seul fut grièvement blessé : il avait reçu deux coups de feu à la jambe droite, et un troisième à la tête. Dès qu'il fut apporté à l'hôpital, on s'empessa de le secourir. La jambe était fracturée dans son tiers supérieur par l'une des deux balles, et l'articulation du genou fracassée par l'autre : dès lors l'indication ne restait pas douteuse, il fallait couper la cuisse. Après bien de l'opposition et des craintes de la part du patient, encore en proie à une agitation extrême, le chirurgien en chef fit l'amputation à deux pouces environ des condyles du fémur, et réunit la plaie du moignon presque immédiatement. La cicatrisation a été assez longue et entravée par plusieurs accidens, tels que la fièvre traumatique, des symptômes d'irritation gastrique, un engorgement sympathique des glandes inguinales du côté correspondant à l'amputation, et des esquilles secondaires ; d'ailleurs l'existence de M. C*** n'a pas été en danger, et la guérison est terminée depuis le mois de novembre.

Quant à la plaie de la tête, elle résultait d'une balle, qui avait seulement déchiré l'épaisseur de la joue, au niveau de l'angle de l'os maxillaire inférieur du côté droit. Le muscle masséter avait été entamé; car les mouvements de mastication sont toujours un peu difficiles, et sans

doute aussi que l'un des rameaux antérieurs du plexus cervical aura été lésé, puisqu'il en est advenu consécutivement une demi-paralysie de tout le bras droit; elle a cédé à l'application réitérée du moxa près de la blessure.

Deuxième observation. — G***, sergent au 7^e régiment des Suisses, avait été frappé, le 28, à la Grève, d'un coup de feu dans la cuisse gauche. Ce fut à la faveur de la nuit que l'on parvint à le transporter au Gros-Caillou. La balle, en traversant l'épaisseur de la cuisse à un pouce au dessus du genou, avait fracassé le tiers inférieur et les condyles du fémur. Le délabrement du membre était tel, que l'on ne pouvait même songer à l'application d'aucun appareil. L'amputation fut donc décidée immédiatement, et confiée par le chirurgien en chef à l'un de nos collègues, M. Barthélemy. Une énorme tuméfaction de la cuisse, survenue presque immédiatement après la blessure, ajouta un peu à la difficulté du manuel opératoire. La réunion fut faite difficilement par première intention; il n'a fallu remédier qu'à de légers accidens consécutifs, et la cicatrisation a été assez prompte et parfaite.

Troisième observation. — E***, sorti récemment des cuirassiers de l'ex-garde, et employé depuis à la Monnaie des médailles, fut blessé, à très-petite distance, d'un coup de feu dans le

genou gauche. C'était le 28, rue Saint-Honoré. Ce citoyen, demeurant tout près de l'hôpital du Gros-Caillou, s'y fit conduire de suite. La plaie semblait tout-à-fait simple, et ne présentait d'autre signe qu'une fracture au condyle externe du fémur, et une perforation des tégumens à l'angle supérieur de l'espace poplité. Il ne se déclara primitivement aucun symptôme fâcheux; néanmoins M. Larrey n'était nullement persuadé de la simplicité de la lésion, et craignait même la nécessité d'en venir plus tard à l'amputation de la cuisse. Effectivement, vers le dixième jour, des douleurs tellement vives apparurent dans l'articulation du genou, que bientôt elles se manifestèrent par les prodromes du tétanos; la blessure, sondée avec toute la délicatesse possible, afin de ne pas exaspérer l'érétisme nerveux, décela alors toute sa gravité: la cavité articulaire était le siège d'un épanchement purulenta. Devait-on laisser en doute l'urgence de l'amputation? Elle fut pratiquée aussitôt, le 10 août, par le chirurgien en chef, qui rapprocha seulement les bords de la plaie sans les réunir par première intention.

A la dissection du membre, nous trouvâmes en effet un épanchement de pus dans l'articulation et dans les bourses synoviales. Le condyle externe du fémur présentait un point fracturé

avec déperdition de substance ; mais les cartilages étaient intacts, comme le constatent d'ailleurs beaucoup d'autres faits, même dans les maladies chroniques des articulations.

Les résultats subséquens de cette amputation ont été fâcheux ; ainsi, le jour même, il est survenu une hémorragie veineuse fort abondante et difficile à arrêter : elle affaiblit beaucoup l'amputé, qui eut pendant quelque temps de la fièvre et de la diarrhée. A cet état général se joignit la mauvaise disposition du moignon, fortement froissé par des mouvements spastiques ; l'os faisait saillie, les téguments étaient décollés en plusieurs endroits, et la suppuration s'y était épanchée.

Malgré si peu de chances favorables de guérison, les résultats définitifs ont été très-heureux, grâce aux soins habiles de M. l'aide-major Gimelle, qui est parvenu à dissiper les symptômes généraux, et à rétablir la plaie du moignon dans les conditions nécessaires à une cicatrisation régulière.

Quatrième observation. — G***, caporal au 6^e régiment, avait eu le genou gauche atteint d'une balle par contre-coup. La plaie semblait superficielle, quoique le projectile se fût enclavé dans le condyle interne du fémur, d'où il ne put être extrait. Les pansemens furent

simples, et aucun accident primitif n'eut lieu ; au bout de quelques jours, il se forma un abcès au dessous de la rotule, il fut ouvert, et donna issue à une assez grande quantité de matière purulente. Un autre épanchement se développa : la plaie fut débridée, une contre-ouverture faite, et un séton établi ; cependant le passage du pus au dehors n'empêcha pas l'infiltration intérieure ; il y eut des décollemens au pourtour de l'articulation, et plusieurs fusées purulentes, avec des symptômes concomitans de fièvre et de pneumonie, qui ne promettaient même pas à l'amputation des chances de succès. C'étaient pourtant une nécessité et un devoir de la pratiquer ; elle le fut le 21 août par le chirurgien en chef. A la dissection du membre, on trouva la balle enclavée dans l'épaisseur du condyle interne du fémur, qui était fracturé, et une infiltration purulente autour et à l'intérieur de l'articulation. Les premiers jours semblaient présager le succès ; mais vers le huitième il se déclara, sans cause directe bien appréciable, des symptômes d'une gastro-entérite avec pneumonie, et malgré l'emploi indiqué des antiphlogistiques, la mort eut lieu le 2 septembre.

La nécropsie fut faite le lendemain : la membrane muqueuse de l'estomac et de l'intestin

grêle était parsemée de plusieurs plaques rougeâtres, constatant l'existence de l'inflammation, Le côté gauche de la poitrine offrait les traces d'une pleurésie aiguë, par un épanchement considérable de sérosité, des pseudomembranes et des adhérences; plusieurs cavernes purulentes dans la substance pulmonaire nous ont paru provenir de quelque pleuropneumonie chronique, d'autant que nous étions fondés à le croire par des renseignemens antérieurs.

Je vais rapporter, au sujet de cette observation, un fait assez curieux: Le nommé G*** avait été affecté en 1818 d'un squirrhe du testicule droit; M. Larrey en fit l'ablation, et la guérison fut complète en vingt jours. A l'autopsie cadi-vérique, nous avons trouvé la cicatrice du scrotum à peine visible et tout-à-fait linéaire; le cordon des vaisseaux spermatiques presque entièrement atrophié, si ce n'est le canal déférent, figuré encore par un ruban ligamenteux; l'artère spermatique ne constituait plus qu'un vaisseau presque capillaire: nous n'avons pu distinguer les veines ni les nerfs, mais bien la gaine propre du cordon. La circonstance qui a le plus fixé l'attention de M. Larrey, c'est une dépression assez sensible de la bosse occipitale droite, correspondante au côté où le testicule avait été enlevé; l'hémisphère droit du cervelet était en

même temps plus petit que le gauche , et la fosse cérébelleuse paraissait aussi réduite en proportion. On peut regarder ce fait comme propre à vérifier les assertions du docteur Gall et d'un grand nombre de physiologistes , sur la sympathie du cervelet et des organes génitaux; il peut s'ajouter de même à d'autres faits analogues observés par M. Larrey, et que j'ai cités d'après lui, dans un mémoire sur l'ablation des testicules (1).

Cinquième observation. — C***, soldat au 7^e régiment des Suisses, blessé au genou droit le 28, fut transporté à l'hôpital le 29. Le projectile (c'était une balle de plomb) avait produit au condyle interne du fémur une lésion semblable à celle qu'a offerte le sujet de la quatrième observation, avec cette différence qu'ici la balle était restée implantée dans l'os, sans qu'il fût possible de l'en détacher. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, M. Larrey n'approuve pas, en général, les tentatives forcées pour extraire les corps étrangers, surtout lorsque ceux-ci sont trop fixement enclavés dans les parties osseuses formant de grandes articulations.

(1) J'ai présenté les pièces pathologiques à la Société d'anatomie.

Les accidens qui exigèrent l'amputation de la cuisse apparurent seulement au trentième jour; ils dépendaient d'un épanchement de pus dans le pourtour de l'articulation du genou, près de s'ouvrir elle-même : circonstance d'autant plus aggravante pour les chances de l'opération. Elle fut pratiquée, le 2 septembre, par M. Gimelle, qui réunit à peu près par première intention. La dissection du membre nous fit trouver la balle entre le condyle interne du tibia, lequel était fendu, et le condyle correspondant du fémur, qui avait été fracturé. L'épanchement de pus occupait tout le pourtour de l'extrémité inférieure du fémur, et une partie de l'espace poplité.

Aucun incident n'a entravé la cicatrisation de la plaie du moignon; au trentième jour, elle était achevée.

Plaies de la jambe.

Généralement accompagnées de lésions ou de symptômes graves, les plaies de la jambe ont aussi nécessité plusieurs amputations; avant d'en donner les détails, je vais citer seulement deux cas de blessures profondes guéries sans la perte du membre, ainsi qu'une autre du pied.

Première observation. — J***, soldat au 6^e régiment, avait été frappé à la jambe droite d'une

balle qui fractura le condyle interne du tibia, et ressortit au côté externe de l'espace poplité. Des symptômes nerveux eurent lieu presque immédiatement, et ne céderent qu'à l'application des cataplasmes émolliens sur la plaie. La cicatrice était terminée le 14 septembre, lorsqu'il se forma un abcès au dessus du condyle interne fracturé. Cet abcès, dont le foyer était comprimé par la tension de la peau, détermina de la fièvre; il fallut l'ouvrir, et il s'en écoula une grande quantité de pus; en sondant la plaie, on reconnut que la fracture du condyle du tibia n'avait pas même commencé à se consolider, peut-être à cause du contact de la matière purulente. On appliqua au genou un appareil inamovible; au bout de vingt jours la consolidation était parfaite, et la guérison parvenue à son terme définitif.

Deuxième observation.—V***, soldat au 7^e régiment, avait eu le tiers moyen du tibia fracassé par une balle. Débridemens, extraction des esquilles, appareils permanens, tout fut fait d'après la méthode déjà exposée. Cependant il survint des accidens primitifs et consécutifs: l'artère récurrente du genou fournit une hémorragie abondante le troisième jour, et quoique l'on ait réussi à l'arrêter par la compression, la fièvre symptomatique dura quarante-huit heures

d'une manière continue. Quelques avis se prononçaient pour l'amputation, mais l'opinion expectante du chirurgien en chef prévalut. Des esquilles secondaires furent extraites; on prévint par des pansemens méthodiques l'infiltration de la matière purulente dans l'interstice des muscles et vers l'articulation du genou; lorsqu'elle fut moins considérable, on renouvela d'autant plus rarement l'appareil que les fragmens du tibia devaient se consolider plus vite. Au quarante-cinquième jour, la guérison était terminée.

Plaies du pied.

Si quelques-unes ont nécessité l'amputation de la jambe, aucune n'a été suivie de l'amputation complète ou partielle du pied. La seule blessure qui aurait pu l'indiquer est celle-ci.

H***, sergent-major au 3^e régiment, avait eu le premier os métatarsien du côté gauche fracturé par un coup de feu. A la visite du chirurgien en chef, ce fut, de son avis même, un cas d'extirpation de la totalité du gros orteil; néanmoins il voulut essayer de le sauver et se contenta d'extraire plusieurs esquilles, de panser simplement, et d'appliquer un appareil compressif. Quelques accidens nerveux et inflammatoires ont été facilement dissipés pendant le

cours de la cicatrisation, on a détaché encore plusieurs petites esquilles mobiles, et au trentième jour la guérison était achevée. Ainsi, par une sage expectation, ce blessé a conservé l'orteil le plus nécessaire à la sustentation du pied.

Amputations de la jambe.

Moins heureuses dans leurs résultats généraux que les autres amputations, celles de la jambe ont été pratiquées, il est vrai, pour des blessures proportionnellement plus graves et plus compliquées. De deux amputations immédiates, une seule a réussi, encore la guérison a-t-elle été très-difficile et très-longue à s'effectuer; et de trois consécutives (1), une seule a eu du succès. En joignant à ces observations celle de M. le duc d'E***, amputé par M. Larrey hors de l'hôpital, on trouvera deux amputations consécutives, au lieu d'une, suivies de guérison. Si ces résultats ne peuvent s'ajouter à tous ceux qui prouvent les avantages des amputations pri-

(1) Il faut compter comme amputation primitive celle qu'a subie M. de P***, si l'on ne veut pas admettre les raisons qui nous l'ont fait placer au nombre des amputations consécutives. *Voyez la première observation.*

mitives, au moins ils ne les infirment pas; car il reste vrai que de vingt amputations en général dont j'aurai rapporté les détails, sept seulement ont été sans succès (non compris une amputation du moignon), et que de ce nombre six avaient été consécutives. Passons aux faits.

Première observation. — M. le comte de P***, âgé de quarante-huit ans, d'un tempérament nerveux, extrêmement impressionnable, et d'une constitution grêle, affaiblie encore par différentes maladies et d'anciennes campagnes, avait été aide-de-camp de Dumoustier, et s'était principalement distingué en Hollande, en Espagne et en Prusse, par sa bravoure et sa capacité militaire. Etait-il donc destiné à combattre contre des Français? Colonel du 3^e régiment de l'ex-garde, il marchait en tête dès le matin du 27 juillet, et parcourait les boulevarts. Vers dix heures, il commença à éprouver une forte résistance de la part des citoyens; plus exposé encore qu'aucun autre de ses officiers, puisqu'il les devançait à cheval, il fut sollicité par eux de mettre pied à terre, et s'y refusa constamment. Les craintes que l'on avait pour le colonel se réalisèrent bientôt: à onze heures il fut atteint de deux balles à la jambe droite, et eut son cheval tué sous lui; (c'était à peu de distance de la Cour Batave, avant l'église Saint-Leu). Renversé par la vio-

lence de cette double secousse, il fut transporté de suite sous l'arceau Saint-Denis, où il reçut les soins d'urgence de MM. Villat et Beaufort, chirurgiens du régiment; à peine le colonel leur en laissa-t-il le temps nécessaire, il voulut absolument reparaître à la tête des siens, et force fut à tous de lui obéir. Quelques momens après, il fut cerné entre la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin sans pouvoir effectuer sa retraite, et obligé de soutenir le combat jusqu'à la fin de la journée. Enfin, les patriotes céderent peu à peu, et le 5^e régiment put évacuer le boulevard. M. de P*** demanda alors à être conduit à l'hôpital de la Garde, où un détachement nombreux protégea son arrivée, mais non sans éprouver encore plus d'un obstacle, puisqu'il fallut sept ou huit heures de marche pour parvenir de la porte Saint-Denis aux Champs-Elysées. Il était minuit passé quand ce cortége militaire entra dans l'hôpital: c'était une de ces scènes lugubres dont on se souvient long-temps. Dès que le chirurgien en chef fut averti que le colonel du 3^e régiment venait d'être apporté, il se rendit auprès de lui, enleva aussitôt l'appareil d'attente, et trouva la jambe entièrement froide et dépourvue de sensibilité dans presque toute son étendue. Un coup de feu avait fracturé la malléole externe, et un autre avait déchiré l'ar-

tère tibiale antérieure et fracassé le tiers moyen du tibia. Cette blessure ne laissait aucun doute sur la nécessité de l'amputation, mais était-il prudent de la pratiquer à l'instant même? L'état d'anxiété de M. de P***, qui était resté plus de douze heures blessé sans vouloir abandonner ses soldats, l'ébranlement déterminé par la chute du cheval, par la fatigue et le transport à l'hôpital, tels furent les motifs qui décidèrent M. Larrey à différer de quelques heures l'amputation, afin de calmer l'agitation morale, de réparer les forces physiques et surtout de rétablir, s'il était possible, la chaleur et la vitalité dans la jambe. A cet effet, on fit prendre au blessé un bouillon léger et un peu de vin de Bordeaux; des frictions avec de la flanelle sèche furent faites à la surface du corps, et l'on enveloppa le membre dans une couverture bien chaude, après avoir pansé simplement les plaies. Le 28, à cinq heures du matin, tout fut préparé pour l'amputation; M. de P*** avait un peu reposé, son état général était meilleur, et la chaleur avait un peu reparu dans le membre; mais l'extrémité inférieure de la jambe, et le pied toujours froids et sans vie, étaient entièrement frappés de sphacèle. Différer plus long-temps, c'eût été favoriser les progrès de la gangrène, il fallut donc pratiquer l'opération, après beaucoup de

craintes et d'hésitation de la part du patient. L'étendue de la plaie supérieure, et l'importance de s'éloigner autant que possible du siège de la gangrène, obligèrent le chirurgien en chef de faire l'amputation dans l'épaisseur des condyles du tibia en désarticulant la tête du péroné; il ne réunit pas par première intention, à cause de l'extrême irritabilité du moignon, et du tiraillement qu'aurait éprouvé la peau pour recouvrir une surface aussi large.

L'état primitif fut assez satisfaisant; vers le huitième jour, quelques accidens généraux apparurent, tels que de la fièvre, une irritation symptomatique de l'estomac et de l'inquiétude morale. De légers antispasmodiques, aidés de quelques révulsifs, produisirent du soulagement; mais bientôt les accidens reparurent avec plus d'intensité; il s'y joignit de la toux et de la diarrhée. La plaie du moignon, qui jusqu'alors avait fait présager des chances favorables de guérison, prit un caractère fâcheux, par le développement d'une collection de pus au pourtour de l'articulation du genou. C'était déjà le 23 août: M. Larrey fit deux incisions latérales un peu au dessus des condyles du fémur, et livra ainsi passage à une grande quantité de matière purulente verdâtre, fétide et paraissant annoncer la désorganisation des portions musculaires

environnantes. Ce malheureux incident agrava les dangers, et surtout l'agitation et l'anxiété morales, parvenues à un tel point, que la moindre modification dans les pansemens ou dans le régime, la vue d'une seule personne étrangère au service étaient de nouvelles causes d'inquiétude pour M. de P***. La suppuration devenait tous les jours plus abondante et plus mauvaise ; l'amaigrissement était extrême, la fièvre presque continue, et la toux opiniâtre. Malgré l'emploi des moyens les plus capables d'agir efficacement, le mal se montra bientôt au dessus de toutes les ressources de l'art. Le 28, il se déclara du délire ; à tout moment le colonel demandait son cheval, ses armes, ses compagnons, et par intervalles il tombait dans un épuisement profond ; enfin le 29, à l'heure même où il avait été blessé, à onze heures du matin, il expira.

L'autopsie cadavérique, faite le lendemain, nous fit reconnaître un épanchement de sérosité dans le crâne, une forte injection de l'arachnoïde et un ramollissement non douteux du cerveau ; un épanchement considérable dans la poitrine, plusieurs adhérences, quelques fausses membranes ; et des tubercules suppurans dans les deux poumons ; enfin un abcès au foie et des plaques enflammées de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins. Quant au membre

amputé, il était totalement désorganisé; le travail de la cicatrisation était resté stationnaire depuis le dixième jour, et l'infiltration purulente, après avoir envahi l'articulation du genou, s'était propagée au tiers supérieur de la cuisse, dont les muscles avaient été presque entièrement réduits en putrilage.

L'embaumement du corps de M. de P***, ayant été demandé par sa famille, fut dirigé par mon père, qui nous fit connaître, à mon condisciple M. Germain et à moi, le manière d'y procéder d'après une méthode égyptienne. Le corps a dû être transporté ensuite en Provence.

Si, récapitulant en peu de mots les différens points principaux de cette observation, nous cherchons à en déduire quelques conséquences chirurgicales, nous voyons d'abord que le long intervalle de douze heures écoulé depuis le moment de la blessure jusqu'à celui de l'arrivée à l'hôpital a été allégé uniquement par un pansement d'attente; tandis que les plaies étaient graves, l'affaiblissement et l'agitation morale continu, et qu'enfin la gangrène avait eu le temps d'envahir une partie du membre.

Nous voyons ensuite que l'état inquiétant du blessé, le besoin de repos, et l'heure avancée de la nuit conseillaient à la prudence du chirurgien en chef de différer de quelques heures l'ampu-

tation. J'ajouterais même que l'on aurait temporisé jusqu'à ce que la gangrène fût limitée, si des faits notoires n'avaient, depuis long-temps, convaincu M. Larrey qu'en général il n'est nullement indispensable que la gangrène traumatique d'un membre soit bornée, pour en faire l'ablution. Bien plus, il blâme alors l'expectation, qui permet au mal de se propager rapidement par absorption et par continuité de vaisseaux.

La blessure du colonel de P***, et la mortification prompte du membre, nous prouvent encore qu'il ne faudrait pas déclarer absolument primitives toutes les amputations faites dans les premières vingt-quatre heures, puisqu'il suffit d'un temps moins long pour entraîner une désorganisation telle qu'il serait mieux alors de nommer l'amputation consécutive.

Nous voyons, en dernier lieu, que l'anxiété continue et l'exaspération morale ont dû contribuer essentiellement au funeste résultat, ainsi que la gravité de la blessure, les chances défavorables de l'opération, et les complications ultérieures.

Cette observation, dont j'ai été à même de recueillir les détails jour par jour, m'a semblé devoir être exposée dans cette relation un peu plus longuement que les autres, à cause des nom-

breuses questions dont elle a été le sujet dans le monde.

Deuxième observation. — B***, soldat au 1^{er} régiment, avait eu la jambe gauche fracassée dans son tiers supérieur par une balle lancée presque à bout portant. Cette fracture comminutive, très-près des condyles du tibia, n'offrait aucune chance propice à l'application d'un appareil quelconque, et nécessitait l'amputation de la jambe; elle fut aussitôt pratiquée par M. Gimelle dans l'épaisseur des condyles, d'après la méthode de M. Larrey. La réunion avait été faite à peu près par première intention. Tout alla très-bien jusqu'au troisième jour, mais apparurent alors des symptômes de triste présage: céphalalgie, fièvre, irritation symptomatique de l'estomac, coliques, et diarrhée: un vésicatoire appliqué sur l'abdomen ne produisit qu'une amélioration momentanée; les accidens se renouvelèrent le lendemain avec plus d'intensité et une complication locale non moins fâcheuse. Une fusée purulente avait décollé la peau autour et au dessus du moignon dans l'étendue de plusieurs pouces, et un épanchement considérable s'était formé dans l'espace poplité. Restait-il quelque ressource, quelque chance de salut? Aucune autre que l'amputation du moignon; avant de la tenter, on essaya encore les

moyens susceptibles d'entraver la persistance des désordres généraux, et de diminuer l'abondante quantité de pus infiltré. Rien ne réussit; on se décida donc à l'amputation secondaire de la cuisse.

Elle fut exécutée le vingt-cinquième jour par le chirurgien en chef; mais les cris, l'agitation et l'inquiétude extrêmes du blessé, la difficulté de maintenir le moignon convenablement, et l'évacuation imprévue d'un vaste foyer de matière purulente, au moment de la section des tégumens, furent autant de circonstances qui rendirent cette opération douloureuse, délicate, et moins prompte que dans les cas ordinaires: aussi les résultats en furent malheureux. Après vingt heures de fièvre ardente, la mort termina cette longue série de souffrances.

Troisième observation.—M. G***, l'un des plus anciens lieutenans de dragons, arrivait, le 29, avec son régiment, par les Champs-Élysées, où se trouvaient épars quelques tirailleurs nationaux: l'un d'eux, caché derrière un arbre, s'avance hardiment vers l'officier, l'ajuste à quelques pas de distance, l'atteint à la jambe droite, et parvient à s'esquiver. Le cheval, effrayé, s'étais abattu et avait renversé son cavalier sur la jambe même qui venait d'être blessée. La violence de la commotion et l'ébranlement qu'elle

causa dans tous les organes de la vie intérieure avaient déjà déterminé un état de stupeur complète. M. G*** fut aussitôt relevé par ses dragons, et transporté à l'hôpital du Gros-Caillou, où nous le reçumes presque mourant. On s'empressa d'abord de rétablir l'équilibre des fonctions générales, au moyen de quelques frictions sèches avec de la flanelle chaude, et en faisant avaler au blessé un peu de vin de Bordeaux et du bouillon. Les os de la jambe avaient été fracassés par deux balles, à la réunion du tiers moyen au tiers supérieur du membre; les parties molles étaient désorganisées; une ecchymose considérable environnait la plaie, et déjà le gonflement inflammatoire se propageait au genou et à la cuisse. Aucun espoir de conserver le membre. L'amputation fut jugée indispensable: M. G*** s'y soumit sans hésiter (c'était deux heures après l'accident); elle fut pratiquée par le chirurgien en chef dans l'épaisseur des condyles du tibia, avec désarticulation de la tête du péroné. La réunion immédiate fut établie à l'aide de bandelettes agglutinatives; des ventouses scarifiées à l'épigastre et aux hypochondres, pour opérer une révulsion salutaire; une saignée générale et la diète, telle fut la première prescription. Aucun accident primitif n'eut lieu; mais vers le quatrième jour, il

survint de la douleur dans le genou, de l'éréthisme, de la fièvre et même du délire ; un érysipèle traumatique envahit toute la cuisse, énormément tuméfiée ; la plaie du moignon, dont on leva l'appareil, offrait les signes de la pourriture d'hôpital : douleurs lancinantes, boursoufflement des lèvres de la plaie, devenues ternes et livides, stase de la suppuration, changée en une matière grisâtre, glutineuse et fétide. À tous ces symptômes se joignait encore un nouvel état de stupeur et d'engourdissement ; il était urgent d'employer sans retard les moyens susceptibles d'y remédier. M. Larrey commença donc par appliquer le cautère actuel à toute la surface de l'érysipèle traumatique et sur le moignon même, pour détruire les effets de la gangrène d'hôpital ; puis il plaça de nouveau des ventouses scarifiées à l'épigastre, aux hypochondres, et des ventouses sèches sur différens points de l'abdomen. Cette médication active produisit une amélioration bien notable dans l'état du blessé : ainsi l'érysipèle avait cédé, et la pourriture d'hôpital ne présentait plus ses signes caractéristiques ; mais la fièvre traumatique persistait encore sans qu'il fût possible de la détruire, lorsque l'on reconnut qu'elle avait pour cause une collection purulente développée sous l'aponévrose du fascia lata, au tiers supérieur de la cuisse, et résult-

tant sans doute de la contusion et de la compression du membre au moment de la chute. Cet épanchement de pus avait même occasionné déjà un décollement assez étendu. M. Larrey pratiqua deux incisions latérales, qui donnèrent issue à une grande quantité de pus; un séton entretenait cet écoulement durant plusieurs jours. Après la cause, l'effet avait sensiblement diminué; bientôt la fièvre traumatique cessa complètement, et l'existence de M. G*** sembla enfin hors de danger. Les complications graves dont je viens de parler nous avaient fait craindre une terminaison fatale; et même si les symptômes généraux n'avaient pas été aussi alarmans, le mauvais état de la plaie aurait peut-être exigé l'amputation secondaire de la cuisse (1). Néanmoins, au milieu de toutes ses souffrances, notre intéressant blessé se soutenait toujours lui-même et lui tout seul par son courage et sa confiance entière dans les soins de M. Larrey; il semblait même vouloir s'abuser sur les chances de sa position. Enfin, après soixante jours d'inquiétudes l'assurance de la guérison s'est prononcée. M. l'aide-major Gimelle, chargé des pansemens, parvint à dissiper

(1) M. Ribes avait été appelé par son ami en consultation.

tous les accidens généraux et à ramener à l'état simple la cicatrisation de la plaie. Elle est depuis long-temps terminée, et le seul inconvenient ultérieur sera peut-être une ankylose incomplète du genou.

L'estime et l'affection que le brave capitaine G*** mérite de la part de tous ceux qui le connaissent, le regret d'avoir été constraint par sa conscience de militaire à une mission réprouvée par sa conscience de citoyen français, et tous ses insignes, acquis sur des champs de bataille plus glorieux pour lui, sont des titres bien dignes d'être appréciés.

Quatrième observation. — B***, âgé de vingt-quatre ans, tourneur de profession, était assis sur l'impériale de l'une des innombrables voitures revenant de Rambouillet, lorsqu'un de ses camarades, placé dans l'intérieur, eut l'imprudence de décharger son fusil par la portière, et le blessa au pied gauche. Il fut aussitôt transporté à l'hôpital du Gros-Caillou. L'articulation tibio-tarsienne semblait seulement effleurée; aussi pensa-t-on la plaie simplement, d'autant qu'aucun accident ne se manifestait d'ailleurs; mais vers le huitième jour le pied devint le siège d'un gonflement inflammatoire assez étendu et très-douloureux; la quantité de la suppuration s'accrut promptement, et détermina une fièvre

ardente. M. Larrey, en sondant la plaie avec soin, reconnut que l'articulation était ouverte et pénétrée déjà par le pus. L'amputation de la jambe était inévitable; le blessé ne s'y résolut que très-difficilement: elle fut pratiquée, le 11 août, par le chirurgien en chef; mais dès le lendemain il survint des accidens nerveux et une hémorragie veineuse assez forte. Le 17, la fièvre fut accompagnée d'hépatite symptomatique et de délire: rien ne put arrêter les progrès rapides de cette funeste complication, et deux jours après le jeune B*** avait succombé.

La dissection du membre démontra une lésion plus profonde qu'on ne l'avait diagnostiquée, car, indépendamment de la plaie pénétrante de l'articulation tibio-tarsienne, l'astragale était fracturé, et tous les os de la seconde rangée du tarse se trouvaient broyés. Il n'a pas été possible d'examiner les organes intérieurs.

Cinquième observation. — F***, soldat au 7^e régiment, avait eu l'articulation du pied gauche fracassée par un coup de feu. On a tenté inutilement la conservation du membre; les accidens ultérieurs ont exigé l'amputation de la jambe. Elle a été faite, le 12 août, par M. l'aide-major Gimelle, et suivie d'un plein succès: la cicatrice était terminée au vingt-

cinquième jour. C'est le seul fait d'amputation consécutive que nous ayons vu réussir aussi complètement.

Sixième observation. — M. le duc d'E***, lieutenant-colonel des lanciers, avait été atteint, le 29, d'un coup de feu au pied droit, lors de la retraite des troupes à Saint-Cloud. Transporté immédiatement à l'hôpital militaire de Versailles, il y fut pansé de sa plaie que l'on espérait préserver de toute opération majeure. L'articulation tibio-tarsienne avait été ouverte par la balle; et bien qu'aucun accident primitif ne se fût déclaré, des symptômes locaux d'inflammation intense et d'éréthisme nerveux survinrent brusquement vers le dixième jour. Loin d'être passagers, ils augmentèrent avec rapidité et faisaient craindre déjà une terminaison fatale. M. d'E*** lui-même voulut connaître sur sa position l'avis de M. Larrey, qui se rendit de suite à Versailles (c'était le douzième jour), et annonça tout le danger de la blessure et de ses complications. L'amputation de la jambe aurait dû être faite dès le principe, si l'on n'avait espéré avec trop de confiance la conservation du membre. On voulut même temporiser davantage; cependant vers le seizième ou dix-septième jour, l'éréthisme nerveux était devenu tel qu'il offrait tous les

prodromes du tétanos. A une nouvelle visite, M. Larrey, ayant reconnu bien plus encore l'urgence de l'opération, en démontra la nécessité absolue au blessé, qui s'y soumit aussitôt avec courage. L'état consécutif fut caractérisé par plusieurs incidens contraires, et notamment par la déformation de la plaie du moignon, et un commencement de saillie osseuse. M. Larrey retourna alors auprès de son amputé, qu'il n'avait pu surveiller lui-même, si loin de ses occupations. Il employa tous ses soins à rétablir chaque chose dans une position normale, et décida M. d'E*** à se faire transporter à Paris, où il a continué de le panser lui-même. La cicatrice s'est achevée régulièrement, et la santé générale a été bientôt rétablie.

Conclusions.

Ici se termine la série des observations les plus notables dont je m'étais engagé à rendre compte. On a jugé des résultats généraux et de chaque résultat en particulier; on a pu s'assurer que les succès annoncés primitivement par M. Larrey à l'Institut, et par d'autres voies de publicité, se sont confirmés à peu près dans la même proportion. Je n'ai plus maintenant qu'à énumérer les

diverses circonstances principales ou accessoires qui ont influé sur la terminaison heureuse de la plupart des blessures.

La première condition offerte d'elle-même, c'est la situation topographique de l'hôpital de l'ex-garde. Placé à l'extrémité du quartier du Gros-Caillou, tout près du Champ-de-Mars, à l'issue de la rue Saint-Dominique et de la rue de l'Université, il jouit sous ce rapport d'une salubrité parfaite; aucun encombrement alentour, aucune usine (1) qui lui transmette des exhalaisons nuisibles. Une fontaine à l'entrée, de grandes cours, un vaste terrain ombragé d'arbres, et la proximité de la Seine, entretiennent sans cesse la fraîcheur et la pureté de l'air.

Les salles, quoique un peu petites et même assez basses dans la division des blessés, sont tenues et aérées avec le plus grand soin, elles ont même, ce me semble, certains avantages sur de plus grandes salles; c'est d'abord que, contenant très-peu d'hommes, elles sont bien moins exposées aux funestes conséquences de

(1) La manufacture de tabac est bien plus rapprochée de la place des Invalides que du Champ-de-Mars.

l'encombrement, telles que le typhus, la gangrène d'hôpital, etc.; et bien que ces accidens soient partout fort rares, ne seraient-ils pas bien plus bornés en se manifestant dans un local peu étendu que dans un autre très-spacieux? En outre, les soins ne sont-ils pas plus multipliés lorsque quinze, vingt ou vingt-cinq blessés ont à leur service deux ou trois infirmiers, dont l'un est de garde auprès d'eux pendant toute la nuit, que lorsqu'on n'en accorde pas un plus grand nombre à une salle de quarante ou cinquante lits? Et ces soins seraient, je le crois, bien mieux répartis encore, s'ils étaient partagés, comme dans les hôpitaux civils, par le dévouement des sœurs de charité, dévouement que les affaires de juillet placent au dessus de tout éloge, et qui donne un démenti formel à d'odieuses calomnies.

Spécialement consacré aux militaires dont la plupart sont sans familles ou se trouvent éloignés d'elles, l'hôpital de l'ex-garde a été aussi, sous ce point de vue, dans des circonstances favorables aux blessés des trois jours, en ce sens que leur état moral ne s'est pas ému, agité par l'impression naturelle des visites de parents ou d'amis; or cette cause a été dans les hôpitaux civils, et notamment à l'Hôtel-Dieu, l'une des influences secondaires de la mortalité. D'ail-

leurs la discipline militaire se serait opposée à l'entrée de personnes étrangères au service. L'état moral et le repos de nos blessés ont été de même bien moins troublés par le tumulte, les cris et le bruit des armes; car, bien que le quartier du Gros-Caillou fût, comme tous les autres, en pleine insurrection, les fusillades, le canon et le tocsin ne résonnaient pas d'aussi près qu'aux environs du grand hôpital civil. Réduits à leur défense personnelle, après avoir cru leur honneur engagé à soutenir une cause qui les avait sacrifiés, la plupart des soldats blessés n'avaient pas, comme les Parisiens, l'inquiétude de succomber, en laissant leurs familles dans le besoin et dans la douleur. S'ils étaient consternés, c'était par la honte d'avoir été vaincus, ou par le regret de s'être battus contre des concitoyens, ou bien par la crainte de perdre leur profession militaire et leur avenir. Aussi, avant de subir une opération chirurgicale, chacun d'eux demandait-il: « Pourrai-je encore servir? ou Aurai-je une pension? » Sans le savoir nous-mêmes, nous leur donnions toutes les assurances possibles; et il n'en fallait pas davantage pour rendre le calme aux esprits, et prévenir des influences fâcheuses sur la terminaison des plaies. C'est positivement de cette manière, c'est en prenant sur lui-même la

garantie de leur existente à venir, que M. Larrey est parvenu à sauver plusieurs blessés dont l'accablement profond avait aggravé déjà la position.

Entrés à l'hôpital qui leur était destiné, ils paraissaient beaucoup plus confiants dans les soins qu'ils recevaient, sans songer que la chirurgie était partout et pour tous également secourable.

Les impressions morales n'étaient pas les seules susceptibles d'influer favorablement sur l'état de la plupart des militaires blessés. Leur constitution physique a dû contribuer, comme cause prédisposante, à un résultat heureux: jeunes, forts, exempts d'infirmités, les soldats de l'ex-garde étaient dans les conditions opportunes à subir toutes les opérations nécessaires et les chances qui en dépendent. C'est à cette dernière influence que je crois devoir rapporter celle d'une constante résignation aux secours utiles, mais presque toujours douloureux, de la chirurgie (1). Habitués par discipline et par amour-propre de bravoure, autant peut-être

(1) J'ai même observé en général que les blessés qui ont montré le plus d'énergie morale sont ceux dont la guérison s'est prononcée le plus positivement.

que par tempérament , à subir leur sort , ils sa-
vaient se soumettre , presque sans hésiter , à
toutes les opérations nécessaires. Du reste , cette
remarque s'applique seulement , et en général ,
au fait même de l'impossibilité : car si la qualité
de courage appartient aux militaires , n'est-elle pas
aussi le noble insigne des citoyens de juillet ?

Ces dernières influences , que j'appellerais vo-
lontiers prédispositions individuelles , n'ont pas
été les seules propices à la terminaison des
blessures traitées au Gros-Caillou. Assurément
il s'y est offert un grand nombre de plaies très-
graves , et nous les avons citées ; plusieurs même
pouvaient être réputées mortelles , et quelques-
unes l'ont été en effet ; mais somme toute , il y a eu
moins de cas désespérés qu'à l'Hôtel-Dieu , dont
la proximité attirait un plus grand nombre de
victimes ; tandis que l'hôpital de l'ex-garde était
rapproché des combats partiels , et non des
combats en masse , tels qu'au Louvre , à la place
de Grève , etc.

J'ajouterai que la majeure partie des blessés
qui nous étaient envoyés , surtout par nos col-
lègues de l'ambulance du Carrousel (1) , se trou-

(1) Dans la soirée du 27 , l'état-major de la place avait
requis auprès du chirurgien en chef quelques-uns de ses

vaient déjà pansés ; et , quelque incomplets que pussent être souvent ces appareils d'attente , ils avaient suffi au moins pour arrêter des hémorragies et prévenir d'autres accidens primitifs.

C'est principalement aux soins donnés aux blessés immédiatement après leur entrée à l'hôpital , qu'il faut attribuer les influences les plus directes de guérison. La longue carrière militaire du chirurgien en chef lui avait rendu familiers tous les cas de plaies d'armes à feu qui se présentaient à lui. Sa méthode générale de traitement , et notamment les avantages des débridemens et des pansemens inamovibles ; sa médication révulsive , dont il a fait une si heureuse application aux blessures les plus dangereuses et souvent les plus désespérées ; enfin son discernement vrai dans la plupart des cas qui ont nécessité des amputations primitives , tel est en peu de mots le résumé des influences pratiques dues à l'expérience de M. Larrey. Ajoutons qu'il a fait placer dans un cabinet à part chacun des

élèves , pour diriger l'ambulance du Carrousel : un aide-major , M. Paban , et trois sous-aides , MM. Bahier , Cayrel et Mialhès , furent désignés. Les dangers auxquels ces messieurs ont été exposés , et le dévouement dont ils ont fait preuve pendant tout le temps de leur mission importante , n'auraient pu mériter une trop forte récompense.

blessés menacés de mourir. Il les persuadait que là tous les soins possibles leur seraient plus facilement donnés, et que toutes les causes extérieures de bruit troubleraient moins leur repos. En même temps il épargnait aux autres les souffrances de leurs camarades à l'agonie, et le spectacle de leurs cadavres. C'est assurément une précaution aussi utile que sage; elle a été employée de même pour toutes les grandes opérations.

Il est enfin une influence secondaire que je ne dois pas omettre dans cette énumération, c'est le zèle et l'empressement dont toutes les personnes attachées à l'hôpital ont fait preuve. La vigilance du directeur (1) présidait à chaque chose: rien n'a manqué pour la commodité du placement dans les salles, pour les appareils de pansemens, pour la confection des médicaments, et surtout pour la salubrité et l'excellence de la nourriture. A cet égard aussi, le fournisseur en chef de l'hôpital, M. Monttessuy, a contribué utilement aux succès obtenus.

D'ailleurs, comme tous les autres hôpitaux, celui du Gros-Caillou a eu des chirurgiens vo-

(1) M. Montigny.

lontaines, dont l'empressement et les services auraient pu se multiplier, si le nombre des blessés n'avait enfin cessé de se multiplier lui-même.

TABLE DES MATIÈRES.

RAPPORT DE M. DUPUYTREN A L'INSTITUT.	vij
CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.	9
Rapport de M. Larrey.	10
Documens nécessaires.	Ib.
Lieux du combat les plus rapprochés de l'hôpital.	11
Nombre des blessés.	12
Tableau.	13
Armes offensives et défensives des citoyens.	14
Distance des coups de feu.	16
Forces de la nation.	17
Hôpitaux civils ouverts aux militaires blessés.	Ib.
Ambulances.	18
Hospitalité pour les soldats blessés.	Ib.
Évacuation sur les hôpitaux militaires.	19
Ordre descriptif de ce mémoire.	Ib.
PLAIES D'ARMES A FEU.	20
Écrits publiés à ce sujet.	Ib.
Leçons orales du professeur Dupuytren.	21
Traitement général employé par M. Larrey.	Ib.
Débridemens.	22
Réunion des plaies.	Ib.
Pansemens simples.	23
Saignée générale.	Ib.
Saignées locales.	Ib.
Leyée de l'appareil.	25

Complication des plaies	26
Pansement des plaies multiples.	27
PLAIES DE LA TÊTE.	<i>Ib.</i>
Plaies simples du derme chevelu.	<i>Ib.</i>
Complication des plaies simples.	28
<i>Première observation.</i> Guérison.	<i>Ib.</i>
<i>Deuxième observation.</i> Mort.	32
<i>Troisième observation.</i> Guérison.	35
PLAIES DE LA FACE.	37
Traitemen ^t général.	<i>Ib.</i>
PLAIES DES YEUX.	38
<i>Première observation.</i> Guérison.	<i>Ib.</i>
<i>Deuxième observation.</i> Guérison.	39
<i>Troisième observation.</i> Guérison.	<i>Ib.</i>
PLAIE DE LA JOUE.	40
<i>Observation.</i> Guérison.	<i>Ib.</i>
FRACTURES COMMUNUTIVES DE LA MACHOIRE.	41
Traitemen ^t général.	<i>Ib.</i>
Consolidation des fragmens.	<i>Ib.</i>
<i>Première observation.</i> Guérison.	42
<i>Deuxième observation.</i> Guérison.	44
PLAIES DU COU.	47
<i>Observation.</i> Guérison.	<i>Ib.</i>
PLAIES PÉNÉTRANTES DE LA POITRINE.	48
Traitemen ^t général.	<i>Ib.</i>
<i>Première observation.</i> Guérison.	50
<i>Deuxième observation.</i> Guérison.	52
<i>Troisième observation.</i> Guérison.	53
<i>Quatrième observation.</i> Guérison	55
<i>Cinquième observation.</i> Guérison.	<i>Ib.</i>
<i>Sixième observation.</i> Guérison.	56
<i>Septième observation.</i> Guérison.	57
<i>Huitième observation.</i> Guérison.	58

PLAIES DE L'ABDOMEN	59
Plaies simples des parois abdominales	<i>Ib.</i>
Plaies des parois avec hernies viscérales	<i>Ib.</i>
Traitement général	<i>Ib.</i>
Plaies intestinales	60
Traitement	<i>Ib.</i>
Mode de cicatrisation	<i>Ib.</i>
<i>Première observation.</i> Guérison	61
<i>Deuxième observation.</i> Guérison	62
PLAIE DE LA VESSIE	63
<i>Observation.</i> Mort	<i>Ib.</i>
PLAIE DES PARTIES GÉNITALES	67
<i>Observation.</i> Guérison	<i>Ib.</i>
PLAIES DES MEMBRES	69
Traitement général	<i>Ib.</i>
PLAIES DE L'ÉPAULE ET DU BRAS	70
Le tétanos	<i>Ib.</i>
Observation de la clinique chirurgicale	71
<i>Première observation.</i> Mort	<i>Ib.</i>
<i>Deuxième observation.</i> Guérison	73
<i>Troisième observation.</i> Guérison	74
Plaie du bras	<i>Ib.</i>
Fracture comminutive de l'humérus	75
AMPUTATIONS DU BRAS DANS L'ARTICULATION SCAPULO-HUMÉRALE	77
Procédé de M. Larrey	<i>Ib.</i>
<i>Première observation.</i> Amputation consécutive	—
Mort	78
<i>Deuxième observation.</i> Amputation consécutive	—
Guérison	81
AMPUTATIONS DU BRAS DANS LA CONTINUITÉ	87
<i>Première observation.</i> Amputation primitive	—
Guérison	88

<i>Deuxième observation. Amputation primitive —</i>	
Guérison.	89
<i>Troisième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Mort.	90
<i>Quatrième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Mort.	91
PLAIES DE L'AVANT-BRAS.	94
<i>Première observation. Guérison.</i>	95
<i>Deuxième observation. Guérison.</i>	<i>Ib.</i>
<i>Troisième observation. Guérison.</i>	96
<i>Quatrième observation. Guérison</i>	<i>Ib.</i>
PLAIE DE LA MAIN.	98
<i>Observation. Guérison</i>	<i>Ib.</i>
AMPUTATIONS DES DOIGTS.	100
<i>Première observation. Guérison.</i>	101
<i>Deuxième observation. Guérison.</i>	<i>Ib.</i>
<i>Troisième observation. Guérison.</i>	102
PLAIES DE LA CUISSE.	<i>Ib.</i>
<i>Première observation. Guérison.</i>	<i>Ib.</i>
<i>Deuxième observation. Guérison.</i>	105
<i>Troisième observation. Guérison.</i>	106
PLAIES DE L'ARTICULATION DU GENOU.	109
<i>Observation. Mort.</i>	110
AMPUTATION DE LA CUISSE.	111
<i>Première observation. Amputation primitive. —</i>	
Guérison.	<i>Ib.</i>
<i>Deuxième observation. Amputation primitive. —</i>	
Guérison.	113
<i>Troisième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Guérison.	<i>Ib.</i>
<i>Quatrième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Mort.	115

<i>Cinquième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Guérison.	118
PLAIES DE LA JAMBE.	119
<i>Première observation. Guérison.</i>	<i>Ib.</i>
<i>Deuxième observation. Guérison.</i>	120
PLAIES DU PIED.	121
<i>Observation. Guérison.</i>	<i>Ib.</i>
AMPUTATIONS DE LA JAMBE.	122
<i>Première observation. Amputation consécutive. —</i>	
Mort.	123
<i>Deuxième observation. Amputation primitive. —</i>	
Amputation du moignon. — Mort.	130
<i>Troisième observation. Amputation primitive. —</i>	
Guérison.	131
<i>Quatrième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Mort.	135
<i>Cinquième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Guérison.	136
<i>Sixième observation. Amputation consécutive. —</i>	
Guérison.	137
CONCLUSIONS	138
Examen des causes qui ont influé en général sur	
l'heureuse terminaison des blessures.	<i>Ib.</i>
Situation topographique de l'hôpital.	139
Salles de chirurgie.	<i>II.</i>
Service des infirmiers.	<i>Ib.</i>
Dispositions morales des blessés.	140
Garantie de leur existence à venir.	141
Constitution physique.	142
Confiance et résignation.	143
Gravité des blessures.	<i>Ib.</i>
Pansemens d'attente.	144
Soins immédiats	<i>Ib.</i>

Expérience du chirurgien en chef.	<i>Ib.</i>
Méthode de traitement.	<i>Ib.</i>
Précaution de localité.	145
Zèle et activité de toutes les personnes attachées à l'hôpital.	<i>Ib.</i>
Chirurgiens volontaires.	<i>Ib.</i>





