

**Processus integri in morbis fere omnibus curandis. Quibus accessit graphica symptomatum delineatio, una cum quamplurimis observatu dignis. Necnon de phthisi tractatulo nunquam antehac edito / [Thomas Sydenham].**

### **Contributors**

Sydenham, Thomas, 1624-1689

### **Publication/Creation**

Londini : Impensis Sam. Smith & Benj. Walford & J. Knapton, 1695.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/j5xsrh5s>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>













Rx: Salis abinthij ʒi  
~~ma~~ ex cochleari uno  
succo limonum, mand &  
serio sumendum. inter  
medijs & temporibus: cochle-  
aria aliquot & q. mentha  
~~laxativa~~ bis quâq;  
hora propino

50487/A

Salt of steel.  
a compound salt.

Steel salt.  
not fusion salt  
thru. q. s.  
h. 2. 1/2  
3. 1/2



Ol. succini  
in spagmis

pret. 1: 6.

Griffiths

In cardialgia. heart b.  
℞ of calycate water (a simp.  
milk water, or Borragi aq) 3; or  
4 pints. dissolve in every draught  
a 3 of  $\frac{1}{2}$  bitter salt to 8 times.  
and drink it cold.

of am: put in

℞ of Rhubarb 3ss.

allana

quart: nut a

Sudan: 1/2 lb. Androm

~~Handwritten scribbles and crossed-out text at the bottom of the page.~~



<sup>℥. 2. 1/2</sup>  
Mintha. ℥i. sal. tartar ℥i. 1/2.  
Aolis. cron. ā: ℥i.  
Sp. Vin. lb ii

---

Aq. Lactis alpestris.  
Card Benedict. Ulmar.  
Galeg. ā M vi.  
Menth. Absinth com. M v. ā.  
rutā. M iiii  
angel. M ii. contus. addē  
lactis cong. iii. distil. organ  
commun



Benjamin. ℥i. Storax ℥ij.

Pulvis Latrum  
an excellent remedy  
in a green sickness.

In Catarrhum.

℞. Aq. pulg. ℥ij  
Syr. pavis Rhæad ℥ij

sumat 3. Spoonfulls  
3. vel. 4. in die: & nocte  
4 spoonfulls

Contr. Rheumatismum.  
Percoct. trifol. aq.



R 3 pints of Spring water  
one of milk, boil it a little  
then pour it upon a hard  
toast. drink it cold.

---

R. one Spoonful of 2 shav-  
ings of Horse-Radish-root.  
12 leaves of Scurvy-grass.  
20 raisins stoned, put em  
into a quart of Beer, let  
them stand close stop'd  
all night, drink of it the  
next day, at Meals & at  
any other time. This  
has done much good in the  
Scurvy.

---

Emoticū in Hebr. & Sydenham.

R. Infus. croc. metall. ʒvi.

oymet sullit. ʒ

Syr. Scabios. compos. a ʒss.



ung. Scabies.

℞ Nutrit. ℥iij Sulphur.  
vivi ℥iij Misco.  
Oil.

℞. Ung. nicotian. ℥iij.  
Sulp. vivi. ℥i. Misco.

---

℞. Cort. porru. subtil. pulv.  
℥i.

rad. gont. pulverizat ℥ij

sal. abinth. ℥ij.

Syrup. de micon. ℥iij.

m. f. Elect.

de quo capiat quantitate  
nucis Moschata major. hoc a  
quāq<sup>3</sup> <sup>3</sup>ia Superbibendo. haus-  
tulū decoct. amar. sine purga-  
tione incipiendo, paroxismo  
recedente.

The bitter ingredients  
to be steeped in 2 quarts  
of white wine.



Hypnotica ~~hanc~~ sub noctem,  
vel horâ somni exhibendum  
post vomitionem in febre &  
Sudorham.

R. aq. papav. rhæad. ℥ij  
aq. Mirab. Syr de  
mecon. ā. ℥iij

Syrup. papav. errat. ℥ss.

M. f. haustus

Diascordium præclarum  
in edamontu, modo eâ quantitate  
exhibueris, quæ remedijs potius,  
quam tituli mensurâ impleat.

Contra Asthma.

R. Decoct. pectorat. lib.

Oxymel Scillitic VI.

Syr. capill. vener. ℥ij

Bibat ℥iij singulis Auroris  
Pitt.



℞ hordii mundat. ℥i

uvae. passul. ℥i.

ficuū — n<sup>o</sup> 8.

dactylor — n<sup>o</sup> 8.

myrs. obstans ʒs.

licoritræ — ℥ii.

cap. Vener.

Pussilag.

Hyssop. an. pugil. ʒ.

Scabiosa

to be Boild in 3 pint of  
spring water to a quart.

you may add to it

sal prund. ʒi.

Syr. capul. ven.

Pussilag: a. ℥iʒ.

vel.

Syr. pectoral.

in ashmat. add ʒm anis

Decoct. pectorale.



---

Tractatus, ( cui Titulus, *Processus  
Integri in Morbis terè Omnibus  
Curandis* ) à Clarissimo D. D.  
*Thomâ Sydenham* Conscriptus  
Imprimatur.

*Thomas Burwell*, Præses.

*Humphrey Brook,*  
*Jos. Clerk,*  
*Gulielmus Briggs,*  
*Fredr. Slare,* } Censores.

Datum 18<sup>o</sup>. Die Augusti  
A. D. 1693. in Comi-  
tiis Censoriis ex Ædi-  
bus Collegii nostri.

---



58375  
Processus Integri  
IN  
MORBIS

Feiè Omnibus  
CURANDIS,  
A Do. *Thoma Sydenham*, M.D.

Conscripti.

Quibus accessit graphica Sym-  
ptomatum delineatio, unà cum  
quamplurimis Observatu dignis.

NEC NON  
De *Phthisi* Tractatulo  
Nunquam antehac Editio.

---

L O N D I N I :  
Impensis *Sam. Smith & Benj. Walford*,  
ad Insignia Principis, & *J. Knapton*, ad  
Insigne Coronæ in Cœmeterio  
D. Pauli. 1695.



Procellus Integri

I n

MORBIT

GURANDIS

AND Thomas Sydenham, M.D.

Conscript.

Quibus accellit graphica Syn-

ptomatum descriptio, una cum

paraphrasis O. Sive dignis

NEC NON

De Phlegmatis



Wundam

LOND

Impressit J. Smith & Co. Reg. Strada

et J. Smith & Co. Reg. Strada

Impressit J. Smith & Co. Reg. Strada

D. Pauli 1697

---

## *Amice Lector,*

**S**pecimen habes Praxeos eximiae, in dilectissimi filii M. D. usum, cautè & diligenter excogitatum, suâ ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate ista qua omnes exceperit, concessum à Cl. Sydenham, Viro sanè cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modo in arte sua mirâ sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo: sed & probis moribus, & in humanum genus, studio & amore insignibus adeo, ut apud omnes summum suî reliquerit desiderium: Cujus præcepta licèt animo meo & imò pectore infixæ sint, ne tamen fortè fortunâ in mei ipsius & ægrorum detrimentum excidant memoriâ parùm fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoq; inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editum; sed ineptâ mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum, nec hypothese placidâ solidis



ut videtur rationum momentis undequaque  
constipatâ superbiens ; humile autem & mo-  
destum accuratè morbos depingit, & accura-  
tius adhuc medetur ; in id solum sollicitum  
ut innotescat quod natura faciat aut ferat.  
Et si verum loqui liceat, modo partium situs  
noveris, pateant tibi per Symptomata ægri-  
tudines, (quod assiduâ ediscas observatione)  
scias deinde veram & genuinam medendi  
methodum per diætam & Pharmaciam adhi-  
bere, sælicissimus eris practicus, & tibi & in-  
firmis optimè consulēs. Parùm interim tuâ  
refert utrum Alkali peccet an Acidum, num  
in Spiritibus Animalibus, an in ipso sanguine,  
aut in recondito aliquo Viscere delitescat  
morbi minera ; unde de Periodico Intermit-  
tentium reditu doctè satis & prolixè possis  
differere ; dum interea ipsa Febris sine ullis  
ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsu  
celeri, nausçâ, cæterisque Symptomatis etiam  
astantibus palam est, & apertè dignoscitur :  
Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxie  
ita & scrupulosè immediatas & proximas  
morborum causas, dum Medicinam pertra-  
ctandam suscipiunt, indagare satagunt, & è  
tenebris istis, quibus natura obduxit, irritò  
licet conatu, eruere, gravi & subactò  
iudicio viri, & in praxi versatissimi ; satis in-  
terim gnari se latere vel quævis obvia ; unde  
enim dimanat graminis viridis, aut albus ni-  
vis color ? Quid est quod humana anima ra-  
ticipinari



tiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pue-  
ri sumus? Unde forma tua Specifica? Sati-  
us esset Medicum quam Philosophum agere. (quis  
enim unquam Cartesium sibi Medicum vo-  
luerit) minutissima Phœnomena planè & ritè  
enumerare, & remedia quibus unusquisque  
morbus faciliùs cedat, candido & sincero ani-  
mo proponere; ita tandem limites suos præter-  
gressa, quibus angustis nimis jam includitur  
ars nobilissima, omnibus, quaquaversum pa-  
ret orbis, fœliciter satis & prosperè salutem,  
filiis autem suis honores summos conciliabit.

Meditabatur paulo ante obitum tractatum  
de Pthisi peritissimus medicus; in perqui-  
rendo, naturæ methodum, qua morbos amo-  
liri studet, ut adjutrices porrigeret manus, &  
miseriis hominum subveniret, diu noctuque  
pensitabundo, & anxio animo, exercitissi-  
mus; hinc fidissimarum observationum serie  
& irrefragabili edoctus experienciâ, medicinæ  
praxin ornavit, & ad saniores reduxit regu-  
las; sed vœ tabidis, dum hujusmodi nun-  
quam intermissis studiis detenti & defatigati  
spiritus, solitis non vacabant excubiis, trucu-  
lentissimus hostis, *Podagra*, quæ per multos  
annos obsederat, & debilitaverat artus, impe-  
tu facto in interiora viscera irruit, per vom-  
itum & secessum enormiores intentans mortem,  
unico autem morbo nescit cedere Medicorum  
Princeps, sed cum malorum cumulo accessit  
& *Renum Calculus*, qui corrasit vasorum of-  
culis,



culis, sanguinem liberalius, quam senectus tulit, urinæ permixtum effudit, se jam non amplius opponens, nec vitæ, nec mortis cupidus, placidam, & pacatam, expiravit animam. Ne tamen auxilio prorsus destituantur tabidi fragmenta quædam quæ autorem ubivis sapiunt in primo saltem morbi stadio plerumque proficua, (neq; enim fas est, quod ægrotanti proximo opituletur, celare,) in publicum prodeunt, ut exindè pateat quam accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Opt. Maximus concessisset vitam, expectari potuisset Phthisiologia.

Quid in Febribus, Variolis, Morbillis, acutis cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit optimè meritis autor noster, sequentes indicant paginæ. Regimen & Diæta instituuntur apertissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse sitim suam restinguere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, unde mirè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plus quam barbarâ, precibus eorum surdus, Apozemata & Julapia præ ingrato sapore fastidita substituit; maximam adhibet cautelam ne exæstuans nimis, vel igne luculentiori, vel stragulorum onere, plus adhuc incalesceret, vel à propinatis forsan remediis eum in finem ut

per



per poros eliminetur materia morbifica cruda  
adhuc & inconcocta, quæ tamen hâc datâ  
ansâ concitato motu cerebrum petit, unde  
Phrenesis aut Coma, aut extravasato san-  
guine deturpant cutim maculæ purpureæ,  
aut eruptiones quas vocant miliares collum  
& pectus ubivis obsident. Nunquid ad a-  
mussim magis depingi poterat quam Vario-  
larum historia? eruptionis diem in utraque  
specie designat, pustularum ingenium ad un-  
guem describit, quo tempore incipiat, &  
quamdiu continuetur Salivatio, quo iterum  
faciei manuumque tumor se prodat, quid  
tandem quolibet die expectandum disertè  
explicat. Paregoricorum usum, quo emo-  
lumento judicent Practici, primus persuasit,  
malum, ingerendi Cardiacæ ante eruptionem,  
morem, unde sæpe accersitum fuerit conflu-  
entium genus, meritò primus improbavit.  
Meliùs autem hæc ex ipso fonte. Valeas  
itaq; amice Lector, & sicubi scateant Mendæ  
ignoscas.

*S. M.*

Amico



Amico suo Integerrimo M. D.  
Expertissimo Domino S. M.

*S*olum sequaces prætulimus diu  
Cum Medentes; Compar habebitur  
Qui clariorem te, minori  
Reddidit hoc, Medicina! Libro.

Non hic tumentæ Mole superbiens -  
Blattis futurus Præda opulentior:  
Sensu sed arcta Ditiori  
Conciliant sibi Verba Pondus.

Frustra molesto vasta Volumine  
Lustres Galeni scripta; Minutula  
Acumen huic majus Tabellæ;  
Se stupet hic Medicina totam.

Hic non remoto sordidus Angulo  
Sensim fatiscet; Sedula strenuè  
Manus quotannis, Spe perenni  
Deteret, auctior ut resurgat.

Applaudè Votis Turba Medentium:  
Non Febris illum, Morbus atrocior  
Haud afflet ullus; Commodis qui  
Immoritur satagendo Vestris.

Sic Vovet,

Christophorus Crelle, M. D.



# I N D E X.

A		Febre Constitutionum variarum, 16
<b>D</b> E Abortu	Præcavendo P. 64	Febribus à dentitione
Ambustis	87	ortis 82
Angina	30	Febre depuratoria, 12
Apoplexia	46	Febre Erysipelatosa,
Asthmate	92	28
C		Febre Hectica Infan-
Canis rabidi morfu,		tum 82
	90	Febre Intermitt. 16
Chlorosi	84	Febre Pestilentiali, 14
Cholera Morbo	56	Febre Scarlatina, 22
Chorea sancti viti,	44	Fluore albo 76
Colica biliosa	55	Furfure five Porri-
Colica Hysterica, 61		gine capitis 90
Colica Pictonum, 58		G
Contusionibus	89	Gonorrhœa virulen-
D		ta 70
Diabete	77	H
Diarrhœa	51	Hœmoptoë 85
Dysenteria	ibid.	Hœmorrhagia nari-
E		um 83
Epilepsia Puerorum,		Hœmorrhoidum do-
	79	lore 78
F		Hœmorrhoidum flu-
Febre Stationaria, 19		xu immodico, 79
		Hys



Hydrope 66

Hypochondriaca af-  
fectione 5

Hysterica Passione,  
ibid.

I

Ictero 63

Iliaca Passione 58

L

Lochiorum fluxu im-  
modico 64

Lochiorum suppressi-  
one 65

Lue Venerea 74

M

Mania communi, 88

Mensium fluxu im-  
modico 60

Mensium suppressi-  
one 85

Mictu Sanguineo à  
Renum calculo, 50

Morbillis 32

N

Nephritico Paroxyf-  
mo 49

O

Ophthalmia 48

P

Paralyfi 93

Peripneumonia no-  
tha, 25

Phthifi 93, 98

Pleuritide 23

Pruritu ferino 30

Punctura tendinis, 87

Podagra 102

R

Rachitide 80

Rheumatismo 26

Remediorum formu-  
lae 1

S

Scorbuto 96

T

Tussi 93

Tenesmo 51

Tussi Puerorum con-  
vulsiva 83

V

Variolis 34

Ulcere Vesicae 91

Vomitu sanguinis, 85

Uteri procidentia,  
49



*Medicamentorum quædam formulæ in praxi magis familiares.*

*Potio Communis Purgativa.*

℞ **T** Amarind. ℥ss. fol. Sennæ ℥ij. Rhei. ℥iſſ, coq. ſ. q. aq. ad ℥iij. in Colatura diſſolve Mannæ & Syrup. Roſar. ſolut. an. ℥j. m. f. Potio.

*Emeticum Commune.*

℞ Aq. Cardui Benedict. ℥ij, Infuſ. Croc. Metal. ℥j. Syr. Caryophyll. ℥ſſ, m. f. vomitorium. Sumat horâ 4<sup>a</sup>. Pomeridianâ, ſuperbibendo poſt ſingulas vomitiones hauſtum largum liquoris poſſetici.

*Julapium Perlatum.*

℞ Aq. Ceraſor. nigr. lact. Alexeter. aa. ℥iij, aq. Cinnamon hordeat. ℥j. Margarit. præparat ℥iſſ, ſacchar. Crystall. q. ſ. adde aq. Roſar. Damascen. ℥ſſ, f. Julap. de quo cap. cochlear. iv. vel v, in Languoribus.



## Jalapium Cardiacum.

℞ Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ℥ij,  
aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri,  
an. ℥ss, m. f. Julap. de quo capiat sæpius.

## Decoctum Diætericum.

℞ Rad. Sarsaparill. ℥vj. lign. Sassafr. &  
Chinæ ana ℥ij. Glycyrrhiz. ℥j, coq. in aq. font.  
Congiis ij. per horæ dimidium; deinde stent  
clausè super cineres calidos per horas xij. postea  
ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum  
primùm ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi.  
℥ss, post duas horas coletur, & postea depuretur  
per residentiam. & liquor reponatur lagenis vi-  
treis probè clausis ad usum. Sit pro potu or-  
dinario per xxx, dies.

## Apozema Aperiens &amp; Antiscorbuticum.

℞ Rad. gramin. Cichor. Fœnicul. & aspa-  
rag. ana ℥j, uvarum Corinthiac. & passul. enu-  
cleat. an. ℥ij, fol. hepat. ling. cerv. & cap.  
Ven. an. M. j. fol. Beccabung. sub finem addit.  
M. ij. coq. s. q. aq. fontan. ad ℥ij, sub finem  
adde vini Rhenani ℥ss. Colaturâ adhuc ca-  
lente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochl.  
hortens. M. j. colatur. adde syr. è quinq; radic &  
è succo Aurant. ana ℥ij. aq. Cinnamom. hordeat.  
℥j, M. f. Apozema. Sumat ℥ss, manè &  
5<sup>a</sup> pomeridianâ per xiv, dies.

Eclegma



## Eclegma Incrassans in Tussi.

R<sup>x</sup> Ol. Amygd. dulc. ℥j. Syr. Papav. Rhead.  
Portulac. Fijub. ℥ Loboc sani, ana ℥ss, Sacchar.  
crystall. q. s. M. in mortario marmoreo ad integræ  
horæ spatium, ℥ f. Linctus perfectè mixtus;  
recondatur in olla figulina, ad usum. Cap. sæ-  
pius lambend. è baculo Liquiritiæ.

## Eclegma fortiùs incrassans.

R<sup>x</sup> Conserv. Ros. rub. Syr. violar. ℥ de Me-  
con. an. ℥j. sem. papav. alb. ℥iij, contundan-  
tur simul ℥ per setaceum trajiciantur, deinde  
adde ol. nuc. moschat. express. gr. vj, f. Eclegma.

## In Defluxione tenui.

R<sup>x</sup> Conserv. ros. rub. ℥ij. Syr. de Mecon.  
℥ jujub. an. ℥j. Oliban. Mastich. ℥ Succin.  
an. ℥j. ol. nuc. Moschat per expressionem gr. vj.  
M. f. Lohoch. de quo lambat læpe; bis in die  
cap. eclegm. descript. cochl. j, instilland. Bal-  
sam. Sulphur. Anisat. à gut. viij, ad gut. xij.

## Cerevisia Purgativa.

R<sup>x</sup> Polypod. Querc. ℥j, Rad. Rhabarb. Mo-  
nach. fol. sennæ ℥ passul. enucleat. ana ℥ss,  
Rhabarb. incis. ℥ rad. Raphan. Rustican. an.  
℥iij, fol. Cochl. hortens. salv. an. M. iv. Au-  
rantior. incis. N° iv. infunde in Congiis v, vel  
vj, Cerevisiæ non lupulatae, fermentationis tempe-  
re, ℥ quando ad maturitatem pervenerit, sit pro



potu ordinario per dies *xiv*, vel *xxj*, præcipuè verò sumat haustum singulis Auroris.

**Emplastrum Hystericum.**

℞ *Galbani in tinctura Castor, solut. & colat. ℥iij*, *Tacamahac. ℥ij*, f. *Emplast. pro umbilico.*

**Catharticum pro Infantibus tenellis.**

℞ *Syrup. Cichor. cum Rhabarb, Cochl. j*, *parvulum.*

**Decoctum Amarum Purgativum.**

℞ *Decoct. amar. duplicatâ senâ ℥iv*, *Syrup. de Spina Cervina ℥j*, *Elect. de Succ. Rosar. ℥ij*, *M. f. Potio.*

**Laudanum Liquidum Authoris.**

℞ *Vini Hispanici ℥j*, *Opii ℥ij*, *Croci ℥j*, *pulv. Cinnamomi, & Garyophyllorum, an. ℥j*, *infundantur simul in B. M. per duos vel tres dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat; Colatura servetur pro usu.*



*De affectione, in fœminis, hy-  
stérica; maribus, hypochon-  
driaca dicta.*

CUM à casu aliquo graviori molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subindè limpidissima copiosè excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis protinus abjicitur, & tristissima quævis sibi ominantur ægrotæ; quamcunque corporis partem morbus infederit (plurimas autem insidet) symptomata ei parti competentia confestim urgent; in capite apoplexia, hemiplegiâ soluta; statim à partu adoritur; spasmi epileptici per similes (vulgò uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versùs intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice possis contegere, ægrâ interim materiam viridem bili porraceæ parem evomente, miserè excruciat; cordis palpitacionem, tussim, passiones iliacam & colicam, nephritin, urinæ suppressionem æmulatur pa-



rozyſmus; vomitiones enormes, diarrhoeam  
 ſubinde excitat; externè in carne muſculosa  
 nunc dolorem nunc tumorem inducit in tibiis  
 hydropis inſtar; nec (quod mireris) intactos  
 dimittit dentes; dolor dorſi creberrimè ſæ-  
 vit; & ſæpe ſæpius aded refrigerantur exter-  
 næ partes, ut cadauer planè referant; in riſum  
 & lachrymas effuſiſſimas ſine ulla *expreſſione*  
 ridiculè erumpunt; pryaliſmus nonnunquam  
 eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio deli-  
 butas facilè crederes. Dolores hyſterici, quam-  
 cunq; partem obſident; ubi diſceſſerint, te-  
 neritudinem, quæ tangi recuſat, relinquunt,  
 ac ſi verberatæ fuiſſent carnes.

Mittatur Sanguis ad 3viiij.

*Emplaſt. de Galbano* umbilico admoveatur.  
 Sequenti manè aggrediatur uſum ſequentium  
 pilularum;

℞ *Pil. Cock. maj.* ʒij, *Caſtor. pulv. gr.* ij.  
*Balaſam. Peruv. gutt.* iiij. f. *Pil. xij.* Cap. iv.  
 ſingulis vel alternis matutinis, pro ratione  
 virium, horâ 4<sup>a</sup> vil 5<sup>a</sup> matutinâ, ſuperdor-  
 miendo.

℞ *Aq. Rutæ ʒiv.* *Bryon, comp.* ʒij. *Caſtor.*  
*nodulo ligat.* & *in vitro ſuſpenſ.* ʒß, *Sacchar.*  
*Cryſtal. q. ſ. ſ. julap.* de quo capiat cochl. iv, vel  
 v, in omni languore. Poſt has pilulas ſumptas  
 utatur ſequentibus;

℞



℞ *Limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. Extract. Absinth. f. Pil. N° iij.* Sumat summo manè, & repetantur horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ per xxx dies, superbibendo haustum Vini Absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat.

℞ *Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. an. ʒj, Angelic. condit. Nuc. Moschat. condit. & Theriac. Andromach. an. ʒss, pulv. Ari comp. ʒij, Zinzib. condit. ʒij, cum s. q. Syrup. de succ. citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. f. Electuarium.*

℞ *Elect. præscript. ʒij, limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. Syrup. Aurantior. f. Bolus* sumendus manè & serò, superbibendo haustum vini absinthitis, vel *Cochl. ʒj seq. Infusionis.*

℞ *Rad. Angelic. Enul. campan. & Imperator. an. ʒj. fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini Hispanic. q. s. ad supereminentiâ duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel,*

In Delicatulis *Chalybs* exhiberi poterit in forma pulv. sequentis ;



*Rx* Limatur. Chalyb. probe trit,  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ , pulv.  
*Ari comp.*  $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ , sem. Coriand. præparat. Anisi,  
 Fœnicul. dulc. an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{s}\mathfrak{s}$ . Cinnamom. acutiss. Co-  
 rall. rubr. præparat. an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ , Nuc. Moschat.  
 $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ , f. omnium pulvis subtilissimus, cui adde  
 sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap. è  
 Cochleari  $\mathfrak{z}\mathfrak{s}\mathfrak{s}$ , bis in die per 4 dies, tum  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ ,  
 bis in die per 40 dies, superbibend. Cochleari  $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ ,  
 seq Julap. vel vini Absinthitis.

*Rx* Aq. Lact. Alexeter.  $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ , Gentian. comp.  
 $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ , Absinth. magis. comp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ , sacchar. albiss.  
 q. s. f. Julap. Vel ;

*Rx* Vini Rhenan. Absinth.  $\mathfrak{w}\mathfrak{s}\mathfrak{s}$ , aq. Gentian.  
 comp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ , Syr. Caryophyll.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ , f. Julap.

*Rx* Myrrh. elect. Galban. & Asie foetidae, an.  
 $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ , Castor  $\mathfrak{z}\mathfrak{s}\mathfrak{s}$ , cum s. q. Balsam. Peruv. f.  
 Pil. è singulis drachmis  $\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . Sumat  $\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ , singulis  
 noctibus, superbibend. aq. Bryon. compos.  
 Cochleari  $\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ , vel  $\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ , per totum decursum hujus  
 processûs.

Si Pilulae Præscriptæ ventrem moverint,  
 aratur sequentibus ;

*Rx* Castor.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ , sal. succin. volatil.  $\mathfrak{z}\mathfrak{s}\mathfrak{s}$ , cum  
 s. q. extract. Rutæ, f. pilula N°  $\mathfrak{x}\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ , Cap.  
 $\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . singulis noctibus, superbibendo Julapii  
 hysteric. Cochleari  $\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . vel  $\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ .

Sp.



Sp. C. C. ad gutt. xvj. vel xvij. in aqua aliqua appropriata sæpius exhibitus valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas;

℞ Trochisc. de Myrrh. pulv. ℥j. Balsam. sulphur. Terebinth. gut. iv. cum s. q. gummi Ammoniac. solut. f. Pil. N<sup>o</sup> iv. Cap. manè & serò superbib. Julap. hysteric. Cochl. iv. vel v. instillando Sp. C. C. gutt. xij.

Electuarium Antiscorbutic. cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus, ut & Electuar. corroborans cum additione Conserv. Cochl. hortens. ℥i. pulv. Ari Compos. ℥vj. superbibendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eundem est ad aquas ferreas; & si neq; his, tum ad Sulphureas, quales sunt Bathonienses.

Inter bibendum aquas ferreas hæc observanda; si aliquod Symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec Symptoma illud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potius ad duos menses perseveret. Zinziber conditum, vel Semina Carui Saccharata, ad calefaciendum ventriculum subinde sumat. Pilula etiam hystericæ iij. devorari possunt per primas x. noctes, superbibendo Julap. hysteric. Cochl. iv. vel v.



Quoad usum *aquarum Bathoniensium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si *Chalybs* justo plus corpus calefaciat, rumper ejus usum, quartâ quâq; Aurorâ sumat *aq. mineralium purgantium* ℥iv. Quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent Cathartica ex officinis deprompta.

Si *Chalybs* magnas perturbationes inducat, Laudanum *aq.* aliquâ hystericâ mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cùm à morbi diuturnitate fractæ & attritæ fuerint vires, venæsectio, & cathartica non sunt præmittenda, sed à Chalybe statim incipiendum.

Ubi Symptomata sunt mitiora, satis est sanguinem mittere, & alvum solvere ad dies *ijj.* vel *iv.* dein. pilulas hystericas ad dies  $\infty$ . manè & serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, & *Diarrhœa* enormioribus, exhibendum Laudanum, & postea corroborandi spiritus, at modò per vires liceat, ante usum Laudani, educatur è venis sanguis, & Catharticum propinetur: in viraginibus præsertim, & sanguineo temperamento præditis, in debilioribus autem, & haud ita pridem paroxysmum passis, sufficit ventriculum Congio uno lactis cerevisiati hausto,



hausto, & mox per vomitum rejecto detergere, dein largam dosin *Theriac. Androm.* vel *Elect. Orvietan.* imperare, & *Cochl.* aliquot, liquoris alicujus Spirituosi, cum pauculis Laudani liquid. guttulis, superbibenda, dare. Quod si ægra jampridem vomuerit, & ulterius emeticis sollicitare periculo non vacabit, Laudanum sine mora propinandum est, eâ dosi, quæ Symptoma vincat, & post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in forma potissimum solida, vel in liquida, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in *cochl. j.* aq. *Cinamon.* fortior. ægrâ interim conquiescente, & caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè & serò, ad dies pauculos continetur usus Laudani.

Hæc duo diligenter notanda, quod cum semel post evacuationes Laudano uti cœperimus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumendum est, donec Symptoma omnino fuerit debellatum, interjecto tantum spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstitit ante noscarnus quam alteram ingeramus, deinceps cum Laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum vel per mitissimum enema.

*Theriaca Andromachi* crebro, diuq; usurpata, magnum est in hoc, & aliis morbis quamplurimis à caloris, & confectionis defectu ortis, remedium.



*Vina Hispanica* gentianâ angelicâ absinth.  
centauryo, corticum arantior. flavedine, aliisq;  
corroborantibus infusis medicata, si ad ali-  
quot Cochlearia ter in die potentur admo-  
dum conferunt, modo ægra tenui non fuerit  
biliosoque corporis habitu.

*Cortex Peruv.* ad ℥j. manè & serò, per  
septimanas aliquot deglutitus, præsertim in  
spasmodicis hysterice miras habet vires.

In tenui biliosoque corporis habitu possit  
insurpari Dieta lactea, præcipuè in Colica  
Hysterica, si modo ea incommoda possint  
superari, quæ primis serè diebus apportat,  
quod nempe tum in ventriculo coaguletur,,  
tum etiam viribus corporis, in statu conser-  
vandis, sustendandisq; minus sufficiat.

Nihil tamen æque sanguinem spiritusque  
fovet, & confirmat, ac diu multumq; singulis  
serè diebus equo vehi, nec itinera in curru  
facta suo carent successu.

*De Febre Depuratoria annorum 1661, 62,  
63, 64.*

Si æger juvenis sit extrahatur sanguis è  
brachio, & eodem die post aliquot horas vel  
sequenti die duabus horis post leve prandium,  
*Emeticum ex infus. Croc. Metall. paratis Zy-  
thogal. ℥vj. vel viij.* ut quoties vomuerit, aut  
alvum exoneraverit, è vestigio sumatur hau-  
stus, exhibeatur; & post finitam operatio-  
nem Emetici, hoc vel simile paregoricum.

℞ Aq.



*Rx Aq. Cerasor. nigr. ziss. aq. Epidem. zss. Laudan. liquid. gutt. xvi. Syr. Caryophyll. zis. M. F. Haustus.*

Vomitoria ex infus. *Croc. Metall.* parata, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minimâ quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum vel duodecimum singulis Auroris injiciatur enema sequens ;

*Rx Decoct. commun. pro Clystere ℥ij. (vel lactis vaccini eandem quantitatem) Sacchar. Culinar. ℥ Syr. violac. an. zij. f. Enema.*

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia febrilis citius concoquatur, ad quem etiam finem Cardiacâ moderata his ultimis diebus exhibita apprimè conducunt ; ut,

*Rx Pulv. è Cochl. Cancror. comp. gr. xiv. Elect. de Ovo Oss. cum s. q. Syr. Caryophyll. f. Bolus sumendus octavâ quâque horâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. v, vel vj.*

*Rx Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ziiij. Aq. Epidem. ℥ Syr. Caryophyll. an. zi. M. F. Julap. vel alia his similia.*

Hac methodo sollicitè observatâ, usitatò circa xv. diem (cum ex laudabili in urina separatione,



paratione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Portionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum maximè in Senibus, curatâ Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valdè debilem esse, & quandoque tussi, interdum etiam screatu, magnam glutinosi viscosique phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat Iliaca passio, præscribatur Sal. Absinth. ʒj. ex Cochl. j. Suc. Limonum, manè & Serò, intermediis temporibus cap. Aq. menth. stillatit. sine Saccharo, Cochl. aliquot, bis quâq; horâ, dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumbat, postquam dolor cum vomitu, per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur *Pill. Coch. maj. ʒj. in Aq. Menth. soluta*, nec removens catulus ante pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus, & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore defendat.

*De Febre Pestilentiali 1665, 66.*

Post venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia Lanea

fin-



incipiti alligetur; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroticum exhibe.

*Rx Theriac. Andromach. ʒss. Elect. de ov. ʒj. Pulv. è chel. cancr. comp. gr. xii. Coccinel. gr. viij. Croc. gr. iv. cum s. q. succ. kermes, f. Bolus, quem sumat sextâ quâque horâ, superbibendo Cochl. vj. seq. Julapii.*

*Rx Aq. Card. Benedict. ʒ. Scord. compos. an. ʒiv. Aq. Theriacal. stillatit. ʒij. Syr. caryophil. ʒi. M. F. Julapium.*

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec solo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis Zythogalæ salviâ alteratæ, vel Cerevisiæ cui macis aliquantulum incoxeris subinde repetitis ad naturalis diei spatium (i. e. horas 24.) est continuanda; in sudore licet jusculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sustinui; per horas adhuc à finito sudore xxiv. ægro se in lecto continente frigus cautè devitetur. Indusium sponte suâ in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & Zythogalæ salviâ alteratæ usus etiamnum continuetur, in seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.



Anni 1667, 1668. Febrim Variolosam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72. Febrim Dysentericam.

Anni 1673, 74, 75. Febrim Comatosam.

Curationem febrium horum annorum non attingo; quoniam methodo in febre anni 1685, &c. descriptâ curari eas potuisse autumo.

*p. 19.*

*De Febris Intermittentibus.*

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens *atropesia*: licet in primis morbi diebus, Autumno maxime, aliquoties remissio potius quam intermissio perentiscitur, in calore æque ac in rigore vomitur ut plurimum ac vehementer ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, rauco, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

*R Cort. Peruv. subtiliss. pulv. zi cum s. q. Syr. Caryophyll. vel de Rosis siccis, f. Electuarium dividendum in xii. doses; quarum unam capiat quartâ quâque horâ, superbibendo Vini cujuslibet haustum, incipiend. immediate post paroxysmum.*

*Si*



Si autem præscripti boli ventrem move-  
rint, in haustu Vini dentur gutt. x. *Laudan.*  
*liquid.* singulis vel alternis vicibus post as-  
sumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipuè  
in quartana) repetatur processus prædictus  
singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat.

℞ *Cort. Peruv. pulv. ℥i. cum s. q. Syrup.*  
*caryophyll. f. Pilulæ mediocris magnitudinis.*  
quarum capiat vi. quartâ quâque horâ.

℞ *Cort. Peruv. pulv. ℥ii. Vin. Rhenan. ℥ii.*  
*stent simul in Infusione frigida, & coletur per*  
*manicam Hippocratis. Usus tempore cap. ℥iii.*  
tertîâ vel quartâ quâq; horâ.

Sin ob vomituritionem, ferè continuam,  
Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies,  
vel octies, Spatio duarum horarum, *Succi*  
*Limonum* recens expressi *Cochl. j.* cum *Salis*  
*Abfinth. ℥j.* assumat, dein *Laudan. Liquid.*  
*gutt. xvi.* cum *Aq. cinnam. fortior. Cochl. j.*  
ac brevi post, cessante vomitu, Corticis usum  
aggrediatur.

In intermittentibus vernalibus, nonnun-  
quam emeticum, tempestivè propinatum, ut  
nempè ante paroxysmum negotio suo defun-  
gi possit, sælicissimè successit. Nonnunquam  
Enema in diebus intermittentibus, per tri-  
dium, vel quatrimum injectum, Curatio-  
nem



nem absolvit. Quæ sequenti quoq; modo tentari potest.

℞ *Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverifat. gr. xv. Vin. alb. ℥iii.* Sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per *iii.* vel *iv.* horas, idem faciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis paroxysmis summe debilis fuerit æger ;

℞ *Conserv. Flor. Borag. Bugloss. an. ℥i. conserv. Anthos. ℥ss. cort. citr. condit. Nuc. Moschat. condit. Theriac. Andromach. an. ℥iii. confectio. Alchermes. ℥ii. M. F. Opiata cap.* ad quantitatem avellanæ, manè & vesperi, superbibendo Cochlearia paucula, alicujus *Aq. Epidemicæ simplicioris, Saccharo edulcoratæ*, interdicto interim enematum usu.

Si sub morbi exitum occurrat hydrops, nondum tamen depulsâ Febre curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed infusionibus rad *Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. centaur. Min. Baccar. Juniper. cinerum genist. &c.* in vino factis, exulante autem Febre, Catharticis, & aperientibus.

Pro Infantibus Febre intermittente laborantibus.

℞ *Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. ℥ii. cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥iii. Syr. caryophyll.*



*phyll. ʒi. M. F. Julap. Cap. Cochl. j. alterumvè, pro ratione ætatis quartâ quâq; horâ, donec Paroxyfmi non amplius difcrucient, inftillando alternis vicibus, fi Diarrhœa adfuerit ; Laud. liquid. gutt. i. vel ii.*

*De Febre Stationaria, ab an. 1685, ad 90.*

Calor & frigus fe invicem excipiunt, artus pariter & Caput dolent, pulfus interim ferè fanus, nonnunquam tuffis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio Febris prope noctem, inquietudo, fitis, lingua vel humida & ex omni parte pelliculâ albâ & fcabrâ veftita, vel Sicca, fulci coloris in medio, quam partem undiq; cingit fimbria inalbefcens. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis, à Calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulfus inordinatus, tendinum fubfultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio fymptomatici divexant, qui fi ab arte provocentur, vifcofi à Capite erumpunt, & materiam morbificam in Caput aut in artus transferunt.

Mittat. Sanguis ad ʒx. è brachiò. Reiretur Venæfectio ; fi modò refpirationis difficultas, dolor Capitis inter tuffiendum lancinans, & alia figna Peripneumoniæ nothæ adfint. In hoc cafu tam venæfectio quàm Catharfis repetenda, donec ager convaluerit.

Ve-



Vesperis applicetur Epispasticum & sequenti Aurorâ Potio Lenitiva præscribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur, & horâ somni post Catharsin haustus pacificus propinetur.

℞ Aq. Paralys. ℥iii. Syr. de Mecon. ℥i. Succ. Limon. recent. Extract. cochl. ii. M. F. Haustus.

Aphthæ & singultus sponte sua post curationem febris supervenientes sponte evanescunt; Si in longum tempus decurrant, facillè sugantur Cortic. Peruv. ℥i. cum Syr. Papav. Rhœad. q. s. in formam Electuar. vel pilular. redactâ, superbibend. haustum lactis deflorati. Remedium hoc certissimè scopum attinget, si non frustrentur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis sequentia præscribantur.

℞ Conserv. Lujul. & cynosbat, an. ℥i. conserv. Berber. ℥ss. crem. Tart. ℥i. cum s. q. Syr. de Limonib. f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. Nuc. Moschat. ter in die, superbibendo sequent. Julap. Cochl. vj.

℞ Aq. Portulac. Lactuc. Paralys. an. ℥iij. Syr. de Limonib. ℥iij. Syr. Violar. ℥j. M. f. Julapium. Vel



*Rx Aq. font. ℥j, aq. Rosar. Succ. Lim<sup>a</sup>  
num Sacchar. albiss. an. ℥iv, coq. lento igne  
dum despumaverint, cap. ℥iij. ad libitum.  
præscribatur quoque seq. gargarisma.*

*Rx Succ. Pomor agrest. ℥ss. Syr. de rubo I-  
daeozj. m. f. gargarisma.*

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger  
portionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj.*  
*ad ℥ij, exhibeantur, tum etiam hypnoticum*  
*est concedendum, v, gr. Laudan. Londin. gr.*  
*iss, cum simili quantitate Mastich. vel Laudan.*  
*Liquid. gut. xvij, in aq. Cinnamom. hor-*  
*deat. ℥j.*

*Decoctum album paratum, ex ℥j, C. C.*  
*usti, in aq. communis ℥iij. cocti & postea Sac-*  
*charo albissimo edulcoratum. sit pro potu, ut*  
*& Cerevisia tenuis pro libitu.*

Post Catharsin bis celebratam, concedatur  
ægro, Pullorum carnibus vesci, & post ul-  
timam Purgationem modo febris aliquan-  
tulum deslagraverit, vini Canarini cochl.  
*ij, vel iv, manè, & sero, ut & post Prandi-*  
*um, per dies aliquot propinentur.*

In Phrenitide, ut & Comate, nihil per-  
inde confert, atq; ægri caput radi, nullo  
admoto Emplastro, sed Pileolo tantum.



V  
 ti A  
 ad si (quod fæminis hystericis quandoq; ac-  
 & iit) post venæsectionem, & purgationes,  
 nujusmodi iteratas, etiamnum duret, pro-  
 curratque febris, modo signa Peripneumo-  
 niæ, & inflammationis circa partes vitales;  
 absint, Singulis noctibus Paregoricum, &  
 medicamenta hystERICA, bis vel ter in die,  
 injungantur.

*De Infantibus febre Stationariâ laborantibus.*

*Hirudines* due utrinq; ponè aures appli-  
 centur, dein *Emplastr. Epispasticum* cer-  
 vici admoveatur.

*Cerevisiâ, quâ Rhabarbarum fusrit infusum,*  
*purgetur.*

Si post Catharsin febris intermittere vide-  
 tur, tum *Fulapium cum Cortice Peruviano* (in  
 Capite de febre intermittenti pro infantibus  
 descriptum) exhibeatur.

*De febre Scarlatina.*

Æstate exeunte, infantes præcipuè infe-  
 stat. Rigent & horrent sub initium; nec ta-  
 men admodum ægrotant; cutis universa ma-  
 culis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus  
 & magis rubentibus quàm in morbillis, inter-  
 stinguitur: Ad duos tresve dies persistunt,  
 quo quidem tempore evanescunt, & dece-  
 dente subjectâ cuticu'â squammulis fursura-  
 ceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.



R<sup>x</sup> C. C. usti & pulv. è Chel. cancr. comp  
an 3ß, Coccinel. gr. ij, Sacchar. Cryst. 3j, M. f.  
pulvis subtiliss. in xij, Chartulas dividend. qua-  
rum unam Cap. 6<sup>a</sup> quâque horâ, superbi-  
bendo cochl. ij, vel iij, sequentis Julapii.

R<sup>x</sup> Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexeter. an.  
3iij, Syr. è succ. citri 3j, M. f. Julap.

Applicetur etiam Epispasticum cervici, &  
qualibet nocte paregoricum ex Syr. de Mecon.  
propinetur, & postquam symptomata cessa-  
verint, purgetur æger.

#### *De pleuritide.*

Inter Ver & Æstatem dominatur. Arigore  
& horrore orditur, quos statim comitantur  
calor, sitis, inquietudo & cætera febrium  
symptomata; elapsis pauculis horis, æger ve-  
hementi dolore punctorio in laterum alter-  
utro circa costas corripitur, qui nunc versus  
omoplasas, nunc spinam, nunc anteriora pe-  
ctoris sese propagat, tussî crebrâ excruciat,   
Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est  
& tenuis, & sæpe sanguinis particulis inter-  
mixta, progressu verò copiosior & magis con-  
cocta, sanguine etiam permixto. Febris pa-  
ri passu incedit cum tussî, sputo sanguinis,  
dolore, & pro ratione liberioris expectora-  
tionis sensim imminuitur; nunc alvus est  
astricta, nunc soluta nimis. Eductus è ve-  
na sanguis sevi liquati speciem præ se fert ubi  
refruxerit.

Mitta-



Mittatur sanguis è brachio lateris affecti  
ti  $\frac{1}{2}$  x.

$\mathcal{R}$  Aq. Papav. R $\mathcal{h}$ æ ad.  $\frac{3}{4}$  v, Sal. Prunel.  $\frac{3}{4}$  j,  
Syr. Violar.  $\frac{3}{4}$  j. M. f. Haustus, sumendus sta-  
tim à prima venæ sectione.

$\mathcal{R}$  Amygd. dulc. excorticat. N $^{\circ}$  v, sem Me-  
lon. Pepon. an.  $\frac{3}{4}$  ß. sem papav. alb.  $\frac{3}{4}$  iij, aq.  
bord.  $\frac{1}{2}$  ßs, aq. Rosar.  $\frac{3}{4}$  j, cum s. q. sacchar.  
cand. f. s. a. Emulsio, Cap.  $\frac{3}{4}$  v, 4<sup>a</sup> quâque  
horâ.

$\mathcal{R}$  Decoct. Pectoral.  $\frac{1}{2}$  j, Syr. Violar.  $\frac{3}{4}$  j  
Cap. Ven. an.  $\frac{3}{4}$  ßs, M. f. Apozema, Cap.  $\frac{1}{2}$  ß,  
ter in die.

$\mathcal{R}$  Ol. Amygd. dulc.  $\frac{3}{4}$  j, Syr. Violar.  $\frac{3}{4}$  j  
Cap. Ven. an.  $\frac{3}{4}$  j, Sacchar. Cand. q. s. M. f.  
Eclegma, de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc, per se, vel Oleum sem:  
Lini recenter extract: exhiberi potest.

$\mathcal{R}$  Ol. Amygd. dulc. Lilior.  $\frac{3}{4}$  j unguent. Di-  
althææ, an.  $\frac{3}{4}$  j, M. f. Linimentum, quo inun-  
gatur latus affectum manè & serò superim-  
ponendo fol. Brassicæ.

Reperatur Venæsectio ad tres alias vices,  
ad eandem quantitatem, quatuor diebus  
continuis, ubi dolor & respirandi difficultas  
suadent. *in dictorum etiam remediortu  
usu persistat per omnem morbi De  
decursum.*



*De peripneumonia notha.*

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum emergit, insultu primo nunc incalescit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculiq; tussit, & inter tussendum dolor capitis lancinans premit, potulenta vomitu rejicit, urina turbida est & intensè rubet, sanguis pleuriticorum æmulus, anhelus crebrò & celeriter spiritum ducit, dolente thorace. Ab asthma sicco planè distinguitur, quòd in isto nusquam comparent febris indicia, in hac manifestò se produnt, licet minora longè & magis obscura quàm in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒx. Die sequenti æger hanc potionem sumat.

*Rx Cassiæ extract. ʒj. Glycyrr. ʒij. ficus pingues N°iv. fol. senn. ʒiij. Agaric trochiscat. ʒj. coq. s. q. aquæ ad ʒiv. in Colatur. dissolv. Mannæ ʒj. Syr. Rosar. solut. ʒss.*

Si verò potionem assumere nequeat, *Cap. Pil. coch. maj. ʒij. horâ quartâ matutinâ.*

Sequenti die celebretur iterum venæsectio, ad eandem quantitatem; ac postero die repetatur Catharsis, quæ porrò repetenda est alternis diebus, vel post majora intervalla, pro ratione virium; Atq; insuper si Symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot

C

inter-



interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum venæsectio bis celebrata sufficiet, Interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis, utatur *decocto Pectorali, Eclegmate & oleo Amygd. dulcium*, in Pleuritide descriptis.

*De Rheumatismo.*

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris & genibus præsertim, vicissim hos relinquens & illos occupans, rubore & tumore in parte, quam postremum affecit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immaniùs sæviante. In lumbagine rheumatica immanis dolor adest, circa lumborum regionem fixus, nephritin mentiens, nisi quodd æger non vomituriat, qui procumbere nequit, sed vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versùs anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur Sanguis è brachio lateris affecti, ad 3x.

*Rx Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an. ʒiiv. Syr. de Limonib. ʒiʒ. Syr. Violac. ʒj. M. ff. Fulap. de quo bibat ad libitum.*

Præ



Præscribend. *Emulsio* 4. *Sem. frigid. maj.*  
*Cataplasma* è *mica panis albiss.* & *lacte Croco-*  
*tincto* applicetur parti dolenti.

Die sequenti eadem sanguinis quantitas de-  
 trahatur; atq; iterum, die uno vel altero in-  
 terjecto, reiteretur, atq; porro quater vel plu-  
 ries, si opus fuerit, hoc observando, ut post  
 secundam Venæsectionem majora sint inter-  
 valla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis *Enema* è  
 lacte saccharato subinde injiciatur, vel se-  
 quens;

℞ *Decoct. commun. pro Clystere* ℥ij. *Syr.*  
*Violar.* & *Sacchar. culinar. an.* ℥ij. *M. f. E-*  
*nema.*

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebo-  
 tomix non ferat, tum post secundam vel ter-  
 tiam venæsectionem *Curatio* hac methodo  
 tentanda.

Capiat alternis diebus *portionem purgati-*  
*vam communem*, donec convaluerit, & iidem  
 nobis *Paregoric. ex Syr. de Mecon.*

Sin his remediis non cedat, & æger ob im-  
 becillitatem evacuationes qualescunq; ferre  
 nequeat, aggrediatur usum *Elect.* & *aq. An-*  
*tiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam  
 remedia locum habent in Rheumatismo  
 Scorbutico.

In Juvenibus, atq; iis qui temperatè vixe-  
 runt, vino non plus æquo dediti, Rheuma-



tilimus. Diætâ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æq; fœliciter, ac repetitis Venæsectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. Ex. grat.

Solo Lactis sero ad dies quatuor vescatur æger, postea præter serum pane similagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat; nisi quòd postremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat. Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, ceteraq; eupepta concedantur, tertio autem quoq; die solo lactis sero victiter, donec tandem pancreaticè valeat.

*De febre erysipelatoſa.*

Nulla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet, pustulæ densæ, parvæ, in vesiculas subinde facessunt, quæ per frontem caputq; serpunt, oculi tumore obruti, rigor & horror atq; reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquorum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes, nonnunquam in vesiculas sublatae, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condentes, maximè pruriunt, & scalpando rursus apparent. Est & alia eruptionis species, pectus ut plurimum obsidens, macula nimirum lata, cuti vix supereminens, porriginosa, cum squammulis flavis, qua



qua vigente, æger bene se habet, eâdem evanescente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad  $\text{zix}$ . vel  $x$ . Die sequenti sumat *portionem communem purgativam*.

$\mathcal{R}$  Rad. Althæe & Lilior. an.  $\text{zj}$ . fol. Malv. Sambuc. Verbas. flor. Chamamel. Melilot. summitat. Hyperic. & centaur. minor. an.  $M. j$ . sem. Lini, sænugræc. an.  $\text{zss}$ . coq. s. q. aq. ad  $\text{thij}$ . Coletur liquor, & tempore usûs adde singulis libris decocti Sp. Vini  $\text{zij}$ . Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post fotum sequenti mixturâ illinatur.

$\mathcal{R}$  Sp. Vini  $\text{thss}$ . Theriac. Androm.  $\text{zij}$ . pulv. piperis longi, & Caryophyll. an.  $\text{zij}$ . f. mixtura. quâ Charta Emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæsectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis Enema è lacte cum Syr. Violarum, Emulsio Refrigerans & Fulap. refrigerans, sunt præscribenda.



De pruritu serino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharsi non cedunt.

℞ Theriac. Andromach. ʒss. Elect. de ovo ʒj. rad. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulver. gr. xv. Lapid. Bezoar. oriental. gr. v. cum f. q. Syr. & conditur. citri. f. Bolus, horâ somni semendus per dies xxj. sepebibendo cochl. ʒj. sequent. Julapii.

℞ Aq. Card. Benedict. ʒvj. aq. Epidem. & Theriacal. Stillat. an. ʒij. Syrup. Caryophyll. ʒj. M. f. Julap.

Singulis matutinis cap. liquoris possetici ʒss. calidè, & sudet horæ unius spatio.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti Linimento partes affectæ inungantur.

℞ Unguent. ex Oxylapatbo ʒij. Unguent. Pomati ʒj. flor. Sulphur. ʒiij. ol. Rhodii ʒss. f. Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi Venæsectione & Catharsi ritè præmissis.

#### De Angina.

Angina inter Ver & Æstatem ut plurimum aggredditur. Sequuntur febris insultum dolor & faucium inflammatio, unde à tumore uvulæ



uvulæ, tonsillarum & laryngis, nec deglutire  
queat Æger, nec spiritum ducere.

Mittatur Sanguis è Brachio copiosè. Tan-  
gantur partes inflammatæ melle Rosaceo, Sp.  
Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem  
permixto, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Garga-  
risina sequens usurpetur, non vulgari modo;  
sed ita ut sine ulla agitatione in ore conti-  
neatur, donec incalescat; dein expuatur, &  
repetatur subindè.

℞ Aq. Plantag. Ros. Rubr. & Sperm. Ra-  
nar. an. ℥iv. album. ovor. in aquam agitando  
redact. N° iij. Sacchar. Crystal. ℥iij. M. f.  
Gargarisma.

Emulsio Refrigerans in Pleuritide descripta  
indies sumatur.

Sequenti manè, nisi febris & dolor inter  
deglutendum remiserint, Venæsectio repe-  
tatur, Catharsi in diem posterum rejectâ, a-  
liàs Catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppidò ra-  
rum) repetatur adhuc Venæsectio, & Ca-  
tharsis; Epispasticum amplum ac forte ap-  
plicetur cervici post primam Venæsectionem.  
Omni manè, nisi diebus purgationi datis Ene-  
ma refrigerans & Emolliens injiciatur; Diætâ  
tenui utatur æger, & lecto per horas ali-  
quot quotidie absistat.



In his omnibus Febribus, quas intercurrentes appello, ut etiam in illa, quæ staticaria est, cautè observandum, quòd æger à lecto abstineat magnam diæi partem, ut iussulis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victuet, & cerevisiam tenuem Lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

*De Morbillis.*

Infantes plerumq; impetunt. Primo diæ rigent horrèntque, calent & frigent alternatim. Secundo consummatam febrim accersunt. Ægritudo vehemens, sitis, inappetentia, lingua alba (non verò sicca) tussicula, capitis & oculorum gravedo, & somnolentia perpetua, acriter premunt, humor è naribus & oculis jugiter stillat (quæ lachrymæ certissimum morbillorum signum.) Huc accedunt stertutatio, tumor palpebrarum paulò ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi in dentientibus præfertim. Symptomata ingravescent ad quartum usq; diem, quo quidem diæ (nonnunquam quinto) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum morsibus per similes prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescent, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, supra cutim paululum elevatis conflantur, quarum protuberantia



rantia digito levi, vix oculorum acie, deprehendi possit.

A facie, quam primò solùm occupans, ad pectus ventremque, crura deinde tibiasque propagantur maculae; in his autem partibus latae & rubrae, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & innappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptâq; cuticulâ, in reliquo corpore maculae latissimae sunt, & maximè rubescunt, Octavo circiter die in facie evanescent, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullae prorsus sunt; per faciem verò & artus quandoq; & totum corpus in farinam quandam & squammulas faecessunt. & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

℞ Decoct. Pectoral. ℞iſſ. Syrup. Violac. ℞  
Cap. Ven. an. ℞iſſ. M. f. Apozema; Cap. ℞iſſ.  
vel iv. ter vel quater in die.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℞ij. Syr. Violar. ℞  
Cap. ven. an. ℞j. Sacchar. Cand. albiss. q. s.  
C 5 M.



*M. f. Eclegma*, de quo sæpius lambat, præcipuè quando tussis urget.

℞ *Aq. Cerasor. nigr. ℥iij. Syr de Mecon. ℥j. M. f. haustus* singulis noctibus sumendus, à primo morbi insultu, usq; dum convalescerit æger, dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio, semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti spatio interposito inter singulas Venæsectiones; Atq; etiam continuentur decoctum Pectorale supra descriptum, ut & *Loboch*, vel *Ol. Amygd. dulc. per se*. Circa diem *xij.* ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ morbillos excipit, Venæsectione sanatur.

#### *De Variolis.*

Distinctæ sunt vel confluentes, & in distinctis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomitio, in adultis ingens in sudores propensio (& hinc minimè confluxuras esse licet conjicere) dolor sub scrobiculo cordis si  
manu



manu prematur, stupor & somnolentia, nonnunquam & insultus epileptici (in infantibus præsertim) quibus si, dentitione peractâ corripiantur, in procinctu esse variolas possis prædicere, ita ut si fortè insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti Aurorâ in conspectum se daturæ sunt variolæ, mites ut plurimum & rarissimè confluentes. Quarto inclusivè ab invasione die nonnunquam seriùs, rarò tamen ante illum erumpunt, quo tempore vel minuuntur Symptomata vel prorsus evanescent. In eruptione autem subrubræ primò pustulæ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus univèrsam; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur. Circiter octavum à primo insultu diem intervalla pustularum priùs alba rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proximæ à facie intumescunt manus, digitiq; distenduntur; pustulæ faciei antea læves & rubræ, jam asperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent, succum insuper luteum, colore à favo non abludentem evomunt, faciei & manuum inflammatio jam summa in pustularum interstitiis colorem exhibet floridum, & rosarum Damascenarum æmulum, quem quidem colorem, quo mitiores sunt variolæ, eo magis una



pustulæ tum cutis interjecta ad amissim exprimunt: Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus minus asperæ albæq; magis conspiciuntur indies. Die undecimo faciei tumor & inflammatio recedunt, pustulæ maturæ & justam magnitudinem (viz. pisi grandiusculi) adeptæ exarescunt deciduntque. Decimo quarto vel quinto pereunt funditus; manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt & tandem dirumpuntur, cæteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squammulis hisce fursuraceis succedunt foveæ. Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur vel rarissimè deiecit. Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo autem in confluentibus intereunt: Quippe cum in discreto hoc genere promoventur sudores tum cardiacis tum regimine calidiore, prædicto die facies, quæ turgida & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat, è contra flaccida reperitur & albescens, pustulis nihilo minus rubentibus & elevatis, etiam post ægri mortem; sudor, qui huc usq; manaverat, derepentè evanescit, æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine, vehementibus, urinam parcè reddit ac frequen-  
ter,



ter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomituritio, &c. immanius sæviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio die aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoq; ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, v. g. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustularum ægrum discruciant: Nunc erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis licet tempore planè distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicitæ, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim  
magis



magis exasperatur, colore fusco: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quod quanto pustulae maturescentes proprius ad colorem subfuscum vergunt, eò deteriores lentius abscedunt; quomagus autem flavescunt, eò minus confluerint, & ocyùs se proripiunt. Ubi primum deciderit pellicula, nullâ scabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squammulae furfuraceae, indolis perquam corrosivae, quae foveas relinquunt: patentiores, & saepe cicatrices. Quandoq; humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, aestimandum. Pustulae manuum & pedum majores, & quo altius ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultiss salivatio in infantibus diarrhoea (licet non ita certò) confluentium comes. Pycialismus nunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduove præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorē ægerrimè excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti de-

beat:



beat, non tamen nisi post diem unum alcerumve omnino recedere) & manuum jam insigniter incipiens & diutius perdurans suppetias tulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat ac pyralismus adultos. In utraq; variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, desinit. Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, pustularum flacciditas & subsidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur: Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Dies in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus in minimè crudo, & maximè vulgari genere, à primo morbi insultu, est undecimus, in crudiore adhuc decimusquartus, & in crudissimo decimus septimus; nonnunquam tamen sed rarius, non ante diem vicesimum primum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum Septimum interjacet, appetente vespérâ, molestissimo inquietudinis



erudinis paroxysmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasionem ad  $\mathfrak{zix}$ . vel  $x$ , & postea *Vomitorium* exhibeatur ad  $\mathfrak{zj}$ . vel  $\mathfrak{ziss}$ . *Infusionis Croci Metallorum*

His primis diebus diluatur sanguis frequenti potatione *Cerevisiæ tenuis Lupulatae*. Cui *Vitrioli Spiritus* immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vesperi propinetur *Syr. de Mecon.*  $\mathfrak{zj}$ . quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Eâ nocte, si Variolæ è *Confluentium* genere fuerint, augeatur dosi ad  $\mathfrak{ziss}$ . quæ dein repetatur ad  $\mathfrak{zj}$ . manè, & ad  $\mathfrak{ziss}$ . serò, singulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si *Syr. de Mecon.* minus congruat, substitui possit *Laudan. Liquid.* viz. gutt.  $xviij$ . pro  $\mathfrak{zj}$ . *Syrupi*  $\mathfrak{E}$  gutt.  $xxv$ . pro  $\mathfrak{ziss}$ . Hoc interim observandum, quod si paregoricum bis in die exhibitum orgasmum compescere non valeat (quod in Variolis insigniter confluentib. sub finem earum sæpe accidit) tum 8<sup>a</sup> quaq; horâ exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si variolæ *Interstinctæ* fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus post plenam e. uptionem exhibeatur *Paregoricum*, atq; etiam in minori dosi.

Qua-



Qualiscunq; autem generis variolæ fuerint, atq; etiam qualicunq; morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur, ac proinde si prior Paregorici dosi metam non attingat, alia atq; alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interposito inter singulas doses spatio aliquo; ut per noscere valeamus, utrùm dosi ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger è lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum Syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur è *Cerevisia tenui* vel *aq. bord. cum Melle Rosarum*; vel sequens usurpari poterit.

*Rx Cort. Ulmi ʒvj. rad. Glycyrrhiz. ʒss. Passul. enucleat. N° xx. ros. rub. p. ij, coq. s. q. aq. ad ʒiij. in Colatur. dissolv. oxymel. simp. & mell. Rosar. an ʒij. M. f. Gargarisma.*

Si epispastico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte istâ, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico, plantis quoq; pedum applicari potest allium, à die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si



Si Infans de Symptomatis, dentitionem comitantibus, jam securus, derepente spasmo corripitur hic cogitandum est, convulsionem istam, fortassis à naturæ conatu, quæ variolas, scarlatinam Febrem, aut morbillos, in corporis habitum protrudere satagit, pendere; applicetur itaq; Emplast. Epispastici cum nuchæ, lecto quamprimum committatur æger, exhibeatur insuper cardiacum, cuii paregorici pauxillum est admiscendum, puero nempe trienni *Laud. Liquid. gut. v. in aq. Epidem. cochl. j.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus symptomatis, usq; adeò efferatur, ut Paregoricis utcunq; repetitis sufflaminari nequeat, & mors quasi immineat, tum sanguis ad satis magnam quantitatem illicò detrahatur, nempe ad  $\text{xxij}$ . vel circiter, atq; porrò repeti possit semel vel bis in sequentibus diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit; at non aliàs. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitivi*  $\text{zj}$ . *dissolut. in aq. Cichor. vel. lactis Alexeterr*  $\text{ziv}$ . Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minùs Paregorica in usum veniant, quæ, (haud obstantibus iis tam quoad largam dosin quàm repetitam exhibentur)



exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, iungatur facies Linimento ex æqualib. partib. *ol. Amygd. dulc. & Pomat.* per biduum; at non ultra.

Die *xxj.* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porrò alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usq; ad *xvij.* non aliis stragulis tectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Jusculis Avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanic. Cochl. *iv.* vel. *v.* bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum fetu fol Malv. verbasc. Sambuc. Lauri, cum floribus Camæmel. & Melilot. in lacte coct. facilè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâq; horâ (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

De



*De chorea Sancti Viti.*

Convulsionis species quædam est, pueros puellâve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit. fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admoveat, sed deductâ à spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortunâ labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit; deditâ tanquam operâ, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad  $\text{ʒviij}$ . plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, potionis commun. hauriatur; & vesperi haustulus sequens propinetur.

$\mathcal{R}$  Aq. Cerasor. nigr.  $\text{ʒj}$ . aq. Epilept. Langii  $\text{ʒiij}$ . Theriac. Andromach.  $\text{ʒj}$ . Laudan. Liquid. gut. viij. f. haustus.

Potio



*Potio Cathartica*. ad tres vices, alternis diebus, repetatur; & *haustus Purgatorius* iisdem noctibus.

Postea Sanguis iterum extrahatur; & ad Catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur.

*Rx Conserv. Absinth. Roman. & flaved. Aurantior. an. ʒj. Conserv. Anthos ʒss. Theriac. Andromach. vet. & nuc. moschat. condit. an. ʒiiij. Zinzib. condit. ʒj. Syr. è succ. citr. q. s. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibend. vini sequentis Cochlear. v.*

*Rx Rad. Peonix, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an. ʒj. fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & summitat. Centaur. min. an. Mj. Baccar. Juniper. ʒvj. Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in vini Canarini ʒvj. Coletur tantummodo usûs tempore.*

*Rx Aq. Rut. ʒiv. aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. an. ʒj. Syr. Peon. ʒvj. M. f. Zulap. cap.*



cap. Cochl. iv. singulis noctibus cubitum iturus, instillando *Sp. C. C. gut. viij.*

Applicetur plantis pedum Emplastr. à *Caranna.*

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quòd hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit, quod tamen non adhuc expectatus sum. Cum verò Chorea *Viti* ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum dosis adaugeantur.

#### *De Apoplexia.*

Somnus est profundissimus, & omnimoda sensûs & morûs privatio, exceptâ respiratio-  
ne, quam ægri habent difficilem cum ster-  
tore.

Mittatur Sanguis è brachio ad  $\text{℥}xij.$  quam-  
primum, ac postea ex venis jugularibus ad  
 $\text{℥viij.}$  deinde *Vomitorium* ex  $\text{℥iss.}$  vel  $\text{℥ij.}$  In-  
fus. *Croc. Metal.* propinetur statim.

*Emplastr. Epispastic.* satis amplum ac for-  
te cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger  
in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

*Sp. Sal. Armoniac. optimè rectificatus* ad-  
moveatur naribus.

Finis



Finitâ Vomitorii Operatione, subinde exhibeantur Cochli, iij. vel iv. sequentis Julapii.

R<sup>x</sup> Aq. Rutæ ℥iv. aq. Bryon compos. ℥<sup>3</sup>  
Antiepilept. Lang. an. ℥j. Sp. C. C. gut. xx.  
Sacchar. Crystall. q. s. f. Julap.

Vel Cochleare j. Sp. Lavendulæ compos. per se propinari possit bis vel ter, durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ.

Cavendum est, ne Cardiaca plus justo calida, ac nimis frequenter (utî mos est) exhibeantur; nam quacunq; demum specificâ virtute pollere videantur, plus damni quàm emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt: quod etiam incommodum non minùs infertur ex nimia straguiorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

R<sup>x</sup> Pil. Coch. maj. ℥ij. cap. tertiâ quâq; die per 6 vices horâ 4<sup>a</sup> matutinâ, superdormiendo.

R<sup>x</sup> Conserv. flor. salv. Rorismarin. an. ℥j.  
Conserv. flaved. Aurant. 3vj. nuc moschat.  
condit. ℥<sup>3</sup> Zinzib. condit. an. 3℔. Theriac.  
Androm. vet. 3ij. pulv. elect. diamb. diamosch.  
dulc. an. 3j cam. q. Syr. conditur. citr. f.  
opiatâ



*opiata*, capiat ad magnitudinem Castaneæ manè & serò, superbibend. *aq. Epilept. Lang. Coch. ij.*

℞ *Ambr. gris. 3ß. ol. destil. sem. Anisi, cinnamom nuc. moschat. an. gut. ij. ol. Caryophyl. gut. j. Sacchar. in aq. flor aurantior. solut. 3iv. f. s. a Tabellæ*, quarum capiat unam ad libitum.

Ab usû potus generosioris cujusvis sibi temperet, vescatur jusculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoq; etiam (præcipuè inter purgandum)) carne pullorum agnorum ac id genus ciborum eupepton.

#### *De Ophthalmia.*

Ex oculorum inflammatione pater.

Mittatur Sanguis è brachio ad 3x. Sequenti dieumat potionem purgativam communem, quæ repetenda est per duas alias vires, duobus diebus interpositis; iisdem noctibusumat haustum paregoricum ex *Syr. de Mecon. 3j.*

Diebus à purgatione vacuisumat ter aut quater in die 3iv. *Emulsionis ex sem. frigid. maj. & Papav. alb.*

℞ *Aq. Plantag. Ros. rubr. & Spermat. Ranar. an. 3j. pulv. Tutia preparat. 3j. f. Collyrium*, cujus guttæ aliquot instillantur oculis bis



bis in die; at non incipiendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venæsectio semel vel bis, (præcipuè si sanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris generosi, ab usu etiam ciborum coctū difficilium, & sale conditorum; & diebus inter purgationes bibat hydrogalam coctam.

Nota. quòd sæpè accidit, quòd Venæsectioni & Catharsi utcumq; repetitis Ophthalmia non cedit; hoc in casu *Paregoric. ex Syr. de Mecon.* ℥j. singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

#### De Uteri Procidentia.

R<sup>2</sup> Cort. Querc. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. sub finem addendo Cortic. Granator. contus. ℥i. ros. rubr. flor. Granator. an. Mij. dein adde vini rubr. ℔ss. Colatura sit pro foru, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec symptoma penitus evanuerit.

#### De Paroxysmo Nephritico.

Adsunt dolor fixus in lumborum regione, urina cruenta, arenularum aut calculi excretio, stupor cruris è directo tenis laborantis, testis retractio ejus lateris, in quo

D

est



est dolor, nausea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud abfimilis; licet in quibusdam symptomatis planè discrepet, quæ recensita in *Capite de Colica biliosa* videas

Si Æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondententi ad 3x. dein liquoris possetrici cui Rad. Althææ ʒij. incoctæ fuerint Cong. j. quam citissimè deglutiatur; & Enema sequens injiciatur.

℞ Rad. Althææ ʒ Lilior. an. ʒi. fol. Malv. Parietar. Branc. Ursin. ʒ flor. Chamemel. ana. M. j. Sem. Lini ʒ Fenugr. an. ʒss. coq. s. q. aq. ad thiss. M. F. Enema. Rejectis Vomitorio & Enemate. Laudan. Liquid. sativæ magna dosis propinetur, viz. ad gutt. xxvj. vel Pil. Matth. gr. xv, vel xvj. In senibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiiis (præcipuè si sub initium Paroxysmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) Venæsectio omittatur; at quoad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omnino procedendum.

*In mictu Sanguineo à calculo renibus impacto.*

Capiat æger, stato quodam die, singulis hebdomadis, Mannæ ʒiij. in seri lactis thiss. solut.

Conducit aliquando, haustus cerevisiæ tenuis liberalior.



In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtusus, nullatenus auctus, sed satis tolerabilis persentitur, nec paroxysmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger se non tutò committeret, nisi prius certò sciat, calculum majorem non esse, quam ut per ureteres viam possit invenire, quod, hoc tantum modo, certò potest dignosci, si nempe, jam antea, paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpeßus, (cum dolore scilicet sævissimo in renum alterutro, per ureterem ductus propagato, & vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem, quorum unus subindè in ureterem illabitur atque ita paroxysmum invitat, qui fere non desinit, nisi calculo in vesicam detruso, cum sic se res habeat, nullum est magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio; quod si calculosus, nullo unquam paroxysmo nephritico, fuerit tentatus, cum jam major sit calculus, quam qui ex pelvi possit elabi, devitandæ sunt aquæ ferreæ.

*De Dysenteria, Diarrhœa & Tenesmo.*

Rigent horrentque, sequitur deinde totius corporis calor, quem brevi excipiunt ventris tormina, & hæc, dejectiones crebræ, & mucosæ omnes (nisi quodd stercorosæ nonnun-



quam interponantur) cum ingenti cruciatu  
& molestissimo viscerum omnium quasi de-  
fensu, quoties exoneratur alvus, sanguinis  
interim lineamenti intertextæ, licet aliquan-  
do ne minimum sanguinis per totum morbi  
decursum admisceatur. Progressu morbi  
sanguis sincerus quandoque excernitur, &  
gangrænâ insanabili afficiuntur intestina. Si  
æger ætate floreat, vel cardiacis incalescat.  
Febricitat admodum, lingua est subalbida,  
quadam mucilagine densè obsita, interdum  
nigra & sicca. Prosternuntur vires, dissi-  
pantur spiritus, aphthæ insuper oris interna  
faucisque obsident, præsertim ubi materiae  
peccantis evacuatio adstringentibus præpo-  
siterè impeditur, non exacto per cathartica  
morbi fomite. Aliquando, exulante febre,  
agmen ducunt tormina, & cætera morbi  
symptomata sequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii sine  
sanguine aut intestinorum exulceratione ex-  
cernuntur.

In tenesmo assidua est desidendi cupiditas,  
nihil tamen præter mucosum quoddam &  
subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum  
eademque nocte *Paregoricum* propinetur; &  
mane sequenti *Potio purgans communis*, repe-  
tenda alternis diebus ad duas alias vices, &  
*Paregoric.* post Purgationes, quamprimum succo  
defunctæ sunt munere; ac diebus à purga-

tione

*Laudani liquid. gut. 15, vel 15.  
in aq. qualibet cardiacâ.*



tionem vacuis idem mande & serò est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur.

*Rx Aq. Ceras. nigr. & fragor. an. ℥iij. Aq. Epidem. Scord. comp. & Cinam. hordeat. an. ℥i. Margarit. præparat. ℥iij. Sacchar. crystal. q. s. adde Aq. R. sar. Damascen. ℥ss. ad gratum saporem, m. f. Julap. de quo cap. cochl. iv. vel v, in languoribus, vel ad libitum.*

Potus sit Lac coctum cum *Aq. Triplo*, vel *Decoct. Alb.* ut,

*Rx C. C. C. & Mic. panis alb. an. ℥ij. coqu. in. Aq. font. ℥iij, ad ℥ij. postea s. q. Sacchar. Albiß. edulcoretur. Vel si dejectio virium postulaverit, Aq. font. ℥ij. cum Vin. Canarin. ℥ss. simul coctæ, pro potu frigide assumantur.*

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui *Laudani* bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quod *Enema ex Lact. vaccin. ℥ss. & Theriac. Androm. ℥iij.* subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in Diarrhœam tantum assurgat, Phlebotom. & Catharsi præscript. omissis, sequ. Bolus singulis matutinis exhibeatur.



R̄ Rhabarb. pulv. ʒss. (plus minus prorati-  
one virium) cum s. q. Diascordii f. Bolus, ad-  
dendo Ol. Chym. cinnam. gutt. ij.

Noctibus insequentibus Paregoric. ex Aq.  
cinnam. hordeat ʒi. & Laudan. Liquid. gutt.  
xiv. exhibeatur.

Ubi tormina ficca sine dejectionibus ex-  
cruciant, curantur diluendo sero lactis frigidi  
propinato, & tepidè injecto ; ut in Cholera  
morbo pullorum jussulo aut lacte cerevi-  
fiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut  
omnis ejus vis in rectum intestinum decum-  
bat, cum assidua desidendi cupiditate. Di-  
aeta Analeptica instituatur, & liquor aliquis  
Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari  
possint vires, quibus redeuntibus, Tenesmus  
sponte se proripit.

In dysenteria malè curata dolores aliquan-  
do ægrum ad annos aliquot discruciant, in  
hoc casu Phlebotomia reperita pristinam sa-  
nitatem restituet.

Notandum est, quòd in constitutionibus  
huic morbo minùs faventib. omissis evacua-  
tionibus dysenteria Laudano solo sanatur  
quod manè & serò repetendum, donec sym-  
ptomata penitus evanuerint, vel etiam ter  
Nycthemeri spatio, si opus fuerit.



*De Colica biliosa.*

Intestinorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injectâ fasciâ contrahit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certo ad unum aliquod punctum determinatur, neq; tam crebra vomituritio, neq; alvus ita pertinaciter catharticum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio frequentior, & major alvi adstrictio, colicâ tandem in iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu colicus dolor augetur: Nephriticus potius imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quàm in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In colica urinae ab initio crassiores existunt.

Sanguis è brachio paulò liberalius educatur, & post horas *iiij.* vel *iv.* *Anodyn.* exhibeatur, Postero die *Catharticum Lenitiv.* & interposito die uno, ad tertiam vicem propinetur.



At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim haurto eluendus est; quo exantlato Anodynum propinandum est; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus ditissimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior sive aquæ Epidem. sive Mirab. sive aliùs cujuscunque, qua sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

*De cholera Morbo.*

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subfellii. Ad sunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24 horarum spatio interimunt.

Pul-



Pullus tenerior in tribus circiter Aq. font. Congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris possetrici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successivè reperenda. *Hautibus & Clysteribus Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve* alicujus uncia subindè admisceri poterit.

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod *iiij.* vel *iv.* horas sibi vendicat) *Paregoricum* curationi Coronidem imponit.

Si non accesserit medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, & jam frigescant membrorum extrema, tum ad *Laudum Liquidum* confugiendum est in paulò majori dosi, (viz. *Laudan. liquid. gutt. xxx. in Aq. cinnam. fort. 3i.*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam cholæræ morbi infantibus valdè familiaris, ac sæpenumerò funesta, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minimè fert, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minùs ut Catharticis tumultus major in humoribus excitetur, sed Curationem *Lau-*



dano solo aggredi oportet ; quamobrem  
gutt. ij, iij, vel iv, vel plures, pro ratione  
ætatis, Cochlear. j. cerevitiæ tenuis vel Aquæ  
cujusvis appropriatæ instillatæ exhibeantur  
repetanturque, ut opus fuerit.

*De colica Pictonum.*

Est species quædam Colicæ, quæ degenerare  
solet in Paralyfin, & motûs omnimodam  
manuum ac pedum depravationem ; quam  
hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyfi  
indigitat, & apud insulas Caribum notissimam  
est ; utpote, quæ magnam vim hominum  
infestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsamum*  
*Peruv.* frequenter ac in magna dosi exhibitum  
nempe si ejus gutt. xx, xxx, vel xl. *Saccharum*  
*Albiss. cochl. j. instillentur*, & bis vel ter in die  
dentur : at Paralysis huic remedio haud cedit.

*De iliaca Passione.*

Peristalticus intestinorum motus invertitur,  
tur, propinata cathartica & injecta enemata  
in emetica statim transeunt, alvi sæces per  
vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad  $\text{ʒiij}$   
vel x. post aliquot horas exhibeatur sequens  
Pulvis.

℞ *Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin.*  
*Falap. gr. xij. Calomelan. Torquet. ʒi. m. ff.*  
Pulvis :



*Pulvis* ; cap. è *Cochl. i.* lactis vaccini, superbibendo ejusdem lactis *Cochl. j.* vel alterum; vel si forma *Pilularum* magis arrideat :

℞ *Pil. ex duob. ʒß. Calomel. Torquet. ʒj. cum f. q. Balsam. Peruv. f. Pil. iv. sumend. è Cochl. j. Syr. Violarum.*

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, *Laudan. Liquid. gutt. xxv. Aq. Cinnamon. fort. ʒß.* instillatæ statim propinentur; cum vero horum usu vomituritio, ac ventris dolores, remiserint, catharticum dictum iterum exhibeatur, verum si anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore restitante, ad usum paregorici supra descripti revertendum; idemque eò usque repetendum quartâ vel sextâ quâque horâ donec intestinis quies omnino inducatur, quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sanè abs re fuerit elapsâ horâ unâ, aut alterâ, post *Venæsectionem*; clysterem aliquem, ex iis qui potentius operantur, injicere, fumum scilicet nicotianæ, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissimè insufflatum, quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat.

Finitâ



Finitâ operatione Cathartici, sumat sequentem haustum.

*Rx Aq. Cinnam. fort. ʒi. Laudan. Liquid. gutt. xxv. m. f. Haustus, qui potitò repetendus est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus cessaverint; atq; etiam, istis symptomatis cessantibus, nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus.*

*De Fluxu Mensium immodico.*

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi anserini implet. Patet autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒviij. sequenti mandè sumatur *potio purgativa communis*, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus post purgationem *Paregoric. è Syr. de Mecon.* exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia.

*Rx Conserv. Rosar. sicc. ʒij. Trochisc. de terra Lemnia ʒiss. Cort. Granator. Corall. rub. præparat. ʒboli Armen. an. ʒij. lapid. hematit. Sanguin. Dracon. an. ʒj. cum s. q. Syr. Cydonior. f. Elect. de quo sumat ad magnitudinem*



nem nucis moschat. maj manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. vj.

℞ Aq. Germin Querc. & Plantag. an. ℥iij. Aq. Cinnamom. hordeat; & Syr. de Rosis siccis an. ℥i. Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.

℞ Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul, & succus exprimatur, & postea clarificetur, de quo cap. Cochl. iv, vel v. sæpiusculè ad libitum.

Post primam purgationem applicetur emplast. seq. regioni Lumborum.

℞ Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. æq. extendantur super alutam, f. Emplastrum regioni Lumborum admovendum.

#### *De Colica hysterica.*

Est species quædam, seu potius insigne ac valdè usitatum affectionis hystericæ symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quò Saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediatur Paregorici efficaciam, satis magna quantitas liquoris possetrici affatim ingurgitetur, atque iterum



iterum per vomitionem reiciatur, nempe  
*ejusdem liquoris Cong. iss*, quo peracto *Laudan.*  
*Liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. Aq.*  
*Epidem. vel alius vehiculi ʒi.* propinentur.

In usu Paregoric. hoc notandum, quòd  
 eò usque repetendum est, donec symptoma-  
 ta omnia penitus cessaverint, debitum interea  
 tempus interjiciendo; ut dijudicare valea-  
 mus, quid prior dosis effecit, antequam no-  
 vam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit  
 æger, vel si antea hoc symptomate haud mul-  
 tum infestatus fuerit ac viribus fractus, hoc  
 in casu sanguis primùm è brachio detrahen-  
 dus antequam vomitorium præscriptum pro-  
 pinetur.

Hâc ipsâ Methodo Clavus hystericus cu-  
 ratur. Sin verò Colica Hysterica diutur-  
 nior fuerit per Paroxysmos affligens: tum  
 in eorum intervallis, sive extra Paroxysmum,  
 seq. usurpentur.

℞ *Zedoar. subtiliss. pulv. ʒj. cum s. q. Syr.*  
*è conditur. citri, f. Bolus,* sumendus manè &  
 serò per xxx dies, superbibendo sequentem  
 infusionem.

℞ *Zedoar. incis. minutim. ʒß. vini Canar.*  
*ʒiv, infundantur frigide per xij horas; deinde*  
*colentur pro usu; vel Balsam Peruv. ut in*  
*Colica Pictonum;* usurpetur.

Quæ



Quæ de Colica Hysterica hîc dicuntur, de Colica etiam hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriusque affectûs natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tamen si ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica Hysterica tam in hypochondriacis, quam hystericis sæpissime in icterum desinit, qui sensim sponte suâ facessit, fin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema sequens.

*℞ Rad. Rub. Tinctur. curcum. an. ʒi. chelidon. maj. cum toto ꝑ summitat. centaur. min. an. M. j. coq. in Æqualib. partibus Vinî Rhenani ꝑ Aq. fontan. ad ℥ij. colatur. dissolv. Syr. de 5 radicibus ʒij. m. f. Apozema, de quo capiat ℥ss. calidè manè & serò, usque dum convaluerit.*

*De Ictero, colicâ neutiquam prægressâ.*

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta, corporis pruritus, segnities, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indignant.

Ex-



Exhibeatur *potio purgativa communis*, dein aggrediatur usum sequentium ; & durante eorundem usu, Catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

*Rx Conserv. Absinth. Rom. conserv. flaved. Aurant. an. ʒi. Angelic. condit. nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & chalyb. cum aceto præparat. an. ʒss. Extract. centaur. min Extract. Gentian. & cremor. Tartar. an. ʒij. croc. Anglic. pulv. ʒss. cum s. q. Syr. de 5 radicibus f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quinta pomeridianâ (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosin aquarum mineralium purgantium ʒi v. & post pomeridianam dosin Apozemat. in colica hysterica descript. ʒss.*

At si signa hydropis affuerint, tam manè quàm serò apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad aquas ferreas eundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

*Ad præcavendum abortum.*

Eadem præscribenda, ac in Fluxu mensium immodico, omisis solummodò catharisi & succis.

*De immodico lochiorum fluxu.*

Fluxum lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per tri-



triduum primum fluens ; dehinc sanguis aquosus, loturæ carniū crassiori similis per quattriduum præter propter durans ; hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosā, paucō aut nullo sanguine permista, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porro ad mensis finem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex viriū dejectione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cūbi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsu debili & frequenti, visus obtenebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituat, & potus sequens addatur.

℞ *Aq. Plantag. vin. rubr. an. ℥ij. coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur s. q. sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, cap. ℥ss. bis vel ter in die.*

Interim Julap. aliquod Hystericum (ar. sat. mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur.

℞ *Galban. Asæ fetid. an. ℥ij. castor. ℥iss. sal. succin. volatil. ℥ss. m. f. nodulus, vel*

℞ *Sp. salis Ammoniac. ℥ij. quem sæpe olfaciat.*

#### *De suppressione Lochiorum.*

Intumescit venter, dolor gravativus in venterem, lumbos & inguina occupat, facies ru-



rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adsunt, animi deliquia, sudores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero, paralysis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. hydropstericum* umbilico admoveatur quamprimum, *Elect. seq.* adhibeatur.

*Rx Conserv. Absinth. Rom. Rut. an. ʒi. Trochisc. è Myrrh. ʒij. Castor. croc. Anglic. sa. volat. Sal Armoniac. & Asæ fœtid. an. ʒss. cum s. q. Syr. è 5 radicib. f. Elect. cap. acc. magnitud. nuc. moschat. quartâ quâq; horâ superbibendo seq. Julap. Cochl. 4 vel 5.*

*Rx Aq. Rutæ ʒiv. Bryon. compos. ʒij. Sacchar. cand. q. s. f. Julap. vel sumat Trochisc. è Myrrh. ʒj. quartâ quâque horâ.*

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unicâ saltem vice exhibendum ut, *Laudan. Liquid. gutt. xiv. in Aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. iß. cum Asæ fœtid. ʒss. in pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum *Enema* ex lacte Saccharato, unicâ saltem vice, injiciatur.

#### De Hydrope.

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ manentes evanescentes hoc malum primum indicant, maximè



maximè si spiritus interim ægrius ducatur (haud rarò tamen fæminæ prægnantes, & quibus catamenia sistuntur, ut & viri ab asthma inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribúque ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis factò æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obsessæ mole augmentur, aliæ magis magisq; gracilescent, urgentibus dyspnœâ, urinæ paucitate, & siti intensâ. Viros, ingravescente ætate; fæminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad instaurandum sanguinis robur; quò novus aquarum proventus præcaveri possit.

*R̄ Vini albi ℥iv. Jalap. subtiliss. pulv. ʒj Zinzib. pulv. ʒss. Syr. de Spin. Cervin. ʒi. M. f. Potio, sumenda summo mandè, repetendâq; singulis vel alternis diebus, pro ratione virium, donec partes affectæ detumuerint; vel,*

*R̄ Tamarind. ʒss. fol. Senn. ʒij. Rhei. ʒiss. Coq. in f. q. aq. ad ʒiij. in Colatur. dissolv. Mannæ & Syr. Ros. solut. an. ʒi. Syr. de Spin. cervin. ʒss. Elect. è succ. Rosar. ʒiij. M. f. Potio, sumenda, ut supra; vel,*

*R̄*



℞ *Pil. ex duob. ʒj. Elater. gr. iij. Ol. Chym. Caryophyl. gutt. ij. f. Pil. N° iij. cap. summo manè, repetanturque, ut opus fuerit; vel,*

℞ *Gambugii gr. xv. vin. alb. & aq. Cichor. an. ʒiſs. Syr. de Spin. Cervin. ʒſs. m. f. Potio. sumenda ut supra; vel,*

℞ *Cortic. interior. Sambuc. è ligno deraſi M. iij. coq. in aq. & lact. partibus aq. mistorum ʒiij. ad ʒj. Colaturæ capiat diuinidiam partem manè, & alteram serò quotidie, donec convalescat. At hoc remedium, nisi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.*

Circa usum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primo, utrùm ægri corpus facilè an verò difficulter Catharticis cedere soleat, cùm in iis qui facilè purgantur *Syrup. de Spin. Cervin. solus ad ʒi.* exhibitus aquas sat copiosè eliciat, in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica supra descripta, utut valida, vix scopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ segnitùs operantur, magis officiunt quam profunt; quamobrem purgatio paulò fortior & nimia, iusto debiliore est præferenda.

Tertio, Aquæ eâ maximâ celeritate exhauriri debent quam ægri vires ferre queant: ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aq. denuò affatim colligantur.

Est



Est autem ubi medicamenta omnia, quæ-  
 liscunq; demum generis, quæ alvum movent,  
 prorsus omitti possint ac debeant; quoties  
 enim æger constitutione est infirmiori, vel  
 scæmina vaporibus obnoxia, aquarum eva-  
 cuatio Diureticis solum committenda, inter  
 quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus  
 Lixivialibus fiunt; ut,

℞ Cinerum Genistæ ℥j. infundantur frigide  
 in vini Rhenan. ℥iv. liquoris per filtrationem  
 colati ℥iij. manè quintâ pomeridianâ & serò  
 singulis diebus exhibeantur, usq; dum humor  
 evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis Calefacientia  
 & corroborantia medicamenta usurpanda;  
 ut,

℞ Rad. Raphan. Rustican. fol. cochl. hor-  
 tens. absinth. vulgar. Salu summitat. centaur.  
 min. & Genistæ, infundantur in cerevisia forti  
 pro potu ordinario, qui potus incipienti hy-  
 dropi aliquando sine Catharticis subvenit,  
 vel sequent utatur;

℞ Conserv. Cochl. hortens. absinth. Roman.  
 an. ℥i. Extract. Gentian. Absinth. vulgar. &  
 Centaur. min. an. ℥iij. cum s. q. Syr. è cortic.  
 citr. f. Electuarium, de quo sumat ad quan-  
 titatem nuc. moschat. maj. manè, quintâ po-  
 meridianâ, & vesperi, superbibend. ℥iv. se-  
 quentis infusionis.

℞



℞ Rad. Gentian. ℥i. Summitat. Genist.  
Centaur. min. ℥ Absinth. vulgar. an. M. j.  
Sem. fœnicul. ℥ Petroselini an. ℥ij. incisis mi-  
nutim affunde vini Rhenani ℥iv. stent simul  
in infusione frigida, & coletur solummodo  
tempore usûs.

Notandum, cùm ad corroborantium usum  
deventum fuerit, ægrum nullo modo esse  
purgandum, tantisper dum sanguinis corro-  
borationi navetur opera.

Quod & per salium Lixivialium usum  
omnino observandum, quo quidem tempore  
pariter corroborare convenit.

℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥ij. fol. Cochl.  
Hortens. absinth. vulg. salviæ, Summitat. Cen-  
taur. ℥ Genistæ, an. M. iij. Aurant. incis.  
Nº iij. Infundantur in Congiis vj. Cerevisiæ  
fortis non lupulatae, inter fermentandum; sit  
pro potu ordinario.

#### De Gonorrhœa virulenta.

Corripiunt dolor genitalium insolitus, &  
rotatio testiculorum, in non recutitis macula  
morbilli æmula glandem occupat, statim à  
cujus exortu liquor, seminis instar, exstillat,  
qui quotidie à seminis colore & consistentia  
recedens flavescit tandem dilutius ovi vitello;  
in lue virulentiore virescit, & aqueo humori  
permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta  
ulcus fit, aphthis infantum simile, indies  
latius & profundius depascens, superveni-  
ente:



ente orificiū callo. Verpi non glandis ulcere, solā Gonorrhœā tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur, quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipuè urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis, sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè quā in glandem desinit. Carunculæ lotii exitum quandoque impediunt; & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

℞ *Mass. Pil. Coch. maj. ʒiij. Extract. Rud. ʒi. Resin. Jalap. & Diagryd. an ʒss. cum s. q. Opobalsam. f. Pilul. è singulis drachmis vi, cap. iv. singulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis, admodum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.*

In iis, qui difficulter purgantur, subindè intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur, *Syr. è Spin. Cervin. & Elect. Succ. Rosar. an. ʒii. vel, curatione minùs sæliciter succedente Turbith. Minerale ad gr. viij. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice Turbith. Mineral.*

℞



R<sup>x</sup> *Pil. ex duob. 3ss. Merc. dulc 3i. cum f. q. Opobalsam. f. Pil. iv. summo mane sumendæ.*

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post pilulas primò descriptas, tribus Auroris continuis sumptas, tum manè & horâ quintâ pomeridianâ quotidie injiciatur Clyster sequens, nisi quod semel aut bis in hebdomade, omisso Clystere, Cathartic. imperandum.

R<sup>x</sup> *Elect. è succ. Rosar. 3vi. Terebinth. Venet. Vitello ovi solut. 3ss. dissolvantur in Aq. bord. ʒi. Colatur. adde Syrup. Violar. ʒiii. M. f. Clyster.*

Singulis noctibus cap. *Opobalsam. vel Balsam. è Mech. gutt. xxv. Sacch. frustulo exceptas.* Hujus defectu *Terebinth. Cypr.* ad quantitatem *Avellanæ* substitui possit.

Sit pro potu hydrogala; at Cerevisia tenuis in pastibus.

Vel sequentem methodum aggrediarur.

R<sup>x</sup> *Pil. ex duob. 3ss. Opobalsam. gutt. iii. f. Pil. N° iii. Cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendo, repetanturq; alternis diebus, vel tertiâ quâque die.*

Diebus à purgatione vacuis injiciatur manè & horâ quintâ pomeridianâ Clyster supra descriptus.

Procedente curatione (quâcunq; eâ demum methodo tentetur) sanguis sub medium cura-



curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia, qualia sunt *hydrogala, Emulsiones ex seminib. frigid. &c.*

Si Penis Tumore afficiatur.

℞ *Rad. Althææ, Lilior. an. ʒiʒ. fol. Malv. Verbasco. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmel. Melilot. an. M. j. sem. Lini, Fœnugræc. an. ʒʒ. coq. s. q. Aq. font. & f. f. f. parti affectæ admovendus per horæ unius spatium bis vel ter in die.*

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein. *Emplast. è mucilaginibus alutæ agninæ inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subjecta Glande, hæreat, tum sequens *Linimentum* præscribatur.

℞ *Unguent. Basilic. ʒvj. Unguent. Nicotian. ʒij. præcipitat. Aq. Rosar. loti & optimè levigat ʒʒ. M. f. linimentum,* quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post fotûs præscripti usum.

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atque bis in die fotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fotubus addendo *Sp. vin. Gallic. Cochl. j. vel*

E

al-



*altexum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum ejus loco applicandum.*

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

*De Lue Venerea.*

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos, crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescent. Quo magis scabies diffunditur, tanto minus æger discrucietur. In cranio, tibiis, baculisq; exostoses, ossium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus, sed fruces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absumunt, ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbantur, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave humore condatur.

*Rx Axung. Porc. ʒij. Mercur. crud. ʒi. M. j.*  
*Linimentum, in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manibus suis æge perungat.*



Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum gr. viij. Turbith. mineral. in Conserv. Rosar. rubr. exhibeantur aut corporibus minus robustis, Mero. dulc. ℥j. Sed si salivatio jam incepta prius elanguescat, quàm symptomata penitus disparuerint, extimulanda subindè est eadem dosi Mercur. dulc.

Ptyalismus ita moderari debet, ut ℥iv. Nycthemeri spatio expuat, aut circiter.

Si justo altius exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atq; id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; at sint ea, quæ prius usurpata fuerint.

Si Diarrhoea supervenerit (quod plerunq; accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. Liquid. ita dosim augendo atq; repetendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, Aq. Ros. Damascen. vel lacte Aq. permisto, vel seq. decoct. idem coluatur.

R Rad. Alth. Hord. mundat. an. ℥i, sem. Cydonior. ℥ss. coq. s. q. aq. ad ℥ij. M. f. Gargarisma, quo sæpius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharsi imperanda, nisi quod primis



aliquot diebus liquore possetico, juscullis  
avenac. hordeac. ac cerevisiâ tenui repe-  
factâ nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiamsi symp-  
tomata omnia evanuerint, ac subindè mor-  
bus penitus profligari videatur) quo minùs  
recidivam postliminèdè pariat, ægro semell  
in septimana per 4 vel 6 vices, *Merc. dulc* ʒj.  
exhibendus, utcunq; bene se habeat, & eti-  
amsi jam domo egrediatur.

*De Fluore albo.*

Quod effluit, modò album, modò palli-  
dum, flavum, viride aut subnigrum, modò  
acre & erodens, tetrum quandoq; & graveo-  
lens, decoloratur facies, dolet spina dorsi,  
prosterhitur appetentia, oculi pedesque intus  
mescunt.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒviij.

℞ *Pil. Coch. maj.* ʒij. *Castor. gr.* ij. *Bal-*  
*sam. Peruv. gutt.* iij. *f. Pil. N° iv.* cap. horâ  
quartâ matutinâ, superdormiendo; repetan-  
turq; per duas alias vices interponendo diem  
unum vel alterum. pro ratione virium.

℞ *Aq. Rut.* ʒiv. *Aq. Bryon. comp.* ʒij.  
*Sacchar. Crystall.* q. s. *f. Fulapium*; Cap.  
*Cochl.* iij, vel iv. in omni languore; deinde  
aggrediatur usum sequentium.

℞



℞ Theriac. Andromac. ʒiʒ. Conserv. flaved.  
 Aurant. ʒi. Diascord. ʒʒ. Zinzib. condit. &  
 nuc. moschat. condit. an. ʒiij. Pulv. i Chel. cancr.  
 comp. ʒiʒ. cort. exterior. granat. Rad Angelic.  
 Hispan. corall. rubr. præparat. & Trochist. de  
 terra Lemnia an. ʒi. Boli Armen ʒij. Gumm.  
 Arabic. ʒʒ. cum s, q. Syr. de Rosis siccis f.  
 Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc.  
 moschat. maj. manè, horâ quintâ pomeridia-  
 nâ, & nocte per mensem integrum, superbi-  
 bendo sequent. infusionis Cochl. vj.

℞ Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic.  
 Calami Aromat. an. ʒss. fol. Absinth. Roman.  
 Marrub. alb. centaur. min. Calamenth. vulgar.  
 salv. sicc. an. M j. Bac. Junip. ʒi. incidan-  
 tur minutim & infundantur in Vini Canarini  
 ʒiij. stent simul in infusione frigida, coletur  
 tantummodò tempore usûs.

Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab  
 usû olerum & fructuum qualiumcunque &  
 singul. pastibus bibat vinum Hispanicum.

#### De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias  
 crudi & inconcocti exitum sibi quærunt,  
 unde sensim labefactantur vires, colliguescit  
 corpus, & quasi substantia ejus per hanc clo-  
 acam exinanitur, cum siti, ardore viscerum,  
 lumborum coxarumq; intumescentiâ, & sa-  
 livæ spumosæ expuitione crebrâ.



Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore albo, omisſis ſolummodo Venæſectione & Catharſi.

*De Doloꝛe Hemorrhoidum.*

Intenſiſſimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi ſuperficies cruore conſpergitur : Nonnunquam tumores verrucioſi ſimiles in ſphinctere deliteſcunt, vel in margine ani apparent.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad ʒx.

℞ Sem. Melon. Pepon. an. ʒß. ſem papaw alb. ʒij. Amygd. dulc. excorticat. N<sup>o</sup> v ; contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundend. Aq. Hord. ʒiſſ. Aq. Roſar. ʒij. Saccharr albiſſ. q. ſ. f. ſ. a. emulſio ; cap. ʒiij. ſæpiuſcule.

℞ Flor. Sulphuris, Pulv. Glycyrrhizæ Salviæ an. ʒi, cum ſ. q. Baſam Lucateell f. Pil. e ſing. drachm. vi ; cap. iij, ter in die, ſuperbibend. Emulſ. præſcriptæ Cochli. vi.

℞ Aq. Spermat. Ranar. ʒiv. in qua diſſolv. Lithargyr. ʒii. Opii ʒi ; f. mixtura cujus tantillo Lintheum madefactum partæ affectæ applicetur, vel ſi tumor intus lateat

Cochli.



Cochl. *iii.* ejusdem mixturæ modo Clysteris injiciantur.

Pro Potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei; & à carnis usu abstineat. Singulis noctibus sumat Diacodium.

*De fluxu Hemorrhoidum immodico.*

Innotescit ex viribus prostratis, copia & diurnitate sanguinis excreti, fædo corporis colore, ad citrinum (ut in ictero) vergente. Succedit cachexia, & deinde hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omisâ solummodò Catharsi.

*De Epilepsia Puerorum.*

Vel primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus (quo in casu *Diascordium* ad quantitatem grani *piperis* in *Aq. Saxifrag.* aut lacte materno solutum, & exhibitum præstantissimum est remedium.) Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem, tussi comitata est, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhœâ, viridia (ut solent hysterica) egerente infante. Quandoq; improvisò occupat paroxysmus, os



oculosque distorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoque præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolita oculorum orbitalium immobilitate. Nunc ferit, nunc ocyus se proripiunt paroxysmi, certâ subinde periodo, vago aliâ; insultu revertentes; sed, appetente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in soporem proclives sunt infantes, donec à novo resuscitentur insultu.

Applicetur *Emplastr. Epispastic.* cervici quamprimum.

℞ *Aq. Epilept. Lang. ℥iij. Laudan. Liquid. gutt. j, vel ij, vel plures, pro ratione ætatis, Syr. Pæon. ʒj. M. f. Haustus, sumendus quamprimum.*

℞ *Aq. Ruta ℥iij. Aq. Epilept. Lang. ℥ Aq. Bryon. comp. an. ʒi. Syr. caryophyll. ʒss. M. f. Fulap. cap. Cochli j. singulis horis, si haustus præscript. paroxysmum non fugaverit.*

*De Rachitide.*

In Rachitide adsunt partium laxitas & mollieties, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio,  
viz.



viz. caput iusto majus, facies plenior & floridior, partes carnosæ infra caput emaciantur, nodis protuberant articuli, maximè carpi, paulo minùs tali, tument & extremitates costarum, ossa incurvantur, præcipuè tibiæ & fibulæ, hinc ulnæ & radii, aliquando femoris & humeri, dentes rardè & molestè erumpunt, vacillant, nigrescunt, & frustulatim excidunt, pectus à lateribus angustum, anteriùs acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum tensio, tussis & pulmonum vitia laceffunt, lateralis decubitùs modò dextri, modò sinistri aversatio.

℞ Fol. Absinth. Vulgar. centaur. minor. Marrub. Alb. chamædryos, Scordii, calamenth. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. hyper. Virg. aureæ, serpill. menth. salv. Rulæ card. Benedict. Puleg. Abrotan. chamæmel. Tanacet. Lilior. convall. omnium rec. collect. & incis. an. M. j, axung. Porcin. ℥iij. sero. ovin. & Vin. claret. an. ℥ij. macerentur in olla fictili super cineres calidos per horas xij. deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem, & postea colentur, ut f. Linimentum, quo venter & hypochondria illinantur manè & serò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30 vel 40 dies, vel donec convaluerit.



*R. Singulor. ingredient. præscript. an. Mij.*  
 infundantur frigide in Cerevisiæ non Lupu-  
 lat. Cong. *iiij.* pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupan-  
 tibus ab Evacuationibus nimis proceden-  
 tibus.

Sanguis & Viscera herbis corroboranti-  
 bus confortentur, ut in Rachitide vera; nisi  
 quod axillæ etiam utraque inungantur, at  
 non artus.

*De Febris à Dentitione Ortis.*

*Sp. C. C. gutt. ij, vel iij, vel iv. pro ra-*  
 tione ætatis in Cochl. *j,* vel altero Aq. Ce-  
 rasor, nigr. vel Julap. alterius appropriati,  
 exhibeantur quarta quâque horâ ad vices  
 quatuor, vel sex.

*De Febre hectica Infantum.*

Sine insigni calore languent cum appeti-  
 tûs dejectione, artus & truncus corporis ema-  
 ciantur.

*Rhabarb. incisi ʒij. in lagenam vitream*  
*cerevisiæ tenuis ℥ij. capacem immittantur pro*  
*potu ordinario.*

Epoto



Epoto hoc liquore, *aliæ ℥ij, eidem Rba<sup>̄</sup> barb. superaffundantur ad tertiam vicem.*

Si verò potus vi Catharticâ saturatiùs impregnetur, tum ℥j. epotâ alteri cerevisia mox adjiciatur.

*De Tussi Puerorum Convulsiva.*

Phlebotomiâ, & repetitâ Catharsi, eâque solâ, expugnatur hæc tussis, malum aliàs pertinacissimum, & fere insuperabile; sed leniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque, cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

*De Hemorrhagia Narium.*

Dolor & calor sinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victûs ratio refrigerans & incrassans injungatur; Julap. refriger. & incrassans, Cum Emulsionib. refrigerantib. præscribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atq; omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur & semel vel bis *potio purgativa commun.* præscribatur.

*Lintea quadruplicata immersa Aq. frigide, in qua sal Prunell. dissolvatur, & postea leviter expressa admoveuntur nuchæ, & utrinq; cervici sæpius in die.*

Post



Post Evacuationes liquor seq. applicetur.

℞ *Vitriol. Hungaric. & Alum. an. ʒi. Phlegmat. Vitriol. ℥ss. Coq. tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigesactum filtra, & à Crystallis subinde natis separa, liquori residuo adde Ol. Vitrioli duodecimam partem; vel potius.*

℞ *Aq. Plantag. ʒiij. Bol. Armen. subtiliss. pulver. ʒss. probè misceantur; Turunda ex linteo raso liquore hoc humectata nari, ex quo sanguis stillat, indatur per dies duos istic relinquenda.*

Hoc minus succedente, *Vitriol. Rom. Aq. commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteamina imbuta, & applicata sanguinem sistunt si ex parte externa diffuat.*

#### *De Chlorosi.*

Adsunt vultûs & totius corporis decoloratio, intumescencia in facie, palpebris & malleolis, gravitas totius corporis, crurum ac pedum tensiva lassitudo, respiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus febrilis, somnolentia, pica & mensium suppressio.

Sumat



Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *Pulv. Chalybeatum* in affectione hysterica præscriptus plus minus pro ratione ætatis, superbibend. haustum vini cujusslibet ad libitum, vel infusion. corroborant. cum Rad. Angelic. ibidem descriptam. Si Ægra non valde debilis fuerit, purgetur semel vel bis ante præscriptorum usum.

*De Suppressionione Mensium.*

Cibum fastidiunt mulierculæ, fœdus faciei color est, gravitas totius corporis dolores scapulis, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum seq. sunt præscribenda.

Singulis Auroris, & quartâ pomeridianâ, sumat *Zulap. Hysteric. sine Castor. Cochl. v. instilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de Myrrh. ʒj. cum Syr. de Artemis. in formam boli vel Pil. Redact.*

*De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoe.*

In Hæmoptoe dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur



Mittatur sanguis ex brachio dextro ad 3x  
Sequenti mane sumat potionem purgativam  
commun. & eâdem nocte Paregoric. ex 3iij  
Aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. 3i.

Postea aggrediatur usum sequent.

R. Bol. Armen. 3i. Pulv. Radic. Symphit.  
3ij, Terr. Sigillat. Lapid. hæmatit. & Sang.  
Dracon. an. 3j, Sacchar. Albiss. ad pondus  
omnium; M. f. Pulvis subtilissimus, cujus  
cap. 3j, manè quintâ pomeridianâ, & nocte  
superbibend. sequent. Apozemat. 3iv.

R. Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & mil-  
lefol. an. M. j. coq. s. q. Aq. ad 1b1, in  
Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. 3ij  
M. f. Apozema; vel cap. Cochl. vj, sequent  
Tincturæ.

R. Flor. Ros. rubr. 3vj, Cort. internu-  
querc. 3ss. sem. Plantag. parim contus. 3iij  
Aq. font. 1b1, Sp. Vitriol. q. s. ad levem aci-  
ditatem, infundantur in vase clauso, calore  
leni, per 4 horas; Colatur. adde Aq. cinnam  
Hordeat. 3iij. Sacchar. Albiss. q. s. ut f. Tinc-  
tura gustui grata.

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur E-  
lectuario in fluxu mensium immodico præ-  
scripto.

Enema quotidie injiciatur, & Diacodium  
horâ somni propinetur.

Phle-



Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpositis; & semel iterum, si res postulet, repetatur potio purgativa.

Diæta incrassans & refrigerans observanda.

### *De Punctura Tendinũ.*

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter destillat.

*Rx Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. & contus. ꝑiv, farin. sem. Lin. & Avenac. an. ꝑiij. coq. ad cataplasmat. consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere, applicetur parti affectæ manè & serò.*

### *De Ambustis.*

Foveatur pars affecta linteis *Sp. Vini imbutis*, usque dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur *lintheum*, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

*De*



*De Mania communi.*

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia maniae species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stultitiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaque cardiaca generosiora, viz. *Theriac. Andromach. Electuar. de ovo, Pulv. Comitiss. Pulv. Gualt. Rawleigh, in Aq. epidem. theriacal. vel aliâ*; & diæta instituantur analeptica.

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad *zviij*, vel *ix*, bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones Interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti Cathartico, quod sumat tertiâ vel quartâ quâq; die, donec convaluerit, hoc interim observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

*Rx Pharmac. domestic. (i. e. Rad. Bryon. alb.) pulv. 3j. lactis vaccin. 3iv. vel,*

*Rx*



℞ *Ejusdem* ℥ss, *vel* ʒvj, *Vin. alb.* ʒiv. *in-*  
*fundantur per noctem, in colatura dissolve Syr.*  
*Violar.* ʒi, *M. f. Potio* ; *vel,*

℞ *Gambugii gr.* xiv, *Aq. Cerasor. nigr.*  
ʒiij, *Syr. Caryophyll.* ℥ss, *f. Potio.*

### *De Contusionibus.*

Mittatur sanguis ē brachio lateris magis  
affecti ad ʒx, seq. mane exhibeatur *potio*  
*communis purgativ.* ac deinceps eodem  
modo Venæsectio & purgatio alternatim re-  
petantur, donec æger convaluerit. Interim  
toto decursu, si internæ partes lædantur,  
sequentia præscribantur.

℞ *Decoct. Pectoral.* ℥ss, *Syr. Violar. cap.*  
*Ven. an.* ʒij ; *f. Apozema* ; *cap. ℥ss,* ter in  
die. Item *Ol. Amygd. dulc. rec. Cochl.* j,  
sæpius propinetur.

℞ *Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialth.* ℥<sup>3</sup>  
*Pomat. an.* ʒi ; *M. f. Linimentum,* quo in-  
ungatur pars læsa manè & serò, superimpo-  
nend. fol. Brassicæ.



*De furfitre, sive porrigne capitis.*

*Potio purgans communis bis propinetur dein.*

*Rx Ol. Amygd. Amarar. & Laurini, Cinee-  
rum fol. Abrotani an. ʒi, misceantur probec-  
& f. Linimentum, quo inungatur totum  
caput singulis matutinis, diligenter infrii-  
cando, & postea superimponendo vesicam  
suillam.*

*At primùm abradatur totum capillitium  
& postea defricentur squammulæ sensim  
singulis auroris, prout decidere pronæ fue-  
rint.*

*De Morsu canis Rabidi.*

*Post 40 dies aut plures melancholica ad-  
sunt symptomata, febris, sitis, hydropho-  
bia, & tandem partium extremarum con-  
vulsio.*

*Rx Sp. vin. optimè rectificat. ʒiv. Theriac-  
Andromach. ʒi, f. mixtura, qua illinatur pars  
læsa ter in die, superimponendo linteum  
eâdem mixturâ imbutum.*



*De Ulcere Vesicae.*

Pus graveolens, aut sanguis nonnunquam squammulae seu pelliculae membranaceae ac veluti furfuraceae crustulae (sin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulae, aliquando crassiores) unâ cum urina excernuntur, perpetua dysuria & continuus earum partium dolor infestant; renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ & doloris dantur intervalla, pus etiam excretum copiosius est, album, leve & minimè foetidum, lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

℞ Emplast. Flor. unguent. dict. ʒiʒ; f. Pil. N<sup>o</sup> ix; cap. iij, horis medicinalibus, superbibendo sequentis Aq. Coch. vj.

℞ Rad. Fœnicul. Consol. Aristoloch. & Caryophyll. an. ʒiij, fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Sanicul. Plantag. an. M. vj, incidantur minutim, & destillentur in vini alb. & lact. an. ℥iv, & eliciantur solummodo ℥iv, pro usu.

℞ Pulv. Rad. Consolid. maj. & gumm. Arabio. an. ʒi, Sacchar. Penid. ʒij; f. Pulv. cap. Coch. j, bis in die.

De



*De Asthmate inveterato in iis, qui sanguineo  
temperamento præditi sunt.*

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorque est spiritus tractio ex infarctui pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum stertore & sibilo. In priorè specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia oppi-  
lantur: Et Orthopnœam, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes, & erectâ, cervice respirare possunt. Musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3x. Die sequenti sumat *portionem purgativam communem*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat sequentia.

Rx Sem. Anisi subtiliss. pulv. ʒij. cum s. q. Balsam. Lucatell. f. pil. ex singulis drachmis ʒj, cap. iij, manè & quintâ pomeridianâ, superbibend. decocti Amari sine purgantibus ʒiv. calidè.

Si



Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

*De paralyfi.*

Sensus & motus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguitur aut vitiatur.

Sumat pil. Coch. min.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . alternis matutinis per  $\text{vj}$ . vices; deinde capiat ter in die per  $\text{xxx}$  dies *Electuar. Antiscorbutic.*  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . superbibend. *Aq. Antiscorbutic. Cochl.*  $\text{vi}$ . Vide in scorbuto.

$\mathcal{R}$  Unguent. Nervin.  $\mathfrak{z}\text{iii}$ , Sp. Lavendul. comp.  $\mathfrak{z}$  Sp. Cochl. hortens. an.  $\mathfrak{z}\text{iss}$ , M. & inungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c. manè & serò.

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videantur; attamen cum humores crudos ac fixos volatilifare præ aliis apta nata sunt, in Paralyfi etiam conveniunt.

*De tussi & Phthisi.*

Tussis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno 18 ad 35. Extenuatur totum corpus. Febris molestat hectica, à cibo invalescens (quæ ex celeritate pulsûs, rubedinéq; genarum dignoscitur) materia per  
tussim



tussim excreta cruenta est aut purulenta, in ignem coniecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petiunt. Sudores nocturni superveniunt, livescunt tandem genæ, facies pallet, exacuantur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequituram denunciant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit, vel si à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequam orta fuerit, satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis abstineat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

*Balsamum sulphuris Anisatum ad gutt. x. Cochl. i, Sacchar. crystall. instillatum* bis vel ter in die devoretur; ut etiam Tabellæ sequent. quas secum æger continuo portet, unam frequenter assumat.

*R Sacchar. cand. lbss, coq. f. q. Aq. font. usque dum adharescat extremis digitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul. Campan. sem. Anis. & Angelic. an. ʒss, pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an. ʒij, Ol. Chym. Anisi ʒij; f. s. a. Tabellæ domesticæ vocand. atque hoc interim Eclegmate utatur.*



℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij, Syr. cap. Ven.  
Violac. an. ℥i, Sacchar. cand. q. s. f. Lohoch.  
de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ,  
quando tussis urget.

In defluxione tenui *Eclegmata incrassantia*  
exhiberi poterint.

Sin verò Tussis his remediis haud cessa-  
ret (præcipuè autem si febrim comitem  
habeat, vel si à Peripneumonia aut Pleuritide  
originem ducat) tum ineptum fuerit pecto-  
ralibus fidere; sed Venæsectione & Cathar-  
si debellanda est, ut in methodo, quæ in  
curatione Peripneumoniæ nothæ describi-  
tur.

Verùmenimverò cum, his omnibus non  
obstantibus, Tussis non modò non curationi  
cesserit, sed & diurnâ Palmonum concus-  
sione eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tan-  
dem subingressa fuerit, tum hâc methodo  
procedendum.

℞ Balsam. peruv. gutt. x, instillentur  
Cochl. j, Syr. Hederæ terrestris, vel si id mi-  
nus gratum fuerit ægro, Cochl. j, Sacchar.  
crystall. cap. ter in die superbibendo De-  
cocti Amari sine purgantib. ℥iv, vel (si idem  
ventrem moverit) ℥iij.

Sed



Sed omnibus aliis ( quotquot adhuc inventa sunt ) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm si puer aut juvenis esset, & sanè haud multò certius Cortex Peruv. feбри intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio Phthisi* medetur.

*De Scorbuto.*

Ad sunt spontaneæ lassitudines, corporis gravitas, dyspnœa, præcipuè ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, sanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumescencia nunc extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumq; ex pallido fuscus.

Extrahatur sanguis è brachio ad ℥viij, nisi signa Hydropis adfuerint : Seq. mane exhibeatur Potio Purgat. communis, quæ repetatur tertiâ quâq; die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia.



℞ *Conserv. Cochl. hortens. ℥ij, Conserv. Lujul. ℥i, pulv. Ari compos. ℥vj. cum s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar. de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & nocte. superbibendo Aq. Raphan. compos. Cochl. vj. vel sequentis.*

℞ *Rad. Raphan. Rustican. raspat. ℥ij, rad. Ari ℥j. fol. Cochl. hort. M. xij. fol. Menth. Salv. Nasturt. aquat. ℥ Beccabung. an. M. vj. Sem. Cochl. hort. parim contus. ℥ss. nuc. Moschat. ℥ss. Vin. Alb. ℥xij. destillentur organis communib. ℥ eliciantur solummodo ℥vj. pro usu.*

*Vel Folia Rec. Cochl. hortens. per se destillentur pro usu dicto.*

*Porro sequens cerevisia fit pro potu ordinario.*

℞ *Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi ℥ij. fol. Cochl. hort. N° xij. passular. enucleat. N° vj. Aurant. cum toto incisi dimidium, in Lagenam vitream ℥ij. Cerevisiæ tenuis capacem subere mox probè obturandam immittantur.*

*In hunc modum parentur eodem tempore sex Lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps ; vel,*

*Vice hujus Cerevisiæ seq. mixturæ Cochl. iij, vel iv. immisceri poterint singulis haustibus potûs communis.*



℞ Rad. Raphan. Rustican. & sem. Cochlear. hortens. an. ʒss. fol. Cochlear. hortens. M. ij. pul-  
pam unius Aurant. Contundantur simul in mor-  
tar. marm. sensim affundendo vin. alb. ʒss. Co-  
letur cum levi expressione, & reponatur pro usu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsis  
omissis, in Rheumatismo scorbutico, sive Hy-  
sterico, valde prosunt.

*Tabis Descriptio & Cura.*

Plures sunt Tabis species : Prima ferè ori-  
tur è frigore hyeme contracto. Paulo enim  
ante solitium Brumale quamplurimi ab in-  
gruente tempestate frigidâ, tussi tentantur :  
Quæ cum illos invaserit quibus pulmones ab-  
ortu sunt infirmiores, omnino necesse est ut ad  
repetitis Tussiendi conatibus magis adhuc de-  
bilitentur ; atq; ita tandem alimento sibi  
proprio assimilando, præ mala *Diathesi*,  
prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens  
Pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continuâ  
pulmonum agitatione & vehementi nisu affa-  
tim per os rejicitur. Pulmones exinde puree  
referti purulenta *μάσματα* quaquaversum in  
carnes dispergunt. Hinc enascitur Febris pu-  
trida, cujus Paroxysmus sub vesperam fatigat  
sub auroram vero sudore copioso ac vires  
imminuente solvitur. Denique ad malorum  
cumulum Diarrhœa succedit, partim ab hu-  
moribus putridis ex arteriis Mesentericis in  
inte-



intestina depositis excretisque, partim à labefactato pessundatq; viscerum Tono. Atq; ita demum æger proximâ æstate fato suo fungitur, à morbo cui prægressa Hyems viam straverat, extinctus. Atq; hæc est præcipua Tabis species.

Porro cùm sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, perspiratioq; à subitâ pororum contractione plus satis inhi-beatur, particulæ hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde iam humor per Asperam Arteriam delapsus in pulmones, Catarrhi ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tussendi conatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cumq; non iam amplius naturalem sibi pulmones œconomiam statumq; tueri valeant, Glandulæ & Tubercula adnasci solent; quæ in ægris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulentâ sanie ut plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel invaluerit hic morbus, & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcunq; potest Medicatio, minuendo causam defluxionis in pulmones, pertusâ in Cubito Venâ, Catharticis mitioribus; tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status accommodatis, Incrassantibus sc. ubi, humor subtilior & tenuior vim Expultri-



cis facultatis videtur eludere: Attenuantibuss  
vero ubi pituita crassior ægre & cum molestiâ  
per os rejicitur. Dein & hæctica Febris reme-  
diis refrigerantibus contemperantibusq; coer-  
cenda. Talia sunt *Lac Asininum, Aqua Lactis*  
*Stillatitia, Emulsiones ex Amygd. dulc. Sem.*  
*Melon. Pepon. Papav. alb. Aq. Fl. Paralyf. &c.*  
Deniq; & curando Ulceri opera danda est  
cui rei Terebinthina illa Liquida, Opobalsa-  
mum vulgo dicta, apprimè conferre censetur.

Hujusce Morbi Curatio, me Judice hâc me-  
thodo optimè ac felicissimè instituetur. Pri-  
mum educatur è brachio sanguis dein subdu-  
catur Alvus ad tres dies continuos, vel *Pil. Coch.*  
*majoribus, vel Decocto Leniente à nobis præscri-*  
*pto.* Tertiâ nocte exhibeatur *Syr. de Mec. ʒß.*  
Intermisso biduo, triduo, pro re natâ repe-  
tatur Purgatio, idq; toties fiat quoties opus  
esse videatur, donec symptomata vel prorsus  
evanuerint vel saltem mitescant. Post singulas  
Catharses jam finitas capiat Opobalsami  
gutt. *xx.* Sacchari particulæ majori instilla-  
tas permixtasq; nihil superbibendo. Vel *Pil. de*  
*Terebinth. ex Insula Chio cum Saccharo can-*  
*do confectam.* Opobalsamum non assumen-  
dum est nisi prægressis evacuationibus debitis.  
Hujus loco *Elektuarium è Balsamo Lucatelli,*  
*Glycyrrh. pulvere, semine Anisi & Terebinthina*  
concinatum poterit substitui. Post evacua-  
tiones sedulo conandum est ut Tussis sedetur,  
ne Pulmones jugi agitatione infirmiores eva-  
dant.



dant. Huc facit præ cæteris Syrupus jam laudatus, qui hac formula possit usurpari, *R Decoct. Pectoral. ℥j. Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. an. ℥ij, Cap. Cochl. v. ter in die.* Medicamentum hoc ita frequenter haustum catarrhum in Pulmones depluentem paulatim sistet; eosq; in pristinam *ἐνεξία* reducet nisi jampridem à naturali statu nimium recesserint. Promovebit insuper purulentæ materiæ in iisdem aggestæ concoctionem.

At vero *Palmarium* hujusce Morbi præsidium est, ut *Æger* quotidie Equo vehatur. Et qui se huic corporis exercitio sanandam tradit nullis jam Diætæ legibus adstrictus, nullo Cibi potusve genere privandus est: cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur. Quibusdam eorum qui ex hac methodo convalescere tumor in collo exortus est non multum à *Scrophulis* abludens.

Est & alia *Tabis* species à *Tussi* prognata, longè diverso anni tempore, initio sc. æstatis. Hæc *Juvenes* persæpe illos invadit qui debiliore sunt corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acribusque refertus est. Sanguinem isti è pulmonibus pertussim exantlant, nimio meri potu prius excalescenti. *Ægri* dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus persentiscunt: Quæ Symptomata nisi maturè remediis appropriatis eliminentur primo scabrities, mox & ulcus accedit, unde pus confectum demum expuitur.



Dicta jam Tabis species Venæsectione & Catharfi bis alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur : Si Diætâ insuper Refrigerante & Incrassante utatur æger & à carnibus in solidum abstineat.

Tertia hujus Morbi Species ortum debet materiæ Febrili in pulmones Febre jam fatiscente, amandatæ ; qui sensim infirmiores reddit à symptomatis jam memoratis vexantur.

Quandoq; oritur à sanie istâ purulentâ quæ à Pleuritidis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem quam Empyema, Curationem postulat.

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debitorum frequentioribus evacuationibus debilitati in quartam Tabis speciem præcipitantur. Hoss calor Hecticus à Cibo potuq; sumpto, sub noctem laceffit : Atq; hos præ cæteris Aphthæ infestant.

*De Podagra.*

Exeunte Januario. aut incipiente Februario ingruit horâ ferè secundâ matutinâ, dolor pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoq; vero calcaneum, suram ; aut talum, mox sequitur rigor cum horrore, & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur, (& pari passu rigor atq; horror recedunt) idq; in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, nunc tensionem violentam, nunc morsum canis rodentis, quandoq; pressu-

ram,



ram, & coarctationem exprimens, hinc præ ex-  
 quilito dolore, nec linteorum superincumben-  
 tium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulati-  
 one concussionem ferre Podagricus valeat;  
 dolor non sedatur, nisi ante horam secundam,  
 tertiamve matutinam, (decurso scilicet nycthe-  
 meri spatio à primo appulsu) & jam lenima-  
 dore perfusus æger somno concedit, à quo evi-  
 gilans, dolore multum imminuto, partem af-  
 fectam tumore recenter occupatam cernit. Se-  
 quenti die, fortè etiam ad biduum, triduúmve  
 dolet nonnihil pars affecta, idq; vehementius  
 ad vesperscente die, levatur autem sub galli  
 cantu. Intra paucos dies alter Pes eodem do-  
 lore torquetur. Postquam utrumq; pedem  
 exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxysmi  
 abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis,  
 tum durationem; atq; ex serie horum paro-  
 xymulorum, constat paroxysmus, qui dicitur  
 Podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate  
 in iis qui vegetiores sunt & quos Podagra ra-  
 rius invasit, diebus sæpe quatuordecim, in seni-  
 oribus, atque iis quos sæpius afflixit, duobus  
 mensibus ferè definit, iis verò, qui vel annis, vel  
 diuturniore morbi mora fracti sunt, non prius  
 valedicit, quàm æstas jam adultior eam fugaverit.

Ad quatuordecim Primos dies urina colo-  
 rator est, cum sedimento rubro, & quasi are-  
 nulis referto, alvus ferè constipata est. *Appe-  
 titus* prostratio, rigor totius corporis sub ve-  
 speram, integrum Paroxysmum comitantur,



recedentem Paroxysmum excipit pedis affecti inter digitos pruritus vix ferendus, unde decidunt furfures, & pedes desquamantur.

Haftenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, cum verò vel ab indebita medicatione turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur, jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasq; regiones occupat, quandoq; unum, pluresve digitos distorquens, fasciculo radicum pastinacæ similes eos reddit, motu paulatim privans, tandemq; concreciones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam, vel oculos cancrorum æmulantes, nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, ferè ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur cum rubore, nonnunquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger ferè undequaq; contractos, & impeditos, ita ut claudicet, & permolestè prorepit. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur, dorsum, aliasq; partes molestè pruriunt, maximè sub horam somni.

Post multos, diuosq; cruciatus Paroxysmi subsequentes (naturâ partim onere materiæ peccantis partim senio oppressâ) ægrum quoad dolorem clementius tractant, at loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoq; etiam propensio



penfio ad diarrhoeam superveniunt, quæ symptomata evanescunt, quoties articulos dolor fatigat, atq; ita nunc dolore, nunc ægritudine, quasi alternatim laceffentibus, Paroxysmus longas moras neçtit.

Calculum Renum in quamplurimis parit hic affectus.

Fœminas perraro infestat, easque, non nisi jam vetulas, & viragines, pueros quoque, & juvenibus minores vix adoritur.

Indicatio Curativa in eo vertitur, ut coctioni consulatur, indigestionibus sublatis, seu fit per Pharmaca, seu victûs rationem, seu exercitationem, seu alia ex istis quælibet, quæ sex res non-naturales indigitantur.

Venæsectio, Catharsis, ac Diaphoresis scopum non attingent, licet iis qui Renum simul Calculo, & exindè orto Mictu sanguineo laborant, non abs re erit, semel in septimana, alvum Mannâ subducere, & singulis noctibus, post Purgationem Paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi satisfaciunt, ea sunt, quæ moderatè calent, & vel amaricant, vel linguam leniter feriunt, talia sunt, Rad. Angelic. enulæ, fol. Absinth. cent. min. cham. cham.ep. &c. quibus addi possunt Antiscorbutica dicta, ut, Rad. raph. rustic. fol. Cochl. hort. nasturt. Aq. &c. quæ tamen parcius usurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos subdunt, & calorem augent, præ istis aliis, quæ miti calore, atq; amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile est Electuar. sequens.

Rx Con-



R<sup>x</sup> *Conserv. cochl. hort. ʒiʒ, Absinth. rom flav. Aurant. an. ʒi, Angel. condit. nuc. mosch. cond. an. ʒʒ. Theriac. Androm. ʒiij. Pulv. ar̄ comp. ʒij. cum s. q. Syr. Aurant. f. Elect. de quo sumat. ʒij. bis in die superbibendo seq. Aq. destillat. Cochl. v. vel vj.*

R<sup>x</sup> *Rad. raphan. rustic. incis. ʒiij, Cochl. hort. M. xij. nasturt. Aq. becabung. sal. v. menth. an. M. iv. cort. aurant. N<sup>o</sup> vj. nuc. mosch. cont. N<sup>o</sup> ij. cerev. Brunsvicens. ʒxij. destillentur organis communibus, donec solummodo ʒvj. aquæ eliciantur pro usu.*

Hæc autem remedia *digestiva*, constanter, atq; omni adhibitâ diligentia, assidue usurpanda, & in *paroxysmorum* intervallis præcipue in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, ut neq; plusimenti ingeratur, quam ventriculus concoquere valeat, neq; è contra nimia, abstinentia, partes eâ proportionem alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis passibus vescatur, de cæteris, demptâ carne, pro libitu comedat, modo nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit, loco autem cœnæ indulgeat sibi, haustum cerevisiæ alicujus tenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi sunt, qui neq; ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, deprimuntur.



muntur. Huiusmodi est *Cerevisia tenuis Londinensis* aut multa aqua, cum paucio vino permixta, aqua autem pura & cruda periculosa est, cum autem universa ferè corporis substantia, in podagram degeneraverit, à liquore quocunq; fermentato quantumvis leni, & tenui abstineat, & utatur *Decocto Dietetico ex Sarsa*, in remedium formulis descripto, ubi primum à paroxysmo convaluerit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo, & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate proveciore, vel deniq; præ nimia debilitate, cibos absq; vino nequeat concoquere, in passibus haustum vini Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Dieteticum* abdicans.

Æger maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis, cæteris vero omnibus, exercitatio corporis quotidiana, facile palmam præcipit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo iusto vehementior; quoad exercitii genus, quoties nec grandior ætas nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua in aere salubri, aut vectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat. Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, à carnibus abstinere iusculo uti avenaceo, aut alio pari alimento; sin autem spiritus animales ataxiam concipere apti sunt, non expedit à carnibus abstinere diutius; quam ventriculus earum usum aversetur ne quid autem vel in quantitate, vel in qualitate ciborum aut potùs peccet.

Sym-



Symptomatis his occurrendum est, à quibus æger in paroxysmo de vita periclitatur, horum maxime familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam à flatu, hoc in casu, nihil æq; votis respondet, ac vini Canarenis haustulus subindè deglutitus, exercitio utatur æger; si autem symptoma, inducias haud ferens, mortem minuetur, modo caput malum non impetat, ad *Laudan.* statim confugiendum, viz. *gutt. xx*, in haustulo *Aq. Epidem.* & in lecto ad quietem se componat. hanc ipsa methodo, se ab imminente morte liberavit autor clarissimus ubi ex errore aliquo, circa res sex non-naturales, in ingentem ventriculi ægritudinem incidit, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore, artus interim, ex retrocessione materiæ Podagricæ, doloris erant expertes, ac ad motum plus solito habiles, Congium nempe unum liquoris possetici, vel cerevisiæ tenuis devorabat, & quamprimum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui infusulata fuerint *Laudan. liq. gutt. xvij*, sumebat. quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur, methodo & medicamenti huius usui dicatis; ad biduum, triduumve, manè & vespere per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantiss in Pulmonum lobos; liberatis artibus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma, pari modo ac Peripneumonia absoluta, venæsectione scilicet repetitâ, diætâ, & remediis, refrigerantibus, & incrassantibus, purgandus est insuper æger, inter venæsectiones, potionibus lenientibus, sudoris autem provocatio obest.

F I N I S.



Conte Peruv. 12.

By Aq. fast. alkali: ceras. nigra.  
 3℥. Sy. de Mecon. 3℥. ss.  
 1℥. 2 dot.







*Cunila* go.  
*Hysop.* 4 pectoral.  
*capre. ven.*  
*scabiosa.*

3℥ of Syr. to a quart.

*Decoctio scabiosa.*

℞ iacn. alb. ℥ iiii

℞ iac. brun. ℥ i.

coctinel. ℞ xvi.

℞ iacn. v.

to be put into a quart

of spring water boiling

hot: let it boyl &

filter while it is warm

it: pour it of

for use.

℞ iacn. v.



~~... ..~~  
~~... ..~~  
~~... ..~~  
~~... ..~~

Marshall's Balls

12m. 1/2

Cumin

flaccidior

causam

flor. lupul. a

sacchar. cand. a

putresc.

suc. liquor. 3i

distill. in. Vin. alb. 3i

Syrup

of 12. m. 1/2

883

What flower

f. 1/2



ad Colicam  
ol. garyoph. gutt vi  
dropt upon sugar  
taken in 3 day.  
John ~~7411~~  
Julap. refriger

Bar. juniper

Caru

Coriand

Sant. med.

Castoreum

Er



