

**Pathologiæ cerebri, et nervosi generis specimen : in quo agitur de morbis convulsivis, et de scorbuto / Studio Thomæ Willis.**

**Contributors**

Willis, Thomas, 1621-1675

**Publication/Creation**

Londini : Typis S. Roycroft, impensis J. Martyn, 1678.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/bj869gvx>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





Vil

1678










F. x. k

7

53355 / A





P

C

N

SE

M

S C

THOM  
M.

Ab A

Typis S.  
ne Cam

21 E

63.D.37

29739

P A T H O L O G I Æ  
C E R E B R I,  
E T  
N E R V O S I G E N E R I S  
S P E C I M E N.

*In quo agitur de*  
M O R B I S C O N V U L S I V I S;  
E T D E  
S C O R B U T O.

---

S T U D I O  
T H O M Æ W I L L I S, ex *Æde Christi* O X O N.  
M. D. & in ista celeberrima Academia Na-  
turalis Philosophiæ Professoris *Sidleiani*.

---

Editio Quarta,  
Ab AUTHORE recognita, atque ab eodem  
multiplici Auctario locupletata.

---

L O N D I N I,  
Typis S. Roycroft; Impensis Jo. Martyn, ad Infig-  
ne Campanæ, in Cœmeterio D. Pauli, MDCLXXVIII.

*agp  
12/7/11*



PATHOLOGIC  
CASES  
ET  
NERVOSI GENIIS  
SPECIMEN  
In quo agitur de  
MORBIS CONVULSIVIS  
ET DE  
SCORBUTO.

STUDIO  
THOMÆ WHILLIS, OR FRS. COLLEGIOR. OXON.  
M. D. & in hisce Collegiis Academiæ No-  
minis Pathologiæ Professoris Ordinarii.

ELIÆ QUINCE  
AB ALTHORÆ recensionis, et ad eam  
multiplicata additio.

LONDINÆ  
Typis E. ROYCE; Impensis J. MARYLAND, et J. B. ROYCE;  
in Compagnie, in Curia D. F. M. B. G. L. X. II.





*Reverendissimo in Christo  
Patri, & Domino,*

D. GILBERTO,

Providentia Divina, Archipiscopo Cantuariensi, totius Angliæ Primati & Metropolitano ; & Augustissimo Principi CAROLO II. M. Britannia, Franciæ & Hiberniæ Regi, a secretioribus Conciliis.



Ta legibus constitutum est, (Amplissime Præsul) ut quicquid fundi cujuscumque solo superstrui contigerit, accessorii jure id ipsum consequatur. Cum itaque isti, quod nuper moliebar operi, de sensitivæ



## E P I S T O L A

animæ natura & muniis, nec non de affectibus cerebri, & nervosi generis, variisque qui in iisdem versantur morbis, humani capitis anatomen, pro fundamento collocassem; syntagmate hoc Clementiæ vestræ dicato, omnino necesse erat, ut qualiscunque postmodum basi isti inniteretur moles, vestra protinus audiat, dicique gestiat; atque ita quidem in vitio proficimus, & olim deliquisse, culpæ subsequenter non gradus tantum, sed, quod majus est, etiam auctoramentum existit, ut tandem amisso delicti nomine officio fungi potius quam peccare videamur.

Interea tamen, neque hæc in qua verfor causa aut a vestris rationibus aliena, aut ab Ecclesiæ rebus, quibus felicissime præfides, abhorrere dicenda est; Nam & qui hic subinde occurrunt Epileptici sese in aquam aut ignem præcipitantes, & illi quibus membra spasmodicis contracta varieque distorta, tum etiam quibus integra corpora modo ut se erigere nequirent incurvata, modo quasi dæmonis afflatu saltibus stupendis aliisque miris gesticulationibus agitata fuerunt; Hi inquam, & plures alii, quos hic passim describo, ægrotantes ab istis

non



## D E D I C A T O R I A.

non multum differre videntur, quos in Evangelio a Christo Domino curatos legimus; ipsisque etiamnum curandis, utpote qui tam contumaces & rebelles sunt, adfidentem sibi Numinis opem supra omnes Pharmaciae vires Medicus utut peritissimus semper implorare debet. Itaque & jure optimo *ὑμῶν* ab antiquis *ἱεσὶν* dictae theoria, & reliqua etiam pathologia nostra, quatenus *τὸ θεῖον* quoddam in se continet, morbosque non minus precibus & jejuniis quam medicamentis sanandos explicat, sacrorum arbitro nuncupari, & proinde sanctitatis vestrae auspiciis muniri praepotaverint.

Porro novum non est ut per nosocomium ad Ecclesiam sit aditus, siquidem ista fere methodo Salvatorem nostrum fuisse usum constat, quia corporis restituti valetudine animae salutem initium sumere plerumque voluit. Et profecto cum stupida melancholicorum deliria, caninae rabies, aliaque a cerebro non satis sano orta, quosdam & a sanctorum communione, & ab hominum societate pepulerint; si haec artis nostrae ope profulgata essent, non desperandum foret, quin morbis una & erroribus valedicentes



## EPISTOLA

rectius non tantum valerent, sed & saperent homines.

Quod superest ἀρχιτρον opt. maxim. supplex veneror, ut quam pacem Reipublicæ feliciter restituit, Ecclesiæ suæ reddat, miserorum oculis caliginem submoveat, animis furorem tollat, & in tanti beneficii pignus, simul & cumulum, Clementiam vestram, ingens reformatæ pietatis decus & columnen, salvam & fospitem diutissime conservet, quod amicus precatur

*Clementiæ vestræ humillimus cultor,  
Cliens addictissimus*

THO. WILLIS.

Amico



Amico Lectori Præfatio.



Uod cerebri, & nervosi generis  
Pathologiam integram polli-  
citus, demum unius, aut alte-  
rius tantum morbirationes  
exhibuerim; Te monendum  
imprimis (Candide lector)  
velim, non me vafra illa fraude, qua rerum  
venalium institores merces suas extrudere  
conantur, prodromas hasce theorias oculis tuis  
subjecisse: cum enim istis solenne habetur, si  
forte aliquid melioris notæ possideant, id  
illico ostendere, pergulis præfigere, in lucem  
dare, & obviis quibuscunque ingerere, ut ita  
tandem offuciis fidem, & vilioribus postmo-  
dum distrabendis decus præstruant. Contrari-  
am ego penitus infisto viam, nimirum ut quæ  
magis dubiæ videbantur indolis, in specimi-  
na præponerem, & ubi censuram, & judicia  
imprimis formidanda duxeram, illa utique  
deposcerem & provocarem. neque enim tam  
docere alios quam ab iisdem discere, nec tam  
famæ velificare quam veritati, quæque ipsi in  
proximo consistit, Philosophie famulari, &  
facem prætendere, in votis habeo.

Quemadmodum autem, inter universas cor-  
poris humani ægrotudines, illæ quæ cerebrum,  
ejusque appendicem tentant, cognitionis sem-  
per



# P R Æ F A T I O.

per arduæ, & impendio intricate, jure merito  
haberi solent; ita in toto hujusmodi morbo-  
rum turba, nihil abstrusius, quodque nodis,  
vindice dignis, magis implicaretur, quam de  
veris convulsionum causis, & earundem ra-  
tionibus (si ita loqui liceat) formalibus dis-  
ceptatio. Quapropter Averrhoes non dubi-  
tabat pronunciare, quod verba medicorum,  
in hoc accidente, universaliter sint propin-  
quiora, ut sint verba musicorum, quam ut  
sint demonstrativa. Item Galenus, qui raro  
admodum in assignandis rerum utut abdi-  
tarum causis hesitavit, ingenue fatebatur ἢ πε-  
ρ ἀκριβὲς εἶναι ἢ αἰτία τῆ νοσήματος ἐφ' ἧ  
παύται τὰ μύρια χαλεπὸν εἶπεν. Nec tantum  
antiquiores Medici veritatem hanc sublatam  
ex oculis, aut alta caligine involutam invidi-  
querebant, verum & recentiores plerique in  
eundem lapidem gravissime offenderunt. Qui-  
dam nuperioris seculi vir doctissimus, Johan-  
nes Crato exclamat, optatque utinam ante  
vitæ nostræ exitum, veram dignotio-  
nem mali Epileptici, verumque remedium  
aliquis ostenderet. Ceterum licet affectionum  
spasmodicæ causæ, a nullis serio reddantur,  
tamen earundem Ætiologia quedam apud  
Authores passim traditur. Hi vero potius quod  
vulgo fertur, quam quod ipsi senserint, aut  
quod animo veritatis avido satisfaciat, scrip-  
tis



## P R Æ F A T I O.

*tis mandarunt : Non abfimili quippe ritu  
 hanc rem peregerunt , ac imperitiores choro-  
 graphi, qui loca tantum plana, & facile acces-  
 sibilia exacte dimetiuntur, interim sylvis ob-  
 tecta, montibus inequalia, aut præcipitiis ab-  
 rupta sine radio adhibito, juxta populi æsti-  
 mationem supputasse satis ducunt. Ita cum  
 medici plures, convulsionum causas repletio-  
 nem, ac inanitionem, & quidam alii partium  
 nervosarum solummodo irritationem esse dixe-  
 runt, nihil hinc plane declaratur, aut quod in-  
 stinctus modum enarraverit, quo præter vel  
 contra naturæ, aut appetitus normam, spasmi  
 peraguntur, aut quod ullatenus explicarit, un-  
 de in affectu isto, facultati motrici impetus, ro-  
 bur, ac celeritas pene infinita, & supra omnes  
 naturalis potentie vires, accesserint. Qua-  
 propter facilem mihi spero veniam si, quando-  
 quidem in ejusmodi phænomenis huc usque  
 frustra desudatum est, ego Harioli, & conjectio-  
 ris partes suscipiens, novas & non prius au-  
 ditas rationum syllogas in medium produxe-  
 rim. Profecto (quicquid alii senserint) spiritus  
 animales revera existere, ipsiusque animæ cor-  
 poreæ hypostasim constituere; eosdem motus, &  
 sensus proxima & immediata instrumenta es-  
 se; quin & nixus motivos ab eorum explosio-  
 nibus excitari, prout ubique in sequenti tra-  
 ctatu supponimus, ita in physiologia nostra ali-  
 quando*



## P R Æ F A T I O.

quando forsan in lucem proditura, rationibus non contemnendis speramus nos evicisse. Super hac igitur hypothesi, (ut opinor satis firma, ac ad rem nostram maxime accommoda) sc. spirituum animalium virtute elastica, sive explosiva, doctrinam spasmoden extruendam curavimus. At quia fetus hic noster faciem adhuc insolitam, & præ notionum raritate, quasi monstrosam quiddam & teratodes ostentat, idcirco (quemadmodum infelices partus tractari solent) in mediam viam, & tantum non in profluentem, ceu exposititium abjicimus. Porro ejusdem fortune vices subit disquisitio quedam alia, de scorbuto instituta, in quantum sc. doctrinæ spasmodicæ hæc plurimum affinis, eidem hypothesi innititur, ejusque velut appendix est. Quos quidem præpoperos, & quasi abortivos partus, si pro sua humanitate hospites illi, qui in eosdem forte inciderint, enutriendos, tollendosque curaverint, justior tandem aliquando succedet proles, quæ utrum unde nascitur feliciter sequatur, & parentis suæ, sc. humane animæ memor, ejus imaginem juxta & indolem expressus referat; saltem (quod huic Pathologiæ accidisse vereor) cerebri morbos non ita describat, ut in eorundem sortem veniat, & numerum auxisse videatur.

T R A C.



(1)  
TRACTATUS PRIMUS  
DE  
MORBIS CONVULSIVIS.

CAPUT. I.

De Spasms, sive motibus Convulsivis in genere.



IN tractandis Affectibus Convulsivis, plerique Medici distinguunt inter Spasnum, sive Convulsionem, & motum convulsivum; per illum nempe intelligentes contractionem constantem, qua membrum rigidum & inflexile evadit; per hunc autem motus celeres, & concussiones, quæ interjecta quiete, alternatim cessant, redeuntque: verum nec illi qui has discriminis notas constituunt, nec cæteri Authores eas perpetuo observant: quippe per vocabula Spasmi & Convulsionis quælibet *πάσιν σπασμωδία* non raro designant: Quare melioris discretionis gratia, priorem affectum cum Cardano *Τίταρον* appellabimus, alterum vero Spasnum seu motum Convulsivum in genere.

Ut autem Spasmi, sive motus Convulsivi, & irregularis natura, & causæ rectius innotescant, præmittendum esset, quo pacto *functio motiva regularis* in corpore animato peragitur: verum hujus plenior consideratio, quoniam ad Cerebri, & nervosi generis *Physiologiam* spectat, in alium deferetur sermonem: In præsentī, quantum ad rei propositæ elucidationem facit, verbo annotetur, *scilicet* motus animales esse proximum *motus regularis* instrumentum, ipsorumque actionem, seu vim motu-  
gularis ut peragitur.

A

glomerati



*Huius duplex  
principium.*

*Duplex  
item subje-  
ctum.*

glomerati in parte motiva, ibidemque in spatium amplius expansi, eandem insient, & intumescant, quæ proinde, quoad longitudinem contracta illico ad se partem sibi appensam attrahit. In nervorum descriptione nostra pridem edita, innuimus huiusmodi motum esse duplicem, sc. *spontaneum*, & *mere naturalem*; huius instinctum à cerebello, ac istius à cerebro, utrumque autem per nervorum ductus veluti canales deferri, cum ad musculos, tum ad fibras, membranas, parenchymatis, aliisque partibus motivis intertextas; denique in hisce omnibus tam expedite varias peragi actiones, quasunque aut *necessitas naturalis*, aut *voluntatis imperium* exigit, ea solum ratione, quod inter spiritus animales, qui animæ sensitivæ hypostasim constituunt, intra prædictas partes, continuata serie dispositas, ubique eadem est *communicatio officii*, *intima conjunctio*, & *celerrimum commercium*. At vero inter motum à musculo, eumque ab aliis partibus editum, discrimen hoc notabile occurrit; quod in his, actio sæpiissime intra corporis motivi terminos circumscribitur, ita ut ejusdem tantum *membrana*, aut *visceris* pars una aliam moveat, & deinceps hæc à vicina moveatur: in genere autem *musculoso*, plerumque *pars movens* in uno membro, & *movenda* in alio proxime confita est (quanquam & inter partes musculosas quædam, uti *cor* & *diaphragma*, proprie seipsas fere tantum movent): Hinc *membrana* & *viscera* motum quasi *intestinum*, & *vermicularem* habere dicuntur; qualis ubicunque incipitur, spiritus ibidem densius agglomerati, & expansi, primo partem istam, dein ultra pergentes, aliam, & mox ulteriorem intumesciunt, proindeque partem illam quæ à tergo est trahunt, adeoque intumescationem, & propterea motum à loco in locum transferunt; simili fere ritu ac lumbrici, aliaque reptilia progressus suos faciunt. Huic autem *membrantarum*, ac *viscerum functioni motiva*, si frequens, aut indiscontinua fuerit, spiritus copiosi requiruntur, qui tamen sine tumultu, aut magno impetu, pensa sua satis tranquille exequuntur:



tur : Et quidem observare est, *spiritus animales* in *viscera membranacea* haud multo parcius, quam in *musculos* influere; prout arguere licet ab istarum partium sensu exquisitiori, & in iisdem multiplici nervorum insertione, & diversimoda per plexus & fibras divaricatione; licet interea *musculi* uberiori sanguinis influxu irrigantur: Quoad *motum* vero in genere *musculoso* peractum, *spirituum agglomeratio* & *rarefactio* per totam partis motivæ compagem subito ac simul explicatæ, tanto cum impetu, ac robore peraguntur, ut *tractio musculi* in nixu motivo, vim *trochleæ*, aut *veſtis* excedat; cumque vis ista tantum à spirituum partis motivæ inſitorum expansione, sive rarefactione dependeat, nihil minus concipere possumus, quam spiritus ita expansos, *pulveris pyrii ritu*, veluti *ignitos explodi*. Enimvero supponere licet, spirituum, fibras musculo intertextas incolentium, *particulis spirituosalinis*, alias diversi generis *particulas*, à *sanguine arterioso* inter easdem fibras ubique interfluo, *nitrosulphureas* accedere, illisque intime accrescere: dein quoties *particulæ* utriusque generis, velut *nitrum* & *sulphur* combinata, propter motus instinctum per nervos advectum, tanquam à fomite ignatio, commoventur, protenus ab invicem *elisa*, & velut *explosa*, musculum subito inflant, proindeque tractionem validissimam efficiunt: enimvero in hunc finem ita constitui videtur, ut *musculi* multo uberius quam *viscera membranacea* sanguine arterioso perfundantur: nimirum ut spirituum *copula elastica*, per motus valde crebros, ac interdum continuos absumptæ, ac perpetim deciduæ, subinde statim nova à *latice sanguineo* substituatur: interim ut ipsi *spiritus* in minori copia per nervos exiles suppeditati, usque in eadem statione, tanquam *milites veterani*, diutius persistant, & sæpe *copulam* multiplicem impendant. Secus enim, unde jumentis, dum per plures horas, imo per integrum aliquando diem, cursu citatiori musculos fere omnes exercent, spirituum penus pro tanto labore sufficiens derivatur? aut quis credat paucos spirituum manipulos,

*Musculi  
motus spiri-  
tuum ex-  
plosio qua-  
dam.*



per exiles nervorum *paris vagi* & *intercostalis* propagines *cordis* adductos, proprio Marte adeo robustum, & indiscontinuum ejus motum efficere posse? *Illis*, equidem necesse videtur, copias *subsidiarias* perpetim à sanguine accedere, easdemque semper protinus *explodi*. Certe ob hanc rationem & *cordis*, & cæterorum *musculorum* virtus motiva robustior, & supra *organum* quodvis *mechanicum*, *elastica* evadit: nempe in quantum spiritus animales, ubique in musculofo genere agentes, sibi met *copulam explosivam* adsciscant.

Quod si *Explosionis* vocabulum, in *Philosophia* ac *medicina* adhuc insolitum, cuius in minus arrideat: proinde ut *Pathologia* *σπασμωδία* huic basi innitens, tantum *ignoti per ignotius explicatio* videatur: facile erit istiusmodi effectus, circa res tum naturales, tum artificiales, instantias, & exempla quamplurima proferre; ex quorum analogia motuum in corpore animato, tum regulariter, tum *ζυνεταλώς* peractorum, rationes aptissimæ desumuntur. Nam præter *Nitri* cum *Sulphure*, cum *Tartaro*, & cum *Antimonio* mixturas, quæ omnes cum detonatione igniuntur; atque *Antium fulminans*, & compositionem ex *sale Tartari*, *Nitro*, & *Sulphure*, quæ absque ignitione actuali, tantum penitus excalescunt, cum fragore vehementi exploduntur; etiam huc referri possint multi liquores, qui simul commissi, aut quibusdam corporibus affusi, motus violentos, & plane explosivos ineunt, concitantve: *Spiritus vitri*, & *liquor Antimonii glacialis* invicem confusi; quin & alteruter *limatura ferri* immixtus, ebullitionem maximam, cum calore & fumo atrato concipiunt. Vulgo notum est quanta effervescencia, & impetus plane explosivi à *salibus fixis deliquatis*, ac *acetosis* cujusque generis simul permixtis oriuntur: Nec minus explosionis effectus cernitur, quando *liquor sale volatili imbutus*, uti *Spiritus C. Cervi* aut *sanguinis*, *flagmati salino* vel *fixo*, vel *acetoso*, vel *nitro sulphureo* admoveatur, sc. particulae aliæ ab aliis vehementer elisæ, cum impetu dissiliunt, & quaqu-



quaquaversus longe proferuntur; quæ proculdubio, si intra corporis cujusdam spatia, uti musculi fibras coercerentur, ipsum subito intumescerent, adeoque motus localis instrumentum constituerent. Super his paulo apertius in *νευρολογία* nostra olim disseruimus, atque rem adhuc fusius, & accuratius explicatam forsitan aliquando publici juris faciemus.

Interea tamen ne videar sententiam hanc, revera novam, tanquam mei unius Cerebri fortum, omni patrono inopem exposuisse; Libet hic *Clarissimi Gassendi* assertionem proferre; quæ ut hypothese huic nostræ apertissime favet, & quodammodo ejus ansam præbuit, ita fortasse poterit & auctoritatem aliquam conciliare. Itaque *ἀντιολογῶνται* ille vir animo perpendens *quanta sit vis* *Gassend.*  
*illæ sive robur, quo non modo brachium, aut crus,* *phys. sect. 3.*  
*sed tota etiam animalis machina movetur, regitur, lib. 1. cap. 1.*  
*attollitur, transfertur:* Subjungit. *Ecquis facile*  
*capiat tenue illud, quodcumque est, intra Elephanti*  
*corpus, quod seu animam, seu spiritum, seu aliud*  
*quodvis principium motus concipimus, posse illum*  
*tantum molem agitare, ac ad tripudium etiam vo-*  
*lox, concinnumque componere?* ac tanto magis,  
 quanto ubi tenue illud intra id corpus non amplius viget, tanta externa vi opus sit, ut vel minimum loco emoveatur: sed nempe ad hoc quoque primum facit, eadem natura anima ignea, quæ tamen si sit flammula pertenuis, sui tamen mobilitate idem proportionem præstare intra corpus valebat, quod flammula ex pulvere pyrio intra tormentum bellicum: dum sc. non modo globum tanto propellit impetu, sed tanta etiam vi depellit totam machinam. Quod vero ad spiritus attinet, qui (instar pulveris pyrii explosi) agitationem istam subeunt, dubium esse, inquit, an ii sint qui adveniunt ex cerebro, an qui in ipsis tendinibus quasi evnati haberi possint: Verum tamen si utrique concurrant, videntur tamen ad hoc munus illi præsentius destinati, qui sunt connati tendinibus. Non pluribus hic opus est, ut declaretur functionem motivam à spirituum animalium copula elastica, ejus-



que *decisione* pendere. Attamen ex hoc supposito (quod quidem maxima cum probabilitate supponimus) facile sequetur, *motus convulsivos* multo magis à tali causa procedere: Quisquis enim in membris, aut partibus affectis, *subitas intumescencias, violentas & validissimas contractions*, quinimo interdum totius corporis *concussiones, jactationesque* impetuosissimas considerabit, nihil minus concipere potest, quam plures spirituum animalium *glomeri*, velut fulguris è nube erumpentis, *explodi*. Porro hinc etiam Elencho velut reciproco arguere licebit, & quia *motus σπασμωδικοί* sunt *explosivi insuper & regulares*, à *spirituum explosionibus* produci: quo tamen ritu, quot modis, & quibus de causis spiritus *animales explosi* affectiones *σπασμωδικοί* pariunt, praesentis instituti erit paulo fusius, & quantum res ita difficilis & abstrusa patitur, apertius demonstrare.

*Spasmodum  
causa con-  
iuncta.*

*Non reple-  
tio aut ina-  
nitio.*

In recitandis aliorum, circa *spasmi naturam & causas*, sententiis non multis hic moror; quæ apud antiquos diu celebris increbuit opinio, affectionem hanc tantum à *repletionem*, aut *inanitionem* produci (utcumque huic stabiliendæ præter auctoritatem Hippocratis proferatur exemplum de *cario*, aut *fidium nervis*, qui aut madido aere impleti, aut nimis *sicco inani* contrahi solent) facile ex se concidit; quia supponere videtur (id quod nemini fragilitatem nervi experto credibile esse potest) nimirum ipsos nervos quoquomodo abbreviatos atque contractos, posse vi quadam musculos ad se attrahere. Quod si referatur *repletionem*, aut *inanitionem* respectu solidarum partium quæ convelli solent, intelligi debere; è contra observare licet, ubi musculi & nervosum genus humore aqueo maxime irrigantur, uti in *Anasarca*, aut eodem plane destituuntur, prout in *tabe*, vel *marasmo*, haud propterea motus convulsivos excitari. *E recentioribus* plerique solummodo *irritationem* nervosarum partium convulsionis esse causam statuerunt, conjecturam inde opinor petentes, quod *αὐτοψία* pateat ab ipsa *vellicatione*, soloque



loque tactu nervorum spasmos induci: Et quidem plane observavimus, in dissectione vivi catuli, cultro nudatis nervorum spinalium caudicibus imposito, statim & ipsos, & musculorum quibus inferebantur corpora convelli: nec inusitatum est, à nervorum, ac tendinum puncturis, in quibusvis fere hominibus, spasmos excitari. Memini ab ulcere in cujusdam brachio excitato muscoli tendinem prorsus nudatum fuisse, qui cum specillo chirurgico tangeretur, patientem rigore quodam in toto corpore, & concussione illico oborta, aliquandiu inhorruisse. Verum enimvero ut concedamus partium *nervosarum irrationes* non raro *causa evidenter* vicem subire; insuper aliquando hac *causa solitaria* spasmos leviores, & cito transeuntes produci: nihilominus ut graviores hujus morbi paroxysmi, sique crebra vice repetentes debite explicentur, alias, atque altiores causas, sc. tum *conjunctam*, tum *procatartica* investigare oportebit.

*Aliquate-  
nus ab irri-  
tatione de-  
pendet.*

Quandoquidem igitur *spasmi* nequaquam accidunt, nisi in corpore vivo, ubi partes nervosae inflantur, & turgescunt spiritu animali, in promptu est conjicere ipsos *spiritus animales*, sicut in motu regulari, ita in convulsivo esse proximum actionis instrumentum: nimirum illi quandiu *copula explosiva* idonea, & moderata imbuuntur, ac ad ipsam elidendam tantum *appetitus jussu*, aut *natura instinctu* proritantur, motus solummodo regulares pariunt: sin vero iidem spiritus sibimet copulam *heterogeneam*, ac nimis *elasticam* asciverint, vel si justo impetuosius, & vehementius in actus suos rapiantur; utique, tamquam equi effrænes stimulis agitati, inordinate exiliunt, & copulam suam, genuinam licet ac naturalem, violente explodunt: proindeque partes continentes, velut currus appensos, motu perverso, efferoque secum una corripunt.

Cum itaque, ut prædicitur, *motus convulsivi* ob duas potissimum causas excitentur, hinc totidem illorum *species* constituentur. Nam 1. interdum accidit *convulsionem* sine procatarxi, aut copula

*Spasmodum  
duplex cau-  
sa, ac dua  
sunt species.  
Irritatio.*



heterogenea prius ascitis, tantum à *causa evidenti solitaria* induci: ita namque *passio vehemens* cerebro impressa, *solutio continui* alicubi in nervoso genere contingens, pathemata spasmodica nonnullis, quibus Cerebrum & nervi debilioris sunt constitutionis, subito intulere: quippe spiritus animales, objecto improporcionado ipsos fugante, partes continentes exagitant, quin & copulam suam, licet idoneam, vehementer elidendo, easdem inflat; proindeque alias hisce annexas convellunt: *Spasmi* hoc ritu excitati, quoniam in iis spirituum copula naturalis vehementius eliditur, quodammodo sunt explosivi, qui tamen cito desinunt, & sæpiissime sine viscerum, aut membrorum jactationibus, cum *tremore* tantum & horrore aliquo in spirituum deliquia transeunt. Verum 2. *convulsiones*, quarum paroxysmi sunt graviores, atque diutius persistunt, aut crebrius repetunt, omnino à causa præcætarctica, sive dispositione prævia pendere, & ab alia, præter irritationem, causa conjuncta exoriri videntur. Ideoque in hoc casu *particulas heterogeneas, & valde explosivas spiritibus in hac aut illa corporis regione agentibus accrescere* supponimus; deinde ex iniqua hac combinatione, & *irrequieta hujusmodi materia & spirituum collisione, crebras, vehementesque explosiones editas, paroxysmos* *σπασμωδεις* inducere.

Copula explosiva præternaturalis.

Enimvero præter *copulam elasticam*, quæ spiritibus à sanguine arterioso ubivis accedit, & à cujus explosione ordinata *impetus motivus*, juxta *appetitus nutum*, aut *natura instinctum* in partibus quibusvis nervosis perficitur (prout alibi declaravimus): etiam alijsmodi interdum corpuscula naturæ effææ, & *pulveris nitrati* magis æmula, spiritibus adveniunt, iisque intime adhærent: cujus materiæ à spirituum amplexibus, cum frequentia & subita divortia contingant, à mutua particularum elisione corpora continentia varie inflantur, adeoque in *motus convulsivos* aguntur. Revera quoties *affectio spasmodica* habitualis evadit, ut *paroxysmi convulsivi* non raro sua sponte, & sine *causa evidenti*, passim vero levi quavis occasione orientur,



orientur, talis morbi procatarxis in hujusmodi mala spirituum animalium diathesi consistit: Neque enim tantæ ægritudini excicandæ, *colluvies serosa*, aliique minus efferi humores, licet in ipsis cerebri ventriculis, aut circa nervorum origines depositi, sufficiant: Quippe in defunctorum capitibus non raro cerebri medullia, ipsaque nervorum principia aquæ limpidæ prorsus immersa vidi; quibus tamen dum vixerunt, nec *Epilepsia*, nec *motus convulsivi* adfuerunt: Quin potius ad hos motus producendos requiruntur *corpuscula* maxime *activa*, qualia sunt *salina*, & *sulphurea*; quæ cum spiritibus combinata, & dein subito erumpentia, particularum mineralium combinationes, violentasque explosiones imitentur. Quandoquidem enim in motu regulari & ordinario (prout modo innuimus) musculi *impetum motivum*, & *vim elasticam* concipere nequimus, nisi *spirituum animalium explosio* quædam supponatur; certe multo magis pro *insultibus epilepticis*, aliisque *convulsionibus* admirandis, quæ passim eveniunt, excitandis, eorundem spirituum, cum aliis particulis valde efferis *complicationes*, eorumque ab invicem *elisiones* vehementes requiri, asserere licebit. Circa ejusmodi vero *copulam spasmodicam*, quia differt à *naturali & ordinaria*, quam in motu regulari adesse, & ubivis à sanguine suppeditari alibi ostendimus, inquirere oportet *undenam* illa provenit, & *quo ritu*, quibusque in locis spiritibus accrescere solet.

Quoad prius, observare licet *explosiones spasmodicas* non solum in *musculis*, quibus solis, quæ *motum regularem* efficiunt limitantur, sed etiam in *membranis*, sc. *ventriculo*, *intestinis*, *mesenterio*, aliisque *partibus* fere *exanguibus* passim contingere: porro *explosiones ipsas* in *affectione convulsiva*, licet *contra appetitus nutum*, & *natura morem* excitantur, longe *vehementiores* esse, & *diutius persistere*, quam in *motu regulari*: Ex quibus constare videtur, *copulam explosivam spasmodicam* aliunde quam *motus regularis effectricem* advenire: Et quidem probabile est illam, non uti hanc à *sanguine*



*Copula ex- arterioso inter fibras musculosas ubique interfluo,  
plosiva spaf- profluere, verum à cerebro cum liquore nervos irri-  
modica im- gante descendere, & dein juxta horum origines,  
mediate non medios processus, plexus, extremitates, quasi in  
à sanguine, morbi convulsivi mineram congeri. Profecto ni-  
verum à hil evidentius liquet, quam affectus spasmodicos,  
Cerebro. ob noxam imprimis cerebro affixam, & exinde in*

*varias systematis nervosi partes transmissam, sæpi-  
sime oriri: hinc enim accidit, quod passio vehe-  
mens, uti timoris, ira, aut tristitiæ spiritus τὸ θυμὸν  
ἐκτρέφει hospites afficiens, ita crebro pathemata di-  
cta hysterica, ac hypochondriaca ordiatur: Porro  
quod in malis febrium crisi- bus, cum sanguinis re-  
crementa adusta in caput transferuntur, convulsio-  
nes passim succedant: Porro & hæc ratio est, cur  
Vertigo, capitis inflatio, mentis torpor, aliæque supre-  
ma regionis accidentia, spasmodorum in visceribus, &  
non raro in toto corpore subsequantium, proce-  
mium esse solent. Quapropter minime dubitan-  
dum est, quin particula heterogenea, & explosiva è  
sanguine una cum succo nervoso cerebro instillan-  
tur, quæ postea in nervosum genus detrusæ inibi  
spiritibus accrescunt, iisque diathesin convulsivam  
inferunt. Revera affectus σπασμωδικοί, qui aut uni-  
versales sunt, aut saltem plures simul corporis par-  
tes occupant, hoc tantum ritu fere oriuntur. Inte-  
rim tamen haud negamus, quin Spasmi particula-  
res, qui se intra quosdam locos, capite nullatenus  
affecto, continent, aliis interdum modis inducan-  
tur. Nam siquidem nervi ab utroque fine, sc. rati-  
ce, & extremis ramentis, humorem suum imbibunt  
(quod & Doctissimus Glissonius verissimum  
esse statuit, & à nobis non sine summa probabili-  
tate in νευρολογία nostra ostenditur), profecto hinc  
quoque inferre licebit, etiam particulas spasmodi-  
cas non tantum à nervorum principiis, sed aliqua-  
tenus per illorum extremitates intus admitti: Id  
quod fortassis aperte satis & plane constat, quod  
ex liene male affecto Spasmi circa ipsius regionem  
exorti hypochondria, & non raro præcordia infe-  
stant. Novi quibus à tumore, vel ulcere in mesente-  
rio, utero, aliisque visceribus existente, Convulsiones  
cum*

*Interdum à  
nervorum  
finibus su-  
scipitur.*



cum in parte affecta, tum circumcirca eam increbrescere solebant: cujus ratio videtur non aliunde petenda quam à particulis heterogeneis in loco affecto uberius congestis, quæque simul in fibras nerveas per totam viciniam confitas irrepentes, iis motuum convulsivorum, velut *pulveris pyrii igniendi formitem* suppeditant: at vero *Spasmi* ob tales *προσάσεις* oriundi haud sese solent longe lateque diffundere, neque semper ad caput ascendere.

His ita præmissis de affectionis Spasmodicæ *causa interna & proxima*, quam sc. potissimum, ac sæpius ipsi *capiti*, quadantenus item *nervorum extremitatibus* ortum debere statuimus; modo restat ut varias in utroque genere *causas remotiores*, & multiplicem hujus morbi apparatus particularius designemus. *Ægritudo igitur Convulsiva* plerunque originem suam à capite desumit: nimirum quoties *particula heterogenea & explosiva* à sanguine in *cerebrum* aut *appendicem* ejus medullarem suffusæ, illinc postea in *nervosum genus* derivantur, ibidemque spiritibus accrescunt: hoc autem fieri contingit variis de causis: *plures enim sunt rationes, modique* quibus *materies morbifica* in *caput* admittitur; *plures item* quibus in *hanc*, aut illam *systematis nervosi regionem* deducitur; & juxta varias ejusmodi *causæ morbificæ translationes*, diversæ *motuum convulsivorum* species constituuntur.

Igitur quod *particula heterogenea & spasmodica* intra *ἐντέφαλον* admittuntur, & *sanguinis mittentis*, & *cerebri susipientis* vitio imputandum est.

I. Cum *sanguis* materiam morbificam capiti suffundit, vel *totā* ejus massa depravatur, uti frequenter accidit in *febris malignis*, item in *affectione scorbutica*, *cachymica*, ac imprimis *originaliter morbida*; vel *sanguis* ex se *insons*, & *incorruptus* corpuscula maligna aliunde accipit, eaque postea cerebro affigit, ita in magnis viscerum impuritatibus, ac præcipue cum partes aliquæ *abscessu* aut *ulcere virulento*, vel *fermento noxio* afficiuntur; è talibus

*Spasmodicæ causa remotiores.*

I. *Materies morbifica intra caput aggeritur vitio, tum Sanguinis mittentis.*



## DE MORBIS

talibus enim *μεταστάται νοσούντων* mineris particulæ noxiæ in sanguinem ebulliunt, ejusque com-  
meatu postea in cerebrum deponuntur: ita ob *Lienem, uterum, aliaque viscera* male affecta *morbi Convulsi* vi excitantur; qui tamen immediatius à cerebro, istarum partium labes per sanguinis commercium suscipiente, dependent.

*Tam Cerebri suscipi-  
entia.*

2. Attamen 2. *sanguis*, ut ut vitiosus, & se-  
minio morbo imprægnatus fuerit, haud facile inquinamentum suum capiti allinit, nisi etiam *cerebri, ejusque appendicis* constitutio aliquatenus in vitio fuerit; quandiu hæ partes bene confor-  
mantur, & vigore pollent, se, suæque tuentur; foribus occlusis, nil præter liquorem spirituosum suis usibus dicatum, purum, putumque admit-  
tunt: sin vero aut *cerebri meatus, & pori* nimis laxantur, aut *spiritus ostiarii* ab excubiis suis ces-  
sant, vel avocantur, una cum *succo nervoso*, mate-  
ries heterogenea & morbifica irrepit, ac in regimi-  
ne animali malignitatem suam explicat. Quod spectat ad ipsius *Cerebri malam dispositionem*, eadem aliquando *hereditaria* existit: ita parentibus *epilepticis*, aut *convulsioni obnoxiiis* oriundi, in eosdem affectus plerunque & ipsi proclives sunt: & quidem constitutio cerebri à partu multis mo-  
dis fieri potest vitiosa: nam aut ipsius *intemperies* justo est *humidior*, aut *siccior*, vel alterius *quali-  
tatis ex esse*, aut *defectu* peccat. Interdum *pori* sunt *laxiores*, vel *consistentia* ejus nimis *dura* aut *mollis* est: quin & *partium Cerebri & appendicis* ejus *conformatio* indebito more habere potest; Cæterum aliquando *Cerebri & nervorum* indoles originaliter sana & firma ex *accidente* vitiat, & diathesin morbidam acquirit: *longa intemperan-  
tia* has partes enervat: quin & *febres malignæ*, & *morbi chronici* eas plurimum debilitant: porro ac-  
cidentia externa, uti *frigoris & caloris excessus*, *vulnus*, aut *plaga* earum crases sæpe pervertit, & impressionum morbidarum magis capaces reddit. Quod vero spectat ad *spirituum animalium* *tracta-  
tionem*, propter quas particulæ heterogeneæ & spas-  
modicæ *cerebrum* absque repulso subeunt, illique facilius

*Cerebri ma-  
la diathesis,  
vel heredi-  
taria.*

*Vel acqui-  
sita.*



facilius cohærent, observare est *spiritus animales* quibusdam ab ipsa nativitate *teneriores*, & cito *dissipabiles* existere, ita quidem ut nihil *sensui*, aut *imaginationi* fortius & vehementius oblatum tolerare possunt, quin statim in confusiones adigantur: propter hanc rationem, *fæminæ præ viris* earumque aliæ præ aliis *affectionibus dictis hystericis* obnoxie fiunt. Porro interdum *passio violenta spiritibus* ut ut mediocriter firmis ejusmodi prostrationem ac inordinationem imprimit, ut postea nihil fortiter sufferre, nec cuivis injuriæ resistere valeant: ita passim accidit *subito timore*, aut *ingenti tristitia* regimini animali impressiones morbidas affigi, quæ postea vix unquam delentur: hinc enim *mulieres sæpe affectiones dictas uterinas*, & *virii hypochondriacas* primo contrahunt, iisque postea iere semper assuescunt.

Ex his constare videtur, *quibus modis & ob quas* 2. *Materies causas materies spasmodica* intra *ἐγκέφαλον* admitti solet: jam proxime videamus *quid de illa fiat* intra caput postea; siquidem ista materia ad Cerebrum advecta *admissa*, affectus convulsivos aut non semper, aut non eodem prorsus modo inducit. *quomodo disponitur.*

1. Interdum accidit *particulas heterogeneas & explosivas* in Cerebrum admitti, quæ tamen exinde sine magna noxa, & priusquam genus nervosum subeunt, rursus exterminantur: quippe *vena & lymphaductus* sæpe quod superfluum & regimini animali inimicum est, resorbent, & vel foras convehunt, vel in emunctoria deponunt. Dum talis materia parumper in cerebro agitur, *particulæ ejus spiritibus nonnullis affixæ*, ab iisque demum *elisa, vertiginem & scotomiam* cient; at vero quia nervorum ductus haud subeant, affectiones spasmodicæ minime succedunt. *Interdum è Cerebro re-geritur.*

2. Quando *materies morbifica* intra *ἐγκέφαλον* *admissa*, non exinde statim relegatur, sæpenumero *in genus* noxam suam, priusquam *nervoso generi* infertur, *nervosum* haud prodit; nam intra Cerebrum spiritus animales admodum vegeti, & spatium liberius nacti, *copulæ* cujusvis *heterogeneæ* complexus evadunt; quos equidem intra angustos nervorum canales evitare



*In Cerebro  
manens ca-  
ducum in-  
fert.*

evitare nequeunt: porro ipsa materies morbifica, siquidem è *Cerebro* per vasa excretoria amandari non potest, exinde mox in *systema nervosum*, utpote partem ignobiliorem dimittitur: fin vero invitis facultatum superiorum præfidiis, talis materia intra *Cerebrum* diutius commoretur, ejusque spiritus incolas valde inficiat, *Epilepsiam* inducit, prout infra speciatim ostendetur: attamen multo crebrius, labes è *Cerebro* absque magna noxa ejus, in *nervosum genus* traducitur; hoc autem non uno semper modo fieri contingit.

*Materia  
spasmodica  
in nervosum  
genus de-  
lapsa.*

Enimvero *particula heterogenea liquori nervoso* immixtæ, ac versus nervorum principia delapsæ, eadem non simul omnia, neque hæc aut illa, prout fors tulerit, indifferenter subeunt, verum in *aliorum* ductus præ aliis, idque non sine aliqua ratione diriguntur. Namque observamus *symptomata convulsiva* sedem plerumque aliam in *pueris* ac in *adultis*, aliamque in *tenerioribus* ac in *robustis* sibi eligere.

*In pueris  
nervos prio-  
res afficit.*

In *pueris*, qui *affectibus cordis, & membrorum exteriorum exercitiis* nondum assueverunt ( quibus sc. utrisque causa morbifica longinquius à *cerebro* profertur ) *materies spasmodica* in nervos proximos, eos sc. 3<sup>ti</sup>. 5<sup>ti</sup>. & 6<sup>ti</sup>. *paris* sæpius incurrit; quare illis *faciei*, ac *oris* partes maxime convelluntur: rarumque est & inassuetum iis *viscera*, & *præcordia*, prout in *adultis* attolli, motuve inordinato affici: E contra in *profecta ætatis hominibus*, aditu ad nervos *paris vagi*, & *intercostales*, uti ad istos *spinalis medulla*, magis patente, partes, quas nervi illi respiciunt, frequentius convelli solent: hoc tamen cum discrimine, quod in *tenerioribus*, & iis qui sunt valde *ἐπιπνευστικὸι*, quibus, ob *passiones animi*, *præcordia* & *viscera* sæpius perturbantur, *materies spasmodica nervorum interiorum* ductus apertiores promptius subit;

*Secus in a-  
dultis.*

illique propterea *spasmi*, in *abdomine*, & *thorace* excitatis, magis obnoxii redduntur: Hinc enim est quod *mulieres passionibus* dictis *hystericis*, ac *viri* quidam *hypochondriacis* molestantur; sicut postea,



postea, cum de affectibus istis particulatim differe-  
mus, fusius declarabitur.

Cum materies spasmodica quorumvis nervo-  
rum capita adpellit, vel ibidem subsistens vertigi-  
nem tantum, partiumque ad quas nervi isti per-  
tingunt, leviores spasmos, & subsultus creat, vel  
in nervorum ductus altius prolapsa paroxysmos  
convulsivos atrociore parit: eadem vero in pro-  
cessus nerveos delata, per caudicis, sive trunci  
unius aut plurium propagines, modo omnes, mo-  
do aliquas tantum, cæteris patentiores disponi-  
tur; atque spiritibus tum intra ipsos nervos, tum  
intra fibras appendices confitis paulatim accrescit:  
nimirum par ratio est, & similis fit apparatus in  
dispositione ad paroxysmos convulsivos, ac si  
pulveris pyrii successive explodendi grana per lon-  
gas series jacerentur. Spiritus ad hunc modum co-  
pula heterogenea imbuti, tum intra nervorum  
truncos, tum intra fibras membranarum, & musculis  
intertextas, potissimum vero intra plexus nerveos  
hospitantur; cumque illi aut gravati ob nimiam  
plenitudinem, aut data aliqua occasione exagitati,  
in copulam suam excutere coguntur, particulæ elisæ  
& ab invicem profilientes partes continententes val-  
de inflant, adeoque impetum motivum contra ap-  
petitus, & naturæ jussa, & leges excitant: Porro  
spiritus ad motus convulsivos obeundos semel in-  
citati, à systematis nervosi extremitate, una, aut  
altera, ut plurimum vero in fine explosiones ordi-  
untur. Illi autem, qui primo explosi sunt, proxi-  
mos quosque prædispositos, velut traduce ignario  
corripiunt; adeoque longa, & continuata spas-  
morum serie, à meta una ad alteram affectio-  
nem inceptam propagant: nam convulsio ab imo  
abdomine, aut à pede, aut manu exorta, sensim  
ad superiora, & plerumque ad ipsum ἐνέφαλον  
prorepat: idemque affectus cum à cerebro ( prout  
in Epilepsia ) orditur, illinc pariter deorsum ad  
viscera remota, etiam ad membra & artus exte-  
riores derivatur.

Materies morbifica in capita nervorum influens  
pro varia sui copia & dispensatione, diversimoda  
convulsio-

Quo ritu  
juxta ner-  
vorum prin-  
cipia subsi-  
stens, aut in  
ductus alti-  
us prolapsa  
spiritus af-  
ficit.

Spiritus ex-  
plosiones in-  
eunt ob ple-  
nitudinem,  
aut irrita-  
tionem.

Materies  
spasmodica  
convulsio-  
nes, aut con-  
tinuas aut

periodicas  
inserit.



convulsionum genera producit: nam primo observare est, abundante, & exuberante materia, interdum *systematis nervosi*, aut quorundam ejus partium *totos ductus* occupari, ita ut *spiritus animales* tum influi, tum insiti, *copula heterogenea*, ejusque supplemento perpetuo saturati, in *spasmos continuos* urgeantur. Novi quibus muscoli omnes, ac tendines in toto corpore *contracturis* & *sustul- tibus* sine intermissione afficiebantur: Novi *alios*, quibus *brachia*, & *crura*, cæterique artus in varias flexiones, & distorsiones perpetuo cogebantur: quin & *alios* vidi, qui saltare, huc illuc discurrere, pedibus, manibusque humum contundere necesse habuerunt; quod ni facerent in immanes viscerum, & præcordiorum convulsiones incidebant. 2. *Particula heterogenea & explosiva*, si minori copia cum spiritibus combinatæ sint, ipsis sine tumultu, aut perturbatione adhærent, donec post aliquod tempus utræque particulæ iterum dissilientes, ac ab invicem elisæ paroxysmos convulsivos cient; cujusmodi *paroxysmi* sunt vel *periodici*, & *statis horis* exacte repetunt; quod accidit ob *materiam morbificam aequali dimensio* generi nervoso quotidie suffusam; proindeque circa idem temporis spatium, ad *plenitudinem explosivam* etiam quotidie aggestam; vel *vagi & incerti*, in quibus sc. particulæ heterogeneæ minori adhuc copia suffusæ, non nisi longo tempore ad *saturatorem explosivam* assurgunt; quarum interim cum *plexior aggestio*, tum *explosio* ob *plures occasiones*, five *causas evidentes* modo *crebrius*, modo *rarius* solent accidere: hinc fit ut *affectio spasmodica* nonnunquam causæ evidenti in totum ascribatur, cum revera nisi *procatarxis convulsiva* præcesserat, talis causa nullam excitasset.

*Spasmodorum  
causa evi-  
dentes.*

Itaque ut de *convulsivorum causis evidentibus* non-nihil dicamus; supra observavimus, si vehementiores fuerint, & *cerebri*, ac *nervosi generis* constitutioni teneriori, ac imbecillæ acciderint, eas interdum *solitarias*, *pathemata convulsiva* inferre: at vero quoties *affectio spasmodica* gravior, & *habitualis* facta, sæpius redire solet, licet *causa evi- dens*



dens in propatulo sit, & effectus culpam sustineat, nihilominus suspicari licet *procatarcticam* intus latere, & in efficiendo potiozem existere: nisi enim spiritus copula heterogenea imbuerentur, in explosiones involuntarias, & præternaturales nec tam facile, nec tam crebro adigerentur.

*Causarum evidentium duplex ordo*, sive *classis* occurrit; aut enim ejusmodi sunt quæ *procatarxin* *adaugēt*, eamque citius ad *plenitudinem explosionem* perducunt, uti sunt *mala victus ratio*, & *errata in sex nonnaturalibus*, quæ *sanguinem & succum nervosum* inquinando, particulas heterogeneas majori copia spiritibus ad saturationem suggerunt, proindeque accessiones spasmodicas eo citius accersunt. *Vel 2. causa evidens* dicitur quicquid *spiritus drepente exagitant & irritant*, ut statim *explodantur*, efficit, & *copulam suam*, qualiscunque fuerit, elidant: atque hujus generis plurima sunt, quæ spiritibus modo intra *ἡνέφαλον*, modo intra *systema nervosum* confitis, accidentia, motus convulsivos instinctu diversimodo (prout in regularibus assolet) aut directos, aut reflexos scient.

*Causa evidens duplex, sc. im-  
plens, & ir-  
ritans.*

*Causa irritans ciet  
spasmos di-  
rectos, aut  
reflexos.*

1. Prioris generis potissimum sunt *violenta animi perturbationes*, quibus *spiritus Cerebri incolæ* agitati, atque confusi, alios intra *nervosum genus* scatentes, & sæpe prædispositos ad *explosiones irregulares*, incitant; ita vehemens timor, ira, aut tristitia non modo incommodo valetudine affectis *insultus epilepticos*, aut *hystericos* inducunt; sed interdum aliis quibuscunque *cordis palpitacionem & tremorem*, quin & *membrorum & artuum convulsiones horribiles* accersunt. 2. Quoad alterum *causæ evidentis genus*, quo sc. *Spasmi actu reflexo* incitantur; hoc quidem nec infrequenter locum habet, quoties *gravis molestia*, cum *fibrarum & spirituum irritatione*, *nervoso generi* aliquibi exhibetur: quippe eadem molestia mox cum primis spirituum fontibus, nempe *cerebro aut cerebello* communicata, exinde *motus inordinati*, ac *violentis præter animi arbitrium incepti*, h. e. *convulsi*, retorquentur; ita namque *lumbri-*



ci, *pharmaca*, aut *acres humores*, intestinorum tunicas immaniter vellicantia, istarum partium, & non raro membrorum externorum spasmos inferunt.

Hæc de *singulis causarum, conjuncta, procatartica*, & *evidentium* generibus, à quibus morbi convulsivi *habituales facti*, & cum gravioribus paroxysmis repetere soliti, exoriuntur: cum vero alteram hujus morbi speciem assignavimus, ubi paroxysmi à causa evidenti solitaria, seu fere tantum ab irritatione, spiritibus nondum copula explosiva præoccupatis, dependent; jam proxime disquiratur quibus, & quod modis hoc fieri contingit. Super his in communi statuitur *insultus spasmodicos*, à mera irritatione productos, aut *leviores* esse, & cito pertranscentes, aut *gravissimos*, & non raro *lethales*, prout quando venenis assumptis, aut *πικραδέσσει* superveniunt. Porro adnotetur, cum *materies morbifica*, sive *irritativa* ipsis nervorum caudicibus, aut plexibus insederit, eam non raro etiam *explosivam* evadere, utcunque spasmos etiam à mera irritatione productos (prout supra annotavimus) explosiones quasdam esse. Itaque his prælibatis, rem propositam expediamus.

*Causa irritans distinguitur quoad loca affecta, quoad subjecta.*

*Loca affecta sunt nervorum principia, extremitates, & medii processus & plexus.*

*Partium nervosarum irritatio*, quæ motus convulsivos efficere solet, variis in locis, variisque rebus, quæ spiritibus & fibris incongrua, atque inimica sunt, contingit. Quoad res spirituum naturæ adversantes, observare est præter venena, & qualitatum tangibilem excessus, qui ab extra infliguntur, multa quæ intus in nobis gignuntur, sc. *varia sanguinis*, & *succi nervosi recrementa*, *miasmata febrilia*, *humores præternaturales*, *salinos*, aut *sulphureos*, quinimo *lumbricos*, *calculos*, cum pluribus aliis nervoso generi infesta esse, & *irritationes spasmodicas* passim ciere. Quoad loca affecta, sive *materiæ irritativæ sedem*; licet hæc in qualibet systematis nervosi parte noxam inferat, ut plurimum vero maxime infesta esse solet cum juxta systematis nervosi principia, vel extremitates, vel circa medios nervorum processus, ac præcipue in eorum plexibus desigitur: Porro talis materia, quæ spiritus



spiritus irritans, *causa evidētis* loco esse solet, non raro, prout modo innuimus, etiam *procatartica* rationem subit, quatenus nimirum particulæ heterogeneæ ab illa emissæ, fibras nerveas subeunt, & cum spiritibus combinatæ, eos ad explodendum aptiores, & procliviores reddunt.

1. Igitur interdum accidit *humores malignos*, & *Causa irri-*  
*nervoso generi infestos* è *sanguine in cerebri regio-* *tans ut ner-*  
*nem suffusos*, & exinde demum in posticam ca- *vorum ori-*  
*pitis regionem delatos*, *nervorum origini incum-* *gines efficit.*  
 bere, ubi si disrupta pellicula, quæ medullam ob-  
 longatam investit, in nervorum truncos nudos in-  
 cidunt, eorumque fibras altius subeunt; propterea  
 quidem *motus convulsivi* non modo in *partibus*  
*capiti vicinis*, verum aliquando in valde remotis,  
 & non raro in toto *systemate nervoso* oriuntur:  
 Hoc passim observare est in *malis febrium crisis*,  
 materia morbifica in caput translata, item in *af-*  
*fectibus cephalicis*, in statum pessimum, ac lethā-  
 lem evectis. Revera cum plurium hoc ritu defun-  
 ctorum capita aperuerim, reperi in omnibus po-  
 sticam *medulla oblongata* regionem fero acri &  
*salsugine immersam*.

2. Quemadmodum systematis nervosi *extremi-* *Ut nervo-*  
*tas interior*, sive origo, ita non raro *exterior*, sive *non extre-*  
*finis* à vellicatione illic facta, *spasmos*, sive *motus* *mitates.*  
*convulsivos* suscipit, eosdemque quaquaversus  
 transfert: hoc in *membris exterioribus* passim fie-  
 ri, testantur *tendinum ac nervorum punctura*. Nec  
 minus à *vellicatione* in visceribus facta *spasmi* cir-  
 cumquaque excitati solent, si quando *pharmaca*,  
 aut *humores acres*, nec non *lunatici* in *ventriculo*,  
 aut *intestinis* scatentes partes membranaceas velli-  
 cant, adeoque sensationem molestam primis senso-  
 riis imprimunt; exinde statim ob spirituum ex-  
 candescēcias *motus convulsivi* modo in *partes af-*  
*fecta*, modo indifferenter in *alias quascunque* re-  
 torquentur: nam à graviore visceris cujusdam  
 noxa sæpe *spasmi* non tantum *partes affectas*, &  
 vicinas occupant, verum in *faciei ac oris muscu-*  
 los, nec non in *membra exteriora* transferuntur.  
*Calculus ureteri* impactus haud tantum in isto du-  
 ctu,



ctu, verum in tota vicinia contractiones immanes accersit. Porro symptomata quædam hysterica, aliaque hypochondriaca nonnunquam hac ratione inducuntur; quatenus nimirum vellicatione in visceris cujusdam membranis facta, illico spasmus retorquetur.

Ut medios  
processus &  
plexus.

3. *Materies irritativa*, quæ spasmorum causa evidens esse solet, interdum *medios nervorum processus* occupat; & propterea partes modo supra, modo infra illius sedem ad *motus convulsivos* incitantur: Hoc de nervorum plexibus satis constare videtur; cum enim *succi nervosi recrementa acria* in iisdem congeruntur, non raro spasmus per totam viciniam procreantur: hac ratione *affectio colica*, atque *hysterica*, nulla viscerum istorum culpa tantum ab humore in *mesenterii plexibus* deposito non raro progigni, ac excitari videntur (quod equidem posthac, cum de affectibus istis parriculatim agemus, planius ostendetur): Pariter ob *plexus ganglioformes* humore acri & irritativo obfessos, *præfocatio in gutture*, nec non variæ *præcordiorum contractiones* inferuntur. Porro *affectiones spasmodicæ* ab humore acri intra *totos nervorum caudices*, & corporum nervosorum meatus sca- tente, non raro dependent. Vidimus quosdam *convulsionibus* admirandis, ac *perpetuis affectis*, ut necesse habuerint (prout supra retulimus) membra huc illuc jactare, & distorquere, saltare, discurre- re, humum manibus, aut pedibus contundere, a- liasque gesticationes stupendas exerere, haud se- cus ac si *sagarum prestigiis* læderentur, cujusmodi *passionum causa* genuina in eo consistere videtur, quod *succus nervosus* genus irrigans, instar *aquæ fixæ* acerrimus, ac à debita crasi degener factus, spiritus infitos influosque continuo irritaret, ac velut cæstro quodam afflaret:

Spasmorum  
differentia  
respectu O-  
riginis.

Ex his quæ circa varias *convulsionum causas* differuimus, multiplices eorundem *species* & *differe- rentia* eliciantur: Nam primo annotavimus res- pectu *originis*, pathemata spasmodica sæpissime à *cavitate affecto*, seu materia morbifica in *nervorum principia* influente, derivari; quandoque tamen, licet



licet rarius, eas à tali materia in *nervorum extremitates* irrepente pendere.

2. Quoad *morbi & symptomatum productionem*, observamus eandem aliquando à *causa evidenti solitaria*, uti passione subito, & vehementi produci: Sæpius vero *procatarxim*, sive dispositionem præviā requiri: porro causas interdum ita coincidere, ut *causa procatartica* etiam *evidentis* vicem suppleat; quin etiam è contra, ut *hæc illius loco fuerit*.

*Causarum.*

3. Quoad *morbi extensionem*, affectio convulsiva distingui potest in *universalem*, quæ spiritus fere totum systema nervosum, ipsumque *ὑπεράλυν* actuantès, successive exploduntur; & *particularem*, in qua spiritus intra privatam quandam ditionis animalis regionem afficiuntur.

*Morbi extensionis.*

1. Prior ista cietur quando spiritus animales intra primos ipsorum fontes, nempe *Cerebri*, & *Cerebelli* meditullia irritantur, unde ipsorum explosiones violentæ accidunt: quapropter tum animæ *functio quavis interna*, sc. sensus, & imaginatio obscurantur, ejusque *facultas exterior locomotiva* pervertitur: Hujusmodi affectio *spasmodica universalis*, in qua sc. præter artuum & viscerum spasmos, *interiores animæ potentie* eclipsin patiuntur, iterum *duplex est*: nempe aut *primaria*, quæ ab *ὑπεράλυν* incipit, oriturque in quantum spiritus hujus incolæ *particulis nitrosulphureis* imbuti primo exploduntur, eorumque accensio, cæteros in *appendice tum medullari, tum nervoso* scatentes corripit, ibique *explosiones convulsivas* concitat, prout cernitur in epilepsia.

2. Vel passio isthæc *universalis ἀνατοδνωτική* inferens *secundaria* est, quæ sc. alicubi in *nervoso genere* inchoata, exinde spirituum copiis successive affectis, factaque velut *aquarum undulatione*, demum ipsi *ὑπεράλυν* traditur: hoc passim accidit in paroxysmis, qui dicuntur hysterici, in quibus ob spasmus principio in imo ventre incipientem, moles, sive intumescencia in *abdomine* excitatur; dein eodem affectu per nervorum ductus superius



superius lato, *ventriculus*, ac mox *præcordia* contrahuntur, ac tandem spasmo *caput* impetente, patientes corruunt, iisque notitia omnis adimitur; denique morbo in *nervos alios* reflexo, membrorum *exteriorum* motus convulsivi succedunt.

2. Quod vero spectat ad *spasum particularem*, in cuius paroxysmo ægrotantes animo constant, hic quidem varias differentias fortitur. Quoad *materia sedem*, quæ circa nervorum *principia*, *extremitates*, aut *medios processus* contingit, spasmodum (uti ostendimus) diversitas oritur: Quinimo prout ista *materies morbifica*, nervorum principia obsidens circa *medulla oblongata caput*, *medietatem*, aut *caudam* defigitur; propterea accidit modo tantum *faciei*, aut *oris partes*, modo *imi*, aut *medii ventris viscera*, ac modo *artus exteriores* potissimum, ac fere tantum convelli.

*Insultus  
durationis.*

Porro *convulsio*, quoad *insultus durationem*, ejusque *magnitudinem*, distinguere solet in *continuatam*, ac *intermittentem*: Prior sicut supra innuimus dicatur *tétrav*, sive *contractio permanens*, uti cum pars una, aut simul plures *constanti tensione contracta* aut *distorta* in eodem situ præternaturali aliquandiu detinentur; sic quandoque musculus, aut membrum, puta oculus, labium, gena, à recta positione distorquentur, nec statim facile reduci possunt: cuius causa interdum est *resolutio*, sive *paralysis* in quibusdam aliis musculis; qui cum relaxantur, oppositi nimis fortiter agunt, & partem, quæ inter utrosque velut in æquilibrio consistere debuit, versus se totam corripunt: aliquando tamen talis *contractio permanens* excitatur propter tendines humore seroso impacto obsessos, qui proinde rigidi evadunt: Hujusmodi affectus in *scorbuto* familiaris existit, ut ægri quandoque nullum membrum aut articulum extendere possint; sed velut in orbem, seu globum contrahantur. Nonnunquam tendines in dorso, ob talem humoris incursum, ossa extra debitum situm trahunt, & *gibbositatem*, vel corporis *incurvaturam* pariunt.



pariunt. *Tetanus* distingui solet in *universalem*, cujus tres sunt species; sc. *ἐμπροσθεν*, *ὀπισθεν*, & *τίταν* ita proprie dictus, & *particularem*, quæ membrum quoddam vel articulum privatum respicit: Super his postea speciatim dicemus.

2. *Convulsio intermittens*, aut *brevis est & momentanea*, quæ per crebras vices, & quasi per *subsultus* peragitur, prout observare est in *horrore & tendinum concussionibus*, quæ semper crebra motus, & quietis alternatione interstinguuntur: vel *spasmodum insultus*, eorumque *intervalla* diutius protrahuntur: ita usitatum est *paroxysmos convulsivos*, quando repetunt, aliquandiu perdurare, ac rursus desinere; tales autem *periodi* modo *certa* sunt, atque *statis horis eveniunt*, modo *rara*, ac *incerta*, atque pro variis datis occasionibus diversimode contingunt. Plures sunt aliæ hujusce affectus differentię, quæ postea cum de singulis convulsionum speciebus particulatim dicemus, melius elacefcent.

## CAPUT. II.

## De Epilepsia.

HActenus *Spasmodum*, sive *Convulsionum* in genere *naturam*, *causas*, & *differentias*, juxta hypothesin plane novam, & insolitam, sed rationi (ut opinor) satis congruam tractavimus: jam proxime incumbit præcipuas istius affectus species particulatim explicare; inter quas *Epilepsia* prærogativam facile meretur, ejusque consideratio methodi, sive ordinis jure quodam præcedere debet; quippe hic morbus in corpore humano quasi imperium amplissimum nactus, non modo in totum *ἑνέαλον*, sed plerumque simul in omnes systematis nervosi partes tyrannidem exercet: quapropter ab affectionis immanitate, *morbis Herculeus*, ab insultus more tamquam à numine immissi



*immissi* admodum stupendo, *ῥόσθ' ἱερῶν*, five *morb*-  
*us sacer* ab antiquis appellabatur; cui accedit cu-  
 jusdam nostratis, haud infimæ notæ, Theologi  
 conjectura, nempe plures, qui in novo Testa-  
 mento pro *Dæmoniis* habentur, tantum *Epilep-*  
*pticos* fuisse; morbike hujus à Christo Salvatore  
*curationem*, *spiritus mali ejectionem* five *exorcis-*  
*um* dici: Revera in hoc affectu *materia morbi-*  
*fica* adeo obscura aut prorsus nulla vestigia appa-  
 rent, ut merito hic *spiritus malefici afflatum* su-  
 spicemur: saltem probabile est, quoties diabo-  
 lus præstigiis suis miseros mortales affligere per-  
 mittitur, ipsum non posse ex alia pharetra gravio-  
 res sagittas torquere, aut sub meliori larva, quam  
 monstrofi hujusce morbi insultibus miracula  
 ostentare.

*Epilepsia* symptomata uti sunt plurimum stu-  
 penda, ita illorum *causa*, & *ipsius morbi* ratio  
 formalis difficillime explicantur. Enimvero inter  
 Authores tum de *parte affecta*, tum de afficiendi  
 modo, res varie controvertitur: plerique hujus  
*sedem* in *cerebro*, aut *ventriculis* ejus; alii in *me-*  
*ningibus*, quin & nonnulli in *medio*, aut imo *ven-*  
*tre* collocant; quo tamen jure mox inquireretur:  
 Interim ut missis aliorum opinionibus, recti ra-  
 tiocinii filo vera *morb*i hujus *Theoria* investiga-  
 tur, primo *descriptionem* ejus, simul cum integro  
*Phænomenorum* censu exarare; secundo, istis rite per-  
 pensis, *morb*i *subiectum*, & *partes* præcipue *affectas*  
 eruere; tertio demum *rationem* & *modum* quo  
 morbus iste generetur, cum veris *symptomatum*  
*causis* subjicere nitentur.

*Epilepsia*  
*descriptio,*  
*seu morbi*  
*historia.*

Primo, quoad *morb*i *ideam*, *insulius epilepti-*  
*cus*, universalis, ac *immanior* tantum *convulsio*  
 esse videtur, in qua sc. spiritibus *cerebri* incolis  
 primo irregulariter commotis, & velut confusis  
 cæteri omnes τῷ ἐκκεφάλῳ *appendicem* tum *medul-*  
*larem* tum *nervosam* incolentes, simul *motus con-*  
*vulsivos*, five *contractiones* inordinatas ineunt, eas-  
 que aliquandiu cum crebris subsultibus conti-  
 nuant: *morb*i *accessio* ut plurimum ex improvviso  
 aggreditur, ægrosque nihil tale cogitantes oppri-  
 mit,



mit, atque ictu oculi citius sensu & intellectu orbos in terram præcipitat; quippe non tam cadunt, quam cum impetu quodam prosternuntur, ut sæpe pars primo in terram aut corpora adjacentia allisa livore aut vulnere afficiatur; prostratis supervenit stridor dentium, cum spuma oris, sæpe etiam capitis concussio, & crebra ad humum allisio; brachia & crura, quinimo cervix & dorsum aut statim rigida fiunt, aut variis flexionibus huc illuc distorquentur; aliqui pectus immaniter contundunt, alii brachia & crura valide exerunt; eaque, ac totum aliquando corpus huc illuc impetuose jactant; plerisque autem præcordia & hypochondria, nec non totus inferior venter intumescunt, & valde instantur: post aliquod tempus modo brevius modo longius hæc symptomata, quasi Tragædia peracta, derepente cessant, & tunc ægroti denuo ad se redeunt, ac mente constant; superstite vero post paroxysmum capitis dolore, cum torpore, & hebetudine sensuum, & non raro vertigine & scotomia.

Paroxysmi epileptici repetere solent, quandoque statis temporibus diei, mensis, aut anni, ut plurimum vero juxta majores anni tempora, aut luna, aut solis consuetudinem, vel aspectus oppositos certius redire, & gravius affligere solent: quandoque accessiones sunt incertæ, & vagæ, pro occasione & varietate causarum evidentium: sunt autem paroxysmi modo leviores, qui cito pertranseunt, ita ut ægroti vix in terram præcipitentur, nec & va. In. corripiantur; modo graviores sunt, quibus correpti plurium horarum spatio insensiles decumbunt, & velut dæmoniacy horrendis symptomatis torquentur: aliquando, licet rarius, signa quædam paroxysmi prænuncia lapsuros commonefaciunt; ut sunt capitis gravedo, oculorum coruscatio, aurium tinnitus; interdum in parte quadam exteriori, brachio nempe, aut crure, aut etiam in dorso, vel hypochondriis spasmus præcedit, qui exinde instar aura frigida ascendens, & versus caput perreptans, caducum inferre videtur: Morbo huic, pueri, & adolescentes, magis quam maturæ ætatis homines, aut senes obnoxii



reperiuntur: quicumque insultum ejus semel repressi sunt, nisi remediorum ope curantur, postea vix per totam vitam ejus labe prorsus immunes fiunt; paroxysmi quo sæpius repetunt eo graviores usque evadunt, qui cum frequenter iterari valde atroces existunt, *memoria*, *imaginationis*, & *rationis* usum, & dein totius functionis animalis robur ac vires enervant; donec hujus œconomia valde perversa, functio demum vitalis labascatur, & sensim aboleatur. Explicatis ad hunc modum hujus morbi telis, & apparatu malefico, jam proxime inquiramus in qua parte sedem figat: siue quod sit proximum ejus subiectum.

*Morbi subiectum siue sedes inquiritur.*

2. *Epilepsia accessio* & invasionis modus plane innuere videntur sedem ejus primariam, siue partem præcipue affectam alicubi intra caput contineri; quod autem *paroxysmus* nonnunquam in partibus remotis incipiat, & exinde versus caput ascendat, hoc quidam ita fieri videtur tantum, & ex accidenti contingit, cum interim causa morifica circa ipsum ἐγκεφάλου subsistit (prout inferius declarabitur): verum quod à primo morbi insultu statim ἀναδινομένη cum membrorum & viscerum fere omnium contractionibus succedit, hoc manifesto indicio est, una totam ἐγκεφαλήν compagem, & nervorum omnium origines à causa morifica occupari; At vero etiamnum explicatu difficillimum videtur ubi causa ista, siue materies morifica præcipue subsistit; neque enim probabile est, eandem per cunctas cerebri partes diffundi; nec tamen constat in quo loco singulari ea defixa, cæteras omnes partes ita subito in ejusdem noxæ consensum trahat.

*Hanc alii meningas alii cerebri meditullium statuunt.*

E variis super hac re Authorum sententiis, due præ cæteris magis probabiles videntur, & pari verisimilitudine assensum vendicant. Quarum una asserit Cerebri meditullium, atque altera meningas ipsum investientes esse primariam Epilepsie sedem: Prioris ratio in hoc fundatur, quod ubi spirituum animalium fons, & ipsius animæ sensitivæ origo consistit, ibidem hujus morbi causa poni debet, nempe cum principes facultates primo læduntur, cæteras omnes



omnes ejusdem noxæ facile participant : verum-  
enimvero ut concedam in *Apoplexia*, & *spirituum*  
*deliquio* ita habere, attamen in *convulsione* (cujus-  
modi affectus est *Epilepsia*) non sequitur *fibras* &  
*nervos* omnes convelli, quia *cerebri medullium* pri-  
us *convellitur* : quippe hoc cum sit mollis & fluidæ  
substantiæ, atque motus & sensus expers, *contracti-*  
*onis*, sive *affectus spasmodici* minime capax vide-  
tur : quapropter alii cerebrum & quamvis ejus  
partem à morbi hujus culpa eximentes, causam e-  
jus omnino in meningas rejiciunt, asserentes *scil.*  
membranas cerebrum investientes, ac inprimis  
illarum processus cerebri, ac cerebelli fissionibus  
instratos, siquidem à materia morbifica vellican-  
tur, spasmos, sive convulsiones immanes concipe-  
re, dein à meningibus istis contractis et diductis u-  
na cerebrum inclusum valde comprimi, & con-  
stringi, ita ut poris, & meatibus ejus constrictis  
*avascularia* inferatur, simulque nervorum caudices,  
quibus utraque meninx appenditur, in consensum  
illarum perducti, etiam motus convulsivos ineant :  
Et quidem ad hunc modum *Epilepsia* ratio for-  
malis forte explicabilis videtur ; at vero cum rem  
altius perpendo, etiam ab hac sententia discede-  
re visum est, quia nimirum haud constat quo ri-  
tu, & quam ob causam, imminente caduco, me-  
ninges istæ spasmos adeo horrendos concipiant.  
Quinimo nec liquet, quomodo ab iisdem, utur  
convulsis, *paroxysmus epilepticus* inducatur.

Quoad prius ; impossibile videtur meningas,  
quoad totas earum concavitates, ita contrahi, ut  
instar marsupii arctius constricti, contenta sua un-  
dique convellant, ac in spatium angustius contra-  
hant : quippe dura mater pluribus in locis calva-  
riæ firmissime cohæret, quin & isti pia mater,  
juxta sinuum processus, mutuo membranarum nexu  
& ubique præterea vasorum continuitate colliga-  
tur : hinc facile patet, utramque membranam,  
quoad magnam sui partem, immobilem esse, ita  
ut spasmos universales nequaquam ineant : quod  
vero ad spasmos minores attinet, ut cum menin-  
gis hujus, aut istius, vel simul utriusque portio

*Asseritur*  
*meningas*  
*non esse pri-*  
*marie affe-*  
*ctas.*



quædam convellitur, revera tales evenire concedimus: nam sæpius audiivi cephalalgia graviore affectos, de magna partium sub calvaria latere, modo dextro, modo sinistro confitarum constrictione immaniter queri, nec tamen exinde ullus caduci insultus sequebatur: porro ut membranæ istæ insigniter læsæ vellicationes maximas subeant, hæudpropterea tamen paroxysmus epilepticus induci solet: Novi enim, abscessu in dura matre excitato, & postea disrupto, cum à pure foetidissimo meninx tenuior & cerebri cortex exederentur, ægrotantem primo in stuporem, & demum in Apoplexiam letalem incidisse, qui tamen in toto morbi decursu symptomate quovis epileptico immunis degebat: Item nemini duram matrem, terrebello à chirurgo imperito adhibito, valde dilaceratam; in alio casu eam cum parte calvaria per vulnus abscissam, ut portio quædam cerebri extuberaret; nec tamen cuilibet horum pathemata quævis epileptica supervenerunt: Quapropter nec verisimile est, sanguinem, aut humores, vel (si quispiam ita contendat) vapores meningibus istis impactos, majorem noxam inferre, quam aut plagam, aut vulnera iisdem inflictæ, aut saniem ibi suffusam: præterea epilepsia leviori affectu, siquidem vix concidunt, ac per totum morbi insultum adhuc animo constant, membranas ita contrahi, & cerebri globum arctius compingi perciperent, si ejusmodi quæpiam affectio subesset; verum illi è contra cerebrum quasi inflatum, & spiritus cum efferatione quadam exilientes, ac velut explosos persentiscere videntur.

*Spiritus animales in-  
tra cerebri  
medullam  
confitos esse  
primarium  
morbi subje-  
ctum.*

Et quidem, uti verisimillimum, arbitror paroxysmum epilepticum à spirituum animalium cerebri incolarum (qui nempe sunt primum & immediatum hujus morbi subiectum) subita quadam rarefactione, & explosione concitari; qua scilicet cerebrum ipsum inflatur, adeoque insensibile redditur: simulque nervi appensi in convulsiones aguntur: hinc enim vero contingit hujus morbi accessionem ita derepente incipere, & perfecte terminari, sine magna materie morbificæ aut provisione, aut reli-



reliquiis; quia nempe labes non tam partibus solidis, quam ipsis spiritibus infertur.

Supra ostendimus, quo ritu copula heterogenea & explosiva particulis, uti videtur, nitro-sulphureis constans spirituum animalium particulis spirituosalinis accrescens, ab iisque ob plenitudinem aut irritationem denuo illisa & explosa, symptomata convulsiva producit: quamvis autem ejusmodi copula spasmodica è sanguine in cerebrum primo extillatur; plerumque tamen spiritus ibi nonprehendit, aut cum iis saltem illic non diu hospitatur: quin potius versus appendicem nervosam illico detrusa, spasmos particulares, & juxta loca affecta respectivos accersit: interdum vero, siquidem materies spasmodica uberior & potens, atque cerebri constitutio imbecillis fuerit, copula heterogenea spiritibus non tantum in nervoso genere, sed etiam intra ipsum *ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ* confitis affixa, diathesin epilepticam infert; atque spirituum & copulae istius particulæ explosivæ ab invicem elisæ caduci paroxysmum cient. Quandoquidem enim urgente epilepsiæ insultu *ἀναίσθησις* plerumque symptoma primum, & fere pathognomicum existit, inferre licet spiritus animales intra ipsum cerebri meditullium scatentes ante alios affici, proindeque partem eam esse priuipalem morbi sedem: dein quatenus ægro-tantis casus, sive in humum projectio, atque membrorum & viscerum spasmi sæpissime *ἀναίσθησις* isti succedunt, sequitur spiritus animales etiam systematis nervosi incolas eadem copula explosiva imbui, cumque ipsis cerebri incolis in consensum trahi, ab iisque ad explosiones puriter inordinatas excitari; licet aliquando (totâ spirituum tum in cerebro, tum in nervoso genere confitorum serie, instar longioris pulveris pyrii tractus, ad explosiones prædisposita) spasmus exterius & è longinquo forsan in membro quodam, aut viscere incipiens, posterius in cerebrum traducatur, prout infra plenius ostendetur. Interim ipsius cerebri regio semper hujus morbi sedes primaria statuatur; atque pro affectus causa conjuncta supponere debemus,



non aquam in cerebri ventriculis congestam, nec humorem crassum, aut viscidum ejus poris & meatibus impactum: tales enim causæ sensim gignerentur, & proinde signa quædam paroxysmi imminuentis prænuntia ederent; porro accessione morbi finita, talis materia non ita brevi tempore penitus discuteretur; quin à reliquiis ejus functionis animalis impedimenta quædam manerent, quod equidem in Epilepsia, nisi inveterata, rarius contingit; attamen pro caduci insultu excitando, nihil minus suspicari licet, quam spiritus animales, qui intra medullarem cerebri substantiam scatentes sensus interioris, imaginationis, & appetitus actus perficiunt, copulam heterogeneam nactos inordinate explodi, proindeque, istis extra ordines & stationes suas perturbatis, superiores regiminis animalis facultates eclipsin pati, dein ab hac majori spirituum explosione, velut à fomite ignario, spiritus alios, appendicis medullaris, & nervosæ hospites, etiam in explosiones prædispositos, similes *ἀραξίας* concipere, pariterque explosos, corporum continentium motus convulsivos ciere.

*Morbus secundario plurimas systematis nervosi partes afficit.*

Quamvis enim cerebri meditullium semper esse primariam Epilepsiæ sedem, & ab initio, fere tantum in illa regione, materiam morbificam congeri statuimus: tamen affectu ingravescente, hæc uberius in caput delata fines suos latius explicat, adeo ut particulæ spasmodicæ, & in reliquo cerebro, & insuper in appendice nervosa, tanquam pulveris pyrii, sive seminii explosivi strata, huc illuc, longe lateque protensa jaciuntur, quo fit ut primo *ἀνασθεντίας* insultui, convulsiones modo in his, modo in illis partibus, et non raro in toto corpore excitatæ, superveniant.



## CAPUT III.

*Epilepsiæ differentie, & symptomatum quorundam rationes explicantur. Nec non ejus methodus therapeutica adumbratur.*

**H**Æc de epilepsiæ essentia & causis in genere: Jam proxime incumbit hujus morbi differentias nec non accidentium quorundam, & symptomatum ad eum pertinentium rationes explicare: quibus demum observationes, & ægrotantium historiæ cum medendi methodo subjungentur.

Epilepsiæ maxime notabilis differentia peti solet à subjecto, nempe quod cerebrum aut pars ejus in hoc morbo laborans, vel primario, ac idiopathetice, vel secundario ac non nisi per consensum cum aliis partibus afficitur: de priori specie hætenus differuimus; quoad alteram, in qua se caduci insultus alicubi extra caput oriri visus, dein ipsum secundario & velut afflatu aliunde immisso corripit: observare est, ejusmodi affectum (prout Galenus annotavit) vel a partibus externis, aut internis procedere: plura equidem epilepticorum exempla occurrunt, in quibus paroxysmo ingruente, primo spasmus cum stupore in manus, aut pedis digito, aliove membro particulari sentitur, qui statim exinde, velut cum formicationis sensu versus caput prorepit; quod cum attigerit, illico ægrotans in terram prostratus ἀναστροφῇ, aliisque pathognomonicis caduci symptomatis corripitur: nec minus usitatum est istius morbi procæmium, & primam quasi velitationem, à stomacho, liene, utero, intestinis, genitalibus, aut aliis visceribus incipere; imprimis nempe in istorum aliquo perturbatio quædam cietur; dein ab eo loco auræ velut frigidæ in caput ascensus percipitur, cui statim affectioni caduci accessio, cum hortendo symptomatum apparatu succedit: hinc vulgo creditur Epilepsiæ causam in parte ita primario affici visa, delitescere, atque noxam suam in cerebrum, ex se insons, propagare. B 3 Ve-

*Epilepsia, qua per consensum excitari dicitur, ratio.*



*Epilepsia  
causa con-  
juncta tan-  
tum in cere-  
bro consistit.*

Verumenimvero super his dicendum esse vide-  
tur, in quavis epilepsia causam non modo proca-  
tarcticam, sed & conjunctam omnino in cerebro  
consistere; nempe spiritus hujus incolas ad explo-  
dendum dispositos, ibidemque explosos, caducum  
omnem inferre. Quoad præliminaria isthæc in qui-  
busdam epilepticis symptomata, ea interdum cau-  
sæ evidentis, nonnunquam vero tantum signi rari-  
onem habent: si quando enim diathesi epilepsiæ  
mala cujusdam visceris, puta stomachi, lienis, aut  
uteri dispositio accadat; quoties in viscere isto af-  
fecto perturbatio quæpiam cietur, facile contingit  
ob fermenti illic transmissionem, aut spasmi in ca-  
put continuationem, in cerebro prædisposito ac-  
cessionem epilepticam excitari.

Attamen ejusmodi caduci symptomata, quæ  
exterius suscitata affectum cerebro propagare vi-  
dentur, non raro ipsiuscerebri consensu oriuntur, &  
paroxysmi epileptici ingruentis, sive spirituum in  
cerebro explodi incipientium tantum signa exi-  
stunt: cum enim spiritus animales in cerebri &  
cerebelli meditullis, simulque in medulla oblon-  
gata juxta nervorum origines confiti, copula hete-  
rogenea ita saturantur, ut ad ipsam elidendam, pro-  
indeque morbi insultum acciendum parati sint,  
priusquam illi una omnes conglobatim explodun-  
tur, spiritus aliqui exterius in privatis quibusdam  
nervis scatentes, siquidem assueto superiorum in-  
fluxu destituuntur, inordinationes quasdam concipi-  
unt, proindeque spasmos ineunt, qui spasmi (prout  
in ejusmodi affectibus sæpe mos est) à nervorum  
extremitatibus huic, vel isti membro, aut visceri  
insertis incipiunt, unde sensim ad eorum principi-  
a prorepunt; quo cum pervenitur, illico spiritus  
per totum ἐγκέφαλον, prius in explosiones dispositi,  
ab eo spasmo commoti, proindeque tanquam fomi-  
te ignario correpti subito eliduntur; adeoque epi-  
lepsiæ paroxysmum per se prius incipientem, velut  
secundario, & instinctu aliunde tradito excitare  
videntur: ad hunc modum aliquando passionem hy-  
stericæ, cum ab imo ventre incipientes cerebro  
communicantur, à visceribus istis oriri, & eorum  
culpa



culpa fuscitari creduntur; cum interim causa mor-  
bificacirca nervorum origines potissimum subsistit,  
ficuta libi inuimus, & infra, cum de affectibus spas-  
modicis particulatim agemus, tufius ostendetur.

Restant plures aliæ morbi comitialis differentiæ; *Epilepsia  
differentia  
alia*  
nempe quod sit vel hæreditarius vel acquifi-  
tus; rursus utraque species varie distinguitur, rati-  
one ætatis seu temporis quo primo ingruit, nempe  
cum prima accessio ante vel circa pubertatem vel  
post eam contingit; porro quoad morbi efficaciam,  
in fortem & debilem, quatenus paroxysmi cum  
vel sine *ἀναίσθησι*, & casu fiunt, quoad morem e-  
jus inordinatum, cujus insultus sunt vagi ac incer-  
ti; quinetiam juxta symptomata his, aut illis æ-  
grotantibus, propter quandam temperamenti in-  
dolem, aut idiosyncrasiam peculiaria, multifari-  
am discriminari solet.

Cæterum ex præmissis symptomatum plurimo-  
rum, quæ in hoc morbo occurrunt, causæ facile e-  
lucescunt, ut non opus sit istæc omnia particulatim  
hic considerare: de nonnullis vero, quæ magis in-  
tricata videntur, non abs re fuerit hoc in loco disse-  
rere.

Imprimis igitur hic lubet inquirere, cur hoc *Cur Epilep-  
tici cum  
impetu ca-  
dunt.*  
morbo laborantes non tam cadunt, prout apople-  
ctici, aut syncopen passi, sed potius cum impetu  
prosternuntur, inque terram, aliave corpora for-  
tuito objecta, tanquam à spiritu quodam malefico  
dejecti alliduntur; ita ut sæpiissime aliqua capitis,  
aut faciei pars præ casu violento lædatur: affe-  
ctique, haud secus ac Dæmoniacus in Evangelio, non  
raro in ignem aut aquam præcipitantur: Huc  
referre oportet, Epilepticos ejusmodi malis ob-  
noxios fieri, eo quod, urgente paroxysmo, iis no-  
titia omnis, sive providentia, adimitur; ac insu-  
per nervis capiti vicinis valide contractis, tota cor-  
poris moles in præceps corripitur: Nimirum in  
syncope, & Apoplexia corporis affecti casus vide-  
tur tanquam ædificii ruina, quæ ob fulcimenta ejus  
subtracta contingit: at vero in caduco, non ali-  
ter res habet, quam si domus à pulvere pyrio ex-  
ploso subverteretur, quæ ut plurimum extra locum  
in quo steterat dimovetur.



*Unde spuma  
oris epilepti  
eis contingit.*

2. Epilepsiæ symptoma maxime pathognomicum vulgo habetur, si affectis in terram prostratis, & convulsiones horrendas passis, saliva spumosa ex ore effluat; quæ quidem à cerebro costricto in palatum exprimi putatur: verum enim vero ut concedatur hoc spumæ effluvium sæpenumero caduci signum esse; tamen illud non ita huic morbo appropriatur, quin idem in Apoplexia, in Carotia affectibus hystericis, aliisque convulsivis interdum accidit: porro ejusmodi spuma haudquaquam à cerebro descendit, nullus enim per quem transeat meatus patescit; verum à pulmonibus inflatis, ac usque ad laringem elevatis, unde velut cum effervescentia quadam, & ebullitione saliva spumescit: urgente enim caduci paroxysmo, cum plerique nervi in toto corpore contrahuntur, etiam qui pulmonum & diaphragmatis motibus inserviunt spasmos immanes passi, præcordia omnia sursum elevant, eaque in systole diuturna fere immobilia continent; ita nimirum ut pulsus & respiratio vix ac ne vix perficiantur: interea quia sanguis intracordis sinus coercitus ipsum distendit admodum ac fere opprimit, pulmones utcumque impediti nemore solito & naturali moveantur, quod possunt tamen festinata & spissa agitatione, quoquo modo sanguinem è corde exantlare satagunt; à quo ipsorum nisu, aer humiditatem viscosam crebra respiratione succutiens, ut agitaturnovi albumen inspumam attollit, mox sursum in oris cavitatem elevat, & illinc ulterius foras propellit: quare saliva spumosa etiam in aliis affectibus, ubi nervi pneumonici, aut contrahuntur, aut à functione sua obeunda inhibentur, non raro succedit.

*Quare nonnulli in caduco pectora contundunt.*

3. Porro ob eandem hanc rationem evenit, quod epileptici quidam in terram prostrati, pectora sua manibus gravissime tundunt, & cohiberi se ægre tolerant: nam cum præcordia spasmo affecta & præpedita movere se solito more non possint, sanguisque in iis stagnans, non sine insigni cordis gravamine, vitæ suffocationem minatur; tunc fit ut laborantes, cerebro licet inscio, mero naturæ instinctu, thoracem percutiant; nimirum ut præcor-



cordia ita concussa, & velut exagitata, motus suos redintigrent, adeoque sanguis à stagnatione, & cor à gravi oppressione vindicentur: Non abfimili ritu hic fieri videtur, ac cum dormientes aut titillati, aut pulicum morfu vellicati, illico locum affectum infcii confricant, aut scalpunt.

Quod spectat ad morbi hujus prognosin, eam *Morbi pro-*  
*gnosis.*  
 difficillimæ curationis esse supra innuimus, quæ quidem difficultas in eo consistit, quod cerebri medullium (in quo spirituum animalium prima scaturigo & fons est) non tantum à causa morbifica, sed insuper ab effectis ejus, nempe singulis paroxysmis plurimum debilitatur, ejusque pori laxantur, ut deinceps materiæ cujusque heterogeneæ incurfibus facillime pateant; adeoque ipsa diathesis morbida repetitis paroxysmis confirmata, atque radices altius agens ægrius tollatur. Veruntamen observare est, Epilepsiam iterdum sua sponte terminari, item aliquando medicamentorum ope profligari: quorum illud circa pubertatem, & tunc fere tantum contingit; adeo ut qui ista periodo elapsa, h. e. ante 25 ætatis annum minime curantur, vix unquam postea sanitatem recuperent. Nimirum circa pubertatem corpori humano duplex alteratio, atque propterea morbi committialis, aut alterius cujusvis altius radicati non raro solutio contingit: Nam primo, hoc tempore humor genitalis in vasis spermaticis congeri incipit; unde sequitur particulas spirituosas, quæque ipsis accrescere solent nitrosulphureas, & morbificas non tantum in cerebrum, sed etiam in testes deponi: quare si heterogenea ista spirituum copula in novum hoc promptuarium uberius inferatur, exinde cerebrum immuniùs degens diathesin epilepticam aut alias morbidam non raro exuit. 2. Circa pubertatem, prout sanguis aliquid cerebro prius destinatum per arterias spermaticas genitalibus suffundit; sic etiam fermentum quoddam ab iisdem partibus per venas retributum accipit: sc. particulas quædam seminali tinctura imbutæ in massam sanguineam regeruntur, quæ ipsam vigorant, ac virtutem novam & vegetiorem inspirant; quare

tunc.



tunc temporis & corporis, & animi dotes se potissimum exerunt, pili erumpunt, vox magis sonora evadit, foeminis catamenia fluunt, aliaque accidentia superveniunt, quibus liquido constat & sanguineum & succum nervosum *ζυμωσθαι* quadam recenti imprægnari: quare fermenta, sive seminia morbifica, nisi ab hoc novo fermento naturali superantur, deinceps sæpe usque in mortem indomita persistunt.

*Epilepsia in  
alios morbos  
commutatur*

At vero Epilepsiam aliquando medicamento-  
rum ope sanari experientia testatur: de medendi  
methodo, & remediorum maxime celebrium ra-  
tionibus mox disquiremus; interim quod ad mor-  
bi hujus prognosin ulterius spectat, si nec circa  
pubertatem desinit, neque medicamentorum usu-  
profligari potest, diversimodum adhuc eventum in  
variis ægrotantibus sortitur, nam vel immediate  
in mortem terminatur, vel in alium morbum, sc.  
paralyfin, stupiditatem, aut melancholiam ple-  
runque incurabilem commutatur.

Quoad prius, cum paroxysmi crebro repetunt,  
& qualibet vice atrociores fiunt, functio animalis  
brevis debilitatur; atque hinc labe in spiritus, &  
nervos præcordiis inservientes sensim traducta,  
functio vitalis paulatim enervatur, donec tandem  
languente toto corpore, pulsuque imminuto, ac  
demum cessante, postremo flamma vitalis extin-  
guatur.

Quod autem hic morbus non raro in paralyfin,  
melancholiam, aut maniam desinit, ratio est, quia  
crebris spirituum animalium explosionibus cere-  
bri tonus, & conformatio depravatnr, ejusque na-  
turalis status tandem ita pervertitur, ut particulis  
morbificis etiam alius generis intus admissis spiri-  
tus figantur, nec amplius in explosiones justo pro-  
cliviores sint, quin potius vitio interdum contra-  
rio superinducto ipforum virtus elastica nimium  
deficit; ita ut supra modum hebetes & torpidi  
evadant; non secus ac intensiora febris incendia  
sanguinis intemperies justo frigidior sæpe excipit:  
atque hæc quidem spirituum depressiones partim  
propria ipforum culpa contingunt, quippe parti-  
culis



culis agilioribus nimium explosis, seigniores tantum supersunt, & deinceps suppeditantur; partim vero, uti dicimus, cerebri vitio accidunt: eo quod pori & meatus ejus à crebris caduci paroxysmis usque adeo dilatantur & aperiuntur, ut postea una cum succo nervoso; particulis quibusvis heterogeneis, & diversimode morbificis aditus petescat.

Hæc de Epilepsiæ diagnosi, & prognosi; quibus *Epilepsia*  
explicandis necesse erat rationes non raro abstru- *Therapeu-*  
sas, & à communi pathologia diversas inducere: *sis*  
nec minus in morbi hujus Therapeia à vulgari, in-  
que aliis affectibus trita medendi methodo recedere cogimur: Enimvero dogmaticorum præscriptiones, quibus fere tantum per cathartica materiam morbificam educere, ac penitus eradicare conantur, in caduco parum aut nihil profunt, imo frequenter obesse solent. Novi quosdam insignes Practicos, omissa penitus intentionum Therapeuticarum serie, ad remedia quædam empirica absque ulla totius provisione se recepisse: hujusmodi praxis, licet interdum feliciter succedat, ea tamen multo certius propositam curationem assequeretur, si per alia itidem pharmaca, corpore rite præparato, impedimenta quævis summoventur.

Quare circa morbi commitialis medelam indicationes (prout vulgo recensentur) erunt vel curatoria, quæ paroxysmum respiciunt, eumque vel ingruentem arcent, vel præsentem citius abigunt: vel prophylactica, quæ morbi causam spectant, quam si tollant, in posterum accessiones ejus inhibentur.

Quantum ad priorem intentionem, evacuantia generalia vix locum habent; nec enim in paroxysmo vomitus, aut purgatio, atque raro admodum venæ sectio adhiberi debent; si *ἀνασθνοία* diutius persistat, enemata interdum usui esse solent; id vero, quod potissimum incumbit, est spiritus animales nimis efferos & volatiles figere, nec non eorum explosiones inceptas suppressere: in quos fines duo remediorum genera præcipue conducunt: sc. primo quæ spiritus animales efferant, &



& exilire aptos reprimunt, & velut fuffitu quodam iis ingrato repellunt, inque ordines suos cogunt: quod equidem medicamenta fale volatili, & armoniaco, aut etiam sulphure vitriolico prædita efficiunt; cujufmodi sunt fal, & oleum succini, sp. sanguinis, C, cervi, fuliginis, tinctura caftorei, & fimilia: hæc enim intus fumpta, aut naribus admota, sæpe levamen conferunt, quin & malos hujus morbi fpiritus, non fecus ac apud Tobitum fumus è felle pifcis combufto dæmonem, abigere creduntur. Secundo fpiritus animales ab explofionibus ineundis avocantur, aut inhihentur, cum illi in opera quadam ipsis affueta alliciuntur, & occupati tenentur: quapropter urgente paroxyfmo friftiones per totum corpus adhibitæ, & aliquandiu continuatæ sæpe juvant: quod autem nonnulli affectos erigunt, eorum brachia & crura à motu convulfivo penitus cohibent, vel in hoc vel in illo fitu constringunt, porro quod fternutatoria naribus inflant, & cardiaca fortiora ori ingerunt, aut cucurbitulas, & fcarificationes adadhibent, aliisque adminiftrationum modis caducos afperius tractant, & paroxyfmi morem interturbant; hujufmodi inquam praxis fæpiffime perperam inftituitur; quoniam hoc modo duplex naturæ moleftia, alia nimirum à morbo, aliaque non levior ab aftantibus & miniftris intentatur; cum longe præftiterat paroxyfmo juxta morem fuum transire permiffio, laborantes unica tantum plaga abfolvi.

Profecto maxima Medici cura & remediorum efficacia circa morbi hujus prophylaxin verfatur, ut caufa ejus fublata, feu radice præcifa, fructus omnes emarcefcant; medicamenta huic indicario ni requifita plures intentiones refpiciunt; quæ tamen ad duo hæc precipua capita reduci poffint: *fc.* primo ut morbi fomes immediate à fanguine vitiofo, aut fucco nervofo, atque mediatius à vifceribus, primisque viis fuppeditatus præcidatur; dein fecundo ut mala cerebri & fpirituum ejus incolarum diathefis, quæ nempe Epileptiæ peculiaris eft, tollatur.

Quoad



Quoad prius indicatum, hic vomitoria, & purgantia, aliaque tum evacuantia, tum alterantia, quinimo phlebotomia & cauteria locum habent; quatenus nimirum hisce modis ac viis & viscerum, & humorum impuritates subducuntur, ac discrasia emendatur: quanquam enim hujusmodi pharmacæ, et administrationes medicæ per se raro aut nunquam Epilepsiam sanent, attamen hæc impedimenta tollunt, naturam erigunt, atque ad hostem suum aggrediendum incitant; etiam vias præparant ut propterea remedia specifica certius & efficacius virtutes suas exerant; quare solenne est, dum morbi hujus cura per secreta & arcana peragitur, Vere, & Autumno, aliisque idoneis temporibus ejusmodi medicamentorum usus intercalare.

20. Quod spectat ad remedia specifica; quæ quidem sola, licet non semper, Epilepsiæ causam attingere, eamque expugnare perhibentur, cujusmodi sunt pæonia mas, viscus quercinus, Ruta, Castoreum, ungula Alcis, præparata è cranio humano, succino, corallio, cum multis aliis: quandoquidem hæc sine quavis sensibili evacuatione, aut etiam perturbatione in visceribus aut humoribus subsequente assumuntur, mirum est qua ratione formali, aut agendi virtute in hoc morbo uspiam juvare solent.

Super hac re intricata satis & obscura, si quis conjecturæ locus sit, cum Epilepsiæ procatarxin in copula heterogenea spiritibus cerebri incolis accrescente, eosque ad explosiones præternaturales incitante consistere superius asseruimus; sequetur ea quæ talem causam expugnant, aut tollunt, ejus naturæ esse ut, cerebrum corroborando, ejusque poros constringendo copulam istam excludant, spiritusque intra cerebri meditullium scatentes eorum copulam exeundo ita figant, & quasi constipent, ut non amplius in explosiones irregulares apti & proclives fuerint; simili forsan ritu ac cum pulvis  $\chi\rho\upsilon\sigma\omicron\nu\sigma\eta\pi\alpha\upsilon\upsilon\iota$  cum sulphure tritus aut spiritu vitrioli irroratus, virtutem suam fulminantem amittit. Et revera hujusmodi proprietates, nempe

*Specificorum in Epilepsia virtus in quibus consistit*



nempe alteram, aut simul utramque in plerisque remediis antiepilepticis suspicari, immo alquatenus detegere licebit: enimvero pæonia, viscus quercinus, ruta, liliū convallium, cum multis aliis manifesta quadam astrictione pollent; ut verisimile sit eorum particulas intus sumptas, adeoque sanguinis, aut succi nervosi vehiculo ad cerebrum delatas, poros ejus nimis laxos & apertos ita constringere & occludere, ut in posterum materiæ morbificæ aditui minime patefiant: porro quoniam hæc concreta *ζωοθυμίασι*, quasi armoniacam, sive dissipatam spirant; idcirco eadem spiritus animales depurare, & copula heterogenea exutos figere & corroborare dicuntur: hæc virtus spirituum depurativa à sale armoniaco procedens in remediis, quæ ex mineralium, & animalium familiis petuntur, qualia sunt cranii humani, sanguinis, succini, & corallii præparata, magis elucescit; sicut alia adstrictoria in vegetabilium partibus & præparatis potior existit.

Non erit hic opus Epilepsia curanda completam medendi methodum, cum exactis præscriptionum formulis proponere, quia apud Authores & generalia præcepta, & elegantissima remedia passim extant, prudensque Medicus tum indicationes, tum uberem istum rei pharmaceuticæ apparatus ad particulares ægrotantium casus facile accommodabit. Verum quia morbi hujus theoriam hoc in loco plane novam exhibemus, etiam methodus Therapeutica eidem adaptata, hic tradi debet: quam quidem mox plenius adumbrabimus, postquam casus aliquot, sive historias Epilepsia laborantium descripsimus.

*observatio,*  
Puella venusta parentibus mediocriter sanis orta, ipsaque ad pubertatem usque bene valens, sub id tempus de capite male affecto queri cœpit: Et primo per vices quasdam vertiginem juxta synciput, qua omnia circumagi videbantur, perpeffa est; simulque dum illud symptoma urgeret, mox delire loqui, & quicquid modo egerat oblivisci solebat: hujusmodi paroxysmi primo intra horæ quadrantem transire, & semel tantum aut bis in mense



menſe repetere, quorum intervallis ſatis recte habuit: poſtea inſultus ſenſim gravioreſ facti, etiam ſæpius redibant, atque intra ſeſquiannum, cerebro indies magis labefactato, vertiginofus iſte affectus plane in Epilepſiam mutabatur, ut ægro- tans quovis paroxyſmo in terram elifa *ἐπιθνήσκει* & convulſionibus horrendis, ore etiam ſpuma dif- fluente, afficeretur. Obſervabant domeſtici eam ſemper in idem latus præcipitari, ita ut juxta focum ſedens, ſi angulum dextrum occuparet in medios ignes, ſi vero ſiniſtrum, in murum à tergo poſitum allideretur: ſemel cum ſola in æ- dibus relicta ſupra carbonem accenſum corrueret, facies ei & ſynciput ita miſere concremata ſunt, ut cranio cute & carne denudato, eſcharam lata & profunda inureretur: & poſtea exterior tabu- la ejus ad palmæ magnitudinem decideret. Ægro- ta interim, quamdiu ulcera ab uſtione contracta ſanie manabant, paroxyſmis caruit; poſtquam ea ſanabantur caducus rediit: Morbus hic comitialis circa pubertatem primo emicuit, nam puellæ ſta- tim ab initio ægri tudinis catamenia fluere cœpe- runt, & poſtea ſtatas periodos ordinate ſatis ob- ſervabant, affectu licet indies in pejorē evecto: Varia medicamentorum genera huic ægrotanti ad- hibita nihil profuere, quoniam ipſius & amico- rum ejus mos & ſtudioſum fuit cum medicum, tum medicinæ methodum, ſiquidem iis felix eventus non ſtatim ſucceſſit, ſubinde mutare, ſequē ad em- piricos quoſvis, & agyrtaſ circumforaneos ut plu- rimum recipere.

Quod in hoc caſu affectus vertiginofus cum bre- vi delirio Epilepſiæ prænunciuſ fuerat, plane ar- guit hujus morbi originem in cerebri medulla conſitam, à ſpirituum inordinatione quadam pen- dere; nimirum illi ibidem ſcatentes, ab initio co- pulam heterogeneam admittere cœperant; quæ plenius aggeſta aut ſponte ſua, aut occasionaliter commota dum excuteretur, ob ſpiritus perturba- tos, nec ſum vero valde exploſos, priores iſtos affectus inducebat: poſtea ab eadem cauſa ſen- ſim in deterius evecta, ſpirituum perturbationes  
in



in ipsorum manifestas explosiones assurgerent, vertigo, & delirium in Epilepsiam migrabant.

Quod vero hæc puella circa pubertatem ægrotare cœperit, hinc planè sequitur uti fermenta naturalia, sic interdum præternaturalia eo tempore sese primo explicare; quare sicut purgationes menstruæ tunc primo erupere, ita morbi comitialis semina, sive innata, sive acquisititia tunc paululum germinare, & sensim in fructus maturari contigit: cum fermentum præternaturale prius emicuit, non raro naturale succedens ipsum delet, hinc Epilepsia impuberis non raro circa pubertatem terminatur; si fermentum illud, sive *μιασμα νόσθεν* fluxu menstruo posterius, aut cum eo simul in actum emergens non statim succumbit, postea ut plurimum ex se indomitum, & remediis quibuscumque insuperabile durante vitaperstat.

Ex observatione ista, quod huic ægrotanti cauteria accidentaliter, & casu excitata à morbi insalutibus immunitatem præstitere, inferre liceat fontanellas in Epilepsiæ curatione utiliter adhiberi: ubicunque enim pro latice seroso, tum è sanguine, tum succo nervoso constanter educendo, emissarium aperitur, illac plures particule heterogeneæ, ac morbificæ una effluunt, propterea ut cerebrum immuniùs perstet.

2  
*Observatio.* Filia Cerevisiarii Oxoniensis à prima infantia catarrho in oculos decumbenti graviter obnoxii fuerat, aliis satis sana & robusta, item duris laboribus quotidie assueta degebat, circa 14<sup>a</sup> ætatis annum paroxysmis epilepticis tentari cœpit, quorum plures juxta majores lunæ *regule* præcipue redeuntes perpeffa est: ut curationem ejus molliar rogatus, vomitorium ex præcipitato solari exhibui, et idem triduo ante quævis novi & pleniluniae iterandum consului; insuper ut qualibet vice per quatrimum à vomitorio assumpto bis in die caperet *pulv. rad. Pœoniae maris 3 j. cum haustu aq. cerasor. nigr.* His remediis paroxysmi tamdiu intermittebant, ut morbus sanari videretur. Posthæc cum iterum redibant, eorundem medicamentorum usu denuo recuperabatur: & dein fluxu menstruo-  
rum



erumpente, & periodos suas rite observante, in posterum à morbo isto immunis perstitit.

*Methodus therapeutica.*

In curatione Epilepsiæ à Catharsi incipiendum esse duco; & si æger vomitionem facile toleraverit, Emeticum imprimis exhibeatur; & per plures menses quatrduo ante plenilunium repetatur. Infantibus, & pueris vinum scilliticum, oleo amygdalorum dul. recenti admixtum, aut etiam sal vitrioli à ʒ β. ad ʒ j. exhibeatur: Adultioribus & constitutione robusta præditis sequentes medicamentorum formulæ præscribantur.

Rx. Croci metallor. aut Mercurii vitæ gr. iiij. Vomitoria. ad vj. Mercurii dulcis gr. 16 ad ʒ j. simul terantur in marmore, misce cum pulpa pomi cocti, aut conserva Boraginis ʒ j. f. Bolus. vel exhibeatur infusis croci metallorum, aut Mercurii vitæ in vino Hispanico facta ab ʒ β. ad ʒ j. β. vel Rx. Tartari emetici Mynsicht. gr. iiij. ad vj. Qui tenerioris sunt constitutionis sumant salis Vitrioli ʒ j. ad ʒ β. & post horæ s. superbiant plures libras lactis cerevisiati: dein, penna, aut digito gutturi indito, vomitus provocetur, & aliquoties iteretur.

Die sequente vomitorium, nisi aliquid contra indicet, mittatur sanguis è brachio, vel è venis hæmorrhoidalibus hirudinum succtu: dein postridie sumatur medicamentum purgans, quod postea quatrduo ante novilunium constanti vice repetatur.

Rx. Resin. Jalap, ʒ β. Mercurii dul. ʒ j. Castorei gr. iiij. Conserva flor. Teonia ʒ j. f. Bolus. Purgationes.  
Rx. Tilul, scæid. Majorum ʒ ij. Resin Jalap. gr. v. Anamoniaci solut. in aqu. hysterica q. s. f. Pilul. v. Rx. Fibrar. Hellebor. nigr. in acet. macerant. exiccat, & pulv. ʒ β. Zinziberis ʒ β. salis Absynth. gr. xij. Olei succini gutt. ij. f. pulvis. Detur in pulpa pomi cocti, Rx. Pulveris hermodactylor. composit. ʒj. Cranii humani præparat. gr. vj. f. pulvis, detur in haustu decoct. hyssop. aut salvia.  
Ia



In diebus quibus à purgatione vacat, præsertim circa lunationum tempora, mane, & vespere exhibeantur remedia specifica, quæ virtute quadam secreta & innata hunc morbum curare dicuntur: horum immensa extat sylva, eaque variis compositionum formulis prescribuntur.

## Specificæ.

Medicamenta simplicissima, quæque experientia valde efficacia fuisse comprobavit, sunt radix Pæoniæ maris, & semina ejusdem. ℞. rad. Pæoniæ maris siccat. & pulv. ʒ j. ad ij. vel iij. detur bis in die in tinctura sequenti. ℞. folior. visci qu. ʒ ij. rad. Pæoniæ incis. ʒ β. Castorei. ʒ j. ponantur in vase clauso cum aq. Betonica, vel Pæoniæ simpl. & vini albi an. ℔ j. salis visci quercini vel communis ʒ ij. digerantur in vase clauso calore arenæ per duos dies, capiat ʒ iij. cum dosi pulv. prescript.

Pauperes sumant pulverem prædict, in decoct. hyssopi, aut castorei in aq. fontan. & vino albo facto.

Eodem tempore radix pæoniæ in taleolas discissa, & filo transfixa collo suspendatur. Etiam radices sartagine siccæ, aut ad teneritudinem coctæ, inter esculenta quotidie assumantur.

℞. Rad. & sem. Pæoniæ maris an. ʒ ij. Viscei qu. ungula Alcis an. ʒ j. incis. & contus. in sindonem raram insuantur. f. sacculus, qui super ventriculi scrobem gestetur.

## Pulveres.

Inter specifica hic pulvis à multis Authoribus valde commendatur. ℞. Castorei, Opoponacis, sanguinis Draconis, Antimonii, sem. Pæoniæ an. f. pulvis, sumatur ʒ β. ad ʒ j. omni mane cum vino, aut decocto appropriato, aut cum aqua cerasor. nigror.

℞. Cranii humani præparat. ʒ j. visci. qu. Cinnabaris factitia, ungula alcis an. ʒ β. misce. Dosis ʒ β. ad ʒ j.

Si formula pulveris cuiquam ingrata sit, vel si diuturnior ejus usus tædio fuerit, Electuaria, pilulæ, trochisci, spiritus, & Elixires, quæ singula medicamentis specificis constant, prescribi solent.

℞



℞. Conserv. flor. *Paonia maris*, *Lilior. convallis* an.  $\mathfrak{z}$  iij. sem. & rad. *Paonia maris* pul. an.  $\mathfrak{z}$  ij. *Coralli* prepar.  $\mathfrak{z}$  j. *margarit. pulv.* *Cranii humani* preparat. an.  $\mathfrak{d}$  ij. *salis visci quercini*  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ . cum. s. q. syr.  $\epsilon$  *Coralliis*, f. *Electuarium*; capiat mane & vesperi qu. *Nucis Moschat.*

℞. Rad. *Paonia maris* pulv.  $\mathfrak{z}$  j. *seminum ejusdem.*  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . *visci qu. ungula Alcis*, *Cranii humani* prepar. an.  $\mathfrak{z}$  ij. rad. *Angelicae*, *contrayerva*, *serpentaria virginiana* an.  $\mathfrak{z}$  j. *succini albi*issimi, *Coralli* calcinat. an.  $\mathfrak{z}$  j. *salis visci communis.*  $\mathfrak{z}$  ij. *sacchari candi* in s. q. *aqua antiepileptica*, *Langii solut.*  $\mathfrak{z}$  viij. f. *confectio*, capiat bis in die q. *Nucis Moschat.*

*Pulveres isti addito sale succini, & C. Cervi Pilulæ.*  
cum s. q. *Balsami Capivi* formentur in massam pilularem; cujus fumantur 3. vel 4. pilulæ mane, & vesperi, superbibendo haustum liquoris appropriati.

Vel paretur hujusmodi *Elixiris*, cujus gut. 8. ad 10. fumantur bis in die in cochleari *Jalapii* appropriat, superbibendo parum ejusdem

℞. *Vitrioli Hungarici* lb vj. destillentur in retorta vitrea calore arena per horas 24. dein retorta eadem loriceata cum recipiente amplo ponatur in furno reverberii, ut spiritus acidi igni fortissimo, quousque exhibunt urgeantur. Liquor totus extillatus in retorta minori vitrea calore arena avocetur, & in matraccio superaffundatur rad. *Paonia mari* in taleolas scis. & exiccat.  $\mathfrak{z}$  iij. sem. ejusdem  $\mathfrak{z}$  j. *Cranii humani* prepar. *Ungul. Alcis, coral, rubr.* an.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . *visci qu.*  $\mathfrak{z}$  ij. digeratur leni calore per plures dies ad tinctura extractionem. liquor decantatus avocetur in retorta vitrea ad tertia partis remanentiam; extillatus seorsim affervetur: remanentia isti affunde sp. vini rectissimiss. & eorundem ingredientium infusione imprægnati parem qu. & digeratur per 6 dies in fumo equino. f. *Elixir*, cujus dosis.  $\mathfrak{d}$   $\beta$ . ad.  $\mathfrak{d}$  j. Liqueur extillatus datur a cochleari  $\beta$ . ad integrum propter easdem intentiones.

Vel paretur oleum ex sale Veneris juxta præscriptum apud Henricum ab Heers, & exhibeatur modo descripto.

Inter



Remedia  
empirica.

Inter remedia specifica, quæ (cum superiora non fuerint proficua) etiam tentari debent, habentur ranarum hepata, vesica apri, cum urina exiecata. Rad. Bryoniæ pul. pul. cuculi, corvorum, coagulum, & pulmo leporis, hepar lupi, lapilli hirundinibus exempti, milvi jecur, ova corvorum inter alimenta, & medicamenta quotidie assumendo, cum multis aliis, quorum catalogus insignis apud Henricum a Bra medicum Zurphaniensem extat; & è quibus præscripta pro pauperibus, utpote facile, & sine magno pretio parabilia, desumi poterunt.

Dum hujusmodi remedia juxta methodum prædictam intus sumuntur, administrationes quædam exterius adhibitæ opem contribuunt, & in curationis pattem merito asciscuntur; quare semper in hoc morbo fontanellæ, sc. una aut altera in locis idoneis excitentur, etiam vesicatoria sæpius adhibeantur.

## Amuleta.

Periapta collo suspensa, aut super ventriculi scrobem gestata, usui esse putantur: radices pæoniæ recentes in taleolas scissæ, & filo transfixæ in bracteolas formentur quæ toti collo circumdantur; quamprimum exaruerint substituantur novæ, illæque in pulverem intus sumendum redigantur. *R. rad. & sem. Pæonia an. 3 ij. ungula Alcis, cranii humani pr. an. 3 j. visci qu. 3 ss. gross pulv. in sericum rubrum insuantur & f. sacculus collo suspendendus.*

Amuletum ex frutice sambuci in salice inventi valde commendatur.

## Emplastra.

Convenit nonnullis capillitio derafo Emplastrum fincipiti applicari. *R. rad. & sem. Pæonia, Castorei, visci quercini, cranii humani tenuissime pulv. an. 3 j. emplastri de betonica 3 ij. caranna, Tacamahacca an. 3 ij. Balsami capiv. q. s. f. massa extendatur super alutam, f. emplastrum pro suturis capitis.*

Tempora & nares sæpius inungantur oleo succini per se, vel cum oleo Capiv. admixto.

## Sternutatoria.

Sternutatoria, & Apophlegmatismi horis matutinis quotidiano sunt in usu. *R. Ellebori albi 3 j. Castorei,*



*Castorei, Euphorbii an. ʒ β. Majorana odorat. folior. Rut. an ʒ ij. f. pulu. Decoct. salvia vel hyssopi cum confectiōe sinapeos in co solut. ore, & gutture obvolvatur.*

Enemata juxta usus exigentiam quandoque injiciantur.

Quandoquidem medicamenta solidiora liquidis interdum dilui, aut hæc illis superbibi debent, in hanc rem præsto sint Aquæ destillatæ, Julapia, decocta, aut tincturæ, quæ virtute quadam contra hunc morbum specifica prædita sunt.

Aquæ de  
stillatæ.

*℞. Vitrioli Hungarici lb. iiij. crani humani recentis pulu. ʒ iiij. rad. Pæoniæ incis. ʒ vj. simul confusus in mortario affunde vini Hispanici, vel albi tenuioris, vel vini è succo Cerasorum nigrorum in dolio fermentatio lb. ij. destillentur in retorta vitrea calore arena.*

*℞. rasura ligni Buxi, Vitrioli Hungarici an. lb. ij. folior. visci qu. vel communis M. iiij. folior. Ruscæ M. ij. simul confusus affunde vini Hispanici lb. iiij. Destillentur in cucurbita vitrea calore arena.*

*℞. Vitrioli cum. lb. vj. rad. Pæoniæ maris ʒ vj. visci qu. ʒ j. Juglandum viridum ʒ viij. incis. & contus. destillentur in olla vitreata, alembico vitreo superimposito in calore arena. ℞. hujus liquoris, lb. j. aq. Cerasor. nigr. flor. Tilia an. lb. β. sacchari albissimi ʒ iiij. misce f. Julapium: dosis ʒ ij. ad. iiij. bis vel ter in die.*

Julapia.

Oxymel scilliticum, item hydromel cum hyssopo incocto ab antiquis plurimum laudantur. Vel hujusmodi Apozema paretur, cujus sumantur ʒ iiij. ad vj. vel viij. bis in die.

*℞. Rad. Pæoniæ maris, Angelica, Imperatoria, Valeriana an. ʒ vj. folior. Betonica, Salvia, Lili convallis, pulegii an. M. j. Sem. Rut. Nigella an. ʒ iiij. Pæonia ʒ β. Passular. ʒ iiij. Liquiritia ʒ β. incis. & contus. coquantur in aq. fontan. lb. vj. ad tertia partis consumptionem. Circa finem adde vini Cerasor. nigror. lb. β. vel ʒ x. f. colatura, quæ servetur in vasis occlusis. Dosis ʒ vj. ad viij. bis in die post remedia superius præscripta.*

Apozema-  
ta.

Vel prædicta ingredientia exceptis liquiritia, & passulis



passulis coquantur in hydromelitis lb̄ vj. ad consumptionem tertiæ partis : dosis ʒ̄ iiij, ad vj.

Remedia  
magna.

Quod si prædicta methodus, cathartico. & specificor. usu constans, aliquandiu tentata prorsus incassum cedit, ad alijs generis remedia, & præsertim ad ista, quæ magna dicuntur, devenire oportebit : In hoc censu diaphoretica, salivantia, Thermæ, & Acidulæ ponuntur.

Alphonfus Ferrius plurimos epilepticos, simplici Guajaci decocto bis in die ad ʒ̄ vj. vel viij. præscripto, ejusque decocto secundario vice potus ordinarii (prout in lue venerea assolet) assumpto, se curasse affirmat: si tali Decocto rad. Pæoniæ aliæque specifica addantur, forsitan efficacior fuerit. Probabile videtur salivationem à Mercurio potenter excitatam succedente postea diætâ sudorifera, hunc morbum certissime esse curaturum. Quid Thermæ aut acidulæ possint, aut propria aut aliorum experientia mihi nondum innotuit. Experiar forsitan aliquando quid acidulæ nostræ artificiales, sc. tum ferro, tum Antimonio imprægnatæ per plures dies in magna quantitate assumptæ, circa Epilepsiæ curationem valebunt.

CAPUT.



## CAPUT IV.

*De cæteris Convulsionum speciebus, ac imprimis de moribus Convulsivis puerorum.*

**P**ost Epilepsiam, velut principem Spasmodum in principe loco, sc. intra Cerebri meditullia excitatum, cæteræ Convulsionum species ordine pertractandæ occurrunt. Harum differentię à duplici causarum genere, & variis utrisque modis, & accidentibus optime desumuntur. Supra ostendimus affectiones quascunque spasmodicas vel à mera spirituum irritatione, vel ab eorum, propter copulæ elasticæ adhæsum, explosione, vel simul ab utroque conjunctim profluere: Quapropter multiplices spasmodorum Ideæ distingui, ac in classēs quasdam distribui possint, prout hanc illamve, aut simul utramque causam in variis *του ἐγκεφάλου* vel appendicis nervosæ locis consistere contingit. Enimvero materies spasmodica, sive spirituum copula explosiva, potissimum ac sæpius per cerebrum, interdum vero & aliquatenus per nervorum extremitatēs aditum inveniēns, aut circa nervorum origines, aut medios processus, tamen fines extimos subsistit, vel in totis eorum ductibus scaturit, prout inferius speciatim declarabitur: porro irritatio per se, vel cum procataxi prævia convulsiones ciens, licet ubivis in nervoso genere fiat; præcipue tamen ac frequentius talem effectum circa nervorum principia, medios processus & plexus, aut fines producit. Cæterum ejusdem generis causa & effectus alio ritu in infantibus ac pueris, alioque in adolescentibus & adultioribus habent. Cum itaque singulas convulsionum species particulatim considerare statutum fuerit, imprimis de moribus Convulsivis infantum ac puerorum differemus.

Infantes & pueros affectibus spasmodicis tentari passim, & tam frequenter accidit, ut hæc præcipua, & fere unica convulsionum species statuta



tur; nam ejusmodi symptomata in adultis aliis insigniuntur nominibus, atque ad epilepsiam, passionem hystericam, hypochondriacam, colicam, aut etiam ad scorbutum referri solent: in pueris vero, quasi *καλὶξοχὴ* motus convulsivi appellantur.

Super his observare est, circa duo potissimum tempora pueros convulsionibus maxime obnoxios reperiri, sc. intra primum à partu mensem, & circa dentium eruptiones: Quanquam hujus morbi insultus etiam aliis temporibus, & quibusdā aliis de causis non raro eveniant.

Primo igitur sæpenumero accidit infantulos recens natos, aut saltem nondum bimestres, crebra vice spasimis in diversis partibus excitatis affici; Quippe oculorum iaversiones, genarum, & labiorum distortionem, aut tremores, quinimo tendinum contractiones, membrorum, & non raro totius corporis subsultus, & concussionem subitā eos infestant; eundemque affectum etiam præcordia nonnunquam afficere hinc sat plane liquet, quod dum spasmi artus, & membra exteriora occupant, etiam à sanguine in corde, & pulmonibus una contractis stagnante, facies modo pallorem, modo livorem contrahit. Cum itaque in pueris spasmi tres corporis regiones infestare soleant, nempe capitis & faciei partes, membra & artus exteriores, atque præcordia & viscera; observamus modo has, modo illas, modo binas, aut simul omnes regiones à causa morbifica occupari, nempe prout eadem aut circa nervorum origines aut extremitates defigitur; & cum prius horum accidit, prout medullæ oblongatæ pars superior, media, aut infima spinalis, sc. unica aut plures simul à causa morbifica impetuuntur.

Quod vero spectat ad cæteras hujus affectus causas, nempe procatacticas, & evidentes; quæ prioris generis sunt, in his duobus præcipue consistunt; primo quod infantibus *πύρρα τοῦ ἰχθυώδους* valde fiat imbecillia, & viscosa humiditate scatent; nempe Cerebrum minus firmum, atque nervorum n. tonus valde laxus, ne leviores quidem cujusvis



cujusvis materiæ impetus sustinere possint, quin spiritus eorum incolæ, etiam à proprio, quo istæ partes irrigantur, liquore, paululum modo immoderatio affluerit, aut saltem copiosior quam pro tantilli roboris modulo, facile in motus irregulares, sive spasmos incitantur. Attamen secundo quoniam observatione constat puerulos, nec solos, nec omnes qui tenuioris sunt constitutionis in hunc morbum proclives reperiri, idcirco potiore procatarxeos morbidæ ratione haberi debet, quod infantibus quibusdam, propter mala ab utero contracta, & sanguis, & succus nervosus originaliter vitiosi existunt: quippe recens natis massa sanguinea per plures retromenses ventilatione carens, impurior evadit; quapropter pleisque infantibus brevi a partu efflorescentiæ latæ, & rubicundæ morbillorum instar per totam cutem erumpunt, cujusmodi *ἐξάνθησις* si impeditur, aut reprimitur, sæpenumero aphthæ periculosæ circa oris partes succedunt. Hinc merito suspicamur tales sanguinis impuritates, quandoque in Cerebrum & nervosum genus, utpote debiliora suffundi, & propterea spasmodicas affectiones oriri; nempe dum sanguis ab utero vitiosus existens depurare se satagit, sæculentias suas, efflorescentia in cutem facta, exterminari solitas, in caput transfert: quare latex modo tenuis & serosus, modo crassior & viscidus, ac uterque salium & sulphurum præternaturalium particeps intra hos, aut illos cerebri, cerebelli, atque medullæ oblongatæ recessus, & cavitates deponuntur; cujusmodi recrementa cum nervi hujus aut illius, ac interdum una plurium origines, aut caudices obfidant, spiritibus eorum incolis particulas heterogeneas, atque in explosiones spasmodicas aptas affigunt. Quamprimum enim nervi tales particulas altius imbiberunt, spiritus eorum copula onusti, aut sponte sua aut à causis evidentibus incitati, eam elidere, & excutere satagunt; proindeque explosiones spasmodicas ineunt.

Causæ evidentes, quæ in puerulis prædispositis motus convulsivos inferunt, sunt bini generis, sc.



primo quæcunque sanguinis effervescentias solito majores cient, uti sunt frigoris & caloris excessus, nutritio uberior, aut justo calidior; aeris, ac auræ mutationes, ac imprimis lunationum periodi, etenim propter has, aliasque similes occasiones sanguis plus debito effervescens copulam heterogeneam spiritibus usque ad plenitudinem citius affigit; utque ab ipsis perturbatis è vestigio elidatur & explodatur, efficit 2. Irritatio fere in qualibet systematis nervosi parte dispositionem spasmodicam non raro in actu deducit: quare non modo qualitatum tingibilium excessus exterius inficti, verum & ille in ventriculo coagulatum, bilis, aliique humores acres, aut etiam vermes intestina vellicantes, spasmos excitare solent: porro hujusmodi causæ evidentes, siquidem fortiores sint, aliquando per se, absque diathesi prævia affectus spasmodicos inducunt: quippe lumbrici, foræ & acres humores puerulis quibusvis, saltem tenerioribus motus convulsivos inferunt.

Quo certius atque ad sensum pateret cujusmodi in motibus convulsivis sit materies morbifica, plurimum quos hic morbus oppressit defunctorum cadavera aperui: causam intra coctionis viscera & primas vias semper frustra quæsi; multorum capitibus latex serofus intra cavitatem cerebello subjectam congestus, & membranam, qua medulla oblongata investitur, distendens, nervorum origines inundabat: in quibusdam nulla hujus morbi vestigia apparebant; adeo quod spiritibus accrescens eos ad explosiones irritat interdum imperceptibili proffus constat mole, & originem tam occultam habet, ut vel perspicacissimum visus scrutinium omnino lateat. Olim in hac urbe cujusdam mulieris nati plures ex hoc morbo interierunt; tandem foetus quarti intra mensem, uti priores, interempti, caput dissecimus; nulla hic serosa colluvies ventriculos inundabat, sed cerebri tantum; ejuque appendicis substantia erat justo humidior, & laxior; quod potissimum observatu dignum erat, in cavitate quæ cerebello subjicitur, supra medullæ oblongatæ caudicem, sanguinis



sanguinis grumosi, & velut concreti copiam insignem reperiēbamus: at vero incertum est utrum materies isthæc ibidem ab initio deposita spasmos primario intulerat; an potius sanguis iste à partium circumcirca confitarum contractione expressus, & extravasatus, convulsionum effectus, & productum, ac minime istarum causa fuerit; Nam & in Apoplecticis ejusmodi Phænomenon passim occurrit, quod tamen morbi effectum potius quam causam esse post hæc ostendemus.

Profecto quod particulæ heterogeneæ, quæ sanguini ab utero innatæ, in plerisque pueris per *ἐξ ὕδατος* in toto corpore cutaneam amandari solent; in aliis capiti suffusæ affectionis spasmodicæ causa materialis existunt, præter rationes superius citatas, etiam à remediis maxime juvantibus inferre licet: quippe in puerulis hæreditario huic morbo obnoxiiis, insultus convulsivi optime præcaventur, si mox à partu fontanella in nucha excitetur, & sanguis hirudinum sucu è venis jugularibus detrahatur; illa nam que succi nervosi corruptelæ subducuntur, atque hoc cruoris efflorescentiæ impuræ à capite avocantur: hisce administrationum modis, cum prius duo aut tres ejusdem parentis nati brevi post partum convulsi interiissent, foetus omnes alii ab eodem malo liberabantur,

2. Hæc de puerorum motibus Convulsivis, qui mox à partu, propter labem ab utero contractam, eos infestare solent. Quod si hac vice aut ipsum morbum aut saltem mortiferas ejus plagas evaserint; nihilominus circa dentitionis tempora eidem periculo denuo obnoxii reperiuntur: quando enim dentes, præsertim majores, è gingivis erupturi sunt, sæpe febris excitatur, cui non raro motus convulsivi adjunguntur: & licet hoc tempore infantes viribus plus valent, eoque morbi insultus melius quam recens nati tolerant; attamen affectiones spasmodicæ etiam nunc nec graviore aliqua occasione excitatæ valde periculosæ, ac interdum lethales existunt,



Quandoquidem autem pueri, qui circa dentitionem febricitant, non omnes motibus convulsivis tentantur; ideo sequitur, hujus morbi dispositionem quandam, sive innatam, sive acquisitam præcedere, atque dolorem à dentitione illatum, tantum causæ evidentis fortioris rationem habere, sc. pueri, quibus aut cacochymicis, aut Cerebri & nervosi generis constitutione debiliori præditis, spiritus animales vel adulterati, vel dissipabiles nimis existunt, in affectiones spasmodicas quandoque ineundas disponuntur: quare cum dolor admodum acutus una cum febre urget, dispositio ista latens in actum ducitur.

Si hic inquiratur, qua ratione febris, & dein qua motus convulsivi in prædispositis dentitioni superveniunt; dicendum erit, quod uterque affectus ad dolorem velut causam immediatam referri debent: In nobis ipsis experimur, quis sit cruciatus, qui irritationem circa dentium radices sequitur; revera tantus & tam atrox, ut excitari vix possit atrocior; quippe nervorum quinti paris una aut altera insignis propago ad cujusque dentis radicem pertingit, quæ cum à sanguinis, aliorumve humorum particulis acrioribus illic congestis vellatur, corrugatione sua acerrimum molestiæ sensum, sive dolorem infert: Istiusmodi autem hujus nervi vellicatio in pueris dentientibus ideo contingit; quia dentibus jam in majorem molem crescentibus, & adhuc intra gingivas vixdum cavatas inclulis, membranæ & fibræ quaquaversus distenduntur: hinc sanguis in circuitu præpeditus tumorem infert, adeoque nervos comprimit, quin & acriores feri particulas iis suffundit, quibus illi insigniter vellicati corrugationibus, & spasmiis dolorificis torquentur.

Cum itaque pueris dolores ita atroces à dentitione contingunt, nihil mirum est, si febres, ac etiam motus convulsivi interdum succedant: prior horum accidit, & quatenus sanguis circa partem dolentem ne solito atque æquabili cursu circuletur, impeditus, propterea in toto corpore inordinatus movetur, & in super quia spasmos alicubi  
in



in nervoso genere excitatis, nervi corrugati & contracti arterias comprimunt & convellunt, proindeque in sanguine fluctuationes irregulares & febriles concitant. Cæterum motus convulsivi dentitioni aliquando superveniunt, tum quia sanguis effervesceus particulas heterogeneas regimini animali suffundit, adeoque spiritus in explosiones ciet, tum præterea cum dolor iste acutus, & velut lancinatio dentes erupturos sequuta, sensum valde molestum ac irritativum à partibus affectis *αἰσθητικῇ* communicet, exinde statim per eosdem nervos, vel alios affines excandescen-  
tiae motus (qui ob dispositionem præviam non raro convulsivus evadit) retorquetur.

Præter has binas (quæ in pueris præcipuæ, & crebriores esse solent) motuum convulsivorum occasiones, sc. prima infantiae, & dentitionis tempora, Affectus iste etiam aliis temporibus, & propter alias causas sæpenumero excitatur: In quibus enim dispositionis spasmodicæ seminia jaciuntur, illa interdum aut statim à partu se explicant, ac in morbosos fructus maturantur; sed aliquandiu latitantia dentitionem modo præveniunt, modo eam è longinquo sequuntur, & propter causas evidentes alias, sc. vel internas vel externas, cujusmodi sunt nutrix invaletudinaria, aut prægnans, lac in ventriculo coagulatum, aut in putrilaginem acidam aut amaram degenerans, intemperies febrilis capitis, aliarumque partium ulcera, aut exanthemata subito evanescentia, aeris mutationes, solis, ac lunæ *εὐζυγία* aut aspectus oppositi & similia, tandem incerto eventu in actum erumpunt. Super his non opus est ut particulatim differamus.

Cum viri cujusdam in hac vicinia degentis, nati omnes intra trimestre spatium convulsi interierint; tandem ad præcavendum, in puerulo recens edito, ejusmodi fatalem eventum, remedia expetuntur: Post aliquot à partu dies accersitus, consulo ut imprimis fontanella in nucha excitetur, dein postridie ut, hirudine utriusque lateris venæ jugulari applicata, sanguis ad *z*ij. extrahatur;



insuper ut juxta singulas solis & lunæ *αυτοζυγία*, & aspectus oppositos, per tres dies mane, & vesperi pulveris sequentis circiter gr. v. exhiberentur è cochleari Julapii. ℞. Cranii humani præparat. rad. Pæoniæ maris an. ʒ j. margarit pulv. ʒ β. sacchari albißimi ʒ j. misce, f. pulvis subtilissimus. ℞. Aq. Cerasor. nigror. ʒ iij. antiepilepticæ Langii ʒ j. syr. de floribus Pæoniæ maris ʒ vj. misce; item præcepi ut nutrix iisdem temporibus medicis fumeret haustum feri lactis, cui sem. & rad. Pæoniæ maris & fol. Lili convallis incocta sunt. Infans per quatuor circiter menses bene valebat, tunc vero affectibus convulsivis tentari cœpit: quo tempore iisdem remediis in dosi majori tum infanti, tum nutrici adhibitis, vesicatoria etiam pone aures applicabantur, & hirudinum suctu sanguis ex utraque vena jugulari fuit detractus: Intra duos vel tres dies puer convaleuit: postea cum intra 4 vel 5 menses spasmi aliquoties redirent, eorundem usque remediorum usu sanabatur. Post sesquiannum affectiones convulsivæ penitus cessabant; attramen circa infimam spinæ dorsi partem tumor indolens succrevit, à quo vertebrarum distortio quædam, atque crurum imbecillitas, & demum paralysis inducebantur. Videtur in hoc casu, quod materiès spasmodica primo cerebrum, & nervorum principia impetere solita, ultimo spinalem medullam subiens, inque extremitatem ejus detrusa, nervorum appendicum capita omnino obstrueret, atque spiritibus transitum præcluserat: nimirum quia particulis explosivis aliæ narcoticæ & crassiores sese adjunxerant.

*Methodus Therapeutica contra affectiones Convulsivas in pueris.*

In pueris ac infantibus passionès spasmodicas aut imminentes præcavere, aut jamjam exorfas curare incumbit.

Nam



Nam si ejusdem parentis nati priores Convul- *Infantum*  
sionibus obnoxii fuerunt, malum illud cæteris *à spasms*  
post natis tempestivo remediorum usu præveni- *preserva-*  
ri debet: in hunc finem solenne est, foetui re- *tio.*  
cens edito, quamprimum spirare incipit, medi-  
camentum aliquod *αντισπασμωδες* ori ingerere:  
hinc nonnulli guttas quasdam mellis purissimi,  
alii cochleare vini canarini saccharo imbuti, quin  
& alii oleum amygdalar. dul. recens extractum  
exhibere solent; à quibusdem olei succini gutta  
i. aut aquæ epilepticæ semicochleare infunditur.

Præter hæc prima infantum libamina, quæ cer-  
tè nullius non momenti esse videntur, alia quæ-  
dam remedia, & administrationum modi in u-  
sum ascisci debent: sc. bis in die propinetur co-  
chlear i. liquoris huic affectui appropriati. e. g.  
*R. aq. Cerasor. nigror. Ruta an. ʒ j. β. Antiepi-*  
*leptica Langii ʒ j. syr. e Corallii ʒvj. Margarit.*  
*præparat. gr. xv. misce in phiala.* Die tertio aut  
quarto post partum excitetur fontanella in nucha,  
dein si vultus sit floridi, parum sanguinis ad ʒj. β.  
vel ij. è venis jugularibus hirudinum suctu extra-  
hatur, cavendo ne inter dormiendum sanguis  
copiose nimis effluat; tempora, & cervix blan-  
de fricentur tali linimento. *R. Olei Nucis Me-*  
*schat per expressionem ʒ ij. Capiivi ʒ iij. succini ʒ j.*  
*Periaptum ex radicibus, & semini us Pæonia ma-*  
*joris addito parum ungulæ aleis collo suspenda-*  
*tur.*

Porro medicamenta antispasmodica nutrici *Methodus*  
quotidie exhibeantur: sumat mane, & vesperi *medendi*  
haustum feri lactis cui rad. & sem. Pæoniæ maris *nutricibus*  
& sem. fœnicul. dul. incocta sunt. *R. Conserv. adhibenda.*  
*flor. Betonica, Pæonia maris, Anthos an. ʒij. pulv.*  
*rad. & flor. Pæonia maris an. ʒ ij. Coralli rubri*  
*præparat. succini albissimi an. ʒ j. rad. Angelica,*  
*Zedaria præparat. an. ʒ β. cum s. q. syrupi de Pæo-*  
*nia, f. Electuarium: capiat q. Nucis Moschata ma-*  
*ne & vesperi.*

*R. Pulveris rad. Pæonia maris ʒ ij. sem. ejus-*  
*dem ʒ j. f. pulvis, sacchari albissimi solut. in aq. flo-*  
*rum Tiliæ & ad tabulat. cocti ʒ iij. Olei succini*  
*C 5 ʒ j. f.*



℞ j. f. f. artem Tabula, singula pendant 3 β. Comedat i. hora quilibet sexta. Illa etiam exacta vietus ratione utatur.

*Infantum  
Spasmi  
lavoran-  
tium Cu-  
atio.*

Quod si infans quispiam Convulsionibus actu afficitur, quia fontanella minus, & tardius operatur, vesicatorium in nucha, aut pone utramque aurem applicari expedit, & nisi temperamentum frigidius obstat, sanguis hirudinum suctu venis jugularibus extrahatur: Linimenta circa tempora, nares, & cervicem, item plantis pedum emplastra admoveantur; enemata quæ alvum copiose subducunt quotidie injiciantur: porro sæpius in die, nempe sexta aut octava qualibet hora, remedia specifica intus sumantur.

*Linimenta.*

℞. Olei Capivi, Castorei an. 3. ij. Succini 3 β. f. linimentum.

℞. Emplastri Oxycroci p. ij. Galbani solut. p. j. Olei Succini ℞ j. f. Emplastrum pro plantis pedum. pulvis de gutteta juxta descripiem Riverii exhibeatur bis vel quater in die.

*Pulveres.*

℞. Cranii humani præpar. sem. Pæoniæ, ungula Aleis, Margaritar. præpar. an. 3 β. Ambra grisea gr. vi. f. pulvis. Dosis gr. vi. in cochleari liquoris infra scripti ter aut quater in die.

Vel ℞. Cranii humani præpar. Margarit. an. 3 β. salis Succini ℞ j. Sacchari perlæ 3 j. Dosis ℞ β.

Vel. ℞. Sp. C. Cervigut. iij. detur sexta vel octava qualibet hora in cochleari Julapii infra præscripti.

Pauperum natis exhibeatur pul. radice Valerianæ sylvestris ℞ β. ad ℞ j. detur bis in die in cochleari lactis, vel liquoris appropriati.

Ungeus valde commendat fel catelli lactantis, nempe ut totus succus cysti fellea exemptus puerulo cum pauxillo aquæ florum Tiliæ propinetur.

Nuper mihi retulit Medicus Eruditus se novisse plures hoc remedio curatos: Porro solent empirici pueris majoribus, post fel epotum, etiam catelli hepar assatum comedendum tradere.

*Liquores.*

Julapia, aquæ destillatæ, alique liquores appropriati juxta præscripta sequentia parari possunt.

℞ Aq.



R. Aq. Cerasor. nigror. ℥ iij. Antiepileptica  
Langii ℥ j. Sacchari perlati ℥ ij. misce.

R. Rad. Paonia maris recent. in taleolas scis.  
sarum ℥ vj. Vitrioli Hungarici ℥ viij. Crani humani  
℥ ij. aq. Antiepileptica Langii lb. β. Mifce & de-  
stillentur in retorta vitrea calore arena. Dosis co-  
chlear j. ad ij.

R. rad. Paonia maris recent. incif. ℥ iiij. contufis  
in mortario marmoreo affunde vini Hispanici lb j. f. ex-  
preffio fortis, adde manus Christi perlata ℥ β. ferve-  
tur in vitro occlufo. Dosis cochlear j. vel ij. bis in die,

Cum ob dentitionem difficilem motus convul-  
fivi eveniunt, fymptoma hoc quemadmodum fe-  
cundarium & minus periculofum exiftit, ita in  
Therapeia non femper primam aut præcipuam  
exigit medendi operam, fed nonnunquam de do-  
lore fedando, & intemperie febrili fummovenda  
potius folliciti fumus; quare & pariens, & nutrix  
victu tenui et refrigerante uti debent; dentibus  
erupturis gingivarum aut friftione, aut fectione  
exitus patefiat; quin & partibus iftis intumefactis  
& dolentibus anodyna applicentur: Enemata, &  
fanguinis detractio, non raro hic locum habent:  
fomnum conciliare, & fanguinis ferociam attem-  
perare decet: interim remedia Antifpafmodica  
ufurpentur, verum temperatiora, & quæ fangui-  
nem, & humores minus exagitant; veficatoria,  
quia ferum in caput nimis fuffundi aptum eva-  
cuant, sæpe juvamen conferunt.

Quando pueri nec ftatim à partu, neque ob  
dentes erupturos, fed propter alias occafiones, &  
accidentia motibus Convulfivis tentantur; talis  
affectionis caufa ut plurimum vel in capite, vel  
alicubi circa coctionis vifcera fubfiftit. Quando  
prioris fufpicio habetur, uti liquere folet à fignis,  
quæ colluviem ferosam intra *ἑνὶ φάλον* nimis  
congeftam arguunt, remedia fuperius citata in  
paulo majori dofi exhiberi debent, infuper in iftis  
qui catharfim bene ferunt, interdum vomitus, &  
levis purgatio inftituantur: vinum & oxymel fcil-  
liticum, item Mercurius dulcis, Rhabarbarum,  
& refina Jalap. egregii funt ufus.

Quoties

Spafmi ob  
dentitionem  
excitati.

Spafmi  
propter alias  
occafiones  
excitati.



Quoties affectionis spasmodicæ causa in visceribus subesse videtur, aut lumbrici, aut acres humores ventris tormina cientes in vitio deprehenduntur,

*Propter  
Lumbricos.*

Contra Lumbricos purgatio ex Rhabarbaro, aut Mercurio dulci, addita resina Jalappæ instituitur. Olim puero convulsionibus miserrime affecto, ut jamjam moribundus videretur, dosim Mercurii dulcis cum resina Jalappæ exhibui, cum alvi dejectionibus, quas 4. habuit, lumbricos 12 excrevit, & derepente convaleuit.

*R. Rad. Serpentariæ virginianæ pul. 3 j. corallii ad albedinem calcinati 3 β. f. pulvis, dosis 3 β. ad 3 j. bis in die per tres dies continuos, superbibendo decoctum rad. graminis. R. Specier. Hiera 3 j. β. Theriaca Venet. 3 ij. f. emplastrum pro abdomine, vel Emplastum ex Galbano applicetur umbilico.*

*Propter  
acres humores.*

Si motus convulsivos à ventriculi, & intestinorum irritatione, per acres humores facta procedere suspicantur, lenis catharsis, aut vomitu aut secessu, aut successive utroque institui debet. In hunc finem blanda emetica ex vino scillitico, aut sale vitrioli propinentur: si quando sc. laborantes vomendi nixu sponte tentantur: si evacuatio potius ~~ad~~ tentanda videbitur, Rhabarbari infusio, aut pulvis, syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro, aut rosarum cum agarico propinari debeat: & non raro hisce remediis tempestive adhibitis, affectionem convulsivam in pueris sanata vidi: porro in hoc casu enemata sint crebri usus: Cæterum non omittantur medicamenta externa, sc. fottus, linimenta, aut emplastra abdomini applicanda.

*R. Folior. Camomillæ minutim incif. M. ij. includantur duobus sacculis è lino tenui aut serico confectis, qui lacti calido intincti & expressi abdomini successive applicentur.*

*R. Summitates, aut flor. malvæ pariter incif. inquantur butyro recenti, vel sevo porcino, & in forma linimenti, aut cataplasmatidis ventri applicentur.*

CAPUT.



## CAPUT V.

*De morbis Convulsivis adultiorum, propter  
originem nervosam præcipue  
affectum, oriundis.*

**L**icet affectiones Convulsivæ quæ adultioribus accidunt, alijs nominibus insignitæ, etiam alijs cujusdam profapiæ vulgo reputentur, atque ad passiones dictas hystericas, hypochondriacas, aut colicas, vel ad scorbutum referri solent; attamen si res paulo attentius consideretur, facile patebit symptomata quædam spasmodica tum viris, tum fæminis crebro evenire; quæ Convulsiones nomen sibi propriè ac jure vendicant: Hæc autem (ut supra innuimus) pro multiplici causæ morbificæ sede vario modo distingui possunt, potissimum vero in has tres species, sc. in spasmos quosdam ob nervorum originem præcipue affectam excitatos, inque alios qui propter nervorum extremitates materia morbifica obsessas, cientur: ac demum in alios quorum materies morbifica à capite descendens, nervorum quorundam, vel simul omnium ductus aut totos, aut quoad maximam partem, occupat. De singulis hisce Convulsionum speciebus ordine dicemus.

*Spasmodorum  
adultiori-  
bus acciden-  
tium tres  
species.*

Itaque imprimis ut convulsiones à nervorum origine affecta oriundas explicare pergamus, hic imprimis notandum sit materiam morbificam nervorum principia obsidentem, quandoque in priora nervorum paria, quæ sc. oculorum & faciei musculis prospiciunt, potissimum influere; proindeque modo nasi, genarum, aut labiorum contractiones, & tremores, modo oculorum, aut oris distortionem sequuntur. Secundo aliquando par vagum, & intercostale particulas heterogeneas maxime imbibunt; & tunc abdominis, & hypochondriorum inflationes, contractionesve, quin & cordis palpitatio, tremor, respiratio difficilis ac interrupta, pulsus intermittens, aliaque mediis, aut

*Ab origine  
nervosa af-  
fecta oriun-  
di distin-  
guuntur.*

*I.  
Juxta va-  
rios nervos  
affectos.*

aut



aut infimi ventris symptomata plurimum infestant. Tertio, nonnunquam vero causa morbifica posterius consita, spinalem medullam præcipue afficit, & propterea membra exteriora & artus subsultibus & contracturis inordinatis obnoxia redduntur: porro in pluribus hujusmodi casibus, quia spiritus animales circa nervorum origines explosi, versus ἐκείθεν inordinate resiliunt; idcirco quibusvis fere spasms hoc ritu excitatis, vertigo, item sæpe Scotomia, aurium tinnitus, & nonnunquam ἀναισθησία adjunguntur, aut succedunt,

2. Cæterum prout ex variis affectionis convulsivæ typis conjicere licebit, videtur quod materies spasmodica, hos aut illos nervos, aut simul eorum plures adpellens, vel circa ipsorum principia fere tantum hospitetur, ita ut spiritibus ibidem crebro explosis, vertigo frequens, & valde molesta oriatur; insuper circa præcordia tremores, ac breve deliquium, & leipothymiae metus, non raro in visceribus aut musculis subsultus, & contracturæ leves sentiantur. Vel secundo particulæ explosivæ ad nervorum origines delatæ, eorum processus altius subeunt, & non raro in plexus nerveos, ad præcordia aut viscera imi ventris, aut etiam membra exteriora pertinentes delapsæ, illic affectionum spasmodicarum alios quasi nidos consciscunt; ut quoties spiritus circa originem nervosam in explosiones adiguntur, statim in abdomine, thorace, aut artubus paroxysmi velut hysterici, asthmatici, aut alias convulsivi oriantur: Horum exempla, & quibus fiunt modis, infra clarius subduntur: Interim materies spasmodica nervorum ductus influens cum usque ad processus, & plexus eorum remotos transfertur, quandoque tamen præcipuam mineram adhuc circa originem nervosam habet; adeo ut post graves viscerum aut membrorum spasmos, magna cerebri perturbatio cum vertigine, aurium tinnitu, & non raro ἀναισθησία subsequatur: interdum vero materia morbifica, quoad maximam partem, ad longinquos nervorum fines translata, deinceps circa eorundem



rundem principia immuni<sup>us</sup> agitur: Etenim plures observavi, qui dum principio vertigine, crebro leipothymias metu, cephalalgia, & occipitis gravitate infestarentur, circa præcordia, aut viscera leviores tantum inflationes, aut tremores pertulisse; postea tamen circa has partes spasmos immaniores perpeffos, de prioribus capitis affectibus minime conquestos fuisse.

Quod si de materia spasmodica amplius inquiratur, undenam illa suggeritur, & quibus viis versus nervorum origines defertur, & cujusmodi ibidem situs, & quasi focos obtinet; dicendum videtur, quod licet hujus ductus manifestos, & vestigia deregere nequimus; quantum tamen ex observationibus quibusdam, & rerum analogia colligere datur, supponere licebit, binos hosce distinctos transitus modos, quibus particulæ spasmodicæ primum e sanguine in Cerebrum, & Cerebellum suffusæ, exinde versus nervorum principia convehuntur: sc. 1<sup>o</sup>. Interdum materies ista à cerebro, ac cerebello imbibita, ac utriusque poros sensim pertransiens, in medullæ oblongatæ caudicem delabitur, cujus item tractu quodam superato, una cum succo nervoso, versus nervorum origines prolabitur, ac prope illorum capita, vel intra ipsum caudicem medullarem, vel intra prominentias annulares aggeritur, in quibus locis aut diutius subsistens, crebras vertigines, ac in partibus remotis spasmos leviores, uti dictum est, ciet; vel exinde in nervorum ductus altius delapsa, convulsionum valde atrocium paroxysmos excitat: talem causæ morbificæ progressum suspicamur, in quibus vertigo, scotomia, capitis gravedo, ac mentis torpor insultus convulsivos præcedunt: cujusmodi quidem affectus prævios, materies *voσepn* adhuc in cerebro, & appendice medullari scatens producit; quæ deinceps in nervos allapfa convulsiones infert.

2<sup>o</sup>. Restat alter modus, quo liquide patet materialem affectus spasmodici causam in principia nervorum transferri; nempe cum eadem à colluvie serosa intra cavitates, sive ventriculos *τῶν κε*

*Materies  
spasmodica  
quo ritu  
nervos in-  
fluit.*



φζα deposita in vicinas nervorum radices insi-  
 nuatur: Enimvero in morbis chronicis, cum ad-  
 insignem sanguinis & humorum dyscrasiam ce-  
 rebri quoque prava dispositio accedit, sæpe ingens  
 feri acris, & nervoso generi infestis copia, è ple-  
 xuum choroeidearum vasis exudans, in cerebri e-  
 jusque appendicis ventriculos dilabatur: serofus  
 autem hic latex postea in quartum ventriculum  
 cerebello substratum irrumpens, luxata ibidem  
 pellicula, qua medulla oblongata obregitur, unius  
 aut plurium nervorum origines obsidet, eosque  
 vel irritando, vel particulis heterogeneis & ex-  
 plosivis imbuendo diathesin spasmodicam indu-  
 cit. Atque hæc fere causa est, quod post febres  
 diurnas, aut male judicatas, etiam post morbos  
 cephalicos graviores, ægrotantes demum convulsi  
 intereunt, prout ex crebra cadaverum, eo ritu  
 defunctorum, Anatome deprehendi. Quinetiam  
 ex observatione Anatomica constat, cerebrum  
 colluvie serosa quadam inundari, absque disposi-  
 tionis spasmodicæ affectu, porro et nonnullis ab  
 Epilepsia, aliisque morbis convulsivis defunctis,  
 nullum intra cerebri ventriculos feri diluvium ad-  
 fuisse: Ex quo datur intelligere, affectiones spas-  
 modicas haud tantum ab aquosa τὸ ἐν τῷ ἐν τῷ illuvie  
 profluere; cæterum nec omnino à tali causa oriri,  
 nisi latex serofus cerebri ventriculos, ac imprimis  
 istum cerebello substratum inundans, particulis he-  
 terogeneis & explosivis imbuatur. Memini olim  
 petiitum esse meum consilium pro adolescente e-  
 gregio phthisi laborante, & tunc temporis plane  
 desperato. Præter tussim & dyspnœam, ille per  
 pluras dies, immo hebdomadas graviter conque-  
 stus erat, non potuisse se in lecto supinum decum-  
 bere, aut dum in cathedra sederet, caput vel mi-  
 nimum reclinare: quippe ab hoc, illo ve corporis  
 situ illico cordis tremores, & spirituum deliquia,  
 quasi jamjam moribundus esset, pati solebat: qua-  
 propter necesse habuit, caput semper pronum sive  
 antrorsum inclinatum tenere. Post obitum cada-  
 vere dissecto, pulmones fere per totum schirrosi,  
 & in quibusdam locis ulcerosi apparebant: dein  
 cranio



cranio aperto ingens feri flavi, & falsi copia intra omnes cerebri ventriculos fluctuabat: qui certe latex, dum capite reclinato in quartum ventriculum supra medullæ oblongatæ caudicem prolaberetur, in nervorum paris vagi & intercostalis capita irruens, circa præcordia convulsiones prædictas ciebat: quamdiu autem, capite antrorsum inclinato, ista feri colluvies in anteriores cerebri ventriculos refluebat, nervorum origines ab ista materia spasmodica immunes perstiterere.

Ostenso hæcenus quot modis & quibus viis materies morbifica, versus nervorum origines delata, spasmos inferre videtur, facile esset juxta has rationes multa symptomata convulsiva explicare: Nam præter infantum, & puerorum motus convulsivos, ab ejusmodi causis sæpissime excitatos, etiam huc referri debent partium nervosarum contractiones, & subsultus quæ febribus superveniunt. Quin etiam passiones vulgo dictæ hystericae, item hypochondriacæ, & quædam aliæ, non raro à causa morbifica nervorum principia impetente procedunt. Hujusce igitur hypotheseos veritatem quibusdam aliis ægrotantium historiis, & exemplis asseruere nitemur, imprimis vero ejusmodi observationes proponemus, in quibus materies morbifica nervorum principia obsidens, necdum in illorum processu altius delapsa, crebras vertigines & leviores tantum viscerum & præcordiorum spasmos inducit.

Fœmina perillustis 30 circiter annos nata, constitutione tenera, & gracili corporis habitu prædita, quavis hyeme catarrho in tracheam & pulmones exudante, cum tussi, raucedine, & sputatione copiosa graviter affligi solebat, novissimo tamen anno, curâ, & cautione diligenti usa istud malum evitavit: at vero post solstitium Brumale à frigore suscepto, immani capitis dolore, aurium tinnitu, vertigine, cum ingenti coryza afficiebatur, ut facile constaret feri colluviem, antehac in pettus exudare solitam, tunc temporis intra caput & cerebrum omnino deponi: cujus insuper effectus erat, quod passionibus, quasi hystericis, quibus

I.  
*Observatio,*



bus nunquam prius obnoxia fuerat, quoties dormire inciperet valde infestaretur: Si quando enim somnum initura oculos clauderet, illico in abdomine molis ascensus, in gutture præfocatio, circa præcordia tremores & subsultus excitabantur; quæ tamen affectiones, cum perfecte evigilaret, protinus cessabant, ita ut ægrotans necesse habuerit per plures dies & noctes somno fere in totum abstinere.

Ad hanc Dominam, postquam plures dies ægrotans valde imbecillis evaserat, accersitus, medicamentis tandem blandis uti cogebar: Itaque sanguinem ex pede ad ℥ iiij. protinus detrahendum, & quolibet die clysterem è lacte saccharato injiciendum curavi, à quo ter, aut quater alvum dejicere solebat: porro octava qualibet hora dosin sp. C. Cervi in cochleari sequentis Julapii exhibui. R. Aq. Pulgii, Juglandum, Cerasorum nigror. an. ℥ iiij. aq. hysterica ℥ ij. syr. Caryophyllor. ℥ j. Castorei nodulo ligat. & in vitro suspensum ℥ β. Margarita pulv. ℥ j. misce. Vescicatoria pone aures, & Cataplasmata ex foliis Ruta & Aronis cum rad. Bryonia, sale marino, & sapone nigro plantis pedum cum fructu admove. Interdum vesperi in huiusmodi Julapii præscripti, Diacodii ℥ β. exhibui, cui somnus moderatus, absque solita spasmodorum consequentia, succedebat: cujusmodi effectum ab opiatibus in tali casu exhibitis sæpius expertus sum: pro fiti restinguenda pristinam cum ingredientibus diureticis incoctis propinavi: horum usu intra breve tempus plurimum alleviata fuit. Attamen quod maximo emolumento cessit, abscessus in aure sinistra sponte disruptus primosaniem flavam, ac postea per multos dies ichoris tenuis copiam ingentem profudit, à qua evacuatione, viscerum, & præcordiorum spasmodis in totum cessantibus, morbus perfecte judicatus fuit.

Quod spectat ad prædictæ ægritudinis ætiologiam, extra dubium videtur, affectus istos à colluvie serosa περι τὸν ἐνέφθαλον deposita excitatos fuisse: nam & istius humoris in caput translatio morbum primo intulit, ejusque per aures emunctorium



Ætorium *explicite* symptomata quævis sustulit: perro cum materies morbifica spiritibus circa nervorum principia confitis diathesin aliquatenus explosivam intulisset, isti, licet tanquam æstro perciti, fere continuo agitentur; quamdiu tamen versus cerebrum resilientes, spatium, in quo possent liberius expandi, obtinerent, phantasiâ quidem illi solum vehementius exercebant, & absque ulteriori incommodo vigilias tantum inducere. At vero cum somno interdum obrepente spirituum irrequietorum excursus versus Cerebrum cohiberetur (quod quidem necessario evenit quando obdormiscimus, liquore nervoso intra Cerebri poros tunc temporis uberius admissio) nervorum paris vagi & intercostalii capita iidem tumultuarie irruentes, spirituum intra nervorum istorum ductus scatentium totas series perturbaverunt, adeoque prædictos, circa præcordia, viscera, & gulæ musculos, spasmos intulere. Plures hoc ritu tum viros, tum fœminas ægotantes novi, qui cum cephalalgia, occipitis gravitate, aut vertigine laborarent, inter edormiscendum, illico in præcordiis, aut visceribus, aut simul in utrisque perturbationes quasi spasmodicas sentire, quod quidem contingit à spirituum tumultantium *δυνάμει* à cerebro in nervorum origines reflexa: Quod autem huic ægotæ opiatarum usus somnum placidum absque solita spasmodorum consequentia, accersivit, ratio erat, quia spiritus animales, utut irrequieti & furentes, particularum tamen narcoticarum implexu, velut catenis injectis ligabantur, ut dein sine resistantia quavis, somno obruerentur. Enimvero graves convulsionum paroxysmos tum Asthmaticos, tum quasi hystericos, opiatis exhibitis non raro fœliciter curavi.

Mulier honesta M. G. 67<sup>o</sup>. anno ætatis, vultu adhuc florido, & habitu corporis obeso, cum prius faciei intumescentiæ, & gravioribus cephalalgia paroxysmis dudum obnoxia degisset, intenso Brumæ frigore, in vertiginem valde molestatam, cum tremore cordis, spirituum deliquio, & crebro vomendi nixu incidit: lecto imposita si oculos aperiret,

2.

Observatio.



aperiret, aut è latere in latus converteretur, statim insigni scotomia, leipothymias metu, & insuper vomitu inani afficiebatur. Hanc invifens minime dubitabam, quin ægritudinis causa foret materies spasmodica ab exteriori capitis regione, ad intimos τῆς ἐγκέφαλος recessus translata; cujus afflatu, sive copula heterogenea spiritus animales tacti, dum inordinate versus cerebrum exilirent, affectus vertiginosos, dumque isti in nervorum capita tumultuarie irruerent, scotomiam, præcordiorum ἀταξία, & vomendi nixum excitabant. Hujus curationem vesicatoria larga nuchæ, & pone aures applicata, enemata quotidie injecta, item frequens sp. C. Cervi, & Julapii cephalici usus intra paucos dies perfecerunt.

3.  
*Observatio.*

Vir egregius 34 circiter annos natus, cum ex longo tempore tussi, cum sputo copioso, & crasso obnoxius egerat, insuper cutis poros valde apertos habens, continuo madere, & qualibet fere nocte sudore multo perfundi solebat: sub initium veris evacuationes istas solennes parcius evenire persensit; interim conquestus est, de manuum & pedum plenitudine, ac velut intumescencia quadam, ita ut hydropem ingruentem videretur; cæterum & in capite scotomia, & vertigine crebra afficiebatur: Brevi postea hoc malo ingravescente, circa labia, aliasque oris ac faciei partes, leves contracturæ, & subiti spasmi passim excitabantur; subinde etiam (materia morbifica, uti videtur, nervorum paris vagi & intercostalis origines influente) cordis tremorem & subsultus, cum crebris spirituum vitalium deliquiis, quasi leipothymia jamjam imminente, perpeffus est.

Scio plurimos pathemata hæc convulsiva, præcordia ita graviter infestantia, vaporibus à liene elevatis ascribere: attamen ratio longe potior videtur, eadem à materia spasmodica intra cerebrum aggesta, & in nervorum principia irruente deducere; quia sc. excrementi cujusdam à partibus aliis in caput metastasis præcessit, ipsumque adeo περί τὸν ἐγκέφαλον deponi, affectus vertiginosus



nosus fere continuus, istique partium oris ac faciei spasmi plane testantur: quare huic remedia, juxta methodum inferius traditam præscribere visum est.

Possem hic plurimas hujusmodi observationes proponere, in quibus materies morbifica prope nervorum origines subsistens, cum vertigine, leviores tantum viscerum, aut membrorum spasmos ciet. Cæterum quia istius materiæ portio quædam, à capite descendens nervorum ductus sæpe altius subit, adeoque circa medios, ultimosque eorum processus, & plexus, seminii explosivi, quasi pulveris pyrii fomitem struit; Ex re fore videtur, hujusmodi casuum exempla quædam subjicere.

Puella quædam E. L. procera, & venusta, parentibus sanis orta, ipsaque constitutionis (prout videbatur) originaliter sanæ; postquam hero longa invaletudine detento, diu & fere continuo ministrasset, atque hinc sæpius totas noctes evigilare, aliisque temporibus crebro expergisci cogebatur, ut nunquam somnus, nisi brevis & interruptus, capessèretur, tandem de capitis hebetudine cum crebra vertigine queri cœpit: intra brevem exinde temporis tractum affectu indies ingravescente, tremores sensit in toto corpore, cum levī membrorum succussu, quibusdam vicibus, licet vagis & incertis, ingruentes: postea dein paroxysmos plane convulsivos, eosque horrendos & crebro infestantes perpeffa erat: paulo ante morbi insultum Scotomia brevi afficiebatur, mox pectoris angustiam & oppressionem magnam, qua præcordia simul omnia strictim contrahebantur, persensit: tum illico strigorem ingentem, cum forti ejulatu edens, in terram confidere solebat; interim animo constabat, at maxima cordis oppressionē laborans, donec ista pectoris constrictio relaxaretur, se nullo modo relevare potuit: postea cum paroxysmus pertransierat, insigni cordis palpitatione, sensuum torpore, & functiones animalis debilitate magna adhuc aliquandiu afficiebatur. Postquam hæc ægotans per quatuordecim circiter menses ejusmodi paroxysmis crebra vice

repe-

4:  
Observatio.



repetentibus obnoxia degisset, demum epileptica evasit, ut quoties mali insultus rediret, in terram prostrata, *ἀναισθησία* cum spuma oris, aliisque pathognomicis caduci symptomatis corripereetur. Neque hic affectus iste gradum sistebat, quin, vix elapso anni spatio, in maniam degenerabat, ut denique ægrotans, amisso rationis usu, modo cum furore insaniret, modo cum stupore plane desiperet.

*Predicti  
Casus Æ-  
tiologia.*

Ex morbi hujus initio, progressu, & crebra metamorphosi liquido pateream primo in capite prope nervorum origines & causam, & sedem habuisse, & exinde fines suos & in cerebrum & in systema nervosum quotidie latius explicuisse: nam ab initio materies morbifica juxta nervorum principia consistens, viscerum, & membrorum leviores tantum spasmos, & succussiones cum Vertigine intulit; postea ejus portio in nervos pneumonicos, eorumque plexus delapsa, gravissimas præcordiorum, diaphragmatis & ventriculi convulsiones produxit, quin & ejusdem materię portio altera cerebrum ejusque medullia invadens, *ἀναισθησία*, ac dein caduci paroxysmos inferebat; atque demum spirituum textura in totum vitiata, eorumque latice in liquorem acerrimum, ac velut stygium degeneri, affectiones spasmodicę in maniam transibant.

Quod itaque spectat ad particulares tum morbi, tum symptomatum rationes, videtur quod prædicta virgo ex vita sedentaria (omni corporis exercitatione & aurę liberioris usu penitus ademptis) præsertim vero ex vigiliis nocturnis, & somno frequenter interrupto, vitiosam sanguinis & humorum diathesin, simulque pravam & debilem cerebri, & nervosi generis constitutionem contraxerat: quibus accessit, quod illa hero suo gravissimis convulsionum affectibus laboranti perpetuo ministraret, atque ex eo forte contagium aliquod, sive miasmata spasmodica susceperat: Et primo quidem particulę heterogeneę una cum succo nervoso in cerebrum & cerebellum suffusę, ibi semque spiritibus accrescentes, præliminari

Scotomia,



Scotomia, & vertiginoso affectu quasi velitabantur; dein materies spasmodica nervorum paris vagi & intercostalis, atque medullæ spinalis principia obsidentis una cum vertigine viscerum & musculorum subsultus, & succussiones leviores intulit: postea cum eadem nervorum ductus altius subiens, in plexus cervicales, cardiacos, & forsan intercostales, aliosque deferretur, atque spiritus respirationis, & pulsus munia exequentes, copula explosiva imbueret; illi crebra vice ob plenitudinem, vel propter irritationem, una cum superioribus nervosæ originis incolis, in explosiones adacti, partium respectivarum spasmos horrendos excitabant: Enimvero urgente paroxysmo, à nervis pneumonicis constrictis derepente thoracis systole inordinata ciebatnr; deinde statim diaphragmate subito & vehementer retracto, ejulatus iste obstreperus succedebat: porro cum ob istam thoracis systolen diutius continuatam, sanguis ne moveri possit impeditus, omnino in præcordiis stagnaret, idcirco durante paroxysmo, cordis oppressio magna, cum ἀσπνία & δύσπνοια laborantem urgebat: interim vero, cum adhuc cerebri regio à spirituum explosionibus libera ac immunis perstaret, ægrotans animo constabat: postea vero cum materies spasmodica indies adaucta, etiam in cerebri debilitati & præfracti meditullia explicaretur, prioribus circa præcordia pathematis, ἀνισθνοσία, dein Epilepsia, ac ultimo mania, propter rationes modo citatas, supervenerunt. Huic ægrotanti medicamenta plurima, & varii generis, à multis tum medicis, tum empiricis, confuse tamen, methodoque incerta, & subinde mutata, prescripta ne hilum profuere

Mulier quædam venusta εὐχνο & εὐσπνο à diutino mœrore in diathesin invaletudinariam incidit; circa meridiem, & horas vespertinas plerunque mediocriter habuit, mane autem cum somno satis, & sæpe plus nimio indulserat, usque magis somnolenta, & torpida evasit: expergefacta, statim queri solebat de gravitate, ac velut stupore

5.  
Observatio.



stupore in toto capite, cum vertigine ad quemvis motum, aut capitis circumactionem; paulo post ea paroxysmum convulsivum, aut ἀναισθησίαν fere constanter expectabat, eamque modo hæc, modo iste infestare solebat: quippe post vertiginem, quasi velitationem præviam, plerumque in ventriculo, & latere sinistro dolorem gravativum huc illuc transcurrentem sensit; hinc rugitus, vomendi nixus, flatuum eruptiones, nec non abdominis, & hypochondriorum distentiones miræ insequiebantur, & plurimis interdum horis hanc misere exercebant: interdum vero hæc symptomata abesse contigit, & tunc in cerebro affectio immanior successit: namque in crebras ἀναισθησίαν incidens, aliquandiu immota, & clausis oculis, sine sensu, aut intellectu perstare solebat; cumque famulæ ejus frictionibus, & nicotianæ fumigatione ipsam excitarent, mox animo constabat, at denuo statim revolvitur in similem ἀναισθησίαν, atque ita quatuor, aut quinque vices ejus subit, priusquam ad se perfecte, & sine residua mox expectanda rediit: Tandem peracta tragœdia, etiamnum capitis gravitate & torpore aliquantulum afficiebatur: circa meridiem vero, nebulis omnino discussis, sudum & serenum πάντα τὰ ἐξῆς obtinere solebant; donec proximo mane, rursus eadem symptomata reverterentur.

#### *Ætiologia*

Qui symptomata hæc rite perpendit, non habebit necesse vapores ab utero, aut liene elevatos supponere, atque in istis causam morificam frustra querere: nempe quam multo certius poterit in ipso capite collocare: Videtur enim quod huic ab initio, propter ingentem mœrorem (prout in foeminis crebro affolet) cerebro & nervoso generi magna debilitas, simulque vitiosa labes imprimeretur; ita quidem ut spiritus animales in Cerebrum & Cerebellum derivati, secum particulas heterogeneas mixti generis, sc. partim narcoticas & partim explosivas afferrent: cujusmodi copulam cum illi à somnis uberiores conciperent, mera plenitudine ad ipsam excutiendam ciebantur: quamprimum igitur expergefieret mulier, iidem



iisdem spiritus commoti, vel ῥωμή inferius facta, in nervorum origines deprimebantur, ibidemque explosi viscerum spasmos excitabant, aut versus cerebri meditullium resiliētes, ibidemque elisi, crebras & terribiles ἀναισθησίαι intulere. Revera hæc affectio Epilepsiæ aliquantulum affinis erat, nisi quod materies morbifica nondum intra regale cerebri palatium, sive meditullium ejus ita commorabatur, ut spiritus illic intra primos ipsorum fontes inficeret; iisdem tamen inferius dissociatis, & juxta nervorum origines sese in varios, minoresque rivulos dividētib; eadem copula heterogenea arctius adhærebat. Interea spiritus, quo istam materiam excutērent, crebrius explosi, cum versus cerebri arcem tumultuose raperentur, stuporem & ἀναισθησίαν, sin alio vergentes in nervorum principia irruerent, propterea istos viscerum spasmos intulere; Quod autem paroxysmū tantum horis matutinis post somnum pleniorē ingruēbant, ratio erat, quia spirituum copula heterogenea iis cum succo nervoso adveniēns, eo tempore ad plenitudinem explosionibus aptam congerebatur; quæ siquidem tunc integre discuteretur, reliquo die ægrotans ab affectu immunis perstitit, donec postridie, cum somnus nocturnus novum materiæ morbificæ supplementum capiti intulerat, mane similis paroxysmus redibat; qui forsā, prout somnus brevior aut protractior fuerat, modo intra cerebrum, modo juxta originem nervosam peragebatur.

Nec tantum in sexu fœmineo, utpote debiliore & magis patibili, spasmi ab origine nervosa principaliter affecta oriuntur; verum ejusmodi affectiones aliquando in viris à simili procatarxi excitatas observare licet. Ante aliquot annos festinanter accersitus ad hospitem quendam in hac urbe diversantem, ipsum primo intuitu reverz dæmoniacum suspicabar, eique exorcismis, potius quam pharmacis opus fuisse rebar. Erat is quadragenarius, qui jam per tres annos statis quibusdam temporibus moribus convulsivis tentari solitus est, hujusce ægritudinis, dum hic paucos dies fortuito

D

hospi-

*Observatio  
affectionis  
quasi hyste-  
rica in viro*



hospitaretur, occasione ingentis mœstitiæ, insul-  
tum solito majorem perpeffus erat: morbi acces-  
sionem per duos aut tres dies præsentiscere sole-  
bat; nempe ex magna intra sinciput commotione,  
continua fere vertigine, & crebra oculorum obsu-  
scatione: ingruente autem paroxysmo, primo o-  
culi varie contorquebantur, invertebanturque,  
dein moles quædam instar vivi animalis, ab imo  
ventre sursum versus Cor & Thoracem, & exin-  
de in caput obrepere videbatur: hujusmodi mo-  
tum egomet manu ventrem ejus comprimens, pla-  
ne perensi; & quamdiu, palmis totis viribus ob-  
tentis, istius globi ascensum inhiberem, se medio-  
criter habuit; quamprimum vero intumescencia  
istæc sensim superius obrepens ad caput pertige-  
rit, illico membra totius corporis immaniter  
convellebantur, ut tanquam spiritu malo obsessus  
se ad parietes, & postes illideret: à quatuor ro-  
bustis viris, vix summa vi detineri, & coerceri  
potuit, quin exiliret, & brachia, & pedes, & ca-  
put motibus diversimodis huc illuc jactaret:  
quando ab exilitione cessaret, membra fuerunt  
robustissime extenta, & muscoli rigidi, & velut  
retano affecti: Talis paroxysmus circiter horæ  
quadrantem durabat, dein ad se rediens sobrie  
loquutus est, in cubiculo obambulavit, qualia  
passus erat conscivit, & veniam ab astantibus pe-  
tiit; brevi postea oculos invertere, & ocissime  
volutare cœpit: dein statim affectus spasmodes re-  
petens, similem uti prius excitabat tragœdiam:  
atque isto ritu intra tres horas quinque aut sex  
paroxysmos ejusmodi convulsivos sustinuit. In  
medio quodam paroxysmo, vena in brachio per-  
tusa, factoque orificio satis largo, sanguis lente  
affluebat, & statim congelari visus est: ita qui-  
dem ut in pelvim exceptus, haud liquidorum  
more, in superficiem planam & æquabilem dif-  
flueret, at instar sevi liquefacti, & in vas frigidum  
instillari, gutta super guttam accumulata, in mo-  
lem accresceret.

*Casus præ-  
dicti E-  
tiologia.*

Si affectio hæc stupenda mulieri contigisset, ob-  
vium esset, eam hysterica dicere, ejusque cau-  
sam



sam in uteri vitium conjicere; eo magis, quia  
 tanquam molis cujusdam ab imo ventre ascensus  
 paroxysmum inchoavit: attamen cum vulgaris  
 ista solutio, quæ sæpissime merum ignorantia  
 subterfugium est, in hoc casu admitti nequit; ra-  
 tioni maxime congruum videtur, omnia istæc  
 symptomata in malas cerebri & nervosi generis af-  
 fectiones referre. Enimvero morbi causam in ipso  
 capite latere, ex symptomatis paroxysmum præ-  
 cedentibus, quæ spirituum intra *ἐγκέφαλον* sca-  
 tentium agitationem insignem denotabant, pla-  
 ne colligitur: ista cerebri inflatio, graves Scotomiæ,  
 quæque insultu jamjam ingruente, constanter eve-  
 nerunt, oculorum contorsiones, manifesto arguunt  
 particulas heterogeneas, & explosivas spiritibus  
 intra *ἐγκέφαλον* juxta nervorum principia degen-  
 tibus accrevisse. Adeo ut hic casus etiam ad Epi-  
 lepsiæ naturam prope accederet, excepto tamen  
 quod intra cerebri meditullium spiritus nec copu-  
 lam heterogeneam admitterent, nec alibi explo-  
 si, illic tumultuarie percurrerent: durante enim  
 paroxysmo, ægotans usque animo constabat:  
 at vero materies morbifica, in capite uberius con-  
 gesta, cum illinc in nervorum tum interiorum,  
 tum exteriorum ductus altius prolaberetur, in  
 visceribus tum imi, tum medii ventris, etiam in  
 membris exterioribus, semini explosivi mineras  
 valde diffusas posuerat; adeo ut cum spiritus ani-  
 males juxta nervorum origines explodi inciperent,  
 illico statim alii plexus mesentericos, & deinceps  
 alii alios plexus nerveos à meta extrema, usque ad  
 caput interjectos, incolentes, ordine explosi, spa-  
 smos à parte in parrem usque continuabant, do-  
 nec ad *ἐγκέφαλον* perveniretur: exinde vero ex-  
 plosione patim ad spiritus spinalis medullæ, & ner-  
 vorum appendicum hospites, translata, musculo-  
 rum, & membrorum totius corporis convulsiones  
 validissimæ insequentæ sunt: Quod autem iste velut  
 molis ascensus, qui sæpenumero in imo ventre, circa  
 convulsionum initia percipitur, à spiritibus intra  
 plexus mesentericos in explosiones adactis proce-  
 dat, inferius, cum de passionibus hysteris dicemus,  
 fuse declarabitur.



*Quare spas-  
mi à nervo-  
rum extre-  
mitatibus in-  
cipiunt.*

Interea si inquiritur ob quam rationem paro-  
xysmo convulsivo *πρὸς τὸν ἐγκέφαλον* juxta ner-  
vorum origines incipiente, illico spiritus extime  
degentes (quotquot in illud symptoma prædispo-  
siti sunt) explosiones ineunt, adeoque affectio-  
nem spasmodicam illic plenius exorsam fursum  
transferant, (nam ita plerunque habet, siue mor-  
bi accessio in imo ventre, siue circa medium ab-  
domen hypochondria, aut precordia incipit: quip-  
pe spasmus ab istis locis sensim versus caput pro-  
repere solet.) Dico propter hujus solutionem hæc  
duo imprimis consideranda offerri, sc. primo ad-  
vertimus, quod, cum spirituum integra quædam  
series perturbatur, qui in extremo ambitu resi-  
dent, influxu originali primo destituuntur; quare  
isti ante alios tumultuari, & irregulariter habere  
incipiunt, hinc quando nervus cubiti aut femo-  
ris ab incubatu constringitur, ut solita spirituum  
influentia impediatur, stupor cum punctionis sen-  
su in manus, aut pedis digitis primo sentitur; un-  
de sensim superius versus loca affecta perrepat.  
Secundo subest altera, eaque potior istius affectus  
ratio, nempe quod spiritus in explosiones parati,  
cum intra ductus nervosos, unum aut plures, qua-  
si totidem distinctos tubulos continentur, spa-  
tium satis amplum requirunt, in quo plurimum,  
& quidem successive rarefieri & expandi queant,  
quod siquidem intra nervorum truncos à prin-  
cipio versus finem haud facile conceditur; idcir-  
co dum spiritus, circa originem nervosam primo  
elisi, versus *ἐγκέφαλον* resiliunt, proindeque ver-  
tiginem cient: spirituum explosio apertior circa  
nervorum processus inferiores, aut extremitates,  
ubi nervi caudex, aut in plexus ampliores dilata-  
tur, aut in plures fibras late dispersas terminatur,  
plerumque incipit; dein spiritibus istis explosis,  
statim aliis ordine succedentibus, quo pariter ex-  
plodi possint, locus conceditur: Hinc observare  
est, dum spiritus exteriores exploduntur, si liga-  
tura, aut compressione strictius facta, aliorum in  
idem spatium successio, aut versus exteriora pro-  
gressus intercipitur, spasmus ne fursum ascendat  
inhiberi



inhiberi solet : quare cum stupor ( prout historiae medicae testantur ) ab extremo manus aut pedis digito exorsus , cum formicationis sensu , aut , instar auræ frigidæ ad superiora repit , ac demum cerebrum petens , convulsiones horrendas infert ; si mox ab initio insultus , brachium , aut crus fortiter ligetur , spasmus locum istum ligatum superare non valens , à capite conscendendo impeditur , quinimo usitatum est fœminis hysteris , quamprimum ventris intumefactio , sive molis in abdomine ascensus primo sentitur , medium corporis truncum fasciis circumpositis valde constringere , adeoque sæpius præcavetur , ne præcordia , & capitis regio eodem paroxysmo convulsivo afficiantur.

Quod autem sanguis medio paroxysmo educus cito congelabatur , ita quidem fieri in affectibus convulsivis , & apoplecticis passim assolet , prout doctissimus Heighmorus ex recensione Heidechii prius annotavit : attamen quod nonnulli hinc contendunt , convulsiones omnino à sanguinis crassitie , motu impedito , & stagnatione pendere , minime concedendum erit : quippe sanguis ab iis qui spasmis obnoxii sunt , paulo ante paroxysmum detractus , sero dilutus , atque satis fluidus existit. Quapropter opinari liceat congelationem istam ab ipso paroxysmo induci ; quia sc. in moribus convulsivis , ab immodicis musculorum & viscerum contractionibus , sanguis interfluus , spiritu & sero ejus exhalantibus , aliquantulum in mixtione solvitur , & propterea aliquatenus coagulatur ; non aliter quam cum lac propter nimiam agitationem , & partium ab invicem separationem , in butyrum concrevit , Quare hujusmodi sanguinis coagulatio videtur convulsionum potius esse effectus , quam causa.

*Quare sanguis in affectibus convulsivis cito congelatur.*



*Methodus therapeutica.*

Quod spectat ad curationem ejusmodi affectio-  
num spasmodicarum, quæ in foeminis, aut viris  
à causa morbifica nervorum origines obsidente  
procedunt. Prima indicatio erit morbi fomitem  
subtrahere, sc. impedire, quo minus sanguis par-  
ticulas heterogeneas, aut in se genitas, aut aliun-  
de à visceribus acceptas, capiti affigat. In hanc  
rem evacuatio & per catharsin, & per phleboto-  
miam, nisi aliquid contraindicat, instituta, com-  
mode adhiberi solet.

*Emetica.*

Vomitio sæpissime juvamen præstat, quare eme-  
tica ex infusione croci metallorum, vel ex sale vi-  
trioli, aut vino scillitico ab initio propinentur.  
Dein propediem sanguinis detractio, aut phlebo-  
tomia in brachio, aut hirudinum suctu è venis se-  
dalibus celebretur; dein postea lenis purgatio aut  
pilulis, aut apozemate solativo instituitur, &  
tempestive repetatur.

*Cathartica.*

℞. Pilul. e succino Cratonis, vel Tartaræarum  
Bonii ℥ ij. resin. Jalap. gr. xvj. Castorei ℥ j. Olei  
rorismarini vel succini ℥ β. Gummi Ammoniæ  
solut. in aq. hysterica q. s. f. pilula 16. sumantur qua-  
turbus die quolibet sexto aut septimo.

℞. Rad. Polypodii qu. Lopathi acut. præparat.  
Cherifolii an. ℥ vj Tæmia maris ℥ iiij. folior. Be-  
tonica, chamædrys, chamæpiyos, verbenæ, veronica,  
maris an. Mj. sem. carthami, bardanæ an. ℥ iiij.  
Coquantur in aq. fontan. lb iiij. ad m dietatem,  
adde vini albi lb j. coletur in matrarium, cui im-  
ponatur folior. sennæ opt. ℥ j. Rhabbarbari ℥ vj.  
Turtib. Gummosi ℥ β. Epithimi, santal. citrini  
an. ℥ ij, salis Absynthii, cochlearia an. ℥ j. Flave-  
dinis cortic. Aurantii ℥ ij. Digerantur clausæ, in  
calor. arenæ per horas 12. Colatura usui serveatur:  
edulcoretur (si opus sit) cum s. q. syrupi Augustæ-  
ni, vel e cichoreo cum Rhabbarbaro. Dosis ℥ vj. se-  
mel aut bis in hebdomada.

Singularis



Singulis diebus quibus à purgatione vacat, remedia cerebrum corroborantia, quin & spiritus animales, à copula heterogenea suscipienda, aut ab explosionibus ineundis vindicantia, exhibeantur. De quibus tamen juxta ægrotantis temperamentum, corporis habitum, & constitutionem delectus quidam instituatur; nam gracili corporis habitu, & sanguini fervidiori præditis medicamenta minus calida, quæque sanguinem haud supra modum exagitent, propinari debent: è contra phlegmaticis, obesius, quorum urina tenuis & aquosa est, atque sanguis hebetius circulator, visceraque infarciuntur, remedia calidiora, & humores intigniter fermentare apta designentur. In priori casu ad hunc modum præscribatur.

*Remedia in  
tempera-  
mento cali-  
diori.*

℞. Conserva flor. Betonica, Tamarisci, Paonia *Corroboran-*  
maris an. ʒ ij. Spec. diamargarit. frigid. ʒ j. β. *tia & Spe-*  
pulu, rad. paonia, & seminis ejusdem an. ʒ j. Co- *cifica.*  
ralli rubr. prepar. ʒ ij. Vitrisli Martis ʒ ij. salis  
Absynthii ʒ ij. cum s. q. succi Aurantior. f. Ele-  
ctuar. capiat bis vel ter in die, superbibendo haustu-  
lum Julapii infra præscripti.

℞. Corallii rubri cum succo Aurantiorum in mar- *Pulveris.*  
more, aut mortario vitreo triti, & exiccati ʒ. β.  
pulu. visci qu. rad. paonia maris an. ʒ ij. sacchari  
perlut. ʒ iiij. f. pulvis. Dosis ʒ j. ad ʒ β. bis vel ter  
in die.

℞. Specier. diamargarit. frigid. ʒ ij. salis Ab-  
synthii ʒ iiij. rad. aronis pulv. ʒ j. misce, f. pulvis,  
dividatur in viginti partes, sumatur dosis mane, &  
hora quarta.

℞. Pul. rad. Tetastidos ʒ j. dos. ʒ β. ad ʒ j.  
bis in die.

℞. Folior. bardana, ari an. M. vj. incisa, & si- *Aqua de-*  
mul mista destillentur. Dosis ʒ ij. ad iiij. bis vel ter *stilla e &*  
in die post dosin Electuarii, aut pulveris. *Julapia.*

℞. Hujus aquæ destillata ℥ ij. Chalybis nostri  
prepar. ʒ ij. misce in phiula, sumantur eodem modo.

℞. Aq. Jugland. simplicis. Cerasorum nigror.  
an. ℥ β. Limacum ʒ iiij. syr. flor. Paonia maris  
ʒ ij. Dosis ʒ. j. β. ad ij. eodem modo.

℞.



℞ Rasur. Eboris, C. Cervi an. ʒ iiij. rad. Chærefoli, bardana valeriana an. ʒ β. folior. betonica, chamæpitys, scolopendrii, summitat. Tamarisci an. M. j. corticum Tamarisci, folani lignosi an. ʒ β. coquantur in aq. fontana lb iiij. ad tertie partis consumptionem, adde vini albi ʒ viij. coletur in lagenam, cui imponatur folior. beccatunga, cardamines an. M. j. f. infusio tepida, & clausa per horas quatuor, colatura servetur in vitris ocellusis. Dosis ʒ vj. bis in die, post dosin medicamenti solidi. Interdum tali Apozemati insundantur chalybris nostri ʒ ij. & sumantur eodem modo.

Tempore æstivo aquar. acidularum usus convenit, in earum defectu nostræ artificiales substituantur.

Remedia in  
tempera-  
mento frigi-  
diori.

Electuari-  
um.

Quod si ob rationes supra citatas, medicamenta calidiora indicantur, juxta methodum sequentem procedere licebit.

℞ Conserva anthos, flavedinis Aurantii, Limonii an. ʒ ij. nucum Jugland. & myrobalanor. condit. an. n. ij. ligni Aloes, santali citrini, rad. serpentaria, contrayerva, angelica, ari an ʒ j. vitrioli Martis (vel chalytis præpar.) ʒ iiij. salis absinthii, cochlearia an. ʒ j. cum s. q. conditura nucum Juglandum. f. Electuriarum. sumatur bis in die quæ nucus mosch. superbibends dosin liquoris appropriati.

Tabula.

℞ Rad. Pænie maris, angelica, corallii rubr præpar. an. ʒ ij. sacchari solut. in aq. limacum & ad tabulatum cocti ʒ vj. Olei succini rectificatissimi ʒ β. s. q. f. Tabula, singula pendant circiter ʒ β. una, aut altera sumatur bis vel ter in die, superbibendo dosin liquoris appropriati.

Pilula.

℞ Rad. serpentaria Virginiana, contrayerva, Valeriana an. ʒ ij. corallii rubr. præpar. margarit. an. ʒ j. Cort. Winteran. rad. distamni Cretici an. ʒ j. vitrioli Martis, salis Absinthii an. ʒ j. β. Extract. Centaurii ʒ ij. Ammoniaci solut. in aq. hystericæ. q. s. f. massa pilularis. sumantur quatuor pilule mane & hora quarta p.m.

Spiritus.

℞ Sp. C Cervi, aut fuliginis, vel sanguinis humani, vel salis Ammoniaci q. s. sumantur gutt.



10. ad 12. mane, & vespere in cochleari Julapii superbibendo haustulum ejusdem.

℞ Folior. betonica, verbenæ, salvia, cardamina, ari, bardana an. M ij. Jugland. viridium Aqua de-  
nº 20. cortices 6. Aurantior. & quatuor Limonum, stillata.  
cardamom. cubebæ. an. ℥ j. concisis, & contusis  
affunde ser. lactis è pomaceo, aut vino albo facti  
℔ vj. destillentur s. a. dosis ℥ ij. vel iij. bis in die  
post dosin medicamenti solidi. Hujus ℔ ij. add  
Chalybis nostri ℥ ij.

℞ Aq. Lumbricor. limacum. an. ℥ vj. Jugland.  
simplicis ℥ iiij. Raphani composit. ℥ ij. sacchari al-  
bissimi ℥ ij. f. Julapium. Dosin cochlearia 4 vel 6  
bis in die post dosin medicamenti solidi.

℞ Millepedum mundator. ℔ j. caryophyllor.  
concis. ℥ β. superaffunde vini albi ℔ ij. destillen-  
tur in cucurbita vitrea, dosis ℥ j. ad ℥ j. β. bis in  
die.

Pauperioribus per remedia facilius parabilia  
ad hunc modum consulatur.

℞ Conserva folior. ruta cum aq. p. sacchari fa-  
cta ℥ vj. sumatur quantitas Nucis Moschat. bis in  
die superbibendo decoct. sem. & rad. bardana in sero  
lactis cum vino albo parat.

Vel paretur Conserva ex foliis Arboris vitæ cum  
æquali parte sacchari. dosis ℥ β. ad ℥ j. bis in die.

℞ Pulveris Millepedum præpar. ℥ iiij. sem. a-  
meos ℥ j. f. pulvis, dividatur in 10. partes. sumat-  
ur dosis bis in die, vel assellis 12. contusis cum vino  
albo affuso, exprimatur succus, f. haustus, sumatur  
bis in die.

Interea dum hæc remedia intus sumuntur, con-  
venit interdum vesicatoriis in nucha, & pone aures  
applicatis ulcuscula excitare; ita namque serosi,  
& acres humores à capite plurimum emulgentur;  
porro sternutatoria, & apophlegmatismi non raro  
juvamen insigne præstant. Sanguinis detractio è  
venis sedalibus, aut è pede aliquoties iterari debet,  
quin & urgente affectu, emplastra, vel cataplas-  
mata plantis pedum utiliter adhibentur. Juvat et-  
iam circa suras, & femora epispastica admovere.



## CAPUT VI.

*De motibus Convulsivis, quorum causa circa nervorum extremitates, aut intra plexus nerveos subsistit.*

**A**ffectiones spasmodicas interdum absque capitis vitio, à spirituum circa nervorum extremitates scatentium irritatione, explosioneque oriri vel hinc constat, quia cum pharmaca ventriculi, aut intestinorum tunicas acrius vellicant, aut lumbrici eas corrodunt, non tantum in istis partibus succedunt spasmi, sed insuper motus convulsivi nonnunquam in membra, & artus exteriores retorquentur: enimvero, prout alibi ostendimus, cum partem aliquam gravioris molestiæ sensus excruciat, & ab illa primo sensorio communicatur, exinde statim spiritibus ibidem irritatis, motus involuntarius & irregularis reflecti solet; idque non tantum per eosdem nervos, quibus doloris sensus afferebatur, sed interdum etiam per alios aut affines, aut prorsus extraneos spasmus recipiatur: Ita lapis ureteri infixus, fibrasque ejus nerveas plurimum irritans, motus convulsivos non tantum in vase affecto, sed in cunctis fere abdominis visceribus excitat; adeo ut urina suppressa, tormina huc illuc diffusa, & vomitiones horrendæ ut plurimum succedant. Quapropter minime ambigendum est, etiam morbos, & symptomata quædam spasmodica, propter noxam externam nervorum apicibus intra membranas, musculos, aut viscera terminatis illatam, sæpenumero induci; quinimo in passionibus hystericis, hypochondriacis, & quibusdam aliis, si quando motus convulsivi, capite illæso, uteri, lienis aut alius visceris culpa excitantur; næ illi hac solum ratione, nempe reliquarum partium incommodis hac via per nervos, nullatenus autem pervapores ad cerebrum translatis, oriuntur, ac quoquo versum in varias corporis regiones propagantur.

Hic



Hic autem adnotetur, quod licet causa evidens *Spasmi à*  
 solitaria, siquidem ea fortis ac vehemens fuerit, *nervorum*  
 convulsionem interdum per se, & absque disposi- *sinibus in-*  
 tione prævia inducat; quatenus nimirum spiritus *cupiunt. Et*  
 animales supra modum irritati, explosiones de- *propter irri-*  
 bito majores & plusquam ordinarias ineunt; pro- *tationem,*  
 utin hypercatharsi, ac paroxysmis colicis, & nephri-  
 ticis passim evenire solet; attamen in plerisque a-  
 liis affectibus spasmodicis, quorum accessiones  
 sunt crebræ & habituales, præter irritationem  
 circa nervorum extremitates factam, quæ ut plu-  
 rimum causæ evidentis loco est, etiam proca-  
 tarxis quædam adest, cujus efficaciæ morbi in-  
 sultus præcipue debetur; nempe cum motus con-  
 vulsivi lienis, uteri, aut alius privatæ partis vi-  
 tio excitari, ac crebra vice repetere solent, su-  
 spicari licet, quod spiritus animales fibrarum in  
 parte affecta, & in vicinia ejus dispositarum in-  
 colæ, copulam heterogeneam, & explosivam prius  
 contraxerant, qua ad plenitudinem saturi, levi-  
 occasione in explosiones spasmodicas cientur: dein  
 istæ circa nervorum extremitates primo inceptæ  
 eorundem nervorum ductu sursum perreptant, &  
 non raro ad ipsam originem nervosam, ac inter-  
 dum ulterius ad cerebri meditullium traducuntur:  
 à quo denuo in genus nervosum reflexæ, etiam  
 membrorum, ac artuum spasmos secundario in-  
 ferunt: postquam vero cerebrum, & superior  
 systematis nervosi portio, spasmis infra excitatis  
 sæpius compati & coassici assueverunt, etiam  
 spiritus istarum partium incolæ, ipsi tandem adul-  
 terari, copulam heterogeneam, & explosivam  
 admittere, adeoque in causæ procatartice par-  
 tem adscisci incipiunt; hinc demum procatartix  
 spasmodica utrique caudicis ejusdem nervosi  
 termino communis evadit, atque spiritus anima-  
 les in nervi unius, aut plurium tum capite, tum  
 cauda male dispositi, ab alterutro explosiones  
 concipiunt, easque alteri statim tradunt, prout  
 infra cum de passionibus hysteris, aliisque specia-  
 tim dicemus, fusius declarabitur. Interim historias  
 quasdam, & observationes spasminorum à nervorum

*Et propter  
 copulam  
 explosivam.*

extre-



I.  
*Observatio.*

extremitatibus oriundorum subjiciemus.

virgo lectissima circa 16. ætatis suæ annum ab equo decidens, & saxo protuberanti allisa, mammam sinistram graviter læsit, unde tumor cum dolore exortus est, quæ tamen symptomata ab initio remediorum usu mitigari, & deinceps ad longum tempus mediocriter habere visa sunt; post triennium vero a frigore suscepto, ac pessima viæ ratione adhibita, omnia exacerbari cœperunt; pars læsa in majorem molem intumescens dolore peracuto, & fere constanti afficiebatur, ut ægrotans præ insigni cruciatu dies & noctes plerasque insomnes degerit, mammæque glandulas tumidiore tunc factas nec tangi nec pertractari, imo ne strepitum quemvis, aut concussionem in cubiculo factam sustinere potuerit.

Cum huic tumori, versus cancrum degenerari, fatus & cataplasmata ex cicuta, & mandragora, aliisque stupefacientibus, & percussivis applicarentur, perillustri Domina affectiones quasdam spasmodicas crebra vice infestantes pati cœpit: imprimis quoties in mamma dolor atrocius urgeret, illic loci punctiones, nec non spasmos ac contracturas huc illuc excurrentes persensit: deinde statim ventriculus ac hypochondria, & non raro totum abdomen cum rugitu & vomendi nixu inflari, ac plurimum distendi solebant; mox idem affectus sensim ad superiora translatus à *paroxysmo* excitabat, cui brevi postea motus convulsivi in toto corpore adeo validi succedebant, ut ægrotans vix à tribus aut quatuor robustis viris contineri potuerit.

Hujusmodi paroxysmi primo erant vagi, & occasionaliter tantum excitati: nempe succedebant, quoties dolor pectoris à causa quadam evidenti intenderetur: postea convulsiones istæ crebrius infestabant; ac demum periodicæ, ac habituales factæ, bis in die, nempe totidem stans horis à pastu constanter repetere solebant: Cumque ad hunc modum per 6 menses ægrotans miserrime affligeretur, tandem vertiginoso capitis affectu, eam fere continuo exercente, molestari cœpit: cui

malo



malo cum fots ex herbis aromaticis & cephalicis capiti aliquandiu adhiberetur, quoad vertiginem melius habuit; verum exinde novo & plane admirando symptomate, tussi sc. inani absque sputo dies & noctes, nisi cum somno obrueretur, perpetuo infestabatur: postquam clarissima hæc virgo, diversimoda remedia à variis medicis præscripta, absque multo commodo tentaverat, demum thermis temperatis apud Bathoniam usa juvabatur, deinde statim nupta, à conceptu ac puerperio sensim convaleuit.

Si totius morbi ejusque accidentium rationes *Ejus A-*  
inquirantur, extra dubium est, affectionem con- *tiologia.*  
vulsivam à mammae tumore, sive loco dolente primo excitatam fuisse; cujus causa partim fuit acutissimus doloris sensus, à fibris ac nervis istius partis impressus, partim autem copula heterogenea spiritibus istarum fibrarum nervorumque incolis affixa, enimvero suspicari licet humorem acerrium tumori impactum, qui forsan aliquatenus nervorum ductibus illuc confluxerat, Topicorum usu percussus, fibras & filamenta nervea per totam viciniam disposita subiisse, proindeque copulam heterogeneam & explosivam spiritibus accrevisse; ad quam elidendam, quoties a dolore incitabantur, explosiones spasmodicas inibant, simulque spiritus alii, intra nervos affines scatentes priorum consensu (uti crebro assolet) pari ritu explodebantur: dein affectio spasmodica nervorum extremitatibus ubi primo inceperat, per eorundem ductus usque ad *ἐνέφαλον* continuata, *ἀναίσθησις*, & exinde in totum systema nervosum resiliens, artuum & membrorum omnium motus convulsivos inferre solebat: circa ægritudinis initium paroxysmi ad hunc modum a parte affecta propter dolorem excitati, ad cerebrum & appendicem ejus secundo traducebantur: postea vero cum spiritus horum incolæ per sympathiam cerebro explosi, partium continentium poros ita laxarant & debilitaverant, ut intra eosdem, una cum succo nervoso, particulis quibuscumque heterogeneis aditus patefceret. procataxis spasmodica etiam



in capite succrescebat; atque spiritus ἐγκεφαλον incolentes, copula heterogenea infecti, paroxysmum spasmodicum ipsi inchoabant, aut saltem insultibus ejus primos instinctus præbuere, qui ut plurimum à pastu totidem statim horis redibant; quia sc. materies morbifica una cum succo nervoso æquali fere dimenso inferebatur: revera in ejusmodi casibus, ubi convulsio generalis fere omnes totius systematis nervosi partes successive occupat, suspicari licet spiritus animales in toto genere nervoso copulam heterogeneam & explosivam contraxisse, quæ cum statim tempore ad plenitudinem assurgat, ipsos spiritus pariter hora condita ad explosionem incitat, eademque explosio alicubi inchoata, fomitis ignarii ritu, in omnes ordine propagatur.

Quod spectat ad tussim istam inanem, quæ capitis fomentationi succedens, ægrotantem istam per plures menses fere incessanter exercuit, videtur quod symptoma istud omnino ab origine nervosa affecta, & nequaquam à pulmonum infarctis penderet, nihil enim tussi excernebat, & si quando istum tussendi impetum violenter inhiberet, statim in gutture præfocationis sensu afficiebatur: adeo ut verisimilius sit materiem morificam prope originem nervosam depositam à motu rarefactam, & commotam, nervorum pulmonibus dicatorem capita altius subiisse, atque in fibris, & filamentis eorum spasmos perpetuos irritasse: simili quodam ritu, ac cum succus nervosus, qui musculorum fibras & tendines irrigat, acris, ac degener factus, partibus iis subsultus, ac contracturas continuas inducit: hinc quando spasmus in aliquibus nervorum affectorum furculis sisteretur, ita ut tussire non liceret, statim motus convulsivus in furculos alios ejusdem, aut affinis nervi incurrens, præfocationem in gutture excitabat. Libet hic exemplum aliud spasmi à nervorum extremitatibus affectis oriundi proponere.

2.  
*Observatio.* Clarissima Matrona quinquagenaria postquam ei menstrua per sesquiannum fluere desierant, primo de dolore pungitivo in mamma sinistra queri cepit;



cœpit; dein postea illo affectu cessante, circa ventriculum male habuit, illic nimirum tumor durus, & velut schirrosus cum dolore gravativo subortus est huic stomachi inflatio cum respiratione difficili, nausea, & vomitione crebra supervenit: dein morbo ingravescente, dolore magis acuto, & huc illuc quaquaversus excurrente, in affectiones ventriculi convulsivas incidit: nempe illic loci spasmis varie excurrentibus, haud secus ac si ventriculus multifariam distraheretur, fere continuo molestabatur: porro cum siti & vigiliis, constans animi perturbatio, & crebra spirituum deliquia, quasi jamjam moribunda esset, Dominam ægrotantem exercebant: quæ tamen omnia symptomata ex isto ventriculi tumore semper oriri, eadem plane persensit: Huic medicamina quævis vomitoria, cathartica, antiscorbutica, & hysterica, absque ullo levamine, molestiæ potius & nocumento fuisse videbantur, à sanguinis missione per hirudines, & lactis asinini usu nonnihil commodi recepit, & postea ab acidulis diu epotis plurimum alleviabatur.

Prædicta symptomata, quæ vulgo passioni hystericae, & vaporibus uterinis ascriberentur, palam est à tumore circa ventriculi fundum excitato processisse: quippe sanguis Dominæ isti valde fervidus & atrabilarius existens, cum non amplius catameniorum fluxu purgaretur, recrementa sua & sæculentias adustas primo in mamma, & deinde novo incepto, in stomachi membranis deposuit: à tumore ibidem factò, particulae acres & heterogeneæ perpetim decedentes, fibras & nervos circumcirca confitos subierant; quæ spiritibus earum partium insitis, influisque continuo accrescentes, ipsos ud crebras explosiones, adeoque affectiones spasmodicas in tota vicinia excitabant: quandoquidem vero motus convulsivi illic loci habiti, leviores fuerint, hinc apparet totum nervosum genus, ipsumque *ἐγκέφαλον* (prout in spasmis majoribus affolet) in eundem affectum nondum consensisse: attamen spirituum inordinatio circa partes affectas exorsa, & illinc mino-

*Ejus A-  
ziologia.*



ri undulatione ad caput traducta, ejusque adeo spiritus incolas leviter tantum afficiens, vigilias, cum ingenti æstu, & phantasie perturbatione inducebat. Quæ hætenus de spasmodis à causa morbifica alterutrum systematis nervosi finem obsidente, differuimus, clarius cluescent, cum postea de præcipuis convulsionum speciebus, de passionibus sc. hysteris, hypochondriacis, aliisque particulatim agemus: Interea huic de spasmodis, propter nervorum extremitates affectas, oriundis, hypothesei methodum therapeuticam non opus erit adjicere, quoniam medendi rationes hujusmodi pathematis postea speciatim tradendis, melius accommodari possunt: In præsentiarum vero procedere oportet ad explicandas passiones spasmodicas, quarum causa, sive materies morbifica intra plexus nerveos subsistere videtur.

De plexibus nerveis alibi satis fuse differuimus, atque ex illorum descriptione & usu verissimillimum esse ostendimus, motuum convulsivorum paroxysmos graviores intra hæc partes sæpenumero incipientes, exinde quaquaversus in viciniam, & non raro in longinquum propagari: saltem multo probabilius videri, particulas heterogeneas & explosivas, postquam τῇ ἐκκενάλῃ, ejusque appendicis medullaris tractus superaverint, inque nervorum canales, eorumque ductus, una cum succo ipsos irrigante, altius prolapsas, intra plexus nerveos, velut compita, sive diverticula copias explicare, ibidemque aliquandiu stativa habere, donec tandem uberius aggestæ, quali collectis viribus affectiones spasmodicæ immaniores producant: hoc, inquam, longe probabilius apparet, quam (quod vulgo fit) ex utero, liene, ventriculo, aliove viscere vapores elevatos supponere, in quos omnis culpa ex facili conjiciatur: Nam intra hosce plexus pro mineris morbificis spatia satis idonea conceduntur, ut materies illic sensim deponi possit, & manere, donec ad plenitudinem congeratur: deinde vero, quia spirituum copias ingentes, supra quam in aliis quibuscunque cellulis, illic hospitari credimus, copula heterogenea

*Plexus  
nervos  
materia  
spasmodica  
sedem esse.*



iis accrescens, in explosiones graviores quasi fomitem struit; adeo ut spiritus intra hæc corpora explosi ea non modo inflent, & dilatent, verum de situ elevent, & attollant, (velut cum ædificium à pulvere pyrio subvertitur) quare partes suprajacentes subito in tumorem efferuntur, atque appense huc illuc violenter contrahuntur. Ad hunc modum atrociore, circa præcordia & viscera, convulsionum paroxysmos sæpenumero excitari, præter argumenta ex ratione petita, non ita pridem *αὐτολίσ* comprobatum habui: Cum enim fœminæ illustrissimæ paulo ante obitum affectibus (quos dicunt) hysterice gravissime laborantis, cadaver aperirem, uterum quidem prorsus insonantem reperi, verum juxta mesenterii plexus nerveos (uti videbatur) in molem attolli, & elevari solitos, visceris istius membranas ab invicem divulsas, & solutas, ut circumquaque tumidæ & laxæ, quasi in bullulas, sive vesiculas inflatæ apparerent.

Profecto plura sunt rationum solidarum momenta, quibus adducimur ut credamus pathemata dicta hysterica sæpissime à materia spasmodica intra plexus mesentericos aggesta, & per vices explosa oriri: quod quidem, ubi de morbis istis speciatim agemus, clarius patebit: sed neque minus probabile est, dolores colicos à materia acriori, & irritativa iisdem plexibus contenta, non raro procedere. Cæterum quoties paroxysmi convulsivi à liene, aut ventriculo incipere videntur, utpote quorum initia sunt partium istarum inflationes, & perturbationes insignes; verisimile est materiæ spasmodicæ nidum, intra plexus nerveos ad lienem, aut ventriculum pertinentes reconditum fuisse: Quinetiam ejusmodi materies, intra plexus cardiacos gravissimos cordis tremores & passionem, intra plexus pneumonicos, aut cervicales, terribiles asthmatis insultus excitare videtur. In Neurologia nostra casum insignem perillustre fœminæ retulimus, cui materies serosa è syncipite per narem sinistram extillari solita, pone aurem decubuerat: ubi cum dolor atrocissimus infestaret,

spasmi

3-  
*Observatio*



spasmi insuper, & contractiones admirandæ succedebant: quibus sc. modo cerebri & totius *ἐγκεφάλου* compages deorsum, modo guttur, præcordia, & viscera sursum convelli viderentur: cujusmodi convulsiones partes ita oppositas, & longe distitas per vices afficientes, cum ab una eademque morbi sede in medio consita procederent, obvium erit concipere, locum dolentem, uti & affectionis utriusque spasmodicæ originem, fuisse plexum ganglioformem, juxta parotidas situm: in quem sc. nervi tum paris vagi è capite descendentes ingrediuntur, & è quo propagines in gutturis musculos, atque rami in præcordia & viscera protenduntur. Porro ab eadem causa, sc. materia *σπασμώδης* intra plexus ganglioformes aggesta & per vices explosa, istum in gutture præfocationis sensum in paroxysmis convulsivis tam crebro excitatum procedere (nec immerito) arbitramur. Verum super his quando morbos, & symptomata *σπασμώδεις* Particulatim tractabimus, erit opportunior dicendi locus. Quod restat de convulsionum, quarum supra mentionem fecimus, specie ultima, quæ nempe in liquore nervoso per totam sui massam, particulis heterogeneis & explosivis infecto, proindeque totos nervorum, corporumque nerveorum processus in spasmos universales, eosque aut continuos, aut intermittentes irritante depender, modo disquirere incumbit.

## CAPUT.



## CAPUT VII.

*De motibus convulsivis, a liquore corpora nervosa irrigante, totosque eorum processus in spasmos irritante, oriundis.*

**A**ffectiones convulsivas aliquando per totum genus nervosum vagari, atque partes modo has, modo illas, modo plurimas simul infestare, adeo notum est, & experientiae fere quotidianae obvium, ut nihil magis: quippe advertere licet in his, musculorum tendines ubique subsilire, spasmis contrahi; in aliis, membra quævis exteriora, variis flexionibus contorsionibusque huc illuc multifariam flecti, aut extendi. Vidimus nonnullos spirituum effræni & indomita vi coactos, modo velut æstro percitos, currere, aut salire, modo, pedibus, aut pugnis, terram, vel objecta quævis validissime contundere: quod ni facerent, illico in lipothymias, & horrenda spirituum deliquia incidere. Nimii esset tædii singulos casus spasmodorum universalium, & per totum genus nervosum oberrantium, enumerare: istiusmodi autem symptomata, licet varia & multiplicia fuerint, ad tria tamen capita præcipua quodammodo reduci possunt; nimirum quatenus à tribus causarum generibus potissimum dependent: quandoquidem enim in vagis hisce spasmis supponere debemus totum liquorem nervosum vitiari, atque spiritus animales in eodem ubique scatentes adulterari, proindeque fere perpetim explodi: Advertere licet ejusmodi labem, & succo nervoso, & spiritibus ubique influis, uno aut altero ex tribus hisce modis, ut plurimum imprimi, sc. 1º. vel a venenis, aut veneficiis. 2º, vel à febre maligna, atque male judicata, in quibus sc. materies morbifica in cerebrum, aut nervosum genus suffunditur; vel 3º. cum liquor nervosus longo temporis tractu, propter affectionem scorbuticam, aut alias vitiosam, à debita crasi, in liquorem acrem, aut acidum,

*Spasmodorum  
universalium tria  
potissimum  
causarum  
genera.*



dum, aut alio modo præternaturalem, & spasmodicum degenerat. Libet hic singulos prædictos casus considerare, & primo de spasmi insultibus qui à venenis aut veneficiis producuntur.

*A venenis  
& venefi-  
cis.*

*A venenis  
è vegetabi-  
lium classe.*

*A cane  
rabido.*

*A Taran-  
tula.*

Primo igitur, venena quædam in liquorem nervosum, potius quam in sanguinem agere, quæ illum depravantia, affectiones spasmodicas potissimum inducunt, alibi à nobis ostensum est: & liquido constat, ex comestione cicutarie, apii, risus, mandragoræ, solani furiosi, pastinacæ sylvestris, aliarumque herbarum noxiarum, quam nempe brevi subsequi solent horrendæ ventriculi contractiones, torpor, delirium, atque in toto corpore tendinum spasmi, ac subsultus: porro ejusmodi affectiones convulsivæ succedunt in demorsis à cane rabido, aliisque feris venenatis, ubi miasma virulentum à succo nervoso susceptum, in eodem diu delitescens, se tandem exerit, atque totam liquoris, quo involvitur, massam, fermento suo inficit ac venenat: Id quod clarius adhuc & liquidius illustrant symptomata admiranda, spasmi nimirum dolorifici, & indefessa saltatio, quæ tarantulæ morsui succedere ab authoribus perhibentur: & possint quidem fabulosa videri, nisi quod rei veritas à pluribus bonæ fidæ viris, tum antiquis, tum recentioribus asseritur: Nam præter Mathiolum, & Epiphanium Ferdinandum, Gassendus, & Kircherus addunt se affectus istius testes oculos fuisse: quinimo fertur in Apulia notissimum esse, & usu fere quotidiano receptum, nempe in regione istac phalangii, sive araneæ genus quoddam extare, quod Tarantula, à Tarento antiqua Apuliæ urbe, appellatur. Animalculum hoc in æstate valde frequens, incolas incautos sæpe mordet, atque ictu venenato afficit, unde statim dolor in parte læsa, cum tumore & pruritu, mox, in variis corporis partibus stupor & tremor, nec non membrorum convulsiones & resolutiones, aliaque symptomata spasmodica, cum summa virium prostratione succedunt, uti ex Mathiolo, Ferdinando, aliisque stupendam hujus morbi pathologiam enarrantibus, colligere datur.



datur. At vero maxima admiratione dignum est, quod de curatione hujus affectus isti Authores referunt, atque per totam regionem vulgo in praxi est: Namque icti a Tarantula, utut graviter laborant, auditis musicis instrumentis, statim à plangoribus cessant, atque in medium profilientes tripudiare, ac saltare incipiunt, tamque diu rem persequuntur, ac si sani essent, ac nullo unquam teneantur dolore: quod si eveniat, ut Tibicines tantillum quiescant, non multo post tempore in terram concidunt, ac ad pristinos redeunt languores, nisi tamdiu sonitu indefinente saliant, atque tripudiant, donec venenum penitus discutiatur: Ob id igitur Tibicines stipendio conducuntur, alternatimque mutantur, ut absque ulla sonitus intermissione, tamdiu tripudiant demorfi, quousque penitus curati conquiescant. Ita Mathiolus: Quibus addit Ferdinandus, pauperes in Apulia omnem fere substantiam suam in musicos & Tibicines erogare, qui per totam illam provinciam evagantur, & Tarantatis inserviando, multum lucri faciunt: & quidem tripudiant, ac saltant intra oppida, in publicis plateis, in agris, alii uno die, alii una hebdomada, alii pluribus. His Authoribus suffragantur viri Doctissimi Gassendus & Kircherus, quorum utrique ex propria observatione referunt, se taliter affectos novisse, asseruntque, ipsos haud quavis musica indifferenter, at certis contilenarum generibus affici, excitari, ac ad numeros quosdam præ aliis tripudiare.

In prædictorum accidentium rationes, ut, si quid conjectura assequi possimus, paululum modo inquiramus; imprimis extra dubium habetur, ab animalculi istius morfu miasmata quædam venenata corpori humano infigi, quæ tamen sanguini, & spiritui vitali minus infesta, quamprimum ex ipso in liquorem nervosum transierint, per totam ejus massam, fermenti instar, statim se explicant, atque spiritus animales, ubivis in ea scattentes inficiunt, ita quidem ut ipsi ab invicem distracti, & huc illuc inordinate agitati, affectiones spasmodicas inducant, quas partium continen-

*Symptoma-  
tum Taran-  
tula demor-  
sorum Æ-  
tiologia.*



*In sedandis  
symptomatis  
musica ra-  
tio in qua  
consistit.*

tium modo contractura, modo languor, & resolutio comitantur.

Cur autem, quæ à Tarantulæ morfu convulsiones dolorificæ suscitantur, statim à musica sedatæ, in saltationem commutari solent, non ita plane constat. Quod nonnulli asserunt, animalculum hoc ( siquidem teste Aristotele *σπασταται* fuerit ) musica delectari, atque eapropter venenum ejus homini inditum, humores fermentando, parem musicæ amorem inducere : hæc inquam conjectura animo veritatis avido minus satisfacit, utpote quæ in araneo naturam philomusicam, eandemque postea cum homine, per metastasin, seu velut *μεταμύχουσι* quandam communicatam supponit; quæ quidem utraque & gratis dicta sunt, & minus arrident; quin potius dicendum videtur, venenum à morfu Tarantulæ liquori nervoso inflicturn, mitius esse, quam ut spiritus animales penitus extinguere valeat, aut distractos prorsus dissipare, & in explosiones immaniores cogere; sed eos tantum in fugam conjicere, fugatosque hincinde in spasmos leviores, ac fere tantum dolorificos, incitare; at vero musicam, blanda mulcedine sua, spiritus ita dissipatos facile una congregare, ac mutuo associare: quapropter cum iidem spiritus, ob miasmata virulenta ipsis adhærentia, usque in motus involuntarios, & convulsivos apti fuerint, melodia, eos simul allectatos, in tales spasmos disponit, ac dirigit, ut serie, ac ordine quodam, nervorum corpora subeuntes, certis velut in cancellis, ac orbitis ferantur, donec tandem veneni particulis penitus evaporatis, atque spirituum furore, ac impetu delassato, æstrum illud omnino excusserint. Enimvero musica homines sanos & sobrios etiam invitos, aut aliud cogitantes, in actiones modulaminis auditi æmulas facile rapit; ut primo statim Tibicinis inflatu, adstantes manus & pedes agitare incipiant, & vix, ac ne vix à saltando se contineant: ne quis ergo miretur, in hominibus, a Tarantula demorsis, ubi spiritus animales, velut stimulis agitati, huc illuc sponte exilire,



exilire, & divagari coguntur, si ad citharæ impulsus, in saltationes, & motus compositos excitentur; adeo ut in hisce affectibus musica spiritus debacchantes velut incantans, eorumque motus convulsivos quodammodo regens atque commutans, antidoti loco habeatur: in quantum sc. spiritus animales, ad hunc modum diu ac multum exerciti, copulam elasticam à veneno aut alias contractam, penitus excutiunt, ipsique plurimum defatigati, demum ab æstro seu incitatione sua conquiescunt.

Huic affine est malum, quod Chorea S. Viti appellatur, de quo refert Gregorius Horstius, se cum mulieribus quibusdam locutum, quæ quotannis Sacellum S. Viti, quod est in finibus Ulmenfium, visitantes, ibidemque saltu cum perturbatione mentis, eousque sese nocte dieque exercent, donec extaticarum instar corruunt: qua ratione sibi restitutæ videntur, ut parum vel nihil sentiant per annum integrum, usque ad Maii tempus subsequens, ubi membrorum inquietudine eousque sese torqueri referunt, ut vicissim circa festum S. Viti ad prædictum locum, salationis gratia, sese conferre cogantur. Horst. Epist. med. sect. 7. de admirandis convulsionibus.

Profecto usitatum est ( prout sæpius observavi) tum viros, tum foeminas, interdum ea membrorum inquietudine, & velut æstro quodam urgeri, ut necesse habuerint, usque ad lassitudinem ambulare, quin etiam saltare, huc illuc discurrere, ut hac ratione graviores molestias, & lipothymias alioquin invasuras, evitare possint: Quorum ratio videtur esse, quod spiritus animales, quatenus in toto nervoso genere a copula heterogenea incitati, efferi prorsus ac effrænes evadunt, quos quidem ita exerceri, atterique opus est, tum ut ipsi perdomentur, tum ut copula explosiva excutiantur.

Affectiones convulsivas interdum a veneficio excitari, & vulgo creditur, & à multis fide dignis Authoribus passim asseritur: & quidem ut concedamus, admiranda in corpore humano pathemata

*Chorea S. Viti descriptio:*

*Ejus Aetiologia.*

*Spasmi universales a veneficio*



*Qui vulgo  
sed falso  
habiti.*

*Eorum A-  
tiologie.*

*Qui venefi-  
cium argu-  
unt.*

themata, à diaboli præstigiis sæpenumero produci, quatenus nimirum iste, pro mira, qua pollet, agendi subtilitate, animæ sensitivæ, sive spirituum animalium systasi, atomos, sive corpuscula heterogænea insinuat, adeoque functionibus ejus modo stimulos addit, modo vincula injicit, modo eas in perversum rapit: quinetiam aliquomodo ipse corpus humanum subit, & quasi altera anima potentior ei coextenditur; singulas partes, & membra ætuoat, vigore insolito inspirat, ac pro libitu suo regit, ac ad facinora immania & supernaturalia perpetranda incitat: attamen omnia spasmodorum genera, quæ præter communem istius morbi morem prodigiosa apparent, non statim sagarum incantamenti inscribi debent, aut Demon *ὁ πῶς μὴ γὰρ* semper in scenam vocandus. Enimvero quoties è potentioribus cuipiam viro natus, aut affinis, spasmis forte atrocioribus & insolitis corripitur, plerumque fit, ut vetula mox proxima veneficii accuserur, rea peragatur, laqueumque aut flammam vix ac ne vix quidem misera evadat; cum interim morbus, a causis mere naturalibus procedens, non alio exorcismo, quam remediis contra affectiones convulsivas præscribi solitis, facile curetur: Revera spiritus animales copula explosiva immaniori præditi, & ab ea confertim elisi, tantum roboris, ac vigoris, supra propriam ac solitam suam postestatem exerunt quantum flamma pulveris pyrii supra flammæ communis deflagrationem; adeo ut qui morbo huic obnoxii, extra paroxysmum levissimo unius viri ductu regi, attolli, & quo libitum erit agi poterint, eodem urgente, quatuor ad minus robustorum hominum ultimos conatus, nixusque eludant: Sin veto in cujusquam laborantis casu veneficii, aut fascinationis suspitio exoriatur, duo sunt imprimis motuum genera, quæ hanc creare, & fovere solent, sc. 1.º si patiens ejusmodi membrorum, aut totius corporis contorsiones, aut gesticulationes perficiat, quas nemo sanus ne quidem mimus, aut gesticulator quispiam, imitari solet. Dein secundo, si robur exerat, quod vim omnem



mnem humanam superat ; quibus si rerum monstrorum excretiones accedant , uti cum aciculorum fasciculi , prout refert Henricus ab Heers, rejiciuntur vomitu , aut viva anguilla , prout refert Cornelius Gemma, per sedem dejicitur, extra dubium ponitur , in hac tragœdia diabolum partes suas habere , & agere.

Obvium hic esset plurimas , & quidem admirandas hominum cujusque ætatis & sexus , more stupendo , & tanquam supernaturali, cum manifesta veneficii suspitione , affectorum , historias congerere : tales enim apud Authores tum medicos, tum philosophos passim extant , quin & morbos a fascinatione excitatos, in unaquaque fere regione sæpius evenire, vulgaris rumor perstrepat : attamen quoniam ejusmodi casus, vel impostura sunt pleni, vel admirationis creandæ gratia , fictitiis narrantium commentis semper aucti, eos (si quidem & rarius sub Therapeusi medica cadunt ) hic consulto prætermittam. Quod superest, proximam convulsionum universalium speciem, qualis nempe febribus malignis, aliisve anomalis, atque male judicatis supervenit, explicare pergam.

E

CAPUT.



## CAPUT VIII.

*De spasmodicis universalibus, qui in febribus malignis, male judicatis, & quibusdam anomalis, excitari solent.*

*Spasmi universales febribus accidentes.*

*Symptomatum Aetologia.*

Convulsiones febricitantibus interdum accidere nullus e vulgo fere est, quin passim advertit, & exinde morbis, aut periculi insigne prognosticum desumat: Enimvero in febribus malignis, item aliquando in ordinariis male judicatis, prout vertigo, aut delirium, a materia morbifica, e sanguine in cerebrum deposita oriuntur, sic ab eadem in nervosum genus delapsa, musculorum, ac tendinum contracturae & subsultus, nec non membrorum, ac artuum subitae succussiones, ac interdum in toto corpore rigores horridi succedunt: Cujusmodi symptomatum ratio in eo consistere videtur, quod liquor partium nervosarum irriguus particulis heterogeneis, ac spirituum irritativis ubique scateat: propterea namque spiritus tum influi, tum insiti ab æquabili suo effluxu & emanatione perurbati, in crebras explosiones & continuos quasi crepitus incitantur; non absimili ritu, ac cum lampadis flamma, oleo sæculento & salito imbuta, cum strepitu & scintillatione ardescit. Cujusmodi tamen affectus *spasmodici* ut plurimum accidunt circa febrium *acutissimas*, cum materies morbifica; primo in sanguine congesta, illinc in cerebrum transfertur, eoque vel protinus trajecto, vel simul infecto, in systema nervosum profertur, proindeque pathemata convulsiva, cum vel sine delirio acciuntur.

At vero, præter hujusmodi affectiones *spasmodicas* febribus *epilepticis*, & secundo excitatas, observare est interdum, in maligna aeris constitutione, etiam a contagii pestilentis affatu, liquorem nervosum sanguine prius, aut ab eo seorsim infici, & propterea delirium ac convulsiones intemperiem febrilem prævertere.

Porro



Porro sæpius observavi febres quasdam anomalias increbuisse, in quibus sanguine vix ebullire, aut supra modum effervesce visum, primum in humore nervoso febris lentæ ac valde periculosæ initia jaciebantur; quæ sensim ad maturitatem e-  
 vecta, affectus spasmodici, cum delirio, aut mania, aliisque spirituum animalium deliquiis, aut exorbitantiis inducebant. Ægrotantes enim de calore aut siti minime conquesti, cito debiles, & quasi enerves facti, crebræ vertigini, nec non artuum tremoribus, ac velut exilitionibus, insuper musculorum ac tendinum subsultibus, & contracturis, atque doloribus hinc inde vagis statim obnoxii fiebant. Hujusmodi ægritudo a quibusdam medicis, siquidem in solidis partibus, potius quam in sanguine consistere videtur, febris maligna hectica appellatur; cum revera eadem in humore nervoso potissimum defixa, lues *ven. & dng* convulsiva melius dicitur.

Apud Gregorium Horstium mentio fit morbi convulsivi & maligni, qui olim Hassiæ, Westphaliæ, & in locis vicinis epidemicus fuerat: illo correpti, sine febrili æstu, aut immodica sanguinis effervescencia, dum circa negotia familiaria versarentur, sese vix modo ægrotare percipientes, circa manus, aut pedes, ac interdum in utrisque fornicationis sensum, cum stupore, huc illuc transcurrentem, habere solebant: dein mox digiti, simulque brachia & crura, modo arcte contrahebantur, modo validissime, ac si obriguissent, extendebantur. Hujusmodi contractiones & extensiones se alternatim excipiebant, & subinde loca mutabant; ut nunc in hac parte, dein statim in alia affectus resideret: sin (uti non raro contigit) morbus cerebrum una totum invaderet, convulsiones universales, & sæpe insultus epileptici ægrotos infestabant: insuper laborantes per vices quasdam delirio, mania, ac interdum lethargo obnoxii fuerunt. Ægritudo hæc sine crisi, aut integra solutione diu perseverabat, & vix in solidum ita curari potuit, quin cerebri, & partium nervosarum diatheses malæ ac morbidæ per totam postea vitam duraverint.

*Morbi convulsivi Hassiæ olim epidemici descriptio.*



Symptoma-  
rum *A-*  
giologia.

Quoad morbi hujus, & symptomatum, rationes, satis obvium est, eadem omnino à succi nervosi vitio, ac insigni depravatione pendere. Iste fornicationis sensus ægritudinem plerumque inchoans, propterea ciebatur, quoniam liquor iste à miasmate maligno venenari, ac in mixtione solvi incipiens, statim spiritus animales in ipso scatentes opprimebat, & ab expansione solita ac libera in hibeat; quare illi semiobrutum, ac velut inter vepres, ac retinacula obrepere coacti, quasi fornicarum transcurrentium sensum excitabant: deinceps vero quoniam hoc morbo ingravescente, liquor nervosus in crasi sua adhuc magis pervertebatur, quæ in illo congerebantur particulae heterogenæ, spiritibus accrescentes, eos huc illuc exagitari, & inordinate explodi fecerunt, propterea quidem ut in membris contractiones, distentionesque horrendæ, ac in capite tumultus & inordinationes maximæ cicerentur. Quod autem in hac febre *veupaid* solutio, sive crisis difficilis, seu potius nulla contigit, ratio erat, quia succus nervosus utpote lentus, & quasi mucilaginosus, proindeque in motu tardus, hæud uti sanguis, effervescentia ec critica defæcatur, nec ejusmodi fermentationem facile concipit, qua purum ab impuro secernitur.

Profecto ægritudinem, simili prorsus typo insignitam, non raro apud nostrates excitatam, & per totas familias, saltem in pueros & juniores grassatam fuisse, novi. Ante aliquot annos febris popularis cerebro, & nervoso generi plurimum infesta in hac regione, imo fere per totam Angliam, plurimum increbuit: Cujus morbi historiam eo tempore quo sæviit, sc. anno 1661. descriptam, hoc in loco pathologiæ nostræ *spasmodi* inserere hic operæ pretium videtur: Hinc enim constet, quo ritu, & quibus de causis, symptomata convulsiva, quæ febribus quibuscunque supervenerint, excitari solent.

*Febris*



*Febris epidemica cerebro & nervoso generi  
potissimum infestæ, anno 1661. incre-  
brescentis descriptio.*

In hac regione, ante novissimam æstatem sc. anni 1660, morbo quovis populari, nisi qui tantum in quibusdam locis sporadice grassabatur, supra biennium immunes degeramus; tunc autem, ante solstitium æstivum, morbilli (affectus hic raro epidemicus) variis in locis exorti, plurimum sæviebant. Post æstatem illam, quæ intense calida & sicca fuerat, autumnus solito humidior insequutus est: et quem postea hyems mitissima, & frigoris pene expers excepit: toto ejus spatio, vix erat tellus nive oblecta, aut unquam supra tres, aut quatuor dies continuos gelu constricta; adeo ut intra paucas à solstitio brumali hebdomadas, arbores frondescere, plantæ vernaes à terræ sinu erumpere & efflorescere, quin & aves nidificare inceperint: tempestati huic miti, ac corpusculis nitrosis à Borea sufflari solitis, haud quaquam ventilatæ sub initium veris, imbrium, fere continuo madentium, squalor maximus successit. Post æquinoctium vernale, febris quædam anomala & inassueta nonnullos sparsim incessit; quæ tamen intra mensem in tantum epidemica evasit, ut pluribus in locis morbus novus appellari cœperit: in pueros & adolescentes potissimum desæviens, eos longa, & velut chronica ægrotatione affligere solebat: quinimo interdum senes, & provectæ ætatis homines, licet rarius, infestabat, at eos citius, & quidem certius jugulabat. Affectus primo quempiam invadens, ita tacite obrepebat, ut ægrotationis initia vix perciperentur: nam sine calore immodico, aut siti acriori exoriens, statim in toto corpore, debilitatem magnam, cum spirituum languore, & functionis animalis torpedine, in lucebat; stomachus esculenta quævis fastidire, & ab ingestis aggravari, nec tamen facile in vomitum proclivis erat. Laborantes ad mo-

*Febris epidemica anno 1661. grassantis historia.*

*Ejus causa procatartica.*

*Symptomata.*



tum quemvis inepti, tantum lecto discumbere, & otio frui ambiebant: intra breve tempus, etiam aliquando ab ipso morbi insultu, de vertigine gravi, aurium tinnitu, sæpe item de cerebri quasi tumultu & preturbatione magna querebantur. Cujusmodi symptomata sæpissime hujus morbi ingruentis signum quasipathognomicum habebantur: si in quibusdam hæc deesse, aut remissius habere contigit, vice capitis eo ritu affecti, morbus in pectore, cum tussi excitata, altiores radices egit, uti mox dicetur. Dum vero cerebro, ac appendice nervosa ad hunc modum affectis, spiritus animales mox ab ægritudinis principio obtorpescerent, febris lenta ac velut hectica in toto accendebatur: attamen cruoris effervescencia, quæ vix continua, sed vaga & incerta fuit, juxta ipsius sanguinis crasin, in aliis intensius, inque aliis remissius habuit, proindeque sitis, linguæ scabrities, aliaque symptomata, quæ ab intemperie febrili dependent, plus aut minus infestabant: sudor haud sponte successit, nec facile aut cum levamine ab arte produci potuit: quinimo nec hujus, nec alijsmodi, évacuatio, velut critica unquam succedens, hunc morbum derepente solvebat; verum iste per plures hebdomadas ac interdum menses persistens, in summam atrophiam ægrotantes redegit, & non raro eos tabe incurabili affecit.

Circa morbi incrementum, quod in plerisque intra octiduum contigit, si affectus (uti sæpius assolebat) cerebrum, ac systema nervosum præcipue obsideret, in eorum regimine, symptomata graviora, sc. aperta phrenesis, aut altus stupor, sive *ἀνασθησία* infestabant. Nam sæpius observavi, in plerisque pueris, atque non raro in sæminis, post septem aut octo a decubitu dies, sensationem & loquelam penitus defecisse, adeoque ægrotantes aliquandiu, immo interdum totius mensis spatio, sine adstantium notitia, cumque involuntario excrementorum profluvio decubuisse; sin iudicii & rationis usus aliquatenus perstaret, eos tamen cerebro delirio, & constanter in somnis fabulatione absurda



absurda & incongrua laborasse. In viris autem, aliisque temperamenti calidioris, a materia morbifica, vice criseos, in cerebrum translata furor, aut phenesis periculosa, ac sæpe lethalis succedebat. Sin neque stupor, neque distractio immanior ingruerat, scotomiæ, motus convulsivi, cum membrorum spasmi ac tendinum subsultibus gravius infestabant. In quibusvis fere ægrotantibus alvus ut plurimum soluta erat, modo flava, modo tenuia & serosa cum insigni fœtore copiose deiciens: raro erat quod vomitio quempiam incesseret: urina in toto morbi processu ( nisi cum materies morbifica uberius in cerebrum correpta, phrenitidem minaretur ) fuit intense rubicunda, ita ut nonnulli propter saturatum lotii colorem, hanc febrem plane scorbuticam fuisse censerent: Quod tamen secus habuisse constitit, quoniam remedia antiscorbutica ( quorum sane plurima, & cujuscunque fere generis tentabantur ) parum aut nihil profuere. Maxime admirandum erat, quam cito ab hujus morbi insultu ægrotantium carnes contabescerent, ipsique in sceleti marcorem redigerentur, cum interea nee adfuit calor immanis, qui partes solidas sensim absumeret, nec evacuatio quævis violenta, que illas affatim deterreret.

Præter hæc mala capitis regionem infestantia, affectio non minus periculosa sæpenumero thoracem incescit. quippe in aliquibus, licet non omnibus, tussis valde molesta, cum sputo copioso, ac crasso excitabatur: hæc in nonnullis circa morbi declinationem successit, nempe dum cerebri confinia serenum obtinerent, quasi nubibus illinc in thoracem dimissis, catarrhus ingens subito in pulmones depluebat. Verum in aliquibus, præsertim qui in capite morbi noxam minorem luebant, statim a febris initio, tussis immanis, & fœda expectatio, cum diathesi velut tabida ingruerant, & ægrotantes subito ac improvise in phthisin præcipitabant: e qua tamen, tempestiva remediorum ope, sæpe insperato emergebant. Adverti in nonnullis, post diutinam facultatis sensitivæ eclipsin,



& cerebri, à materia morbifica oppressionem, quod demum in glandulis juxta cervicem tumores successerint, è quibus ægre maturatis & disruptis ichor tenuis & fetidus longo tempore emanavit, & levamen contulit. Vidi etiam pustulas aquosas in aliis partibus corporis excitatas, quæ in ulcera cava, & ægre sanabilia transiebant: interdum maculæ exiguæ, & petechiales sparsim apparuerunt: non audiui tamen latiores aut lividas hujusmodi ægrotis unquam conspicuas fuisse. Utcunque licet hæc febris exanthematis plurimum malignis rarius insignebarur, haud tamen contagio vacabat. Quippe in eadem familia, pueros, & juniores successive fere omnes invasit, etiam non raro provecioris ætatis homines, qui ægrotantibus ministrando, circa eorum cubilia & stragula familiariter versabantur, eadem lue inficiebantur: at vero haud tanta suspicionis causa erat, ut propter ea ægrotantium amici ab eorum commercio aut visitatione omnino interdicerentur,

Quamquam hujus morbi decursus (nisi cum cerebrum intime obsideretur) tantummodo mitis apparebat, ac sine horrendo quovis symptomate peragebatur, tamen curatio ejus semper difficilis non nisi longo tempore successit: Etenim laborantes raro intra tres aut quatuor hebdomodas, immo ut plurimum vix intra totidem menses convalescebant. Quod si in homines præfractæ ætatis, aut virium, hic morbus inciderit, præsertim qui affectibus cephalicis, ut Lethargo, Appoplexiæ, aut spasmo erant prius obnoxii, eos sæpenumero breviori spatio interfecit: sin vero convalescentiæ spes ulla suberat, ista tarde admodum promoveri potuit (remediis quibuscumque vix levamen sensibile conferentibus) ut ægrotantes non citius extra febris hujusce sphaeram evaderent, quam intra tabis confinia sisterentur.

*Eorum ætiologia.*

Si prædictæ ægritudinis ratio formalis, & causæ inquirantur, facile hic constat, liquorem cerebri & nervosi generis irriguum, fere simul, atque sanguinem in culpa, & symptomatum præcipue urgentiam, causam immediatam fuisse: nempe in quantum



quantum iste latex, statim a primo morbi insultu solito pauperior, & quasi effectus evaserat, propterea in toto corpore languor & enervatio, cum lassitudine spontanea, ac impotentia ad motum, cumque subita corporis intabescencia agrotantibus accidebant. Porro quatenus idem liquor particulis heterogeneis, sc. partim narcoticis, partim explosivis refeciretur, idcirco stupor, fornicationis sensus, tendinum & musculorum subsultus, & contracturæ, nec non vertigo, scotomia, aliæque affectiones cephalicæ graviores suboriebantur: Porro aliquatenus ob succi nervosi labem, non cito aut facile emendandam, morbi solutio aut sanatio tam ardua ac diuturna extitit. At vero siquidem laticis hujusce vitium a sanguinis dyscrasia, etiam à cerebri constitutione prava, necessario dependet; quales eorum diatheses morbidæ fuerint, & quo ritu febris modo descriptæ symptomatis ortum, vel fomitem præbuerint, jam proxime videamus.

Quoad prius, videtur, quod hac tempestate propter anni constitutionem calidam, & humidam, ac à Borea (cujus nimirum corpuscula, sanguinem, & succos corporis nostri, conditura velut nitrosa imbuunt, eosque exagitando contraputredinem muniunt) minime perflatam, sanguis in plerisque hominibus, ac præsertim in pueris, adolescentibus, & sæminis, instar aquæ stagnantis, proindeque situm contrahentis, valde impurus, particulis heterogeneis refertus, atque ad lentorem & aquositatem vergens evaserat; in quo sc. spiritu, ac sulphure puriori aliquantum depressis, particulæ aquosæ cum sale & sulphure impuro simul evectis, nimis exaltarentur. Quamobrem sanguis tum propter crasin ejus vitiatam, tum ob particulas heterogeneas in sinu ejus uberius congestas, effervescentiæ febrili aut sua sponte, aut occasionaliter, aut propter contagium suscipiendæ habilior factus est, proinde ut plurimi hoc tempore febricitarent. Attamen sanguis, à miasmate febrili suscepto effervescens, non statim cum aperto incendio, sed tanquam ligna viridia

E s . . . . . foco



foco imposita, cum flamma velut suppressa, ac fumo plurimum obvoluta exardescibat. Quapropter materies morbifica, intra massam ejus aggesta, non (uti in febre regulari) deflagrando absumi, ejusque reliquiae statim tempore per crisin exterminari solebant: sed tamen mox a febris initio, istius materiae portio ingens, in caput vel thoracem, vel simul in utrumque suffusa, & postea iisdem partibus continuo suppeditata, aut praedictas cerebri, & nervosi generis affectiones, aut tussim cum dispositione tabida, vel simul utrasque inducebat: atque ob hanc rationem circa initia hujus morbi, cum pulsus debito celerior, & urina rubicunda, & contentis saturata, sanguinem ab intemperie febrili effervescente indicabant, aegrotantes de calore, aut siti minime conquesti sunt; quia nimirum sanguis effervescens impuritates & recrementa sua illico in liquoris nervosi penum, aut in pulmones deponebat; quare intra haec receptacula symptomata pejora statim acciebantur; postea tamen, morbo in statum evecto, calor nonnihil acris cum linguae scabritie in aliquibus satis molestus esse solebat: quinimo in omnibus febris lenta, & velut hectica perdurabat, quae nec sudore, nec transpiratione insensibili ita in totum amoveri potuit, quin illa quotidie, praesertim a pastu, licet tenuissimo, redintegraretur: quod equidem ita contigisse videtur, quia succus nervosus faeculentis a sanguine depositis satur, eas postea haud in copia tam uberi excipiebat, quin recrementa istaec una cum humore nutritio (siquidem & hic particulis solidis alendis minime absumeretur) intra massam sanguineam restantia, ipsam usque febriliter effervescente fecerunt.

2. Praeter hanc sanguinis diathesin morbidam ab anni intemperie contractam, videtur & cerebrum ab eadem ~~peragratum~~ in pathemata praedicta proclive factum. Cum enim longo temporis tractu venti austrini, cum humidiori aeris constitutione, jugiter spirarent; proinde cerebri meatus & pori plurimum laxati & aperti, ejusque compages nimis dissoluta, humoribus serosis, & particulis



ticulis quibuscumque heterogeneis aditum facilius præbebant: quare sanguis valde sæculentus & aquosus, quamprimum a febre effervescebat, recrementa ferosa, & sordes suas statim intra τὸ ἐγκεφάλου fores nimis patentes ingerebat: enimvero quotuscumque est, qui non humido cælo de capite nimis oppleto, & spirituum torpore queritur quia scilicet excrementitii humores in cerebrum a tali occasione laxatum irruunt: e contra hujus poris a frigore intenso, aut sicciori aere constrictis, sensus & facultates omnes vegeti magis & expediti perstant.

His ita de cerebri & humorum, nempe sanguinis & humoris nervosi apparatu, propter anni constitutionem morbido, præmissis, quo quidem plurimi tunc temporis in febrem lentam, inæqualem, diuturnam, symptomatis cephalicis & convulsivis stiparam, nec non ægre solubilem inciderint: hinc etiam facile erit reliquorum symptomatum & accidentium in isto morbo præcipue notabilium rationes extricare.

Primo etenim, quod hæc febris anomala in pueros, adolescentes, fæminas, & viros phlegmaticos potissimum defæviebat, in causa erat, quoniam in istiusmodi corporibus, & sanguis aquosior, minus perspirabilis, proindeque colluviem ferosam, & sæculentias heterogeneas congerere aptus est; quin & cerebrum humidius, debiliusque existens, sanguinis recrementa quævis facile suscipit. Quapropter observare licet, ejusmodi personas in convulsiones, propter alias ἐπαρτάς oriundas, magis proclives reperiri.

Secundo, insignis atrophia tam cito huic febri supervenit, quoniam ob succi nervosi depravationem nutriticus munia ab eo pendentia (quæ, prout alibi ostendimus, sunt maxime activa) protinus defecerunt. Quamvis enim minimè concedimus, humorem nervosum solummodo nutritium esse, sed materiam partibus alendis destinatam, in massa sanguinea præparatam, per arterias dispensari, attamen arbitrari fas sit, liquorem cerebri, & nervosi generis irriguum, sub ratione causæ efficientis

*Cur morbus hic pueros, fæminas & viros phlegmaticos potissimum invadit.*

*Atrophia huic febri supervenientis ratio.*



cientis, alimentationi plurimum conducere; hic enim spiritu animali turgescens, succum nutritium cuilibet parti a sanguine allatum actuat, & vigorat, eumque in corporis alendi meatus ac intimos recessus admittens, & velut intro manuducens, assimilatur. Quare cum hic liquor œconomus adeo depravatur, ut spiritus animales, circa nutritionis opus requisitos, haud rite suppeditent, membra quælibet ac partes, veluti stomachas in tono suo vitiatas, nutrimentum quodvis oblatum vel respuunt, vel proprium in usum recipere nequeunt: propterea quidem in hoc morbo, moles, sive habitus corporis utut plenior, aut obesus, plus ac citius deterebatur, quam in febre causode, ubi à calore intenso, aut sudoribus copiosis, longe plus evaporat. Cujus ratio est, quoniam in febre ardenti, licet sanguis valde effervescentius copiosius exhalat, interea tamen aliquid nutrimenti jugiter apponit, quod singulae partes, liquoris nervosi beneficio adjunctæ, facile excipiunt, & assimilant; verum in ista lue *νευράδεια*, quamquam materia nutritiva satis appareretur, tamen spirituum *δυσλειτουργικῶν* defectu, nutritio prorsus inhibebatur.

*Cur febris  
hac ægre  
solubilis.*

3. Ob prædictas rationes, etiam febris ista diutissime protracta, vix unquam critice judicari. ac difficulter admodum medicamentorum ope curari solebat: materies enim febrilis statim à morbi initio in liquorem nervosum irrepens, ab ejus sinu ægre postea, & non nisi longo tempore exterminari potuit: quippe hic latex motu segni, inque vasis obstrictis lente scaturiens, non uti sanguis effervescentiam depurativam, sive fermentationem sponte concipit, neque medicamentorum vires ad eum facile ac illibatae pertingunt: sed aut aliis partibus prius impenduntur, aut siquidem heterogenea sunt, à cerebro incongruum quodvis respuente, prorsus excluduntur. Equidem ob hanc rationem, quævis cerebri, & nervorum affectiones, medicinæ velut opprobrium facientes, difficillime sanantur. Itaque in hac febre, si quando labes cerebro & nervosogeneri impressa tolleretur  
vel



vel tussis immanis cum sputo copioso, vel tumores, & abscessus in collo succedebant: sc. materia morbifica, à sanguine resorpta, & rursus deposita, vel in thoracem, vel in glandulas, & emunctoria juxta cervicem confita. Cæterum hic morbus contumacior extitit, quoniam & sanguinis dyscrasia non facile emendaretur: nam licet ab initio latex ejus recrementis usque in liquorem nervosum suffusus, minus ac inertius effervesceret; postea tamen receptaculis hisce oppletis, & fæculentiæ morbificæ, ac insuper materies nutritia partibus solidis alendis minime impensa, usque in cruore refides, ipsum aggravabant, eique propter molesti hujus non miscibilis exclusionem, effervescentiam, non secus ac in febre hectica affollet, aut fere continuam, aut subinde repetere aptam inducebant. Enimvero sæpius observavi, in hac febre, à jusculis avenaceis, decocto hordei, alioque victu tenuiori, non minus ebullitionis in sanguine concitari, quam à jure carniæ consummato: nempe utrobique succus nutritius, è chylo in sanguinem suppeditatus, siquidem in nutritionis opus non impendebatur, velut quoddam heterogeneam, & non rite miscibile sanguini molestiam inferebat; atque ob hujus succi superflui particulas cum sero copiose amandatas, urina valde crassa, rubicunda, & contentis plurimum saturata existeret: Etiam ob hanc rationem alvus plerunque soluta fuit, in quantum sanguis succo nutritio satur, minorem chyli portionem è visceribus exugebat, atque istius, quod ipsi inferebatur, partem intestinis reinfundebat, intemperies insuper febrilis tamdiu cruori inherebat, quia donec regimine animali restituto, nutritio rite perageretur, materies ista superflua in massa sanguinea congerebatur.

Febris prædictæ typum, ejusque Ætiologiam ideo fusius tradidimus, quoniam idem morbus apud nostrates etiam aliis temporibus sporadice increbuit: eo quippe nuper in hac urbe cujusdam familiæ juniores successive omnes ægrotabant: quin & olim memini plures à tali febre laborasse. E variis, quæ  
prostant

I.  
*Observatio*



prostant ab ea, quando epidemica fuit, ægrotantium historiis & exemplis, libet hic unum aut alterum proponere.

I.  
*Observatio.*

Juvenis robustus & floridus sub initium veris Anni 1661. sine causa evidenti ægrotans, absque calore aut siti intensis, cito debilis & quasi enervis, cum appetitu dejecto, & spirituum languore evasit. Remedia cathartica, antipyretica, digestiva, quin & antiscorbutica, aliaque varii generis, ex medicorum celebrium præscriptis, adhibita, nequicquam profuere: attamen æger usque languidus, cum febre lenta & vaga, pulsu celeri & debili, urina intense rubicunda, per sesquimensum decubuit: insuper ad summum marcorem redactus de vertigine, aurium tinnitu, & sonitus in capite velut fluctuatione conquestus est: Licet magno stupore afficeretur, tamen somni erant valde perturbati, ac interrupti, cum fabulatione delira. Post 40. dies, cum febris nondum declinabat, visum erat, sanguinis circiter 3 iij. vel v. evenis sedalibus hirudinum sucu detrahere; hinc statim febris plurimum exacerbari coepit nam calor magis intensus, cum siti, vigiliis, & corporis jactatione fere continua, etiam lingua exicca & scabra evasit; dein brevi, tussis molesta, cum sputo copioso & decolori, successit: Huic amygdalata & hordeata, cum bechicis temperatis incoctis, aqua e lacte, cum limacibus, & herbis thoracicis destillata, pulveres testacei, nitrum præparatum, insuper opiata cardiacæ sedulo exhibebantur; quibus tamen vix ullum juvamen conferentibus, æger usque debiliior factus erat: Cumque hoc ritu, supra bimestre spatium ægrotans, febrili intemperie, & tussi etiam indies in pejus euntibus, obitui approximari videretur, tandem diaphoresi sponte oborta, noctibus modo singulis, modo alternis sudore copioso perfundebatur, & exinde paulatim semelius habens, prædictis remediis deinceps usus, intra 6. hebdomadas integre convaluit.

Morbum hunc, donec plures eodem ritu ægro-  
tasse cernerem, omnino febrem hæcticam, cum  
tabida



tabida pulmonum diathesi, suspicatus fueram; at-  
tamen cum multi alii tunc temporis simili mo-  
do passim decumberent, hujusce febris Ætiolo-  
giam, qualis supra describitur facile instituebam:  
nempe quod sanguis, propter anni intemperiem,  
& forsan errata in victu, procatarxin vitiosam  
contraxerat: dein iste febriliter effervescens, at-  
que impuritates suas statim cerebro ingerens, ejus-  
que adeo, & nervosi generis succum irriguum de-  
pravans, affectus vertiginosos, cum stupore, spi-  
rituum languote, & totius corporis atrophia indu-  
cebat: quamdiu autem sanguis recrementa sua e  
proprio sinu in cerebrum, ac appendicem nervo-  
sam transferebat, effervescencia febrilis blandius  
ac mitius peragebatur: Postea tamen, quando  
hæmorrhoidum apertio materiæ morbificæ  
a cerebro avocarat, eadem primo intra mas-  
sam sanguineam retenta febrem auxit; dein pulmo-  
nibus suffusa, tussim immanem cum sputo copioso  
excitavit: quatenus autem pulmonum caro usque  
a putredine immunis perstitit, quamprimum col-  
luvies serosa per uberiores diaphoresin foras a-  
mandaretur, ægrotans a tum febre, tum a phthisi  
deplorata visa, incolumis evasit.

*Ejus Æ-  
tiologia.*

Interea dum iste decubuit, alium 12 circiter  
annos natum pari modo affectum invisi. Hic au-  
tem cum primo accerferet, supra mensem ægro-  
tans in sceleti marcorem redigebatur: porro  
vertigine, cum aurium tinnitu, & surditate, ac  
insuper tussi violenta, cum sputo flavo, ac velut  
tabido afficiebatur: fuit pulsus celer, & debilis,  
urina rubicunda, & crassa, appetitus plurimum  
dejectus, spiritus ita languidi, ac vires prostratæ,  
ut lecto abstinere nequiret. Huic aquam e lacte  
cum limacibus & herbis temperatis destillatam  
sæpius in die propinavi: insuper decoctum aperi-  
tivum, quale in rachitide usitatum est, vice po-  
tus ordinarii quotidie assumendum præcepi. Cu-  
jusmodi remediorum ope intra mensis spatium  
sanitati restituebatur. Hoc tempore ad plures alios  
cujusque ætatis, & sexus homines, eodem morbo  
tunc plane epidemico affectos, vocabar: nam iste  
per

2.  
*Observatio:*



per totas familias grassatus, non tantum in hac urbe, ejusque vicinia, sed in regionibus longe distantis, prout à medicis aliorum locorum incolis, audiui, increbuit. Plerique ab hac febre laborantes, modo alioqui essent sani, idoneo circa medicinam & diætam regimine usi, convalescebant: Illis sæpe numero male cessit, qui aut senio fracti, aut inveterudinaria cerebri & nervosi generis constitutione præditi fuerunt; cæterum non raro ægrotantium casus aleæ periculosa subiciebantur; quia Medici non statim à morbi initio, quinimo vix antequam hujus radices altiores jaciebantur, ipsaque medendi occasio præterierat, accersi solebant.

3. *Observatio.* Propterea namque hæc febris in viri cujusdam prænobilis familia, inter natos ejus, affectionibus cephalicis originaliter obnoxios, admodum funesta evasit. Circa æquinoctium vernale, puer in ætate circiter undecim annorum ægrotare cœpit: Imprimis absque calore, aut siti intensis, appetitus dejectio & virium languor accesserant: Insuper, vertigo fere continua molestabat, cum crebro lipothymias metu, ut sæpius animi deliquium instare putaverit. Huic ex mulieris cujusdam ministrantis consilio clysteres quotidie injiciebantur: dein cum ex linguæ, orisque spurcitie, febris signa manifesta apparerent, Empirica ista, die quintovomitorium ex infusione croci metallorum propinabat, atque die septimo pulvere cardiaco exhibito, ægrotum stragulis coopertum ad sudandum incitabat: vix cutis madefieri cœperat, quin statim hic delire loquutus, de pileo suo in aquas delapso conquestus, mox ἀπαύδης factus, intra quatuor horas, dum modo egomet accerserer, ante adventum expirabat.

4. *Observatio.* Brevi posthæc, sororem ejus ætate minorem, idem morbus incescit: cujus tamen ægritudo, quoniam tussis crebra, & humida stipata fuerat, primo tantum frigoris susceptio putabatur; verum intra paucos dies, ista tussis plane convulsiva evasit: adeo ut inter tussendum, diaphragmate sursum elato, & cum systole repetita ita aliquandiu retento,



retento, stridor ingens, & velut suffocativus ederetur: dein puellula hæc apertius febricitans, ac de siti & calore conquesta, noctes insomnes cum insigni corporis agitatione ducebat, atque propediem delire loquuta, uti prius frater ejus, de veste sua in aquas delapsa querebatur; cumque omnia in pejus ruerint, motibus convulsivis, primo in artubus, mox in facie, & subinde in toto corpore tentari cœpit: paroxysmi crebra vice, nempe bis, aut ter intra horam repetentes, gravissime urgebant, adeo ut misella hæc, intra nycthemeri spatium, à quo affectiones spasmodicæ graviores exortæ fuerint, spirituum animalium tenore penitus labefacto, fatum obierit. Dum paroxysmi convulsivi urgerent, pulsus erat plurimum inordinatus, ac sæpe intermittens, etiam vomitione crebra afficiebatur. Ad hanc invisendam, etiam sero nimis, sc. paulo ante obitum, accersitus, cum nihil vitæ prorogandæ contribuere potuissem, quantum licebat ex morte ejus, in prædicti morbi diagnosin inquirere satagebam, proinde cadaveris dissecandi venia impetrata, symptomatum in hac febre præcipue urgentium rationes & vestigia clarius patebant.

Itaque ventrem inferiorem primo aperiens, *Morbi diagnosin a dissecto cadavere investigata.* viscera omnia in eo contenta satis sana & sarta resecta inveni: Ventriculus, licet inani vomitione crebro laceffitus, nihil præter liquorem nuper ore ingestum continebat: etenim neque in ipso, nec in appendice ejus lumbrici, aut acres humores (qui sæpe ejusmodi convulsionum causæ perhiberi solent) reperiebantur: intestina tenuia pluribus in locis mutuo involvebantur: nempe partis unius superficies convexa, in alterius concavam, tanquam in vaginam fuit intrusa, & alte recondita quod quidem a viscerum istorum motibus convulsivis omnino contigisse arbitror; dum enim ob spasmus vehementem ab origine nervosa excitatum, fibræ oppositæ simul convulsæ, idem intestinum una in motus contrarios agerent, facile eveniat, ut intestini ilei pars una sursum lata, alterius deorsum raptæ, cavitatem incurreret.

Thorace



Thorace aperto, pulmonum caro valde rubicunda, & velut cruore suffusa, immo in quibusdam locis quasi livida, & fere nigra apparebat: ex eadem ubivis discissa ichor tenuis & spumofus exudabat. Certe hoc indicio constitit, materiam febrilem, sive serosas sanguinis effervescentis impuritates illico pulmonibus impactas, eorum poros & meatus adeo infervivisse, ut ipse sanguis, solito, & liberiori ejus circuitu præcluso, ibidem stagnans, & extravasatus, inflammationem quandam excitavit.

Nec minus clara morbi hujus adeo funesti vestigia in capite deteximus: nam calvariae olla amota, statim vasa meningas perreptantia, sanguine plurimum turgescere conspiciebantur, quasi fere tota cruoris massa, in capite aggereretur: venis enim circa viscera imi ac medii ventris sectis aut disruptis, parum sanguinis effluxit: porro membranae istae, ubi cerebellum investiant, atque altius instratae ipsum a cerebro dirimunt, sanguine pluribus in locis extravasato suffusae, colore atro-purpureo insigniebantur; ut minime dubitandum esset, quin phlogosis, sive inflammatio illic circumcirca excitata, convulsionum adeo atrociter infestantium causa fuerit. Integumentis hisce ablatis, cerebri substantia prorsus madida, & humore aquoso supra modum irrigata videbatur: quinimo ejus cortice exempto, ventriculi omnes aqua limpida erant repleti, cujusmodi pellucidi liquoris plusquam librae semissem eximere licuit.

*Prædicta  
febris pathologia.*

Ex his phaenomenis praedictae febris pathologia facile colligitur: Nempe in hac ægrotante, sicut etiam in plerisque aliis, sanguis febriliter effervescebat, statim recrementa sua tum in pulmones, tum in cerebrum deponebat; quare serosa colluvies utriusque compagem illico inundabat; dein propterea sanguis, & hic & illic a debita circulatione præpeditus, circa partium affectarum confinia plurimum coacervari, demum stagnare, & quasi phlogosin inferre coepit: hinc ob serum in pulmonibus copiose aggestum, & calore assatum,

tussis



tussis molesta, cum sputo crasso & decolori, plerunque isti morbo supervenit; atque ob similem affectionem intra ἐνέφαλον excitatam, vertigo, scotomia, stupor, aliave pathemata cephalica, laborantes fere constanter incessabant: Cujusmodi affectus in hac puellula ac in fratre ejus, propter cerebri constitutionem in utroque prius invaletudinariam, graviores facti, in apoplexiam terminabantur. In promptu hic esset plures alias ab hac febre tunc temporis ægrotantium historias proponere; verum ex his modo citatis morbi prædicti typus satis innotescat: Quoniam vero eadem febris quosdam prædispositos fere quotannis incessit, & propter malam anni constitutionem forsitan aliquando posthæc epidemica evadet, ex refore videtur, circa curationem ejus methodum quandam adumbrare.

De qua imprimis annotetur, in hac febre dies criticos, prout in syncho vulgari, nequaquam observandos esse: etenim sanguis, quamprimum effervesce incipit, materiæ morbificæ partem adhuc crudam, ac minime subactam, e complexu suo statim capiti aut thoraci suffundit: Quapropter incassum esset expectare, ut sanguis particulas heterogeneas in massa sua ad plenitudinem congeri sinat; dein ut efflorescentia statis temporum intervallis oborta, easdem subtiliatas foras excernat: Quinimo iste effervescens, haud magno, & aperto incendio gliscit: verum instar ignis cespitibus cooperti, fumum sive halitum madidum, potius quam flammam emittit: ita tamen ut exinde propter succum nervosum statim in crasi depravatum, & non raro ob pulmones materia tabifica infarctos, symptomata aut convulsiva aut phthisica in toto morbi decursu præcipue urgerent.

Intentiones curativas juxta varia morbi tempora & symptomatum præcipue urgentium diversitates designare oportebit. Circa febris hujus initium, sanguinis missio fere omnibus convenire videbatur: Hoc remedii genus sæpe parvulis cum fructu expertus sum: Quippe hoc modo, cruoris

*Methodus  
therapeuti-  
ca,*

*Initio mor-  
bi sanguis  
missendus.*

massæ



massæ tacite ac cooperte effervescenti, fuliginis-  
que suas in partes nobiliores obtrudenti, spiracu-  
lum quasi aliud aperitur, proindeque efflorescen-  
tiæ ejus impuræ a cerebro & pulmonibus evocan-  
tur: quanquam igitur hæc febris mali moris ali-  
quatenus maligna audiat, attamen in quantum  
sanguis haud statim coagulari, sed fundi nimis, &  
serositates suas in partes nobiliores, nempe cere-  
brum & pulmones suggerere aptus fuerit, idcirco  
phlebotomia, modo in principio morbi celebra-  
tur, fere nulli non convenit.

Propter eandem juvaminis rationem, medica-  
menta cathartica, ac imprimis vomitoria, statim  
a morbi principio adhibentur; hæc enim non mo-  
do coctionis viscera evacuant, adeoque & morbi  
fomittem primum, & quasi originalem subdu-  
cunt, verum insuper a sanguine serositates emul-  
gent, adeoque purgamenta ejus potius in stoma-  
chum & intestina, quam in caput aut pulmones  
suggeri faciunt. Porro ab emeticis, in quantum  
glandulæ lymphæductuum exceptrices, cum suc-  
cussione magna vellicantur, succi nervosi super-  
fluitates, ne cerebrum, ejusque appendicem ma-  
le afficiant, in viscera inferiora exprimuntur: e-  
tiam in hunc finem, crebro enematum usu, alvus  
continuo soluta teneatur. Interea tamen dum san-  
guis hujus morbi labe inquinatus, cerebro, aut  
præcordiis malum minatur, haud tutum erit, aut  
diaphoreticis, aut diureticis, aut etiam catharticis  
fortioribus quidpiam moliri: hujusmodi enim  
pharmaca, quatenus sanguinem valde fundunt,  
& serositates ejus in exitus aperiores adigunt, re-  
crementa quævis a cruoris massa abscedere apta,  
cerebro, aut pulmonibus, si quando debilioris sint  
constitutionis, facile obtrudunt: Ita in juvene  
supra citato, sudore intempestive citato *æroia*  
supervenit: Novi etiam in morbida pulmonum  
diathesi sudorifica, non secus ac chalybeata, tabem  
intulisse.

*Emetica &  
cathartica  
exhibenda.*

Itaque phlebotomia, & si opus fuerit, vomি-  
tione, aut catharsi, sc. altera, aut ntraque mox  
ab initio morbi celebratis, cæteræ intentiones e-  
runt,



tunt, sanguinis ferositates morbificas, in caput & thoracem exundare aptas, avocare, perque alias evacuationum vias leniter derivare, & foras excernere. In hunc finem vesicatoria circa nuquam aut parotidas, juxta alas, aut inguina, circa femora, aut furas, sc. modo in hac parte, modo in ista applicare debent; nimirum ut ulcuscula hic illic excitata, & continuo manantia, serum particulis heterogeneis & morbidis imbutum copiose profundant.

Vesicatoria.

Cæterum remedia serum in renes & vias urinarias blande ducentia, sæpissime cum fructu adhibentur: In hanc rem Apozemata, & Julapia diuretica juxta formulas sequentes instituantur.

Diuretica.

R. Radicum scorzonera, cheresolis, graminis, cryngii condit. an. ʒvj. pumum j. incisum, folior. pimpinella, Ulmaria. an. M. j. passular. ʒj. β. C. Cervi usti ʒij. incis. & contus. coquantur igne claro in aq. fontana lb iij. ad tertia partis consumptionem, colatura clara lb ij. adde syrupi acetositis citri, aut violar. ʒij. salis prunella ʒj. β. f. Apozema. Dosis ʒ iij. ad vj. ter in die.

Apozema

diureticum.

Vel colatura ista superaffundatur amygdalar. dulcium excorticatar. no. 15. & 4. sem. frigid. an ʒj. contusis. f. a. fiat Emulsio.

Emulsio.

R. Aq. Dracontii, cerasor. nigror. an. ʒ iij. scordii compositi ʒij. Theriacalis ʒj. β. syr. Caryophyllor. ʒij. sp. vitrioli gut. xij. f. Julapium.

Julapium.

Sal prunellæ sæpius in die ad ʒ β. vel ʒ ij. pro- pinetur in cerevisia tenui, vel sero lactis.

Pulvis.

Porro in hac febre medicamenta blande diaphoretica, ejusmodi imprimis, quæ spiritus animales restaurant, eosque copula quavis heterogenea vindicant, egregii sunt usus: quare aut margaritarum pulvis, aut spiritus C. Cervi, vel sanguinis in modica dosi bis in die, sc. mane & vespere, exhibeantur.

Blande]

diaphore-

tica.

Enemata quolibet fere die injiciantur, & si opportunum videatur, pharmaca leniter solutiva, semel aut bis in septimana repetatur.

Enemata.

Victus non nisi tenuis, qualis nimirum in aliis febribus affolet, instituat, carne, aut brodio ejus penitus interdictis, solum jusculis avenaceis

Victus.

aut



aut hordeaceis æger vescatur, potus sit cerevisiæ tenuis aut feri lactis.

Quod si non obstante *προσολαζή* quavis medica, materies morbifica cerebrum, aut pulmones, vel simul utrumque occuparit, ita ut functionis animalis deliquium & inordinatio, aut etiam tussis violenta ingruerint, considerare oportebit, quid in utrolibet morbi statu, in conditionem malam ad hunc modum evecto, agendum fuerit, tunc autem indicationes curativæ respicere debent stuporem, aut insaniam, aut tussim: atque demum si morbo in declinatione posito, hæc symptomata remittent, contra Atrophiam, velut ultimum hujus febris popugnaculum, remedia appropriata adhibeantur.

*Methodus  
therapeutica  
in stupore &  
insania.*

1. Itaque si materia morbifica, uti crebro asolet, cerebro illata, stuporem aut affectus soporosos intulerit, remedia ipsam alio deducant, & quoquomodo a capite derivantia, insuper quæ spiritus animales exuscitant, & copulam impuram exuunt, sedulo administrari debent. Quare in hoc casu exterius Epispasticorum usus plurimum augeatur, spiritus C. Cervi fere sexta qualibet hora in dosi paulo majori exhibeatur, sanguis adhuc amplius e venis Jugularibus salvatella, aut etiam ex venis sedalibus hirudinum sucu detrahatur. Si affectus minime remittit, capillitio derafo, fotus emollientes capiti sæpius applicentur: porro cucurbitæ, emplastra, & cataplasmata plantis pedum admovenda, aliique administrationum modi, quales pro stupore curando vulgo indicantur, adhiberi debent: pariter, si malæ, aut nulli hujus febris crisi, phrenesis, aut mania supervenit, remedia in istis affectibus appropriata usurpentur.

*In tussi.*

2. Sin vero, cum vel sine hujusmodi plaga capiti illata, etiam pulmones morbi noxam luunt, ita ut ægrotantes, necdum febre immunes, cum tussi molesta, sputo copioso & crasso non, raro item discolori, in tabem, sive phthisin incidisse videantur, medicamenta in hujusmodi affectibus communiter indicata, satis conveniunt, quare decocta



ſta pectoralia, Eclegmata, ſyrupi, aquæ lactis & limacum deſtillatæ, aliaque hujus farinæ remedia diligenter uſurpari debent, quorum formulæ in caſibus ſupra deſcriptis reperiuntur.

Hactenus febrem continuam, maxima ex parte convulſivam, atque ex ſucci nervoſi non minus quam ſanguinis vitio oriundam deſcripſimus: Inſuper hic ſubeſt morbi, febris intermittentiſ typum referentiſ, atque in ſucco nervoſo potiſſimum radicati exemplum proponere; cujuſmodi affectuſ, ſiquidem oppido rari, atque ad pathologiam ſpaſmodicam rite pertinentiſ, natura ex ſequenti hiſtoria eluceſcet.

Mulier lætiſſima, tenera admodum, atque cerebri & nervoſi generiſ conſtitutione imbecilliori prædita, proindeque affectibus ſpaſmodicis valde obnoxia, poſtquam utero conceperat, circa quartum gravidationiſ meſem, a frigore ſuſcepto paroxyſmiſ aſthmaticiſ, inſuper crebriſ ſpirituum deliquiſ graviſſime affligebatur: Verum ab hujusmodi pathematiſ remediorum ſale volatili prædictorum uſu intra binas ſeptimanas convaluit; attamen deinceps poſt ſeſquimeſem affectio inſolita & plane admiranda hanc dominam inceſſit.

Quodam mane, poſt ſomnum ea nocte minus tranquillum evigilans, in toto corpore levem rigorem; tamquam urgente febris tertianæ paroxyſmo patitur: ſuccedunt crebræ oſcillationeſ & pandiculationeſ, cum frequenti vomendi nixu: dein urina, quæ modo fuit citrina cum hypoftaſi laudabili, pallida & aquoſa evadit, & crebra vice, ſc. fere quoviſ horæ minuto excernitur: porro circa lumbos & hypochondria, aliſque in lociſ doloreſ cum ſpaſmiſ levioribuſ huc illuc tranſcurrenteſ excitantur: Cujusmodi ſymptomata plane ſpaſmodica, cum crebrourinæ limpidæ miſctu a mane fere ad velperam perſiſtunt; quotemporiſ ſpatio, lotii quantitas ingeſ, nempe triplex ad minus ſupra liquorem aſſumptum redditur; interim nec calor intenditur, nec ſitiſ urget, neque pulſuſ augetur: velperi affectuſ prædicti ceſſant, atque urina ruruſ citrina, ac modica evadit; toto inſuper nocte ſomno

*Observatio  
oppido rara.*



*Ejus A-  
etiology.*

somno moderato fruitur, dein mane sequenti juxta eandem horam redit paroxysmus, simili prorsus symptomatum apparatu stipatus, & quotidie eandem omnino tragœdiam peragit.

Hanc Dominam, postquam per duodecim dies hoc ritu ægrotarat, invisens, prædicti casus hujusmodi Ætiologiam instituo: Nempe quod morbus iste in nervoso genere potissimum radicans, ab humoris partes nerveas irrigantis effervescentia & fluore dependeat: Enimvero suspicari licet hunc laticem a sanguine, propter catamenia suppressa degeneri factò, in cerebrum, & nervosum genus diffusum, plus debito acrem ac serosum, proindeque partibus continentibus incongruum evadere: quare a somno nocturno ad plenitudinem aggestus, eas propter sui expulsionem ubique in corrugationes, contractionesque irritat: hinc in toto corpore rigores, pandiculationes, oscitatio crebra & dolores vagi excitati: porro a partibus solidis hoc modo contractis & concussis non tantum liquor nervosus, sed etiam nutritius partibus solidis ubique appositus, necdum vero assimilatus excutuntur: ac dein uterque latex receptaculis suis exterminatus, & per lymphæductus aut venas exceptus, massæ sanguineæ redditur: e cujus sinu, priusquam ab eo tincturam lixivialelem acquirat, per renes denuo secretus urinam limpidam & copiosam constituit: quod autem affectus isti periodos adeo exactas observant, ratio est, quia latex nervosus inæquali dimenso suppeditatus, stato quotidie tempore ad turgescentiæ plenitudinem assurgit: propterea item urina ante & post paroxysmum concocta & citrina apparet, quia tunc materia ejus tantum e sanguinis sero constat: postea durante accessione spasmodica humor limpidus a partibus nerveis & solidis excussus, & sanguinem cito trajiciens, lotii quantitatem & colorem alterat. Huic gravidæ phlebotomiam ac insuper pulverem e corallio, margaritis, ebore, aliisque cardiacis compositum in liquore appropriato ter in die sumendum præscripsi; mane & vesperi cepit tincturæ antimonii (cujus affectum in nimio urinæ pro-



profluvio singularem aliquoties expertus sum) gut. 12. Horum usu intra breve tempus sympto- mata omnia remittebant.

CAPUT IX.

*De spasmodis universalibus, qui propter succi nervosi diathesin scorbuticam excitari solent.*

**H**actenus de spasmodis universalibus per totum genus nervosum diffusis, qui febribus superveniunt; ac speciatim de convulsionibus, quæ in febre maligna hectica vulgo dicta, excitari solent. Restat adhuc (quod tertio erat propositum) ostendere, quo ritu, & quibus de causis, spasmi universales, absque veneno, aut miasmate febrili, propter succi nervosi dyscrasiam scorbuticam, aut alias vitiosam inducuntur. Enimvero liquor tum nervos, tum partes nerveas irrigans, interdum a crasi naturali acidonea desciscens particulis heterogeneis & explosivis in tantum refertur, ut spiritus animales copulam incongruam, sibi inter ubi accrescentem, admittentes, in continuos velut crepitus, sive explosiones convulsivas irritentur: ejusmodi spirituum affectiones aut sunt divisæ, sive discretæ, inter quas nulla communi- catio aut dependentia intercedit, sc. quando multæ partes corporis simul totidem spasmodis sibi propriis afficiuntur, qui se invicem successive non excipiunt, sed in eodem musculo aut mem- bro ubi incipiunt, terminantur: quo ritu novi quosdam ægrotantes, quibus muscoli & tendines simul omnes in toto corpore totidem distinctis convulsionibus perpetuo subsilirent. Vel secundo affectiones convulsivæ, quæ in toto genere nervoso simul excitantur, sunt continuæ, sive connexæ, quæ perpetua quadam vicissitudine inter se continuatæ invicem succedunt: in quantum membro- rum fere omnium motus inordinati sese mutuo excipientes, ab una parte exorti, mox in alias

*Spasmodis u-  
niversales  
propter suc-  
ci nervosi  
diathesin  
scorbuticam*

*Horum dua  
species, sc.  
discretæ &  
connexæ.*

F transeunt.



transeunt. Ita nimirum Horstius refert puellam motibus convulsivis obnoxiam, cujus non tantum membra, & artus in diversimodas flexiones, ac distortionem urgebantur, verum insuper illa, tanquam malo spiritu agitata, eodem loco stare impotens, in hypocausto hic inde discurrere, & saltare usque necesse habuit; neque ulla vi, aut increpatione detineri potuit, quo minus hinc inde cursitaret; se modo in pedes conjiceret, modo alias se impetuosè jactaret; nam si vel paululum tantum subsistere conaretur, statim præcordia gravissime affligebantur. Quare præsentis instituti res est in utriusque affectionis convulsivæ, nempe tum illius quæ per tendinum & musculorum una plurium subsultus, tum hujus, quæ per membrorum, aut totius corporis cæstra & inquietudines peragitur naturam, & causas paulo exactius inquirere: exinde ut constet qualis medendi methodus in utroque casu adhiberi debeat.

*Affectionis  
convulsivæ  
intercisi-  
væ natura.*

1. Quod itaque spectat ad speciem priorem, facile occurrit ejusmodi affectus non simplices, sed complicatos esse, nimirum ex spasmo & paralyti: Nam licet muscoli, & tendines motibus convulsivis perpetuo urgentur, tamen ægrotantes enervæ facti, membra quævis, aut totum corpus strenue movere nequeunt: quinimo his pathematis, dolores per singulos artus æque diffusi adjunguntur. Hinc inferre liceat, spiritus animales copula multiplici, sc. particulis tum explosivis tum narcoticis, tum etiam aliquatenus irritativis imbuti: adeo ut quamvis semper onusti, explosiones ineunt, tamen nec plures simul, ob particulas alias alius generis interjectas, nec quidem ulli expedite ac vegete explodantur; quare impetus motivus haud longe pergit, sed brevis usque & interruptus existit: Res fere simili modo habet, ac cum pulvis nitratus humore limoso subactus ignitur: quippe non tota simul massa cum fragore eliditur, nec una acervus illico alium accendit, sed pauca tantum grana, eaque successive, sc. alia aliquandiu post alia, cum exiguis crepitibus exploduntur: pariter & liquor nervosus, particulis spasmodicis quæ spiritibus



spiritibus usque accrescunt, per totum refertur: in quantum vero quædam narcoticæ, aliæque dolorificæ illis admiscuntur priorum vis elastica, utut perennis, & valde diffusa, tamen multum refringitur, ac ubique interciditur.

Pro illustranda hujusmodi affectione *σπασμωδία* *Observatio.* intercisa, libet hic generosi cujusdam in hac vicina nuper degentis, casum maxime notabilem describere; cui quidem plane stupendo vix medicorum scripta; aut observationes ullæ parem suggerunt. Vir Illustrissimus quem refero, parentibus proavisque aut cerebri, aut nervorum dispositioni alias morbidæ obnoxiiis oriundus, circa ætatis suæ *ῥῆγε ἡλικίᾳ* seminii istius *νοσέων* fructus luere cœpit: primo enim artuum debilitate, stupore, & spasms levioribus tentari solebat, cujusmodi affectibus cum diu laborasset, demum curationis gratia Bathoniam adiens, thermis calidioribus nimis crebro usus, vice remedii, tantam morbi exacerbationem retulit, ut ab isto tempore prædicta symptomata non amplius per vices, sed fere constanter urgerent, nimirum singulos artus, imo quamvis partem corporis motus convulsivi, & tensiones dolorificæ incessanter exercebant, ita ut muscoli simul omnes subsultibus repetitis perpetuo convellerentur, idque non sine insigni cruciatu: cujus unica sedandi ratio in hoc sita erat, ut corpus modo totum, modo aliqua ejus membra motu locali perpetim exercebantur: quamdiu enim evigilabat, in lecto vel sedili agitari, aut in curru vehi, aut membra comprimi vel fricari necesse habuit; in quem finem illi parabantur cathedræ & lecti cum basi arcuata, uti sunt puerorum incunabula, in quibus cum decumberet vel erectus sederet, huc illuc, motu versatili, continuo agitaretur; quod ni fieret, immani dolore & musculorum tensionibus atrocioribus infestabatur: Hujusmodi diurnam affectionis spasmodicæ molestiam tempore nocturno, & statim a somno symptomata longe graviora exceperet: nam recens expergefacto, illico totum corpus horrescere, muscoli tensionibus dolorificis plurimum exerce-



ri, singuli artus, velut instanti mortis agone, sudore squalido perfundi solebant, qui in tantum corrosivus erat, ut instar aquæ fortis, liatæ, ni statim abluerentur, cito exederet, & corrumpere-  
 ret. Æger durante hoc conflictu, sudores inter & horrores per plures horas torquebatur, donec penitus defatigato somnus obrepens levamen aliquod afferret; quod si paroxysmo ingruente protinus e lecto excitaretur, melius habuit, adeoque solitam affectus ferociam præcavebat: idcirco quamprimum a somno expergisceretur, licet hoc intra horæ semissem contingeret, illico ut torturam evaderet, domesticis ascitis, statim lecto eximebatur: quantum ad appetitum satis valens, absque nausea comedebat, neque a comestis stomachus turbabatur: sæpe tamen de cardialgia querebatur, ac interdum sputatio molesta cum foetore oris, velut ab assumpto mercurio, per plures dies eum exercuit. Calidiora quævis tum alimenta, tum pharmaca constitutioni ejus minime congruebant; vinum, aut cerevisiam generosiorum ne pitissare audebat, Primis ægrotationis suæ annis ad conspectum ignis horrescebat postea imbecillior factus, licet urgente bruma, prope focum sedere renuebat; urina semper fuit citrini coloris, quæ si in vase fictili supra prunas evaporaretur, fœculentiæ salinæ, supra dimidium liquoris, in fundo residebant; alvus continuo astricta, nisi a pharmacho, aut enemate irritata sarcinam nunquam deposuit. Quinimo præter motus convulsivos paralyxis spuria totius corporis membra quævis occupabat, nec enim manus attollere, aut pedes gressui accingere potuit, linguavacillans verba non nisi imperfecta protulit, interdum vero cum ex occasione gaudio repentino gestiret animus, spiritibus, & robore mire exuscitatis, e cathedra subito surgere, & sine alterius ope recte incedere, & salire valebat, quod tamen intervallum, vix horæ minutum durabat, quin membra denuo vacillarent, & solito languore & tremore afficerentur. Cum supra duodecim annos Dominus insignis ad hunc modum ægrotabat, Medicorum in tota  
 Anglia



Anglia maxime celebrium confilia adhibuit, & remedia quamplurima; ac fere nullius non generis tentavit, sc. antiparalytica, antiscorbutica, diætæ exiccantes, sudoríferas, purgantia, cauteria, balnea, linimenta, quin & salivationem bis expertus est, verum nulla ejusmodi medendi methodo sanari potuit, quare dimissa penitus curationis spe, per septem posteriores vitæ suæ annos, tantum remedia, quædam symptomata præcipua respicientia usurpavit, sc. ter in septimana medicamentum solutivum ex senna & rhabarbaro, cum correctivis, in forma modo syrupi, modo extracti cepit; opiatæ ex conservis & speciebus temperatis dosin qualibet nocte sumere solebat: porro Julapium pro data occasione, cum spiritus fatiscerent, sumendum præsto habuit: insuper cerevisiam avenaceam, herbis temperatis & diureticis alteratam, continuo bibebat. Horum usu septem ut minus annos, sine magna in pejus alteratione, transegit; tandem ingravescente senio, simul ac morbo, spasmodum paroxysmi atrociores, non uti prius, somno peracto, sed quamprimum lecto incalesceret, ipsum invaserunt, ut necesse habuerit lecto suo omnino abstinere, atque vestimenta raro, nisi ut lintea mutarentur, exuere: hinc transpiratione impedita, recrementa serosa, aliaque evaporari solita, in pulmones defigebantur, quæ primo respirationem crebram, postea affectionem asthmaticam, ac denique tabem lethalem intulere.

Si prædictorum affectuum rationes inquirentur, obvium erit universa hæc mala a prava cerebri & nervosigenis constitutione, ac immediatius succi istas partes irrigantis dyscrasia, ac vitio deducere. Nam cum liquor iste, in quo spiritus animales scaturiunt, quoad temperiem summe acris, & instar aquæ stygiæ corrosivus esset, & quoad mixtionem particulis tum narcoticis, tum explosivis referciebatur; haud mirum est, propterea spiritus plurimum onustos, proindeque a debita expansione cohibitos, ubique in minutas explosiones, seu velut crepitus urgeri, quin & corpora

*Symptomatum præcipue urgentium rationes.*



continentia, a debita tensitate, & robore exoluta. etiam in corrugationes dolorificas continuo irritari.

*Exacerbatio mox a somno unde processit.*

*Cur motus sedatur.*

*Ptyalismus natio.*

Affectiones istæ spasmodicæ mox a somno acrius inestabant, quoniam calor lecti heterogeneas succi nervosi particulas exuscitat, easque rarefaciens velut in explosiones adigit; tum etiam quia partes nervosæ in somno succum suum, ac cum eo simul allatæ materiæ morbificæ penum uberiores, imbibunt; quibus ad plenitudinem saturæ, primo evigilationis instanti, protinus quod molestum est excutere nituntur. Propter hanc rationem, observare est scorbuticorum dolores, & asthmaticorum paroxysmos a lecti calore, atque a somno plurimum ingravescere; ideo statim lecto eximi, ut his, ita ægroto nostro levamen conferre solebat: Quod autem molestia a continuis musculorum subsultibus, & tensionibus dolorificis excitata corporis, aut membrorum motu locali aliquatenus sedaretur, ratio est quia spiritus animales, dummodo in actiones diversas ab extra coguntur, inordinationes quasvis ab intra fuscitatas remittunt: etenim ut in dolore & pruritu, qui leviores sunt spasmi, partem affectam comprimere, fricare, aut scalpere juvat, ita musculorum, ac tendinum motus convulsivi, a totius corporis, aut membrorum agitatione inordinata aliquatenus placantur.

Quod spectat ad ptyalismum, sive copiosam oris sputationem, cum fœtore anhelitus, quæ incertis intervallis redire solita est; suspicari est, eam forte a mercurio clanculum aliquando exhibitio processisse; quanquam & multos viderim affectibus tum convulsivis, tum scorbuticis laborantes, quibus hujusmodi perpetua sputi ex ore defluxio, citra omnem Mercurii suspicionem molesta fuit; nonnullos etiam (ut mox infra dicitur) quibus salivatio superveniens (materia explosiva ad hunc modum critice evacuata) morbum solvit: porro verisimile est, hanc affectum a meris succi nervosi recrementis productum fuisse, ductusque salivales, cum plures & satis patientes



tentes fuerint, superfluitates a nervis, ac æque arteriis in glandulis copiose depositas excipere, & foras convèhere.

Quoad lucida intervalla quibus æger inducias quasdam, licet breves mitigata quasi morbi se-  
rocia, obtinere solebat; ut quem modo ægritu-  
do cathedræ alligabat, derepente exilire, & cir-  
cumcirca deambulare potuerit; insperato tamen  
atque evanido hoc robore, mox iterum in pristi-  
num languorem desinente: Dico ejusmodi motus  
naturæ laborantis, & sub gravi onere prostratæ,  
fortiores quasdam nixus, & ultimos conatus es-  
se; quibus sc. ad momentum temporis se recol-  
ligit, & quasi morbi jugum excutere tentat; ve-  
rum quia huic certamini diu sustinendo impar  
sit, denique statim relabitur, & pristinæ succum-  
bit sarcinæ. Profecto mirum est quantum supra  
naturæ vires, ira ac timor, aliæque animi pas-  
siones quædam, nervosum genus intendunt, atque  
impetus plane stupendos edere cogant: sunt  
vero exiguæ tantum durationis hæc conatum pro-  
digia.

*Cur æger  
hic indu-  
cias quas-  
dam obti-  
nuit.*

Designata ad hunc modum morbi prædicti cau-  
sa conjuncta, & symptomatum præcipue urgen-  
tium rationibus ostensis; adhuc inquirendum re-  
stat, circa causam *πρὸνυμένην*, nempe ob quas  
*πρὸς ἄσθεν* succus nervosus ita degener factus, pri-  
mo paralyfin, ac deinde musculorum omnium  
subsultus, sive spasmos intestinos intulerit: porro  
explicare oportet, quamobrem morbi hujus fructus  
paulatim accrescentes, thermarum usu tam cito ad  
maturitatem pervenerint, item quare ægri-  
tudo ista nullis remediis cedens incurabilis exti-  
terat.

*Prædicti  
affectus  
causa  
πρὸνυμένη*

Quoad prius, dicendum esse videtur quod æ-  
grotans parentibus, qui morbis cephalicis gravi-  
ter obnoxii fuerunt, oriundus, malam cerebri  
& nervosi generis constitutionem originaliter con-  
traxerat, adeo ut intra sextum ætatis suæ lustrum  
paralyfi spuria laborare inceperet; dein cum pro-  
catarxi huic hæreditariæ causæ evidentes sanguini  
& humoribus majorem indies labem affigentes



accederent, (erant enim varii casus atque infortunia quæ viro eximio mœstitiā & melancholiam continuo intulere) propterea quidem liquor nervosus sale fixo, & scorbutico supra modum imbutus, instar aquæ fortis, aut stigmati vitrioli, summe acris, & irritativus evalit; proindeque spiritus, & corpora eos continentia, non secus ac prædicti liquores lumbricis suffusi, in corrugationes, & contracturas spasmodicas continuo incitaverit.

*Cur affectus  
hic thermarum  
usui in-  
gravescebat.*

Quod autem hic morbus, primo sensim accrescens thermarum calidiorum usu, in statum longe deteriorem cito evehebatur, ratio facile pater; experientia enim constat balnea calida, & sulphurea in corpore humano salinas, aliasque morbidas, quæ intra viscera, aut humores scatent, particulas, plurimum exaltare, & cito ad ἀπορρυαγ perducere; eas sc. exagitando efferatiores reddere, e primis viis in sanguinem, & exinde in cerebrum & nervosum genus urgere, quinimo prius secretas & otiosas conjungere, ac in ζύμωσιν quandam incitare: quare qui aut arthritidi, aut calculo hæreditario obnoxii, istorum affectuum paroxysmos nondum perpeSSI fuerunt, a thermarum usu sæpissime alterutrius morbi fructus in se statim maturari sentiunt: Cum itaque in hoc ægrotante & sanguis, & liquor cerebrum nervosum irrigans particulis tum narcoticis, tum spasmodicis imbuerentur: quin & a crasi dulci, & balsamica, iste versus salsum, atque hic in acetosum, & stigmati vitrioli ciemulum degenerarent, tantum absuit aquarum calidarum mineralium usus ab auxilio ferendo contra hæc mala, ut propterea statim omnia plurimum exacerbarentur: atque morbus ab humoribus, quoad temperiem & mixturam ita depravatis procedens, nullis uspiam remediis curari potuerit; nihilo facilius sc. quam acetum in vinum reducatur.

Cum Illustrissimihujus viri a phthisi demum extincti cadaver aperuissem, pauca admodum ejusmodi gravissimorum pathematum vestigia detegere licebat. Hinc ut constet, paralyfin & spasmus  
non tam



non tam a crassa & copiosa materia, alicubi in mineris congesta, quam a mala spirituum animalium, qui subtilissimi ac invisibiles sunt, affectione pendere. Quæ circa hujus anatomen notatu digna occurrebant, paucis exponam.

Abdomine aperto omentum (prout in plerisque a tabe, aliisque morbis chronicis interemptis affolet) putridum erat, & fere consumptum. Interim ventriculus, intestina, pancreas, & mesenterium satis recte habuerunt; sc. membranæ erant firmæ, bene coloratæ, & abscessu quovis aut tumore scirrroso liberæ: intestinis majoribus excrescentiæ quædam carnes, instar auricularum maris adnascabantur, hujusmodi cum plurimæ fuerint, ex utroque intestinorum coli, & recti latere, ad certa quasi stadia, instar ramorum arboris, gemellæ prodibant: Simile quiddam in tabido olim reperi: Hujus ratio videtur esse, quod in phthificis nutritio (licet circa partes solidiores & exteriores deficiat, aliquando tamen) interius prope succi nutritii fontes plus debito perficitur, proinde ut epiphyse nonnaturales, & superflue excrescant.

*In dissecto  
cadavere  
notanda.*

Lien, qui semper pessime audierat, & a plerisque medicis, velut scorbuti, & cæterorum omnium affectuum causa principalis damnatus fuerat, prorsus insons, & quavis culpa immunis apparebat: nam prout in maxime sanis observamus, fuit subatri coloris, mollis, & superfici ei æqualis, obstructione, aut scirrho quovis liber, fibris, & vasis satis distinctis, & firmis præditus: e compage ejus dissecta, sanguis nigricans effluxit.

Hepar (quod equidem mirari subest) mediocriter se habuit, nec a tam gravi & diuturna ægrotatione solito durius, aut scirrhosum, aut tuberculis oblitum evaserat, erat tantum grandius, & coloris nonnihil obscuri.

Renes, licet calculo ac ulcere quovis immunes, tamen culpa non vacabant: nam in medio dextri renis cavitas ingens a pelvi distincta, eoque multo amplior, aqua limpida impleta, conspicieba-



tur: talem in hydropicis sæpenumero comperi: Atque hæc quidem fortasse ex sero in renem istum deposito, quod haud facile per meatus, & poros ejus percolaretur, orta est; quippe serum inibi subsistens, ab initio specum sibi exiguum procuderat, qui sensim postea dilatabatur, cumque ob hanc rationem feri secretio, & per ureterem exitus aliquatenus præpedirentur, latex ejus in sanguinem restagnans, capiti noxam graviores intulit, quod quidem eo magis suspicari fas erat, quia ren etiam sinister valde extenuatus, & absumptus, plures hydatidas, & cavitates aqua limpida repletas continebat.

Pulmones sterno, & costis, & diaphragmati undequaque adnati, sine ulla fere distinctione loborum, una tantum compages carnis spongiosæ, putridæ, & materia ichorosa per totum infarctæ videbantur. Proculdubio ægotans hoc malum non ita pridem contraxerat, sc. cum nullo corporis exercitio defungi, nec intra lectum, ut liberius perspiraret, commorari potuerit, sanguinis sæculentiæ, & recrementa, quæ per cutim evaporare solita sunt, in pulmones deposita, in causa erant quod hi & inter se. & cum aliis partibus concreverent, eorumque tonum & conformationem prorsus vitiant, ita ut phthisis demum exorta cæterorum affectuum, quibus diu ac misere affligebatur, affectus, & productum, ac minime causa fuerit.

In utroque cordis ventriculo sanguis in substantiam solidam, albidam. & carnis coctæ æmulam concreverat, quæ juxta cordis, & vasorum cavitates, & processus effigiata, serpentis, cum caudamultiplici & divisa, figuram nonnihil referebat: quo quidem in multis, post longam invaletudinem defunctis, nihil usitatus occurrit: Cujus ratio est, quod sanguis a longa ægrotatione effæctus, atque hinc circa præcordia pigre circulatus, in corde & vasis appensis stagnare incipit, proindeque in concreta ejusmodi carnea sensim congelatur.

Dum cranio aperto præcipuam morbi causam  
inter



inter contenta ejus perquirimus: primo occurrebat, cerebri molem justo minorem, & gyris paucioribus instructam fuisse, unde spiritus animales non satis copiose productos suspicati fuimus: porro universa τῆ ὑπεράλει compages justo humidior, latice aquoso madida & prorsus immersa videbatur, ut integumenta ejus, sc. meninges integræ divellerentur, atque anfractus & ventriculi omnes aqua limpida inundarentur. Probabile est hoc cerebri diluvium nuper accidisse, nempe quatenus ob διαπνοὴν impeditam, & lotii secretionem parcius habitam, serositates in massa sanguinea aggestæ, capiti traderentur: ideoque cerebri substantia, & imprimis corpora striata uliginosa prorsus & tam madida erant, ut discissa eorum substantia vix compacta maneret, quin liquidorum inspissatorum more aliquatenus diffunderet intra sinus cerebro ejusque appendici superstratos ac insertos, atque vasa ex iis prodeuntia sanguis in glomeres duriusculos, ac velut carneos, non secus ac intra cordis ventriculos, & vasa iis appensa, concreverat; quod etiam nuperrime cum sanguis pigre circularetur, propter eandem rationem, qua sanguis intra præcordia coagulabatur, accidisse putamus.

Spi- alis medullæ truncus aquæ limpidaë immersus, valde extenuabatur, ut vix dimidium ossæ cavitatis impleverit: quod equidem a seri falsi, cui velut incoquebatur, colluvie, effectum censemus.

Hæc de spasmodis universalibus, qui affectioni paralyticæ ut plurimum conjuncti, simul in pluribus locis divilim excitantur: restant alii quos continuos appellavimus, quia sc. a partibus aliis in alias subito translati, se mutuo excipiunt, atque membra modo hæc, modo ista, & non raro totum corpus involuntarie moveri, diversimode flecti aut agitari cogunt. In hujusmodi casibus spiritus animales non tantum insiti in privatis quasi focus & mineris copulam explosivam sibi met asciscunt, & eam quatenus vel saturati, vel irritati per vices quasdam elidunt; sed cum tota liquoris nervosi

massa

*Affectionis  
convulsivæ  
continuæ  
naturæ, &  
sistendi mor-  
dus.*



massa particulis elasticis abunde scateat: Hæ quidem spiritibus tum influis, tum insitis ubique accrescunt; quos propterea in spasmos fere continuos cient: in quantum vero spiritus non simul omnes, utcumque prædispositi, explodi queant (quia sc. tantis illorum agitationibus intra ductus nerveos spatium satis amplum non conceditur,) idcirco impetus explosivus in his aut illis partibus exorsus, inde mox in alias, & subinde in alias transfertur, adeoque instar pyroboli, aut ignis missilis e pulvere tormentario conflati, sese huc illuc ocysime proripientis ex artubus his in illos, & dein statim ex omnibus in præcordia, aut viscera, ac viceversa vage transcurrit. Quo hujusmodi affectionum typi innotescant, libet hic ægrotantium, quibus olim sanandis operam navavi, casus quosdam rariores proponere.

1.  
*Observatio.*

Virgo lectissima & piissima, procera & gracilis, patre valetudinario, sc. gravissimis nervosi generis affectibus obnoxio, genita, circa vicesimum ætatis suæ annum cephalalgia valde atroci, & periodica, per plures dies affligebatur, instanti demum solstitio brumali 1656. dolor capitis remisit, sed in vicem ejus, ingens catarrhus, cum sputo tenui & copioso, nec non ulcerosa narium oris, & gulæ affectione successit; cum hujus molestiam aliquandiu pertulisset, tandem ex mulieris cujusdam præscripto, fumum succini per tubulum ore excipiens, derepente sanata est, catarrhus nempe subito sistebatur, subinde vero conquesta erat, de vertigine insigni cum capitis dolore & aurium tinnitu: die tertio, cervicis tendines convellebantur, ut caput modo antrorsum, modo retrorsum, modo ad latus deflecteretur, modo rigidum & immotum perstaret; brevi post hæc totius corporis membra exteriora, & artus ejusmodi affectio spasmodica invasit, brachia & manus mire contorquebantur, ut eorum flexiones & convolutiones haud quispiam agyrta aut gesticator imitari potuerit; crura & pedes huc illuc divaricare, mutuo concutere, & alternatim transponere necesse habuit: adhuc modum aut in cathedra



dra sedens, aut lecto commissa, nisi a somno obrueretur, motibus convulsivis perpetuo afficiebatur; cumque summo musculorum nixu membra paululum cohiberet. statim respiratione difficili & anhelosa, cum præfocationis sensu corripiebatur; interim vero oculi, fauces, os, & viscera inferiora spasmo quovis immunia perstabant; nec vomitu, rugitu, neque ventris hypochondriorum inflatione tentabatur: porro animo usque constitit, memoriæ, intellectus, & phantasiæ munia rite obivit, nihil delire aut insipienter loquuta est, aut egit; quin inter stupenda hæc mala verbis usque piis, & probis, fortitudinis & patientiæ Christianæ specimen admirandum exhibuit; appetitus cito dejiciebatur, ut cibos, & alimenta quævis nisi valde averfaretur; fitis autem continuo urgebat, vires admodum debiles fuerunt, ut nec stare, nedum pedibus incedere potuerit, urina erat coloris citrini, falsedine plurimum saturata, in cujus superficie pellicula tartarea crescebat.

Cum sexto ægrotationis die ad hanc Dominam accerserer; admirandi istius affectus hujusmodi Ætiologiam instituebam: Etenim ne cum multis aliis statim omnia ad sagarum præstigias referrem patris ejus consideratio effecerat, qui in eadem domo passionibus spasmodicis tunc temporis gravissime laborabat: quapropter ut symptomatum istorum causas naturales investigarem, imprimis obvium erat suspicari, dominam illam hereditario affectionum convulsivarum seminia contraxisse, quæ tandem circa ætatis suæ ἀκμὴν in ejusmodi fructus eruperunt: cum enim sanguis particulis heterogeneis & explosivis plurimum imbueretur, istæ demum (prout in tali diathesi assoler) in caput suffundi, ibidemque affigi cœperunt: primo igitur in meningas depositæ, cephalalgiam immanem & periodicam induxerunt, dein postea eadem materies, metastasi accidentaliter facta, in gulæ ac oris emunctoria decumbens, cephalalgiam in catarrhum commutavit: cum denique intempestivo remedii adhibiti usu defluxio sisteretur,

materies



materies morbifica in cerebrum regurgitans, vertiginem intulit, & exinde in nervosum genus detrusa, prædictas affectiones *σπασμώδεις* excitavit.

*Prædicti  
casus Æ-  
tiologia,*

Quod vero spectat ad rationem formalem, seu generationis modum, quo materies spasmodica in nervosum genus decumbens symptomata istæc admiranda produxisse videatur opinari fas sit, quod eadem ab *ἐγκεισθῆναι*, utpote firmioris, confinio, in medullam spinalem ejusque appendicem detrusa, ac instar fermenti maligni habens, imprimis succi has partes irrigantis massam integram particulis heterogeneis & summe explosivis infererat, quæ spiritibus per totas eorum series ubique dispositis accrescentes, ipsosque velut æstro quodam agitantes in explosiones continuas irritabant: revera cum succus nervosus, uti dictum est, a materiæ spasmodicæ influxu ita fermentatur, qui partes continentes alioqui blando allapsu irrigaret, atque spiritus animales cum expansione æquabili per easdem trajiceret, nunc idem fibras nerveas in varias contractiones, & corrugationes torquebat, atque spiritus tum influos, copula nimirum heterogenea onustos, a debita irradiatione inhibebat, tum partis cujusque insitos varie exagitans, afflatu velut diabolico incitabat, adeo ut appetitus imperio minime obsequentes, motus inordinatos iniverint, eosque huc illuc rapide translatos, reciprocatione perpetua iterarint.

Quamvis autem particulæ heterogeneæ e sanguine in cerebrum suffusæ, indeque in genus nervosum protrusæ, haud ex æquo nervorum omnium origines, sed spinalem medullam, ejusque propagines nerveas præcipue, ac fere tantum subiere; ita ut viscera interna, insuper oculi, oris, & faciei partes spasmo quovis immunes perstarent: iste tamen impetus explosivus, quo minus a membris exterioribus obiretur vi quadam inhibitus, illico velut ignis missilis, qua data via, in præcordia, ac imi ventris viscera incurrere solebat: quia sc. spiritus influi æstro quodam perciti, & spatium amplius in quo baccharentur exigentes, ab

ano



uno loco exclusi, mox alium alicubi patentem subeunt: quapropter cæstrum illud, si tum a membris, tum a visceribus fuisset repulsum, nullus dubito, quin cerebrum regurgitasset, furorem ibi aut *ἀναισθησιαν* quasi epilepticam illaturum. Quæ quidem symptomata abesse contigit, eo quod Dominae hujus ingeniosissimæ cerebrum constitutione firmiore præditum, e liquore nervoso recens instillato, quicquid congruum & spirituosum fuerat, in penum proprium arripiebat, eoque fruebatur: interim particulas quasque morbificas in spinalem medullam deprimebat, a quibus membrorum motus involuntarii, eo quo dictum est modo excitabantur,

Præclaræ hujus virginis curationem moliri rogatus, facta imprimis levi corporis præparatione potionem solutivam ex infusione fennæ & rhabarbari, adjectis santalo citrino, & sale absynthii, propinabam, qua duodecies cum magno levamine purgata fuit; die sequenti e brachio sinistro sanguinem ad 3 viij. detraxi, quovis vesperi opiatam ex aqua & syrupo florum verbasculi cum pulvere margaritarum exhibui: insuper semel intra 6 horas dosim spiritus C. Cervi cum haustulo Julapii sequentis sumendam præscripsi. *R. Aq. cerasorum nigrorum, juglandum, florum pæonia an. 3 iij, antiepileptic. Langii 3 ij. syrupi e floribus pæonia maris 3 ij. margaritar. pul. 9. j. misc. f. Julapium*, quia purgationem multam ferre nequibat, enemata ex lacte saccharato erant crebro in usu: præter linimenta antispasmodica cervici & spinæ applicata, frictiones membrorum affectorum cum pannis laneis oleo appropriato madefactis, & excalefactis frequenter instituimus.

Horum usu, intra 6 dies ægrotans plurimum alleviari visa fuerat; nam motus convulsivi fere in totum cessabant, membra in debito situ, & quiete continere potuit, solummodo caput contractione leviori interdum huc illuc leniter deflectere cogebatur; porro cathedra exurgere & parum incedere valuit, sed dum gressum faceret, non recta, sed in latus oblique procedebat: Hoc tempore

*Methodus  
therapeutica in hoc  
casu observata.*



tempore discedens, eam multo melius habere visam, in manifesto convalescentiæ statu reliqui: post alteram vero septimanam, cum Boreas inclementior nocturno tempore exortus, fenestra haud firmiter occlusa, ægrotanti lecto commissæ vehementius afflaret; illa statim a frigore suscepto, ejusmodi recidivam passa fuit, ut non modo pathematis spasmodicis, verum & paralyfi universalis periodicæ obnoxia evaseret: nam deinceps a mane usque ad vespere capite & membris (uti prius) huc illuc vicissim flexis atque jactatis artus successive omnes circumagere, deflectere, ac varie detorquere coacta est; donec sub noctem, motibus ejusmodi prorsus sedatis, membrorum resolutio, sive paralyfis succederet, ita ut nec manus aut pedes, neque ullam præterea partem movere, aut corporis nixum quemvis motivum exercere potuerit, intra lectum instar saxi, fere immobilis jacens; at aliquanto somno resecta, circa mane prout facultatis motivæ regularis virtutem quandam, sc. brachiis & cruribus huc illuc, imbecillius licet, deflectendis parem recuperavit, sic etiam motus convulsivi & involuntarii, per totam exinde diem perdurantes constanter redibant; qui vesperi rursus in artuum resolutiones commutabantur.

Ex his liquido constat, Dominam ægrotantem, & duplici morbo, sc. paralyfi ac spasmo laborasse, & utriusque causam materiale aliquatenus distinctam fuisse: videtur enim, quod spiritus animales ubique scatentes, a particulis narcoticis onusti fere continuo ligarentur: præterquam quod inter dormiendum, una cum succo nervoso, particulæ spasmodicæ ubertim influentes, etiam spiritibus accrescerent: quarum explosionibus spiritus incitati motus involuntarios produxerunt: quin & copula narcotica eo tempore aliquatenus excussa, etiam voluntarios, seu regulares quadatenus persicere valuerunt: Præter remedia modo citata, alia quamplurima cujusque fere generis, sc. antiscorbutica, antiparalytica, decocta, sudorifica, aquæ destillatæ, spiritus, elixires, tincturæ, balnea



balnea, linimenta, cum multis aliis sedulo adhibebant; quorum usu symptomata nonnihil remittebantur, haud tamen morbus integre sanabatur; paralyfis universalis brevi cessabat, ita ut omni tempore artus movere, & huc illuc deflectere potuerit; quin & membrorum motus involuntarii, eam rarius molestabant, usque tamen languida & imbellis perstitit, Cumque illa constitutionisterioris, ac in tabem proclivis, & nunc quidem nulli exercitio habilis esset, ob transpirationem impediram, sanguinis recrementa in pulmones deposita, tussim inferebant, qua indies ingravescente, demum phthifica interibat.

Ante plures annos accerserbar ad virginem nobilem, simili fere ritu & aliquanto gravius ægrotantem: Hæc enim capitis & membrorum motus involuntarios, nempe aut succussiones, aut huc illuc deflectiones, vel circumactiones fere perpetua vice redeuntes perpeffa fuerat: insuper diaphragmatis, & musculorum respirationi inservientium, spasmo admodum molesto, & plane stupendo afficiebatur: Etenim quovis horæ minuto, & sæpius spina dorsii circa medietatem ejus subito incurvabatur, simulque pectore antrorsum exiliente, & hypochondriis introrsum contractis, singultus valde sonorus, idemque modo duplicatus, modo triplicatus, minus tamen, & usque minus stridulus edebatur: per plures horas hujusmodi motus, & stridoris reciprocationes obire solebat, ut per totas ædes exaudiretur; si quando breve hujus interstitium contigit, illico brachia & manus, modo crura & pedes valde concutere, aut contorquere, quin etiam caput modo rapidissime conjectare, mox cervicem quasi rigidam, & immobilem tenere cogebatur: quandoque inter loquendum lingua eo ritu corripiebatur, ut idem verbum sæpius immo aliquando vices ut minimum repeteret: Cum in membris exterioribus motus convulsivi fortius urgerent, ab affectu isto stridulo, & singultuoso aliquantulum vacabat, atque hoc spatium intermissionis, & levaminis sui tempus dicebat; licet interea caput ac membra motibus violentis huc  
illuc

2.  
*Observatio.*



illuc proriperentur : si quando in latus sinistrum decumberet, statim dextri hypochondrii introrsum contractio, cum singultu ciebatur. Intra paucos dies, hujusmodi pathematum assiduitate viribus plurimum dejectis, tantam in lumbis & crurum artubus imbecillitatem contraxit ut nec stare, nedum pedibus incedere potuerit : ventriculus sive languore, sive spasmo affectus, quidvis ingestum vomitu reddebat.

*Casus d -  
scripti na-  
u-  
ra & causa.*

In hoc casu, sicuti in priori plane constat, spiritus animales non modo huic aut isti parti vel regioni initos copulam heterogeneam per vices quasdam elidendam contraxisse, sed & spiritus nervorum quorundam in suos particulis explosivis imbutos, motus convulsivos perpetuos & vagos intulisse. Cumque ab initio contigit spiritus ita affectos, non omnes simul nervos nec quosvis indifferenter, verum spinalis medullæ appendices atque ad diaphragma pertinentes, fere tantum subisse, ita ut intra horum spatia, spirituum continuo explosorum debacchatio limitaretur, propterea quidem accidit, affectiones spasmodicas, in una qualibet istarum parte cohibitas, in alia statim ferocius erupisse; cumque ex proprio instinctu, illorum impetus motivus in una regione intenderetur, in altera idem interea remitti solebat. Porro in hac ægrotante, materiès morbifica, particulis tum narcoticis tum spasmodicis constans, affectionem una paralyticam ac convulsivam inferebat.

Die quarto adveniens pharmacum emeticum propinabam, a quo septies evomit pituitam viscidam cum bile flava copiosa, sine quovis tamen levamine: die postero sanguinem e brachio detrahebam ad  $\frac{3}{4}$  vj. exinde statim sanguine versus caput impetuosius raptò, de cephalalgia, & vertigine plurimum conquesta erat. intra triduum vero phlebotomia in pede celebrata, se melius habuit: sumpsit postea remedia nervorum affectibus dicata, sc. spiritum C. Cervi, & sanguinis, pul-  
veres



veres testaceos, & bezoarticos, julapia, & electuaria antispasmodica: Horum usu symptomata non-nihil remittere visa, usque tamen aliquatenus, juxta typos modo descriptos, perdurabant: Post duas septimanas, ex præscripto mulieris cujusdam rusticæ, cepit sanguinis, ex aure asini detracti, cochlearia 6 in haustu cerevisiæ, a quo derepente sanari videbatur: nam motus convulsivi illico omnes cessabant, iisque per 24 horas immunis degebat; attamen morbus cum solita ferocia propediem revertens, neutiquam isti remedio, nec quidem facile aliis quibusvis cedebat: Itaque in posterum cepit medicamenta methodice præscripta: semel intra 6 dies blande purgabatur, præterea sumebat pulverem ex bezoar, margaritis, & corallis cum rad. & sem. pæoniæ compositum, item electuarium, ab Horstio ad convulsiones hujusmodi admirandas præscriptum; insuper julapia, & decocta iu affectibus spasmodicis appropriata: Ene-mata erant crebro in usu, frictiones, vesicatoria & linimenta cum fructu adhibebantur: Intra alteram hebdomadam affectio singultuosa prorsus cessabat, quin & reliqui motus convulsivi sensim mitiores facti plurimum remittebant: ab istis vero pathematis convalescens, catharro in fauce decumbente, in tantum molestabatur, ut salivam acrem, & velut corrosivam fere continuo expueret, ac si ab assumpto Mercurio salivatio induceretur: quod equidem remedii genus, in hoc casu peridoneum fuisse eventus comprobavit: ab eo tamen adhibendo, quia cum ægrotantis, & amicorum ejus venia minime licebat, prorsus abstinēbam.

Postquam sputatio isthæc copiosa, & valde molesta per plures dies perstitisset, morbus fere in totum sanari videbatur: adeo ut domina illustris motibus convulsivis libera, foras incederet, & viribus, & stomacho valeret: solummodo querebatur quod aliquoties in die, subito totius corporis horrore circiter horæ minutum afficeretur; qualis etiam affectus, quandoque noctu superveniens somnum abrumpebat: Intra mensis spatium, hoc



hoc etiam fymptoma, ac infuper catarrhus prorfus ceflabant: deinceps vero illa, interdum fummo acore in ventriculo & æfophagi ductu, quandoque etiam in faucibus & palato affligebatur, ut vereretur ne partes istæ, cute interiori detrita, diathefin ulcerofam contraherent; porro sæpius in fomnis aliquando etiam evigilans incubo tentari solebat. Huic, vere & autumnò, blandam catharfin cum remediorum antifebrilium, & nonnunquam chalybeatorum ufu adhibendam præfcripsi: Cujusmodi methodum tanto fuo commo observavit, ut per plures annos fatis recte valuerit, & etiamnum valeat.

Inter multa remedia, quæ contra iftum palati & æfophagi acorem, & diathefin quafi ulcerofam fumebantur. præfcripsi ut quolibet mane propriam urinam recens excretam ebiberet; hæc ut plurimum valde falfuginea, levamen ingens conferre solebat; quibusdam vero temporibus urina tenuis & copiofa, quæ tamen minime falfa, verum infar aceti plane acida effluxit, a cujus potu parum aut nihil commodi recepit.

Cafus modo defcripti ætiologia, priori non multum abfimilis videtur, nifi quod in hac ægro tante particulæ explofivæ, plurimum nervorum ductus, fc præter iftos medullæ spinalis appendices, quofdam infuper refpirationis muneri, ac per vices quasdam linguæ motui dicatos subierint, atque fpiritus in ipfis fcatescentes, æftro fere perpetuo affecerint.

Quod autem morbi hujus folutio per humoris acerrimi in oris & gulæ emunctoria decubitus contigerit, hinc colligere licet, hujus caufam materialem fuiſſe particulas heterogeneas, & quafi nitroſas in fanguine progenitas; quæ cum exinde, cerebro trajecto, in nervofum genus deferrentur, parthemata prædicta intulerant: quam primum vero remediorum ope, uberius iftius materiæ provenus inhiaberetur, atque particulæ morbificæ, jamjam productæ, cum a fanguine, tum a cerebro & fucco nervoſo in ifta capitis emunctoria derivarentur, affectio convulfiva ftatim remiſit, atque intra  
breve.



breve tempus, tali ~~expro~~ usque perdurante, morbi solutio perfecta sequebatur.

Quandoquidem urina, ex se plurimum falsa & quasi lixivialis, per vices quasdam acetosa evasit, quæ contra gulæ acorem, non uti prior, juvamen præstitit: hinc colligere datur, sanguinis & humorum particulas salinas per urinam decedentem duplicem statum, nempe fixitatis & floris, subiisse, quare serum, iis imbutum, modo hujus, modo istius indolis extitit: videtur enim quod particulæ salinæ, intra massam sanguineam degeneres, fixiores manent, & urinam plerunque lixiviam reddunt: quæ tamen extra sanguinem in succo nervoso scatent, aut circa partes solidas deponuntur, in fluorem, sive acetositatem degenerant: Itaque ab his, in oris emunctoria derivatis, in signis iste oris & æsophagi acor procedebat: porro cum ejusmodi particulæ in succo nervoso, ac partibus solidis ad plenitudinem aggestæ turgescerent ac fluxione oborta, in sanguinem ebullierint: hæc statim exinde confertim per renes amandatæ, urinam quantitate auctam acetosam reddebant. In quantum vero particulæ salinæ, diversi status ac minime quæ sunt ejusdem, invicem commissæ, in se mutuo agunt, & vires suas refringunt, idcirco urina falsa ac neutiquam acetosa gulæ acorem sanabat. Experimento satis vulgari constat spiritum vitrioli acerrimum, salis tartari aut cujusvis alius lixivialis mixtura, plurimum mitiscere: quinimo & humorem acidum in Dominæ hujus oris & gulæ partes exudatum, prope ad acetum calcanthini indolem accessisse inde constat; quia nicotianæ fumus ægrotantis ore acceptus mire dulcescebat, prout nimirum in quibusvis a vitriolo prægustato assolet.

Quoniam hic de convulsionibus admirandis, quæ non passim eveniunt, & quarum natura & causæ in abstruso latent, agimus; pro meliori ejusmodi affectuum illustratione, libet hic casum adhuc unum & alterum, & prioribus haud minus stupendos proponere.

Decem



Decem abhinc annis, nobilis cujusdam filiam ad motus convulsivos eo ritu incitatam, ut nonnulli eam a spiritu malo obsessam putaverint, in visibam: Virgo hæc 16 circiter annos nata, pulchra & εὐσχημον, patre tamen paralytico progenerita, sine causa evidenti, circa brumæ solstitium, male habere cœpit: primo per aliquot dies cephalalgia & vertigine, haud gravi tamen modo afficiebatur, deinde in brachio uno, & mox in altero tremorem, & subitam contractionem persensit; cujusmodi spasmi isto die sæpius repetentes, vix punctum temporis durabant; postridie juxta sororem suam in cathedra sedens, subito exiliens saltum unum & alterum, multosque alios successive ad distantiam plurium pedum mira agilitate perficiebat; dein cum cameræ extremum limitem attigit, aliquandiu in eodem loco, & qualibet vice ad miram altitudinem saliens perstabat; cum saltationi ulteriori crura deficerent, in terram concidit ac statim caput cum mira violentia huc illuc conjecit, quasi illud collo excuteret: quamprimum ab hoc motu præ lassitudine cessaret, statim manus, & pedes idem furor invasit, ut necesse haberet membra hæc parietes, aut postes percutiendo, vel pavementum contundendo validissime exercere: Quando, ob pudorem, aut verecundiam, amicis aut astantibus debitam, se magna vi ab his motionibus cohiberet, (usque enim animo constabat, & sobrie loquuta erat) statim affectu interius transmissio, insigni cordis oppressione, cum gemitu, & singultu valde stridulo, plurimum infestabatur; dein cum se relaxaret, statim, cestro ad artuum exteriorum musculos transmissio, aut saltare, aut caput, vel brachia immaniter huc illuc conjicere, aut etiam in camera rapidissime curfitare, vel humum pedibus contundere cogebarur: quippe hujusmodi vehementes artuum, aut viscerum commotiones, affectus tragœdia, velut in orbem, revertente, se mutuo excipiebant.



Die quinto a quo hæc domina primo ægrota-  
verat adveniens, vomitorium ex infusione croci  
metallor. vino scillitico, & sale vitrioli propina-  
bam, a quo septies evomuit bilem æruginosam,  
in magna copia, cum admistione humoris acer-  
rimi, & quasi vitriolici: postridie sanguis e vena  
saphæna ad  $\frac{3}{4}$  x. detrahebatur, præterea sumebat  
bis in die antidota ex pulveribus lapidum pretio-  
forum, cranii humani & rad: pæoniæ maris. Horum  
usu intra septimanam sanari visa, per plures exin-  
de dies affectionibus prædictis immunis degebat,  
Attamen post binas hebdomadas, instanti pleni-  
lunio, ejusdem morbi recidivam solito atrocio-  
rem patiebatur, nam præter saltus admirandos, ca-  
pitis & membrorum contorsiones, convolutionesque  
vehementes, insuper intra cubilis spatia cursum  
huc illuc rapidissimum iterare cogebatur. Cepit  
hoc tempore. ex aliorum præscriptis, remedia  
anti hysterica, & statis quibusdam intervallis pur-  
gantia, sine quovis tamen juvamine: Denuo ac-  
ceritus, siquidem robusto corporis habitu, &  
spirituum efferatione insigni prædita videretur,  
emeticum fortius propinabam, a quo decies evo-  
muit bilem instar æruginis viridescentem, cum  
pituita instar aquæ stygiæ acerrima, & subito al-  
leviabatur: Exhibui posthæc, quovis mane, hau-  
stum vini albi cum aqua ceraforum nigrorum dilu-  
tum, asellis contusis superaffusum, & fortiter ex-  
pressum: Horum usu statim curari visa, per men-  
sem & amplius integre valebat: Cumque postea  
affectus redituri quævis præludia unquam persen-  
sit, mox vomitorii & ejusdem millepedum expres-  
sionis usu, morbi insultum avertibat: Intra  
tres menses sanitatem pristinam ita recuperabat,  
ut plures nunc annos affectionibus ejusmodi spa-  
smodicis immunis degeret: attamen a quo tem-  
pore pathemata convulsiva prorsus cessarunt,  
quandoque circa oris & gulæ partes humoris aci-  
dissimi ac instar stigmati vitriolici, desiccatione af-  
ficiebatur, insuper interdum malaciæ & picæ, ali-  
quando etiam tussi, cum sputo decolori phthisin  
minante obnoxia fuit, quæ tamen remediis in e-  
jusmodi



*Prædicti  
casus Æ-  
tiologia.*

jusmodi casibus usitatis facile sanabatur.

Quod spectat ad prædicti casus Ætiologiam : non est cur vereamur hujus morbi, & symptomata tum causas, ad particulas explosivas e sanguine (cerebro usque impune trajecto) in genus nervosum continuo suppeditatas referre : quæ siquidem copia ingenti suffusæ, intra privatas mineras tantum per vices elidendæ, minime coercerentur, spiritibus ubique tum influis, tum insitis accrescentes, eos, velut æstro afflatos perpetim explodi, & per manipulos huc illuc inordinate efferri cogebant : ita nimirum ut intra partes continentes paulatim regulari nequirent, quin eos impetuose tumultuantes, & hic illic, turbinis instar, corripere aptos, exercitio valido, ac admodum violento subigi, & perdomari opus fuit : Revera in hac ægrotante non aliter res se habuit, quam in organis musicis, quæ si vento nimis insufflato supra modum impleantur, ni statim plures fistularum aperturæ recludantur, breui totius machinæ compages concutitur, ac in partes diffilire periclitatur : pariter in hac domina cum spiritus animales nervorum quorundam ductus & fibras appendices actuentes, ultra debitum tenorem exagitarentur, necesse erat eorum impetus, dum corpora nervosa supra modum inflarent, in motus locales una plures & vehementiores impendi : quapropter cum eorum rabies ab una parte cohiberetur, mox uti ventus oclusus alio se proripiens, in quadam alia parte violentius erupit.

In hac ægrotante vomitorii usus semel, atque iterum juvamen præstitit, eo quod cysti felleæ, quin & glandulis & emunctoriis, quæ circa coctionis viscera confita sunt, hoc modo inanitis, sanguinis & succi nervosi purgamenta, in eadem copiosius allicerentur ; propterea quidem, ut spiritus animales intra ductus nerveos affectos scatentes, ab iis minus inficerentur : Hac ratione etiam succus asellorum profuit, quatenus materiam morificam e nervoso genere ad vias urinarias derivavit : Præter hæc remedia materiæ morificæ radicem & ramos magna ex parte amputantia, cum & alia



alia velut antidota, ejus vegetationem ubique impediens sedulo adhiberentur, quicquid ejus reliquum fuit, natura demum superior facta (solita in his casibus *ἐκκρίσις*) ad oris & gulæ emunctoria ablegabat:

Dum hæc scriberem, virginem illustrem invisebam, quæ alijsmodi motibus convulsivis, iisque universalibus & non minus admirandis afficiebatur: Hæc circiter annum ætatis 18 *εὐχρονία*, venusta, & antehac satis sana, cum grassante in hac vicinia pestilentia ejus contagii periculum incaute subiret, in terrorem panicum, cum crebra leipothymia incidit, sequenti nocte, tanta spirituum deliquia, & *ἀραξίας* passa erat, ut plane moribunda videretur: isto tamen malo ægre eluctata, deinceps quolibet die paroxysmos convulsivos, horis tamen primo incertis, & sub specie multiformi redeuntibus habuit: verum intra breve tempus morbi accessiones regulares factæ, bis in die, sc. hora undecima ante & quinta post meridiem, constanter repetebant, ut nulla febris intermittens periodos suas exactius servaverit; quin & singula paroxysmi accidentia simili ritu quotidie obtingebant.

Cum per tres septimanas hoc modo laborasset, quodam die accersor, ut symptomata quævis ac integrum morbi typum advertere possem: Hora decima matutina lecto excitata, recte valuit, vultu, incessu, colloquio optime se gessit, ut nullas eam quoquomodo ægrotare suspicaretur: hora undecima de *συνέπληξη* plenitudine & spirituum torpore cum levi scotomia queri cœpit; mox in hypochondrio sinistro pulsationem insignem, & quasi vivi animalis exilitionem persensit: hunc motum lateri manum meam admovens, plane percepi; deinde pandiculatio & rugitus succedebant; quo facto illico ad lectum ducebatur, & ancillæ super pulvinar sedenti tenenda tradita est: Hæc ægrotantem in gremio suo, brachiis circa medium corpus ejus complicatis, durante paroxysmo arctissime constringit: insuper præsto sunt ministræ, affinesque adstantes, quæ modo ejus brachia &

G

manus

4.  
Observatio



manus cohibent, modo ventrem & hypochondria in molem ingentem elevata, & sursum nitentia comprimunt. Præcipua morbi symptomata, quæ vicissim excitata, fere totum paroxysmum dividebant, erant hæc duo, sc. modo immanes viscerum spasmi infestabant, ita ut abdomen in molem ingentem assurgens, obtentis astantium manibus contraniteretur, ut vix, ac ne vix comprimi potuerit; simulque præcordiis sursum contractis, cordis & sanguinis motus pene sisterentur: quo temporis spatio virgo hæc caput reclinans, cum pulsu diminuto, & fere nullo *ἄσπαστος*, & fere insensibilis jacet; post duo aut tria horæ minuta hi spasmi cessant: & dein ægrotans sese erigens, alacriter circumspicit, & aliquandiu morbi impetum in colloquia & cantilenas convertit, quorum utraque lepidissima, & supra propriam indolem elegantissima indefinenter effundit: ejusmodi effaris, & dicteriis adstantes quosvis prosequitur, ut nihil uspiam in commœdia facitius occurrat; dein harmoniæ modulos suavissimos, & jucundiores quam aut alius quispiam potest, aut ipsamet alio tempore profert: postquam ita jocando, canendoque circiter sex aut septem horæ minuta transegit, denuo viscerum & præcordiorum spasmos, & *ἀσπαστος* uti prius incurrit: atque his brevi remittentibus spirituum *ὄρμη* a nervis inferioribus in cerebrum resiliens, denuo loquelæ cantusque facetiis impenditur; quoties cum adstantibus colloquitur, si quid ab his acerbius aut ignominiosum reponitur, illa viscerum spasmos graviores & diuturniores subit: Ad hunc modum, sc. alterna viscerum & cerebri affectione circiter horæ unius spatium molestari solet: dein paroxysmo versus finem vergente viscerum, spasmi leviores facti ter aut quater cum minima intermissione repetunt; dein his in totum cessantibus, morbi impetus in membra exteriora erumpit, unde statim penitus evanescit: nam brachia & crura per horæ minutum contracturas, subsultusque patiuntur, illico dein ægrotans excitata, e lecto descendit, omni spasmo, usque dum novus redit

parox



paroxysmus, immunis, quin & viribus mediocriter valens, circa ædes obambulat, & durante affectus interstitio, consueta vitæ munia alacriter obit, excepto tamen quod stomachus languescens toto die alimenta fastidit, vesperi post secundum morbi paroxysmum, modice cœnat.

Hic præsens morbi status est: in cujus paroxysmis quarundam facultatum usus illustrior aliarum anomalias quadantenus compensare videtur: Verum circa ægrotationis initia paulo secus habuit: quippe viscerum spasmi longe graviores fuerunt, iisque ἀναισθησία adjuungebatur: illorum insuper interstitia, tabulatio absurda, cantus inconcinni, quin & risus, aut fletus, ratione haud conscia erumpentes, excipere solebant: nunc autem spiritus animales in explosiones diuturnas coacti, eas tam regulariter modo hac, modo illac, qua data via commodior, peragunt, ut quodammoderationis & voluntatis imperio fieri videantur.

Itaque ut juxta nostram hypothesein hujusce affectionis ætiologiam instituamus: Videtur imprimis, quod timor vehemens spiritus cerebri & præcordiorum incolas in magnas ἀταξίας adegiret: ita ut istis extra ordines suos perturbatis, & amentia quædam & leipothymia crebra succederent: Porro suspicari licet ab eadem impressione cerebro ipsi noxam illatam fuisse, ita ut conformatione ejus nonnihil vitiata, particulæ heterogeneæ & morbificæ, una cum succo nervoso admitterentur: dein licet spiritus ab initio confusi atque perturbati, post breves inordinationes sese denuo recuperarent, & functionis tum animalis, tum vitalis solita munia exequerentur: attamen ob labem cerebro impressam particulæ heterogeneæ constanter admixtæ spiritibus accrescentes iis, δαυζυεῖς explosivas inducebant; quamprimum enim spiritus copula extranea ad plenitudinem saturantur, ad ipsam excutiendam, sive elidendam irritati, explosiones σπασμώδεις inibant.

Prædicti  
affectus ætiologia.



Circa morbi principia, cum et cerebri, & spirituum incolarum diathesis a noxa recens suscepta magis perversa & vitiosa esset, copulæ heterogeneæ plenitudo citius contigit, proindeque explosio ejus crebrius & inordinatius succedens, cum majori tumultu peragebatur; postea vero cum regiminis animalis noxa remittente, istius copulæ, non secus ac liquoris nervosi supplementa æquali dimenso quotidie ingerebantur, spirituum explosiones, regulares mitioresque factæ, justas observabant periodos.

Quod ingruente paroxysmo in capite plenitudinem, ac velut inflationem, cum spirituum torpore & scotomia ægrotans persensit: ratio est, quoniam hoc tempore, spiritus cerebri incolæ, jam jam in explosiones parati, primo exagitari, & velut turgescere solent; dein pulsatio ista in sinistro hypochondrio successit, in quantum spiritus, plexus fibrasque nerveas, circa lienem densissime confitas, incolentes, explodi incipiunt: postea cum spiritus intra plexus tum mesentericos, tum cardiacos scatentes, una exploduntur, istæ abdominis & thoracis elevationes, & quasi subsultus inducuntur: cumque in hac affectione, cordis & sanguinis motus fere in totum sistuntur, ideo pulsus diminutus & fere nullus, cum ἀραιὰ & aliquali ἀραιότης evadit.

Remittente viscerum & præcordiorum spasmo, garrulitas & cantus succedunt, quia spirituum adhuc explosorum πόνη e nervoso genere in cerebrum facta, spasmos in phantasie exaltationem, & promptiora phantasmatum exercitia commutat: Quamdiu spiritus intra cerebri meditullium regulariter ac ordinate exploduntur, facultatum & habituum actus tantum nobiliores, & quasi supra naturæ vires & tenorem eduntur, prout in hac ægrotante: e contra autem, cum in ista regione spirituum explosiones inordinatæ contingunt ut plurimum amentia, aut saltem potentiarum istarum exercitia incongrua, ac absurda peraguntur.

Viscerum



Viscerum spasmi & actiones phantasticæ sese mutuo, & alternatim excipiunt; quia sc. spirituum copiarum ad explodendum dispositarum, velut undulatione directa & reflexa, tendentiam suam modo in hanc partem, modo in istam vicissim faciunt: dein ultimo, cum fere omnes exploduntur, viscerum spasmi crebriores excitantur; cumque explodendorum manipulus tantum exiguus superest, iste denuo tum a capite, tum a visceribus exclusus, in spinalem medullam excurrit, ultimosque morbi impetus in brachiorum & crurum convulsiones impendit.

In hoc casu difficultas adhuc insignis restat, quare morbi hujus paroxysmi, cum statim semper horis exacte repetant, periodos tamen adeo inæquales habent: nimirum ut accessio prima tantum sex horas antecedit secundam, & dein secundæ reditus ad primam non nisi .8. horarum spatio contingat. Propter hujus solutionem, supponendum erit paroxysmos istos pendere a liquore nervoso particulis heterogeneis ad plenitudinem referto: quæ particulæ huic e massa sanguinea omnino convehuntur, atque sanguis easdem e succo nutritio a visceribus suppeditato imbibit. His ita suppositis, considerare oportebit quo temporis spatio massa sanguinea particulis istis morbificis saturatur, & dein quali dimenso eas in liquorem nervosum suffundit. Super his, in ægrotantis hujusce casu ut melius constet, quo ritu habent, sciendum est, eam in toto nycthemero unica tantum vice victum plenum assumere: nempe paroxysmo secundo finito circa horam septimam mediocriter cœnat, reliquo die appetitu carens, vix quidquam alimenti ingerit, itaque probabile est materiem morbificam, una cum penurâ nutritio potissimum tempore nocturno in massam sanguineam suffundi; idque uberius quam ut totum exinde statim in liquorem nervosum derivari possit: particulæ heterogeneæ, quæ primo e sanguine recens saturato in liquorem nervosum convehuntur, ad plenitudinem aggestæ paroxysmum primum excitant, cujus accessio ideo diutius pro-



telatur, quoniam & spatium unum requiritur quo sanguis, & dein aliud quo cerebrum & nervi impleantur: post exactum hunc paroxysmum, quia sanguis adhuc satur plures alias ejusmodi particulas in se continens, eas succo nervoso e vestigio suffundit; idcirco paroxysmus alter sub triplo istius spatii quo prior inducitur: hoc autem finito, quia tum massa sanguinea tum succus nervosus sarcina sua prorsus liberantur, ægrotans melius quam alio quovis tempore se habens, alimenta satis avide capeffit; deinceps vero, cum ad paroxysmum proxime sequentem primo massa sanguinea, & tunc succus nervosus materia morbifica saturari debent; ideo gemino huic penso horæ octodecim requiruntur: siquidem vero ad secundum paroxysmum tantum opus, est particulas alias e massa sanguinea adhuc plena in liquorem nervosum derivari, ideo huic effectui spatium longe minus, 6 sc. horarum, sufficiat.

*Methodus  
therapeutica.*

Postquam hanc dominam per plures septimanas ejusmodi paroxysmis periodicis laborantem, denovo inviseram, præcepi ut tres horas ante secundum paroxysmum sanguis e vena pedis ad 3 x. detraheretur, quo facto accessio vesperi expectata prorsus eam deseruit, neque unquam postea repetebat: alter vero paroxysmus pristinam vicem observans quotidie redibat, donec phlebotomia paulo ante accessum ejus celebrata, patiens isto die morbo immunis perstitit, qui tamen postridie rediens, juxta eundem typum eam per plures menses exercuit: interim illa quia brumæ frigus gravissime urgebat, remediorum usum aliquandiu distulit: attamen ineunte vere, Illustrissima Domina Oxonim adducta sequenti methodo sanabatur.

Imprimis hoc catharticum exhibui, atque sexta aut septima qualibet die idem repetendum curavi.  
℞. Sulphuris Antimonii gr. vj. Mercurii dul. 9 j.  
resin. jalap. gr. iij. Zinziberis gr. vj. simul teran-  
su in marmore, dein addendo conserva violar 3 j.  
f. bolus: bis aut ter vomitum, atque tres aut qua-  
tuor sedes provocare solebat. Catameniorum fluxus  
ei



ei statis temporibus, in magna copia constanter eveniebat: quare cum sanguis valde copiosus, & calidus videretur, medio inter periodos menstruas tempore phlebotomiam bis aut ter instituebam: porro singulis, quibus a purgatione vacabat, diebus cepit bis in die quatuor pilulas massæ sequentis, superbibendo haustulum julapii infra præscripti.

*R. Radicum pœonia maris ℥ β. serpentaria virginiana, contrayerva, dictamni cretici an. ʒ ij. rani humani præpar. ʒj. β. ungula alcis ʒ j. corallii rubr. præpar. Margarit. pul. an. ʒj. salis absynthii ʒ ij. salis corallii ʒ j. cum s. q. syrupi de floribus pœonia maris, f. massa.*

*R. Aq. florum pœonia maris, cerasorum nigrorum juglandum an. ℥iiij. aq. antiepileptica L. angii ʒ ij. syrupi de floribus pœonia ʒ j. β. castorei nodulo ligati & in vitro suspensi ʒ j. misce, f. julapium.*

Quando pilulas fastidire cœpit, iis omissis sumpsit bis in die, sc. primo mane, & sero vesperi circiter ʒ j. pulveris sequentis in cochleari julapii, superbibendo 4 aut 5 cochlearia ejusdem. *R. Lapidis Bezoar, utriusque succini albi, margaritarum præpar. corallii rubr. an. ʒj. cranii humani ʒ ij. rad. serpentaria virginiana, sem. ruta an. ʒ β. misc. f. pulvis, capiat ʒ j. mane & vesperi cum dist. julapii supra præscripti.*

Dein cum & hoc medicamentum tædio esse cœpisset, pilular. aut etiam elixiris proprietatis, quandoque etiam per plures dies sp. C. C. usus succedebat. Postea demum ab isto pulvere aliquanto spatio quotidie assumpto juvari cœpit.

Interea dum hæc medendi methodus instituitur, capillitio derafo, caput tenui solum amictu coopiebatur: Emplastrum hystericum cum Galbano admixto super abdomen gestavit: pro potu ordinatio bochetum ex sarfa & china, rad. pœonia maris, aliisque appropriatis in aq. fontana infusis, & decoctis bibebat. Intra mensem paroxysmi aliquantulum remittebantur. dein mitiores sensim minoresque facti tandem fere in totum cessabant: nisi quod iustante catameniorum fluxu ejusdem morbi in-



sultu uno aut altero affici solebat: porro vertigine fere constanti & anorexia laborabat, media æstate bibit acidulas astropenses per sesquimenssem, & perfecte convaluit.

Quod vero spectat ad Therapias rationem in genere pro convulsionibus ejusmodi admirandis adhibendam; non facile erit aut remedia morbo huic Herculeis paria, aut curationis methodum certam & crebris experimentis comprobatam assignare: præterquam enim quod casus isti similes raro occurrunt, insuper observare est, quod eadem medicamenta, quæ huic ægrotanti hoc tempore profuerunt, alteri, aut eidem, alio tempore adhibita, ne hilum juvarent: cujus ratio videtur esse, quod morbi causa in succi nutritii dyscrasia consistat, qui liquor non uno semper eodemque modo pervertitur: verum a multiplici salium ac sulphurum combinatione, indolem varii moris, ac generis morbidam adipiscitur, eamque subinde commutat: quapropter in gravissimis ejusmodi affectibus, medicamenta haud vulgaria & ex pharmacopeia deprompta, sed magistralia, & pro re nata, juxta symptomatum admirandorum apparentias præscribantur, Vomitus lenis, purgatio, & phlebotomia imprimis celebrari, ac aliquoties, prout opportunum videbitur, iterari debent. Quoad medicamenta autem specifica ac in casibus istis appropriata, cum præcipua indicatio fuerit, succi nervosi crasim emendare plurima tentare, & ab effectu eorum virtutes rimari liceat: itaque experiri fas sit, quid remedia sale volatili aut armoniaco prædita efficiant. In hanc rem sp. & sales C. Cervi, sanguinis, fuliginis, flores & spiritus salis armoniaci assumantur: His nihil juvantibus ad chalybeata deveniendum est, tincturæ & solutiones corallii, ac antimonii præbeantur, cujusmodi medicamenta in tali dosi & forma, & tam crebra vice exhibeantur, ut ex iis alteratio quædam toti sanguini & succo nervoso inducatur: porro si talibus deerit successus, ad alexipharmaca, quæ contra venena & malignitatem humoribus impressam juvant, procedere oportebit:



bit, sc. ex his vegetabilium decocta, destillata, pulveres, conservas, aliaque præparata instituere, & alia cum aliis varie componere, & diversimode administrare. Verisimile est, quod ejusmodi medicamina, quæ demorsis a vipera, aut cane rabido, etiam quæ contra aconita & toxica ore assumpta prodesse solent, etiam in convulsionibus supradictis ex usu esse possunt. Licebit hic, juxta exemplum Gregor. Horstii in tractatibus suis de morbo convulsivo maligno, item de convulsionibus admirandis remedia magistralia sub forma electuarii purgantis, item pulveris & antidoti convulsivi præscribere, eademque ex simplicibus partim alexipharmacis, partimque antiepilepticis varie componere.

## CAPUT



## CAPUT X.

*De passionibus quæ vulgo dicuntur  
hystericæ.*

**P**assio hysterica, inter morbos muliebres, pessimæ adeo famæ existit, ut semidamnati instar, plurium aliorum affectuum culpas gerat: si quando enim ægrotudo inusitati moris, aut occultioris originis in corpore fœmineo occurrat, ita ut causa ejus lateat, & indicatio therapeutica sit prorsus incerta, statim uteri (qui plerumque insons est) malam influentiam accusamus, & in symptomate quovis inusitato aliquid hystericum subesse pronunciamus, proindeque ad hunc scopum, qui sæpe tantum ignorantiae subterfugium est, intentiones medicæ ac remediorum usus diriguntur.

*Passionis  
hystericæ  
descriptio.*

Pathemata, quæ ad hunc censum referri solent, varia & multiplicia reperiuntur, quæ raro in diversis fœminis conveniunt, aut ad eundem prorsus modum contingunt: communissima, & quæ vulgo affectionis hystericæ rationem formalem constituere dicuntur, sunt hæc, sc. motus in imo ventre, ibidemque velut globi cujusdam ascensus, dein rugitus, aut vomendi nixus, hypochondriorum distentio & murmur cum flatuum eructatione, respiratio inæqualis ac ut plurimum impedita, præfoecatio in gutture, vertigo, oculorum inversio aut rotatio, sæpe risus, aut fletus, fabulatio absurda, quandoque *ἄσθια* & *ἀνιμσία* cum pulsu obscuro aut nullo, & aspectu cadaveroso, interdum motus convulsi in facie, ac artubus, & nonnunquam in toto corpore excitati: verum spasmi universales rarius contingunt, & non nisi morbo hoc in statum pessimum evecto: quippe ut plurimum sine membrorum contractione tantum in ventre inferiori, thorace & capite, sc. in eorum aliquo, aut successive in omnibus paroxysmi tragoedia peragitur. Hujusmodi affectionibus obnoxie sunt fœminæ cujusque ætatis & conditionis, sc. divites & pauperes,



rēs, virgines, uxores & viduæ: observavi symptomata istæc in puellis ante pubertatem, etiam in vetustis post catameniorum defectum; quinimo ejusmodi passiones interdum viros infestant, uti plane constat exemplo superius allato.

Quod spectat ad symptomatum istorum causas, eas Medici plerique veteres & quidam neoterici solummodo in uteri ascensum & vapores ab eodem elevatos retulere: Prior opinio, licet antiquum obtinet, minus verisimilis videtur; quippe in virginibus & viduis uteri corpus adeo exigua constat mole, & partibus circumquaque vicinis ita strictim alligatur, ut nec ipse loco moveri, & ascendere, nec motus ejus, si quis fuerit, persentiri poterit: quoad *αἰτιολογίαν* istam vulgarem a vaporibus desumptam, eam uti prorsus vanam, & futilem alibi justis de causis sæpe rejicimus: passiones autem modo descriptas neque semper, neque omnino ab uteri ascensu aut vaporibus procedere judicamus: idque prius quidam alii celebriores medici statuerunt, Quippe olim Carolus Piso, & nuper doctissimus Highmorus utrum ab omni culpa vindicarunt, atque pathemata, quæ vulgo dicuntur hysterica, hic a sanguine in pulmones impetuosius irruente, atque iste a colluvie serosa juxta nervorum origines congesta, oriri excogitarunt; Posterior hæc opinio quantum probabilis videtur, e sequentibus patebit. Quoad doctrinam vero super hac re a D. D. Highmoro traditam, quanquam a more nostro absit cujusquam placita convellere, & mihi pene religio sit a Clarissimo hoc viro dissentire: quia tamen pathologia nostra basi contrariæ innitens (sc. affectus hysterici causa ad genus nervosum immediatius quam ad sanguinem imputata) gratis asserta videbitur, nisi rationes, quæ contra istam hypothesein & pro nostra militant, proferam; idcirco venia hic detur, utramque sententiam, velut in balance positam, exactius trutinare.

In paroxysmo igitur vulgo dicto hysterico supponit vir egregius, sanguinem, utpote tenuiorem & flatulentum cum effervescencia quadam in vasa pneumonica & cordis nimis confertim irruere, &

*Symptomatum causa inquiruntur*

*D. Highmori opinio examinatur*  
ia.



in iis impetuose ebullire, adeoque pulmones infer-  
 cire, & plurimum aggravare, ut nec illi motum  
 ineant, neque sanguis e cordis sinubus lacunari  
 possit: hinc a sanguine in præcordiis stagnante,  
 magna oppressio, respiratio difficilis, & sæpe nulla,  
 cum spirituum vitalium deliquio inferri solent:  
 dein septum transversum, ut pulmonibus magis  
 magisque distentis, locum cedat, & respirationem  
 aliquo saltem modo perficiat, cum diastole immani  
 & diutius continuata deorsum fertur, adeoque in-  
 testina deprimendo, abdomen & hypochondria at-  
 rollat, & motum, velut globi ascendentis simulet:  
 postea vero functione vitali ad hunc modum labo-  
 rante, facultas animalis in suppetias ejus insurgit,  
 quapropter urgente motuum in variis partibus ne-  
 cessitate, spiritus animales in principia nervorum  
 impetuose propulsi convulsiones diversimodas,  
 hinc inde vagas, edunt. Hanc opinionem a magno  
 juvamine in hoc affectu per sanguinis missionem,  
 nec non ab insigni læsione propter excretionis cu-  
 jusque sanguineæ retentionem, tum a juvantibus,  
 tum nocentibus in hac passione, Author confirmare  
 satagit.

Verum licet doctrinam hanc de suffocatione ute-  
 rina, prout valde ingeniosam, & affabre exco-  
 gitatam, non possim non laudare, tamen quo mi-  
 nus huic per omnia consentiam, rationes quæ-  
 dam magni momenti plane evincunt. Equidem  
 fateor me non intelligere quomodo in quibusdam  
 hysteris, quæ sc. temperamenti frigidioris sunt,  
 sæpe etiam pica & malasia afficiuntur, sanguis ita  
 in pulmones immodice ebulliat, sine quibusvis  
 effervescentiæ suæ notis alibi conspicuis. Novi  
 paellas ob *χλωροσι* quasi exangues, quarum nem-  
 pe cruor, utpote effectus, a quovis exercitio in  
 corde stagnaret, & exinde difficulter admodum  
 in pulmones exantlaretur, quæ tamen passionibus  
 dictis hysteris erant graviter obnoxie: certe haud  
 probabile est, quod harum sanguis immodice effe-  
 vescens in vasa pneumonica impetuose irruat, eo-  
 rumque poros & meatus confitissime infarciat,  
 cum interea tales anhelosæ fiunt, propter sangui-  
 nis



nis a pulmonibus absentiam, aut admissionem  
difficilem: præterea quo pacto evenit, ut violen-  
tus iste sanguinis in pulmones incurfus, qui circa  
paroxysmum fieri supponitur, haud inflammatio-  
nem in iis pariat? quippe sanguis parti cuiusdam ra-  
pide & nimis confertim impactus, facile extrava-  
satur, & *φλόγῳσι* ægre discutiendam excitare  
solet. unde igitur in affectu hysterico cruor pulmo-  
nes violenter subiens & distendens peripneumo-  
niam minime inferat? aut quare non peripneumo-  
niæ, alias inductæ, affectus quasi hysterici super-  
veniunt? Quamobrem improbable videtur, quod  
sanguis, proprio orgasmo turgescens, in pulmo-  
nes irruat, eosque infractione nimia immobiles  
reddens diaphragmatis, aliarumque partium con-  
vulsiones secundo & consequenter inducat: quin  
potius videtur quod ob diaphragma, aliaque re-  
spirationis organa prius spasmo affecta, sanguis  
in præcordiis stagnare cogatur: Insuper observare  
licet, quod pulmones haud semper ante alias par-  
tes afficiuntur; sæpe enim symptomata spasmodi-  
ca alibi incipiunt, & non raro pectoris regionem  
omnino intactam demittunt. Quippe in aliqui-  
bus vertigo, & oculorum coruscationes paroxy-  
smum inchoant, quibus fletus, aut risus, aut ar-  
tuum motus convulsivi sine thoracis angustia, aut  
cordis oppressione succedunt: in aliis antequam re-  
spiratio quovis modo laborat, infimi ventris intu-  
mescentia cum vomitu, aut rugitu, paroxysmum  
ordiuntur, & non raro finiunt; utcumque respi-  
rationis difficultas symptomata ista sæpe longo  
intervallo sequitur, eamque fasciarum in hypo-  
chondriis arcta constrictio præcavere solet: porro  
videtur quod iste, velut globi cuiusdam ab hypo-  
gastrio ascensus, a septi depressione ne utique pro-  
cedat: quoniam sc. in paroxysmo hysterico, hæc  
pars haud semper versus inferiora derpimitur, ac  
sæpenumero ad superiora contracta, pulmones sur-  
sum propellit, adeoque spiritu fere præcluso, suffo-  
cationis periculum minatur. His aliisque rationibus  
persuasi in ea demum sententia sumus, quod affe-  
ctio dicta uterina, præcipue, ac primario sit con-  
vulsiva. *Est.*

*Affectio hy-  
sterica adce-  
rebrium &  
nervosum  
genus præ-  
cipue spe-  
culiva. Est.*



vulsiua, atque a cerebro & nervoso genere affectis potissimum dependeat quicquid inordinationis, aut anomaliz exinde circa sanguinis motum contingit, tantum secundo, & dependenter a viscerum spasmis fiat.

Enimvero passio quæ vulgo perhibetur hysterica, sicut alii motus convulsiui, omnino a spirituum animalium explosionibus producitur; discriminis ratio, quæ tum morbi hujus species ab invicem, tum ab aliis affectibus spasmodicis differunt, a varia causæ morbificæ origine & potissimum extensione de sumitur: nam origo hujus, sicut plurimum aliufmodi spasmorum, utero prorsus infante, sæpenumero in capite consistit: quandoque tamen hic affectus ab uteri culpa, & nonnunquam ab aliarum partium vitio dependet. Quoad morbi extensionem a quacunque origine procedit, ut plurimum nervos interiores, nempe ad viscera & præcordia spectantes, eorumque appendices præcipue afficit, spiritusque in iis scatentes potissimum exercet: interdum vero, licet rarius, etiam spiritus qui nervis exterioribus, item qui cerebro & cerebello præsident, eodem affectu involvuntur. Primo dicemus de morbi hujus origine.

Hanc autem sæpissime περὶ τοῦ ἐγκέφαλου consistere, & symptomatum quæ in vivis accidunt comparatio, & defunctorum observationes anatomicæ aperte indicant: quippe observare licet hunc affectum a subito terrore, ingenti tristitia, aut indignatione, aliave passione violenta, in qua spiritus cerebri incolæ potissimum afficiuntur, crebro exortum ducere; porro nonnullis mala victus ratio, & varia accidentia, quibus humores vitiosi intra caput uberius congeruntur, hoc malum primo intulerunt: quin & paroxysmorum ritus idem manifesto evincit, in quantum sc. capitis plenitudo, vertigo, oculorum coruscatio, aurium tinnitus in multis paroxysmum hystericum ordiuntur, eumque non raro concludunt: præterea mulieres quasdam ab aliis morbis defunctas, passionibus interim hystericis dum ægrotarent valde obnoxias, apertius, in quibus utero satis recte habente, in occipite



pite nervorum principia sero acri madida, ac prorsus immersa deprehendi, prout infra fusius declarabimus.

Has aliasque rationes perpendentes, non dubitemus asserere passiones, vulgo dictas hystericas, creberrime oriri, eo quod spiritus animales, nervorum principia intra *ἐν τῷ φάρυγγι* occupantes, labe quadam afficiuntur, illi nimirum aut in confusio- nem acti, aut humoribus vitiosis perfusi, copulam heterogeneam & explosivam sibi met asciscunt, quam una secum in canales nerveos longe deducunt: cumque iidem spiritus, per totas eorum series sive ordines copula ista ad plenitudinem saturantur, aut sponte sua, aut occasionaliter commoti explosiones ineunt, adeoque motus convulsivos cient: quod vero talis copula spiritibus adhærens una cum iis in nervos interiores potissimum derivatur, ratio est, quoniam in hoc versus præcordia & viscera com meatu spiritus animales propter animi affectus plurimum perturbantur, quare noxas quasvis aliunde illatas, facilius admittunt, & anomalias promptius concipiunt. Spiritus enim animales ob hanc præcipue occasionem diathesin spasmodicam contrahunt: quatenus nimirum illi, ab impressione violenta, extra orbitas suas, ac solitum influentiæ & actus modum pervertuntur, hinc inordinationes suas non modo postea repetunt, quin & particulas heterogeneas in amplexus suos suscipiunt, cumque iis facilius combinantur: quapropter in quantum spiritus animales nervos paris vagi & intercostalis permeantes, appetitus tum concupiscibilis, tum irascibilis perturbationibus quibusvis continuo implicantur, nihil mirum est, si illi præ cæteris dispositionem convulsivam acquirant,

Supposito igitur (quod revera supponi debet) *Eadem causa* spiritus animales, juxta origines nervosas copulam *sa postea* heterogeneam & explosivam contraxisse, eamque *per totos* in nervos interiores una secum vexisse, & per totos *nervorum* eorum ductus explicasse, non difficile erit *ductus dis-* paroxysmi hysterici omniumque ejus symptomatum *ponitur,* rationes assignare. Imprimis enim morbo ingruente,

*Causa morbi sapissime circa nervorum principia incipit.*



ente, sæpenumero vertigo, oculorum rotatio & cerebri velut inflatio quædam, quasi velitationes præviæ excitantur, quia tota spirituum cohorte in explosiones parata, leves eorum copię versus cerebrum resilientes primo eliduntur; deinde statim in imo ventre, aut hypochondriis perturbatio succedit, in quantum spiritus intra plexus hic aut illic confitos proxime afficiuntur: nam alibi ostendimus, si quando spiritus animales in tota quadam serie exploduntur, qui in extremis partibus resident, affectionem istam primo inire: quare morbi hujus initia in capite & visceribus plerunque habentur: quod autem convulsiones modo in imo ventre, ac modo in hypochondriis primo sentiuntur, ratio est, quia materies morbifica, interdum nervi intercostalis ductu, in plexus ultimos mesentericos provehitur; quandoque tamen eadem non ultra paris vagi fines delapsa, multo citius, nempe circa plexus lienares aut stomachicos subsistit.

*Symptomatum hystericorum rationes explicatur.*

Cum itaque spiritus animales (prout ostensum est) intra nervos paris vagi & intercostalis ab eorum origine, usque ad fines ultimos copula heterogenea & explosiva imbuuntur, illi tandem vel mera plenitudine, vel ab irritatione alicubi facta in explosiones cientur, in qua affectione si qui spiritus versus cerebri meditullium exiliant, vertiginem, capitis inflationem, aliaque accidentia prævia inducunt: attamen spiritus, nervosi caudicis extremitatem alteram, sc. plexus mesentericos incolentes, præcipue explodi incipiunt; qui statim elisione sua, imas hypogastrii partes attolli & sursum contrahi cogunt, adeoque molis cujusdam, quasi uteri ascensum inducunt: dein cum plexus mesenterii superiores eodem affectu sensim implicantur, idcirco in quantum tota mesenterii compages, visceraque eidem annexa elevantur, & versus superiora impetuose corripuntur, abdominis intumescencia violenta, velut cum exilitio- ne quadam succedit: porro ventriculus, non tantum situ ejus mutato elevatur, quin fibris ejus omnibus, sc. obliquis, rectis & transversis una spa-  
smo



smo affectis, sæpe tanquam vesica inflata distenditur: hinc non raro vomitus, aut saltem rugitus & hypochondriorum murmura excitantur: quamprimum vero spiritibus serie quadam explosis ad thoracis regionem pervenitur, diaphragma modo diastole immani convulsus deprimitur, adeoque viscerum ascensionem occurrens, inflationem, & summam intumescientiam, cum ingenti lucta infert; ita ut in affectis illico ligamenta vestium solvi debent, secus illæ in leipothymiam incidere periclitabuntur: interim septo ita depresso, ejusque diastole continuata, sanguis fere immotus in præcordiis subsistit: adeoque stagnatione sua magnam oppressionem ac non raro functionis vitalis deliquium ciet: porro septi convulsio modo versus superiora contingit, adeoque illud pulmones sursum impellens, thoracis systolen violentam, & diutius quam par sit protractam inducit; cumque hac ratione sanguis in vasa pneumonica propellitur, nec denuo a cordis sinu excipitur, ibidem ac in toto præterea corpore stagnat, unde cordis oppressio, & sæpe leipothymia, immo interdum *ἀσπνία, ἀσπνία* modo cum livore faciei, modo cum aspectu cada-veroso insequuntur: postquam hæc in ima mediæque regione peraguntur, demum affectio ad caput, nervorum, quasi fomitis ignarii ductu, pertingit, atque spiritus ibidem explosi modo versus cerebri medullium resiliens, scotomiam, & non raro symptomata epilepsiae æmula producant; modo spiritus illic explosi in nervorum aliorum principia irruunt, ibidemque pares explosiones cient: quapropter hystericae circa finem paroxysmi sæpe rident aut plorant, aut delire fabulantur, nonnunquam faciei ac oris partes, quinimo interdum brachia, aliaque membra motibus convulsivis afficiuntur, cumque adeo demum spiritus omnes, qui copulam heterogeneam contraxerant exploduntur, paroxysmus finitur, verum exinde statim alterius paroxysmi materies congeri incipit.

*Symptoma-*

Quandoque accidit dispositionem spasmodicam tum diversam non ita longe lateque protensam esse præterquam sitas unde  
enim contingit.



enimquod sæpe nervi tantum paris vagi & intercostalis eadem plectuntur, ut neque cerebrum, nec membra exteriora quicquam afficiantur; quinimo interdum, nec ipsi nervi interiores per totos eorum processus causa morbilica occupantur: nam diathesis convulsiva (prout modo innuimus) sæpe non ultra plexus lienares, aut stomachicos pertingit, & tunc paroxysmus a ventriculi, aut hypochondrii sinistri inflatione incipiens, non uteri sed lieais vitio oriri creditur: cujusmodi affectio mox ad thoracem traducta, ibidemque septum, & pulmones spasmò involvens, respirationem, & cordis motum sistit, aut quodammodo pervertit: subinde vero paroxysmus iste modo cum, modo sine capitis perturbatione insigni pertransit. Hæc quidem vario modo contingunt, juxta quod materiem morbilicam, sive copulam explosivam a capite descendente, velut pulveris pyrii acervos modo in hac, modo in illa parte plus aut minus congeri accidit: de qua tamen materia, quo ritu eadem in capite producta, nervorum origines primo afficit, adeoque passionis dictæ hystericæ causam procatacticam constituit, jam proxime inquirendum restat.

*Morbi causa  
procatacti-  
ca vel juxta  
nervorum o-  
rigines sub-  
sistit.*

Quod itaque spectat ad materiam morbilicam, sive copulam explosivam, quæ spiritibus intra *ἐνκεφαλον* scatentibus accrescens, cumque iis in processus nerveos derivata, non raro affectuum, qui vulgo perhibentur uterini, causa existit: dicimus hanc, sicut in aliis convulsionum speciebus, esse particulas heterogeneas, & sanguine suffusas, quæ tamen ob duas potissimum *προφάσεις* spiritibus in nervorum principia influxuris affigi solent: nempe aut spirituum ipsorum culpa, aut ipsius materiæ præpollentia, utriusque generis instantiæ passim occurrunt. Interdum accidit spiritus animales intra cerebrum, inque comœatu ab ipso ad præcordia ducente, confitos, a subita passione, puta timoris, iræ, tristitiæ, plurimum perturbari, ac in *ἀταξίας* cogi; proindeque illos extra ordines propulsos, particulas heterogeneas quas- cunque obvias sibi met asciscere, cumque ipsis com-



combinari; ut propterea mox diathesin explosivam acquirant, eamque aliquandiu postea retineant, prout supra declaravimus. Insuper secundo ipsa materies morbifica interdum magis effera & potentior facta, invitis œconomiae animalis praesidiis, e massa sanguinea in cerebrum, ejusque appendicem suffunditur, quæ spiritibus adhærescens, eos statim in explosiones disponit: hoc passim cernitur in malis febrium crisis, nec non in affectibus quibusvis malignis, etiam scorbuticis, aliisque chronicis perperam judicatis. Has causas plurimum fovet, suscitaturque mala aut debilis cerebri & nervosi generis constitutio, sive eadem hæreditaria, sive ob malam victus rationem acquisita fuerit: namque in corporibus ita dispositis, & spiritus animales a levi quavis occasione in confusionem aguntur, atque cerebri, & systematis nervosi meatus materiae heterogeneæ, & explosivæ incurfibus facilius patefcunt. Revera propter hanc rationem foeminae præ-viris, illarumque aliæ præ aliis, affectibus convulsivis obnoxiae fiunt, prout infra fufius ostendetur.

Quamquam autem hujusmodi mulierum passionum dictæ hystericæ sæpissime a capitis vitio, sive a causa morbifica intra *ῥαχιδ* oriunda procedunt: attamen aliquando tales affectus propter causam alibi incipientem, sc. modo in utero, modo in aliis visceribus, suscitantur, atque hujus pathologiae spasmodicæ duo sunt præcipue capita, sc.

1. Interdum accidit tumorem, aut ulcus, aut humorum acrium congestiones, in partibus membranosis circa uterum, aut alia viscera confitis excitari, atque partes ita affectas, ob solutionem continui in spasmos dolorificos crebro irritari: deinde in quantum spiritus animales circumcirca dispositi, influique in crebras *ῥαχιδ* adiguntur, illi demum particulas heterogeneas aut a parte affecta, aut aliunde dimissas sibimet asciscentes, ad impetus explosivos disponuntur: cumque imprimis motus convulsivi tantum in loci affecti vicinia contingunt, nempe ut moles in hypogastrio ascendens, aut ventris intumescencia, solummodo per cipi-

Vel juxta  
uterum aut  
alia viscera.

Tosterius  
hoc duplici  
modo contin-  
git.  
vel ob so-  
lutionem  
continui.



percipiuntur; postea corporum nerveorum ductu, & consensu spasmi ibidem incepti sensim in alia ventris imi viscera; dein ad præcordia; ultimoque in ipsum caput propagantur; atque affectu ira paulatim ad spiritus cerebri incolas delato, illi insuper in propria officina copulam heterogeneam nacti, eam in viscera retorquent, adeoque causa morbifica reciproca facta, ab utraque caudicis nervosi extremitate inchoatur. Vidi olim virginem prænobilem, in qua tumor exiguus subter os pubis cum dolore atrocissimo exortus, convulsiones immanes primo in ventre infimo, ac postea ad præcordia & caput ascendentes, ac demum in membra exteriora protensas ciebat: nam semel aut bis in die, postquam in parte affecta cruciatus insignes urgerent, abdomen, & mox hypochondria attolli solebant: dein respirationis difficultas & *æva* *insula* succedebant, atque statim affectu exterius translato, membrorum & artuum contractiones, convulsionesque horrendæ sequutæ sunt. Nonnunquam etiam accidit puerperis, ob noxam utero illatam symptomata spasmodica induci: Refert Harveus ab injectione uterina acriori convulsiones mirandas excitatas fuisse: ita interdum licet rarius accidit, spiritibus circa nervorum extremitates, & prope uterum degentibus, materiam morbificam sive copulam explosivam immediate a loco ibidem affecto, & absque cerebri culpa affigi.

2.  
Vel ob succi  
nervosi ob-  
structionem.

2. Restat adhuc alter casus, sive afficiendi modus, quo dispositio spasmodica partium longe a cerebro distitarum vitio producitur (licet interim labes, quæ istius affectionis causa existit, non raro ipsi cerebro mediate communicetur:) nimirum, si quando succus nervosus, alicubi in motu suo, sive circulatione impeditur, exinde in partes nervosas restagnans, easque aggravans, sæpe diathesin spasmodicam infert: Ita cum evacuatio quædam solennis, qua liquoris nervosi superfluitates excerni solebant, cohibetur, uti a fontanelis subito occlusis, aut ulceribus vetustis sine catharsi exiccatis, plures in affectiones convulsivas inciderunt:



inciderunt : quinimo aliquatenus hic locum obtinet , quod vulgo in virginibus & viduis pro causa passionum hystericarum assignari solet, nempe humoris seminalis , quem *περί τὰ ἀσπιδία* impendi oportuit, intempestiva cohibitio ; saltem si quando istæ a conjugali vitæ statu juvamen recipiunt, ideo accidit, quoniam humoris nervosi restagnationes , quæ cerebro & nervoso generi sæpe labem affigunt, hac ratione præcaventur : Porro succus nervosus versus principium suum regurgitat , quia transitus ejus alicubi a tumore aut scirrhuso aut cancroso præcluditur. Nuper in hac urbe istiusmodi affectus insignis instantia contigit, sc. puella quædam 12 annos nata herniam contraxerat, hinc ex præscripto matris suæ, fasciam male adaptatam , cum fibula duriuscula glandulas inguinales valde comprimente, non sine magno dolore & cruciatu per binas septimanas gestabat : intra hoc spatium ( cum prius integre valebat ) de vertigine & gravi capitis torpore queri cœpit ; ac paulo postea affectiones convulsivas & quasi hystericas crebro ingruentes passa erat, simulque scrophulæ ingentes pone aures ac in cervice ejusdem lateris subnascebantur, quibus antehac in tota vita haud quaquam obnoxia fuerat. In hoc casu minime est quod dubitem, quin a glandulis istis , quæ sunt liquoris nervosi emunctoria, nimis compressis humoris istius superfluitates , inde per vasa lymphatica amandari solitæ , in caput restagnantes mala ista pepererint : quippe symptomatum prædictorum, a subligaculi istius inguinalis gestatione , ortus, ita subito & manifesto successit , ut in hanc occasionem vel mater ejus morbi causam retulerit. Insuper etiam in aliis observavi humoris nervosi, alicubi in decursu suo obstructi, recrementa versus caput restagnantia, non modo symptomata spasmodica, ast deinde affectus strumosos intulisse.

Hæc de affectionis dictæ hystericæ ratione formali, diversimoda origine, nec non de symptomatum ejus causis genuinis : e quibus liquido constare videtur , passionem istam non semper ab utero, quin solvantur.

*Objectiones  
contra prædictam hystericam  
posthæc  
solvantur.*



quin longe crebrius a cerebri, aliarumque generis nervosi partium, vitio pendere : At vero contra hæc multa objiciuntur, quæ juxta veterum opinionem culpam omnem in uterum rejiciunt : Nimirum ita fieri videtur, quoniam hujus morbi insultus fere tantum fœminas invadit; quin & mulieres circa uterum male habentes, sc. puerperæ, aut quibus catamenia sistuntur, ei potissimum sunt obnoxie : porro ex juvantibus hoc arguere licet, quia scil. emplastra super abdomen gestata, item arcta ventris & hypochondriorum constrictio, quibus sc. uteri ascensus inhibetur, paroxysmum ingruentem non raro arcent; hoc etiam iudicat, quod suaveolentia naribus admota paroxysmum inducunt, atque fœtida eundem abigunt, e contra accidere perhibetur, si eadem ventri aut pudendo imponuntur.

Ut has objectiones diluamus, dicimus imprimis symptomata quæ videntur hysterica, haud tantum mulieres incessere : nam historia superius allata ostendimus virum quendam ejusmodi Paroxysmis, cum molis in imo ventre ascensu obnoxium fuisse : quod autem fœminæ multo crebrius quam viri affectibus istis convulsivis tentantur, duæ rationes proferri possunt : sc. primo quod illarum constitutio animalis sit longe debilior : nempe cerebrum & nervos molliores, & minus firmæ texturæ obtinent, ut nihil fortiter sufferre, nec injuriæ cuivis resistere queant; quin & in illis spiritus animales magis in fugam & distractionem proclives, copulam heterogeneam & explosivam facilius admittunt : hinc fœminæ a subito terrore, aut ingenti tristitia maximas spirituum inordinationes subeunt, cum viri a tali occasione vix omnino perturbantur. Secundo fœminæ diathesin spasmodicam promptius suscipiunt, quia materiæ morbificæ copiam uberio- rem congerunt : quippe cum vitam sedentariam plerumque degunt, sanguis ob ventilationis defectum impurius evadit : insuper in hoc sexu, iste particulis heterogeneis, & fermentativis originaliter scatur, quapropter eum catameniorum fluxu  
sæpius



sæpius expurgari expedit, quo tamen haud semper, quod extraneum & incongruum est, e massa sanguinea iu totum eliminatur, quin superstes sit, quod pro data occasione in cerebrum & appendicem ejus suffusum, affectionum convulsivaram causa existat: porro cum fluxu menstruali cohibito, diathesis spasmodica accersitur, haud igitur putandum est, tales affectus ab utero suscitari, verum quod massa sanguinea, particulis heterogeneis plus solito imbuta eas, una cum succo nervoso capiti ingerat: quinimo potissimum ob hanc rationem etiam purperæ passionibus quasi hysterice obnoxie reperiuntur; præterquam enim quod læsis uteri membranis, spasmus illic, obfensionem molestam inceptus sursum perreptat, ac denuo cerebro communicatur, sæpissime accidit, sanguinem a lochiis retentis infectum, febrili incendio effervesce, ac dein criseos loco, miasmata maligna cerebro ingerere; unde affectus convulsivi, & non raro soporosi excitantur.

Quod vero arguitur, morbum hunc videri hystericum, quia remedia circa abdomen applicata non raro levamen conferunt, facile erit referre, causam morificam in mesenterio sæpius quam in utero consistam, interdum hac ratione aut tolli, aut ab iussu sua cohiberi: præterea ejusmodi circa hypogastrium applicationes nihilominus prodesse, licet affectus origo ab ipso capite derivetur: nam supra ostendimus, quod cum materies heterogenea & explosiva ab ἐκέφαλω descendens, spiritibus intra totos nervorum interiorum processus dispositis, diathesin spasmodicam intulit; motus convulsivi propterea excitati, a nervorum extremitatibus incipiunt, & exinde sursum versus illorum initia perreptant: adeo ut imprimis viscera imi ventris, dein præcordia, ac ultimo cerebrum ipsum afficiantur; sin vero spiritus extimi, sc. in mesenterii plexibus degentes, ab explosionibus ineundis cohibentur cæteri omnes in reliquo ductu nervoso intra ordines suos permanent: hoc autem emplastra super



per umbilicum gestata, non raro efficiunt: namque odore suo spiritus ab exilitione reprimunt, ac in ordines cogunt, quinetiam copulam illis accrescentem non raro excutunt, abiguntque: quare cum explosiones illic ineundæ inhibentur, paroxysmus convulsivus omnino præcavetur: quod adhuc amplius constat, in quantum si spasmus in imo ventre inceptus, indeque instar globi ascendens, statim suppressitur, ac istarum partium constrictione valida impeditur, ne superius perreptet, sæpenumero passio convulsiva, præcordiis, & cerebro intactis abruptitur: quapropter vulgo in more est, mulieres laborantes, fasciis, aut brachiis circa epigastrium complicatis arcte constringere, adeoque symptomatum versus superiora progressum sistere: cum enim spiritus animales velut fomite ignario, spasmos successive ineunt, ubicunque fomes abscinditur, aut intercipitur, affectio istæc prorsus inhibetur,

Quod spectat ad varios odoratorum effectus, nempe quod suavia paroxysmum accersunt. fœtida vero eundem abigunt, dicendum esse videtur, priora spiritus animales demulcendo, resolvere, ac a solitis influentiæ pensis nimis relaxare, adeoque ipsos ad explodendum paratos, in tales inordinationes provocare, quinimo velut flammula admota aliquatenus accendere; e contra autem graveolentia spiritus reprimunt, ab excursibus & exorbitantiis retro cogunt, inque ordines compellunt, quin velut sulphur auro fulminanti admixtum, virtutem explosivam iis adimunt.

Quæ hætenus de passionibus vulgo dictis uterinis fuse disseruimus, adhuc clarius elucescent, si in confirmationem hypotheseos nostræ, argumenta ab anatomicis observationibus desumpta, adjiciantur: Itaque libet hic casum insignem, quo affectionum convulsivarum ratio formalis & causæ plurimum illustrantur, in medium proferre.

*Observatio.* Domina perillustis, forma elegantissima, optimaque animi & morum indole prædita, nuper in hac vicinia degebat, quæ per multos annos affe-

ctibus



nam-  
mum, ac  
lis accre-  
re: quare  
peror-  
r: quod  
afimus in  
i alcen-  
um con-  
terreper,  
, & ce-  
vulgo in  
ut bra-  
conftrin-  
uperiora  
animales  
ineunt,  
cipitur,  
effluunt,  
ut. fur-  
de vide-  
refol-  
laxare,  
in tales  
fi flami-  
nra au-  
curfus  
es com-  
i admi-  
utcri-  
ent, fi  
gmen-  
adji-  
is, quo  
tis &  
n pro-  
opti-  
per in  
as af-  
ebius

nam-  
mum, ac  
lis accre-  
re: quare  
peror-  
r: quod  
afimus in  
i alcen-  
um con-  
terreper,  
, & ce-  
vulgo in  
ut bra-  
conftrin-  
uperiora  
animales  
ineunt,  
cipitur,  
effluunt,  
ut. fur-  
de vide-  
refol-  
laxare,  
in tales  
fi flami-  
nra au-  
curfus  
es com-  
i admi-  
utcri-  
ent, fi  
gmen-  
adji-  
is, quo  
tis &  
n pro-  
opti-  
per in  
as af-  
ebius

nam-  
mum, ac  
lis accre-  
re: quare  
peror-  
r: quod  
afimus in  
i alcen-  
um con-  
terreper,  
, & ce-  
vulgo in  
ut bra-  
conftrin-  
uperiora  
animales  
ineunt,  
cipitur,  
effluunt,  
ut. fur-  
de vide-  
refol-  
laxare,  
in tales  
fi flami-  
nra au-  
curfus  
es com-  
i admi-  
utcri-  
ent, fi  
gmen-  
adji-  
is, quo  
tis &  
n pro-  
opti-  
per in  
as af-  
ebius

nam-  
mum, ac  
lis accre-  
re: quare  
peror-  
r: quod  
afimus in  
i alcen-  
um con-  
terreper,  
, & ce-  
vulgo in  
ut bra-  
conftrin-  
uperiora  
animales  
ineunt,  
cipitur,  
effluunt,  
ut. fur-  
de vide-  
refol-  
laxare,  
in tales  
fi flami-  
nra au-  
curfus  
es com-  
i admi-  
utcri-  
ent, fi  
gmen-  
adji-  
is, quo  
tis &  
n pro-  
opti-  
per in  
as af-  
ebius

nam-  
mum, ac  
lis accre-  
re: quare  
peror-  
r: quod  
afimus in  
i alcen-  
um con-  
terreper,  
, & ce-  
vulgo in  
ut bra-  
conftrin-  
uperiora  
animales  
ineunt,  
cipitur,  
effluunt,  
ut. fur-  
de vide-  
refol-  
laxare,  
in tales  
fi flami-  
nra au-  
curfus  
es com-  
i admi-  
utcri-  
ent, fi  
gmen-  
adji-  
is, quo  
tis &  
n pro-  
opti-  
per in  
as af-  
ebius



stabat : sub finem tertii mensis, quo tempore constanter abortire solebat, menstrua eruperunt, quibus per duos aut tres dies, una cum membranarum laceratarum frustulis descendantibus, abortum expectabat : attamen fluxu isto cessante, dolores, velut parturientis, in abdomine & lumbis, uti prius exorti sunt, eamque hebdomadæ spatio die & nocte miserrime torquebant ; tandem balneo herbarum emollientium usa, & exinde lecto ad sudandum commissa, uteri sarcinam deposuit : conceptus ita cum ingenti cruciatu decedens, galli Indici ovum & magnitudine & figura æquabat : hujus tunica exterior fuit lacera & disrupa, interior integra manens, aquæ limpidæ circiter lb. β. & nihil præterea continebat ; nulla quidem fœtus aut formati, aut uspiam futuri rudimenta apparebant : postea per quatuor aut quinque dies lochia cum aliquibus membranarum frustis effluebant ; interim dolores cum solita atrocità urgebant ; cumque elapso hebdomadæ spatio, haud sponte defierint, demum iis sedandis remedia expetuntur.

Propter hunc finem, imprimis linimenta, fœtus, balnea, & clysteres crebro adhibentur ; etiam medicamina uteri sordes expurgantia, in quas totius mali causa rejicitur, intus sumuntur : priorum usum, torminum breves intermissiones sequutæ sunt ; subinde vero affectus cum insigni molestia redibat ; quinimo intra tres hebdomadas, morbus plurimum ingravescens, multa alia horrenda symptomata ascivit : nam præter dolores in abdomine & lumbis, qui indies atrociores fiebant, insuper in dorso, cervice, scapulis, nec non in brachiis & cruribus magno cruciatu mox afficiebatur, idque acerbius quoties lecto incallescerebat ; cæterum crebra vertigine, vomitu & nausea, atque sæpius in die paroxysmis convulsivis gravissimis affligebatur ; sc. primo moles in hypogastrio ascendere visa, illico totum ventrem cum impetu attollebat, mox respiratione cohibita *ἀναισθησία* cum vultu cadaveroso successit : postquam ita velut demortua, per tria aut quatuor horæ



horæ minuta jacuerat, subito exilire solebat, ut ab astantibus vix comprimi, aut contineri posset; dein contractiones immanes & distorsiones in cunctis oris & faciei partibus; nec non in omnibus corporis membris sequutæ sunt: symptomata hæc revera hysterica judicabantur, quoniam Domina illustris ita nuper abortierat.

Attamen hæc singula perpendens, in ea demum sententia fui, utriusque paroxysmi, sc. tum *ἀλγυμνωδῆς*, tum *σπασμωδῆς* causam omnino a mala cerebri & nervosi generis affectione, etiam absque uteri culpa pendere; nempe quod humor acris intra *ἐγκέφαλον* congestus, exinde per nervorum ductus in partes longe distitas descenderet, qui membranis & fibris insidens, cumque humore a massa sanguinea infuso fermentescens, eas plurimum irritaret, adeoque dolores atroces ciceret: postea dein cum particulæ heterogeneæ & explosivæ cum humore isto intra *ἐγκέφαλον* admixtæ, atque ductus nerveos subeuntes, spiritibus accrescerent, propterea diathesis spasmodica subinde in graves paroxysmos erumpens inducebatur, prout mox fusius patebit.

Juxta hujusmodi Ætiologiam intentiones curativas instituens, Domina ægrotanti, quo tempore gravissime laborabat, sanguinem e vena saphena mitti, intra biduum lene catharticum exhiberi, idque semel, aut bis in hebdomada iterandum præcepi: insuper aliis diebus, vesperi & mane sp. C. Cervi, aliisque horis bis aut ter in die pulveris e margaritis & oculiscancrorum cum dosi sequentis julapii propinabam. R. Aq. limacum, lumbricor. magistralis an. ℥iij. saxifragæ, cerasor. nigror. an. ℥iiij, hystericæ ℥ij. syr. e coralliis ℥j. β. tincturæ castorei 3 j. misce; Balneo herbarum dulcium frequenter usa fuit cum necessitas urgeret, opiata semper bono successu assumpsit; vesicatoria internæ parti utriusque femoris, etiam cervici applicabantur; porro fots, linimenta, clysteres, cucurbitæ, sternutatoria, cum multis aliis administrationum modis, juxta symptomatum exigentias præscribebantur.



Ab hac medendi methodo per 14. circiter dies adhibita, Domina illustrissima plurimum alleviata, paroxysmis convulsivis omnino caruit. Quinimo viscerum & membrorum tormina, aliaque symptomata valde mitigata, citæ convalescentiæ spem optimam fovebant: Posthæc vero, partim ob malam victus rationem, cui ægrotans vel paululum resecta semper indulgit, præcipue tamen, propter subitam terroris vel tristiæ passionem, quam funestum accidens, intra proprias ædes contingens, excitarat, recidivam passa, mox morbus in multo deteriorem statum eversus, nam & spasmi & dolores atrocius infestabant; quin & ventriculus vomitu fere continuo laceratus, nec alimenta nec medicamina admittebat. Lac asinum per aliquot dies cum fructu quodam fovebat; quod tamen, siquidem in ventriculo bilefcens, ei molestiam pareret, brevi omittebatur: tandem invitis omnibus remediis, juxta plurium medicorum consilia diligentissime præscriptis, nobilissima patiens magis indies, magisque elanguescebat, atque sensim morti appropinquabat: biduo ante obitum ventris & lumborum tormina plurimum remittebant, ipsaque solito alacrior facta, convalescentiæ spem quandam concepit; interea tamen conquesta erat de capitis dolore & gravitate insigni; cumque circa initium noctis alte dormiverat, expergescens in paroxysmum convulsivum valde horrendum incidit, qui statim in apoplexiam cito lethalem transit; namque insensibilis & *apropria* facta, intra 12 horas hac vita emigravit.

*Morbi A-  
xiologia ex  
observatis  
anatomicis  
desumpta:*

Cum circa ægritudinis, ex qua illustrissima Domina obierat, causam varia judicia ferebantur, plerisque nimirum mala omnia in affectiones uterinas; aliis in abscessum aut apostema, quod alicubi circa abdominis viscera latitans suspicati sunt referentibus; placuit amicis ut cadaver, ob funus diu prolatum aperiendum, sedulo inspiceretur; adeoque genuinæ morbi & mortis causæ investigarentur, quod pensum curæ meæ delegatum, summa qua poteram diligentia executus sum.

Itaque



Itaque primo circa habitum corporis observatu dignum erat, quod membra, & partes inferiores, juxta, ac ultra dolorum sedes confitæ, plurimum contabuerant, ut crura prorsus emaciata, instar sceleti apparuerint: interim facies, cervix, & brachia satis plena & torosa manebant, unde constat liquorem nervosum operi nutritio non minus quam facultatum animalium exercitio conferre: quare cum liquor iste, in lumbis & abdomine a transitu multum impeditus, & spasms continuis absumptus, haud debito influxu ad partes inferiores descenderet, istæ propterea statim tum enerves, tum emaridæ evaserunt. Hujusmodi atrophia in hoc differt ab altera hæctica, quæ sanguinis vitio contingit, quoniam in hac facies Hippocratica præcipuum morbi signum est, in illa vultus aspectusque parum aut nihil mali produnt.

Dominæ illustrissimæ cadaver, ut valde emaciatum, & viscera omnia inanita fuerint, tamen illud citissime computruerat, nam intra 40 horas cutis per totam discolor, in hac parte livida, in ista viridis, inque alia subnigra apparebat, & corpus tam subito putrescens odorem summe tetrum expirabat, cujus ratio proculdubio erat, quod propter musculos spasms perpetuis exercitos mixtionis principia in tantum laxarentur, ut illa in dissolutionem prompta, post obitum mox ab invicem decederent; pari certe ritu uti observamus de carne ferarum, quæ aut cursu diuturno fatigatæ, aut sustibus contusæ occiduntur, hæc enim multo citius putrescit, quam illarum, quæ statu tranquillo & sedato mactantur.

Abdomine aperto, intestina & ventriculus, satis sana sc. integra enim & bene colorata apparebant, erant tamen inanita, & quasi-inflata, utpote quæ in perpetuas fere evacuationes, sc. supra, aut infra habitas, sollicitata fuerint: in tota hac cavitate nulla abscessus, aut apostematis vestigia cernebantur. Dum morbi causam perquirentes, viscera huc illuc devolvimus, in mesenterio aliquid notatu dignum occurrebat; nempe circa me-



dium ejus ubi dorso affigitur, atque majores nervorum plexus continet, substantia laxior & pluribus quasi vesiculis inflata manus latitudinem exæquans videbatur, eo sc. ritu, ac quando in armo vitulino interstitia musculorum a laniis insufflantur, ut pars ea plenior & velut pinguior facta, extumescat: Hoc mesenterii loco, quia tumidior & tactu mollior fuit, humorem aliquem doloris causam hospitari putaveram; aperiens vero deprehendi tantum membranas fuisse ab invicem solutas, & interstitiis suis nihil præter flatum inclusisse: qualis membranarum separatio, & ab invicem divulsio, proculdubio inducta fuerat a crebris spasmodis, sive spirituum explosionibus, quæ intra plexus, & fibras nerveas illic densissime confitas fere continuo ciebantur; atque spasmi isti, ob particulas heterogeneas & explosivas illuc nervorum ductu a capite derivatas contingebant.

Enimvero quod spectat ad ista ventris tormina, & in affectibus convulsivis velut molis ascensum, & abdominis inflationem, non dubitandum est quin causæ morbificæ sedes in illa mesenterii parte delituit: attamen quoniam uteri principaliter affecti tanta suspicio ferebatur, quantum hoc viscus meruerat, proxime inquirebam: itaque pelvim intra ossa pubis confitam diligenter scrutatus, uterum in debito situ & quoad omnia sanum, & factum tectum reperi: corpus ejus ad justam molem, licet 5 tantum septimanæ post abortum præterierant, contrahebatur, sc. pyrum minorem & magnitudine & figura referebat; glandulæ ex utroque fundi latere, quæ testes dicuntur, perexiguæ & flaccidæ, sine quovis humore superfluo, aut virulento in iis contento, apparebant: uteri corpus ubilibet dissectum, crassitudine sua pollicem latum æquabat; ejusque interior cavitas haud major fuerat quam ut fabam contineret: intra hunc specum, sicuti in aliorum viscerum cavernis assolent, mucosum quiddam in perexigua quantitate includebatur: revera circa uterum, aut appendicem ejus nihil extabat, cui, tanquam causæ



sæ morbificæ, symptomata modo descripta imputari poterint: quapropter hinc quod prius opinatus sum, *ἐποδαιτυνῶς* concludere liceat, passionnes dictas uterinas sæpissime ab alia causa quam uteri vitio excitari.

Intestinis amotis etiam renes satis sanos reperimus; alter tamen eorum inusitata erat figuræ, sc. in plures lobos instar renis vitulini fidebatur.

Lien, pancreas, & omentum sine culpa: ventriculus valde inflatus erat, ejusque tunica interior, absque plicis, aut rugis plana evaserat, quod certe acciderat propter crebros vomitus, viscere hoc spasmodis fere continuis affecto: porro ob hanc rationem, sc. stomachi toto præfracto, alimenta nec bene appetere, nec concoquere solebat.

Hepar a sana constitutione plurimum defecerat, fuit namque tumidum & subdum, pallidi coloris, atque instar ligni putridi, exangue prorsus & exiccum, hoc proculdubio effecerat liquorum cardiacorum, & impense calidorum crebrior usus.

Pulmones erant lividi coloris, & per totum obstructi, utpote ichore spumoso, & foetido infarcti: Certe hoc viscus & hepar a longo tempore vitiosa extiterant, propterea ut sanguis diutius a recta crasi degeneret & valde depravatus, ægritudinis prima seminia, ejusque deinceps fomitem constantem suggererit.

At vero præcipuam, & quasi originalem morbi causam in capite, idque haud frustra quælivimus; itaque calvaria exempta, vasa meninges & cerebrum perreptantia sanguine plena, & distenta apparebant, cum in reliquo corpore inter dissecandum vix quidquam sanguinis effluerat: meninge crassiori amota, per alteram tenuem, & pellucidam, aqua limpida cerebri plicas & anfractus implens, ejusque totam compagem quasi inundans, cernebatur: revera omnes cerebri cavitates & recessus colluvies serosa impleverat: plexus choroides aqua diu immersus, & velut elixus, discolor & semicorruptus evaserat: Juxta nervorum splanchni-

corum



rum origines, aqua se plurimum insinuans, piam matrem, a medullæ oblongatæ caudice, per duos digitos latos separaverat, proculdubio horum nervorum ductu, materies morbifica a capite in mesenterii plexus descendens, & dolorum, & spasmodorum causa extiterat: porro eadem materies etiam aliorum nervorum capita afficiens, eorumque ductus pervadens, postea in aliis partibus, sc. quibusvis fere totius corporis, atrocissimas hæc affectiones produxit:

*Medendi  
methodus  
contra af-  
fectiones  
hystericas.*

Quod spectat ad therapiam, sive medendi rationem, in passionibus vulgo dictis hystericis usurpandam: quandoquidem plurima hujus morbi symptomata sunt convulsiva, inde constat remedia antispasmodica, qualia superius describuntur, potissimum indicari; attamen cum affectiones hæc sexui femineo sæpissime contingunt, in quo nempe fluxus menstruus, aliaque uteri accidentia, plerumque in causæ morbi partem asciscuntur; idcirco medicamenta varias uteri dispositiones respicientia prioribus superaddi, iisque multifariam complicari debent: Indicationes therapeuticæ sunt vel curatoria in paroxysmo adhibendæ, vel præservatoria, quæ extra paroxysmum institutæ morbi causam tollunt, ejusque accessiones præcavent.

*Curatoria.*

1. Quoad prius, si paroxysmus levior esse solet, absque ulteriori spirituum perturbatione, sua sponte pertransire permittatur, sin eo gravius urgente, naturæ valde oppressæ suppetias afferre opus sit, unum illud agatur, ut spiritus copulæ heterogeneæ amplexibus immunes facti, inordinationes suas, explosionesque remittant; in hunc scopum usu receptissimum est imprimis foetida & graveolentia naribus admoveere, quorum sc. effluvia spiritus nimis efferos, & exilire paratos reprimunt, ac in ordines cogunt, quin & copulam heterogeneam iis excutiunt, & non raro penitus profligant: asa foetida, castoreum, galbanum, sindone rara inclusa, & naribus admota conveniunt; æm plumæ perdicum, & vetera coria cumbusta, aut sulphur accensum: Porro spiritus, ac oleum fuliginis



fuliginis, aut cornu cervi non raro juvant: Novitamen hujusmodi suffumigia, quibusdam sceminiis plurimum infesta paroxysmum aggravasse; probabile est eadem interdum spiritus nimium irritare, ac in majores *ἀραξίαι* adigere, sicut foetida naribus admota, ita similia ori infusa non raro levamen conferunt: quare hysterics tincturam castorei, solutiones asæ foetidæ, & galbani, etiam spiritus C. cervi, ac fuliginis, cum aquis appropriatis sæpius bono cum successu propinamus. R. Sp. C. cervi gut. 12 ad 15 vel 20. sumantur in haustulo julapii sequentis. R. Aq. pulegii, artemisiæ an ʒ iiij aq. bryoniæ compositæ ʒ ij. castorei nodulo ligat. & in vitro suspensi ʒβ. sacchari albisimi ʒj. misce. R. Tincturæ castorei ʒj. ad ʒβ. sumatur in haustulo cerevisiæ tenuis, R. Asæ foetidæ, vel galbani ʒij. dissolvantur in spiritu vini ad tincturæ rubicundæ extractionem. Dosis ʒj. in aq. matricariæ cochlear. ij. vel iiij. Riverius valde prædicat illud Solenandri. R. Moschi, sanguinis draconis an. ʒj. plus minus sumatur in aq. Naphæ ʒiiij. ad iiij. Johannes Anglicus commendat sem. pastinacæ vel aquilegiæ in vino, aut aq. appropriata prout remediæ certissima. Si paroxysmus diutius persistens *ἀπαρίαι* aut *ἀποῦξίαι* intulerit, enemata acriora, ut rad. bryoniæ cum carminativis aq. incoctis injiciantur, frictions crurum ac pedum instituantur; ac si ad fortiora procedendum erit, cucurbitulæ abdomini, aut inguini applicentur, quin & sternutatio crebro provocetur, nonnullis convenit in media paroxysmo, aq. frigida haustum, aut simplicem, aut in qua camphora deflagavit, propinare.

2. Indicatio præservatoria has tres præcipuas intentiones complectitur, sc. primo sanguinis impuritates cerebro ac nervoso generi suffundi aptas tollere, aut alio derivare. Secundo cerebrum munire, spiritusque incolas ita corroborare, ut illi copulam heterogeneam, vel non omnino suscipiant, vel facile excutiant. Tertio quicquid enorme uterus habet, ac dispositioni spasmodicæ contribuit commendare.

Hæc

1. Prima



1. Prima intentio catharsi & phlebotomia, a-  
liisque communioribus sanguinem, & humores de-  
purandi expurgandique viis perficitur. Si emetico  
locus fuerit, ab eo semper ordiendum esse duco,  
præsertim in cacochymicis, atque pica, aut mala-  
cia affectis, in quibus ingens phlegmatis viscosi sa-  
burra, ventriculi plicis ac tunicis infarcta, alio-  
rum medicaminum virtutes inhibet: propediem  
a vomitorio, nisi aliquid contra indicat, sanguis  
detrahatur, in foeminis temperamenti calidioris,  
statim e brachio, & postea, si opus sit, ex pede,  
aut hirudinum suctu e venis sedalibus; in corpo-  
ribus vero obstructionibus molestatis, & minus  
calidis sanguis mittatur parcius & rarius, ac tan-  
tum in locis infra uterum confitis: post has eva-  
cuationes (si modo indicantur) rite celebratas  
semel intra sex semtemve dies purgatio instituatur  
juxta formulas sequentes. R. Pilul. foetid. ma-  
jor. ʒ i. β. resinæ jalap. gr. xii. Tartari vitriolat.  
castorei an. ʒ j. ammoniaci solut. in aq. hystericæ  
q. s. f. pilulæ 12 pro tribus dosibus. Vel. R. Resinæ  
jalap. gr. xvij. Calomelanos ʒ j. castorei ʒ j. f. pul-  
vis, dividatur in tres partes pro tribus dosibus, de-  
tur in pulpa pomi cocti vel in conserva boraginis:  
temperamento calidiori præditis, extracti, aut  
syrupi nostri solutivi dosis convenienter exhibea-  
tur: ad materiæ morbificæ a capite revulsionem  
fontanella suræ, aut femori inusta, atque inter-  
dum vesicatoria, ligaturæ, & frictiones dolorificæ  
adhiberi solent. Nec tantum sanguinis purgatio,  
ejusque recrementorum a capite revulsio, sed li-  
quoris ejus alteratio, inque crasi debitam redu-  
ctio hic locum habent: quare in quibusdam hyste-  
ricis chalybeata juvant, in aliis acidulæ aut serum  
lactis, in nonnullis thermarum usus insigniter  
prodesse solent.

Secunda intentio, nempe cerebri, & spirituum  
animalium rectificatio, medicamentis cephalicis, ac  
proprie antispasmodicis perficitur, quæ quidem se-  
re singulis diebus, quoties a catharsi, aut phlebo-  
tomia vacat, sedulo exhibeantur: talium remedio-  
rum cum variæ sunt species & administrationum  
modi,



modi, libet hic selectiores quasdam formulas sub-  
jicere.

R. *Facula bryonia, asa foetida, castorei* an. ʒ j.  
*salus corallii, succini, Jovis* an. ʒ ʒ. *galbani solut.*  
*in aq. hysterica q. s. f. massa, Dosis* ʒ ʒ. *ad ʒ j.*  
*mane & vespri, superbibendo dosin liquoris appo-*  
*priati.*

Val. R. *sem. pastinaca sylvestris, urtica* an. ʒ ij.  
*vitrioli martis* ʒ j. *extracti gentiana, matricaria* an.  
ʒ j. ʒ. *cum s. q. syrupi de artemisia, f. massa, su-*  
*maur ad ʒ ʒ. eodem modo.*

Si forma pulveris magis arridet. R. *Rad. ser-*  
*pentaria virginiana, contrayerva* an. ʒ j. ʒ. *coral-*  
*lii prepar. margarit. succini albiissimi* an. ʒ j. *misce,*  
*f. pulvis. Dosis* ʒ j. *ad ʒ ʒ. mane, & vespri cum*  
*liquore appropriato.*

Opiatæ ad hunc modum componantur. R. *Con-*  
*serv. flor. lilii convallis, paonia maris, betonica* an.  
ʒ ij. *sem. paonia, corallii rubr. prepar. an.* ʒ ij. *pulv.*  
*dictamni cretici* ʒ j. ʒ. *salis al synthii* ʒ ij. *cum s.*  
*q. syr. & corticibus citri. f. electuarium. Dosis mane*  
*& vespri q. N. Moschat. eodem modo pauperi-*  
*bus exhibeatur conserv. foliorum arboris vitæ, vel*  
*foliorum rutæ bis in die.*

Liquores contra affectiones hystericas appropri-  
ati, & medicamentis prædictis superbibendi, sunt.  
vel aquæ destillatæ, quæ per se, vel cum aliis in  
forma julapii sumantur, vel decocta, vel tincturæ,  
ac infusiones.

R. *Aq. artemisia, pulegii* an. lb. ʒ. *hysterica*  
ʒ iiij. *tinctura castorei* ʒ. ʒ. *syr. & corallii* ʒ j. ʒ.  
*misce. Dosis* ʒ j. *ad ʒ j. ʒ. cum medicamento qualibet*  
*et supradictis.*

R. *Folior. pulegii, matricaria, abrotani utrius-*  
*que calamintha, nepeta, marrubii utriusque* an.  
M. j. *rad. bryonia* ʒ iiij. *sem. pastinaca* ʒ ij. *incisi,*  
*& contusis affunde vini albi, vel pomacei lb. vi. de-*  
*stillentur s. a.*

R. *Rad. paonia maris, angelica, valeriana* an.  
ʒ ʒ. *folior. artemisia, chamæpycos, calamintha,*  
*pulegii, visci qu. an. M. j. sem. utriusque pastinaca*  
*sylvestris, an. ʒ iiij. passular. M. j. coquantur in aq.*  
*formata*



*fontana lb iij. ad medietatem, adde vini albi lb j. β. f. colatura, servetur in vasis occlusis. Dosis ʒ iij. iij. bis in dies.*

*℞. Sem. pastinacæ sylvestris contus. ʒ ij. castorei ʒ j. ponantur in vitro cum vini albi lb ij. Dosis ʒ ij. bis in die.*

3. Quoad tertiam intentionem, quæ uteri inordinationes inhibens passionis dictæ hysteriæ sanationem promovet; dico imprimis, quod olim credebatur circa morbi causam, & curationis scopum, nempe uterum ascendere, ideoque debere in debitum locum reduci, omnino commentitium esse, prout alibi ostendimus: uteri descensus, sive exitus sæpenumero accidit, attamen raro aut nunquam affectus hystericos producit: porro uteri dislocatio puerperis mox a partu interdum contingit, sc. cum uteri corpus capacius factum, & recens inanitem, non recto in loco, intra pelvim subsidet, verum superius ad latus illi modo dextri, modo sinistri declinat, ibidemque instar marsupii constricti, in molem ingentem complicatur: cujusmodi moles, juxta inguinis latus diu permanens, foetus alterius, aut secundinæ relictæ, aut etiam tumoris scirrhusi illic accrescentis, suspicionem inferre solet; postea tamen, cum lochiis copiose fluentibus, uterus ad debitam magnitudinem redigitur, tumor iste sensim evanescit: atqui dum illic persistit, nisi forsan lochia propterea sistuntur, passionibus hystericas minime producit. Huic parti in debitam positionem citius reducendæ, foras, linimenta, & emplastra bene conducunt. Sæpissime tamen symptoma illud sine ulteriori noxa sponte pertransit. Quibus præterea affectibus uterus a puerperio obnoxius fuerit, & qua medicinæ methodo iis occurrendum sit, alibi ex professo ostendimus. Quoad cætera istius partis vitia, quæ fœminis aliis, sc. minime puerperis obtingunt, advertimus, ea potissimum esse vel uteri morbum ex solutione continuifactum, qui se. aut tumor, aut ulcus est; vel excretionis ejusdam assuetæ inhibitionem, nempe aut sanguinis menstrui, aut floris albi, aut humoris femoralis



minalis suppressionem: Propter menstrua retenta particulæ heterogeneæ non raro in caput suffusæ, pathemata spasmodica inducunt: pariter cum fluor albus sistitur, materia excrementitia a sanguine resorpta, cerebro & nervoso generi traditur: Quinimo cum seminis evacuatio solita inhibetur, humoris nervosi superfluitates in cerebrum regurgitant, ejusque spiritus incolas tinctura morbifica & explosiva inficiunt. Super his particularibus uteri affectibus non opus erit speciatim ac fuscè differere, sed medicamenta & administrationes iatricas morbis muliebribus appropriatas, cum remediis antispasmodicis complere.

---



## CAPUT XI

*De affectibus, vulgo dictis hypochondriacis, quos, ostenditur, maxima ex parte esse convulsivos, obiter item de medicamentis chalybeatis.*

**I**N superioribus plane evicimus, passiones di-  
ctas hystericas non semper ab utero, imo sæpius  
a capite affecto procedere; inquirendum proxime  
de affectibus hypochondriacis, cujusmodi originis  
& naturæ illi fuerint, & a quarum partium vitio  
potissimum dependent. Vulgaris invaluit opinio  
symptomata, huic morbo accenseri solita, omni-  
no a liene produci; quare ut plurimum vaporibus  
ab hoc viscere elevatis, & huc illuc varie dis-  
currentibus, ascribuntur; cum revera ægritudi-  
nes istæ plerunque sint partium nervosarum spa-  
smi & contractiones: ut vero constet quibus de  
causis excitari solent, ipsa symptomata imprimis  
perpendere, eorumque censum quendam instituire  
oportebit.

*Affectus  
hypochon-  
driaci de-  
scriptio.*

Quoad affectus igitur, qui vulgo hypochondria-  
ci perhibentur, observare licet eos hominibus  
temperamenti atrabilarii, cum aspectu lurido, &  
graciliori corporis habitu potissimum accidere:  
raro est quod morbus iste *ἰσχυρὸς* vultu florido,  
aut etiam nimis phlegmatico præditos molestat:  
circa ætatis *ἀκμὴν* signis manifestis se prodit;  
huic viri, frequentius quam foeminae, obnoxii  
reperiuntur, in utrisque habitualis factus, ægre  
admodum aut vix omnino curatur, in mulieri-  
bus ob debiliorem constitutionem, affectibus  
spasmodicis longe pluribus stipatur; quare vulgo  
dicitur in hoc sexu, passioni hypochondriacæ, hy-  
stERICAM ASCISCI.

Symptomata, quæ huic morbo accensentur,  
vulgo valde multiplicia, & diversimodæ indolis  
existunt, neque in omnibus parem originem, aut  
eandem



eandem a se mutuo dependentiam observant: quippe in his ventris inferioris viscera, in illis præcordia, in aliis cerebri confinia plurimum affici videntur: in plerisque, verumtamen haud omnibus, ventriculus multum laborat: circa appetitum sæpe nimius, atqui ab ingestis statim aggravatur; cumque alimenta ob *βραδυπείλαιαν* diutius in eorum morantur, eorum particulae salinae in fluorem evectae, totam chyli massam in pulvem modo acidam, aut austeram, modo in salsam, aut acrem pervertunt: hinc cardialgiae, flatuum ingens proventus, rugitus, ac crebra vomitio succedunt; & quoniam ob *πνευματικῆς* defectum, chymus haud in totum volatilifatur, ac foras provehitur, quin materiae viscosae saburra ventriculi tunicis adhærescens pone relinquitur, sputatio fere continua eos infestat, in sinistro hypochondrio distentio; & non raro ibidem, ac subtus ventriculum pulsatio immanis sentitur, etiam illic dolores passim oriuntur, qui hinc inde vagi transcurrunt, & cum lancinatione quadam per plures horas misere exeruciant: interim a membranarum contracturis & flatuum exinde concitatorum fluctuatione, borborygmi, & murmura producuntur: in thorace autem sæpenumero adest magna constrictio & angustia, ut respiratio difficilis, & ad motum quemvis laboriosa evadit: etiam in nonnullis paroxysmi asthmatici gravissimi ingruunt: insuper de cordis tremore & palpitatione, cum insigni ejusdem oppressione, laborantes queri solent; item crebra spirituum deliquia, & leipothymiae metus superveniunt, ut ægroti mortem iis semper imminentem putarint: in hac regione circa membranas, ac præcipue mediastinum, dolor acutus, qui modo in una parte circumscribitur, modo ad scapulam extenditur, hujus morbi symptoma familiare est. At vero in capite maiorum ilias hypochondriacos plerunque perturbat; nempe dolores atrocissimi periodice revertentes emergunt; item scotomiae, crebrae vertigines, vigiliae pertinaces cogitationum æstus, & fluctuatio molestissima, animi incertitudo, phantasia perturbata, rei cujusque formido.



formido & suspitio, morborum, quibus immunes sunt, possessio imaginaria, pleræque etiam aliæ spirituum distractiones, imo interdum melancholia, & mania hanc ægritudinem comitantur: præter interiores hæc corporis regiones ab hoc morbo obsessas insuper partes fere quasvis externas dolores vagi, nec non spasmi, & stupores cum formationis sensu invadunt, sudores nocturni, sanguinis in facie & volis manuum suffusiones, febres erraticæ, & pleræque alia incertæ originis symptomata passim oriuntur; de quibus siquidem in promptu non fuerit causas genuinas & fiendi modos assignare, statim in lienem culpa omnis rejicitur, illumque, velut affectus cujusvis anomali primum authorem, medici accusant; verum quo jure mox inquiretur: interim observare est, quod præcipua hujusce ægritudinis symptomata sint spasmodica, atque immediate a spirituum animalium, & sæci nervosi anomaliis, potiusquam a viscerum coctioni inservientium dyscrasiis dependent. Verumtamen unde morbi hujus complicatissimi prima origo procedit, & qua ratione in pluribus ita locis affectiones diversimodas pariat, non ita facile erit designare.

*Affectus  
hypochondriaci ad  
genus nervosum spe-  
ctant.*

*In passionis  
hypochondriacæ causas  
inquiritur.*

Quid medici veteres atque moderni de passione hypochondriaca ejusque essentia, & causis crediderunt, tædio hic esset particulatim referre; annotamus solum quod plerique valetudinariam hanc diathesin unici lienis vitio adscripserint; interim nonnulli tota hujus visceris confinia in culpæ partem asciscentes, sanguinem in vasis splenicis, & epigastricis ubivis scatentem, utpote intemperiei calidæ & siccæ reum, adeoque adustioni, & nimie fermentationi obnoxium multiformi huic malo originem præbere contendunt: At vero insignissimus Highmorus lieni, æque ac utero vindicias afferens, præcipuam hujus morbi causam omnino in vitiosam ventriculi constitutionem retulit; atque hinc symptomatum prædictorum rationes originaliter petendas esse voluit. Enimvero ut hypothesein pro solvendis hujus ægritudinis phænomenis idoneam contexeret, supponit im-

primis.



primis stomachi tonum nimis laxum & debilem evasisse, ut propterea alimenta difficile admodum & imperfecte coquat: ita nimirum ut chyli portio tenuis & spirituosior, debito citius illinc sanguini commissa, ejus crasin versus acrem & calidam pervertat; dein alimenti residuum diutiori intra ventriculum mora in phlegma viscidum, & ponderosum degeneret; quod etiam stagnatione sua (pariter ac in eduliis diutius asservatis observare est) valde acidum aut austerum evadit: hinc autem arguit vir doctissimus, quod a sanguine nimis seroso, & tenuiori facto, ejus effervescentiæ cito transeuntes inducantur, atque a stomacho materiæ viscosæ saburra aggravato, ventriculi & hypochondriorum flatu ac distentiones nec non ructus & sputatio molestissima oriantur: quo vero lienem hac culpa penitus eximat, eum neque sanguinis faciem atrabilariam secernere, nec alii cuivis circa *αἱματῶν* muneris inservire contendit; attamen usum ejus fere tantum in eo consistere, ut viscus hoc sanguine præservido turgescent, ventriculo adjacenti calorem suppeditet, ipsumque blando tepore foveat.

Circa hanc opinionem, licet egregio huic Authori eatenus consentiam, ut ventriculum in hoc affectu sæpe graviter laborare concedam, cujus siquidem tonus sit laxus, & robur præfractum propter alimenti indigestionem, pituitæ viscosæ saburra usque in sinu ejus progignitur; cui ob particulas salinas diutina mora in fluorem evectas sæpe acor insignis aut austeritas accedunt; dein quia vitium in prima coctione haud emendatur, in secunda *ἀριστα* sanguinis dyscrasiæ & inordinationes excipiunt: Veruntamen in illam opinionem haud adducat ventriculum semper esse primum in culpa, aut cætera morbi hypochondriaci symptomata tantum a vitiosa illius constitutione pendere: Novi enim plures ægritudine ista immaniter afflictos, qui stomacho satis valebant: etenim de pulsatione in sinistro hypochondrio, de pectoris angustia, & dolore vago in eo excitato, nec non de cordis tremore & oppressionem, cum metu

*D.D. High-  
mori hypo-  
thesis ven-  
tilatur.*



tu continuo & imaginatione perturbata, plurimum questi sunt; interim cibos copiose appetere, ac ingesta quævis sine ventriculi molestia, aut gravamine, etiam absque sputatione aut ructu acido digerere solebant. Quinimo observavi alios bibaces & mala victus ratione utentes, stomachi flacciditatem cum dyspepsia, flatulentia, & crebra vomitione contraxisse, qui circa præcordia & facultates animales satis sani pro hypochondriacis haud omnino haberentur: præ erea in hoc affectu sæpe ventriculus, potius aliarum partium aut sanguinis vitio, quam propria culpa laborat; quippe usitatum est, huiusmodi ægrotos, quamdiu in lecto compositi multum perspirant, circa stomachum recte habere; cum vero excitantur, poris oclusis, & massæ sanguineæ sæculentia intrus restagnante, statim cardialgia, flatuum aggestione, & crebro vomendi nixu affici.

Propter hæc, aliaque rationum momenta, affectionis hypochondriacæ originem ab alio fonte quam a ventriculi imbecillitate derivandam esse existimo: quatenus autem inter partes hic primario affici suspectas, maximæ querelæ contra lienum suscitantur; erit operæ pretium inquirere, quali officio hoc viscus defungatur; dein quoties ab eo desciscit, utrum huic morbo contribuat.

*In lienis usum inquiretur.*

Ut concedam igitur, cum D. Highmoro, lienum calore suo ventriculum fovere, adeoque forsitan aliquatenus coctionem javare: attamen haud eo potissimum sine, sed ob usus quosdam nobiliores hanc partem conditam esse concludo; quippe stomacho, propter alimenti digestionem, haud tam calore quam fermento activo opus esse videtur: etenim pisces, actu frigidi, esculenta sua integra devorant, ac sine caloris subsidio eadem velut a menstruo quodam resoluta facile coquunt: præterea de liene observare est, quod licet in homine tota ejus compages ventriculo adjaceat, in cæteris plerisque animalibus figura oblonga præditis, quoad maximam ejus portionem, procul a ventriculo amoveatur: porro si lien sit tantum focus in quo sanguis ventriculum calefaciens contri-

neatur,



neatur, quæ ratio est ut iste potius quam hepar, aut pulmones, lividi coloris evadat, & cruore nigricante, ideoque minus præservido inferciatur?

Dum hæc perpendo, quod olim de lienis usu annotaveram, longe probabilius videtur, quod nimirum a sanguine per arterias advecto, portio quædam sæculentior, sc. materia terrestri & sale fixo constans, in hoc viscere deponatur, quæ illic velut digestionem exaltata, & in fermenti naturam evecta, denuo sanguini per venas refluxo committatur, quæ ipsum ζυμός quædam inspiret, atque circa πνεύματιν ejus idem præstet quod fermentum nostrum vulgare (*leaven* dictum) massæ farinaceæ commissum; nam sicuti panis incocti portio quædam ad austeritatem servata istam indolem assequitur, ut panes alios fermentet, eorumque particulas alias segnes in motum vindicet, ita videtur quod sanguis in liene reconditus ibidemque velut stagnatione acefcens, fermenti naturam induat, quo quidem reliqua cruoris massa, alique forsân humores, tanquam spiritualisati, in motum vividiorum actuentur. Quo spectant quæ a nupero Authore, sc. Doctissimo Veltusio, de lienis usu ingeniose proferantur: enimvero ille in hoc viscere fermentum, quo sanguinis particulae segiores ad activitatis statum perducuntur, contineri, uti summe probabile, constituit: quippe animadvertens quod in pueris aliisque temperamento sanguineo, & habitu corporis obefiori præditis, uti mores, & animi indoles ad otium, mollitiem & hebetudinem inclinarent, ita lien semper coloris rubicundi, & sanguine, uti hepar, florido repletus fuerit: hinc concludit, in his lienem, uti partes genitales ante pubertatem, aut in elumbis minus officio suo fungi; e contra vero, quandoquidem in viris circa mediam ætatem, præcipue in istis, qui sunt vultus severi & corporis gracilioris, uti solertiæ, sagacitatis, constantiæ ac fortitudinis indicia se produnt, ita lien coloris lividi, & sanguine, velut cænoso, imbutus reperiatur: hinc insuper arguit sanguinem

*Vid. d. a-  
trib. de fer-  
ment. c. 5.*

in.



in liene, velut conditorio, diutius asservatum, plane in fermentum abire, quo reliqua ejus massa subinde inspirata, subtilisetur magis, ac spiritus acutiores in regimine tum vitali, tum animali progignat: supponit enim corpora nostra naturaliter humiditate nimia scatere, qua quidem partium & viscerum plerorumque functiones plurimum hebetantur; at vero lienem massæ sanguinis communicare partes solidas, constantes, firmas, nec facile dissipabiles; atque has detergere illam humiditatem, simulque aliquatenus a sanguine & spiritibus illam mollitiem auferre. quæ in tenella ætate præpollent: eo ferme modo quo Boreas, aut ventus orientalis, siccitate & robore suarum partium aerem ventilans & intime penetrans, aeri & corporibus nostris robur aspirat.

Sed quæ olim circa lienem meditatus fuerim, cum alibi prostant, non opus erit in hoc loco repetere: attamen amplius annotare libet, quod in corporibus animalium ex elementorum quinario conflatis, uti spiritus cæteris præpollere debent: ita quidem isti viscosa sulphuris & aquæ humiditate irretiti, præpediuntur adeo, ut sæpe vires suas vegete satis exerere nequeant; hinc particulae salinæ, utpote plurimum fermentisibiles, ad hoc requiruntur, ut corpuscula spirituosiorum complexu semiobruta, ac sopita exuscitentur, ac in motus libertatem vindicentur. Unde in nobis ipsis experimur, cum a sanguine nimis halituoso spiritus hebescent, a liquoribus acetosis, uti primario vinis tenuibus & pomaceo insigni juvamen præstari: hujusmodi enim remedia spiritus exacuunt, ac torporem quemvis excutiunt. Talem omnino *superius* virtutem a liene recte se habente, erga sanguinem & liquorem nervosum jugiter exerceri, facile credimus.

Cum enim hoc viscus triplici vasorum genere instruatur, sc. arteriis & venis, ac insuper magnis nervorum plexibus, fibrarumque nervearum textura confitissima; singulorum usus ad hunc modum dirimi censemus: nempe per arterias sanguis lieni infertur, hinc saculentias suas e sale fixo & materia



teria terrestri conflatas, in meatus & porositates  
 ejus deponit, atque istæ ibidem reconditæ, ve-  
 lut digestionem quadam in succum valde fermenta-  
 tivum evehuntur: cujus item portio sanguini per  
 venas reducendo, continuo permiscetur: adeo-  
 que tota ejus massa hujusmodi particulis fermenta-  
 tivis a liene inspiratur, a quibus eidem velut au-  
 steritas quædam, & acumen, cum motus vigore  
 conciliatur; ita ut propterea ipse sanguis vege-  
 tius in vasis feratur, etiam exinde succus ner-  
 vosus e sanguine procreatus, magis activus re-  
 gimini animali suppeditetur: at vero haud tan-  
 tum hoc ritu mediate, & cruoris interventu, lie-  
 nis virtus fermentativa cerebrum & genus nervo-  
 sum inspirat: veruntamen opinari licet, quod  
 hoc aliquatenus immediato nervorum, in liene dis-  
 perforum, comœatu fiat: nam siquidem in hac  
 parte, nervorum, & plexuum nervorum, fibra-  
 rumque ab iis ortarum, ingens satellitium anatomi-  
 a detexit, merito ambigitur quali usui in ser-  
 viunt. Super hoc imprimis annotetur ventricu-  
 lum & lienem cum cerebro intima commercia ha-  
 bere; in tantum ut Helmontius in visceribus istis  
 animæ sedem posuerit; hoc autem nulla, quam  
 per nervos prædictos, commodiori via fieri possi-  
 bile est: Quapropter hic merito suspicamur, non  
 tantum spiritus animales a meta alterutra ad al-  
 teram internuncios esse, quin etiam & liquorem  
 nervosum, qui spirituum istorum tum pabulo,  
 tum vehiculo est, modo a cerebro versus hæc vi-  
 scera descendere, modo a visceribus hisce per ner-  
 vos susceptum, versus *ἡ κέφαλον* perreptare: Cu-  
 jusmodi succus lienaris, ad cerebrum delatus spi-  
 ritus animales exacuit, eosdem segnes erigit, ac  
 in motus pernices irritat: unde a liene, mentis  
 acumen & sagacitatem proficisci vulgo fertur,  
 & lienosi pro ingeniosis habentur. Cæterum pro-  
 babile est, quod passionum *ἡ ῥυαλ*, impetusque, a  
 spiritibus cerebri incolis incepti, nervorum com-  
 meatu, in lienem feruntur; adeoque spiritus inibi  
 degentes pathetice afficiunt, & sanguinem illuc  
 confluum in-perturbationum fluctus exagitant:  
 hinc



hinc enim aliquatenus procedit, quod in ira, tristitia, aliisque animi affectibus, juxta quod lienis fermentum, plus aut minus commotum, sanguini inspiratur, hujus liquor diversimode ebullit: porro ob hanc rationem accidit lienosis a passione quavis violenta sinistri hypochondrii inflationes & commotiones magnas cieri.

*Symptomatum hypochondriacorum rationes explicantur.*

Circa lienis usum his ita prælibatis, in promptu erit, juxta hanc nostram hypothesein, symptomata pleraque ad affectionem hypochondriacam pertinentia, explicare, & singulorum rationes assignare: Si quando enim lien in officio suo deficit, h. e, cum sanguinis recrementa atrabilia non fecernit, nec in materiam fermentativam coquit, sicuti in pueris, aliisque temperamenti sanguinei, aut nimis phlegmatici crebro evenire modo observavimus; animi indoles fit hebetior, corpus otio pinguescit; quin & sanguis debito segnior, intra vasa stagnare, aut saltem minus vegete circulari aptus est: e contra vero, cum lienis vis fermentativa nimis exaltatur, aut pervertitur, sanguis proinde debito acrior, aut austerior factus huc illuc rapide transcurrit, atque motuum anomalias concipit; quin & succus nervosus a recta crasi desciscens, spiritus animales copula heterogenea & explosiva imbuat, eosque adeo, velut stimulis afficiens in crebros spasmos irritat: ut non prorsus immerito lien, perperam habenti, plurima morborum genera imputentur: sunt autem afficiendi rationes, quibus lien male dispositus passionis hypochondriacæ symptomata producit, aut saltem eorum ortui contribuit, potissimum hæc sequentes.

*Inproducendis symptomatibus lienis influentia explicatur.*

Sc. primo interdum accidit spongiosam lienis substantiam, a sanguinis fæce poris ejus nimis impleta, ibidemque stagnante plurimum infeciri ac obstrui; ut deinceps massæ sanguineæ recrementa haud satis excipiat: quin eadem illuc delata, sed minime suscepta, in arteriæ cæliacæ ramos propinquos regurgitent, unde statim in ventriculi membranas omentum mesenterium, aliasque partes vicinas deferuntur, iisdemque affigi solent



lent, hinc viscerum istorum tonus in tantum labefactatur, ut circa chyli coctionem debita munia haud rite exequantur, & membranæ circumquaque consistæ, particulis heterogeneis, & irritativis plurimum imbutæ, siquidem fere continuo vellicantur, a spasms hic illic fuscitatis, doloribus vagis, contracturis, distentionibus, & flatuum proventui graviter obnoxie fiant; propter hujusmodi sanguinis a liene obstructo regurgitationem, verisimile est pulsationem istam, quæ in hypochondriacis subtus ventriculum sentitur, excitari.

2. Cum sanguinis sæculentiæ, liene obstructo excluduntur, partibus ei vicinis, uti dictum est, affixæ, sinistri hypochondrii affectionem valetudinariam pariunt: at vero licet viscus illud succum atrabilarium e cruore per arterias advectum satis excipiat, sæpe tamen eundem haud rite coquit, verum sale plurimum exaltato, in humorem nimis acidum, aut austerum, vel alius generis vitiosum pervertit; quo, cum tota massa sanguinea, atque succi alibilis in sinu ejus contenti penus inficiuntur, seminii hypochondriaci fructus in toto corpore repullulant; sanguis indubito effervescens, in quibusdam partibus impetuosius agitur, simulque in aliis stagnare aptus est: hinc lienosis familiare est, statim a pastu, faciem rubescere, manuum volas incallescere, hypochondria æstare, cordis oppressiones, atque pulsus variationes insignes succedere: Cæterum particulis istis fermentativis e sanguine in partes solidas ubique translatis, dolores vagi hinc inde transcurrentes, & punctiōum sensus, in plerisque corporis membris acciuntur: porro ab hoc cruoris inquinamento, siquidem massa ejus a temperie benigna & balsamica in salsam & tartaream mutatur, corporis habitus macilentus cum vultu lurido & obfusco inducitur.

3. E sanguine ita lienis culpa depravato, etiam regimini animali labes sæpenumero infertur; nam particulæ heterogeneæ & spasmodicæ non raro incerebrum, indeque in nervosum genus confunduntur



funduntur; ita ut spiritus animales in utraque provincia degentes, varias anomalias concipiant: propter noxam τῇ ἐγκέφαλῳ impressam, hypochondriaci variis phantasmatis, & cogitationum mole, fluctuationibusque tentari solent: insuper iis crebra vertigines, scotomiæ, cephalalgia, & non raro affectus paralytici contingunt: dein quatenus materies morbifica e capite in nervosum genus prolabitur, affectiones spasmodicæ in plerisque corporis partibus, potissimum vero circa præcordia, ac imi ventris viscera excitantur: cum enim spiritus intra nervos, qui partes istas respiciunt, scatentes, propter animi affectus valde perturbantur, particulæ spasmodicæ istos ductus promptius subeunt, illisque spiritibus diathesin convulsivam facilius imprimunt: Itaque partim ob labem, mediante cerebro transmissam, partimque ob noxam a liene (uti ostensum est) immediate communicatam cordis palpitatio, tremor, & frequens deliquium, pectoris constrictiones, respirationis impedimenta, stomachi dolor, rugitus, vomitus, & multa alia in istis visceribus accidentia hypochondriacis contingunt.

4. Præter hujusmodi inordinationes, quæ sanguinis tractu a liene in humores & partes solidas, ipsumque cerebrum, & nervosum genus, derivari solent, sunt & alia præterea mala, quæ ab hoc viscere, etiam nervorum comœatu exoriri videntur: quippe cum eorum propaggines extremæ, ipsæque fibræ nerveæ visceribus intertextæ, extremis suis osculis humorem quendam imbibere, ipsumque nonnunquam sursum convehere ostendimus; summe probabile est, fibras nerveas lieni dispersitas (quarum prout modo innuitur ingens satellitium est) succum ejus acerrimum suscipere, qui ductus nerveos altius perreptans, motuum convulsivorum causa existat: Revera quod inter cerebrum & lienem tam intima commercia habentur, nimirum longe citius, quam quæ per sanguinis ambages fieri possint, opinari liceat, nervos paris vagi & intercostalis, proximam comœatus viam esse, qua hæ partes invicem communicant,



Vir quidam illustris, temperamenti malancholici, & semper pro lienoso habitus, de dolore & inflatione hypochondrii sinistri, crebro rugitu, ructu acido, nec non de tremore cordis, assidua vertigine, nimis vigiliis, & phantasia perturbata plurimum conquestus erat: circa trigesimum quintum ætatis suæ annum, morbo ingravescente, somnum ægre, ac raro admodum capeßere noctu, & interdum cogitationum æstu, & fluctuatione molestari, res omnes, ac personas suspectas habere, & objecta quævis valde pertimescere cœpit: præcordia plurimum constringi, & coarctari, atque inimum subsidere videbantur, quasi cor ipsum usque in ventrem deprimeretur, quo symptomate urgente, valde mœstus, & animo dejectus evasit.

I postea

Vir quidam illustris, temperamenti malancholici, & semper pro lienoso habitus, de dolore & inflatione hypochondrii sinistri, crebro rugitu, ru&tu acido, nec non de tremore cordis, assidua vertigine, nimis vigiliis, & phantasia perturbata plurimum conquestus erat: circa trigesimum quintum ætatis suæ annum, morbo ingravescente, somnum ægre, ac raro admodum capeßere noctu, & interdum cogitationum æstu, & fluctuatione molestari, res omnes, ac personas suspectas habere, & objecta quævis valde pertimescere cœpit: præcordia plurimum constringi, & coarctari, atque inimum subsidere videbantur, quasi cor ipsum usque in ventrem deprimeretur, quo symptomate urgente, valde mœstus, & animo dejectus evasit.

I

postea



postea tamen, remittentibus istis animi affectibus, una cor paululum elevari, simulque præcordia relaxari, & dilatari perſentiebat: porro dolores, & contractiones circa viſcerum ac membrorum musculos varie excitatos, & huc illuc discurrentes creberrime ſuſtinebat.

1.  
*Observatio*

Quoad morbi naturam, facile conſtat, affectionem hanc ejuſmodieſſe, quæ vulgo hypochondriaca appellatur, quod vero ſpectat ad ſymptomatum admirandorum cauſas, ſupponere licet, ſanguinis maſſam degenerem, & ſæculentiis atrabilariis reſertam recrementa ſua aduſta capiti continuo ſuggerere; unde liquor cerebrum, & nervos irrigans acris, & ſpiritibus improporcionatus factus, corpora continentia in corrugationes dolorificas, & contracturas irritabat: perſo cum a capite, in nervos paris vagi & intercoſtalis hæc labes præcipue derivatur, cerebrum & præcordia noxam inde ſuſcitataſ quam maxime luunt. Quod autem ſanguis eo ritu depravatur, lienis vitio imputandum videtur, in quantum hoc viſcus perperam habens, ſæculentias atrabilarias a ſanguine non recte ſecernit, quinimo & recrementa quæcunque ab illo ſuſcipit, amplius pervertit, eademque in fermentum noxium exaltata cruori remandat, proindeque maſſam ejus plurimum inquinat, dyſcracia acetofa & plane vitriolica imbuat.

Obvium eſt intelligere, ſymptomata iſthæc caput moleſtantiâ, ſc. vigilias nimias, vertiginem, phantaſiam perturbatam, cum multis aliis a particulis heterogeneis, e ſanguine in cerebrum ſuffuſis procedere: Quoad iſtam pectoris anguſtiam & cordis ſubſidentiam, cum inſigni metu & triſtitiâ, opinari licet fibras nerveas cordi, ac imprimis pericardio insertas, in ſpaſmos & corrugationes actas, partes iſtas conſtringere, & deorſum convellere; quapropter in toto pectore velut conſtrictio quædam ſentitur, & cor ipſum deprimi videtur: porro in quantum præcordiis ita conſtrictis & depreſſis, ſanguis intra cordis ſinus ſiſtitur, ac velut ſtagnare cogitur, anima tum vitalis, tum ſenſitiva a ſolita expaſſione, & irradia-



diatione plurimum inhibetur, proindeque a sy-  
stasi ejus diminuta, & decurtata, immanes isti  
metus & tristitiæ affectus oriuntur; cum vero  
spasimis remittentibus, ista cordis & appendicis  
ejus constrictio relaxatur, etiam anima, velut  
flamma amplius expansa, passionum istarum ca-  
tenas paululum excutere nititur. Pro curatione  
istius affectionis quam plurima remedia & ad-  
ministraciones medicas a longo tempore usurpa-  
rat, sine magno tamen fructu, demum aquarum  
acidularum usu aliquantulum sublevatus, & exin-  
de sensim melius habens, a gravioribus istis sym-  
ptomatis immunis evasit, usque tamen affectui  
hypochondriaco obnoxius degit.

Juvenis quidam Academicus, temperamenti  
originaliter sanguinei, *ὑπόχολος*, vultus floridi *2.*  
indolis benignæ, ac mitis, propter studia immo- *Observa. 10.*  
dica & intempestiva, interim exercitio & vi-  
ctus ratione prorsus neglectis, lienis obstructionem  
aliamve istius visceris affectionem morbidam  
contraxerat: quippe aderat sinistri hypochondrii  
inflatio & tumor, cum dolore gravativo fere con-  
tinuo ipsum infestante, cætera satis sanus habeba-  
tur. Postquam hujusmodi affectu sesquiannum  
circiter laborasset, de crebra vertigine, oculorum  
obfuscatione, mentis inquietudine, & de somno  
perturbato queri cœpit: quæ symptomata tunc ob-  
vium fuit vaporibus a liene elevatis imputare:  
deinceps vero tremor cordis, cum frequenti spiri-  
tuum deliquio, hypochondrii pulsatio, ac tandem  
dolores & contractiones in membris exterioribus,  
cum crebro stupore, & formicationis sensu hucilluc  
excurrentibus, succedebant; denique ut malorum  
iliade correptus, contra genium suum, nativam-  
que indolem valde hypochondriacus evaserit.

Ut casus hujusce pathologiam verbo expediam  
satis hic constare videtur lienem in vitio primum  
fuisse; cujus culpa cum massa sanguinea deprava-  
retur, exinde labes in humorem cerebrum &  
nervosum genus irrigantem serpens, eumque in-  
quinans, symptomata prædicta spasmodica indu-  
cebat.



*Medendi  
methodus  
contra af-  
fectiones  
hypochon-  
driacas,*

Methodus therapeutica contra affectiones hypochondriacas adhibenda, indicationes potissimum has quatuor generales appetit, sc. 1. Imprimis ut curationis impedimenta tollantur; cujusmodi intentio primarum viarum purgationem & custodiam præcipue respicit. Secundo innitendum erit, ut lienis obstructions, aliæve inordinationes corrigantur. Tertio, ut massæ sanguineæ tum recrementa expurgentur, tum debita crasis restituatur. Quarto, denique ut cerebri & nervosi generis, nec non humoris irrigui, ac spirituum incolarum enormitates, sanguinis, ac lienis culpa contractæ, emendentur, aboleanturve. Cum simul in plures, aut omnes hosce scopos collimandum fuerit, tempora idonea eligantur, quibus singulis propositis absque cæterorum incommodo aut neglectu satisfiat.

1. Quoad primam indicationem, cum ingens materiæ crudæ, aut adustæ saburra in primis viis congeri, cumque ventriculi tonus labefactari, ejusque fermentum varie perverti solet, contra hæc cujusque generis mala cum idoneis remediis tempestive occurratur; itaque blandæ, & lenes evacuationes, & per vomitum, si facile succedat, & per secessum adhiberi debent: quibus stomachus contenta sua facile sursum ejicit, suadeo ut semel intra mensem, assumpto liquore scillitico, aut sale vitrioli, atque cerevicia lacteata, aut aqua tepida copiose epota, vomitus crebra vice provocetur; intermedio tempore purgatio lenis, & tantum *ἡκιστα καθαρὰ* sæpius instituatur: in hunc finem pilulæ Tartaræ Bontii, aut stomach. cum gum. vel extractum nostrum solutivum ex usu esse poterint. ℞. Sennæ opt. ʒj. rhabarbari ʒvj. epithymi ʒiij. fantali citrini ʒij. salis absynthii ʒij, spicæ celticæ ʒj. incisa & contusa digerantur in vini albi & aq. fumarie an. ʒx. per horas 48. colatura clara evaporetur leni balnei calore ad consistentiam extracti addendocirca finem pulv. sennæ rhabarbari & cremoris tartari an. ʒij. terantur simul in mortario vitreo, redigendo in consistentiam pilularum. Dosis ʒß. ad ʒij. vel ʒj. remedia ventriculi tonum

ac



ac fermentum spectantia, cum multiplicia, ac diversimoda fuerint, ex iis cujusque ventriculi crasi maxime accommodata seligantur; namque huic amara, illi salsa, alteri acida, aut forsan acria melius competunt. Ex hujusmodi medicamentorum (quæ vulgo digestiva appellantur) censu, sunt, elixir proprietatis, tinctura sacra, pulvis Ari compositus, sal absynthii, cremor tartari, tartarus vitriolatus, vitriolum martis, cum multis aliis. Præter hæc remedia interna, etiam externæ applicationes non raro juvamen conferunt: quippe stomacho male affecto, fons ex vino albo cum absinthio, centauryo, aliisque plantis amaris concoctis, etiam linimenta, aut emplastra sæpe opem præstant: de quibus non opus erit particulatim disserere, ipsorumque medicamentorum formulas præscribere.

2. Indicatio lienis vitia emendare instituens (sive nimirum eadem, obstructio, sive tumor, aut dolor, vel simplex dyscrasia, fuerit) per remedia tum interna, tum externa perfici, aut saltem tentari solet: Quæ prioris generis sunt, cum istis tertio in loco indicatis (quibus sc. sanguinis depuratio intenditur) coincidunt; quippe cum præcipuum, aut fere totum illud, quod lieni importatur, aut effertur, sanguinis commeatu fiat, tum laticis, hujus, tum visceris istius anomalie, opere sociali, conjunctis medicamentorum viribus sanari debent; quo ritu mox ostendetur; interim applicationes quædam externæ sub forma emplastri, aut linimenti, aut fons lienis corpus proprius & immediatius respiciunt, & non raro juvamen insignè conferunt, quatenus nimirum tumores discutunt, sæculentias atrabilarias inibi stagnantes circulationi reddunt, quin & fibrarum corrugationes, & affectiones spasmodicas sedant, ac compescunt. Hujusmodi medicamentorum exteriorum copia ingens passim apud authores prostat, quorum delectus, cum juxta varia lienis pathemata, tum diversas patientis constitutiones institui debet, non opus erit particulares eorum formulas hoc in loco tradere.



3. Remedia tertio in loco indicata, quæ nempe sanguinis dyscrasias lienis vitio contractas depouunt, simulque primariam lienis culpam eluunt, multiplicia, ac diversi generis, & moris existunt, quorum delectus juxta variam hujus ac illius labem adhiberi debet: Ex his alia sunt compositiora, juxta medicipræscriptum paranda, prout electuaria, pulveres, apozemata, tincturæ, infusiones, & similia; alia sunt simpliciora, prout serum lactis, lac asinum, aquæ acidulæ & thermales.

Duo sunt præcipui ægrotantium casus, quibus remedia magistralia, secundum eorum vires & qualitates accommodari debent: nempe aut sanguis est crassus, subfrigidus, & terrestris cum liene obstructo, qui medicamenta calidiora, fermentantia, ac imprimis chalybeata requirit, vel sanguis plane adustus, ac fervidus supra modum fermentescit, simulque hypochondria valde æstuant, in iisque sanguis & vapores ebulliunt; in quo statu remedia solum temperata, humorum ζέωv immodicamque ζύμωσιν sedantia indicantur, ubi chalybeata omnino fugienda sunt.

Cum itaque frigido ventriculo sanguinis ac lienis dyscrasie, etiam frigida accesserunt, juxta formulas sequentes præscribere soleo.

℞. Trochif. de rabarbaro, pulv. rad. Ari, cort. Winterani an. 3 ij. rad. serpentariæ virginianæ, contrayervæ, diatrion santalon, oculor. cancri an. 3 j. extracti gentianæ, centaurii an. 3. j. β. amnioniaci solut. in aq. lumbricorum q. s. f. massa pilularis. capiat quatuor pilulas mane, & hora quarta p. m. superbibendo haustulum vini absynthitis, vel chalybeati, cum exercitio moderato.

℞. Conserv. flavedinis aurantii, limonii an. 3 iiij. myrobalanor. condit. no. ij. spec. aromatici rosat. cort. Winterani an. 3 ij. salis absynthii 3 ij. vitrioli martis 3 j. (vel chalybis præparat. 3 iiij.) cum f. q. syr. e corticibus citri, f. electuarium. capiat bis in die superbibendo haustum vini absynthitis, vel infusionis corticis vel flor. tamarisci.

Quibus medicamenta non nisi in forma elegantiori, & mole perexigua placent, tincturas antimonii,



nii, e coralliis, etiam e chalybe cum spiritu vini (corpore prius per propria menstrua soluto, & ad calcem redacto) paratas exhibere convenit: quin & spiritus fuliginis, item sanguinis, aut C. cervi ad gut. 12. plus minus bis in die cum liquore appropriato sumendos, commodo insigni, supra quodvis aliud medicamentum cessasse novi: porro potus assiduus *Coffee* dictus, etiam alter ex infusione foliorum *Thee* paratus, nonnullis emolumento fuerunt.

Quod si affectioni hypochondriacæ sanguinis fervor, & nimia *Σπυγσις*, cum lienis æstu, & mentis inquietudine conjungitur,

℞. Conservæ fructus cynosbati ʒ vj. (vel flor. tamarisci, & foliorum lujulæ an. ʒiij.) spec. diarrhodon abbatis, confectionis alchermes an. ʒj. eboris pulv. ʒj. β. margarit. ʒ β. salis tamarisci, absynthii an. ʒ j. c. f. q. syr. acetositis citri, vel cariophyllor. f. opiata, capiat bis in die qu. nucis muschat.

℞. Eboris pulv. ʒij. margarit pulv. ʒ j. spec. diarrhod. abbatis, diamargarit. frigid. an. ʒj. β. f. pulvis subtilis, adde sacchari albissimi solut. in aq. Melissæ, & ad tabulat. coct. ʒ vj. f. a. f. tabulæ. sumat. ʒ j. β. ad ʒ ij. bis in die. His, aliisve hujus farinæ medicamentis adjungatur usus aquarum acidular. quæ quidem in altero, immo in quibusvis melancholiæ hypochondriacæ casibus, fere semper cum fructu sumuntur. Defectu illarum aquar. nostræ acidulæ artificiales bene substituantur, quin & serum lactis, & si atrophia notabilis adfuerit, lac asininum quotidie sumatur.

Præter hæc remedia interna, aliasque applicationes externas supra citatas, phlebotomia, aut sanguinis e vasis sedalibus hirudinum succu detractio in crebro sit usu: quin & venam salvatellam, juxta veterum præscripta nonnunquam secare conveniat: Porro cauteria aut fontanellæ, quæ sanguinis adusti recrementa foras continuo derivent, & paulatim excernant, fere nulli non commodo esse solent.

4. Quarta indicatio, cerebri, ac nervosi generis



affectiones, five symptomata spasmodica prioribus *ἡσυχάζοντα* respiciens, raro per se, ac seorsim ab aliis in usu venit, quin remedia huic scopo destinata, cum supradictis complicantur. Liquores sale volatili, aut armoniaco præditi, prout sp. C. cervi, fuliginis, huic intentioni, simulque non raro cæteris modo citatis adprime conveniunt; quapropter talia remedia, nisi quiddam contra indicat, opportuna hora quotidie exhibeantur. Porro cum aq acidulæ bibuntur, tabulæ, aut pilulæ, quales supra ad affectiones spasmodicas præscribuntur, saltem bis in die capiantur. In crebra vertigine & scotomia, nec non in cordis passionibus spirituum deliquiis, cum timore, & mortis quasi jamjam imminentis metu, a medicamentorum chalybeatorum usu insigne juvamen sæpius collatum novi.

*Medica-  
mentorum  
chalybeato-  
rum præ-  
parationes  
& effectus  
explican-  
tur.*

Quandoquidem hic mentio incidit de medicamentis chalybeatis, operæ prætium videtur inquire in varias eorum præparationes, & propterea in diversimodos, quos in corpore humano producere solent, effectus, hinc ut constet, qua ratione, & ob quos respectus, hæc aut illa ferri præparata nonnullis hypochondriacis insigniter profint, atque aliis plurimum oblinet.

Medicamentorum chalybeatorum virtus, & operatio a concreti particulis vario modo resolutis, explicatis, & in actum exertis dependet: Enimvero chalybs five ferrum potissimum constat ex sale, sulphure & terra; spiritu, & aqua tenuiter admodum dotatur: priorum vero elementorum particulæ, præsertim sulphureæ, ac salinæ in mixto, una cum terra combinatæ, fixæ prorsus ac inertes manent; verum solutæ, ac ab invicem divulsæ *ἡσυχάζοντα* valde efficacia existunt.

Prædictæ particulæ duplici modo dissolvuntur, & in actus libertatem vindicantur, sc. vel ab arte, dum medicamenta parantur, vel a natura postquam intus assumuntur; corpus enim metallicum a ventriculi fermento, non secus ac a menstruo chymico corrodi, ac solvi solet: singulas utriusque species, & fiendi modos perpendamus, ut constet.



constet qualis alteratio medicamento ferrato inter præparandum imprimitur, & quales effectus quodlibet ejus præparatum corpori humano imprimit.

Simplicissimus ferri parandi modus, est corporis ejus in partes exiguas integrales, per limaturam divisio, quæ totius mixti naturam referunt, continentque corpuscula tum sulphurea, tum salina inter se, cumque aliis terrestribus combinata. Limatura ferri intus sumpta a ventriculi fermento, tanquam a menstruo acido dissolvitur, cujus indicia sunt tum ructus sulphureus, & niodorosus, velut a comestis ovis ad duritiem coctis, tum excrementi stercorei nigredo: a chalybe intra coctionis viscera dissoluto, particule activæ tum sulphuræ tum salinæ, copiose exiliunt, atque succo nutritio involutæ in sanguinem evehuntur; quæ cum diversa pollent virtute, non raro utraq; velut junctis viribus, in ægroti commodum conspirant. Corpuscula sulphurea sanguini illata, ipsi novum ac uberius sulphuris penum addunt, propterea ut massa ejus, si antea pauperior & effoeta fuerit, intra vasa vegetius fermentescat, & ulterius in corde accensa calorem magis intensum quin & colorem saturatiorem acquirat; Ita namque observare est de plerisque leucophlegmatia, pica, & malacia affectis, vultus pallescit, sanguis frigidus, & aquosus existit, a chalybis autem usu brevi vultus floridior, cruor, tinctura, & calore intensioribus imbuitur: porro a limatura ferri in ventriculo soluta, etiam particule salinæ efferruntur, & non raro tum in partes solidas, tum in humores uberem fructum erogant; nam istæ siquidem naturæ sunt vitriolicæ & stipticæ, viscerum fibras nimis laxas, & debilitatas adstringunt & corroborant, adeoque tonum præfractum restituant: cæterum particule istæ salinæ sanguinis impetum inhibent, ab æstu nimio, spumaque turgescencia reprimunt; & in æquabili circulatione retinent: insuper (quæ maxima illarum virtus est) arteriarum oscula nimis laxa; aperta, & dehiscencia contrahunt & angustant; proinde ut nec



nec serum, nec latex sanguineus exudet, aut circuitus filum abrumpat: Quapropter in hydrope & hæmorrhagiis, remedia salinis ferri particulis imbuta, celeberrimi sunt usus, & efficaciæ; plures enim morbi ab hac causa procedunt, in quantum arteriarum osculis nimis patentibus, & vasorum interstitiis supra modum laxatis, serum aut latex sanguineus erumpit. Cujusmodi affectibus particulæ chalybis vitriolicæ, & vasa sanguifera, & fibras nerveas constringendo & corroborando sæpenumero medentur.

Ad hunc modum limatura chalybis, intus assumpta sanguini & calcaria, & fræna simul adjicere videtur. In quantum vero ab istiusmodi medicamento incitatio longe potentius exeritur quam restrictio; idcirco illis tantum, quorum sanguis valde crassus & frigidus est, uti rusticis & valde robustis, exhiberi debet; in sanguine præservido & spirituofo, ac visceribus calidis, minime convenit: porro in delicatulis, & tenerioris constitutionis hominibus periculum est, ne chalybis portiunculæ, cum satis dissolvi nequeant, tanquam yitriamenta, viscerum membranis impingantur, ii sive pertinaciter adhærentes, ulcera, & tormina lethalia producant, quod revera interdum accidisse novi.

2. Post limaturam ferri proximus ejus parandi modus fit, calcinando cum sulphure, nempe chalybis laminæ intensissime ignitæ, magdaleon sulphuris admovetur, ut metallum in globulos lique scat, qui denuo ad consumptionem sulphuris calcinati, ac mortario triti, in pulverem subtilem, qui eximii usus est, rediguntur. In hoc ferri præparato particulæ quædam sulphureæ exhalant, cujus indicium est, quod pulvis hic a liquore acido affuso longe minus ebullit, aut incalescit, quam ferri limatura: attamen ab eodem ore assumpto, nidor sulphureus excitatur. Interim in præparato isto particulæ salinæ nonnihil augeri videntur novis a sulphure flagrante metallo accrescentibus; adeo ut utriusque generis particulæ activæ, nempe sulphureæ ac salinæ, fere ad æquilibrium accedunt: cumque



cumque hac ratione medicamentum hoc, laxata metalli compage, minutissime pulverisari possit, longe prestantioris usus quam limatura ferri evadit: in plerisque casibus ubi chalybs in substantia exhiberi debet, prout in cachexia, pica virginum, & similibus, hoc medicamento uti convenit.

3. Tertio in loco succedit chalybis præparatio cum aceto: nempe limatura chalybis totius irroratur cum aceto & exiccatur, donec in pulverem impalpabilem reduci queat: in hac præparatione particulae sulphureæ adhuc longe plures, immo quoad maximam partem evaporant, paucioribus tantum relictis, interim salinæ, propter alias ab aceto accrescentes, plurimum augentur, quæ cum particulis terrenis commiscuntur: pulvis hic chalybeatus a liquore acido asperso parum, aut vix omnino spumat, aut ebullit: etiam ore assumptus nidorem sulphureum vix ullum inducit: quare in expediendis viscerum obstructionibus, aut restituendo sanguinis fermento minus conducit: nihilominus in calidiori constitutione, in hæmorrhagiis, & affectione hypochondriaca majori successu quam superiora præparata exhiberi solent.

4. Succedit ferri rubigo, quæ corporis metallici extractum, sive quinta essentia esse videtur: quippe in excrescentia ista particulae quædam cujusque generis, nempe sulphureæ, salinæ, & terrenæ a totius compage solutæ, inter se combinantur, & novum quasi mixtum magis subtile, & defæcatum constituunt. Quoniam in hoc concreto, pauciores resident sulphuris particulae, idcirco non adeo potenter sanguinem fermentat, aut viscerum obstructiones reserat, uti chalybs cum sulphure præparatus, attamen in calidioribus partium aut humorum dyscrasiis, intentiones a medicamento chalybeato requisitas egregie perficit.

Huic classi nostra præparatio chalybis jure accensetur; in qua se metalli particulae omnes a mixtionis vinculo laxatæ, una continentur: quæ tamen (concreto prius in pulverem redacto) in  
quovis



quovis latice, aut menstruo immediate dissolvuntur. Hic pulvis intus sumptus pari virtute, ac chalybs cum sulphure calcinatus pollet; at menstruo, five liquori, in quo dissolvitur, particulas salinas, seu vitriolicas potissimum, ac fere tantum impertit, sulphureis avolantibus, & terrenis in fundo subsidentibus. Aquam communem hujus dissolutione imprægnatam, vice acidularum naturalium in magna quantitate exhibere soleo, & non raro cum optimo successu: porro vinum, cerevisiam, pomaceum, serum lactis, aliosque liquores ab hoc pulvere dissoluto medicatos efficio, & propter varias intentiones iatricas sumendos præcipio. Hæc de ferri præparatis, in quibus particulae elementares cujusque generis, in varia licet proportionem comprehenduntur: restant alia in quibus particulae fere tantum unius generis, nempe salinae, aut terrestres, cæteris, quoad maximam partem, propulsis, relinquuntur: cujusmodi imprimis sunt vitriolum martis, five sal chalybis & crocus martis.

5. Pro conficiendo vitriolo martis, imprimis metallum a liquore valde acido & corrosivo exedi, & in partes elementares dissolvi solet: inter dissolvendum particulae salinae menstrui aliis ferri salinis impinguntur, iisque intime combinantur, reliquis interim sulphureis, ac terrenis sepositis, & a consortio exclusis, dein aqua communi solutioni isti affusa, sales utriusque generis combinati a liquore inhibentur, eoque demum filtrato, & evaporato, in chrystallos rediguntur. Hujusmodi salificatio succedit, five cum spiritu vitrioli, oleo sulphuris, aqua stygia, aliisque stigmatibus mineralium stillatitiis proceditur: Quinimo sal armoniacus tantum deliquio solutus ferrum eodem ritu dissolvit, & ad chrystallandum disponit.

Sal martis ita præparatus, saporem subdulcem, cum aspera quadam stipticitate refert, & naturæ vitriolicæ in tantum participat, ut a cuperosa viridi haud multum differre videatur: Intus pro medicina sumptus, humores aliquatenus fermentat, atque fibras nervosas potentius constringit: in ca-



chexiis frigidis & phlegmaticis, quoniam nullæ exeruntur sulphuris particulæ, hoc medicamen minus convenit: in calidioribus viscerum dyscrasiis eum sulphuris adusti prædominio, nec non in sanguinis, & succi nervosi effervescentiis vagis, scorbuticis, & inæqualibus, illud per se, aut cum aliis remediis stimuli vice admixtum non raro cum fructu adhibetur: attamen in constitutionibus tenerioribus periculum est, ne ab acrimonia ejus, & constrictione nimia, ventriculi tonus & fibræ lædantur.

6. Ultimo in loco succedit crocus martis astringens, per diuturnam ab igne calcinationem paratus; sc. ferri limatura, scorix, aut laminæ in fornacis reverberio ita collocentur, ut a flamma intensa continuo lambantur: Limatura hoc modo igni nudo exposita, primum aliquatenus rubescet, ac in glomeres duriusculos concresecet; post tres, autem vel quatuor dies, subito in acervum altiorum intumescens, summe levis, impalpabilis, & coloris purpurei elegantissimi evadet: In hoc præparato particulæ sulphureæ & salinæ, dum vi ignis a concreto abigi incipiunt, se mutuo apprehendunt, adeoque invicem combinatæ in glomeres accrescunt; postea tamen particulis istis, tum salinis tum sulphureis, penitus profligatis, igneisque in eorum loco succedentibus, tota massa mole intumescens, & velut spongiosa facta, levissima evadit.

Medicamentum ita paratum in quibusdam casibus, ususegregii, & nulli e chalybeatis fecundi existit: nimirum in omni feri ac sanguinis extravasatione, aut eruptione nimia, prout in hæmorrhagiis externis, internisve, in diarrhœa, diabete, in catarrho vehemente, etiam in ascite, aut hydrope incipiente nihil hoc remedio præstantius novi: hoc etiam nuper, a celeberrimo. & exercitatissimo apud nostrates Medico summe comprobatum audiui: De quo tamen medicamine, siquidem illud particulis, tum salinis, tum sulphureis prorsus destitutum, fere solummodo terrenis igneisque inclusis constat, valde ambigitur, qua facultate



te operatur, & affectum ita laudabilem in corpore humano producit: videretur enim nihil huic plusquam, ac in vitrioli, aliorumque mineralium igne intensissimo destillatorum, capite mortuo, aut terra damnata superesse. Circa hæc, ut conjectari liceret, videtur imprimis, quod huic præparato activitas quædam, qua sese exerit, & virtutes suas, five obstructions referendi, five vasa fibrasque viscerum nerveas constringendi, explicat, a particulis igneis terræ fixissimæ inclusis, ab iisque intra corpus, erumpentibus debeatur: attamen potissima juveni ratio in eo consistat, quod particulæ terrestres salinæ (quibus arctissime tenebantur) prorsus orbatæ, iisdem, aut similibus reuniri avidissime expetunt: quapropter iste crocus martis corporibus nostris immersus, sales quoscunque obvios sibi arripit, ac intime devincit, adeoque dum particulas salinas quamplurimas velut spongia absorbet, multas enormitates a salium fluore potissimum abortas tollit. Sub hac ratione C. cervi ustum, spodium, & antimonium diaphoreticum, si quando juvamen præstant, virtutes suas exerunt.

## CAPUT.



## CAPUT XII.

*De tussi, ac asthmate, convulsivis:*

**T**Ussim aliquando, sine magno pulmonum vi-  
tio, propter materiam morbificam, nervis  
pneumonicis illapsam, excitari, historia superius  
allata clare indicat: ubi nimirum refertur, in casu  
nobilis puellæ, paroxysmis convulsivis, ac insuper  
vertigine gravi & continua laborantis; quod  
cum, ex medici præscripto, fots ex decocto ce-  
phalico capiti adhiberetur, illico scotomia cessa-  
ret, inque vicem ejus, tussis inanis, sine ullo sputo,  
sed dies & noctes fere perpetuo molesta, succede-  
ret: quod proculdubio contigit, ob materiam  
spasmodicam, a cerebro in nervorum origines de-  
pulsam: Hujusmodi exempla tussis mere convul-  
sivæ in adultioribus rarius occurrunt, ut affectum  
huic similem haud sæpius viderim: attamen usi-  
tatum est in pueris (quandoque etiam novi in vi-  
ris) tussim a colluvie serosa pulmones inundante  
exoriri; quæ cum primo simplex, & moderata fue-  
rat, postea vehemens, & convulsiva evadet; ita  
nimirum ut inter tussendum, diaphragmate sur-  
sum contracto, ac in systole longiori, aut creber-  
rime repetita, detento, pulmones valde coarctati,  
in motu suo plurimum inhiuantur: interim ob  
respirationem impeditam, & sanguinem intra  
præcordia cohibitum, proindeque in aliis locis  
stagnantem, laborantes suffocari periclitentur, &  
non raro vultum lividum, aut cadaverosum ac-  
quirant. Cæterum in hoc casu, præter spasmos  
cum tussendi impetu, circa præcordia excitatos,  
non raro etiam ventriculus in consensum addu-  
ctus, quicquid sinu suo continetur, vomitu rejicit:  
quin & novi, in quibusdam tenellulis hoc ritu  
affectis, morbum subinde in alias partes grassa-  
rum, motus convulsivos in facie, oculis ac artubus  
excitasse, ac demum lethalem evasisse. Hujusmodi  
tussis convulsiva, inter pueros valde frequens est,  
&

*Tussis mere  
convulsiva  
exemplum.*

*Hic affectus  
in pueris sa-  
tis frequens.*



& quibusdam annis ita plurimos corripit, ut plane epidemica videatur, ubi radices egit, difficulter admodum remediis sanatur, quin sæpius diu protracta, vix aliter nisi ab immutato anni statu curari solet.

*Ejus A-  
etologia.*

Si prædicti affectus causæ inquirentur, obvium erit, procatarxin ejus ad serosi humoris in massa sanguinea, & aliquatenus in toto corpore redundantiam referre, cujus materiæ portio quædam arteriarum osculis in pulmones exudans, tussim ordinariam creat, postea cum serosa colluvies, adhuc in sanguine exuberans, & particulis spasmodicis referta, etiam intra caput aggereretur, eadem nervos pneumonicos subiens, tussim simplicem inconvulsivam adauget: cum enim hi nervi circa extremitates suas prius irritati, supra modum exerceantur, illi propterea materiam spasmodicam, juxta principia sua depositam facilius imbibunt: cumque adeo demum, binis in locis, sc. capite, & cauda, atque ob duas distinctas causas, sc. a spirituum irritatione, tum explosione, in motus irregulares adigerentur, nihil mirum est si tussis primo communis, postea in malum morem evecta, adeo immanis & spasmodice evadat: porro cum interdum accidit, eandem materiam in capite aggestam, nervos quosdam alios subire; propterea tussi convulsivæ alijsmodi pathemata spasmodica non raro superveniunt.

*Asthma  
convulsi-  
vum.*

Ostenso ad hunc modum, quod tussis neque solummodo, neque semper pulmonum vitio, sed interdum a causa spasmodica solitaria, sæpius tamen ab hac, affectioni pneumonicæ superinducta, oriatur; etiam de pathemate quodam alio thoracico, sc. asthmate, fere idem pronunciare non dubitemus: nam sive hic morbus continuus sive periodicus fuerit; in utroque casu symptoma præcipue urgens est respiratio difficilis; quæ quidem propterea excitari videtur, quia pulmones nimis inflati, & distenti thoracis cavitatem valde implent, nec uti par est, per vices subsident: hinc spiritus intus manens haud libere satis emitte, neque revera aer recens, ob spatium prius opplerum, facile

*Quandoque  
a pulmoni-  
bus una ac  
nervis affe-  
ctis depen-  
det.*



facile introduci potest: dum pulmones in diastole continua, aut parum remissa, ita diutius detinentur, sæpenumero diaphragma, contra morem suum, in systolen violentam urgetur, atque sursum contractum, pulmones magis, magisque elevare, eorumque subsidentiae contraniti solet; quo fit ut respiratio adhuc difficilior & plus laboriosa existat.

Hujusmodi dyspnœæ affectionem quandoque pulmonum vitio accidere, facile credimus; quoniam *ἀλλὰ* anatomica plane detexit: nam si colluvies serosa ingens, in thorace deposita, pulmones plurimum infert, illorumque poros omnes & meatus in tantum obstruit, ut sanguis in circuitu impeditus, vasa pneumonica haud libere pertranseat, propterea quidem, taliter affecti, nullo non tempore anhelosi fiunt: deinde quoties sanguis ab exercitio aut calore lecti plus incallescens, & rarefactus, pro circulatione sua intra pulmones spatium amplius requirit; tunc statim a tali occasione respiratio creberrima, sive paroxysmus asthmaticus cietur: si præter hanc morbidam pectoris diathesin, etiam massa sanguinea lactice seroso abundans, subitis fluxionibus, & feri effervescentiis apta fuerit; hinc etiam, ob violentum feri effervescentis in pulmones prius obstructos, & valde oppletos incursum, non raro istius morbi insultus graviores, & pene suffocativi eveniunt. Porro interdum præter asthmatis radices, uti dictum est, circa præcordia defixas, ejusdem morbi germina quædam ab *ἐκπεσέλα* pullulantia, prioribus occurrunt, cumque iis complicata, immaniores dyspnœæ fructus producant. Nam siquidem, pulmonibus sero oppletis, ejusdem amplius in sanguine redundantis quantitas alia, particulis spasmodicis imbuta, capiti suffundatur, eadem nervos pneumonicos promptius quam alios subiens, asthma thoracicum prius simplex, & moderatum, periodice vehemens, & convulsivum efficit.

Hujusmodi.



Huiusmodi affectuum. sc. dyspnœæ, pulmonum vitio singulari ac socio excitatæ, instantiæ & exempla quamplurima observationi nostræ constiterunt, ac etiamnum fere quotidie eveniunt. Nihil enim usitatus, quam tussi inveterata, aliasve mala pulmonum diathesi laborantes, demum hydrope, aut scorbuto accedente, asthmaticos fieri, nempe cum sanguis, longe impurius factus sculentias serosas etiam in capite deponit, hæc nervos pneumonicos, utpote debiliores, & juxta extremitates suas crebro irritatos, promptius, & quidem facilius quam alios subeunt, inque iis dyspnœæ spasmodicæ materiem congerunt,

*Asthma interdum mere convulsivum a nervis solummodo affectis procedit.*

Porro interdum observavi, graves asthmatis paroxysmos, sine quavis notabili pulmonum labe, accidisse, revera ut putaverim, hunc morbum aliquando esse mere convulsivum, eoque insuleus solummodo excitari, quoniam serosa colluvies, particulis explosivis referta, nervos, pulmonum diastolen perficientes, subiens, spiritibus ibidem scatentibus accrevit, quibus postea ob plenitudinem, vel irritationem confertim, & aliquandiu elisis, pulmones velut rigidi & inflati detinentur, ut neque *ἐκπνοή* neque *ἐισπνοή* munia exequi possint: paroxysmo autem finito, quin etiam priusquam incipitur, respiratio libera & æqualis satis recte ducitur, nullaque tussis, aut valetudinariæ pulmonum dispositionis signa apparent. Cum huiusmodi dyspnœæ mære spasmodicæ casum in pluribus notavi, libet hic unam aut alteram historiam proponere.

*I. Observatio.*

Generosus quidam robustus & obesus, victu pleniori & inordinato, sine quovis exercitio, aliquandiu usus, sub initium hyemis male habere cœpit: primo capitis gravitate & dolore, cum insigni vertigine, & leipothymias metu, se jamjam moritutum subinde credens afficiebatur, alioqui satis sanus; intra paucos dies, hæc symptomata in apertum stuporem, seu potius lethargum transibant: phlebotomia in brachio celebrata, cucurbitulas, vesicatoria, enemata acria, cum multis aliis remediis sedulo adhibenda curavi: nycthemeri



meri spatio ad se rediens animo constitit, & torporem omnem excussit. Verum cerebro licet inclarescente, debilitate magna & stupore in membris corripiebatur: qui tamen affectus remediis antiparalyticis, & antiscorbuticis brevi sanabantur: post duas autem septimanas, iterum de capitis gravitate, & vertigine conquestus est, dein postridie in asthma horrendum incidit: ut pulmonibus subito inflatis, & sursum nitentibus, spiritum, qui creberrimus, laboriosus & valde præpeditus fuit, vix ac ne vix ducere valens, quovis horæ minuto suffocari periclitaretur. Paroxysmus hic, utut immanis, intra duodecim horas sine tussi, sputo, aut vomitu pertransiit, & deinde supra hebdomadæ spatium, thoracis vitio quovis carebat; tunc autem similis dyspnœæ paroxysmus rediens, eum paulo mitius exercuit, atque postea, juxta magnas aeris mutationes, præsertim frigore intenso, ac nive imminentibus, tali asthmatis insultu tentari solebat.

Novi alium virum generosum scorbuto inveterato laborantem, qui tussi omni carens, modo cephalalgia, cum insigni vertigine per plures dies laborat; dein alio tempore, ab iis pathematis immunis asthmatis paroxysmo valde atroci corripitur, atque affectus modo hujus, modo istius, crebros insultus, præsertim circa insignes aeris alterationes, & majores anni tropas, patitur.

In prædictis casibus minime dubitandum est, quin isti dyspnœæ paroxysmi omnino penderent a materia spasmodica, in nervos, pulmonum distensionem inservientes, delapsa, quæ spiritibus accrescens, ab iisque ob plenitudinem vel irritationem elisa, sive explosa, præcordia sursum attolli, ac velut inflari, proindeque a motu suo reciproco inhiberi fecit.

Porro hujusmodi dyspnœam convulsivam interdum excitari putamus propter trachæ bronchia coarctata nimis, & non raro penitus constricta: in neurologia nostra advertimus plurimas nervorum fibrarumque nervearum propagines asperæ arteriæ ramificationes omnes ubique amplecti,

2.  
*Observatio.*

*Ætiologia.*

*Asthma interdum propter bronchia spasmodice affecta excitatur.*  
&



& circumligare, quos equidem nervos, si forsan accidat, a materiâ morbifica obsessos, in crebros spasmos irritari, propterea sequitur, canales, sive ductus, quos ambiunt, valde constringi, & in quibusdam locis prorsus occludi.

3.  
*Observatio*

Virgo lætissima, constitutionis teneræ ac gracilis, atque vultus floridi, vix secundum ætatis suæ lustrum prætergeßa, paroxysmis asthmaticis graviter tentari cœpit; iisque priusquam curæ meæ delegatur, quatuor ut minus annos obnoxia degit. Interdum morbi hujus insultu quovis per duos aut tres menses immunis perstat: sæpenu-mero tamen, propter errata in victu, vel propter magnas anni, aut aeris mutationes, in atrociores dyspnææ paroxysmos incidit: Ita nimirum ut pulmonibus inflatis, & sursum versus guttur elatis, ibidemque in diastole fere continua detentis, ægrotans vix ac ne vix respirare possit; interim respirationis quoquomodo peragendæ gratiâ diaphragma & musculi pectoris motuum nixibus creberrime repetitis, laboriosissime exercentur. Hujusmodi accessio, intra 7 vel 8 horas sensim remittens, paululum desinit; subinde vero per unam aut alteram hebdomodam, aut sponte sua, aut de levi qualibet occasione, repetere solita: postquam morbi impetus, materia ejus in plures ejusmodi paroxysmos impensa, pertransiit, virgo illustris deinceps per plures septimanas, immo interdum menses, satis recte valet, atque thoracis vitio quovis experts libere respirat. Huic vere & autumnio medendi methodum sequentem institui, jamque supra biennium prædictæ affectionis quovis insultu caruit.

℞. Sulphuris antimonii nostri gr. vj. cremoris tartari gr. vj. misce. Detur in pulpa pomi cocti. ab hoc medicamine assumpto, quater, aut quinquies evomere solet: post quadriduum sumit hoc catharticum, quod item interjectis 6 aut 7 diebus bis repetere solet. ℞. Calomelanos gr. xij. refin. jalap. gr. v. castorei gr. iiij. c. s. q. ammoniaci solut. f. pilul. iiij. Quolibet præterea die, capit mane & vesperi, tincturæ antimonii gr. xij. in cochleari ju-



lapii sequentis, superbibendo ejusdem cochlearia 6 vel. 7. ℞. Aq. limacum 3 vj. lumbricor. 3 iiij. aq. pulegii, rutæ an. 3 iiij. hystericæ 3 iij. castorei nodulo ligati & in vitro suspensi 3 β. sacchari albißimi 3 j. misce in vitro f. julapium.

Circa autumnum prioris anni, puella quædam alia nobilis, simili ritu, sc. asthma periodico, laborans, mihi sananda adducitur; quæ prædictis remediis, paulo in minori dosi usa, eademque vere novissimo repetens, insigne levamen percepit.

In his etiam casibus, nihil appertius constare videtur, quam morbi causam absque phlegmate, aut humore viscoso pulmonibus, uti vulgo creditur, impacto, intra nervosum genus subsistere; atque dyspnœam hujusmodi mere convulsivam propter nervos pneumonicos, affectione spasmodica occupatos, excitari. Huius veritas, observatione anatomica mihi nuper a Medico Doctissimo D. Gualt. Ncedham communicata, adhuc planius evincitur. Retulit mihi vir insignissimus, se novisse *Laurenium Wallfalliensem* in agro *Staffordiensis*, qui cum diu laboraverat asthma periodico, intra 14, vel 20 dies ut plurimum, recurrente, tandem in ipso paroxysmo extinctus est. Cadaver apertum exhibuit viscera omnia sana, præsertim pulmones neque aut excrementi in bronchiis collecti, aut sanguinis in venis restagnantis ulla indicia prodita sunt, hoc tantum præter naturam accidit, quod vesica fellea calculos complures in se continuit. Cætera (subdit ille) vel generi nervoso affecto tribuenda erant, vel causæ nobis ignotæ, certe oculis non conspicuæ.

Olim pro puerulo nobili consului, qui 12 circiter menses natus, paroxysmis convulsivis, & quasi epilepticis, a quibus brevi fatum obiit, gravissime affligebatur. Sæpius observabam, quod dum spasmi partium exteriorum intermitterent, tussis immani & singultuosa corriperebatur: unde suspicio fuit materiam morbificam haud minus in pectore quam in cerebro desigi. Post obitum vero, cadavere aperto; pulmones sarti tecti, vitio quovis immunes

4.  
*Observatio.*

*Observatio  
Anatomica.*

*Observatio  
alia Ana-  
tomica.*



immunes apparebant; ut manifesto liqueret, tussim istam, mere convulsivam, propter nervosi generis affectionem, excitatam fuisse.

Quod spectat ad remedia, & therapias rationes, quæ in prædictis casibus usurpari debent, si quando tussi, vel dyspnœæ, pulmonum vitio primo exortæ, insuper ob labem cerebro communicatam, symptomata convulsiva superveniunt; id sedulo agatur, ut medicamenta antispasmodica, thoracis intentiones quascunque respicientibus, apte compliceantur. Quinimo interdum, ut modo his, modo illis seorsim exhibitis, medendi tempora intercalentur. Non opus erit medicamenta bechica, aut pneumonica, eorumque formulas, quarum sylva immensa apud authores medicos passim extat, huc transferre: in propositum nostrum satius erit, medicinæ methodum, item selectiora quædam remedia in tussi, ac asthma, mere convulsivis convenientia subicere.

*Tussis convulsivæ curatio,*

Quoad priorem affectum, qui pueris potissimum familiaris, curationis difficilis, & non nisi longioris ut plurimum existit. Præcipuæ indicationes erunt, tum humores serosos & acres e sanguine & visceribus expurgare, ut illorum *δὲ πρὶν* ac decubitus in cerebro, ac aliquando forsan intra pectus præcaveatur, tum has partes, ne seri æstuantis superfluitates facilius admittant, corroborare. In hos fines vomitoria, & cathartica leniora, fere semper conducunt, & aliquatenus iterari debent: Vesicatoria sæpe proficua sunt; quinimo si morbus sit contumacior, fontanellæ in nucha, aut brachio, vel circa axillas excitentur. Potus & alimenta liquida, in quantitate solito minori, sumantur; istius vice, Bochetum ex sarfa, China, santalis, rasur. Eboris, C. cervi cum ingredientibus diureticis & antispasmodicis usurpetur: in hoc casu remedia quædam, velut specialia, valde commendantur, cuiusmodi sunt muscus pixidatus in pulvere exhibitus, vel lacte incoctus, adeoque crebra dosi, quotidie exhibitus: decoctum, vel syrupus, ex castoreo & croco; decocta rad. pæoniæ, visci quercini, item hyssopi multos juvarunt, aq. cerafor. nigrorum



rum, saxifragiæ, aqua limacum, cum sero lactis ac ingredientibus appropriatis destillata, sæpe cum fructu adhibentur.

2. Qua methodo, & quibus remediis, asthma periodicum in nonnullis junioribus sanavi, superius annotatur. Cæterum in plerisque hoc morbo affectis, vomitoria imprimis conducere, insignissimus Riverius observavit, licet rationem minus recte assignarit: quæ quidem in eo consistere videtur, quod nempe pharmacum istud, emunctoria, circa primas vias consita, valde succutiens & irritans, ex iisdem, sanguinis & succi nervosi recrementa, in cerebrum & nervosum genus urgeri, aut restagnare apta, valide exprimunt & foras deducunt. Zacutus Lusitanus, non sine ratione, cauteria modo in bregmate, modo in nucha, aut circa axillas inusta valde prædicat: Mil-lepedum præparata, sc. in forma pulveris sicci, aut liquoris destillati raro successu carent; talia nempe feri superfuitates a capite, ac genere nervoso avocant, ac ad vias urinarias deducunt: propter eandem rationem, cathartica blanda, & per epicrasin evacuantia, in crebro sint usu; in hunc finem, decoctum galli veteris, cum pharmacis alterantibus, & leniter purgantibus ventri ejus insutis, a multis laudatur. Præter remedia hætenus citata, quædam alia asthma matî appropriata, & velut specifica perhibentur, cujusmodi sunt balsamum sulphuris terebinthinat. item sp. C. cervi. vel fuliginis, eodem imprægnatus, syrupus de peto, ex ammoniaco, diasulphuris noster, lohoch de allio, pilul. de rad. enulæ campan. lacte sulphuris, floribus benzoin cum pice liquida, aut liquidambra, confectæ, cum multis aliis, quæ singula enumerare hic tædio esset.

Et jam præcipuis convulsionum speciebus, & modis una cum symptomatum causis, & medendi rationibus satis fuse explicatis, tempus videtur, pathologiæ hujus periodum affigere: Attamen siquidem aliud morbi genus restat, nempe scorbutus, qui pathemata mixtæ naturæ, sc. partim spasmodica, partim a sanguinis & viscerum dyscrasiis im-

*Asthmatis  
convulsivi  
curatio.*

mediatæ



mediate oriunda, continet, operæ pretium existimo, hujus theoriam, una cum Ætiologia, & Therapeias methodo adjectis, succincte tradere. Ambo etenim hi affectus, sc. convulsiivi & scorbutici, juxta positi, se mutuo illustrabunt, ac utrique alterutris facem non levem præfernt.

---

FINIS.



TRACTATUS SECUNDUS  
DE  
SCORBUTO.


K



TRACTATUS SECUNDUS

DE

SCORBUTO.



ma, de  
omnes l  
tempo  
fuit loc  
perit : an  
minibus in  
pope aut  
de Hippoc  
monia tant  
Circa va  
allicini, a  
simque res  
fuita fuer  
improban  
aut vix sing  
ut ne fore v





## TRACTATUS SECUNDUS

D E

## SCORBUTO

## CAPUT. I.

*Scorbuti descriptio; ejus causa interna & proxima, potissimum in sanguine, de- in aliquatenus in liquore nervoso radicata.*



N veteri medicina, morbi quem scorbutum appellamus, tam rara sit mentio, & tam parca descriptio, ut nonnulli dubitarint, utrum talis ægrotudo, nunc multis in locis endemia, & ubique fere sporadica, qua sc. fere nunc omnes laborant, aut se laborare putant, priscis temporibus omnino extiterit; quin natales suos, sicut lues venerea, & rachitis longe posterius duxerit: attamen affectionem hanc, licet aliis nominibus insignitam, ab antiquis observatam, ejusque curam, rudiori licet Minerva traditam fuisse, Hippocratis, Aretei, Plinii, aliorumque testimonia satis evincunt.

Circa varias hujus morbi appellationes parum solliciti, ad naturam ejus eruendam, explicandamque recta procedimus: quæ tamen cum adeo diffusa fuerit, atque ad tam varia & multiplicia symptomata extenditur, ut nec unica definitione aut vix singulari descriptione comprehendi possit, ex re fore videtur imprimis cuncta hujus morbi



phænomena congerere, five accidentium præcipue notabilium historiam pertexere, dein apparentiis istis rite solvendis hypothesin quandam accommodare.

*Præcipuo-  
rum scor-  
buti sym-  
ptomatum  
recensio.*

Quoad prius, maxima symptomatum farrago, affectus multiplices, & diversi generis, quique interdum naturæ sunt oppositæ, aut contrariæ scorbuto accensentur: immo si accidens quoddam insultatum, nec prius auditum in corpore humano eveniat, cum ad aliud certum morbi genus referri nequit, sine dubio statim illud scorbuticum pronunciamus: adeo hic morbus, quasi mali nominis, & damnati instar, pathemata aliena luit: Interim huic a proprio lare plurima extant symptomata, in singulis fere partibus humani corporis excitari solita; quorum recensio, cum partium corporis distributione optime perficitur. Itaque ut scorbutus vestigia a capite ad calcem pertractemus, 1. Imprimis ab illius ~~scorbuti~~ incipiamus: huc spectant cephalalgia immanes, & habituales, illæque aut vagæ, aut periodicæ, modo spirituum torpor & somnolentia, modo vigilæ pertinaces, crebræ vertigines, ac scotomiæ, convulsiones, paralyfis, sputatio copiosa, gingivarum ulcera, dentium vacillatio, oris fætor. 2. Interim circa pectoris regionem, dolores in variis membranarum partibus, ac præsertim in sterno, qui, sæpe acuti & lancinantes, laborantes per plures dies & noctes miserrime torquent, frequens asthma, respiratio difficilis & inæqualis, pectoris constrictio, & angustia tussis inanis, pulsus inordinatus, cordis tremor, crebra spirituum deliquia, frequens lipothymia, e jusque metus fere continuus. 3. In ventre inferiori hic morbus, quasi principem sedem figens, malorum Iliada producit: sæpe nimirum adsunt nausea, vomitus, rugitus, cardialgia, hypochondriorum inflationes, & murmura, colica frequens, & dolores molestissimi huc illuc discurrentes, diarrhœa fere constans, interdum dysenteria, aut tenesmus, atrophia, ac interdum ascitis.

Urina sæpissime rubicunda & lixivialis, cum crusta innatante, aut vitri parietibus affixa: interdum

*In capite.*

*In pectore.*

*In ventre  
inferiori.*



dum vero per vices quasdam eadem pallida, & aquosa copiose excernitur. 4. Præter hujusmodi ventrium affectus, in externis membris, immo in toto habitu corporis, dolores vagi, & non raro summe atroces, & noctu potissimum ingravescentes, sentiuntur, lassitudo spontanea, carniū intabescencia, lumbago, aliorumque artuum debilitas & enervatio, in cute maculæ varii coloris, tumores, tubercula, & non raro ulcera cacoethea erumpunt: circa musculos, stupor, formicatio, ac velut frigida auræ ascensus; Item contracturæ, ac tendinum subsultus: porro scorbuticis, sanguinis inordinationes, effervescentiæ incertæ, vagæ intemperies, ac febres erraticæ, ac hæmorrhagiæ graves passim contingunt. Præter hæc communia, & maxime assueta scorbuti symptomata, quorum modo plura, modo pauciora, eaque interdum hujus, quandoque istius generis, ac moris laborantes infestant, nonnunquam alia inassueta & prodigiosa accidentia huic morbo superveniunt.

Ad pleniorē hujus morbi notitiā, huc referre visum est, quæ circa originem ejus, ac prima initia, sive invasionis modum passim observantur. Nempe advertimus, scorbutum propter varias causas, & occasiones produci: nam licet mala victus ratio, vita sedentaria, lienis inordinatio, & cruditates in primis viis congestæ plurimum accusantur; attamen longe potius in causa esse solent, aeris insalubritas, & sanguinis crasis a prioribus morbis vitiata: quare scorbutus, oris maritimis aut paludosis sæpe endemius existit: diu navigantibus, ac interea cibis salis ac fumo induratis, nec non aqua putida utentibus, crebro supervenit: febris diuturnæ, aliisque morbis chronicis male curatis, item hæmorrhagiis nimis, aliisque excretionibus immodicis, quin & evacuationibus solennibus, uti mensium & hæmorrhoidum, suppressis, passim succedit: Porro hic morbus sine magna procatarxi, non raro per contagium excitatur, & quandoque hæreditarius existit.

*In partibus  
exterioribus*

*Causæ evidentes quæ  
scorbutum  
inducunt.*



*Morbi  
causa per  
totum cor-  
pus diffusa  
inheret vel*

*sa guini,  
vel succo  
nervoso, vel  
utrique.*

*Sanguinis  
et vinorum  
dyscrasia  
comparan-  
tur.*

*Quoad res  
non mis-  
cibiles utriq;  
confusas.*

Ex his circa affectionem scorbuticam observan-  
dis, manifesto liquez, materialem hujus morbi  
causam, haud in privato quodam loco, aut sin-  
gulari minera contineri, sed per totum corpus, &  
singulas ejus partes tum intus, tum extus diffun-  
di: unde statim colligere licebit, miasma scorbu-  
ticum vel in sanguine, vel in succo nervoso, aut si-  
mul in utrisque fundari: Revera sanguinis labem  
affigi effervescentiæ ejus inordinatæ, macularum,  
aut tuberculorum eruptiones, urina rubicunda,  
& velut elixiviata plane testantur, quibus pari in-  
dicio conspirat diversimoda hujus morbi produ-  
ctio, quæ ut plurimum massæ sanguinæ deprava-  
tioni succedit: nec minus liquore nervoso vitium  
hærere, declarant molestissimi dolores tum intus  
in membranis, tum extus in musculofo genere ex-  
citati, membrorum debilitates, aut resolutiones,  
verrigo, spasmi, & crebra spirituum animalium  
deliquia. Cum itaque humores ambo generales in  
vizio deprehendantur, videamus quis prior, aut  
prior in culpa fuerit, undenam labem suam con-  
trahat, ac quo ritu humori alteri ac insuper parti-  
bus quibuscunque aliis, affici solitis, noxa commu-  
nicetur.

Quoad sanguinem (in cujus massa scorbutus ra-  
dices suas potissimum agere videtur) alibi osten-  
dimus, cum in crasi sua ejusmodi particulis, &  
simili fere ritu temperatis, ac vina constare: por-  
ro ob duas præcipue causas, uti vinum, ita san-  
guinem ægrotare innuimus, nempe vel quoniam  
aliquid extraneum, & non rite miscibile, huic aut  
isti confunditur, vel quoniam liquoris crasis, sive  
temperies pervertitur, h.e. quatenus elemento u-  
no, forsan aut altero, quibus dominium debe-  
tur, suppressis, alia, quæ subjugari oportuit, ex-  
altantur.

Circa prius, de vino observamus, quod cum  
fæces, prius secretæ, ac ad fundum detrusæ, de-  
nuo commotæ eleventur, vel si heterogeneous ali-  
quid, uti serum, aut sulphur exoticum dolio in-  
jicitur, exinde perturbatio insignis concitatur;  
quæ nisi brevi compescatur, vini crasis subverti pe-  
riclitatur:



richitatur : Pariter quamplurimæ sunt res non miscibiles, quæ sanguini confusæ motum ac circulationem ejus perturbant, & œconomix ritus, quo minus recte perficiantur, impediunt: Liquor nutritius, sæculentiis refertus, sanguinem inordinate fermentat: quin & liquor iste degener factus, febrium intermittentium paroxysmos ciet, prout olim monstravimus: recrementa sanguinis vaporosa, ferrosa, biliosa, ac atrabilia in sinu ejus retenta catarrhos, hydropem, icterum, melancholiam, pluresque alios affectus pariunt: quod si extraneum illud tempestive amoveatur, sanguis, uti & vinum mixtura extranea cito liberum, constitutionem pristinam brevi recuperat: attamen uterque liquor contentis heterogeneis aliquandiu in ectus, tandem a debita crasi degenerat, proindeque non facile restauratur.

2. Præterea quidem, & vinum & sanguis, ob multas alias causas a recta temperie desciscunt. Quod spectat ad vinum plures sunt modi, & rationes, quibus liquor ejus a crasi legitima pervertitur: quibus etiam parallelas subjungantur totidem, ac forsan plures sanguinei liquoris dyscrasix. (Hic etenim venenari, ac subito corrumpi solet, quod non facile vino accidit.) 1. Igitur de vinis observare licet, eadem aliquando maturitatem non attingere, sed propter *νεωπαιότητα* defectum, quatenus nimirum spiritus, aliaque activa sulphuris, ac salis principia, crassioribus obvoluta, sese extricare nequeunt, prorsus cruda manere: quare minime spiritualescunt; sed consistentiæ crassæ, & saporis ingrati, in vappam degenerant: simili fere ritu, quandoque sanguis spiritu, ac sulphure depressis crudus & aquosus, nec non vigoris expers, ac in corde vegete accendi inhabilis perstat. Hujusmodi sanguinis *μόλις* Cl. Gregorius Horstius affectionis scorbuticæ causam asserit; attamen talis sanguinis dispositio, picam & malaciam, nec non diathesin hydropicam potius quam scorbuticam inferre videtur, prout mox plenius ostendemus. 2. Vini pars sulphurea præ cæteris exaltata, liquori immodicam effervescentiam, si-

*Quoad utriusque temperiem varie alteratam.*



*Sanguinis  
dyscrasia  
scorbutica  
instar vi-  
norum, dum  
sunt*

*Rancida aut  
pendula.*

Ve ebullitionem inducit; nostro idiomate dicitur, *fretting of wines*: pariter & sanguinis pars sulphurea nimium evecta proindeque supra modum effervesce, ac in corde accendi apta, intemperiem febrilem accersit, & revera febrium *ουρεχτων* plurimarum causa existit. 3. In vinis non raro spiritu fatisciente & sulphure constricto, pars salina in fluorem evecta, cæteris præpollet; quapropter liquor in acetum transit. Cl. Sennertus sanguinem in scorbuto, sicut vinum in acetum degener alterari putat quod tamen secus fieri mox declarabitur. Interim ab acetosa sanguinis dyscrasia, melancholiam inferri olim monstravimus. 4. Restat adhuc alia vinorum dyscrasia, cui equidem sanguinis diathesis scorbuticam satis apte comparemus: sc. cum spiritu depressio, particulæ sulphuræ & salinæ simul combinatæ exaltantur: cumque hoc in vinis duplici modo fiat, etiam ob sanguinem pariter affectum, duplicem scorbuti speciem illinc deducere fas sit, prout mox clarius patebit. Itaque de vinis vulgaris observatio est, quod præterquam quod in vappam aut acetum degenerant, eadem aliquando a spiritu depressio, atque sulphure, ac sale, una exaltatis, aut rancida, aut pendula, sive mucilaginosa evadere: nostro idiomate dicitur, *Wines become over fretted, or become ropy*: In utraque mutatione, spiritu subjugato, particulæ sulphuræ & salinæ simul associatæ, cæteris elementis præpolent, atque ad indolem suam liquoris crasin defleunt. Attamen non eodem prorsus modo in utroque res agitur: quippe in priori vini dyscrasia, sulphur aliquantulum sale, ac in posteriori sal sulphure potius existit: quin & alterutrum potentius factum, excusso spiritus dominio, sibi alterum consciscit, & supra debitum tenorem attollit. Utriusque ratio ad hunc modum explicabilis videtur.

Cum vina generosa diu efferbuerunt, particulis multum agitatis, invicemque allisis, spiritus partim evaporat, & partim elementis crassioribus obvolutus, supprimitur: Interea sulphur (cujus magna subest copia) agitatione magis provehitur, proindeque



proindeque spiritus jugo solutum, sali adhærescit, ipsumque attollens, liquoris mixtionem alterat: cui dein, ob sulphuris cum sale combinati eminentiam, ranciditas accedit: pariter cum vina tenuia diutius asservantur, sal evectus, & fluore potitus spiritum deprimit, proindeque latici subjecto acorem inducit; dein postea, sal eminens, sulphur (quod in minori subest copia) sibimet asciscens, intimeque aduniens, liquoris consistentiam e tenui in crassam, & velut oleaginosam, & a sapore acido in valde ingratum & quasi mucidum convertit.

Probabile est, non absimili modo sanguinem in affectione scorbutica alterari, quam vina quoties nimis effervescentia in rancida, aut pendula degenerant; quippe morbum istum non tam a sæculentis sanguini admixtis (quanquam tales adfuerint, attamen denuo excerni, eorumque supplementa præscindi possint,) quàm a sanguinis dyscrasia habituali pendere, argumento est; quia scorbutus radicans adeo difficulter, ac interdum non omnino curatur. Porro sanguinis dyscrasiam scorbuti parentem, pariter ac vini duplicem, nempe sulphureo-salinam, ac salino-sulphuream, statuere licet. Cum enim maxima sit varietas affectuum, qui scorbutum accensentur, omnes ad hæc duo quasi præcipua capita, seu velut binos mali fontes, satis apte revocari possint, scilicet primo quod sanguis miasmate scorbutico tactus, aut prætervixus existit, in quo nempe sulphur prædominatio potitum sibi salelem asciscit: quapropter iste rancidior factus inordinate in vasis effervescent, atque recrementa adusta, nempe sulphuris & salis concretiones, perpetim a se amandat, atque huc illuc dispergit, quæ quidem exterius suffusa maculas, exanthemata, tubercula, aut ulcera producunt: interius vero depositæ vomitus, cardialgias, diarrhoeas, aut dysenterias, porro dolores atroces pariunt. In hujusmodi scorbutica sanguinis ranciditate, remedia solum temperata, ac crebræ phlebotomiæ; ac minime cochlearia, raphanus sylvestris, aliaque acedine, & incitatione prædi-



ta conveniunt: pari quidem ratione ac vina rancida curantur eximendo e facibus, insuper lactis, amyli, ichthiocolle, aliorumque demulcentium infusione. Vel secundo in sanguine scorbutum foven- te, sal prædominio potitum, sibi met sulphur asciscit: quapropter, iste non ita fervidus, quin vini penduli instar, crassus, & quasi mucilaginosus evadit, pigre in vasis circulatur; viscera, dum pertransit, infercire, iisque sæculentias quasi limosas affigere aptus est. Taliter affecti, ut plurimum sine exanthematis, aut eruptionibus cutaneis, torpidi, anhelosi, ac enerves fiunt, lassitudine spontanea, pectoris angustia laborant, quin & passionibus cordis spirituum deliquiis, vertigini, & convulsionibus obnoxii reperiuntur: porro in huiusmodi diathesi scorbutica, remedia calidiora, & sale volatili prædita, immo & chalybeata quæ sanguinem fundunt & exagitant, maxime ex usu esse solent: pari quidem ratione ac vina pendula tractantur, nempe plurimum conquassari, & agitari debent; porro iis calx viva, alumen ustum, gypsum, sal marinus calcinatus, aliaque summa acredine prædita imponuntur. Hæc de scorbuti principiis in massa sanguinea radicatis: Adhuc explicandum restat, quibus de causis sanguis a propria indole degenerans hanc, illamve dispositionem morbidam, & scorbuti parentem concipit. Attamen prius ostendere oportet, quo ritu in succo nervoso, sc. altero humore generali, istius morbi seminia jaciuntur.

*Quoritu-  
lales scorbu-  
tica liquori  
nervoso im-  
ponitur.*

E sanguine cerebri oras adpellente, liquorem subtilissimum, pro spirituum animalium tum materia, tum vehiculo extrillari, eumque per totum *ἑνδοκρατον*, & genus nervosum jugiter scaturire, alibi declaravimus: Latex iste, quandiu recte habet, spiritu & sale eidem combinato, seu volatilisato, potissimum constat; his modicum aquæ, qua diluantur accedit, sulphure ac terra parum opus esse videtur: attamen ista spiritus & salis volatilis concretio, humorem præstantissimum, qui sc. omnia permeat, penetrat, actuat, & irradiat, supra quod chymici de alchæst somniarunt, revera constituit:



constituit : Circa scorbuti initia , donec sanguinis crasis, ac cerebri tonus haud penitus vitiantur, liquor iste cerebri & nervorum irriguus, adhuc spirituosus, dulcis, atque ad destinata quævis munia haud valde inidoneus perstat, postea tamen e massa sanguinea depauperata, & plurimum efforta, latex multo tenuior, & versus acetosum declinans extillatur : porro e sanguine sæculento, & quasi rancido aut limoso, particulæ heterogeneæ, atque regimini animali plurimum infestæ suggeruntur, ac intra cerebrum debilius factum, sine repulsa admittuntur, indeque in appendicem ejus tum medullarem, tum nervosam cum succo irrigante diffunduntur : hinc spirituum animalium in singulis regionibus scatentium, modo deliquia & eclipses, modo distractiones, explosionesque dolorificæ ac spasmodicæ sequuntur : Quapropter paralytis, convulsio, vertigo, dolores, tremores, aliaque cerebri ac nervosi generis præternaturales affectiones, scorbuto, altiores radices agent, supervenire solent : de quibus infra speciatim dicitur. Interim adnotetur in genere, labem scorbuticam succo nervoso affixam in his tribus, sc. in eorum aliquibus, aut simul omnibus consistere, vid. quod liquor cerebri & nervorum irriguus multo tenuior, seu pauperior evadat, quod a crasi spirituosissima, versus acetosam degeneret, quod particulis heterogeneis, & moribificis referciatur.

Hactenus ostendimus quo ritu in sanguine, & deinceps succo nervoso affectionis scorbuticæ prima quasi semina conferuntur. Priusquam morbi fractus, sive symptomata, propter malam utriusque humoris diathesin excitata, eorumque rationes, & fiendi modos, perpendimus, in ipsius morbi causas remotiores, & differentias inquirere oportebit: nempe ut constet ob quas *απορροή*, & quasi apparatus dispositio scorbutica prædictis humoribus imprimatur.



## CAPUT XII.

*De scorbuti causis remotioribus, a quibus nimirum massæ sanguineæ, & per consequens liquor nervosus labes affigitur.*

Ostenso, in superiori capite, quæ sit scorbuti causa conjuncta & proxima, sc. mala diathesis sanguini & succo nervoso impressa: circa causas remotiores, ob quas utrique humori, ac imprimis illi, qui potior & prior in culpa est, nempe sanguini labes infertur, disquirendum restat: etenim hujus depravatione detecta, facile patebit, quomodo in alterum laticem, miasma morificum derivatur. Cum itaque ratum habemus, affectionem scorbuticam in sanguine vitiato potissimum fundari, ejusque vitium, quasi vinorum dum rancida & pendula fiunt, in sale & sulphure, dum spiritus deprimitur, indebite exaltatis consistere; sedulo perpendamus, quomodo hæc illave diathesis *rosæph* massæ sanguineæ imprimitur.

*Aliorum  
sententia  
de origine  
scorbuti re-  
solvitur.*

Atque hic præterite non debemus, quid alii auctores scorbuti naturam diligentissime rimati, circa causas & subjectum ejus statuerunt. Super hac re, cum plures extant sententiæ, fere omnes hoc respectu conveniunt, ut morbi fons & origo a viscerum culpa derivetur, ejusque producti sedes in massa sanguinea collocetur, nempe ut hæc, illorum vitio fere tantum inquinata, labem scorbuticam contrahat: Antiquiores præcipuam hujus morbi causam lieni, officio suo non recte defungenti, imputarunt: Verumtamen cum lienis munus hoc a nonnullis, aliud ab aliis, & diversum ab istis concipitur, diversimodæ hujus morbi productiones fingebantur: *Wierus*, *Echtius*, *Albertus*, *Rossius*, *Eugalenus*, cum multis aliis, ex supposito quod lien receptaculum melancholici succi excrementitii, a sanguine separati, statuunt scorbuti causam internam, proximam, esse copiam humoris lutulenti, crassique melancholici.

*solius s.*



folius; vel etiam cum aliis misti, peculiarem corruptionis formam subeuntis, quæ circa lienem, ac jecur, atque in ipsis venis abundet: Hæc opinio, si melancholici succi a liene secretionem neglectam, aut impeditam, aliquando, & ex parte scorbuti causam esse pronuntiaret, merito assensum nostrum vendicaret; sin morbum istum semper & omnino hujus visceris culpa oriri statuatur, summe improbable videtur, prout inferius patebit, ubi scorbuti longe potiores causas assignabimus. Authores alii, hæmatoseus munus lieni attribuentes, scorbutum produci dixerunt, eo quod lien, chyli partem sibi destinatam in sanguinem laudabilem minime conficiat. Cum vero alii, humidiores & magis aquosas chyli partes in liene præparari, ac in sanguinem converti statuunt, uti Reusnerus, &c. Idcirco proxima & interna scorbuti causa perhibentur aquosi & serosi humores, qui siquidem a liene haud excipiuntur, sanguini confusi, scorbuto originem præbent: Interim alii, uti Platerus, Baubinus, &c. Chyli partem crassiorem sanguificationis causa a liene allici dixerunt, & ex eo sibi & aliis partibus sanguinem idoneum præparari. Ex hoc supposito *Gregorius Horstius* dicit scorbuti causam, esse crudum & ichorosum sanguinem, in toto corpore, potissimum tamen in hypochondriis, non quantitate solum, sed specifica quadam corruptione peccantem, ob *μολυσμα* ex imbecillitate lienis proveniente: quia sc. per lienis affectum præternaturalem crudiores chyli partes a sanguificatione jecoris non avertuntur, unde primo sanguis invenis jecoris & lienis depravatur, alienæ materiæ commistione deinde jecoris *αἱμάτωσις* impeditur, ratione objecti minus recte dispositi, quatenus chylus ob lienis læsionem, justo modo non depuratur. *Horst.* append. ad lib. ij. part. ij. sect. j. de scorbuto. Hæc opinio facile concidit, quia asserit, contra legem hæmatoseos, lienem sanguificare, atque chyli partes crudiores ad se attrahere; cum notissimum sit, nullum chyli ad lienem transitum patere: Quin & eadem litura refellitur Reusneri aliorumque sententia, qua asseritur, proximam & internam cau-

sana



sam scorbuti esse serofos & aquosos humores, quos lien debuerat attrahere, & per peculiare suum hæmatoseos munus, in sanguinem convertere.

Doctissimus Sennertus, licet cum prioribus sanguificationis munus etiam lieni attribuat, Institutionum lib. 1. cap. 9. attamen alio quam ab hujus visceris culpa, scorbuti causam derivat. Enimvero statuit ille, propter chylum in primis viis male concoctum, & *πικρὰ καὶ σφοδρὰ* destitutum, sæculentias salvas & tartareas circa mesenterium, & omentum congeri, easque novæ materiæ appulsu indies auctas, & sero dilatas, demum in lienem & hepar, indeque in venosum genus transferri, illisq; adeo totam massam sanguineam infici, atq; crudam & salsam reddi. Primam hanc scorbuti mineram, in primis viis aggestam, appellat humorem melancholicum, quem insuper dicit serofum esse humoribus pituitosis stipatum, atque ob moram in istis partibus, peculiari ritu corruptum: Deniq; addit humorem istum, spiritus, & salis volatilis fixatione generari, non secus ac cum vinum in acetum transfit.

*Scorbutus non semper lienis aut primarum viarum vitio oritur.*

Huic opinioni, utut probabili, ne per omnia consentiam, quædam non levis momenti rationes evincunt. Præterquam enim quod hæc etiam doctrina cum circulatione sanguinis non exacte quadret, utpote cujus lege, humores in vasis mesaraicis seorsim a reliquo vasorum genere vix congerantur: saltem illis exinde in lienem transitus minime patefcit. Insuper haud recte statuitur scorbutum in primis viis solummodo incipere; namque interdum mero contagio contrahitur: Nec etiam hunc morbum a salis fixitate, aut sanguinis, & humorum cruditate provenire censemus; sæpenumero enim febribus diuturnis succedit, proindeque a sanguinis deflagratione nimia, & adustione, potius quam a chyli aliorumque humorum in primis viis *μολύνει* exoriri videtur: porro interdum aura maritima & paludosa hunc morbum inducit, licet nullæ cruditates circa viscera gignuntur: siquidem laborantes ab initio circa appetitum & digestionem minime queruntur. Revera quod attinet ad cruditates



tatem, atque falis in chymo aut sanguine fixitatem, & πνευματώσεως defectum, concedimus, ab his causis, diathesin valetudinariam non raro produci, propterea tamen non statim scorbutus, sed potius malacia, & pica virginum, leucophlegmatia, aut dispositio hydropica succedunt. Cum itaque scorbuti Aetiologia, ab authoribus, quibus sanguinis circulatio nondum innotuit, tradita, veritati minus quadret; libet modo, clave istac adhibita, rem totam denuo pertractare, atque morbi hujus causas, tum procatarticas, tum evidentes, juxta ἀμαρτωσίας legem, qua tenuitas nostra potest, accuratius explicare.

Modo innuimus, esse plures occasiones & procatarticos modos, a quibus scorbutus originem suam ducere videtur. 1. Quibusdam locis endemius existit, ut propter malignam aeris, & vaporum quibus stipatur, influentiam, una cum spiritu vitali miasma morbificum hauriatur. 2. Sæpe numero morbus iste febribus diuturnis, aliisque morbis chronicis succedit, illorumque affectus, si ve productum merito censetur. 3. Nonnunquam hæditario, & a parentibus scorbuticis per traditionem propagatur. 4. Interdum mero contagio suscipitur. 5. Mala victus ratio, inordinationes circa res non naturales, atque viscerum dyscrasie innatae, aut acquisitæ affectionem scorbuticam aliquando inducunt, sæpissime ejus genesi contribuant, aut fomitem præbent. Singulorum hujusmodi effectuum rationes consideremus.

1. Scorbutum aeris vitio sæpius contrahi nullus e vulgi sæce, quin confitetur, fere omnium in ore est, loca maritima, lacustria, & uliginosa quosvis, febribus intermittentibus, aut scorbuto, obnoxios reddere: quare valetudinarii, aut qui sanitatem suam colunt, procul ab hujusmodi locis habitationes constituunt: Talis equidem humidus aer tetras exhalationes, & inquinamenta continuo diffundens, duplici respectu insalubris, & non raro scorbuti parens existit: sc. ob transpirationem præpeditam, & propter fermenti incon-

I. Quam ob rationem aer in salubris scorbutum parit.

grui



susceptionem. Primo enim, in aere crasso & minus eventilato degentibus, meatus, & pori cutis valde constipantur: quare cum effluvia sanguinis haud debite satis exhalant, eadem intus retenta reliquam massam sanguineam fermentant, ejus particulas activas ad varias inordinationes disponunt. Dein secundo, quatenus eodem tempore vapores tetri, salia, & sulphura incongrua redolentes inspirantur, propterea sanguinis spiritus valde deprimuntur; ac interea particulae ejus sulphureae, & salinae ad *ἀπορίττας* evehuntur, proindeque massae sanguineae crasis sensim mutata in morbidam degenerat. Cujus nimirum pars sulphurea siquidem perse exaltata sanguini rancorem insignem inducit; febris interdum continua, saepius vero intermittens, aeri insalubri, propter rationes alibi ostensas, ita familiaris, excitari solet: Quod si a tali *πρὸς ἀσθενίαν* (uti frequentius assolet) una cum sulphure principium salinum evehitur, dispositio scorbutica, qualis supra describitur, sc. vini aut rancidi, aut penduli aemula, sanguini imprimitur. Nec tantum ingens aeris humidi, & vaporosi tractus, ad hunc modum insalubris est, verum incolere domos loco palustri confitas, vel stagno circumdatas, aut calce viva recens obductas, morbo isti obnoxios reddit.

2. *Quare  
febris  
diuturnis  
supervenit.*

2. Febris diuturnior saepissime scorbutum inducit: cujus ratio ex hypothese nostra manifeste liquet; etenim a crebra, nimiaque sanguinis deflagratione, spiritus plurimum absumuntur, ut liquor pauperior & effectus evadat; quin & sulphuris purioris ingens copia deflagrando evaporat; interea quod hujus reliquum est, sibi salem asciscens, ipsumque evehens, sanguinis crasin morbidam & plane scorbuticam inferre solet. Observare est a longiori febre propter spiritum & sulphur nimis exhalantia, atque plurimum salis cum sulphure residuo diutius concoctum, sanguinem valde salsum, & quasi lixiviale evadere, ita quidem ut deinceps aegra, & vix circulationi peragendae, satis in corde accendatur: Cujusmodi sanguinis dispositio, non nisi longo tempore restau-



restauratur, & difficulter admodum a scorbuto ineundo vindicatur. Nec tantum febribus, sed & aliis morbis chronicis male curatis, scorbutus supervenit, idque propter duplicem rationem, sive afficiendi modum: nempe vel quia sanguis a morbo præfenti, versus diathesin scorbuticam immutatur; vel quoniam ægritudo laborantes a quovis exercitio aut motu diu inhibet; proindeque illi a longo otio & secessu in scorbutum inclinantur: Prius cernitur in melancholia, ubi spiritus depressus, & sale in fluorem evecto, sanguis in acetosum vergit. Cujusmodi crasis, sulphure postea a sale ascito, & pariter evecto, facile in scorbutum transit. Affectio hypochondriaca in tantum scorbuticæ affinis est, ut sæpissime hanc sociam inducat: nam sæculentia atrabiliaria, quæ sanguinem pro istius affectus indole solummodo inquinant, postea crasin ejus pervertunt, adeoque scorbuticam reddunt: pariter icterus & hydrops, quæ sanguinem impura, aut incongrua mixtura primo tantum inficiunt, diutina mora temperiem ejus prorsus mutant. 2. Plures alii morbi scorbutum accidentaliter inducunt; quatenus nimirum ægrotautes a labore aut exercitio quovis impediunt; proindeque illorum sanguis parum eventilatus, non secus ac vina supra fæces suas diutius retenta, crasin amittunt, atque salis & sulphuris inordinationes subeunt. Hoc modo paralysis, lumbago, ossium fracturæ, ulcera, ac vulnera non nisi longo tempore sanabilia, homines scorbuto obnoxios reddunt.

3. Scorbutus interdum hæreditario contrahitur ita ut morbi lues a parentibus in natos derivata, absq; aliis causis, sive externis, sive internis, fructus morbidos, affectionis scorbuticæ indolem exacte referentes, producat. Ita novi pueros stirpe valetudinaria oriundos, doloribus artuum vagis, macularum eruptione, gingivarum, & dentium erosionem & carie affectos fuisse. Insuper observare est, parentum lue venerea tactorum natos, symptomatis gravioribus, affectionis scorbuticæ æmulis, obnoxios degisse. Hujusmodi affectuum ratio

3. *Quomodo hæreditario contrahitur.*



tio in hoc consistere videtur, quod miasma morbidum, humori genitali impressum, instar fermenti venenati habet, quod licet aliis particulis obvolutum, aliquandiu lateat, tandem *dux* suas exerat, atque in sanguine aut succo nervoso symbola salis & sulphuris elementa exuscitet, eaque supra cæteras particulas evehendo, in labem scorbuticam deflectat.

*Quomodo  
per conta-  
gium.*

4. Pari ratione, & afficiendi modo, scorbutus per contagium propagatur; scilicet effluvia a corpore infecto decidua, atque vicini poros subeuntia, vel per anhelitum inspirata, aut sanguinem, aut succum nervosum, vel simul utramque fermentant, adeoque particulas salinas, & sulphureas spirituosas evehendo, liquoris crasin juxta indolem suam pervertunt.

*Quomodo  
viscerum  
& prima-  
rum via-  
rum culpa.*

5. Scorbuti causæ hactenus citatæ massam sanguineam immediatius respiciunt, & morbum a lactice ejus sine magno primarum viarum vicio, incipere ostendunt: attamen ne hanc regionem, cui a nonnullis culpa omnis attribuitur, prorsus immunem perhibeamus, juxta aliorum sententias statuere visum est, scorbuti rudimenta etiam intra coctionis viscera interdum concipi, atque illinc in sanguinem traduci. Si quando enim a longo tempore accidit e chylo vitiato, succum nutritivum non nisi incongruum, atque salium & sulphurum enormium particulis refertum, massæ sanguineæ suppeditari, necesse erit hujus crasin tandem mutari, & juxta materiæ, unde constat & quotidie suppletur, indolem perverti. Quare observare est, qui cibis sale conditis fumoque induratis maxime vescuntur, atque vinum, & aquas ardentes copiose bibunt, e quibus particule salinæ & sulphuræ in sanguinem rapiuntur, scorbuto plurimum obnoxiosos reperiri: porro qui carne porcina aut etiam piscium, licet recentium, ac imprimis testaceorum carnibus plurimum aluntur; siquidem hæc alimenta sulphuris, & salis rancidiorum (uti colligere est ex putrescentium insigni foetore) copiam præbent, facile in scorbutum, & quod majus est, quandoque in lepram proclives habentur: E contra



tra in hunc morbum non ita prompte incidunt, qui lactinia, fructus crudos & immaturos, caicum recentem, aliaque absurda comedentes, magnam pituitæ saburram in ventriculo congerunt. Nec tantum e cibis pravis & dyspeptis, succus scorbutum fovens, producitur; sed interdum alimenta satis idonea, viscerum culpa in materiam morbificam facessunt: quod tamen non semper hepatis, aut lienis vitio, prout nonnulli arbitrantur, accidit: his enim cum chylo nihil negotii est: verum ipse stomachus fermento extraneo præditus ingesta quævis pervertit, inque pulsem modo acetosam, modo salsam aut vitriolicam mutat; verisimile est etiam a pancreate, aut ductu cholidocho succum incongruum chylo permisceri. ipsumque tintura heterogenea imbuere. Nec vero inficias imus, quin lien & hepar scorbuti productioni non raro contribuunt; licet eorum culpas non chylus, sed ipse sanguis immediatius luit; quando hepar obstruitur, ut sanguinis recrementa adusta minus fecernat, propterea hujus massa sæculentior, atque salis & sulphuris particulis simul incoctis, nimis luxuriat. Quod spectat ad lienem, haud prorsus immerito est, quod circa scorbuti productionem tot querelæ in ipsum proferuntur. Cum enim hujus visceris munus (prout supra ostendimus) in his consistat, nempe tum ut sanguinis sæculentias atrabilarias, quæ sale fixo & terra constant, fecernat & excipiat, tum ut easdem ulteriori coctione, in fermentum sanguini remiscendum digerat: si quando lien hisce muniis suis non recte defungitur, duplici respectu massa sanguinea inquinari solet; nempe vel quia sæculentiæ atrabiliaræ a liene obstructo, aut debilitato non omnino excipiuntur; vel quoniam exceptæ, ibidem in fermentum inidoneum, & sanguinis corruptivum pervertuntur: massa sanguinea vel hoc, vel isto modo interdum male disponitur, & non raro propter hanc occasionem solitariam, aut aliarum causarum accessu, in diathesin scorbuticam degenerat. Enimvero a tali præcatarxi, affectionem hypochondriacam oriri olim declaravimus;

cui



cui quidem scorbutus ( prout modo innuimus ) adeo affinis est, ut illi sæpissime aut comitem se adjungat, aut superveniat. At vero scorbutum non semper aut tantummodo lienis vitio oriri, observatione superius citata, liquido pater. Nempe olim vir nobilis affectione scorbutica, symptomatis quamplurimis, & maxime horrendis stipata, per plures annos laborabat; hunc medici celeberrimum curabant, lienis vitio ægritudinem contraxisse, & istius visceris causa mala gravissima pati pronunciabant: Supra decennium doloribus fere continuis, nec non paralyfi, & convulsionibus miserrime afflictus, tandem contabescens, phthisi interibat: Defuncti cadavere aperto, sensui constabat, lienem, utut pessime defamatum, omni culpa immunem fuisse: namque viscus hoc in figura, magnitudine, substantia, & colore laudabiliter habens, tumore quovis, aut obstructione carebat: insuper vasa sanguifera aperta, & infarctione libera, fibræ nervæ satis firmæ, atque sanguis intra lienis poros contentus, putredinis experts apparebant.

*Quare tristitia & studia immodica scorbutum gignunt.*

6. Inter scorbuti causas, a rerum non naturalium inordinatione derivari solitas, merito hic tristitiam ponimus; namque passim observare est, homines propter occasionem aliquam luctu ingenti percussos, & deinceps diu mæstos, scorbuticos fieri. Cujus ratio hæc videtur esse, ingens mæstitia animam inferiorem, seu corpoream immediate afficiens, binas ejus partes, nempe sensitivam & vitalem, intus compellit, earum systases a solitis expansionibus inhibens coarctat, ac in minus spatium contrahit: hinc spiritus animales a debita expansione præpediti, œconomiam suam remittunt, quare & sanguis minori ambitu circuitus suos repetens, circa cordis sinus agglomerari ibidemque stagnare aptus est; hinc cum spiritus utriusque regiminis, sc. tum animalis, tum vitalis præsides, deprimuntur, & sanguis & succus nervosus secundum crases suas alterari incipiunt; & uterque vigorem suum sensim amittens, a liquore generoso, versus acetosum & effectum vergis: insuper



insuper coctionis viscera, solito spirituum influxu denegato, munia sua perperam obeunt. Hinc a chylo minus recte cocto, aut inter coquendum depravato, succus nutritius non nisi vitiosus & fæculentiis refertus, massæ sanguineæ infunditur, unde crasis ejus magis pervertitur, inque diathesi scorbuticam facilius transit: porro ob hanc rationem, studia immodica & nimis seria, & continua animi intentio, quatenus hinc spiritibus depressis, & viscerum muniis subversis, humorum præcipuæ crases in pejus alterantur, sæpe labem scorbuticam accersunt: Cui accedit, quod tum mœsti, tum studiosi vitam sedentariam plerumque degunt; cujus causa & sanguis, & succus nervosus tanquam aqua motus defectu situm contrahens, vitari, & corruptelam scorbuticam promptius inire solent.

Hæc sunt scorbuti causæ procatae, si non omnes, saltem præcipuæ, quæ sanguini labem affigunt; non opus erit *ἁτιολογίαν* aliam, ut constet quomodo noxa a sanguine in succum nervosum derivatur, pertexere: etenim sanguis solenni ritu, & circulationis lege, spirituosum liquoris portionem in cerebrum extillat: at vero, prout supra innuimus, e sanguine pauperiori facto latex tenuior, & ex eodem salso (uti salinorum cum destillantur mos est) liquor acris prolicitur; item præterea a sanguine fæculento, & quasi limoso, particulæ heterogenæ, & regimini animali infestæ suggeruntur; quæ tamen a cerebro firmiori & sano non facile admittuntur: quare ut tales particulæ, intra *ἐγκέφαλον* susceptæ, affectiones paralyticas aut spasmodicas scorbuto superinducant, causæ quædam præcedunt, a quibus cerebri constitutio debilitetur, cujusmodi esse solent, 1. ejus mala diathesis hæreditaria, item. 2. frequens crapula, & vini potus immodicus, somni meridiani, otium & exercitii defectus, venus immoderata, hæmorrhagiæ ingentes, aliæque occasiones, quibus aut spiritus animales nimis absumentur, vel cerebri pori & meatus relaxantur, ac nimis apperiantur, ut quodvis præ foribus allatum admittant,

CAPUT.

*Labes scorbutica & e sanguine in cerebrum & genus nervosum derivatur.*



## CAPUT III.

*De scorbuti differentiis; item de morbi huius signis, symptomatis, causis, imprimisque de illis, quæ propter labem sanguini impressam oriuntur.*

*Scorbuti  
differentia.*

**E**X causis scorbuti, hætenus descriptis, facile erit huius morbi differentias assignare Primo etenim juxta duplicem causæ conjunctæ regionem, sc. sanguinem & liquorem nervosum, affectio ista distingui potest, quod vel huius, vel istius ditionis maxime fuerit, atque modo in sanguine, modo in succo nervoso radices potiores egerit. Secundo juxta duplicem sanguinis affecti labem, nimirum quod ista sulphureosalina, vel salinosulphurea fuerit, etiam scorbutus iisdem nominibus insigniatur, aut secundum vulgares appellationes dicatur, vel biliosus, sive calidior, exanthematis, aliisque symptomatis apertioribus se prodens, vel melancholicus, cujus virus, quasi sub cineribus cooperitis latens, facultatum læsione intrinseca, potius quam externis eruptionibus dignoscitur. Tertio secundum morbi originem, & invasionis modum, quatenus sc. aut per contagium suscipitur, aut per internam procatarxin oritur; item juxta varium ejus statum, quod vel inchoatus, perfectus, vel deploratus fuerit, multifariam distinguitur, & circa curationem indicationes diversimodas requirit, de quibus postea explicatius dicetur. Interem vero scorbuti signa & symptomata recensere, eorumque causas, & fiendi modos subicere incumbit.

*Signa &  
symptomata.*

Signa, quibus scorbuti indicia capiuntur, sunt vel extrinseca, sc. accidentia quædam, & circumstantiæ, quæ donec morbi notæ certiores adsint, suspicionem ejus præbeant. Ita si quisquam parentibus scorbuticis ortus sit, vel cum conjugæ, aut sociis affectis diu conversetur, vel si juxta oram maritimam, vel loca paludosa, aut alias insalubria-



bria degat, vel si febrem diuturnam aliosque morbos chronicos prægressos habuerit, vel si a remediis antiscorbuticis juvamen senserit, talem, absque febre, aut alterius morbi certis indicibus, valedudinarie dispositum, scorbuti labem quandam contraxisse, merito arbitremur. Vel secundo, morbi hujus signa, sunt affectus & symptomata præsentia, sc. corpore laborante inhærentia; cujusmodi, cum multiplicia fuerint, varie distribui & in classes quasdam redigi solent, nempe quatenus scorbuto propria sunt, aut huic cum aliis morbis communia; item in quantum vel circa morbi initia, augmentum, aut statum ejus pessimum excitantur: porro distinguuntur, juxta quod in variis partibus corporis excitata, interna, vel externa fuerint; item quatenus utraque in capite, thorace, abdomine, vel circa membra, aut habitum corporis evenerint: Hoc ritu symptomata scorbutica superius recensuimus. Cæterum illa satis apte distribui possunt, juxta quod oriuntur vel propter labem sanguini præcipue affixam, vel propter succi nervosi vitia, vel propter utriusque humoris enormis facti congressus, & quasi conjunctas influentias. Huic methodo, qua licet, in recensendis explicandisque scorbuti symptomatis, & signis insistemus, quanquam interea plurimi affectus, qui ab humoris hujus, aut illius culpa singulari procedere videntur, etiam in causæ partem humoris alterius vitium aliquod consciscant: quod autem spectat ad primarum viarum, & viscerum in scorbuto affectiones præternaturales, licet tales interdum ab erratis in victu procedunt, sæpiissime vero etiam istarum partium ægritudines, siquidem permanentes & habituales factæ, propter sanguinis aut succi nervosi inordinationes, oriuntur, uti proprio in loco inferius declarabitur: Interim uni prospectui subjiciatur, quomodo præcipua scorbuti symptomata, ab humoris hujus aut istius, aut conjunctim ab utriusque vitio procedunt.

## I. Cum



1. *Cujusmodi affectus propter sanguinis dyscrasiam scorbuticam oriuntur.*

1. Cum itaq; sanguis miasmate scorbutico plurimum inficitur, ob tres potissimum rationes mala symptomata succedunt. Sc. 1. quia liquor ejus depauperatus solito vigore caret, ut nec clare in corde accendatur, nec vegete & æquabiliter circuletur; quam ob causam, totius animæ dejectio, & velut subsidentia, mœstitia, anxietas, respiratio difficilis, pectoris angustia, pulsus intermittens, frequens leipothymia, caloris & frigoris suffusiones inordinatæ succedunt. 2. Sanguis sæculentiis scatens recrementa sua partibus, quas interluit, passim suffundit; quapropter exterius maculæ, exanthemata, tubercula, ac ulcera passim excitantur: hinc etiam catarrhi, hydrops, membrorum intumescencia, gingivarum ulcera, vomitus, diarrhœa, dysenteria, sputatio ingens, sudores, urina lixivialis, aut contentis saturata, quin & viscerum tumores, aut obstructions non raro sequuntur. 3. Sanguis pauper & sæculentus, cerebro & nervoso generi liquorem non nisi vitiosum suppeditat; adeoque mediate istarum partium culpas luere debet: porro sanguis depravatus, spiritibus intra fibras ubique scatentibus copulam, pro facultatis locomotivæ actibus, explosivam, haud satis idoneam immediate præbet, unde lassitudo spontanea & impotentia ad motum ex parte procedunt.

2. *Qui propter labem cerebro & nervoso generi impressam.*

2. In scorbuto, succus cerebri, & nervosi generis irriguus, postquam labe morbida inficitur, sub triplo respectu peccat, 1. Quatenus a nobili & spirituosus in pauperem & tenuem declinat, unde languor & totius corporis enervatio, hinc etiam atrophia aliquatenus procedit. 2. Quatenus liquor iste a spirituosalino in acetosum mutatur, inde melancholia & metus, spirituum fatiscencia, & a solito vigore suppressio; quin & partium nervosarum dolores, ac irritationes fere continuæ, & ossium crepitus inducuntur. 3. In quantum liquor iste particulis heterogeneis, & regimini animali infestis refertur, convulsio, spasmi, paralyfis, vertigo, affectus soporosi, aut vigilæ pertinaces, stultitia demum, aut insania oriuntur.



3. In scorbuto inveterato & graviore, sanguinis & succi nervosi recrementa variis in partibus simul deposita, quatenus ea particulis salinis, quæ diversimodæ sunt indolis, prædita sunt, invicem congregiantur, ac mutua lucta, & effervescencia symptomata tetriora producant: hinc enim dolores intolerabiles, præsertim nocturni, arthritidis vaga, rhëumatismus, aliique hujus generis affectus oriuntur. Ad hunc modum, a gemino lûis scorbuticæ fonte, plurimi malorum affectuum rivuli, quaquaversus decurrentes in singulis totius corporis partibus, molestias creant. Quartum adhuc ut plenior notitia constet, ex re fore videtur singula prædicta symptomata recensere, & cujusque illorum rationes, & fiendimodos, particulatim tradere.

1. Primum scorbuti signum, quo sæpe morbi incipientis suspicio præbetur, lassitudo spontanea est, cui accedunt impotentia ad motum, item crurum debilitas & velut gravitatis sensus. Hæc symptomata circa morbi initia oriri solita, a sanguinis, potius quam liquoris nervosi (qui vix adhuc inquinatur) vitio derivantur: hoc autem duplici respectu fieri potest, sc. primo quatenus sanguis impurius factus, sæculentias serosas inter circulandum exuit, easque musculorum poris & meatibus insinuat, quibus infarciuntur illi & aggravantur, proinde ut spiritus impediti, ac intercepti, explosiones suas locomotivas haud libere facitis ac vegete ineant; insuper partes, velut sarcina quadam onustæ, non uti prius facile & expedite moventur. 2. A sanguine vitioso spiritus animalis copula explosiva, non nisi degener ac imbecillis accedit; propterea illi neque motus locales prompte ineunt, nec vegete perficiunt. In scorbuto inveterato impotentiam ad motum, etiam a succi nervosi depravatione, & spirituum inopia, oriri credimus.

2. Respiratio difficilis, ac ad motum quemvis anhelata, familiare scorbuti symptoma est; cujus cum binæ solent esse causæ, modo ab una, modo ab altera, & aliquando simul ab utraque dependet. Dyspnœa scorbutica, si valde crebra, & fere constans

3.  
*Qui propter  
conjuncta  
utriusque  
humoris  
mala,*

*Symptoma-  
tum causa  
explicatur.  
Lassitudo  
spontanea.*

*Respiratio  
difficilis.*



stans fuerit, a sanguinis statu pauperiori, & quasi effecto, quo quidem in corde stagnare, & non statim accendi aptus est, provenit: quare a motu quovis, siquidem muscoli vasa sanguifera comprimendo liquorem contentum prorsum urgent, sanguis aliquanto uberius in cordis sinus irrumpit, qui cum illic non statim accenditur, & foras evehitur, cor aggravat, & functionis vitalis deliquium minatur: idcirco pulmones, ut suppetias ferant, celerius moventur, ut sanguinem citissime exantlent, adeoque in hunc finem, nempe sanguinis effecti, & ex se pene immobilis circulationem, respiratio valde crebra & anghela instituitur: in hoc casu cum respiratione laboriosa, etiam pulsus celer & parvus existit. 2. Dyspnœa scorbutica interdum a nervosi generis culpa procedit; postquam enim labe morbida cerebrum ac appendices ejus occupavit, particulæ heterogeneæ, ab ἐκπελάσσει dimissæ, uti nervos alios, ita pneumonicos aliosque affines, sc. diaphragmatis, & musculorum pectoris motui inservientes crebro subeunt; proindeque juxta quod nervi isti, a muniis rite fungendis, aut inhibentur, aut pervertuntur, respiratio difficilis varii generis producit, estque ut plurimum aut paralytica, aut convulsiva: etenim particulæ morbificæ caudices nerveos subeuntes, & circa eorundem plexus, aut extremitates uberius congestæ, spirituum copiis affiguntur: hinc aliquando accidit a tali particularum (si forsan illæ narcoticæ fuerint) cohæsione, spiritus quorundam nervorum incolas ligari prorsus, & ab actibus designatis inhiberi: unde respiratione impedita, cæteri spiritus nervorum adhuc immunium hospites, ut ipsi proprio Marte pensum commune perficiant, valde exercentur; adeoque qua licet, respirationem magis crebram, & laboriosam edunt quandoque vero spiritus, intra quosdam ex respirationis munere nervos, scatentes, copula heterogenea, explosiva, sive spasmodica afficiuntur, cuius elidendi gratia, cum illi ob plenitudinem, vel propter occasiones aliquas excitantur, motus convulsivos ineunt; proindeque pulmones cum laboriosis,



riosis, & crebrius repetitis, modo systoles, modo diastoles vicibus, paroxysmis quasi asthmaticis detinentur: in his casibus quandoque nervi diaphragmatis, interdum pneumonici, ac pectoris motus absolventes, item forsan aliquando bronchia amplectentes, ac illorum modo hi, modo isti, seorsim a reliquis, aut narcosi, aut affectionibus spasmodicis obnoxii sunt, ac propterea respirationis anomalæ variæ differentiæ, ac modi occurrunt, quarum species quasdam & exempla posthac adjiciemus. Scio quosdam prædictorum symptomatum causas vaporibus a ventriculo ejusque vicinia elevatis ascribere: quorum sententia rationibus in contrarium allatis, alibi a nobis merito rejicitur. Eugalenus, Horstius & Senner-tus, quos alii sequuntur, dyspnœæ scorbuticæ causam, a visceribus imi ventris inflatis, aut tumefactis, proindeque septum comprimentibus deducunt, non secus ac in gravidis ac hydropicis fieri assolet: attamen huic opinioni minime assentior, quia symptoma illud non raro iis evenit, quibus venter & hypochondria satis mollia, ac infra costas subsidentia, spatium pro diaphragmatis motu satis liberum concedunt, prout examine facto sæpius observavi: Quod autem lienis perturbationi respiratio difficilis passim in hypochondriacis, & quandoque forsan in scorbuticis succedat, ratio est, quia nervi splenici cum pneumonicis communicant: quandoquidem igitur utrique materia morbida sc. spasmodica obsidentur, eadem in alterutris commota, spasmos ciens, alteros in affectus consensum trahit, prout supra de passionibus hypochondriacis differens manifesto declaravi; in omni respiratione difficili, propter nervosi generis culpam excitata, pulsus ut plurimum satis fortis, at debito celerior, ac interdum intermittens existit.

3. Pectoris angustia scorbuticos nonnullos graviter infestat; cujusmodi symptoma, cum respirationem difficilem adjunctam habet, eidem causæ, nempe septi a visceribus elevatis compressioni vulgo ascribitur: At vero licet pectus interdum

*Pectoris  
angustia.*



eo ritu angustetur, ut affecti anhelosi spiritum altiore dūcere nequeunt, quin medio thorace inspiratio terminatur, tamen aliquando e contra inspiratio nimis profunde ducitur, ut laborantes ægre & difficulter expirent; quod certe nullo modo viscerum diaphragmate inferiorum anomaliis, sed vel sanguinis in corde accensione haud rite peractæ, vel potius nervorum respirationi inservientium affectioni præternaturali, attribui debet: quin par ratione etiam inspirationis difficilioris causa, ab eodem fonte deducatur: sc, in utroque casu nervi καὶ εισπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν perficientes, quatenus materia morbilica, eaque vel narcotica, vel spasmodica occupantur circa propria munera defungenda, aut nimis aut minus quam opus est peragunt. Quidam vero scorbutici interdum pectoris angustia, sine respiratione multum impedita, molestantur; sentiunt nimirum thoracis ambitum arctius constringi, ac in minus spatium contrahi: interim affecti de cordis anxietate, potius quam de pulmonum motu inhibito queruntur: hujus causa videtur esse, quod membranæ præcordia investientes, quatenus humore seroso, una tum nerveo nimis irrigatæ, instar corii madidi, contractiores evadunt: quin & earum fibræ in spasmos breviores irritatæ corrugantur nimis, proindeque partes continentes coarctari coguntur: porro hujusmodi præcordiorum coarctatio ipsius cordis motui quodantenus obsequitur: quippe dum sanguis pauperior factus, haud vegete satis cordis sinu exilit, nec aperte in pulmones deflagrat, propterea hos minus dilatari, aut expandi opus est; quinimo ut sanguinis circulationi, in minori ambitu peractæ respondeant, & exacte quadrent membranis investientibus, fibrisque nerveis ipsorum motui destinatis, quoad debiles expansionum limites regulantur: quare ista præcordiorum coarctatio, sicuti in pluribus observavi, propter gaudii & tristitiæ occasiones subito remitti ac intendi solet, nimirum juxta quod sanguis uberius, aut parcius e cordis sinu exilit, circulationi ejus spatium majus, minusve proportionatur.



4. Pulsus inæqualis, ac intermittens, item frequens leipothymia, ac ejusdem metus, scorbuto graviore sæpenumero accidunt; quorum par ratio, ac respirationis anomalæ, modo sanguinis in corde accensione indebitæ, modo nervosi generis inordinationi merito ascribitur: sanguis falsuginior factus, ac insuper sæculentiis scorbuticis valde refertus, velut ellychnii oleum, sale ac sordibus limosis imbutum, non nisi inæqualiter, ac interrupte accenditur: quare hinc pulsus irregularis, cum spirituum vitalium ctebro deliquio ciatur: Porro si quando nervi cardiaci etiam materia morbifica obsidentur, ut spirituum animalium influxus, quo cordis motus perennatur, haud justo dimenso, & æquabili ritu peragatur, propterea quidem accidit cordis motum aliquatenus inhiberi, ejusque reciprocationes varie perturbari, pulsus inæqualis, vel intermittens, & parvus ac debilis a dyscrasia sanguinis, si satis sit magnus & fortis, a functionis animalis vitio procedere videtur.

*Pulsus inordinatus.*

5. Cordis tremor, palpitatio & magni subsultus scorbutice affectis non raro contingunt; ejusmodi passiones sunt mere convulsivæ, atque a nervis cardiacis, nempe ad cor ipsum, aut pericardium spectantibus a materia spasmodica & explosiva obsessis, omnino dependent; nam spiritus animales, ipsorum nervorum, fibrarumque appendicum hospites, inordinate explosi, totam cordis compagem immaniter succuti, & locomoveri cogunt; interea dum cordis integra moles eo ritu agitur, non raro proprios systoles & diastoles motus satis recte perficit, prout in nonnullis observavi, quibus urgente tali cordis succussione, pulsus ordinatus, & laudabilis fuit.

*Passiones cordis.*

6. Febres erraticæ, nec non subitanæ caloris ac frigoris in variis partibus corporis suffusiones, scorbuto inveterato supervenire solent: priorum ratio est, quod materia extranea, sæpe cum succo nutritio sanguini illata, quinetiam ipse succus alibilis, degener factus, quatenus non rite cum sanguine miscibilis, effervescentias ejus extemporaneas

*Fe' res vagæ.*



neas concitant : interea febris typum regularem observans , istam ob causam excitari solita scorbuticis raro contingit ; quia sanguis salsugineus , licet incendio febrili correptus , haud diu , neque multum , saltem non æquabiliter deflagrat : Quoad caloris ac frigoris suffusiones subitaneas , illæ quidem aliquatenus propter nervosi generis affectus inferri videntur : quippe cum nervi ac propagines furculique nervei , vasa sanguifera , in plerisque corporis partibus , amplectuntur & varie circumligant , in istum fortassis usum , uti juxta passionum impetus , aliasquæ naturæ exigentias , sanguinis cursus , velut stimulis , & frænâs urgeatur , coerceaturque : verisimile est , quod cum a labe scorbutica regiminis animalis œconomia pervertitur , plerosque nervos & fibras eorum appendices huc illuc protensas , spasmos sive motus convulsivos passim inire , propter eorum ἀταξίας etiam arteriæ , & venæ ἀνομαλῶς contrahuntur , proinde ut sanguis in has partes plus debito compellatur , ac ab istis nimis exulat , unde caloris & frigoris ejusmodi inordinationes procedunt.

*Sudores  
nocturni.*

7. Sudores copiosi , præsertim nocturni , scorbuticis quibusdam perquam molesti esse solent ; cujus ratio est , quod cum succus nutritius in massam sanguineam quotidie illatus , propter hujus dyscrasiam , & illius impuritatem ac sordes , minime assimilatur , a sanguine rejectus , sub sudoris forma amandatur . Quod vero liquor nutritius inter assimilandum degener factus , febrem intermittentem non more suo producat , in causa est sanguinis intemperies salsuginea , qui propterea deflagrationibus periodicis minus habilis existit : hujusmodi sudatio immodica in scorbuto , febridiurnæ , aliisque morbis chronicis , superinducto potissimum contingit , ubi nimirum liquor nutritius sanguinis assimilantis , magis quam viscerum coquentium , culpa pervertitur .

*Urina lixivialis.*

8. in scorbuto , certiori , quam in aliis affectibus , diagnosi matulam consulimus : nam si absque febre , aut ictero , urina intense rubicunda , & quasi lixivialis apparet , istius morbi hoc signum indubitatum



indubitatum pronunciamus. Enimvero dum latex ferofus cum fale & sulphure solutis aliquamdiu circulatur, particulæ salinæ & sulphureæ eodem incoctæ, tincturam valde saturatam, & velut lixivalem impertiunt: quod etiam talis urina, contentis, quæ in lotio refrigerato ad fundum præcipitantur, plurimum abundat, particulis succi nutritii degeneris cum fero abreptis, omnino debetur. Sed tamen urinæ scorbuticorum sæpe variant; aliquando namque illæ citrini coloris, cum cremore innatante, aut vitri parietibus affixo apparent, unde sumitur indicium, sanguinem particulis salinis plusquam sulphureis abundare: Equidem si talis urina ad ignem exhalet, residentia salina in subdupla liquoris quantitate remanebit: Porro interdum ægrotantium urinæ de hoc, vel illo statu in contrarium mutantur, ut quæ hodie rubicunda, aut citrina sit, cras limpida & tenuis in copia ingenti excernetur: Cujusmodi lotium siquidem constat haud diu cum sanguine circulatum fuisse, (quia nullam ab eo tincturam suscipit) provenire statuimus, a sanguinis & succi nervosi recrementis aquosis, partim intra lymphæductus contentis, partim intra poros & meatus solidarum partium depositis, quæcum ad plenitudinem aggeruntur, fluore oborto, e receptaculis suis ubique exundant, inque massam sanguineam irruentia, exinde statim per renes amendantur.

9. Huic morbo ingravescenti, supervenit sputatio copiosa, & plerumque gingivarum sanguinolentia, dein earum flacciditas, ac tandem putrefactio, quam dentium erosio, vacillatio, aut casus cum oris fœtore comitari solent: Quorum ratio, ut melius constet, imprimis advertendum est, circa partes oris peculiare quosdam ductus, nempe salivales, quibus ferofi humores copiose excernantur, constitui: isti a variis glandulis, nempe parotidibus, maxillaribus & sublingualibus exorti, maxima ex parte circa gingivas, aut prope ipsas terminantur: horum munus constans & ordinarium est, salivam propter usus quosdam necessarios in cavitatem oris deponere. Præter-

*Sputatio  
copiosa &  
oris affectio-  
nes ulcerosa.*



ea tamen observare est, humores superfluos, quin & vitiosos, crassiores forsan quam ut per sudorem, urinam, aliasve vias a sanguine secernantur, hac via foras amandari. Argentum vivum salibus subactum, & deinde intus assumptum, aut corpori illitum, a salinis corporis nostri particulis minutissime dissolvitur, iisque involutum penitissime immiscetur: hujusmodi salium & Mercurii concretiones, per omnes humores, inque omnes totius corporis partes diffusas, cum natura, siquidem molestiam pariunt, expellere nititur, illarum excretionem per hæc oris emunctoria optime, & quidem facillime molitur: Etenim sanguis, & forsan aliquatenus liquor nervosus, recrementis istis mercuriosalinis onusti, eadem omnimodo excutere satagunt, quæ tamen, cum crassiora fixioraque sunt, quam ut per diaphoresin exhalent exudentve, aut a renum fermento præcipitata per urinam amendantur; illa interdum articularum oscula intestinis inserta perrumpentia aliquatenus per alvum excluduntur, attamen istius pharmaci particulæ sero obvolutæ promptissime in prædictis glandulis, aliisque ad os & gulam spectantibus depositæ, per salivationem uberius excitatam, effluunt; quo effluxu gingivas, aliasque oris partes ulcerari, atque dentes, cum foetore oris, vacillare contingit: cæterum hujusmodi salivatio interdum sine mercurio in febrium male judicatarum declinatione, criseos loco sponte succedit; atque humor excernendus non tantum apertioribus ductuum salivalium foraminibus, sed & articularum osculis ubique confitis exudans, crusta albicante oris cavitatem oblnit: Par equidem ratio symptomatum ejusmodi in scorbuto accidentium reddi debet: quandoquidem enim in sanguine depravato, salis ac sulphuris enormium recrementa plura & crassiora congeruntur, quam ut diaphoresi, vel per urinam aut sedem satis excerni possint, ad oris emunctoria, quibus saliora sanguinis purgamenta exire solent, deferuntur: salsamenta ista sero diluta, non solum e vasis salivalibus exundantia, sputationem copiosam creant, sed etiam per artie-

rias



rias advecta, molles & spongiosas gingivarum carnes subeunt, quæ primo, poris earum sanguine ichoroso oppletis, intumescunt; postea tamen, ichore salso a sanguine abscedente, & continuo excreto, gingivarum caro, propter laudabilis nutrimenti defectum flaccescit, dentes pene nudatos relinquens: porro a diuturno materiæ plane corrosivæ affluxu gingivarum caro corrumpitur, ut dentes stabilire nequeat, quin hi, alveolis dissolutis, laxantur, aut decidunt, atque ob particulas salino-sulphureas, partim humoris excreti, partimque gingivarum putrescentium, continuo expiratas, fœtor oris graveolens excitatur.

10. Maculæ in cruribus, aliisque partibus corporis erumpentes scorbuti signum pathognomicum habentur; hæc quandoque latiores, nummi denarii, non raro item solidi aream exæquant; interdum cutis ad magnitudinem manus, aut supra in parte quadam saggillarivideretur: porro maculæ istæ diversicolores, sc. modo citrinæ, modo obfuscae, modo purpureæ, lividæ aut nigræ apparent: porro quibusdam exanthemata variæ extumescencia, sc. modo lævia, modo cum cute aspera, & quasi crusta, aut squamis obducta in his aut istis membris vel in toto corpore erumpunt: inter maculas & exanthemata, five tumida & æqualia, five aspera fuerint, hoc discrimen in genere annotetur, nempe quod hæc materiam sanguini minus congruam continent, quare a massa ejus in circuitu secreta in cute defiguntur; nec tamen eadem prorsus a sanguine derelinquuntur, quin sanguis pertransiens particulas subinde alias, novasque apponit: quo fit ut materia extravasata, a continuo sanguinis appulsu vel denuo resorbeatur, vel subtiliata foras exhalet, (licet interdum partim hævia, partim illa res agatur) vel denique materies ista suppurata in abscessus transit. Porro exanthemata cujusque fere generis, non tantum in scorbuto, sed in plerisque aliis affectibus, immo si quando sanguis propter occasiones aliquas immo-dice ebullit, passim eveniunt. At vero maculæ sunt portiones a sanguine secretæ, & ab eodem

*Maculæ &  
exanthemata va-  
ria.*



prorsus derelictæ, adeo ut nihil illis cum sanguine circulato deinceps commercii fuerit; quare nec in molem accrescunt, nec suppurantur, nec facile evaporant: maculæ citrinæ aut obscuræ videntur esse bilis flavæ aut atræ portiones quædam e sanguine in cutim suffusæ: quoad stigmata vero nigra aut purpurea advertere est, eadem in nullis præterea affectibus, nisi in febre pestilentiali, lue venerea, & scorbuto excitari: in peste & febribus malignis videntur esse sanguinis syderati, & velut ~~vexati~~ affecti, partes quædam rejectæ, quibus semper malignitas & contagium adjunguntur, pro ut alibi fufius ostendimus: in lue venerea & scorbuto etsi non tanta malignitas reperiatur, ut spiritus sanguinis valde mortificentur, ejusque liquor syderationes majores ineat, tamen suspicari fas sit, quod in utroque morbo ingravescente, sanguis aliquatenus corrumpi & coagulari aptus, in grumos minores concreascit; cujusmodi sanguinis concretiones arteriarum osculis extrusæ, in cute desiguntur, & juxta quod portiones istæ majores aut minores fuerint, & cruoris plus aut minus corrupti participant, etiam maculæ quoad magnitudinem & colorem insigniuntur.

*Alvi fluxus.*

II. Alvi fluor & diarrhœa in scorbuto satis frequenter accidunt, in tantum ut fæces alvi, quæ modo liquidæ sunt, modo compactæ & diversi-colores, alimenta ingesta in quantitate excedere videantur. Cujusmodi fluxus, licet immodicus apparet, si medicamentorum usu sistitur, statim affecti, ventriculi, & hypochondriorum intumescencia, dyspnœa aut animi deliquio tentari solent. Diarrhœæ scorbuticæ causa est, partim quod chylus non recte coquitur, neque per vasa lactea cito ac satis effertur; hinc in intestinis stagnans & degener factus foras amandatur, præcipue vero hoc contingit, quod e massa sanguinea impuritates interius admissæ arteriarum osculis exudant; quapropter excreta interdum ingestis copiosiora existunt.

*Vomitus, nausea, &c.*

II. Pari ratione, crebro vomitui, rugitui nausea, & cardialgiæ scorbutici æque ac hypochondriaci



aci obnoxii reperiuntur : quæ quidem symptomata frequenter in hoc morbo accidunt, partim quia stomachi tonus labefactatur, ejusque fermentum vitatur, quo fit ut chyli male concocti reliquæ in pulvem austeram, falsam, vitriolicam, aut alias degenerem faceffat : præterea tamen stomachus male habet, quoniam & sanguinis recrementa interius restagnantia, in sinum ejus suffunduntur.

13. Nonnunquam affectus dysenterici, item crebræ hæmorrhagiæ e naribus, venis sedalibus, renibus, thorace, gingivis, aliisque locis scorbuto inveterato laborantibus succedunt : cujusmodi symptomatum causa est, quod sanguis falsior factus, proptereaque effervescente aptus, vasorum osculis facile erumpit; præcipue vero, quia cum partium solidarum tonus debilitetur, atque fibræ sint valde laxæ, vasorum ora fiunt patentiora, & discontinua, ita ut ex arteriarum extremitatibus in venarum oscula transitus non recta ducat, quin sanguis inter vasorum aperturas interceptus, ibidemque stagnare, & diffuere aptus, qua data via, facile erumpit, & se foras proripit.

*Dysenteria  
& hæmorrhagia.*

Hæc sunt præcipua symptomata, quæ propter labem massæ sanguineæ impressam, & exinde in alias partes immediate translatam, scorbutus inferre solet, quorum aliquibus tamen in causæ partem, etiam liquoris nervosi depravatio accedit: Jam proxime consideremus hujus morbi effectus & accidentia, quæ fere tantum, aut potissimum succi nervosi culpa excitari solent.

## CAPUT.



## CAPUT IV.

*Symptomata & accidentia quæ, in scorbuto, propter labem cerebro & nervoso generi impressam, exoriri solent.*

*Fusillanimitas, & totitas corporis languor.*

1. **S**upra innuimus, ingravescente scorbuto, liquorem cerebri & nervosi appendicis irri-  
guum, solito tenuiorem & pauperiorem evadere, quo fit ut pleræque functiones animales præpedire admodum ac minus vegete exerceantur; hinc potentia locomotiva plurimum vacillat, ut affecti otium, & secessum amantes, corporis exercitia, & labores devitent, pensa quævis ægre suscipiant, eaque statim delassati remittant. Novi quibus tota anima sensitiva debito exilior, & quasi corpori impar facta videbatur, adeo ut ægri se nec ambulare, nec stare posse credentes, lecto excitari, aut exurgere omnino recusarent; cum tamen nulla evidens causa impediret, quin sua munera satis exequi valerent: porro tales utut prius ingeniosi, etiam animi labores, & studia abhorrent, & plane nihil agendo vitam conterere affectant.

*Melancholia.*

2. In scorbuto inveterato, succus nervosus a crassi spirituosissima, versus acetosam declinat; hinc, prout alibi ostendimus, melancholia, animi fluctuatio, propositi inconstantia & crebra mutatio procedunt: porro cum fibræ nervæ a tali humore influo perpetuo irritentur, hinc leviores spasmus, contracturæ, & dolores vagi aliquatenus eveniunt: At vero maximum liquoris nervosi visum esse solet, quod fordibus, & sæculentiis refertus, particulas heterogeneas, & regimini animali diversimode infestas contineat: quapropter affectus sæpe graviores, & horrendi scorbuticis contingunt; cujusmodi sunt symptomata sequentia.

3. *Affectus*



3. Affectus paralytici, sc. impotentia, aut resolutio unius, aut plurium membrorum, item stupor, & fornicationis sensus scorbuto ingravescenti crebro superveniunt: cujusmodi tamen symptomata, ut plurimum non sunt valde fixa & permanentia, verum modo cessant, aut remittunt, mox repetunt, aut intenduntur. Scorbutica paralytis potissimum ob tria causarum genera excitari solet, quæ sc. modo conjunctim, modo divisim hunc morbum producant. 1. Etenim membri debilitas aut resolutio contingit, quia succo nervoso depauperato, spirituum animalium, quibus membra quævis actuentur, penus sive copia sufficiens desideratur: Hinc valetudinariis, tanquam senio confectis, circa crura & pedes, aliasque interdum partes extremas, ad quas spirituum influxus haud satis ubertim pertingit, facultas locomotiva vacillat: postea forsan, cum major spirituum affluxus membro affecto confertur, ac interim alibi deficit, morbus cessat, aut alio transfertur. 2. Interdum spiritus animales, etsi copiose satis in partes suppeditantur; tamen particulis heterogeneis, & quasi narcoticis, cum succo nervoso illatis inficiuntur; ita ut quasi ligati, & semiobrutī, nixus explosivos vegete satis inire nequeunt: hinc non solum impotentia facultatis motivæ, verum & sensitivæ depravatio quædam, sc. stupor & fornicationis sensus oriuntur: quippe dum spiritus animales copula incongrua aggravantur, eorum irradiatio, haud aliter quam solis radiorum nebulosum aerem pertranseuntium, non nisi refracte & impeditè peragitur, 3. Licet spiritus animales uberi satis copia dispensentur, sintque narcosi quavis immunes, & liberi, sæpe tamen illorum viæ obstruuntur, ut intra membra quædam commercia spirituum influorum, & infitorum commode peragi nequeant; namque interdum accidit, particulas crassiores, & terrestres nervorum corpora cum succo irriguo subire, quæ dein alicubi circa plexus nerveos, aliosque anfractus plenius aggestæ ductus in tantum infarciunt, ut spirituum in hoc aut illud membrum irradiatio prorsus inhibeatur.

*Paralytis  
scorbutica.*

*Ob tria  
causarum  
genera.*

Ita



*Dolores  
quorum  
varia sunt  
species.*

Ita novi in aliquibus manum, aut pedem, quin & brachium aut femur, reliquo corpore valente, penitus resoluta evasisse.

4. A simili causa, sc. sæculentiis scorbuticis, in nervorum corpora delapsis, etiam dolores, qui frequentissimum hujus morbi symptoma habentur, aliquatenus procedunt; attamen cum varii sint generis, etiam propter alias præterea causas oriuntur. Enimvero dolores scorbutici sunt vel leviores, incerti, ac cito transeuntes, qui interdum a flatu membranas distendente, quandoque etiam a materia falsa, vel acri, modo a sanguine, modo etiam a liquore nervoso, in partes nerveas suffuso dependent; cujusmodi materies, quatenus fibris nerveis improporcionata, eas vellicat, ac in corrugationes irritat, dolorifica evadit: in quantum vero eadem vel a sero affluente cito eluitur, vel a calore dissipatur, sensatio molesta a tali causa illata facilius dimovetur. Vel secundo dolores scorbutici graviores sunt, plurimum acuti, difficulter mobiles; cujusmodi item, vel sunt fixi & determinati ad particularem quandam locum, aut vagi, molestiam, utut gravissimam, ab uno loco subinde in aliam transferentes; prout cernitur, in arthritide vaga, scorbutica & rheumatismo, de quibus infra speciatim differemus: interim dolores fixi, & diu permanentes, in variis partibus, præcipue vero in ventre, lumbis, cruribus, sterno, ac capite excitari solent: Operæ pretium videtur pathologiam, ad singula hæc loca pertinentem, breviter describere.

*1.  
Dolor ventris fere  
continuus.*

1. Dolor ventris scorbuto adeo familiaris est, ut juxta idioma Germanicum, exinde nomen acceperit. Hoc symptoma nonnullos affectos, in mitiori licet gradu, fere continuo affligit; cui alvus modo soluta, modo summe astricta adjungi solet: quorum ratio esse videtur, quod cum & sanguis, & succus nervosus impuritatibus scatent, tum arteriæ, tum nervi materiæ excrementitiæ copiam versus alvi cloacam deferunt, quæ circa mesenterii, aut intestinorum tunicas defixa, fibras nerveas perpetuo vellicando, dolores constantes ciet.

Cæterum



Cæterum vero in quibusdam scorbuticis dolorum valde acutorum paroxysmi, tamquam affectiones colicæ frequenter eveniunt; qui per plures dies, immo interdum septimanas protracti, laborantes miserrime excruciant: nimirum hi, præ doloris atrocitate, viscera quasi divelli, & dilacerari sentiunt: tormenta hæc vix ullis remediis nisi generosioribus opiatis, compesci solent, & quam primum hypnoticorum virtus absumitur, cum solita atrocitate repetunt; paroxysmo vero diutius persistente, cruciatus sæpenumero in lumbos & dorsum propagentur, & exinde demum in membra totius corporis diffundantur: cujusmodi affectioni non raro paralysis succedit. Quod autem spectat ad colicæ scorbuticæ causam; haud probabile est, eam oriri ab acri materia, intra cavitates intestinorum depolita, nec etiam ab humore quopiam simplici, utut tetro, illorum tunicis impaeto: hic etenim brevi discutiatur, aut in abscessum transeat, porro iste enematum, aut purgantium usu facile exterminetur: reverea atrociam istæc ventris tormina, non ob aliam causam quam a salium (qui diversæ sunt indolis) simul congre-dientium mutua lucta, & effervescentia, qua quidem fibræ nervæ ab invicem divellanrur & quasi dilacerentur, provenire possunt. Enimvero supponere licet, succi nervosi recrementa quædam acetosa, stigmati vitriolici æmula, circa mesenterii plexus, aliasve istius regionis partes nerveas, copiose aggesta, quibus dein a sanguine arterioso effervescente colluvies serosa, salis fixi & velut lixivialis particulis abunde referra, advenit, cumque iis turgescens, dolores velut lancinantes producit. Seminii morbidi prioris mineram e capite nervorum ductu in imum ventrem descendere, hinc arguere licet, in quantum cephalalgia immanes, nec non vertigo, & scotomia ejusmodi colicam sæpissime præcedunt, eique non raro succedunt: Porro e massa sanguinea particulas salis fixi, quasi deliquium passas, abunde suppeditari, hinc constat, quoniam urgente hujus morbi paroxysmo, ægrotantium urinæ coloris saturati & sale

2.  
*Dolores  
quasi colici.*

*Eorum  
causa.*



fale plurimum refertæ, quasi lixiviales apparent, earumque superficies sæpenumero, instar caudæ pavonis, diversis coloribus variegatur: quamprimum vero morbus declinare incipit, urina melius habet, atque hinc convalescentiæ spes & signa desumi solent. Quod autem ventris affectio sæpenumero in lumbos propagetur, ratio est, quoniam nervi lumbares & mesenterici intime communicant, ac pluribus in locis mutuo inosculantur: quare cum materies dolorifica in horum ductibus superabundat, in vicinos illorum processus facile transit: deinde autem, quod morbo ingravescente, dolores per totum corpus diffusi, singula fere membra ac artus affligunt, ratio est, quia cum uberior seminii morbidi penus in capite progignitur, quam ut totus in nervorum imprimis affectorum, sc. paris vagi & intercostalis, caudices, derivari possit; pars ejus, aliorum insuper nervorum, etiam spinalis medullæ corpora subiens, in plurimas totius corporis partes mineram morbificam, salis acetosi participem, explicat, quæ ubique salis fixi e massa sanguinea accessu ἀλγυμω-τῶδες evadit; denique postquam nervis una plurimis materia incongrua, sc. post mutuas humorum effervescentias residua, obsessis, & valde repletis spirituum copia profligatur, emanationum viæ obstruuntur, eorumque mutua commercia abruptuntur, nihil mirum est, si diuturni dolores ultimo in paralyfin terminantur. Nec tantum in medio ventre, ubi circa mesenterii plexus causa morbifica subsistere videtur, sed in aliis circumcirca locis dolores, colicis haud inferiores, exoriri solent. Novi virginem nobilem cruciatibus acerrimis, prope os pubis, supra mensis spatium durantibus, & pro data occasione repetere solitis, absque ulla calculi, aut ulceris, circa vias urinarias, suspitione obnoxiam fuisse: Cujusmodi affectionem a materia morbida, plexibus nerveis in hypogastrio confitis impacta, dependere arbitramur. Porro familiare est scorbuticis in hypochondrio, modo dextro, modo sinistro, modo circa ventriculi regionem, dolorum valde atrocium paroxysmos.

*Dolores in  
variis ab-  
dominis  
partibus.*



smos experiri: quorum causas in plexibus nerveis ad viscera ibidem loci consita pertinentibus, latere putamus.

2. Dolores scorbutici interdum lumbos, quin & dorsi regionem, modo summam, modo imam, absque prævio abdominis affectu, vel nephritidis culpa infestare solent. Novi plures a tali ægritudine decumbentes, aliquot dies & noctes de cruciatu intolerabili perpetuo conquestos: Cujusmodi pathematis causam, in liquoris nervosi recrementa acetosa, istarum partium membranarum & tendinibus suffusa, ac dein falsamenti sanguinei accessu in effervescentiam concita, referre visum est.

*In lumbis,  
& dorso.*

3. Propter ejusmodi salium conjugia, membranarum præcordia investientibus affixa, dolores circa pectoris regionem perquam molesti, & non facile mobiles, crebro inducuntur; hinc pleuritis notha adeo frequens scorbuti symptoma est. Novi plures scorbuticos dolore molestissimo, subter sternum excitato, perquam diu vexatos; ut in quibusdam ita affectis, nihil minus quam abscessum in mediastino latentem suspicarer, cum revera symptoma istud tantum a materia heterogenea, illuc partim a nervis, partimque ab arteriis allata, & membranarum affixa ibidemque effervescente penderet: quod & eventus sæpe comprobavit: nam ægrotantes diuturno remedium antiscorbuticorum usu liberabantur.

*In pectore  
& pleura.*

4. Hactenus præcipuas dolorum, intermedias corporis partes infestantium species, recensuimus. Cæterum in scorbutico non minus molestiæ circa partes extremas, sc. caput & crura, sentitur. Quoad prius, cephalalgia morbo isti tam raro deest, ut multi potissimum hoc affectu virus scorbuticum luant; cujus nempe mali paroxysmis gravissimis, longo tempore protractis, & crebra vice repetitis, obnoxii fiunt. Hujus causam unicuique obvium est, humoribus in meningas suffusis ascribere; quod etiam *avro. 4/a* comprobavit. Nam in quorundam defunctorum cipitibus apertis, utraque membranas coalitas, & tuberculis, ac tumoribus

*In capiti.*



moribus scirrhis per totum obfitas vidi. Cujusmodi tumores & concretiones, a gemini humoris dolorifici, post crebras effervescentias, mutuis coagulationibus, exoriri videntur.

*In cruribus.*

5. Nec quidem aliter statuendum erit circa dolores ægrotantium crura & tibias, nocturno præsertim tempore, gravissime molestantes: plures etenim scorbuto inveterato laborantes, quamprimum lecto incalescunt, circa furas & femora, atque alias interdum partes, cruciatus intolerabiles pari solent, ita ut inclament, carnes suas, velut canum morsibus, aut laniena corrodere, ac dilacerari: Tortura hæc, si lecto eximantur, paulo remissius habet, secus affecti, per totas fere noctes miserrime excruciantur. In hoc casu nihil aptius concipi potest, quam succi nervosi recrementa acetosa in tibias, utpote in loco maxime declivitas, decumbere, earumque membranis copiose affigi, quibus, a sanguine, propter lecti calorem, insignius rarefacto, & agitato, dum rejectanea salina accedunt, cumque iis, pro salium more, fermentescunt, propterea quidem, a mutua particularum diversi generis lucta & effervescentia, fibræ nervæ supra modum vellicatæ, & divulsæ, corrugationes valde dolorificas ineunt, nec quidem citius *ἀλγέματα* hæc cessant, aut remittunt, quam particulæ, tunc aggestæ, aut evaporant, aut mutua lucta subactæ & attritæ ab effervescentia conquiescunt, subinde vero intra breve spatium, utriusque materiæ penus recens in novum paroxysmum deponitur. Propter hujusmodi salium diversi generis, & ab humore duplici prodeuntium *σζυγίας*, mutuatque effervescentiam, etiam arthritidis vaga, rheumatismus, & quidam alii affectus, quos merito ad conjunctas sanguinis & succi nervosi dyscrasias, & velut in malo confæderationes, referimus, producantur. Porro in eadem classe dolorum scorbuticorum species quædam modo tractatæ poni debuerant: attamen quia doloribus aliis, a singulari succi nervosi aut sanguinis vitio oriundis, affines sunt, idcirco affectionum *ἀλγέματῶδων* theorias diversimodas hic simul conjunximus.

In



In scorbuto, prout symptomatum diversi generis confluxus occurrit, ita & materies morbifica multiplex, & variæ indolis progignitur: sc. particulæ heterogeneæ, cerebrum & nervosum genus cum succo irriguo subeuntes, modo sunt narcoticæ & paralyseos, modo salinæ & dolorum parentes, (uti dictum est) quandoque etiam, nitrosulphuræ & explosivæ, a quibus affectiones spasmodicæ oriuntur: Enimvero propter hujusmodi particulas, in cerebro aggestas, vertigines, scotomiæ, ac interdum insultus quasi comitiales, scorbuticis contingunt: A tali causa, genus nervosum occupante, in visceribus & membris, motus convulsivi, tremores, succussiones, & non raro contractiones horrendæ succedunt. De convulsionum natura, differentiis, & causis supra satis fuse differuimus. Porro hujus affectionis casus quosdam admirandos, a labe scorbutica oriundos, plene descripsimus, ut non opus videatur super hac re jam plura differere, namque hypothesi superius tradita, quibusvis scorbuti symptomatis spasmodicis facillime accommodetur.

6. Scorbuto inveterato laborantes vertigini ut plurimum valde obnoxii fiunt: super hoc affectu, uti & de plerisque aliis cephalicis, disquisitiones speciales, aliquando forsan publici juris faciendas, instituimus. Interim hic verbo annotetur, symptoma istud oriri, eo quod spiritus animales de solitis expansionum suarum viis aliquatenus pervertuntur, nempe statas suas series, & ordines vel impediti, vel alio propulsi, abrumpere coguntur: hæc, uti in aliis casibus, ita præsertim in scorbuto, propter duas potissimum causas, nempe alteram, aut simul utramque fieri contingunt; sc. vel quia cerebri meatibus & poris quibusdam, ab hospite extraneo occupatis, spirituum commeatus alicubi obstruitur; vel secundo spirituum manipuli quidam copula heterogenea onusti, aut pone reliquos subsistere, vel tractibus suis excedere coguntur: In hoc morbo, siquidem a sanguine valde impuro, liquor cerebro instillatus, plurimas feculentias secum refert, qui secus fiat, quin particulæ

*Vertigo:*



culæ heterogenæ cerebri poros passim infarciant, atque spiritibus animalibus accrescendo, eos aggravent, aut in explosiones adigant?

*Somnolentia.*

7. Propter similem fere causam, somnolentia, & torpor insignis scorbuticis frequenter accidunt, in quantum sc. spiritus animales particulis vel aquosis aut narcoticis onusti, ac plurimum aggravati, intra cerebrum, etiam valde obstructum, motus pernices, & expeditos non facile ineunt, neque functionum suarum actus & exercitia diu continuant, quin succumbere, ac otio, & quieti indulgere amant. Porro hujusmodi affectus, quandoque a spirituum animalium defectu & penuria excitatur; etenim a sanguine plurimum vitiato, & quasi effæto, liquor, non nisi tenuis, & vigoris omnis fere expers, cerebro & nervoso generi suppeditatur; a tali  $\pi\rho\phi\acute{o}\varsigma$  in moribundis lethargum excitatum novi; quo sc. affecti, licet somno continuo indulgere viderentur; interpellati tamen, illico adstantes noscere, & affatis quibusvis respondere solebant; spirituum vero animalium copia fatifcente, nec diu evigilare, nec ad colloquia longiora attendere valebant. Tales demum cum somno perpetuo obrutos aperui, cerebrum satis exiccum, ac hydrope, aut colluvie serosa, quibus lethargici plerunque afficiuntur, prorsus immune deprehendi.

*Et vigilia.*

Interdum vero e contra, scorbutici quidam vigilia fere constanti molestantur. Cujusmodi symptoma, aliquando ab animi affectibus, dolore, pathematis convulsivis, leipothymias metu, passionibus cordis, etiam a stomachi, aliorumque viscerum perturbationibus, procedit; in quantum sc. ob spiritus in quapiam animæ sensitivæ parte vehementius commotos, tota eorum hypostasis, a quiete, sive statu tranquillo ineundo, detinetur. Novi autem quosdam labe scorbutica tactos, qui licet dolorum, aut spasmodum immunes fuerint, etiam animi affectu quovis immodico liberi, per plures tamen septimanas dies & noctes prorsus vigiles duxerunt, ac sæpe, opiatas validioribus licet assumptis, ne tantillum somni capeßere potuerint:

Interim



Interim ac si somno minime carerent, sine capitis gravitate, absque sensuum aut mentis torpore, usque vegeti, atque ad labores obeundos satis expediti perstiterunt. Hujus ratio videtur esse, quod interdum una cum succo nervoso, particulæ quædam nitrosalinæ, naturæ, sc. efferæ & irrequietæ, (cujusmodi sunt effluvia ab aqua forti, aut spiritu nitri decedentia) spiriribus accrescentes, eos perpétim agitari, ac indefinenter in motu esse cogunt: quemadmodum enim vapores ab aquis stygiis emanantes, nunquam prorsus figuntur, aut quiescunt; ita particulæ heterogenæ, quæ istiusmodi sunt indolis, spiritibus cerebri incolis adhærentes, eos fere nunquam otiosi, aut somno indulgere sinunt. Hæc sunt præcipua symptomata, quæ in regimine animali, propter scorbuticam labem, liquori cerebri, & nervorum irriguo impressam, excitari solent; quibus præmittuntur illa, quæ sanguinis a recta crasi degeneris vitio contingunt. Quod spectat ad magnos istos, & plane Herculeos morbos, nempe apoplexiæ, & epilepsiæ insultus, qui interdum scorbuticis accidunt: in hujusmodi casibus, prior affectio, quasi alteri digniori maritata, nomen suum amittit, ac in illius pathologiam, velut prosapiam transit. Ultimo inquiramus quæ sunt scorbuti symptomata, propter conjunctas sanguinis & succi nervosi dyscrasias, & veluti in malo confederationes repululantia,

## CAPUT V.

*De scorbuti symptomatibus, quæ propter conjunctas sanguinis & succi nervosi dyscrasias oriuntur.*

**I**N hoc censu imprimis collocetur atrophia scorbutica, qui enim hoc morbi diutius laborarunt, absque notabili pulmonum labe, aut phthiseos suspicione, sæpe in marasimum incidunt, ita ut carnes prorsus decendant, ac cutis valde flaccescens vix ossibus

I:  
*Atrophia  
scorbutica.*



ossibus cohæreat. Cujus causa non tantum sanguinis a recta crasi degeneris culpæ attribui debet, namque hic, utut depravatus, aliqualem succi nutritii portionem plerumque assimilât, partibusque enutriendis apponit: at vero, siquidem liquor nervosus etiam male habet, facultas nutritiva omnino inhibetur; quin hujus defectu, aut vitio, nutrimentum a sanguine elaboratum prorsus infœcundum ac inutile existit: Quo munere, circa nutritionem, uterque liquor, sc. sanguineus, & nervosus defunguntur, alibi ostendimus: ex hypothefi ista, quam rationes satis probabiles astruere videntur, facile sequetur, atrophiam scorbuto familiarem, a conjunctis utriusque facultatis nutritivæ anomaliis pendere. Quatenus enim sanguis alimentum non nili vitiosum suppeditat, atque liquor nervosus in eo actuando, assimilandoque delinquit, necesse erit partes solidas victu suo, contiuuo fraudatas emarcescere.

2.  
*Arthritis  
scorbutica  
vaga.*

2. Arthritis scorbutica, quæ ut plurimum vaga, partem modo hanc, modo istam successive, modo simul plures afficit, atque ab una in aliam, vel ab his in illas transilit, a duplici seminio, non secus ac colica superius descripta, pendere videtur, attamen modo prorsus inverso. Enimvero supponere licet in hoc morbo, salis fixi plures quasi congeries e massa sanguinea, hic illic circa membra, aut articulos, velut totidem nidos disponi, quæ quidem intra totidem distinctas cellulas reconditæ, tanquam piscium ova, sive semen foemininum maneant, quibus postea liquoris nervosi recrementa acetosa, velut semen masculinum accedant, easque fertiles reddant, nempe in quantum sales diversæ indolis una commisti, valde effervescent; proindeque a mutua particularum lucta & agitatione, membranæ, fibræque nervæ insigniter vellicatæ, in corrugationes dolorificas aguntur. Révera primam hujus morbi, sicut etiam arthritidis communis, mineram a massa sanguinea deponi, eamque a succi nervosi recrementis actuari, inde constat, quia cum dolorum insultus in variis partibus simul, aut successive oriuntur, sanguis



guis haud supra modum effervesce, nec salsamenta sua tunc temporis deliquium passa, copiosius exuere videtur; quippe nec pulsus citior, neque urina lixivialis evadit. Attamen urgente paroxysmo, acetosa succi nervosi recrementa fluorem pati, arguunt prægressæ ut plurimum cephalalgia, capitis gravedo, aut vertigo, membrorum inquietudines, & non raro tendinum subsultus, cujusmodi symptomata dolorum insultus sæpe præcedunt, aut comitantur. Huc etiam spectat, quod liquores acidi epoti, paroxysmos erthriticos accerfunt. In scorbuto, siquidem utraque minera uberius progignitur, arthritidis nidi longe plures jaciuntur, in iisque dolores multo citius pullulant: porro e sanguine valde impuro materies salina, sive tartarea, non tantum in pedum, aut crurum articulis, sed ubique fere circa membranas, & musculorum interstitia aggeritur; cui etiam a succo nerveo copula acetosa, pluribus in locis suffusa, dolorum prolifica existit; dein quatenus utraque minera, in materia minus crassa consistit, atque in locis patentibus colligitur, brevi ut plurimum tempore, aut a sero affluente eluitur, aut a calore dissipatur, vel a sanguine resorpta, alio transfertur.

3. Rheumatismus, prout ab authoribus modernis describitur, scorbuto inveterato crebro supervenit. Cujusmodi affectio, dolores fere in omnibus corporis partibus, seriatim excitans, licet arthritidi vagæ modo descriptæ similis apparet tamen ab ea differt, tum respectu dolorum, qui in rheumatismo citius transeunt, & crebrius sedem mutant, iisque febricula, & partium affectarum tumor, & phlogosis ut plurimum adjunguntur, tum ratione causæ conjunctæ, quæ quidem isti, quæ colicam scorbuticam parit, affinis, arthritidis vagæ causæ inversa est: videtur enim quod in primum hujus morbi apparatus, minera acetosa, a succo nerveo, quasi semen foemininum, pluribus in locis deponatur; cujusmodi symbolis hic illic varie relictis, dum sanguis effervescens exuvias salinas copiose rejectas suffundit; statim a mutua

particu-

3.  
Rheuma-  
tismus.



particularum dissimilium lucta, & congressu, dolores inferuntur. Porro quia sanguinis recrementa, in medio suo decursu exposita, motum ejus aliquatenus impediunt; idcirco in parte affecta tumor & phlogosis inducuntur. dein quia sanguis materiam a se modo rejectam denuo resorbet, ac alio transfert, dolorum ita crebræ metastases ac mutationes contingunt. Hæc affectio peculiarem considerationem meretur: super eadem hic pauca quædam in genere, quatenus nimirum scorbuti symptoma est, annotasse sufficiat.

Haftenus scorbuti symptomata, a triplici causarum genere oriunda explicavimus; cujusmodi pathologia affectus alios multiplices, ac inter se longe diversos, in se continet: de quibus tamen observatu dignum est, quod cum plures morbi, ad cerebrum & nervosum genus pertinentes, qui sæpenumero per se, ac solitarii existunt, etiam scorbuto superveniunt; tamen quoad rationes suas formales, & quoad medendi methodum in his ac illis adhibendam, discrimen insigne occurrit. Enimvero paralyfis, vertigo, convulsio, lethargus aliique morbi affines, cum per se contingunt, semper a causa fixiori, ac ut plurimum ab insigni capitis ac appendicis nervosi labe, dependent; cumque remedia cephalica, ac in istis morbis tantum appropriata, conveniunt, tamen successus haud facile, neque semper votis respondet. Interim pro sanguinis emendatione aut parum curæ impenditur, aut si adhibetur, plerumque incassum cedit: at vero cum pathemata istæ a scorbuto inducuntur, minoris sunt periculi; atque licet paroxysmos crebriores habent, isti tamen facilius transeunt; cæterum morbi curatio remediis antiscorbuticis felicius quam specificis, & cum sanguinis ad debitam crasim reductione, potius quam cerebri & nervosi generis malis occurrendo, perficitur. Eadem observatio locum obtinet in tumoribus, ulceribus, hydrope & multis aliis affectibus a lue scorbutica productis, qui, secus ac cum per se excitantur, remediis non nisi antiscorbuticis sanantur. Horum ratio est, quod in scorbuto, symptomatum & affectu-

*Ut differunt morbi per se excitati, & scorbuto ἐπιγινώσκονται.*



affectuum plurimorum causa conjuncta, fere tantum in humoribus, nempe sanguine & succo nervo, ac nondum in partibus solidis, sc. visceribus, præcordiis, accerebro consistit, quare cum illorum dyscrasie multo facilius quam horum malæ conformationes emendantur, ejusdem generis morbi, propter scorbutum, quam per se excitati, certius, ac cum minore negotio curantur. Attamen cum, ægritudine ista radices altiores agente, partes etiam solidæ principales (prout sæpius usu venit) noxam contrahunt; vid. cum sanguinis & succi nervosi recrementa iisdem diutius impacta, tonos lædunt, poros, & meatus infarciunt, & non raro in iis tumores scirrhosos, aut abscessus pariunt; hinc prædicta symptomata, quamvis labi scorbuticæ fere tantum imputata, raro aut nunquam sanationem admittunt; & propter hujusmodi causam invincibilem, demum ipse scorbutus deploratus evadit.

## CAPUT XI.

*Scorbuti prognostica.*

CUM in affectione scorbutica, simul plura, ac interdum valde tetra, & horrenda symptomata urgere solent, prognosticon a medico expectatur: immo ipse, quo melius medendi methodum instituat, qualis morbi eventus futurus sit, sedulo perpendat: attamen judicia in hoc casu sint cauta, diu suspensa, ac minime temeraria; plures enim (uti nostræ observationi consistit) pro desperatis habiti, convaluerunt. Vidi quos frequens & horrendum asthma jamjam suffocare videretur, alios a crebra leipothymia continuo moribundos, quin & alios, aut paralyfi, aut paroxysmis convulsivis, aut colica gravissima tentatos, intra breve spatium, medicamentorum ope prorsus liberatos: Novi quosdam scorbuticos ab hydropo per totum corpus intumefactos, alios atrophiam in extremam maciem redactos, denuo ad perfectam sanitatem restitutos. Quamvis igitur

*In scorbuto  
prognosis  
non sit temeraria.*



hoc morbo laborantes, interdum affectibus summe periculosis urgentur; si tamen adhuc viscera mediocriter sana, aut saltem non multum vitiata fuerint, de malis istis, propter meram scorbuti labem excitatis, minime desperetur: e contra autem quando symptomata minus terribilia apparent, si hypochondriorum & abdominis contenta obdura & velut scirrhusa evaserint, aut si pulmones corrumpi inceperint, circa morbi sanationem nihil ingens, aut benignum promittatur: In casibus vero nondum doploratis, ubi spes valetudinis recuperandæ relinquitur, aut saltem mortis subitæ metus longe abest, si forsan quæstio fiat, quam cito, aut tarde, facile, aut difficulter therapeia succedat, hujusmodi criteriis insistatur.

1. Scorbutus uti non statim affectos jugulat, aut versus statum insanabilem præcipitat, ita nec cito, nec facile curatur: etenim morbi causa potissima, in dyscrasia sanguinis consistens, non multo facilius tollitur, quam vina, dum rancida, aut pendula fiunt, ad debitam crasin restituuntur: quare hujus labe correpti per plures menses, ac interdum annos, immo aliquando per totam vitam ejus noxam luunt.

2. Ægritudo hæc ab intemperie sanguinis sulphureosalina, sive calidiori vini rancidi æmula, dependens, ægrius curatur, quam si eadem a dyscrasia salinosulphurea, sive minus adusta, vini penduli æmula procedat: namque hæc mala sanguinis, aut vini constitutio, in statum a quo decidit, quodammodo rursus evehi; verum ista in statum, quem transiit, non facile reduci solet.

3. Scorbutus febribus diuturnis, aliisque morbis chronicis male curatis superveniens, aut etiam constitutioni originaliter, vel propter occasiones quasdam, valetudinariæ superveniens, difficilioris curationis habetur; quia nimirum in his casibus, & sanguinis crasis plus vitiatur, non raro item visceribus noxa quædam affigitur. Proxime his, ægre sanantur, qui mala victus ratione, ac imprimis ab assiduo liquorum generosiorum potu,



tu, labem hanc cum læso ventriculi, aliorumque viscerum tono contraxerunt: attamen qui propter contagium, aeris insalubritatem, navigationem, aut vitam sedentariam scorbutici evadunt, sæpius & cum minori negotio sanitati restituuntur.

4. Hic morbus adhuc recens, quamdiu labes fere tantum massa sanguinea inclusa, nondum cerebro ac nervoso generi imprimitur, neque in solidis partibus symptomata durabilia excitavit, non raro sanationem perfectam admittit: sin vero affectio radices altiores agens, in regimen animale propagatur, ibidemque pathemata spasmodica ac dolorifica producit, ac insuper virus suum, macularum & exanthematum eruptione, gingivarum & dentium erosione, aliisque signis pathognomicis latius prodit, vix unquam radicitus extirpatur; quin præcipua medicinæ opera, symptomatis maxime urgentibus occurrendo, eorumque incrementa, & extremitates supprimendo, impenditur.

5. Qui scorbuto inveterato laborantes, modice vivere recusant, sed malefano appetitui, in pessima quævis proclivi, indulgent: ac insuper in assumendis remediis difficiles ac morosi existunt, medici operam, utut sedulo adhibitam sæpissime eludunt; revera ut præstet, eos malo suo genio relinquere, quam medicamenta utilia, hic omnino incassum præscripta, defamare.

6. Quandoquidem, hoc affectu ingravescente, materies morbifica multiplex, & diversimoda, utpote symptomatum varii generis, ac indolis causa progignitur; idcirco remedia non tantum unius generis adhibentur: sed cum medicinæ methodus quædam, licet cum summo judicio præscripta, parum aut nihil versus therapeiam profuit, non statim relinquendi sunt ægri, sed medicamenta alia, & subinde alia tententur: Enimvero non eadem omnibus, neque semper eidem personæ conveniunt: In corpore affecto salium ac sulphurum potestates, & combinationes passim variant; perinde etiam medicamenta minus



juvantia aliquoties mutantur, donec in aliquod maxime congruum & juvans inciditur.

2. Quod si non obstante, aut non recte adhibito remediorum usu, scorbutus sensim ingravesens in deteriorem statum indies evehatur; tandem hydropem vel phthisin inducit; ab hoc, aut illo morbo proximus in mortem fit transitus: postquam enim sanguis plurimum depravatur, recrementa sua, copiosius demum aggesta, aut pulmonibus, aut imi ventris visceribus suffundit; proindeque hujus aut illius generis affectus pariter exitiales accersit.

## CAPUT VII.

### *De scorbuti curatione.*

*Indicatio  
triplex.*

*I.  
Præserva-  
tio.*

Quod spectat ad scorbuti therapeiam, siquidem haud unica & simplex affectio præternaturalis, sed legio quædam profliganda est, idcirco mendedi methodus indicationes multiplices, easque varie complicatas, ac subordinatas perfringere debet: quas tamen vulgari modo ad tria hæc capita referre visum est: nempe ut sint præservatoriae, quæ morbi causam, & curatoriae, quæ morbum ipsum & symptomata ejus respiciunt & tollunt, & denique vitales, quæ patientis robur ac vires tuentur vel restaurantur.

Ab ipso curationis initio contra morbi causam collimare debemus; hac enim, velut radice præcisa vel avulsa, statim truncus, rami, & fructus emarcescent. Cum itaque ostendimus, scorbuti causam in sanguinis dyscrasia, sc. aut sulphureo-salina, aut salino-sulphurea fundari: imprimis danda erit opera, quo melius illa, tum hujus, tum illius indolis, emendetur: in hanc rem, primo impedimenta tollantur, dein ipsa primaria intentio perficietur: propter utrumque scopum remedia a Diæta, Chirurgia & Pharmacia expetuntur. Quoad Diætam, specialis victus ratio inferius apponetur; interim ut de reliquis procedamus.

Sanguinis, ad debitam crasin per remedia appropriata



priata reductio, propter hæc duo potissimum impeditur; sc. primo, quia succi nutritii, non nisi vitiosi penus ei continuo infertur; dein secundo, quia recrementa in sinu ejus producta, per idoneas cloacas non satis amendantur. Itaque providendum erit, tum ut chyloseos negotium in primis viis recte peragatur, tum ut recrementa vaporosa per diaphoresin, serosa per renes & lymphæductus, biliosa per cystin felleam, atrabilia per lienem, atque alia cujusque præterea generis, per propria emunctoria satis expurgentur: dein hisce muniis rectius institutis, sanguinis dyscrasiam, per medicamenta specifica, ac imprimis sale volatili prædita, reducere nitemur. Remedia singulas hæc intentiones respicientia una complicari, ac simul in usum adhiberi debent: quo tamen ritu, ac quibus administrationum modis, adhuc particularius designare oportebit.

1. Ut chylosis in primis viis recte perficiatur, curandum erit, ut materiæ excrementitiæ saburra in iis congesta exterminetur, ut fermenta deperdita, aut depravata restituantur, ut meatus & pori quomodo infarcti & obstructi referentur. In hos fines medicamenta cathartica, digestiva & aperientia, destinantur.

*Intentiones  
therapeuti-  
cæ.*

2. Excrementa in massa sanguinea collecta, cum per propria emunctoria non satis amendantur, per alias vias maxime idoneas subinde educantur: in hanc rem etiam cathartica, ac insuper diaphoretica, & diuretica conveniunt.

3. Sanguinis dyscrasia scorbutica emendetur, phlebotomia & remediis specificis. Quare, ut indicationis præservatoriæ, res tota in summam redigatur, remedia quæ præcipuas ejus intentiones perficiunt, sint cathartica, phlebotomia, digestiva, aperientia, diaphoretica, diuretica & antiscorbutica, sive specifica: Dein quatenus remedia digestiva, ac aperientia sæpius concidunt; siquidem utraque particulis acidis, acribus, aut salinis præcipue imbuuntur; porro, in quantum ejusmodi pharmaca diaphoresin, aut diuresin apte satis movent; idcirco apparatus pharmaceuticus, inten-



tionibus prædictis requisitus, in angustiores adhuc limites redigi potest: nimirum ut fere tantum constet medicamentis catharticis, digestivis, ac antiscorbuticis, quibus phlebotomia pro data occasione adjicitur: illorum formulas quasdam, & præscripta, ac insuper utendi modum, designare incumbit.

## CATHARSIS.

*Catharsis.*

I. Methodus medendi scorbuticis fere quibusvis præscripta, a catharticis incipiat: Etenim nisi primæ viæ mundantur, medicamenta in alios quosvis usus destinata, ab illorum fordibus inquinabuntur, quapropter vomitio interdum non minus quam purgatio conveniat.

*Per vomitum.*

Si ventriculus (ut crebro affolet) materia viscida acescente, aut nidorosa aggravatus, tarcinam impuram nausea aut vomendi nixu sursum ejicere molitur, atque patiens talem evacuationem olim satis robuste ac cum *ευφορία* tolerare solebat, nihil yetat, modo vires non sint nimium prostratæ, pharmacum emeticum exhibere. Fortioribus, infusio croci metallorum, aut Mercurius vitæ, aut tartarus emeticus Mynsichti, vel sulphur antimonii Glauberi propinetur: qui sunt constitutionis imbecillæ, aut tenerioris, vinum scilliticum, aut Gillam Theophrasti assument: quibus in exigua dosi exhibitis, serum lactis in magna copia superbibant, dein ventriculo ad nauseam repleto, digito vel penna gutturi immisissis, vomitio facillima provocatur, & aliquoties pro libitu iterari potest. Hoc vomendi ritu mera stomachi contenta, a plicis ejus deterfa excernuntur: neque in aliis circumcirca visceribus, aut membranis (prout a stybiatis fieri solet) vellicationes dolorificæ, aut convulsivæ cum leipothymia ciuntur. Quibus ventriculus, propter malam digestionem, pituitæ, aliufve materiæ degeneris saburram facile congerit, præcepi (& sæpius bono cum successu) ut semel in mense, talem vomitionem, utpote tutam, & salubrem proritent.

Ubi



Ubi vomitio locum non habet, a purgatione in- *Perseces.*  
 epiatur; saltem posito aliquot dierum interstitio, *sum.*  
 evacuatio hæc isti succedat. Quod olim de præ-  
 paratione humorum ab authoribus passim incul-  
 catur, aut supervacaneum, aut, non intellecta  
 sanguinis circulatione, prorsus erroneum esse du-  
 co: quin istius intentionis vice, viscerum fermenta  
 restaurantia, & sanguinis crasin alterantia, sub-  
 stituantur: interim ut primarum viarum fordes  
 & liquoris tum sanguinei, tum nervosi superflui-  
 tates recrementitiæ amendantur; Purgatio primo  
 lenis & blanda instituat, ac postea juxta patientis  
 tolerantiam, aut semel intra septimanam, aut cre-  
 brius vel rarius iteretur; & medicamenti vires  
 juxta primæ doseos successum proportionentur:  
 In hunc finem pilulæ, potiones, apozemata, electua-  
 ria, pulveres, & plures aliæ medicamentorum for-  
 mularum præscribi solent.

Si ægrotantis constitutio sit calidior, atque scor- *R. media*  
 butus in sanguinis dyscrasia adusta, sc. sulphureo- *indicata*  
 salina fundari videtur, aloetica, & diagrydiata *in sortuto*  
 quævis vitentur, & temperatiora solum e senna, *calidiori.*  
 rabarbaro, & aliis quæ sanguinem & humores  
 non exagitant, exhibeantur.

℞. Folior. sennæ ʒj. rhabarb. ʒvj. epithymi *Pilula.*  
 ʒiij. rad. polypodii qu. rhabarb. Anglicani ficut.  
 an. ʒβ. santali citrini ʒij. spicæ celticæ ʒβ. salis  
 absynthii ʒij. incisa & contusa digerantur in ma-  
 tracio calore arenæ cum vini albi, & aq. fumariz  
 an. ℥ij. (vel cum aq. magistralis antiscorbutici  
 nostri ℥ij.) per duos dies, colatura clara evapore-  
 tur lenissimo balnei calore, ad consistentiam mellis  
 dein adde pulveris foliorum sennæ, rhabarb. an. ʒj.  
 β. specierum diatriæ santalæ ʒj. cremoris tartari  
 ʒj. β. f. massa pilularis. Dosis ʒβ. ad ʒj.

Vel paretur talis infusio, quæ evaporetur leni ca- *Syrupus.*  
 lore ad consistentiam syrupi, addendo circa finem  
 mannæ colatæ, & sacchari albissimi an. ʒij. fiat  
 syrupus. Dosis cochlear j. ad ij. cum vehiculo con-  
 venienti.

℞. Ejusmodi tincturæ ʒiiij. vel vj. pro dosi exhi- *Tinctura.*  
 beantur,



*Tassula-  
rum.*

'beantur, addendo cremoris tartari ʒß. & si edul-  
'coratione opus sit, syrupi de pomis ʒiij.

'Vel tincturæ præscriptæ imponantur uvarum co-  
'rinthiacarum mundatar. ʒvj. digerantur calide, do-  
'nec uvæ intumescant, quibus exemptis, liquor ad  
'syrupi consistentiam evaporetur, addendo sacchari  
'& mannæ colatæ an. ʒj, ß. dein uvis denuo impo-  
'sitis, medicamentum in vase vitreato probe obtu-  
'rato servetur. Dosis cochlear j. vel ij.

*Electuari-  
um.*

'Vel tincturæ præscriptæ ad medietatem evapo-  
'ratæ adde cassiæ recentis, pulpæ tamarindorum  
'cum aqua antiscorbutica extractæ an. ʒiij. conservæ  
'violarum rosarum damascenarum an. ʒij. pulv. sen-  
'næ compositi majoris ʒj. rhabarb. pulv. ʒß. cremo-  
'ris tartari, specier. diatriœ santalœ an. ʒij. simul  
'terantur in mortario lapideo, donec redigantur in  
'formam electuarii. Dosis qu. nucis juglandis, plus  
'minus, juxta operationis successum.

*Pulvis.*

Quibus stomachus nauseabundus, pharmaca  
non nisi in exigua quantitate, ac forma eleganti,  
admittit. R. Resinæ scammonii gr. iiij. ad viij.  
cremoris tartari ʒß. spicæ celticæ gr. vj. misce f.  
pulvis, detur in cochleari panatellæ, vel in pilulas  
formetur.

*Cathartica  
in scorbuto  
frigidiori.*

Qui affectione scorbutica laborantes, frigi-  
dioris sunt constitutionis, atque morbus in san-  
guinis diathesi nitrosulphurea, vini penduli æ-  
mula, fundari videtur, iis cathartica asperio-  
ra, & particulis calidioribus prædita exhibean-  
tur.

*Pilula.*

R. Pilular. stomach. cum gum. ʒij. resinæ jalap.  
'gr. 20. tartari vitriolat. gr. 16. olei juniperi ʒß. cum  
'f. q. ammoniaci solut. in aq. lumbricor. f. pilulæ 16.  
'sumantur quatuor pro vice, semel intra septima-  
'nam.

R. Pilular. tartar. Bontii ʒj. ß. resinæ jalap.  
'gr. 12. salis tartari ʒß. cum f. q. syrupi Angustani:  
'f. pilulæ 12.

*Extractum  
ac syrupus.*

R. Extract. pilular. Ruffi ʒj. extracti hellebori  
'nigri ʒj. salis tartari ʒß. cum f. q. ammoniaci so-  
'lut. f. pilulæ 9. sumantur iij. pro dosi.

R. Folior sennæ ʒj. rhabarbari ʒvj. mechoacæ,  
turbith.



\*turbith.gum.an.ʒβ. fibrarum hellebori nigri ʒiij.  
 \*salis tartari ʒij. fantali citrini ʒj β. corticis Win-  
 \*teran. ʒij. incif. & contuf.digerantur in vini albi  
 \*ʒij. per duos dies. f.colatura clara fine expreffione  
 \*fumatur vel per fe ab ʒv ad ʒvj. vel in extractum,  
 \*aut fuprum, aut electuarium redigatur, prout  
 \*tinctura fuperius defcripta, addendo pulv. arthri-  
 \*tici, vel diafenæ q. f. &c.

\*Vel paretur hujusmodi tinctura, quæ detur viris *Tinctura.*  
 \*robustis ad cochlear j. vel jβ. R. Salis tartari ʒj.  
 \*ſpiritus vini tenuioris ʒij. β. digerantur donec fla-  
 \*veſcat: huic a ſecibus per inclinationem effuſæ, in-  
 \*funde folior. hellebori nigri in aceto macerat. ʒj.  
 \*fantali citrini ʒj. flavedinis aurantii ʒj. β. f. di-  
 \*geſtio clauſa & calida per tres dies. Colatura clara  
 \*deſtilletur in balneo ad medietatem, liquor reſiduus  
 \*ad uſum ſervetur.

\*R. Rad.lapathi acut. polypodii qu.urticæ uren- *Apoſema.*  
 \*tis, cherifolii, an. ʒvj. folior.eupatorii, veronicæ  
 \*an. M. j. ſantal. albi, citrini an. ʒj, β. carthami  
 \*ʒj. tartari vini albi ʒβ. coquantur in aq. fontan.  
 \*ʒij. β. ad medietatem, adde vini Rhenani ʒij. &  
 \*ſtatim coletur, cui impone ſennæ opt. ʒβ. rhabarba-  
 \*ri ʒvj. folior. hellebori nigri ʒβ, flavedinis auran-  
 \*tii ʒij. f. infuſio clauſa & tepida per horas 12. Cola-  
 \*tura ſervetur in vitro occluſo. Doſis ʒv. ad vj.

In promptu hic eſſet, plures alias catharticonum  
 formulas ſubjicere; verum in his non magna va-  
 rietas requiritur: e prædictis aut hæc, aut illa,  
 quæ melius conveniunt, exhibeantur, & ſubinde in-  
 tra quinque aut ſex dies, prout occaſio requirit,  
 iterentur. Nimis crebra, & violenta purgatio vires  
 proſternit, viſcerum robur valde labefactat, atque  
 morbum interea non tollit.

Post unam aut alteram purgationem, ſi miſſio *Phlebotomia.*  
 ſanguinis indicatur, aut phlebotomia in brachio, aut  
 hirudinum ſuctu in venis ſedalibus celebretur:  
 non multum intereſt, quæ vena ſecetur: nec enim  
 ſalvatellæ apertio tanti, prout vulgo perhibetur  
 meriti eſt. Quod inter authores magnis ambagi-  
 bus de vena aut jecoraria, aut cephalica, alia quavis  
 potiori, in ſcorbuto incidenda, a quo ſanguinis cir-  
 culatio.



culatio innotuit, in nihilum recidit. Phlebotomia indicatur a sanguinis copia & vitiositate, quem præstat aliquoties in quantitate modica, quam semel in magna educi: Cum enim liquor sanguineus valde impurus evasit, nullo remediorum genere certius emendatur, quam crebra & parca extramissione: quippe sanguini vereri corrupto, quoties educitur, recens melior, & defæcator succedit. Interim cautione opus est, ne semel in quantitate nimia subtrahatur, nam penu ejus confertim diminuto, sanguificatio labescit, propterea ut hydrops aut cachexia sequatur.

Præter catharsin, & (si opus fuerit) phlebotomiam, plura alius generis remedia, non minus necessaria in scorbuto requiruntur: de quibus tamen ordine præscribendis, statim considerare oportet, utrum indicationes solum præservatoriæ hic locum habent, ac annon iis curatoriæ quædam, nempe quæ symptomata gravius urgentia respiciunt, intercalari debent: Quod si vacat, in morbi causam, totam therapeias operam impendere, juxta methodum sequentem procedatur: Inferius ostendetur, quali interea symptomatum (si forsan occasio exigit) cura adhibenda sit.

Itaque si præcipuam medicinæ operam, in scorbuti causam imprimis, ac per se eradicandam, impendere liceat, propter hunc scopum, insuper remedia digestiva & specifica, seu antiscorbutica, prout modo innuimus, omni tempore, exceptis purgationis diebus, usurpentur: quibus interdum, si opus fuerit, diaphoretica, aut diuretica adjiciantur. Medicamentorum hujusmodi intentiones perficientium formulæ, & præscripta multiplicia, ac varii generis apud authores passim extant. Libet hic selectiora quædam apponere, quæ quidem juxta duplicem causæ scorbuticæ indolem, nempe sanguinis dyscrasiam sulphureosalinam & salino-sulphuream, in duas classes distinguere visum est: & primo, quæ in hoc posteriori affectionis modo conveniunt, ubi nimirum medicamenti incitatione quadam præditis, atque sale volatili plurimum refertis, opus est, trademus.

Remedia



Remedia digestiva, quæ ventriculi fermentum *Digestiva.*  
restituunt, ejusque ac aliorum viscerum chylosi  
inservientium, functiones juvant; atque antiscor-  
butica, sive specifica, quæ sanguinis dyicrasiam tol-  
lunt, aut in eadem compositione junguntur, aut  
saltem eodem die successive assumantur.

Inter medicamenta digestiva merito recensentur  
tartari cremor, chrystalli, sal, tinctura, tartarus vi-  
triolatus, chalybeatus, Elixir proprietatis, mixtura  
simplex: Cujusvis horum, bis in die exhibiti,  
usus sæpenumero prædest.

Porro tincturas & elixires magistrales, varii ge-  
neris, & digestivas & scorbuto appropriatas, cum  
duobus mensuris sequentibus facile conficies.

℞. Spiritus vitrioli rectificati ℥vj. spiritus vi-  
ni alcholisati ℥xvj. misce, & destilla in retorta  
vitrea cum ternis cohobiis: in vitro probe occluso  
ad usum serva: Elixir proprietatis cum hoc men-  
struo composito facilius, & melius, quam vulgari  
modo paratur.

℞. Corticis Winteran. ligni aloes. rad. galangæ  
minoris, an. ʒij. cinamomi, caryophyllor. cubeba-  
rum an. ʒj. seminis ameos, nasturtii an. ʒβ. contusis  
affunde prædictum menstruum ad supereminenti-  
am 3 digitorum; digerantur in matratio in furno  
arenæ per 6 dies. Colat. servetur in vitro occluso.  
Dosis gut. 20. plus minus in cochleari vini Canarini  
vel aq. appropriatæ. Exhibeatur bis in die.

℞. Succini albissimi, gummi hædæ, carannæ,  
tacamahacæ an. ʒj. croci ʒβ. caryophyllor. nucis  
moschat. an. ʒij. contus. affunde prædictum men-  
struum, & s.a. extrahatur tinctura. Dosis gut 20.  
ut supra.

℞. Salis tartari cærulei ʒiiij. digerantur in ma-  
tratio cum spiritus vini alcholisati ℥ij. ad extra-  
ctionem tincturæ: hoc sit aliud menstruum, quo e  
gumm. aromatis, &c. eodem modo, uti cum priori  
menstruo elixires parabis.

Dum hujusmodi remediis in dosi perexigua ve- *Specificæ,*  
speri, & primo mane exhibentur, horis medicis, sc. *sive anti-*  
octava ante, & quarta p.m. alius generis medica- *scorbuticæ.*  
menta antiscorbutica sumantur, quæ quidem ut  
plurimum



plurimum in duplici forma, nempe in solida & liquida, simul capienda præscribere solemus, ita ut solido premisso, liquidum superbibatur: utriusque variae extant species, & compositionis modi, vid. in forma solida, electuaria, confectiones, pulveres, pilulae & tabulae: in liquida, sunt decocta, infusiones, expressiones, aq. destillatae, vina & cerevisiae medicatae: Cujusque horum generis medicamenta se lectiora quaedam proponemus.

## ELECTUARIA.

℞. Conservae cochleariae, absynthii Romani, fumariae an. ℥ij. pulv. cort. Winterani, rad. angelicae, Ari an. ʒij. spec. diatrion fantal. ʒj. β. pulv. oculor. cancri ʒj. salis absynthii ʒij. Cum s. q. syrupi e corticibus citri. f. electuarium.

℞. Conservae folior. cochleariae, beccabungae cum aequali parte sacchari fact. an. ℥iij. trochiscor. de capparibus, de rhabarbaro an. ʒij. salis absynthii, cochleariae an. ʒj. eboris pulv. corallii calcinat. an. ʒj. cum s. q. syrupi e succo cochleariae. f. electuarium.

Præscribere soleo conservas e cortice exteriori limoniorum & aurantior. item e floribus purpureis arboris fraxini, e foliis & floribus cardamines, e radice lapathi acut. & rhabarbari Anglicani, cum aequali parte sacchari parandas, quae inter se, aut aliis conservis, & speciebus permixtae ejusmodi electuaria ingrediuntur.

℞. Conservae flavedinis aurantium, limoniorum, flor. fraxini an. ʒij. pulv. rad. contrayervae ʒj. β. galangae minoris ʒβ. rad. Ari ʒij. spec. aromatici rosat. ʒj. salis absynthii ʒij. cum s. q. syr. conditurae nucis moschat. f. electuarium. Dosis hujusmodi medicamentorum qu. nucis moschat. superbibendo liquorem appropriatum.

Rusticis & pauperioribus, a quibus medicamenta facile parabilia, & minus cara expetuntur, ad hunc modum præscribo. ℞. Folior. cochleariae, beccabungae an. ℥iij. sacchari albissimi ʒviiij. simul contendantur in mortario addendo pulv. cort. Winterani



Winterani ꝑ. tartari cum nitro calcinati ꝑij. cum  
f. q. vini Hispanici, redigantur in electuarium. Dosis  
qu. nucis juglandis bis in die, superbibendo liquo-  
rem appropriatum.

℞. Foliorum cochleariæ ℥j. passular. exacinat.  
sacchari albißimi, an. ℥ss. sæcul. rad. raphani  
sylvestris ꝑij. simul contundantur in mortario, &  
redigantur in formam electuarii. Dosis qu. nucis  
juglandis, bis vel ter in die.

## CONFECTIO NES.

℞. Pul. Ari compos. ꝑj. cort. Winterani pulv.  
ꝑss. specier. diatrion santal. trochisc. de capparibus,  
an. ꝑij. salis absynthii, cochleariæ an. ꝑj. ꝑ. fla-  
vedinis aurantii condit. ꝑij. simul terantur in mor-  
tario, dein adde sacchari alb. solut. in f. q. aq. lum-  
bricor. ꝑij. f. a. f. confectio.

℞. Rad. eryngii, & scorzonæræ condit. an. ꝑij.  
nucum jugland. myrobalanor. condit. an. no. ij. e-  
lectuarii de sassaphræ ꝑvj. pulv. cubebar. carda-  
mom. an. ꝑij. pulv. rad. zedoariæ, angelicæ an.  
ꝑj. ꝑ. salis absynthii ꝑij. cum f. q. syrup. condituræ  
nucum juglandum. f. confectio.

℞. Pulv. rad. Chinæ, ligni sassaphræ an. ꝑss.  
santal. citrini, albi an. ꝑij. sem. erucæ, cubebar. na-  
sturtii, granor. paradisi an. ꝑj. ꝑ. spec. dialaccæ,  
cinamoni, iridis, galangæ minoris an. ꝑj. salis ab-  
synthia ꝑij. conservæ flavæ inis aurantii, & saccha-  
ri anthosati. solut. in f. q. aq. limacum, an. ꝑij.  
f. a. f. confectio. Dosis qu. nucis moschat. bis in die,  
superbibendo liquorem appropriatum.

In quibusdam scorbuti casibus, ubi chalybis u-  
sus indicatur, aut chalybis cum sulphure præparat.  
ꝑij. aut vitrioli Martis ꝑij. cuilibet e præscri-  
ptis, aut confectiõni, aut electuario adjiciantur,  
& post medicamentum aut semel, aut bis in die  
assumptum, corpus pro ratione virium exercea-  
tur.

Medica-  
menta  
chalybeata.



## PULVERES.

℞. Pulv. Ari compositi ʒj. β. cort. Winteran, ʒβ. cubebar, granor. Paradisi, cardamomi an. ʒij. salis absynthii ʒiij. tabular. aurantior ʒiij. f. pulvis. Dosis ʒj. in liquore appropriato.

Pulveri prædicto, adde nucleorum fructus Indici cacao ʒβ. in mortario calido redigantur in massam sive pastam. Dosis ʒij. eo ritu quo confectio chocolate assumitur, sc. in aq. fontan. cum foliis rosmarini, aut betonicæ, aut radice scorzonæræ, aut etiam rasura eboris, vel C. cervi incoctis.

## PILULÆ.

Quibus medicamentum in dosi minori, & forma pilulari magis arridet. ℞. Rad. serpentariæ Virginianæ, contrayervæ an. ʒij. cort. Winteran. cubebar. sem. erucæ. an. ʒiij. salis absynthii, cochleariæ, an. ʒj β. extracti, sive rob. juniperi ʒβ. c. f. q. syr. condituræ nucis moschat. fiat massa. Dosis pilulæ iij. bis in die, superbibendo liquorem appropriatum.

## TABULÆ.

Pro delicatioribus tabulæ, sive trageæ ad hunc modum præscribantur. ℞. Pulv. cort. Winteran. oculor. cancri an. ʒj. β. margarit. pulv. ʒβ. sacchari albissimi solut. in f. q. aq. lumbricor. & ad tabulat. coct. ʒvj. sp. cochleariæ ʒij. f. a. f. tabulæ quæ singulæ pendant ʒβ. capiat circiter ʒj. bis in die superbibendo liquorem appropriatum.

Tabulæ aurantior. quæ in pharmacopoliis Oxoniensibus prostant.

℞. Cort. aurantior. limoniorum, citri, condit. an. ʒj. rad. eryngii condit. ʒβ. nucleorum pini, pistach. an. 20. amygdalar. dul. excorticat. no. ʒ. sem. anisi pulv. ʒβ. Zinziberis condit. ʒij. spec. aromatic.



\*aromatic. rofat. nucis moschat. an. ʒj. β. rad. galangæ ʒj. caryophyllor. n. x. ambræ griseæ gr. iij. moschi, zibetæ an. gr. ij. sacchari albissimi solut. in aq. rosar. & ad tabulat. coct. ℥j. β. l. a. f. tabulæ.

Hæc de medicamentis in forma solida, sive substantia crassiori scorbuticis exhiberi solitis: quorum virtus ut melius, & cum majori emolumento, in massam sanguineam deferatur, iis ut plurimum liquida superbibenda præscribuntur. Quamvis horum & magna extat varietas, & diversimoda componendi ratio; præcipua tamen, & usitatissima sunt qualia supra innuimus, & cuiusmodi singulorum modo formulæ subjunguntur.

*Medicamenta liquida.*

### 1. Decocta.

Et si decocta sunt maxime familiare medicamentorum liquidorum genus, in scorbuto tamen rarius usurpantur, quia simplicia, quæ huic morbo præcipue conferunt, uti cochlearia, beccabunga, &c. virtutes suas, a sale volatili acceptas, coctione amittunt: attamen quoniam remedia hoc ritu facile ac cito parantur, interdum admitti debent; quin eorum nonnulla efficacia fuisse, experientia comprobavit. Pro rusticis & pauperibus, medicamentum hoc paratu facillimum a plerisque authoribus commendatur. ℞. Folior. nasturtii aquatici M. iij. acetosæ minoris M. ij. concisa macerentur in lactis ℥vj. & coquantur ad tertiæ partis consumptionem. sumantur ʒvj. ad viij. bis in die. Decoctum absynthii ab Eugaleno & aliis laudatur. Remedium sequens, cum bono successu ego sæpius expertus sum. ℞. Summitat. genistæ M. iij. minutim incis. coquantur in cerevis. fortioris ℥iij. ad medietatem, exhibeantur ʒij. ad iij. bis in die.

### 2. Infusi.



## 2. Infusiones.

Infusio decocto superaddita, medicamentum utilissimum præstat. ℞. Rad. scorzonæræ, cherefolii an. ʒj. folior. eupatorii, chamæpytios an. M. β. C. cervi usti ʒij, passular. M. β. coquantur in aq. fontanæ lb ij. ad tertiæ partis consumptionem, adde vini Rhenani lb β. & statim coletur in vas vitreum, cui imponantur folior. cochleariæ, beccabungæ contus. an. M. β. cort. aurantii condit. & minutim incis. ʒ β. f. infusio clausa & calida per 6 horas. Colatura servetur in vasis occlulis. Dosis ʒvj. bis in die post medicamentum solidum.

℞. Seri lactis, cum vino albo, aut pomaceo facti lbj. β. huic incoquantur rad. bardanæ, eryngii condit. an. ʒvj. baccar. juniperi condit. ʒ β. liquor ad tertiæ partis consumptionem decoctus coletur in lagenam, cui imponantur folior. cochleariæ, beccabungæ an. M. j. f. infusio calida, & clausa per horas 6. Dosis lb β. bis in die post medicamentum solidum.

Infusiones item per se factæ nonnunquam egregii sunt usus. ℞. Folior. cochleariæ M. j. rasuræ rad. raphani sylvestris M. β. cort. Winteran. contus. ʒij. ponantur in vitro cum vini albi, aut pomacei, & aq. cochleariæ an. lbj. fiat infusio in cella per duos vel tres dies. Dosis ʒvj. ad viij. bis in die, ut supra.

## 3. Succis &amp; expressiones.

Commendatissimus herbarum aut fructuum antiscorbuticorum usus est, ut illarum succi, & expressiones per se, aut cum aliis liquoribus appropriatis, bis, aut ter in die assumantur: sic enim remedii virtus integra, ac illibata exhiberi præsumitur.

℞. Folior. cochleariæ, nasturtii aquatici, beccabungæ an. M. iij. contusis exprimatur succus, servetur in vitro occluso. Dosis ʒj. β. ad ʒiij. bis in die in haustulo cerevisiæ, vini, aut aq. destillatæ.

℞. Folior. cochleariæ M. iij. acetosellæ M. ij. contusis



contusis exprimatur succus, qui vitro occlusus  
breui clarescet: namque acetositas lujulæ præcipi-  
tat crassiores cochleariæ partes. Idem succedit, si  
succus aurantior. succo cochleariæ permiscetur. Do-  
sis ℥ij. vel iij. bis in die.

℞. Folior. cochleariæ M. iij. beccabungæ, nastur-  
tii an. M. ij. piperis longi ℥iij. rasuræ raphani syl-  
vestris ℥ij. simul omnia contus. ponantur in olla  
vitreata cum vini Rhenani, vel Hispanici, si potius  
videtur, ℥ij. orificio probe occluso, stent in cella  
frigida per ij. dies, dein f. expressio fortis. Dosis  
℥iij. bis in die, post medicamentum solidum.

℞. Folior. cochleariæ M. iij. beccabungæ, nastur-  
tii, lujulæ an. M. j. contus. affunde aq. limacum, &  
lumbricor. an. ℥vj. f. expressio fortis, quæ servetur  
in vitro occluso. Dosis ℥ij. bis in die,

#### 4. Syrupi.

Propter eandem rationem, qua decocta, etiam  
syrupi in scorbuto minus probantur, in quantum  
sc. simplicium maxime efficacium virtus, intra  
coquendum evaporat: quia tamen aliquibus pro  
liquorum appropriatorum edulcoratione tali me-  
dicamento interdum opus esse videtur; præpara-  
tionem hic nostram, reservatis qua licet ingre-  
dientium viribus, proponemus.

Itaque ℞. folior. cochleariæ hortensis M. vj. corr.  
4. aurantior. & duor. limoniorum tenuiter deraf. ra-  
sur. rad. raphani M. β. piperis longi pulv. ℥iij. om-  
nibus simul contusis exprimatur succus, qui statim  
vitro probe obturato inclusus, collocetur in cella  
frigida, donec per subsidentiam clarescit: dein li-  
quor clarus per inclinationem in vitrum aliud ef-  
usus, & occlusus, in calore Balnei m. detineatur, in-  
terim pro singulis unciis. ℞. Sacchari ℥j. β. ejusque  
tota quantitas cum parum aq. lumbricor. dissolutæ,  
ad tabulat. coquantur, cui mox liquor prædictus ca-  
lidus sensim affundatur & cum spatula agitetur:  
Quamprimum incorporatur, compositio igni exi-  
matur, & frige facta vitro imponatur. Hic nodulus  
in vitro suspendatur. ℞. Cinamomicontus. ℥j. β. sem.  
nasturtii, erucæ pulv. an. ℥j. misce.



5. *Aqua destillata.*

Aquæ destillatæ, quia sunt elegans & jucundum remedium, inter præscripta antiscorbutica fere utramque implent paginam. Harum dispensationes quædam in nostra pharmacopœa perquam utiles & concinnæ habentur, ut sunt aq. Raphani composita, lumbricor, & limacum magistralis. Præterea extant celebres hujusmodi aquarum præscriptiones a Quercetano, Dorncrelio, Sennerto, Doringio, aliisque Authoribus traditæ. Insuper unicuique Medico in promptu est tales cujusque ægrotantis conditioni appropriatas, pro re nata præscribere: recipiuntur enim ingredientia antiscorbutica, ac insuper accidentia quædam, & affectus particulares, respicientia, quibus concisis & contusis liquor idoneus, sc. vinum album, pomaceum, aut serum lactis ex utrovis paratum, affunditur: dein tota mixtura in cucurbita, aut in organis rosaceis destillatur. Libet hic formam unam, aut alteram nobis usitatas subungere.

℞. Folior. cochleariæ utriusque, beccabungæ, nasturtii aquatici, summitatum genistæ an. M. iiij. foliorum chamædryos, chamepytios an. M. ij. rad. raphani sylvestris ℥ss. Ari, angelicæ, imperatoricæ, an. ℥iiij. cortices externæ quatuor aurantior. & totidem limoniorum, radic. calami aromatici ℥j. cinamomi, caryophyllor. an. ℥ss. contusis, & concisis affunde pomacei opt. ℔viiij. digerantur per duos dies in olla vitreata occlusa: dein distillantur in communi distillatorio: aquæ primo, & ultimo advocatæ, misceantur.

Tempore brumali, cum herbæ virides sunt rariores, juxta hunc modum præscribatur. ℞. Folior. cochleariæ M. iiij. summitatum genistæ, pini, juniperi an. M. iiij. cort. mediani sambuci, fraxini an. ℥iiij. rad. raphani sylvestris, polypodii qu. an. ℥iiij. cortices quatuor aurantior. & totidem limoniorum, cort. Winteran. ℥iiij. contusis & concis. affunde vini albi vel pomacei, vel seri lactis cum alterutro facti. ℔viiij. distillantur.

Aq.



Aq. simplex folior. Ari verno tempore distillata contra scorbutum efficax remedium est, si ℥iij. vel iiij. bis in die cum alio medicamento exhibeantur.

Aqua simplex cochleariæ, foliis recentibus contusis reaffusa, & extillata, adeoque crebris cohobis iterata, efficax remedium evadit. Porro cochleariæ spiritus ardens ad hunc modum paratur. ℞. Folior. cochleariæ q. s. contusa in pilas, quales ex glasto pro Tintor. usu parari solent, fermentur, dein pilæ istæ in olla vitreata, aut aq. cochleariæ, vel vino ejusdem ad quatuor digitorum supereminentiam affusa, per tres aut quatuor dies exacte clausa in loco frigido detineantur: dein tota materies, alembico imposito destilletur: aqua destillata cucurbitæ indita rectificetur: primo exibit spiritus ardens, cujus gut. 15. vel 20. in idoneo vehiculo propinentur.

#### 6. *Vina & cerevisia antiscorbutica.*

Vinum antiscorbuticum simplex egregii usus ad hunc modum parare soleo. Verno, aut æstivo tempore. ℞. Folior. cochleariæ sub sereno cælo collector. q. v. succo e contusis expresso, doliolum iij. aut iiij. congiar. capax impleatur, flor. cerevisiæ cochleari j. vel ij. impositis per duos dies fermentare sinatur: dein vas occlusum in cella vinaria per 6 menses collocetur: dein liquor clarus, ac instar vini Hispanici flavescens, in utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat. Dosis ℥iij. vel iiij. bis in die.

Vina medicata, quorum cyathus unus aut alter horis medicis, aut etiam inter prandendum quotidie assumantur, ad hunc modum parentur. ℞. Folior. cochleariæ M. iiij. rasuræ raphani sylvestris ℥iiij. cort. Winteran. contus. 3℔. cortices exteriores quatuor aurantior. & totidem limoniorum ponantur in vitro, cum vini albi, Rhenani aut tenuioris Hispanici ℔xij. vas obturatum servetur in loco frigido: vinum effundatur clarum quoties usus opus est.

Usitatus.



Usitatus est allam, aut cerevisiam medicatam scorbuticis pro potu ordinario constanter bibendam præscribere. Paretur cerevisia pro doliolo quatuor congiarum capaci: vice florum lupuli incoquantur summitatum pini, vel abieris M. iij. post fermentationem in doliolo peractam, imponentur folior. cochleariæ M. iij. rad. lapathi acut. præparat. ʒiiij. cortices quatuor aurantior. postquam per septimanam subsidentia inclaruit, potui exponatur.

Hujusmodi cerevisiæ cum aliis ingredientibus medicata, juxta patientis temperamentum, & affectionem diversimode parari possunt: quo remedii genere, siquidem particulæ medicamento-  
sæ, sanguinis dyscrasiam alterantes, massæ ejus una cum alimentosis continuo inferuntur, in tollenda scorbuti causa, sæpe multum proficitur. In quantum vero hujus causam, uti & morbi speciem, duplicem esse ostendimus, & medicamenta hætenus proposita, sanguinis intemperiem salinosulphuream fere tantum respiciunt, proxime incumbit medicamenta, quæ in altera sanguinis dyscrasia scorbutica, nempe sulphureosalina, conveniunt, subjicere.

## C A P U T. VIII.

*De medicamentis, cujusque prædictarum formularum generis, scorbutum, in constitutione calidiori, & sanguinis dyscrasia sulphureosalina, excitatum respicientibus.*

**I**N quibusdam scorbuticis, cochleariæ, raphani sylvestris, corticis Winteran. aliorumque acrium, & sale volatili valde præditorum usus multum officere deprehenditur: quare in ejusmodi casibus, ubi causa morbifica in calidiori sanguinis dyscrasia, vini rancidi æmula, consistit, medicamenta temperata, & humorum particulas, per se effervescent aptas, minus exagitantia indicantur: quare formulæ, eodem quo superiores ordine,



dine, ac velut *ῥοχαλάως* subjicientur, atque imprimis de remediis solidis agemus.

## ELECTUARIA.

℞. Conservæ beccabungæ, cardamines, cum æqualiparte sacchari facti. an. ℥iij. spec. diatri. santal. diarrhod. abbatis. an. ʒj. β. eboris pulv. ʒj. margarit. ʒβ. salis absynthii, tamarisci an. ʒj cum f. q. syr. e coralliis. f. electuarius.

℞. Conservæ lujulæ, cynorrhodii, an. ℥iij. (vel conservæ rad. lapathi acut. rad. cichorei. an. ℥iij.) trochisc. de rhabarbaro ʒij. spec. diamargarit. frigid. ʒj. β. cort. tamarisci ʒj. salis prunellæ ʒj. β. myrobalanor. condit. no. ij. c. f. q. syr. condituræ myrobalanor. f. electuarius.

Pauperioribus hoc *ῥοχαλάως* præscribere soleo. ℞. Folior. beccabungæ ʒvj. lujulæ ʒij. sacchari albissimi ʒviij. contundantur addendo farinæ sem. feniculi d. ʒβ. eboris pulv. ʒij. salis prunellæ ʒj. β. cum f. q. syrupi esucco beccabungæ, f. electuarius.

## CONFECTIONES.

℞. Pulv. rad. Chinæ, præoniæ maris an. ʒj. santal. albi, citrini an. ℥iij. eboris ʒj. β. margarit. ʒβ. oculor. caneri ʒj. corallii cum succo aurantior. irrorati ac in marmor. lævigat. ʒij. tartari albissimi ʒj. β. sacchari albissimi solut. in f. q. aq. scordii compo- sit. ʒvi f. confectio.

℞. Rad. eryngii condit. scorzonæ condit. an. ℥iij. pulv. Ari compos. ʒβ. spec. diatrion santal. ʒij. salis prunellæ ʒj. β. cum f. q. syrupi cariophyllor. f. confectio.

## PULVERES.

℞. Pulv. folior. chamæpytios, Ari compos. an. ʒj β. eboris pulv. corallii rubr. præparat. cum succo aurantior. an. ʒij. tabularum aurantiorum ʒij. misce. f. pulvis. dosis cochl. i. bis in die.

PILV.



## PILULÆ.

℞. Spec. diatrion fantal. diamargarit. frigid. an.  
 ʒij. sem citri, cardui contus. an. ʒj. β. rad. di-  
 amni Cretici, pæoniæ maris an. ʒj. β. salis tama-  
 riscii ʒij. cum s. q. gelatinæ e cervi vel exuviis an-  
 guium. f. massa.

## TABULÆ.

℞. Spec. diatrion fantal. diamargarit. frigid. an.  
 ʒj. β. margarit. pulv. corallii rubr. præpar. eboris  
 pulv. an. ʒj. sacchari solut. in aq. scordii & ad ta-  
 bulat. coct ʒvj. f. a. f. tabulæ.

Quod si, cum antiscorbuticis hujusmodi tem-  
 peratis, usus chalybis indicatur, electuario, vel con-  
 fectioni, aut etiam pilularum massæ, addantur ma-  
 gisterii Martis Mynsychti, vel extract. chalybis  
 præparationis nostræ ʒij. In quibusdam casibus  
 croci Martis circiter ʒij. β. vel ʒiij. tali compositio-  
 ni addantur, sæpius tamen liquores solidis medica-  
 mentis superbibendos, quam prædictas compositi-  
 ones, chalybeatos reddere præstat. Restat modo  
 liquorum formulas præscribere.

## Decocta.

In scorbuto post febrem diurnam excitato,  
 hujusmodi decocta, quæ sanguinem purificant,  
 & urinas copiose movent, cum fructu exhiben-  
 tur.

℞. Rad. cherefolii, scorzonæ, acetosæ, pe-  
 troselinii an. ʒj. folior. eupatorii, linguæ cervinæ  
 an. M. j. C. cervi usti ʒij. cortices trium pomorum,  
 uvarum Corinthiacarum ʒij. glycirrhizæ ʒiij. co-  
 quantur in aq. fontanæ ℥iiij. ad tertiæ partis con-  
 sumptionem, adde salis prunellæ ʒij. vel iij. Dosis  
 ʒvj. bis vel ter in die.

℞. Rad. eryngii condit. ʒvj. graminis ʒij. fo-  
 lior. aparin. M. ij. eupatorii, epaticæ an. Mj. pas-  
 sular. ʒij. fantal. albi ʒj. glycirrhizæ ʒij. co-  
 quantur



\*quantur in aq. fontanæ ℥iiij. ad tertiæ partis consumptionem. Dosis ʒvj. post medicamentum solidum.

Rusticis & pauperioribus, ne post febrem in scorbutum incidant præscribere soleo, ut bis in die capiant haustum sequentem, nempe ut rad. & fol. taraxaci M. j. β. in liquor. Possit. ℥j. β. coquantur ad tertiæ partis consumptionem; coletur pro duabus dosibus.

\*Vel. R. rad. taraxaci M. β. sem. citri, cardui an. ʒj. coquantur in liquore Possit. cum pomis, vel pomaceo fact. ℥j. β. ad tertiæ partis consumptionem.

### *Infusiones.*

Apozemata modo præscripta, contra scorbutum præstantiora evadent, si absque glycyrrhiza parata, colentur in lagenam, cui imponantur folior. beccabungæ & nasturtii aquatici vel cardamines an. M. j. dein f. infusio calida & clausa per 6 horas. Liquor denuo colatus fervetur in vasis oclusis. Dosis ʒvj. bis vel ter in die. Quin & serum lactis, cum rad. taraxaci, aut foliis fumarie incoctis, coletur in vas continens folior. beccabungæ, chelidonii minoris an. M. j. f. infusio, &c.

Infusiones chalybeatæ crebro in usu esse solent, nempe chalybis sal, magisterium aut extractum in decocto quodam, aut aq. destillata infundantur; cæterum, prout acidulæ naturales, sic etiam artificiales e nostr. præparatione chalybis in aq. fontana dissoluti, atque antiscorbuticorum infusione imprægnati cum insigni commodo bibuntur.

### *Succi & expressiones,*

\*R. Folior. beccabungæ, nasturtii aq. an. M. iij. lujulæ M. ij. contusis exprimatur succus, vitro oclusus cito per subsidentiam depurabitur. Dosis ʒj. β. ad ij. cum vehiculo convenienti.

R. Folior.



℞. Folior. beccabungæ M.iiij. caulium rhabarb.  
 Anglicani M.ij. contusis exprimatur succus.

℞. Folior. beccabungæ, nasturtii, cardamines,  
 chelidonii minoris, acetosellæ an. M.ij. contus. ex-  
 primatur succus, adde succi aurantior. p. 4. ferven-  
 tur in vitro.

### Syrupi.

Quoties syrupus, cuilibet alii compositioni ad-  
 dendus exigitur, aut syrupo de succo lululæ, vel  
 fumarie, vel e coralliis composito utimur; aut e-  
 tiam magistralis de succo beccabungæ, eodem ritu  
 quo supra, de cochleariæ succo præscribitur, parari  
 potest.

### Aqua destillata.

Aquæ destillatæ temperatiores parantur, mutan-  
 do aut ingredientia, aut menstruum, aut simul u-  
 trumque.

Quoad prius, juxta hunc modum proceditur.

℞. Folior. beccabungæ, nasturtii, fumarie, linguæ  
 cervinæ, hepaticæ, melissæ, summitatum tamarisci,  
 cypressi an. M.iiij. santal. om. contus. an. ʒβ. rad. lapa-  
 thi acut. polypodii qu. an. ʒij. cort. exteriores quatuor  
 aurantior. limacum mundat. lbj. incis. & contus.  
 affunde feri lactis cum pomaceo fact. lbvj. Destil-  
 lentur in communi destillatorio.

2. Ut menstruum sit debilius, ingredientia sint  
 moderate calida.

℞. Folior. cochleariæ, beccabungæ, cardami-  
 nes, nasturtii an. M.iiij. cort. quatuor aurantior. lima-  
 cum lbj. minutim concisis affunde feri lactis com-  
 munis, vel lactis recentis lbvj. Destillentur vulgari  
 modo.

3. In scorbutica atrophica & dispositione tabida,  
 ubi nihil calidum, sanguinem, humores, ac spiritus  
 exagitans, admitti debet, tum ingredientia, tum  
 menstruum, sint temperata & sanguinem demul-  
 centia.

℞. Folior. beccabungæ, cardamines, linguæ cer-  
 vinæ,



\*vinæ, adianthi, hepaticæ, veronicæ, eupatorii, an.  
 \*M.ij. limacum mundat. ℥j. β. (vel pulpam ca-  
 \*pomis, aut cordis ovilli incif.) semicoctis & incifis  
 \*omnibus simul contufis affunde lactis recentis (vel  
 \*aq. fumarizæ) ℥vj. destillentur communi modo.

*Vina, & cerevisiæ medicatæ.*

Etsi vinorum usus in scorbuto propter calidio-  
 rem, sive sulphureosalinam sanguinis dyscrasiam,  
 excitato minus convenire videatur, si quando ta-  
 men aut stomachus debiliior, aut longa consue-  
 tudo, vini saltem oligophori, potum exigunt, e-  
 jusmodi liquor simul temperatior, & quodam-  
 modo medicatus parari potest. Imprimis etenim  
 vina tenuia aqua diluta, & melissæ, borraginis,  
 aut pimpinellæ, aliorumve infusione imprægnata  
 concedi debent.

Porro vina parentur e succis ribium, cerasorum,  
 aliorumve fructuum horariorum, quæ cum fer-  
 mentatione maturantur, stomacho perquam gra-  
 ta, & sanguinis depurativa existunt; dein pomaceum,  
 familiare & fere genuinum patriæ nostræ  
 vinum, modo hoc defæcatum, mite, ac sine a-  
 core quovis dulce fuerit, in scorbuto plurimum  
 juvat: Porro huic liquori sæcibus exempto, &  
 doliolis reposito ingredientia varii generis infun-  
 dantur; cujusmodi nimirum sunt summitates pi-  
 ni, vel abietis, flores tamarisci; item rasura C.  
 cervi, vel eboris, quæ liquorem edulcorant, & ab  
 acrescentia præservant; in quantum sc. particulæ  
 salis fluidi in pomaceo scatentes, ipsique acorem  
 inducere aptæ, prædicta ingredientia dissolvendo  
 impenduntur.

Cerevisiæ medicatæ temperatiores ad hunc mo-  
 dum præscribantur, sc. paretur alla tenuior, pro-  
 doliolo 5 vel 6 congiorum capaci, cui vice flo-  
 rum lupuli incoquantur summitates pini, abietis,  
 vel tamarisci, aut rasuræ ligni cujusvis illorum;  
 dein post fermentationem, vasi imponantur rad.  
 lapathi acuti exiccatae (quibus certe nullum in  
 scorbuto præstantius remedium est: ) His inter-



dum addantur folia beccabungæ, nasturtii aquatici, barbareæ, &c. item poma citrea, vel aurantia, in taleolas discissa.

Folia linguæ cervinæ, doliolo cerevisiæ mediocris, post fermentationem imposita, ipsi saporem simul, ac odorem gratissimum inducunt.

## CAPUT. IX.

*De scorbuti indicatione curatoria, qua ipsi morbo, & symptomatibus præcipue urgentibus occurritur.*

**H**Actenus circa scorbuti therapeiam, quæ indicationem præservatoriam, sc. causæ morbificæ remotionem spectant, sc. tum medendi intentiones, tum remedia indicata designavimus. Cujusmodi methodus tempestive incepta, ac rite instituta, sæpe rem totam perficit; in quantum sc. ægritudinis causa, sive radice præcisa, affectus ab ea pendentes sponte emarcescunt. At vero, hunc cursum *ἡσυχία* non semper directe, quin varie deflectendo ad latus, conficere licebit: quippe interdum accidentia & symptomata graviora contingunt, quæ peculiarem, & quasi extraordinariam medicinæ operam requirunt, quibus nempe immediate, ac interrupta sæpe cura generali, attendere oportebit: Super his observetur, quod cum affectus qui scorbuto superveniunt, pro cuiusque ipsorum natura ac patientis indole, appropriata exigunt remedia, hisce tamen antiscorbutica semper admisceri debent. Non opus erit contra morbos, & affectus omnes, quibus scorbutus stipari solet, methodum therapeuticam instituere, ita namque huc tota medicina praxis transcribatur; quin ad symptomata solum præcipue urgentia, a quibus nempe vel patientis vita periclitatur, vel cura principalis obstruitur, respiciendum erit: quo ritu, ac quibus medicamentis, talia sanentur, modo ostendemus.



*De curandis difficili respiratione,  
& paroxysmis asthmaticis.*

**R**espiratio difficilis, cum pectoris angustia & paroxysmis asthmaticis, remediis statim appropriatis, & extra methodum generalem præscribendis tolli debet, secus enim ægrotans cito in vitæ discrimen adducitur. Cum hujusmodi mala in scorbuticis ut plurimum, vel sanguinis in corde stagnantis vitio, vel propter nervos pneumonicos in functione sua impeditos, oriuntur, idcirco medicamentis, aut cardiacis, aut antispasmodicis curantur: sp. C. cervi, fuliginis, sanguinis, cranii, item tinctura castorei, antimonii, vel sulphuris, flores salis armoniaci, flores benzoini, item elixir proprietatis, in his casibus sæpe egregii sunt usus: cujusmodi remedia exhibeantur crebra vice, cum dosi liquoris cujusdam antiscorbutici etiam contra prædictos affectus appropriati. Pro subita dyspnœa ære spasmodicæ, si quando gravissime urgeat, sedatione, nullum præsentius remedium expertus sum, quam Laudani opiatum tincturam nostram ad gut. 10. vel 12. in liquore convenienti exhibitam, quippe somno obrepente spiritus inordinationes suas remittunt, ac interim refecti, debito postea ritu, pristina sua pensa resumunt. Enemata acriora, quæ alvum copiose subducunt, item decocta sudorifera, ac diuretica sæpe juvamen præstant.

*℞. Rad. bardanæ, petasitidos, cherefolii an. ʒj. folior. adianthi, chamædryos, an. M. j. sem. bardanæ, carthami, an. ʒiij. passularum ʒij. incis. & contus. coquantur in aq. fontan. ℥iij. ad tertiæ partis consumptionem, adde vini albi ʒiiij. colentur in lagenam, cui imponatur fol. cochlear. concis. M. j. rad. Elenii condit. & minutim incis. ʒß. f. infusio clausa & calida, per horas tres. Dosis ʒvj. bis vel ter in die.*



*De ventriculi affectibus scorbuto accidere solitis.*

Scorbutici interdum magna ventriculi oppletione & dolore, item nausea & ructibus, & nonnunquam etiam vomitu crebro, ac immani tentari solent. Cujusmodi vitia, interdum a chylo illic in putrilaginem degeneri, sæpius tamen a materia morbifica, aut sanguinis, aut etiam succi nervosi com meatu advecta, & vel intra stomachi cavitatem deposita, vel plexibus nerveis & membranis infixa, oriuntur: In hujusmodi casibus, si materia viscida nidorosa, aut alias infesta inter vomendum rejicitur, & suspicio sit, causam intra ventriculi cavitatem subsistere, lene vomitorium ex vino scillitico, aut sale vitrioli propinare conveniat; vel extracto rhabarbari, aut infuso ejus, adjecto sale aut cremore tartari, humor peccans per alvum derurbetur: sin materies intra membranas, aut plexus nerveos, penitus adhærescat, diaphoretica, aut salium effervescentias cohibentia potius conducant. Elixir proprietatis, vel flores salis armoniaci, vel spiritus fuliginis, cum aq. raphani composita, lumbricorum, aut alio liquore antiscorbutico crebra vice sumantur. Interim semel, aut bis in die, fots ex absynthio, centaury, floribus chamomillæ, rad. gentianæ, aliisque vino albo incoctis, cum stuphis laneis calide inunctis & expressis, ventriculi regioni applicentur. Enematum usus convenit. non raro item opiata juvamen magnum conferent.



*De dolore ventris, & colica scorbutica.*

Nulla propemodum affectio citiorem medicinae opem postulat, quam quæ in scorbuto frequenter accidunt, colica & ventris tormina. Contra hæc mala, clysteres varii generis, fots, linimenta & cataplasmata adhibentur. Opiatarum usus hic valde necessarius deprehenditur. Certe in hoc casu illud Riverii præscriptum, ut catapotia purgantia, cum laudano admixto exhibeantur, maxime locum habet; namque a somno concitato, ac alvi solutione uberiori proritata, non raro paroxysmus solvitur. Cæterum pulveres testacei, a quibus sales acetosi imbibuntur, aut figuntur, causæ morbificæ profligandæ plurimum conducunt. E. g. ℞. Pulv. oculor. cancri, testarum ovor. an. ʒj. β. margaritar. ʒj. f. pulvis, dividatur in 12 doses, quarum una sexta qualibet hora sumatur cum aq. scorbutica, vel cum decocto rad. & seminum Bardanæ, qualis supra describitur, aut etiam cum liquore Possët. cum rad. & seminibus Bardanæ, foliis majoranæ odoratæ, ac saxifragiæ incoctis, foliisque cochleariæ infusis. In colica scorbutica, etiam in ventriculi affectibus modo descriptis, acidularum purgantium, quales apud nostrates juxta vicos *Epsum* & *Barnet* prostant, usus egregium sæpe commodum præstat.

*De diarrhœa & affectibus dysentericis.*

Diarrhœa inveterata, qualis scorbuticis frequenter accidit, haudquaquam medicamentis astringentibus fisti debet, nec etiam alterantibus, aut antiscorbuticis quibusvis facile curatur: acidulæ ferro, aut vitriolo imprægnatæ, hujus affectus remedium optimum existunt; his succedunt acidulæ artificiales, aut medicamenta chalybeata, quæ juvamen insigne præstare solent. Crocus Martis recte præparatus, cæteris omnibus jure præfertur. Methodo sequenti sæpe bono cum successu usus sum. Imprimis purgatio ex pulvere, aut in-



fuso rhabbaro, aromaticis astringentibus adjunctis, instituat, & aliquoties sc. trium aut quatuor dierum intervallo iteretur. Cæteris diebus, electuarii sequentis dosis ad quantitatem nucis moschatæ mane & horæ quarta sumatur. ℞. Conservæ absynthii vulgaris, cum æq. parte sacchari fact. ʒvj. (in constitutione calidiori, hujus vice, conserva rosar. rubrar. recipiatur) spec. diarrhod. abbatis ʒij. santal. albi, rubri pulv. an. ʒj. croci Martis opt. ʒß. cum s. q. syr. chalybis. f. electuarium.

*Observatio.*

In affectibus dysentericis, ac tenesmo, simili methodo procedendum erit; præsertim acidularum usus, si fieri potest, adhibeatur: insuper enemata, e decoctis vulnerariis parata, crebro sint in usu. Nuper ego quendam dysenteria diuturna ac gravi laborantem, qui sc. quotidie plures uncias sanguinis, per alvum a longo tempore excreverat, hoc remedio sanavi. ℞. Rhabarb. opt. pulv. ʒj. santal. rubr. pulv. ʒij. cinamomi ʒj. croci Martis ʒiij. balsami Lucatelli q. s. f. massa pilularis; sumpsit quatuor pilulas, diebus modo singulis, modo alternis, per duas septimanas, & perfecte curatus erat. Huic etiam, cerevisiam medicatam ex rad. lapathi acut. & foliis beccabungæ infusis constanter bibendam præscripsi.

*De vertigine, ac leipothymia, aliisque affectibus eidem in affectione scorbutica adjungi solitis.*

Vertigo scorbuto inveterato crebro supervenit, cui etiam leipothymia frequens, ac fere constans ejus metus, insuper in membris stupor, ac formationis sensus modo huc, modo illuc excurrens adjungi solent. Cujusmodi affectus, modo a spirituum animalium in ipso fonte, & modo ab eorundem intra nervos, tum cardiacos, tum membrorum motui inservientes, deliquiis, procedunt: cumque a cerebro & nervoso genere, sale scorbutico plurimum obsessis, dependent, non facile curantur.



rantur. Remedia cephalica, qualia in vertigine & morbis paralyticis per se excitatis, conveniunt, cum antiscorbuticis admixtis adhiberi debent. Itaque facta imprimis totius provisione, per cathartica idonea, & qualia in scorbuto conveniunt, cum remediis contra prædictos affectus appropriatis, ad hunc modum procedatur.

Circa initia curationis, sanguinis detractio e venis sedalibus hirudinum succtu celebretur; & nisi aliquid contraindicat, crebra vice postea iteretur.

℞. Pulv. rad. pæoniæ maris ꝑ℞. coral. rubr. præpar. ꝑ℞. cranii humani, ungulæ alcis, an. ʒj ℞. Sacchari opt. solut in aq. pæoniæ composit. vel in aq. raphani sylvestris, & ad tabulat. coct. ʒviii. olei succini opt. rectificat. ʒ℞. f. a. f. tabulæ, sumantur ad ʒj. ℞. vel ʒij. mane & vesperi, superbibendo haustum aq. destillat. sequentis.

℞. Folior. cochleariæ, beccabungæ, nasturtii, lilii conval. salviæ, rorismarini, betonicæ an. M. iij. jugland. viridium ℥j. cort. 6. aurantior. & quatuor limoniorum, rad. pæoniæ maris recent. ℥j. ℞. contusis & concisis affundantur phlegmatis vitrioli ℥j. feri lactis cum pomaceo fact. ℥v. Distillantur more vulgari, aq. simul tota miscetur. Dos ʒiij. ad ʒiiij.

### De hæmorrhagiis.

Hæmorrhagiæ, in affectione scorbutica, sæpe ingens periculum minantur, nimirum quasi laborantes propterea in mortem præcipites traderentur; dum sanguis fere ad animi deliquium, modo e naribus, modo fluxu menstruo, aut hæmorrhoidali, erumpit: præterea, iste interdum e pulmonibus, aut ventriculo rejectus, ulceris, aut saltem magnæ debilitatis in parte affecta delitescens suspicionem præbet. Quare excretiones sanguinolentæ, si vel immodicæ fuerint, aut loco inconvenienti accidunt, in præsens sisti, ac imposterum præcaveri debent.



Pro sistendo sanguine, quando immodice erumpit, methodus satis vulgo nota est, ac nihil magis, aut peculiare, in hoc affectu propter scorbutum, quam propter alias occasiones excitato, agendum restat. Attamen ad præcavendas hæmorrhagias remedia adhibeantur, quæ sanguinis acrimoniam tollunt, & vasorum ora nimis laxa & dehiscencia constringunt. Utraque intentio medicamentis chalybeatis optime perficitur. Acidularum vitriolicarum usus in hanc rem maxime idoneus est: porro chalybis infusiones, extracta, sales, &c ejusmodi præparata, quæ salinam, sive vitriolicam ferri naturam præcipue continent, contra hæmorrhagias semper utilissima existunt. Qua ratione ferri & præparata ejus, hos affectus, aliosque diversimodos, in corpore humano produciunt, superius ostenditur.

℞. Conservæ rosar. rubrar. cynorrhodii, an. ℥iij. spec. diarrhod. Abbatis, diatriæon santalæon an. ʒj. β. salis chalybis ʒj. croci Martis opt. præparat ʒij. corallii rubr. præpar. ʒj. β. cum s. q. syr. de chalybe f. electuarium, sumatur ter in die qu. nucis moschat, superbibendo liquoris appropriati haustum,

Pauperibus ad hunc modum præscribere soleo.  
℞. Summitatum cypressi, urticæ urentis an. ℥iiij. beccabungæ ʒij. Contundantur in mortario cum ʒx. sacchari albißimi: dein adde squamar ferri tenuissime pulv. ʒj. pulv. santal. albi, rubri an. ʒij. cum s. q. syr. e succo urticæ. f. electuarium. Dosis qu. nucis jugland. bis in die.

℞. Aq. destillatæ, vel decocti antiscorbutici temperat. ℥ij. chalybis nostr. præpar. ʒij. misce in vitro: Dosis ʒiij. vel. iiij.

℞. Summitat. urticæ urentis, folior. beccabungæ, an. M. iiij. contusis exprimatur succus, servetur in vitro. Dosis ʒij. vel iiij bis in die cum aq. destillat. antiscorbutica.



*De vitiis oris, propter scorbutum  
oriundis.*

Quamprimum labes scorbutica partes oris incessit, ut gingivæ intumescant, earumque carnes fungosæ evadant, protinus remedia, quæ putredinem ab iis arcent, sedulo adhibeantur: Inter hæc, collutiones oris, ac linimenta, & morbo circa has partes incipiente, & illo ibidem ingravescente, præcipui sunt usus; quæ tamen, uti variis intentiones respiciunt, ita diversimode parari solent, sc. gingivarum caro primo intumescens, a sanguinis, aut feri falsi, & corrupti influxibus liberari & exiccari: postea earundem caro flaccescens, ac a dentibus subsidens, a putredine vindicari, quin etiam ut dentes arctius complectatur, constringi debet; propter has & forsân alias intentiones, gargarismi, sive oris collutiones, varii generis instituantur: quorum fere omnium præcipua ingredientia, sunt vegetabilia incocta, ac mineralia infusa. Herbæ, aut radices, quæ liquore idoneo, sc. aqua, aut vino incoquantur, plerunque sunt vel acres, vel amaræ, vel stypticæ: dein ejusmodi decocta imprægnantur, aut sale volatili, lixiviali, vitriolato, seu chalybeato, vel aluminoso. Libet hic formulas quasdam cujusque generis subijcere.

1. Cum itaque gingivarum caro propter feri, & sanguinis falsi & corrupti influxum, primo intumescit & fungosa evadit. ℞. Cort. med. ani. sambuci, Ulmi, an. M. β. folior. satyriæ, salviæ, erysimi, nasturtii, an. M. j. rad. Pyrethri ℥ij. contus. & concisa coquantur in a. calcis ℔ij. ad tertiæ partis consumptionem: si edulcoratio requiritur, adde mellis rosat. ℥ij. f. gargari-smus. Vel ℞. Vitrioli camphorati ℥j. (vulgo apud nostrates insignitur, nomine pulveris Capivi nei Green.) aq. fontan. ℔ij. misce in vitro, conquas-setur, & dein liquor per subsidentiam clarescens, usurpetur. Vel paratur lixivium e cineribus geniste, aut roris marini, vel e tartaro & nitro calcinat;



hujus ℥iij. incoquantur folior. satireiæ, thymi, salviæ, rorismarini an. M. j. colatura superfundatur folior. cochleariæ M. ij. f. infusio calida & clausa per horas tres, iterum coletur & servetur ad os colluendum, sæpius in die.

Propter eandem intentionem, etiam linimenta intermodiis temporibus, ac præsertim noctu applicentur, ut illorum virtus ægrotantibus, vel inter dormiendum communicetur. Apud Authores præscriptum frequens celebre, & longo usu expertum habetur. ℞. Pulv. folior. aquilegiæ, menthæ crispæ, salviæ, nucis moschat. myrrhæ (quæ tamen aliquando omittatur) an. ℥ij. aluminis usti ʒβ. mellis virginei ʒiiij. vel q. s. f. a. f. linimentum.

2. Si quando gingivarum caro flaccescens, dentium radices destituit, Scarificatio levis sæpe adhibeatur; insuper hoc decocto os colluatur, ℞. Summitatum rubi, cypressi, folior. faniculæ, cardamines an. M. j. coquantur in aq. ferratæ ℥iij. ad tertiæ partis consumptionem, colaturæ adde mellis rosat. ℥ij. misce.

Linimentum hujusmodi applicetur. ℞. Pulv. rad. ireos Florentinæ, folior. salviæ, hyperici an. ℥ij. boli Armeni, salis prunellæ an. ʒj. mellis virginei calentis q. s. agitatione bene incorporentur.

3. Quando gingivæ putrescunt, & corrumpuntur, simulque dentes carie obfiti vacillant, ac tetrum odorem expirant, medicamenta fortiora, & putredini valde resistentia, adhibeantur, vitrioli camphorati, etiam lapidis medicamentosi infusio, hic ad primis locum habent.

Vel. ℞. rad. Gentianæ, Aristolochiæ rotund. incis. an. ʒβ. folior. centaurii minoris, absynthii Pontici, satireiæ, aquilegiæ. an. M. j. coquantur in aq. calcis, aut lixivialis, etiam modo ferratæ, modo aluminosæ ℥iij. ad tertiæ partis consumptionem. Colaturæ adde mellis crudi ℥ij. vel iij. misce.



4. Si dentium casus præcipue metuatur. R.  
 Cort. rad. prunor. sylvestrium ʒj. tormentillæ, &  
 bistortæ totius an. M. j. malicorii, balauftior. an. ʒß.  
 coquantur in aq. fontanæ lbij. Colaturæ adde alu-  
 minis ʒij. vel iij. mellis opt. ʒij. misce. R. Vitri-  
 ol. camphorat, C. cervi usti an. ʒj. mucis moschar.  
 ʒß mellis opt. q. s. f. linimentum. Vel. R. Pulv. rad.  
 bistortæ, malicorii, boli Armeni, aluminis usti an.  
 ʒj. mellis rosacei q. s. adde spiritus vitrioli ʒj. f. li-  
 nimentum.

5. Si quando (uti interdum assolet) ulcera pu-  
 trida & profunda, gingivas, aliasve oris partes  
 incessant, remedia prædicta fortiora erunt sæ-  
 pius adhibenda: Insuper loco affecto petia un-  
 guento Ægyptiaco, in spiritu vini dissoluto, vel  
 lapidis medicamentosi aut sublimati infusione in-  
 tincta, aliquoties applicetur. In his casibus Chirur-  
 go perito curatio delegetur.

*De doloribus crura, ac alios interdum ar-  
 tus, noctu potissimum infestare soli-  
 tis.*

Contra hos dolores, siquidem acerbissimi in-  
 terdum existunt, præter generalem scorbuti cu-  
 randi methodum, remedia specifica, & sym-  
 ptomati isti occurrentia indicantur: Itaque in  
 tali casu, purgationis ritu bene instituto, etiam  
 phlebotomia (si opus sit) celebrata, & pharma-  
 cia interna & topicis externis, morbum adoriri  
 convenit.

Quoad prius, quæ per sudores, etiam & quæ  
 per urinas movent, sæpe juvamen præstant, in  
 quantum sanguinis, & succi nervosi recrementa  
 lixivialia & acetosa, in parte affecta congredi so-  
 lita, alio deducunt: potissimum vero adhibean-  
 tur, quæ utrumque humorem, ab indole sua  
 prava, sc. tum salina, tum acetosa, vindicant:  
 pulveres testacei, oculorum cancri, mandibularum  
 lucii, item sp. & flores salis armoniaci, sp. sangui-  
 nis, tinctura antimonii, corallii; Decocta rad. &  
 femina



feminis bardanæ, chamæpytios, chamædryos, adprime conferunt. Cujusmodi remedia cum aquis destillatis antiscorbuticis bis aut ter in die sumantur. Aqua destillata, ex stercore equino, additis, cochlearia, beccabunga, iva arthritica, & similibus, interdum valde proficua est. Interea fofus, linimenta, cataplasmata, aut alius generis applicationes, quæ dolores sedant, exterius admoveantur.

*De arthritide vaga scorbutica.*

De hoc affectu Eugalenus, Wierus, Medicus Campensis, & Gregorius Horstius, ex composito scripserunt, in septentrionalibus Belgicæ plagis, valde frequens perhibetur. Cujus certum indicium constat lumbricum vivum loco dolenti imponendo; nam ille statim exilire, circumgyrari, incurvari, labascere, & mori solet; quod quidem in hoc morbo, etiam apud nostrates satis crebro evenire expertus sum. Cujusmodi experimenti ratio (uti videtur) hæc est, doloris & tumoris in parte affecta excitati, causam esse statuiimus, quod a sanguine sæculentiæ salinæ, five lixiviales, simulque a succo nervoso acetosæ, in eodem loco depositæ, mutuo effervescent, non secus ac spiritus vitrioli, salis Tartari deliquato commissus; porro a tali particularum dissimilium lucta, & agitatione, uti dolor & tumor cientur, ita quidem effluvia valde acria, & velut corrosiva copiose abscedunt, quæ lumbricum loco dolenti impositum, nihilo minus, quam super liquores istos ebullientes suspensum, enecant: Propter experimenti istius effectum, morbi curatio, per lumbricos, sc. remedia ex iis parata instituitur; qui tamen nescio, utrum intus sumpti, tam certo profligabunt morbum, ac illi exterius admoti, a morbo profligantur. Utcunque lumbrici, uti & limaces, aselli, & alia animalcula exanguia, in quantum sale volatili abundant, remedium satis efficax non raro cedunt.

Henricus



Henricus Petrus refert duo remedia, contra hunc morbum in Westphalia usitata. R. Novem lumbricos, cum duobus cochlearibus vini in mortario contusos, & per pannum expressos, his addatur dimidia vini mensura, sumantur cochlearia iij. mane, meridie, & vesperi, per plures dies. 2. R. Sabinæ ramulos ij. vel iij. mellis virginei cochlearia ij. coquantur cum mensura vini ad subsidentiam duorum digitorum. Colatura sumatur ad cochlearia iij. vel v. ter in die. Priori medicamento affinis est potio quædam vulgaris, ab Horstio citata, dicta Monasteriensis. R. Salvæ, betonicæ, Rutæ an. folia 5. lumbricorum cum cingulis rubris in collo no. 5. sabinæ parum, & rad. succisæ no. ij. cum aqua flor. sambuci contendantur, & succus expressus pro sudore movendo exhibeatur. Etiam simile præscriptum a Medico Campensi apud Forestum proponitur.

Certe in hoc affectu, aqua lumbricorum magistralis, in pharmacopœa Londinensi præscripta egregie convenit: Quin sp. & salem C. cervi, sp. sanguinis, flores salis armoniaci cum bono successu sæpius adhibui. Porro pulveres testacei sc. oculi cancrorum, corallia, margaritæ, & vegetabilia, quæ arthritidis antidota feruntur, uti rad. aristolochiæ, folia chamæpytiæ, chamædryos, & similia antiscorbuticis conjuncta, morbi hujus sanationi conducunt. Exterius pro doloribus sedandis, præter anodyna, quæ sub forma linimenti, fots aut cataplasmatibus usurpantur: Oleum lumbricorum, ranarum, & bufonum non raro sunt valde proficua. Accepi a viro Insigni huic morbo valde obnoxio, quod aqua e contentis ventriculo bovis nuper extracti exemptis per destillationem prolicita, & cum petiis ei calide intinctis, atque pro fotu applicatis, levamen certissime adferret,



*De affectibus convulsivis & paralyticis, scorbuto supervenire solitis.*

Si quando labes scorbutica in cerebrum & nervosum genus irrumpens, liquorem utriusque provinciae irriguum valde inquinavit, propterea quidem diversimodi affectus, ac imprimis paralytici, aut spasmodici, prout supra ostendimus, oriri solent: nimirum juxta quod materies morbifica, regimini animali illata, aut narcotica, aut explosiva fuerit. Cujusmodi affectus, licet in hoc casu symptomatice fuerint, attamen ingravescentes, praescorbuto parente & nomen, & potiore curationis partem sibi vendicant, ita ut aegrotans paralyti, aut convulsione, magis quam scorbuto labore dicatur, etiam medicamenta istis affectibus dicato, quibuscunque aliis eodem tempore, propter alias intentiones requisitis, praependantur.

Pro sanandis hujusmodi affectibus, scorbuto superinductis, id potissimum agatur, ut remedia iisdem appropriata, cum antiscorbuticis rite complificentur. Quoad morbos convulsivos, quae in superiori tractatu prostant, huc facile transferantur. Caeterum de paralyti, lethargo, nec non plerisque aliis cerebri, & nervosi generis pathematis, disquisitiones speciales aliquando forsan lucem visuras, instituimus: interim haud par est, methodos therapeuticas, quae ad pathologias istas spectant, hoc in loco praecipere; quin potius, quod ex re fore videtur, sub calcem hujus operis scorbuticorum quorundam, simul ab istis morbis decumbentium, casus & curationes proponemus.



*De atrophia, item de febre scorbutica,  
quæ sæpe illius aut causa est,  
aut affectus.*

Tria sunt causarum genera, serie quadam pendencia, a quarum una, aut pluribus, atrophia scorbutica, absque pulmonum phthisi existens, produci solet, sc. aut chylus primarum viarum culpa pervertitur, quo minus penus ejus sufficiens, aut laudabilis, sanguini inferatur. Secundo aut isti illatus, tamen sanguinis vitio, non recte in sanguinem & succum nutritium mutatur. Tertio aut denique succus nutritius in massa sanguinea præparatus, propter liquoris nervosi culpam, solidis partibus non rite assimilatur.

Remedia huic symptomati appropriata, aut primarum viarum, aut prædictorum humorum, emendationes respiciunt. Quoad prius, interdum accidit ob stomachi tonum præfractum, aut fermentum vitiatum, alimenta ingesta non rite coqui, sed in putrilaginem inutilem faceffere. Hujusmodi malis lenia cathartica, digestiva, corroborantia adhibeantur. Sæpius tamen propter tumorem scirrhum, modo in ventriculo, modo in mesenterio, aliisve circumcirca partibus, excitatum, chylicationis opus inhibetur: in hoc casu deobstruentia, & dissolventia conveniunt, acidularum usus quibusvis remediis palmam præripit. Porro fots, linimenta, aut emplastra exterius applicari debent.

Insuper interdum accidit, sine tumore in visceribus excitato, vasa lactea a materia crassa ac viscida iisdem impacta, in tantum obstrui, ut chyli, satis laudabilis, & copiose licet confecti, penus haud sufficiens in sanguinem feratur. In hoc affectu alvus ut plurimum copiose dejicit, albida tamen, instar lactis coagulati, ac non, uti aliorum excrementa, bile tincta aut foetida. Quorum ratio est, quod sanguis depauperatus



pauperatus bilem flavam, e qua intestinis suffusa, excrementorum color ac foetor procedunt, parcius progignit. In hoc casu acidulae imprimis conveniunt, item de obstruentibus intus exhibitis, linimenta, fots & balnea exterius usurpentur.

Contra marasmm, sanguinis a crasi degeneris vitio exortum, lac asinum aut vaccinum, aqua hordeata, aut aqua idonea destillata, dilutum saepe opem conferunt: Limacum jussula, aut lacteata cum iisdem incoctis, porro aquae distillatae ex lacte, aut sero lactis cum limacibus & herbis antiscorbuticis temperatis, in hoc casu valde conducunt: in hunc finem etiam decocta ex herbis vulnerariis & antiscorbuticis infusis bono cum fructu sumuntur: Interea partibus externis frictiones cum pannis, unguento resumptivo, aut oleo amygdalarum recenti madidis & intepefactis, quotidie adhibeantur.

Cum sanguinis affecti, proindeque succum nutritium pervertentis vitio, atrophiam exoritur, plerumque febrem erraticam, cum sudoribus nocturnis adjunctam habet, in quantum sc. massa sanguinea, a succo isto degeneri, in effervescentias inaequales, ac incertas cogitur; atque materies ita molesta sudore nocturno ejicitur. In hoc casu victu tenui instituto, decocta & aquae destillatae, quae sanguinem fundunt ac purificant, cum antiscorbuticis admixtis crebro sumantur.

℞. Rasurae eboris, C. cervi an. ʒij. β. rad. eryngii conditi ʒvj. rad. cheresolii, taraxaci an. ʒβ. folior. linguae cervinae, hepaticae an. M. j. pomum j. incisum, passular. M. j. coquantur in aq. fontanae ℔ iiij. ad tertiae partis consumptionem. Colatura superaffundatur folior. beccabungae contus. M. ij, salis prunellae ʒj. β. vel nitri fixi ʒj. f. infusio clausa, & calida, per horas tres, sumantur ʒ iiij. vel vj. ter in die.

℞. Folior. beccabungae ℔ iiij. oxalidis, taraxaci totius an. M. ij. limacum mundatar. ℔ j. β. cort. duorum aurantiorum: contusis & concisis



\*cisis affunde lactis recentis, vel feri lactis cum pomaceo facti, vel succi pomor. recentis lb. vj. destillentur more vulgari. Capiat ℥iij. bis vel ter in die.

*De rheumatismo.*

Hunc affectum, a salium, qui sunt diversæ profapiæ ac indolis, nempe fixi a sanguine, & acetosi a liquore nervoso adventantium, congressu & mutua effervescencia, provenire statuimus. Utriusque salis subjecta sunt sæculentiæ superflua, a prædictis humoribus, in turgescencias quasdam actis depositæ, atque in partes, modo has, modo illas suffusæ: quare ut morbus curetur, & humorum turgescenciæ sedentur, & sæculentiæ eorum superflua expurgentur, etiam sales utroque ritu degeneres, ad volatilitatis statum reducantur.

Propter duas priores intentiones levis purgatio & phlebotomia imprimis requiruntur, & aliquoties pro tolerantia virium iterari debent: quin & diuretica & diaphoretica, quæ serositates salinas quoquomodo foras convehant, subinde exhibeantur. Cujusmodi evacuationes, ut sedate, & cum *ὑποψία*, & natura assistente, melius succedant, opiata crebro sint in usu. Propter alterum scopum, in quo præcipuus curationis cardo versatur, alterantia, & præsertim quæ sale volatili prædita sunt, valde conducunt: quare in hoc casu vulgaris, sed non contemnenda medicina est, infusionem stercore equi masculi in vino tenui, aut cerevisia, aut aqua destillata appropriata, factam, ad ℥iij. vel vj. bis aut ter in die propinare. Quin & pharmacum paulo gratius & non minus efficax parari potest, si ex stercore illo cum ingredientibus antiscorbuticis vino albo, aut pomaceo infusis, aqua distilletur, quæ ad ℥iij. vel iiij. bis in die exhibeatur: spiritum C. cervi, ac sanguinis sæpius in hoc casu, cum insigni ægrotantis commodo præscripsi.



*De hydropē:*

Cum hydropem scorbuto supervenire solitum duplicem statuimus, sc. habitualement & occasionalem; circa prioris medelam, plerumque & opera & oleum perditur: nulla etenim remedia hepar, atque pulmones, aliaque interdum viscera prorsus vitiata, atque sanguinis crasin penitus subversam, restituere possunt. In tali casu si quid agendum videtur, medicinæ ambitus perangustus existit; neque enim catharticis, nec diaphoreticis, neque alius cujusque generis evacuationi fortiori locus relinquitur; cardiacis, ac diureticis præcipue ac fere tantum insistendum erit. In hos fines, elixires, tincturæ, electuaria, pulveres, infusiones, decocta, aquæ destillatæ, &c. quæ partim antihydopicis, partim antiscorbuticis constant, exhibeantur; quorum tamen, quia parum aut nihil significant, formulis præscribendis supersedere visum est.

Hydrops scorbuticus, a causa evidenti, five occasione quadam, uti ostensum est, subito excitatus, non raro curationem admittit, quæ quidem ut facilius succedat, naturæ tumultus imprimis sedari, ac inordinationes compesci debent: quamobrem, si vigilæ adhuc plurimum infestant, somnus opiatatum usu concilietur, & subinde quoties valde opus sit, denuo accersatur. Quamprimum pro ratione virium purgare licet, sequens pulvis sumatur, & debitis intervallis aliquoties iteretur; interim a crebro enematum usu alvus soluta reddatur. ℞. Mercurii d. ʒj. resin. julapæ gr. v. ad 10. caryophyllor. ʒβ. misce, detur in cochleari panatellæ; aliis temporibus diuretica, ac interdum diaphoretica sedulo propinentur. ℞. Tincturæ salis tartari, millepedum infusione imprægnatæ q. v. detur ʒj. ad ʒij. bis in die cum liquore appropriato. ℞. Sp. salis armoniaci q. v. Dosis ʒβ. ad gut. 15. eodem modo. ℞. Millepedum præparat. ʒiij. salis tartari ʒij. nucis moschat. ʒj. misce. f. pulvis.



\*vis. Dosis 3ß. bis in die, cum liquore appro-  
 \*priato. Vel R. Apum siccatur. & pulv. 3ij. sem-  
 \*ameos pulv. 3j. olei juniperi 3j. terebinth. q. s. f.  
 \*massa pilul. Dosis 3j. ad 3ß. bis in die superbi-  
 \*bendo liquorem specificum.

\*R. Folior. cochleariæ utriusque, nasturtii aq.  
 \*lepidii, persicariæ, an. M. iij. rad.. Ari, Bryo-  
 \*niæ, iridis Florentinæ an. 3iij. corticis mediani  
 \*sambuci M. ij. cort. Winteranæ 3ij. cort. externa  
 \*quatuor aurantior. trium limoniorum, baccarum  
 \*juniperi recentium 3iij. incis. & contusis affun-  
 \*de vini Rhenani 1biiij. vini e succo baccarum  
 \*sambuci 1bij. Destillentur more vulgari, aqua  
 \*tota confundatur. Dosis 3iij. ad iij. bis in die  
 \*post dosin alicujus medicamenti superius præscri-  
 \*pti.

Parentur decocta & cerevisiæ medicatæ, qualia  
 supra præscribuntur, adjectis ingredientibus anti-  
 hydropicis.

### *De crepitu ossium.*

Restat adhuc symptoma, scorbutum interdum,  
 licet rarius superveniens, sc. crepitus ossium, in  
 cujus rationem superiori pathologia omissem, &  
 therapeiam, ex re fore videtur, hic loci inqui-  
 rere. Novi quosdam, vix tamen ultra tres aut  
 quatuor, qui scorbutum dudum laborantes, no-  
 xam ejus non tantum in humoribus, & partibus  
 carneis, sed in ipsis demum ossibus luerunt:  
 quoties enim membrum quodvis ullo modo  
 flecterent, ossium capita, quasi nuda essent,  
 inter se attrita, strepitum ingentem edebant;  
 porro cum lecto decumberent, ibidemque e  
 latere in latus se devolverent, a vertebrarum col-  
 lisione, tanquam a sceletro asperius tractato, cre-  
 pitus ingens, vel ipsos affectus perterefaciens ex-  
 audiebatur.

Hujus causa conjuncta forsan videatur esse,  
 quod molli ossium interstitio, sc. adipe, mem-  
 branis, & ligamenti valde absumptis, ipsorum  
 juncturæ, velut lapides molares prorsus inaniti,  
 propter



propter mutuum attritum, resonarent: attamen rem secus habere constat, quia nec summe tabidis adest ossium crepitus, neque hoc affectu laborantes semper intabescunt: quare potius dicendum erit, quod symptomatis hujus causa immediata sit ossium ariditas, sive medullæ ita propriæ dictæ, quam intra ossium cavitates, ac imprimis capita ipsorum, contineri oportuit, defectus; nam siquidem ossa quævis medullam, sive humorem unctuosum, aut cavitatibus magnis aut poris & meatibus exiguis ubique exculis, includunt, hujus usum statuimus, tum ut ossa eodem irrigata, minus fragilia evadant, tum insuper, ut humor iste, ossium nodis exudans, articulos quosvis, velut machinæ commissuras pinguedine linitas, lubricet, eorumque adeo motus faciliat, quare ossium capita, hac medulla destituta, crepant non secus ac currus rotæ, rarius inunctæ.

Quod si de morbi hujus causa procotartica inquiratur, quomobrem sc. unctuosum illud articulorum oblinimentum deficit: hoc equidem vel sanguinis vitio imputandum erit, quasi hic, alimentum sulphuris, æque ac salis, particeps ossibus haud rite suppeditat, quod equidem minus verisimile est, quoniam massa sanguinea, etiam in scorbuticis particulas utriusque generis prædicti continet, quin & ossium crepitu laborantes cutim, & musculos pinguedine satis oblitos ostendunt, vel secundo potius videtur, humorem unctuosum, quo articuli lubricentur, ipsorum ossium culpa desiderari, quia scil. horum pori, & meatus a materia quadam extranea forsan limosa, aut tartarea per sanguinem advecta, in tantum obstruuntur, propterea ut balsamum iis destinatum non satis excipiant, nec pro humectandis ipsorum commissuris, exudent; non facile erit (quia res tota in abstruso latet) particulares hujus affectus rationes investigare, neque in Aitiologia hac, ultra hujusmodi conjecturam pergere.



Nec minus in luto hæremus, cum ad morbi hujus curationem proceditur: nam licet primaria indicatio, sc. ossium aut articulorum humectatio satis obvia fuerit, quo tamen ritu, & quibus remediis ea perficitur, non ita plane constat. Etenim in hoc casu, novi plurima pharmacæ genera, & varios administrationum modos, omnino incassum tentatos. Vir quidam ingeniosus ab hoc morbo per multos annos gravissime laborans, plurimum, & quidem celeberrimorum medicorum consilia expertus est; præter usitata contra scorbutum remedia (una cum crebris phlebotomiis & purgationibus, e quibus haud quicquam levaminis recepit) varios insuper & magnos medicinae cursus, sine quovis successu tentabat: namque post methodum ab uno medico per aliquot menses frustra adhibitam, mox ad alium se conferebat, & ita deinceps ad plures: interim a singulis, nova semper medendi ratio, a prioribus intentata, præscribitur; fots, linimenta & frictions singulis artubus quotidie adhibentur Thermis Bathoniensibus aliquandiu utitur; postea acidulae varii generis, modo hæ, modo istæ bibuntur. Quibus nihil juvantibus, cursus chalybeatus, alio tempore decoctum lignorum temperatorum, interdum diæta lactea, porro nullo non tempore, electuaria, aquæ destillatæ, apozemata, aliaque remedia ex antiscorbuticis parata sumuntur: cumque hoc ritu supra tres annos fere constanter medice & misere vixisset, circa prædicti affectus therapeiam ne hilum proficitur; interim vero, ille viribus ac stomacho mediocriter valuit, uxorem duxit, & quo ad reliqua magis communia scorbuti symptomata, melius habuit: hinc ut constat, quam pertinax morbus, nullisque fere remediis cedens, ossium crepitus fuerit, quod etiam aliis eodem affectu laborantibus, atque medici operam prorsus eludentibus comprobatur novi.



## CAPUT. X.

*De indicatione vitali, qua includuntur  
medicamenta cardiaca, opiata & diæ-  
ta, siue victus ratio in scorbuto requi-  
sita.*

**H**Aftenus indicationes tum præservatorias, tum  
curatorias, quæ scorbuti therapeiam spectant,  
fufè explicavimus; restat adhuc dicendum de in-  
dicatione vitali, nimirum ut declaretur, qua me-  
thodo, & quibus remediis ægrotantium vires,  
aut nimis ad fatiscendum aptæ sustineantur, aut  
labefactatæ, vel prostratæ restaurentur. Propter  
hos fines cardiaca & opiata, juxta decumben-  
tium exigentias assumenda præscribantur, ac in-  
super recta victus ratio, si quando opus fue-  
rit, analeptica, & semper antiscorbutica præscri-  
batur.

Quoad medicamenta cardiaca, quæ sc: sangui-  
nem in corde stagnantem exagitant, flammam  
ejus semiobrutam resuscitant, spiritus animales  
oppressos, vel distractos libertati ac debitæ  
irradiationi restitunt, obvium est, plura re-  
media, quæ proprie antiscorbutica dicuntur,  
has intentiones perficere, cujusmodi nimirum  
sunt, aqua raphani composita, limacum & lum-  
bricorum magistralis, sp. C. cervi, fuliginis, pul-  
veres testacei, cum multis aliis, quæ non tan-  
tum quibusdam horis, & juxta methodum certo  
ordine præstitutam, sed insuper pro data occasio-  
ne, quoties syncope, aut quævis spirituum deliquia  
contingunt, cum fructu sumantur.

Attamen præterea, qui cordis passionibus, cre-  
bræ leipothymia, nausæ, vomitui, tremori, vertigi-  
ni, aliisque horrendis symptomatis valde obno-  
xii reperiuntur, etiam præsto habeant alijsmodi  
medicamenta magis proprie cardiaca, quibus o-  
mni spirituum exolutioni immediate succurratur.  
In hunc finem egregie convenit, elixir vitæ qu.

majus



majus ; in destillatione ejusdem elixiris, aqua secunda, quæ edulcorata ad cochlear. j. exhiberi potest, item aqua mirabilis, aqua bezoartica, aqua Gilberti temperata, theriacalis, cinamomi, quibus singulis, aut inter se compositis, adjiciatur confectio alchermes, confectio de hyacintho, pulv. margaritar. aut magisterium coralli, syrupus caryophyllor. vel e coralliis, e corticibus citri, e cinamomo : ex his, aliisque hujus farinæ medicamentorum formulæ diversimodæ præscribi solent. E. G.

℞. Aq. theriacalis, mirabilis an. ℥iij. mellis ℥iij. syrupi caryophyllor. ℥j. β. confectio alchermes ℥j. misce. Dosis cochlearia iij. vel iiij.

Vel ℞. Aq. mirabilis ℥vj. limacum, juglandum, an. ℥ij. margarit. pulv. ℥j. confectio de hyacintho ℥j. syrupi caryophyllor. ℥j. misce.

Cum mulieres scorbuticæ, affectibus hysteriis, ac viri convulsivis, tentari solent. ℞. Aq. mellis, pulegii an. ℥iij. aq. bryoniæ composit. ℥iij. tincturæ castorei ℥β. tincturæ croci ℥j. syr. caryophyllor. ℥j. β. castorei nodulo ligat. & in vitro suspensi ℥j. Dosis cochlearia iij. vel iiij.

Quibus remedia cardiaca in forma solida potius expetuntur, electuaria vel tabulæ præscribantur.

℞. Conservæ flor. tunicæ ℥iij. confectio alchermes ℥β. margaritar. pulv. ℥j. cum s. q. syrupi e coralliis. f. electuarius.

℞. Specier. diamargarit. frigid. diarrhod. abbat. an. ℥j. β. margaritar. pulv. ℥j. sacchari albi solut. in aq. theriacali, & ad tabulat. coct. ℥iij. olei cinamomi gut. 6. f. a. f. tabulæ.

Quod spectat ad opiata & medicamenta anodyna, in quibusdam scorbuticorum affectionibus, mallet quovis præterea medicamentorum genere, quam illorum usu destitui : nec enim solummodo contra dolores & vigilias pertinaces, verum in paroxysmis asthmaticis, in vomitu, diarrhœa, quin etiam in vertigine & pathematis convulsivis, quoties natura supra modum irritata, in-



inordinationes immaniores concipit, nullam præstantius remedium sæpius expertus sum, quam ut narcotico tuto adhibito, somnus concilietur: interim maxima opus est cautione, ne sumantur, si quando aliquid in ægrotantis constitutione, aut in morbi conditione, vel tempore, talis medicamenti exhibitionem prohibeat.

Præter hypnotica in pharmacopoliis usitata, sc. laudanum opiatum, nepenthen, philonia, diacodium & syrupum papaveris erratici, duæ insuper opii præparationes mihi innotescunt, quas in forma tincturæ, sive extracti liquidioris a gut. 10. ad 20. cum alio quovis liquore appropriato exhibere soleo.

Diæta, sive victus ratio a scorbuticis observanda, in methodo therapeutica, haud minimi momenti est; qua scil. neglecta, aut perperam instituta, reliqua medicinæ præscripta parum, aut nihil versus sanitatem proficiunt. Regimen diætetikum, cum ad varia extenditur, præcipue circa aerem & habitaculi situm, cibum, ac potum, atque corporis motum, vel quietem versatur.

Quoad prius, cujusmodi, respectu cæli ac soli, mansiones & commorandi loca, scorbutum pariunt, ac proinde vitari debent, e supradictis abunde constat: qui hunc morbum aut cavere, aut curare student, aerem moderate calidum & siccum, qui etiam tenuis & purus, & satis eventilatus fuerit, eligere satagant.

Cibi tantum *Ευχρυμοι* & *Ευπεπτοι* conveniant; crassi, visceri, ac fumo indurati, mucidi, ac rancidi, porro alimenta infermentata, aut valde composita, legumina, lacticia, fructus immaturi evitentur. Saccharo condita, aut plurimum imbuta, in tantum vitupero, ut illius inventionem, ac usum immodicum, scorbuti in nupero hoc seculo immani augmento, plurimum contribuisset existimem: Enimvero concretum istud, sale satis acri & corrosivo, cum sulphure tamen delinito constat, prout ex analysi ejus spagyricæ facta liquido patet. Quippe saccharum



charum ( prout supra innuimus ) per se destillatum, exhibet liquorem aqua stygia vix inferiore: quod si ipsum, in vesica plurima aqua fontana perfusum, destillaveris; quamvis sal fixus non adeo ascendit, prodibit tamen liquor, instar aquæ vitæ acerrimæ, urens, ac summe pungitivus: cum itaque saccharum quibuscvis fere alimentis commixtum, ita copiose a nobis assumitur, quam verisimile est, ab ejus usu quotidiano, sanguinem & humores salios, & acres, proindeque scorbuticos reddi? Author quidam insignis, tabis Anglicæ causam, in immoderatum sacchari apud nostrates usum, retulit; nescio an non potius etiam hinc scorbuti increbrescentis fomes derivetur.

Potus sit cerevisia mediocris, mitis, ac bene defæcata, quin & ingredientibus antiscorbuticis, citra ingratum saporem alterata; non sit crassa & dulcis, nec etiam vetusta nimis & acescens: hæc in modica quantitate, ac fere tantum statim prandii ac cœnæ temporibus, sumatur: Quæ apud multos invaluit consuetudo, nempe ut quamprimum lecto excitantur, statim haustu matutino ( uti vulgo dicitur ) largiori indulgeant, perniciofa admodum videtur. Etenim hac ratione, siquidem vasa sanguifera, chyli recentis penu, fere perpetim suffusa, nimis repleantur, & cruditates & fæculentiæ morbificæ in sanguine gignuntur, & hæmatoseos munus valde debilitatur, præstat sane plerosque homines ( nisi quibus ventriculus, quam diu sit vacuus, moleste contrahi & corrugari solet ) usque ad prandium jejunos manere. Nec minus sanitati adversatur mos iste vulgaris, statim a victu poculis plenioribus sese ingurgitare. Vina ac pomacea, modo sint mollia, sincera ac minime adulterata, modice sumpta non nocent; iisdem vero fucatis, rantidis, austeris, aut acrescentibus, nihil magis noxium, ac sanitati nostræ injurium.

Exercitia, ac labores pro scorbutum sanando, tum præcavendo, sunt commodi adeo insignis,



signis, ut multi hoc solo remedio integram valetudinem, aut tuentur aut recuperant: etenim otiosis, & vitam sedentariam agentibus sanguis & liquor nervosus, tanquam aquæ stagnantes, quasi lentorem & situm contrahunt: a motu vero corporis assiduo & multo, humores & spiritus inclarescunt & vigorantur, particulæ excrementitiæ, & heterogeneæ evaporant, viscerum infarctiones expediuntur, eorumque tonus corroboratur.

## CAPUT XI.

*Scorbuticorum hîstoriæ quadam & casus rariores.*

Y.  
Observatio.

QUæ circa scorbuti & theoriam, & therapeutiam hæcenus protulimus, ægrotantium exemplis, sive historiis in medium productis, & juxta hypothesein prædictam explicatis, adhuc clarius elucescent. Cum vero ab hoc morbo laborantium, casus multiplices, ac diversimodi existant, libet hic quosdam rariores, propter labem cerebro ac nervoso generi, non minus quam sanguini affixam, excitatos proponere.

Fœmina illustris, procera & venusta, in ætate 25. circiter annorum, propter varios errores in victu labem scorbuticam contraxerat: Cujus indicia fuerunt lassitudo spontanea, respiratio difficilis, tibiæ doloris & maculæ, atque gingivæ insuper tumidæ & sanguinolentæ, verno tempore, post abortum. in febrem tertianam incidens, cito languida, & imbecillis evasit, a quo tamen morbo primum methodice curata, brevi convaluerat, nisi quod carniæ, aliorumque incongruorum appetens, cito recidivam pareretur. Tunc autem, medicinæ pertæsa, remedia tantum empirica cepit, quibus interdum paroxysmi febriles abigebantur, mox subinde redituri, interim ægrotans pallida ad motum impotens, & anhela, juxta ventriculum, & hypochondria



pochondria tumida, & inflata manebat. Circa tertium ægrotationis mensem, in ventre tormina, & cruciatus acerrimos pati cœpit; quibus modo ad dorsum, modo ad ventriculum excurrentibus, dies & noctes fere continuo affligebatur. Insuper crebra vertigine, ac interdum paroxysmis quasi hysterice afficiebatur, item vomitu frequenti molestata, pituitam viscidam & spumeam quotidie rejiciebat: Intra mensis spatium morbus hic fines suos explicans, dolores in dorso, ac lumbis, dein postea in singulis corporis partibus excitabat. Cæterum hoc tempore, de summa pectoris angustia, & magna viscerum contractione conquesta erat. Interim habitus corporis plurimum emaciabatur, ut ossa carne destituta, vix cuti cohærent. Urina fuit pauca & rubicunda, in cujus superficie, pellicula, instar caudæ pavonis variegata, accrescebat. Brevi posthæc, stupor & fornicationis sensus, modo in ventre, modo in artubus sentiebantur, & deinceps tormina & dolores remitti cœperunt; attamen illorum vice, paralyfis successit, quæ intra hebdomadæ spatium, singula rotius corporis membra ita pervadebat, ut nec manum, aut pedem, aut etiam quamvis partem flectere, aut latum unguem loco movere potuerit.

Quoad prædicti casus Ætiologiam, hic obvium est, symptomata istæc graviora, omnino a radice scorbutica pullulasse; namquæ ob labem sanguini imprimis affixam, lassitudo spontanea, respiratio difficilis, quin & febris intermittens, vaga & sæpius recurrens, aliorumque symptomatum velitationes, quasi præviæ, ac leviores inducebantur: porro urina lixivialis, & coloris variegati, sanguinem dyscrasia sulphureo-salina correptum plane indicabat: cujusmodi lotium, eo ritu insignitum, in pluribus aliis, simili morbo affectis, annotavi. Cæterum in hac domina ægrotante, quando seminium morbidum, copia adactum, & in massam sanguineam exundans, in cerebri & nervosi generis confinia explicaretur,

*Ætiologia.*



tur, affectus adhuc graviores subnascebantur; nempe materies <sup>1006p7</sup> particulis heterogeneis & irritativis constans, intra cerebrum deposita, vertiginem & scotomiam, cum diathesi spasmodica intulit; dein portio ejus in nervos paris vagi, & intercostalis illapsa, eorumque ductu ad plexus mesentericos detrusa, colicam scorbuticam excitavit; cumque eadem materies, in immensum aucta, plerosque alios nervos subiret, affectus dolorifici fere in singulas corporis partes propagabantur; in quantum scilicet recrementa acida, stigmati vitriolici æmula, passim e succo nervoso deposita, cum salsamentis lixivialibus, ubique etiam a sanguine suffusis, congregarentur; ultimo dein cum nervi omnes, a materia morbifica sensim oppleti & infarcti, in tantum obstruerentur, ut spirituum irradiatio, & commercia inhiherentur, paralyfis in toto corpore successit.

*Curatio.*

Hæc domina procul hinc degens, ex Medici vicini consilio, cepit medicamenta, contra affectionem colicam usitata, quibus non obstantibus cum morbus ingravesceret, patiens Oxonium adducta, remedia quam plurima tum antiscorbutica, tum antiparalytica, cujusque fere generis ac formæ, sine quovis tamen fructu, tentavit. Postquam igitur ordinaria quæpiam medendi methodus huic morbo impar videretur, ad remedia magna, & quidem periculo haud prorsus libera, pervenire visum erat. Quare huic ægrotanti, utut debili & emarcidæ, pharmacum mercuriale, salivationis excitandi gratia, exhibebamus. Cujusmodi effectus ex voto successit: namque fluor oris intra biduum exortus, & sine malo quovis symptomate per plures dies blande persistens, illustrissimæ Dominæ plurimum levaminis conferebat. Doloribus enim mitigatis, membra aliquatenus movere, alimenta melius appetere & concoquere, quin & somno quieto frui cœpit: salivatione finita, cepit decoctum e sarfa & China, cum ingredientibus antiparalyticis, per paucos dies; dein Bathoniam adducta, ibidemque thermis



thermis temperatis aliquamdiu usa, mediocrem valetudinis statum recuperabat. Tota hyeme medicamenta contra scorbutum, & paralyfin constanter sumebat; cumque anno sequenti thermarum usum repeteret, perfecte convaleuit; & postea plurium liberorum læta mater evasit.

Vir quadragenarius, temperamentum melancholicum, a multis annis scorbutum laborans, multiplicia & diversimoda ejus symptomata, variis anni temporibus experiri solet. Circa crura maculae, & stigmata nigra latiora, tanquam vibices apparent, ventris dolores, cum alvo soluta, crebro infestant, urina ut plurimum lixivialis apparet, lassitudo spontanea, languor virium, inappetentia fere constanter adsunt: Præter hæc mala ordinaria. & velut assueta, insuper ægrota- tionis paroxysmis atrocioribus, iisque varii generis, obnoxius degit. Ante biennium, quando hunc primo invisebam, de respiratione difficili, tanquam suffocari periclitaretur, cum tremore cordis, spirituum deliquiis, & crebro leipothymias metu, gravissime conquestus erat: insuper siquid horum in præcordiis pathematum paulo remitteret, ut plurimum scotomia gravis, & vertigo eum incessabant. Ab his affectibus, postquam remedia antispasmodica, cum antiscorbuticis complicata aliquandiu ceperat, perfecte convalescere visus erat: deinceps vero intra paucas septimanas nausea & cardialgia, cum hypochondriorum inflatione afficiebatur; urina erat pauca, & valde lixivialis, brevi abdomen intumescerebat, dein pedes, & crura summe œdematosa hydropis ingruentis indicium præbuere: postea femora, nec non dor- si, & brachiorum carnes ejusmodi tumor in- cessit; qui tamen affectus, licet deploratus videretur, remediis antiscorbuticis cum catharti- cis & diureticis adjectis, facile curabatur. At- tamen vir egregius, licet valetudini restitutus, non ita diu perstitit: etenim binis anni quadris vix elapsis, de cephalalgia gravi, cum vertigi-

*Observatio.*



ne, & vigilia pertinaci queri cœpit, deinde, sine causa evidenti, vomitu horrendo corripiebatur: brevi postea paroxysmi asthmatici, cum tremore cordis & spirituum deliquiis, redibant. Hoc etiam tempore, cum pene deploratus videretur, rursus medicamentorum antiscorbuticorum usu brevi convaluit. Ex hoc casu liquido constat, quantum malorum miasma scorbuticum, fermenti instar, tum in sanguine, tum in succo nervoso latitans, & pro data occasione virus suum explicans, inferre potest. Cujusmodi tamen affectus, utut horrendi ac terribiles videntur, dummodo ab humoribus tantum in crasi vitiatis, ac minime a visceribus in tono, aut conformatione læsis dependent, plerumque facili negotio, sc. methodo antiscorbutica, juxta patientis, æque ac morbi conditionem apte designata curari solent.

*Observatio.*

Clarissima Domina 25. circiter annos nata, temperamenti sanguinei, gracilis corporis habitus, εὐχρῶς & venusta, affectione scorbutica dudum laborarat: nam præter maculas latas, & erysipelata in diversis corporis partibus erumpentia, dolores & cruciatus acerrimos noctu potissimum ingravescentes, modo in tibiis, modo in brachiis, a longo tempore pati solebat; medicinam, curationis gratia sæpius inceptam, quia prægnans fuerat, statim omittere cogebatur. Post novissimum puerperium, siquidem lochia copiosius effluerant, per plures dies languida, & imbecillis, cum respiratione difficili, & ad motum quemvis anhela permansit: Post exactum a puerperio mensem lecto excitata, & ambulare aggressa, in dyspnœam gravissimam, cum tremore cordis, & crebro spirituum deliquio, incidit: e vestigio lecto commissâ adhuc tremens, & creberrime palpitans, per integrum fere diem perstitit: porro membra inferiora, tanquam instante letho, prorsus algida, nullis frictionum, aut pannorum excalefactorum applicationibus intepecebant: tandem nycthemero pene elapso, a cardiacis



cardiacis fortioribus frequenter exhibitis, circa præcordia melius habuit, succedebat tamen iuxta inguen sinistrum in summitate femoris dolor valde acutus, usque in suram protensus, atque intra paucas horas tumor subdurus tactui resistens totum illud spatium occupabat. Hoc tempore accersitus, cum ægrotans adhuc δυσπνοῖα & anhela fuerit, statim enemate mox injiciendo præscripto, exhibui sp. C. cervi gut. 12. in cochleari julapii sequentis, ejusdem ℥ij. postea ebibitis. ℞. Aq. limacum ℥vj. hystericæ ℥iiij. jugland. simp. pulegii an. ℥iiij. sacchari ℥j. castorei petia ligat. & in vitro suspens. ℥j. Hæc medicamenta sexta qualibet hora iterabantur. Vesicatorium amplum internæ parti femoris applicandum curavi: dein vesperi, liquidem toto hoc paroxysmo adhuc in omnis perstiterat, exhibui laudani gr. j. margarit. pulv. g. vj. confect. alchermes sine moscho ℥β. Placide dormivit, & mane sequenti plurimum alleviebatur: dolor, & tumor femoris aliquantulum remiserunt; etiam dummodo in lecto quieta jacebat circa præcordia recte habuit, verum erecta, aut in latus conversa, illico prædyspnœa fere expirare visa erat: Usus sp. C. cervi & julapii sexta qualibet hora iterandum per plures dies continuavit. Cæterum quoniam fixi molesta premebatur, atque urinam usque parcam, rubicundam & contentis saturatam reddebat, apozematis sequentis dosin ad ℥vj. bis in die capiebat. ℞. Rad. graminis, cherefolii eryngii. condit. an. ℥vj. rasur. eboris. C. cer. vi an. ℥ij. C. cervi usti ℥j. β. passular. ℥ij. pomum j. incisum, liquiritiæ ℥ij. β. Incis. & contus. coquantur in aq. fontan. ℥iiij. ad tertiæ partis consumptionem; dein additis vini albi ℥iiij. coletur in lagenam, cui imponantur foliorum cochleariæ, beccabungæ an. M. j. salis absynthii ℥ij. f. infusio clausa, & calida per horas tres: Colatura servetur in vasis occlusis. Diebus modo singulis, modo alternis enema injiciebatur. Horum usu indies melius habere videbatur, ut



intra hebdomadæ spatium lecto excitata per duas aut tres horas juxta focum in cathedra sedere potuerit: Si tamen paulo magis, quam par erat, aut lecto abstineret aut movendi nisum exereret, illico in dyspnœam, sive paroxysmum asthmaticum incidere solebat: ita ut quodam die extra lectum diutius morata, morbi insultum graviores perpeffa, respiratione difficili, totius corporis tremore, ac crebris spirituum deliquiis afficeretur: Propter hanc dominæ ægrotantis recidivam, denuo accersitus, sp. C. cervi ad gut. 20. cum julapio supra præscripto, atque vesperi laudani nostri dosin exhibui; cum exinde circa præcordia melius haberet, dolores & tumores in femore, & tibia dextra, quales antea in sinistra evenierant, succedebant: Vesicatoria etiam isti femori applicanda præcepi, atque præter remedia hætenus citata, cepit bis in die vini nostri e succo cochleariæ ꝑiij. cum aq. magistralis antiscorbutici ꝑij. Insuper purgationem ex syrupo nostro solutivo superius præscripto institui; quæ cum bene successit, intra tres, aut quatuor dies iterandam præcepi. His remediis intra mensem convaleuit.

*Ætiologia,*

Quod spectat ad symptomatum rationes in prædicto casu observandas, imprimis obvium est, a maculis, & artuum doloribus, & sanguinem & succum nervosum labe scorbutica dudum fuisse tactos; quæ tamen intra prædictos humores, quousque spiritu vitali ac animali pollebant, velut subjugata, absque malo insigni latebat: post ingentem vero hæmorrhagiam, cum sanguis & liquor nervosus in crasi fatiscerent, morbidi seminii particule, instar fermenti commotæ affectus terribiles excitabant: dyspnœa gravissima propter duplicem causam sive gemini mali concursum exoriri videbatur, nempe & quia sanguis depauperatus in corde stagnaret, & quia nervi quidam pneumonici materia scorbutica obsessi circa respirationis munus inhiherentur: Hinc etenim necesse erat, pulmones,



pulmones, ut sanguinem e corde haurirent, citissime moveri, atque respirationis actus a nervis impeditis, debiliores, proindeque crebriores & valde laboriosos fieri. Urgente dyspnœas paroxysmo, cum sanguis circa præcordia plurimum exaggeraretur, partes extremæ (ubi tum pene defecerat) propter ejus absentiam algebant, postea cum pulmonum spasmi remitterent, atque sanguis materia morbifica, quæ ibidem resorbuerat, valde imbutus, a stagnatione sua solutus, circulationi redderetur, iste in femora, scilicet modo dextrum, modo sinistrum prius desertum, impetuosè irruens, proindeque canales suos exundans, una cum serosa colluvie extravasatus, tumorem subitum, cum phlogosi inducebat. Attamen propter hanc materię morbiicę in partes ignobiliores metastasin semel iterumque factam, morbus licet valde periculosus videretur, remediis humorum dyscrasias alterantibus, atque minerę morbiicę reliquias blande auferentibus, facile cedebat.

Vir nobilis in ætate 33. circiter annor. tem- *Observatio.*  
peramenti, uti videtur, sanguinei, procerus & gracilis, ingenii maxime acuti, animique sagacis, etsi a longo tempore studiis immodicis ac intempestivis, una cum inordinata victus ratione, se plurimum exercuerat, usque tamen vegetus ac vigore plenus, mente sana in corpore sano frui videbatur, paulo antebien-  
nium, cum per noctem integram inter convivastripudiando se valde delassasset, mane lecto frigido intra cameram nimis humidam commissus, & somno aliquanto potitus, ægrotare cœpit. Experrectus enim in maximas circa præcordia perturbationes, cum gravissimis spirituum deliquiis, quasi jam jam fuisset moribundus, incidit. Post vini haustum, & remedia quædam cardiaca assumpta, paulo melius habuit, subinde tamen recidivam passus, ut toto isto die, tum ipse, tum amici ejus, aut syncopen lethalem, aut appoplexiam imminentem vererentur.



vererentur. Cæterum postquam hic morbi insultus præterierat, usque tamen cordis passionibus quotidie obnoxius degebat, & propter graviores quemvis in victu errorem, rursus paroxysmo immaniori affigi solebat. Non obstante remediorum usu, morbus ingravescebat intra paucos menses non tantum præcordia infestabat, verum in toto corporis habitumodo frigoris, modo caloris suffusiones, porro in arrubus aut stupor, aut formicationis sensus, aut leviores spasmi, ac subitæ contracturæ excitabantur. Nuper autem, præter symptomata hæcenus citata, quæ etiamnum Dominum Illustrissimum valde molestant, insuper crebra vertigine, & spirituum cerebri anterioris incolarum distractionibus & deliquiis, gravi modo afficitur, in tantum ut studiis & negotiis (quibus semper addictus fuit) politicis, immo & severiori quavis mentis intentione abstinere cogatur: secus namque tum in capite, tum in nervoso genere ejusmodi perturbationes persentit, ut vel morbi attoniti insultum, vel affectiones spasmodicas horrendas pertimescat: Urgente hujusce ægritudinis paroxysmo majori, plerumque etiam ventriculus perturbatur: Cæterum a vomitu aut sponte naturæ, aut medicamenti emetici ope suscitato, sæpius levamen percepit. Hinc nonnulli morbi causam omnino circa stomachum aut hypochondria subsistere arbitrati sunt: Attamen huic medicamina cathartica, emetica, digestiva, cephalica, antiscorbutica, chalybeata, aliaque cujusque fere generis, a Medicis celeberrimis, quinetiam ab empiricis & agyrtis, per biennium præscripta pro morbi curatione minus profuerunt. Nuper acidulas astropenses expertus, ab earum usu, siquidem deterius habuit, statim desistens, jam proxime consulitur ut aquas sulphureas apud Knaresborough in agro Eboracensi potaret: quo tamen successu dum hæc scriberem mihi nondum constitit.

*Ætiologia.* Hic casus, quia propter variorum symptomatum



matum syndromen, ad nullum præterea peculiare morbi genus spectat, non immerito ad scorbutum refertur. Enimvero suspicari licet, ægrotationis istius procatarxin jamdudum in vitiosa sanguinis dyscrasia positam fuisse, nempe quod liquor ejus a dulci, balsamico & spirituosissimo, in acrem, sive sulphureofalinum, propter elementa isthæc supra modum evecta, degenerasset: quod equidem accidisse videtur, partim ob errata in victu, quippe vir insignissimus post negotia, & studia severiora ad *ασθενεσιον* sæpe protracta, tunc temporis cœnare, & statim lecto commissus obdormire solebat: Porro hic morbus partim oriebatur, a lienis, aliorumque forsan viscerum, fermenta morbida sanguini supeditantium, diathesi valetudinaria: nec enim prorsus sine ratione fuisse censemus quod lien accusaretur.

Sanguis dyscrasia prædicta laborans, proindeque recrementa heterogenea congerens, a causa evidenti adjutus, eadem capiti facile suffundit: quare cum cerebrum propter studia immodica & intempestiva nonnihil debilitatum, injuriis minus resistere valeret, cumque propter occasionem superius citatam, massa sanguinea in majorem ebullitionem evecta, totius corporis poris mox constrictis, satis eventilari nequirit, ejus magna in caput suffusio primam ægrotationem manifestam inferebat: nempe a cruore circa capitis regionem nimis aggesto imprimis faciei intumescencia, & phlogosis evenerunt: porro ab eodem, tunc temporis *αἷμα* consinia impetuosius irruente, ac ibidem stagnante, particulæ heterogeneæ, partim narcoticæ, partim explosivæ, in nervorum origines decumbebant: quibus ita materia incongrua obsessis, perturbationes istæ circa præcordia excitatæ (propter rationes in pathologia spasmodica ostensas) successerunt. Porro in quantum eadem materies versus occiput delata, nervos a spinali medulla oriundos subiens, totos eorum.



eorum ductus, ac processus extremos pervaderet, in toto corpore stupor, formicatio, atque spasmi leviores ciebantur. Porro quia nervi eorumque propagines vasa sanguifera circum ambientes, spasmi affecti, varie contrahebantur, ob sanguinem quasi frænis & stimulis modo coercitum, modo exagitatum, subitæ istæ frigoris & caloris diffusiones in toto corpore exoriebantur.

Circa morbi initia, quia materies νεσφῆ e massa sanguinea suggesta, aut in cerebelli regionem primo irrumpens, aut intra cerebrum licet admissa, illinc denuo statim amandata, circa nervorum origines potissimum defigeretur, idcirco sine vertigine, aut scotomia præviis, aut principibus animæ potentiis insigniter læsis, præcipua labe in appendice nervosa, atque circa exteriores ejusdem processus apparebat: postea vero ob sanguinis dyscrasiam indies auctam, atque τῆ ἰγχιφάλας constitutionem magis labefactam, particulæ heterogeneæ etiam cerebrum antè, sive regale animæ palatium, percurrentes, spiritibus ibidem incolis, & deliquia & distractiones intulere. Adeo morbus hic, post radices alicubi intra ἰγχιφάλας semel actas, non obstante remediòrum usu, fines suos quotidie explicabat, ut cum primo tantum origines nervosæ parvis vagi, ac intercostalis afficerentur, deinde mox horum, aliorumque totius corporis nervorum processus, & ductus interiores, materies morbifica subiret: quibus oppletis, demum, illa e sanguine adhuc impuro in cerebrum ipsum suggesta, nobiliora ejus claustra occupabat: Cujusmodi affectionum cephalicarum similes progressus in multis aliis observavi; ita ut plane constet symptomata istæc, tali serie excitata, ob causas prædictas, ac minime propter vapores, a visceribus elevari suppositos, oriri.

Quod autem paroxysmo urgente, sæpe numero ventriculus perturbatur, item quod a vomitione levamen subito conferri solet, non difficile erit, talva



salva hac hypothesi, rationes ostendere. Quoad prius, nihil magis obvium est, quam ventriculum subverti, atque nauseam aut vomitum succedere, propter molestiam circa nervorum origines insictam, prout in superioribus fuisse ostendimus; dein plures sunt rationes, ob quas vomitio juvenem præstet: Primo namque, siquidem nervi paris vagi, & intercostalis hoc modo plurimum succutuntur (uti partium nervosarum mos est) *ἀναζήσις* suas, a causa interna excitatas, statim remittunt, sc. membrum prurienis, aut dolens, si fricatur aut scalpitur, a molestia liberatur. Cæterum prædicti nervi, inter vomendum valde succussi, & contracti, materiam morbosam, in principiis eorum, aut extremitatibus infixam, facile excutunt; quibus accedit, quod sæpe materies acida, vel acris aut alio modo infesta, intra primas vias aggesta, ibidemque aut sanguinem fermento noxio inficiens, aut corpora nervosa in spasmos irritans, per vomitum educitur, proindeque morbi fons, aut irritamentum evocatur.

Quoad methodum therapeuticam, in hoc casu, aliisque similibus usurpandam, duæ sunt intentiones, quibus præcipue insistendum erit: sc. primo sanguinis massam depurare, ejusque fermenta noxia a ventriculo, liene, aliisque forsan visceribus suggestam, subducere oportet. Secundo cerebrum & nervosum genus, ne particulas extraneas admittant, corroborari: quin & succus nervosus istarum partium irriguus, a recta crasi in acetosam, aliasque morbidam degenerans, restitui & rectificari debet. Prior harum catharticis, emeticis, phlebotomia, ac imprimis medicamentis specificis, cruoris labem scorbuticam corrigentibus, aut penitus auferentibus perficitur: Quoad autem acidulæ ferratæ sive vitriolicæ, celeberrimum sanguinis *καθάρσις*, huic Domino obfuerunt potius quam opem præstiterunt, in causa esse videtur, tum quod cerebrum, propter affectiones cephalicas imbecillius factum, aquæ colluviem sanguini immixtam ægre excludit; quin ab ea confinia



nia sua impetuosius adpellente, inundari periclitatur; tum insuper quia cum liquor nervosus a crasi sua degener, in acetosam vergit, ab acidularum sale fluido magis perverti solet. Quare passim observamus, in rheumatismo & arthritide, ab ejusmodi aquarum potu diathesin morbidam augeri. Secunda intentio per remedia cephalica, ac imprimis sale volatili prædita, cujusmodi sunt sp. & sal sanguinis, fuliginis, C. cervi, radices & sem. pæoniae, folia visci qu. &c. quibus antiscorbutica commiscetur, optime instituitur.

---

F I N I S.

I N

M O

C A  
cc

Q

Dupl  
Masf

Spasf

Horn

in

ter

Cepul

su

Aliq

tu

Part

tu

Intra

In nec

fer

In pue

pas

Motus

sifta

Spirita

ant



ELENCHUS RERUM  
IN TRACTATU  
DE  
MORBBIS CONVULSIVIS.

CAPUT I. De spasmodicis sive motibus  
convulsivis in genere. Pag. I

Quo ritu motus regularis peragitur. I

Ejus duplex principium. ibid.

Duplex item subjectum. ibid.

Musculi motus a spirituum explosione dependet. 3

Spasmi non fiunt ab inanitione aut repletionem. 6

Horum duæ species propter duplicem causam, sc.  
irritationem, & copulam explosivam præ-  
ternaturalem. 7

Copula explosiva spasmodicæ a cerebro cum  
succo nervoso ut plurimum descendit. 10

Aliquando a nervorum extremitatibus suscipi-  
tur. ib.

Particulæ spasmodicæ intra cerebrum admit-  
tuntur tum sanguinis, tum cerebri vitio. 11

Intra caput admissæ, quos affectus producunt. 13

In nervosum genus delapsæ, quæ symptomata in-  
ferunt. 14

In pueris in nervos proximos ad oris ac faciei  
partes sæpius incurrunt, secus ac in adultis  
ibid.

Motus convulsivi in spirituum explosione con-  
sistunt. 15

Spiritus explosiones ineunt ob plenitudinem,  
aut irritationem. ibid.

Convulsiones



- Convulsionibus sunt vel periodicæ, vel continuæ. 16  
 Earum causæ evidentes. ibid.  
 Insultus spasmodici a mera irritatione produ-  
 cti, variis in locis, variisque ex rebus con-  
 tingunt. 18  
 Illos inferunt venena, qualitatum tangibilium  
 excessus, varia sanguinis & succi nervosi  
 recrementa, humores præternaturales, lumbrici,  
 calculi. ibid.  
 Loca affecta sunt vel systematis nervosi princi-  
 pia, vel extremitates, vel medii nervorum  
 processus, ac præcipue eorum plexus. 19, 20  
 Spasmodorum differentiæ recensentur. 20  
 Respectu sc. originis, materia morbifica vel in  
 nervorum principia, vel in eorum extremitates  
 irrepente. ibid.  
 Respectu causarum, quod a causa evidenti soli-  
 taria, aut procataretica dependent. 21  
 Quoad extensionem, quod universales sint, aut  
 particulares. ibid.  
 universales vel primarii, vel secundarii. ibid.  
 Secundum insultus durationem, in quantum  
 continui, aut intermittentes sint. 22

## C A P. II. De Epilepsia. 23

- Epilepsia descriptio, ejusque phænomena recensio. 24, 25  
 Morbi subjectum sive sedes inquiritur. 26  
 Hoc neque meningas, nec cerebri meditullium  
 esse. 27  
 Sed spiritus animales intra cerebri meditulli-  
 um constitutos. 28  
 Paroxysmus epilepticus a spirituum animalium  
 cerebri incolarum subita explosione concita-  
 tur. ibid.  
 Causa



*Causa morbi conjuncta, non aqua in cerebri  
ventriculis congesta, non humor viscidus. 29*  
*Sed copula heterogenea spiritibus affixa. ibid.*

**CAP. III. Epilepsiæ differentiæ & sym-  
ptomatum quorundam rationes explican-  
tur; nec non ejus methodus therapeuti-  
ca adumbratur. 31**

*Epilepsiæ differentia a subjecto, sc. cerebro, quod  
vel primario & idiopathetice, vel secunda-  
rio & per consensum afficitur. ibid.*

*Illius, quæ per consensum excitari dicitur, ratio.  
ibid.*

*Spiritus cerebri incolæ ad explosionem irritati  
epilepticos insultus inducunt. 32*

*Preliminaria symptomata extra cerebrum ob-  
servata, causæ evidentis, vel signi rationem  
habent. 32, 33*

*Morbi committialis propter varias circumstan-  
tias differentia. 33*

*Cur epileptici cum impetu prosternuntur. ibid*  
*tende spuma ex ore effluit. 34*

*Quare pectora contundunt. ibid.*

*Morbi prognosis. 35*

*Difficillimæ curationis existit, tum quia cere-  
brum inficitur, tum quia singulis paroxysmis  
plurimum debilitatur. 35*

*Nonnunquam sponte sua, interdum remediorum  
ope sanatur. ibid.*

*Circa pubertatem morbus aliquando solvitur, in  
quantum eo tempore duplex alteratio corpori  
contingit. ibid.*

*Non raro in mortem terminatur, vel in alium  
morbum commutatur. 36*

*Epilepsiæ Therapsis. 37*

*Indi-*



## ELENCHUS RERUM.

<i>Indicationes sunt vel curatoriæ, vel prophylacticae.</i>	37, 38
<i>Specificorum virtus explicatur.</i>	39
<i>Historia aliquot epilepsia affectorum.</i>	40, 41, 42
<i>Methodus therapeutica in morbo commitiali observanda.</i>	43, ad 48

### CAP. IV. De cæteris convulsionum speciebus, ac imprimis de motibus convulsivis puerorum.

<i>Multiplices spasmodum-ideæ.</i>	ibid.
<i>Infantes circa duo potissimum tempora convulsionibus præcipue obnoxii, sc. intra primum a partu mensem, &amp; circa dentium eruptiones.</i>	ibid.
<i>Propter duplicem item causam, tum quia cerebrum obtinent debilius, tum ob mala ab utero contracta.</i>	50
<i>Causæ evidentes in puerulis motus convulsivos inducentes.</i>	51, 52
<i>Quo ritu insultus epileptici in illis præcurentur.</i>	53
<i>Quamobrem febris &amp; convulsiones dentitioni superveniunt.</i>	54
<i>Atrocitatis doloris dentium ratio.</i>	ibid.
<i>Infantum a spasmodis præservatio,</i>	56
<i>Methodus medendi nutricibus adhibenda</i>	57
<i>Puerorum convulsionibus laborantium curatio</i>	58, 59
<i>Quomodo tractandi, qui propter dentitionem dolorificam in spasmos incidunt.</i>	57
<i>Eorum, qui ob alias causas convulsi evadunt, medicatio.</i>	ibid.
<i>Propter lumbricos aut acres humores.</i>	60



# ELENCHUS RERUM.

CAP. V. De morbis convulsivis adultiorum, propter originem nervosam præcipue affectam, oriundis. 61

*Spasmodum adultioribus accidentium tres species, secundum multiplicem causæ morbificæ [sedem in, quantum hæc vel nervorum principia aut extremitates, vel medios processus occupat. ibid.*

*Convulsiones a nervorum origine affecta oriundæ explicantur & distinguuntur, tum juxta varios nervos affectos, tum juxta eorundem nervorum varia loca affecta. 61, 62*

*Quo ritu materies spasmodica in nervos deferatur. 63, 64*

*Historiæ quædam rariores hujusmodi convulsionibus affectorum. 65 ad 77*

*Affectio hysterica æmula in viro. 73*

*Sanguis emissus statim congelans. 74*

*Paroxysmus inchoatus a molis cujusdam ab imo ventre ascensu. ib.*

*Ascensus hic molis, a spiritibus intra plexus mesentericos in explosiones adactis processit. 75*

*Paroxysmo convulsivo juxta nervorum origines incipiente, spiritus extime degentes explosiones interdum primo ineunt. 75*

*Quod duplici de causa contingit. 76*

*In affectibus convulsivis subitaneæ sanguinis congelationis ratio assignatur. 77*

*A paroxysmo producitur. ibid.*

*Methodus therapeutica in curandis hujusmodi convulsionibus. 78 ad 81*

*Medicamenta in temperamento calidiori. 79*

*In frigidiori. 80*

CAP.



C A P. VI. De motibus convulsivis,  
quorum causa circa nervorum extremi-  
rates, aut intra plexus nerveos subsi-  
stit. 82

*Affectiones spasmodicae non semper a capitis vi-  
tio procedunt.* ibid.

*Sed interdum a pharmitis ventriculi tunicas  
vellicantibus, a lumbricis, a lapide ureteri  
infixo.* ibid.

*Nonnunquam propter noxam nervorum apicibus  
illatam incipiunt.* 83

*Vel ob irritationem, vel ob copulam explosivam  
accidunt.* ibid.

*Historiae & exempla illustriora spasmodorum a  
nervorum extremitatibus oriundorum.*  
84 ad 90.

*De spasmodis plexus nerveos praecipue occupanti-  
bus.* 88

*Circa mesenterii plexus in passionibus vulgo  
dictis hystericis.* ibid.

*Intra plexus nerveos lienares, & stomachicos in  
inflationibus lienis, ac ventriculi.* ibid.

*Ad plexus cardiacos in cordis tremoribus &  
insultibus.* 89

*Intra pneumonicos, aut cervicales, in asthmatis  
paroxysmis.* ibid.

*Præfocationis sensus in gutture propter materi-  
am spasmodicam intra plexus ganglioform-  
es aggestam, & explosam excitatur.* 90

C A P. VII. De motibus convulsivis, a  
liquore corpora nervosa irrigante, to-  
tosque eorum processus in spasmos ir-  
ritante, oriundis. 91

Spas-



*Spasmi universales per totum genus nervosum oberrantes, ad tria præcipue referuntur. ib.*

*A tribus causarum generibus potissimum dependent ibid.*

*Scil. vel a venenis aut veneficiis, a febre maligna, aut male judicata, vel a liquore nervoso propter affectionem scorbuticam, aut alias vitiosam degenerante. 91*

*Spasmi a venenis. 92*

*Venena spasmos inducentia multiplicia, a vegetabilium classe petita, a cane rabido, a tarantula. ibid.*

*Quo ritu affectiones spasmodicas inducunt. 93*

*Symptomata, quæ tarantulae morsui succedunt, explicantur. 93, 94*

*In eorum sedatione musicæ efficacia. 94*

*Unde musica demorsos in saltationem excitat. ibid.*

*Choræ S. Viti descriptio. 95*

*Symptomata explicantur. 95, 96*

*Spasmi universales a veneficio. 95*

*Non omnes a diaboli præstigiis excitantur, sed ut plurimum a causis naturalibus incipiunt ac desinunt. 96, 97*

*Quod robur supra humanum aliquando exeri videmus, a copula explosiva immaniori dependet. ibid.*

**C A P. VIII.** De spasmis universalibus, qui in febribus malignis, male judicatis, & quibusdam anomalis, excitari solent. 98

*Symptomatum febribus supervenientium census ac Aetiologia. ibid.*

*Morbi convulsivi & maligni Hassiæ, Westphaliæ,*



# ELENCAUS RERUM.

*lia, & in locis vicinis olim epidemici ex*  
*Greg. Horstio descriptio.* 99  
*Symptomatum rationes explicantur.* 100

*Febris Epidemicæ cerebro & nervoso ge-*  
*neri potissimum infestæ, anno 1661 in-*  
*crebrescentis descriptio.* 101

*Causæ procatarticæ; qualis anni constitutio*  
*præcessit.* ibid.

*Symptomata recensentur.* ibid.

*Inter illa, debilitas magna, spirituum languor,*  
*functionis animalis torpido, esculentorum*  
*fastidium, ad motum ineptitudo, vertigo, au-*  
*rium tinnitus, cerebri tumultus, tussis imma-*  
*nis, febris lenta ac velut hectica, atrophia. ib.*  
*Circa morbi incrementum symptomata ingravesc-*  
*cebant, hinc aperta phrenesis, altus stupor,*  
*involuntarium, loquelæ defectus, involuntarium*  
*excrementorum profluvium, scotomiæ, motus*  
*convulsivi, alvi fluxus foetidus & decolor,*  
*urina intense rubicunda, tussis molesta cum*  
*sputo copioso ac crasso, tumores in glandulis*  
*cervicalibus, ulcera cava, maculæ exiguae*  
*& petechiales.* 102, 103, 104

*Febris hæc contagiosa erat.* 104

*Curatio ejus difficilis.* ibid.

*Symptomatum rationes assignantur.* ibid.

*Qualem sanguini & liquori nervoso diathesin*  
*malam anni constitutio imprefferat.* 106, 107

*Cur in pueros, scæminas, & viros phlegmaticos*  
*præcipue deserviebat?* ibid.

*Atrophie, febrî huic supervenientis, ratio.* ibid.

*Succi nervosi vitio contigit.* ibid.

*unde febris hæc difficulter curari solebat.* 108

*Tussis immanis & glandularum tumores, a ma-*  
*tiri-*



## ELENCHUS RERUM.

- teria morbifica in illas partes deposita.* 109  
*Ægrotantium historia & exempla.* 109 ad 114  
*Morbi diagnosis e dissecto cadavere investiga-  
 ta.* 113  
*Methodus therapeutica.* 115 ad 119  
*Morbi, febris intermittentis typum referentis,  
 atque in succo nervoso radicati, historia op-  
 pido rara.* 119  
*Tinctura Antimoniivi egregia in nimio urinæ  
 profluvio.* 120  
  
**C A P. IX.** De spasms universalibus, qui  
 propter succi nervosi diathesin scorbuti-  
 cam excitati solent. 121  
  
*Convulsionum universalium duæ species, sc. dis-  
 cretæ vel connexæ.* *ibid.*  
*Discretæ seu intercise natura explicatur.* 122  
*Et spasmus, & paralyfi complicatur.* *ibid.*  
*Spiritus animales in hoc affectu particulis tum  
 explosivis, tum narcoticis, tum etiam ali-  
 quatenus irritativis, imbuuntur.* *ibid.*  
*Hujusmodi intercise convulsionis exemplum il-  
 lustrans.* 123, 124, 125  
*Symptomatum præcipue urgentium rationes ex-  
 plicantur.* 125  
*Observationibus anatomicis confirmantur.* 128  
*Affectiois convulsivæ continuæ natura &  
 fiendi modus.* 131  
*Exemplis & historiis insignioribus illustratur  
 una cum methodo therapeutica in illis casi-  
 bus observata.* 132 ad 153

**C A P. X.** De passionibus, quæ vulgo di-  
 cuntur, hystericæ.



<i>In passionibus hystericis uterus falso accusatur.</i>	ibid.
<i>Earum descriptio.</i>	ibid.
<i>Symptomatum causæ inquiruntur.</i>	155
<i>Nec ab uteri ascensu, neque a vaporibus exinde elevatis procedunt.</i>	ibid.
<i>D.D. Highmori opinio examinatur.</i>	ibid.
<i>Affectio, dicta uterina, convulsiva est, a cerebro &amp; nervoso genere affectis potissimum dependet.</i>	157
<i>A spirituum animalium explosionibus produci- tur.</i>	158
<i>Materia morbifica sæpe nervorum principia occupat.</i>	159
<i>Dein in totos eorum ductus disponitur.</i>	ibid.
<i>Symptomatum hystericorum rationes explican- tur.</i>	160
<i>Eorum distinctio instituitur, prout materies morbifica hos aut illos plexus nerveos occu- pat.</i>	161, 162
<i>Copula explosiva circa nervorum principium spiritibus accrescens, a sanguine suffunditur.</i>	162
<i>Duplici de causa accretio hæc contingit.</i>	ibid.
<i>Passiones dictæ hystericæ, aliquando a causa morbifica extra cerebrum delitescente produ- cuntur.</i>	163
<i>Hæ duplici modo accidunt, vel ob solutionem continui, vel ob succi nervosi obstructionem.</i>	164
<i>Convulsio a glandulis inguinalibus compressis.</i>	165
<i>Objectiones contra nostram hypothesein propo- nuntur &amp; solvuntur.</i>	165, 166, 167
<i>Cur scemine crebrius, quam viri, affectibus his convulsivis tentantur.</i>	166
	unde



# ELENCHUS RERUM.

*tende remedia circa abdomen applicata, leuamen conferre solent.* 167

*Quamobrem suavia paroxysmum accersunt, fœtida eundem abigunt.* 168

*Hypothesis nostra anatomicis observationibus confirmatur.* 168 ad 176

*Medendi methodus instituitur, remedia antispasmodica indicantur, sed cum uterum respicientibus aliquando complicanda.* 176

*Indicatio curatoria.* ibid.

*Præservatoria, quæ tres præcipuæ intentiones complectitur.* 177 ad 181

*uteri dislocatio in puerperis mox a partu.* 180

C A P. XI. De affectibus, vulgo dictis hypochondriacis, quos, ostenditur, maxima ex parte esse convulsivos, obiter iteni de medicamentis chalybeat. 182

*Affectus hypochondriaci descriptio.* ibid.

*Ad genus nervosum spectat.* 184

*In ejus causas inquiritur.* ibid.

*D.D. Highmori hypothesis ventilatur.* 185

*Quali officio lien defungitur.* 186

*Non, ut ventriculi calorem foveat, conditus.* ib.

*Sanguinem in fermentum evehit.* 187

*Viscus hoc triplici vasorum genere instruitur, sc. arteriis & venis, ac insuper insignioribus nervorumplexibus fibrisque nerveis.* 188

*Per arterias in lienem delatus sanguis digestionem in succum fermentativum exaltatur* 188, 189

*Hic per venas sanguini communicatus, asperitatem & vigorem illi conciliat.* 189

*Cruoris interventu, cerebrum & genus nervosum inspirat.* ibid.

P

SUCCUS



# ELENCHUS RERUM.

<i>Succus lienaris insuper ad cerebrum defertur per nervos.</i>	ibid.
<i>Hic spiritus animales exacuit.</i>	ibid.
<i>Lienis influentia in producendis passionibus hypochondriacis.</i>	190
<i>Lienis obstructio, sanguis in arterie coeliacae ramos regurgitat, unde ventriculo, omento, mesenterio male affectis, dolores spasmi, flatus, pulsatio subtus ventriculum contingunt.</i>	ibid.
<i>Quo ritu lien sanguinem in fermentum evehendum pervertit.</i>	ibid.
<i>A sanguine lienis culpa depravato, labes cerebro &amp; nervoso generi imprimitur.</i>	191
<i>Succus lienaris degener factus, cerebro per nervos expeditius suffunditur.</i>	192
<i>Historiae &amp; exempla rariora passione dicta hypochondriaca affectorum.</i>	193, 194, 195
<i>Methodus therapeutica instituitur, quae quatuor indicationes respicit, sc. curationis impedimenta removenda sunt:</i>	196, 197
<i>Lienis vitia emendanda.</i>	197
<i>Sanguinis dyscrasia lienis vitio contracta tollenda.</i>	198, 199
<i>Cerebri &amp; nervosi generis, nec non humoris irrigui, ac spirituum enormitates abolendae</i>	199, 200
<i>Medicamentorum chalybeatorum preparationes &amp; effectus explicantur.</i>	200
<i>Limatura.</i>	201
<i>Calcinatio cum sulphure.</i>	202
<i>Preparatio cum aceto.</i>	203
<i>Ferri rubigo.</i>	ibid.
<i>Preparatio nostra.</i>	ibid.
<i>Vitriolum Martis.</i>	204
<i>Crocus Martis astringens.</i>	205



# ELENCHUS RE RUM.

C A P. XII. De tussi ac asthma con-  
vulsivis. 207

*Tussis mere convulsivæ exemplum.* ibid.

*Pueros ut plurimum, raro adultiores infestat.* ib.

*A materia spasmodica nervos pneumonicos sube-  
unte excitatur.* 208

*Asthma quandoque pulmonum vitio accidit.* 209

*Interdum mere convulsivum a nervis solummodo  
affectis procedit.* 210

*Historiis & exemplis confirmatur.* 210 ad 214

*Tussis convulsivæ curatio.* 214

*Asthmatis spasmodici medicatio.* 215

P. 2. I. N.



ELENCHUS RERUM.  
IN TRACTATU.  
E E  
S C O R B U T O.

CAPUT. I. Scorberi descriptio, ejus  
causa interna, & proxima potissimum  
in sanguine; dein aliquatenus in liquo-  
re nervoso radicata. 219

**I**N veteri medicina rara scorbuti mentio. ib.  
Præcipuorum symptomatum census institui-  
tuitur. 220

Causæ evidentes, quæ morbum inducant, aeris  
insalubritas & sanguinis crasis vitata. 221

Non raro per contagium excitatur, quandoque  
hereditarius existit. ibid.

Miasma scorbuticum vel in sanguine, vel in suc-  
co nervoso, aut simul in utrisque continetur. 222

Sanguinis & vinorum dyscrasie comparantur.  
ibid.

uti vinum, ita sanguis ob duas præcipue causas  
agrotare solet. ibid.

Scil. propter aliquid extraneum & non rite mis-  
cibile huic aut isti confusum, vel quoniam  
liquoris crasis pervertitur. 222, 223

Vinum & sanguis ob multas causas a recta  
temperie desciscunt. 223

Cum maturitatem non attingunt, unde vinum  
in vappam degenerat, sanguis crudus fit.  
ibid.

Quandoque pars sulphurea nimium exaltatur;  
hinc vina immodice ebulliunt, sanguis feбри-  
lem intemperiem contrahit. 224

Interdum pars salina in fluorem vehitur, liquor  
inde in acetum transit, melancholia induci-  
tur. ibid.

Non



## ELENCHUS RERUM.

Nonnunquam spiritu depresso particula sulphurea & salina simul combinata exaltantur, hinc vina rancida aut pendula evadunt.

ibid.

Vina rancida fiunt propter sulphuris cum sale combinati prædominium.

225

Pendula, ob salem evectum & fluore potitum sulphuris minori licet copia, intime adunitum.

ibid.

Sanguinis dyscrasia, pariter ac vini duplex, nempe sulphureosalina, ac salinosulphurea.

ibid.

utraque scorbuti parens.

ibid.

In scorbutica sanguinis ranciditate, sulphure prædominio potito, sanguis nimium ebullit

ibid.

Remedia temperata conveniunt.

ibid.

In mucilaginosa ejus constitutione sale prædominante, vini instar penduli, crassior evadit.

226

Quo ritu labes scorbutica liquori nervoso imprimitur.

ibid.

Labes hæc in tribus potissimum consistit.

227

Vid. quod liquor pauperior evadit, quod a crasse spirituosalina versus acetosam degenerat, quod particulis heterogeneis refertur.

ibid.

C A P. II. De scorbuti causis remotioribus, a quibus nimirum massæ sanguineæ, & per consequens liquori nervoso, labes affigitur.

228

In causas dyscrasie sanguinis scorbuticæ tum sulphureosalinæ tum salinosulphureæ inquiritur.

ibid.

Aliorum sententiæ de origine scorbuti recensentur.

228, 229



## ELENCHUS RERUM.

Non semper lienis aut primarum viarum vitio  
contrahitur. 230

De variis occasionibus & procatarxeos modis,  
a quibus scorbutus originem suam ducere vi-  
detur. 231

Quam ob rationem aer insalubris scorbutum pa-  
rit. ibid.

Quare febribus diuturnis & aliis morbis super-  
venit. 232

Quomodo hæreditario contrahitur. 233

unde per contagium serpit. 234

Quomodo viscerum & primarum viarum culpa  
imprimitur. 234, 235

Quare tristitia & studia immodica scorbutum  
inducunt. 236

Labes scorbutica e sanguine in cerebrum & ge-  
nus nervosum derivatur. 237

C A P. III. De scorbuti differentiis, i-  
tem de morbi huius signis, sympto-  
matis, causis, imprimisque de illis  
quæ propter labem sanguini impressam  
oriuntur. 238

Scorbuti distinctio juxta duplicem causæ regi-  
onem, sc. quod sanguine vel liquore nervoso po-  
tiores radices egerit. ibid.

Secundum duplicem sanguinis affecti labem, quæ  
vel sulphureo salina vel salino sulphurea, unde  
scorbutus iisdem nominibus insigniatur. ib.

Quoad morbi originem, quatenus vel per conta-  
gium vel per internam procatarxin prurit. ib.

Juxta morbi statum, in quantum inchoatus vel  
perfectus fuerit. ibid.

Signa & symptomata, eorum variæ distincti-  
ones. 238, 239

Oriuntur vel propter labem sanguini præcipue  
affixam.



## ELENCHUS RERUM.

<i>affixam, vel propter succi nervosi vitia, vel propter utriusque humoris enormis faeli, congressus.</i>	239
<i>Symptomata propter sanguinis dysscrasiam scorbuticam recensentur una cum illorum fiendi modis &amp; rationibus.</i>	240
<i>Cujusmodi sunt lassitudo spontanea, respiratio difficilis.</i>	241, 242
<i>Pectoris angustia.</i>	243
<i>Pulsus inordinatus.</i>	245
<i>Passiones cordis, febres vagæ.</i>	ibid.
<i>Sudores nocturni, urina lixivialis.</i>	246
<i>Sputatio copiosa, gingivarum sanguinolentia &amp; putrefactio, dentium eroso, vacillatio, aut casus, oris foetor.</i>	247
<i>Maculae &amp; exanthemata varia.</i>	249
<i>Alvi fluxus, vomitus, nausea, cardialgia, rugitus, dysenteria, crebra hæmorrhagia.</i>	250, 251
<b>C A P. IV. Symptomata &amp; accidentia quæ in scorbuto, propter labem cerebro &amp; nervoso generi impressam, exoriri solent.</b>	252
<i>Puillanimitas &amp; totius corporis languor, melancholia.</i>	ibid.
<i>Paralysis.</i>	253
<i>Dolores.</i>	254
<i>Horum variae species, alii leviores &amp; cito transeuntes, alii graviores &amp; difficulter mobiles.</i>	ibid.
<i>Posteriores vel fixi vel vagi.</i>	ibid.
<i>Dolores fixiores in variis partibus excitantur sc. in ventre.</i>	ibid.
<i>In variis abdominis partibus.</i>	256
<i>In lumbis &amp; dorso.</i>	257
<i>In pectore &amp; pleura, in capite.</i>	ibid.



## ELENCHUS RERUM.

<i>In cruribus.</i>	258
<i>Vertigo scorbutica.</i>	259
<i>Somnolentia &amp; torpor, vigilia.</i>	260

### CAP. V. De scorbuti symptomatis, quæ propter conjunctas sanguinis & succi nervosi dyscrasias oriuntur.

261

*In hoc censu sunt atrophia scorbutica, arthritis  
vaga.*

261, 262

*Rheumatismus.*

263

*Quo ritu differunt morbi per se excitati &  
scorbuto supervenientes.*

264

### CAP. VI. Scorbuti prognostica.

265

*Plures pro desperatis habiti convaluerunt.*

ibid.

*Scorbutus ab intemperie sanguinis sulphureo-  
salina ægrius curatur, quam qui a salino sul-  
phurea.*

266

*Febris diuturnis, aliisque morbis chronicis  
supervenienti diffilioris curationis habetur*

ibid.

*Morbus adhuc recens non raro sanationem per-  
fectam admittit; radices altiores agens, vix  
unquam extirpatur.*

267

*Remedia non unius generis adhibenda, sed sæpi-  
us mutanda.*

ibid.

*Scorbutus ingravescens tandem hydropem vel  
phthisin inducit.*

268

### CAP. VII. De scorbuti curatione.

ibid.

*Indicatio triplex, præservatoria, curatoria &  
vitalis.*

ibid.

*Indicatio præservatoria absolvitur catharticiis  
&*

&



## ELENCHUS RERUM.

<i>Et per vomitum Et per secessum.</i>	270 ad 273
<i>Phlebotomia.</i>	273
<i>Digestivis.</i>	275
<i>Specificis, quorum variae extant species.</i>	ibid.
<i>Electuaria, confectiones.</i>	276, 277
<i>Pulveres, pilulae.</i>	278
<i>Tabulae, decocta.</i>	278, 279
<i>Infusiones.</i>	280
<i>Succi, syrupi.</i>	281
<i>Aquae destillatae.</i>	282
<i>Vina Et cerevisiae.</i>	283

C A P. VIII. De medicamentis cujusque  
Prædictarum formularum generis, scor-  
butum, in constitutione calidiori, &  
sanguinis dyscrasia sulphureosalina,  
excitatum respicientibus. 284

*In dyscrasia sanguinis sulphureosalina remedia  
acria Et sale volatili prædita multum no-  
cent.* ibid.

*In his casibus medicamenta temperata indi-  
cantur.* ibid.

<i>Horum formulae variae, sc. electuaria.</i>	285
<i>Confectiones, pulveres, pilulae, tabulae.</i>	285, 286
<i>Decocta, infusiones.</i>	286, 287
<i>Succi expressi, syrupi, aquae destillatae.</i>	287, 288
<i>Vina, Et cerevisiae.</i>	289

C A P. IX. De scorbuti curatione, qua  
ipsi morbo & symptomatis præcipue  
urgentibus occurritur. 290

*De curandis difficili respirazione Et paroxys-  
mis asthmaticis.* 291

*De ventriculi affectibus scorbuto accidere so-  
litis.* 292

Di



## ELENCHUS RERUM.

<i>De dolore ventris &amp; colica scorbutica.</i>	293
<i>De diarrhœa &amp; affectibus dysentericis.</i>	ibid.
<i>De vertigine, ac leipothymia aliisque affectibus eidem in affectione scorbutica adjungi solitis</i>	294
<i>De hæmorrhagiis.</i>	295
<i>De vitiis oris, propter scorbutum oriundis.</i>	297
<i>De doloribus, crura, ac alios interdum artus, noctu potissimum infestare solitis.</i>	299
<i>De arthritide vaga scorbutica.</i>	300
<i>De affectibus convulsivis &amp; paralyticis, scorbuto supervenire solitis.</i>	302
<i>De atrophia, item de febre scorbutica, quæ sæpe illius aut causa est aut effectus.</i>	303
<i>De rheumatismo.</i>	305
<i>De hydrope.</i>	306
<i>De crepitu ossium.</i>	307

C A P. X. De indicatione vitali, qua includuntur medicamenta cardiaca, opiata & diæta, sive victus ratio in scorbuto requisita. 310

<i>Cardiacorum formulæ.</i>	311
<i>Opiatorum insignis usus.</i>	312
<i>Opii præparata in forma liquida.</i>	ibid.
<i>Regimen dieteticum.</i>	312, 313
<i>Præcipue circa aerem &amp; habitaculi situm, cibum ac potum, atque corporis motum &amp; quietem versatur.</i>	ibid.

C A P. XI. Scorbuticorum historiarum quædam & casus rariores. 314

F I N I S.



293  
bid.  
294  
295  
297  
299  
300  
302  
303  
305  
306  
307  
310  
311  
312  
bid.  
313  
314




℞ Racul Bryon  
 Aca fatid Castor. a 3i  
 Sal Corallij Succ coral  
 Jov a 3B Galban sol  
 in Aq Hyster q s m ff  
 maha

℞ Aq Baec Sambac  
 Aq craf nig a 3vi  
 Aq Bryon campos 3i  
 in Jstis extingur ad  
 Potalsm consump tress  
 Camph Jv add ~~Castor~~  
 add Syrup & Corallys  
 3i m/

### Cinctura

℞ Diacet Senne Geron 3ij  
 Syrup & Ros solut 3ss  
 cremor tart Jv Aq mir 3ij  
 m ff







Incubo

R Sp vii rectif tartarif 3vi  
Ol ma succ aa 3ij  
mixta stent p Crampus donec  
Spiritus Salis Armon 3ij  
Ex Phiala oblonga distilla ex  
arena & serva ad usum

R Huius spirit olros 3ss  
Aq cinnam 3ss  
Apothet 3i  
Spr de cinnam 3ss  
In & ad vitrum coaleat in  
ortur

vel R Conf flor paeon  
Rorismarin a 3i  
Sal cc volat gr vi  
magis succin gr iiij  
In ff. Bolus horis matutinis  
& vespertinis usurpandus  
Decoctum Lignorum in qd instill  
= tur Spirit Sal Armon  
Aq Cinnamon addita Ambra  
Particula  
Sperma ceti



