

**Dissertatio de febribus intermittentibus praecipue medendis ... / auctore
Henrico Xavier Baeta.**

Contributors

Baeta, Henrique Xavier, 1776-1854.

Publication/Creation

Edinburgi : Apud Jacobum Pillans et filios, 1800.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/gf5fhcbc>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Suppl. P | BAE

52874/10

BW7

DISSERTATIO

DE

FEBRIBUS INTERMITTENTIBUS

PRÆCIPUE

M E D E N D I S.

ОГЛАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ

DISSERTATIO

DE

FEBRIBUS INTERMITTENTIBUS

PRÆCIPUE

M E D E N D I S.

A U C T O R E

HENRICO XAVIER BAETA,

LUSITANO.

*Fierce from his Fens the Giant Ague springs,
And wrapp'd in Fogs descends on vampire wings.*

DR DARWIN'S B. G. p. 2. cant. 1.

EDINBURGI:

APUD JACOBUM PILLANS ET FILIOS.

1800.



To Dr. Duncan
who having made
the Analysis of
Dr. Darwin's Zoonomia
may be a proper Judge
of the merit of the
following pages
from his std.

H. L. Baed

*Je ne connois rien de plus estimable, dans le monde, après
l'homme vertueux, que l'homme savant, si toutefois on peut
séparer les sciences de la vertu. — ST PIERRE.*

ERASMO DARWIN, M. D.

S. R. S.

EXIMIORUM OPERUM,

ZOONOMIÆ, PHYTOLOGIÆ, HORTI BOTANICI, &c.

AUCTORI;

OB UNIVERSALEM, QUA FULGET, SAPIENTIAM;

OB MAXIMAS, QUIBUS ORNATUR, VIRTUTES;

OB INSIGNEM ERGA ME URBANITATEM;

HOC OPUSCULUM

GRATI ANIMI, ET OBSERVANTIAE

TESTIMONIUM:

D. O. C.

HENRICUS XAVIER BAETA.

Слово о том как в селе Борисоглебском
в селе Борисоглебском в селе Борисоглебском
в селе Борисоглебском в селе Борисоглебском

СЛОВО О ТОМ

о том как в селе

Борисоглебском

в селе Борисоглебском в селе Борисоглебском

в селе Борисоглебском

в селе Борисоглебском в селе Борисоглебском
в селе Борисоглебском в селе Борисоглебском
в селе Борисоглебском в селе Борисоглебском

в селе Борисоглебском

в селе Борисоглебском

в селе Борисоглебском

в селе Борисоглебском



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30382178>

“ A THEORY founded upon nature, that
“ should bind together the scattered facts of
“ medical knowledge, and converge into one
“ point of view the laws of organic life, would
“ thus, on many accounts, contribute to the
“ interest of society. It would capacitate men
“ of moderate abilities to practice the art of
“ healing with real advantage to the public ; it
“ would enable every one of literary acquire-
“ ments to distinguish the genuine disciples
“ of medicine from those of boastful effrontery,
“ or of wily address ; and would teach man-
“ kind, in some important situations, the know-
“ ledge of themselves.”

Dr Darwin's Zoonomia, vol. I. preface.

*Te sequor ——— inque tuis nunc
Fixa pedum pono pressis vestigia signis :
Non ita certandi cupidus, quam propter amorem
Quod te imitari aveo ———*

Lucret. de Rer. Natur. lib. 3.

DISSE^TRAT^O &c.

QUATUOR hoc Tentamen absolvetur
Sectionibus.

In prima, Quædam de immediata Intermittentium suppressione, et periculis, quæ inde, ut aliqui putant, nascuntur, consequentiis loquemur.

In secunda, *imo*, Quo pacto Paroxysmi frigoris et caloris formari videantur, explicare tentabimus; indeque duæ in curatione Intermittentium indicationes deducendæ. *2do*, Tabulæ, in quibus omnia, quæ ad hasce indicationes adimplendas necessaria sunt, adjicientur. *3tio*, Eorum utilitas, quæ in Tabulis continentur, stabilietur.

In tertia, De iis, quæ in Intermittentibus fungandis utilissima reperta sunt, remediis agemus.

In quarta, Denique, de iis, quæ in Intermittentium curatione cum restrictione adhibita sunt, tractabimus.

S E C T. I.

An sibi relictae febres intermittentes per se ipsas desinant, et an ab initio earum cura instituenda sit (a) ?

I. AGITATA jamdudum hæc quæstio est, ex Hippocratis ad nostra hæc tempora, multique intermittentes sibi relinquendas, naturæ viribus sanandas, saltem earum curationem perten-
tandam non esse, priusquam earum typus for-
maretur, autumârunt medici.

II. Febrem naturæ, ad morbificam ex cor-
pore materiem expellendam, conatum esse, per-
suasio Sydenhamum induxit, ut vel febres in-
termittentes naturæ relinqueret, vel *vitæ vires*,
si periculum non adesset, tantum adjuvaret.
“ Febris intermittens,” inquit ille, “ sponte de-
sistit, si pharmaco non curatur, per septem
scilicet accessiones.”

III. Hujusmodi res nuperrimè a Cive Hu-
sone in libello memoriali, cui titulus, “ Les
fievres

(a) Senac. de recondita febrium natura.

“ fievres tierces simples, doivent-elles être
“ abandonnées à elles mêmes jusque après le
“ septieme accès?” (b) tractata est.

IV. Contendit Huson, febres tertianas reme-
diis fortibus ante septimam accessionem sup-
primendas non esse, hisce argumentis fultus.
imo, Quia multi periculosique morbi ex earum
suppressione nascuntur:—“ Combien,” in-
quit ille, “ les deux exemples que cite Grant
“ doivent arreter l’ardeur trop precipitée des
“ Medecins à supprimer la fievre? Une fem-
“ me gagne une hydropisie, un jeune homme
“ une tumeur au foie, suivie d’ictere; tous
“ deux perissoient, s’il n’eut rappelé la fievre
“ tierce supprimée par le Kina avant le sep-
“ tieme accès” (c). 2do, Quia febres ita fuga-
tæ recurrere possunt. “ Torti,” inquit ille,
“ cite l’exemple d’une tierce simple, le malade
“ fut saigné les premiers jours, et le troisième
“ acces fut supprimé par le Kina. La fievre

A 2

“ revint

(b) Memoires de la Société Medicale d’emulation
pour l’an V. de la Republique Franc̄oise, p. 24.—39.

(c) Ib. p. 32.

" revint au bout d'un mois, fut encore supprimée par le même moyen, et le malade eut une seconde rechute" (*d*).

V. Quod Huson de hydrope, et hepatis tumore, febrium suppressionem sequentibus, ab eaque inductis, ratione stabiliri minimè videtur. Nam quo pacto fieri potest, ut suppressio causæ corpus debilitantis morbos inducat, qui ab hujusmodi causæ præsentia producuntur? Hydropes nascuntur ex duratione intermittentium, quas sap. Cullenus hydropum causam considerat (*e*); quod Hunter confirmat (*f*).

VI. Hepatis schirrus intermittentibus longius perstantibus etiam tribuendus est, quod ex iis, quæ de caloris et frigoris paroxysmis dicenda sunt, patebit, (IX—XX.). Si verò post intermittentis suppressionem hepatis tumor supervenit, qui prægresso alio morbo adscribi non possit, non intermittenti citò ac ritè fugatae,

(*d*) Ib. p. 31. (*e*) Practice of Physic, art. 1656.

(*f*) Observations on diseases of the army in Jamaica, p. 171.

fugatæ, sed alicui, quæ tunc accidere potuisset, frigoris v. g. expositioni cum æger profuso sudore perfundebatur, tribuendus est. Hujusmodi phænomenon a variis variè explicatum est; nos vero sequentem explanationem proponemus.—Profuso sudore perstante, absorbentia cutanea ad torporis statum maximè tendunt, quod et a sudoris evaporatione (*g*), et ab aliis causis exoritur: hæc absorbentium ad torporem proclivitas, si cuti frigus externè applicatum fuerit, pro frigoris gradu major vel minor evadet:—cum autem jecinoris absorbentia plus minusve, ex consensu directo cum absorbentibus cutaneis, torpescant, eorum itaque actio vel minuatur vel supprimatur necesse est. —Imminutâ igitur, vel omnino suppressâ, hepatis absorbentium actione, dum vasorum fecerentium actio per aliquod tempus perdurat, eorum libramen interrupitur, humorumque accumulatio in hepate fit, indeque tumor efformatur.

(*g*) Darwin's Botanic Garden, Part I. additional notes, note 25.

formatur (*b*). Huic aliisque, quæ hepaticorum absorbentium torporem inducunt, causis, adscribendi hepatis tumores sunt (*i*), qui post suppressas intermittentes apparent. Hinc ratio reddi potest tumoris, quem Grant intermittentis suppressionem insequutum esse testatur.

Si verò nihil accidit, quod tumori originem præberet, (nam id non contigisse Huson minimè refert), hoc explicari potest sequenti modo; nempe, proclivitatem ad torporem in hepatis absorbentibus ante febris accessum existere, quæ a totius corporis languore in stadio algido locum habente adaucta, in primo vel secundo febris paroxysmo, eam torpidam hepaticorum absorbentium conditionem affert, ut libramen inter hepatis vasa absorbentia et fecerentia, quod supra diximus, abrumptatur, humorumque accumulatio in hepate fiat, &c. Ex hisce itaque causis, hepatis obstrunctiones,

quas

(*b*) Dr Darwin's Zoonomia, vol. II. p. 101. & 544.

(*i*) Plurimæ varietates hepatis tumorum optimè a Dr Baillie descriptæ sunt, (Morbid Anatomy, second edit, p. 213.—221.).

quas Grant atque Huson febri statim fugatæ tribuêre, ortum duxisse probabile est.

VII. Febris statim et ritè fugata non ægros ad recidivam procliviores facit, ut Torti alii-que contendunt;—amoventur enim multa, quæ febris diurnitati ansam præbent, debili-tas scilicet ab ea inducta, habitus vel catena-tionis morbidæ formatio, &c. (*k*). Recidiva igitur, in exemplo a Torti adducto, alicujus ex visceribus abdominalibus, hepatis, v. g. vel lienis, vel cutaneorum absorbentium post fe-brem remanenti torpori adscribenda potius est (*l*). Non poterat forsan hic torpor, post fe-brem perstans, febrem denuò per se afferre, nisi unà cum aliis causis conjunctus. *imo*, Nimia fatigatione, terrore, animi anxietate. *2do*, In-edia, fiti, diæta prava, &c. *3to*, Caloris ex-terni, et gravitatis vel solaris vel lunaris, de-fectu (*m*), &c. Hæ causæ igitur, plus minusve conjunctæ,

(*k*) Cleghorn on Diseases of Minorca, p. 206.

(*l*) Zoonomia, vol. II. p. 549. (*m*) Zoonomia, vol. I. Sect. 36. 3. et vol. II. p. 518. & 550.

conjunctæ, majori vel minori gradu torporem illum augere, febremque inducere valent. Hoc tamen nec Torti nec Huson memorant.

VIII. Cita ergo rectaque febris intermit-
tis medela, non solum nec alias morbos inducit,
vel ægrós in recidivam proniores facit, sed
contrà eos avertit, relapsum difficiliorem reddit,
et ægris sanitatem statim affert. Multi hanc
praxim commendant medici. Dr Gregory, in
prælectionibus suis de medecina practica, nulla
intermittentes statim fugatas damna excipere
se vidisse testatur (*n*). “Many practitioners,”
inquit Fordyce, “have conceived, that a regu-
“lar tertian especially, should be left to go
“through its natural course. Others more
“sanguine, perhaps more wise, think to re-
“lieve the patient immediately :”—et postea,
—“There should not be a moment’s hesita-
“tion in determining to restore the patient to
“perfect health at once (*o*).”

S E C T.

(*n*) Aud. Præl. (*o*) Second Dissertation on a re-
gular Tertian, p. 100.

S E C T. II.

Restrain those rude hands that are ever ready to pluck up the tender plants of science, because they do not bear ripe fruit at a season when they can only be putting forth their blossoms.

DR BEDDOES'S OBSER. ON CALC. &c. p. 265.

IX. OPINATUR sapientissimus Dr Darwin, stomachum generaliter in intermittentibus laborantium nonnisi secundariè affici (*p*) ex consensu inter illum et cutanea capillaria (*q*), vel absorbentia cellularia (*r*), vel interna viscera, v. g. hepar vel lienem (*s*), &c. quæ torpore priùs correpta sunt. Hæc autem torpida primariò reddi multimodis possunt, mobilitatis vel incitationis scilicet excessu vel defectu : Nihil impedit tamen quo minùs hæc secundariò affici-

B. antur,

(*p*) Zoon. vol. 2. p. 592. (*q*) Zoon. vol. 1. sect. 32.—3.—4. & vol. 2. p. 716. (*r*) Zoon. vol. 2. p. 716.
 (*s*) Zoon. vol. 1. sect. 32. 7.

antur, per sympathiam cum aliis partibus priùs affectis. Variæ esse possunt earum partium, quæ cum ventriculo consensum habent, affectionis causæ (*t*).

X. Stomachus, ut in paragrapho præcedenti diximus, hebes fieri potest ex *facultatis sensorialis associationis* in illo accumulatione (*u*), ab inactione vel inertia earum, quæ cum stomacho connectuntur, partium, quæ priùs torpore laborabant ab aliqua suprà memorata causa :—Hinc stomachus per sympathiam affici dicitur.

XI. Sed ventriculus etiam torpore affici primariò potest, v. g. ex *facultatis sensorialis irritationis* accumulatione, a deficiente vel immunita internorum vel externorum stimulorum actione producta (*x*). Hujusmodi accumula-

(*t*) Vide Cullen's Practice of Physic, art. 83—5. Brown's Elem. of Med. art. 66c.—3. &c. Townsend's Journey through Spain, vol. 3. p. 23. & 137.

(*u*) Zoon. vol. 2. p. 564.

(*x*) Zoon. vol. 2. p. 550. & 594.

tio major evadens eum inducere torporem valet, ut algoris stadium efformetur (y).

XII. Quocunque, igitur, ex supra numeratis modis, ventriculus afficiatur, aut torpescat, hic tunc generalem totius systematis torporem inducere valet (z); hinc algoris stadium efformatur, quo durante, *potestatis sensorialis* accumulatio fit (a), quæ ad majorem vel minorem gradum producta, stadium caloris, vel quædam ejus phænomena, auctam v. g. vel partis cuiusdam vel totius corporis actionem, producit; ac proinde secretiones calorique corporis augentur.

XIII. Horum aliorumque hujuscemodi phæ-

B 2 nomenorum

(y) Hoc unum forsan febris intermittentis exemplum extat, in quo stomachus per consensum non affectus est, quod Dr Darwin in explanatione (Zoon. vol. 2, p. 592.) intelligendum præbet. Hic ventriculi torpor, a defectu non ab stimulorum excessu originem ducens, febrem intermittentem, non continuam, producit. (Zoon. vol. 2. p. 594—5.

(z) Zoon. vol. 2. p. 593. (a) Zoon. vol. 2. p. 547.

nomenorum duratio violentiaque *naturæ* vi *medicatrici*, seu *systemati*, breviùs vel longiùs, magis vel minùs, reagenti, a Culleno adscribuntur (b).

XIV. Juxta Brunonem, omnium, quæ in caloris stadio contingunt phænomena, duratio violentiaque spuriæ incitationi, ut ait, tribuenda sunt, (Elem. of Med. par. 656.), cum eaque proportionem habere debent. Incitatio autem juxta illum nihil aliud est, quam stimulorum in incitabilitatem operantium effectus (c).

XV. Secundum verò præclarissimum Darwin, hæc phænomena ex *potestate sensoriali* a stimulus acta oriuntur, cum eorumque majori vel minori gradu proportionem habent; hoc est, *potestatis sensorialis* conatus (exertion of the sensorial power) ad stimulus gradus, *potestatisque sensorialis* vel *animationis spiritus* accumulationem proportionem habet (d).

XVI.

(b) Practice of Physic, art. 60. (c) Elem. of Med. art. 16. (d) Zoon. vol. 1. sect. 12. 2.

XVI. Phænomena, ergo, stadii caloris, hoc est, intentæ systematis actiones, secretiones, calor, &c. quæ ex systematis reactione (XIII.) vel simulata incitatione (XIV.), vel conatus sensoriali (XV.) oriuntur, varios producunt effectus, qui ex iis, quæ in paragraphis (IX.—XII.) stabilita sunt, hoc modo explanandi.

XVII. *Imo*, Intentæ actiones, &c. quæ in caloris studio contingunt, vel *potestates sensoriales irritabilitatis et associabilitatis*, (irritability and associability), in naturalem reducunt statum, tuncque febris curatur (*e*) ; vel partes torpore correptas excitando pares non sunt, remaneat proinde necesse est aliquid torporis post caloris stadium, variis in corporis partibus (*f*), quod pro majori vel minori intentionis suæ gradu febrem denuò inducere valet, præsertim ex naturalium stimulorum absentia, hoc est, inedia, siti, caloris externi, ac solaris vel lunaris gravitationis, defectu (*g*) ; vel hujusmodi actiones adeò

(*e*) Zoon. vol. 2. p. 547 & 558. (*f*) Zoon. vol. 2. p. 549. (*g*) Zoon. vol. 2. p. 550. & 559.

adeò intentæ evadere possunt, ut *potestates sensoriales* exhauriendo alterum algoris stadii accessum afferant (*b*), præsertim si, quas modo retulimus, causæ ad augendum hunc torporem, a majori vel minori *potestatum sensorialium* dispendio vel exhausto statu productum, concurrant. In utroque casu febris intermittit.

XVIII. 2do, Intentæ actiones in caloris stadio locum habentes eo gradu esse possunt, ut aut levem tantum remissionem, aut ad stadium algoris proclivitatem producant (*i*), qua durante, *potestatum sensorialium* accumulatio fieri, indeque postea caloris stadium efformari potest. Possunt etiam aliquo, qui in sistema constanter agat, stimulo adjuvari adeo, ut aucta *potestatis sensorialis* vel *animationis spiritus secretio* in cerebro contingat (*k*). In utroque casu febris typum continuæ assumit. Sed cum hæc raro eveniant, ideo febris, quæ tunc inducitur, hoc est, febris irritativa, seu febris cum pulsu fortissimo.

fine

(*b*) Zoon. vol. 2. p. 558. (*i*) Zoon. vol. 2. p. 539.

(*k*) Zoon. vol. 2. p. 540.

fine inflammatione (*l*), synocha aut febris inflammatoria (*m*), vel pyrexia simplex (*n*), raro locum habet. (Zoonomia, v. 2. p. 539.)

XIX. *3tio*, Auctæ actiones systematis in studio caloris contingentæ eæ esse possunt, ut inflammationem topicam unà cum febre irritativa adducant. Hoc phlegmasias constituit, quas Bruno majori tantùm incitationis gradui adscribit (*o*). Dr verò Darwin supra dictas actiones, ad certum productas gradum, dolorem vel voluptatem inducere contendit, quas ille ut stimulus habet, qui *sensorialem sensibilitatis potestatem* (sensorial power of sensibility) excitant. Huic potestate in actionem excitatæ, cumque potestate *irritationis conjunctæ*, phlegmasiae ab eodem adscribuntur (*p*). Hinc discrimen inter synocham simplicem et synocham cum inflammatione

(*l*) Zoon. vol. 2. claf. I. ord. I. gen. I. sp. I.

(*m*) Cullen. Genera Morborum, p. 69.

(*n*) Brown's Elem. of Med. art. 68.

(*o*) Elem. of Med. art. 332.

(*p*) Zoon. vol. 1. sect. 33. I. 2.

matione conjunctam, sicut in peripneumonia, percipitur, quod non ex majori minorive incitationis gradu tantum exoritur, cum hæc ex majori minorive earumdem potestatum gradu producatur (*q*). Nam hujusmodi incitatio *sensoriali potestati irritationis* tantum respondet, quæ per se phlegmasiam producere minimè valet, quin dolorem aut voluptatem inducat, quæ, ut supra diximus, *potestatem sensorialem sensibilitatis* excitant, quæque in actu posita simul cum *potestate sensoriali irritationis* phlegmasiam producit (*r*).

XX. 4to, Intentæ actiones eæ esse possunt, ut debilitatem indirectam (*s*) vel potestatem sensorialem exhaustam (*t*) inducant. Hinc morbi asthenici oriuntur (*u*), qui a Darwin optimè explicantur (*x*).

XXI.

(*q*) Brown's Elem. of Med. art. 229. & 232. note (*f*).

(*r*) Zoon. vol. 2. sect. 12. 2. 3. & vol. 2. p. 551.


(*s*) Elem. of Med. art. 23. & 359. note (*o*).

(*t*) Zoon. vol. 1. sect. 12. 1. 2. & sect. 11. 7. 8.

(*u*) Elem. of Med. part 2. chap. 6. & part 4. chap. 1.

(*x*) Zoon. vol. 1. sect. 12.

XXI. Ab explanatione algoris et caloris stadiorum in intermittentibus, sicut et eorum quæ ex stadio caloris effici possunt (IX—XX.), in earum curatione duas proponemus indicationes. Prima in causis, quæ directe vel indirecte ventriculi torporem, indeque algoris stadium, ac proinde intermittentem inducere possunt, vel evitandis vel oppugnandis versabitur. Optima huic rei efficiendæ periodus intermissio. Secunda in hoc cardine vertitur, *1mo*, In moderando et oppugnando torpore jam formato, id est, algoris paroxysmo; sic enim caloris stadium, ac proinde febris, avertitur. *2do*, In moderandis vel juvandis systematis viribus, hoc est, caloris stadio, sic namque quæ inde efficiuntur leniri vel absolute averti possunt. Hujusmodi indicatio perstante paroxysmo adimpletur.



XXII. Prima indicatio hinc comprehendetur.—Primò, Causas, quæ ventriculum torpidum directè reddunt, oppugnabimus (XI).—Secundò, Causas, quæ ventriculum torpidum indirectè reddunt, auferemus (IX).—Tertiò, Oppugnandæ causæ sunt, quæ eas in articulis precedentibus enumeratas adaugere possunt (XVII).—Quartò, Habita nulla attentione causis precedentibus, violentam in systemate actionem, paulo ante paroxysmi accessum, excitando, torporem generalem, scilicet febrem, oppugnare possumus.

PRIMÆ INDICATIONIS TABULA.

TABULÆ

Prima hujus indicationis pars iis rebus et cautionibus impletur, quas Bruno in oppugnanda debilitate directa (y) Darwinque in sensorialis potestatis accumulatione (z) debellanda suadent.

I.

1. Internè, remediis, quæ Darwin incitantia (a), et Bruno stimulos diffusibiles (b) vocat; qualia sunt,— Opium, vinum, æther, moschus, liquores spirituosi, phosphorus? oxygénium?
 2. Externè, variis regioni epigastricæ, vel aliis corporis partibus, applicationibus, quales sunt,— Fomentationes, frictiones, concussions electricæ, vesicatoria, frictiones cum opio in palverem redacto?
 3. Possimus etiam directam debilitatem indirectè oppugnare, hoc est, majorem debilitatem directam, vel potestatum sensorialium accumulationem inducendo, ut, stimulorum in eisdem postea agentium ope, ad naturalem statum adducantur.—In hunc finem,
- A, Emeticum lene, quod accumulationem potestatis sensorialis *irritationis* in ventriculo efficit,
(c), porrigidum;
B, Posteaque, stimuli pro sensorialium potestatum summa applicandi.

II.

- Secundum indicationis caput absolvetur, torporem partium, que cum ventriculo sympathiam habent, amovendo.
1. Si absorbentium cellularium torpor adsit (d), remedia seu substantiae, quæ ea præcipue excitandi facultate pollent (e), exhibenda; hæc sunt,—Cortex Peruvian. cortex angustura, gentiana, chamaemelum, centaurea benedicta, quercus, cinnamomum, myrrifica, vomitoria, balnea calida, frictiones cum substantiis, quas absorbens Darwin (f), Cullen astringentia et amara vocat (g).
 2. Si absorbentia lienis, hepatis, &c. torpida sint (h), eorum, que hæc viscera peculiariter (i) stimulare videntur, usus inducendus est, quales sunt metallice preparationes, e. g. ex mercurio, ferro, antimoniio, zinco, cupro, arsenico, &c.
 3. Si intestinorum absorbentia torpore correpta sint (k), ea, que peculiarem in hæc vim exferere videntur (l), adhibeantur; hæc sunt,—Rheum palmatum, gallæ quercinae, quassia amara, alumen, &c.
 4. Si torpor in aliqua fecerentis systematis parte sit (m), exhibenda sunt substantiae que generalem in systemate fecerente actionem exferant; hac enim ratione partium torpor amoyetur: Aridden itaque.—Vinum, opium, liquores spirituosi, sal ammoniacus, &c. phosphorus? canella alba, ex antimoniio preparata, balnea calida, olea essentialia, æther, sales volatiles, &c.

III.

- Tertium hujus indicationis caput adimpletur, stimulorum naturalium et influxus externi defectum supponendo:
- Hinc,
1. Vetus idoneus, &c.
 2. Aër purus fuscus, &c.
 3. Exercitatio moderata, &c.
 4. Oblectamentum, spes, ac delectabilis societas, &c. praescribenda sunt.

IV.

- Quarta indicationis pars iis, que Darwin incitantia, Bruno stimulos appellat, remediis, majori vel minori gradu pro morbi ratione ægotropique statu applicatis, adimpletur; itaque adhibenda sunt,—
1. Opium, vinum, &c.
 2. Frictiones, fomentationes, electricitas, &c.
 3. Passiones excitantes, e. g. amor, letitia, ira, &c.
 4. Exercitatio plurima, agitatio, &c.
 5. Torcularis extremitatibus superioribus et inferioribus applicatio.

(y) Elem. of Med. par. 107. (z) Zoon. vol. 1. sect. 12. 7. 8. (a) Zoon. vol. 2. p. 692. (b) Elem. of Med. par. 126.

(c) Zoon. vol. 2. p. 595-6. (d) Zoon. vol. 2. p. 716. (e) Zoon. vol. 2. p. 736. (f) Zoon. vol. 2. p. 710.

(g) Cullen's Mat. Med. vol. 2. (h) Zoon. vol. 2. p. 716. (i) Zoon. vol. 2. p. 736. (k) Zoon. vol. 2. p. 716.

(l) Zoon. vol. 2. p. 736. (m) Secernentis systematis pars, que torpore correpta torpidum ventriculum reddit, ea est ex qua capillaria cutanea efformantur (IX).: Hinc quæ capillaria cutanea præsentim afficiunt, sicut diaphoretica vel sudorifica, e. g. serpentaria Virginiana, canella alba, opium, vinum, olea essentialia, camphora, æther, sales volatiles, ex antimoniio praeparata, balnea calida, &c. in febribus curatione summa cum utilitate adhibentur. Observandum tamen est, multa eorum, quibus ad incitanda capillaria cutanea utuntur Medici, (Darwin fecerentia), excitant etiam absorbentium systema (Zoon. vol. 2. p. 696.), et vice versa: magnam igitur attentionem fibi vindicant, intermitentes namque non solum a torpore aliquo ex hinc systematibus, sed etiam conjunctum oriri possunt.

XXIII. Secunda indicatio, quæ durante paroxysmo adimpleatur, in duas tribuitur partes. In prima, majorem vel minorem systematis torporem, ex quo algoris stadium pendet (XII.), oppugnabimus. In secunda systematis vires actionesque, ex quibus caloris stadium pendet (XVI), vel refrænandæ, vel juvandæ, prout eæ magis fortes vel debiles sint (XVII.), quam ut potestatem sensorialem in statum salutis adducant necessariæ sint : Rarò tamen systematis actiones in paroxysmo caloris debilitate peccant. Duæ hujus indicationis partes eleganter a Dre Darwin sic exprimuntur :—“ From hence it appears, that the true means of curing fevers, “ must be such as decrease the action of the system in the hot fit, and increase it in the cold fit; that is, “ such as prevent the too great diminution of sensorial power in the hot fit, and the too great accumulation “ of it in the cold one.” (Zoon. vol. I. sect. 12. 6. 1.).

SECUNDÆ INDICATIONIS TABULA.

Prima hujus indicationis pars totum excitando sistema (XXV.) adimpleter, sic namque potestatum sensorialium accumulatio, ac proinde algoris paroxysmus, avertetur : Hinc adhibenda sunt,—

1. Opium, vinum, æther, liquores spirituosi, moschus, phosphorus?
2. Aëris plus oxygenati inspiratio.
3. Frictiones, fomentationes, indusium laneum, balnea calida.
4. Electricitatis ictus vel scintillæ.
5. Affectus excitantes, e. g. amor, lætitia, ira, &c.
6. Frictiones cum cinchona, in subtilem pulverem redacta? Opium, camphora sub eadem forma?
7. Totum excitare sistema, ventriculum indirectè stimulando, possumus (Tab. primæ indic. part. I. n. 3. & XXVII.).

Secunda hujus indicationis pars dupli ratione explebitur.

1. Systematis vires, si rectè fieri possit, compescendo : Hic locum habent remedia a Darwin torpentina (n) vocata.
 - A, Venæfæctio, arteriotomia, hirudines, &c.
 - B, Silentium, tenebrae, &c.
 - C, Aqua frigida, aër frigidus.
 - D, Aëris minus oxygenati inspiratio?
 - E, Acida vegetabilia, mala aurea, citrea, &c.
2. Systematis vires vel actiones, quæ in studio caloris auctæ videntur, sustentando, si excitandis torpidis partibus pares non sint (XVII.), ut potestates sensoriales in naturalem adducantur statum. Varia sunt, quæ in hunc finem adhibentur excitantia, sed opio medici frequenter utuntur (XLV.).

CONFIRMATIO EORUM QUÆ IN TABULA PRIMÆ INDICATIONIS CONTINENTUR.

Quoi de plus satisfaisant pour l'esprit, que de saisir comme d'un coup d'œil une multitude d'objets differens, liés ensemble par une rapport commun, à une action principale !

RECUEIL DE DIV. ESCR.

XXIV. EARUM, quæ in prima primæ indicationis parte commemorantur, usus in intermittentium curatione ab omnibus medicis agnoscitur : Cur autem ea, in expellendis intermittentibus, felici effectu adhibentur, sequenti elucidatione apparebit.

XXV. *imo*, Daruini incitantia, vel stimuli diffusibles Brunonis, sicut opium, vinum, &c. interne sumpta, potestates sensoriales in justum gradum adducendo, febris causam profligant. Ita quandocunque horum stimulorum dosis ad sensorialium potestatum vel incitabilitatis

accumulationem invergam proportionem habet, sensoriales potestates in justum adducuntur statum, febrisque curabitur. Quotiescunque vero levis potestatum sensorialium accumulatio minimo stimulorum gradu oppugnatur, cum stimuli ad potestates sensoriales justam proportionem non habeant, debitam non producunt incitationem, ideoque eae potestates in naturalem statum minime adducuntur, perstatque febris. Quandocunque tandem magna potestatum sensorialium accumulatio magno stimulorum concursu profligatur, magna aderit incitatio ; id est, potestates sensoriales limites excedent, effectusque in XVII.—XX. recentiti producentur. Hinc inquit Bruno, “ This superabundant excitability so speedily brings on death, that the only means of restoring health is first to encounter it with a very small dose of diffusible stimulus, a dose scarcely exceeding the scanty portion of stimulus that occasioned it (o).” Darwin etiam

etiam ait, “ The longer in time, and the
 “ greater in degree, the quiescence or inertion
 “ of an organ has been, so that it still retains
 “ life or excitability, the less stimulus should
 “ at first be applied to it (*p*) ;” et paulo post,
 “ If these circumstances are not attended to,
 “ as the sensorial power becomes accumulated
 “ in the quiescent fibres, an inordinate exer-
 “ tion takes place, by the increase of thesti-
 “ mulus acting on the accumulated quantity
 “ of sensorial power, and either the paralysis
 “ or death of the contractile fibres ensues,
 “ from the total expenditure of the sensorial
 “ power in the affected organ.”

XXVI. 2do, Variæ regioni epigastricæ ex-
 ternæ applicationes, sicut et aliis corporis par-
 tibus, majorem vel minorem potestatum senso-
 rialium in stomacho, ac proinde in toto sy-
 steme, accumulationem avertunt : Hinc eæ po-
 testates ad justam normam per consensum addu-
 cuntur ; hæ namque partes in quibus applica-
 tiones

tiones fiunt, motus cum ventriculi motibus associatos habent (*q*). Hinc vesicatoria in intermittentium cura a multis utilia inventa sunt, scilicet a Vansuitenio (*r*), Lind (*s*), Jackson (*t*), Fordyce (*u*), et præsertim a Dre Rush (*x*). Vesicatoria, si ita adhibeantur, ut eorum effectus paulò ante accessum, vel etiam præsente algoris paroxysmo, producatur, magnæ utilitatis esse puto. "The coldness," inquit Darwin, (Zoon. v. I. sect. 12. 7. 4.) "of the extremities, "as of the nose, ears, or fingers, is hence the "best indication for the successful application "of blisters." Quod ab eodem in alio loco elucidatum est (*y*), et ab observationibus Dris Percival confirmatum (*z*). Hac ratione agere
videntur

(*q*) Zoon. vol. 1. sect. 12. 7. 4.

(*r*) Com. in H. Boer. Aph. vol. 2. p. 571.

(*s*) Diseases of Europeans in Hot Climates, p. 301.

(*t*) Fevers of Jamaica, p. 222.

(*u*) Lib. cit. p. 151.

(*x*) Med. Inq. & Obs. vol. 1.

(*y*) Zoon. vol. 2. p. 700. 701.

(*z*) Essays Med. & Exp. vol. 1. p. 199.

videntur rubefacientia, fomentationes, et frictions a variis commendata, eodem igitur tempore adhibenda sunt.

XXVII. *3^{to},* Utilitas stomachum indirectè stimulandi multorum experientiâ confirmatur. Hinc emeticorum usus in intermittentibus debellandis ab Hippocratis usque ad nostra hæc tempora efficax repertus est. Hoc pacto cinchonæ in febrium intermittentium curatione effectus optimi, a Dre Darwin explicantur (*a*), cum ea post emeticum exhibetur, cuius praxeos excellentia, a Dre Jackson refertur. Eadem ratione explicari possunt emeticorum refractis dosibus exhibitorum effectus, quos Fordyce in intermittentium cura optimos testatur esse (*b*). Ex hujusmodi testimoniis utilitas stomachum indirectè excitandi appareat, quidquid repugnet Bruno, qui dicit, “ Excitement, therefore, is “ never to be lessened, and debility increased, “ with the view of giving greater effect to a new
“ stimulus

(*a*) Zoon. vol. 1. sect. 12. 7. 6.

(*b*) Lib. cit. p. 110.

" stimulus by accumulating excitability (*c*)."

Attamen si Brunonis hac de re doctrina experientiâ minimè confirmatur, hoc est, si aliquando debilitatem directam vel potestatum sensorialium accumulationem avertere fas sit,—
1mo, Eam adaugendo,—*2do*, Stimulos applicando: id in iis tantum verum adjunctis locum habet, in quibus sensorialium potestatum accumulatio talis est, ut earum ulteriori accumulatione ea summa irritabilitatis tandem efformetur, in quam stimuli agere propriè possint: Itaque potestates sensoriales in justum reducuntur gradum, febrisque curatur. Id verò plus minusve noxium in iis circumstanciis, in quibus, (ob quam avertere tentamus debilitatem, vel ejus gradum, quem in eum finem augemus, vel ægroti conditionem, &c.), eam inducimus debilitatem, vel adeo magnam irritabilitatis accumulationem, ut incurabilis reddatur, hoc est, aut sensorialium potestatum accumulatione in eum evehitur gradum, ut vel mi-

nim

nimâ stimulorum applicatione aliquem ex iis,
quæ in par. XVIII. XIX. et XX. retulimus,
producat; aut hujusmodi accumulatio talis
est, qualis, ut inquit Darwin, "is succeeded
" by paralysis, first of the voluntary and sensi-
" tive motions, and afterwards of those of ir-
" ritation and association, which constitutes
" death (*d*)."
In hisce igitur, quas ultimò re-
tulimus, veras attentioneque dignas Brunonis
ideas, quarum suprà mentionem fecimus, re-
putamus, cujus hæc sunt verba hoc confirman-
tia: "So much debility may be induced, and
" excitability so far accumulated, that the re-
" storation of excitement shall become imprac-
" ticable (*e*)."

XXVIII. Hinc ratio reddi potest,—*imo*,
salutarium emeticorum in febrium continua-
rum principio effectuum, id est, cum debilitas
adhuc in eo gradu est, ut, novæ debilitatis ad-
ditione, actioni stimulorum apta evadat;—*2do*,

D Emeticorum

(*d*) Zoon. vol. 1. sect. 12. 5. 6.

(*e*) Elem. of Med. art. 42.

Emeticorum malorum effectuum, quum febris ulterius progressa est, secundum Robertson (*f*), quod iis in ultima (XXVII.) expositis tribendum est.

XXIX. Quæ in secunda primæ indicatio-
nis tabulæ parte recensuimus, in debellandis
intermittentibus utilia a medicis agnoscuntur.
Explanatio verò eorum operandi modi, et di-
versarum partium torporis, quæ cum stomacho
consentiunt, originemque intermittentibus præ-
bent, ex Daruini doctrina deduccta (*g*), illus-
trat, cur quædam in intermittentium curatione
remedia adeò extolluntur, et etiam cur, quæ
tanta celebritate non gaudent, in hujusmodi
febribus fugandis quandoque efficaciora reper-
ta sunt.

XXX. *imo*, Cùm lymphaticorum cellula-
rium cutaneorum torpor generatim (*b*) tor-
poris

(*f*) *Essay on Fevers*, p. 179. and 218.

(*g*) *Zoon.* vol. 2. Suppl. to the Class IV. and part. III.

(*b*) Cùm absorbentia cellularia cutanea magis frigo-
ris

poris ventriculi, ac proinde febris causa (XII.) fit, cùmque diversa medicamenta in tabulae primæ indicationis parte secunda, n. 1. cinchona præfertim, lymphaticis cellularibus excitandis idonea fint (*i*), ratio in propatulo est, cur hujusmodi remedia, sicut emetica, gentiana, chamæmelum, præfertimque cinchona (*k*), in curatione intermittentium a medicis utilia inventa sunt, et magnopere commendantur.

XXXI. 2dō, Sed cùm ventriculi torpor a torpore alicujus ex visceribus internis aliquan-

D 2 do

ris ac caloris actioni alternè subiecta sint, torpore corripi faciliūs possunt.

(*i*) Zoon. vol. 2. p. 736.

(*k*) Cinchona verò generatim intermittentes oppugnat, non solùm ob maximam virtutem, quâ pollet, absorbentia cellularia excitandi, quorum torpor generalior intermittentium causa videtur ; sed etiam quia potestatem habet omnia absorbentia excitandi. (Zoon. vol. 2. p. 713.). Hujusmodi omnia absorbentia stimulandi vis plus minusve communis est, in omnibus iis remediis, quæ Darwin *forbentia* vocat ; sed hæc superiori gradu a cinchona possidetur.

do ducat originem ; cum hoc autem viscus a cinchona (*l*) non ita facilè excitetur, ac a metallicis præparationibus (*m*) ; hinc concipi facile erit, cur hæc successisse, dum illa quandoque impar esse inventa fuit (*n*). Hinc præpara-

tiones

(*l*) Quamquam cinchona, in viscerum internorum torpore amovendo, non eadem efficacia, ac remedia quæ in tabulâ primæ indicationis parte 2. n. 2. recensita fuere, polleat, hunc tamen effectum aliquando ab ea produci posse credimus, dummodo parvus adsit torporis gradus, id est, talis, qualem lymphaticorum cellularium exercitatio a cinchona inducta avertere possit, quod fit ratione eorum motuum, qui cum viscerum internorum motibus eorum connectuntur, (Zoon. vol. 2. p. 712.). Hinc patet cinchonam hepatis, &c. absorbentium torporem oppugnare posse, *imo*, Ex sympathia, quam hæc cum lymphaticis cellularibus habent ; *2do*, Hepatis absorbentia directè stimulando ; ea namque totum absorbentium sistema stimulandi facultate gaudet, (Par. XXX. n. (*k*)).

(*m*) Zoon. vol. 2. p. 737.

(*n*) Zoon. vol. 2. p. 716. Duncan's Annals of Medicine,

rationes metallicæ a multis commendantur :
 Vitriolum album, ad gr. 5, omni horæ qua-
 drante intermissionibus exhibitum, a Blane ;
 Flores Zinci a Dre Gr. (o) ; vitriolum cœru-
 leum ad $\frac{1}{4}$ grani a Dre Darwin (p) ; arsenium
 a Dre Fowler præparatum ab eodem (q), et a
 Macleish (r) ; ex mercurio præparata a Cul-
 leno (s), Fordyce (t), Hunter (u), Gregory (x),
 Maclean (y). Præparationes mercuriales imò
 etiam,

dicine, vol. 2. p. 409. and Maclean's View of the
 Science of Life, p. 82—7.

(o) Aud. præl. de M. P.

(p) Zoon. vol. 2. p. 725.

(q) Zoon. vol. 2. p. 726.

(r) Duncan's Annals of Med. vol. 2. p. 409.

(s) Practice of Physic, art. 231.

(t) Lib. cit. p. 126.

(u) Observ. on the Diseases of the Army, p. 169.

(x) Aud. Præl.

(y) Science of Life, p. 156. 157. and 166.

etiam, in febribus continuis, ab iisdem et ab aliis (z) commendatæ sunt.

XXXII. 3^{to}, Cum ventriculi torpor aliquando ab intestinorum torpore originem ducat, et hæc iis, quæ infra enumerabimus, remediis præsertim excitentur ;—hinc explicari potest, cur in intermittentibus debellandis quandoque utilissima inventa sunt ; hinc optimi Rhabarbari, sicut et aliorum catharticorum, quæ a Dre Gr. commendantur (a), effectus ; hinc quassia amarae (b), gallarum quercinorum (c), effectus quam cinchonæ efficaciores, in curandis intermittentibus, aliquando dicuntur. Intermittentium curatio ab alumine, cum alia incassum tentata fuerunt, a Dre Darwin, eidem intestinorum absorbentia excitandi potestati, adscribuntur (d).

XXXIII. 4^{to}, Tandem cum ventriculi tor-

por

(z) Contributions to Med. Knowl. p. 377. and 466.

(a) Aud. præl.

(b) Edinburgh New Disp. p. 223.

(c) Edinburgh New Disp. p. 163.

(d) Zoon. vol. 2. p. 722.

por ab alicujus secernentis systematis partis, v. g. cutaneorum capillarium torpore, oriri quoque potest, cumque opium, totum systema stimulando, hanc etiam secernentis systematis partem stimulat ; hinc opium, unà cum aliis remediis exhibitum, aliquando in hisce febribus fugandis admodum valet (*e*). Hinc etiam sudorifica, et sal ammoniacum, a Dre Gregory commendatum, utilia in intermittentium curatione reperta sunt. (Vide Annotationem (*m*) part 2. n. 4. tabulæ primæ indicationis).

XXXIV. Utilitas eorum, quæ in tabula primæ indicationis, parte *3ia*, exposita sunt, ab omnibus in intermittentium cura auctoribus, et agnoscitur et commendatur (*f*). Res tamen sequenti explicatione elucefcet.

XXXV. *imo*, Juxta Cullenum, stimulorum naturalium, et externorum influxuum, defectus ad producendam generalem debilitatem concurrit ;

(*e*) Zoonomia, vol. 2. p. 716.

(*f*) Med. Com. Dec. 1. vol. 2. p. 50.

currit ; hæc autem debilitas, in vasa extrema propagata, spasmodum, ac proinde febre, ejusque durationem inducit (*g*). Hinc exercitatio et diæta lauta, quantum ægroti vires ferre possint, ab eodem præscribuntur (*b*). IVXXX

XXXVI. *2do*, Ex doctrinæ Daruinianæ placitis id constat, horum stimulorum defectum, ad ventriculi torporem efformandum et augendum, concurrere (*i*) : igitur diæta lauta, exercitatio, delectabilis societas, &c. commenda data sunt. (a) utræq; exq; qm mltq; spt;

XXXVII. *3tio*, Secundum Brunonis doctrinam, horum stimulorum defectus ad efformandam asthenicam diathesin, cuius naturæ febris intermittens ab eo consideratur (*k*), concurrit. Hinc potus victusque proprius, aër purus, exercitatio, &c. ab eo commendantur. In hujus rei confirmationem exemplum Lugduni Batavorum

(*g*) Practice of Physic, art. 76.

(*b*) Lib. cit. art. 232.

(*i*) Zoonomia, vol. 2. p. 550.

(*k*) Elem. of Med. sect. 663.

vorum studentium adducit : Angli, qui opipara diæta et Baccho liberiùs indulgebant, minus intermittentibus corripiebantur, quam Batavi, qui diæta haud lauta utebantur (*l*).

XXXVIII. *4to*, A Dre Fordyce, victus idoneus ac potus, aër purus, et exercitatio benè regulata commendantur (*m*).

XXXIX. *5to*, Vitandus frigidus humidusque aër, secundum Drem Gregory, diætaque lauta præscribenda, quæ, inquit ille, intermittentium relapsum magnoperè avertit (*n*).

XL. Itaque eorum, quæ in parte *3tia* tabulæ primæ indicationis commendabantur, observatio, non solum in intermittentibus, sed etiam in aliis morbis, veram constituit prophylaxin (*o*) : ex hujus igitur observationis defectu, ea descriptio, quæ circa carcerum miserum,

E immo

(*l*) Elem. of Med. art. 660. n. (*x*)

(*m*) Lib. cit. p. 21. & 88.

(*n*) Aud. Præl.

(*o*) Howard's Account of the Lazarettos, p. 224.—225.

immo etiam horridum statum in tota Europa, a
benevolo Howard (*p*) exposita (*q*), orta est.

XLI. Quæ in tabulæ primæ indicationis
parte 4ta enumerabantur, totum systema, ac
proinde

(*p*) " O'er burning sands, deep waves, or wilds of
" snow,
" Thy Howard journeying seeks the house of woe,
" Down many a winding step to dungeons dank,
" Where anguish wails aloud, and fetters clank ;
" To caves bestrew'd with many a mouldering bone,
" And cells, whose echoes only learn to groan ;
" Where no kind bars a whispering friend disclose,
" No sun-beam enters, and no zephyr blows,
" He treads,—inemulous of fame or wealth,
" Profuse of toil, and prodigal of health,
" With soft assuasive eloquence expands
" Power's rigid heart, and opes his clenching hands ;
" Leads stern-ey'd Justice to the dark domains,
" If not to sever, to relax the chains ;
" Or guides awaken'd Mercy through the gloom,
" And shews the prison, sister to the tomb !—

Dr Darwin's Botanic Garden, part 2. canto 2.

(*q*) Howard's State of the Prisons, sect. 1. & 4.

proinde torpidas, quæ cum stomacho consen-
tiunt, partes stimulant. Incitatio verò, cum
major vel minor sit, pro potestatum sensoria-
lium vel incitabilitatis accumulatione, stimu-
lisque, ut dictum est, applicatis, inde sequitur,
hujus incitationis regulationem (XXV.) ab
ejus accumulationis, stimulorumque applican-
dorum, notitia depromendam esse. Si iis ani-
mum attendamus, noxii vitari possunt effectus,
qui ex majori vel minori, quàm par est, incita-
tionis gradu emergunt (XVII—XX.), febris-
que, in naturalem statum potestatibus sensori-
alibus adductis, debellatur. Hinc sequentia
remedia, experientia multorum scriptorum,
commendantur. *imo*, Opium, quod a Culle-
no (*r*), Fordyce (*s*), Gregory (*t*), et Brunone,
paulò ante paroxysmum administrari commen-
datur. Exhibit etiam Bruno liquores spirituo-

(*r*) Pract. of Phys. art. 231.

(*s*) Lib. cit. p. 150.

(*t*) Aud. præl.

fos (u). Æther vitriolicus a W. Davidson magna cum utilitate exhibitus fuit (x). Phosphorus quoque h̄ic præscribi potest (LXIX.).—2do, Eadem ratione, aërem plus oxygenatum, paulò ante intermittentis accessum inspiratum, utilem esse posse puto, quod ex principiis Daruini (y) ac Beddoes (z) inferendum est (LXVI.).—3to, Hinc etiam balnea calida, eodem sub tempore ministrata, utilia esse credimus. Hisce usi veteres sunt, recentioresque in variis morbis a debilitate ortis, inter quos eminent Darwin (a), Beddoes (b), et Percival (c), laudibus ea extollunt.—4to, Hinc salutares frictionum et fomentationum, quas Dr

Gregory

(u) Elem. of Med. art. 661. n. (z)

(x) Med. Facts & Observ. vol. 5. p. 68.

(y) Zoonomia, vol. 2. p. 689.

(z) Conf. on the Med. use of Factitious Airs, p. 1. p. 163.

(a) Zoonomia, vol. 2. p. 597.

(b) Essay on Consumption, p. 193—226.

(c) Essays Med. & Exp. vol. 2. p. 209—212.

Gregory utiles circa eandem periodum esse testatur (*d*), effectus.—*5to*, Hinc leves ictus electrici, paulo ante accessum, et usque ad ejus temporis terminationem, a Townsend commendantur (*e*). *6to*, Hinc etiam affectus excitantes paulo ante accessum, a Culleno (*f*), Fordyce (*g*), ac Gregory (*h*) salutares reperti sunt (*i*). *7mo*, Torcularis extrematibus inferioribus

(*d*) Aud. Præl.

(*e*) Guide to Health, vol. i. p. 73.

(*f*) Lib. cit. art. 231.

(*g*) Lib. cit. p. 150.

(*h*) Aud. Præl.

(*i*) Vide Encyclop. Method. Franc., part. medic. artic. “*affections de l'ame*,” a Dre Antonio Nunes Ribeiro Sanches compos. qui magno cum ingenio ac eruditione demonstrat, animi passiones et producere et curare multos morbos posse, &c. Vid. etiam Falconer on the Passions. “*Les passions*,” (ait Helvetius, de l’Esprit, Disc. 3. chap. 7.) “sont semblables aux volcans, dont “l’eruption soudaine change tout-a-coup le lit d’un “fleuve, que l’art ne pourroit détourner qu’en lui “creufant

rioribus et superioribus applicationem, a Kellie ante paroxysmum commendatam, eodem modo agere autumamus. Ejus salutares effectus sic explicari possunt. Torcularis compressio irritationem, ac proinde sensationem majorem vel minorem excitat; hinc *potes̄as sensorialis volitionis* inducitur (*k*), quæ, unà cum aliis caufis concurrentibus, actiones magis vel minus in systemate violentas producit. Si hujusmodi actiones justo gradu fint, febris avertitur, si minori gradu, febris plus minusve mutata persistit; si verò plus quam par est actiones excitentur, effectus plus minusve noxii enascuntur. (XVIII—XX.)

CON-

“ creusant un nouveau lit, et, par consequent, après
“ des tems, et des travaux immenses.”

(*k*) Zoon. vol. I. sect. 4.

CONFIRMATIO EORUM QUÆ IN TA-
BULA SECUNDÆ INDICATIONIS
CONTINENTUR.

XLII. Quæ in prima tabulæ secundæ indicationis parte exponebantur, eâdem, ac quæ in *4ta* tabulæ primæ indicationis parte relata sunt, ratione agere videntur. In eorum igitur applicatione, ante oculos habenda sunt, quæ in par. præcedenti protulimus. Accumulatio enim irritabilitatis, vel potestatum sensorialium hîc major est; itaque si magnus stimulorum gradus applicetur, consequentiae periculo plenæ sequentur (XVII—XX.); quodque Dr Darwin sic exprimit: “ I have heard of two well-“ attested instances of patients in the cold fit “ of ague, who have died by the exhibition of “ gin and vinegar, by the inflammation which “ ensued

"ensued (*l.*)."
Hinc, in hac periodo, parca manu administranda sunt,—*1mo*, Opium, quod a Dre Gregory(*m*) et Fordyce(*n*) commendatur; vinum tepidum ab aliis etiam commendatur(*o*).
2do, Aeris oxygenati inspiratio (XLI.). *3to*, Leves iictus electrici (XLI.). *4to*, Caloris per pannum laneum, fomentationum, frictionum applicatio (XLI.). *5to*, Affectus excitantes, v.g. amor, ira, lætitia, &c. (XLI.). *6to*, Frictiones cum substantiis stimulantibus, et astringentibus, in pulverem subtilissimum redactis (LVII.).
7mo, Emetica, quorum salutares effectus, potestati ventriculum indirectè stimulandi, tribuendi sunt (XXVII. & XLVIII.).

XLIII. In secunda tabulæ secundæ indicationis parte, hanc impleri dupli ratione diximus:—*1mo*, Vires systematis vel intentas actiones minuendo, cùm eæ nimis ad potestates

(*l*) Zoon. vol. 1. sect. 12. 7. 8.

(*m*) Aud. præl.

(*n*) Lib. cit. p. 150.

(*o*) Med. Com. sec. dec. vol. 2. p. 125.

tates sensoriales in justum gradum adducendas adauctæ sint (*p*). Itaque contrariam ac in iis, quæ in par. præcedenti diximus, rationem sequi debemus. *2do*, Systematis vires vel actiones, quantum eæ videntur adauctæ, juvando, cum eæ minores, quam ut potestatibus sensorialibus in proprium gradum reducendis aptæ fint. Itaque remedia iis, quæ in prima hujus paragraphi parte commendata sunt, contraria præscribenda.

XLIV. Secundum igitur primum articulum secundæ partis tabulæ secundæ indicationis, optimi explicari possunt effectus sequentium remedium, quæ multorum experientia in febribus intermittentibus

(*p*) Hinc quasdam Brunonis ideas circa febres intermittentes oppugnamus, qui systematis vires in stadio caloris intentas minimè considerat; nam inquit ille, (Elem. of Med. par. 656.), “ In the cold fit, exhibiting “ manifest debility ; in the hot, counterfeiting vigour.” Itaque evacuationes, et ea remedia, quæ Darwin *torpentia* vocat, rejicit, (par. 661.), quæ tamen in stadio caloris haud raro necessaria sunt.

intermittentibus curandis commendata sunt.
 Hinc, *imo*, Venæfæctio a Culleno, cum phlo-
 gistica adest diathesis (*q*), et etiam a Dre Gre-
 gory (*r*), commendata est; hac feliciter usū
 sunt Pringle, si ægroti robusti et plethorici e-
 rant (*s*), et nuperrime Rush, qui se febres in-
 termittentes, a cinchona non deletas, venæfec-
 tione curavisse testatur (*t*). *2do*, Silentium,
 tenebræ, aer frigidiusculus, et quæcunque an-
 tiphlogisticum regimen constituunt, a Dre Gre-
 gory in stadio caloris commendata sunt. *3to*,
 Aquæ frigidæ affusionem, a Dre Currie felici-
 ter adhibitam, et in febre continua, typho,
 commendatam (*u*), in intermittentium sta-
 dio caloris, adhiberi feliciter posse contendimus;
 quod ex iis, quæ Dr Currie circa ejus in typho
 applicationem consiliis præbet, scilicet, "When
 " there

(*q*) Practice of Physic, art. 234.

(*r*) Aud. Præl.

(*s*) Diseases of the Army.

(*t*) Med. Obs. & Inq. vol. 1.

(*u*) Medical Reports, &c.

" there is no sense of chillness present, when
 " the heat of the surface is steadily above what
 " is natural, and when there is no general or
 " profuse perspiration (*x*)," patet. Præterea,
 idem Currie, in p. 32. M. R. aquæ frigidæ
 in intermittentibus applicationem, quod ille
 exemplo confirmat, commendat. 4^{to}, Aeris
 minus oxygenati inspiratio, in eadem febris
 periodo, utilis esse potest, quod ex illustrationi-
 bus Dris Beddoes (*y*) conjicimus. 5^{to}, Potus
 aciduli, vel fructus acidi, v. g. mala aurea ci-
 trica, quæ, inquit Townsend (*z*), stomachum
 per consensum cum pulmonibus ad agendum
 ita disponunt, ut hi aerem atmosphericum mi-
 nus decomponant, minorque oxygenii quanti-
 tas in sistema recipiatur (*a*).

(*x*) Med. Reports, &c. p. 17.

(*y*) Confid. on Fact. Airs, p. 41. 42.

(*z*) Guide to Health, p. 28. 29.

(*a*) Quacunque ratione oxygenii in sistema influxus
 consideretur, hoc est, sive calori animali originem præ-

XLV. Juxta verò secundum articulum secundæ partis secundæ indicationis, sinistros eorum quæ in par. præcedenti exposuimus, venæfæctionis præsertim, a Boerhavio in intermittentibus in genere rejectæ, effectus explicamus. Hinc pariter explicantur effectus *anodynorum* optimi, ex quibus opium a multis auctoribus in hac periodo commendatur (*b*). Hic igitur loci opium stimulans considerandum est, quod systematis vires, quæ potestatibus sensorialibus in justum gradum adducendis imparés erant, juvat. Itaque si hoc medicamentum, sub circumstantiis in articulo primo expeditis, adhibetur, tunc vires systematis nimis auctæ evadent, effectusque sinistri (XVIII—XX.) locum habent. Hinc opium in stadio caloris a Burserio rejicitur (*c*) ; hinc apoplexiæ

beat, ut aliqui putant, vel arteriosum systema, secundum Darwin, stimulet, ejus diminutio hic utilis esse potest.

(*b*) Cullen, Gregory, Houlston, &c.

(*c*) Instit. Med. Pract. vol. I. p. 194.

aliique morbi, testante Morton, ejus usum superveniunt.

XLVI. Ab explanatione a par. XXIV. usque ad XLV. proposita, id patet, ea proportione qua remediis in duabus tabulis expositis, uno ab alio adjuto, usi fuerimus, intermittentium curationem, quæ opprobrium medicorum videntur, consequi poterimus.

S E C T. III.

— — — thro' ev'ry vein,

Throws motion, warmth; and shuts out death from life.

YOUNG'S NIGHT-THOUGHTS.

XLVII. Continet hæc sectio remedia, quæ utiliora in febrium intermittentium curatione experientiâ inveniuntur: Sed duo tantum, ut pote præcipua, recensemus.—*imo*, Emetica: Horum agendi modus a variis variè explicatur.
1. Afferit Fothergillus, salutares eorum effectus ab evacuatione ventriculi, vel ab stimu-

lante

lante eorum actione derivari (*d*).—2. Culenus quoque id, non solum ab evacuatione pertendum, sed etiam ab auctis fibrarum muscularium ventriculi actionibus, quæ ope confensus, qui inter stomachum et vasa extrema intercedit, spasmum removent (*e*).—3. Bruno emetica debilitantia considerat (*f*).—4. Darwin denique, vomitum ab imminuto, deinde ab inverso motu stomachi peristaltico ortum ducere putat (*g*): hic autem motus inversus, vel a potestatis sensorialis accumulatione, quæ a subtractione jucundarum sensationum, quam emetica lenia, sicut præparata ab antimonio, ipecacuanha in minutis dosibus, &c. inducunt (*b*), originem habet; vel a fortioris emeticis magno stimulo, digitalis, v. g. potestatem sensorialem

(*d*) Diff. Med. Inaug. de emeticorum usu, &c.

(*e*) Mater. Med. vol. 2.

(*f*) Elem. of Med. art. 283. et 460.

(*g*) Zoon. vol. 1. sect. 35. I. 3.

(*b*) Zoon. vol. 2. p. 740.

sensorialem exhauste, hic effectus produci potest (*i*).

XLVIII. Hinc patet, emetica lenia in febribus curandis utilia esse, fortia vero noxia, ideoque illa in intermittentibus a Culleno (*k*), Fordyce (*l*), et Gregory (*m*), summa cum utilitate commendantur (XXVII.).

XLIX. Hinc sinistri emeticorum effectus, quos Fordyce, magnis eorum dosibus (*n*), et Gregory nimis repetitis (*o*), tribuunt, similes considerandi sunt secundis emeticis, quae semper noxia sunt. Justas igitur Brunonis de modo operandi emeticorum observationes, quoad secunda emetica, consideramus, quod ad prima vero attinet, ejus ideæ experientia minime confirmantur, si excipias, cum aliquid eo-

rum

(*i*) Zoon. vol. 2. p. 741.

(*k*) Practice of Physic, art. 230. et 233.

(*l*) Lib. cit. p. 108.

(*m*) And. præl.

(*n*) Lib. cit. p. 110.

(*o*) Conspect. Med. Theor. art. 1410.

rum in ultima par. XXVII. parte relatum adfit.

L.—*2do*, Cinchona a Linnæo *cinchona officinalis* appellata est; sed ejus characteres specifici adhuc latent. Ignoratur itaque utrum cinchona communis, cinchona rubra, cinchona flava diversæ sint species, vel ejusdem speciei varietates considerandæ sint.

LI. Opinantur aliqui, hasce cinchonæ species vel varietates iisdem gaudere proprietatis, alii vero rubram cinchonam, alii flavam efficaciorum considerant. Fordicij, omnes cinchonæ species eandem in intermittentibus fungandis efficaciam habere, opinio est (*p*): Saundersii verò pericula, cinchonam rubram in spiritu vino faciliùs dissolvi; hanc plus resinæ continere; solutionemque etiam levem cinchonæ rubræ, qualitates suas sensibiles plūs exhibere, quam fortiorem communis cinchonæ solutionem, nos docent. A vero igitur absconde

mile

simile non est, cinchonam rubram communi efficaciorum esse ; ideoque hæc in curatione intermittentium præferenda est. Ex D. D. Relphi ac Babingtonis verò periculis patet, cinchonam flavam vim amaram et astringentem eminentiori, quam cinchona communis ac rubra, gradu possidere : Hinc flava Dr Rutherford præ cæteris utitur (*q*), quæ a Woodvillio et Harveyo maximè in intermittentium cura laudata est (*r*). Dr Vaughan etiam de cinchonæ flavæ efficacia in intermittentibus nos certiores facit (*s*).

LII. Optima cinchonam exhibendi methodus, juxta Cullenum (*t*), Fordyce (*u*), et Gregory (*x*), in substantia est ; efficacior enim eva-

under mild ointment G *(foliis admodum foliosis)* dit,

(*q*) Vidi in Nosocomio Edinensi.

(*r*) Medical and Chir. Review, vol. I. p. 157.

(*s*) On the yellow bark.

(*t*) Practice of Physic, art. 216.

(*u*) Lib. cit. p. 121.

(*x*) Aud. præl.

dit, quam ejusdem infusa, decocta, tincturæ, vel extracta ; quod experimenta Dris Percival confirmant (*y*) ; idemque probat cinchonæ flavæ analysis a F. Marabellio instituta (*z*).

LIII. Proprium cinchonam exhibendi tempus intermissio est, ex observationibus Cull. (*a*) ac Fordyce (*b*). Dr verò Home statim post paroxysmum exhibendam suadet (*c*). Cinchonæ dosis pro ægri ætate, habitu corporis, ventriculi statu, regione, morbi conditione, &c. esse debet.

LIV. Variæ sunt in cinchona exhibenda cautiones, quæ a medicis observari commendantur. Hanc exhibendam non esse, quando phlogistica aderit diathesis, vel viscerum abdominalium obstructio, Cullenus suadet (*d*) :

Gregory

(*y*) Essays Med. and Exp. vol. I. p. 176.

(*z*) Annals of Med. vol. 3. p. 197.

(*a*) Lib. cit. art. 232.

(*b*) Lib. cit. p. 132.

(*c*) Clinical Exp. Hist. and Dialect. p. I.—12.

(*d*) Lib. cit. art. 232.

Gregory vero, hanc utilem esse, etiam cum jecinoris morbi adsunt, testatur (*e*). Fordyce cinchonæ usum commendat, cum perfectæ sint intermissiones, alioquin enim, salutares ejus effectus non adeo certos esse nos certiores facit (*f*). “ When the intermissions,” ait Hunter, “ were complete, the bark was given directly, without any previous evacuations ;” et post, “ there was no inconvenience arose from omitting the vomiting and purging, usually made to precede the bark ; on the contrary, it was so much time gained (*g*). Ex Daruini principiis (*b*) concludi potest, cinchonam quantociùs ministratam, certiores ejus effectus producere, quod a Dre Cleghorn confirmatum est (*i*). Hoc confirmant etiam Dris

G 2

Robertfonis

(*e*) Aud. præl.(*f*) Lib. cit. p. 135.(*g*) Observ. on the Diseases of the Army, p. 166.(*b*) Zoon. vol. 2. suppl. to the class 4. and part 3.(*i*) Diseases of Minorca, p. 189.

Robertsonis observationes, qui etiam in febribus continuis, quum cinchona in principio, idoneaque quantitate ac qualitate, porrigitur, raro curationem non efficere testatur (*k*).

LV. Circa modum operandi cinchonæ disputatum est. Contendunt aliqui ejus actionem non exferi, nisi postquam in sanguinis massam intrat; alii verò, hanc in nervos stomachi illicò agere autumant (*l*). Perpenfis igitur

(*k*) *Essay on Fevers*, p. 189.

(*l*) *Experimenta a Dre Monro prolata, (Exp. on the Nervous Syst.)* quæ Fontanæ doctrinam circa venenorum operandi modum subvertunt, nos docent,—*imo*, Opium illicò in ejus partis nervos, cui applicatur, agere (p. 16.)—*2do*, Ejus actionem præsertim vel omnino exferi in cordis ac arteriarum et venarum nervos, postquam in sanguinis massam intrat, (p. 16.). Nonne cinchona agit similiter? Quanquam cinchonæ actio in cujuscunque systematis partis nervos, hoc est, in cujuscunque partis incitabilitatem vel potestatem sensorialem exferi potest: attamen nos cum Dre

Darwin

tur medicorum, de cinchonæ virtutibus, ejusque in fugandis intermittentibus effectibus, opinionibus; Brunonis hac de re ideas (*m*) respuendas concludere fas sit. “Delay,” ait Dr Robertson, “and *parsimony* in administer-“ ing bark in febrile infection, are execrable “foes to the human race (*n*).”

S E C T. IV.

Probabilia conjectura sequens.

CICERO, Tusc. lib. 1.

LVI. Hæc in duas distribuitur partes. In primâ externa remedia continentur, quæ sunt,

—*Imo*,

Darwin, autumamus cinchonam præfertim in incitabilitatem vel potestatem sensoriam systematis absorben-
tium agere, (Zoonomia, vol. 2. p. 710. and 717.) quod ex intento in systemate animali absorptionis gradu, qui post cinchonæ exhibitionem locum habet, probabile vi-detur.

(*m*) Elem. of Med. art. 665. n. (*t*).

(*n*) Essay on Fever, p. 188.

imo, Frictiones cum opio, cinchona, &c. Hæc methodus primùm a Dre Chiarenti proposita, et postea ejus usus a Dre Brera confirmatus est (*o*). Italici medici hujusmodi applicaciones utilissimas esse testantur, quæ juxta Brera sic præparantur: Cinchona vel opium in pulverem subtilissimum redigatur, qui cum fucco gastrico, saliva, vel alio animali fluido misceatur. Dr Chiarugi eosdem effectus salutares haberi posse ab opii pulvere, cum unguento simplici commixto, testatur (*p*).

LVII. Ex his testimoniis, igitur, et observationibus D. Ward, a Dre Percival illustratis, circa externum opii usum in typho et aliis morbis (*q*), ope frictionis, et etiam ab explanatione a C. Alibert de utilitate cinchonæ frictionum, earumque in febribus tertianis effectibus salutaribus (*r*), hujusmodi applicationes

in

(*o*) Annals of Med. vol. 3. p. 190.

(*p*) Annals of Med. vol. 3. p. 194.

(*q*) Med. & Physic. Journal, vol. 1. p. 441.

(*r*) Collect. Mem. jam cit. p. 180.

in intermittentibus utiles esse posse, in propatulo erit.

LVIII. Variæ sunt, quæ nos ad hæc remedia ministranda rationes inducunt. *1mo*, Cum nausea, a cinchona excitata, internum ejus usum prohibet. *2do*, Hac ratione salutares cinchonæ, opii, &c. cum ægrotus ea, vehiculis etiam dulcibus exhibita, fastidit, effectus obtineri possunt. *3to*, Usu tandem opii, cinchonæ, &c. externo, eorum operatio interna promovetur. Itaque hujusmodi applicationes commendamus, quidquid dicant Currie ac Seguin contra absorptionem, quæ in tota corporis superficie locum habent (*s*) ; nam ipse Currie postea dicit, “ I think it unnecessary (Appendix to Med. Rep. p. 63.) to add a “ single observation to this extract, which will “ convince every candid mind, that our con- “ clusions respecting cutaneous absorption “ have been hasty, if not wholly erroneous.”

LIX.

(*s*) Currie's Med. Rep. p. 244—272. & la Med. éclair.

par les Scienc. Phys. vol. 3. p. 234.

LIX. *2do*, Aquæ frigidæ affusio, et aquæ frigidæ applicatio cum aceto per ablutionem, qua Dr Gregory summa cum utilitate in typho usus est (*t*), quæ etiam a Harrisone commendatur (*u*); (hæc tamen applicatio duplicitate agere videtur, *imo*, ejus frigus capillarium ac absorbentium cutaneorum torporem vel inertiam inducere potest; hinc intentæ eorum vasorum actiones reducuntur: *2do*, acetum corporis superficiei admotum venarum hujus actiones auget (*x*); hinc sanguinis quantitas in arteriis reducitur, ac proinde secretiones calorque corporis minuuntur.). Proprium hoc remedium est, ut supra diximus, in stadio caloris, cum systematis vires fortiores, quam ut potestati sensoriali ad statum naturalem recessendæ neceſſe fint, evadunt. Id nosci potest a caloris gradu ad 102° , 103° , 104° 105° , scalæ Fahrenheitanæ vel altius, quam

(*t*) Vidi in Nofocomio Edinensi.

(*u*) Mem. of the Lond. Med. Soc. vol. 4.

(*x*) Zoon, vol. 2. p. 713.

quam Dr Currie, se nunquam in febribus intermittentibus altiorem quam 105° caloris, observasse testatur (*y*). Hujus, in intermittentium curatione, remedii præstantia intelligi potest, *imo*, ab status morbidi analogia, id est, typhi statu, in quo Currie aquam frigidam præscribit (*z*), et etiam a caloris statu, in quo nos hanc applicationem proposuimus; *2do*, ex modo, quo Darwin hanc applicationem considerat (*a*); *3to*, denique ex hujus applicationis in intermittentibus utilitate, qua Currie ad eas oppugnandas usus est (*b*).

LX. Affusionem aquæ frigidæ simplicem simili, qua aer frigidus, rationale, sed majori gradu, agere nobis videtur. Frigoris operatio a Brunone optimè explicatur (*c*), qui id sti-

H muli

(*y*) Med. Rep. p. 170.

(*z*) Med. Rep. p. 17. & 170. Vide etiam Howard on Prisons, p. 23. & 255. Howard on Lazarettos, p. 39. & Ferriar's Med. Hist. & Refl. p. 124.

(*u*) Zoon. vol. 2. p. 761.

(*b*) Lib. cit. p. 31. 32.

(*c*) Elem. of Med. art. 37. 117. 121. 257. 282. & 463.

muli caloris absentiam, ac proinde sedantem, considerat. Daruini opinio cum Brunone consentit, qui frigus *torpens* reputat (d).

LXI. Si frigus absolutè consideratur, *sedativum* vel *torpens* æstimari oportet; implicat enim stimulum minutum vel absentem: Si verò relatione ad nostra corpora contemplatur, alias *sedativum*, alias *stimulans* videbitur, cum revera ejus effectus sedans sit. Frigus sedanti, vel, ut ait Darwin, torpenti virtute pollere inde patet, quod ejus applicatio, ex minimis ad maximos gradus, partium quiescentiam vel inertiam inducit: Si vero frigus aliquando *stimulans* appareat, id subsequentis caloris *stimulo*, vel aliæ causæ adscribendum est.

LXII. Frigus *stimulans* videtur:—*imo*, Cum aliquis a media ad frigidorem temperiem transit, et, postquam in hac aliquando remanserit, ad priorem redit. Experitur enim homo caloris in cute sensationem, quæ, antequam frigidæ

(d) Zoon. vol. 2. p. 755.

gidæ temperiei exponeretur, non aderat ;— hinc quod caloris primæ temperiei stimulo debetur, vulgo frigoris stimulo adscribitur. Adeſt enim major incitabilitatis vel potestatis sensorialis gradus, in quam caloris primæ temperiei stimulus ſeſe exferere potest. Verum quidem eſt, frigus corporis ſuperficiem caloris actioni aptiorem reddidiffe, ſed id non stimulanti, ſed fedanti vel torpenti frigoris virtute, confeſtum eſt.

LXIII. 2do, Cum aliquis ex intenſo caloris gradu ad frigidiusculam temperiem transiſt, vel aqua frigida affunditur, fortior redditur, ſenſusque ingrati aufugiunt, quod frigoris et a Dre Currie affuſionis aquæ frigidæ ſtimulo adſcribitur (*e*) ; ſed ad caloris potiùs ſtimulum referendum puto. Certum quidem eſt, frigoris applicatiōnēm vel aquæ frigidæ affuſionem nos a debilitate ſensationibusque ingratis liberare, ſed frigus vel aquæ affuſionem non hujusmodi effectum ſtimulando ſed debilitando producere, vel potiùs ſtimulum caloris in juf-
tum

(*e*) Lib. cit. p. 177.

tum reducendo gradum, eumque idoneum stimulum efficiendo.

LXIV. Hinc aquæ frigidæ, in febris a Currie commendatæ, salutares effectus derivandi sunt, a virtute directè debilitandi, vel absorbentia cutanea, totumque per consensum absorbentium systema, capillaria cutanea, totumque per sympathiam capillarium systema, torpida reddendi, aut imminutas eorum vasorum actiones producendi (*f*), et non a subito aquæ frigidæ affusionis stimulo, extremorum vasorum spasmum removente, transpirationem restituente, sicque liberum reddente calorem, qui, juxta ipsum Currie, in corpore accumulatus erat (*g*). Nullus adeo quippe spasmus perspirationem præpediens, quidquid cutis ariditas id indicare videatur; perspiratio enim, secundum Dris Alexandri pericula, tam copiosa est vel major in calore 107° et 108° , cute sicca et calida, quam sudore humectata (*b*).

LXV.

(*f*) Zoon. vol. 2. p. 755. 756.

(*g*) Lib. cit. p. 177.

(*b*) Zoon. vol. 2. p. 19. 20. p. 698. “A defect of
“perspiration,”

LXV. Caloris igitur diminutio, quæ aquæ frigidæ affusionem excipit, non, ut opinatur Currie, liberæ hujus extiricationi, extremorum vasorum spasmo ablato, sed minutæ caloris animalis, ut ita dicam, *elaborationi*, quæ secretionum diminutioni vel minus intento gradui a capillarium ac absorbentium torpore, ab aquæ frigidæ affusione producto, tribuenda est (i).

Metus

" perspiration," ait Dr Darwin, (Zoon. vol. 2. p. 699.),
" can only exist, when the skin is cold."

(i) Secretiones unam caloris animalis originem esse contendit Dr Darwin, (Zoonomia, vol. 1. sect. 18. 6. sect. 32. 3. 1. et Botanic Garden, part. 1. cant. 1. l. 401.), ex quibus hujus theoriæ probabilitas explicatioque phænomenorum, quæ a minuto vel adacto calore animali oriuntur, agnosci possunt. Hæc aruini idea a D. H. Davy comprobata est, (Beddoes' Contrib. to Med. Knowl.) qui calorem animalem, non solum ex repulsi motus (repulsive motion) augmine, a phoxxygenii (phoxxygen), (p. 37.), conjunctione cum sanguine venoso in respiratione, ac ejus decompositione, producتو ; sed etiam ex repulso motu ab aliis chemicis processibus, hoc est, *secretionibus*, &c. et actione mu-

tua

Metus ab aquæ frigidæ affusione excitatus eundem effectum producere potest (*k*). Sitis diminutio, quæ aquæ affusionem statim excipit, non spasmī vasorum extremorum oris, faucium, et stomachi resolutioni; sed minutæ materiæ perspirabilis evacuationi, vel dispendio minori, ab exhalantium vasorum torpore producto, adscribenda est, &c.

LXVI. Pars hujus sectionis secunda remedia, quæ internè adhiberi possunt, continet. Hæc sunt,—*imo*, Aeris plus oxygenati quam in natura est inspiratio. Hujusmodi aeris inspirationem stimulandi potestate gaudere, ex Dris Beddoes testimonio constat (*l*). Hujusmodi aerem arteriosum systema stimulare, credit Darwin (*m*). Effectus, qui ab oxygenii inspiratione fluunt, ejus agendi rationem quodammodo,

tua solidorum et fluidorum generato, originem ducere putat, (p. 134.).

(*k*) Zoonomia, vol. 1. sect. 16. 8. 1. sect. 32. 8.
et Falconer on Passions, p. 48.

(*l*) Conf. on the Med. use of Factitious Airs.

(*m*) Zoonomia, vol. 2. p. 688. 689.

dammodo, morbosque in quibus adhiberi potest indicant. Beddoes, de hujus aeris inspiratione differens, sic se explicat: "The heart and arteries pulsate more quickly and forcibly; the eyes grow red, and seem to protrude; the heat of the body is said considerably to increase, sweat to break out over the whole body, and fatal mortification of the lungs to come on (n)."

" Whence in bright floods the vital air expands,
 " And with concentric spheres involves the lands ;
 " Pervades the swarming seas, and heaving earths,
 " Where teeming Nature broods her myriad births ;
 " Fills the fine lungs of all that *breathe* or *bud*,
 " Warms the new heart, and dyes the gushing blood.

Darwin's Bot. Gar. part I. cant. 4. l. 39.

LXVII. Hinc patet, oxygenium, magis minusve aeri atmospherico commixtum, majorem vel minorem stimulum redi posse. In cura-
 tione

(n) Lib. cit. part I. p. 13.

tione igitur intermittentium adhiberi potest in iis febris periodis, in quibus incitantia vel stimulantia praescribi debent (o). Patet etiam aëris atmospherici, a portione quadam sui oxygenii privati, inspirationem contrarium producere effectum debere, hoc est, sedativum vel torpentinum; subtrahitur enim hoc modo stimulus; ideoque in ea intermittentium periodo indicatur, in quo omnes stimuli ad certum gradum avertendi sunt.

LXVIII.—*2do*, Phosphorus: C. Leroy in libello quem de phosphori virtutibus medicis scripsit, hunc in febribus malignis, in quibus magna adest virium depresso, magnopere commendat. Varias sub quibus phosphorus praebeti potest formulas recenset (*p*), quarum unam feligemus: Injiciatur phosphorus in aquam calidam, qui statim liquefit: agitata phiala vel vase, aqua frigida injiciatur, et statim

(o) Hujus remedii utilitas a Dre Thornton demonstrata est. Vide Dr Beddoes, lib. cit. part 4. p. 137.

(p) Collect. Mem. jam cit. p. 172.

tim sedimentum in fundo vasis deponetur, cuius grana duo cum duabus olei guttis et vitelli ovi pauxillo commisceri debent. Hujusmodi mixtura in mortario vitro, in nivem vel aquam frigidam, immerso, collocetur et probè teratur. Hujus præparationis sumat æger unam partem, quæ quartam grani partem phosphori habeat.

LXIX. Hac præparatione se febrem, quæ magna cum virium prostratione incesserat, curavisse testatur C. Leroy. Hinc patet, phosphorum simili modo agere ac opium vel quodlibet aliud stimulans: in iisdem ergo circumstantiis, in quibus opium indicatur, exhiberi potest. Quanquam Dres Brera (*q*) et Gesseniuss (*r*) hujus remedii utilitatem in dubium revocent, id tamen medicorum attentionem promereret autemamus; violentos enim edit

I

effectus

(*q*) Riflessioni Medic. Pract. sopra lo uso interno del phosphoro.

(*r*) Manual Therap.

effectus, ad dosin granorum tres vel quatuor exhibitus, secundum C. Leroy. Nova igitur requiruntur experimenta, quæ faciliorem præparationem idoneamque phosphori dosin determinent, qui activitate sua magnum in medicina remedium esse potest. Ad ea, sicut et alia experimenta, perpetrandum, sequens Robertsonis sententia nos suadet :

“ SHALL EVERY SCIENCE DAILY RECEIVE IM-
“ PROVEMENT, BUT THAT WHICH IS THE MOST
“ ESSENTIAL TO MAN ? ” (s)

(s) Observ. on Jail, Hosp. and Ship-fever, p. 370.



APUD JACOBUM PILLANS ET FILIOS,
PROPE VIAM COLLEGII SEPTENTRIONALEM.

CORRIGENDA.

Pag. 5. l. 10. *adplicatum*, *lege applicatum*.

12. l. 6. *phenomena*, *lege phenomenum*.

21. l. 6. *une*, *lege un.*

53. l. 3. *sint*, *lege sunt*.

60. l. 13. *inducit*, *lege inducat*.

68. l. 1. *tres*, *lege trium*.

GORGETCINDA.

1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.