

**Dissertatio medica inauguralis de glandulis salivalibus atque saliva /
[Nathaniel Lister].**

Contributors

Lister, Nathaniel.
University of Edinburgh.

Publication/Creation

Edinburgi : Excudebat Jacobus Walker, 1827.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ty3xjpx3>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

61746/P

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

GLANDULIS SALIVALIBUS

ATQUE SALIVA;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,

D. GEORGII BAIRD, SS. T.P.

ACADEMÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,
ET NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

Pro Gradu Doctoris,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

NATHANIEL LISTER,

Anglus,

DOCT. PHIL. ET M. A. GÖTT.

SOC. REG. MED. EDIN. SOCIUS EXTRAORDINARIUS.

Kalendis Augusti, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

EXCUDEBAT JACOBUS WALKER.

1827.

suppl.-P HIS

COLLEGE OF PHARMACEUTICAL

SCIENCE

20

PHILIPAVIAS AND CHALD-

EVILLE HORT

MADE

BY HAMILTON COWELL LTD.

PRINTERS TO THE PHARMACEUTICAL

ASSOCIATION AND THE COLLEGE OF PHAR-

MACEUTICAL SCIENCE

1900. 12mo. Price 10/-

PRINTED IN ENGLAND

AT THE PRESS OF THE COLLEGE OF PHAR-

MACEUTICAL SCIENCE

1900. 12mo. Price 10/-

PRINTED IN ENGLAND

AT THE PRESS OF THE COLLEGE OF PHAR-

MACEUTICAL SCIENCE

1900. 12mo. Price 10/-

PRINTED IN ENGLAND

AT THE PRESS OF THE COLLEGE OF PHAR-

MACEUTICAL SCIENCE

1900. 12mo. Price 10/-

PRINTED IN ENGLAND

AT THE PRESS OF THE COLLEGE OF PHAR-



GULIELMO LISTER, M. D.

PATRI CARISSIMO,

PRIMITIAS STUDIORUM

FILIUS DICAT.

HOC OPUSCULUM

GRATI AVIMI TESTIMONIUM,

DICERIT.

NATHANIEL ALSTON.

VIRO SPECTATISSIMO,

ET LITERIS ET SCIENTIA ORNATISSIMO,

JACOBO HOME, M. D.

PROFESSORI MEDICINÆ PRACTICÆ ATQUE CLINICÆ

IN ACADEMIA EDINBURGENA,


PATRIQUE ET SIBI AMICISSIMO ;

HOC OPUSCULUM,

GRATI ANIMI TESTIMONIUM,

INSCRIBIT

NATHANIEL LISTER.



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30386846>

OPTIMO VIRO,

JOSEPHO HENRICO GREEN,

PROFESSORI ANATOMIÆ IN REGIA ACADEMIA,

NECNON

ANATOMIÆ CHIRURGIÆQUE IN COLL. REG. CHIRURGORUM

LONDINI,

VALETUDINARI DIVI THOMÆ CHIRURGO,

IBIQUE DE ANATOMIA ET CHIRURGIA PRÆLECTORI;

HOC OPUSCULUM,

SUMMÆ OBSERVANTIÆ ET AMICITIÆ PIGNUS,

D. D. D.

NATHANIEL LISTER.

* Pancreas, sicut etiam glandulas salivares, ciboservitium, super a Viris doce. Tumidum et tenuissimum ciboservitium hucusmodi monstratum est.

ORBITO ARI^o
DESERTATIO MEDICO
JOSEPHO HENRICO GREEN.

An Saliva omnis ejusdem naturae sit, dubium videretur, cum
non uno in loco omnis praeparetur.

GLANDULIS SAPIALIBUS
Stenonis Observationes Anat.
de Glandulis Oris, p. 25.

HOC OBSERVATUM

W. Fleming Esq

At the Compt^t of the Author

PUBLISHED, ONLY TOTALY RECENTLY, BY THE AUTHOR,

A NEW BOOK, TITLED, AN INQUIRY INTO THE NATURE OF SWEAT,

WITH A HISTORY OF SWEAT,

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS

GLANDULIS SALIVALIBUS

ATQUE SALIVA.

SALIVA vulgo dicitur secerni a tribus paribus glandularum conglomerati ordinis, nempe a Parotidibus, Submaxillaribus et Sublingualibus. Hae glandulae diversae sunt forma et magnitudine; an secretio eadem sit, quaestio est nunquam adhuc, ut opinor, agitata *.

* Pancreas, olim inter glandulas salivales enumeratum, nuper a Viris doct. Tiedemann et Gmelin diversum laticem secernere, monstratum est.

2 DE GLANDULIS SALIVALIBUS,

Ad talem indagationem, igitur, et ad examinandas glandulas ipsas, pro viribus me nunc adcingo.

DE GLANDULIS SALIVALIBUS.

MAGNITUDO diversarum glandularum, et situs ostiorum ductuum, secundum CUVIER, habent in mammalibus certam relationem ad dispositionem dentium, et ad eam partem oris ubi alimentum praecipue dentibus comminuitur *.

Glandulae salivales pene in omnibus animalium classibus inveniuntur. Satis erit, tamen, eos considerare in classe Mammalium. In cetaceis † glandulae salivales, ut dicuntur, non inveniuntur. In amphibiis mammalibus inveniuntur, sed parvae. (In phoca quidem glandulae parotis et sublingualis desunt.) Majores sunt in gliribus et vespertilionibus, ubi glandulae maxillares permagnae sunt, spectatis parotidibus et aliis glandulis. In

* Cuvier, Anatomie Comparée, t. iii. p. 203.

† C. G. Carus Lehrbuch der Zootomie.

edentatis, ut echidna et myrmecophaga, parotides desunt. Plerumque in mammalibus, ut in avibus quae herbivorae sunt, glandulae salivales magnae sunt. Jam diximus de gliribus, in quibus, cum dentes incisivi praecipue agant, glandulae salivales, quae secretionem in os anterius fundunt, pro rata parte, magnae sunt. Hae glandulae quidem maxime sunt in ruminantibus et solidungulis; atque in iis saliva praecipue prope dentes molares effunditur. Magnae sunt, secundum CUVIER, parotides simiarum.

De his glandulis in homine nunc est dicendum. Sequimur in hac descriptione scripta optimorum auctorum, qui in manibus sunt *.

Hae glandulae inter se differunt forma et magnitudine; sed de tali differentia observatio Cl. BELL de forma viscerum abdominalium, notatu digna esse videtur †. “Puto,” dicit, “formam solidorum ab-

* Meckel Handbuch der Menschlichen Anatomie.

Monro, Elements of Anatomy.

Hildebrandt Lehrbuch der Anatomie.

† Bell's Anatomy.

“dominalium viscerum oriri omnino ab eorum si-
“tu ; forma spectat ad locum, non ad functionem :
“in paucis forma oritur a systemate consarcinan-
“di, magis quam ab ulla alia causa.”

Glandula parotis occupat spatium inter meatum auditorium externum, processum mastoideum, et angulum maxillae inferioris, et se extendens super faciem, tegit partim musculum masseterem, substantia sua attenuata ; exigit quoque processum qui tangit glandulam maxillae inferioris. Forma hujus glandulae ovalis est. Glandula parotis tegitur a cute, et a quibusdam fibris M. platysmatis myoidei, et denique a tunica alba quae substantiam glandulae involvit. Haec est maxima inter glandulas salivales, interneque angularis, cum se ad omnes vicinas partes aptet. Acini tela cellulosa inter se conjuncti sunt. In superiore et anteriore parte parva glandula ejusdem structurae in quibusdam corporibus cum priore conjungitur, et tanquam pars ejus habenda ; in aliis vero discreta est. Huic nomen est glandula accessoria.

Ductus excretorius hujus glandulae est tenuis,

membranosus, ovalis tubus, qui ex duabus tunicis constat. Exterior formatur ex densa tela cellulosa; interior membrana mucosa est. Amplitudo ductus parva est, spectatis densis tunicis. Ductus autem est dilatabilis. Radiculae ejus oriuntur a singulis glandulae lobulis. Hae inter se conjunctae faciunt ductum, qui orsus ab anteriori margine superioris hujus glandulae partis, procedit transverse super musculum masseterem, perforatque muscolum buccinatorem, membranamque oris inferiorem aduersus spatium inter secundum et tertium molares dentes. Terminatio hujus ductus ubi buccinatorem perforat, ante STENONEM cognita, delineata est apud CASSERIUM *. STENONIS autem inventit totum ductum A. D. 1660 in ove, et postea descriptis in Dissertatione Inaugurali de Glandulis Oris. NEEDHAM † tamen et BLASIUS sibi vindicant inventionem.

Glandula submaxillaris sita est in interiori la-

* Casserius Pentaesthesia, Org. Aud. t. iv. f. 1. 10.

† Needham de Formato Foetu.

6 DE GLANDULIS SALIVALIBUS,

tere anguli maxillae inferioris, inter hanc et ventrem posteriorem musculi digastrici, partim post marginem posteriorem musculi mylohyoidei, partim etiam sub hoc musculo. In multis corporibus appendix glandulae procedit supra M. mylohyoideum usque ad glandulam sublingualem, ita ut cum eo connectatur. Ovalis est glandula, longitudine et latitudine minor quam parotis. Acini moliores et maiores sunt, telaque cellulosa quae eam amplectitur et acinos conjungit mollior est.

Ductus excretorius, qui oritur a superiore et anteriore glandulae parte, magnus est, tenuesque habet tunicas, et fertur inter musculos mylohyoideum et genioglossum, prope inferiorem et interiorem sublingualis glandulae marginem, ita ut membranam oris interiorem juxta fraenum linguae perforat. In cursu suo comitatur ramum lingualem nervi maxillaris inferioris.

Ostium hujus ductus fortasse GALENO notum fuit. Recentiore autem aevo WHARTONUS *, hunc duc-

* Adenographia, p. 139.

tum in quadrupedibus invenit et descriptsit, pos-
teaque VAN HORNE etiam in homine *.

Glandula sublingualis posita est sub anteriori
parte linguae, supra ductum glandulae maxillaris,
inter musculos mylohyoideum et genioglossum.
Superior pars glandulae in os se projicit, et fixa est
in loco suo, cute sub lingua reflexa.

Ductus hujus glandulae terminantur aut in duc-
tu glandulae submaxillaris, aut circa fraenum lin-
guae. Nonnunquam ductus, ductui submaxillari
similis, cum hoc coit. Hic autem ductus Bartho-
linianus, illi ductus Riviniani nominantur.

Glandula parotis ab arteria temporali et trans-
versa faciei, glandula submaxillaris ab A. faciali ex-
teriori, glandula sublingualis ab A. sublinguali
arterias suas accipiunt.

Venae harum glandularum procedunt ad venas,
arterias ejusdem nominis comitantes.

Nervi ad parotidem a nervo duro et a nervo
maxillari inferiore, ad glandulas submaxillarem et

* Jo. van Horne, de Ductibus Salivalibus Disputationes.

sublingualem a gramo linguali Ni maxillaris inferioris feruntur.

In animalibus inferioribus, ut supra diximus, glandulae salivales, ut dicuntur, etiam inveniuntur.

In equo quatuor sunt glandulae salivales, glandula, scilicet, parotis, submaxillaris, sublingualis, et buccalis*.

Ex his parotis, quae maxima est, sita est in depressione inter superiore marginem maxillae inferioris, et alam primae vertebrae cervicalis, superius musculum stylomaxillare, proceditque a ventre musculi auricularis usque ad latus laryngis. Color eius est subflavus, ad rubicundum tendens. Constitutus ex lobulis, laxe inter se conjunctis, figuram que habet fere pyramidalem. Notandae sunt duas superficies, exterior et interior, duo margines anterius et posterior, et duo termini superior et inferior.

* Gurlt Handbuch der Vergleichenden Anatomie der Haus Säugetiere.

Superficies exterior plana est; tegitur musculo depressore auris. Interior, e contrario, minime plana est; explet enim spatium inaequale inter maxillam inferiorem et primam cervicis vertebram. Margo anterior (seu inferior) pervenit a superiore ejus parte ad articulum maxillae inferioris, marginemque ejus superiorem. Margo posterior (seu suberior) affixus est laxe per telam cellulosam alae primae vertebrae cervicalis.

Ductus excretorii singulorum glandulae lobulorum inter se coëunt, et plures majores ductus faciunt, qui postremo ad faciendum ductum Ste nonianum conjunguntur. Hic tubus est membranosus, constans ex membranis exteriore cellulosa interioreque mucosa, et habet amplitudinem tubi pennae anserinae. Oritur fere in media anteriores marginis glandulae parte, descendensque super interiorem superficiem musculi pterygoidei, reflectit antrorum ad angulum maxillae inferioris una cum arteria et vena maxillari; inde procedit sursum sub inferiorem marginem musculi masse.

10 DE GLANDULIS SALIVALIBUS,

teris, et perforat musculum buccinatorem prope tertium dentem molarem maxillae superioris, ubi membrana mucosa papillam valvulosam facit, quae sic introitum alicujus corporis prohibet, ita tamen ut exitum saliva non impedit.

In ruminantibus, uti in bove, glandula parotis ad anteriorem et superiorem partem lobulum habet rotundum, qui situs est super musculum masseterem. Magnus ductus excretorius inde procedit, ferme in eodem modo quo in equo. Hic ductus in bove perforat buccinatorem prope secundum, in ove autem prope tertium maxillae superioris dentem molarem.

In sue ductus excretorius hujus glandulae procedit ut in equo, se autem aperiens in os prope quintum aut sextum dentem molarem maxillae superioris. In hac bestia glandula est pro rata parte satis magna.

In cane et fele parotis parva est, ductusque procedit ut in homine, transverse super masseterem, et perforat buccinatorem prope tertium dentem molarem.

Quod ad glandulam submaxillarem attinet, haec in equo tegitur ab inferiore parotidis extremitate. Multo minor est hac, habetque oblongam planamque figuram, et colorem rubicundum. Pars superior connexa est tela cellulosa alis atlantis, inferior autem ad basin linguae tendit. Ductus Whartonianus incipit fere in media ejus parte, descendensque super musculum mylohyoideum et glandulam sublingualem perforat membranam lingualem ab utraque parte fraenuli lingualis, et finitur in papilla quae prope alteram alterius lateris sita est. Hoc iter amplitudinem calami straminei habet, et constat ex membrana tenui.

In ruminantibus haec glandula est pro rate parte major. Papilla etiam ad ostium ductus excretorii major est, et cartilaginosa.

In sue nullo modo differt ab eadem glandula in equo.

In cane et fele, oblongus processus procedit a glandula rotunda, qui ductum excretorium per exiguum spatum comitatur.

At glandula sublingualis in equo plana et mi-

12 DE GLANDULIS SALIVALIBUS,

nor prioribus, jacet sub anteriori linguae parte super M. mylohyoideum, et a latere prope musculos geniohyoideum et genioglossum, et tegitur mucosa linguae membrana. Ductus Riviniani, quorum plures sunt, terminantur parvis aperturis ad inferiorem linguae superficiem.

In ruminantibus, haec glandula major est quam in equo. Habet tantum unum ductum excretorium, qui aut prope ductum submaxillarem procedit, et cum eo finitur, aut circa finem demum cum eo conjungitur.

In sue duae sunt glandulae sublinguales, quarum posterior (sive interior) oblonga est et angusta, proceditque una cum ductu excretorio glandulae submaxillaris ab angulo maxillae inferioris, usque ad anteriorem glandulam sublingualem. Ductus excretorius a posteriori parte exit, proceditque prope et extra canalem glandulae submaxillaris, et terminatur ante eum, interpositis quibusdam lineis, parva apertura.

Anterior (sive exterior) glandula sublingualis posita est ante priorem, planaque est et quadran-

gularis, et constat ex majoribus subrubellisque lobulis. Hi octo decemve ductus excretorios habent, qui ad inferiorem linguae superficiem ordine terminantur.

In cane et fele, secundum D. GURLT*, haec glandula simplex est, et multis ductibus excretoriis ad inferiorem linguae superficiem terminatur. Secundum Cl. CUVIERT†, in fele deest glandula sublingualis; et in cane est potius prolongatio glandulae submaxillaris, quam glandula propria; id quod ipse quoque inveni.

Glandula buccalis in equo sita est ad marginem M. masseteris inferiorem, inter musculum molarem et membranam mucosam. Constat ex pluribus planis granis rubri coloris, quae infra sparsa, supra inter se conjuncta sunt. Haec glandula plures habet ductus excretorios, qui membranam mucosam malarum a secundo usque ad ultimum dentem molarem perforant, et in ordine siti sunt.

* Gurlt Handbuch der Vergleichenden Anatomie der Haus-Säugethiere.

† Leçons d'Anatomie Comparée, tom. iii. p. 212.

14 DE GLANDULIS SALIVALIBUS,

In ruminantibus fertur glandula buccalis usque ad fossam temporalem.

In sue autem haec glandula constat ex duabus oblongis partibus, quae prope anteriores et posteriores dentes molares usque ad cuspidatos procedunt, pluresque habent ductus excretorios.

At in cane haec glandula minima est. Altera tamen glandula, major et globosa, sita est sub jugo intra orbitam, et plures ductus excretorios ad ultimum dentem molarem edit.

In fele autem haec buccalis glandula, major quam in cane, posita est ad latus maxillae inferioris. Altera glandula quoque etiam in orbita reperitur.

Cursum ductuum salivalium in iis animalibus, quae bursas faucium habent, discere frustra quaesivi. Si ductus has bursas intrant, cibus qui in iis servatur, necessario magis saliva objicitur, quam in aliis animalibus. Hoc observato, physiologia salivae fortasse multum augeretur.

DE SALIVA.

SALIVA variorum animalium saepe subjecta est analysi chemicae, jampridem a NUCK, BOERHAAVE aliisque, postea a BOSTOCK, BERZELIOQUE et aliis, nuper vero a TIEDEMANN et GMELIN, qui proxime analysin curiosiorem fecerunt. Plerumque, tamen, saliva, quam chemici analysi subjecerunt, ita accepta est ab ore, ut necessario admixta sit cum secretione glandularum mucosarum. Ante TIEDEMANN et GMELIN bis solum, ut credo, chemici salivam puram tractaverunt. HAPEL * de la Chenaie, A. D. 1780, et LASSAIGNE †, A. D. 1821, ductu parotidis in equo diviso, secretionem puram obtinuerunt. TIEDEMANN et GMELIN in cane etiam et in ove, ductu diviso, secretionem parotidis explorarunt. Nunquam autem, ut credo, secretio

* Observations et Experiences sur l'Analyse de la Salive du Cheval. In Mém. de Société Royale de Medecine, an. 1780 et 1781, p. 325.

† Annales de Chimie et Physique, t. xix. p. 174.

16 DE GLANDULIS SALIVALIBUS,

aliarum glandularum observata est ; et nondum scimus, ut initio diximus, an revera secretiones eae- dem sint an diversae. Possumus quidem diversas rationes in utramque partem proponere ; sed melius est hanc quaestionem re ipsa indagare, quam de ea solum disputare. Imprimis igitur dicendum est de saliva humana in ore reperta.

Haec saliva * liquor est limpidus et viscidus, sine colore vel odore. Gravitatem specificam habet ad 1,0043, secundum TIEDEMANN et GMELIN †. Per microscopium visa, saliva globulos pellucidos in se ostendit. Ad gradum 28 F. congelat, circaque gradum 210 F. fervet. Saliva dicitur spissari absorptione oxygenii ab aere, quod iterum aliis corporibus reddit. Ita explicatur oxydatio auri, argentine, et hydrargyri, cum hoc humore in mortario triti. Ego autem aliquando spiritum oxygenii per salivam, per horae quadrantem aut amplius transmisi, sine ulla spissatione manifesta. Saliva sani hominis colorem coeruleum dat rubrae tinctu-

* Plenck Hygrocologia.

† Tiedemann et Gmelin, Die Verdauung nach Versuchen.

rae litmi. Experimenta virorum doctissimorum TIEDEMANN et GMELIN in salivam humanam fere omnia iterum feci. Illi autem in saliva haec repererunt :

1. Materiam, quam vocant Salivalem :
2. Osmazomium :
3. Mucum :
4. Albumen ; sed de hoc non certiores facti sunt :
5. Adipem cum phosphoro conjunctum :
6. Potassam conjunctam cum pluribus acidis ;
sodam vero fere nullam :
- Sales potassae fuerunt :
 1. Acetas potassae. Hic sal autem in cineres combustion, non separatione acidi inventus est :
 2. Carbonas potassae in minima quantitate :
 3. Phosphas potassae :
 4. Sulphas potassae in minima quantitate :
 5. Murias potassae in magna copia :
 6. Sulpho-cyanas potassae :
 7. Calcem in satis magna copia cum acido phosphorico, minore copia cum acido carbonico conjunctam :

8. Magnesiam in minima copia.

Invenio acidum sulpho-cyanicum per permuriam tem ferri detectum, celerrime radiis solis decomponi ; id quod non accidit in sulpho-cyanate potassae. Quoniam permurias ferri colorem cum acetate sodae rubrum, et similem illi quem cum acido sulpho-cyanico, facit, periculum est, ne non possimus distinguere haec, cum adsint in parva copia. Hac autem decompositione, credo fore ut distinguere possimus, cum inveniamus talem effectum a radiis solis non oriri in mixtura in qua acetas sodae adest *.

At secretio parotidaea ovis, a TIEDEMANN et GMELIN tractata, haec praebuit :

1. Vestigium materiae salivalis :

2. Osmazomium in satis magna copia :

* Analogia inter glandulas salivales, et eas reptilium, quae venenum secernunt, reperto acido sulpho-cyanico in saliva, confirmari habeatur, si, ut verisimile est, hoc acidum ipsum est venenum. Nescio an effectus hujus acidi in corpus animale unquam tentatus sit.

3. Mucum :
4. Muriatem sodae in magna copia :
5. Sulpho-cyanatem sodae :
6. Phosphatem sodae in maxima copia :
7. Carbonatetm sodae in magna copia, ita ut saliva effervescente cooperit adjecto acido :
8. Phosphatem et carbonatetm calcis, parva copia.

Secretio autem parotidaea equi a J. L. LASAIGNE * explorata, haec ostendit :

1. Materiam animalem in alchole solubilem (osmazomium) :
2. Materiam in aqua solubilem (materiam a TIEDEMANN et GMELIN Salivalem dictam) :
3. Albumen :
4. Vestigia muci :
5. Muriates potassae et sodae :
6. Sodam liberam :
7. Carbonatetm calcis :
8. Phosphatem calcis.

* Annales de Chimie et Physique, t. xix. p. 174, 1821.

*tu Secretio parotidea canis, a TIEDEMANN et GME-
LIN tractata, sequentia dedit :*

- 1. Osmazomium in minima copia :*
- 2. Materiam salivalem satis magna copia :*
- 3. Mucum :*
- 4. Muriatem sodae, maxima copia :*
- 5. Carbonatem sodae, satis magna copia :*
- 6. Acetatem et sulphatetm sodae, parva copia :*
- 7. Phosphatetm sodae, minima copia :*
- 8. Phosphatetm calcis et parvam copiam carbo-
natis calcis.*

*Quod attinet ad secretionem submaxillarem,
hunc ego a cane obtinui.*

Membris ligatis, et capite animalis supini a socio
retento, traxi integumentum quod incidere volui
super os maxillare inferius. Tunc incisionem lon-
gitudinalem ad sesquiunciam longam per cutem
super os feci. Cuto postea in naturalem situm
redeunte, musculus mylohyoideus visus est, quem
etiam divisi. Ductum Whartonianum facile in-
ventum, nunc adaperui. Vix aliquid sanguinis
fluxit; nec visum est animal multum doloris per-

operationem pati. Propter terrorem autem, ut credo, copia secretionis minima primum fuit. Animal vivum servavi, et vulnere, praeter parvam fistulam, conglutinato, stimulis ad linguam admotis, secretionem puram in magna copia obtinui.

Liquor limpidus est et aliquanto viscidus. Per eum omnia experimenta, quae in secretionem parotidaeam canis a TIEDEMANN et GMELIN facta sunt, feci, nec ullum discriminem inter secretiones reperire potui.

Secretionem sublingualem nondum obtinui. Potest tamen fortasse ab ove obtineri, ductu Bartholiniano secto; an vero in aliis animalibus obtineri possit, nescio.

Experimentis igitur factis, redeo ad quaestionem, an glandulae, salivares dictae, revera eadem sint, eodemque officio fungantur. Adversus hanc opinionem, haec praecipua argumenta esse videntur: differentia situs glandularum, specieique externe; calculi in ductibus maxillaribus frequentiores, quam in parotidum; et quod in aliis corporis partibus singula organa ad singulas functiones ple-

rumque invenimus. E contrario, in mentem revocanda est observatio supradicta a Viro Cl. CUVIER facta, de relatione inter glandulas salivales et dentes in animalibus inferioribus; calculorumque in ductu parotidaeo rariorū causa esse potest pronus ductuum cursus, idque maxime cum compositio chemica calculorum, siquando occurunt, eadem sit; et, quod ad numerum glandularum attinet, eodem officio fungentium, possumus referre, analogiae modo, duplices pancreatis ductus, vel duplices ureteres a singulis renibus nonnunquam in homine, in quibusdam aliis animalibus autem semper, repertos.

Saliva perpetuo in parva copia secernitur; haec autem, cibo in os assumpto, aut in ventriculum; odore cibi; irritatione partis vicinae, uti auris; actione quorundam medicamentorum, quae inde nomen Sialogogorum habent, et postremo affectibus animi, augetur.

Sympathia inter testem et parotidem bene nota est: an vero secretiones inde ullo modo afficiantur, atque an sympathia reciproca sit, nescio. MURALTO quidem, in libro cui nomen “Vade Mecum

“Anatomicum” est, dicit, omnes glandulas eunuchi majores esse quam viri.

Videtur, ut inquit * doctissimus MONRO, salivam non omnino necessariam esse ciborum concoctioni, cum homo bene valuerit post œsophagum divisum, cibo protinus in ventriculum per vulnus accepto, ita ut nunquam saliva madefieri potuerit. Veruntamen ab experimentis SPALLANZANI constat, sic concoctionem multum saltem adjuvari.

Utilitates salivaes esse videntur:

1. Cibos humectare, atque ita bolum pultaceum facere, commodeque deglutiendum.
2. Cum cibis sub masticationem admixtam, eosdem diluere, et fortasse partim solvere.
3. Adjuvare assimilationem ciborum.
4. Saporem ciborum augere, diluendo aut solvendo.
5. Sitim, ut quidam putant, moderari, os et fauces humectando.

* Monro, Elements of Anatomy, vol. i. p. 507.

