Delle malattie del grano in erba / trattato storico-fisico del conte Francesco Ginanni ... Con note perpetue ad esso trattato, e con altre osservazioni di storia naturale. Del medesimo autore.

Contributors

Ginanni, Francesco, conte, 1716-1766.
Abbati Olivieri-Giordani, Annibale degli, 1708-1789.

Publication/Creation

Pesaro : Stamperia Gavelliana, 1759.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/ed58djp2

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

Libreria Antiquaria
ANGELO GANDOLFI
BOLOGNA

Materia Scienze IX
Ubicazione 43 III
Volumi 1
Prezzo L. 7—

1911

4,632/C

DELLE MALATTIE
DEL
GRANO IN ERBA.

DELLE MALATTIE

DEL

GRANO TURCO.



Tommaso Gentili inv. e del.

Carlo Gregori Scul. 1786.

DELLE MALATTIE
DEL
GRANO IN ERBA

TRATTATO STORICO - FISICO

DEL CONTE

FRANCESCO GINANNI

PATRIZIO RAVENNATE

Con Note perpetue ad esso Trattato, e con altre Osservazioni di Storia naturale del medesimo AUTORE.



IN PESARO; M. DCC. LIX.

NELLA STAMPERIA GAVELLIANA.

Con licenza de' Superiori.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY





All' Inclita Società Letteraria

RAVENNATE

ANNIBALE DEGLI ABATI OLIVIERI.



Ueſta utiliſſima Opera *Delle malattìe del grano in erba*, ch' eſce

alla

alla luce per le eleganti ſtampe del noſtro Gavelli, era ben giuſto, che da me veniſſe all' inclito nome della SOCIETA' Voſtra conſecrata. Ella è parto del Conte FRANCESCO GINANNI, mio Cugino, il quale quanta parte abbia in coteſta SOCIETA', Voi bene il ſapete; onde come coſa voſtra a Voi la preſento; anzi ve la preſento pure come coſa quaſi mia, sì perchè proviene dalla penna di perſona a me e per ſangue, e per amicizia congiuntiſſima, sì ancora perchè io ſono ſtato la cagione, ch' egli ſiaſi determinato a laſciarla

pub-

pubblicare. Godo così di potere in qualche modo corrispondere all' onore, che fatto mi avete nell' ascrivermi al vostro chiarissimo Ceto, e molto più godo della gloria, che al medesimo cagionerà la pubblicazione di questo Trattato, il quale farà conoscere, che gl' ingegni Italiani, anche senza quegli ajuti, che da tanti stabilimenti ritraggono le estranie Nazioni, sanno intraprendere, e perfezionare cose vantaggiose, e grandi. Resta ora solamente da desiderarsi per una parte, che a benefizio di nostra Italia vengano messi in prati-

ca i ſavj avvertimenti ſuggeriti dall' Autore per liberarci da mali così eſteſi, e che ci fanno tante volte provare, dopo le più belle ſperanze di fortunata meſſe, una vera inopia, e per l' altra, che dalla noſtra SOCIETA' eſcano ſovente produzioni di ſimil natura, onde il nome di Lei vada ſempre più chiaro, e luminoſo.

Peſaro 15. Giugno 1759.

PRE-

PREFAZIONE.



Ra le naturali cose degne di considerazione, le quali per fino a questi tempi illuminatissimi giacquero, se così fia lecito il dire, in oscurità, e in dimenticanza, per non essere state, come conveniva, esaminate, annoverar si debbono senza alcun dubbio molti fenomeni dell' Agricoltura avventuratamente a' nostri giorni presi ad osservare da varie Nazioni, le quali, non ha guari, una rispondendo quasi per eco all' altra, hanno istituito Accademie, e Società per trarli da quelle tenebre, in cui apparivano involti. Tanta parte tengono fra' medesimi, e nella Storia naturale sì ampio luogo le malattìe delle biade, *ch' esse certamente minor attenzione, e diligenza meritar non debbono di molte altre ricerche più dilettevoli per verità, che vantaggiose. Or io, la copia, e la differenza considerando di queste* malattìe, *rivolsi già, per* προαίρεσιν κατὰ φύσιν τηρῆσαι, tranquillum animum servare, *il pensiero a quelle sole, che il grano in erba del* Territorio Ravennate *infestano; e quantunque le molte difficoltà, che vi s' incontrano, dubbio mi recassero, e smarrimento per via, volli porre con tuttociò nell' accurata, e continua investigazione sopra di esse ogni maggior sollecitudine. Nè poteva da questo mio proposito allontanarmi il sapere, che altri si fossero dati recentemente ad esami-*

nar-

narle per adoperare con qualche certezza i mezzi più proprj a fermarne i progressi, e farle cessare; perchè io era troppo ben persuaso, che quanteppiù facciamo attente riflessioni sopra quegli oggetti, che ne presenta tuttodì questo Teatro dell' Universo, tanteppiù novità scopriamo in essi, e che possono continuamente a un esatto Fisico venir sotto degli occhi alcune apparenze, le quali alla sola esperienza sia dato di manifestarci. E bene a ciò fare mi deliberai interamente per lo consiglio amorevole del mio buon ZIO, *Conte* GIUSEPPE, *che fu, mentre visse tra noi, cotanto avido rintracciatore de' più volgari lavori della Natura, da cui trasse poi notizie, e conseguenze certe, che gli furono di scorta al discoprimento del vero intorno alcune opere di lei portentosissime. Se non che ben veggendo io, che il dar in luce le osservazioni mie non era agevole impresa, e misurando con essa le mie deboli forze, già mi restava, lasciandone a più felice indagatore il consiglio; ma ora, che un dotto, e savio Cugino, e Amico mio fammi riflettere, che la* Società letteraria *nostra* Ravennate *vuol anche per istituto suo, che di Storia naturale si parli, e si stampi, e un tale mi si aggiugne efficacissimo impulso, a cui non posso contraddire, già io mi sento in certo modo obbligato di comunicare al pubblico le medesime osservazioni, che avrei più volentieri sentenziate a quella morte, che sogliono meritar le cose mie; perchè altramente operando, e' mi parrebbe di mancare al debito, e all' offizio di buono, e di leale Accademico. Tanto varj, e curiosi, e molti sono gli esperimenti, e le ricerche, che in parecchi anni mi è avvenuto di poter fare,*

che

che un ben ampio TRATTATO, *non che una Dissertazione, come proposto mi era nell' animo, riempieranno. E qui una circostanza io non voglio tacere, la quale ad altri forse avrebbe recato spavento, se pur anche non avesse sospeso il progresso dell' incominciato lavoro, e a me, per confessare ingenuamente la verità, diede anzi impulso, ed animo più fervente per progredire. Ciò fu l' essermi venuto a notizia, che un valente ingegno* Franzese *m' andava prevenendo, e nel tempo stesso, che io scriveva, e a qualche metodo riduceva le osservazioni da me fatte, egli felicemente pubblicava le sue. Io non altero punto la verità, di cui sono consapevoli non pochi de' miei Amici, i quali, se ad uno ad uno qui nominassi, parrebbe, che io temessi di non trovar fede; e mi perdonino essi, che vinto da particolar gratitudine io nomino sol tanto il Signor* SEGUIER, *noto alla Repubblica letteraria per le sue Opere, il quale in una sua lettera del dì* 11. *Aprile* 1754. *nè più nè meno così mi scrisse:* Ora sento dalla sua, che da parecchi anni Ella ha fatte osservazioni sopra le malattìe del frumento, e ne ha distinte le spezie, formandone un Trattato. Utilissime queste saranno, e non dubito, che non sieno accettate con giubilo da tutti. Le dirò però con tutta schiettezza, che sarebbe meglio, ch' ella sollecitasse di pubblicare queste sue osservazioni..... *Giovami certamente sperare, che vedendo questa mia fatica l' egregio Signor* TILLET *non me ne vorrà male alcuno, dacchè in questo* TRATTATO *io non rifò il già fatto, e sebbene riguardo a qualche malattìa in particolare sembrerà, ch' egli mi abbia in*

alcuna maniera prevenuto, non ha però esausta la materia, in guisacchè ad altri non sia rimasto che dire. Vedrà altresì chiaramente, che i pareri nostri non convengono in molte cose; e già mi sono dichiarato fin da principio, che io favello soltanto di quelle malattìe delle biade, che sono state da me osservate in parecchi anni, e in questo Territorio di Ravenna, *ove io scrivo. Se per tanto alla difficoltà dell' impresa corrisponderà il valore dell' opera, onde qualche utile rechi al pubblico, mi parrà di avere non perdutamente impiegato la fatica, e il tempo. E quando ciò non avvenga, pur debbo sperare un altro mio utile proprio, cioè il venire in cognizione della verità nel sentir emendati i miei sbagli. Tantoppiù questo è certo, che io non ho risoluto di produrla alle stampe per applauso alcuno, trovandomi di dover essere più geloso di non perdere i primi disinganni, che ansioso di guadagnarmi gli applausi altrui.*

Non diversamente dunque, che in tutti gli altri viventi, si scuoprono anche malattìe moltissime, e stravagantissime nelle molli biade, che di alimento forniscono l' umano genere, e la cui pronta conservazione interessa ognuno singolarmente, alcune delle quali sono a tutta la pianta comuni, altre alle sole parti di essa, altre a tutto il genere, altre solamente ad alcune spezie particolari. Ma quelle sole, come ho detto, avendo io considerato del grano in erba, che i Latini chiamano triticum, *le quali sono state forse da' trapassati o troppo confusamente, o troppo superficialmente descritte, o anche del tutto ignorate, giacchè* multa inveniuntur hodie, quae apud majores nostros non fue-

fuere inventa, *delle medeſime favellerò, in quattro parti dividendo il* TRATTATO, *e ciaſcuna di eſſe in alquanti* CAPITOLI. *Nella* PARTE PRIMA *fiſſerò i nomi, e i caratteri di queſte malattìe, e cercherò, per quanto è poſſibile, quale contezza ne aveſſero gli Antichi. Sono coteſte la* ruggine, *la* filiggine, *il* grano carbone, *il* grano ghiottone, *il* giallume, *il* grano voto, *il* ſeccarſi della ſpiga, *la* ſterilità, *la* luſſuria, *l'* infeſtamento degl' Inſetti, *il* pullular dell' erbe eterogenee, *ed altre sì fatte.*

Ma perchè il conoſcimento delle naturali coſe pende dall' attenzione, e dal candore delle oſſervazioni; e non ſempre inutili ſono le diligenze più minute, che ſi adoperano nelle medeſime per far sì, che incurabili egualmente non ſieno le malattìe, di quellocchè una volta furono; io non ho ceſſato di ſempreppiù accuratamente farne diligenza, e oſſervazione, e con varj eſperimenti, e artifizj eſaminarne il miſtero in una maniera mecanica, che riſchiari la mente, e nel tempo ſteſſo in qualche modo percuota i ſenſi; parendomi rara, e incredibile coſa, che un male non debba o curarſi, o diſperarſene la cura, quando meglio la cagione di eſſo, e il più ſottile, e arcano lavoro della natura ſi conoſca, e con la mano, e con l' occhio ſi diſtingua, e ſi veda. Per queſta ragione dopo aver eſaminato, quali ſieno le malattìe del grano in erba, ho fatte oſſervazioni, ed eſperienze, le quali debbono contribuire allo ſcoprimento delle loro cagioni, e de' loro rimedj, ma ſoprattutto ho avuto ricorſo all' analiſi di ognuna di eſſe, perſuaſo, che ſenza un metodo ſimile l' ingegno anche più penetrante non arrivi giammai alla co-

noſcenza della minima verità. Io confeſſo, che a varie utili eſperienze ſcorta mi furono que' lumi, che uomini volgari mi ſomminiſtrarono, a' quali certamente non può negarſi una lor Fiſica particolare, e una naturale Storia; e benchè de' lor racconti ſi debba per ordinario diffidar molto, è però coſa certa, ed eſperimentata, ch' eſſi dar ſanno alcuna volta certi principj di notizie, e far naſcere in altri certe idee, le quali conducono rettamente al vero. Solea ſpeſſo il gran LEIBNITZIO *trattenerſi con ogni ſorta di perſone, e da eſſe raccogliere, come ſcriſſe il celebratiſſimo* FONTENELLE, *quante più poteva conoſcenze pratiche, le quali ben egli ſapeva poi condurre alla teoria, e renderle per la ſocietà degli uomini vantaggioſe. Niuna coſa per tanto io ricevetti per vera, che per tale non la voleſſi conoſcere evidentemente, nè credetti agli altrui detti, quando gli occhi miei proprj non vi acconſentirono più di una volta, ſtando ſempre lontano da certi ſottiliſſimi raggiri di mente, che occultano la verità, e laſciando di andar più innanzi, quando il lume della ragione mi abbandonava, e quando il paeſe, per così dire, mi compariva incognito, e inacceſſibile. Ho dunque eſpoſto nella* PARTE SECONDA, *quanto mi venne avvertito di più particolare in queſte malattìe, ſenza però laſciare indietro quell' altre oſſervazioni, che ho fatte in tal' occaſione, le quali poſſono eſſere valevoli a render l' opera in qualche maniera intera, e compita. Havvi in luogo d' eſempio la* topografia *delle ſperimentali ſeminazioni fatte in alquanti anni, e le oſſervazioni generali degli anni, che a quelli ſeguivano, come le alterazioni del* Barometro,

tro, *e di altri ſtrumenti idonei alla* Meteorognosìa, *e il corſo, e le vicende de' venti. Havvi la deſcrizione di alcuni curioſi fenomeni; havvi la Storia di cinquanta, e più ſpezie diverſe d' Inſetti, che in qualche maniera appartengono al grano in erba, e quella di cento, e più ſpezie di piante ad eſſo grano eterogenee, le quali noi vediam di frequente fra il medeſimo pullulare.*

Si entra quindi nella PARTE TERZA *a trattare di quanto ſpetta alle cagioni, raccogliendo dal detto nell' antecedente, quanto poſſa più ragionevolmente crederſi di eſſe. Ben ſanno i Fiſici oggidì, che i morbi de' corpi viventi ſono le alterazioni delle parti loro, ma non tutti vogliono egualmente ſapere, che in alcuni morbi ciò poſſa derivare da varie cagioni, ſecondo le varie circoſtanze, oſtinandoſi eſſi nel produrne una ſola, ed unica; e pure quanti effetti ſomiglianti naturali vi ſono, che da cagioni diverſe in diverſi tempi derivano, e che non ſi poſſono in tutti i loro aſpetti conoſcere, fuorchè eſaminandoli ſotto diverſi punti di viſta? La preſſion ineguale di qualche fluido è probabilmente, per dirne pur alcuno, il fondamento della ſpiegazion degli effetti de'* tubi capillari, *ma l' aderenza, e la viſcoſità naturale de' liquidi, la figura delle loro parti, e forſe un certo movimento lor proprio ſono altrettanti mezzi, che la natura può impiegare per ſomiglianti effetti. Non fia dunque ſtrano, ſe ad alcuna malattìa del grano in erba io abbia aſſegnato diverſe cagioni, ſecondo i diverſi principj, che ho in lei ſcoperto, e ſe a diverſe malattìe ho talor creduto di poter attribuire una ſola cagione, ſiccome a ciaſcheduna delle altre u-*

na lor particolare, perchè tali mi ſono eſſe in loro manifeſtate.

Qualche non difficile rimedio alla maggior parte di queſti morbi io ſpererei, che ſi poteſſe agevolmente portare, ſe non vado errato, e ſe gli eſperimenti reiterati, che mi ſono ſempre tornati a puntino, vaglio-no per la verità. Dovrà contarſi per uno de' loro vantaggi la facilità di eſeguirli. Un rimedio ſi vuol tanto ſtimare, quanto egli ſarà utile nell' effetto, e agevole nella eſecuzione, e ſi può dire, che la ragione del ſuo valore ſia compoſta di due ragioni, di utilità l' una, e di agevolezza l' altra. Comprenderà perciò l' ultima PARTE *que' rimedj, che ho provati per buoni, e per facili, rendendo giuſtizia al merito di coloro, che alcuni di eſſi hanno inventati, ed eſperimentati, e non laſciando anche di riferir quelli, che non mi ſono riuſciti alla prova. Sono certamente i confini della curioſità lodevole quegli ſteſſi, che furono preſcritti all' intelletto dell' uomo in generale, e allo ſtato particolare di ciaſcheduno; onde il conoſcere, quanto eſſo intelletto vaglia, ci anima nelle noſtre intrapreſe, e il conoſcere, quanto e' non vaglia, ci ritrae da' varj tentativi inutili. Sarà uopo il confeſſare, che alcune di queſte malattìe non poſſono aver rimedio opportuno; ma una tal conoſcenza appunto è ciò, che forma il noſtro utile, perchè ella ci libera dalla ſollecitudine di andarne più a lungo in traccia. Queſto mi baſta di aver detto, onde qualche idea ſi formi della ſeguente Opera, qualunque ella ſiaſi.*

IN-

INDICE
DELLE PARTI, E DE' CAPITOLI.

PARTE PRIMA

Delle malattìe del grano in erba.

CAP. I. Qual ſia la *ruggine del grano*.
CAP. II. Qual ſia la *filiggine del grano*.
CAP. III. Qual ſia il *grano carbone*.
CAP. IV. Qual ſia il *grano ghiottone*.
CAP. V. Quali ſieno *altre malattìe del grano in erba*.

PARTE SECONDA.

Delle oſſervazioni, ed eſperienze d' intorno alle malattìe del grano in erba.

CAP. I. *Sperimentale ſeminazione dell' anno* 1749.
Oſſervazioni generali dell' anno 1750.
CAP. II. *Sperimentale ſeminazione dell' anno* 1750.
Oſſervazioni generali dell' anno 1751.
CAP. III. *Sperimentale ſeminazione dell' anno* 1752.
Oſſervazioni generali dell' anno 1753.
CAP. IV. *Sperimentale ſeminazione dell' anno* 1754.
Oſſervazioni generali dell' anno 1755.
CAP. V. Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno alla *ruggine del grano*.
CAP. VI. Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno alla *filiggine del grano*.
CAP. VII. Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno al *grano carbone*.
CAP. VIII. Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno al *grano ghiottone*.
CAP. IX. Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno all' *infeſtamento degl' Inſetti*.

CAP. X. Osservazioni, ed esperienze particolari d' intorno al *pullular dell' erbe eterogenee*.
CAP. XI. Osservazioni, ed esperienze particolari d' intorno ad *altre malattìe del grano in erba*.
CAP. XII. Osservazioni, ed esperienze particolari d' intorno *alcuni fenomeni appartenenti al grano in erba*.

PARTE TERZA.


Delle cagioni delle malattìe del grano in erba.

CAP. I. Cagione della *ruggine del grano*.
CAP. II. Cagione della *filiggine del grano*.
CAP. III. Cagione del *grano carbone*.
CAP. IV. Cagione del *grano ghiottone*.
CAP. V. Cagioni di *altre malattìe del grano in erba*.
CAP. VI. Cagioni di *alcuni fenomeni appartenenti al grano in erba*.

PARTE QUARTA.

De' Rimedj per le malattìe del grano in erba.

CAP. I. Rimedj per la *ruggine del grano*.
CAP. II. Rimedj per la *filiggine del grano*.
CAP. III. Rimedj pel *grano carbone*.
CAP. IV. Rimedj pel *grano ghiottone*.
CAP. V. Rimedj per *altre malattìe del grano in erba*.


TRAMONTANA
LEGAZIONE DI FERRARA
LEGAZIONE DI
Valli di Comachio
Territorio di Comachio
Isola di Primaro
Valle di Filo e di Longastrino
Territorio di Argenta
Valle di Santerno
Territorio di Lugo
Territorio Leonino
Territorio di Fusignano
FERRARA
Territorio di Bagnacavallo
RAVENNA
Territorio di Ruisi
Territorio di Forlì
Territorio di Cervia
Territorio di Cesena
MARE ADRIATICO
PONENTE
LEVANTE
MEZZO DI
TERRITORIO RAVENNATE
posto tra 44° 10' 30" e 44° 35' 30" di Latitudine, e tra 29° 26. e 29° 49' di Longitudine
ANNO MDCCLVII
Spiegazione delle Note
TERRA
Villaggio o Borgo
Arcipretura
Parocchia
Chiesa
Badia
Casa Nobile di Villa
Torre
Luogo distrutto
Strada
Fiume
Condotto
Scolo
Ponte
I Luoghi del Territorio Ravennate compresi in questa Carta sono stati trigonometricamente determinati colla maggiore possibile diligenza. Quanto appartiene alla forma de Luoghi l' Autore non s'impegna punto. La direzione delle Strade, e il corso de Fiumi, e de Condotti ec. è presa da Carte particolari le mano cattive
Miglia di Ravenna a 67 ½ per grado
Miglia Romane a 74 ½ per grado



PARTE I.

Delle malattìe del grano (1) *in erba.*

QUantunque la natura non operi giammai cosa alcuna di nuovo, o certamente assai di rado ; pur ella sempre nell' opere sue ci presenta delle mutazioni (2), le quali se fossero state dagli uomini subito avvertite, qui potremmo fissar prima d' ogni altra cosa un' epoca delle malattìe del grano in erba, che il principio della lo-

(1) Io favello di quel grano, che i Latini chiamarono *triticum*, di cui PLINIO nella sua Storia naturale l. XVIII. c. 7. *Frugum sunt duo prima genera : frumenta , ut triticum , bordeum : & legumina, ut faba , cicer.*

(2) *Omnia commutat Natura , & vertere cogit .* LUCREZIO l. 5. *De natura rerum.*

ro Storia formaſſe. Io per altro mi do a credere, che molte di quelle ſieno antiche, quanto poſſa eſſere il grano medeſimo (3); e dubito, che queſta vetuſtà appunto ci metta inſuperabilmente allo ſcuro de' principj di una tale Storia, e tantoppiù che gli Scrittori, i quali ne potrebbero avere

(3) Quantunque il *Farro* ſia ſtato il primo cibo degli Antichi in Italia: *primus Antiquis Latio cibus*. PLIN. *Hiſt. nat.* XVIII. 8., e non abbia il Popolo Romano per 300. anni uſato altro cibo, che queſto: *Populum Romanum Farre tantum e frumento* ccc. *annis uſum, Verrius tradidit. ibid. 7.*; onde ſiccome i Greci, ſtimando l'*Orzo* eſſere il più antico delle biade, davano ne' Sacrifizj le primizie di quello, chiamandole ὕλας, che deriva da ὑλὸς, *integer, ſanus, perfectus*, così i Romani, credendo il *Farro* eſſere tra loro antichiſſimo frutto, da lui cominciavano tutti i Sacrifizj, dove fuoco interveniva: DIONIGI d' ALICARNASSO l. 1., è tuttavia manifeſto che il grano noſtro fu de' primi, ch' eſſi conobbero. Grido di molta antichità ſi ſcorge in DIODORO SICULO *Bibliot. Hiſtor.* l. 1., dove accenna, che „Iſide ritrovò il „ frutto del grano, e dell' orzo, che naſceva alla ventura nel Paeſe inſie„ me con l' altra erba, e non era dagli uomini conoſciuto." Queſte ſono le ſue parole: εὑρόσης μεὺ ἴσιδος τὸν τέ τῦ πυρῦ [*triticifrumenti*] ἢ τῆς κειθῆς καρπὸν, φυόμενον μεὺ ὡς ἔτυχε κατὰ τὴν χώραν μετὰ τῆς ἄλλης βοτάνης. ἀγνεύμενον δὲ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ivi il medeſimo Autore oſſerva, che *Iſide era ſtata, quanto più ſi poteva, eſattamente interpretata per Cerere*, ch' è delle più antiche Deità dell' Egitto: τὴν ἴσιν ἐγγύς πως μεθερμηνεύομενον Δημήτραν. Si riconoſce dunque con l' autorità di DIODORO, che gli Antichi chiamarono Dea quella Donna, che ſparſe la prima volta nelle campagne di Europa, come quella gente vantavaſi, una ſalvatica, e comunale *gramigna* di Egitto, qual è appunto il noſtro grano. Molto erano le ſpighe di eſſo grano in venerazione preſſo i Romani, e delle medeſime fu la prima *corona*, che uſaſſero. Queſta portavano continuamente, quando una volta era loro ſtata conceduta, ancorchè foſſero in eſilio, o prigionieri de' Nimici, e un tal onore durava, quanto vivevano; onde ACCA LAURENTA per fare coſa grata a ROMOLO gli donò una *corona di ſpighe*. Così PLINIO XVIII. 2. *Arvorum Sacerdotes Romulus in primis inſtituit; ſeque duodecimum Fratrem appellavit inter illos, ab Acca Laurentia Nutrice ſua ſpicea corona, quae vitta alba colligaretur; in Sacerdotio ei pro religioſiſſimo inſigni data, quae prima apud Romanos fuit corona: honoſque is non niſi vita finitur.*

re

re trattato, ſi ſono perduti. Molti Greci, che dell' Agricoltura ſcriſſero, ricorda TEOFRASTO nel ſuo Libro delle Piante, ma di eſſi non ci reſta, che il nome. Così perduta è l' Opera di ESIODO ASCREO, che, per teſtimonio di PLINIO (4), fu il primo, che ne ſcriveſſe. Sebbene poco tuttavia per tal capo ne avranno pregiudicato queſte perdite, giacchè una non minore, ſe non più remota antichità, alle mentovate malattìe viene aſſicurata dalle *Sacre Carte* (5), onde ſembri non poterſi mettere in dubbio, ch' elle ſieno ſtate anticamente conoſciute (6). La qual coſa quanto

 chiaro

(4) PLIN. *Hiſt. Nat.* l. XVIII.

(5) Si ha in Aggeo c. 2. v. 19. *Percuſſi vos in vento urente, & in aurugine, & grandine omnia opera manuum veſtrarum.* E nel *Salmo* 77. v. 46. *& dedit aerugini fructus eorum, & labores eorum Locuſtae.* E così in altri luoghi.

(6) PLINIO ne ſcriſſe a lungo nel libro XVIII. E ſi trova in frammento d' Iſcrizione riportato dal GRUTERO *Corpus Inſcriptionum pag.* CXXIV. 1. un voto fatto da' *Fratelli Arvali*, dove ſi nominano le ſpighe viziate: *ſpicis vitiatis*. Il GUTHERIO, per quanto ſi riferiſce nelle note aggiunte all' edizione di Amſterdam, legge, non *vitiatis*, ma *vittatis*, ſervendoſi di un paſſo del medeſimo PLINIO. Qual ſia la miglior lezione, lo potranno i Critici giudicare. Io quanto a me ſtimo, che il racconto non potrebbe verificarſi, ſe non parlando di *corona di ſpighe*, il che quanto ſia vero il Lettore ſel vegga. Eſſa la Iſcrizione è tale:

C · VIC IORIVS GETA · ET CAND
M. VALERIVS. IVNIANVS. VOLVSIVS. SATVRNINVS. P. CORNEL
HERACLEO. OPTIANVS ISDEM. COS

IN.LVCO.DEAE.DIAE.TI.IVLIVS.IVLIANVS.ALEXANDER.PER.PROMAG
LVCI.COINQVIENDI.ET.OPERIS.FACIVNDI.IBIQVE.VACCAM.HO
IBIQ.SACERDOTES.IN.TETRASTYLO.CONSEDERVNT.ET.EX.SACRIFI
SPICIS.VITIATIS.LVCVM.DEAE.DIAE.SVMMOTO.ASCENDERVN
TI.IVLIVM.IVLIANVM.PRO.FLAMINE.MAGNAS.OPIMAS.IMMOL
FECERVNT.DEINDE.CORONIS.INLATIS.SIGNISQVE.VNCIIS.C.V
IN.SATVRNALIA.SECVNDA.MAG.ANNVVM.IN RVNT.IBIQVE.I.

Ha

chiaro gli Autori ci manifeſtano, altrettanto eſſi ci occultano, quali diſtintamente quelle foſſero. Di alcune ſembra, che non aveſſero contezza veruna, o non curaſſero di averla, perchè non ne fecero menzione; e di altre, benchè l' aveſſero, nome alcuno non ne aſſegnarono (7), e quindi non furono da loro deſcritte. Di quelle, che mancarono avanti il ſorgere de' Romani, o erano almeno a poca coſa ridotte, ancorchè portaſſero forſe il nome, non ce lo fecero ſapere. Ma non ſi può dubitar veramente, che il ſilenzio da eſſi medeſimi tenuto ſopra alcune malattìe del noſtro grano derivaſſe dal non averle in que' tempi fra loro conoſciute, poichè nello ſteſſo modo, che d' altre di minor conto, avrebbero di queſte anche favellato. Sappiamo da PLINIO (8), che molti mali erano ſtati anticamente ignoti, i quali nacquero a ſuo tempo, e dall' IPPOCRATE LATINO (9), che

Ha TEOFRASTO nella *Storia delle Piante* varj Capitoli ſopra le malattìe di eſſe; e la *Bibbia* in varj luoghi, come ſi è veduto, ne fa memoria. Che ſe i più remoti poco ne laſciarono, gli Autori *Geoponici* de' ſecoli a noi più vicini pochiſſimo ne ſcriſſero, e FIORENTINO, che ne' Libri degli *Ammaeſtramenti dell' Agricoltura* attribuiti all' Imperator COSTANTINO POGONATO tanto promeſſe, nulla affatto ne diſſe.

(7) Pare, che di tal credenza foſſe TEOFRASTO, ch' ebbe *Hiſt. Plan.* l. 5. c. 10. *Agreſtium plantarum morbos, ſed urbanarum complures, atque alios carere nomine, alios nominari.*

(8) PLIN. *Hiſt. nat.* XXVI. 1. *Senſit & facies hominum novos, omnique aevo priore incognitos non Italiae modo, verum & fere univerſae Europae morbos, nunc quoque, nec tota Italia, nec per Illyricum, Galliaſque, aut Hiſpanias magnopere vagatos, aut alibi, quam Romae.....*

[9] A. CORNEL. CELSI *Medicinae l.* 1. *Praef. p.* 5. *Saepe vero etiam nova incidere genera morborum, in quibus nihil adhuc uſus oſtenderit, ut ideo neceſſarium ſit animadvertere, unde ea coeperint; ceu ſine quo*

nemo

che si appreſtavano ſpeſſo certi generi di morbi, le qualità, e le cagioni de' quali non comparivano per conto alcuno. E veramente una sì fatta condotta è conforme all' ordine della natura, la quale ſiccome nelle ſue operazioni ora è molto ſollecita di aggiugnere, ora è ſommamente negligente, e perciò gli animali ſono in diverſo modo figurati, creſcono in diverſa guiſa, dormono, protraggono lo ſpazio della lor vita, e l' eſtremo biſogno tollerano diverſamente, e i vegetabili ora più preſto, or più tardi dalla terra ſpuntano; così alcuni morbi preſtamente naſcono, alcuni altri protraggono la lor generazione a più ſecoli, altri del tutto ſi annientano, e ne mettono altri nuovi in iſcena: del che ſerva di eſempio i *Licheni*, lo *ſternuto epidemico*, il *ſudore Anglico*, il *Morbo Ungarico*, ed altri tali, e fors' anche la *Lue venerea*, e la *Plica Polonica*, che che di quella ne abbia detto il Signor DE VALOIS nella ſua *Valeſiana*, e di queſta il Signor ERNDTEL nella ſua *Storia naturale, fiſica, e medicinale di Warſovia*. Io favellerò per tanto di tutte quelle malattìe del grano in erba, le quali ho vedute, ed oſſervate diligentemente; e acciocchè ſenza errore poſſa avanzarmi nella loro ricerca, dichiarerò prima, e fiſſerò di ciaſcheduna il nome, e ne diſtinguerò il carattere; facendo qui riflettere con TEOFRASTO (10), che alcune delle medeſime ſi poſſono chiamare eſterne

nemo mortalium reperire poſſit, cur hoc, quam illo, potius utatur. Et ob haec quidem in obſcuro poſitas cauſas perſequuntur.

[10] THEOPH. *De Cauſ. Plan. 5. 9. Morborum autem initia ſicut & in animalium genere vel intrinſecus, vel extrinſecus contrahuntur.*

ſterne malattìe, ed altre interne, perchè le une nell' eſterno, le altre nell' interno dalla pianticella ſi contraggono.

CAPITOLO I.

Qual ſia la *ruggine del grano*.

1. PRocederò col miglior ordine, che io ſappia, ſe innanzi ogni altra io metta la *ruggine del grano*, Tav. 1. Fig. 1., ſiccome quella malattìa, che ha ſempre avuto nome preſſo i trapaſſati, quantunque abbaſtanza non ſia ſtata conoſciuta. Ella ſi dirà eſterna malattìa; e non altro ſi vorrà intendere per eſſa, che quell' umore tenace di colore ordinariamente giuggiolino, o roſſigno cupo, il quale ſi attacca alla pianticella, e tutta, o in parte la tigne, e la percuote, e talor anche la penetra, e non laſcia, che perfezioni (11). Ancorchè ſi poteſſe dividere in molte ſpezie, a due principalmente io la riſtringo, perchè ſiccome in eſſe ho ritrovate ſempre delle proprietà coſtantemente varie quanto agli effetti, così anche vi ho

(11) I dottiſſimi Uomini, che col loro *Vocabolario della Cruſca* hanno illuſtrata l' Italiana favella, diſſero „ la *ruggine* eſſere quelle macchie „ che appariſcono ſulle biade, e ſulle piante, quando intriſtiſcono.“ Così appunto ſpeſſe fiate accader ſuole, allorchè l' umor rugginoſo attacca leggiermente il grano in erba, e le foglie di molte piante. Per altro queſta diffinizione convenir anche potrebbe a quella malattìa del grano, che io chiamo *giallume*. Il CHAMBERS nel *Dizionario delle ſcienze* parlò vero della *ruggine*, quando aſſerì, che venuta queſta malattìa ſopra il grano, ne macchia lo ſtelo con un color differente dal naturale, ma non diſſe abbaſtanza.

ho ſcoperto delle diverſità ſempre coſtanti quanto alle cagioni. Una ſpezie di *ruggine* io dico quell' umore, che macchia la pianticella, e ſopra la medeſima ſi raſciuga, e ſi diſecca, ſenza produr polvere giammai, e che ſpeſſo l' eſterna buccia ne penetra, per modo che tutta la inaridiſce. E' di colore or pallido, ora roſſigno, or giallognolo, ora giuggiolino, or nericcio, e ve n' ha anche di variegata, o di più colori. Nè queſta diverſità può riputarſi coſa nuova nelle malattìe, le quali d' ordinario prendono sì varie apparenze, maſſime ne' colori, che qualche volta più non ſi riconoſcono da quelle di prima; e quindi è, che nulla ſia più importante nella Medicina, quanto il ſaper eſattamente la Storia delle loro variazioni. L' altra ſpezie inveſte, e cuopre tratto tratto quella pianticella di una certa materia umida, e alquanto denſa, che poi aſciugaſi, e in polvere ſi riſolve; ed è ſoggetta anch' eſſa a' predetti colori, ma dilavati alcun poco, benchè per ſolito ſia roſſigna, o giuggiolina; e imprime ſempre nella corteccia lividure, e corroſioni, e puſtole dall' una parte, e dall' altra moltiſſime, e maggiori della prima. Si eſtende quella a tutte le biade; ſi riſtrigne queſta al ſolo grano in erba, o al più più ſi vede talor ſull' *avena*, e ſull' *orzo*, che molta hanno ſimiglianza al noſtro grano. Potrebbe crederſi una terza ſpezie di *ruggine* quella ſoſtanza polveroſa, e giallognola, che ſtando fra l' epidermide delle foglie del grano s' innalza in veſcichette, le picchia in molti luoghi, e ne corrode anche le fibre; nè male per

avven-

avventura ſi crederebbe. Tale dunque è il maggiore divario, che io abbia ritrovato nelle *ruggini del grano*, le quali ſono da metterſi per altro ſotto un medeſimo genere; e ſe alcun' altra varietà ne vedeſſi, mi ſervirei di quel *ludit natura*, che tante volte udimmo dire all' HOFFMANNO.

2. Or queſte diverſe ſpezie di *ruggine*, non bene diſtinte, vengono in *Lombardia* comunemente nominate *malume*, o *melume*; onde il VALLISNIERI (12), la *ruggine delle biade* mentovando, ſi eſpreſſe, che *il volgo Lombardo la chiama malume dal male, che apporta*; e prima di lui il TANARA (13) diſſe: *chiamaſi malume dal male, che apporta, ovvero melume dall' avere per la viſcoſità ..... ſomiglianza di mele* [14]. Ella è il *mildew* degl' *Ingleſi*, che ſi diſtingue, per ſentimento del CHAMBERS (15), dal loro *bright*, tenuto volgarmente

(12) VALLISNIERI *Della curioſa origine degli ſuiluppi, e de' coſtumi ammirabili di molti Inſetti.*

[13] TANARA *Economia del Cittadino in Villa lib. 6.* Ma più anticamente il CRESCENZI *Agric. 4. 17. 5. che volgarmente a Bologna melume chiamano.* Alcuni altri con termine volgare dicono *manna.*

(14] Dal Signor TILLET *Diſſertation ſur la cauſe, qui corrompt, & noircit les grains de bled dans les Epics, & ſur les moyens de prevenir ces accidens; Ouvrage, qui a remportè le prix de l' Academie Royale des Belles-Lettres, ſciences, & arts de Bordeaux*, abbiamo recentemente *bleds rouillès*, biade arrugginite per quelle, „ il cui gambo, e le foglie „ ſono coperte di una ſoſtanza roſſa, " e vuol egli intendere la noſtra *ruggine*, e forſe della ſeconda ſpezie. Diſſero i Franzeſi anche *nielle*; e il Signor DE LA QUINTINYE ſcriſſe, che *nielle*, ovvero *nouille* è una maniera, o ſpezie di *ruggine* giovane, che ſi mette ſopra le biade, e ſopra il piede, e le foglie del melone. DIONIGIO GODEFROY ſopra la Legge 15. al Digeſto *Locati*, così favella: *Galli nellam, quaſi nebulam vocant.* E BUDEO ſopra le Pandette fol. 148. *Rubigo, vel aeſugo, niſi fallor, eſt, quam nuillam noſtrates Agricolae vocant.*

(15] CHAMB: *Diz. del. Ar., e del. ſcien.* Alcuno potrebbe rendere per

mente per lo ſteſſo; ma di una tal diſtinzione ſi vedrà altrove. Ella è l' *Orujo* degli *Spagnuoli*, il *Roeſt* da *colore ruſſo* de' *Fiaminghi*, e certamente l' ἐρυσίβη, *morbus ſegetum* de' *Greci*, da ἐρευθος, *ruber*, o da ἐρυθρίνω, *rubefacio*; ed è finalmente degli *Ebrei* la ירקון *Jerakon*, perchè il vizio de' metalli, che porta queſto nome medeſimo fu eſpreſſo da eſſi חלודה *Kaludà*.

3. Anche però in que' dì, che gli uomini abitavano le campagne, e che menavano una dolce vita, e utile nella coltivazione de' loro campi (16), ſi potrà dire, ch' erano cognite, e uſitate le *ruggini*; e queſte pare a me, che voleſſero particolarmente ſignificare i latini Scrittori, quando della loro *rubigo ſegetum* favellarono (17), la quale poi i noſtri *Botanici* con altre malattìe del grano in erba hanno confuſo. Che ſe in conferma

B di

per *ruggine* anche il loro *blaſting*, ſe queſto, come già ſeppi dall' Ingleſe prode Matematico Padre CRISTOFORO MAIRE della Compagnia di Gesù, non foſſe un participio divenuto nome, conforme accade nella lingua Italiana al verbo infinito, e ſuona quantocchè il *guaſtare*. E' però da porſi mente, che tal voce ſignifica ſolamente quel guaſtare, che naſce dalla troppa umidità del grano in erba eſpoſto poi a' raggi cocenti del Sole.

[16] Onde ORAZIO *Epodon lib. Od* 2.

Beatus ille, qui procul negociis,
Ut priſca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet ſuis,
Solutus omni foenore.

E VIRGILIO *Georg. l.* 2.

O fortunatos nimium ſua ſi bona norint
Agricolas! quibus ipſa procul diſcordibus armis
Fundit humo facilem victum juſtiſſima tellus.

[17] I Latini per *rubeus* diſſero anche *robeus*, e quindi *robigo* per *rubigo*, come ſi trova in ottimo Codice Romano, che fu veduto dal

PIE-

di quanto asseriſco, ſi voglia di queſta voce riandar l' origine (18), baſta rammentare, che tal malattìa molto alla ruggine del ferro ſi aſſomigliava (19), ſiccome appunto le ſopraddeſcritte *ruggi-*

PIERIO. Il *Vocabolario della Cruſca*: „ ruggine, lat. *rubigo ſegetum*." Il VALLISNIERI luog. cit. „ ruggine delle biade, *rubigo frugum, & plantarum*;" e il TANARA luog. cit. „ in latino queſto malume chiamaſi *rubigo*." Ma ſi dice *rubigo* abuſivamente; *nam*, ſcrive SERVIO *Commēt. in Virgil. Op.*, *proprie rubigo eſt, ut Varro dicit, vitium obſcoenae libidinis, quod ulcus vocatur.*

[18] Siccome quella, da cui per avviſo del Filoſofo EPITETTO, *apud Arrian.* l. 1. c. 17., il principio della erudizione procede.

[19] Scriſſero gli Autori della Cruſca, che „ la ruggine, o rubigine è quella materia di color giuggiolino, che genera ſul ferro, e che „ lo conſuma." Ma ogni metallo, ſebbene il ferro ſpecialmente, è ſoggetto alla ruggine, e per fino l' oro medeſimo. Il VOSSIO *Lex. Etymol. in Ruber. ab eodem colore* [*robo, vel robeo*] *dicta eſt robigo, ſive rubigo. Eſt id vitium metalli ruborem contrahentis, quod in ferro ſpeciatim ferrugo, & in aere aerugo appellatur*; le quali in un luogo di PLINIO ſi comprendono tutte due ſotto il nome di ruggine: *aes etiam, ac ferrum rubigo protinus corrumpit, odorque dirus.* Da FESTO ſappiamo, che anche i buoi furono chiamati roſſi, *robi*, dal color roſſo, *robo*, che i Greci pronunciano ξανθὸν; e troviamo in VITRUVIO *Arch.* l. VII. c. 7., non che in PLINIO medeſimo XXXV. 5., e in altri, che dal color roſſo venne anche denominata *rubrica* quella ſpezie di terra, della quale i ſegatori da legno ſi ſervono per tignere il filo, che dirigge i loro lavori. Siccome però non ſolo il color roſſo conobbero gli Antichi nella ruggine del ferro; ma lo ſquallore: *ſqualida rubigo* CATULLO *Agon.* 59., e la nerezza: *Nigrae rubiginis morſu ſcabri enſes* LUCANO l. 1., e il corrodimento: *robigo dici videtur, quaſi rodigo, quia arrodat* ISIDORO l. 16. c. 20., e la corruzione: *Putris* STATIO 3. *Thebaid.*, o PLINIO nelle citate parole.... *rubigo protinus corrumpit*... [quantunque il ſupporla una corruzione del metallo non ſia provato baſtantemente, eſſendo eſſa il metallo medeſimo ſotto altra forma; onde vediamo, che la ruggine del rame può di nuovo convertirſi in rame]; quindi ſembra, che non impropriamente un tal nome attribuiſſero alla malattìa delle biade, in cui queſti colori, e queſte proprietà riconobbero. Alcuni autori vollero per verità diſtinguere il nome di ciaſcheduna, come nota il GIRALDI *de Deis Gentium Hiſt.*, „ e po-

gini si assomigliano . E siccome quella del ferro fu nominata da VIRGILIO (20) la *scabbia*, e la *rogna* di esso ; così queste delle biade si potrebbero dire, quando una etimologia piacesse a maniera di quella del chiarissimo Signor MENAGGIO (21), la *scabbia*, e la *rogna* delle medesime (22). Ma certamente singolare è la multiplicità de' vocaboli, co' quali variamente dagli Antichi sono state denominate ; imperciocchè, conforme sta

 scrit-

e posero: *rubigine del ferro*, e *robigine delle biade*, ma queste differenti espressioni non ebbervi giammai fra gli Antichi, come riflette egli medesimo. Di tutte due queste ruggini gentilmente OVIDIO ne' *Fasti:*

Parce precor, scabrasque manus a messibus aufer,
Neve noce cultis, posse nocere sat est.
Ne teneras segetes, sed durum amplectere ferrum.

[20] VIRGIL. *Georg.* l. 2.

Nec scabie, & salsa laedit rubigine ferrum.

E spiegasi ruggine salsa, perchè nasce da umidità salsa.

[21] Il MENAGGIO nelle *Origini della lingua Italiana* deriva la voce *rogna* dal *rubigo* de' Latini per queste vie: *rubigo*, *robigo*, *robiginis*, *robigine*, *rogine*, *rogina*, *rogna*, per essere la rogna, com' e' dice, quasi la ruggine dell'uomo: e in questa opinione egli seguitò il FERRARI. Ma ci vuol bene della forza per tenere a sì fatte etimologie le risa. *Rogna* è fatto dal *ronger* de' Franzesi, che significa rodere; onde *ronge*, *rodimento*, che si è poi da essi Franzesi applicato alla ruminazione degli animali: e in Provenzale *rongia* per *rosione*. E' poi nota la trasposizione, che in non poche parole fu praticata della *g*, e della *n*, onde *pongbiamo*, e *pogniamo*, *spongia*, e *spogna*, *venga*, e *vegna*, *tenga*, e *tegna*. Così di *rongia* ci venne *rogna*. Il BASTERO *Crusc. Provenz.* in fatti questa voce tra quelle pur novera, che ci sono dalla Provenza venute.

[22] PLIN. XVII. 24. *Scabies communis omnium est*. Ma egli per iscabbia vuol qui un morbo, ch' è diverso dalla *ruggine*, come s' intese da TEOFRASTO *de Caus. Plant.* l. 5. c. 21., quando trattò cosa fosse la *scabbia*, la *volatica*, la *chiocciola*, ed altrettali infirmità degli alberi. Questa sorta di *scabbia* non ho veduta giammai sulle biade.

ſcritto in PLINIO (23), *alcuni le chiamavano ruggine*,

[23] PLIN. XVIII. 28. *ſub fin.* laddove, moſtra la differenza delle ingiurie, e de' caſtighi celeſti: *Publica haec, & magnae differentiae a prioribus: aliis rubiginem, aliis uredinem, aliis carbunculum appellantibus, omnibus vero ſterilitatem.* Quanto mi ſembra neceſſario, che ſi debbano dividere quelle coſe, le quali per l' unione de' nomi poſſono indurre nell' errore, altrettanto credo opportuno il raccogliere in uno quelle, che ſono con varie appellazioni, eſprimenti la medeſima coſa, diſperſe. Ma le difficoltà, che ſopra queſto paſſo mi ſi fecero in SALMASIO avvertire dal noſtro ſocio Signor Dottore ANTONIO ZIRARDINI, che uniſce a tanta erudizione un così ſaldo giudizio delle coſe, a me ſembra in vero, che non reggano. Soſtiene SALMASIO *Exercit. Plinian. T. I. p.* 308. *Edit. Traject.*, che *recte ibi Turnebus legebat: aliis caniculum appellantibus: nam in veteribus libris, & Rigaltiano omnium optimo ſcriptum eſt: aliis caniculum. At carbunculus heic locum habere non poteſt, qui alius eſt a rubigine, & vitibus nocet, non frugibus. Alio denique tempore fit ab exortu canis; at rubigo circa occaſum ejuſdem.* Io non mi oppongo intorno alla retta lezione di TURNEBO, ma non ſo accordare all' autore pienamente, che qui non poſſa aver luogo il nome di *carbonchio*, ſe lo può avere quello di *uredine*, che molto differente dal *carbonchio* io per verità non iſtimo. Certamente il *carbunculare* era un veſtirſi di nero le piante, come ſpiega il BUDEO *Lex. Graec. Lat.* in Φακελισμὸς: *Latini ſiderationem, & carbunculationem appellant, quando ſcilicet arbores nigreſcunt.* E cos' altro era l'*uredine?* perchè PLIN. XVIII. 28. ha: *carbunculare dicuntur, ut quodam uredinis carbone exuſtae.* E conformaſi con l' autorità di COLUMELLA l. 4. *quin etiam pruinas, & caliginem, & carbunculum facile propulſat.* Quantunque però *carbunculare dicuntur vites* PLIN. XVIII. 28.; onde TEOFRASTO *de Cauſ. Plan. V.: acriore Solis exuſtione acini uvarum veluti toſti, aſſique inareſcunt;* non è queſto un diſordine, che alle ſole viti attribuiſſero. Ebbe PLINIO medeſimo altrove: *carbunculantur ſemina*, e in oltre XVII. 24. *quod in flore carbunculum vocant.* Non è da omettere, che ſe per avviſo di eſſo PLINIO XVIII. 17. *coeleſte frugum, vinearumque malum nullo minus noxium eſt rubigo*, ſarà dunque la *ruggine*, ſecondo lui, un male non meno delle biade, che delle viti. Dunque ſe la *ruggine* nelle viti ſi dice *carbonchio*, non ſi dovrà ſoſtenere, queſto male *alius eſſe a rubigine*. Non poſſo partirmi da PLINIO ſenza riportarne un altro paſſo tolto dal Libro XVIII. cap. 28., in cui ciò manifeſto appare, ed è quello: *Plerique*

gine , altri uredine , e altri carbonchio , ma tutti poi universalmente sterilità , e non mancarono anche di appellarle *siderazione* , quando nel senso di abbru-

que dixere rorem inustum Sole , acri frugibus rubiginis causam esse , & carbunculi vitibus . Quod ex parte falsum arbitror , omnemque uredinem frigore tantum innoxio constare Sole . Meglio scrisse per tanto il NIZOLIO *Thes. lin. lat.* che *uredo* spiegò: κνδμὸς , *morbus herbarum , fruticum , arborumque , qui in vitibus etiam carbunculus dicitur , & in caeteris rubigo , pisa , plantas , arboresque adurens* . Io penso , che la *ruggine* allora essi chiamassero *carbonchio* , che formava come un *ulcero* . GIOVANNI GOTTIFREDO HAHN *Variolarum antiquitates nunc primum e Graecis erutae* , dimostra con l' autorità d' IPPOCRATE , con GALLENO , e con ARETEO , che il *carbonchio* del corpo umano non si debba avere per un *ulcero pestilente* , ma per uno de' vizj della cute , e fra gli *ulceri crostosi* . Questo pure sostiene DIOSCORIDE , e avverte insieme , che il nome de' primi *carbonchi* venne da' Greci per denotare un termine generale delle *pustole* . Ma un tal nome si volle unir anche all' idea del color rosso , e per rosso fu il *carbonchio* generalmente conosciuto , come lo è la ruggine del ferro . *Carbunculosa arena* , cioè rossa , e di certi sassetti rossi , o di *carbonchi* ripiena , espresse PLINIO XXXI. 3. 17. E *carbonchio* si nominò pure una gioja del colore del *carbone* acceso . GIOVANNI DE LAET di Anversa *de Gem.* , & *Lapid.* l. 1. c. 2. *Carbunculi , Pyropi , & Anthraces a veteribus nominantur , vulgo creditum fuit , carbonis instar in tenebris lucere , quod tamen in nulla gemma hactenus deprehensum , licet a quibusdam temere jactetur . Peritissimis autem Gemmariis haud dubium est Plinium , & alios veteres sub carbunculorum titulo descripsisse gemmas omnes translucidas rubre coloris , & quasi ardentis , quales nostro aevo appellantur Rubini , Granati , Almandini , & Hyacinthi rubentes* . Dicevano i Greci ἀνθρακώδης , ardere , o risplendere come *carbone* , perchè ἄνθραξ valeva *carbone* . Si trova presso NONNIO , che poeticamente favella ἀνθρακόεις πυρσοὶς , fuoco composto di *carboni* . E' vero per altro , che ἀνθρακινος significa negro , come *carbone* . Concluderò dunque , che PLINIO , sebben distinguesse la *ruggine* dall' *uredine* , e dal *carbonchio* , e ciò doveva aver imparato da TEOFRASTO , che la prima chiamò ἐρυσίβη , la seconda κνδμὸς , la terza κρόμβος , pur in esse conobbe una malattìa sola , diversamente appellata secondo i diversi aspetti , e apparenze , in cui ella si dimostrava ; per la qual cosa avrebbe potuto dire benissimo nel luogo citato : *aliis rubiginem , aliis uredinem , aliis carbunculum*

ap-

bruciar le piante vollero considerarle (24). Forse tuttociò avvenne, perchè varie ne' loro effetti le riconobbero, e varie pur anche nelle cagioni. La *ruggine* della prima spezie, ch' è ad ogni

appellantibus. Dopo tutto ciò poco peso in verità mi sembra, che aver debba, quanto il SALMASIO medesimo per conferma della sua opinione asserisce: *alio denique tempore fit ab exortu canis; ac rubigo circa occasum ejusdem*. Troppo è vero, che la *ruggine* si vede, e credo, che a' tempi antichi si vedesse anche nell' uno, e nell' altro tempo. Ma questo basti aver detto, non meritando il conto di perder tempo in simigliante cosa già chiara abbastanzà.

[24] Si leggono in un luogo di TEOFRASTO, ch' è nel libro 4. *de Plantis*, queste precise parole: ἀποκάει δὲ τὰ δένδρα, ἢν ἔτυχεν αὐα ποιεῖ, ἢν ξηρά, ὡς οὐδ' ἂν ὑφ' ἡλίου, καὶ χρόνῳ πολλῷ γένοιτ' ἄν. διὸ καὶ κλῆσιν ποιοῦσι; cioè: „ma gli alberi abbrucia fino a seccarli, di maniera che neppure „ il Sole in molto tempo può farli così aridi, onde si chiama uredine; " dov' è d' avvertirsi l' ἔκπληξιν τῶν δένδρων, quasi percossa, o spavento, o stupore degli alberi, con cui TEOFRASTO fa il carattere di questa loro alterazione. *Similis uredini*, aggiugne ottimamente il BUDEO *Annot. in Pandect.* Ed. 1535. car. 316., e segg. *est syderatio, quae graece* καῦμὶς *dicitur, pruina, quae* πάχνη, *irroratio, vel, ut Plinius appellat, roratio, quae* μοῦς, *tabes, quae* ἔκπληξις, *carbunculatio, syderatio, quae ipsa tamen tamquam genus multas species complectitur*. Dal che pur si comprende l' accennata diversità. Ma la *syderatio* de' Latini fu detta da' Greci ἀστροβολισμός, e vale come percuotimento di astro, e differo insieme σφακελισμὸς; e mi sovviene di aver letto nel lib. 5. *de Causis* di TEOFRASTO espressamente ἀστροβλῆτας, che significava gli alberi assiderati. Volle tuttavia questo medesimo autore l. 4. *de Plantis*, che lo *sfacelismo* fosse distintivo delle radici ὅταν αἱ ῥίζαι μελανθῶσι, cioè „quando le radici si fanno nere," e si converte anche *tabitudo radicis*; onde gli uomini attaccati da un tale morbo chiamarono ἀστροβλῆτες, e in latino *syderati*. Si ha σφακελίζειν presso ARISTOTELE, e presso PAOLO EGINETA. Ed ERODOTO σφακέλισαντος δὲ σαπρόητος τοῦ μηροῦ, cioè *siderato, & marcente femore*. Osservo qui anche per trascorsa, che da TEOFRASTO l. 4. *Hist. Plan.* si mette per vizio simile a quello delle radici delle piante la *radicazione*, ch' è quando si marciscono. Molti luoghi io potrei trascriverne, se non volessi troncare questa leggenda, e dire piuttosto di altra cosa.

ogni frutto della terra comune (25), e lo fu pure ne' tempi andati (26), e che non ſolo le ſpi-

[25] Il *Moro* ne ſente la ſua forza, e perciò il RAMAZZINI *Diſſer. de Conſtit. an.* 1691. *vim rubigalis morbi prima perſenſit Morus*; la ſente l' *Ulivo*, il *Pero*, il *Brugno*, la *Vite*, ed altre piante, e l' erbe tutte. CARLO NICCOLÒ LANGIO *Deſcriptio morborum ex eſu clavorum ſecalinorum cum pane*, della *ruggine* ſcrivendo al Cap. 13. così laſciò: *plantas, fructuſque veneno inficit, quorum eſum morbi periculoſi, contagioſi, & peſtilentiales excipiunt. Nec minus animalibus nocet, vaccis potiſſimum, & ovibus, quae dulcedine ejus allectat gramen, cujus incumbit, avide devorant. Auget tamen bilem, inflammationes accendit, omnibuſque ſymptomatibus anſam praebet, quibus hoc animalium genus ſubjectum eſt; nec dubium relinquitur ullum, quin nuperi morbi contagioſi bovum eidem ſuam originem in acceptum habeant referendam. Praeterea Apes vel necat, vel fugat. Interim & cicadis infenſa eſt, loco roris naturalis veneno veſcentibus, unde taciturnitas earum morborum epidemicorum praeſagium exiſtit.*

[26] Perchè TEOFRASTO *Hiſt. Plant.* l. 8. c. 10. chiamolla „ di „ tutte le biade, e de' frutti tutti la comune malattìa.“ E quivi egli aveva già detto ἡ δὲ σπερμάτων νόσημα τι τὰ μὲν, κοινὰ πάντων ἐστὶν, οἷον ἐρυσίβη, che ſuona: „ma vi hanno alcuni vizj de' ſemi, che a tutte le coſe ſo„ no comuni, come la ruggine.“ Cantò ORAZIO perciò l. 1. *Carm.*

Nec peſtilentem ſentiet africum foecunda vitis,
Nec ſterilem leges rubiginem . . . . . .

Si fa ne' *Sacri Codici* menzione della *ruggine*, quando talora queſta, come miniſtra della ſua ira, Dio manda al ſuo popolo per levargli ogni frutto, ed ogni biada, onde condurre alla buona ſtrada il medeſimo: *Percuſſi vos in vento urente, & in aurugine, multitudinem hortorum veſtrorum, & vinearum veſtrarum.* AMOS 4. v. 9. che altri verte.... *& in aerugine multitudinem fructuum veſtrorum, & vinearum veſtrarum.* Nel ſecondo *de' Paralip.* c. 6. v. 28.: *Fames ſi orta fuerit in terra, & peſtilentia, aerugo, & aurugo, & locuſta, & brucus*; che la verſione dall' Ebraico legge: *fames cum fuerit in terra, peſtis cum fuerit, percuſſio ſegetum, & rubigo, locuſta, & brucus cum fuerit.* E nel 3. *de' Re* c. 8. v. 37. *Fames ſi oborta fuerit in terra, aut peſtilentia, aut corruptus aer, aut aerugo, aut locuſta, aut rubigo*; che nella medeſima verſione abbiamo: *fames cum fuerit in terra, peſtis ſi fuerit percuſſio ſegetum, aerugo, locuſta, brucus cum fuerit.* Altri luoghi molti così fatti nelle *Scritture* ſi trovano, i quali io qui non riferiſco, perchè ſono a chi non

ſpighe occupa, e le percuote, ma i gambi avvelena del grano in erba, come gli antichi (27), non meno che i moderni Autori (28) ce lo comprovano, queſta *ruggine*, dico, poteva mutar nome, ſecondo i diverſi gradi di malignità, ch' eſſa produceva. Quella *ruggine*, che non paſſà i termini del macchiare le piante, e le loro foglie, e i teneri germogli principalmente, e del riempierne i pori coll' umor finiſſimo, per cui ne vengono a ſoffrire pregiudizio bensì, ma non eſtremo, riteneva forſe in modo particolare queſto nome. Il MORTIMER citato dal CHAMBERS credette, che queſta foſſe il cibo principale delle api, e ſembra, che il CHAMBERS medeſimo non altro voglia, che ſia veramente il *Mildew* degl' *Ingleſi*. Ma quella *ruggine*, che non ſolo macchia, ma che ſi avvanza per fino a riardere, a ſeccare, a bruciare, e tal volta a conſumare le parti

non è affatto oſpite nelle medeſime già notiſſimi. Bensì è d' avvertire, che quantunque la *ruggine* colpiſca le produzioni tutte della terra, ella infeſta però, ſiccome conſidera TEOFRASTO *de Cauſ. Plan.* l. 4. c. 15., maggiormente i grani, e più *triticum atque hordeum*. Scrive egli: *robigo quamvis comune omnium vitium ſit, tamen frumenta magis infeſtat, & magis triticum, atque hordeum*. E il medeſimo nella *Storia delle Piante* l. 8. c. 10. *Rubigines, ut ſimplicius loquar, in frumentaceis magis, quam leguminibus*. Ma una tal maggiore infeſtazione delle biade da non altro io credo, che derivar poſſa, ſe non ſe dall' unirſi nelle biade medeſime le mentovate due ſpezie diverſe di *ruggini*.

[27] VIRGIL. l. 1. Georg.

Mox, & frumentis labor additus: ut mala culmos
Eſſet rubigo . . . . . .

E SERVIO *Commen. in Virgil. Op.* : *Rubigo autem genus eſt vitii, qui culmi pereunt*. Onde GRONOV. in *Aul. Gel. Noct.* l. V. c. 12. *Robigo autem tum ſegetes laedit, cum udos imbre culmos Sol ardens torret* . . . .

(28) Il RAMAZZINI *Diſſ. de Conſtit.*, &c. laſciò ſcritto, che

„ ver-

parti percoſſe della pianta , molto propriamente ſi poteva dire *uredo* , ſecchezza , abbruciamento (29), da *uro*, che vale appunto bruciare , ardere, conſumare (30). La *ſiderazione* avrà per avventura eſpreſſo una cagione della *uredine*, e il *carbonchio* un effetto, e un' apparenza della medeſima.

4. Non ſi può uſcire da queſta malattìa delle biade ſenza rammemorar l' orrore , e lo ſpavento , che i *Romani* ne concepirono . Niun' altro male è peggiore della *ruggine* di que' vecchi Popoli celebratiſſimi (31) , i quali per allontanar da loro una sì fatta peſte iſtituirono giorni feſtivi , che chiamarono *rubigalia* , *floralia* , *vina-*

C *lia*

„ verſo il ſolſtizio dell' anno 1689. furono oſſervati ne' frutti del-
„ la terra i ſegni della ruggine, e queſti ſingolarmente nel frumento
„ in erba, le cui gambe per fino alla ſpiga erano aſperſe di mac-
„ chie come ſanguigne. " E aggiunſe , che „ la medeſima peſte
„ ſucceſſe alle Fave, e agli altri legumi. "

[29] E quindi i Franzeſi hanno *ſechereſſe*, e *brùlure*, ed anche *nielle*, e gl' Ingleſi *bright* . Si trova nell' *antico Teſtamento* al *Lev. XIII.* 24. ſeg. *Jeſs. III.* 24. כויה, מכוה, *aduſtio*, arſura, abbruciamento.

[30] CICERONE nel 3. *de nat. Deor.* c. 35. : *nec ſi uredo, aut grando quippiam nocuit, id Jovi animadvertendum fuit* . E COLUMELLA l. 3. cap. 20. *ſeu frigidus, & pruinoſus quod non eſt patiens uredinis*.

(31) Laonde, come diſſe PLINIO XVIII. 28., *non comparantur huic malo grandines, procellae, quaeque nunquam annonae intulere charitate* . E altrove XVIII. 17. *Rubigo quidem maxima ſegetum peſtis*. Il capitolo 13. del libro 3. *de re ruſtica* di COLUMELLA tutto conſiſte: *ne rubigo vineam vexet*. E ORAZIO nel l. 1. *Carm.*

Ne peſtilentem ſentiet Africum
Foecunda vitis, nec ſterilem ſeges rubiginem.

Onde OMERO nella *Iliad.* a. eſpreſſe ἰὸν ἔγχει, cioè βέλος, che tanto vale *rubigo*, ſeu *aerugo*, quanto *venenum*.

lia (32), e quantunque allora ſenza lettere; nulladimeno pii, e ingegnoſi finſero due ruſtici Dei, che *Robigo*, e *Rubigine* appellarono (33), e

(32) Talchè PLINIO XVIII. 29., volendo queſti mentovare, ſoggiunſe: *Rubigalia Numa conſtituit anno regni ſui XI., quae nunc aguntur ad VII. Calend. Maii, quoniam tunc fere ſegetes rubigo occupat;* e così ſeguitò degli altri.

(33) Conſiderò SALMASIO *Exercit. Plinian. T.* 1. *p.* 308. *Ed. Traject. Diva Rubigine, quem alii Divum Robigum dixere*, come ſe aveſſero i Latini un ſolo Dio ſopra le *ruggini;* ma e l'una, e l'altro diſtintamente ebbero eſſi, e di loro ſcriſſero. Vero è, che molti parlarono del ſolo Dio ROBIGO. Fra' dodici Dei quaſi conſentienti, che nomina VARRONE nel principio del lib. 1. *De re ruſtica*, come Condottieri, e Duci, e Protettori degli Agricoltori, v'ha in quarto luogo il Dio ROBIGO. Di queſti dodici Dei ſi fa pur anche menzione preſſo i Greci Scrittori, come in ERODOTO, in STRABONE, in PAUSANIA, e in altri, e vi fu poi aggiunto il MACEDONE, per quanto atteſta DIODORO nell' *Aleſſandro*. ROBIGO ſolo vien ricordato da GELLIO nel l. 4. c. 6. : SI. QUID. SUCCIDANEIS. OPUS. ESSET. ROBIGUS. ACCEDERET. E vidi per opera dell' erudito, e dotto Padre Abate Don PIETRO PAOLO GINANNI Monaco Caſineſe, che il FONTANINI aveva riferito nelle Note al *Ragionamento ſopra le Maſnade*, che „ il picciol Vil„ laggio di Rubignano fuor delle Porte di Cividale ha preſo il no„ me dal Dio Rubigo, che quivi ſi adorava, e oggi giorno vi ſi „ conſerva un marmo nella Caſa de' Signori Conti Manini, nel „ quale ſi legge:

„ DEO RVBIGO
„ SACRVM "

e aggiugne poi: „ Queſta è la prima iſcrizione, che abbia letta in„ dirizzata a quel Dio, perchè nè il Grutero, nè altri antiquarj, „ che io ſappia, ne portano alcuna. " Ma non ſovvenne al celebre Monſignor FONTANINI, che una ne aveva portata il REINESIO *Syntagma Inſcript. Antiq. Cl.* 1. n. 233., e poi fu anche riferita nella Collezione del GUDIO *Antiquae Inſcriptiones quum Graecae, tum Latinae olim a Marquardo Gudio collectae, nuper a Joanne Koolio digeſtae cum adnotationibus pag. LV. n.* 4.; ſia mo ella o vera, o ſoſpetta, giacchè avuta dal LIGORIO, che potrebbe renderla dubbia, eccola:

In

e ad essi, come *Befane* di mal talento, sacrificavano, perchè non nocessero (34). Ma que-

 sti

In via Campana, ubi creditur fuisse Ampsanianum Praedium cum Luco.

ROBIGO ET CERERI ET FLORE
SACRVM L· AMPSANIVS MER
ENDA LANVMVINVS PRAEFEC
TVS PRAETORIVS PECVN· S· D· D·

Nè solo questa Iscrizione ha il LIGORIO in onor di quel Dio, ma l' altra di QUINTO FADIO RITISIO:

Q· FADIVS RYTISIVS
RYTISIANVS
ROBIGVMNVM SIGNVM MARMOREVM
DEDICAVIT CVM ROBIGALIA SACR· CORON·
ARGEN· KAL· MAII VESPASIANO AVG· IIII
ET T· CAESARE II COS· D· D·

E molto finalmente di esso Dio si rammenta da Monsig. del TORRE nella Dissertazione *de Diis Aquilejensibus* car. 316., e segg. Ma vero è altresì, che della Dea RUBIGINE volle parlare OVIDIO *Fast.* 4. *v.* 919.

. . . . . *Sic culmos Titan incalfacit udos*
Tunc locus est irae Diva timenda tuae.

e prima: *Flamen in antiquae Lucum Rubiginis ibat.* Parlonne pur FESTO, e SERVIO; e S. AGOSTINO *de Civ. D.* l. 4. c. 21. *Nec Deus Spinensis, ut spinas ex agris eradicaret; nec Dea Rubigo, ut non accederet, rogaretur.* Molti anche parlarono dell' uno, e dell' altra di questi Dei, come si trova nel libro *Deor.*, *&* *Dear.* di ORTELIO c. 11. 40.. Fu detto presso i Lituani, ed i Peruani *de* שרפרו, e *de* ירקרו, *de Deo* ROBIGO, *& de Dea* RUBIGINE per quanto rapporta G. OUTHOVIO *Judicia Jehovae Zebaoth, seu Bellum divinum, quo petit Deus peccatores*, ec. *cum notis variorum*, *Ed. Groningae* 1721.. E già fu instituto di tempi più rimoti il dividere le potestà, o gli attributi tra maschio, e femmina: cosa, che ha messo in chiaro l' immortale Sig. Abate GIAMBATTISTA PASSERI colle Pitture Etrusche da lui spiegate, ed illustrate, nelle quali costantemente a' Dei si veggono unite altrettante Dee.

(34) Vedo presso LATTANZIO, SERVIO, e PORFIRIO il filosofo, che alcuni Dei furono adorati dagli Antichi, perchè loro giovassero, e fossero in ajuto, ed altri, perchè loro non nocessero, e non portassero danno. Così alla Dea ORBONA sacrificavano, per-

chè

ſti Dei non ſolo ebbero i *Romani*, ma gli ebbero

chè non gli faceſſe orbi, alla Dea FEBBRE, perchè non mandaſſe loro la febbre, al Dio ROBIGO, perchè non noceſſe alle biade colla *ruggine*. PRUDENZIO *Hamartig.* ſcriſſe: *Par furor illorum, quos tradit fama dicatis conſecraſſe Deas, Febrem, Scabiemque facellis;* e ARNOBIO l. 3. *Non commemoravimus hoc loco Deam Lavernam furum, Bellonas, Diſcordias, Furias: & laeva illa, quae conſtituitis numina, taciturnitatis ſilentio praeterimus.* PITISCO *Lex. Antiq., Rom.: Eum colebant, non ut prodeſſet, quemadmodum Ceres, Liber, Jupiter, ac Bonus-eventus, ſed ne obeſſet, neque frumenta, & arbores corrumpat rubigine.* In fatti M. VARRONE *De Re ruſtica* l. 2.: *Robigo propitio, robigo frumenta, atque arbores non corrumpit.* E penſano i GRONOVJ *Noct. Gel. l. 4. c. 6.*, che ſi poſſa la predetta legge interpretare: *praeter Jovem, & Martem, caeteroſque Deos, & Robigo, non ſolum frumenta, & arbores, ſed nec haſtarum, & armorum Romanorum ferrum, corrumperet, adederetque fieri voluiſſe Patres.* Avevano anche il Dio AVERRUNCO, al quale ricorrevano per eſſere avvertiti de' pericoli, che a loro ſopraſtavano; onde VAR. *de ling. lat. averruncare*, avvertire. PACCUVIO: *Deus, qui meis rebus praeeſt Averruncus.* GELLIO *l. 5. c. 12. In iſtis autem Diis, quos placari opportet, uti mala a nobis, vel a frugibus natis amoliantur, Aruncus quoque habetur, & Robigus.* Qui alcuni eruditi leggono AVERRUNCUS, in iſcambio di ARUNCUS, e conſervano l' antidetta lezion di PACCUVIO. Si pubblicavano per tanto le feſte *Rubigalie* nel dì 25. di Aprile, cioè, come ſcriſſe OVIDIO ne' *Faſti*, e PLINIO nella *Storia naturale: in 7. Kal. Maii*, benchè altri abbiano voluto nella feſta delle Calende medeſime, *quia*, dice FESTO, *Robigo Deo ſuo, quem putabant rubiginem avertere, ſacrificabant.* Si vede di queſte Feſte la memoria nel Calendario ruſtico riportato dal GRUTERO car. 133. Il FONTANINI nel luogo citato delle *Maſnade* rileva, che „ preſso noi Criſtiani ſuccedeſsero alle ſolennità „ ſuperſtizioſe delle Rubigalie le Proceſſioni, che fanno nel dì di S. „ Marco per le campagne.“ Ma perchè non potrebbe dirſi piuttoſto, che la ſacra coſtituzione di queſte noſtre Proceſſioni ſia ſtata ſoſtituita alle Feſte dette *Ambarvalia*, che ſi offerivano ogni anno a CERERE, e a BACCO per la proſperità del frumento, e del vino? La parola *arvales*, viene da *arvum*, campo, perchè i *Fratelli Arvali*, ch' erano 12. Sacerdoti da ROMOLO iſtituiti, nelle loro cerimonie giravano in proceſſione attorno le campagne, dal greco ἀμφι, intorno, ovvero dal latino *ambio*, vado intorno. Per *ambarvalia* ſcriſsero alcuni *ambarbalia*, ed *ambarbia*, che fecero da *ambire urbem*; ma

GEL-

ro anche i *Rodiani*, fra' quali si trovò il Tempio

GELLIO intese *arvales*, poichè offerivano sacrifizj per la felicità de' campi. Parmi di poter ravvisare dalla mia opinione non lontano il BUDEO *Anot. in Pandec.* quando scrive: *a rubigine rubigalia dicta, ideſt feſti dies amoliendae rubigini inſtituti ab antiquis, quales ſunt ſupplicationes amburbiae, aut ambarvales, quae hodie propter ejuſmodi cauſas factitantur;* quantunque il DOMENICHI nelle Note in margine alla traduzione di PLINIO XVIII. 29. porti a far credere, che BUDEO medesimo sostenga piuttosto, che le nostre *Rogazioni* venissero sostituite alle superstizioſe *Rubigalie*. Che se alcuno sospettar volesse, la istituzione delle *Rogazioni* essere molto posteriore al Gentilesimo, perchè SIDONIO APOLLINARE *l.* 5. *Ep.* 14. lasciò di esse: *Quarum nobis ſolemnitatem primum Mamertus Pater, & Pontifex, reverentiſſimo exemplo, utiliſſimo experimento invenit, inſtituit, invexit*, e ciò fu l' anno 474.; avverta, che il medesimo SIDONIO quindi scrive, che le predette *Rogazioni* anche prima si costumavano, ma oscurate dalle irriverenze, dalle negligenze, e da altre imperfezioni: *Erant quidem prius (quod ſalva fidei pace ſit dictum) vagae, tepentes, infrequenteſque, utque ſit dixerim oſcitabundae ſupplicationes:* il che può accordarsi con l'accennata opinione.

A' voti, che gli Antichi facevano al Dio ROBIGO, aggiunsero una di quelle condizioni, che tanto dalla Plebe erano tenute in venerazione, cioè ch' essi andassero uniti al sacrifizio della Pecora, e del Cane di pelo biondo, appunto perchè le biondeggianti spighe non fossero dal temuto morbo percosse. Così OVIDIO ne' *Fasti* l. 4., indirizzando il suo canto alla Dea RUBIGINE:

Flamen in antiquae Lucum Rubiginis ibat
Exta Canis flammis, exta daturus Ovis.

E parla anche del Bosco sacro dedicato a questa Dea: *Rubiginis Lucus*. L' approvatissimo COLUMELLA disse l. 10. *de R. R.*, che il Cane era lattante:

Hinc mala rubigo virides ne torreat herbas,
Sanguine lactentis Catuli placatur, & extis.

Ma con questo Sacrifizio si volea placare altresì il Cane celeste, nimico anch' esso delle biade, come si ha in FESTO l. 3.: *Catularia Porta Romae dicta eſt, quia non longe ab ea ad placandum caniculae ſydus frugibus inimicum rufae Canes immolabantur, ut fruges flaveſcentes ad maturitatem perducerentur*. E altresì lo stesso FESTO l. 16. *Rutilae Canes, ideſt, non procul a rubro colore immolantur, ut ait Attejus Capito, canario ſacrificio pro frugibus deprecandae ſaevitiae cauſa ſideris caniculae*. E OVIDIO l. 4. v. 939. ingenuamente confes-

pio di APOLLINE ERYTHIBIO, come notarono i GRONOVJ in *Aulo Gellio* (35), e gli ebbero gli *Eſtruſci* (36), ed altre Nazioni antichiſſime.

CA-

ſeſſa, che nel medeſimo ſacrifizio altra rifleſſione non avevano, che quella del nome:

Eſt Canis (Icarium dicunt) quo ſydere moto
Toſta ſitit Tellus, praecipiturque ſeges.
Pro Cane ſydereo Canis hic imponitur arae:
Et, quare fiat, nil niſi nomen habet.

Antichiſſimo era fra' Romani medeſimi queſto rito, ſiccome appare in PLUTARCO *Problem. cap. 67. aliis 68.*, che lo mette, portato in prima nel Lazio da' Greci, e particolarmente dagli Arcadi, i quali furono ſoliti d' immolare il Cane a' *Lupercali*. Conſideravano per tanto con molta attenzione l' occaſo del Cane celeſte, laddove noi difficilmente, come nota il RAMAZZINI, ne poſſiamo oſſervare il naſcere, talchè ſpeſſo crediamo, che nel tempo quaſi medeſimo dia principio in ogni luogo a' giorni canicolari, e molti dotti uomini il credettero; ma certamente egli è diverſo ſecondo la diverſa latitudine, che hanno le diverſe regioni, la qual coſa non fu ignota a GALENO, quando inſegnò, che „ nel medeſimo tempo ſi ſanno per „ verità in tutti i luoghi della terra tanto gli Equinozj, quanto i „ Solſtizj, ma il naſcere, e tramontare degli Aſtri eſſere comune „ ſolamente a quelli, che ſotto il medeſimo vertice abitavano. " Il cane celeſte ſi diceva παραυχτέλλων, o συμπαυχτέλλων, dal Granchio, perchè naſce con queſto ſegno del *Zodiaco*, e in una parte di eſſo; ma ſopra ciò dottamente, e ampiamente ha favellato il SALMASIO *Plin Exercit. Ed. Traj. ad Rhen. T.* 1. c. 32.

(35) GRONOV. in *Auk. Gel. Noct.* l. 5. c. 12.

(36) E qui piacemi di riportare un paragrafo di lettera ſopra tale propoſito ſcrittami dal dotto Signor Abate PASSERI: „ I miei Iguvini " [dic' egli di que' di Gubbio] „ conobbero anch' eſſi la „ Dea Rubigine, e ne' loro Indigitamenti " (che ſono i libri de' Pontefici, ne' quali erano regiſtrati i nomi de' loro Dei, e la maniera di adorarli) „ le preſcriſſero ſacrifizio. Ma non credeſſimo „ già di ritrovarvi un tal nome così proferito, poichè eſſi non ave- „ vano la *B*, e la *G*, che proferivano per *P*, e per *K*, o *C*, op- „ pure le ingojavano, onde vi leggerete RVPINIE. Così nella Ta- „ vola VII. l. 27. RUPINIE ETRE PURCA RUFRA UTE PEJA FETA PRE- „ STATE " (Il DEMPSTERO *de Etrur. Regal.* Tav. VII. lin. *6.* delle Eugubine leſſe: RUBINE. PORCA. TRIF. ROFA. OTE. REJA. FETU. PRE-

CAPITOLO II.

Qual ſia la *filiggine del grano*.

1. VEduto della *ruggine*, paſſo ora a ragionar della *filiggine* (37), ch' è malattìa interna del grano in erba, Tav. II. Fig. 1., e da me ſi concepiſce per quella, che ſolo attacca la ſpiga, e ordinariamente l' attacca primacchè formati ne ſieno i granelli, quand' ella ſta chiuſa pur anche in varj invogli di una materia debole, che ſi dicono *follicoli*, i quali poi ſi raſſodano, e pigliano forza,

PRESTOTE. E il Sig. Ab. GORI nella medeſima Tavola VII. Eugubina ſcritta in caratteri Pelaſgici l. 6. RUBINE PORCA TRIF RUFA OTE PEJA FETU PRESTOTE) „Più ſotto ſi vede menzion di lei alla linea 35., „ e 36.; ma ſi chiama Rupiname, che ſarà il quarto caſo, quaſi diceſſe „ Rupinam, ſiccome Rupinie è il ſecondo. Nelle Tavole però „ ſcritte in carattere Romano, che ſono parafraſi delle altre ſcritte in Etruſco, ſeguendo il dialetto più recente, ſi dice Rubine, „ come alla Tavola III. l. 6. RUBINE PORCA TRIF ROFA OSE „ PEJA FETU; e alla linea 43., e 44. ſi legge Rubiname, che io „ credo pure il quarto caſo di queſto nome. In queſto luogo colla Rubigine ſi accoppiava la Dea pure ruſtica Traha Sahata, che „ io credo lo ſteſſo, che la Dea Seja preſſide del ſeminare molto „ nota appreſſo i Latini colla Segeſta, Runcina, e la Volutina, „ che preſedeva a far sì, che le ſpighe ſi ſviluppaſſero dal follicolo, e il Dio Nodoto, che avvertiva, che i nodi del gambo non „ ſi rompeſſero, ed altre Deità applicate ad altrettanti vizj del grano, „ che vedrete notati dallo ſteſſo Santo Agoſtino *de C. D. l. 4. c.* „ 8. colle note del Vives. "

(37) La *fuliggine*, o *filiggine*, da' Latini detta *fuligo*, e da' Greci ἄσβολος, λιγνὺς, è propriamente quella materia nera volatile, terreſtre, che laſcia il fummo ſu pe' cammini, o piuttoſto è il fummo ſteſſo fiſſato, e raccolto, come afferma il CHAMBERS. Dalla ſimilitudine però, che a queſta materia porta un morbo del grano in erba, ſi è voluto trarre il nome di eſſo, che *filiggine* ho detto, qua-

za, perchè ſono deſtinati dalla natura a riparare eſſa ſpiga dall' umido eſterno, e dagl' inſulti degli uccelli. Ella diviene tutta, o in parte fradicia, e nericcia; e creſciuta quindi, e uſcita dagl' involucri, che la tenevano ſtrettamente racchiuſa, diviene ſecca, e arida così, che ſi riſolve in una polvere ſottiliſſima, impalpabile, e fetida, che volandone via per iſcoſſa di vento, o di altro, laſcia per ſolito il fuſto ſpogliato, intero, e ſchietto, e ſempre verde, ſugoſo, e groſſo (38). Brutto vedere è per tanto la ſommità de' gambi, appoco appoco ingroſſati, eſporre le già tempo concepute ſpighe tutte per lo più ammantate di nero co' bianchi *follicoli*, tanto male aſſodati, che a ogni minor pioggia, o vento, o altro ſi cadono colla polvere nera medeſima, che ſoſtenevano. *Filiggine* per tanto, e non *ruggine* credo, che foſſe quella, che oſſervò il RAMAZZINI (39), quando vide i campi del Modeneſe in un ſubito veſtiti a bruno. Il color nero della *ruggine* non ſi manifeſta ſopra le biade, ſe prima egli non ſia apparſo di color roſſigno, o ſquallido. Sarà d' ver-

quaſicchè la ſpiga ſi riſolva in *filiggine: in ſuliginem evaneſcat, ſeu tranſeat*, ſiccome RUELLIO appreſſo DIOSCORIDE eſpoſe ἀπαφρολωθῇ.

[38] L' AMBROSINI *Phytol. T.* 1. *p.* 247. *Spicas, & jubas ejus priuſquam perfecte e vaginis ſuis erumpere quaeant infeſtans.* E più ſotto: *Marceſcunt hoc vitio ſpicae, & atro pulvere obſidentur.*

(39) RAMAZZINI *Diſſ. de conſtit. an.* 1690. *in Mutinen. Civit. & illius Dit.: Luctuoſum ſane, ac deplorandum ſpectaculum omnium oculis fuit campos circumquaque non virentes, ſed atratos, & fuliginoſos intueri.*

vertirſi per altro , che la polvere della *filiggine* potrebbe dirſi piuttoſto di color caſtagno , che nera , e quanto ella ſi trova più al baſſo della ſpiga , tanto appare più ſcolorita , e talor cenerognola , e come di oliva marcia .

2. I *Toſcani* comunemente hanno per eſſa la *golpe* , o ſia la *volpe del grano* (40) . Ma in varie parti della *Lombardia* ſi conoſce ſotto nome di *carbone* , e ſotto quello di *carboncino* (41) . Gli Scrittori *Botanici* de' ſecoli più vicini a noi , che la immagine ne dettero ne' loro *Erbarj* , la chiamarono col nome generale di *uſtilago* , che i Tedeſchi dicono *brand* , arſura , abbruciamento (42) ;

(40) Si ha nel *Vocabolario della Cruſca* „ Volpe , o Golpe ſi di„ ce una ſorta di malore delle biade , per cui divengono marce , e „ ſi riducono in polvere . „

(41) Sarebbe ella forſe *le bled charbonnè* , la biada incarbonchiata del Signor TILLET *Diſſ. ſur la cauſe* , ec. *chap.* 3. ch' egli ſpiega per quella , di cui „ la ſpiga non conſerva , che il fuſto , dove i „ grani erano attaccati , o al più qualche grano , che ha pelle bian„ ca , e ſoſtanza nera ?“ Ma della mia *filiggine* io non potrei tutto queſto dire , come ſi vedrà altrove . Sotto il vaſto nome di *nielle* i Franzeſi generalmente la compreſero ; e volle parlar di queſta il BUDEO *Annot. in Pandec. p.* 316. ſcrivendo : *quam nuillam noſtrates Agricolae vocant : ſpicae enim marcidae fiunt hoc vitio , & in pulverem foetidum confriabiles ;* e ben ſoſpettò d' ingannarſi , quando nominolla *rubigine : rubigo , vel erugo , niſi fallor , eſt , quam nuillam* , ec. . Il DES LANDES *Obſer. nouv. & Phyſ. ſur la maniere de conſerver les Grains* , più anche generalmente ſi eſpreſſe : „ Dans „ quelques-unes de nos Provinces , quand les années ſont trop plu„ vieuſes , & qu' il y tombe ſouvent de cette eſpece de brouillard „ gras , que les Laboureurs , & les Jardiniers nomment nielle , tous „ les Grains degenerent . „

(42) L' AMBROSINI al luogo citato : *Uſtilago dicitur ab uſtione , quia ſpiga facile uſtionem patiatur* . USTORES ſi chiamavano quelli , che davan opera negl' incendj de' roghi , e negli abbruciamenti de' cadave-

e mi ſi conceda, che io qui ſolamente accenni la non piccola, e credo non irragionevole maraviglia, che mi ha cagionato il vedere, che eſſi poi nel deſcriverla non abbiano recato difficoltà alcuna per metterla come *ruggine* degli Antichi (43), ſupponendo, che i medeſimi così queſta pur chiaramente denominaſſero, e che ambedue dalla cagion medeſima ripeteſſero. E pure la noſtra *filiggine*, o la figurata *uſtilago* di eſſi Botanici diverſa è ſenza dubbio da quella, e da cagione diverſa originata. Nè io crederei, che queſta controverſia poteſſe ridurſi giammai a ſola λογομαχια, come dicono i *Greci*, cioè *verborum pugna*, come i *Latini*.

3. Ma in qual maniera dunque fu dagli Antichi nominata? Sarebbe deſiderabile di averne una chiara notizia; e per verità fra eſſi non ſi rinvie-

daveri, ſecondo l' antico coſtume. La *Gloſſa*: *uſtor*, νεκροκαύτης; e LUCANO VIII. 738. ebbe:

Robora non deſint miſero, nec ſordidus uſtor.

Ma ciò, che debbaſi intendere per queſta parola, hallo dato a conoſcere CATULLO in que' ſuoi elegantiſſimi verſi LIV. 4.:

Quum devolutum ex igne proſequens panem
Ab ſemiraſo tunderetur uſtore.

[43] La immagine, che ci dà LOBELIO *Plant. ſeu ſtir. Hiſt. p.* 22. della ſua *uſtilago adverſariorum* non altra è certamente, che la mia *filiggine*; ma il ſopraddetto AMBROSINI, che tale immagine pure riporta, ſcrive: *quaelibet ſpica combuſta, & nigra uſtilago vocatur*; e quindi la conſidera come l' *uredo*, e la *rubigo* degli Antichi. Per la medeſima pure la tenne il CHABREO *Stir. Icon., & ſciag.* car. 175. col dire: *uſtilago, rubigo, carbunculatio*; *Germ. Brandt, Gal. Brûlure, nielle*. Tale la tennero i BAUHINI, e gli altri Botanici, e Scrittori, che di eſſa parlarono. Ma ſopra queſto ſoggetto è da vederſi la Diſſertazione del Signor RODOLFO JACOPO CAMERARIO, Profeſſore di Tubinga, ſtampata nel 1709. in 4.: *Diſſertatio de Uſtilagine Frumenti. Tubingae.*

viene chi chiaramente ne abbia fatto menzione ; o con qualche eſpreſſion diſtinta l' abbia pur diffinita . In primo luogo ne' Libri del *vecchio Teſtamento* non fu circonſcritta giammai . Queſta neppure ſi ha in OMERO , o in altro Autore di que' tempi . Che ſe tuttavia voleſſimo indicarla ſotto il nome di *uredine* , o di *ruggine* , non l' abbiamo forſe più d' antico , che in TEOFRASTO (44) , e in PLINIO . E certamente tante ſono

[44] TEOFRAST. *de Cauſ. Plan. l.* 4. *c.* 15. rende GAZA ... *triticum , atque hordeum : quod alterum nudum eſt alterum tunicis integitur pluribus , & follium ſpicae gerit proximius , unde frugem ſuam effundit . Reſidet enim in eo humor putrefactus , qui rubiginem creat .* E il ſuo Commentatore SCALIGERO nel libro 3. c. 30. *de Cauſ. Plant. Ratio ; quia rubigo putrefactio quaedam eſt : cum exceptus in ſpicam ros , aut pluvia non decutitur , ſed Solis ſuperventu excalefactus putreſcit .* Ma veramente quella putredine , o corrompimento , o alterazione , in cui vien qui la *ruggine* coſtituita , ſembrerà , che ſi concepiſca ſulle ſpighe già formate , e dagl' involucri uſcite fuori , ſe già debba verificarſi , che la *rugiada* ſi metta ſopra di eſſe , e la formi ; il che dire non ſi vorrà della *filiggine* , la quale naſce , quando le ſpighe ſono anche dentro gl' involucri , e che il granello non hanno per avventura formato . SCALIGERO medeſimo nel l. 4. c. 17. di quel Commentario più chiaro diſſe : *Ubi calami conſumpſerit medullam , invadere in illam ſpicam , quoad vel totam deleat , vel alteram partem .* Dove ben ſi comprende un effetto della *uredine* , che attacca egualmente il gambo , che la ſpiga , e queſta ſpiga non riduce in polvere , come d' ordinario per effetto della *filiggine* noſtra vien ridotta ſenza intaccarne il gambo . Di una tale proprietà eſſendoſi però traſcurato l' eſame , s' induſſero quindi gli Autori ad applicar francamente , quaſi come coſa chiariſſima all' *uſtilagine* , quanto avevano ſcritto gli Antichi della *ruggine* ; e l' AMBROSINI copiò TEOFRASTO , allorchè nel luogo citato ſcriſſe : *reſidet enim in eo humor putrefactus , qui aeruginem creat , & frequentius in illis frugibus , quae ſpicam gerunt erectam , & denſiorem : hinc enim humor minus poteſt defluere , ideo in illis , quae ſpicam aliquantulum inclinatam habent , non accidit .* Il che quanto alla *ruggine* conviene più , altrettanto meno può dirſi della *filiggine* , ch' è male inter-

le corruzioni di genere diverſo degli alberi, e delle biade riportate da queſti due Scrittori, che fra le medeſime difficile non ſarebbe, che queſta malattìa aveſſero anche compreſa, benchè non ſi avviſaſſero di farne paleſe differenza, non avendo eſſi delle malattìe del grano in erba tutta quella cognizione eſatta, che ſi ricercava per favellarne più chiaramente. Sembrerà forſe ad alcuno, che poſſa ritrovarſene qualche diſtinzione nel paſſo di COLUMELLA, dove ſi eſprime *caliginem* (45); ma queſto pure non diſtinguendo il luogo della *caligine*, reſta oſcuro. Vedemmo, che un tal morbo è particolare alle ſpighe (46), e lo è certamente a quelle ſole di alcune ſpezie di grano (47).

4. Se

terno, come ottimamente riflette il Signor TILLET *Diſſer. ſur la cauſe, qui corrompt, & noircit les grains*, ec. concludendo, che „ la maladie du Charbon ainſi, que celle de la carie ſont abſolu„ ment interieures;" ond'è, che, perpendicolari ſieno, o inclinate le ſpighe, quand'elle ſono chiuſe ne' loro involucri, ſempre il morbo potranno contrarre.

[45] COLLUMEL. *l.* 4.: *quin etiam pruinas, & caliginem, & carbunculum facile propulſat.*

[46] Quantunque il FACIOLATI alla parola *rubigo* ſpieghi „ quel „ morbo delle biade, che naſce dentro a' gambi de' frumenti pel „ troppo umore, da cui ne diriva, che le ſpighe ſi fanno fracide, „ e in una fetida polvere riſolvibili." E quindi per confermazione porti quello di VIRGIL. *Georg.* 1.

Mox & ſnmentis labor additus, ut mala culmos
Eſſet rubigo . . . . . .

dove non ſi parla di un male interno nel gambo, per cui un altro della ſpiga ſe ne produca, ma di un male, che danno reca al gambo medeſimo, come dal Commentatore Servio ſi fa chiaro abbaſtanza.

[47] Il DODONEO lo chiama *avenae, ac tritici proprie morbus*; e il LOBELIO *Lugd.*: *cujus praeſertim avenae peſtis eſt*; Ma l' AM-

BRO-

4. Se per tanto egli non è altro , che la ſpiga medeſima del grano infradicciata , non ſi dovrà ſenza dubbio conſiderare per coſa, che ſpetti a materia *botanica*, benchè i predetti *Botanici* fra le piante l' abbiano poſta (48), e alcuni ſegnatamente fra' *Moſchi* (49). Così fatte mutazioni delle piante debbon eſſere tenute come ſoli accidenti , che le rendon morboſe , ſiccome valenti altri *Botanici* le tennero , i quali non vollero porle ne' loro Cataloghi , e così di recente fece il ſaggio Signor Dottore GIUSEPPE MONTI; perchè non muta ſpezie quella pianticella , ch' è attaccata dalla *filiggine* , rimanendole ſempre le ſue foglie , lo ſtelo , e il fuſto della ſpiga , come

BROSINI , come quello , che non lo diſtingue dalla *ruggine* , troppo più lo eſtende : *eſt enim* , dic' egli , *frugum praeſertim ſpicatarum morbus , & vitium maxime avenae , & ſecales , hordei , tritici , & aliarum* . Così il CHABREO *Stir. Icon.* , *& ſciag. p.* 175. : *ſegetum , ſive frugum , praeſertim ſpicarum , maxime vero avenae , ſecalis , & tritici vitium eſt uſtilago* . Così GASPARE BAUHINO *πίναξ . Theat. Botan. l.* 1. *ſec.* 4. : *Uſtilago frugum praeſertim ſpicatarum maxime avenae , & ſecales morbus eſt* . E quindi ne vennero *Uſtilago ſecales* C. B. . *Uſtilago ſecalia* TABER. . *Uſtilago hordei , uſtilago polyſtichi , & uſtilago hordei dyſtichi* LOB. *Ic.* . *Uſtilago hordeacea* TABER. . *Uſtilago avenae , & uſtilago avenacea* LOB. *Icon.* . *Uſtilago tritici* DOD. .

(48) Molti ſe ne potrebbero allegare , come ſarebbe il DODONEO , il LOBELIO , GASPARE BEUHINO , il CHABREO , l' AMBROSINI , ed altrettali .

[49] Siccome fece il Padre Don ANTONIO ALBERGHETTI *Spontaneae generationis aſſertio* , ec. *cap. V. p.* 189. ; Libretto contra i Medici , che difendono la generazione dall' uovo . E pure il *Moſco* non è altro , che una piccola pianticella , la quale , ſecondo il VALLISNIERI *Della cur. orig. degli ſvil.* , ec. : „ amenamente ſopra i „ campi verdeggia , o ſulle mura antiche ; “ e creſce anche ſulle ſcorze di diverſi alberi , come del *Pioppo* , del *Fraſſino* , della *Quercia* , del *Cedro* , e di altri . La qual coſa non ſi avverò nè della *ruggine* , nè della *filiggine* del grano in erba giammai.

me prima erano, intatte, e ſane. Queſto fatto della natura non dà luogo a cavilli.

CAPITOLO III.

Qual ſia il *grano carbone*.

1. VIene per terzo il *grano carbone* (50), male interno anch' eſſo, e fieriſſimo, e ſarà quella malattìa, Tav. III. Fig. 1. a. b., che fa vedere tutti, o in parte i granellini della ſpiga nel tempo della panocchietta, che gli ricuopre, interi, e chiuſi tra' ſuoi *follicoli*, ma diformati però, bislunghi, e ſenza punta, di ſcorza piuttoſto liſcia, che cede ſotto a' denti, più groſſi dell' ordinario, e ripieni di una materia umida tinta di nericcio, fetidiſſima, la quale, raſciugata, e ſecca, non molto agevolmente ſi riſolve in polvere, quantunque la ſcorza, o buccia diventi allora faciliſſima ad eſſere ſtiacciata co' polpaſtrelli delle dita, e ſcrepoli ad ogni piccola premitura (51). Il WOLFIO c' inſegna

(52)

(50) Così detto in molti luoghi dell' Italia per ſomiglianza al legno arſo, e già ſpento, primacchè egli inceneriſca.

[51] L' egregio Signor TILLET *Diſſer. ſur la cauſe*, ec. *p.* 64. riguarda la polvere nera del *grano carbone*, come quella in circa del *Lycoperdon*, o *Veſſa di Lupo*. Queſto è il *Fungus pulverulentus, crepitus Lupi dictus, major, pediculo longiore, ventricoſo* RAII *Syn.* 16.. E potrebbe eſſer anche il *Lycoperdon niveum, ſphaericum, ſuperficie in Areolas adamantis inſtar diſſectas diſtributa*. *I. R. H.* 564.. Che divien bruno nello ſeccarſi, come tutte fanno le altre ſue ſpezie, ed è ripieno di una polvere di color caſtagno, o lionato. In tale idea ſi conferma queſto autore, rammentandoſi quel-

lo,

(52), che queſti granelli ſono *moſtri tricorporei*. Quella figura è a loro tanto rara, che non mi ſembra il doverſi a dritta ragione adottare per metterla nella diffinizion de' medeſimi.

2. Un sì fatto morbo è conoſciuto da' *Lombardi* col nome di *fama*, oppur anche di *fame*, perchè forſe, quando egli entra nel grano, lo diminuiſce di quantità, in manieracchè coloro, che di eſſo viver debbono, per così dire, affama. Nel *Territorio Piacentino*, per quanto mi riferì il gentile, e a me caro moltiſſimo Signor Conte ERCOLE CAPECE DELLA SOMAGLIA, è detto *marzetto*, credendoſi colà, ch' egli cominci nel meſe di Marzo, o perchè il grano, che ſi raccoglie con queſta peſte, è un marciume. *Nel Vocabolario della Cruſca* (53) ſi ſpiega per *golpe*, o *volpe del*

lo, che dicono i Viaggiatori de' famoſi *Pomi di Sodoma*, i quali racchiudono una polvere nera, quantunque freſchi, e vermigli appajano all' eſterno. Di un sì fatto albero, che naſce vicino al *Mare morto* a una giornata dall' imboccatura del *Giordano*, ſi fa memoria, com' egli aſſeriſce, nel *Voyage nouveau de la terre ſainte l.* 4. *p.* 380. E ne parla FOULCHER DE CHARTRES. Anche gli Antichi moſtrarono di conoſcerlo, ſe tra gli altri FLAVIO GIOSEFFO *de Bello Judaico, ſive Judaicae Hiſtoriae de excidio l.* 4. *c.* 27. dice, che queſto frutto compariva buono a mangiare, ma che ſi riduceva in polvere, quando ſi toccava.

(52) WOLF. *Vera cauſa multiplic. frumen. admir. omnem Plant. veget. una illuſtrans. cap.* 4.

(53) *Vocab. degli Ac. d. Cruſc. Compend. da un Ac. anim.* Dove *volpe del grano* eſpone: „ que' granelli, che infradicciati prima di „ perfezionarſi, rimangono di color nero, o ſe ne vanno in pol„ vere; onde grano volpato quello diceſi, ch' è meſcolato con gra„ no così fatto, e così forſe delle altre biade. " Poche veramente qui ſono le biade, che di sì fatti granelli infradicciati ſieno accompagnate, e ſe leviſi il frumento, pochiſſime altre ſe ne troveranno, che

ne

del grano, punto non volendolo dalla *filiggine* noſtra diſtinguere, ſiccome quelli fanno, che *carboncino*, e *frumento mutolo* addimandano queſte due ſpezie indifferentemente. Ma per farne ſeparazione baſta conſiderare la notabiliſſima diverſità, che ſi trova fra loro (54). E per verità i più eſperti, e i più vecchi *Agricoltori* di queſto *Territorio Ravennate* non laſciano di affermare, che la noſtra *filiggine* è ſtata ſempre ne' loro campi, laddove il grano carbone è cominciato a' giorni loro, nè prima l' avevano mai veduto, nè udito a mentovare. Mi vien detto, che in *Lombardia*

ne abbiano, laddove tutte quaſi hanno la *filiggine*. Ma forſe due ſpezie di *volpe del grano* ſi vorranno nel Vocabolario della Cruſca conſiderare, ſiccome due ſpezie di *uſtilagine* ſi conſiderano ne' *Commentarii de rebus in ſcientia naturali, & medicina geſtis*, che ſi ſtampano in Lipſia, laddove al Tomo III. ſi dà contezza del libro intitolato: *Mich. Chriſtoph. Hanovus ſeltenheiten der natur und Oeconomie*, 2. *Baende*, ec., cioè: *Mich. Chriſtoph. Hanovii variora phyſica, & oeconomica, ex Gedanenſium obſervationum collectione extracta, & edita per Joannem Daniel Titium. Tomus II. p.* 292.. E queſte due ſpezie di *uſtilagine* ſono dette in Germania: *Gemeiner Schmutzbrand*, e *Knoten-oder Steinbrand*. Della prima ſpezie è la noſtra *filiggine*, dell' altra è il *grano carbone*.

(54) Ed havvela molto ben trovata il mentovato Signor TILLET *Diſſ. ſur la cauſe*, ec. *chap.* 3. che la denomina *bled cariè*, biada cariata, „ il cui grano, " dic' egli, „ ſenzacchè la ſua forma, e „ la ſua pellicola ne ſiano molto alterate, ſi converte in una pol„ vere craſſa, nera, e fetida, ed eſſendo ſecco, ſi diſtacca facil„ mente dal fondo della ſua pelle. " Ma il Signor DUHAMEL, per quanto nota queſto Scrittore, diſtinſe la noſtra *filiggine* col nome di *nielle proprement dite* dal *grano carbone* con quello di *boſſe*, o di *charbon*. Sembra, che aveſſero queſta i Franzeſi già diſtinta dalle altre malattìe del grano, facendo *bled niellè*, mentre *il* FURETIERE *Dic. univ. Franc.* alla parola *niellè* aggiunſe, che „ il grano ni„ gellato è tutto corrotto, e nero al di dentro, e ſi riduce in pol„ vere, "

dia non si è fatto universale prima dell' anno 1730. incirca, o almeno prima d' allora non si era generalmente conosciuto, e nel qui contiguo *Territorio Cesenate* fu ignoto prima dell' anno 1738.

3. Non è difficile dunque, che questa fosse infermità propria di un luogo, la quale appoco appoco ad altri luoghi si sia comunicata (55). In somma io mi avviso di sostenere, che la *filiggine*, e il *grano carbone* possano esser tenute per due spezie differenti; ancorchè per altro io non voglia escludere affatto il *grano carbone* dalla classe della *filiggine*, ben concependo, che non si dee considerare per cosa essenzialmente distinta, ma solo per una varietà di un grado diverso dall' altro, che talora ritrovasi in varie piante non solo *cereali*, ma pur anche di altro genere.

4. Di questa varietà orma alcuna negli Antichi non rinvengo (56), per cui mi sento incli-

E na-

(55) Infermità proprie a' luoghi particolari erano anche a' tempi di PLINIO, che disse l. XII. c. 6. : *sunt enim quaedam aegritudines, & locorum.*

[56] Un dotto Antiquario per altro crede, che l' avessero certamente anche gli Antichi: „ il carbone, " dic' egli, „ riduce in polvere il „ granello, e lo annienta; ma che questo effetto conoscessero an- „ che gli Antichi, pare a me, che si possa bastevolmente ricavare „ da PLINIO nel lib. XII. c. 7., ove parla del pepe: " *verum & iis sua injuria est, atque Coeli intemperie carbunculantur, fiuntque semina cassa, & inania.* „ E' vero, " seguita egli, „ che ivi si „ parla solo del pepe, ma io mi persuado, che se non fosse stata „ nota per altra parte questa maniera di carbunculazione, non a- „ vrebbe egli cominciato a dir così del pepe, ch' era pianta fore- „ stiera; ma troppo fu già nota la carbunculazione delle viti. " E sarà forse del *grano carbone* un carattere proprio *semina cassa, & inania*? Io penso, che ciò a dritta ragione affermar non si possa. Quando mai egli è voto, vano, e casso, come la espressione ivi di-

nato a ſupporla ne' baſſi tempi prodotta. Molto meno dunque io mi accorderò con quelli, che non tanto per la *filiggine*, quanto per la *ruggine* pigliandola (57), hanno ciò voluto come Storia re-

dichiara? Chi dirà, che quel Filoſofo del *grano carbone* medeſimo intendeſſe di favellare qualora dettò queſte parole? *Eſt & aliud ex vicino avenae vitium: cum amplitudine inchoata granum; ſed nondum matura, priuſquam roboretur corpus afflatu noxio caſſum, & inane in ſpica evaneſcit quodam abortivo l. XVIII. c. 17.* dov' è da notare quell' *aliud ex vicino avenae vitium*; per il che io ſon di parere, che altro egli intendere non voleſſe per *ſemina caſſa, & inania*, fuorchè un vizio particolare del grano, per cui reſtava voto, e ſecco: la qual coſa, oltre il non eſſere lo ſteſſo, che il *grano carbone*, ſe nelle uve, e nel pepe fu ſtimata un effetto del *carbonchio*, e per tale la nominarono, nelle biade però fu riputata un effetto di altre cagioni. Io non nego tuttavia aſſolutamente, che negli antichi tempi vi poteſſe eſſere il *grano carbone*, ſapendo beniſſimo, che quelle cagioni, le quali ora concorrono per formare una tal malattìa, potevan anche concorrere in que' tempi, quantunque io non ſappia, che vi concorreſſero; nella ſteſſa guiſa che vi avrebbe potuto eſſere il *morbo venereo*, ſe quelle cagioni allora vi foſſero concorſe, le quali ora lo formano; onde il Signor di VALOIS nella ſua *Valeſiana, où les penſées critiques, hiſtoriques, & morales* car. 14., che volle ſoſtenere, non eſſere tal morbo ſtato ignoto agli Antichi, diſſe, che molti fra loro egualmente furono dediti allo ſmoderato uſo di Venere, come oggi accade; e veramente s' ingannò, perchè queſta, com' è ſtato ritrovato, non è la cagion vera di eſſo. Ma nego bensì, che del *grano carbone* abbiano gli Antichi laſciato ſcritto, almeno chiaramente, come negherei, che chiaramente del *morbo venereo* s' intenda in TACITO libro IV. degli *Annali*, dove di TIBERIO ſi legge così: *Erant, qui crederent in ſenectute quoque corporis habitum pudori fuiſſe. Quippe illi praegracilis, & incurva proceritas, nudus capillo vertex, ulceroſa facies, ac plerumque medicaminibus interſtincta*; che che ne dica eſſo Signore di VALOIS.

(57) Il CHABREO *Stir. Icon. & ſciag. p.* 175.: *Uſtilago, eryſine Theophraſto dicta, & Gaze rubigo: ubi ſcilicet in ſpicam abit culmus apparente ſolita, ſi pluvia madens incerti Solis ſentiat fervidiores radios, culmo foliove neutiquam degenerante, ſed granis in fuſcum fuliginoſum pulviſcolum commutatis, qui vel ſolus, vel ſalivam, liquoreve alio ſubactus, ejuſmodi colore cutim inficit. Ruggine* delle bia-

regiſtrare ne' loro libri, onde accoppiare inſieme effetti oppoſti, e incompatibili. Laſciando dunque godere di tali opinioni chiunque ſe ne compiace, dirò francamente, che troppo manifeſto è l' inganno.

CAPITOLO IV.

Qual ſia il *grano ghiottone*.

1. MI chiama a ſcrivere per quarto il *grano ghiottone* (58), ch' è morbo interno, e muta la figura de' granelli, primacchè dal ſuo involucro eica la ſpiga, gli fa creſcere più dell' ordinario, ma inegualmente ritondi, e gli rende di color verdiccio. Tav. III. Fig. 2. a. Che ſe diventan ſecchi, appajono di colore lionato ſudicio, di buccia ſcabroſa, e facile ad eſſere ſtracciata co' denti, e di varie grandezze ſempre minori di quelle de' granelli verdi, alcune delle quali al *pepe* nero, altre alle *coccole* dell' *ellera*, ed altre alle *bacole* del *ginepro* ſi raſſomigliano. Non hanno per entro ſoſtanza alcuna di fari-

biade, o *carbonchioſo male* fu anche dal VALLISNIERI *Della curioſ. orig. degli ſvil.*, ec. chiamato il *grano carbone*, e ſopra queſta ſuppoſizione tutto ciò di lui ſcriſſe, che gli Antichi avevano alla *ruggine* attribuito.

(58) Così è da me nominato per la ſimilitudine, ch' egli ha co' ſemi dell' erba detta *gittagine*, e però l' AMBROSINI *Phytol.* l. 1. *githagine, ſeu pſeudo-melanthio* . . . . . *Italis* Gittone, *Bononienſibus* Gittone, & Jottone, che creſce ne' frumenti; della qual' erba il NIZOLIO *Theſ. ling. lat.* ebbe: *eſt & gittago, Authore Hermolao, quae in frumentis creſcit, herba inutilis ſeminis, git ſpeciem referens.*

na, ma una materia fibrosa bianca bianchissima, pieghevole molto, e anche frangibile, e come di *talco*, la quale occupa tutto il vano della sua matrice formata di sode membrane.

2. In alcuni luoghi della *Lombardia* si nomina *fame bianca*, siccome *fame nera* viene addimandato il grano carbone, ma con dialetto *Ravennate* è chiamato *cerrone*.

3. Io non trovo, che alcun antico, o moderno Scrittore abbia di questo morbo fatto menzione, quando dir non si voglia, che del medesimo, non ha molto, intendesse l'Inglese NEEDHAM (59), Filosofo, a cui siamo debitori di tante belle, e minute osservazioni, laddove del grano favellando guasto dalla *nigella* (60), con simili parole, se non quanto sono in Idioma *Inglese* quelle, che si leggono nel suo libro, egli lo circonscrive: *La nielle est une maladie du blè, dont elle dètruit la substance farineuse, qui est au-dedans, & introduit à sa place une matiere etrangere, qui ternit, & noircit*

(59) NEEDHAM *Nouvelles decouvertes faites avec le microscope, Chap. VIII.*

(60) Verte *nielle* il Tradutore dell' Opera del NEEDHAM, ma il FURETIERE la voce *nielle* in tal modo dichiara: „ ella è anche una nebbia, o ruggiada, che guasta le biade, che sono vicine a „ maturarsi." E il Signor HALES *Statique des Vegetaux chap. I. exp. 9.* considera, che „ la nielle tombe ordinairement vers le on„ zieme de Juin, & vers la mi-Juillet, elle rend les feuilles noi„ res, & les fait sentir mauvais." Il che non si accorda colle osservazioni sopra il *grano ghiottone*, le quali molto tempo prima di Giugno, e di Luglio lo fanno conoscere; nè il FURETIERE, che descrive il *grano nigellato* per nero al di dentro, e per facile a ridursi in polvere, ha scritto poi anche, ch' egli sia bianco nell' interno, e non si riduca in polvere, come del *grano ghiottone* vorrà dirsi, dove sarebbe contraddizione.

cit le grain au moins exterieurement. Cette matiere eſt ou une pouſſiere noire, & fort fine, mais dont les parties, vues au Microſcope, n' ont point une figure uniforme, ou c' eſt une ſubſtance blanche toute composèe de longues fibres empaquetèes enſemble, & qui ne donnent aucun ſigne de vie, ou de mouvement, ſi on les expoſe au Microſcope, telles qu' on les tire du grain, ſans leur appliquer de l' eau. Ma per vero dire, ſiccome queſto ſecolo ſi è interamente determinato a non concedere tuttocciò, che non abbia certe prove, e indubitate, così io dirò liberamente, che qui due malattìe del grano in erba tra di lor differentiſſime ſi confondono. Perchè o la materia, che ſi trova nel granellino, la qual egli vuol dire introdotta in eſſo, è una polvere nera, e molto ſottile, le cui parti vedute col microſcopio non hanno figura uniforme, e ſarà queſto per avventura il noſtro *grano carbone*, quando però unite alla medeſima polvere s' intendano, e ſi vogliano riconoſcere alcune fibre non tramutate, che l' inuguaglianza producono della materia; o queſta è bianca, e compoſta di lunghe fibre ammonticellate inſieme, che non hanno alcun moto, fino a tantocchè bagnate non ſieno con acqua, e non ſi dovrà queſto il *grano carbone* medeſimo giudicare, ma piuttoſto quel morbo, che i granelli rende ſimili a quelli del *nigellaſtro*, cioè in ſomma il *grano ghiottone* (61).

4. So-

[61] Tutto quello, che di un tal grano aſſeriſce il Fiſico Ingleſe, ſi pretende nella Diſſertazione *ſur la cauſe, qui corrompt, & noircit les grains*, ec. *pag.* 62., che ſi debba intendere del *grano ſperone*,

4. So bene, che a voler fiſſare il tempo della ſua venuta fra noi ſarebbe un penſar chimerico, giacchè nè il Signor NEEDHAM, nè altri ſi è pigliato il penſiero di farne ricerca. Siccome però al *grano carbone* è appropriato da alcuni *Botanici*, come ſi è veduto, il nome dell' antica *ruggine*, così potrebbero altri credere indubitato, che cadeſſe molte, e molte età prima de' giorni noſtri, perchè ſotto queſto nome anche il *grano ghiottone* aveſſero gli Antichi conoſciuto; ma un tal raziocinio a malattìa appunto di penſar condurebbe, che certamente tra' Filoſofi è diſdetto. In tal caſo piuttoſto ſi potrebbe mettere queſto morbo fra que' diverſi, a' quali non dettero nome; benchè TEOFRASTO, e PLINIO nulla ne diſſero, e in

rone, *bled ergotè*, e di queſto *grano ſperone* inteſe pure di ragionare il Signor di BUFFON nel ſecondo tomo della *Storia naturale*. Ma certo è, che la maggior parte di quelle proprietà, le quali il NEEDHAM attribuiſce al ſuo grano, ſi poſſono riconoſcer anche nel noſtro *ghiottone*, e non ſi riconoſcono per avventura nel *grano ſperone*. Nè a dritta ragione ſi potranno forſe attribuire al noſtro *ghiottone* molte proprietà d' un certo grano, che nella Diſſertazion medeſima ſi chiama *bled avortè*, biada ſconciata, ſvanita, o coſa ſimile, e „porta," vi è detto, „ la gamba baſſa ritorta, embricata, „ e ravvolta, le cui foglie ſono verdi, turchinicce, raggrinzate, rotolate, o ſpirali, " e ſi aggiugne car. 30, che „ la ſpiga non „ moſtra, altrocchè i principj imperfettiſſimi del grano. " Si conclude in ſomma con queſte medeſime parole car. 83.: „ J' ai nommè bleds avortès ceux, dont la tige eſt ordinairement un peu „ tortue, & tient plus, ou moins du rachitiſme, dont les feuilles „ ſont d' un verd blevàtre, & recoquillèes, dont le grain eſt verd, „ terminè bruſquement en une, deux, ou trois petites eminences, „ & aſſez ſemblables à un pois, qui comence a ſe former dans la „ coſſe. " Tutte le quali coſe non convengono interamente, come ſi vedrà, al *grano ghiottone*; per il che mi ſono dato a credere, che queſto non ſia neppure *le bled avortè*, o che in Francia egli abbia diverſe condizioni, che in Italia.

in VARRONE, in COLUMELLA, e negli altri *Geoponici* più accreditati, e ſincroni a queſti, o di tempi poco diverſi non ſi vede per ombra un piccolo barlume, che lo accenni. Ma per recare in uno la faccenda dirò, che io diſtinguo queſta dalle altre malattìe, perchè da cagion ben delle altre diverſa mi è ſembrato di poter congetturare, che derivi un effetto cotanto dagli altri diverſo; nè reputo, che per conto alcuno ſi debba queſto ſupporre dalla *ruggine* prodotto, o dalla mentovata *nigella* de' *Franzeſi*.

CAPITOLO V.

Quali ſieno *altre malattìe del grano in erba*.

1. ORa, che è detto di quelle, che ſono ſtate confuſe ſotto il nome di *ruggine*, o che lo potevan eſſere, ſi dirà brevemente di alcune altre, che ſono forſe di minore ſtrage, benchè di ugual conſiderazione.

2. Il *giallume*, che ſi trova di più ſpezie, abbia qui luogo. Egli è delle foglie, quando le medeſime, ſenza precedente umor eſterno alcuno, prima diventano tinte di un verde bianchiccio, e poſcia ſi fanno gialle, o roſſigne, e ſi ſeccano in fine. Queſta forſe da alcuni ſi chiamerebbe *ruggine*; ma tale ella non è, ſe riguardar ſi voglia l' idea, che di quella abbiamo conceputa. Sarà del grano, ed anche della foglia, quando infra la tunica, e il grano medeſimo, o ſopra la foglia ſi tro-

va

va una materia gialliccia denſa, che dal volgo *Lombardo* è detta *fumana* (62). Sarà del gambo, e della ſpiga, quando queſti diventano macchiati prima di giallo, e anche di roſſigno, e poi ſeccano (63).

3. Il *grano voto* ſi ha dalla ſpiga immatura per qualche accidente, che a ſuo luogo riporterò, così rimaſta. Il ſuo nome dà la ſua diffinizione (64). E' facile, che queſto ſia quel vizio, del quale PLINIO intenda, quando ſi eſprime (65), che *v' è nel grano un altro difetto ſimile all' avena.*

4. Si potrà riputare un morbo annuale del grano in erba il *ſeccarſi della ſpiga* interamente, o in par-

(62) Il VALLISNIERI *Del. cur. orig. degli ſvil.*, ec. notò „ certa polvere gialla, detta dal volgo *Lombardo*, e *Reggiano fumana*, ec.. " e da lui ſi preteſe, che queſta „ venga ſoventemente confuſa, e preſa da' poco pratici Agricoltori per la ruggine delle biade. "

(63) E queſte forſe vorrà intendere il Signor TILLET per quelle *ruggini*, che e' mette fra le minori malattìe del grano in erba.

[64] Il prefato Autore chiama *bleds coulès*, biade ſcolate, e trappaſſate quelle, onde „ le ſpighe non contengono, che piccoli grani „ voti di farina; " e ſono di ſpezie diverſa dalle biade *echaudès*, „ *& retraits*, i cui grani minuti, e appaſſati, e arridi contengono poca farina. Male per avventura non penſerebbe chi diceſſe, che ſiccome queſto *grano voto* può averſi per morte immatura del grano in erba, così il *ſeccarſi* della ſua ſpiga ſi poſſa avere per morte acerba di eſſo, volendoſi dire naturale quella, che ſuccede al grano medeſimo già maturo. Non altramente le diverſe morti de' viventi diſtinſe GIULIANO, Arciveſcovo di Toledo, che diſſe, per quanto ricavo da HENNINGIO SUCCOVIO nel ſuo *Plauto Filologo-critico*, cioè *critico-philologica ſatyra in trinummum M. Acci Plauti comicorum Principis*, queſte parole: *tria ſunt mortis genera, acerba, immatura, naturalis; acerba Infantum, immatura Juvenum, naturalis Senum.*

(65) PLIN. XVIII. 17. *Eſt & aliud ex vicino avenae vitium, eum amplitudine inchoata granum, ſed nondum matura..... caſſum, & inane a ſpica evaneſcit quodam abortivo.*

parte, primacchè vi ſieno formati i granelli; e di eſſo nulla hanno detto gli Scrittori, che io ſappia.

5. La *ſterilità del grano* ſia quella malattìa, per cui la pianticella, benchè vegeta, freſca, e ſana, poco s' innalza dal piede, e la ſpiga non fa fiori, o ſe falli, non perfeziona i granelli. Può chiamarſi anche la *penuria del grano*, come per ſimile guiſa fu detto anche di tutti i frutti della terra (*66*). A queſta maniera di ſterilità non credo, che ſia ſtato badato dagli antichi *Geoponici*, ſebbene io mi perſuada, che pur fra loro accadeſſe, per eſſer ella troppo alle biade connaturale.

6. La *luſſuria del grano* è una ſpezie di ſterilità, perchè per eſſa le biade, proſtrandoſi, tratte in terra dall' altezza, a cui le aveva condotte il troppo loro vigore, ſi fanno i lor granellini più lunghi, ma con pochiſſima polpa. Ben la conobbero gli Antichi, e PLINIO la ci deſcriſſe compitamente (*67*). Il luſſureggiar delle biade fu da' Greci però detto ἐξηβριζειν, e quello degli alberi ἠλομανεῖν che tanto vale, come *ſilveſcere*, e così dell' altre coſe.

7. Anche l' *infeſtamento degl' Inſetti* (*68*) era noto agli Antichi.

(*66*) *Fructuum penuria*. Jo. COST. LAUD. *De univ. Stir. natura, libri* 2.

[*67*] PLIN. XVIII. 17. *Inter vitia ſegetum & luxuria eſt*, ec.


[*68*] THEOPH. *Hiſt. nat. l.* 8. *c.* 10.: *Triticum etiam vermiculi enecant*. E PLINIO XVIII. 17.: *Naſcuntur & vermiculi in radice ..... Gignuntur & in grano*. E però il NIEREMBERGIO *Hiſt. Nat. l.* 3. *c.* 5. *Coſtaeus inter plantarum morbos cum Senioribus vermiculationem poſuit*.

8. Conobbero il *pullular dell' erbe eterogenee* (69), ed altrettali conobbero malattìe, nell' indagar delle quali nulla io mi fermerò, brancolando fra le tenebre della rimota età, e tanto più che niun' altra io ne ho osservata, che meriti attenzione.

9. Questi sono dunque i nomi, e i caratteri delle malattìe del grano in erba da me ritrovate nel *Territorio Ravennate*, delle quali molte appresso gli Autori della naturale Storia, e segnatamente appresso TEOFRASTO, e PLINIO si hanno. Potrebbe esservi forse qualche Region vicina, o lontana, in cui alcuna di esse non trovasse luogo, per cagione della diversità del clima, o del terreno, o di altro, che per la formazion di quella in altra parte d' *Italia* s' incontrasse, in *Francia*, in *Germania*, e altrove. Per questo appunto io mi guarderei bene d' affermare d' ogni altro quello, che affermo di questo territorio, quantunque io sia persuaso, che le mentovate malattìe possano anche ritrovarsi, e si ritrovino forse altrove.

PAR-

[69] PLIN. XVIII. 17. *Lolium, & Tribulum, & Carduum, Lappamque non minus, quam Robum inter frugum morbos...*



PARTE II.

Delle osservazioni , ed esperienze intorno le malattìe del grano in erba .



Li Antichi , che diletto non avevano per quello , che noi chiamiamo Fisica particolare , ed esperimentale , non pensarono , che si potesse trarre alcun vantaggio dall' esame scrupoloso , e dalla descrizione esatta di tutte le parti di una cosa , e credettero forse , che l' autorità potesse aver forza in contraddizione con l' esperienza ; e quindi n' è avvenuto , come altri scrisse , che le opere di ARISTOTELE , di TEOFRASTO e di PLINIO , le quali sono de' primi Naturalisti , e forse de' più grandi , quantunque poche ne abbiano fra le moderne , che le pareggino , sieno con tuttociò di queste per un tal conto molto inferiori . Volendosi ora per tanto l' ottimo uso seguitar de' moderni investigatori delle naturali cose , non mai troppo ricercate , alla *Fisiologia* più minuta de' morbi del grano in erba sarà dicevole per avventura , e vantaggioso il porre innanzi le sperimentali seminazioni da me fatte in parecchi anni , il procedere di esse in diverse stagioni , e le *meteorologiche* osservazioni , che le hanno seguitate .

CAPITOLO I.

Sperimentale ſeminazione dell' anno 1749.

SEMINAZIONE I.

Queſto piccolo campo, ch' è poſto nella Villa di *Santo Stefano* vicino a *Santa Maria in Fiumicello* in luogo aperto, era ſtato da tempo immemorabile per fino allora tenuto a prato. Lo feci dividere con mattoni nelle ſeguenti XX. *caſelle* quadrate, il cui lato era di 4. piedi Romani. Io aſſiſtetti alla ſeminazione, che fu del grano noſtro volgare, cioè di quello, che GIOVANNI BAUHINO nel Tomo ſecondo della ſua *Storia univerſale delle Piante* chiama: *triticum vulgare, glumas triturando deponens*.

Oſſervazioni generali dell' anno 1750.

1. POichè nell' Autunno dell' anno 1749. fu interrotto il buon tempo dalle piogge, la ſeminazione alquanto venne bagnata, e ritardò la produzion dell' erbe più dell' ordinario. Spuntò bene tuttavia il grano de' campi del Contado, e il preparato nacque per la miglior parte, quello ſolo ritardando de' numeri XIV. XVII.. Piovve quaſi tutto Dicembre, ed anche il ſuſſeguente Gennajo del 1750., ma entrato Febbrajo ſi mutò in ſereno per fino agli ultimi dì, ne' quali ripigliaro-

no

no le piogge, benchè leggieri (70). Misurata la densità dell' aere (71), trovai per essa in questo mese, che la maggior altezza del *Barometro* (72) era a' pollici 28. linee 4., la minore a pol. 27. lin. 1; la maggior altezza del *Termometro* (73) a' gradi 2. sopra il punto della con-

ge-

[70] Molto dalla costituzion degli anni si volle da' Fisici raccorre per la produzione delle malattìe. Il NIEREMBERGIO *Hist. Nat. max. pereg. l. 6. c. 22.* : *Si mutatio coeli ratione contigerit, haec ob annorum varias constitutiones erit; prout etiam coelum varias reddit anni constitutiones, annus clementior quandoque, aut horridior fit, & ita plantas varias producit..... Recte in proverbio est, ut Theophrastus inquit, annus fructificat, & non tellus.* Perciò il RAMAZZINI *Differ. 2. de Constit. an.* 1691. tenne, che „ bisognava sem„ pre avere d' innanzi agli occhi la costituzione dell' anno. " E avvertì poi, che „ siccome nella maggiore abbondanza de' frutti del„ la Terra, *annus est, & non terra, quae fructificat*, come „ dice TEOFRASTO, così in tutt' i tempi non la particolar disposi„ zione del corpo, ma la costituzione dell' anno è quella, che pro„ duce le malattìe. "

[71] E' noto a' Fisici, che operando la forza della gravità uniformemente, se si piglieranno le altezze in progressione aritmetica, le densità dell' aria a queste altezze saranno in progressione geometrica, cioè a dire, che tali altezze saranno le misure delle ragioni tra le densità dell' aria alla superficie della terra, e le densità sue a queste altezze. Ma la giusta misura, che veramente convenga alla proposta ragione di esse densità, è quella, che rimane da determinare. Il che vorrà dirsi di avere ottenuto, quando si abbia determinato l' altezza del *Barometro*; perchè le altezze del *Mercurio* in esso *Barometro* sono come le gravità di tal *Mercurio* alle gravità dell' aria.

[72] Le altezze del mio *Barometro* sono indicate con due numeri, i quali denotano i pollici del piede di Parigi, e le parti centesime, o duodecime di esso pollice, o sieno le linee. Queste misure ho adoperate, perchè ora mi pajono le più usitate, e le più conosciute. Il diametro di esso *Barometro* è di una linea, e mezzo. Nel formarlo ho usato le maggiori diligenze, onde il *Mercurio* resti purificato, e che sprigioni l' aria in lui rinserrata; talchè non dubito, che sia esatto, per quanto è possibile.

[73] Il *Termometro* ermeticamente serrato, di cui mi sono servito

gelazione, la minore a' gradi 6. ſotto il medeſimo punto per far queſte oſſervazioni, è ſtato ſempre il medeſimo. L' ho conſultato ſempre al far del giorno, che qui è il tempo più freddo, e verſo le due ore dopo mezzo giorno, ch' è il tempo più caldo. Quando l'aria è temperata, queſto *Termometro* ſegna pol. o l. 15. ſopra lo zero, e nel giorno 13. Gennajo dell' anno 1709. avrebbe diſceſo a 5. gradi in circa ſotto quel punto. Egli ſi accorda con quello inventato dal REAUMUR. Ho procurato, che lo *ſpirito di vino* vi ſia egualmente dilatabile, ſecondo la norma, che ne dà queſto celebre Autore, e ſe le mutazioni del caldo, e del freddo non vi ſi ſcorgono molto prontamente, perchè egli ha di diametro una linea, ſono però ſenſibilmente proporzionali a quello del *Termometro Mercuriale* del FARENEZIO del diametro di un quarto di linea, e trovo, che l' altezza dello ſpirito nel primo ſta all' altezza del *Mercurio* nel ſecondo, come 1: 7.. La ſcala, per cui paſſa lo *ſpirito*, comincia dal freddo dell' acqua, che gela, da' *Franzeſi* chiamato *glace pilèe*, ov' è ſegnato lo o, ſopra del quale a' gradi 80. ſegna il grado dell' acqua bollente, avendo ſotto lo zero medeſimo a gradi 25. quello dell' eccеſſivo freddo inſoportabile. Queſti gradi ſono vere, e reali miſure di caldo, e di freddo, come ſi può vedere dal diſcorſo di eſſo REAUMUR *Mem. de l' Acad. R. des ſcien.* 1730., & 1731.. Ma per aver qui una ragione degl' incrementi, e decrementi del mio *Termometro* io miſurai la ſuperficie dello ſtagno, che ſtava vicino a un luogo delle mie oſſervazioni, e procurai di ſtabilire qual foſſe il grado ordinario della temperie di quell' acqua, e dell' aria vicina, quantunque io ſoſpettaſſi con altri, che l' acqua dall' aria ſolo pel più, e pel meno ſi diſtingua, eſſendocchè l' acqua non meno ſi muta nell' aria di quello, che queſta faccia in quella, come ogni dì vediamo. Per la qual coſa TEODORO SANTUOORT *Diſſ. philoſoph. de cauſ. mot. & princip. ſolidor. corp.* ſi avanzò a dire, che l'aria ſia acqua diradata, e l'acqua ſia aria condenſata. Concluſi dopo replicate oſſervazioni, che gl' incrementi, e decrementi del *Termometro* in piccoli tempi eguali erano generalmente in ragione compoſta della diretta delle ſuperficie intere, e delle differenze tra la temperie dell' acqua, e dell' aria, e inverſa delle maſſe loro. Le differenze delle temperie dell' acqua, e dell' aria variavano in tempi eguali ſecondo la progreſſione aritmetica, e gl' incrementi, non menocchè i decrementi del *Termometro* ſi facevano in progreſſione geometrica: e quindi è, che il ſoprannominato SANTUOORT vuole, che la ſcala de' decrementi ſia la *Logaritmica*, per cui ſi potrà dedurre queſta legge generale: „ Poſta la „ tem-

punto . Quantunque il Cielo foſſe ordinariamente ſereno , la nebbia al baſſo fu quaſi continua . Dominarono i venti di *Levante* , o di *Eſt*, e ſi fecero ſpeſſo ſentire quelli anche di *Settentrione* , o di *Nord*.

2. Venuto il Marzo continovarono le nebbie, e quaſi ogni giorno ebbe nuvolo, ma non piovve che ne' dì 7. 13. 17. 21. 29. leggiermente. Il vento ſenſibile fu prima *Meridionale* , o di *Sud* , poi voltò di *Levante* , o di *Eſt* . La maggior altezza del *Barometro* contò pollici 28. lin. 1. , la minore pol. 27. lin. 3. $\frac{1}{2}$; e la maggiore altezza del *Termometro* ſi vide al zero , cioè al punto della congelazione , la minore a' gradi 5. ſotto del medeſimo punto . Il maggior calore del Sole all' aria libera in un giorno ſereno, e quieto fece montare il liquore a' gradi 8. ſopra di eſſo punto . Meglio di ogni altro grano era nato quello de' numeri II. III. V. VI., e particolarmente del V. . Nel dì 16. gl' internodj de' gambi poco apparivano, benchè le foglie , che mettevano da' nodi , foſſero alterelle per fino a comporre della prima inferiore un cannello di tre pollici, e della ſeconda un altro di un ſolo . Il dì 28. ſi diſtinſe nella *caſella* XIX. il *loglio* puro , e ſchietto, e moltoppiù baſſo del grano; e nella *caſella* XVI. nacque alquanto di ghiottone . Molte foglie del gra-

„ temperie dell' aria coſtante, ſe le Abſiſſe della Logaritmica dieno i tempi, le ſue ordinate dieno le differenze tra la temperie „ dell' acqua, e quella dell' aria preſe ſucceſſivamente , le quantità „ delle evaporazioni ſaranno in circa in ragione degli ſpazj , ovvero " [che dà lo ſteſſo per la coſtante ſubtangente] „ come le „ differenze delle differenze tra la temperie dell' acqua , e quella „ dell' aria . "

grano in erba di tutte le *caſelle* fino dal dì 16. erano alquanto abbronzate. Pochiſſimo per altro lo erano quelle de' numeri V. X.. Furono macchiate di giallo quaſi tutte quelle foglie più baſſe, e alcune di roſſigno, ed eſſe poi ſi ſeccarono. Vi avevano di molti *Inſetti* ſopra le radici del grano, e l' *erbe eterogenee* erano abbondanti.

3. Ne' giorni 3. 4. 11. 21. 23. di Aprile piovve alquanto, e maſſime di notte, e reſtò l' aria ingombrata di nuvoli per quaſi tutto il rimanente del meſe. I venti ſi fecero varj, e contrarj, e a' 4., e a' 5. tirò un fieriſſimo *Libeccio*, o *Sud-Oueſt*, ma quelli di *Levante* prevalſero. Il freddo crebbe, e quantunque lo ſpirito di vino nel *Termometro* aſcendeſſe per fino a 12. gradi ſopra lo zero verſo la fine del meſe, ſi era depreſſo per altro ſotto il medeſimo zero per fino a 7. gradi verſo la metà del medeſimo. La maggiore altezza del *Barometro* ſi vide di pollici 17. lin. 11., e la minore di pol. 17. lin. 4.. Il grano in erba del numero XII. era molto rado, e i gambi di eſſo molto baſſi per eſſere ſtato dagl' *Inſetti* ſotterranei danneggiato, e dalle molte *erbe eterogenee* ivi nate oppreſſo. Nel dì 4. i talli ſoli, e i lembi laterali di alcune foglie ſi macchiarono di un giallo cupo. Il dì 14. alcune gambe ritrovai nella *caſella* V. colorite di roſſigno, e di giuggiolino, che ſecche avevano, e brune alquante foglie. Ebbi nel dì 24. al numero VII. alcune ſpighe *filigginoſe* dentro i loro involucri. La *luſſuria del grano* in erba fu al numero medeſimo. Comparvero

a' nu-

a' numeri XI. XII. alcune foglie quasi tutte rosse:
4. Il Maggio comparì ventoso, e prevalsero i venti di *Tramontana*, o di *Nord*. Le piogge caddero ne' giorni 5. 12. 13. 14. 28., e furono mediocri, e i giorni torbidi, e nebbiosi superarono i sereni, e chiari, massime verso la fine del mese. Il *Barometro* non ascese più alto di pol. 27. lin. 11. $\frac{5}{8}$, e discese per fino a pol. 27. lin. 2. $\frac{1}{8}$. Il *Termometro* contò gradi 8. $\frac{1}{2}$ nella maggiore altezza, e non discese più, che a' 5. gradi sopra il zero. Molte spighe il dì 28. non apparivan anche fuora de' loro involucri. In questo tempo crebbero i segni di *ruggine* della prima spezie. Nel giorno 18. ebbi al numero II. tre ceppi di spighe *filigginose*, e un altro ceppo simile al numero IV.. Il primo *grano carbone*, che io vedessi, fu nel dì 20. di questo mese, e ve n' era a' numeri I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XI. XII. e XVIII.. Al XV. trovai nel dì 19. un ceppo, nel quale stavano più spighe di *ghiottone*. Alcune spighe *secche* si videro anche in varie *caselle* nel dì 30. del mese, e queste si erano seccate prima di maturarsi.
5. Ne' mesi di Giugno, di Luglio, e di Agosto, e in parte di Settembre la siccità non ebbe intervallo alcuno, e i venti di *Tramontana*, e di *Levante*, o di *Nord*, e di *Est* regnarono per la maggior parte di essi mesi, venendo per altro interrotti da quelli di *Ostro*, o *Sud*, e particolarmente alla fine di Giugno, e nel principio di Agosto. Alla metà di Luglio cadde una dirottissima pioggia, che durò mezza giornata. L' al-

tezza del *Barometro* in quel tempo non fu maggiore di pol. 27. lin. 9. $\frac{1}{2}$, cioè in Luglio, nè minore di pol. 27. lin. 6. in Settembre. Quella del *Termometro* giunſe a' gradi 12. ſopra il zero, nè meno apparve di 8. gradi ſopra il medeſimo. Alla metà di Giugno rimaſero molti gambi del grano, ſtati già percoſſi dalla *ruggine*, nella eſterior parte quaſi abbronzati, e ſecchi, ma non per modo, che i gambi medeſimi ſi ſeccaſſero. Nel principio di queſto meſe ritrovai fra varj ceppi di grani, che avevano ritardato a creſcere, alcune ſpighe di *filiggine*, e ſegnatamente al numero III.. In quel tempo medeſimo fra' ceppi pur ritardati al VI. ſi diſtinſero due ſpighe di *grano carbone* dentro i loro involucri, e all' VIII. una ſpiga di *grano ghiottone* unito a qualche grano buono. Alla fine del meſe, quando già ſi ſtava per mietere, oſſervai in molte *caſelle* i ſegni della *ſterilità*; e poco prima aveva io veduta certa materia gialla infra la tunica, e il grano non meno buono, che morboſo. Si reſe comune in queſt' anno la diſgrazia di molti *Inſetti*, i quali bucarono i grani, e molti ne divorarono prima della ricolta.

6. Dal dì 15. di Settembre ſino alla fine di Ottobre conſervoſſi tempo umido, e intorno all' *Equinozio Autunnale* fecero gran piogge. Il vento ſpirava particolarmente dalla parte *meridionale*, ma ſi numerarono in fin di Ottobre alcuni giorni freddi, e maſſime nelle ore mattutine. Non così in quelli di Novembre, e di Dicembre, ne' quali ſi ebbero tempi varj, e ſempre dolci.


CA-

à car. 51

SEMINAZIONE

I.

I. Grano tratto da ſpighe ottime primacchè foſſero battute.	II. Grano traſcelto da altre ſemenze, e unito al grano CARBONE.	III. Grano traſcelto, ben vagliato, e purgato, con *ranno*.	IV. Grano traſcelto, e vagliato, e fatto ſtare *al Sole* per alquanti giorni.	V. Grano traſcelto vagliato, e ſtato in *acqua di calce* per qualche ora.
VI. Grano traſcelto vagliato, e preparato, con *acqua di ſal comune*.	VII. Grano traſcelto vagliato, e ſtato per alcuni dì in *acqua di pioggia* unita a *ſtabbio di cavallo*.	VIII. Grano con CARBONE preparato con *ſugo di alcun' erbe*.	IX. Grano con CARBONE ſtato *al Sole* molte ore.	X. Grano con CARBONE ſtato in *ſalamoja di zolfo*.
XI. Grano con CARBONE ſtato in *ſalamoja di canfora*.	XII. Grano con CARBONE preparato colle *ceneri di tartaro*.	XIII. Grano con CARBONE cavato da una ſpiga.	XIV. Grano buchera to, con CARBONE.	XV. Grano di una ſpiga traſcelto dal GHIOTTONE, ch' era in eſſa.
XVI. Grano con GHIOTTONE di una ſpiga ſola.	XVII. Grano aggrinza to di una ſpiga, che molto aveva patito per RUGGINE.	XVIII. Grano di cattiva qualità unito con molti altri gra ni.	XIX. *Loglio* traſcelto.	XX. *Loglio* miſto con grano.



CAPITOLO II.

Sperimentale ſeminazione dell' anno 1750.

SEMINAZIONE II.

Queſta ſi fece nella villa medeſima di *Santo Stefano* in uno degli Orti di Caſa mia, e in terreno graſſiſſimo; nè io laſciai di vegliare, perchè foſſe fatta eſattamente.

Oſſervazioni generali dell' anno 1751.

1. L' Autunno del 1750. fu dolce, e ſecco, e diverſo dall' anno paſſato; ma il principio dell' Inverno fu molto nebbioſo, e nel fine di Dicembre cadde molta pioggia. Le biade ſpuntarono felicemente.

2. Per fino alla metà di Gennajo del 1751. ſeguitarono le nebbie, e piovve tutto il giorno de' 9.; e quindi ſi fece tempo variabile, talchè ſpeſſo ſi vedeva il Sole, e ſpeſſo il nuvolo. La maggiore altezza del *Barometro*, che fu nel 21., non paſsò pol. 28. lin. 4. $\frac{1}{2}$, e la minore nel dì 31. pol. 27. 4. $\frac{3}{4}$. La maggiore del *Termometro* ſi ebbe il dì 27. di gradi 1. $\frac{1}{2}$ ſopra il zero, e la minore il giorno 15. di gradi 3. ſotto il medeſimo. In que' dì regnarono venti di *Ponente*, o di *Oueſt*.

3. Febbrajo portò a dì 28. la maggior altezza del *Barometro* pol. 28. lin. 3., e a dì 5. aveva portata la minore pol. 27. lin. 3. $\frac{1}{2}$. Fu a dì 16. l' altezza maggiore del *Termometro* gradi $\frac{1}{2}$ ſopra il gelo, e la minore, ne' dì 8., e 9., gradi 3. ſotto di eſſo. Nel giorno medeſimo de' 9. fece un freddo crudele, ma non nevicò; miſe bensì ne' dì 5., e 7. una

neve terribiliſſima, ed ebbevi gran parte del meſe nuvoloſo, e caliginoſo, vedendoſene qualche giorno verſo la metà riſchiarato, e col Sole ſcoperto.

4. Nel Marzo i venti di *Tramontana*, o *Nord* ſuperarono, e per tutto Aprile, e Maggio continuarono. Non laſciò mai d' eſſere torbido, nevicò ne' giorni 10. 12. 13. 14. 15. 18., piove ne' dì 17. 22. 23. 24. 25. 31., e ſeguitò a piovere nel 1., e nel 2. di Aprile. Il *Barometro* ſi elevò nel dì 1. a pol. 28. lin. 2., e ſi depreſſe nel dì 15. per fino al 27. 1. $\frac{1}{2}$. Il *Termometro* giunſe alla maggiore altezza nel dì 20., cioè a' gradi 3. ſopra il punto del gelo, e ſi depreſſe nel 17. alla minore gradi 2. ſotto queſto punto.

5. L' Aprile non ſi moſtrò molto chiaro, e durò in tale ſtato coſtantemente. Non avanzò l' altezza del *Barometro* ſopra pol. 28., e la baſſezza ſopra 27. 4. La ſeminazione era creſciuta notabilmente, e nelle *caſelle* erano nati alcuni ceppi di grano, toltone però in quelle de' numeri VIII. XI. XIII. XIV., che non ne avevano; e quella del numero IX. era la più ſcarſa; diſtinguendoſi le *caſelle* VI. XVIII. come le più copioſe. *Verme* alcuno non mi fu poſſibile di ſcoprire ſotterra fra le radici del grano delle mie preparazioni, quantunque molta diligenza in queſto meſe vi uſaſſi, ma ne vidi alcuni ſopra le foglie. Comparvero al fine di queſto molti gambi macchiati di *giallume*, e in alcuni luoghi riarſi, e corroſi dalla *ruggine* della ſeconda ſpezie. Le ſpighette ſi trovavano anche fra i loro involucri, e ve ne aveva-

no

no di lunghezza per fino a 4. in 5. e più linee.

6. Alla metà di Maggio ſcoperſi quantità grande d' *Inſetti* fra le radici del grano, alcuni de' quali ſalivano ſu pe' gambi delle ſue pianticelle, intorno le quali ſi vedevan anche alcuni *moſcherini* a ronzare. Al numero IX. ſi erano manifeſtati già nel principio del meſe i ſegnali del *ghiottone*. Queſto meſe dette molte nebbie, e vi piovve ne' dì 2. 8. 9. 23. 26. 28. 29., ſeguitando a piovere interrottamente per alquanti giorni di Giugno. Il *Barometro* non aſceſe più di 28. pollici nel dì 25., e non diſceſe meno di 27. 6. nel 10. Il *Termometro* arrivò all' altezza di 9. gradi ſopra il zero ne' dì 8., e 23., e non ſi depreſſe maggiormente di gradi 5. ſopra il medeſimo punto.

7. Nel principio di Giugno apparvero le foglie, e le ſpighe del grano infeſtate da molti *Inſetti*, e alcune di queſte ultime erano corroſe nella loro ſommità da' medeſimi. Quelle del numero I. non ebbero alcun' altra malattìa. Al II. e al III. furono alquante ſpighe di *carbone*. Nel IV., quantunque foſſero nati pochi ceppi del grano bucato, non v' era malattìa alcuna. Il V. portava gambi ſegnatamente coperti d' *Inſetti*. Al VI. era *grano carbone*, *filiggine*, e *ruggine*. Nel VII. vidi un ceppo di due gambi, che porgeva una ſpiga di *grano buono*, e un' altra di *grano carbone*. Poche ſpighe uſcirono nel IX., e tutte ſarebbero ſtate intatte, ſe una di *ghiottone* non v' era; ma negli VIII. XI. XIII. XIV. non nacque pure una ſpiga, e in ſua vece di molta

avena, ed altre *erbe eterogenee*. Il X., e il XII. recavano *grano carbone*, e *ruggine*. Neſſuna di queſte malattìe attaccarono le *caſelle* XV. XVI. XVII., e la XVIII. era ſolo attaccata dalla *ruggine*, non eſcludendo in tutte l' *infeſtamento degl' Inſetti*, e dell' *erbe eterogenee*. Quindi molto in tal anno patirono generalmente le noſtre biade per la *ruggine*, pel *grano carbone*, pel *ghiottone*, e per le altre malattìe. Nebbie grandiſſime ſi videro la mattina per tempo ne' primi giorni di queſto meſe, nel quale i venti furono variabili, ma forſe più ſi ſentirono quelli di *Ponente*, o di *Oueſt*. Piovve ne' dì 1. 2. 7. 9. 10. 14. 15. 26.. Il *Barometro* non aſceſe più di 28. 3. $\frac{1}{2}$ nel dì 12., e diſceſe per fino a 27. 4. nel primo giorno del meſe. Il *Termometro* ebbe il ſuo dilatamento maggiore ne' dì 10., e 26. di gradi 9. $\frac{1}{2}$, e il minore nel dì 2. di 7. $\frac{1}{2}$.

8. Dopo il meſe di Giugno ſi fece la ricolta, ed io tralaſciai le oſſervazioni, ma non tralaſciai di riflettere, che quantunque ne' predetti giorni aveſſe piovuto, doveva quell' anno conſiderarſi per generalmente aſciutto (74.). E queſto ſi palesò nel rimanente della ſtagione, che quaſi ſenza pioggia traſcorſe, come nell' Autunno per fino agli ultimi giorni di Ottobre, ne' quali piovve leggiermente. Il Novembre fu chiaro nel principio, foſco, e piovoſo nel mezzo, aſciutto, e quieto nel fine; e il Dicembre quaſi tutto nebbioſo, e talora leggiermente piovoſo, e verſo il fine umido.


CA-

[74] L' Inverno di queſt' anno molto fu ſimile a quello del 1724. deſcritto dal Sig. MILLER *Mem. ſur l'an.* 1723., come dolciſſimo, e in cui i *cavoli fiori* furono guaſtati dalla *ruggine* eccefſivamente.

SEMINAZIONE

II.

I. Seme traſcelto da grano, che molto CARBONE aveva.	II. Grano con molto CARBONE preparato con *orina*.	III. Seme traſcelto da grano, che pochiſſimo CARBONE aveva, ma alcuni grani bucherati.	IV. Grano da' TOGNI bucato, e dalle TARME, e preparato con *acqua di ſal marino*.	V. Grano bucato da' TOGNI, e dalle TARME, non preparato.	VI. Grano con molto CARBONE preparato con *polvere di calce*.
VII. Grano CARBONE ſolo.	VIII. Grano GNIOTTONE ſolo.	IX. Seme tratto da una ſpiga di grano con GHIOTTONE.	X. Grano colto preſto, e immaturo.	XI. Spiga intera di FILIGGINE ſotterrata.	XII Grano *groſſo*.
XIII. Grano *groſſo* tocco da' vermi, e alterato nella ſoſtanza.	XIV. Grano meſſo *nel vino*, e *nell' aceto* per una notte.	XV. Grano di punta acuta, e lunga, ma piccolo, e preparato con *acqua di nitro*.	XVI. Grano piccolo di punta acuta, e lunga non preparato.	XVII. Grano generoſo, buono, pieno, ſaldo, non rugoſo, e quaſi del color dell' oro.	XVIII. Grano preparato colla *polvere di zolfo*.



CAPITOLO III.

Sperimentale ſeminazione del 1752.

SEMINAZIONE III.

Il Sig. Conte LUIGI DE' SETTECASTELLI, gentiliſſimo Cavaliere di queſta Città, e amantiſſimo de' begli ſtudj, e di coloro, che gli coltivano, mi conceſſe, che queſta ſeminazione qui ſi faceſſe in un ſuo *Orticello* d' alti muri circondato, e poco dal Sole percoſſo; dove mi aſſicurai di una diſtribuzione rigoroſiſſima de' grani.

Oſſervazioni generali dell' anno 1753.

1. L' Autunno del 1752. ebbe le notti alquanto fredde, e poi entrato l' Inverno in tutte quelle gelò, ma con gelo, che ſpeſſo non penetrava più innanzi dentro la terra, di quello che faceſſe la liquefazione del giorno.

2. Verſo la metà di Gennajo i venti di *Tramontana*, o di *Nord* miſero freddi gagliardiſſimi, e produſſero ne' dì 6. 7. 15. 18. 22. copia di neve, avendo in alcuni altri giorni piovuto. Tuttavia i venti di *Mezzodì*, o *Sud* ſi avanzarono, il Cielo più volte ſi riſchiarò, e comparve il Sole; ma la ſerenità di que' giorni era oſcurata la mattina, e la ſera dalle nebbie, che s' aggiravano per l' aria verſo la ſuperficie della terra, e ſcompariva-

no

no nelle notti, le quali furono acerbissime. Il dì 11. lo *spirito di vino* nel *Termometro* si depresse per fino a' 5. gradi sotto il punto di congelazione. Il Mercurio del *Barometro* non andò a maggiore altezza di pol. 28. lin. 3. nel giorno 1., a minore di 27. 5. nel 15.: e le biade perciò erano rimaste molto basse, e l' altre erbe non nascevano.

3. Nel mese di Febbrajo parve, che l' Inverno desse volta, e benchè fosse freddo, non erano più tuttavia lunghi ghiacci, ma corti gentili geli. Nevicò solo il giorno 2., e piovve il 25. Ma i venti di *Levante*, che dominavano, ricondussero verso la fine di esso mese nelle notti il gelo, e lo fecero continuare in Marzo per alcuni dì, e poi cominciò a diminuire nuovamente, e mostrò anzi di cessare col vento di *Sud*, che subentrò, e fu quindi interrotto con intervalli di *Ponenti*, e di *Tramontane*, che rendevano l' aria ora dolce, ora rigida. Le alterazioni del *Barometro*, e del *Termometro* non apparvero notabili, onde qui non le riferisco.

4. La pioggia in Marzo cadde ne' dì 2. 3. 4. 10. 11. 14. 15. 20. 21., e le nebbie furono frequenti. Lo *spirito di vino* nel *Termometro* non giunse al zero, se non al dì 10., nel qual giorno si fece l' aria costantemente procellosa, umida, e piovosa, spirando sopra *Favonio*, od *Ouest*, ma sotto *Affrico*, o *Sud-Ouest*; e il dì 31. il medesimo *spirito* si alzò sopra di esso punto per fino a' 6. gradi, e spirò *Nord-Est*. Il *Barometro* fu a 28. pollici nel 26., e a 27. 2. nel dì 11.. Pochi *Insetti* si vide-

videro ſopra le radici , ma molti sì bene ſopra le pianticelle del grano . L' *erbe* tutte miſero il tallo, e cominciarono nella Primavera ad occupare le campagne notabilmente, e molto ſi eſaltarono anche nel luogo delle mie oſſervazioni .

5. L'Aprile comparve dolce, e ſereno, e ſe qualche volta intorbidoſſi, fu per nebbia, che l'aria ingombrò di folte nubi. Ebbevi pur anche qualche brina dalle parti ſpecialmente di *Tramontana*. Dominarono i venti di *mezzodì*, i quali negli ultimi giorni di queſto meſe furono ſcacciati da un fier *Libeccio* , che l' aria coprì di rade , e di mutabili nuvole. Il *Barometro* tenne la maggior altezza del meſe nel dì 15., cioè a' pol. 28. lin. $\frac{1}{2}$, e la minore nel dì 29. a' pol. 27. 6.. Il *Termometro* ebbe quella ne' dì 20., e 21. a' gradi 8. ſopra 0., queſta ne' dì 4., e 5. a' gr. 4 $\frac{1}{2}$. Le guazze delle notti furono frequenti . Nel luogo delle mie oſſervazioni non ſi era veduto per fino allora malattìa alcuna delle più dannevoli . Tutt' i ſemi vi erano ben nati: non così ne' campi aperti, dove già ſi ſcoprivano i ſegni di molte malattìe. *Farfalle* , e *Moſche* di varie ſpezie ſi vedevano ſingolarmente, non che *vermi* parecchi, che ogni dì poi crebbero a diſmiſura .

6. Dopo il giorno 12. di Maggio ſi fece anche nel mio *Oſſervatorio* conoſcere qualche malattìa . Si era ſparſo il *grano carbone* nelle *caſelle* XI. XII., dove erano pure delle ſpighe di *filiggine* , e molte altre ſpighe attaccate dalla *ruggine* , e nella XII. in oltre ſi vedeva *Loglio*, *Veccia*, ed altre *erbe etero-*

genee, ma pochi vi ebbero *Insetti*. Verso la metà del mese piovve alquanto; e quando il Sole entrò nel segno de' *Gemelli*, si rasserenò il Cielo, e per lungo tempo non vennero altre piogge. I venti di *Levante*, di *Mezzodì*, e di *Tramontana* fra loro gareggiarono, e l' uno all' altro succesſe a vicenda. Il *Termometro* arrivò a gradi 7. sopra il zero nel giorno 29., e si abbassò più di 3. sotto il medesimo nel 21.. L' altezza del Mercurio nel *Barometro* non fu maggiore di pol. 27. lin. 11. ne' dì 2., e 3., nè minore di 27. 4. nel 17.

7. Ne' primi giorni di Giugno un vento impetuoso di *Mezzodì* superò ogni altro, e dominò per tutto esso mese, quantunque si facesse talor sentire un *Ponentello*, che condusse ne' dì 25., e 26. la pioggia. Il *Termometro* solevossi nel dì 24. sopra i gradi 12., e nel dì 2. si era veduto a' 6. I termini della maggiore, e della minore altezza del *Barometro* caddero nel dì 2. di 27. 10., e nel dì 25. di 27. 3.. La *ruggine* si dilatò in questo mese sopra il seminato delle *Caselle* I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X., e vi nacquero anche *Insetti*, ed *erbe eterogenee*. Poche spighe dettero le VI. VII. VIII.. Ma la *ruggine*, non meno che l' altre malattìe tutte, erano sparse nella mezza Primavera, e appoco appoco cresciute sopra i frumenti delle campagne del *Territorio Ravennate*.


CA-

a car. 59

SEMINAZIONE

III.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Grano dell' anno 1749. traſcelto, e preparato con *zolfo*.	Grano colto da luogo, dove altra malattìa non era, che la RUGGINE.	Grano bucherato dagl' Inſetti, e lavato con *orina*.	Grano tratto da ſpighe, che portavano anche de' grani di GHIOTTONE.	Grano tratto da ſpighe offuſcate, e riarſe, divenuto molto aſciutto, e aggrinzato, e riſtretto.	Grano ſecco primacchè perfezionato, il quale era ſtato percoſſo dalla RUGGINE.
VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Grano tratto da ſpiga buona, ma da ceppo, le cui altre ſpighe erano di puro grano CARBONE.	Grano ſecco per forza, e in parte corrotto, e guaſto.	Grano di ſpighe buone, ma di ceppo, che molte ſpighe aveva di GHIOTTONE.	Grano tratto da ſpiga alquanto FILIGINOSA nella cima.	Grano traſcelto da grano, ch'era miſchiato con ſemi d' altro genere.	Grano miſchiato colla polvere della FILIGGINE, e del grano CARBONE e con altri grani.



CAPITOLO IV.

Sperimentale Seminazione del 1754.

SEMINAZIONE IV.

Fu queſta in un campo contiguo alla Città dalla parte di *Sud-Oueſt*, dove la benivolenza del ſoprallodato *Cavaliere*, a cui apparteneva, mi permiſe, ch' io faceſſi pure le mie comode oſſervazioni, dopo aver laſciato, che più volte le replicaſſi nell' *Orticello* ſuo circondato da fabbriche.

Oſſervazioni generali dell' anno 1755.

1. AVendoſi avuto nel 1754. un Autunno anzi dolce che no, e accompagnato da alcune piccole piogge, non tardò la ſeminazione a farſi vedere, ma crebbero con eſſa molte erbe autunnali. Entrato l' Inverno, il freddo non fu grande, talchè in Dicembre lo *ſpirito di vino* nel *Termometro* non ſi depreſſe più di $1\frac{1}{2}$ ſotto il zero; ma piovve quaſi tutto queſto meſe.

2. Anche nel Gennajo del 1755. ſi ſoffrì poco freddo, nè diſceſe lo *ſpirito* ſotto il zero più di 3. gradi. Il *Barometro* s' innalzò per fino a 28. 6. nel dì 30., e ſi era abbaſſato a' 27. 5. nel 16., nel qual giorno fece piccola piova, altra non eſſendovene ſtata in altro giorno di queſto, o del ſuſſeguente meſe, in cui molto dominò la *Tramon-*

tana. Quantunque il Sole in Febbrajo si facesse vedere, spesso però venne oscurato dalle nebbie, che molto si fermarono sull' *Orizzonte*. Alla fine di Febbrajo l' orme si svelarono della *ruggine*, e del *giallume* sulle biade, e di molti *Insetti* sopra le loro radici. Furono giornate così belle, così chiare, e così quiete, che sul mezzo giorno si sentiva, per così dire, l' odor della vicina Primavera.


3. Nel Marzo, nell' Aprile, e nel Maggio resse l' asciutto, e se cadde in ciascun mese qualche poco di acqua, fu così tenue, che bagnò appena il terreno. In Marzo crebbe nel dì 29. lo *spirito* nel *Termometro* a' gradi 5. sopra il zero, in Aprile nel 30. a 6. $\frac{1}{2}$, in Maggio nel 28. a 7. $\frac{2}{3}$. S' alzò il Mercurio del *Barometro* in Marzo ne' dì 2. 3. e 4. a 28. 1., e si depresse il dì 24. a 27. 3., in Aprile questi due estremi furono nel dì 3. di 28. 2., e nel 5. di 27. 5., in Maggio nel dì 6. di 28. 0., e ne' 25., e 26. di 27. 5.. Fra' venti superarono sempre quelli di *Mezzo giorno*. Poco *ghiottone* uscì fuora, ma però molto *carbone* generalmente, e molta *filiggine* dalla parte massime delle *Valli*. Nella mia seminazione conobbi alla metà di Marzo il *grano carbone* a' numeri I. II. III. VIII.. Poco ne avevano l' I., e l' VIII., e moltissimo il II., e il III.. Al IV. v' era la *filiggine*. Nel V. non nacque frumento, ma solo nacquero *erbe eterogenee*. Il VI. ebbe *filiggine*, e molt' *Insetti*. Il VII. portò grano ottimo senz' altra malattìa, che *Insetti*, ed *erbe eterogenee*. Nulla si vide nel IX., che

a car. 61

SEMINAZIONE

IV.

I. Grano del 1752. alcun poco intarlato.	II. Grano del 1753. di cattiva qualità.	III. Grano del 1754. di cattiva qualità, tenuto in *acqua di arsenico*.	IV. Grano nel 1750. traſcelto, e preparato con *acqua di calce*.	V. Grano GHIOTTONE con grano CARBONE.	VI. Grano miſchiato con grano CARBONE ſtato in ſalamoja *di alume*.
VII. Grano di ottima qualità.	VIII. Grano del 1753. tratto da grano con molto CARBONE tenuto nel ſugo dell' erba *ſedo*.	IX. Grano tratto da una ſpiga quaſi vota.	X. Grano di ottima qualità miſchiato con polvere di CARBONE.	XI. Grano con CARBONE miſchiato con *polvere di chiocciole tenuto nell' acqua*.	XII. Grano di cattiva qualità miſchiato con *polvere di guſcio d' uovo*.



che foſſe grano; e nel X. non ſi vide pur un gambo di *grano carbone*, ma sì bene la *ruggine* abbondantemente. L' XI. dette qualche ſpiga con *grano carbone*, e il XII. alcuna con *ghiottone*. Nel Giugno ſi manifeſtarono al n. III., oltre i grani del *carbone*, quelli anche del *ghiottone*, ed altre malattìe.

4. Ho notato in tutti queſti anni il calore eſtivo eſſere al freddo jemale, come 34. ad 1. in circa. Queſte ſeminazioni medeſime io feci nello ſteſſo tempo in luoghi diverſi; ma gli effetti non corriſpoſero poi a una tale diverſità.

CAPITOLO V.

Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno la *ruggine del grano*.

1. PErchè tutti gli effetti della *ruggine* non ſi paleſano a un tratto, quindi mi è avvenuto di oſſervarli in tempi, e in luoghi diverſi, come ora qui mi faccio con ogni candore a riportare.

2. Alla metà di Maggio del 1751. moltiſſimi gambi, e ſpighe di grano dalla parte ſuperiore di un campo all' *Occidente* della Città furono tinti improvviſamente di un umore giallognolo, che nel mattino conſervava l' umido, e nel giorno aſciugavaſi. Vidi ſopra i gambi certe *ſtriſce*, o canaletti, i quali appoco appoco oſcurandoſi, alla metà di Giugno rimaſero quaſi abbronzati, e le ſuperficie eſteriori di eſſi gambi, e le reſte delle ſpighe ſi ſeccarono, ma non per modo, che i granellini

ne

ne patiſſero notabilmente, eſſendoſi ſolo alcun poco riſtretti, e diminuiti di mole. I legumi ne patirono maggiormente, e maſſime le *Fave*, i gambi delle quali erano divenuti neri, e parevano già ſecchi. Le viti furono nel tempo ſteſſo macchiate di roſſo cupo, e le foglie de' Mori ſi videro intriſtite, e ſpruzzate di pavonazzetto. Queſta *ruggine* della prima ſpezie non fece putir le foglie di alcun albero, come avrebbe forſe dovuto, ſe il ſentimento del Signor HALES nella ſua *Statica de' Vegetabili* foſſe generalmente coſtante, perchè in quel tempo furono nebbie fieriſſime.

3. Una *ruggine* improvviſamente apparve della prima ſpezie nel cominciar di Giugno del 1753. nella villa di *San Marco*. Erano ſtate colà nella fine di Maggio fioritiſſime le campagne, e il grano in erba già molto alto, e vegeto. I *Zefiri* medeſimi pareva, che aveſſero ambito di ſcherzarvi intorno, quando eſſi ceſſarono, e la *ruggine* lo colpì. Queſta non s' inſinuò ne' gambi, ma attaccò le ſpighe ſegnatamente, apportando a' grani, che contenevano, non affatto maturi, molto nocumento, col privarli della loro groſſezza, della quantità della loro paſta, e del loro colore ordinario. Sopra i gambi, e le foglie colpiti ſi oſſervavano le umide bolle, e le lividure di un colore, che tendeva al roſſo più, o meno carico, e alcune erano foſche, per modo che ſembravano nere. Molti gambi allora ſcoſſi dal vento ſi ruppero.

4. Improvviſa fu anche quella della ſeconda ſpe-

ſpezie, che io vidi la mattina del dì 29. Maggio diſteſa ſopra le gambe, e le foglie, e le reſte del grano. Tav. I. Fig. 1. 2. 3. 4.. Un umore viſcoſo, o ſia un marciume giallognolo apparve prima, e poſcia una polvere granelloſa fra eſſo umore, ſimile alla roſura de' *Tarli*, di color giuggiollino carico, che paſſava da una parte, e l' altra di quelle foglie, e s' inſinuava ne' gambi, corrodendone le fibre. Non ſempre però ho veduto all' umidità viſcoſa, talor nera, e talor anche di vivo giallo colorita, andar del pari la polvere granelloſa. Quantunque in quel dì foſſero ne' campi molte ſpighe egualmente infeſtate da queſta polvere, alcune portavano granelli di ottimo grano, altre ne avevano di *grano carbone*, quali di *ghiottone*, e quali altre di *grano voto*, non mancandone alcune con *vermi*, altre con *giallume*, ed altre con altri morbi differenti. Or io ſtando ad eſaminar con attenzione la figura della polvere *rugginoſa*, e le corroſioni, e le feſſure, che nelle pianticelle aveva impreſſo, mi parve di veder in quella materia, non ſenza opera del *microſcopio*, de' piccoliſſimi *Bacherozzoli*, de' quali molti ſtavano appiattati tra tunica, e tunica de' gambi medeſimi. Diſſi, che mi parve di veder *Bacherozzoli*, perchè quegli animaletti, che ivi erano, molto analoghe avevano le loro fattezze a' *vermi*, ſebbene per altro gli conoſceſſi per *Bruchi*, e da loro uſciſſero poi *Farfalle*, e non *Moſche*, onde chiamar ſi potrebbero in latino *erucae vermi-formes*. Queſti *Bruchi* dunque, non anche, a quello che io credo, oſſervati,

era-

erano di varie grandezze, che non oltrepaſſavano tuttavia quella di un quarto di linea del piede di *Parigi*, e ad occhio nudo poco ſi diſtinguevano da' grani della polvere rugginoſa, tantoppiù ch' eſſi ſtavano immobili lungo tempo in mezzo a tal polvere. Col ſoccorſo del *Microſcopio* mi comparvero di color verde - giallo dilavato, tutti tempeſtati di macchiette roſſigne, Tav. I. Fig. 5. 6. 7., e con bell' ordine lungheſſo il dorſo, e lungheſſo il ventre diſpoſte, e, come ſuole per lo più in tali eſperimenti d' *Inſetti* addivenire, le loro interiora traſparivano dal diafano corpicello. Che ſe alcuno di eſſi veniva ſeparato dalla pianticella, onde mangiar non poteſſe, ben toſto per bianco ſcorgevaſi, e non pareva più deſſo, ma tutto cambiato da quel di prima, gracile, e ſmunto. Una catena di dodici ſegmenti, o zone, o anelletti faceva tutto il loro corpo, e queſti anelletti erano più diſtinti, e più rilevati di quelli delle *Rughe* ordinarie, ma l' ultimo di eſſi, che chiude il ventre inferiore, terminava in una ſpezie di *paraboloide*, e il primo della parte anteriore finiva nel breve capo bianchiccio, e diafano, formato di due pezzi a guiſa di due berettini di color ſudicio, e ſimile alla *Calcidonia* oſcura, i quali pezzi vengono diviſi da una linea di color meno carico, e portano ciaſcheduno nel mezzo da una parte, e dall' altra del capo, un piccol occhio, come congetturo per due macchiette nere. Gli altri dieci anelli ſono circondati da 14. ſpuntoncini di peli, alla ſommità de' quali ſpeſſo attaccan-

candoſi la polvere rugginoſa , vengono a preſentare un vago ordine di corone cimate di pallottoline . Alcuni di queſti *Bruchi* hanno gli ſpuntoncini attaccati ſopra certe prominenze fatte a guiſa di quelle degli *Echini marittimi* , ed altri non l' hanno . Quelli , che ne ſono adorni , ſviluppano le piccoliſſime , e altrettanto leggiadre *Farfalline* femmine di queſta ſpezie , e quelli , che ne ſono privi , ſviluppano i maſchi . Per levarmi ſopra ciò qualunque ombra di dubbio , che faceva temermi qualche illuſione del *Microſcopio* , ne ho poi fatte molte , e diverſe eſperienze , e mi ſono ſempre tornate a puntino . Di 16. gambe del color medeſimo del corpo ſono eſſi forniti , e le due prime ſcaglioſe , vicine a' tronchi de' berrettini del capo , ſono più corte di tutte l' altre , le due ſeconde più lunghe delle prime , e le terze più delle ſeconde . Il primo pajo delle membranoſe non è ſeparato dalle ſcaglioſe , come nelle ordinarie *Rughe* , per mezzo di qualche anello ſenza gambe , ed è compoſto di cinque fucili , e tutte l' altre paja di quattro ſolamente ; ma l' une , e l' altre gambe con grandiſſima difficoltà ſi ſcoprono . Dopo che ſi ſono ſpogliati la terza volta , gittando la loro buccia , ſi direbbero quaſi di ſpezie diverſa da quella , che ho deſcritta , perchè il dì 2. di Giugno alcuni di loro ſi ſpogliarono per eſſa terza volta , e mi ſi fecer vedere tutti bianchi ſudicj , trattone le prominenze , ch' erano un poco più colorite , e gli ſpuntoncini di color biondo , e ciò più volte mi è accaduto di

oſſervare . Or io non ſaprei dire a qual Claſſe delle *Chenilles* del Signor DI REAUMUR ſi poteſſero attribuire , non volendoli mettere fra le minatrici , perchè ſi aprono bensì delle ſtrade ſopra i gambi , e le foglie , ma queſte ſtrade ho ſempre vedute ſcoperte . Ne ho nutriti molti colle foglie , e co' gambi di *orzo* egualmentecchè di *grano*. Una mattina a buon' ora ne trovai alquanti de' minutiſſimi, e pallidiſſimi, i quali , avendo abbandonato l' antico nido del gambo , vagavano in qua, e in là per le foglie , delle quali pure ſono ingordiſſimi divoratori . Eſſi amano certo il grande umido , perchè , quando è alto il Sole , ſtanno naſcoſti , e la mattina di buon' ora ſolamente per *nebbie* , e per *guazze* ſi veggono . Ne miſi alcuni a notare nell' acqua, e non ſolo non morirono in eſſa , ma non parve nemmeno , che ſe ne ſentiſſero male. Non infettano ſempre tutta la pianticella del grano, perchè io oſſervai nel Giugno del 1755. queſti Animaletti in un campo della villa di *Piangipane*, nel quale avevano attaccato i ſoli gambi , quantunque l' umor viſcoſo innondat' aveſſe tutta quella meſſe. Mi ſono avveduto più volte , che due, o tre di eſſi baſtano per picchiare un gambo intero , e corroderlo . Parlerò altrove delle metamorfoſi di queſte *Rughe* , giacchè in altri tempi ne ho fatte le oſſervazioni . Scoperſi , ch' eſſe naſcevano da *uova* preſſocchè inviſibili , e traſparenti , com' è l' *ambra* , le quali ſono depoſte ſotto le foglie da una piccoliſſima *Farfallina* . Sfuggì queſta

queſta oſſervazione a quel LEEUWENHOEKIO, che co' ſuoi mirabili vetri vide anche ſul grano in erba coſe a tutti inviſibili; ma forſe in *Olanda* così fatto *Bruco* non trovaſi. Qui potrebbe naſcere la difficultà, s' egli quel deſſo ſia, che il VALLISNIERI nomina nel ſuo Trattato *degli ſviluppi, e del coſtume ammirabile di molti Inſetti*, come cagione della *ruggine*; ma troppo diverſo è il mio dal ſuo *Bacherello*, e troppo diverſi ne ſono i genj per non crederli affatto tra lor ſomiglianti, come in quell' Autore ſi può vedere. Le corroſioni dell' *Inſetto* da me deſcritto ſono nell' eſterior buccia dello ſtelo, della foglia, e della reſta, da cui il verme fa uſcire certa materia, ch' è ſimile a quella, che producono i *Tarli*. Queſte corroſioni non camminano ſempre di alto in baſſo, ma ſono ſpeſſe fiate traſverſali, e talora al piano ſottopoſto inclinate. E certo è, che nella *ruggine* della prima ſpezie, in quelle macchie roſſigne cupe, che riardono, abbruſtiano, e inſteriliſcono la pianticella del grano, e che attaccano ogni altra pianta, benchè più e più volte io aguzzaſſi le ciglia, non mi è ſtato mai poſſibile di veder polvere granelloſa alcuna, nè verme, nè corroſione verminea. Queſto ſi trova ſolo nelle umidità craſſe, e viſcoſe (75).

[75] Ella non è forſe molto diverſa da quella *rugiada vermicoloſa*, da cui reſta ſorpreſo, al dire di FEDERICO HOFFMANNO *Medic. ration. ſyſtem. T. 2.*, il *cavolo creſpo*, che, ſe in quel tempo ſia mangiato, eccita ſpeſſo la diſenteria. Un tal male è veriſimilmente quello, che i *Tedeſchi* chiamano *mehlthau*, avendo una tal denominazione ricevuto dall' eſſere que' vermi ſimili a' bacherelli del formag-

5. Ho conoſciuto mediante l' analiſi chimica, che dalla *materia umida rugginoſa* ſpogliata della roſura degl' *Inſetti* ſi ricava un *liquore acido* in ſommo grado, del *Sal volatile concreto*, e non piccola quantità di *terra*, ma unito ad eſſa roſura dà indizio di contenere un poco di *ſpirito urinoſo*. V' ha al contrario un' altra *materia rugginoſa* meno denſa, e più umida, la quale dà un *liquore alcalico* con alquanto di *terra*; il che anche ſi ricava dalle ordinarie *guazze*, e *rugiade*.

6. Merita d' eſſere avvertito, che nel 1751. le *ruggini* ſi dilatarono ſingolarmente nelle parti più alte del *Territorio Ravennate* verſo *Filetto*, e la *Coccolìa*, e in alcuni campi molto baſſi vicino alla *valle di Claſſe* niun indizio apparve di tali malattìe. Queſto medeſimo ho molte altre volte veduto, per cui ſe non reſta ſpogliata di autorità quella

formaggio, i quali chiamano *mulben*, o *mullen*, onde ſia ſtato mutato *mullenthau* in *meblthau*. Eſſi hanno, come tutti gl' Inſetti, certo ſale cauſtico, che corrode, e perciò nuoce alla ſalute. E chi ſa, che queſti Inſetti non aveſſe veduti anche TEODORO, quando ſcriſſe χαλκόμιυος κράμβος, *hoc animal aerugini ſimile*, e che perciò lo SCALIGERO *Com. in ſex. l. de Cauſ. Pl. Theoph. l. 5. c. 7.* ragione alcuna non aveſſe di ſcrivere: *nullum animal eſt, qui aerugini ſimile*. Ma comunque ſia, è qui d' avvertire, che l' opinione de' *vermi peſtilenziali* non è coſa nuova. La miſe in gran lume il Padre CHIRCHER, e la promulgò, come vogliono alcuni, prima di lui AUGUSTO HAUPMANNO col trattato *De viva mortis imagine*; e prima di tutti ne ſcriſſe PIER GIOVANNI FABBRI Chimico, e Medico di Montpelier nella *Patologia*, come nota il Cavalier VALLISNIERI nella *Nuova idea del mal contagioſo de' Buoi*. Anch' eſſo il Signor FRANCHI in una lunga Prefazione al LANGIO per confermare, che molti mali riconoſcono la loro origine da' vermi di varie ſpezie, cita un popolo di Autori, che di ciò parlano, e cita anche il Signor CRISTIANO PAOLINI, che con molta erudizione altri, e poi altri ne riferiſce.

quella comun' opinione , che le *ruggini* fieno frequentiſſime ne' luoghi particolarmente baſſi , e non purgati da' venti , e che ſe ne preſervino gli alti , e dominati dal vento (76) , almeno non meriterà , che in lei ſi faccia quel fondamento , che ſi pretende .

7. Pernicioſe ho vedute ſpeſſo le *ruggini* nella fine di Aprile , in Maggio , e in Giugno , quantunque gli Antichi abbiano per tali riputate quelle ſole , che ſuccedono in fine d' Aprile , o anche quando il Sole è alla metà del *Toro* (77) .

8. Fannoſi per lo più in notti , che ſi poſſono riputar fredde a proporzione della temperie del giorno . Nel dì 24. Maggio del 1754. trovavaſi il mio *Termometro* a' gradi 4. ſopra il termine della congelazione . Nell' entrar della notte cominciò a diſcendere , e diſceſe tanto , che allo ſpuntare del dì era giunto al termine predetto ; ma il

(76) THEOPH. *De Cauſ. Plant. l. 3. c. 27.: Locis enim cavis, & a flatu ſilentibus ſegetes rubigine infeſtantur* . E più ſotto : *ſegetes vento expoſitae minus ea infeſtantur ;* la qual propoſizione più giuſta ſembra della prima , e così quella *l. 4. c. 15.* : *Locis editis , comodeque perflatis , minus rubigo creatur ; In cavis vero , rorulentiſque magis* . E quindi PLINIO XVIII. 17. : *Frequentiſſima haec in roſcido tractu , convallibuſque , ac perflatum non habentibus . E diverſo carent ea ventoſa , & excelſa .*

(77) Notò PLINIO XVIII. 29. , come ſi è veduto , che *Rubigalia Numa conſtituit anno Regni ſui XI. , quae nunc aguntur ad VII. Calend. Maii* [che ſono il dì 25. di Aprile] *quoniam tunc fere ſegetes rubigo occupat* . E VARRONE *R. R. l. 1.* ſcriſſe , che la *ruggine* ſi genera quando il Sole è nel mezzo de' gradi del Toro , e ſe a caſo in queſto tempo ſucceda il Plenilunio , e i grani ſi trovino in fiore , che non ſolo i frumenti , ma tutte le biade fieno perdute : *ſi in hoc quatriduum inciderit Plenilunium , fruges , & omnia , quae florebunt , laedi neceſſe eſt .*

il giorno, che ſucceſſe, egli ſi rialzò dopo mezzodì a' 6. gradi ſopra il medeſimo termine, eſſendoſi nel mattino veduta la *ruggine* della prima ſpezie. Così un' altra degli 11. Giugno del 1755. fu dopo una notte, al finir della quale il liquore del *Termometro* era diſceſo gradi 7 ½, vale a dire ½ ſotto la congelazione, laddove nel giorno venturo poco dopo mezzodì fu ſopra di eſſa per 5. gradi, e ½. Con ſimile varietà di caldo, e di freddo altre *ruggini* ho oſſervate. E' ben vero, che quelle della ſeconda ſpezie ſono ſempre accadute in giorni, ne' quali le diſceſe, e le ſalite del liquore nel *Termometro* avevano minore differenza. Ho notato più volte per coſa coſtante, che quando queſte differenze non erano ſenſibili, le *ruggini* non erano pure ſenſibili. Ma non ho potuto determinar preciſamente la differenza dell' intemperie, che debba averſi tra la prima, e la ſeconda *ruggine*. Chi voleſſe tuttavia avventurare una congettura, mettendola come 4. a 3., non andrebbe forſe molto diſcoſto dalla verità.

9. La *ruggine* di prima ſpezie con molta difficoltà, e forſe mai ſi comunica a' gambi, che ne ſieno ſtati colpiti, quantunque i ſani ſi combacino ſtrettamente con gl' infermi, laddove la *ruggine* della ſeconda ſpezie ſi comunica con facilità, quando i gambi ſi facciano per alquanto tempo combaciare inſieme.

10. Separai con la punta acutiſſima del temperino l' epidermide di alcune foglie ne' luoghi, ſopra

ſopra i quali una *ruggine* della prima ſpezie nel dì 7. di Maggio era nata , onde le parti non turbavano il loro ſito ; ne ricercai col *Microſcopio* i condotti del liquido inviſibili ad occhio diſarmato , e vi applicai altresì per ſicurezza maggiore della oſſervazione diverſe *Lenti*, guardando eſſi condotti in diverſe ſituazioni (78) . Sempre io vidi i tronchi ſottopoſti alle macchie , come ſe foſſero oſtrutti , laddove quelli a loro non ſottopoſti erano ripieni dell' ordinario umore. Conſiderai anche col *Microſcopio* ne' gambi percoſſi da queſta ruggine le fibre ſpirali , che paſſano , per eſſere quelle dell' aria , e le ritrovai rotte . So , che il Signor di FONTENELLE rivocò in dubbio le trachee delle piante , e degli alberi , onde quelle da me oſſervate potrebbero cadere ſotto queſto dubbio , ma perciò appunto io parlai delle fibre, che paſſano ſotto un tal nome . Per altro io tengo di molto probabile, che in tutte le piante vi ſieno , giacchè nella vite ſi diſtinguono eſſe con occhio anche diſarmato chiaramente.

11. Raccolſi un dì certa quantità di quell' umor craſſo , e viſcoſo , che ſi trova nelle *ruggini*, la miſi a fuoco gagliardo in una ritorta di vetro ben lotata , e chiuſa , e ſubito ſi liquefece , e diventò bigia ; meſſa al Sole per alquante ore indurì , e macinata ben bene ſopra un marmo ven-

ne

(78) Uno de' microſcopj, che io adoperai, mi rappreſentava il diametro dell' oggetto dieci volte maggiore di quello, che mi appariva coll' occchio ſpogliato, ond' io contava di vedere la ſua ſuperficie per ben 200. volte, e il ſuo corpo 4000. volte maggiori di quello, che naturalmente dimoſtrava.

ne di un colore pallidetto tirante al cenerino.

12. Dopo alcune *ruggini* di Giugno esaminati di buon mattino i tronchi del fugo più vicini alle percosse, non mi fu possibile, neppure con acuto *Microscopio*, di scoprirvi per entro gli accennati ristagni. Vi scopersi bensì le fibre qua, e là rotte, non altramente che si faccia nel legno putrido. Era la *ruggine* tutta quasi esteriore, e la secca umidità giuggiolina si distendeva in alcune parti, come se vernice fosse, ma poco sensibili oltre la epidermide si manifestavano le offese.

13. Erano al fine del dì 11. di Giugno le pianticelle del grano bagnate di un umor sottile, e vaporoso, il quale pregiudizio alcuno per anche non aveva lor recato, ma poco dopo mutò loro il colore, e tutte le tinse di giallognolo. Venuto il Sole, egli si asciugò, e quelle rimasero abbronzate. Ho veduto altre volte questa umidità, o *rugiada*, o *nebbia* sottile (79) non affatto asciutta, e che a tignere cominciava la pianticella. Per assicurarmi, ch' essa, e non altra umidità fosse atta a produrre questo effetto, molte foglie asciugai diligentemente, e poscia ne aspersi alcune di acqua comune, altre di acqua piovana, e tutte andarono illese da questa *ruggine*, ma le contigue dalla umidità notturna bagnate ne rimasero in-

(79) ALCINA, Poeta Lirico, e MACROBIO scrissero, per testimonio di ALCMONE, e di BOCCACCIO *Genealog. degli Dei*, che la *rugiada* è Figliuola della Luna, e dell'aria; e vollero dire, che nasceva di notte, e ISIDORO insegna, che *ros* fosse nominata *a raritate*, per non essere di sua natura crassa, come la pioggia.

infette (80). Mi è accaduto più volte di esperimentare, che le *guazze* delle notti, nelle quali il *Termometro* discendeva due gradi in circa sotto del zero, e il giorno innanzi era asceso per fino a' quattro, sono più agli uomini pernicioſe, che al grano; perchè non fanno *ruggine*, ma ne sentono la forza quelli, che camminano pe' campi, e per gli prati a piedi nudi, quando le loro carni si fanno aspre, e si corrodono.

14. Nel dì 28. di Maggio un' ora dopo mezzodì il mio *Termometro* era a 4 $\frac{1}{4}$ sopra il zero. Allo spuntar del giorno venturo venne a $\frac{1}{4}$ sotto esso punto, e un' ora dopo mezzodì del medesimo giorno s' innalzò a 5 $\frac{1}{4}$. Nella mattina di questo giorno mi apparve la sopra descritta *ruggine* della seconda spezie; ma senza que' vermicciuoluzzi, e senza quella polvere granellosa, che ordinariamente vi si vede.

15. Io stava una mattina di buon' ora osservando la *ruggine* del giorno antecedente ripiena di vermicciuoluzzi, rinvenuta molto per la *rugiada* della notte, e maneggiando quelle foglie, e que' gambi, sopra cui era, mi sentiva una straordinaria debolezza di nervi, la quale crebbe, di modocchè fui costretto a partirne. Più volte già nelle ore mattutine in diversi luoghi delle mie osservazioni era stato attaccato da questa debolezza; ma,

[80] Di questa natura io penso, che fosse la *nebbia*, che osservò il Signor AUSTIN DI CANTORBERY, la quale, per quanto riporta il Signor HALES *Stat. des Veget. chap.* 1. *ex.* 9., cade ordinariamente verso l' undecimo giorno di Giugno, e verso la metà di Luglio, e rende le foglie nere, e le fa putire.

tali osservazioni essendo state brevi, presto me n' era liberato, e per nulla io aveva contato quella molesta sensazione. In quest' ultima fiata, che lunghe furono, la dose crebbe notabilmente, ed io stetti poco bene alquanti giorni. Quelli, che meco erano, e che vollero maneggiare le stesse foglie, patirono i medesimi incomodi (81). Considerabile effetto altresì della *ruggine* è la strage, che spesso ho veduto portarsi a quegli animali, che dell' erbe rugginose si pascono.

16. Molto umor crasso, e viscoso della *ruggine* della seconda spezie, che certamente è alquanto diverso dalla *guazza*, o *rugiada*, che si coglie co' piatti (82), io ragunai, e così di fresco ragunato, e perciò anche liquido, e subito che sulle foglie è apparso, feci passare per tela bianca, e fina. Non restò molto chiaro, ma di un colore, che dava nel giallo, e s' accostava a quello dell' *orina*. L' ebbi non poche volte nella Vil-
la

(81) Si ha dal LANGIO *Descrip. Morbor. ex esu clavorum secalinorum cum pane* cap. 15., che la *ruggine* fa danno agli Uomini: *Tandem & homines habent, cur ad ea sibi caveant, dum non solum ex esu fructuum, herbarumque venenatarum morbis gravissimis se exponunt, verum etiam quando depluente rubigine in libero aere commorantur, aut nudis pedibus per gramina, ea humectata, circumambulant*. Il che viene confermato in *Acta Physico-Medica Academiae Caesarae Leopoldino-Carolinae Naturae curiosorum*. Vol. 2., dove per la Storia naturale v' ha l' osservazione 57., nella quale si dice, che la *ruggine* è nociva alla sanità; e v' ha in oltre all' osservazione 134., che si trova una *nebbia mortifera*. Ma dell' anzidetto esperimentato effetto di debolezza nel corpo umano non so, che alcuno abbia fatto menzione.

(82) Tra le Dissertazioni di HUET si legge una lettera, nella quale è provato, che la *rugiada* non cade, ma s' alza. Uno degli

là di *Santo Stefano*. Procurai di farne imputridire in vasi di vetro ben chiusi, e posti in diversi caldi, come di *letame*, di *forno* temperato, e di *Sole*; ma non ne ho avuto l' intento, perchè il caldo piuttosto lo chiarificava, e lo conservava di grato sapore, ancorchè l' operazion continovassi per più di un mese. Al contrario lasciato in una stanza ombrosa senza raggio di Sole per alquanti giorni, si putrefece da se medesimo, e putiva terribilmente.

17. Raccolto il più di *umor rugiadoso* ne' luoghi bassi vicini al *Ponte nuovo*, lo feci putrefare, e passato per tela lo collocai in un vetro ben chiuso al Sol gagliardo. In breve d' ora vi si videro per entro de' picciolissimi vermi a foggia di coni, i quali sguizzavano da ogni parte. Dopo alcuni giorni il vetro si riempì di *Zanzare*, e tutti quasi gli animaletti acquatici scomparvero, lasciando alcune delle loro pellicole vote sopra quel liquido, onde io potetti argomentare, che quelle traessero origine da questi (83). Varie acque sta-

gli Autori, che hanno molto illustrata, e promossa questa opinione, è stato CRISTIANO LODOVICO GERSTEN nella Dissertazione *Roris decidui errorem antiquum, & vulgarem per observationes, & experimenta nova excutiens* stampata in Francfort nel 1733.. Lo STOLTERFOHT, Medico di *Lubeca*, nel suo Trattato insegna di raccorre la *rugiada* di Maggio con piatti di vetro, e fu dall' ETMULLERO approvato, e seguitato, siccome da altri. Co' dischi di terra io ho creduto di poter ottenere lo stesso, scegliendo un luogo, che durante il giorno fosse stato lungamente esposto al Sole, una notte serena, e fresca, e un terreno umido.

[83] Una simile osservazione fece il Signor TOMMASO HENSHAW, Gentiluomo Inglese, sopra la *rugiada* di Maggio, e questa fra molte

gnanti del *Ravennate* alimentano sì fatti *Insetti*, da cui vengono *Zanzare* (84). Molte di queste ho vedute ne' mesi di Maggio, e di Giugno fra' grani in erba, e specialmente in luoghi vicini a' sopraddetti stagni, e mi hanno alquante volte incomodato molto nelle mie osservazioni. Nulla di tuttocciò in altri tempi ho scoperto intorno a questo *umor rugiadoso* (85).

18. I varj esperimenti per ricercare la natura dell' umidità velenosa delle *ruggini* usati dal RAMAZZINI (86) non mi hanno prodotto quell' effetto, ch' egli pretende. Ho asperso con varj liquori

te altre si riporta nel terzo Giornale d' Inghilterra del 1665. Da due boccali di questa *rugiada* putrefatta prima, e passata poscia per tela, e lasciata molte settimane sopra una finestra a mezzo giorno battuta gagliardemente da' raggi del Sole, ebbe per ultima deposizione una terra bigia, la quale calcinata, e ripassata più volte dette finalmente circa due once di sal bianco fino, e sottile. Egli trovò pure in certa quantità di questa *rugiada* posta a putrefare una massa di quegl' *Insetti*, che gl' Inglesi chiamano *Hog - Lice*, o *Millepedes*.

(84) Un sapientissimo Prelato diede avviso al VALLISNIERI di aver egli stesso veduto nuvoli d' infinite piccole *Zanzare*, e quasi invisibili, volanti, e uscenti dalle *Paludi*; il che dette a questo Filosofo occasione di riflettere, ch' *esse fossero probabilmente, come quegli sciami di minutissimi Insetti, che uscivano da simili Paludi notati da Varrone, e da Columella*.

(85) Molto tuttavia senza distinzione alcuna di tempi scrisse della forza della *rugiada* nelle sue dottissime Animadversioni il Signor GIUSEPPE LANZONI, Medico Ferrarese, e fece vedere, che in tutti i climi ella è accompagnata da quantità di liquor volatile salino, onde per egregio mestruo la commenda. Dalla medesima dicono alcuni cavarsi anche uno *spirito*, che sia efficace a dissolvere i metalli, del quale *spirito* si serviva il CNOSELLIO a preparare la *tintura di coralli*.

[86] RAMAZZINI *Differ. de Constit. an. 1690. in Mutin. Civit., & illius Dit.*

quori ora acidi, ora alcalici, e liſciviali le foglie del grano in erba, e i gambi loro per vedere qual colore poſcia ne derivaſſe. Dagli ſpruzzi dello *ſpirito di vitriolo* non mi apparvero macchie gialle, come da lui ſi volle, ma piuttoſto cenerognole, e del colore di marciume bianchiccio; le quali macchie non nego, che certa nebbia innalzata in certi tempi da' terreni paludoſi, o pendenti a natura di palude non poſſa cagionare, perchè io più volte l' ho eſperimentato ne' luoghi della Villa di *Campiano* vicini alle *Valli*.

19. Quantunque l' eſiſtenza del *Sal volatile nitro-aereo* da neſſuno ſia ſtata giuſtamente dimoſtrata, come afferma il BOYLE (87), certo è tuttavia, che delle particole ſaline altre ſono in luogo d' eſempio vitrioliche, altre alcaliche, e che l' une, e l' altre poſſono corroſione apportare. Per quant' eſperienze io abbia fatte, non ho potuto determinare ſicuramente a quali di queſti generi appartenga la *ruggine*. Di alcuni *ſali* per verità difficilmente ſi può determinare la loro natura, e ſono ſenza nome, perchè a noi finora ignoti, come quello per eſempio, che produce la corroſione de' vetri. E' bensì vero, che volendoſi conſiderare l' affinità del *regno minerale* col *vegetabile*, ſiccome viene ottimamente conſiderata da GIAN-FEDERICO HENCKELIO (88), potrebbero dirſi vitrioliche le particole della *ruggine*. Com-

(87) BOYLE *General. Hiſt. Aeris. Tit. 9.*

(88) HENCKELIO *Flora ſaturnizans, ſeu affinitans vegetabilium cum mineralibus*. Cap. 1. cap. 2. cap. 14.

Commemora queſto Autore varj eſempi di metalli ritrovati nelle piante, i quali manifeſtano la natura delle medeſime. Io m' avvenni un giorno in molte ſpighe di grano dell' accennato *Podere Settecaſtelli*, nelle quali certa materia ritrovai, che molto teneva del *zolfo*, ma era *metallica*. Ne traſſi alquanta da più ſpighe, e n' ebbi per fino a dodici dramme. La ſpolverizzai, e la calcinai con un fuoco mediocre in un vaſetto di terra, che non era invetriato per di dentro. Gettò molto fummo ſulfureo. Continuai queſta calcinazione per 10. giorni, finchè non levava più vapori, e che la polvere aveva pigliato un colore cenericcio. Allora la laſciai raffreddare, e peſata la trovai due terzi d' oncia. Quindi eſperimentai, che quella materia così calcinata peſava un quinto più, che la medeſima cruda in uno ſteſſo volume, e che dopo una calcinazione reiterata era creſciuta pur anche di peſo. Tutta queſta diligenza però non la potè liberare interamente dal *zolfo*, perchè miſchiata con *ſalpietra*, e meſſa ſul fuoco ella fece qualche ſcoppio, benchè leggiero.

20. Ho cercato la natura de' vapori, che bruciano foglie di grano, col ſeppellire ſotto alcuni ceppi di eſſo alla profondità di un piede una compoſizione di *zolfo*, e *limatura di ferro*, bagnata in un po' d' acqua, perchè in capo a due giorni una mattina ſi videro molte di quelle foglie picchiate di roſſigno cupo, e quaſi nero. Una tal malattìa mi è accaduto più volte di oſſervare dopo certa nebbia gagliardiſſima, e ſegnatamente nel-

nella fine di Maggio del 1755.. Alcune delle foglie del grano reſtarono abbruciate, e ſi riſtrinſero, e ſi diminuirono i granelli medeſimi notabilmente.

21. Non ſembra molto diverſa dalla *ruggine* una *muffa*, che alcune rade volte naſce ſulle foglie inferiori del grano, e talora ſulla parte più baſſa della ſpiga medeſima dopo una pioggia di molti giorni. Vidi queſta in alcuni campi molto alberati della villa di *San Bartolommeo* nel dì 28. di Maggio del 1752. dietro una pioggia di 6. giorni quaſi continui, ed eſſa pure trovai altrove nel dì 10. di Giugno del 1755., poich' ebbe piovuto per ben 10. giorni con poco intervallo di tempo nuvoloſo. Fu anche ne' *Lupinaj*, quanto noti in *Italia*, e in *Inghilterra*, altrettanto poco conoſciuti in *Francia*, conſiderata dall' eſattiſſimo HALES (89.), ne' quali ella è più frequente, che nel grano in erba.

22.

[89] HALES *Stat. des veget.* chap. 1. ex 9. „ Dans les longs-
„ tems pluvieux, & humides, ſans mèlange de jours ſecs, l' humi-
„ ditè trop abondante repandue autour des Houblons, les couvre de
„ façon, qu' elle empèche en bonne partie la traſpiration nèceſſaire
„ des feuilles; la ſève arrètèe croupit, ſe corrompt, & engendre de
„ la moiſiſſure, qui ſouvent gàte beaucoup les plus belle houblo-
„ nieres. Ce cas arriva en 1723., pendant des pluies continuelles,
„ qui durerent dix, ou quatorze jours, & commencerent environ le
„ 15. de Juillet, après quatre mois de ſechereſſe; car les Houblons les
„ plus floriſſans, & de la plus belle eſperance furent tous infectez de
„ moiſiſſure, feuilles, & fuits; tandis que les Houblons languiſſans,
„ & qui promettoient le moins, èchaperent, & produiſirent meme
„ en abondance; parce qu' ètant plus petits, que les autres, ils ne
„ tranſpiroient pas en sì grande quantitè, & par conſequent l' hu-
„ miditè de la tranſpiration, qui nuiſoit aux grands Houblons en
„ s' arretant dans le buiſſon èpais de leurs feuilles, n' ètant pas sì
„ ab-

22. Ho trovato ſpeſſo delle foglie di *Pero*, di *Brugno*, e di altri frutti nella fine di Aprile ſeccate per metà, abbruciate, nere, e tutte frangibiliſſime, mentrecchè quelle del grano non erano tocche in parte alcuna.

23. In certo abbruciaticcio delle foglie del grano mi ſono anche più fiate avvenuto, e in certo rimpicciolire, e raggrinzare del granello medeſimo della ſpiga dopo una nebbia gagliardiſſima; e in queſto ſegnatamente m' incontrai nella fine di Maggio del 1755. nelle campagne di *Claſſe*.

24. Non mi piacque di ſtare al detto di PLINIO (90), il quale atteſtò, che l' *orzo*, e la *ſegala* ſieno meno danneggiati incomparabilmente dalla *ruggine*, che gli altri grani; ma ebbi curioſità di

„ abondante dans les petits Houblons, ne les empechoit pas de croi-
„ tre .... Les Planteurs de Houblons obſervent, que lorſque la
„ moiſiſſure s' eſt une fois emparée d' une partie d' un terrein, el-
„ le gagne enſuite, & s' ètend par tout; & meme que les Foins, &
„ toutes les autres herbes, qui ſont ſous les Houblons, en ſont in-
„ fectées. Probablement parceque les petites graines de cette moi-
„ ſiſſure, qui croit vite, & vient promptement en maturitè, ſont
„ ſouflées, & portées ſur toute l' ètendue de la houbloniere, où el-
„ les ſe multiplient, & infectent quelque fois des terreins pendant
„ pluſieurs années de ſuite; ſçavoir chaque année par la germina-
„ tion des grains de moiſiſſure de l' année prècedente. " Io ho giudicato qui di traſcrivere tutta l' oſſervazione dell' HALES colle parole ſue medeſime, affinchè ſi ſcorga, quanto ella ſia d' importanza a ſaperſi. Nè ſarà già fuor di propoſito il notare, che i *lupini* ſi voltano ogni dì, come ſi volta il Sole, talchè per mezzo loro i lavoratori delle campagne potrebbero conoſcere le ore del giorno, quantunque il tempo foſſe nuvoloſo. L' *Elitropia* non giugne forſe ad altrettanto.

[90] PLIN. XVIII. 7. *Hordeum ex omni frumento minime calamitoſum; quia tollitur antequam triticum occupat rubigo*. E al c. 10. del medeſimo libro, parlando della *ſegala*, dice: *ſed minus, quam caetera frumenta in ſtipula periclitatur*.

di vederne la prova co' proprj occhi, e sempre vidi l' uno, e l' altra, egualmente che il frumento, essere percossi dalla medesima.

25. Quantunque le spighe nate sotto una *capanna* d' ogn' intorno aperta, dove alcuni granelli erano stati seminati, ma non dall' acqua bagnati, recassero ottimo grano, tuttavia alla metà di Maggio del 1756. furono attaccate dalla *ruggine* della seconda spezie, ma in poca quantità.

26. Non esaminerò qui, se io sia venuto sempre al punto di assicurarmi della verità di tutti questi effetti col replicarne le osservazioni, e le esperienze, perchè l' affermar questo sarebbe un ripetere ciò, che si è detto, e che si rendeva troppo chiaramente necessario.

CAPITOLO VI.

Osservazioni, ed esperienze particolari d' intorno la *filiggine del grano*.

1. EGli è difficile il riconoscere da principio all' esterno le malattìe del grano in erba, che all' interno si contraggono, perchè i medesimi sintomi non sempre danno il morbo medesimo (91). Però nel 1753. fino dal cominciar di Aprile io aveva intrapreso a fendere pel lungo molti teneri gambi di grano, e molti di quegli

(91) Quelle foglie deboli, e ristrette, e que' gambi bassi più degli altri, che all' Autor saggio della Dissertazione *sur la cause, &c. pag.* 136. dettero biade malate, e non mai sane, a me hanno dato or l' une, or l' altre.

aſtucci, dove le teneriſſime, e non per anche compite ſpighe ſtavano chiuſe ſtrettamente, ad oggetto di ſcoprirvi per entro i principj della *filiggine*, che al di fuori non ſi paleſavano per conto alcuno. Non prima del dì 24. di eſſo meſe reſtai certificato di alcune *ſpighe filigginoſe* dentro i loro involucri medeſimi (92). Erano eſſe più groſſe delle altre, ſenza orma alcuna de' granellini.

2. Si vede ordinariamente, primacchè in cima a' cannelli incaſſati, per dire così, l'uno nell'altro ſi ſollevi la ſpiga del grano, ſquarciare il gambo là, dove era chiuſa la ſpiga della *filiggine*, uſcire la medeſima dal ſuo *aſtuccio*, e ſollevarſi. Ed ho oſſervato altresì, che tutte per lo più le ſpighe del ceppo ſteſſo ſono egualmente attaccate da queſta malattìa.

3. La *ſpiga filigginoſa* ſta d' ordinario involta in certa lanuggine bianca ſimile a ſpezie di *muffa*, ſopra la quale ſparſe ſi trovano ſpeſſo delle gocce di acqua.

4. Nè ſi creda già, che queſta malattìa ſi produca in un luogo più, che nell' altro, perchè io l' ho veduta in tutt' i luoghi di queſto territorio, ed egualmente negli umidi, che negli aſciutti. E l' ho veduta tanto nelle ſpighe di frumento, quanto in quelle di *orzo*, di *orzola*, di *avena*, di *ſegala*, e di molte altre generazioni di pianticelle erbacee (93), alle quali non ſi dà mente per eſſe-

[92] Il CHABREO *Stir. Icon. p.* 175. la mette in Aprile, e in Maggio: *Naſcitur uſtilago Aprili, & Majo menſibus.*

[93] Anche in Italia l' *orzo*, e l' *avena*, benchè ſieno ſoggetti alla

eſſere inutili al vitto umano, ma non in tutte le ſpezie di grani in erba, come la *ruggine*, ſi vede. Anche nell' *Aconito unifoglio*, Tav. II. Fig. 2., mi apparve un dì d' Aprile del 1755., ed altre poſcia molte volte mi è apparſa in queſta pianta, e infra gli altri luoghi nell' accennato *Podere ſuburbano* del Signor Conte DE SETTECASTELLI. Quivi era nel dì 14. di quel meſe creſciuta aſſai la medeſima, e portava già nelle ſue capſule i ſemi perfetti, quando parecchi de' ſuoi gambi, e delle ſue foglie ſi furono attaccati dal *filigginoſo morbo*. Stava eſſo tra pelle pelle in forma di nericcia poltiglia, la quale, gonfiandoſi poi, ruppe la pellicola eſteriore, e finalmente s' inſinuò anche nella interiore, e paſsò nel parenchima, infeſtandolo tutto, e producendo ne' gambi medeſimi, e nelle foglie lunghi ſquarci, che più internamente la manifeſtavano. In mezzo a quella materia nera ſi vedevano le fibre rigonfie. Erano molte altre foglie macchiate di roſſigno colore, e molte quaſi ſeccate. Mentre io teneva l' infetta pianta per la ſua lunga radice con una mano, teneva con l'altra una lente di foco molto corto, per mezzo della quale oſſervai chiaramente un

alla *filiggine*, non lo ſono però al *carbone*, come appunto ſuccede in Francia, al dire dell' Autor medeſimo della Diſſertazione *ſur la cauſe*, *&c. pag.* 133., il quale avverte, che da queſta malattìa ſono altresì attaccati il *Gramen avenaceum*, *elatius*, *juba longa ſplendente* RAII *Synopſ.* 260., il *Gramen arundinaceum*, *aceroſa gluma*, *noſtras*. PARK. *Theat.* 1723., il *Bromus panicula patente*, *ſpiculis ovatis*. LIUN. *Flor. ſucc.* 84., e il *milium vulgare*. GES. *hor. ad Comm. Ang.*, il che pur qui ho veduto verificarſi nelle Ville ſingolarmente di *Campiano*, e di *Piangipane*.

ammaſſo di fibre ſtrappate, e turgide, e una radunanza di umore guaſto, e corrotto, che poi videſi in polvere finiſſima cenerognola ridotto. Avevano quelle fibre perduto il loro bianco naturale, ed erano divenute del color di caſtagna, diafane, e tratto tratto inclinanti al nero. In queſto color medeſimo ſi ſcorgeva per altro una degradazione quaſi coſtante, ſendocchè la malattìa aveva pigliato maggior forza, e maggior eſtenſione. Fu gran nebbia ne' giorni innanzi a queſto fenomeno, e fu accompagnata dal *Sirocco*, o *Sud-Eſt* leggiero.

5. Non ſempre la *filiggine* ſi ſparge per tutta la ſpiga. Nel principio di Luglio 1752. ſtaccai una ſpiga d' *orzo* da un ceppo, ſul quale tutte l' altre erano di pura *filiggine*. Queſta lo era ſolo per metà dalla parte inferiore, perchè indi venivano attaccate le ſole ſpoglie del grano, e nella parte più ſuperiore tutta era illeſa. Trovai in alcuni granellini cominciata al fondo loro la *filiggine*, eſſendo il rimanente all' eſterno ſegnato di nero. Anche il dì 8. di Giugno del 1754. m' avvenni in un ceppo di tre ſpighe di grano, una ſola delle quali portava la *filiggine*. Queſta pure cominciava per di ſotto, e aſcendeva poco più di un pollice, ma l' umida polvere nera non manifeſtavaſi, che in due luoghi, perchè nel reſto erano le bianche tuniche ſenza granelli come marce, e del color cenerognolo, ſparſe per altro di un pocolin di nericcio. Un' altra di queſte ſpighe non era ſtata preſa da verun male, e la terza aveva il *giallume* nella parte inferiore. Le due ultime ſtavano chiuſe, ma

quella

quella della *filiggine* era uſcita ſollecitamente, e ſi trovava, per così dire, più preſto maturata. Incontrai pur anche nello ſteſſo meſe una ſpiga, la cui metà di ſotto ſi paleſava *filigginoſa*, e quella di ſopra moſtrava ottimo grano, ma gli eſtremi granelli non avevano germinato. Nel meſe ſteſſo di Giugno dell' anno ſeguente fu vicino alla città nel *Podere Settecaſtelli* una ſpiga di *filiggine* nella ſola cima, e in alcune cellette inferiori, avendo nel mezzo laſciati intatti i granelli, benchè alquanto eſtenuati. E un' altra ſpiga vi era del medeſimo ceppo, lungo la quale ſi vedevano tra l'un grano, e l' altro alcune ſpoglie di tratto in tratto ſegnate dalla polvere di *filiggine*. M' abbattei anche in una ſpiga di *ſegala*, che portava la ſommità alquanto *filigginoſa*, non trovandoſi in eſſa granello alcuno. Quivi le fibre delle tuniche erano dalla parte, che ſi univano al fuſto, più groſſe dell' ordinario. Poco ſi vedevano intaccate dal morbo, ma la polvere ſcura, e umida troppo più manifeſtavaſi all' eſterno. Io non finirei, ſe tutte annoverar voleſſi le oſſervazioni minute, che intorno a queſta parte in diverſi tempi ho fatte.

6 Nel dì 24. di Maggio del 1752. alcune più groſſe ſpighe *filigginoſe* da me eſaminate mancavano alquanto di umore, ed erano preſſo a ſeccarſi, laddove quelle del grano buono erano anche in ſugo. Nel dì 27. di Giugno più non apparvero ſpighe *filigginoſe*, perchè, ſeccateſi quella materia nericcia, e quelle fibre, e quelle tuniche deformi, tutto era caduto allo ſpirare di un leggier vento, e altro

non

non rimaneva delle ſpighe medeſime, che il fuſto ſecco, e frangibile.

7. Nel dì 20. Giugno dell' anno ſteſſo ebbi a conſiderare nella villa di *Piangipane* un ceppo di *avena*, che portava due ſpighe, ottima l' una, e già uſcita dal ſuo aſtuccio, deforme l' altra, e uſcitane ſolo per metà. Queſta era *filigginoſa* per fino quaſi alla eſtremità, dove le ſpoglie ordinarie de' granelli erano ſecche, e bianche, ed eſſi granelli all' eſterno *filigginoſi*. Sulla cima cima ſtava un granello ſolo illeſo, perchè un altro a queſto vicino era veſtito di una certa pelluria bianca, e ripieno di materia nera della natura ſteſſa di *filiggine*, e ivi poco lungi un altro granello giaceva tinto alquanto di nero eſteriormente, e un ſuo involucro ſembrava manucato da verme, ma l' altre ſpoglie erano *filigginoſe*. L' ultima foglia del gambo, la quale involgeva la ſpiga, ſi moſtrava già per ſecca a due terzi della ſua parte ſpiegata. Apperto il gambo, dove ſerravaſi il rimanente della ſpiga, trovai fra molto umido, che in gocciole agevolmente univaſi, e fra quella nericcia materia della *filiggine*, la quale continuava per fino al nodo, trovai, dico, un verme bianco, che faceva, e ivi laſciava eſcrementi neri, e nel quale traſparivano le nere interiora. Conſiderati quegli eſcrementi, reſtai aſſicurato, ch' eſſi foſſero di una ſtruttura affatto diverſa da quella della materia *filigginoſa*, ma di una natura quaſi medeſima. Queſto verme era lungo due linee, e fatto come un verme da ſeta colla teſta a *linguattola*,

tola, e lucida, e pendente al canuto, formato il corpo di una catena d' otto anelli di color quasi perſo, alla riſerva del dorſo, in cui ſi ſcorgeva una linea di colore molto più chiaro, con due gambe a ciaſcuno anello, e due pendici ſcurette per coda. Altri di sì fatti animaletti ho ſcoperti non ſolo dentro ad altre ſpighe di *filiggine*, ma dentro a quelle di ottimo grano.

8. Poichè ogni ſperanza ebbi perduta di vedere il primo primo cominciamento della *filiggine* per altra ſtrada, volli tentar quella di accoſtare con leggieriſſima legatura una teneriſſima ſpiga di grano buono ad altra di *filiggine* per modo, che ſempre con eſſa nel creſcere ſi toccaſſe; ma ciò non per tanto reſtò ella contaminata, che anzi neppur ebbe minima offeſa.

9. Queſta malattìa non viene improvviſamente, ſe non ſe quando sbucano dal loro aſtuccio molte di eſſe ſpighe in un tempo, la qual coſa non è frequente. Ella creſce certamente con qualche intervallo, perchè avendo io alcuna volta con molta diligenza penetrati quegli aſtucci, e vedute le ſpighe non interamente *filigginoſe*, le ho poi anche con egual diligenza appoſtate, e in capo a parecchie ſettimane mi ſono comparſe tutte di *filiggine* aſperſe.

10. Speſſe fiate ho reciſo dal gambo la ſpiga *filigginoſa*, e quella altresì del grano buono, e l'uno, e l'altro gambo ho inſinuato, e chiuſo ermeticamente per mezzo di una miſtura di cera, e di terebintina nel capo a due tubi vitrei di egual diametro, e

lun-

lunghezza. Rivolto il tubo di ſopra l' ho riempito a metà di acqua, e a metà di Mercurio, e chiuſa l' apertura di eſſo tubo col polpaſtrello del dito, l' ho infuſa toſto nella tazza ripiena di *Mercurio*. Allora quello dentro il tubo è diſceſo al proporzionato livello. Dopo ciò quell' acqua fu tirata da' gambi, e a miſura, ch' ella montava in eſſi, il *Mercurio* montava dalla tazza nel tubo. Paſſate che furono due ore, ella ſi vide aſceſa a un quarto di pollice; ma dopo mezzo giorno cominciò a declinare, e ad abbaſſarſi. Così il *Mercurio*, che comunicava con l' acqua, ſi vedeva dentro il tubo a diverſe altezze in tempi eguali. Tra l' altre nel Giugno del 1753. aſceſe il *Mercurio* in un quarto d' ora nel primo tubo a linee 8., laddove nel ſecondo non videſi più alto di linee 2. Pure nel Maggio 1755. dall' ore 16. alle 17. nel primo s' innalzò linee 6., nel ſecondo linee 3. Queſti eſperimenti dovevano paleſarmi la velocità del ſugo, che quelle pianticelle traevano nel dato tempo, e aſſicurarmi, che quanto maggiore era la velocità ſua nel tempo medeſimo, tanto maggiore doveva eſſere la quantità, e l' impeto, cioè ch' eſſa velocità doveva eſſere in ragione diretta della quantità del ſugo, e del ſuo impeto. Miſurai per tanto la velocità, con cui aſcendeva il *Mercurio* ne' due tubi diverſi, e la miſurai con gli ſpazj, ch' egli percorreva, diviſi da' tempi impiegati a percorrergli (94), e ne ricavai, che in tempi egual-

[94] Queſta maniera di operare viene certificata dal Signor di Sau-

guali il fluido del gambo del grano buono ſcorreva ſpazio minore di quello, che ſcorreſſe il fluido del gambo della *filiggine*, e quindi apparve, che quello aveva velocità minore di queſto.

11. Oſſervai in oltre, che le tenere ſpighette del grano ſpogliate dell' aſtuccio non ſono atte a ſoſtenerſi per loro medeſime; laddove la ſpighetta accennata dalla *filiggine*, quantunque tenera, e della medeſima età di quelle, da ſe ſola pienamente ſi ſoſtiene.

12. Ho anche veduto ſempre ne' miei campi d' oſſervazione, che i gambi compiuti delle ſpighe *filigginoſe* avevano la ſuperior parte alquanto più groſſa dell' ordinario, e colà, dove ella ſi atteneva alla ſpiga, era molto fibroſa; laddove il gambo del grano buono ivi per ſolito ſi aſſottiglia, e poco le fibre vi ſono appariſcenti.

13. Ebbi nel dì 4. Giugno dell' anno 1754. un ceppo di grano, che aveva ritardato a creſcere, e portava un gambo ſolo di *filiggine*. Tagliato queſto pel lungo apparve di ſugo traboccante, ma niuno di quelli del frumento portava ormai più ſugo ſenſibile.

14. Dico per coſa eſperta, e vera, che avendo

SAUVAGES nelle ſue conſiderazioni ſopra la *Statica degli Animali* dell' HALES *exp. 9. Remar.* Egli ha ſcritto, che la velocità di un fluido ſi conoſce, o ſi miſura con gli ſpazj, ch' eſſo percorre, diviſi da' tempi impiegati a percorrerli; cioè che in tempi eguali un fluido ha una velocità doppia, tripla, ec. di un altro, ſe eſſo percorre uno ſpazio, che ſia doppio, triplo, ec. dell' altro; e in eguali ſpazj percorſi il fluido ha una velocità doppia, tripla, ec. di un altro, ſe v' impiega un tempo ſudduplo, ſuttriplo, ec. di quello impiegato dall' altro.

fatto ſeminare del grano in luoghi baſſi, ed umidi, non ho quaſi mai gambo di *filiggine* veduto in eſſi. Così mi avvenne dentro la buca di una fornace a *Santo Stefano* nel 1755., la quale non ſolamente molto era umida, e baſſa, ma ſi trovava talor anche nell' Inverno coperta di acqua; perchè molte ſpighe vi produſſe di ottimo grano, ma tutte piccole, vi nacque molta erba, e vi ſi vide la *ruggine* della ſeconda ſpezie, e non mai la *filiggine*.

15. Alcuni granelli traſſi da una ſpiga nel 1754., i quali da un lato verſo il fiore avevano in pelle in pelle una materia nera neriſſima, che faceva ſtare alquanto rilevata la ſpoglia di eſſi, ma la loro paſta niente aveva perduto. Il nero cupo di queſto corrompimento era molto diverſo dal colore della *filiggine*, e della materia del *grano carbone*, ſiccome molto anche diverſo fu il capo morto della diſſoluzione, che poco dopo ne feci.

16. Egli non ſono anche molti meſi paſſati, che io vidi un *grano morboſo* nella villa di *Campiano*, che poi ſi ritrovò abbondantemente meſcolato tra il grano buono, dopocchè fu battuto. Componevaſi di grani d'una circonferenza per due, o tre, ed anche quattro volte maggiore del volgare frumento. Di fuori erano bruni con certe ſcanalature nere, e di dentro bianchi, e molto duri. La gravità ſpecifica loro era alla gravità del grano buono in ragione poco minore di 14. a 13.. Molti ne ſeminai, quando fu tempo opportuno, e dopo tre ſettimane ne diſotterrai alcuni, che

trovai

trovai umidi, e gonfi, ed altri erano nello ſtato medeſimo, che gli aveva poſti. Sei ſettimane dopo, avendo fatta rimovere la terra, non vi potei vedere alcuno di eſſi; il che mi fece conoſcere, ch' erano privi della virtù vegetativa. Queſti corriſpondevano molto ad altri ſimili grani, che produce la *ſegala* (95), i quali ho veduti alcune rade volte ne' campi vicino alla *Città* (96).

[95] GIOVAN-GIACOMO DILLENIO, *Ac. Caeſ. Leopol-Carol. Natur. curioſ. ephemer.*, prova, che la *ſegala dura*, *ſecale toſtum*, è il *caffè Europeo*, che non cede punto all'*Arabo* per ſenſo del ſuo palato, e di quello de' ſuoi amici. Ma o queſto *ſecale toſtum* io non conoſco per conto alcuno, poichè neſſuna *ſegala* è riuſcita al mio, e ad altri palati di un egual diletto al *caffè Arabo*, o il guſto del DILLENIO, e de' ſuoi amici fu molto ſingolare. Manca ogni *ſegala* da me eſperimentata di quell' olioſo, che fa il migliore del buon *caffè*.

[96] *Clavi* [ſcriſſe CARLO NICCOLO' LANGIO *in deſcriptione morborum ex eſu clavorum ſecalinorum cum pane*] *ſunt morbus granorum ſecalinorum, qui in eorum excreſcentia, magnitudine aucta, & forma, coloreque depravato conſiſtit*. Se ne veggono particolarmente in Francia, e in Germania, e dagli Scrittori ſi figurano col nome di *ſecale luxurians*. Così GASPARE BAUHINO *Pin.* 23. *Theat.* 434. *ſecale luxurians quibuſdam; aliiſque orga, & ſecalis mater.* 1. *Hiſt. Ox.* 3. 179. Sento, che i Franzeſi della *Salogna* gli chiamino *grains ergotès*, e quelli del *Gatineſe blès cornus*, perchè hanno d' ordinario la figura di uno *ſperone di gallo*. E queſta fors' anche ſarà la cagione, per cui da' Tedeſchi vengono diſtinti col nome di *mutterkorn*. Sono grani neri per di fuori, e bianchi per di dentro, e duriſſimi. Ve ne ſono alcuni, che per avviſo del VAILLANT *Bot.* 181. hanno per fino a 13., o 14. linee di lunghezza, e ſe ne trovano talora otto, o dieci nella medeſima ſpiga. Seminati, non naſcono; la qual coſa molto è naturale, e nello ſteſſo tempo avventurata. Strane malattìe hanno prodotto ſingolarmente nel Lucerneſe, nel Berneſe, nel Tigurino, nell' Orleaneſe, nel Bleſeſe, e in altre Provincie a' poveri villani, che ne facevan uſo col pane, e ſoprattutto hanno cagionato loro la cancrena, e quella carie nelle oſſa, che σφάκελος, *ſphacelus* fu detta. Abbiamo nella *Iſt. dell' Accad. Reale*

Avevano più fessure in quel luogo particolarmente,

delle scien. an. 1710. *car.* 62, che il Signor NOET Chirurgo diceva, che „ siccome la segala della Salogna nel 1709. conteneva vicino a un „ quarto di *ergot*, così subitocchè i contadini avevano mangiato „ del pane fatto con essa, ne restavano quasi ubbriachi, e spesso „ veniva loro poco dopo la cancrena.“ Anche quelli, che mangiano pane, in cui sia entrato molto *grano carbone*, risentono grande stordimento di capo, e grande stupidità di mente, quantunque cancrena in loro non si produca. Da' semi neri del *loglio*, e della *segala* venne, per sentimento del Medico GOTTLOB SCHOBERO *Epitome Dissert.*, l'epidemico morbo dell'anno 1722., che consisteva nella stupidità, nella sonnolenza, nella stanchezza delle membra, e nel dolore delle ossa. Ma questi effetti prodotti da' semi del *loglio*, se neri anche non sieno, furono notati, ed osservati pure dagli antichi maestri della medicina. Sopra ciò si potrebbe vedere ARISTOTELE *l. V. c.* 3. *de somno, & vigil.*, TEOFRASTO *Hist. Plan. l.* 8. *c.* 5., PLINIO *Hist. Nat. XVIII.* 17., GALENO *simpl. l.* 17. *& de alimen. facult. l.* 1.. Che tali semi mangiati in pane cagionino offuscamento di vista, si legge scritto altresì presso di PLAUTO *in Milite Ac.* 2. *sc.* 3., e presso OVIDIO *Fast. l.* 1. *ver.* 691.. Di qui è derivato il proverbio: *Lolio victitare*, che si dice di quelli, che poco veggono per essere miopi, o di corta vista. Gli effetti però de' semi guasti della *segala* non furono così esattamente notati dagli Antichi, come sono stati notati da' Moderni. Varj morbi epidemici, febbri, pustole, ed altri, che nascono per cagione dell'uso di essi, riportò l' *Accademia naturale de' Curiosi di Germania, Dec.* 2. *an.* 8. *obs.* 173., ed *an.* 9., e 10. *obs.* 93. *p.* 171., ed *append. an.* 1712. *p.* 48., e segg.; e si dà pure una relazione storica del morbo *spasmotico-epidemico* pel pane fatto con essa *segala* infetta nella Decade II. *Actorum Medic. Berolinen. in incrementum art., & scientiarum collector., & digestor. Vol. VI.* Ma si rifletta, che questi grani di *segala* degenerata si davano anzi dagli Antichi per medicamento ne' dolori di capo, nelle podagre, nelle infiammazioni, ne' tumori, nelle ulceri; del che DIOSCORIDE, e PLINIO può consultarsi, i quali altre virtù anche gli attribuirono. Il Dottor FAGON, primo Medico di LUIGI XIV., *Hist. de l' Acad. Roy. des scien.* 1710. p. 62., pensò, che solo nella *segala* si trovasse l'*ergot*; e pure una malattìa simile mi accadde già, come ho detto, di vedere anche nel frumento; e sembra per quello, che asseriscono al T. III. i *Commentarii de rebus*, ec. in *Rariora physica, T. II. p.* 289, che ve la vedesse pur anche MICHELE CRISTOFORO HANOVIO. Ma ben chiaro ve l'ha riconosciuta il Signor LE-

MON-

te, che ſtava oppoſto agl' involucri della farina. Si rompevano con facilità per traverſo. L' interna ſoſtanza era ſimile al vecchio magro formaggio, come di quelli pure avvertì CARLO NICCOLÒ LANGIO (97), e quando ſi ſtritolavano, non davan farina volatile, ma una polvere greve.

17. Ho ſpeſſe fiate oſſervato, che la naſcita della *filiggine*, e di queſt' altre malattìe a lei analoghe, accade dopo un aere umido, oſcuro, nebbioſo, ed oltre al ſolito caldo, e opprimente. Ho veduto anche ne' terreni dolci di *Santo Stefano* ſorgere molta *filiggine* dopo un vento di lunga durata, che sbuffava da *Levante*, il che non è avvenuto nel terren forte, e nero della *Pievequinta*, dove piuttoſto è nata la *filiggine* dopo il vento coſtante di *mezzodì*.

18. Introduſſi nella fine di Aprile dentro gl' invo-

MONNIER (*La merid. de Paris ſuite des mem. de l' Ac. des ſc.* 1740. *Par.* 3. *pag.* 114.) non ſolo, ma il diligentiſſimo Signor TILLET, il quale ha ſcoperto, ch' ella è pur comune alle piante nominate da' Botanici *Gramen loliaceum*, e *Gramen micoſuros* della minore ſpezie. Rilevo però nel Tomo I. de' Commentarj medeſimi, che fu trovato una inſigne differenza tra queſti grani della *ſegala*, e quelli del *frumento*, dell' *avena*, e di altri generi di grani, perchè G. F. MOELLERO nelle congetture *De cauſis ſecalis cornuti*, *ſive uſtilaginis* non diſtingueva la *ſegala cornuta* dalla generale *uſtilagine*, arſura, abbruciamento.

[97] LANGIO *Deſc. morb. ex eſu clav. ſec. cum pane cap.* 5. 6. Egli oſſervò, che i grani infetti della *ſegala* ſono più leggieri di quelli del frumento, e galleggiano ſopra l' acqua; il che non ſucceſſe a quel frumento morboſo, che io ebbi dalla villa di *Campiano*, il quale anzi peſante andò al fondo. Egli aggiugne, che in acqua bollente macerati, gettano fuora una pinguedine, che ſi congela nella ſuperficie, e che abbruciati facilmente concepiſcono fiamma, e fanno una cenere nericcia ſplendente a guiſa di quella de' corni, o de' crini bruciati; ma queſto anche ſucceſſe al frumento mio morboſo.

involucri delle chiuſe ſpighe teneriſſime molta guazza raccolta nelle notti più critiche. Nulla queſta produſſe nelle medeſime, che pernicioſo foſſe, quantunque dopo appariſſe il Sol cocente; e ciò più volte ho replicato con evento non diſſimiglievole.

19. Nella ſeparazione chimica della materia *filigginoſa* molto *Sal volatile* vi ho ſcoperto.

20. Primacchè le ſpighe *filigginoſe* ſi preſentino alla viſta, ho talora chiaramente veduto un fummo tenuiſſimo dagl' involucri, dov' erano naſcoſte, innalzarſi, e ſparire, e quindi altro ſuccedere a quello, ed altro a queſto. A' tali gambi ho allora preſentata la canna del *Termometro*, e di rincontro alle ſpighe ho accoſtato il *Mercurio*, il quale ſubito ha dato ſegno di alterazione, e ſi è alzato, benchè quaſi inſenſibilmente.

21. Dal ſin qui detto ſi vede, che queſta malattìa è generata per lo più in tempo, che le biade non hanno per anche meſſa fuori la ſpiga; onde rade volte i grani interi vi potran eſſere attaccati, ſe già per ordinario eſſi non vi ſono interamente formati. Che ſe pure in alcuna di tali ſpighe ſe ne trovano, queſti forſe non ſofferſero il primo attacco, ma rimaſero poſcia contaminati; e queſta contaminazione ho ſempre veduto, che comincia all' eſterno, nè mai tutta *filigginoſa* è la ſoſtanza, quando altra cagione diverſa da quella della *filiggine* non la produca (98).

CA-

(98) Pure la *biada incarbonchiata* del Signor TILLET, che ſembra poter

CAPITOLO VII.

Osservazioni, ed esperienze particolari d' intorno al *grano carbone*.

1. TEnni spesso alcuni gambi di grano dentro un vaso in ambiente regolato col *Barometro*, i quali produssero ottimo grano, a differenza di alcuni altri della medesima qualità di seme, cioè tratto dalla medesima spiga, tenuti alle ordinarie intemperie, che produssero *carbone*, Tav. III. Fig. I..

2. La pianticella del *grano carbone* cresce più vegeta di quella del grano buono, e la spighetta si vede molto grande, e con molta loppa; laddove quella del buono, che sia dello stesso tempo, è allor piccolissima, tenerissima, e pieghevolissima (*99*).

3. Un color verde carico appare nel gambo, e nell' erba del *grano carbone*, primacchè la spiga pur si vegga; e questo fu da me osservato nel 1752. a' primi giorni di Maggio, e poi dopo l' ho quasi sem-

poter essere, come dissi, la nostra *filiggine*, „ non conserva , che il „ fusto , dove i grani erano attaccati , o al più qualche grano , „ che ha pelle bianca , e sostanza nera . "

[*99*] Questo carattere è molto diverso da quello , che ne dà il mentovato Signor TILLET , il quale ha osservato in Francia , che „ le spighe attaccate dalla carie nel tempo medesimo , che i loro „ gambi sono in piedi , si rappresentano fiacche , e molli , e non „ hanno mai la consistenza delle spighe sane . " Lo conferma nella osservazion riportata a car. 136.

ſi ſempre a queſto indizio conoſciuto (100).

4. Il granello del *carbone* s' ingroſſa notabilmente più di quello del grano buono, Tav. III. Fig. I. let. a., ma non più di eſſo ſi allunga, compie la ſua grandezza, e ſi riempie, avanticchè la ſua compia, e ſi riempia il grano buono, ſebbene prima di lui per ſolito non maturi, e non ſecchi, anzi lo faccia più tardi. Quando per altro ſecco egli addivenga, è minore aſſai del grano buono.

5. Qual ſia la natura, e l' indole di queſta peſte, non è coſa facile il concepire. Feci calcinare una pianticella intera di *grano carbone*, che ſomminiſtro del *Sale liſcivioſo* per una terza parte del ſuo peſo; calcinatane un' altra di grano buono della medeſima grandezza, ne dette ſolo una quinta parte.

6. Nel dì 27. Maggio del 1753. in trenta, e più gambi, che aperſi pel lungo, non ritrovai ſugo molto ſenſibile, ſe non ſe in uno, che portava ſpiga di *carbone*, ed era ſopra un ceppo, che due altri gambi aveva di grano buono miſchiato con *carbone*, e queſti ritenevano ſugo quanto minore del primo, tanto maggiore di quello degli altri gambi.

7. Al principio di Luglio del 1752. trovai ſopra un ceppo medeſimo alcune ſpighe di *frumento*, e altre di *carbone*, delle quali una moſtrava da un lato *frumento* ſolo, dall' altro ſolo *carbone*, trattone un granello di frumento nel mezzo ſano ſaniſſi-

[100] Nè ho mai veduto, che proprietà del noſtro *grano carbone* ſia l' aver le foglie del ſuo gambo macchiate di giallo.

niſſimo. Sopr' altri ceppi anche altre ſpighe v' erano con granelli di *frumento*, e di *carbone* a vario ordine diſpoſti, e diviſi.

8. Non ho incontrato mai ſopra l' eſterna ſuperficie del *grano carbone* quella polvere nera, che ſi trova ſopra i granelli attaccati dalla *filiggine*.

9. Nel Maggio del 1753. inſinuai un gambo di *grano carbone* dentro al capo d' un cilindro di vetro del diametro di linee 1 $\frac{1}{4}$, e un gambo di grano buono in cilindro del diametro di linee $\frac{1}{7}$, avendo tutti e due i cilindri l' aſſe loro di un palmo. Preparato tutto, come ſopra, oſſervai, che dalle ore 13. alle 17. s' innalzò ſopra lo ſtagnante il *Mercurio* del primo cilindro per linee 4 $\frac{1}{2}$, e del ſecondo per linee 4 $\frac{1}{7}$. Feci la ſteſſa eſperienza nel dì 4. Giugno, e non apparve il *Mercurio* del primo cilindro fuori dal piano dello ſtagnante; e ſolo per una mezza linea vi uſcì quello del ſecondo, il cui gambo non era indurito pienamente. Queſta prova medeſima io ebbi nel dì 6. di Maggio del 1754. in cilindri di egual diametro, e di egual aſſe, e vidi, che il gambo del *carbone* rapiva ſubito il *Mercurio* dentro il tubo al livello in circa dello ſtagnante, ma il gambo del grano buono lo riteneva ſotto il livello per ben 2. linee. Fatta queſta medeſima operazione in altri due gambi della medeſima qualità, ne venne il medeſimo effetto. Mutati ſcambievolmente i cilindri, lo ſteſſo effetto pure non mancò. Io miſi anche queſti medeſimi cilindri a *Mercurio* in diverſi gambi dello ſteſſo ceppo, che aveva ſpi-

ghe di *grano carbone* intere, e ſpighe miſte con grano buono, e fece il Mercurio in eſſi diverſo effetto. Qualche lume dar poſſono queſte oſſervazioni per la conoſcenza del morbo. La maggior parte de' progreſſi, che ſi ſono fatti d' intorno la natura de' vegetabili, ſi reputa dovuta all' eſperienze ſtatiche.

10. Alla fine di Aprile del 1754. erano poco più che alla metà creſciute l' erbe delle biade, e mi accorſi, che ſi aveva un ceppo nella *caſella* XI., che voleva dare *grano carbone*, perchè le foglie erano di un verde ſcuro, e perchè anche ſcoperſi una ſpighetta, che ne' granellini, ad occhio diſarmato inſenſibili, per mezzo del *Microſcopio* lo dimoſtrava. Quello trapiantai in un vaſo di terra purgatiſſima, e vagliata, ed eſſo vaſo medeſimo poſi ſopra una tavola, difeſo da' venti, e dalle intemperie. Il *carbone* tuttavia crebbe, e tutto ne occupò il ceppo, portando ſolo un gambo di grano buono.

11. Le prime orme del *grano carbone* in molte occaſioni ho ſcoperto col benefizio del *Microſcopio* nel primo ſviluppo delle ſpighette; altre oſſervazioni facendovi diverſe da quelle del *Wolfio*, unite alle quali potrebbero forſe introdurci ne' penetrali più ſecreti della natura ad iſcoprirne il mecaniſmo. Per formare delle ſeguenti una idea chiara biſogna conſiderare un grano di frumento, come tutte l' altre ſemenze, compoſto del ſuo germe, delle ſue prime foglie, e della ſua ſcorza. Io non entrerò nella deſcrizione eſatta delle par-

ti di esso, e della loro struttura, perchè ciò è stato fatto con grandissima diligenza da altri. Vidi nel dì 7. di Maggio del 1754. le fibre verdi della corteccia non tutte del medesimo colore. Fra gli anelli verdeggianti di essa occupava il luogo di mezzo un altro anello, che inclinava al bianco, ma la sostanza di farina, la quale nel grano buono circonda il germe, e dee servire al suo crescimento, e alla sua nutrizione, qui già si trasformava; perchè quantunque apparisse bianca, v' erano tuttavia di quando in quando per entro certi forami, pe' quali si vedevano nell' interno alcune macchiette nere. Non sempre nel piegamento, o nella unione de' due *lobi* terminano certi corpicelli globosi quasi tra loro tangenti, come l' ordine degli *utricoli* delinea il MALPIGHI. Separai poi anche la cuticola del *grano carbone* giovane colla punta sottilissima di un ago, e non ci vidi altro che una materia verde composta di particole molto piccole senza distinzione alcuna di polpa, e di germoglio; e questa era per avventura quella materia primitiva, di cui è composta la sostanza interna di esso grano racchiusa ne' suoi *lobi*. Ma dopo attente riflessioni perdetti ogni speranza di potere scorgere distintamente la figura di quelle particelle, ch' erano fors' anche troppo giovani.

12. La mia curiosità perciò non essendo interamente soddisfatta, rinovai diligenze molte sopra di essi grani. Trassi dal principio di una spighetta negli ultimi dì di Aprile del 1754. alcuni

granellini non più lunghi di un quarto di linea; e gli osservai scrupolosamente con diversi *Microscopj*, e con varie *Lenti*. Venni subito in cognizione, che nella parte esteriore appajono sommamente lisci, e del color di canna dilavato; ma cresciuti alcun poco cominciano a mostrare un verde pallido, e appoco appoco pervenuti ad una stagionata maturità, diventano coloriti di un verde cupo, che talor anche inclina al giallo, e sono corredati di alcune barbicelle nella superior pendice; laddove quelli del grano buono, che allo esterno sono molto pelosi, prima bianchi si scorgono, poi verdi, e biondi in fine. Conobbi poscia, che non minori succedono mutazioni nella loro interna polpa, la quale, se fia il *grano carbone* tenacemente anche serrato fra le sue guscie, si trova bianca bianchissima, ma senza latte (101), e senza germe alcuno, nè occhio v' ha, sebbene armato del più perfetto *Microscopio*, che macchia veruna scoprire vi possa. Fatto però il granello più adulto, ella comincia a tignersi qua, e là di minutissimi punti cenerognoli, e neri, che non si fanno manifesti agevolmente. Questi poi vengono appoco appoco dilatando, fino a che quella materia ne rimane pienamente infestata. Altramente succesſe al grano buono, ch' era nella medesima spiga, del quale la solita interna latticinosa pasta era prima

(101) Il frumento tenero è pieno di latte, onde VIRGILIO l. 1. *Georg.*

. . . . . *& cum*
Frumenta in viridi stipula lactentia turgent?

VARRONE nel libro *Delle Cose Divine* dice, che LACTANS è un Dio, il quale s' interessa per le biade, e le fa riempiere di latte.

ma di color verde, che poi mutò in bianco lattato; nè più lo perdette. Il gambo del *grano carbone* era più groſſo di quello del grano buono, e le ſue trachee, ſparſe tratto tratto per tutta la ſua groſſezza, avevano le fibre ſpirali, che mettevan capo nell' aria eſterna, le quali erano più ſenſibili, che in quello. I granelli anche del *carbone* s' ingroſſavano oltre il ſolito degli altri grani, e alcuni avevano l' ovale figura, altri la ritonda, altri ſi trovavano colla punta, altri privi di eſſa. La mattina del dì 4. di Maggio del 1755. dopo aver aperti molti aſtucci delle ſpighe, ne ſcoperſi una finalmente teneriſſima di *grano carbone*. Poco le cellette, o ſacchi, deſtinati a racchiudere il corpo de' grani venturi, ſi erano dilatati. Stavano alcuni granellini più piccoli nella parte inferiore, ed altri di mezzana grandezza ſi vedevano poſti indiſtintamente co' più groſſi ad ogni altezza. Erano aſcoſi, e difeſi da varie coperte groſſe, le quali fino d' allora potevano rintuzzare i raggi del Sole, e impedire, che la *rugiada*, e la *pioggia* s' internaſſe ſopra di eſſi. Non avevano fiore, o ſe l' avevano, era ſenza ſtami. Ne tagliai uno parallelamente all' aſſe maggiore, ed era di figura *ſferoidale*, e del colore di paglia molto chiara, e di grandezza quanto un mezzo grano di miglio. La cuticola interiore era verdiccia, e nella materia bianca pochi nericci punti ſi diſtinguevano apertamente. In altro granellino del medeſimo colore, e della medeſima ſpiga lungo una mezza linea ſi vedeva quella materia bianca circondata da punti nericci minuti-

nutiſſimi, e intorno ad eſſa ne veniva la verdiccia per fino alla tenera ſcorza. Uno, ch' era lungo $\frac{1}{4}$ di linea, e del medeſimo colore degli altri, aveva confuſa per entro la materia bianca con la verdiccia, nè vi potei ſcorgere ſegno nero alcuno. Fuvvene un altro di ſimile grandezza, ma di colore più carico, il quale aveva la materia verdiccia picchiettata di nero, eſſendo quella di mezzo bianchiſſima.

13. Nel dì 21. di Maggio in un ceppo di ſette gambi vidi una ſola ſpiga di *grano carbone* unito a grano buono, ma il primo era più groſſo, e più lungo di un terzo del ſecondo. Il verde eſteriore dell' invoglio era carico, maſſime verſo le piegature de' *lobi*. Tagliatine alcuni, mi conparvero ſenz' opera di *Lente* in mezzo alla materia bianca certi filamenti, i quali, camminando pel lungo della medeſima, ſeco portavano alcune ſpruzzaglie di nero, delle quali non ſi trovava pienamente illeſa la ſteſſa materia bianca. Queſta era molto arrendevole, al contrario di quella verde ſoſtanza, che l' involgeva, conſiſtente aſſai, e fibroſa. Nel dì 27. Maggio mi furono recati alcuni grani di *carbone* lunghi tre linee, e mezzo, laddove i maggiori del grano buono non oltrepaſſavano le due linee.

14. Quando il *grano carbone* è ſecco interamente, non più all' eſterno faſſi vedere di color verde, ma di caſtagno ſcuro, e la ſoſtanza interna non più bianca, e verde picchiettata di nero, ma tutta nera, o cenerognola, reſtando la pellicola, che la involge, ſottiliſſiſſima, e frangibile.

15. Of-

15. Osservai nel 1752. un ceppo di 5. gambi, che aveva ritardato il crescimento per fino al dì 20. di Giugno, tempo, nel quale generalmente in questo Territorio si considera il grano come già quasi maturo. Questo ceppo aveva due gambi di grano buono, uno compito, e l' altro nò, e tre di *grano carbone*, l' uno grandicello, e gli altri due piccolissimi, le cui spighe stavano negli astucci. Io potrei aggiugnere altre molte osservazioni di questo genere, che sopprimo per non annojare quelli, che non hanno bisogno di prove soprabbondanti, e che si sono assicurati, come io ho fatto, co' loro proprj occhj dell' esistenza, e della qualità di esso *grano carbone*.

16. Ho più volte considerato, che, quantunque il *grano carbone* si trovasse abbondantemente pe' campi, ciò nulla ostante in alcuni da loro non disgiunti neppur ve n' era una spiga, e talor anche il campo medesimo aveva quel grano da un lato, e non dall' altro.

17. Nel dì 6. di Maggio del 1754. levai da molti granelli del *carbone* que' loro filamenti, e quelle fibre del colore di talco, e la sostanza nericcia, che vi stava d' intorno, e tutto infusi nell' acqua. Nessun altro moto io conobbi dopo ciò in tali particelle; siccome con altre esperienze non ho mai conosciuto, che quello venuto loro dal formarsi alcune bolle nell' inzuppamento della sostanza nera, che si spargeva in quell' acqua. Le fibre, inzuppate pur esse nella medesima, si scioglievano, e diventavano nere. Misi anche nell' acqua più volte le spighe della *filiggine*, e vidi sempre un capo

po morto difficile a inzupparſi, e una polvere, che ſi muove col fluido, ſiccome tutte fanno le altre polveri.

18. Nelle *Memorie di Trevoux* dell' anno 1750. del meſe di Marzo, riportandoſi il Libro di nuove eſperienze del Signor NEEDHAM al capitolo VIII., dove parla della *nigella*, ſi dice, che la polvere nera del grano, ſe ſi fa notare nell' acqua, compariſce al *Microſcopio* ripiena di animaletti viventi, che hanno un moto irregolare, e coſtante, e che ſono ſimili alle *anguille* di acqua dolce. Si aggiugne, che l' Autore avendo conſervato per due anni i granellini di queſto grano guaſto, continovò a vedervi le *anguillette* a vivere, e a muoverſi. Io non credo, che ſarò tacciato di preſuntuoſo, ſe mi darò vanto di arrivare con l' ajuto di un buon *Microſcopio* a veder perfettamente quello, che altri hanno veduto. Queſto fatto io non ho mai ſcoperto nel *grano carbone* noſtro, quantunque le particelle della polvere nera, venendo bagnate dall' acqua, acquiſtino per breve d' ora un moto progreſſivo, e coſtante, che le potrebbero far ſembrare *anguillette* ſemoventi (102). Ma l' equivoco apertiſſimo, che quivi accade, vedraſſi nel capitolo ſeguente, e ſi è accennato già nel IV. della Parte prima.

19. Non

[102] Conobbe pur anche l' accurato Signor TILLET, che i *vermi* non erano proprietà del *grano carbone*, e ſi oppoſe fondatamente al Signor NEEDHAM, che aveva detto introdurſi nel granellino una materia di figura non uniforme, riflettendo a car. 62. che le particelle di quella polvere ſono ritonde, e che non è conforme all' ordine della natura l' introdurre di nuova materia in eſſo granellino.

19. Non ſarà inutile il dire, che nel 1752. ebbe nella villa di *Santo Stefano* una poſſeſſione, la quale tutto quaſi dette *grano carbone*. Queſta peſſima miſtura fu ſeminata a ſuo tempo, e produſſe nell' anno ſeguente una ricolta migliore. Così ſucceſſe nella villa di *San Bartolommeo* nell' anno 1754., dove anzi nello ſteſſo tempo feci ſeminare grano ſcelto, da cui venne peſſimo frutto.

20. L' avere io per tanto alquante volte oſſervato, che la ſeminazione del grano buono unito al *grano carbone* non dava ſempre grano, che foſſe percoſſo da queſta malattìa, e che anzi ſiccome da queſto veniva ſpeſſo buon grano, così dal buono talora naſceva il cattivo, l' aver ciò, dico, oſſervato mi toglieva ogni ſoſpetto, che la comunicazione di queſti due grani poteſſe in tale malattìa aver colpa alcuna giammai; ma quando ſeppi eſſervi chi formava ſopra queſta comunicazione medeſima le ſue congetture, io entrai nel penſiero di darmi a por mente con maggior attenzione, ſe per ſenſata, e chiara oſſervazione poteſſi venire in notizia, che anche in queſto territorio dalla ſola polvere del *grano carbone* foſſero contaminati i grani buoni. Preſi dunque queſto fatto come vero, mi poſi a ritrarne alcune conſeguenze, che ſeguire ne avrebbero dovuto, e poi accuratamente cominciai a riſcontrare coll' eſperienza, ſe veramente ne ſeguiſſero. Manifeſte già ſono queſte conſeguenze, cioè, che quaſi mai doveſſe ſuccedere l' unione de' buoni co' cattivi grani ſenza queſta malattìa, nè quaſi mai queſta malattìa ſen-

za tale unione. L' esito de' fatti replicati replicatissimi mostrò l' assurdo per l' una, e per l' altra parte, e vidi spesse fiate nuovamente da' grani ottimi uniti colla polvere del *grano carbone* nascere ottimo grano, e da grano trascelto venire grano percosso da questa malattìa. Nell' anno 1753. essendomi da grano morboso nato grano di buona qualità, avvenne, che nel seguente anno 1754. nacquero da questo secondo grano buono alcuni gambì di *grano carbone*. E' vero per altro, che spesso dal seme unito con molto *carbone* ho avuto molto *carbone*; e allorchè questo fra 'l seme non era, poco, o nulla d' ordinario ne ho avuto. Ma non per tanto io crederò, come della polvere di archibuso, che quella del *grano carbone*, la quale poco prima era benissimo riuscita alla prova, non vaglia di nuovo a produrre lo stesso effetto, e poscia riprovata di nuovo, torni di nuovo a riprodurlo.

21. Affaticai molto sopra l' analisi chimica di questa polvere, e conobbi con DEMOSTENE, che tutto poteva farsi colla pazienza: διὰ καρτερίας ὐδὲν ἀνάλωτον πέφυκε. Tanto essa polvere, quanto quella della *filiggine* provai con l' acqua forte, perchè così mi sembrava di dover fare, quando l' ispezione, e la comparazione di queste due materie non bastavano per essere in istato di denominarle, e di ordinarle nella classe, alla quale elle appartengono. M' accorsi ad occhi veggenti, che il *grano carbone* resiste più della *filiggine*. Lo *spirito di vino* non contrasse alcuna nerezza nelle minime

sue

ſue parti, talchè vi ſi poteſſe dire incorporata ne' due meſi interi, che nel medeſimo tenni la polvere del *grano carbone*; ma la contraſſe in un meſe da quella della *filiggine*, e per modo che ſconciamente poteva ſtenderſi col pennello ſopra la carta. Il latte però freſco di vacca meſſo a fuoco lento gli levò appoco appoco ogni nerezza, e quella polvere fece bianca; il che per altro rieſce anche più preſto mediante la cera bianca, come il MARSIGLI ha eſperimentato nel *corallo*. Da tutta la pianticella del *grano carbone* ſi cava del *ſale liſcivioſo* in quantità maggiore, che da altre piante, nelle quali tutte con varia proporzione egli entra. Ne feci l' eſperienza nel meſe di Aprile, e la reiterai di Maggio, e di Giugno, e la feci anche con un orinale di vetro ſerrato col ſuo cappello roſtrato, e accomodato nel fornello.

22. Nelle diverſe grandezze, e figure de' granelli del *carbone* io non ho trovato mai, che tutte le parti loro ſimili ſieno in ragione duplicata de' lati omologhi, che in eſſi immaginar ſi poſſono, come ho trovato in quelli del grano buono, e come in tutte le figure ſimili ſi dimoſtra da' Matematici avvenire, e nelle curvilinee lo ha ſingolarmente dimoſtrato il WOLFIO (103). Piccola ſcintilla di Geometrìa mi è però baſtata a trovar per coſtante nella figura di queſti granelli, che tutti gli angoli ſalienti della lor buccia ſono oppoſti agli angoli rientranti; il che prova la grande loro debolezza, e quanto ſuggetti ſieno alle impreſſioni.

(103) WOLFIO *Meditat. de ſimilitud. figurar. praeſ. curvilin.*

23. Da molte esperienze fatte agli anni passati sopra la gravità specifica de' semi diversi, e di quelli, da' quali poi è nato per lo più *grano carbone*, ho rilevato, che possa in circa concluderſi essere la gravità specifica degli ultimi a quella del seme, da cui deriva grano ottimo, come 8 ½ a 10.

24. Mi parve degno da investigarsi con esattezza scrupolosissima, e con *Microscopio* alla mano ne' gambi del *grano carbone* i condotti, che portano il sugo a diversi granellini; e però vidi ne' gambi, che avevano le spighe di tutto *grano carbone*, non meno, che in quelli, che le avevano di tutto grano buono, essere l'abbondanza del sugo de' diversi condotti quasi uniformemente distribuita; ma se nelle spighe il grano infetto era mischiato a grano buono, vi trovava una distribuzione inegualissima, talchè gli uni erano scarsi di umore, mentrecchè gli altri ne abbondavano. Dopo replicate osservazioni, ed esperienze sopra questo fenomeno ho giudicato di poter concludere, che que' fifoncini, i quali portavano l'ordinario umore, avessero comunicazione col solo granello buono, laddove quelli, che ne portavano in maggiore abbondanza l'avessero solo con l'infetto.

25. Il *grano* detto comunemente *grosso*, e da' *Bottanici* conosciuto col nome di *Triticum rufum grano maximo*, non è soggetto alla malattìa del *carbone*, e però nel qui contiguo *Territorio Cesenate*, dove ordinariamente questo si semina, per quanto mi scrisse, non sono eglino anche molti anni passati, l'onoratissimo Padre STEFANO FIORAVAN-

VANTI dell' Oratorio, ella poco ſi conoſce, o ſolo in quelle baſſe parti, dove ſi ſemina il grano, che diceſi Italico (104).

26. Quattro libbre di *grano carbone* in pentolino non invetriato meſſo a bruciare con poco di *zolfo*, e riabbruciare di nuovo nella fornace, dettero un' oncia di cenere. Si coſſe di nuovo per ſei giorni continui nella fornace, e fattone il ranno, non ſe ne potè mai cavare punto di ſale. Pigliai anche *grano carbone* bruciato, e riabbruciato nella fornace, lo peſtai ſottilmente, lo feci paſſare per iſtaccio ſottile, e poſcia macinar lungamente ſul porfido, di modo che venne impalpabile. Queſta polvere ſciolta con l' acqua, mi dette un color cenerino, che ſi diſtendeva beniſſimo col pennello.

27. Troppo faticoſo ſarei, ſe portaſſi maggior quantità di oſſervazioni ſopra queſta parte. Mi baſta ſolo di accennare, che ſono frequenti queſte ſorte di grani tanto nelle campagne umide, quanto nelle aſciutte.

CAPITOLO VIII.

Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno al *grano ghiottone*.

1. SEguiterò al favore de' lumi, che mi hanno ſomminiſtrato l' eſperienze, e le oſſervazioni, la formazione di queſta malattìa dal cominciamen-

[104] *Triticum Italicum*. MATTIOLI *Comm. in lib. 2. Dioſcor. cap. 78. p. 249.*

mento dell' acerbo granello nella ſpiga ſino allo ſtato di maturità ſua perfetta. Nel dì 18. di Maggio del 1752. le ſpighe non erano per anche da' loro invogli comparſe fuora, quando io ne traſſi alcune, nelle quali fra' ſuoi teneri follicoli giaceva il *grano ghiottone* in forma di una pallottolina non maggiore di $\frac{1}{4}$ di linea tutta verde per entro, e per di fuora, ſe non ſe qui alquanto più chiara. Barbicella alcuna alla ſommità non aveva, come il grano buono, e il *grano carbone*, e nel mezzo mezzo niuna materia vi appariva, che figurata foſſe. Molte erano le ſpighette di un tal grano morboſo ripiene. In una ſola di eſſe vidi, che andavano alternativamente diſpoſti nelle loro cellette i granellini del *frumento*, e quelli del *ghiottone*, ma queſti erano più grandicelli di quelli. Nel dì 21. ritrovai alcuni granellini del *ghiottone* ritondetto aperti in cima, e formanti quaſi due barbicelle verdi. Vi ſcoperſi in mezzo col *Microſcopio* certa poltiglia bianca compoſta di molti filamenti traſparenti. Stando aperto il granellino per qualche breve tempo, queſta materia ſi ſeccava, e que' filamenti perdevano la loro traſparenza. Nel dì 30. oſſervai una ſpighetta levata da un gambo di ceppo, che ne aveva per fino a 32. tutti di ottimo grano, fuorchè queſta, la quale recò tre granelli di *ghiottone*. Uno di eſſi, non maggiore di $\frac{1}{3}$ di linea, ſembrava unito alla metà di un granellino buono, che aveva il fiore in cima, ma veramente egli era un granello ſolo, e moſtrava, che la metà ſola foſſe *ghiottone*. Dentro

tro un' altra veſta di ſpiga d' altro ceppo ſi ſtavano poi anche due granellini gemelli inſieme, come ſtanno talora due amandorle dentro il medeſimo guſcio, e l' uno di eſſi era di *ghiottone*, l' altro di grano buono. Un ceppo di 23. ſpighe era tutto di *grano ghiottone*. Alcuni di eſſi grani lunghi $\frac{1}{4}$ di linea, i quali avevano per entro una cavità molto ſenſibile, non racchiudevano materia ſenſibile. In altri di maggiore grandezza ſi faceva vedere la materia bianca predetta, i cui filamenti, lunghi quaſi due linee, e ſottiliſſimi, con molta facilità ſi rompevano, e in bianca melmetta ſi disfacevano. Nel dì 14. di Giugno del medeſimo anno ſcorſi in granellino di *ghiottone* un bianchiſſimo, e diafano filamento lungo per ben due linee, che ſtava in mezzo a quella poltiglia, altrettanto pur bianca, nella quale egli aveva confitta una eſtremità, e l' altra, eſſendo libera, ben ſi diſtingueva alcuna rada volta col benefizio di finiſſimo *Microſcopio* a rimuoverſi, e a dilatarſi, tantocchè ebbi motivo di ſoſpettare, che quello foſſe corpo vivente, ſiccome gli altri filamenti tutti, che là immobili giacevano, ma che la medeſima figura avevano, la medeſima traſparenza, la ſteſſa facilità di ſtrapparſi, e di ſcioglierſi. Condotte a fine queſte oſſervazioni io mi ſentii tratto a maggiormente innoltrarmi in tale ricerca.

2. Nel dì 20. di Giugno del 1754. mi capitò una ſpiga, che non ſolo aveva granellini di *ghiottone*, ma alcuni anche di *grano carbone*, e di gra-

no

no buono. Il *ghiottone*, dopo eſſere divenuto all' eſterno di color verde ſcuro, e raggrinzato, e vizzo, rimaſe quaſi nero, e ſecco notabilmente, e di minor mole degli altri due. Quantunque però ſecco, egli conteneva per entro la ſolita materia bianca, che aveva pigliato maggior conſiſtenza, e maggiore tenacità, Tav. III. Fig. 2. let. b. c. d.. Moſtrava queſta qualche rado puntolino ſcuro. I filamenti diafani, benchè non foſſero creſciuti di groſſezza, erano per altro creſciuti non poco di conſiſtenza, per modo che più volte rimoſſi non ſi ſtrappavano, e cotanto facilmente non ſi diſcioglievano, come prima. Tuttavia non reſſero alle prove del taglio, o a dir meglio della ſeparazione di loro parti, e ſi ſciolſero toſto, e ſi riduſſero in una ſoſtanza viſcoſa, per cui ſi reſero difficili molto ad eſſere eſaminati. Queſti filamenti erano di varie grandezze, e i più grandi manifeſtavano nell' interno per una ſtriſcia di bianco ſudicio lungo il corpo qualche coſa diverſa dal rimanente. Stavano immobili nella materia bianca del loro granello, o ſe pure alcuno di eſſi voleva moverſi, lo faceva con molta lentezza, ed era de' più groſſi, e lunghi, cioè quanto un ſottiliſſimo capello non più eſteſo di mezza linea. Squillavano eſſi nell' acqua, ma con moto aſſai minore, e più ambiguo di quello de' piccoli, i quali ſi veggono ſolo con ottimo *Microſcopio*, e non ſenza qualche artificio. Tal è per altro il loro moto, ch' eſſi non progrediſcono un minimo che. Tenuti anche lungo tempo fuor del granello, ripigliavano il moto per mezzo

zo dell' acqua medeſima (105). Queſti noſtri filamenti s' ingroſſano nel mezzo, e ſi aſſottigliano quaſi egualmente nelle eſtremità, in niuna delle quali orma d' occhi non può ſcoprirſi, o d' altro, che a teſta appartenga.

3. Quanto avventurata oſſervazione ſarebbe ſtata quella di vedere il principio principio della formazione, e dell' accreſcimento di queſta malattìa! nè io ho mancato di ricorrere a' mezzi più efficaci per riuſcirvi, e malgrado le diligenze uſate, l' accuratezza, la circoſpezione, e quella maniera di operare, che vale a togliere ogni preteſto a' dubbi, nulla ho potuto vedere, che mi convinca del vero. Ma forſe a queſto non giugnerà la potenza de' noſtri occhi, o biſognerà dire, che ſe da per tutto la natura ci ſomminiſtrò de' motivi per dimettere la noſtra ammirazione, qui anche non ce gli abbia paleſati. Intanto queſti ambigui fatti non potranno negarſi. Certo è, che avendo conſiderati ſcrupoloſamente i granellini del *ghiottone*, quando cominciano a renderſi ſenſibili, gli ho ritrovati chiuſi da tutte le parti, nè mai in eſſi una menoma apertura ſi è preſentata al fuoco del *Microſcopio*.

4. In verun grano di *ghiottone* ho ritrovato un ſolo di queſti corpi ſemoventi, perchè da molti d' eſſi viene più, o meno popolato. Quando i medeſimi ſono giovani, mentrecchè il *ghiottone* è an-

[105] Scriſſe il REDI in una lettera al Dottor GIOVANNI NERI queſte parole: „ Del reſto i vermi piani ſono arrivati tut„ ti morti; ma io gli ho meſſi nell' acqua a rinvenire. " Quaſichè dir voleſſe a farli ritornare in vita.

che verde pallido, e chiaro, ſiccome il grano delle *uve ſpine*, o il *ribes*, che non ha principiato anche a colorire, o come que' novelli grani ritondi, che il Signor MARCHARD trovò ſopra la *Quercia*, meglio eſaminati poi dall' incomparabile REAUMUR, prendendo poſcia eſſo *ghiottone* un colore più carico, che diviene indi ſcuro, e finalmente quaſi nero, quando, dico, tali corpi ſemoventi ſono giovani, appajono di un verde pallido, che poi affatto ſcoloraſi, e diviene bianchiccio, e alla fine rimangono bianchi bianchiſſimi. Il NEEDHAM forſe gli oſſervava, allorchè compito avevano il loro creſcimento, poichè egli dice, che ſono bianchi.

5. Non poche, anzi moltiſſime in diverſi tempi, e in diverſi luoghi io aveva fatte rifleſſioni, ed eſperienze d' intorno a queſto *grano ghiottone*, e aveva aguzzato l' occhio per mirarvi dentro più chiaramente, che io poteva, innanzicchè mi compariſſe il libro di eſſo Signor NEEDHAM; e prima anche di veder l' effetto, che l' acqua vi produceſſe, io aveva oſſervato nella bianca poltiglia raſciutta, e l' aveva ad altri fatto oſſervare, il moto ſcherzevole, benchè tardo, e ambiguo di que' filamenti a guiſa di *anguillette*, o piuttoſto di *lombrichetti* del corpo umano, i quali da queſto Autore nel ſuo libro di *Novelle ſcoperte fatte col Microſcopio* furono deſcritti, come un numero ſterminato di minutiſſimi inſenſibili vermini, che animavano que' granellini. E qui è, dove forſe naſceva il mentovato equivoco, perchè, confondendoſi da lui il *grano carbone* col *ghiottone*, parve, che gli

voleſſe per due effetti della medeſima cagione tenere (106). Straordinaria ſarebbe per altro queſta razza di viventi, ſopra i quali baſta laſciare una goccia di acqua per metterli in un bollicamento, che talor quello ſembra de' vermi del formaggio; ma reſtano novellamente come inzeppati, e incalappiati in quella polta, quando ella ritorna al ſuo primiero eſſere di conſiſtenza; che ſe nuova acqua ſi ſoprapponga, nel primo moto ſi rimettono. E ſimile giuoco, come già vide il Signor NEEDHAM medeſimo, può farſi non meno per alquanti meſi, ma per alquanti anni, mettendo in molle que' granellini nell'acqua, fino a tantocchè eglino inviſcidiſcano, e rinvengano.

6. Ma ſiccome dopo certo tempo, tenendoli all'aria aperta, più eſſi nel granello non ſi veggono; così un eſperimento in queſto genere aſſai curioſo io feci. Molti granelli ripieni di sì fatta materia ſerrai in un pentolino con un cuojo bene ſtretto, e ve gli tenni più di un anno. Aperto poi, e cercati dentro, e fuori que' granelli, non vi trovai più que' corpi *lombrici-formi* nè vivi, nè morti, nè putrefatti, nè interi, e non ho potuto

[106] Siccome io ho fondamento di credere, che il grano deſcritto dal NEEDHAM ſia quello ſteſſo, che io chiamo *ghiottone*, così parmi, non debba a ragion dirſi, che quella ſpezie di alterazione, o di perturbamento della ſoſtanza organica del *grano ſperone* poſſa avere le proprietà dall' *Ingleſe* attribuite alla ſeconda maniera del ſuo *grano nigellato*. Poco differente dal *grano ſperone* ſarebbe altramente il noſtro *grano ghiottone*: ſe in quella *biada cornuta* ſi trovaſſe una infinità di filetti, o di piccoli corpi organizzati, come afferma il Signor di BUFFON, ſimili per la figura alle *anguille*, i quali veramente ne' granelli per tali da me riputati non ho potuto ſcoprire giammai.

rinvenire mai come ſpariſſero; e ſarà ſtato forſe nello ſteſſo modo, che ſogliono eſſi allo ſcoperto da' granelli ſparire.

7. Se queſti corpi ſi eſpongono in poco d'acqua a un freddo violento, come il Signor di BUFFON eſpoſe alcuni liquori ſeminali, un tal freddo non reca loro alcuna alterazione, perchè in quell'acqua continuano a muoverſi colla ſteſſa ambiguità, e così lungo tempo, come gli altri, che non vi ſono ſtati eſpoſti; ma quelli al contrario, che hanno ſofferto il calore, ſoſpendono qualunque moto, poichè il liquore ſi addenſa, e sì gl' imprigiona.

8. Io confeſſo, mentre la maggior parte delle proprietà di queſti corpi diſconvengono interamente con ciò, che ſuccede agli animali, eſſere ſtato da principio in qualche dubbiezza per non giudicar ſubito per vermini quelli, che ne avevano tutta la ſimiglianza. E molto più, perchè io ſapeva, che mille corpi eterogenei, i quali ſi veggono ſpeſſo ſcherzare, e notare in qualche linfa, non ſono ſempre animali. Sapeva, che certe ſabbie, e certe ſoſtanze farinacciole, che ſi trovano nelle pietre, ſi poſſono animar prontamente, mettendole nello ſpirito di vino, e farle anche rianimare dopo qualche tempo, quando ſi voglia, per mezzo di queſto liquore. E ſapeva finalmente, che il detto Sig. di BUFFON (107) era di parere, che v' abbiano in natura corpi viventi, i quali non ſieno ne' animali, nè vegetabili, nè ſpirito, nè materia, i cui moti non dipendano nè dalla configurazione delle par-

(107) DE BUFFON *Hiſtoire naturelle, generale, & particuliere T.* 2.

parti, nè dall' impulso, ch' esse possono avere; corpi viventi in somma affatto indifferenti per loro medesimi a entrare in ogni composizione organica, sia di vegetabile, sia di animale; e tali, che non si possono ammettere, senza che resti percosso il buon senso, e senza ricorrere, come ben avverte l'Autore delle *Lettere a un Americano*, (108) al Sistema di EPICURO, tanto valorosamente convinto di falso dal famoso Cardinale di POLIGNAC nel suo *Antilucrezio*. Contuttocciò io non ho potuto non venir nel pensiero di riputargli cotesti corpi viventi per una vera spezie di vermini, i quali abbiano una propria loro indole, e un particolare loro costume di farsi abitatori in modo singolare di que' granellini, e vivere in quelle cieche tenebre. Parmi ciò ragionevole a credere, e non difficile a giustificare. Le varietà, e le maraviglie, che si scoprono ogni giorno in questo genere di viventi, non sono forse una millesima parte di quelle, che ci sono anche nascoste. Molti restarono attoniti per le tante cose inaudite, che si osservano ne' *polipi a mazzo* (109), le quali non si sarebbero credute, e mai avuta non avremmo di esse alcuna idea, quando un fortunato accidente non ne avesse fatto scoprire le prime tracce al celebre Sig. TRAMBLEY

[108] *Lettres à un Ameriquain sur l' Histoire naturelle, generale, & particuliere de Monsieur de Buffon. Par. 2. Let. 6. De la construction animal.*

[109] Per la similianza, che un aggregato di questi animaletti porta a un mazzo o di *fiori*, di *pera*, o di altro, il Signor di REAUMUR ha dato a' medesimi il nome di *Polipi a mazzo*, *Polypes à bouquet*.

BLEY (110), e conſiderare poſcia i progreſſi. Io non dubito, che al primo aſpetto non debba naſcere qualche difficoltà dal far paragone di coteſti corpi *lombrici-formi* con altra qualunque ſpezie d' *Inſetti*; ma noi ſappiamo, come già fu detto in ſimile caſo, che infinitamente ſaggio, e potente è quello, che ha ordinato le coſe tutte. Avremmo noi creduto giammai, che ſi trovaſſero *Inſetti*, i quali non aveſſero teſſo, altrocchè dopo quattro generazioni? E pur queſto ſi dice de' *pidocchi delle piante*. Il Signor NEEDHAM colle accennate ſue prime oſſervazioni rigettava l' opinione del Signor di BUFFON, da cui ſi voleva, che non ſi poteſſe trovar l' origine di que' corpi *lombrici-formi*, quando non ſi diceſſe, che foſſero una ſpezie di macchine, le quali, benchè ſempliciſſime, pur foſſero attive per loro medeſime, e ſi metteſſero in movimento, ſubitocchè veniſſero infuſe in un liquido; ma in altra ſua opera di oſſervazioni (111) egli mutò ſentimento interamente, e ſi eſpreſſe, che queſti corpi ſemoventi non dovevano ſenza dubbio eſſere conſiderati per animali viventi prodotti da qualche *Inſetto*, perchè potevano crederſi piuttoſto le particelle medeſime de' germi del grano corrotto. *Certo è per altro*, riflette l' Autore delle lodate lettere, *che il ſuo valente Traduttore gli aveva aperta la ſtrada di ſoſpettare, che que' filamenti foſſero altra coſa, che germi, quando in una*

ſua

[110] *Memoire ſur le Polype à Bouquet, & ſur ceux en endonnoir. Par* A. TREMBLEY.

(111) *Nouvelles obſervations faites par Monſieur Needham de concert avec Monſieur de Buffon.*

ſua nota egli ſcriſſe, che non avrebbe ardito di aſſicurare, ch' eſſi foſſero animali, perchè forſe non erano, che aſtucci, i quali chiudono piccoliſſimi animaletti. Ma già ſembra, che il Fiſico *Ingleſe* non deſſe pure uno ſguardo a queſto lume.

9. Io qui non vorrei tuttavia, far credere, che tutti i corpi ſemoventi del *grano ghiottone* ſieno aſtucci, i quali racchiudano piccoliſſimi animali, e non piuttoſto aſſerire queſto de' ſoli grandicelli, i quali hanno in vero certe proprietà, che da' più piccoli forſe gli diſtinguono. E veramente ſe ſi rammenti, che la *materia farinacea*, che inviluppa il germe, e ch' è una parte organizzata di ciaſcun grano, conſiſte in una infinità di piccoli corpi bianchi, e traſparenti, che non ſi poſſono conoſcere, ſe non col *Microſcopio*, e non ſenza diſeccare il grano ben deſtramente (112), ſi troverà forſe probabile, che queſti corpi traſparenti medeſimi, componendo i *lombriciformi* maggiori, ſieno poi le caſe de' minori. Ma il Profeſſore di *Leyda*, che in Franceſe traduſſe il libro delle *Nuove ſcoperte* del Signor NEEDHAM, ſoſtiene di aver veduto molte volte romperſi le *anguillette* del *ghiottone*, e uſcire dal loro corpo alcuni globetti chiuſi in una fina membrana, e di aver oſſervato, che que' globetti erano piccoli corpi, che nuotavano nell' acqua con molta velocità; ond' egli poi conclude, che tali globetti ſieno minutiſ-

[112] E queſti corpi ſono ſpezie di pallottoline, le quali eſſendo meſſe in moto pel calore della terra, s' inſinuano ne' pori del germe, diſtendono appoco appoco le ſue parti, e lo nutrono, finchè getta radici proprie a ricevere il ſugo della terra.

tiſſimi animali ſerrati in quelle *anguillette*, come in tanti aſtucci. E perchè mo queſti piccoli globetti non potrebbero eſsere per avventura certi quaſi inſenſibili *bacherelli* da me alquante volte conſiderati, e a queſto noſtro ingegnoſo Signor Dottore MARTINETTI fatti vedere dentro il medeſimo *grano ghiottone*, i quali certamente non eſcono da' corpi *anguilli-formi*, e ſono diverſi molto da quella materia, nella quale eſſi ſi ſciolgono, e ſembrano alla ſemplice viſta tanti puntolini ſcuri, o anche di color tanè fra que' filetti, che tutta quaſi compongono la ſoſtanza bianca, nè vengano gran fatto ingranditi dal *Microſcopio?* Che ſe per mettere in dubbio, che que' filamenti del *ghiottone*, i quali nell' acqua manifeſtano un moto di fleſſione, e quaſi di attorcigliamento, e ne' più piccoli un equivoco moto di progreſſione, ſieno veri animali, baſti por mente a' loro ſtravaganti fenomeni, e a ciò, che ne dicono il Signor di BUFFON, e il Signor di MAUPERTUIS (113), per conoſcere, che queſti ſecondi viventi ſieno veri *baccherelli* introdotti nel *ghiottone*, baſta fare le oſſervazioni da me fatte. Come ciò poi veramente avvenga, io non ſo intrigarmi a favellarne, perchè non ne ho potuto avere alcuna eſperienza. Voglio bene dentro all' animo mio credere, che que' corpi *lombrici-formi* alcuna volta ſi trovino attaccati da' *vermi carnivori*, i quali piglino il loro alimento nell' interno medeſimo del *ghiottone* a ſpeſe di eſſi, giacchè mol-

[113] *Venus Phyſique. Par. I. chap. 16.*

molti granelli di *ghiottone*, dov' erano queſti *bacherelli*, ho veduti eſtenuati affatto de' corpi *lombrici-formi*. Per quanto tuttavia abbia ricercato col *Microſcopio* que' granelli, ne' quali poi ho ritrovato tali *bacherelli*, non ſono potuto giugnere a comprendere il luogo, per cui eſſi erano entrati. Non ſi potrebbe egli dire, o che *Moſche icneumoni* piccoliſſime facciano un inſenſibile foro nel granello, e depongano nel ſuo interiore l' uovo, da cui naſca il *verme*, oppure che il *verme* medeſimo ſul granello ſi ritrovi molto più piccolo anche di quello, che vedeſi dentro di eſſo, cioè meno di un puntolino, talchè un inſenſibile meato ſia ſufficiente a dargli paſſaggio? Ha per verità queſto granello nelle ſue eſtremità delle piccole ineguaglianze, dove ſi veggono, ma non ſempre, delle righe, che alquanto s' internano, ed ivi è forſe, dove il *vermetto* s' introduce nel medeſimo. Il Signor BARON medico di *Laçon*, per quanto riferiſce il Signor di REAUMUR, dal quale ho tratto il penſiero, oſſervò ſopra i granelli del *frumento* ſecco le *uova* delle *farfalle*, e diſſe, che il luogo, dove il germe deve uſcire, è quello, che la piccola *ruga* ſceglie per penetrare nel grano medeſimo, eſſendo luogo più tenero, e dov' ella trova una ſpezie di veicolo. Simile maniera potrebbero adoperare i *bacherelli* noſtri per entrare nel *ghiottone*. La natura avrà inſegnato loro queſto mezzo per trovare il propio alimento, come l' ha inſegnato a tante altre generazioni di sì fatti *vermi carnivori*, che ſi trovano nell' interno delle più groſſe,

e delle più dure galle degli alberi, e delle piante. Molti esempi ne abbiamo nella *Storia degl' Insetti* di esso REAUMUR, e molti nelle Osservazioni mandate all' *Accademia Reale delle Scienze di Parigi* dal Signor CARLO BONNET.

10. Il nostro *bacherello*, invisibile quasi ad occhio disarmato, è nericcio, ed ha la *testa* di color lionato scuro armata di due uncini senza orma alcuna visibile di occhi, Tav. III. Fig. 2. let. b. e. f.. Non se gli veggono *gambe* nè scagliose, nè membranose, o al più sembra, che abbia alcuna di quelle mammelle carnose sotto il ventre, che sono porzione degli anelli, di cui viene formato. Ordinariamente egli sta piegato in semicerchio, come il *verme*, che si trova nelle *galle del salce*, ed è anche a lui simile alquanto nella figura. Quantunque fossi convinto di non aver nulla trascurato nel 1753. per accertarmi della trasformazione di quest' *Insetto*, giudicai bene nondimeno di vederla anche dopo più, e più volte. Gran numero de' granellini del *ghiottone* d' ogni età ho aperti per tale effetto, e in quelli, che non avevano cominciato a indurire, ho trovato la cavità, occupata bensì da' corpi *lombrici-formi*, non già da' *bacherelli*, e quando ne ho aperti alcuni, che avevano pigliato della consistenza, e del color verde carico nella buccia, vi ho in oltre trovato alcune volte di cotesti *vermi carnivori*. Niuno di essi però mi è riuscito mai di vedervi, allorchè il grano era secco, e di più mesi colto, quantunque gli altri corpi vi avessero il vigor di prima; perchè

chè il *bacherello carnivoro*, nutrito abbaſtanza, già il *ghiottone* abbandona, uſcendo per un foro proporzionato alla grandezza del ſuo corpo, e va a trasformarſi ſopra una foglia del grano in criſalide di figura come *sferoidale* del color di boſſo, compoſta di alcuni anellini; Tav. V. Fig. 8. 9. 10., e 11.. Ho queſto diſaminato nell' alberello di vetro, dentro cui la pianticella io aveva chiuſa; ma non ho potuto detergere affatto la nebbia, che velava il bello di queſto vero, ſe non dopo molto tempo, e non ſenza diligentiſſima ricerca armato di perfetta *Lente*. Lo *ſcarabeo*, che ne venne, era verdiccio, colla teſta lunga, ed occhi neri, e le antenne nodoſe ingroſſate nello attaccamento. Dopo il *capo* portava un *cappuccio*, al principio del quale ſtavano congiunte le prime due *gambe*, nella manieracchè ſtanno quelle delle *cavallette*. Le *vagine* delle *ale* erano tutte rigate pel lungo con qualche macchietta nera vicino alla loro origine. Il colore di queſte macchiette era quello di eſſe *ale*, che apparivano traſparenti, come quelle delle *moſche*. S' egli aveva *gambe*, queſte erano di color roſſigno. Il VALLISNIERI vide uſcire da una galla un piccolo *ſcarabeo* turchino, e il REAUMUR deſcriſſe quello, nel quale ſi trasforma il verme della *galla del ſalcio*, ma nè all' uno, nè all' altro il noſtro aſſomigliaſi punto.

11. Per lo traſparire de' corpi *lombrici-formi* ſenza vederne le trasformazioni, e gli altri accidenti della lor vita, ſopra cui il NEEDHAM fonda una ſua difficoltà a riguardo anche di molti altri sì

fatti viventi (114), mi viene ſuggerita una ragione dal mentovato ingegnoſo Autore delle *Lettere a un Americano* (115): vale a dire, che ſe non ſi veggono paſſare nell' aria, ſarà, perchè ſono inviſibili, e che non ſi diſtinguono altrocchè le loro ſpoglie, ſpeſſo in fatti veggendoſi le medeſime precipitate in forma di ſedimento al fondo dell' acqua, o attaccate alle pareti del granello. Si rendono poi inviſibili, dice eſſo Autore, *parcequ' au paſſage de l' eau dans l' air, il faut qu' il vuident leurs canaux des ſucs, qui ſont trop groſſiers, pour leur permetre de parvenir à la legeretè equivalente à un volume d' air egal au leur. Ils deviennent par là sì diaphanes, qu' ils ſont inviſibles. Ils etoient dejà fort traſparens dans l' eau: ainſi un corps humain, qui deviendroit auſſi leger, & auſſi traſparent, que l' air, diſparoitroit totalement.* Ma il paſſaggio de' noſtri *Inſetti* ſi potrebbe far per avventura dalla materia glutinoſa del granellino nell' aria, non volendoſi dire, che ſi faccia dall' acqua nell' aria medeſima.

12. Succede non di rado, che da una pianticella ſola moltiſſime generazioni di animaletti volanti naſcano, e così minuti, che con molta ragione alcuni di eſſi furono da TERTULLIANO chiamati *unius punctì animalia*. Forſe gli abitatori del *grano ghiot-*

[114] *Nouvelles*, ec. car. 117. „ s' ils ont pris la forme d' Inſectes „ volans, comment ſe fait-il, que je ne voie pas le progrès des chan- „ gemens, qu' ils eprouvent? Comment ne les apperçois-je pas „ etendre leurs petites aîles ſur ces eaux, après y en avoir vû „ tant de millions dans un etat aquatique? "

[115] *Lettres*, ec. *Partie* 4. *lett.* 11. *pag.* 83.

ghiottone potrebbero eſſere in due ſpezie almeno diſtinti, e ve ne foſſero probabilmente de' voraci, che uccideſſero quelli dell' altra ſpezie. Fra' *Lombrici-formi* vorrà dirſi, che i maggiori ſieno le caſe, o, come eſprime il Profeſſor di Lipſia, gli aſtucci di eſſa, e i minori ſieno per ſorte que' *bacchi*, o quelle *aurelie*, da cui eſcono i volanti. Ma forſe noi ſaremo in una perfetta ignoranza dell' origine di queſti corpi, infintantocchè non c' incontriamo in uno di que' fortunati accidenti, che ſono proprj, per avviſo di dotto uomo, a fiſſare lo ſpirito ſopra tutti gli avvenimenti de' medeſimi, ſiccome di quelli, che nel *ghiottone* compajono un puntolino nero, dirò ſenza timore di dir troppo, che mi è accaduto di poter fare.

13. Il primo inviluppo del *grano ghiottone* è di una ſoſtanza ſerrata, e denſiſſima, e alquanto groſſa, dopo la quale ſeguita una ſoſtanza ſpugnoſa, ma come quella delle ſpugne *ircine*, e dopo queſta ſe ne ſcuopre un' altra teneriſſima, che poco lontana dal centro del grano ſi parte, e occupa il medeſimo, formando ivi quella materia latticinoſa bianchiſſima, e talor fluidiſſima, nella quale ſi trovano i corpi ſemoventi.

14. Diverſe figure hanno i granelli del *ghiottone*, ma tutte per altro inclinano al ritondo. Alcuni ſono liſci, altri ſcannellati, altri a guiſa di garofano. Quando ſono verdi, hanno la buccia ſtirata, e florida, ma ſecchi, l' hanno grinza, e ſvenevole. Il loro peſo non è in ragione reciproca del loro volume; talchè ben ſi comprende, ſenza

ocu-

ocularmente vederle, che alcune parti vote debbono eſſi avere nell' interno. Al ſeccarſi in fatti non ſolo diventano molto piccoli, ma la materia bianca in loro racchiuſa, riſtrignendoſi, e alle pareti immobilmente attaccandoſi, laſcia in mezzo a' medeſimi una cavità ben ſenſibile.

15. Queſti grani del *ghiottone*, meſſi a calcinare al fuoco ardente d' una fornace di pietre, mi hanno dato un ſale bianchiſſimo ſimile al ſale marino, che in acqua agevolmente ſi ſcioglie.

16. Eſſi non pregiudicano alla qualità del pane, come quelli del *grano carbone*, per cui dolori di capo, o altri diſordini della ſalute debba riſentire chi ne mangi.

17. Nel dì 10. di Novembre del 1754. ſeminai dentro un vaſo di terra cotta il frumento di una ſpiga, nella quale erano ſtati alcuni granellini animati dall' accennato nuovo genere di viventi. Per quanto procuraſſi di ſceglierli ad uno ad uno, e quindi non giugneſſi a ſcoprire ſopra gli eletti grani coſa alcuna dannevole, eſſi mi erano pur anche ſoſpetti; perchè ſpeſſo aveva eſperimentato, che da un tal ſeme naſceva *grano ghiottone*. Trovai in effetto il dì 9. di Aprile del 1755. nati tre ceppi, che portavano i loro gambi più del ſolito groſſi, e queſti ſtriſciavano per terra con foglie arricciate, poſtillate, e ritorte, maſſime quelle, ch' erano le più interiori. Quando furono i gambi innalzati, eſſi tutti dettero ſpighe di *ghiottone*, e due fra eſſe ne trovai, che in parte erano di grano buono. In altra mia ſeminazione notai,

tai, che alcune foglie del grano erano pur creſpe, e ſtavano dolcemente piegate all' infuora in varie diſtanze bellamente allontanate dal centro, e tutte ſi andavano ſtrignendo, e attortigliando verſo il medeſimo. Da queſto centro s' innalzò poi lo ſtelo, che portò ſpiga di eſſo *ghiottone*. Giunto il gambo vicino alla maturità, quelle foglie perderono tutto quaſi il loro torcimento; la qual coſa per altro non ho ſempre trovato nelle foglie del *grano ghiottone*. Fu degno di rifleſſione, che alcuni granelli di quel *ghiottone* erano ſtraordinariamente groſſi, uſcivano dalla ſpiga, e ſtavano attaccati ad eſſa con ſottili, e non molto lunghi picciuoli. Queſti incatorzolimenti non mi venivano nuovi, perchè aveva altre volte veduto ramuſcelli di *Eliantemo* (116) nella vicina *ſpiaggia*, i quali ſi erano ſtravolti, rigonfiati, e divenuti ſcabroſi, e avevano preſo un color gialliccio punteggiato di roſſo, e di bianco; e ne' gambi del grano buono medeſimo mi erano più volte comparſi.

CAPITOLO IX.

Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno all' *infeſtamento degl' Inſetti*.

1. IL grano in erba è ſoggetto ad eſſere divorato in varie guiſe da *Inſetti*, i quali ſono ſpeſſo difficili da vederſi, e più difficili anche

(116) *Helianthemum vulgare, flore luteo*. Jo. B. 2. 15. *Flos Solis*. Dod. *Pempt.* 193.

anche da estirparsi. Grande n' è la turba certamente in questo, e in ogni altro *territorio*; e ben disse il VALLISNIERI, che qualche anno non ci possiamo difendere dalla plebe molestissima delle *Zanzare*, qualche anno dalle *Mosche*, e qualche anno, aggiungo io, da' varj altri nojosissimi animali, che infestano essi grani. Quantunque generalmente abbiano gl' *Insetti* avuto a' dì nostri molti osservatori, che de' più nascosti loro andamenti sieno venuti in traccia, questi però del grano in erba se ne acquistarono pochissimi, o perchè da essi non furono curati, o perchè non avvertiti, e quindi ne avvenne, che di loro la maggior parte non fosse conosciuta, e descritta. E certamente non piccola diligenza è richiesta per tutti esaminarli in diversi tempi, e in luoghi varj. Qualche contezza non può negarsi, che ne avessero gli Antichi (117), perchè molti ne

(117) Se già conobbero l' infestamento degl' Insetti in tutte le piante, non che in quelle del grano. TEOFRASTO, che tra Greci fu Maestro di Storia naturale, scrisse nel l. V. c. 10. *de Caus. Plant.* οἷον τό τε σκωληκοῦσθαι, καὶ ἀτροβολισθῆναι, καὶ ἐρυσιβισμούς; le quali parole significano, che morbi comuni sono la *vermiculazione*, la *siderazione*, e la *radicazione*: e PLINIO XVII. 24., fra' Latini di essa pur Maestro, disse poi: *Communis vermiculatio est, sideratio, & dolor membrorum*, e altrove XIX. 10. delle biade favellando singolarmente: *Bestiolarum quoque genera innascuntur*. Anzi il medesimo TEOFRASTO *de Caus. Plant. l. V. c.* 11.: *Nulla enim fere sunt, quae non vermibus infestentur*; che è quanto: πάντα γὰρ, ὡς εἰπεῖν, σκώληκας ἴσχει. E aveva detto prima: *omnes enim fere (Plantae) vermes etiam gignuntur, sed quaedam pauciores, quaedam plures*; e l. V. c. 10. *Vermiculantur magis, quae aetate provectiores sunt*; il che per altro non è sempre vero. Ma non solo ne' Libri delle piante ragionò lungamente TEOFRASTO di questi Insetti, e saggiamente tenne per fermo, che malattìa fossero di quelle; volle nominarli anche nel fram-

ne mentovarono ne' loro ſcritti, quantunque neſſuno ne deſcriveſſero, o di neſſuno avanzaſſero eſatta ſtoria (118). Io molti ne ho oſſervati, e molti ho ſeguiti nelle loro trasformazioni con quella attenzion maggiore, e con tutte quelle precauzioni, che ſi poſſono adoperare da chi teme ad ogni paſſo qualche illuſione, o che nulla vuol pubblicare, che, per quanto è a lui, non ſia vero, e certo. De' medeſimi io qui darò conto; ma non parlerò delle *lucertole*, de' *grilli*, delle *locuſte*, delle *donnole*, delle *formiche*, delle *veſpe*, de' *moſcioni*, e di altri abbaſtanza eſaminati animaletti dannevoli a' ſeminati tutti, non che alle biade (119): e neppure voglio impegnarmi a dire, che tutti gl' *Inſetti*, ivi da me ritrovati, ſieno proprj di eſſo grano, benchè dir ſi voglia ſicuramente, che tut-

R te

frammento del Libro, che egli ſcriſſe *degli animali, che ſono creduti invidioſi*, conſervato nella Libreria di Fozio.

(118) Ebbe TEOFRASTO *de Cauſ. Pl. l. IV. c.* 15. *Vermem maxime ſentiunt triticum, atque cicer, verum non eadem parte utrumque. Alterum in fructu, alterum in radice..... Vermis generatus in eo, ubi alimentum conſumpſit, quod in culmo eſt, ſpicam aggreditur, & vel totam erodit, vel alteram partem.* E nell' *Hiſt. Pl. l. VIII. c.* 10. *Naſcitur enim in tritico cantharis .....* Anche PLINIO XVIII. 17. *Eſt & cantharis dictus ſcarabeus parvus frumenta erodens.* E perchè aveva prima detto, che naſcevano vermetti nelle radici, e nel grano, qui aggiunſe: *Omnia ea animalia cum cibo deficiunt.* Ma veramente egli s' ingannò, come ingannato ſi era TEOFRASTO, perchè queſti animali, venendo il grano a ſeccarſi, e però a mancare loro il cibo, quando ſieno giunti alla total perfezione, com' è ordinariamente, non muojono già eſſi, ma ſibbene, per terra cadendo, ſi trasformano in criſalide, e poſcia in Inſetto volante.

(119) Il GALLO nell' *Agricoltura Gior.* 1. mette tra le beſtiuole, che rodono le biade „ i *Lucertoni*, i *Muſoni*, i *Sorci*, le *Talpe*, „ e quanti altri animaletti dannevoli, che ſono fra due terre. Vo-

„ glio-

te le piante abbiano i loro particolari *Insetti* (120). Alcuni di questi medesimi possono avere avuto il nascimento per avventura in altre piante, che quelle del grano non sieno. A venire per altro in qualche lume di verità ho usato per lo più nell' Autunno la precauzione di far nascere dentro uno stesso vaso alcuni semi di *frumento*, alcuni d' *orzo*, altri di *fava*, ed altri di altre simili pianticelle, ivi mettendo cotali *Insetti* a soggiornare, e nella Primavera poi sopra tutte ho veduto bensì *rughe*, e *vermi* della medesima spezie, ma sono restato persuaso, che quelle di *frumento* erano sicuramente le più accette, e di gusto loro maggiore. Piccoli sono per ordinario questi nostri *Insetti*; ma perchè appunto la trasmutazione succede tanto più presto, quanto sono essi più piccoli (121), così mi è riuscito in alcuni di vederla più volte in un anno medesimo. Fuori de' vetri non avrei per avventura potuto fare le mie osserva-

zio-

„ gliono " seguita egli, „ del grano, nè v' è rimedio alcuno, le „ Galline, i Porci, l'Oche, ed altri animali, come cantò Virgilio:

„ Che sempre noce al gran l' Oca, e la Grue,
„ E con l' amara sua radice ancora
„ Noce la cicorea, e nocon l' ombre. "

E TEOFRASTO in una lettera, che e' finge di scrivere a un uomo di villa, avverte, che „ grande incomodo a' campi sogliono le Talpe „ apportare, essendo un nimico molesto, che deve temersi dall' agri- „ coltore " τί δῆτα περὶ τῶν ἀσπαλάκων λέξαμι; φοβερὸν γὰρ τῷ γεωργῷ τὸ κακὸν, καὶ δυσαπαγώνιστον τὸ πολέμιον.

[120] *Vermem*, scrisse il NIEREMBERGIO *Hist. Nat. Max. pereg. l. 3. c. 5. in sua quemque nasci arbore, notavit Scaliger apud Theophrastum.*

(121) Anche il VALLISNIERI *Nuov. id. del mal contag. de' Buoi*, osservò, che „ gli animali quantoppiù sono minuti, tantoppiù „ presto, e felicemente propagano la loro spezie. "

zioni, perchè tali animaletti per ſolito abbandonano la pianta per comporre i loro *bozzoli* in luoghi naſcoſti.

2. In tre claſſi io gli divido. In quegl' *Inſetti*, che tutta quaſi la vita paſſano ſopra i gambi, o ſopra le foglie, o ſopra le ſpighe del grano. In quegli altri, che ſtanno tutta, o parte della vita loro dentro i gambi, o dentro le radici del grano, o nel grano medeſimo, o negl' involucri delle ſpighe, o ſotto l' epidermide delle foglie, o in alcune ſpezie di galle. Negli ultimi finalmente, e ſono i più copioſi, e quelli, che apportano danno maggiore, e ſtanziano parte della loro vita ſotterra tra le radici del grano, e parte di eſſa ſopra le foglie, e i gambi del grano medeſimo, oppure anche ſtanno ſempre ſotterra. V' hanno nella prima le *rughe*, o *bruchi*, che ſi tramutano in *farfalle notturne*, e i *vermi*, o *bachi*, che paſſano ad eſſer *moſche*, o *ſcarabei*, o *cantaridi*. Vi ſi comprendono anche parecchi *ragnatelli*, che a trasformazione non ſono ſoggetti. V' hanno nella ſeconda claſſe le *rughe* parimente, che ſi mutano in *farfalle diurne*, e in *notturne*, e i *vermi*, che pigliano forma di *moſche*, o di *ſcarabei*, o di *cantaridi*. In queſta ſi contengono le *rughe* dette *minatrici*, e i *vermi* detti *minatori*, ſiccome i *vermi* di certe ſpezie di *galle*, e quelli, le cui *moſche* depongono le uova in altri *Inſetti*. V' hanno anche nella terza i *bruchi*, che prendono figura di *farfalle diurne*, e di *notturne*, e i *bachi*, che ſi cambiano in *moſche*, in *ſcarabei*, e in *cantaridi*, e quelli in oltre

che ſi diſtinguono col nome di *pidocchi*, ed altri con quello di *lioni* de' medeſimi *pidocchi*, e alcuni *ragnatelli*, e alcuni *bachi*, che non ſi trasformano mai. Nulla dovrò dire di quelli, che altrove ho deſcritti.

3. Quanto alla prima claſſe: *rughe* ſottiliſſime, e brevi ſtavano il dì 8. di Maggio del 1753. ſopra creſcenti foglie di ottimo grano, e ne mangiavano la polpa ſenza offenderne le fibre. Erano del color bianco-ſudicio, lunghe due linee in circa, con teſta breve giallognola, ſei gambe ſcaglioſe, e quattro membranoſe. Da una eſtremità avevano il pungiglione, dall' altra le due forfici di color chiaro celeſte. Sono dette *geometre*, o *miſuratrici*, perchè nel camminare ſembra, che miſurino il cammino, alzando la parte media del corpo coll' accoſtare le gambe poſteriori alle anteriori, e abbaſſandola col portare innanzi le anteriori, e così ſucceſſivamente. Elle ſi trasformano in *farfalle notturne* di color nericcio, lunghe una linea, e mezza in circa, a ſei gambe di color giallo, le cui eſtremità ſono nere, ſiccome lo ſono le lunghe antenne, e il capo. Sporgono alquanto in fuora dall' un canto, e dall' altro del capo i due neri occhi. Il collo più groſſo del capo forma come una faſcia, ch' è di color giallo alquantoppiù cupo di quello delle gambe. Le ale ſono tutte nere, e le tengono parallele al piano di poſizione.

4. Della parte più tenera delle foglie pur ſi paſceva una *ruga gialla*, lunga per ben otto linee, dal

dal cui ventre traſparivano le viſcere, ed era eſſo compoſto di dieci zone cartilaginoſe, le quali non circondano tutto l' addome, ma terminano a' fianchi. Queſte venivano diviſe da certe mammelle carnoſe, che tengono luogo di gambe. Tutto il corpo era di figura *cilindrica*, e finiva in piano. La teſta liſcia, e lucida ſi diſtingueva dal reſto peloſetto, benchè del color giallo medeſimo. Nella eſtremità ſuperiore di queſta regione ſi vedevano due punti neri molto diſtinti fra loro, che ſi poſſono valutare per gli occhi. La ſomiglianza, che in queſta *ruga* ſi trova con una deſcritta dal Signor di REAUMUR (122), che io loderò ſempre come uno de' più accreditati Scrittori di Storia naturale de' noſtri tempi, e de' più chiari lumi dell' *Accademia delle ſcienze di Parigi*; che vale a dire dell' *Atene* de' noſtri dì, dove gl' ingegni più grandi perdono l' ammirazione per la gran copia, queſta ſomiglianza, dico, mi farebbe dubitare, che foſſe della medeſima ſpezie, ſe l' *Inſetto alato*, che uſcì dal ſuo bozzolo, non foſſe ſtato diverſo da quello, ch' egli poſcia deſcrive. Il noſtro aveva la parte anteriore del corpo, la teſta, le antenne, e la metà de' piedi di color nericcio, eſſendo l' altra parte di eſſi, e del corpo di color giallognolo, e le ale bianco-ſudicie rigate di bruno. De' ſei piedi i due poſteriori erano più lunghi degli altri. Queſta *farfalletta*, lunga due linee, e mezza incirca, è da metterſi perciò nella

(122) DE REAUMUR : *Memoires pour ſervir à l' Hiſtoire des Inſects.* T. 1. *p.* 568.

nella quinta classe delle *notturne*, secondo la divisione da esso REAUMUR stabilita, perchè porta le antenne barbate, ma senza tromba.

5. Ragunai certe galantissime pallottoline, o *bozzoletti* lisci, e di color bigio fatti a guisa di borsellino, che alle foglie non meno, che particolarmente a' gambi del grano nella fine di Maggio, e in Giugno si attaccavano, e dove si chiudeva una crisalide. Sono molto differenti nella struttura da' bozzoli comuni. Quantunque questi *bozzoletti* fossero di una piccolezza straordinaria, erano pur tuttavia così trasparenti, che si scorgeva l' aumento dell' interno vivente, quando sulla punta di un ago si opponevano al lume del Sole, e si mettevano al foco del *Microscopio*. Essi vengono tessuti da que' *bruchi* funestissimi divoratori del grano in erba, che abbiamo sopra descritti, e stanno fra la *ruggine* della seconda spezie, Tav. V. Fig. 1. 4.. In otto giorni mi nacque una *farfallina* femmina, e fu maggiore del maschio, che pur mi nacque in altrettanto tempo, Tav. V. Fig. 2. 3. 5. 6.; ma l' una, e l' altro erano così piccoli, che mal si distinguevano. Fu mero accidente, che io le scoprissi, perchè stavano appiattate sotto le foglie nell' alberello, dove più volte io aveva ricercato per esse, nè mi era riuscito di poterle rinvenire. Ebbi attenzione di esaminare un dì quelle foglie senza toccarle, e ve le trovai, e se ne volavano via ad ogni piccolo moto delle medesime. La *farfallina* femmina ha il *capo* piccolo, e diafano, irsuto di alcuni

cuni peli finiſſimi del color caſtagnino, e punteggiato di nero, con due occhi roſſi rilevati, che ſembrano diviſi per metà da una linea, che gli traverſa. Porta ſulla fronte le due *antenne* (123), che ſono pennate, e di color biondo chiaro. Sotto la bocca, che ſta in mezzo alle due oſcure pallottoline degli occhi, ſi veggono due piccoliſſime *gambettine*, che in altri ſimili minuti animali ſono quattro, e furono da alcuni dette in latino *proceſſus*, non avendo gl' Italiani dato loro nome alcuno. Queſte, checchè ne dica il VALLISNIERI, non ſembrano eſſere ſtate formate, ſe non che per accoſtare il cibo alla bocca medeſima. Il *dorſo* è pure coperto di peli finiſſimi, ma lunghi, e di color giuggiolino, ſiccome d' altri più brevi lo è tutto il corpo cilindrico compoſto di ſette *zone* diviſe l' una, e l' altra da un cerchio, ch' è bigio oſcuro, ſopra la *ſchiena*, ma che mutaſi in bianco-ſudicio ſotto il *ventre*. L' ultima *zona* è chiuſa da una pendice oſcura iſpida di più ſetole. Le quattro *ale* hanno ampiezza proporzionata, e le inferiori tanto quaſi ſi allungano, quanto le ſuperiori, le quali ſono di color roſſigno chiaro, in alcuni luoghi miſto di acquerello di lacca, che ſul mezzo chiude una faſcia bianca, e ne' lembi paſſa a un color bigio. Il roveſcio è degli ſteſſi colori, variando eſſi ſolamente nell' eſſere più pallidi, e dilavati. Le *ale* inferiori hanno pure

(123) Con acconcio vocabolo ſi dicono queſte dagl' Italiani *antenne*, e così chiamar ſi udirono le corna degl' Inſetti per fino da ARISTOTELE *Hiſtor. anim.* l. 4. c. 7. per ſimilitudine forſe a' que' legni delle Navi, a' quali ſi appiccano le vele.

pure i medeſimi colori accompagnati dalle medeſime macchie delle ſuperiori. Il petto di fondo giuggiolino carico, è coperto da' peli bianchi, de' quali ſono pure coperte le gambe. Il maſchio, che ſi trova, come diſſi, di minor mole, ha il *capo* vagamente irſuto di finiſſimi peli biondi, e gli occhi di colore criſtallino circondati da un giro nero. Le *antenne* ſono differenti da quelle della femmina, perchè non pure ſono pennate, ma ciaſcheduna delle medeſime è compoſta di ventidue nodi di colore gialliccio, e nel margine d' ogni nodo eſcono due ſpini fleſſibili, che vengono contornati di finiſſimi peli, e tanto queſti peli, quanto gli ſpini ſono di color biondo. Il *capo* è diviſo dal *corpo* per una faſcia di peli bianchicci, la quale termina nell' attaccatura delle ale. Tutto il *corpo* è di ſette anelli con peli di color giuggiolino, i quali hanno nel principio queſto color più carico. Il petto è a quello della femmina ſomigliantiſſimo. Le *ale* ſuperiori ſono del color di cannella miſto al perſo, terminando in una faſcia bianca miſta con bigio. Le inferiori ſono di un belliſſimo color di cannella chiara, circondate verſo a' lembi da una faſcia ondata del colore medeſimo, ma più ſcuro. Tinto è il roveſcio de' colori ſteſſi, e vivaciſſimi, e ſimili al dritto. Queſte *farfalline* ſi accoppiano poco dopo la loro naſcita ſotto quelle foglie, e la femmina depone ben toſto le *uova* inviſibili ad occhio diſarmato, Tav. V. Fig. 7.. Sono eſſe di figura cilindrica con baſi conveſſe. Dopo alcuni

pochi

pochi giorni eſcono dalle medeſime le ſopraddeſcritte piccoliſſime *rughe* ſimili a' *bachi*. Queſta ſpezie di *farfalle* raſſembra a un' altra di grandezza molto maggiore, che ſi nutriſce del *dauco*, la quale in queſto ſolo da quella differiſce, che la femmina ha bigio ſcuro il dorſo, verde la diviſione degli anelli, grigie le ale ſuperiori, bigio chiaro il petto; e il maſchio ha bigj chiari i peli de' ſette anelli, del colore in parte di cannella, e in parte di caſtagno miſte al perſichino le ale ſuperiori, attraverſate da tre linee di color biondo chiaro, e le ale inferiori paſſano verſo il lembo a un colore ſcuro ondato, che termina in una faſcia del color di carne. Neppure la ſua *ruga* differiſce dalla noſtra nella forma di *verme*, ma ſolo anch' eſſa nella grandezza, e ne' colori, che ſono verde, nero, e giallo. Notturne ſono quelle, e con tromba, ſiccome le noſtre mi ſembrarono, quantunque la loro tromba non ſi diſcerna chiaramente.

6. Una piccoliſſima *ruga bianca*, Tav. V. Fig. 12., che ſendeva le ſoglie, trovai, che aveva la parte poſteriore del corpo più groſſa dell'anteriore; dalla qual' eſtremità eſcono due pendici brune, e ſcaglioſe, parallele fra loro, e ſaranno le antenne. Immediatamente ſopra queſte ſi diſtinguono quattro punti neri collocati in circa a' quattro angoli di un piccolo quadrato, e ſi può credere, che ſieno gli occhi dell' *Inſetto*, diſpoſti appunto come quelli di qualche *ragno*. Queſta *ruga* fece il ſuo *bozzolo* verſo il principio di Giugno, naſcon-

dendolo dentro una foglia piegata, Tav. IV. Fig. 3.. La *criſalide* è una di quelle, che non hanno figura conica, avendo tagliate le due eſtremità, delle quali quella della coda è più groſſa di quella del capo, Tav. V. Fig. 13.. Si potrebbe mettere queſta *ruga* fra quelle, che il REAUMUR (124) chiama *arpenteuſes à dix jambes*; e tante appunto ella ne ha, perchè la *farfalla*, che ne deriva, a quella claſſe ſingolare delle *notturne* appartiene, di cui le femmine mal ſi diſtinguono da' maſchi, e mal ſi conoſcono per *farfalle*, perchè ſono quaſi ſprovvedute di *ale*, Tav. IV. Fig. 4. 5.. La noſtra *farfallina* per la ſua piccolezza non può eſſere ben diſtinta, mentrecchè l' occhio non ſia bene armato di *lente*; è tuttavia più grandicella di quella della *ruggine*, di corpo ſpianato, di color verdiccio, con due alette non traſparenti, e quaſi inutili per volare, e ſei piedi neri, due occhi, e altrettante corna. L' infimo *ventre* è compoſto di più anelli, i quali ella riſtrigne, e poi con impeto diſtende per gettar, o ſcoccare dall' ano lungi da ſe con moto di molla un ſugo bianco viſcoſo, che ſi forma ſubito in una pallottolina, o in un filo ſottiliſſimo lunghetto di ſopra la foglia. Queſto ſugo ſcoccato da molte *farfalline* ſi rende ſenſibile, per modo che appar dolce molto, e ſoave, e ſi liquefà a' primi raggi del Sole (125). Il Signor SEGUIER di Nimes mi ſcriſſe già da Verona,

(124) DE REAUMUR *Mem. pour ſer. &c. T. 2. Mem. 9.*

[125] Il ſugo bianco, e lucido, che getta una ſimile Farfalla, da alcuni è chiamato *manna celeſte* per una falſa credenza; ed è forſe

na, quando colà abitava, e la ſua bella mente di nuove notizie ſempre fecondava, che nel meſe di Maggio, ed anche nel principio di Giugno aveva trovati di sì fatti *Inſetti* ſulle foglie del *cotinus coriaria*, i quali erano giallicci, ſiccome de' verdegialli rigati ſul dorſo del medeſimo colore più giallo, ma colle corna più lunghe de' primi, ſopra quelle del *ſiliquaſtro*, e dell' *arbor Judae*. Queſta mia *farfalla* era morta, quando la feci diſegnare.

7. Gira intorno al grano una elegantiſſima *farfallina*, che ha l' *ale* ſuperiori coperte di piuma finiſſima bianca con macchie nere, e le inferiori ſono nericce. Tav. VI. Fig. 10. 11. 12.. Il *capo*, il *dorſo*, ed il *ventre* ſono di un bianco lucido come argento, e così pure le gambe, ma queſte vengono macchiate di nero. Porta in *capo* due lunghe *antenne* fatte di moltiſſimi nodetti, che la paleſano per *notturna*. In mezzo a due barbe rivoltate allo insù tiene una lunga *propoſcide* di color bianco ſudicio, che ſpeſſo diſtende. Depoſte le ſue *uova* ſopra le foglie della noſtra pianticella, elle ſi tingono prima di giallo, e poi in capo a due, o tre giorni ſi oſcurano, e da eſſe naſcono certe *rughe*, le quali ſono nella loro adoleſcenza bianche, e, ben preſto ingroſſandoſi, divengono alquanto brunette. Si compongono di dodici anelli ornati di neri, lucidi, e ritondi punti, dalla ſommità di

ſe quello *aeris mella*, di cui favellano i Poeti: mele veramente di curioſa ſpezie, difficiliſſimo a raccoglierſi, maſſimamente perchè ſe ne ritrova in poca quantità, e in pallottoline piccoliſſime.

ciaſcuno de' quali eſce un pelo; ma l'anello, che ſuccede al *capo* ſi diſtingue con una macchia nera nel mezzo. Nero pure hanno, e lucido il *capo* medeſimo, e ſparſo di qualche rado pelo. Le ſei *gambe* ſcaglioſe ſono pur nere, e le dieci membranoſe del colore di tutta la *ruga*. Quando ella ha dormito la prima volta, depone la ſpoglia, come fanno tutti i *bruchi*, e ſi vede dipinta di color bigio ſcuro colle ſteſſe macchie, e punti neri, ma più ſenſibili. Poco ſopra a' due primi piedi anteriori ſi veggono allora ſpuntare due bronconcini neri, i quali dopo la terza ſpogliatura ſi ſcuoprono per *ale*. Subito nate cominciano a divorar quelle foglie, dove ſi trovano, e allorchè hanno finito di cibarſi, teſſono un piccoliſſimo, e bianco *bozzolo*, dentro cui ſi chiudono. Da queſti *bozzoli* eſcono dopo un meſe in circa le *farfalline* deſcritte.

8. Si ſgravano delle lor *uova* ad una per volta in qua, e in là ſopra l'anche tenero gambo del grano certe *moſche* lunghe due linee, e forſe più, di *gambe* gialle, di *teſta* equina roſſigna, di *corpo* nere, e d'*ale* del color di tabacco, Tav. V. Fig. 27. 28. 29. 30.. Coteſte *uova* mi fecero ſovvenire di que' *cacchioni*, che dalle *moſche* ſon fatti o ſul peſce, o ſulla carne, che divengon poi vermi, mentovati dal REDI. A queſta razza di *moſche* è tanto ſimile quella de' *roſaj* deſcritta dal VALLISNIERI (126) eſattamente, e figurata, che per aver contezza di eſſa ben a quella deſcrizione io mi ri-

por-

(126) VALLISNIERI: *Oſſer. intorno alla moſca de' Roſaj.*

porterei volentieri, ſe diverſa la noſtra non foſſe alquanto ne' colori del ſuo corpo, e nel deporre le ſue *uova*, le quali non intrude per entro il gambo, come quella fa, ma dopo eſſerſene di tutte ſul medeſimo ſgravata, le abbandona. Piccoliſſimi ſono i *bacherelli*, ch' eſcono da queſte *uova* di colore alquanto brunetto, e di figura *cilindrica*, con baſi conveſſe. Sono eſſi coperti di una pellicella lucida, e traſparente, per cui traluce l' interna loro ſoſtanza, ch' è tutta di un color nero lavato. Si attaccano fortemente alla foglia, e al gambo. Quando ſono in *ninfe*, o *criſalidi*, fanno un volume aſſai minore. Queſte *ninfe* hanno forma di *pinocchi* ſguſciati, e ſono compoſte di molti anelli rilevantiſſimi.

9. Ne' primi giorni di Marzo del 1756. ſi videro nella villa di *Piangipane* in alcuni luoghi più baſſi, e di terreno più forte oſcurate le biade; e le tenere pianticelle del grano, venute meno, e in gran parte ſeccate, apparir verminoſe, e roſſigne. Le oſſervai diligentemente, e vi ſcoperſi infinite *uova* depoſtevi da una ciurma di *moſcherini*, che aſſalite le avevano, Tav. VII. Fig. 1. 2. 3. 4.. Elle erano tutte di figura ritonda, e piccoliſſime, ma non tutte dello ſteſſo colore, e della ſteſſa grandezza, perchè le minori erano bianche, e le maggiori pendevano al carnicino. Tutti però i *verminetti*, che da eſſe nacquero, avevano figura di cono, e ſembravano bambinelli faſciati di colore roſſigno cupo (127).

La

(127) Di queſta razza d' Inſetti s' inteſe per avventura di favellare NICCOLA BREGNY nel *Zodiaco medico-Gallico Men. Decem. Obſer. alt.*

La *teſta* variava di aſpetto a loro talento, perchè veniva coperta da una membrana, che talora la facevano ſembrare un morione. Nell' infimo ventre nereggiavano le fecce, ma niuna delle lor gambe ſi vedeva chiaramente nel ſolito luogo. Poſſono eſſi andare fra quegl' *Inſetti*, che ſtanno in ſocietà. Ho poi anche veduto tra le pianticelle del grano medeſimo ſopra il *cardo volgatiſſimo del* LOBELIO, o ſia l' *onopiſſo del* GUILANDINO i nidi di queſti *bacherelli*. Io credo, che in eſſi il verno ſi ritirino, e vi ſi chiudano. Speſſo forſe l' intemperie dell' aria pregiudica al loro ſviluppo; e certo ſi fan ſolo vedere ne' tempi proporzionati alla loro natura, e tale appunto in quell' anno ſarà ſtata, e in quella ſtagione la temperie dell' aria. Mal per loro però, che nel terminar dell' Inverno uſciſſero, perchè una pioggia gagliardiſſima gli ſorpreſe, e tutti gli diſtruſſe. In que' primi giorni di Marzo, ne' quali, com' è detto, ſucceſſe la ſtrage, era il *Termometro* del REAUMUR a' 15. gradi ſopra il termine di congelazione. La figura de' loro *bozzoli* è quella di una *elipſoide* allungata, e direi quaſi di un *cilindro*, le cui baſi foſſero conveſſe, il loro colore eſſendo quello della

ult. p. 367. quando pubblicò : *conſpecta ſunt Inſecta quaedam figura humana, ac pileo ſimili illi, quem equites catapularii gerunt, donata, a quibus omnino vaſtatum eſt triticum : contrectata digitis crepabant, ſanguinem purum fundentia, cujuſvis mixturae expertem, admodum foetentem.* E per verità, „ che curioſa viſta, " ſcriſſe nella *curioſa origine degli ſviluppi ec.* a tal racconto graziosamente il VALLISNIERI, „ ſarà mai ſtata quella di vedere, come un eſercito d' Omaccini col morione in capo aſſalire un campo di Cerere, „ e con ſanguinoſa battaglia atterrarlo ! "

la *ciregia*. Sono teſſuti con fila, che s' incavalcano, e s' incrocicchiano fra di loro. I *moſcherini*, che ne uſcirono, avevano il *corpo* di queſto medeſimo colore carico, nere le ſei lunghe *gambettine* attaccate ſopra il petto, e le due *antenne* ſul piccolo, e acuto *capo* pur nero. Alla parte deſtra, e ſiniſtra del *dorſo* verſo la cima del *petto* ſtavano appeſe le quattro *ale* del color di *talco*, lunghe al doppio di tutto il corpo, che per altro non eccedeva la grandezza di un piccoliſſimo grano di *miglio*; e le prime erano ſopra le ſeconde attraverſate, e diſteſe. Nell' inferior ventre da una parte, e dall' altra ſpuntavano in fuora due come neri *cornetti*, che terminavano in due oſcure pallottoline, de' quali per anche mi è ignoto l' uſo. Otto anelli molto diſtinti componevano il corpo, e un *cappuccio* molto rilevato copriva il collo. Lunga era la *coda*, e oltrepaſſava almeno la metà di tutto il corpo. Mi avrebbe queſta fatto ſoſpettare, che l' *Inſetto* foſſe una *moſca icneumone*, ſe non aveſſi veduto, ch' ella deponeva le *uova* ſulla ſuperficie delle foglie ſenz' altro più.

10. Intorno alle medeſime frondi ho più fiate ſorpreſo una razza di animaletti neri pigriſſimi, e di varie grandezze, ſecondo la loro diverſa età, non oltrepaſſando per altro la grandezza di tre linee. Da una ſpezie di coperta era veſtita la parte ſuperiore del loro corpo, e avevano un lungo *muſo*, che ripiegavano di ſotto, e ſei gambe molto brevi. Si riſtringono talora in quella loro veſta, come in una pallottola. Ella è di materia

ne-

nericcia teneriſſima, e facile a rilaſciarſi, e di quella forſe de' ſuoi eſcrementi medeſimi, ſiccome il REAUMUR ha ritrovato eſſere ne' *vermi* de' *ſcarabei* di altre piante, e ſpecialmente in alcuni, che ſtanno ſopra le foglie di *gramigne*, di *avena*, e di *orzo*; e queſti noſtri ſaranno forſe del medeſimo genere di quelli, quantunque non della ſpezie medeſima. Speſſo anche ſi veggono ſpogliati delle loro veſte, e ſembrano nudi. Si manifeſtano nella Primavera, e ſi naſcondono nel principio di State. Tali *vermi*, che golosamente mangiano la ſoſtanza della foglia, ond' eſſa poi ſembra ſecca, già molto ſino d' allora ſi aſſomigliano agli *ſcarabei*; ma non mi è riuſcito di poterne fare una compita, e perfetta Storia, perchè non ho potuto ſeguitarli ſino alla loro trasformazione. Non è per altro inveriſimile, che ſi tramutino in certi *ſcarabei* poco diverſi da quelli, che furono dal noſtro REAUMUR deſcritti nelle ſue *Memorie degl' Inſetti* (128), perchè alcuni ſimili ad eſſi ne ho veduti ſulle foglie del grano, ſulle quali prima aveva oſſervati queſti *vermini*.

11. Nel meſe di Giugno del 1753. notai ſulle foglie medeſime alcuni *bozzoletti* fatti a rete di materia denſa, e viſcoſa, di figura *sferoidale*, e del colore di *cocco*. Da queſte nacquero poco dopo ne' miei alberelli alcune ſpezie di *cantaridi* non più lunghe di mezza linea di *corpo* ritondo, ſcuro, e come dorato, con ſei *piedi*, e due *corna* nere, e *teſta* piccoliſſima del medeſimo colore.

12.

(128) DE REAUMUR *Mem. pour ſer. &c. T. 3. mem. 7.*

12. Molti *uovicini* di figura *cilindrica*, e di colore *caſtagno* mi furono fatti vedere nella parte inferiore delle noſtre foglie del grano, l' aſſe de' quali era quanto una mezza linea, e il diametro quanto un quarto di linea. Avevano un coperchietto ſulle baſi circolari, l' una delle quali poſava ſopra la foglia, e l' altra ſuperiore era quella, da cui uſciva il vivente. Stavano con mirabil ordine diſpoſti in due fila, e tenuti inſieme da un umore viſcoſo. Erano tutti ſtati laſciati da un medeſimo vivente, e me ne ſono poi accertato per altri mucchi di queſte *uova*, ſopra altre tenere foglie ritrovati. Il numero loro non è ſempre il medeſimo, perchè alle volte ne ho contate ſino a 18., alle volte 14., e per lo più 10.. I nati *bacolini* trivellarono le foglie, e queſte furono il loro alimento. Avevano il corpo di 11. anelli, o ſegmenti ſenza quello, che veniva a formare il capo. Tutti comparivano rilevati, e di color pavonazziccio carico, e alcuni macchiati di giallo carico, particolarmente quelli, ch' erano verſo la parte del *capo*. Alquanti ſpuntoncini del medeſimo colore pavonazziccio adornavano ciaſcun anello, e, ſe ben ſi aguzzavano le ciglia, chiaramente ſi ſcopriva, che quelli erano fiocchetti di peli. Le otto *gambette* ſcaglioſe avevano pure il medeſimo colore, e uſcivano dalla unione degli anelli anteriori, il primo de' quali formava come un *cappuccio* pavonazziccio macchiato di giallo, ma ſenza ſpuntoncini. Erano lunghi di cinque linee, e groſſi di due, e veramente molto

vaghi a vederſi. Queſto *verme* incriſalidì, e dopo ſei giorni, crepato il dorſo alla *ninfa*, nacque una galantiſſima *cantaride* ſimile ad una *teſtudine*. I due terzi inferiori del ſuo corpo hanno un fondo del color di canna, e ſono circondati da macchie nere, alcune delle quali formano certe linee quaſi ſpirali, a' capi delle quali giacciono alcune ritonde macchiette roſſigne. L' altra terza parte, ch' è l' anteriore, figura ſolo quaſi il *cappuccio* del *verme* medeſimo, e s' interna nelle due inferiori, ed è macchiata di color d' oro, e di bianco. Le ſei *gambe* in parte nere, e in parte gialle, le *antenne* tutte nere, il *ventre* del color di canna. La lunghezza di tutto l' *Inſetto* non è minore di due linee, e mezzo, e la larghezza nella parte maggiore di quaſi due linee. Ha quattro *ale*, delle quali le due inferiori ſi ſpiegano per di ſotto le ſuperiori, che ſono più brevi, e il loro colore è quello del *talco* finiſſimo.

13. Curioſo, e degno da vederſi è un *verme* di color verdiccio contornato ne' fianchi di peli ſcuri, avendo nel mezzo al *dorſo* una linea pel lungo di un bel colore verde carico, contornata da un' altra linea bianca, Tav. V. Fig. 31. 32. 33.. Il mezzo del *ventre* è tutto ombreggiato di ſcuro, e il fondo è di color cedrino. Scuro è il *capo*, ma tanto il tiene rivoltato allo ingiù, che non vedeſi agevolmente. L' eſtremità del *corpo* è corredata di due lunghi ſpuntoni acuti, e tutto il medeſimo è compoſto di 12. anelli, con ſei *gambe* verdi ſcaglioſe. Quando ſia ridotto alla ſua total perfezione,

ne, egli ſi attacca alla foglia, e così reſta immobile, e come ſtordito per varj giorni, e quindi, ſpogliandoſi della ſua pelle, ne rimane una vaga *cantaride*. Queſta ha il *capo* nero lucido coperto di una cartilagine bianca traſparente, la quale ſul dorſo avanzandoſi alcun poco, forma un *cappuccio* colorato di liſcio cinabro, ſotto cui ſcappano le due *ale* membranoſe, e le due cartilaginoſe, che ſervono di riparo, e di *vagina* alle prime, che ſono più deboli, e di una teſſitura di tendini, e di muſcoli sì fatta, per la quale in ſito ſtrettiſſimo tutte ſi ripiegano, e ſi ſtringono. Nericce ſono queſte, e traſparenti, laddove quelle di color verdiccio punteggiate ſolo di nero, e opache. Di dieci nodi ſi compongono le nere *antenne*. Tinto pur di nero è il *petto*, ſiccome anche il *ventre*, ch' è di ſei *zone* contornate di bianco, nelle quali molti peli ſi ravviſano; ma la parte ſuperiore al petto ha tre punti roſſi per banda. Le ſei *gambe* verde-chiare ſi ſcorgono attaccate al ventre con un groſſo capo nodoſo. Quantoppiù conſidero queſta *cantaride*, tantoppiù mi ſembra ſimile ad un' altra, che depoſita le ſue *uova* ſopra le *bietole ortenſi*. Il *verme* di queſta *cantaride* ſtava in fatti ſopra l' erba del grano fatto da me ſeminare in orto della Villa di *Santo Stefano*. Sono tali *uova* del colore di tabacco, e la loro figura pende al ritondo, e non eccede la grandezza di un grano di *ſenape*. Stanno eſſe ammonticellate, e inſieme appiccate ſopra la foglia da umore viſcoſo, che ſembra vernice, e che le ricuopre. Il *verminetto*, ch' eſce da queſto

uovo , è parimente molto consimile al descritto.

14. Ha il grano in erba anche i suoi *tarli*, perchè una *mosca* , che si vede aggirargli intorno , trae la sua origine da un *tarlo* , che si fabbrica sopra quella pianticella la sua casa , che è del color di foglia secca , e l' ho veduta alcuna volta star essa attaccata per di sotto alla medesima, Tav: VI. Fig: 13. 14. 15. 16.. Questo *tarlo* , che si veste di membrane , e si nutre della sostanza delle foglie , per cui in parte si seccano , è di spezie diversa da quelli , che si trovano sopra l' altre piante , ma del genere di alcuni , che il Signor BERNARDO DI JUSSIEU ha osservato sopra le foglie di un *lichnis*. La *mosca* , in cui si trasforma essa spezie di *tarlo*, sembra anche veramente d' un genere diverso dalle mosche degli altri *tarli* , e però io credo , che possa mettersi fra quelle , che il REAUMUR chiama *mouches papillonnacées* (129) , e sicuramente può andare nella sua classe degl' *icneumoni di coda distesa* . Ha la *testa* nera tutta coperta di peli neri mischiati con gialli , e due *antenne* di color nero , del qual colore sono pure due pallottoline , che tondeggiano nella parte destra , e nella sinistra del capo , che saranno gli *occhi*. Il *dorso* parimente è nero , e circondato all' intorno di peli lunghi folti , e neri , e gialli. Il *corpo* nero , e lucido è coperto di peli gialli , e composto di sei anelli , nell' ultimo de' quali ha un pungiglione rauncinato nero , e osseo . Le quattro *ale* sono molto trasparenti , lucide , e di co-

(129) ivi *Tom.* 3. *mem.* 5.

color bigio, e le gambe nere. Il maſchio di queſta *moſca* non varia dalla femmina ſenſibilmente, altrocchè nell' eſſere di lei minore, e in non avere l' acuto pungiglione nell' infimo ventre. Altro uſo non ha un tale pungiglione, che in fare ſtrada entro la pelle di un *baco* della medeſima ſpezie della *moſca* per isgravarſi delle ſue *uova*, renduta ch' ella è feconda. Mi do a credere tuttavia, che più facilmente le depoſiti nella criſalide di quel *baco*, perchè, avendo aperto moltiſſime delle lor caſe, v' ho incontrato le criſalidi medeſime ripiene delle mentovate *uova*. E da queſte *uova* poi a ſuo tempo nacquero piccioli *vermini*, i quali uſciti dalla criſalide ſubito cominciarono a fabbricarſi la propria abitazione, e ſi ſervirono di particelle della medeſima caſa, in cui giaceva il verme, o la criſalide, dov' eſſe *uova* la madre aveva depoſitate. Or vedaſi, che non ſolamente gl' *Inſetti* ſi ſgravano delle lor *uova* ne' luoghi, in cui nulla poi manchi a' loro parti, quando uſciti ſieno alla luce, ma le pongono anche, dove alimento non trovaſi. Queſti *vermi* hanno il *capo* nero, e lucido, ſiccome hanno pure i tre primi anelli, a' quali ſi attengono le ſei *gambettine* anch' eſſe nere. La caſa loro novella ſi vede coſtrutta di finiſſime fila di ſeta. Queſte ſi diſpongono dal *verme* ſopra le particelle di altre caſe, ma ſecondocchè egli s' ingrandiſce, va combinando intorno alla medeſima molti pezzolini di ſottiliſſimi ſterpi, o di fuſcelletti delle tenere fibre ſecche della pianticella del grano, o di altre

ſimi-

ſimili pianticelle, e con belliſſimo ordine gli diſpone, i quali corpicelli non ſi veggono, ſe non quando ſi leva una fortiſſima, e denſa tela di ſeta bianca, che ſopra vi è ſtata poſcia teſſuta dal *tarlo*, o vogliam dire dal *domi-porta*, meritando queſt' *Inſetto* ognuno di eſſi nomi; cioè di *tarlo*, perchè ſucchia l' umor delle foglie, e de' gambi della pianticella, dove poſaſi, e di *domi-porta*, perchè ſeco porta ſempre la ſua abitazione. Subitocchè il *verme* è ridotto alla total perfezione, ſi ferma ſopra un ſottil gambo di grano, e ſpeſſo anche ſopra qualche *giunco*, o altra ſottil pianta, ed ivi attacca col filo viſcoſo della bava la ſua caſa, ſerra l' ingreſſo della medeſima, e vi s' incriſalidiſce. Queſta *criſalide* è del colore di cannella, fabbricata di nove commeſſure in foggia di anelli, ognuno de' quali viene diviſo da un giro nero, e dal primo anello ſcappano due piccoliſſime eminenze ritonde, bianchicce, e luſtre. Dalla medeſima poi ſi ſviluppa la *moſca*, che ſi è deſcritta.

15. Un' altra *moſca*, che non eccede di grandezza le piccole *moſche* volgari, ho oſſervato ne' grani vicino alle *Valli*, Tav: VI. Fig. 17. 18.. Ha la *teſta* ſchiacciata di colore gialliccio, e macchiata di nero. Gli *occhi* ſono anch' eglino neri, e di figura ovale, e infra queſti s' innalzano due lunghiſſime *antenne* compoſte di minuti nodi, e di colore bianchiccio in una parte, e più chiaro nell' altra. Il *dorſo* è nero, e le quattro ale, che ad eſſo ſi congiungono, ſono traſparenti, e carti-

tilaginoſe. Alla eſtremità del *dorſo* nella parte inferiore ſi ſpiccano quattro lunghiſſime *gambe*, avendone due altre minori più innanzi. Ivi s' attiene il *corpo* bislungo per un attaccamento ben ſottile, il qual *corpo* è di color nero faſciato in tre luoghi di giallo. Sotto il forame dell' ano ha due lunghe nodoſe, e ſottili *pendici* nericce con qualche macchietta più nera. Nel mezzo mezzo del baſſo ventre pure nericcio ſta un lungo *pungiglione* di cornea ſoſtanza, e di color caſtagno, che verſo la punta s' ingroſſa, e ſi divide poſcia in tre parti. Queſta *moſca* è un fiero *icneumone* del ſecondo genere del REAUMUR, perchè, al ſuo favellare, ella ha il *trivello* attaccato nella inferior parte del ventre. Eſſo *trivello* è curvo, ma non egualmente in tutta la ſua lunghezza, e forma una linea, preſſo la cui eſtremità piglia l' oppoſta direzione, dove ſi può conſiderare, ſecondo l' uſo de' *Geometri*, un punto di *fleſſo contrario*, benchè ſingolare, ſiccome quello, che divide la porzione concava dalla conveſſa del medeſimo *trivello*, ma quivi è ſnodato. Anche un tal punto oſſervò il REAUMUR nelle ſeghe delle *falſe-rughe*, ma ſenza la ſnodatura. Il verme *domi-porta*, da cui queſta *moſca* proviene, è molto ſimile al precedente, e ſta ordinariamente ſopra i *giunchi* vicino alle *Valli*.

16. Mi è accaduto alcuna fiata di veder treſcare ſulle foglie del grano, e deporre le loro *uova* alcuni di quegl' *Inſetti*, che *lucciole* i Toſcani appellano, e i Latini *cicindela*, o *noctiluca*, ed anche *nitedula*, e *lampyris*, traendola dal Greco λαμπυρὴς.

Quan-

Quantunque ſopra tutte l' erbe elle ſi aggirino, ed anche lungi d' eſſe, non aliene ſaranno dal caſo noſtro varie oſſervazioni, che vi ho fatte in tale occaſione. Il primo, che le deſcriveſſe, fu il COLONNA, come dalle parole ſue medeſime ſi comprende (130). I *vermini*, che naſcono dalle accennate *uova*, ſono alquanto ſimili alle *rughe*. Hanno le ſei *gambettine* attaccate al *petto*, la *teſta* groſſa, e il *corpo*, che termina molto ſottilmente in punta, del colore di talco nericcio. La *criſalide*, da cui eſce queſta ſpezie di *moſca* (131), nulla ha di ſingolare. E' il *corpo* della *lucciola* nella parte inferiore del *ventre*, e un pocolino anche ſopra di eſſo, bianchiccio, nè quel verde ivi ſcorgo, che il nominato COLONNA aſſeriſce, ch' ella abbia, ſiccome nel reſto del corpo quel ſuo negro purpureo. Il *capo* depreſſo ſi compone di due *lobi* corredati di due *antennette* nere, e queſto è tutto coper-

[130] *Fab. Colum. aquatil. & terreſt. aliq. anim. Obſer. c.* 17. *p.* 38. ſegg. *Igneus coruſcans fulgor, quem novum, nec ab aliquo deſcriptum Inſecti hoc genus noctu edit, majoremque, forſitan illo vulgaris Cicindelae, atque alatae Lampyridis, nominis πυριλαμπὶς occaſio eſſet, ac etiam νυκτιλαμπὶς.* Indi anche il MALPIGHI *Op. poſt. T.* 1. *p.* 84. *In epiſ. ad Dom. Bonfil.*, ne ragionò, e parecchie oſſervazioni vi fece ſopra. Ma varie ſpezie di *lucciole alate* tanto ſenza guaine, che con guaine furono regiſtrate dal BOTTONI LEONTINI nella *Pyrologia topographica, i. e. De igne Diſſertatio juxta loca, cum eorum deſcriptionibus*, come traggo dal Tomo II. ſez. IV. de' *Supplimenti agli Atti eruditi di Lipſia*.

[131] Della generazione di queſto Inſetto parlando l' ALDROVANDI, aſſeriſce, che dalle uova partorite dalla *lucciola* naſce una certa ruga, e da queſta finalmente ne viene l' Inſetto alato. Quaſi nello ſteſſo modo vien deſcritta dal MOUFFETO *c.* 15. *p.* 108., da TOMMASO BARTOLINO *De luce animalium l.* 2. *c.* 12., e da RICARDO WALLERO *Obſervationes de Cicindela volante* in *Tranſ. philoſoph. Ang. mem. Jan. an.* 1685. *n.* 167.

coperto da una cartilagine fatta a maniera di *cappuccio*. Le *ale* diafane, che di ſotto al *cappuccio* partono, ben notabilmente avanzano il corpo tutto, qual' è compoſto di dieci zone l' una dentro l' altra, e le ſei gambette, notate dal MALPIGHI (132) per *gemina crurum paria*, eſcono d' innanzi al *petto*. Non ha grandezza maggiore di quattro linee, ſecondocchè io ho veduto, ma il COLONNA la eſtende per fino a un' oncia del palmo Romano, che ſarebbe per lo meno al doppio. L' eſtremità del *ventre* è coperta da un velo, o ſia da una membrana, che viene dall' animale liberamente alzata, o depreſſa, naſcondendovi ſotto l' organo della generazione, e il forame dell' ano. La ſera degli 8. di Giugno del 1755. vidi alcuni di queſti *Inſetti*, i quali aggirandoſi pe' vaſi di vetro, in cui gli aveva racchiuſi, più dell' ordinario ſplendevano, al lume chiaro anche della candela. Naſcoſta queſta, oſſervai, che al bujo or creſceva in eſſi la luce, or diminuivaſi, or ſi riſtava, or veniva rinvigorendo, ora indebolendo-

V ſi,

(132) MARCEL. MALPIG. loc. cit. Quantunque alcune pur con ſei gambe ne deſcriveſſe il Siciliano LEONTINI nell' Opera indicata, egli non oſtante ne parlò in guiſa dalla fin qui moſtrata cotanto diverſa, che parmi di poter ſoſpettare, che quelle ſue lucciole d' altra ſpezie foſſero delle noſtre. Si ſcrive nel Supplimento di quegli Atti, che *conſtat haec alata lucula ex octo quadratulis, quae ſicut & alae in tenuiſſimas deſinunt fibrillas, haeque in unum conſpirant ramulum, qui ad pulmones tendit, uſque ad ſpinam, unde naſcitur. Quadratula haec cuti cartilagineae aligantur, quae ex illis ad invicem ſuperimpoſitis media quadam tenuiſſima membranula ſunt connexa, ut elaſtica quaſi vi ad invicem conſtringi, dilatari, ac ubique ad motuum varietatem contorqueri poſſint; quorum quadratulorum extima pars nigra, ac diaphana quadam lanugine circumdatur, adeo ut villoſi ſerici ſpeciem referat, in inferiori parte, qua ad ventrem ſpectat, eadem, quae ſupra quadratula obſervantur, ſed ſuperioribus molliuſcula.*

ſi, ma in varj tempi, e tutti brevi, appoco appoco ſi dileguava; e perciò credetti ſubito, ch' eſſi foſſero morti, e che la luce ſpenta foſſe in loro nel tempo ſteſſo della vita: ma ben toſto m' accorſi dell' inganno, perchè ripigliato il lume ſcoperſi, che queſti camminavano come prima pe' vaſi, e la loro parte deretana moſtravano bianca, ma ſenza luce. Se non che dopo alquanto di tempo ricominciarono alcuni d' eſſi a mandar zampilli di luce, e a riſplendere al lume pur della candela. In queſto ſtato durarono per quaſi mezz' ora, e dopo aver meſſo qualche rado ſcintillamento, nulla quaſi più in quella ſera riſplenderono. Altre volte molte mi fu agevole di rifare la medeſima oſſervazione, e le medeſime coſe vedere. Se queſti *Inſetti* vengono irritati, non mandano già eſſi luce maggiore di prima, come alcuni ſcriſſero; o ſe ne mandano, è così tenue, che poco ſi diſtingue, e poco dura. Piuttoſto la luce ordinaria, che hanno quelli, che ſono ſtati prima irritati, continua un gran pezzo, e ve l' ho conſiderata per fino a tre ore ſenza interrompimento veruno. E' bensì maggiore una tal luce nel tempo ſereno, e ſecco, che nel nuvoloſo, e piovoſo, e ſembra anzi talvolta, che in queſto la perdano quaſi affatto. V' ha chi crede, che in eſſi non altramente ſi facciano le vibrazioni della luce, che col chiudere, e aprire il luminoſo ventre, ſecondocchè chiudano, e aprano le ale, quando volano; e lo credette FRANCESCO DA BUTI, che ſcriſſe: *le lucciole ſono piccoli animali, come le mo-*

moſche, che hanno il ventre lucido, che pare che ſia fuoco, e chiudono, e aprono queſto folgore, ſecondo che ſi chiudono, e aprono coll' ale, quando volano. Io dirò ſchiettamente, fiancheggiato dalla mera infallibile eſperienza provata, e riprovata, ch' eſſi vibrano la luce, ſebben fermi ſtieno, e immobili, e ſupini, e allorchè punto punto dell' ale valer non ſi poſſono. Io non debbo negare però, che più gagliarde, e più frequenti appariſcono quelle vibrazioni, quando maggiore in loro faſſi, e più ſucceſſivo il moto, ch' è allor, quando volano, o per lungo dibattimento ſi ſono affaticati. Ma ſenza ciò, è noto, che vi hanno *Inſetti* ſenz' ale più grandi molto delle *lucciole*, i quali riſplendono, e vibrano la luce. Mi ſono tal volta incontrato in certi *mille-piedi* vivaciſſimi, e di ſpezie molto comune, che brillavano almeno quanto le *lucciole* maggiori. Ma ſopra tali vibrazioni alcune eſperienze ho fatte più, e più fiate attentamente, per le quali parmi di non andare errato nell' aſſerire, che la velocità delle medeſime ſia in ragione reciproca della grandezza delle *lucciole*, e che il tempo impiegato da eſſe vibrazioni ne maggiori di queſt' *Inſetti* corriſponda in circa ad un regolato battere di arteria (133). Quindi è, che, ſe ſi paragoni una tale velocità con quella del moto dell' onde dell' aria, le quali ſcorrono, ſecondo il Signor DE LA HIRE, 180. pertiche in un ſecondo di tempo, ſi troverà, che la velocità

(133) Il medeſimo MALPIGHI in eſſo luogo ſcrive di aver contate queſte vibrazioni: *rhythmo analogo pulſui cordis quaſi fulgor.*

tà delle vibrazioni di luce nelle *lucciole* maggiori è a quella del moto dell' onde dell' aria nella ragione medesima. Chi poi in cosa tanto chiara volesse essere oscuro, ma più breve, e a una certa razza di persone più grato, potrebbe verificare questo fatto col chiamare la velocità delle vibrazioni mentovate nelle maggiori *lucciole* = a, quella nelle minori = b, la grandezza delle *lucciole* maggiori = c, quella delle minori = d; e sarebbe a: b: : d: c, e in oltre a = 180; ma se supponga si la grandezza delle *lucciole* maggiori = 4, quella delle minori = 2, avremo la velocità delle vibrazioni di luce delle *lucciole* minori = $b = \frac{ac}{d} = \frac{720}{2} = 360$. Io credo, che se l' *Algebra* stessa potesse parlare, ricuserebbe di mettersi in questione sì facile, come in molte altre ricusar dovrebbe di entrare, le quali a' soli principj suoi appartengono. Vollero i Signori dell' *Accademia Reale delle Scienze* (134), che queste vibrazioni di luce accompagnate venissero da un piccolo dolore, o solletico nel dito, o in qualunque altra parte, che loro si avvicini, senza produrne per altro caldo veruno; ed io al certo non saprei disdirlo, che anzi mi sembra, se il credito a cotesti grand' Uomini non mi ha prevenuto, e reso il senso mio delicato, averlo spesse fiate in me esperimentato. Ho talora raccolti con

(134) *Mem. de l' Acad. Roy. des Sc.* 1733. 1734. Della luce di cotesti animaletti scrisse già il Signor DORTOUS DE MAYRAN nella Dissertazione *sur la cause de la lumiere des Phosphores, & des Noctiluques, qui a remporté le prix à l' Academie Royale des Belles Lettres, Sciences, & Arts de Bordeaux pour l' année* 1717., ma ne fu contraddetto dall' HARTSOEKER: *Recueil de plusieurs Pieces de Physique*, ec.

con ottima *lente* i raggi di luce tramandati da *lucciole* meſſe inſieme, ed ho veduto, ch' eſſi non ſono atti ad accendere la polvere di archibuſo, nè quella materia, che ſi mette ſopra la pietra focaja per appiccarvi il fuoco col ſucile, e diceſi *eſca*, ma eſſerlo ſibbene per indurre nella cera tenera qualche piccoliſſima quaſi inſenſibile impreſſione. La quale impreſſione anche al ſenſo del tatto quaſi affatto inſenſibile mi apparve, alloracchè chiuſene parecchie col loro cibo nell' alberello di vetro, ſeparate dal lume della candela, le oſſervai la ſera dopo, nella quale ſebbene vive, e ſnelle mettevano tuttavia vibrazioni di luce deboliſſima, perchè di forza preſſocchè infiniteſima, e queſta luce poi anche via via ſempreppiù riducendoſi a meno, ſe ne dileguò al fine colla morte la forza interamente . Nè luce alcuna in loro rimane quando hanno laſciato di vivere, che anzi nel bujo più denſo non ſi veggono punto, e ſolo al chiaro lume del giorno moſtrano un color pallidetto, e uniforme. So, che il COLONNA vuol parimente rinvenir la luce nel cadavero di queſto animaletto (135): ma io diſtinguerò volentieri la ſua propoſizione, perchè ſe intendere ciò vogliaſi per morte violenta, io accorderolla ; che ſe

per

(135) COLONNA luog. cit. *Poſt mortem etiam lacent in obſcuro cadaveris nates quandiu adſit humor, exſiccato quidem illo, lumen deperditur.* Nel che diſcorda dal LEONTINI, il quale oſſervò, che *lucidam materiam extractam ex nitedula adhuc ſplendere, imo & igni admotam, concremataque ſuccingente pellicula nitorem vivide ſpargere; at & ita exſiccatam, & uſtam lucidam materiam per longum tempus detinuit; & majori indagine proſequens vaſi vitreo aqua pleno repoſuit, ubi immerſam adhuc ſplendentem in aqua ipſa vidit.*

per morte ordinaria ciò anche s' intenda, io negherolla. Non mi ſono incontrato mai di veder quello, che raccontano i *Saggi di naturali eſperienze dell' Accademia del Cimento*, cioè che la proprietà di riſplendere alle ſole *lucciole* femmine ſia dato. Ma ben l' oſſervò quell' avvedutiſſimo Signor di REAUMUR (136), che di tutti gl' *Inſetti* ſeppe incontrar gli andamenti, perchè tenendo egli una di eſſe in mano, venne il maſchio privo di luce a fecondarla. Un caſo ſimile ſcriſſe già il Signor GIULIO PONTEDERA in una lettera al Signor GUGLIELMO SCHERARDO, car. 19., narrando di aver egli veduto ſulla palma della propria mano, dove eſaminava una *lucciola* non alata, che vale a dire un *verme lucente*, volare una *lucciola* alata, e toſto ſeco unirſi all' opera della generazione. Ma qui punto non ſi fermò quel grande Naturaliſta a conſiderare, ſe il maſchio alato foſſe privo di luce; la qual coſa pur ſingolare, ſe veduta aveſſe, egli non avrebbe certamente voluta tralaſciare. I pori degli ultimi anelli della *lucciola* ſono atti fatti per riempierſi di un certo ſugo bianco, ch' è ſenza dubbio l' origine del lume mentovato. Sembra quel ſugo, per avviſo anche dello ſteſſo COLONNA, compoſto di una congerie di globetti giallognoli avvinti in un conſimile fluido glutinoſo, ch' è quello della traſpirazione. Tali globetti ricevono mirabilmente la luce, e la tramandano con una celerità ſingolare,

(136) *Mem: de l' Ac. Roy. de Sc. du* 1723. *Des merveilles des Dails, ou de la lumiere, qu' ils repandent.*

re, onde viene percosso il contiguo aere, e se ne fa subito all' occhio nostro la sensazione. Quando nel fluido glutinoso non sono entrati i globetti, o le bolle ritonde, o quando queste si sono dissipate, già il vivente non mette alcun lume; e siccome possono questi essere formati nel tempo dell' accoppiamento degl' *Insetti* medesimi da una certa fermentazione, che si faccia nella macchinetta animale della femmina, dando il fluido della traspirazione quella disposizion necessaria, per cui ne venga la separazione; così v' entreranno solo in quel tempo; e le stagioni, nelle quali non lucono, saranno quelle, in cui queste *mosche* non hanno alcuna disposizione all' accoppiamento. Di qui è, che lo splendore in esse appare solo ne mesi di Maggio, e di Giugno in circa, passato il qual tempo cessa appoco appoco. Quindi pur avviene, che in esso tempo possono ricoprirsi di tenebre, e ripigliar la luce a vicenda. Non sarà ora difficile d' intendere, che morendo l' animaletto di morte violenta, gli resti il lume per qualche spazio, laddove di morte ordinaria mancando, si dissipano a poco a poco in lui anche que' globetti, e perde la forza, e l' attività di produrne de' nuovi. Mi fu agevole altresì di comprendere, come tratta dall' animaletto la parte lucida, ella seguiti alcun poco a risplendere senza scintillare, e mandi nel comprimerla zampilli di luce, e così se questa è immersa nell' acqua, nell' aceto, o in altro liquido pur anche vi splenda, cioè finchè i globetti si sieno dissipati. Che se

nell'

nell' umido, e nel tempo nuvoloso, e piovoso non appar lucido, forse quelle particelle umide sparse per l' aria smorzeranno, e dilegueranno quella luce, che allora il medesimo da' suoi globetti riflette. Dirò per ultimo delle *lucciole*, che, quantunque tutto il loro corpo sia di minutissime scagliette fornito, le quali vengono i ritondetti lembi de' pori a ricoprire, la parte però diretana è bianchiccia per se medesima, e del rimanente di esso corpo più dilicata, e più tenera, e nella sua composizione in questo particolarmente n' è diversa, che ciascuna di quelle scagliette, o laminette a guisa di embrice va sopra i margini dell' altra, acciò possa dilatarsi, e ristrignersi il ventre, e sotto quelle medesime si veggono col *Microscopio*, e ve gli ho veduti assai delle volte gli accennati globetti giallognoli. Ecco però le vibrazioni di luce, che in questi *Insetti* succedono: com' è al *volatile* in sua posta il volare, all' *Istrice* il gettar le penne, al *Leone* l' increspare i crini, e ad altri viventi altre proprietà, così a me pare il poter dire, che ad essi è in loro posta il chiudere, e l' aprire il varco ne' loro pori alla luce per mezzo di quegli uscioletti, o valvole, che gli ricopre, onde poi ne avvenga la divisata riflessione, e quindi ne succedano le vibrazioni (137).

17 Cer-

(137) E quanto a ciò in parte convengo col più volte citato Bottoni LEONTINI, perchè vedo, ch' egli disse: *Inter septimum, & octavum quadratulum lucida vesicula situatur, quae constrictione obscuratur, dilatatis vero quadratulis noctu refulget, & ad quadraginta circiter passus lucem suam spargit.*

17. Certe fila confuſe talor ſi veggono tra un ſolco, e l'altro de' campi recentemente ſeminati a grano, le quali per loro medeſime alle *tele di ragno* tanto aſſomigliano, ch' era già ſtato ſoſpettato, che poteſſero eſſere fattura di ſimili animali, quantunque da veruno veduti non ſi foſſero. Vano ſarebbe ſtato il dubbio, ſe l' eſperienza dichiarato il vero non aveſſe. Trovandomi io per fino del 1737. a *Piacenza*, e facendo delle medeſime diſcorſo col Padre Abate Don Aleſſandro CHIAPPINI Canonico Lateranenſe mio buon amico, che fu poi Generale del ſuo Ordine, ed era uomo per ſomma erudizione, e per dottrina ſtimabiliſſimo, e a cui l'amore per la ſtoria naturale non permetteva di conoſcere nè fatica, nè pericolo, mi aſſicurò di aver molte volte oſſervato al buon mattino nel più fitto verno alcuni campi tutti coperti di tali fila, ch' erano ſtate prodotte in breviſſimo tempo, ſiccome quelle, che poche ore prima non vi potevano eſſere ſtate, perchè egli aveva veduto mettere poco innanzi que' terreni medeſimi ſotto il lavoro. Una sì mirabile preſtezza nella fabbrica di eſſe ben ſembrava, che poteſſe eſcludere l' opera di qualunque *Inſetto*, giacchè non volevaſi credere, che in quelle notti, nelle quali ghiacciava, alcun *Inſetto* aveſſe forza di tirar le ſue fila così velocemente, e di teſſerle, e d' ingroſſarle. Concludemmo per tanto, che queſta poteſſe eſſere una meteora ſimile ad altre delle aeree, e dicemmo, che in quel campo di freſco arato era un tal fenomeno per avventura potuto accadere per

cagion de' vapori esalati in quel breve tempo nel mosso terreno, giacchè usciti questi dalle viscere della terra, che sono nel verno più calde, e trovato l' ambiente esterno molto freddo, potevano essi costiparsi, e formare un corpo simile a *tela di ragno*. Tantoppiù in questa opinione io mi confermai, quantocchè egli mi assicurò, che il Signor WOLFIO aveva già veduto nel mese di Maggio le *gramigne* di un prato vicino alla Città di *Jena* coperte come da *tele di ragni*, le quali altro non erano, che la *rugiada* della notte passata bellamente sopra le medesime *gramigne* distesa. Se non che nelle ultime mie ricerche, considerando queste tele, una minutissima osservazione mi venne fatta, per cui rimase verità costante il sospetto predetto; mentre divisai chiaramente, che non da altro, se non da *ragni* moltissimi quanto minuti, altrettanto velocissimi queste fila senz' altro si producono. E' cosa piena di maraviglia, come con tanta velocità possano essere le medesime ingrossate a consistenza di tela. Feci pigliar della terra, dov' erano questi *ragnateli*, e portata in casa fu disposta sopra una tavola a maniera di solchi per assicurarmi di momento in momento, come andava il lavoro, Tav. VI. Fig. 19. 20.. Essi stillano il liquore da una parte, e dietro loro va il filo, mentre si slanciano velocissimamente dall' altra banda del solco. Quest' opera forse non sarà impedita dalle stagioni anche più rigide. Ma quel filo non si scuopre in principio, che per mezzo della *lente*, nè si scoprirebbero i medesimi *ragnateli* con essa, quando

gran-

grande attenzione non vi ſi portaſſe. Appiccato in un ſubito con la loro colla un tal filo da quella banda, preſſo a quello ne attaccano un altro, ſaltando indietro per condurre queſto ſecondo, dove cominciarono il primo. Saltano, e riſaltano in tal guiſa più fiate, e ſembra, che volino, e mai ſi fermano, e queſti primi fili loro ſervono di piano per altri fabbricarvene ſopra, e far la tela molto ſenſibile. Niente di queſto ho potuto vedere ad occhio diſarmato; e ſiccome la velocità, con cui mettono a fine un tal lovoro, è ſempre ſorprendente, così è molto credibile, ch' eſſi facciano più fili alla volta per una ſpezie di grata, che in loro opportunamente appare. Queſto *ragno* non fila per traverſo della tela nella maniera, che fanno gli altri, ma incolla l' un filo ſull' altro, più volte l' addoppia, e ciò fa particolarmente nella eſtremità della ſua lunga tela, il che più preſto ſi eſeguiſce dal medeſimo, che non farebbe in qualunque altra maniera di operare. Si vede bensì alcuna volta, ma con molta pena, qualche radiſſimo filo tranſverſale, che mette, come centro, laddove il *ragnatelo* minutiſſimo ſta ritirato. Io feci ſolcare una ſera di mezzo verno un terren dolce, nel quale aveva ritrovato queſta tela; la notte gelò, e ciò nulla oſtante la mattina ſeguente per tempo trovai rifatto il lavoro, ma di notabilmente minore conſiſtenza, e tenacità, e groſſezza. Ebbi queſt' eſperimento per più giorni continvati, finchè più nulla ſi vide. Biſognerà dire, che non ſolo debba eſſere abbondante la palla, o ri-

ſerbatojo della gomma viſcoſa, che fila queſto animaletto, ma che più volte ſi rifaccia quella materia, ſecondocchè eſſa vien meno nel fabbricar tela così ſenſibile in tempo così breve, e ch' ella manchi finalmente, ma non manchi il *ragno*, che a lungo vive, anche ſenza alimento, eſſendochè alcuni, preſi a' 15. di Aprile, camparono ſino alla fine di Gennajo ne' miei alberelli; e oſſervai parimente, che uno di quegli dopo eſſere ſtato rinchiuſo due meſi, gettò la ſpoglia ſana, e intera, della quale un altro *ragno* indugiò a ſpogliarſi dopo tre meſi. Queſto noſtro veduto col *Microſcopio* ſi fa conoſcere per molto diverſo degli altri ordinarj. Ebbi curioſità di eſaminarne la ſingolare ſtruttura, e dopo qualche tormento di ſpirito, e diligenza di mano rinvenni, quanto bramava. Egli non è ſolamente, ma neppure ſi aſſomiglia a quello delle campagne, detto volgarmente *falangio*, di cui parla LEEUWENHOEKIO (138), e le cui fila laſciate in balìa del vento ſpeſſo nel Settembre, e nell'Ottobre ſi uniſcono in lunghi ammaſſamenti bianchiſſimi, che ſi ſtendono per l'aria, e ſi fermano per tutto. Neppur è d' alcuna di quelle ſpezie, che annovera il LISTER (139), nè di

[138] LEEUWENHOEK: *Arcan. Nat. T. 2. ep.* 135. Il Ragno delle *tele volanti per l' aria*, è ſtato pure oſſervato da LORENZO SCHAERDING, il quale ſe ne credette primo ſcopritore, come appare nell' *Hamburgiſches Magazin VIII. Band.*, ec., cioè *Promptuarium Hamburgenſe, ſive Collectio Scriptorum, inſtitutionis, & oblectamenti gratia ex phyſica, & humanioribus litteris collectorum*, ec. *T. VIII. Par: III. p.* 316. Ma vegganſi le Note del KAESTNERO alla *Inſettoteologìa* del LESSERIO.

[139] LISTER. *De Arcan.*

di quelli piccoliſſimi nati da *uova* non maggiori de' granelli del *panico* oſſervati da ARISTOTELE, de' quali diſſe: πηδᾶ δὲ εὐθὺς, καὶ ἀφίστιν ἀράχνιον, cioè, che *ſaltano, e laſciano la tela*. E piuttoſto ſi potrebbe raſſomigliare ad uno di quelli, che riporta il Conte MARSIGLI (140) per ritrovati lungo il Danubio. Egli ha la *teſta*, e il *petto* uniti al ventre, in maniera che luogo di ſeparazione alcuna non vi ſi ſcorge, come negli altri *ragni*. Eſſa teſta è groſſa, e incaſſata nel petto, il quale ſi dilata, e poſcia ſi riſtrigne nel ventre, la cui parte inferiore termina in acuto, e ſi divide in due lunghe pendici. Ha due macchie ritonde, nere, e lucide ſulla parte deſtra, e ſulla ſiniſtra del capo, che ſaranno gli occhi, e dal medeſimo ſi ſpiccano due piccole branche, le quali hanno ciaſcheduna un lungo pungiglione. Quattro *gambe* molto lunghe, e ſottili ſtanno attaccate ſotto il petto, ed altre due alla metà del ventre, e ſono tutte articolate, ed hanno le punte adunche. Si veggono nel fondo del *ventre* alcune papille, dalle quali ſi ſtilla quella materia, ond' egli è ripieno. Il ſuo colore è nero-pavonazzo, che nell' eſtremità pende al terreo. Di queſti medeſimi *ragnateli* ho trovato alcune volte fra quelle radici del grano, che io veniva eſaminando col *Microſcopio*, e mi ſono fuggiti velocemente, nè ho potuti vederli ad occhio diſarmato. Ho bensì veduto alcune pallottoline fatte della lor tela, dentro cui incalappiate ſtavano alcune minutiſſime *uova*, dalle quali a ſuo

[140] MARSIGLI. *Danub. Pannon. Myſic. Obſer. T. VI.*

ſuo tempo eſſi *ragnateli* mi nacquero. Alcuni di altra razza, che già ſulle radici aveva oſſervato, vidi pure ſopra alcuni gambi di grano, ed erano bianchi con gambe di una ſmiſurata lunghezza, e ſottigliezza. Chiuſi in una ſcatoletta, dov' era un ſemplice piccoliſſimo foro, uno di queſti *ragnateli*; durò in vita per lo ſpazio di ben tre meſi ſenza nutrimento alcuno, e morto ch' egli fu, notai dentro alla tela da lui fabbricata un minutiſſimo ſaſſolino eguale a un grano di arena veſtito, rotondo, e bianchiccio con pendice ſcura, e frangibile come legume. Non altro lo credetti, che il ſuo *bozzolo*. Un' altra ſpezie di *ragno* aveva appiccato la ſua tela ne' 22. di Maggio a due gambi di grano, e da eſſa veniva ſoſtenuto un ſacchetto roſſiccio, dov' erano ripoſte le ſue uova pure roſſicce, ſiccom' era egli medeſimo. Chi ſa, che fra queſti non ſia quella ſpezie di *ragno*, che PLINIO (141) trovò nelle *robiglie*. Ma qui io prima di terminar queſta claſſe dirò, che da altri bozzoletti oſſervati tra il grano ſopra varie maniere di pianticelle altre generazioni di *moſcherini*, e di *farfalle* mi ſono nate, alcune delle quali erano così minute, che appena dagli occhi potevano eſſere ſeguite per la piccolezza loro; ma di eſſe non più.

18. Paſſando ora agl' *Inſetti*, che ſi trovano in tutta, o in parte della loro vita, chiuſi negli ſteli, o nelle radici del grano, o nel grano medeſimo, o negl' involucri delle ſpighe, o ſotto l' epidermide

[141] PLIN. XVIII. 17. *Naſcitur & phalangion in ervo, beſtiola aranei generis, ſi hyems aquoſa ſit.*

mide delle foglie, o in alcune ſpezie di galle, avvertirò, che diverſe *rughe* trovai nella Primavera del 1753. variamente colorite, perchè alcune gialle con teſta nero-lucida, altre bianche con teſta, e primo anello giallognoli, tutte di dodici anelli, e non avevano più di ſedici gambe, ond' erano del medeſimo genere, quantunque di ſpezie diverſe. Stavano dentro ad alcune ſpighette non per anche uſcite da' loro involucri, delle quali ſi vedevano corroſe le cime, e manucate molte ſpoglie col fiore del grano, ch' era nelle medeſime racchiuſo. E fra queſte ſpighette ſe ne contavano alcune di grano buono, alcune di *grano carbone*, altre di *ghiottone*, ed altre di altra ſpezie. Tutte queſte *rughe* ſi miſero a fare il *bozzolo* ſotto le foglie tra il giorno 12., e il 17 di Maggio, e ne uſcirono *farfalle diurne* alla metà di Giugno. Elle avevano ſomiglianza baſtante fra loro, onde io le doveſſi giudicar tutte della medeſima claſſe, come già delle *rughe* io aveva giudicato, benchè foſſero di ſpezie diverſe per qualche piccola varietà di colori, che pur fra le medeſime ſi ravviſava. Sono per altro comuni, e ſi veggono anche ſopra altre pianticelle.

19 Ebbervi alcuni gambi mezzo ingialliti, i quali portando le parti eſteriori ſaniſſime, avevano l' interno midollo manucato da un *bruco*, che abitava l' internodio ſuperiore, e il cui bianco, e diafano corpo era giallo nell' eſtremo, portando alcuni punti più carichi lungheſſo il dorſo. Nel ſuo nido ſi vedevano gli eſcrementi, e queſti

per

per lo più nella parte inferiore del cannellino, dove prima ſtava anche il *bozzolo*. Nero era l' acuto *capo*, e nere le ſedici gambe. Poco diverſe queſte *rugbe* mi ſembrano da quelle, che il REAUMUR ebbe da' gambi della *ſcrofularia*, dell' *enulæ campana*, e delle *latughe*. Si trasformano in *farfalle* della quinta claſſe delle *notturne* di queſto Autore, che ſono bianco-ſucide con tinta del colore di *uliva*. Ciò vidi nel dì 21. di Giugno dentro il vaſo, dove nel dì 15. di Aprile aveva meſſo una di eſſe col gambo medeſimo, nel quale ella abitava, perchè fece in tal vaſo il *bozzolo*, la cui figura nulla ebbe di particolare, eſſendo più rilevata nel mezzo mezzo, che altrove, e dalla *criſalide* uſcì in breve tempo una delle predette *farfalle*, il colore delle cui *ale* s' imbruna, quantoppiù ſi avvicina al lembo.

20. Cavai da' granelli di alcune ſpighe certi *verminuzzi*, che loro avevano mangiata tutta la interna polpa. Erano bianchi lattati, lunghi poco meno di una linea, ſottiliſſimi, avendo il *corpo* di forma conica, la *teſta* diafana, e ritonda, e la *bocca* armata di due ſeghe taglienti, alquanto colorite. Non vivono d' altro, che dell' accennata polpa del grano, e quindi alcuni, che mangiato non avevano abbaſtanza, ſi avventavano ingordamente ad eſſo,

Ut Lupus in placidas ſanguinolentus Oves.

Gli miſi dentro a un alberello, dov' erano delle ſpighe, e quivi s' incriſalidirono ben toſto, ma prima ſi cacciarono dentro a quelle ſpighe, dove ſtet-

tero

tero rintanati fino alla loro maturazione; perchè nel termine in circa di 20. giorni uſcirono da' creduti vermi non già moſche, ma piccole *farfalle notturne* bianco-ſudicie picchiate di nero da metterſi nella claſſe quarta del REAUMUR. Quindi ſi fa manifeſto abbaſtanza, che coteſti non ſono que' *verminetti*, o piuttoſto bruchi annidati in ſeno de' grani, quando le ſpighe ſi moſtrano tra verdi e bionde, da' quali poi ſul granajo naſcono le *farfalle*, e che furono deſcritti, e illuſtrati dall' inſigne qualificatiſſimo, e tra' begli ſpiriti, ſecondo la fraſe di Omero, τῦ πατρὸς τὸ παιδίον, Sig. Marcheſe UBERTINO LANDI in un ſuo grazioſo *Ragionamento* inſerito nel Tomo I. del *Supplimento a' Giornali d' Italia*.

21. Sono elegantiſſime da oſſervare certe *farfalline*, che ſopra le foglie depoſitano le loro bianche quaſi inviſibili *uova*, Tav. VI. Fig. 1. 2., e da queſte ſortono piccoliſſime *rughe* del genere delle *minatrici*, che il REAUMUR chiama *mineurs en galerie*, dipinte di un vivaciſſimo colore d' ambra lucente, perchè ſubito nate cominciano a ſolcare la tenera foglia, s' inſinuano tra tunica e tunica, e di quella ſoſtanza carnoſa alimentanſi, e così viene ciaſcuna a formare una ſtradicella, e come un' aſcoſa mina ſerpeggiante larga nel ſuo principio quanto un capello, la qual' è ſeparata dalla vicina per mezzo di una parete diviſoria compoſta del medeſimo parenchima, o ſoſtanza interna della foglia. Queſte lunghe, ſtrette, e ritorte abitazioni all' eſterno compajono giallicce, o biancaſtre, o almeno di un verde diverſo da quello degli altri

luoghi della foglia. Ivi dentro s' incrisalidiscono, e scappa fuora dopo alquanti giorni da ciascheduna *crisalide* una delle sopraddette *farfalline*, che hanno la *testa* nera, siccome le *antenne*, che sono lunghette. Al *dorso*, ch' è di colore castagno lucido, s' attengono quattro ale, e le superiori avanzano in grandezza il corpo, e sono circondate nel lembo da un giro di peli lunghi oscuri, che fanno risaltar molto il colore argentino misto al color d' oro lucido, sicchè rassembrano, vedute colla *lente*, coperte di foglia d' oro. L' *ale* inferiori hanno colore di argento lucido; ma il *petto*, il *ventre*, e le *gambe* lo hanno bigio. Questa *farfalla* è *notturna*, e la giudico di quella settima classe del REAUMUR, la quale benchè metta sotto le *diurne*, anche però le considera come *notturne*, e portano due *antenne* fatte a corna di *montone*.

22. Minori di un sesto di linea erano alcuni *bacherelli* del colore di canna, fiorito con colore più vivo, e con maniera particolare accoppiato, ne' quali non si vedevano *gambe*, ma sibbene due *antenne*, che rimovevano costantemente. Poco camminavano, ma bensì saltavano talora, come fanno le cavallette. Si possono collocare fra' *vermi minatori* del REAUMUR, perchè si fanno delle strade tra la epidermide superiore, e la membrana inferiore della foglia, che secca, e gialliccia ivi appare. Abitano per qualche tempo quelle lor tane, dalle quali usciti più non vi ritornano. Mi sono dato a credere, che ciascheduno di essi abbia u-

na

na ſtrada aperta nella foglia, la quale non comunichi con le altre; perchè non vi ho contati mai più *vermi* di quello, che foſſero ſtrade. Anche il REAUMUR non ha mai veduto nelle foglie degli alberi fuorchè un *verme* in ciaſchedun luogo minato. Naſcono da *uova* quaſi invisibili del medeſimo colore, e queſte ho trovate alcuna volta, e non ſenza ricercare colla *lente*, ſulle foglie bianchicce, e picchiate del grano. Vi ho anche veduto la mattina di buon' ora i *verminetti*, e più non ve gli ho ritrovati, quand' alto il Sole faceva vederſi ſull' Orizzonte, e quando le foglie medeſime erano raſciutte, perchè mal ſoffrono il caldo, e ſaltano al baſſo del gambo, e s' intanano dentro i principj delle foglie. Si trasformano preſto in *moſcherini* a due *ale* del colore di *talco*, o di un colore, che tira al biondo, le quali ſorpaſſano di molto il corpo, ch' è di color celeſte, avendo eſſi la teſta lunga colle due corna, e le ſei gambe nere. Vidi la loro *ninfa* chiuſa in un piccolo *bozzolo* fatto della pelle medeſima, che il verme ha abbandonato.

23. Nel principio di Primavera del 1754. traſſi dal *parenchima* di una foglia, picchiata in più luoghi, ſcolorita, e ripiena di lunghe tortuoſe ſtrade dirette verſo le fibre principali, un *verminetto minatore* tutto del colore di *talco* con una macchietta bianca ſul dorſo. Era fatto a cono, lungo mezza linea, ſenza gambe viſibili, ma con due antenne capillari bionde, e lunghe quanto lui medeſimo, col capo ritondo munito di forfi-

cette con due occhi neri. Costa di otto commessure, o anelli, se male non ravvisai. Morì senza trasformarsi; ma un altro, ch' era uscito da una di quelle stradicelle, si trasformò all' ordinario di questi *vermi* in *ninfa* del color di mele chiusa nel suo *bozzolo*, da cui venne in breve, e dentro Maggio un *moscherino* nero di sei gambe, di quattro antenne, e di due alette, che coprivano la metà solo del pelosetto corpo.

24. Ebbi certi *bacherelli* fatti a cono, lunghi quasi una linea, di color rosso, di dodici anelli, all' ultimo de' quali sta la coda nera alquanto sottile, e lunga, Tav. V. Fig. 21. 22. 23.. Le nere antennette sono di una sottigliezza estrema. Il *capo* è nericcio, e lo sono pure le sei *gambettine* scagliose, non vedendosi le membranose, per cui sembra, che si strascichi dietro il corpo. Cotai bestioluzze si stavano non tanto sopra i granellini di *frumento*, quanto sopra quelli di *carbone*, e di *ghiottone*, e non solo in mezzo alla loro materia gialla polverosa, ma fuor pure di essa. Siccome una tal materia fu dal VALLISNIERI tenuta per ispezie di *ruggine*, così questi animaletti da lui si vollero per cagione di essa *ruggine*, non menocchè del *grano carbone*, e però disse: *ordinariamente ogni grano ha un verme, o due, o tre, che lo macchia, e divora* (142). La qual cosa non parmi vera, come

[142] VALLISNIERI: *Della cur. orig. degli Svil.*, ec. Questo medesimo Autore giudica, che tali verminetti sieno que' dessi, „ de' „ quali fece menzione Plinio nel Lib. XVIII. c. 17., dove trattando „ *de vitiis frugum, & remediis*, lasciò scritto: *Gignuntur* (*ver-*

„ *micu-*

me vero non parmi, che quella materia gialla ſia prodotta dalla roſura di tali *bachi*, ch' ella ſi trovi ſolo, dov' eſſi ſono, e che il grano reſti diformato, e divorato da' medeſimi, come altrove ſi vedrà. Il noſtro *Inſetto* della *ruggine* è *bruco*, e non *baco*, come ſi è veduto. La *criſalide* di queſti *bacherelli* è giallognola, e vibra ſalti, quand' ella è tocca. La ſua forma è pur conica, e ſopra la baſe del ſuo cono ha un pennacchietto del medeſimo colore. Il *moſcherino*, che ne ſcappa fuora, è del colore del tabacco, ha due lunghe *antenne*, la *ſchiena* rugoſa, e ſquallida, e le ſei *gambettine* nere. Le *alette* lunghe, e molto traſparenti ſono del colore pur di tabacco. Nel *vetro*, in cui al principio di Maggio io poſi molti di queſti *moſcherini*, vidi alcuni di eſſi a partorire le *uova* il dì 8. dello ſteſſo meſe, e da queſte uſcire gli accennati *vermi* nel principio di Giugno alle ore venti. Queſt' ora non mi era indifferente per la naſcita di tal *vermetto*, che mi doveva ſcoprire la verità di un fatto, ſopra cui io molto dubitava. I *bacherelli* ſolcarono le tenere foglie, ſopra le quali erano nati, e queſte ſi videro prima ſpalmate di un ſugo lucido, e viſcoſetto, e poco dopo tinte di roſſigno chiaro, e ſcrepolate in alcuni luoghi, e nella offeſa epidermide ſeccate. La qual coſa è molto differente dalla *ruggine*, e da quella materia gialla, in cui talora ſi tro-

„ *miculi*) *& in grano, cum ſpicae pluviis calor inferveſcit*“. Ma perchè lo ſteſſo giudizio non potrà formarſi di ogni altro verminetto, che ſi trova nella ſpiga, e ve n' ha parecchi, di ſpezie diverſa?

trovano. Quelli, che nacquero la mattina, non lasciarono queſta impreſſione ſe non dopo il *mezzodì*.

25. *Verminetto* tutto giallo pendente al colore di canna, lungo mezza linea, compoſto di otto anelli, ho mirato tal volta ſcappar fuora dagl' involucri delle ſpighette, non menocchè la ſua *moſca* deporre alla cima del germoglio le *uova*, da cui eſſo proviene. La *teſta* non ſi diſtinguerebbe dalla coda, ſe non vi tondeggiaſſero i neri occhi, e non vi ſi alzaſſero le cenerognole corna. Si nutre del ſugo, che in quelle cavità mette foce, gemendo da' ſifoncini corroſi delle tuniche, i quali perciò s' ingialliſcono. Le *moſche*, che n' eſcono, null' hanno di ſtraordinario, ſe non che di accoppiarſi volando.

26. Gl' involucri pure delle ſpighette di ogni grano ſono talor ripiene di certi *bacherelli* neri ſottiliſſimi, che colà penetrano, e vi ſoggiornano fino al termine della loro trasformazione. Non ſono più lunghi di una linea. Hanno ſei *gambe* nere ſcaglioſe, coda molto ſottile, che dietro ſi ſtraſcicano, e due *antennette* in capo. Sono figliuoli di certi galantiſſimi *moſcherini* neri a *vermini* medeſimi ſomigliantiſſimi, che ſvolazzano, e ſi vibrano, e ſi rattengono ſulle ale. Portano queſti il color di *talco*, ſei *gambe* nere, piccole *antenne* pur nere ſopra capo ſottiliſſimo. Scappano dal *bozzoletto* nella loro maggiore grandezza, e ſono ſenza peli, e ſtanno qualche tratto a ſveſtirſi delle primiere ſpoglie, e a comparire peloſi. Chi voleſſe metterli nella claſſe prima delle *moſche*

del

del REAUMUR, ſiccome i *vermicelli*, da cui queſti derivano, nella claſſe quinta de' ſuoi *vermi*, non credo forſe, che sbaglierebbe (143).

27. Nel Giugno del 1754. oſſervai tra gl' involucri della ſpiga del grano ottimo certi *vermicciuoli* molto gialli minori nella lunghezza di quelli, che ho deſcritti, e maggiori nella groſſezza, ammonticellati l' uno ſopra dell' altro, e ve gli trovai anche ſopra il fiore d' eſſo grano non compiuto. Si nutrono del fior naſcente, e de' ſuoi *petali*. Erano queſti animaletti lunghi in circa una linea, fatti di molti anelli, e a guiſa de' *bachi a ſeta*, avendo gambe ſolo membranoſe. Non vorrebbero eſſere toccati, e slancian via ad ogni piccolo ſtimolo; perchè ſotto il ventre portando il *capo*, e la *coda* di contro ad eſſo piegando, vibrano il ſalto; ma ſe un punto di appoggio non incontrano, indarno va lo ſforzo, e rimangon fermi. La *coda* è *triforcata*, e la *teſta diafana* ha del *conico*, e ſi diſtingue dal reſto del corpo per eſſere del color di *canna*. Ne ho contati ſopra un granello medeſimo per fino a 24., e 30., talchè eſſo granello era rimaſto per le loro punture aſciutto, ed arſo. Quando queſti animaletti hanno finito di cibarſi, cavano dalla loro bocca della ſeta, colla quale tanto s' intrigano, che in fine ſi riducono in un mucchio di *bozzoletti* ravvolti in una ſeta gialletta, da' quali in termine di pochi gior-

[143] Queſti ſaranno per avventura quegl' *Inſetti neri*, de' quali ha fatto una Storia eſattiſſima il noſtro Signor TILLET, ed ha ſcoperto, car. 79., che depongono le loro uova quaſi impercettibili lungo il fuſto delle ſpighe.

giorni ſaltano fuora tanti *moſcherini* giallognoli, le cui ale involgono il corpo.

28. V' hanno eziandio ſopra ogni ſorta di *frumento* certi *vermi*, i quali laſciano uno ſmorto color di cenere, per veſtirſi di un roſſo infiammato, e maravigliosamente brillante. Portano ſei *gambe* ne' primi tre anelli, la *teſta* piccoliſſima, le *antenne*, e la *coda* nericce, e ſono lunghi mezza linea. Vengono ſolcati a traverſo da innumerabili grinze. Le loro minutiſſime *aurelie* danno *moſche* di corpo ſottiliſſimo, non più lunghe di una linea del medeſimo color roſſo, ſe non che più cupo, col *ventre*, e le *gambe* peloſi, e liſtati di color d' oro, ſiccome ſono le lucide *antenne*. Le *ale*, quaſi *diafane*, e del color di *tabacco*, ne fanno quel carattere, per cui ſi potrebbero aſſegnare alla claſſe prima del REAUMUR.

29. Nell' Aprile 1753. io ſtava eſaminando con attenzione, e col *Microſcopio* alla mano l'inferior parte di un gambo ſecco, quando ſaltò fuori dalle radici un vivaciſſimo *Inſetto*, che ad occhio diſarmato io non poteva diſcernere. Da queſto quaſi inaſpettato incontro reſtai prima ſorpreſo, e paſſai poſcia ben di volo a riconoſcere l' *Inſetto*, e a eſaminarlo. Queſto era nero di *corpo*, di color ferrigno brunito nel *ventre inferiore*, ritondo, con otto *gambe*, e con qualche rado peluzzo moſtrato da eſſo *Microſcopio*, che per altro non giugneva a far diſtinguere il *capo*. Egli aveva forato, e penetrato una delle più groſſe radici, e abitava la parte di lei più interna vicino all' origine del gambo,

bo, e ſi nutriva del ſuo midollo. Le corroſioni ivi appena ſi vedevano, e gli eſcrementi erano di una enorme piccolezza. Non mi riuſcì di oſſervarne la trasformazione.

30. Benchè, ſecondo REAUMUR, il numero maggiore delle ſpezie di *falſe rughe* ſtieno ſopra le foglie delle piante, ve ne ſono fra noi delle ſpezie parecchie, che vivono naſcoſte dentro le foglie delle medeſime, come ſarebbe quella, che penetra nel gambo del *roſajo*, dove ſi nutre di ciò, che ivi diſtacca. Avvene una ſpezie giallo-biancaſtra, che io ritrovai dentro un gambo di grano, la qual' è della claſſe di quelle, che hanno 24. gambe, Tav. V. Fig. 19. 20.. Porta una piccola teſta nera, che naſconde a ſuo talento. Queſta *ruga*, o ſia verme ſi trasforma in una moſca, che ha qualche ſimiglianza altresì con quella de' *roſaj* deſcritta dal VALLISNIERI. Ella ha il *corpo* giallo di dieci anelli, e la parte eſteriore delle *ale* circondata di bruno. Le ſue *antenne* ſono alquanto lunghe, e piegate per lo più allo in fuora. Laſcia le ſue *uova* ſopra le foglie di rincontro alle fibre, ivi facendo un leggeriſſimo taglio baſtante a ſomminiſtrare all' *uovo* quella umidità, che gli può eſſere neceſſaria.

31. Dentro il midollo di alcune foglie ſi trova un *verme* formato a guiſa di quelli de' *moſcherini* del vino, variando ſolamente nella mole, ch' è minore almeno della metà, Tav. V. Fig. 24. 25. 26.. Ha colore di *canna*, e l' *addomine* è così traſparente, che per mezzo di eſſo ſi ſcorgono le in-

teriora. Non sì tosto egli è venuto a perfezione, che buca la vescichetta, la quale dianzi gli serviva di stanza, e si lascia cadere sopra il terreno, dove fermandosi sbalordito, s' incrisalidisce. La *crisalide* è del colore di *bosso* chiaro, composta di otto anelli ritondi, come se fossero fatti al *torno*. In *capo* agli otto giorni esce da questa *crisalide* certa bizzarra *mosca*, che potrebbe aver nome d' *icneumone*. Ha la *testa* di color gialletto, che nel fine passa al bianco, dove scappa la proposcide, che pure è bianca, e che si allarga nella estremità, come quella dell' *elefante*. Questa mosca è pelosa, e singolarmente in tutta la *testa*, a' lati della quale tondeggiano gli occhi, che a proporzione di lei sono grandi, e di un bellissimo color verde lucido simile a quello delle penne di *pavone*, e sono a guisa della pelle di *sagrì*, come quelli della maggior parte degl' *Insetti*. Due lunghe *corna*, o *antenne* oscure sulla *testa* s' innalzano. Dietro a questa viene immediatamente il *dorso* di colore assai nero, e lustro, sopra il quale spiccano alcuni peli nerosmorti. Alla estremità del *dorso* si attaccano due *alette* lunghe cartilaginose, che si mostrano trasparenti, ove anche contro il lume non sieno. Hanno queste alcune liste nere con bell' ordine disposte, nelle quali, volando, o camminando la *mosca*, nient' altro si vede, che le accennate liste, ond' è, che l' *ale* pajano intagliate. Unito al *dorso* stassi il *petto*, che pure è tinto, e imbrattato di nero, e ad esso si attaccano sei *gambe* bianche, che passano al verde. Le prime quattro non esco-

ſcono dall' ordinario delle altre *moſche*, ma le due direttane ſono molto più lunghe, e più groſſe di quello, che a sì piccolo corpicciuolo parrebbe convenirſi; e ſono fatte di materia croſtoſa. Il *corpo* è pur nero, e molto lucido, di figura *ovale*, nella cui eſtremità ſorge un finiſſimo aculeo di color gialliccio. Or queſta *moſca* depone le ſue *uova* dentro la polpa, o midolla delle foglie del grano, e da eſſa ſcappano i deſcritti *vermini*, che di tale midolla ſi paſcono, e quindi fanno apparire eſſe foglie quaſi ſecche, le quali poi dal volgo ſi credono percoſſe dalla nebbia, e da lei sì maltrattate. Una *moſca* ſimile trovò mio ZIO, e me la fece vedere due anni prima della ſua morte, cioè nel 1751., ſopra le foglie del *ſiſaro* comunemente detto *paſtinaca*, e la chiamò *moſca pavoncina*, perchè quando ella è poſta ſopra qualche corpo dominato dal Sole, mai non ſi riſtà, ma ſempre paſſeggia coll' ale aperte, e inarcate a ſimilitudine del *pavone*. Nelle veſcichette pure delle foglie di queſta pianta ſi dimorano i ſuoi vermi, finchè ottengono l' ultima perfezione. E una tal *moſca* parmi, ſe non vado errato, che dal REAUMUR veniſſe anche riferita.

32. Una certa razza di *moſcherini* vidi, che andavano ronzando intorno alle *cantaridi*, della ſpezie qui ſopra deſcritta al n. 13., e ſpeſſo gli erano addoſſo, e con certo aculeo foravan loro la pelle, e inſinuavano in queſti fori le loro uova, che ſono così piccole, che ſi rendono inviſibili ad occhio, che armato non ſia di perfettiſſima *lente*, Tav. VI.

Fig. 3. 4. 5.. Ivi erano poſte come al covaticcio, e vi ſtettero, finchè ne uſcirono dopo qualche tempo alcuni verminetti divoratori di quella *cantaride* medeſima ἕνεκα τῆς φυσικῆς ἀπανθρωπίας, *per nativam quandam crudelitatem*, pigliando da eſſa tanto nutrimento, quanto baſtava per mantenerli in vita. Sono compoſti di 12. anelli, hanno il *ventre* acuto, e portano nella bocca due forficette nere, ed oſſee, ed a' lati di eſſa un orlo bianco. Toſtocchè hanno pigliato un ſufficiente cibo, fanno la loro criſalide dentro allo ſteſſo Inſetto, da cui ſcappano poi i ſopraddetti *moſcherini*. Queſti hanno la *teſta*, il *dorſo*, e il *petto* di color nero con occhi groſſi, ritondi, e nero-lucidi, ſopra i quali ſtanno due lunghe, e ſottili *antenne*, pur eſſe nere. Le quattro *ale*, aſſai traſparenti, e luſtre, poco ſi ripoſano. Le *gambe* ſono in parte del color di *giuggiola*, e in parte nere; il *corpo* è compoſto di ſei anelli del color pure di giuggiola, ma più lucido aſſai, paſſando poi a un color nericante. Egli è ſeparato, e diſtinto dal *petto* per un riſtrignimento ſimile ad un ſottiliſſimo filo, che tra l'uno, e l'altro fa la membrana, che gli ricuopre, e s' ingroſſa nel fine, dove ha un lungo *aculeo* nericcio, difeſo da due laminette, onde i *Naturaliſti* chiamarono sì fatta *moſca* col nome di *muſca tripilis*. Dovrà per tanto metterſi in quella claſſe delle *moſche icneumoni*, che hanno una lunga coda diſteſa, compoſta di tre fili, de' quali i due laterali ſervono di cuſtodia a quello di mezzo, ch' è il ſuo *trivello*. Ho poi anche queſta *mo-*

ſca

ſca medeſima veduta, ma di grandezza aſſai maggiore, in queſto *boſco* della *Pineta di S. Vitale*, e l' ho veduta ſopra certo *bozzolo* compoſto di finiſſima ſeta bianca, dal qual ella era uſcita recentemente. Di tali *bozzoli* pure ebbi contezza dal fu mio ZIO, il quale ne aveva trovati alcuni dentro a un *bozzolo* maggiore di quercia lavorato da un verme, che ſi traſforma in *cantaride*.

33. Ho conſiderato un *moſcherino* della ſpezie degl' *icneumoni*, la cui piccolezza è tale, che fugge dalla viſta agevolmente, Tav. VI. Fig. 7. 8. 9.. Ronza d' intorno alle ſpighe, e ſpeſſo poſa ſopra di eſſe. Nera è la ſua *teſta*, e nere ſono le lunghe *antenne*. Il *dorſo* è bigio, e le *ale*, che ad eſſo ſi attaccano, ſono così fine, e traſparenti, che appena ſi diſtinguono. Il *petto* è dello ſteſſo colore, e ad eſſo ſtanno unite le ſei *gambe* aſſai lunghe, e ſottili, e di color bronzino. Il *corpo*, che ſi attacca al *dorſo*, e al *petto*, è compoſto di otto anelli di color carneo traſparente, e lucido. Egli finiſce in una pallottolina nericcia, nel mezzo della quale eſce un piccolo aculeo bianco, che ſerve al *moſcherino* per trivellare, o fendere l' epidermide delle ſoglie, e dentro la midolla depoſitare le ſue *uova*. Si ſcorgono però in eſſe foglie chiaramente molte bolle, o ſieno veſcichette, le quali da un lato ſono piane, e ritonde, dall' altro conveſſe, e lunghette. Aperte le medeſime, ſi ſcoprono in eſſe le depoſte uova, e non ſe ne trovano più d' una per veſcichetta. Da queſte naſcono *verminetti* bianchi compoſti di 12. anelli con teſta

teſta acuta, e con due gambettine membranoſe attaccate alla parte inferiore di ogni ſuo anello. Non chiamerò queſto *verme* un *minatore*, perchè nella ſua veſcichetta ſi riſtà, e non ſi apre via alcuna intorno alla medeſima. Ridotto eſſo nella ſua total perfezione, s' incriſalidiſce entro a quella veſcichetta, e la ſua *criſalide* è di grandezza poco diverſa dal *verme*, non che di figura, ſe non ſe alquanto ſolcata nel mezzo. M' apparve anche un tal *moſcherino* ſulle foglie del *ſolco* chiamato altramente *cicerbita*; ma forſe quello era di ſpezie diverſa dal noſtro, perchè ho meſſi di queſti noſtri *moſcherini* tanto ſopra le *cicerbite ortenſi*, quanto ſopra le *pratenſi*, e le *marittime*, che qui ſi trovano, ed eſſi vi hanno depoſte le *uova*, ma i *verminetti* appena nati vi ſono morti. Anche una ſimil' eſperienza fece ſoſpettare al Signor di REAUMUR, ſe doveva dirſi de' *cavoli* una certa *farfallina*, che a quella di eſſi aſſomigliava.

34. Venendo finalmente agl' *Inſetti*, che ſtanno parte della loro vita ſotterra fra le radici del grano, e parte di eſſa ſopra le ſpighe, e ſopra i gambi del medeſimo, parlerò di una *ruga* gialla, lunga undici linee, groſſa una linea, e compoſta di 13. anelli. Queſta ha ſei gambe ſcaglioſe, e le due poſteriori, mancando delle intermedie, e ſono tutte del medeſimo colore giallo. Stava intorno alle radici. La piccola ſua *teſta* è nera, molto piana, guernita di quattro come tubercoletti brunити, e luſtrati, i quali ſembra, che poſſano eſſere gli occhi. Si nutrì ſopra di eſſe radici per fino

al

al tempo della ſua trasformazione, venuta la quale ſi rampicò ſu pel tronco, ſi fece *criſalide*, e ſviluppoſſi in *volatile*. Queſto *volatile* è una *farfalla diurna* del colore di canna, avendo ſemplicemente ſopra ciaſcun' *ala* ſuperiore un raggio traſverſale alquanto cenerognolo, e nelle inferiori una macchia bruna, che inclina molto al circolare. Potrebbe metterſi nella claſſe ſeconda del REAUMUR.

35. Non meno ſopra le foglie del grano, che ſopra quelle della *gineſtra tintoria*, ho avvertito una *ruga* veſtita di molte macchie, o punti roſſicci, che la natura ha ſeminato ſopra un fondo di verde aſſai bello, Tav. V. Fig. 16. 17. 18.. Quella per altro della *gineſtra* è molto più grande, ſiccome lo è la *farfallina*, che ne deriva. Ridotta queſta *ruga* all' ultima perfezione, ſe ne va ſotterra, dove s' incriſalidiſce. Alcune *rughe* di queſta razza, che ho nutrite in vetro lungamente, ſono entrate in terra per formar la *criſalide* verſo la fine di Maggio, e ne ſono uſcite *farfalle* a' primi giorni di Luglio. E' tal *criſalide* di color bigio chiaro con macchia roſſiccia nel mezzo mezzo di ogni anello in forma di liſta, e ne' lati punteggiata di nero. Si ſviluppa da eſſa una *farfallina* diurna bella, e viſibile agli occhi di ognuno, la quale ha la *teſta* coperta di peli lunghi, e neri coll' eſtremità del colore di perla, gli occhi di figura romboidale, e di color ferrigno circondati da giro bianco. Le *antenne*, che ſono di molti nodi bianchi, e neri, terminano a mazza con un contorno di peli bianchi, e il *dorſo* è corredato

dato di peli lunghi di color ceruleo. Le *ale* ſuperiori nella parte inferiore ſono di color cenerognolo, paſſando nell' attaccamento ad un verdiccio. Verſo la metà di eſſe ſtanno cinque macchiette nere ritonde contornate da giro bianco, e poſte negli angoli di un *pentagono* irregolare. Per di ſopra a ciaſcheduna di queſte piccole macchiette avvene una più piccola di figura ſconciamente *tetraedra*. Le *ale* inferiori ſono in parte di color verde marino, perchè paſſano dalla metà in giù al color cenerognolo, avendo ſulle pendici ſei macchiette tonde, e nere contornate di bianco, ſiccome tutto è il lembo dell' *ale*, per cui raſſembra una frangia. Il *petto*, e il *ventre* ſono coperti di peli lunghi cenerognoli chiari. Il *dorſo* è del color violaceo, e le *gambe* ſono nericce. Ne ha ſei, numero ordinario in ſomigliante ſorta d' *Inſetti*, ed è di quel genere, che portano le *ale* parallele al piano di poſizione.

36. Nel dì 21. di Marzo del 1753. vidi uno ſpazietto di terra, che comprendeva ſei copioſi ceppi di grano, eſſere tutto bucherato di minutiſſimi fori. Molt' altre volte di sì fatti ſpazj bucherati io aveva avvertito ſopra la terra vicino a' ceppi ſecchi di grano, ma non vi aveva ritrovato animale alcuno, da cui poteſſi ſoſpettare, che derivaſſero, come nel dì ſopraddetto ben chiaramente mi avvenne. In alquanti di queſti fori ſtavano certi piccoliſſimi *bruchi*, molti de' quali ſi vedevano ammonticellati inſieme attorno le radici di que' ceppi. Eſſi erano que' medeſimi, che le foglie di *olmo*, e di

altre

altre piante avevano nell' Autunno paſſato corroſe, e traforate. Alcuni tenevano 14. *gambe*, altri 16., tutti 6. ſcaglioſe, e il reſto membranoſe, ma queſte non ſi vedevano ſenza il *Microſcopio*. Il loro colore era oſcuro, e cupo. Fatti più adulti abbandonarono il nido, uſcirono di Maggio dalla terra, e rampicarono ſu per le piante, e per gli alberi, de' quali ſi paſcolarono, e poſcia ſi ritirarono, e ſi racchiuſero tra le foglie non meno degli *olmi*, che del grano, e ivi filarono una ſpezie di ſeta, e formarono *bozzoletti* ritondi, ne' quali ſi fecero in *aurelia*, e finalmente sbozzolarono *farfallette* del colore di *oliva* marcia a quattro *ale*, ma deboli molto, e che poco ſervivano al volo. Queſti ſi poſſono mettere fra que' *bruchi*, che vivono in ſocietà per tutta la loro vita, perchè mai gli ho veduti ſoli, e ciò ſecondo la diſtinzion fattane dal REAUMUR (144). Furono in quell' anno pochiſſimi, quantunque le altre ſpezie di *bruchi* abbondaſſero. Una tale varietà è ſorprendente; ma ſi potrebbe attribuire, ſecondo il parere di eſſo REAUMUR (145), a' nimici di queſta ſpezie, che l' aveſſero in tal anno quaſi diſtrutta, o alle malattìe, che fatti morire in gran parte ne aveſſe, o anche alla qualità della ſtagione, per cui ſterili ſi foſtero renduti, ſiccome fertili in altre ſi renderono.

37. Ebbi ſulle radici *animaletto* lungo un quarto di linea del colore tanè chiaro-lucido con ſei

[144] REAUMUR: *Mem: pour ſer. &c. Tom. 2. Mem. 4.*
[145] Ivi. *Mem. 8.*

gambettine ſcaglioſe di una finezza ſtraordinaria, e il muſo acuto, e ſenza corni. Meſſo nel vetro con terra, non entrò ſotto di eſſa, ma ſi fermò ſopra alcune foglie, dove fece il *bozzolo*, e poſcia nel dì 20. di Maggio s' incriſalidì, e nel dì 8. di Giugno ſe ne vide ſvilluppata una *farfalla notturna* di color d' oro, e di figura ordinaria. Il ſopraddetto *bozzolo* è fatto a rete, ed è alquanto maggiore della *ruga* medeſima.

38. Un *verminetto* giallo colla teſta nera di figura variabile, con otto *gambe carnoſe*, lungo una mezza linea, e velociſſimo trovai ſopra due radichette di un gambo ſecco. Lo miſi in un vetro colla ſolita preparazione, ed ivi ben toſto entrò in terra, dove s' incriſalidì, e non tardò molto a uſcirne il volante, perchè nel principio di Giugno, cioè dopo nove giorni, venne alla luce un *moſcherino* a due *ale* galantiſſimo di color giallognolo, di *teſta* piccoliſſima, di ſei *gambe* ſottiliſſime, e di due lunghe *antenne* nere.

39. Ho avuto un *moſcherino* a due *ale* di piccola mole veramente, ma di grande ſpirito, di *corpo* giallognolo, e di ſei *gambe* nere con denſi peluzzi nel ventre inferiore moſtrati dal *Microſcopio*, e mi è ſembrato ſimile a molti altri, che ho veduti aggirarſi per le camere. Naſce da una *criſalide*, nella quale ſi trasforma un verminetto bianco bianchiſſimo lungo una linea, e mezzo, o poco più, e ſottiliſſimo, che abita fra le radici del grano. Sembra, che abbia 24. *gambettine* carnoſe non bene formate; ma certamente ha quattro *cor-*

na,

na, e la *testa* , e gli *occhi* neri , e questa poco si distingue dal *corpo* , ch' è formato di dodici anelli .

40. Nel dì 6. di Maggio del 1754. levai dal fondo di un ceppo di grano un *verminetto* di figura molto allungata, che pendeva alla *cilindrica*, del color di *cantaride*, di grandezza non maggiore di un grano di arena con *testa* lunghetta anzicchè no, due *cornetti* , e le solite sei *gambettine* nere scaglioſe. Il suo moto era sommamente pigro. Messolo nell' alberello , e riconosciutolo il seguente giorno, trovai , ch' entrato era sotterra, ma non vi aveva fatto il *bozzolo* sensibile, perchè furono vane le mie diligenze per rinvenirvelo anche dopo quindici giorni in circa, che tanti ne abbisognarono alla nascita della sua piccolissima *mosca*. Ella molto rassomiglia a' *moscherini* del vino, benchè a prima vista nella figura non sembri diversa dalle *mosche* ordinarie , che fastidioſe ronzano per le case .

41. Nel principio dello stesso mese di Maggio trassi dalle radici di un altro ceppo alcuni *verminetti* lunghi una linea del colore di terra d' ombra, che nel ritondo capo, e sulle corna lunghette era più carico . Portano sei gambe scure scaglioſe, e due membranoſe, e il corpo di otto anellini . Hanno tardo il moto loro spontaneo , ma toccati spiccano salti , l' altezza de' quali non è guari minore della lunghezza di otto , o dieci linee, e talvolta di tre, o quattro pollici . Io crederei di doverlo riguardare fra quelli , che divo-

rano le *rughe*. S' incrisalidì dentro il vetro sotto terra alla metà del mese, e ne sortì poscia un *moscherino* nericcio di quattro ale. Nè qui voglio stancare la pazienza de' leggitori in descriverlo, perchè ha la struttura medesima a puntino delle *mosche* rossigne ortensi da altri descritte.

42. Ebbervi alcuni *bachi*, che pendevano al turchino, lunghi più di una linea, e sottilissimi con due cornetti agilissimi in capo, e con 18. *gambettine* dello stesso colore del corpo ad altrettanti anelletti *diafani*, il che non può vedersi senza buon *Microscopio*. Questi si potrebbero dire *falsе-rughe* del primo genere del REAUMUR. Si trasformano in *moscherini* con *ali* di color d' oro, che loro involgono il corpo.

43. Un *verme* di color tendente al giallo con due piccolissime *antenne* bianche pieghevoli lungo una linea in circa, di moto tardo, di sei *gambe* scagliose, e di dieci membranose, non si conservò in vita nel vaso di vetro, nel quale io l' aveva posto per vederne la trasformazione. Si potrebbe mettere per avventura tra le *falsе-rughe* della classe ottava del REAUMUR.

44. Un verminetto bianchissimo lungo più di una linea con due lunghe antenne, ed una lunga coda biforcata ebbi dalle radici di un ottimo ceppo di grano, e lo misi nell' alberello. Egli era diafano, e vi si vedevano lungo il corpo le interiora del color di *tabacco*. Era composto di molti anelli, e la *testa* si allargava notabilmente dopo l' acuto suo principio. Le sei *gambettine* scaglio-

se,

ſe, attaccate molto innanzi nel *petto*, gli facevano ſtraſcicar dietro il *corpo*. Era velociſſimo, e inquieto, e di quelli, che mangiano le *rughe*. Più volte ſi ſveſtì della ſua ſpoglia, ſinchè il penultimo giorno di Maggio ſi cacciò in fondo del vetro, ed ivi fabbricò ſuo *bozzoletto*; ma un fiero vento, avendomi aperta la fineſtra, e gettato per terra il vetro medeſimo, fece sì, che, quantunque vedeſſi quel *bozzoletto*, non poteſſi vederne la trasformazione. Tali furono per altro i contraſſegni, che ſi avrebbe potuto giudicare, che venir ne doveſſe un *icneumone*.

45. V' era *Inſetto* del color di cenere con ſei gambe di ſtruttura ſimile alle ſcaglioſe, e con quattro delle membranoſe, e portava una ſpezie di *cappuccio* ſopra la teſta, la quale gli ſcappava per di ſotto, e terminava in una ſpezie di *propoſcide*, portando in cima al capo due *cornetti* con due *occhi* neri, e rilevati. Quando veniva toccato ſi riſtrigneva, mandava la *propoſcide* ſotto il *corpo*, e ſi metteva immobile in un gomitolo. Era lungo una linea, e ſi fece il ſuo *bozzolo* di terra della figura di una palla allungata, da cui uſcì dopo pochi giorni una *farfalla notturna* del colore di paglia. Aveva il dritto dell' *ale* ſuperiori lavorato, come noi diciamo, a *punto Franzeſe* con macchiette grigie, e quello delle inferiori era in gran parte giallo con alcune ſtriſce nericce. Si può mettere in quella claſſe di *farfalle*, che hanno *trombe*, e le *antenne* a pezzetti conici, e nel genere di quelle, che portano l' *ale* parallele al piano di poſizione.

46.

46. Il dì 24. di Aprile ſcoperſi ſotto alcune radici del grano un *bacolino* lungo quattro linee, e mezzo, ch' era ſchiacciato nella parte del corpo di maggior diametro, nel qual luogo però non ſi dilatava più di mezza linea, ſtringendoſi alquanto verſo la coda, che poi di nuovo allargandoſi un po' poco terminava in due rami biforcata. Dalla parte anteriore ſi aſſottigliava per fino al collo, dove ſi attaccava la *teſta* ampia, e piana. Coteſti giovani *verminetti* ſono bianchi ad occhio nudo, ma quando è armato col *Microſcopio* ſi veggono di color biondo. Fatti adulti, e giunti all' ordinaria grandezza ſi paleſano per di colore giallognolo, e lungo il mezzo di tutto il corpo moſtrano le interiora. Di undici anelli ſono compoſti ſenza la *teſta*, ch' è ſchiacciata. L' ultimo anello, a cui s' attiene la biforcata *coda*, è roſſigno. La *teſta* è ſempre di un biondo, che tira al bianco, e nell' eſtremità di eſſa ſi ſpiccano due *antenne*, che continuamente ſi rimuovono nel ſuo velociſſimo camminare. Ha ſei *gambe* attaccate nella parte anteriore del *petto*, e dietro ſi ſtrafcica il *corpo*. Porta gli occhi neri viviſſimi da una parte, e l' altra delle *antenne*, e ſta in mezzo ad eſſe la *bocca*. Sottiliſſime, e lunghe più di una linea, e mezzo ſono eſſe *antenne* formate di anelletti bianchiſſimi inſieme uniti. Quanti ho tenuti in vetro per averne la trasformazione, altrettanti ſono morti, talchè non ho potuto vederla.

47. Erano ſotterra tra le radici *verminetti* lunghi due terzi di linea, e ſottili un duodecimo di eſſa,

essa, di color sanguigno, con due sottilissime, e piccole *antenne* dello stesso colore, ma più scuro. Avevano otto *gambettine* di struttura simile alle membranose, ed erano senza coda, o quella si allargava quanto il corpo. Una spezie di *cappuccio* copriva loro il collo. Vibravano piccoli salti. Un altro piccolo *verminetto*, ma senza *cappuccio* del color di cannella, lungo $\frac{1}{4}$ di linea in circa, vibrava pur salti come *pulce*, e il suo corpo, essendo diafano, faceva trasparir le interiora del color di tabacco carico. Tutte e due queste spezie di *verminetti* mi si trasformarono in *cantaridi* di fondo giallo punteggiate, e listate di nero, lunghe poco più di una linea, e grosse poco più di mezza. Le *ale* inferiori, e il capo di ciascheduna erano neri, e le ale superiori, che giacevano sul dorso in figura conica, vagamente macchiate di nero, e le *gambe* gialle.

48. *Bacherelli* io vidi del color di rosa pallida, della lunghezza di mezza linea, della figura di *pidocchi*, di moto pigro, con due corna bianche, le quali, camminando, rimovevano prestamente. Sarei troppo lungo, e pieno di noja, se volessi a minuto descriverli, onde mi basterà dire, che all' origine di que' cornetti chiaramente si stanno gli *occhi* neri molto rilevati. Portano sul *dorso* una macchia di colore castagno, e sei *gambe* scagliose sotto a tre primi muscoli, o anelli, de' quali otto compongono tutto il *corpicciuolo*, e stanno affibbiati, ed uniti sotto una pelle sola. Si muta il loro colore in più, o in meno carico a ta-

talento de' medeſimi, e morti, che ſieno, diventano quaſi bianchi. Hanno l' induſtrioſo genio di ſolcare la polpa delle radici. Si trasformarono in *ſcarabei* ne' primi giorni di Maggio. Ne ho veduti non ſolo ſopra le radici del grano, ma ſopra il *lilium perſicum* del CLUSIO.

49. Da *verminetti* biondi chiari non più lunghi di mezza linea, anguſti nella parte loro anteriore, e groſſi nella poſteriore, con ſei *gambettine* ſcaglioſe ne' primi ſegmenti, le cui giunture ſono nere, come nera pur anche è la lunga *teſta*, o piuttoſto caſtagna, con due *antenne* di ſimile colore, pigri, e melenſi, da queſti *verminetti*, dico, venne pure una ſpezie di *ſcarabeo*.

50. Ma *pidocchi* di molte ſpezie ho conſiderati, che ſi ragunano intorno alle radici del grano nell' Inverno, o nel principio di Primavera, i quali poi ſono uſciti, come dietro a un incanteſimo, ſopra i gambi, ed hanno infeſtate le ſpighe. Il Sig. di JUSSIEU fece conoſcere al Sig. di REAUMUR certi *pidocchi*, che ſi attaccano alle radici di una ſpezie di *lichnis*. Il medeſimo REAUMUR ne ha trovati ſopra le radici del *millefoglie*, ſopra quelle della *camomilla*, ſopra quelle della *cinogloſſa*, ſopra quelle dell' *avena*, e ſopra di altre, e quindi ha creduto, che forſe pianta non vi abbia, le cui radici non dieno nutrimento a qualche ſpezie di *pidocchio*. Per queſto ſi può conoſcere, quanto s' ingannarono coloro, che diſſero naſcere i *pidocchi* delle piante dalla *ruggine* (146). Alla metà di Apri-

[146] Scriſſe l' ALDROVANDI l. V. *de Inſect. c.* 4. *p.* 549. *Habent*

Aprile oſſervai un ceppo, ne' cui gambi ſi era ſeccata la maggior parte delle foglie, e ſi erano anche ſeccati alcuni di eſſi gambi. Molti *Inſetti* ſtavano fra le radici, e vi notai particolarmente alcuni *pidocchini roſſi* con ſei gambe ſcaglioſe, delle quali le due poſteriori erano ſtraordinariamente lunghe. Se gl' innalzavano in fronte due piccole *antenne*. Uno di eſſi ritondetto compariva ſenza gambe, o erano tanto corte, che non ſi vedevano, perchè forſe ſtava per incriſalidire. Un altro aveva meſſe l' *ale*, ritenendo la figura di prima. I più lunghi non paſſano due terzi di linea. Hanno la *teſta* acuta, e la parte poſteriore del *corpo* ſi divide dall' anteriore per mezzo di un riſalto circolare, che ſembra quaſi diſtaccato. Se i più grandi hanno il corpo tronfio ſimile a quello de' *ragni*, i più piccoli l' hanno bislungo. Il dì 4. di Aprile 1753. gran numero di *pidocchi* aſceſero dalle radici al gambo, alle foglie, e alla ſpiga. Erano verde-pallidi, di grandezza poco maggiore di mezza linea, i quali vergandole pel lungo, ſcavarono delle foglie la ſoſtanza più dilicata, e più tenera, e ne mangiarono, o ne diſtaccarono il *parenchima* ſolo ſuperiore, talchè queſte ſi ſeccarono, e ſembrarono come abbruciate dall' ardor del Sole. Le loro ſei gambe ſono molto lunghe, e peloſe, e fatte come le minori delle *cavallette*. Gli *occhi* roſſi, e rilevati ſtanno dietro le alte corni-

bent denique & Plantae ſuos Pediculos, vulgo Pidocchietti *dicuntur. Corpore ſunt viridi, admodum exiguo, flores, & fructus interimunt, pedes ſex habent, in capite binas antennas. Ruſtici dicunt oriri ex rubigine, quae vulgo* melume *dicitur.*

celle, le quali talora ſi veggono diſteſe lungo il *dorſo*. La *teſta* è fatta come quella delle *cicale*, e tanto le *cornicelle*, quanto le *gambe* ſono articolate. Altri *pidocchi* erano del colore di *canna* chiara, e alla fine del corpo ritondetto ſtavano due *cornetti*. Che ſe le diverſe ſpezie de' *pidocchi*, come aſſeriſce il REAUMUR, differiſcono fra loro pel ſolo colore, di moltiſſime ſpezie certamente biſognerà dire, che ne abbiano le pianticelle del grano; perchè ve n' ho incontrati de' verdi ſcuri, de' verdi chiari, de' citrini, de' neri, de' bianchi, de' bronzini, del color di cannella, de' rigati con varj colori, de' macchiati di colore, che nel giallo verdeggia, ed altri. Queſte varietà di colori certe, ed infallibili poſſono autenticare almeno, che non ſempre ſono verdi, come pretende l' ALDROVANDI (147). Le curioſe eſperienze poi di eſattiſſimi Oſſervatori, del Sig. BAZIN, del Sig. BONNET, del Sig. TRAMBLEY, del Sig. di REAUMUR provano inconteſtabilmente, quantunque il Sig. ALBIN nel fine della ſua Storia de' *Ragni*, favellando de' *pidocchi*, non faccia di queſta particolarità motto alcuno, che i *pidocchi* di tutte le piante ſono fecondi per loro medeſimi, e che meſſi ſoli ſubito che nati, generano pochi giorni dopo degli altri *pidocchi*. Ebbi curioſità di farne la prova, e vidi con mio piacere queſta verità conteſtata co' proprj occhi; ma non ho avuto luogo di verificare l' oſſervazione del Sig. LIONET, per la quale ſi è ſaputo, che quattro generazioni di eſſi

[47] Nel luogo citato.

di essi *pidocchi* partoriscono senza opera di maschio, e dopo queste il pidocchio alato cuopre il non alato (148). Notabile effetto produce talora sopra la pianticella del grano il succiamento di tali *pidocchi*. Questa s' incurva da una parte, alcuna volta si attortiglia, e spesso nelle foglie s' increspa. Ciò per altro in essa particella non si rende tanto sensibile, quanto in quella del *carpine*, che giugne a formare molti giri spirali. Rettamente si spiegano questi torcimenti, e queste piegature dal lodato REAUMUR. Ma si consideri, che se i medesimi torcimenti si facessero sempre dalla parte, dove stanno i *pidocchi*, già, dov' essi non giacessero, quelli non si farebbero; il che certo non si verifica, perchè io gli ho anche veduti, quando i *pidocchi* erano sulle radici stabiliti, ed ivi succiavano l' umore della pianticella; e si potrebbe credere, che facessero perdere alla medesima molto sugo nutritivo da quella parte, dove stavano, e così venisse la curvità a pigliar direzione per quel verso, ch' era meno nudrito. Vidi spesso le foglie del medesimo gambo egualmente coperte da questi *Insetti*, ma le une incurvate da parti diverse, altre arricciate, ed altre rimaste nello stesso loro stato naturale, perchè l'

[148] REAMUR *Mem. pour ser.* &c. T. *6. Mem.* 13.. La qual' osservazione distruggerà quella opinione, per la quale fu sostenuto, ch' essi tutti fossero ἀρρενόθηλυ, e quelle parti avessero congiunte, che distinguono gli altri animali di un sesso, o dell' altro. Appunto come le piante, che concepiscono, secondo il Signor GREVV *Anatom. Plant.*, e nutriscono il feto, finchè venuto alla maturità esce fuora, e con nuova fecondità progenera altra pianta.

azione del ſucciamento accennato, ſe può far incurvare i gambi, dev' eſſer capace di produrre ſimili effetti; mentre quantoppiù ſono i principali nervi intaccati, tantoppiù ſi fa ſenſibile l' alterazione. V' hanno alcuni di queſti animalucci pigri, e melenſi, e ſtolti, i quali camminando ſulla foglia con moto tardiſſimo, e le due corna ſul capo dimenando, portano talora ſotto il corpo attaccato uno, due, tre, e per fino a 14. roſſi animaletti non più lunghi di $\frac{1}{6}$ di linea del genere di quelli, che ho diſſopra deſcritti. Sono ritondi a guiſa di una pallottolina con ſei *gambettine* innanzi, la *teſta* del medeſimo roſſo infiammato poco dal corpo diſtinguendoſi. Queſto nimico de' *pidocchi* (149) è molto ſimile a quello dal REAUMUR eſaminato nella ſua *Storia degl' Inſetti* (150), in cui ſi trasforma quel ſuo *riccio bianco*, o *barbino bianco*, giacchè non mi par ſicuramente lo *ſcarabeo*, perſecutore de' *pidocchi*, deſcritto dal Sig. CESTO-

[149] Il tante volte nominato REAUMUR T. 3. *Mem.* 11. diſſe, che „ gl' Inſetti, al nutrimento de' quali i Pidocchi delle „ piante ſono deſtinati, poſſono dividerſi in due claſſi. In vermi „ ſenza gambe, e in vermi con gambe. Quelli della prima claſſe ſi „ trasformano in moſche a due ale; e tra quelli della ſeconda al„ tri divengono moſche a quattro ale, altri divengono ſcarabei. „ I vermi di queſta ſeconda claſſe hanno ſei gambe, come ſi tro„ vano negl' Inſetti, ne' quali ſi trasformano. " Pochi di tali vermi a ſei gambe conoſce il noſtro Autore, e queſti egli chiama *Leoni de' pidocchi*, perchè hanno ſimiglianza con l' Inſetto conoſciuto ſotto nome di *Formica-Leo*. Eſſi afferrano i pidocchi, e loro ſuccchiano per modo la ſoſtanza parenchimoſa, che ne rimane la ſola ſpoglia. Ma forſe un maggior numero ne avrebbe egli queſto grand' Uomo conoſciuti, ſe quelli aveſſe potuti conſiderare del grano in erba di queſto Territorio.

(150) Ivi T. 3. *Mem.* 11. Tav. 31. Fig. 28. 29.

STONI (151), nè quell' altro ſuo *baccherello* cieco.

51. Bianchi *ragnateli* ſulle radici del grano ho anche veduti, i quali avevano un raggio alquanto brunetto, che partiva dal lato anteriore del corpo, e metteva al poſteriore. Erano piuttoſto corpacciuti, e lunghi quanto un mezzo granello di miglio. Avevano ſei *gambe* piuttoſto brevi, le due anteriori erano più lunghe dell' altre, e queſte nel correre velociſſimo portavano, e diſtendevano molto innanzi. Quando ſono fermi ſi raggomittolano, in maniera che non raſſembrano più deſſi. Hanno colore di canna pallida. Il loro *capo* è tanto piccolo, che non ſi vede ſenza *Microſcopio*, talchè volendone far comparazione col corpo, ſi troverebbe forſe, ch' egli ſta al medeſimo come 1. a 100.

52. Era nel dì 4. d' Aprile appiattato ſotto a due radicette, delle quali il gambo ſi moſtrava ſecco, con altri *Inſetti* molti un *ragnatelo* d' una ſpezie di lunghe gambe, e viſpo al maggior ſegno, e non più grande di $\frac{1}{7}$ di linea. Il colore del ſuo *corpo* non diſtinguevaſi da un bel verde ſpruzzato di nero. Aveva formato una piccola tela, nella quale ſi vedevano alcune uova piccoliſſime di figura ſferoidale. Meſſe queſte in vetro con terra, dalle medeſime nacquero ſimili *ragnateli*, troppo piccoli per eſſere da principio ad occhio nudo eſaminati.

53. *Ragni* di ſpezie diverſa, ma che tutti avevano la proprietà di raggomittolarſi, furono quelli,

[151] CESTONI *Origine di molti animali ſulle foglie de' Cavoli.*

li, che mi apparvero, mentre io ſtava altri *Inſetti* oſſervando ſopra le radici del grano. Erano queſti di una velocità ſorprendente, e di varj colori nericci. Alcuni di eſſi trovati nell' Aprile del 1755. erano lunghi per ben due linee, di ſei gambe, di ventre ritondo attaccato al petto per una finiſſima membrana lunga più di una linea. Altri erano bianchi macchiati di roſſo con *gambe* di una ſmiſurata lunghezza, e ſottigliezza.

54. Dirò ora de' *vermini*, che non ſolo in Aprile, ma in Maggio, e Giugno ho rinvenuti ſopra le radici del grano, i quali ſono del genere di *lombrici terreſtri*, Tav. V. Fig. 14.. Uno ve n' era lungo ben quattro linee, ſottiliſſimo, e bianchiſſimo. Il *Microſcopio* non giunſe a farvi baſtante ingrandimento per poterlo diſtinguere minutamente in tutte le ſue parti. L' ho tenuto lungo tempo dentro la terra dell' alberello, vi ha viſſuto 35. giorni, e ha ſempre conſervata la ſua prima figura di *lombrico*. Ve ne avevano de' giallognoli con alcune ſtriſce roſſe a traverſo del corpo, lunghi per ben cinque linee, e ſottili quaſi come un capello. Di queſti volli far l' eſperienze, che altre volte ho fatte ſopra i groſſi *lombrici terreſtri* (152). La pietà non ſembrava, ch' eſigeſſe alcu-

[152] *Lettere intorno alla recente ſcoperta degl' Inſetti, che ſi multiplicano mediante le ſezioni de' loro corpi*, inſerite nella raccolta Calogeriana d' *Opuſcoli Scientifici, e Filologici* T. XXXVII. car. 53., e ſeg., le quali furono ſenza mia contezza mandate al dotto Editore colle ſagge, ed eleganti riſpoſte del troppo per me favorevole Signor Marcheſe UBERTINO LANDI. Ma ſopra queſto punto ſono da vederſi ſpecialmente le memorie del Signor TREMBLEY, del Signor BONNET, del Signor LYONET, del Signor REAUMUR, quelle del Padre MAZZOLENI, quelle del Signor BAKER, e quelle, che molto colle

alcuna difficoltà di tagliarli a pezzi, e n' ebbi il medeſimo effetto della moltiplicazione, vedendo le loro parti riprodotte. E' coſa deplorabile, che il Sig. di REAUMUR non abbia potuto mettere alla luce l' ultimo Volume della ſua grand' Opera ſopra gl' *Inſetti*, nel quale, com' egli promette nella prefazione al VI. Volume, avrebbe parlato degli animali, che conſervano per tutta la loro vita la forma, ch' eſſi avevano nel naſcere, non eſſendo ſoggetti ad alcuna trasformazione. Di quante belle ſcoperte queſta parte anche oſcura avrebbe egli illuſtrata?

55. Non è del genere de' *lombrici* un *verme* lungo ben due pollici, che fra i ſopraddetti io ritrovai, del colore di tabacco, o di caſtagno, compoſto di moltiſſimi anelli, e diafano pienamente, Tav. V. Fig. 15. Non era più groſſo di un terzo di linea, ed aveva due *antenne* articolate, che ſempre rimoveva nel camminare. La teſta era piana, e gli occhi

colle mie s' incontrano, del Signor GIACOMO PARSONS, in Londra ſtampate nel 1752. nelle ſue *Philoſophical obſervations on the Analogy between the propagation of animals and that of vegetables, &c.* cioè *Philoſophicæ obſervationes de ſimili animantium, & vegetabilium propagatione, &c.* Nè io certamente ſo negare a me ſteſſo, e a queſti eſatti Oſſervatori una tal maniera di multiplicare, quantunque vegga aſſerito nelle Lettere del VALVASENSE pel meſe di Novembre 1757. car. 337., che il Signor Dottore VANDELLI, Profeſſore in Padova, ſia per ſoſtener quanto prima in una Diſſertazione, che darà alle ſtampe, non farſi ne' *lombrici* tagliati in pezzi la riproduzione, altrocchè nella parte, in cui rimane la bocca, l' eſofago, il ventricolo, il principio dell' inteſtino, il cervello, il cuore, e l' ovaja, mentre l' altre parti tutte ſi putrefanno. Molte parti ſimilmente ne' miei alberelli ſi ſono putrefatte, ma non per tanto ho dovuto inferire, che una ſola parte rimaneſſe in vita, e più volte fui convinto, che ogni pezzo riproduceva quello, che aveva perduto.

occhi ſtavano al fondo delle antenne. Si rivolgeva bensì come *lombrico*, e come *ſerpe*, ma non era ſenza *gambe*, com' eſſi ſono, e gliene contai 120. per lungo il *corpo*. Nella eſtremità inferiore del medeſimo ha due *cornetti* brevi, e groſſetti. E non potrebbe eſſere queſta una delle *rughe ſcolopendre* del REAUMUR (153), ch' è *Inſetto* di moltiſſimi piedi? Ma io non ho veduto in qual *farfalla* ſi trasformi. Ho tentato la ſua moltiplicazion per ſezioni, e quantunque dopo il taglio mi ſia viſſuto nella terra molti giorni, ed abbia rimarginate perfettamente le piaghe, non ha però rifatte le parti perdute. Certe piccole *formichette* roſſigne, che gli ſtanno talora fortemente azzannate ſul corpo, per quanto eſſo verme ſi divincoli, e ſi aggiri per liberarſene, non ſi diſtaccano giammai, ſinchè del ſuo ſangue ſatolle non ſieno. Havvene di più grandezze, e di color chiaro, che pende al bianco. Siccome le *formiche* tengono i loro *leoni* col nome di *formica-leo*, de' quali dette una compita Storia il Sig. PONPART, (154), così tra le *formiche* medeſime ſi potrà dire, che ve ne ſieno alcune, che ſi debbano chiamar *leoni* di altri *Inſetti*, e ſegnatamente de' ſopraddeſcritti.

56. Ma finalmente oltre ad ogni altro *Inſetto* è dannevole alle radici del grano, non che a' ſeminati tutti, quello, ch' è detto *zuccajuola*, perchè ora ſopra, ora ſotterra ſpeſſe fiate mangia le tenere

[153] REAUMUR *Mem. pour ſer., &c. Tom.* 1. *Mem.* 1. *p.* 83.
[154] *Mem. de l' Ac. Roy. des ſc.* 1704.

nere radichette, e le foglie; e non contento, come gli altri *Insetti*, del solo parenchima, e del sugo solo, ha per malvaggia inclinazion di natura il volerla sempre colle sottili fibre, e di non risparmiarla alle più grosse, Tav. VI. Fig. 21. 22.. FERRANTE IMPERATO Speziale Napolitano lo descrisse prima d' ogni altro nella sua *naturale Storia* (155) sotto nome di *talpa*, ond' è, che ULISSE ALDROVANDI (156), di esso favellando, lo chiamò *talpa Ferrantis Imperati*, perchè a guisa delle *talpe* co' piedi anteriori, o sieno mani scava la terra (157). Nessuno però di lui ha fatto una intera Storia, e solamente nel primo Tomo dello *Spettacolo della Natura* (158), venendo nominato *taupe-grillon*, *grillo-talpa*, si dice, che furono contate in un solo nido di questo *Insetto* 150. *uova*; numero grande certamente, ma forse de' minori, che io ne abbia avuti. Sette nidi nel mese di Giugno del 1754. me ne furono portati, e nel primo di essi con mio stupore contai 1197. *uova* di *zuccajuola*, che intatte conservo pur anche nel mio *Museo* dentro

(155) IMPERATO: *Historia naturale lib.* 28.

(156) ALDROVANDI: *de Animal. Insect. l.* 5. *c.* 9.

(157) I contadini *Napolitani*, scrisse l' IMPERATO, lo chiamano *gufolo*, quasi ch' egli sia il *gufo* degl' Insetti, e i *Bolognesi*, e i *Lombardi*, riferì l' ALDROVANDI, lo dicono *zuccara*, ed egli poi *vermem cucurbitarium*, perchè le zucche singolarmente infesta. Io l' ho nominato *zuccajuola*, come i *Toscani* fanno, e come il REDI nelle sue *Osservazioni degli animali viventi negli animali viventi*.

(158) *Le Spectacle de la Nature* T. 1. p. 507.. Alcuni fatti della *zuccajuola* racconta il GOEDAERT, per quanto ricavo dal REAUMUR *Hist. des Insect. T.* 1. *Mem.* 1. *p.* 26:, in cui io non mi sono mai incontrato, e de' quali il REAUMUR medesimo non lascia di dubitare.

lo *ſpirito di vino*; ne contai nel ſecondo 172., e nel terzo erano 90.. Nel quarto trovai l' *Inſetto* chiuſo da ogni parte, il quale non aveva anche cominciato a partorire le *uova*, ma era molto corpacciuto, e ne partorì 102. dopo quattro giorni. Il quinto conteneva 206. *uova*, il ſeſto 194., e l' ultimo 79. ſolamente, ma ivi ſtavano rannicchiate due piccoliſſime *zuccajuole* nate di freſco. Oſſervate le medeſime colla *lente* ſi manifeſtavano per bianchiſſime, e di figura ſimiliſſima a quella della loro genitrice, eſſendo mancanti ſol tanto delle *ale*, come alle *cavallette* ſuccede. Mi vennero queſti nidi dalla villa di *San Marco*, dove le *zuccajuole* avevano alle biade recato una ſtrage orrenda col divorarne le radici (159). Il fu mio ZIO, ſopra la teſtimonianza del quale in queſto genere di coſe ho ſempre contato, quanto ſopra quella degli occhi miei proprj, già più volte mi aveva aſſicurato, che nel 1739. gli era ſtato portato un nido di queſt' *Inſetti*, che contava più di 2000. *uova*. Difficiliſſimo ſi renderà però ſempre l' eſtirpamento di una peſte di viventi così pernizioſa, e di cotanto prodigioſa fecondità dotata (160).

[159] Onde bene avvertì AGOSTINO GALLO nella prima giornata della ſua *agricoltura*, che tra i vermi, che rodono le biade, e lo confermò il VALLISNIERI nel libro *del male contaggioſo de' Buoi*, i più dannevoli ſono queſti ſegnatamente, e diſſe, che ſono „ groſſi, e „ lunghi poco meno di un mediocre dito, i quali non eſcono mai „ fuori di terra, ma quanto più creſce il caldo, tanto più ſi ap„ proſſimano alla ſuperficie." Ma quanto è vero, ch'eſſi creſcano alla groſſezza, e lunghezza di un mediocre dito, altrettanto è falſo, che mai fuori non eſcano di terra, uſcendone eſſi talora infallibilmente, e maſſime nella buja notte.

(160). Io non ho veduto mai *zuccajuola*, ch' ecceda la lunghezza di due pollici; pur mi vien detto, che ve n' abbia delle maggiori. Ha la *testa* ossea, che nel suo principio inclina al ritondo, di color nericcio purpureo, e termina in acuto, laddove le sopravvanza una cartilagine bianca, che nel suo lembo è nera. Serve una tal cartilagine di superior labbro alla *bocca*, sotto la quale si stanno due forficette ossee, e brunotte formate a somiglianza di quelle, che si veggono nelle *cavallette*, e a guisa di quelle medesime atte fatte per uso di denti. Così dalla parte inferiore sotto il mento scappano, come in esse *cavallette*, quattro piccole, movibili, e pieghevoli branche nodose, delle quali le due superiori sono più lunghe delle inferiori, e tutte servono ad esse pure, come a quelle, per appressare il cibo a' labbri. Dall' un canto, e dall' altro del *capo* grossetti, e lucidi tondeggiano gli occhi di color castagno, e talvolta neri, e per di sotto a' medesimi sporgono alquanto in fuora due chiare, e rilucenti preminenze, le quali sembra, che potessero considerarsi come una parte coperta dell' orbite degli occhi stessi. Di sopra a questi escono due *antenne*, che sono tutte minutamente rigate pel traverso, e nodose. La *testa* vien fuora da un *cappuccio*, che cuopre il collo, grande molto, e grosso; e questo *cappuccio* medesimo è coperto di bre-

[160] Tuttavia il mentovato GALLO insegna varj modi per distruggerla, i quali „ servono ancora a' lucertoni [dic' egli] a' „ musoni, a' sorci, talpe, e a quanti animaletti dannevoli sono fra „ due terre. "

vi, e finiſſimi peli di color caſtagno lucido vellutato. Nella parte inferiore di eſſo ſtanno attaccate le due come *braccia* fatte di tre internodj peloſi, e lucidi del colore di tabacco, il primo de' quali nel margine dell' articolazione manda fuora pel di ſotto uno ſpino, o ſtilo alquanto lungo, e l' ultimo internodio finiſce quaſi in una *mano*, le cui dita ſieno ſei artigli, avendone due, che luogo tengono del dito groſſo. Sotto a quella corazza ſi veggono ſpiccare due piccole *ale* molto reſiſtenti non più lunghe della metà del corpo, e di colore biondetto ſparſo di filamenti neri; e ſotto queſte ſcorrono due membrane fatte a maniera di ſpada, che ſi ſtendono per fin oltre l' eſtremità del corpo, e coſtituiſcono due altre *ale* meno reſiſtenti, le quali al principio del dorſo ſi uniſcono, e ſono di color biondo, e traſparenti, con nervi, e con ramificazioni del colore di *caffè*. Bianco n' è il roveſcio con intrecciamenti di nervetti del medeſimo colore di *caffè*. Al *petto* ſi attaccano quattro *gambe*, l' ultime due delle quali ſono aſſai più lunghe delle prime, e tutte quattro ſono compoſte di tre internodj, non compreſi due altri, che formano il piede, e l' ultimo di queſti internodj è guernito dal mezzo in giù per diſopra di fini, e acuti pungiglioni, e termina con due uncini. Il *corpo* è compoſto di dieci anelli nericci, dall' ultimo de' quali eſcono lateralmente due pendici del medeſimo colore ſparſe di finiſſimi peli lunghi, e queſte pendici hanno ſei vertebre, o nodi; ma il *ventre inferiore* è grazio-

ſa-

ſamente corredato di peli biondicci vellutati. I dieci anelli nella parte ſuperiore ſono ſcanalati con orli, e ſponde, e per diſotto tondeggiano, e ſono conveſſi, e rigati con alcune linee compoſte di punti nericci. Aperſi alcuno di queſt' *Inſetti*, e ne conſiderai gl' integumenti fortiſſimi del *ventre*, e il ſito delle viſcere nell' ampio *torace*, e nell' *adomine*. Vidi che la *membrana adipoſa*, *carnoſa*, e *comune* de' *muſcoli*, che in altri groſſi *vermini* ſi può riputare per involucro univerſale, quivi ſi doveva conoſcere per una membranoſa eſpanſione de' *tendini* procedenti da diverſi *muſcoli*, e come foſſe il *meſenterio*, il *legamento ſoſpenſorio* dell' *epate*, e il proceſſo del *peritoneo*, non meno che il *mediaſtino*, e la *pleura* del *pericardio* del cuore. In mezzo del *torace* alquanto a ſiniſtra tra la dupplicatuta del *mediaſtino* ſi vede collocata una craſſa, e doppia membrana nervoſa, ed è il *pericardio* medeſmo, che involve il cuore, ed ivi poco diſtante dà principio il lungo, e tortuoſo progreſſo degl' *inteſtini*. Trinciai minutamente queſto interno lavoro, e vidi ſepararſi pochiſſima quantità di materia ſebacea (161). Depoſte che ha

(161) Neſſun altro forſe de' vermi del grano più di queſto acconcio ſarebbe ſtato per imbandire le tavole degli Antichi, ſe contezza ne aveſsero avuta, o ſe guſtati gli aveſſero, come quelli fecero di altre piante. ELIANO lib. 14. cap. 13. ci ha parlato di un Re dell' Indie, il quale faceva portare alla menſa in luogo di frutti un verme a roſto, che ſuol naſcere da certa pianta: *Indorum Rex ſecundis menſis, & bellariis non iiſdem delectatur, quibus Graeci, qui palmarum pumilarum fructus expetunt; at ille vermem quemdam in planta quadam naſcentem ſecundis menſis igne toſtum adhibet, ſuaviſſimum quidem illum, ut Indi ajunt, & eorum, qui guſtaverunt, nonnulli aſſe-*

ha la *zuccajuola* le ſue *uova*, apre il nido, in cui ſi era rinchiuſa, e le abbandona. Queſto *nido* è una pallottola informe di terra, nella quale ſi ritrova un' ampia cavità, dove ſtava il vivente, ed è il ſerbatojo delle *uova*. Non poterono allontanarſi dal *nido* loro quelle *zuccajuole*, che ſotto una campana di vetro allevai per farne oſſervazione. Eſſe *uova* ſono cenerognole bianchicce, e di figura non eſattamente ovale. Dalle medeſime naſcono, per quello che ſi è detto, ſenza covaticcio i piccoli *Inſetti*, e vi naſcono, rompendo la buccia, come dalle loro *uova* naſcono i *bruchi da ſeta*. Se non dopo molta diligenza, e attenzione, e dopo l' avere aſpettato dal meſe di Aprile a quello di Agoſto mi è riuſcito di poter vedere un tale naſcimento. Eſcono i medeſimi dall' *uovo* colla parte anteriore, ſi divincolano alquanto, e sbrigano in breve tempo tutto il corpicciuo-

lo

aſſerunt. Onde S. GIROLAMO l. 2. *adverſus Jovinian.* ha queſte parole: *In Ponto, & Phrygia vermes albos, & obeſos, qui nigello capite ſunt, & naſcuntur in lignorum carie, pro magnis reditibus paterfamilias exigit, & quomodo apud nos attagen, & ficedula, mullus, & ſcarus, in deliciis, computantur: ita apud illos* ξυλοφάγοι *comediſſe luxuria eſt*. E già Plinio XVII. 24., declamando contra il luſſo delle Tavole de' ſuoi tempi, che aveva condotto i Romani a ingraſſare i vermi di *Quercia* per eſſe, dopo aver fatto diſcorſo di que' vermi, che attaccano le piante, *jam pridem*, paſsò a dire, *& in hoc luxuria eſſe coepit; praegrandeſque roborum delicatiores ſunt in cibo, coſsos vocant; atque etiam farina ſaginati ii quoque altiles fiunt*. Il Sig. di REAUMUR *T.* 2. *M.* 8., che pur riferiſce queſto paſſo, e quello di ELIANO, lungi dal convenire con PLINIO nel diſaprovare tal uſo, anzi bramerebbe, che foſſe il medeſimo a' noſtri giorni introdotto per diminuire il numero de' vermini, e per fare in queſto modo, che meno ci nuoceſſero di quello, che fanno. Io non ſo figurarmi, qual forte ſtomaco ſi regeſſe ora a queſta per noi ben ſingolare vivanda.

lo dal guſcio, che rimane come una pellicola bianchiſſima, e diafana. In tale ſtato eſſi raſſomigliano alquanto a' *grilli* (162), ma ſe bene ſi conſiderano le loro fattezze, chiaramente ſi riconoſcono per quali ſono, e l' intera ſtruttura ſi diſtingue. Le *ale* ſolamente, che per volare ſembra, che loro non ſieno date, e la corazza, o il *cappuccio* non vi ſi poſſono in alcuna maniera vedere, giacchè allora ſi coprono interamente, ma, come le piccole *cavallette* ſi ſpogliano dopo alquanti giorni di una pellicola, che tutte le ricopriva, così queſti fanno, e compariſcono un poco più grandicelli di prima, e le veſtigie dell' *ale*, e del *cappuccio* appaleſano; fintantocchè ſpogliati per due altre volte in varj tempi, e ſenſibilmente ingranditi, tutte le loro parti ſi manifeſtano all' ultimo finimento ridotte. Alcune *zuccajuole* ſono ſtate ne' miei alberelli più di 4. meſi ſenza cibo alcuno ſtracche, e ſtrapazzate; ma poſcia ſono morte.

57. E queſto ſarà il termine di ciò, che ſopra gl' *Inſetti* del grano in erba ho potuto vedere nel *Territorio Ravennate* con gli occhi miei proprj. Non ho di alcuni fatto più minuto racconto, perchè troppo ſarebbe ſtata nojoſa coſa coteſta al leggitore, e mi avrebbe troppo dal mio fine dilungato.

CAPI-

[162] L' ALDROVANDI *de Animal. Inſect. l. 5. c. 9.* laſciò, che queſt' Inſetto *cum Grillo - Locuſtae ſpecie affinitatem quandam habere videtur.*

CAPITOLO X.

Osservazioni, ed esperienze particolari d' intorno al *pullular dell' erbe eterogenee*.

1. ERbe moltissime si trovano fra il grano in erba, delle quali se alcune ve n' ha, che non sieno contrarie alla natura del medesimo, altre però lo privano di quell' alimento, che maggior vigore gli renderebbe, maggiore fertilità, e maggior perfezione (163). Io nominerò quelle, che ho vedute in diversi campi di questo territorio, potendovene essere di molte più, che io non abbia vedute, le quali da miglior investigatore sieno state notate. Alquante delle medesime furono anche dagli Antichi considerate per dannevoli alle biade (164), e conobbero, che molte nascevano solamente nell' anno loro (165), cioè quando nella terra si trovavano i sughi proprj per quella spezie. Sopra ciò molte considerazioni ho io fatte, che si vedranno altrove. Di quest' erbe lascerò indietro ogni descrizione, e non ricercherò il loro uso nella medicina, perchè tutto si potrà avere dalle Opere, che ci hanno lasciate insigni Scrittori di *Botanica*. 2. *Aco-*

(163) OVID. *Remed.*

Terra salutiferas herbas, eademque nocentes
Nutrit: & urticae proxima saepe rosa est.

(164) PLIN. XVIII. 17. *Commune autem omnium satorum vitium urica, etiam ciceris* .... e più sotto, come altrove si è veduto: *Lolium, & tribulum, & cardum, lappamque non minus, quam rubum inter frugum morbos*..... ed altrettanti.

[165] Il medesimo PLINIO XIX. 7. *Quaedam anno tantum suo pariunt, quaedam saepius: sicut apium, porrum, gethyumque.*

2. *Aconito Unifoglio*. Se ne manifesta in gran copia ne' campi, che stanno intorno alla *città* (166). Fiorisce a mezzo Febbrajo, e non matura il seme prima della fin di Maggio.

3. *Adonide Silvestre*. E' molto frequente in queste campagne, siccome lo è in quelle del Veronese per testimonio del Sig. GIAN-FRANCESCO SEGUIER (167). Matura il seme nel principio di Primavera.

[166] Il SEGUIER *Plan. Ver. T.* 3. *p.* 210., parlando di questo Aconito, disse: *In vallis Orcanae silvulis a Bordonio inventus*. Egli è l'*aconitum unifolium, luteum, bulbosum* C. B., *Pin. l. V. sec. IV. p.* 183. *Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa* J. B., *Hist. Plan. T.* 3. *p.* 414. *Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio, flore luteo* TOURNEF. *In. R. H. p.* 272. *Aconitum luteum minus* DOD. *Pomp.* 440. *Aconitum hiemale* GER. *Emac.* 968. RAII *Hist.* I. 700. Molti si dicono gli *Aconiti*, ma questo solo io ho ritrovato fra 'l grano in erba, quantunque in luogo non dirupato, e sassoso, per cui ebbe il nome di ἀκόνιτα, come attesta TEOFRASTO, e PLINIO, non meno che OVIDIO, il quale cantò *Met.* 7.

Quae, quia nascuntur dura vivacia cote,
Agrestes aconita vocant . . . . . .

Non molti *aconiti* però volle il SALMASIO *Exercit. Plin. T.* 1. *c.* 43. *p.* 121., se già scrisse: *Falluntur igitur, qui* παρδαλιαγχές, *&* λυκοκτόνον, *quasi diversas acconitorum species distingunt, quod haec peculiariter lupos sicut illa pardos tollat*. E più sotto: *Non igitur plura genera aconiti, sed unum, quod aconitum proprie dictum ab* ἀκόνιτος, *idest cautibus, in quibus provenit*. Che se il CLUSIO nel l. V. della sua *Storia delle piante* volle dar parecchie effigie, o immagini del vero aconito, cioè dell' erba *Luparia*, tratte da' luoghi diversi, dov' ella nasce, il medesimo *Salmasio* riporta le immagini altresì del primo, e del secondo *aconito* di DIOSCORIDE, tratte da un libro Greco vetustissimo di questo autore, acciocchè dal loro confronto possa insieme costare, che non sono piante del medesimo genere, e che più rettamente sentirono quegli antichi Greci, i quali all' una imposero il nome di *telifone*, o di *scorpione*, e all' altra quello di *aconito*; per il che dimostrarono, che tutte e due non volevano comprendere sotto il genere medesimo. ESICHIO le distinse così: θηλυτόνον, ἀκόνιτον.

[167] *Adonis* SEG., *Plan. Ver.* T. I. p. 509., e più innanzi *inter*

4. *Afaca* (168). Si vede ogni anno vicino alla *Pineta*, ed anche in terreni buoni. Fiorisce al principio di Maggio.

5. *Aglio salvatico* (169). Fa in luoghi aprichi, e arenosi dalla parte di *Cervia*. Fiorisce verso la metà di Giugno.

6. *Alisso*, o *Semenzina*. E' pianta comune ne' campi d' intorno alla *città*. Mena il fiore nell' Aprile, e matura prima delle biade.

7. *Anagallide* (170). Nasce dalla parte di *mezzodì* in luoghi ombrosi, ma di terreno grasso. Mette il fiore dal principio di Giugno per tutto Agosto.

8. *Anonide* (171). Si ha pur anche in queste terre più fertili d' intorno alla *città*. Ella dà il fiore in Luglio particolarmente, e talor prima di questo mese.

9. *Antemide* (172). E' non solo vicino alla *città*,

inter segetes admodum frequens. Questo è l' *Anemone di sottil foglia di Valerio Cordo* PON. 149. *Adonis silvestris, flore phoeniceo, ejusque foliis longioribus* C. B. *Pin.* 178. MORIS., *Hist.* III. 27. *Ranunculus arvensis, foliis chamaemeli, flore phoeniceo* TOURNEF., *Inst. R. H.* 291.

(168) E' la *Pitine di Teofrasto* CALC., *It.* 10. *Vicia lutea, foliis convolvuli minoris* C. B., *Pin.* 345. *Lathyrus cirris aphyllis.* LIN., *H. Clif.* 367. *Aphaca* LOB., *Icon.* 70. RAII, *H.* I. 899., e SEG: *P. V. T.* 2. *p.* 86.: *Inter segetes, solo praesertim glareoso, haud rara est.*

(169) *Alii genus ophioscoronon* CHABR. *stir. Icon. p.* 201.

[170] *Anagallis mas* MATTH. *Com. in lib.* 2. *Dios. p.* 464. BRUNSFELS. 2. 238. DOD. *Pompt.* 32. CALC. *It.* 9. *Anagallis foliis ovatis* LIN. *H. Clif.* 52.

(171) E' l' *Egipiro* CALC. *It.* 10. *Anonis* RIV. *Ic.* 2. SEG. *P. V. T.* 2. p. 90. n. 1. *Anonis purpurea vulgaris spinosa flore purpureo, siliquis erectis lentiformibus* MORIS. *Hist.* II. 169. *Anonis spinosa, flore purpureo* C. B., *Pin.* 389. RAII. *Hist.* I. 957.

(172) *Anthemis, sive chamaemelum* CHABR. *Stir. Icon. p.* 362.

Passim,

tà, ma lungi pur anche da essa verso *Levante*. E' annuale, e fiorisce di Maggio, e se ne trova di quattro sorte.

10. *Antirrino* (173). Abbonda nelle campagne nostre di *Occidente*, e fiorisce in principio di Luglio con fiore purpureo.

11. *Aparine*, o *Speronella*. Di più spezie me ne furono recate come venute da quella parte del *territorio*, ch' è vicina alla *Pineta*, dove fioriscono nel Maggio, non che nel Giugno, e nel Luglio, e sono spezie di *aconiti*; ma io non ve le ho ritrovate.

12. *Aristolochia* (174). L' ho veduta in terreni grassi, ed alti del *territorio*; e fiorisce a mezzo il mese di Maggio.

Passim, aggiugn' egli, *in segetibus provenit*. E' pure l' *antemide*, *ovvero Camomilla* PON. 4. *Chamaemelum serotinum annuum*, *foliis obscure viventibus*, *flore majore* MORIS. *Hist.* III. 35. *Chamaemelum inodorum*, *sive Cotula non foetida*, *flore majore* J. B. III. 120. PONT. *Diss.* 257. V' ha anche l' *Anthemis arvensis annua patula*, *modo odora*, *modo inodora*, *modo foetida*, *folio glauco*, *capitulis*, *& ramulorum extremitatibus crassioribus* MICH. *N. Pl. Gen.* 33. *Tab.* 30. *fig.* 2. V' ha il *Chamaemelum chrysanthemum quorumdam Buphtalmum multis* CHABR. *stir. Icon. p.* 363., il quale soggiugne, che *in arvis inter avenae*, *& tritici segetes nascitur*, *earumque est vitium*. E v' ha finalmente il *Chamaemelum foetidum* C. B. *Pin.* 135. TOURNEF. *In. R. H.* 494.

(173) *Antirrhinum* SEG. *P. V. T.* 1. *p.* 261. *Crescit*, dic' egli, *in solo arenoso juxta Urbem*, *tum quoque in declivitatibus Collium*. Ebbe *Antirrino* CALC. *It.* 11. PON. 13. *Antirrhinum arvense minus* MORIS. *Hist.* II. 505. *Antirrhinum silvestre Phyteuma* DOD. *Pompt.* 182. *Antirrhinum foliis lanceolatis*, *petiolatis*, *calicibus florem superantibus* LIN. *H. Clif.* 324.

[174] *Aristolochia longa* CHAB. *Icon. p.* 512., la qual dice, che *provenit in campestribus locis*, *inter segetes in Gallia Narbonensi praesertim frequens*. Così la nomina anche il LOBELIO *Stir. Ob. p.* 332. Scrisse *Aristolochia lunga* CALC. *It.* 9. *Aristolochia clematitis vulgaris*

13. *Artemiſia* (175). E' ne' campi graſſi, e ne' magri, ma più abbondantemente ne' magri. Poco danno reca alle biade, perchè naſce tardi, e non fioriſce, che dopo mezzo Giugno.

14. *Avena ſalvatica* (176). E' frequentiſſima ne' luoghi ſpezialmente più baſſi di queſte campagne. Non ho veduto mai, che in lei ſi tramuti il grano, o che da lei ne venga il medeſimo. Fioriſce a mezzo Maggio; ma in Francia, per quanto ne dice il VAILLANT nella ſua *Botanica Pariſienſe*, non manda fuora la ſpiga, e non fioriſce prima di Giugno, e more di Luglio.

15.

ris J. B. III. 560. CLUS. *Hiſt.* LXXI. *Ariſtolochia caule erecto ſimpliciſſimo, foliis cordatis, petiolatis, floribus lateralibus confertis* LIN. *H. Clif.* 432.

(175) *Artemiſia maggiore* PON. 142. *Artemiſia vulgaris major, caule ex viridi albicante* TOURNEF. *In. R. H.* 460. *Artemiſia latifolia* DOD. *Pompt.* 33. *Artemiſia vulgaris* J. B. III. 184. RAII *Hiſt.* I. 372. *Artemiſia foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis* LIN. *H.* CLIF. 404. *Artemiſia* SEG. *P. V.* T. 2. p. 175., e afferma, che *utraque in campeſtribus locis copioſe reperitur.*

(176) *Avena ſilveſtris piloſa, ariſtis recurvis* MORIS. *Hiſt.* III. 209. *Aegilops quibuſdam ariſtis recurvis, ſive avena piloſa* J. B. II. 433. RAII *Hiſt.* II. 1254. *Gramen feſtucae, ſeu aegilops, & Bromos herba* C. B. *Pin.* l. 1. ſec. 1. p. 9. *Lolium Adami Loniceri. Feſtuca graminea* Jo: THALII. *Feſtucago Gazae. Aegilops Chabr. ſtir. Icon. Cl. XVIII. p.* 177. Seguita poi eſſo CABREO: *ſylveſtrem vero aegylopa nigram, & barbatam, ac frumenti vitium nuncupant Auctores;* e più ſotto: *In pratis, in agrorum marginibus, atque in ſegetibus reperitur Feſtuga, ſive Feſtucago, quae pro Aegylope traditur.* Se però ſi trova ne' prati, e ſulle ripe, dove non è grano certamente, non verrà dunque da eſſo. Anche lo Scrittore della *Hiſtoire des plantes de l' Europe, & des plus uſitées, qui viennent d' Aſie,* pretende, che l' *Avena ſilveſtre* proceda dalle biade corrotte, ſiccome l' *Uſtilagine* dalla Segala annebbiata, e qualche volta, dic' egli, dall' orzo. Ma quell' autore non eſaminò forſe la natura di queſta pianticella compitamente, e però cogli Antichi anch' eſſo volle in-

gan-

15. *Bardana*, *o Lappa*. In mezzo a' grani più poveri di queſte campagne ſi paleſa, e i ſuoi fiori produce ſolo di Luglio.

16. *Borſetta*, *o ſcarſellina* (177). Queſta è una pian-

gannarſi, e con PLINIO ſegnatamente, il quale, di tal' opinione eſſendo abbaſtanza perſuaſo, non dubitò di dire: *Primum omnium frumenti vitium avena eſt, & hordeum in eam degenerat, ſicut ipſa frumenti fit inſtar. l.* 18. c. 17. L' *avena* è una pianta molto diverſa da quella del grano, e per lei viene la terra ſterilita, onde VIRGILIO: *Georg.* 1. *Urit enim Lini campum ſeges, urit avena*. E PLINIO l. 22. c. 25. *Bromos ſemen eſt ſpicam ferentis herbae naſcitur inter vitia ſegetis avenae graecae: genere, & folio, & ſtipula triticum imitatur. In cacuminibus dependentes, parvulas velut Locuſtas habet*. Il che ricavò da DIOSCORIDE: κριθῆς δὲ ἔχει ἐπάρχων ὥσπερ ἀκίδια. L' *avena ſalvatica* è ſimile all' *orzo ſalvatico*, e all' *avena dimeſtica* interamente, ſe non che i ſuoi grani ſono più grandi, e più neri, e queſti non produſſero mai, che *avena ſalvatica* ne' luoghi da me fatti più volte ſeminare con eſſi puramente. Quantoppiù in ſomma ſi riflette, e ſi eſperimenta ſopra la legge della generazione delle coſe, più che ſi ſtudiano i caratteri, che diſtinguono le ſpezie, meno ſempre ſi è diſpoſto a credere, che una pianta divenga un' altra pianta. Non lo credette il Sig. BONNET della Società reale di Londra: *Traitè ſur l' uſage des Feuilles*, quantunque un accidente curioſiſſimo gli aveniſſe, per cui altri meno eſperti di lui ſi ſarebbero forſe determinati per l' antica opinione: „ Je ne ſai, " dic' egli, „ ſi l' on „ doit mettre au rang des monſtres une plante de froment d' un „ ſeul tuyau, de l' un des noeuds du quel ſortoit un ſecond tuyau, „ qui portoit à ſon extremitè un epi d' Yvroie. Le tuyau comun „ ſe prolongeoit, & ſe terminoit par un epi de froment. " Egli attribuì queſto ſucceſſo ad una ſpezie d' ineſto; perchè il Sig. CALANDRINI avendo ſeccati queſti due gambi, e oſſervati diligentemente, vide nel luogo dell' inſerimento le loro membrane perfettamente contigue. Nè è coſa molto ſtraordinaria l' accidente de' fiori di *ranuncolo*, in mezzo a' quali eſca uno ſtelo, che porti un altro fiore. Queſta ſpezie di moſtro è frequente ſopra i Roſai, e ne' frutti di acino: „ J' ai vù, " dic' eſſo BONNET nel luogo citato, „ u- „ ne poire, de l' oeil de la quelle ſortoit une touffe de 13. a 14. „ feuilles très-bien conformèes, & dont pluſieurs avoit leur gran- „ deur naturelle. "

[177] *Burſa paſtoris* MATTH. l. II. *Dioſc. c.* 150. *p.* 313. J. B. II. 936.

pianta, che naſce tra il grano di ogni qualità di terreno. Mette il fiore in Aprile, e in Maggio, e talor anche in Giugno.

17. *Bugloſſa ſilveſtre* (178). Se n' ha in abbondanza a *mezzodì*, e nella *Pieve quinta*. Apre il fiore nel principio di Giugno, e talor anche in Luglio.

18. *Bulbo vomitorio* (179). E' ſtato qualche volta trovato ne' campi ſeminati di grano in vicinanza della *Pineta di San Giovanni*, e non lungi dal fiume *Savio*, ma in quelli ſoli più ſterili. Non ho creduto, che ſia il *Bulbo eſculento* del CHABREO, per

936. RAII *Hiſt.* l. 838. E SEG. *Pl. Ver. T.* 1. *p.* 394. ſcriſſe: *Vix enim Ager invenitur, in quo non naſcatur haec Planta, quae interdum hortos infeſtat. Il* CHABREO *Stir. Ic. Cl. XXII. p.* 295. *Burſa paſtoris foliis perfoliatae*, e aggiugne: *variis locis ſponte provenientem obſervavimus. Thlaſpi ſiliquis verticaliter cordatis Lin. H. Clif.* 330.

[178] *Bugloſſum ſilveſtre* MATTH. *l.* 4. *c.* 122. *Bugloſſum erraticum aſperum echioides. Adv.* LOB. *Echium Fuchſii, ſive Borago ſilveſtris* Jo: B. III. 581. RAII *Hiſt. I.* 494. *Boraginem noſtram* GEORG. A TURRE *Hiſt. Plan. T.* 2. *c.* 91. *Bugloſſum* SEG. *Pl. Ver. T. I. p.* 215. *n.* 3. *In arvis circum Urbem, & Gretianae vicum inter ſegetes copioſe provenit.* Un' altra ſpezie di Braſſica, che ho fatta ricercare indarno nelle noſtre campagne, aſſeriſce il SEGUIER, che abbondantemente ſi produce in quelle del *Veroneſe*, ed è l' *anchuſa degener, facie milii-ſolis* del RAII *Hiſt.* I. 503. il *Lithoſpermum annuum album, tetracarpon, ſemine nigro anguloſo* del MORIS. *Hiſt.* III. 447. *Bugloſſum arvenſe annuum, Lithoſpermi folio.* TOURNEF. *Inſt. R. H.* 134.

(179) Così lo chiamarono il MATTIOLI, CASTOR DURANTE, e il CHABREO, il quale nell' *Appendice ſtir. Icon. pag.* 623. avverte, che *hodie non cuivis notum eſt, ut ſcite ajunt Cordus, & Turnerus;* GASPARE BAUCHINO *l.* 11. *ſec.* 1. *p.* 43. lo nomina *Hyacinthus racemorus moſchatus.* Il SALMASIO *Exercit. de Homon. Hyles Jat. T.* 3. *c.* 114. così parla de' Bulbi: *Hodie ignorantur bulbi illi veterum eſcarii tam dulces, quam amari. Nec obſervarunt noſtri herbarii, duo genera eorum a Dioſcoride conſtitui praeter vomitorium. Communes,*

per aver le foglie pieghevoliſſime, ma piuttoſto un *giacinto*. Sol dopo la mietitura fioriſce.

19. *Buftalmo* (180). Si vede continuamente nelle pianure umide di *Santo Stefano*, e di *Campiano*. Fioriſce a mezzo Maggio.

20. *Bupleuro* (181). E' poco frequente in queſte campagne, e talora ſi trova ſolo nelle più *orientali*. Manifeſta i ſuoi *petali* nel principio di Luglio, ed è anche in fiore di Agoſto.

21. *Calamenta* (182). Si fa vedere tra le biade di terreno più povero frequentemente. Nel grano comincia a fiorire ſulla fine di Maggio, e ſeguita anche nelle *ſtoppie*.

22. *Camepitide* (183). Si produce nelle terre col-

munes, & omnibus noti amari erant. Qui ex Africa afferebantur, dulces, quod & rubicundos fuiſſe autumant. Alii tamen amaros eos tradunt, & ſcillini ſaporis, ut Tarantinus Heaclides, & ex correctione noſtra Dioſcorides. Bulbine etiam dulcis, quam non inter βολβὰς, ſed inter βολβώδη recenſet Theophraſtus. Et ſane ἡ βολβίνη dicta a ſimilitudine βολβῷ.

[180] *Buphthalmum vulg. Chryſant. cong.* CLUS. *Rar. Plan. Hiſt. l. 3. p. 332. Buphthalmum Dodonaei, aliis conſiligo tenuifolia* CHABR. *ſtir. Icon. p. 528. Chryſanthemum conyzoides, foliis circa florem rigidis* MORIS. *Hiſt. 3. 18. Tab. 5. Fig. 25.*

(181) Queſto è il *Bupleurum foliis ovalis perfoliatis* di LINEO *H. Clif.* 104. *Perfoliata* CORD. *Hiſt.* 103. RIV. *Ic. 3.* TRAG. 482. *Perfoliata vulgatiſſima, ſive arvenſis* C. B. *Pin.* 277. *Perfoliata longioribus foliis* CHABR. *Icon. Claſ. XXVII.* p. 408., il quale aggiugne: *nonnullis locis in arvis inter ſegetes, ac etiam in pratis, & juxta Agrorum margines ſponte naſcuntur perfoliatae.* E' comune pur anche ne' grani d' intorno a *Parigi*, come atteſta il VAILLANT *Botanicon Pariſienſe p.* 24.

(182) *Calamintha Pulegii odore, ſive Nepeta* C. B. *Pin.* 228. *Flore minore odore Pulegii* J. B. 3. *part.* 2. 229. *Meliſſa floribus ex alis ſuperioribus pedunculo dichotomo, caule procumbente* LIN. *H. Clif.* 308. *Pulegium ſilveſtre, ſive calamintha altera* DOD. *Pompt.* 98.

[183] *Camepizio* CALC. *It. 9. Iva moſcata officinis. Camaepytis*

coltivate novellamente, le quali ſieno ſabbionicce, e ne ho rinvenuto nella villa di *Primaro* non lungi dalle *Mandriole*. E' pianta annuale, che fioriſce di Maggio, e dura per fino al gelo.

23. *Camomilla* (184). Naſce ne' campi migliori, e più fertili del *territorio*, e mette il fiore verſo la fine di Maggio, continua nel Giugno, e in altri meſi, ed è pianta annuale.

24. *Cardo* (185). Alligna ſingolarmente nelle parti baſſe apriche del *territorio* verſo le *valli*. Quantunque cominci a ſpuntare dalla terra nell' Autunno, egli non finiſce però di creſcere, che a Maggio, e dura verde lungo tempo. Ve n' ha di più ſorte.

25. *Cavolo ſalvatico* (186). Sta vicino a queſti no-

tis vulgaris RAII *Hiſt. I.* 573. *Chamaepytis lutea vulgaris, ſive folio trifido* C. B. *Pin.* 249 MORIS. *Hiſt.* III. 425. *Teucrium foliis ſimpliciter trifidis* LIN. *H. Clif.* 301. *Chamaepytis* SEG. *P. U. T.* 1. *p.* 322. *Locis aridis, & ſabuloſis delectatur.*

(184) *Chamomilla vulgaris* 3. TRAG. *Deſc. & Icon.* 148. *Chamaemelum elatius foliis obſcure virentibus ſemine nigro* PLUK. *Almag. Bot.* 97. *Chamaemelum vulgare Leucanthemum Dioſcoridis* C. B. *Pin.* 135.

(185) *Carduus arvenſis Tabernaemontani Carduus. Moſchatus, flore amplo albo, capite deflexo* PLUK. *Almag. Bot.* 83. VAILL. *Act. Ac. R. Par. an.* 1718. Di alcune altre ſpezie riferite dagli Autori ne ho ivi anche ritrovate, e particolarmente il *volgariſſimo Cardo del Lobelio, ovvero l' Onopiſſo del Guilandino* PON. 3. *Carduus xeranthemos flore luteo, capitulis parvis in umbella* MORIS. *Hiſt.* III. 162. *Carlina ſilveſtris vulgaris* CLUS. *Hiſt.* CLVI. TOURNEF. *Inſt. R. H.* 500. PONT. *Diſſ.* 168. Infeſta anche le noſtre campagne il *Cirſium arvenſe ſonchi folio, radice repente, flore purpuraſcente* TOURNEF. *In. R. H.* 448. PONT. *Diſſ.* 133. VAILL. *Act. Ac. R. Par. ann.* 1718. *p.* 159., ch' è il *Carduus vulgatiſſimus viarum* MORIS. *Hiſt.* III. 156.

[186] *Braſſica campeſtris* CLUS. *Par. Hiſt. l. V. c.* XXVI. p. CXXVII. *Braſſica arvenſis* C. B. *Pin. l.* 3. *ſec.* 3. *p.* 112. *Braſſica ſylveſtris* Dio-

noſtri *fiumi* in terreno ſabbioniccio tra le biade meno copioſe di gambi. Comincia a fiorire nel principio di Primavera.

26. *Centaurea* (187). Queſta pianticella di fior giallo, che ſi fa vedere nel principio di Giugno, è comune ne' campi vicini alla *marina*.

27. *Cerinte* (188). Naſce in diverſe qualità di terre coltivate a grano, e fioriſce alla fine di Aprile, continua di Maggio, ed è pianta per ordinario annuale.

28. *Ciano* (189). Frequentemente ſi oſſerva, da chi vuol vederla, tra le pianticelle del grano nelle campagne anche fertili. Fioriſce di Maggio, ed è annuale.

29. *Cicerbita*, o ſia *ſonco*. Alcuna volta ſi ha ne' terreni migliori, e in varie ſpezie, le quali tutte fioriſcono la State, e ſono piante annuali.

30. *Cicerchia ſalvatica* (190). Rade volte ſa vederſi

E e

Dioſcòrid. Braſſica ſiliquoſa J. B. II. 853. *Braſſica ſylveſtris, & ſpinoſa* CHABR. *ſtir. Icon. p.* 271. PLINIO confonde, come nota il DALECHAMPIO, e dopo di lui il CHABREO la Storia del *Cavolo marittimo* con quella del *ſalvatico*.

(187) *Centaurium luteum perfoliatum* MATTH. *Comm. in l.* 3. *Dioſcor. p.* 489.

[188] *Cerinthe minor* C. B. *Pin.* 258. MORIS. *Hiſt.* III. 446. RAII *Hiſt. I.* 506. *Cerinthe foliis cordatis ſeſſilibus* LIN. *H. Glif.* 48. *Cerinthe* SEC. *Pl. V. T.* 1. *p.* 226., che aggiugne: *haud raro inter ſegetes Majo menſe reperitur*.

[189] *Ciano minore* CALC. *It.* 12. *Cyanus ſegetum vulgaris minor annuus* MORIS. *Hiſt.* III. 134. *Centaurea calicibus ſerratis, foliis linearibus, infimis dentatis, ſuperioribus integerrimis* LIN. *H. Clif.* 422. *Cyanus ſegetum* CHABR. *ſtir. Icon. Cl. XXV. p.* 340., che dice: *ſpontanei in agris proveniunt*.

[190] Per cagione del ſeme più piccolo ella ſi conoſce differente dal *Lathyrus, cicercula, piſum Graecorum* CHABR. *ſtir. Icon. Claſ.* XVII.

p.

derſi in queſte campagne, e quaſi ſempre vicino alla città, e fioriſce nel Maggio, e nel Giugno.

31. *Cicoria ſalvatica* (191). Viene in molti luoghi coltivati del *territorio*, e fioriſce tardi, perchè in Giugno, e negli altri meſi di State.

32. *Cicuta* (192). Produce il ſuo fiore nel meſe di Maggio in terreni ſaſſoſi, e dalle acque dolci, come dalle ſalſe non molto rimoti; e ne ho veduto in alcuni campi contigui alla *Pineta di Claſſe*, che non avevano anche del tutto ſpiegate le foglie.

33. *Cipero* (193). Mi è capitato in anno piovoſo da' luoghi più baſſi mal coltivati, e vicini alle *paludi*, dove creſce preſto, ma fioriſce tardi, e quando il grano è già maturo.

34. *Codacavallina*, o *equiſeto*. E' per l' ordinario nelle biade al principio di Aprile, e v' è in fiore.

35. *Condrilla* (194). Ella ſpunta fra le biade, allor-

p. 145. Ella è il *Lathyrus arvenſis*, *radice tuberoſa repente* MORIS. *Hiſt.* II. 51. *Chamaebalanus leguminoſa* J. B. II. 324. RAII *Hiſt. I.* 895.

(191) *Cichorium ſylveſtre*, *Picris* DOD. *Pempt.* 635. *Cichorium caule ſimplici* LIN. *H. Clif.* 389. *Cichorium ſylveſtre*, & *ſativum* J. B. 2. 1007. *Intybum ſylveſtre*. FUCHS 679.

(192) *Cicuta* MATTH. *Comm. in l.* 4. DIOSC. *p.* 773. DODON. *Pempt.* 461. J. B. 3. 2. 175. *Cicuta major* C. B. *Pin.* 160.

[193] *Cyperus* CHABR. *ſtir.* 194. Scriſſe, che *naſcitur in cultis paluſtribus locis*, e aggiunſe: *Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec ſemen producere, ſed ſola radicum propagatione conſervari Geſnerus de hortis Germaniae*, & *Pona in ſuo Baldo affirmant. Contra Matth. Dodonaeus*, *Lob.*, *Columna cum flore pingunt*. Parmi di poter convenire con queſti ultimi. Egli è il *Cyperus rotundus*, *vel juncus anguloſus*, & *triangularis Celſi*, & *Plinii* LOB. *Icon.* 75. *Calamagroſtis altera* TRAG. 679.

[194] *Condrilla II. di Cluſio* PON. 236. *Chondrilla viminea* J. B.

II.

allorchè ſono quaſi mature, onde reca loro poco danno. Fioriſce in Luglio, e in Agoſto.

36. *Convolvolo*, o *Vilucchio*. Moſtra i ſuoi fiori a mezzo Maggio, e ſi manifeſta in varj luoghi aperti, e di terreno non graſſo.

37. *Correggiuola*, chiamata altramente *Poligono*. Non lungi dalla *città* ſi paleſa ne' campi più vicini al *fiume Ronco*. E' pianta volgare, che non mena il fiore, ſe non quando il grano è già mietuto.

38. *Coriandro*, ovvero *zizania*. Queſta bene ſpeſſo, e ora in maggiore, ora in minore copia ſi paleſa nelle biade di terreno più debole, e dolce, e fioriſce nella State.

39. *Dauco* (195). Fa molto abbondantemente ne' luoghi anche più colti. E' pianta annuale, e comincia a dare il fiore nella metà di Maggio, e queſto fiore è roſſo.

40. *Delfinio* (196). Si manifeſta frequentemente nelle campagne verſo *mezzodì*, e fioriſce in tempo di Primavera.

41. *Ebbio* (197. Infeſta alcune volte le biade, quando ſono più tenere, ma non dà fiori, che nel meſe di Luglio.

II. 1021. RAII *Hiſt.* I. 223. *Chondrilla juncea viminea arvenſis* TABERN. *Ic.* 178. *Lactuca ſylveſtris perennis lutea, juncea, viminalibus virgis H. Ox.* 3. 58. *n.* 21.

[195] *Daucus ſegetum humilior, & ramoſior* VAILL. *Botan. Pariſ. p.* 46. *Caucalis arvenſis, humilior, & ramoſior Hiſt. Ox.* 3. 308. *n.* 9. *Caucalis ſegetum minor, anthriſco hiſpido ſimilis* RAII *Hiſt.* 468.

(196) *Delphinium ſegetum, flore albo* TOURNEF. *R. H.* 426. *Conſoulde royalle* FUCHS. *Gall. c.* VIII. *Conſolida regalis arvenſis, flore albo* C. B. *Pin* 142.

[197] *Ebulus, ſive ſambucus herbacea* J. B. *I.* 546. *Ebulus* DOD. *Pempt.* 845.

42. *Echio* (198). Radiſſime fiate ſi vede in queſte campagne, o ſe pur ſi vede, è dalla parte di *mezzodì*, e non vi fa i ſemi, ovvero non gli conduce a maturazione. Fioriſce nel tempo della mietitura, ed anche prima, e nel Maggio.

43. *Elatine* (199). Di una ſpezie ſola ne ho veduto fra il grano di terre dolci; e fioriſce di Primavera, e di State, ma ſingolarmente in Aprile.

44. *Equiſeto* (200). Vedi *Codacavallina*.

45. *Erucagine*, o *rucagine* (201). Si rende frequentiſſima ne' luoghi più ombroſi delle noſtre campagne, e fioriſce nella State.

46. *Ervo* (202). Sta per lo più ne' campi eſpoſti all' Oriente, e ve n' ha molto vicino alla *città*. Manda fiori alla fine di Maggio, e ſe ne vede anche di Giugno.

47. *Eu-*

845. PONT. *Ant.* 270.. E il SEGUIER *ſecus vias publicas, & vicinales, & in agrorum limitibus, tum in ipſis arvis per totam planitiem agri Veronenſis paſſim reperitur. Plan. Ver. T.* 1. *p.* 250. *Sambucus humilis, ſive ebulus.* C. B. *Pin.* 456. TOUR. *In. R. H.* 606.

(198) *Echium* DOD. *Pempt.* 631. E il SEGUIER aggiugne: *ſecus vias, & ſemitas abunde provenit Pl. V. T.* 1. *p.* 217. *Echium vulgare* C. B. *Pin.* 254. J. B. III. 586. *Echium, ſive Alcibiacum. Herbe aux viperes* DOD. *Gall.* 7.

(199) Queſta è la *Elatine femmina, folio anguloſo di* CHABR. *ſtir. Icon. p.* 453. la *Veronica femmina* del FUCHS. cap. LIX. la *Linaria ſegetum nummulariae folio villoſo* di TOURNEF. *I. R. H.* 169.

(200) *Coda di Cavallo* PON. 144. *Equiſetum minus* DOD. *Gall.* 76. *Equiſetum arvenſe longioribus ſetis* C. B. *Pin.* 16. RAII. *Hiſt. I.* 128.

(201) *Erucago ſegetum* TOURNEF. *In. R. H.* 232. *Sinapi echinatum* J. B. II. 858. *Bunias* LIN. *H. Clif.* 340. *Erucago* SEG. P *V. T.* 1. *p.* 400. *Inter ſegetes ſtatim ab urbe occurrit occidentem verſus.*

(202) *Ervum* MATTH. *in l.* 2. *Dioſc.* c. 102. p. 264.. E SEGUIER *in collibus inter ſata ſponte provenit, mihique occurrit in illis, qui Po-*

giano

47. *Eupatorio* (203). Naſce agli anni piovoſi nelle campagne più baſſe del *territorio*, e l' ho trovato in fiore ſolo nell' Agoſto.

48. *Felce* (204). Non rade volte l' ho veduta creſcere abbondantemente vicino alla *città* dalla parte di *Settentrione*. Produce i ſuoi fiori dopo la mietitura, e non dà i ſemi prima di Agoſto, e di Settembre.

49. *Galega* (205). Si ha anch' eſſa nelle vicinanze della *città*, e ſegnatamente nelle parti di *Settentrione*, e fioriſce di Maggio.

50. *Gaelopſi* (206). Non vedeſi per ſolito fra il grano, ſe non ne' luoghi più baſſi, e in fiore non trovaſi, ſe non in Agoſto.

51. *Gallio* (207). Moſtra il fiore nel meſe di Mag-

giano vico imminet P. V. *T.* 3. *p.* 237. *Orobus ervum* CHAB. *ſtir. Ic. p.* 148., o è quello piuttoſto da eſſo lui chiamato *ſylveſtre*.

[203] *Eupatorium cannabinum* C. B. *Pin.* 320. *Eupatorium cannabinum fiore purpureo*, *Flor. Pruſſ.* 70. *Eupatorium adulterinum* J. B. II. 1065. *Eupatorio di Dioſcoride* CALC. *It.* 9.

(204) *Filix foemina* DOD. *Pompt.* 462. *Filix major*, & *prior Trago*, *ſive ramoſa repens* J. B. III. 735. *Filix ramoſa major*, *pinnulis obruſis non dentatis* C. B. *Pin.* 357. TOURNEF. *In. R. H.* 536. *Filix* SEG. *Pl. Ver. T.* 1. p. 68. n. 4. *In convallibus montibus Baldi*, & *Leſſinenſium admodum luxuriat*, & *arvis exoſa eſt*.

[205] *Galega*, *o Ruta capraria* PON. 138. *Galega* J. B. II. 342. DOD. *Pompt.* 548. RAII *Hiſt. I.* 911. LIN. *H. Clif.* 362. *Galega*, *ruta capraria* CHABR. *ſtir. Ic. Claſ. XVII. p.* 154., che aggiugne: *In fulliginoſis locis ſcrobium aggeribus*, *montibus*, & *arvis frugiferis paſſim provenit*, *at colitur etiam in hortibus*.

(206) *Ladano Campeſtre di Plinio* PON. 13. *Ladanum ſegetum quorumdam*, *flore rubro* J. B. III. 855. RAII *Hiſt. I.* 566 *Galeopſis patula ſegetum*, *fiore purpuraſcente* TOURNEF. *In. R. H.* 185. *ſideritis arvenſis anguſtifolia rubra* C. B. *Pin.* 233. *Lamium arvenſe annuum anguſtifolium rubrum*, *verticillis ſpinoſis* MORIS. *Hiſt.* III. 386.

(207) *Gallium verum* J. B. 3. 720. *Gallium* DODON. *Pempt.* 355.

Maggio, e ſta ne' luoghi umidi, e nelle campagne poco fertili.

52. *Ghiaggiuolo*, o *Gladiolo*. Non l' ho veduto mai in altri terreni, che in poveri, e vicini alle *Pinete*. Fioriſce nel Maggio, e al principio di Giugno.

53. *Git*, o *Nigella* (208). Qualche volta ſi fa vedere ne' campi aperti più umidi, e fioriſce di Maggio.

54. *Gitagine*, o *Gittone*, o *Nigellaſtro* (209). E' in eſſi campi aperti frequentiſſimo, ma ſpeſſo anche in terreni ſecchi, ed ombroſi. Fioriſce di Maggio, e di Giugno.

55. *Git-*

(208) *Graecis* μελάνθιον, *papaver nigrum*, *nigella*, *& gith latinis dicitur..... ſylveſtre autem in agris ſua ſponte provenit* FUSCH. *Hiſt. ſtir. cap.* 45. *p.* 132. GATTI nell' agricoltura: „ Il git è un ſeme ne„ ro quaſi in triangolo, la cui erba naſce tra il grano, e tra la „ ſpelta, e tra le ſegale, e in volgare ſi chiama gitterone, e fa „ fiori roſſi a modo di campanelle. Alcuni lo chiamano melanzio, „ ed altri nigella. " Abbiamo *Melanthium calice*, *& flore minore*, *ſemine nigro*, *& luteo* J. B. III. 208. *Melanthium ſativum ſimplici flore* CLUS. *H.* CCVII. a. *Gith*, *ſeu melanthium* MATTH. *in l.* 3. DIOSC. *c.* 78. *p.* 417. CHABR. *ſtir. Icon. Claſ.* 26. *p.* 378.

(209) *Lolio del Fuchſio* PON. 138.. Ma il CHABREO *ſtir. Icon. XXIX. p.* 443. *Non eſt lolium ut apertiſſime hallucinatus credit Fuchſius teſtibus Trago*, *Cordo*, *Cornario*, *Lacuna*, *& Matthiolo*. Il medeſimo: *Pſeudo-melanthium*, *nigellaſtrum Gall.* Nielle des bleds... *In agris inter ſegetes paſſim ubique provenit. Majoque*, *& Junio menſibus cum flore viget. Melanty nomen a ſeminis nigredine obtinuit: verum ad legitimi differentiam cum adjectione* μελάνθιον ἐν τῶν πυρῶν *dicitur Hippocrati*, *ut Octavio Horatio: Gith*, *quod in ſegete naſcitur*, *ac doctis aliis plaeriſque omnibus Pſeudo-melanthium*. Ma GASPARE BAUCHINO *Pin.* l. 6. ſec. 1., nominandolo *Lychnis ſegetum*, ſoggiugne: *nec lolium*, *nec melanthium eſt; quibuſdam* ἀνθεμοφυλλάδες *Theophraſti*. Il medeſimo FUCHSIO *Hiſt. ſtir. c.* 45. *p.* 132. *Officinae nonnullae non ſine magno errore*, *pro melanthio*, *ſeu nigella utuntur*, *ut non temere etiam Pſeudo-melanthium dici queat*. Si ha: *Lychnis hirſuta ſegetum ma-*

jor

55. *Gittone*. Vedi *Gitagine*.

56. *Gladiolo* (210). Vedi *Ghiaggiuolo*.

57. *Gramigna* (211). Di varie ſpezie in molti ſeminati del *territorio* ne ho ritrovate, e fioriſcono tutte di Maggio, e di Giugno.

58. *Je-*

jor MORIS. *Hiſt. II.* 543. *Agroſtemma* LIN. *H. Clif.* 175. *Nigellaſtrum* DOD. *Pompt.* 173. *Githagine, ſeu Pſeudo-melanthio .... Gitton aliquibus. Italis* Gittone, *Bononienſibus* Giottone, & Juttone. AMBROS. *Phytolog. T.* 1. *p.* 247.

[210] *Gladiolo* PON. 138. *Gladiolus, ſive Xiphion* I. B. II. 701. RAII *Hiſt. II.* 1168. *Gladiolus carnei coloris* SUVERT: 42. *Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis major, & procerior, flore purpureo rubente* C. B. *Pin.* 41. MORIS. *Hiſt. II.* 343. *Gladiolus* SEG. *Pl. V. T.* 2. *p.* 60. dove: *Inter ſata copioſe provenit cum in urbis viciniis, tum in locis ab illa diſſitis.*

[211] 1. *Feſtuca avenacea ſterilis elatior, ſeu Bromos Dioſcoridis* C. B. *Pin.* 9. RAII *Hiſt.* II. 1289. MORIS. *Hiſt.* III. 212. *Gramen loliaceum locuſtis longiſſimis, modo purpuraſcentibus, modo viridibus* MONT. *Prodr.* 35.. 2. *Gramen paniculatum, proliferum* TOURNEF. *In. R. H.* 523.. *Gramen arvenſe, panicula criſpa* C. B. *Pin.* 3. *Theat.* 23.. 3. *Gramen tremulum majus* C. B. *Pin.* 2. *Theat.* 22. SCHEUCHZ. *Agroſt.* 204.. *Lolium* 10., & *Aegilops Plini juxta* HIERONYMI TRAGI.. 4. *Gramen ſpicatum, ſpica cylindracea tenuiſſima longiore* TOURNEF. *In. R. H.* 520. SCHEUCHZ. *Agroſt.* 69. *Gramen alopecuroides, ſpica longa tenuiore* MORIS. *Hiſt. III.* 192.. 5. *Gramen paniculatum aquaticum, anguſtifolium, panicula ſpecioſa, locuſtis parvis* SCHEUCHZ. *Agroſt.* 184. *Gramen paluſtre, panicula ſpecioſa* C. B. *Pin.* 3. *Prodr.* 7. *Theat.* 39.. 6. *Gramen plumoſum Lobelii, ſpica candida, & ſerica modo lucens* CHABR. *ſtir. Icon. p.* 186. J. B. II. 476. *Gramen paniculatum arundinaceum panicula denſa ſpadicea* TOURNEF. *In. R. H.* 523.. 7. *Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa* C. B. *Pin.* 3. *Theatr.* 34. SCHEUCHZ. *Agroſt.* 144. MORIS. *Hiſt. III.* 199. *Gramen repens officinarum* CHABR. *ſtir. Icon. p.* 181.. 8. *Gramen agrorum Lobelii, agrorum venti ſpica* CHABR. *ſtir. Icon. p.* 181.. *Gramen miliaceum majus, glumis ariſtatis ſpadiceis* PETIV. *Conc. Gr. num.* 122.. 9. *Gramen ſpicatum, locuſtis echinatis* TOURNEF. *Inſt. R. H.* 519. *Gramen echinatum parvum* J. B. II. 467. MONT. *Prodr.* 64.. 10. *Gramen arundinaceum ramoſum plumorum album* C. B. *Pin.* 7. RAII *Hiſt. II.* 1280. *Arundo ſarcta vallium Ravennae* ZAN. *Hiſt. Bot.* 64. MONT. *Prodr.* 32. MORIS. *Hiſt. III.* 221. SEG. *Pl. Ver. T.* 1. *p.* 361. il quale

av-

58. *Jeracio*, e ſi dice talor *Ragadiolo*. S' incontra vicino alla *città* in terreni anche ben coltivati, e ha compoſto in Giugno il ſuo fiore.

59. *Lampſana* (212). Si manifeſta, benchè di rado, ne' campi pur meglio coltivati dalla parte di *mezzodì*, e fioriſce alla metà di Maggio, eſſendo pianta annuale.

60. *Lappa* (213). Vedi *Bardana*.

61. *Lappola* (214). Eſce ne' campi più incolti, e particolarmente nelle vicinanze di *Sant' Alberto*. Fioriſce nel Giugno.

62. *Lat-*

avverte, che non ſolo ella è di Ravenna, *ubi primum eam legi, & deinde hinc accepi a Cl. V. Joſepho Ginannio.... ſed in agro Veronenſi creſcit ſecus athеſis ripas.....*

(212) *Lampſana* DOD. *Pempt.* 675. J. B. II. 1028. RAII *Hiſt.* I. 256. PONT. *Diſſ.* 113. PON. 154. CALC. *It.* 12. MATTH. *in l.* 2. DIOSC. *c.* 109. *p.* 271. SEG. *P. V. T.* 2. *p.* 204.. *In hortis, & in cultis locis frequenter exit.* Abbiamo *Lampſana, ſive Lapſana papillaris* CHABR. *ſtir. Icon. claſ.* XXIII. *Intybus, ſive endivia erecta lutea napifolia, Lampſana dicta* MORIS. *Hiſt.* III. 54.

(213) *Lappa, ſive Bardana major, flore albo* MOR. *Hiſt. Bardana altera vulgaris capitulis minus tomentoſis* RAII *Sin.* 88. *Lappa major ex omni parte minor, capitulis parvis, eleganter reticulatis* PLUK. *Almag.* 205. SALMASIO però *Exercit. de Homon. Hyl. Jat. T.* 3. *Edit. Trajec. c.* 58. *p.* 74. di eſſa così ſcriſſe: *Lappam vero, quidquid deradit, & vellicat aſperitate ſua, Latini vocarunt; unde & Lappa ſervio, id quod lana decerpitur. Omnia ſemina aſpera, & veſtes retinentia, Lappa dicuntur Plinio. Unde* Lappae minutae *de tenuibus, & aſperis ſeminibus, &* lapae grandis *de perſonata, quae capitula fert grandiuſcula, & veſtibus adhaereſcentia.* E nel cap. 62. car. 80. *Lappam vulgo hoc tempore appellatam in officinis audimus, quam veteres Graeci* ἄχριον, *&* προσωπίδα *Latini* perſonatam *dicebant. At Lappa aetate Plini in Latio vocabatur ea herba, quae in Graecia* ἀπτεῖνη.

[214] *Caucalis arvenſis echinata parvo flore, & fructu* PON. 152. *Lappula canaria flore minore, ſive tenuifolia* J. B. *III. l.* 27. *p.* 8. *Echinophora* 3. *Leptophillos, purpurea* COL. 1. 96. *fig.* 97.

62. *Latte di gallina*, o ſia *Ornitogalo* (215). Si ſcuopre tardi, e nelle campagne aſciutte, e fertili vicino al *territorio Forliveſe*. E' di fior bianco, e fioriſce di Aprile, e di Maggio, al contrario del giallo, che fioriſce alla metà di Febbrajo, ma non già fra eſſi grani.

63. *Latuga ſilveſtre* (216). Nelle ville contigue al *territorio Ceſenate*, ed al *Forliveſe* l' ho notata talora, e ne ho veduto il fiore nel Luglio, e nell' Agoſto.

64. *Licnide* (217). E' molto dannoſa alle biade, e naſce in parecchi luoghi del *territorio* noſtro, fiorendo nel Luglio, e nell' Agoſto.

65. *Litoſpermo* (218). Particolarmente s' incontra ne' campi meglio tenuti, e fioriſce ne' meſi di Aprile, e di Maggio.

66. *Loglio* (219). Ama i campi baſſi, e umidi,

[215] *Ornithogalum* C. B. *Pin. p. 69.* CHABR. *ſtir. Icon. p.* 219., il quale conſidera, che *vel majus eſt, vel minus: ac variis locis copioſe admodum in Pratis, & inter ſegetes abundat.*

(216) *Lactuca ſylveſtris laciniata* MORIS. *Hiſt.* III. 58. *Lactuca ſylveſtris, ſive endivia multis dicta folio laciniato, dorſo ſpinoſo* J. B. II. 1003. *Lattuca ſilveſtre del Mattioli, e del Fuchſio* PON. 9., e 12. *Lactuca ſylveſtris, opii odore vehementi, ſoporifero, & viroſo Adv.* MORIS. *Hiſt.* III. 58. *Lactuca ſylveſtris, lato folio, ſucco viroſo* J. B. II. 1002.

[217] *Lychnis graminea hirſuta umbellifera* MORIS. *Hiſt.* II. 546. *Alſine verna glabra, floribus umbellatis albis* TOURNEF. *In. R. H.* 242. *Holoſteum Caryophyllum Tab. Icon.* 233. *Caryophyllus arvenſis umbelliferus* J. B. III. 361. RAII *Hiſt.* II. 1028.

(218) *Lithoſpermum minus* DOD. *Pempt.* 83. *Lithoſpermum arvenſe, minus* TOURNEF. *In. R. H.* 137. *Echium ſcorpioides, arvenſe* C. B. *Pin.* 254. *Lithoſpermum ſeminibus levibus corollis vix calicem ſuperantibus* LIN. *H. Clif.* 46..

(219) *Lolium gramineum ſpicatum, caput tentans* J. B. II. 437.

Gra-

e non isdegna i più alti, e asciutti; e ne ho osser-

Gramen loliaceum spica longiore, seu lolium Dioscoridis C. B. *Theat.* 121. SCHEUCHZ. *Agrost.* 31. *Inter Graminea loliacea spicata* SEG. *Pl. V.T.* 1. *p.* 340., che aggiugne: *Inter segetes nimio frugum damno frequenter oritur*. Ma il CHABREO *stir. Icon. p.* 178. *Lolium, phoenix Gramen loliaceum* sostiene: *nascitur in arvis cum tritico, & hordeo, seminibus ipsorum corruptis, aut, ut Galenus ait, in deterius permutatis;* onde il RAMAZZINI *Diss. de constit. an.* 1690., *&c. Sic fumentatio pessum ivit, frumento passim a rubigine absumpto, partim ab aquarum colluviem in lolium converso*. Il MATTIOLI *in l.* 2. *Diosc. cap.* 93. *non solum triticum, hordeumque in lolium degenerat, sed & ipsum quoque lolium in triticum mutatur. Id quod non solum affirmant Ruriculae, sed & Theophrastus quoque testatur lib.* 4. *c.* 6. *de plant. caus. sic inquiens*: sed de mutatione in formam alienigenam, ceu ex tritico in lolium, & rursus ex lolio in triticum, & semine in avenam, mirandum sane est, &c.. Disse il RAJO *Hist. Plan. T.* 1. *c.* 12., che curiose sono le osservazioni intorno la trasmutazione delle piante, perchè senza contar quella del *frumento* in *loglio*, la *rapa* in *ravanello*, alcun' erbe di pascolo in *serpillo*, volgarmente si crede, che spesse volte sia succeduto, che dal seme del *cavolo fiore* sieno nate delle *verze*, dall' erba *appio* il *baludappio volgare ingrato*, dal *finocchio dolce* il *finocchio salvatico*. Fra quelli, che confermarono, e francamente sostennero quest' opinione, è da vedersi GIULIO CESARE SCALIGERO *Com. in Sex lib. de Caus. Plant. Theoph. l.* 2. *c.* 17. *l.* 2. *c.* 22. *l.* 5. *c.* 3., GIO. EUSEB. NIEREMBERGIO *Hist. Nat. l. VI. c.* 21., GIO: BATT. TRIONFETTI *Obser. de ort., & veget. Plant.*, e moltissimi altri Autori de' bassi tempi, non menocchè tutti gli Antichi, perchè ammettendo essi questa favola per vera, sovente sul di lei fondamento pretendono di fabbricare macchine grandissime. De' moderni per altro alcuni ve n' ha, che tal fatto dimostrarono falso, ed immaginario, e dalle annuali mie esperienze, ed osservazioni viene ciò confermato manifestamente. Non le credette il TANARA *Econ. del Cit. in Villa l.* 6., che scrisse: „ Io sono uno di „ quelli, che siccome ho per impossibile, che il loglio diventi gra„ no, perchè vedo, che nelle mutazioni sempre le cose deteriorano, „ così dubito ancora, che il frumento, si muti in loglio.“ Il VALLISNIERI *de arcano lenticulae palustris semine, ac admir. veget.* così volle dichiararsi: *de lolii etiam trasmutatione, quae tam alte populorum in mente sedet, subdubito. Observavi enim saepe, quod tempestate sicca humile cepit, ita ut interdum vix ad spithamae longitudinem excrescat; ideo cum non aequet proceritate triticum inter stramina,*

sti-

ſervato ne' ſterili, egualmente che ne' fertili. Que-

 ſta

ſtipulaſque calcantur pedibus, & inobſervatum latet, cujus ſemina rurſus ibi cadunt, ibique ſervantur. Contra vero pluvio Coelo campos nimis irrorante lolium cum aliis male natis ſeminibus luxuriant non ſolum tritici culmos, & ariſtas exaequat, ſed ſuperat, triticum vel obruit, vel occultat, marceſcente interea plurimo tritico, plurimo effoeto, humilique pallente. Cum autem ruſtici meſſores ſegetes tundunt, lolium ſicca tempeſtate breviuſculum non palmant, coecumque in agro relinquunt: quod humida tempeſtate non evenit, immo contrarium ſequitur. Qua de re orta eſt primo apud bardos ruſticos aequivocatio lolium in triticum, triticum in lolium mutavi, quae fabella neſcio quo fato e campis in ſcholas irrepſit..... Incaſſum enim decantatam tranſmutationem expectavit Malpighius, ut in opere poſthumo teſtatur, incaſſumque pariter, ſi ulla meis verbis fides, per biennium tentavi. Id quod etiam aliis, & ſignante D. Camerario an. 3. Decad. 3. miſcel. ſur. Ger. Obſerv. 143. contigiſſe legimus..... Eodem modo fallaciae ſubſunt in aliis vulgo creditis tranſmutationibus, ut lini in dracunculum, ſi ejuſdem ſemen perforatae coepae committatur, ni me experientia fefellit, & ante me magnos illos naturae genios Geſnerum, Matthiolum, Hiſt. Lugdun. Dalechampium, Baubinum. Immo, pace etiam clariſſimi Malpighi, quod uvarum racemi in Capreolos udo tempore vertantur, valde dubitamus, ſed racemi remaneant ſemper racemi, licet officio quandoque capreolum fungantur. Io non poſſo ſeriamente oppormi a quel folle penſiero di certi uni anche viventi, i quali s' immaginano, che il *frumento* non ſolo, ma la *ſegala* ſi convertano qualche volta in *loglio*, e il *loglio* in queſt' altri grani. Le loro aſſerzioni ſono mere illuſioni. E certamente ne' campi delle mie lunghe oſſervazioni mai è nato loglio, dove non foſſe ſtato ſeminato loglio, e mai altro grano, dove ſolo loglio doveva naſcere. Ma quello, che rende ciò ſempreppiù aſſicurato, è quanto ultimamente confermò il bravo Signor BONNET *Trait. ſur l' uſ. des Feuil.* della ſtruttura particolare del loglio, la quale di carattere troppo diverſo a ogni altro grano lo rende per far sì, che in altro poſſa degenerare. „ Tutte le prove “, dic' egli, „ che ſi adducono in contrario, e tutt' i fatti avvenuti, ſono prove „ molto equivoche di queſta degenerazione. “ Il caſo riportato dal medeſimo BONNET della pianta di *frumento* d' un ſolo ſtelo, dall' uno de' cui nodi uſciva un ſecondo ſtelo, che portava nella ſua eſtremità una ſpiga di *loglio*, è un fenomeno molto rado, che non ſi può allegare in prova. Le ſemenze di queſte due piante poſſono eſſerſi unite in terra, come dice l' Autore, o, come penſa il celebre Signor DU HAMEL, può eſſere ſucceduto, che le polveri degli ſtami di una

pian-

ſta pianta è qui ſoggetta al *carbone*, non meno che alla *filiggine*, ma più di rado alla *filiggine* (220). Si terrà per una ſpezie di *gramigna*, e non mai per una mutazione del *frumento*, o di altro grano, che ſia. Il ſuo gambo è roſſo vicino alle radici, e queſto colore viene diminuendo nell' alzarſi. Fioriſce di Maggio, e di Giugno.

67. *Lombruna* (221). Creſce vicino alle *valli* in campi mal coltivati, e fioriſce di Aprile.

68. *Loto* (222). Qualche rada volta ſi oſſerva ne' luoghi più eminenti, e più ſcoperti dal Sole. Fioriſce in Luglio.

69. *Me-*

pianta di loglio, e di una pianta di frumento, eſsendoſi unite, e confuſe, abbiano formata una ſpezie di moſtro. Ebbi anch' io novità sì fatta coll' inſinuare deſtramente in grano di frumento un tenuiſſimo grano di miglio, perchè dallo ſtelo medeſimo del frumento vidi uſcirne un' altro di miglio. Il Signor BONNET riſponde con ſode ragioni a tutte le difficoltà, e tratta queſta materia con tal preciſione, e con tanta copia di oſservazioni, che nulla più ſi potrà deſiderare, onde queſto fatto reſti oramai pienamente deciſo.

[220] Laddove in Francia per le oſservazioni del Signor TILLET car. 133. ſi è ſcoperto alla *carie* ſolamente ſoggetto.

[221] *Jacea nigra* CHABR. *ſtir. Icon. Cl. XXV. p.* 342. *Jacea nigra laciniata* C. B. *Pin.* 271.

[222] *Trifolium argentatum floribus luteis* J. B. *II.* 359. MAGN. *Bot. Monſp.* 267. RAII *Hiſt.* 1. 969. *Lotus aſperior fruticoſus* PARK. *Theat.* 1100. *Lotus hierazuni, cretica belli, ſeu trifolii genus edule* CHABR. *ſtir. Icon. Cl. XVII. p.* 158 *Cytiſus humilis argenteus anguſtifolius* TOURNEF. *In. R. H.* 648.. Il SALMASIO ſcriſſe: *Exerc. de homon. hyl. iat. cap.* 2. *p.* 1.. *Quod ad Loton communem ſpectat, quem in Italia naſci, Plinius aſſerit ex Africa translatum, ſed ſolo mutato factum degenerem, non alia poteſt eſſe, praeter azadarat herbariorum..... Nulla quippe hodie in Italia loti ſpecies praeter hanc reperitur, quae & umbrae cauſa expetitur, ut ex magnis eſt arboribus. Fructum habere ſimilem nabac ſcribit Aviſena, & magnam eſſe arborum. Priſcis pro loto acceptam, & ſic vocatam non dubitandum puto, eamque intelligi, cum* λωτὸν μίγα δένδρον, *& ἐμεγέθης eſſe dicunt. Nam*

vero

69. *Medica* (223). I ſuoi fiori ſi paleſano nel principio di Aprile. Ve n' ha molta in terreni meſſi nuovamente a coltura dopo le inondazioni de' *fiumi*, che portarono molte arene, e vicino alla *Villa di Savarna*, e di altre.

70. *Melampiro* (224). Creſce ordinariamente fra le biade de' campi tutti, ma più ne' meno fertili. Fioriſce nel Giugno, e nel Luglio.

71. *Meliloto* (225). E' frequente nelle biade, e di più ſorte, ma non dà fiore che dopo la mietitura, cioè di Agoſto.

72. *Menta* (226). E' anch' eſſa di più ſpezie, pro-

vero lotos non nimium magna. Nec vero procera, & vaſta praecipue, foliis latiſſima umbra expatiantibus, & in vicinia domos, teſte Plinio, tranſilientibus. Il noſtro *loto* è molto diverſo. Ma SALMASIO medeſimo al c. 4. car. 6. aggiugne, che λωτὸς *etiam herba plurium generum, & praeterea paluſtris frutex Aegypti peculiaris ex genere nymphaearum, vel nymphaea* αἰπύχρημα *Nilotica.... herbam, ſive gramen fuiſſe Homero debemus credere. Quintilianus l. V. c. 8. neque aliter, quam ii, qui traduntur a Poetis guſtu cujuſdam apud lotophagos graminis, & Sitenum cantu deliniti voluptatem ſaluti praetuliſſe..... de loto pratenſi, & hortenſi poſſumus accipere. Nullus enim alius lotus, graminis, vel herbae inſtar ſe gerit.*

(223. *Medica puſilla* CAM. *Medica cochleata* πολύκαρπος *annua, capſula minima rotunda* MORIS. *Hiſt. II.* 144. *Trifolium echinatum, arvenſe* C. B. 329.

(224) *Melampiro di Teofraſto* PON. 140. *Parietaria ſylveſtris tertia* CLUS. *Hiſt. XLV. Triticum Vaccinum* DOD. *Pompt.* 541. CALC. *It.* 10. *Melampyrum purpuraſcente coma* C. B. *Pin.* 234. PONT. *Anth.* 241. TOURNEF. *In. R. H.* 173. MORIS. *Hiſt.* 428. *Melampyrum* SEG. *Pl. V. T.* 1. *p.* 272. *Inter ſegetes frequens, praeſertim in collibus.*

[225] *Trifolium odoratum, ſive melilotus vulgaris, flore luteo* J. B. *II.* 370. *Saxifraga lutea* FUSCH. *Hiſt.* 749. *Melilotus officinarum Germaniae* C. B. *Pin.* 331. *Melilotus* SEG. *Pl. V. T.* 2. *p.* 97. *Inter ſegetes copioſe provenit, & interdum in murorum pinnis, humanam altitudinem haud raro ſuperans.*

[226] *Calaminta terza, ovvero acquatica del Mattioli* PON. 4.

Men-

produce ne' campi vicini a' luoghi paludosi copiosamente, e mostra i suoi petali solo nella state.

73. *Mercorella* (227). Produce in terreni coltivati. E' pianta annuale, e se ne trova in fiore per tutta la State.

74. *Miglio salvatico* (228). Nasce spesso nelle campagne anche più fertili, e di State fiorisce.

75. *Miagro* (229). Si fa spezialmente vedere nelle parti *Occidentali* del *territorio*, e mette il fiore nel Maggio, non meno che nell' Aprile.

76. *Millefoglio* (230). Si compiace di terreno umido, e basso. Comincia a fiorire in Giugno, e seguita per tutta la State.

77. *Miosote*, oppure *orecchia di Topo* (231). Fiorisce talvolta ne' campi magri del *territorio* in Aprile, e in Maggio, e resta molto bassa.

78. *Mosco* (232). Cresce in terre sabbionicce, e

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis, acutis, serratis LIN. *H. Clif.* 307. *Mentha arvensis, verticillata hirsuta* MORIS. *Hist. III.* 369. J. B. *III. Part. II.* 217.

(227) *Mercurialis spicata, sive foemina Dioscoridis, & Plinii* C. B. *Pin.* 121. *Mercurialis foemina* DOD. 658.

(228) *Milium arundinaceum perenne minus, semine oblongo nigro* MON. *Prodr.* 8. *Gramen arundinaceum paniculatum locustis partim muticis, partim aristatis* SCHEUCHZ. *Agrost.* 509. *Gramen palustre arundinaceum, milii panicula, semine Phalaridis* BARR. *Icon.* 1151. *Icon.* 8.

[229] *Myagrum Monospermum latifolium* C. B. *Pin.* 109. *Prod.* 51. *Myagrum siliculis obverse cordatis, fere sessilibus* LIN. *H. Clif.* 328. *Raphanistrum monospermum latifolium, siliculis fungosis glabris auriculatis* MORIS. *Hist. III.* 267. *myagrum* SEG. *P. V. T.* 1. *p.* 369. *Inter segetes obvium est.*

(230) *Millefolium rubro flore* CLUS. *Hist.* 331. *Millefolium vulgare purpureum minus* C. B. *Pin.* 140. MORIS. *Hist. III.* 39.

(231) *Myosotis arvensis hirsuta, flore majore* TOURNEF. *In. R. H.* 245. *Cerastium hirsutum, flore magno* DILLEN. *Cat. Giss.* 46.

[232] *Muscus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis*

e poco fertili vicino alla *Pineta*, e ſi trova nella Primavera in fiore.

79. *Muſcari* (233). Si vede ogni anno fra le biade, e fioriſce nel meſe di Maggio.

80. *Napo* (234). L' ho frequentemente ſcoperto in mezzo al grano in erba co' ſuoi fiori aperti nella Primavera.

81. *Narciſo* (235). Fioriſce alla fine di Marzo, e ſi trova abbondantemente nella villa di *S. Marco*.

82. *Naſturzio ſilveſtre* (236). Mi accadde di vederlo una ſola volta non lungi dalla *Città* in campi di non buon terreno, e fiorì al principio della State.

83. *Ni-*

gis MORIS. *Hiſt.* III. 631. VAILL. *Bot. Pariſ.* 130. *Tab.* XXIV. *fig.* 7. *Bryum trichoides exile, erectis capitulis in pediculis longioribus rubris* DILL. *Pl. Giſſ.* 224. RAII *Syn. Ed.* 3. 97. Ma ſiccome per *Muſco* chiamaſi anche quella verde lanugine, che ſuol naſcere intorno le ſcorze degli alberi, e per le grotte, e muraglie, ove non percuotano i raggi del Sole, onde diſſe VIRGILIO *Egl. 6. v. 63. Tum Phaethontiadas Muſco circumdat amarae*; così in que' luoghi delle campagne ſeminate a grano, i quali ſono umidi, e che non vengono dominati dal Sole interamente, ho ſpeſſe fiate oſservato gambi di grano, i quali nella parte inferiore erano coperti di quella verde lanugine medeſima, quantunque foſſero già maturi, e in iſtato di eſſere mietuti.

(233) Ve n'ho trovate di tutte le ſpezie riportate dal SEGUIER *Pl. Ver. T.* 2. p. 51., e *ſeqq.* Ma particolarmente della prima ſpezie: *Muſcari arvenſe latifolium purpuraſcens* TOURNEF. *In. R. H.* 347. *Hyacinthus maximus botryoides, coma coerulea J. B.* II. 574. *Hyacinthus comoſus major, purpureus* C. B. *Pin.* 42.

(234) *Napus* SEG. *P. V. T.* 1. *p.* 297. *Inter ſegetes oritur*. Abbiamo *Napus ſylveſtris* C. B. *Pin.* 95. *Braſſica radice cauleſcente fuſiformi* LIN. *H. Clif.* 339. *Rapa Salvatica* FUSCH. Ch. LXIII.

(235.) *Narciſſus albidus medio luteus cum aliquot floribus* CHABR. *Stir. Icon.* p. 215.

(236) *Naſturtium ſylveſtre, capſulis criſtatis* TOURNEF. *In. R. H.* 214. *Coronopus Ruellii, ſive Naſturtium verrucoſum I. B.* 2. 910. *Ambroſia campeſtris, repens* C. B. *Pin.* 137.

83. *Nigella*. Vedi *Git*.

84. *Nigellaſtro*. Vedi *Gitagine*.

85. *Orecchia di Topo*. Vedi *Mioſote*.

86. *Ornitogalo*. Vedi *Latte di Gallina*.

87. *Ornitopodio*, ovvero *Scorpioide* (237). Si fa conoſcere in campi di terra cretoſa, e fioriſce di Giugno, e di Luglio.

88. *Orobanche* [238]. L' ho qualche volta incontrata fra' grani di terreno graſſo, e co' fiori alla fine di Maggio, e nel Giugno; ma queſta pianta è propria de' legumi.

89. *O-*

(237) *Teleſio di Dioſcoride appreſſo Anguillara* PON. 140. *Scorpioide* CALC. *It.* 10., e 13. *Ornithopus foliis ternatis fere ſeſſilibus, appendiculatis, impari maximo* LIN. *H. Clif.* 364. *Telephium ſcorpioides* J. B. *II.* 889. E CHABR. *ſtir. Icon. p.* 284. aggiugne *ſpontaneum monſpelii in Agris cultis*.

[238.] *Orabanche flore majore* J. B. II. 780. *Orobanche major, Caryophyllum olens In. R. H.* 175. *Orobanche* LOB. *Icon.* 2. 268. MATTH. *l.* 2. *c.* 136. *p.* 301. CLUS. *Rar. l.* 2. *c.* 62. *p.* 270. E CHABR. *ſtir. p.* 257. *vulgaris orobanche provenit in agris conſitis Avena, Piſis, Fabis, Lentibus, & ejuſmodi leguminibus, quorum eſt vitium*. E PLINIO Nat. Hiſt. l. 18. c. 17. aveva detto: *eſt herba, quae cicer enecat, & ervum circumligando ſe, vocatur orobanche; Triticum ſimili modo aera; Hordeum feſtuca, quae vocatur aegilops; Lentem herba ſecuridaca, quam Graeci a ſimilitudine pelecinon vocant. Et hae quidem complexu necant*. Ma il TATTI nell' *Agricoltura* ſcrive, che *l' orobanche, chiamata da' contadini erba Lupa, naſce non ſolamente ne' campi tra' legumi, ma tra le biade, e tra il canape, e li ammazza*. E così addimandata da' contadini, perchè ſi danno a credere, che ſi mangi tutte quante le altre erbe, che le naſcono intorno, e vicine, o che per lo meno ella le faccia ſeccare. E' detta in Latino *ervi anguina*, e in Toſcano il *ſucciamele*, la quale, come afferma il MATTIOLI, è chiamata anche *coda di Leone* dalla ſimilitudine, ch' ella ha colla coda di queſto animale. Di una tal' erba parlò l' egregio SEGUIER nella ſua *Biblioteca Botanica*, e ne aveva diſteſa una Relazione il Signor PIETRO ANTONIO MICHELI, ch' è ſtata poi illuſtrata dal valoroſo Padre Abate MONTELATICI Canonico Lateranenſe.

89. *Orobo* (239). Non è molto frequente; ma, quando naſce, occupa ſingolarmente le biade de' luoghi, che ſono tra gli due fiumi, e fioriſce di Maggio.

90. *Panico ſilveſtre* (240). Fa gran danno alle biade, che ſono preſſo alle *Valli*, e mette la ſpiga di Giugno.

91. *Papavero erratico* (241). E' comuniſſimo ne' noſtri campi, e fioriſce di Maggio, e di Giugno, e di Luglio.

92. *Parietaria ſilveſtre* (242). L' ho ritrovata

[239] *Orobus ſylveſtris foliis oblongis glabris* VAILL. *Botan. Paris. p.* 155. *Lathyrus anguſtifolius radice tuberoſa Flor. Pruſ.* 138.

(240) *Panicum* SEG. *Pl. V. T.* 1. *p.* 333. *n.* 2. *Panicum ſylveſtre dictum, & dens canis* J. B. *II.* 443. *Icon. Gramen paniceum ſpica ſimplici laevi* RAII *Hiſt. II.* 1261.. In queſto territorio Ravennate *Pabbio* volgarmente ſi chiama.

[241] *Papaver erraticum* MATTH. *in l.* 4. DIOSC. *c.* 59. *p.* 525. DOD. *Pompt.* 447. *Papaver erraticum, rubrum, campeſtre* J. B. 3. 395. *Papaver erraticum majus, ῥοιὰς Dioſcoridis, Theophraſti, & Plinii* C. B. *Pin.* 171. MORIS. *Hiſt. II.* 277. *Papaver erraticum, papaver rhoeas* CHABR. *ſtir. Cl. XXX. p.* 459., e dice, che *gignitur in agris cum omnis ferme generis frugibus, ac non raro etiam inter olera, & ſecus margines agrorum*. Scriſſe il SALMASIO *Exerc. de Homon. Hyl. Jac. T.* 3. *Ed. Traj. in Proleg. p.* 3. *Papaver erraticum dicitur Graecis μήκων ῥοιὰς. Nam τλὼ μήκωνα illi plerumque iſto genere enunciant. Unde & ῥοιὰς μηλώνων. Plinius Papaver rhaean perperam appellavit quaſi ὁ ῥοιὰς diceretur. Inde & cum ῥοιᾷ, quae Punicum malum ſignificat errore nominum idem ſtatuit.*

[242] Il CLUSIO *Rar. Plan. Hiſt. l.* 4. *p. XLIV. Parietaria ſylveſtris* 2., così diſſe: *cauſam non video nominis parietariae, cum neque ad parietes, neque ad macerias ſponte naſcatur, imo potius loca culta fugiat, & ſylveſtribus gaudeat*. Ebbero: *Parietaria* J. B. *II.* 976. DOD. *Pompt.* 102. RAII *Hiſt. I.* 206. SEG. *P. V. T.* 1. *p.* 88. *Parietaria foliis lanceolato-ovatis* LIN. *H. Clif.* 469.. Si trova in SALMASIO *Exerc. de Hom. Hyl. Jat. T.* 3. *Ed. Traj. c.* 13. *p.* 10.: *Parthenium helxine, ſive murarium Celſi, officinis hodie parietaria vo-*

ca-

in campi di nuovo coltivati dalla parte di *Sant' Alberto* contiguo alla Pineta, e anche altrove in terreno mediocre. Fioriſce alla metà di Maggio.

93. *Perſicaria* [243]. Mi è capitata più volte da' campi baſſi al *Levante* della *Città*, fiorendo di Luglio, e di Agoſto.

94. *Pettine di Venere*, o *Scandice*. Si ha qualche volta ne' campi vicino al condotto nominato *Foſſo della Ghiara*; ma ſi trova anche in ſuolo pingue. Fioriſce alla fine di Aprile, e in Maggio.

95. *Piantaggine* [244]. Fioriſce nella fine di Aprile in umido ſuolo.

96. *Poligono* [245]. Vedi *Coreggiuola*.

97. *Pruno* [246], ovvero *Rogo*. Alligna molto ne' campi poco coltivati, e ſingolarmente verſo la *Pineta* in terreni aſciutti. Fioriſce di Giugno, e di Luglio.

98. *Pſillio* [247]. Creſce notabilmente ne' campi,

catur, antiqua admodum voce. Conſtantinus Trajanus herbam parietariam *vocabat, quod nomen ejus multis operibus publicis inſcriptum legeretur.* Herbam parietinam *appellat Amianus*..... Vitreolam *hodieque Itali nuncupant ab uſu, quem praeſtat in vitreis poculis abſtergendis.*

[243] *Perſicaria minor* C. B. *Pin.* 101. *Perſicaria puſilla repens* 3. RAII *Hiſt.* 1. 183.

(244) *Plantago major incana* CLUS. *Rar. Plant. Hiſt. l.* 5. *p. CIX. Plantago major* DOD. *Pompt.* 107.

[245] *Polygonum III. Dodanaei, ſive tenui-folium* J. B. *III. Part.* 2. 377. *Knavel folio, & flore viridi Flor. Ien.* 85. *Alchimilla ſupina, gramineo folio, minore flore* TOURNEF. *In. R. H.* 508. VAILL. *B. P.* 4.

(246) *Rubus* DOD. *Pompt.* 742 MATTH. *in l.* 4. *Dioſc. c.* 33. *p.* 507. *Rubus vulgaris, ſive rubus fructu nigro* C. B. *Pin. l.* 12. *ſec. IV. p.* 479. Anche *Rubus minor* DOD. *Pompt.* 742.. Si trova pure fra' grani: *Rubus repens fructu caeſio* C. B. *Pin.* 479. *Rubus* SEG. *P. V. T.* 2. *p.* 301. *n.* 1. 3.

[247] *Pſyllium* DOD. *Pompt.* 115. PON. 131. SEG. *P.V. T.* 1. *p.* 207.,

pi, dove ſono ſtate le acque torbide per le rotte de' Fiumi noſtri. Produce il fiore in tempo di Luglio, e di Agoſto.

99. *Rafaniſtro* (248). Sta ordinariamente in tutte le biade, e fioriſce alla fine di Primavera, e nella State.

100. *Ragadiolo* (249). Vedi *Jeracio*.

101. *Ramunculo* (250). Piucchè in altro luogo fioriſce tra le biade vigoroſe nel tempo di Primavera, e ve n' ha di ſpezie diverſe.

102. *Raperonzolo* [251]. Si ha frequentiſſimo, e ſpecialmente vicino alla *Città*, dove molto già ſi

207., che aggiugne: *creſcit abunde in agris ſabuloſis....* Si ha *Pſyllium vulgare* RAII *Hiſt. I.* 882. *Pſyllium annuum majus, foliis integris* MORIS. *Hiſt. III.* 262.

(248) *Ranunculus* SEG. *P. V. T.* 1. *Ranunculus foliis cordatis, dentatis, periolatis* LIN. *H. Clif.* 229. *Chelidonia rotundifolia minor* C. B. *Pin.* 309. Vi è *Ranunculus arvenſis echinatus* C. B. *Pin.* 179. J. B. *III. App.* 859. MORIS. *Hiſt. II.* 440. *Ranunculus ſeminibus aculeatis foliis decompoſitis, linearibus* LIN. *H. Clif.* 229.. Evvi *Ranunculus hirſutus annuus flore minimo* RAII *Hiſt. I.* 583. *Synop. ſtir. Brit. Ed.* 3. 248. *Tab. XII. fig.* 1.. Evvi *Ranunculus paluſtris, Apii folio, levis* C. B. *Pin.* 180. MORIS. *Hiſt. II.* 341. *Ranunculus fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis, ſuperioribus digitatis.* LIN. *H. Clif.* 230.. Ed anche *Ranunculus arvenſis parvus folio trifido* C. B. *Pin. V. p.* 179. *Ranunculus repens flore luteo ſimplici* CHABR. *ſtir. p.* 466.

[249] *Raphaniſtrum ſegetum, flore luteo, vel pallido* TOURNEF. *In. R. H.* 230. *Raphaniſtrum ſiliqua articulata glabra majore, & minore* MORIS. *Hiſt. II.* 265. SEGUIER *P. V. T.* 1. *p.* 398. ha, che *inter ſegetes frequens occurrit.*

(250. *Rhagadiolus alter* CAESALP. 511. PONT. *Diſſ.* 109. *Hieracium ſtellatum* J. B. II. 1014. RAII *Hiſt. I.* 256. *Intybus, ſive endivia lutea humilis, ſtellato ſemine* MORIS. *Hiſt.* III. 53.

(251) *Campanula arvenſis minima Dodonaei* MORIS. *Hiſt. II.* 457. *Onobrychis arvenſis, vel campanula arvenſis erecta* C. B. *Pin.* 215. *Viola arvenſis* TABER. *Icon.* 304.

manifesta alla fine di Aprile, e dà il fiore di color celeste nel mese di Maggio.

103. *Rapistro*, ovvero *Remoracia* (252). Nasce qualche anno in terreni di mediocre qualità, e fiorisce di Giugno, e di Luglio, e anche prima.

104. *Remoracia*. Vedi *Rapistro*.

105. *Rogo*. Vedi *Pruno*.

106. *Rucagine*. Vedi *Erucagine*.

107. *Ruta salvatica* (253). Rado si è fatta vedere, e solo nelle campagne, che vennero inondate per rotta del *Fiume Lamone*. Poco danno reca alle biade, e fiorisce la State, e l'Autunno.

108. *Scan-*

[252] *Rapistrum arvense, folio auriculato acuto* TOUREF. *In. R. H.* 211. *Myagro affinis herba, capitalis rotundis* J. B. *II.* 895. RAII *Hist. I.* 839.. Alcuna volta mi è capitato anche il *Rapistrum monospermum* C.B. *Pin.* 95. *Prodr.* 37. J. B. II. 845. TOURNEF. *In. R. H.* 211. *Rapistrum monospermon* CHABR. *stir. p.* 273., che aggiugne: *crescit sponte, vidimus Monspelii, necnon Basileae in Agris*. E il SEGUIER *P. V. T.* 1. *p.* 368. *attamen non adeo obvium est*.

(253) *Ruta Sylvestris narmala* CLUS. *Rar. Plan. Hist. l.* V. C. XXXV. *p.* CXXXVI. *Ruta sylvestris major* CHABR. *stir. p.* 377. C.B. *Pin.*336. VAILL. *Bot. Par.*174. Per testimonio di DIOSCORIDE questa fu chiamata da' Greci πίγανον ἄγειον, ma da' Capadoci μῶλυ, e da altri ἅρμαλα; onde abbiamo in SALMASIO *Exer. de Homon. Hyl. Jat. Cap.*49. *p.*43. *De Moly*, che *omnes antiqui Interpretes Homeri exponunt* πήγανον ἄγειον. *Quia rutam nimirum Sylvestrem apud se nascentem Capadoces, & Galatae sic vocarunt, diversam tamen in totum a moly illo Homerico, quod in Arcadia etiam tum reperiri praedicat Theophrastus folio scillae, radice bulbi. . . . Quin & rutam agrestem* μῶλυ *quidam vocarunt a similitudine, quam quadam tenus habet cum vero Moly, radice nigra, & flore lacteo. . . . Duorum igitur generum moly; immo genere diversum Capadocicum, sive Galaticum, & Homericum, sive Arcadicum. Hic est* ἀνωνυμία. *Capadocicum quidem vocarunt rutam agrestem. Ipsi Capadoces* μῶλυ *nominabant. Dioscorides* καλοῦσί τινες μίγανον ἄγειον, ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ, ἐν δὲ τῇ κατὰ Ἀσίαν Γαλατίᾳ λεγόμενον μῶλυ e vale a dire, che alcuni chiamavano *miganon silvestre* quello, che in Asia, nella Capadocia, e nella Galazia si diceva *Moli*.

108. *Scandice* [254]. Vedi *Pettine di Venere*.

109. *Scarſellina*. Vedi *Borſetta*.

110. *Scorpioide*. Vedi *Ornitopodio*.

111. *Scrofolaria* [255]. Mi vien detto, che naſce qualche volta ne' terreni magri, ed aridi, ma io non l' ho veduta in alcuni. Fioriſce nel principio di Maggio per quanto pur dicono.

112. *Saſſobarbaſſo*, o *Verbaſco*. E' pianta annuale, che non ſi vede ordinariamente, ſe non ne' campi fertili, e graſſi, e mette i ſuoi fiori gialli nel meſe di Giugno.

113. *Semenzina* [256]. Vedi *Aliſſo*.

114. *Senape* [257]. Creſce in molte parti del *territorio*, comincia a fiorire di Aprile, e dura per tutto Giugno.

115. *Se-*

(254) *Scandice* CALC. *It.* 10. *Pettine di Venere* PON. 12. *Scandix ſemine roſtrato vulgaris* C. B. *Pin.* 152. VAILL. *Bot. Pariſ.* 178. *Scandix* SEG. *P. V. T.* 2. p. 46. *inter ſegetes, glareoſis, & apricis locis omnino frequens.*

[255] *Ruta canina* CLUS. *Hiſt.* CCIX. PON. 142. *Scrophularia tertia Dodonaei tenuifolia, ruta canina quibuſdam vocata* J. B. III. 423. *Scrophularia foliis multifidis, racemo terminatrici nudo, pedunculis bifidis* LIN. *H. Clif.* 322.

[256] Si trova anche *Aliſſo*, e però *Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis acutis* TOURNEF. *In. R. H.* 217. *Camelina, ſive Myagrum* DOD. *Pempt.* 532. *Myagrum majus, ſive ſativum* MORIS. *Hiſt. II.* 212.

(257.) Di due ſpezie è fra il grano in erba: *Sinapi arvenſe praecox, ſemine nigro H. Ox.* 2. 216. *Eriſymum Theophraſti*. Detto *Rapiſtrum arvorum* LOB. *Icon.* 198 RAII *Hiſt.* I. 802. *Sinapi vel Sinapis* CHABR. *ſtir. Icon. Cl. XXI. p.* 274. E *ſinapi arvenſe praecox, ſemine nigro, foliis integris* TOURNEF. *In. R. H.* 227. *Rapiſtrum flore luteo, foliis non inciſis* C. B. *Pin.* 95. *Rapiſtrum* BRUNSF. 3. 159. Il ſeme non è veramente nero, ma di un roſſo nericcio, come anche riflette il VAILLANT in quello de' contorni di Parigi *Botan. Pariſ. p.* 184.

115. *Senacione* [258]. Dà il fiore nel primo apparir di Primavera, e ſe ne vede in terreni ben coltivati a lato della ſtrada *Faentina*.

116. *Sio* [259]. E' pianta, che ho trovata una volta ſola nel mio campo di oſſervazioni ordinarie nella villa di *Santo Stefano*, e fiorì nel tempo della mietitura, e anche dopo continuò per lungo tempo.

117. *Solatro* [260]. Naſce ne' luoghi più coltivati, e ne' più pingui, e fioriſce ne' meſi di Luglio, e di Agoſto, eſſendo pianta annuale.

118. *Sonco* [261]. Vedi *Cicerbita*.

119. *Speronella* [262]. Vedi *Aparine*.

120. *Titimalo* [263]. E' frequente, e di molte ſpe-

[258] *Senecio minor vulgaris* C. B. *P.* 131. *Senecio, ſive erigeron* Lob. *Ic.* 225.

[259] *Sium terreſtre umbellis varioribus H. Ox.* 3. 283. Ic. *Sect.* 9. *Tab.* 5. 2. 6. *Sium arvenſe, ſive ſegetum Inſt. R. H.* 308. Vaill. *Bot. Pariſ. p.* 187. *Selinum ſegetale* Park. *Theat.* 932.

[260] *Solanum officinarum acinis nigricantibus* C. B. *Pin.* 166. *Solanum hortenſe, ſive vulgare baccis nigris* J. B. 3. 608. *Solanum caule inermi annuo, foliis ovatis angulatis* Lin. *H. Clif.* 60.

[261] *Sonchus minus laciniosus, aſperior, ſive ſpinoſior* J. B. *II.* 1014. V'è pure tra' grani: *Sonchus laciniatus ſpinoſus* J. B. *II.* 1016. non che: *Sonchus repens, multis Hieracium majus* J. B. *II.* 1017. E *Sonchus minus laciniosus mitior, ſive minus ſpinoſus*. J. B. *II.* 1014.

[262] *Aparine* Calc. *It.* 8. 13. Dod. *Pempt.* 353. Matth. *in l.* 3. *Dioſc.* c. 88. *p.* 426. *Aparine, ſive aſperula* Chabr. *ſtir. p.* 546., il quale conſiderò, che *erit juxta margines agrorum, & quandoque in ipſis agris, frugibus permixta: nec non ſecus vias, ſcrobes aepes, & inter ſentes*. Vi ebbi: *Aparine vulgaris* Camer. *Epit.* 557. Fuvvi *l' aparine ſegetalis, erecta flore albo* Vaill. *Botan. Pariſ.* 15, e l' *aſperula caerulea, arvenſis* C. B. *Pin.* 334. ovvero l' *aparine ſegetalis, erecta flore caeruleo* Vaill. *Bot. Pariſ.* 15.

(263) V' ha *il Tithymalus cyparissias* C. B. *Pin.* 291. *Titimalo ciparissio del Lobelio* Calc. *It.* 7. Pon. 3. *Tithymalus, eſula* Chabr. *ſtir.*

ſpezie in terreni di ogni qualità. Alcuni fioriſcono nell' Aprile, e nel Maggio, altri nel principio della State.

121. *Tlaſpio* [264]. Naſce più, e meno in molti luoghi delle noſtre campagne, e fioriſce nel cominciar della State.

122. *Tribolo* [265]. Creſce or più copioſo, or meno in molte campagne del *territorio*, ma in quelle ſpecialmente, che ſono ſabbionicce, e vicine

ſtir. Icon. p. 532. che aggiugne : *ſaepius alunt ſepes , & pratorum margines , ac nonnunquam etiam agri inter ſtipulas , demeſſis ſegetibus* ; ma io ne ho veduto anche prima della mietitura. V' ha l' *Edula minore del Tago* Pon. 14. *Tithymalus minimus , anguſtifolius annuus* J. B. III. 664. Vi ha il *Peplo* Calc. *It.* 10. *Tithymalus rotundis foliis , non crenatis H. Lugd. Bat.* 600. V' ha il *Titimalo Elioſcopio* Calc. *It.* 7. Pon. 237. *Tithymalus helioſcopius , ſive ſoliſequus* J. B. III. 669. V' hanno in ſomma i Titimali notati dal Seguier *P. V. T.* 1. *p.* 153. a' num. 5. 7. 8. 9. 11. 12. E vi ha anche ne' campi di ſotto al *Ponte nuovo*, laddove i due Fiumi ſcorrono uniti, quel *Tithymalus argenteus maritimus leptophyllos* del Triunfetti, che ſi dice eſſere ſtato trovato nella *Pineta di Ravenna*.

[264] *Thlaſpio di Dioſcoride, o ſia Naſturzio de' Tetti di Serrapione* Zanon. *Iſt. Bot. c.* 100. *p.* 191. *Thalſpi* Chabr. *ſtir.* 290. che aggiugne : *Cultis , & incultis omnium fere regionum locis uberrime provenit* . E ſarà il *Thlaſpi arvenſe perfoliatum majus* C. B. *Pin.* 106. *Thlaſpi alterum mitius rotundifolium , Burſae paſtoris fructu* Col. 1. 278. *fig.* 276.

(265) *Tribulus terreſtris* Matth. *in l.* 4. *Dioſc. c.* 14. *p.* 494. Dod. *Pompt.* 557. J. B. II. 352. Raii *Hiſt.* II. 1344. Chabr. *ſtir.* 156., che afferma : *Inter frugum morbos recenſetur* . Diſſe *Tribulus terreſtris* : τριβολος *Theophraſti* Clus. *Hiſt. CCXLI.* Calc. *It.* 8. Teofrasto parla di un Tribolo ſpinoſo, e aculeato. *Tribulus terreſtris , ciceris folio , ſeminum integumento aculeato* Moris. *Oxon. Hiſt. P.* 2. 102. e ſi legge preſſo Virgilio : Georg. 1. v. 153.

Lappaeque , Tribulique , interque nitentia culta ,
Infelix Lolium , & ſteriles dominantur avenae.

E Plinio XVIII. 17. così dichiaroſſi : *Lolium , & Tribulum , & Carduum , Lappamque non minus , quam rubum inter frugum morbos* po-

cine alle *Valli*, e a' *Prati*. E' pianta annuale, che fioriſce nella State.

123. *Trifoglio* (266). E' comune ne' campi aridi, e magri, ed alcune radiſſime volte ſi ha ne' mediocri. Fioriſce nel mezzo di Maggio, ed è pianta annuale.

124. *Turrite* [267]. Eſce per fino d' Autunno fra i grani, che ſi hanno ne' luoghi anche più coltivati, e fioriſce dal principio di Aprile per tutto Maggio, e non molto dopo periſce. E' annuale.

125. *Valerianella* [168]. Havvene di due ſpezie fra le biade, le quali vi fioriſcono promiſcuamente nel meſe di Aprile, e alcuna volta anche in quello di Maggio.

126. *Vec-*

potius, quam inter ipſius Terrae peſtes numeraverim. Dove il SALMASIO, leggendo diverſamente, *de Homon. hyl. Jat. c.* 48. *p.* 51., dopo avere ſcritto, che *Lappas, & Tribulos apud Virgilium Servius interpretatur res, quibus lana decerpitur*, aggiunſe, che *Plinius ipſe lappas, tribulos, carduos, & rubos inter terrae peſtes potius, quam inter frugum morbos numerari debere cenſet.*

[266] *Trifolium ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calicinis ſetaceis* LIN. *H. Clif.* 374.. *Trifolium arvenſe, humile, ſpicatum, ſive Lagopus* C. B. *Pin.* 328. *Lagopus vulgaris* PARK. 1107 RAII *Hiſt.* I. 948. *Lagopiro del Dodoneo, o Lagopo ſpicato* PON. 10. *Trifolium* SEG. *Pl. V.* T. 2 *p.* 94.; che nota: *in collibus Urbi circumvicinis, & inter ſegetes ſolo praeſertim macro, & arido paſſim conculcatur.*

(267) *Turritis vulgaris ramoſa* TOURNEF. *In. R. H.* 224. *Braſſica ſpuria exilis, non laciniata, hirſutior, foliis longioribus juxta terram hirſutis, ad cauliculos vero glabris* PLUK. *Almag. Bot.* 70. *Piloſella ſiliquata Thal. D. Tab. VII.*

(268) *Valerianella* SEG. *Pl. V.* T. 1. *p.* 212. *n.* 1. 2. *Valeriana campeſtris inodora, major* C. B. *Pin.* 165. *Locuſta herba* J. B. III. 323. *Valerianella arvenſis proecox humilis, ſemine compreſſo* TOURNEF. *In. R. H.* 132. *Polipremno de' Leoneſi* PON. 14.. E *Pſeudovaleriana erecta, ſerotina, ſemine umbelicato, hirſuto, pyramidali* MORIS. *Hiſt.*

I. I.

126. *Veccia* [269]. Ne appare di molte ſpezie, ed è molto ordinaria in tutte le biade. Fioriſce nel meſe di Maggio.

127. *Verbaſco* [270]. Vedi *Saſſobarbaſſo*.

128. *Verbenaca* [271]. Una volta ſolo mi ſono in eſſa avvenuto, e fu nel mio campicello di oſſervazioni ordinarie a *Santo Stefano*. E' pianta perenne, e fioriſce in tempo di State.

129. *Veronica* [272]. Ne ho trovato di molte ſpezie, particolarmente nelle campagne verſo il *monte*, e fioriſcono in Aprile, ed anche in Maggio.

III. 104. *Valerianella arvenſis, ſerotina, foliis ſerratis* VAILL. *Bot. Par.* 199.

[269] *Vicia* SEG. *P. V. T.* 2. *p.* 82. *n.* 1. 3. 4. 5. *Vicia Supina, latiſſimo folio non ſerrato* T. *In. R. H.* 397. *Faba ſylveſtris, fructu rotundo atro* C. B. *Pin.* 338. E *Vicia multiflora* C. B. *Pin.* 345. RAII *Hiſt. I.* 903. *Vicia perennis nemorenſis, ſive dumentorum* J. B. II. 314. E *vicia ſylveſtris ſive cracca major Ger.* RAII *Hiſt. I.* 902. *Vicia vulgaris acutiore folio ſemine parvo nigro* C. B. *Pin.* 345. E *cicer pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis* LIN. *H. Clif.* 371. *Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis birſutis* C. B. *Pin.* 345. MORIS. *Hiſt.* II. 63. RAII *Hiſt. I.* 902. Hacci anche: *Piſum ſylveſtre perenne* C. B. *Pin. l.* 9. *ſec.* 3. *p.* 343..

[270] *Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente* C. B. *Pin.* 240. *Verbaſcum perenne, flore luteo, ſtaminibus purpureis* J. B. 3. *app.* 873. *Blattaria Plinii, verbaſcum nigrum* EYST. *Tab.* 265. *Verbaſco terzo del Mattioli* PON. 14.

(271) *Verbenaca volgare del Mattioli* PON. 3., oppure *Jerabotane del Dodoneo* PON. 169. *Verbenaca ſupina, ſive foemina* FUCHS. *Hiſt.* 593. *Verbenaca communis coeruleo flore* C. B. *Pin.* 269. MORIS. *Hiſt.* III. 418. *Verbena, ſive verbenaca, herba ſacra* CABR. *ſtir.* 477. DIOSCORIDE, e i Greci tutti la diſtinſero in retta, e in ſupina. Quella, che io ho veduta fra il grano, è retta. *Provenit utraque*, ſcriſſe il medeſimo CHABREO al luogo citato, *verbena ubique ſecus agrorum, viarumque margines, & Urbium areas, at non raro in ipſius etiam ruderibus*.

(272) *Veronica* SEG. *P. V. T.* 1. *n.* 9. 10. 11. 12., che ſono: *Al-*

ſine

130. *Vilucchio* [273]. Vedi *Convolvolo*.

131. *Viola* [274]. Di varie ſpezie ne ho talora incontrato ne' campi meno coltivati, ma quella di due colori in maggiore quantità. E' pianta perenne, e fioriſce di Primavera.

132. *Zizania* [275]. Vedi *Coriandro*.

CAPITOLO XI.

Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno ad *altre malattìe del grano in erba*.

1. LE *foglie inferiori* di un intero ceppo di grano, che io aveva ſtrapiantato in un vaſo di terra cotta, e collocato ſopra una tavola, divennero in breve tempo tutte gialle, e indi ſi fecero ſecche.

2. Tro-

ſine ſerrato folio birſutiori, floribus, & loculis caulicolis adhaerentibus J. B. *II.* 367. *Alſine ſerrato folio, glabro* J. B. III. 366. *Alſines genus Fuchſio, folio hederulae birſuto* J. B. III. 368. E *Alſine folio profunde ſecto, flore purpureo, ſive violaceo* J. B. III. 367.

(273) *Convolvulus minor* CLUS. *Rar. Plan. l. IV. p. L. Convolvulus minor arvenſis flore roſeo* C. B. *Pin.* 294. *Helxine ciſſampelos multis, ſive convolvulus minor* J. B. II. 157. RAII *Hiſt. I.* 725.

[274] *Viola* SEG. *Pl. V. T.* 2. *n.* 1. 2. 7., e ſono *Viola ſylveſtris inodora* DOD. *Pompt.* 156. *Viola bianca di Teofraſto* CALC. *It.* 9. *Viola bicolor arvenſis, flore candido, & luteo* C. B. *Pin.* 200. RAII *Hiſt. II.* 1093.

(275) *Coriandro ſilveſtre del Micone* PON. 189. *Coriandrum ſylveſtre foetidiſſimum, & coriandrum minus teſticulatum* C. B. *Pin.* 158. MORIS. *Hiſt. I.* 269. *Coriandrum* SEG. *T. p.* 27. che ſcrive: *inter ſegetes copioſe reperitur, nimioque proventu triticum ſuffocat, & teterrimo odore praetereuntium caput tentat: qui odor, dum pluvia ingruit vehementior evadens, ad vicinas terras defertur, tamquam coeleſtis injuriae praeſagus, praenunciatque tempeſtates, & procellas accidiſſe haud longe ab eo loco, in quo exhalat.*

2. Trovai nell' Aprile molte *foglie* del grano in erba macchiate di giallo, e riarſe, e in alcuni luoghi corroſe, e ciò particolarmente vidi nelle cime di eſſe *foglie*, ad alquante delle quali ſtava appiccata un gocciola, e alcune altre di queſte gocciole ſtavano ne' lembi, dove cominciavano a comparir le macchie.

3. Ho ſpeſſo veduto in una notte ſola macchiarſi di certe *bolle giallicce* il gambo, non meno che la ſpiga, i quali erano verdi, e ſenza macchia alcuna.

4. Oſſervai nella parte inferiore in mezzo a un ceppo di grano nel meſe di Febbrajo un *verminetto*, che corrodeva alcune *radici*, e le *foglie* di quel grano erano ingiallite, e ſecche. Altre ſimili oſſervazioni ho riferite nel Capitolo IX. di queſta Parte.

5. Nel dì 14. Marzo v' erano ceppi con parecchie *foglie* vergate di giallo, e brucate; altre mezzo gialle, o picchiate di giallo; altre non ſolo picchiate, ma ragrinzate; altre tutte ingiallite. V' era un gambo nella ſommità ingiallito, e marcio ſul piede.

6. Nell' Aprile del 1754. oſſervai *foglie* di grano moltiſſime, le quali erano macchiate tratto tratto di macchie ritondette, e ovali di piccoliſſimo diametro, e di color pavonazziccio, eſſendo nel mezzo, e dov' era ſcoperta la *foglia* bianchicce, e paſſando eſſe macchiette da un lato, e l' altro delle *foglie* medeſime, niente meno che ſe foſſero diafane. Vi ſi trovavano anche varie macchie

giallognole, ma queſte erano aſſai più grandi delle pavonazzicce, e pigliavano talvolta tutta la *foglia*.

7. Vidi nel Giugno del 1755. molte *foglie* rigate pel lungo di materia gialliſſima, che ſollevavaſi in grana, e penetrava la *foglia* medeſima, e la rodeva. Anche nell' Aprile del 1756. ebbi in vaſo ſeminato a grano di buona qualità alcuni gambi con *foglie*, che quantunque coperte da altre *foglie*, pure manifeſtavano per un tratto della loro lunghezza certe punteggiature gialle, che da un lato, e l' altro trappaſſavano. Erano come veſcichette ripiene di polvere gialla gialliſſima, le quali ſi rompevano da ſe da ſe, cadeva la loro polvere, e ſole rimanevano le rotte, e ſconce fibre giallognole di quella foglia medeſima. Il reſto di eſſa era verde, e bello, e vegeto.

8. Dentro gl' intonachi del grano buono, e del *carbone*, e del *ghiottone* ſi trova per lo più nel meſe di Giugno una *materia gialla*, carica, granelloſa, e poco diverſa dalla ſoprammentovata, della quale ſono tinte anche alcune reſte, e in cui talora ſi veggono animaletti roſſi con ſei piedi neri. Di queſt' *Inſetti* v' ha maggior numero ſopra i granelli maturi del *carbone*, che ſopra qualunque altro, e ſe n' è favellato nel ſopraddetto Capitolo IX.. Il VALLISNIERI (276) ſcriſſe, che, *eſaminando la grana del diformato frumento, vide infra la tunica, e il grano medeſimo una materia giallaſtra, dentro la qua-*

[276] VALLISNIERI *della curioſ. Orig. degli Svil., e de' coſt. ammir. di mol. Inſ.*

quale ſtavano avvolticchiati piccoliſſimi vermicciuoluzzi. E ſoggiunſe, *eſſer egli probabile, che quella polvere gialla, detta dal volgo Lombardo fumana, non ſia altro, che il ſugo della grana, e della pannocchietta corrotto, che per la roſura de' vermini da' lacerati vaſi diſtilli, e gema*. Che queſta polvere ſia il ſugo della grana, e della pannocchietta corrotto, e da' lacerati vaſi diſtillato, io non ſaprei forſe contraddirlo; ma che quella lacerazione di vaſi ſi faccia per la roſura di que' *vermini*, non ſo interamente accordarlo. Non ha dubbio, che queſta *materia*, o *polvere* gialliccia ſi ritrova, dov' anche non ſono que' *vermini*, e que' *vermini* ſi ritrovano ſpeſſo, dove non è quella *materia*. Me ne ſono aſſai delle volte aſſicurato, per cui ho chiaramente conoſciuto, che quella lacerazione non deriva da' *vermini*, e che quella *materia* può anche non derivare da lacerazion di vaſi, per non avervi ſpeſſo tal lacerazione ritrovata. Molto meno io poſſo convenire col VALLISNIERI, che ivi dice: *ogni grano, da cotai beſtiolucce infeſtato, è, per così dire, moſtruoſo, ſenza punta, ritondaſtro, e privo della ſolita interna latticinoſa paſta, e della eſterna ovale figura*. Dalle medeſime beſtiolucce ho veduti coperti per lungo tempo grani ottimi, i quali niun pregiudizio ne hanno riportato. Alcuni forſe colla ſcorta di queſto grand' uomo, conſiderando, che *certe roſure de' bachi, e certe corruttele cagionate ne' grani vengono ſoventemente confuſe, e preſe da' poco pratici Agricoltori per la ruggine delle biade*, diranno, che la mia ſeconda ſpezie di *ruggine*

ſi

ſi debba riconoſcere per di quelle roſure medeſime, e conſeguentemente per l' accennato *giallume*, e non per *ruggine*. Ma già le roſure dal VALLISNIERI oſſervate nel grano molto diverſe ſono da quelle da me deſcritte de' gambi del medeſimo, le quali vengono a guiſa di umor viſcoſo, e granelloſo diſteſe ſopra tutta la pianticella. Che ſe conſiderar vogliamo que' caratteri, pe' quali *ruggine* quella io chiamai, ben ſi vedrà come propriamente un tal nome poſſa convenirle, il quale forſe a queſto *giallume* non converrebbe. L'analiſi di tale materia ha fatto vedere, ch' ella contiene molto *liquore acido*, non piccola quantità di terra, e un poco di *ſpirito orinoſo*.

9. Dentro gl' involucri di una ſpiga ſecca prima di maturare il granello fra materia gialligna ſcoperſi un dì certi *vermi* gialli, che ſi allungavano per bene una linea, con teſta ſottiliſſima nera, e con gambe quaſi inſenſibili; e ſono ſtati pur deſcritti nel mentovato Capitolo IX..

10. Volli rintracciar l' indole del *liquore* della pianticella del grano, per aver da eſſa qualche non diſadatto lume; e ne feci alcune eſperienze, quand' ella era in ſugo. Ne ſpremetti da moltiſſimi gambi quella quantità, che mi fu poſſibile, e la diviſi in varie parti; gittai ſopra a ciaſcuna diſtintamente dello *ſpirito di vitriuolo*, di *zolfo*, di *ſale*, di *nitro*, e infino dell' *acqua forte*, e non vidi bollimento, nè mutazione veruna, onde ſoſpettando, che voleſſero eſſere *alcalici* quelli, che alterano queſto liquido, infuſi in altra porzione di

ſu-

ſugo dello *ſpirito di corno di Cervo*, di *filiggine*, di *orina umana*, e di *ſale armoniaco*, e nemmeno vi ſcorſi alcuna ſenſibile alterazione. Penſando allora, che le gentili ſue particelle foſſero talmente figurate, che non incontraſſero per l' appunto i pori, o gli ſpazietti voti de' ſuddetti *alcalici*, preſi la *polvere di tornaſole*, giudicata di un *alcalico* così delicato, e ſoave, e di pori così arrendevoli, e facili, che ſcopra ſubito qualunque menoma particella di acido, che annidi, o ſtia naſcoſta in ogni maniera di fluido. Nè fu vano il ſoſpetto, mentre appena rimeſcolato il liquore colla ſuddetta polvere egli venne ſubito rubicondiſſimo. Paſſato un mezzo quarto d' ora in circa divenne pavonazzo, cioè del color di *tornaſole*, ma di nuovo infuſovi nuova polvere tornò a roſſeggiare. Di pochi minuti era il tempo, nel quale andava mutando colore, perchè gli otto non paſsava mai.

11. Ho ritrovato *grano voto* in alcune ſpighe uſcite di Maggio. Egli non era della compiuta grandezza, e ſi vedeva privo della ſolita latticinoſa paſta. La buccia non aveva mutato colore, ma ſi era raggrinzata, e ſecca, ſiccome ſecca pur era tutta la ſpiga.

12. Quando il grano è in fiore nel principio di Maggio ho veduto ſeccate molte ſpighe ſenza granellini in eſſe, rimanendo verde lo ſtelo, fino al tempo della mietitura. Sul primo nodo dello ſtelo di queſte ſpighe s' annidava per ordinario un *verminetto*.

13. In

13. In alcuni campi di terreni magri, e ſabbionicci ho veduto alcune volte naſcere gambi di grano ſottiliſſimi, rimaner baſſi molto, e portare ſpighette con pochi grani, onde *ſterilità* manifeſtarſi. Così anche mi ſono ſpeſſo nel principio di Giugno cadute ſotto degli occhi alquante ſpighe con pochi fiori, nelle quali pochi poi furono i granellini, che abbonirono.

14. Oſſervai alcuna volta ſul cominciare di Primavera, che il grano in erba era ne' campi così abbondante per quantità di foglie, e di gambi, come ſcarſo per buone, e peſanti ſpighe. Nel Marzo del 1753. in terreno graſſo di *Santa Maria in Fiumicello* erano le biade così folte, e il loro ſtelo così debole, che molte ſi fiaccarono a un piccolo vento ſotto il peſo delle benchè non piene ſpighe.

15. Conſiderai una ſpiga nel dì 24. Maggio del 1756., che aveva lo ſtelo, e le foglie verdi, ed ella pure era verde, ma colle reſte alquanto arruffate, e quaſi ſecche. Nel comprimere alcuni de' ſuoi grani ingialliti m' accorſi, che al di dentro de' medeſimi ſi conteneva qualche porzioncella di materia morbidiſſima. Altri all' incontro vidi, che non ſolo in tutte le loro parti erano ſecchi, e raſciutti, ma di più voti affatto di materia, e non apparivano ſe non le pure, e ſemplici pellicole eſteriori, nelle quali ſi ſcorgeva un piccolo foraметto. Queſta oſſervazione mi fece ſubito dubitare, che vi foſſero alcuni *Inſetti*, che andaſſero divorando internamente queſti granelli;

ma

ma non vedendone orma alcuna ne' medeſimi, creſceva vieppiù in me il deſiderio di ſcoprire l' origine di una così ſtravagante metamorfoſi. Per venirne in chiaro io m' interteneva intanto la maggior parte del giorno a eſaminare tutte quaſi le ſpighe di quel campo; onde alla fine dopo molta pazienza, e molta aſſiduità ebbi l' incontro per me fortunato di certe piccoliſſime *moſche*, le quali mi liberarono da più lungo incomodo. Queſte forando col loro pungilione il granello, deponevano nel foro, che poi ſi chiudeva, uno, o più uova, e da eſſe in breve d' ora uſcivano i *bacherelli*, e queſti della polpa ſi paſcevano di eſſo granello, finchè ve n' era, e poſcia formavano un pertugio, dal quale uſcivano per andare in terra a comporre il loro *bozzolo*. Tanto anche vidi nell' alberello di vetro, e quello di più, che ſi è notato nel Capitolo predetto.

16. Ho fatti fare alcuni *ſeminati* in iſtagioni diverſe, nè ho veduto mai, che ad eſſe morbo alcuno ſi poſſa veramente, e giuſtamente attribuire.

17. Se tutte queſte circoſtanze non ci danno qualche lume per iſcuoprir le cagioni delle malattìe del grano in erba, e per ritrovarne i rimedj, non ſaprei di qual coſa farmi ſcorta.

CAPITOLO XII.

Oſſervazioni, ed eſperienze particolari d' intorno *alcuni fenomeni appartenenti al grano in erba*.

1. MOlti gambi di grano ho veduti nel meſe di Aprile, i quali erano piegati ne'

loro nodi, quantunque d' ordinario ſi veggano alzar perpendicolarmente ſopra l' *Orizzonte*.

2. Ne' primi di Marzo levai con molta diligenza dal terreno un ceppo di grano, lo trapiantai in vaſo di terra cotta, ma per modo che le eſtremità delle radici uſciſſero fuora da eſſo terreno. Ne trapiantai un altro ceppo, ma ſolo alcune delle radici volli, che ne uſciſſero fuora. Da ciò nacque, che il primo ceppo s' inaridì, e dopo pochi giorni ſe ne morì, e il ſecondo portò verdi alcuni gambi, i quali ſi maturarono, e le ſpighe perfezionarono.

3. E' bello a ſaperſi, che nella villa di *Ducenta* io traſſi alcuni ceppi di grano, fra' quali erano due, che avevano le radici di color citrino, e a giudizio del ſapore molto amare, e mettevano l' odore di *viole mammole*, e in particolare ſe queſti ceppi erano poſti vicino al fuoco. Cercai ſe alcuna *viola* ivi intorno ſi trovaſſe, ch' era di Marzo, ma non m' avvenni in alcuna di eſſe. Feci quell' eſame, che per me ſi poteva più diligente ſopra il colore, l' odore, il ſapore della terra, dove avevano radicati que' ceppi. Color bianco cinereo ella portava con tutte le terre di que' d' intorni. All' odore vi rincontrai quello in circa dell' aſſenzio, il quale molto più veniva diſtinto a un certo ſapore amaro della medeſima terra, che paragonato ad altri amari conveniva molto con quello dello ſteſſo aſſenzio.

4. Nel dì 20. di Maggio 1754., mentre io era intento in far iſcavare d' attorno attorno un ceppo

po di grano per trarne intatte le radici, e conſiderarne quel, che n' era più degno, mi venne avanti gli occhi, ſotterra per ben quattro pollici, una *Botta*, o un *Roſpo* di mediocre grandezza, macilente, e rannicchiato dentro materia duriſſima (277). Aperto che fu queſto ſuo nido, il che non ſenza qualche difficoltà può farſi, perchè era di ſoſtanza quaſi pietroſa, o certamente della natura di tufo, egli tentò di fuggire, ma io volli trattenerlo per compiere ſopra di eſſo lui quell' anotomìa, che altre volte ſopra di altri così laidi animali aveva cercato con qualche intrepidezza di fare (278). Nulla però mi apparve in eſſo, che in quelli non aveſſi veduto, e ſolo certa *concrezione* vi ſcoperſi nel capo, che

[277] Fu anche trovato dentro a un *Olmo*, e ſi racconta nella *Storia dell' Accademia Reale delle Scienze* an. 1723., altro ſimile *Roſpo* all'altezza di un Uomo ſopra le radici fra l'intervallo di circa tre, o quattro piedi, chiuſo da ogni parte. L'albero era ſano, e il legno denſiſſimo; talchè ricercandoſi, come poteſſe eſſervi entrato, ſi concluſe, che aveſſe potuto naſcere con l'albero medeſimo, e che foſſe viſſuto, e creſciuto dentro di lui, col pigliare dal ſugo, che ivi ſcorreva perennemente, il neceſſario nutrimento.

[278] Può averſene un ſaggio nel Tomo XLV. della *Raccolta d' Opuſcoli ſcientifici, e filologici* del Padre Abate CALOGIERA *alla Lettera ſopra il Roſpo* con gentile artificio a me rapita, e fatta ivi ſtampare. Vi ſi parla ſingolarmente del preteſo incanto di queſto animale. Ebbevi un mio ſtimatiſſimo amico d'oltre monti, il quale non trovò fondamento alcuno di ſicurezza per aſſerire, che il veleno del *Roſpo* foſſe atto a far tramortire la preda, che il medeſimo *Roſpo* aveva prima a ſerrata. Egli mi ſcriſſe perciò ſotto il dì 8. Novembre 1753.: „ Io vidi tre meſi ſono un Roſpo, che teneva in bocca una di quelle „ groſſiſſime moſche, che noi altri nominiamo *Taon*. Queſta molto „ ronzava, e probabilmente ferì il Roſpo in bocca, perchè laſciolla „ ſcappare, ed egli poi sbadigliò per lungo tempo, e penſo per ca„ gione della ferita; ſe il Roſpo aveſſe avuto il veleno pronto nella „ bocca, avrebbe con eſſo ammazzato ſubito un sì piccolo animalet-

„ to,

avrebbe ad alcuno potuto apparire per una di quelle pietruzze (279), le quali, a dirla come anche io l'intenten-

„ to, e non sarebbe scappato, e volatosene tutto allegro, e vigoro-
„ so sotto gli occhi miei. " Io tuttavia sospetto, che siccome il *Raparino* da me allora veduto, ch' è il *Picus cinereus* de' *Latini*, fu per avventura colto astutamente dal *Rospo*, quando troppo se gli era accostato, e fors' anche venne ferito, per cui il veleno insinuatosi nel sangue, quantunque egli si liberasse tosto dalle sue insidie, e si fuggisse, cadde però altrove tramortito; così il *Tafano* o non fu ferito, o se fullo, benchè dalla bocca del *Rospo* fuggitosi, egli sarà morto altrove. Non nego io già, che senza apportar veleno alcuno potesse darsi caso, in cui il *Rospo* afferrasse la preda, e colla tenace bava l'involgesse, e serrasse, e affogasse, come soliti sono i serpi di fare, e come i *Ragni* fanno continuamente alle *Mosche* dimestiche. Ma certo è per l'esperienza, che in me ho fatta, e più espressamente in molti animali, che forza venefica non può rivocarsi in dubbio nel *Rospo*. E' vero, che questa forza può avere diversi limiti secondo i diversi soggetti, a' quali è applicata; e nella diversità dei *sintòmi* potrebbe anche darsi, che pregiudiciale fosse all' *uccelletto*, e non al *Moscione*. Tutt' i veleni non sono veleni a tutti. Il *Tabacco* è veleno per le *Biscie*, e per altri animaluzzi, e non lo è per l' uomo. L'amandorle amare se sieno mangiate da bestiolucce tenere, e forse anche da' *cani* faralli morire ben tosto, e pur sono medicinali ad altri viventi.

(279) Per validissimo contravveleno furono tenute dagli Antichi le *pietre bufonite*, che si dicevano trovarsi nel capo del *Rospo*, e l'opinione loro fu secondata da molti moderni. Il MATTIOLI *Praefat. l. 6. comm.* ragionando del *Rospo*, ch' egli reputa molto velenoso, conclude: *tametsi conciliator lapidem his omnibus praeferat, qui in earum capite reperiri solet*. E ce la descrive, benchè non la ci dia per cosa certissima, MICHELE ETTMULLERO *Oper. omn. med. Physic.* T. 2. *Schroderi dilucidati Zoologia, sive regnum animale* Class. 1. num. 7. μύξος *Bufo*, dicendo, che *Lapis bufonites, chelonites, batrachites. . . . gemma est bullae instar, altera parte cava, altera convessa, coloris ex fusco pallentis, aliquantum fusci, interdum nigri, albi, viridis versicoloris. Reperiuntur in agris. Affirmant tamen alii eos in annosiorum, acqui diu in arundinetis inter rubos, sentesque delituerint, bufonum capitibus generari: cui ut fidem adhibeam, dissuadet quorundam magnitudo . . . . sunt, qui asserunt, illum gestantes a venenis tutos esse, blandoque attritu inflationes a venenatis bestiis discutere, ac virus omne elicere. Casp. Bauchin. de Lapide Bez-*

c. 3.

tendo, ſono tutte adulterate, o fittizie, nè a queſta in conto alcuno ſi aſſomigliano, o ſeppure ſono ſtate anch' eſſe generate nella teſta del *Roſpo*, non hanno potenza contro a veleno alcuno, ſiccome non l' ha moſtrata per molte eſperienze la mentovata *concrezione*. Ma ſopra ciò molto ſcriſſe il VALLISNIERI nelle ſue oſſervazioni dopo la *Storia del Camaleonte*. Queſto m' avvenne in un campo molto baſſo della Villa di *Santo Stefano*.

5. Preſi ſenſata eſperienza col mezzo del *Microſcopio* di que' *globetti lucidi* inchiuſi nella farina del *frumento*, dell' *orzo*, e di altri grani, che furono notati dal LEEUWENHOEKIO (280), e da altri, quantunque eſſo *Microſcopio* non me gl' ingrandiſſe gran fatto, e fors' anche ſolo me gli riſchiariſſe.

c. 3. *Praeſente poculo venenato fertur hic lapis colorem mutare, ac ſudare*. Sopra le quali coſe tutte però io laſcio ad altri della verità la fede. Ma non laſcerò di affermare, che io rividi nell' infimo ventre del mentovato Roſpo, come negli animali notanti ſi veggono, quelle veſcichette da me altre volte eſaminate, le quali poi mi diedero motivo di ſpiegare lo ſpontaneo gonfiamento del medeſimo Roſpo. Trovo per altro, che non è ſtata queſta mia opinione approvata dagli Autori de' *Commentarii, de rebus in ſcientia naturali, & medica geſtis*, ſtampati in Lipſia recentemente, i quali a propoſito del mio Opuſcolo *ſopra il Roſpo* dicono nel Tomo III. Par. IV. p. 638. *Has cum aliis veſiculis in animalibus natantibus viſis comparat; ſed quod deſcenſum, & aſcenſum in aquis his facilitavi conſpicimus, Bufones vero ex animalium natantium genere non ſunt, ratio veſicularum, & inflationis dubia nobis videtur*. Ma io non ſo intendere veramente con quale fondamento: imperciocchè quantunque negli animali notanti queſte veſcichette ſervano al nuoto, non mi pare che a dritta ragione debba negarſi, che in altri animali non forſe notanti poſſano ſervire ad altro uſo, giacchè eſſe vi ſono, e per eſſe viene quel gonfiamento del Roſpo abbaſtanza ſpiegato, e quindi ignoto non reſta a qual uopo la natura ivi le abbia collocate.

(280) LEEUWENHOEKIO: *Epiſtolae Phyſiologicae ſuper compluribus naturae arcanis*.

ſe. Nè mi parve ſenza maraviglia com' eſſer poteva, che accreſcendomi egli tutti gli oggetti viſibili, ſolo queſti lucidi non moſtraſſero nello ſteſſo modo eſſere da lui aggranditi. Per togliere ogni preteſto a' dubbi, volli far uſo d' altri *Microſcopi*, ed eſſi mi dettero lo ſteſſo effetto. Io vi notai poi anche i colori dell' iride, quando i *globetti* erano illuminati da' raggi ſolari. Ciaſcuno di queſti *globetti* è veſtito di una membranetta, che non è di figura *sferica*, ma ſpeſſo tortuoſetta, e ſpirale, e come appunto avvertì LEEUWENHOEKIO.

6. Il dì 18. Maggio miſurai con iſcrupuloſo rigore tutte le parti di alcune pianticelle di grano. Il dì 19. la mattina per tempo tornai a miſurarle nello ſteſſo modo, e trovai, che le parti ſuperiori nulla erano creſciute, ma ſibbene alcun poco tutte le inferiori. Al contrario miſurate la ſera del medeſimo dì 19. le ſuperiori eran eſſe creſciute, e nulla affatto le inferiori. Queſto creſcere vicendevolmente delle parti ſuperiori, e delle inferiori è ben ſingolare.

7. Cavai nel dì 24. di Marzo da terra un ceppo, che aveva un gambo ſolo di grano, e lo ſeppellii in altra terra, laſciandone ſolo fuora la ſuperior parte, dov' era la ſpiga. Apparvero al principio di Maggio tre altri gambi, i quali crebbero toſto, e miſero alla fine di queſto meſe la ſpiga. Allora feci ſcavare all' intorno di eſſi, e ſcoperſi, che i nuovi gambi erano uſciti dagl' *internodj*, i quali avevano gettata radice. Il gambo ſeppellito non molto s' avanzò, e ſolo ſviluppò un nuovo *internodio*. Tanto queſto *gambo primario*,

quan-

quanto i *ſecondarj* s' innalzarono perpendicolarmente ſopra l' Orizzonte. Il WOLFIO pretende, che un *gambo* ſolo eſca immediatamente dal ſeme, e che tutti i *ſecondarj* vengano da eſſo (281). Ma di queſto io non ho potuto accertarmi, perchè molti ceppi da principio ho veduti con un *gambo* ſolo, i quali ſono rimaſti con eſſo ſolo, ed altri con molti *gambi*, che non crebbero mai di numero, quantunque altri ſieno creſciuti. E' certo però, che i nodi de' *gambi* del grano, che ſono di midolla ripieni, a differenza degl' internodi, che ſono voti, ſi manifeſtano per gravidi di bottoni, e di occhi. Queſta maniera di propagare non è come quella, ch' eſſo WOLFIO vide per mezzo del grano ſeminato; e il fatto della moltiplicazione de' *gambi* derivati da un grano ſolo di biada ſembra non poterſi certamente mettere in dubbio. La difficoltà dunque ſta nel vedere, ſe in ciaſchedun ſeme in vece di un germe ſolo, ve ne ſieno molti, come afferma l' Autore dello *Spettacolo della Natura* (282), e che il più maturo ſia il primo a ſpuntare, e affami gli altri, quando non ſi trovi circondato da' ſali, e da altri principj vegetabili tanto copioſi, che poſſano nutrire, e far naſcere eſſi germi oltre di quello. Una tal quiſtione merita tanta rifleſſione almeno, quanta ne meri-

[281] WOLFIO *Vera cauſa multip. frumen. admirand. omn. plantar. vegetat. una illuſtrans*. Egli aſſicura, che i gambi ſecondarj ne gettano degli altri negl' Internodj vicino a terra continuamente, quando il tempo favoriſca, e quando gl' internodj medeſimi ſieno coperti di terra.

[282] *Spect. de la Nat.* T. 2.

meritò quella, che TEOFRASTO propoſe nella ſua *Storia delle Piante* (283), dove un Capitolo intero impiegò a eſaminare, perchè certi *legumi*, come *piſelli*, *fave*, ec. ſi cuocano più facilmente, che altri della medeſima ſpezie. Il grado della utilità non ſarebbe forſe minore, quando la verità ſcoprir chiaramente ſi poteſſe.

8. Non mi fu difficile di ſtabilire, che la *gravità ſpecifica* del grano de' luoghi migliori di queſto *territorio* foſſe alla *gravità* di quello de' luoghi peggiori nel 1753. in ragione poco maggiore di 15. a 14., benchè tutti e due foſſero buoni.

9. Faceva oſſervazione un dì nella villa di *Pievequinta*, ſopra alcune ſpighe di peſo maggiore a tutte le altre, ma non di mole, e sì di grano ottimo; e mentre andava ſeparando gl' involucri di alcuni teneri granelli colla punta acutiſſima di un *temperino*, acciocchè le parti non turbaſſero il loro ſito, vidi cadermi ſulla tavola una *materia bianca metallica*, che ſtava aderente alla *materia farinacea*, e molto non iſtentai a ravviſarla per una ſpezie di *ſtagno*. Non mi piacque contentarmi del veduto, e perciò ſeguitai le ricerche. Peſai otto granelli, che contenevano di queſta materia, e levategliela poſcia interamente, e ripeſatili, conobbi, che tre di eſſi erano ſcaduti una dramma e mezzo dal primo peſo, e gli altri cinque erano ſcemati un' altra dramma e mezzo. Peſati tutti a otto inſieme, tornò il calo del peſo di tre dramme. Non credo, che da alcuno ſia giammai ſtato

[283] TEOFRASTO *Hiſt. plant. l. 8. c. 9.*

ſtato badato a queſto tal vizio, o ſcherzo, che ſia. Avuti dunque tre ottavi di queſta *materia*, poſi eſſa a calcinare, e laſciò una polvere grigia cinerizia. Io voleva con più accurate oſſervazioni, ed eſperienze, ricercare altre particolarità di una tale *materia*, ma dalla fortuna non mi è ſtato dato il poter ciò eſeguire, non eſſendomene mai altra volta capitato in altro grano. E' coſa certa però, che molta affinità ſi trova generalmente fra il *regno vegetabile*, e il *minerale*, e ciò vedemmo aver dimoſtrato ben chiaramente FEDERICO HENCKELIO (284).

10. Ho conſiderato il grado di *creſcimento delle biade*, ſecondo il grado del calore, e del freddo, e mi ſono aſſicurato, che non il ſolo caldo è cagione della loro vegetazione. Queſte vegetano anche ne' luoghi più freddi, quaſi egualmente che ne' caldi, quando eſſe abbiano cominciata la loro germinazione. Strapiantai nel meſe di Aprile in vaſo di terra alcuni ceppi di grano mal conſiſtenti per tenerezza di gambi, e queſto collocai dentro una conſerva di ghiaccio; e pur eſſi miſero al loro tempo varie ſpighe copioſiſſime di grano ottimo (285), le quali vennero ivi a maturità, nè danno alcuno ſoffrirono di malattìa. La maniera, colla quale determinai il grado del calore,

(284) HENCKELIO: *Flora ſaturnizans, ſeu affin. vegetabil. cum miner. &c.* nel cap. 4. fa commemorazione di metalli ritrovati nelle piante, come dell' oro ne' germi delle *uve*, e del *frumento*, dello *ſtagno* nella *gineſtra*, e del *piombo* nell' *aſſenzio*.

[285] Delle quali VARRONE *de R. R. l.* 1. aveva detto: *multi frumenti*, πολύπυρον.

e del freddo, quanto alla ſola azione del Sole; non fu molto diverſa da quella, con cui determinollo il celebre Signor EULERO [286]. E ſe non ſuppoſi, che il calore del Sole perveniſſe all' ultimo, e ſommo grado, allora che i raggi ſolari incideſſero perpendicolarmente ſopra la data ſuperficie piana, fu perchè giudicai, che queſta legge non poteſſe aver luogo. Quantunque la forza maſſima del Sole ſi debba conſiderare nel *mezzodì*, non per queſto il calor ſolare ſi rende allora maſſimo; poichè conſervandoſi eſſo per qualche tempo, e aggiugnendoſene dell' altro, ſempre creſce, finchè la parte, che ſi perde, addivenga maggiore di quella, che s' acquiſta. E lo ſteſſo può dirſi del freddo. Un tale diſcorſo dovrebbe almeno far ſoſpetta quella formola, per cui ſi determina il calore generato dal Sole, come il ſeno d' incidenza, o d' inclinazione del medeſimo Sole, quando ſia data la ſteſſa diſtanza, e lo ſteſſo piano, che riceva i raggi, e mutata ſolo di queſti la inclinazione. E' vero, che un mio dottiſſimo Amico ha penſato, che il calore del Sole ſopra l' *Orizzonte* creſca non in diretta, ma piuttoſto in ragione duplicata del ſeno dell' inclinazione, cioè dell' angolo d' incidenza; poichè l' inclinazione non ſolo altera la forza del calore a ciaſcun raggio, ma ſcema, o accreſce anche il numero de' raggi incidenti ſul dato piano, e il numero de' raggi incidenti è come il ſeno d' incidenza, e lo è altresì la forza

(286) *Determinat. caloris, & frigoris graduum pro ſing. terr. loc., ac temp. in Comment. Acad. ſcientiar. Imperial. Petropol. ad an.* 1739. *T. XI.*

za calorifica di ciaſcun raggio: laonde diminuendoſi, o accreſcendoſi tal forza per due titoli, che ſono ciaſcuno, come il ſeno, ſi genererà la ragione compoſta duplicata. Ma non perciò io laſcio di dubitare, che queſta ſuppoſizione medeſima nel caſo noſtro ſia vera. Sembra altresì, che dall' attribuirſi pel Signor EULERO al Sole ſotto l' *Orizzonte* la forza refrigerante, non difficilmente naſca l' aſſurdo, che ſotto l' *Equatore* nella mezza notte debba eſſere il maggior freddo, come nel rigidiſſimo inverno ſotto il *Polo*. Ma comunque ſi determini il grado di calore, e di freddo ſulle noſtre *regioni*, egli ſarà ſempre certo, che la vegetazione non ſi fa pel ſolo caldo; e potrà crederſi, che molto ad eſſa contribuiſca l' aere elaſtico inchiuſo ne' pori della pianticella non anche ſviluppata.

11. Mi ſi è alcuna volta preſentata innanzi agli occhi tra il grano in erba quell' *Iride parabolica*, che per alquanti anni oſſervò il WOLFIO ſull' erbe del prato vicino alla città di *Jena*, come riferiſce il *Supplimento IV. degli Atti eruditi di Lipſia*; nè queſt' Autore ſi pigliò la briga di ricercarla fra le biade. Ella fu deſcritta eſattamente dal Signor PARENT in un tomo delle ſue *Recherches de Mathematique, & de Phyſique*, dal Signor FILIPPO CARTERET WEBB nella *Iridem inverſam bis in gramine viſam*, e da molti altri: e avverte GIACOMO BERNOULLI nel tomo primo delle ſue Opere, che facilmente ſe ne può determinare la figura, giacchè tal' Iride ſi dipigne nelle gocciole della

rugiada pendenti dalle pianticelle, alla guisa medesima che l' Iride aerea si dipigne nelle nuvole. Nel mese di Aprile dell' anno 1752. io aveva una mattina scoperto fra le basse, e tenere pianticelle del grano di un campo delle mie osservazioni alquante di quelle *tele di ragno* descritte nel Capitolo IX., e che furono osservate dal medesimo WOLFIO, come quasi una *meteora*. Se elle erano riguardate a certo aspetto, ben tosto sopra di loro apparivano graziosamente i vivacissimi colori dell' *Iride*. Queste *tele* erano coperte di gocciolette, che per mezzo del *Microscopio* si manifestavano di figura pienamente ritonda, che in tal caso sarà stata forse la più perfetta (287). Simile giuoco mi fecero altre fiate.

12. Il *gambo del grano* è generalmente fortificato da quattro nodi di una sostanza dura, che non gli levano però quella flessibilità, che basti a piegarsi senza essere fiaccato dal soffio di piccol vento, e talor anche da' fieri colpi di vento impetuoso; e mediante questi nodi egli ha pure vigor bastevole per rialzarsi nello stato di prima, quando il vento qualche posa intermetta, o cessi. Questo *gambo*, che alcuna volta giugne all' altezza di otto piedi, non ha d' ordinario più che due linee di diametro.

13. Mi

[287] Non può dirsi assolutamente, come avverte il GALILEO nel *Nunzio sidereo*, che „ la figura sferica sia più o meno perfetta „ delle altre, ma solo con qualche rispetto, " così in luogo d' esempio, per un corpo, che s' abbia da poter raggirare da tutte le bande, la figura sferica è perfettissima; all' incontro per un corpo, che dovesse rimanere stabile, e immobile, tal figura sarebbe, com' egli prova, oltre ogni altra imperfettissima.

13. Mi ſono accertato, che la lunghezza di eſſo *gambo* per fino al primo nodo non aumenta che molto poco, perchè queſto intervallo (288) era indurito, e pervenuto ſempre al ſuo intero creſcimento, quando lo miſurava. L' intervallo ſeguente, eſſendo più giovane ſi diſtende un poco più, e il terzo ſi allunga per ben tre, e quattro pollici. A ciaſcun nodo ſpiegaſi una foglia nutrice, che circonda il *gambo*, e queſta è propriamente quella, che i Latini nominarono *ſtipula* (289), la quale ſerve di potenza concertata dalla natura per innalzare il ſugo in abbondanza, e per aumentare in queſta maniera l' eſtenſione della giovane pianta. Vero è, che queſta naturale operazione non può l' occhio vedere, ma la ragione ivi adopera la ſua forza tutta per ſapervi fare più degli occhi. Queſte *foglie nutrici* vi ſi ritrovano lungo tempo prima, che il giovane rampollo compariſca. Ma ciò da altri è ſtato oſſervato, poche coſe in queſto genere eſſendo alla lodevole curioſità de' Fiſici ſfuggite.

14. Nell' Ottobre del 1752. feci ſeminare all' aperto un pugno di grano, e nel tempo ſteſſo ne fu ſeminata altrettanta quantità in luogo all' aria eſterna non eſpoſto. Il primo germinò prontamente, e nel tratto di otto giorni la ſua erba per-

(288) Gl' internodj dello ſtelo furono da PLINIO chiamati *geniculaj*; e *genicoli* diſſe pur anche le foglie, che circondano lo ſtelo medeſimo, e la ſpiga primacchè eſca.

[289] Onde VIRGILIO *l.* 1. *Georg. v.* 320.

. . . . . *ita turbine nigro*
Ferret hyems, culmumque levem, ſtipulaſque volantes.

pervenne all' altezza di un pollice ; l' altro posto al coperto non aveva in questo tempo potuto anche spuntar fuora dal terreno, e cominciò solo a spuntarvi, e a crescere dopo molti giorni, ma non lasciò poscia di andar crescendo, e di ridurre le pianticelle colle loro spighe a sufficiente maturità. Ricercai queste in fine da capo a piè, e particolarmente nelle radici, e indarno tentai di vedere, che tocche fossero da *verme* alcuno, o se per avventura tocche n' erano, che malattìa particolare sostenessero. Il grano, che ne venne, fu veramente di scarsa polpa, ma sanissimo.

15. Ho tenuto nel voto della *Macchina Pneumatica* per alquanti giorni alcuni semi di grano, finchè la terra, in cui erano, ha conservato qualche poco di umidità, ed essi hanno germogliato come se la solita aria vi godessero. Lungo tempo per altro vissero questi germogli, e si seccarono. La medesima quantità di semi della stessa spezie messi nel tempo stesso in terreno all' aria esposto germinarono molto prima di quelli, e crebbero, e vissero.

16. Trovai delle *uova* bianche bianchissime sopra alcune foglie di grano, e le misi in alberello con terra umida. Ne uscì dopo dieci giorni, cioè il dì 2. di Giugno, alcuni piccoli *lumachini* spogliati, o solo vestiti di una mucilagine, da cui mi pareva, che ne venisse la loro conchiglia appoco appoco formata. Queste *chiocciolette* debbono essere nella Classe di quelle, che i *Naturalisti* chiamano *testacei terrestri*, ed hanno principalmente somiglianza alle

chioc-

chiocciolette minute riportate da PLINIO (290), le quali naſcono tal volta anche in terra dalle loro *uova* ivi depoſte.

17. Oggi ha quattro anni, perchè il dì 12. di Giugno dell'anno 1753., trovai in alcune ſpighe portatemi dalla Villa di *Primaro* molti grani più groſſi dell' ordinario, la cui materia interiore eſaminata diligentemente mi parve ſimile al *coralloide bianco rupino* non pulito. Era come oſſea, o piuttoſto inſieme unita, e ſtretta da certa viſcoſità di un umore, che la rendeva di *ſoſtanza tartarea*, o *lapidea* irregolare. Gli altri grani delle medeſime ſpighe furono ſeppelliti al tempo della ſeminazione, e neſſuno germinò. Così non l'aveſſi ſperato, perchè dopo tre meſi ne oſſervai ſpuntata l' erba con molto vigore, e alla metà di Maggio del 1755. ne vidi le ſpighe di una ſtraordinaria grandezza, dal che io mi aſpettava qualche nuovo fenomeno; ma un turbine improviſo le aſſalì, e prima ch' eſſe aveſſero compiuto il granello, tutt' i loro gambi troncò, e diſperſe interamente, laſciandomi col deſiderio di più oltre oſſervarle.

18. Un gambo di ottimo grano ebbi nel meſe di Maggio del 1754., il quale aveva nel mezzo di un internodio formata una *eſcreſcenza lignea*, che riempiva il di dentro, e tanto era dura, che con iſtento ſi tagliava. In mezzo a queſta ſoſtanza lignea ſcoperſi coll' uſo del *Microſcopio* un piccoliſſimo

(290) PLINIO XVIII. 17. *Limaces naſcuntur in vicia, & aliquando e terra cochleae minutae mirum in modum erodentes eam.*

mo nido, dove alloggiava un *verme* del colore di *canna* descritto al Capitolo IX. di questa Parte.

19. Nel mese di Giugno del 1755. trovai nella Villa di *Gambellara* due spighe di grano, ch' erano secche, come molt' altre, e che nulla valendo per seminare, perchè non avevano grani, erano eccellenti, per far discorrere un Filosofo. Non mi era accaduto mai di vedere spighe più grandi, e più vote. Io condussi le mie ricerche sopra i loro gambi, e m' avvidi, che in tutti e due stava certa *materia cenerognola* durissima, e ne riempiva molta parte nel cannello superiore. Tutta la separai diligentemente colla punta sottilissima del temperino, la misi in sul fuoco dentro un pentolino, e ve la feci stare, in maniera che non giugnesse a calcinarsi; poi minutamente fu pestata, e messa in polvere; e questa con acqua comune stemperata mostrommi, che faceva lo stesso effetto del *gesso*, pure stemperato; ond' io giudicai, che quella fosse una *materia gessosa* quivi dentro condottasi col sugo medesimo della pianticella.

20. Trapiantai in un vaso alcuni ceppi di grano, i quali misero perfettamente dopo due mesi la spiga. Furono innacquati abbondantemente dal Febbrajo al Maggio, e per fino a tre volte il giorno, ne quest' acqua punto loro pregiudicò, che anzi venne il grano a perfetto maturamento, nè si vide in esso malattìa alcuna.

21. Feci l' analisi della qualità dell' alimento, cioè del sugo, che scorre ne' gambi del grano buono, e in quelli del grano, che porta qualche

malat-

malattìa, nè vi trovai differenza, che foſſe ſenſibile..

22. Nell' interno delle radici ſi paleſano col *Microſcopio* certi condotti ora uniti ne' loro corſi, ora allargati a guiſa di cellette, ſiccome fatto è appunto il polmone di molti *Inſetti*, che multiplicano per la ſezione di lor medeſimi. Queſti condotti delle radici del grano ſaranno quelli, che al dire de' *Botanici* nelle piante tutte hanno luogo di trachee, per le quali entra l' aria a dare la fluidità conveniente a' ſughi.

23. Io non ho mai potuto determinare qual parte del campo foſſe maggiormente infeſtata dall' una, e dall' altra malattìa, perchè da per tutto or più, or meno, or nulla ho trovato di tali malattìe indifferentemente.

24. M' incontrai nel dì 4. di Aprile del 1755. in un ceppo di grano, che aveva tutte quaſi le radici manucate da' *vermi*, ma perchè a ciaſcun gambo qualcheduna appariva, che ne foſſe rimaſta, erano però tutt' i gambi verdi abbaſtanza per vivere, ma non vegeti abbaſtanza per ingroſſarſi, e per dar quindi bella meſſe. Tagliai varj *ceppi* orizzontalmente, e vidi, che i piedi de' loro gambi formavano altrettanti circoli diſtinti l' uno dall' altro, e ſolo uniti nel punto di contatto da un *glutine*, che ben ſi diſcerneva, e che occupava le parti loro intermedie. Ogni circolo pareva fatto di molti circoli quaſi concentrici l' uno ſoprappoſto all' altro. Tre gambi ſeparai da un *ceppo* medeſimo, e furono piantati diſtintamente in tre vaſi ripie-

ni di buona terra nel dì 21. di Marzo, dove molto ben radicarono, e un quarto gambo ripiantato nel luogo, dove queſti tolti ſi erano, in breve tempo inaridì, e certo per non avere nella ſeparazione ritenute le proprie radici. Volli a un altro *ceppo* tagliare tutte le radici, fuorchè una; ma vidi, che ripiantatolo tutti ſe ne ſeccarono ben toſtamente i gambi, trattone quello, che metteva alla radice ivi rimaſta. Non fui però contento di queſte eſperienze ſole, anzichè infinite altre ne feci in diverſi tempi, e in vaſi diverſi, e per non laſciare coſa alcuna intentata poſi finalmente qualche *ceppo* entro dell' acqua ſul rifleſſo, che ſe aveſſe ciaſcheduno tanti pezzi diſtinti, quanti erano gambi, ſi ſarebbero eſſi in breve tempo potuti ſeparare ſenza lacerazione alcuna, e quaſi da ſe da ſe, come affermato mi aveva il fu per eccellente ſpirito illuſtre noſtro ſocio Sig. Dottor ENEA GARATONI. Dopo lo ſpazio di due ore gli traſſi fuor dell' acqua, e gli trovai ſvenuti di colore, ma inſiem' inſieme infraliti abbaſtanza di tenacità per diſtaccarſi l' un gambo dall' altro ſenza menoma difficoltà, portando ſeco quella porzion delle radici, che gli conveniva. Tutte cimentai allora col *Microſcopio* le cicatrici de' ſeparati gambi, Tav. IV. Fig. 1. 2., e riſcontrai in eſſe un' orma come di callo, ma ſenza leſion della parte. E' bensì vero, che ſi veggono talvolta certe radici così fattamente avviticchiate le une coll' altre, e dall' accennato *glutine* così ſtrettamente legate, che a tutti inſieme i gambi del me-

medeſimo *ceppo* ſembrano appartenere; ma poi con eſattezza conſiderate, e con diligenza ſeparate troppo ben ſi manifeſtano diſtinte, e a' gambi diverſi ben dovute. Queſta oſſervazione io ebbi ſegnatamente nel meſe di Giugno dell' anno medeſimo 1755. ſopra le radici di un *ceppo di grano*, ch' erano con molta tenacità unite a quelle di uno di *avena*, e ſopra un' altro di *grano*, ch' era accompagnato, e da *glutine* appicciato con uno di *loglio*. Fui coſtretto di tenergli immerſi nell' acqua per quaſi cinque ore. Ho di ciò preſo delle volte aſſai pieniſſimo conoſcimento, e tantocchè mi luſingo, che potrà cadere ſotto il ſenſo degli occhi a chiunque voglia farne la eſperienza con queſto genere di grani in erba; che degli altri io non l' ho fatta, nè debbo aſſerirlo: pur non oſtante ſiccome la natura nelle ſue operazioni cammina ſempre, e opera con gran ſemplicità di modi, e di coſe, così io non mi allontano dal ſupporre, che ciò medeſimo ſi avveri anche degli altri grani, che in *ceppi* ſi conformano.

25. Che ſe ciaſcun gambo ha radici particolari, io vengo in ſoſpetto, che anche ciaſcun grano della ſpiga di un gambo abbia nel gambo medeſimo fibre, e condotti particolari. Forſe potrebbe recarne una prova il vedere ne' gambi delle ſpighe di grano buono miſchiato a *grano carbone*, o a *grano ghiottone*, come io ho più fiate veduto, la diverſa diſtribuzion di ſugo ne' varj canaletti, che ve lo conducono, e da alcuni de' quali tanto n' eſce, e trabocca, quanto in altri poco appare, e poco ſcorre.

26. Nel dì 15. Aprile 1755., che io ſtava facendo eſame ſopra certa qualità di terra nella Villa di *Piangipane*, m'avvenni in una *concrezione lapidea*, nella quale ſi vedevano grani di frumento ben diſtinti. Io l'ho collocata nel mio *Muſeo* come una *naturale teſſera frumentaria* (291).

27. Dirò qui finalmente, che eſſendomi ſpeſſo accaduto di oſſervar con attenzione le giornaliere produzioni del grano in erba, ho conſiderato anche ſpeſſo ne' gambi diverſi del medeſimo que' piegamenti, e quelle curvature, che poſſono malattìa loro cagionare, ogni volta che ne' punti di maggior diſtrazione della fibra ſucceda qualche leſione, per cui, il corſo del fluido interrompendoſi, venga la pianticella a riſentirſene. E ben ſembrato mi ſarebbe di vedere impreſſa per l'ordinario in tali gambi la forma di una medeſima *curva*, ſe trattenuto non mi aveſſe il riflettere, che piccole parti di curve diverſe potevano eſſervi, le quali con facilità ſi combaciaſſero inſieme, e sì quello faceſſero comparire, che in natura forſe non ſuccede giammai. A queſta coſtante apparenza doveva opporſi fra le altre coſe la ſomma varietà, e la diſſimiglianza de' gambi; perchè ſono eſſi diſuguali ſempre, e diverſa n'è la ſolidità, e diverſi ne moſtrano i nodi, e gl' inter-

(291) FRANCESCO GALLO nel Trattato *de Fructibus Diff.* 7. parla della *Teſſera frumentaria* mentovata da ULPIANO al lib. 52. §. 1. ff. *de Judic.* contra l' ACCURSIO, ALESSANDRO ab ALESSANDRO, e STEFANO FORCATULO, e dice, che non ſolo come un genere di miſura, che a *Roma* fu in uſo, ma ſi dee pigliar anche come un ſegno, o indizio del *frumento*, quando ſi trovi il medeſimo in qualche materia ſolida impreſſo.

ternodj, giacchè tutto varia ſecondo la varietà del terreno, del ſito, del tempo di ſeminare, e della ſtagion ſempre notabilmente incoſtante. Molte v' hanno in oltre ſpezie di grano, nelle quali i gambi ſi manifeſtano diſſomiglianti, perchè ſe tenue ſi ritrova in quello, che nella *Lombardia* è comune, e fu detto da' Latini *ſiligo*, groſſo in altri ſi vede certamente, e di maggiore altezza. Notiſi poi, che ora egli è ſolido per fino alla ſpiga, ora lo è nella parte inferiore ſenza più, ed ora tutto cavo, ma con groſſi internodj. E quindi addiviene ſempre, che varie parti di un gambo medeſimo abbiano forze varie per reſiſtere alla forza impellente, e varie elaſticità per ritornare al primiero ſtato. Il fu celebratiſſimo *Botanico* Signor GIULIO PONTEDERA, che molte ſpezie di grano per molti anni ſegnatamente coltivò in un ſuo podere, ben ebbe queſta varietà a oſſervare, e a me ſignificolla corteſemente per mezzo di una ſua lettera del dì 31. di Gennajo del 1755.. Io non ſarò qui dunque per voler determinare quali ſieno realmente ne' gambi del grano gli andamenti delle loro curve [i quali per altro, ſe regolati foſſero, non laſcierebbero di darcele del genere dell' elaſtiche, e nelle ſuppoſizioni immaginarie, in cui procede la formola di DANIELE BERNOULLI (292) $\frac{p}{1} \int. sdx + Px = \frac{m}{R}$ per la curvatura della lamina

[292] *Invenire curvaturam laminae elaſticae partim proprio pondere, partim pondere appenſo incurvate.* Lo ſcioglimento del qual *Problema* ſi legge nel ſuo *Methodus univerſalis determinandae curvaturae fili a potentiis quamcunque legem inter ſe obſervantibus extenſi una cum*

mina elaſtica, ce le darebbero tra quelle, ch' eſſa può determinare], perchè diſperata ormai ne reputo l' impreſa. Mi gioverà bensì, per dare del grano in erba tutta quella contezza, che io ho pigliata, di eſporre in queſto luogo alcune fiſiche eſperimentali oſſervazioni fatte in varj tempi ſopra di eſſi andamenti. Ho riconoſciuto primieramente, che tutt' i gambi del grano nel loro piegarſi non ſolo eſtendono la ſuperficie eſterna, ma la interna contraggono, perchè avendone molti ſulla

cum ſolutione problematum quorundam novorum eo pertinentium inſerito ne' *Comm. Acad. ſcient. Imper. Petrop. T. III. ad an.* 1728.. Nè io aveva laſciato di portarvi qualche rifleſſione per la *Curva frumentaria* in ſuppoſizioni puramente arbitrarie; e mi ſi era pur anche volto per l' animo quell' altro *Problema* del Sig. LEONARDO EULERO, che ivi dopo alquante carte s' incontra a ciò atto. *Invenienda curva, quam formet lamina utcumque elaſtica in ſingulis punctis a potentiis quibuſcunque ſollicitata.* Il che avendo io partecipato a *Matematico* ingegnoſiſſimo di qua non molto diſtante, da lui ebbi per non ſo qual degnazione in riſpoſta del dì 6. Gennajo 1757. „ L'arte, che certamente non è co-
„ mune di applicare la Geometria alla Fiſica, è aſſai ben maneggia-
„ ta da lei nello ſcritto, onde mi ha favorito, e ne moſtra in que-
„ ſta tutto il poſſeſſo. Ne' ſuoi raziocinj penſa giuſtamente, e da
„ ciò, che prova, rende perſuaſo il Lettore della verità di quello,
„ che non prova. Spiacemi di non poterla ſeguire co' miei penſie-
„ ri, atteſa l' infermità, che da tanti anni, e sì gravemente mi
„ moleſta. Ma per quanto la mia indiſpoſizione mi ha laſciato con-
„ ſiderare, io non poſſo, ſe non applaudire alla giuſtezza, e perſpi-
„ cacia della ſua mente. Non ſaprei indurmi per l' antidetta ca-
„ gione a rivolgere le carte Petropolitane; bensì mi ricordo di aver
„ letto con attenzione, e con piacere negli Atti di Lipſia, quanto
„ il celebre Giacomo Bernoulli inventò il primo ſopra la Curva ela-
„ ſtica. Il Signor Daniele ha da lui tratto il meglio, ed ella della
„ dottrina del ſecondo ha fatto un ottimo uſo. Dovrebbe pubbli-
„ care queſte ſue produzioni, e renderſi benaffetto a Cerere più dell'
„ antico Tritolemo; a Cerere, dico, che mediante lei ha la ſua
„ *Curva frumentaria*, come Nettuno aveva già la ſua *Velaria*, men-
„ tre *Eolo* tanto in queſta ſeconda Curva, quanto nell' altra influi-
„ ſce. Gli accennati miei acciacchi appena mi permettono, ec. "

ſulla piegatura ſteſſa ritenuti, mentre creſcevano, nella medeſima poi reſtarono, quantunque tolti ne foſſero gl' impedimenti. Volli miſurare il ſucceſſivo accreſcimento de' cannellini delle foglie, e degl' internodj de' gambi, per vedere ſe trar indi ne poteva qualche proporzionale differenza ne' piegamenti; ma non mi ottennero ciò, che mi era luſingato di poterne ottenere. Trovai, che queſti accreſcimenti non erano coſtanti in tutti i gambi, anzi variavano in alcuni sì fattamente, che talora non davano più un creſcere, ma uno ſcemare. Non è però, che qualche volta non ne abbia anche taluno oſſervato, che in aumenti eguali di tempo, e nelle ſteſſe circoſtanze di *atmosfera* non deſſe eguali incrementi, cioè a dire, che creſcendo *aritmeticamente* il tempo non creſceſſero pure *aritmeticamente* i cannellini delle foglie, e gl' internodj de' gambi, ma però con differenze tra i tempi, e gli accreſcimenti de' cannellini, e degl' internodj affatto incoſtanti, e diverſe. Mi ſono poi mille volte accertato, ch' eſſi gambi maturano per gradi, cominciando dalla ſommità, e affinano l'umore, che dee rarefarſi, a ſegno di divenire una ſpezie di fummo, come già tutti i *Botanici* migliori ſi accorſero; e i loro nodi ſono a guiſa di ſetacci fini, che filtrano, e ſottilizzano le parti integranti dell' umor nutritivo, quando s' innalza verſo le ſpighe. Tutto ciò è cagione, che la reſiſtenza delle parti del gambo ſi faccia anch' eſſa per gradi, in modo però che la parte ſuperiore ſia della inferiore più fleſſibile.

Ma

Ma ſembra, che altre iſpezioni dar poteſſero qualche miglior lume per formare almeno alcuna idea di qualche proprietà di tali curvature. Egli è manifeſto, che le radici col loro gambo, e col fuſto della ſpiga coſtano delle medeſime fibre, e rette, e fra loro parallele, e che queſte fibre ſi eſtendono dalla inferiore eſtremità di eſſe radici per fino alla ſommità, e all' apice della pianta, facendo un angolo nel collo delle medeſime radici. Oltrecciò queſte fibre ſono ripiene tutte di una ſpugnoſa, e midolloſa ſoſtanza, e tutte quaſi ſempre lubricate dal ſugo, per cui ſi rendono incomparabilmente ben preparate al moto, e alla forza. In piccol tratto ſopra le radici non ſono ordinariamente le medeſime tanto lubricate, e ſpugnoſe, e fragili, quanto più alto ſi manifeſtano, ma vengono riveſtite di una gagliarda, e forte ſoſtanza cartilaginoſa, la quale ſerve alla forza, e poco al moto. Reſta dunque chiaro, che la *curvità* del gambo poco ſi eſtenderà nella parte inferiore, molto nella ſuperiore, e che ſe per eſſa venga il medeſimo a romperſi, dovrà ciò farſi nella parte ſuperiore veramente, piuttoſtocchè in altra. Oſſervai molte volte il *piegamento* di alcuni gambi col venire adattando per fianco a' medeſimi, ſenza che impediſſe la direzion del vento, Tav. VII. Fig. 5., un' aſta immobile non più alta di eſſi, all' eſtremità della quale era ſoſpeſo il centro di un *quadrante* del raggio di un piede di *Parigi*, e queſto, cadendo allo ingiù veniva ſpeſſo a determinare nel gambo due punti di devia-

viazione dalla perpendicolare. Così abbaſſando il *quadrante*, più altri punti mi era agevole di avere (293). Vidi fra queſti: Il dì 2. di Maggio ſulle ore 14. in circa, eſſendoſi piegati molti gambi di mezzana grandezza, alcuni dettero nella parte ſuperiore vicino alla ſpiga un punto, che toccava nel lembo del *quadrante* i gradi 65., e poi ſi allungò per fino a' gradi 84., e mezzo, che furono miſurati coll' abbaſſamento del medeſimo *quadrante*. Un altro punto inferiore al primo di ben tredici pollici fu indicato prima da' gradi 11., poſcia da' gradi 20.. Neſſuna leſione perciò avvenne in que' gambi, quantunque talvolta colla mano gli portaſſi anche a toccare il ſottopoſto terreno. Non così fu de' più grandi, e più lunghi, i quali, benchè da quel vento, che piegati molto aveva i primi, piccola impreſſione riceveſſero, dallo ſforzato piegamento datogli però colla mano per fino in terra ſi riſentirono, per modo che tutti quaſi ſi ruppero ſotto l' anche piccola pannocchietta, dove ſtavano racchiuſi gli embrioni de' granellini. E pure queſto grano era della ſteſſa qualità, ſeminato nel medeſimo tempo in terreno di natura medeſima. Nel dì 8. Maggio ſull' ore 12. in circa ſe ne piegarono alcuni pochi a ſegnare col punto ſotto la ſpiga i gradi 90., perchè avendo

[293] Avvertaſi, che io qui non intendo di determinare l'angolo, che fa il gambo colla perpendicolare, o con altra linea, quaſicchè io penſaſſi di miſurare l' inclinazione di una verga diritta, e rigida. Mainò, che io queſto inteſi, e volli ſolo determinare, quanto ſi allontanavano dalla perpendicolare alcuni punti del gambo, per quindi vedere, ſe le *curve*, nelle quali ſi conformavano diverſi gambi, portaſſero giammai la ſteſſa piegatura.

depresso il *quadrante*, questo punto stava nella cima del raggio. L' altro punto inferiore di otto pollici sotto il primo, non deviò più di gradi 28. Il dì 12. Maggio sulle 16. in circa altro non vedevasi, che un dolce inclinar dell' une spighe in sull' altre, più forse dal proprio peso cagionato, che dalla percossa del vento, il quale sopra di esse correva non meno leggiermente di quello, che si facessero, secondo il grazioso infingimento di OMERO nella *Iliade* Y., le cavalle agilissime del Re ERITTONIO:

Αἳδ' ὅτε μέν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
ἄκρον ἐπ' ἀνθερίκων καρπὸν θέον, οὐδὲ κατέκλων.

che il Sig. APOSTOLO ZENO così volse in nostra favella:

Queste saltando nel fecondo campo
Correvan sulla cima delle spighe,
Nè le rompevan mai.

Il dì 18. pur di Maggio alle ore 20. in circa m' avvenne di osservare, che alcuni gambi de' più rasciutti si torcevano con lentezza nella parte superiore, e davano il punto accennato a' gradi 80. e due terzi, altri più molli lo davano per fino a 60., e mezzo, e niuno di quelli, che mi caddero allora sotto la esperienza, benchè sostenuto non venisse da' contigui gambi, arrivò con questo punto a' gradi 50. di deviazione. L' inferior punto de' primi era accennato dal grado 43., e quello de' secondi dal grado 30.. Uno de' gambi più rasciutti trovandosi con un suo punto, ch' era a 11. pollici sotto la spiga, nel lembo del *quadrante*, che segna

i gradi 36., e mezzo, venne a rincontro della piegatura una follata di vento, che portandolo ſubito a contraria direzione, ſi ruppe ſopra il ſecondo nodo a mezzo pollice ſotto queſto punto. Traſſi due ſpighe piene di granelli a toccare il terreno, ma eſſe nol toccarono, primachè i gambi non ſi rompeſſero. Uno, ch'era di *grano carbone*, ſi ruppe, quando la ſpiga fu a due piedi da terra, ma l' altro, ch' era di buon frumento, ſi ruppe ſolo, quando vi fu a un pollice. Nel dì 24. di Maggio alle 18. o circa le ſpighe del mio campicello d' oſſervazione più direttamente percoſſe dal vento s' inclinavano, per modo che il punto del gambo a loro più vicino uſciva per di ſotto al lembo del *quadrante* ne' gradi 51., ed eſſe cadevano giù per una linea quaſi perpendicolare all' *Orizzonte*, laſciando dentro il *quadrante* medeſimo la *curvatura* di eſſo loro gambo. Che ſe dal vertice di una tale *curvatura* foſſe caduta una perpendicolare ſul *piano orizzontale* di queſto punto, ſi poteva dire, che quel vertice s' innalzava per due pollici, e un terzo ſopra eſſo piano, e che quella perpendicolare s' allontanava dal punto predetto per due pollici, e un quarto, che tanto è, quanto avere l' aſciſſa, e l' ordinata al medeſimo (294). Il punto

(294) In queſto caſo io ho notato quello, che mi è accaduto di poter oſſervare; nè ho voluto cercar più oltre. Non mi era per altro naſcoſto d' intorno all' azione del vento, onde ſi piega il gambo, che quando la piegatura trapaſſi un certo limite, l' azione di eſſo vento poſſa opporſi alla parte del gambo contraria alla prima, che ha ſcorſo queſto limite; e perciò una tal' azione poſſa conſiderarſi parte poſitiva, e parte negativa. Così nel riferito caſo, ſe il *vento* a-

inferiore de' gambi, che tagliava il lembo del *quadrante*, nè lo tagliava in tutti nel medeſimo luogo, nè ſi trovava in tutti a una medeſima diſtanza dal punto ſuperiore. Quelle ſpighe, che avevano il *grano carbone*, ed erano delle altre più peſanti, s' inclinavano maggiormente, portavano la curva più vicino a terra, e ſpeſſo ſi rompevano. Il dì 4. di Giugno ſulle 22. ore in circa i gambi più groſſi, e le ſpighe più cariche di granella s' inclinavano fino a portare l' accennato punto ſuperiore a' gradi 45., e due terzi, ma due di eſſe non poterono ſoſtenere queſta piegatura, ſicchè non ſi rompeſſero poco ſotto le medeſime ſpighe. Il punto inferiore ſtava ſotto il ſuperiore per ſette pollici a' gradi 13.. Queſte oſſervazioni ſono analoghe a di molte altre, che ho fatte in altri tempi, e in anni varj, e ſembrami di potere da eſſe rilevare, che ne' gambi del grano la reſiſtenza al moto non ſolamente ſia come la gravità, direttamente proporzionale alla quantità di materia

girà contro la parte del gambo, Tav. VII. Fig. 6., che giugne ſino al vertice della *curva*, cioè al contatto della *tangente* parallela alla direzione del *vento* medeſimo, per ſempreppiù incurvarla, eſſo *vento* agirà contro anche l' altra parte, che gli preſenta la concavità, piuttoſto per raddrizzarla, e farla tendere verſo la ſua direzione. Ma pure mi era anche noto, che l' *azion negativa* del *vento* poco ſi rendeva ſenſibile pe' molti oſtacoli, che vi ſi frappongono, e poco variava l' accennata proprietà della *curva*, per gli ſforzi continui della gravità, ad oggetto di far piegare la ſpiga, e il gambo medeſimo verſo l' *Orizzonte*. Che ſe voleſſimo preſcindere dalla gravità del gambo, e della ſpiga, laſciando il tutto ad una ſola forza eguale, e coſtante, come ſi conſidera in ogni punto di una verga, egli non piegherebbe, ſe non che a proporzione della ſua minor reſiſtenza ne' punti aſcendenti, la quale però potrebbe tal eſſere, che il medeſimo gambo s' inclinaſſe a terra, conſervando quaſi per tutto la dirittura medeſima.

ria propria di ciaſcun gambo, ma che ſia anche reciprocamente proporzionale alla tenacità delle ſue fibre. Con tutto ciò non mi è ſtato mai poſſibile di mettere a un vero, e chiaro computo nè le diverſe diſtrazioni, e contrazioni, che ſuccedono nelle fibre de' gambi, nè le diverſe elaſticità, che indi naſcono. Il che veramente non ſarebbe ſtato alla molta diligenza da me uſata negato, quando foſſe ſtata determinabile quella *curva del grano*, che ſi ha in natura. Ogn' ipoteſi poteva darci curve diverſe da queſta, come ſaggiamente rifletterono alcuni profondi Matematici, a' quali io ne volli ſcrivere, e tra eſſi il dottiſſimo, e ugualmente gentile Signor Marcheſe GIOVANNI POLENI, e il chiariſſimo Padre VINCENZO RICCATI della Compagnia di Gesù, che tanto vale non ſolo nelle Matematiche pure, ma nelle miſte (195).

28. Re-

[295] Dal quale ebbi ſotto gli 18. Agoſto del 1757. queſte preciſe parole: „ Se altro non ſi pretenda di provare nel conſaputo foglio, „ ſe non che la curva, in cui ſi conforma uno ſtelo di frumento, a cui „ ſieno applicate qualunque potenze, e di qualunque grandezza, ſia „ del genere dell'elaſtiche, io non potrei in guiſa alcuna contraddi- „ re, eſſendo queſta una verità più chiara della luce del mezzo gior- „ no; concioſiacchè altro non è lo ſtelo, ſe non ſe una verga ela- „ ſtica, unita a quando a quando con nodi, che la riempiono, la „ quale in virtù della elaſticità, di che è dotata, reſiſte ad eſſer „ piegata, e quando ne ſia coſtretta, ſi piega con quelle leggi, che „ convengono alla ſua propria elaſticità. Ma ſe ſi pretendeſſe in ol- „ tre di determinare la particolar curvatura, che deve aſſumere, „ temo aſſai, che ci manchino i dati per poter eſeguire una tale de- „ terminazione. Nè la difficoltà naſce dalle diverſe maniere, e dalle di- „ verſe forze, onde può venir piegato lo ſtelo, perchè queſte ſi potreb- „ bero agevolmente mettere a computo. Se, che in diverſe curve ſa- „ rà piegato lo ſtelo, ſe eſſendo eſſo nato obbliquamente venga in- „ curvato dalla ſola gravità della ſpiga, ovvero ſe eſſo ſia urtato dal

„ ven-

28. Reſtami a dire, che tutte queſte oſſervazioni,

„ vento, o ſollecitato da una potenza orizzontale, o preſſocchè o-
„ rizzontale; ovvero ſe ſi coſtituiſca orizzontale lo ſtelo, e s' incurvi
„ pel ſolo ſuo peſo; o in altra maniera. In tutti queſti incontri lo
„ ſtelo ſi conformerà in curve totalmente diverſe, le quali eſſendo
„ del genere dell' elaſtiche, quando altra difficoltà non s' opponeſ-
„ ſe, ſi potrebbero determinare col calcolo. La difficoltà maſſima,
„ e inſuperabile naſce da ciò, ch' è affatto ignoto con quali leggi
„ creſca l' elaſticità dello ſtelo, creſcendo in lui la compreſſione, o
„ la diſtenſione. Si è ottimamente avvertito, che nel piegarſi lo ſte-
„ lo la parte conveſſa ſi diſtrae, la concava ſi coſtipa, e dove più, e
„ dove meno: dunque non trovandoſi in ogni luogo lo ſtelo del fru-
„ mento egualmente diſtratto, e compreſſo, ſarà dotato in diverſi luo-
„ ghi di diverſe, e ineguali elaſticità, le quali come corriſpondano
„ alle diſtrazioni, o alle compreſſioni, niun Geometra, o Fiſico ha
„ ſaputo ſino al preſente determinare. E ſenza queſta cognizione è
„ impoſſibile il definire col calcolo la particolar curva, che veſti-
„ rà. Se taluno ami appigliarſi ad una qualche Ipoteſi d' elaſticità, ſic-
„ come han fatto tutti i Geometri, i quali delle curve elaſtiche han-
„ no trattato, queſti determinerà non la curva, che ſi ha effettiva-
„ mente, e in cui ſi conforma lo ſtelo, ma quella curva, che ſi a-
„ vrebbe, e in cui egli ſi conformerebbe, ſe valeſſe l' ipoteſi, che ſi
„ è aſſunta. S' aggiunga, che nell' atto del piegarſi, dall' una parte
„ contraendoſi, dall' altra diſtendendoſi lo ſtelo, malagevole, e diſpe-
„ rata impreſa ſarà il determinare i limiti della diſtenſione, o della
„ compreſſione, ſenza de' quali è impoſſibile lo ſtabilir intorno alle
„ curve coſa alcuna di certo. Si aggiungono le molte, e diverſe
„ circoſtanze, che naſcono o dalla diverſità del terreno, o dalla varie-
„ tà delle ſtagioni, o dal modo di germinare, e di naſcere, le qua-
„ li coſe tutte poſſono indurre non piccola mutazione nell' elaſtici-
„ tà dello ſtelo: e quanto è difficile il ridurre tutte queſte diverſe
„ circoſtanze ad un giuſto computo? Per le quali coſe tutte io repu-
„ to, che nella preſente materia altro non ſi poſſa dire di certo, ſe
„ non che la curva, in cui ſi piegherà lo ſtelo, ſarà del genere
„ dell' elaſtiche, e che il ſuo andamento, preſuppoſte le forze ap-
„ plicate, vien dall' oſſervazione, e dalla ſperienza agevolmente
„ determinato. La qual' impreſa ancora in alcune circoſtanze
„ non ſarà tanto facile, perchè ſi può dar caſo, in cui ſia coſtretto
„ a piegarſi lo ſtelo in una curva di doppia curvatura, e allora
„ eſſo ſtelo aſſumerà una poſizione, che non potrà eſſere con-
„ tenuta in un piano. “ Ho voluto qui porre queſto lungo para-

grafo,

ni, ed esperienze ci scuoprono una parte della Storia ignota del *territorio Ravennate*, la qual forse un dì si renderà più compita con altre molte, che da' varj soggetti di questa società letteraria si fanno, e si meditano. All' esposizion semplice per tanto, e puramente storica delle medesime seguiteranno quelle considerazioni, che sopra di esse ho formate.



PAR-

grafo, perchè illustra la materia, che ho trattato; nè io credo, che ciò possa per conto alcuno dispiacere al degnissimo Padre RICCATI, se già non è a me per amore della verità dispiacciuto.

PARTE III.

Delle cagioni delle malattìe del grano in erba.

QUalora i ſemi delle piante ſieno ſtati gettati ſopra la terra colle opportune diſpoſizioni, troppo neceſſaria ſi rende al nutrimento, e alla fecondità, non menocchè alla naſcita, al creſcimento, e alla germinazione ottima di eſſe piante, l' azion regolata del fluido, che in loro traſcorre, e che, ſiccome fu penſato (296), vi opera per le ragioni medeſime, che operano i liquidi nel *Termometro*, nel *Barometro* [297], e nell' *Igrometro*; onde dir vogliaſi, che ſe ella venga impedita, o indebolita, o accreſciuta, o depravata,

(296) Sopra ciò ſi veggano i *ſaggi della Medicina Italiana del Signor Dottore Cogroſſi, Profeſſore di Medicina nello Studio di Padova.*

[297] Ma è difficile oltre modo a rinvenir la cagione, per cui operi il Mercurio nel *Barometro*. Chi diceſſe tuttavia, che ſingolarmente poteſſe riporſi nella mutua azion della *Luna*, e della *Terra*, non dovrebbe forſe andar molto lontano dal vero, giacchè per lunghe oſſervazioni ho conoſciuto tra queſta mutua azione, e le alterazioni del *Barometro* una grandiſſima analogìa. Che ſe l' azion medeſima vale a far naſcere il *fluſſo*, e *rifluſſo del mare*, moltoppiù agevolmente varrà ad innalzare, rarefare, diſſipare la tenue *nebbia* aggirantesi nella ſommità dell' *aere*. Queſta ſarebbe per avventura quella opinione, alla quale io mi atterrei nella propoſta ſeconda parte di una Diſſertazione ſopra alquante mie oſſervazioni del *Barometro* letta nell' *Accademia Ravennate*, piuttoſtocchè al parere del Signor LEIBNITZIO, o ad altri.

ta, o in altra maniera ſconcertata, e offeſa, già ne provenga il morbo (298). Imperocchè queſto fluido, dalle diverſe, e ineguali particole rigonfiato, è a due moti ſoggetto, uno de' quali a lui compete come fluido ſemplicemente, e conſiſte nell' agitazione inteſtina delle minime particelle, l' altro gli compete come fluido progreſſivo ne' varj condotti della pianta. Col primo moto egli uniſce le particole omogenee, ed eſpelle l' eterogenee; col ſecondo ſi porta ne' diverſi luoghi, dove ſi fanno queſte funzioni. Quando procedono tutti e due queſti moti naturalmente, egualmente, e giuſtamente, ſuccedono altresì bene le ſeparazioni, e la pianta è ſaniſſima in tutte le ſue parti, ma quando venga interrotta una tale armonìa, il fluido degenera dallo ſtato naturale, e la ſeparazione ſi altera, e ſi deprava.

2. Che ſe la varietà de' morbi delle piante ſi attribuiſca a' varj modi, co' quali l' azion regolata di queſto fluido poſſa eſſere offeſa, niun mor-

[298] Così GIOVANNI COSTEO *De univerſali ſtirpium natura libri duo* ebbe: *Quum in Plantarum genere ad nutritionem, vel foecunditatem, atque adeo ad ortum, alimentum, incrementum, germinationem, vel foecunditatem omnes pertineat; ubi harum aliqua actionum, vel impedita prorſus, vel imbecilla, vel depravata fuerit, praeceſſiſſe jam morbum, & cauſſam, quae morbum fecit, neceſſe eſt.* Il TURNEFORZIO *Mem. de l' Ac. des ſc.* 1705. *p.* 437. *Obſervations ſur les Maladies des Plantes*, attribuiſce tutte queſte malattìe alle cagioni ſeguenti: 1. Alla troppo grande abbondanza del ſugo nutritivo. 2. Al difetto, o alla ſcarſezza di queſto ſugo. 3. Ad alcune male qualità, ch'egli acquiſta. 4. Alla ſua inegual diſtribuzione nelle parti differenti della pianta. 5. Ad accidenti eſterni. E già de' morbi in generale parlando LABEONE in AULO GELLIO *Noctes Atticae l.* 4. *c.* 2. *Morbus eſt habitus cujuſque corporis contra naturam, qui ſum ejus facit deteriorem....*

bo delle biade, a mio giudizio, accadere potrà ſenza alcuna di queſte circoſtanze, le quali ſi debbono indagare, e ſcoprire, per quindi poi ritrovare la via agevole di prevenirle, o di curarle, onde alla ſocietà degli uomini penuria non rechino, e danno. Ma ſiccome la cognizione di queſte coſe particolari dipende dalla notizia delle univerſali (299), e le cagioni univerſali de' morbi ſono eſterne, o interne (300), ſiccome detto abbiamo, che ſono i morbi medeſimi, e queſte nel caſo noſtro ſembrano ſingolarmente o le cattive coſtituzioni dell' aria, o le alterazioni dell' alimento (301), o tutte e due inſieme; così, quando ſi abbia ſcoperto il genere di queſte cagioni, molto difficile non avverrà poi lo ſcoprirne anche la ſpezie, e la cagion efficiente. Di tanto io ſono andato in traccia per le molte oſſervazioni, ed eſperienze già riportate, e parmi, ch'

(299) Ch'è quanto TEOFRASTO *De Cauſ. Plan.* l. 2. c. 5. diceva: εὑρεθεῖεν γὲ τὶνων, ἢ τὰ καπὶ μέρος φανερά.

[300] Le quali due cagioni furono chiamate da' Greci: ἕξωμμένα, παιήσαντος, come riferiſce lo SCALIGERO *Com.*, & *Anim. in ſex. lib. de Cauſ. Plant. Theoph. l.* 1. *c.* 2.

(301) Il TANARA *Econ. del Cit. in Villa l. 6.* „ E' certa coſa, che „ la maggior parte de' mali, che offendono il grano, provengono „ dall' alimento, e dall' intemperie dell' aria. " Le cagioni poi di queſte cagioni ſono nel ſeno di Dio: *Procedes hunc, & non ibis amplius*. Inſegna IPPOCRATE in non ſo quale delle ſue opere, che quando i mali ſono univerſali, e comuni, biſogna ricorrere a una cagione univerſale, e comune, e ciò, ch' egli dice dell' Uomo, dice d' ogni vivente. Cagion molto univerſale è particolarmente l' intemperie dell' aria. GARDENIO, e WALLISIO *Tranſac.*, & *Collec. Philoſoph. uſque ad an.* 1700. *in Epit. redac. a Johan. Lawthorp. Vol.* 2. conſiderano le mutazioni del tempo dipendenti dalle alterazioni del peſo dell' *atmosfera*.

ch' eſſe m' abbiano tali notizie, e tali lumi recati, che, ſe l' amore della verità non m' impegnaſſe a diffidar de' medeſimi, e non foſſi perſuaſo col ſommo Filoſofo, e Matematico GALILEI, che *non poſſiamo per ordinario intendere, come la natura operi, perchè ella ſi ſerve di modi a noi ſpeſſo inopinabili*, fors' io mi luſingherei di aver pure abbaſtanza veduto per iſcoprire l' origine di alcune malattìe del grano in erba (302) di queſto *territorio Ravennate*.

CAPITOLO I.

Cagione *della ruggine del grano*.

1. DAlle ree coſtituzioni dell' aria ſarà forza il dire, che derivino le *ruggini* principalmente; e ſembra, che aderiſſero a crederlo anche gli Antichi, i quali vollero, ch' elle ſieno un male, che piove dall' alto (303), ſe già queſte vengono inaſpettatamente, e ſenza diſpoſizione preventiva nella pianticella del grano, che n' è percoſſa. Più fiate mi è ciò accaduto di conſiderare in alcuni campi voluti da me con diligenza

[302] Fu ſentenza di ARISTOTELE *Etic.* 1. *unuſquiſque bene judicat, quod cognoſcit*.

(303) Non errò propriamente PLINIO, quando ſcriſſe XVIII. 17. *Coeleſte frugum, vinearumque malum nullominus noxium eſt rubigo*. Il che più largo dichiarò nel già riferito paſſo del Capitolo 28. dello ſteſſo libro, laddove moſtrando la differenza delle ingiurie, o de' caſtighi celeſti: *unum*, diſſe, *quod tempeſtates vocamus, in quibus grandines, procellae, caeteraque ſimilia intelliguntur.... alia ſunt illa, quae ſilente Coelo, ſereniſque noctibus fiunt, nullo ſentiente, niſi cum facta ſunt. Publica haec, & magnae differentiae a prioribus, aliis rubiginem.....*

ſcrupoloſiſſima eſaminare, perchè gli ho veduti coperti di *ruggine*, quando pochi momenti prima gli aveva laſciati di bella meſſe ripieni. Vengono di buon mattino, perchè in quel tempo ſi contraggono; quando con PLINIO (304) non ſi voleſſe che di notte ſi contraeſſero; e vengono ſempre dopo uno ſproporzionato freddo della notte al caldo del giorno antecedente, perchè ſolo dopo queſta ſproporzione ſi manifeſtano.

2. Ed ecco dunque, che nel freddo della notte non proporzionato al caldo del giorno antecedente hanno queſte malvage coſtituzioni dell' aria l' eſſere loro, quantunque alcuna volta al ſenſo noſtro non appariſcano. E a una tale intemperie ſi debbono le *ruggini* ordinariamente, per quanto penſo, riconoſcere, e i loro diverſi effetti attribuire. Non è però, che queſta medeſima ragion di freddo, e di caldo, queſta ſproporzion di aria diurna, e di notturna per varj mezzi non le produca, i quali rendono eſteriore la cagione, quando il principiar della malattìa è interiore. Produce quelle della prima ſpezie col ſoſpendere quaſi per ſoffocamento ne' luoghi o più ſcoperti, o più teneri, o alcun poco offeſi della pianticella, l' azion dell' umore, che per inſenſibile traſpirazione eſalaſi dalla medeſima, ritenendolo ne' ſuoi canaletti, e sì queſti rendendo come ſe foſſero oſtrutti, per cui poi anche tutta la regolata azione del liqui-

(304) PLIN. XVIII. 28. *Nam primum omnium hoc non evenire niſi noctibus, & ante Solis ardorem.*

liquido, che in lei traſcorre, ſconcertaſi (305); e ne verrà maggiore, o minore, più vaſto, o più riſtretto attacco, ſecondo la maggiore, o la minor forza della intemperie, la maggiore, o minor eſtenſione, o diſpoſizion di parti ſoggette alla impreſſione, la quale alcuna volta ſi rende così tenue, che alle macchie medeſime indi ritorna il primiero colore [306]: troppo ſcarſo eſſendo in queſto caſo l' impedimento, o l' oppreſſione dell' aria, che ritiene quella materia della inſenſibile traſpirazione, onde gli urti di eſſa poſſono ſuperarlo, e quindi la medeſima ripigliare il corſo, che prima aveva. Parmi ciò ragionevole, e giuſtificato da quella *ruggine* della prima ſpezie, che oſſervai nel dì 7. di Maggio del 1754., e tali poi mi ſono ſembrate molte altre, che avevano

(305) Siccome i vegetabili mancano di quella poſſente macchina, che negli animali per le ſue dilatazioni, e contrazioni alternative obbliga il ſangue di paſſare per le arterie, e per le vene, la natura ha ſomminiſtrato loro in iſcambio altri mezzi attivi, e poſſenti per innalzare, e tenere in moto il ſugo, che le anima. L' umidità, che le piante traggono con molto vigore pe' loro piccoli tubi capillari, ſi eſala nella traſpirazione per cagione del calore, e così dà libertà a' vaſi del ſugo di procurare nutrimento nuovo continuamente; ma ſe venga impedita queſta evacuazione, eſſi ne reſtano ripieni, e il ſugo per conſeguenza vi ſtagna, e acquiſta un' indole prava, e genera corrompimento.

(306) La forza attiva del liquido, o ſugo di queſta, ſiccome di tutte l' altre piante, contiene un certo atto, o ſia ἐντελέχεια, ch' è una coſa di mezzo tra la facoltà di operare, e l' azion medeſima, e comprende ſforzo; quindi per ſe ſteſſa è portata all' operazione, ne ha biſogno di ajuti, ma la ſola ſottrazione degl' impedimenti. Siccome queſta coſa può eſſere in *mecanica* illuſtrata da un grave ſoſpeſo ad una *fune*, o da un *arco teſo*, così nel caſo noſtro può avverarſi nella ſottrazione di quelle oſtruzioni, che impedivano il libero corſo al liquido.

vano ſingolarmente percoſſe quelle foglie, che coprivano i cannelli di alcuni ſteli del grano.

3. Speſſo anche ſuccede, che l' azione dell' umore traſpirato dalla pianticella del grano viene per cagion d' intemperie ſoppreſſa o dal congelamento dell' umore medeſimo, che ſi coſtipa, e ſi ſecca ſopra di eſſa, o dalla *nebbia*, che vi cade in tante piccoliſſime, e quaſi inſenſibili pallottoline (307), o da' *vapori*, ed *eſalazioni*, che nelle loro minime particelle vi ſi ferman ſopra [308]; E bene a queſto chiu-

di-

[307] Quantunque le gocciole, ed altre piccole quantità d' acqua, che ſopra una ſuperficie piana ſi ſoſtengono ſenza ſpianarſi, abbiano la proprietà di figurarſi ſempre in forma di *emisfero*, o di minor porzione di eſſo, e non mai di maggiore; tuttavia le ſtille in eſtremo piccoliſſime di queſte *rugiade*, e *nebbie* ſi veggono di figura *ſferica*, come perlette quaſi inſenſibili, formate. Queſta figura ritener ſogliono tutte le minutiſſime ſtille, che ſi poſano ſopra una ſuperficie aſciutta, e la ritengono quelle piccole gocciole, che nella cima, e a' lembi delle foglie ſi ſoſtengono, benchè ritte ſieno, e perpendicolari al ſottopoſto terreno. Ma come avvenga, che le medeſime ſi mantengano in tal guiſa eminenti ſopra una ſuperficie aſciutta, non ſarà difficile di concepirlo, ſe la cagione ſe ne attribuiſca col GALILEO all' ambiente, e di più al contatto delle particole minime inſenſibili dell' acqua, le quali, come accade a tutti gli altri corpi, che ſi toccano, reſiſtono al ſepararſi, e allo ſtaccarſi, oppure col NEWTON all' attrazione di eſſe minime particelle dell' acqua. Nè anche ſarà difficile di concepire, come quelle gocciolette ritonde ſi trovino piuttoſto ne' lembi della foglia, che altrove, quando ſi conſideri, che le parti più ſpiritoſe del ſugo nella traſpirazione s' innalzano, e paſſano per le eſtremità più facilmente che per altrove.

(308) I *vapori*, e le *eſalazioni* ſono particelle, che ſi diſtaccano dalla terra, e da' vegetabili per un certo grado di calore, che in lei ſi trova, e che le determina, come le più ſottili, e le più mobili, a laſciare la maſſa comune, appunto come ſi oſſerva nella ſuperficie dell' acqua fatta riſcaldare, e ne' cibi, e nelle frutta, che ſi fanno cuocere. Il Dottore DESAGULIERS nell' eſtratto, ch' ei fece della *Statica de' vegetabili* dell' HALES riferito nelle *Tranſ. Filoſof.* n. 398. ricava una oſſervazione dall' eſperienza 20. pag. 50., dove quell' Au-

tore

dimento di pori le tenerelle fibre di quelle ſuperficie poſſono ſquarciarſi, e quell' aridezza generare, e quel ſecume, che ſopra i gambi, e ſopra le foglie ſpeſſe fiate ſi veggono. Ma per cagion di queſto medeſimo ſi poſſono eziandio rompere i tronchi principali del ſugo nutritivo, per modo che trabocchi dalle ferite, e quindi ne vengano le più atre *ruggini*, e le più dannevoli della prima, non meno che della ſeconda ſpezie, ſe il trabboccante umore ſi metta d' intorno ad eſſe ferite in guiſa di *mele nericcio*, come avverte l' HARTSOEKER (309), e vi ſi ſcuopra talor anche la polvere

tore aveva provato, che il Sole rarefaceva i *vapori* a due piedi di profondità ſotto terra, inſinuandovi il ſuo calore. Egli dice dunque, che ſecondo tutte le apparenze il calor ſolare rarefà l' umidità della terra ad una profondità ben maggiore per condurla alle radici della pianta, e ſollevarla in rugiada, perchè egli ha oſservato col Signor BEIGTON della Società reale, che nella macchina per alzar l' acqua col mezzo del fuoco il *vapore* dell' acqua bollente, quando la ſua elaſticità è eguale a quella dell' aria, ſi ritrova più di tredici mila volte più rada dell' acqua, che la produce. Ma troppo è manifeſto, che i *vapori*, e le *eſalazioni*, quando ſono nello ſtato di fluidità, ſi rendono ſoggetti, come i liquori, a tutti gli effetti proprj de' tubi capillari, e però ſiccome i liquori s' innalzano più, o meno, ſecondo lo ſtato attuale di eſſi tubi capillari, cioè ſecondo l' apalogìa della loro propria materia con quelle, che fanno aſcendere, e ſecondo principalmente la grandezza del loro diametro, che vale a dire in ragione inverſa della loro larghezza, per cui tanto i liquori aſcendono, quanto i tubi ſono più ſtretti; così riputare ſi può, che i *vapori* montino più, o meno, giuſta la diſpoſizion dell' atmoſfera, e la temperie dell' aria, e che quantoppiù ſi alzino, tanto meno cadano nelle minime loro particelle.

(309) Queſto Filoſofo nell' *Extrait critique des Lettres de Monſieur Leeuwenhoek* notò ſopra la lettera 109. del dì 13. Settembre 1697. al Signor VAN-LEEUWEN, in cui ſpiegaſi „ce, qu' on appelle nielle", che „ces corps en ſe deſsechant alors par la perte de leur ſuc, qui „en ſortent des bleſsures, qui y ont etè faites, ſe met à l' entour en „for-

vere granelloſa co' *vermicciuoluzzi* per entro di eſſa.

4. Nè forſe andrebbe errato chi diceſſe, che v' ha qualche *ruggine* della ſeconda ſpezie, ch' è un morbo particolare della epidermide originato dal corrompimento di un umore ſtagnantevi nelle grandi umidità (310), per le quali non conſentendoſi alla materia traſpirabile di poter eſalare, ella ſi diſtende ſulla foglia, e un raggio di Sole ſopravvenuto ve la induriſce, e fa crepare la foglia medeſima, che s' apre, e fendeſi, e in alcuni luoghi ſi diſcioglie in polvere, e così formaſi quaſi una *lebbra*, e dove anche una *muffa*. Non altro parmi, che ſia quel morbo di alcuni alberi fruttiferi dagl' *Ingleſi* chiamato *the bright*. Queſta ſcabroſa buccia diventa poi talora un ricovero di *vermini*, che vivono di eſſa. E forſe di una tal natura ſarà ſtata quella *ſcabbia* mentovata da PLINIO, ch' egli attribuiſce alle *rugiade lenti* dopo le *Virgilie*, o ſieno le *Plejadi*, la cui apparenza denota l' avvicinamento della Primavera [311]. Già ben ſap-

„ forme d' une eſpece de miel noiràtre, paroiſſent noirs, & comme „ s' ils etoient brulès, principalement ſi dans le jour, qui ſuit une „ sì facheuſe nuit, ils ſont expoſès à l' ardeur du Soleil ". E il Signor RENEAUME nella ſua Diſſertazione ſopra il ſugo nutritivo delle piante fece vedere, che quella *Manna di Calabria*, la quale ſi è creduta già tempo, che cadeſſe dal Cielo, altro non è ſe non che il ſugo uſcito fuora da' canali rotti ſugoſi del *Fraſſino ſalvatico*.

[310] E però il RAMAZZINI fu di ſentimento, che la tanto grande, e inſolita inondazione dell' acque accaduta nel 1690. poteſſe aver cagionato a quell' anno una ſimile malattìa del grano in *Lombardìa*.

(311) PLINIO *Hiſt. Nat. XVII.* 24. *Scabies gignitur roribus lentis poſt vergilias; nam ſi rariores fuere perfundunt arborem, & ſcalpunt ſcabie.* Quando le foglie degli alberi, dice GIOVANNI HILL nel Capitolo VIII. del ſuo *Eſsays in natural Hiſtory, and Philoſophy*, ec., cioè:

Ten-

ſappiamo per mezzo d' infallibili eſperienze, che l' acqua impediſce la traſpirazione delle piante (312). Nè dee far caſo, che una tal ſorta di *ruggine* non ſia frequente nel grano in erba, come

Tentamina in Hiſtoria, & Philoſophia naturali, quae per microſcopia inventorum ſeriem continent, ſono attaccate da queſto morbo, elleno s' infievoliſcono, s' increſpano, e ſi contorcono, la loro corteccia ſi fa rugoſa, e ſi fende in varj luoghi, e veggonſi poſcia Inſetti alati moltiſſimi di color verde ſulle foglie medeſime, a' quali viene da alcuni attribuita la cagione di eſſo morbo. L' *Ingleſe* Filoſofo però una tal cagion non ammette per vera, e tiene anzi come dimoſtrato, che l' origine di queſto vizio ſia nella impedita circolazione del ſugo o per tutto l' albero, o per qualche ſuo ramo, congetturando inſieme, che quegl' Inſetti entrino nell' umore ſtagnante, e putrefatto, perchè vi trovino un nutrimento loro proporzionato. Ma per verità queſta genìa d' Inſetti, che accompagnano i ſuoi alberi fruttiferi, e che da lui è deſcritta eſattamente, molto diverſa reputo da quella, che io vidi ſul grano in erba, e deſcriſſi.

[312] HALES *Stat. des Veg. Ch.* 1. *ex.* 9. oſſervò fra l' altre coſe, che la traſpirazione di una ſua pianta in notte calda, ſecca, e ſenza alcuna *rugiada* ſenſibile era di circa tre once, ma ſubitocchè v' era un poco di *rugiada* non traſpirava più. Le particelle della traſpirazione delle *piante* ſi rendono evidentemente più ſottili, e più minute di quelle della *rugiada*, la cui maſſima parte, per quanto appartiene all' ipoteſi del GERSTENIO, ſi concede dall' HAMBERGERO, *elementa Phyſices methodo mathematica*, che ſia quaſi un ſudore delle piante medeſime. Io ho meſſo più volte alla prova della traſpirazione qualche pianticella di grano preparata in un vaſo, come inſegna queſto Autore, ed ho ſempre veduto, che l' aſciutto non impediſce, anzi promove la traſpirazione della medeſima. Il che non ſo, come poſſa accordarſi con quello, che della *ruggine* ha ſcritto il CHAMBERS; il quale ſotto il nome di *malattìa* mette due ſpezie di *ruggini*: „ la prima al cadere della rugiada, o della pioggia immediata„ mente ſeguita da' raggi penetranti del Sole, che repentinamente „ chiude i pori prima dilatati, e abbrucia le foglie: la ſeconda pro„ cede da un ſimile cruciore nelle parti interne dell' albero, cioè „ nel midollo, cagionato da qualche interno difetto, " che GIORGIO AGRICOLA *Tent. multip. univ. omn. arb. fruct., & flor.* con altri attribuiſce a colpa del Giardiniere: *uredinem cum externam, tum internam . . . . . oriri arbitratur ex laeſione radicum in tranſplan-*

lo è ne' *lupinai*, perchè egli non ha biſogno di una traſpirazione abbondantiſſima, come hanno quelli.

5. Vero è, che le umidità di *nebbia*, o di *guazza*, o di *rugiada*, o di *pioggia*, le quali otturano le vie alla materia della traſpirazione, e al ſugo nutritivo, non ſono per loro medeſime d' indole maligna, e ſolo acquiſtano dall' intemperie dell' aria non ſo qual grado di denſità, che prima non avevano [313]. L' eſperienze fattene, e le oſſervazioni molte non mi laſciano credere altramente. Coteſte *rugiade*, e coteſte *guazze* recano di lor natura anzi fertilità alle biade, che danno. Elle ſono ſtate deſtinate a rifocillare le piante, e nel meſe di Aprile, e in quello di Maggio, ne' quali ſono più abbondanti, che in altro tempo mai, promovano eſſa fecondità ſingolarmente. Ne lo afferfer-

ſplantatione improbans, ſcilicet morem communem hortulanorum. Mal certo le piogge impediranno la traſpirazione, ſe eſſe i pori dilatano. Nulla io dico dell' altra ſpezie, perchè al grano in erba non ſembra, che poſſa attribuirſi.

[313] Il Signor COOK, e il Signor MORTIMER, per teſtimonio del nominato CHAMBERS, vogliono, che la *ruggine* ſia „ un va„ por denſo, e viſcoſo eſalato nella Primavera, e nella State dalle „ piante, e da' germogli, ed anche dalla terra ſteſſa in tempo affat„ to quieto, allorchè non evvi nè Sole ſufficiente per tirarlo in al„ to, nè vento baſtante a diſperderlo. Stando egli così ſoſpeſo nel„ la baſſa regione, quando il freddo della ſera s' avanza, ei ſi con„ denſa, e cade ſulle piante colla ſua ſoſtanza ſpeſſa, e tenace, ne „ tura i pori, e così ne impediſce la traſpirazione. " Queſta *rugiada* condenſata ſulle piante credette poi il medeſimo Signor MORTIMER, che ſia il *cibo principale delle Api*, che gl' *Ingleſi* dicono *honydew*. Ma forſe il GASSENDO meglio ſopra di eſſo cibo penſò, quando ſcriſſe nelle Opere ſue, che „ un ſugo viſcoſo traſpirato dalle fo„ glie concorra a comporlo, e a covertire la rugiada, che ſu quel-

„ le

ferma CRISTIANO WOLFIO nelle ſue *Meditazioni Fiſiche* [314]. Ma è vero altresì, che dalle attente conſiderazioni chimiche può coſtare, e coſta in fatti, come n' è teſtimonio GIOVANNI ARBUTTHNOT, [315] la diverſa indole di eſſe *rugiade*, e dell' altre umidità mattutine, acquiſtata nella diverſità de' luoghi, ſecondo il maggiore, o minor freddo della notte corriſpondente al minore, o maggior caldo del giorno antecedente, o conſeguente, ſecondo in ſomma la coſtituzion de' tempi. E perchè le pernicioſe intemperie non ſono continue, quindi avviene per ordinario, che quelle umidità non ſieno alterate, e accompagnate da *ruggine*.

6. Ma ſe fin qui abbiamo veduto, ch' eſſe intemperie hanno prodotto ſolo quel grado di ſpeſſezza nelle umidità naturali, per cui talora ſono reſtati otturati i pori della pianticella, e n' è indi venuto il mentovato diſordine; ora ſi dirà, ch' eſſe medeſime intemperie poſſono queſte umidità naturali in molte guiſe viziare, ed eſſere pur cagione di tale effetto della *ruggine*. Io non faccio qui ſiſtema alcuno, ma parlo ſemplicemente col ſolo lume di natura, e della ſperienza. Le prime *rugiade* ſi ſono nelle deſcritte *ruggini* trovate ſempre naturali, ma in quelle, di cui ora favello, ſi ſono conoſciute ſempre alterate. Diverſe

„ le cade, in una ſoſtanza di mele, di cui prima nulla aveva.“ Io per me trovo, che il *cibo delle Api* è differente molto dalla noſtra *ruggine*.

(314) *Chriſt. VVolfii Meditationes Phyſicae de finibus rerum naturalium*.

[315] *Jo. Arbutthnot M. D. Tentamen circa effectus aeris in corpore humano*.

naſcono occaſioni, nelle quali vuolſi concedere alle medeſime una forza corroſiva, e penetrante; e di queſta forza chiare ne ho avute le pruove. Viene accuſato principalmente il *nitro volatile*, o *ſottile* dell' aria, penetrando in eſſo l' acrimonia, e la ſalſa umidità; onde la *rugiada* viziaſi, quando l' aria dall' intemperie è più eſaltata, e quando da' *ſali acri corroſivi arſenicali* innalzati per mezzo del calor ſolare dagli *Stagni*, e dalle *Paludi*, e condotti da' venti, è impregnata. Il naſcimento di queſto veleno dalle *Paludi*, da' *Laghi*, e dalle *Lacune* è troppo manifeſto; imperocchè l' acqua ſempre in eſſi riſtando, mentre ella appoco appoco penetra in terra, diſſolve la ſua eterogenea ſoſtanza, e uniſce inſieme la ſua ſottil *pinguedine*, o *zolfo*, o *ſali nitroſi*, *aluminoſi*, *vitriuolici*, e talor anche *arſenicali*, o d' altri minerali, e co' medeſimi nel moto della fermentazione ſi uniſce, e ſi altera. E' noto, che tra le bevande hanno natura di veleno maſſimamente le *acque ſtagnanti*, *putride*, e *verminoſe*. Dopo una tal fermentazione ſi ſollevano colle eſalazioni le particelle *ſulfuree*, e *ſaline*, e queſte nella State, e nella Primavera entrano ſpeſſo nelle *ruggini*; e nel Verno, e nell' Autunno paſſano nella materia fetida delle *nebbie*. In ſimile modo alcune eſalazioni uſcite dal Mare, e da certi Fiumi poſſono qualche coſa contribuire alla *ruggine*, mentre le loro acque volgono ſopra un fondo paludoſo, e pregno di ſali nocivi, o portano d' altronde l' abbondanza di acque inſalubri. Nè ſi rende per avventura improbabile, che da me-

deſi-

desimi vegetabili alcune acre particelle corrosive si esalino in tempo di qualche intemperie, che sieno ad essi nocive, quanto la *ruggine*, nella medesima guisa che vi sono delle *guazze*, e delle *rugiade*, le quali, non diversamente che le *ruggini*, mostrano in certi tempi una tale attività, che diventa agli animali, che d' erbe *rugiadose* si alimentano, perniciosissima. E certamente per cagione di tali pascoli reso il sangue di essi, e più delle tenere pecorelle troppo impedito nel suo moto, o accade repentina morte ne' medesimi, o nascono loro sul collo, o sopra altra parte del corpo quelle pustule, che vengono dal ristagno del sangue: il che è de' Medici comune opinione. Se però io fui da mancamento di forze sorpreso, mentrecchè que' gambi irrugginiti del grano maneggiava, ben ne appar la ragione, se un *sal volatile corrosivo* poteva sollevarsi da quelle *ruggini* col molto rimoverle, e sì a' nervi portare irritamento, e relassazione. Stima il RAMAZZINI, che i sali di queste *ruggini* sieno a guisa di *acqua forte*, o di *spirito di vitriuolo*, o di *nitro acido*, perchè, avendo spruzzato le foglie di alcune piante collo *spirito di vitriuolo*, pensa di aver veduto macchie gialle simili a quelle, che si eccitano dalla *ruggine*, la qual cosa per altro non mi è riuscito di verificare giammai.

7. Alle volte dunque quelle umidità, che si fermano sopra il grano in erba, malignano, per modo che dalla loro venefica natura ne vengono le mentovate *ruggini* senza sospensione alcuna dell' umore, che nella pianticella trascorre. E fu que-

sta

ſta da molti creduta l'unica cagione delle *ruggini* (316). Prova n' ebbi della prima ſpezie in quella del dì 11. di Giugno, la quale fu ben toſto dal calor ſolare aſciugata. Ella apparve ſopra i gambi, e le foglie, come vernice, ſecca, e diſteſa, e il gambo, e la ſpiga non patirono per lei notabilmente (317).

8. Ma non così preſto ſi aſciugano quelle *rugiade*, o quelle *nebbie* pingui, e viſcoſe (318), che nelle accennate intemperie di minore ſproporzione vengono a ſorprendere le biade. Eſſe conſervano alquanto delle loro umidità, e corrodono l' *epidermide* della foglia, e le ſue fibre, e ne fanno uſcire il ſugo, che miſchiato colle medeſime reſta in forma di mele bianchiccio, o giallognolo, ed anche nericcio, ſecondo i gradi della intemperie, e le diſpoſizioni delle pianticelle, condenſato

[316] Onde laſciò ARISTOTELE *Problematum ſec. 26. Rubigo autem per humorem calidum, alienumque conſiſtere ſolet.*

(317) Il Signor SEGUIER nella ſua lettera del dì 11. Agoſto 1754. mi ſcriſſe: „ Io ho oſſervato più di una volta un pero, ch' è nel mio „ Orticello, il quale avendo le foglie verdi, e ſenza macchie, ſono „ poi diventate tutte macchiate di giallo in una notte, ed ò queſto „ ſempre attribuito a gocce di rugiada troppo nitroſe, che vi ſo„ no cadute ſopra. "

[318] Alcuni ſtimarono, che queſte rugiade, o nebbie acquiſtino la loro pinguedine, e viſcoſità per mezzo de' raggi cuocenti del Sole; onde il TANARA *Econ. del Cit. in Villa l. 6.* „ Queſta umidi„ tà, avantichè da ſe ſteſſa cada, o da venti ſia aſciutta, dal Sole „ ſeccata ſopra le ſpighe, e ſopra la paglia, cagiona, che fatta vi„ ſcoſa vi ſi attacchi, e ſi converta in materia maligna." Ma ſarà pur uopo il dire, che queſta viſcoſità maligna in lor riſegga alcuna fiata, primacchè il Sole monti ſull' *Orizzonte*, ſe già prima di ciò potrà ella vederſi ſopra le ſpighe, come a me più volte è accaduto di vedere.

ſato ſopra le paglie, e le ſpighe (319). Queſte *ruggini*, come ſi è detto, vanno ordinariamente accompagnate da' *vermicciuoluzzi* deſcritti, e dalla polvere loro granelloſa, la quale non dà, come alcuni potrebbero giudicare, ammaſſi di uova depoſte dagl' *Inſetti*, ma il ſugo rappreſo, e raſſodato, non menocchè le corroſioni de' vermini medeſimi. E vorrà crederſi, che di queſta ſoſtanza melata ſieno eſſi molto ingordi, o che quella umidità, o quella temperie d' aria ſia neceſſaria a ſviluppare tali animaletti da uova quaſi inſenſibili, onde a loro porti tanto giovamento, quanto pregiudizio, e danno rechi a queſte pianticelle.

9. Se altre vi poſſono eſſere maniere, con cui il freddo della notte non proporzionato al caldo del giorno, coſtituiſca una tale temperie di aria, per cui ne venga ciò, che abbiamo detto, in pregiudizio dell' azion regolata de' fluidi della pianticella del grano, e sì queſte *ruggini* cagioni, io nol ſo, perchè avvenimenti altri particolari non mi ſono accaduti in parecchi anni di oſſervazione, che queſte mi paleſino. So, che le ricchezze

[319] Il Signor TILLET *Diſſ. ſur la cauſ. p.* 27. penſa, che „ la „ ruggine, e la rugiada melata, la rugiada farinoſa, e quelle ma„ terie graſſe, che ſi concepiſcono qualche volta ſopra le foglie del„ le piante di gramigne, di arbuſti, e di alberi, ſieno ſempre ſughi „ traboccati, che ſi diſeccano appoco appoco, che ſi convertono in „ una polvere impalpabile ſopra certi vegetabili, e che variano di „ colore, ſecondo le ſpezie di piante, e la natura degli alberi, do„ ve ſi trovano.“ Siccome abbiamo veduto, che alcune malattìe del grano in erba di queſto territorio hanno qualche diverſità da quelle deſcritte da eſſo Autore, così vedremo, che hanno cagioni alquanto diverſe.

ze della natura nel produrre gli effetti della *ruggine* con maniere da noi anche ineſcogitabili ſpiegare abbaſtanza non ſi potrebbero, quando il ſenſo, e la eſperienza non lo ci moſtraſſero, e talvolta queſti anche non baſtano per ſupplire alla noſtra incapacità. Che ſe gli accidenti medeſimi debbano avere alcune regole, il conoſcere però queſte non è coſa agevole ſenza bilanciare la forza delle probabilità, e la veriſimiglianza delle congetture.

10 L' egregio HALES rapporta per verità di aver veduto nel meſe di Luglio dall' eſtremità all' altra di un campo i ceppi tutti de' *lupini* dopo una grande ondata di pioggia abbruciati da un raggio del Sole ardente [320]. E già da molti viene cre-

[320] HALES *La ſtat. des veget. cap.* 1. *ex.* 9. E ciò non ſolo avverte queſto Autore di aver oſſervato, ma di più colla ſua naturale acutezza aſſegna la maniera, colla quale può eſſere addivenuto: „ I' „ ai vù au Mois de Juillet [ſaiſon des nielles brùlantes] les Seps dans „ le milieu des houblonieres tous brùlès, preſque de l' extremitè d' „ un grand terrein juſqu' à l' autre exremitè, par un rayon ardent „ de Soleil après une grande ondèe de pluie; dans ces momens l' on voit „ ſouvent à l' oeil nud, & beaucoup mieux avec les Teleſcopes re- „ flèchiſſans, les vapeurs s' èlever en aſſez grande abbondance pour „ rendre les objets obſcurs, & tremblans; il n' y avoit dans tout ce ter- „ rein brùlè pas une veine de terre sèche, ou graveleuſe: il faut donc „ attribuer ce mal à une quantitè de vapèurs brùlantes, plus gran- „ des dans le milieu, que vers les bords du terrein; dans le milieu, „ parceque les vapeurs de la traſpiration y ètant plus abondantes, el- „ les y forment un medium plus denſe, & par conſequent plus „ chaud, que celui des bords du terrein.

„ Peut-ètre ce grand nombre de vapeurs ètendues dans un sì grand „ eſpace, faiſoit-il auſſi converger un peu les rayons du Soleil vers „ le milieu du terrein, ou par la denſitè du medium, par cette con- „ vergence la chaleur augmentoit conſiderablement; car j' ai obſer- „ vè, que la liſiere des haublons brùlèe ſe trouvoit dans une ligne a „ angles droits avec les rayons du Soleil à onze heures, qui etoit „ l'

creduto, che le *ruggini* naſcano da certe piogge brevi nelle maggiori vampe della State, alle qua-

„ l' iſtant du rayon brùlant. La houbloniere etoit dans une vallèe, „ qui s' etendoit du Sud-oueſt au Nord; & ſi je m' en ſouviens bien, „ il ne faiſoit, que très-peu de vent dans le tems de la brùlure; „ mais s' il y avoit eu un vent leger, Nord, ou Sud, il eſt probable, „ que le vent de Nord ſoufflant doucement la vapeur, qui s' elevoit, „ elle ſeroit tombèe ſur le cotè Sud du terrein: ce còtè par conſequent „ auroit ètè bien brùlè, & de mème le cotè da Nord l' auroit ètè „ par le vent du Sud.

„ Pour les nielles particulieres, qui brùlent ça, & là quelques ſeps „ de houblons, ou une, ou deux branches d' un arbre, ſans endomma- „ ger les voiſines, nous pouvons en trouver la cauſe dans les obſer- „ vations, que les Aſtronomes ont ſouvent faites avec le Teleſcope „ reflèchiſſant, de petites particules de vapeurs dètachèes, tranſparen- „ tes, qui flottent dans l' air, & qui quoiqu' elles ne ſoient pas viſi- „ bles à l' oeil nud, ſont cependant beaucoup plus denſes, que l' air, „ qui les environne; car ces vapeurs, à cauſe de leur denſitè, peuvent „ fort bien acquerir un tel degrè de chaleur par les rayons du So- „ leil, qu' elles pouront enſuite èchauder les Plantes, qu' elles tou- „ cheront, & ſur tout celles, qui ſont les plus tendres: c' eſt ce „ que les Jardiniers de Londres n' ont, que trop ſouvent èprouvè à „ leurs depènſes, lorqu' il leur eſt arrivè de mettre imprudemment des „ Cloches de verre ſur leurs Choux-Fleurs les matinèes de gelèe, a- „ vant que d' en avoir laiſsè èvaporer l' humiditè; car cette humiditè „ s' elevant par la chaleur du Soleil, & ſe trouvant arrètèe par le „ verre, forme alors une vapeur denſe, & tranſparente, qui echaude, „ & fait mourir la plante: peut-ètre auſſi que les ſurfaces de ces grands „ volumes de vapeurs denſes, qui flottent dans l' air, peuvent [parmi „ toutes les autres figures] prendre quelque fois celle d' un hemiſphe- „ re, ou d' un hemicylindre, & par-là faire converger aſſez les ra- „ yons du Soleil pour brùler les plantes, ſur les quelles ils tombent, „ en raiſon de leurs plus grandes, ou de leurs moindres convergen- „ ces. " Ho riferito queſto lungo tratto dell' ópera del Sig. HALES per rammentare il grazioſo ſiſtema di un così ingegnoſo, e diligente oſſervatore. Per altro io direi piuttoſto, che quelle particelle di vapori, le quali ſeparate galleggiano per l' aria, acquiſtaſſero dalla menzionata intemperie colla qualità bruciante una denſità propria per concepire dal raggio del Sole, principalmente pomeridiano, quel maggior calore, che più efficaci le rende.

li i cocenti raggi del Sole ſubito ſuccedano (321). Ma o queſte ſono l' anzidetto morbo particolare della *epidermide*, o elle propriamente non poſſono dirſi le noſtre *ruggini*, ma piuttoſto alcuni *abbruciamenti* delle biade, e dovrebbero eſſere la *carbunculatio*, e anche l' *uredo* degli Antichi, le quali, come ſi è detto, non altro erano, che un *ſeccamento*, un *abbruciamento*, e un *annerimento* della parte bruciata, mai in eſſe ſuccedendo marciume alcuno, il che non vuolſi dir ſempre della *ruggine* (322).

11. Non è difficile, che i vapori brucianti di queſto valente Ingleſe abbiano la loro origine dalla mentovata intemperie, perchè ſieno l' effetto di un grado di fermentazione cagionato da eſſa, nel quale la ſomma dell' azione attrattiva delle particole eſalanti ſia molto minore alla ſomma della loro potenza ripulſiva, onde le parti coſtituenti ſeparandoſi, e il loro moto ritardandoſi, ne facciano la preteſa converſione de' raggi del Sole. Ma fors' anche potrebbe dirſi, che quando ſi poſa ſulle foglie della vite, e ſopra altre frondi, o piante una quantità di ſtille minutiſſime di figura ritonda, e sferica, i raggi del So-

(321) Il CRESCENTIO nella ſua *Agricoltura* 4. 17. 5. laſciò queſto ſentimento: „ avviene ancora ſpeſſamente, che nel tempo del calore „ diſcenda con fervente Sole una piccola piova velenoſa, e aduſta, „ che volgarmente a Bologna *melume* chiamano, che molte generazioni di viti sì alidiſce, che il loro frutto a niente al tutto riduce. "

(322) BUDEO in *Pandect.*: *Similis uredinis eſt ſyderatio, quae graece* σφακελισμός *dicitur, & latine etiam carbunculatio.*

Sole, paſſando per quelle piccoliſſime sferette, percuotano per refrazione la foglia, che ad eſſe ſoggiace, ficchè nel medeſimo modo, che gli ſteſſi raggi paſſando per una palla di criſtallo, o per una caraffa piena di acqua, e percuotendo ſull' eſca, e ſul panno, o altra coſa ſimile, la riſcaldano, e accendono, così anche paſſando per que' piccoli globetti, vengano a riſcaldare talmente la foglia, o il germe, ſopra cui poſano, che l' inaridiſcano, e ſecchino affatto. E ſe ciò non accade ſempre, ſia perchè, durando la nebbia molto tempo, ſi vengono a ragunare ſulle foglie tante di quelle minute goccioline, che ſi rammontano una ſopra l' altra, ſi confondono inſieme, e perdendo affatto la figura sferica ſi ſchiacciano, ond' altro non appare ſulla foglia, che un ſottil velo di acqua; e in queſto caſo il Sole non può fare in eſſe quell' effetto, ch' e' fa, mentre quelle goccioline vi ſtanno ſopra intatte, e intere. Sembra, che queſta foſſe opinione dell' immortale noſtro GALILEI.

12. Molta per tanto deve eſſere la forza, e molta la velocità del raggio in *abbruciamenti* così fatti; imperciocchè il calore, come ha dimoſtrato l' HERMANNO (323), è nella ragione compoſta del numero delle particelle ignee, e del quadrato della loro velocità; e per la medeſima ragione ne' corpi, che hanno eguale quantità di parti ignee, ma aſſiderate, e fiſſe, come ſarebbe nel *parenchima* delle foglie, delle uve, o di altro, il calore,

[323] HERMAN. *App. ad Phoronom.*

che ſi eccita per lo ſtrofinamento, è in ragione compoſta della ſemplice della denſità, e della doppia della velocità de' corpi ſtrofinati. PLINIO dunque s' ingannò, e con lui altri molti s' ingannarono in non volere, che il Sole aveſſe colpa alcuna in queſti *abbruciamenti*, e che veniſſero eſſi ſolamente dal freddo [324]; e s' ingannarono forſe per non diſtinguer-

(324) PLIN. *Hiſt. Nat. XVIII.* 28.: *Plerique dixere: rorem inuſtum ſole acri frugibus rubiginis cauſam eſſe, & carbunculi vitibus. Quod ex parte falſum eſſe arbitror, omnemque uredinem frigore tantum conſtare Sole innoxio. Id manifeſtum fiet attendentibus; nam primum omnium non hoc evenire niſi noctibus, & ante Solis ardorem, deprahenditur, totumque lunari ratione conſtat: quoniam talis injuria non fit niſi interlunio; plenave Luna, hoc eſt praevalente; utroque enim habitu plena eſt; ut ſaepius diximus. Sed interlunio omne lumen, quod a Sole accepit, coelo regerit.* Non è tanto vero, che alcune *ruggini* vengano ſolo di notte innanzi l' ardore del Sole, e fra la vecchia Luna, e la nuova, che vero anche non ſia, che altre *ruggini*, quantunque di notte, e innanzi l' ardor del Sole, vengano tanto nella vecchia, quanto nella nuova Luna, e che gli *abbruciamenti*, le *uredini*, le *carbunculazioni* per lo più non ſuccedano ſenza l' ardor del Sole, ſebbene poſſono ſuccedere anche pel ſolo freddo. L' eſperimento dell' HALES nella ſua *Statica* baſta per comprovare quanto io dico, e il ſentimento di ARISTOTELE ne' ſuoi *problemi* ſez. 3. baſta per confermare, che queſti *abbruciamenti* da diverſi effetti poſſono derivare: *Nihil prohibet*, dic' egli, *rem eandem a contrariis effici, dummodo non agant modo eodem, ſed diverſo. Exempli gratia: Uritur (uſtio) & a gelu, & a calore, ubi gelu calorem coepit univerſum. Itaque modo quodam a contrariis effectus proficiſcitur idem: & modo quodam non niſi idem producitur.* Haſſi da BUDEO *Annot. in Pandec. p.* 316.: *Carbunculatio, ſideratio, quae ipſa tamen tanquam genus multas ſpecies complectitur.....* E più ſotto: *At vero in vitibus carbunculatio, quae circa idus Auguſti in Italia accidit, vitium eſt, cum uvae non ſatis foliis tectae praefervidis ſolibus interdum vetorridae fiunt, & exuſtae, ex quo tandem aceſcunt, ut quodam uredinis carbone exuſte, acinique tunc praecoquuntur in callum, ut quodam in loco Plinius ait.* L' opinione di PLINIO ciò non oſtante per vera tennero, e ad eſſa aderirono non pochi de' moderni Autori, fra' quali l' AMBROSINI confeſſolla per veriſſima nella ſua *Phytologia*, *hoc*

guerli dalla *ruggine* in alcuna maniera (325). Qual parte v' abbia talora il freddo, troppo è chiaro, ma io mi ſono anche accertato, che il ſolo freddo, quando grande non ſia, o improvviſo (326), nulla vi può.

13. Mol-

hoc eſt de Plantis Tom. 1. p. 247. dov' ebbe: *rubigo morbus ſatorum e frigore, & pruinis. Uredo, & rubigo, vel robigo frigoris cauſa tantum naſcitur.* E dopo di lui l' HARTSOEKER *Ext. crit. des let. de Monſieur Leeuwenhoek* ſopra la let. 109., dove parlò di quello „ qu' on ap- „ pelle nielle “, aſserì, che „ cela arrive plutòt par une gelèe, „ qui eſt aſsès capable de faire cet effet. “

[325] Così reſtò ingannato LODOVICO VIVES, quando ſcriſse ne' per altro dottiſſimi ſuoi Commentarj a' libri di SANTO AGOSTINO *de Civit. Dei l. 4. c. 41.: Rubigo eſt ros putrefactus, fruges teneras corrumpens, & frians. Ad Auroram ſolet id vitium ſegetibus accidere ſilente Coelo, ſicut ait Plinius, ſereniſque noctibus, nullo ſentiente, niſi cum factum eſt, in convallibus, & locis perflatum non habentibus.* E il ſoprallodato BUDEO, *annot. in Pan.: eſt autem erugo incidentis ſegetibus humoris putrefactio.* E già TEOFRASTO *De Cauſ. Plan. l. 4. c. 15.* aveva detto: *rubigo autem putredo quaedam reſidentis humoris eſt. Quamobrem ſi copioſae pluviae fuerint, rubigo, nulla eſt. Diluitur enim, atque detergitur. Sed ſi ſtillicidia, vel etiam rores plures inceſſerint, ſolque ſecutus ſit, ſtatuſque deſit; dum putrent.* Di queſta natura credette GIOVANNI COSTEO *De univer. ſtirp. Nat. lib. duo*, che poteſse quaſi giudicarſi quel vizio particolare dell' *Ulivo; quod arachnium vocant, ob umidiorem enim aerem, ſitu, quaſique Arachnae tela quadam obducitur, unde & illi eſt nomen, cui ſuccedit corruptio, & lapſus l. 2. c. 57. p. 466.*. Ma per verità, ſe le *ruggini* ſempre da *rugiada* putrefatta derivaſsero, come queſti Filoſofi penſarono, eſse non ſuccederebbero per avventura, com' eſſi vogliono, fuorchè nelle notti ſerene, mentre la *rugiada* non appare, ſe non che a Cielo ſereno; e già ſi è veduto, che non è così certamente.

[326] E nel caſo, che e' ſia eccesſivo, tutto vi può. Riportarono gli *Atti eruditi di Lipſia* dell' anno 1712., che il ſeccamento di moltiſſimi alberi ſuccεduto nel 1709. era ſtato attribuito dal CHOMEL alle fibre rotte del legno, per cagione del ſugo gelatovi per entro in quel freddo ſtraordinario. La qual ragione convenne colle oſservazioni del WOLFIO eſpoſte nella Diſsertazione ſopra eſso freddo, per-

chè

13. Molto è bensì facile, che i *vapori brucianti* ſieno alcuna volta portati da certi venti, piuttoſtocchè da certi altri, perchè quelle fermentazioni, che tali gli coſtituiranno, poſſono farſi piuttoſto da una parte della terra, che dall' altra (327). Oſſervai, che il vento di *Levante*, o *Subſolano*, o *Eſt*, il quale nella State è alquanto caldo, e ſecco, nell' Inverno è talor freddo, e conſuma, e diſperde per ordinario i vapori, che ſeco porta. Il vento *Meridionale*, o *Auſtro*, o *Sud* è caldo, e nocivo alle biade, perchè ne fa ſeccare qualche fiata i gambi, e reſtar i grani diminuiti di mole. Il *Ponente*, o *Favonio*, ovvero *Oueſt*, umido, e freddo, è utile alle biade, e queſto ſpira aſſai vicino alla terra, e conſuma i vapori. Il vento *Settentrionale*, o *Borea*, o *Nord* è freddiſſimo, e ſecchiſſimo, ed è alle tenere pianticelle mortale nimico. Tuttocciò vogliaſi dir anche de' loro colaterali. Ma quando il vento *Greco*, o *Nord-eſt* ſpira di State, mantiene l' aria freſca, e tien lontane le intemperie, e le malattìe del grano. Queſti venti potranno anche da molto lungi condurre i vapori o favorevoli, o pernicioſi alle biade,

ſe

chè in effetto egli ſcuoprì, ch' erano rotte qua, e là tali fibre, non altramente che ſi faccia nel legno putrido. Ma ben di frequente ſuccede, che, quando al primo apparire delle dolci arie di novella ſtagione cominciano le piante tutte ad abbandonare il ſugo, che dalla forza ſolare ſi tirò in alto, ſe giunga uno intempeſtivo freddo, a cui molto ſiamo nel noſtro clima ſoggetti, come altri hanno conſiderato, il qual freddo trovi eſse piante con pori alquanto pieni di ſugo, queſto fa ſeccarle prontamente, perchè fa ſubbolire il ſugo medeſimo.

(327) Nota il CHAMBER, che „ il diſordine della ruggine, che

„ gl'

ſe già eſſi medeſimi vapori ſono ſpeſſo cagione di tali venti. Egli è certo, che alquanti moti alle particole aeree imprimono i vapori, che dalla terra, e dalle piante aſcendono, ſiccome vediamo, che una nave, o altro legno muove l' acqua prima quieta. Levato a cagion di tal moto l' equilibrio all' aria, eſſe particole aeree tendono, dove minore trovano la reſiſtenza, e ſeco portano quelle de' vapori medeſimi, come l' acqua porta la nave. L' aver io fatto più volte bruciare in faccia a un campo di biade alcune materie bituminoſe, mi è ſtato cagione di rimanere aſſicurato, che le foglie eſpoſte a quel vapore portato loro dal vento, in poco tempo ſi ſmarrivano, e in fine ſi ſeccavano. Mà il calore di tal vapore eſalato dalle materie, che abbruciavano, non poteva far queſto effetto, eſſendo eſſe in troppo gran diſtanza; per lo che ſembra, che ſi debba attribuire all' azione delle particelle bituminoſe ſopra l' aria contenuta nelle foglie, di cui fiſſino la elaſticità; e di queſta natura potrebbe dirſi che talor foſſero i vapori, che cagionano le *nebbie*, e le *rugiade* pernicioſe. Agli eſpreſſi *abbruciaticci* io credo dunque, che i venti non altramente concor-

„ gl' Ingleſi chiamano *bright*, ſuccede quando ſoffiano i venti a-
„ cuti di Oriente, che ſono frequentiſſimi in Inghilterra ne' meſi
„ di Marzo, e di Aprile. " GIOVANNI BERNARDO DE FISCHER del ſuo libro: *Lieflaendiſches Landwirthſchafts-buch*, *&c.* cioè: *Liber de re ruſtica ad regiones Livoniae*, *Eſtoniae*, *& Curoniae accomodatus*, *in quo*, *&c.* crede di poter giuſtamente traere dall' acceſso vario de' venti, e dalla mutua temperie dell' aria un ottimo pronoſtico della futura meſſe; e molti per ciò adduce eſperimenti eſattiſſimi da lui fatti.

corrano, che col portare ſulle lor ale que' vapori, che producono il ſeccamento (328).

14. Non

[328] Perciocchè non ſarà da dirſi giammai, che dal moto del vento l' effetto dell' abbruſtiare, e del ſeccar le foglie, e il grano medeſimo riconoſca la ſua origine. Troppo è ſpacciata l' opinione, che il moto cagioni il calore. E ſe fu creduto, che una *ſelva* da un furioſiſſimo vento foſſe bruciata, e che in mezzo al *mar* tempeſtoſo ſi ſieno alcuna volta per la ſtraordinaria velocità dell' acque, e de' *venti* acceſe le *navi*, queſte ſi furono di quelle verità, che il REDI direbbe *frodate dalla menzogna*; perchè e' doveva crederſi piuttoſto, che le ſtoppe, e le tavole della *nave* ſi poteſſero eſſere acceſe, comprimendoſi, e ſoffregandoſi nel tormento della procella, del quale le ſcoſſe, e i ſuoi ſtridori ne fanno fede; e che in un *boſco* folto di alberi poſſano alcuni di loro moſſi, e agitati dalla furia del vento eſſerſi inſieme tanto gagliardemente arrotati, che ne ſieno ſtate eccitate le fiamme. L' accendere il fuoco collo ſtropicciare due legni è coſa nota, e uſitata in *America*; e mi venne ciò confermato dal P. VENANZIO DA BAGNACAVALLO, Miſſionario Cappuccino, mio corriſpondente in quelle parti, dalla cui amorevolezza curioſe rarità ho riportate per fornirne il mio *Muſeo*. Anche in queſta sbagliò forſe il NIEREMBERGIO, come in altre coſe molte aveva sbagliato. Pensò *Hiſt. nat. max. pereg. l. 6. c. 22.* che *in frugibus ex ſerenitatibus, flatibus Auſtrinis, acqua, & rore in ſpicis inſidente, quibus ex Sole ferveſactis aerugo creatur*. Qualora i *venti d' Auſtro* fanno bruciar le biade, io non ho mai qui oſſervato acqua alcuna, o *rugiada* ſopra le ſpighe, e i gambi del grano, talchè a me coſta che i *vapori* portati da quel vento ſieno piuttoſto aſciutti, e poco tenaci, ſe la loro umidità non appare. Ma l' opinione del LEEUWENHOEKIO *Epiſt. ad Soc. Reg. Angl. & al. illuſt. vir. ſeu Contin. Mirand. Arcan. Nat. detector. Epiſ.* 109. *ad Jo. Van Leeuwen*, che il *vento* produca la *ruggine* col rompere le fibre della paglia, e del *frumento*, per cui ne ſucceda dalle piaghe il traboccamento del ſugo, che doveva nutrirle, non ha fondamenti, che la ſoſtengano, quantunque forſe non già perchè queſto vento doveſſe avere quella forza, che pretende l' HARTSOEKER *extr. Crit.*, &c. nel luogo citato: „ Le vent devroit ètre bien fort „ pour caſſer ainſi la paille, & qui plus eſt le froment mème; “ ma perchè queſto vento dovrebb' eſſere di una natura ben ſingolare, e a noi ignota per rompere alcune fibre della pianticella, e alcune del grano medeſimo ſolamente, e non piuttoſto troncarne il gambo, e portarne via eſſo grano, come tal volta per verità ſuccede, ſenza venir ruggine alcuna. Tra le molte oſſervazioni da me fatte intorno le impreſſio-

14. Non io già ho veduto mai, che per mezzo di vento alcuno ne venga la *ruggine* della seconda spezie; perchè quegli *abbruciamenti* del vento non ho veduti giammai accompagnati dalle dense umidità, nè da' *vermini*, onde accompagnate sogliono essere le *ruggini* della seconda spezie. Per tanto sarà cosa singolare all' *Inghilterra*, che i *Bruchi*, come asserisce il Signor BRADLEY (329) di aver osservato, accompagnino d' ordinario nel mese di Marzo il vento acuto di *Oriente*, e che questi sieno motivo di *ruggine*. Qui almeno non è così certamente.

15. Siccome gli antichi, così molti de' moderni Scrittori pretesero d' incolpar la *ruggine* medesima di moltissime infermità delle piante, e il LANGIO (330) non ha molto si dichiarò, ch' ella lo fosse della *filiggine del grano*; la qual cosa per verità non mi è stata mai dall' esperienza confermata. Vero è sol tanto, che la impressione della *ruggine* viziando in qualche modo il sugo, e l' alimento della

pressioni, che il *vento* produce sopra il grano in erba, non mi è succeduto mai di verificare un sì fatto rompimento, da cui la *ruggine* producasi, quantunque molte fiate abbia veduto, che la pianticella d' esso grano venga dal *vento* scossa, e troncata.

(329) BRANDLEY, Vescovo di *Croyne* in *Irlanda*, Autore del famoso Dialogo tra *Hylas*, e *Philonaus* sopra *l' immaterialismo*.

[330] LANGIO *Descriptio morborum ex esu clavorum secalinorum cum pane* cap. 13. *Adurit haec plantas, & maculis rubicundis, vel luteis, vel nigris signat, oculos arborum fructiferarum corrodit, vel acrimonia sua, vel mediantibus vermiculis ex se exclusis, spicas frumentorum corrumpit, & in pulverem nigricantem transmutat, pictoribus in usum cedentem, quod malum ustilaginem vocant, fructus immaturos debilitat, ut vel ad maturationem pervenire nequeant, vel vermibus scateant, erucas, aliaque insecta cumulat, plantas, fructusque veneno inficit.....*

pianticella, è cagione, che nella ſpiga ſi produca il granello magro, riſtretto, e piccolo.

CAPITOLO II.

Cagione della *filiggine del grano*.

1. NElla guiſa, che molte, e diverſe oſſervazioni mi hanno condotto a non laſciar quella, che io chiamo *filiggine* nella categoria delle *ruggini*, molte anche, e diverſe oſſervazioni mi hanno ſcoperto in queſta malattìa una condotta diverſa da quella, ch' è tenuta dalla natura nella formazione di eſſe *ruggini* (331). Nella *filiggine* del grano ſembrami di poter rinvenire un' alterazione dell' alimento, per cui il morbo ſi faccia intrinſeco, e tronchi nella ſpiga l' azion regolata del ſugo nutritivo, e sì tutta la corrompa. Queſt' alterazione dell' alimento perviene ordinariamente a tutta l' eſtenſione, che deve avere, quando la medeſima tenerella ſpiga ſi ſta per anche chiuſa nel ſuo aſtuccio (332). Per le ſopra deſcritte eſperien-

(331) Il Signor DUHAMEL nel ſuo eccellente Trattato della *Coltura delle terre*, e il Signor TILLET nella ſua famoſa Diſſertazione ſopra il *grano carbone* fecero pur differenza de' principj di queſte malattìe; il che a me non era noto, come lo è poi ſtato di recente.

(332) Queſto fatto diſtrugge il ſentimento di GIOVANNI BAUCHINO *Hiſt. Plant. T. 2. p. 418.*, il quale pretende, che il *marcimento* ſi faccia, quando la ſpiga s' innalza ſopra il gambo, per l' azion del Sole ſopra di eſſa, già penetrata da una pioggia abbondante. E viene diſtrutto pur anche dal ritrovarſi la *filiggine* tanto ne' luoghi umidi, quanto ne' ſecchi, come afferma lo ſteſſo DUHAMEL *Exper. relat. au Traitè de la Cult. des terres*; tanto dopo la pioggia, quanto dopo il ſecco.

rienze io metto bensì in conſiderazione, ſe ſi poſſa giuſtamente ſoſpettare, che la cagion interna immediata di eſſa malattìa derivi da qualche impreſſione eſterna, la quale impediſca, che il liquido, filtrandoſi per la ſoſtanza glanduloſa, e fiſtolare delle radici, ſepari poi liberamente per le ſolite vie le parti, che a lui non convengono; per il che fermentando (333) impetuoſo ſcorra ne' ſuoi canaletti, i quali per eſſer allora nella ſpiga più teneri, e dilicati, che in ogni altro luogo, gli sfor-

[333] Belliſſimo è, quanto della fermentazione un dì pensò l'HALES *Stat. des Veget. c. 6. exp.* 109. „ Il y a des gens, qui croyent, que la pu-
„ trefaction eſt l'effet d'un feu inherent dans les matieres, & que les
„ vegetaux n'ayant chez eux aucun principe de chaleur ne ſont ſujets,
„ qu'à la fermentation; mais que les animaux ſont ſujets à la fermentation,
„ & à la putrefaction; & ils attribuent ces operations à des cauſes
„ tres-differentes, en diſant, que la cauſe immediate de la fermenta-
„ tion eſt le mouvement de l'air interceptè par les parties fluides, &
„ viſqueuſes de la liqueur, qui fermente, & que le feu lui mème ren-
„ fermè dans le ſujet, qui pourrit, eſt la cauſe de la putrefaction.
„ Mais je ne vois pas pourquoi l'on ne doit pas regarder la putre-
„ faction, comme un different degrè de fermentation; car je ſerois tres-por-
„ tè à croire, que la nutritione n'eſt, que l'effet d'un degrè de
„ fermentation, dans la quelle la ſomme de l'action attractive des
„ particules eſt bien ſuperieur à la ſomme de leur puiſſance repulſi-
„ ve. Si cette puiſſance repulſive devient ſuperieure à l'autre, les
„ parties conſtituantes ſe ſeparent, & quand dans cette ſeparation
„ elles ſe trouvent delayèes dans beaucoup de flegme, leur mouve-
„ ment eſt retardè, & par conſequent elles n'acquierent pas un
„ grand degrè de chaleur en ſe diſſolvant; mais lorſque ces parties
„ conſtituantes n'ont, qu'un certain degrè d'humiditè, elles s'a-
„ cquierent, comme le Foin amaſsè verd, aſſez de chaleur pour brùler,
„ & s'enflammer, ce qui rend leur ſeparation plus parfaite, & les
„ diſſout juſqu'au point de ne pouvoir plus en tirer d'eſprits acides,
„ ou vineux; ce qui ſans doute doit plùtòt s'attribuer à ces cauſes,
„ qu'au feu pretendu, qui reſide au dedans de ces matieres, puiſque, ſelon
„ le vieux axiome, l'on ne doit point multiplier les ètre ſans neceſſitè.
„ Si l'on reſtraint la notion de la fermentation [comme on le fait

„ or-

zi, e ne ſtrappi le fibre (334) più deboli, onde ne

„ ordinairement] aux plus grands degrès de cette fermentation, il ſe-
„ ra vrai de dire, que les fluides des Animaux, & des vegetaux ne
„ fermantent point, quand ils ſont en ſantè; mais en la prenant,
„ comme on le doit, dans un ſens moins ſtrect, c' eſt à dire en ap-
„ pellant fermentation tous les degrès du mouvement inteſtin des
„ fluides, on ſera forcè de l'admettre dans l' ètat mème de la plus
„ parfaite ſantè des vegetaux, & des animaux; car leur fluides contien-
„ nent en abbondance des particules ſulphureuſes, & des particules
„ elaſtiques. "

L' effetto di un fermento, come quello, che accade nella ſpiga della *filiggine*, deriva dalle ſue parti più penetranti, e mobili, colle quali diſcioglie, e rompe la teſtura, o la combinazione delle parti componenti, o de' principj della ſpighetta, dà al liquido un nuovo moto, e diſpone quelle a prendere una nuova poſizione, o combinarſi in una nuova maniera, e perciò coſtituire una nuova ſpezie di corpo. Il che torna lo ſteſſo, che ſe col grande HARVEO *Ars curandi morbos* ſi diceſſe, che „ la fermentazione naſce, quando „ nelle parti della circonferenza ſi ſcoſtano le intermedie particole paſ- „ ſive dalle attive, le quali ſi concepiſcono da una parte acide dall' „ altra oppoſta alcaliche, e ſpiritoſe, di manieracchè poſſano in ſe „ mutuamente agire, finchè l'une ſieno diſtrutte dall' altre. " Queſte parti attive, e paſſive ſono quelle, l'une delle quali ſi concepiſcono dall' ingegnoſo GIOVANNI BERNOULLI *Differ. Chym. Phyſ. de efferveſ.*, & *ferment.*, *nov. hypot. fund.*, *cum deſcript. alic. perp. mobil. pure artific.*, come *tetraedre* contenute da' *triangoli iſopleuri*, l'altre come compoſte di tali *tetraedri* roveſciati, talchè eſſendo inveſtite da que' *tetraedri*, non ammettano ſinuoſità alcuna, e quando gli *apici* de' primi *triangoli* vengono in queſte inſeriti, le parti medeſime pazienti frangano, e così dieno l' eſito all' aria incluſa compreſſa. E aggiugne, che la cagione del moto di queſte particelle può eſſere qualche volta un agente eſterno, e qualche volta una ſoſtanza tenue, e ſpiritoſa, che a' medeſimi pori del corpo ſia inerente. Il moto delle particole eccitate è determinato prima dall' impeto impreſſovi dal corpo eccitante, ma poi anche riceve nuove determinazioni dalla teſſitura, da' pori, e dalle diſpoſizioni del corpo, nel quale ſi fa tal moto.

(334) Per molte eſperienze ſi vede chiaramente, che la forza eſpanſiva dell' aria nuovamente prodotta nelle *fermentazioni* cagiona effetti ſingolariſſimi. Ne abbiamo delle riprove nella tante volte mentovata *Statica de' vegetabili* dell' HALES *ch.* 5. *exp.* 89.. ISACCO NEWTON ci avviſa nella ſua *Ottica Quaeſt.* 31. intorno alla generazion dell'

ne venga la corruzione, e lo ſcioglimento. Chiaro indizio mi parve, che aveſſi di una tal fermentazione nel ſummo tenuiſſimo da queſte ſpighe innalzatoſi, primacchè uſciſſero da' loro aſtucci (335); mentre della forza, e dell' impeto di queſto ſugo ne ho avute molte riprove nell' eſperienze fattene co' tubi da *Barometro* ſopra nominate. L' accennata impreſſione dell' aria, quantunque poſſa venire in tempo di *nebbia*, di *brina*, di

dell' *aria*, e del *vapore*, che „ les particules, qui ſont forcées de ſor-
„ tir des corps par la chaleur, ou la fermentation, ſe trouvant hors de
„ la ſphere de l' attraction du corps, dont elles s' eloignent, en s' eloignant
„ auſſi les unes des autres avec grande force, occupent quelque fois un
„ eſpace un milion de fois plus grand, que celui, qu' elles occupoient
„ auparavant dans le tems, qu' elles ètoient ſous la forme d' un corps
„ denſe. Cette sì grande contraction, & cette vaſte expanſion eſt
„ incomprehenſible dans toute autre hypotheſe, que celle d' une puiſ-
„ ſance rèpulſive, en ſuppoſant, comme on l' a fait, les particules
„ d' air à reſſort, & rameuſes, où roullèes comme des cerceaux ....“
Se ſi concepiſca nella ſpiga una dilatazione ſforzata de' vaſi del ſugo, non ſarà difficile il riconoſcervi lo ſquarciamento di eſſi. Perchè biſogna conſiderare, che queſti vaſi ſono compoſti di fibre circolari, e di molte laminette parallele. Se le ſcoſſe della *fermentazione* non ſeparaſſero queſte fibre, che ſecondo il diametro del *tubo*, o non faceſſero, che gonfiare le lamine, o tuniche, la cavità del *tubo* non ſi dilaterebbe, che ſecondo l' ordine naturale; ma elle dividono anche tali fibre per tangenti al vaſo, e per ſecanti al medeſimo in ogni verſo. Così elle prima le allargano, onde il diametro aumenta proporzionalmente all' allungamento, poſcia le fende, e le diſordina, e produce anche delle cavità. Che ſe la miſura del vaſo creſce nelle dilatazioni ordinarie, come i quadrati de' diametri, e l' allungamento delle fibre è al loro rigonfiamento laterale in circa, come la loro lunghezza alla loro denſità, cioè di molto più grande, come atteſtollo il SAUVAGES nella *Stat. des Anim. Remar. in exp.* 15., reſta però in queſta dilatazione ſforzata interrotto il proporzionale accreſcimento per la rottura delle fibre, che il vaſo, o tubo compongono.

[335] GIOVANNI BERNOULLI *Diſſ. Chim. Phyſ. de effervеſ., & fermenr.* ..... notò col BARTOLINO *Act. med. p. 2. Obſ. 70.*, che una

di *guazza*, o di altro, non viene però dalle *nebbie*, o *brine*, o altro, che le *ruggini* producono, come ho esperimentato [336]; ond' è, che tra le moltissime *ruggini*, che mi sono cadute sotto degli occhi, una sola ho ritrovato, la quale si accompagnava colla *filiggine*, e ciò forse per caso. Un calore straordinario, breve, e cocente porterà forse più di ogni altra cosa questa impressione malvagia (337) nella spighetta.

2. Dopo ciò si potrà facilmente spiegare, come le spighe della *filiggine* s' ingrossino prima dell' altre, e più presto squarcino il cannello, dov' erano chiuse, escano dal loro astuccio, e tutte si sollelevino

una misura di *Antimonio* con *Mercurio* sublimato ben misti, e strettamente compressi si riscaldano, fermentano, e metton fummo.

(336) Male però avvertì l' AMBROSINI *Phytologia, hoc est de plantis T. 1. p. 247*, se la *filiggine* intese, che *ob levem pluviam, vel rorem inustum Sole acri, cum exceptus in spicam ros, aut pluvia non decutitur, sed Solis superventu excalefacta putrescit*. Lo stesso aveva della *ruggine* lo SCALIGERO *Commen. & animad. in sex lib. de Caus. Plan. Theoph. l. 3. c. 30. Ratio, quia rubigo putrefactio quaedam est: cum exceptus in spicam ros, aut pluvia non decutitur, sed Solis superventu excalefactus putrescit*. Aggiugnendo: *simile de Cytinis supra quamobrem quatuor evenit rationibus, ut ne contingat rubigo. Prima est cum spica natat: non enim excipitur humor ..... Secunda cum vento decutitur. Tertia cum sequitur nox: resicatur enim priusquam Solis ferveat calore. Quarta cum multum eminet a foliis spica stipula porrecta: a spica namq. tum longe humor abest, qui in foliis detinetur; itaque non communicatur*. Le quali cose certamente non possono dir bene alla *filiggine*, se non altro per essere la spiga da questo morbo attaccata, quand' ella sta dentro a' suoi involucri, che da qualunque insulto esterno abbastanza la difendono. Con ragione però il Sig. DUHAMEL sostenne, che la *filiggine*, il *carbone*, il suo *rachitisme* non derivano dalla *nebbia*, o dalla *guazza*, ma piuttosto le *ruggini*.

(337) Conosciuto è bastevolmente, che il *calore* non solo diminuisce la gravità specifica de' fluidi, ma dirige anche l' elatere dell' aria ivi chiusa, perchè facilmente esca. Il primo, che ciò provasse, fu il PITCARNIO *Opuscula Medica*.

levino per l' ordinario alterate, e ſenza quaſi diſtinzion di reſte, e di grani, perchè il ſugo della pianticella sforza le pareti de' canaletti ſuoi nella tenerella ſpiga, e sì gli gonfia, e gli diſtende prima, e più dell' ordinario; nè tempo ha per lo più il granellino di ſviluppaſi, che il ſuo embrione ſconcertato ne rimane, e corrotto.

3. Che ſe la *filiggine* attacca per ſolito ſul medeſimo ceppo le ſpighe ſue tutte, gioverà il dire, che da queſta impreſſione reſtino percoſſe tutte quelle, che ſono, per dir così, di una compleſſione, o ſtruttura medeſima, o ſomigliante, che tanto mai non può eſſere quanto quella, che ſi trova fra le ſpighe di un medeſimo ceppo.

4. Sono le ſpighe della *filiggine* nelle parti loro pochiſſimo aderenti per la ſola legge generale della coeſione delle parti de' corpi, perchè ficcome queſta naſce da' moti coſpiranti delle medeſime parti, ond' eſſi corpi ſono più, o meno coerenti, ſecondocchè le loro parti ſono più, o meno puntualmente applicate l' una appo l' altra; cioè ſecondocchè elleno ſi toccano in più, o in meno punti, e che i loro moti coſpirano più, o meno, per cui naſcono le differenti ſpezie di coeſione, che rendono alcuni corpi ſegabili, altri frangibili, altri, che ſi riducono in polvere: così nelle ſpighe noſtre, molto deboli eſſendo i moti coſpiranti delle lor parti, accade una deboliſſima coeſione, per cui ſi ſciolgono agevolmente.

5. Nè mi parrebbe fuor di ragione il credere, che le tenerelle ſpighe del grano naſcoſte ne' loro

aſtuc-

aſtucci poteſſero alcuna volta ſortire dal naſcimento una ſtruttura di parti più, o meno reſiſtenti, per cui ſi rendeſſero più, o meno ſoggette all' eſterne, e alle interne impreſſioni. Quindi è, che non ſempre la *filiggine* ſi ſparge per tutta la ſpiga, e qualche volta ne ſono attaccati ſolo in parte alcuni granelli; e perchè le prime, che ricevono l' impreſſion de' ſughi, ſono le parti inferiori, perciò queſte verranno le prime ad eſſere infeſtate, ſe eſſe una meno conſiſtente ſtruttura avranno ſortita di quella dell' altre parti. Queſta interna impreſſione potrebbe eſſer agevolata da una qualità contumace di ſugo nutritivo, il quale s' inſinuaſſe in alcuni gambi per quelle radici a loro proprie, che ſole e' tocca.

6. Sembra, che la *ſpiga filiginoſa* tragga la ſua nerezza da' ſali volatili, de' quali ella abbonda, come ſi raccoglie dalla ſeparazione, che ne ho fatta. E' noto, che la nerezza de' corpi deriva generalmente o dalla *filiggine*, o dal *vitrivuolo*. Si è oſſervato, che alcuna coſa ſi fa nera per cagione di una *materia filigginoſa* procedente dal *zolfo* de' corpi aduſti, arſicci, e riarſi, cioè dall' *olio*, dalla *pinguedine*, e dalle parti *untuoſe*, ſiccome quelle, nelle quali hanno la ſede i principj dell' accendimento. Non favello del puro *zolfo*, che s' incontra nello *ſpirito di vino* ſpeſſo rettificato, ma di quello, che contiene particole terreſtri, e *ſal volatile*, quale ſi eſperimenta nel guſto della comune *filiggine*. Nè vogliaſi anche intendere il *zolfo* volgare, e uſuale, perchè quello o quaſi niente, o po-

o poco annerirà, ſe non ſe foſſe il corpo metallico, che riceveſſe nel formarſi la ſua eſalazione.

7. Dal riſtagno di certe gocce d' acqua, le quali ſi trovano ſopra la *ſpighetta filigginoſa*, quand' ella è chiuſa ne' ſuoi involucri, e ſono ſpremute da quella medeſima *ſpighetta* infievolita, e corrotta, è cagionata quella bianca pelluria, o lanuggine ſimile a ſpezie di *muffa*, della quale in molti luoghi è coperta.

8. Il vedere che la ſommità dello ſtelo, che dee portare la *ſpiga filigginoſa*, e più groſſa di quello, che alla natura ſua conviene, mi fa congetturare, ch' eſſa *ſpiga* contragga la *filiggine*, primacchè lo ſtelo medeſimo perfezioni, e acquiſti una intera conſiſtenza; perchè quand' eſſo è aſſodato, il ſugo nutritivo non potrebbe dilatare i canaletti ſuoi, e gonfiarli ſenza romperli. Si è veduto, che la ſommità dello ſtelo della biada matura per gradi, e affina l' umore, ch' entra nella ſpiga; e ſe eſſo è giunto alla ſua perfezione, la denſità delle ſue parti rende difficile, che il ſugo nutritivo una volta nel medeſimo ricevuto ſi travaſi, e ſi alteri. La diſpoſizione di queſto ſtelo, ch' è ritondo, e traforato, ſerve anche a renderlo più fermo, più ſolido, e più reſiſtente alle impreſſioni, ond' è ch' eſſo in tale ſtato dalla *filiggine* non viene attaccato giammai; il che non ſuccede alle più tenere pianticelle, come ſi è veduto nell' ACONITO UNIFOGLIO.

9. Nè ſi voglia credere già, come molti Autori credettero, e in particolare il Signor TULL,

che queſto diſordine provenga da una eccesſiva umidità della terra vaporoſa, o dell' aria, perchè dall' eſperienza chiaro appariſce, che ciò eſſere non poſſa giammai, quantunque abbondanza di ſugo ivi poſcia concorra. Il CRAMER [338] valente Profeſſore di Filoſofia, non meno che il BONNET (339) della *Società Reale di Londra* lo confermano, parendo a queſto ultimo coſa degna di attenzione l' oſſervarſi una tal malattìa egualmente nelle biade, che ſolo erano ſtate bagnate dall' acqua del Cielo, che in quelle, che lo erano ſtate e da eſs' acqua, e da quella degli adacquamenti. Se io più volte ho fatto adacquare alcune tenere pianticelle di grano abbondantiſſimamente, finchè giunte ſono alla lor perfezione, queſto umore ſovverchio non ha potuto mai alterarle.

10. Non ſarò perciò lontano dal convenire col ſentimento di un fu dottiſſimo uomo, e gran *Botanico* mio Amico, il quale tenne, che queſto morbo abbia la ſua origine nella mancanza di traſpirazione, ſe già per cagione di eſſa ne dovrà ſuccedere la ſuppoſta fermentazione. E potrebbe metterſi queſta per avventura fra quelle molte malattìe delle piante, che per avviſo del HALES [340] derivano dall' eſſere interrotta la loro traſpi-

[338] *Journal Helvetique, ou Recueil de Pieces fugitives de literature choiſie. Auril.* 1755.

(339) *Traitè de Monſieur Charles Bonnet de la Societè.... ſur l'uſage des feuilles.*

(340) HALES *Stat. des Veg. c.* 1. *exp.* 1.. „ Puiſque les Plantes, „ ou les arbres ont beſoin, pour ſe bien porter, d' une traſpiration a- „ bondante, il eſt probable, que pluſieurs de leurs maladies viennent „ de

ſpirazione. Il quale impedimento o dall' intemperie dell' aria potendo derivare, o dalla mancanza de' ſughi proprj, e convenienti alla pianticella, come queſto Filoſofo giudicò, improbabile non ſarà per tanto, che alcuna fiata coteſti malnati ſughi più agevolmente fermentino, per cui il morbo ſi generi.

11. Ora egli non ſi genera immediatamente, ma appoco appoco, e quindi la *filiggine* non è improvviſa, com' altri diſſe; e quando vogliaſi riflettere alla natura di queſta alterazione, ſi vedrà che non può eſſere altramente (341).

12. Non mi ha recato maraviglia il vedere qualche volta in terreni fertili, e pingui, eſtenderſi la *filiggine* a maggior numero di gambi, che in terreni magri, e ſterili; perchè ho ſtimato ſempre, che nel terreno fertile i gambi dipendenti da un medeſimo piede doveſſero eſſere in mag-

 gior

„ de ce, que cette traſpiration eſt quelque fois interrompue par l' „ intemperie de l' air. La traſpiration dans l' Homme eſt ſouvent „ arretèe, juſqu' à cauſer des accidens facheux, non ſeulement par „ l' intemperies de l' air, mais auſſi par l' intemperance, les gran- „ des chaleurs, & les grands froids: pour la traſpiration de la plan- „ te, il n' y a, que l' intemperie de l' air, qui puiſſe l' arrèter, à „ moins que le Sol, dans le quel eſt la Plante, manquant de ſucs „ propres, & convenables à cette Plante, ne lui fourniſſe pas aſſez de „ nourriture, & par là diminue ſa traſpiration. "

[341] ROBERTO BOYLE *Opera in compen. redac. ſtud. Richardi Boulton* ſoſtiene, che la corruzione, e l' alterazione non ſono così facili da ſpiegarſi, quando vi ſi voglia far concorrere natural cagione, che in un attimo le produca, già formato il corpo perfettamente. „ Piuttoſto," ſeguita egli, „ ſi può credere, che eſiſtano nel ſeme „ di molti corpi naturali certi immediati principj, i quali per ca- „ gione della grandezza, e della figura, e della tendenza al moto „ fieno autori del movimento delle forme, non menocchè dell' alte- „ razione di eſſi corpi. "

gior numero di quelli del terreno ſterile (342).

13. La *ſpiga filigginoſa* preſto va in fummo, e ſvaniſce, quando da' ſuoi involucri è uſcita fuori, perchè il Sole aſciugando quel marciume, e il moto dell' aria, e il vento, o altro diſunendolo dalla piccola conneſſione, in cui ſi trova, fa sì, che diſciolgaſi agevolmente, laſciandone il fuſto interamente ſpogliato. Il TANARA [343], ed altri pare, che attribuiſcano alla *ruggine* un tale effetto della *filiggine*, ſenza forſe aver veduto giammai, come io non ho veduto, ch' ella riduca a queſto ſcioglimento di *polvere filigginoſa* le ſpighe.

14. Non diverſa cagione della *filiggine* io credo, che aveſſero que' granellini, che portavano fra pelle pelle quella materia nera, che vi trovai nel 1754. Speſſe volte ſi oſſerva, che una medeſima cagione non produce un effetto medeſimo in diverſe piante, benchè elle ſieno della medeſima ſpezie, perchè ſi trovano per qualche accidente diverſamente diſpoſte. Si fece per avventura lo ſtrappamento delle fibre tenerelle in quella parte ſola, dove ne venne il corrompimento, laſciando intatto il reſtante di fibre forti, e conſiſtenti fornito.

15. Ma di quel frumento morboſo, che trovai nel-

(342) E ſe l'aſtuto *Servo Plautino* favella di un campo, che negli anni più fertili rendeva tre volte meno del ſeminato; quantoppiù meno avrà egli voluto far credere, che doveſſe rendere poi il medeſimo campo negli anni ſterili? e ben riſpoſe il prudente *Vecchio*, che niuno ſi ſarebbe curato di poſſederlo, ſe non quando vi ſi foſſero potuti ſeminare i mali coſtumi.

(343) TANARA *Econ. del Cit. l. 6.* car. 440. „Queſto nocumento, „ che

nella Villa di *Campiano*, biſognerà dire, che i piccoli granellini foſſero bensì formati, ma non indurite le fibre loro, quando ſi fece l'impetuoſo ſcorrimento dell' umor nutritivo, talchè ſenza ſtrapparſi poteſſero le medeſime eſſere ſviluppate ſempreppiù, e rigonfie, e diſteſe per fino di giugnere a grandezza sì ſmiſurata. Quivi tal umore ſtagnando, accadde, che la ſoſtanza del granello divenne così dura, e così bianca; e ſolo di eſſo anneriſſi la pellicola, perchè ſolo le fibre più eſteriori ſi ruppero, e alcun poco di umore ne fecero uſcire dalle ferite, che imputridì, e a ſe traſſe la maggior parte de' *ſali volatili*, che nel grano ſi chiudevano. Nè io mi avventuro al giuoco dell' indovinare, poichè mi appoggio a oſſervazioni diligentiſſime, e replicatiſſime. Seminati eſſi grani non nacquero mai, perchè i germi ſi erano in quel riſtagno alterati, e perduta avevano la loro virtù prolifica; ſiccome la perderanno que' grani, che i Franzeſi chiamano *Ergot*, o ſia *grano ſperone* [344].

16. Se

„ che viene alle biade, ſi genera o da umidità di terreno vaporo-
„ ſo, o da nebbie, o da piogge, a' quali ſuſſegua il Sole, perocchè
„ eſſendo queſta umidità, avanticchè da ſe ſteſſa cada, o da venti
„ ſia aſciutta, dal Sole ſeccata ſopra le ſpighe, cagiona, che, fatta
„ viſcoſa, vi ſi attacchi, e ſi converta in materia maligna, qual ſi
„ avanza fino a ridurre in fumo le dette ſpighe. " Il CHABREO, *Stir. Ic., & ſciagr. p.* 175. *Naſcitur uſtilago Aprili, & Majo menſibus: cum Coeli tempeſtas crebro inconſtans, & alias nimboſa, alias ſerena fervens fuerit: tunc enim ſpicae humore madidae a Solis fervore corrumpuntur, ac quodam modo, ut ajunt, aduruntur.*

[344] Il Signor di FONTENELLE, *Hiſt. de l' Ac. Roy. des Scien.* 1710. *p.* 62. ne ſpiega per bocca del Dottor FAGON, primo Medico del

RE

16. Se dopo tutto quello, che della cagion della *filiggine* si è detto, vogliamo bene ponderare i pensamenti, che d' intorno alla medesima ci hanno lasciati gli Autori di *Botanica*, non meno conosceremo, che questo male non è nuovo, di quellocchè in vano se ne sia cercata da essi la cagione.

CAPITOLO III.

Cagione del *grano carbone*.

1. NOn molto diversa da quella, che ci reca la *filiggine*, potrebbe altri credere, che fosse la cagione del *grano carbone*, quantunque diversi ne

RE LUIGI XIV., la generazione circa in questi termini: „ Vi „ sono delle nebbie, che guastano i frumenti, e dalle quali la mag- „ gior parte delle spighe di segala si difendono per mezzo delle lor „ barbe. In quelle, che questa umidità maligna può penetrare, e „ penetra, ella imputridisce la pelle, che cuopre il grano, l'inneri- „ sce, ed altera la sostanza del grano medesimo. Il sugo, che vi „ si porta, non trovandosi più rinserrato dalla pelle ne' termini or- „ dinarj, è in maggiore abbondanza, e ammassandosi irregolarmen- „ te, forma una spezie di mostro, ch' è nocevole alla salute delle „ persone, perchè è composto di un miscuglio di questo sugo super- „ fluo con una umidità viziosa. " Anche l' HANOVIO *Rar. phis.*, *&c.* fa nascere questo male dalle *rugiade*, o *nebbie*; e il LANGIO nel Cap. 7. della sua Descrizione *Morb. ex esu clau. secal. cum pane*, l' attribuisce all' eccedente umidità dell' *aria*. Ma il Signor TILLET *Diss. sur. la Cau. qui cor.* ..... stima, che la *nebbia* non ne possa essere assolutamente la cagione, siccome non lo sia l'umidità de' luoghi, ne' quali si ritrova la *segala*. Nè vorrà egli persuadersi, che il seme trasudi un sugo simile alla rugiada, e sì una tale malattìa produca, come si è persuaso G. F. MOELLERO nelle nominate congetture *de Causis*, *&c.* giacchè egli ha sostenuto, che questo grano diventi così mostruoso per essere forato da un' *Insetto*; onde il sugo traendosi in maggior copia verso la parte, dove si ritrova la pelle,

ne ſieno gli effetti; o che nella pianticella del grano ſuccedeſſe, come appunto ſuol talora ſuccedere in varie piante non ſolo *cereali*, ma di altro genere pur anche (345), nelle quali la varietà è accidentale, e conſiſte in un grado diverſo dell' altro, che poi in ſoſtanza è il diſordine medeſimo. Io tuttavia diſtinguo la *filiggine* dal *grano carbone* [346]: e per modo la diſtinguo, che diverſe cagioni a loro attribuiſco. Ecco per tanto gli ſchietti miei ſentimenti, ſenza nè punto, nè poco obbligarmi nemmeno a queſti difendere, ſebbene io li creda ſopra l' eſperienze deſcritte nella PARTE SECONDA di queſto TRATTATO, provate, e riprovate molte, e molte altre volte, abbaſtanza fondati. Queſto male giugne appoco appoco al ſuo ultimo grado, e

vi

pelle forata, dia al medeſimo grano la figura cornuta. Egli ha in oltre penſato, che l' *Inſetto* laſci nel grano punto un liquor ſottile, e velenoſo, il quale fermenti nella *materia farinoſa*, e la corrompa. Ma della forza di queſto liquor ſottile in tali fermentazioni pochiſſimo caſo fece il Signor di REAUMUR, parlando della formazion delle *Galle* nella ſua *Storia degl' Inſetti*.

[345] Una ſimile diformità oſſervai nell' anno 1753. ne' ſemi di quella pianta, che da DIOSCORIDE *l.* 2. *c.* 173., e da TEOFRASTO *Hiſt. Pl.* 7. è detta τραγοπώγων, e da CORDO, *Not. in Dioſcor.*, *Barba hirci*, le cui radici coltivate negli *orti* ſono da molti guſtate ſaporitiſſimamente. Nella *Epiſtola* 20. del libro *Garmanni*, & *aliorum V. C. Epiſtolarum centuriae*, ſi adduce la cagione della diformità del *Chryſanthemo* moſtruoſo, e di altre piante moſtruoſe, e ſi fa conſiſtere parte nell' eccesſo della materia, e del ſugo nutritivo fermentante all' indebita dilatazione, e diſuguale delle parti della pianta, parte nelle percoſſe de' *Cultori*, parte nell' umidità del Cielo, e parte nel caſo.

[346] Come queſte malattìe ha diſtinte il DUHAMEL nella ſua Opera *Suite des experiences*..... ſtampata nel 1752. co' nomi di *nielle proprement dite*, e di *boſſe*, o di *charbon*, e come il TILLET nella ſua Diſſertazione con quelli di *bleds charbonnès*, e di *bleds cariès*.

vi giugne talor anche nella ſpiga, che ſia eſpoſta all' aria, ſenzacchè alcuna cagion eſteriore immediatamente lo produca. Perchè a me ſembra di poter dire, che il *grano carbone* tragga naſcimento da un difetto organico [347], che conſiſta in certa teſſitura meno perfetta, e naturalmente debole delle fibre di alcuni germi del ſeme medeſimo (348). Egli è facile, che un lavoro così debole foſſe in alcuni grani del *frumento* ne' tempi anche più remoti, ma che ora non venga fortificato, come fortificato veniva per avventura in eſſi, e come pur lo viene in alcuni anni di preſente da buona, e proporzionata coſtituzione di aere (349), o da buono, e regolato vento, o da altro eſteriore ajuto, che può afforzarlo, e sì un regolato ſcorri-

[347] E certamente il difetto organico, ſiccome coſtituiſce differente maniera di nutrimento, così egli deve eſſere una ſorgente di varietà ne' ſuoi effetti.

[348] E quindi il *grano carbone* potrebbe dirſi un *morbo ſontico* del grano, ſiccome quello, che naſce colla pianticella medeſima, e vi reſta continuamente. Il VENULEIO ſpiegò l' origine di queſto nome, allorche ſcriſſe *l. ult. ff. de Aedil. Edict.: Quoties morbus ſonticus nominatur, eum ſignificari, Caſſius ait, qui noceat. Nocere autem intelligi, qui perpetuus eſt, non qui tempore finiatur. Sed morbum ſonticum eum videri, qui inciderit in hominem, poſtquam is natus ſit. Sontes enim nocentes dicuntur.* Ne parlò FESTO l. 9., e abbiamo in JAVOLEN. *l.* 113. *ff. verb. ſignific.: morbus ſonticus eſt, qui cuique rei nocet.* E però ULPIANO l. 2. §. 3. delle XII. Tavole, conforme ſi riferiſce da HENNINGIO SUCCOVIO nel *Plauto filologocritico, hoc eſt Critico-philologica ſatyra in trinummum M. Acci Plauti comicorum Principis*, ſtabilì: *Si Judex, vel litigator morbo ſontico impediatur dies judicii diffiſus eſto.* Dove altri leggono: *Si Judex, vel alteruter ex litigatoribus morbo ſontico impediatur, jubet diem judicii eſſe diffiſum.*

(349) E per verità l' ordine antico delle ſtagioni pare, che vada pervertendoſi. Qui in Italia è voce, e querela comune, che i mez-

rimento dell' umor nutritivo in lor produrre, che il frutto alla perfezione conduca. Il riconoſcere evidentemente, che da ſeme di qualità medeſima ſi generi *ottimo grano* all' ambiente regolato, e *grano carbone* all'aria libera, mi conferma in queſto ſentimento [350].

2. Tali germi dunque di ſtruttura debole, e meno perfetta non aſſodati da verun ajuto eſterno poſſono talvolta non ſolo il *grano carbone* generare, ma quelle pianticelle del grano anche, le quali mettano le loro ſpighe con alcuni granellini di ſtruttura ſimilmente debole, e difettoſa, ſecondo le diſpoſizioni, che in loro ſi trovano. Che ſe per l' eſperienze del Signor DE LA HIRE

mezzi tempi non vi ſono più, e in queſto ſmarrimento di confini, non v' è dubbio, che il freddo acquiſta terreno, e la ſeminagion ne pate. Che così non foſſe, anticamente lo troviamo eſpreſſo ben chiaro in DIONIGI ALICARNASSEO l. 1. quando nelle lodi d' *Italia* ſi dichiara, che „ la più bella d' ogni coſa è la temperie dell'aria pro- „ porzionata a' tempi, acciocchè nè con troppo freddo, nè con caldi „ intenſi il creſcere delle biade, e degli animali offenda, talchè non „ è punto da maravigliarſi, gli antichi aver creduto queſta Terra a „ Saturno eſſere ſacra. " Si potrebbe tuttavia con alcuni ſoſpettare, che qui forſe lo Storico non limitaſſe al puro vero le ſue lodi; ma comunque ciò ſia, non dovrà crederſi giammai, che tanto vantaggioſamente aveſſe voluto in una Storia DIONIGI ſcrivere dell' *Italia*, quando di lei almeno molto di vero non foſſe ſtato.

[350] Altri forſe congetturerebbe, che queſta teſſitura meno perfetta, e naturalmente debole foſſe piuttoſto ne' nodi del gambo, e che per eſſi nodi mal teſſuti filtrandoſi l' umor nutritivo, queſti lo viziaſſero, e così viziato giugneſſe a' granellini, dove ne' piccoliſſimi condotti mettendo capo, gli ſforzaſſe diſordinatamente a dilatarſi, e ad eſtenderſi, onde le più tenerelle fibre, all' urto irregolare non reſiſtendo, finalmente ſi ſtrappaſſero, l' umor ne uſciſſe, e la corruzione interiore ſi produceſſe. Al che veramente parmi, che alcuna coſa ſi opporrebbe, la quale qualche forza potrebbe avere.

(351), e di altri molti, le quali non ho lasciato di verificare, il sugo nutritivo delle piante si può innalzar solamente per via di mecanismo, che si ritrova nelle fibre cave di esse piante, e degli alberi tutti; e quindi, se questo mecanismo è sconcertato dall' intemperie dell' aria, o da altro in qualche parte della pianta, il sugo si disvj, e in quel luogo venga malattìa: quanto più agevolmente nella pianticella del grano verrà sconcertato il mecanismo del piccolissimo granellino, se già per origine, e per natura sua era debolmente tessuto, e mal organizzato? Sarà dunque uopo il dire, che si faccia in esso un tale sconcerto; e siccome que' granellini, benchè derivino dal medesimo germe, non tutti però sempre sono di fibre egualmente costrutti, o se tutti pur lo furono, alcuni possono aver avuto una tale disposizione migliore in esse fibre, per cui sieno state da qualche esteriore ajuto fortificate; così avverrà, che nelle spighe medesime si trovino grani preservati, e grani morbosi.

3. Quella deviazion di umore per tanto determina i sifoncini capillari del *grano carbone* a tirarne più abbondantemente, che gli altri facciano, ivi ritrovando minor resistenza; ond' è che il granello deforme si faccia notabilmente più grosso, e giunga alla sua grandezza, primacchè vi giunga il sano, ma non prima di quello si maturi, e si secchi: anzi per l' ordinario più tardi si maturi, perciocchè, siccome è noto, l' abbondanza del sugo, e però dell' umido, aumenta l' accrescimento del-

(351) *Mem. de l' Ac. des Sc. an.* 1693.

delle piante, ma ne ritarda la loro maturazione (352).

4. Il modo però, col quale venga queſto ſugo nutritivo a diſviarſi dagl' interni condotti del quaſi allora inſenſibile granellino, ſi paleſerà, ſe ſi concepiſca, che l' aria inchiuſa nelle fibre di eſſo granellino [353] ſoverchiamente deboli, e mal teſſute per origine, trovandoſi a cagione del-

[352] Queſt' abbondanza di umore nel grano carbone non accordavaſi certo col ſentimento di un *Filoſofo* defunto, mio buon Amico, il quale era di avviſo, che queſto morbo derivi da mancanza di umore nella pianticella, per cui i *vermini* trovando nelle ſue radici di che paſcerſi opportunamente, s' inſinuino in eſſe, e ne vizino il mecaniſmo. Quando l' alimento ſia ſottratto al grano in erba, non ho veduto mai, che queſta pianticella venga tocca da *vermine* alcuno, o ſe pur n' era tocca, che per ciò ella *grano carbone* produceſſe. So, che l' HALES *Stat. des Veg. Append. Obſer. V.* aſſeriſce di aver oſſervato „ alcuni rami di un Pero, i quali tiravano così potente„ mente il ſugo, che affamavano, e facevano morire i rami vicini; " talchè ſoſpetò poi, che „ ſi doveſſe qualche volta at„ tribuire alla medeſima cagione la morte de' rami, che anneriſco„ no, perchè ciò ſuccede ſpeſſo per un difetto particolare nella ra„ dice, che ſerviva a queſto branco, ed anche per la cattiva qua„ lità dell' aria, che può far perire i rami già indeboliti da una, „ o altra di queſte cagioni interne." Dice in oltre: „ L' eſperien„ za c' inſegna, che gli alberi piantati in un cattivo fondo, o in „ un terreno a loro non conveniente, ſono ſoggetti ad eſſere anneb„ biati, ch' è un' altra ragione per attribuire la cagione di queſta „ malattìa a difetto di nutrimento. " Io convengo coll' *Ingleſe*, che ciò poſſa ſuccedere negli alberi; ma da ciò non inferiſco, che ſuccedere anche debba nell' erbe, e ne' gambi del grano, trovandoſi in tutt' i gambi del *carbone* un ſucciamento conſiderabiliſſimo, per cui eccеſſo, e non difetto di nutrimento in tutti loro ſi manifeſta.

[353] Le *veſcichette*, o *trachee dell' aria* di media grandezza guardate col microſcopio dall' HALES *Stat. des Veg. c.* 1. *ex.* 89. nelle più tenere piante ſi giudicano una centeſima parte d' un pollice di diametro, e di figura piuttoſto *cubica*, che *ſferica*. Supponendoli cubi perfetti, egli fa vedere, che la ſomma delle ſuperficie in un pol-

la intemperie liberata dalla preſſione dell' eſterno aere, ſi ſpanda con molta forza, e laceri in eſſo que' vaſi medeſimi, che ſono deſtinati a portargli il nutrimento, onde la diſtribuzion diſuguale del ſugo nella pianticella ne venga, e la detta corruzione nel granello medeſimo. L' abbondanza di queſto ſugo, e il ſuo difetto ſembra, che poſſa accadere, come ſi è detto, per la diverſità delle ſtagioni, ma la diſtribuzion diſuguale del medeſimo nelle piante non dee ſuccedere, che per colpa organica. Lo confermano i molti ſperimenti, che io ebbi, onde provare la ſtraordinaria forza, che per tale deviazione di umore toſto pigliava l' attrazione de' vaſi del ſugo. Ma l' eſperienza, a cui ſono quegli appoggiati, fatta dall' HALES (354) a diverſi branchi di una pianta, induſſe queſto Autore a dimoſtrar per conſeguenza, che la forza dell' attrazione del ſugo non venga ſolamente dalla radice; ma ch' ella deve anche venire da qualche altra potenza inerente a' branchi, ſe già alcuno di

pollice *cubico* di queſte *veſcichette* ſarà di 600. pollici quadrati; perchè, ſe ſi divida un pollice *cubico* in 100. parti, le quali per cagione della loro piccoliſſima denſità ſaranno riguardate come piani, o come due ſuperficie unite inſieme, vi ſaranno 100. di queſti piani, o 200. ſuperficie in ciaſcuna dimenſione del *cubo*, cioè 600. pollici quadrati, poichè il *cubo*, com' è noto, ha tre dimenſioni. Moltiplicando queſti 600. pollici per la ſomma di tutte le *veſcichette*, cioè per 100., noi avremo 60000. pollici *quadrati* per la ſuperficie delle *veſcichette*, da cui però biſogna ſottrarre un terzo, perchè tra ciaſcuna di eſſe vi dev' eſſere una comunicazione libera per laſciar paſſare l' aria, il che diſtrugge due lati del *cubo* ſuppoſto. Reſta dunque in tutto 40000. pollici quadrati per la ſuperficie intera di tutte le *veſcichette* dell' aria. Grandiſſima eſtenſione veramente, e che fa vedere quanto di luogo tenga l' aria in una pianta.

[354] HALES *Stat. des Veg. c. 3. ex.* 37.

di essi sentiva talvolta più facilmente le variazioni del caldo, e del freddo, della ficità, e della umidità, che gli altri facessero. Io anzi penserò di aver quivi un argomento, onde stabilir maggiormente, che ogni gambo piglia l' alimento dalle proprie sue radici, le quali come diverse fra loro, così di effetto diverso possono essere cagione.

5. Con tutto ciò io non saprei ben dire, se la cosa del *grano carbone* stia, in generale almeno, così infallibilmente, perchè forse io non ci vedo abbastanza per rendermela sensibile. Un animo nulladimeno preso dall' amore del vero, senza rifinir di ricercare giammai, non crederà di perdere il tempo, quantunque non possa giugnere a render le sue congetture sensibili, purchè possa trovare qualche idea chiara, e distinta, alla quale egli non debba negare il suo consentimento senza ripugnanza. Il che pare a me di aver sentito nel segreto della mia coscienza, qualora ho considerato nel seme medesimo un difetto organico, da cui il disordine provenga.

6. Ma potrebbe chiedere alcuno, d' onde tragga origine questo difetto stesso del grano, e quella mal tessuta fibra del germe suo, ed io ben nol saprei. Molti vogliono suppore, che dal grano intempestivo ciò derivi; ma io ne ho fatta la prova, ne ho seminato del non maturo, e non ho veduto mai per esso generarsi malattìa. Altri pensano, che il fimo de' cavalli delle straniere genti sparso pe' campi d' *Italia*, e specialmente di *Lombardìa* recasse al grano una condizio-

zione così pernicioſa, e ne rimaneſſe contaminato; e che queſti grani contaminati, e infetti ſparſi poi, e propagati in tutta l' *Italia*, abbiano prodotto, che il morbo divenga generale, avanzandoſi in quelle parti medeſime, dove indizio alcuno non era di eſſo. Qui noi ſappiamo veramente, ch' egli ci è venuto dalla *Germania*, e che prima d' ogn' altra parte ne ſoffrì la *Lombardìa*, ch' è a quella più vicina; ma che il fimo de' cavalli di quella nazione lo abbia cagionato, io non ſo concepirlo, e vi trovo inſuperabili difficoltà. Egli è per altro molto credibile, che qualche eſterno agente poſſa alcuna volta il granellino in sì fatta maniera rendere affetto, che debole rimanga, e mal teſſuto (355). Nè io intenderei per tuttocciò di eſcludere, che il difetto talor anche dipendeſſe, per così dire, dalla ſchiatta del ſeme, come dalle narrate oſſervazioni ſembra, che ſi poſſa raccorre. Quello, che ſuccede nel regno, e nella economia animale, pare altresì, che poſſa autorizzare queſto ſentimento. V' hanno imperfezioni, che ſono originarie, e che attaccano un ſeme, e non l' altro, un parto, e non l' altro, perchè

355. Dove potrà convenirſi in qualche maniera col Signor TILLET, dicendo, che queſto difetto organico ſpeſſo derivi dalla pravità di alcune particole della polvere del *carbone* ſparſe ſopra la ſcorza del grano, che lo penetra intimamente, o dal veleno della polvere medeſima inſinuato per le radici. Nè io ſaprei diſdirlo, dopo le prove, ch' egli ci ha date della malignità contagioſa di queſte polveri, e dopo le precauzioni, ch' egli ha preſe per aſſicurarſene. Non può negarſi, che una tal polvere ſi attacchi a que' grani, ch' ella tocca, e che anche penetrar gli poſſa agevolmente.

chè una disposizione è nell' uno, che non si trova nell' altro (356).

7. Ma forse alcuno vorrà chiedere come mai un granello di *frumento* male organizzato debba produrre de' gambi, delle foglie, e delle spighe senza difetto alcuno, mentrecchè produce grani difettosi, i quali portano il morbo prim' anche di essere interamente formati? Se già un tale difetto organico si dicesse ne' nodi del grano in erba, com' altri vorrebbe, io dubiterei, che la difficoltà restasse sempre la medesima. Chi poi rispondesse, che la malattìa del *carbone* è propria del seme, e non di altra parte della pianticella, risponderebbe per quanto vede, ma non per quanto basta; e chi volesse in oltre soggiugnere, che se da principio crescano i gambi, e le foglie, quando le pianticelle sono nel minor sugo, essi hanno tempo di fortificarsi appoco appoco, e sì di resistere poscia alle scosse del maggior sugo; e se talora non vi resistano interamente, ben se ne vede qualche segno esteriore sopra essi gambi medesimi, e sopra esse foglie; laddove trasmettendosi copiosamente il sugo all' embrione nascente, e racchiuso nella spiga, quando è anche tenero, e sottopo-

[356] Il Signor TILLET, il quale nella sua bella Dissertazione scrisse, che „ la cagione ordinaria, e la sorgente abbondante delle „ biade corrotte risiede nella polvere delle biade corrotte; che il „ grano già sano, il quale sia stato annerito da questa polvere ri„ceve mediante una contagione rapida, e una comunicazione inti„missima il veleno, ch' ella racchiude; che lo trasmette a' grani, „ di cui è l' origine; che questi grani una volta infettati si conver„tono in polvere nera, e divengono per altri una cagione di cor„ru-

topoſto alla minor impreſſione, contrae il diſordine delle ſue parti, per cui l' infermità ne deriva: chi voleſse cio, dico, ſoggiugnere, direbbe forſe quanto baſta, ma non quanto vede [357].

8. Le opinioni degli autori, che di queſto fenomeno hanno trattato, ſono fra loro diſcordi (358). E certo che non ſi può concedere al Wol-

„ ruzione; che le paglie medeſime, le quali hanno portato delle „ ſpighe cariate, hanno qualche coſa di peſtilenziale pel grano, che „ loro ſi avvicina, e che germina ſopra di eſſe, " il Sig. TILLET, dico, non approverà forſe queſta mia dichiarazione. Ma che ho io a dire per mia fe? A me certo non è riuſcito in queſto *Territorio Ravennate* di aver teſtimonianze, onde ſenza ſoſpetto, e ſenza rimordimento poteſſi ammettere come generale il ſuo ſiſtema. E mi ſi permetta una tale libertà ingenua per amore del vero, avendo ſempre alta ſtima verſo il ſaggio, e diligente Autore di un' Opera, la quale, pel giudizio, che ne danno i dotti di *Trevoux*, ſi dee riputar la migliore, e la più metodica, che in queſto genere ſia uſcita alle ſtampe, e che certamente dev' eſſere molto ſingolare, e ragguardevole, ſe ha meritato gli applauſi, e il premio di un' Accademia sì celebre, com'è quella di *Bordeaux*. Le mie oſſervazioni, ed eſperienze porteranno a far decidere, che alcuna volta almeno il grano carbone naſca indipendentemente dalla via contagioſa della polvere, ſe già per eſſe è giuſtificato abbaſtanza, che aſſicurati alcuni ſemi da ogni ſoſpetto, pur è nato *grano carbone*. Il fatto del *Lavoratore*, che ha meſſo un' attenzione ſcrupoloſiſſima alla ſcelta della ſua ſemenza, e non ha avuto mai biada guaſta, riportato dal medeſimo, prova la fortuna, ch' egli ebbe di ſceglier bene la prima volta, onde il grano o non fu tocco dalla polvere, o non fu accompagnato da' grani originalmente difettoſi. Ma con tutto queſto io mi rimetto alla dottrina, eſperienza, e autorità di coteſto bravo Filoſofo.

(357) A una ſimile oppoſizione riſponde il noſtro Signor TILLET car. 148. indirettamente, col dare qualche maniera di prova dell' eſiſtenza del veleno delle ſue polveri nella pianticella, benchè l' effetto ſi vegga ſolo nel grano, adducendo gli eſempj, che ne ſommiſtra il *regno animale*.

[358] Niuno però di queſti ſiſtemi, da me prima non ſaputi, io aveva in mente, quando intrapreſi le mie oſſervazioni per rintracciare quello della natura, talchè eſſi non mi potevano eſſere tante nubi,

Wolfio [359] la moſtruoſità de' granelli del *carbone*, perchè conſervano la loro forma dopo un' intera corruzione. Nè favoriſce la ſua opinione il mettere in veduta, che queſti granelli vengano generati per l'impedita circolazione della pianticella (360), onde il ſugo, ſtagnando in eſſi, venga a cor-

T t

nubi, che mi naſcondeſſero la verità, come del Signor Tillet ſcriſſe grazioſamente il *Giornaliſta di Trevoux ſep.* 1755. *ar.* 96. „ c'e„ toint autant de nuages, qui ſembloient ſe ſucceder pour lui ca„ cher la veritè, qu' il cherchoit. " Ebbi in mira bensì a ogni paſſo le difficoltà, che potevano naſcere, e vedendone la forza, non mi fu difficile con altre eſperienze, ed oſſervazioni aprirmi la ſtrada, e ſul fondamento di queſte, e d' altre molte piantare il mio ſiſtema. Alcune di eſſe opinioni rigetta il prelodato Signor Tillet con loro opporre ſette ſue oſſervazioni.

[359] Wolfio *Vera cauſa multiplicationis frumenti admirandae, omnem Plantarum vegetationem una illuſtrans cap.* 4. Riflette il ſempre lodato Signor Tillet car. 37. che il Wolfio vuol dilatare al frumento i ſuoi moſtri tricorporei, *monſtra tricorporea*, oſſervati da lui nel ſolo orzo, e nell' avena; ma io veramente in queſto *territorio* non ho veduto giammai neppur fra l' *orzo*, e fra l' *avena* un tale *moſtro tricorporeo*, non che *grano carbone*, quantunque v' abbia ſpeſſo veduta la *filiggine*, nella quale i grani, come ſi è veduto, non ſono ordinariamente raffigurati per eſſi, e molto meno riconoſciuti per moſtruoſi, o ripieni di polvere. Ben altrove il medeſimo Signor Tillet car. 132. ſi dichiara contro il ſentimento del Signor Duhamel *Suite des exper. p.* 114. aſſerendo, che l' *orzo*, e l' *avena* non ſono ſoggetti, altrocchè alla *filiggine*.

(360) L' Hales preteſe per molte eſperienze aver provato, che nelle piante non ſia circolazione veruna del ſugo nutritivo, e in queſto avviſo andò il Bazin, che non riconobbe nelle medeſime, fuorchè un ſemplice moto progreſſivo di queſto liquido. Contuttociò il Perrault, e il Mariotte hanno ſoſtenuto, e provato, che vi circola, e l' Hartsoeker ha creduto, che queſta circolazione ſi faccia con un vero moto periſtaltico, cagionato da un *agente*, che vi riſiede. Quindi è, che il Signor de la Baisse, dotto Fiſico *Franzeſe*, ha ſcritto, che il ſugo circola nelle piante, come il ſangue circola negli animali, e ſi è immaginato di veder una comunicazione tra il ſugo aſcendente, e il ſugo diſcendente. Ma in qual maniera ſi

faccia

a corromperſi. Troppo chiaramente vi ſi è riconoſciuto l' abbondanza del ſugo per dedurne una molta attrazione, anzicchè una impedita circolazione. Credo, che pur abbia preſo abbaglio, e che fugga via molto lontano dal vero il Signor TULL [361] in accuſarne l' umidità non del grano medeſimo, ma della terra, dove il grano germoglia [362]. Ho detto altrove, che feci ſeminare del grano nel baſſo terreno di una grande buca, la quale per lo meno era nell' Inverno bagna-

faccia queſta comunicazione, è ciò veramente, dove trovaſi la difficoltà maggiore. Pure non è da dubitare, che ſia nelle piante un ſugo, che s' innalzi dalla radice nello ſtelo per le ſue fibre interiori, e un ſugo, che diſcenda dalla ſommità dello ſtelo verſo le radici per le fibre più eſteriori. Il Signor CARLO BONNET nel ſuo trattato *ſur l' uſage des Feuilles* ſoſpetta, che queſta comunicazione ſi operi principalmente nelle ultime ramificazioni delle foglie, e de' fiori, e che le eſtremità più libere de' vaſi del legno negli alberi ſi uniſcano al luogo deſtinato dalla natura con le eſtremità più ſciolte, e libere, e ſottili de' vaſi della ſcorza. Siccome la radice tira il ſugo dallo ſtelo, e lo ſtelo lo tira dalle radici; così dal commerzio mutuo tra la ſoggetta pianta, e l' *Ineſto*, riſulta comunicazione reciproca delle loro buone, e delle loro cattive qualità, che ſi allegano in prova della circolazione. Alcuni Fiſici hanno penſato, che i liquori aſcendano ne' canali delle piante colla medeſima forza, che aſcendono ne' tubi capillari; ma queſta congettura è diſtrutta da una eſperienza di eſso BONNET, per la quale egli conclude, che il ſugo s' innalzi nelle piante con moto in circa ſimile al moto periſtaltico degl' inteſtini, come già credette l' HARTSOEKER, eſsendo, dic' egli, le fibre legnoſe in eſse loro quello ſteſso, che ſono le fibre oſsee negli animali; perchè avendo queſto ingegnoſo Autore infuſo il piccivolo di alcune foglie nel vino roſſo, e nell' acqua di carminio, ha oſservato in faccia al lume del giorno delle righe brune, che ſeguitavano i principali andamenti de' nervi, e moſtravano il paſsaggio del liquore per diverſi luoghi.

(361) *Traitè de la cult. des Terres par Monſieur Dubamel p.* 227.

(362) Le piogge abbondanti del meſe di Marzo ſi credono in molti luoghi della Lombardia cagione del *grano carbone*, e perciò fu queſto, come ſi è detto, da' Piacentini nominato *marzetto*.

gnata, se non ripiena dalle acque, e dove perciò l'umidità non metteva posa; e pure io non vi trovai *grano carbone*. Senzacchè, non ci ha egli di questo grano anche sopra le montagne? Il sistema poi del Signor BONNET, che questa corruzione attribuisce *à des rosées froides, que les premiers rayons du Soleil metent en action* (363), mi sembra, che tener non si debba coerente alla ragione, quando si sappia, che questa malattia comincia ordinariamente, qualora la spighetta si sta racchiusa ne' suoi involucri, che la difendono da ogni esterno insulto, e che non si produce mai, quando il granello è giunto alla sua maturità. Ma tutti questi scrittori per avventura, non menocchè l'Autore dello *Spettacolo della Natura* [364], ed altri delle tre fin' ora spiegate malattie ne fecero una sola, e a tutte la medesima cagione attribuirono, che a una sola forse poteva al più convenire.

9. Sembra, che pigliasse errore anche il VALLISNIERI nostro, il quale sospettò nel suo *Trattato degli sviluppi, e del costume ammirabile di molti Insetti*, che questo morbo, da lui pure confuso colla *ruggine*, derivasse da piccolissimi *vermicciuoluzzi*, ch' egli vide avvolticchiati dentro a una materia gialligna, la quale stava sopra la grana del difformato frumento infra la tunica, e il grano medesimo: *Quantunque sieno probabili*, diss' egli, *le cagioni*

[363] *Mem. de Math., & de Phys. Tom.* 1. 1750. *pag.* 431. *Mem. sur la veg. des Plant. par. Monsieur* BONNET.

(364) *Le Spect. de la Nat. T.* 4. *Entret.* 4.

ni apportate della ruggine, ho nulladimeno osservato nelle grane, che chiamano annebbiate, o incarbongiate, col microscopio quantità di minutissimi vermicelli delle biade, e della grana occulti divoratori. Convengo, che talor si veggano dessi *vermicelli* sul difformato frumento tra la materia giallognola, ma dico poi anche per cosa esperimentata, e vera, che quest' *Insetti* non hanno, che fare nè punto, nè poco co' *vermicelli rugginosi* da me descritti, e colla *ruggine*, e col *grano carbone*, essendo di una razza differentissima da quelli, e possono essi con insolita secondazione popolare tutte le spighe, senzacchè sieno cagione, che direttamente per loro pure un grano muoja, e si alteri. Di questi ho detto, quanto ho saputo, laddove io favellai dell' *infestamento degl' Insetti*. In oltre egli è certo, che tali *verminetti* alla vista altrui si presentano dopo molti, e molti giorni, che i granellini del *frumento* sono apparsi di nera materia ripieni, e tali erano, benchè strettamente racchiusi nel loro fodero, e però inaccessibili agl' *Insetti*. Che se il decantato nutrimento trovassero essi ne' sughi di tai granellini, dovrebbero pure lasciarvi impresse dell' orme più, o meno sensibili della loro ingordigia.

10. Il LANGIO (365) veramente non mise per lo stesso morbo il *grano carbone*, e la *ruggine*, ma disse, che il veleno dell' uno si avvicinava a quello dell' altra, osservandosi, che vien prodotto in quel tempo appunto, che i grani del *frumento* co-

min-

[365] *Car. Nic. Langii Descrip. Morb. ex esu clavor. secal. cum pane. Cap.* 8.

minciano a creſcere, e ſi vede ſotto la forma di certa materia viſcida, e dolce, ch' è aderente talora allo ſteſſo grano, e percio gode le medeſime facoltà, cioè di *glutine*, e di *acrimonia*. Altra non è queſta, ſe non ſe la materia, che fu oſſervata dal VALLISNIERI, la quale ſi trova ſopra queſti grani non ſolo, ma ſopra anche l' ottimo frumento, e molto prima di eſſa ſi manifeſta, come ho detto, il granellino del *carbone*, talchè propria di lui non può dirſi certamente.

11. Reſtano alcune altre coſe di queſto grano a conſiderare. E prima, che la *ſoſtanza farinacciola* dell' anche piccoliſſimo granellino, la quale nel *frumento* dee ſervire al ſuo creſcimento, e alla ſua nutritura, vedemmo mutarſi ben toſto, e ciò pel nuovo moto inteſtino, che diſtruſſe il vincolo naturale delle parti primitive, e apparve bianca, ſe non che di quando in quando v' erano certi forami, pe' quali ſi ſcorgevano nell' interno alcune macchiette nericce. Sopra la qual coſa, poichè l' illuſtre NEWTON nella eſimia ſua Opera dell' *Ottica* dimoſtra, che ne' corpi opachi gli occulti loro meati ſi riempiono di qualche materia, che molto differiſce dalla denſità delle medeſime parti, e chi non vede il poterſi arguire una inſigne oſcurità in laminette tenuiſſime di *ſoſtanza farinacciola* del *carbon giovane*, della quale ſoſtanza le cavità delle veſcichette ſi riempiano da qualche ſottiliſſimo fluido dall' aere diverſo certamente, perchè i germi del grano eſcono dalla ſoſtanza medeſima. Gli *otricelli* delle foglie poſti

ſti fra il lume del Sole, e la lente del microſcopio appajono oſcuri, e pure è certo, che a queſto luogo conviene la traſparenza ſingolarmente.

12. Se trovanſi alcuna volta con bell' ordine diſpoſti i granelli del *carbone* in quelle ſpighe, nelle quali eſſi co' buoni ſono miſchiati, non può tal coſa riputarſi, che accidentale, trovandoſene pur altri in altre ſpighe co' buoni molto irregolarmente diſpoſti.

13. Sì. Vedeſi di continuo quella parte del gambo, che ſi attacca alla ſpiga, la quale nel grano buono è la più ſottile, nel *grano carbone* eſſere quaſi la più groſſa dell' altre parti di eſſo gambo. Ma è d' avvertire, che l' accreſcimento delle piante viene fatto per le eſtremità, che ſono molli, e ſpugnoſe, e l' ultime a indurirſi; onde ſuccederà, che attraendoſi (366) da' granellini del *carbone* maggior ſugo dell' ordinario, mentre la eſtremità del gambo non è anche conſolidata, queſta ſi dilati notabilmente, e più dell' ordinario s' ingroſſi.

14. Che ſe da' grani traſcelti mi nacquero alcune ſpighe di *grano carbone*, biſognerà dire, che nella ſemenza fuggiſſe qualche grano infetto, che ſpeſſo non ſi diſtingue da' ſani [367].

15. Una

[366] Noi non poſſiamo ne' vegetabili ſcoprire altra cagione del moto del ſugo, ſe non che la forte attrazione de' tubi ſugoſi capillari, ajutata dalle vive ondulazioni dell' aria, originate dal calore del Sole, che innalza il ſugo ſino alla ſommità degli alberi più alti, dov' egli ſi eſala per le foglie.

(367) Dice in queſto caſo il Signor TILLET car. 144. che per qualunque attenzione ſi porti alla ſcelta della ſemenza, è quaſi impoſſibile, che

15. Una tale malattìa non ſeguirà per avventura al *grano*, che diceſi *groſſo*, e al *grano turco* ſingolarmente, che reſiſte a tutte quaſi le malattìe, che diſtruggono le altre biade ſullo ſtelo, nè, per quanto io ho qui oſſervato, all' *orzo*, e alle *gramigne* tutte, quantunque dalla *filiggine* ſieno attaccati, ſe eccettuar ſi voglia eſſo *grano turco*; perchè queſti grani hanno una interna teſſitura molto eguale, e forte, onde le loro novelle fibre non ſono ſoggette a quelle impreſſioni, per le quali un sì fatto diſordine ſuccede (368).

CAPITOLO IV.

Cagione del *grano ghiottone*.

1. ALcune *galle* ſono ſtate oſſervate a' noſtri tempi, e alcune eſcreſcenze di piante, le quali debbono la loro origine a *Inſetti*, che fuggono dagli occhi per la loro enorme piccolezza, e che non ſi potrebbero vedere, quando non ſi cer-

che non vi ſi trovi qualche grano o interamente corrotto, o ſolo in parte, o qualche grano ſano, che ſiaſi avvicinato a un grano malato.

[368] L' Analogia, che il medeſimo Signor TILLET ritrova fra il morbo, di cui parla il Signor ASTRUC *De morbis venereis* T. 1. p. 119., e 120. eccellentemente, e quello del *grano carbone* venne per dir vero anche da altri penſata. Farò giuſtizia al Signor Dottore GIOVANNI BIANCHI di Rimino, ſe io dirò, che in ſua lettera del 1754. ſcrittami, dopo che io ebbi dato in queſta *Società letteraria* un ſaggio delle mie oſſervazioni ſopra le *malattìe del grano in erba*, mi fece intendere, che per iſcherzo egli avrebbe aſſerito, che il *carbone* foſſe la malattìa *venerea* del grano per la molta analogìa, ch' egli fra' qaeſti due morbi riconoſceva.

cercaſſero colla *lente* pazientemente nelle circoſtanze favorevoli; e molto più ſi è reſo difficile il loro ſcoprimento, quantocchè alcuni di eſſi non amano di camminare. Dopo queſto, e dopo le oſſervazioni molte, e gli eſperimenti fatti ſopra il *grano ghiottone* io m' immagino, che non parrà totalmente un paradoſſo, l' aſſerire, che i filamenti di un tal grano, i corpi *lombrici-formi* ſi debbano riporre fra gl' *Inſetti* di queſto genere, e conſiderarli, come la cagione di una sì fatta malattìa, e della deformità di quel grano, nel quale ſi trovano, e in cui da principio hanno forſe tutto quello, che loro biſogna per alimentarſi [369].

2. Ma come vengono eſſi così formati que' grani medeſimi? Per ſaper queſto con certezza di verità biſognano anche maggiori lumi, che non abbiamo, e forſe non avremo giammai. Altri per avventura nell' oſſervare, che la ſcorza, o la pellicola d' ogni ſorta di grani è compoſta di due *lobi*, i quali nel ripiegarſi in maniera inſenſibile l' uno rientra nell' altro, e non poſſono unirſi così eſattamente, che non formino una ſpezie di cicatrice, che alcuni chiamano il *ſolco*, potrebbe credere, che da queſta entrati quegl' inſenſibili anima-

[369] CRISTIANO LANGIO nel ſuo trattato, che va col nome di *Pathologia animata, ſeu animadverſiones in Pathologiam ſpagiricam Cl. Viri Joannis Fabbri.....* pretende di moſtrare, che tutti quaſi i mali vengano principalmente *ex animata putredine*. Ma è da vederſi, che il titolo non corriſponde in tutto all' Opera, perchè pochiſſimi riſpettivamente, com' altri nota, ſono i mali, ch' egli riduce alla detta cagione, nè fra eſſi queſta malattìa delle biade ſi annovera. ELIA CAMERARIO *Diſſertationes Taurinenſes Epiſtolicae Phyſico-medicae*

nimaletti (370) ne' teneriſſimi granellini, vi ſuccino il loro alimento, per cui ſcomponendoſene il regolato creſcimento, eſſi reſtino difformati. Ma più agevole contuttocciò a me ſembra poter eſſere, che queſti corpi inviſibili ad occhio diſarmato ſi trovino ſopra il grano ſeminato, e vi ſi trovavano forſe prima di ſeminarlo, quand' egli ſotterra ſviluppaſi, e che quivi i medeſimi ſi fiſſino ſopra alcuni de' ſuoi germi, i quali ſtendendoſi ne' varj gambi, gl' inſeguano nella parte più tenera, ch' è dove ſpunta la ſpighetta, e vi continuino a ſtar fiſſi, e ad alimentarſi del ſugo, che vi concorre, diſtribuendoſi poſcia a varj embrioni de' granellini; ma perchè non in tutt' i germi ſi fiſſano, e non a tutt' i granelli ſi diſtribuiſcono ſempre, quindi è, ch' eſſi non ſi trovano ſempre in tutte le ſpighe, e in tutti i granellini provenienti dal medeſimo ſeme. Potrà dunque queſto ſucciamento determinare il ſugo, che riem-

dicae facendo menzione alla diſſertazione 12. delle febbri epidemiche congiunte co' *vermini*, conſidera ſopracciò, che ne' morbi diuturni, e lunghi i *vermini* hanno ragion di cagione, e di effetto.

(370) Quando, ſenza cagion però ſufficiente, non ſi voleſſero far entrare ne' granellini per mezzo le radici della pianticella, come fu detto, che *Inſetti* entraſsero ne' frutti, e nelle erbe, e fra gli altri lo diſse JACOPO ARDERO, e lo partecipò in una lettera a LUCA SCHROCHIO. La qual coſa negò francamente il VALLISNIERI nel libro *dell' origine de' vermi ordinarj del corpo umano*, e la negò, „ perchè oſservata la notomia delle Piante ſi vede eſser quelle fibre, e „ cannelletti deſtinati a' ſughi della nutrizione così ſottili, e così angusti, che neppure l' occhio armato di microſcopio può giungere a „ vedere l' ultima bocca de' medeſimi, che dal fine delle radici aſsorbe il nutrimento, dove le uova degl' Inſetti ſono viſibili. " Queſto motivo per altro addurre forſe non ſi potrebbe per negare l' ingreſso a' noſtri egualmente inſenſibili animaletti.

pie i canali dell' organizzata pianticella, a portarsi più abbondantemente in quel luogo, dove trova minor resistenza, far ingrossare i gambi più dell' ordinario, arricciare, e ritorcere le foglie, e increspare, e attortigliare le reste, ma particolarmente far crescere le parti, dov' essi poggiano. Di questa alterazione più si risentirà il granellino, che le reste, più le reste, che le foglie, più le foglie, che il gambo per cagion della varia loro disposizione, e struttura. Quando però i gambi si accostano alla maturità, le foglie perdono al più delle volte tutto quasi il loro insolito atteggiamento, perchè in quel tempo l' umor della terra pigliando in essi maggior vigore, e maggiormente le fibre consolidando, ogni principio di alterazione supera, e vince. Che se io considero i piccoli organi del granellino del *ghiottone* nella nascente spiga già sviluppati, i quali stavano colà ristretti, e altro bisogno non avevano, come nella formazion delle piante una simile cosa nota il BELLINI, e il VALLISNIERI, che di un leggierissimo, e regolatissimo moto, che gli urtasse per dilatarli, onde il corso de' fluidi circonvicini si avanzasse; vedo, ch' essi al moto straordinario prodotto dall' accennato succiamento si risentono notabilmente, e que' fluidi penetrano con veemenza dentro gl' invisibili canali, vieppiù li dilatano nello scorrervi continuamente, gli aumentano, e agitano, per cui alcuni di questi si strappano, e il granello cresce ben tosto, e piglia diversa figura dell' ordinaria. Nel crescere però, e nel di-

sten-

ſtenderſi di queſti granelli, avverrà, che que' corpicelli, o *verminetti*, i quali ſtavano ſopra i loro embrioni, reſtino chiuſi, ed entrino nella *materia farinacciola* de' medeſimi, e così compongano una ſpezie di *galla*, ch' è di nuovo genere (371), e la cui figura non poſſa mutarſi poi per forza alcuna del ſugo, che le ſopravvenga. In queſta maniera per avventura ſi forma il *grano ghiottone*. Nè una tale congettura piucchè veriſimile mi ſarebbe molto difficile di portare per fino alla dimoſtrazione, ſe uopo foſſe, e ſe lo ſcomponimento di tutta la figura del granellino chiaro non appariſſe, che per altro motivo ſuccedere non poſſa.

3. Io non voglio già con tuttocciò dire, che il formarſi, e l' ingroſſare del medeſimo ſia come il generarſi uno ſtato affatto nuovo ſopra lo ſtato del grano buono primiero, perchè io m' avviſai, ch' egli foſſe uno ſvilupparſi di un faſcio di fibre, che come mataſſa di refe ſtava aggrovigliato, e riſtretto in cerchio, il quale mediante il ſovverchio ſugo nutritivo ſi gonfia ſovverchiamente, e ſi manifeſta; ma nello indurirſi poi, e nel ſeccarſi

[371] Ne abbiamo un eſempio non molto diverſo nella formazione delle tuberoſità delle foglie del *Melo*, dell' *uva ſpina*, e dell' *Olmo*, ed anche di certe *eſcreſcenze* di piante ſecondo la deſcrizione, che ce ne dà il REAUMUR. Perchè il luogo, dove il concorrimento faſſi del liquido, ſi alzerà ſopra la ſuperficie dell' inſenſibile granellino, e formerà nello ſteſso tempo una piccola cavità, nella quale ſi troveranno que' corpi. Continuerà intanto queſto ſcorrimento verſo il ſuo fondo, e il granello piglierà una figura più vicina alla *cilindrica*, che alla *ſferica*, ond' eſſi reſteranno chiuſi nel medeſimo. Allora il concorſo del liquido ſi farà dentro il granello, e da tutte le parti, per cui egli acquiſterà una figura *ritonda*, come una pallottola.

carsi vengono le parti solide insieme a unirsi, e però egli si fa moltoppiù piccolo dell' usitato, e muta spesso figura.

4. Ma se questi *vermi* sul germe, e sugli embrioni de' granellini non si veggono, potrebbe anche dirsi, che in principio non ve ne fosse, che uno solo, non agevole forse a vedersi, il quale si chiudesse, come fa nella *galla* il *pidocchio* delle piante [372], nel granellino medesimo per essere l' origine di una copiosissima popolazione.

5. Una tal malattìa volle forse intendere il Sig. BRADLEY, quando fece sapere (373), ch' *entre autres causes, ce qui occasionne la nielle dans les bleds est, que parmi les grains, qu' on seme, il y en a, qui sont infectès de la nielle. Si l' on suppose, que des animalcules trouvent dans la terre une humiditè suffisante pour leur donner la vie, si je puis m' exprimer ainsi, eux, où leurs oeufs peuvent aisement s' insinuer dans le jeune bled, & croitre avec lui.* Così, dirò anch' io col lodato autore delle *lettere a un Americano*, parlava pure il Signor NEEDHAM nel 1745., quando pubblicò il suo libro di scoperte, che fu poi tradotto dal professore di Lipsia nel 1747. (374). Ma nell' ultima sua opera tutto questo egli spiega con quella sua forza vegetativa. *Il y a*, dic' egli [375], *une force vegetative dans chaque point microscopique de matiere.* E se a lui chiedasi, per-

(372) Fu ciò osservato dal REAUMUR in alcune *Galle*.
[373] BRADLEY *dialog. sur l' immater. p.* 108.
[374] NEEDHAM *Nouvelles decouver. fait. avec le mic. chap.* 8.
(375) *Nouvelles observations faites par Monsieur Needham de concert avec Monsieur de Buffon. p.* 136.

perchè mai nel *grano ghiottone*, dopo essere stato conservato per ben due anni, e non aversi in lui veduto, già fatto secco, alcun moto de' filamenti suoi, se si lascia macerare nell' acqua, si palesino col microscopio que' filamenti medesimi animati? Egli risponderà francamente, che la forza vegetativa, risedendo sempre nelle sue fibre, è stata sospesa per due anni, e l' acqua ha potuto rimetterla in azione. Quando con candore io dicessi, che ciò non intendo, direi certamente, quanto sento.

6. Ma qui potrebbe alcuno contro me replicare, qual dunque sarà la cagione del lungo vivere di cotesti *corpi semoventi*, se quella non è. Al che risponderei primieramente con TULLIO essere molto più facile il dire: *quid non sentiam, quam quid sentiam*, esser cosa ingenua non solo, ma gloriosa il confessare di non saper tutto. In secondo luogo rifletterei, che veramente è cosa sorprendente, che vi sieno animali, i quali perdano per lungo tempo gli usi della vita, e questa a nostro arbitrio ripiglino, ma non è ciò impossibile da concepirsi dopo aver considerato la diversità di viventi, che sono fuori della sfera di nostra vista, e dopo il sapere ormai per cosa infallibile, che se ne trovano alcuni di mole incomparabilmente maggiore, i quali passano una parte della loro vita senza nutrimento alcuno, e senza moto. Così le *Rondini* de' paesi più Settentrionali si nascondono, e si rannicchiano le une contro l' altre sotto il ghiaccio, e vi si addormentano, e vi passano quasi

mezz'

mezz' anno immobilmente, finchè la Primavera le fa rinvenire (376). Noi non abbiamo una co-

no-

[376] Quantunque il NEGRI di *Ravenna* nel ſuo *Viaggio Settentrionale* lett. 4. dopo aver narrato queſto fatto, ſembri, che lo metta in dubbio: „ difficilmente “, dic'egli, „ poſſo laſciarmi perſuadere queſto, non potendo capire, come poſſa queſto animaletto „ vivere per lo ſpazio di mezzo anno continuo in un così contrario „ elemento, eſſendo baſtante o il ſolo intenſo freddo per ſe ſteſſo, „ o l'acqua di ſua natura ſoffocante, o la privazione del cibo alla „ ſua ſpezie conveniente ad apportar loro la morte, non che tutte „ tre queſte coſe inſieme. Ben è vero, che ſono ſtati molti, e di „ condizione, teſtimonj di veduta, che mi hanno confermato il tutto; “ e quantunque DANIELE SENERTO, da lui riportato come Scrittore del medeſimo fatto, non altro dica nel ſuo *Epitom. Natural. Scient. l. 7. c. 10. de Dif. anim.* di eſſo, che: *Poſt finem Aeſtatis, & Muſcis jam deficientibus, ex his Germaniae, ut & Galliae regionibus ad oras Maris Baltici advolant, & ſub altiſſimis rupibus Mari imminentibus mutuis complexibus haerentes, & ad aequinoctium vernum uſque deliteſcunt, ac ventis Aviariis flare incipientibus ſuam quaeque Patriam repetunt:* l' abbiamo però in una relazione data alla *Società Reale di Londra* il dì 12. Febbrajo del 1713., come coſa certiſſima; e nelle *Tranſazioni Filoſofiche*, e nel *Giornale de' Letterati* an. 1666., e 1667. ſi dice, che la cautela anticipatamente uſata di liſciarſi le piume col proprio olio, e d' aggomittolarſi col capo in dentro, e la ſchiena in fuori, le ripara, benchè ſieno nell' acqua, e nel ghiaccio. GIACOMO TEODORO KLEIN nel ſuo *Hiſtoriae Avium prodromus cum praefactione de ordine animalium in genere, acceſſit hiſtoria muris alpini, & vetus vocabularium animalium mſc. cum figuris* ſtampato in Lubeca nel 1750., ſcrive a car. 157., che le rondini vengono nell' Inverno oppreſſe da certo letargo, per cui il ſangue loro ne' vaſi ſcorre lentamente, e quindi poi reſtano eſſe naſcoſte ſotto le ripe, e dentro l'acque pur anche; ma fatto l' aere un poco caldo, il ſangue medeſimo ſi attenua, elle ſi rendono più leggiere, rivivono, e altrove ſen volano. PEDO ALBINOV. *De morte Mècoen.* cantò:

Conglaciantur aquae, ſcopulis ſe condit hirundo:
Verberat egelidos garrula vere lacus.

Ma ben più mirabile anche ſarebbe, ſe vero foſſe quello, che il DEL RIO, *Deſquiſition. Magicar. l. 2. Quaeſt. 29. §. 2.* riferiſce avere ſcritto GUAGUIN nella deſcrizione della *Moſcovia*. Certi popoli della Ruſſia, narra egli, muojono tutti gli anni verſo il giorno 27. di Novembre, e la Primavera gli fa rivivere. E potrebbe eſſere, che

noſcenza eſatta di tutte le creature viventi, che Dio ha quaggiù ordinate, nè conoſciamo le miſure, e le circoſtanze della vita di ciaſcheduna. Sembra una preſunzione il voler render conto delle proprietà de' corpi naturali, che ci cadono tuttodì ſotto degli occhi, non che di voler penetrare la cagion delle coſe quaſi inſenſibili (377), limitando le operazioni della natura, e immaginandoci, che Dio non abbia fatto nulla, che non ſia conforme a certe leggi, che ci ſon note. Certo è, che alla ragione umana, come alla mole del corpo ſono prefiſſi certi limiti, il trapaſſare i quali non ci è dato. Noi abbiamo una diſtinta cognizione della grandezza, ma perciò non poſſiamo concepire la grandezza; laddovecchè noi poſſiamo concepire il progreſſo della vita de' vermi lombrici-formi del ghiottone, ma non abbiamo di loro una diſtinta cognizione. Da tuttocciò voglio io inferire per conchiuſione, che una diretta riſpoſta non può darſi, o quella ſolo può darſi, che tale

che qualche annuale malattìa ſopiſſe in loro per qualche tratto l' uſo de' ſenſi, e ſtupidi gli rendeſſe, talchè morti foſſero creduti: *Alexander Guaguinus in deſcriptione Moſcoviae ſcribit populos quoſdam in Lucomonia Regione Ruſſiae habitantes, quottannis vigeſima ſeptima Novembris die, ut ſolent hirundines, & ranae, ſic, & ipſos prae frigoris brumalis magnitudine mori: poſtea redeunte vere vigeſima quarta Aprilis die, denuo reviviſcere.*

[377] ENRICO BAKER della *Società Reale di Londra* ſcriſſe nel ſuo *Eſſai ſur l' Hiſtoire naturelle du Polype Inſecte cap.* 11. *pag.* 339., che „ l' Hiſtoire naturelle nous laiſſe deſirer bien des choſes „ au ſujet des grands animaux, & plus encore au ſujet des Inſectes; „ mais lorſque nous venons à examiner les plus petits animaux vi- „ vans, nous trouvons une terre inconnue, dont tous les habitans „ doivent nous paroitre ſurprenans, & extraordinaires. "

tale è ſtato il piacere del Sovrano Creatore. Se però i corpi *lombrici-formi* eſpoſti a un freddo violento ſi muovono colla ſteſſa velocità, e così lungo tempo, come quando non vi ſono eſpoſti, ma tenuti nell'acqua; ciò diſconverrà certamente con quello, che ſuccede agli altri *Inſetti*, ma non diſconverrà con quello, che il Creatore ha ſtabilito, che di queſti avvenga.

7. Siccome tuttavia biſogna appoggiarſi all' eſperienze in ſimili caſi fatte, quando in un effetto manca la ragione, potrebbe crederſi per avventura, che tutto l' arcano ſi ſvelaſſe nella conſiderazione dell' organo del reſpiro di tali *Inſetti*. Dopo che LEON BOTALLO d' Aſti nell'anno 1562. ci deſcriſſe l' uſo del *forame ovale*, noi ſappiamo, ch' egli è quell' organo, che ſerve per la circolazion del ſangue nel *feto*, finchè ſieno meſſi in moto i polmoni. Vien detto, che ſi chiuda, quando la creatura è nata; ma generalmente è ſtato creduto, che poſſa tal volta rimaner aperto anche negli adulti, e ce lo conferma l' accurato Signor COWPER [378], non menocchè il Dottore CONNOR (379), che che ne dica per rigettarne tutte le autorità il Sig. CHESELDEN (380). Molti Anatomici hanno chiaramente oſſervato, che nel *Vitello marino* queſt' organo ſta ſempre aperto, e che per tal ragione appunto egli è atto a ſtare sì lungo tempo ſott' acqua. Il prode, diſcreto

[378] COWPER. *Anat. Append. fig.* 3.
[379] CONNOR. *Diſſer. Med. Phyſ. de ſtup. Oſ. Coal.*
(380) CHESELDEN. *Ap. Der. Phyſ. Theol. l.* 4. *c.* 7.

to, e diligente Medico Signor Dottore FILIPPO BARONIO di Meldola mi ha più volte atteſtato di aver fatto eſattiſſima ſezione di molte *rondini*, e di avervi ritrovato per fino a tre forami ovali aperti, e alcuna volta la metà ſolo aperta di uno d' eſſi *forami*; nè ha ſoſpettato mai di avere preſo con errore l' entrata delle *vene coronarie* pel *forame ovale*, come qualche Anatomico di contrario ſentimento potrebbe credere. Da qualche organo per tanto non molto da queſto diſſomigliante potrebbe aver origine ne' noſtri corpi *lombrici-formi* quel vivere loro sì lungo tempo immobili nella materia mucilaginoſa del *grano ghiottone*, ripigliando eſſi il movimento, allor quando ſolo dall' acqua, o da altro agente foſſe maggior impeto dato alla circolazione del loro ſangue.

8. Avvertirò così di paſſaggio, che i vermi *lombrici-formi* abitatori de' mentovati granellini del *ghiottone* non permettono al diſcioglimento, e alla corruzione delle parti interne di fermarſi ivi entro, e di accomularviſi, per modo che condannati ne reſtino interamente, e diſtrutti eſſi granellini tutti, perchè quegli animaletti ſi nutrono del liquore, che vi concorre, come fanno gl' *Inſetti* delle *galle*. Per queſto appunto nel grano *carbone*, dov' è tutto putredine fino alla più ſottile *epidermide*, non dovrà crederſi, che ſi ritrovi *verme* alcuno, il quale naturalmente, e come cagione di eſſo vi abiti, e vi ſi nutra.

9. Nè laſcerò di accennare per ultimo qual poi eſſer poſſa la cagione dell' inalbamento non meno

del *grano carbone*, che del *ghiottone* calcinati a un fuoco ardente di fornace, perchè io per me credo, che venga da un *ſale* ſimile a quello, che ſuol fiorire ſu' vaſi di criſtallo, e che col tempo gli rode, gli ſpezza, e ſe gli mangia.

CAPITOLO V.

Cagioni di *altre malattìe del grano in erba*.

1. IL *giallume*, che quantunque non tolga alla pianticella di apparir ſana, nulladimeno, quando principia a gettare le ſue foglie, fa, che alcune di eſſe appajono di un verde bianchiccio, e ſecondocchè ingroſſano, ſi rendan gialle, ond' egli ha il nome, naſce per lo più da cagioni eſterne, quantunque da interne anche poſſa eſſere derivato. Viene dal ſuolo, o terreno pietroſo, non menocchè cretoſo impregnato di un *ſale acido*, e alcune volte dalla *ruggine* medeſima, e da quelle cagioni in minimo grado, che quella producono. E ben può eſſere una eſalazione della ſteſſa pianticella del grano trattenuta da' raggi del Sole ne' ſuoi pori più eſterni, dove ſi fiſſi, vi ſquarci le fibre minutiſſime, e vi laſci però le foglie picchiate di giallo più o meno carico. Anche i *vapori ſulfurei* innalzati dalla terra poſſono percuotere le foglie, in guiſa che conſumato, e diſperſo il liquido, che ſcorre pe' canaletti del ſugo, reſtino eſſe ingiallite. Queſti *vapori* danno ſovvente caldo, ed anche fiamma (381). 2.

[381] HALES *Stat. des Veg. Appen. Exp.* 3. *pag.* 342. A differenza delle

2. L' esperienze poi da me fatte per determinar l' indole del *fugo* della pianticella del grano sembrami, che possano dar motivo a congetturare, che le macchie di quelle foglie sieno di colori diversi, ed ora di un verde pallido, ora di un verde citrino, ora di un verde lavato di rosso, ed anche di un bellissimo rosso, secondo la diversa natura de' *vapori*, ed *esalazioni*, che percuotendole in tempi diversi s' insinuano pe' loro pori dentro i canaletti del medesimo fugo, d' onde combinazion diversa producasi.

3. Questo *fugo* medesimo, quando per la sua grossezza non può insinuarsi ne' vasi capillari delle foglie, e de' grani, apparentemente si scarica nel gambo, ed è allora, che disperdendosi esso cogli *olj* della pianticella senza venir rimesso, accade che la foglia s' ingialla, e null' altro di lei in fine rimanga, che un tessuto di vescichette, e di nervi seccati. Lo stesso dee dirsi, quando ingrossato a certo segno l' internodio inferiore della pianticella, squarciasi la foglia, che chiudeva, e circondava il cannello, e si abbandona sul terreno. Tal essa diventa, quando per umido stagnante si marcisce il gambo sul piè; e tale, quando alcuni *vermini* si fissano sopra le sue radici, specialmente nel mese di Febbrajo, nel qual tempo molti ve n' ho trovati; perchè avendo questi per le radici succiato già molto umore della pianticella medesima, ella non può nello stesso tem-

delle esalazioni, che danno fiamma, e non caldo. Queste sono particelle terrestri, quelli sono acquose particelle.

po rifarne altrettanto, ond'è, che debbano le foglie ingiallire, e seccarsi [382]. Fu però avvertito, che le foglie di qualunque pianta non s'ingialliscono mai, non si smarriscono, non languiscono, e non cadono fuor di stagione senza difetto di nutrimento, sia, che questo gli venga rubato da' piccoli vermi, che vi si attaccano, sia, che non possa giugnervi per qualche imperfezion delle radici. Ma sopra ciò vennero mentovate da PLINIO favolose cagioni, e dateci nella sua Storia a intendere per vere. Affermò tra l'altre, che il basilico intorno al nascimento della canicola impallidisce, e che tutte l'erbe ingialliscono non meno di quelle del grano, se loro *Donna* si appressi, che abbia il suo tempo [383].

4. Il *giallume* figurato in polvere nelle interne pareti degl'involucri del grano, o nelle vescichette della *epidermide* della foglia non può farmi sospettare, che non sia il sugo medesimo della pianta traboccato da' *sifoncini*, che mettono capo a' gra-

[382] Un fenomeno straordinario descrive l'HARTSOEKER, *Recueil de plusieurs pieces de Physique p.* 74., che osservò nell'anno 1720. al principio del mese di Marzo. Vide alcune foglie del *melone*, che avevano contratto un colore rossigno, o giallognolo; e siccome egli scoprì col *microscopio*, che la cagione di esso era un infinito numero di *mille piedi* fissati nella parte contraria della foglia, così esaminò la terra, a cui era commessa la pianta, e molta ne volle posta in un vaso; e non fu poco sorpreso al trovare, ch'ella era ripiena di uno sterminato numero di questi animaletti, i quali non prima dello spazio di tre giorni con acqua bollente gli fu possibile di sterminare. Aveva il luogo, che tenevano essi in terra di lunghezza quattro piedi, e tre di larghezza.

[383] PLIN. *Hist. Nat. XIX.* 10. ..... *& ocimum sub canis ortu paleſcit. Omnia vero, acceſſu mulieris menſtrualis, flaveſcunt.*

granelli, o alla foglia, dov' egli ſcorre, e dove ſtagna. Una ferita venuta da verme, da materia acre, da fermentazione, o da altro può ben rompere un lato di eſſi *ſifoncini*, e cagionare il diviſato traboccamento.

5. Reſtano voti qualche volta tutti, o ſolo alcuni granellini di una ſpiga anche freſca, e vegeta per interrotto nutrimento cagionato da qualche *oſtruzione* fattaſi nelle vene, o nelle radici, ovvero da mala ſeparazion degli umori. I diverſi canali, che mettono a queſti diverſi granellini poſſono fare, che queſta malattìa ſia piuttoſto degli uni, che degli altri. A' *venti nocivi* l' attribuì PLINIO (384).

6. S' egli è vero, come oſſervò il MORTIMER nel CHAMBERS, che la mancanza di pioggia (385), in tempo che le piante gettano, o germinano, togliendo loro l' umor nutritivo, produca ſpeſſo la caduta, o lo ſvanimento de' loro getti, ed occhi, queſto potrà far anche, che la ſpiga reſti ſenza granellini, la qual coſa volle il TANARA appro-

(384) PLIN. XVIII. 17. *afflatu noxio* ... E però: *venti autem tribus temporibus nocent frumento, & hordeo. In flore, aut protinus cum defloruere, vel matureſcere incipientibus. Tum enim exinaniunt grana.*

[385] Non la mancanza di pioggia, ma una pioggia fredda, che cade qualche volta nel tempo appunto, che il frumento è in fiore, credette il Signor DUHAMEL *Cult. des Ter.*, che diveniſſe un oſtacolo alla fecondazione, onde reſtaſſe la ſpiga vota. Per altro quando il grano è in fiore, che agevolmente cade, moltiſſimo è dannevole la pioggia o fredda, o calda, ch' ella ſia, dove in ogni altro tempo è utile, e ſovente biſognevole, e neceſsaria per lo ingroſſamento, e la maturazione di eſſi grani; e ſenza la medeſima la pianticella infralirebbe, e quaſi verrebbe meno, e ben toſto ſeccarebbeſi.

propriare al vento, quando diſse [386], che *un vento caldo cagiona, che nella metà delle ſpighe non ſia grano, e quello dell' altra metà ſia minutiſſimo.* Io credo, che i *venti* tutti ſaranno in quel tempo dannevoli al grano, perchè allora con facilità potranno ſcuotere, e portar via il fiore dalla ſpiga, non già perchè tutti ſieno caldi (387). Ma qui biſogna por mente, che alcuna fiata, prima-chè il granello del frumento ſia compiuto, e in tempo, che la ſpiga è in fiore, entra un *verme* nel ſuperior cannello dello ſtelo, e ſi ferma al fondo di eſſo, quivi ſucciando l' umore, che dovrebbe paſſare in nutrimento della ſpiga, e corrodendone i condotti, per cui dovrebbe ſcorrere. Ella perciò ſi ſecca, e ſi annientano i granellini, mentrechè tutto il reſto dello ſtelo inferiore alla percoſſa, venendo nudrito dalle radici, reſta verde infino al tempo della mietitura. Che alla ſpiga ſecca ſi trovi ſpeſſo unito il gambo ſecco, il quale per altro ſia intatto, e ſano in ogni parte, non farà caſo, quando ſi ſappia, che deriva da verme, che corrode le radici, e sì al gambo leva il nutrimento neceſſario, che da eſſe pigliava, oppure da qualche altro difetto delle radici medeſime, per cui un tale nutrimento ſi tolga. Succede anche talvolta, che per eſſer creſciuto troppo

[386] TANARA *Econ. del Cit. in Villa l. 6. p.* 353.

(387) Il DUHAMEL *Cul. des Ter.* conſiderando quell' accidente, che fa i grani minutiſſimi, rugoſi, e con poca materia farinacciola, volle, che derivaſse o da poco nutrimeuto, che riceve la ſpiga, quando le biade ſono roveſciate, o da grandi calori, che ſopravvengono, dopocchè le biade ſono ſtate nutrite di alquanta umidità.

po preſto il cannello, che ſerviva d' eſteriore involucro alla ſpiga, ſtringendola eſso per di ſotto, mentrecchè il piede della medeſima è pur tenerello, la sforza a innalzarſi, e però ſtrappaſi il piede. Separata così la ſpiga da tutto il gambo, ella vien meno, e ſeccaſi, e a nulla ſi riducono i granellini. Può la ſmoderata vaporazione produrre il ſeccamento di tutta la pianticella, di alcune foglie, o di una parte più tenera della medeſima. Lo produce non meno il gelo, quando queſte parti ſono bagnate, perchè l' acqua, che ſi gela ne' loro pori, gli ſtraccia, e fa rompere i vaſi, dov' ella ſi è inſinuata (388) GIOVANNI COSTEO [389] pretende, che vi contribuiſca la più calda, e la più fredda intemperie.

7. La *ſterilità* del terreno, e la privazione de' ſughi neceſsarj può cagionare ſterilità del grano, e diminuzion notabile di ſua grandezza, e penuria in ſomma conſiderabiliſſima. Queſta malattìa viene talora dalla diſtribuzion medeſima imperfetta del liquido, che nella pianticella traſcorre. Si veggono belliſſime piante, il cui ſugo ſi ſpande così facilmente nelle foglie, per cagione della ſtruttura delle

(388) TEOF. *De Cauſ. Plan. l.* 5. *c.* 18., ciò non oſtante laſciò: *Perniciofius gelicidium terrae arboribus evenit, quam aquae. Magis enim radices id tangere poteſt. Damnoſius vero utrumque redditur, cum pluvia, & gelu miſcentur inter ſe vicibus, ſaepeque alternantur.*

(389) COSTEO *De univerſali ſtirpium Natura libri duo l.* 1. *c.* 41. *Calidiori, atque frigidiori intemperie non nunquam laborant, quae per aeſtum, hyememque non perſtringuntur modo, ſed etiam intereunt; ſicciori vero, qua graciles praeter ſpeciei morem evadunt humidiori, qua interdum ſuccis diffluunt undique inutilibus, interdum etiam ſuffocantur.*

delle loro fibre più atte dell' ordinario al ſucciamento, ch' eſſe non fioriſcono. In alcuni anni la temperie dell' aria diſpone per modo i canaletti del ſugo del grano in erba, ch' egli va tutto nelle foglie, e il gambo, che porta la ſpiga, reſta eſtenuato. La diſpoſizione di que' vaſi è tale, per cui eſſi concepiſcono grand' attrazione. Diſſe perciò TEOFRASTO, che la copia del ſugo, egualmente che l' inopia, eſtenua, e finiſce la pianta [390].

8. Ma la troppo grande abbondanza di germinazione, cagionata dalla troppa quantità di ſali fecondanti della terra, può affamare, per dire così, la pianticella del grano, onde non compia la maturazione, e sì quella malattìa far naſcere, che abbiamo chiamata *luſſuria*. La copia eſorbitante di ſugo, che la medeſima pianticella può tirare per cagione del vigore delle ſue parti, può anche farla creſcere più del ſolito, e produrre tant' erba, che il frutto alla maturazione non giunga perfettamente, e, come diſſe PLINIO (391), per troppa fertilità poſtraggaſi. Ben ſi vede, che quelle piante, le quali largamente fruttificano, ſono di vita brevi, e lo avvertì anche TEOFRASTO (392).

9. La

(390) TEOF. *De Cauſ. l.* 5. *c.* 11. *Copia enim alimenti nimia, vel inopia arbores eo quoque modo intereunt. Ni forte ſucci potius cruditate, ac vi extrinſecus occurrente.*

(391) PLIN. XVIII. 17. *cum onerata fertilitate procumbunt.* E il BUDEO *Annot. in Pand. p.* 316. *In eadem cauſa etiam eſt Luxuria ſegetum, cum nimia pabuli ubertate laſciviunt ..... Laſcivire eſt petulanter agere, ut equi indomiti ſolent ..... Laſcivire etiam Arbores dicuntur, cum nimia pabuli ubertate eluxuriant, ideſt ἐξυβρίζειν.*

(392) TEOF. *De Cauſ. l.* 5. *c.* 15. *Quippe omnino, quae large fru-*

ctifi-

9. La cagione dell' *infeſtamento degl' Inſetti* è troppo manifeſta. Le *moſche*, o le *farfalle* depongono le *uova* in que' luoghi, dove poi naſcono i *vermi*, o le *rughe*. Una temperie d' aria opportuna gli promove, e un cibo adatto gl' invita. Naſcono *Inſetti* ſopra il *frumento*, il *grano carbone*, il *grano ghiottone*, e ſopra tutti gli altri grani ſerrati anche dentro le loro ſpighe, naſcono nella ſoſtanza corrotta delle cortecce, de' germogli, delle foglie, del frutto, e delle radici del medeſimo frumento, perchè i volanti di quella ſpezie v' introduſſero col loro pungiglione le *uova* per metterle in ſalvo, e perchè a naſcenti foſſe preparato l'alimento. V' hanno anche vermini, che naſcono altrove, ma vengono a infeſtare le pianticelle del grano per fino a ridurle qualche volta a languire, come ſi è già veduto altrove, perchè ſono allettati dal ſapor grato di eſſe, e dalla ſtagion favorevole alla loro propagazione. Per queſto volle PLINIO (393), che la pioggia impediſca loro di naſcere, quando ſia venuta dopo l' *arturo*, che vale a dire dopo il dì 13. di Maggio, e promuova la loro naſcita, ſe venga co' venti di *Mezzogiorno*. TEOFRASTO ne aſſegna la dolcezza per cagio-

ſtificant, vitae ſunt brevis; e ne adduce la ragione: *exareſcunt enim quia totus humor ad fructus conſumitur, quod accidit pluribus.*

(393) PLIN. XVII. 24. *Gigni illos prohibent pluviae, quae fiunt poſt arcturum. Eaedem, ſi Auſtrinae fuere, generant.* Ma nulla credendo egli più vero, quanto l'aſſioma de' ſuoi tempi: *corruptio unius, generatio alterius*, ſcriſſe poi nel l. XVIII. c. 17. *Naſcuntur & vermiculi in radice: cum ſementem imbribus ſecutis incluſerit repentinus calor humorem. Gignuntur & in grano, cum ſpicae pluviis calor inferveſcit.*

gione (394). Dirò finalmente degl' *Insetti*, che, se nella macchina del Mondo il minimo di essi sia necessario, quanto è l' uomo (395), sempre in qualche parte della terra sarà quella temperie di aria, per la quale venendo i medesimi fecondati, per dir così, e tenuti in vita, si perpetui la loro generazione.

10. Sembra, che i germi delle piante sieno fatti in maniera, che non ammettano per loro nutrimento, e ingrossamento se non che i sughi, che loro convengono, perchè alcuni saranno per una pianta troppo densi, e mucilagginosi, che per un' altra non lo saranno. Sopra questo soggetto già scrisse il TOURNEFORT, o promise di favellarne a lungo in un *Trattato di Agricoltura ragionata*. E' noto, che la terra si vota, e rimane esausta a forza di nutrire la medesima spezie di piante, e che le si dà ajuto, dirò così, con variare la semenza sopra di lei. Quindi è, che i semi delle piante eterogenee al grano portati dal vento, o in quel luogo caduti per altro accidente, ritrovando quivi i sughi a loro proporzionati, allignano agevolmente, e non trovandoveli non allignano. Queste piante medesime però non dovrebbero poter levare il sugo a quella del grano, se già di esso non si nutrano, e il danno, che a lei producono da ogni altra cagione derivar sembra, che da questa. E' cosa veramente sorprendente,

(394) Onde lo SCALIGERO *Com. & anim. in sex. lib. de Cauf. Plan. Theoph. l.* 4. *c.* 14. *Hic comparat eorum partes, quae vermibus infestentur; & causam assignat dulcedinem.*

[395] HARTSOEKER *Suite des conjectures Physiques.*

te, che in un campo non meno copioso di grano, che di pianticelle d' altro genere, ciascuna di queste piante ricavi il nutrimento, che a lei sia proprio, senza confondersi i diversi loro sughi. Ma se è vero, che que' canali, che portano l' umor nutritivo, facciano l' opera de' tubi capillari, si presenta in questi un esempio, che potrebbe riputarsi per una rozza immagine della natura in tale fenomeno. Se nel medesimo vase si metteranno due liquori assai diversi l' uno dall' altro, come *olio*, e *vino*, e vi s' immergeranno due capi di una striscia di *panno*, una delle quali sia stata imbevuta già di *vino*, e l' altra di *olio*, entrambe si diporteranno, come una spugna, ma la prima non tirerà a se altrocchè il *vino*, l' altra l' *olio* solamente. Tutti e due questi corpi sono atti a sollevar liquori, ma l' uno piuttostocchè l' altro, secondo l' analogìa, ch' egli ha con loro. Tale analogìa consiste senza dubbio nella figura, nella grandezza, nella disposizione delle parti; ed ogni spezie di pianta ha per avventura un non so che di simile, ed opera per le medesime ragioni. Questa comparazione però, è stato detto, che non sia, come non è in fatti, una spiegazione compita del divisato fenomeno; perchè i canali dell' umor delle piante non sono meri tubi, ma sono organizzati; e per questa ragione la loro funzione di tubi capillari può avere effetti, a' quali questi sarebbero incapaci di estendersi, se non fossero qualche cosa di più. Una pianta morta sul suo piede più non vegeta, non

già, com' altri à riflettuto, perchè in essa manchino i canali dell' umor nutritivo, ma perchè l' organizzazione è distrutta. Questi diversi effetti ciò non ostante non sono così certi, e costanti, che non ve ne possano essere alcuni, i quali comprovino anche in diverse spezie di piante la medesima interna configurazione, e disposizion di parti, e forse la medesima organizzazione, per questo appunto, che l' una affama, per dir così, l' altra, siccome ve n' hanno alcune, che il sugo mantengono per altre, e l' accrescono. E' cosa provata, e riprovata, che dov' è stato l' *orzo*, e la *segala*, non bene alligna il grano, ma dov' è stata la *fava*, e altri *legumi*, egli cresce notabilmente, e moltiplica.

CAPITOLO VI.

Cagioni di *alcuni fenomeni appartenenti al grano in erba*.

1. I Gambi del grano pigliano alcuna volta in qualche nodo troppo notabile *piegatura*, e la conservano, perchè all' uscire, che fa il cannello dall' involucro della foglia, e l' ho spesso osservato, questo suo nodo ritrova nel luogo più ristretto qualche difficoltà a passare, ma pur vi passa, ed esce dal molto vigore, che ha la pianticella, sforzatovi. Il gambo per anche tenerello ivi a tale sforzo si piega, dov' è minore la resistenza, e in quello stato portando a crescere, e a ingrossare le

sue

ſue fibre, egli rimane piegato (396). Talor anche, quando eſſo tenerello gambo prende aumento, ſi fiſſano in qualche parte alcuni *pidocchi*, o altri *Inſetti* della pianticella, e quivi ne ſucciano l' alimento. La ſuperficie forata conſervando minor ſugo delle parti vicine non offeſe, ſi riſtrignerà, e dovrà per conſeguenza far incurvare il gambo, o la foglia, o altro.

2. Fattomi a dimandare a me medeſimo la cagione, perchè ſi ſecchino que' gambi, de' quali l' eſtremità delle radici ſono fuori della terra, mi parve di non potermi far più vicino al vero, ſe non col riſpondere, che i medeſimi ſi nutrono per eſſe eſtremità delle fibre radicali, e non per altrove, ſiccome gli animali per quelle delle oſſa. La continua ſucceſſione delle particelle nutritive fa i gambi eſtendere, e giunte queſte particelle fino alle oppoſte eſtremità, parte ſe ne eſalano, e parte alle radici ritornano.

3. L' odor di *viole*, che mettevano le radici di que' ceppi di grano da me oſſervati, naſceva ſicuramente da certe particelle odorifere, e balſamiche ſparſe dal liquido, che ſcorreva per le radici medeſime in non ſo qual *olio* meſcolato coll' aria, e co' ſali proprj ad eſſi ceppi. Si potrebbe credere, che queſte particelle foſſero loro ſtate comu-

(396) Dice il Signor TILLET car. 88. „ Ho trovato alle volte „ delle foglie incartocciate, rivoltate, e fatte a vite. Queſto di„ ſordine, poco eſſenziale per ſe ſteſſo, potrebbe eſſere attribuito al„ la forza della vegetazione. Ho conſiderato in fatti, che ciò era co„ mune nelle biade vigoroſe, e molto rado nelle biade magri, e „ languenti. "

municate da qualche contigua *viola*, che poi ſeccataſi, ella ſi foſſe toſto ſmarrita; quando piuttoſto non ſi voleſſe, che la teſſitura di quelle radici tale ſtata foſſe, che le particelle eſaltate aveſſe configurato, nella ſteſſa guiſa che ſono le odorifere della *viola* configurate, onde il ſenſorio mio ne rimaneſſe, come da quelle, percoſſo. Potrebb' egli eſſer altro? Il fatto come ſtia, non ſi vede; ma ſarebbe temerità l' aſſerire il contrario ſenza adurne delle prove. Qui non vorrà dirſi quello, che il BONANNI nel *Muſeo Kircheriano* aſſeriſce di que' ſaſſi, che ſpiravano *l' odor di viole* cavati dal Monte *Calemberg* nella Miſnia, e mentovati anche dall' AGRICOLA nel libro della *natura de' foſſili*, cioè, che dal *muſco* ivi appicciato uſciva un tale odore.

4. Ora del *roſpo* trovato ſotto le pianticelle del grano dirò, ch' egli poteſſe reſtare per avventura dall' aratro, o dalla zappa, o da altro ivi coperto poco dopo eſſere nato, e nel tempo appunto della ſeminazione, e che ivi ſi conſervaſſe in vita del ſugo nutritivo di quelle radici, e dell' altr' erbe, che mettevano intorno al chiuſo carcere, dove poco poteſſe creſcere, e poco reſpirare, perchè qualche liquido quaſi pietrificante eſſendo penetrato in quelle pareti, troppo le aveſſe indurite; ond' egli ne foſſe venuto così macilente, e derelitto.

5. L' eſperienza della PARTE II. CAPITOLO XII. §. 5. dimoſtrerà forſe, che i corpi lucidi non s' ingrandiſcono notabilmente per loro medeſimi nel *microſcopio* mio, perchè non ſi poſſono vedere ſotto

to maggior angolo del vero, e naturale, il che non ſuccede de' corpi opachi, i quali ſi veggono certo ſotto maggior angolo. E qui reſterebbe la difficoltà di comprendere, come vada queſta faccenda, e ſi potrebbe ſoſpettare, che io aveſſi pigliato abbaglio in una eſperienza, che io penſo di aver reſa certa dalle replicate prove. La difficoltà di ſpiegare un fatto certo non è ſenza dubbio una ragione di rigettarlo; e però ſi ammette l'*elaterio* dell'aria, benchè ſe ne ignori la cagione. Alcuno vorrebbe credere, nel conſiderare, che la forza refrattiva dell'aria ſi compone della ſomma di due elementi, cioè della denſità, e della tenacità del corpo, in cui eſſa aria percuote, che quivi ſi doveſſe rinvenire la ſpiegazione di queſto fenomeno. Quantunque ardua ſia la ricerca, e la determinazione di queſte refrazioni, niente di meno ſi poſſono conoſcere proſſimamente; e il dotto RIZZETTI [397] eleſſe la tenacità di alcuni mezzi, e ne formò una tavola, la quale ſe non li determina eſattamente, pur molto ſi accoſta al vero. Poſtocciò ne verrebbe, che quanto il corpo foſſe più diafano, tanto minore aveſſe denſità, e tenacità; quanto minore ſi trova la denſità, e tenacità, tanto minore foſſe la forza refrattiva dell'aria; e quanto finalmente queſta forza refrattiva dell'aria ſi faceſſe minore, tanto minore doveſſe eſsere l'angolo, ſotto cui ſi vede il corpo; talchè ſi poteſſe concludere, che maggiore del natu-

(397) *Continuatio Diſſertationis Anti-Bernoullianae de luminis refractione Au. Jo. Rizzetto.*

turale non doveſse apparire. Ma v' ha chi dalla forza refrattiva dell' aria non vorrà queſto fenomeno derivare, e piuttoſto dirà, che i raggi, i quali ſulla lente cadono perpendicolarmente, e quelli a lor più vicini meno obbliqui de' più rimoti, facciano per avventura una tal impreſſione nella retina, che gli altri derivanti dall' eſtremità dell' oggetto lucido, e più obbliqui entrando, refratti nell'occhio, abbiano poca forza riſpettivamente a primi; onde, eſſendo queſta minima riſpetto a quella, non deſti nell' animo quella ſenſazione, nè produca quell' effetto, che dovrebbe corriſpondere all' aſpettato ingrandimento dell' oggetto. Potrebbe tuttavia la coſa andar altramente, e non colpirſi neppure in sì fatto modo nel ſegno.

6. Per dare in queſto luogo qualche ſpiegazione al fenomeno, ch' ivi ſegue del §. *6.*, ſarà uopo di avvertire, che il ſugo traſpira a miſura dell' apertura de' pori, che trova nella cuticola delle foglie, e delle frutta. Un caldo temperato, e un ſoave freſco vietano, che lo ſvaporamento non ſia troppo copioſo, e quindi la pianticella creſce; ma il caldo talora divien sì grande, e dilata per modo le parti eſterne delle foglie, e d' altro di eſſa pianticella, che il ſugo eſala preſtiſſimo, e quindi le fibre ſi riſtringono, ed ella ſi riſtà. In certi eſtremi caldi la pianta ſi avanza più la notte, che il giorno, mentre la notte le apporta più vantaggio, che il giorno ſcapito. Se però ſi è veduto nel mattino creſciuta qualche parte inferiore della pianticella del grano, e la ſera qualche ſuperior parte, converrà dire, che

che l' aria di quella notte foſſe calda, e faceſſe le parti ſuperiori della pianticella medeſima traſpirar troppo, onde ſi riſtaſſero, ma che il freſco del terreno, impedendo lo ſvaporamento delle inferiori, elle creſceſſero; laddove l' aria di quel giorno foſſe freſca, e laſciaſſe creſcere le parti ſuperiori, e le inferiori, trovandoſi per avventura da' vapori innalzati dal Sole riſcaldate, non creſceſſero punto. Queſta conſeguenza non dee però eſſer meſſa, ſe non al rango delle congetture, fintantocchè ſia ſtabilita da oſſervazioni nuove, ed anche, ſe vogliaſi, più preciſe.

7. Le *gravità ſpecifiche* de' grani diverſi derivano a mio ſenſo dalla maggiore, o dalla minore quantità di materia, ch' eſſi contengono.

8. Ricavo dall' eſperienza del §. 9., che col ſugo nutritivo delle piante s' innalzano dalla terra pe' loro condotti quelle materie più affini, e più omogenee ad eſſe piante, che in quel luogo ſi trovano; talchè il color d' *oro* del *frumento* migliore potrebbe dirſi, che derivaſſe dall' affinità, ch' egli ha con l' *oro*. Le particelle della *materia bianca metallica* erano ſtate dalle radici di quella pianticella ſollevate col ſugo nutritivo, e ſi erano radunate colà, dove libero non avevano potuto avere il paſſaggio. In altro modo non naſcono i corpi ſolidi, che con una prima, per dir così, coagulazione, e mutua unione delle particole più tenaci de' fluidi. Si rende queſto manifeſto in luogo d' eſempio nelle parti tutte del corpo umano, le quali negli adulti ſono ſolide aſſai, men-

tre che ne' fanciulli ſi ſono riconoſciute per liquide, e proſſime a conglutinarſi. I filamenti ſolidi del corpo umano ſogliono eſſere dagli *Anatomici* nominati fibre, le quali, ſecondo la varia diſpoſizione, e teſtura loro, vengono a coſtituire organi del noſtro corpo di genere diverſo. Non altramente addiviene delle diverſe materie, che s' inſinuano nelle pianticelle.

9. Troppo è chiaro, che l' *Iride parabolica* oſſervata ſopra l' erbe del grano di alcuni campi, derivò da una rifleſſione de' raggi di luce, che ſi fece nelle gocciolette, di cui erano coperte quell' erbe.

10. Il grano tenuto a coperto crebbe poco, e ſol dopo molto tempo, perchè in queſto caſo il ſugo avrà riempiuto più agiatamente le veſcichette, di cui il ſeme è ripieno, e ſiccome eſſe ſono aperte da ambedue i capi, così il ſugo delle prime ſarà paſſato molto piano alle ſeconde, le avrà immollate poi tutte, e in moltoppiù ſpazio delle ordinarie 24. ore ſarà giunto al *picciuolo*, o alla radice del *germe* pe' vaſi voti, che da tutte le parti de' *lobi* vengono a unirſi alla barbicella in due ſiti. Queſta barbicella, lo ſtelo, e le foglie ſeminali, che cuoprono lo ſtelo medeſimo, eſſendo anch' eſſi ripieni di veſcichette vote, parimente ſi ſaranno imbevute dopo molto tempo, e tardi ſi ſaranno impregnate di quanto riceveva-no da' *lobi*. E quindi le foglie ſeminali, e lo ſtelo gonfiati, e avvivati agiatamente dall' azione de' ſughi, e ſoſpinti con difficoltà da quelli, che

ſcarſi

ſcarſi ſopraggiugnevano, ſi ſaranno alzati verſo la ſuperficie della terra con iſtento .

11. Hanno germogliato i ſemi di grano tenuti nel voto della *macchina pneumatica*, perchè l' elatere dell'aria, e il ſuo peſo non ſono la principal cagione della germinazione (398): e ſe il grano medeſimo ha germinato molto più nell' aria aperta, che nel voto della *macchina*, queſta verifimile ragione può darſi, che l' aria chiuſa nel ſeme, e liberata dalla preſſione dell' eſterno aere dentro quella macchina ſi ſpande con molta forza, e lacera molti vaſi deſtinati a portare, e a diſtribuire il nutrimento, onde ſi riſtà. Queſto almeno io ſono tentato di credere, finchè non cada altra ſpezial cagione in contrario.

12. Quel grano, che io trovai un dì ripieno di *materia ſimile al corallo bianco*, e quaſi oſſea, aveva per avventura ricevuto nel ſuo interno quelle particelle, che prima fluttuavano nel ſugo di tutta la pianticella. Ivi queſte annidateſi avevano depoſitato per così fatto modo, e in tanta copia, che poc' altro vi reſtava, che parti tartaree, o lapidee, o altra ſimile ſoſtanza.

13. L' oſſervazione del §. 18. ci porta a riconoſcere una deviazione di ſugo nella parte offeſa, per cui ſi fece l' *eſcreſcenza come legnoſa*. Dalla diverſità del liquore, che geme colle uova depoſte da alcune razze di moſche penſa il VALLI-

(398) Queſto viene confermato dagli eſperimenti fatti dal Signor HOMBERG *excerptis ex Commentariis Math. phyſ. Acad. ſcien. Pariſ.* intorno alla germinazione delle piante. „ L'aria, " dic' egli , „ è „ accidental cagione della germinazione.

SNIERI (399), che *naſcano in gran parte le diverſe maniere di galle, di gallozzole, di tubercoli, di ricci, di calici, di gonfietti, di coccole, di calli, di pillole, di veſciche, di tumori, di bitorzoli, di crene, di ſpugne, e di altre ſimili produzioni, o naſcenze ſforzate, o mentiti frutti*, che vengono in molte ſpezie di piante; onde con eſſo lui ragionando, ſi potrebbe ſupporre, che queſta eſcreſcenza foſſe nata per cagion di offeſa d' *Inſetto*. Ma egli è da ſaperſi, che ciò deriva talora per cagion di grandine, o di altro accidente, poichè percoſſe le foglie, o il gambo, ne reſtano livide le fibre, e offeſe, e ſi travaſa perciò il ſugo nutritivo, che ſtagna, e forma una durezza elevata in tumore nella parte offeſa.

14. Sarà difficile il render ragione, perchè i gambi del grano, quando ſi piegano, ſembri, che facciano ſempre una *curva* della medeſima natura, detratti i piccoli accidenti, e le minute differenze. Penſando tuttavia intorno alla gravità aſſoluta de' corpi, che lo ſpazio precorſo è tanto maggiore, che la porzione dell' arco infinitamente piccolo della curvità è minore, potrebbe eſſere, che nella *curva* dal gambo del grano deſcritta, eſſendo l' impreſſione della gravità ſempre diverſa, la forza centrifuga ſi variaſſe in tal maniera, che ſcambievolmente l' eccesſo foſſe emendato dal difetto, ſicchè tutte e due pigliate inſieme faceſſero, che l' effetto aſſoluto della gravità di quel corpo foſſe ſempre eguale. Il Marcheſe DELL' HO-

SPI-

[399] VALLISNIERI *Oſſervazioni intorno alla moſca de' roſai. p.* 2.

SPITALE dà ſopra queſto punto la ſoluzione di un ſuo Problema

15. Non è da ſtruggerſi la mente a indagare come introdotta ſi foſſe ne' gambi del nominato grano quella *materia geſſoſa*, che ritrovai ne' medeſimi. Ella ſi era certamente infinuata, come di altra materia abbiamo detto, ne' canaletti del loro ſugo con queſto medeſimo ſugo, finchè giunta in luogo, dov' ella non poteva penetrare, aveva quivi depoſte le ſue parti, e inſieme unite, facendo oſtacolo al libero corſo del ſugo ſopravveniente per allimentare le pianticelle.

16. Ma tanto baſti aver detto delle cagioni delle malattìe più ordinarie del grano in erba di queſto *Territorio Ravennate*, e di alcuni fenomeni appartenenti ad eſſo. Il più lungamente fermarmici potrebbe ſembrar troppo ardire. A me per tanto baſterebbe, che il poco, che ne ho detto, aveſſe ottenuto un grado di probabilità maggiore ſopra quello, che altri ne hanno generalmente congetturato, o che almeno mi foſſe toccato una qualche parte nella verità delle medeſime [400], giacchè, ſiccome appreſſo ELIANO, μηδὲ τὴν ἀρχὴν, *non interamente* poteva ella toccarmi giammai.



PAR-

[400] Parlando degli Antichi Filoſofi il *Greco* Padre San CLEMENTE ALESSANDRINO, diſſe, che avevano eſſi trattata la verità, come fecero le *Baccanti* il loro *Orfeo*, cioè, che a ciaſcheduno ne era toccato un brandello.

PARTE IV.

De' Rimedj delle malattìe del grano in erba.



E il vero metodo di curare i morbi non poſſa averſi, quando prima non ſe n' abbia perfetta la *Fiſiologìa*, e la *Storia*, io mi luſingo di poter ora con piè franco andare in traccia de' rimedj delle malattìe del grano in erba, perchè molto parmi aver detto della loro *Storia*, non meno che della loro *Fiſiologìa*. Svelate già dunque nel miglior modo, che io abbia ſaputo le origini di tali malattìe, mi rivolto a cercarne i rimedj [401] e giuſta la notizia ſuggeritami dalle proprie eſperienze, e giuſta il lume ricevuto da quelle degli altri (402). Quantunque aſſai bene ſia ſtato ragionato de' rimedj particolari d' alcune di loro, pochiſſimo però, o nulla affatto ſopra quelli di altre ci è ſtato laſciato.

[401] Cic. *l.* 3. *Tuſc. q. ut medici cauſa inventa, curationem inventam eſſe putant: ſic nos aegritudinis cauſa reperta, medendi facultatem reperiemus.*

(402) Lo ſcoprimento delle verità pratiche è un favor particolare della ſorte, che ſi ſparge indifferentemente ſopra tutti quelli, che operano, perchè elle ſono di natura ad eſſere facilmente conoſciute. Molti argomenti ſe ne poſſono avere nella ingegnoſiſſima Diſſertazione dell' *azione del caſo nelle invenzioni* del celebre Padre Jacopo Belgrado della Compagnia di Gesù.

to. Se io debbo dire, quanto la cotidiana esperienza per molti anni mi ha fatto conoscere, la cura di queste malattìe non è senza difficoltà. Egli è chiaro, che tutti i rimedj si debbono dirigere o alla pianticella del grano, o al seme della medesima. A due maniere essi tutti si riducono, e sono i preservativi, e gli espulsivi, quelli impediscono l' effetto, questi tolgono la cagione. Ad alcune malattìe si richiedono gli uni, ad altre gli altri, e ve n' hanno alcune, che gli uni, e gli altri possono richiedere. Di simili rimedj intendo ora io di favellare.

CAPITOLO I.

Rimedj per la *ruggine del grano*.

1. A Prevenir la *ruggine*, e a scacciarla dalle biade hanno gli antichi Autori ne' loro libri annoverati alcuni rimedj, de' quali niuno sembra forse, che conseguisca quell' esito felice, ch' essi vantano. Mi è giovato il provarne la loro efficacia per valutarne il loro peso. Viene asserito da essi, e da molti de' moderni accordato, che quando le notti sono serene, e non sia punto di vento, o appajano *nebbie*, o soffino *venti Orientali*, se *paglie*, o *sterpi* si accendano, resterà certamente impedita la *ruggine* [403]: il che per veri-

[403] PLIN. XVIII. 29. perciò: *sarmenta, aut palearum acervos, & evulsas baerbas, fruticesque per vineas, camposque cum timebis incendito, fumus medebitur.* E COLUMELLA *l. de arboribus cap.* 13. ha:

verità non avendo mai potuto con ſicurezza rinvenire, mi vieta il buon ſenſo di preſtarvi intera fede, o almeno io vengo in opinione, che ciò rado ſia di molto.

2. Neppure mi ha retto alla prova il mettere de' *rami di lauro* vicino al grano, perchè queſti non l' hanno liberato dalla *ruggine* [404] ſopravve-

ha: *Palearum acervos inter ordines verno tempore poſitos habeto in vinea. Cum frigus contra temporis conſuetudinem intellexeris omnes acervos incendito, ita fumus nebulam, & rubiginem removebit.* Così il medeſimo nel Cap. 13. *de Re Ruſ.* Anche PALLADIO RUTILIO *de Re Ruſ. l.* 1. *Tit.* 35. *Contra nebulas, & rubiginem paleas, & purgamenta pluribus locis per hortum diſpoſita ſimul omnia, cum nebulas videris inſtare, combures....* Onde M. AG. GALLO nel ſuo libro *delle venti giornate dell' Agricoltura* laſciò: „ ſogliono venire alcune „ nebbie, o caligini, che molto nuocono le biade, e ſpecialmente „ quando fioriſcono; onde ſi provvede, per detto di Paladio, met„ tendo paglie, e purgamenti di caſa in più luoghi, e quando ap„ pajono queſte nebbie, ſubito s'apicchi il fuoco in eſſe.“ Nello ſteſſo conſiglio venne CARLO STEFANO nella ſua *Agricoltura nuova* l. 2. c. 154. „ ſe le nebbie, “ dic' egli, „ o il carbonchio minaccia„ no qualche danno, biſogna ammaſſare in molti luoghi del giardi„ no molti tumulti di ſarmenti, o di paglia, o di erbe, o di ar„ buſti, poi mettervi fuoco.....“ e aggiugne: „ contra il malio, „ o carbonchio, ch' è una corruzione, che viene all' erbe, e agli „ alberi per una mala coſtellazione, non v' è coſa di maggior va„ lore, che di abbruciare con iſtabbio il corno deſtro di un bue, „ di manieracchè da ogni parte n' eſca il fumo grande. “ Fors' anche preſentemente in *Inghilterra* uſeranno alcuni il fummo delle paglie, già il CHAMBERS dice, che „ per impedire le ruggini i più e„ ſperti fra' contadini ſogliono, mentre i venti orientali ſoffiano, „ difenderſi da' medeſimi coll' abbruciare mucchi di canne, paglia, „ ed altri incendevoli dalla parte del vento de' loro Pometi. “

(404) PLIN. XVIII. 17. *Rubigo quidem maxima ſegetum peſtis; lauri ramis in arvo defixis tranſit in earum folia ex arvis.* Onde CARLO STEFANO al luogo citato ſoggiunſe: „ ovvero ſarà buono pian„ tare in più luoghi del giardino molti rami di lauro, perchè il „ malio caderà tutto ſopra di quelli. “ Intorno a cui favellò TEOFRASTO nel l. 8. della *Storia delle piante cap.* 9. 10. ampiamente.

venuta, o da quella, che v' era di breve tempo; giacchè, quando ella è giunta a certo grado di malignità, è ſempre ſtata creduta irremediabile [405].

3. V' ha chi crede, che poſſa ricavarſi rimedio contro le *ruggini* dallo ſpruzzare il grano in erba con *tabacco*, o con *pepe* [406], ma queſto non riſponde all' eſperienze per fino alla terza volta da me fatte. Per la qual coſa è manifeſto, che altrove ſi debba inveſtigare il rimedio a queſta malattìa.

4. Egli è però d' avvertire, che certe *ruggini* non ſi poſſono evitare, onde non v' è mezzo, che vaglia a prevenirle, non che, come abbiamo detto, a ſterminarle, quando venute ſieno. Fra eſſe vorranno porſi quelle, che ſi producono da ſubbollimenti, da improvviſi ghiacci, da venti brucianti, le quali non ſi poſſono prevenire, nè rimediare in conto alcuno.

5. Ho gettati più volte fra il grano in erba nel meſe di Aprile pezzi di *panno*, e di *fanella*, o di altro intinti in una forte ſoluzione di *ſal di tartaro*, o di *ſal marino*, o in *aceto* buono di vin bianco, e ben ſeccati, giuſta l' inſegnamento dell' HALES (407), per garantirlo da cattivi effetti de' vapori, e dal ſoffocamento dell' aria, ma non ardirei di affermare, che foſſero ſtati ſempre

(405) Ce ne aſſicura il medeſimo PLINIO XVIII. 28. *Carbunculus autem regionum late patentium; non difficili remedio, niſi calumniari naturam rerum homines, quam ſibi prodeſſe, mallent.*

(406) CHAMBERS *Dic. des Sc.*, ed altri.

(407) HALES *Stat. des Veg. p.* 223.

di giovamento, avendoli ſpeſſo per molto equivoci ritrovati: e certamente v' hanno alcune *ruggini* provenienti anche da' medeſimi, le quali non ſembra, che poſſano trovar rimedio.

6. Congetturai, e con l' eſperienza mi accertai, che un buon preſervativo contra i cattivi effetti de' vapori foſſe una denſa liſciva di *grano carbone* ben calcinato, e ſpolverizzato unito col *ſale di tartaro*, e in eſsa fatto ſtare il grano per un giorno intero prima di ſeminarlo. La combinazione di queſti due ſali è tale, che ſi rende atta per avventura ad aſsorbire fortemente i vapori medeſimi, quando eſſi attaccano il grano.

7. Ma acciocchè l' eſalazioni pernizioſe delle *paludi* non contribuiſcano alla formazione della *ruggine*, io ho creduto ſempre ben fatto, che ſia formato un largo *foſſo* vicino ad eſse, pel quale la putrida acqua continuamente eſca, e che v' entri della pura, e con eſſa ſi miſchi. Queſto a me pare, che ſia lo ſpecifico rimedio contrario alle medeſime, perchè impediſce in qualche modo la fermentazione, corroborando, per dir così, come volle il Signor LANGE [408], le parti di quel corpo liquido contra l' irruzione de' corpuſcoli ſeparati.

8. Ma ſe foſſe praticabile, come penſa ABRAMO MONTING (409), che debba farſi agli alberi per difenderli dalla *rugiada* frigida notturna, l' *innacquare* ogni ſera le biade, quando fioriſcono, io cre-

(408) *Traitè des vapeurs par M. Lange med. de la Soc. Roy.*
(409) MONTING. *Curioſa deſcriptio plantarum.*

crederei, che foſſe anche giovevole contro i pernizioſi vapori.

9. Efficace rimedio ſpeſſe volte ho ritrovato quello di ſcuotere da' gambi del grano la *rugiada*, primacchè ſi condenſi. Io l' ho ſcoſſa nel campo delle mie oſſervazioni per mezzo di un piccolo mazzo di ſottiliſſimi *vimini*, ma quantunque ſpeſſo veniſſe il *grano carbone*, e la *filiggine* ſenza la *ruggine*, pur talora è venuto anche la *ruggine* medeſima. Il Sig. PLUCHE, o chi altro ſia l' Autore dello *Spettacolo della Natura* (410), inſegna, che *ſi prenda in due perſone una lunga corda per farla ſucceſſivamente paſſare ſopra tutte le ſpighe di un campo, ſcuotendo ben bene la ſpruzzaglia, primacchè il Sole l' accenda*. Per queſto il TANARA dice (411), *le ſpighe, che ſono aſſai pendenti, non temono tanto il malume, perchè ſopra quelle non ſi può fermare l' umidità. Similmente quelle, che ſonoſi alzate aſſai lungi dalle foglie, lo temono poco, perchè per ordinario ſopra le foglie queſto ſi ferma*. E TEOFRASTO aveva detto (412), che *la ſpiga rimarrà illeſa dalla ruggine, ſe ſarà coperta da qualche foglia, che non laſci la rugiada innoltrarvi*; ma egli non avvertì, o non ſeppe, che la *rugiada* poteva trovarſi beniſſimo ſopra la ſpiga, quantunque queſta foſſe coperta .

10. Di qui pur venne, che fu giudicato ottimo rimedio per la *ruggine*, nella qual opinione

(410) *Spect. de la Nature T.* 4.
(411) TANARA *Econom. del Cit. in Villa* l. 6. car. 458.
(412) TEOFRASTO *de Cauſ. Plant. l.* 4. *c.* 17. ὃτι ἡ σάχυς μᾶλλον ἀπήρτηται τῶν φύλλων.....

io vado volentieriſſimo, lo ſterpare di mezzo a' grani l' *erbe eterogenee*, e qualunque altra erba, che quella del grano non ſia, o di rimuovere la terra intorno a' medeſimi (413), perchè allora la *guazza* ſi ferma più difficilmente ſulle ſpighe ſcoſſe da leggier vento. In molti luoghi delle mie oſſervazioni ho fatto uſare queſto rimedio, e v' ho quindi trovato bensì *vermini*, *filiggine*, ed altre malattìe, ma la *ruggine* quaſi giammai.

11. Se tanto agevole, e di poca ſpeſa, quanto ſicuro, e certo foſſe l' *ugnere d' olio* le ſpighe, io crederei queſto un gran rimedio per prevenire le nocevoli *guazze*; ſiccome un vento, che ſoffi ben forte dopo la venuta di tali *guazze*, ma non a ſegno di troncare i gambi del grano, ſarebbe forſe l' unico rimedio naturale contro di quelle, quando la ſituazion particolare de' medeſimi gambi, e la loro teſſitura più forte non poteſſero contribuirvi, e difenderli in parte da quelle alterazioni, che ſi producono in altri gambi più dilicati, o mal ſituati, o poſti in aria da non poter eſſere agevolmente commoſſa, onde ſia per ordinario quieta, e tranquilla.

CAPITOLO II.

Rimedj per la *filiggine del grano*.

1. SIccome in vano ſi è cercata dagli Scrittori la cagione di queſta malattìa, così parmi, che

[413] PALLADIO *l.* 2. *Tit.* 9. ebbe: *ſi ſiccas ſegetes ſarculaveris*,

che in vano ſe ne ſia cercato il rimedio . Null' altro che preſervativi poſſono giovare contro la *filiggine*, giacchè introdotta, ch' ella ſiaſi nelle biade, già non è rimedio, che vaglia per levarvela. A impedire, che vi s' introduca, ſi dovrà operare, per modo che non ſi formi nella ſpigarella naſcente quella impreſſione, onde naſce la fermentazione, e quindi il corrompimento. Direi certamente, che queſto mi foſſe riuſcito di ottenere per mezzo del recente *ſpirito di ſale armoniaco* ſpruzzato ſulle biade medeſime, primacchè ſieno formate le ſpighette ne' proprj aſtucci, col *ſale armoniaco* ſciolto nell' acqua [414], e miſto col liquore alcalino del *ſale di tartaro*, col *ſale prunello* ſciolto nell' acqua, o ſimili. Io mi ſono figurato, che queſte materie trattengano, e ſmorzino quella impreſſione, che dovrebbe paſſare alla ſpighetta ne' ſuoi involucri. Ma non voglio parlarne, concioſſiacchè per tre anni continui tal eſperienza mi è riuſcita vera, e ne' due ultimi anni, ſenza trovarne la cagione, non ho potuto mai alcuna ſpiga prevenire nella filiggine.

2. Se tuttavia queſto rimedio foſs' anche il più efficace, non ſarebbe forſe il più utile, perchè ſempre qualche ſpeſa richiederebbe; nè ſarebbe il più eſeguibile, perchè qualche incomodo apporte-

aliquid contra rubiginem praeſtitiſti, maxime ſi ordeum ſiccum ſarrietur. E VARRONE *de R. R. l. 2. c. 12. Segetes, quae humidae moveri poſſunt, melius tamen ſicce ſarriuntur, quoniam ſic tractatae non infeſtantur rubigine*.

[414] Molte eſperienze fanno vedere, che il *Sale armoniaco* rende freddiſſimi i liquori, ne' quali è diſciolto, e ciò per la ſua parte ſali-

terebbe a gente, che tutta la vita loro paſſano in continui incomodi; talchè io ſono ben perſuaſo, che dagli *Agricoltori* non verrebbe abbracciato giammai. Ma ſe queſti terranno iſolate le loro biade, gettando i grani della ſemenza in qualche diſtanza l' uno dall' altro, e ſterpando continuamente l' erbe, che naſcono fra eſſe, avranno forſe un provvido rimedio contro queſto morbo, com' io ho più volte eſperimentato. Addivenga ciò, perchè una tal ſeparazione dia loro un nuovo vigore, o perchè quindi i loro gambi ricevano, e ſi giovino d' ogni freſc' aura, che ſpiri loro d' intorno, o altro ſia, il giovamento è certo (415).

3. Avranno pure un forte preſervativo a queſta malattìa le biade, ſe conſiderata la qualità delle terre, in cui ſi ritrovano, non ſaranno arate in tempo de' *venti pernizioſi*. In queſto non s' ingan-

ſalina fiſſa, piuttoſtocchè per la ſua parte volatile, come appare per la ſoluzione del capo morto, da cui ſi cava lo *ſpirito*, e il *ſal volatile aromatico olioſo*, perchè ſi ſente un freddo conſiderabiliſſimo anche di mezza State, applicando la mano d' intorno al vetro, dentro cui ſi ſia fatta la ſoluzione di queſto capo morto. Molto atto ſembra un tale freddo a ſmorzar l' azione della fermentazione.

[415] Da una lettera del Sig. SEGUIER ebbi: „ In varj libri d' „ agricoltura, che un mio Amico ha portato da Parigi, ſi parla de' „ varj metodi per impedire, che la malattìa, che qui in Verona ſi „ dice carbone, e credo, che ſia l' uſtilago degli Antichi, non infetti le „ ſpighe di frumento: e ſi conclude, che il miglior metodo ſiaſi far „ macerare, e mettere in molle il grano, avanti di ſeminarlo, „ nell' acqua di calce. " Se queſti libri parlano veramente della *filiggine* noſtra, ch' è l' *uſtilago degli Antichi*, io non potrei accordare a' loro Autori quanto concludono, perchè queſto rimedio per la *filiggine* non mi è riuſcito fortunato, ma piuttoſto lo è ſtato pel *grano carbone*.

gannarono certamente gli Antichi (416), quantunque s' ingannaſſero nell' aſſegnar la cagione, perchè tali foſſero eſſi venti, e chiaro non eſprimeſsero il morbo, per cui uſar ſi doveva una tal prevenzione.

CAPITOLO III.

Rimedj pel *grano carbone*.

1. MOlti tentativi per avere un particolar rimedio contro queſto ſtravagante male mi ſono ſtati inutili, come ſi è veduto nelle ſperimentali ſeminazioni degli anni 1749., 1750., 1752., 1754.. Non così furono veramente gli altri, che ſeguirono da poi; ne mi ſembra di poter negare, che lavorandoſi dall' *Agricoltore* profondamente il terreno, e triturandolo, e ſmovendolo, prima di ſeminarlo, quando non ſia paludoſo, e ſterile per ſe medeſimo, ſi debbano eſaltare que' ſpiriti, i quali ſieno proprj a raſſodar le fibre del ſeme, e della pianticella, e sì dal morbo qualche volta allegerirgli, e difendergli [417].

2. Il

[416] A qualche coſa di ſimile avrà mirato VIRGILIO, quando cantò *l.* 1. *Georg. v.* 50.

At prius ignotum ferro quam ſcindimus aequor
Ventos, & varium coeli praediſcere morem
Cura ſit . . . . . .

[417] Il Signor TILLET car. 119. crede, che „ le biade meſſe a „ 6. pollici di profondità, dovendo perciò gettare molti piani di ra„ dici, prima d'uſcire dalla terra, potrebbero al favore di queſte ra„ dici multiplicate acquiſtar un vigore, che daſſe minor forza alla „ carie. " Io benſì gli accordo, che queſto vigore non baſti a fermare

2. Il *concime*, o *letame* preparato può molto contribuire a queſta copia di ſpiriti (418).

3. Ma queſti rimedj non tolgono, e non diſtruggono, come ſi vede, il *grano carbone*. Molti vorrebbero, e v' hanno certuni, che vogliono s' infonda il grano prima di ſeminarlo nella *calce viva* allora allora ſmorzata nell' acqua. Io l' ho trovato utile, ma non ſempre ſempre ſicuro rimedio (419) contro il *grano carbone*.

4. Un

mare nella pianticella interamente l' azion pernizioſa già in eſſa introdotta, com' egli replica più chiaro a carte 135.; ma poi anche vedo, che l' acquiſtato vigore può in qualche maniera afforzar le fibre del granello, o del gambo medeſimo, onde l' azion pernizioſa non s' introduca. Egli aggiugne a car. 121., che „ una gran quan„ tità di ſemenza però ſolamente per ragione de' ſolchi troppo pro„ fondi. " E veramente il lavoro profondo non dee già per eſſer utile laſciar i ſolchi profondi molto, quando ſi venga bene dall' *Agricoltore* tritolando la terra. Alcuni vecchi eſpertiſſimi *bifolchi* da me in più maniere interrogati, perchè intendeſſero, mi hanno di ciò in più maniere aſſicurato, perchè io intenda.

[418] E in queſta preparazione ſi abbia in mira, che può venire il *letame* infeſtato, per avviſo del Signor TILLET, dalle paglie, che hanno portato ſpighe di *grano carbone*.

[419] Scrive l' Autore dello *Spettacolo della natura* nel T. 4. „ La „ preparazione delle ſemenze conſiſte nel farle paſſare per una liſci„ va di calcina viva; o nell' infonderle per cinque, o ſei ore in una „ ſalamoja fatta a poſta. Dopo aver gettato in una gran ceſta 120. „ lire di biada, ch' è la quantità ordinaria, e baſtevole per ſemina„ re un campo, ſi può tuffare per qualche ora la ceſta, e la biada in „ un tino, in cui vi ſieno 20. libbre di calcina con nove, o dieci „ ſecchie di acqua, indi far ſeccare la biada al Sole: ovvero ſi vol„ ta, e ſi rivolta in un tino, nel quale ſi ſieno ſtemperate coll' ac„ qua tre libbre di ſalnitro, ovvero la metà di alume, o ſolamen„ te due once di verde rame. Altri v' adoprano il vetriuolo, altri „ il ſal comune. Altri fanno queſta ſalamoja di ſali eſtratti dalle „ ceneri di ogni ſpezie di pianta." E il Signor TILLET *ſuite des expet., & reflex. relat. a la Diſſer. ſur la cauſ. &c. p.* 51. la fa di ceneri del legno nuovo. E aveva detto p: 41., che uno de' mi-

glio-

4. Un eguale vantaggio comprovai nel bagnarlo, e tenerlo infuso in *vinaccia* ben calda, o anche in *morchia* ben disciolta nel *ranno* (420).

5. Ma forse di tutti questi più efficace ho comprovato quello di spargere per qualche tempo prima sopra della semenza medesima la *polvere di zolfo*, e con essa alquante volte mischiarla, e rimuoverla; a tal segno che nel campo delle mie esperienze è stata bene sfortunata quella spiga, che dopo ciò è venuta da un simile morbo attaccata.

6. E ben rimedio efficacissimo sarebbe il levare diligentemente, primacchè fosse mietuto il grano,

gliori, e de' più facili rimedj è di lavare il grano nell' acqua di *lisciva comune*, e che l'*acqua di calce* versata quasi bollente sopra il grano ebbe buon effetto; laddove l'HANOVIO *Rar. phis.*, *&c.* commenda il mischiare col grano, prima di seminarlo, la polvere di *calce viva*. All' una, e all' altra maniera io mi soscrivo, troppo parendomi evidente la esperienza; così a car. 42., che l' infusione del grano nell' *orina putrefatta* di vacca è uno de' rimedj più efficaci. E per tale ho anch' io valutata questa, non che ogni altra *orina putrefatta*. Tutte le *salamoje* però, quantunque portino qualche rimedio alle malattìe del grano, più atte non ostante sono a fecondare il grano medesimo. Si sa per esperienza, che le semenze bagnate con *lisciva* sono più feconde, e fanno miglior riuscita, onde VIRGILIO *Georg.* 1. *v.* 195.

Grandior ut foetus siliquis fallacibus esset.

E MARCELLO MALPIGHI nella più ingegnosa delle sue Opere, ch'è l' *Anotomia delle piante*, disse, che per affrettare, e rendere più abbondante la germinazione delle biade, bisognava alcuni giorni prima lasciare infusi i grani nell' *acqua di pioggia*, dove si fosse messo del *letame di cavallo*, e di *cervo* mischiato con poca *paglia*. E il medesimo MALPIGHI *De seminum vegetatione p.* 12. *Calcis vivae usu prae caeteris excrescebant Plantae.*

[420] E' da credere, che la *morchia* si usasse con profitto ne' tempi anche di VIRGILIO, perchè egli ha nella Georg. 1. v. 193.

Semina vidi equidem multos medicare serentes,
Et nitro prius, & nigra perfundere amurca.

tutte le ſpighe, che *carbone* contengono; il che potrebbe farſi con molta facilità dagli *Agricoltori*, e da' loro *dimeſtici*, quando uſar non voleſſero gli altri agevoli rimedj, e di poca ſpeſa (421), viſitando con queſta diligenza un campo per giorno, allorchè le ſpighe ſono vicine alla loro maturità, e che il *grano carbone* ſi manifeſta pienamente. Una tale attenzione levarebbe alla ventura ſemenza la maggior parte del grano male affetto; e s' ella ſi continuaſſe per alcuni anni, ſi giugnerebbe ad aſſicurarſi di averlo tolto affatto dal proprio grano [422]. La eſperienza me ne ha dato tutto il lume.

CAPITOLO IV.

Rimedj pel *grano ghiottone*.

1. IL Signor BRADLEY, in conſiderazione degli animaletti, che poſſono inſinuarſi nella giovane biada, e creſcere con eſſo lei, vuole, che pri-

(421) „ Il reſultera " , dice il tante volte mentovato Signor TILLET nell' ultimo capo della ſua Diſſertazione, „ de huit combi- „ naiſons differentes, aux quelles je me ſuis bornè, que la prepara- „ tion la plus chere en ce genre, pour un boiſſeau de grain, ſera „ d' un ſol huit deniers, & que la moins coûteuſe ſera de deux de- „ niers. " Queſte combinazioni, delle quali mi rallegro col noſtro Autore, gran riſparmio non ſolo, ma ricolta abbondante apporterebbero, ſe da' mal coſtumati *Agricoltori* uſar ſi voleſſero.

(422) Il medeſimo Signor TILLET nel capo citato aſſicura, che quando ſi ſemini un grano puro, e ſano, ſenza anche alcuna preparazione, non abbia a temerſi naſcita di ſpiga corrotta, ſe per altro il terreno, che cuopre queſto ſeme, non ſia da quella polvere infettato, ch'è un veleno per eſſo altrettanto pericoloſo, quantocchè baſta, ch' ella il tocchi. Ma tutto queſto io certamente non potrei dire.

prima di ſeminare il grano ſi tenga per trenta ore in infuſione di una forte *ſalamoja* [423], dove ſia ſtato ſciolto l' *alume*, poi ſi lavi nell' acqua freſca, perchè ivi galleggiando i grani guaſti, ſi dovranno eſſi diligentemente ſeparare, e trar via. Aſſicura nello ſteſſo tempo, che ſe queſta macerazione non avrà qualche volta il ſuo effetto, verrà ciò, o perchè la *ſalamoja* non è ſtata forte baſtevolmente, o perchè la biada non vi è ſtata un tempo ſufficiente per entro infuſa. Soggiunſe in fatti il Signor NEEDAM (424): *avendo fatto ſtare in infuſione alcuni grani guaſti in una forte ſalamoja, ed eſaminati poi in capo a* 12., *o* 15. *giorni ne cavai corpi viventi; ma non iſcoperſi alcun ſegno di vita in quelli, che laſciai macerare per* 30., *e più giorni*. Ottimo trovai da prima queſto rimedio, ma conſiderato poi meglio il fatto mio, e a più ſano intelletto, mi è convenuto dubitarne, perchè una volta mi riuſcì, ma avendolo altre volte molte tentato, ſenza laſciar indietro ogni più eſatta precauzione, non ha riſpoſto all' eſperienza, e ſempre deluſo ne ho atteſo indarno la deſiderata privazione di quelle ſpighe morboſe.

2. Arriſchiai di mettere il grano ſoſpetto di *ghiottone* ne' bagni di *acqua dolce*, i quali non furono ſolamente inutili, ma forſe nocivi, avendogli cagionato maggior copia di ſpighe infette dell' ordinario.

[423] *Salamoja* è veramente un compoſto di acqua, e di ſale, parola nata forſe dall' ἁλμυρὸς de' *Greci*, o dalla *muria* de' *Latini*, *ſalamuria* de' baſſi ſecoli nell' *Italia*.

[424] NEEDHAM *Nouvel. decouver. fait. avec le Microſc. Cap.* 8.

3. Giovamento bensì ho veduto, che apporta il tener lungo tempo questo grano sospetto nella polvere di *arsenico*. Questa facendo il più di que' *vermini* morire, che si trovano forse appiattati negl' invisibili meati del granellino, lo libera quasi interamente dal *ghiottone*. Io me ne valsi con sicura felicità contro tutti i *verminetti* delle biade, che rimasero debellati agevolmente, e vidi, ch' era pur cagione, che di nuova fecondità si vestissero le medesime. E me ne valsi, perchè m' imbattei a leggere in RODOFREDO KLAUNIO (425), essere stato creduto, che questo minerale avesse portato grandissimo vantaggio alle campagne di *Barberia*.

4. Il rimedio in somma sopraccennato di spogliare i campi delle spighe contumaci sarà in questa malattìa eziandio il più sicuro, e il più agevole, che suggerir si possa.

CAPITOLO V.

Rimedj per *altre malattìe del grano in erba*.

IO non ho giammai trovato rimedio alcuno, che sia valevole a prevenire, o a togliere il *giallume*, che vien sopra le biade; e se qualche vol-

[425] RODOFREDO KLAUNIO *Acad. Caes. Leopold. Carol. nat. Curios. Ephem. sive obser. med. Phys. a celeb. vir. tum med. tum aliis erud. in Germ. & ext. eam communic.*, ebbe notizia, che gl' *Inglesi* avendo mandato gran quantità di *arsenico* nella *Barbaria*, forse per altro fine, questo servì alla fecondazione di que' campi, e all' estirpamento de' *Ghiri*, e di un gran numero di altri animali, i quali

volta mi è ſembrato di apportarne loro ſufficiente giovamento, eſſo non è ſtato, che apparente, perchè tuttavia le medeſime ne hanno poſcia riſentito il danno. Qualche maniera di *giallume* non oſtante ſarà prevenuto con que' rimedj medeſimi, che ſono contro la *ruggine*.

2. Non maggiore fortuna ho provato nell' oppormi alle cagioni, che fanno i *granelli voti* dentro la ſpiga. Dopo molte ricerche per averne un ſicuro rimedio, ho acquietato la ſame, che ne aveva; perchè non ho tenuto già per rimedio praticabile, almeno quanto a' grani in erba, l' innaffiare le piante in tempo, ch' eſſe gettano, ſiccome raccomandano generalmente il MORTIMER, e il DUHAMEL nelle loro Opere, quantunque poteſſe ciò eſſer utile, uſando molta diligenza, alle pianticelle anche del grano, e l' abbia io per tale in breve tratto praticato. Allorchè per altro ſopravvengano grandi calori, l' innaffiamento è piuttoſto dannevole.

3. Non così gettai la fatica nella ricerca di un rimedio, che preſervaſſe i gambi dalle *ſpighe vote* di grano, perchè ſpeſſo mi riuſcì di ſalvarli con que' rimedj medeſimi, che li liberava da' *vermini*. Queſti ſi avranno più ſotto. Giova però talora il non toccar le ſpighe, quand' eſſe ſono in fiore, ond' è, che rimedio non v' ha alcuno per pre-

li offendevano i prodotti della terra. E queſto egli non eſitò a credere, dopo aver veduto ne' prati della Sileſia vicini alle caſe, dove ſi prepara l' *arſenico*, pullular le *gramigne*, e l' *erbe* tutte con vigor prodigioſo; perchè le ſaline, e le ſulfuree particole alla fecondità conducono.

prevenir le *ſpighe vote*, quando in quel tempo dominano venti gagliardi, o fa gran pioggia. Non è ſempre vero, come dice il TANARA, che *per evitar queſto in parte ſi potrà ſeminar preſto* [426]. Neppure avrà rimedio alcuno la *ſpiga vota*, quando il gambo per qualche accidente ſi rompa (427), o venga un improvviſo gelo, o faccia una ſmoderata vaporazione, o altro.

4. La *ſterilità* del grano può rimediarſi coll' ingraſſare il terreno, in cui vuol ſeminarſi, e col fecondar queſto di ſughi proprj, e abbondanti. Quando ciò non ottenga l' intento, ſi ſemini anzi grano groſſo, come faſſi al monte, dove povera è la terra ordinariamente. Se le biade diventano piccole, e miſerabili poſte ſempre in un ſuolo medeſimo, biſognerà avvertire ogni anno di mutar

(426) TANARA *Econ. del Cit. in Villa* l. 6. p. 453. Ma il *ſeminar preſto* farà un pregiudizio, che in parità di circoſtanze ſarà maggiore del vantaggio, che ne potrebbe ridondare dal toglierci le ſpighe vote. Abbiamo dal Signor TILLET *Suite des exper., &c.* pag. 28.: „ E' bene di non ſeminare troppo preſto il frumento, almeno „ in certi climi. I gran geli ſono capaci di diſtruggere i piedi, „ che hanno molto vigore, e che portano gambi alquanto formati. „ Le biade appena naſcenti reſiſtono a queſti medeſimi geli, e ſi na„ ſcondono ſotto la terra a quella impreſſione di freddo eſteriore, „ che i gambi di frumento troppo avanzati non poſſono per av„ ventura ſoſtenere. "

(427) Quando non ſi voglia ſeminare il grano a certa profondità, per cui il gambo acquiſti maggior vigore, e forza per reſiſtere alle percoſſe di vento, o di altro, che ſoverchiamente lo pieghino. Del profondar molto ſotterra i grani è ſtato parlato dal WOLFIO *vera Cauſ. multip. frum. admir. omnem plan. vegetat. una illuſt. cap.* 4. Egli lo inſinua, e avverte altresì di gettarli più lontani l' uno dall' altro, che non ſi fa ordinariamente; perchè ne verranno faſci di ſpighe per ogni grano.

tar loro ſito (428). Dirò per prova, non per conſiglio, che da queſta malattìa preſerva le biade il bagnar di *latte* in egual porzione di acqua le ſue radici, come il MONTING [429] conſiglia di fare alle piante, che ſi veggono quaſi impiccolite per cagion di penuria, e di morbo.

5. E' ſtato ſempre un ottimo rimedio al *luſſureggiar delle biade*, quando al primo apparir di Primavera s' alzan troppo, e diventano folte di ſovverchio, il far entrare nel campo, ſe il terreno è aſciutto, una mandra di *Pecore* per rodere la punta tenera di quell' erbe, che ſi fiaccherebbero ſotto il peſo della ſpiga [430]. Si poſſono anche cimar col taglio, ed io l' ho fatto praticar più volte con giovamento.

6. All' *infeſtazione degl' Inſetti* furono dagli Antichi portati varj rimedj, e non inutili, e mai ſi è ceſſato d' inventarne de' nuovi per ripararne i ſenſibili danni. Vuole TEOFRASTO (431), che tut-

[428] L' Autore dello *Spettacolo della Natura* T. 2. favellando delle medeſime, riflette, ch' eſſe „ ſi ſucciano tutt' i ſughi a lor „ proporzionati, laddove mettendole in una nuova terra, ne ritro- „ vano ſempre de' nuovi. "

(429) MONTING *Curioſ. Deſcrip. Plantar.*

(430) E però VIRGILIO nella *Georg.* 1. *v.* III.

. . . . . *ne gravidis procumbat culmus ariſtis;*
Luxuriem ſegetum tenera depaſcit in herba.

E PLINIO XVIII. 17. *Luxuria ſegetum caſtigatur dente pecoris in herba duntaxat, & depaſtae quidem, vel ſaepius nullam in ſpica injuriam ſentiunt.*

[431] TEOFRASTO *De Cauſ. Plant. l.* 5. *c.* 11. *Omnia, quae leniſco inſerta terrae mandantur, minus vermiculationem ſentiunt, odoris, caloriſque cauſa.* Ed ivi pure: *Minime vermiculantur, quae acerba, & vehementia ſunt.*

tutte le cose mischiate col *lentisco*, se sieno gettate in terra, facciano, ch' ella dia minor quantità di *vermini*. Spruzzavano i grani con acqua mischiata col sugo dell' erba *sempreviva* (432), che chiamavano anche *sedum*, della quale se ne fa il vetro. Altri [433] spremevano il sugo del *cocomero serpentino*, e vi mischiavano in acqua le sue trite radici, e quando le biade cominciavano ad essere infestate, ne bagnavano i solchi per iscacciarne i nocivi animali (434). Ho usati questi rimedj delle volte assai, ma sempre con poco frutto. *Contro le lumache, e le zuccajuole*, dice CARLO

[432] PALLAD. *de Re Rust. l. 2. Tit. 35. Contra Erucas semina, quae spargenda sunt sempervivae succo madefiant.* E PLINIO XVIII. 17. *Democritus succo herbae, quae appellatur aizoon in tegulis nascens, tabulisve, latine vero sedum, aut digitellum, medicata seri jubet omnia semina.*

(433) COLUMEL. *de R. R. l. 2. c. 9.*

(434) AGOSTINO GALLO l' aveva imparato, quando scrisse nelle sue *venti giornate dell' Agricoltura*, che „ rimedio pe' vermi, che „ mangiano il grano sotterra, sarà il mettere quel seme, che vuol „ seminarsi a molle una notte nel sugo dell' erba chiamata sedo, „ che nasce sopra i tetti, ed altri luoghi simili, mescolato coll' ac„ qua, ovvero nell' umore, e sugo del cocomero salvatico colla sua „ radice trita, pur mescolato con l' acqua. E in tal guisa questi „ grani, come dicono Columella, Palladio, Costantino Cesare Im„ peradore " [o l' Autore dell' Opera, che va sotto questo nome] „ ed altri, saranno liberi da questa generazione. " PALLADIO *de R. R. l. 1. Til. 35.* ha queste precise parole: *omnia semina horti, vel agri seruntur ab omnibus malis, ac monstris tuta servari, si agrestis cucumeris tritis radicibus ante macerentur.* Seguita poi il Gallo: „ Si difenderanno eziandio alquanto da questi vermi, essendo, co„ me dice Plinio, bagnati nel vino. " Ma veramente PLINIO XVIII. 17. dice piuttosto che, essendo i semi spruzzati prima di vino, si credeva, che fossero meno soggetti alle malattìe: *vino ante semina perfusa minus aegrotare existimant.* Scrisse ben egli XVII. 28. che *multi & Talpas a murca necant;* e che *contra Erucas, & mala ne putrescant, Lacertae viridis pelle tangi cacumina jubent.*

LO STEFANO (435), *giova molto la feccia d' olio recente, o la filiggine del cammino ſparſa pe' giardini.* Io ho praticato per ottimo contro l' infezione delle *zuccajuole* lo ſtritolare guſci di *oſtrica*, e di *uova*, e ſpargerle ſopra il terreno, dove quelle ſi trovano, perchè ne ſono ingorde, le mangiano, e ne muojono. Il medeſimo STEFANO più ſotto: *I cimici, o pidocchi dell' erbe muojono incontanente, ſe ſono aſperſe d' aceto forte miſchiato con acqua, in cui ſia ſtata cotta della cicuta.* Al che non preſto intera fede, vietandomelo l' eſperienza, che ne ho preſa. Io non proporrò, perchè è di troppo affare, e per le biade di troppo difficile pratica, ſebbene in piccol tratto io l'abbia con riuſcimento meſſo all'opera, un rimedio contro le *moſche*, e le *rughe* di ABRA-

[435] STEFANO *Agric. nova l.* 2. *c.* 154. Secondo per altro il ricordo di COLUMELLA *de R. R.* l. 2. c. 9. il miſchiar *filiggine* col grano, ovvero innaffiar queſto con acqua, dove ſia ſtata infuſa della *filiggine*, era buono per reſiſtere in generale a tutti gl' incomodi delle biade. Per *feccia d' olio* recente ebbe VARRONE *de R. R.* l. 1. *c.* 51. *Amurca;* onde ſcriſſe: *Itaque amurca perfundere ſolent* (cioè *aream contra formicas, & talpas*) *ea enim herbarum eſt inimica, & formicarum, & talparum venenum;* le quali ultime parole PIETRO VITTORIO *explic.* 5. *in Var. Caſt. ad Cap.* 51. leſſe: *ea enim herbarum, & formicarum, & talparum venenum.* Seguita CARLO STEFANO nel luogo citato, che „ per impedire le rughe, e i „ verminetti biſogna adacquare le piante con acqua, nella quale ſia „ ſtata infuſa cenere di ſarmenti di vigna, ovvero profumare l' erbe, „ e gli alberi con zolfo vivo. " Ma è novella da vecchie puerili quella, che aggiugne: „ Columella, " dic' egli, „ fa menzione di un „ rimedio molto ſicuro, ed eſperimentato in queſto caſo, ch' è, quan„ do per altra via non poſſono cacciarſi le rughe, biſogna far paſ„ ſeggiare una donna a piedi nudi, che ſia nel ſuo meſe, col „ ſeno aperto, e tutta ſcapigliata tre volte all' intorno de' quadri, „ o del muro del giardino. Fatto queſto ſi vedranno cadere le ru„ ghe di ſull' erbe, e di ſugli alberi; ma biſogna in queſto tempo

„ av-

MO MONTING [436], il quale pigliò della *ruta*, dell' *aſſenzio*, e del *tabacco virginiano* ſpolverizzati per un pugno di ciaſcheduna coſa, oppure due ſoli pugni di *tabacco*, e per una mezz' ora li fece macerare, o cuocere in una pignatta ripiena di due miſure in circa d' *acqua piovana*, e con queſt' acqua fatta paſſare dal colatojo, adacquò le piante per due, o tre volte. Commenda egli pure contro agl' *Inſetti* l' acqua piovana, nella quale, eſpoſta al Sole, ſia ſtato dello *ſterco colombino*, o *pecorino*, e ſcioltovi un poco di nitro, e ſparſovi della polvere di tabacco. Volli anche di queſto far la pruova, e reſtai certo, che poco profitto ſe ne può veramente ricavare, perchè reſtarono contaminate tutte quaſi le biade, che io feci con quell' acqua innaffiare. Le maniere ſuggerite dal REAUMUR (437) per abbreviare la vita agl' *Inſetti* non poſſono ſervire per diſtruggere quelli del grano in erba, il quale ſe per conſeguenza privo foſſe del caldo neceſſario, non potrebbe maturarſi. Eſſe non diſdirebbero però a' grani raccolti ſull' *aja* (438), come non diſdice la *ſtufa* inventa-

„ avvertire, che queſto non ſi faccia al levar del Sole, perchè o-
„ gni coſa s' impaſſirìa ne' giardini. " Abbiamo anche ſopracciò preſſo di PLINIO XVII. 28. *privatim autem contra Erucas ambiri arbores ſingulas a muliere incitati Menſis nudis pedibus recincta*. E PALLADIO *de R. R. l.* 1. *Tit.* 35. *Item equae calvaria, ſed non virginis, intra hortum ponenda eſt, vel etiam Aſinae. Creduntur enim ſua praeſentia foecundare, quae ſpectant.*

[436] MONTING *Curioſ. Deſcrip. Plant.*

[437] REAUMUR *Sur les Juſ.* Tom. 2. Mem. 1.

[438] I quali benchè ottimi, ho talora oſſervato, che contraggono il morbo ne' *manipoli* ridotti ſu quella, quando ſtanno lungo tem-

tata dal Signor INTIERI Napolitano a quelli, che ſono ſu' *granaj*. Egli è bensì vero, che ſi potrebbe far la guerra a queſt' *Inſetti* del grano in erba, primacchè ad eſſo facciano danno alcuno, diſtruggendone le *uova*, e nello ſteſſo tempo le piantícelle a lui *eterogenee*, ſopra le quali dalle *farfalle* ſi laſciano (439). Dovrebbe ciò eſſere praticabile per la maggior parte almeno di quelli, che vivono ſopra la terra; ma il fatto è, che moltiſſimi ſe ne trovano anche ſopra le biade medeſime, i quali non paſſano in altro luogo, e dove non è facile il diſtruggerli. Io rifletto, che non vi ſarebbe ſtrada più ſicura, che il prendere di mira l' ucciſione delle *rughe*, e de' *vermini* medeſimi, morti i quali ſiamo ſicuri per queſto conto della conſervazion delle ſpighe. Il pretendere di difenderle interamente col preparar i grani da ſeminare per mez-

tempo ammonticellati inſieme, perchè in eſſo allora s' introducono Inſetti, e vi ſi depongono le uova; talchè compreſſo, trebbiato, e ſu' *granaj* collocato, dalle medeſime naſcono poi certi *verminetti bianchi*, i quali occupano appoco appoco quaſi tutto l' interno de' granelli, e quindi eſcono *farfalline* del colore del medeſimo grano. E' però d' avvertire, che, dopo aver laſciato il grano ne' *manipoli* a diſſeccarſi dalla ſferza del Sole ſul campo, non ſia tenuto lungamente ſull' *aja* ammonticellato, ma ſi batta quanto prima, e ſi riponga ne' *granaj*, uſando quelle precauzioni, che l' ingegnoſo Napolitano ſuggeriſce. Il Signor BAKER *della Corriſpond. de' Dotti* 13. Apr. 1743. nel dare la Storia naturale di un gran numero d' *Inſetti* d' ogni luogo, dove ſia nutrimento, e in particolare delle *tignole*, alla qual claſſe potrebbero condurſi gli accennati *bachi*, racconta fra l' altre coſe, che queſti voraci animali da niun' altra coſa poſſano eſſere ammazzati, quantocchè dagli effluvj caldi, e ſecchi della *canfora*. Ond' è, che non ſarebbe inutile, primacchè veniſſe compreſſo il grano, di girare tali profumi intorno ad eſſo.

[439] Le *farfalle*, e le *moſche* ſi rendono poco pericoloſe, perchè effettivamente in quel tempo non pigliano alimento alcuno.

zo delle *ſalamoje*, o di altro, è, a mio giudizio, coſa inutile. Nulla diſtrugge più prontamente gl' *Inſetti*, quanto i profumi di *zolfo*, di *riſagallo*, e di altri *bitumi*, e coſe piene di *ſali*, e di *zolfi volatili*; ed è buon rimedio anche il gettare in qua, e in là fra le biade de' pezzi di *canfora*, di *ſolimato*, e de' manipoli d' erba *regina*, o di *corallina*, di *nicoſiana*, foglie di *perſico*, *ſeme ſanto*, o altre materie, ed erbe contrarie a' *vermini*. Se non altro il fummo di quelli, e gli effluvj di queſte li ſtordiſcono, e dal grano gli allontanano (440).

7. Ma chi può difendere i grani, e le biade dal pullular, che fanno tra loro l'*erbe eterogenee?* I ſemi delle medeſime o ſi trovano nel terreno, o vi ſono portati dal vento, e troppo è difficile il levarveli. Altro rimedio forſe non trovaſi, che il tagliarle, quando ſon nate di freſco, e lo ſvellerle diligentemente, quando foſſero molto creſciute, ſenzacchè ne patiſcano le radici del grano. Avevano queſto per coſtume gli Antichi (441), e sì fatta diligenza uſavano, e la con-

[440] Fa rifleſſione il VALLISNIERI nel ſuo libro della *nuova idea del mal contagioſo de' buoi*, che „ gli Amuleti portati pendenti dal collo, o avvolti alla cintola, praticati già in tempo di „ peſte da' popoli dell' Europa, e dell' Aſia, non poſſono più eſſere „ deriſi, mentre non erano, che ſacchetti pieni di mercurio, di „ riſagallo, di ſolimato, e di arſenico, tutte materie nimiche a' vermini, benchè i medeſimi non ſapeſſero rendere la ragione de' loro effetti, e piuttoſto alcuno li derideſſe. "

(441) E lo facevano in due maniere. Col *ſarchiare*, e col *roncare*. Il *ſarchiare* è un levar l' erbe inutili creſcenti tra le biade per mezzo del *ſarchiello*; onde in ORAZIO Od. 1. ſi legge:

Gau-

Un ridicolo rimedio contro la Peste vien riportato dall'Autore della Luzia, o l'Arte di pensare stampata dal Tramezzino in Venezia del 1746. pag. 70.

configliavano [442]. Il TANARA (443) mette fra l' erbe nocive al grano la *veccia*, l' *avena*, il *loglio*, e il *giottone*, e dice, che il *giottone però ſi cava facilmente, quando abbia aperto i ſuoi fiori, poichè da lungi ſi conoſcono*. Pretende GIULIO SCALIGERO (444), che non venga *loglio*, quando ne' cam-

Gaudentem patrios findere ſarculo
Agros . . . . . .

E in PLAUTO Truc. II. 2. 21. St. *Tene tangam? ita me amabis ſarculum*. PLINIO XVIII. 21. credette, che il *ſarchiare* apriſſe una certa triſtizia nel terreno indurato pel freddo del verno, e faceſſe, che il Sole di Primavera vi penetraſſe agevolmente: *Sarculatio induratam hyberno rigore Soli triſtitiam laxat temporibus vernis, novoſque Soles admittit*. Il *roncare* è lo ſvellere l' erbe colle mani, quando le biade hanno fatto il nodo; onde eſſo PLINIO XVIII. 21. *Runcatio cum ſeges in articulo eſt, evulſis inutilibus herbis frugum radicem vindicat, ſegetemque diſcernit a ceſpite*. E ne' *faſti antichi*, che ſono deſcritti in un' antica *lapida*, ſi legge, che nel meſe di Maggio *ſegetes runcantur*. La *roncazione* diſſero i *Greci* βοτανισμὸς, e però *Poſtea pauci runcant, quod botaniſmon vocant* PLIN. XVIII. 18. Uno Scrittore *Greco* ſcriſſe: πλὴν ὅσον ὑποτίλαι τὴν βοτάνην, che TEODORO ſpiega così: *niſi quod runcandum ſit*. Ma tutte e due queſte maniere di ſpurgar le biade dall' erbe furono eſpreſſe nell' antico *Calendario ruſtico Farneſiano* Colon. XI. 2. riportato dal GREVIO nel Tom. VIII. car. 21. delle antichità Romane: *eodemque menſe ante Kalen. Febbr. ſarriendae ſegetes autumnales. Runcabantur menſe Majo Kalen. idem*.

[442] *Qui ſarriet*, volle PLINIO XVIII. 21., *caveat, ne frumenti radices ſuffodiat. Triticum, hordeum, ſemen fabam bis ſarrire melius*. Si *ſarchiava* la prima volta, dopocchè nate erano le biade, e la ſeconda, quando erano le medeſime creſciute in erba. Ma TIBURZIO *Academiae Regiae Sveticae ſcientiarum acta*. an. 1750. Vol. XI. p. 311. riferice un metodo propoſto dal Signor WIBIOERNSSON per diſtruggere da' campi l' infeſtevole *gramigna*, nominata da' Botanici *gramen avenaceum hirſutum*, e dagli Svedeſi *landhafre*. Queſto conſiſte nello ſvellere prima la medeſima *gramigna*, e ſeminar poſcia ne' campi la *ſegala*. Io non l' ho eſperimentato, ma ſi vuole, ch' eſſo TIBURZIO lo provaſſe per egregio.

(443) TAN. *Econ. &c. l. 6. par.* 454.

(444) SCALIG. *Comment. in ſex lib. de cauſ. Pl. Theoph.* l. 2.

c.

campi ſi facciano i foſſi, e doveva dire piuttoſto, quando l' *Agricoltore* non ne ſemina, perchè queſti dal buon ſeme, dov' è frammiſchiato, non levandolo interamente, quindi egli naſce, come ſopra ſi è veduto. Perciò riferì GALENO, ſecondochè veggo in DANIELE SENERTO [445], che non venendo nettate bene anche a' ſuoi dì le grana commeſtibili dal *loglio*, cagionavano a molti il dolor di capo, e altri mali. Ond' è, che per condurre una vita ſana abbiaſi cura, che ciò facciano i pubblici *fornaj*, ſe far nol vogliono gli *Agricoltori*.

8. Rannodiſi ora il diſcorſo, e ſi concluda collo SCALIGERO predetto [446], che l' *Agricoltura* è la medicina delle piante, ſiccome la medicina è l' *Agricoltura* degli uomini. La terra rende all' uomo, ſcriſſe TULLIO (447), con uſura incredibile, quanto egli le preſenta; e moltiplica le ſemenze, che riceve a miſura dell' aſſiduità, e dell' induſtria, con cui egli la coltiva. Per rendere ben colto

c. 22. *Ut ne degeneret Triticum in Lolium propter arvi humiditatem, elicibus avertemus imbres.*

(445) SENER. *Oper. med. Tom.* 3. *l.* 4. *Par.* 7. c. 22. *Galenus* 6. *de ſimpl. med. fac. &* 1. *de animen: refert, quod cum anni conſtitutio prava aliquando fuiſſet, lolium tritico affatim innaſci contigit, quod cum neque Agricolae accomodatis ad eam rem cribris accurate purgaſſent, neque piſtores, quod paucus eſſet tritici proventus, multis caput dolore coepit. Ineunte vero aeſtate in cute multorum, qui comederant ulcera, aut aliud quoddam ſymptoma, quod ſuccorum pravitatem indicaret, eſt ſubnatum.*

[446] JUL. CES. SCALIG. *Com., & anim. in ſex, &c. l.* 3. *c.* 2. *Agricultura eſt medicina Plantarum, & medicina eſt Agricultura hominum.*

[447] M. T. CIC. *de Senec.*

to un terreno primieramente si fende la terra, che i *Latini* dicono *proscindere*, e rimanendo in questo primo lavoro molte zolle grosse, e diformi, torna il *bifolco* (448) con uno strumento, che chiamasi *erpice*, e rompe, e sminuzza quelle zolle, il che dicesi *erpicare*, e i *Latini* dissero *occare*, ovvero *obfringere*. Quando poi dal medesimo si fanno le *porche* [449] egli getta il seme sopra di esse, e lo ricuopre, conducendo i *solchi*, acciocchè l' acqua possa scorrere, e andar via. Questa operazione da' *Latini* è chiamata *lirare*, e da noi lavorar per la semenza. Dopo tutto questo lavoro non è già necessario, che i *solchi* siano molto profondi. La prima arazione, nella quale la terra rimane cruda, e meno fertile, si faccia molto prima della seconda, perchè in questo intervallo ella assorbe l' umore estivo alternativamente, e viene dal brumal freddo, e dal *nitro aereo* corretta, e fecondata. La vera *Agricoltura*, per avviso di AMBROGIO ZEIGERO, come rilevo negli *Atti eruditi di Lipsia* (450), giacchè il suo libro è Te-

(458) אבר *Ackerman*, *Agricola*. Pensa GIOVANNI CRISTOFARO Klemmio: *Critica sacra sensus literalis incomplexi codicis Hebraei veteris Testamenti*, &c. che questa parola abbia origine da בדה *fodite*, *cavar la terra*; e lo trae dal *Testo della Cant.* 1.

(449) Così nominate anche da' Latini *a porrigendo*, se vogliam credere a M. T. VARRONE, il quale nel primo degli affari della Villa ci lasciò: *quod est inter duos sulcos elata terra dicitur porca, quod ea seges frumentum porrigit.*

[450] *Ad Nov. act. erud. Supl. T. 1. Sec. VII. Introductio rationalis ad oeconomiam, & artem perficendae Agriculturae; in qua methodus exponitur, diuturna, & propria experientia confirmata, omne genus Agrorum recte dijudicandi, atque etiam sine consueta stercoratione foecundandi. Auc. Ambrosio Zeigero.*

Tedeſco, conſiſte in una fondata cognizione della natura, e della differenza delle terre, e della fecondità loro, non menocchè del ſeme, e del conciliar queſte coſe coll' opportuno letaminamento. Egli conſidera, che le *terre nere* imbevendoſi prontamente l' umore, per cagion de' frequenti, e maggiori pori, facilmente anche lo perdono. Le *terre limaccioſe*, e *giallicce*, attingendolo più difficilmente, e ciò per cagione de' pori più anguſti, molto anche lo conſervano. Le *terre argilloſe*, ſtagnando l' umore eſtrinſecamente, e facendolo più craſſo, e più lento, con iſtento lo ſcacciano. Finalmente la *terra arenoſa* per cagion di natura inerte, e per mancanza di pori, colando l' umore con intervalli, non può entrare utilmente nella ſua ſoſtanza. Egli però, eſaminando qual ſia l' ottimo di queſti terreni col farne miſtura, aſſegna il primo luogo alla *terra nera*, poi alla *terra nero-arenoſa*, in cui miſchiandoſi la nera, e l' arenoſa, prevalga la nera. L' altre ſi collocano con queſto ordine: *nero-argilloſa*, *nero-limaccioſa*, *e gialliccia*, *limaccioſo-gialliccio-nera*, *limaccioſo-gialliccio-argilloſa*, *limaccioſo-gialliccio-arenoſa*, *argiloſo-nera*, *arenoſo-nera*, *arenoſo-limaccioſo-gialliccia*, *argilloſo-arenoſa*, *argilloſa*, *arenoſo-argilloſa*, *arenoſa*. Sebbene una eſatta eſperienza io non abbia fatta ſopra la condizion di tutte queſte terre, pur non oſtante mi ſembra di poter raccogliere da' pochi lumi, che mi ritrovo, la verità della ſerie di queſte loro combinazioni. Certo è, che io feci dare un dì la medeſima quantità, e qualità di *concime* a due campi di

terre

terre diverſe, e manifeſtarono fecondità diverſa. Ed è altresì vero, che avendo la medeſima qualità di terra di un campo medeſimo fatta concimare in due luoghi con diverſa qualità di fimo, pur queſto campo palesò nella diverſa copia di biade in eſſi due luoghi, quanto diverſo ajuto ne' medeſimi aveva ricevuto. Un tale eſperimento ho replicato in più ville di queſto territorio, e però in diverſe qualità di terre, e ſempre mi è ſucceduto il medeſimo effetto. I terreni dunque imbevuti di buona qualità di *letame* rendono certamente maggiore, e miglior ſugo nutritivo alle loro pianticelle. E però abbiaſi l' occhio di darne a' medeſimi del graſſo, e bene ſtagionato [451], e ſi rammenti, che lo *ſtabbio* di *pecora* è più efficace di quello del *bue*, e incomparabilmente più di quello del *cavallo;* ma ſi conſideri nel tempo ſteſſo, che ognuno di eſſi in quantità ſoverchia ſarà loro nocivo, e maſſime negli annuali aſciutti, e ne' luoghi, ne' quali non v' è argomento, che debbano eſſere più che abbondantemente innaffiati. Io non converrò per al-

(451) Il coſtume di *letaminare i campi* leggeſi per antichiſſimo in PLINIO; e POLIDORO VIRGILIO *de rerum inventoribus l.* 3. col teſtimonio di Servio lo fa aſcendere a Piturno: *Uſum autem ſtercorandorum, teſte Servio ſuper IX. Aeneidos, Piturnus invenit;* ond' è, che fu nominato, ſecondo l'antica uſanza di aſſegnare un Dio a ciaſcheduna coſa, STERQUILINIO quel Dio, che preſedeva a queſta operazione. PIETRO ZORNI ha nel ſeſto luogo del quarto *faſcicolo* della *Miſcellanea Duisburgenſia* T. II. una elegantiſſima Diſſertazione, nella quale ſi ricerca, perchè talora nelle *ſacre Lettere* ſi chiamino i falſi Dei col nome di גלולים *ſtercora*, ed aſſeriſce che gli *Egizi* ebbero i Dei STERGORARJ, fra' quali era lo SCARABEO, *Scarabaeus*, e v' era la COREGGIA, *ventris crepitus*.

tro giammai nell' opinione, che in queſti caſi ſi abbia d' abbandonar interamente queſto coſtume per appigliarſi a quello delle *ſalamoje*. Da' ſali unicamente, e dalla macerazion de' ſemi ſenza *letame*, o materia untuoſa, e tenace dell' aria indarno ſi aſpetta la fecondità, come ſcriſſe il KUHNHOLD [452] contra il ZEIGERO. Varj altri modi ſono ſtati ritrovati per rendere le biade più feconde; ed è credibile che un oſtacolo alla fecondità maggiore de' grani di queſto *territorio Ravennate*, e di molti altri d' *Italia*, ſia la copia degli alberi, che vi ſi piantano, talchè DIONIGI ALICARNASSEO nelle lodi di eſſa (453) ebbe a dire, ch' ella è fecondiſſima di biade, benchè abbia aſſai alberi [454]. Dalle *Tranſazioni Filoſofiche d' Inghilterra* (455) ſi ha il modo di richiamare la fertilità del campo per mezzo delle *conche*, e dell' *arena marina*, le quali coſe non ſolo poſſono giovare, ma eſſer comode a' terreni paludoſi non diſcoſti dal mare [456]. S' ingraſſano i campi, per

(452) *Chriſ. Ern. Kuhnholdi centum, & decem probata experimenta oeconomica: ſive oeconomia experimentalis Tractatui Zeigeriano de perficienda Agricultura oppoſita.*

(453) *Dionyſii Halicarnaſſei ſcripta omnia Hiſtorica, & Rethorica Gr. Lat. Opera, & ſtudio Friderici Sylburgii l.* 1.

(454) Onde bene giudicò CATONE preſſo VARRONE *de R. R. l.* 1. *c.* 23. *Ager craſſus, & laetus, ſi ſit ſine arboribus, eum agrum frumentarium fieri oportere.*

(455) *Tranſac. Philoſoph. ab an.* 1700. *ad an.* 1720. *in Epitomen redactae, & per capita generalia diſpoſitae a Beniaminio Motte Vol.* 2. *cap.* 5.

(456) Non ha molto il Signor CARLO DE BRENNER negli atti dell' *Accademia Reale delle ſcienze di Stockolm* dell' anno 1750. Vol. XI. *Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar, &c.* volendo *palu-*

per ſentimento del GALLO (457), e di altri, colla *calcina pura*, o accompagnata col *fimo*, e ſi uſava a' ſuoi tempi in molte Ville del *Comaſco*; perchè la *calcina* rende più frutto del ſolo *fimo*, e il ſecondo, e terzo anno giova a' terreni più del primo, e cuoce in oltre i medeſimi, al dir di lui, talmente, e diſtrugge le nocive erbe, che le biade reſtano nette, quando ſi mietono. E' da rinnovare anche la terra, miſchiandovi ſoſtanze ripiene di *particelle ſaline*, *ſulfuree*, e *aeree*, come *ceneri*, *cotico di prato*, e altrettali. Le materie, che contengono *nitro*, e altri ſimili *ſali*, poſſono eſſer ottime parimente. Che ſe vogliaſi la conſervazione de' ſemi, il lodato ZEIGERO propone un rimedio, che ben ſi può riputar vantaggioſo. Quattro miſure di *ceneri di legno duro* con una miſura di *tartaro*, e una di *calce viva* infonde in recente *orina di animale*, non però di *cavallo*, quanto baſta a inzupparne il compoſto, per ore 48., al quale poſcia ſopraggiugnendo della *ſemplice acqua* per altrettante ore, fa, che queſta ſi ſcoli, e ſi aſciughi. Tale compoſto ſi potrebbe allora ſpargere con frutto ſopra la ſemenza; ma egli del *ranno* ſuo ordi-

paludoſos agros arena emendare, inſegnò che ſi miſchiaſſe colla terra paludoſa alquanto di arena, perchè ne verrebbe un compoſto idoneo a nutrire perfettamente le piante. E dal LEOPOLDI *Diſquiſitio de arena, ejuſque natura, & fertilitate*, al dire degli Autori de' *Commentarii de rebus, &c.* T. 1. in *Oeconomiſche Nachrichten, zweyter Band, &c.* cioè *adverſaria oeconomica, &c. Vol. II. Par. XX. n. 2. p. 576.* ſappiamo, che fra le arene altre ſono feconde, altre ſterili. Quelle che convengono a' frumenti, ſi vogliono ivi dall' Autore indicate.

[457] GALLO *Agric. Gior. 9.*

na un *olio*, che chiama *olio vegetabile*, col quale inumidiſce la medeſima, prima di ſeminarla, e ne ſpruzza pur anche, e ne bagna il campo, perchè trova, che lo rende fecondo. Non dubita, che l'*orina pura* degli animali non ſia per ſe ſteſſa molto efficace. Che il *moſco* promova la vegetazione de' ſemi delle biade io non poſſo aſſerirlo, perchè non ne ho fatto eſperienza; ma il Signor BONNET nelle ſue ricerche intorno a quella delle piante ſopra varj corpi [458] ha ſcoperto, ch' egli è proprio a promuovere la loro vegetazione. Dirò bene, che una delle principali attenzioni dell' *Agricoltore* dev' eſſer quella di fare la ſua ſeminazione ne' terreni non ſolo, ma nelle ſtagioni più convenienti, onde poſſano i ſemi tirar giuſtamente la quantità di nutrimento, che loro è neceſſaria. Ben lo farà avvertito la propria eſperienza, ſenza badare a quello, che fanno gli altri, ch' egli dee ſeminare in tempo dolce, che prometta fra poco la pioggia, e uſare quelle altre precauzioni, che il vario temperamento de' luoghi richiede (459), laſciando le inutili coſe, giacchè è troppo vero, come ſembra, che confeſſaſſe il me-

de-

[458] BONNET *experimenta circa vegetationem Plantarum in aliis corporibus, quam terra.*

[459] Così nel campo, dove domina la *terra nera* ſi richiederà, per avviſo del ZEIGERO, una intera libbra di nitro da dividerſi tra il ſeme, e la terra egualmente dopo la recente letaminazione, la quale per verità non ſi dovrà tralaſciare giammai, quantunque queſt' Autore creda, che talor ſi poſſa. Troppo gli ſono contrarie le comuni, e diuturne eſperienze. Gli *Eruditi di Lipſia* nel loro eſtratto riportano la varia proporzione di liquor *nitroſo vegetabile*, che ſecondo i varj temperamenti delle terre egli propone, che io tralaſcio

desimo COLUMELLA (460), che molti provvedimenti non bene esaminati potrebbero essere vani. In fatti vi hanno, dic' egli, de' seminatori, i quali vestono con una pelle di certo animale nominato *Hyaena*, e quando sono stati con essa alquanto tempo, gettano i semi, non dubitando, che la ricolta venga per ciò abbondante; il che quanto sia vano, non bisogna fior di ragione per comprenderlo. La *semenza* in somma dev' essere trascelta, eleggendo la più bella, e vagliandola, e spurgandola affatto da ogni maniera d' impurità, e di seme straniero, e sarà bene, ch' ella derivi da una terra un poco meno fertile di quella da seminarsi, e che non sia vecchia, perchè spesso ho veduto, ch' ella non nasce, o fa pochissimo, ma non mai che per ciò si tramuti, come scrisse VARRONE [461]. Il *grano*, che ha una punta acuta, e si allunga di molto, e resta più piccolo dell' ordinario, vien creduto da' Milanesi *Agricol-*

to-

scio per brevità. Vero è per altro, che mai potrà questo metodo aver luogo, quando per osservazioni, e per esperienze particolari reiterate da ogni *Agricoltore* non si sia conosciuta la giusta relazione, che trovasi fra la qualità del proprio terreno, e la sua situazione, e il tempo, in cui si semina. Veggasi *Dissertatio de artificiosa foecunditate immersiva seminum vegetabilium*, *Praeside*, JOH. GOTSCHALK WALLERIO, *respondente* JOHANNE PIHLMAN; e veggasi: *adversaria oeconomica, &c.* lib. Baron. PETRI DE HOLLENTHAL; laddove p. 19. n. 3. si ha *Critica oeconomica de tempestate, & incremento frumentorum anni* 1750.

(460) COLUMEL. *de R. R. l. 2. c. 9.*

[461] VAR. *de R. R. l. 1. c. 40.*: *Prima semina videre oportet ne vetustate sint exsucta, aut ne sint admixta, aut ne propter similitudinem sint adulterina. Semen vetus tantum valet in quibusdam rebus, ut naturam commutet. Nam ex semine brassicae vetere fato nasci ajunt rapa, & contra ex raporum brassicam.*

tori d' inferiore qualità. PLINIO [462] trovò differenza di grano per la differenza de' gambi, riputando migliore quello, che gli ha più groſſi (463). Queſte avvertenze, e queſte cautele rendono quaſi ſicura la buona meſſe de' grani: nè ho mai veduto tal anno i mal eſperti *Coloni* per ſolo favor di ſtagione ritrarre copioſa ricolta di grano, e d' uva, mentrecchè altri meglio periti *Lavoratori*, dopo aver poſte in uſo tutte le regole dell' arte, pel tenue ajuto degli efficienti ſuperiori altro non riportare da' ſolchi, e dalle viti, che paglia, e pampani.

Ed eccomi finalmente di queſto intralciato, e ſpinoſo campo delle malattìe del grano in fine. Io ho liberamente ſpiegate le opinioni mie, πρὸς παῤῥησιάζειν, le quali ſono anche diſpoſto a mutare, qualunque volta mi ſia ſcoperto l' errore, e terrò obbligo particolare a chiunque mi farà grazia

[462] PLIN. XVIII. 7. *Differentia eſt, & calami. Craſſior quippe melioris eſt generis....*

[463] AGOSTINO GALLO nelle *venti giornate dell' Agricoltura* s' avvisò, che „ il fiumento, che ſi ſemina, deve eſſer generoſo, buo„ no, pieno, ſaldo, morbido, e non rugoſo, e quaſi del color dell' „ oro. Quanto è più vecchio, per ſeminare è peggiore. " Diſſe il TATTI nella ſua *Agricoltura*, che „ il grano è ottimo, quando è mez„ zanamente lungo, e bianco, e roſſo, ed ha ſottile corteccia, e la „ farina bianca. Il groſſo, tondo, o bianco, e riſplendente è meno „ buono. " E il TANARA *Econ. del Cit. in Vil. l. 6. car.* 457.: „ Tra le ſpezie del formento Italiano il grano ordinario ſarà il me„ glio, perchè ſebbene quello, che chiamiamo toſello, fa pane can„ dido, e però fallace nella fertilità, perchè eſſendo naturalmente „ ſenza ariſte, teme aſſai il malume, dalle quali l' altro formento è „ difeſo. Il formento, che ſi chiama groſſo ..... quando non ſia „ atterrato da' venti, a che è ſottopoſto per alzarſi molto di gambo, „ e quando per la morbidezza del terreno non riceva danno da' ma„ lumi, rende 15., o 20. per uno.

zia di paleſarlomi. Ho tentato tutte quelle vie, le quali ho creduto, che mi poteſſero far camminare verſo la verità, e ſe l'ho raggiunta, altri ſel vegga. Io non ho avuto in mira nel ricercarla altrocchè il pubblico bene, e il vantaggio de' popoli (464).



Er-

[464] Sappiaſi per ultimo, giacchè prima, come opportuno ſarebbe ſtato, neppur io il ſapeva, che l' ingegnoſo, e dotto giovane sig. Dottore DOMENICO VANDELLI, di queſta ſocietà letteraria Ravennate degniſſimo Socio, nella Diſſertazione con altre varie recentemente pubblicata *de verminum, ſeu lumbricorum terrae reproductione*, della quale era già precorſo l'avviſo nelle Lettere del Valvaſenſe, come io notai (152), porta gli eſami ſuoi, e le ſue teſtimonianze tanto innanzi, che ben ſi pare, quanto io debba oggimai diffidare di quello, che ſopra tali vermini mi aſſicurai di avere veduto nel 1743, e ne' ſuſſeguenti anni in compagnia del Dottor Giulio Zavona, del Conte Giuſeppe mio Zio, e di altri diligenti oſſervatori, i quali tutti meco convennero, che la riproduzione delle parti perdute in così fatti viventi non era illuſione. Tanto più di queſta mia diffidenza mi compiaccio, quanto, che veggo il parere del sig. Dottor Vandelli confermato dall' eſatiſſimo sig. Cavaliere Carlo Linneo in ſua lettera data di UPSAL il giorno 3. Febbrajo 1759., nella quale in queſti termini con l' autor noſtro ſi eſprime: *Pari certitudine evicisti fallaciam doctrinae Reaumurianae de redintegratione lumbricorum, quam, auctoritate acutiſſimi auctoris, hactenus credideramus*. Quelle difficoltà, che ſi voleſſero proporre ſenza avere le oſſervazioni ſue rinovate, ſembrerebbero per avventura tutte baje, e buone ſolamente a dirſi per eſſer l' ultimo a dire qualche coſa.

Errori ſcorſi nella Stampa.

Carte	Note	Linee	ERRORI.	CORREZIONI.
28	[46]	6	*fumentis*	*frumentis*
35	[58]	4	Gittone	Giottone
40		5	ſeccano	ſi ſeccano
52		18	ſopra	ſotto
142	[127]	2	catapularii	catapultarii
195	[148]	1	REAMUR	REAUMUR
		7	progenera	genera
209	[166]	19	*in*	*a*
211	[172]	3	*viventibus*	*virentibus*
215	(179)	3	*Heaclides*	*Heraclides*
222	(208)	2	FUSCH.	FUCHS.
229	(225)	2	FUSCH.	FUCHS.
231	(234)	3	FUSCH.	FUCHS.
238	(262)	4	*aepes*	*ſepes*
243		5	un	una
		19	brucate	bucate
251		7	può	potè
340	[373]	1	dialog. ſur l' immater.	ſur la rouille.
359		24	ſi trova	ſi trovaſſe
		28	ſi vede	ſi vedeſſe
368	(403)	23	già	ſe già
386	(437)	1	*Jus.*	*Ins.*
343		3	le circoſtanze	e le circoſtanze

INDI-

gine delle biade (26).
Amuleti degli Antichi qual uso avessero (440).
Antenne degl' Insetti: Perchè così dette (123).
Ape: suo cibo principale quale si creda I. *I. 3. (313).
Arazione, quando debba farsi IV. *II. 3. A che giovi per le malattìe del grano in erba ivi *III. 1.
ARBUTTHNOT, GIOVANNI: sue osservazioni sopra la *rugiada* III. *I. 5. (315).
ARDERO, JACOPO: sua opinione intorno agl' *Insetti*, ch' entrano ne' frutti, e nell' erbe (370).
Arena marina, a che giovi IV. *V. 8.
Aria: sua differenza dall' acqua (73).
ARISTOTELE: come esprima la *syderatio* de' Latini (24).
Grande naturalista II.
Scrisse degli effetti de' semi del *loglio* (96).
Suoi *ragni* II. *IX. 17.
Sua sentenza (302).
Suo sentimento sopra la *ruggine* (316).
Sopra gli *abbruciamenti* delle foglie (324).
Arsenico a che giovi IV. *V. 3. (425).
Assenzio a che giovi IV. *V. 6.
ASTRUC. suo trattato de' morbi venerei (368)
Atti dell' Accademia reale Svedese delle scienze (442).
Atti eruditi di Lipsia riportano un' osservazione dell' *Iride parabolica* sull' erbe fatta dal WOLFIO II. *XII. 11.
L' opinione del CHOMEL sopra il seccamento degli alberi del 1709. (326).
L' opinione del ZEIGERO intorno l' *Agricoltura* IV. *V. 8. (450). (459).
Atti medici di Berlino: vi si parla del morbo cagionato per l' uso del *grano sperone* (96).
Avena non deriva dal *gràno* (176).
AVERRUNCO, Dio degli Antichi, (34).
AUSTIN DI CANTORBERY: sua osservazione della *nebbia* (80).

B

de la BAISSE: sua opinione intorno alla circolazione del sugo nelle piante (360).
BAKER, ENRICO, scrisse degl' *Insetti*, che si multiplicano per le sezioni (152) suo sentimento sopra l' Istoria Naturale (377).
Suo rimedio contro gl' *Insetti* (438).
Barba hirci di CORDO qual sia (345).
Barometro: sue proporzioni (71). (72).
Sue alterazioni II. *I. 1. 2. 3. 4. 5. *II. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *III. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * IV. 2. 3.
Come operi in esso il *Mercurio* (297).
BARR. *Icon.* BARRELIERI *plantae per Galliam, Hispaniam, & Italiam observatae*.
BARONIO, FILIPPO: sue osserva zioni anatomiche sopra le *Rondini* III. *IV. 7.
BARTOLINO, TOMMASO, descrisse le *lucciole* (131).
Sua composizione di materie, che fermentano (335).
BASTERO: sua origine della voce *rogna* (21).
BAUCHINO, GASPARE: sua *ustilagine* (47).
Sua *fecale luxurians* (96).
BAUHINO, GIOVANNI: sua *Storia universale delle piante* II. *I. sua opinione intorno alla *filiggine* (332).
BAZIN: sue osservazioni sopra i *pidocchi* delle piante II. *IX. 50. sua opinione intorno alla circolazione del sugo nelle piante (360).
BEIGHTON: sua esperienza sopra il vapore dell' acqua bollente (308).
BELGRADO, Padre JACOPO: suo sentimento intorno le verità pratiche (402).
BERNOULLI, DANIELE: sua *formola Algebraica* II. *XII. 27.
Suo *Problema* (292).
BERNOULLI, GIACOMO: sua figura dell' Iride delle gramigne II. *XII. 11.
BERNOULLI, GIOVANNI: sua opinione intorno la *fermentazione* (333).
Sua composizione di *materie fermentabili* (335).
BIANCHI, GIOVANNI: sua proposizione intorno al *grano carbone* (368).
Bifolco, vedi *Agricola*.
Blasting degl' Inglesi qual sia (15).
BOCACCIO parlò della *rugiada* (79).
BONANNI scrisse di alcuni *sassi con odor di viole* III. *VI. 3.
BONNET sue osservazioni sopra i *pidocchi*

chi delle piante II. *IX. 50.
Scriſſe degl' *Inſetti*, che ſi multiplicano per ſezioni (152).
Di certo gambo ſingolare di *avena* (176).
Della ſtruttura particolare del *loglio* (219).
Fu contrario al TULL intorno la *filiggine* III. *II. 9. (339).
Sua opinione intorno al *grano carbone* III. *III. 8. (363).
Intorno la *circolazione del ſugo* nelle piante (360).
Suo *mezzo da fecondare i campi* IV. *V. 8. (458).
BOTALLO, LEONE, ſcriſſe dell' uſo del *forame ovale* III. *IV. 7.
βοταυισμός de' Greci coſa foſſe (441).
Botta, vedi *Roſpo*.
BOYLE *ſal volatile nitro-aereo* di queſto Filoſofo II. *V. 19. (87).
Sua opinione intorno l' *alterazione de' corpi* (341).
BRADLEY: ſuoi *bruchi*, che cagionano la *ruggine* III. *I. 14. (329).
Sua opinione intorno la *nigella* III. *IV. 5. (373).
Suo rimedio contro il *ghiottone* IV. *IV. 1.
Brand de' Tedeſchi qual ſia I. *II. 2.
BREGNY, NICCOLA': ſuoi *Inſetti* particolari (127).
de BRENNER, CARLO: ſuo metodo per la fertilità delle terre paludoſe (456).
Bright degl' Ingleſi qual ſia I. *I. 2. (29). III. *I. 4.
BRUNFELS. BRUNFELSII *herbarum vicones*.
BUDEO: *ruggine del grano* qual ſia ſecondo queſto Autore (14).
Quale il *carbunculare* degli Antichi (23).
Quale l' *uredine* (24). (322).
Coſa ſcriſſe delle *Rogazioni* (34).
Coſa della *filiggine* (41).
Coſa degli *abbruciamenti* delle foglie (324). (325).
di BUFFON: che dica queſt' Autore de' *liquori ſeminali* II. *VIII. 7. ſuoi corpi viventi ſingolari *ivi* 8. 9. (107).
da BUTI: ſua deſcrizione delle *lucciole* II. *IX. 16.

C

CAESALP. CAESALPINI *de Plantis*.
Cagioni delle malattie in generale, e loro diviſione III. 1. 2.
Cagione della *ruggine* ivi *I. 1. per fino ad 8.
Della *filiggine* ivi *II. 1. per fino a 16.
Del *grano carbone* ivi *III. 1. per fino a 10.
Del *grano ghiottone* ivi *IV. 1. 2. 3. 6. 7. 8.
Del *giallume* ivi *V. 1. 2. 3. 4.
Del *grano voto* ivi 5.
Del *ſeccarſi della ſpiga* ivi 6.
Della *ſterilità* delle biade ivi 7.
Della *luſſuria delle biade* ivi 8.
Dell' *Infeſtamento degl' Inſetti* ivi 9.
Del *pullular dell' erbe eterogenee* ivi 10.
CALANDRINI: ſua oſſervazione di un gambo ſingolare di *avena* (176).
Calce viva a che giovi IV. *III. 3. (419) ivi *V. 8.
Caldo, e freddo qual *proporzione* abbiano fra loro II. *IV. 4.
Loro *determinazione* ivi *XII. 10.
Quale la proporzione del *caldo* riguardo alle ſue particelle III *I. 12.
Coſa produr poſſa il *caldo* ivi *II. 1. (337).
Calendario ruſtico Farneſiano accenna il *ſarchiare*, e il *roncare* degli Antichi (441).
Calendario ruſtico riportato dal GRUTERO (34).
CALMET, Padre Don AGOSTINO: ſue rifleſſioni ſopra l' origine delle *cifre di Aritmetica* (465).
CALOGIERA': ſua *Raccolta di opuſcoli ſcientifici, e filologici* (152). (278). (465).
CALT. *Is. Il viaggio di Monte Baldo di* FRANCESCO CALZOLARI.
CAMERARIO, ELIA: ſua opinione intorno a' morbi (369).
CAMER. *Epit. Camerarii epitome Mathioli*.
CAM. CAMERARII *Hortus medicus*.
CAMERARIO, RODOLFO JACOPO, parla ampiamente dell' *uſtilagine* del frumento (43)
Campiano, Villa, dove furono fatte oſſervazioni II. *V. 18 (93). ivi *VI. 16. (97).
Campo vicino a Ravenna, dove furono fatte oſſervazioni II. *IV.
Canfora a che giovi (438)
CAPECE *della* SOMAGLIA lodato I. *III. 2.

Car-

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI, E DEGLI AUTORI CITATI

Colla ſpiegazione delle abbreviature denotanti gli Scrittori di coſe Botaniche, e le Opere loro.

I numeri ſolo majuſcoli danno le PARTI, e accompagnati con l'Aſteriſco ſignificano i CAPITOLI. Da' ſoli numeri minori (465) vengono accennati i PARAGRAFI, e da eſſi numeri fra le Parenteſi ſi moſtrano le NOTE.

A

Abbruciaticcio delle foglie oſſervato II. *V. 22. 23.

Coſa egli ſia III. *I. 10. 11. 12.

ACCA LAURENTA, nutrice di ROMOLO (3).

Accademia Ceſarea-Leopoldino-Carolina: ſi parla ne' ſuoi atti della *ruggine* delle biade (81).

Del *caffè Europeo* (95).

De' *morbi epidemici*, cagionati dall' uſo del *grano ſperone* (96).

Accademia della Cruſca: come ſpiega la *ruggine del grano* (11), e (17).

Come la *ruggine del ferro* (19).

Come la *filiggine* (40).

Come il *grano carbone* I. *III. 2. (53).

Accademia del cimento: che dicano i ſuoi *Saggi*

[465] Dico *numero minore*, e non *cifra arabà*, come altri direbbe, perchè tutti queſti *caratteri* io credo *Romani*; e lo dimoſtrai nella Diſſertazione *de numeralium notarum minuſcularum origine*, ſtampata in Venezia nel Tomo 48. della raccolta CALOGIERIANA d' *Opuſcoli ſcientifici, e filologici*. E ſiami qui permeſſo di confermare l' opinion mia, non oſtante l' ingegnoſiſſimo ritrovato del Signor WACHTER, il quale pubblicò in *Lipſia*, e in *Coppenaghen* nel 1752. quella ſua erudita operetta: *Naturae, & Scripturae concordia commentario de litteris, ac numeris primaevis, aliiſque rebus memorabilibus cum ortu litterarum conjunctis illuſtrata, & tabulis aeneis depicta*; in cui al cap. 4. dell' ultima parte egli pretende, che l' origine di queſti *numeri minori* ſi debba cercare, ſiccome quella de' maggiori, nella diverſa combinazione delle dita: che l' unità eſſendo ſtata trovata nel dito in piedi, ſi è ripetuta, e variata queſta figura, donde vennero i caratteri 𝍐 per due, 𝍑 per tre, 𝍒 per quattro, ec., e col tempo ſi formarono 2., 3., 4., ec., che riſpondono a tali combinazioni. Ma ſe queſta foſſe l' origine delle noſtre cifre volgari,

non

Saggi di naturali esperienze dello splendore delle *lucciole* II. *IX. 16.
Accademia Imperiale delle scienze di Pietroburgo si riporta ne' suoi atti l' opinione dell' EULERO sul caldo, e sul freddo (286).
Lo scioglimento di alcuni *Problemi* del medesimo, e del Signor DANIELE BERNOULLI (292).
Accademia Reale delle scienze di Parigi: Storia del *grano sperone* (96).
Cosa abbiasi detto in quell' Accademia d' intorno alle vibrazioni di luce delle *lucciole* II. *IX. 16. (134). (136).
Che della *formica-leo* (154).
Che di un *rospo* (277).
ACCURSIO, contro cui scrisse ULPIANO, (291).
Aceto buono a che giovi IV. *I. 5. ivi *V. 6.
Aconito unifoglio ha la sua *filiggine* II. *VI. 4.
Se questa pianta sia di molte specie (166).
Adustio de' Latini (29).
AGGEO Profeta: suo passo intorno alla *ruggine* delle biade (5).
AGOSTINO, Santo, parla della Dea *Rubigine* degli Antichi (33).
Agricola degli Antichi: qual' origine abbia questa parola (448).
AGRICOLA: sentimento di quest' Autore intorno all' *uredine* (312).
Mentova *sassi* coll' odor di *viole* III. *VI. 3.
Agricoltura cos' ella sia IV. *V. 8. (446). (450).
ALBERGHETTI, Padre DON ANTONIO, tenne la *fuliggine* per *muffe* (49).
ALBIN: sue osservazioni sopra i *pidocchi* delle piante II. *IX. 50.
ALCINA parla della *rugiada* (79).
ALDROVANDI, ULISSE: sua opinione sopra le *lucciole* (131).
Descrisse i *pidocchi* delle piante II. *IX. 50. (156). (157).
Parlò delle *zuccajuole* ivi 56. (156). (162).
ab ALESSANDRO, ALESSANDRO, contro cui scrisse ULPIANO (291).
Alume a che giovi IV. *IV. 1.
Ambarvalia: quali feste degli Antichi fossero cotesle (34).
AMBROSINI, GIACINTO, parla della *filiggine* (38) (336).
Dell' *ustilago* (42). (43). (47).
Della *ruggine* (44).
Degli *abbruciamenti* (324).
AMBROS. *Phytolog.* AMBROSINII Phytologia.
AMOS, Profeta: suo passo intorno la *ruggine*

non solo non bisognerebbe credere, che gli *Arabi moderni* ne fossero gli Autori, ma neppure i *Romani antichi*. La conseguenza è giusta secondo il Signor WACHTER. Egli in fatti nel quinto, ed ultimo capo di quest' opera fa risalire l' epoca di esse *cifre* per fino a' *Giudei*, ed anche agli *Egizj*. Chi vorrà tuttavia pigliarsi la pena di leggere quella mia Dissertazione, io spero, che rimarrà ben persuaso, ch' esse furono inventate da' *Romani*. Ma quantunque venga il mio sentimento confermato da certe riflessioni del Padre Don AGOSTINO CALMET Benedettino, che ho vedute, non ha molto, inserite nelle *Memorie letterarie di Trevoux* del mese di Settembre 1707. col titolo di *Recherches sur l' origine des chiffres d' Aritmetique*, dove questo dotto Autore pensa, che le medesime vengano da' *Latini*; con lui non convengo però nell' asserire, che sieno avanzi delle antiche note numerali di TIRONE pigliate da' *Pitagorici* per la facilità delle loro dimostrazioni di *Aritmetica*, perchè le note numerali di TIRONE sono molto diverse dalle nostre, e da quelle medesime, fra le molte sue, che non significano numero, e che pur sono simili ad alcune di queste nostre numerali.

Nomina il Dio ROBIGO (33).
Erpice cosa sia IV. *V. 8.
Erucae vermi-formes, quali si possono dire II. *V. 4
Esalazioni perniziose: rimedj contro di esse IV. *I. 7.
ESICHIO: sue denominazioni diverse dell' *Aconito* (166).
ESIODO ASCREO primo scrittore di *Agricoltura* I.
ETTMULERO, MICHELE: cosa egli disse delle pietre *bufonite* (279).
EULERO, LEONARDO: sua determinazione del caldo, e del freddo II. *XII. 10. (286). (292).
ἐξυβρίζειν de' Greci qual sia I. *V. 6.
Eyst. BESLERI *Hortus Eystetensis*.

F

FABBRI, PIER GIOVANNI, scrisse de' vermi pestilenziali (75).
FACIOLATI come spiega *rubigo* (46).
FAGON come parlasse del *grano sperone* (96). (344).
Falangio, ragno delle campagne, II. *IX. 17.
Fama, o *fame* de' Lombardi qual sia I. *III. 2.
Fame bianca, e *fame nera* quali sieno I. *IV. 2.
Farfalle, e *mosche* II. *IX. 3. per fino a 56
In qual tempo non piglino alimento (439).
Farina del frumento composta di globetti lucidi II. *XII. 5.
Questi non ingranditi dal *microscopio* ivi.
Danno i colori dell' *iride* ivi. Loro figura ivi.
Farro, primo cibo degli antichi Italiani, (3).
Qual altro uso ne facessero i Romani ivi.
Fasti antichi accennano il *roncare* (441).
FEBBRE, Dea degli Antichi, (34).
Feccia d'olio a che giovi IV. *V. 6. (435).
Fecondare le terre come si può IV. *V. 8.
Fermentazione fattasi nelle *spighe filigginose* III. *II. 1.
Cos' ella sia (333).
Effetti della medesima (334).
Se il liquor sottile introdotto dagl' *Insetti* nel loro foro la produca (344).
FESTO chiama rossi i buoi (19).
Parla della Dea *Rubigine* (33).
Del Dio *Robigo* (34).
Del sacrifizio del *Cane* ivi.
Parla del *morbo fontico* (348).
Figura perfetta come si debba intendere (287).
Figure simili qual proporzione debbano avere II. *VII. 22. (103).
Filetto, Villa, dove furono fatte osservazioni, II. *V. 6.
Filiggine del cammino a che giovi IV. *V. 6. [435].
Filiggine del grano qual sia I. *II. 1. (37). (38).
Se fu negli antichi tempi I. *II. 3. (23).
E' stata considerata per pianta I. *II. 4. (48). (49).
Suoi principj I. *VI. 1. 2. 3. (91).
In qual tempo nasce ivi 1. (92).
In quali biade si produca ivi 4. (93).
E' indifferente ad ogni luogo ivi 4.
E' comune a molte pianticelle erbacee ivi.
Non si sparge sempre in tutta la spiga ivi 5.
Gambi delle *spighe filigginose* quanto velocemente tragghino il sugo ivi 10. (94).
Cime de' gambi delle *spighe filigginose* più grosse delle altre ivi 12.
Granelli attaccati da essa *filiggine* ivi 15.
Suo *sal volatile* ivi 19.
Fummo esalato dalle *spighe filigginose* ivi 20.
Cagione di essa *filiggine*, e de' suoi fenomeni III. *I. 1. per fino a 16.
Rimedj contro di essa IV. *II. 1. 2. 3.
Rimedio non fortunato per essa (415).
Fimo, vedi *letame*.
FIORAVANTI, Padre STEFANO: lodato II. *VII. 25.
FIORENTINO, Autor Greco, (6).
FISCHER, GIOVANNI BERNARDO: suo pronostico (327).
Fisiologia delle malattie del grano in erba III. *I. *II. *III. *IV. *V. *VI.
FLAVIO, GIOSEFFO, parla de' *pomi di Sodoma* (51).
Flor. Jen. RUPPII *flora Jenensis*.
Flor. Pruss. flora Prussica LOESELII.
FONTANINI, Monsignore, parla del Dio *Robigo* (33).

Suo ſentimento intorno alle *Rogazioni* (34).
di FONTENELLE: queſto Autore non ammette le *trachee delle piante* II. *V. 10.
Come ſpiega il *grano ſperone* (344).
Forame ovale: ſuo uſo III. *IV. 7.
FORCATULO, STEFANO, contro cui ſcriſſe ULPIANO (291).
Formica-leo, Inſetto nemico delle *formiche* (149). II. *IX. 55. (154).
Foſſi a che giovino IV. *I. 7.
FOULCHER DE CHARTRES parla de' *pomi di Sodoma* (51).
FRANCHI ſcriſſe de' *vermini peſtilenziali* (75).
Freddo qual parte poſſa avere nelle *ruggini* III. *I. 12.
Suo effetto (326).
FUCHS. FUCHSII *ſtirpium hiſtoria*.
Fuligo de' Latini qual ſia (37).
Fumana qual ſia I. *V. 2. (62).
FURETIERE come ſpiega il *grano nigellato* (54).
Come la *nigella* (60).

G

GALLENO, che diſſe del naſcere, e del tramontare degli *aſtri* (34).
Degli effetti de' *ſemi del loglio* (96).
De' pregiudizj alla ſalute pel *grano impuro* IV. *V. 7.
GALILEO: coſa egli intenda per *figura perfetta* (287).
Suo ſentimento intorno all' operare della natura III. 2.
Sua ragione della *figura delle piccole ſtille di acqua* (307).
Degli *abbruciamenti* delle foglie III. *I. 11.
Galle debbono ordinariamente la loro origine ad *Inſetti* III. *IV. 1.
Il *grano ghiottone* n' è una ſpezie ivi 1. 2.
Eſempio della formazione di queſta ſpezie di *galla* (371).
GALLO, AGOSTINO, ſcriſſe di molti animali, che producono danno alle biade (119).
Della *zuccajuola* (159). (160).
Di un rimedio contro la *ruggine* (403).
Di altro contro a' *vermini* (434).
Del modo di *fecondare i campi* IV. *V. 8. (457).
Del *miglior grano* (463).
GALLO, FRANCESCO: ſua *teſſera frumentaria* (291).
Gambo del grano talora ſi piega ne' ſuoi nodi II. *XII. 1.
Sue *curvature* miſurate ivi 27.
Ha *radici* ſue proprie ivi 2. 24.
Sue parti diverſamente creſcono in diverſo tempo ivi 6.
Suoi *nodi* gettano altri *gambi* ivi 7.
Da che derivi la multiplicazione de' *gambi* ivi.
Loro aumento ivi 10. 13. 27.
Loro ſtruttura ivi 12. 27.
Materia geſſoſa ritrovata in qualche gambo ivi 19.
Perchè l' eſtremità ſuperiore del gambo della *ſpiga filigginoſa* ſia più groſſo dell' ordinario III. *II. 8.
Perchè quello del *grano carbone* ivi III. 13.
Perchè talora un gambo ſi pieghi ne' *nodi* III. *VI. 1.
Perchè ſi ſecchi quello, le cui radici ſono fuori della terra ivi 2.
Perchè diverſamente creſcano i gambi in diverſi tempi ivi 6.
Da che derivino le loro *curvature* ivi 14.
Come in alcuni gambi ſi poſſa eſſer introdotta la *materia geſſoſa* ivi 15.
GARATONI, Dottor ENEA, lodato II. *XII. 24.
GARDENIO: ſua opinione intorno le *mutazioni del tempo* (301).
GASSENDO: ſua opinione ſopra il *cibo delle Api* (313).
GATTI: come queſto Autore parli del *Git* (208).
GELLIO, AULO, ſcriſſe del Dio ROBIGO (33).
Del Dio AVERRUNCO (34).
Della *natura del morbo* (298).
Genicula de' Latini qual foſſe (288).
GEORG. *a* TUR. *Hiſt. Plan.* GEORGII A TURRE, *Catalogus Plantarum horti Gymnaſii Patavini*.
GER. GERARDI *Hiſtoria Plantarum*.
Germinazione non è impedita dal voto della *macchina Pneumatica* II. *XII. 15.
Perchè III. *VI. 11.
Cagione della *germinazione delle piante* ivi.

GER-

Carbonchio delle biade qual foſſe I. *I. 3. (23). III. *I. 10.
Carbone, o *carboncino*, o *frumento mutulo* di alcuni Lombardi qual ſia I. *II. 2. ivi *III. 2.
Carbunculoſa arena qual foſſe (23).
C. B. Pin. CASPARI BAUHINI *Pinax.*
C. B. Theat. CASPARI BAUHINI *Theatri Botanici Liber primus.*
CARTERET WEBB, FILIPPO, parlò dell' Iride delle gramigne II. *XII. 11.
CATULLO parlò degli *Uſtori* degli Antichi (42).
Cavolo creſpo percoſſo dalla *rugiada vermicoloſa* (75).
καυσμὸς de' Greci qual foſſe (23). (24).
CELSO, CORNELIO, detto l' IPPOCRATE LATINO, come penſaſſe intorno a certi generi di mali I. (9).
Ceneri di legno duro a che ſervano IV. *V. 8.
Cerrone del grano qual ſia I. *IV. 4.
Ceſenate territorio dà grano groſſo II. *VII. 25.
CESTONI: *bacherello* cieco di queſto Autore II. *IX. 50. (151).
CHABREO: ſua *uſtilagine* (43). (47).
Confonde varie malattìe del grano (57).
Suo *bulbo eſculento* II. *IX. 18.
Sua opinione intorno alla *filiggine* (343).
CHABR. *ſtir. Icon.* CHABRAEI *ſtirpium Icones.*
CHAMBERS: come ſpiega queſto Autore la *ruggine del grano* (11).
Suo ſentimento intorno al *cibo principale delle api* I. *I. 3.
Sue ſpezie di *ruggini* (312).
Sua opinione ſopra di eſſe (327).
Rimedj da lui accennati contro la *ruggine* (403). (406).
CHESELDEN: ſua opinione intorno al *foramè ovale* III. *IV. 7. (380).
CHIRCHER, Padre ATANASIO: ſua opinione de' *vermi peſtilenziali* (75).
CHIAPPINI, Padre Abate Don ALESSANDRO: ſue oſſervazioni ſopra una preteſa *meteora* II. *IX. 17.
CHOMEL: ſua opinione intorno al *ſeccamento degli alberi* del 1709. (326).
Chryſanthemo moſtruoſo da che provenga (345).
CICERONE, MARCO TULLIO, parla dell' uredine (30).
Suo ſentimento intorno alle *cagioni delle coſe* III. *IV. 6.
Intorno al ricercare i *rimedj delle malattìe* (401).
Cicuta a che giovi IV. *V. 6.
Cifre di Aritmetica: loro origine (465).
CLEMENTE ALESSANDRINO coſa diſſe degli Antichi Filoſofi (400).
CLUSIO: ſuo *lilium Perſicum* II. *IX. 48.
Suoi diverſi *aconiti* (166).
CLUS. *Hiſt.* CLUSII *rariorum plantarum Hiſtoria.*
CNOSELLIO qual uſo egli faceva della *rugiada* (85).
Coceſta, luogo, nelle cui vicinanze furono fatte oſſervazioni II. *V. 6.
Cocomero ſerpentino a che giovi IV. *V. 6.
COGROSSI: ſua *medicina Italiana* (296).
COLONNA, FABBIO: ſue oſſervazioni ſopra le *Lucciole* II. *IX. 16. (130). (135).
COL. COLUMNAE, *minus cognitarum ſtirpium ἔκφρασις.*
COLUMELLA: qual ſia per eſſo il *Carbonchio* (23).
Quale la *uredine* (30).
Quale la *ruggine* (31).
Parla del *ſacrifizio del Cane* (34).
Se conobbe la *filiggine* I. *II. 3. (45).
Rimedio da lui accennato contro la *ruggine* (403).
Altri contro i *vermini* (433). (435).
Precauzioni nella ſemina da lui tenute per inutili IV. *V. 8. (459).
Commentarj ſtampati in Lipſia (53). (96).
Conche a che giovino IV. *V. 8.
Concime, vedi *Letame.*
CONNER: ſua opinione intorno al *foramè ovale* III. *IV. 7. (379).
Concrezione lapidea con orme di *frumento* II. *XII. 26.
COOK: ſua opinione intorno la *ruggine* (313).
CORALLINA, erba, a che giovi IV. *V. 6.
COREGGIA, Dio degli Antichi, (451).
Corona di ſpighe fu la prima corona tra' Romani (3).
Suo pregio ivi.
CORD. Hiſt. CORDII *annotationes in Dioſcoridem, & Stirpium Hiſtoria.*
Corpi traſparenti della farina II. *VIII. 9. (112).
Perchè non s' ingrandiſcano dal *Miaroſcopio* I. II. *VI. 5.

CO-

COSTEO, GIOVANNI: sua opinione intorno alla *sterilità delle biade* (66).
Intorno la *vermiculazione* (68).
Intorno al *seccarsi delle spighe* III. *V. 6. (389).
Intorno all' *origine de' Morbi* (298).
Intorno a un *vizio dell' ulivo* (325).
Costituzioni diverse degli anni (70).
COWPER: sua opinione intorno al *forame ovale* III. *IV. 7. (378).
CRAMER: suo sentimento contrario al TULL III. *II. 9. (338)
CRESCENZI spiega il *Melume* (13).
Sua opinione intorno la *ruggine* (321).
Curve del gambo del grano: Se sono determinabili II. *XII. 27.
Osservazioni intorno ad esse ivi (293).
Lettera di un Matematico ad esse appartenente (292).

D

DALECAMPIO parla sopra la Storia del *Cavolo* (186).
DAVIDE: suo detto intorno alla *ruggine* (5)
DEI degli Antichi erano per diversi fini adorati (34).
DEMOSTENE: suo detto II. *VII. 21.
DESAGUGLIERS: sua opinione intorno la *forza del Sole* sopra l' umidità della terra (308).
Difetto organico del grano carbone III. *III. 1. (347).
DILLENIO, GIOVAN-GIACOMO: suo *caffè Europeo* (95).
DILLEN. *Cat. Giss.* DILLENII *Catalogus plantarum sponte circa Giessam nascentium*.
DIODORO SICULO: antichità del *grano*, e dell' *orzo* secondo questo Autore (3).
DIONIGI D' ALICARNASSO: donde cominciavano i Romani, secondo questo Autore, alcuni *Sacrifizj* (3).
Temperie dell' aria d' Italia secondo il medesimo (349)
Fecondità delle biade d' Italia per suo detto IV. *V. 8. (453).
DIOSCORIDE: suo sentimento sopra il *carbonchio* (23).
Sopra il *grano sperone* (96).
Sopra l' *avena* (176).
Sopra la *ruta silvestre* (253).
Sopra la *verbenaca* (271).
DODONEO cosa dica della *filiggine* (47).
DOD. *Pompt.* DODONAEI *Pomptades*.
DOMENICHI: cosa pensi delle Rogazioni (34).
Domi-porta qual sia II. *IX. 14. 15.
DONNA nel suo mese a che pregiudichi, secondo PLINIO III. *V. 3. (383).
A che giovi, secondo il medesimo, e secondo COLLUMELLA, e PALLADIO (435).
Ducenta, Villa, in cui si fece una osservazion singolare, II. *XII. 3.
DUHAMEL: sua distinzione della *filiggine*, e del *grano carbon* (54). (331).
Suo sentimento intorno a un gambo di grano unito ad uno di *loglio* (219).
Sua osservazione della *filiggine* (332).
Cosa da lui si dica di alcune malattie (336).
Sua cagione della *spiga vota* (385).
Sua cagione de' grani minutissimi (387).
Sua precauzione intorno le piante IV. *V. 2.

E

EGINETA, PAOLO come esprime la *sideratio* de' Latini (24).
ELIANO SOFISTA mentova l' uso degli Antichi di mangiar *vermi* (161).
Sua espressione III. *VI. 16.
Eliantemo: ramuscelli incatorzoliti di questa pianta II. *VIII. 17. (116).
EPITETTO: sentimento di questo Filosofo sopra l' *origine delle voci* (18).
ἐρυσίβη de' Greci qual sia I. *I. 2.
Erbe, che si trovano fra il grano messe in Indice II. *X. 2. per fino a 132.
Se conosciute per dannevoli dagli Antichi II. *X. 1. (69). (164). (165).
Se v' hanno erbe, che si trasmutino (219).
Cagione del loro pullulare fra il grano III. *V. 10.
Sterparle di mezzo a' grani a che giovi IV. *I. 10. ivi *II. 2.
Rimedj contro di esse ivi *V. 7.
ERITONIO, Re: sue *cavalle* II. *XII. 27.
ERNDTEL scrisse delle antichità della *Pisca Polonica* I.
ERODOTO: sua espressione (24).

No-

GERSTEN, CRISTIANO LODOVICO: ſua opinione intorno la *rugiada* (82). (312).
Ghiottone, vedi *grano ghiottone*.
Giallume qual ſia I. *V. 2. (63).
Macchia le foglie di grano in diverſe maniere II. *XI. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dà materie gialle ivi 7. 8. 9.
Verminetti di queſte ivi 8. 9.
Cagione di eſſo *giallume* III. *V. 1. 2. 3. 4.
Cagione di qualche ingiallimento ſecondo gli Antichi ivi 3.
Rimedio al *giallume* IV. *V. 1.
GINANNI, Abate Don PIETRO PAOLO, Parente dell'Autore, lodato (33).
GINANNI, GIUSEPPE, Zio dell'Autore, nominato II. *IX. 31. 32. 56. (464).
Giornale elvetico: citato (338).
Giorni rubigali, florali, vinali quali foſſero I. *I. 4 (32).
GIRALDI: ſuo ſentimento intorno l' antica eſpreſſione di *ruggine* (19).
GIROLAMO, Santo, mentova l' uſo di mangiar *vermini* (161).
Gittone fu tenuto per *loglio* (209).
GIULIANO, Arciveſcovo di Toledo: come denomina la morte ſecondo le diverſe età del ſoggetto (64).
Gocciole delle nebbie, e delle rugiade in qual modo ſi conformino (307).
Cagione della loro figura ivi.
GODEFROY, DIONIGIO: come ſpiega *Galli nellam* (14).
GOEDAERT ſcriſſe della *zuccajuola* (159)
Golpe, o *volpe del grano* de' Toſcani qual ſia I. *II. 2. ivi *III. 2.
GOTTLOB, SCHOBERO: ſuo ſentimento intorno i morbi cagionati dal *loglio*, e dalla *ſegala* (96).
Grano, di cui ſi favella in queſt' opera (1).
Come foſſe chiamato da' Latini ivi.
Quanto ſia antico I.
Sua *lattea materia* II. *VII. 11. (101).
Sua *gravità ſpecifica* ivi *XII. 8.
Seminato al coperto, che ne venne ivi 14.
Sua *materia metallica ſulfurea* ivi *V. 19.
Sua *materia ſtagnea* ivi *XII. 9.
Sua *materia ſimile al coralio* ivi 17.
Sua *eſcreſcenza lignea* ivi 18.
Dove bene alligna III. *V. 10.
Cagione della diverſa gravità ſpecifica de' grani diverſi ivi *VI. 7.
Cagione delle predette *materie metalliche* ivi 8.
Cagione del poco creſcere al coperto ivi 10.
Perchè germina nella *macchina pneumatica* ivi 11.
Cagione della predetta *materia ſimile al corallo* ivi 12.
Cagione dell' *eſcreſcenza lignea* ivi 13.
Grani ſull' *aja* come ſi poſſono conſervare IV. *V. 6.
Grano carbone qual ſia I. *III. 1. 2. 3. (50). (51).
Sua antichità ivi 4. (56).
Confuſo dagli Autori colla *ruggine* ivi (57).
Quanto poſſa l' *intemperie dell' aria* ſopra di eſſo II. *VII. 1.
Vigore della ſua pianticella ivi 2. (99).
Indizio del *grano carbone* nella pianticella ivi 3. (100).
Frammeſſo in alcune ſpighe col grano buono ivi 7. 13.
Suo gambo con qual forza tragga il ſugo ivi 9.
Suoi principj nel granello, e ſua deſcrizione ivi 11. 12. 13. 14. 15.
Dove ſi trovi ivi 16.
Sua polvere ſecondo il NEEDHAM ivi 18. (102).
Se queſta è ſempre velenoſa ivi 19. 20.
Analiſi chimica della medeſima ivi 21.
Il *grano carbone* è di figure diverſe ivi 22.
Sua *gravità ſpecifica* ivi 23.
Condotti del ſugo ne' ſuoi gambi ivi 24.
Ceneri del *grano carbone* eſaminate ivi 26.
Cagione del *grano carbone* III. *III. 1 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. (350). (352). (362).
Sua diſtinzione dalla *filiggine* ivi 1. (346).
Suo *difetto organico* ivi (347).
Ch' egli potrebbe dirſi *morbo ſontico del grano* (348).
Se il *difetto organico* poſſa eſſere ne' *nodi del gambo* (350)
Se poſſa derivare da *mancanza di umore* (352).
Origine del *difetto organico* ivi 6.
Perchè queſta malattìa attacchi ſolo il *granello* ivi 7. (357).
Mutazione della ſua *ſoſtanza farinoſa* ivi 11.

Cagione dell'ordine de' granelli ſuoi nella ſpiga ivi 12.
Perchè la parte ſuperiore del ſuo gambo tanto s'ingroſſi ivi 13.
Perchè da buono naſca ſpeſſo cattivo grano ivi 14 (367).
Analogìa di quello male col *morbo venereo* (368).
Rimedj contro di eſſo IV. *V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Grano ghiottone qual ſia I. *IV. 1.
Perchè così detto (58).
S'egli è la *nielle* del NEEDHAM I. *IV. 3. (61).
Se ſia antico ivi 3. 4.
Suoi principj, e ſua deſcrizione II. *VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 13.
Suoi filamenti *lombrici-formi* ivi 5. 6. 7. 8. 9. 11.
Moto, e traſparenza di queſti filamenti ivi (105). (114).
Suo *bacherello*, e ſuo ſcarabeo ivi 9. 10. 12.
Sua calcinazione ivi 15.
Egli non pregiudica al pane come fa il *grano carbone* ivi 16.
Suoi indizj ivi 17.
Cagione di eſſo, e de' ſuoi fenomeni III. *IV. 1. 2. 3. 6. 7. 8. (371).
Perchè i corpi *lombrici-formi* non ſi vedono da principio ſul granellino ivi 4.
Cagione del lungo loro vivere ivi 5. 6. 7.
Cagione del non alterarſi ivi 8.
Cagione dall'inalbamento del *grano ghiottone* calcinato ivi 9.
Rimedj contro il *grano ghiottone* IV. *IV. 1. 2. 3. 4.
Grano groſſo qual ſia II. *VII. 25.
Non è ſoggetto a *grano carbone* III. *III. 15.
Grano in erba: ſua *Iride parabolica* II. *XII. 11.
Se nel gambo egli abbia condotti ſuoi particolari ivi 25.
Grano Italico comunemente ſeminato II. *VII. 25. (104).
Grano morboſo della ſegala II. *VI. 16. vedi *grano ſperone*.
Grano morboſo ſingolare II. *VI. 16.
Sua cagione III. *II. 15.
Grano nigellato qual ſia (54).
Grano ſperone: cos'egli ſia, e in quali biade ſi trovi (96).
Dove regni ſingolarmente ivi.
Suoi effetti pernizioſi ivi.
Gli Antichi attribuivano a queſto grano delle virtù (96).
In quali piante ſi trovi (344).
Grano turco reſiſte alle malattìe III. *III. 15.
Grano voto qual ſia I. *V. 3.
Come poſſa dirſi morte immatura del grano in erba (64).
Se conoſciuto dagli Antichi (65).
Oſſervazione di eſſo II. *XI. 11.
Sua cagione III. *V. 5.
Suo rimedio IV. *V. 2.
Grillo Talpa, vedi *zuccajuola*.
GRONOVIO: qual effetto faccia ſecondo queſto Autore la *ruggine* (27).
Per qual fine gli Antichi ſacrificavano a ROBIGO (34).
ROBIGO Dio de' Rodiani (35).
GRUTERO, ſuo frammento d'iſcrizione, dove ſi nominano le ſpighe *viziate* (6).
GUAGUIN: coſa ſcriſſe queſto Iſtorico di certi popoli della Ruſſia (376).
Guazza, vedi *rugiada*.
GUDIO: ſua collezione d'iſcrizioni (33).
GUTHERIO: ſuo ſentimento intorno la lezione di *ſpicis vittatis* in un frammento d'iſcrizione (6).

H

HALES oſſervò la *muffa ne' Lupinaj*, II *V. 21. (89).
Effetto delle *nebbie* ſecondo queſto Autore ivi 2.
Effetto *del Sole* (308).
Suo *raggio ardente* III. *I. 10. (320).
Suoi *vapori brucianti* ivi 11.
Sua opinione intorno la *mancanza di traſpirazione* ivi *II. 10. (340).
Che dica della *fermentazione* (333).
Sua forza de' vaſi del ſugo delle piante (352).
Veſcichette dell'aria nelle piante ſecondo queſto Autore (353). (354).
Se v'ha circolazione di ſugo nelle piante ſecondo il medeſimo (360).
Suo rimedio contro i *vapori pernizioſi* IV. *I. 5. (407).
HAHN, GIOVANNI GOTTIFREDO: coſa ſia, ſecondo queſto Autore, il *carbonchio* del corpo umano (23).
HAMBERGERO: ſuo parere d'intorno alla

alla rugiada (312).
HANOVIO scrisse del *grano sperone*, e dell' *ustillagine* (53). (96). (344). (419).
HARTSOEKER: sua opinione intorno la *ruggine* III. *I. 3. (309). (324). (328).
Intorno la *circolazione del sugo* nelle piante (360).
Sua osservazione singolare d' *Insetti* (382).
Sua opinione intorno gl' *Insetti* (395).
HARVEO: sua opinione intorno la *fermentazione* (333).
HAUPMANNO, AUGUSTO, scrisse de' *vermi pestilenziali* (75).
HENCKELIO, GIAN-FEDERICO, trovò affinità tra il *regno minerale*, e il *vegetabile* II. *V. 19. (88) II. *XII. 9. (284).
HENSHAW, TOMMASO: sua osservazione sopra la *rugiada* (83).
HERMANNO: sua proporzione determinata del *calore* III. *I. 12. (323).
HILL, GIOVANNI: sua descrizione del *bright* degl' Inglesi (311).
de la HIRE determinò la *velocità del moto dell' aria* II. *IX. 16.
Sua opinione intorno l' *innalzamento* del sugo delle piante III. *III. 2. (351).
de HOHENTHAL, PIETRO: sua opera (456). (459).
HOFFMANNO, FEDERICO: suo detto I *I. 1.
Sua *rugiada vermicolosa* (75).
HOMBERG: sua opinione intorno la *germinazione delle piante* (398).
Honydew degl' Inglesi cosa sia (313).
H. Lugd. Bat. HORMANNI *Plantarum Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus*.
dell' HOSPITALE, Marchese: suo problema intorno la conformazione di certe *curve* III. *VI. 14.
HUET parla della *rugiada* (82).
Hyaena animale, della cui pelle vestivano i *seminatori* IV. *V. 8.

I

JAVOLENIO parlò del *morbo sontico* (348).
Jeriakon degli Ebrei qual fosse I. *I. 2.
IMPERATO, FERRANTE, parlò della *zuccajuola* II. *IX. 56. (155).
Innacquare a che giovi IV. *I. 8.
A che pregiudichi ivi *V. 2.
Insetti, che infestano il grano in erba, se furono noti agli Antichi I. *V. 7. II. *IX. 1. (68). (118). (120).
Loro presta trasformazione ivi (121).
Loro divisione ivi 2.
Insetti, che si trovano sopra la pianticella del grano allo scoperto ivi 3. per fino a 17.
Rughe dette *Geometre*, o *misuratrici* ivi 3.
Bruchi, e *farfalle* della *ruggine* ivi 5.
Ruga detta dal REAUMUR: *arpenteuse à dix jambes* ivi 6.
Vermetti, e *moscherini* singolari ivi 9.
Cantaride ivi 13.
Tarli del grano in erba ivi 14. 15.
Mosca detta dal Reaumur: *moube papillonnacée* ivi 14.
Mosche Ichneumon ivi 14. 15. 31. 32. 44.
Insetto nominato *domi-porta* ivi 14. 15.
Ragnatelli, che menano tele sottilissime fra il grano ivi 17.
Insetti, che si trovano chiusi nella pianticella del grano, e nel grano medesimo ivi 18. per fino a 33.
Rughe dette dal REAUMUR *mineurs en galerie* ivi 21.
Minatori ivi 22.
Bacherelli tenuti dal VALLISNIERI per cagion della *ruggine* ivi 24. e II. *XI. 8.
False rughe nascoste dentro le foglie ivi 30.
Mosca detta *pavoncina* ivi 31.
Mosca detta da' Naturalisti: *musca tripilis* ivi 32.
Insetti, che si trovano sopra le radici del grano ivi 34. per fino a 56.
Scarabeo ivi 49.
Pidocchi del grano in erba ivi 50.
Nimico di essi *pidocchi* ivi.
Vermi del genere de' *lombrici terrestri* ivi 54.
Rughe dette *scolopendre* ivi 55.
Cagione del loro infestamento III. *V. 9.
Nella macchina del mondo necessarj gl' Insetti, quanto è l'uomo III. *V. 9.
Rimedj contro di essi IV. *V. 6.
Quali sieno gl' Insetti de' grani raccolti sull' *aja* (438).
INTIERI: suo rimedio contro gl' Insetti de' granaj IV. *V. 6.

J. B. JOANNIS BAUHINI *Hiſtoriae univerſalis Plantarum*.
IPPOCRATE: ſuo ſentimento intorno le cagioni (301).
Iride parabolica, oſſervata ſul grano in erba II. *XII. 11. ſua cagione III. *VI. 9.
Iſcrizione di GRUTERO, che nomina le *ſpighe viziate* (6).
Iſcrizioni al Dio ROBIGO (33).
ISIDE trovò il frutto del *grano*, e dell' *orzo* (3).
Interpretata per CERERE antichiſſima Deità di Egitto ivi.
ISIDORO: che dica della *rugiada* (79).

K

KAESTNERO: ſue note (138).
Kaludà degli Ebrei qual foſſe I. *I. 2.
KLAUNIO, RODOFREDO, coſa narri dell' *arſenico* IV. *IV. 3. (425).
KLEIN, GIACOMO TEODORO, parla delle *rondini* (376).
KLEMMIO, GIOVANNI CRISTOFORO: ſua opinione ſopra l' origine della parola *Agricola* (448).
KUHNHOLD: ſua opinione intorno al *letaminamento de' campi* IV. *V. 8. (452).

L

de LAET, GIOVANNI: ſua deſcrizione della gioja detta *carbonchio* (23).
des LANDES parla della *nigella* (41).
LANDI, Marcheſe UBERTINO: ſuo raggionamento ſopra alcuni *Inſetti del grano* II. *IX. 20.
Sue lettere (152).
LANGE: ſuo rimedio contro l'*eſalazioni pernizioſe* IV. *I. 7. (408).
LANGIO, CARLO NICCOLA: ſuo ſentimento intorno la *ruggine* (25). (81).
Sua deſcrizione del *morbo della ſegala* (96). (97).
Vuole, che la *ruggine* ſia cagione di *filiggine* III. *I. 15. (330).
Sua cagione del *grano ſperone* (344).
Suo parere intorno al *grano carbone* III. *III. 10. (365).
LANGIO, CRISTIANO: ſua opinione intorno a' mali tutti (369).
LANZONI, GIUSEPPE, ſcriſſe della forza della *rugiada* (85).
LATANZIO parla de' Dei, che per diverſi fini gli Antichi adoravano (34).
LATTANTE, Dio delle biade (101).
Latte a che giovar poſſa IV. *V 4.
Lavoro della terra qual debba eſſere IV. *III. 1. (417) ivi *V. 8.
Lauro: ſe i ſuoi rami liberano dalla *ruggine* il grano in erba IV. *I. 2.
Lebbra del grano in erba, qual poſſa dirſi III. *I. 4.
LEEUWENOEKIO non vide il *bruco della ruggine* II. *V. 4.
Suo *falangio* II. *IX 17. (138).
Suoi *globuletti* lucidi nella farina II. *XII. 5. (280)
Suo vento produttore della *ruggine* (328).
LEMONNIER: dove trovò il *grano ſperone* (96).
Come parli di eſſo (344).
Lentiſco a che giovi IV. *V. 6. (431).
LEONTINI, BOTTONE: ſue oſſervazioni ſopra le *lucciole* (130). (132). (135). (137).
LEOPOLDI: ſuo eſame delle *arene* (456).
LESSERIO: ſua *Inſettoteologia* (138).
Letame a che giovi per le malattie del grano in erba IV. *III. 2.
Suoi effetti ivi *V. 8.
Antichità del *coſtume di letaminare i campi* (451).
Qual ſia più efficace IV. *V. 8.
Se ſia da tralaſciare ivi.
Lettere a un Americano eſaminano la *Storia naturale* del Signor di BUFFON II. *VIII. 8. 11. (108). (115).
Coſa vi ſi dica del Signor NEEDHAM intorno al *grano ghiottone* III. *IV. 5. (374).
Lettera di un matematico intorno alle curve de' gambi del grano (292).
Lettere intorno alla ſcoperta degl' Inſetti, che ſi multiplicano per le ſezioni de' loro corpi (152).
Lettera ſopra il roſpo (278).
Licheni mentovati I.
LIGORIO: Autore ſoſpetto (33).
LIN. *H. Clif.* LINNAEI CAROLI *Hortus Cliffortianus*.
LIONET: ſue oſſervazioni ſopra i *pidocchi delle piante* II. *IX. 50.
Lirare de' Latini coſa ſia IV. *V. 8.
Liſciva di grano carbone calcinato, e ſpolverizzato a che giovi IV. *I. 6.
Liſciva comune a che giovi (419).

A che giovino le *liſcive* generalmente ivi.
LISTER: ſuoi *ragni* II. *IX. 17. (139).
LOB. *Adv.* LOBELII *Adverſaria*.
LOB. *Icon.* LOBELII *Icones*.
LOBELIO: ſua uſtilagine (43). (47).
LOB. *Stir. ob.* LOBELII *Stirpium obſervationes*.
Loglio: malattìe da queſto ſeme prodotte (96).
Erba eterogenea al grano II. *X 66.
E' ſoggetta al *carbone*, e alla *fuliggine* ivi.
Coſa ella ſia ivi.
Sue preteſe traſmutazioni (219).
Sue radici attaccate con alcune altre di *avena* II. *XII. 24.
Lombrici terreſteri, che ſi moltiplicano per ſezioni II. *IX. 54. (152).
Corpi *lombrici-formi* del *ghiottone* coſa ſieno II. *VIII. 5. 6. 7. 8. 9. 11.
Come queſti cagionino il *grano ghiottone* III. *IV. 1. 2. 4.
Cagione del lungo loro vivere ivi 5. 6. 7.
Lue venerea, mentovata I.
LUCANO parla degli *Uſtori* degli Antichi (42).
Lucciole oſſervate minutamente II. *IX. 16.
LUCREZIO: ſuo ſentimento intorno la mutazione delle coſe (2).
Lumachini del grano in erba II. *XII. 16.
Luſſuria del grano qual ſia I. *V. 6. (67).
Oſſervazione intorno ad eſſa II. *XI. 14.
Sua cagione III. *V 8.
Suo rimedio IV. *V. 5.
Lycoperdon, o *veſſa di lupo* coſa ſia, e ſue proprietà (51).
LYONET ſcriſſe degl' *Inſetti*, che ſi multiplicano per ſezioni (152).

M

MACROBIO parla della *rugiada* (78).
Macchina pneumatica non impedisce la germinazione II. *XII. 15.
Perchè III. *VI. 11.
MAGN. *Bot. Monſp.* MAGNOLI *Botanicum Monſpelienſe*.
MAIRE, Padre Criſtoforo, Matematico prode (15).
Malattìa propria di un luogo I. *III. 3. (55).
Malattìe del grano in erba quanto ſieno antiche I. (6).
Loro cagion generale III. 1. 2.
Mali nuovi I.
MALPIGHI, MARCELLO: ſuoi *utricoli* II. *VII. 11.
Sue oſſervazioni ſopra le *lucciole* II. *IX. 16. (130). (132). (133).
Suo *mezzo per fecondar le biade* (419).
Malume, o *melume* qual ſia I.*I. 2. (13).
Manna, vedi *malume*.
Manna celeſte qual ſia (125).
Manna di Calabria, cos' ella ſia (309).
MARCHARD: ſuoi grani ritondi di *quercia* II. *VIII. 4.
MARIOTTE: ſua opinione intorno la *circolazione del ſugo* delle piante (360).
MARSIGLI, Conte FERDINANDO: ſuoi *ragni* II. *IX. 17. (140).
MARTINETTI, Dottore, lodato II. *VIII. 9.
Marzetto de' Piacentini qual ſia I. *III. 2. (362).
Materia metallica ſulfurea di alcune ſpighe II. *V. 19.
Materia ſtagnea di alcune ſpighe II. *XII. 9.
Materia di altre ſpighe *ſimile al corallo* ivi 17.
Materia geſſoſa di alcuni gambi ivi 19.
MATTIOLI: che dica della pietra *buſonite* (279).
MATTH. *Com. in lib. dioſc.* MATTHIOLI *Commentarius in Dioſcoridem*.
MAUPERTUIS: ſuoi *corpi ſemoventi del ghiottone* II. *VIII. 9. (113).
MAZZOLENI ſcriſſe degl' *Inſetti*, che ſi multiplicano per ſezioni (152).
Melume, vedi *malume*.
Memorie di Trevoux riportano il libro di nuove eſperienze del NEEDHAM II. *VII. 18.
Le rifleſſioni ſopra le *cifre d' Aritmetica* del CALMET (465).
MENAGGIO: ſue *Etimologie* I.*I. 3. (21).
MICH. *N. Pl. Gen.* MICHELI *Nova Plantarum genera*.
MICHELI, PIETRO ANTONIO, ſcriſſe dell' erba *ſucciamele* (238).
Microſcopi diverſi addoperati II. *V. 10. (78).
Mildew degl' Ingleſi qual ſia I. *I. 2. 3. Si diſtingue ſecondo il CHAMBERS dal *bright* (15).
Millepiedi: oſſervazioni ſopra queſti *Inſetti* (83). (382).

MILLET descrisse l' *Inverno del* 1723. (74)
MOELLERO, Abate, scrisse del *grano sperone* (96). (344).
MONTELATECI, Abate, scrisse dell' *erba succiamele* col MICHELI (238).
MONTI, Dottor GIUSEPPE, lodato I. *II. 4.
MONT. *Prodr.* MONTII *Prodromus Catalogi stirpium agri Bononiensis*.
MONTING, ABRAMO: suo rimedio contro la *rugiada frigida notturna* IV. *I. 8. (409).
Suo rimedio per la sterilità delle piante IV. *V. 4. (429).
Contro i *vermini* ivi 6. (436).
Morbo sontico cosa sia (348).
Quando possa dirsi del grano ivi.
Morbo Ungarico, mentovato I
Morchia a che giovi IV. *III. 4.
Morte variamente denominata secondo le diverse età (64).
MORIS. *Hist. Ox.* MORISONI *Historia Oxonienfis*.
MORTIMER: suo sentimento intorno il cibo principale dell' *api* I. *I. 3.
Suo sentimento intorno la *ruggine* (313).
Intorno lo svanimento de' getti delle piante III. *V. 6. IV. *V. 2.
Mosca ichneumone qual sia II. *IX. 15.
Mosco cosa sia (49).
A che giovi IV. *V. 8.
MOUFETO descrisse la *lucciola* (131).
Muffa delle foglie del grano qual sia II. V. 21.
Si trova moltoppiù spesso ne' *lupinaj* ivi.
Quale possa dirsi *del grano in erba* III. *I. 4.
Mutterckorn de' Tedeschi (96).

N

NEbbia, osservata II. *V. 13. (80).
Preceduta a certo abbruciamento delle foglie II. *V. 23.
Come si conformi III. *I. 1.
Cagione della figura delle sue particole (307).
Sua indole naturale III. *I. 5.
NEEDHAM: suo *grano guasto dalla nigella*, e suoi corpi *anguilli-formi* I. *III. 3. (59). II. *VII. 18. II. *VIII. 4. 5. 8. 9. 11.
Suo equivoco ivi 5. (106).
Mutò opinione intorno i corpi *anguilliformi* ivi 8. (111).
Sua opinione intorno il lungo movimento di questi corpi ivi 5. (375).
Tenne in *salamoja* grano guasto IV. *IV. 1. (424).
NEGRI, Don FRANCESCO: suo racconto di un fatto delle *rondini* (376).
NEWTON, ISACCO: sua cagione della figura delle piccole *stille di acqua* (307).
Sua proprietà de' *corpi opaci* III. *III. 11.
NICOZIANA a che giovi IV. *V. 6.
Nielle de' Franzesi qual sia (14). (29). (41). (60).
NIEREMBERGIO scrisse della costituzione diversa degli anni (70).
Che ogni albero ha propri *vermi* (120).
Tenne la *trasmutazione delle piante* (219).
Tenne il vento per cagion di *ruggine* (328).
Nitro a che gioni IV. *V. 6. (459).
NIZOLIO: come spiegò *Uredo* (23).
NONNIO: sua espressione (23).
Numero minore: perchè così detto, e sua origine (465).

O

OLio: ugnere le spighe a che giovi IV. *I. 11.
Olio vegetabile del ZEIGERO a che giovi ivi *V. 8
OMERO: suo sentimento della *ruggine* (31).
Sua espressione leggiadrissima II. *XII. 27.
ORAZIO loda quelli, che abitano la *Villa* (16).
Detesta la *ruggine* (26). (31).
Come accenna il *sarchiare* (441).
ORBONA, Dea degli Antichi (34).
Orina di animale a che giovi (419), e IV. *V. 8.
ORTELIO parla de' Dei degli Antichi (33).
Orticello circondato d' alti muri, dove furono fatte osservazioni II. *III.
Orujo degli Spagnuoli qual sia I. *I. 2.
Orzo stimato il più antico delle biade (3).
Date le primizie di esso ne' sacrifizj de' Greci ivi.

Osservazioni generali II. *I. *II. *III. *IV.
Ostrica: a che giovino i suoi gusci IV. *V. 6.
OVIDIO parla della *ruggine del ferro*, e di quella *del grano* (19).
Della Dea *Rubigine* (33).
Del sacrifizio del *Cane*, e della *Pecora* (34).
Degli effetti del *loglio* (96).
Dell' erbe nocevoli, e delle salutifere (163).
Dell' *Aconito* (166).
OUTHOVIO parla de' Dei *Robigo*, e *Rubigine de' Lituani, e Peruani* (33).

P

PABBIO, qual sia (240).
PACCUVIO parla del Dio *Averruncо* (34).
Paglie, e sterpi accesi se impediscono la ruggine IV. *I. 1.
Paludi, e *stagni*, e *lacune:* loro veleno III. *I. 6.
Rimedio per difenderne le biade IV. *I. 7.
PALLADIO, RUTILIO: rimedj da lui accennati contro la *ruggine* (403). (413).
Parla de' rimedj contro i *vermi* (432). (434). (435).
PAOLINI CRISTIANO, scrisse de' *vermi* pestilenziali (75).
Paralipomeni: supplimento nella Scrittura a' quattro libri de' Re, nel quale si parla della *ruggine* (26).
PARENT descrisse l' *Iride parabolica* veduta sull' erbe II. *XII. 11.
PARK. *Theat.* PARKINSONI *Theatrum Plantarum*.
PARSONS, GIACOMO, scrisse de' Polipi (152).
PASSERI, Abate GIAMBATISTA, *pitture Etrusche* da lui spiegate (33).
Come gli *Etrusci*, e gli *Eugubini* conobbero la Dea *Rubigine* (36).
PAUSANIA nomina il Dio *Robigo* (33).
Pecore: effetto, che in loro produce il pascolo d' *erbe rugginose* II. *V. 15.
Quando la *rugiada* sia a loro perniziosa III. *I. 6.
Quando giovi al grano in erba l' essere svettato da esse IV. *V. 5.
PEDO ALBINOU: cosa dica delle *rondini* (376).
Penuria del grano qual sia I. *V. 5. (66).
Pepe creduto rimedio contro la *ruggine* IV. *I. 3.
PERRAULT: sua opinione intorno alla *circolazione del sugo nelle piante* (360).
Persico sue foglie a che giovino IV. *V. 6.
PETIV. *Conc. Gr.* PETIVERII *Concordia Graminum, Muscorum, &c.*
Piangipane, villa dove furono fatte osservazioni particolari II. *VI. 7. ivi (93). II. *IX. 9. ivi *XII. 26.
Pievequinta, villa dove furono fatte osservazioni particolari II. *VI. 17 II. XII. 9.
Pidocchi delle piante, loro generazione II. *VIII. 8. ivi *IX. 50.
Un solo di essi chiudesi nella *galla* sua III. *IV. 4. (372).
PITCARNIO: suo effetto del calore (337).
PITISCO parla de' fini diversi, per cui gli Antichi sacrificavano a' Dei (34).
PITURNO di qual costume sia tenuto per inventore (451).
PLATONE: sua testimonianza intorno a' *nuovi generi di mali* (9).
PLAUTO parlò degli effetti de' semi del *loglio* (96).
Suo pensiero sopra un campo sterile (342).
Plica polonica, mentovata I.
PLINIO: suo *triticum* (1).
Quai fosse per lui il *primo cibo del Lazio* (3).
Quale la *prima corona* ivi.
Quale il *primo scrittore di Agricoltura* I. (4).
Mali nati al suo tempo I. (8).
Nomi diversi della *ruggine* da lui mentovati I. *I. 3. (23).
Sua *ruggine del rame*, e *del ferro* (19).
Qual sia per lui la *scabbia delle piante* (22).
Danni prodotti dalla *ruggine* (31).
Qual grano non ne patisca secondo questo Autore (90).
Se conobbe la *filiggine* I. *II. 3.
Difetto simile all' *avena* I. *V. 3.
Descrisse la *lussuria del grano* I. *V. 8.
Grande naturalista II.
Attribuisce virtù al *grano sperone* (96).
Sua *cantaride*, o *scarabeo* (118).
Suo *ragno* II. *IX. 17. (141).
Mentova l' *uso di mangiar vermini* (161).
L' *erbe dannevoli alle biade* (164). (165). (265).
Sua *avena* (176).

Suo

Suo *cavolo* (186).
Sua *orobanche* (238).
Sue *chiocciolette* minute II. *XII. 16. (290).
Cos' egli denominaſſe *genicula* (288).
Cagione per lui della *ruggine* (303).
Quando per lui ſi contragghino le *ruggini* (304).
Donde naſca la ſua *ſcabbia delle piante* III. *I. 4. (311).
Non vuole dar parte alcuna al Sole nelle *ruggini* III. *I 12. (324).
La dà al *vento* (327).
Sua cagion curioſa d' *ingiallimento dell' erbe* III. *V. 3. (383).
Sua cagione di *grano voto* ivi 5. (384).
Sua cagione della *luſſuria delle biade* III. *V. 8. (391).
Intorno l' *infeſtamento degl' Inſetti* (393).
Rimedj da lui accennati contro la *ruggine* (403). (404).
Quando ſi dice da lui irrimediabile (405).
Parla del rimedio per la *luſſuria delle biade* (430).
Di quelli contro *vermini* (432). (434). (435).
Come accenna il *ſarchiare* (441). (442).
Come il *roncare* (441).
Dell' *antichità del letaminare i campi* (451).
Quale per lui ſia *miglior grano* IV. *V. 8. (462).
PLUCHE, vedi *Spettacolo della natura*.
PLUK. *Almag. Bot.* PLUKENETII *Almageſtum Botanicum*.
PLUTARCO parla del ſacrificio del *Cane*, che gli Antichi facevano al Dio *Robigo* (34).
POLENI, Marcheſe GIOVANNI: ſuo ſentimento intorno le *curve del grano* II. *XII. 27.
POLIDORO, VIRGILIO, determina l' Antichità del *letaminare i campi* (451).
POLIGNAC, CARDINALE: ſuo *Anti-lucrezio* II. *VIII. 8.
Polipi a mazzo ſcoperti negli ultimi tempi II. *VIII. 8. (109).
PON. JOANNIS PONAE *viaggio di Monte Baldo*.
Pomi di Sodoma coſa ſieno (51).
PONPART: ſua *formica-leo* II. *IX. 55.
PONTEDERA, GIULIO: ſue oſſervazioni ſopra i gambi del grano II. *XII. 27.
Suo caſo intorno alla *lucciola* II. *IX. 16.
PONT. *Ant.* PONTEDERAE *Anthologia*.
PONT. *Diſſ.* PONTEDERAE *Diſſertationes Botanicae*.
Porca coſa ſia (449)
Derivazione di queſto termine ivi.
PORFIRIO Filoſofo parla de' Dei, che per diverſi fini gli Antichi adoravano (34).
Primaro, villa, dove ſi è fatta una oſſervazione ſingolare II. *XII. 17.
Proſcindere degli Antichi qual foſſe IV. *V. 8.
Pullulare fra il grano dell' *erbe eterogenee*, Vedi erbe, che ſi trovano fra il grano.

Q

QUINTINYE: come ſpiega la parola *nielle* (14).

R

RADICAZIONE qual foſſe (24).
Radici particolari a ciaſcun gambo di grano II. *XII. 2. 24.
Radici di grano con l' *odore di viole mammole* eſaminate ivi 3.
Cagione di ciò III. *VI. 3.
Struttura delle radici del grano ivi 22.
RAII *H. Hiſtoria Plantarum*.
RAII *Syn. Synopſis ſtirpium Britannicarum*.
RAMAZZINI: qual pianta ſenta prima la *ruggine* ſecondo queſto Autore (25).
Dove vedeſſe la *ruggine* (28).
Oſſervò la *fuliggine* ſul Modeneſe I. *II. 1. (39).
Parla delle coſtituzioni diverſe degli anni (70).
Suoi eſperimenti ſopra la *ruggine* II. *V. 18. (86).
Sua opinione intorno alla *ruggine* (310). III. *I. 6.
de' Re: libri della *Bibbia*, ne' quali ſi parla della *ruggine* (26).
de REAUMUR: ſue oſſervazioni ſopra gl' *Inſetti* II. *IX. 4. (122). 6. (124. 10. (128). 14. (129). 15. 16. (136). 19. 20 21. 22. 26. 28. 30. 33. 34. 36. (144). (145). 42. 50. (148). (150).
Scriſſe degl' *Inſetti*, che ſi multiplicano per ſezioni (152). 54. 55. (153).

Suo *Termometro* (73). II. *IX. 9.
Mentova la *zuccajuola* (158).
L' uſo di *mangiar vermini* (161).
Che ſenta della *fermentazione* introdotta dagl' *Inſetti* nel ſugo della pianta (344).
Sue *galle de' pidocchi* (372).
Suo mezzo per abbreviare la vita agl' *inſetti* IV. *V. 6. (437).
REDI dice, che i *vermi* rivengono (105).
Regina erba a che giovi IV. *V. 6.
REINESIO: ſue iſcrizioni (33).
RENEAUME: ſua opinione intorno la *manna di Calabria* (309).
Reſpiro: uſo del ſuo organo ne' corpi *lombrici-formi* III. *IV. 7.
RICCATI, Padre VINCENZO: ſuo ſentimento intorno le *curve del grano* II. *XII. 27. (295).
Rimedj contro le malattìe del grano in erba moſtrati dal Signor TILLET di pochiſſima ſpeſa (421).
Contro la *ruggine* ivi IV. *I. 1. per fino a 11.
Contro la *filiggine* ivi *II. 1. 2. 3.
Contro il *grano carbone* ivi *III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Contro il *grano ghiottone* ivi *IV. 1. 2. 3. 4
Contro il *giallume* forſe non ve n' ha ivi *V. 1.
Contro il *grano voto* ivi 2.
Contro il *ſeccarſi delle ſpighe* ivi 3.
Contro la *ſterilità* ivi 4.
Contro il *luſſureggiare delle biade* ivi 5.
Contro l' *infeſtazione degl' Inſetti* ivi 6.
Contro il *pullular dell' erbe eterogenee* ivi 7.
Rimedio pe' *grani*, *che ſono ſull' aja* IV. *V. 6. (438).
Per quelli, che ſono ſu' *granaj* ivi.
del RIO: coſa egli ſcriſſe di certi *Popoli della Ruſſia* (376).
Riſagallo a che giovi IV. *V. 6.
RIV. *Ic.* RIVINI *Icon.*
RIZZETTI: Sua tavola della tenacità di alcuni mezzi III. *VI. 5. (397).
ROBIGO, e RUBIGINE degli antichi *Romani*, *Rodiani*, *Etruſci*, ed altri I *I. 4. (33). (34). (36).
Iſcrizione a queſto Dio (33).
Perchè a ROBIGO ſacrificavano la *Pecora*, e il *Cane* (34).
Roeſt de' Fiaminghi qual ſia I. *I. 2.
Rogazioni: a qual coſtume antico ſieno ſtate ſoſtituite queſte *Proceſſioni* (34).
Rogna: da che deriva queſta voce ſeconde il Signor MENAGGIO (21).
Roncare degli Antichi cos' era (441).
Rondini: lungo tramortimento di queſti uccelli III. *IV. 6. (376).
Cagione di eſſo ivi 7.
Roſpo trovato ſotterra dentro materia duriſſima II. *XII. 4.
Oſſervazioni ſopra di eſſo ivi.
Altro *Roſpo* trovato chiuſo in un olmo (277).
Se queſto animale ha veleno (278).
Qual proprietà ſi attribuiſca alle pietre *bufonite* (279).
Come il trovato *Roſpo* poteva eſſere reſtato chiuſo, e aver viſſuto nella materia duriſſima III. *VI. 4.
Rubeus per *robeus* (17).
Rubigalie: feſte degli Antichi (34).
RUBIGO, vedi ROBIGO.
RUELLIO: come eſpone ἀπαφβολωῖν. (37).
Rugiada: cos' ella ſia ſecondo alcuni (79).
Suo effetto II. *V 15.
Sua cagione III. *I. 6.
Raccolta co' piatti ivi 16. (82).
Sua forza (85).
Umor rugiadoſo putrefatto, e paſſato per tela ivi 17.
Introdotta nella ſpiga tenerella II. *VI. 18.
Sua indole naturale III. *I. 5.
Quando ella è alterata ivi 6.
Quando pernizioſa agli animali ivi 6.
Sua pinguedine da che prodotta ivi 8. (318).
Scuoterla da' gambi a che giovi IV. *I. 9.
Rugiada vermicoloſa dell' HOFFMANNO (75).
Ruggine del grano qual ſia I. *I. 1. 3.
Sua ſpezie ivi.
Sua antichità ivi 2.
Perchè così denominata ivi.
Suoi nomi diverſi ivi 3.
Così detta impropriamente (17).
Alla *ruggine* è ſoggetto ogni metallo (19).
Non è corruzion di eſſo ivi.
Accidenti della *ruggine del grano* II. *V. 2. 3. 4. 12. 13.
Suoi *bruchi* ivi 4.

Sua analisi chimica ivi 5.
Sua indifferente espansione ivi 6. (76).
Quale sia perniziosa ivi 7. (77).
Qual proporzione di temperie ella richiegga ivi 8. 14.
Sua comunicazione ivi 9.
Suo effetto sopra le foglie ivi 10. 13.
Messa in *lambicco* ivi 11.
Effetto prodotto in chi la maneggia ivi 15.
Effetto negli animali, che mangiano l' *erbe ruginose* ivi.
Ruggine passata per tela ivi 16.
Chiarificata dal caldo ivi.
Zanzare nate in essa ivi 17. (84).
Di quali sali ella sia composta ivi 19.
Se danneggi meno l'*Orzo*, e la *segala*, che altro grano ivi 24. (90).
S' ella attacca le spighe coperte ivi 25.
Sue cagioni III. *I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Quando venga (324).
Rimedj contro di essa IV. *I. 1. per fino a 11.
Quando ella è irrimediabile ivi 2. 4.
Ruta a che giovi IV. *V. 6.

S

Sacrifizio della Pecora, e del *Cane* degli Antichi (34).
Salamoja cosa sia (423).
A che giovi; vedi lisciva.
Sale armoniaco a che giovi IV. *II. 1.
Rende freddi i liquori (414).
Sale, che produce la corrosione de' vetri, è senza nome II. *V 19.
Sale di tartaro a che giovi IV. *I. 5. ivi *II. 1.
Sale marino tenuto per rimedio contro i vapori pernicios IV. *I. 5. (445).
Sale prunello a che giovi IV. *II. 1.
Sale volatile nitreo-aereo qual sia II. *V. 19.
SALMASIO legge in PLINIO *caniculum* in vece di *carbunculum* (23).
Parla della Dea RUBIGINE (33).
Del sacrifizio del *Cane* degli Antichi (34).
Vuole un solo aconito (166).
Come parla de' *bulbi* (179).
Come della *lappa* (213).
Come del *loto* (222).
Come del *papavero erratico* (241).
Come della *parietaria* (242).
Come della *ruta silvestre* (253).
Sua lezione in PLINIO diversa della comune a proposito dell' erbe dannevoli alle biade (265).
San Marco, Villa, dove furono fatte osservazioni II. *V. 3.
Santa Maria in Fiumicello, Chiesa, nelle cui vicinanze furono fatte osserazioni II. *I.
Santo Stefano, villa, dove furono fatte osservazioni II. *I. *II. *V 16. *VI. 14. 17. *VII. 19. *X. 19. (128).
SANTUOORT, TEODORO: suo sentimento sopra l' aria, e l' acqua (73).
Sarchiare degli Antichi cos' era (441).
Sassi con l' odor di viole del monte Calemberg III. *VI. 3.
SAUVAGES: sua misura della velocità de' fluidi (94).
Aumento de' condotti del sugo nelle piante secondo questo Autore (334).
Scabbia del grano in erba qual possa dirsi I. *I. 3. (22).
SCARABEO, Dio degli Antichi, (451).
SCALIGERO, GIULIO; se parla della filiggine (34).
Tenne la trasmutazione delle piante (219).
Division delle cagioni III. 2.
Cosa disse della *ruggine* (336).
Cosa dell' infestamento degl' *Insetti* (394).
Suo rimedio contro il *loglio* IV. *V. 7. (444).
Che sia secondo lui l' *Agricoltura* ivi 8 (346).
SCHAERDING, LORENZO, scrisse delle *tele volanti di ragno* (138).
SCHEUCHZ. *Agrost.* SCHEUCHZERII *Idea operis Agrostographici*.
Secale luxurians qual sia (96).
Seccarsi della spiga: come s'intendesse dagli Antichi per riguardo alla ruggine I. *I. 3.
Qual sia I. *V. 4.
Osservazione intorno ad essa II. *XI. 12.
Sua cagione III. *V. 6. (385).
Suo rimedio IV. *V. 3.
Secheresse, o *brûlure* de' Franzesi nelle biade qual sia (29).
Sedum, vedi *sempreviva*.
Segala usata per modo di *caffè* (95).

Semi

Semi di *ſegala*, che hanno prodotto malattìe (96).
SEGUIER, GIAN-FRANCESCO: ſue oſſervazioni d' Inſetti II. *IX. 6.
Piante fra il grano da lui oſſervate II. *X. 1. (166). (238).
Sua oſſervazione ſopra la *ruggine* (317).
SEG. *P. V.* SEGUIERII *Plantarum Veronenſium*.
Semenza come deve eſſere IV. *V. 8.
Seme Santo a che giovi IV. *V. 6.
Semi diformi oſſervati (345).
Seminazioni diverſe II. *I. *II. *III. IV.
Se giovi il ſeminar preſto IV. *V. 3. (426).
Se le ſeminazioni debbono eſſere profonde (427).
Quando debbono farſi, e precauzioni per eſſe IV. *V. 8. (458).
Sempreviva, o *ſedum* a che giovi IV. *V. 6. (432).
SENERTO, DANIELE: coſa dica delle *rondini* (376)
Che dica de' grani comeſtibili mal ſani IV. *V. 7.
SERVIO: qual ſia propriamente la *ruggine* ſecondo queſto Autore (17).
Qual effetto ſecondo lui faccia la *ruggine* delle biade (27)
Parla della Dea RUBIGINE (33).
de SETTECASTELLI, Conte LUIGI, lodato II. *III.
Σφακελισμὸς de' Greci qual foſſe (23).
Siderazione qual foſſe I. *I. 3.
SIDONIO APPOLINARE: ſuo ſentimento intorno alle *Rogazioni* (34).
Sileſia: quanto l' *arſenico* renda abbondanti l' erbe in queſto Ducato (425).
Siligo de' Latini qual ſia II. *XII. 27.
Solchi troppo profondi, ſe ſono pernizioſi (417).
Sole: ſua forza maſſima II. *XII. 10.
Suoi gradi di calore ivi.
Solimato a che giovi IV. *V. 6.
Spettacolo della natura, vi ſi parla della *zuccajuola* II. *IV. 56. (158).
Vi ſi determina, ſe il ſeme abbia uno, o più germi II. *XII. 7. (282).
Come vi ſi parli di tre malattìe diverſe del grano III. *III. 8. (364),
Come di un rimedio contro la *ruggine* IV. *I. 9. (410).
Come della preparazione delle ſemenze (419).
Come del rimedio per la *ſterilità delle biade* (428).
Spighe attaccate dalla *filiggine*, perchè preſto s' ingroſſino III. *II. 2.
Perchè lo ſono quaſi tutte quelle di un medeſimo ceppo ivi 3.
Perchè ſono nelle parti loro sì poco aderenti ivi 4.
Perchè non ſempre è attaccata tutta la ſpiga ivi 5.
Perchè ſia nera ivi 6.
Spirito di Sale armoniaco a che giovi IV. *II. 1.
Stabbio, vedi *letame*.
Stagioni diverſe, e loro conſeguenze per riguardo alle biade II. *I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. *II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. *III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *IV. 1. 2. 3. 4.
Loro ordine pervertito (349).
Stagni: loro acque alimentano *Inſetti* II. *V. 17.
STEFANO, CARLO: rimedj da lui accennati contro la *ruggine* (403). (404).
Contro i nocivi animali IV. *V. 6. (435).
Sterco colombino a che giovi IV. *V. 6.
Sterilità del grano qual ſia I. *V. 5.
Oſſervazione intorno ad eſſa II. *XI. 13.
Sterilità di un campo, come eſpreſſa da PLAUTO (342).
Cagione di eſſa III. *V. 7.
Suoi rimedj IV. *V. 4.
Sternuto epidemico: morbo ſingolare I.
STERQUILINIO: qual Dio foſſe (451).
Stipula de' *Latini* coſa ſia II. *XII. 13.
Storia delle malattìe del grano in erba I. *I. *II. *III. *IV. *V., e II. *I. *II. *III. *IV. *V. *VI. *VII. *VIII. *IX. *X. *XI. *XII.
Storia delle piante di Europa: coſa vi ſi dica dell' *avena* (176).
STOLTERFOHT inſegna a raccogliere la *rugiada* (82).
STRABONE nomina il Dio ROBIGO (33).
SUCCONIO HENNINGIO: ſue conſiderazioni ſopra PLAUTO (64).
Che diſſe del *morbo ſontico* (348).
Sudore anglico: morbo ſingolare I.
Sugo della pianticella del grano: ſua velocità, e ſua forza II. *VI. 10. ivi *VII. 9. (306).
Sua indole ivi *XI. 10.

Come opera nella pianticella medeſima III. 1. (296).
Mezzi, per cui egli opera (305).
Come s' innalzi III. *III. 2.
Sua abbondanza ritarda la maturazione ivi 3.
Da che provvenga tale abbondanza ivi 4.
Se circoli nelle piante (360).
Cagione della ſua forza (366).
Suoi effetti III. *V. 2. 3. 4. 7. 8.
Sua diverſità nelle diverſe piante ivi 10.
SUVERT. SUVERTII *florilegium*.

T

T*Abacco* a che giovi IV. *I. 3. ivi *V. 6.
TABERN. *Ic.* TABERNAEMONTANI *Icones Plantarum*.
TACITO: ſuo paſſo non bene inteſo (56).
TANARA dà il carattere del *malume* I. *I. 2. (13).
Credette la traſmutazione del *loglio* (219).
Sua diviſion generale de' mali (301).
Che dica della *rugiada* (318).
Sua opinione intorno la *filiggine* III. *II. 13 (343).
Sua opinione intorno lo *ſvanimento de' getti* nelle piante III. *V. 6. (386).
Quali ſpighe ſecondo lui ſi difendano dalla *ruggine* IV. *I. 9. (411).
Suo rimedio pel ſeccarſi delle ſpighe IV. *V. 3. (426).
Contro il *giottone* IV. *V. 7. (143).
Quale per lui ſia il miglior grano (462).
Talpa, vedi *zuccajuola*.
Tarlo qual verme ſia II. *IX. 14.
Tartaro a che giovi IV. *V. 8.
TATTI parla dell' erba *Orobanche* (238).
Tele di ragno ſingolari II. *IX. 17.
Loro *iride parabolica* ivi *XII. 11.
TEOFRASTO parla de' Greci, che ſcriſſero d' *Agricoltura* I.
Diſtinzione delle malattìe del grano in erba ivi.
Malattìe ſenza nome (7).
Malattìe eſterne, e interne I. (10).
Sua *ſcabbia delle piante* (22).
Sua *uredine* (24).
Suo ſentimento intorno la *ruggine* (26). (76).
S' egli conobbe la *filiggine* I. *IL 3. (44).
Grande naturaliſta II.
Seriſſe dell' infeſtamento degl' *Inſetti* nelle piante (117).
Nominò qualche *verme del grano* (118).
Parlò del danno delle *talpe* (119).
Sua quiſtione ſopra certi *legumi* II. *XII. 7. (283).
Suo parere intorno le cagioni delle coſe III. 2.
Intorno la *ruggine* (325).
Intorno il *gelo* della terra (388).
Intorno la *ſterilità* (390).
Intorno la *luſſuria delle biade* III. *V. 8. (192).
Intorno l'*infeſtamento degl' Inſetti* III. *V. 9.
Parlò del rimedio contro la *ruggine* (404).
Quali ſpighe ſecondo lui ſi difendano dalla *ruggine* IV. *I. 9.
Suo rimedio contro gl' *Inſetti* ivi *V. 6. (431).
Termometro: ſua determinazione (73).
Sue alterazioni II. *I. 1. 2. 3. 4. 5. *II. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * III. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *IV. 1. 2. 3. *V. 8. 14.
Terre diverſe, e loro natura IV. *V. 8. Come ſi fecondino ivi.
TERTULLIANO: ſuo detto II. *VIII. 12.
Teſſera frumentaria II. *XII. 26. (291).
THAL. S. THALLI *Sylva Hercynia*.
TIBURZIO propone un metodo contro le *gramigne* (442).
TILLET: come ſpiega la *ruggine* del grano (14).
Come la *filiggine* (41). (44). (98).
Riguarda la polvere del *grano carbone*, come quella del *Lycoperdon* (51).
Come nomina, e ſpiega queſto grano (54).
Suoi ſegni della *filiggine* (91). (99).
Dove trovò il *grano ſperone* (96).
Si oppoſe al Signor Needham (102).
Suoi *verminetti delle ſpighe* (143).
Sua opinione intorno la *rugiada melata* (3 9).
Diſtingue la *ruggine dalla filiggine* (331).
Come parli del *grano ſperone* (344).
Cagione del *grano carbone* ſecondo queſt' Autore (355). (356).
Che dica de' *moſtri tricorporei del* WOLFIO (359).
Sua analogia del *grano carbone* col *morbo*

bo venereo (368).
Sua opinione intorno l' *incartocciare delle foglie* (396).
Cosa egli crede, che dia minor forza alla *carie* (417).
Suo infestamento delle *paglie* (418).
Suoi rimedj contro il *grano carbone* (419). (422).
Dimostrati di pochissima spesa (421).
Sua opinione intorno il *seminare presto* (426).
del TORRE, Monsignore, parla del Dio ROBIGO (33).
TOURNEFORT: sua opinione intorno l' origine delle malattìe del grano (298).
Suo trattato di *Agricoltura* III. *V. 10.
TOURNEF. *I. R. H.* TOURNEFORTII *Institutiones Rei Herbariae*.
TRAG. TRAGI *de stirpibus libri tres*.
τραγοπώγων di *Dioscoride* qual sia (345).
TRAMBLEY: suoi *polipi a mazzo* II. *VIII. 8. (110).
Sue osservazioni sopra i *pidocchi* delle piante II. *IX. 50
Scrisse degl' *Insetti*, che si multiplicano per sezioni (152).
Transazioni Filosofiche d' Inghilterra: vi si parla delle *rondini* (376).
Del modo di *fecondar le terre* IV. *V. 8. (455).
Traspirazione delle piante: come venga impedita III. *I. 2. 3, 4.
Prova della traspirazione delle piante (212).
TRIONFETTI, GIAMBATTISTA, tenne la trasformazione delle piante (219).
Triticum vulgare del BAUHINO II. *I.
Tubi capillari: loro effetto III. *V. 10.
TULL: sua opinione intorno la *filiggine* III. *II. 9.
Intorno il *grano carbone* ivi II. 8. (361).
TULLIO, vedi CICERONE.

V

VAILLANT: suo *grano sperone* (96).
Sua *avena salvatica* II. *X. 14.
VAILL. *Bot. Paris.* VAILLANTII *Botanicum Parisiense*.
VAILL. *act. Ac. R. Par.* VAILLANT. *in actis Acad. Reg. Paris.*
VALLISNIERI, Cavalier ANTONIO nomina il *melume* I. *I. 2. (12).
Suo pensiero intorno le *zanzare* (84).
Sua *mosca de' rosai* II. *IX. 8. 30. (126).
Suoi *vermi della ruggine* ivi 24. (142). II. *XI. 8 (276).
Non ammette la *trasformazione delle piante* (219).
Parla delle pretese pietre del rospo II. *XII. 4.
Suo parere intorno il *grano carbone* III. *III. 9.
Intorno le diverse escrescenze delle parti offese delle piante III. *VI. 13. (399).
di VALOIS scrisse dell' antichità del *morbo venereo* I. (56).
VALVASENSE: sue lettere (152).
VANDELLI, Dottore: sua opinione degl' *Insetti*, che si multiplicano per sezioni (152).
Suo parere confermato dal LINNEO (464)
Vapori fatti artificiosamente esalare, e loro effetto II. *V. 20.
Cosa essi sieno generalmente (308).
Cagione de' *vapori brucianti* III. *I. 11.
Effetto de' *vapori* III. *V. 1.
Loro differenza dalle *esalazioni* (381).
Loro natura III. *V 2.
VARRONE parla del Dio ROBIGO (33). (34).
Del Dio AVERRUNCO (34).
Del Dio LATTANTE (101).
Suo sentimento sopra la *ruggine* (77).
Come egli nomina le spighe copiose di grano (285).
Rimedio da lui accennato contro la *ruggine* (413).
Altro contra i *vermini* (435).
Sua derivazione del termine *porca* (449).
Sua opinione intorno la fecondità de' campi (455).
Intorno il tramutar de' semi IV. *V. 8. (461).
Vegetazione, e *crescimento delle biade* diversamente esperimentati II. *XII. 10. 14. 15.
Venti: loro varietà II. *I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. *II. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *III. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *IV. 2. 3.
Azione de' venti ne' gambi del grano II. *XII. 27. (294).
Come possano portar danno alle biade III. *I. 13. (327) ivi *V. 6.

Non

Non poſſono abbruciare (328).
VENULEJO come ſpiega il nome di *morbo ſontico* (348).
Vermi di alcune piante mangiati dagli Antichi (161).
Vermi del granello di frumento II. *XI. 15.
Vermi fiſſati ſulle foglie qual effetto fanno III. *V. 3.
Vinaccia a che giovi IV. *III. 4.
VIRGILIO: ſua *ſcabbia del ferro* I. *I. 3. (20).
Loda gli *Agricoltori* (16)
Dove ſecondo lui ſtia la *ruggine* delle biade (27).
Accennna il *latte* de' granelli (101).
Il danno dell' *avena* (176).
E di altre piante (265).
Parla del *muſco* (232).
Foglia nutrice del grano come da lui chiamata (289).
Loda la *morchia* per rimedio alle biade (420).
Parla del rimedio per la *luſſuria delle biade* (430).
Vitello marino ſta lungo tempo ſott' acqua III. *IV. 7.
VITRUVIO: coſa egli pretende, che gli Antichi denominaſſero *rubrica* (19).
VITTORIO, PIETRO: come leſſe un paſſo di VARRONE (435).
VIVES: ſuo ſentimento intorno la *ruggine* (325).
ULPIANO mentova la *teſſera frumentaria* (291).
Parla del *morbo ſontico* (348).
VOSSIO, GIOVAN GERARDO: ſue *ruggini de' metalli* (19).
Uova: loro guſci a che giovino IV. *V. 6.
Uredine qual foſſe I. *I. 3. (24), e III. *I. 10.
Uſtilago de' Botanici qual ſia I. *II. 2. (43).
Diverſità ſua (47).
WACTER: ſua opinione intorno a' *numeri minuſcoli* (465).
WALLERIO, GIO: GOTSCHALH: ſua opera (460).
WALLERO, RICCARDO: ſue oſſervazioni ſopra la *lucciola* (131).
WALLISIO: ſua opinione intorno le *mutazioni del tempo* (301).
WIBIOERNSSON: ſuo metodo contro le *gramigne* (442).
WOLFIO: ſuoi *moſtri tricorporei* I. *III. 1. (52), e III. *III. 8. (359).
Sue oſſervazioni ſopra il *grano carbone* II. *VII. 11.
Sue *figure ſimili* ivi 22. (103).
Sua *rugiada* in forma di *tela di ragno* II. *IX. 17.
Come ſi multiplichino i gambi del grano ſecondo queſto Autore II. *XII. 7. (181).
Sua *tride parabolica* ſopra l'erbe ivi 11.
Natura della *rugiada* ſecondo il medeſimo III. *I. 5. (314).
Sue oſſervazioni ſul freddo del 1709. (326).
Sua *ſeminazione* (427).

X

ξανθὸν de' Greci qual ſia (19).

Z

ZAN. *Hiſt. Bot.* ZANONI *Hiſtoria Botanica*.
Zanzare uſcite da acque ſtagnanti II. *V. 17. (84).
ZAVONA, Dottor GIULIO, nominato (464).
ZEIGERO, AMBROGIO: ſuo ſentimento intorno l' *Agricoltura* IV. *V. 8. (450).
Suo rimedio per la *conſervazione de' ſemi* ivi.
Sue precauzioni per la *ſemina de' grani* (458).
ZIRARDINI, Dottore ANTONIO, lodato (25).
Zolfo, e ſua polvere a che giovi IV. *III. 5.
Suoi profumi a che giovino ivi *V. 6. (435).
ZORNI, PIETRO: ſua opinione intorno il nome STERCORA de' falſi Dei (451).
Zuccajuola: quanto ſia dannevole queſto Inſetto al grano II. *IX. 56.
Sua quantità di *uova* ivi.
Suoi *nidi* ivi.
Sua *ſtruttura eſterna, e interna* ivi.
Sua ſomiglianza a' *grilli* ivi.
Sue *denominazioni* ivi (157).

SPIE-

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.

TAVOLA I.

FIGURA 1. *Spiga di grano* infestata dalla *ruggine*.
2. *Tronco di gambo* illeso da *ruggine*.
3. *Tronco di gambo* attaccato dalla *ruggine*, e in cui si veggono le *tane*, dove stanziano i *vermini*, che rodono la superficie del *gambo* medesimo.
4. *Tronco di gambo* coperto da *ruggine* con alcuni de' detti *vermini*.
5. *Verme* della *ruggine* di grandezza quasi naturale.
6. Esso *verme* ingrandito con *lente*.
7. Il medesimo ingrandito con *microscopio*.

TAVOLA II.

FIG. 1. *Spiga di filiggine*.
2. *Pianta d' Aconito unifoglio* attaccata dalla *filiggine*.

TAVOLA III.

FIG. 1. *Spiga di grano carbone*.
a *Grano carbone* di grandezza naturale.
b La metà di un *grano carbone* ingrandita col *microscopio*, che mette in vista la materia nericcia, e fibrosa, che racchiude.
2. *Spiga di grano carbone*.
a *Grano ghiottone*.
b La metà del *grano ghiottone* ingrandita col *microscopio*, ch' esprime la materia bianca, fibrosa, con qualche macchietta nera, che v' è per entro.
c *Filamento semovente maggiore* ingrandito col *microscopio*, fatto a guisa di *lombrico del corpo umano*.
d *Filamento semovente minore* veduto col *microscopio*.
e Piccolissimo *bacherello* della razza degli *Scarabei*, che non si distingue senza opera del *microscopio*.
f *Bacherello* medesimo ingrandito.

TAVOLA IV.

FIG. 1. *Pianta di grano in erba*, ch' esprime la separazione de' gambi sopra la radice.
2. *Gambo* separato dagli altri colle proprie radici, senza lacerazione alcuna.

3. *Fo-*

3. *Foglia di grano*, in cui si racchiude un *verme*, dove ha fatto il suo *bozzolo*.
4. *Insetto* nato da esso *verme* di grandezza in circa naturale.
5. *Insetto* medesimo veduto colla *lente*.

TAVOLA V.

FIG. 1. *Bozzoletto* al naturale della *ruga*, che sta sul *gambo ruginoso*.
2. *Farfalla maschio* di essa *ruga* di grandezza naturale.
3. *Farfalla femmina* di essa *ruga*, di grandezza naturale.
4. *Bozzolo* di essa *ruga* ingrandito col *microscopio*.
5. *Farfalla maschio* in grande della *ruga* medesima.
6. *Farfalla femmina* in grande della medesima.
7. *Gambo di grano*, sopra cui si veggono alcune *uova* di essa *farfalla* ingrandite.
8. *Bozzolo del bacherello*, che si trova nel *ghiottone* di grandezza naturale.
9. *Bozzolo* medesimo ingrandito.
10. *Scarabeo* uscito da esso *bozzolo* di grandezza naturale.
11. *Scarabeo* medesimo ingrandito.
12. *Ruga bianca* delle foglie di maggior grandezza del naturale.
13. *Bozzolo* di essa ingrandito.
14. *Vermetto lombrico-forme* sottilissimo, e bianco-diafano.
15. *Vermetto* con antenne articolate, e coda biforcata.
16. *Ruga* delle foglie del grano.
17. *Crisallide* di essa *ruga*.
18. *Farfalla* della medesima.
19. *Ruga* trovata dentro il gambo del grano
20. *Mosca* di essa *ruga*.
21. *Bacherello* della *ruggine*, secondo il VALLISNIERI, ingrandito col *microscopio*.
22. *Crisallide* giallognola di forma conica.
23. Suo *moscherino* con ale molto trasparenti.
24. *Verme* trasparente ingrandito.
25. *Crisallide* di esso *verme*.
26. *Mosca* del *verme* medesimo con proposcide, e con ale trasparenti.
27. *Gambo di grano* con *uova* al naturale di una *mosca* a testa equina.
28. *Gambo di grano* colle *Ninfe*, o *crisallidi*, e con *bacherello*, ingranditi.
29. Essa *mosca* in atto di deporre le *uova*.

30. *Cri-*

30. *Crisalide* del sopraddetto *bacherello*.
31. *Verme* delle foglie composto di dodici anelli.
32. *Cantaride* uscita da esso *verme*.
33. *Uova* deposte da essa *Cantaride* sopra una foglia di *bietola*.

TAVOLA VI.

FIG. 1. *Foglie di grano* in erba, sopra le quali si veggono stradicelle delle *rughe minatrici*.
2. *Farfalla* della *ruga minatrice*.
3. *Verme* ingrandito, composto di dodici anelli.
4. *Bozzolo* di finissima seta bianca ingrandito.
5. *Mosca* ingrandita, che porta un aculeo difeso da due laminette.
6. *Gambo di grano* [illegible]
7. *Vermetto* di ventiquattro gambe.
8. *Crisallide* in forma poco diversa del *verme* sopraddetto.
9. *Moscherino* con ale diafane.
10. *Ruga* ingrandita, ch' è bianca nella sua adolescenza, e poscia bruna.
11. *Bozzolo* di essa *Ruga* ingrandito.
12. *Farfalla* di essa *Ruga* ingrandito.
13. *Crisalide* di sette anelli.
14. *Gambo di grano*, a cui si vede attaccata la *Casa dell' Insetto*, chiuso in essa da ogni parte.
15. *Verme* uscente da essa *casa*.
16. *Mosca icneumone* di esso *verme*.
17. *Mosca* di lungo pungiglione in mezzo al ventre.
18. *Verme*, da cui si ha detta *Mosca*.
19. *Campo* seminato recentemente a grano, sopra il quale stanno distesi molti filamenti, e tele con alcuni minutissimi punti, che mostrano *Ragni* della grandezza naturale.
20. Uno d' essi *Ragni* ingrandito notabilmente.
21. *Zuccajuola* alcun poco ingrandita col nido aperto, e con alcune *uova*.
22. *Nido* de' più piccoli della *Zuccajuola*.

TAVOLA VII.

FIG. 1. *Foglia di grano* in erba con *uova* ritonde di varia grandezza ingrandite col *microscopio*.
2. *Vermetto* di figura conica uscito da una delle suddette *uova*.
3. *Bozzolo* ingrandito di esso *vermetto*.
4. *Moscherino* ingrandito, che nacque dal medesimo *bozzolo*.

5. *Gambo di grano*, in cui si misurano per mezzo del *Quadrante* i piegamenti, che lo scostano dalla perpendicolare.
6. *Gambo di grano*, il cui piegamento passa il limite di una parallela all' *orizzonte*, presentando all' azione del vento una parte convessa, ed una concava.

IMPRIMATUR

Quoad Nos = hac die 6. Julii 1758.

S. [illegible]

Die 2. Augusti 1758.

IMPRIMATUR

F. THOMAS ZACCONIUS *Ordinis Praedicatorum Provicarius S. Officii.*

AVVERTIMENTO

AL LEGATORE DEL LIBRO.

IL Ritratto si metta in faccia al Frontespizio.
La Carta Topografica del Ravennate si metta in faccia alla PARTE PRIMA.
Le sette Tavole si mettano qui appresso.

Tav. I.


1.



7.


6.


5.


4.


3.


2.



1
2

Tav. III.





2.
1.
3.
4.
5.

Tau: V.


1.
10.
19.
24.
2.
11.
3.
20.
25.
4.
12.
21.
26.
5.
13.
22.
29.
27.
14.
23.
6.
15.
31.
7.
16.
30.
28.
17.
8.
32.
9.
18.
33.



Tau:VI.
17.
1.
2.
6.
3.
18.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.
15.
13.
14.
21.
19.
22.
20.


1


3.


2.


4.


5.


6.