Apparatus ad nosologiam methodicam, seu synopsis nosologiae methodicae in usum studiosorum / auctore Gulielmo Cullen.

Contributors

Cullen, William, 1710-1790. Sagar, Johann Baptist Michael, Edler von, 1732?-1813?

Publication/Creation

Amstelodami: Sumptibus Fratrum De Tournes, 1775.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/xzvjzdkv

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



Med Chir Dr. Sel Furtner

Sturmer Shysicals, prod.
1806.

1806.



46666

APPARATUS AD NOSOLOGIAM METHODICAM.

SEU

SYNOPSIS

NOSOLOGIAE METHODICAE

In Usum Studiosorum.

Auctore GULIELMO CULLEN

M. D. Et in Acad. Edinburg. Prof.

Editio nova, juxtà secundam Ill. CULLENII in quatuor partes Edinburgi ann. 1772. editam: nunc quintâ parte aucta, Scilicet

SYSTEMATE MORBORUM SYMPTOMATICO
A J. B. M. SAGAR proposito.



AMSTELODAMI,

Sumptibus FRATRUM DE TOURNES.

A P P A R A B II S AD MOSOLOGIAM METHOLINGAM

0.015

SYNCIOCIAE METHODICAE

In Union Studioscom.

Androre GULIELMO CULLEN

HISTORICAL MEDICAL MEDICAL

miles , some

CHERNOSTER MARCHARDA COMPACTO

AMSTELODAMI,

- Sumpribus - FEATRUM DE TORRWES.

LECTORIBUS

Tive I

GULIELMUS CULLEN

moderate sydmodhib S. onisample above snoithed

C U M biennio abhinc ad medicinae praxin; in Alma hac Academia, docendam admotus essem, id imprimis mihi demandatum putavi, ut medicinae studiosos in morbis accurate dignoscendis, qua cura possem, instituerem. Quod a descriptionibus et historiis morborum jam editis vix perdisci posse mihi persuasum est. Harum enim auctores, quo eas pleniores et absolutas magis efficerent, symptomata, in morbo dato, quaecunque, quovis tempore apparentia, enarrant; nec tamen inter symptomata essentialia et inseparabilia, et ea quae occasionalia tantum sunt; aut morbum quemvis simplicem inter et eundem aliis complicatum distinguunt; quod practico juniori saepe multum facessit negotii.

Cui malo ut remedium adhiberem, nihil consultius fore duxi, quam si morbos, quoscunque possem, ad normam Nosologiae methodicae ordinatos definirem. Hoc quidem ipsum multi laboris opus, et difficultatibus pluribus impeditum, esse vidi; sed illae ipsae difficultates necessitatem operis aggrediendi mihi abunde probabant. Si enim species morborum hactenus incertae, et inter se vix bene distinctae sint; omnino opus est, ut jam de symptomatis unicuique

* 2

pro-

propriis accuratius disquiramus, et a speciebus invicem collatis aliquid certi demum statuamus: Estque hoc Nosologiae methodicae proprium.

METHODUM nosologicam frivolam, et curiositatis affectatae plenam, quibusdam videri novi; nec injuria, si in dispositione totius systematica, in distinctionibus multiplicandis, et in novis nominibus effingendis, potius quam in characteribus cujusque singularis morbi stabiliendis, opera ponatur. Dummodo vero ab ineptiis caveatur, dispositio totius systematica haudquaquam negligenda est; nam in ea; a ad characteres fingularium melius determinandos semper respicitur, nullam de dispositione systematica quaestionem oriri posse, quae non alicujus in pathologia momenti sit, contendo. Hic quidem rem aliter se habere agnosco ac in pictura vel poesi, ubi recte ponere totum maxima laus est; cum in Nosologia, si in generibus et speciebus definiendis, et a proximis quibusque distinguendis, satis accurati fuerimus, classes et ordines minus ad amussim constitui haud adeo refert.

Cum mihi igitur bene persuasum sit, prudentem Nosologiae methodicae cultum multum commodi studiosis allaturum, ad hoc studium promovendum me accinxi; et, biennio abhine, synopsin eorum quae, in generibus morborum
definiendis, a summis viris Sauvagesio, Linneo,
et Vogelio jam sacta essent, edidi; simul, quo genera
morborum, praecipua saltem, plenius et accuratius definirentur, ipse aliquid de meo promere sum conatus. Systema, morbos universos complectens, condere dissicile admodum, nec, a me saltem, temere suscipiendum inveni;

ideoque, non quae volui, sed quae cum aliqua certi specie potui, tentavi. Immo exiguum illud, quod seci, non prorsus mihi placet; et quorundam dubius adhuc haereo. Hoc autem me ad inceptum opus promovendum incitabat, quod conamina nostra, qualia qualia sint, principibus quibusdam viris placuisse, et auditoribus nostris utilia suisse animadverti.

DISCIPULI nostri in generibus morborum duntaxat diftinguendis immorari non debent; quin ad species et varietates cognoscendas etiam progrediantur. Cum igitur ad praxin iterum docendam, ut altero quoque anno faciendum est, redii, aliquid ad Nosologiae studium ulterius promovendum tentare statui. Id praecipue mihi in votis erat, ut ex proprio penu species et varietates morborum plerasque ipse definirem. Sed, ad pensum hoc absolvendum; protinus sensi, nec scriptorum medicorum notitiam, nec meam ipsius experientiam, ubique sufficere; et, licet ad bibliothecas bene instructas aditus mihi pateret, ob defectum tamen librorum quorundam, me saepe impeditum sore; maximeque tempus necessarium, aliis mihi negotiis quam plurimis districto, defuturum comperi. Tollenda igitur, pro tempore, de tabula manus erat. Cum interim discipulis nostris, ad morborum species ex Nosologiae methodicae legibus cognoscendas, solum suppeteret SAUVA-GESII opus; id aliquanto, quam nunc est, utilius reddere decrevi. Quam bene de republica medica meritus SAUVAGESIUS sit, multa, quae ad specierum cognitionem quomodocunque facere possint, undique colligendo et congerendo, haud obscurum esse potest; quibus vero

* 3

ordi-

ordinandis tempus ei non concessum fuisse; aeque manifestum est. In meliorem ideo ordinem redigere conatus fum; et, cum ita ordinaverim, ut affinia quaeque juxta ponantur, faciliusque superflua et repetita rejiciantur, in hoc me labore non frustra fuisse spero. In opere Sauvagesiano, cum species tot recenseantur, ut tyronem delassent et turbent necesse sit, optandum omnino erat, ut in minorem et justum numerum redigerentur; quod, ni fallor, ex conspectu quem exhibemus, satis commode fieri potest. Ne dicam de generibus Sauvagesianis, plus justo numerosis; illum nusquam fere species a varietatibus distinxisse, ideoque illas praeter modum multiplicasse, neminem latere potest. Plerumque etiam, pro dati generis speciebus, complures habuit ac recensuit, quae aliorum morborum symptomata tantum sunt; toties, scilicet, quoties fymptoma, in charactere generis dati praecipuum, alius etiam morbi symptoma sit. Inde sit, ut species eaedem apud SAUVAGESIUM saepe repetantur; quam luxuriantem frondem quomodo abscindere possimus, ex dispositione nostra, spero, patebit: Nec, in summum, dubito quin, cum magno studiosorum commodo, specierum in opere Sauvagesiano numerus ad decimam partem redigi queat.

In nominibus morborum non adeo curiosus sum. Delectus aliquando necessario habendus erat; sed nomina jam recepta, licet non semper optima, nusquam mutavi.

In synonymis, quam volui, parcior saepe sui. Multa a SAUVAGESIO allata, utpote curiosa potius quam utilia, omisi. Inter alia, veterum Graecorum, Latinorum, et Ara-

bum synonyma consulto neglexi; et quia saepe difficile soret de iis certi aliquid statuere, et quia plus exigeret quam quo in præsentia fruor otii. Quibusdam generibus et speciebus fynonyma adjeci, quibus tyrones ad scriptores melioris notae quosdam relegarem, et, in eundem finem, Systematicorum nunc maxime celebrium, BOERHAAVII, scilicet, HOFFMANNI, et STAHLII, synonyma ubique indicavi.

SI denique de Nosologia methodica judicio sagacis et periti GAUBII fidendum sit, « Specimina jam nunc a re-» centioribus edita in spem erigunt, tentaminibus multi-» plicatis haud defuturos successus, remque tanti momenti, » ac bonis ideo omnibus exoptatissimam, sic tandem feli-» citer perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat mor-» borum inveniendis sese utilem praestet, sed praecipue fa-» cilem ad eruendas curationes viam expediat ». Hac spe meam operam impendi; et, quamvis multum posteris faciendum restabit, tamen, si quodam ego tenus prodierim, gaudebo. Antequam metam optatam haec res contigerit, verisimile est, tantum temporis interventurum esse, quantum ab initiis botanices in rudi systemate CESALPINI, ad eandem in illustris LINNEI operibus jam prope consummatam, praeteriit. Ego quidem Morisoni nostratis sorte contentus ero, licet nimirum ipse parum sim profectus, si ingenia plurima ad studii admodum neglecti cultum statim excitavero. Ab aequalibus jam senescentibus vix aliquid hujusmodi expecto. Quorum alii, studiis nunquam dediti, has novitates, quas vocant, vel refugiunt, vel detrectare student; alii, studiorum licet fautores, in quibus etiam mul-PARS

tum

T viii]

forsitan dediscenda fateantur, vix adduci possunt. Quocirca, hoc studium a junioribus fere solis promotum iri spero; et ardor ille studiorum, qui in hujus Almae Academiae alumnis jam praeclare viget, spem mihi facit, haec studia nosologica praecipue ab iis excultum iri: Quibus hi nostri labores omnes consecrati, et in posterum consecrandi sunt.

SI denique de Nofologia methodica judicio faracis et

a comiosibus cdira in them erigune, contaminious multi-

a plicatis hand defitures foccesses, remque tanti momenti,

se de bonis ideo emnibus exequirifimam, fe tandem fei-

some inveniendia fole utilem gracilet, fed prage one fa-

Edinburgi 30. Octob. 177 Book and malanolist 115 U A D initia

ELLINS.



contentes ero, licet admirum iple parom figs profestos,

fi ingenia plurima ad fludii admodam negledi colum fla-

tim excitavero. Ab acqualibus jam senescentibus vix aliquid

bujalmodi expedio. Quorum alii, fludiis ramquam dediti,

has novicates, quas vocant, vel refugiunt, vel demethare

student; alii, studiorum licet factores, in quibus citem und-

PARS PRIMA.

GENERA MORBORUM DEFINITA

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica, 2. tom. 4to;

Amftel. 1768,

PARSPRIMA

MORBORUM.

DEFINITA

Ab Endirillino

ERANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES,

Ex Nosquera Murmonical action and

Andd 1763,

SERIES

CLASSIUM.

I. VITIA.

II. FEBRES.

III. PHLEGMASIÆ.

IV. SPASMI.

V. ANHELATIONES.

VI. DEBILITATES.

VII. DOLORES.

VIII. VESANIÆ.

IX. FLUXUS.

X, CACHEXIÆ,

SERIES

CLASSIUAL

IL VITIA ...
III PHEBBRA.
IV. SLASME.
VI. DEBILITATES.
VII. DOLOBES.
VII. VESANIE.

X CACHEXER.

GENERA MORBORUM.

THUROGROM ANGRES

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidensia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDOI. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS. I. LEUCOMA,

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO.

Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita; cum depressione cutis,

3 G. III. EPHELIS.

Maculae acquisitae, umbrinae, glabrae, corymbosae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut afperae, et diu permanentes.

G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

G. VI. ECCHYMOMA:

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis slavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subsolitaria.

A 3

O. II.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctaenas, varos, similesve asperitates.

- a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.
- b. Papula. Phyma parvulum desquamari solitum?
- c. Phlyctaena. Vesicula fluido seroso plena.
- d. Varus. Tuberculum durum constans.
- 7 G. VII. HERPES.

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas fursuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

8 G. VIII. EPINYCTIS.

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potissimum acriter pungentes.

9 G. IX. PSYDRACIA;

Phymata eryfipelatofa.

10 G. X. HIDROA.

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

O. III. PHYMATA:

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

TI G. XI. ERYTHEMA.

Tumor sine febre, superficiarius, solitarius, diffusus, rubroroseus, pressione evanescens.

G. XII. OE DE MA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

33 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.
14 G. XIV.

4 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor spheroideus, rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, sponte in suppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim scirrhosus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

G. XVII. PAROTIS.

Tumor scirrhoso-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atroruber, cujus centrum, cum suppuratus est, occupant sibrae crassae, quae in pus non colliquescunt.

19 G. XIX. ANTHRAX.

Phyma apice gangraenosum, ambitu inflammatum.

20 G. XX. CANCER.

Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus.

21 G. XXI. PARONYCHIA.

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

22 G. XXII. PHIMOSIS.

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente crescentes, in suppu-

GENERA MORBORUM

23 G. XXIII. SARCOMA.

Excrescentia carnis consistentiam circiter obtinens?

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excrescentia firma carnibus durior, offibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excrescentia cutanea prominens, condylomate minor, sensu destituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrescentia carnea, vel membranaceo - vasculosa ad oculi canthum exorta, alam expansam referens, et versus corneam se extendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix sensu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enascens, sphaericus, piso ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excrescentia vel tumor scirrhosus anticae partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor offis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Ossium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, distortione, aut alio principio oriunda.

31 G. XXXI. LORDOSIS.

Ossium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavang tur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deslectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

32 G. XXXII.

32 G. XXXII. A NEURISMA.

Cystis arteriofa.

33 G. XXXIII. VARIX.

Cyftis venofa.

34 G. XXXIV. HYDATIS.

Cyftis lymphae ductuum.

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruorem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cyftis aquofa a corneae proptofi, et dilatatione, vel ab

uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

37 G. XXXVII. L U P I A.

Cyftis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

58 G. XXXVIII. HYDARTHRUS.

Cyftis articuli aquofa.

39 G. XXXIX. A POSTEMA.

Cystis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis faepius aquosa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.
Cyftis in fcroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoses, Celes, Pararthremata, Graec.

Prolapsus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, Lat.

Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

В

42 G. XLII. EXOPHTHALMIA.

Magnitudo nimia, Prolapius, Expressio oculi, Lat.

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, Boerh. de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ecpiesmus Gracorum. Mauchart, diss. de Hydrophthalmia, et oculi paracentesi inter Haller. Disput. Chir. T. I.

Groffeur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chûte de l'oeil. Maitre-Jan, part. II. chap. 6.; Saint Yves, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibiliter nativa ipsius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS Mauchartii.

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, Gr. Palpebrae superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, Lat.

Chûte, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarses. Vide Platner. Instit. Chirurg. §. 577. §.584.; Maitre-Jan, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; Saint Yves, part. 1. chap. 8. 9. 10.; Dionis, Dem. 6.; Boerh. de Morb. ocul. part. I. Cap. 5.; Heister. Chir. T. I. part. II. §. 2. cap. 45. 46. 48.; Gorter. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, Aretaei, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, Nenter. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, Heister, Chir. T. II. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralyfis, casus, Gorter, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luette, Dionis, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inslammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumescentia, magnitudo, inflatio, Galen. Method. med. libr. XIV. Valesci de Taranta Philon. lib. 2. cap. 59.; Marc. Donat. Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, Gorteri.

Glossocele Gaubii Pathol. J. 242.; Linguae extrusio, Idem J. 254. Renversement de la langue dans le gosser, Petit. mém. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revolutae vel ore extrusae, exundantis, exertae ectopia.

46 G. XLVI. PROPTOMA.

Partis externae, etiam ante lapsum conspicuae, et a palpe? bris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diversae procidentia.

47 G. XLVII. EXANIA.

Proctocele Pathol. Meth. edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapsus ani Auctorum, ut Plateri, Prax. lib. II. cap. 2. Nenteri, tab. 126. &c.

Chûte du fondement Dionis, Dem. IV. pag.392.; Arnaud des Herinies, tom. I. chap. 28.; Levret obs. sur les polypes, sect.3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

48 G. XLVIII. EXOCYSTE.

Prolapsus, inversio vesicae urinariae Austorum, Salzmanni diss. de Hern. vesicae inter Halleri Disp. Sel. tom. III.; Solingen de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire. Noel. obs. Recherches sur la Hernie de la vessie par Verdier; Mém. de l'Acad. R. de chir. tom. 2.

Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius collum, interne obvestientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysteroceles nudae Pathol. Method. Edit. 3.
Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel vaginae Austorum, ut Heisteri Inst. chir. tom. II.; Gunzii de Herniis, &c.
Relachement, chûte, descente, renversement de la matrice ou du vagin. Arnaud, tom. I. chap. 24. &c.; Puzos sur les maladies de la matrice; Sabatier, mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

30 G. L. ENTEROCELE.

Hernia intestini.

12

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE Ign. La Chausse!

Hernia ventriculi, Fabr. Hildani resp. ad Doring. pag. 915.; Blegny Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obs. 2. pag. 44.; Gunzii libell. de hern. cap. 20. Ign. La Chausse Diss. de hernia ventrali, et Kirschbaum Diss. de hern. ventriculi in disp. Chir. Haller. tom. 3. Diss. 68. 69. Hernie de l'estomac, La Faye sur Dionis, pag. 121.; Arnaud Tr. des hernies, présace, p. 81.; Sharp Rech. Crit. chap. I.; Garengeot, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. I. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

G. LIII. HEPATOCELE, Gunzii libell. de hern. p. 4. Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII.; Bohnii Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, Arnaud des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

54 G. LIV. SPLENOCELE, Gunzii Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, Fabr. Hildani, epist. LV. pag. 999.; Spigelii de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; Ruyschii Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate, Arnaud des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri Sennert. Lib. IV. Med. Pract. part. II. sect. II. cap. 17.; Doringii Epist. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, pag. 893.; Graaf de mulier. organ. cap. 8.; Ruysch. Adv. Dec. II. pag. 23. Hernie de la Matrice, Arnaud des hernies. T. I. pag. 29.; Sabatier, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, Platner Inst. Chir. Ign. La Chausse de hern. ventrali.

Hernia cyffica quorundam.

Hernia vesicae urinariae Salzmanni Diss. inter Halleri Disp. Chir. T. III. Diss. 72.; Gunzii Libell. de Hern. &c.

Hernie de la Vessie urinaire Mery. Mém. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; Garengeot Oper. de Chir.; Levret Obs. sur les polypes; Sharp Rech. Crit.; Verdier Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicae urinariae trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, & per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapsae ectopia herniosa.

57 G. LVII. ENCEPHALOCELE, Corvini Diss. de hern. Cerebri inter Halleri Disp. Chir. T. 2. Diss. XLVI.

Hernia cerebri, Reiselii Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obs. 115.; Le chelii ibid. Obs. 158.; Treu Comm. Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; Tazconi Diss. de humano monstro Bononiae nato; Corvini, ibidem.

B 3

Hernie

Hernie du Cerveau, Le Dran Obs. de Chir. Obs. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo Encephali, per ossium cranii non penitus ossificatorum hiatum prorumpentis, ectopia herniosa.

58 G. LVIII. HYSTEROLOXIA.

Obliquitas uteri Roedereri, Elem. aft. obstetric. §. 449. - 507.; Levret Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri Deventer. cap. 46.47.48.; Ruyschii, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, Sabatier Mém. de l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, saepius gravidi, et contra quam in hysterocele sit, abdominis claustris contenti situs in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Testiculorum serior descensus, vel retractio, Felic. Plateri Mantiss. Observ.; Ambr. Paraei Lib. VII.; Thom. Bartholini Hist. Anat.; Morgagn.
Advers. IV.; Dionis Oper. de Chir. Dem. IV; Quelmalzii inter Halleri
Disput. Anatom. T. V. Dissert. I.; Verdier sur la Hernie de la Vessie,
Mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, Graec.

Exarthrofis, Pararthrema eorund.

Luxatio, subluxatio, distortio, Heister. Inst. Chir. T. 1.; Boerh. aph. comment. T. I.; Gorter. Chir. repurgat. cap. VI. Platner. Instit. Chir. 6. 1090 - 1213.

Luxation, entorse, Petit Malad. des os, T. II.; Col de Villars Chir. T.V.; de la Faye Princ. de Chir.; Duverney Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in offium articulis diarthrofice, non vero immobiliter combinațis.

DIASTASIS, Graecorum. 61 G. LXI.

Offium receffus, Latin.; Petit T. II. chap. 8. et 13.; La Faye Princ. de Chir. pag. 474. Duverney T. II. ch. 1. et 5.

Offium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

62 G. LXII. LOXARTHRUS.

Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum, Duverney T. II. cap. II.

Artus vari Duverney, T. II. cap. II.

Gibbolitas scapularis Auctorum.

Offium cum motu sensibili articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

VULNUS. 63 G. LXIII.

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiad tu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationem que tendens.

PUNCTURA: 64 G. LXIV.

Continui folutio intus tantum extenfa.

EXCORIATIO. 65 G. LXV.

Cuticulae vel cutis a carnibus subjectis separatio.

CONTUSIO. -66 G. LXVI.

Textus carnosi, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio ecchymoma saepius inferens;

FRACTURA. 67 G. LXVII.

THE LAX WELL

Separatio violenta et mechanica offis in fragmenta invicem non cohaerentia.

67 G. LXVIII.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio ossis in duas partes rima tantum dissitas, et alterutro saltem extremo cohaerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum folutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

G. LXX. AMPUTATURA Ill. Linn. G. 241.
Solutio continui in partibus tum mollibus, tum offeis, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

72 G. LXXII. EXULCERATIO.

Excoriatio ulcerofa suppurans.

73 G. LXXIII. SINUS.

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplus, saepe multiplex, definit in angustum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui ficca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Crusta sicca, mortua, sluidis solidisque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Ossis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio.

78G. LXXVIII,

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullae offium, saepius in epiphysibus, cum carie, exostosi, et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret exspectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore saepius exordiens sine exacerbatione partiali; et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

81 G. III. SYNOCHUS Galeni.

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

82 G. IV. TYPHUS Hippocratis 1. et 2. de intern. affect. Foesii 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres, cum calore et urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, et quoad robur non majori, artubus interea maxime prostratis.

C

GENERA MORBORUM

83 G. V. HECTICA Galeni et ejus Sequacium;

Sydenhami, p. 524.

18

Decursus ultra mensem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulsu post pastum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et decrescit, non omnino recedit, typus saepe confusus.

84 G. VI. A M P H I M E R I N A.

Remissio quoridianae typum servat. Exacerbationes cum
horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanae typum servans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu aegritudinis deserit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Accessus similes quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

S & C. W.

89 G. XI. QUARTANA.

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, Galeni.

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICA.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna, quandoque

91 G. I. PESTIS.

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

92 G. II. VARIOLA, Haly Abbatis, Jouberti, et antiquorum.

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

93 G. III. PEMPHIGUS.

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter magnitudine sero dilute slavo turgidarum.

24 G. IV. RUBEOLA, sic primitus nominata a traductoribus Haly Abbatis Practicae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae Medela.

Eruptio papularum in squamulas fursuraceas abeuntium.

Praecedunt tussis sicca, sternutatio, lachrymatio, et sebris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlycaenarum milii semini non majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente sebre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum synocha febre.

2 98 G. VIII.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praeludio catarrhali, et saepe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim.

99 G. IX.

ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatosa, subito accedens per vices et recedens,

100 G. X.

APHTHA.

Eruptio pustulosa, phlyctaenodes, et ulcerosa, in ore aut pudendis.

O. III. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo synochae vel synochi cum dolore visceris drot seibaringem vorionicujusdam. mennonsylde oisanut

101 G. XI. PHRENITIS.

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulsusque major, pyrexia acuta.

102 G. XII. PARAPHRENESIS.

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens, tussis.

304 G. XIV. GASTRITIS.

Dolor epigastrii, nausea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna. An UMATUM

105 G, XV. ENTERITIS.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dyfenteria. VIII

Kruptio orythematis com fynocha febre,

too G. XVI.

EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum juxta epiploi extenfionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extensione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre. Contractio invita , conflant, vel int

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tensio hypogastrii, cum dysuria vel ischuria;

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non sacciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

CEPHALITIS. 109 G. XIX.

Febris acuta cum delirio fomnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyspnoea strangulante, dysphagia, et pyrexia acuta.

III G. XXI.

CARDITIS.

Dolor sub sterno, pulsus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas, REO G.

112 G, XXII, PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tuffis cruenta, pulsus mollis,

113 G. XXIII. HEPATITIS, Galeni I. Epid. Comm. 3? Dolor, tensio, calor in regione hepatis, cum pondere, tussi sicca, respiratione difficili.

114 G. XXIV. SPLENITIS.

rag G. VIII.

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

C 3.

115 G. XXV.

NEPHRITIS. 115 G. XXV.

> Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus, cum febre acuta, dyfuria, ischuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus inservientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

x16 G. I. STRABISMUS.

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

x17 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

OBSTIPITAS. nis G. III.

> Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

CONTRACTURA. 119 G. IV.

> Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta. CRAMPUS.

120 G. V.

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

TETANUS. 322 G. VII.

NAX D TES.

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

123 G. VIII.

123 G. VIII. CATOCHUS. 10

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

124 G. IX.

NYSTAGMUS.

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

125 G. X.

CARPHOLOGIA.

Motus velut convultivus manuum, quo aegri floccos e vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum ofcitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum exspira?

128 G. XIII.

CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et superstite in paroxysmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV.

TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

pismio difficilia, frequenty fine febre acum

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens,

Aguario invita, defailgans, murcolorum pedoris, unde ref-

131 G. XVI. CLAUDICATIO.

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibiliter, dextrorsum, vel sinistrorsum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

132 G. XVII.

RIGOR.

Totius cutis succussio frigorifera.

233 G. XVIII. ECLAMPSIA.

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

134 G. XIX. EPILEPSIA.

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sen-

#35 G. XX. HYSTERIA.

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis sugacibus leviter variantibus, cum mortis sormidine intensissima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis sestinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

AVX O see

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculorum pectoris, unde refpiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed saepius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum exspiratione sonora.

138 G. I. EPHIALTES.

Anhelatio difficilis, querula, cum infomnio terrifico.

39 G. II. STERNUTATIO.

Concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

140 G. III. OSCEDO.

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiante, saepius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrup-

TUSSIS.

Concussio fonora, violenta pectoris cum exspiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum; in gutture edens, saepe cum alterno sibilo.

144 G. VII. DYSPNOEA.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNŒA.

Praeceps ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

147 G. X. ANGINA.

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

148 G. XI. PLEURODYNE.

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

149 G. XII. RHEUMA.

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, raucedo, &c.

150 G. XIII. HYDROTHORAX.

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

151 G. XIV. EMPYEMA.

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante sebre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine sopore.

152 G. I. CATARACTA.

Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

156 G. V. ANOSMIA.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHOSIS.

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

161 G. X. ANÆSTHESIA.

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.

D 2 163 G. XII,

28

163 G. XII.

ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppressio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac saepe sensus in organis libertati subditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV.

MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV.

APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et syncopema

167 G. XVI.

PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literasve pronunciandi impotentia.

168 G. XVII. PARAPHONIA.

Vocem solitam edendi impotentia.

169 G. XVIII.

PARALYSIS.

Motus aut tactus, vel utriusque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX.

HEMIPLEGIA.

Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.

171 G. XX.

PARAPLEXIA.

Debilitas sensus et motus in dimidio corporis transversim fumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

172 G. XXI.

ASTHENIA.

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas, sensubus integris.

#73 G. XXII.

173 G. XXII. LEIPOTHYMIA.

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensumque obscuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

> Omnium motuum et sensuum apparens cessatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiae, memoriaeque feriationes.

CATALEPSIS. 176 G. XXV.

Status soporosus cum artuum slexilitate et ad quosvis novos situs retinendos aptitudine,

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporosus a gravi pathemate subito ortus, aegrum in eodem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

> Apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

179 G. XXVIII. LETHARGUS.

Status soporosus facile excitabilis cum summo imaginatio nis et memoriae torpore ac febre.

180 G. XXIX. CATAPHORA.

Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, et oblivione,

181 G. XXX.

CARUS.

Sopor profundus sine stertore.

182 G. XXXI.

APOPLEXIA:

Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles funt.

O. I. VAGI.

Dolores et molestiae vagae saepius universales aut cutaneae ad phlegmasias non referendae.

183 G. I.

ARTHRITIS.

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, Gorraei definit.

Offium dolor non erraticus et internus in artubus.

185 G. III.

RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnofa artuum.

CATARRHUS. 186 G. IV.

> Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tusfi, coryza, &c.

187 G. V.

ANXIETAS.

Molestia quae ad continuam loci mutationem cogit.

188 G. VI.

LASSITUDO.

Molestia cum debilitate quae ad quietem invitat.

189 G. VII.

STUPOR.

Molestia quae sensum tactus obscurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Molestia quae ad scalpendum nos cogit.

191 G. IX.

191 G. IX.

ALGOR.

Molestia qualis a summo aeris frigore excitatur.

192 G. X. ARDOR.

Molestia qualis a summo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

193 G. XI.

CEPHALALGIA.

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV.

OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lachrymatione.

197 G. XV.

OTALGIA.

Dolor aurium. AIOIAMIII48

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens sine notabili respirationis laesione.

200 G. XVIII.

PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago sine febre acuta.

201 G. XIX. CARDIOGMUS.

> Gravis pertinaxque molestia in praecordiis, cum sensu ponderis et magnae molis pulsantis a minimo motu increscens.

O. IV. DOLORES Abdominales Interni.

202 G. XX. CARDIALGIA.

Molestia in stomacho syncopem minitans.

GASTRODYNIA. 203 G. XXI.

> Quicumque dolor notabilis et constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non stipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gastritis. Sames anvalues anamonib anotheris T

204 G. XXII. COLICA.

Dolor intestinorum.

HEPATALGIA. 205 G. XXIII.

> Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quaevis in regione hepatis, fine pyrexia acuta.

SPLENALGIA. 206 G. XXIV.

Dolor aut molestia in regione lienis fine pyrexia acuta.

NEPHRALGIA Zwingeri. 207 G. XXV.

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA Montalti. Dolor uteri sine nisu parturitionis.

V. DOLORES Externi et Artuum.

MASTODYNIA. 210 G. XXVIII.

Dolor mammarum.

aor G. XIX

211 G. XXIX.

211 G. XXIX. RACHIALGIA Astrucii.

Dolor abdominis et spinae dorsi in brachiorum paralysin aut convulsiones desinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

213 G. XXXI. ISCHIAS.

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem saepius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor podicis citra tenesmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dysuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio?

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quiescentia e loco moveri vel in gyrum verfari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio.

218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra aures prinzipium.

220 G. V.

HYPOCHONDRIASIS. 220 G. V.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque, levidensibus malis, imaginatur.

SOMNAMBULISMUS. 221 G. VI.

> Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exsequuntur, et se saepe diversis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut aversationes depravatae.

222 G. VII.

PICA.

Alimentorum consuetorum aversatio, cum inassuetorum, sanisque insalubrium, appetitu. BULIMIA.

223 G. VIII.

Appetitus esculentorum copiae majoris quam quae digeri possit. POLYDIPSIA:

224 G. IX.

Appetitus majoris folito copiae potulentorum?

ANTIPATHIA. 225 G. X.

Quorundam objectorum tanta aversatio ut ex eorum visu; vel olfactu aeger gravia fymptomata patiatur.

NOSTALGIA. 226 G. XI.

> Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum fine causa evidenti.

SATYRIASIS. 228 G. XIII.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine,

229 G. XIV.

In foeminis effraene veneris desiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel faltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum aversatio, saepius a morsu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens:

Delirium universale mite, sine surore et audacia, cum more bo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA:

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diudeturno.

236 G. XXI. DÆ MONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

Omnis memoriae feriatio.

A M N E S I A.

Omnis memoriae feriatio.

E 2 238 G. XXIII

238 G. XXIII. AGRYPNIA.

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, desuetudine notabilis est.

O. I. SANGUIFL UXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejectio sine alvi fluxu.

HÆMORRHAGIA. 239 G. I. Fluxus fanguinis è naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis è gingivis saepius soetidis, putridisve!

HÆMATEMESIS. 242 G. IV.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu-

243 G. V. HÆMATURIA.

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

244 G. VI. MENORRHAGIA.

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

245 G. VII. ABORTUS.

Foetus immaturi, faepius cum menorrhagia ex utero exclusio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

I. Alvifluxus sanguinolenti.

246 G. VIII. HEPATIRR HOEA.

Alvisluxus per inferiora seroso-cruentus nec ater nec tor-

247 G. IX. HÆMORRHOIS.

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obsito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens, torminosa, saepe tenesmodes, soecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per superiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. Alvisluxus non sanguinolenti.

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aëri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et soeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris affidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro surarum crampis.

254 G. XVI. DIARRHOEA.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempestiva de-

255 G. XVII. COELIACA.

264 G. XXVI

Albescentium, aut chylacearum materierum dejectio.

E 3 256 G. XVIII.

256 G. XVIII. LIENTERIA.

Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix mutatorum; dejectio.

257 G. XIX. TENESMUS.

Muci pauci frequens dejectio cum intensa dejiciendi cupiditate, et assiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

- 258 G. XX. EPHIDROSIS Hippocratis.

 Sudoris quantitate, qualitate, intempestivitate peccantis effluxus.
- Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, sebacei, vel purulenti effluxus.
- 260 G. XXII. CORYZA, Hippocr. Gorræi, Def. Med. Humoris serosi, mucosive e naribus essluxus sine ozæna, sepius cum gravedine.
- 261 G. XXIII. PTYALISMUS.

 Salivae vel muci fine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.
- 262 G. XXIV. A NACATHARSIS, Hippocr. Galen. in Aph. 8. lib. 5.

 Muci, lymphae, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans et notabilis.
- 263 G. XXV. DIABETES.

 Subita post pastum potulentorum cum magna siti per urinae vias, emissio.

art G. XWILL

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio:

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, saepius ardens, urinae immissio:

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentae, albescentis, aut viscido-mucosae materiei mictio?

LEUCORRHOEA, Castell. Lex. Bonet. 267 G. XXIX. Anat. Pr. Lib. 3.

Seroso-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

GONORRHOEA. 268 G. XXX.

Stillicidium fluidi seminalis ex urethra, aut ex vagina.

DYSPERMATISMUS, D. Cuffon. 269 G. XXXI. Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

270 G. XXXII. GALACTIRRHOEA. Stillicidium lactis ex mammis.

OTORRHOEA, Linn. gen. 271 G. XXXIII. Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

FLATULENTIA. 272 G. XXXIV. Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

Curis totius intumo ÆDOPSOPHIA. 273 G. XXXV.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

ast G. IX.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

CL. X. CACHEXIA.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

275 G. I.

TABES.

Macies cum amphimerina lenta fine tuffi.

276 G. II. PHTHISIS, Graec.

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoea, et utplurimum puris sputo.

277 G. III.

ATROPHIA.

Macies fine febre.

278 G. IV. ARIDURA, Etmulleri.

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V.

CI OL

POLYSARCIA.

Intumescentia universalis ab adipe molesta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elastica et flatulenta cutis intumescentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumescentia, mollis, pallida, non elastica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgescentia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens ; opus generationis subsequens et partu terminanda.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel vesicae contento.

HYDROCEPHALUS. 285 G. XI.

Tumor capitis, facie faepius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tensus elasticus sub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, Morgagni.

Tumor cyfticus sero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaesthesia.

Ulcera cancred cure A S C I T E S. cuo fictorico arealU 288 G. XIV.

> Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis

HYDROMETRA. 289 G. XV.

Hypogastrii in mulieribus successive crescens tumor, uteri figuram referens, pressioni cedens, sluctuansve, ab ischuria et graviditate diversus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

VO

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

GENERA MORBORUM

291 G. XVII. TYMPANITES.

42

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Tumor hypogastrii ex urinae retentione saepius intra ve-

O. IV. TUBERA.

Tumores partium solidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

Tumor scirrhosus glandularum colli, mesenteriique, cum labiis et naso crassioribus.

Ulcera cancrofa cum doloribus lancinantibus?

297 G. XXIII. LEONTIASIS.

Papillae setaceae vel corniculatae cutim exasperantes.

298 G. XXIV. MALIS.

Tumores saepius purulenti, vel alcera, cum insectis vets misormibus, passim enata.

299 G. XXV. FRAMBÆSIA.

Excrescentiae sungosae, mori instar granulosae saepius cum alceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici saepius contagiosi qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

SYPHILIS. 300 G. XXVI.

> Post impurum concubitum ulcuscula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII. SCORBUTUS. Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis

potissimum tibiarum.

310 G. XXXVI. ELEPHANTIASIS. 302 G. XXVIII. Facies deformis tuberibus callosis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosa, in extremis artubus anaesthesia.

LEPRA. 303 G. XXIX.

> Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

304 G. XXX. SCABIES.

> Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae, manus potissimum obsidentes.

TINEA. 305 G. XXXI.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia acuta.

AURIGO. 306 G. XXXII.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII.

GENERA MORBORUM

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginofus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, Sennerti qui falso nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, saepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque desoedant, aut puncturis, pruritu discruciant.

G. XXXVII. TRICHOMA, Jachii.

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, faepius cum phthiriafi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapsus cum cuticulae desquamatione?

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, foetida eum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

BOY G KXXIII

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio; induratio, nigredo.

PARS SECUNDA.

GENERA MORBORUM

DEFINITA

Ab Illustri

CAROLO A. LINNE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upfaliæ 1763,

PARS SECUNDA

GENERA

MURBORUM

DEFINITA

HAD VALUE OF HADEL INDEED IN A PARTY OF THE PARTY OF THE

CAROLOARINNES

EQUITA AURATO, ARCHIATEO, &C. SC.

the state of the same of the s

GENERA MORBORUM

CLAVIS CLASSIUM.

MORBI.

dirduro D. lose	I.I C.I Febria cum Pab	PHLOGIS.
Febriles (e sar	nguine in medullam.)	topico.
H	EXANTHEMATIC	POLOROR
(RITICI.	HENTAL
P	HLOGISTICI.	IIIIETAL
Temperati		MOTORIL
Nervini		SUPPRESS
Sensationis		VIV
Judicii	MENTALES.	X EFORME
Motus	Level Execute palpack	AITIV
White Burnshap	QUIETALES.	VI
de realiste et l'oliere ad	MOTORII,	VII
Fluidi Secre	tionis.	FEBRUS
	SUPPRESSORII	VIII
	EVACUATORII,	IX
Solidi.		the state of the s
Interni	DEFORMES	X
Externi	VITIA	XI

I. EVAN.

MI

IM

EXAM

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI lateritia.

PHLOGISTICI Debriles (e fanguine in medullant.) topico.

DOLOROSI Doloris fensatio. MENTALES QUIETALES Motus abolitio. MOTORII DEFORMES VITIA

Febris cum Urinae hypoftasi

Febris cum Pulsu duro, Dolore

Judicii alienatio. Motus involuntarius SUPPRESSORII Meatuum impeditio. EVACUATORII Fluidorum evacuatio. Solidorum facies mutata. Externa palpabilia. autoM

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

EVACUATORIL

SUPPRESSORIE VIII Secretionie. SUPPRESSORIE

DEFORMES VAITIV Externi

I. EXANTHEMATICI,

I. CONTAGIOSI,

MORTA.

Phlyclaenae (273) aliquot in Abdomine sive Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) malignissima, funestissima.

II. PESTIS.

I.

Anthraces (272) seu Bubones (271) gangraenosi (233). Febris Synocha (12) acutissima, funestissima, Vertigo (74); Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Pustulae (274) erysipelaceae, suppurantes, escharoticae (280), deciduae, cicatrisantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evanescenti-fursuraceae.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (172);

Tussis (155) sicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido - lurida, superficialia, insensibilia.

Febris exacerbans (23), Asthenia (92), Agrypnia (130).

VI. SYPHILIS.

Nodi (262), Ulcuscula, Myrmeciae (279).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore ostocopo (61), Marzore (209), Stranguria (196), Angina (46).

II. SPORADICI.

VII.

MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immersae, diversicolores, confertae, intacta facie, pruriginosae.

Febris Synocha (12), Sudore (207) foetido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilatabilia, pruriginosa, sugacia, recidivantia, surfuraceo-evanescentia. Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX.

APHTHA.

Escharae (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis in-

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96).

III. SOLITARII.

X.

II. SPO.

ERYSIPELAS.

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum Erysipelas (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: Lipothymia (93), Delirium (65), Vertigo (74), Oblivio (107), Anaesthesia (118), Lipyria, Carpologia (135), Anhelatio (157), Aphonia (115), Aglutitio (164).

core (209) Surangmin (196), Angina (46)

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra septimanam dimidiam

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra septimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris singulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris alternis.

XVII. OUARTANA.

Febris paroxysmi similes ny&hemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxysmi similes alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyfmi dissimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

G 2 XXII.

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20)

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18):

Protypus Criticorum Tertiana (16) su, aut potius Rheumatismus (62). Apyria est destagratio febris.

Phthisis (208) posset post Hesticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expestoratio.

Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) Meningum.

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) Diaphragmatis.

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) Pleurae.

Febr. Synocha (12), Dyspnoea (160), Tussis (155)? Haemoptysis (179), Pleuritica (53).

Bebris cominens (14) cum Quotidiana (15).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) Ventriculi.

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingestorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) Intestini.

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenfiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) Ani.

Febr. Proctica (59) cum Tenesmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) Vesicae.

Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore instammatorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) Encephali.

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135), Asthenia (92), Immobilitas, Anaesthesia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNACHE.

Inflammatio (231) Faucis.

Febr. Synocha (12), Tussis (155) Aglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46), Sussociaio (158) Linguae intumescentia.

Processor Phlogisticarum Phlogmane (19) ell.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) Pulmonis.

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), Interscapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) Jecinoris.

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) Lieuis.

Febr. Tetartophia (22), Respiratio intersecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

Andammatio (131) Mini.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) Renis.

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausca (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) Uteri.

Febris, Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis (125), Dolor hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) Partis Externae.

Febris ex partis externae tumore pulsatorio, rubore tensivo, calente.

Lipyria dum externa frigent, interna fervent.

Protypus Phlogisticorum Phlegmone (39) est.

Delicium (65) quasi primus gradus Phrenitidis est.

IV. DO-

Fefere dolor.

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

HEMICRANIA. XLI.

Capitis lateralis dolor tensivus.

GRAVEDO. XLII.

Frontis dolor pressorius.

OPHTHALMIA, XLIII.

Oculi dolor.

OTALGIA. XLIV.

Auris dolor.

TIXI

XLV. ODONTALGIA:

Dentis dolor maxillaris.

ANGINA. XLVI.

Faucis dolor cum suffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oesophagi dolor rancido-deurens Ructibus (181) calidis.

CARDIALGIA, XLVIII.

Cardiae dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

GASTRICA. Tolob muselmin XLIX. a Periofic infestor a trace

Ventriculi dolor epigastrii.

COLICA.

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus (123)?

HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

SPLENICA. LII.

Lienis dolor hypochondrii sinistri, suspiria (150).

LIII,

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

PNEUMONICA. . . . LIV.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tussi (155), Haemoptyfi (179) vesvera releb sinoing ses seisos ango

HYSTERALGIA. LV.

Uteri dolor.

Capil's lateralls dolor terrivus. NEPHRITICA: LVI.

Renis dolor.

Fromis dolor prefforing. LVII. DYSURIA

Vesicae dolor.

PUDENDAGRA; LVIII.

Genitalis dolor.

PROCTICA: LIX.

Ani dolor.

EXTRINSECI.

Lieux dolor hypochordiii finifici, fulpiria (170).

ARTHRITIS. LX.

Geniculorum dolor periodicus;

a Synovia corrupta.

OSTOCOPUS. LXI.

Articulorum dolor internus fixus;

a Periostio infecto.

Venninii dolor estantii RHEUMATISMUS. LXII.

Musculorum dolor ad motum;

a Tunica cellulosa infecta.

VOLATICA; de volob anomint LXIII.

Vasorum dolor migrans,

LXIV.

PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem inducens.

Raphania (145) dolore intenso his assinis: Ob Spasmos vero et Con-

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV.

DELIRIUM.

Infania acuta, transitoria, symptomatica cum febre:

LXVI. PARAPHROSYNE.

Infania acuta, periodica, fine febre.

LXVII. AMENTIA.

Infania chronica, univerfalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Infania chronica, univerfalis, furibunda,

LXIX. DÆMONIA.

Infania chronica, partialis, furibunda, meticulofa, de Dac-

LXX. VESANIA.

Infania chronica; partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA:

Infania chronica, partialis, moesta, meditabunda

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio Soni tinnitantis falsi.

LXXIII. PHANTASMA:

Perceptio Visibilis objecti falsi.

VERTIGO. LXXIV.

Perceptio circumgyrationis falfae.

PANOPHOBIA: LXXV.

Imaginatio mali falsi in solitudine.

HYPOCHONDRIASIS. LXXVI.

Imaginatio fati lethalis e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio somniantis fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII.

CITTA:

Desiderium non Esculenti ingerendi.

LXXIX.

BULIMIA.

Desiderium Cibi inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium Potus continuum.

LXXXI.

SATYRIASIS.

Desiderium Veneris enorme.

LXXXII.

EROTOMANIA.

Desiderium Amantium pudicum.

LXXXIII.

NOSTALGIA.

Desiderium Patriae Affiniumve.

TARANTISMUS. LXXXIV.

Desiderium Choreae (saepe a morsura Insecti). THANTASMA

Percento Millitis objecti falfi.

LXXXV.

RABIES.

Desiderium Mordendi lacerandique innocuos (saepe a morsura Mammalis).

HYDROPHOBIA: LXXXVI.

Aversatio Potulentorum cum Rigore (141) et Sardiasi (125); (saepius praecedenti maritata).

LXXXVII.

CACOSITIA.

Averfatio Cibi cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio objecti particularis.

LXXXIX.

ANXIETAS.

Aversatio mundanarum rerum. (Cordis dolor).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

XCI.

LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII.

ASTHENIA:

Debilitas fuccessiva virium omnium.

XCIII.

MIT.PRE

LIPOTHYMIA:

Defectio motus sensusque subita; superstite Pulsu Menteque.

Sopor transitionius partis alicujus cam-fensu formicationis;

XCIV.

SYNCOPE.

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

XCV.

ASPHYXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque persistens:

II. SOPOROSI.

XCVI.

SOMNOLENTIA

Sopor vigiliis protractior.

XCVII.

TYPHOMANIA:

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII.

LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio (65) obliviofo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor conftans allocutione evigilans.

C.

CARUS.

Sopor constans cum insensibilitate, respiratione que tacital CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque stertorosa (156).

CIL sharager no PARAPLEGIA; som amadell

Sopor constans partium sub thorace.

CIII.

HEMIPLEGIA:

Sopor constans lateris alterius.

CIV.

PARALYSIS.

Sopor constans partis alicujus. Third amon oil stall

CV.

STUPOR.

Sopor transitorius partis alicujus cum sensu formicationis.

III. PRI-

LOUD

H MCIV.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CIX. CATARACTA:

Visus privatio cum vitio observabili.

CX. AMAUROSIS.

Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilatata.

CXI. SCOTOMIA.

Visus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA:

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Gustus defectus.

CXV. APHONIA;

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA:

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA:

Tactus sensationis defectus.

CXIX.

ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX.

ATONIA:

Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI.

SPASMUS.

Artus distentio violenta, subitanea, sugar:

CXXII.

PRIAPISMUS.

Penis spastica intumescentia.

CXXIII.

BORBORYGMUS.

Intestinorum contractio boans.

CXXIV.

TRISMOS.

Mandibularum clausura arcta.

CXXV.

SARDIASIS.

Oris retractio rifum mentiens, fugax.

CXXVI.

HYSTERIA.

Praecordiorum pressio sub pectore, cum flatulentia (165); Suffocatione (158), Anxietate (89) Palpitatione (132), verticis pressione.

CXXVII.

TETANUS.

Corporis rigiditas cum sensibilitate.

CXXVIII.

CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum infensibilitate.

声 是五

CXXIX.

CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.

CXXX.

AGRYPNIA.

Sensorii rigiditas spastica, continua (Pervigilium).

II. AGITATORII.

CXXXI.

TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.

CXXXII.

PALPITATIO.

Cordis Viscerisve motus subsultorius.

CXXXIII.

ORGASMUS.

Arteriarum subsultus.

CXXXIV.

SUBSULTUS.

Tendinum subsultoria elevatio.

CXXXV.

CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inscia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio fonora, vacua.

CXXXVII.

HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentissima.

CXXXVIII.

PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibusdam literis.

CXXXIX.

CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI.

RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei fenfu. CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.

CXLIII

GENERA MORBORUM

CXLIII.

64

EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibili-

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV.

RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva; Dolore violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII. I. SUFFOCATORII.

CXLVI.

RAUCEDO.

Vocis fibilans elocutio ab arescentia pneumatica.

CXLVII.

VOCIFERATIO.

Vocis dolorofa exaltataque exclamatio.

'Ad Corpus indurandum.

CXLVIII.

RISUS.

Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiasi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX.

HILLIAN

FLETUS.

Inspiratio intersecta, singultuosa, cita, suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).

toute vicients renedice, com lentile

Ad sanguinem intra pulmones inglutiendum?

CL.

SUSPIRIUM.

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI.

OSCITATIO.

Inspiratio tarda; adaucta, hians, spasmodica.

Ad sanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis ar-

'Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.

CLIII.

SINGULTUS.

Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora. Ad Cardiam evacuandam.

CLIV.

STERNUTATIO.

Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae suc-

Ad sinum Frontis evacuandum.

CLV.

TUSSIS.

Exspiratio sonora, convulsiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI.

STERTOR.

Respiratio sonora, rauca, narium agitatione;

Ad mucum faucium subigendum.

CLVII.

ANHELATIO.

Respiratio citatissima, profunda, laevis, sugax.

Ad sanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII.

SUFFOCATIO.

Respiratio angustatione faucium continua, sine sebre.

A Tracheae angustatione.

CLIX.

EMPYEMA.

Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

A pure in cavum Thoracis effuso.

CLX.

CLX. DYSPNOEA.

Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

A pulmonum substantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Respiratio stertorosa (156), laboriosa, dissicilis, chronica, A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNOEA.

Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

A sanguinis per pulmones difficili transitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum Somnio laborioso.

Ab Intestinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) Crepitusque (194) impeditus cum abdominis intumescentia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Foecum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus.

MUD

CLXVIII. DYSMENORRHOEA

Menstrua suppressa s. dolorifica.

CLXIX.

DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio.

CLXX.

AGLACTATIO.

Lactis defectus.

STERILITAS.

Geniturae suppressio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIII. HÆMORRHAGIA:

Naris fanguineus fluxus.

CLXXIV. CORYZA.

Naris mucosus fluxus, copiosus, continuus,

CLXXV. STOMACACE.

Oris sanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVI. PTYALISMUS.

Oris salivalis e glandulis copiosissimus essuxus.

II. THORACIS.

CLXXVII. SCREATUS.

Faucis muci fonora evacuatio.

ALID XO

CLXXVIII. EXPECTORATIO.

Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.

CLXXIX. HÆMOPTYSIS.

Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.

I 2

CLXXX.

CLXXX.

AVOMICA.

Pulmonis purulenta, copiosa, improvisa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXI.

RUCTUS.

Rejectio Flatuum frequens.

CLXXXII. NAUSEA.

Rejectionis Cibi Flatuumque conatus inanis:

CLXXXIII. VOMITUS.

Rejectio ingestorum convulsiva.

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) sanguinis.

CLXXXV.

ILIACA.

Vomitus (183) cum Obstipatione (166) fixa et Colica (50).

CLXXXVI. CHOLERA.

Vomitus (183) cum Diarrhoea (187), Colica (50).

CLXXXVII.

DIARRHOEA.

Dejectio Foecum liquidarum frequens.

CLXXXVIII. LIENTERIA.

Dianhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXX.

CLXXXIX. COELIACA.

Diarrhoea (187) Chymi.

CHOLIRICA:

Diarrhoea (187) rubella, absque Colica.

CXCI.

DYSENTERIA.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica (50), Tenesmo (193).

Pulmonis fanguinea cum Enfil evaceacio.

HÆMORRHOIS. CXCII.

Dejectio Sanguinis cum Proctica (59), absque Colica.

CXCIII.

Lassis effluxus

CXCIII. TENESMUS.

Dejectio Muci frequens, parca, cum desiderio.

CXCIV.

CREPITUS.

Dejectio Flatuum copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorofa micturitio.

CXCVII.

DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CXCIX.

GLUS. sinos A mus rossell

Urinae viscosae micturitio.

CC.

GONORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e sinu Muliebri effluxus.

CCII.

MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriofiffimus.

CCIV.

CIV.

A B O R T U S.

Foetus praematura ejectio.

Corporis emphy (emano (.A L O M efectua.

Massae carneae, intus cysticosae, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lastis effluxus.

CCVII.

SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCVIII.

PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyspnoea (160), Expectoratione (178) purulenta, copiosa.

CCIX.

TABES.

Marcor cum Hectica (24), absque Expectoratione.

CCX. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), absque Expectoratione et Hectica.

CCXI. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), absque Atonia, Expectoratione, Hectica.

CCXII.

RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; offibusque saepe flexilibus.

II. TUMIDOSI:

CCXIII.

V. COR-

POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescentia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphysematosa (228) intumescentia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematosa (229) intumescentia.

CCXVI.

HYDROCEPHALUS. CCXVI.

Capitis oedematosa (229) intumescentia, hiantibus suturis

ASCITES. CCXVII.

Abdominis oedematosa (229) intumescentia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodosa intumescentia.

TYMPANITES. CCXIX.

Abdominis flatulenta (165) intumescentia, constans, sonoral

GRAVIDITAS. CCXX.

Abdominis a foetu intumescentia nimia.

III. DECOLORE

CACHEXIA. CCXXI.

Pallor corporis oedematosus (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citta (78).

SCORBUTUS. CCXXIII.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (Obstipatio Bilis). PLETHORA.

CCXXV.

Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea (160). Leftemmatio f. Seppuration follocata simurtual ferr

HYDROPIS nomine veniunt Anafarca (215), Afcites (217), Hyposarca (218), Hydrocephalus (216), Oedema (229), et Tympanites (219) in argine fibinflammato, fil (218) zatin

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVI. ARIDURA.

Pars exfucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens:

CCXXVII. DIGITIUM.

Articuli exficcatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intensissimo.

CCXXVIII. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam cellulosam Partis.

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

CCXXIX. OEDEMA.

Lympha stagnans intra tunicam cellulosam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

CCXXX. SUGILLATIO.

Cruor effusus in tunicam cellulosam.

Tumor obsoletus, latus, luridus.

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obstructus in vasis.

Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio suppurata, in Pus collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio f. Suppuratio suffocata, mortua serpens in tu-

Curis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

CCXXXIV.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium solidorum partis.

Mortificatio putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA

(Solutiones Continui).

CCXXXV. FRACTURA.

Ossis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVI. LUXATURA.

Geniculi solutio citra substantiae dissolutionem?

CCXXXVII. RUPTURA.

Tendinis solutio citra substantiae dissolutionem,

CCXXXVIII. CONTUSURA.

Fibrarum solutio citra substantiae dissolutionem?

CCXXXIX. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copiosus e substantiae dissolutione,

CCXL. VULNUS.

Substantiae dissolutio partis mollis, hians, cruenta,

CCXLI. AMPUTATURA.

Vulnus detruncatione partis totalis factum?

CCXLII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutisque laceratione factum

CCXLIII, PUNCTURA.

Vulnus Tendinis punctione factum.

CCXLIV. MORSURA!

COLVA

Vulnus punctum armis animalium venenatis

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus igne factum, inducta Eschara (280).

CCXLVI,

GENERA MORBORUM 74

EXCORIATURA. CCXLVI.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulae erosio madens dolensque.

CCXLVIII. RHAGAS.

Fissura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(Suppurationes apertae).

CCXLIX. U L C U S.

Vulnus Suppuratum partis carnofae.

CCL.

CACOETHES.

Ulcus superficiale serpens, manans, perenne.

CCLI.

NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depascens, cicatricem indu-

CCLII.

CARCINOMA.

Ulcus Scierhi (283) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIII.

OZÆNA.

Ulcus intra antrum Highmori.

Ulc. occultum e Naribus foetens.

CCLIV.

FISTULA

Ulcus cortice calloso-vaginatum.

Ule. sinuoso penetrans, intus cortice obtectum, ore anguflatum.

CCLV.

CARIES.

Ulcus Offis separato periostio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, sanie passim nigra se prodens.

CCLVI. ARTHROCACE.

Ulcus Medullae cum offis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore oftocopo (61).

CCLVII.

COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem receptum. Partis stigma dolore furioso.

CCLVIII. PARONYCHIA.

Serum corruptum sub tendinibus periostioque. Partis rubor dolentissimus, os destruens.

CCLIX.

PERNIO.

Partis ustio Gelu facta.

Pars albo caerulescens, tempestatibus recrudescens, saepe exulcerans.

CCLX.

PRESSURA.

Digiti inflammatio (231) a frigore, in casum unguis tendens; Inflam. Digiti circum ungues in suppurationem vergens.

CCLXI. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem fecans. Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES.

* Multiplicativa.

CCLXII.

LEPRA.

Pustulae (274), Eschara (280) sicca colorata, cum Nodis immersis mobilibus indolentibus fuscis Rhagadibusque (248).

K 2

CCLXIII.

CCLXIII.

TINEA

Pustulae (274) Capillatii siccae, eschara (280) albo-slaves-

CCLXIV. A C H O Resborg of amin suffice.

Pustulae (274) exulcerantes, manantes communi pinguedinoso.

CCLXV. PSORA.

Pustulae (274) ichorosae, escharoticae (280), noctu imprimis pruriginosae (64).

CCLXVI. LIPPITUDO. nov proboleminA

Pustulae (274) excoriantes Palpebrarum margines.

CCLXVII. SERPIGO.

Pustulae (274) siccae, obsoletae, serpentes, subfarinaceodesquamantes.

CCLXVIII. HERPES.

Pustulae (274) escharoticae (280), basi communi erysipelacea (10).

CCLXIX. VARUS.

Pustulae (274) Glandularum sebacearum rubrae, dispersae; chronicae.

CCLXX. BACCHIA.

Vari (169) faciei cum nodis maculisque coloratis chronicis. ** Simplex.

CCLXXI, B U B O.

CCLXUIL

Glandula conglomerata inflammata, in suppurationem tendens.

CCLXXII. A N T H R A X.

Glandula subcutanea inflammata, in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erysipelaceus (10), immersus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

CCLXXIII.

CCLV.

CCLXXIII. PHLYCTÆNA. HIXXXIII

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta Nodus durus, afper, concolor, indolens, roundatenlobel

PUSTULA: sillinolni smoil CCLXXIV.

Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pure!

PAPULA. Afrancia alubando CCLXXV.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix suppu-ATHEROMAL randum.

CCLXXVI. HORDEOLUM.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans faepius apice. O J Y H O M A ... IVXXXX I DO

CCLXXVII. VERRUCA.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, sicca, indolens.

CCLXXVIII. MCLAVUS. MVXXXIII

Verruca (277) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis?

CCLXXIX. MYRMECIUM.

Verruca (277) madida, mollis, denudata:

CCLXXX. ESCHARA.

Custa mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, de-XXXIX SPINOLAS. cidua.

V. TUMORES protuberantes.

HERNIA.

CCLXXXI. ANEURISMA.

Arteriae dilatatio. accominante onatrio xa surub romu T

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus,

CCLXXXII. VARIX.

Venae dilatatio.

CCXCIL

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII, K 3

CCXCI.

CCLXXXIII. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensilis.

CCLXXXIV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, folidiusculus, pressione obtuse sentiens.

CCLXXXV. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens absque cystide.

CCLXXXVI. ANCHYLOSIS.

Tumor Geniculorum, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

CCLXXXVII. GANGLION.

Tumor Tendinibus innatus, ovatus, mobilis, pulposus, in-dolens.

CCLXXXVIII. NATTA.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, eminens, pulposus, indolens.

CCLXXXIX. SPINOLA.

Tumor supra vertebras lumborum mollis, exiguus, Vertebrarum processibus dehiscentibus.

CCXC. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex offe prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCI. HERNIA.

DOLKXXIL

Intestini obtecti ultra propriam sedem protrusio.

CCXCII.

CCXCII. PROLAPSUS.

Viscus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIII. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. SARCOM A. Emmission solliv ileno

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCV. PTERYGIUM

Cuticula excrescens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.

CCXCVI. ECTROPIUM.

Palpebra inferior resupinato-inversa.

CCXCVII. PHIMOSIS

Praeputii intumescentia inflammata, glandem denudans incarceransve.

CCXCVIII. CLITORISMUS.

Clitoridis intumescentia extra sinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens. suppersignof estologoo all

CCCI. LORDOSIS.

Offium incurvatio.

CCCII. · DISTORTIO.

Ossium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

VIII MA

CCCIV. STRABISMUS.

Oculi distorti et inaequaliter moti.

CCCV. LAGOPHTHALMIA.

Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.

CCCVI. NYCTALOPIA. Or voicemi point

SARCOM A, sunruson suliv of San S

CCCVII. PRESBYTIA.

Oculi visus remotus. I TIOV HATA WOXOO

CCCVIII. MYOPLA

Dentes vacillantes in suis alveolis. HE MONDO

CCCX. LAGOSTOMA.

Labium superius oris fissum.

CCCXI. SUAPELLATIO HIVOXOO

Praeputii abbreviatio absque inflammatione,

CCCXII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. A R P L I CA.

Capillorum contortuplicatio indiffolubilis.

CCCXIV. HIRSUTIES.

Pili copiofiores longioresque.

CCCXV. ALOPECIA,

Pilorum defluvium.

CCCXVI. TRICHIASIS.

TORTURAL

Over ad Jacus Sexio.

CCXCII.

VIII. MACULÆ.

CCCXVII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes consolidatas.

CCCXVIII. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. MORPHÆA.

Macula alba, depressa, lata.

CCCXX. VIBEX.

Lineae sanguinicolores sub cuticula.

CCCXXI. SUDAMEN.

Maculae rubrae, pulicares, glabrae, pungentes, evanefcentes.

CCCXXII. MELASMA.

Macula caerulescens in parte tecta.

CCCXXIII. HEPATIZON.

Macula grifea, subaspera, pruriens.

CCCXXIV. LENTIGO.

Maculae grifeae, confluentes, insensiles.

CCCXXV. EPHELIS.

Color fuscus partis insolatae.

Heu mibi! tot mortes Homini, quot membra, malisque,
Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

differ matelott aplott (t)

(a) Hysoustiones dune fimul et femal pollims vis flare.

9. Quinquid praedipue advertien fenties praecipue corae vel

minora majoribus adlocias (6), us tota fo his opponen

THEORIA.

r. CORPUS vivum constat Medullari cerebroso, et Corticali solido fluidoque.

2. VITA sentiens movensque residet in medullari primordia-

li, continuato, multiplicativo.

3. MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e sluidis vegetabilium, et sluida haec vicissim per solida praeparat.

4. Medullare hoc nutritur tenuissimo spirituoso liquido corti-

cali, sed flagrat electrico pulmonibus hausto.

5. Medullare sentiens se pandit ad gratum salutare, et movens se retrahit ad ingratum noxium.

6. Fluidum corticale, e quo folida, folvitur destruiturque Acidis aut Putridis, utrisque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES:

Criticae ab acescente; Phlogisticae a putrescente, at Exanthe:

maticae a vivo? peregrino multiplicabili.

- 8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul ejecit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (a).
- 9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (b), ut tota se his opponat

(a) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare:

(b) Dolor Dolorem trahit.

AO. COR-

- adeoque quotidie reparandum; reparatur autem Diaeta; eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverfe, unde defectus, Morbi dicti.
- natura obtineat, Toxica misceantur ingerendis, Medicamen-
- ex Olidis in medullare agentibus dignoscenda sunt: E contrariis itaque saporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque Clavis Materiae Medicae.

Againt in Manallers Animousing

SPIRITUOSA, Chippingland

(c) Morbi morbis curantur,

A VISCOSAL

Sentim

Trois out

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

ias Affedicanting	in Fluidis.	in Solidis.	catura obcineat; va difla.	
1 AQUOSA.	Mundificantia, Absorbentia,	Humectantia. Exficcantia	SICCA.	I
2 ACIDA.	Refrigerantia, Balfamica,	Attenuantia. Tonica	AMARA.	
3 DULCIA.	Edulcorantia, Incidentia,	Impinguantia. Corrodentia	ACRIA.	3
4 VISCOSA.	Invifcantia, Penetrantia,	Lubricantia. Abstergentia	SALSA.	4
5 PINGUIA,	Obtundentia, Inspissantia,	Emollientia. Adfiringentia	STIPTICA.	5

II. OLIDA.

Agunt in Medallare Animatum.

Senfum	Excitant	AROMATICA,	Sopiunt	VIROSA.
Motum	Spasticant	ORGASTICA,	Evacuant	NAUSEOSA.
Judicium	Acuunt	SPIRITUOSA,	Confundunt	TETRA.
Libidinem	Provocant	AMBROSIACA,	Suffocant	HIRCINA.

PARS TERTIA.

DEFINITIONES

GENERUM

MORBORUM

A Clariffimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUJUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

PORMITATES: Abendence School

Labour Spent, supports, sirling the

PARS TERTIA.

DEFINITIONES

GENERUM

MORBORUM

A Clariffimo

RUDORPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUJUSQ. PAOPESS. SIC. CIC.

Continue 1769

SECRETICAL SPRING

OF CREATINGS Departs

THERE AMERICALCA, Series

TABULA CLASSIUM

MORBORUM.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum præternaturale, cum oris ficcitate et gravitate corporis.
- II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESES. Excernendorum suppressiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis & animi tranquillitatem turbantes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. A D Y N A M I Æ. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum desectus, aut imminutiones.
- VII. HYPERÆSTHESES. Sensationes auctae, vel perversae.
- VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis constitutio, cum debilitate.
- IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

A V. C. Ser annual manual designation of the contraction of the contra

- X. VITIA. Mutationes in superficie corporis confpicuae.
- XI. DEFORMITATES. Aberrationes folidorum ab ordine, positura, habitu, sigura, numero, aliisque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat; posteaque revertitur praevio frigore.

I. SIMPLICES.

I. QUOTIDIANA

Quolibet die aut nocte recurrit.

TERTIANA. II.

Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

QUARTANA: III.

Uno die vel una nocte invadit, deinde hiduum intermittit, quarto iterum redit.

QUINTANA: IV.

Singulo quinto die redit.

SEXTANA.

Singulo fexto die repetit.

SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

OCTANA VII.

Quolibet octavo die redit.

NONANA. VIII.

Quovis nono die recurrit.

DECIMANA. IX.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.

XI.

MENSTRUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. DUPLICATE.

XII.

TERTIAN A duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

XIII.

QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui relpondent. rebris aum profutifinto se cerperuo fudore in

III. TRIPLICATE.

XIV.

QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

SIMPLICES.

QUOTIDIA NA continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crist perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus Ephemera est.

XVII. A M A T O R I A.

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

XIX. E P I A L A.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu. Typhodes et Sudor Anglicanus ejus species sunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergesactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crisin singultit.

Pacie rabra, our has SODES. It some en freque, IIVXX

SILVOR

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molefteque habet, vel fastidio agitatur.

XXVIII

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejec-

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum aversatione liquidorum, singultu, convulsione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oscitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis ficca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subsidentia.

II. COMPOSITÆ.

1. Exanthematicae.

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut fensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus soetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subslavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, sugaces, in squamulas dehiscentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum fimilia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

NXXXX

Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erum pentes.

multalas purulentes elektereisens decidues abeunies.

D 24

XLII. VARICELLA *.

Variolae spuriae; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio reficcatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, sungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

II. INFLAMMATORIÆ.

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo phlegmone dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

M 3 XLIX

* Haec Varicella facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praesocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravativus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiave.

LII. MEDIASTINA.

Mediastini instammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, urgente morbo syncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, delor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

HAIK

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris leipyria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris assodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, slatuum et stercoris retentio, aut dyfenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distensio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Mesenterii instammatio; sebris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestiones chylosae et ichorosae, nullo doloris sensu desluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. MYOCOILITIS, SO COMMONDO

Musculorum abdominalium inslammatio; symptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, rustus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, eryfipelatis expulfionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, fynochos, cum dolentissimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenefmus.

III. SYMPTOMATICE.

Mufculorum abdominalium inflummatio; fympromata ut in

LXXII. APOPLECTICA,

Continua apoplexiae superveniens.

LXXIII. CATARRHALIS

Vespertina, catarrhis socia. OOOYIM

VIKI

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatismo juncta, multus sudor, interdum pustulae purulentae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo sebris sinitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens,

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri superveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA:

Partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo; cum sudore colliquativo et phthisi.

II. PROFLUVIA.

I. HEMORRHAGIA

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

XCV

LXXXIII. HÆMOPTOE

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tussim?

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA:

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA:

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpebris eruptio?

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA:

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non aequaliter persundit ac in imo subsidens in grumos concrescit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. Haemorrhoides vesicae appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

LKXXIV

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

HÆMATOPEDESIS. XCV.

Sudor fanguineus; fanguinis tenuis e poris cutis eruptio?

MENORRHAGIA. XCVI.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profusio.

ABORTIO. XCVII.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola subsequente.

II. APOCENOSES.

CATARRHUS. XCVIII.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

EPIPHORA. XCIX.

Lacrymae involuntarium profluvium.

CORYZA. C.

Catarrhus narium cum seri tenuioris destillatione,

OTOPUOSIS. CI.

Puris ex aure effluxus: catarrhus auris fordidus,

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

PTYALISMUS. CIII.

Copiosa salivae profusio.

VOMICA. CIV.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tussim.

DIARRHOEA. CV.

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo prosluvium, sine vehementi fensu doloris. PUORRHOEA, Carallera distant

CVI.

Puris sinceri ex alvo excretio.

CVII.

GENERA MORBORUM

CVII. DYSENTERIA.

Sor

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum descendunt; alimentis assumptis substantia et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cremoris specie de-

CX. CHOLERA.

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco stercoris, excretio diuturna, cum contabescentia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sincerae et cruentae ex alvo excretio tenesmodes; periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria conftans, fine acrimoniae et doloris fensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

PUOURHOEAT

wis finceri en alvo exclesion

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

TIVO .

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. Glus Linn.

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita seminis, liquoris prostatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis insomnia, citraque colis tentiginem; profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis ex rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXXXVIII

CXXII. GALACTIA:

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. E CPHYSE, ON THE CANAL STATES

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene sonora, spiritu nonnihil difficili, qui nec nisi hiante ore duci potest.

citans.

LaCits defectus.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita supra infraque expulsio; cum intumescentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA:

Urinae suppressio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menstrui sanguinis ex utero sluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. DOLORES.

ex mammis thillicidium.

CXXXIV. ANXIETAS.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum ex-

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

CXXXVIII,

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et musculorum dolor. Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag. funt species.

ARTHRITIS, Tolob murament CXXXIX.

Articulorum dolor; cujus species chiragra et gonagra:

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CEPHALÆA: CXLI.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum fensu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupans.

CAREBARIA. CXLIV.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

ODONTALGIA. CXLV.

Dolor dentium.

HÆMODIA. CXLVI.

Dentium supor cum dolore.

CXLVII. O DAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. na stobre adespose CIONIS. a sarder since sanitu thra excepts,

Dolorifica uvulae craffities.

HIMANTOSIS. CLI.

Ejusdem folito major longitudo et gracilitas:

104

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

MASTODYNIA. CLIII.

Mammarum dolor.

CLIV.

SODA:

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces affurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI.

PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque ENCAUSIS, vomitu.

CLVIII.

Ardor in stomacho cum inextinguibili siri,

CLIX.

NAUSEA.

Inane vomendi desiderium.

CLX.

COLICA.

Dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea; et vomitu.

CLXI.

EILEMA.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae dense rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta. Dolerifica uvalae era fine

all lo

CLXIV. DYSURIA.

Urinae stillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV.

LITHIASIS. CLXV.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa et cruenta egeritur.

CLUNESIA. CLXVII.

Dolor in podice. Proctica Sauvages. et Linn.

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. Pudendagra Linn.

HYSTERALGIA,

Dolor ventris parturientium similis.

DYSMENORRHOEA:

Profluvium fanguinis uterini menstruum dolorificum;

DYSTOCIA, CLXXI.

Partus laboriosus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA:

Partus difficillimus, qui fine arte prorsus absolvi non potest, PRIAPISMUS. CLXXIII.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum CLXXIV. PSORIASIS.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

PODAGRA. CLXXV.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus offium? Committee and Committee an

CLXXVIII.

0

GENERA MORBORUM

VOLATICA. CLXXVIII.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

EPIPHLOGISMA. CLXXIX.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur Pyrofis.

V. SPASMI.

CLXXX.

105

TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

OPISTHOTONUS. CLXXXI.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CATOCHUS. CLXXXIII.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV.

TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalgescunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR

Idem at violentior cum trismo et sensu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA:

Agitațio convulsiva universalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex ore.

CLXXXIX

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepsia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulsiva, continua, chronica, cum integritate sensum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum.

CXCII. RAPHANIA Linn.

Convulsio cum spastica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procursiva. Tarantismus est species.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel Contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praesocatio acuta, sine inslammatione. Angina con vulsiva et Suffocatio hysterica ejus sunt species.

CXCVII. GLOSSOCELE,

Linguae violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA:

Linguae violenta, acuta, revulfio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio: malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perversio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum niclitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuosam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aeris e pulmonibus expulsio:

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, s. Spasmus Maxillae inferioris.

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, s. Spasmus Cynicus.

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, f. Rifus Sardonius.

Involuntarius rifus, fub quo animus non gaudio, fed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in infomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, fonora, recurrens. CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CEXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus ite-

CCXVII. OESOPHAGISMUS, s. Spasmus Oesophagi.
Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora
dolorisica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum spasmis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, s. Æstus volaticus.

Subitus fugaxque aestus cum rubore faciei, and alle sup

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et constans incurvatio;

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa fensatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. ASTHENIA.

Languor aut debilitas corporis.

CGXXXIV.

CCXXIV. TORPOR.

Sensus motusque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAMIA.

Impotentia, qua se aegri nullo modo movere aut in lecto erigere possunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Sensus motusve aut utriusque defectus in singulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium sub collo, aut saltem medii corporis artuumque inferiorum paralysis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralysis alterutrius lateris.

CCXXIX. A POPLEXIA.

Subita functionum animalium cessatio, cum stertore et magno pulsu.

CCXXX. CATALEPSIS, f. Catoche.

Subita functionum animalium cessatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum situm; qui ipsis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus sopor, liberam respirationem sine stertore conservans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. C O M A, s. Cataphora.

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipsum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA:

Inclinatio in fomnum justo major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subapparitio,

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Visus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae visioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas fine fenfibili oculorum labe, praeter mydriafin,

CCXXXIX. CATARACTA:

Coecitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua.

CCXL. SYNIZESIS. Comming abov

Coecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII, A C H L Y S.

Corneae obscuritas, visum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Visus noctu faltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Visus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Visus dimidiatus.

CCXLVI. DYSECOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS

Auditus abolitus a salita oppositionaismon mini

CCXLVIII. A NOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS

Gustus abolitus, in regal anadealag ibastions changes and

ASAPHIA. CCL:

Vocis obscuritas. Oupo organi antilioadmi antiv

CLANGOR. CCLI.

Vox acuta cum stridore.

RAUCITAS. CCLII.

Vox aspera et obscura, quae vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest. A T D A R A T A D XIXXXXXXX

CCLIII. O APHONIA.

Vocis privatio. 218 4 NI MY

LEPTOPHONIA. CCLIV.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu;

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CONEVIII.

CCLVIII. TRAULOTIS, Blacsitas.

Vitiosa literarum s et r pronunciatio.

PSELLOTIS, Balbuties. CCLIX.

Cum inter pronunciandum aut litera aut syllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA:

Vitium pronunciationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

CCLXI.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo sermo praecipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oscitatio cum artuum extensione.

CCLXV. APNOEA.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse vi-

CCLXVI. MACROPNOEA.

Respiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNOEA.

Respirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, Catarrhus suffocatious.

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, f. Stertor.

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, f. Ronchus.

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido; tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

ASPHYXIA. CCLXXV.

Abolitio pulsus.

CCLXXVI. A P E P S I A.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficilisque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

ANOREXIA:

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. A N A T R O P E.

Inappetentia nauseabunda. CCLXXX.

ADIPSIA; CCLXXXI.

Sitis defectus.

CCLXXXII, ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. A G E N E S I A.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

COUNTRY HERO CHINOS, C. Francisco

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHESES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis aversatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA:

Perceptio corporum ante oculos obversantium, quae non adsunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se repraesentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corrufcans.

CCXCI. DYSOPIA.

Visus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA,

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA,

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA:

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA:

Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente?

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitraria;

CCC. MALACIA,

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Cerci cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehemens deside?

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute;

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum?

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum subnigro cutis colore : urina de nativo statu haud decedente.

CCCVIII,

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et hectica.

CCCIX. T A B E S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea et tussi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica; dyspnoea; et tussi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae intra pectus; strepitum concussione intus facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphysium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumescentia, aquosa, mollis, digiti impressi vestigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. A S C I T E S.

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquosus, cum atro? phia superiorum partium.

Abdomen impulsum sonum collectae permotaeque intus

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops faccatus pleurae, peritonaei, aut visceris abdo-

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obstipatione et atrophia.

CCCXVII,

* In atrophia sola pinguedo absumitur, nec aeque restituitur; in tabe et phthisi caro simul minuitur.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et ulceribus faucium partiumque obscoenarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPRA Graecorum, f. Psora.

Pertinacissima scabies totius corporis vel partis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis surfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, f. Lepra Arabum.

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, faniem foetidama

crustosam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA Arabum.

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, f. Rhopalofis.

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo possint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis longa, a magnitudine habituve visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra uterum.

CCCXXVII,

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars fensum motum et innatum calorem tota amisit, sitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverofa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. DELIRIUM, Paraphrosyne:

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda, Carpologia ejus est species.

CCCXXXI. MANIA.

Infania longa, ridicula aut furibunda. Furorem uterinum et satyriasin pro speciebus habeo.

CCCXXXII. · MELANCHOLIA.

Infania longa cum moestitia ac timore. Nostalgia ejus species est.

CCCXXXIII, ECSTASIS.

Infania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS:

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur? si qua viderint audiverintve. Lafammanio dolorinea in fumminare digitorum.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, Morosis, Fatuitas.

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, Anoia.

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. Pavor ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo affurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. INFLAMMATIONES.

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter turnet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. Zoster dicitur, si abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in fummitate digitorum.

CCCXLVI.

CCCXLVI: ONYCHIA:

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerfo.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

CCCXLVIII. PHIMOSIS. nels ni onomyold

Inflammatio aut oedematodes, tumor praeputii, quo gians nudari non potest.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

The color of I. TUMORES. wo me alwayed T

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore; ovi faltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum mag

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pusturales circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, quo excidente ulcus cavum sordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

CCCLXVE

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam fubstantiam conversio.

CCCLV. AONYX.

Abscessus inter corneae laminas.

CCCLVI. HYPOPYON.

Abscessus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abscessus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum sebre hectica, praegressa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA:

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethle minor, planior, minusque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute subito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, sugacissima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, sugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis fine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apostematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida; paireiran conflorammanni ni eaffello

CCCLV

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA:

Collum tumidum:

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumescentia abdominis subita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, livefcens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumorifve specie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA:

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus species Ficus et Thymus a figura ita dictae.

Q 2

CCCLXXIX:

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini insidens.

CCCLXXX. RANULA, Batrachus.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum et subrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorfum eminens

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subtercalvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA bifida.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus verrebrarum dehiscentibus processibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem confistente?

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus!

over hear or Thurse a figure its di

CCCLXXXIX. HYDROPS, Scrott.

Tumor tunicae scroti cellulosae aquosus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumescentia pinguedinosa, graviditatem men-

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumescentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aere cellulos sum cutis habitum ingresso formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Intestimi recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso

CCCC. ENTEROCELE, Ovalaris.

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in superiori et interna femoris parte prope perinaeum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatum intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per musculi obliqui annulum, sub qua urina nonnisi presso exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis; renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipfo illo, post pastum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita;

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in offe circumscriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius offis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor offis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus. Atheroma, Steatoma, Testudo, Talpa, Meliceris ejus species.

CCCCXXI. STAPHYLOMA,

Protuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea difrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. EXTUBERANTIE*.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel pensile. Unde species Achrochordon, Acrothymium, Myrmaecium.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obscoenis mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, f. Tylloma.

1. Obdurata fumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae fine sensu est, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumescentia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra

CCCCXXXII. PINNULA.

Excrescentia corneae tunicae inhaerescens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excrescentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.

CCCCXXXIV.

^{*} Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, Crithe!

Tuberculum calidum in abscessum fere desinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

CCCCXXXVI. VARUS, Ionthos.

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callofum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA Rofacea.

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Asperitas quaedam et durities mali coloris in facie,

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

J. Jacob

IV. PUSTULÆ et PAPULÆ.

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut sabae magnitudine, circa quam vehemens inslammatio et dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Pustula substavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manisesto dolens. In capite Psydracium vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, Serpigo.

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens.

Purpura scorbutica, quam vocant, verissima serpigo est.

CCCCXLIV. SCABIES.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam sicciores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. HYDROA, Boa, Sudamina.

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine rubore et sine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens; contagiosa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Pustula fimilis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Pustula pruriens, seminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, Phlyzacion.

Pustula ab ustione contracta.

OCCOMEN.

V. M. A. C. U. L. A.

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a sanguine per cutem quasi effuso livida vel nigra. Illa Pelioma, haec Melasma speciatim dicitur.

M

Parpara feedunier , summ vocant, verifica ferrige ell.

CCCCXXXXXX

PETECHIÆ. CCCCLII.

Maculae pulicum morsui similes, magnitudine et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

MORBILLI. CCCCLIII.

Maculae acutae, rubellae, latescentes, es plerumque confluentes, inque squamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatae, in febre acutal UM

CCCCLV. LENTIGO. LENTIGO

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum et in manibus emergens.

URTICARIA. CCCCLVI.

Maculae subtumidae, rubentes, prurientes, sugaces.

CCCCLVII. STIGMA,

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. COMPONIE X. I IN SOCIETY OF THE COMPONIE AND ADDRESS OF THE COMPONIE AND AD

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (Alphos) aut nigra (Melas).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini similes pili.

OICYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, Impetigo.

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine. CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in unquelnoo a amo so esholisto omdoma

CCCCLXXVE

132 GENERA MORBORUM

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. DISSOLUTIONES.

1. Apospasmata.

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica; cum effluxu fanguinis. . . mean everibagaider on soroimt saluati.

RUPTURA. CCCCLXVI.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa; cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA:

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem?

CCCCLXX. PLICATIO.

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam?

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depressa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio offis ex articulo suo perfecta!

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab offe paulum recedit, eaque inter se dehiscunt

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio. mo took study aligned aligned aligned

CCCCLXXV. ATTRITIO, Ethlimma:

Dissolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI.

CCCCLXXVI. PORRIGO, Pityriafis.

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas,

CCCCLXXVII. A POSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio. PAH9 HIVXXXJOODO

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS!

Offis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manisestam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio. The se suimed de mes shown and

CCCCXCVIE.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crustam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA,

Unguis destructio et casus.

2. Exulcerationes. 210st ai 2910st A

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callosis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrescit, atque mollis et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excrescit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, angustum, callosum.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in offe cum substantiae et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

CCCCXCIV. A CHORES.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA lattea.

Achores in facie.

CCCCEXXXVII.

CCCCXCVI. FAVUS, Cerion.

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

E A

TINEA CCCCXCVII.

Ulcus capitis, quod denfissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

ÆGILOPS. CCCCXCIX.

Anchilops in ulcus conversum.

OZÆNA. D.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat. APHTHÆ. DI.

Ulcera oris aut pudendorum, superficiaria, mucosa.

INTERTRIGO. DII.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris vel urinae acrimonia.

RHACOSIS. DIII.

Excoriatio scroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. Vicient Sylveniaris palpebrae, il mar pa

Pupillae concretio.

DACRYOMA. DVI.

Punctorum lacrymalium coalitus.
VII. ANCYLOGLOSSUM. DVII.

Linguae concretio cum partibus subjectis, loquelam, suctum; deglutitionemque impediens.
VIII. ANCYLOSIS.

DVIII.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur. DIX

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. Leucoma in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Ejus species Cyphosis, Lordosis, Scoliosis, et Seisis.

DXIII. CAPUT obstipum.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil om-

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur; sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum,

DXX:

DXX:

RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et sordes, quae in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, Labium leporinum; Divifum semel vel bis labium.

MALACOSTEON. DXXIII.

Offium mollities.

HIRSUTIES. DXXIV.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

CANITIES. DXXV.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quali pulvere sint conspersi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo graviore convalescentibus evenit. Sacissimos muo ciagurios and DXLHL

DXXIX. ALOPECIA

Pilorum defluvium, aream relinquens. Ophiasis ejus species; item Calvities et Pelada.

MADAROSIS. DXXX.

Ciliorum defluvium. 9 270090130 VIXO

DXXXI. De don PTILOSIS, monben mubeq to

Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

RODATIO. DXXXII.

Ciliorum decurtatio.

planum.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

COLOBOMA: DXXXIV.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit:

DXXXVII. GRYPOSIS.
Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

POLYSARCIA:

Corpulentia excedens.

ISCHNOTIS. DXLI.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis?

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrfum versa. In manalist murolist

DXXXIII

VALGUS. of Parising of Man DXLIV.

Cui crura extrorsum distorta. A TAM

LEIOPODES, Plancus, Plantus. DXLV.

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum, sed Madem cum duritie callota palpebrarum, munalq

RODATIO.

DLIX

DXLVI.

APELLA:AD

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat. A I O M

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.dd

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa effluit.

XLIX. ATRETA.

DXLIX.

Cujus anus aut naturalia occlufa.

DL. More SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu est angustus. ibroo iqyloq , sobia byd

DLI STE CE LE SORCHIS . STE SORCHIS SE LE SE LE

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

HERMAPHRODITUS. DLII.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae offeae, quasi cornua, nascuntur.

ARTETISCUS. DLIV.

Qui membri alicujus defectum patitur.

NEFRENDIS. DLV.

Oui dentibus caret.

SPANOPOGON. DLVI.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX.

5 2

PARS

DLIX.

GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenira. alla conice maisaquera ino

DLX. MOLA: asympton mon mobinsin au

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec filentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta; quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, musculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vasorum, positura viscerum perversa, bullae aereae in venis et pulmenum superficie, aneurismata aortae, angustiae praeternaturales vasorum et ductuum, ipsorumque concretiones.

DIONYSISCUS.

Oni prope tempora duae eminentiae offeae, quafi cornuz,

Oui viciofa naturalium conformatio, ita ut utitufque fexas

ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum paritur.

DLV. NEFRENDIS DIS CERCE.

Qui dentibus cerce.

SPANOPOGONE TOTAL

Qui raram habet barbam; et cui e mento pili excidunti DLVII. HYPERARTERISCUS,

GALIANCON.

S &

Qui brachium altero brevius. .-

IVIXE

PARS QUARTA.

GENERA MORBORUM PRÆCIPUA

DEFINITA.

ADDITIS

Ex SAUVAGESIO SPECIEBUS,

ET IN MEDIOREM ORDINEM REDACTIS.

A

GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1771,

PARS QUARTA.

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

GENERA MORBORUM

PRECIPUA

Some single DEFINITA.

ADDITIS

Ex SAUVAGESIO SPECIEBUS,

ET. IN MEDIOREM ORDINEM REDACTIS.

A

GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1771,

SERIES

CLASSIUM et ORDINUM. CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO I. FEBRES.

II. PHLEGMASIÆ.

III. EXANTHEMATA.

IV. HÆMORRHAGIÆ.

V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATA.

II. ADYNAMIÆ.

III. SPASMI.

IV. VESANIÆ,

CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES.

II, INTUMESCENTIÆ.

III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

O.I. DYSÆSTHESIÆ,

II. DYSCINESIÆ.

III, APOCENOSES,

IV. EPISCHESES.

V. TUMORES.

VI. ECTOPIÆ.

VII, DIALYSES,

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles auctorum.

ORDOI. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitaris signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres auctorum S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II. Morbi critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes.

Intermittentes auctorum S. Cl. II. O. III. L. Cl. II. O. II. V. Cl. I. O. I.

Remittentes auctorum S. Cl. II. O. II.

Exacerbantes L. CL. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II.

Continuae periodicae Sennert. de febr. Lib. II. cap. 13.

Continuae remittentes, Boerb. 727.

Compositae ex acuta periodo, Junck. Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, Torti. Therap. spec. L. V. cap. I.

Continentes Mortoni, Exerc. II.

1 13

Nota. Continentem scholarum nutlam effe putamus.

GENUS I. TERTIANA.

Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter ho-

Tertiana

Tertiana auctorum, S. G. 88. L. 16. V. 2. Hoffm. Tom. II. pag. 11. Stabl. de tertiana febris genium universum imanisestante, Halae 1706. Ejusd. Casual. magn. Cas. 21. Casual. min. Cas. 96. Cleghorn's diseases of Minorca, chap. III. Senac de recond. febr. natura.

TERTIANA eft vel ? , susmitimed - obusiq anismidamA

- I. Interposita apyrexia, quae a simula apprecia allamos M
- 1. Variat paroxysmi duratione.
- A. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

 Tertiana legitima, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. II. cap. 18.

 Tertiana vera, Clegh. Min. p. 140.
- B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

 Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. Sennert. de febr. L. II. c, 18.

 Clegh. Min. p. 140.
- C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus, al-

Tertiana duplex, S. sp. 13. Sennert. de sebr. L. II. c. 21. V. G. 12. Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. Jones de febr. interm. P. II. cap. 6. River. Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis, altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. Clegh. Min. p. 142. Semitertiana Hoffm. II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis Galeni, Spig. de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertiana quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus notabili.

T

Haemitritaeus, Celsi L. III. cap. 3. Semitertiana, Clegh. Minorc. p. 143. Semitertiana fecundi ordinis, Galeni Spig. L. II. c. 5. Amphimerina hemitritaeus, S. fp. 8. 10 and M. 10 and M. 10 Amphimerina pseudo - hemitritaeus, S. sp. 9. 10 AMAITATT

- N. Fortassis hemitritaea omnis ad remittentes relegari debet, sed affines separare nolui. 15 Variat paroxylini decarione.
- 3. Variat symptomatibus of and buad analyzone sagnest .A
- G. Tertiana affectibus soporosis stipata.

Tertiana carotica, S. sp. 10. Werlhof. de febribus et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertiana hemiplegica, S. sp. 20. Werlhof. ibid.

Quotidiana foporosa, S. sp. 8. Car. Pif. obs. 175. 176.

H. Tertiana spasmis et motibus convulsivis stipata. Tertiana afthmatica, S. sp. 6. Bonet. Polyalth. Vol. I. p. 250? Tertiana hysterica, S. sp. 8. Wedelii A. N. C. Dec. I. A. II. obs. 1932 Hysteria febricosa, S. sp. 8.

Tertiana epileptica, S. sp. 16. Calderae Trib. med. p. 225. Lautter. Histor. med. bienn. Cap. II. cas. 2. Duplicana L. 18.

Quot. epileptica, S. sp. 3. Edinb. Eslays, Vol. V. P. 2. art. 49. Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Ecclampfia febricofa, S. sp. 17.

Tertiana tetanodes Medici Beobacht. I. Band. p. 24,

Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

Tetanus febricofus, S. fp. vo. anomovou sibrioup ansisto T . I

II. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

Tertiana petechialis, S. Sp. 3. M. Donati, L. III. Cap. 14. Lantter. hift, med. Cap. II. caf. 10.

Tertiana scorbutica, Wedel. A. N. C. Dec. I. A. H. Obs. 193.

Tertiana urticata, S. sp. 22. Planchon, journ. de med. 1765. Clegh. Minore parsyllactions and store store and

Tertiana miliaris, S., sp. 21. Walibiers de med. German. apud Roncalli Europ. med. p. 151.

K. Ter-

K. Tertiana phlegmafia stipata.

Tertiana pleuritica, S. sp. 4. Valesii in epid. L. 1. Sect. 3. Lautt. hist. med. cap. H. cas. 5.9.

Tertiana arthritica, S. sp. 5. Morton. Exerc. I. cap. IX. hist. 22.

Lautt. l. c. cas. 19.

4. Variat aliis morbis complicata.

Tertiana scorbutica, S. sp. 9. Etmuller. prax. L. I. Sect. XVI. cap. 2. Timaei L. VIII. cas. 15.

Tertiana syphilitica, S. sp. 17. Deidier de morb. ven. Sect. IV.

Tertiana verminosa, S. sp. 18. Stisser. in act. Helmstad. Van den Bosch. const. epid. verminos. ann. 1760, &c. Lancisi de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6. Illust. Bringle diseases of the army, p. 98. Ramazzini const. epidem. rural. ann. 1690, Sect. XI.

N. De typo febris federariae Loven

coal epich en ippus descriptione non lique

Tertiana a scabie S. sp. 11. Juncker. tab. 80. Hoffm. II. p. 12.

II. Interposita remissione tantum.

Tritaeophya, S. G. 85.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

-201

Tertianae remittentes et continuae Auctorum.

Tertianae remittentes variant, adeo cum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem etiam homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil quod perpetuum sit efferri possit. Varietatum itaque characteres non tentavi, et synonyma auctorum tantum hic apponere decrevi.

Tertiana perniciosa quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis et mille accidentibus periculosissimis implicata existit. Mercat. de febr. L. VI.

Tertiana pestilens, P. Sal. Divers. de febri pestilent. cap. X.

Tertiana maligna pestilens River. L. XVII. Sect. III. cap. I. et Sect. III. cap. 3.

Tertiana folitaria, Tort. Therap. spec. L. III. c. 1.

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae, Tort. ib.

Tertiana subcontinua, S. sp. 19.

Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.

Amphimerina femiquintana, S. sp. 24.

Tritaeophya deceptiva, S. sp. 10.

Tertiana comitata, Tort. loc. cit.

- a. Tertiana cholerica sive dysenterica, Tort. ibid. Lautter. hist. med. eas. 6. 16. 17. 20. Morton. app. ad Exerc. II.
- b. Tertiana subcruenta sive atrabilaris, Tort. Ibid. Cleghornio nunquam visa.
- c. Tertiana cardiaca Tort. ibid. Lautter. Hist. med. cas. 15, 18. 23.
 Amphimerina cardiaca, S. sp. 5.
- d. Tertiana diaphoretica, Tort. ibid.
 Tritaeophya typhodes, S. sp. 4.
 Tritaeophya elodes, S. sp. 5.
- N. De typo febris sudatoriae Boyeri Meth. à suivre dans les mal. épid. ex ipsius descriptione non liquet; et ad typhum potius referrem.
 - e. Tertiana syncopalis Tort. ibid. Lautter. cas. 11. 12. 13. 15. 16.

 Tritaeophya syncopalis, S. sp. 1.

 Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.

 Amphimerina humorosa, S. sp. 6.
 - f. Tertiana algida, Tort. ibid. Lauter. cas. 13.

 Amphimerina phricodes, S. sp. 7.

 Amphimerina epiala, S. sp. 3.

 Tritaeophya leipyria, S. sp. 9.

 Tertiana leipyria, S. sp. 23. Valcarengi med. ration. p. 18.
 - g. Tertiana lethargica, Torti ibid.

 Tritaeophya carotica, S. sp. 7. Lautter. 1. 7. 14.

 Tertiana apoplectica, Morton Ex. I. c. IX. hist. 25.

Tertiana soporosa, Werlhof. de febr. p. 6.

Febris epidemica Urbevetana Lancisi de noxiis pal. effluv. 1. II. cap. 3.

N. Hactenus fere ad ductum experientiss. Torti, sed sequentia etiam apponenda sunt.

Amphimerina fingultuosa, S. sp. 14.

Tritaeophya affodes, S. sp. 6.

Tritaeophya typhodes Mangeti, S. sp. 11. Raym. Fort. de febribus, pag. 24. Tritaeophya caufus, Hipp. S. sp. 2.

Febris ardens, Boerb. 738.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Morbus Hungaricus Lang. Lemb. L. 1. ep. 4. Sennert. de febr. L. IV. cap. 14. Jordan. de pest. phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus, Cober. obs. castr. Hungar. dec. 1. obs. 6. &c. Vide postea N. ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, Schenck obs. L. VI. ex Corn. Gemma.

Febres pestilentes Ægyptiorum, Alpin. de med. Ægypt. L. 1. cap. 14. Febris tertiana epidemia, Bartholin. hift. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, Willis de febr. cap. 16.

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664, et postea ab ann. 1- 1673 ad 1691. Mort. app. ad Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, Sydenh. de morb. acut. ad ann. 1661 - 1664, et in epist. ad H. Paman ad 1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, Fr. Sylvii prax. med. app. tract. X. et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemius Leidensis, Fanois Dist. apud Haller. Disp. tom. V. Tertianae perniciosae et pestilentes et sebres castrenses epidemiae Lancist de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, Hoffm. II. p. 38. Febris cholerica minus acuta, Hoffm. II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. Koker apud Haller. Difp. tom. V.

Amphimerina paludofa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. Pringle Diseases of the army, Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Amphimerina biliofa, S. fp. 22.

Febris Castrensis, Illustr. Pringle loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, Huxham de aere ad ann. 1729.

Febris biliofa Laufannensis, Cl. Tiffot de febr. biliof.

Tritaeophya Wratislaviensis, S. sp. 3. De Hahn Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritaeophya Americana, S. sp. 12.

Febris anomala Batava, Grainger de febr. anomala.

Morbus Naronianus Pujati de morb. Naron.

Febris continua remittens, Hillary's des. of Barbadoes.

Febris remittens Indiae Orientalis, Lind. med. Edin. Diff. inaug. 1768.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, Rouppe de morb. navig. Febris remittens regionum calidarum, Cl. Lind. med. Haflar. Effay on the diseases of hot climates.

N. Tertiana remittens symptomatica est. Tritaeophya lactea, S. sp. 8. Febris lactea, Etmulleri Coll. consult. Cas. 57.

G. II. QUARTANA.

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter ho-Febres Autumnales incipientes, Befond die gerale alemmutus.

Quartana auctorum S. G. 89. L. 17. V. 3. Hoffm. II. p. 23. Junck. Allectus epidemicus Leidenus, Ir. Syfrif pesti rad. 18. dat. II. Eft vel, vel, cario de afficiere carriel de la serie de contro se

- I. Interposita apyrexia.
- 1. Variat typo.
- Lauret de pox palue, effice, i A. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; alus diebus nullis. 11 p. 11 p. at sudah

Quartana legitima, S. sp. 1. Sydenham de morb. ac. cap. V.

B. Quar-

B. Quartana paroxysmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. sp. 4. Bonet.

C. Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus; interme-

Quartana triplicata, S. fp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet paroxyfmis quarto quoque die fimilibus.

Quartana duplex, S. sp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana triplex, S. Sp. 5. V. 14. Barthol. H. anat. c. 1. 95.

2. Variat symptomatibus.

Quartana cataleptica, S. sp. 7. Bonet. Polyalth. vol. 1. p. 805.

Quartana comatosa, S. sp. 15. Werlhof. de febr. C. Pisonis observ. de morbis a colluvie seros. obs. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173.

Tetartophya (plenalgica S. fo. a.

Quartana epileptica, S. sp. 8. Scholzii Cons. 379. 380.

Quartana hysterica, S. sp. 10. Morton. Pyret. Exerc. I. cap. IX. H.

Quartana nephralgica, S. Sp. 9. Activity and Ill and the second

Quartana metastatica, S. sp. 17. Acces s que de construit

Quartana amens, S. sp. 12. Sydenham de morb. ac. cap. V.

Quartana splenetica, S. sp. 2. Etmuller. Coll. consult. cas. 25.

3. Variat aliis morbis complicata. A morella de accumped

ACCESSES A

Quartana fyphilitica, S. sp. 6. Plateri obs. L. III. p. 676. Edinb. Est. art. XLVII. ob. 8.

Quartana arthritica, S. sp. 11. Musgr. de arthr. sympt. cap. IX. H. 4. et 5.

Quartana scorbutica, S, sp. 14. Barthol. de med. Dan. diss. IV. Tim.

II. Interpolita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. L. 22.

Quartana remittens Auctorum.

Tetartophya simplex, S. sp. r.

N. Quartana continua Joeli septuagenario nunquam visa est. Franc. Joelis op. tom. V. and the round of the contract of

Quartena depătetta, S.

Variat lymptomanbus.

Amphimerina semiquartana. S. sp. 23.

Tetartophya semitertiana, S. sp. 5.

Tetartophya maligna, S. sp. 6. Lautter. hist. med. caf. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex M. Gatenaria. Horst. L. 1. obf. 15.

Tetartophya carotica, S. sp.4. Werlhof. de febr. Bianchi hist. hep. pars III. conft. ann. 1718. p. 751.

Tetartophya splenalgica, S. sp. 2.

Species funt, 184 Aller of the state of the factor of the state of the

N. Neque febris Ferneliana Raym. Fort. neque febris qua mortuus est Fernelius ex genere remittentium fuere.

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. Car. Pif. in praefat. p. 33.

Ad tertianam vel quartanam ERRATICAS, S. pertinere putamus, et hic ideo earum varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. Tulp. L. III. 52. Forest. L. III. obs. 43. ex quartana III. Van Swieten Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. Boerb. apud Ill. Van Swieten ibid. M. Don. Quertans amens, S. Ip. 12. Sydenbete de morb. 141. III. J.

Septimana, Ill. Morgag. XLIX. 36. 1100 and to the artis of the Vice

Erratica octana, S. sp. 3. Etmuller prax. L. I. Sect. XV. cap. 2. Cyrilli in Etmuller, p. 187. 188. 365. Valles. Controv. L. V. c. 25. P. Sal. Div. in not. ad D. A. de Altomari, cap. XII. Zacut. Luf. P. M. L. III. obs. 34. Schultzius in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. Quadraca feedbucies, S. fp. 14. Berthel, de n ed. Dan. 07. do

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

al, inter

Erratica nonana, S. sp. 4. Zac. Lus. ibid.

Erratica decimana, S. sp. 5. Zacut. Lus. ibid.

Ephemera dichomene, S. sp. 11. M. Don. L. III. 14. ex Gentili. Erratica vaga S. sp. 6. River. cent. III. obs. 32. Etmuller L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter hora-

Quotidiana Austorum, S. G. 87. L. 15. V. 1. Hoffm. II. 33. Junch. tab. 79.

- I. Interposita apyrexia.
- 1. Variat folitaria.
- A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens?

Quotidiana fimplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, Sennert. de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. sp. 10. Cnoffel. E. N. C. D. I. A. III, obs. 205. Edinb. Med. Ess. vol. I. art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. Morton Pyret. Exerc. I. Hist. 27. Van Swieten in Boerh. p. 534.

Cephalalgia intermittens, S. sp. 7.

Cephalaea febricosa, S. sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, Morton ibid. Hist. 16. Van Swiet. ibid.

2. Variat comitata.

Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. Edinb. Ess. vol. V. art. 49. Ischias intermittens, S. sp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. Morton ibid. Hift. 28.

Nephralgia febricofa, S. sp. 13.

Quotidiana uretico sputatoria, B. Scharf. E. N. C. D. II. A. II. obs. 104.

Quotidiana epileptica, S. sp. 4. Edinb. Ess. loc. cit. Hysteralgia sebricosa, S. sp. 9.

N. Vespertinae symptomaticae videntur sequentes

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae Auctorum.

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, Etmuller Coll. cons. cas. 32. River. obs. cent. I. obs. 57.

Amphimerinae, S. Caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginofa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De amphimerina mimosa Bontii, et phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ.

Febres, fine intermissione, simul sine remissione vel exacerbatione notabili, perstantes.

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. Boerb. 727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. Stabl. Cas. magn. 35. Cas. min. 87. Junck. 58. Sennert. de febr. L. II. cap. 2. et 10.

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

Syno-

Synocha, S. G. 80. L. 12. Junck. 58.

Synocha sive febris acuta sanguinea, Hoffm. II. 105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, Boerh. 729.

Ephemera, S. G. 79. Boerh. 728. Junck. 57.

Diaria , L. 11.

Febris inflammatoria Austorum,

Species funt.

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha sanguinea, Sennert. de febr. L. II. cap. 11.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica Ann. 1765. Sydenh. fect. V. c. I. 5.

Synochus rheumatisans, S. sp. 7. Sydenb. sect. V. c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. Sydenb. in P. S. ad tractat. de hy-drope.

Symptomaticae sunt.

Ephemera nauseativa, S. sp. 2.

Ephemerae phlogofi, &c. S. sp. 6.

Synocha dolorum, S. fp. 7.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus fcorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. fp. 8.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; sensorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82,

N. Syno-

N. Synonyma potius quam varietates sunt sequentia:

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatofus, S. sp. 3.

Febris pestilens, Fracastor. de morb. contag. L. II. cap. 4.

Febris pestilens sine charactere veneni, Forest. L. VI. obs. 26.

Febris maligna hectica, sive lues veuçudns convulsiva, Willis de morb. convulsiv. cap. 8.

Febris hectica pestilens, Forest. L. VI. obs. 32.

Febris nova, ann. 1685, Sydenham. Sched. monitor.

Febris putrida nervosa, Wintringham. Comm. Nosol. ann. 1720.

Febris lenta nervosa, Huxham on fevers, chap. 8.

Febris catarrhalis maligna petechizans, Junck.72. Hoffm. II. 75. Eller. de cogn. et cur. morb. sect. VI.

Febris petechizans Germanorum. Weitbrecht. apud Haller Disput. pract. tom. V.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis, Huxham de aere ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, Huxham de aere; ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum, Ill. Pringle Diseases of the Argmy, p. 294. Ill. Van Swieten Maladies des armées, p. 136.

Febris contagiofa, Lind on fevers and infection passim.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. Willis de febr. cap. 14.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant.

Henr. Maii, et A. Ph. Kopff Dist. apud Haller tom. V.

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742. Scrinci apud Haller Disp. tom. V.

Febris Hungarica castrensis, Junck. 74. et plurium auctorum.

N. Morbum sive febrem Hungaricam ad tertianas remittentes cum Sauvagesio et Ill. Pringle supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat, febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum suisse, (Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quaest. 39.) et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibusvis saepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Febris pestilens Ægyptiorum Alpin. de med. Ægypt. L. I. cap. 14: Febris pestilens, P. Salii Diversi.

Febris pestilens maligna, Sennert. de febr. L. IV. cap. 10.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant Fracastor, de morb. contag. L. II. cap. 6.

Febris petechialis, Sennert. L. IV. cap. 13. River. Prax. L. XVI. fect. III. cap. I. Hoffm. II. p.84. Junck.73. Huxham on fevers, chap. 8. Ludwig. Inft. med. clin. No. 146. Monro diseases of military hofpitals, pag. 1.

Febris petechialis epidemica Coloniae, ann. 1672. Donckers idea febris petechialis.

Febris petechialis epid. Posonii 1683. C. F. Loeu in app. A. N. C. vol. II.

Febris petech. epid. Mutinae 1692. et seq. Ramazzin. Const. Mutinens. Febris maligna petechizans, Ann. 1698. Hoffm. 11.80.

Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann. 1708, 1718, et seq. Roger's essay on epidemic diseases.

Febris continua epidemica Corcagiensis, ann. 1719, et seq. M. o Connel de morb. obs.

Febris petechialis epidemica Cremonae 1734. Valcarenghi Med. ra-

Febris petechialis Ann. 1740 et 1741. in Hassia. Ritter A. N. C. vol. VII. Obs. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii, 1741. Furstenau ibid. Obs. 5. Febris petech. epid. Silesiae 1741, et seq. Brandhorst apud Haller. Disp. tom. V.

Febris petech. epid. Viennae 1757. Hasenohrl Hist. med. cap. 2. Febris petech. epid. Lipsiae 1757. Ludwig. Adversar.

Febris petech. epid. variis Germaniae locis, ab ann. 1755 ad 1761. Strack de morbo cum petechiis.

N. Typhus revera specierum plurium esse videtur, quarum una petechialis dici potest, et ad quam synonyma omnia jam recensita pertinere videntur: Altera vero omnino diversa est.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae occidentalis, Warren Malign. fever of Barbadoes. Hillary's Difeafes of Barbadoes. Linning Edinb. phys. liter. effays, vol. II. Mackittrick de febre flava Indiae occidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam species esse videtur.

Ephemera sudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, Caius de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, Sennert. L. IV. cap. 15.

Hydronosus, Forest. L. VI. obs. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris fudatoria, S. fp. e.

Febris sudatoria, La Suette Gallorum, Meyserey Meth. aisée, &c. Ejusd. Maladies des Armées 250. Boyer Methode à suivre dans les maladies épidemiques.

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhauftorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9. nobis non liquet.

G. VI. SYNOCHUS.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha et Typho composita, initio synocha, progressu et versus sinem typhus. Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, Boerh. 730.

Inter eyphum et synochum limites accuratos ponere vix possumus, et utri eorum synonyma auctorum referenda sunt saepe dubium est. Sez quentes fortasse Sauvagesii species ad synochum referri possunt.

Synochus fanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. Sydenh. de morb. acut. Synochus sudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. Sydenham. ibid. Synochus soporosa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. Sydenham. ibid.

Febris continua putrida annor. variorum, Wintringham Com. No-

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

De synocho variolode, S. sp. 3.

Synocha dysenteriode, S. sp. 4.

nobis non fatis liquet, et minus adhuc de

Synocho anniversaria, S. sp. 9.

Synocho spermatica, S. sp. 10.,

Synocho tarantata, S. sp. 11.

Complicata eft,

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

et symptomatica est.

Synochus a scabie, S. sp. 15.

N. Hectica, S. G. 83. semper symptomatica esse videtur; et in plerisque saltem ita se habere ex sequentibus Sauvage-sii speciebus satis manifestum siet. Vide Sauvagesii scholium; p. 319.

Hectica chlorotica, S. sp. 3.

Hectica syphilitica, S. sp. 4.

Hectica scrophulosa, S. sp. 5.

Hectica a calculis, S. sp. 6.

Hectica hydropum, S. sp. 7.

Hectica verminosa, S. sp. 9.

Hectica cachectarum, S. sp. 10.

Hectica fluxuum, S. fp. 11.

Hectica infantilis, S. sp. 1. charactere caret, et nobis vel rachitica vel scrophulosa vel verminosa videtur.

Hectica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hectica lymphatica, Baglivi, S. sp. 12. et

Hectica nervea, Cl. Lorry, S. sp. 13. nobis non liquet.

O. II. PHLEGMASIÆ.

Pyrexia; phlegmone, vel dolor topicus simul laesa partis internae sunctione; sanguis missus, et jam concretus superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae, S. Cl. III. O. I. II. Morbi sebriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuae compositae inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, Boerh. 770.

Febres inflammatoriae, Hoffm. II. 105. Junck. 61.

G. VII. PHLEGMONE.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tensio dolens: Species I. Phlegmone rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, saepe in apostema abeunte; dolore saepe pulsatili.

Phlegmone Auctorum, S. G. 15. L. 39. V. 351. Inflammatio, L. 241. Beerh. 370. Junck. 20.

v. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.

Papula , L. 275.

Varus , V. 4 6.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 4.7.

Achor, L. 264. V. 494.

Crusta lactea, V. 495.

2. Variat sede.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148

Dolor otalgicus, Hoffm. 11. 336.

Parulis, V. 362.

Maftodynia, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocace. S. G. 78. L. 256.

Paedarthrocace, V. 419.

Spina ventosa, Boerb. 526.

Phimofis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunesia, V. 167.

N. Sunt fortassis aliae inter locales recensendae.

SP. 2. Phlegmone colore rubicundo, ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctaenas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.

Erysipelas Auctorum, V. 342.

Hieropyr, V. 344.

de Idios

minimize thecies or verientes fi

I. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353. Erythema gangraenosum, S. sp. 7. Carbo et carbunculus Auctorum.

2. Variat causa remota.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Combustura, L. 245.

Encausis, V. 347.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Eryfipelas ambustio, S. sp. 4.

Combustio , Boerh. 476.

Erylipelas fymptomaticum, S. sp. 6.

Erysipelas Chinense, S. sp. 7.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erylipelas a vespis, S. sp. 10.

Psydracia a vespis, S. sp. 2.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema paratrima, S. fp. 6.

Phlegmones sequelae sunt,

APOSTEMA, S. G. 3. 9.

Abscessus, L. 232. V. 354. Boerh. 387. 402.

Puffula, L. 274.

GANGRÆNA, S. G. 314. L. 233. V. 327. Boerb. 388. 419.

SPHACELUS, L. 234. V. 328. Boerb. 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. Junck. 24

Chemosis, V. 46.

COV 13

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatio oculorum, Hoffm. II. 165.

Ophthalmiae species et varietates sunt.

- I. Idiopathicae.
- 1. In tunica adnata et ei subjacentibus membranis sive tunicis oculi.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.

Ophthalmia humida, S. sp. 8.

Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.

Ophthalmia choroeideae, S. sp. 13.

Ophthalmia Eryfipelatofa, S. fp. 7.

Ophthalmia puftulofa, S. sp. 6.

Ophthalmia phlyctaenodes, S. sp. 21.

2. In limbo palpebrarum.

Ophthalmia tuberculofa, S. sp. 3.

Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.

Ophthalmia ficca, S. sp. 5.

3. In cantho majori.

Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

- II. Symptomaticae.
- 3. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.

Ophthalmia tenebricofa, S. sp. 10.

Ophthalmia cancrofa, S. sp. 15.

Ophthalmia a fynechia, S. fp. 16.

Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.

Ophthalmia ab elcomate, S. fp. 18.

Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.

Ophthalmia a corneae fiftula, S. sp. 20.

Ophthalmia uveae, S. sp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metaftatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia fyphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricofa, S. sp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia acuta; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; luz cis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. G. 101. L. 25. Boerh. 771. Hoffm. II. 131. Junck. 63. Phrenifmus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109.

Sphacelismus, L. 32.

Phrenitides funt,

I. Idiopathicae.

Phrenitis vera, S. sp. I. Boerh. 771.

Phrenitis idiopathica, Junck. 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis firialis, S. sp. 4.

Siriafis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis fynochi fanguineae, S. sp. 4.

Phrenitis calentura, S. sp. 11.

Phrenitis Indica, sp. 12.

Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1500, S. sp. 6.

Cephalitis verminosa, S. sp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis apyreta, S. sp. 10.

Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.

Phrenitis variolosa, S. sp. 5.

Phrenitis morbillofa, S. sp. 6.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.

Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.

Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.

Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche' S. G. 110. L. 33.

Angina , V. 49. Hoffm. II. 125. Junck. 30.

Angina inflammatoria, Boerh. 798.

Sp. I. Cynanche membranam faucium mucosam; et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum sebre synocha.

Cynanche tonfillaris, S. sp. 1.

Anginae inflammatoriae, sp. 5. Boerh. 805.

SP. 2. Cynanche tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albestentis vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.

Cynanche ulcerosa, S. Var. a. Journ. de Med. 1758.

Cynanche gangraenosa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.

Scarlatina anginofa, 1765, S. sp. 6.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia. Hispanis Garrotillo, Lud. Mercat. consult. 24.

Angina ulcerofa, Cl. Fothergill account of the ulcerous fore throat Ed. 1751, Huxham on the malignant ulcerous fore throat from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, Douglas Practical history, Boston 1736.

Angina epidemica, Russel Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, Withering's Diff. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, Bard's Inquiry, New-York, 1771.

Sp. 3. Cynanche respiratione difficili, inspiratione strepente voce, rauca, tussi clangosa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et sebre synocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea Auctorum, Eller. de cogn. et curand. morb. Sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. Boerb. 801.

Angina latens et difficilis, Dodon. obs. 18.

Angina interna, Tulp. L. 1. obs. 51.

Angina perniciosa, Greg. Horst. observ. L. III. obs. 1.

N. An haec Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad nostrum characterem manifesto pertinere videntur.

Suffocatio firidula, Scotis the Croup. Cl. Home on the Croup.

Ashma infantum, Millar on the ashma and chincough.

Ashma infantum spasmodicum, Rush Differtation, London 1770.

Cynanche stridula, Crauford, Diff. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. Molloy apud Rutty's history of the weather.

Morbus strangulatorius, Starr Phil. trans. No. 495.

Morbus truculentus infantum, Francof. ad Viadrum et in vicinia graffans, ann. 1758. C. a Bergen, A. nova N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, Russel Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadensis, ann. 1758. Hilary's Barbadoes, p. 134.

Sp. 4. Cynanche cum rubore in imis praesertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima; respiratione satis commoda et sebre synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. Eller de cogn. et cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta. Boerh. 804.

Sp. 5. Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarium glandularum magno; respiratione et deglutitione parum laesis; sebre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidaea, S. sp. 14. Gallis oreillons et ourles, Tisso. Avis au peuple, No. 116. Encyclopédie mot Oreillons.

Angina externa, Anglis the Mumps, Russel, Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks.

Catarrhus Bellinfulanus, S. sp. 4.

N. Cynanche purpuro parotidaea, S. sp. 15, ad malignam, S. sp. 3. pertinere videtur.

N. Anginae symptomaticae sunt,

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12,

Febris anginosa, Huxham de aere.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. fp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.

Plourisis

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 17.

N. Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est, et vix hujus loci.

G. XI. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia; pectoris sub sterno vel inter scapulas dolor obtusus; anxietas; spirandi difficultas; tussis plerumque humida, saepe cruenta; pulsus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. Boerh. 820. Junck. 67. Febris pneumonica, Hoffm. II. 136.

I. Idiopathicae fimplices.

Peripneumonia pura, S. sp. 1.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha Sydenb. Sect. VI. c. 4. Boerb. 867. Morgagn. de sed. et caus. Ep. XXI. art. 11.-15.

Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. Morgagn. de sed. et caus. Ep. XX. art. 30. 31.

II. Complicatae fynocho vel typho.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

Perippeumonia typhodes, S. sp. 5.

III. Symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Perippeumonia phthisicorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

G. XII. PLEURITIS.

Pyrexia; dolor lateris pungens; inspiratio dolens; decubitus, plerumque in latus affectum, molestus; tussis dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. Boerh. 875. Junck. 67. Paraphrenesis et paraphrenitis, S. G. 102. L. 26. V. 55. Boerh. 907. Febris pneumonica, Hoffm. II. 136.

I. Idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. Boerh. 875. Verna princeps morb. acut. pleuritis, L. I. cap. 2. 3. Zeviani della parapleuritide, cap. 3. Morgag. de sed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45. Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. Zevian. della parapleur. III. 28. &c. Pleuripneumonia, pleuroperipneumonia, peripneumopleuritis. Baronius de pleuripneumonia III. Halleri opuscul. patholog. obs. 13. Morgagn. de sed. et caus. Epis. XX. et XXI. passim. Clegborn Minorca, p. 247. Triller de pleuritide, Aph. 1. 2. 3. cap. II. 2-8. Huxham Diff. on pleurifies, &c. chap. I. III. Pringle Dif. of the army, p. 147.

Pleuritis dorfalis, S. sp. 3. Verna pleur. P. III. cap. 8. Mediastina, V. 52. P. Sal. Div. de affect. part. cap. 6. Pleuritis pericardii, S. sp. 4. Verna pleur. P. III. cap. 9. De inflammatione diaphragmatis, mediastini, et pericardii. Vid. Morgagni de sed. et caus. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. Van Swieten Comm. ad Boerh. 913.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. De Haen Rat. med. I. 7. Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. Bianchi Hist. hep. vol. 1. p. 234. Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. Morg. de sed. et caus. XX. 34. Parapleuritis, Zeviani della parapleuritide. Pleurodyne parapleuritis, S. sp. 19.

II. Complicatae.

1. Synocho vel Typho.

Pleuritis biliofa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatosa, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, Bianchi Hist. hep. vol. I. p. 236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9. Wanglag ; allauponal colling ; allan

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

Empyema chaplaragmatic, S. Ic. A

Empyema intercoffele, S.

Carditio, S. G. 111. V. 54.

Pelicardida, V. 53.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20. Pleuritis periodica, S. sp. 14. Vide tertianam pleuriticam. Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10. Pleuritis lympathica, Bianchi Hift. hep. I. p. 233.

III. Symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminosa, S. sp. 8. Verna pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. 11. Morgagn. de sed. et caus. XXI. 43. 44.

Pleuritis stomachalis, Bianchi Hist. hep. I. pag. 232.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. fp. 17.

Pleuritis Polonica, S. fp. 18. Pleading dorfeling, S. fp. 3. Verna plein, P. Hil. cap

IV. Falfae.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. Panarol. Pentac. I. obs. 37. Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Peripneumoniae et pleuritidis sequelae sunt.

VOMICA, L. 180. V. 104.

Pleurodyne vomica, S. fp. 21.

EMPYEMA, S. G. 157. L. 159. Boerh. 1183.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediastini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6. . on and love odooned at

CARDITIS. G. XIII.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

Pericarditis, V. 53.

Desgith pefillens, 8, fp. 16. I. IdioI. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. Senac Traité du Cœur. L. IV. chap. 7. Meckel Mem. de Berlin. 1756.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. sp. 2. Senac ibid. chap. 6.

PERITONITIS. G. XIV.

Pyrexia; dolor abdominis corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Peritonitis, V. 62. Lieutaud Hist. anat. med. L. r. obs. 3. Raygerus apud eund. L. 1. obs. 341. Morgagn. de sed. LVII. 20.

Epiploitis, S. G. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, Boerh. 958. et Ill. Van Swieten Comm. Stork. Ann. med. I. 132.

Mesenteritis, V. 60.

Engentis cougas S. fo. 2, Breils, 96 Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

Myocoilitis, V. 63.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus. lam et fummum humeri

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, Boerb. 951.

Febris stomachica inflammatoria, Hoffm. II. 120.

- I. Idiopathicae.
- 1. A causis internis.

Gastritis legitima, S. sp. 1. Eller. de cogn. et cur. morb. Sect. XI. Haller. obs. 14. hist. 3. Lieut. Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatosa, S. sp. 4.

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. Tralles de opio, sect. II. p. 231.

Y 2

Surveyor freezes funds ! !

2. A

y, Meckel Mem. de Berlin, 1776.

I Idionachical

Il. Symptomatota.

Ann. med. 1. 132.

Melentenus, V. 60.

Myocollitie; V. 63.

z, A causs internis.

P. 23 I.

Galhitis erylipelatola, S. sp. 4.

2. A causis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

ENTERITIS. G. XVI.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adstricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57.

Intestinorum inslammatio, Boerh. 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio, Hoffm. II. 170.

Omeni inflammatio, Boers, 958. et Ill. Van Sw. sprintequille. I

Enteritis Iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. Boerh. 963.

Symptomaticae.

II. Symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.8 . ql. 2 esineluslum siringali

HEPATITIS. G. XVII.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. Boerh. 914. Hoffm. II. 14. Junck. 66. I. Idiopathicae.

Sauvagefii species sunt,

Hepatitis eryfipelatofa, S. fp. 1.

Hepatitis pleuritica, S. sp. 2. Bianchi Hist. hep. tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12.

Hepatitis cyflica, S. fp. 4.

2. A

Hepatitis obscura, S. sp. 3. 41 .2 canonamani siglaibia

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

Hepatitis suppurans, S. sp. 6.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

SPLENITIS. G. XVIII.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. Junck. 67.

Lienis inflammatio, Boerh. 958. et Ill. Van Swieten Comm.

Una tantum species recensetur

Splenitis phlegmonodea, S. Forest. L. XX. obs. 5. 6. De Haen apud Pleuritis splenica, S. sp. 19. Van Swieten, p. 958.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

NEPHRITIS. G. XIX.

Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

I. Idiopathica. Spontanea. Nephritis vera, S. sp. 1.

WadniA.

Nephritis calculofa, S. fp. 2.

Nephralgia calculofa, S. sp. 1.

Nephralgia arenofa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7. Spa . O . complorus !!

Nephralgia arthritica, S. sp. 3. 1878 Area amugi aimmel

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; micio frequens dolori-I dropathroad. fica vel ischuria; tenesmus.

Cyftiris, S. G. 108. L. 31. V. 66. Inflammatio vesicae, Hoffm. II. 157.

nuum aruculos, infelians.

Helmas, S. G. 21g.

I. A causis internis; the sale of the sale of the sale of the

Cyftitis spontanea, S. sp. 1.

II. A causis externis.

Cyftitis a cantharidibus, S. sp. 2. Cystitis traumatica, S. sp. 3. Pressia : hopochondra finales

G. XXI.

HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. G. 107.

Inflammatio et febris uterina, Hoffm. II. 156.

Species funt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. Boerb. 1490. Junck. 19.

Neglinaleja purulente; S. dp. 7.

Menhralgia architica, S. 19. 8.

fica vel ifchuis tenefmus.

Dolores rheumatici et arthritici, Hoffm. II. 317.

Lumbago, S. G. 212.

Ischias, S. G. 213.

Pleurodyne, S. G. 148.

Pleuritis spuria, Boerh. 878.

Odontalgia sive rheumatismus odontalgicus, Hoffm. II. 330.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. Junck. 25.

I. Idiopathicae.

Rheumatismus acutus, S. sp. 1. 1. 1301 . D. 3 enitivo

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

Rheumatismus arthriticus, S. sp. 3.

Arthri-

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Lumbago rheumatica, S. sp. 1.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. Fordyce Pract. of phys. P. II. p. 70.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

Ischias rheumaticum, S. sp. 10.

Ischias sanguineum, S. sp. 2.

Lumbago a nisu, S. sp. 10.

Ischias a subluxatione, S. sp. 9.

Pleurodyne rheumatica, S. sp. 3.

Odontalgia cariosa, S. sp. 1.

Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.

Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Arrinida

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4. Lumbago scorbutica, S. sp. 11. Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11. Rheumatismus calidus, S. sp. 5. Rheumatismus metallicus, S. sp. 10. Rheumatismus necroseos, S. sp. 14. Rheumatismus convulsivus, S. sp. 15. Rheumatismus hystericus, S. sp. 7. Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8. Rheumatismus verminosus, S. sp. 8. a. Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11. Rheumatismus sugax, S. sp. 13. Rheumatismus febricosus, S. sp. 9. Arthritis febricosa, S. sp. 20. a. Pleurodyne febricofa, S. sp. 15. Lumbago febrilis, S. sp. 4. Rheumatismus miliaris, S. sp. 12; Lumbago miliaris, S. sp. 9. Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

ARTHRITIS. G. XXIII.

Morbus sine causa externa evidente, sed praeeunte plerumque ventriculi affectione infolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi et internarum partium affectionibus alternans. 0, 5, 10, 5.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139.

Febris podagrica, V. 69.

Podagra, V. 175. Boerh. 1254.

Dolores arthritici, Hoffm. II. 317.

Dolor podagricus et arthriticus verus, Hoffm. II. 339.

Affectus spastico - arthritici , Junck. 46.

Ex mente Sauvagesii species unica est,

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Variat autem,

- 1. Pro tempore anni. Arthritis hiemalis, S. sp. 2. Arthritis aestiva, S. sp. 4.
- Pro causa remota. Arthritis rheumatica, S. Sp. 3. Arthritis febrisequa, S. sp. 10. Arthritis febricola, S. sp. 10. a. Arthritis rachialgica, S. sp. 11. Arthritis exanthematica, S. sp. 12. Arthritis Americana, S. sp. 14. Arthritis Bahamensis, S. sp. 15.
- Abenmeridinus miliarie, & fo. en. 3. Variat complicata. Arthritis chlorotica, S. sp. s. Arthritis melancholica, S. sp. 6. Arthritis scorbutica, S. sp. 7.

Arthritis

Lumbago milimis, S. fp. 9.

Arthritis fyphilitica, S. sp. 8.

Arthritis asthmatica, S. sp. 9.

Arthritis rachitica, S. sp. 13.

O. III. EXANTHEMATA:

Post febrem phlegmasia, plerumque phlegmonae plures exi-

Phlegmafiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXIV. ERYSIPELAS.

Synocha unius vel duorum dierum.

In cutis aliqua parte, saepius in facie, erythema, G. VII. Sp. 2. Erysipelas, S. G. 97. L. 10. Febris erysipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98.

Sp. 1. Eryfipelas vesiculosum.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. II. c. 15.

Febris erysipelatosa, Sydenham Sect. VI. cap. 5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2.

Erysipelas pestilens, S. sp. 5.

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

Sp. 2. Erysipelas phlyctzenodes. And much armus ai is

Zona, Anglis, The Shingles, Russel de tabe gland. p.124. Hist. 35. Herpes Zoster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Solas V

Eryfipelas a veneno, S. sp. 3.

N. Caeterae Sauvagesii species ad erythema pertinent!

G. XXV. PESTIS.

Typhus maxime contagiofa.

Incerto morbi die eruptio bubonum vel anthracum?

Variolan kemalaran diki etaus

Pestis, S. G. 91. L. 2. Junck. 78.
Febris pestilentialis, V. 33. Hoffm. II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Massiliensis Class. 3. Traité de la peste, pag. 41. Ejusdem pestis, Cl. 5ta, Traité p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2. Traité p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traité p. 225. &c. Chenot de Peste Transylvanica 1755-1757. de Haen Rat. med. part. 14.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. Alpin. de med. Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Massil. Cl. 1. Traité, p. 37. 224.

Species dubiae sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Peftis Siamaea, S. Sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

G. XXVI. VARIOLA:

Synocha contagiosa cum vomitu, et ex epigastrio presso dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, spatio octo dierum, in suppurationem et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas sive foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3.

Febris variolosa, V. 35. Hoffm. II. 49.

Variolae, Boerb. 1371. Junck. 76.

Variat,

I. Discreta. Survey of the of the manner of the server of

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolae regulares discretae, Sydenb. Sect. III. cap. 2.

Variolae discretae simplices, Helvet. obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. Helvet. sp. 2.

Vario-

Variolae anomalae, Sydenh. Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. Sydenh. Sect. IV. Cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, Mead de variol. cap. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. Mead ibid.

Variola discreta siliquosa, S. sp. 7. Freind Oper. p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. Helvet. obs. sp. 3.

2. Confluens.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. Sydenb. Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, Helves. obs. sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, Kempfer.

Vesiculae Divae Barbarae, C. Pif. obs. 149. potius ad pemphigum pertinent.

Variola confluens maligna, Helvet. obs. sp. 1.

Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, Helvet. fp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12. Sydenb. Sect. V. cap. 4.

Variola confluens maligna, Helvet. sp. 3.

Variola fanguinea, Mead de variolis, cap. 2.

Variola confluens corymbola, S. sp. 13.

Variola confluens maligna, Helvet. sp. 4.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 2.

Variola lymphatica, S. sp. 1. Anglis the Chicken pox. Heberden in Med. tranf. art. 17.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca rauca.

Quarto die vel paulo serius erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4.
Febris morbillofa, V. 36. Hoffm. II. 62.
Morbilli, Junck. 76.
Species funt,

Morbilli regulares, Sydenb. Sect. IV. cap. 5.
Rubeola anomala, S. sp. 2.
Morbilli anomali, Sydenb. Sect. V. cap. 3.
Rubeola anginosa, S. sp. 4. Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.

2. Rubeola variolodes, S. sp. 3. Scotis, The Nirles.

G. XXIX. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctionibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, difcretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas albas brevi manentes ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, Hoffm. II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, Junck. 75. Hamilton de sebr. miliar. 1710. Fantonus de sebr. mil. 1747. Allioni de miliar. 1758. Fordyce de sebr. mil. 1748. Fischer de sebr. mil. 1767. De Haen de divis. sebr. 1760, et in Ratio. med. passim. Matt. Collin ad Baladinger de miliar. 1764.

1. Idio

I. Idiopathica.

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. f.

II. Symptomaticae.

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris lactea, S. sp. c.

Miliaris puerperarum, S. sp. k.

Miliaris scorbutica, S. sp. 1.

Miliaris critica, S. sp. b.

G. XXX. SCARLATINA:

Synocha contagiofa.

Quarto morbi die facies aliquantum tumens, simul in cute passim rubor sloridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas surfuraceas abiens.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. Junck. 75.

Species unica est.

Scarlatina febris, S. Sp. 1. Sydenh. Sect. VI. cap. 2.

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. vide Cynanche, sp. 2.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh. Sect. VI. cap. 6. et scarllatina variolode, S. sp. 5. nobis non liquet.

G. XXXI. URTICARIA.

Febris amphemerina contagiofa.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu sere evanescentes, vespere cum sebre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeuntes.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, Junck. 75. Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Eryfipelatis species altera, Sydenb. Sect. VI. cap. 6.

Febris scarlatina et febris urticata, Meyserey Mal. des armées, 291. et seq.

G. XXXII. PEMPHIGUS.

Typhus contagiofa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. G. 93.

Morta, L. I.

Febris bullofa, V. 41.

Species sunt,

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata serosa, C. Pison obs. 150.

Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A. VIII. obs. 56.

Pemphigus castrensis, S. sp. 2.

Febris syneches cum vesiculis per pectus et collum sparsis, Morton app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. Langhans in act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in Beschreibung des Siementhals, Zurich 1753. An eynanche ulcerosa?

'An pemphigus omnis symptomaticus?

De pemphigo Indico, S. sp. 4. et

Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

G. XXXIII. APHTHA.

Synochus.

Lingua tumidiuscula; linguae et saucium color purpurascens; escharae in saucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae,

ali-

0

aliquando discretae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. Boerb. 978. Hoffm. II. 478. Junck. 137. Febris aphthofa, V. 44.

Species funt,

Aphtha lactucimen, S. sp. v.

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

Manifesto symptomaticae

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

N. Exanthema symptomaticum est.

Purpura, S. G. 96.

Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. Hoffm. II. 194. Junck. 5. Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I.

G. XXXIV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio fanguinis e naribus.

no vila praiodica , S. lp. 5. Rechlar

Epistaxis, V. 82.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173.

Haemorthagia narium, Hoffm. II. 196. Junck. 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. Hoffm. 11. 198.

II. Symptomaticae.

A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. Hoffm. II. 198.

Haemorrhagia insalubris, S. sp. 5. Hoffm. ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemorrhagia a hirodine, S. sp. 7.

G. XXXV. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiae aut doloris et aliquando caloris in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem sloridum saepe spumosum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. Junck. 8. Haemoptoe, Boerh. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Hoffm. II. 202.

I. Idiopathicae.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis a diapedesi, S. sp. 3.

Haemoptysis phthisica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

Haemoptysis a sphacelo pulmonum, S. sp. 11.

II. Symptomaticae. q room isise tanivary low rolob animal

3. A causis internis.

Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Haemoptysis peripneumonica.

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4. Pechlin. obs. 43.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5. Pechlin. ibid.

Haemoptysis variolosa, S. sp. 7. Sydenb. Sect. III. cap. 2.

Haemoptysis ascitica, S. sp. 15.

Haemoptysis splenetica, S. sp. 16.

4. A causis externis.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1. Morton Phthis. L. III. cap. 5. Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

III. Spuriae.

Haemoptysis scorbutica, S. sp. 6.

Haemoptysis Helvigiana, S. sp. 17.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haemoptyseos sequela.

PHTHISIS, S. G. 276. L. 208. V. 310. Junck. 33.

Phthisis pulmonalis, Boerh. 1196.

Affectio phthifica five tabes pulmonalis, Hoffm. III. 284.

I. Primariae, S. Originariae, Morton Phthisiolog. L. II.
Phthisis sicca, S. sp. 1. Phth. incipiens, Morton L. II. c. 3.
Phthisis humida, S. sp. 2.

II. Secundariae, S. Symptomaticae, Morton L. III.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Pththisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthifis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp.20. De Haen Rat. med. Ed. Leid. vol. 1. cap. 7.11.

Phthisis a febribus, S. sp. 13.

Phthisis ametastasi puris, S. sp. 9.

Phthisis afthmatica, S. sp. 5.

Phthisis rheumatico-arthritica, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15. Schacht. de phthisi icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis fyphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

Cachexig

G. XXXVI. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia e quibus plerumque profluit fanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoid , S. G. 217. L. 192. Haemorrhoid fluxus, Hoffm. 219. Haemorrhoides, Junck. 11. & 12. Leucorrhois, V. 112.

Sp. 1. Haemorrhois a mariscis.

Variat,

A. Cruenta,

Haemorrhoides ordinatae, Junck. 11.

Haemorrhoides immodica, S. sp. 2.

Haemorrhoides nimiae, Junck. 11.

Haemorrhoides excedentes Alberti de haemorrh. pag. 179.

Haemorrhois polyposa, S. sp. 3.

B. Mucofa.

Haemorrhoides decoloratae albae et mucidae, Junck. 13. Alberti, de haemorrhoid. pag. 248.

Sp. 2. Haemorrhois ab exania, S. sp. 4:

An haec species ad morbos locales periinet?

G. XXXVII. MENORRHAGIA:

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar dolores; menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina praeter ordinem sluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Uteri haemorrhagia, Hoffm. II. 224.

Haemorrhagia uterina, Junck. 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119.

Cachexia

Cachexia uterina five fluor albus, Hoffm. III. 348. Fluor albus, Junck. 133.

Abortus, S. G. 245. L. 204. Junck. 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, Boerh. 1303.

Convulsio uteri sive abortus, Hoffm. III. 176.

Menorrhagia est,

- I. Cruenta.
- Sine vitio locali.
- A. In non gravidis nec puerperis.

Menor hagia immodica, S. sp. 2. Pasta Consid. sopra menst. cap. 12. 13.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 1.

B. In gravidis.

> Menorrhagia gravidarum, S. Sp. 6. Pasta intorno al fluss. di sang. dall uter. nelle gravide.

> > O. V. PROE

Abortus effluxio, sp. 1.

- a. Abortus subtrimestris.
- b. Abortus subsemestris.
- c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

C. In puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. sp. S. Pasta sopra gli sgravi sanguigni del parto. A vitio locali.

Menorrhagia ab hysteroptosi, S. sp. 5. Menorrhagia ulcerofa, S. sp. 9. 20 W. St. D. & continued

Serofa. 11.

N. Gonda

Rheuman S. G. 142 Taffi , S. C. 143. E. 176 U Menorrhagia decolor, S. sp. 7. Leucorrhoea S. ut supra et species sunt.

- 1. Sine vitio locali.
- A. In non gravidis.

 Leucorrhoea Americana, S. sp. s.

 Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.
- B. In gravidis,

 Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.

 Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.
- 2. A vitio locali.

 Leucorrhoea ulcerofa, S. sp. 1.

 Leucorrhoea fungosa, S. sp. 2.

 Leucorrhoea cancrosa, S. sp. 4.

 Leucorrhoea schirrodes, S. sp. 7.

 Leucorrhoea syphilitica, S. sp. 3.
- N. Haemorrhagiae symptomaticae sunt;
 Stomacace, S. G. 241. L. 175. V. 85.
 Haematemesis, S. G. 242. L. 184. V. 89.
 Haematuria, S. G. 243. L. 198. V. 92.
 Cystirrhagia, V. 93.

O. V. PROFLUVIA:

Pyrexia cum excretione aucta naturaliter non fanguinea.
G. XXXVIII. CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98.

Coryza, L. 174. V. 100.

Rheuma, S. G. 142. Tussis, S. G. 142. L. 155. V. 205. Junck. 30.

Tussis catarrhalis et rheumatica, Hossin, III. 109.

Menorrheela cft.

N. Genera sequentia ad hunc titulum plerumque referenda symptomatica funt.

Anacatharsis, S. G. 262.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoreus, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. Salmuth. obs. cent. 1. 37. Junck. 28. Morgagn. de sed. XIV. 21.

Rangerus in Ephem. Genh. D.

1670 Judenis, Ep. relp. ad R. Bra

Coryza febricofa, S. sp. 6.

Tuffis catarrhalis, S. sp. 1. N. Rosen Diff. apud Haller. disput. pract, tom. II. Mongagui de fed. et cauf.

Rheuma catarrhale, S. fp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina tufficulosa, S. sp. 13.

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Anni 1387. Valescus de Taranta.

Marchesi apud Morg. de sed. XIII. 4.

1510. Valleriola append. ad loc. comm. cap. 2.

1557. Valleriola, ibid. I domino de la composición del composición de la composición

ADDE

Riverii Obs. in biblioth. vet. repert. obs. IX. Foresti L. VI. into et Zubenbusler de febr. caterfinis. in ido Faller, Dity.

1580. Haenischius in Aretaeum, pag. 315. 396. Wieri Obf. L. II. M. A. ...

P. Sal. Diversus de febre pestilenti, cap. XI.

Aa 3

Foreflus;

Cerrolus.

Forestus, L. VI. obs. 3.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repertae, obs. X.

Sennertus de sebr. L. IV. cap. 17.

Anni 1591. Sennertus, ibid.

1658. Willis de febribus, cap. 16.

1675. Sydenham Sect. V. cap. 5.

Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A. VI. et VII. obs. 213.

Maucedo, L. 146.

20d. med. Gall. A. I. Decemb. obf. 6.

1708. Schroeckius in Ephem. Germ. Cent. I. et II. in append.

1709. Hoffm. 11.47.

1712. Camerarius in Ephem. Germ. Cent. III. & IV. obs. 58. Schroeckius ibid. in append.

1729. et 1730. Hoffm. II. 109.

C. Fr. Loew in append. ad A. N. C. vol. III.

Scheuchzer Obf. meteorol. in app. ad A. N. C. vol. IV.

Morgagni de sed. et caus. XIII. 3. 4.

Hillary on Weather and diseases, pag. 35.

Winteringham Comm. Nosolog. p. 319.

Rutty's Hist. of weather, pag. 17.

Edinb. Med. Ess. vol. II. art. 2.

Hillary of weather, &c. pag. 47.

Winteringham Comm. Nosolog. pag. 354.

Huxham de aere, &c. 1733. M. Febr.

Rutty's hist. of weather, pag. 30.

Octob. Rutty ibid. pag. 63. Lange Month of the Julio. Comm. lit. Norimb. 1737. p. 347.

Tuch et Zuberbuhler de febr. catarihali apud Haller. Disp. pract. tom. V.

Huxham de aere 1743. M. April.

Rutty Hift. of weather, p. 99.

8 2 12

Anni 1758. Rutty fibid. pag. 211. Whytt Lond. Med. Obf. Vol. II. art. 13.

1762. Baker de catarrho, Lond. 1764. Monro Dis. of mil. hosp. pag. 137.

Dylenseria cathentia, S. fp. 7. Ram

L'ylenceria carnola, 5. 1p. 16.

1767. Heberden Med. trans. art. 18.

N. Inter catarrhi coryzae et tussis species symptomaticae sunt:

Catarrhus rubcolosus, S. sp. 5.

Tussis exanthematica, S. sp. 20.

Coryza variolofa, S. sp. 4.

Coryza virulenta, S. sp. 3.

Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tuffis accidentalis, S. sp. 4.

- Tuffis gutturalis, S. sp. 8.

Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.

Tussis verminosa, S. sp. 21.

Tussis sicca, S. sp. 3.

Tussis calculosa, S. sp. 22.

Tuffis phthifica, S. sp. 17.

Tussis haemoptoica, S. sp. 15.

Tuffis a polypo, S. sp. 16.

Tussis a dentitione, S. sp. 12.

Tussis stomachalis humida, S. sp. 6.

Tuffis stomachalis ficca, S. sp. 7.

Tuffis hyflerica, S. sp. 2.

Tussis gravidarum, S. sp. 14.

Tuffis hepatica, S. sp. 9.

Tussis rheumatica, S. sp. 18.

Tuffis arthritica, S. fp. 19.

Tussis metallicolarum, S. sp. 13.

der and the speed of the season of the season

G. XXXIX. DYSENTERIA. bid and see

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, mucosae; vel fanguinolentae, retentis plerumque socibus alvinis; tormina; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. Hoffm. III. 151. Junck. 76.

I. Idiopathicae.

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. Sydenham Sect. IV. cap. 3. Helwich. in hist. morb. Wratislav. ad ann. 1699. Degner. de Dysenteria Neomagensi 1736. Huxham de aere, &c. ad ann. 1743. Clegborn's Minorca, chap. V. Grimm. hist. dysenteriae malign. 1759. &c. in append. ad A. nov. N. C. Vol. III. Baker de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. Akenside de dysenteria, Lond. 1762. Stark Hist. et sectiones dysenteric. diss. inaug. L. B. 1766. Zimmerman von der Ruhr.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. Ramazzini de morb. artisic. cap. 40. Illustr. Pringle Dis. of the army, pag. 224. Cl. Monro Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. Bont. de med. Ind. cap. 3.

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. Huxbam de aere, &c. ad ann. 1743. m. Maio. Ill. Pringle pag. 225. Monro pag. 62.

Dysenteria carnosa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnofa, S. sp. 5. Wedelius Ephem. Germ. D. II. A. II. obs. 182. Wagner ibid. D. II. A. III. obs. 187. cum scholio Schroeckii. Morgagn. de sed. Ep. XXXI. 17—24. Ill. Pringle, pag. 237. Monro pag. 62.

Dysenteria miliaris, S. sp. 20.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. Morton in append. ad Exerc. II. Cleghorn's Minorca, pag. 236. Lautter. hist. med. bienn. cas. 17. 20.

Dysenteria alba, S. sp. 10. Willis Pharm. rat. P. I. Sect. III. cap. 3. Sydenbam Ed. Leid. pag. 179. Morgagn. de sed. Ep. XXXI. 11. Ill. Pringle, pag. 225. Cl. Monro pag. 61. Roederer de morbo mucoso, Gotting. 1762.

II. Sympto-

N. All hoc genus permient ve

Caslepfis, S. G. 176. L. 32

Echalis, S. G. 177. V. 333.

Idiopathicae.

Typhomania, S. G. 178 L.

Carus Ipontageus, S. fp. r. Borrb, 10

II. Symptomaticae.

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1. Haemombagia cerebri s In

Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.

Dyfenteria gravidarum, S. sp. 4.

Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.

Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.

Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.

Dysenteria Polonica, S. sp. 19.

Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.

N. Ad diarrhoeam pertinent.

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

CL. II. NEUROSES.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia et sine morbo locali.

O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore sive sensuum feriatione. Courphora corna , S. fp. 2.

Comata, S. Cl. VI. O. II.

Soporofi, L. Cl. VI. O. II.

Nervorum resolutiones, Hoffm. III. 194.

Affectus soporofi, Hoffm. III. 209.

Motuum vitalium defectus, Junck. 114.

APOPLEXIA G. XL.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum sopore plus mi-Af bysia fufpenforum, S. fp. 4. nus profundo.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. Boerh. 1007. Junck. 117. Wepfer. Hist. apoplecticorum, and a solutionale malle stand

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. Boerh. 1045.

Bb

Cata-

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. Boerh. 1048. Coma, V. 232. Boerb. 1048. Haemorrhagia cerebri, Hoffm. II. 240.

- N. Ad hoc genus pertinent vel symptomatica sunt. Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Boerh. 1036. Junck. 44. Affectus cerebri spasmodico ecstaticus, Hoffm. III. 44. Ecstasis, S. G. 177. V. 333. Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23. Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22.
- Idiopathicae. I.
- A causis internis. 3.

Apoplexia fanguinea, S. sp. 1. Morg. de sed. Ep. II. III. LX. Carus spontaneus, S. sp. 1. Boerh. 1045.

Asphyxia spinalis, S. sp. 15. Du Hamel Hist. Acad. ad ann. 1688. cap. 2. Boerh. Praelect. ad Inft. 401. Morg. de sed. III. 3.

Apopl. polyposa, S sp. 11. Boerh. 1010. 2. Morg. de sed. IV. 23. Apopl. pituitosa, S. sp. 7. Apopl. serosa Morg. de sed. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora fomnolenta, S. sp. 1.

Cataphora coma, S. sp. 2.

Le hargus literatorum, S. sp. 7. Van Swieten in Aph. 1010. 2. y et 3. a

Apoplexia atrabilaria, S. sp. 12. Preylinger. sp. 6. Asphyxia flatulenta, S. sp. 12. Morg. de sed. V. 17--30. Afphyxia caraleptica, S. sp. 6.

A causis externis.

Apoplexia traumatica, S. Sp. 2. Cirus traumaticus, S. fp. 5. mint animo oros immanilos acrold Asphyxia suspensorum, S. sp. 4.

Carus a pathemate, S. Sp. 11. 101 . St. D. 3 , sixologo A. Ecftasis cataleptica, S. sp. 3.

SHORE.

Cana vericiologe , S. fp. 8.

Carus hyltericus, S. fp. 9.

Carus nydagmus, S. fp. ry.

Alphysia hyflerica, S. fp. S.

Apoplexia architica, S. Ip.

Carus authiticus, S. fp. 6.

Cataphora arthritica, S. fp. 4.

Lethregus activitions, S. fp.

Apoplexia verminofa, S. fg.

Carus verminofus, S. sp. 7.

Lechargus cephaliticus , S. 10. 1. Ecstasis resoluta, S. sp. 2. Afphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3. d al 2 e missassem sixsloogA Carus a narcoticis, S. sp. 14.31 Al Registrated annual Carus a plumbagine, S. fp. 10. 2 commentary modernia Lethargus a narcoticis, S. sp. 3. Cataphora fiorbusions, S. Sp. 3. Cataphora chronica, S. sp. 7. Apoplexia mephitica, S. sp. 14. Afphyxia a mephitide, S. sp. 9, 10 2 . S. spinoty isology Catalepsis a sumo, S. sp. 3. Carus hypochondriacus s. S. f Asphyxia a fumis, S. sp. 2. Asphyxia a carbone, S. sp. 16. Caralegiis hyfferica, S. Ip. E. Asphyxia a musto, S. sp. 3. Cataleplis delirans, S. Sp. 6, Afphyxia foricariorum, S. sp. 11

Afphyxia fideratorum, S. fp. 10.0 at .2 apingslasso sixydolA

Carus ab infolatione, S. sp. 12.

Apoplexia epileptica, S. fp. 8. Carus a frigore, S. sp. 15. Apoplexia fulpiriola, S. fp. 1 Lethargus a frigore, S. sp. 6. Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9. Carus febricofus, S. sp. 3. Cataphora timor, S. sp. 8. Typhomania febricofa, S. fp. 1. Catalepsis quartanaria, S. sp. 7.

Typhomania verminofa, S. fp. 4 Carus febrilis, S. sp. 2. Caralogue verminole, S. fp. 2. Typhomania continua, S. sp. 2. Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3. Lethargus a febre, S. sp. 1.

Apople-

Medalia refoluta, S. Ip. 2.

Aerhargus a rercoticis, S.

Alphysia a mephidde , S.

Carus a frigore, S. sp. 15.

Symptomaticae,

Lethargus a frigore, S. fp. Alphysia congelatorum, S. fp

Corus febriculus, S. 19.9.

Cataphora timor, S. fp. 8.

Carus febrilis, S. Sp. 2.

Tychomania agrypnocoma, S. fp. 3.

Bb 2

Apoplexia inflammatoria, S. sp. 13. Lethargus cephaliticus, S. sp. 4. Lethargus pulmonicus, S. sp. 2. Carus variolofus, S. sp. 8. Carus exanthematicus, S. sp. 18. 11 . d & elastrosism s en co Cataphora exanthematica, S. fp. 5. 1 . 3 . smigrdmule a sund

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

Apoplesia mephitica , S. fp. Apoplexia hyfterica, S. sp. 4. Carus hystericus, S. sp. 9. Cataleplis a fumn, S. sp. q Carus hypochondriacus, S. sp. 13: Carus nystagmus, S. sp. 17. Catalepsis hysterica, S. sp. 1. Catalepsis delirans, S. sp. 6. Afghyria foricationmy 5 fp. 11 Afphyxia hyfterica, S. sp. 8. Asphyxia cataleptica, S. sp. 6. or of the managed the Catalepsis a menostasia, S. sp. 4. Carna ab infolatione, S. fp.

Apoplexia epileptica, S. sp. 8. Apoplexia suspiriosa, S. sp. 10.

Apoplexia arthritica, S. sp. 5. Carus arthriticus, S. sp. 6. Cataphora arthritica, S. sp. 4. Lethargus arthriticus, S. sp. 5.

Apoplexia verminosa, S. sp. 15. of . 2 elocated sinsared T Carus verminosus, S. sp. 7. 17. ql & airsantrapp wilgolated Typhomania verminosa, S. sp. 4. Catalepsis verminosa, S. sp. 2. Typhomania continua, S. fg. 2.

> Lethergus a febre, S. fp. r. e que a G. XLI.

II. Symptomaticae.

Paralylis biliofa, S. Ip. 9.

Paralylis Polonica, S. Ip. 7. Tremor Afturientis, S. fp.

Paralyfis febrilis, S. fp. 8.

Tremor typhodes; S. fp. 19,

Tremos vertiginostis, S. fp. 7.

G. XLI.

PARALYSIS. 2 . efficient compart

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, saepe cum sopore.

Paralysis , Boerb. 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. Paralylis transmitted, Soup. 4.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227. Q. 91 & collemnati significant

Paralysis, S. G. 169. L. 104. V. 226. Junck. 115.

Atonia, L. 120.

Tremor, S. G. 129. L. 131. V. 184.

Beriberia, S. G. 137. L. 140.

I. Idiopathicae.

Tremor theuroadhadis, S. (p. 18)

Paraplexia fanguinea, S. sp. 2.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7. 1 2 communa significanti

Hemiplegia ferofa, S. sp. 10.

Paraplegia a spina bisida, S. sp. 3.

Tremor a hydrocephalo, S. fp. 8.

Tremor paralytodes, S. fp. 11. 2 . d . 2 . alaladyoud sulyland

Hemiplegia apostematodes, S. sp. 11. estolutional significant

Femirelegia Tynniktical, S. fal Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12.

Hemiplegia spasmodica, S. sp. 2.

Hemiplegia saturnina, S. sp. 14.

Paralysis metallariorum, S. sp. 22.2 constitutation aigelque H

Tremor scorbuticus, S. sp. 10.

Paraplegia rheumatica, S. fp. 1.8 capitamentinase significant

Paralysis nervea, S. sp. 11.

III. Sput

Tremor a debilitate, S. sp. 1.

B6 31 . Samuel a tom Tremot

Tremor fenilis, S. Sp. 2. A A A A A Tremor a pathemate, S. sp. 14 illing on instantov anola Tremor a coffea, S. sp. 4. Tremor temulentus, S. sp. 3. Paralyfig Boork 2017. II. Symptomaticae. Hemiplegia, S. G. 170. L. 169, V. 208 Paralysis traumatica, S. sp. 4. Parapieria, S. G. 171. Hemiplegia traumatica, S. sp. 9. Peraplegia, L. 102, V. 227. Paraplegia traumatica, S. sp. 4. Partiries S. G. rop. L. 205. Tremor traumaticus, S. sp. 17. Paralysis a vomica, S. sp. 10. Aremor , S. G. 129. L. 131. V. Paralysis rheumatica, S. sp. 3. Oht A 781.0 .2 eshedited Idiopacnicae. Tremor rheumatismalis, S. sp. 18. Paralyfis plethurien, S. fp. r. Beriberia Indica, S. sp. 1. Beriberia spuria, S. sp. 2. Hemiplegia arthritica, S. sp. 5.1 2 sixologos so significant Paralysis rachialgica, S. sp. 2. 11 . 2 another a room T Paraplegia rachialgica, S. sp. 5. ar . al . alored allyland Paralyfis biliofa, S. sp. 9. or al 2 chorst signlyingeld Hemiplegia transversa, S. sp. r. 2 estilled anique a supplement Paralysis scorbutica, S. sp. 6.3 . d. d. eladgecoubyd a nomen T Paralyfis fcrophulofa, S. sp. 5. 11 .cl. 2 29box/larg 10mm F Hemiplegia scrophulosa, S. sp. 42 , who tame have significant Hemiplegia syphilitica, S. sp. 3. Paraplegia fyphilitica, S. fp. 7. at & silqeliqe as airefqimett Elemiplegia spalmodica, S. sp. 2. Paralyfis Polonica, S. sp. 7. Tremor Asturiensis, S. sp. 15, 1 . 2 . sainrais zigesquineH Hemiplegia intermittens, S. fp. 8. 2 muroirellesson siglene ? Paraplegia intermittens, S. sp. 6. 91 2 emmografiatem romer? Tremot foorburious, S. fp. 10. Paralysis febrilis, S. sp. 8. Hemiplegia exanthematica, S. Sp. 6. 2 estitemunda significant Tremor typhodes, S. sp. 19.

Tremor vertiginosus, S. sp. 7. Tremor a debilitate, S. fp. z. Tremor a faburra, S. fp. 12.

III. Spu-

Patelylis nerven, S. fp. 11.

III. Spuriae. 18 177 9 como? 32 of . 8 colosodo a segurave

Tremor coachus, S. fp. 6. Tremor tendinum, S. fp. 9. 1 2 estatodolida a ogcony? Tremor palpitans, S. fp. 16. 16. 18 of 18 estolob a ogoony?

O. II. ADYNAMIÆ.

Afghysia usumanica y S. fo. 149.

Symptomaticae.

Adynamiae, V. Cl. VI. Leipopfychiae, S. Cl. VI. O. IV. 191 3 , toldattool agoany?

SYNCOPE. G. XLII.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens. Syncope, S. G. 174. L. 94. V. 274. Junck. 119. Leipothymia , S. G. 173. L. 93. V. 273. soitaflataat oquanyo Afphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275. 2 saindres square Virium lapsus et animi deliquia, Hoffm. III. 267.

I. I Idiopathicae. In ab away was de all solindre oquoev?

A causis internis. IETHIST A I.

Syncope plethorica, S. Sp. 5. Senac, Tr. du coeur, p. 540. Syncope a cardiogmo, S. sp. 7. Senac du coeur, 414. Morgagn. de fed. XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. sp. 8. Senae, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. fp. 12. Senae, 533. Schreiber Almag. L. III. 6. 196.

Syncope Lanzoni, S. sp. 18. Lanzon. Op. II. p. 462. Afphyxia Valfalviana, S. fp. 13.

II. A causis externis.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. Senac, p. 544. Syncope pathetica, S. sp. 21. Afphyxia a pathemate, S. Sp. 7. 28 . 2.075 . 3 . 2 . 20101/1 Syncope ab antipathia, S. Sp. 9. Jenac, p. 544 Syncope a veneno, S. sp. 10. Senac, p. 546. Syncope ab apostematis, S. sp. 11. Senac, p. 554. Loibl L

Syncope

Syncope a sphacelo, S. sp. 14. Senac, p. 553. Syncope ab inanitione, S. sp. 1. Senac, p. 536 3000 100011 Syncope a phlebotomia, S. sp. 4. o at 2 control tomes? Syncope a dolore, S. sp. 2. Senae, p. 583 Afphyxia traumatica, S. sp. 14. Asphyxia neophytorum, S. sp. 17.

II. Symptomaticae.

Syncope

Advosmise, V. Cl. VI. Leipothymia stomachica, S. sp. 2. JO IV IO II in Bole CI Syncope stomachica, S. sp. 13. Senac, p. 545. and vigo is I Syncope hysterica, S. sp. 6. Senac, p. 547. Syncope febrilis, S. sp. 3. Senac, p. 548. Syncope febricosa, S. sp. 17. Torti Therap. spec. L. III. cap. 1. Syncope exanthematica, S. fp. 19.42 . Art. D. & agoony & Syncope metaffatica, S. Sp. 20.2 . I WI . S. aimydiogisal Syncope scorbutica, S. sp. 15. Lind, de Scorbuto, P. II. cap. 11. Senac, p. 552. M. M. A. phipilob incins to coleat muit V

Syncope arthritica, S. fp. 16. Musgrave de arthr. anomala, cap. 8.

DYSPEPSIA. cauca A G. XLIII.

Ventriculi functio idiopathice turbata per anorexiam, naufeam, vomitum, inflationem, ructum, ruminationem, cardialgiam, gastrodyniam, et alvum plerumque astrictam, Syncope ab hydrocardia, S. fp. 10. Strate, 533. Schrabbilli

Dyspepsia, V. 277. L. III. 6. 196. Syncope Lineani, S. fp. 18. Lanzon Op. 11.675 . V. singapa Diaphthora, V. 278. Alphyxia Valfalviana, S. fp. 1372 . . Anorexia, S. G. 162. L. 116. Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157.

Gastrodynia, S. G. 203. Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159. Vomitus, S. G. 251. L. 182. V. 214. ridisquas de equanção Flatulentia, S. G. 272. L. 165. V. 127. coneda e equanção de equançã

I. Idio-

Vorridus verezionius, S. 19.

Calicovide Americana, S.

Vomitus gefficiens, S. Sp. 19.

I. Idiopathicae.

Cardialgia bradypepta, S. sp. 9. Anorexia pituitofa, S. sp. 2. Vomitus pituitofus, S. sp. 26. Vomitus ruminatio, S. sp. 6. Anorexia a faburra, S. sp. 9. Cardialgia a faburra, S. sp. 1. Gastrodynia saburralis, S. sp. 1. Vomitus a faburra, S. sp. 2. Vomitus a crapula, S. sp. 1. Nausea ex cacochylia, S. sp. 11. Cardialgia lactentium, S. sp. 11. Vomitus lacteus, S. sp. 3. Flatulentia infantilis, S. sp. 5. Cardialgia flatulenta, S. sp. 3. Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2. Flatulentia acida, S. sp. r. Vocairus a curillagina xipbook Flatulentia nidorofa, S. sp. 2. Anorexia exhauftorum, S. fp. 8. Gedfredynia gallengelica, & Anorexia paralytica, S. sp. 1. Naufea ex gaffrocele; S. sp. Cardialgia paralytica, S. sp. 7. Vonima granocelius, S. Ip. Gastrodynia periodynia, S. sp. 7. Cardielgia sputatoria, S. 10. Gastrodynia astringens, S. sp. 9. Cardislain inflammacoria , S. Gastrodynia atterens, S. sp. 10. Gastrodynia a frigore, S. sp. 18, 41 & eshiristan an actual

II. Symptomaticae.

-ona

A morbo ipsius ventriculi, muinaq munila odiom A

Vomitus a pyloro calloso, S. sp. 8. . snemnosb s smimo V Vomitus a steatomate ventriculi, S. sp. 11. Nausea ab apostematis circa cardiam, S. sp. 9.

Gastrodynia ulcerosa, S. sp. 5. Vomitus ab ulcere ventriculi, S. sp. 10. do sieged da antimo V

Cc

Cardialgia a veneno, S. sp. 2. Gastrodynia a veneno, S. sp. 4. Vomitus a veneno, S. sp. 7. Flatulentia accidentalis, S. sp. 4. Gastrodynia a peregrinis, S. sp. 11. Anorexia biliofa, S. sp. 6. Naufea biliofa, S. fp. 6. Gastrodynia biliosa, S. sp. 3. Vomitus urinofus, S. sp. 27. Gastrodynia calculosa, S. sp. 8. Vomitus bezoarticus, S. sp. 13. Cardialgia verminosa, S. sp. 10. Nausea a taenia, S. sp. 1. Vomitus verminosus, S. sp. 5. Gastrodynia a xiphoide, S. sp. 12. Gastrodynia Americana, S. sp. 6. Nausea ex compresso ventriculo, S. sp. 5. Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. sp. 22. Vomitus ab oesophago obstructo, S. sp. 21. Gastrodynia gastrocelica, S. sp. 20. Nausea ex gastrocele, S. sp. 4. Vomitus gastrocelicus, S. sp. 18. Cardialgia sputatoria, S. sp. 5. Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. Nausea ex gastritide, S. sp. 10. Vomitus gastriticus, S. sp. 19.

Vomitus cephalalgicus, S. sp. 23.
Vomitus a dentitione, S. sp. 4.
Vomitus iliacus, S. sp. 24.
Nausea ex pancreatis scirrho, S. sp. 3.
Vomitus a pancreate, S. sp. 17.
Vomitus ab hepate obstructo, S. sp. 16.

Anorexia melancholica, S. sp. 5. Gastrodynia hypochondriaca, S. sp. 16. Flatulentia hypochondriaca, S. sp. 3. Flatulentia convulfiva, S. sp. 7. Vomitus hypochondriacus, S. sp. 9. Vomitus atrabilarius, S. sp. 15. Anorexia mirabilis, S. sp. 10. Gastrodynia hysterica, S. sp. 14. Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13. Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15. Nausea a semine corrupto, S. sp. 8. Nausea gravidarum, S. sp. 2. Vomitus gravidarum, S. sp. 12. Flatulentia lochialis, S. sp. 6. Anorexia arthritica, S. sp. 12. Cardialgia arthritica, S. sp. 8. Nausea nephritica, S. sp. 7. Vomitus nephriticus, S. sp. 20. Anorexia Stewartiana, S. sp. 13. Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12. Anorexia plethorica, S. sp. 3. Anorexia cachectarum, S. sp. 7. Anorexia febrilis, S. sp. 4. Cardialgia febricosa, S. sp. 4. Gastrodynia febricosa, S. sp. 17. Vomitus febricofus, S. sp. 29. Vomitus rabiosus, S. sp. 14. Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28. Gastrodynia metastatica, S. sp. 19. Nausea marina, S. sp. 12. Vomitus marinus, S. sp. 25. Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

G. XLIV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia, cum languore, torpore, metu, et moestitia. Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218.

Morbus hypochondriacus, Boerh. 1098.

Malum hypochondriacum, Hoffm. III. 64. Junck. 36.

I. Idiopathicae.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3. Hypochondriasis algida, S. sp. 10. Ex theoria, ut videtur, sequentes. Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1. Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2. Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

II. Symptomaticae.

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5. Hypochondriasis phthisica, S. sp. 6. Hypochondriasis assimatica, S. sp. 7. Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8. Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

G. XLV. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum saepe retentio.

Chlorofis, S. G. 309. L. 222. V. 305. Boerh. 1285. Hoffm. III. 311. Junck. 86.

Pica, S. G. 222. V. 301. Citta, L. 78.

I. Verae.

Chlorosis virginea, S. sp. 2.

a. Chlorosis amatoria.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Pica infantilis, S. sp. 1.

Pica chlorosiantium, S. sp. 2.

Pica malacia, S. sp. 3.

II. Spuriae seu pallores.
Chlorosis verminosa, S. sp. 5.
Chlorosis viridis, S. sp. 6.
Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.
Chlorosis maculosa, S. sp. 7.
Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.
Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.
Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.
Pica antiscorbuticorum, S. sp. 4.

O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes:
Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. Vog,
Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsivi, Hoffm. III. 9.
Spasmi et convulsiones, Junck. 45. 54.
Epilepsia, Boerb. 1071. 1088.

Sect. I. In functionibus naturalibus.

G. XLVI. TETANUS.

Totius fere corporis rigor spasticus.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. Catochus, S. G. 123. L. 128. V. 183. Opishotonos, V. 181. Epishotonos, V. 182.

I. Idiopathicae.

FIGO and

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 2.

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus holotonicus, S. sp. 4.

Tetanus Indicus, S. sp. 5. Hillary's Barbadoes, pag. 219. Chalmer's in Lond. Med. Obs. Vol. 1. Art. 12.

Spasmus Bontii de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Tetanus lateralis, S. sp. 6. Morg. de sed. X. 3.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus holotonicus, S. sp. 1. M. Fehr. in Ephem. Germ. D. II. A. I. Obs. I.

Catochus cervinus, S. sp. 2. Storck. ann. med. 1758. in Julio. Catochus diurnus, S. sp. 6.

II. Symptomaticae.

Tetanus traumaticus, S. sp. 11. Hillary's Barbadoes, p. 221.

Tetanus fyphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminofus, S. sp. 8.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus febricofus, S. sp. 10. Storck. ann. med. 1759. p. 166. Tetanus hystericus, S. sp. 12.

G. XLVII. TRISMUS.

Maxillae inferioris rigor spasticus.

Trifmus, S. G. 117. L. 124. Capiffrum, V. 208.

I. Species verae.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. Lond. Med. Obs. Vol. I. art. 1. 7. V. II. 34. V. III. 31.

Angina spasmodica, S. sp. 18. Zwingeri Act. Helvet. tom. III. pag. 319.

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. Hillary's Barbadoes, 221. Lond. Med. Obs. Vol. IV. 7.

Trismus nascentium, S. sp. 1. Heister. Med. Comp. cap. XV. J. 10. Cleghorn Minorca introd. p. 33. Hofer. in act. Hely. tom. 1. p. 65.

II. Spu-

II. Someoning

II. Spuriae.

Trifmus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorisicus, S. sp. 14.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus cynicus, S. sp. 16.

Trismus cynogelos, S. sp. 17.

Trismus sardonicus, S. sp. 18.

Trifmus diaftrophe, S. sp. 9.

G. XLVIII. CONVULSIO.

Musculorum contractio, clonica, abnormis, citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191.

Scelotyrbe, S. G. 136.

Chorea, L. 139.

Hieranosos, L. 144. V. 190.

I. Idiopathicae.

Egiforda

Convulsio universalis, S. sp. 11.

Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.

Convulsio ab onanismo, S. sp. 13.

Convulsio hemitotonos, S. sp. 15.

Convulsio abdominis, S. sp. 10.

Scelotyrbe chorea viti, S. sp. 1. Sydenb. Schedul. mon.

Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4. Convulsio ab hydrocephalo, S. sp. 5. Convulsio nephralgica, S. sp. 6. Convulsio gravidarum, S. sp. 14. Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5. Convulsio febrilis, S. sp. 3. Convulsio intermittens, S. sp. 16. Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4.

RAPHANIA. G. XLIX.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. Linn. Amoen. acad. Vol. VI. Convulsio raphania, S. sp. 7.

Eclampfia typhodes, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. IV. cap. 16. Gregor. Horst. oper. tom. Il. L. VIII. obs. 22. Brunner in Ephem. Germ. D. III. A. II. obs. 224. Willisch. ibid. Cent. VII. obs. 13. Wepfer. de affect. cap. obl. 120. Breflauer Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. vol. VII. Becketying, b. G. 136. obl. 41. Chorca, L. 189.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An Convulsio Soloniensis vel Necrosis ustilaginea sit idem morbus? Vide Salerne in mémoires presentés à l'acad. des sciences, tom. II.

EPILEPSIA. alabation ofference G. L. Convulio habitualis, S.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. Boerh. 1071. Hoffm. III. 9. Eclampfia, S. G. 133. V. 189. Junck. 54.

de Convellio abdominis 8. fp. 20.

Secletyrbe chorea viti. S. fp. 1. Sydeni, Sibedel . maintagoibl . I

IL Sympte+

Epilepsia plethorica, S. sp. 1. Sectionarbe festioners S. In. 21 Eclampfia plethorica, S. sp. 7. Scalourbe inflability S. fo. e. Eclampfia ab inanitione, S. sp. 8.

Epilepsia

Epilepsia traumatica, S. sp. 13.

Eclampsia traumatica, S. sp. 9.

Epilepsia pedi symptomatica, S. sp. 6.

Epilepsia symptomatica, S. sp. 8.

Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

Eclampsia ab atropa, S. sp. 11.

Eclampsia ab oenanthe, S. sp. 12.

Eclampsia a cicuta, S. sp. 13.

Eclampsia a coriaria, S. sp. 14.

Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

II. Symptomaticae.

Epilepsia cachectica, S. sp. 2.

Epilepsia stomachica, S. sp. 3.

Eclampsia a saburra, S. sp. 5.

Epilepsia uterina, S. sp. 4.

Epilepsia a dolore, S. sp. 10.

Eclampsia a doloribus, S. sp. 4.

- a. Rachialgica.
- b. Ab otalgia.
 - c. A dentitione.

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.

Eclampsia verminosa, S. sp. 14.

Eclampsia parturientium, S. sp. 3.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 16.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

G. LI. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

amdha.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. Hoffm. III. 83. Junck. 33.

Dd

I. A morbo cordis aut vasorum majorum.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. sp. 1. Senac Mal. du cœur. p. 484. Lancisi de aneurysm.

Palpitatio tremula, S. sp. 4. Senac du cœur, p. 502.

Palpitatio apostematosa, S. sp. 7. Lancist de aneurysmate, lib. x. prop. 5. Senac du cœur, p. 485.

Palpitatio a corde offificato, S. sp. 2. Senae du cœur. pag. 484. Morgagni de sed. Ep. XXIV. 17.

Palpitatio calculofa, S. fp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. Senac du cœur. lib. IV. cap. 16. p. 484. Palpitatio polypofa, S. fp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortae angustia, S. sp. 9. Lancist de aneurys. prop. 53. Senac p. 484.

II. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. Storek ann. med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. fp. 11. Or al . 2 estoloh a silyeliga

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12. 2 and toloh a silematod

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. Lancist de aneurys. prop. 44. Palpitatio febricofa, S. sp. 15. Storck Ann. med. 1. p. 75.

ASTHMA. G. LII.

Spirandi difficultas, cum angustiae in pectore sensu, per intervalla fubiens.

Afthma, S. G. 145. L. 161. V. 268.

Ashma convulsivum et spasmodico-flatulentum, Hoffm. III. 94. Afihma spassicum, Junck. tab. 51.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269.

I. Species idiopathicae.

offa ab ficheria, S. Ip. o Asthma humidum, S. sp. 1. statulentum. Floyer on the asthma chap. I.

Ashma stomachicum, S. sp. 8. Floyer scheme of the species of afthma, periodic ashma, 6.

Afthma

Ashma convulsivum, S. sp. 2. Willis Pharm. rat. P. II. sect. 1. cap. 12.

Asthma hystericum, S. sp. 3. Floyer on the asthma, cap. 1.

Affhma hypochondriacum, S. sp. 4.

Afthma exanthematicum, S. sp. 11.

Ashma cachecticum, S. sp. 13.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

II. Symptomaticae.

Afthma arthriticum, S. sp. 5.

Ashma venereum, S. sp. 14. Junek. tab. 32. VI. 15.

N. Cum species asthmatis dyspnoeae et orthopnoeae adeo saepe confundantur, species dyspnoeae ut et asthmatis et orthopnoeae, quae ad dyspnoeam referre liceat, hic, utcunque ordinatas, subjungere utile fore putavi.

or socuding S. 19. 27

Dyspnoea est,

I. Ex pulmonibus immediate affectis.

z. Ex vitio ipsius pulmonis.

Dyspnoea pituitosa, S. sp. 1.

Afihma catarrhale, S. sp. 16. pneumonicum, Willis Pharm. rat. P. II. sect. I. cap. 12.

Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea calculosa, S. sp. 3.

Afthma pneumodes, S. sp. 17.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

Orthopnoea peripneumonica, S. sp. r.

Orthopnoea pseudo-peripneumonia, S. sp. 21.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. sp. 12.

Orthopnoea a vomica, S. sp. 7.

Dyspnoea a vomica, S. sp. 6.

2. Ex morbo cordis vel vasorum majorum.

Dyspnoea a corde, S. sp. 11.

Ashma a polypo cordis, S. sp. 6.

Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.

Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.

Dyspnoea aneurysmatica, S. sp. 19.

Orthopnoea ab aneurysmate, S. sp. 8.

Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

- 3. Ex compresso pulmone.
- Qrthopnoea a pinguedine, S. sp. 6.

 Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

 Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.
- b. Ab humore effuso intra thoracem.

 Orthopnoea ab hydrothorace, S. sp. 5.

 Orthopnoea ab empyemate, S. sp. 13.
- c. A partibus thoracem cingentibus.

 Asthma a gibbo, S. sp. 9.

 Dyspnoea rachitica, S. sp. 10.

 Dyspnoea traumatica, S. sp. 15.

 Orthopnoea traumatica, S. sp. 14.
- d. A tumore abdominali.

 Dyspnoea a physconia, S. sp. 7.

 Dyspnoea a graviditate, S. sp. 8.

 Dyspnoea tympanitica, S. sp. 9.

 Dyspnoea a liene, S. sp. 14.

 Dyspnoea a stomacho, S. sp. 13.

 Dyspnoea a gastrocele, S. sp. 17.

 Orthopnoea a gastrocele, S. sp. 11.
- Asthma pulverulentorum, S. sp. 7. Asthma metallicum, S. sp. 12.

Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 16.

Orthopnoea hysterica, S. sp. 4.
Orthopnoea spasmodica, S. sp. 3.
Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.
Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.
Orthopnoea a vermibus, S. sp. 17.
Dyspnoea plethorica, S. sp. 21.
Orthopnoea ab inanitione, S. sp. 19.
Dyspnoea scorbutica, S. sp. 18.
Orthopnoea fcorbutica, S. sp. 18.
Orthopnoea fcorbutica, S. sp. 18.
Orthopnoea febricosum, S. sp. 18.
Orthopnoea febricosum, S. sp. 20.
Orthopnoea variolosa, S. sp. 24.
Orthopnoea a hydrocephalo, S. sp. 23.

G. LIII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora, iterata; saepe vomitus.

Pertussis, Sydenham Ed. Leid. p. 200. 311. 312. Huxham de aere; ad ann. 1732.

Rachialgia pichonum, S. fp. r.

Colica hyderica, S. fp. 17.

Colega bilida, S. fp. 7.

Tussis convulsiva, sive ferina, Hoffm. III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11.

Amphimerina tufficulofa, S. sp. 13. silluenquibs de siglaides I

III. In functionibus naturalibus.

G. LIV. PYROSIS. murabivers gravidarum

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque insipidi, aliquando acris, eructata.

Pyrosis, S. G. 200. Scotis, The Water - brash, in the Species unica vera,

Dd 3

Pyrons

Pyrofis Suecica, S. fp. 4. Trans Resemble of the Estate of the Profit of

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5. 2 antialgod to 1900 quality

Caeterae Sauvagesii species symptomaticae sunt.

Pyrofis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrofis a conceptione, S. sp. 6, 12 & espirostyd asongorino

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrofis a phlogofi, S. sp. 3.

Pyrofis ulcerofa, S. sp. 5.

Dyspance plemorics ADLIOD G. LV.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta. 81 ql & estinduol asonglect

Ordinanto da coongenhia.

Orthopnoen a fungis, S. 19. 25

Orthoproce variolola; S. Ip. 24.

Tulis convoliva, five forms,

Tuffis convultiva, S. fp. 11.

III. In functionibus naturalibus.

Species unica wera,

Tuffis ferina, S. fp. 10.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. Junck. 106.

Colica spasmodica et flatulenta, Hoffm. II. 284.

Rachialgia, S. G. 211.

Ileus, S. G. 252. V. 162. Orinopaces a hydrocephalor, S. fp. 23.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, Hoffm. II. 263.

Passio iliaca, Junck. 107. Mayroo allas cantorgestoo endrolla

Species ex Sauvagesio sunt,

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Heus phyfodes, S. fp. 9. 2002 q bed by madeshed afformed

Colica spalmodica, S. sp. 7.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1.

Colica biliofa, S. sp. 5.

Rachialgia ab adiapneustia, S. Sp. & estolucitus sociemidam A

Colica hysterica, S. sp. 17.

Colica gravidarum, S. sp. 16.

Colica pituitofa, S. sp. 2.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.
Colica stercorea, S. sp. 3.

2,6035,5

lleus a foecibus induratis, S. Sp. 2. 2000 000 0 3

Colica meconialis, S. sp. 19.

Colica accidentalis, S. sp. 18. 10 11 Colica lactentium, S. sp. 20, noilid copmurale airomati Colica Japonica, S. fp. 10. lleus a veneno, S. fp. 14. OII .V . 38. J . 572 . 3 . 200 . 3 Rachialgia metallica, S. fp. 3017 Annil espitaled sandruich Colica calculofa, S. sp. 15. Species fant. Ileus calculofus, S. sp. 10. Colica verminosa, S. sp. 4. ... 2 and again melodo Ileus verminofus, S. fp. 13. 2 andillina simony a motorio Colica Lapponica, S. fp. 9. que de ilamina onomo a arelono Ileus herniofus, S. Sp. 6. 12 signut a clonique molecto an Colica enterocelica, S. sp. 22. Ileus a callosa coli strictura, S. sp. 11. 2 calonima V avalono Ileus imperforatorum, S. sp. 12. 01 . 3 espiridas susferio Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4. Colica mesenterica, S. sp. 11.3 que a signamalai arolado Cholers indice, S. fp. 7. Colica scirrhosa, S. sp. 12. Colica pulsatilis, S. sp. 14. Ileus inflammatorius, S. sp. r. non audiom ; anoupon oisojo I primaria. Colica phlogistica, S. sp. 6. Colica plethorica; S. sp. 8. V 781 J. Age . D. & candidate a. Haemorrhoidalis. blepeninhoea, S. G. as6. b. Catamenialis. Cholerica, L. 190. Colica febricofa, S. sp. 2131 . V . 081 LI . 772 . O . 8 . april so O Rachialgia febricofa, S. sp. 2. 881 M. dre . D. & siromoid Pinicaria, V. 111. Rachialgia arthritica, S. sp. 4. Rachialgia scorbutica, S. sp. 6. Idiopathicae. Rachialgia traumatica, S. sp. 7. Rachialgia ab ofteofarcofi, S. fp. 8. 12 . Borossoft sportnaid Diarrhoea valgaris, S. Sp. 2

Diarrhoen lackentiam, S. fp. 19. 19.

CHOLERA, dilatashina anilo G. LVI.

Humoris plerumque biliosi vomitus, ejusdem simul dejection frequens; anxietas; tormina; furarum spasmata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. Hoffm. II. 165.

Diarrhoea cholerica, Junck. 112. 3 . Saille son siglations!

Species funt.

Cholera spontanea, S. sp. 1. Sydenh. Sect. IV. cap. 2.

Cholera crapulofa, S. sp. 11.

Couce verminole; S. fp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5. al a minoggal apilo

Cholera ficca, S. sp. 2. Sydenb. Sect. IV. cap. 2. Mary low and I

a. Cholera auriginosa a fungis venenatis.

b. Cholera dysenterica auriginosa.

Cholera Verminofa, S. sp. 9. 2 supplied too stolles a small

Cholera arthritica, S. sp. 10. st. of 2 monoterobegani avoil

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8. 11 . 2 e somesandera soilo

Cholera indica, S. sp. 7.

DIARRHOE A. Dimension as low G. LVII.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria. Colice phlogiffice, S. fp. 6.

Colica terrhola, S. 19, 12.

Marinalgia arthritica , S. fp. 4. Rachialgia fearbution, S. fp. 6.

Rachielgia traumatica, S. fp. q.

Ruchialgia ab offeologooff, S. f.

b. Catamenislis.

Diarrhoea, S. G. 254. L. 187. V. 105. Junck. 112.

Hepatirrhoea, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 1090 1 3 (Rooted as 100)

Lienteria, S. G. 256. L. 188.

Pituitaria, V. III.

I. Idiopathicae.

TY III

Diarrhoea stercorosa, S. sp. x.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Diarrhoea

Diarrhoea lactea, S. sp. 4.

Dysenteria parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

Coeliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhoea serosa, S. sp. 10.

a. Diarrhoea urinosa.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

Diarrhoea adiposa, S. sp. 18.

Diarrhoea adiposa, S. sp. 18.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

Coeliaca chylosa, S. sp. 1.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

Hepatirrhoea intestinalis, S. sp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3. Diarrhoea febricosa, S. sp. 20. Hepatirrhoea intermittens, S. sp. 7. Diarrhoea variolosa, S. sp. 6. Diarrhoea pleuriticorum, S. sp. 21. Diarrhoea arthritica, S. sp. 9. Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13. Diarrhoea choleriodes, S. sp. 17. Hepatirrhoea vera, S. sp. 1. Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3. Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4. Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11, Diarrhoea purulenta, S. sp. 11. Caeliaca purulenta, S. sp. 2. Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5. Dysenteria scorbutica, S. sp. 18. Lienteria scorbutica, S. sp. 3. Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1; Lienteria aphthofa, S. sp. 4.

Diarrhoea verminosa, S. sp. 14. 3 at . a seeding single of . Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15. 15 Monthly and the Colonial and the Col Diarrhoea chiliensis, S. sp. 12. Coclinca maccoin, S. fp. q. Diarrhoea acrasia, S. sp. 7. Diagriposa ferola, S. Ip. 10.

G. LVIII.

DIABETES,mine asociusid a

Urinae praeternaturalis, copia immodica, profusio, chronica. Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115, Junck. 99. Diuresis, V. 114. Dytenteria a catharticis, S. fp. 12.

Idiopathicae. 1.

Diabetes legitimus, S. sp. 1.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. Mead on poisons, Est. 1. Monita med. Symptomaticae. cap. 9. fect. 2.

Cocliara chylofa, S. fp. t.

Lienteria fpontanea, S. fp. 2.

Dimrhote febrilis , S. fp. 7. Diarrhoes febricofa, S. fp. 20.

Lienteria fcorbutica, S. fp. 3.

Lienteria aphtholas S. fp. &

Diabetes a vino, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Diabetes hyftericus, S. sp. 3. Sydenh. Diff. Epist. ad G. Cole. Diabetes arthriticus, S. sp. 6. Diabetes artificialis, S. sp. 4. que a marconinusta asodinica

G. LIX.

Diambora architica , A I R H Y S T E R H

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis, ibique strangulantis; fopor; convulfiones; urinae limpidae copia profufa; animus, nec sponte, varius et mutabilis.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V.1219. 2 catasturag asortmaics Malum hystericum, Hoffm. III. 50. Junck. 36. seetung cosiles ? Affectio hysterica, Willis de morb. convuls. cap. 9. 10. et 17. Sy-

denh. Diff. Epist. ad G. Cole. Whyte on nervous disease.

Idiopathicae.

222351L

Hyfteria chlorotica, S. fo. 2. B illusiumen eresla ne aimmell Hysteria libidinosa, S. sp. 6.

Hysteria

Amentia fetola, S. fp. 2.

Dagmonominia, S. G. 236.

Velania, L. 70.

Panophobia, L. 77.

Athymia, V. 329.

Rectomania, L. Sz.

Species fune, Market les

Melancholia valgaris , .S. sp. r.

Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4. A sp. 2 coloron amount

II. Symptomaticae.

Hysteria stomachica, S. sp. 7. of . 2 and Lind of da simem A Hysteria emphractica, S. sp. 5. 4 91 .2 estomas a sincon A Amerita en ficcitate , S. (). 7. Hysteria febricosa, S. sp. 7.

HYDROPHOBIA: G. LX.

Potionis cujuslibet, ut convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morsu animalis rabidi. Amendia a venenis, S. ip. 3.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. Boerh. 1138. Junck. 124.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1. 2 of 2 with de abnomA Hydrophobia spontanea, S. sp. 2. 12 continuer allenna

Amenda a quartena, S. fp. 11 O. IV. VESANIÆ.

Mentis functiones laesae, sine pyrexia vel comate. Infania partialis.

Vefaniae, S. Cl. VIII.

Mentales, L. Ch. V. O. I. St. V. 17 . I . St. O. S. ailed and M.

Paranoae, V. Cl. IX.

AMENTIA: AR AITMAMA G. LXI.

Mentis functionum imbecillitas.

Amentia, S. G. 233. V. 337.

Morofis, L. 106.

Amnefia, S. G. 237. 111 musilodingslem manifold

Oblivio, L. 107. V. 338.

Stupiditas, morofis, fatuitas, V. 336. I. des . O. & englation Memoriae debilitas, Junck. 120.

Species funt,

Amentia senilis, S. sp. 1.

Amnesia senilis, S. sp. 2.

Melancholia argantis, S. fp. 4.

Amne-

Holistin a meanwhamis, 5. 15. 2.

Aydrophobia vulgaries S. fo. r.

Amenia S. G. 233 V. 557.

Amentia ferilis, S, fp. I.

Symptomoticas

Amnelia a venere, S. sp. 1.

Amentia morofis, S. sp. 8.

Amentia serosa, S. sp. 2.

Amentia ab hydatidibus, S. sp. 5.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia calculofa, S. sp. 12.

Amentia ex siccitate, S. sp. 7.

Amentia microcephala, S. sp. 6.

Amnesia plethorica, S. sp. 4.

Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.

Amnesia a pathemate, S. sp. 5.

Amentia a venenis, S. sp. 3.

Amentia rachialgica, S. sp. 10.

Amnesia a temulentia, S. sp. 7.

Amentia ab ictu, S. sp. 9.

Amnesia traumatica, S. sp. 3.

Amentia a quartana, S. sp. 11.

Amnesia febrisequa, S. sp. 8.

G. LXII. MELANCHOLIA:

Infania partialis.

Melancholia , S. G. 234. L. 71. V. 332. Roerb. 1089. Junck. 121.

Daemonomania, S. G. 236.

Daemonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, Hoffm. III. 251.

Erotomania, L. 82.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. Junck. 125.

Melancholia nervea, Cl. Lorry de melancholia, P. I.

Ec a

Species funt,

Amne-

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.

Melancholia argantis, S. sp. 4.

Melan-

Species funt .

Melancholia Anglica, S. sp. 11.

Melancholia phrontis, S. sp. 14.

Panophobia phrontis, S. sp. 3.

Melancholia religiosa, S. sp. 3.

Melancholia enthusiastica, S. sp. 13.

Melancholia faltans, S. sp. 8.

Melancholia amatoria, S. sp. 2.

Melancholia moria, S. sp. 5.

Melancholia Scytharum, S. sp. 10.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

Melancholia zoantropia, S. sp. 12.

Melancholia hippantropica, S. sp. 9.

Melancholia attonita, S. sp. 6.

N. Daemonomaniam plerumque simulatam effe censemus.

G. LXIII.

MANIA.

Infania universalis.

Mania, S.G.23 5. L. 68.V.331. Boerb. 1118. Junck. 122. Battie on madneff.

AU JULIO

Leformer, L. Cl. X.

Paraphrofyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, Hoffm. III. 251.

Species funt,

Mania vulgaris, S. sp. 7.

Mania a pathemate, S. sp. r.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3.

Mania periodica, S. sp. 6.

Mania a venenis, S. sp. 5.

Mania metaftatica, S. sp. 4.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

G. LXIV.

SOMNIUM.

In somno imaginatio vehementior vel molesta?

Somnium, V. 339.

Somnambulismus, S. G. 221. L. 77.

Middanillolia febrana, S. fp. S.

deracincolvere, L. 66.

Amenda J. 67.

Sommium , V. 379.

Hypnobatasis, V. 340. Noctambulatio, Junck. 124. Ephialtes, S. G. 138. L. 163. Sal & simondy midodeous !

Incubus, V. 211. Junck. 50. 4 3 alleges allegente

Panophobia, S. G. 227. It of the southerness stierbested

Species funt,

Somnambulismus vulgaris, S. sp. 1. Somnambulismus catalepticus, S. sp. 2. Molancholia Septimon, 5, 1p. 10.

Panophobia verminosa, S. sp. 1. 2 and and and additional A Ephialtes verminosa, S. sp. 4. 11 . 2 . separates silodianions

Ephialtes plethorica, S. sp. r. Melancholia attentite, & 19. 6. Ephialtes stomachica, S. sp. 2. Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6. Ephialtes ex hydrocephalo, S. fp. 3. Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

N. Vesaniae symptomaticae.

Paraphrosyne, S. G. 232. Delirium, L. 65. V. 330.

CL. III. CACHEXIA.

Manu vulgers Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; fine pyrexia primaria vel neurofi. que a maniaged de ainaM

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII. A & spibonog signal Mania a venenis, S. fp. 5. Deformes, L. Cl. X. Mania metafiaticas S. fp. 4.

O. I. MARCORES. Manie hyderalgies, S. fo. 8.

Corporis totius macies UINIMOZ VIXI

Hypno:

Macies, S. Ch X, O. I. roingamely obsaigant onnol al Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

> Somnambuhlmus, S. G. 222. L. Tr. G. LXV.

Tiber during, S. 190 T

Tables (yabolation, S. S. E.

A to the time seems & St. Th.

Tokes a dydroge, S. Ip. S.

Atrophia reminole, St. (g. 1-5.

America leterais, S. fo. 17.

O. IL INTUM

Totan vet magen corpora par

Insummissing, S. C. X. O.

Turnidon's L. C. M. O. H.

Lengophic gmatia, L, 21 h.

Emplrylems in unancom,

Preumacolis a volución S. Co

Specific to the second

Sect. L. ADIP

G. LXV.

TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309.

Species funt,

Tabes apostematodes, S. sp. 3. Tabes ulcerofa, S. sp. 12.

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes fenilis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

Tabes a stomacho, S. sp. 14.

Tabes rachialgica, S. sp. 16.

Tabes mesenterica, S. sp. 9.

Tabes glandularis, S. sp. 10.

Atrophia infantilis, S. sp. 13.

Atrophia rachitica, S. sp. 8.

Tabes a pericardio, S. sp. 7.

Tabes catarrhalis, S. sp. 13.

Tabes a veneno, S. sp. 17.

Atrophia febrifequa, S. sp. 16.

G. LXVI.

Polylering S. C. 279. L. 21 ATROPHIA.

Marcor et asthenia sine pyrexia hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. Junck. 41. Marasmus, L. 211.

Species funt topen did anificio alica sinastementa interest

Atrophia senilis, S. sp. 11.

Atrophia nervosa, S. sp. 1.

Atrophia a vomitu, S. sp. 9.

Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7.

Atrophia a fanguisluxu, S. sp. 2.

Atrophia ab alvi fluxu, S. Sp. 6.

Atrophia lactentium, S. sp. 3. Passengolis a central Salis E.

Tabes fudatoria, S. sp. 6. Enghantena A

Atrophia a leucorrhoea, S. sp. 4.

Tabes dorsalis, S. sp. 1.

Tabes nutricum, S. sp. 4.

Atrophia nutricum, S. sp. 5.

Tabes syphilitica, S. sp. 11.

Atrophia scorbutica, S. sp. 12.

Tabes a hydrope, S. sp. 5.

Atrophia a crinonibus, S. sp. 16.

Atrophia verminosa, S. sp. 14.

Atrophia lateralis, S. sp. 15.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorfum tumens, Intumescentiae, S. Cl. X. O. II. Tumidosi, L. Cl. X. O. II.

Sea. I. ADIPOS E.

G. LXVII. POLYSARCIA:

Corporis pinguedinosa intumescentia molesta.

Polysarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540.

Steatites, V. 390.

Species unica,
Polyfarcia adipofa.

Sect. II. FLATUOS E.

Corporis intumescentia tensa, elastica, sub manu erepitans, Pneumatosis, S. G. 280. V. 391.

Emphysema, S. G. 13. L. 228. V. 392. Leucophlegmatia, L. 214.

Species funt,

Emphysema spontaneum, S. sp. 1. Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2. Pneumatosis a veneno, S. sp. 1.

Pneumatofis

Pneumatofis hysterica, S. sp. 3. Pneumatosis febrilis, S. sp. 4.

TYMPANITES. G. LXIX.

Abdominis intumescentia tensa, elastica, fonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies; rejecto sursum vel 87. Moura on the Dra deorsum aere levamen.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. Boerb. 226. Junck. 87. Affectio tympanitica, Hoffm. III. 339. Species lunt, Meteorismus, S. G. 292.

Phlogmatin vulgaria, S. Ip

Analarca examinematica,

Phiegmatin a menofialus,

Phlegmana gravidarum,

Phlegmatia cruralis, S. Igo

Analarca urisois, S. (p. 11 Analisca purulenta, S. 1p. 9.

Analarca hydropotatum, S. Ip. 10.

Species funt,

Analana Americana, S. fp. Tympanites intestinalis, S. sp. t. Tympanites enterophysodes, S. sp. 2. The want a comman A Ansforce a febribuse S. sp. Tympanites Stewartii, S. sp. 6. Anslerca metallatica, S. Ip. Meteorismus abdominis, S. sp. 2. a. Analarca periodica. Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.

Meteorismus hystericus, S. sp. 3. Meteorismus de sordanA de Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.

Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

Tympanites verminofus, S. sp. 7. 2 3 2 essel succesself Tympanites abdominalis, S. sp. 2.

Tympanites asciticus, S. sp. 4.

PHYSOMETRA: G. LXX.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens. Analerca radiialgica, S. ip.

Physometra, S. G. 290. 01 . c) & sometimental examined in the second of the contract of the co Hysterophyse, V. 317.

Species funt,

G. LXXII.

Physometra ficca, S. sp. 1.

Tympanites uteri ficca, Astruc sur les malad. des femmes, L. II. Pilegmand Malabarida, S. 19. cap. 9.

Physometra humida, S. sp. 2. gt 2 saimsdiels sine masida

Tympanites uteri humida, Aftruc loc. cit.

Sea

GENERA MORBORUM 226

Sect. III. AQUOSÆ SIVE HYDROPES.

G. LXXI. ANASARCA.

Corporis intumescentia mollis, inelastica.

Anafarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. Boerb. 1225. Hoffm. III. 322. Junck. 87. Monro on the Dropfy, 1765.

Mateonicous , S. G. 202.

Aympanies Sie Faith , S.

(Meteorificus abdominis, S.

Aleteoricates ventricular S.

Hyflerophyle, V. 317.

Phylomeua floor, S. fp. v.

Lympanices finalmodicus, S. fr.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, Boerb. 791.

Species funt,

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anafarca Americana, S. sp. 7-

Anafarca a fluxu, S. sp. 2.

Anafarca a febribus, S. sp. 4.

Anafarca metaftatica, S. fp. 1.

a. Anafarca periodica.

b. Anafarca ab adiapneuftia.

Anafarca exanthematica, S. sp. 3.

Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5. Alliannam a sometime state

Phlegmatia lactea, S. sp. 3.

Tympanites verminoles, S. ip

Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.

Analarca gravidarum, S. sp. 5. qt & ensittite estimates

Anafarca hysterica, S. sp. 6.

Phlegmatia hysterica, S. sp. 2. The and the served rooms

Anafarca rachialgica, S. sp. 8.

Anafarca hydropotarum, S. sp. 10.

Anafarca urinofa, S. sp. 11.

Anafarca purulenta, S. sp. 9.

Phlegmatia ulcerofa, S. sp. 6. and cool italia estimatory

Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.

Phlegmatia elephantina, S. sp. 8. g. d. & chimud ausmolydy

Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

Selle

1. Serofi abdominalest

G. LXXII. HYDROCEPHALUS. VXXII

Capitis intumescentia mollis, inelastica, hiantibus cranii suturis.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. Boerh. 1217. Gaudelius de hydrocephal. apud Sandifort Thefaur. Vol. II.

Hydrocephalum, V. 384.

Species funt,

Af ites vulgation, S. (b) Hydrocephalus interior, S. sp. 1. Whytt's Works, p. 725. Lond. Med. Obf. Vol. IV. Art. 6. Alcites ab hepate, S. 15. 3.

Hydrocephalus exterior, S. fp. 2. A. of . enoil a seriolA

G. LXXIII. HYDRORACHITIIS OF A 251101A

Tumor supra vertebras lumborum, mollis, exiguus, hianti-Alcices ab ovaras, S. ip. 6. bus vertebris.

Hydrorachitis, S. G. 287. Morgagn. de sed. XII. 9. et seq. a. Alcites laccatus. Spinola, L. 289.

G. LXXIV. HYDROTHORAX.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; subita et sponte ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans and a seriolA

Hydrothorax, S. G. 150. V. 311. Boerh. 1219. 01001 2010 A. Alcites calidus, S. fp. 13. Species funt, Seroff non abdominales.

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

Hydrothorax mediaftini, S. sp. 6. 41 . Q. & supresni aesislA

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. Hoffm. III. 337 manni antilA

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. Morgagn. de sed. XVI. 34. 36. Senac du coeur. tom. II. pag. 349. 91.2 e cilatoparo estrolA

Hydrothorax chylosus, S. sp. 1. Willis. Pharm. rat. P. II. Sect. I. Aleites cruentus, S. fp. 20. cap. 13.

Hydrothorax hydatidosus, S. sp. s. Morg. de sed. XVI. 33.

Hydrothorax febrifequens, S. fp. 4.cs of 3 suboritu social.

Hydrothorax a scabie, S. sp. 9. Morg. de sed. XVI. 35.

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2. 45 of & suitoslo sesticlA

S. Nec

Ff 2

G. LXXV.

G. LXXV. ASCITES.

Ascites, S. G. 288. L. 217. V. 314. Boerh. 1226. Hoffm. III. 322. Junck. 87. Monro on the Dropfy, 1765. drocephal. apad Sandybre Thefact. Vol. 11. Species funt,

1. Serosi abdominales.

Ascites vulgation, S. sp. 1. Ascites ab oppilatione, S. sp. 2.

Ascites ab hepate, S. sp. 3. . STA .VI .IOV 1150 .bsMI

Ascites a liene, S. sp. 4.

Ascites scrophulosus, S. sp. 5. O A CIYH IIIXXI D

Ascites artificialis, S. sp. 10. produtul anderrov arqui rome I

Ascites ab ovariis, S. sp. 6.

Ascites ovarii, S. sp. 19. Apprella 180 D. & chinomorbyth

a. Ascites saccatus.

Hydrometra ovarii, S. sp. 6.

Ascites a sanguisluxibus, S. sp. 7.0 AQYH WIXXI D

Ascites ab exanthematis, S. sp. 8. 11dill a allioinib autiduosb

Ascites arthriticus, S. sp. 19. 309 ni supa ; oitanoxo onoita

Ascites scorbuticus, S. sp. 11. V .OTI . D. & Amontorby H.

Ascites calidus, S. sp. 13.

Ascites intercus, S. sp. 14. 6. d. 8 e inifiaibaca associativada

Ascites intermuscularis 5 S. sp. 17 at 2 ennuly marchorbyti

Ascites flomachi, S. sp. 16. 8 . 12. 8 ibassing anotherbyH

Ascites omentalis, S. sp. 18. and . 11 . mor . neoco ub anna

Non ferofi abdominales 1 . 1 . 2 . enloyed xarodronbyH

Ascites cruentus, S. sp. 20.

Afcites urinofus, S. fp. 4.2. fp. d. S. fp. 4.2. Afcites urinofus , S. fp. 4.2.

Ascites chylosos is S. fp. 23. M. c. icabie, S

Ascites oleosus, S. sp. 24. 2. sp. 2. onemo de marodiorbyH

G. LXXV.

Hydrocephalus exterior, S. fp. 2.

Species lu t,

and Adams of the Market of the American Marke

bus verrebris.

Spinola, L. 289. Spina bifida, V. 386.

a. Ascites ex quartana.

Species funt,

cap. 13.

Afcites putulentus, S. fp. 21. ql .2 , sulobiobyd xcodorbyH

4. Nec

2 3 E

4. Nec serosi nec abdominales. A G LA D & MA Soc

Ascites sanguineo intercus, S. sp. 26.

Ascites sanguineo peritonaeus, S. sp. 27.

Aicites flatulento-peritonaeus, S. fp. 28.

Ascites purulento - peritonaeus, S. sp. 29.

G. LXXVI. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor; uteri figuram referens, pressui cedens sluctuansve; citra ischuriam Phylonia hepatica, S. fp. r. Cl. Carpa Eme amathire tar-

Hydrometra , S. G. 289. Boerb. 1224.

Species funt , A. J. C. D. J. M. West Of The boddies a

Hydrometra ascitica, S. sp. 1.

Hydrometra hydatica, S. sp. 4. fepteat. Tem. H. p. 311.

Ascites uterinus, S. sp. 15.

Hydrometra sanguinea, S. sp. 3. 2 42.8 essiblished sandovally

Ascites sanguineo - uterinus, S. sp. 25.

Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

G. LXXVII. B HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluz Auans, pellucidus. b. Sarcomatico - cyrlica Haller, Difb.

Oscheocele, S. G. 41. V. 388.

Hydrops scroti, V. 389.

Hydrops testium, Boerb. 1227. q1 & consvo de sicos per

Species funt,

Oscheocele aquosa, S. sp. 2. Monro in Edinb. Est. Vol. V. Art.

21. Sharp's Operations and critical inquiry. Douglas on the hydrocele. Pott's remarks on the hydrocele. Le Dran Opérations de chirurgie. Bertrandi in Mem. de l'Academ. de chirurgie, Vol. III.

Oscheocele Malabarica, S. sp. 4. Kempfer Amoen. exot. fasc. III. am conight Sect. II. confult. 134. Trineavell , if .1do. conf.

Art. 74. obf. 1.

Sect. IV. SOLID Æ. solmimohds oan flored as M.

LXXVIII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora nec suctuans.

Physconia, S. G. 283. V. 325. O A CY H

Hypofarca , L. 218. The miselved suchasham at improquent

Species funt, syllandout granes inless, andreles manuag

Physconia hepatica, S. sp. I. Cl. Cusson Bonet. Sepulchr. de graviditate falsa, obs. 3. n. 8. 9. 10. Verduc Patholog. du rachitis.

- a. Scirrhodea, G. Segeri M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obl. 142.
- b. Calculosa Bonet. Sepulch. de hypochondrii tumore, obs. 5.
- c. Hydatidosa Winckeri Disp. de hydatidibus apud Bonet. Med. feptent. Tom. II. p. 313. Afeites uterious, S. fp. 17.

- a. Emphractica Haller, Disp. pathol. T. IV. disp. 109. Tulp. Obs. med. lib. II. cap. 30. 7. at 2 simoling ausmonby H
- b. Scirrhodea Bonet. Sepulch. de ventris tumore, obs. 34. n. 3. Physconia renalis, S. sp. 3. Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs.

a. Calculofa Plater. obs. L. II. p. 449. River. cent. IV. obs. 34.

b. Sarcomatico - cyflica Haller. Disp. pathol. disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4. Bonet. Sepulchret. de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.

Physconia ab ovario, S. sp. 5. Monro Essais d'Edimburgh, tom. VI. Species funt Art. 74. obf. 1.

- a. Hydatidosa Greg. Horstii, Lib. V. obs. 33. Tulp. obs. Lib. II. drocele. Four's remarks on the hydrocele, In Date 1.45.3
- b. Strumosa Bonet. ex Rudnicio de ventr. tumore, obs. X. n. 15. Ambr. Parei, L. VII. c. 21. Scultet. Armam. chirurg. obs. 38.
- c. Scirrhodea Marc. Donat. Hift. med. mir. lib.VII. c. 15. Claudin. consult, Sect. II, consult. 134. Trincavell, lib. III, cons.

22. Riolan. Anthropogr. lib. II. c. 26. Morgagni de sedib. Ep. 39. n. 2.

d. Sarcomatica, Bonet. Sepulchr. de falsa gravid. obs. 3. n. 1.

e. Steatomatosa, Barth. Cabrol. Obs. 33. et 35. Tulp. Obs. Lib. II.

c. 32. et 33. J. Lechelii apud Bonet. Med. sept. T. II. p. 486. idem Collect. acad. Tom. III. p. 585. Hierne Collect. acad. Tom, III. p. 226. obs. 166.

f. Fungosa, Bonet. Sepulch. de gravid. salsa, obs. 3.
Physiconia intestinalis, S. sp. 7.

a. Concreto - glomerata, Morgagn. de sedib. epist. 39. n. 21. 25.

b. Sarcomatica, Fanton. Obs. med. selectiores, obs. 11.

Physconia omentalis, S. sp. 8. Frid. Reebman Diss. de omento. Physconia polysplachna, S. sp. 9.

a. Scirrhodea, Fabr. Hildani, cent. II. obs. 45.

b. Scirrhodea et sarcomatica, Huldenreich. M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.

c. Scirrhodea et adipofa, T. Bartholin. cent. III. obs. 6.

d. Hydatidosa, Volch. Coiter. Obs. anat. p. 117. Maur. Cordaei comm. 5. ad lib. priorem, Hippocr. de muliebr.

e. Hydatidosa et scirrhodea, Halleri Disp. pathol. Tom. V. p. 256.

Physconia visceralis, S. sp. 10. Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. Megalosplachnos Hippocrat. Marc. Donat. Hist. med. mir. lib. VI. c. 2. Schenck. ex Garnero de liene, Lib. III. obs. 9. Salmuth. cent. I. obs. 21. Bonet. Med. sept. Lib. VII. p. 487. Bianchi Hist. hepat. T. I. p. 130.

Physconia externa lupialis, S. sp. 11. Graham Trans. philos. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Physiconia externa scirrhodea, S. sp. 12. Ger. Blas. Obs. med. VI. Physiconia externa hydatidosa, S. sp. 13. Bonet. Sepulchr. de gravid. salsa, obs. 3. s. 2. 3. 4. 11. &c. Acholtzii apud Schenckium, Lib. III. de hydrope, obs. 4. et apud Scholtzium cons. 339. Solenandri cons. 15. sect. V. Riverii Obs. communicat. ultim.

Physconia ab adipe subcutaneo, S. sp. 14.

a. Simplex, Cl. Lieutaud. Comp. med. J. Mich. Febr. apud Bonet. Med. fept. T. I. p. 636.

b. Syphilitica, observante Celeb. Fizes.

Physconia ab excrescentia, S. sp. 15.

G. LXXIX. RACHITIS.

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; costae depressae; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. Boerb. 1480. Hoffm. III. 487. Zeviani della rachitide.

Species funt,

Rachitis nodosa, S. sp. 1.

Rachitis Britannica, S. sp. 2. Glisson. de rachitide.

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Calmucana, S. sp. 4.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.

Rachitis a castratione, S. sp. 7.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue defor-

Impetigines, S. Cl. X. O. V.

G. LXXX. SCROPHULA:

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies slorida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367.

Struma, L. 284.

Species funt, and de la burge is A ldo cogorbya so All de l

e. Sim-

Scrophula vulgaris, S. sp. 1. Russel de tabe glandulari, et de oeconomia naturae. At A Regulation of the data

Scrophula

Scrophula fugax, S. sp. 2.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Scrophula periodica, S. sp. 6.

Scrophula Molucana, S. sp. 8.

G. LXXXI. SYPHILIS.

Morbus contagiosus; post concubitum impurum et genitalium morbum; ulcera tonsillarum, cutis, praesertim ad marginem capillitii; papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

Syphilis, S. G. 3085. L. 6. V. 319.

Lues venerea, Boerb. 1440. Hoffm. III. 413. Junck. 96. Astruc

Species funt,

Syphilis Venerea, S. fp. 1.

Syphilis Polonica, S. fp. 2.

Syphilis Indica, S. fp. 3.

G. LXXXII. SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus consectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthenia; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices. Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. Boerb. 1148. Hoffm. III. 369. Junck. 91. Lind on the scurvy. Hulme de scorbuto. Rouppe de morbis navigantium.

Variat gradu.

- a. Scorbutus incipiens.
- b. Scorbutus crescens.
- c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

d. Scorbutus lividus, Nitzsch Theoret. pract. abhandl. des Scharbockes, &c.

e. Scor-

Louis inishyous, 5. ip. 21.

Legita Affairientis, S. Cp. 4.

Legea heroesica, S. fp. f.

Legra Indica, S. fp. 3.

- e. Scorbutus petechialis, Nitzsch ibid.
- f. Scorbutus pallidus, Nitzsch ibid.
- g. Scorbutus ruber, Nitzsch ibid. A monthem A studious?
- h. Scorbutus calidus, Nitzsch ibid.

G. LXXXIII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anaesthesia; facies tuberibus desormis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321.

Elephantia Arabum, V. 322.

Species funt,

Elephantiasis orientalis, S. sp. 1.

Elephantiasis legitima, S. sp. 2. Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 19.

Elephantiasis leonina, S. sp. 3.

Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.

Elephantiasis Alopicia, S. sp. 5.

Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.

Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.

Elephantiasis Indica, S. sp. 9.

G. LXXXIV. LEPRA:

Cutis, escharis albis furfuraceis rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262. V 200 . 1.102 . O. 8 . amodios8

Lepra Graecorum, V. 320.

Species funt,

e. Scor-

Lepra Graecorum, S. sp. 1.

Lepra ichthyosis, S. sp. 2.

Lepra Indica, S. sp. 3.

Lepra Asturiensis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

GB

G. LXXXV.

a. Scorbuttas incipiens.

c. Scorbutus inveterator.

Variat cuam fymptomatibus.

G. LXXXV. FRAMBOESIA.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboesia, S. G. 299.

Species funt,

Framboesia Guiniensis, S. sp. 1. Edinb. Essays, Vol. VI. Art. 71. Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. LXXXVI. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicari.

Trichoma, S. G. 311.

Plica, L. 313. 11 TEARTIC .1 .0

Plica five Rhopalofis, V. 323.

Species funt,

Trichoma cirrofum, S. sp. 1.

Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. LXXXVII. ICTERUS. Lav emminimi entiv

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidae; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. Boerh. 918. Junck. 90.

Aurigo, S. G. 306.

Cachexia icterica, Hoffm. III. 301.

Species funt,

Aurigo calculosa, S. sp. 9. Edinb. Essays, Vol. I. Art. 33.

Aurigo hysterica, S. sp. 13. Sydenh. Sect. IV. cap. 3.

Aurigo rachialgica, S. sp. 14.

Aurigo plethorica, S. sp. 5.

Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.

Aurigo hepatitica, S. sp. 11.

Aurigo purulenta, S. sp. 7.

Aurigo a venenis, S. sp. 4.

Aurigo febrilis, S. sp. 1.

Amblyogia, S. G. 154

Myopia L sigoy M

GENERA MORBORUM

Aurigo accidentalis, S. sp. 2. Aurigo febricofa, S. sp. 8. Aurigo typhodes, S. sp. 10. Aurigo neophytorum, S. sp. 12. Aurigo Indica, S. sp. 3.

236

CL. IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio. Vitia, S. CL. I. L. CL. XI. V. CL. X. Morbi organici, Auctorum.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Cachesia icherica, McTia. 11L 301.

Aurigo a venenis, S. fp. 4.

Sensus depravati aut deleti ex organorum externorum vitio. Dyfaesthesiae, S. CL. VI. O. I.

G. LXXXVIII. CALIGO.

Visus imminutus vel abolitus.

Caligo, S. G. 153. V. 288.

Cataracta, S. G. 152. L. 109. V. 239.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Amaurosis, S. G. 155. L. 110. V. 238.

Mydriasis, V. 237.

Synizesis, V. 240.

Glaucoma, V. 241.

AMBLYOPIA G. LXXXIX.

227

Visus depravatus.

Auste

Amblyopia, S. G. 154.

Suffusio, S. G. 217.

Phantasma, L. 73. V. 287.

Presbytia, L. 307.

Myopia, L. 308.

Haemalopia, V. 289.

Marmaryge, V. 290.

Diplopia , S. G. 218.

Dysopia, V. 291.

G. XC.

DYSECOEAL

Auditus imminutus vel abolitus.

Dyfecoea, S. G. 158. V. 286.

Cophosis, S. G. 160. L. 112.

Surditas, V. 247.

G. XCI.

PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159.

Syrigmus, S. G. 219. L. 72.

G. XCII.

ANOSMIA.

Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248.

G. XCIII. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel depravatus.

Agheustia, S. G. 157. L. 114.

Apogeusis, V. 249.

G. XCIV. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel depravatus.

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118.

Anodynia, V. 284.

G. XCV. ANAPHRODISIA:

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164. 2 THA ATTE

Atechnia, L. 119.

Agenesia, V. 283.

Strabificus, S. G. 116 L. 204-V. 514

O. II. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

G. XCVI. APHONIA.

Vocis plena suppressio citra coma aut syncopen. Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253.

G. XCVII. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. 165. V. 257.

G. XCVIII. PARAPHONIA.

Vocis sonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Asaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

G. XCIX. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ischnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

G. C. STRABISMUS.

Oculorum motus inaequalis.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514.

G. CI. CONTRACTURA.

Geniculorum contractio rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299.

Obstipitas, S. G. 118.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

O. III. APOCENOSES.

Fluxus, five fanguis aut humores alii solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenofes, V. CL. II. O. II.

Fluxus, S. CL. IX.

Morbi evacuatorii, L. CL. IX.

G. CII. PROFUSIO.

Fluxus fanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. St. Boerh. 218.

G. CIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99.

G. CIV. PTYALISMUS.

Fluxus falivae.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103.

G. CV. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113.

G. CVI. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra sine libidine stillicidium.
Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118.

O. IV.

O. IV. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

Epischeses, V. CL. III.

Morbi constrictorii, L. CL. VIII. O. II.

G. CVII. OBSTIPATIO.

Dejectiones nullae vel solito rariores.

Obstipatio, L. 166. V. 128.

G. CVIII.

ISCHURIA:

Urinae suppressio.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129.

Species funt,

a. Ischuriae renales.

Ischuria (Nephritica) a renum inflammatione, S. sp. 1. Schacht. Institut. med. pract. lib. VIII. cap. I. et VIII. Gort. Syst. prax. med. de ischur. Fabric. Hildan. de lithot. cap. IV. Lael. a Fonte, Cons. 59. Bonet. Sepulcht. lib. III. sect. XXIV. obs. IV. §. 3. Schenck. lib. III. de ischur. fals. cap. IV. et V. Etmuller Coll. pract. pag. 994.

Ischuria (nephrolithica) a renum calculo, S. sp. 2. Schacht. lib. citat. cap. II. et VIII. Gort. lib. citat. de morb. renum. Car. Pison. de morb. a colluv. seros. Schenck. de ischur. Bonet. Sepulchr. de

urin. suppress. et Medic. septentrional. de ischur.

Ischuria (Nephroplethorica) renalis a plethora, S. sp. 3. River. Cent. I. obs. 1. et 89. Etmull, Schacht. loco citat. Gaub. Pathol. de vit. mict. Ludwig. Instit. med. clin. Seb. Nasii Specul. method. med. pag. 167.

Ischuria (lunatica) renalis lunatica, S. sp. 4. Tulp. Obs. med. lib. II.

cap. 49.

Ischuria (Nephrospastica) renalis spasmodica, S. sp. 5. Schacht. Gort. lib. citat. Sydenh. Dissert. epist. tom. 1. Raulin des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1715.

Ischuria

- Ischuria (Nephrelmintica) renalis verminosa, S. sp. 6. Gort. lib. citat. Gaub. Pathol. de vit. mict.
- Ischuria (Nephrothromboides) renalis a sanguine congrumato, S. sp. 7. Mercat. de morb. intern. cur. cap. 12. Etmull. de laes. urin. fecret. pag. 314. Fernel. Pathol. lib. VI. cap. 13. Gort. Gaub. loc. citat.
- Ischuria (Nephropyica) a renum purulentia, S. sp. 8. Schenck. lib. III. de ren. tumorib. Gort. Gaub. loc. citat. Bonet. Sepulchr. de urin. suppress. Sal. Divers. de affect. particularib. cap. 14.
- Ischuria (Nephrophlegmatica) renalis pituitosa seu mucosa, S. sp. 9. Sal. Divers. loc. citat. Grasii Ephem. natur. cur. ann. III. obs. 212. Schacht. Gort. Gaub. Mercat. loc. citat. Varand. de ren. assect. Bonet. Sepulchr. de ischur. obs. IV. V.
- Ischuria (Nephroplegica) renalis paralytodea, S. sp. 10. Sal. Divers. Mercat. loc. cit. Horst. tom. II. lib. IV. obs. 49. Marcel. Donat. Histor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. Barthol. Cent. IV. epist. 18. 38. 39. Hoechstet. Obs. Dec. V. cas. 20. Claud. Chaptal. pract. Monspel.
- Ischuria (Suppleta) renalis ab alia evacuatione suppleta, S. sp. 11.
 - a. A diarrhoea et sudore, Marcell. Donat. Hist. med. mirab. lib. IV. cap. 27. Schenck. lib. III. de diabete, obs. 9.
 - b. Ab otorrhagia, Sennert. ex Plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.
 - c. A perspiratione, Vandermond. Journ. de med. tom. IV.
 - d. A sudore, Vandermond. Journ. de med. tom. X.

2. Ischuriae uretericae.

- Ischuria (Ureteritica) ureteritica inflammatoria, S. sp. 12. Sal. Divers. loc. citat. Ludwig Instit. clin. Gaub. Pathol. de vit. mict. Schacht. Instit. pract. de ischur. spur.
- Ischuria (Ureterolithica). Ischuria ureterica calculosa, S. sp. 13. Tulp. Obs. med. lib. II. cap. 45. Monro Essais d'Edinb. tom. VI. art. 68. Bonet. Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. Schenck. lib. III. de ureterib. Sal. Divers. loc. citat.

Hh

Ifchy-

Ischuria (Uretero-thromboides) Ischuria ureterica, a sanguinis grumo, S. sp. 14. Sal. Divers. Schacht. Gaub. loc. cit. Bonet. Sepulchr. de urin. suppres. obs. I.

Ischuria (Uretero - phlegmatica) ureterica a pituita, S. sp. 15. Gort. Prax. med. fyft. Schacht. Sal. Diverf. loc. citat. Bonet. Sepulchr. de urin. suppress. Sebast. Nas. Spec. meth. med. loc. citat. Epiphan. Ferdinand. hift. 97.

Ischuria (Ureteropyica) ureterica purulenta, S. sp. 16. Gort. lib. cit, de ureter. morb. Schacht. Sal. Divers. loc. cit.

Ischuria (Ureterostomatica) ab orificii ureterum inferioris clausura, Theod. Eller. Miscell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. Verdier ex Noel. Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obs. 17. Lieutaud Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1753. Franc. Sylv. Deleboe Prax. med. lib. H. Saltzmann. Obs. anat. pag. 62. Mercie, loc. cit. Herft. com. 11

3. Ischuriae vesicales.

Ischuria (Cystitica) a vesicae inflammatione, S. sp. 18. Schacht. Instit. practic. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1704. 1753. Boneti Sepulchr. lib. III. de urin. suppres. Forest. lib. XXV. observ. 27. 28. Zacuti Lustrani ex Galeno, Hist. med. princ. lib. II. no. IV. cap. 27. Schenck. Hift. 150.

Ischuria (Cystolithica) a vesicae calculo, S. sp. 19. Tulpii Observ. med. lib. IV. cap. 37. Effais d'Edinburg, tom. IV. Foresti lib. XXV. obf. 23. Fabric. Hildani , Cent. III. observ. 67. Car. Pisonis de morb. a colluv. seros. Boneti Sepulchret. de urin. suppress. observ. X. &c.

Ischuria (Cystospastica) a sphincteris vesicae spasmo, S. sp. 20. Mercati de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. Sebaf. Nasii Specul. method. med. part. II. pag. 267. Nenteri de ischur. Schachtii, Gorterii, Gaubii, Varandaei, loc. citat.

Ischuria (Cystoplegica) a vesicae paralysi, S. sp. 21. Lieut and Compend. medic. de ischur. Zacut. Lustan. ex Galeno Hist. princ. hist. 140. Mangeti Biblioth. medic. pract. tom. IV. Serane Thes. pro Reg. Cathedr. Hollerii de morb. intern. cap. 47. Amat. Lusitan.

Lustian. Cent. IV. cur. 10. Pringle Essais d'Edinburg; tom. 2. artic. 32.

Ischuria (Polyurica) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. Halleri Praelect. in Boerhaave, tom. II. J. 384. pag. 336. Forest. lib. XXV. observ. 14. Nenter. de ischuria. Paraei lib. XVI. cap. 48. Sennert. Pract. lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. Etmulleri, Riverii, Varandaei de ischur. &c.

Ischuria (Cystopyica) vesicalis purulenta, S. sp. 23. Felic. Plateri Mantis. Obs. 29. Camerar. Ephem. natur. curios. tom. II. Zacuti Lusitani ex Galeno, Hist. medic. princip. hist. 148. Hollerii de morb. intern. cap. 47. Sebast. Nasii Specul. method. med. part. 11. pag. 167. André des maladies de l'urethre, observ. 16. Vandermonde Journ. de med. tom. IX.

Ischuria (Cystothromboides) vesicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. Claudini consult. 141. Fabric. Hildani Cent. III. observ. 66.

Foresti lib. XXV. obs. 20. Zacuti Lustani ex Galeno Hist. med. princip. hist. 145. et ejustem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. Mercati de morb. intern. cur. cap. 12.

Ischuria (Cystophlegmatica) vesicalis a muco, S. sp. 25. Mercati loc. citat. Schacht. Instit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. Etmulleri de ischur. vesical. Amati Lusitani, Cent. VI. cur. 12. Zacuti Lusitani, Prax. medic. admirab. lib. II. observ. 64. Boneti ex Thom. Bartholini de urin. suppres. observ. 17.

Ischuria (Ectopocystica) a vesicae ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, Verdier Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. Felic. Plater. observ. pag. 830.

b. Proptoica, seu ab exocyste, Verdier ex Noel. lib. citat. obs. 17. Ischuria (Cystoprollica) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, slatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. S. sp. 27. Dodonaei Observ. medic. cap. 47. Schenck. lib. III. de ischur. observ. 6. Wepferi Dissert. de apopl. pag. 391. Vandermonde Journ. de med. tom. IX. pag. 261. Boneti Sepulchret. de urin. suppres. observ. 18. s. 4. Schacht. Gaubii, loc. citat.

Ischuria (Hysterocystica) vesicalis ab utero, S. sp. 28.

- a. Gravido, Nordman. Differt. de ischur. gravidar. Mauriceau, lib. I. cap. XV. Roderici a Castro, lib. II. cap. XV.
- b. Parturiente, Boneti ex Riolano de urin. suppres. Vandermonde ex Daran. Journ. de med. tom. V.
- lib. IV. part. I. sect. II. cap. X. XI. Schenck. lib. IV. de mol. fals. Schachtii, Gaubii, loc. citat.
- d. Tumoribus distento, Gaubii, Schachtii, loc. citat. Sennerti ibidem, ac supra, cap. XIII. Knoeffelii, E. N. C. ann. IV.
- e. Prociduo, Nordmann. Dissert. citata. Sabatier Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. Sennerti ibid. ac supra cap. XVI.
- Ischuria (Atretarum) urethrocystica a menstruis in vagina retentis, S. sp. 29. Amyand Transact. philos. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. Schenck. lib. IV. de part. genit, mulier. observ. 9. Heister. Chirurg. tom. II. pag. 951. Astruc de morb. mulier. tom. I, lib. 1. cap. 5.
 - Ischuria paradoxa, S. sp. 30. Morgagni Epistol. Le Clerc Journ. de med. Juill. 1755, p. 11.

4. Ischuriae urethrales.

Ischuria (Perinaealis) urethralis a perinaei tumore, S. sp. 31. Gallen. lib. de affect. loc. et ex eo Zacut. Lusuan. Hist. 149. Vandermond ex Daran. Journ. de med. tom. V. pag. 291. Tulp. Observ. med. lib. III. cap. X. Forest. lib. XXVI. obs. 2.

Ischuria (Urethrolithica) a calculo urethrae impacto, S. sp. 32. Schmid. Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obs. 89. Winckler. ibid. tom. VI. obs. 34. Zacut. Lustran. Prax. med. admirab. lib. II. obs. 66. 67. 68. Tulp. Obser. med. lib. III. cap. VIII. Bonet. Sepulchr. de urin. suppress. obs. 14. Barthol. cent. IV. epist. 5. Heister. Chirurg. tom. II. pag. 839.

Ischuria (Urethrophlegmatica) a muco urethram infarciente, S. sp. 33.

Bonet. Sepulchr. et medic. septent. Manget. Biblioth. med. pract.

Amat. Lusitan. cent. V. obs. 71. Forest. libr. XXV. obs. 25. Varand.

de ischur. Lud. Apin. Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 69.

Ischuria

Ischuria (Urethrothromboides) a sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34. Bonet. Med. septentrion. de ischur. et sepulchr. de urin. suppres. obs. XI. Forest. lib. 25. obs. 25.

Ischuria (Urethropyica) a pure urethram obstruente, S. sp. 35. Boinet. Med. septentr. de ischur. Forest. Scholio modo citat. Boer-haave Praesat.

Ischuria (Urethrohymenodes) a membrana in urethram impacta, S. sp. 36. Hist. de l'Acad. R. des sc. ann. 1714, hist. pag. 22.

Ischuria (Urethrelmintica) urethralis verminosa, S. sp. 37. Joan. Petr. Albrecht. Vid. Bonet. Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31. et Manget. Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. spectant. Vandermonde Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. Joan. Rhodii Centur. 3. obs. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obs. 77.

Ischuria (Urethritica) ab urethrae inflammatione, S. sp. 38. Hildan. Cent. IV. obs. 54. Forest. de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. versus finem. Varand. de affectib. ren. et vesic. cap. VII. Bonet. Medic. septentr. de ischuria, cap. 1. No. V. Goulard. des malad. de l'urethre. Heister. Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Ischuria (Carunculosa) a morbis, ut vocant, urethrae, S. sp. 39.

Amat. Lusitan. cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. Sharp Recherches critiq. cap. IV. Goulard. des malad. de l'urethre. Heister. Chirurg. tom. II. pag. 834. André des maladies de l'urethre, passim.

Ischuria (Hydrocelodes) ab urethrae ruptura in scrotum hiante, S. sp. 40. Joan. Lud. Apin. Miscell. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 68.

Ischuria (Cryptopyica) a penis intra corpus retractione, S. sp. 41. Fred. Hoffm. Consult. de morb. abdom. cas. 105.

Ischuria (Peridesmica) a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42.

Bonet. med. septentr. de Ischuria, cap. 1. No. VIII.

Ischuria (phimosica) urethralis a phimosi, S. sp. 43. Horst. tom. II. lib. IV. pag. 274.; Goulard. des malad. de l'urethre. Heist. Chirurg. tom. II. pag. 818. Bonet. Sepulchr. de ischur. obs. XV.

Ischuria (aspadialis) ab urethrae clausura, S. sp. 44. Heister. Chi: rurg. tom. II. pag. 818. et 951. Horst. tom. II. obs. 55. Joan. Wieri obs. pag. 221. Bonet. Sepulchr. de urin. suppres. observ. XV. schol. et med. septentr. de ischur. cap. 2. J. VI.

G. CIX. A MENORRHOEA.

Mensium suppressio.

Amenorrhoea, V. 130. Dyfmenorrhoea, L. 168.

O. V. TUMORE

Partis magnitudo aucta non phlegmonodea. Tumores protuberantes. L.

ANEURYSMA. G. CX.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurysma, S. G. 32. L. 282. V. 408.

G. CXI. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam? Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407.

ECCHYMOMA: G. CXII.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens, Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. Sugillatio, L. 230. north gardiant dis (scholased () singel

C. CXIII. SCIRRHUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre fuppurans. sugro and singue (siegoryed) sire follower

Scirrhus, S. G. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. CXIV. CANCER.

Tumor scirrhodeus dolens, in ulcus mali moris abiens. Cancer, S. G. 20. V. 375. Boerb. 492. .VX ddo radoh eb tubinge? genen 8181, geq .111, mor G. CXV.

BUBO. G. CXV. Glandulae conglobatae tumor suppurans. Bubo, Llagi. so commismation coloonoo imo cana Bubo, S. G. 16. V. 368. Parotis, S. G. 17. V. 370. Hydanhous, S. G. 28. SARCOMA. G. CXVI. Extuberatio mollis, non dolens. Anobina illo aurub romu I Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376. Polypus, V. 377. Hyperofielis, V. 418. Porrus, V. 427. G. CXVII. VERRUCA: Extuberatio durior, scabra. meromen atomit ebel aul ne and Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426. Edopiae, S. Cl. I. O. VI. CLAVUS. G. CXVIII. G. CXXIV. Cuticulae crassities dura, lamellata.
Clavus, L. 278. V. 428. Callus five Tylloma, V. 429. John Pater Jan J. SimoH G. CXIX. LUPIA: Extuberatio subter cutem mobilis, mollis, non dolens. Prolapius, L. 292. Lupia, S. G. 37. Prolaplus es procedentis, Gant. Pathole 185. Encyftis, V. 420. LUXATIO, G. CXXVI. Os ex fua in junchuris MOLLD NA A D G. CXX. Extuberatio durior, mobilis, tendini insidens. Ganglion, L. 287. V. 379. Exarchrema , S. 60.

G. CXXI. HYDATIS. .. 10 .2 . ellerad

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34.

(ILV of)

Phlyctaena, L. 273. V. 442.

Luxatura, L. 256.

E48 GENERA MORBORUM

G. CXXII. HYDARTHRUS.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

G. CXXIII. EXOSTOSIS,

Tumor durus offi infidens. anglob non aillor oisendural

Exoftolis, S. G. 29. L. 290. V. 417.

Hyperoftolis, V. 418.

O. VI. ECTOPIÆ.

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI.

G. CXXIV. HERNIA:

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. Gaub. Pathol.

G. CXXV. PROLAPSUS.

Partis cujusdam ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, Gaub. Pathol.

G. CXXVI. LUXATIO.

Os ex sua in juncturis sede dimotum,

Luxatio, Gaub. 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60.

Diastasis, S. 61.

G. CYXII

Luxatura, L. 236.

Vehicularis humore aqueo

Physhems, L. sys. V. sys.

O. VII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII.

Vitia dialytica et folutiones continui, L. Cl. XI. O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Diffolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXXVII.

VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. Boerb. 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243.

G. CXXVIII.

ULCUS.

Partis mollis folutio purulenta vel ichorofa:

Ulcus, S. G. 71. L. 249.

Exulceratio, S. G. 72.

Sinus, S. G. 73. V. 492.

Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. Boerh. 413.

Cacoethes, L. 250. V. 485.

Phagedaena, V. 488.

Noma, L. 251. V. 489.

Carcinoma, L. 252. V. 487.

Ozaena, L. 253. V. 500.

Therioma, V. 486,

Sycosis, V. 490.

G. CXXIX.

HERPES.

Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentia, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443.

GENERA MORBORUM 250

G. CXXX. TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum; ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. CXXXI.

PSORA.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Pfora , L. 265. sillom sirreq estasoro esapor oinu sillo Scabies, S. G. 304. V. 444.

G. CXXXII. FRACTURA.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae. Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. Boerb. 339.

G. CXXXIII.

CARIES.

Effects S. C. 74. Liery V. 4911 Etch. 413. Cacoches, L. 250. V. 485. Abut March

> News, Lasi. V. 480. Cardinoma, L. 252. V. 23K.

Hoges S. C. 7. L. c68. V. 447.

Ozacus, L. 253. V. 500.

Therioma, V. 485.

Sycoffs, V. 4901

Ulcus offis.

CHESTER.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493.

HERPES, ALLERANT

Enly daenac vel ulcufoula placima, gregolia, for encia, cy-

PARS QUINTA.

SYSTEMA

MORBORUM SYMPTOMATICUM,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES, ET GENERA,
CUM CHARACTERIBUS PROPOSITUM

A

JOANNE BAPTISTA MICHAELE SAGAR,

CIRCULI IGLAVIENSIS IN MORAVIA, PHYSICO REGIO:

Viennae 1771,

PARSQUINTA

SISTEMA

MORBORUM SYMPTOMATICUM,

THE SECUMD UM

CLASSES, ORDINES, ET GENERA,

CUM CHARACTERIBUS PROPOSITUM

A

JOANNE BAFTISTA MICHABLE SAGAR,

CINCULT ICLAVIENSIS IN MORAVIA, PHYSICO HEGIOS

Viennac 1771.

SYSTEMA

MORBORUM SYMPTOMATICUM. CLAVIS CLASSIUM.

- I. VITIA, Symptomata folidorum externa, palpabilia, chirurgiæ auxiliis curanda fine notabili cachexia.
- II. EXANTHEMATA, febris cum efflorescentia cutis varia.
- III. CACHEXIE, coloris, figuræ, molis in corporis habitu mutatio absque febre vehementi.
- IV. Dolores, sensationes molestæ ad febres, aut phlegmasias non referendæ.
- V. Fluxus, exitus insoliti cujusvis solidi, vel sluidi è cor-
- VI. SUPPRESSIONES, meatuum impeditio; hinc excretionum consuetarum in sanitate impedimentum manu chirurgica non curandum.
- VII. ANHELATIONES, motus spasmodici iterati, desatigantes pectoris, cum respiratione sonora, molesta, sine sebre notabili.
- VIII. SPASMI, contractio vel constans, vel interpolata; invita, musculorum motum localem efficientium.
- IX. DEBILITATES, impotentia sentiendi, adpetendi, imaginandi, organa, artusque movendi more ad sanitatem necessario.
- X. Phlegmasiæ, febris cum pulsu duro, dolore topico, inflammatione partis.
- XI. FEBRES, frigus, calor, pulsus frequens, respiratio aucta viribus artuum imminutis, depravatis; vel sola virium Ii 3 artuum

artuum notabilis imminutio fine mutatione pulsus; sino evacuatione notabili &c.

XII. VESANIE, error mentis in imaginatione, adpetita; judicio.

CLASSIS I.

GENERUM CHARACTERES.

III. CACHENIE, colAis I firm I Whis in corporis habitu

Character Classis: Syndrome symptomatum cutaneorum in solidis palpabilium, morbi Chirurgici vulgo dicti.

ORDO I. MACULE, mutationes coloris nativi.

I. LEUCOMA, macula opacans corneam.

II. VITILIGO, macula cutem deprimens corymbosa.

III. EPHELIS, macula cutis corymbofa, fusca.

IV. GUTTA ROSEA, macula faciei corymbosa, rubra,

V. NEVUS, macula congenita protuberans, vel non.

VI. ECCHYMOMA, macula a fanguine sub cute effuso.

QRDO II. EFFLORESCENTIE, tumores humorales exigui, gregales absque pyrexia.

VII. PUSTULA, phyma parvulum apice suppurans, rumpendum, subin in crustam abiens.

VIII. PAPULA, phyma parvulum desquamandum, nec sup-

IX. PHLYCTENA, vesicula fluido seroso plena.

X. VARUS, tuberculum durum, constans.

XI. HERPES, papularum prurientium corymbus.

XII. EPINYCTIS, phlyclænarum atrarum dolens congeries.

XIII. PSYDRACIA, phymata eryfipelatofa.

XIV.

XIV. HIDROA, exanthemata miliaria phlyctænoidea sine sebre ac asthenia.

ORDO III. PHYMATA, tumores humorales solitarii.

XV. ERYTHEMA, phyma rubrum calens, diffusum.

XVI. OEDEMA, phyma album, indolens, molle, impressionem digiti servans.

XVII. EMPHYSEMA, phyma pallidum, elasticum.

XVIII. Scirrhus, phyma durum, indolens, cuti con-

XIX. Bubo, phyma scirrhoso-phlegmonoideum in glandulis plerumque inguinalibus.

XX. PAROTIS, bubo juxta aurem.

XXI. FURUNCULUS, phyma subdurum, inflammatum; prominens, vorticem habens incongerendum.

XXII. ANTHRAX, phyma apice gangrænosum, in ambitu inflammatum.

XXIII. CANCER, phyma scirrhosum, lancinans.

XXIV. PARONYCHIA, phlegmone extremi digiti. I .VIX

XXV. PHIMOSIS, phlegmone præputii.

ORDO IV. EXCRESCENTIE, tumores à solidis morbose adauctis.

XXVI. SARCOMA, excrescentia carnosa. MANG. HIVAX

XXVII. CONDYLOMA, excrescentia cutanea tendineave.

XXVIII. VERRUCA, excrescentia cutanea globosa.

XXIX. PTERYGIUM, excrescentia plana in oculi cantho.

XXX. HORDEOLUM, excrescentia varo similis ad tarsos palpebra.

XXXI. BRONCHOCELE, excrescentia gutturis. ABM WALL

UVI

XXXII. Exostosis, excrescentia offis instar dura.

ORDO V. CYSTIDES, tumores capsulati sluido referti.

XXXIII. ANEURYSMA, cyftis arteriofa, pulsu noscenda.

XXXIV. VARIX, cystis venosa.

XXXV. HYDATIS, cystis lymphæ ductuum.

XXXVI. MARISCA, tumor fanguine turgens in margine podicis, isque pertinax.

XXXVII. STAPHYLOMA, cystis corneæ, vel corneam perforans.

XXXVIII. LUPIA, cystis in articulis spisso sluido plena.

XXXIX. HYDARTHRUS, cystis articuli aquosa.

XL. APOSTEMA, cyftis purulenta.

XLI. Exomphalos, cystis umbilicalis sæpius aquosa.

XLII. OSCHEOPHYMA, cystis in scroto variis repleta.

ORDO VI. ECTOPIE, partium solidarum è sua sede dimotio sensibus obvia, continentibus relaxatis.

XLIII. EXOPHTHALMIA, ectopia oculi.

XLIV. BLEPHAROPTOSIS, ectopia palpebræ.

XLV. HYPOSTAPHILE, ectopia uvulæ.

XLVI. PARAGLOSSE, ectopia linguæ.

XLVII. PROPTOMA, ectopia appendicis alicujus corporis externæ morbofa.

XLVIII. EXANIA, prolapfus ani.

XLIX. Exocystes, prolapsus vesicæ urinariæ.

L. HYSTEROPTOSIS, prolapsus uteri.

LI. GASTROCELE, hernia stomachi.

LII. OMPHALOCELE, hernia umbilici.

LIII. LAPAROCELE, hernia ventralis seu abdominalis.

LIV. MEROCELE, hernia cruralis.

ORRO

LV. BUBONOCELE, hernia inguinalis.

LVI. OPOODEOCELE, hernia foraminis ovalis.

LVII. ISCHIOCELE, hernia intra tuber ischii & os fa-

LVIII. COLPOCELE, hernia vaginalis.

LIX. PERINEOCELE, hernia perinæi.

LX. ENCEPHALOCELE, hernia cerebri.

LXI. HYSTEROLOXIA, uteri obliquitas.

LXII. PARORCHIDIUM, ectopia testiculi.

LXIII. EXARTHREMA, offium mobilium luxatio.

LXIV. DIASTASIS, offium immobilium recessus.

LXV. Loxarthrus, offium immobilium obliquitas refpectiva citra spasmum & exarthrema.

ORDO VII. PLAGE, continui solutiones.

LXVI. VULNUS, continui solutio molli in parte hians, cruenta.

LXVII. OPERATIO, studiosa solutio continui ad aliquid eximendum: ut lithotomia.

LXVIII. PUNCTURA, continui folutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente.

LXIX. SUTURA, studiosis puncturis mediante acu factis; silisque trajectis solutorum contractio.

LXX. Morsus, vulnus armis animalium factum.

LXXI. CONTUSIO, partis cujuscunque in minimis vasculis, particulis adtritio, fractio.

LXXII. AMBUSTIO, plaga igne facta, succedentibus inflammatione, phlyctænis, vel eschara.

LXXIII. FRACTURA, divisio ossium in fragmenta sepazi rabilia.

LXXIV. FISSURA, offium divisio rimam referens.

LXXV:

LXXV. RUPTURA, ligamentorum, tendinumve ab offibus divulsio, ruptio, excoriatio.

LXXVI. AMPUTATIO, vulnus detruncatione partis totalis factum.

LXXVII. ULCUS, vulnus suppuratum partis carnosæ. Fis-TULA, ulcus cortice calloso vaginatum, ore angustatum.

LXXVIII. RHAGAS, fissura cutis arida.

LXXIX. ESCHARA, crusta mortua partis sæpius causticis facta.

LXXX. CARIES, offis erofio cava, vel aspera periostio exfoliato denudata plerumque nigra.

LXXXI. ARTHROGACE, ulcus medullæ cum offis carie; exoftofi.

ORDO VIII. DEFORMITATES, vitia vin sanitatem ladentia.

LXXXII. GIBBOSITAS, thoracis dilatatio prominens.

LXXXIII. Lordosis, offium incurvatio absque molestia.

LXXXIV. LAGOSTOMA, labium oris fissum.

LXXXV. APELLA, præputii, vel alterius partis liberæ ab-

LXXXVI. IMPERFORATIO, præclusio meatus naturalis; ut ani, vaginæ &c.

LXXXVII. POLYMERISMA, partium integrantium nume-

LXXXVIII. EPIDOSIS, appendicum incrementum incon-

LXXXIX. ANCHYLOMERISMA, partium concretio.

XC. HIRSUTIES, pili copiosiores, longioresque.

XXXX

XCI. CICATRIX, callus replens ulcerationes confolidatas.

CLASSIS II.

GENERUM CHARACTERES.

EXANTHEMATA.

Character Classis: Febris cum efflorescentia cutis maculata; varia, pustulosa, papulosa, phlyctænoidea &c. sæpius maligna.

ORDO I. EXANTHEMATA, contagiofa.

XCII. PESTIS, eruptio bubonum, anthracum, purpuræ,

pemphigi, pyrexia typhodes.

XCIII. VARIOLA, eruptio pustularum phlegmonoidearum; hæ suppurantes, escharoticæ, deciduæ, cicatrisantes; febris decatessara; præludit cephalalgia, lumbago, & subin vomitus, nausea.

XCIV. PEMPHIGUS, eruptio phlycaenarum avellanis simi-

lium in artubus, pyrexia.

XCV. Purpura, eruptio maculosa, indolens, similis pulicum morsui, sine tamen puncto infixionis aculei, cum febre typho, vel remittente, lingua plerumque profunde rubra.

XCVI. RUBEOLA, papulæ rubræ, uniformes, evanescentifurfuraceæ, febris hebdomadaria, præludium catarrhosum.

XCVII. MILIARIS, eruptio phlycamarum milii semine non majorum cum sudore vappido, febris continua vel remittens; præludit oppressio præcordiorum, pulsus contractus, urina minus tincta, semipellucida, asthenia, lingua plerumque alba.

XCVIII. ERYSIPELAS, eruptio erythematis cum febre decatessara; tumidula superficialis, dilatabilis, desquamabilis.

XCIX. SCARLATINA, eruptio maculosa ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, desquamabilis, sine præludio catarrhali, cum sebre plerumque ephemera.

C. ESSERA, eruptio plerumque apyreta, suberysipelatosa subito accedens per vices & recedens; vidi hanc in puero semel cum sebre ephemera gravi, & sub recessione esserva qualibet alvus sluebat cruenta.

CI. APHTHA, eruptio pustulosa, phlyetænoidea, & ulcerosa dolens & urens in ore, vel pudendis, sebris hectica obscura, somnolentia. An in pudendis observatæ dum in ore exstant? Saltem id vidi in meis infantibus.

CLASSIS III.

GENERUM CHARACTERES.

CACHEXIÆ

Character Classis: Vitiosus corporis habitus quoad volumen, æqualitatem, & colorem.

ORDO I. MACIES, diminutio voluminis corporis ex confumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.

CII. TABES, macies cum amphimerina lenta fine tuffi.

CIII. PHTHISIS, macies cum amphimerina lenta, tussi & anacatharsi purulenta: Dulcamara una fors medicina?

CIV. ATROPHIA, macies fine febre & tuffi.

Mik a MCVIII.

CV. HAEMATAPORIA, macies ex inopia sanguinis. Descriptio: successu accedens virium debilitas, pertinacior aurium

sibilus,

sibilus, appetitus languens, facies lurida, epidelio tecta, pallidissima, alvi sluxus, diabetes, sudores subin profusi, lipothymiæ, tibiæ tumidæ, quandoque hydrothorax his succedens, vigiliæ, suspiria, animi abjectio, mæror, morsis timor, pulsus vacuus. Lieutaud pag. 52. Ant. de Haen Tom. VI. pag. 114.

CVI. ARIDURA, macies, exsiccatio, unius tantum partis.

ORDO II. INTUMESCENTIE, deformitas ex volumine, mole, auctis.

CVII. PLETHORA, intumescentia universalis ex abundantia boni sanguinis: Diagnosis; amystidis & ventris eultus, pulsus plenus, venarum amplitudo conspicua, æstus & gravitas totius corporis, respirandi dissicultas, lassitudo spontainea, stupor artuum, partes epidelio tectæ ruberrimæ, temperamentum sublaxum.

CVIII. POLYSARCIA, intumescentia universalis ab adipe. CIX. PNEUMATOSIS, intumescentia universalis ab aëre.

CX. ANASARCA, intumescentia universalis cedematosa.

CXI. Phlegmatia, intumescentia partium inferiorum edematosa.

CXII. PHYSCONIA, intumescentia abdominis à partibus solidis sine graviditate & sluctuatione.

CXIII. GRAVIDITAS, intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens & partu terminanda; pathemata gravidarum, menostasia, mutationes oris tineæ, motus infantis.

ORDO III. HYDROPES PARTIALES, tumores à fluidis in cavitatibus congestis, abdomine, &c.

CXIV. HYDROCEPHALUS, hydrops capitis à sero.

CXV.

CKV.

- CXV. PHYSOCEPHALUS, hydrops capitis à flatu?
- CXVI. HYDRORACHITIS, tumor cysticus ex hiatu verte-
- CXVII. A SCITES, hydrops totius abdominis à fluido non classico, gravis & fluctuosus.
- CXVIII. HYDROMETRA, tumor hypogastrii sine graviditate ab utero sluidis distento, rotundus, gravis, sluctuans.
- CXIX. PHYSOMETRA, tumor hypogastrii à slatu uterum distendente; rotundus, elasticus, levis, bombos ad pressionem emittens.
- CXX. TYMPANITES, hydrops totius abdominis à flatu, elasticus & levis.
 - ORDO IV. TUBERA, tumores partium folidarum non hydropici, externi, cachexia.
- CXXI. RACHITIS, deformitas ex articulorum tumore duto, carnium marcore, capitis mole; ingenium præcox in infantibus, offiumque flexilitas.
- CXXII. Serophula, tumor scirrhosus glandularum colli, mesenteriique cum labiis nasoque crassioribus.
- CXXIII. CARCINOMA, ulcera cancrofa cum doloribus lancinantibus, serpentia, vasa tumida atrorubra.
- CXXIV. LEONTIASIS, cognoscitur ex papillis setaceis; vel corniculatis cutim exasperantibus: aspectus hominis ferinus.
- CXXV. MALIS, tumores fæpius purulenti, vel ulcera cum infectis vermiformibus passim enata.
- GXXVI. FRAMBESTA, excrescentiæ fungosæ mori instar granulosæ sæpius eum ulceribus.

KK3

- ORDO V. IMPETIGINES, morbi contagiosi chronici, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, inducunt.
- CXXVII. SYPHILIS, ulcuscula, porri, bubones, ficus, nodi, tophi post gonorrhæam plerumque; dein pustulæ crustosæ, dolores nocturni, osteocopi, exostoses, caries, macies, & color luridus, morbum adesse loquuntur palam.
- CXXVIII. Scorbutus, stomacace, maculæ lividæ, violaceæ, lassitudo matutina, lurida facies, urina pellicula tecta: scorbutus acidus probabiliter est chimæra.
- CXXIX. ELEPHANTIASIS, facies deformis, tubera callofa, ozæna, raucedo, cutis elephantina, crassa, unctuosa, in extremis artubus anæsthesia.
- CXXX. LEPRA, cognoscitur ex tuberculis, scabie majoribus, vel crustis & squamis diffusis, herpeticis, pruriginosis, escharoticis.
- CXXXI. SCABIES, pustulæ pruriginosæ lentis magnitudine inter digitos, poplitem, &c. primum phlycænoideæ; dein crusta albicante tecæ.
- CXXXII. TINEA, cognoscitur ex crustis slavis, vel griseis; ulcerosis, per caput dispersis.
- ORDO VI. ICTERITIE, cognoscuntur ex totius cutis colore inassueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido, sine pyrexia notabili.
- CXXXIII. Aurigo, flavedo ad aureum vel aurantium tendens colorem, præcipue seleroticæ.
- CXXXIV. MELASICTERUS, color cutis, vel & scleroticæ niger, atrolividus, fuliginosus.

ORDO

CXXX V.Pho enigmus, color ruber cutis, maculosus; diffusus sine pyrexia.

CXXXVI. CHLOROSIS, est pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, sæpius cum pica.

ORDO VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ, noscuntur ex signis classeos, & adfinitate cum prioribus ordinibus.

- CXXXVII. PHTHIRIASIS, exortus pediculorum cum exulceratione & alopecia.
- CXXXVIII. TRICHOMA, cognoscitur ex capillis invicem complicatis, adglutinatis inextricabiliter sæpius cum phthiriasi.
- CXXXIX. ALOPECIA, capillorum lapsus, cuticulæ des-
- CXL. Elcosis, copiosa, ampla, ulcera, chronica, fœtida, cariosa cum pyrexia lenta.
- CXLI. GANGRÆNA, mors partis, laxa dein resolutio; foetor.
- OXLII. NECROSIS, partis mors sine prævio tumore, lenta; ordinario cum dolore rodente, dein exsiccatio, induratio, nigredo.

CLASSIS IV.

GENERUM CHARACTERES.

DOLORES.

Character classis: ingrata & molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ustione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem.

ORDO

ORDO I. DOLORES VAGI, sæpius universales, aut cutanei, ad phlegmasias non referendi.

CXLIII. ARTHRITIS, articulorum dolor spontaneus, periodicus a synovia corrupta.

CXLIV. OSTEOCOPUS, offium dolor non erraticus & internus in artubus a periostio infecto.

CXLV. RHEUMATISMUS, dolor diuturnus in parte carnosa artuum sine rheumate.

CXLVI. CATARRHUS, collo vicinarum partium dolor à frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.

CXLVII. Anxietas, molestia, ad loci mutationem continuam cogens.

CXLVIII. LASSITUDO, molestia cum debilitate, quæ ad quietem invitat.

CXLIX. STUPOR, molestia, quæ sensum tactus obscurat.

CL. PRURITUS, molestia, ad scalpendum cogens.

CLI. ALGOR, molestia, qualis à summo aëris frigore exci-

CLII. ARDOR, molestia qualis a summo aëris calore producitur.

ORDO II. DOLORES CAPITIS, faciei vel capillitii.

CLIII. CEPHALALGIA, gravativus capitis dolor.

CLIV. CEPHALÆA, periodicus, diuturnus, tensivus capitis dolor.

CLV. HEMICRANIA, dolor alterutrius lateris frontis.

CLVI. OPHTHALMIA, dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia.

CLVII. OTALGIA, dolor aurium?

CLVIII. ODONTALGIA, dolor maxillarum, dentiumque.

ORDO III. Dolores Pectoris, anhelationis expertes.

CLIX. Pyrosis, ardor cofophagi ad stomachum extensus.

ORDO IV. Dolores Abdominis interni.

CLXI. CARDIALGIA, molestia in stomacho syncopen minitans.

CLXII. GASTRODYNIA, dolor vehemens epigastrii, sto-

CLXIII. COLICA, dolor intestinorum.

CLXIV. HEPATALGIA, dolor hypochondrii dextri, hepatisve.

CLXV. SPLENALGIA, dolor vel molestia in regione lienis.

CLXVI. NEPHRALGIA, dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, ruris stupore in seminis, sine sebre acuta.

CLXVII. HYSTERALGIA, dolor uteri sine nisu parturitionis, & phlegmasia magna.

ORDO V. DOLORES EXTERNARUM partium locales.

CLXVIII. MASTODYNIA, dolor mammarum.

CLXIX. RACHIALGIA, dolor abdominis & spinæ dorsi in brachiorum paralysin, aut convulsiones desinens.

CLXX. Lumbago, dolor lumborum corporis erectionem impediens.

CLXXI. Is CHIAS, pelvis & coxendicis dolor sæpius claudicationem inducens: hoc morbo multum laboravi ipsus, venæ sectio & infusum casseæ nigrum semper me juvit, & penitus liberavit abstinentia à vinis acidis.

CLXXII. PROCTALGIA, dolor podicis citra tenesmum & phlegmasiam.

I.I.

CLXXIII.

CLXXIII. PUDENDAGRA, dolor genitalium citra dysuriam, ischuriam, phlegmasiam notabilem.

CLXXIV. DIGITIUM, dolor periodicus articuli cujusdam digiti cum emaciatione sine omni phlegmasia; ossis friabilitas: vide Sauvages p. 150. T. I.

CLASSIS V.

GENERUM CHARACTERES.

F L U X U S.

Character Classis: exitus insolitus cujusvis sluidi; vel solidi è corpore.

ORDO I. SANGUIFLUXUS, sanguinis vel saltem sanguinolentæ materiæ ejectio sine alvi fluxu.

CLXXV. HEMORRHAGIA, fluxus sanguinis è naribus.

CLXXVI. HEMOPTYSIS, sanguinis expectoratio cum tusti fine pyrexia acuta.

CLXXVII. STOMACACE, fluxus sanguinis è gingivis sæpius sætidis, putridisve.

CLXXVIII. HEMATEMESIS, sanguinis rejectio ex œsophago cum vomitorio conatu, observantur & sæces alvi sanguine tinctæ.

CLXXIX. HEMATURIA, fanguinis, fluidive rubri per vias urinarias emissio.

CLXXX. MENORRHAGIA, sanguinis per uterum, aut vaginam sluxus vitiosus, nimius.

CLXXXI. ABORTUS, fœtus immaturi, fæpius cum menorrhagia ex utero exclusio.

ORDO

ORDO II. ALVIFLUXUS sanguinolenti.

CLXXXII. HEPATIRRHOEA, est alvi fluxus per inferiora fanguinolentus, nec ater, nec torminosus.

CLXXXIII. HEMORRHOIS, est fluxus cruentus ex podice; subin vero glutinosus, ut ego habeo; vel ex recto mariscis sæpius obsito.

CLXXXIV. DYSBNTERIA, est frequens, torminosa, sæpe tenesmoidea, mucosarum & sanguinolentarum sæcum depositio per inferiora.

CLXXXV. MELENA, fluidi atri per superiora, vel inferiora rejectio: vidi sepius.

ORDO III. ALVIFLUXUS non sanguinolenti.

LXXXVI. NAUSEA, est inanis vomendi conatus, & slatuum aut muci ex ore exigui tantum per os emissio: flatulentiæ genus analogum.

CLXXXVII. Vomitus, est palpabilium materierum non cruentarum facta per os, cesophagumque rejectio frequens ex ventriculo.

CLXXXVIII. ILEUS, gastrodynia, obstipatio, anxietas, & vomitus demum fæculentæ materiæ determinant bunc morbum.

CLXXXIX. CHOLERA, est syndrome ex vomitu, diarrhora, gastrodynia & subin surarum crampo.

CXC. DIARRHOEA, est excrementitiorum humorum frequens, copiosior, vel intempestiva dejectio.

CXCI. Coelia Ca, est albescentium, aut chyliacearum materierum per alvum dejectio plerumque profusa: in Venerabili Domino Stamitz vidi hanc.

CXCII. LIENTERIA, est vix mutatorum ingestorum dejectio; morbus hic frequens, sanabilis.

CXCIII.

- CXCIII. TENESMUS, muci pauci frequens dejectio per anum cum intensa dejiciendi cupiditate, & assiduo conatu.
 - ORDO IV. SERIFLUXUS, fluidi nec sanguinolenti, nec per alvum effluxus morbosus.
- CXCIV. EPHIDROSIS, est sudoris quantitate, qualitate, intempestivitate, peccantis essurus.
- CXCV. EPIPHORA, est vitiosus ex oculis humoris lacrymalis, sebacei, vel purulenti essuus.
- CXCVI. Coryza, est humoris serosi, mucosive è naribus effluxus sine ozæna, plerumque cum gravedine.
- CXCVII. PTYALISMUS, est salivæ uberior, frequentiorve ex ore rejectio, aut destillatio.
- CXCVIII. Anacatharsis, est muci, purisve è pectore facta per os cum tussi rejectio.
- CXCIX. DIABETES, subita post pastum potulentorum, vel urinæ utcunque coctæ nimia copia cum magna siti, per urinæ vias emissio.
- CC. ENURESIS, involuntaria doloris & ardoris expers mictio.
- CCI. PYURIA, est purulentæ, albescentis, aut viscido-mucosæ materiei mictio: physice eastis bonis avibus subin accidit.
- CCII. LEUCORRHOEA, est seroso-flavæ, puriformis, fœtidæ, atræ, materiæ ex utero delapsus, effluxus.
- CCIII. LOCHIORRHOEA, lochiorum nimius fluxus.
- CCIV. GONORRHOEA, est stillicidium sluidi seminalis, vel puriformis ex urethra, aut vagina.
- CCV. GALACTIRRHOEA, est stillicidium lactis ex mammis. CCVI. OTORRHOEA, est sluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

ORDO V. AERIFLUXUS, est flatus halitusve vitiosa emissio.

CCVII. FLATULENTIA, est morbus slatuum per inferiora, vel superiora emissione frequenti, & borborygmis designatus.

CCVIII. AEDOPSOPHIA, est flatuum per urethram, vel vaginam ex utero emissio: virginem salacem audivi sonitus hos emittere.

CCIX. Dysodia, est fœtor sudoris, variorumque miasmatum exsudantium: huc possunt referri & hæmorrhoides albæ, &c.

C L A S S I S VI. HVORD

GENERUM CHARACTERES.

SUPPRESSIONES.

Character Classis: meatuum impeditio, hinc solitarum excretionum in sanitate impedimentum.

ORDO I. SEROSORUM suppressiones.

CCX. ADIAPNEUSTIA, transpirationis naturalis & liquoris humectantis organa suppressio.

CCXI. STERILITAS, fecunditatis seu conceptus impedimenta, aut impeditio.

CCXII. Is CHURIA, urinæ retentio sine, vel cum ejusdem secretione; tumor aliquando hypogastrii, vel stupor renum adest.

CCXIII. DYSURIA, difficilis & dolorifica, sæpius ardens, urinæ emissio.

CCXIV. AGLACTATIO, lactis defectus.

ORDO

CCXV. Dyslochia, lochiorum suppressio.

ORDO

ORDO II. INGERENDORUM suppressiones.

CCXVI. DYSPHAGIA, deglutitio impedita.

CCXVII. ANGINA, respiratio impedita cum sensu obicis in gutture, cum, vel sine dysphagia, absque phlegmasia.

ORDO III. SUPPRESSIONES imi ventris.

CCXVIII. METEORISMUS, est inslatio slatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis: cholera sicca est species meteorismi.

CCXIX. MENOSTASIA, menstrua suppressa ac dolorifica.

CCXX. Dystocia, partus difficilis, impossibilis.

CCXXI. DYSHÆMORRHOIS, suppressio suetarum hæmor-rhoidum.

CCXXII. OBSTIPATIO, alvus segnis, obstructa: ab hæmorrhoidibus internis tumentibus, & obstipationem pertinacem causantibus sinistre tractatus pannitonsor Hossmann vir
dives mortuus est.

CLASSIS VII.

GENERUM CHARACTERES.

ANHELATIONES.

Character Classis: motus spasmodici, iterati pectoris cum respiratione sonora, molesta, absque pyrexia notabili.

ORDO I. Spasmodicæ, insultus sugaces sæpius iterati cum exspiratione sonora.

CCXXIII. EPHIALTES, anhelatio difficilis querula, cum infomnio terrifico oppressivo.

CCXXIV. STERNUTATIO, concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora everrente & sonora.

fympromani)

CCXXV.

- CCXXV. OSCEDO, repetita, lenta, profunda inspiratio, ore hiante, sæpius cum pandiculatione.
- CCXXVI. SINGULTUS, concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.
- CCXXVII. Tussis, concussio sonora, violenta, pectoris cum exspiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.
 - ORDO II. OPPRESSIVÆ, constantes cum metu suffoca-
- CCXXVIII. STERTOR, respiratio inter inspirandum sonum gravem, tremulum in gutture edens, sæpe cum alterno sibilo.
- CCXXIX. ASTHMA, est morbus chronicus, cujus præcipuum symptoma est periodice recurrens respirandi difficultas.
- CCXXX. ORTHOPNOEA, est præceps & ut plurimum acuta respirandi difficultas.
- CCXXXI. DYSPNOEA, est difficultas respirandi chronica, ut in assemble, sed non intermittens, unde ab assemble mate differt.
- CCXXXII. PLEURODYNE, anhelatio cum pectoris dolore fine febre.
- CCXXXIII. R HEUMA, cognoscitur ex difficultate respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur, vel præcedunt coryza, sternutatio, raucedo, cephalalgia, tussis: vix adest pyrexia notabilis: endemius hic morbus.
- CCXXXIV. HYDROTHORAX, differt à dyspnœa faciei pallore, manuum & pedum atque scroti ædemate, symptomatis

fymptomatis ephialtis; decubitus horizontalis impossibilis, pulsatio, sluctuatio aquarum ad sinem advertitur: ut in P. Einback observavi; insuper tussis sicca, vel humida, gravitatio & pressio ad diaphragma, pulsus contractus, intermittens, inæqualis, cordis palpitatio, diagnosin hujus morbi sirmant.

CCXXXV. EMPYEMA, differt ab hydrothorace per febrem hecticam, phthisicam, magis evidentem, maciem,
prægressam aliquam phlegmassam pectoralem neglectam,
sudores profusos nocturnos, ruborem genarum, post
pastum dyspnæam majorem, &c.

CLASSIS VIII.

GENERUM CHARACTERES.

COXILVI. PANDICI I.M. S. A. P. S. Rus focolline ex-

- Character Classis: contractio vel constans, vel interpolata; musculorum motum localem essicientium, eaque invita.
- ORDO I. SPASMI TONICI partiales, rigiditas organi, vel artus determinati.
- CCXXXVI. STRABISMUS, oculi spasmus axium opticarum divergentiam inferens.
- CCXXXVII. TRISMUS, maxillæ inferioris spasmus tonicus, vel etiam aliquando clonicus.
- mus tonicus, capitis nativam mobilitatem & directionem mutans.
- CCXXXIX. CONTRACTURA, artus cujusdam: ut brachii, cruris, &c. constans diuturna rigiditas.

ORDO

CCXL

CCXL. CRAMPUS, subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

CCXLI. PRIAPISMUS, penis injucunda rigiditas.

ORDO II. SPASMI TONICI generales.

CCXLII. TETANUS, spasmus generalis tonicus subito ortus cum dyspnæa.

CCXLIII. CATOCHUS, spasmus generalis tonicus sensim

factus fine dyspnœa.

ORDO III. SPASMI CLONICI partiales, agitatio invita & coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

CCXLIV. NYSTAGMUS, spasmus clonicus oculi vel pal-

pebræ.

COXE

CCXLV. CARPHOLOGIA, spasmus clonicus manuum, carpive in acutis.

CCXLVI. PANDICULATIO, spasmus artus successive ex-

tendens per vices, semivoluntarius.

CCXLVII. APOMYTTOSIS, succussio cutis & capitis tremula, violenta, cum exspiratione sonora quasi stertorosa.

CCXLVIII. CONVULSIO, agitatio invita artus vel mufculi cum animæ libertate, circumstantiarum perceptione; periodica. rum divergenciam interche.

CCXLIX. TREMOR, artus alterna per itus & reditus frequentes motitatio cum movendi voluntate concurrens.

CCL. PALPITATIO, pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate respondens.

CCLI. CLAUDICATIO, est inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibiliter dextrorsum, vel finistrorsum transfertur.

000 300

- ORDO IV. SPASMI CLONICI generales.
- CCLII. PHRICASMUS, est totius cutis succussio frigori-
- CCLIII. E CLAMPSIA, est artuum, vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscura-
- CCLIV. EPILEPSIA, est spasmus clonicus; periodicus, chronicus, artuum cum sensuum obscuratione: oleum stillatitium radicis valerianæ huc usque mihi contra hæc duo mala summum remedium observatum, quod per meos pharmacopæos egregios & expertos destillari curo.
- CCLV. HYSTERIA, est artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensa; urina hyalina, larga: contra hysteriam oleum destillatum essentiale vulvariæ fors adhuc palmam feret, quod pharmacopæi mei me authore parant.
- CCLVI. SCELOTYRBE, est motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens. Son termidely bushing the water of MIXIOO
- CCLVII. BERIBERIA, est motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris morbus.

di dimendus ver impoemits ib

will be did not be a series

CLASSIS IX.

GENERUM CHARACTERES. DEBILITATES.

Character Classis: impotentia sentiendi, appetendi, imaginandi, organa artusque movendi, more ad sanitatem necessario.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ, impotentia clare sentiendi.

CCLVIII. CATARACTA, visus debilitas ob maculam opacam pone & post pupillam: extractum hyoscyami hucusque mihi nihil præstitit exhibitum.

CCLIX. CALIGO, visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

CCLX. AMBLYOPIA, visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

CCLXI. AMAUROSIS, visus debilitas absoluta sine ulla organi opacitate observabili.

CCLXII. ANOSMIA, odoratus debilitas, aut olfaciendi im-

CCLXIII. AGHEUSTIA, gustus debilitas, aut gustandi im-

CCLXIV. DYSECOEA, auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

CCLXV. PARACUSIS, voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

CCLXVI. COPHOSIS, sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas aut impotentia, obice intra vel ultra labytinthum posito.

Mm a

CCLXVII.

- CCLXVII. AN ESTHESIA, tactus in toto corpore debilicas vel obscuritas sine stupore & sopore.
- ORDO II. ANEPITHYMIE, appetituum sensitivorum de-CCLXXXI. Aspervine communication and Alexandra Alexandra
- CCLXVIII. ANOREXIA, famis seu appetitus feriatio.
- CCLXIX. ADIPSIA, sitis feriatio. VOO VOORO
- CCLXX. ANAPHRODISIA, suppressio libidinis, feriatio, feu debilitas, aut impotentia.
 - ORDO III. DYSCINESIÆ, impotentia exercendi motus voluntati subjectos.
- CCLXXI. MUTITAS, voces articulatas edendi impotentia.
- GCLXXII. APHONIA, plenaria vocis suppressio citra stuporem, & fyncopen.
- CCLXXIII. PSELLISMUS, quasdam syllabas pronunciandi impotentia. mebos di murro cauro oridal sano
- CCLXXIV. PARAPHONIA; vocem solitam edendi impotentia, difficultas. ATMAMONAYT .VIXXXJOO
- CCLXXV. PARALYSIS, motus aut tactus vel utriusque in alterutro latere debilitas cum laxitate.
- CCLXXVI. HEMIPLEGIA, debilitas 'motus aut tactus', vel utriusque in alterutro latere, dextro, vel sinistro, tantum.
- CCLXXVII. PARAPLEXIA, debilitas motus ac tactus in utroque latere corporis infra caput.
- ORDO IV. LEIPOPSYCHIE, motuum viriumque vitalium debilitas.
- CCLXXVIII. ASTHENIA, totius corporis gradaria seu succeffiva debilitas sensibus integris.
- CCLXXIX. LIPOTHYMIA, virium muscularium totius corporis subitanea imminutio pulsu superstite.

Mm 3

- CCLXXX. SYNCOPE, motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione: u pulsus, &c.
- CCLXXXI. Asphyxia, omnium motuum & sensum apparens cessatio, mortem ipsam referens.
- ORDO V. COMATA, morbi soporosi, omnium actionum fe-
- CCLXXXII. CATALEPSIS, status soporosus cum artuum stexilitate, & ad quosvis novos situs retinendos aptitudine: facies rubet, oculi sixi, aperti, sudor frigidus, respiratio parva, lenta: quinquies vidi hunc morbum in mulieribus, & ultimatim summo cum dolore in pie defuncta mea uxore.
- mate subito ortus, ægrum in eodem situ, quo prehenfus est retinens, sine aptitudine cataleptica.
- CCLXXXIV. TYPHOMANIA, status soporosus facile excitabilis, sed illico rediens, cum frequenti mussitatione, seu somnio, & vividitate imaginationis & memoriæ; est coma vigil.
- CCLXXXV. LETHARGUS, status soporosus facile excitabilis cum summo imaginationis & memoriæ torpore, & febre.
- CCLXXXVI. CATAPHORA, status somnolentus facile excitabilis sine sebre, delirio, ac oblivione: vidi hunc semel & curavi morbum Casseæ insuso & chocolata, prævia venæ sectione.
- CCLXXXVII. CARUS, est sopor profundus sine stertore, seu est levis apoplexia, quam sese curasse sortem jactant minus versati Medici, dum carum curarunt.

CCLXXXVIII.

CCLXXXVIII. APOPLEXIA, est sopor profundissimus cum stertore, vel sonora respiratione, pulsu plerumque fortiore, rubedine faciei.

CLASSIS X.

GENERUM CHARACTERES.

PHLEGMASIAE.

Character Classis: febris cum pulsu duro, dolore topico, inflammatione alicujus partis, sanguine crusta inflammatoria tecto.

ORDO I. PHLEGMASIÆ membranaceæ.

CCLXXXIX. PHRENITIS, dolor capitis, delirium audax; vis artuum, pulsusque major, pyrexia acuta.

CCXC. PARAPHRENESIS, symptomata phrenitidis cum symptomatibus peripneumoniæ: piæ memoriæ Dominus Prælatus de Hennet Zarensis laboravit peripneumonia & inflammatione diaphragmatis cum lethargo.

& pulsus frequens, tussis; Rmus. P. Norbertus Zarensis ex dorsali pleuritide periit.

CCXCII. GASTRITIS, dolor epigastrii, nausea, febris typhodes, vel remittens maligna.

CCXCIII. ENTERITIS, dolor circa umbilicum vehemens, cum meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

CCXCIV. EPIPLOITIS, dolor circa hypogastrium & umbilicum juxta epiploi extensionem, pyrexia mitior, canalis intestinalis sat liber, & pervius, tumor sub integumentis observabilis.

CCXCV.

CCXCV. METRITIS, dolor & tumor in regione & extensione uteri, ac lumbis & inguinibus cum sebre ples
rumque remittente.

CCXCVI. CYSTITIS, dolor, tumor, hypogastrii tensio

cum dyfuria, vel ischuria, ac febre.

ORDO II. PARENCHYMATOS E phlegmasia.

CCXCVII. Myositis, febris acuta, dolores in diversis musculis artuum diu noctuque discruciantes; sanguis in patella est tectus gelatina alba: vulgo rheumatismus acutus.

CCXCVIII. CYNANCHE, dolor gutturis cum dyspnæa strangulante, dysphagia, pyrexia acuta, & inflammatione gutturis.

CCXCIX. CARDITIS, dolor sub sterno, pulsus inæqualis, frequens; palpitatio, cardialgia; cordis anxietas.

CCC. PERIPNEUMONIA, pyrexia acuta, dyspnæa gravis, fensus oppressionis gravativæ sub sterno, tussis cruenta, pulsus mollis ad sinem.

CCCI. CEPHALITIS, febris acuta cum delirio fomnolento, carphologia, afthenia.

CCCII. HEPATITIS, dolor, tensio, calor in regione hepatis cum pondere, tusti sicca, respiratione difficili, pyrexia plerumque amphimerina.

CCCIII. SPLENITIS, dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans cum febre remittente.

CCCIV: NEPHRITIS, dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus cum sebre acuta, dysuria, ischuria, &c.

CCCV. PHLEGMONE, inflammatio partis externæ, febris inflammatoria, dolor partis inflammatorius, fanguis crufta inflammatoria tectus.

CLAS-

CLASSIS XI. GENERUM CHARACTERES.

FEBRES

Character Classis: pulsus frequens, fortisve, respiratio aucta viribus artuum minutis; vel est virium vitalium augmentum, vel faltem in eodem statu perseveratio viribus artuum notabiliter minutis.

ORDO I. CONTINU & febres.

- CCCVI. EPHEMERA, decursus 4. dierum ad summum, vigor morbi illico, virium artuum non magna imminutio, pulsus illico unus ex criticis Ill. Bordeu: in pulsibus hujus Autoris me exerceo attentissimus, & invenio ex semiotica haud esse proscribendos; quamvis subinde fallant, secus, si ita procedere vellemus, tota semiotica eradi deberet; omne enim signum erroribus subjectum est. Quod pace summi viri Ant. de Haen dixerim de praxi medica benemeriti, & Professoris mei æternum venerandi.
- CCCVII. HEBDOMADARIA, decursus 7 dierum, incrementum fuccessivum, degeneratio major humorum, virium artuum debilitas, pulsus ab initio irritationis.
- CCCVIII. DECATESSERA, decursus intra 14 vel 20 & unam diem, pyrexia major, pulsus irritationis, lentum incrementum, virium artuum debilitas magna.
- CCCIX. TYPHUS, decursus ultra 20 & unam diem, pyrexia nulla, vel exigua in pulsu, debilitas maxima artuum: pulsus & urina bona, & æger moritur.

CCCX. HECTICA, decursus ultra mensem, pyrexia exigua, debilitas parva.

CCOXXL

ORDO II. REMITTENTES febres.

CCCXI. AMPHIMERINA, remissio quotidianæ typum servans, frigus in paroxysmis.

CCCXII. TRITEOPHIA, remissionis typus tertianæ, frigus fere nullum.

ORDO III. INTERMITTENTES febres perfecte.

- CCCXIV. QUOTIDIANA, accessus similes quolibet die accedunt, & recedunt.
- CCCXV. TERTIANA, accessus similes alternis diebus revertuntur, & recedunt.
- CCCXVI. QUARTANA, accessus similes duobus interpofitis diebus redeunt, & abeunt.
- CCCXVII. ERRATICA, accessus similes distantes ab invicementarious quam duabus diebus; vel incerti sunt accessus.

CLASSIS XII.

GENERUM CHARACTERES.

VESANIAE.

- Character Classis: est morbus animi, seu error in imaginatione, appetitu, aut judicio.
 - ORDO I. HALLUCINATIONES, imaginationes deceptivæ ex errore organi natæ.
- CCCXVIII. VERTIGO, apparens objectorum vacillatio; feu nutatio.
- CCCXIX. SUFFUSIO, objectorum, quæ non sunt, visio imaginaria.
- CCCXX. DIPLOPIA, hallucinatio, qua idem objectum multiplicatum apparet.

 CCCXXI.

- CCCXXI. SYRIGMUS, auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra aures principium.
- CCCXXII. HYPOCHONDRIASIS, morbus diuturnus, quo affectus se in mortis periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque levidensibus malis imaginatur; vel est hallucinatio circa propriam valetudinem nata ex philautia, salvo ratiocinio de reliquis.
- CCCXXIII. Somnambulismus, hallucinatio, qua fomniantes è lecto surgunt, seque diversis periculis exponunt.
 - ORDO II. MOROSITATES, cupiditates aut aversationes depravatæ.
- CCCXXIV. PICA, alimentorum inaffuetorum & indigestibilium appetitus cum assuetorum aversatione.
- ris, quam digeri potest.
- CCCXXVI. POLYDIPSIA, appetitus majoris folito copiæ potulentorum.
- CCCXXVII. ANTIPATHIA, quorundam objectorum tanta aversatio, ut ex eorum visu, vel olfactu æger gravia symptomata patiatur.
- CCCXXVIII. Nostal GIA, parentum, patriæ tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat; totus langueat, consumatur: Carniolis patriotis meis innatus morbus; junior Crisii ipse hoece malo laboravi; anima vix corpori adhæret, commercium hujus cum corpore sere est sublatum.
- CCCXXIX. PANOPHOBIA, summus pavor inter dormiendum sine caussa evidenti.
- CCCXXX. SATYRIASIS, effrænis, impudensque veneris cupiditas in viris cum libidinosa penis tentigine.

384 GENERA MORBORUM SAGAR!

CCCXXXI. NYMPHOMANIA, est effrænis in fæminis veneris cupiditas: duas jam metritide laborantes tractandas habui matronas, quæ simul ex furenti nymphomania quosquos mares ad coitum faciendum cogebant.

CCCXXXII. TARANTISMUS, est effrænis choreas agendi; faltandi, cupiditas.

CCCXXXIII. HYDROPHOBIA, est effrænis potulentorum aversatio, sæpius à morsu animalis rabidi: uxor mea pie defuncta puerpera decumbens ex metritide typhode, persape recurrente catalepsi, simul furens hydrophobica erat. An Rabies distinctum sit genus, ut Ill. Carolus Linnæus constituit?

ORDO III. DELIRIA, insomnia mentis judicantis à cere-

bri vitio.

CCCXXXIV. PARAPHROSYNE, delirium fugax, à veneno, aut altero morbo dependens.

CCCXXXV. A MENTIA, delirium universale mite, sine fu-

rore & audacia cum morbo diuturno.

CCCXXXVI. MELANCHOLIA, delirium particulare mite cum mœrore, ac morbo diuturno.

CCCXXXVII. MANIA, delirium universale cum furore, vel audacia, & morbo diuturno, ordinario fine omni febre notabili.

CCCXXXVIII. DEMONOMANIA, delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiæ tribuitur.

ORDO IV. ANOMAL & vesaniæ prioribus affines.

CCCXXXIX. AMNESIA, omnis memoriæ feriatio.

CCCXL. AGRYPNIA, pervigilium continuum.

NB 2 CCCXXXI

Summa igitur Generum est 340. in hoc systemate symptomatico; in ultima vero editione Ill. de Sauvages 315. constituerat; addidi ergo genera 25.

INDEX

INDEX

GENERUM.

Littera S. denotat Sauvages. L. Linneum. V. Vogelium. C. Cullenium & Sag. Sagar.

A Bortio, V. 97. C. 37. Abortus, S. 245. L. 204. C. 37. Sag. 181. Ablceffus, L. 232. V. 354. C. 7. Acatapolis, V. 149. Achlys, V. 242. C. 88. Achor, L. 264. V. 494. C. 7. Acrochordon, V. 426. Acrothymium, V. 426. Acyilis, V. 282. Addephagia, V. 297. Adiapneustia, Sag. 210. Adiptia, S. 163. L. 117. V. 281. Sag. 269. Adynamia, V. 225. Aedopiophia, S. 273. Sag. 208. Aegilops, V. 499. Æstus Volaticus, V. 220. Agalaxis, V. 133. Agenesia, V. 283. C. 95. Ageustia, L. 114. Agheustia, S. 157. C. 93. Sag. 263. Aglactatio, L. 170. Sag. 214. Aglutitio, L. 164. Agomphiafis, V. 482. Agrypnia, S. 238. L. 130. V. 286. · Sag. 340. Algor, S. 191. Sag. 151. Allotriophagia, V. 299. Alopecia, S. 312. L. 315. V. 525. Sag. 139. Amatoria, V. 17. Amaurosis, S. 155. L. 110. V. 238. C. 88. Sag. 261. 410

Amblyopia, S. 154. L. 108. V. 236. C. 88. 89. Sag. 260. Ambustio, Sag. 72. Amenorrhoea, V. 130. C. 109. Amentia, S. 233. L. 67. V. 337. C. 61. 64. Sag. 335. Amnesia, S. 237. C. 61. Sag. 339. Amphemerina, S. 84. L. 20. C. 3. Sag. 311. Amputatura, S. 70. L. 241. C. 127. Sag. 76. Anacatharlis, S. 262. C. 38. Sag. Anaesthesia, S. 161. L. 118. C. 94. Sag. 267. Anaphrodifia, S. 164. C. 95. Sag. 270. Anapleusis, V. 478. Anafarca, S. 281. L. 215. V. 313. C. 71. Sag. 110. Anatrope, V. 280. Anchylomerisma, Sag. 89. Ancyloblepharon, V. 504. Anchylops, V. 364. Anchylogloffum, V. 507. Anchylofis, L. 286. V. 508. Aneurisma, S. 32. L. 281. V. 408. C. 110. Sag. 33. Angina, S.147. L.46. V.49. C.10. Sag. 217. Convulfiva, V. 196. Angone, V. 196. Anhelatio, L. 157. Anoia, V. 337. Nn 3 Ano-

INDEX

Anodynia, V. 284. C. 94. Anorexia, S. 162. L. 116. V. 279. C. 43. Sag. 268. Anofmia, S. 156. L. 113. V. 248. C. 92. Sag. 262. Anthrax, S. 19. L. 272. V. 353. C. 7. Sag. 22. Antipathia, S. 225. L. 88. V. 285. Sag. 327. Anxietas, S. 187. L. 89. V. 134. Sag. 147. Apella, L. 311. V. 546. Sag. 85. Apeplia, V. 276. C. 43. Aphonia, S. 166. L. 115. V. 253. C. 96. Sag. 272. Aphtha, S.100. L. 9. V.501. C. 33. Sag. 101. Aphthola, V. 44. Apnoea, V. 265. Apogeulis, V. 249. C. 93. Apogeusia, V. 294. Apomyttolis, S. 127. Sag. 247. Apoplexia, S. 182. L. 101. V. 229. C. 40. Sag. 288. Apoplectica, V. 72. Apostema, S. 39. C. 7. Sag. 40. Apolyrma, V. 477. Aquula, V. 445. Archoptoma, V. 395. Arctura, L. 261. Argemon, V. 498. Ardor, S. 192. Sag. 152. Aridura, S. 278. L. 226. Sag. 106. Artetiscus, V. 554. Anhritis, S. 183. L. 60. V. 139. C. 23. Sag. 143. Arthrocace, S. 78. L. 256. C. 7. Sag. 81. Alaphia, V. 250. C. 98. Afcites, S. 288. L. 217. V. 314. C. 75. Sag. 117. Asphyxia, S. 175. L. 95. V. 275. C. 42. Sag. 281.

Affodes, V. 27.
Afthenia, S. 172. L. 92. V. 223.
Sag. 278.
Afthma, S. 145. L. 161. V. 268.
C. 52. Sag. 229.
Atecnia, L. 119. C. 95.
Atheroma, L. 285. V. 420. C. 119.
Athymia, V. 329. C. 62.
Atocia, V. 172.
Atonia, L. 120. C. 41.
Atreta, L. 312. V. 549.
Attritio, V. 475.
Atrophia, S. 277. L. 210. V. 308.
C. 66. Sag. 104.
Aurigo, S. 306. C. 87. Sag. 133.

Acchia, L. 270. C. 7. Balbuties, V. 259. Batrachus, V. 80. Battarismus, V. 261. C. 99. Beriberia, S. 137. L. 140. C. 41. Sag. 257. Blaesitas, V. 258. Blepharoptofis, S. 43. Sag. 44. Blepharotis, V. 342. Bleftrismus, V. 135. Boa, V. 446. Bombus, V. 302. Borborygmus, L. 123. Bronchocele, S. 28. V. 369. Sag. 31. Bubo, S.16. L. 271. V. 368. C. 115. Sag. 19. Bubonocele, V. 396. Sag. 55. Bulimia, S. 223. L. 79. V. 296. Sag. 325. Bullofa, V. 41. C. 32.

C.

C. 128. Cacofitia, L. 87.

Cali

GENERUM.

Cephalaea, S. 194. V. 141. Sag. Caligo, S. 153. V. 288. C. 88. Sag. 259. 154. Callus, V. 429. C. 118. Cephalalgia, S. 193. L. 40. V. 140. Calvities, V. 529. Sag. 153. Cancer, S. 20. V. 375. C. 114. Cephalitis , S. 109. C. 9. Sag. 301. Cercosis, V. 535. Sag. 23. Cerion , V. 496. Canities, V. 525. Chemosis, V. 46. C. 8. Capiftrum, V. 208. Chilon, V. 366. Caput obstipum, V. 513. Chiragra, V. 139. Chlorofis, S. 309. L. 222. V. 305. Carcinoma, S. 296. L. 252. V. 487. C. 128. Sag. 123. Cardialgia, S. 202. L. 48. V. 157. C. 45. Sag. 136. Sag. 161. Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. C. 56. Sag. 189. Cardiogmus, S. 201. V. 152. Sag. Cholerica, L. 190. V. 28. C. 57. Cholosis, V. 536. Carditis, S. 111. V. 54. C. 13. Sag. Chorea, L. 139. V. 193. C. 48. 299. Carebaria, V. 144. Chylaria, V. 117. Cicatrix, L. 3.17. V. 509. Sag. 91. Caries, S. 77. L. 255. V. 493. C. Cillofis, V. 203. Cinclefis, V. 201. 133. Sag. 80. Carphologia, S. 125. L.135. V.330. Cionis, V. 150. Sag. 245. Cirsocele, V. 409. Carus, S. 181. L. 100. V. 231. C. Citta, L. 78. Clamor, V. 206. 40. Sag. 287. Catalepsis, S. 176. L. 129. V.230. Clangor, V. 251. C. 98. C. 40. Sag. 282. Cataclasis, V. 202. Claudicatio, S. 131. Sag. 251. Cataphora, S. 180. L. 99. V. 232. Clavus, L. 278. V. 142. ibid. 428. C. 40. Sag. 286. C. 118. Cataplyxis, V. 137. Clitorismus, L. 298. Cataracta, S. 152. L. 109. V. 239. Clunesia, V. 167. Cocyta, L. 257. C. 88. Sag. 258. Catarrhalis, V. 73. Coeliaca, S. 255. L. 189. V. 109. Catarrhexis, V. 91. C. 57. Sag. 191. Coilima, V. 373. Colica, S. 204. L. 50. V. 160. C. Catarrhus, S. 186. V. 98. C. 38. Sag. 146. 55. Sag. 163. Catarrhus Suffocativus, V. 270. Coloboma, V. 534. Colpocele, Sag. 58. Coma, V. 232. C. 40. Catoche, V. 230. Catochus, S. 123. L. 128. V. 183. C. 46. Sag. 243. Caufos, V. 20. C. 1. Combustura, L. 245. C. 7. Cedma, V. 168. Condyloma, S. 24. L. 293. V. 378. Celfa, V. 303. Sag. 27. Con

INDEX

Contractura, S.119. L.299. C.101. Sag. 239. Contufio, S. 66. V. 480. Sag. 71. Contufura, L. 238. Convulsio, S. 128. L. 142. V. 191. C. 48. Sag. 248. Copholis, S. 160. L. 112. C. 90. Sag. 266. Coryza, S. 260. L. 174. V. 100. C. 38. Sag. 196. Crampus, S. 120. V. 194. Sag. 240. Crepitus, L. 194. Cripforchis, V. 55 1. Crithe, V. 434. Crusta lactea, V. 495. C.7. Cyasma, V. 461. Cynanche, S. 110. L. 33. C. 10. Sag. 298. Cynorexia, V. 298. Cyphofis, V. 512. Cyrtoma, V. 405. Cyssotis, V. 71. Cystirrhagia, V. 93. C. 37. Cyflitis, S.108. L. 31. V.66. C.20. .V chamers Sag. 296. Cyflocele, S. 56. V. 404. Cyftoptofis, V. 394.

D.

Aemonomania, S. 236. C. 62.

Sag. 338.

Daemonia, L. 69. C. 62.

Dacryoma, V. 506.

Dactylion, V. 510.

Decateffera, Sag. 308.

Decimana, V. 9. C. 2.

Delirium, V. 330. L. 65. C. 64.

Deuteria, V. 132.

Diabetes, S. 263. L. 197. V. 115.

C. 58. Sag. 199.

Diabrofis, V. 481.

Diachalafis, V. 474.

Diaphthora, V. 278. C. 43. Diarrhoea, S. 254. L. 187. V. 105. C. 57. Sag. 190. Diaria, L. 11. C. 4. Diastalis, S. 61. C. 126. Sag. 64. Digitium, L. 227. V. 221. C. 101. Sag. 174. Dionylifcus, V. 553. Diplopia, S. 218. C. 89. Sag. 320. Distortio, L. 302. Diffrix , V. 526. Diuresis, V. 114. Duplicana, L. 18. C. 1. 2. Dylecoea, S. 158. C. 90. Sag. 264. Dyfecoia, V. 246. Dylenteria, S. 248. L. 191. V. 107. C. 39. Sag. 184. Dyshaemorchois, Sag. 221. Dyslochia L. 169. V. 131. Sag. 215. Dylmenorthoea, L. 168. V. 170. C. 109. Dyfodia, S. 274. V. 125. Sag. 209. Dyfopia, V. 291. C. 89. Dyspepsia, V. 277. C. 43. Dyspermatismus, S. 269. Dylpnoea, S. 144. L. 160. V. 267. Sag. 231. Dylphagia, S. 199. Sag. 216. Dystocia, S. 208. V. 171. Sag. 220 Dyluria, S. 265. L. 57. V. 164

Cataritant, V. J.

Cchymoma, S. 6. V. 451. C.

112. Sag. 6.

Ecphyfe, V. 124.

Eclampfia, S. 133. V. 189. C. 50.

Sag. 253.

Ecplexis, V. 334.

Ecftasis, S. 177. V. 333. C. 40.

Sag. 283.

Ecthlymma. V. 475.

Ecthyma-

GENERUM

Ecthymata, V. 360. Ectropium, L. 296. V. 518. Eilema, V. 161. Elcofis, S. 313. Sag. 140. Elephantialis, S. 302. V. 321. C. 83. Sag. 129. Elephantia Arabum, V.322. C.83. Elodes, V. 21. Elytrocele, V. 402. Emphysema, S. 13. L. 228. V. 392. C. 68. Sag. 17. Empyema, S. 151. L. 159. V. 358. C. 12. Sag. 235. Encanthis, V. 430. Encauma, V. 450. Encausis, V. 158. ibid. 347. C. 7. Encephalocele, S.57. V.383. Sag.60. Encystis, V. 420. C. 119. Enteritis, S. 105. L. 29. V. 57. C. 16. Sag. 293. Enterocele, S. 50. ---- ovularis, V. 400. Enthuliasmus, V. 335. Entropium, V. 519. Enuresis, S. 264. L. 195. V. 113. C. 105. Sag. 200. Ephelis, S. 3. L.325. V. 438. Sag. 3. Ephemera, S. 79. C. 4. Sag. 306. Ephialtes, S. 138. L. 163. C. 64. Sag. 223. Ephidrosis, S. 258. Sag. 194. Epiala, V. 19. Epidosis, Sag. 88. Epilepfia, S. 134. L. 143. V. 188. C. 50. Sag. 254. Epinyctis, S. 8. V. 441. Sag. 12. Epiphlogisma, V. 179. Epiphora, S. 259. L. 172. V. 99. C. 103. Sag. 195.31 Epiplocele, S. 51. Epiploitis, S. 106. C. 14. Sag. 294. Epistaxis, V. 82. C. 34. Episthotonos, V. 182. C. 46.

Epulis, V. 363. Erotomania, C. 62. Errana, L. 19. C. 2. Erratica, S. 90. C. 2. Sag. 317. Eryfipelacea, V. 68. C. 24. Erysipelas, S. 97. L. 10. V. 343: C. 24. 7. Sag. 98. Erythema, S. 11. C.7. Sag. 15. Eschara, S.76. L.280. V.483. Sag.79. Esoche, V. 439. Effera, S. 99. Sag. 100. Exania, S. 47. Sag. 48. Exarthrema, S. 60. C. 126. Sag. 63. Exceptatio, S. 65. Excoriatura, L. 246. Exoche, V. 440. Exocyfte, S. 48. Sag. 49. Exomphalus, S. 40. C. 75. Sag. 41. Exoneirofis, V. 120. Exophthalmia, S. 42. Sag. 43. Exoftofis , S. 29. L. 290. V. 417. C. 123. Sag. 32. Expectoratio, L. 178. C. 38. Exulceratio, S. 72. C. 128.

C. 106, S. 2. 204. L. 200. V. 218. F Atuitas, V. 336. C. 61. Favus, V. 496. Fisfura, S. 68. V. 469. Sag. 74. Fiftula, S.74. L.254. V.491. C.128. Sag. 77. N Flatulentia, S. 272. L. 165. V.127. C. 43. Sag. 207. Flemen, V. 425. Fletus, L. 149. W. migologie A. T. W. Fractura, S. 67. L. 235. V. 468. C. 132. Sag. 73. Frambaefia, S. 299. C. 85. Sag. 126. Frigus, V. 185. Fungus, V. 423. Furunculus, S. 18. V. 352. C. 7. Sag. 21. Furor Uterinus, V. 331. 00

G. 132 V ciliqa

Alactia, L. 206. V. 122. J Galactirrhoea, S.270. Sag.205. Galbulus, V. 559. Galiancon, V. 558. 8 , saisquiyuH Ganglion, L. 287. V. 379. C. 120. Gangraena, S. 3 14. L. 233. V. 327. C.7. Sag. 141.

Gastrica, L. 49. Gaftritis, S.104. L.28. V. 56. C.15. Sag. 292.67 . 286 . TP. C . Sinsx H Gaffrocele, S. 52. V. 410. Sag. 51. Gaffrodynia, S. 203. Sag. 162. Gelaimus, V.210. de attituto vil Gibber, L. 300. V. 512. Gibbolitas, S. 30. Sag. 82. Glaucoma, V. 241. C. 88. Gloffagra, V. 138. V allouismon I Gloffocele, V. 197. simledidgoxd Gloffocoma, V. 198. . alofford Glus, L. 199. V. 117. Gonagra, V. 139. Gongrona, V. 371. Gonorrhoea, S. 268. L. 200. V.118. C. 106. Sag. 204. Grando, V. 435 . V , zarigiA Gravedo, L. 42. V. 126. C. 38. Graviditas, S.284. L. 220. Sag. 113. Gypolis, V. 537. .. 47.6 . alumid Gutta Rofea, S. 4. V. 437. C.7. Flemen, V. 42 .H

Haemataporia, V. 289. C. 89.

Haemataporia, Sag. 105.

Haematemesis, S. 242. L. 184. V. 89.

C. 37. Sag. 178.

Haematuria, S. 243. L. 198. V. 92.

C. 37. Sag. 179:

Haemodia, V. 146.

Haematopedesis, V. 95.

Haemoptoe, V. 83. C. 35.

Haemoptysis, S. 240. L.179. V. 84. C. 35. Sag. 176. Haemorrhagia, S.239. L.173. V.81. C. 34. Sag. 175. Haemorrhois, S. 247. L.192. C.36. Sag. 182. Haemorrhoidalis, V. 75. Hebdomadaria, Sag. 307. Hectica, S. 83. L. 24. V. 80. C. 6. Sag. 3 10. Hemalopia, V. 245. Hemeralopia, V. 244. Hemicrania, S. 195. L. 41. V. 143. Sag. 155. Hemiplegia, S. 170. L.103. V. 228. C. 41. Sag. 276. Hemitritaea, L. 23. C. I. Hepatalgia, S. 205. Sag. 164. Hepatica, L. 51. 701 de cantonna Hepatirrhoea, S. 246. V. 90. C. 57. Sag. 182. Hepatitis, S.113. L.35. V.58. C.17. Hepatizon, L. 323. Hepatocele, S. 53. V. 411. Hermaphroditus, V. 552. 701 Hernia, L. 291. C. 124. C. silenga Herpes, S.7. L. 268. V. 443. C.129. Sag! 1191 set .6 replanted Hidroa, S.10. V.446. Sag. 14. Hieranosos, L. 144. V. 190. C. 48. Hieropyr, V. 344. QI .V almight Himantofis, V 151. gad allohig Hippos, L. 137 V. 199. all galigat Hirafia, V. 527. 12 200 00 Hirfuties, L. 314. V. 524. Sag. 90. Hordeolum, S. 27. L. 276. V. 434. .C.7. Sag. 30. 272 & Moderal Horror, V. 186, 01 .988 1501 .0 Hydarthrus, S. 38. C. 122. Sag. 39. Hydatis, S. 34. C. 121. Sag. 35. Hydrenterocele, V. 406. Hydrocele, V. 388. C. 77. Hydro-

GENERUM.

Hydrocephalus, S. 285. L. 216. Impetigo, V. 462. Incubus, V. 211. C. 64. V. 384. C. 72. Sag. 114. Hydrocyftis, V. 315. Inflammatio, L. 231. C. 7. Hydrometra, S.289. C.76. Sag. 118. Intertrigo, L. 247. V. 502. Ionthos, V. 436. Hydromphalos, V. 387. Ischias, S. 213. V.138. C. 22. Sag. Hydropedesis, V. 121. Hydrophobia, S.231. L.86. V.30. Ischiatocele, V. 401. Sag. 57. C. 60. Sag. 333. Hydrophthalmia, V. 385. Ischnophonia, V. 260. C. 99. Hydrops fcroti, V. 389. C. 77. Ischnotis, V. 541. Ischuria, S. 293. L. 167. V. 129. Hydrorachitis, S.287. C.73. Sag. 116. C. 108. Sag. 212. 8 cognomus Hydrothorax, S.150. V.311. C.74. Sag. 234. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sag. 170. 1 Lupia , S. 37. C. 110. Sec. 18 Hygrocirsocele, V. 414. Hypercatharsis, V. 123. Abarium, L. 309. Labium Leporinum, V. 522. Hyperartetiscus, V. 557. Hyperostosis, V. 418. C. 123. Laceratura, L. 242. C. 127. Hypnobatalis, V. 340. C. 64. Lactea, V. 76. Lagocheilos, V. 522. Hypochondriafis, S. 220. L. 76. V. Lagophthalmia, L. 305. V. 516. 218. C. 44. Sag. 322. Lagostoma, L. 310. Sag. 84. Hypogastrocele, V. 403. Languer, L. 91. V most confatt Hypoftaphyle, S. 44. Sag. 45. Laparocele, Sag. 53. Hypophalis, V. 234. Hypopyon, V. 356. Hypofarca, L. 218. C. 78. Lassitudo, S. 188. L. 90. V. 222. Sag. 148. Leiopodes, V. 545. aurilars M. Hypospydiaeos, V. 547. Leipyria V. 24. 7 8 coline M Hysteralgia, S. 209. L.55. V. 169. Lenta, L. 14. V. 70. C. 6. Sag. 167. Lentigo, L. 324. V. 455. Hysteria, S. 135. L. 126. V. 219. C. 59. Sag. 255. Leontialis, S. 297. Sag. 124. Hysteritis, L. 38. V. 67. C. 21. Lepra, S. 303. L. 262. C. 84. Sag. Madaena 5. 249. 32C. 135.081 Hysterocele, S. 55. V. 413. Hysteroloxia, S. 58. Sag. 61. des / Arabum, V. 321. Graecorum, V. 320. C. 84. Hysteroptosis, S. 49. V.393. Sag. 50. Leptophonia, V.254. C.98. Hysterophyse, V. 317. C. 70. Noma, L. 2511 F. 489. C. 128. Lethargus, S. 179. L. 98. V. 22. C. 40. Sag. 285. Ctericodes, V.32. Leuce, V. 46000 V empoils M. I Icterus, L. 244. V. 306. C. 87. Leucoma, S. I. Sag. I. Leucophlegmatia, L. 214. C. 68. Ileus, S.252. V.162. C.55. Sag. 188. Iliaca, L. 185. C. 55. mortany 11 Leucorrhoea, S.267. L.201. V.119. Illofis, V. 200 L. Courneshy C. 37. Sag. 2024 V st hos M Leucorthois, V. 112. C. 36. Imperforatio, Sag. 86. 002

Lichen, V. 462. Lienteria, S. 256. L. 188. V. 108. C. 57. Sag. 192. Lipothymia, S. 173. L. 93. V.273. C. 42. Sag. 279. Lippitudo, L. 266. Lithiasis, V. 165. Lochiorrhoea, Sag. 203. Lordosis, S. 31. L. 301. V. 512. Sag. 83. Loxarthrus, S. 62. Sag. 65. Lumbago, S. 212. V. 138. C. 22. Sag. 170. Lupia, S. 37. C. 119. Sag. 38. Luxatio, V. 472. L. 236. C. 126. Lyngodes, V. 26.

M

Madarofis, V. 266. Malacia, V. 300. Malacosteon, V. 523. Malis, S. 298. Sag. 125. Mania, S. 235. L. 68. V.331. C. 62. Sag. 337. Marasmus, L. 211. C. 66. Marisca, S. 35. C. 36. Sag. 36. Marmaryge, V. 290. C. 88. Mastodynia, S. 210. V. 153. C. 7. Sag. 168. Mediastina, V. 52. C. 12. Melaena, S. 249. Sag. 185. Melanchlorus, V. 307. Melancholia, S. 234. L.71. V.332. C. 62. Sag. 336. Melaficterus, S. 307. Sag. 134. Melasma, L. 322. V. 451. Meliceris, V. 420. Menorrhagia, S.244. L. 202. V. 96. C. 37. Sag. 180. Menostafia, Sag. 219. Menstrua, V. 11. 200 . TE. Merocele, V. 399. Sag. 54.

Mesenteritis, V. 60. C. 14. Meteorifmus, S. 292. C.69. Sag. 218. Metritis, S. 107. C. 21. Sag. 295. Miliaris, S. 95. L. 7. V. 37. C. 29. Sag. 97. Mola, L. 205. V. 560. Monstrositas, V. 539. Morbilli, V. 453. C. 28. Morbillofa, V. 36. C. 28. Morolis, L. 106. V. 336. C. 61. Morphoea, L. 319. Mortura, L. 244. Sag. 70. Morta, L. 1. C. 32. Mutitas, S. 165. V. 257. C. 97. Sag. Mydriafis, V. 237. C. 88. Myocoilites, V. 63. C. 14. Myopia, L. 308. V. 515. C.89. Myositis, Sag. 297. Myrmecium, L. 279. V. 426.

Hyperiagny or .N. 1. Sag. ag.

NAevus, S. 5. L. 318. V. 538. Sag. 5. Natta, L. 288. Nausea, S. 250. L. 182. V. 159. C. 43. Sag. 186. Nebula, V. 464. Necrosis, S. 315. Sag. 142. Nefrendis, V. 555. Nephralgia, S. 207. Sag. 166. Nephritica, L. 56. Nephritis, S.115. L.37. V.65. C.19. Sag. 304. Noma, L. 251. V. 489. C. 128. Nonana, V. 8. C. 2. Noftalgia, S. 226. L. 83. V. 332. C. 62. Sag. 328. Nyctalopia, L. 306. V. 243. Nymphomania, S. 229. Sag. 331. Nystagmus, S. 124. Sag. 244.

GENERUM.

0.

Blivio, L. 107. V. 338. C. 61. Obstipatio, L. 166. V. 128. C. 107. Sag. 222. Obstipitas, S. 118. V. 128. C. 101. Sag. 238. Octana, V. 7. C. 2. Odaxismus, V. 147. Odontalgia, S. 198. L.45. V. 145. C. 22. Sag. 158. Odontirrhoea, V. 86. Oedema, S. 12. L. 229. V. 382. Sag. 16. Oesophagismus, V. 217. Omentitis, V. 61. C. 14. Omphalocele, V. 398. Sag. 52. Onychia, V. 346. Onyx, V. 355. Operatio, Sag. 67. Ophiasis, V. 529. Ophthalmia, S. 196. L. 43. V. 341. C. 8. Sag. 156. Ophthalmites, V. 47. C. 8. Ophthalmorrhagia, V. 88. Opisthotonos, V. 181. C. 46. Opoodeocele, Sag. 56. Orgalmus, L. 133. Orthopnoea, S.146. L. 162. V.269. C. 52. Sag. 230. Oscheocele, S. 41. V. 397. C. 77. Sag. 42. Ofcedo, S.140. V. 263. Sag. 225. Oscitans, V. 31. Oscitatio, L. 151. Oftocopus, S. 184. L. 61. V. 176. Sag. 144. Otalgia, S. 197. L. 44. V. 148. C. 7. Sag. 157. Otitis, V. 48. Otoplatos, V. 102. Otopuosis, V. 101.

Otorrhoea, S. 271. L. 171. V. 87. Sag. 206.
Oxyphonia, V. 255. C. 98.
Ozaena, L. 253. V. 500. C. 128.

Aedarthrocace, V. 419. C.7. Palpitatio, S. 130. L. 132. V. 213. C. 51. Sag. 250. Panaritia, V. 70. Pancreatica, V. 64. Pandiculatio, S.126. L.152. V.264. Sag. 246. Panophobia, S. 227. L. 75. C. 62. 64. Sag. 329. Papula, S. P. 3. L. 275. C.7. Sag. 8. Paracufis, V. 159. C. 91. Sag. 265. Paracyisis, V. 326. Paralysis, S. 169. L. 104. V. 226. C. 41. Sag. 275. Paraglossa, V. 365. S. 45. Sag. 46. Paraphrenesis, S. 102. L.26. C. 12. Paraphrenitis, V.55. C.12. Sag.290. Paraphonia, S. 168. C. 98. Sag. 274. Paraplexia, S. 171. L. 102. V.227. C. 41. Sag. 277. Paraphimosis, V. 349. C. 7. Paraphrofyne, S.232. L. 66. V.330. C. 63. 64. Sag. 334. Paronychia, S. 21. L. 258. V. 345. C. 7. Sag. 24. Parotis, S.17. V.370. C.115. Sag.20. Parorchidium, S.59. Sag. 62. Parturitio, L. 203. Parulis, V. 362. C. 7. Pavor, V. 339. Pelada, V. 529. Pelioma, V. 451. Pemphigus, S.93. C. 32. Sag. 94. Pemphingodes, V. 43. Periadynia, V. 155. Pericarditis, V. 53. C. 13. Perinæocele, Sag. 59.

003

Perip-

NINDEX

Peripneumonia, S.112. L.34. V. 51. C. 11. Sag. 300. Peritonitis, V. 62. C. 14. Pernio, L. 259. V. 350. C. 7. Pertussis, C. 53. Peffis, S. 91. L. 2. C. 25. Sag. 92. Pestilentialis, V. 33. C. 35. Petechia, L. S. V. 452. Petechialis, V. 38. Phagedaena, V. 488. C. 128.
Phalacrotis, V. 528. Phalangosis, V. 533. Phantaima, L. 73. V. 287. C. 89. Phimofis, S. 22. L. 297. V. 348. C. 7. Sag. 25. Phlegmatia, S.282. C.71. Sag.111. Phlegmone, S. 15. L. 39. V. 351. C. 7. Sag. 305. 2 V cally am Phlogofis, V. 220. Phlyctaena, S. P. 3. L. 273. V. 442. C. 121. Sag. 9. Phlyzacion, V. 450. Phoenigmus, S. 308. Sag. 135. Phoxos, V. 511. Phrenifmus, V. 45. C. 9. Phrenitis, S.101. L.25. V.18. C.9. Sag. 289. Chi . V calcondomos Phricalmus, Sag. 252. Phricodes, V. 25. Phthirialis , S. 310. V.324. Sag. 137. Phthisis, S. 276. L. 208. V.310. C:35. Sag. 103. Phygethlon, V.357. Phyma, V. 359. 2 d minutal Physconia, S. 283. V. 325. C.78. Sag. 112. Phylocele, V. 416. Phylocephalus, S. 286. Sag. 115. Phylometra, S.290. C.70. Sag. 119. Pica, S.222. V. 301. Sag. 324. Carachama and Pinnula, V. 432. Piptonychia, V. 484. Pituitaria, V. 111. C. 57.

Pityriafis, V. 476. Pladarotis, V. 431. Plancus, V. 545. Plautus, V. 545. Pleurifica, L. 53. Pleurodyne, S. 148. V. 50. C. 21. Sag. 232. Plethora, L. 225. Sag. 107. Pleuritis, S.103. L.27. V.50. C.12. Sag. 291. Plica, L. 313. V. 323. C. 86. Plicatio, V. 470. Pneumatofis, S. 280. V. 391. ibid. 156. C. 68. Sag. 109. Pneumonica, L. 54. Pnigma, V. 270. Podagra, V. 175. C. 23. Podagrica, V. 69. C. 23. Polydipfia, S. 224. L. 80. V. 295. Sag. 326. Polymerisma, Sag. 87. Polypus, V. 377. C. 116. Polylarcia, S. 279. L. 213. V. 540. C. 67. Sag. 108. Porrigo, V. 476. Porrus, V. 427. C. 116. Presbytia, L. 307. C. 89. Preflura, L. 260. Priapismus, S. 121. L. 122. V. 173. Sag. 241. Prochalgia, S. 214. C.7. Sag. 172. Proctica, L. 59. V. 167. Proctitis, L. 30. C. 7. Profusio, L. 239. C. 102. Prolapsus, L. 292. C. 125. Proptoma, S. 46. Sag. 47. Pruritus, S. 190. L. 64. V. 136. Sag. 150. Pfellismus, S. 167. L. 138. C. 99. Sag. 273. Piellotis, V. 259. C. 99. Prophos, V. 177. Piora, L. 265. V. 320. C. 131. Pfo-

Psorialis, V. 174. Pfydracia, S. 9. V. 442. Sag. 13. Pterygium, S. 26. L. 295. V. 433. Sag. 29. Ptilofis, V. 531. Ptofis , V. 235. Piyalilmus, S. 261. L.176. V. 103. C. 104. Sag. 197. Pudendagra, S. 215. L. 59. V. 168. Sag. 173. Punctura, S. 64. L. 243. C. 127. Sag. 68. Puorrhoea, V. 106. Puoturia, V. 116. Purpura, S.96. V.449. C.33. Sag.95. Purpura Scorbutica, V. 443. Puftula, S. P. 2. L.274. C.7. Sag.7. Pyrofis, S. 200. C. 54. Sag. 159. Pyuria, S. 266. Sag. 201.

Uartana, S. 89. L. 17. V. 3. C. 2. Sag. 316. Quartana duplex, V. 13. triplex, V. 14. Quintana, V.4. C. 2. Quotidiana, S. 87. L.15. V.1. C.3. Sag. 314. Quotidiana continua, V. 15.

Syrigmos, S. I. A. Abies , L. 85. Rachialgia, S. 211. Sag. 169. Rachitis, S. 294. L. 212. V. 312. C. 79. Sag. 121. Ranula, V. 380. Rhagas, L.248. S.75. V.467. Sag.78. Raphania, L. 145. V.192. C. 49. Raucedo, L. 146. V.252, C.38, 98. Sag. 193. Rachosis, V. 503. Renchus, V. 271. V . and mines I Rhenophonia, V. 256. C. 98. Rheuma, S. 149. C. 38. Sag. 233. L ertiana

Rheumatica, V. 74. Rheumatismus, S. 185. L. 62. V.138. C. 22. Sag. 145. Rhienofis, V. 542. Rhochmos, V. 272. Rhoeas, V. 520. Rhophalofis, V. 323. C. 86. Rhyssemata, V. 521. Rigor, S. 132. L. 141. V. 187. Rifus, L. 148. Rifus Sardonius, V. 210. Rodatio, V. 532. Ronchus, V. 272. Rubeola, S. 94. L.4. C.28. Sag. 96. Ructus, L. 181. V. 215. Ruminatio, V. 216. Ruptura, S. 69. L. 237. V. 466. Sag. 75. Valendaria O suchard

C Aniodes, V. 550. Sarcocele, V. 415. Sarcoma, S. 23. L. 294. V. 376. C. 116. Sag. 26. Sardialis , L. 125. V. 209. Satyriasis, S. 228. L. 81. V. 331. Sag. 330. Scabies, S. 304. V. 444. C. 131. Sag. 131. Scarlatae, V. 454. Scarlatina, S.98. V.39. C.30. Sag.99. Scelotyrbe, S. 136. V. 195. C. 48. Sag. 256. Scirrhus, S. 14. L. 283. V. 374. C. 113. Sag. 18. Scoliosis, V. 512. Scorbutus, S. 301. L. 223. V. 318. C. 82. Sag. 128. Scotomia, L. 111. Screatus, L. 177. Scrophula, S. 295. V. 367. C. 80. Sag. 122. Seilis, V. 512.

Seli

INDEX

Seline, V. 463. Septana, V. 6. C. 2. Serpigo, L. 267. V. 443. Sextana, V. 5. C. 2. Singultus, S. 141. L. 153. V. 212. Sag. 226. Sinus, S. 73. V. 492. C. 128. Siriafis, V. 34. Soda, L. 47. V. 154. Somnambulismus, S. 221. L. 77. C. 64. Sag. 323. Somnium, V. 339. C. 64. Somnolentia, L. 96. V. 233. Spanopogon, V. 556. Sparganofis, V. 372. Spaima, V. 479. Spaimus, L. 121. Spaimus Oelophagi, V. 217. Spalmus Cynicus, V. 209. Spalmus Maxillae inferioris, V. 208. Sphacelismus, L. 32. C. 9. Sphacelus, L. 234. V. 328. C. 7. Spina Bifida, V. 386. C. 73. Spinola, L. 289. C. 73. Splenitis, S. 114. L. 36. V. 59. C. 18. Sag. 203. Splenalgia, S. 206. Sag. 165. Splenica, L. 52. Splenocele, S. 54. V. 412. Staphyloma, S. 36. V. 421. Sag. 37. Staphylofis, V. 422. Steatites, V. 390. C. 67. Steatoma, V. 420. Sterilitas, L. P. 127. Sag. 211. Sternutatio, S. 139. L. 154. V.204. Sag. 224. Stertor, S. 143. L. 156. V. 271. Sag. 228. Stigma, V. 457. Stomacace, S. 241. L. 175. V. 85. C. 37. Sag. 177. Strabismus, S. 116. L.304. V.514. C. 100. Sag. 236.

Stranguria, L. 196. V. 163. Stridor, L. 136. Struma, L. 284. C. 80. Stupor, S. 189. L. 105. Sag. 149. Stupiditas , V. 336. C. 61. Stymatolis, V. 94. Subluxatio, V. 473. Subsultus, L. 134. Sudamen , L. 321. Sudamina, V. 446. Sudor, L. 207. Suffocatio, L. 158. Suffocatio Hysterica, V. 196. Suffulio, S. 217. C. 89. Sag. 319. Sugillatio, L. 230. C. 112. Suppuratoria, V. 78. Surditas, V. 247. C. 90. Sulpirium, L. 150. V. 262. Sufurrus, V. 292. Sictura, Sag. 69. Sycolis, V. 490. C. 128. Synocha, S. 80. L. 12. C. 4. Synochus, S. 81. L.13. V.16. C.6. Syncopalis, V. 29. Syncope, S. 174. L. 94. V. 274. C. 42. Sag. 230. Synizefis, V. 240. C. 87. Syphilis, S. 300. L. 6. V. 319. C. 81. Sag. 127. Syrigmos, S. 219. C. 91. Sag. 321. Syringmos, L. 72.

T.

T Abes, S. 275. L. 209. V. 309. C. 65. Sag. 102. Talpa, V. 420. Tarantismus, S. 230. L. 84. V. 193. Sag. 332. Tenesmus, S. 257. L. 193. V. 166. Sag. 193. Terminthus, V. 381. Tertiana, S. 88. L. 16. V. 2. C. 1. Sag. 315. Tertiana

INDEX GENERUM.

Tertiana duplex, V. 12. Testudo, V. 420. Tetanus, S. 122. L. 127. V. 180. C. 46. Sag. 242. Tetartophia, S. 86. L. 22. C. 2. Sag. 313. Therioma, V. 486. C. 128. Thlasis, V. 471. Tinea, S. 305. L. 263. V. 497. C. 130. Sag. 132. Tofus, V. 424. Torpor, V. 224. Tortura, L. 303. Traulotis, V. 258. C. 99. Tremor, S. 129. L. 131. V. 184. C. 41. Sag. 249. Trichiafis, L. 316. V. 517. Trichoma, S.311. C.86. Sag. 138. Trismus, S. 117. L. 124. V. 207. C. 47. Sag. 237. Tritaeophya, S. 85. C. 1. Sag. 312. Tritaeus, L. 21. C. 1. Tuilis, S. 142. L.155. V.205. C.38. Sag. 227. Tylloma, V. 429. C. 118. Tympanites, S.291. L.219. V.316. C. 69. Sag. 120. Typhomania, S. 178. L. 97. V. 23. C. 40. Sag. 284. Typhus, S. 82. C. 5. Sag. 309.

V.

Valgus, V. 10. C. 2. Valgus, V. 544. Varicella, V. 42. id. 448. C. 27.

Dylentelia Resiliaca , 57.

Variola, S. 92. L. 3. V. 447. C. 26. Sag. 93. Variolofa, V. 35. C. 26. Varix, S.33. L.282. V. 407. C.111. Sag. 34. Varus, S. P. 3. L. 269. V. 543. id. 436. C. 7. Sag. 10. Verruca, S. 25. L. 277. V. 426. C. 117. Sag. 28. Vertigo, S. 216. L. 74. V. 293. Sag. 318. Vefania, L. 70. C. 62. Vibex, L. 320. V. 458. Vitiligo, S. 2. V. 459. Sag. 2. Ulcus, S. 71. L. 249. C. 128. Sag. 77. Vociferatio, L. 147. Volatica, L. 63. V. 178. C. 22. Vomica, L. 180. V. 104. C. 12. Vomitus, S. 251. L. 183. V. 214. Sag. 187. Uredo, L. 8. C. 31. Urorrhoeas, V. 548. Urticaria, V. 361. id. 456. C. 31. Urticata, V. 40. C. 31. Vulneraria, V. 77. Vulnus, S. 63. L. 240. V. 465. C. 127. Sag. 66.

X.

X Iraflia, V. 527.

Z. manda estillA

Z Ofter, V. 344.

Africana Busheam, 40.

INDEX SPECIERUM.

EX CENERUM:

Quae sub nominibus genericis non inveniuntur.

Numerus denotat Genus Culleni ubi indicantur.

Amphimerina anginosa, 10.
Amphimerina biliosa, 1.
Amphimerina catarrhalis, 38.
Amphimerina epiala, 1.
Amphimerina hemitritaeus, 1.
Amphimerina humorosa, 1.
Amphimerina Hungarica, 1.
Amphimerina paludosa, 1.
Amphimerina peripneumonica, 11.
Amphimerina phricodes, 1.
Amphimerina phricodes, 1.
Amphimerina pseudo-hemitritaeus,

Amphimerina semiquartana, 2. Amphimerina semiquintana, I. Amphimerina fingultuofa, I. Amphimerina spalmodica, I. Amphimerina lyncopalis, 1. Amphimerina tufficulofa, 38. Amphimerina tufficulofa, 53. Angina Spalmodica, 47. Arthritis febricofa, 22. Arthritis rheumatica, 22. Ascites sanguineo - uterinus, 76. Alcites uterinus, 76. Alphyxia a carbone, 40. Afphyxia cataleptica, 40. Alphyxia congelatorum, 40. Asphyxia flatulenta, 40. Alphyxia foricariorum, 40. Alphyxia a fumis, 40. Alphyxia hyfterica, 40. Alphyxia a mephitide, 40. Alphyxia a muito, 40.

Asphyxia a pathemate, 40. Asphyxia sideratorum, 40. Asphyxia spinalis, 40. Asphyxia suspensorum, 40. Atrophia sebrisequa, 65. Atrophia infantilis, 65. Atrophia rachitica, 65.

C.

Cardialgia inflammatoria, 15.
Cardialgia fputatoria, 54.
Catarrhus Bellinfulanus, 10.
Cephalalgia catarrhalis, 38.
Cephalalgia febricofa, 3.
Cephalalgia inflammatoria, 9.
Cephalalgia intermittens, 3.
Convulsio a nervi punctura, 47.
Convulsio raphania, 49.
Convulsio ab ustilagine, 49.

D.

D'Iarrhoea carnosa, 39.
Dysenteria a catharticis, 57.
Dysenteria a mesenterii vomica,
57.
Dysenteria Parisiaca, 57.
Dysenteria scorbutica, 57.
Dysenteria scorbutica, 57.
Dyspnoea pituitosa, 52.

INDEX SPECIERUM

E.

Ecclampsia febricosa, 1.
Ecclampsia typhodes, 49.
Enteritis mesenterica, 14.
Ephemera sudatoria, 5.
Epilepsia febricosa, 1.

H.

Hepatalgia apostematosa, 17.
Hepatitis muscularis, 14.
Hysteralgia sebricosa, 3.
Hysteria sebricosa, 1.
Hydrometra ovarii, 75.

I.

Schias intermittens, 3.

M.

Miliaris nautica, 5. Miliaris purpurata, 5. Miliaris sudatoria, 5.

N.

Nephralgia arenosa, 19.
Nephralgia arthritica, 19.
Nephralgia calculosa, 19.
Nephralgia febricosa, 3.
Nephralgia purulenta, 19.
Nephralgia rheumatica, 22.

P. -

Pleurodyne parapleuritis, 12. Pleurodyne verminosa, 12. Pleurodyne verminosa, 12. Pleurodyne vomica, 12.

Q.

Quotidiana deceptiva, 1. Quotidiana epileptica, 3. Quotidiana foporofa, 1.

S.

Scarlatina anginosa, 10.
Splenalgia suppuratoria, 18:
Synocha catarrhalis, 38.
Synocha miliaris, 6.
Synochus hiemalis, 4.
Synochus pleuritica, 12.
Synochus pleuritica, 4.
Synochus rheumatizans, 4.
Synochus scorbutica, 4.

T.

Tabes dorsalis, 66.
Tabes a Hydrope, 66.
Tabes nutricum, 66.
Tabes sudatoria, 66.
Tabes syphilitica, 66.
Tetanus sebricosus, 1.

FINIS INDICUM.

COURTE SERVING

T. Cochampia febricola 1.

E. Eschampia typhédes (12)

E. Dochampia typhédes (14)

E. Phemera fudicuta (14)

Hampholds Phronis da.
Floundyne pandleuris, and
Pleurodyne verminish, 12.
Pleurodyne verminish, 12.
Pleurodyne verminish, 12.

TI.

T. T. Postel in apollements, 17.

I. Hepaines muciniarie, 19.

Hyderalgu tehnicels, 3.

Hydroment overs, 1.

I Schles intermittens 3-

Minnis mondos, 5.
Miliaris financias, 5.

Nephralpia calcololia 19.

Nephralpia calcololia 19.

Nephralpia febricolo 3.

Nephralpia purolente 19.

Nejhralpia purolente 19.

Nejhralpia incumuita 22.

O Condina deceptiva, 1.

0

.3

Schools and the solution of th

Synochus plemodus 12. Synochus plemosus 4. Synochus rhemsingum 5. Synochus fundulica 4.

Tobes carries, Cf., Tobes caterom, Co., Tobes tataronis, Co., Tabes faplalitices Cf. Temans represents F.

FINIS INDICUM,

