

**Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes. Fondé sur un grand nombre d'observations cliniques : atlas de 41 planches, représentant les principales altérations morbides des organes génitaux de la femme / par Mme. Boivin et par A. Dugès.**

**Contributors**

Boivin, Veuve, Mme. 1773-1841.  
Dugès, Ant. 1797-1838.

**Publication/Creation**

Bruxelles : Établissement Encyclographique, 1834.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/fvaymnct>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

TRAITÉ PRATIQUE  
DES  
**MALADIES DE L'UTÉRUS ET DE SES ANNEXES,**

FONDÉ  
SUR UN GRAND NOMBRE D'OBSERVATIONS CLINIQUES.

**ATLAS DE 41 PLANCHES,**

REPRÉSENTANT

LES PRINCIPALES ALTÉRATIONS MORBIDES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME.

PAR M<sup>me</sup> BOIVIN,

DOCTEUR EN MÉDECINE, AGÉ-DIÈRE SURVEILLANTE EN CHEF D'LA MAISON ROYALE DE SANTÉ, DECORÉ DE LA MÉDAILLE D'OR DU MERITE CIVIL DE PRUSSIE, MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS PARISIENNES,

ET PAR A. DUGÈS,

PROFesseur à LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER, MEMBRE DE LA LIGION D'HONNEUR, MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADEMIE ROYALE DE MÉDECINE, ETC.

Anvers, CHEZ BARTHOLO.  
Courtine, VASSEUR, FRÈRES ET FILS.  
Gand, JULIUS BERNARDUS.  
— VASSEUR.  
— BERNARDUS.  
Tournay, BERNARDUS.  
Lidge, CALLEGARI.

**BRUXELLES,**  
ÉTABLISSEMENT ENCYCLOGRAPHIQUE, QUAI AU FOIN, N° 33.  
**LEIPZIG, NIEDERLANDISCHE BUCHHANDLUNG,**

1834.

Loosdrecht, VAN KOEN, COUDREAU DE  
CUNIVERSITÉ.  
Malines, GOMS FONTAINE.  
— FLAMMENS SEMAT.  
Mon, LENOË.  
Nijmegen, OIJENBURG.  
Utrecht, GARNIER BOUTEIX.

14422-D

J XVIII . p  
19





5321

TRAITÉ PRATIQUE  
DES  
**MALADIES DE L'UTÉRUS ET DE SES ANNEXES,**

FONDÉ

SUR UN GRAND NOMBRE D'OBSERVATIONS CLINIQUES.

**ATLAS DE 41 PLANCHES,**

REPRÉSENTANT

LES PRINCIPALES ALTÉRATIONS MORBIDES DES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME;

PAR M<sup>me</sup> BOIVIN,

DOCTEUR EN MÉDECINE, SAGE-FEMME SURVEILLANTE EN CHEF DE LA MAISON ROYALE DE SANTÉ, DÉCORÉE DE LA Médaille d'OR DU MÉRITE CIVIL DE PRUSSE, MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES;

ET PAR A. DUGÈS,

PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER, MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR, MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADEMIE ROYALE DE MÉDECINE, ETC.


**SECONDE ÉDITION.**

Bruxelles,  
ÉTABLISSEMENT ENCYCLOGRAPHIQUE, QUAI AU FOIN, N° 33.

1834.







## UTÉRUS DANS DIVERS ÉTATS.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Utérus à l'état de vacuité chez une femme qui n'avait point eu d'enfants.  
L'organe est vu par sa paroi postérieure.

- A, A. Corps de l'utérus.
- B. Muscœu de tanche.
- C. Ligne médiane ou plan fibreux longitudinal de l'utérus.
- O, O. Ligamens postérieurs ou utéro-sacrés, provenant d'un prolongement des fibres du corps et du col de l'organe.
- D. Ailerons de la matrice; prolongement des plans fibreux obliques postérieurs, formant les ligamens des ovaïres.
- E, E. Ovaïres.
- F, F. Trompes de Fallope ou tubes utérins.
- G, G. Pavillon de la trompe.
- H, H. Bords frangés du pavillon.
- I, I. Ligamens larges ou replis du péritoine.
- J, J. Cordon de l'ovaire.
- K, K. Portion antérieure du vagin vue par sa face interne.

FIG. 2. Utérus vu par sa face antérieure.

- A. Ligne médiane ou plan fibreux longitudinal antérieur.
- B. Lèvre antérieure du muscœu de tanche, plus longue que la lèvre postérieure; elle ne permet pas de voir l'orifice utéro-vaginal.
- C, C. Origine des ligamens ronds ou cordons sus-pubiens.

- O, O. Cordons sus-pubiens ou ligamens ronds.
- D, D. Trompes de Fallope.
- E, E. Bords frangés de la trompe.
- F, F. Ovaïres vus à travers le tissu des ligamens larges.
- G, G. Ligamens larges ou replis du péritoine.

FIG. 3. Utérus vu de profil.

- A. Paroi postérieure plus saillante et plus arrondie que la paroi opposée.
- B. Lèvre postérieure du muscœu de tanche plus élevée que la lèvre antérieure, formant le *bec de flûte*.
- C. Repli vésico-utérin du péritoine.
- D. Repli recto-vaginal de la même membrane.

FIG. 4. Vue de la face intérieure de l'utérus pendant l'écoulement des règles;  
l'organe ouvert sur un de ses bords et sur son fond.

- A. Corps de l'utérus. On y remarque une ligne médiane déprimée, et des gouttelettes de sang.
- B. Orifice intérieur du col utérin.
- C. Orifice externe. Entre ces deux orifices se trouve la cavité du col et les nombreux replis qui composent l'appareil d'un développement considérable de cette portion de l'utérus, pendant la grossesse et dans quelques autres circonstances. (Voir planche II, figure 6.)





Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



## MUSEAUX DE TANCHE A L'ÉTAT NORMAL.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Chez la fille avant sa nubilité. — FIG. 2. Chez la fille pubère. — FIG. 3. Chez la femme qui a usé du coït. — FIG. 4. Pendant l'excrétion menstruelle chez celle qui n'a point eu d'enfants. — FIG. 5. Chez la femme qui est accouchée à terme. — Légères cicatrices aux angles de l'orifice. — FIG. 6. Utérus d'une femme morte dans les premières semaines de sa grossesse.

Cette figure 6 présente l'organe ouvert sur un de ses bords latéraux, et laisse voir la face interne de ses deux parois d'un rouge foncé, d'un tissu mou. Chacune d'elles, au corps, est empreinte d'un sillon longitudinal qui occupe le milieu et correspond à une ligne saillante de chaque paroi du col.

Le col de l'organe, d'un blanc violacé, présente dans sa cavité, déjà presque aussi spacieuse que celle du corps, de nombreux replis, les uns simples, les autres complexes, affectant diverses directions. C'est dans ces replis que se trouvent des follicules muqueux en grand nombre. On remarque assez souvent à leur surface des concrétions globuleuses, tantôt à l'état de transparence contenant du fluide, et d'autres fois à l'état calcaire. Elles sont

quelquefois en si grand nombre, et si pressées les unes contre les autres, qu'elles finissent par faire disparaître tous les replis du col et même par en obstruer totalement la cavité.

Mais dans l'état normal, chez la femme récemment enceinte, ces replis sont gorgés d'une humeur glaireuse, épaisse, qui remplit exactement la cavité du col et lui sert, pour ainsi dire, de bouclier, jusqu'au dernier temps de la grossesse, où cette matière glaireuse s'écoule en abondance, lubrifie et prépare le vagin et ses orifices à se dilater pendant le travail de l'accouchement.

- A.A. Corps de l'utérus.
- B.B. Orifice interne.
- C.C. Orifice externe.

## MINÉAUX DE LA CHINE A THIEN HUAT

ANNALES DES MÉTALLURGIES CHINOISES


Volume I. — Nos deux premiers numéros ont été consacrés à l'industrie métallurgique de la Chine. — Le troisième nous présente les résultats de nos recherches sur les minéraux de la Chine. — Nous avons commencé par étudier les minéraux métalliques et nous continuons à faire des observations sur les minéraux non métalliques.

Les minéraux métalliques sont ceux qui contiennent des éléments métalliques tels que cuivre, fer, zinc, plomb, etc. Ces éléments peuvent être soit dans un état pur, soit dans un état combiné avec d'autres éléments. Les minéraux non métalliques sont ceux qui ne contiennent pas de métal. Ils peuvent être soit minéraux purs, soit minéraux associés, mais dans ce cas il n'y a pas de métal présent. Les minéraux associés sont ceux qui contiennent plusieurs éléments métalliques et non métalliques.

Le premier chapitre de ce volume est consacré aux minéraux métalliques. Il traite des propriétés physiques et chimiques des minéraux métalliques, de leur extraction et de leur utilisation. Le deuxième chapitre traite des minéraux non métalliques, de leur extraction et de leur utilisation. Le troisième chapitre traite des minéraux associés, de leur extraction et de leur utilisation. Le quatrième chapitre traite des minéraux minéraux, de leur extraction et de leur utilisation.



N274



CETTE PLANCHE REPRÉSENTE LA DISPOSITION

DES PLANS FIBREUX DE L'UTÉRUS À L'ÉTAT DE GROSSESSE À TERME,

VUE PAR LA FACE ANTÉRIEURE DE CE VISCÈRE.

EXPLICATION DES LETTRES.

L'organe est réduit aux deux tiers de son volume ordinaire.  
A. Ligne médiane de l'utérus dont l'extrémité supérieure est inclinée à gauche : direction la plus ordinaire.

Si l'on compare la disposition des plans fibreux médians de l'utérus dans le plus grand état de développement de cet organe, avec ces mêmes plans dans l'utérus à l'état de vacuité (Pl. I<sup>e</sup>), on y remarquera une grande différence. Les fibres longitudinales ont disparu, ou plutôt elles ont changé de direction, en s'écartant de bas en haut dans le cours du développement de l'utérus; dans les cinquième ou sixième mois de la grossesse, ces fibres sont écartées à la manière des feuilles du palmier ou des plis d'un éventail ouvert (*voy.* pl. XXII), et à la fin de la grossesse, ce plan médian ne représente plus qu'un lacis de fibres entrecroisées sur toute la longueur de cette même ligne.

B,B. Les plans de fibres supérieurs, les plans inférieurs et les plans transverses, sont réunis avec une portion des mêmes plans de fibres de la face postérieure, en un seul faisceau, pour former les cordons sus-pubiens. Ces cordons, par l'elongement qu'ils ont éprouvé à leur base, se trouvent alors aux deux tiers inférieurs du corps de l'utérus.

C'est sur la ligne médiane, de chaque côté des pubis, en devant, et sur la région inférieure du sacrum, en arrière, que les plans de fibres extérieurs de l'utérus trouvent leurs principaux points d'appui pendant la contraction de cet organe.

C,C. Les trompes dont les fibres prennent naissance sur la ligne médiane du fond de l'utérus, et s'étendent transversalement jusques sur les angles, pour se réunir en forme de tubes qui se terminent librement par un orifice évasé et à bord frangé, que l'on nomme pavillon de la trompe.

D,D. Les ovaires rapprochés et presque au niveau de la surface du corps de l'utérus par l'effet de la grossesse.

E,E. Le col de l'utérus contenant une portion de la poche amniotique et la tête du foetus. Le col de l'utérus comprend l'espace qui se trouve entre les deux points où s'isolent de l'utérus les deux cordons sus-pubiens. Cette portion inférieure de l'utérus, d'un blanc rosé, contraste d'une manière tranchée avec le reste de l'organe qui est d'un rouge vif. Les trompes et les cordons sont un peu moins colorés.

F. Corps jaune.

G. Veines utérines correspondant à l'insertion du placenta, sur la paroi postérieure voisine du col.

H. Section du vagin.

I. Orifice externe dilaté laissant voir une portion des membranes fœtales.

*Nota.* C'est à dessein que nous n'avons pas représenté la disposition des différents vaisseaux du corps de cet organe. Ce sujet deviendra l'objet d'un travail particulier.

CETTE PLANCHE REPRÉSENTE LA DISPOSITION

DE LA PLATEAU D'UN TERRAIN A FAIRE A TERRE  
OU A POURRIR POUR FAIRE UN DÉPÔT DE GROSSESSE A TERRE


une concession d'exploitation qui est faite à l'ordre de M. le Gouverneur Général, au nom de la Compagnie des Indes, et que l'ordre est émis par le Gouvernement de l'Inde, pour faire un dépôt de grossesse à terre.

Le terrain est une surface de 1000 mètres par 1000 mètres, et il est divisé en deux parties, une partie de 500 mètres par 500 mètres, et l'autre partie de 500 mètres par 500 mètres. La partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre, et la partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre.


Le terrain est une surface de 1000 mètres par 1000 mètres, et il est divisé en deux parties, une partie de 500 mètres par 500 mètres, et l'autre partie de 500 mètres par 500 mètres. La partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre, et la partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre.

Le terrain est une surface de 1000 mètres par 1000 mètres, et il est divisé en deux parties, une partie de 500 mètres par 500 mètres, et l'autre partie de 500 mètres par 500 mètres. La partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre, et la partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre.

Le terrain est une surface de 1000 mètres par 1000 mètres, et il est divisé en deux parties, une partie de 500 mètres par 500 mètres, et l'autre partie de 500 mètres par 500 mètres. La partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre, et la partie de 500 mètres par 500 mètres est destinée à faire un dépôt de grossesse à terre.



N° 297



Bonnet-  
Méthode

## UTÉRUS VU APRÈS SA DÉPLÉTION RÉCENTE

DU PRODUIT DE LA CONCEPTION A TERME, DU COTÉ DE SA FACE ANTÉRIEURE,

ET RECOUVERTE ENCORE DU PÉRITOINE. SA COLORATION EST PARTOUT D'UN ROSE-LILAS.

### EXPLICATION DES LETTRES.

- A. Ligne médiane contournée en deux sens opposés.
- B,B. Origine des trompes.
- I,I. Trompes.
- C,C. Origine des ligamens ronds.
- O. Les ovaires.
- D,D. Plans de fibres concentriques extérieurs, désignés par J. Sue sous le nom de *muscles quadrijumeaux*, et comparés par Alph. Leroy à des nœuds de bois. Une disposition semblable se fait remarquer sur la paroi opposée.

Cette disposition des plans fibreux de l'utérus, si différente de ce que nous l'avons vue dans l'utérus vierge, sur le même organe à l'état de grossesse, est fort souvent encore différent de lui-même en plusieurs autres circonstances qu'il est inutile de rappeler ici. Mais depuis que nous avons continué nos re-

cherches sur la structure de l'utérus, nous avons trouvé que tous ces frondes ne sont formés qu'aux dépens du péritoine et de la tunique *utéro sous-péritonéale*, qui recouvrent les véritables plans fibreux de l'utérus. Ceux-ci, en se rétractant, ont conservé, à peu de chose près, leur disposition primitive; disposition que nous avons reconnue depuis qu'il nous a été possible de débarrasser entièrement le corps de l'utérus des deux tuniques qui l'enveloppent et qui y sont adhérentes d'une manière excessivement serrée, spécialement sur les régions supérieures et médianes.

Cette nouvelle découverte de la véritable disposition des plans fibreux de la matrice après l'accouchement a fait l'objet d'un mémoire inséré dans les bulletins de la société médico-pratique, 1830.

(Voyez les deux figures suivantes.)

TELEGRAMS AND TELETYPE MESSAGES  
TO THE DEPARTMENT OF DEFENSE

As per your request, I am enclosing a copy of the  
proposed new contract for the supply of aircraft  
engines. This contract will be issued to the  
Government of Canada, and will be effective  
as of January 1, 1955. The proposed contract  
will be issued to the Government of Canada  
and will be effective as of January 1, 1955.

The proposed new contract will be issued to  
the Government of Canada, and will be effective  
as of January 1, 1955. The proposed contract  
will be issued to the Government of Canada  
and will be effective as of January 1, 1955.





N°157.

## VUE DE LA FACE ANTÉRIEURE DE L'UTÉRUS

RÉCEMMENT VIDÉ DU PRODUIT DE LA CONCEPTION À TERME,  
APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉPOUILLÉ DU PÉRITOINE ET DE LA TUNIQUE UTÉRO-SOUS-PÉRITONÉALE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

- 1,1,1. Plan médian de l'utérus.
- 2. L'ovaire droit.
- 3. Trompe droite.
- 4. Cordon sus-pubien ou ligament rond droit.
- 5. Plans fibreux communs au ligament rond, et à la trompe du côté droit.
- 6. Plans fibreux communs au ligament rond 7 et à la trompe gauche 8.
- 9,9,9. Lambeaux de la tunique musculaire et du péri-

toine, qui recouvriraient la face antérieure du corps de l'utérus.

*Nota.* On voit par l'écartement de quelques portions des plans fibreux de l'utérus, effet du développement total de l'organe, combien était nécessaire cette tunique musculaire qui en embrasse d'une manière intime le fond et le corps, et les maintiennent ainsi dans leurs rapports respectifs. Sans ce moyen conservateur, les ruptures de ce viscère eussent été beaucoup plus fréquentes.

## AUJ DE LA VIE VINTURIENNE DE LUTHER


RECOLLECTIONS SUR LE MOYEN DE LAISSEZ-FAIRE  
AUX AVOIS DE L'EMPIRE ET DE LA CONFÉRENCE D'ALGIERS

### APPLICATION DES LETTRES DE DISGRACE

Jointe, des recommandations de nos personnes qui ont  
l'ordre. On voit que l'empereur de Russie possède des  
instructions de l'empereur, il est au dévouement tout ce qu'il a  
lors, cependant cette instruction est à prendre immédiatement dans  
comme il me semble toutes les formes de corps, de la mini-  
trale, et lorsque des personnes étrangères sont en voyage pour  
l'empereur, ces personnes doivent être admises dans le plus grand hon-

1. A. Plus tard dans le mois.
2. J'avais écrit.
3. Toute écriture
4. Cet état ne laisse pas de faire une telle mort, si je suis  
trompé au côté droit.
5. Plusieurs personnes se présentent tous les 2 ou 3  
semaines dans le pays.
6. Plusieurs personnes se présentent tous les 2 ou 3  
semaines dans le pays.
7. Il y a plusieurs personnes qui ont été





## VUE DE LA FACE POSTÉRIEURE DE L'UTÉRUS

REPRÉSENTÉ DANS LA PLANCHE PRÉCÉDENTE (N° V.) LE PÉRITOINE EST ENLEVÉ.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

On remarquera sur ce côté de l'utérus, que les plans fibreux qui se rendent aux ovaires naissent d'un centre commun, c'est-à-dire de la ligne médiane et du fond de ce viscère.

- 1.1.1. Ligne médiane.
- 2.2. Les ovaires.
- 3.3. Plans fibreux communs aux trompes et aux ovaires.
- 4.4. Plans fibreux propres aux ovaires.
- 5.5. Plans ascendans obliques communs aux ovaires et aux cordons sus-pubiens.
- 6.6. Ligamens larges.
- 7.7. Lambeaux de la tunique sous-péritonéale et de la portion de péritoine qui recouvrivent les plans décrits.

*Nota.* Nous ferons remarquer que les ailerons des ovaires ainsi que leur ligament ont disparu pendant la grossesse; qu'ils

se sont effacés au profit de la paroi postérieure de l'utérus. L'organe, en se développant, s'est approprié ce tissu fibreux qui semble être mis en réserve dans l'état de vacuité, pour fournir à l'ampliation de l'utérus, pendant la grossesse.

Les ovaires qui, à l'état de vacuité, se trouvaient à trois ou quatre pouces de distance des angles de l'utérus, ne sont, à la fin de la gestation, qu'à quelques lignes du corps de cet organe, et à peu près au milieu de ses bords latéraux. On voit encore par cette disposition combien l'ovaire doit être exposé à la compression et aux chocs des corps extérieurs, puisqu'ils n'ont plus, pour les protéger pendant la grossesse avancée, que les parois très-amincies de l'abdomen. (*Voyez*, sous ce dernier rapport, la pl. III.)

## AUJ DE LA FACE POSTERIEURE DE L'UTERUS

REMARQUES SUR LA FORME PREGNANTE (A. A.) LE VERSOIR EST ENRAME

### EXPLICATION DES FIGURES DE CE CHAPITRE

ce sont elles au moins qui se sont posturées de l'utérus  
depuis ce qu'il a été démontré, et les deux dernières, c'est  
du simple fait que ces deux dernières figurent des lésions  
qui résultent d'un état de maladie, pour  
lorsqu'il existe un état d'inflammation ou d'infection.  
Les autres qui sont au contraire, se trouvant à droite ou  
dans le bas de la cavité de l'utérus, ou tout à fait  
au bas de la cavité, et qui démontrent l'état de ces dernières  
et qui sont au contraire de celles qui sont à droite ou à gauche  
que cette disposition connaît l'utérus doit être attribué  
à cause de ses gosses qui sont extrêmement, dans les deux  
cas de maladie susmentionnée, à l'origine d'une  
maladie de l'utérus. (Voir, sous ce chapitre, la partie  
de la III<sup>e</sup> )

On peut distinguer sur ce côté de l'utérus, des figures qui  
sont destinées aux malades qui ont une certaine condition, c'est  
à dire, qui n'ont pas encore atteint la fin de leur vie.

I. I. T. Figurine préliminaire.

2. 2. Figurine.

3. 3. Plus préparée contenant les formes de ces malades.

4. 4. Plus préparée lorsque les parties


5. 5. Plus préparée où il existe une certaine condition de ces


malades qui sont dans la partie.

6. 6. Figurine finale.

7. 7. L'appareil de l'utérus qui démontre les malades qui ont

atteint leur plus grande énergie dans leur vie; et de





## VUE DE L'UTÉRUS PAR SA FACE INTERNE.

APRÈS SA DÉPLÉTION RÉCENTE DU PRODUIT DE LA GROSSESSE À TERME.

PAROI POSTÉRIEURE INTERNE;

LE PLACENTA ÉTAIT GREFFÉ SUR LA PAROI OPPOSÉE.

### EXPLICATION DES LETTRES.

A, A. Orifice interne des trompes *utéro-tubaires*.  
B, B. Plans des fibres concentriques des régions latérales internes, ou muscles expulseurs de *Ruisch*.

Cet observateur n'avait jamais remarqué cette disposition que d'un seul côté. Soit que le plan opposé se trouvât effacé, soit qu'il eût été couvert et altéré par la présence du placenta, soit enfin que cet anatomiste célèbre n'ait pas assez insisté sur ses recherches, il n'a jamais fait mention que d'un seul plan de ces fibres que nous avons toujours rencontré double, lorsque le placenta n'était pas greffé sur l'un des deux, mais on en reconnaissait toujours quelques portions.

F, F. Ligne médiane interne; disposition de ses fibres.

C, C, C. Orifice interne de l'utérus.

D, D. Orifice externe formant sur le vagin un léger bourrelet cordé à la surface de ce canal.

E. Ligne médiane de la paroi postérieure du col qui donne naissance aux nombreux replis que l'on remarque à sa surface.

*Nota.* Ces replis ne sont apparens que lorsque le col est resté dans un état de collapsus; ils sont si minces, et si intimement accolés les uns sur les autres, que, le plus souvent, on ne les distingue qu'en agitant la pièce dans une eau transparente. Si l'on plonge ensuite la pièce dans une eau fortement saturée de sulfate d'alumine, on voit les parois du col se resserrer dans tous les sens, ses replis changer de direction, ses orifices se rétrécir, celui du museau de tanche rentrer en dedans du col et reprendre sa forme mamelonnée. Ce phénomène s'opère instantanément, et sous les yeux de l'expérimentateur, lorsque la solution alunée est assez forte.

# ALTE DE LUTTRES PAR SYLVIE INTERNET

ALTE DE LUTTRES PAR SYLVIE INTERNET

SYGNE INTERNET


SYLVIE INTERNET

SYLVIE INTERNET

SYLVIE INTERNET

A. Officiale de la poste que devra être envoyé à l'heure  
B. Officiale de la poste que devra être envoyé à l'heure  
C. Officiale de la poste que devra être envoyé à l'heure  
D. Officiale de la poste que devra être envoyé à l'heure





N°298.

## PROLAPSUS DU VAGIN.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

Pris d'abord pour une descente de matrice à laquelle on fit l'application d'un pessaire, ce prolapsus du vagin s'étant reproduit, la forme pyramidale qu'il affectait le fit prendre pour un polype sur lequel on fit l'application d'une ligature. L'accident s'est renouvelé une seconde fois: deuxième ligature, qui fut suivie, comme la première fois, de la chute d'une énorme tumeur. A peine celle-ci fut-elle tombée, qu'aussitôt il en parut une troisième de même grosseur, de même texture apparente que les deux premières. Ces tumeurs, qui se sont montrées successivement et spontanément en moins d'un mois, dont la nature et le siège avaient été méconnus, étaient occasionnées par la présence d'une masse énorme de tissu disfluente, encéphaloïde, qui s'était développée entre le rectum et le vagin. Recouverte de la paroi postérieure de ce dernier canal, elle venait former au bas de la vulve une tumeur du volume du poing.

- 1.1. Coupe des pubis.
- 2.2. Lambeaux renversés des parois abdominales.
- 3.3. Paroi postérieure du vagin d'un rouge livide, bleuâtre.
- 4.4. Tube passé dans les ouvertures résultantes de l'appli-

cation des deux ligatures appliquées à un mois de distance.  
(Des premiers jours de janvier 1830 au 28 du même mois. La troisième tumeur parut le 12 février.)


5. Museau de tanche.
6. Corps de l'utérus dont la presque totalité se trouvait comprise entre les deux tumeurs fibreuses blanches, à surfaces lisses avec lesquelles le col paraît souillé. Cet organe se trouvait situé presque au niveau de l'ombilic.
7. Tumeur fibreuse antérieure.
8. Tumeur postérieure.
9. Le rectum refoulé en haut et très-longé, était entraîné avec l'utérus.
10. L'ovaire gauche d'un jaune verdâtre, dur, ridé à sa surface.
11. Ovaire droit, transparent, membraneux, contenant un fluide séreux et diaphane.
12. Le psoas droit.
13. Les intestins grêles relevés pour faire voir les parties que l'on vient de décrire.

PROLOGO ALLA PRIMA EDIZIONE

... e' stato scritto da un poeta che non ha mai sentito parlare di poesia. Il poeta si è detto: "Sai cosa sono le poesie? Sono i versi che cantano la vita. Sono i versi che parlano di amore, di amicizia, di ammirazione. Sono i versi che parlano di dolori, di tristezza, di rabbia. Sono i versi che parlano di speranza, di fiducia, di coraggio. Sono i versi che parlano di vita, di morte, di rinascita. Sono i versi che parlano di Dio, di angeli, di demoni. Sono i versi che parlano di natura, di paesaggi, di animali. Sono i versi che parlano di storia, di miti, di leggende. Sono i versi che parlano di poesia, di poesia, di poesia".

Scritto da: *[Nome]*  
Data: *[Data]*  
Luogo: *[Luogo]*





## DÉPLACEMENTS DE L'UTÉRUS

PAR ABAISSEMENT.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>re</sup>. Semi-prolapsus survenu à la suite de l'accouchement à terme.

- A. Le vagin.
- B. Museau de tanche.

FIG. 2. Prolapsus complet à la suite d'une chute.

- A. Vagin renversé.
- B. Museau de tanche. L'accident était récent.

FIG. 3. Brides et adhérences du vagin.

- A. Le museau de tanche caché par les brides anormales.
- B. Brides du vagin.

FIG. 4.

- A. Prolongement morbide du vagin sur l'orifice du museau de tanche.
- B. Tuméfaction du museau de tanche.
- C. Petites tumeurs rouges, molasses, vasculeuses.

### ANTÉFLEXION DE L'UTÉRUS.

FIG. 5. L'utérus replié sur lui-même présente son fond en avant.

- A. Le fond de l'utérus.
- B. Lèvre antérieure du museau de tanche.
- C. Face interne du vagin.

D,D. Les ovaires situés en dessus et en avant, au lieu d'être en arrière et au-dessous des trompes.

E,E. Les trompes qui ont également suivi le déplacement du corps de l'utérus.

FIG. 6. L'utérus fléchi en avant vu de profil.

- A. Le fond de l'utérus.
- B. Coudé formé par la flexure de l'utérus, point correspondant à l'orifice interne.
- C. Lèvre antérieure du museau de tanche.
- D. Coupe verticale du corps et du col de l'utérus.
- E. Face interne du vagin.

FIG. 7. Extroversion du col de l'utérus:

- A. Corps de l'utérus.
- B. Bord interne du museau de tanche.
- C,C. Face interne du col devenue externe par son renversement
- D. Orifice accidentel du col de la matrice.

FIG. 8. Extroversion du col utérin vue de face:

- A,A. Bord de l'orifice externe.
- B,B. Lignes médianes de la face interne du col.
- C. Orifice accidentel.

## CHIUSI DI SPAGNOLE

L'ESPRESSO - 20 SETTEMBRE 1971 - 10 LIRE

proibiti per l'intera durata della marcia: 10.000 di questi saranno riconosciuti come "disabili" al fine di ricevere una "indennità di disoccupazione".  
Dopo che questo provvedimento sarà stato approvato, i tre comitati di difesa dei lavoratori di ogni settore di lavoro, compito loro specifico, dovranno fare affari con le loro organizzazioni sindacali per stabilire i criteri di "disabilità".  
In tutti i casi, i criteri non possono essere più rigidi di quelli stabiliti dal governo. Il governo, infatti, ha deciso di accettare le proposte dei sindacati di riconoscere come "disabili" anche i lavoratori che hanno dovuto lasciare il posto di lavoro perché sono stati assorbiti da nuovi posti di lavoro. Questo provvedimento, tuttavia, non riguarda solo i lavoratori di pubblica amministrazione, ma anche quelli privati. I criteri di "disabilità" sono stati stabiliti in base alla capacità di ciascun lavoratore di svolgere almeno un altro tipo di lavoro. Se un lavoratore non può più svolgere la sua attività professionale, ma può ancora svolgere un'altra, questa sarà considerata come "disabile".  
Questo provvedimento è stato approvato dopo che il governo ha deciso di riconoscere come "disabili" anche i lavoratori che hanno dovuto lasciare il posto di lavoro perché sono stati assorbiti da nuovi posti di lavoro. Questo provvedimento, tuttavia, non riguarda solo i lavoratori di pubblica amministrazione, ma anche quelli privati. I criteri di "disabilità" sono stati stabiliti in base alla capacità di ciascun lavoratore di svolgere almeno un altro tipo di lavoro. Se un lavoratore non può più svolgere la sua attività professionale, ma può ancora svolgere un'altra, questa sarà considerata come "disabile".



Fig. 1.





Fig. 2.



## PROLAPSUS COMPLET DE L'UTÉRUS.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Prolapsus complet de l'utérus, avec renversement du vagin et du fond de la vessie, pris sur une femme vivante, âgée de 60 ans, tombée en enfance depuis plusieurs mois.

- A. Orifice externe ou utéro-vaginal de l'utérus.
- B. Orifice supérieur du vagin devenu inférieur.
- C,C. Face muqueuse du vagin.
- D. Méat urinaire.
- E,E. Un stylet est passé de haut en bas dans le col de la vessie, et une ouverture *idéale* est pratiquée à la paroi du vagin correspondante à la vessie, pour faire voir le renversement de l'organe urinaire.

Le fond de l'utérus se trouvait à peu près à l'angle supérieur de l'ouverture idéale.

La femme urinait en comprimant la tumeur : l'urine remontait par le méat urinaire D. Mais il restait toujours un peu de liquide dans la vessie.

- F,F. Ulcérasions déterminées par l'écoulement de l'urine sur cette portion renversée du vagin.
- G. Le clitoris.

FIG. 2. Prolapsus complet de l'utérus avec renversement du vagin passé à l'état chronique.

La femme qui avait ce genre d'infirmité est entrée à la maison de santé le 27 mai 1832, pour une affection de l'estomac que l'on traitait depuis long-temps comme une maladie organique de ce viscère ; elle ne parla qu'occasionnellement de sa descente de matrice qu'elle avait depuis plus de trente ans.

Cette femme n'avait eu qu'un enfant à l'âge de vingt-huit ans. Elle s'est relevée le huitième jour de sa couche, pour reprendre ses occupations habituelles de *palefrenier*, son mari étant loueur de chevaux et de voitures. Elle sentit presque aussitôt un corps étranger volumineux sortir du vagin. Le médecin qu'elle fit appeler

replaça l'organe dans sa situation naturelle, l'y maintint au moyen d'un large pessaire, et fit garder le lit pendant quinze jours. Le pessaire gênant la malade, elle s'en débarrassa. Elle le reprit plus tard, puis le retira encore pour n'y plus revenir. Il paraît que le prolapsus complet ne s'est opéré qu'à la longue. Ce ne fut qu'à l'âge de cinquante ans, époque de la cessation totale des règles, que la matrice franchit entièrement la vulve, et c'est aussi depuis cette époque qu'elle est restée pendante au-dehors, sans occasionner d'autres accidens que quelques tiraillements dans les aines et dans la région inférieure du sacrum. La muqueuse du vagin avait pris tous les caractères de la peau des tissus voisins ; il restait à peine quelques traces des anciennes rides qui sillonnaient cette membrane avant son renversement et son exposition à l'air libre. Je fis rentrer facilement la tumeur, mais la malade ne voulut pas se soumettre à une nouvelle épreuve d'application de pessaire. Le périnée étant lacéré jusqu'à l'anus, le cas exigeant un instrument mécanique d'une très-grande dimension, je n'insistai pas pour vaincre la répugnance de celle qui, comme je viens de le dire, était accoutumée à son nouvel état.

- A. Le clitoris.
- B. Le méat urinaire.
- C,C. Nymphe ou petites lèvres.
- D,D. Grandes lèvres de la vulve.
- E,D. La surface muqueuse du vagin desséchée ayant pris l'aspect de la peau. Ce canal, renversé complètement, contenait la totalité de l'utérus qui était d'un très-petit volume.
- F. Petite tumeur pédiculée située à l'angle droit de l'orifice du museau de tanche.
- G. L'épithélium du museau de tanche excorié, laisse à nu la portion de muqueuse qui recouvre cette extrémité vaginale du col utérin.

## PROLÉGÈS COMPTÉ DE L'UNIVERSITÉ

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES

Le mot *université* n'a rien de commun avec l'allemand *Universität*, ni avec le français *université*. Il est d'origine grecque et signifie tout ce qui concerne l'enseignement et la recherche dans un domaine précis. Le terme *université* a été introduit en France au XVII<sup>e</sup> siècle par les jésuites, qui avaient fondé des collèges à Paris et dans d'autres villes. Ces collèges étaient destinés à former des hommes de lettres et de sciences, mais aussi à préparer des clercs pour l'église. Les universités ont donc une histoire très ancienne et sont considérées comme des institutions prestigieuses.

Le mot *université* est formé de deux parties : *uni* et *versitas*. *Uni* signifie « tout » ou « entier », et *versitas* signifie « citoyenneté » ou « citoyen ». C'est pourquoi l'université est souvent appelée « université de tous les citoyens ». Les universités sont donc des institutions publiques qui offrent une éducation à tous les citoyens, sans distinction de sexe, de race ou de religion.


Le mot *université* a été introduit en France au XVII<sup>e</sup> siècle par les jésuites, qui avaient fondé des collèges à Paris et dans d'autres villes. Ces collèges étaient destinés à former des hommes de lettres et de sciences, mais aussi à préparer des clercs pour l'église. Les universités ont donc une histoire très ancienne et sont considérées comme des institutions prestigieuses.

Le mot *université* est formé de deux parties : *uni* et *versitas*. *Uni* signifie « tout » ou « entier », et *versitas* signifie « citoyenneté » ou « citoyen ». C'est pourquoi l'université est souvent appelée « université de tous les citoyens ». Les universités sont donc des institutions publiques qui offrent une éducation à tous les citoyens, sans distinction de sexe, de race ou de religion.

Le mot *université* a été introduit en France au XVII<sup>e</sup> siècle par les jésuites, qui avaient fondé des collèges à Paris et dans d'autres villes. Ces collèges étaient destinés à former des hommes de lettres et de sciences, mais aussi à préparer des clercs pour l'église. Les universités ont donc une histoire très ancienne et sont considérées comme des institutions prestigieuses.

Le mot *université* est formé de deux parties : *uni* et *versitas*. *Uni* signifie « tout » ou « entier », et *versitas* signifie « citoyenneté » ou « citoyen ». C'est pourquoi l'université est souvent appelée « université de tous les citoyens ». Les universités sont donc des institutions publiques qui offrent une éducation à tous les citoyens, sans distinction de sexe, de race ou de religion.





## ÉLARGISSEMENT DU COL DE L'UTÉRUS.

### SA FORME APLATIE. — HERNIE CRURALE DE L'UTÉRUS.

ANTÉ ET RÉTROVERSION DE L'UTÉRUS.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1. Prolongement du col de l'utérus et prolapsus de cet organe.

- A. La lèvre postérieure du museau de tanche très-longée et beaucoup plus saillante que la lèvre antérieure B.
- C. Excroissances pédiculées du prépuce du clitoris.

FIG. 2. Le même col d'utérus vu de profil.

FIG. 3. Hernie crurale de l'utérus.

- A. Portion gauche des parois abdominales vue par sa face externe.
- B. Portion droite des mêmes parois vue par sa face interne.
- C. Région pubienne.
- D. La cuisse gauche.
- E. La cuisse droite.
- F. La vulve.
- G, G. L'enveloppe de la tumeur ouverte et renversée sur la cuisse.
- H. La matrice renversée et offrant en ayant sa face postérieure.
- I. La trompe utérine.
- J. L'ovaire gauche.
- K. La trompe droite.
- L. L'ovaire droit changé en kyste.
- M. Autre kyste adhérent à l'ovaire droit et à la matrice.
- N. Masse graisseuse adhérant fortement à la matrice, au sac, et se continuant avec lui.
- O. Prolongemens de l'épipoon qui sont coupés et renver-

sés. (*Ces trois figures sont copiées d'après les dessins originaux de M. le professeur J. CLOQUET.*)

FIG. 4. Coupe du bassin vu de profil, représentant l'antéversion de l'utérus dans les premiers temps de la grossesse.

- A. Pubis droit.
- B. Le sacrum.
- C. La vessie.
- D. L'urètre.
- E, E. Le rectum.
- F. Coupe de la trompe et du ligament du côté gauche de l'ovaire.
- G. Corps de l'utérus.
- H. Portion latérale de l'utérus qui n'est point recouverte du péritoïne.
- I. Museau de tanche.
- K. Le vagin.

FIG. 5. Rétroversion de l'utérus dans les premiers temps de la grossesse.

- A. Pubis droit.
- B. Museau de tanche.
- C. Canal de l'urètre.
- D. Vagin.
- E. Corps de l'utérus.
- F. La vessie dans son plus grand développement.
- G. Le rectum.
- H. L'angle sacro-vertébral.
- I. Coupe de la trompe et du ligament de l'ovaire gauche.







REVERSEMENT OU INTROVERSION  
DE L'UTÉRUS OCCASIONÉ PAR L'EXTRACTION PRÉCIPITÉE DU PLACENTA.

EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

La restitution de l'organe a été tentée, sans succès, par plusieurs personnes de l'art. Cette femme est arrivée à la maison de santé le sixième jour de l'accouchement.

FIG. 1.

- A,A. Mont de Vénus.
- B,B. Les grandes lèvres de la vulve.
- C,C. Les petites lèvres ou nymphes.
- D. Le clitoris.
- E. Le Méat urinaire.
- F. Le bord externe antérieur du vagin.
- G. Le bord antérieur de l'orifice externe de l'utérus.
- H,H. La face interne de la matrice devenue externe.
- I,I. Quelques lignes circulaires du plan de fibres concentriques.
- G,G,G. Points saillants où se trouvait implanté le placenta.
- FIG. 2. Le même utérus renversé, vu cinq années après l'accident.
- A. Orifice externe de l'utérus.

B. Face interne de l'utérus renversé, présentant à sa base quelques petits points rougeâtres.

Pendant les vingt-quatre heures qui suivirent l'accident, la femme eut une perte de sang des plus abondantes, qui se termina par une profonde et longue syncope. Non seulement l'hémorragie avait cessé, mais il n'y eut même plus de loches rouges. L'impossibilité d'uriner et les douleurs qui en résultèrent furent les seuls accidens qui accompagnèrent cet événement grave. La réduction n'ayant pu s'opérer, l'excrétion de l'urine se faisant bientôt sans aucun secours, on abandonna le reste au temps et aux ressources de la nature. Cette femme, qui était venue accoucher clandestinement à Paris, retourna chez elle une quinzaine de jours après son entrée à la maison. Ce n'est que cinq ans plus tard qu'elle vint nous demander conseil pour favoriser le retour de ses règles, que nous apprîmes qu'elle était restée privée de cet écoulement, et que nous reconnûmes, par la vue et par le toucher, l'état où était resté l'utérus.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA


LIBRARIES OF THE STATE OF CALIFORNIA


and of a tankard; between which is a small vase.

On either side of the fireplace are two large  
cabinets, one containing books, the other containing  
curiosities. On the floor before the fireplace is a  
large white marble pedestal, supporting a statue  
of a man in a classical attitude. On the floor  
before the pedestal is a large, round, white  
marble basin, containing a large plant.

The ceiling is decorated with four large  
painted panels, representing the four seasons.

At the top of the stairs leading up to the  
second floor are four large paintings, representing  
the four cardinal virtues. The entrance to the  
second floor is through a doorway in the  
center of the back wall, leading into a large  
hall, in which there is a large painting on  
the ceiling representing the four elements.





## CAS D'OBLITÉRATION COMPLÈTE

DE LA CAVITÉ DE L'UTÉRUS

ET DE TRANSFORMATION DE TISSU DE L'ORGANE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

La femme qui nous a fourni cette pièce était âgée de cinquante ans; elle avait été traitée, quelques années auparavant, d'un cancer au nez; elle a succombé à une phthisie tuberculeuse du poumon.

FIG. 1<sup>e</sup>. A, A. Tumeurs développées à l'extérieur du fond de l'utérus; cet organe est vu par sa paroi postérieure. Les trois tumeurs, développées derrière le péritoine, étaient d'un tissu blanc, crayeux et très dur. L'instrument tranchant ne put l'entamer qu'en frappant dessus à coups de marteau. Leur surface était injectée de vaisseaux sanguins très nombreux et d'un rouge très vif qui naissaient de leur pédicule.

B, B. Les trompes.

C, C. Les ovaires étaient très sains.

FIG. 2. Coupé sur son épaisseur en deux portions égales, l'utérus de la figure 1<sup>e</sup> ne présentait pas la plus petite cavité; la totalité de l'organe était composée d'une substance blanche, compacte, solide, qui se laissait couper comme le savon blanc du

commerce dont il présentait l'aspect et la consistance. Cette femme n'avait jamais été enceinte.

FIG. 3. L'utérus coupé en deux sur son épaisseur n'offrait point de cavité. Mais une ligne A, A, A, parfaitement triangulaire, d'un blanc bleuâtre, de la dureté du cartilage, retracait l'ancienne cavité de ce viscère.

A l'endroit B du col, un sillon longitudinal rappelait la cavité de cette portion de l'utérus. C'est par cette ouverture que s'échappait le sang qui s'était écoulé en assez grande abondance les jours précédents, et qui avait sa source derrière la couche cartilagineuse de la paroi postérieure de l'organe; on pouvait séparer en cet endroit cette couche dure et épaisse.

C, C. Les trompes étaient courtes, mais saines.

D, D. Les ovaires d'un jaune foncé étaient d'un tissu mollassé et graisseux.

E. Sur l'ovaire gauche s'était développé un kyste du volume d'une moyenne prune, rempli d'une sérosité jaunâtre.

## CES DOUBTS TERRITORY COPIED

THE EX-CATHOLIC OF AUSTRIA

THE EX-CATHOLIC OF AUSTRIA


THE EX-CATHOLIC OF AUSTRIA

and, in other words, the present situation is that Americans can no longer be sure of the correctness of their belief in the divine origin of the Bible, and, therefore, in the truth of the Christian religion. As a result, there is a general alarm throughout the country, and efforts are being made to find a way out of this difficult situation. There is a strong desire to find some way to reconcile the old religious beliefs with the new scientific knowledge. This is a task that requires careful thought and research.

The author of this article, Dr. John Henry Newman, F.R.S., is a well-known biologist and author, known for his work on the evolution of the nervous system. He has written several books on the evolution of life, including "Darwinism," "The Evolution of the Nervous System," and "Darwinism and the Nervous System." He has also written on the evolution of the brain and the development of the nervous system. He is a member of the Royal Society and a fellow of the Royal Society of Medicine.

Dr. Newman's article is a comprehensive study of the evolution of the nervous system. It is a detailed analysis of the development of the nervous system from its earliest stages to its final stage of complexity. It is a valuable contribution to the field of biology and medicine.





N° 303.

## TUMEURS FIBREUSES INTERSTITIELLES DE L'UTÉRUS.

PL. XIV.

(CE CAS AVAIT ÉTÉ PRIS POUR UNE GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE.)

### EXPLICATION DES LETTRES.

Trois tumeurs de différens volumes occupaient diverses régions de la matrice, et lui donnaient, par leur forme et la situation qu'elles affectaient, la figure d'un bonnet phrygien ou d'un cône.

- A. Angle latéral droit de l'utérus, formant le sommet du cône.
- B. Lieu où correspond l'angle latéral gauche.
- C. Trompe utérine droite.
- D. Pavillon de la trompe hypertrophié. Vues sous l'eau, ses longues et nombreuses franges présentaient, sur leurs bords latéraux, de petits filets semblables à ceux que l'on observe au bord des branchies des poissons.
- E. Première tumeur qui avait la forme d'un cône dont la petite extrémité répondait à l'orifice tubaire.
- F. Seconde tumeur hémisphérique.
- G. Petite portion de la troisième tumeur qui était obovonde.
- H. Ovaire droit.

I. Ovaire gauche.

K. Ligament rond ou cordon sus-pubien droit. Le cordon gauche se trouvait un peu en arrière, entre la tumeur G et la tumeur F.

L,M. Tumeurs poly-lobées et lardacées, développées dans le tissu cellulaire.

N. Tumeur pédiculée hydatidiforme, transparente, remplie d'une sérosité jaunâtre et limpide.

O,O. Repli du péritoine vésico-utérin.

P,P. Tubercules à l'état de crudité.

Q. Museau de tanche à l'état normal, d'un rouge-brun.

R. Portion du vagin.

Une ligne tirée depuis l'Angle A jusqu'à l'orifice du museau de tanche Q, indiquerait la longueur et la direction de la cavité de l'utérus ; elle formait un canal étroit de huit pouces de longueur. L'utérus était mobile.


LETTRES HISTORIQUES ET LITERAIRES DE L'ESPAGNE


LE GOUVERNEMENT ESPAGNOLE ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

LETTRE 230 ECONOMIE

... de la partie de l'Espagne qui appartient à la monarchie. Il  
y a dans ce pays deux sortes de personnes : les nobles et les  
bourgeois. Les nobles sont les seigneurs et propriétaires de  
terres, et possèdent des franchises et des privilégiés qui leur  
permettent d'être豁免 (exempt) de toute forme de service  
militaire ou civil. Ils ont également le droit de faire justice  
entre eux et leurs sujets sans être tenus de répondre devant  
les tribunaux ordinaires. Les bourgeois, au contraire, sont  
totalement soumis à la loi et doivent faire tout ce qu'ils sont  
obligés de faire par la loi. Ils n'ont pas de franchises et  
ne bénéficient pas des mêmes privilégiés que les nobles.

La différence entre les deux classes est très grande. Les nobles sont généralement très riches et ont une grande influence sur le gouvernement. Ils sont également très puissants militairement et peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans être tenus de répondre devant les tribunaux ordinaires. Les bourgeois, au contraire, sont généralement moins riches et ont moins d'influence. Ils sont également moins puissants militairement et doivent faire tout ce qu'ils sont obligés de faire par la loi. Cependant, il existe de nombreux exceptions à cette règle, et il existe de nombreux nobles qui sont pauvres et ne possèdent pas de terres, et il existe de nombreux bourgeois qui sont riches et ont une grande influence. Il existe également de nombreux nobles qui sont pauvres et ne possèdent pas de terres, et il existe de nombreux bourgeois qui sont pauvres et ne possèdent pas de terres.





## PLUSIEURS CAS DE TUMEURS DE L'UTÉRUS

OCCUPANT DIVERSES RÉGIONS DE L'ORGANE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Tumeur fibreuse interstitielle avec congestion sanguine du museau de tanche et mélanose de l'ovaire gauche. Cas observé chez une femme morte d'une affection chronique du système circulatoire.

- A. Face antérieure de l'utérus.
- B. Face postérieure de l'organe et siège de la tumeur.
- C,C. Trompe droite contournée.
- D. Enveloppe albuginée de l'ovaire droit.
- E,E. Ovaire droit développé par son bord inférieur.
- F,F. Bandes fibreuses provenant du cordon de l'ovaire.
- G. Ouverture faite avec le scalpel sur la membrane péritoneale de l'ovaire.
- H. Matière noire, épaisse, contenu dans l'ovaire.
- I. Museau de tanche tuméfié et d'un rouge livide.

FIG. 2. Tumeur fibreuse de la figure 1<sup>e</sup>.

Ce corps, divisé en deux portions, représente le tissu dont il est composé; c'est-à-dire de plusieurs petits corps plus ou moins durs, et dont les fibres étaient rayonnées du centre à la circonference.

FIG. 3. Tumeur fibreuse développée dans la propre cavité de l'utérus.

Cette pièce pathologique de l'appareil génital interne offre plusieurs affections différentes dans les divers organes qui le composent.

- A. Le museau de tanche, de plus du double de son volume ordinaire, présente une surface rugueuse et comme charrinée; son tissu est extrêmement dur.
- B. Le col de l'utérus, développé dans la proportion du museau de tanche, est d'un tissu blanc et comme cartilagineux; sa face interne est lisse, et ne laisse pas la moindre trace de ses rides.
- C. Cavité de l'utérus.
- D. Stylet introduit dans l'orifice du col, et qui pénètre dans la cavité utérine.
- E,E. Tumeur polylobée occupant la propre cavité de l'utérus et n'y étant adhérente que par un tissu lamelleux très-fin, qui en permettait facilement la dénudation.
- F,F. Parois de l'utérus, d'un tissu rouge, très-élastique, et sur lesquelles se dessinaient très-bien ses divers plans fibreux.
- G,G. Trompes de Fallope.
- H,H. Ovaies convertis en deux kystes à parois fibreuses, rouges, remplis d'une matière purulente jaunâtre et de consistance de bouillie.
- I,I. Portion du vagin.

(Cette femme, qui était entrée à la Maison de Santé pour s'y faire traiter d'une sciatique, a succombé à une pleuro-pneumonie.)

## TRAITEMENT DES GAZ DE CHAMPS DE CARBURE

PAR M. A. LAFAYETTE

regular des obédiences n'ayant pas obtenu de mention dans les  
tableaux annuels de concours et d'exposition, peuvent être  
admis au concours sans être soumis à l'épreuve de leur régularité  
et de leur exactitude par les juges. Les deux derniers articles  
de la loi sur les concours et expositions sont ainsi formulés :  
Article 10. — Les juges pourront déclarer que les échantillons  
sont réguliers et admissibles, ou non. Si les juges déclarent que les  
échantillons sont réguliers et admissibles, il sera alors admis à faire partie du concours et de l'exposition, et il sera  
évalué par le jury qui détermine les récompenses et les distinctions  
et qui décerne les diplômes et les médailles. Il sera alors admis à faire partie du concours et de l'exposition, et il sera  
évalué par le jury qui détermine les récompenses et les distinctions  
et qui décerne les diplômes et les médailles.


Il est donc nécessaire de faire une distinction entre les deux types de concours et d'exposition, et de faire une distinction entre les deux types de jugement.

Le premier type de concours et d'exposition est celui où les juges déclarent que les échantillons sont réguliers et admissibles. Le deuxième type de concours et d'exposition est celui où les juges déclarent que les échantillons sont irréguliers et non admissibles. Il est donc nécessaire de faire une distinction entre les deux types de jugement.

Il est donc nécessaire de faire une distinction entre les deux types de concours et d'exposition, et de faire une distinction entre les deux types de jugement.

Il est donc nécessaire de faire une distinction entre les deux types de concours et d'exposition, et de faire une distinction entre les deux types de jugement.





## CAS D'AMÉNORRHÉE.

PL. XXV.

TUBERCULES DANS LA CAVITÉ DE L'UTÉRUS ET DANS SES ANNEXES,

CHEZ UNE JEUNE FILLE DE SEIZE ANS.

### EXPLICATION DES LETTRES.

- A,A. L'utérus ouvert sur son bord latéral droit et sur son fond, laisse voir une tumeur blanche B,B sur chaque face de l'organe.  
B,B. Cette matière blanche granulée, d'apparence solide, se liquéfie par le grattage, et pénètre dans le propre tissu de la matrice.  
C,C. Face interne du col de l'utérus.  
D,D. Face interne ou muqueuse du vagin.  
E. L'ovaire gauche contenant plusieurs tumeurs irrégulières.  
F,F. Chacune de ces tumeurs est composée d'un ou de plusieurs kystes contenant une matière pultacée et solide, comme du fromage de Hollande.  
G. La trompe gauche, plus courte que l'autre, est saine.  
H. L'ovaire droit, mou, d'un tissu noirâtre, ne contient

qu'une matière muqueuse d'un bleu foncé, quelques vaisseaux d'un rouge vif, et un corps noir à surface lisse, du volume d'une aveline et d'un tissu compact.

J,J. La trompe droite offrait trois renflements sur sa longueur, qui étaient déterminés par la présence de trois tubercules volumineux K dont chacun était pourvu d'une enveloppe ou kyste solide. Ils sont représentés divisés sur leur épaisseur. La trompe était d'un rouge foncé, d'un tissu plus épais qu'à l'état normal, et généralement plus développé sur sa longueur.

L. Le pavillon de la trompe, ainsi que ses franges, sont convertis en une masse de tubercules granulés, d'une consistance solide.

MM. Le ligament large du côté droit est parsemé de nombreux tubercules à l'état solide.

## CVS DIVINORUM

DISCOURSES POUR LA CONFÉRENCE D'ARTS ET MÉTIERS

PAR J. B. DE LAMBERT

### INTRODUCTION DES PARTIES

employé, dont voilà un'septembre moins que un  
septembre à venir et auquel il a été ajouté un  
septembre qui a été mis au bout de l'année.  
Il a été ajouté à ce septembre deux autres qui sont  
l'un au bout de l'année et l'autre au bout de la  
seconde partie de l'année. Il a été ajouté  
une autre partie de l'année au bout de la  
troisième partie de l'année. Il a été ajouté  
une autre partie de l'année au bout de la  
quatrième partie de l'année.

According to the hypothesis of Leibniz, there are seven months in a year. A  
month has 30 days and consists of two parts, each  
of which has 15 days. The first part is called the  
first month, the second part is called the second  
month, the third part is called the third month,  
the fourth part is called the fourth month,  
the fifth part is called the fifth month,  
the sixth part is called the sixth month,  
the seventh part is called the seventh month.





MOLE VÉSICULAIRE AVEC LES MEMBRANES FOETALES.

PL. XVII.

EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Môle vésiculaire avec les membranes foetales.

Ce corps représentait à l'extérieur une masse rougeâtre, spongieuse, ovoïde, aplatie sur deux faces opposées, sans ouverture lors de sa sortie de l'utérus. Son volume était moitié moindre qu'il n'est représenté ici, la tumeur étant ouverte sur sa longueur et vue par sa face interne.

A,A,A. Membrane séreuse ou amniotique. Le chorion ne put être distingué. La membrane nous parut simple.

B. Repli de cette membrane où se trouvait encore une petite cuillerée de fluide séreux. Lors de l'expulsion de la masse, elle en contenait une certaine quantité.

C,C,C. Trois petites tumeurs rouges, du volume d'une cerise, de consistance solide, contenant une substance lardacée.

D. Autre tumeur piriforme, surmontée d'une tumeur plus petite et de même nature.

E. Vésicule transparente pédiculée, et au-dessous un grand

nombre d'autres vésicules semblables à celles qui composaient le tissu de la masse totale.

F,F,F. Vésicules de la masse totale, situées à l'extérieur de la membrane amniotique.

FIG. 2. Polype en bottant de cloche (1).

Cette tumeur s'est développée chez une vierge, âgée de 40 ans. Cette tumeur était étroitement renfermée dans le vagin; ce ne fut qu'avec peine qu'elle put être amenée au-dehors, au moyen d'une pince à anneaux. Son tissu était lobulé, sa surface inégale, et son pédicule de plusieurs pouces de longueur.

A. Grandes lèvres.

B. Le clitoris.

C. Les petites lèvres.

D. Bord antérieur de l'orifice du vagin.

E. Segment semi-lunaire de l'hymen.

F. Le corps du polype.

(1) Opéré par M. le professeur J. Cloquet, et copié sur le dessin original qu'il en a fait.

*Note.* Ce cas offre une nouvelle preuve que le pédicule n'est pas le résultat du tiraillement exercé par le poids de la tumeur.

## MEDE MACHINARIE VEC LES MEMBRES HUMAINE

qui se trouvent dans les membres humains  
et qui sont de la nature des os.

On voit que ces os sont disposés par un ordre  
qui résulte du mouvement des membres et  
qui est à l'origine de leur force et de leur  
solidité.

Les os sont disposés de telle manière qu'ils puissent  
être placés pour servir de supports aux muscles,  
qui sont les agents moteurs de l'animal. Ils sont  
aussi disposés pour servir de supports aux tendons  
qui sont les agents de la force et de la solidité.

Les os sont également disposés de manière à ce  
qu'ils puissent servir de supports aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.


C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.

C'est pourquoi on voit que les os sont disposés  
de manière à ce qu'ils puissent servir de supports  
aux tendons.





## POLYPES DE L'UTÉRUS.

(MÉTRORRHAGIE.)

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

L'utérus, offrant au moins le double de son volume, présente, à l'extérieur et sur son fond, trois tumeurs pédiculées, A,A,A.  
B. Une autre petite tumeur pisiforme se présente à l'orifice du museau de tanche.

FIG. 2.

Le même utérus, ouvert sur son bord latéral droit, présente, à l'intérieur de son col, trois petits corps rouges pédiculés, dont chacun renferme un petit kyste contenant une matière albu-mineuse incolore, filant à la pointe de l'instrument.

A. Paroi antérieure de l'utérus.

B. Lèvre antérieure du Museau de tanche, plus longue que l'autre, à la face interne de laquelle le petit polype a pris naissance.

Nota. Le corps et le col de l'utérus étaient très-mous.

FIG. 3.

A. Polype qui est engagé dans l'orifice du museau de tanche,

et qui coïncidait avec un cancer de la mamelle droite.  
Point de règles; point d'écoulement d'aucune nature.  
B. Orifice du museau de tanche.

FIG. 4.

Utérus très-développé, fortement injecté, d'un tissu très-mou, contenant dans sa cavité une tumeur fibro-celluleuse, A, adhérente par une membrane mince accidentelle, B.  
C,C. Le col, très-long, était d'un blanc violacé.

FIG. 5.

A. Polype pédiculé inséré dans le fond de la cavité de l'utérus, et dont la chute s'est opérée spontanément. La femme est morte, quelques jours après, d'une affection du poumon.  
B. Pédicule du polype.  
C. Bord de l'orifice externe de l'utérus.

## PORTA DE LA MATERIA

(Continuación)

### SISTEMA DEL MUNDO

Algunos elementos de la teoría de la materia que se han mencionado en el apartado anterior, son:


— La materia es la sustancia que existe en el universo, es decir, que no es un concepto abstracto ni una idea pura.


— La materia es la sustancia que existe en el universo, es decir, que no es un concepto abstracto ni una idea pura.

— La materia es la sustancia que existe en el universo, es decir, que no es un concepto abstracto ni una idea pura.

— La materia es la sustancia que existe en el universo, es decir, que no es un concepto abstracto ni una idea pura.

— La materia es la sustancia que existe en el universo, es decir, que no es un concepto abstracto ni una idea pura.





PL. XIX.  
**POLYPES DE LA CAVITÉ DE L'UTÉRUS.**

EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Portion postérieure de l'Utérus d'une femme morte d'une affection du cerveau le deuxième jour de son accouchement qui avait été naturel.

- A.A. Coupe longitudinale de l'utérus.
- B.B. Traces du lieu où était situé le placenta.
- C. Polype à pédicule palmé, F d'un tissu encéphaloïde.
- D. Lambeau de la membrane caduque, ou épichorion.
- E. Tubercule solide d'un blanc jaunâtre.

FIG. 2. Polype en battant de cloche.

- A. Corps du polype.
- B. Pédicule grêle qui prenait naissance à la face postérieure et moyenne du col de l'utérus.
- C. Portion du col hors du vagin D.
- La base de ce pédicule E, offrait l'aspect d'un petit placenta; la tumeur était bosselée à sa surface et recouverte d'une membrane fine et de nombreux vaisseaux veineux.

FIG. 3. Polype creux d'une énorme dimension et dont la ligature fut faite avec succès par le professeur Dubois.

- A,A,A. Plis formés par l'application de la ligature.

FIG. 4. Coupe verticale du même polype.

- A,A. La tranche présente un tissu composé de plusieurs couches charnues superposées, rougeâtres.
- B,B. La face interne de la tumeur offre une apparence membraneuse, et présente plusieurs sillons résultant de la réduction de volume de la tumeur.
- C,C. Orifices qui s'ouvraient à l'extérieur et par lesquels sortaient le sang et les autres fluides qui avaient distendu la tumeur avant qu'on en eût fait la ligature.
- D,D. Froncis résultant de l'application de la ligature.

Cette tumeur nous a paru formée par la concrétion de fluide plastique de l'utérus, pendant un certain temps que la femme n'avait point ses règles. L'application successive de ces couches pseudo-membraneuses a donné lieu à une espèce de sac qui servait de doublure à l'organe dont il avait pris la forme. Ce sac s'étant probablement détaché d'abord par son fond, a fini par se présenter à l'orifice et s'y est engagé à la manière de l'utérus dans le cas de renversement de cet organe.

Cette pièce pathologique, présentée à plusieurs médecins, fut prise pour un utérus renversé. Mais on était certain que l'utérus était resté dans sa situation naturelle.

400742 DE LA CIVILISATION

DU JAPON

PAR  
J. G. BUNNELL,  
Membre de l'Académie des sciences de l'Institut de France,  
Professeur à l'Université de Paris, et  
Conservateur du Musée Guimet.  
Traduit par M. Léon Dierx, Professeur à l'Université de Paris,  
et Conservateur du Musée Guimet.  
Paris, 1886.



Fig. 2.



Fig. 3




Fig. 4



## POLYPES DE LA CAVITÉ DE L'UTÉRUS.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>re</sup>. Utérus provenant d'une femme qui avait eu un avortement trois mois avant sa mort.

- A. Le corps de l'utérus, d'un rouge pâle : il était très-mou.
- B. Petit corps molasse, spongieux, rougeâtre, adhérent par un tissu lamelleux très-fin et transparent à la face interne de l'utérus.

FIG. 2. Pièce pathologique enlevée sur une femme de soixante-dix ans. Tous les ganglions lymphatiques étaient très-engorgés. — La matrice vue par sa face postérieure.

- A. Concrétion arrondie, pierreuse, inégale, entourée par la substance de l'utérus.
- B. Substance de l'organe développé dans son fond, séparée, par une cloison mince, de la cavité de l'utérus.
- C. Cloison de la cavité de l'utérus.
- D. Un polype pédiculé, vésiculeux, mou, contenant beaucoup de petites vésicules, remplies d'un fluide jaunâtre, occupe toute la cavité inférieure de l'utérus et s'insère à son fond (*Le pédicule ne dépend pas de la traction du polype*, car ce pédicule était plié sur lui-même, et le petit polype remplissait toute cette cavité : sur la figure dessinée, il a été tiré en bas).

Au fond de l'utérus quatre ou cinq petites vésicules agglomérées, remplies de fluide transparent et saillantes sur les parois de l'utérus.

- E. Le col de l'utérus n'offrait aucune altération : il était très-étroit dans sa portion supérieure.
- F. Corps aplati, jaunâtre, mou, tenant à l'utérus par un long pédicule vasculaire, dans lequel rampent plusieurs

artères flexueuses. Ce corps est formé de plusieurs granulations jaunes et de quelques petites concrétions.

- G. Le vagin.
- H. Est une concretion très-dure, du volume du poing, jaune, très-pesante, hérissée de tubercles, adhérente par des brides membraneuses à la partie antérieure de la matrice et du vagin, et à l'épipoon. Cette grosse tumeur sciée, a offert un composé de tissu fibreux, blanc, très-ferme, en petite quantité, réunissant des grains inégaux de tissu pierreux, blanc, friable, opaque, et d'un autre tissu plus dur encore, jaunâtre, demi-transparent. Ces trois substances étaient mêlées et unies intimement. Description et dessin d'après M. J. Cloquet, extrait de son porte-feuille.

- I.I. Trompes très-saines.
- KK. Ovaïres atrophies.
- L. L'épipoon pèse au moins une livre et demie.

FIG. 3. Polype pédiculé de l'Uterus.

Cette figure est copiée de Clarke. Il attribue la dépression longitudinale à la présence du canal de l'urètre.

La tumeur est attachée au fond de l'utérus par un col étroit. Elle a passé de l'utérus dans le vagin.

- A. Fond de l'utérus. La paroi antérieure de l'organe ouverte pour faire voir la forme et le point d'attache du polype.
- B.B. Section en deux portions du museau de tanche.
- C. Le vagin.
- D. La tumeur.

ANSWER TO THE QUESTIONS IN  
THE HISTORY OF THE ENGLISH

SECOND EDITION REVISED AND ENLARGED.

AN ANSWER TO THE QUESTIONS IN  
THE HISTORY OF THE ENGLISH.  
BY J. R. GREEN,  
HISTORIAN OF ENGLAND, & OF THE BRITISH EMPIRE.  
IN FIVE VOLUMES.  
VOLUME I.—FROM THE EARLIEST TIMES TO THE CONQUEST.  
LONDON: LONGMAN, REES, ORME, AND CO., 1843.


AN ANSWER TO THE QUESTIONS IN  
THE HISTORY OF THE ENGLISH.  
BY J. R. GREEN,  
HISTORIAN OF ENGLAND, & OF THE BRITISH EMPIRE.  
IN FIVE VOLUMES.  
VOLUME II.—FROM THE CONQUEST TO THE REIGN OF HENRY VII.  
LONDON: LONGMAN, REES, ORME, AND CO., 1843.

AN ANSWER TO THE QUESTIONS IN  
THE HISTORY OF THE ENGLISH.  
BY J. R. GREEN,  
HISTORIAN OF ENGLAND, & OF THE BRITISH EMPIRE.  
IN FIVE VOLUMES.  
VOLUME III.—FROM THE REIGN OF HENRY VII. TO THE RESTORATION.

ANSWER TO THE QUESTIONS IN  
THE HISTORY OF THE ENGLISH.  
BY J. R. GREEN,  
HISTORIAN OF ENGLAND, & OF THE BRITISH EMPIRE.  
IN FIVE VOLUMES.  
VOLUME IV.—FROM THE RESTORATION TO THE END OF THE SEVEN YEARS' WAR.  
LONDON: LONGMAN, REES, ORME, AND CO., 1843.

ANSWER TO THE QUESTIONS IN  
THE HISTORY OF THE ENGLISH.  
BY J. R. GREEN,  
HISTORIAN OF ENGLAND, & OF THE BRITISH EMPIRE.  
IN FIVE VOLUMES.  
VOLUME V.—FROM THE END OF THE SEVEN YEARS' WAR TO THE PRESENT TIME.  
LONDON: LONGMAN, REES, ORME, AND CO., 1843.





N° 229.

## DÉGÉNÉRESCENCE SQUIRRHEUSE

DE LA LÈVRE ANTÉRIEURE DU MUSEAU DE TANCHE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

Cette portion de l'utérus avait acquis cet énorme volume sans passer à l'état d'ulcération. Les violentes métorrhagies qui ont causé la mort du sujet, étaient occasionnées par l'extrême dilatation des vaisseaux nombreux de la face interne de l'utérus,

L'utérus est vu par sa paroi postérieure.

- A. Corps de l'utérus ayant plus de trois fois son volume ordinaire.
- B. Lèvre postérieure du museau de tanche.
- C,C,C. Lèvre antérieure du museau de tanche.

D,D,D. Vagin largement développé; ses rides effacées par la présence de la tumeur.

E,E. Trompes de Fallope à l'état normal.

F,F. Ovaires également sains.

Les vaisseaux ovariens étaient très volumineux, et les ligaments larges fortement injectés.

G. Portion de la vessie renversée.

H,H. Ligamens rond, vus à travers le péritoine.

RECEIVED  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO  
JULY 1914

RECEIVED  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO  
JULY 1914

RECEIVED  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO  
JULY 1914



X<sup>2</sup> 420.



## COUPE VERTICALE DE L'UTÉRUS

QUI FAIT LE SUJET DE LA FIGURE PRÉCÉDENTE.

### EXPLICATION DES LETTRES.

Cette figure représente l'épaisseur de la lèvre antérieure du museau de tanche, et son étendue. L'orifice que l'on voit sur la planche XXI se trouve ici en arrière; il est indiqué par le stylet A, qui pénètre dans la cavité B de l'utérus.

On remarquera l'extrême épaisseur des parois du corps de ce viscère.

C,C. Granulations blanchâtres qui pénètrent le tissu de l'utérus.

B. Nombreux orifices des vaisseaux de la cavité utérine, qui produisirent une hémorragie mortelle.  
D,D,D. Coupe de la tumeur formée par la lèvre antérieure du museau de tanche. On y distingue une multitude de granulations dures, d'un blanc bleuâtre, comme cartilagineuses, dont la totalité du tissu de l'organe se trouvait farcie.

ДЕЯНИЯ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ


ІСТОРИЧНОГО СПУСТЯ ВІД ТИМІЮ

ІСТОРІЯ ІЗОВІДАЛЬСЬКЕ

Історія ізів'ядальського хутора № 1  
від часу заснування хутора  
до часу заснування села відома з писем  
Івана Симонова, письменника, який  
зробив з опису хутора № 1 відомості про

історію хутора № 1 від часу заснування хутора № 1 до часу заснування села відома з писем  
Івана Симонова, письменника, який  
зробив з опису хутора № 1 відомості про





## TUMÉFACTION SQUIRRHEUSE

DE LA LÈVRE POSTÉRIEURE DU MUSEAU DE TANCHE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

Cette tuméfaction s'est rencontrée sur l'utérus d'une femme morte de phthisie tuberculeuse, à la suite d'un avortement dans le sixième mois de la grossesse.

- A. Fond de l'utérus.
- B. Disposition *palmée* des plans fibreux de l'utérus pendant le cours de la grossesse.
- C,C,C,C. Trompes groupées sur la face postérieure de l'utérus et décrivant chacune une anse, dans laquelle se trouvent encadrés les ovaires qui sont fortement adhérents à la paroi postérieure de l'utérus, au moyen de nombreux replis morbides des ligaments larges.
- D. Ovaires.
- E,E. Ligaments larges.
- F. Lèvre postérieure du museau de tanche, d'un tissu squirrheux, ayant environ un pouce d'épaisseur.
- G. Tumeur hydatidiforme sur l'angle supérieur et extérieur

gauche du fond de l'utérus. Ce kyste, du volume et de la forme d'une figue ordinaire, était transparent et contenait un fluide séreux et jaunâtre.

FIG. 2.

Museau de tanche squirrheux, orifice largement ouvert; ses bords minces, durs, découpés.

Cette disposition, qui se rencontrait chez une femme éminemment lymphatique, était accompagnée de flueurs blanches très-abondantes.

FIG. 3.

Tuméfaction; induration du museau de tanche, parsemé à sa surface de points livides sur un fond violacé. Disposition également accompagnée de flueurs blanches abondantes.

Cette dame était blonde, pâle, ayant tous les muscles mous et flasques. La mère et une sœur de cette dame, ainsi affectées, venaient de succomber à un cancer de la matrice.

## INSTITUTION SURNOMMÉE

DE LA LIÈGE DES TERRITOIRES DU MURAN DE TANCIE


ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA CHARTRE

Leurs amis du peuple de l'Europe. Ce peuple qui devient à la fois  
l'ami des hommes et l'ennemi des tyrans, est l'ami de l'ordre et de la paix  
qui libère le droit de l'homme.

Même si les idées diffèrent, nous sommes d'accord sur une chose :  
que l'ordre, que la paix, que la justice, que la liberté, que la dignité humaine,  
soit respectée, soit conservée, soit enseignée, pour tous les hommes dans le monde.

La chartre, qui établit un nouveau régime politique, offre également de nombreux avantages.  
Elle garantit la sécurité des personnes et des biens, elle protège les droits de l'homme, elle prévoit des institutions efficaces et responsables.  
C'est pourquoi, nous croyons que la chartre de la paix, de la justice, de la liberté, de la dignité humaine  
est une véritable source d'inspiration pour tous les hommes dans le monde.

Il existe de nombreux groupes qui soutiennent la chartre de la paix, tels que les amis de l'ordre,  
les amis de la paix, les amis de la justice, les amis de la liberté, les amis de la dignité humaine.  
Tous ces groupes ont un rôle important à jouer dans la promotion de la chartre de la paix.  
Ils travaillent à la fois à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, pour promouvoir la paix,  
la justice, la liberté et la dignité humaine dans le monde entier.  
La chartre de la paix est un document très important pour tous les hommes dans le monde.  
Elle garantit la sécurité des personnes et des biens, elle protège les droits de l'homme, elle prévoit des institutions efficaces et responsables.  
C'est pourquoi, nous croyons que la chartre de la paix, de la justice, de la liberté, de la dignité humaine  
est une véritable source d'inspiration pour tous les hommes dans le monde.



N°322.



## CANCER FONGUEUX

### OU CHOUFLEUR DU MUSEAU DE TANCHE.

#### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

Cette affection est accompagnée de pertes de sang très-considérables, et aussi d'une sécrétion de sérosité limpide, inodore, prodigieusement abondante.

Fig. 1.

- A. Corps de l'utérus supposé à l'état naturel ; mais on remarquera que la *lèvre postérieure* du museau de tanche est portée à gauche, et que la *lèvre antérieure*, convertie en une tumeur énorme, désignée sous le nom de *choufleur*, est dirigée à droite.
- B. Paroi antérieure du corps de l'utérus.
- C. Choufleur de la lèvre antérieure du museau de tanche.
- D. Lèvre postérieure du museau de tanche.
- E. Portion du vagin développé par la tumeur.

Fig. 2.

Vue du pédoncule du choufleur après sa séparation, au moyen de ciseaux courbés sur le plat. On avait préalablement jeté une ligature sur le collet de la tumeur pour l'amener hors de la vulve.

La coupe de cette tumeur présente un tissu lardacé qui n'a

pas tardé à dégénérer en un cancer épouvantable auquel cette femme a succombé dix à douze mois après l'opération.

- A. Coupe du pédoncule.
- B. Lèvre antérieure du museau de tanche.
- C. Lèvre postérieure du museau de tanche.
- D. Le vagin revenu presque à l'état normal.

Fig. 3.

Autre choufleur, moins développé que le précédent. On essaya d'abord d'amener la tumeur à la vulve au moyen d'érigines que l'on avait enfoncées dessus à plusieurs reprises, et qui chaque fois emportaient avec elles un lambeau de la tumeur. Le lendemain on appliqua une ligature comme dans le cas précédent, et l'on fit l'excision de la tumeur avec les ciseaux plats. Ici on emporta, en même temps, la totalité du museau de tanche.

Fig. 4.

Portion retranchée du col de l'utérus de la figure 3.

A. Portion renversée du col, dont le tissu mince et très-

- ramolli permettait d'en abaisser un bord pour faire voir les granulations de la surface interne.
- B,C. Stylet passé dans le col par son orifice externe.  
 D. Lèvre antérieure du museau de tanche.  
 E. Lèvre postérieure.  
 F. Débris de la tumeur après son ablation.  
 G,H. Lambeaux de membranes très-fines et fortement injectées de sang, qui recouvrerent la tumeur.


FIG. 5.

Cicatrice du moignon du col de l'utérus, quinze jours après l'opération.

*Nota.* Cette dernière tumeur, après son excision, avait perdu sa forme et les trois quarts de son volume. La première, qui fut enlevée en totalité et du premier coup, a conservé à peu près tout son volume et sa forme; seulement sa coloration en un rouge vif fut promptement dissipée dans l'eau, où elle fut plongée de suite.

Sa coloration dépendait donc de la membrane qui l'enveloppait. Elle s'enfonçait dans les interstices des granulations de la tumeur, comme la pie-mère s'enfonce entre les circonvolutions du cerveau. Lorsque cette membrane fut enlevée, la tumeur représentait absolument la surface granulée du chouleur dont elle a emprunté le nom chez les Anglais.





## EXCISION DU COL DE L'UTÉRUS.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Excision du col de l'utérus (1).

Cette pièce avait été le sujet d'une grave discussion. La femme sur qui elle avait été prise avait eu un ulcère du col de l'utérus. Elle fut admise à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris. Après un examen de plusieurs médecins, il fut reconnu que cet ulcère était de nature cancéreuse et qu'il convenait d'enlever la portion malade avec des ciseaux. M. Bougon, chirurgien alors de cette clinique, fit l'opération. La tumeur enlevée, il survint une inflammation violente de l'utérus qui se propagea rapidement au péritoine, et la femme mourut quelques jours après.

Les parties, après la mort, furent examinées avec soin par un grand nombre de chirurgiens et de médecins : les uns persistaient dans leur opinion pour un cancer du col de l'utérus, les autres n'y virent autre chose qu'une affection vénérienne, qui aurait pu être traitée par des moyens plus doux et plus sûrs dans leurs résultats; ceux-ci voyaient dans l'ulcération qui restait sur la paroi postérieure du vagin tous les caractères d'un ulcère vénérien, tandis que l'opérateur et ses amis n'y reconnaissaient que l'effet des ciseaux courbes sur le plat, qui avaient pincé et endommagé le vagin pendant les tentatives d'excision du col. Tels sont les détails que nous a donnés sur ce cas M. le docteur Guillou.

Nous avons copié la pièce aussi exactement que possible, et nous la produisons ici sans autre commentaire.

- A. Coupe de l'utérus sur sa paroi antérieure.
- B. Lieu d'excision du museau de tanche.

(1) Figure qui nous a été communiquée par le docteur Guillou.

C,C,C. Ulcérasions de la surface du vagin, soit qu'elles aient précédé l'opération, soit qu'elles en aient été le résultat.

D. Petites granulations qui se faisaient remarquer à la surface du vagin.

E,E. Épaisseur des parois de la matrice. Tissu ferme et à l'état normal.

F. Cavité de l'utérus.

G,G. Cordons sus-pubiens.

H,H. Trompes de Fallope d'un rouge plus intense qu'à l'état naturel.

I,I. Ovaies sains.

K,K. Ligaments larges, tissu épais, fortement injectés.

FIG. 2. Utérus chez une fille chaste:

A. Utérus vu par sa paroi postérieure.

B. Rectum renversé, pour faire voir les adhérences avec l'utérus.

C,C. Membranes morbides.

D,D. Tumeurs tuberculeuses, communes à l'utérus et au rectum.

E. Trompe droite oblitérée et adhérente à l'ovaire.

F. L'ovaire droit.

G. Kiste rompu présentant la forme de la corolle d'un lisseron.

H. Trompe gauche, à l'état morbide adhérente à l'ovaire.

I. Ovaire gauche hypertrophié.

J. Ligament large.

EXCESSION DE GOUVERNEMENT

collation des deux ouvrages de l'ordre de la Révolution et de la Révolution, mais il n'y a pas de rapport entre eux. Il est à noter que les deux ouvrages sont écrits par deux auteurs différents, et que l'un d'eux, M. de Tocqueville, a été édité par un autre auteur, M. de Tocqueville, et que l'autre, M. de Tocqueville, a été écrit par un autre auteur, M. de Tocqueville.

Il est intéressant de voir que les deux ouvrages sont écrits par deux auteurs différents, et que l'un d'eux, M. de Tocqueville, a été écrit par un autre auteur, M. de Tocqueville. Les deux ouvrages sont écrits par deux auteurs différents, et que l'un d'eux, M. de Tocqueville, a été écrit par un autre auteur, M. de Tocqueville. Les deux ouvrages sont écrits par deux auteurs différents, et que l'un d'eux, M. de Tocqueville, a été écrit par un autre auteur, M. de Tocqueville.



Fig. 1.



Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 2.



## ÉROSIONS, ULCÉRATIONS SUPERFICIELLES,

VÉSICULES MILIAIRES DU MUSEAU DE TANCHE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

Utérus vu par sa paroi postérieure.

- A. Congestion sanguine du museau de tanche.
- B. Érosion des bords de son orifice.
- C,C. Portion supérieure du vagin.
- D,D. Cicatrices récentes sur l'ovaire gauche (l'ovaire droit, quoique sain, est du double du volume ordinaire).

FIG. 2.

Museau de tanche de l'utérus d'une dame âgée de vingt-quatre ans, mariée et sans enfans, sujette à d'abondantes flueurs blanches. L'épithélium du museau de tanche était presque totalement enlevé. Cette portion du col utérin était presque constamment baignée dans une sécrétion très-abondante de matière puriforme provenant de l'intérieur de la matrice. La mère de cette dame, affectée pendant très long-temps de dartres sur di-

verses régions du corps, a succombé à un ulcère de la matrice.

FIG. 3.

Museau de tanche de volume naturel, d'un rouge vif, parsemé à la surface de vésicules miliaires, blanchâtres, molasses. Cet état était accompagné d'irrégularité dans l'évacuation des menstrues et d'émission de sang pendant le coït.

FIG. 4.


Museau de tanche très-tuméfié; ulcération très-étendue; écoulement blennorrhagique des plus abondans, accompagné de douleurs violentes et des symptômes les plus graves, tels que fièvre, vomissements, diarrhée et métrorrhagie, etc.

FIG. 5.

Tuméfaction, ulcération du museau de tanche; flueurs blanches habituelles; fréquentes pertes de sang.

## MÉTIERS, OCCUPATIONS SUPÉRIEURES

ARTICLES MÉTALLIERS DE L'ÉTAT DE TOME IX






Fig. 6.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 5.




Fig. 7.




Fig. 4.



Fig. 1.

## AFFECTIONS DIVERSES DU MUSEAU DE TANCHE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

Jeune femme de 18 ans. Congestion sanguine avec granulations blanches à la surface du museau de tanche; tissu mou; transsudation sanguine sous la pression; émission plus abondante pendant le coït. Affection herpétique supprimée à l'époque de la menstruation : habitude de la masturbation.

FIG. 2.

Concrétion granulée; ulcération superficielle; congestion sanguine du museau de tanche. Dysménorrhée guérie.

FIG. 3.

Concrétion granulée; érosion; dysménorrhée; émission de sang pendant le coït : guérie.

FIG. 4.

Tuméfaction considérable; dureté du museau de tanche; mouchetures rougâtres à sa surface; sensibilité extrême au toucher; dysménorrhée. Traitee avec avantage par les antiphlogistiques et les stupéfians. Depuis, grossesse, accouchement long, à cause de la dureté et de l'épaisseur des parois du col. (La mère de cette dame a succombé à un cancer de la matrice.)

FIG. 5.

Deux petites tumeurs du volume d'un pois sur la lèvre antérieure du museau de tanche; tuméfaction de cette partie de l'utérus avec congestion sanguine. Coloration d'un rouge bleuâtre. Cette disposition coïncidait avec une tumeur de la mamelle, qui a résisté à la méthode compressive. (La mère de cette dame avait eu une affection grave du col de l'utérus, guérie par les soins de M. le docteur Marc.)

FIG. 6.

Tuméfaction, sensibilité du museau de tanche. Son orifice entouré de nombreuses vésicules transparentes, semblables à des groseilles blanches, accompagnées d'abondantes pertes de sang. Ces vésicules disparurent au moyen d'injections styptiques. Les pertes, au moyen d'un régime tonique, devinrent beaucoup plus rares.

FIG. 7.

Museau de tanche n° 6, vu après la disparition des vésicules, plusieurs mois plus tard; mais la métorrhagie était revenue; un écoulement purulent abondant sortant de l'orifice, indiquant une ulcération à l'intérieur du col, qui amena par suite la perforation complète de ce canal et celle de la vessie, et peu de temps après, la mort du sujet.

## VILLETONS DIVERSES DU MUSÉE DE LYONCE

EXPOSITION DES MUSÉES DE LYONCE ET DE CHAMBERY

3. 31  
Où l'heure est venue de faire que l'art soit à la portée de tous, il nous paraît nécessaire d'ouvrir un musée au public dans les locaux de l'ancien hospice des Chartreux, qui sont à l'angle de la rue de la République et de la rue de l'Université. Ce musée sera ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Il sera composé de deux salles : une grande et une petite. La grande salle sera réservée aux expositions temporaires, et la petite sera réservée aux collections permanentes.

4. 32  
Le musée sera ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Il sera composé de deux salles : une grande et une petite. La grande salle sera réservée aux expositions temporaires, et la petite sera réservée aux collections permanentes.

5. 33  
Le musée sera ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Il sera composé de deux salles : une grande et une petite. La grande salle sera réservée aux expositions temporaires, et la petite sera réservée aux collections permanentes.





## DÉGÉNÉRESCENCES DIVERSES

DU MUSEAU DE TANCHE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

A. Congestion sanguine avec tuméfaction énorme de la lèvre antérieure du museau de tanche, qui est surmonté d'une crête fibreuse C, dont le rouge vif contraste avec la couleur brune de la partie affectée.

B. Lèvre postérieure du museau de tanche.

Le sujet porteur de cette pièce pathologique, était une femme qui se livrait à l'usage des boissons fortes et à la masturbation. Elle n'avait jamais eu d'enfants.

FIG. 2.

Aspect gangrénous du col de l'utérus après la destruction spontanée de la tumeur.

FIG. 3.

Museau de tanche très-développé, très-dur, bosselé à sa surface, d'un blanc rosé; orifice largement ouvert, à bords anguleux, fort durs. État considéré comme le résultat d'une affection vénérienne. Métrorrhagie abondante; abus du coït; habitude de la masturbation; cette femme n'a jamais eu d'enfants.

FIG. 4.

Induration, tuméfaction peu considérable du museau de tanche; couleur légèrement rosée, surface lisse. Femme depuis long-temps sujette à des pertes de sang, et à des flueurs blanches abondantes. Abus du coït. L'ulcération existait à l'intérieur du col: elle n'a paru à l'extérieur du museau de tanche, près de l'orifice, que quelques semaines avant la mort.

FIG. 5.

Ulcération de la lèvre antérieure du col; la lèvre postérieure très-longée. Matière purulente sortant avec abondance de la cavité de la matrice.

Cet état était accompagné d'un abcès formé dans l'un des ovaires et qui s'est ouvert dans la vessie, la malade ayant rendu, par cette voie, une quantité considérable de pus. L'affection du col est restée à peu près stationnaire depuis sept ans. (Malade du docteur Espiaud.)

FIG. 6.

Dégénérescence squirrheuse du museau de tanche, accom-

pagnée de pertes abondantes, de douleurs dans tout l'appareil génital, de calculs dans la vessie, et de loupes en diverses parties du corps. Il y en avait une sur le sommet de la tête, qui fut prise d'inflammation avec des douleurs si vives, que l'on fut obligé de pratiquer une incision cruciale sur le cuir chevelu.

Fig. 7.

**Ulcération cancéreuse du col de l'utérus.**

A. L'organe vu par sa face antérieure.

B. Ovaire droit entouré de la trompe du même côté.

C,C. Adhérences anomalies du péritoine.

D,D. Ovaire et trompe gauches à l'état sain.

E,E. Lambeaux granulés des bords de l'ulcère.

Fig. 8.

Coupe verticale sur la ligne médiane du même utérus; sa cavité se borne à un léger sillon. Sur ses parois blanches, épaisses, se font remarquer plusieurs couches de tissus lardacés, entremêlées de granulations d'un blanc bleuâtre.





## TUBERCULES ET ULCÉRATIONS

DE L'APPAREIL GÉNITAL INTERNE; OSSIFICATION DES VAISSEAUX UTÉRINS.

DESTRUCTION TOTALE DU COL DE L'UTÉRUS.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

L'utérus vu par sa paroi postérieure, dont le corps est plus arrondi et plus saillant que dans l'état normal, sans être beaucoup plus volumineux.

- A. Corps de l'utérus.
- B. Trompe gauche entourant l'ovaire du même côté.
- C. L'ovaire gauche.
- D. Ligament de cet ovaire.
- E,E. Adhérences anormales du ligament large.
- F. Portion de l'ovaire droit.
- G. Autre portion de l'ovaire droit dont la surface ulcérée laisse voir le tissu devenu tuberculeux.
- H. Rectum.
- I,I. Masse tuberculeuse ulcérée à la face utérine du rectum.

FIG. 2.

Le même utérus, vu par sa face antérieure.

- A. Le fond de l'utérus.
- B. Le rectum.
- C. La vessie abaissee pour laisser voir la face antérieure du corps de l'utérus.

D. La trompe gauche.

E. Portion de l'ovaire gauche.

F. Cordon sus-pubien gauche.

G. Cordon sus-pubien droit; à sa racine, ulcération et concréction osseuse.

H. Ovaire droit adhérent au bord latéral droit du fond de l'utérus.

I,I. Portion tuberculeuse et ulcérée de l'ovaire droit.

K,K. Trompe droite.

L. Tubercules de la paroi antérieure et latérale droite de l'utérus.


FIG. 3.


Le même utérus, coupé verticalement sur son épaisseur.

- A,A. La cavité de l'utérus est complètement oblitérée par une substance blanche, solide, de la consistance du suif.
- B. Paroi postérieure du vagin.
- C. Concration tuberculeuse sur la face interne du vagin.
- D,D. Bords déchiquetés de l'orifice, débris du museau de tanche.
- E,E,E. Vaisseaux utérins pour la plupart ossifiés.
- F,F. Coupe de l'ovaire droit.

1. In the year of Jesus Christ in the month of  
January the day of the 1<sup>st</sup> there was born  
a son to the said John and Mary his  
wife. The child was named John  
and he was circumcised on the eighth  
day after his birth. He was  
nursed by his mother Mary  
and he grew up to be a  
strong and healthy child.  
He was educated in the  
scriptures and in the  
language of his country.

2. When he was about twenty years old  
he went to Jerusalem to see the  
temple and the city. He  
met many people who were  
traveling to Jerusalem for  
the feast of Pentecost.





N°328.

## DÉGÉNÉRESCENCE CANCÉREUSE DE L'UTÉRUS

PL. IXX.

AVEC DESTRUCTION DU COL DE L'ORGANE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

- A. Coupe verticale de l'utérus, sur sa ligne médiane, en deux portions latérales.
- B. On remarque, sur la tranche de chaque portion, l'épaississement de chaque paroi et la couleur rouge de son tissu lardacé. Il ne restait de la cavité qu'un léger sillon occupé par un petit corps fibreux pédiculé C.
- D,D. La vessie ouverte par sa paroi pubienne, pour laisser voir l'ulcère cancéreux de cet organe correspondant à la paroi postérieure du col de l'utérus, entièrement détruit par un ulcère de même nature, et dont le bord, d'un gris noirâtre, était en tout semblable à celui de la figure 2. Le museau de tanche n'était point entamé.
- F,F. Bourrelet d'un tissu lardacé de trois lignes d'épaisseur, découpé en festons assez réguliers, présentant sur son bord libre une substance d'un gris sale.


FIG. 2. Utérus vu par sa face postérieure.

Destruction totale du col de l'utérus, d'une portion des trompes et des ovaires, qui se trouvaient accolés de chaque côté de l'organe. Les trompes étaient oblitérées et frappées de la dégénérescence cancéreuse, ainsi que le cordon des ovaires et les ovaires mêmes.

- A. Le corps de l'utérus, sans la moindre trace de cavité ni d'orifice.
- B. La portion ulcérée, présentant une surface inégale, d'un gris ardoisé.
- C,C. Concrétions mêlées de gris sale et de jaune à la surface muqueuse du vagin.
- D. Tumeur entièrement graisseuse, d'un jaune foncé.
- E,E. Ligaments des ovaires ulcérés.
- F,F. Trompes également ulcérées.







COUPE DU BASSIN VU DE PROFIL.

CANCER DE L'UTÉRUS, DU RECTUM ET DU VAGIN.

EXPLICATION DES LETTRES.

Cancer de l'Utérus, du Rectum, de la paroi postérieure du Vagin, avec destruction totale du Muscule de Tanche, sans hémorragie précédente.

La femme quia fourni cette pièce pathologique, était depuis long-temps sujette à une constipation opiniâtre. Elle n'en éprouvait d'autres résultats que des borborygmes, des coliques intestinales et de violentes douleurs pour aller à la garde-de-robe; fonction qui ne s'opérait que tous les 8, 12 et 15 jours.

C'est après de violents efforts pour aller à la garde-de-robe, pendant son séjour à la Maison de Santé, que la malade saperçut que les excréments sortaient par le vagin.


Il était difficile de s'assurer de l'état des parties; le bord postérieur de l'orifice du vagin, très-épais et très-dur, s'élevait presque au niveau du bord inférieur des pubis, nous pûmes à peine y introduire le doigt.

La mort ne tarda pas à mettre fin à cette dégoûtante infirmité.

A. L'utérus sans la moindre trace de cavité. Le tissu dont il était composé, ressemblait à du savon blanc pour la couleur et la consistance.

- B. Le rectum. Perforation par amincissement du rectum.
- C,C. Perforation du tissu de l'utérus depuis le fond de l'organe jusqu'à son orifice, occasionnée par les matières stercorales qui se sont frayé cette voie.
- M. Portion épaissie du rectum; son adhérence intime avec la paroi postérieure du vagin. Ce dernier canal également affecté de la même dégénérescence.
- D. Bord antérieur et tuméfié du vagin qui favorisait la rétention des matières stercorales dans cette gaine vulvo-utérine.
- E,E. Matière stercorale provenant de la rupture indiquée par le stylet F.
- G. Paroi antérieure du vagin.
- H. La vessie.
- I. Le pubis droit.
- J. La grande lèvre droite.
- K. Le sacrum.
- L. Le sphincter de l'anus.





946N




Fig. 1.

Fig. 2.

(LIT. )

## UTÉRUS AFFECTÉ DE RAMOLISSEMENT

AVEC PHLÉBITE DE CET ORGANE,

URÈTRE OCCUPÉ PAR UN CALCUL RAMEUX. VARICOCÈLE DES CORDONS SUS-PUBIENS.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Utérus affecté de ramollissement avec phlébite de cet organe, chez une femme âgée de vingt-trois ans, accouchée depuis trois semaines.

Cette pièce pathologique, qui nous a été communiquée par M. Collineau, médecin en chef de la prison de Saint-Lazare, est représentée ouverte antérieurement sur la ligne médiane.

- A,A. Coupe longitudinale.
- B,B. Cavité du corps de l'organe.
- C,C. Coupe du propre tissu de l'utérus, d'un rouge foncé, spongieux comme celui de la rate.
- D. Lambeau de placenta resté attaché à l'utérus.
- E,E. Vaisseaux veineux à parois blanches, épaisses et d'une dilatation si considérable, qu'ils furent pris d'abord, à la simple inspection, pour des abcès tuberculeux : ces canaux étaient remplis d'un pus épais, jaune et bien lié.
- F,F. Trompes.
- G,G. Ovaïres.
- H,H. Origine des cordons sus-pubiens.

FIG. 2. Uretère occupé par un calcul rameux.

Cette figure représente l'uretère occupé par un calcul qui,

Jeanne BOIVIN ET A. DUGÉS.

PL. XXXII.

par ses rapports de voisinage, a donné lieu à un rétrécissement de la veine cave inférieure, à une grande dilatation des veines du bassin, à une congestion des vaisseaux de l'utérus, et par suite, à l'ulcération de cet organe. Dessin original de M. J. Cloquet, avec l'explication suivante :

« Je trouvai, sur une femme de cinquante ans, l'urètre rempli par un calcul rameux; cet urètre est obstrué, changé au-dessous en un gros cordon squirrheux. La tumeur qu'il forme, comprime tellement la veine cave inférieure, que cette veine se termine en entonnoir, et permet tout au plus le passage d'une sonde de femme. Au-dessus elle est vide; au-dessous, elle est toute remplie par de la fibrine solide qui occupe toute la capacité des grosses veines du bassin et de la partie supérieure des cuisses. Au bas des membres qui sont infiltrés, les veines contiennent un sang fluide; les grosses veines du bassin et de la cuisse sont remplies par cette fibrine, et tapissées par une fausse membrane qui adhère à cette fibrine, comme dans les anévrismes. L'artère aorte est parfaitement libre; il y a abcès dans la région lombaire droite. Infiltration considérable dans le dos et dans le bassin. Tous les organes contenus dans la cavité pelvienne, la matrice, les trompes, les ganglions lymphatiques sont engorgés et squirrheux. Le pus de

L'abcès est d'une odeur un peu fade : je ne crois pas qu'il vienne d'une carie.

- A. Uretère droit.
- B. Point dilaté.
- C. Calcul rameux.
- D. Extrémité de l'uretère oblitérée et squirrheuse.
- E. Veine cave inférieure.
- F. Sa portion étranglée.
- G. Veines iliaques internes.
- H. Face interne des veines iliaques internes.
- J. Aorte inférieure.
- K. Artère iliaque interne, tirée de côté pour laisser voir la disposition de l'uretère et la compression qu'il a exercée sur le tronc de la veine cave.

#### L. Artère iliaque interne du côté gauche.

FIG. 3. Varicocèle des cordons sus-pubiens.

Cet état variqueux des deux ligaments ronds, dont un seul spécimen est ici représenté, s'est rencontré chez une femme de soixante ans; les veines noueuses, tortillées, remplissaient totalement le canal inguinal; l'aspect de la tumeur que formaient ces ligaments variqueux avait fait croire à l'existence de deux sacs de hernies inguinales. (Copié sur l'original de M. J. Cloquet).

- A. Canal inguinal.
- B. Varices des veines du cordon sus-pubien.
- C. Tissu fibreux du cordon.



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.



## MÉLANOSE DES TROMPES UTÉRINES

AVEC OBLITÉRATION DE LEURS ORIFICES. CONGESTION SANGUINE

DE L'UTÉRUS. VÉSICULES MILIAIRES SUR LE MUSEAU DE TANCHE.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1. Mélanose des Trompes utérines avec oblitération de leurs orifices.  
Congestion sanguine de l'Utérus. Vésicules miliaires du Museau de Tanche

La femme à qui appartenait cet utérus fut apportée mourante à la Maison de Santé, en septembre 1831, hémiplégique depuis quelques jours et dans un état de suffocation imminente.

A l'autopsie on trouva tous les viscères emphysématiques.

A, A. L'utérus, du double de son volume naturel, d'un rouge foncé, d'un tissu mou; la face interne, laissant sauter sous la pression, des centaines de gouttelettes de sang (cette femme était sujette, depuis quelque temps, à des métorrhagies assez abondantes).

B,B. Les vésicules miliaires sur le museau de tanche, se détachant sur un fond brun violâtre.

Ces vésicules contenaient une humeur muqueuse, filant à la pointe du scalpel.

C,C. Les trompes, du volume d'un petit œuf de poule, étaient obliterées à leur extrémité libre 1. Les franges étaient en partie renfermées dans leur pavillon 2. L'intérieur de ces deux canaux était injecté de matière d'un bleu foncé; ils étaient sillonnés sur leur longueur de crêtes grisâtres 3.

D. L'ovaire droit contenait également des vésicules noircâtres et un tissu muqueux de même couleur; il conte-

nait en outre un corps noir, ovoïde, d'un tissu compact et du volume d'une petite noisette.

E. L'ovaire gauche hypertrophié, du double de son volume ordinaire, sain du reste.

F. Sur la face externe du corps de l'utérus, une longue vésicule membraneuse était remplie d'une humeur sèvreuse et jaunâtre.

Cette disposition nous paraît être celle qui précède l'hydro-physie des trompes et celle de l'ovaire, disposition qui peut être également désignée sous le nom de *mélanose*.

*Les figures 2, 3 et 4, représentent les ovaires d'une femme morte d'une variole confluente, dans le septième mois de sa grossesse.*

FIG. 2. Ovaire droit avec tumeur d'un rouge-brun.

A. Tumeur d'un rouge-brun, vasculaire.

FIG. 3. Le même vu à l'intérieur.

A. Membrane vasculaire de la tumeur.

B. Kyste contenant une substance noire solide.


C,C. Autres petits kystes contenant la même substance.

FIG. 4. Ovaire gauche du même sujet.

A. Cicatrice récente.







## HYDROPSIE DE LA TROMPE

ET DE L'OVaire GAUCHE.

### EXPLICATION DES LETTRES.

Cette figure représente une hydropsie de la trompe et de l'ovaire gauche chez une jeune fille que l'on soupçonnait à tort d'être récemment accouchée.

- A. La trompe gauche est adhérente en C à la paroi postérieure de la vessie.
- B. On y remarquait de nombreux vaisseaux d'un rouge vif.
- D. Pavillon de la trompe et orifice externe de la trompe oblitérée. Les bords frangés ont entièrement disparu.
- E. Ovaire gauche développé sous la forme d'un kyste épais, volumineux, et adhérent avec le rectum, au moyen de fausses membranes. F,F.

G. Ovaire droit, plissé, dur, rugueux à sa surface; il est ouvert sur sa longueur pour laisser voir sa cavité qui contenait un peu de matière puriforme.

- H. Trompe droite à l'état normal.
- I. Corps de l'utérus.
- K. Museau de tanche.
- L. Le vagin ouvert sur sa longueur.
- M. Ligament large droit.
- N. Le rectum.
- O. Canal de l'urètre.

(L'observation de ce cas est consignée dans mon *Mémoire sur les causes de l'avortement*, observation XX, page 96.)

SCOTT & CO. PRINTERS 1822.

JOURNAL OF THE SISTEMATIC


SCIENTIFIC AND PRACTICAL

JOURNAL AND COMMENTARIES

FOR THE USE OF SCIENTISTS, MEDICAL MEN, AND OTHERS.  
CONTAINING  
ARTICLES ON AGRICULTURE, MEDICINE, PHYSICS,  
CHEMISTRY, MATHEMATICS, PHYSIOLOGY, ETC., ETC.  
BY JAMES H. GREENE, M.D.,  
PROFESSOR OF PHYSIOLOGY,  
IN THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA,  
AND AUTHOR OF "PHYSIOLOGY."  
JOURNAL AND COMMENTARIES

FOR THE USE OF SCIENTISTS, MEDICAL MEN, AND OTHERS.  
CONTAINING  
ARTICLES ON AGRICULTURE, MEDICINE, PHYSICS,  
CHEMISTRY, MATHEMATICS, PHYSIOLOGY, ETC., ETC.  
BY JAMES H. GREENE, M.D.,  
PROFESSOR OF PHYSIOLOGY,  
IN THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA,  
AND AUTHOR OF "PHYSIOLOGY."





## DEUX CAS D'HYDROPSIE ENKYSTÉE

PL. XXXV.

(Lit. )

## DE LA TROMPE.

Fig. 1. Hydropsie de la trompe droite. — L'utérus vu par sa paroi postérieure.

Cette pièce a été trouvée par M. J. Cloquet, sur une femme âgée de 50 ans.

- A. Trompe dilatée, formant des flexuosités, se rétrécissant de plus en plus pour se terminer, près de son insertion à l'utérus, par une cavité à parois épaisses, blanchâtres, à cellules ne communiquant pas avec l'utérus. La surface de la trompe était parsemée de beaucoup de vaisseaux.
- B. Kyste séreux de l'ovaire, adhérent à la portion développée de la trompe.
- C. L'ovaire.
- D. Ligament de l'ovaire. L'hydropsie de la trompe est formée par un fluide jaunâtre, transparent.

Fig. 2. Polype cancéreux. — Hydropsie des deux Trompes et des deux Ovaies. Utérus déprimé sur son fond, vu par sa face antérieure.

La femme de laquelle fut extraite cette pièce pathologique, était âgée de 60 ans.

- A. Polype cancéreux, supporté par un large pédicule blanc, d'un tissu ferme, comme fibreux, implanté au fond de la matrice, se continuant avec ce fond dont il détermine le renversement en forme d'entonnoir. B. Ce polype se joignant d'une manière insensible avec le tissu de la matrice. En bas il s'épanouit en franges molles, pultacées,

rouges, brunes, parsemées de vaisseaux nombreux, et tombant en fonte putride.

C,C. La grosseur de ce polype détermine un grand élargissement du vagin D, qui présente quelques franges comme squirrheuses.

E,E. Le col de l'utérus est très-dilaté (de la grandeur d'un écu), fibreux, résistant, laissant passer le fond de l'utérus à l'endroit où celui-ci se continue avec le pédicule du polype. La membrane muqueuse du vagin est gonflée, molle, pulpeuse, présente des ulcérations légères, superficielles, et de plus quelques végétations en crêtes de coq.

La trompe gauche présente une hydropsie. Elle forme un kyste flexueux, peu volumineux à l'endroit où il répond au tubercule précédent, et où il se termine en cul de sac, renflé, tortueux, à l'autre extrémité replié sur lui-même, F, il se courbe en bas et en arrière, et vient s'appliquer à la surface d'un kyste oblong, formé par l'ovaire G.

Cette trompe est remplie par un fluide muqueux jaune, semblable à une gelée, d'une odeur fade. Là, l'extrémité interne de la trompe se termine par une espèce de cul-de-sac H, et l'externe par un renflement considérable, dans lequel on reconnaît encore les franges du pavillon qui font saillie en dedans, I.

Cette dilatation communique par une ouverture assez large et arrondie à un autre petit kyste appliqué sur le contour du kyste de l'ovaire G.

**G.** Le kyste de l'ovaire gauche est oblong, à parois blanches, épaisses, sans communication. L'ovaire est appliqué et étendu dessus. Ce kyste est ridé, aplati sur lui-même. Au-dessous existe un autre kyste rempli d'une matière tuberculeuse.

**K.** La trompe droite offre une semblable dilatation, mais moins considérable. Elle se termine de même par un cul-de-sac L, à deux pouces et demi de l'utérus. Son autre extrémité retrécie, communique avec une petite cavité M, formée par le pavillon. Cette cavité offre une petite ouverture sinuose, véritable petit canal d'une couleur noirâtre, et qui va s'ouvrir dans le grand kyste de l'ovaire correspondant N. Le fluide passe facilement par ce petit canal de la cavité de la trompe L, dans celle du

kyste N. Ce kyste est presque vide. Le liquide qui y est contenu est peu abondant, séreux, fluide, et nullement glutineux. (Cette description appartient, ainsi que ces deux figures, à M. le professeur J. Cloquet.)

Fig. 3.


La même matrice, vue supérieurement, offre une cavité triangulaire, formée par trois grands plis, et dans laquelle on peut introduire le doigt. Elle passe à travers le col de l'utérus.

H. Un gros tubercule comme squirrheux, comparable, pour les propriétés physiques, aux tumeurs verrueuses de la peau, est près de s'engager dans cette cavité de l'utérus.

Cette tumeur squirrheuse H, répond à l'insertion de la trompe et l'obstrue entièrement.



N<sup>o</sup> 552.



## GROSSESSE TUBAIRE

OBSERVÉE A LA MATERNITÉ CHEZ UNE JEUNE FEMME, EN 1816.

### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

Le fœtus s'était développé dans la trompe gauche. Après la rupture spontanée de ce canal, qui avait été pour lui un organe d'incubation, la femme ne tarda pas à succomber à cet accident. On trouva le fœtus situé sur la fosse iliaque gauche, F.F.

La matrice molle, rouge et assez volumineuse, était tapissée d'une membrane pulpeuse rougeâtre.

- A. Grand lobe du foie.
- B. Vésicule biliaire.
- C. L'estomac.
- D. L'épiploon adhérent à la trompe gauche.
- E. Intestins.

F.F. Kyste formé par la trompe gauche.

G. Corps de l'utérus.

H. Fœtus.

I. Cordon ombilical.

Cette figure est copiée d'après le dessin original de M. J. Cloquet.


*Nota.* C'est par erreur du graveur que la lettre C,C,C. qui indique les intestins, est portée aussi sur l'épiploon dont la portion adhérente est marquée D. Marquez aussi d'un D,D, la grande portion relevée de l'épiploon mal à propos indiquée par e, e.





CHOCOLATE TURNER

ESTAMPA AL MATERIALE QUE UNA JUNCA TIENE, EN 1816.

EDICIÓN DE LAS LETRAS DE LOS CHOCOS.

ESTAMPA DE LOS CHOCOS.





DIVERSES AFFECTIONS

DE L'OVaire A L'ÉTAT NAISSANT.

EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1<sup>e</sup>. Représentant les diverses affections de l'ovaire à l'état naissant.

Ovaire pris sur une jeune fille vierge, âgée de dix-huit ans, morte d'une phthisie pulmonaire. Elle n'avait été réglée que quelques mois.

L'ovaire droit très-volumineux est surmonté à sa face supérieure d'un kyste transparent, du volume d'une grosse prune, et contenant un fluide jaunâtre légèrement muqueux. Coupé par tranche, l'intérieur de l'ovaire présentait de nombreuses vésicules incolores. Un autre kyste du volume d'un pois, également transparent, était suspendu par un long filet au bord de l'ovaire.

FIG. 2.

Ovaire d'une femme récemment mariée qui a succombé à une fièvre typhoïde.

FIG. 3.

Le même ovaire, coupé sur son épaisseur fait voir la tranche de la petite tumeur du premier. Ce corps organisé est le corps jaune ou *corpus luteum*.

FIG. 4.

*Ovarite.* Chaque vésicule était injectée de vaisseaux d'un rouge vif, d'une finesse extrême.

FIG. 5.

Ovaire du volume d'un gros œuf, pris chez une femme de dix-huit ans, récemment accouchée à terme. Elle avait repris son métier de blanchisseuse le huitième jour de ses couches, par un froid des plus rigoureux. Elle a succombé le quinzième jour à une métorrhagie, et à un épis taxis des plus violents. Les vésicules très-volumineuses sont d'un blanc nacré, et entourées d'un fluide muqueux semblable à celui qu'elles renferment.

FIG. 6.

Jeune fille, aussi blanchisseuse, morte d'une méningite, avait été mal réglée depuis que la menstruation s'était établie. L'utérus était atrophié; les deux ovaires très-volumineux, blancs, d'un tissu mou, contenant des vésicules transparentes. Dans le gauche, des corps hydatidiformes étaient du volume d'une noisette et contenaient un fluide transparent, tenace et filant entre les doigts.

FIG. 7.

Ovaire droit du même sujet; un peu moins gros que l'autre: les vésicules moins volumineuses et plus multipliées, contenant un fluide de même nature.

FIG. 8.

Cette pièce pathologique fut prise sur une fille âgée de dix-huit ans, qui avait succombé à une gastro-entérite aiguë. Cette fille sur le point de se marier avait éprouvé des contrariétés relativement à son mariage.

A. Utérus d'un rouge foncé.

B. Le corps de l'utérus plus développé était d'un tissu ferme.

D. Museau de tanche.

E. Les trompes étaient d'un rouge vif et très-développées.

F. Ailerons de l'ovaire.

G. Ovaire du double de leur volume ordinaire, bosselés à leur surface, ressemblant, pour la disposition de leurs granulations et de leur couleur, à deux grappes de cassis : la surface de chaque tanche était noire et représentait des cercles grisâtres, formés par les vésicules qui se trouvaient coupées en différens sens.





## UTÉRUS PROVENANT D'UNE FEMME

AGÉE DE VINGT-SIX ANS, QUE L'ON CROYAIT ENCEINTE DE QUATRE MOIS ET DEMI,

ET QUI A SUCCOMBÉ À UNE ENTÉRO-PÉRITONITE. ELLE N'AVAIT JAMAIS EU D'ENFANS.

### EXPLICATION DES LETTRES.

L'Uterus vu par sa paroi postérieure, avait près du double de son volume naturel. Son tissu, d'un rouge foncé, était mollassé ; son orifice à l'état normal.

A. Ovaire droit, sphérique, du volume du poing, rempli de matière solide, tenace, verdâtre, d'une odeur pénétrante. Le kyste, d'un brun-violet à l'extérieur, avait environ une ligne d'épaisseur ; sa face interne était tapissée

d'une membrane fine et consistante.  
B. L'ovaire gauche, de forme conique, du volume d'un gros œuf de cygne, d'un tissu mou, était rempli d'une matière purulente, épaisse, d'un blanc jaunâtre et bien liée. Cet organe était couvert de putrilage et adhérait à la flexure sigmoïde du colon.  
D. Matière contenue dans ce kyste.

LAISSEZ-FAIRE ET LIBERTÉ

LE 25 JANVIER 1848, LES LOIS CONSOLIDANTES DE LA DÉMOCRATIE EN FRANCE


LOI SUR LE MARCHÉ DES BIENS COMMUNES, ET SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. EXÉCUTION A PARTIR DU 1ER FÉVRIER 1848.

EXPLICATION DES LETTRES

Il résulte de la loi sur le marché des biens communs que les deux dernières lettres de l'alphabet sont réservées à l'usage des propriétaires de biens communs, et que les deux dernières lettres de l'alphabet sont réservées à l'usage des propriétaires de biens privés.

Il résulte de la loi sur le marché des biens communs que les deux dernières lettres de l'alphabet sont réservées à l'usage des propriétaires de biens privés.





## DÉGÉNÉRESCENCE DES DEUX OVAIRES

CHEZ UNE FEMME DE VINGT-DEUX ANS.

### EXPLICATION DES LETTRES.

L'Ovaire droit, du poids de sept livres, prit cet accroissement extraordinaire en neuf mois : ce qui donna lieu de croire à la grossesse foetale, les douleurs qui survinrent au neuvième mois simulant celles du travail de l'accouchement. L'extrémité inférieure de la tumeur s'étant engagée dans le bassin, plusieurs accoucheurs successivement appelés, prirent cette tumeur les uns pour la tête, les autres pour les fesses de l'enfant. Feu Désormeaux qui fut consulté, reconnut l'existence d'une tumeur extra-utérine, dont il était difficile, alors, de déterminer la nature. La malade fut apportée à la maison de santé, et nous pûmes, mais après beaucoup de peine, reconnaître l'utérus à l'état de vacuité. Après avoir séjourné vingt jours dans l'établissement, la malade mourut d'une péritonite consécutive (1).

*Autopsie.* Les intestins grèles étaient déjetés à gauche ; le bord supérieur de la tumeur, A, était en contact avec le grand lobe du foie, qui s'en trouvait recouvert dans une très-grande étendue. Cette masse n'était adhérente que par un tissu membranovasculaire extrêmement lâche à la trompe du même côté, B,B.

La trompe était très-rouge, d'un volume et d'une longueur proportionnés au développement anormal de l'ovaire.

C,C. Renflement mammiforme de la tumeur, occasioné par une collection de sérosité limpide.

D,D,D. Renflements plus petits, également remplis de sérosité.

E,E. Région inférieure de la tumeur, enveloppée du péritoine, à l'état d'inflammation.

F. Utérus atrophié.

G. Le vagin refoulé en arrière avec l'utérus, et recouvrant une portion de la tumeur.

H. Ovaire gauche, transformé en une masse composée de corps durs, très-rapprochés entre eux, présentant à sa surface des inégalités qui indiquaient l'individualité de chaque portion de la tumeur.

I,I,I. Le Bassin.


K. Symphyse des pubis.

(1) Voyez : Mémoire sur l'une des causes de l'avortement; Observation XXVI de fausses grossesses, page 23.

## LE PETIT ORGUE DES PETITS OISEAUX

un orgue pour les oiseaux qui joue avec elles. Il a été inventé par un certain M. G. L. et il est fabriqué à Paris. Cet orgue est très petit et il ne pèse que 15 kilogrammes. Il a une batterie de 1200 coups et il peut jouer toutes sortes de mélodies. Il a aussi des instruments pour faire des sons d'oiseaux. Il est très intéressant et il est très pratique.

Le petit orgue des petits oiseaux est un instrument très intéressant et très pratique. Il est fait pour les enfants et les adultes. Il peut jouer toutes sortes de mélodies et il a aussi des instruments pour faire des sons d'oiseaux. Il est très intéressant et il est très pratique. Il est fait pour les enfants et les adultes. Il peut jouer toutes sortes de mélodies et il a aussi des instruments pour faire des sons d'oiseaux. Il est très intéressant et il est très pratique.





## DIVERSES AFFECTIONS

### DE L'APPAREIL UTÉRO-VULVAIRE

#### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

Tumeur enkystée de la grande lèvre du côté droit, accompagnée d'une affection cancéreuse de la matrice, et d'une destruction totale du col de cet organe.

- A. Grande lèvre tuméfiée.
- B. Lèvre à l'état normal. Petite lèvre du côté gauche ; celle du côté opposé est effacée. Copiée sur le dessin original du professeur J. Cloquet.

FIG. 2.

Coupe du bassin vu de profil, représentant une partie de l'appareil génital, et des organes affectés par une fistule stercorale, qui, du rectum, communiquait derrière le vagin, jusqu'au bord inférieur de la lèvre droite de la vulve.

- A. Lèvre droite de la vulve.
- B. Le vagin.
- C. Col de l'utérus.
- D,D,D. Corps et fond de l'utérus.
- E. Lèvre antérieure du museau de tanche.
- F,F. Rectum; anneau tuberculeux très-épais, cause du premier rétrécissement du rectum.

G. Portion rétrécie du rectum.

- H. Fistules.
- I. Fond de la vessie.
- K. Face articulaire du pubis droit L.

FIG. 3.

Tumeur encéphaloïde du méat urinaire, traitée par les anti-phlogistiques, la compression au moyen d'une bougie urétrale et l'excision de la tumeur atrophiée en partie.

- A. Tumeur polylobée.
- B. Méat urinaire.
- C. L'Orifice du vagin.
- D,D. Les petites lèvres.
- E. Clitoris.
- F. Grandes lèvres.

FIG. 4.

Tumeur fongueuse du méat urinaire, enlevée avec des ciseaux courbes sur le plat.

- A. Tumeur rouge, molle.
- B. Orifice du méat urinaire.

Nous avons rencontré plusieurs cas de cette nature, guéris par l'excision et la cautérisation.

Fig. 5.

*Cancer pancréatique* de l'appareil vulvaire, chez une femme qui a succombé à une affection tuberculeuse des poumons, du foie et de l'utérus.

A,A. Lobules des petites lèvres. Lobules du clitoris.


C,C. Grandes lèvres. Toute cette masse, supportée par un pédicule commun, pouvait se relever au-devant des pubis; c'est


ce que faisait la malade pour satisfaire le besoin d'uriner.

Fig. 6.

Représente la vulve fermée par une longue cicatrice, chez une femme âgée de soixante-six ans. Les grandes lèvres avaient été pendant long-temps le siège d'une dartre accompagnée d'un prurit insupportable; cette femme, qui vécut avec son mari pendant trente-ans, n'eut jamais d'ensans.

A,A. Cicatrice qui indique la réunion des grandes lèvres. Le méat urinaire seul, est resté libre.





## CANCER HÉMATODE DU CLITORIS,

### ET LE SPÉCULUM BRISÉ DE M<sup>me</sup> BOIVIN, AVEC LES MODIFICATIONS

NOUVELLES ET SUCCESSIVES QU'ELLE A FAIT SUBIR À CET INSTRUMENT (1).

#### EXPLICATION DES LETTRES ET DES CHIFFRES.

FIG. 1.

Elle représente le clitoris affecté depuis long-temps d'un prurit qui donnait lieu à des frottemens continuels avec les linges, ou à des lotions avec l'eau froide, quelquefois avec l'oxycrat, sans en éprouver qu'un soulagement passager. Cet état fut suivi d'un écoulement de sang que la malade croyait venir de l'utérus; et c'est pour se rassurer qu'elle s'est présentée à notre examen.

(1) Depuis près d'un an qu'est publié le premier volume du texte de cet ouvrage, où l'on trouve une notice sur le spéculum, page 70, plusieurs personnes ont relevé l'honneur de quelques perfectionnemens qui nous appartiennent. Puisque ces personnes y ont attaché une assez grande importance pour occuper l'Académie royale de médecine d'une chose qui nous avait paru d'une trop mince valeur pour mériter l'attention de cette savante compagnie, nous croyons devoir rappeler ici, surtout pour ceux qui ne possèdent point le texte de cet ouvrage, les divers changemens que nous avons fait subir au spéculum, pour l'amener à l'état où il est représenté planche 41 de cet Atlas.

En 1819, le spéculum, tel que M. Récamier le fit exécuter alors, était un simple tube d'étain à surfaces lisses et polies. M. Dupuytren y ajouta un manche recourbé de même métal; presque dans le même temps, M. Dubois y fit pratiquer une large échancre sur le bord extérieur pour l'examen des fistules urinaires.

Telle était la forme de l'instrument, lorsque nous en fîmes l'application pour la première fois sous les yeux de M. le professeur Duméril, Maison royale de santé.

C'est encore dans le service de M. Duméril, que je fis échancre la portion utérine du tube, pour un cas de maladie du col utérin, qui réclamait l'application de cet instrument.

1819. 2<sup>e</sup> C'est à la même époque, et dans le même lieu, que je fis couper le tube en deux portions égales sur sa longueur; ces deux portions, en forme de gouttières, furent réunies par leurs bords, au moyen d'une pince à anneaux, dont les branches arquées étaient fixées par une soudure à l'extrémité extérieure de chaque fragment du tube. Ainsi, le spéculum réduit de volume, était devenu d'une introduction plus facile; une fois introduit, on pouvait l'amener à un degré d'écartement aussi considérable que l'exploration des parties et l'application du traitement médical pouvaient l'exiger;

Il me fut facile de voir que cette femme se méprenait sur l'organe affecté: la tumeur formée par le clitoris faisait saillie au milieu de la vulve, et tombait sur le méat urinaire; aussi chaque émission d'urine était-elle excessivement douloureuse.

Cette surface granulée, d'un rouge-brun, saignant au moindre contact, ne présentait, selon nous, d'autres indications que l'excision. Les moyens péculiaires de cette femme ne lui permettant pas de séjourner à la Maison de santé, où je l'engageai d'entrer;

et on l'y fixait au moyen d'une vis de pression placée au point de jonction des branches à anneaux de l'instrument.

1821. Mais la négligence apportée dans la confection du spéculum me fit sentir la nécessité d'y ajouter un embout en étain, qui, recouvrant les bords utérins de l'instrument, s'opposait au rebroussement de la muqueuse du vagin, qui cause souvent de vives douleurs.

1823. Les branches à anneaux rendaient l'instrument peu commode pour mettre à la poche; je les fis remplacer par une boîte en cuivre, soudée au bord extérieur de la gouttière gauche: cette boîte est destinée à recevoir une crémaillère coulée, et soudée au bord extérieur de la gouttière droite. La crémaillère marchait dans la boîte au moyen d'un pignon à engrenage, à pivot, adapté aux crans de la crémaillère; le pivot placé à l'extérieur, au centre du levier horizontal, au moyen d'une clef, faisait marcher le curseur à crémaillère de gauche à droite. Un cliquet placé près de la roue du pivot moteur, servait à fixer les deux gouttières au degré d'écartement où on les a menées.

En 1829, je fis fabriquer cet instrument en argent; j'y fis faire sur le côté une longue échancrure, fermée par une plaque qui glisse dans une rainure intérieure, et que l'on peut enlever après l'introduction, soit pour examiner le vagin, soit pour appliquer des sanguines sur quelques points de cette gaine, soit enfin pour y appliquer quelques médicaments jugés nécessaires.

En 1832, je fis ajouter une légère courbure à la branche horizontale, et les gouttières s'écartent davantage encore à leur extrémité interne. Ce dernier instrument qui est fabriqué avec du nickel, me paraît présenter tous les avantages désirables pour l'exploration des parties génitales internes. Il est confectionné par Samson, coutellier mécanicien, rue de l'École de médecine.

elle se rendit à l'Hôpital Saint-Louis, service de M. Jobert, en février ou mars 1832. On fit l'amputation du clitoris, et la femme s'est parfaitement rétablie : elle est partie depuis pour la Belgique.

- A. Corps du clitoris.
- B. Granulations.
- C. Méat urinaire.
- D. Le vagin.
- F, F. Grandes lèvres de la vulve.

FIG. 2.

*Levier fenêtre*, pour ramener le col de l'utérus au centre du vagin, dans les cas de déplacements où l'orifice de l'organe n'est pas en rapport avec l'ouverture du spéculum.




FIG. 3.

- C. Pivot.
- D. Cliquet pour fixer l'instrument.
- F. Embout.
- G. Anneau de la tige qui porte l'embout.

FIG. 4.

#### Le Spéculum ouvert.

- B. Curseur.
- C.C. Clef adaptée au pivot.
- D. cliquet.

E, E. Plaque à coulisse. L'embout et sa tige que l'on retire de dedans en dehors, après avoir donné deux ou trois tours de clef.

*Nota.* Nous considérons l'instrument comme ayant deux extrémités : nous appelons extrémité *utérine*, celle qui touche à l'utérus, celle qui porte l'embout ; nous désignons l'autre sous le nom d'extrémité libre du spéculum, parce qu'en effet elle reste libre au dehors des parties pendant l'application de cet instrument.







