

Theatrum universale omnium animalium piscium, avium, quadrupedum, exanguium, aquaticorum, insectorum, et angium [sic] ..., CCLX. tabulis ornatum / ex scriptoribus tam antiquis quam recentioribus ... & aliis maxima curâ à J. Jonstonio collectum, ac plus quam trecentis piscibus [& animalibus] nuperrime ex Indiis Orientalibus allatis, ac nunquam antea his terris visis, locupletatum; cum enumeratione morborum, quibus medicamina ex his animalibus petuntur, ac notitiâ animalium, ex quibus vicissim remedia præstantissima possunt capi; cura Henrici Ruysch ... VI. partibus, duobus tomis, comprehensum.

Contributors

Jonstonus, Joannes, 1603-1675.

Ruysch, Hendrik, 1671-?

Castelli, Pietro, -approximately 1657. Hyaena odifera.

Publication/Creation

Amstelædami : Prostat apud R. & G. Wetstenios, 1718.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/afvy8cyb>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
Elibrary@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



30636/D
t.p. in vol II

18/


JONSTON, J.

William Balfour Baikie, M.D.

Huslar

28 July 1855

p. 18
1855/99
118



CELEBERRIMO VIRO D. HERMANNO BOERHAVEN

Medicinæ & Botanices in Academia

Lugdunenſi Profeſſori .

S. P. D.

HENRICUS RUYSCH.

Sapientia ſummi Creatoris ex omnibus quidem rebus elucet, præſertim tamen e creaturis, quas ſapientiſſimus opifex in hoc terrarum orbe poſuit. Scilicet earum non tantum genera ſunt adeo multiplicia, ut ingenium humanum vix eorum numerum capere poſſit, ſed ſingulorum ſpecies ſunt tam variæ & tam multæ, ut plane ſit impoſſibile ſingulas comprehendere memoria. Adde, quòd diverſæ regiones diverſa etiam omnino animalia producant, quæ aut in aliis prorſus ignota ſunt aut ſaltem rariffime videntur. Hinc excitata cupiditas ac diligentia eorum, quibus gratum eſt Divinæ Sapientiæ opes ſpeculari, ad indagandum quidquid ubique eſt animalium. Dices id etiam non infeliciter tentatum jam à veteribus fuiſſe; fateor ſua illis laus debetur, ſed poſteriorum diligentia adeo non cedit eorum ſedulitati, ut eam etiam longiſſimè ſuperet. Si ſpectes, tam in regno vegetabili quam animali, quid debeat veteribus, quid poſteriorum laboribus, non dubito, Vir Cl. quin faſſurus ſis nihil æque hoc noſtro tempore excultum fuiſſe ac ſtudium rerum Naturalium. Illud tamen dolendum eſt, gloriam iſtam exteris præcipuè deberi, licet nos nulli in toto terrarum orbe cedamus genti, ſi ſtudium adeundi longinquas & diſſitas regiones reſpicias, unde cumprimis ſingularia in hanc terram poſſint adduci. Verum plerique omnes in exteris regionibus degentes totos ſeſe tradunt mercaturæ, nec alia cupiditate ducuntur. Non dico illud mercaturæ ſtudium aut illaudabile aut improbum, ſed dùm illud excolitur, alia, unde magna etiam utilitas redundat, non debebant negligi. Quod ſi jam unus aut alter, quales fere ſunt Eccleſiarum in India miniſtri, aliquod tempus tribuant iſtarum rerum indagatiſſioni, id fere non fit, ut viris cordatioribus iſto modo ſatis fiat. Nempe teſtimonio erit hæc, quam Tibi conſecro, Collectio. Videbis ibi piſces orientales plures quam trecentos, qui delineati ſunt in Inſula Amboina ab homine nec improbo quidem nec aliarum rerum imperito, ſed forſan non ſatis docto in arte pingendi. Is enim cum ibidem conciones ad populum haberet, & ceteras res, quæ pertinent ad religionem, per aliquot annos curaret, otium ſibi reliquum poſuit in piſcibus iſtius tractûs delineandis. Quod ſi ille aliquanto peritior pingendi fuiſſet, quæ hominis erat cupiditas bene merendi de literis, forſan per eum haberemus abſolutum ſyſtema piſcium Orientalium, ſed bene cupienti deſuit facultas ad finem perducendi ea, quæ bene deſtinaverat.

Icones ita depictæ cum incidiffent in manus Wetſteniorum, ii rati ſunt non eſſe committendum, ut prorſus perirent, quoniam multa in iis eſſent bona, multa forſan poſteriorum indagine detegerentur, quæ nunc veritati minus

videntur consentanea, quia nobis experientia earum rerum deest. Ego vero bonas aliquot horas in iis describendis posui, & ex proprio Museo, ac scriniis Lamotii quondam verbi divini Ministri vigilantissimi in Ecclesia Mauritianae quaedam addidi, quae ut animo facili accipias rogo, quaesoque. Parva sunt, non diffiteor, quae nomini tuo tanto inscribere audeo, sed magis facio id, ut publicè profitear me plura tibi debere, quam ut ita velim significare me quod debebam persolvissè. Scilicet postea, ut spero, si Deus otium concedet, dabitur opus aliquod, omnibus partibus absolutum. Hoc tantum pro tempore sic editur, donec per otium in singula quae jam in manus meas inciderunt, ac postea reperientur, inquisivero. Non dubito tamen, quin hæc mea amicitiae testificatio sit Tibi futura gratissima. Et cui, quaeso, alii hæc forent gratiora, quam Tibi per quem Rei Medicæ & Botanices studio sua constar laus & suus honos? Id restantur tum Opera tua præclara, tum vox unanimis exterorum undique ad Te audiendum concurrentium, qui domum reversi libenter agnoscunt se Tibi debere quidquid in Medicina præclarum sciunt ac eximium. Accipies igitur, Vir celeberrime, hoc quantulumcunque, quod in hoc Theatro meum est. Vale, Vir exime, & perge bene mereri de Medicina, id est de toto genere humano. Amstelod. Nonis Maii. MDCCXIX.

PRÆFATIO

A. D.

LECTOREM.

Nihil æque præstantiam hominum supra bruta animantia commonstrat quam discendi cupiditas ac amor scientiarum. Hic & illa faciunt eum ceterorum omnium, quæ Divina potentia produxit, regem. Licet enim non diffitendum sit, nos multò esse celeritate & viribus inferiores quam quædam animantia, quæ a natura ficta sunt ad terram prona; illud tamen constat homines tantum sapientia reliquis animalibus præstare, ut mera stultitia sit comparisonem inter hæc & illos velle instituire. Sint cervi veloces, valeant leones, ursi, aliæque feræ, viribus, humanum ingenium veloces cervos capere, leones & ursos feroces domare novit. Nec sane quidquam laudis accedit ad feras e notissima fabula de leone cum homine iter faciente. Is enim cum homo ei ostendisset virum pictum aut fictum, qui leonem occidisset, respondisse fertur, quòd, si leones novissent pingere, ubique talia monumenta reperirentur. Neque etiam quidquam officit laudi humano ingenio debitæ, quod Boilavius, egregius inter Gallos poëta, falsè eos ridet, qui regem vocant hominem ceterorum animantium, quum tamen in desertis ursi non timeant hominem, regem scilicet suum, sed homines ursos. Recte quidem illud: quis enim negabit à ferocitate earum ferarum timendum esse? Verum nullo modo efficere poterunt feræ, quin succumbant hominibus in eorum capturam armatis. Si hominibus libet aliquam regionem habitata ante à feris incolere, protinus illis est cedendum, atque aliæ sedes quærendæ, ni omnes ad unam velint occidi. His possis plura alia addere, quibus omnis vis atque robur omne detrahitur argumentis & Fabulatoris veteris & Boilavii. Ingenium ergo solum est laude dignum. Reliqua illi serviunt. Attende mihi animum ad singulas disciplinas & artes, quæ quasi totidem indicia sunt præstantiæ humanæ, nihil illis opponere possit par aut simile universum genus animantium. Didicimus quædam ab Hippopotamo, ab Ibide, atque aliis animantibus. Num ideo eorum solertia in censum venire debet? Quod illi faciunt instinctu naturæ, nos ratione facimus. Eos quidem nos imitati sumus, sed ratio nostra atque mens facit, ut nobis liceat ab illis exemplum capere. Si quidquam in illis esset vicissim rationis, illi etiam à nobis quamplurima didicissent. Quod quum hætenus à nemine sit observatum, constare mihi videtur etiam in hac re nullam animantibus ceteris deberi laudem solertiæ, quæ solis hominibus propria ac perpetua est.

Illud tamen e contrario est observandum, hominem quamplurima debere benignitati Divinæ, quæ eum imposuit regem quasi universo Terrarum orbi. Contemplare quid ubique est; illud aut tuum est aut hominum tibi similitum. Omnia, quæ e terra nascuntur, aut ex ea cibum capiunt, prorsus subsunt hominum potestati, qui nondum omnes suas divitias novit, quatenus multas res ignorat, quæ ipsi aliquam adferrent utilitatem, si illis rectè uti novisset. Quam parum notæ sunt omnes arborum, fruticum, & plantarum species! Quam non cognita sunt universa animalia, quæ in singulis regionibus reperiuntur! Quis omne piscium genus novit? quis in censum retulit? Nemo sane; nec est illud unius hominis aut ætatis. Veteres quidem jam ante Aristotelem & ipse Aristoteles, vir egregius, multum temporis posuerunt in describendis animalibus & eorum proprietatibus, quæ in re etiam singularis est Æliani laus, verum tantum abest, ut illi satisfecerint huic argumento, ut etiam post illorum tempora plures exstiterint præclari viri, qui non vulgarem sibi laudem quæsiverunt & corrigendo, quæ perperam erant ab iis posita, aut addendo, quæ illi omiserant. Quid, ut alios mittam, Rondeletius, Gesnerus, Aldrovandus, Bellonius, Raius, Jonstonus, Willoughbeius, Pettiverus, atque alii quamplurimi, non in hac parte præstiterunt? Ii detexerunt errores veterum multos, sed præcipua eorum diligentia elucet tamen in exhibendis magna multitudine cujusvis generis animantibus, quæ fuerunt veteribus ignota. Scilicet illi non solum iconibus fecerunt, ut omnia quasi subicerentur curiosorum oculis, sed ipsis iconibus veluti vitam dedere accuratissimis descriptionibus, quæ Lectorem docent quid cuique animanti sit proprium ac singulare, quid cum aliis commune. Ergo res eo deducta est ab illis scriptoribus, ut co-

PRÆFATIO AD LECTOREM.

rum scripta sint habenda universæ Naturæ compendii instar, in quò exiguo sumptu homines studiosi possunt contemplari singula animalia, & eorum naturam discere ac species.

Verùm licet in istis operibus permulta ac præclara exhibeantur solertiæ humanæ testimonia, non cogitandum est tamen jam istud argumentum esse exhaustum, ac nihil ulteriori aliorum diligentia aut inquisitioni relictum. Tanta est potestas Divina ac ejus opera tam latè patent, ut non credam ea unquam omnia expositum iri oculis aut menti humanæ. Scilicet, quo plura reperiis antè non cognita, eò plura comperies incognita superesse, quæ novum laborem merentur ac indagacionem. Ea res visa fuit mihi semper præclarum ac summum infinitæ Sapientiæ ac Potentiæ Divinæ testimonium. Nam cum nos homines sciamus nos esse multo præstantiores quam reliqua animantia, nostrâ sorte tamen contenti vix sumus, sed discendi nostra cupiditas, quæ multa nobis commoda affert, id habet incommodum, quod perversa quadam curiositate vult inquirere in naturam ac potentiam Divinam, ut possit inter se & illam comparacionem instituere. Illud tamen ne fieret diligenter cavit summus ille rerum Opifex, sed e contrario fecit, ut prudens ingenium semper reperiret materiam celebrandi ejus immensam Potentiam ac Sapientiam. Scilicet, si homo posset comprehendere quidquid Deus creavit ac fecit, sciret saltem ab ea parte quantus esset Deus, atque ita quodammodo suo ingenio complecteretur Divinitatem, quanta quanta esset. Inde in quibusdam nasceretur contemptus Divinitatis summæ, quæ non esset major, quam ut cadere possit sub sensum. Nunc autem quasi in mare aliquod profundum immergimur, si Divina opera contemplamur, neque usquam exitum reperimus, sed omnis nostra diligentia in admirationem vertitur, & quo longius procedimus, eò major & magnificentior Potentiæ Divinæ in nobis nascitur imago, licet multum illi desit ad perfectionem.


Omnis ergo inquisitio in naturam rerum creaturarum, genera & species animalium, & in res hujuscemodi alias, in gloriam Divinæ Potentiæ vertitur. Neque cogitandum est unquam nobis materiam admirationis aut diligentia defuturam. Laudanda est eorum cura, qui ad discendum undique congerunt opes Naturæ semper parturientis aliquid admirabile, atque dicendum est eos tantum mereri de sua ætate non solum, sed etiam de posteris, quantum quisquam aliquo modo mereri possit. Per eos enim licet nobis oculos & animum pascere jucundissimo spectaculo & utilissimo. Contemplare mihi hoc Theatrum, vere Theatrum dices. Aërea, terrestria, atque aquatica animantia in illud sunt collata ac suis locis, generibus, & speciebus, quantum potuit fieri, digesta. Jonstoni in eo est laus præcipua, ut qui primus est ausus opus tale systematicum suscipere, verum nec meæ diligentia, ut spero, defutura est adprobatio eruditorum hominum. Nempe quum tam e quadrupedibus quam aliis animalibus, ac eorum partibus, medicina possit parari, meum esse duxi Lectori exhibere notitiam, tam morborum quibus remedia ex animalibus petuntur, quam animalium, quæ talia remedia præbent. Talem igitur indicem singulis præposui hujus Theatri partibus, e quo studiosus Lector statim atque uno intuitu potest discere remedia, quæ passim in singulis Theatri partibus indicantur.

Peculiare tamen est ac palmarium Additamentum Collectio Piscium Amboinensium & vicinarum Insularum Orientis, quarum icones ante menses non ita multos ex istis locis allatæ in manus Wetsteniorum, ut in Dedicatione dictum est, devenerant. Ego autem eas feci publici juris, adieci brevem descriptionem, atque icones præterea aliquot piscium aut alibi à parente meo editorum, aut nunc demum e Museo meo prolatorum, addidi. Longe plura potuissem addere, quum a longo satis tempore non indiligenter versatus fuero in Naturæ istiusmodi divitiis conquirendis, nec fuerim infelix in reperiendis, verum rationem non unam habeo, quæ me perpulit ad differendum istum laborem in aliud tempus. Si patuerit hunc non ingratum fuisse laborem eruditis lectoribus, deinde Mantissam aliquam huic adjiciam, & tum, spero, si hoc contigerit, videbit Lector, quam sim religiosus in depingendo animalia aut pisces, aut in iisdem describendo. Utere igitur hoc labore ac conatibus meis fave.

Collect.



COLLECTIO NOVA
PISCUM AMBOINENSIVM



COLLECTIO NOVA PISCIUM AMBOINENSIIUM

partim


IBI AD VIVUM DELINEATORUM,

partim

EX MUSEO HENRICI RUYSCH M.D.

XX. *Tabulis comprehensa.*

TABULA PRIMA.

1.  **D**E TAFELVISCH, ita dictus ob singularem, quam Amboinensibus præstat utilitatem, quum fere in lautioribus epulis adhibeatur, tanquam eximium aliquod ferculum. Sapore dicitur non ab-similis esse passeribus nostris, magnitudine etiam major. Maculis variis est insignis, corpore striato, quod in superiori parte satis magnam habet pinnam, aculeos habet novem, sex in summo corpore, tres ante dictam pinnam, & totidem post eandem, quibus tres aliæ sub ventre respondent.

2. DE MOORSCH AFGODT, five *Idolum Maurum*. Huic pisci nomen istud dedere nostrates, quia Mauri quadam religione prohibentur eo pisce vesci, quin potius, ubi in eorum retia incidit, eum dimittunt liberum. Eorum tamen superstitio non prohibet Christianos, quo minus comedant hunc piscem, sed as-sum, nam coctus non valet, neque saporem habet satis gratum. Superiore quidem est multo minor corpore, nec aculeos habet, sed dentes, & tamen ejusdem videtur speciei, quum & figura satis conveniat, & pinnam similem habeat in summo corpore, at rostro porcino præditus est.

3. DE VAANDRAGER, five *Signifer*, ita dictus, quod se quasi ducem præbeat aliis minutis piscibus, qui eum magno numero quasi ducem sequuntur. Figura cum duobus superioribus fere est eadem, licet corpusculum sit multo minus, ac squammis obsitum. Ex figura tamen patet eum esse ejusdem cum istis speciei. Esui est ineptus, nec ob aliam rem capitur, quam quod elegantissimis coloribus sit pictus, & ideo etiam in liquore à talium rerum æstimatoribus servatur. Tam mansuetus est, ut

adnatet cibum porrigentibus hominibus, atque ideo facilis captu. Ceterum non omnes ejusdem nominis pisces undiquaque cum hac icone conveniunt, sed exigua differentia est, quæ fecit, ut ex tribus aut quatuor speciebus unam tantum curaverim exhibendam.

4. HET WAFELYZER, five *Atropta*. Ita dicitur à nostratibus in India degentibus, quia oris extremitas fere definit in figuram instrumenti istius, quo crustularii utuntur ad excoquendas crustulas. Saltem similitudo rostri, aliquo modo ad figuram istius instrumenti accedens, suffecit ad nomen huic pisci reperiendum. Toto corpore est fuscus, excepto quod maculis quibusdam cœruleis inficiatur, quod plerumque indicium est pisces iis insignitos venenatos esse. Ideo neque Mauri neque Christiani audent hoc pisce vesci.

5. ICAN SWANGI, five *Speervisch*. Nomen est generale, quo indicantur omnes pisces, qui aculeos habent five pinnas productiores. Eo nomine saltem vir iste, qui mihi delineationes istas tradidit, adseverabat omnes istiusmodi pisces vocari, qui habent tales aculeos; nam piscem, qui alioqui proprie *Ican Swangi* vocatur, exhibuit parens meus in Thef. Animal. I. Tab. II. ubi depictus ad objectum & descriptus extat, ac inde in hæc Tabulas translatus. Vid. Tab. V. N^o. 19. Hic vero piscis, quem nobis hoc loco delineatio repræsentat, videtur esse Scorpana Rondeletii, Gesneri, & aliorum. Exhibetur certe à Rondel. p. 201. & à Gesn. p. 846.

6. ICAN SWANGI. Eodem, ut vides, nomine vocatur, quo superior, sed tamen multum differt, si figuram respicias. Verum satis est, quod aculeos habet in dorso venenatos. Pinnæ laterales sunt factis latæ & magnæ. Os magnum est, cir-

ris duobus propendentibus ex inferiori mandibula. Esui est prorsus ineptus, quod & venenatus est & præterea exiguus admodum.

7. ICAN SWANGI. Exigua differentia est inter hunc & superiorem piscem, quum pro duobus cirris in inferiori mandibula tantum duos alios habeat ventrem versus, & pinnæ tenui pelliculo sint junctæ; secus ac in superiori vidimus.

8. ICAN SWANGI. Corpore est hic piscis striato & maculoso, in ipso capite quinque aculeos habet in caudam reflexos. Pinnæ in dorso sunt aculeis venenatis præditæ. Ab inferiori mandibula duo cirri dependent. In latere, sive sub branchiis, adeo latas habet pinna, ut fere videatur accedere ad volatiliū piscium genus.

9. ICAN SWANGI. Idem fere dicendum est de hoc pisce, quum & ille sit striato & maculoso corpore, ac habeat aculeos in capite & dorso, verum isti fere ad caput vergunt, quod longe aliter se habet in præcedenti pisce.

10. ICAN SWANGI. Colorem si excipias, nulla differentia est inter hunc piscem & proxime antecedentem. Est autem utriusque color partim subcœruleus, partim flavescens, verum eodem corporis loco qui color in uno flavet, in altero cœruleus est. Hinc omnis differentia.

11. ICAN SWANGI. Cauda huic pisci est tricuspis, color nescio quid viriditatis præfert. Dentes habet satis acutos, squammas & caudam rubescentes. Supra oculum unam pinnam, alteram infra oculum ostendit, atque ita differt ab aliis cognominibus, quos hætenus exhibuimus.

12. ICAN SWANGI. Et hic piscis quam proxime accedit ad istum, quem numero octavo descripsi, præterquam quod cauda & pinnis magis sit similis proxime præcedenti pisci, quod intuentibus facile patebit.

13. ICAN SWANGI. Si compares hunc piscem cum altero isto cognomine, qui numero decimo exhibetur, non magnam reperies differentiam, adeo similes sunt inter se. Licet hic satis magnus sit, non audent tamen Amboinenses eo pisce vesci, quod ductus quidam cœruleus, quasi vena, reperiatur intra illum piscem; quæ res cum veneni, ut jam dixi, indicium præbeat, haud libenter quisquam periculum faciet de sapore hujus piscis, metu veneni.

14. ICAN SWANGI. Tres satis magnos aculeos in dorso ostendit, quartum etiam in ventre non procul à pinnis, quæ

caudæ sunt proximæ. Ceterum est colore simpliciter nigricante, sine ullis maculis, nisi quod in capite & cauda quædam reperiantur, nec vividi coloris nec valde magnæ, & ideo vix memoratu dignæ.

15. ICAN SWANGI. Similem huic piscem exhibet Tabula tertia loco primo, sed majorem. Vide tamen, quæ ibi dixi.

16. ICAN SWANGI. Dentatus est hic pisciculus, & cauda singulari modo trifida. E capite duo aculei, pro magnitudine pisciculi ingentes, prominent, & à ventre duo alii non dissimiles dependent. Præterea longiuscule productas pinnae habet, tam in infimo ventre, quam in lateribus. Cum aliis ejusdem nominis hoc habet commune, quod corpusculum sit lineis variegatum.

17. ICAN SWANGI. Quod attinet ad aculeos prominentes, hic piscis non est dissimilis à superiori, sed magna conspicitur differentia in ipso corpore, quum hic, ut superior, lineis sive striis non sit variegatus, sed maculis rubris insignitus. Venenatus etiam non est, sed in cibum adsumitur ab Amboinensibus. Octo fere pollicum est magnitudo.

18. ICAN SWANGI, cui etiam apud nostrates nomen est de *Paarsebe Speer-visch*. Scilicet quum colore sit nonnihil in violaceum vergente, statim inde sumpta est occasio nominis. Videtur autem capriscei species, qualem exhibet Rondeletius Lib. V. c. 27. Galli & Siculi, ex Gesneri observatione, porcum appellant, quo nomine etiam alibi apud Strabonem occurrit, forsitan ideo quod sit ore porcino. Idque fit mihi tanto verisimilius, quia pictor autoptes referebat caput hujus piscis tantum esse, ut fere reliquam corporis partem æquaret. Carne est non insipida sed grata & pingui, quapropter libenter eâ vescuntur incolæ.

19. ICAN SWANGI. Ventre est hic piscis prominenti, è quo duo cirri maculosi dependent, dentes habet acutos, aculeum ad caudam projectum in dorso, ac alium in imo ventre, qui uterque junguntur pinnis ad caudam vergentibus. Alioqui videtur quodammodo accedere ad formam piscium cognominum, qui exhibentur loco primo & secundo hujus Tabulæ. Nam quod hic maculas duas, Lunularum sibi invicem obversarum similitudine, in corpore habet, id forsitan huic pisci fuit peculiare.

TABULA SECUNDA.

1. **DE GROTE SPEERVISCH.** Ita dictus est ab aculeo è dorso prominente. Non dubium est, quin hic piscis sit etiam caprisci species. Id satis ostendit aculeus, quem in summo dorso ostendit. Jonstons Tab. XXXVIII. N^o. 3. exhibet etiam piscem huic non dissimilem ex Marçg. Hist. Brasil. quem *Acaramuca* vocat, ac ita describit, ut ejus descriptio satis cum icone istius piscis, quem hic exhibeo, conveniat. Capitur prope Amboinam, non ubique, sed tantum circa istum locum, cui à tribus fratribus nomen est. Pellis huic pisci est crassa ac dura. Hanc illi detrahunt incolæ, ac postea elixum mensis inferunt. Sapore est proximè ad carnem vitulinam accedente.

2. **DE SPEERVISCH.** Non multum hic differt à superiori, nisi quod minori corpore sit, aliis maculis insignitus & dentatus; nam si aculeum respicias aut pinnas, satis inter se conveniunt, atque ideo habendi pro duobus ejusdem generis tantum sed etiam speciei piscibus.

3. **DE SPEERVISCH.** Nomen huic simile est, quod duobus superioribus, ac eadem nominis ratio. Figura tamen aliquantisper ab istis recedit. Aculeus, quem in dorso habet, spiculis brevioribus est armatus. Præterea tam in dorso quam sub ventre minores aliquot aculeos habet, qui tenui membrana in superiori parte sunt juncti. *Lupi marini* nomine ab aliis vocatur, licet multum differat ab eo pisce, qui eodem nomine apud Ichthyographos occurrit. In cibum adsumitur hujus piscis caro, sed quum ingrati sit saporis & admodum sicca, fere solet sale conditus in usus domesticos adfervari, ac tum satis bona est.

4. **DE SPEERVISCH.** Adhuc voluit noster pictor hunc piscem iis annumerari, quibus aculeus in dorso nomen dedit, sed, ut verum fatear, non incommode in Tabulam primam retulisset, ubi alii exhibentur, qui non multum ab hoc differunt. *Guapervæ* speciem possis dicere, quo nomine similem piscem exhibent Jonstons & Willoughbæus. Vide infra Tab. XIX. N^o. 1.

5. **DE SPEERVISCH.** Nihil fere huic pisci singulare est, quod non etiam observatur in superiori, si excipias, quod superior præter longissimum aculeum sex alios habeat ab utraque corporis parte; hic vero, præter istum in dorso aculeum, non habet nisi unicum in imo ventre reflexum ad caudam.

6. **DE GROTE BEDRIEGER,** quasi dicas *Magnus Impostor*, quod nomen illi adhæsit è singulari oris forma ac consuetudine. Scilicet quum asellum nostrum minorem magnitudine æquet, & accedat fere ad carpionis figuram, ex ore tamen, cum opus est, emittit quasi quoddam prostoma, quod latissime patet, ac illi inservit ad pisces minutos capiendos, quos decem aut duodecim unica vice deglutit; postea vero retracto prostomate clauso ore natat, eo modo, quo caput exhibui N^o. 7. Editur ab incolis, quibus gratissima fercula ex hujus piscis carne conficiuntur.

8. **ICAN RADY,** sive *Piscis retiarius*, quod squammæ in retis ferè modum sese ostentent. Difficile est singulos pisces ad suas species revocare, verum hic quam proxime convenit cum *Peixe Porco* Lufitanorum, quem sub nomine *Guapervæ* exhibuit Piso. Possis etiam referre ad *Gobionis* sive *Paganelli* speciem, qui exhibetur apud Rondel. Lib. VI. c. 16. Præter aculeum, qui pinnis adhæret in summo corpore, sub ventre alium habet aculeum, sed non adhærentem pinnis, quæ ab ano initium capiunt, & ad caudam usque continuantur. Cauda est bifida acuminata. Illud cum aliis hac Tabula propositis piscibus habet commune, quod cute sit dura, quâ detractâ in cibum adsumitur. Reperitur ad eam Amboinæ partem, quam nostrates *De Pas* vocant, sed rarissime capitur.

9. **DE STREPELING,** quem commode *Pisces striatum* Latine possis dicere, quia nomen illi est inditum à variis & versicoloribus lineis, quibus passim insignitus est. Pinnarum figura est admodum singularis, quibus etiam adhærent minutiores adhuc pinnulæ. In dorso novem aculeos habet, verum in aliis ejusdem speciei piscibus non semper idem numerus observatur. Aliquando plures habent, aliquando pauciores.

10. **DE STREPELING.** Lineæ per corporis longitudinem ductæ magis huic & sequentibus aliquot piscibus nomen invenerunt, quam figuræ externæ aliqua similitudo cum proxime præcedenti pisce. Aculeos in dorso habet sex, qui tenui membrana sunt juncti, atque pinnis adhærent, quæ inde ad caudam usque continuantur. Sub medio ventre alium aculeum habet, sed unicum tantum.

11. **DE ALPHOREESHE STREPELING.** A loco, ubi capitur, eo cognomine indicatur. Aut parum aut nihil à superiori differt, excepto colore corporis & linearum, quæ in hoc rubent, in illo cœlum æmulantur. Et hoc & priori

vescuntur incolæ, præsertim assis; nam alioqui minus gratum saporem palato præbet.

12. DE STREPELING. Ut in duobus prioribus tres lineæ conspiciuntur, ita in hoc quatuor vides, sed non omnes ad caudam vergentes, quum duæ superiores abeant ad dorsum. Colore est subviolaceo, pinnae sunt fuscae, nec præterea quidquam singulare reperitur in hoc pisce.

13. DE STREPELING. Hic est ejusdem speciei, & nulla est differentia nisi in pinnis & in colore. Nam nullos aculeos habet, sed tantum pinnae sine aculeis. Color est subflavus, pinnae nonnihil virides, unde gratissimo adspectu oculos intuentium in se fixos tenet. Ad eam Amboinæ partem capitur, quæ ab incolis Honimo vocatur.

14. DE STREPELING. Si unum sub ventre aculeum, & quinque in dorso excipias, nihil differt à proxime præcedenti, atque adeo singula, quæ isti conveniunt, etiam de hoc possint dici. Incolæ libenter hoc pisce vescuntur, sed cocto & in aqua calida apposito, ut apud nos perca mensis inferuntur.

15. DE STREPELING. Satis ille etiam convenit cum aliis cognominibus piscibus. Sub ventre duos aculeos habet, & ii conficiunt omnem differentiam inter hunc & proxime præcedentem.

16. DE STREPELING. Medium corpus hujus piscis à capite ad caudam notatur linea flavescente, quæ ad utrumque latus mutatur in dilutè cœruleum. Ajunt hunc piscem harengi magnitudine esse, & gratissimi saporis. Mihi quidem & hic & plerique omnes pisces cognomines videntur esse è genere Cyprino lato.

17. DE STREPELING. Sex omnino lineas in corpore habet hic piscis. Armatus est dentibus acutissimis & aculeis novem in dorso, duobus in ventre, quorum postremus adhæret pinnis ad caudam decurrentibus. In ea Amboinæ vicina insula capitur, quam incolæ Hilam vocant. Ad cibum utilis est & bonus, sed præsertim sumptus cum jusculo acetario.

18. DE STREPELING. Nisi satis sit, quod pisces unam aut alteram lineam in corpore versicolorem habeant, ad locum illis inter *Striatos pisces* inveniendum, hic vix suum locum videtur posse tueri. Sed quia noster autoptes voluit eum hoc nomine indicare, mihi non sumo tantum auctoritatis in alienum laborem, ut eum hinc removeam. Est igitur corpore, ut vides, oblongo, in dorso pinnae habet exiguo interstitio inter se distantes; verum in imo ventre prioribus dorsualibus nul-

læ respondent, quum ibi sit cavitas ventris, quæ in hoc genere pinnis non solet ornari. Ab ano usque ad caudam aliæ reperiuntur in ventre pinnae. Capitur eo loco, quem nostrates De Pas indigitant.

19. DE STREPELING. Et hæc est species ejusdem generis, sed armata spinis tam dorsualibus quam ventralibus. In dorso enim sex aculeos habet, tenui membranula junctos, ac tandem pinnis adhærentes, quæ usque ad caudam decurrunt. In imo ventre, post anum, etiam sex aculeos habet, sed disjunctos, nec membranula inter se ligatos, aut pinnis caudam versus adhærentes.


20. DE STREPELING. Est hic ut ultimus in hac Tabula, ita etiam extremus istius speciei. Totidem lineas habet, quot proxime præcedens, quinque scilicet, & corporis figura etiam satis inter se convenit, sed hic tantum duos habet aculeos in dorso, statim post caput, qui primum inter se junguntur membranula, ac deinde pinnis adhærent. Eæ, neque in dorso, neque in imo ventre ad caudam usque perveniunt, sed parvum discrimen relinquunt vacuum. Cauda ipsa est bifida, quod etiam in duobus præcedentibus observari meretur.


TABULA TERTIA.


1. I CAN SWANGI. Ex genere armatorum piscium, quibus aculei nomen invenere est etiam hic piscis, quem cum nullo alio rectius possis comparare, quam cum perca Amboinensi parentis mei & Willoughbæi; sed tamen an idem sit piscis dubito. Cauda est acuminata utrinque. In ipso rostro nescio quos parvulos aculeos ostendat, quos duo alii circa oculos, & dein iterum alii magna multitudine in summo corpore sequuntur. Ad pinnae laterales quod attinet, eas non undiquaque bene expressit pictor, omisâ membranulâ tenui, qua inter se coherant. Inde credibile est hunc piscem proprie pertinere ad volatiliū genus.




2. I CAN HONIMO, alio nomine vocatur *Piscis Siamensis*. Obstipio capite & ore dentato est. Multiplices tam in dorso quam in ventre spinas habet inter pinnae, sed præterea non procul a cauda est nescio quid, aculei instar, quod ultimo loco inter spinas ponitur. Apud Chineses hic piscis est in magno honore, habeturque inter delicias; verum fere semper utuntur isto pisce asso, rarissime elixo.

3. DE LEERVISCH. Hoc nomine eum vocari libuit nostratibus ibi degentibus, nulla satis idonea causa, nam quod in









in dorso & ventre, sive potius in utroque latere, aculeos habet, qui quodammodo scalarum ligna transversa exhibent, an ideo statim arripienda fuit occasio ita hunc piscem nominandi. Forsan melius fecissent, si illum à corio rigido ita denominassent, nam ejus pellis corii instar riget ac dura est. Corpore est fusco, & quatuor aut quinque maculis insigni. Ceterum, habet dentes & pinnas versicolore, ut etiam caudam, quæ præterea videtur non destituta esse aculeis. Dicuntur tales pisces interdum tres pedes aut tres pedes & dimidiatum longi & lati esse. Carne est gratissima, & ideo cupidè emitur tam ab Amboinensibus quam nostratibus ibi terrarum degentibus.

4. DE KALKOENVISCH. Videtur species Ican Swangi Tab. I. N. 16. Minutulus est hic piscis, nec tres aut summum quatuor pollices excedit. In capite habet duos aculeos longissime prominentes. Pinnæ laterales pertingunt longitudine ad caudam usque. Ore est magno & dentato. A cauda ad caput variis lineis est distinctus. Cauda etiam est tricuspis, sed ita ut extremitates longius procurrant. Mauri libentissimè isto pisciculo vescuntur, & dicunt eum saporis non ingrati esse.

5. MAKREEL sive *Scomber*, genus piscis satis notum, & qui ubique apud Ichthyographos est descriptus. In hoc nihil prorsus singulare est, præterquam quod vividis coloribus sit distinctus, & tam maculis quam linea circa ventrem ornatur. In capite quoque ab oculis aliquot lineæ deducuntur.

6. PASSER FLUVIATILIS, nostris passeribus tam magnitudine quam forma similis. Nec præter maculas albicantes quidquam habet singulare aut eximium.

7. ICAN PEIXE, est numerandus inter acus, sed non semper accuratè unius est formæ. Os habet prælongum & osseum. Color est in latere cinereus, sub ventre dilute griseus. Lineæ transversales, quæ à tergo ad latus ducuntur, rubent, ac tandem miscentur cum viridi sive citrino colore, qui in latere à capite ad caudam procurrat. Ab ore usque ad caudam novaculæ instar acutus est, quo fit ut alios pisces inter natandum lædat & scindat.

8. JACOB EVERTZEN. Apud Willoughbæum, Jonstonum ac alios scriptores fit mentio hujus piscis, sed forsitan non satis accurata, quum variæ sint ejus species, quæ hic omnes ordine exhibentur. Dicunt inde nomen esse repertum huic pisci, quod navales socii navis cujusdam, cui quidam Jacob Evertzen præ-

erat, eum ceperint primi circa Insulas Flandricas. Scilicet erat iste navarcha facie valde maculosa, & piscis variis in corpore maculis est insignis; ideo socii navales per jocum navarchæ nomen huic pisci dederunt, quod adeo pertinaciter illi inhæsit, ut jam nullo nomine sit notior. A Lusitanis vocatur Meros, à Brasiliensibus Gugupu guacu. Videndus præter alios diligentissimus Rajus in Synopsi Meth. Piscium pag. 127. Ceterum dicunt hunc piscem quodam tempore esse aptissimum esui & gratissimi saporis, alio vero non tantum insipidum, sed prorsus ineptum. Nempe si ejus carnem igni admoveas, interdum corrugatur & in unum contrahitur corii instar, nec dentibus quidem hominum dilacerari potest; alio autem tempore caro est pinguis, nec ad ignem contrahitur. Tunc bona est, & in cibum adsumitur, non tantum in insula Amboina, sed aliis quoque locis in India maritimis. Alii pisces, qui hac in Tabula sequuntur, omnes sunt ejusdem speciei & cognomines, sed unica differentia in colore & aculeorum multitudine notatur. Ideo indicabo tantum differentiam. Ad hunc autem Jacob Evertzen quod attinet, is fusco colore inficitur toto corpore. Aculeos in dorso sex habet, qui tandem cum pinnis conjunguntur. Maculæ sunt albicantes, quæ etiam in pinnis & in cauda conspiciuntur, licet auctores negent caudam aut pinnas esse maculosas. Willoughbæus tamen in icone hujus piscis, quam exhibet Tab. T. tam caudam quam pinnas dorsuales exhibet maculosas.

9. JACOB EVERTZEN. Hunc piscem homo meus dicebat esse femellam superioris, quod quidem verum esse potest, sed color utrique non est idem. Cetera ad amussim conveniunt.

10. JACOB EVERTZEN. Octo habet hic pisces aculeos in dorso, quorum ultimus conjungitur cum spinis. Colore est vergente in nigrum, maculæ candidæ. Sub branchiis nullas habet pinnas, secus ac videre est in superioribus hujus generis.

11. JACOB EVERTZEN. Totidem etiam aculeos habet hic pisces, quot proxime præcedens, sed colore & maculis convenit cum eo, qui descriptus est numero octavo. Circa branchias lineolæ aliquot cernuntur flavescentes, quod huic pisci est peculiare, nec facile in aliis ita observatur.

12. JACOB EVERTZEN. Dilute cœrulei coloris est, quem hic exhibeo piscis. Aculeis, pinnis, maculis, & cauda reliquis similis.

13. JACOB EVERTZEN. Nec in hoc pisce quidquam singulare, quod non in aliis itidem occurrit. Proxime tamen convenit cum pisce ultimo loco descripto, qui cum masculus sit, hunc aiunt esse femellam, quod vero dissimile non est.

14. JACOB EVERTZEN. Color huic pisci est violaceus, maculae sunt albicantes, pinnae tam in dorso quam in ventre sunt quodammodo rotundae. Distinguitur autem haec species ab aliis capite, quod pro corporis ratione multo majus est quam in aliis piscibus, unde etiam illi Capitonis nomen, Belgice *Groot-hoof*, est inditum, quo signo, quasi characteristico, distinguitur ab aliis piscibus cognominibus.

15. JACOB EVERTZEN. Vix meretur hic piscis eo nomine insigniri, siquidem omnes fere maculosi pisces, quorum nomen ignorabatur, ita vocantur, verum huic nullae sunt maculae, si excipias tres aut quatuor, quae sub ventre conspiciuntur. Aliud quoque nomen ab acuto rostro à nostratibus est ei inditum, qui illum solent *Spitsbek* vocare, nomine fane magis conveniente.

16. JACOB EVERTSEN. Majori jure hic piscis suum nomen tuetur, quum totus sit maculosus, ac in reliquis conveniat cum praecedentibus piscibus, quibus idem nomen est.

17. JACOB EVERTZEN. Et hic piscis, si maculas spectes, eo nomine dignus est, verum videtur pertinere ad Turdos, quales exhibentur à Jonstōno Tab. XIII. Hic autem licet mihi fidem nostri pictoris confirmare, quum mihi aliunde sit transmissa hujus piscis Icon, sub nomine *Ican Soufalath*, quae accurate cum hac, quam exhibeo, pictura convenit. Corpore est rubicundo, maculae sunt flavae, qui est etiam color squammarum & imae partis branchiarum.

18. JACOB EVERTZEN. Caput huic pisci est magnum, os dentibus acutissimis armatum. Idem est ubique color, tam corporis quam pinnarum, fuscus scilicet. Maculae, ut in aliis, sunt albicantes. In dorso spinam habet supra caput longiorem, sed reflexam ad caudam. Ab imo ventre, ubi caput definit, duo cirri dependent, qua propter mihi quidem videretur commodius ad aliud genus posse referri quam ad hoc maculosum, verum nolui in ordine quidquam mutare, ne judicaretur nimis acutè in laboribus alienis cernere.

TABULA QUARTA,

1. KLIPVISCH. Minutum genus piscium est, quod hac Tabula comprehenditur, in quorum descriptione est notandum, quod nostrates fere omnes pisces minores, quibus nomen deest, solent piscium saxatiliū, sive *Klipvisch*, nomine comprehendere. Nempe passim ad littora inter scopulos magna multitudo talium anonymorum piscium reperitur, qui nullum nomen habent, & tamen quodammodo ad unum & idem genus pertinent. Plerumque ob colorum varietatem à curiosis naturalium rerum indagatoribus in liquore adservantur. Sunt qui non tantum vividis sese commendant coloribus, sed qui maculis etiam aut striis aureis ac argenteis splendescunt. Qui hic loco primo ponitur sex in dorso aculeos habet, quinque circa ipsum ventrem, eā tamen differentiā, quod superiores sunt ligati membranula tenui, quae in inferioribus non cernitur. Cauda est variegata miris modis, quae res tamen etiam in aliis piscibus observatur, nec quidquam auctoris fidei detrahit.

2. KLIPVISCH. Totum corpusculum hujus pisciculi, qui quatuor pollices magnitudine non solet excedere, est fere nigrum, nisi quod linea candidissima sese ostendit in latere statim post branchias. Notum est apud Ichthyographos plures pisces reperiri, qui ita sunt corpore varie colorato, quod non injucundum est ad spectu. Immo ipse aliquot in liquore ad servo, in quibus aliquot lineae candidae corpusculum, quod alioqui nigricat, distinguunt.

3. KLIPVISCH. Hujus pisciculi caput definit in acutum rostrum, unde facile, si tanti esset, aliud huic nomen possis reperire. Ventre est laxiore & maculis notato. Pinnae branchiales longiuscule pro corporis ratione producuntur caudam versus, quae est bifurcata. Paulo ante caudam observabis lineas duas aut tres versicolores.

4. KLIPVISCH. Ejusmodi lineae sive striae versicolores, quae in proxime praecedenti pisce conspiciuntur, etiam in hoc pisce sunt notandae circa caudam. Caput est contractum & obtusum, unde etiam non difficile esset illi nomen invenire. Ceterum branchiales pinnae fere sunt rotundae. In ventre, praeter pinnas post alvum, habet duas dependentes paulo infra caput.

5. KLIPVISCH. Huic pisciculo fere os est simile rostro aviculae alicujus, quod singulare tantum in illo, nam quod atti-

attinet ad colorem, is violaceus est & hic illic maculis notatus; id commune habet cum multis aliis.

6. KLIPVISCH. Orbis diceret speciem esse hunc pisciculum adeo tumido ventre ac magno capite videtur, cauda in ductum tenuem desinente. Capite & dorso est cristatus, quum novem aculei inde promineant, qui sibi invicem adhærent per membranulam tenuissimam. Alias pinnas in dorso non habet sed in ventre, ubi corpus incipit gracilescere, quo loco etiam videbis tres aculeos, sed, ut in aliis ventralibus etiam vidimus, nullo ligamine junctos.

7. KLIPVISCH. Hic pisciculus est proxime superioris femella, nec inter utrumque alia est differentia, quam quod hic armatus non sit, ut superior. In reliquis prorsus conveniunt, tam quod attinet ad formam & colorem, quam quod maculas spectat & lineas, quibus uterque est notatus. Color autem vergit ad flavedinem, cetera nonnihil viridatis ostentant.

8. KLIPVISCH. Paululum forma hujus pisciculi ab ita superioribus, sed tamen non omnino est diversa. Variis maculis & lineis notatur præsertim circa caudam.

9. KLIPVISCH. Rarum & ignotum fere pisciculi genus. Tuto tamen referas ad genus Caprinum, quum aculeum erectum habeat in summo capite. Vide infra, hac Tabula numero 20.

10. KLIPVISCH. Neque hoc genus satis notum est. Exiguum corpus & raritas hætenus videntur non meruisse nomen. Colore est gilvo, lineis fuscis, quæ à dorso ad ventrem deducuntur. Tam in summo corpore quam imo pinnae sunt, quales etiam non tantum ad latus branchiales reperiuntur, sed etiam infra branchias binæ.

11. KLIPVISCH. Paulo aliis frequentior invenitur hoc pisciculi genus. Colore est fusco, sed corpus miris modis variegatum est, quasi marmor aliquod venis distinctum. Capite est brevior ac valde obtuso, quodque supra os nescio quam cœruleam maculam præfert, unde peculiare huic pisci nomen est inditum *de Blauneus*.

12. KLIPVISCH. Inter pisciculos parvos hic fere est minimus, & ideo nulli rei idoneus, excepto quod animi gratia ob raritatem & colorem in liquore custoditur à talium rerum aestimatoribus. Si lagenæ aquâ plenæ talem indes piscem, diutissimè possis vivum adservare absque ullo alimento. Unde autem veniat, quod quidam pisces ita adservati diu vivant,

alii autem brevi tempore moriantur, licet non indignum sit scitu, hoc tamen loco id indagare nunc non est animus.

13. KLIPVISCH. Mandibula inferior hujus pisciculi est aliquanto productior superiore, venter quoque prominet. In dorso sex aculeos habet pro exigui corporis modulo satis magnos. Sub ventre ab ano ad caudam pinnas habet, ut & in dorso ab ultimo aculeo ad caudam usque.

14. KLIPVISCH. Mirum videtur, quod in hoc pisce quasi foliola quædam ex ipsis aculeis efflorescant, idque alternis. Corporis color vergit ad violaceum, sed maculae quatuor, quas in corpore cernis, sunt albicantes. E ventre duæ pinnae propendent non longè infra caput. Caudæ additur quasi præsegmen, alterius coloris quam caudæ, quæ subviridis quidem est, sed extrema ista pars flavescit.

15. KLIPVISCH. Paulo reliquis piscibus hætenus in hac tabula propositis est major & crassior. Ideo à popello capitur & in cibum adsumitur. Corpus est colore nigricante ab ore usque ad caudam. Præter unum aut alterum aculeum in summo tergo, tertium habet longiusculum, sed reflexum ad caudam. Maculae, quæ in lateribus observantur, sunt exiguae, sed dilutè cœruleæ.

16. KLIPVISCH. Multa hic piscis, quod ad formam attinet, communia habet cum isto pisciculo, qui numero quinto hujus Tabulae est descriptus, nec ulla fere differentia est, præterquam coloris, qui quodammodo cœruleus est. Præterea circa anum dependet pinna. Venter est prominulus, atque aliquot maculis notatus.

17. KLIPVISCH. Idem fere in hoc pisce color est, qui in superiore, sed formâ aliquantum inter se differunt. Capitur in ea insula, quæ à nostratibus Hila vocatur, verum rarissime, & ideo vix notus est apud plerosque etiam ibi degentes. Pinnae branchiales sunt rotundæ. Sub ventre pinnam habet tricuspide. Cauda est bifurcata. Maculae, quas cernis in corpore, non multum differunt à reliquo colore, sed constant tantum è circulis nigricantibus.

18. KLIPVISCH. Hic multo est notior quam præcedens, atque ideo *Basiliffæ* cognomine à quibusdam ornatus est. Præter aculeos in dorso pinnam habet, non uniformem, sed lineis rubicundis duabus variegatum. Pinnae branchiales ventrem versus sunt reflexæ. Præterea duæ maculae à dorso progrediuntur versus latera, ubi linea cernitur producta à capite

ad caudam. Eodem capitur loco, quo dixi superiorem inveniri.

19. KLIPVISCH. In hoc pisce singulare est, quod aculeum habet exstantem in medio dorso, inter pinnas priores & posteriores. Ceterum, maculosus est & ore acuto. In corpore exiguas aliquot maculas habet, nec præterea quidquam observatu dignum.

20. KLIPVISCH. Si aculeum, veluti cornu aliquod, supra oculos prominentem adspicias, non dubium est, quin sit hic piscis species Caprisci, qualis exhibetur apud Jonstonum Tab. XXIII. & alios; verum tamen non undiquaque convenit cum pisce ibi descripto, quod etiam necesse non est, quoniam non dico eundem plane esse utrobique piscem, sed ejusdem generis. Colore est violaceo nullis maculis interrupto, sed circa ventrem flavescit, & aliquot maculas cum aculeo habet, eodem modo, qui observatur in figura hujus Tabulæ nona.

21. KLIPVISCH. Est his piscis non alius coloris, quam qui in proxime antecedente cernitur, sed valde differt corporis forma. Multo se quidem aculeos habet in dorso, multos in ventre, verum eadem, quam jam supra observavimus differentia, hic quoque obtinet, quod scilicet inferiores aculei nullo ligamine cohæreant, ut isti, qui in dorso reperiuntur.

22. KLIPVISCH. Majoris paulo hic est corporis quam alii pisces cognomines, atque ideo à Mauris in cibum adsumitur. Corpus dilute flavum est, cum versicoloribus maculis in dorso, quæ à capite ad caudam procedunt, sed tanto plerumque minores sunt, quanto eæ propius ad caudam accedunt.

23. KLIPVISCH. Figuram hujus piscis si respicias, non dubium est, quin dicendus sit *Scolopax* rostro porcino, qualis exstat apud alios descriptus. Habet enim, ut vides, rostrum plane simile porcino, & præterea aculeum ad caudam reflexum. Capitur non procul ab insula Borneo, atque non illibenter eo vescuntur socii navales, quod ille sit carne firma, sed tamen pingui.

24. KLIPVISCH, sed non anonymus, quoniam nostrates ei dederunt nomen *bet Princesje*, quasi parvam feminam principem dicas. Capite est oblongo, corpore striato, in quo linea una corpus percurrit à capite ad caudam, dum tres aliæ transversæ, quasi totidem ligamina, ventrem pisciculi ambiunt. In dorso aliquot aculeos habet, qui terminantur à pinnis ad caudam procurrentibus.

25. KLIPVISCH. A striis, sive lineis,

quas in corpore hujus piscis depictas vides, nomen illi est inditum de *Gebandeerde Princesse*, quasi dicas principem feminam latioribus lineis striatam. Neque hoc neque proximè præcedenti pisce utuntur incolæ ad cibum, sed tamen propter eximios colores, qui non semper in eadem specie iidem sunt, capiuntur, ac in liquore ab amatoribus hujusmodi rerum adservantur.


26. KLIPVISCH. Nullum nomen peculiare est huic pisciculi, qui tamen videtur esse ex genere triangularium. In dorso tres aculeos ostendit. Pinnas habet tam in dorso quam in ventre; præterea aliquot lineis est notatus a dorso ad ventrem vergentibus, sed earum numerus est incertus, nec color semper idem.


27. DE BOOTSHAARK, sive *Harpago*, quod nomen illi impositum est a filamentis, quæ ex ore illius videntur protrudere. Quatuor aculeos habet in dorso, & in lateribus notatus est lineola, a branchiis ducta ad caudam. Referebat meus homo incolas Amboinæ istiusmodi pisces conditos sale diu adservare, ac cum libet iis vesci, quemadmodum apud nos acipenseris solent, à quo tamen multum distat, si longitudinem spectes. Non est enim vulgo major quam aselli minores, quos vulgo *Schelviseh* vocamus. Mihi autem, ut dicam quod verius videtur, est species *Bagræ*, ut Markgravius vocat, & ex eo describit Jonstonus, quem vide Tab. XXXVIII.

TABULA QUINTA.

1. **H**ic piscis à nemine hætenus est descriptus, nec facile poterit ad aliquam cognitorum piscium speciem referri, quum magis monstrum marinum sit quam piscis. Captus fuit prope Bagevalam circa Amboinam anno MDCCVII. Tres pedes cum dimidiato pede erat longus, pelle dura, & aculeatus tam in posteriori corporis parte quam in cauda ipsa. Color ipsi erat dilute cœruleus, sed singulare & mirabile prorsus fuit, quod circa dorsum in priori corporis parte notaretur figura solis satis accurate expressa & flavescente. Ejusdem coloris erant duæ maculæ non procul à cauda. In cauda autem ipsa cernebantur tres maculæ nigricantes. Ceterum aculeis armabatur tam in summo capite quam infra branchias. A ventre duo cirri ad caudam reflexi pendebant. Ut verbo dicam, nihil non monstrosum in hoc pisce erat, qui ideo in dicta insula memoriæ causâ adservatur.

2. DE BOOTSHAARK. Hic, ut vides ejus-





eiusdem nominis est cum pisce, quem ultimo loco superioris Tabulæ descriptum dedi. Si tamen icones inter se conferantur, satis magna differentia reperietur inter utrumque, nec videtur ad eandem speciem Bagræ pertinere, sed undique convenit cum Brasiliensium Tamoata, quem Johnstonus, Willoughbæus, & alii dederunt descriptum.

3. DE GROTE BYTER, quem forsitan haud incommodè *Pandacten* nominaveris. Corpore est magno & crasso, colore fusco, nisi quod linea lata & maculis insignis ducatur per medium latus a capite ad caudam. Dentes habet longos & acutissimos, quibus tam alios pisces obvios, quam quæcunque aliæ, solet appetere. Tres in dorso aculeos habet, quorum ultimus pinnis adhæret, sicut priores inter sibi invicem tenui membranula. Sub branchiis, præter solitas pinna laterales, duas alias habet. Similem huic piscem reperies N. 1. Tab. XII. sed notandum hic est, quod multum ii inter se colore differant.

4. DE EENHOORNVISCH, sive *Monoceros*, ita dictum à cornu satis magno, quod è capite prominet. Totum illud est durissimum ac plane osseum, & intus candidissimum. Aculeos habet in dorso, interdum plures, interdum pauciores; circa caudam tres maculas habet, quæ tamen non multum colore differunt à reliquo corpore, quod ad cœruleum vergit. Mira huius piscis figura non obstat, quo minus incolæ illo utantur ad cibum, ac fateantur carnem esse non ingrati saporis.

5. DE KOFFERVISCH, quod ei nostrates nomen dedere, vertentes in suam linguam nomen Amboinense *Ican Tomtombo*, aliis etiam *het Strykyser*, piscis triangularis dorso, capite & lateribus spinosis. Vivit fugendo, quod illi commune est cum aliis piscibus cognominibus. Namque illi, quum sint ore parvo, aliis piscibus, aut quibusvis rebus obviis adnatant, ac fugendo succum quemcunque adtrahunt, unde vitam tolerant. Tam pertinaciter autem adhærent, si manui imponas ad periculum faciendum, ut inde difficillime queas divellere. Pelle est tam dura, ut testudinem marinam fere æquet, atque ideo magna vi est findendus, ut possis inde jecur extrahere, quod ajunt oculis mederi simpliciter illitum. Ceterum hic piscis tam in ventre quam in dorso est aculeatus. Toto corpore maculas habet æqualiter magnas, & hexagonas, quod non injucundum est adpectu. In ventre, non procul à cauda pinna crassiores habet dependentes, quod

signum est hunc piscem fuisse femellam, quoniam mares etiam supra caudam, è regione inferiorum pinnarum, tales pinna crassiores habent. Quod semel dictum sufficiat.

6. KOFFERVISCH. Hanc speciem reperies descriptam apud auctores sub nomine piscis quadrangularis ab utraque parte cornuti. Corpus tegitur maculis versicoloribus æqualibus & adpectu gratissimis. In dorso, non procul a cauda, pinna habet crassiores & rotundas, quibus è regione in utraque ventris parte respondent duo aculei in caudam reflexi. Sunt, qui hunc vocent piscem flabellarium, propterea quod ejus cauda quodammodo referat flabellum, quod visum fuit sufficere ad aliquam quamcunque nominis rationem reddendam.

7. KOFFERVISCH. Forsan rectius hunc piscem dicas esse speciem caprisci quam orbis, sed tamen nescio quid videtur commune habere cum orbibus. Magnus venter, caput brevius, nullæ pinna præter binas crassiores circa caudam, quæ singula orbibus conveniunt, verum aculeus, qui solus in capite extat, facit ut libentius eum ablegem ad capriscos. Colore non valde differt à duobus superioribus piscibus.

8. KOFFERVISCH. Inter hunc & superiorem non magna est differentia, quæ fere consistit in pinnarum & oris forma, quam vereor ut pictor rectè expresse rit. Atque id tanto majori ratione, quia singula, quæ de superiori pisce dicuntur, etiam de hoc narrentur. Quibus adde, quod Mauri hoc pisce vescantur, sed Christiani omnes ab eo abstinent.

9. KOFFERVISCH. Si conferas hunc piscem cum eo, quem loco quinto huius Tabulæ descriptum vides, cujus est minor species, exiguum reperies differentiam, quæ omnis consistit in pinnis dorsualibus, quarum priores aculeum præfixum habent, posteriores satis accurate respondent crassioribus illis pinnis, quæ à ventre dependent.

10, & 11. KOFFERVISCHEN. Sunt & illi *Ican Tomtombo*, sed quos rectè annumerabis orbibus fere quadrangularibus. Omnis inter utrumque differentia in eo est, quod prior pluribus maculis sit insignitus, posterior paucioribus, quæ fere latus occupant circa branchias; præterea prior est fusco colore, posterior subcœruleo. Reliqua in utroque sunt paria.

12. KOFFERVISCH. Quod jam de aliis piscibus dixi, nempe alias atque alias videri rationes, quare adscribas huic vel illi generi piscium, idem etiam de hoc

pisce dicendum venit. Verum de ea re nunc litem non movebimus. Pinna in dorso non est aculeata, cauda miris modis variegata, unde à quibusdam etiam vocatur piscis flabellarius. Sit quodcunque voluerit noster autoptes, postea forsitan occasio erit ulterius disquirendi de hoc atque aliis piscibus, de quibus nunc paucis tantum loquor, ad designandum singularem quædam cuique pisci propria.

13. & 14. KOFFERVISCHEN. Egregie etiam illi inter se conveniunt, excepto tantum colore & duobus aculeis, quos posterior ostendit in dorso. Prioris color flavus est, posterioris magna parte coeruleus, excepto quod maxima capitis & laterum pars etiam flavescit.

15. KOFFERVISCH. Quum plerique omnes pisces sint pelle, uti dictum est, durissima, hic è contrario habet eam mollem, sed tam in dorso quam in ventre præfert nescio quæ ferta, quasi florum corollas. Ea sunt durissima, ac cultro auferenda, si quis eo pisce velit vesci, quod soli Mauri faciunt, Christianis nolentibus pisciculis tam minutis, est enim 5. aut 6. pollicum, vesci. Nihil præterea singulare in hoc pisce occurrit, præterquam quod linea ab ipsius ore ad oculos ducta rubeat, quum alioqui totum corpus sit subcoeruleum.

16. KOFFERVISCH. Hic circa Amboinam tantum capitur. Capite est maculoso, præsertim inter oculos, ubi versicoloribus maculis videtur insignitus. Aculeos tres in dorso habet, unum in ventre, nec est, quod diutius immorari velim huic pisci ulterius describendo.

17. KOFFERVISCH. Cum superiori undiquaque convenit, tam ad colorem quam figuram corporis quod attinet. In eo tantum differunt, quod hic habeat plures maculas, in capite non tantum, sed etiam in corpore, & vicissim sit destitutus aculeis, quos in superiore notavimus. Dentes etiam ostendit acutissimos, qui licet in superiore non conspiciantur, adfirmare tamen pene ausim, id esse factum pictoris incuria.

18. KOFFERVISCH. De hoc pisce nihil est quod dicam, nisi illum cum prioribus convenire, nec ullam observari differentiam præterquam in colore. Totus enim est dilute coeruleus, cum maculis ejusdem, sed paulo intensioris, coloris.

19. PERCA AMBOINENSIS. Hunc piscem in museo servo, & in Thes. I. à Parente meo est descriptus. Forma quidem est non admodum diversa à nostris percis, sed colore multum differt. Squammæ in superiori corporis parte obscure virides sunt, circa ventrem rubent, quo

colore etiam orbes oculorum & pinnae tam branchiales quam dorsuales sunt notatae. In cauda bifurcata duas maculas nigricantes habet.

20. Pisciculus est Ceilanicus, quem ex Thesauro I. Parentis mei hic effingendum curavi. Quod ratus est, nec major est quam aleæ lusoriae vulgo sunt. Præterea reticulatus est ac maculatus, verum maculae sunt non majores quam granum seminis sinapi.


TABULA SEXTA.


1. **DE KONING DER KAKATOES.** Id est *Rex Psittacorum majorum*, ita dictus, credo, à variis & vividis coloribus, quibus hic piscis est notatus, ut solent majores isti Psittaci, à quorum similitudine nomen nactus est. Possis eum, & aliquot sequentes Callychitides nuncupare, nomine nec inconveniente, nec ignoto apud alios.


2. **KAKATOEVISCH** Ejusdem est cum superiore generis, sed specie non parum differunt. Nam cum ille sit lineis sive striis latioribus à tergo ad ventrem procurrentibus, hic ejusdem fere coloris lineis est insignitus, sed à capite ductis ad caudam. Præterea ille tantum in dorso habet aculeos, hic vero etiam in imo ventre, quibus tam in dorso quam in ventre pinnae rotundiores adjunguntur, quod etiam in aliis fieri piscibus exoticis solet.


3. **KAKATOEVISCH ALFORENSIS.** Diu ignotus fuit, & ante annos sex aut septem coepit primum innotescere. Tum nemo audebat ejus carne vesci, sed postea Mauri periculum fecere; timebatur enim nonnihil à coeruleis venis, quarum venenum exhorrescebant Christiani, verum postea, quum res Mauris bene successerat, coepere & illi hujus carne vesci. Porro, ut ex icone satis patet, lineæ ex dorso aliis è ventre ductis circa medium latus obviam fiunt, ac ibi angulum acutum constituunt. In capite etiam maculosus est, sed reliquum corpus est fuscum.

4. **DE BRUINE KAKATOEVISCH,** ita dictus est à præcipuo colore, qui in capite & toto corpore regnat. Verum per medium latus linea sive fascia satis lata à capite ad caudam procurrit. Ea tota est candida, qualis etiam observatur in aliis piscibus peregrinis, qui apud me in liquore adservantur, licet eorum corpusculum etiam sit quodammodo nigrum. In dorso septem aut octo habet aculeos tenui membrana junctos, ac pinnas adhærentes, quæ in hoc pisce rubent. In tergo aliquot reperiuntur maculae nigricantes.









cantes. Squammas nullas habet, sed pellem æqualem & duram, quæ detrahitur, antequam in cibum adsumitur. Solent enim incolæ hoc pisce affato vesci, nam elixus non valet.

5. DE RODE KAKATOEVISCH, nomen suum etiam à colore, qui ruber est, videtur accepisse. Circa branchias tamen nescio quid viridatis habet, corpore subinde candentibus maculis distincto. In deliciis habetur apud Amboinenses, qui adfirmant eum nihil cedere carpionibus, si saporem spectes. Magnitudine etiam interdum est major, sed raro conspicitur.

6. DE SPITSNEUSDE KAKATOEVISCH. Si excipias, quod hic piscis aliquot habet in dorso maculas, plane convenit cum præcedente. In ventre etiam maculosus est & circa branchias. Corporis color violaceus est. Ejus carne vescuntur incolæ Laricenses, nam ibi capitur, ac ea rubet cum cocta est, plane ut videmus in nostris salmonibus.

7. DE CITROENVISCH. A colore nomen Citrii mali huic pisci est datum. Corpus totum est distinctum lineis variis à capite ad caudam usque, sed intervalum, quod inter singulas lineas interest, obsidetur aculeis multiplicibus, qui totum corpus ambiunt. Sapore (nam editur affatus) non multum differt ab alosa nostrate, verum multo minus sunt in istis regionibus obviæ, quam alosæ hic sunt.

8. DE CITROENVISCH. Qui numero octavo sequitur ejusdem generis est, ac speciei non multum à præcedente diversæ. Verum nullos circa latera ostendit aculeos, quos tantum habet in dorso & in ventre. Ibi reperiuntur, quæ pinnis ad caudam decurrentibus adhærent. Præterea lineæ sive striæ corporis sunt versicolores, & ad caudam reflexæ.

9. POEPOETJE. Figuram satis mirabilem hic pisciculus præfert. Nam in medio latere, quum sit pelle dura & sine squammis, in lateribus tamen videtur admodum squamosus esse. Rostrum, aviculæ more, est acutum. In dorso primum aculeos habet ac deinde caudam versus pinna, in ventre autem è contrario infra branchias ostendit pinna & magis ad caudam aculeos.

10. POEPOEVISCHJE. Ut figurâ ita sapore hic piscis æmulatur percam nostram, colore nonnihil differt, ut & cirris ab imis branchiis dependentibus, & aculeo circa anum. Color purpurascit, sed dilutè, nisi quod circa caudam abeat in flavedinem.

11. POEPOEVISCHJE. Qui hic exhibetur pisciculus, est fere ignotus apud

ipso incolas. Reperitur tamen, quamquam rarò. Ventre est latiore, & maculis in extremo corpore insignis. Circum os ducitur linea versicolor, qualis etiam conspicitur, ubi branchiæ desinunt. In mediam quasi caudam corpus procurrit.

12. POEPOEVISCHJE. Superiori est persimilis, sed magis notus, & aliquanto major corpore, quod sex aut septem pollices dicitur æquare. Utuntur etiam illo Amboinenses ad cibum, licet manum abstineant à superiore, quod an fiat ob raritatem, an vero quòd credatur venenatus esse, haud facile dixerim.

13. & 14. POEPOEVISCHJES. Licet & hos addas prioribus proxime præcedentibus, quum nihil prorsus differant à pisce, quem postremo loco descripsi, præterquam colore, & linea varia, quæ ab ore procedit, & continuatur usque ad extremitatem branchiarum. Ceteros hujus generis pisces pictor retulit in Tabulam XIX. ubi de iis plura.

15. KAPITEINSVISCH. Nisi aliud esset nomen, diceret & hunc pertinere ad illorum genus, qui proxime sunt descripti. Octo in summo corpore aculeos habet, in ventre nullos. Præter spinas branchiales satis longas, duas adhuc longiores habet sub ipsis branchiis in ventre. Dentes etiam habet acutissimos, quod illi commune est cum aliis piscibus, quos paulo ante dedimus.

16. DE KAPITEIN VAN DE KAFFERS, quasi Afrorum ducem voces. Rostrum est acutissimo, aculeoque longissimo in dorso præditus. Corpusculum quoque per mediam caudam procurrit ad finem usque. Lineis latioribus à dorso ad ventrem, quasi fasciis, distinguitur. Ad branchias ipsas habet pinna binas, quarum altera est longior, altera contractior. Reliqua huic cum aliis communia sunt.

17. DE LEDENVISCH, quem piscem articulare vocare possis, quum quasi articulis tenui tendine coherentibus totus constet. Videtur esse species acus, aut tæniæ. Id vero huic pisci dicitur esse peculiare, quod eum possis extendere, & quasi duplo majorem facere, omnibus articulis inter se disjunctis, nec ipso pisce coherente nisi tendine tenui. Quod si ita extensum in aquam projicias, corpus denuo contrahit & illæsus evadit celeri natatu. Pro cauda habet tenuem & satis longam spinam, quæ crassior non est quam filum lineum.

18. DE FLUITER. Nullus dubito, quin hic piscis sit aliorum *Petim buaba*, sive *Tabakpyvisch*. Longo est corpore sed ita tenui, ut vix digiti minoris crassitiem excedat. Vocalis quoque est adeo,

ut nocte possis eum satis longo intervallo quasi sibilantem audire; qua ratione ad Tibicinum genus videretur referendus. Vide quæ notata sunt ad num. 16. Tab. XVII. Indigenæ Amboinenses solent eo pisce vesci, quum alii non suppetunt, nam quum adeo tenuis sit, ut dixi, & cartaliginosus, facile possis conjicere eum multâ carne non abundare.

TABULA SEPTIMA.

1. **DE ZAAGVISCH**, nomen invenit à proboscide ferrata, quæ eboris instar est dura & intus nitida. Pinnas branchiales habet prælongas, quibus ad volandum utitur, sed cum corpore sit majore, quam vulgo solent pisces volatiles, non diu relicta aqua sese in aëre potest sustinere, verum statim decidit in aquam, nec se denuo tollere potest in aërem, nisi satis longo tempore post. In dorso habet aliquot aculeos. A branchiis duo cirri dependent. Non procul à cauda, tam in dorso quam ventre, etiam pinnas habet, quarum, quæ in ventre sunt, multo sunt longiores quam dorsuales.

2. **DE ZEEDRAAK**, sive *Draco marinus*, rostro osseo etiam est præditus, sed non ferrato. Cum superiore commune habet, quod utatur pinnis branchialibus pro alis. Notabile est, quod eæ quidem quum totæ sint dilute virides, in extremitate tamen rubeant, quod gratissimum præbet intuentibus spectaculum. Ceterum ab utraque corporis parte aculeos nullos habet, præter duos prope caudam, sed pinnas utrinque binas habet molles & flexibiles admodum. Soli pauperes hoc pisce vescuntur, quoniam & caro insipida & pauca in eo sit. Est enim fere totus cartaliginosus, & si cutem detrahas, non multum est quod restat carnis.

5. **'T KLEINE DRAAKJE**. Pisciculus est itidem Amboinensis volans, qui fere in omnibus convenit cum eo, quem modo descripsi. In cauda est quidem aliqua varietas, sed non magna, neque quæ sufficit ad aliam speciem constituendam. Si forte in colore quædam sit differentia, credibile est eam pro loci & magnitudinis piscium ratione interdum variare, neque ideo alius esse piscis putandus est. Descriptus in Th. Animalium 1. Parentis, ubi etiam illius icon occurrit.

4. **ICAN LOMPO**. Peculiariter notandum de hoc pisce, quod fusco colore est, & corpore striato & maculoso, quæ striæ & maculæ non ingratum ad-

spectu faciunt hunc piscem. Præterea est gratissimi saporis. Non in mari sed in fluminibus reperitur. Ideo delicatioris palati homines, qui è nostratibus mercaturæ causa fere in oris maritimis degunt, non refugiunt, quo minus sumptus faciant satis magnos, mittendo hominos certos, qui decem aut duodecim miliaribus à mari remotas aquas adeant ac captos ejusmodi pisces prono fluvio secum avehant ad oram maritimam.

5. **BLIEMA**. Alofæ fere similis est, quod attinet ad saporis, sed corpore aliquanto minor, capite magno, pinnis etiam magnis & rotundis, qua corpus in caudam vergit. Sub branchiis nullas pinnas habet, sed in lateribus tantum. Caput, præsertim inter oculos, est notatum variis maculis. In dorso cernuntur quinque aculei, quos dicunt esse acutissimos. Color corporis nonnihil purpurescit, ventre candente ac lateribus, verum sub imo ventre dilute cœruleus est.


6. **DE KAMVISCH**. Ita nomen huic pisci fecere, eo quod in summo capite candidam habeat maculam radiatam, quæ aliquid commune cum pectinis radiis videtur habere, atque adeo causâ fuit nominis huic pisci reperiendi. Alaudæ cristatæ speciebus possis eum annumerare, quum figura & reliqua satis bene conveniant cum alaudis.

7. **ICAN BARO**. Singularis formæ & varii coloris pisciculus. Rostrum est plane porcinum, & oblongum. Macularum in corpore color aureus est, reliqui corporis dilute purpureus. Ab utraque parte singulas habet pinnas, caudam pro corporis magnitudine satis amplam. Mauri solent eo vesci, præsertim siccato, aut fumo indurato, nam alioqui non est saporis laudabilis.

8. **DE GRAAF**. Licet in hoc pisce lineæ sive striæ appareant, illæ tamen non alterius coloris sunt, quam qui est reliqui corporis, verum maculæ capitis alios atque alios colores, qui interdum variant, exhibent. Unicum in dorso aculeum præfert, post quem pinna continuatur ad caudam usque. Præter branchiales pinnas satis magnas, duas habet sub ipsis branchiis, quæ longius propendent, sed ad caudam reflexæ sunt. Ipsi caudæ extremitati quasi limbus quidam adfuitur, alio atque alio colore subinde notabile.

9. **'T DAMBORT**. Squammæ variis coloribus notatæ ac quadratæ huic pisci peperere nomen. Videas illic rubras, fuscas, & flavas squammas, quarum diversitas gratissimum præbet adspectum.

Sub



Sub branchiis venter maculosus prominet. In dorso septem aculei reperiuntur, qui tenui membrana inter se cohærent. Venter anterior nullas ostendit pinnas, sed ab ano ad caudam usque cernuntur pinnae uno ordine ad finem continuatae. Rarissime capitur, verum è genere Turdorum est.

10. DE LANGBEK. Nec minus raro conspicitur hic piscis quam præcedens. Rostri longitudo nomen illi quæsit. Os est magnum & rictus pro corpore amplius. Non alio quam violaceo colore, sed obscuriore, conspicitur. Verum adeo pauci ejusmodi pisces reperiuntur, ut fere à peritissimis Amboinensibus ignoretur.

11. LINGUALA. Chinensibus in deliciis est, & merito, quum ejus caro sit eximii saporis. Caput illi flavum est, corpus ejusdem coloris, quem in superiori pisce notavi. Oblitum est caput, ore altiuscule sublato. Aculeos dorsuales sex aut septem habet, & præterea pinnam crassam & reflexam circa caudam. In imo ventre aculeum habet inter binas pinnas, quarum priores è regione respondent pinnis branchialibus.

12. DE GESTREEPTE SAUBILANG. Piscis est fere anguilliformis, & ejusdem saporis, qui in anguillis observatur. Pedem plerumque longitudine excedit. Sed reperiuntur etiam, qui ad duos pedes longitudine pertingunt. Saubilang quid sit fateor me non satis scire, verum prior denominationis pars est orta à lineis latioribus, quæ latera discriminant.

13. COUPANGVISCH, sive *Ican Coupang*. Vulgus nauticum isto nomine solet indigare hunc piscem, quod fingat eum in capite præferre quasi numisma aureum, cui in India nomen est Coupangii, verum mihi quidem nullo modo dubitandum videtur, quin sit remora, notissimus piscis, atque ab omnibus auctoribus, post fabulam decantatissimam, quæ de eo narratur, descriptus. Quapropter huic diutius immorandum non censeo.

14. DE KNEVELBAART. Nomen huic datum à cirris duobus longissimis ab imo ore propendentibus, qui nescio ob quam causam magis proprii visi sunt ad nomen reperiendum quam aculei duo cornei, qui in utraque capitis parte supra oculos cernuntur. Color corporis est fuscus, maculis rubentibus. Præter pinnas dorsuales & ventrales duas alias habet infra branchias.

15. DE KNEVELVISCH. Eadem in hoc pisce est nominis ratio, quæ in superiore, & genus itidem unum, sed cum ille præferat duos aculeos crassiores, hic

ostentat unum tantum, sed majusculum, in summo dorso, paullo supra caput. Cirri etiam ab imo ore dependentes sunt aliquanto longiores, quam qui videntur in pisce cognomine.

16. DE POEPOESCHE SARDYN, id est, *Encrasicolus Paponensis*. Vix quidquam in hoc pisce notabile, quod non item reperitur in nostris Sardis. Visus fuit tamen dignus, qui exhiberetur, quia capite est maculoso, corpore exiguis admodum maculis, ceu punctis candidis, notato, & pinnis rubris.

17. DE ST. ANTONIE-VISCH. Piscis Amboinensis volans, quem ajunt assum bene sapere, sed elixus aut coctus nulli rei est idoneus. Nullus mihi videtur esse dubitandi locus, quin hic Piscis Divi Antonii, ut meus autoptes eum vocabat, sit hirundo, quo nomine eum exhibet Pettiverus *Gazophyl. Nat. & Artis Tab. XXX. n. 2.*

18. DE VLIEGENDE HILAVISCH, ita dictus partim à facultate volandi, partim à loco, ubi capitur. Adeo parum differt à superiere, ut facile videre possis ejusdem esse speciei & hunc & illum. Licet tamen per me ut harengum volantem voces, ac conferas cum ejusdem nominis pisciculis, qui prostant apud Jonstonum *Tab. XVII. & XXII. & apud alios auctores.*

19. 'T VLIEGEND VISCHJE. Nullo peculiari nomine est pisciculus hic insignitus, quod exiguo sit corpore, & forsan effugiat aliorum diligentiam. Pinnae branchiales, ut in aliis etiam sit, illi præstant alarum usum, quibus tanto facilius sese extra aquas tollere potest, quod gracili corpore sit, & pinnae è contrario, pro corporis modulo, satis longæ. In ventre etiam pinnas prægrandes habet, præter alias, quæ ad caudam vergunt, & respondent iis, quæ in dorso reperiuntur.

20. DE SAGUEERDRINKER. Arbores quædam in Insula Amboina sunt, quæ vocantur *Sagueerbomen*, seu Palmæ Indicæ Vinariæ, *Sagueri* Rumphio dictæ. Eæ peperere nomen huic pisci, qui ex genere milvino est, nec multum abludit à milvo Salviani; forsan idem piscis. Namque subinde aquis relictis evolat in istas arbores, earumque fructus liquore plenos appetit. Deinde, cum satur est, relicta arbore, vicissim aquas petit, sed dispari successu. Sive enim quod alæ exsiccatæ piscem non ferunt, sive quod vertigine quadam corripiatur, fere in terram solet decidere, ubi non magno labore capitur, post aliquod tempus tamen evasurus in aquam. In summo dorso aliquot aculeos habet prælongos, a-

lios magis ad caudam remotos, ac tandem iterum alios in imo ventre versus caudam.

21. *T GEHORENT VLIENGEND VISCHJE.* Tenuissimo corpore est pisciculus, quem hic exhibeo, tenuioribus alis, sed longis. Cornutus dicitur à duobus aculeis, sive cornulis, quæ ab utraque capitis parte prominent. In ipso capite cristulam gerere videtur.

22. *T VLIENGEND VISCHJE.* Et hic tandem pisciculus minutus volantibus annumerandus venit. In exiguo corpore non magnæ sunt vires, neque magnitudine pinnarum branchialium sive alarum, compensatur, quod viribus deest. Ergo nihil aliud quam tollit se paullulum extra aquam dependente fere cauda in eam, ac ipso pisciculo singulis fere momentis decedente.

23, 24. *PEDICULI MARINI,* Insecti genus infestissimum piscibus, ut è Roneteletio observat Gesnerus, & post eum alii magno numero annotarunt. E limo generantur, ac adeo pertinaciter adherent dorso mugilum & piscium saxatillum, ut eos omnino aridos reddant. Nec minor in fugendo est vis & pertinacia quam hirundinum.

TABULA OCTAVA.

I. *DE GEBANDEERDE CITSVISCH.* Lineæ vestes Indicæ à nostratibus, si eæ sint pictæ, vocantur *Cits*. Inde factum est, ut huic pisci quæsitum sit nomen, quo appellatur; nam tam pinnæ quam corpus egregie sunt variegata vividis coloribus. Pinna dorsualis, aculeo coherens, quæ in principio tenuis at percae instar ad caudam sese expandit, nigri coloris est, maculis albicantibus interspersis lineis transversalibus continuis è corpore; post duos aculeos in imo ventre circuitus pinnæ niger est cum maculis albis. In summo dorso conspicuus est aculeus, qui facit, ut hunc piscem tuto annumerare possis Caprisceis, aut Ican Svangi, qui sunt propositi Tab. I. Idque eo magis, quod in imo ventre duos alios habeat aculeos, & tertium non procul ab ore sub squammis.

2. *DE BANDERA.* Piscis est latus, & mensæ inter fercula delicatiora inponitur. Color in toto corpore est unus, præterquam quod in ipso capite notetur fascia lata candidi coloris. Pinnæ ab utraque parte tenues sunt, & absque ullis aculeis ad caudam usque continuatæ, sed eæ sumunt tantum initium à medio pisce, cujus pars anterior omnino pinnis caret.

3. *DE BANDERA,* cui & *Capitonis*, à magno capite, est nomen. Vix convenit in aliqua re cum pisce cognomine, unde patet quam interdum nullas rationes habuerunt nostri ad imponendum nomen aliquod piscibus ignotis. Capite est magno, dorso aculeato, ventre prominente, corpore rotundo & versicolore. Quid, quæso, eorum est in priori pisce? Et tamen cognomines sunt; quod probe notandum, ne quis in simili differentia piscium decipiatur nominis similitudine.

4. *DE BANDERA,* cui à rostro acuto *Nafonis* cognomen adhæsit, corpore est cœrulei coloris, à capite ad caudam, sed corpus quasi interfecatur fascia latâ flavescente, quæ à dorso ad ventrem procedit. Similis color quibusdam hujus speciei etiam in capite, quâ in os desinit. In dorso horret hæc species crebris aculeis, nec in ventre iis est destitutus.

5. *DE BANDERA.* Etiam hic est lineis latioribus, quasi fasciis vinctus, & ideo nomen & locum inter pisces cognomines invenit. Ore est acuto, dorso ad medium fere nudo, ubi aculeis quinque aut sex armatus est. Ab istis aculeis ad caudam usque pinnæ uno ordine procedunt, tam in ventre quam in dorso.

6. *DE BANDERA.* Percae majoris magnitudine est, sed paulo latior. Totus à capite versus caudam striis, sive lineis latioribus notatur, partim cœruleis, partim flavescens, partim dilute violaceis. Nihil fere aliud in hoc pisce notatu dignum; nam quod incolæ libenter hac piscium specie vescantur, id is commune habet cum aliis quoque hujus speciei piscibus.

7. *DE BANDERA.* Major paulo est isto pisce, qui numero quarto hujus Tabulæ est descriptus; figura corporis etiam non prorsus eadem, sed tamen non valde diversa, nam utrique idem est color, eadem fasciæ, in ventre iidem aculei. In capite major est differentia, quum hic sit obstipio capite, ille rostro acuto; hic ore lato, ille contractiore & angustiore. Reliqua, ut dictum est, satis inter se conveniunt.

8. *DE BLAZER.* Vim, quæ ab hoc pisce adhibetur, ad aquam è fistulis, quas in summo capite habet, projiciendam, ajunt nomen huic reperisse. Namque interdum ex ore magnam aquæ vim projicit. Corpus illi est contractum, venter amplius, & aquæ capax. Ut verbo dicam, orbis est species, quarum esse plures quam quatuor, ut quidam voluerunt, non est quod quisquam dubitet, quum vel in hac Tabula plures prostent. Si ve-

ro ob exiguam differentiam omnes istos pisces ad unam & eandem speciem revoces, vereor, ut minus provide facturus sis.

9. DE BLAZER. Color convenit cum præcedenti, qui subcœruleus est, ut & forma corporis, verum hic habet tres aculeos in dorso, quibus alter ille caret. In lateribus à pinnis usque ad caudam caudidâ lineâ est notatus, verum istæ pinnæ branchiis non sunt adjunctæ. Venter fere totum piscem occupat, atque adeo magnam capitis partem. Respirandi aliam viam non reperies in hujusmodi piscibus quam per foramina, quæ in superiori capite sunt, aut per os ipsum. Unde fit, ut subinde aquam intus acceptam cum magna vi foras projiciant.

10. DE KLEINE BLAZER. Recte, credo, orbem hunc minorem adscribes iis, qui à maculis stellati dicuntur, nam, ut vides, maculæ aliquot in corpore notatæ sunt, sed non radiatæ, quod forsitan est adscribendum negligentia pictoris. Cetera satis bene conveniunt cum orbibus stellatis. Corium utrique durum, ut omnium omnino istius generis piscium, nullas squammas habet neque hic neque ille, sed tantum sex aculeos in dorso, quorum tres priores nullo ligamine inter se cohærent, sed posteriores tres membrana tenui sunt juncti, primo inter se invicem, & deinde cum pinnis dorsualibus, quæ causam versus decurrunt. Sub ventre neque aculei sunt neque pinnæ, nisi ubi corpus jam tenue est prope caudam.

11. DE GELE STREEPKOP. Ratio nominis satis patebit iconem intuentibus. Nam nostrates eo nomine designant piscem, qui in capite lineas sive fascias versicolores ostendit, quales hic cernuntur in icone hujus piscis. Color est ei fuscus, sed lineæ in capite sunt fuscæ. Septem in dorso habet aculeos, & pinnas rotundas post eosdem. Venter ad anum usque est glaber. Post anum duos aculeos habet & pinnas respondentes dorsualibus. Notandum est de hoc pisce, quod raro reperitur, & ob præstantem saponem tantii pretii esse judicetur, ut magnates etiam solant, si forte talis ab eorum servis piscatoribus sit captus, eum aliis dono mittere pro præstanti ac singulari munere.

12. DE BRAASSEM VAN LARYKE, quasi dicas Cyprinus Larycensis (nomen illud est insulæ distantis non procul ab Amboina) non aliam ob causam magis meruit hic depingi, quam ob prægrandes pinnas, quas ab utraque corporis parte ostendit, atque ob colores longe alios,

quam quos videmus in nostris Cyprinis. Est enim ille colore helvo, qui sub ventre abit in albedinem. Per utrumque latus medium à capite ad caudam linea candida ducitur, quæ gratam in illo pisce varietatem colorum præbet, præsertim quum ista linea aliquoties, priusquam ad caudam pervenit, interrumpatur maculis subcœruleis.

13. DE BRAASSEM VAN AMBON, id est *Cyprinus Amboinensis*, aliquanto latiori corpore est quam proxime præcedens, & ni ejusdem esset cum illo saporis, diceret eum pertinere ad pisces istos, quos supra Striatos vocatos vidimus. Verum nihil obstat, quo minis, quod attinet ad formam exterioriorem, ad illos referatur, & tamen Cyprinus sit, sed latus, cum & illi apud Amboinenses reperiantur variis coloribus mirabiliter picti, & ita possint numerari inter pisces striatos, cum tamen proprie Cyprini sint. Huic autem pisci pellis est variata quasi fasciis deductis recto ordine à dorso ad ventrem. Præterea aculeos præfert ab utraque corporis parte, aliquando plures, aliquando vero minores, ut necesse non sit hic eorum numerum designare.

14. DE BRAASSEM VAN AMBON. Quemadmodum eodem gaudet hic piscis nomine, quo superior, ita capite est eadem simillimus. Uterque enim ibi singulari modo ostendit fasciam unam aut alteram. Sed in corpore est satis magna differentia, tam si aculeos illius conferas cum hujus pinnis, quam si corporis maculas intuearis. Namque hic pro lineis latioribus aliquot tantum maculas habet, & colore persimilis est isti Cyprino, qui exhibitus est N^o. 12.

15. DE BRAASSEM VAN AMBON. Hic est adhuc aliquanto latior quam præcedentes pisces cognomines, verumtamen ad idem genus pertinet. Vocatur etiam *Diklip*, quasi *Labeonem* dicas, propterea quod inferior mandibula multo est crassior quam superior. In reliquis sic satis convenit cum aliis istius nominis piscibus, excepto quod caput sit gilvi coloris ac divisum quasi duobus lineis dilute cœruleis. In ventre etiam aliquot maculas habet ad utrumque latus eodem ordine positas.

16. DE BRAASSEM VAN TERNATE. Nactus est hic Cyprinus cognomen ab insula Ternate, prope quam capitur. Si Hepatus, quem Jonstons Tab. XIV. alique alibi exhibent, in latere haberet istiusmodi lineam latam sive striam, qualis in hoc pisce notatur, prorsus Hepatum hunc diceret. Est ergo & ille quidem Hepatus, sed hoc peculiare habet,

quod notatus sit istiusmodi linea coloris ravid, quum dorsum & venter plane sit istius coloris, quem nos videmus in Cyprinis nostris.

17. DE BRAASSEM VAN TERNA-TE. Idem fere dicendum venit de hoc pisce, qui ab eodem loco idem cognomen est fortitus. Verum in hoc singulare est, quod branchiales pinnæ versus superiorem corporis partem ordine fere recto adfurgant, & quod utraque caudæ pars muniatur quasi crassiori quodam & osseo acumine.

18. DE BRAASSEM VAN BANTAM. A loco, ubi frequenter capitur, etiam huic nomen est inditum. Totus horret aculeis in tergo, nec alias pinnas habet quam aculeatas, etiam in ventre. Cauda non tantum est bifida, sed utrique parti adhæret præterea aculeus dentatus, quod magis mirum videretur, si non simile aliquid, aut saltem eo tendens, jam in superiori pisce vidissemus.

19. DE BRAASSEM VAN BORNEO. Tam prope ad nostrorum Cyprinorum formam accedit hic piscis, cui cognomen est impositum ab insula notissima Borneo, ut non dubium sit, quin suo loco sit positus. Nam quod pertinet ad colores, ii speciem piscis non variant, multo minus genus. Illud quoque non indignum observatu videtur, quod hic piscis totus est fusci, seu potius nigricantis coloris, qui etiam in maculis non alius est, nisi quod maculæ paulo obscuriores videantur quam reliquum corpus. Adde, quod & hic & plerique alii, qui eodem gaudent nomine, soleant quidem inferri mensis, sed assii; nam alioqui eorum caro nimis est humida & quasi diffluit, quæ res mihi videtur adscribenda calidiorum regionum naturæ, in quibus pisces raro tam pingues inveniuntur quam in regionibus frigidis.

TABULA NONA.

I. **D**E GROTE MOORVISCH. Egregius sane est piscis, & singularis utilitatis, quum satis magno sit corpore & carne non minus bona. Color fere niger est, unde illi nomen Mauri adhæsit, sed nigredo ista est variegata tenuissimis & confusis lineis, quales fere notantur in lapide porphyretico. Caput candens fascia ambit, quam ad utrumque latus, ubi branchiæ desinunt, excipit fascia sive linea latior ejusdem coloris. Simili colore quoque maculæ dorsuales gaudent. Pinnae in cauda fere nullas habet, licet binas pinnae dorsum præferat, ac in ventre, non pro-

cul à cauda aliæ non parvæ conspiciantur.


2. DE TURKSCH VISCH. Rationem nominis meus homo non addidit, verum patet id nomen huic pisci impositum esse propter tres candidas lunulas crescentes, quas in latere depictas vides. Verum illud meus autoptes adseverabat, quod nulli piscium generi, quod quidem apud nos notum est, hic piscis possit annumerari, quoniam duplo quidem major sit Carpione, quem refert, sed tamen nihil aliud commune habeat cum isto pisce. Pinnæ nullis aculeis horrent, præterquam duobus, qui in summo dorso exstant. In maculis majoribus aut minoribus, quæ in hoc pisce cernuntur, describendis, non immorabor, quum, tribus istis lunulis exceptis, in singulis istius generis piscibus fere soleant variare.


3. DE MAANVISCH. Singularis raritatis est hic, quem hoc loco exhibeo, piscis, & quidem tam raro capitur, ut in insula Amboinæ unus diu fuerit adservatus, ad eum peregrè advenientibus ostendendum tanquam rem singularem. Scilicet cum luna est plena, crassus est piscis & fere rotundus ac firmæ carnis; cum vero luna decrescit etiam sensim atque sensim ejus corpus extenuatur, ita ut luna silente totus flaccescat, & nulli rei sit idoneus. Videtur esse species Caprisci, quod patet è prælongo aculeo uno & altero, quos è summo corpore vides prominentes. Dorsum est dilute cœruleum, venter flavus, & maculæ, quæ in ventre cernuntur, albicant.


4. DE GELE SIAANSVISCH. Confer hunc piscem cum alio ejusdem nominis, qui conspicitur Tab. III. N°. 2. Omnis differentia est in coloribus, qui raro iidem reperiuntur, etiam in ejusdem plane speciei piscibus. Ore hic videtur edentulo, saltem nullos dentes in hiante ore exhibuit pictor, sed linguam crassiusculam. In dorso subcœruleus est hic piscis, sed venter est plane flavus, unde nomen quæsitum.

5. & 6. DE SERBANDERS, quos etiam vocant, *Kusservisschen*, quia pelvium instar quadrati sunt. Pertinent ad Platychtuas, & facile eorum forma sufficeret ad eosalicui generi annumerandos, si è forma eorum hujusmodi pisces ordinarentur. Colores plerumque iis nomen quærent. Hi vero quasi fasciis versicoloribus involuti sunt, tam directe à dorso descendentibus, quam decussatim se invicem secantibus. Qui prior ponitur est masculus, posterior femella.

7. I CAN KAPELLE. Hic piscis descriptus







scriptus extat apud varios, alio atque alio nomine. Johnstonus exhibuit Tab. XXXVII. & descripsit p. 141. sub nomine *Abacatuia*, quo nomine haud cum hoc convenientem piscem descripsit Rayus in Synop. p. 99. qui negat pisci ita dicto aculeatas pinnas esse. Hic vero, ut vides, habet aculeos aliquot grandiores & pinnas, quos Johnstonus dicit esse quinque. Squammas nullas hic piscis habet, sed cutis illi est glabra, argentei coloris, & splendens. Cauda pro corporis magnitudine satis longa & bifurcata, nam piscis ipse quatuor aut quinque pollicibus non est major.

8. *T ZEEKATJE*. Exiguus est pisciculus ac satis notus, qua propter ulteriori ejus descriptione superfedebat. Piscis quadratus est ab utraque parte cornutus minor, ac quatuor aculeos habet, quorum duo è capite prominent, duo sub ventre non procul à cauda enascuntur & caudam versus reflexi sunt. Diceres fere ex icone squammosum esse hunc pisciculum, sed non est; verum tota cutis dura est ac exiguis maculis distincta, non aliter ac videre est in aliis piscibus Orientalibus.

9. *DE NONNEVISCH*, quem *Monialem* vocare licet. Ratio nominis non apparet. Nomen ipsum tamen satis notum. Capitur prope Hilam. Color est ei dilute cœruleus. A tergo summo usque ad mandibulam inferiorem decurrit linea lata, sive fascia, quæ rubet. Venter varie maculosus est. Ab utraque corporis parte pinnas habet non aculeatas. Esui quidem non ineptus est, si prius aperiatur & ad solem siccetur, aut salitus in usum conservetur.

10. *DE NONNEVISCH*. Ut nomen, ita pleraque communia habet cum pisce præcedente; verum, qui illi desunt aculei, huic sunt octo, sex in dorso, ac duo in ventre. Præterea color flavedinem aliquam præfert. Tres maculæ candentes sunt in eo conspicuæ, quibus totidem aliæ ab altera corporis parte respondent. Habet etiam pinnas sub branchiis, quæ desunt priori.

11. *DE NONNEVISCH*. Si conferas hujus piscis iconem cum proxime præcedenti nullam differentiam reperies. In colore est tamen permagna. Ille enim flavus est, hic fuscus, sed nescio quid cœruleum pellucet. Caput etiam quodammodo rubet, excepta linea, quæ per caput ducitur, & aliis atque aliis coloribus ornatur.

12. *DE MUURVISCH*, id est *Piscis muralis*. In ventre aliquot maculæ apparent in acumen desinentes alternis, alter-

nis vero in superiori parte rectæ, unde videtur aliquam speciem pinnarum muralium præferre, ac inde illi nomen. Corpore est longo sed compresso, non lato. In dorso medio pinnas habent aliquamdiu continuatas, sed tamen non ad caudam perductas. In imo ventre nullæ cernuntur pinnae, præter eas quæ à branchis dependent.

13. *DE DUBBELDE MUURVISCH*, sive *Muralis duplex*. Hic non tantum in ventre maculas superiori similes habet, verum etiam in dorso ventralibus ad amussim respondentes. Nominis igitur ratio patet ex eo quod modo diximus. Reliqua omnia huic pisci sunt communia cum præcedenti, excepto quod hic una pinna ditior sit, in ventre scilicet.

14. *DE CAFFERVISCH*, tantundem est, puto, ac si diceres piscem Africanum. Ore est incurvo nec lato, corpus satis latum est, verum non valde crassum. Color dicitur fuscus esse, aut in tergo etiam nigricans. Sub ventre duo exstant pinnae, una in tergo; verum neque in illis ulli notantur aculei. Maculæ non sunt valde vividæ, quia non multum colore differunt à reliquo corporis colore.

15. *DE CAFFERVISCH*. Nil aliud differt à superiore, quam quod is maculosus sit, hic vero omnino maculis careat; nempe in corpore, nam capiti ejus etiam suæ sunt maculæ: præsertim latior linea, quæ per oculos caput ambit, & ita illud videri possit dividere in os & caput proprie dictum.

16. *DE GESTREEPTE CAFFER*. Cognomen, ut alii permulti, nactus est Afer hic à lineis, quæ corpus ejus ornant. Scilicet color corporis est quodammodo violaceus, verum quatuor aut quinque lineæ à capite ad caudam ductæ multo sunt vividioris coloris, quod gratum præbet adspectum. In dorso sex aculeos habet, in ventre nullos, at pinnae tam dorsales quam ventrales accuratè inter se conveniunt. Ubi incipiunt sunt longiores, sed statim post decrescunt, ac tandem omnino desinunt paulo ante caudam.

17. *DE NYPTANGVISCH*, sive *Forcipinus*, à rostro productiore, duro, & reflexo ita videtur dictus. Est enim oris extremitas prædura huic pisci, ac morsus vehemens, quasi quem forcipe apprehendat. Pisciculus tamen non ubique reperitur, sed tantum prope insulam minorem, cui nostrates à Leonibus nomen dedere, & quæ non procul distat ab Amboina. Caudam non habet è pinnis constantem sed è carne, quod singulare ac dignum observatu.

18, & 19. ONBEKENDE VISCHEN, id est *Pisces Anonymi*; verum licet quidam Anonymi etiam apud editos Ichthyographos occurrant, nihil tamen iis est commune cum alterutro horum duorum piscium, quos exhibemus. Ceterum vel imperito oculo intuenti apparet istos pisces esse ejusdem generis ac prope ejusdem speciei. Prope, inquam, nam in maculis quædam est varietas, quæ possit videri sat magna esse ad constituendam aliam ejusdem generis speciem.

20. DE ONBEKENDE VISCH. Hic æque est Anonymus, neque licet mihi ob defectum descriptionis hoc loco illi dare nomen, quia facilis esset in conjiciendo lapsus. Verum forma hujus piscis ostendit utcumque illum esse ex non ignoto genere piscium, etiamsi pictor noster adseverabat se nomen hujus nescire, non aliam ob causam, quam quia piscis iste carebat revera nomine. In colore vix quidquam peregrinum, sed singula ubique obvia.

21. DE ONBEKENDE VISCH. Majori utique jure hunc piscem Anonymum dictum reor, & ipse autoptes confirmabat conjecturam meam, quum ille advehatur interdum ex ora Seramentis. Omnis illi ornatus in capite, quod supra lineis est variegatum, infra vero maculis quamplurimis minutis signatur. Rarissime perures illius speciei pisces unà reperiunt, nec si reperiās capere velis, quoniam nulli rei sunt utiles, sed solum adservantur capitis causa.

22. DE ONBEKENDE VISCH. Quidquid in hoc pisce est dignum observatu, id totum pertinet ad caput; namque ab oculo quaquaversum lineæ coloris subcœrulei ducuntur, quæ ab utraque parte in medio capitis conveniunt, atque ibi angulos varios constituunt. Præter aculeos ac pinnas dorsuales habet aculeum paulo post branchias supra pinnas branchiales.

23. DE ONBEKENDE VISCH. Rarus est admodum hic piscis, qui nusquam reperitur præterquam in ea Amboinæ parte, quæ de *Kaimans Hoek* vocatur. Caudam gestat latissimam, aculeos aliquot in corpore summo ostendit. Ipsum corpus tenue, caput magnum est. Lyra videtur species.

TABULA DECIMA.

1. **D**E STOMPNEUS, quasi *Simum* dicas. Magno est corpore & lato. Dorsum aliquot aculeos præfert inter se junctos, sed circa caudam pinnis non adhærentes. Pinnæ ab utraque cor-

poris parte sunt rotundæ in extremitate, atque iis quasi tenuiores adhuc pinnæ prætexuntur. Ad solem solent incolæ hujus piscis carnes exsiccare, ac deinde in usum adservare; nam recens captus hic piscis nihil valet.

2. DE STOMPNEUS. Satis convenit cum pisce proxime præcedente, sed multo minor est, quapropter Amboinenses eum aliquo tempore ad fumum exponunt, ac deinde assatum comedunt, quemadmodum nos haleces infumatas solemus. Ratio nominis satis patet intuenti iconem, quum rostro sit obstipito, quod nomine vernaculo significatur.

3. DE STOMPNEUS. Minutus est hic pisciculus, cui capitis figura idem nomen imposuit cum superioribus. Caput subviolaceum est, corpus flavescit, verum isti flavedini admixtum est nescio quid venarum rubescendum, quæ quasi oberrant per totum corpusculum. Venter dilute cœruleus est.

4. DE STOMPKOP. Caput huic pisci est prope rotundum & valde crassum, ore ad inferiorem partem recedente. In dorso, ut vides, eminet aculeus unicus, qualis, sed aliquanto minor, etiam sub ventre conspicitur. Color ei est viridis citrino mixtus, non certis maculis, verum confusis & inter sese confluentibus. Si forte sub summa aqua natantem conspicias hunc piscem, totus fere videtur obsitus laminis aureis & argenteis, unde jucundissimum spectaculum præbet. Idem apud alios observatur de *Dorado*.

5. DE STOMPKOP. Eadem figura capitis eandem nominis rationem peperit, licet hic piscis reliquo corpore satis differat à priori. Longior enim huic est pinnarum series, aculeus aut exiguus aut nullus. Latus est maculosum variis lineis distinctum, verus corporis color est fuscus sive gilvus, qui circa ventrem ad albedinem vergit.

6. DE HERTVISCH. Si quis dicat hunc sibi piscem videri non recte delineatum, nã ille me sibi adsentientem habebit. Nihil certum igitur possum de eo affirmare. Si vera est icon in pinnis supra caudam reperiens semper figuram cordis humani, à quo illi nomen inditum.

7. 'T ZEEBOTJE, & nomen & piscis figura convenit cum eo, quem nobis eodem nomine dedit Willoughbæus, quem vide. Natatu hic piscis est celerissimus, quod videtur adscribendum pinnis non solum longioribus sed etiam validioribus, quam vulgo solent in piscibus latis reperiri. Pinnæ duæ priores, quæ dependent à ventre, sunt adeo duræ, ut rectè

recte eas possis dicere osseas. His dexterime utitur in natatu dirigendo, cursum sistendo, aut etiam nocendo aliis piscibus. Nam potest eas antrorsum, retrorsum, & ad latera, cum libet, flectere, & ita natatum suum dirigere aut sistere.

8. & 9. DE HARTEVISCHEN. Duo, qui hoc loco exhibentur pisces, nomen habent à cervis, quia, ut ajunt, eorum corpus est conspersum ramulis duris, qui cornua cervina æmulantur. Esui non sunt quidem inepti, verum pellis illis ante omnia est detrahenda, ac ossa ista durities, quæ in cute reperitur, rejicienda. Color utrique est gilvus, & quidem totius corporis. Aculeos uterque in dorso non habet, alter duos in ventre alter tres. Reliqua undiquaque conveniunt.

10. DE TERNATENSCHÉ BAARS. Hic piscis & aliquot sequentes, licet percarum nomina gerant, non tamen satis plerique conveniunt cum genere percarum, quod apud nos est notum. Verum ita est statuendum: in aliis piscibus corporis similitudo occasionem dedit denominationi, in aliis saporis. Recte igitur hic piscis annumeratur percis, utpote cujus caro plane convenit cum aliis percis. Corpus in medio cingitur linea latiore sive fascia. In dorso sunt aliquot aculei, in ventre unicus. Ab utraque parte versus caudam pinnæ longiores eminent.

11. DE GROTE RODE BAARS. Hoc illi nomen inhæsit à colore & magnitudine; nam quamvis diversæ magnitudinis soleant perca cum primis esse, hæc species tamen plerumque reperitur major, quam aliæ quæcunque. Corpus rubet, ac flavescitibus paululum lineis latoribus à tergo ad ventrem distinguitur. Pinnæ sunt flavæ, atque aculeis distinctæ. Plane similem in Museo meo habeo piscem, quem hic effigendum curavi, N. 24. ut diligens rerum hujusmodi studiosus videat sibi à nostro pictore non imponi. Nomen autem isti meo pisci datum fuit *Ican Sisor*, quod quam bene conveniat cum aliis piscium nominibus Belgicis, fateor me nescire.

12. DE RODE BAARS. A colore rubro nomen perca rubra huic pisci est inditum. Namque toto corpore rubet, præterquam capite, quod colore propius ad flavedinem accedit, ut & pinnæ. Eiusdem coloris est linea, quæ corpus in utroque latere dividit, & à branchiis procedit ad caudam usque. Capitur tantum prope Amboinam, & quidem circa castellum Nasselavia, quod in ora insulæ extrema jacet. Talia castella XXI. reperiuntur in tota insula.

13. DE AMBONESCHÉ BAARS.

Neque forma corporis, neque color multum abluunt à præcedentibus piscibus eodem nomine dictis. In ore tantum quædam conspicitur differentia, & in branchiis, quæ hic illic notantur lineis subcœruleis, qualis etiam conspicitur sub ventre. Linea, quæ in latere procedit à branchiis ad caudam albicat.

14. DE AMBONESCHÉ BAARS. Forma totius corporis in hoc pisce quidem satis respondet aliis cognominibus, sed colore & lineis lateralibus aliquantum differt. In dorso octo aculeos habet, uno ordine positos ac junctos membrula inter se, ac tandem cum pinnis. Sub ventre totidem præfert aculeos, quatuor versus caudam ac totidem in medio ventre, sed nullo ligamine junctos. Lineæ laterales sunt, dilute cœruleæ, verum corpus flavescit.

15. DE AMBONESCHÉ BLEI. Trutta est Amboinensis, quæ in corpore aliquantum est cœrulea, at maculas habet subnigras. Pinnarum color est dilute violaceus, ut apud nos etiam in quibusdam piscibus videre est. In capite ab oculis versus mandibulam inferiorem linea ducitur, cui aculei aliquot exigui sunt impositi, quod videtur non indignum observatu.

16. DE ZEEBAARSCH. Forma & color satis convenit cum piscibus aliis, qui idem nomen sunt nati, sed in colore capitis quædam est differentia, quum passim caput sit distinctum maculis flavescitibus & lineis cœruleis. In dorso multis aculeis gaudet, in ventre unico circa anum. Maculæ nigricantes reperiuntur in pinnis.

17. DE RIVIER BAARSCH. Ut superior species perca denominatur à mari, in quo capitur, ita etiam hæc perca nomen est sortita à fluminibus, in quibus solet capi. Corpore est viridi, sed pinnis rubris. Caput quodammodo flavum est, verum non absque rubedine. Aculei in dorso primum inter se deinde cum pinnis junguntur.

18. DE KLIPBAARS. Minutulus est hic piscis, & ex eorum genere, qui inter rupes & scopulos natantes inde sibi nomen peperere, ut jam supra vidimus. Corpus huic pisciculus est varie maculosum, neque semper eodem colore. Hic, quem exhibeo pisciculus, erat colore helvo, maculis fuscis, quod in aliis aliter sese habet. Sub ventre sex aculei prostant; sed dorsum iis quasi oppletum est à capite ad caudam.

19. DE STEKELBAARS. Aliquanto latiore est corpore, quam videmus aut in nostris percis aut in piscibus co-

gnominibus, qui in hac Tabula exhibentur. Verum, ut jam supra observavi, habuerunt forsan Amboinenses alias rationes, quibus adducti sunt, ad nomen istud huic pisciculo dandum. Ad quam rem aculei, tam è ventre quam tergo prostantes, potuerunt dedisse causam.

20, 21, 22, & 23. AMBONESCHE BLEIEN, id est *Alburni Amboinenses*. Hos omnes junctim damus, quum iidem sint pisces, & eorum omnis differentia versetur in colore, striis, maculis, aculeis, & pinnis. Primus enim est russi coloris cum maculis argenteis, secundus cœrulei (obscuri quidem in tergo, at lætioris in lateribus) tertius ejusdem coloris, sed interstinctus est maculis colore flavescente conspicuis, ultimus autem est plane violaceo colore, sed argenteis maculis, ac præterea in capite præfert lineam latam & versicolorem, quæ per oculos transit ac caput totum cingit.

24. Vide quæ notavi ad hujus Tab. Num. 11.

TABULA UNDECIMA.

1. **D**E SNIPVISCH. Si totum hujus piscis corpus adspicias, quod eximie est viride, diceres formam ejusmodi esse, ut postulare etiam caput crassum, & obtusum; interim ex ipsa icone vides rostrum ei esse prælongum, ac dentatum, sed tamen non usque ad finem, quæ capiti jungitur, apertum, unde rictus non valde magnus esse potest. Sex aut septem aculeos habet in dorso, in ventre nullos. Pinnæ sunt citrini coloris, ut & cauda, cui tamen adhuc limbus quasi accedit alterius coloris, plerumque cœrulei.

2. **D**E SALMONETVISCH. In hoc pisce describendo nulla prorsus est difficultas, quum ab aliis jam diu descriptus existeret. Salmoneta Lusitanorum est, qui ab aliis confunditur cum Alpheste & Cinnædo. Color varjat, ut Bellonius inquit, sed tamen plerumque est rutuli, aut fulvi coloris, qualis etiam exhibetur in delineatione, è qua hæc icon est transumpta. Vide Gesnerum in Corollario de Alpheste, Rondel. Lib. VI. c. 4. & alios Ichthyographos passim.

3. **D**E SALMONETVISCH. Licet hic piscis paulum differat forma à superiore, ejusdem tamen nominis est, & sic satis convenit cum descriptione, quæ apud alios, ut modo dixi, reperitur. Dentes habet acutissimos, caninis similes, ac os prælargum, ut fere majorum canum. Color est etiam rufus, sed paulo intensior, quam in præcedenti pisce.


In lateribus notatur linea candida procedens à branchiis ad caudam usque. In dorso vides quinque aculeos membranula tenui inter se connexos, post quos sequuntur pinnæ ad caudam usque continuatæ, quibus aliæ in ima parte à cauda ad anum usque respondent. Anterior corporis pars pinnis caret.

4. **D**E KONING VAN DE KABOSSEN, patrio Indorum sermone dicitur *Kabos Lauwd*. Egregie variis coloribus notatus est, quum corpus sit flavum, hinc inde maculis rubris à dorso & ventre ad medium latus procedentibus, sed tamen sese non contingentibus in medio. Caput, quod satis crassum est, armatum vides dentibus acutissimis. In eo præsertim regnat idem color, quem dixi esse macularum in corpore conspicuarum, verum præterea dilite cœruleus color hic illic in capite conspicitur. Reliqua, quæ huc pertinent, vide N^o. ultimo hujus Tabulæ.


5. **KABOS VISCH**. Hic piscis eodem gaudet nomine, sed corporis color multum differt à præcedenti. Nam neque maculis est insignis, neque flavus, sed cœruleus, ac in tergo quodammodo nigricat. Referebat meus homo hujusmodi pisces frequentius capi, quam superiores, verum non semper esse eodem colore. Hic, quem exhibeo, illud singulare habebat, quod caput passim esset notatum coloribus vividis, cœruleo, flavo, rubro, ac maculis candidis. Propterea dignus fuit visus, qui delinearetur, quum illud raro in hac specie soleat accidere.


6. **D**E RIVIER CABOS. Ejusdem est & hic generis, nisi quod piscis fluviatilis est, & non capitur, præterquam in aqua dulci, quum præcedentes fere in salsa reperiantur. Quatuor in dorso habet aculeos inter se membranulâ junctos; quibus succedunt pinnæ ad caudam fere usque. Pinnæ branchiales sunt satis magnæ. In imo ventre infra branchias etiam pinnæ longæ conspiciuntur, ac denique ab ano caudam versus aliæ pinnæ decurrunt. Earum color est viridis, corporis cœruleus; verum linea, quæ latus percurrit, candentibus maculis est notata.

7. **D**E GELE KABOS. Dentes huic pisci sunt tam acuti quam Luciorum, quibus obvia quæque facile frangunt ac lacerant. Intra oculos fere macula rubra reperitur. Reliquum caput helvi coloris, corpus subflavum est, unde etiam nomen isti est inditum. Rarum est hoc piscis genus, & magni propterea pretii. Nam à delicatioribus hominibus magno studio









studio quæritur propter singularem saporē. Æque valet coctus ac assus, neque cuiquam Orientalium piscium cedit, si species raritatem & præstantiam.

8. DE CHINEESCHE KABOS. Longius abit hic piscis à forma aliorum cognominum, namque ventre est largo ac prominente, quod in aliis non ita se habet. Corpore est etiā contractiore ac latiore. Corporis solum color est idem, qui in præcedente, sed præterea tribus quasi latioribus fasciis est vinctus, quæ à tergo ad ventrem procedunt atque coloris cœrulei sunt. Dorsum horret sex aut septem aculeis, quos pinnae excipiunt, quales etiam reperiuntur in imo ventre, ac sub branchiis. Chineses hunc piscem in deliciis habent, ac solent magno eos mercari, si quando in forum piscatorium inferantur.

9. DE BORROWESCHE KAPER, sive *Carpio Borrowensis*, in quo nihil fere singulare aut notatu dignum occurrit, nisi forte quod dorsum sit colore cœruleo, venter gilvus. Nec opus est, ut addam hunc illud cum piscibus ejusdem nominis commune habere, quod egregii sit saporis ac carne firma, namque affinitas earum rerum cum aliis carpionibus fecit, ut illud huic nomen imponeretur, licet figura nonnihil differat.

10. DE RIVIER OF BERGKAPER. Nihil etiam in hoc pisce singulare aut eximium. Omnia habet communia cum nostris carpionibus, ac proinde facile ulteriori descriptione supersedere mihi licet, quum vel apud plebem hoc piscium genus sit notissimum.

11. I CAN LAYER, quem nostrates de *Zeikvisch* vocant, Brasilienses *Guebucu*, ut observat Markg. Hist. Bras. Lib. I. c. 15. cujus descriptio optime convenit cum hac nostra icone. Dicit enim Markgravius piscem istum esse oblongo & ferme tereti corpore, capite porcino, rostro longo, acuto, osseo, duro, quod quam bene conveniat cum nostra icone, potes facile cernere, simulac oculos in eam conjeceris.

12. I CAN LAYER. Quem hic exhibitum vides piscem, ego addendum curavi è Museo meo, ut justus rerum æstimator videat, quæ sit differentia inter hunc meum & alterum istum à meo homine descriptum. Namque, licet non negem fieri posse, ut præcedens piscis sit quidem ejusdem generis sed non plane ejusdem speciei, notabilis differentia cernitur inter utramque iconem. De hac autem pro certo adfirmare possum piscem prorsus ita se habere, ut hic exhibetur. Corpus est longiusculum & subnigrum,

nec pinnarum aut macularum lateralium alius est color, nisi quod maculae sint aliquanto nigriores, quam reliquum corpus, pinnae autem nigerrimæ. Rostrum est prædurum, acutum, ejusque superior pars dimidio longior est quam inferior. Pinnae in dorso sunt maximæ, in ventre non quidem tantæ, sed tamen satis magnæ, præsertim quæ infra caput à ventre dependent. Natatu est celerrimus, naturā pugnacissimus. In eo describendo singularem curam dicit se adhibuisse Guil. Piso, quem vide Lib. III. p. 56. & adde Willoughb. Tab. I. 27. & Apend. 5.

13. DE BONTE CAFFER. Hoc nomine aliquot pisces vidimus Tab. IX. quibus & hunc possis addere, ob eximiam colorum varietatem. Scilicet corpus ipsum est subviride, excepto quod linea candida à branchiis procedat, atque ad caudam usque procurrat. Caput notatum est coloribus variis, qui interdum in hac specie alii atque alii sunt. Dorsum totum horret aculeis longioribus ac membranula inter se junctis. In ventre sex similes reperiuntur. Nullæ præterea pinnae, si branchiales excipias, & illas quæ ab imo ventre prope caput dependent. Adde quod in corpore quidem reperiuntur maculae quædam, verum eæ sunt non alterius coloris quam corporis, id est viridis, sed paulo intensioris.

14. T SERGEANTJE. Ita dicitur, quia nunquam fere solus capitur, sed cum aliquot piscibus, qui eum sequuntur, ac quibus sese veluti ducem præbet viæ. Corpore est fere rotundo ac striato, ejusque color est plerumque flavus in medio, verum ad caput & caudam vergit ad cœruleum. In tergo, præter tres aculeos ostendat cuspidem longiorem ac projectam ad caudam. Ceterum à ventre non habet aculeos, sed pinnas, quales etiam cernuntur in tergo post cuspidem longius prominentem. In superioribus Tabulis jam aliquot pisciculi sunt positi, qui quodammodo cum hoc conveniunt.

15. DE GOWELVISCH. Singularem Orientalium insularum incolis utilitatem præstat pisciculus hic, quem exhibeo. Namque carne est satis bona, & fere ubique prope littora reperitur in magna multitudine. Harengum fere ajunt æquare magnitudine. Cutis ei est dura, quæ tempestive, id est cum piscis adhuc vivit, detrahitur. Deinde in cibum adsumitur. Exterior corporis color flavet, sed venæ, quales in marmore cernuntur, totum corpus pererrant. Eæ sunt rufi coloris, quo etiam caput est notatum. Aculei huic nulli sunt, sed pinnae ab utraque corporis parte longiusculæ.

16. *T VISCHJE PAMPUS*. Et hunc pisciculum magni faciunt Amboinenses non solum, sed fere omnes qui Orientalem Indiam habitant, ob singularem, quam præbet, usum. Nempe facile ad solem expositus exsiccatur, ac tum diutissime incorruptus perdurare potest. Si uti eo velis aquâ tantum est macerandus, & tum satis bonus est. Eam ob causam naves, in longe distitas regiones abiturae etiam magnam multitudinem talium piscium siccatorum secum avehant, tanquam certissimum contra penuriam cibi remedium. Navales focii in jentaculo aut merenda plerunque eo utuntur crudo, quemadmodum alibi vulgus aliis piscibus. Corpus huic pisciculus est latum ac subviride, sed colore variegato, nec semper certo. In dorso quinque aculei ad caput obversi cernuntur, post quos vides cuspidem unam longiorem, tam in ventre quam in tergo, quibus adhærent pinnae, ad caudam usque continuatae ac uniformes.

17. *CABOS LAUWD*. Eximius hic piscis, ad illustrationem piscis superius exhibitum, præter alios è Musco meo huc accessit, & dignissimus est, qui describatur, tam ob præstantes colores, qui passim in eo cernuntur, quam quod certus sim delineatum eum esse accuratissime. A summo ore nigricat, ut & superiori corporis parte; verum subinde dorsum est distinctum aut conspersum maculis candidis, quas fere argenteas possis dicere. Ab imo ventre ad latus medium lineæ ducuntur latiores & fuscæ, quæ in maculas rotundas desinunt, nec tamen pertingunt ad superiores sive dorsuales maculas. Ambitus oculorum aliquantum rubet, licet reliquum caput aliquam viriditatis speciem præbeat. Pinnae branchiales gilvi sunt coloris. Aculei, tam dorsuales quam ventrales, juncti sunt tenui membranula candente, ac exiguis maculis nigris notata. Cauda tandem est etiam quodammodo nigricans, sed in superiori parte, quâ adhæret corpusculo, est macula nigerima, in qua cernitur quasi lunula candidissima. Quæ omnia sane adspectu sunt jucundissima.

TABULA DUODECIMA.

I. **D**E GROTE BYTER. Jam Tab. V. similem noster exhibuerat piscem & nomine & corpore, atque poterat hunc omisisse, nisi illi dignus visus fuisset, qui exhiberetur, quia hic nullis neque maculis neque lineis notatus est. Reliqua, quæ de eo dicendo erant, jam dixi Tabulâ indicata N°. 3. Addiderat &

tertium, sed ego tantum N°. 2. caput exhibendum curavi, propterea quod corpus omnino cum hoc conveniebat, atque ipsius capitis exigua quædam esset differentia.

3. *DE BYTER*. Dubium non est, quin & huic sit illud nomen inditum à mordacitate. Ore est prælargo, ac dentibus magnis & acutissimis. Corpus nullis maculis neque lineis est variegatum, sed uno eodemque colore, qui dilute cœruleus est, æquabiliter ubique insignitum. In dorso aliquot aculeos, ac postea pinnas habet, quibus in ventre ad anum usque caret, verum ab ano usque ad caudam pinnae cernuntur. Haud difficile esset hunc piscem revocare ad genus aliquod è piscibus apud nos cognitis. Ab asello molli non multum figurâ distat, quem etiam æquat magnitudine. Indi haud illibenter eo pisce vescuntur, at nostrates eum, ut viliorē, rejiciunt.

4. *DE BYTER*. Et in hoc pisce eadem est nominis ratio atque causa. Figurâ corporis non multum abit à piscibus cognominibus, sed longissime colore. Namque licet potior pars corporis sit cœrulea, maculae tamen rubentes & flavescētes, & quidem grandiusculæ, in capite, lateribus & versus caudam reperiuntur. Reperitur nusquam frequentius, quam prope Amboinam, ubi incolæ isto pisce non illibenter vescuntur, præsertim cocto, & cum jusculo acetario apposito.

5. *DE GROENE BEER*. A voracitate, credo, ac rapacitate illud nomen huic pisci est repertum; qui ideo cognomine, *de Groene* vocatur, quia corpus quodammodo viride est. Capitis pars anterior rubet. Aculei in dorso sunt longiusculi & satis magno numero. Nec quidquam præterea in isto dignum est observatu.

6. *DE GROTE BEER*. Quid causæ fuerit, quare hoc nomen huic pisci sit impositum, ne conjectura quidem assequi possum. Illud scio, Guapervæ esse speciem, quam maximam vocat Willoughbæjus, atque exhibet Tab. I, 23. Vide etiam quæ dicat idem Auctor Lib. III. c. 3. ubi reperies quædam, ad colorem quod attinet, huc pertinentia, quum color in hoc pisce, quem exhibeo, sit fuscus & alicubi nigricans. Ceterum, in ipso capite non tantum habet aculeum sive cuspidem longiorem & rigentem, sed etiam plures istiusmodi intra oculos & superiorem oris partem, sed multo minores. A ventre quoque similis aculeus, durus & osseus plane, propendet. Capitur circa insulam Borneo. Cutis est prædura ac de-

tra-

trahenda. Caro reperitur firma ac bona, sapore nonnihil ad carnem vitulinam accedente.

7. DE BEERIN. Nisi ratio autopten nostrum fugit, hic piscis est femella superioris. Ut dicam, quod res est, illud mihi non valde simile vero videtur. Nec tamen nunc libet diutius immorari in describendo pisce hoc ignoto, aut in inquirendo ad quod potissimum genus piscium sit referendus.

8. & 9. DE TYGERVISCHEN. Horum piscium corpora lineis æqualibus à capite ad caudam procedentibus notata fecere, ut iis à Tigride nomen quæretur. Nulla notabilis inter utrumque differentia est, nisi in colore & pinnis ventralibus. Prior est colore gilvo, lineis nigricantibus. Posterioris corpus subcœruleum est, verum lineæ itidem nigricant. Cauda utrique est viridis, qui color conspicitur etiam in pinnis. Verum tam cauda quam pinnæ sunt notatæ magna multitudine macularum fulvarum, quod certe jucundissimum est adspectu. Dicitur esse species aselli, quem quodammodo etiam sapore refert.

10. DE ZUIGER. Vides huic pisci esse os admodum exiguum, quale fere est iis, qui sugendo, unde nomen illis impositum, cibum quærunt. Color est fuscus aut subniger, nullis maculis interruptus, nisi quod prope caudam sit macula cœrulea. Ab utraque parte corporis reperiuntur pinnæ satis latæ ac densæ, quod etiam de cauda est observandum.

11. DE ZUIGER. Aliud plane pisciculi genus est quam præcedens, atque omnino ab illo diversus, licet in hoc quoque nominis ratio constet. Ore enim caret, sed pro eo habet proboscidem, qualem fere videmus esse muscis & aliis id genus insectis, quæ sugendo quærunt victum. Eà iste piscis quoque utitur simili modo. Adnatat obviis quibuscunque, atque è singulis attrahit, quod in iis est succi. Dum ita omnia scrutatur prope fundum natat, ut res ibi delitescentes facilius possit appetere. Nihil tamen attrahit, quod ei possit nocere, aut hominibus, qui eo solent vesci. Propterea in deliciis habetur, atque ab Amboinensibus magni fit.

12. & 13. DE ZAALVISCHEN, sive *Ephippiati*, ita dicti, quod eorum dorsum in ephippium adsurgat, veluti præbiturus commodum fessoribus locum. Rostrum habent Psittacinum. In istis porro illud admodum singulare est, quod sint cataphracti post anum atque corio durissimo armati. Id sub ventre desinit in

tenuissima lamina, ac eis est pro aculeis & pinnis. Eà obvios pisces lacerant, quum non solum sit valde tenuis, sed etiam adeo dura ac acuta, ut aliorum piscium pellem possit facile discindere, veluti si cultri essent acutissimi. Porro figurâ prorsus inter se similes, colore non item, in quo aliqua observatur differentia, etiam si ea non sit magna.

14. DE HANGLIP. Inferior hujus piscis mandibula ita propendit, ut fere nullum usum præbeat illi, unde nomen est huic inditum. Corpus est coloris dilutè cœrulei, qui sub ventre albescit, verum infra caput ab inferiori mandibula usque ad pinna ventrales est notatus macula rubicunda ac lata, qualis etiam cernitur in summo dorso. Ex eo ibidem prorumpunt quatuor aculei ad os reflexi, ac satis magni, sed nullo ligamine juncti. Capitur prope insulas in mari Orientali, cui nostrates Trium Fratrum nomen à similitudine imposuere.

15. DE KNEVELBAART. Bagra hæc est species, atque à Belgis nomen accepit, quod veluti superioris barbæ partes ex utraque oris parte progrediantur. A mandibula inferiori dependent duo cirri satis longi, quod in hoc piscium genere fere solitum est. Colore est inter cœruleum & candidum, sed ubique conspersus rubris quasi venis, quales cernuntur in marmore versicolore. Cauda est bifurcata. Pinnæ duplices prostant in dorso, ac totidem in ventre, præter pinna branchiales, quæ pro corporis modulo magnæ sunt. Id, quod ab autopte nostro vocatur *Knevels*, est osseum, durum ac nigricantis coloris. Alium hoc nomine piscem, sed diversum, exhibui Tab. VII. N. 14.

16. 'T ZEE-ZWALUWTJE. Nihil hic pisciculus habet commune cum aliis, quibus ab auctoribus Ichthyographis idem nomen tribuitur. Piscis est exiguus atque saxatilis. Dubites merito rostrumne an cauda, an vero utrumque, illi meruerit hirundinis nomen, quum rostro sit acuto & cauda longa ac bifida, quod etiam observatur in avicula, quæ ei nominis causa fuit. Nihil præterea de hoc pro certo adfirmare possum, quum meus homo diceret hujus speciei singulos pisces fere semper à se invicem differe.

17. DE PEERVISCH, sive *Piscis piriiformis*. Ratio nominis ex ipsa icone satis superque elucet, quoniam pisciculus hic sit plane forma non tantum piri, sed etiam habeat quorundam pirorum colorem, nempe flavescens. Per caput, ad anum ventrem usque, procurrit linea latior cœrulea. Nulla est differentia inter

pinnas dorsuales ac ventrales, quoniam utræque aculeum præfixum habent, atque sint colore ruffo, qui & caudæ est.

18. DE HORENVISCH. Nova est caprisci species, quæ duo cornua præfert, ac os habet porcinum. Singulare est, fateor, piscem talem alibi reperiri, sed tamen non ideo pro ficto habendus. Forfan erit tempus, quo rerum naturalium indagatoribus erit notissimus. Nunc autem, quantum ego scio, plane ignoratur, ac ideo fidei nostri pictoris relinquendus.

19. KAPELLA KITSJUL, id est *Piscis parvo capite*, ita dictus, quia caput exiguum est pro ratione corporis satis crassii. Hujus etiam caput, ut paulo ante in pisce piriformi vidimus, linea seu fascia cingitur, quæ etiam corporis partem non minimam complectitur. Esui non ineptus est, sed grati saporis, licet parvus sit admodum, & à folis Mauris vescendi causa capiatur.

20. 'T ZEE-KEMPHAANTJE. Etiam hic saxatilibus piscibus adscribendus est. Corpusculum totum consitum est in dorso aculeis non inter se junctis, sed tamen satis firmis, quales etiam aliquot in utroque latere cernuntur. Oris rictus est satis magnus, pinnae branchiales longæ, ut etiam illæ, quæ ab imo ventre dependent. Earum color est helvus. In corpore non alius obtinet color quam dilute cœruleus, qui circa ventrem magis ac magis albescit.

21. DE ZEE-POSCH, sive *Porculus marinus*, singularis est atque eximie raritatis pisciculus ob colores, qui in ejus corpore conspiciuntur. Color est subviolaceus, verum à cauda usque ad caput cernuntur lineæ candentes. In tergo habet aculeos aliquot, quorum numerus non semper est idem. Infra branchias duo dependent cirri, & præterea pinnae, post quas sequuntur aculei, ac dein iterum pinnae ad caudam usque.

22. DE WAYERVISCH. Huic pisci natura tribuit pinnas in dorso longiores, quæque ad caput vergunt, ac constituunt quodammodo flabelli figuram; inde illi nomen *de Wayervisch* adhæsit, quoniam nos ita flabellum vocamus. Ceterum, duo cornicula supra caput eminent, sed exigui in hoc pisce usus. In dorso ac in ventre aculeos habet quamplurimos, inter se membranula junctos. Maculas quoque in dorso tres habet quadratas ac rubicundas, quum reliquum corpus sit coloris dilute cœrulei. Indi utuntur hoc pisce ad cibum, sed infumato; nam alioqui minus valet.

23. HET GOUTVISCHJE, sive *Pis-*

cis auratus, datur etiam piscis argenteus istius magnitudinis ac formæ non differens. Hoc illi nomen jure meritissimo est datum à colore, qui aurum æmulatur, tam colore quam fulgore. Parvulus est & nulli rei idoneus, quare non capitur à quocumque nisi ab amatoribus hujusmodi naturæ opum. Corpusculum in dorso est pinnis obsitum à capite ad caudam, in ventre, ab ano ad caudam etiam usque, reperiuntur quoque pinnae. Infra caput cirri dependent.


TABULA DECIMATERTIA.


1. **D**E GROTE EILANDER. In medio latere hujus piscis magna cernitur macula flavescent, quæ interdum quidem variatur, sed nunquam tamen deletur aut in plures dividitur. Ista macula visa fuit nonnihil esse similis insulæ alicui, atque ideo nomen ab insulæ significatione petitum huic pisci est impositum. Corpus quoque viride ac undulatum est, præterquam in ventre, ubi magis albescit. Aculeos cernes in hoc pisce nullos, sed pinnas, quarum istæ, quæ adhærent branchiis, sunt satis magnæ.


2. DE PERROQUITVISCH. Cutis huic pisci est admodum dura, sed non ingrata adspectu, quum elegantissimis coloribus sit variegata, plane ut psittaci minores, quos Peroquetos vocant, solent. Inde nomen pisci inditum. Nulli non colores, qui oculos feriunt, in illo inveniuntur. Viridis, flavus, cœruleus, ac purpureus suas habent in illo vices, sed non semper eodem loco reperiuntur.


3. DE PERROQUITVISCH. Licet nomen in hoc pisce sit idem, quod in superiori, non est tamen eadem nominis ratio, verum magis nomen videtur impositum à rostri forma, quæ quodammodo procurrit atque incurvatur, ut videre est in psittacis. Nihil præterea in hoc singulare est aut notatu dignum. Nam quod parvulus est, & à folis Indis in cibum convertitur, id cum aliis quoque piscibus illi est commune.

4. & 5. DORADO, quem etiam *Delphinem* vocant, est quorundam judicio utilissimus atque omnium optimus piscis. Sive enim colorem respicias, sive formam corporis, sive saporem carnis, omnia sunt ita constituta, ut nulli cedant alii pisci. Qui hic exhibentur sunt plane ejusdem speciei, sed non capti prope locum eundem; atque ita factum est, ut utriusque icon apponeretur. Color in utroque est omnino idem, verum difficile









cile est dicere quo nomine istum velis indicare, quum videatur mixtus ex aereo, argenteo, purpureo, viridi, ac coeruleo, è quibus omnibus semper iste color prævalet, qui maxime expositus est radiis solaribus respectu intuentium. Igitur prout movetur hic piscis, ita variatur colore, qui tamen semper in suo genere est intensus ac pulcherrimus. Prior horum captus fuit prope Hilam, posterior prope Bandam, sed tamen huic plane similes etiam reperiuntur prope Ternatensem. Multa de his passim apud Ichthyographos, quare non opus est, ut plura hic addantur. Præter alios vid. Willoughb. Tab. V. 10.

6. HET RODE DOLPHYNTJE. Est quidem hic piscis è Delphinum genere, sed singularis prorsus species, quum asellos molles non soleat magnitudine excedere. Forma tamen satis convenit cum delphinibus apud alios descriptis. Hic, quem exhibeo, fuit captus prope Hilam. Corpusculum est rotundum fere, cutis violaceum colorem ostendat, qui tamen circa ventrem magis albescit.

7. DE GELE JUFFER. Quasi dicas *Dominam flavam*. Ita à colore dicitur, qui flavus est in ventre ac lateribus, verum tamen è dorso ad utrumque latum progrediuntur maculae sive fasciae rubicundae, quæ lineis coeruleis ad utrumque latum sunt distinctae. Octo oculos habet in dorso, quorum longissimus est, qui conspicitur loco ultimo, qua adherent pinnis. Sub branchiis in imo ventre cernuntur etiam pinnæ longiores, non dependentes, sed ad latera reflexae.

8. HET JUFFERTJE VAN AMBONA, id est *Domicella Amboinensis*, cujus nominis causa aut ratio evidens est nulla, nisi forte quod colores in hoc pisce sint admodum viridi, quilibet fere puellæ gaudent in vestitu. Corpus non est longius quam latum est. Ab utraque parte aculeos habet ac pinnas exiguas, verum è cauda duo aculei longiores ac ossei prominent. Color utcunque flavus est, caput rubet, rostro excepto, quod est coeruleum ac osseum.

9. HET JUFFERTJE VAN AMBONA. Satis magna differentia est inter hunc & superiorem pisces, & tamen, ut vides, idem nomen, quæ res facit, ut tanto magis credam vividos colores causam fuisse nominis imponendi. Scilicet & huic pisci color est vividus, violaceus nempe, sed maculis flavescentibus & coeruleis distinctus. Caput totum est flavum. Nulli sunt aculei, sed pinnæ, tam in dorso ac ventre, quam sub branchiis, quæ longiusculæ sunt.

10. HET RODE JUFFERTJE. Pisciculus est saxatilis, atque minimæ magnitudinis, sed variis coloribus, ut aliæ cognomines notatus. Quæ colorum varietas etiam notatur in pinnis è dorso prominentibus. Præsertim autem etiam fulvus & rufus color in eo est conspicuus. Prior in ventre ac dorso, usque ad corporis medium, ubi rufus initium sumit, qui etiam in latere est ac priori ventris parte conspicuus.

11. DE RODE JUFFER. Raro hujus formæ pisces capiuntur, atque ideo vix noti sunt. Apud diligentes talium rerum indagatores tamen reperiuntur. A capite ad caudam usque quasi cinctus est fasciis coeruleis, inter quas quamplurimæ, sed exiguae, maculae reperiuntur. Eæ albicant, verum earum ambitus est subniger. Caput est non magnum. Quinque aculei sunt in dorso, quibus succedunt pinnæ latiores ac rotundæ. Sub ventre binas pinnas habet, ac duos aculeos intermedios.

12. DE SPITSBEK. Rostrum, quod in hoc pisce fere accedit ad alicujus aviculæ rostrum acutum, fuit causa nominis ei reperiendi. Rictus est exiguus pro modulo ac magnitudine corporis. Color in eo est coeruleus, sed per medium caput fascia procurrat, quæ variis coloribus est insignis. Sapore Alburnum refert, à quo etiam corporis figura non multum distat.

13. DE SPITSBEK. Minutus est hic pisciculus, & saxatilis. Ideo non referri potest ad certum aliquod genus, quum saxatiliū tanta sit multitudo ac varietas, ut Natura ludibunda videatur in parvulis hisce etiam voluisse exercere curiosorum hominum studium. Præter colores admodum varios, & aculeum longiorem, nihil fere in illo observatu dignum.

14. DE LANGNEUS. *Nasonem* à nasi, sive mandibulae superioris longitudine, recte hunc pisces vocaveris. Crediderim eum esse Caprisci speciem, quod videtur indicare prostrans in dorso aculeus. Caput subcoeruleum est, corpus à dorso ad latera fuscum; atque à latere ad ventrem, qui quodammodo tumidus est, ac rotundus, flavum. Præter pinnas branchiales, duæ, sed breves, propendent à ventre infra caput.

15. DE SPITSNEUS. In dorso supra caput adsurgunt pinnæ latiores, quæ videntur ab aculeo uno aut altero sumere initium. Idem non est color universarum pinnarum, sed quum flavæ sint ea parte, quæ corpori adheret, extrema tamen earum pars est viridis, ut & cauda. Corpus ipsum est violaceum, verum

rum una aut altera macula subviridi distinctum.

16. DE SPITSNEUS. Hujus piscis forma à superioribus plane est diversa, sed os quodammodo simile, atque ideo annumerandus piscibus, quibus acutum os nomen reperit. Corpus flavo colore est insignè, caput rubet. Sub ventre nonnihil cœruleum, sed albicans reperitur. Capitur præsertim circa insulam Hilam.

17. DE SPITSNEUS. Hic magis formâ superiori similis est quam quisquam præcedentium & cognominum piscium. Rostro acuto est etiam præditus. Corpusculum dilute cœruleum est, ac maculis albicantibus notatum. Nil aliud observatu in illo dignum reperitur, neque enim ob corporis parvitatem in ullo fere numero habetur. Quatuor aut quinque pollices longitudine nunquam excedit. Nusquam capitur, nisi prope Laricam.

18. DE MAREELPRIEM. Non dubito, quin hic piscis in plerisque conveniat cum Marena Schonfeldii, adeo singula in eo, ac pisce, quem sub Marenæ nomine ille describit, conveniunt. Harengo etiam non est dissimilis, tam quod ad formam corporis, quam quod ad argenteum circa ventrem colorem ac squammas facile deciduas attinet. Amboinenfes frequenter eo utuntur in cibo, sed præsertim fumo indurato, aliqui enim saporis est minus grati.

19. LINGUA. Corpore est lato & maculoso. Macularum color est fere albus, reliqui corporis flavus. A branchiis dependent pinnae longiores. In ceteris, tam si saporem quam corporis formam spectes, convenit cum Bugloſſo.

20. LINGUA. Etiam hic est species à priori nonnihil differens, præsertim in colore, qui in eo est cœruleus. Præterea per medium latius procurrit linea candida, quæ etiam per caudam mediam transit. Capitis etiam color nonnihil variat, ut & pinnarum, quæ à capite propendent.

21. DE PARADYSVISCH. Mustelæ marinæ species videtur, sed non in omnibus conveniens cum reliquis hujus generis piscibus, qui hætenus descripti sunt apud Ichthyographos. E priori ac superiori capitis parte prominent duæ cuspides curvæ ac duræ. Aculeos aliquot habet in corpore summo, unde initium sumunt pinnae, quæ per caudam ad medium ventrem usque continuantur. Nam caudam proprie non habet, sed ejus locum obtinent pinnae, ut dixi, continuatae, quæ illi pro cauda sunt.

22, & 23. PARADYSVISCHJES. Fe-

re conveniunt cum isto pisciculo, quem præcedenti Tabula N^o. 16. sub nomine hirundinis marinæ exhibui. Quid causæ fuerit nunc eos exhibendi sub alio nomine, plane ignoro, nisi dicendum sit illos quoquo modo esse similes apodi Indicæ, quam nostrates avem Paradisicam solent nuncupare.

24. 'T BERGVISCHJE. Id nominis meruit hic pisciculus à dorso in altitudinem producto, sive gibboſo. Describitur passim apud Auctores, quos vide. Præsertim Jonſtonum Tab. XIII. & ejus descriptionem apud eund. p. 24. Illud in hoc nostro est singulare, quod ex ipso gibbo, quâ incipit ad caudam descendere, aliquot prominent tuberculi, quales etiam in lateribus reperiuntur.

25, & 26. ZEEPAARDTJES, sive duo *Hippocampi*. Pisciculi sunt satis noti, & quorum effigies passim reperiuntur, non tantum apud Ichthyographos, sed etiam apud Itinerarios. In Italia satis frequens est, atque inde fit, ut exhibeatur in quibusdam Itinerariis Italicis, ut apud Missonum Tom. I. pag. 295. ubi dicit Italis hunc pisciculum venire nomine *Cavaletto*, eum esse crinitum, sed crines decidere, simulac coeperit siccari, ac singularia quædam alia de hoc pisciculo adfert, quæ non sunt indigna scitu. Crinitos exhibet etiam Willoughb. Tab. I. 25. quem etiam operæ pretium est videre Lib. IV. c. 9. ut jam de aliis nihil dicam, apud quos depicti ac descripti exstant.

TABULA DECIMAQUARTA.

1. **D**E CHINEESCHE BILANG, quem non dubito vocare *Congrum Coronatum*. Habet enim in capite aliquot sive aculeos sive pinnulas prostantes, quibus adſimilatur corona. Dicitur hic piscis esse carne pingui, sed spinosa. Eam ob causam nostri homines raro isto vescuntur, idque tanto magis, quia Chineses eum magno mercantur, si quando in foro reperiatur. Ex eo ferculum conficiunt, cum allio & *Capsico*, sive, ut nos vocamus, *Pipere Brasilianno*. Atque eo modo mensis illatum ajunt eum esse gratissimi saporis.

2. DE ALPHORESCHJE GEËP. Et hic piscis ex Acorum, (ita enim malo cum Martiale scribere quam cum aliis Acuum) genere est, & quidem maximus, ut eum videtur vocare Willoughb. Tab. P. 8. Non habetur à ditioribus in magno honore, sed fere relinquitur militibus & aliis vilioris fortis hominibus, qui eum vili pretio mercantur. Mordax est admodum, atque ejus morsus est adeo venenatus,

natus, ut quidam ex eo sint mortui. Corpus est squammosum ac cœruleum. In dorso bis adfurgunt pinnæ ac toties deficiunt. Primum circa medium corpus, ac deinde non procul à cauda. In ventre autem unica tantum pinnarum series reperitur ab ano ad caudam.

3. DE ALPHORESCH GEEP. Idem est plane piscis cum præcedenti, atque ideo singula, quæ de illo dixi, etiam de hoc sunt dicenda. Pinnas in dorso non habet, nisi circa caudam. In reliquis similibus est alteri isti, excepto quod aliquanto minor sit corpore.

4. DE GROTE HALBEK. Vocatur acus Indica mandibula inferiore in spiculum producta à Willoughb. & etiam icon habetur in Itinerario Nieuhoffii. Etiam hic acus est, sed cujus mandibula inferior longiuscule est producta, quales etiam apud alios scriptores reperiuntur. Capitur prope Amboinam. Color squamarum, quas habet densissimas, est argenteus. Maculæ tamen in lateribus nigricant. Ajunt eum magnitudine non cedere Lucii mediocribus, neque etiam sapore, unde fit, ut à quibusdam habeatur in deliciis.

5. 'T HALBEKJE. Acus minor est, nec excedit magnitudine harengum vulgarem. Corpus est dilute cœruleum ac undulatum. Reliqua optime conveniunt cum iis, quæ apud Ichthyographos de hoc piscium genere dicuntur. Minor species est præcedentis.

6. DE JAGER, quasi *Venatorem* dicas. Piscis est admodum rapax, ac natu celerrimus. Inde fit, ut facile alios pisces consequatur. Tota piscis figura satis ostendit eum valere natu, ac rapacem esse. Os enim illi est prælargum; dentes canini atque acutissimi. Pinnæ priores, quæ in dorso conspiciuntur, sunt longissimæ; aliæ breviores, quales etiam ventrales. Color corporis est argenteus, sed maculæ quædam rubicundæ, nullo certo ordine, in eo conspiciuntur. Eo ad cibum non utuntur Amboinenses, nisi forte infumato.

7. DE JAGER. Forma ac nomen hujus piscis sunt eadem, quæ vidimus in superiore. Neque ulla differentia est inter utrumque, quam quod hic præter pinnas dorsuales nullas alias habeat. Nam quod in ore aperto nulli cernuntur dentes, id reor esse adscribendum pictoris incuriæ.

8. DE GROTE JAGER. A corporis, præ ceteris hujus generis piscibus, nomen *Magni Venatoris* meruit, qui hoc loco exhibetur piscis. Forma corporis cum duobus præcedentibus undiquaque

convenit, verum in pinnis quædam reperitur varietas. Namque præter tres in dorso aculeos, qui aliis defunt, pinnas habet non tantum longiores, sed etiam maculosas. Earum color est citrinus, verum maculæ partim rubent, partim albicant. Similes etiam observantur in pinnis branchialibus & cauda. Color pisci est quodammodo viridis, sed undulatus, atque cum movetur, diceret totum esse argenteum. Per medium latus quoque candida, splendens, sive argentea, linea transit, quæ ab ipso capite uno tramite ad caudam usque continuatur.

9. DE KIKVORSCHVISCH. Eundem locum cum ranis hic piscis incolit, lacus nempe & paludes, ac ex earum captura sibi victum quærit, unde illi nomen. Natu satis celeri gaudet & dentibus acutissimis, quibus ranas & alia id genus aquatica solet appetere. In capite præfert aliquot aculeos sive cuspides, nullo ligamine junctas, quas aliæ sequuntur longiores in dorso sed inter sese cohærentes. Prope caudam pinnæ sunt in utraque corporis parte. In colore nihil est dignum notatu; verum valde mirabile est, quod huic pisci producuntur branchiæ, non in pinnas sed pedes, quibus, cum opus est, in aquis prope fundum utitur. Ceterum nihil minus quam ignotus est hic piscis, quum prosteret apud Ichthyographos plerosque, qui eum exhibent sub nomine Guapervæ Brasiliensis, quo primum à Markgravio est dictus, ac deinde descriptus à Willoughb. Lib. III. c. 3. ac jam ante à Jonstono, quem vide sis Tab. XXXVI. & alios, quos non exscribo.

10. 'T ZEEVARKENTJE. Non est hic æque notus ac superior, sed tamen quum piscis iste habeat duos pedes, ac satis notus sit, minus mirum videbitur, si quis fidem habeat auctori meo talem piscem, quatuor pedibus, cum opus est, progredientem, prope Amboinam reperiri. Progreditur is aliquando in terram, & incedit satis celeriter, sed gradu infirmo, & lassus facile labitur. In aquis multo celerius progreditur in fundo, sed raro, quum plerumque natet, & ex aliorum piscium captura victum sibi quærat. Totum dorsum ac caput sunt cataphracta, sive tecta pelle tam duro, ut vix possit perrumpi, plane testudinum more. Sub ventre est tamen cutis mollis atque subflava. Dorsum totum horret aculeis fortibus & acutissimis. Pinnæ dorsuales ab iis ad caudam vergunt, atque præterea sub cauda reperiuntur pinnæ rotundæ, Ceteris pinnis caret.

11. DE VARKENSBEK, cui rostrum porcinum suum nomen peperit, est piscis

scis latus, & squamosus, in quo nihil singulare, aut notatu dignum, præter rostrum reperies. Namque color est illi, qui fere est naturalis omnibus apud nos piscibus, nempe dilute cœruleus. In aculeis aut pinnis etiam nihil est, quod abit à vulgariis piscibus.

12. DE VARKENSBEEK. E figura utriusque piscis satis patet utrumque ejusdem esse generis, ac specie non multum inter se diversos; verum hic posterior dignus fuit visus, qui adponeretur, quoniam colores in eo sunt longe alii ac in præcedente, atque aculeos aliquot in ventre habeat, quibus alius iste caret. Nempe dorsi color ac potior capitis pars nigrescit, inferiore capitis parte rubescit. Quin etiam venter ipse est subniger, sed maculis candentibus distinctus. Lateris color fuscus est, quem variant venæ rubefcentes, quod non ingratis est adspectu. Præterea linea candidissima, quæ argentum æmulatur, deducitur per medium corpus à capite ad caudam.

13. DE OOSTINDISCHVAARDER. Quum nostri homines in Indiis viventes, immo etiam cum inde redeunt, præsertim gaudeant vestibus versicoloribus, non dubium, quin huic pisci inde sit nomen impositum. Est enim ille coloribus tam variis in toto corpore ac lateribus notatus, ut nihil magis varium possis videre. Scilicet corpus est flavum, sed ubique notatum lineis rutulis, cœruleis, aut candentibus. Amboinenfes frequenter illo utuntur in ferculis, verum pellis ei detrahatur, antequam appareatur, quum illa sit durissima, ac nulli rei apta, è genere Caprisci versicoloris striati est.

14. DE GROTE OOSTINDISCHVAARDER. Magnum hunc vocant, quia aliquanto major est præcedente, sed non potest magnus vocari ratione aliorum piscium, quum revera magnus non sit. Corpore est vario, verum maculoso, non striato, ut in superiori dictum est. Os habet admodum parvum ac rotundum, etiam è genere Capriscorum uti præcedens. Sugendo victum quærit, quod aliis quoque piscibus peculiare esse supra vidimus.

15. DE GORRAVISCH. Quæ sit hujus nominis ratio ac causa fateor me juxta cum aliis ignorare, quod adeo mirum non est, cum nomen sit plane Indicum, nec meus homo ipse ejus significationem sciret. Dignissimus est tamen piscis, qui hic etiam locum inveniat. Scilicet, secus ac in aliis hætenus descriptis vidimus, dorsum majoribus aculeis vacat, pro quibus ab inferiori mandibula, quæ major est superiori, longissimus atque plane offeus aculeus dependet, non sine parvis

eminentiis, quemadmodum videre est in quibusdam ex genere cetaceo. Ceterum color est, ut in proxime antecedentibus, admodum variis. Quippe totius corporis color est flavus cum maculis albescentibus, & suis vicibus succedunt lineæ sive fasciæ rubefcentes, quibus etiam in medio non desunt minores lineæ, sed cœruleæ. Circa oculos etiam in capite rubefcente ducuntur lineæ quodammodo cœruleæ, quæ singula jucundissimum spectaculum intuentibus præbent.


16. HET PRINCESJE. Jam supra, Tab. IV. non unum piscem hoc nomine positum possis invenire, verum inter illos & hunc atque sequentem non exigua differentia reperitur. Caput est huic magnum, & rubicundum, excepto quod circa oculos ostendat aliquot lineas varii coloris, quæ non semper in hac specie eadem sunt, nec numero nec colore. Idem est ventris color, qui capitis, nisi quod venter sit maculosus. Reliquum corpus est cœruleum, utrimque aculeis armatum, atque pinnis ad natandi usum instructum. Non alio loco capitur quam prope Hilam, insulam non procul ab Amboina distantem.

17. HET PRINCESJE. Cognominem hunc piscem superiori vides, à quo & forma corporis non longe abit, longius capitis, & color. Quippe caput est parvum, sed acuto rostro, quasi aviculæ, præditum. Corpus est violacei coloris, vergentis tamen potissimum ad cœruleum, inque eo apparent lineæ ejusdem, sed paulo intensioris coloris. Quin etiam in cauda, quod singulare est, maculam habet flavam, qui est quoque ventris color. Medium caput dividitur quasi fasciâ versicolore ac lata. Adde, quod piscis hic & superior sint saxatiles.


TABULA DECIMAQUINTA.

1. DE ZEEPALING. Est Conger marinus satis magno corpore & colorum varietate conspicuus. Caput partim est viride, partim rubrum, duobus cirris cœruleis dependentibus. Color corporis est fuscus, linea, quæ per medium latus decurrit, est cœrulea, quo colore & maculæ sunt spectabiles, & extremum illud, quod caudæ loco est. Sub ventre fuscus tergi color in flavedinem abit.

2. DE GETEKENDE KABELAAN. Proxime hujus piscis figura accedit ad asellum majorem, cujus etiam nomen habet, licet aliqua differentia notetur inter hunc piscem, & asellum nostrum, quod attinet ad formam, de qua ut singula







gula indicem non est opus. Duas in corpore lineas notatas vides, unam dorsum versus, alteram in medio latere, utramque notatam colore fulvo, maculis rubescentibus. Atque inde dignus fuit visus, qui hic exhiberetur. Adhibetur quidem ab Amboinensibus in cibum, sed tamen plerumque sale conditus in usum hybernici temporis solet reservari.

3. DE BANDASCHE KABELAAW. Recedit quidem hic piscis quodammodo à superiore & à nostris asellis majoribus, sed tamen quia circa Bandam non reperiuntur pisces propius ad asellum accedentes, ideo illud nomen ei impositum videtur. Totum dorsum & bona pars ventris aculeis sunt obsita. Nec quidquam aliud in eo notabile, nisi forsitan, quod in latere, quà corpus cum capite cohæret, reperiuntur tres lunulæ, ac maculæ duæ. Lunularum color non alius est quam reliqui corporis, maculæ vero rubent, qui color etiam notatur in piscis oculis.

4. & 5. DE KWIKSTAARTEN. Nul- lum fere genus piscium notorum existat, ad quod possis hos referre, qui a cauda mobili dicti sunt *Notacille*. Forte tamen tuto possis dicere eos ad Bramas pertinere, sed in re non certa nihil affirmare audeo. Alter eorum est masculus, alter femella. Neque quidquam fere inter utrumque differentia est, præterquam quod masculus in ipso capite post oculos habeat maculam fuscā, & præterea aliam in summo capite, sed ea etiam in femella conspicitur. Color utriusque est dilute cœruleus, sed lineæ tres medium latus percurrunt, quæ ejusdem fere coloris sunt, qui in maculis cernitur. Capiuntur prope Amboinam, & quidem in sinu, qui vocatur Lusitanicus. Illud singulare ac observatu dignum est, quod si femella capiatur, masculus, qui eam semper comitatur, sua sponte insiliat in rete, ac ita piscatoribus una cum femella præda fiat.

6. DE DIKLIP. Singularia quædam de hoc pisce notanda sunt, non tam quod attinet ad corpus, quam quidem ad pin- nas & caudam. In superiori corpore aculei aliquot & pinnae illos sequentes conspiciuntur; verum hoc ei commune est cum multis aliis. Illud singulare, quod pinnis ventralibus, quæ virides sunt, accedant quasi aliquot globuli satis rotundi, qui flavi coloris sunt. Eodem modo è media cauda prominet veluti alia cauda in acumen desinens, unde etiam quandoque de *Pylstaart* vocatur. Illud etiam est flavum, ut observavi de globulis, qui è pinnis ventralibus procedunt. Totius piscis color fuscus est, præter maculas

duas aut tres per latus sparsas, quæ partim cœrulei sunt, partim albi.

7. DE DIKLIP. Ejusdem generis est sequens hic piscis, sed alterius speciei. Nam hic est illo multo brevior, neque ea varietas in pinnis & cauda observatur, quæ forsitan soli speciei superiori est peculiaris. Color est idem, sed nullæ maculæ, quarum loco habet lineam in latere candentem, quæ à capite ad caudam procurrit. Ab inferiori mandibula duo cirri longissimi propendent, qui in altera ista specie etiam quidem adsunt, sed multo breviores.

8. DE BONTE HAAN, quasi dicas *Gallus varius*, aut *versicolor*, quod nomen quare ille sit impositum nulla satis firma videtur ratio atque causa, nam si à colorum varietate piscibus Orientalibus nomen sit imponendum, omnes fere dicendi essent cognomine varii aut versicolores, adeo vividis coloribus, quod in illis eximium, notati reperiuntur. Caput obtusum est, ac viridi, flavo, & rubro colore notatum. Corpus totum est fuscum, verum à cauda ad medium latus procedit linea lata, sive fascia aliquantum rubens. Sub branchiis propendent duæ pinnae longiusculæ, ut etiam eæ, quæ branchiis adhærent, pro corporis modulo dicendæ sunt satis longæ esse.

9. 'T ZEEHAANTJE. A forma capitis videtur illud nomen adeptus. Nempe cristam in summo capite gerit, quemadmodum videmus in Gallis gallinaceis. Os sive rostrum, nam rostro porcino simile est, longius procurrit, & quodammodo etiam galli rostrum refert. Exiguus est pisciculus ac saxatilis, & apertura, quæ conspicitur in rostro, nulli alii rei inservit quam fugendo, quoniam huic pisciculo vita est toleranda fugendo, atque ita attrahendo succum ex obviis quibuscunque. Nullos aculeos habet, pinnas binas, unam nempe ab utraque corporis parte, quod colore fulvo est, qui sub vente diluitur, ac abit in flavedinem. Lineæ latiores, quæ tanquam flammæ à tergo versus latus procedunt, rubent.

10. DE GRAVIN, quam nomine apto magis & apposito quam Latino *Comitissam* recte dixeris, è genere Cyprinorum latorum est, atque meretur suum locum in hac Collectione obtinere ob singularem corporis formam, & colores in eo conspicuos. In dorso vides crebros aculeos, & post illos pinnas, quæ decurrunt ad caudam. Ex ipsa cauda prominent duæ extremitates aliquanto duriores ac magis osseæ. Caudam sequuntur non quidem pinnae proprie dictæ, sed carnosa quædam substantia, quæ quibusdam

dam piscibus, Orientalibus præsertim, pro pinnis est. Ea est rotunda & subnigra, verum illi accedunt aliæ pinnæ minutæ. Deinde sequuntur tres aculei nullo ligamine inter se cohærentes, ac tandem pinnæ, quæ sub branchiis propendunt. Totum corpus quodammodo violaceum est, sed maculis distinctum, nisi quod è medio ac summo corpore procedat macula flava ac magna, quæ fere medium corpus occupat.

11. DE GRAVIN. Idem est genus huic pisci, quod superiori, eadem fere species, excepto colore, qui variatur. Quippe corpus est flavum & macula, quæ à dorso procedit, variis, nec certis coloribus est notata. In inferiori capitis parte cernitur etiam quædam differentia, quum in hoc pisce ibi ductæ sint aliquot lineæ; partim flavæ partim rubentes, quod paulo aliter sese habebat in superiore; verum quod fasciæ quasi colligatur caput, id utrique est commune.

12. DE GRAVIN. Superiores duos dixi è genere Cyprinorum esse, quod de hoc pisce affirmare non ausim, ut qui videtur pertinere ad aliud plane genus, planorum scilicet piscium. Corpus mire varium est, de quo vix quidquam pro certo affirmare licet. Quidquid sit, illud certum est, hunc pisce in cibum adhiberi, sed cute prius detracta. Nec tamen valet assus aut coctus, sed elixus.

13. ICAN BOULANG. Inermis est piscis, neque habet, quo se tueatur contra aliorum insultus, si forte excipias cutem durissimam, quam alii pisces non facile dentibus perrumpere possunt. Lineis mirum in modum toto corpore quasi conspersus est. Corpus est quodammodo flavum, lineæ cœruleæ, sed non valde. Sub ventre color est fuscus, quod rarum, quoniam plerumque color ventris soleat aliquanto magis in albedinem vergere, quam corporis. Hic autem, è contrario, magis intenditur. Cauda lunæ crescentis in modum cavata est, & quæ desinit aliquantum rubet.

14. DE KROPVISCH. Singulare atque notandum est in hoc pisce, quod quasi duplicem habeat ventrem, in quorum priorem primum cibum ingerit, quem deinde in posteriori concoquit, ut ita dicam. Ore est satis magno, quod amplius satis venter statim sequitur, aptus continendis pisciculis minutis, quos inter natandum devorare, seu potius deglutire, solet. Præter istam singularem corporis formam nihil in eo dignum observatu.

15. DE MODDERVISCH. Quod illi nomen datum est à consuetudine. Quip-

pe non solum versatur in limosis ac palustribus aquis, sed, ut parvus est corpore, solet, sese totum abdere in cœno, ubi illud reperire potest. Ceterum minutus est, atque ablegatur à potentiorum mensis ad popellum, qui tales pisces vili pretio mercatur, atque adhibet in cibum.

16. LIMOENVISCH. Harengo in multis est similis, sed aliquanto minor. In corpore nihil est singulare, quod à nostris piscibus discedit. Color enim dilute cœruleus est, qualis fere etiam aliorum piscium esse solet apud nos. Illud tamen silentio non est prætereundum, quod aculei dorsuales inter se sint ligati membranula rubente in imo, qua corpori adhæret, sed in superiori parte flavescente, & quod cauda latissime, pro talium piscium naturâ, expanditur.

17. DE VOLGER, quasi dicas *Secutor*, non valde discedit à superiore, excepto capite, quod paulo est obtusius, ac præterea flavet. Nomen autem *Secutoris* inde est illi inditum, quia solet in mari sequi ac comitari naves, unde haud difficulter & absque magno labore capitur. Vix tamen captu dignus est, quoniam carne est flaccescente & macra, ita ut nec mesonautæ iis velint uti, nisi cum penuria ciborum eos incipit urgere.

18. DOUWING ZHAAR. Hunc & sequentem pisce adjeci è Museo meo, atque propterea certo certius adseverare audeo eos ita vivos reperiri, quemadmodum hic reperiuntur. Caput huic est acutum ac in priori parte candens, verum circa oculos macula nigra oritur, quam deinde interruptit alia macula cœrulea, sed inde nigredo ista continuatur per dorsum ac medium latus, ad caudam usque, ita tamen ut passim notetur lineis rubentibus. Venter est candidus, nisi quod lineæ latiores per eam deducantur ad caudam. In dorso aliquot aculeos vides, ad caudam reflexos, quos pinnæ excipiunt, quæ partim candidæ, partim rubræ sunt. Sub ventre quoque duos aculeos habet, unum sub ipsis branchiis, & unum statim post anum.

19. DOUWING SONGO. Figuram corporis si respicias, pene est eadem, sed rostrum & colores corporis variant. Rostrum est longissimum, sed non valde fissum, ita ut piscis non possit os latius aperire. In ipso capite supra oculos omnia sunt nigra in hoc pisce. Corpus ipsum est candidum, præterquam quod squammæ rubeant sed non totæ. Venter albicat. In dorso ac ventre pinnæ reperiuntur rufi ac subviridis coloris. Reliqua satis ex ipsa figura cognoscuntur.

TABULA DECIMASEXTA.

1. **DE GROTE BLAZER** aut **HANG-BUIK**. Oportet quem esse valde imperitum in distinguendis piscium generibus, qui non videt hunc esse orbem. Nomen quoque illud satis indicat. Vide quæ ad Tab. VIII. N°. 8. dixi. Hic est longe omnium maximus in eo genere. Dentes habet plane caninos, & oris rictu satis magno aliis piscibus minatur. Cauda est tricuspis, ante quam ex utraque corporis parte, ubi incipit gracilesce, pinnae longiores prostant. Corporis color est flavus, macularum, quæ in latere conspiciuntur, niger, verum eæ sunt passim punctulis candentibus distinctæ. Non multum hic differt ab orbe Lagocephalo, quem exhibet Willoughb. Tab. I. 2.

2, & 3. **ICAN DOURION**. Vocantur illi ita à fructu Indico aspero, Durione dicto, nomine, quod possis histricem interpretari. Illis non dissimiles pisces apud alios prostant, sub nomine orbium muricatorum, apud alios autem sub nomine histricum. Toti horrent pinnis sive cuspidibus acutissimis & durissimis. Immo ipsorum pellis adeo dura est, ut nullus ensis eam possit perrumpere, cum siccata est. Ideo Amboinenses ex istis pellibus, cum ituri sunt in pugnam, pileos faciunt, quibus tuto licet eis caput confidere, quoniam non tantum tunc non cedunt gladiis, sed ne minoribus sclopetis quidem. Ad icones quod attinet, nullum verbum addo, quoniam pisces ipsi satis sunt noti, ac apud alios descripti exstant.

4. **DE AMBONSCHÉ ZEELT**. Enomine satis constat de genere piscis, qui Luciscus possit dici. Colore est fusco ad nigrum vergente, excepto quod circa branchias, qua caput à reliquo corpore dividitur, grandis macula flava sit. Oris rictus est permagnus, in quo sese ostentant acutissimi dentes. Nihil aliud in eo notatu dignum occurrit.

5. **DE GEELVISCH**. A superiore non multum differt, si corporis colorem respicias, qui est etiam fuscus ad nigredinem vergens, verum caput omnino flavum est, ac inde nomen pisci est repertum. Venter est cœruleus, & quidem intense, quod observatu non indignum mihi videtur, quum, ut jam plus semel dixi, fere soleat color sub ventre minui.

6. **POELA**. Egregia carne hic piscis commendabilis est, atque ideo magni fit, non solum apud Laricenses, apud quos capitur, sed etiam apud vicinos insula-

res. Ex eorum piscium genere est, qui è raptu vivunt, quales apud nos Lucii, quos hic sapore etiam refert. Caput est rufum. Corpus à branchiis ad medium usque, caudam versus, est flavum ac quasi reticulatum. Quod restat dilute cœruleum est. In dorso nullos aculeos habet, neque etiam in ventre, sed in pinnis illud videtur tamen singulare, quod sint rubrae prope corpus, ac dein subvirides.

7. **DE FESTONVISCH**. Supra Tab. X. N°. 8. & 9. exhibui duos pisces, quorum in superiori cute hærent quasi cervina cornua; hic autem, quem hoc loco exhibeo, similiter ornatus cernitur quasi florum corollis sive fertis, quæ adeo dura sunt, tanquam ex durissimo ebore essent confecta. Ergo si quis hoc pisce velit vesci, quod frequenter accidit, quum caro ejus sit bona, ac in nulla re cedat vitulinæ, prius istæ corollæ, sive ossæ sive eburnæ, sunt detrahendæ una cum cute, quæ etiam valde est dura. Ceterum, corporis color est flavus, corollarum sive fertorum floralium est rufus flavo mixtus, quod non ingratum est adspectu. Caput perquam maculosum est, verumtamen vix aliis coloribus quam flavo & rubente est insignitum. Sub branchiis duæ pinnae dependent. In dorso unica serie continuantur, usque caudam fere, absque ullis aculeis.

9. **KALIO**, qui frequenter siccatus ad solem adservatur ad usus domesticos, atque ideo nomen aselli arefacti, sive *Stokvisch* apud nostrates, meruit, pedes tres longitudine excedit, formâ non valde dissimilis asello nostro majori. Colores in eo varii sunt, sed præsertim flavus, qui universi corporis color est. Reliqui colores constituunt maculas, quæ potissimum cœrulei sunt, si excipias lineam, quæ à cauda procedit, ac pertingit ad medium usque latus ea enim, præter cœruleum colorem, etiam præfert rufum.

10. **DE RODE ZILVERVISCH**. Hoc illi nomen est inditum partim à colore rubicundo, partim à maculis argenteis, quæ in latere, flammularum instar, cernuntur. Illud mirum non est; simulac enim maculae piscium splendide candentes sunt, statim argenteæ videntur. Nihil præterea in illo dignum est observatu, quoniam forma corporis nihil singulare præfert, nisi forte quod oculos habeat magnos nigricantes, quorum ambitus notatus est circulo flavo.

11. **DE SALMONETVISCH**. Jam in superioribus hic piscis descriptus, & alioqui satis notus est. Adeo ut opus non sit

fit hic pluribus immorari ejus descriptioni. In colore tamen sunt quædam, quæ forsan videbuntur aliis aliquam attentionem mereri. Subnigri coloris est totum corpus. Verum in illo cernuntur, caudam versus, lineæ aliquot cœruleæ à dorso aut à ventre procedentes, quæ etiam quasi clavis sunt notatæ concoloribus. Reliqua nihil singulare præferunt.

12, & 13. I CAN LEMA. Ejusdem generis, ac penè speciei, sunt duo isti pisces, quos exhibui duobus hisce locis. Ne color quidem variat, & omnis in eo est differentia, quod alter habeat pinnas ab aculeis in tergo continuatas, alius iis careat; alter tres in ventre habeat aculeos, alius tantum duos. Prioris oculi sunt virides & quodammodo in medio albescentes, posterioris flavent. Adde quod prior sit notatus macula fusca, sive linea sub branchiis producta, quæ in alio nusquam notatur.

14. DE BONTE SPRINGER. Huic pisci sua consuetudo dedit nomen. Nempe, quod etiam videmus in quibusdam nostrorum piscium, inter natandum ex aqua profilit, veluti ludibundus atque lascivius. Illo temporis momento, cum supra aquas est, si eum intuearis, admirationem, tibi pariet ob singularem colorum varietatem, quæ gratissima est intuentibus. Scilicet corpus illi est fuscum ac fere nigrum, sed lineæ bicolores illud passim dividunt. Qua ad caput obversæ sunt, flavescent, verum ea pars, quæ ad caudam spectat cœrulea est. In capitis maculis, quæ multæ sunt, omnes isti colores, qui in toto corpore conspiciuntur, reperiuntur.

15. DE PERSIAANSCHÉ VISCH, id est *Piscis Persicus*, quod nomen quare illi inhæserit pro certo adfirmare non audeo. Caput illi est breve & obstipum, corpus à capite valde crassum, quod deinde ad caudam decurrens multo fit tenuius. Unicum omnino aculeum habet, in dorso nempe præfixum pinnis grandiusculis, quæ dorsum medium occupant. Ceterum colores corporis sunt varii, nec certi in omnibus hujusmodi piscibus; quare non opus est eos hic indicare.


TABULA DECIMASEPTIMA.


1. **D**E SERAMSCHÉ ROG, sive *Raia Seramensis*, in deliciis habetur apud Amboinenses, & dicitur etiam nostris rajis sapore carnis multum præstare. Ossa cartilaginea, quæ in eo reperiuntur, sunt multo molliora, quam quæ in nostris rajis sunt, quo fit ut fa-


cile hanc raïam possis totam comedere. Forma, ut vides, aliquantum distat à nostris rajis, immo caput, cauda, & alia prorsus recedunt à nostrarum raïarum figura. Adfirmabat autoptes meus pelles hujus raïæ in magno apud Amboinenses haberi pretio. Quippe colores in iis sunt varii, & pellis per se est dura. Ea res fecit, ut mulieres nuptæ pudenda sua talibus soleant tegere, ad quam rem tanto major ab iis sumptus in pelles impenditur, quanto vividioribus coloribus eæ possunt reperiri. Ad virgines quod attinet, eæ incedunt omnino nudæ, adeo ut talis raïæ pellis in muliere Amboinensi sit signum eam maritum habere. Porro colores in ea, quam exhibeo primo loco, raia sunt notatu digni. In medio quasi insula quædam cernitur flava, quam ambit rubescens circulus, qui denuo est inclusus limbo cœruleo. Inde procedit color fuscus (qui in nigredinem tendit, ac venis subcœruleis percurritur) ad latera, verum antequam eo perveniat, interrumpitur semicirculo flavescente, inter quem & extrema latera visuntur maculæ aliquot cœruleæ atque rotundæ. Quæ omnia singularem adspæctum præbent. De capite, cauda, & aculeis, præstat tacere, quam incerta quædam prodere.


2. I CAN PARING, qui est species *Lyra cornutæ*, ab auctore meo erat delineatus; isque addebat tales reperiri diversæ omnino magnitudinis, verum à nemine adhiberi in cibo nisi à Mauris. Ego autem, quum ipse talem piscem habeam in liquore, diligenter eum contuli cum hoc meo, atque curavi hanc iconem effingi ad piscem istum, quem vitro inclusum servo. Est ergo piscis longus quidem, sed tamen octangularis & cataphractus à capite ad caudam usque, non squammis sed durioribus ac osseis plane ac cuti firmiter adhærentibus quasi clypeolis. Color est, saltem in liquore, gilvus, & quidem in toto corpore, præterquam oculorum, qui plane sunt purpurei etiam in hoc meo pisce. In superiori mandibula cornua duo recta & ossea, sed plana, prostant, quod singulare est, ut & illud, quod piscis cataphractus pinnas habeat & aculeos, quales tamen in hoc pisce notatos vides. Dixi Mauros solos eo vesci, quod non capiendum est, nisi de recentibus, nam saliti etiam à Christianis adhibentur ac mensis inferuntur, præsertim quodam anni tempore, quo pinguius solito reperiuntur.

3. I CAN SATAN, id est *Diabolus marinus*, maximus est piscis è rajarum genere, pinnis latioribus ac cauda longissima.









fima. Exstat passim descriptus, nec est quod aliorum sedulitati possim addere. Nomen non aliam ob rem est nactus, quam quia magno impetu natans interdum progrediatur ad aquæ superficiem, ubi pinnas vehementer quassans magnum in aqua motum excitat. Ac inde illi adhæsit nomen Diaboli marini, quod timorem non exiguum incutiat navigantibus, ac intuentibus motum tam vehementem aquarum, cujus causam vix vident. Nam non cernitur totus piscis, sed aut cauda tantum, aut pinnae, aut caput. Color ei est dilute cœruleus, quo colore etiam maculae in corpore sunt notatae.

4. ICAN SATAN. Aliquanto est minor corpore hic diabolus marinus, sed multo monstrosior. Figura corporis est non uniformis, & ubi in latera ventum est, quasi aliquantum coarctatur. Inde utrinque pinnae prominent longiores, quas aliae minores sequuntur ad caudam usque, accedentibus ante eam aliis pinnis longioribus. Quin etiam cauda, quæ longissima est, ac desinit in ductum acutissimum, non caret suis pinnis. Ea, ut totum corpus, flava est. In medio tamen corpore reperitur macula rubicunda in colorem violaceum vergens. Magis versus caput lineæ ductæ sunt rubicundæ, quæ versus oculos flectuntur, & adspectum magis tetrum efficiunt. Ex ipso ore cornu quasi planum & longum prominet, sed aliquantum reflectitur, nec eo hic piscis potest uti ad nocendum aliis piscibus.

5. ICAN SATAN. Eiusdem est hic fere speciei, cujus est proxime præcedens piscis. Genere saltem nihil differunt. Corpus est planum atque rotundum. Undique pinnas longissimas, pro modulo corporis, præfert, quæ caudam versus minores fiunt; aut saltem modo contrahuntur, modo producuntur. Maxima inter hunc & superiorem differentia reperitur in capite, quod ore hiulco ac dentibus caninis minatur cædem obviis piscibus. In corpore aliquot lineæ plures maculae conspiciuntur, quæ omnes sunt cœruleæ, sed in albedinem vergunt.

6. ICAN FAY, quem etiam quidam nomine immundo *De Strontvisch* vocant, atque sub eo nomine describunt. Mihi nunc non vacat videre, quid alii de hoc pisce dicant, quum satis ab hac, quam exhibeo iconē, eorum figuræ recedunt. Hoc est adscribendum eorum piscium magnæ multitudini & varietati. Ajunt eum illud nomen esse nactum, propterea quod semper sequatur naves, & quidem diligenter inhiat excrementis circa istum locum, in quem solent nautæ ad alvum

exonerandam secedere. Corpus est non magnum, color fuscus toto corpore, excepto quod maculae cœruleæ, aut subnigræ, toto corpore sint sparsæ. Licet è victu tam immundo vivat, non refugiunt tamen nautæ, quo minus ejus carnibus vescantur. Eæ autem sunt non admodum bonæ, nec sapore suo facile aliquem ad se possent pertrahere, si aliarum rerum esset abundantia.

7. DE BONTE VISCH. Non diu dubius hærebis in causa nominis in hoc pisce indaganda, si colores in eo admodum varios respexeris. Namque latus medium illi dividitur linea candente, ac id quod superius est, notatur macula ingenti cœrulea, in cujus medio iterum alia minor ac rubra invenitur. Reliquum corpus est cœruleum, ventre albicante. Duo aculei satis magni in dorso prostantes satis ostendunt eum esse Capriscis adscribendum. In vente itidem duo reperiuntur, sed multo minores, circa anum, unde pinnae ad caudam procurrunt, ut etiam in tergo ab istis aculeis, quos ibi gerit. Pinnae branchiales plerumque versus tergum reflexæ sunt. Infra branchias duæ aliae dependent satis longæ.

8. DE SALAMANDERVISCH. Quæ nam huic pisci fuerit causa nominis ignorare me juxta cum aliis fateor, nisi forte tuberculosa macula, quæ ab utraque lineæ ventralis parte cernuntur, quales etiam ajunt esse in salamandro quadrupede, illi nomen pepererint. Decem in dorso habet aculeos flava ac tenui membrana junctos, primum inter se, ac deinde pinnis, quæ ad caudam procurrunt. Corpus totum eo colore, qui vulgo piscium censetur, est, nempe dilute cœruleo, ventre albicante, sub quo priores pinnae sunt rutilæ, posteriores subvirides. In capite quoque permagna macula flava cernitur, quæ tanta est, ut non tantum totam mandibulam inferiorem occupet, sed etiam oculum includat ab utraque parte.

9. ICAN SWANGI. Hujus generis aliquot pisces jam vidimus aliis locis, præsertim Tab. II. quibus hic meretur apponi, quum totum corpus, atque adeo caput, horreat aculeis crassioribus. Pinnae branchiales sunt permagnæ, & fere accedunt ad formam piscium volatiliū. Totum corpus est subflavum, excepto quod maculae quædam in eo reperiuntur, quæ in medio sunt coloris candidi, sed versus extremitatem nigricant. Caput miris modis variatur lineis cœruleis. Nihil aliud in eo est observatu dignum, quod non itidem possis videre in aliis piscibus cognominibus, quos forsitan operæ pretium est cum hoc conferre.

10. T SPRINGERTJE. In superiori Tab. N^o. 14. exhibui piscem cognominem, sed aliquanto majori corpore, aliis coloribus, & forma. Hic totus est cœruleus, ventre candente, in quo duæ lineæ leviter reflexæ procurrunt à branchiis ad medium corpusculum, quod tenui linea est notatum. Caput est obtusum, lingua crassiuscula ac rubens. Cauda panditur in latissimum spatium, sicum totius corporis magnitudine conferas. Caro est fere omnium piscium Orientalium præstantissima, quæ res hujus piscis pretium auget, quoniam ditiores sibi minuat ex ejus carne pro gratissimo ferculo habent, veluti apud nos è Luciorum carne minuat magni fit, quando religio illos prohibet vesci carne quadrupedum.

11. DE SCHOUT BY NACHT, possis interpretari *Prator nocturnus*, si ad primitivum vocum significationem attendas, verum quum nostrates ita soleant vocare Legatum, qui in classe Archithalasso subest, dubium non videtur, quin inde sit nomen illi quæsitum, quemadmodum supra vidimus alios pisces nomina Reginarum, Comitum, Signiferorum, &c. gerere. Illud tamen non videtur prætereundum, quod noctu soleat capi accensis lucernis, ad quas procul visas adnatat. Percam mediocrem magnitudine non excedit. Colore est gilvo, maculis passim rubris passim subcœruleis. Oculi huius sunt virides, in quorum medio pupilla candidissima conspicitur.

12. T SLECHTHOOFD. Piscis hic videtur ideo ita dictus, quod in capite neque maculas habeat neque lineas versicolores, quod alioqui frequens esse in piscibus Orientalibus, jam credo satis notum est. Alburni est species, quo tamen non utuntur Amboinenses nisi fumo indurato. In dorso habet aliquot aculeos membrana tenui junctos, atque pinnis adhærentes. In ipso corpore nihil est notabile, præterquam quod statim post caput sequantur maculæ quatuor flavæ sibi invicem succedentes, quarum posterior semper priore minor est, donec tandem deficient.

13. DE CORTISAAN. Solent nostrates eo nomine non tam aulicum, qui proprie tamen eo designatur, significare, quam quidem Morionem, qui operam navat medico circumforaneo. Quæ igitur fuerit ratio nominis imponendi mihi non videtur patere. Ad genus piscis quod attinet, Caprisci species est, ut vel è forma corporis ac crassiori ac longiori aculeo in corpore summo prostante satis patet. Corpus est contractum, respectu crassitudinis, atque coloris incerti. Undula-

tum enim est, ac exhibet rarios colores, viridem, cœruleum, flavum, prout aliter atque aliter intuearis.

14. DE BAARDMAN, ita dicitur à cirris longioribus, qui dependent ab inferiori mandibula. In dorso prostant pinnae, non continuatæ, sed tribus locis divisæ ac distinctæ. Corpusculum est violaceum, maculisque partim albis partim cœruleis insignite. Caput autem potissimum est cœruleum, intercurrentibus aliquot lineis flavis.

15. DE VOREN VAN LARYKE, id est *Trutta Laricensis*, egregius est piscis, ac magni fit propter eximium saporem, quo vulgares nostras superat troctas. Magnitudine est plerumque quatuor aut quinque pollicum. In capite prope os duos aculeos, sed non magnos ostentat. Alios in toto corpore habet nullos. Corpus est flavum, sed linea lata, quæ latus occupat, est cœrulea. Caput quodammodo violaceum est, excepta lunula parva, quæ in mediis branchiis conspicitur, atque aurei coloris videtur.

16. DE TROMPETTER, quasi *Æneatorem* dicas, verum longe alia est facie, quam iste piscis, qui apud alios sub eodem nomine prostat, quem dicunt magno ventre esse. Hic autem est acus, Aristotelis qui dicitur, & quidem major, ut recte vocatur à Willoughb. Tab. I. 25. Dicebat quoque meus homo sonorum admodum hunc piscem esse, unde nomen illi fuit datum. Namque, noctu præsertim atque mari tranquillo existente tantum subinde sonum edit, ut possis eum ad dimidium milliare ab eo loco, ubi natat, audire. Colore est flavo, sed variegato lineis candentibus, quæ colorem suum quodammodo cum corpore communicat. Pinnæ in priori corpore nullæ, si aculeos in dorso exstantes iis non adnumeres. Prope caudam tamen utrinque enascuntur pinnæ latiores ac fere quadratæ. Ad rostrum vero quod attinet, illud est prælongum ac ossæum, atque cum hic piscis sibilum vult edere, extremam partem tantum non claudit, atque ita rostro supra aquam prolato ærem attrahit, unde sonus oritur.

17. DE DIKMUIL, quasi dicas *Buculentum*, vocatur ita à superiori mandibula, quæ est crassissima. Pauca in eo observatu digna. Color est flavus, maculæ candidissimæ, atque argentum imitantes. Non magnus est, at adsumitur tamen in cibum, quoniam ejus caro satis grata est. Namque quinque aut sex pollicibus transversis nunquam reperitur major.

TABULA DUODEVIGESIMA.

1. **DE BARBAAR**, ita fuit dictus, quia primum captus fuit prope regiones in Asia ad Mare Indicum subditis Turcarum Imperatori, quas regiones homines nostri uno nomine Barbaricas vocant. Mahumedani præsertim plurimi faciunt hunc piscem. Sapore non multum differt, ut nec corporis forma, ab asello nostro majore, nisi quod aliquanto sit pinguior. In capite etiam delicatiores homines venantur ac quærunt quod gratissimum est, quemadmodum apud nos quidam salmonum capita in magno honore habent. In corporis forma aut colore notandis, nihil dignum observatu fuit. Ubique idem est color, subcœruleus scilicet, nisi quod in medio dorso ducatur linea à pinnis ad ipsum os. Corpus quasi caudam intrat, & distinctum maculis tenuatur versus illam, verum non alius est earum color, quam qui in toto corpore cernitur.

2. **BORSKOP**. Capite hic passerem refert, atque adeo ipsi inde nomen est impositum. Nam quantum capite accedit ad illum, tantum differt corpore, quod non planum sed rotundum est. Mandibula inferior est notata lineis rubescentibus ac cœruleis. Circa pinnas ventrales posteriores etiam macula rubra cernitur. Reliquum corpus subcœruleum est. Oculos ambit circulus flavus, ipsique oculi sunt coloris violacei. Infra eos lunula viridiuscula notatur.

3. **DE SPITSBEK**, ita dicitur ab acuto rostro, quod imitatur quarundam avicularum rostra. Multa in eo sunt, quæ nescias quo sint referenda, quum nihil fere habeat cum aliis piscibus commune. Ab utroque latere in medio corporis nonnihil contrahitur, ac deinde recedit, quasi priorem formam continuans. In dorso habet aliquot aculeos, in ventre nullos, sed circa caudam ab utraque parte longissimi aculei procedunt. Cauda est bifurcata, ac coloris flavi, quo colore etiam sunt pinnae dorsuales. De colore corporis nihil certi adfirmare audeo, quum interdum is varietur, non tantum in aliis atque aliis hujus generis piscibus, sed etiam in uno atque eodem pisce pro ratione ætatis. Ceterum, tam raro capitur, ut plerisque etiam Amboinensibus nunquam sit visus.

4. **DE GELE KAMEELVISCH**, id est *Camelus flavus*, ita est dictus à colore ac forma corporis. Est enim color flavus, corpus tuberculatum. Caro ejus est tam pinguis, ut inter edendum ni-

mia pinguedo nauseam moveat. Capitur in ora Seramenfi, atque incolæ istius regiones solent telorum suorum, quibus in bello utuntur, cuspidem ex aculeis hujus piscis facere, qui brevi tempore tam duri fiunt, ut nullum cum iis ebur, ac ne vix quidem ferrum cum iis possit comparari. Corpus, ut dixi, flavescit, maculis interdum albicantibus, interdum vero rubentibus. Per medium latus linea cœrulea decurrit à capite ad caudam. In capite præter flavum colorem notantur maculae rubrae.

5. **DE JONKER VAN AMBON**, quem possis dicere *Domicellum Amboinensem*, qua ratione ita sit dictus, aut quid illi hoc nomen meruerit, ignoro. Quod etiam dictum velim de duobus sequentibus, qui etiam Domicelli sunt dicti absque evidenti causa. Color ei est quodammodo violaceus in maxima corporis parte, in reliqua flavus. Nullos aculeos habet, sed pinnas in dorso continuatas. Sub branchiis in ventre pinnas habet crassiusculas, si modo ita possis dicere quod natura illi ibi dedit pro pinnis, ac reflexas versus utrumque latus.

6. **DE JONKER VAN HILA**, sapore percas nostras quodammodo æmulatur, quas etiam utcumque refert forma. In dorso multos habet aculeos inter se coherentes tenui membranula viridi. Sub ventre vides etiam duos, sed nullo ligamine inter se junctos. Ceterum, alternis quasi fasciis vinctum est corpus, quæ modo flavent, modo subcœruleæ sunt, atque ita se invicem excipiunt à capite ad caudam, quæ bifurcata est ac viridis.

7. **DE BONTE JONKER**. Et hunc libuit nostro pictori vocare eodem nomine, quia apud nostrates in Amboinensi insulâ degentes ita vocatur, ratione non magis evidenti quam in duobus superioribus. Pisciculus est saxatilis, atque proinde exiguus. Præter longissimam cuspidem, quæ in dorso prominet ad caudam reflexa, tres habet aculeos satis magnos in anteriori corpore. In ventre nullos habet, sed pinnas binas; primum scilicet sub branchiis, ac deinde ab ano ad caudam. Corpusculum est flavum lineisque cœruleis ac maculis ejusdem coloris distinctum. Nihil præterea in illo observatu dignum. Hoc, ut aliis quibusdam saxatilibus, soli Indi vescuntur, nostratibus eum, tanquam nimis parvum, rejicientibus.

8. **DE DROMEDARIS**, cameli nullo tubere in dorso notabilis nomen, quare huic pisci sit datum alii videant. Magna horum piscium multitudo reperitur

prope Amboinam, ac solent iis interdum incolæ vesci, verum ejus caro est admodum sicca. Si colores spectes, in corpore prorsus nihil memorabile occurrit, sed in capite observandum est, quod illud totum sit flavum, venis rubris per illud decurrentibus. Oculi sunt quoque magni ac rubicundi, nisi quod eorum pupillæ dilute viridem colorem præferant.

9. DE HARING VAN BANDA, quem si *Encrasicholi* speciem dixeris, non dubito, quin rectè sis facturus. Videtur de hoc pisce etiam loqui Nieuhoffius in Legat. Part. Ult. p. 115. quam possis consulere. Multa cum nostro harengo habet communia, forma etiam corporis non multum differt, verum hic aliquanto longior est pro ratione crassitie. Eodem modo, quo nostri harengi solent, sale contra corruptionem custoditur, atque ita servatur in usus domesticos.

10. DE AMBONSCHÉ HARING, sive *Harengus Amboinensis*, aliquanto minor est nostris harengis, & etiam mollior carne, quæ si sale adspargatur parvo tempore omnem saporem amittit, & plane insipida fit præ falsedine. In dorso vides aliquot aculeos, qui plerumque octo sunt, adhærentes pinnis, quæ versus caudam decurrunt. Ea est satis lata & tenuis. Squammas quoque habet hic piscis, verum non densas ac facile deciduas, quod illi est commune cum plerisque piscibus, quibus carnes sunt molliores.

11. DE BUITELAAR, id est *Piscis Cernuus*, quo nomine vocatur, quia inter natandum cursu celerrime mutato quasi exsultat ac cernuus volvitur. Nil fere aliud de eo observandum, quoniam neque color, neque forma, neque caput, neque pinnae quidquam habent singulare. Omnia enim in illo sunt vulgaris, atque undiquaque cum nostris piscibus conveniunt.

12. DE KROESVISCH, ita dictus fuit, quia ejus cauda quodammodo poculum aliquod refert, quo nomine nos solemus *een kroes* indigitare. Piscis est porro saxatilis, quique nulli rei est idoneus, sed à curiosis adservatur in liquore, tam ob corporis singularem formam, quam ob colorum in eo varietatem conspicuam. Rostrum habet acutum atque osseum, quod flavo colore est insignitum. Ad oculos usque caput est violaceum; atque ibi, ut in aliis jam ante factum vidimus, vincitur fascia viridi. Corpus ipsum etiam est violaceum à branchiis ad extremitatem caudæ usque. Pinnæ dorsuales non cernuntur in eo, nisi ubi corpus jam incipit in caudam flecti.


Verum aculeos aliquot in summo dorso prostantes vides, quales nulli in imo ventre reperiuntur, præter unicum, qui prope pinnae ventrales non procul à cauda videtur.


13. DE GEBANDEERDE GRUNDEL, quem Latine vocare licet *Gobium fluviatile striatum*, capitur prope Amboinam, ac in cibum adsumitur tam à Mauris quam à Christianis ibi degentibus, verum non aliter quam in jusculo, sive embammate ex aceto, apponitur. Corpus, quod quatuor aut quique pollices transversos nunquam excedit magnitudine, fuscis sive nigricantibus lineis notatum est à capite ad caudam, quam exiguum admodum habet, occupante gracillima corporis parte locum etiam caudæ.


14, 15, 16, 17. GRUNDELS. Hi omnes Gobii fluviatiles sunt, quos omnes unà comprehendere placuit, quia ejusdem sunt generis, ac specie etiam non valde differant, si colores in censum recipere nolueris. Primus eorum est fuscus, capite maculose flavo ac violaceo; secundus, qui designatus est numero decimo quinto, est flavus, verum lineis subcoeruleis ac maculis nigricantibus est conspicuus. Caput est subviolaceum, quod tamen non caret maculis flavis. In dorso pinnae habet, atque aculeos ante illas erectos; reliqua sunt ei cum aliis Gobiis communia. Hunc sequitur etiam Gobius flavus capite violaceo, in quo nihil etiam notabile est, nisi quod in dorso, quæ incipit ad ventrem flecti, recto ordine aliquot prostant maculae candidæ, reliquo corpore existente flavo. Tales etiam maculae reperiuntur in eo, qui ultimo loco est positus, verum ejus corpusculum est subcoeruleum, & non tantum in dorso præfert aculeos erectos, sed etiam in ventre, qui tamen inter se non sunt ligati membranula, ut dorsuales.


18. LINGUEBAS, quod nomen quid significet non mihi meus homo explicuit, neque alibi explicatum reperire potui. Quod si Auratæ dicerentur pisces, qui quasi aureo colore sunt insigniti; possis eum Auratam vocare, à quorum forma etiam haud longe abit. Color illi à rostro ad caudam est flavus, seu potius aureus, quasi adspicias massam auri puri. Plurimæ tamen maculae exiguae colorem istum aureum interstinguunt, quæ quasi argentum per totum corpus sunt dispersæ. Pinnarum atque caudæ color est ruber, qualis conspicitur fere in nostris percis.

19. DE SNAVELAAR. Non est quidem hic piscis esui ineptus, verum non magni









magni fit, quoniam caro ejus est mollis & non boni saporis. Nomen nactus est à longius producta mandibula superiore, quæ facit, ut eum inter acos annumerare possis. In dorso vides aliquot aculeos satis longos, quibus in ventre nulli respondent aculei, neque ullæ pinnae. Ab istis aculeis dorsualibus ad caudam usque progrediuntur pinnae, ut & in ventre ab ano.

20. DE MOORSCHEN SNAVELAAR. Eadem est nominis ratio, sed non idem genus piscium, quoniam hic non videtur pertinere ad acos, sed ad cataphractos & tuberculiferos. Neque recte id, quod è capite prominet, possis dicere mandibulam esse superiorem, quum potius cornu sit, infra quod totum os piscis latet. Ceterum, habet hic dorsum durum atque coloris coerulei, quod distinguitur lineis flavescentibus. Latera rubent, ventre ad albedinem vergente, in quo etiam conspicitur una aut altera macula candida.

TABULA UNDEVIGESIMA.

1. DE JAPANSCHKE KEIZER, id est *Imperator Japonensis*, ita dicitur ob multas rationes. Si enim respicias præstantiam carnis supra ceteros pisces Orientales, facile illud nomen ei concesseris. Est enim caro tam grati saporis, ut aliorum piscium carnes ne comparari quidem cum ea mereantur. Si colores attendas, non minori jure dices ei competere Imperatoris nomen, quum ii sint simul vivi ac simul gratissimi. Si à magnitudine nomen est sumendum, præstat hic etiam omnibus piscibus Orientalibus, iis nempe, quibus Indi solent vesci. Si denique intuearis coronam, quam in capite gerit intra oculos, non negabis ei competere nomen Imperatoris. Ceterum adeo pinguis est caro, ut salmonum nostrorum capita ab ea parte æquet, si non superet. Ad colorem exteriorem quod attinet, is est fuscus, sed lætus atque splendescens, perque totum corpus tenues lineæ coeruleæ percurrunt. Pinnae multis quasi plicis convolutæ atque ita veluti colligatæ sunt, quod etiam non ingratum ad spectum præbet. Capitis color est intense rubens, sed non uno loco per coeruleum variegatur. Cetera ex ipsa icone satis patent intuentibus.

2. DE GROOTOOG, qui ita à magnis oculis est denominatus, prope insulam Manipensem, nec usquam alibi, capitur. Eo salito utuntur Indi. Vix quidquam in eo est peculiare, quod non item in aliis piscibus notabile est, oculis exceptis, qui non tantum in illo sunt magni, verum etiam linea quadam rubente cinguntur.

Inferior branchiarum pars etiam variis coloribus est notata, lineis nempe coeruleis & flavis.

3. DE EENOOG, sive *Monophthalmus*, illud habet prorsus singulare, quod unicuique tantum habeat oculum in medio capite prominentem, nec præterea alium. Capitis quoque forma est inusitata, ac fere talis, qualis in insectis quibusdam esse solet. Corpus est tenue, color subcoeruleus. In supremo dorso videbis pinnas longiores ad caput reflexas, & post eas aliæ sequuntur, tam in dorso quam in ventre. Neque indignum notatu videtur, quod sub branchiis quæ dependent pinnae, etiam sint reflexæ versus anteriorem partem.

4. DE POEPOESCHEN VISCH. Vide quæ de hoc piscium genere jam dixi ad Tab. VI. quæ ut hic denuo repetam, non opus est. Color est illi fuscus in nigredinem vergens, qui etiam pinnarum videtur. Lineæ sive fasciæ, quæ in eo notantur, sunt non unius coloris, sed præcipue tamen aliquam flavedinem semper præferunt.

5, & 6. POEPOEVISCHEN. Formam corporis horum piscium, si intuearis, Capriscorum species dices, & rectè; nam corpore sunt brevi ac rotundo, & dorso aculeato. Prior tamen, licet aliquot aculeos magnos habeat, non præfert tamen cuspidem primo loco longiorem, quod quodammodo omnium Capriscorum proprium est. Color ei est inter fuscum & violaceum, maculae, quas in capite vides, sunt coeruleæ. De posteriori minus dubitandum est, quia is plane Capriscorum more longiorem aculeum præfert. Præter lineas fere similes priori, post caput, supra pinnas branchiales, adsurgunt maculae insignes variis coloribus vividissimis. Reliquus corporis color paulo magis ad violaceum accedit, quam in pisce priore.

7. DE POEPOEVISCH. Hic jam plane Caprisculus est, nec possis merito de illo dubitare, quum non tantum cuspidem è summo dorso prostantem videas, sed eam quidem imprimis duram ac crassam pro corporis modulo. Tam in dorso quam in ventre videbis quoque pinnas longissimas, quod etiam huic piscium generi convenit, ut te docebunt fere omnes auctores Ichthyographi. Color corporis est viridis ac undulatus, id est incertis maculis, quæ, undarum instar, nullo ordine firmo constant, variegatus.

8. DE BANDAASVAARDER. Parvulus est piscis ac saxatilis, qui prope Bandam, nec usquam alibi, capitur. Est etiam de genere capriscorum. Habet in rostro aperturam exiguam, quæ illi inservit ad victum sugendo quærendum: post illam aperturam reperiuntur dentes quoque, ut in aliis

etiam fieri potes meminisse. Præcipuus corporis color est flavus, qualem etiam Nieuhoffius in Ultima Parte Legat. agnovit in hujuscemodi piscibus, verum mirè aliis coloribus, striis, ac maculis variegatus.

9. DE GOUDSPIERING, id est *Apna Cobitis aurata*, ita à colore dicitur, qui totus est flavus splendescens, atque adeo aureus. Corporis forma, neque os cum nostris istius speciei Apuis satis convenit. Nolo tamen illum hinc remove, quum placuerit homini meo illum hoc loco ponere ob nomen, quod etiam aliquot sequentibus, at magis nostrarum Apuarum similibus, adhæsit. Os est prælargum, longum, ac caninis dentibus armatum. Si corpus esset aliquanto tenuior, dicerem hunc piscem esse aci speciem, nunc anceps hæreo.

10. DE RIVIERVOREN, quem Latini *Troctam* sive *Truttam fluviatilem* vocant, propius accedit formâ ad nostras Troctas. Verum color ejus multum ab istis discedit. Est enim toto corpore ita flavus, ut quodammodo in albedinem vergat. Lineæ, quæ per dorsum, latus, ac ventrem sunt dispositæ, fusci coloris sunt. Præterea in capite aliquot maculas habet rubentes, ac subinde cœruleo colore notatas.

11. DE VOREN VAN AMBON. Hic jam plane est Trocta, si formam respicias, neque aliam ob causam hic locum meruit, quam quia singulari modo in capite est coloratus. Inferiorem enim mandibulam percurrit linea versicolor, qualis etiam notatur, ubi caput corpori adhæret. In dorso pinnae sunt æque ac in ventre. Præterea ibi etiam cernuntur aculei quinque, qui inter se membranula cohærent, ac deinde pinnis dorsualibus junguntur.

12. DE RUISCHVOREN. Species est etiam Troctæ latæ, quam quidam Salarem vocant, licet illud nomen proprie detur junioribus Salmonibus. Esui non est quidem ineptus, sed fere nullo alio modo apparatus quam tostus in sartagine, ac tum satis boni est saporis. Pauca sunt, quæ de hoc piscis dicere, quæ non jam in aliis quibusdam piscibus vidimus, atque adeo non diutius huic immorabor, postquam dixero colorem capitis esse rufum, corporis dilutè cœruleum, qui versus ventrem abit in albedinem.

13. DE SERAMSCHÉ VOREN. Est ille quodammodo præcedenti similis, excepto quòd nullos aculeos habeat in dorso, sed vicissim in ventre post anum duo aculei prostant, nec ullæ sint præterea ibi pinnae. Sub branchiis quidem dependent exiguæ quaedam pinnae, verum si formam adspicias, dubitabis, an eæ proprie pinnae sint dicendæ. In capite est color idem, quem

in superioris capite notavi, verum præterea idem color in dorso ac latus continuatur supra lineam lateralem, infra quam cernitur color cœruleus, qui circa ventrem penè in candidum mutatur.

14. DE LANGNEUS VAN AMBON. Mandibula superior in hoc pisce producta ei peperit nomen *Nafonis*, quod jam supra vidimus Tab. XIII. alii quoque pisci fuisse datum. Caput est flavum, in quo linea bifida infra oculum cernitur. Egregie variegatus est color corporis, qui dilute cœruleus est, sed variis, sive venis sive incertis linearum ductibus, variegatus, plane ut videre est in lapide porphyretico.

15. DE FLESSENVISCH. Ut supra vidimus alii pisci nomen esse repertum à poculo, ita hic nomen invenit à lagena, quam aliquo modo refert, si rostrum capias pro lagenæ colle. Parvulus est pisciculus & faxatilis, quique nulli rei est utilis. Color ei est cœruleus, usque ad fasciam, qua quasi vincitur, verum post eam totus rubet, pinnis exceptis, quæ virides sunt.

16. 'T LOOTSMANNETJE. Est hic piscis satis notus, propterea quod in medio mari semper Galeum sequentem prænatat, quæ res jam vulgatissima est ac decantatissima. Color ei plane est idem atque supra vidimus in Dorado, quare non opus est, ut hic denuo repetam, quæ ibi dicta sunt. Vid. Tab. XIII.

17. DE SABROGVISCH. Ita vocatur à loco, in quo frequenter capitur. E forma diceres aselli minoris esse speciem, quod etiam mihi vero non dissimile videtur, quum dicatur etiam ejus caro accedere ad saporem aselli istiusmodi. Ceteroquin nihil peregrini præ se fert, atque ideo me non morabitur, quo minus transeam ad alios pisces.

18. DE STAROOGVISCH. Ab oculis hujus piscis quasi radii procedunt, quos ibi efformant maculæ obscure rufæ, atque inde nomen illi est datum. Aculeos multos in dorso ostendit ac pinna rotundas, licet ea forma non ostendatur in imi ventris pinnis. Color est cœruleus, exceptis lineis latioribus, quæ rubent. Quidam incolæ Amboinenses eo vescuntur, sed plerique tamen eum, ut inutilem ac insipidum, nihili faciunt ac rejiciunt.

19. DE ZEE SNOEK, sive *Lucius marinus*, quam proxime accedit ad nostrorum Luciorum naturam. Neque propterea quidquam occurrit de eo dicendum. Nisi forte quod hic, quem nobis autoptes depinxit, fuerit longus sex pedes & pollices octo. Omnis differentia in his & nostris Lucis in eo versatur, quod hi non habeant tot spinulas minutas per carnem spar-

sparsas, quæ edenti interdum haud exiguum molestiam creare solent.

20. COLUMBO, est piscis Seramensis, sed ad nullam rem aptus, quum carne sit prorsus insipida, atque adeo moli, ut statim diffluet, si piscis aliquamdiu jacuerit soli expositus, ubi aliorum carnes solent ficcari atque durescere. Maculae aliquot in eo sunt insignes & nigrae, verum proprius piscis color est helvus. Superior mandibula est quidem fatis crassa, sed tamen paulo ultra inferiorem producta, quod non indignum videtur observatu.

TABULA VIGESIMA.

1. **D**E VYFVINGER VISCH. Vides in latere hujus piscis quinque maculas rotundas, atque eas fuerunt causa nominis huic pisci. Nempe Amboinenses eum in sua lingua designant peculiari nomine, quod significatione convenit cum appellatione nostra Belgica. Possis eum *Dactyliophorum* vocare nomine fatis ad rem appposito. Ceterum, notandum est, quod tanta multitudo talium piscium, mensibus praesertim Junii & Julii, prope Amboinam reperiatur, ut etiam vulgus eos vili pretio mercetur. Alofae fere similis est sapore, sed corpore paulo rotundiore. Igitur nihil aequè obstat horum piscium bonitati quam immensa eorum multitudo, & quod facile parabiles sint.

2. **D**E ALPHORESCH. Bot. Crassa ac praedura huic est pellis, de qua, respectu mulierum, idem est dicendum, quod supra de Raia dixi, quæ exhibetur Tab. XVII. N. 1. Quod restat de eo dicendum non multum est, namque cum nostris piscibus cognominibus ad amissim convenit, si spectes formam aut carnis saporem. Colore tamen multum differt à nostratibus. Est enim ille obscuri quidem coloris, sed ubique lineolis sive striis variati. Maculae in eo cernuntur praeterea coeruleae & ad oras subnigrae.

3. **I**CAN TATABULA, quod nomen à nostris vertitur de *Speelvisch*, quasi dicas *Lusorium*. Scilicet natura dedit illi in summo dorso maculas aliquot quadratas, osseas, ac punctulis notatas. Eas imperitum vulgus fabulatur esse aleas lusorias, & non veretur mendacio quadam fabula fidem querere. Scilicet ajunt nautas quosdam eo ludendi ardore processisse, ut neque dies neque noctes à ludo abstinerent. Deinde factum, ut aliquis eorum, quasi resipiscens, aleas extra navem projecit addito jurejurando, quo sibi ipse omnia mala imprecaretur, si postea denuo ad ludum accederet. Istum hominem cum fatis tenax non esset jurisjurandi, postea denuo

libido ludendi incessit, atque etiam coepit ludere animo magis ludo intento quam unquam antea. Fit interea, dum is cum suis in posteriori parte navis strenue calfacit forum aleatorium, strepitus magnus in navi sociorum concurrentium ad piscem aleis in tergo notatis, ac hamo captum à sociis navalibus. Accedit & nauta, videt miraculum, & inde in memoriam jurisjurandi rediens sanctè promittit se porro melius victurum. Videri possit cuiquam hæc fabula esse ficta postquam tales pisces coeperunt innotescere, atque reperisse fidem apud vulgus, quod ubique miracula venetur; is sciat se habere me sibi consentientem. Porro, quin talis piscis exstet nullus quidem dubito, quum supra aliquid simile in cornibus cervinis & florum sertis vidimus, sed maculas istas accurate aleas referre vix ego crediderim. Aliis liberum relinquo, quid de hac re tam insolita velint statuere. Ceterum, vix quidquam aliud in hoc pisce notabile, nisi forte, quod aculei quidam promineant è pinnis ventralibus.

4. **D**E BESAANVISCH, ita dicitur à longissima cuspide, quæ mali instar prostat in summo dorso, paulum reflexa versus caudam. Rarissime hic piscis capitur, & ideo fere ignotus est. Videtur tamen species Signiferi, qualem Tab. I. N. 3. exhibui, adeo singula in utroque conveniunt; præter colorem. Post cuspidem maximam in tergo prostant aliquot aculei, qui pinnis adhaerent. Sub branchiis duæ longissimè prominent pinnæ, quibus hic piscis in natando dexterrime utitur. In medio corpore fascia lata subviolacea ambit piscem, qui alioqui est flavi coloris.

5. **D**E ZEE OS, quem si *Bovem marinum* dixeris, rectè facies. Piscis est cornutus in capite, è quo tria prostant cornua durissima ac plane ossea. In superiore parte lateris videntur squammæ, sed non sunt, verum cutis durissima, & lamellis quasi distincta. Præterea cuspidem in tergo prominentem ostentat, reflexam ad caudam. Sub ventre aculei sunt tres nullo ligamine juncti, verum fatis magni. Cetera in hoc pisce observatu digna patebunt vel ex icone.

6. **D**E ZEE KOE. Si fides sit habenda testis oculato, hic piscis ejusdem non tantum generis, sed etiam speciei est, quippe habetur pro femella superioris, estque omnis differentia in cornibus & cuspide dorsuali, quibus hic caret. Durities pellis, forma, color, & reliqua conveniunt tam accurate, ut non magna sit causa dubitationis in hac re.

7. **D**E BORDUURVISCH. E Cyprinorum, ut forma corporis fatis indicat, genere est

est hic piscis, in quo præter maculas nihil dignum observatu reperitur. Eæ non semper sunt ejusdem coloris, sed pro ratione temporis ac loci, ubi pisces capiuntur, variant. Præsertim tamen rubent.

8. ICAN BANDA. Corpus huic pisci totum est obsitum maculis fere quadrangularibus, quæ squammarum instar se invicem excipiunt. Oculos in capite habet prægrandes & fulgentissimos; quibus addedit, quod ab eorum extremitate lineæ ducantur, tanquam radii stellares. Ceterum, capite est obliquo, & ore non magno, fere posito in medio capite. Aculeatus non est, sed pinnas longiores habet in tergo continuatas à capite ad caudam, quales etiam fere cernuntur sub ventre ab ano ad caudam. Accedit ad genus *Pectinis Salviani*.

9. ICAN BRUNO. A fusco sive nigricante colore nomen videtur huic pisci quæsitum. Est enim ille coloris præsertim fusci in nigrum vergentis. Cutis ei est dura ac detrahenda, priusquam piscis apparetur in cibum. Deinde caro est satis bona. Rapax est genus piscis, qui præsertim vivit è captura piscium minorum, quos avide devorare integros solet.

10. ICAN BRUNELLO. Minor est hic piscis, si respicias corpus, verum non minoris apud Amboinenses utilitatis, quibus est, ut ita dicam pro perca, nam quemadmodum apud nos perca habentur pisces gratissimi ac delicatissimi, si in aqua calida rite apponantur, ita eodem modo hi ibi mensis inferuntur, ac in æque magno pretio habentur. A colore, credo, etiam nomen illis inditum, quoniam eorum color undiquaque convenit cum proxime præcedente.

11. ICAN BINCO, piscis est curvo corpore, unde illi nomen est datum. Capitis color est violaceus, qui etiam est in lineis sive fasciis, quæ ambiunt corpus, atque itidem in pinnis, verum aliquanto dilutior. Reliquum corpus est cœruleum, ac notatum exiguis maculis, quales etiam conspiciuntur in fasciis violaceis.

12. ICAN PORCOS, id est *Piscis porcinus*, qua appellatione ab aliis congeneribus distinguitur. Quippe tanta pinguedine est, ut caro ejus proprie lardum sit dicenda, & nulla re magis obsit edentibus quam quod nimis sit pinguis. Caro ejus est igitur magis grata quam ad valetudinem conducens, namque ex nimio hujusmodi piscium usu provenit diarrhoea, quæ in istis regionibus difficillime curatur.

13. DE ZEEKAP. Ex eodem genere est hic piscis, cujus est superior, verum magnitudine & carnis natura differt. Scilicet neque tantus est, si corpus respicias, neque ejus caro est adeo pinguis. Ergo neque idem incommodum oritur ex esu hujus piscis, quod dixi ex illius esu solere oriri. Color est subcœruleus, atque nullis maculis in toto corpore interruptus. Superior capitis pars est candida, atque adeo argenti instar splendida, excepto quod aliquantum viret, quæ corpori conjungitur.

14. DE ANGELVISCH. In hoc prorsus est singulare, quod ex ore ejus quasi hamus bifurcatus procedat, uti in anguibus ac serpentibus, quæ res etiam fecit, ut inde huic pisci quæreretur nomen. Si corporis figuram respicias Capriscum diceres, cui sententiæ etiam videntur favere aculei in dorso conspicii.

15. ICAN BOE. Est species Cyprini lati, quem in magno honore habent Amboinenses & vicinarum insularum incolæ. A cauda ad corpus medium cœrulei est coloris, ac nihil in eo dignum observatu occurrit; verum in medio corpore quasi fasciæ latæ ac rubræ vincitur. Quod restat, usque ad caput, est fuscum ac penè nigricans.

16. DE ZANDKRUIPER. Notus est satis hic pisciculus, atque ab aliis jam descriptus. Icon nostra satis etiam convenit cum illa, quam dedere alii auctores in hoc pisciculo describendo. Est autem è genere torpedinum, at statim se in arena abdit, simul ac aliquem accedentem audit, unde apud Ichthyographos ei nomen *Ammodite Indici* adhæsit. Vid. Willoughb. Tab. G. 10. No. 2. ad Raium in Synopsi p. 154.

17. DE MONIVISCH. Ignotus mihi pisciculus, quem tamen non difficile esset revocare ad aliquam speciem cognitorum jam piscium, si videretur res tanti esse. Nihil in illo adnotatu est dignum, quod se non prodatur intuentibus iconem ipsam. Quare ad eam mittendus est lector.


18. DE HARDER, id est *Mugil*, sic enim nos interpretamur, quum vox proprie significet pastorem, sive bubulcum. Satis etiam hic est notus, nec dignus esset, qui exhiberetur, nisi os ejus esset longe alio modo positum quam aliorum piscium solent ora poni. Scilicet non in inferiori capitis parte cernitur, sed in superiori, quoniam caput non curvarur prope os, sed recto tramite à dorso procurrit. Illud igitur tantum notandum est, atque ideo hic piscis adscribendus aliis mugilum speciebus, quæ apud nos sunt notæ. Atque hæc dicta sufficiant de piscibus Amboinensibus & vicinarum insularum, è quibus quosdam vidimus satis accuratè delineatos, alii autem an omnes ita, ut exhibentur, ad amissim sese habeant, adhuc dubius hæreo. Verum spes est huic Naturalis Historiæ Parti deinde ulteriori indagatione haud exiguum lucem accessuram.

F I N I S.

ADMONITIO, quibus paginis Tabulæ piscium sint adjungendæ.

TAB. I. pag. 1. T. II, 4. T. III, 5. T. IV, 8. T. V, 10. T. VI, 11. T. VII, 13. T. VIII, 16. T. IX, 17. T. X, 20. T. XI, 21. T. XII, 24. T. XIII, 25. T. XIV, 28. T. XV, 29. T. XVI, 32. T. XVII, 33. T. XVIII, 36. T. XIX, 37. T. XX, 40.

HIS



HISTORIA
NATURALIS
PISCINUM.

PER
J. L.

JOHANNES
L.



HISTORIA NATURALIS PISCIIUM.

CURA

H. RUYSCH.

PRÆFATIO

JOH. JONSTONI.



Ecce Tibi Historiæ naturalis specimen, studiose Lector. In piscibus id exhibere voluit Typographus: ego non multum interesse arbitrabar, in quibus daretur; modo & reliqua, quod Deo volente fiet, prodirent. Suscepti laboris tui mihi commodum causa; cui fortè per diffusa volumina hæcenus incumbere molestum erat. Taceo jucunditatem, quâ melioribus ingeniis, dum inexhaustam specierum naturalium varietatem, & stupendum eorumdem genium exhibet, illabitur: *Deum, eruditionem, conversationem, & naturæ imitationem*, si respexeris, summè eam necessariam comperies. *Deum dico.* Cultor quotidianus infinitæ Dei Potentiæ & bonitatis esse teneris. Hic Naturæ liber tibi ejus post sacrum codicem admiranda aperit. Machinam hic tantæ vastitiei invenies; tantæ & ejus partes molis, ut difficile sit judicare, quid magis in stuporem nos agat, infinita partium a se invicem distantia, an tanta earundem inter se magnitudo. Videbis aspectu vilia, & tantæ subtilitatis corpuscula, ut nulla planè esse appareant; sed quarum virtutes maximis illis controversiam faciant. Sol centies sexagies, vel ut cjes mille milliarius conficiat. *Proximum etsi terris Sydis, Luna;* ab iisdem tamen, dum minimum distat, *L. i. terre semidiametris;* hoc est, milliarius Astronomicorum 178698. removetur: quæ si in nostra milliaria per 52. reduci deberent, quanta quæso distantia non exsurget? Terra & aqua in unum globum redacta; etsi gravia corpora, ita tamen in medio aëre suspensa librantur, & ad polos mundi disponuntur, ut ne latum quidem unguem, vel ab oriente in occidentem dimoveri; aut à septentrione in Austrum, vel vice versâ, propelli possint. Pisciculus est Echineis, quem Remoram dicimus. At idem, gubernaculo navis affixus, immobilem eam reddere creditur. Ferruginea gleba Magnes: at quæ non miracula ejus beneficio patramus? Imbellis populus formicæ: tamen iis Reip. ratio, memoria, cura. *Semina erosa condunt, ne rursus in fruges exeant e terra. Madefacta imbre proferunt & siccant. Et quoniam ex diverso convolvunt, altera alterius ignaræ, certi dies ad recognitionem mutuum, velut mundinis, dantur.* Exiguum insectum Apis, nec ullius, si solo aspectu æstimari debet, pretii. At si earum naturam, Remp. opera excusseris, exclamabis; *verum naturam nusquam magis quam in minimis totam esse.* Infinitæ hæc potentiæ argumenta, quæ Historicus naturalis suggerit. Bonitatem si attendas, grande illius documentum, quod nulla re natura ad conservationem sui destituitur; quod omnes hujus universi partes, singulari nexu inter se colliguntur, & sibi mutuum ad conservationem totius præstent subsidium: quod superiora, etsi mole, loco & qualitatibus nobiliora videantur, inferioribus quasi inserviant; & denique, quod cuncta homini tanquam regulo suo famulantur. Rem se ita habere, per universam corporum naturalium seriem, in Historia deducitur. Bona eruditionis nostræ pars naturalium peritia. In eo defudat intellectus noster, ut quænam sit sublimium, elementorum, subterraneorum, plantarum, animalium, hominis denique ipsius conditio, penitus cognoscat. Spinosa illæ de materia primâ, infinito, loco, tempore, motu, generatione, &c. quæstiones huic desiderio non sufficiunt: historia, si exactè instrui velis, consulenda est. Generalia sunt quæ præcipiuntur, & isagoges primò vicem tenent: in adyta per singularia inducimur. Ab his illa abstrahi, per eadem restringi, confirmari, refutari, nemini ignotum. Nullæ nobis metallorum, lapidum, terrarum, succorum, florum, plantarum, &c. differentie essent, nisi à singularibus eorundemque inter se comparatione peterentur. Non poterat Aristoteles & ex eo Plinius scribere, *Capita piscibus proportionem corporis maxima: Nul- li animali, cui cornua, exsertos dentes, sed omnibus concavos, piscium omnibus serratos præter scaro: volucris nullo præter vesperilionem; Quibus longa crura, iis & longa colla: Cornigera una parte dentata, & quæ in pedibus talos habent, sævo pinguescere, bisulca, scissivæ in digitos pedibus, adipe; &c. nisi Hi- storiam consulisset.* Inde ergo tibi & in hoc puncto necessaria; quod fortè accuratissimè explica- rum, ut omnia solet Excellentissimus D. Sperlingius Amicus noster singularis in specialioribus Physicæ, quas adhuc premit, partibus dabit. De *Conversatione* res clara est. Eo sæpius de natura apud veteres in conviviis in usu, Plutarchi Symposiaca, & Athenæi Deipnosophistæ docebunt. *Natura imitatio* summus sapientiæ nostræ apex est. Hæc indigentia humanæ subvenit, opes auxil, inge-

P R A E F A T I O A D L E C T O R E M.

ingenium supra sortem mortalem extulit. Deo quasi similes redduntur, dum ipsius naturæ machinamentis uti, eandem, generando, corrumpendo, transformando, provehendo, impediendo, divertendo, resolvendo, reducendo, &c. nobis quasi subijci & famulari cogimus. Ausum est hæc ingenium humanum, cælum perpetuo & uniformi motu æmulari; ignes perpetuos, deducta quasi astris face, accendere; ventis, pluviis, iridibus, fulguribus, tonitribus, minari; ærem in unum coactum librare; aquas in declive ire solitas, in sublime propellere; monstra & novas species formare; lapides pretiosos fundere; corpora in sua principia, plumbum in hydrargyrum, ferrum in liquorem rubiginosum resolvere; arbores argenteas & aluminosas subito producere; plantarum incrementa retardare vel accelerare; easdem in seipsas transmutare; ex tineribus resuscitare; facultate purgativa, & venenata imbui; ex stupidis lignis, & mineralibus, Deos, cœlites, heros, Aquilas, columbas, muscas, mundum adeoque ipsum efformare, iisque animam inspirare; oculum syderibus inferre; exilibus stupendam molem adaptare; Musica affectus varios excitare & sopire; Dæmonum denique apparitiones, spectra, & nescio quas *παραφρονας* ad instar Morgannæ Reginae in freto Mamertino, de qua ingeniosissimus Kircherus, Artis Magiæ Lucis & umbræ l. 10. c. 1. agit, mentiri. An hæc absque naturalium cognitione peracta? Falleris. Non potest agricola suum agrum bene proscindere, effringere, tertiare, occare, runcare, sarrire: non hortulanus suum hortum plantare; opilio ovibus prospicere; pecuarius pecori subvenire; venator feras sectari; piscator squamigero gregi insidiari; auceps aviculas allicere; &c. absque hujus subsidio si fuerit. Hujus beneficio convenientia animantibus Adamus nomina imposuit: & Caini posteritas artes fabriles invenit. Non est ergo mirum, & Salomonem tantum huius studio impendisse, ut de plantis & animalibus libros, quos nos perisse dolemus, Urreta in Bibliotheca Preteganis habere nugatur, scripserit; tantum per Alexandrum M. indagandi Animalium per Aristotelem natura studio inlumpum, ut summa ad plura talenta excreverit: tantum & præterito sæculo Franciscum I. Gallorum Regem, ut *Gyllium* & *Bellonium*, viros eruditissimos, & quorum quædam in hac materia scripta extant, in remotas Europæ partes, quin Asiam & Africam misissent. Hujus etiam sine dubio admiratione factum, quod præter Reges & Principes, præcipui Philosophi in eam inquisiverint, & posteritati commendarint. Habemus præter eos, quos in Bibliothecis, Alexandrina, Constantinopolitana, Pergamenli, & aliis perisse dolemus; quique fortè adhuc cum blattis & tinea conflictantur, inter veteres Geographos, Aristotelem, Theophrastum, Dioscoridem, Ælianum, Oppianum, Columellam, Varronem, Palladium, &c. & qui omnium instar est Plinium, cujus Solinus simia appellatur; inter recentiores, Gesnerum Germaniæ Plinium, Aldrovandum, Wottonum, Turnerum, Mouffetum, Agricolum, Boërium, Baccium, Ruveum, Schonfeldium, Freygius, Mathiolum, Tabernmontanum, Bauhinum Ximenem, Bustamantium, Rondeletium, Bellonium, Cæsium, Thevetum, Marggravium, Pisonem, ab Horto, &c. & qui utriusque Indiæ Navigationes scripsere. Hinc fit, ut sæpe mirari soleam, quod nullam huic Historiæ in Academiis, Bononiensem si excipias (in Wittebergensi quoque eam cœpit urgere Cl. Sperlingius) Professionem assignatam videam: & malitius sæpe inter quæstiones de generalibus motis consensescere, nulli vitæ generi prompti; quam nature abdita scrutari, quæ omni inserviunt. Et tantum de Historia naturali. De *Labore* medicæ hæc paucis habe. Totam me naturalem historiam prætexere constituisse, si mihi ad tantas curas Deus vitam producere voluerit, eamque ex vastis illis tam recentium quam antiquorum, Plinii imprimis, Aristotelis, Oppiani, Gesneri & Aldrovandi, voluminibus excerptam, & brevioribus gyris inclusam, ut te quasi in illa scripta introducerem: illa præcipue quæ ad naturalium cognitionem spectant omisissis aliis attingere, ne te distraham: ordinem qui mihi videtur commodissimus sequi, ut memoria tua juvetur: Paralipomena ex recentioribus illis imprimis, qui Indica nobis dedere, addidisse, ne quid omisissum esse conqueraris: in descriptionibus authorum ipsorum plerumque verbis uti, sæpe & breviora capita inserere, ne quid secus acceptum occurrat: Authorum loca etiam ab istis neglecta adjecisse, ne te ab his abduci per compendia, imaginis: Figuras, & quidem elegantes, ut Chalcographus adjiceret persuasi, ut descriptiones facilius conciperes, & impressam memoriæ imaginem, specie ipse visâ depromere posses. In hoc de Piscibus volumine adjectos quosdam ex Schonfeldio habebis: Liber verò quartus ex Marggravii, in cuius immatura morte, ingentem Resp. literaria jacturam fecit, Historia Brasiliæ naturali totidem verbis depromptus est: Cur ad suas classes reduci non potuerint, dixi. His interim frui, studiose Lector, & ad sequentes nundinas, Avium, Quadrupedum, & Aquaticorum, Exanguium, quæ jam parata, Historiam expecta. Bene vale, & studiis nostris fave. Dabam Lesznæ Polonorum ex Museo, in cureotide Nativitatis Salvatoris nostri, Anno M. DC. LI.

ENUMERATIO MORBORUM

quibus petuntur Remedia ex PISCIBUS.

A. A dustæ partes. Pag. 88. b. Alvus. 28. b. Alvi profluvio. 24. a. Alvum reddens. 56. b. Anguillam purgationis causa deglutire. 83. Angina. 55. a. Ani vitia. 41. b. Arquatus morbus. 64. b. Arquatus oculorum morbus. 115. b. Asthma equorum. 83. b. Articulorum dolores demulcens. 16. b. Artuum dolores. 115. b. Auditus gravis. 88. Aurium dolores. 83. a.	Exanthea. 34. b. F. Febris. 112. b. 115. b. Febris quartana. 155. b. Fœtura. 119. b. G. Genitalem humorem augens. 118. a. H. Hepati conferentia. 24. a. Hemorroides. 41. b. 83. b. I. Ictericus morbus. 26. a. 115. b. L. Lactis mulieribus copiam facere. 4. a. 56. a. Lethargia. 101. a.	Pterygia oculorum. 28. Pustulæ. 30. a. R. Renum lapides. 108. b. S. Sanguis è naribus fluens. 112. b. Sanguinem stringens. 147. a. Scabies. 24. a. Scrofula. 34. b. Secundinæ à partu hærentes. 104. a. Somnifera. 157. b. Strangulatus mulierum. 64. b. Stranguria. 49. b. Stillicidium urinæ. 37. a. Strumæ efficacia. 70. b. Suffusiones. 23. b. Surditas. 20. b.
C. Calculus. 32. b. 111. a. 159. Caligo oculorum. 49. b. Canum rabidorum morsus. 35. b. Capillos restituens. 83. b. Capitis dolorem amovens. 11. b. 70. b. 115. b. Carnes oculorum supervacuas. 63. a. Cephalalgia. 34. b. Cicatrices. 63. a. Colica. 33. b. 104. b. Comitiales morbi. 157. b. Cutem denigans. 101. a.	M. Mammæ. 24. a. Mulierum morbi. 157. b. Mulieres ne concipiant. 41. b. N. Nephritis. 73. b. Nephriticis adversantia. 157. b. Nervorum dolores. 83. b. O. Oculorum maculæ. 104. b. nubeculæ. 104. b. suffusiones. 43. a. 104. b.	T. Tabes. 24. a. Tenefimus. 35. b. Torpedines amovens. 115. b. Tumor gingivarum. 54. a. V. Venenis obstants. 61. b. Verendorum pustula. 56. a. Veneris vim augens. 112. b. Ventris tormina ex dysenteria sopiens. 83. b. Ventriculi vires reficit. 73. a. Verruæ. 49. b. 55. a. 56. a. Vesicæ vitia. 50. a. Vini tadium pariens. 83. b. Vomitum compescens. 73. b. Vulnera. 83. b. Vulva. 30. a. 55. a.
D. Dentibus & gingivis infantium conferentia. 155. b. Dentium dolor. 19. b. 61. b. Dentitionem puerorum promovens. 14. a. Dothienæ. 34. b. Dysenteria. 41. b. 55. a. E. Epinyctides. 101. a.	P. Panni. 33. b. Partus mulierum continens. 8. b. promovens. 104. b. Pavores repentinos tollentia. 55. b. Pavores arcens. 14. a. Pituita. 32. b. 42. b. Plueria. 111. a. Podagra. 16. b. 157. b. Prurigo. 20. b.	U. Ulceræ exsiccans. 111. a. Ungues. 88. b. Unguam scabrities. 49. b. Urina. 28. b. Urinæ difficultas. 111. a.

NOTITIA PISCIUM

ex quibus Remedia præstantissima capiuntur.

A. A cus. Pag. 37. a. Albula parva. 119. b. Anguilla. 83. a. Anthis. 34. b. Astronotus. 147. a.	G. Glaucus. 4. a. Gobii. 35. b. H. Hepatus. 30. b.	P. Pastinaca marina. 19. b. Perca marina. 30. a. Perca fluviatilis. 108. b. Phoca. 159. b.
B. Blennus. 50. a. Boopis. 56. a.	I. Ichthyocolle. 101. a. Julis, aliis Jurella. 28. b.	R. Raja. 20. b. Rana marina. 23. b. Remora. 8. b.
C. Carchæa. 14. a. Centrina. 16. b. Coracinus. 32. b. Cuculus marinus. 42. b. Cyprinus. 112. b.	L. Lucius vel Lupus. 111. a. Lupus. 70. b.	S. Sardus. 54. a. Scarus. 26. a. Scombrus. 64. b. Scorpio. 49. b. Squatina. 24. a.
D. Delphin. 155. b. Draco. 61. b.	M. Mæna. 55. a. Manatis. 157. b. Milvus seu Milvago. 43. a. Mugil. 73. a. Mullus. 41. b. Murena. 11. b.	T. Tiuca. 115. b. Thynnus. 6. Thymallus. 88. a. Torpedo. 18. b.
E. Erythrinum. 44. b.	M. Mustella fluviatilis. 104. a. b.	U. Umbra. 33. b. Uranoscopus. 63. a. IN.

in Historiam de Piscibus & Cetis, juxta seriem alphabeticam
dispositus, in quo litera P. paginam descriptionis,
T. tabulam denotat.

A.	P.	T.	P.	T.	P.	T.
A bacatuaia.	141.	37	Afellus alius.	2.	Cete.	150.
Acacana.	165.		Afellus virefcens.	46	Cete admirabilis forma.	45
Acara.	126. 133.	34	Afellus varius.	46	Channe.	30.
Acaraaja.	133.	34	Alper pifciculus.	96.	Citharus.	59.
Acaramucu.	141.	37	Danubiantus.	96.	Citharus flavus f. alper.	59.
Acarnan.	44.	18	Attagenus lepras.	27.	Clavatus Cyprinus.	120.
Acara pinima.	126.	32	alius.	13	Cobites aculeata.	97.
Acara pitamba.	127.	33	Atherina.	52. 17.	Barbatula.	97.
Acarapucu.	124.		Attilus Padi.	99.	Cobites fluviatilis Rondel.	97.
Acarauna.	123.	32	Aurata.	46.	Cobitus.	26
Acipenser Zelandicus.	23.	23	Axotototi.	147.	Colia five lacertus.	64.
Acipenser	75.	23			Conger.	9.
	2	23			Coracinus.	31.
	3	23			minor.	32.
A culcatus marinus major.	47.		B		niger.	32.
Acus major Oppiani	37.	15	Bagre.	143.		32.
minor Bellonii.	37.	15	species alia.	38	Carax Rondel.	65.
alia species.	36.	15	alia.	38	Corocoro.	135.
Acus Aristotelis.	36.	15	alia.	38	Corvulus.	31.
alia species.	36.	15	alia.	38	alius.	2
Adonis exocatus Bellonii.	32.	15	Balanx genera.	151.	Corvus Niloticus.	94.
Agonis Italicus.	121.	30	Balanx vulgi.	152.	Cottus Gefneri.	95.
Germanicus.	93.	26	Balanx 60 pedem longitudine &	41	Cuculus.	42.
			altitudine.	42	Cucupuguacu.	134.
Ajereba.	144.	38	Ballerus.	114.	Cucuri.	39
Alaüda cristata.	38.	17	Barbo.	88.	Curema.	137.
non cristata.	38.	18	Barbota Gallorum.	102.	Curimata.	128.
Albula cœrulea.	119. 120.	30	Barbus Salviani.	31	Curruca.	125.
Albula lavaretus.	118.	30	Bezola.	118.	Curvata Pinima.	140.
Albula lacultris, Bezola dicta.	119. 30	30	Blennus.	49.	Cynadus Alphaflus.	31.
Albula minima.	119.	30	Blennus Bellonii.	19	Cyprinus.	111.
Albula nobilis.	46		Blica feu Ballerus.	114.	latus Rondel.	113.
Albula parva Gefneri.	119.	30	Boops.	56.	alius.	114.
Albula.	46		Boops peregrinus.	26	monitrofus.	112.
Alburnus albus Salviani.	120.	30	Boops Rondeletii.	66.	Salviani.	31
Alburnus Aufonii.	109.	29	Bubulca Bellonii.	98.		
Alota.	70.	27				
Alota feu Clupea.	70.	27				
Alphettes.	31.	15	C			
Ambriza.	148.		Comatipaguacu.	137. 40.	Delphinus prior.	154.
Amia.	6.	3	Camuri.	130.	alter.	43
Amilor.	148.		Canadella.	30.	Denter five Synodon.	45.
Ammocatus, vide Exocatus.			Canicula feu Galeus canis.	14.	Doncella feu Julia Salviani.	19
Amore Guacu.	132.	34	Canis Carcharias.	13. 14.	Draco marinus major.	60.
Amore Pixuma.	135.	35	alia species.	6	minor.	11. 60.
Amore Tinga.	135.		Aristotelis.	159.	Dracunculus.	61.
Anguilla.	81.	24	Carcharias aliis.	6		
alia.		24	Canis Carcharia dentium series.	7		
Anthias Rondeletii.	31.	16	Canis marinus.	8	E	
Anthias afellis conformis Rondelet.	16		Cantharus.	47.	Encafricollis.	51.
Anthias primus.	16		Caper five Caprifcus.	74.	Epelanus fluviatilis.	109.
fecundus.	16		Capeuna.	127.	Eperlanus.	78.
tertius.	16		Capito Anadromus.	73.	Erythrinus.	43.
quartus.	16		Capito Aufonii f. Squalus veterum.	98.	Exos five Ichthyocolla.	100.
Antias congener.	16		Capito fluviatilis f. Squalus minor.	90.	Exocetus.	32.
Antacæus Rondel.	100.	25	fluviatilis rapax Gefneri.	91.		
Alatus.	100.	28			F	
Anthropomorphos.	146.	40	Carapo.	134.	Faber.	57.
Aper.	3.	1	Carana.	125.	marinus.	17
Aphyia Cobites.	51.	19	Carpio.	118.	Fario feu Trutta.	85.

HISTORIÆ NATURALIS DE PISCIBUS.

LIBER PRIMUS.

De Piscibus Marinis.

TITULUS I.

De Pelagiis.

CAPUT I.

De Piscibus Squammosis.

ARTICULUS I.

De Asellis.

Tab. I. r.
Tab. II.
I.Varro. l.
4. de LL.
Oppian.
l. 3.
Haliut.
Plin. H.
N. l. 9. c.
7. item. l.
32. c. 11.
Athen.
Dipnol.
l. 7.

Pisces, qui Latinis *Aselli* dicuntur, Græci *ἰσὶν* & *ἰσῆναι*, seu ab asinino colore, quod Varroni placet, seu à torpore, ut Oppiano, vocant.

Genera eorum duo Plinius, & Dorion, faciunt, *Callariam* & *Bacchum* seu quem *Gadon* alii dicunt, & *Calleridam*, *ἰσὶν* & *ἰσῆναι* tria Oppian. nisi Oniscum pro parvo sumpserit: Nos eis *Asellum nigrum*, *Molvam*, *Morhuam*, *Gobergum*, hisque *Muselam*, & *Tincam*, adjicimus.

Onos, nonnullis *ἰσῆναι*, *Asellus*, Plinio, seu quod Libero Patri facer, seu ob tumidū ventrem *Bacchus*, Dorioni *Gadus*, Holl. juvenculus *Bolek*, adultus *Cabelliau*, dicitur, magnitudine est insigni, tres enim cubitos saepe excedit; colore in tergore, nigricante, ad latera & in ventre albicante, capite amplo, ore, ante quod cirrum habet, (radiolum & virgulam quidam vocant) grandissimo. *ἰσῆναι* *ἰσῆναι* *ἰσῆναι*

Arist. H.
A. l. 9.

ἰσῆναι, Arist. dicit, ventre non variegato (malè Epichar. apud Athen. *ἰσῆναι* vocat) sed tumido, ut *ἰσῆναι* legendum sit, jecore maximo. *Degit* in alto mari, in aliquo latibulo; sub Sirii maximè exortum latitat, cum alii per frigus se abdant, sæpè se arenâ obruit, unde forte *Sandi* apud Borussos nomen.

Plin. H.
N. l. 9. c.
17.Arist.
H. A.
Elim.
H. A.

Ufus ejus in cibis apud Rom. post Accipenserem, hodie apud Septentr. frequentissimus. Carne est alba & friabili. quod si mari puro & alimento probo utatur, carnis bonitate cum saxatilibus contendit. Difficilem esse concoctu, virosumq; aliquid habere Diphil. apud Athen. prodit. Exsiccatum osseam duritiem contrahit, nec nisi fustibus verberatus coquitur; unde piscis fustuarii, & Germ. *Stockfisch* nomen. Sale inveteratus, & salugine abluta ex nova aqua elixus, *Laberdamus*, (*Laberdan*) in Germaniam devectus, *Khemsfisch* / Rheni piscis, vocatur.

Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.
c. 30.

Callarias f. *Clarius*, *galaria*, *galerida*, *galaxia*, Holl. *Schelfisch* / *Murmelio* *Piscis capitosus*,

Gallis *Merlucius*, longitudine plerumq; est cubitali, teres, ventricosus, squammas habet minutas, in lateribus & dorso ad cineritium colorem vergentes. Caput majusculum, & in eo lapillos duos oblongos, latum, pressum. Oris rictum maximum. Oculos maximos, branchias utrinq; quaternas, duplices; in interiore oris parte post linguam ossa patre inferna, superna, aspera, & in gula, regione cordis duo alia reliquis longiora, quæ obstant ne pisces dum devorat, in gulæ angustias compulsi, aculeorum asperitate cor vulnerent. *Ventriculus* est magnus, crassus, superiore parte latus, inferiore acutus, albus in interna capacitate tenuissima ac nigerrima membrana obducitur. Pinnis natat. 4. quar. quæ in supina parte, ori sunt propiores, quam quæ ad branchias. Unicam habere spinam ex dissecto Salvian. didicit. Interiora si spectes, cor, quod inter branchias situm est, pericardio involutum, figuram ossis dactylorum exprimit. *Iecur*, cui fel committitur, album, *intestina* rubent, *uterus* bifidus nec longus ex vertebrarum extremitatibus, quæ retusa sunt, crassâ utrinque membrana, scapulæ formam dissecta ad amussim representans, suboritur; quæ capacitatem intus vacuum, extuberantemq; efficit ita. ut piscis ventriosus reddatur. *Degit* plerumq; circa exnosa ac herbosa littora. Gobionibus, atherinis, & marinis rejectamentis vescitur. Carne est candida & friabili. Huic similis est, quem Veneti *Piscem mollem*, Rom. *Ficum*, Galli *Merlangium*. Albus argentei coloris, mollis, squamis parvis tectus, oculis magnis, argenteis; ore mediocri, dentibus in maxillis, parvis, albis, acutis, ordinatis. In capite calculos oblongos habet. *Pinnas* ei tres in tergore, duas ab ano ad caudam, in lateribus ad branchias utrinque unam, Bellon. tribuit. Spina tergoris 60. vertebris. linea à branchiis ad caudam sinuosa ducitur. *Ventriculum* habet magnum cum multis appendicibus. *Epar* ex candido rubescens, vulvam bifariam juxta Rondel quadrifariam juxta Bellon. divisam. Ascendit sæpè ex alto ad littora, & Aphys Caridibus, Gobionibusque, quos integros devorat, pascitur. In Gallia maximè frequens est. *Asellus NIGER* Anglis ideo *Collfisch* / à carbonibus dictus; squamis est latioribus, tergore nigricante, ventre candidiore. Linea à capite ad caudam atra, & ad latera aliquantulum inflexa producit. pinnæ reliquis sui generis piscibus duriores

Tab. I.
2. 3.
Tab. II.
2. 3.Aldrov.
l. 3. de
Piscib.
c. 3.A'drov.
Gefner.
Tab.
II. 3.

res & robustiores sunt. Parvus carnem habet planè inspidam, profectus habetur in pretio.

Asellum trefc. v. Tab. 46.

ARTICULUS II.

De Molva, Morhua, Mustela, & Tinca marina.

Tab. II.
6. Tab.
XXXVj.

MOlva, Rondeletio *Asinus varius*, & *Molva major*, dorsum habet cinereum multis maculis nigris conspersum, ventrem candidum falcatum, pinnae in dorso tres, à podice unicam, duas ad branchias, duas in ventre. *Dentes* in maxillis, internas partes *Asino* similes.

Aldrov.
de Pisc.
lib. 1. 3.
cap. 6.

Morhua seu *Molva altera*, Anglis *Morchuel*, plerumque est sesquicubitalis longitudinis, pedis unius. *Os* ipsi magnum, *dentes* in maxillis, *oculi* magni. Ex inferioris maxillae extremo *appendix* carnosae ceu pilus è barba propendit. *Pinnae* ad branchias & in ventre binæ, parte prona tres, à podice duæ conspiciuntur. *Dorsum* cinereis fulvisque maculis notatur. *Venter* est falcatus. Caro coctione propter humoris tenuis consumptionem, glutinosior, ut farina aqua diluta, & saccharum dissolutum evadit, butyro immersa adeò digitis adhærescit, ut vix inde avelli possit. *Intestina* & folliculi ichtyocollæ conficiendæ inserviunt.

Gobergus duorum cubitorum magnitudinem superat. *Colore* est cinereo, ventre falcato, ore sine dentibus mediocri partibus internis Merlucio similis. *Carnes* duriores quàm *Asinus*.

Tab. I. 4.

Quem *Mustelam* Genuenses vocant. *Illyrici* *Pegorellam* dicunt. *Bellonius Aristotelis* & *Galenus Callariam*, *Rondeletius Asellum*, veterum esse opinatur. Trium interdum palmarum est longitudinis, cruris humani crassitiei, colore exlivido in opacum abeunte. Duas in tergo pinnae gerit, minimo capiti vicina est, præter has alia ad caudam usque protenditur, ad latera utrinque una rotunda, ut & cauda visitur, sub quibus postremis crassiores ac carnosae quidam cirri bifidi conspiciuntur. Maxillæ ipsi mobiles. *Dentes* confusi, in superiore labro, maculam, cordis figura, denticulis circumfultam, linguam albicantem & in cuspidem efformatam ostendit. *Branchias* distendit utrinque quatuor. *Interiora* si spectes, sub branchiis cor delitescit triquetrum, bursâ suâ involutum. *Hepar* pallidum ac ferè lacteum in tres lobos divisum, diaphragmati appensum. Sinistra ejus pars, cæteris major, vesiculam feliis oblongam admittit. *Lien* prægrandis sanguineus, gracilis, oblongus, pastorum instrumentum, cui cornutæ Musæ nomen referens, à ventriculo dependet. In pyloro, triginta & aliquot apophyses numerantur. *Intestina* tribus revolutionibus circumflectuntur, priusquam rectum attingat. *Vesicula* quædam cæteris *Asellis* communis, gemino veluti folliculo ter-

gori conjuncta, commodum nationis usum exhibere creditur.

Tab. I. 5.

Tinca marina, propter corporis cum palustri similitudinem sic dicta, *Pesce fico* Italiam quod passus ficus instar mollis sit, vocatur. *Salvianus Asellum Callarium* esse sed falsò, contendit. Vix pedalem mensuram excedit. Corpore est toto oblongo, latiusculo, squammis minutis contexto, coloris cinericii. Capite, in quo duos lapillos gerit, lato & pressò. Ore magno, & valdè denticulato. Oculis aureis. Ex in feriore maxilla appendix cum barba propendit. Branchias habet utrinque quaternas, & ad eas binas latiusculas pinnis, unam scilicet utrinque. Ex anteriore ventris parte pinnarum vice bini longi admodum atque rotundi circi propendunt. In primo dorso pinna parva erigitur; post eam alia una enascitur, per dorsum totum ad caudam usque extenditur. Inferiori ventri singularis pinna ab ano orta, ad caudam etiam usque producta, subnectitur. Cauda in unicam rotundam desinit. *Hepar* magnum & subalbidum visitur.

Caro concoctu est facilis, sed excrementitia.

ARTICULUS III.

De Harengo, & Lipari.

Piscis, quem Germani *Harengum* fortè à Græcorum *ἡρίγγιον*, quod balsamentum sonat, alii *Halecem* vocant, qui apud antiquos sit & vocetur, ignoratur. *Chalcidum* marinæ seu Sardinæ quidam congenerem faciunt. *Thris* sive *Alois* nonnulli.

Aldrov.
vand. l. 3.
cap. 10.

Dorso est quodammodo cæruleo, ventre albo falcato, squammis acutis pertinaciterque hærentibus. Branchiarum scissuram, quia pro corporis ratione magnam habet, citissimè aqua extractus emoritur. Jejuno duntaxat intestino instructum *Albertus* auctor est.

Tab. I. 6.

In Oceano Germanico circa Britanniam, Hiberniam, Scotiam, Norvegiam, Daniam inveniuntur, in Mediterraneo quoque capi, & Romæ, Massiliæ, Venetiis proflare falsò *Bellonius* prodidit, formæ similitudine, quam cum *Trissis* habeat deceptus. Puro aquæ elemento *Nutriti* voluerunt quidam, quod in aërem protracti in momento exspirent. Magnis simul agminibus natant, & tanta ipsorum copia, ut ad c. c. m. coronatorum in singulos annos capturæ precium ascendere *Cardanus* prodiderit: In terra sancta Oceanici maris Insula i. m. hominum vitam harengis sustentabant. Cum per petulantiam unam ex captis virgis cecidissent, adeò eorum numerus est imminutus, ut post illa vix centum ex eo quæstu vixerint. Lucent in aqua, ventribus versus summum æquor, obversis. imò tantum de se splendorem, squammis maximè quæ circa oculos, emittunt, ut mare fulgurare videatur. Lucem emoriente mori, credi-

credidere quidam, per aliquot post mortem superesse dies, quidam experti sunt. Semel anno teste Alberto pariunt.

Carade-
nus in
Brigan-
tibus.
Lan-
de Prin-
cipatu
Europæ.

Mira de eorum natatu prodita sunt. Proavorum tempore ad Norvëgiam sua quasi stativa habuerunt nostro tempore Britanniam totam immensis exercitibus circumnatant. Circa solstitium æstivum ex alto Scotiæ littora petunt: inde anglica littora adeunt, & ab Augusto medio ad Novembrem à castro Scarborough ad Thamesin capiuntur. Postea aliqua vehementiore procella in Britannicum mare deferuntur, & in eo ad Christi natalitia piscantibus se offerunt. hinc Hiberniam utrinque pernantes, in Septentrionalem Oceanum, circumnavigata quasi Britannia, se transferunt. & ibi ad Junium occultantur. Postquam fretificaverunt, redeunt.

Ufus ipsorum in cibus, apud Septentrionales frequens. Recentes muriâ conditi, & exsiccati, mensis inferuntur. Solent & saliti aqua macerari: falsugine deposita, in craticula assi eduntur. Conspecta in novo orbe volantium nubes. *Misera horum*, inquit Thuanus, conditio, quibus nec in mari nantibus, nec in aëre volantibus, tutus unquam receptus, naturamque in utroque elemento novercam experti, cum ut se à perniciæ cognatorum piscium asserant, in altum evadunt, mox ab avibus circumvolantibus rapiuntur; quarum si rostrum fugiendo evaserint, arefactis aliis deficientes, rursus se in aquas precipitant, & volando fessi, à piscibus infestis glutuntur. Itaque mediam sortem eligentes plerumque in obvias naves involant, & prada hominum fiunt.

Thuan.
Histor. l.
117.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 12.
Tab. l. 7.

Liparis piscis à Plinio memoratus, à pinguedine, quasi *liparis* nomen invenit. Capite terrestrem curriculum refert. Os ei parvum, sine dentibus, maxillis asperis. virga à capite ad caudam satis lata. Squamma parva. pinna ad branchias & in ventre binæ. alia à podice ad caudam, alia à cervicis loco ad eandem continua sine aculeis.

Cauda in duas definit. Adeo pinguis est, ut sub cute pinguedinem loco carnis habeat, asservatus, totus in oleum abiverit.

ARTICULUS IV.

De Apro Scolopace & Monocero.

Tab. l. 8.
Aldrov.
l. 3. c. 12.
de Piscibus.

Per Rondeletii, quem ille cum Apro veterum eundem, sed falso ut Aldrovandus ostendit, ponit, piscis est squammosus, ferè rotundus, compressus corpore præduro, & aspera veluti ac villosa cute prædita, rostro suis instar, oblongo & obtuso, sine dentibus. aculeis præacutis, duris, longis, rectis. setas inæquales esse diceres, qui mox à capite secundum dorsi longitudinem decurrunt. Pinnas habet ad branchias duas, in ventre duas alias, multis firmisque aculeis & à se distinctis constantes. à podice tres aculeos bre-

ves & acutos. Cauda in unâ pinnam definit.

Iconem porci supini Salviani tradit Tab. XXXI. 1.

Qui Rondeletio SCOLOPAX, seu Ascolopax est, hunc alii *Elepaentem*, sed perperam, rostrum enim rigidum est; Gesnerus *Serrâ* Plinii quod radium caudam versus serratum habeat, nominat. Semper ferè parvum esse. exinde conjicit Rondeletius quod tres ejusdem magnitudinis ovis distentos viderit.

Tab. l. 9.
Rondei.
ut Hist.
Pisc. Ge-
snerus de
Aquatil.

Corpore est rotundo, Erythrini modo rubescente. rostro prælongo, rigido. In dorso habet aculeum longum durum, præacutum, altera tantum parte serratum. denticulis serram referentibus, utpote contiguus basibus quæ latiusculæ sunt. Caudam habet tenuem.

Caro ei substantia Pagro similis. boni succi & facilis concoctionis. Cum rarus sit, exsiccat potius servatur quam editur.

Monoceros Clusii, ob consimilem potius cum Scolopace formam, quam ut quod intersquammosos censeretur debeat; aspero enim corio est; priori subjungitur. Ex orientali India alatum Clusius ita descripsit. Ab extimo ore usque ad caudæ pinnas, paulo longior erat tribus uncis, medio corpore paulo plus uncia latus, &c.

Tab. l.
10.

Clusius l.
6. Exot.
c. 27.

ARTICULUS V.

De Glauco veterum & Hippuro.

GLaucus piscis à colore cæruleo seu Cyaneo ita dictus, interdum à Græcis, teste Eustachio, dicitur, & benè à Glaucisco, cum ille æstate lateat, si Aristoteli & Ovidio credimus; hunc æstate & hyeme Damoxenus Comicus in cibus laudet, distinguitur. Mnesitheus apud Athenæum inter Volaterranus ferratorum & carnivororum genera, eum ponit, Aristoteles squammosum facit, & paucas appendices supernè circa ventriculum exeuntes habere adjicit. Plinius austero & irascenti mari simili colore, esse prodit.

Tab. l.
11.

Plin. l.
32. c. ult.

Apud Rondeletium tres ipsius habemus species. Prior provincialibus Cabrolle dictus, tricubitalis quandoque, corpore est longo, ventre compresso, dorso falcato, cæruleo, cute nitida, squammis vix apparentibus, ni cutis exsicceatur. ventre candidissimo, maxillis asperis potius quàm dentibus munitis. Statim à capite aculeos habet; quorum duo qui juxta anum sunt, velut in vagina conduntur. Aculeos pinna sequitur, ad caudam usque continua, initio magna, maculâ nigrâ notata, inde brevis & tenuis, tenuibus quasi villis constans. Ad branchias pinnæ aurei sunt coloris, pro podice rimam potius quàm formam sortitus est. Ventriculum habet magnum cum uno appendice. Vesica fellis intestino adhæret. Splen parvus, caro candida & pinguis visitur. Salvianus Amiam veterum esse credit, Jovius centrinam quibusdam videre dicit.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 36.

Alter minor, unde *γλαυδον* apud Athenæum

næum esse conjicit, septem aculeos in dorso, ad caudam spectantes habet; à superiore branchiarum parte ad medium corpus linea tortuosa admodum dimittitur, hinc rectà ad caudam protenditur.

Tertio quem *sinuosum* vocat, quod linea à branchiis ducta, serpentum corporis flexibus gradientium instar tortuosa sit, dentes sunt acuti, dorsum ex cæruleo nigrescit.

Locum in petris etiam & arenis pasci Oppianus scripsit. Numenius apud Athæneum καὶ πρὸς αἰγυρίῳ, id est, *per algas molles*, fluctibus minimè agitata & muscum versari, tradit. Aristoteles, & Athenæus pelagium fecit. *Cibus* quidem ipsi, carnes. Sed nec algam vel muscum contemnit. Vnde Tarentinus escam ad Glaucos capiendos præscribens, partem ex musco & farina, partem ex piscium carne componit. Fœtum suum ore, ubi metuit recipere, iterum emittere, tradidere quidam; quia spinosus est, de Glaucos Galeo sumendum id videtur: sanè solum ex Galeis Acanthiam fœtus suos propter spinam non recipere, author est Aristoteles. Æstate circa LX. dies non conspicitur. Plinius alibi dictor. immemor, nunquam apparere scripsit.

Ufus ipsius expetitus in cibis, sive uterum gerat, sive non. Caput tamen potissimum, apud Anaxandridem, Soradem Comicum, inprimis si in Olytho, & Megaris captus esset, commendabatur. Eustathius palmam oculis tradit ut ut sit, difficulter, si Tralliano & Mnesitheo credimus, concoquitur. Concoctus permultumimenti præbet. Ex jure sumtum seu Glaucum seu Glauciscum, copiam lactis mulieribus facere, Plinius Author est.

ARTICULUS VI.

De Hippuro & Reverso Indico.

Hippurus seu à similitudine equinæ caudæ, seu δὴ καὶ ἵππου δὴ καὶ οὐροῦ ὡς ἵππου ὡς οὐροῦ quod equi more feratur & saliat, ita dictus, aliis ἀρπύριος ab agnis saltus urinantibus similes exercentibus, Dorioni & Epeneto ἀρπύριος, à pinna quæ à vertice incipit, in eoque veluti crista erigitur, Hicetio *Hippurea*, Hispanis *Lampugo*, *Gazæ Equilis* vocatur. Glaucos colore internisque partibus similis est, & faciliè inter cæteros pisces ex pinna quæ à capite incipiens in prona parte ipsi unica est, & caudæ equinæ simillima, villis multis constat, cujusmodi in nullis aliis piscibus reperitur. Venter in medio corpore situs est.

Degit in pelago, mari Mediterraneo ignotus. Caryllius ab Arcestrato maximè celebratur, quod mirum, cum cæteri ibi pisces viles sint. Delectatur carnibus, & nassis inclusus tantopere crescit, ut inde incrementum cepisse videatur. Vere *parit*. hyeme la-

tet in natatu celer est, & nunquam nisi certis diebus capitur.

Reversus Indicus duplex est, Anguilliformis alter, de quo inferius dicemus: alter, de quo hic, squamosus. Nomen inde, quod retractus venetur, accepit. Magnitudine est palmi. Squammis contegitur rugosis, spinis in dorso, & ab umbilico ad caudam maximè acutissimis. Docilis est, & faciliè cicuratur. Magnam Indis in venandis piscibus præstat operam. Tenui sed valido funiculo alligatus ad mare defertur, blandis animatus verbis in piscem conspectum, etiam magnum, emittitur, ejusdemque lateri seu ventri sese affigit. sic extrahitur. Præda blandè avellitur, ne, quia valide adhæret, discerpta intereat.

REVERSUM Indicum anguilliformem vide Tab. II.

CAPUT II.

De Pelagiis Levibus.

ARTICULUS I.

De Thunno.

Thunus, seu à Græcorum ὄνκον quod est magno impetu moveri, seu ab Ebræorum Thannia, quo Cetaceum piscem intelligunt, sic dictus, multa apud Authores pro diversitate ætatum sortitur nomina. Thynnis seu Thynna simpliciter sive mas est sive fœmina, Pelamyde major, Thunno propriè dicto minor. *Cordyla* appellatur partus, quot fœtas redeuntes in mare autumnino comitatur, Byzantii ἀνέλικας, δὴ καὶ ἀνέλικας ἐπὶ τῇ ἀνέλικας ut testatur Aristoteles, seu quod paucis diebus augeant (Gaza *Auxum* vocat) dicunt. Redux in Pontum ex magno mari *Cordyla*, *Pelamydis* nomen, seu κατὰ τὴν αἰὲν πρὸς τὸν ἰσθμὸν, id est quod in limo se abdat, seu δὴ καὶ πρὸς τὸν ἰσθμὸν quod gregatim degat, ut Plutarcho placet, (*Limosam*, *Limatriam*, & *Lutariam* alii vocant) sortitur. Pelamydes cum annum excessere tempus, *Thunni* vocantur, hisce paulò majores *Tritones*, *Orcynus*, *Apolectus*, *Sarda*, *Synodontis*, *Cybia* seu *Cybios*, *Cete*, *Melandrys*, *Triton*, *Chelidonas*, *Xanthias*, propriis suarum appellationem rationibus non carent. sed & variis eorum sale aservatis partibus, singularia nomina indita, apud Authores invenies.

Lubricos eos Plinius facit. Rondeletius suum *Orcynum*, ut & cum quem *Pelamydis* veræ seu *Thunni* Aristotelis nomine exhibet, squammis magnis ita ad amussim compactis, ut iis carere videatur, tegi, coctione eadem dehiscere, tuncque perspicuè apparere tenui membrana contextas, scribit. *Pelamydem* verò *Sardam* cute levi esse, & sine squammis, ea parte, quæ à pinnis ad branchias sitis, incipit excepta, adjicit. Sed nec vel de sexu notis, vel de *Pelamydum*, & *Thunorum* differentiis inter

Autho-

Oppian. l. 3. Halieutic. Athenæus. Dipnos. l. 7.

Æl. H. A. l. 1. c. 16. Arist. H. A. l. 6. c. 16.

Plin. H. N. l. 32. cap. ult.

Plin. H. N. l. 32. cap. 9. Tab. I. 12.

Rondelet. in Hist. Piscium.

Arist. H. A. l. 9. cap. 10.

Tab. III. Clusius. Exot. l. 6. c. 18.

Nieremb. Nat. Exot. l. 11. c. 18.

Aldrov. l. 3. 18. Tab. III. 2. 3. 4.

Plin. H. N. l. 9. c. 15.

Arist. H. A. l. 6. cap. 16.

Plutarch. de solert. Animal.

Aldrov. l. 3. c. 11.

Rondelet. in Hist. Pisc.

Aristot. H. A. l. 5. c. 9. Plin. H. N. l. 9. c. 15. Athen. Dipnol.

Authores convenire videtur. Aristoteli Plinio & Athenæo mas à fœmina eo distinguitur, quod hæc sub ventre pinnulam habeat dictam, quâ mascaret. Rondeletius in utroque semper pinnam sub ventre deprehendi ait, indivisam in mare, divisam in fœmina, ut podicis foramen dilatari, fœtusque commodius in lucem edi possit. Ligures & Massilienses piscatores nunquam ex Pelamydibus Thunnos fieri apertè ostendisse, author est Scaliger: à Pelamyde hoc unum distare Thunnum, quod hic sit lividus lateribus, illa undantibus maculis transversis atque obliquis eidem destinato gerat, asferet Bellonius. Captus Anno M. D. C. L. X. V. circa Gaditanum fretum, pedem xxxij. longitudine, latitudine xvj. in cujus pelle integra classis delineata conspecta est.

Scaliger in Exercitat.

Bellon. cit. Al. drov.

Oppian. Halieut. l. 3. c. 620.

Locus Thunnorum varius pro ætate esse videtur. Oppianus, qui eos piscibus pelagiis annumerat, ex Oceano in mare Mediterraneum, cum vere ad sobolis propagationem instigatur, venire, ideoque tum plurimos in Tyrreno & Iberico capi, author est, mense Majo Xiphiis cogentibus irumpere, Jovius adjicit. Pelamydes æquora fluvio aut paludi vicina incolere, ideo in Pontum ad dulciora pabula gregatim intrare, ex Plinio habemus, ibidem, ut & in Mœoticis paludibus nasci, Strabo retulit. tepore gaudere ideo per summa maris natate, aliquando flumina subire, ex Aristotele discimus; Vifos qui Agathopoli ad pontem usque, qui aliquot millibus passuum à mari distabat, conscenderent, Rondeletius prodidit. sed & in Rheno, Nilo, Pado, Platina scripsit. in algosis quibusdam locis. Gaditanis extra Herculis columnas subsolano vento cò delatis, ingenti numero, magnitudine & crassitie incredibili, occurrisse, Admiranda Aristot. venditant. Vix credendum Thynnorum multitudinem in Indico mari tantum, ut Magni Alexandri classis haud alio modo, quàm hostium acie obvia contrarium agmen adversa fronte direxerit quòd apud Plinium legimus. Græci scriptores enim Cete & Physiteres fuisse innuunt. De eorum circa Byzantium & captura & mora ita Strabo &c.

Plin. H. N. l. 9. c. 15. Strabo. Georg. l. 7. Aristot. H. A. l. 8. c. 19. Rondelet.

Aristot. in admirand.

Plin. H. N. l. 9. c. 3.

Strabo Georg. l. 7.

Aristot. in Admirand. Strabo l. 3.

Athen. l. 7. Dipn. Polybius Histor. l. 34.

Aristot. H. A. l. 6. c. 17.

Oppian. Halieut. l. 4.

Aristot. H. A. l. 6. c. 17.

Cibus eis aliquando alga; sæpè, circa Hispaniam imprimis, (ex anteriore ad columnas delati pelago, esca deficiente maceantur) glandes, ex quercubus ad mare nascentibus delapsæ quibus vehementer pinguescunt: & ex harum ubertate, ubertas Thynnorum colligitur: ut plurimum caro. Tepore fœturæ quicquid attigerint, liguriunt. quin & partu soluto, ne propriis quidem parcunt natis, sed læti tempore veris *Ova vorant subito, & lacerant sub dentibus atris.* aliquando præ pinguedine rumpi Aristoteles author est.

Vitam ad biennium duntaxat producere,

quod Plinio ex Aristotele placuit, vix verisimile videtur. Ad tantam enim excrescunt magnitudinem, ut xv. talenta pendeant, caudaque duo cubita, seu ut apud Aristotelem extat, quinque palmum latitudine, expleat, & visi capi, quos corporis magnitudine, squammarum crassitie & corporum duritie biennio multo provectiores fuisse fateri oportuerit.

Plin. H. N. l. 9. c. 15.

Aristot. H. A. l. 8. c. ult.

De *Generatione* habemus, Thunnos coire mense Februario post idus Junii initio parere semel, & quidem, in Ponto Thunnos, bis credi, quia partim tempestivus partim cordus ejus fœtus est. prior soboles mense Decembri ante brumam exit, posterior vere. *Ova* edunt quasi in utriculo. Ex his fiunt, quas Scordulas vocant, Byzantii Auxiadæ quod paucis diebus augeant.

Aristot. H. A. l. 5. c. 11. edit.

Scaliger. Plin. H. N. l. 9. c. 115.

Oppian. Halieut. l. 4. v. 505.

Vide Oppian. & Scalig. p. 234.

Excunt Autumno cum Thunnis simul, verno autem tempore repetunt, jam factæ Pelamydes. Quantum ad *animales functiones*, concessit & istis singularia quædam Natura. Dromades esse, seu ut Gaza reddit cursores, ex superioribus cognosci potuit. Non vagantur tamen bruma; ubicunque deprehensi usque ad æquinoctium, ibi hybernant. Ex Ponto exituri lævam tenent, & Aquilonem operiuntur, ut secundo fluxu exeant. ingressuri eundem, ad dextram flectuntur, quia dextro oculo plus cernunt, utraque natura hebet. Eadem debilitas in causa, quod ad saxum illud miri candoris, à vado ad summa perlucens, quod in Euripo Thracii Bosphori, quo Propontis Euxino jungitur, in ipsis Europam Asiamque separantis freti angustiiis, juxta Chalcedonem in Asia littore visitur, exhorrescant, & sic repetente terrore, adversum Byzantii promontorium, ex ea causa appellatum Auri cornu, præcipiti petunt agmine. Noctu proficisci & vetustissimum Amphyliti vatis apud Herodotum oraculum, & nummus à Bellonio visus, in quo altera parte spica, altera Thunnus conspiciebatur, & supra hunc Luna cum inscriptione PHILIPPENZE. innuit, nec de nihilo est, quod Plinius, postquam dixisset, capturam illorum à vergiliarum exortu ad arcturi oëcasum durare, reliquo tempore hyberno latere in gurgitibus imis, nisi tepore aliquo evocatos, aut pleniluniis, adjiciat. In natando figuram cubicam, si gregatim vagantur, servant, atque sex lateribus comprehensi, soliditatem ex semetipsis constituunt. Ad promontorium Bubonicum, maximi, suum instar, soli vagantur. alii more luporum bini proficiscuntur. nonnulli more caprarum, gregatim pascuntur. Exoriente canicula, in Euxinum natate contendunt, & marinis fluctibus, & fervidè radiato sole calefcentibus, inter se velut contexti, confertis turmis sese invicem opacant. *Dormire* infimis gurgitibus, sub saxo aut littore ab-

Plin. H. N. l. 9. c. 11.

Plin. H. N. l. c.

Herodot. l. 2. Histor.

Aldrov. l. 3. de piscib. c. 18.

Plin. H. N. l. c.

Plutarch. de solert. Animal.

Ælian. H. A. l. 15. c. 3.

Aristot. H. A. l. 4. c. 10.

Oppian.
Halicut.
l. 2. c. 5.

ditos, Aristoteles prodidit; & quidem tam profunde, ut ne jacta quidem fuscina, moveantur. Sub Caniculæ exortum cestro exagitantur. Heret ille ubi cutis tenuior, sub pinna, & ita miseros divexat, ut sæpè in terram *ἀνὰ πτερὰ* saliant, sæpè in naves se conjiciant.

De *Sympathia* & *Antipathia* non est quod multa dicam. Dicuntur Cephos habere comites, qui carunculas pisciculorum, à Thunnis discerptorum, aquis innatantes, depascuntur. Cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, à Sicilia prohibiti, in majores incurrunt belluas. Majo Mense à Xiphiis ex Atlantico Oceano in mare mediterraneum pelluntur. Non aliter ab iis gregatim in fugam agi, quàm ovium greges à lupis Mathiolus auctor est. De captura Thunnorum agere alterius loci est.

Plin. H.
N. lib. 9.
c. 15.

Usum reperere in *Cibis*. Olim membratim caesi cervicæ & abdomine (*καὶ ἀπὸ τῆς κοιλίας* Athenæus vocat) commedabantur, atque clidio (clidia Thyum Festus, Petimen ex Nævio Petimen piscinum, quod est inter duos armos ad pectus, claviculas Medici vocant) salitis, Omotarichi nomen impositum est) recenti duntaxat, & tum quoque gravi ructu; cætera parte plenis pulmentis asservabantur. Melandria vocabantur, cæcis quercus assulis, simillima. Vilissima ex his, quæ caudæ proxima *ἀνὰ τὴν* dicebantur, quia pingui carenti hinc *ἀνὰ τὴν* nomen, probatissima, quæ faucibus, Pelamides in apolectos, particulatimque confecti, in genera Cybiorum (sic dicuntur seu falsamenti frustra quæcunque in formam *ἀνὰ τὴν* dissecta; vel quæ ex dorsi partibus cervici clidioque proximis) dispertiebantur. Alexis caput, commendabat, caudam Antiphanes. Falconius Hetruscus eruditioris gulæ ganeo, novum & sapidissimum obsonii genus ex iis commentus est. Athenæus *ἀνὰ τὴν* (intritum hoc, ex aliis & aliis condimentis) aliis piscibus prætulit. Alii falsamenta, quæ *ῥοστρόν* seu *ῥοστρόν* potius, quàm recentis piscis quamlibet partem præferunt. Sunt quippe Xenocrati apud Oribasium stomacho inepti, mali succi, flatulenti, ad excernendum difficiles. Gálēno, durâ carne præditi, & insuaves. Archestratus tamen nobilem Thunnum circa Byzantium, Carystum & Siciliam; præstantiorem circa Cephalen & Tyndaridem oram; præstantissimum circa Hipponium Italiæ, nasci, circa Samum ingentem, & deorum convivii dignum capi, prodidit.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 10.
Ælian.
H. A. l.
13. c. 27.
Dioscor.
l. 2. c.
30.

Præbent & in *Medicina* usum. Sanguis fel, & jecur, sive recentia sive servata, vim psilothri obtinent. Non pubesciturum, qui in pueritia iis illitus est, Ælianns affirmat, Omotarichus largius sumptus, Presteris serpentis venenum retundit. Cybiorum cinis, cum melle ad Condylomaia confert.

ARTICULUS II.

De *Pompilo* & *Amia*.

POMPILUS seu *παρά τῆς πτερῆς* à transvehendo, (fabulantur enim Pompilum hominem *πτεροῦ* portitorem, vel ut Athenæo placet *παλαστήριον*, ab Apolline quod Ocyrhoen puellam trajecisset, in sui nominis piscem transmutatum) seu quod navigantes in alto mari ad continentem usque comitentur; aliis sacer piscis, aliis *πτεροῦ* dicitur, & à Plinio inter Thunnos reputatur. Athenæus Pelamydi similem & varium esse inquit. Rondeletius pro eodem, piscem squamis carentem, in dorso varium & maculosum, in quo à branchiis ad caudam linea magna curva, à qua ad ventrem lineæ multæ transversæ interpunctæ descendunt, ducitur. pars quæ supra & inter oculos est, flavescit, aurique colorem imitatur. Cauda in unicam non divisam, neque crescentis Lunæ figura, Thynnorum & Pelamydum more, desinit.

Locus ipsis ima maris sedes est. Sæpè navigia velis euntia comitantes, mira aliqua dulcedine per aliquot horarum spacia, & pascuum millia à gubernaculis non separantur, ne tridente quidem sæpius in eos jacto territi, ubi terram persensere, recedunt, nec longè abesse nautis colligitur. Inimicos experiuntur Delphinos sed magno horum exitio. Degustatis enim illis, continuò convelluntur, fororeque incensi, pelluntur, ad littora, esca marinis avibus futuri.

Amiam sex *παρά τῆς ἀμίας* quæ *παρά τῆς ἀμίας* quod una cum sui generis piscibus erat; sive quod *ἡ κατὰ μὲν οὐδὲν, ἀλλὰ ἀγανθὸν* quod non solitaria sit, sed gregatim vivat, ita dictam Ælianus *Troffam*, Hispani *Bizam* quasi Bizantium, alii *Bonitam*, vocant. Jovius & Salvianus pro ea Lechiam, alii Sphyrænam, quidam illum piscem qui Hispanis Lambugo dicitur, perperam substituunt. Piscis est Pelamydi, vel Thunno vel Scombro corporis specie, pinnis caudæ similis cute lævi, ea parte quæ circa branchias est dempta, *ροστρό* acuto, oculis parvis auræ æmulis. *dentibus* ferratis, acutissimis, in os recurvis *branchiis* operitis, *ventre* crasso, argenteo, rugoso, longo, ad podicem usque demisso, cujus appendices sunt innumeræ scombrorum appendicibus tenuiores. *dorso* cæruleo, & dum vivit splendente, à quo ad ventrem lineæ ductæ sunt obliquæ, nigrantis, certis intervallis à se distantes. *Cauda* habet tenuem, in figuram lunæ in cornua curvatæ, *intestina* gracilia, *epar* rubescens, *splenem* nigrantem, *fel* toti intestino attextum, vel ad illud porrectum paricum eo longitudine, sæpè etiam replicatum.

Degere in mari, stagnis & fluviis affirmat Aristoteles, & eum eo Scaliger. vicinum fluviis & stagnis ob dulcem aquam & limum amare, Oppianus Pontum subire, atque

Tab. III.
5.

Ælian.
H. A. l.
15. c. 23.
Athen.
Dipn. l.
6.
Apollon.
Rhodius
in Ar-
gon.
Plin. H.
N. l. 9. c.
29.
Athen. l.
c.
Ronde-
let. in
Hist. Pis-
cium.

Plin. H.
N. l. 9. c.
15.

Oppian.
Halicut.
l. 1.
Ælian.
H. A. l.
2. c. 15.
Athen.
l. 7.
Athen.
cap.
Plutarch.
utra ani-
mal.
Ælian.
H. A. l.
1. c. 6.
Tab.
III. 6.
Ronde-
let. de
Piscib.

Aristot.
de part.
Animal.
l. 4. c. 2.
Arist. H.
A. l. 2. c.
18.
ex Scali-
ger. sect.
Arist. H.
A. l. 8. c.
13.
Scaliger.
l. 2. H. A.
c. 18.
Oppian.
Halicut.
l. 1.

atque ibi cum suis ducibus æstatem traduce-
re, tum quod ibi belluæ magnæ pauciores,
tum quod ob dulcium aquar. permissionem,
pastus grator; unde eorum incrementum
singulis diebus intelligitur, certum. Circa
Provinciam in maris angustis quas insulæ
frequentes efficiunt, capi, Rondeletius au-
thor est.

Vescuntur aliquando algæ, ut plurimum
carne. Audaces & celeres sunt. quin Tro-
ctam saltu valere Ælianus loco supra citato
scripsit.

Fugnam cum delphinis apud Oppianum
elegantè descriptam invenies. idem de
Troctis apud Ælianus legitur. Capræ pro-
siliunt, & arrosâ liniâ aufugiunt. Appetun-
tur à quibusdam piscibus in escam, Glauco
inprimis, si Tarentino fides est.

Adhibentur in *cibis* tanquam boni succi
ad excernendum mediis, sed parçè nutrien-
tes. Archestratus autumnis tempore post
Vergiliarum occasum, Byzantiasque inpri-
mis commendat. procul à mari Helleston-
tiaco deteriores scribit si vicinum Ægei ma-
ris tractum pertransieris, pristinam gloriam
maculare invenies.

ARTICULUS III.

De Xiphia seu Gladio.

Piscem qui à figura rostri *Xiphias* com-
muniter, *euqias* Epicharmo, *xiol* Me-
nandro, Gladius Latinis dicitur, Homerus
à Hesychius & Varinus *Thyris* alii *Thra-*
nin, Hermolaus *Tomum Thurinum*, ita
enim apud Plinium legit. fortè à Thuriis
Italiæ oppido. Albertus *Atilitem* appellat,
Galeum à Plinio vocari, Salvianus & Mas-
surus perperam oppinantur.

Magnitudine interdum est insigni. Ad
decem nonnunquam cubitos accedere, tra-
dit Rondeletius. Delphini magnitudinem
excedere, Plinius, naviculas æquare, Strabo.
Corpus habet teres, à capite statim valde
crassum, deinde ad caudam usque tenuius,
in extremo ante caudæ exortum eminentia
quædam extuberat. *Corium* caudam versus,
ducta manu læve est, os versus asperum.
Squamæ sub cute latent plurimæ, *adept* in
dorso suis more residet. Utraque *maxilla*
rostrata est, superior magis ossea, durior, ali-
quando bicubitalis, (Athenæus totius cor-
poris magnitudini æqualem esse, scribit)
inferior brevior & triangularis, plerumque
illa habet se ad totam magnitudinem ut tria
ad decem, ista ut unum. *Gladius* est ferro
acutior, sed extincto pisce corrumpitur.
Gellius ejus mucrone dura excavavit saxa.
Dentes ipsi falso Ælianus tribuit, non admo-
dum curvos, nec admodum inanes. Nullos
enim habet, eorum loco ossa oblonga & as-
pera in palato resident, absumtâ in tantum
gladium marerâ, quæ dentibus cedere de-

buerat. *Oculi* ipsi orbiculati prominentes, &
ante eos foramina. *Brachie* octonæ & du-
plices, *tergus* ex cinereo nigricans, & serici
instar splendens. *Pellis* tenuissima, *venter*
argento micans. *Fellis* vesicula intestino
committitur.

Degunt in mari, & rarò adeunt littora.
Copiosius verò juxta Scillæum promonto-
rium apud Siculos & Zephyrium quod Ita-
liæ extremum est, hodieque Spartiventum à
nautis nuncupatur, capiuntur. Tribuuntur
tamen ab Æliano & Danubio, sed & in Da-
nia in lacu Suerinensi notissimi dicuntur.

Vicitant piscibus, quos rostri incursum in-
terficiunt, nec prius comedunt, quam spicu-
lo transfixerint.

Exortu Caniculæ divexantur ab cestro
seu asilo (Animal est parvum, scorpionis
effigie aranei magnitudine) tantoque infe-
stantur dolore, ut in naves sæpenumero exi-
liant. Balenam exhorrescunt, eamque con-
spicati, gladium suum in terram, aut ob-
vium quemcumque vadi locum impingunt,
sic infixio capite sese continent. Nec tamen
sua ignorare arma credendum. Utitur ro-
stro tanquam gladio. Sæpe in mari Indico
validissimas Lusitanorum naves, ad sesqui-
palmum aliquando perforant. Visus in me-
diterranea juxta navim natantem, medium
rostro discidisse. Græcicum sermonem ab
Italo distinguere, illum minimè reformi-
dare, ad hunc diffugere, Joannes Marius
Cætareus, qui Locrensi in littore Xiphia-
num piscationi interfuit, prodidit, & Brutii
testantur.

Ufus in cibo rarus. Carne enim est arida,
& difficulter concoquitur. Archestratus
Byzantinum commendat.

ARTICULUS IV.

De Remora & Cetorum Duæ.

DE Remora, quæ *Echeneis*, *Remiligo*, &
Nauclates, dicitur, vix quicquam certi
scribere possum, adeò Authores in diversa
scinduntur, tria tamen occurrunt, descri-
ptio, facultatis naves retinendi, & causa. Va-
riè à veteribus describitur. Quibusdam est
parvus piscis, assuetus petris. Quidam eum
pedes ex Aristotele habere opinantur, ita
positâ pinnarum multitudine. Mutianus
muricem esse, latiore purpurâ, neque as-
pero, neque rotundo ore, neque in angulos
prodeunte rostro, sed simplice concha, utro-
que latere sese colligente, quibus inharenti-
bus, plenam ventis stetit navem, portan-
tem nuncium à Periandro, ut castrarentur
nobiles pueri, conchasque quæ id præstite-
runt, apud Guidiorum Venerem coli, prodi-
dit. Trebius Niger pedalem esse, & crassi-
tudine quinque digitorum credit. Tres eo
nomine celebrari, haud perperam inde col-
ligas. Nec inter recentiores de eodem con-
venit.

Arist. H.
A. 1. 2. c.
13.

Plin. H.
N. 1. 32.
c. 11.

Ælian.
H. A. 1.
14. c. 21.
Ælian. 1.
c.

Oppian.
Halieut.
2. v. 509.
Plin.
H. N. 1.

Opian. 1.
2. v. 509.

Ælian.
H. A. 1.
9. c. 40.

Tab. IV.
3.

Plin. H.
N. 1. 9.
c. 25.

Arist. H.
A. 1. 8. c.
13.

Arist. H.
A. 1. 6. c.
13.

Arist. 1.
8. Hist.
c. 2.

Oppian.
Halieut.
c. 1. 2.
Ælian.
H. A. 1.
12. c. 53.

Aristot.
H. A. 1.
4. c. 8.

Tab. IV.
1. 2.
Ælian.
H. A. 1.
13. c. 4.

Homer.
Odyss. m.

Plin. H.
N. 1. 32.
c. 11.

Rondel.
in Hist.
Plin. H.
N. 1. c.
Strabo.

Athen.
Dignof.
1. 7.

Oppian.
Halieut.
4. 2.

Ælian.
H. A. 1.
14. c.
23.

venit. *Rondeletius* inter ignotos reponit. *Gillius* nunquam se piscem, vel piscatorem qui ipsum vidisset vidisse profitetur. *Bellonio* est totus exossis, mollis, lubricus, coloris herbacei, inferiore parte planus, dorso repandus, in gibbo convexus, limacis rubri testa carentis effigiem referens. Eidem ad spitamæ longitudinem & manubrii ligonis crassitiem plerunque excrevit, circa saxa in mari, sed lentè serpit, & iter cornibus præterit, mucaginemque ut limax serpendo relinquit. In *Coreyra* frequentissimè è verriculis extrahi dicitur. Quam in *Imperati Neapolitani* Exoticotamiejo Neapoli vidimus, sic describitur. Capite supino acetabula habet similitudine cirrorum sive acetabulorum Polypi, quibus naves magnosque ac cetaceos pisces apprehendens pertinaciter hæret. Cursumque eorum remoratur, & pro arbitrato suo retinet. Ad magnitudinem corporis *Icon* expressa est.

Remora Aldrovandi color toto ferè corpore ad violaceum inclinat. *Latera* candicant. medium corpus subviridis linea interfecat. *Cauda*, quæ unicam pinnam degenerat ad cæruleum vergit. *Rostrum* canino simile, nisi inferior maxilla superiorem longitudine superaret. *Pinnæ* toto corpore sex. Simillimus *Embdæ* in *Frisia* pisciculus reperiuntur, referente *Gesnero*. quatuor digitorum longitudine. Cuticula sine squammis tenuissima. capite pro corporis magnitudine maximo. Oculis parvis, reliquo corpore turbinato. sub mento quiddam habebat figura acetabuli. Cavitas cum digito premeretur, ita adhærebat ut circumferri posset. Par facultatis navigia retinendi ratio. Ruant venti licet, & sæviant procellæ cogit stare navigia secundum *Plinium* (verba ejus sunt. Ventum est ad summa natare. &c.) *Plinio* *Oppianus* adstipulatur. *Cheremenianus* *Trallianus* apud *Plutarchum* impedimentum & moram navigationi inferre. & ut tardius navigia ferantur facere asserit ille puppi, hic lateri navis, *Oppianus* carina adhærere scribit. *Petrus Melara* Cardinalis *Turonensis* triremem cum è *Gallia* *Italiam* mari peteret, ab eodem (nisi forte de *Lampetra* id accipiendum sit) in medio cursu retentum fuisse. *Kircherus* pro fabulosis omnia ista habet. Nunquam talem à *Plinio* ad tempora nostra effectum notatum, etsi totus orbis navigationibus lustratus sit. Non posse potentia majus à minore vinci. Nullum magnetis frustum, quamvis efficacissimum, exactissimeque libratum aliud majus & gravius allicere. Frequenter in færo *Siculo* ob contrarios æstus, unam onerariam extensis velis, secundo vento in mediis fluctibus hære, vicinis cursum tenentibus.

De causis haud certiora occurrunt. *Rondeletius* *Aristotelis* responso, quo cur clavus cum sit parvus, & in extrema navi, tantum

possit, ut ab exiguo temone & hominis unius viribus, magnæ navium moles moveantur, exponit, innixus, minus potius ad contactum *Remoræ* moveri, quam sisti ostendit. Idem de *Plutarcho* dicendum, dum navim multo musco & alga obductam, aquam obtusius secare, & tardius moveri, hisce *Echeneidem* adhærere, si tarditatis non causam, sed causæ accidens esse, prodit. *Fracastorio* latentis scopuli *Echeneidem* indicium esse, navi ita ut avelli nequeat propter metum vacui, adhærescere, placet. *Scaliger* *Plinium* secutus, ad occultas qualitates confugit. Movendi quibusdam esse potestatem, contrariam aliis. Nemini comperta in igne caloris principia. hunc *Lonicerus* sequitur. *Suarezius* influentias cœlestes addit. nec *Basilius* & *Ambrosius* renuunt. Peculiaris *Keckermanni* opinio. Viscosum & frigidissimum humorem de se fundere putat *Echeneidem*. hoc aquam circa gubernaculum congelari, ipsum quasi immobile reddi. Vix quicquam verisimile.

Quantum ad usum alii è *Græcis* lubricos partus atque prociendias contineri ad maturitatem alligato eo prodiderunt: alii sale adservatum ad alligatumque, gravidis partus solvere, ob id alio nomine *Odynolyon* tem appellari. A matoris beneficiis infamem esse, indiciorum & litium moram, inter falsa repono.

Cetos ducem habere, tum quod mole corporis oppressi tardè moveantur, & faciliè in cœnum, brevia & angustias impingant: tum quod parum acutè cernant, *Oppianus* *Ælianus* & alii authores sunt. destitutas, ad terram delabi & perire, *Plutarchus* & *Claudianus* prodidere. *Ælianus* is quædam idem, *Plinio*, nescio quare *Musculus*, quo nomine *Balenæ* partem *Oppiano* & *Aristoteli* dici falsò opinatur *Bellonius*, *Hermolao* *Iulus*, aliis, *Mylicetus* dicitur. Longus est, colore albo, capite longo, angusta cauda, si *Æliano* credimus. *Aldrovandus* dodrantalem, rostro acuto, capite prælongo & plano, cauda angusta & tenui, toto corpore aspero, squammis experte, sed osseo corio testò, proponit.

Fabulosumne id, quod *Rondeletius* arbitratur, an ambiguum, quod *Scaliger*, natura talem dederit, an amicitia adscribendum sit, non disputo. Amicitia exempla sunt *Balena*, *musculus*, quando prægravi superciliorum pondere obrutis, ejus oculis, infestantia magna vada, prænatans demonstrat, oculorumque vice fungitur, apud *Plinium* legimus. Agnitum, ore velut anchoram à *Balenis* recipi, in faucibus dormire, hoc quiescente, illas non moveri, hoc gubernatore, destitutas, ad terram delabi & perire, *Plutarchus* & *Claudianus* prodidere.

Plutarch.
Symp. l.
2. probl.
7.

Fracastor.
de
Sym-
pach. c.
8.
Scalig.
Exer.

Lonicer.
de Aquat.
Sua-
rez. Dis-
put. Met-
ap. 18.
Basilius
8. He-
xam. ho-
mil. 7.

Ambros.
Hexam.
l. 5. c. 10.
Keckerm.
in
probl.
nauticis.
Plin. H.
N. l. 22.
c. 1.
Tab. IV.
4.

Oppian.
Ælianus
l. 3.
Ælianus
H. A. l.
10. c. 6.

Aldrov.
de Piscib.
l. 3. c. 23.

Scaliger
ad H. A.
Arist. l.
2. c. 16.

Plin. H.
N. l. 7. c.
62.

Plutarch.
l. utra
animal.
Claudian.
in
Eutrop.

Gesner.
in Hist.
Piscium.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 1.

Plutarch.
l. 2. Sym-
pos. probl.
7.

Kircher.
l. 3. Ar-
tis Ma-
gnet.
Oppian.
Ælianus
l. 1. c.
221.

Rondel.
de pisc.
marin. l.
15. c. 18.
Arist. in
Mæch-
nici
quæst. 6.

ARTICULUS V.

De Serpente Marino.

Tab. IV. 5. 6. Tab. V. 1. Plin. H. N. l. 32. c. 1. Elian. H. A. l. 18. c. 28. Arist. H. A. l. 2. c. 15. Arist. H. A. l. 8. c. ult. Plin. H. N. l. 6. c. 23. Solinus in Polyhist. Arrian. in Periplo. maris rubri. Virgil. l. 2. Æneid. Arist. H. A. l. 2. c. 14. & l. 9. c. 37. Aldrov. de Piscib. l. 3. c. 24. Aristot. H. A. l. 2. c. 14. ex Scal. edit. 17. Bellonin observat. Plin. H. N. l. 9. c. 37.

Serpens marinus, Plinio *Draca Marinus*, *Æliano* *Hydrus*, Aristoteli *Hydrus* dicitur.

Notabilis ipsorum quibusdam locis magnitudo. Ejus sunt in Africa, ut boves insectentur, & triremes apprehensas evertant. Circa Norvegiam ducentorum pedum longi visi, tantas aliquando supra mare spinas, erigentes, ut navis per unam transire possit, si Olao Magno credimus. Conspicitur in sinu Codano quidam flavi coloris XL. pedum, innoxius, nisi irritaveris. Apud insulas quasdam ante Persidem, vicenum cubitorum, terruere classem. Tales in Carmanie promontorium & Arabiam circa tres insulas è mari egrediuntur. Baraces sinus navigantibus perniciosus, quod ad eum è pelago tendentibus prægrandes & nigri serpentes occurrant. Maximi cujusdam descriptionem & in Virgilio invenies. Is de quo hoc loco, terrettri similis est, capite & corpore congrui duntaxat, ore acutiore, si Aristotelem sequimur. Si Salvianum, habet dorsum subrubrum, latera subflava, ventrem sub albidum. Rondeletius eum trium cubitorum facit, corpore fulvo, quam Anguilla rotundiore, colore quem & sceleton apud Aldrovandum exhibebat, capite congrui, oculis flavescentibus, ventre & rostro cinereis, maxilla superiore longiore. Dentes muræne modo, sed rariores habere, addit: pinnulas ad branchias veluti Anguillæ duas. A. Castelleto ad Aldrovandum missus, colore erat congrui, sed ad caruleum inclinante. Ore intra rubido, dentibus acutissimis instructo, sub mento apophysis barbæ modo propendebat, altera ad ani orificium.

Maris est incola: nec tamen *profundissimis*, gurgutibus nascitur. Qui in aquis fluvialibus reperiuntur, Hydri sunt & toto cælo ab istis differunt. Degit tamen aliquando & in terra, ut terrestribus quadam species. toto ferè die in marivivit, somni causa in terram egreditur. vehementior est congruo, si *profundissimis* ita placet vertere. Captus atque immisus in arenam, cavernam sibi rostro mira celeritate excavat.

Pugnare aliquando in Turcia tempore Bajazetis à solis ortu ad occasum cum terrestribus, Occisorum utrinque octo millia numerata sunt. Aquatici concessere victoriam.

Comedi quidem potest: sed propter similem cum terrestri formam rejicitur.

ARTICULUS VI.

De Congro & Ophidio Plinii.

Congri, qui Græcis à *γῆρ*, quod est voro; & *ὄφιδος* aliis *Grillus*, quibusdam à corporis & coloris similitudine, *Anguilla marina*, dicitur, duo genera; Unum Album & pelagium, alterum Nigricans, quod haud rectè vel littorale vel pelagium dixeris. Ambigit enim ut scribit Aristoteles: recentiores unum duntaxat, in quo omnes notæ congrò à veteribus attributæ, reperiuntur.

Longus est & lubricus seu lavis: sæpe in quatuor aut quinque cubitorum longitudinem excrevit. Visus à Scaligero quem utraque manu nequisses amplecti, ut non mirum multos in Sycyone quos homo vix ferat, aliquos plaustrum magnitudine capi, Eudoxus, circa Cartejam in exterioribus locis augeri supra minarum octoginta, Strabo prodiderit. Toto dorso rubet, ventre & lateribus pallet. Binis natat pinnis. Linea nigra in exteriori parte membranaceæ pinnae per dorsum extensa conspicitur. Oculi sunt Anguillis longè majores. In extremo rostro duo brevica cutacea cornicula gerit. Dentes habet parvos pectinatim coeuntès, branchias utrinque binas, pinnæ harum rubent, quæ verò corpus ambit fusca est, & ad caruleum inclinat. Interiora si spectes, Gula ipsi exigua, qua alii pisces carent. Fells vesica ab epate pendens.

In nullo non degunt mari, fluminibus imprimis vicinum si sit. nam & hos juvenes subire solent: ne de paludibus dicam, quarum illustris alumnus à Matrone Parodo vocatur. In terram egredi non absolum, cum idem & de serpente marino superius dixerimus, & de Anguillis ex Aristotele colligatur. Vescuntur pisciculis. Ideo vehementiore spirante vento, quo tempore numerosiores pisciculi mare intrant, pinguescunt.

Coitus eorum Anguillar. coitui comparatur, non quod ex simili spumæ sanie in arena obruta nascantur, sed quod circumplexu mutuo supina. partium coitum peragant, quod *ὄφιδος* & *γῆρ* solenne est: Ova longa serie inter se protensa, pinguedine ita obducuntur, ut vix appareant. Si in ignem conjeceris, abit in vaporem pingue, ova exiliunt, & elisa crepant.

Latant hyeme, nec, eadem, præterquam statis diebus paucis, & nisdem semper, capiuntur. Gregales ne sint, an solitarii ambigitur. Causam Mnesitheus præbuit. Modo gregarios esse posse dicit, modo nec inter hos nec inter illos recenset.

Inimicitias cum Polypo, Locusta, & muræna exercet. Polypum devorat. Neque enim ob levitatem ab eodem apprehendi potest. A Locusta lateratur, licet valido

Tab. IV. 7. Ritters hufi. ad l. 1. Halicut. Oppian. Athen. Dipnos. l. 7. Aristot. H. A. l. 8. c. 13.

Scaliger ad Arist. H. A. l. 2. c. 16.

Eudox. l. 6. de terræ motu apud Athen. Strabo Geogr. l. 3.

Aristot. H. A. l. 2. c. 13.

Oppian. Halicut. lib. 1. v. 113. Athen. l. 4.

Oppian. Halicut. lib. 1. v. 516.

Aristot. H. A. l. 5. c. 4. Aristot. H. A. l. 6. c. 17.

Aristot. H. A. l. 8. c. 13. Plin. H. N. l. 9. c. 16. Athen. l. 8.

Aristot. H. A. l. 8. c. 13.

B sic

fit corpore. Ipse & Muræna caudas inter se prarodunt.

Plin. H.
N. 1. 9.
c. 62.

*U*usus ipsius apud Græcos in *cibis* laudatus. inprimis si è Sicyone adferebatur, Italum tantum cæteris præcellere putabant, quantum pinguis Thynnus vilissimis coracinis. Tanti denique æstimatus, ut Nereus quidem Chius Diis eum elixasse legatur: Dorion verè opsofagus, cum puer optimor piscium nomina dicere iussus, Congrum inter cæteros recensuisset, piscium se, non Deorum nomina dicere iussisse, reposuerit, Nunc in vili admodum sunt, apud omnes, *Hispanis exceptis*, precio. Angli pusillos cum aceto & sinapi comedunt. *Congener* congris est, qui in mari circa Canibales insulas capitur. Cutè intensè viridi & elegantissimè variegata; rictu patenti, & dentibus acutissimis. Caro detracta cutè candidissima est; sed qualitatè adeò virulentæ, ut sæpe in mortem gustantes conjiciat.

De Laet.
Ind. O.
vid. l. 1.
c. 18.

Tab. V.

Ophidion Plinii, quem Salvianus & Bellonius cum serpente marino confundunt, quemque Tragum Oppiani quidam esse opinantur, duorum est apud Rondeletium generum. *Unum* est barbatum, quod gemina barba à maxilla inferiore propendente instructum sit; *Alterum* imberbe & flavum, de cætero superiori simile. Bellonius palmum non excedere, pelle lubrica esse, pinnas carnosas habere integram in gyrum caudam ambire, & multra nigredine perfundi, testatur. *Linguam* habet parvam, acutam. *Cor* trigonum ruberrimum, *hepar* ad sinistrum latus exprorectum, *stomachum*, oblongum, *pylorum* permultis apophysibus circumdatum, à quo tres intestinorum revolutiones ad anum pertingunt, *lienem* rubrum, & oblongum. Cætera ad ipsos Afellos accedit.

ARTICULUS VII.

De Muræna.

Tab. V.
3. 4.

Eustach.
in Home

Macro.
Saturnal.

Strabo.
Geogra.
l. 3.

Ant. H.

Muræna, quibusdam *Draco marinus*, quod corporis specie serpentes æmuletur, Græcis *μύρανα*, *μυράνα* & *εὐμύρανα* (multæ n. dictiones quæ ab *eu* incipiunt, olim per *eu* scribebantur) *μύρανα* vel *μύρανα*, quod præ pinguedine in summa aqua fluitent, & à sole terrefactæ, qua curvare se nequeant, mergi non possunt, quod tamen de optimis quæ Latini *Flutæ*, Græcis *μύρανα*, quasi navigabiles vocantur, potissimum sumi debet, quamvis & *rhyades* pisces *Flutas* Gaza vertat, dicitur.

Externæ si attendas, ad duorum cubitorum longitudinem accedunt; circa Cartejam locis exterioribus minarum supra octoginta reperiri, Strabo, ad decem libras augeri neque majorem se vidisse, Salvianus, prodidit. Longus est, lubricus seu lævis,

& serpentis speciem referens. Cutis quæ tenuissima diversi coloris, qui nec in omnibus sibi respondet, seu quod alius vivis sit, alius in mortuis (sanè Plinius, in Gallia septentrionali, Murænis omnibus, in dextra maxilla septenas maculas ad formam septentrionis aureo colore fulgere, duntaxat viventibus, pariterque cum anima extinguuntur) appareat. *Mas* paucioribus maculis distinguitur, & quibusdam veluti stellis conspergitur, *femina* pluribus veluti aureis guttis, quas Ovidius auratas notas dixit, variatur; Bellonius, eidemque ut plurimum fulvescunt. Rondeletius colore fusco, ideò ab Oppiano dici; Massurius maculis luteis & nigris; Gillius alium colore sub-nigro, luteis alium, albo nigris quasdam colore distinctas, prodidere. Aldrov. *femina* varia est, blattariæ floribus simillimis, hinc ardens Ovidio dicitur. *Caput* habet rotundum, tenue, & acuminatum, rictum *oris* latissimum. *Dentes* acutissimos, serratos, solidos, non in maxillis solum, sed & in ima quoque faucium parte dispositos. *Carnosum palatum*, quod linguæ loco obtinuit. *Maxillam* superiorem aquilinam in cujus extremo duæ sunt breves apophyses seu verrucæ *Oculos* magnos. *Dorsum* cultellatum, ut Pythæas ait, hoc est, spino acuto, & pinnulam ferè constitutent. *Pinnas* & branchias, adimit ipsis Plinius, sed male. Quaternas enim has habent. Sed parvas; utpote ex quaternis minutis osculis, sive foraminibus paulum modo se exferentes; seu ut Aristoteles dicit, non *εὐμύρανα* id est explicatas, sed præter alior. piscium morem confusas. Illas non ad latus sitas, neque tales ut natare possint.

Quantum ad *Interiora*, carnem habet candidissimam, sub cutè obliquis & transversis ductibus dispositam; variis musculis hinc & inde abeuntibus munitam, multis spinulis brevibus & recurvis conspersam. *hepar* subfulvum, oblongum, stomacho incumbens, longiusculum; *fel* Cyaneum, magnitudine avellanæ, quod Bellonius jecori, Aristoteles intestinis inhærere, à jecore meatibus quibusdam dependere, scribit. Habet & lienem oblongum nigricantem, stomacho annexum. *Ventriculum* longum, à cujus medio intestinum sine spiris ad anum protensius, juxtaque eum cellulæ, instar intestini coli, habentur. *Vertebres* quæ minus frequentes, sed oblongiores quam Anguillæ, processus insunt transversis ac sursum spectantes præter aliorum piscium morem Aristas Scaliger vocat, quæ si coriam inversum detrahatur, cum eo simul omnes educuntur. In Oesophagi qui latus, & à rictu incipit, orificio, hamuli leviter uncinati, ad gulam citra fauces spectantes, linguæ vicem supplent, ac statim à branchiis folliculus

A. l. 2. c.
13. l. 4.
de partib.
c. 13.
Plin. H.
N. 1. 9.
c. 11.
Plin. H.
N. 1. 9.
c. 23.

Bellon.
Hist. l. 5.
c. 10.

Aldrov.
de Piscib.
l. 3. c. 27.

Plin. H.
N. 1. 9.
c. 20.
Athen.
Dipnos.
l. 7. ex
Theophr.
Hist. l.
A. l. 2.
c. 13.

Arist. l. 2.
Histor.
c. 15.

Scalig. ad
A. H. l. 2.
c. 16. v.
108.

culus teres, spinæ incumbit, flatu turgidus, commodioris natationis usum præbens.

Vivunt quidem in mari, circa petrosa loca; videntur tamen & fluviorum ostia petere. In Oceano rarissimæ sunt. Tartessæ & è Siculo freto, unde ad piscinas Romam accersebantur, antiquis in pretio fuere. minus ex Tarlensi & Carpathio mari probabantur. Exeunt & in terram frequenter, in eademque capiuntur. & diu, quod parvas branchias habeant, parum aquæ admittant, nec multum refrigerii desiderant, vivunt.

Cibus ipsis caro, idè in petrisquæ Chanis, & Patellis plenæ domicilium. Nec ab humana abstinent. Cujus rei gnarus Vedius Pollio, Eques Romanus, & ex amicis Augusti, invenit in hoc animali documenta sævitæ, vivariis earum immergens damnata servitia, non tanquam ad hoc feris terrarum non sufficientibus, sed quia in alio genere totum pariter hominem distrahi spectare non poterat. Cum rabie agitantur, sævissimè persequuntur squamosos; ita verò morsu valent, ut partem nisi tota amputetur, ab ea liberari possè neget, Rondeletius. In Sicilia in summa aqua præ pinguedine flutantur. Unde manu capi murænas flutas Papirius apud Varronem prodidit.

De Murænæ cum vipera congressu à multis sparfa opinio. Muræna inquit libidinis impetu plena, latibulum vipere intrat. Vipera mas stimulis concitata ad mare accedit, & sibilo edito amatam evocat: sic ambo invicem colligantur. Falsitatem si discrepantia (alii marem cum vipera scemina congressi, alii sceminam cum vipera mare prodrunt) non ostendit, at certè illud, quod Nicander famæ, Plinius & Ælianus vulgo eam tribuant. Andreas apud Athenarum, quod vipera nemor, secreta amet. nec à quoquam id observatum esse, vel piscatore vel littorum ubi frequentes murænæ, accola, neget, ostendere potest. Coeunt autem more serpentum, & *ova* parva, *καθυλα* eaque seu arenæ, numerosa & quocunque tandem tempore pariunt. Murænulæ recens prognatæ, celeri adolefcunt incremento.

Latitant hyberno tempore, quo, paucos dies si excipias, non capiuntur. Quia pinnis carènt, flexuoso corporis impulsu *moventur*.

Ad *Ingenium* & *Mores* pertinet, quod, è vivariis egressæ piscatores adoriri, & è navibus in mare pronos dejicere; reti circumdatæ maculas appetere ipsas, conscie teretis ac lubrici tergi, cum multiplici flexu laxari donec evadant; ut hædere in hanc amplius devorare quàm hamum, admoveque dentibus lineas, atque ita erodere; infixas hamo, quod sint cultellato dorso, sese invertere; cauda istas, celerrimè exanimari, capite istas difficulter unde animam in cauda ha-

bere certum Plinio concentu & tintinnabulis, quod ex fabula de vipera sibilo natum esse credo, à piscatoribus evocari, dicuntur.

Docilitatis argumentum, L. Crassi, qui cum Cn. Domitio Censor fuit, Muræna Inauribus & gemmis distincto monili ornata, tanquam eximæ pulchritudinis puella, vocem Crassi cognoscebat, ad eum adnatabat, & porrecta cum gaudio accipiebat. in piscina mortuam, atratus tanquam filiam luxit. Idem de Antonii Drusi in villa apud Bauculos, in parte Bajana, Muræna, dicitur.

Antipathiam ipsarum cum Locusta, Polypo, Ozena, Congro, Aceto, & Ferula notarunt authores. *Vincuntur* à locustis. Ad carnes Polyporum Ozonarum imprimis præpropere feruntur. Pugnas Ælianus descripsit, addidit Kiranides incredibile, evanescere Murænam, si cum Locusta coquatur. Cum Congro sæpissimè congressam Puteolis, spectavit Perottus, Aceti gustu præcipuè in rabiem aguntur. Licinius Macer pinguescere jactatu, (alias lactatu) fuisse non interimi, eadem ferulâ protinus, prodidit. Mirum quod ex Æliano habemus, cum plagam unam acceperit torpescentem persistere, sin plures inferas, funditus ita accendi.

Summis olim apud Romanos fuere in deliciis, seu ut gulæ irritamenta, seu quod diutissimè & magna copia in variis servari possent. vel unus C. Hirrius duodena millia festertia, ipsis alendis infumebat, & uno tempore Cæsari vixit Murænarum mutuo dedisse in pondus dicitur. nam permutare pretio vel aliâ merce noluit. Hujus villam intra quam modicam quadrages piscinæ venierant. Tripatinus summa coenarum lautitia, ex Fenestella appellatur; unaque fuit Murænarum, altera Luporum, tertia Myxonis piscis. Heliogabalus earundem lactibus in locis mediterraneis rusticos pavisse creditur, ut totum Romanum imperium perderet. Piscis æstivum Liciniis Murænarum nomen imposuit, ut Sergio Oratæ. Commendatas maximè prægnantes ex Horatio potest colligi. sed & à lactibus summam obtinuisse carnem. Nam sive molles illarum, carnes statuas, sive duras, opprobrium vitare non poterunt. Illæ inflationes, hæ cruditates difficiles concoctu pariunt. Galenus tamen mediocres posuit, si in puro mari versentur.

Reperere & in Medicina usum. Nam Marcellus pellium cinerem ex aceto fronti illitum, prodèssè adversus capitis dolorem prodidit.

Plin. H. N. l. 32. c. 2.

Ælian. H. A. l. 8. c. 4. Macrob. Satur. l. 2. c. 1. Tzet. Chil. 8. c. 173. Plutarch. l. 1. ultra animal.

Porphyr. l. 8 de abstin. ab anim. Ælian. H. A. l. 1. c. 32. Oppian. Halieut. l. 3. v. 190.

Plin. H. N. l. 9. c. 30. Plin. H. N. l. 9. c. 22. Ælian. H. A. l. 1. c. 37.

Varro de R. R. l. 3. c. 17. Plin. N. l. 9. c. 55. Macrob. Satur. l. 2. c. 11. Plin. H. N. l. 35. c. 12. Lamprid. in Heliogab.

Macrob. Satur. l. 2. c. 11.

Horat. l. 2. ferm. Saty. 8.

Galen. l. de cibis boni & mal. succi. l. 3. de Aliment.

ARTICULUS VIII.

De Myro, Reverso Indico Anguilli formi & Tania.

Tab. V. 5. **M**Y R U S, seu *μύρος*, *παρά τὸ μύρον* five *μύρον* fluere, quod præ nimia pinguedine mari supernatet, dicitur. Volaterranus, falso Plinio & Gazæ Oculatam, Plauto Ophthalmiam vocari scripsit. Alicubi Myrinus, sed perperam, *μύρον* enim legi debet, vocatur. Sitne Murænarum mas, quod Plinius, Hesychius & aliis prodidere, ex descriptione colligetur. Aristoteles concolorem, muræna robustiorem, colore piceo, dentibus intus & extra instructum prodidit. Athenæo *μύρον* seu colore leonis & *εὐρύς* seu torquillæ, esse creditur.

Athen. Dipnol. l. 7.

Athen. Dipnol. l. 7.

Duo ejus apud Dorionem genera. *Nigrum*, quod Galli piscatores serpentem vocant, & *Ruffum*, quod deterius. Ille serpenti magis similis est quam Muræna, corpore nigricante, rotundo, sine maculis, sine squammis. Carne tenerrima, sine ullis spinis. *Pinnulas* habet valde exiguas cutis substantia, unam à cervicis loco ad anum usque, & alteram ab ano ad eandem, quarum ora nigra est: unicum utrinque branchiarum imperfectarum foramen, *puncta* in utroque latere aliquot aurea, quæ magis in viventibus quam mortuis apparent. *gulam* ventriculo præpositam, *intestina* longa, recta ad podicem porrecta. *jecur* longum, rubescens, sine felle. *splenem* longum, tenuem.

Alter serpens rubescens Rondeletio (Dorionis Myrum *μυροειδὴς* non absurde dixeris) piscis est rarissimus, corporibus specie serpentibus terrenis similis, colore rubro vel phæniceo, lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eam lineam quæ à capite ad caudam protensa est, secantibus; scissura oris non admodum magna. *Dentes* habet acutos, serratos, *branchias* squammosorum piscium instar opertas. in *dorso* à capite ferè ad caudam capillamenta tenuia à sese disjuncta, in ventre similia. *Cauda* in pinnam unam definit.

Tab. II. 5.

REVERSUS INDICUS Anguilliformis, inter Pelagios non squamosos ab Aldrovando refertur. inter Galeorum genera ab Hernando. Instar Anguillæ Columbus facit, nisi grandiusculum caput haberet. Capite autem pelliculam quandam crumenæ similem gestare scribit. Si Hernandum sequimur, tres spithamas est longus, Corio nigro, figura mirabili: vix possis divinare an natet supinus vel pronus, imo judices, cum supinus est prouum jacere, & cum pronus supinum. Rostrum habet acutum, labrum inferius superiori longius, latius, & ad superiora contortum. Caput compressum, ac rostellum spinifero octo uncias longo,

Nieremb. Exot. Nat. l. xi. c. 18 ex Hernando.

tres lato insigne, quo tuberoni & aliis piscibus adhærere solet, pinnas circa branchias quaternas, singulas, juxta ventrem & dorsum, caudam nonnihil lunatam. Vivit in Oceano Septentrionali, & piscibus vescitur. Usus ejus in piscibus capiendis, Viso fulgore aëris statim prædam deserit. Modus piscationis à Martyre descriptus est.

Martyr. l. 3. Decat. Oce. Ta. VI. 1. 23.

TANIARUM, quæ à similitudine fasciæ & vittæ ita dicuntur, Gaza vittas reddidit, tres apud scriptores *descriptions* sese offerunt. *Una* est corpore longo, tenui, stricto, flexili; tenuiatis tantæ, ut ossa vertebrarum spinæque quibus firmatur, carne non recta, appareant. Caput ei depressum, ossibus multis constans. Oculi magni, rotundi. pupilla exigula ad branchias pinna utrinque unica ad notandum data. in prona parte villos habet ad caudam usque, in quos & cauda terminatur. Flammæ modo cum natat movetur, inde nomen Flambo à Gallis accepit. *Alter*a corpore est priori similis, coque argenteo, ad tres interdum cubitos excrescit. branchiæ ei, præter quæ ad pinnas, sub maxilla inferiore duæ ruffæ ejus coloris dorsi villi & cauda, maculæ in parte prona purpureæ, rotundæ, certo spacio à se distantes. Ventriculus magnus & longus. *Intestina* sine ullis gyris. Cor compressum, hepatis ex albo rufescens. *Lien*, & *fel* adeo parva, ut fermè visum effugiant.

Tertia Falce nuncupatur, quod falcem messoream referat. Est ulnam longa, palmum lata, tota ingyrum quibusdam veluti crenis serrata, Capite deformi, ut simiam dicas oculis magnis. In lateribus linea visitur aspera. pinna in tergore unica, continua, subrubra, duæ sub branchiis totidemque substerno. Polypi modo mollis est. & perfrixus vel assus in quoddam veluti gluten resolvitur. Huc pertinet Piscis, quem *Iridem marinam* non absônè dixeris. Solis quodammodo aristis & cute constat, & rubro amethystino, caruleo & aureo colore variat. quin rectius quam præcedens *Tenia falcata* dicitur.

CAPUT III.

De Pelagiis Cartilagineis.

ARTICULUS I.

De Cartilagineis in genere.

Cartilaginei pisces dicuntur, qui pro dorsi spinea Cartilaginem habent: Græci *χόνδριον* olim dixerunt; Aristoteles *χόνδριον* & *σύνδριον* primus, à splendore cutis, ut testatur Galenus, qua noctu lucent, vocavit. *Duo* a. talium sunt genera, *plânium* unum, in quo alii aspera, alii lævi cute sunt præditi; alii spinis carent, quidam iis armantur, *Alte-*

Plin. N. l. 9. c. 24.

rum

rum longum & rotundum, qui Galeno γαλι & γαλιονα. Aristoteli γαλι γαλιονα aliquando & γαλιονα, ἀπὸ τοῦ γαλι, id est, mustela terrestri, seu quod corporis similitudinem referant, seu quod quædam communia habeant, inter quæ Jecur adiposum, in oleum resolvable, dicuntur. Tribuitur hoc nomen & Canicularum generi, quod Ælianus secundum & varium, Oppianus tertium ponit, utrumque in cæno volutari, addit. Magnitudo etiam minorum inter mares ultra cubitum. Spinam Cartilagineam branchias detectas, quod cartilagine tegumenta earum constent, pinnas duplices & utrinque quinas habere, nullo discreto adipe carni ventrive adherescente pinguescere, ova ea specie, qua aves habere, commune omnibus. Locus illorum variat. Plana parte inferiore supinaque habent, oblongis in lateribus adherent, & tegumenti loco quinque habent foramina. Cor pentagonum, jecoris, & ejus gemini substantia adipea, fel in jecore situm, appendices supra ventriculum exeuntes, Galeis propria sunt. Vulvæ, quas qui ova pariunt, in binos sinus partitas, & sub præcordiorum septo constitutas habent, ad avium naturam vergunt. ad easdem in gravidis veluti mammae albidæ visuntur. Os supina parte esse, non omnibus convenit, in extremo quædam rostro habent. quibus ita situm est, cibum corripere, nisi conversi resupinentur, nequeunt. sic & piscium quos insectantur saluti, & ipsorum commodo consuluit Natura. Immodica satietate isti interirent. illi, dum moram sese convertendo nequeunt, effugiunt. Sexus duplici dignoscitur nota. Maribus bina quædam circa excrementi ostium propendent, minores iidem. Fœminæ majores, illis destituuntur. Locus cartilagineis mare est. sed alii in pelago, alii in profundo cæno morantur. Cum pariendi tempus instat, vada & littora petunt.

Cibus ipsis pisces, hos resupinati, ut diximus, capiunt. Quantum ad *Generationem*, ore parere perperam sibi Ægyptii persuadebant. Coitus diversus, visa ex cartilagineis nonnulla, quæ averla canum terrestrium more cohærebant. Plani qui caudam habent, non solum admotis supinis, sed etiam terga fœminarum, marium supinis superpositis, modo caudæ crassities nihil impediatis, coeunt. Quia semine non abundant, nec fœminæ suos conceptus, nec marres suum semen spargere, quod generis non vivipari pisces facere solent, visuntur. Ova eodem tempore & superiore parte ad præcordiorum septum omnibus, cum majora tum minora multa, & inferiore jam exclusi foetus, diversitas inferius patebit. quod non omnia simul, sed sæpe numero ac diu edunt, interim quæ in ima matrice sunt, concoquantur, eodem mense sæpe & parere & coire crediti sunt. Superfoetare, & senis complurium u-

terum ferre mensibus, author est Aristoteles. Ex alto terram repetunt, ubi pariant. Sic tēporem captant, & proli provident. Pariunt autem vere animal. hinc partus viperino similis: siquid in quibusdam differentia occurrit, in sequentibus dicetur. discrimen sanè ipsi pisces inter se ostendunt. senos vel ostenos, undecim interdum, si Rondeletio credendum, foetus suis partibus absolutos pedali longitudine diversis temporibus parere scribit Bellonius. persapè vivo emergente foetu, ovis adhuc crudis, scatere uterum, superiorem ejus partem, quæ ad septum est occupantibus, eorumque alia dextro, alia sinistro matricis cornu concludi, adjicit. quod Galei metu insidiarum catulos devorent, his evanescentibus revocent, prodidere antiqui, & ad *Ingenium* referri potest. *Antipathiam* cum Pastinaca, qua nihil venenatius ex mari, exerceat, apud Plinium invenies. Tanta est aviditas ipsius veneni.

Ufus Cartilagineorum in cibis rarus. Caro est concoctu difficilis, diuturno usu, visum hebetare, proditum à Diphilo. Exenteratos quosdam absque sale insolari ex Ephippo colliges. παραχρῆτος ipsi est.

ARTICULUS II.

De Cartilagineis Longis.

PUNCTUM I.

De Cane Aristotelis, seu Carcharia.

Primum inter Cartilagineos longos locum Galei seu Musteli inter hos *Kém* seu Canis, vel quia hoc in genere *maximus*, sibi vendicat. *Galeus* hic simpliciter Aristoteli; *Galeus Canis*, Oppiano; *Canicula*, Plinio; *Carcharias*, quia dentibus plurimum valet Theophrasto: allis *Seylla*. Perperam Rondeletio, ex Nicandri autoritate, *Lamia*. Nam & inter planos Cartilagineos à Plinio refertur, & incredibile, est tantæ magnitudinis piscem, qui loricated etiam homines devoret, planis ab eo accenseri posse. Potuit Nicander Carchariam Lamiam propter aliquam naturæ similitudinem vocare, & Siculis Rana marina Lamia dicitur. Cete non esse, vel exinde colligas, quod & branchias habeat, & ova concipiat.

Magnitudine Galeos omnes excedit. Visus mille librarum pondere mediocris. Captus, qui ad quatuor librarum millia accederet. Inventus in quodam loricated homo est. alter, curru impositus, vix à duobus equis trahi potuit. Cure aspera integitur. Os ipsi non in rostro, quod in mucronem exporretum, sed supina parte est.

Caput amplissimum. *Dentes* trianguli forma, durissimi, acutissimi, utrinque serrati,

Arist. H. A. l. 3. c. 1.

Arist. H. A. l. 3. c. 1.

Plutarch. libroutra animal. Tzetzes Cheliad. l. 3. c. 126. Plin. H. N. l. 32. c. 2.

Tab. VI. 4. 5. 6.

Arist. H. A. l. 5. c. 11.

Oppian. Halieut. l. 1. v. 374.

Plin. H. N. l. 13. c. 15.

Theophr. Hist. Plant. l. 4. c. 8.

Plin. H. N. l. 9. c. 24.

Tab. VII. 1. 2.

feno ordine dispositi. Prioris ordinis extra prominent, & in anteriorem partem vergunt. secundi rari sunt. tertii, quarti, quinti, & sexti, in os maxima ex parte recurvi, in utraque maxilla carne molli conteguntur. qualibet maxilla duos & septuaginta comprehendit.

Oculos habet maximos rotundos; in quibus tunica cornea parte anteriore, posterioreque dura est. quæ humorem crystallinum involvit, telas arenarum tenuitate superat. *nervi optici* ex substantia cartilaginea & dura constant. muscoli qui eos quodammodo intra trahunt, & fixos tenent, non radicem nervorum opti corum ambiunt. sed à superiore ossis regionis oculorum parte orti, in longum extenduntur; quem situm in humanis quoque videmus. Laterum & tergoris *pinnæ* longè quàm in sui generis majores sunt. binæ earum haud procul à cauda, binæ aliæ ad branchias & podicem, aliæ in medio ferè dorso. *Cauda* duabus constans pinnis cubitalem longitudinem æquat, & ejus pars superior, quæ vetebri communita, altius attollitur quàm inferior. hæc crescentis lunæ figuram exprimit; quarum inter capedinem dimidia linea explere potest. *Hepar* adipatum, in duos maximos lobos dividitur. *Degit* in alto. sed ad littora refugit. Amnes nonnunquam adire, fortè dum prædam insequitur, Wottenus author est: *Vescitur* carne, & pisces adoritur ex insidiis. benè *ἀρροάντα* Oppianus vocavit: quia Archestrato *ἀρροάντα*, carne humana delectari, facile crediderim. Pugnam cum Urinantibus apud Plinium legimus.

Plin. H. N. l. 9. c. 46. Cum caniculis, inquit, atrox dimicatio. Inguina & calces omnemque candorem Thunnos inprimis persequitur, & ex eorum venatione cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, Siciliamque attingere prohibentur, pinguescit. Vidit Bellonius undecim fœtus uno *partu* edidisse, non tunicis involutos, sed umbilicali tantum in ea cum utero matris conjunctos. Caput ut in aliis animalibus primo prodibat. In *Cibis* non adeò expetuntur. Divinum quidem Archestratus cibum vocat; & Mnesitheus iis qui facile concoquantur annumerat; Galenus tamen, excrementitiæ carnis esse, asserit. Facile in apparatu peccatur. Dentes argento inclusi, sub nomine dentium serpentis, dentitionem juvare, & puerorum pavores arcere, vulgo creduntur. Dentifricia optima ex iis parari Rondeletius tradit.

PUNCTUM II.

De Galio Aristotelis, & Catulis.

Tab. VIII. 4. Quem Oppianus *γαλιό αἶον* seu Mustelum seu Galeum. Canem vocat, is Aristoteii simpliciter *γαλιό* est. Quia apud Latinos nomen non habet, poterit vel simpliciter Mustelus, aut Galeus, Mustelusve Canis

vocari. Fortè est Græcorum *συνελισσός*. *Corporè* est oblongo & rotundo, cinereo, à podice ad extremam usque caudam gracilescit. Centenas aliquando libras excedit, nec squammis, sed corio tegitur. *Oculos* habet oblongos; retrò eos bina foramina auditui inservientia, ex parte inferiore tunica enascitur, quæ palpebræ avium modo, totum oculum operit. Os ipsi in supina parte denticulatum, ante ipsum duo alia foramina olfactui dicata. Branchiæ utrinque quinæ detectæ, juxta quas duæ pinnæ, aliæque rursus duæ supina parte enascuntur, præter has maribus duæ appendices, ex podice pendent. *Hepati* bifido & pallido, vesicula fellis subnectitur. *Splen* subrubescit. In cœnosis maris locis habitat. *Ova* vitellis ovorum Gallinæ similia, ex quibus fœtus, donec foras prodeant, nutriuntur, parit. Quia Carne *vescitur* gregalem ne credas. Natantes homines adoritur. In cibis plebi inservit.

CATULI Aristoteli *γαλῖνες*, Athenæo & Oppiano *γαλιόνα*, aliis *ἰσχυρὰ γαλιόνα*. Hinnulos vertunt nonnulli, quibusdam Caniculæ dicuntur, Bellonius Nissolas Massiliensium esse, quod albas maculas per dorsum dispersas habeant, putat Galli duos pro iis, Roussettes dictos, ponunt. *Major* ad cubitalem magnitudinem exerescere solet, interdum binos superat; *Cute* est adeò asperâ & durâ, ut eâ ebur perpoliri possit. *Dorsum* & latera subnigricant, nigerrimisque & latissimis maculis insigniuntur. In petris & alto mari frequentius degit, hinc Saxatilis Canicula Rondeletio dicitur.

Minori cubiti aliquando magnitudo, dorsum & latera subrubent, notisque liventibus, & multò quàm in majore minoribus, consperguntur. Cutis, si à cauda sursum ad caput macrum ducas, aspera; si à capite ad caudam, minimè. Oculis, ore, branchiis, pinna, caudaque similis, ab aliis parum differunt. *Generationem* si attendas, *ova* ipsis in medio matricis circa spinam hærent, aucta circumducuntur. In binos enim partita sinus matrix cum sit, atque sub præcordiorum septo constituta, in circumstantem utramque partem abscedunt. Gerunt testacea quædam, in quibus ovi specie, humor inest; quem colore & perspicuitate cornu, figurâ pulvinaribus quæ capiti dormituri supponimus, similem, facit Rondeletius: *Ova* nulla conteguntur secundina: à venosa umbilici parte ipsis nutrimentum est. testæ facies similis tibiæ ligulis, atque in ea sunt meatus, capillamentorum tenuitate. Testa intus rupta dilapsaque fœtus exit; & ex ovo vivum protruditur animal. Caro Majoris ferinum edit odorem. Uterque etiam à plebe rejicitur.

Arist. H. A. l. 6. c. 10. Tab. VIII. 1. 2. 3.

Arist. H. A. l. 5. c. 10.

Athen. Dipnos. l. 4. Gal. l. 3. de Aliment.

PUNCTUM III.

De Mustelo Lævi & Asteria.

Tab. VIII. 6. **M**ustelus seu Galeus LÆVIS, non à cutis Lævitate, sed ut ab Acanthia cui perquam similis est, distinguatur, ita dicitur. Romæ *Pesce Columbo* vocatur. Vix ad viginti libras pervenit. Colore est albicante, *Corio lævi*, ore edentulo, dentium vicem asperæ maxillæ obtinent, foramina pro naribus habet, quibus minora sunt alia post oculos, rostro, branchiis, pinnis, caudâ, intereanisque cum Cane Galeo convenit. *Viscitat* piscibus, etsi inter gregales habeatur. De *Generatione* sic Aristoteles. Ova in medio matricum continent, ubi circumstetere in utrumque matricis sinum descendunt, & evadunt annexa per umbilicum ad matricem animalia, ita ut absumptis ovis, non alio modo quam quadrupedes foetus habere videantur. Annexus est longus umbilicus ad matricis partem inferiorem, unusquisque tanquam appensus acceptabulo. Et ad foetus medium quæ jecur habet, quem si feces, intus alimentum quasi ex ovo deprehendas: etiam cum amplius ovum non est. Tamen secundæ membranæque sua cuique foetui, more quadrupedum. Foetus per initia caput in superiore parte habet, aditus autem atque perfectus devexum. In læva mares generantur, in dextra foeminae, quin eadem in parte simul tum foemina, tum mas. Dissecto foetu, quot habet viscera, puta jecur, ea interius magna, & sanguine constantia, sicut in quadrupedibus. Propter duram insuavemque carnem plebi relinquitur.

Tab. VIII. 8. **GALEUS ASTERIAS**, Oppiano *Πτερο-ελιανό*, Æliano simpliciter *γαλιό*, nisi Galeos omnes maculatos vocet, Bellonio *Mustelus stellaris*, qui etiam Oppiano *Pardalim* dici credit. Lævi mustelo internis & externis partibus est similis, cute tamen læviore. Dorsi maculæ aliæ stellarum speciem referunt, aliæ sunt rotundæ. Locum, victum, partum, Ingenium, & Mores, communia cum cæteris habet. Itcesius Galeorum optimos & tenerimos esse opinatur.

PUNCTUM IV.

De Glauco Æliani & Malthæ.

Tab. VIII. 7. **GLAUCUS** Æliani vel ideo inter Galeos refertur, quod sit Cartilagineus, tota corporis figura cæteros Galeos referat, & parvulus periculo instante, ore hiant excipiat, præterito, revomat. Piscis est quatuor aut quinque cubitorum magnitudine. Cute lævi. Dorso cæruleo exsaturato, ventre candido. Rostro acuto. Ore in supina parte posito. Oculis magnis, ex quorum inferiore parte enascitur membrana candida, quæ ad oculum sursum attollitur, eisque veluti nubes caliginem offundit. Dentium acutorum, la-

torum, quodammoda ferratorum, ad latera spectantium ordines sunt duo, in palato substantia fungosa & mollis, quæ supernam inferamque oris partem replet. *Lingua* crassa & aspera. Branchiæ detectæ; propè has *pinnæ* duæ magnæ, ad podicem totidem minores. duæ in tergore. *Cauda* ex duabus constat. superior multò longior est quàm inferior, sursumque spectat. *Interna* si attendas, videbis *ventriculum* amplissimum & longissimum; *splenem*, qui ventriculo annectitur, longum, ex multis particulis carnosis rotundisque racemi instar compactum. *Hepar* adiposum, in duos lobos dissectum, quor. alteri vesicula fellis adhæret. *Fel* viride. parte ventris infima in maribus feminis vasa in duas partes divisa, in foeminis *vulvam*, in maribus substantiam carnosam, digitali magnitudine, penis specie. *Intestina* primo sunt gracilia, dein lata, sine ullis spiris. Ex venis meseraicis rami duo oriuntur; quorum alter ad hepar, alter ad ventriculum tendit, & in multos ramos diducitur. *Cor* quoque angulatum est. Carnis humanæ avidissimus, & ad littora deambulantibus inhians. Exemplum militis cujusdam præbuit, à quo cum calces apprehendere frustra tentasset, occisus est.

MALTHAM inter belluas marinas numerat Oppianus. Suidas cum Presti aliquando eandem facit. aliquando ab eodem distinguit, *δυσσινδρυόστρον* belluam appellans, Rondeletius Cetaceum esse piscem, & ex Galeorum numero colligit, quod caro ipsi sit laxa, mollisque. Pinnis, cauda, internis partibus, à Cane Galeo non differt, nisi quod alba oculorum macula destituatur. Rostro est brevi, dentibus latis & acutis. Os habet in supina parte, non multum infra rostrum. *dentium* multos ordines.

Oppian. Halieut. l. i. v. 371.

PUNCTUM V.

De Vulpecula marina, & Galeo Acanthea.

Piscis, qui Græcis *ἀλκυόνη*. Oppiano *ἀλκυόνη*, Bellonio *Simia marina*, Latine *vulpecula marina*, vel à caudæ longitudine, vel insuavi ingratoque gustu, vel ab astu ingenioque, nomen sortitus esse videatur. Distinguat ne ab Archestrati vulpecula, quam circa Rhodam sapidissimam, & alio nomine *ἀλκυόνη*, id est canem pinguem appellari scribit; an cum eo sit eadem, ignoro. Piscis est aliquando ad centenas libras excrefcens. Cum Cane Galeo, oculis, foraminibus auditui, & olfactui inservientibus, & branchiis conveniens. Crassior & brevior. Cute tectus. Dorsum habet cineraceum, ventrem candidum, *caudam* falcatam, & quodammodo ensiformem, quæ magnitudine reliquum corpus superat, & in cuius exortu pinna conspicitur. Rondeletius ita eam exprimit, ac si ex binis pinnis constaret,

Tab. VII. 3. Rondelet. Hist. Pisc. Bellon. l. i. de Aquat. c. 7. Diphilus apud Athen. l. 8. Arist. H. A. l. 9. c. 37. ex Scaliger dist. Æl. Hist. Var. l. i. c. 5. Athen. l. c. Oppian. Halieut. l. i. v. 381.

ret, quarum illa, quæ sursum abit, toto corpore longior est, altera decuplo minor. Pinnae ad branchias & anum quam in dorso longiores. Ventriculus amplus, intestina lata, jecur pallidum & in duas fibras divisum. Iconem apud Aldrovandum vide; nos hic alterius cuiusdam subijcimus. *Locis*, in mari gaudet coenosis à littoribus magis remotis. Pisces etiam grandiores pro cibo. In *Conceptu* & partu spinacem imitatur. Sobolem metu periculi intro recipere, præter lapso emitte- re, Rondeletius oculatus testis est. Cauda, longitudo ob mollitiem quæ in tenellis facilime flectitur, impedit. Hamo devorato glutunt amplius ad infima lineæ, quæ facile prærodunt. Caro virus resipit.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 43.
Oppian.
Halieut.
l. 3. v.
144.
Tab.
VIII. 5.

GALEUS ACANTHIAS Gazæ *Mustelus Spinax*; Scaligero *Mustelus Spinus* est, Æliano *Centrines* nomine venit. Nunquam viginti libras implet. Corpus sensim gracilescit. Dorsum cinereum apparet, venter albicat. Rondeletius in mari argenteo colore esse, cum expiravit ex cinereo rubescere, author est. *Rostrum* ipsi primò latum, mox in acutum definens. Retro oculos, qui mediocres, bina foramina auditui dicantur. Ante os, quod in supina parte, & dentibus validissimis armatur, bina alia olfactui inserviunt. Branchiæ à lateribus utriusque quinae & detectæ, *Pinnae* duæ, natatui destinatae branchias sequuntur, in parte supina nullæ sunt, præterquam expodice utraque parte, quæ in fœmina minores, in mare majores sunt. hac nota, quia in cæteris omnibus Galeis inter podicem & caudam, imò ventri singularis commissa conspicitur, ab aliis, ut mas appendicibus parvis, quas illic obtinet, à fœmina, distinguitur. Utraque in dorso pinna, aculeum longum, triangularem magis, quam rotundum annexum habet. *Cauda* est gemina, superiore parte longior inferiore brevior, *Splen* in duos lobos dividitur. Cæteris partibus cum aliis convenit. *Locus* ipsi coenosa maris receptacula, flumina nunquam subit: nec in Euripo Pyrrhæo reperitur. in septo præcordiorum supra mammæ ova continere, ubi ovum descendit atque absolutum fuerit, in eo catulum fieri, author est Aristoteles. Sex in ventre fœtus perfectos observatos, multis aliis ovis non exclusis, pendentes, qui ex ovis per venam umbilicalem excludantur. Ova nullo vinculo alligata esse, observavit Rondeletius. Ex ovis alimentum trahere, donec perfecti foras emittantur, haud malè colligi potest. *Gregalem* esse, quod multi simul capiuntur, certum est. Quod fœtus suos nec recipere, nec emittere possit, spinæ faciunt. Carne est dura & insipida; minus tamen quam vulpecula virus resipit.

Arist. H.
A. l. 6.
c. 8.
I. Scalig.

Arist. H.
A. l. 6. c.
10.

PUNCTUM VI.

De *Centrines*.

NOMINE CENTRINES, Ælianus Mustelosa aculeis præditos intelligit, cum duo Canum genera, in Galeos & Centrinas dispe- scit: noseum intelligimus, quem Aristoteles *κατακταρ τοιδον*, esse, Arhenæus ab Epæneto *αποκταρ* vocari, docet. Romæ & tota Italia *Pesce porco* dicitur. Plinius nusquam ejus meminit, nec apud Aristotelem quicquam invenias, quamvis scripsisse Athenæus prodiderit. Quantum ad descriptionem brevis est, crassus & spissus, à capite ad podicem *trianguli* figura. *Cute* integitur asperrimâ, brevibus crebrisque aculeis horrida. qui in capite & dorso robustiores sunt, colore ex cinereo nigricante. *Caput* habet exiguum & depressum. *Oculos* splendentes, post eos duo foramina auditui destinata, duo supina rostri parte pro naribus conspiciuntur. *Caput* supina parte, rotundum, magnum, semper ferè hians. *Dentes* latos, acutos, quorum in superiori maxilla triplex, in inferiori simplex ordo est. Branchias utrinque in lateribus quinque, easdemque detectas. *Pinna* prior à capite statim enascens, aculeo longo & ad caput sese inclinante armata, cristæ instar multum furrigitur, quæ è podicis regione minor, minore & ad caudam vergente aculeo instructa est. In caudam & podicis pinnae, imò ventri nulla alia pinnula subnectitur, quod ei cum Acanthia commune. Cauda in pinnam inferiore parte latam, superiore parte in acutum angulum definientem degenerat. In *partibus internis*, ventriculus est oblongus crassus. *Intestina* haud multis gyris reflexa. *Hepar* præpingue, magnum, in duos lobos ad infimam ferè usque ventris sedem extensos divisum, albicat. *Locus* ipsi in coenosis pelagi domiciliis potius quam littore, ideò varius capitur. *Ova* primum in se gignit numero sissima, vitellis gallinaceorum ovorum similia. animal reliquorum cartilagineorum more excludit. Venenum fundere ex Oppiano discimus, quos ille *αποκταρ τοιδον* vocat, hoc *αποκταρ* vocari, vetus scoliastes adscripsit. Vix aliquis ejus in *cibis usus*, nerveâ potius quam carneâ substantia constat. In *Medicina* oleum ex hepate frixo collectum, ad duritiem humani hepatis emolliendam conferre, & articulorum dolores lenire ex Rondeletio habeo. Cinis urinas vehementer movet.

Tab.
VII. 4. 5.
Ælian.
l. 2. H.
A. c. ult.
Arist. H.
A. l. 5.
cit.
Athen.
Dipnos.
l. 7.

Oppian.
Halieut.
l. 2. v.
640.

PUNCTUM VII.

De *Simia marina*, & *Zygana*.

SIMIARUM MARINARUM duas habemus descriptiones. Æliano est bellua in mari rubro, cartilaginea, terrestri tum colore, tum facie similis; in hoc differt, quod variè distinguatur, cervicemque & branchias

Tab.
VII. 6.
Ælian.
H. A. l.
12. c. 27.

Gesner.
de Piscib.

chias ruffas habeat. Tegmen corporis testudinis involucrium est. Cum natat, volare videtur. Gesnerus piscem sibi ex Dania allatum scribit, coloris corpore toto viridis, dorso magis fusci, ad latera pallidi. Os sinum habebat. *pinnas* tanquam volans extendebat, & inter duas in dorso *pinnas* aculeum retrò tendebat. branchiarum foramina quina apparebant, obliquo inter os & oculos descensu. Testudineum involucrium si accessisset, *Æliani* simiam fecisset.

Tab.
VII. 8 9.

ZYGÆNA piscis monstrosus, à capitis figura, quæ *ἰχθυόει* imitatur, quo transversum librile, ex quo lances dependent significatur, nomen obtinuit.

Oppian.
Halieut.
l. i. v. 6.

GAZA Libellam vertit. Massilienses piscem Judæum à similitudine tegumenti capitis, quo olim Judæi in provincia utebantur, dicunt. Galenus, *Ælianus*, *Oppianus* eoque secutus *Suidas*, cetis annumerant. Galeis, quia multa cum illis communia habet, haud malè subnectitur. Corio tegitur. Ventre est albo, dorso cinereo, pro spinis cartilagineas obtinet. *Cervicem* & *gulam* habere scripsit *Rondeletius*. Os ipsi non rotundum, non rostratum, nec in latera compressum, sed in ea extensum, atque transversum habet. Pars frontis anterior, quæ utroque oculo, magno, & deorsum potius quàm sursum vel ad latera vergente, clauditur, in semicirculum ferè extuberat, & sic in aciem acuitur, ut obvios pisces secare posse credatur. Os subtus, inferiore parte, permagnum, dentibus validis sinus planis, in latus ferræ modò vergentibus, triplici vel quadruplici ordine digestis armatum, latet. *Lingua* lata, humanæ haud absimilis. *branchiæ* utrinque quina & detectæ. *Pinnas* icon ostendit. in dorso nullam esse tradit *Rondeletius*. *Cauda* duabus inæqualibus pinnis constat, quarum superior vertebriis fulcitur, ac multo longior est; inferior vertebriis caret, & brevior extat. *Versatur* in profundo. Pisces obvios, & homines natantes frontis suæ acie subvertit, & *Leoni* quod ad vires, ab *Oppiano* opponitur. Occursus ejus olim, navigantibus infestus habebatur.

Ælian.
H. A. l.
10.
Oppian.
l. i. v.
367.
Oppian.
l. 5. v.
37.
Ælian.
l. c.

Ab ista *ZYGÆNA* plerimum ille differt, qui ventre candicante, ore miniacei coloris, cætera niger esse, scribitur.

PUNCTUM VIII.

*De Mola Salviani, seu Orthragorisco
Rondeletii.*

Tab.
IX. 1. 2.

Monstroso pisci monstrosiorem subijciamus, sed & istum toto corpore cartilagineum. *Mola* quibusdam, seu quod informem molam referat, seu quod rotunditate corporis molæ molendinariæ similis sit, ut

Rondeletio placet, dicitur. Apud Massilienses, *Luna*, vel quod extrema corporis parte, quæ pinnis subest, crescentis figuram referat, vel quo demptis pinnis toto corpore plenæ instar sit, vel quod corporis extremum in cornua curvatur respondeat, vel denique quod noctu splendeat, vocatur. sed cave pro *Æliani* sumas. Porcum, quem *Lacedæmonii Orthragoriscum* vocant, quemque *Appion* maximum piscium esse, & cum capitur grunnire, credit *Rondeletius*, nec abaudit comparatio. Nec longus, nec planus est, sed in latera comprimitur. brevis adeò, ut solum caput potius quàm piscem repræsentare videatur. Centenas sæpè superat. *Cute* tegitur asperâ non secus ac *Squatina*, argentei coloris, ventre est subalbido, dorso cinereo. Os habet exiguum. *dentes* tantum geminos, utramque universam oris partem munientes, quorum inferior retusior, superior magis acutus ac secans est, latos continuosque *Rondeletius* facit. Oculos parvos ac orbiculares. *De branchiis ita Salvianus*. Branchiarum internum orificium utrinque, unum est parvum & semicirculare, prope quod etiam utrinque pinna una parva & rotunda sita est, quæ alia prorsus ratione quam aliorum piscium laterales pinnæ, moventur. Cum enim illæ in piscibus à cauda ad caput, in hoc nostro à dorso in imum ventrem deducuntur. In extremo præterea dorso propè caudum alia multò major pinna, non rotunda sed sublonga erigitur: è cujus regione altera ejusdem magnitudinis & figuræ imò ventri statim ab ano subest, quæ alio etiam modo quàm dorso & ventris aliarum piscium pinnæ mobiles sunt. Non enim ut illæ à cauda ad caput eriguntur, & à capite ad caudam inclinantur, sed in utrumque latus moventur.

In *caudam* carneam non degenerat: nam postrema ejus æquè ac latera lata sunt: pinna tamen cauda, non oblonga sed lata, atque omnem postremam piscis partem amplectente, in latereque mobili munitur. Crescentis lunæ figuram referre; superiore parte articulatam esse, ut tam in dextrum, quam in sinistrum moveatur, *Rondeletius* addidit.

Quantum ad *Interna*, quæ ob corporis rotunditatem conglobata sunt. Carne est candidissima, nerveam potius, quàm carneam substantiam præferente. Cocta gluten ex tergoribus boum confectum refert. *Adipe* ut in porco, multo carni corium firmissimè adhæret, & difficillimè avellitur. *Tecur* habet pallidum, magnum, & tenerrimum, dum coquitur in densam pinguedinem facessit. Noctu ex internis partibus caruleus è longinquo splendor, imò ignis splendidissimus enitet. Grunnire dum capitur, dicitur. Pinguedo ejus est multa & candidissima, linquefacta, lucernis inservit, solo pisculento odore molesta.

Ælian.
H. A. l.
15. c. 4.
Plin. H.
N. l. 32.
c.
Aldrov.
de Piscib.
l. 3. c.
44.

molesta. *Speciem aliam Gallus quidam Venetiis descripsit.* Iconem exhibeo. Forma, inquit, in orbem vergebat. Corio sine squamis, &c.

An huc Piscis Cadamusti suem referens dolium crassitudine, duo longitudine superans, formæ obrotundæ, suilla cute, Oculis parvis, edentulus, loripes, branchiis brachii mensuram excedentibus, cauda longa, & lata spectet, aliis judicandum relinquo.

ARTICULUS III.

De Cartilagineis planis.

PUNCTUM I.

De Torpedine.

Tab. IX.
3.4.5.6.

Absolutis Cartilagineis longis, ad Planos progredimur, primus occurrit *Torpedo*, quæ veteribus Græcis *τορπις* & *τορπινα*, ad differentiam affectus, *τορπινα*; modernis *torpida*, & Margotir, Alberto *Stupefactor*; mixto barbaris, *Torpigo*, *Terpigo*, *Stupor*, *Stupefaciens* & *Stupefector*, dicitur. Ex Cartilagineis planis esse, ex Aristotele & Plinio habemus. Lævem, apud Athenæum legitur. Corruptus Aristotelis locus ex quo colligitur spinosa, nec vacat errore Cardanus. Duo olim ipsius genera. *Nigrum* quod ad capitis dolorem commendatur, & subruffum, seu ad rubricæ colorem accedens. In *Maculosas*, & *Non maculosas* optimè dispescuntur. Tria illarum genera. *Macula* in quibusdam diversarum figurarum & albicantes, huc & illuc sparguntur, in quibusdam quinæ rotundæ, nigricantes, pentagoni figurâ locatæ, oculos tam egregiè representant, ut Oculatam Plinius dixerit; bene dictum Bellonius defenderit. Omnium corpus si caudam exceperis orbiculare est, senas libras vix excedunt, molli & lubrica cute teguntur. Venter est subalbidus, *dorsum* sublavum, & ad rubricæ fabrilis colorem accedens, partes quæ ad caudam mediis corpulentiores apparent. hæc *cartilagineum* quandam tabidam in seipsis habere videntur. *Ore* sunt in supina parte parvo, ante quod foramina duo odores deferunt, dentibus minutis & ferratis. Oculis in superiore parte antèrè exiguus, quos retrò foramina duo, ipsis grandiora, patula, & in palatum pervia. Cerebro non carent. *Lingua* destituuntur: *Branchiæ* in medio sunt corpore (ob ipsius tenuitatem ad latera locari non poterant) utrinque quinæ & detectæ, quarum orificia parva & semicircularia, tenui quadam cuticula conteguntur: *pinnæ* juxta caudam duæ; pro reliquis latitudine utuntur, & utroque sui corporis semicirculo quasi pinnis natant, podex in caudæ exortu, ipsa brevis & latiuscula. *Intus* Carnosum habent ventriculum: *intestinum* breve & amplum. *hepar* pallidum, & in duos lobos divisum.

Fellis vesica illaque magna hepati committitur & dextro annexa lobo, in sinistrum quoque venulas quasdam immittit. *Lien* est parvus & subrubens. Uterus oblongus & bifidus. *Habitant* in mari, locis cœnosis, reperiuntur & in Nilo. ut haud male in Marinas etiam & Fluviatiles, distinxeris. Piscibus *vescuntur*, quos astu, ut post dicam, capiunt. *Pariunt* circa æquinoctium, & quidem ova intra se præmollia, quæ in alium locum uteri transferunt, & excludunt. Sic animal pariunt, pua concipunt. Octogenos foetus habens, inventa est. Hyeme propter frigus in terra latent. Latitudine sua quasi geminis pinnis *feruntur*, natant sed ægrè, nam *παρὰ τὴν βαρύνειναι, pigra tarditate gravantur.* ideo *βαρὺν κινεῖσθαι, & κινεῖσθαι* Natura concessit. Singularis ipsis torporem vel tremorem inferendi, unde nomen habent, facultas. *Merfæ* in limo se occultant & pisces, qui securi supernatantes obtorpuere, corripunt. Idem procul & è longinquo, vel si hasta virgave attingantur, quamvis prævalidos lacertos, torpidos, & quamlibet ad cursum veloces pedes, alligatos reddunt. Et illi, qui rete, in quo una ex iis capta fuerit, attigerint, torporem pariuntur, quod *Æliani* fide dictum sit: & si inter mortuos pisces vivens torpedo sese moveat, qui tacti fuerint, interno quodam motu cientur, ut videantur vivere, quod Godignus de rebus *Abyssinis* prodidit. In totone corpore, quod *Salviano* placet, an parte, quod *Diphilus*, *Oppianus* & *Cardanus* prodidere, incertum. Exiguam plerarumque, quæque quavis corporis excitatione refellatur, nec totum corpus infestantem, *Gillii* & *Kircheri* experientia docemur, ut vel inde *Albertum*, qui hoc veneno hominem interfici prodidit, refellere liceat. Causam in cæcam facultatem, quod mortua eadem destituitur, coniecere alii; in narceticam & insensibilem qualitatem, nervis & masculis contrariam alii.

Ufus Torpedinis in *cibis* commendatus à Galeno & aliis, quod carnem mollem, jucundam, & mediocriter per ventrem subeuntem habeat, à *Diphilo* & aliis rejectus est. Partes duntaxat quæ circa caput laudantur. *Venetiis* ne in foro piscario vendatur, præfecti sanitatis autoritate cautum est. *Genuæ*, *Masilæ*, & alibi à tenuiore fortuna experitur. In *Medicina* diuturnis caput doloribus admoveatur: & sedem prociduum coerceat. idem apud *Marcellum Empiricum* invenies. fortè & arthriticos demulcet; eodemque modo *Anteroëa* *Cæsaris* libertum supra fidem podagram curasse, *Scribonius Largus* testatur. & *Diaturpanos* ceratum apud *Æginetam* ad podagram habemus. Mirum, si verum, quod de ea *Plinius*, si capiatur cum Luna in libra fuerit, triduoque asservetur sub dio, facilis partus facere postea, quoties inferatur. fortè quod velut induciis dolorum

Oppian.
l. c. H.
lieut.

104.

Athen.

Dipn. l. 7.

Plin. H.

N. l. 9. c.

51.

Arist. H.

A. l. 5. c.

12.

Oppian.

Hal. l. 2.

v. 58.

Plin. H.

N. l. 9. c.

42.

Oppian.

Halieut.

l. 2. v. 55.

Arist. H.

A. l. 9. c.

37.

Plin. H.

N. l. 32.

cap. 1.

Ælian.

H. A. l.

9. c. 14.

Athen.

Dipn. l.

7. Opian.

Hal. l.

22. v. 55.

Kicherus

l. 3. Ma-

gnet. ar-

tis p. 6.

l. 4.

Gal. l. 3.

de Alim.

Diosco-

rid. l. 2.

mater.

medi.

c. 17.

Plin. H.

N. l. 32.

c. 10.

rum datis, natura ad excludendum foetum firmatur. Corium nuper decorticata, si parti matricis prolapsa involvatur, ipsam reducere, Aëtius ex aliis habuit.

PUNCTUM II.

De *Pastinaca marina*.

Tab. IX.
7.

Quem Graeci *καρχarias*, seu ut D. Ambrosius vertit, *Turturem*, ab alarum expansionum similitudine vocant, is Latinis *Pastinaca marina*, seu à colore, seu quod radio ceu pastino instrumento fossorio fodiat & pungat: Gallis *Raja*, ob similitudinem quam cum *Rajis* habet, dicitur. Duas ejus species Bellonius & Rondeletius agnovere. hic capite tantum & rostro differre ait: ille in *leuem*, cujus cutis perpolita, dorsum liver in corticis platani modum, venter albicat, plurimis veluti striis, per carnem hinc inde deductis, & *Asperam*, quæ tota aculeis horret, atque ad caudam præsertim per multis uncinis in gyrum dispositis scatur, dispescit. Magnitudine vix denas libras superant. Corpore sunt quadrilatero, ventre albicant, dorso livent. Superiore parte aliquod *capitis* vestigium antè cernitur, capiti palustris ranæ non absimile: in eo non nisi *oculi* oblongi & grandiusculi, à quibus foramina bina, oculis majora, semper patula, in palatum deducuntur, pars oculis anterior in rostrum carnosum acuitur. *Os* habet parvum & edentulum, (mendum in Dioscoride, si dentes habere innuit) solaque maxillæ asperitate illorum vice utitur. *Pinnis* carent circa caudæ exortum unum orbicularem si excipias, idè latitudine sua natant. *Branchias* in medio ferè ventre quinquæ, in partibus flaccidis & carne vacuis, (partes circa caudam mediis partibus carnosiores habere, cartilagineis planis commune est,) sitæ sint. *Caudam* habent longissimam, spinosam, muris caudæ persimilem. Crassa primum, paulatim in magnam tenuitatem stringitur. super eam, in medio ferè aculeus, osseus, longus, acutissimus, & serratus, quincunciali magnitudine, Dioscoridi *αλεγο*, Horo Apollini *δαρδα*. Plinio radius eminet.

Quantum ad *interiora*, Ventriculum habet parvum, angustum, cui, quia satis ab ore distans est, *stomachus* præponitur: idem in ecphylin à qua breve & gracile intestinum dependet, quod aliud initio angustius, mox sensim latius, dein priusquam maximè dilatetur, angustum postremum in tectum intestinum declinens, & unde excrementa porracei coloris rejiciuntur, desinit. *Iecur* amplum, ex albo flavescens, in duos lobos, quorum dexter latior & major, sinister brevior & minor, divisum. *Fel* hepatis annexum, ex viridi flavescens. Ute-

rum oblongum, quo ova continentur. *Degunt* in cœnosis maris locis. Carnibus vescuntur & latrocinantur ex occulto, transeunt radio (quod telum est eis) figentes, nec quinquam attingunt, nisi telo suo vulneratum.

Ex insidiis venari, quod Mugilem velocissimum piscem allequantur, argumento esse potest. *Cœunt* ut *Rajæ*, ad motus invicem non solum partibus supinis, sed etiam tergo foeminarum supinis marium, superpositis. Foetus aliorum cartilagineorum more non recipiunt. Id enim acuties caudæ prohibet. *Volatum* quoque exercere, falsò apud Ælianum dicitur: sed radii sui veneno se tueri, tam certum, quam Musicæ dieteriis & saltationibus delectari, ambiguum videtur. De ejusdem radii venenositate non est quod dubitemus. Nullum usquam execrabilius, arbores, infixus radiei, necat, arma, ut telum perforat, vi ferri & veneni malo, non tamen, ut nulli remedio, quod Ælianus prodidit, succumbat: & necesse fuerit Leonidam, Byfantium ictum occumbere. Benè radii cinis cum aceto vulnere admoveretur, feliciter furfures in eodem cocti auxiliantur. Lauri decoctum, Theriaca Andromachi, Galeus, cum quo inimicitias gerit, haud frustra adhibita. Cauda, quæ idem intulit, in arborem, quercum imprimis, infixa, aut de eadem suspensa, emarcidam eandem evadere, sanari agrum, Aëtius prodidit. De *Uso in cibo*, ne falsò Galenus mollem & jucundam carnem ejus faciat, vehementer metuo, gustus insuavem & ferinum quid respicientem, testatur. In *Medicina* mitigat dentium dolores radius, quos frangit & extrahit. Torrerium, mox conteri resinaque excipi, debere, apud Celsum legimus.

PUNCTUM III.

De *Aquila*.

Quid per Aquilam piscem, seu *ve-* teres voluerint, difficulter sciri potest, planum duntaxat, & cartilagineum, animalque parere, ab omnibus proditum est; an radium aliquem in cauda habuerit, nec ne, reticere. Non mirum itaque in diversa recentiore trahi, & unam à Salviano, quam Rondeletius alteram Pastinacæ speciem facit, duas ab Aldrovando, monstruosam à Bellonio & Paræo describit, *Salvianiana* magnitudine trecentas libras non superat. Lævi & molli cute tegitur, inferiore parte alba, superiore livida. Caput habet exertum, capiti bufonis simillimum: oculos magnos, rotundos & prominentes, post quos bina, magna, & patula foramina insculpta sunt. *Os* supina parte mediocre & denticulatum. *Lateræ*, quæ acuta, expansas volantis Aquilæ alas æmulantur. In caudæ exortu utrinque una

Plin. H. N. l. 9. c. 42.
Ovid. in Halieut. l. 2. v. 472.

Aristot. H. A. l. 5. c. 3.

Arist. H. A. l. 6. c. 10.
Ælian. H. A. l. 8. c. 26.
Ælian. H. A. l. 9. c. 40.
Idem. l. 1. c. 30.
l. 17. c. 18.
Ælian. l. 1. c. 56.
Ælian. l. 2. c. 50.

Galen. l. 3. Alim.
Dioscorid. Mat. Med. l. 2. c. 22.

Tab. IX. 8. 9.
Plin. H. N. l. 9. c. 24.

Arist. H. A. l. 1. c. 5.
Galen. l. 3. Alim.
ment.

parte & rotunda pinna exoritur, in *maribus* ex utroque podicis latere, una appendix pendet. Cauda pallinacæ tenuior & longior; in dorso paulo post principium pinnatam unam erigit, atque hæc deinceps *aculeus* offeus, longus, acutissimus atque serratus, eminet. *Intra*, Jecur est subflavum, lien subater. Aldrovandi *prior* videtur *aliquando* latissimis alis, qua corpori hærent caruleis, in extremitate rubris. *Altera* supra oculos & in fronte aculeata est, in cauda binos gerit radios. Cœnosa hi pisces in mari loca incolunt, resupinati piscibus aliis vescuntur, quos ex occulto figunt. Vivos foetus cartilagineorum more pariunt. Radio lædunt, ideo publicè cum eo non divenduntur. Caro quia tetrum & gravem spirat odorem, à mensis exulat. Quæ de lapide in capite ejus à Kiranide scribuntur, fabulosa sunt. Bellonii verè monstruosus est. descripsit eum Gesnerus: Piscis hic rarus (inquit) & ignotus omnibus. & Pærus volantem facit, rostro viridi.

Tab.
XII. 2.

PUNCTUM VI.

De Rajis in genere.

Tab.
X. 12.

Plin. H.
N. l. 23.
c. 11.
Arist. H.
A. l. 2. c.
13.
Plin. H.
N. l. 9. c.
24.

Ælian.
H. A. l.
13. c. 4

Rajarum nomen fortè à radendo Latini sumfere. Græci à quadam cum rubo similitudine, sunt dorso asperæ, ut recurvas supina parte rubus, spinas gerit; *ῥαγι* marem, foeminam *ῥαίσα* dixere. Plinius Græco vocabulo utitur. Ex cartilagineis & planis esse nullum dubium. Albertus in pectinum genere posuit. Tria vero illarum apud antiquos genera. *ῥαγι* unum simpliciter, *ῥαίσα* Alterum Aristoteles & Galenus vocavere, *stellatum* Athenæus addidit. Rondeletius postquam in *laeves* & *asperas* easdem divisisset, mox stellulis notatas, iisque carentes addidit, & ex *asperis* alias modicè tactum vellicante lanugine, alias robustis sed raris aculeis, quasdam robustissimis & densissimis asperari dixit. Magnitudine inter se differunt, bicubitales aliquando Salvianus vidit, haud minores Ægolicæ clypeo in India nasci, Ælianus prodidit. Cuticulari reguntur operimento, omnibus membranula, quam nebulam vocant, *oculus* obtenditur. juxta oculos foramina sunt magna ampla, ad oris usque intima patentia, quibus operculum interiore parte à natura additum est. Ore aperto dilatantur, clauso magna ex parte occluduntur. Cauda omnibus procera atque aspera, in ejus dorso duæ pinnulæ, toridemque, sed exiguæ & orbiculares ad ejusdem exortum. Quod cartilaginei generis plana, pinnis destitui scripsit Aristoteles, illas quibus natando corpus impellunt, intellexit, quæ ad caudam, dirigendi itineris grata data sunt. Si quid in contrarium apud eum occurrit, mendum in causa *ῥαγι* pro *ῥαίσα* legendum est. Interiora si lustremus, *fellis* omnibus in hepate vesica. *splen* in ventri-

culi plexu; intestina crassa; in ecphyssi & recti intestini extremo angusta, genitale vitulæ marinæ simile. Circulatorum ex exciscatis Draconum & Basiliscorum figuras effecerunt, sic plebeculæ imponunt.

Tab.
XII. 1.

Commoda Rajis in cœnosis maris locis, non procul à littore *habitatione*. Hyeme latent, & quia numerosæ capiuntur, gregales haud malè colligas.

Coerunt non tantum ad motus invicem partibus supinis, sed etiam tergo foeminarum supinis marium superpositis, nec inter suum duntaxat genus consistunt. Cum Squatina quoque *coire* scripsit Aristoteles. Gerunt utero testacea quædam, testa tibiæ ligulis similis est. Pariunt animal, cum primum ova intra se pepererint. Ova quæ flava, sine testa primum in superiore vulvæ conspicuntur, quædam magnitudinem ovorum gallinæ æquant, alia his minora, nonnulla cicoris magnitudinem non excedunt, plura centenis in singulis aliquando numerantur. Quæ à perfectione propius absunt, in inferiorem matricis partem dimissa, restâ, & in qua albumen & ovum continentur, operiuntur, quadratiformia hæc, demptis angulorum, quæ variæ sunt appendicibus. Unius lateris appendices longiores, sunt foliis gladioli herbæ similes: alterius, breviores, latiores, replicatæ, quibus undique summotis, laterum anguli, tibiæ repræsentant ligulas. Unum aut ad summum duo pariunt, quod maximus earum in mari proventus, infinita ovorum in superiore vulvæ parte series facit, ex quibus tempore perfectis, iterati foetus excluduntur. Abditas, pinnas exertas movere specie vermiculorum, allapfos ad eas pisciculos capere, sic tarditatem motus astu compensare Plinius author est. Aristoteles radiolos vocat. Mendum tamen hisce locis subesse, suspicio est, cum nec pinnas nec radiolos habeant, vel pinnas Plinius improprie vocavit, & radiolis ab Aristotele tributum, quod rostri acumini competere videtur. Olaus quondam depingit; quæ homini in septentrionali Oceano circumvento suppetias tulerit. *Ufus* etiam in *Cibis*. Copiosioris nutrimenti & concoctu difficiles Galenus facit. Rondeletius de Rajæ bonitate quæsitus, perinde ac si quis pallium elixum comedit, respondit. Archestratus scapulas & hyeme laudat. Laterum extremas partes à divitibus comedi, reliquas plebi relinqui, ex Gesnero habemus. Apud Hollandos potissimum elixantur, butyrum, acetum, & sinapi condimenti loco sunt. Caseo & Silphio veteres condiebant. In *Medicina* auri fel est utilissimum, hepate ad pruritus feliciter Rondeletius usus est.

Tab.
XII. 4.

Plin. H.
N. l. 9. c.
42.

Galende
victu
attenuante.

PUNCTUM V.

De *Rajis Lævis*, & in specie de *Lævi Raja*, *Undulata*, & *Oculata*.

Tab.X.1.
2.3.4.5.6.

RAJÆ in Læves & asperas optimè distinguuntur: Inter illas, quarum alix acuto, alix obtuso rostro sunt, prima est quæ simpliciter Græcis, ΛΕΥΙΡΑΙΑ Latinis, *Mucosa*, & à lata fascia qua mucus seu potius coryza in laborantibus excipi solet, *Barysa* Romanis dicitur. Omnium est sui generis piscium post bovem maxima.

Corpore quidem tenui, sed in amplissimas alas expanso. Cute ab aculeis nuda. Uterque oculus, media dorsi linea, & cauda tenuioribus & raris aculeis muniuntur, sed & in supina parte quidam in os, quod latum est, cibi sine dubio retinendi causâ, recurrescunt. *Rostrum* tenui & pellucida cartilagine, constat. Alæ utrinque expansæ tenues sunt, & prono parte nigricant. *Cauda*, quæ tribus aculeorum ordinibus, instruitur, tota supina parte alba est. Rima quæ podici, pudendum muliebre refert: Quam Aldrovandus describit, maculis supina parte nigris undique variabat. *Rostri* pars in obtusum angulum, figura depressa, & quasi quadrangula tendebat. Branchias quinque detectas, habebat. Inter cutem & peritonæum albida caro mucosa, panniculi carnosus vicem obtinebat. *Intra*, *hepar* erat in latitudine ventris, ex albo rufescens, tribus lobis, linguarum figuram referentibus, quorum medius brevissimus, distinctum. Sub hepate figuræ planæ ventriculus, pars convexa ad sinistram vergebat latus, concava in spinam. *Mesenterium* ad connexionem ventriculi & intestini medio hepatis lobo colligabatur, sub ventriculo caro cernebatur rubicunda, lienis fortè vice fungens. *Cor* thoracis sinu exiguo triangulari, exiguum, trunco unico veluti pediculo appensum continebatur.

RAJA UNdulata à maculis flexuosis ita dicta, à colore *Cinerea* dicitur. Corpus ovi potius est, quàm Rhombi formâ, pronâ parte multis sinuosis lineis describitur. *Aculei* in linea dorsi pauci, parvi, & rari, circa oculos nonnulli, in cauda majores & densiores triplici ordine disponuntur.

RAJA OCulata & *levis*, *Asterias* quibusdam, sed perperam dicitur. Nam & *Galeus* à maculis, *Asterias* à maculis stellatim dispositis ab Aristotele nominatus est, quales in ista minimè deprehenduntur, & *Asterias* veterum tenerior est bonique succi, quod de hac dici non potest, & Galli hoc genus *Miralet* à speculorum parvorum similitudine vocare solent.

PUNCTUM VI.

De *Oxyrincho majore* & *Raja stellari*.

DUO OXYRINCHORUM genera Tab.X.8.
(à rostri acumine ita dicuntur) Rondeletius facit. *Majorem* unum, *Minorum* alterum. Bos ille Bellonii est; non quod quadrupedem repræsentat, sed quod Rajarum generis maximus, ad Bovis magnitudinem excrescat. Ligures *vaccam* vocant, in quibusdam Galliæ locis *Eleno*, quasi subulam, quod piscis rostrum tale sit, dicitur. Ex planis cartilagineis Bovem esse dubitari non debet. Ad duodecim ulnas latitudinis excrescere, Oppiani autoritate affirmo. In descriptione non conveniunt Authores. Dorso, facie, lateribus admodum niger est. Supinæ partes albicant, si *Æliano* credendum. Bellonius toto corpore lividum facit. Eidem dentes habet truces, hami in modum inflexos, triplici ordine in maxilla dispositos, eosque mobiles. Oppiano sunt obscuro & exigui. *Æliano* adeo inclusi, ut in conspectum non veniant. Rondeletio Major *Oxyrinchus* minori similis est, alis amplis & extusis, ipso corpore strictiore, acutioreque Dorso longiore. *Aculeorum* in sola cauda unicum habet ordinem. Pelagii sunt Ovidio boves, in cœnosis locis degunt Oppiano, *Æliano* in lutosus gignuntur. Piscibus *rescuntur*, sed humum maximè appetunt. *Parvi* statim animal. Corpore etsi sint magno, ideo quibusdam inter Cetaceos, imbelli tamen, mollitie conscii, sola corporis mole feruntur, sic & piscantes pondere suo opprimunt, & capti, renituntur. Carne sunt quam ceteræ molliore, & sale fumoque canditi exsiccantur, exsiccati diu incorrupti remanent.

OXYRINCHUS *Minor* corpore est maximo, & maculis multis lentis specie, notatur. *Dentes* habet in os vergentes. Ad oculos quatuor aculeos, in cauda tres eorum ordines, diversos & inæquales; primus medii ordinis major est secundo, tertius primo, quartus secundo respondet. Utrique per transversum recti sunt, ad latera converfi, qui per hos sequuntur in cauda extremi, in caput recurvantur. In supina parte rostri, alii sunt ad capiendos pisces curvi, alii acutiores. Ceteris partibus cum reliquis conveniunt. Ad *Oxyrinchos* referri debet ille, quem Gesnerus Venetiis accepit, corpore cinereo, maculis distinguendis fuscis, ambitu corporis subruffo, Normannis Hal, Lusitanis Huga dictus.

Iconem hic vide.

RAJA STELLARIS *levis*, Græcis *Asterias*, quam Gellius *Rajam oculatam* esse vult, capite, dorso, & cauda ab aliis distinguitur. Dorso pars prona alæque expansæ,

Arist. H. A. l. 5. cap. 5. Plin. H. N. l. 9. c. 24. Oppian. Halicut. l. 2. v. 143. *Ælian.* H. A. l. 1. c. 19.

Oppian. l. c. v. 145.

Ovid. in Halicut.

Arist. H. A. l. 6. c. 12.

Tab.X.9. Tab. XII. 7.

Tab.X.7.

fac, stellulis eleganter depictæ conspiciuntur. Aculei in eodem mox à capite incipientes, in priorem caudæ pinnulam desinunt. *Caput*, quia crassius & latius, Pastinacæ quàm aliis Rajis similis est. Cauda tenuis, & quàm reliquis brevior.

PUNCTUM VII.

De Rajis Asperis: & in specie de Raja aspera Stellari, Oculata, & Clavata.

Tab. X. 4.
5. 6. 7.
Tab. XI.
2. 3. 4. 5.

RAJA ASPERA STELLARIS tota aculeis horret. In oculorum intervallo multi sunt, breves, frequentes, peracuti: in medii dorsi linea alii magni, in cauda tres magnorum ordines, alii plurimis & minoribus distincti, infiniti alii sine ordine per totum corpus resperguntur, pro *dentibus* ossa dura & aspera gerit. Duæ hujus generis esse videntur. Una quæ stellulas habet in medio albas, sed quas ambit circulus ex nigris punctis constans, totumque corpus aculeis horridum est. Altera, stellulas prorsus candidas, cum multo paucioribus aculeis obtinet.

OCULATA lævi maculis similis est. *Aculeos* in alis extensis regione macularum utrimque habet, alios in lateribus capitis utrimque, alios in dorso, in cauda, majores, frequentiores, & validiores visuntur.

RAJA CLAVATA duplex est. Una quam Massilienses Clavade, Galli alii Raje bouclier vocant. Corporis specie reliquis est similis, sed multo brevior minusque acuto, &c. Colore nigricante, alis valde expansis. *Hepar* habet flavescens in duas partes disiectum, in quo vesica, *fel* aqueum & tenue continens. Pingue est illud, & inter cibos delicatissimos, in oleum resolutum, hepatis duritiem resolvit. Carne est durum. Posset Aquilæ conferri.

Alterà à superiore differt (Verba sunt Rondeletii, cui multas Rajarum species debemus,) &c. Congener hinc est & illa, Cujus icon Venetiis ad Gesnerum missa est. Maculis distinguitur fuscis, reliquum corpus obscure subluteum est, reliqua apparent.

PUNCTUM VIII.

De Raja spinosa, Aspera Fullonica, & Asperima.

Tab. XI. 5.
Aldrov.
de Piscib.
l. 3. c. 59.

RAJA SPINOSA Gallis Cardaire, quasi Lanifica, à spinis seu aculeis quorum multi infixi sunt instrumentis quibus lana carminatur, figura corporis lævi rajæ similis est, si longas cutis spinas excipias. *Spinæ* non in alis solum habet, ut clavata altera, sed etiam in lateribus circa caput, duo ocu-

lis præfixi sunt, & in media dorsali linea, & ad priorem usque caudæ pinnulam continuus est aculeorum ordo unicus. Carnis substantia & succo ab aliis non variat.

ASPERA, illa à Rondeletio cognominatur, quæ à cæteris eo differt, quod *aculeis* parvis latera conspersa habet, corporis verò truncum nullis. *Rostro* est acutiore. In cauda tres sunt longorum & firmissimorum aculeorum, ad extremum usque caudæ ordines.

RAJA FULLONICA ab eo nomine inditum est, quod ubique in alis, corpore, capite, cauda, tota frequentissimis aculeis conspersa sit, instrumenti illius, quo fullones pannos poliunt instar, quod totum aculeis ferreis confectum est. *Rostro* est satis longo & acuto. Caudæ aculei incurvi sunt, triplici ordine dispositi. Rara est, & pugnacissima esse creditur.

RAJA ASPERRIMA, à præcedente eo tantum differt, quod non solum prona, sed etiam supina tota aculeis peracutis ita horret, ut manu tolli non possit, nisi pinnulis cauda apprehensis, ideo supina in icon exhibetur, pro *dentibus* maxillas habet asperas & osseas.

PUNCTUM IX.

De Rana marina.

RANA MARINA. Græcis Βατραχία θαλασσία. Plutarcho Βατραχία δαδία nomen ranæ ex eo forte meruit, quod gyrinas sive ranulas recens editas, & imperfectas, oculis quidem & cauda notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes, & caudæ fissura, referat. A venandi olertia *Piscatrix*, quod & à Plutarcho factum, ob scædam corporis monstrositatem *Diabolus marinus* Dalmatis, ob oris hiantis amplitudinem, *Lamia* Siculis, ob carnis molliem *Maltha* Bellonio, sed perperam, dicitur. Magnitudine est ubique ferè pedali & cubitali, alicubi tricubitalem inveniri, *Salvianus* author est. Cute capitis, *aculeis* exceptis, lubrica & molli, infernâ parte subalbida, superna verò ex nigra flavescente tegitur. Unde molles, Ovidio, tergore Ranæ. *Caput* habet toto corpore longè grandius, ut nihil in eo præter caput & caudam conspicias aculearum, asperum, orbiculatum atque depressum. *Os* in promptu, seu anteriori parte, secus ac aliis cartilagineis, vastum, pro corporis proportionem grandissimum, ac quàm maximè hians. *Dentes* permultos magnos, acutissimos, in os recurvos, utriusque maxillæ, duobus palati ossibus, & linguæ radici infixos. Bellonius mobiles, albos, & confusis ordinibus dispositos facit. *Maxilla* ipsi retusi, semicirculares, quarum superior brevior est, inferior longior & prominens.

Lin-

Tab. X. 7.
Aldrov.
libro cit.
cap. 60.

Tab. XI.
Aldrov.
lib. cit.
61.

Tab. X. 6.
Idem.
c. 62.

Tab. X. 8.
Vossius
de Idol. l.
4. c. 28.

Arist. l.
3. de ge-
nerat.
c. 3.
Ælian. l.
13. c. 2.

Lingua maxilla superiore longior. Membrana quædam gingivarum interiore parte enata, & in os complicata, quæ à maxilla separari non videtur. *Oculi* ampli in capitis vertice potius quam in temporibus siti, *aculeis* sepiuntur. Ante eos duæ propendunt appendices, tenues, albæ, tetri odoris, si Oppiano credimus. In medio nasi *pinna* oblonga prædura, & versatilis, visitur: à cujus extremo musculus quidam ceu cirrus instar fili subtilissimi deducitur, per ejus cavum humorem certum in fundum usque cirri derivant, ubi coacervatus ad vivi vermiculi similitudinem tumet. Omnia hamum piscatoris exactè expriment. Parvæ ex rostro albicantes carunculæ, eminentia sub oculis cornicula Plinio, fili capilli speciem referentia, postremis quibusdam præpilatis, Aristoteli; gracilia quædam cornua Bellonio; pilli Gilio; geminæ regidæ albæque setæ Salviano, dicuntur. *Branchias* neque detectas, neque supina parte cæterorum planorum cartilagineorum more, sed in lateribus, non spineo operimento, sed cuticulari intactas habent. *Pinnas*, contra cartilagineorum planorum morem, in medio corpore, ubi cauda capiti jungitur, membranaceas & crassiusculas duas, propter amplitudinem partis superioris: in superiore caudæ parte una non admodum lata, sed longiuscula conspicitur. A capite illic *cauda* sequitur, rotunda, brevis, carnosa in pinnam, rotundam, crassiusculam & latam definens. Ex hujus & capitis lateribus, appendiculæ cornosæ, certis intervallis à se distantes, dependent, quæ natante ranâ, supernatant. *Intra*, si spectes, *peritoneum* vidibus nigrum; *ventrem* magnum, carnosum, appendice utrinque unica & brevi instructum; *intestina* gracilia, multis gyris circumvolata; *hepar* parvum, rubescens, in quinque lobos, ut Bellonius scribit, divisum. (Rondeletius sectum negat) eorum utrinque bini ad latera protrahuntur. *Fellis* vesica longo meatu ex hepate propendens, intestinis annectitur. *Vulva* est bifida, anfractuosa, duas ulnas longa, tribuit & vesicam, sed nescio quam verè Bellonius, & addit, totidem in Rana numerari cartilagineas, quot in quovis sceletto, ossium animalium terrestrium formas referentes, quæ prorsus medullâ, præter vertebrae careant; totidem item nervorum conjugamenta in ejus cerebro, multò tamen liquido, numerari, quot in reliquis animalibus numerantur. *Ventriculus* & interanea, si per os eximantur, corpusque quod ejus fieri potest, distendatur, totum perlucidum, & instar carbunculi fulgens evadit, immissoque lumine, laterna horrendo aspectu apparet. *Locus* ipsi herbosæ maris partes & littus. *Cibus* carnes humanæ etiam. Vatantem aliquando virili membro apprehensum in profundum detraxisse, Gesnerus se audivisse refert. Con-

tra cæterorum cartilagineorum morem, *ova*, non animal pariunt. Caput corpore grandius & aculeatum in causa, quod ut aditui, sic exitui, ineptum est. Ovum unum solidum, durumque ut foris fervetur, cum cæterorum cute molli tegantur, Aristoteles prodidit. Universa simul juxta terram edunt; ortus cum iis, quæ extra perficiuntur, & iis, quæ intus idem. Numerosius quidem foetificant: sed quia de facili pereunt, pauciores reperiuntur. Aliquandiu extra aquam vivere, Rondeletius testatur. Vifa duos in littore dies inter herbas vixisse, vulpeculæque terrenæ noctu victum quæritantis pedem, dentibus arripuisse, & ad auroram detinuisse. *Solitarias* esse ex eo, quod plures una capi non soleant, colligitur. Plana quamvis, non sola tamen latitudine natat, sed pinnulis etiam, quas in lateribus habere dictum est. Singulari in venando astu utuntur. Inter saxa conditæ, aperto immani rictu, mentitum vermiculum musculo annexum, per pinnam in faucium rictum conjiciunt, eo viso pisciculi ceu ad escam accurrunt, rictum, cavitatem alicujus saxi reputantes subintrant, pisces retracto, qui vellicatur hamo, orisque rictu clauso, totum pisciculi gregem devorant. Macilentiores, quæ præpilatis villorum capitibus destituuntur. *Ufus* earum in cibo ferè nullus. Insula, mucosa & ferina saporis carne præditæ sunt. Anaxandrides tamen eas in Cotyis Thracum Regis conviviis reponit. Ventrem inter lautissimos cibos Anthiphanis recenset. In *Medicina* fel adversus suffusiones utile est. Quod strumâ utiliter pungi, piscis ejus qui Rana in mari appellatur, ossiculo de cauda, ita ut non vulneretur, idque fiat quotidie donec percureatur, apud Plinium occurrit; *Rajarum* potius aculeis convenit. Nullum enim ossiculum Rana habet. Diversa est ab istis tum illa castanei coloris, ventre candicante; tum Rana *Minor* dicitur. Tota tam supinè quàm pronè asperâ cute tegitur, supinè aculeata est, & albicat, pronè colore est cinereo. *Oss* habet exile & planè edentulum: *Caput* erectum & velut cornu in extremo procerum, sub eo cuteus nervus, quem velut ex vagina exere; rursusque contrahere videtur. *Oculi* ad latera ubi angustum valdè caput, velut in fovea quadam latant. Foramina olfactu distincta, supra os coeunte extremitate hærent, auditui inservientia oculis sunt contigua. Pinnas ex icone cognosces.

PUNCTUM X.

De Squatina.

Squatina pisces, in Græcis, *Squatrus*, quod sit squammis acutis, Isidoro, *Lima Falla*, *Celtes* in veteri lexico, dicitur. Media inter Mustelos & Planos à Rondeletio ponitur. Magnitudine ad centum sexaginta fere

Aquil.
lib. in.
Ran.
Aristot.
H. A. I.
2. c. 13.

Aristot. f.
1. 3. de
gener.
c. 3.
Aristot.
H. A. I.
6. c. 17.

Ælian.
H. N. I.
9. c. 24.
Plutarch.
1. intr. 2.
animalia.
Aristot.
H. A. I.
9. c. 73.
Oppian.
Hal. I. 2.
v. 90.

Plin. H.
1. 37. c. 8.

Tab. XI.
7.
Tab.
XII. 6.

Kircher.
1. 3.
Art. Ma-
gnet. p.
6. f. 5.

Oppian.
Halieut.
1. 2. v. 90.
Aristot.
H. A. I.
9. c. 37.
Aristot.
H. A. I.
2. c. 13.

Ovidio
in Ha-
lieut.
Martial.
1. 10. c.
37.
Gesne-
rus de

Plin. H.
N. l. 9.
c. 12.

sapè libras exerefcit. Coloris est pronè cinerei ad fufcum vergentis, afperrima: ut cute lignum & ebore poliantur, fupinè alba & lævis. Partem corporis anteriorem habet latam, circularem, retufam, ut *roftro* prorfus careat. Os prima parte obvium, brevibus fed acutiffimis, iisque aliter quàm in aliis pifcibus difpofitis *dentibus* munitum. Maxillarum offa in angulum obtufum definentia, in lingua extrema carneum tuberculum. Ex fuperioris maxillæ extremo, quod cute non integitur, apophyfes duæ in alias divifæ demittuntur. Post oculos, qui in fuperioris capitis parte, ad latera parvi, foramina ad os ufque patentia vifuntur. *Pinnæ* utrinque binæ funt, & utræque in lateribus. *Cauda* longiufcula in aliam lunatam pinnam definit. *Mares* à feminis appendicibus cartilagineis, quæ circa anum, diftinguuntur. Intra nihil à cæteris cartilagineis differt. *Hepar* habet in duos lobos divifum, in quo *fellis* vefica felle viridi plena latet. *Lienem* mediocrem ex rubro nigricantem. *Cor* angulatum, compreffum, & unico finu inftitutum. De dentium fitu ita Rondeletius, funt eorum ordines, &c.

Arist. H.
A. l. 2. c.
25.

Oppian.
Hal. l. 1.
v. 380.
Arist. H.
A. l. 6. c.
11.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 51.
Arist. H.
A. l. 6. c.
11.
Arist. H.
A. l. 5. c.
9.

Arist. H.
A. l. 9.
c. 37.

Oppian.
Halieut.
l. 1. v.
742.
Aldrov.
de Pifcib.
l. 3. c.
66.

Plin. H.
N. l. 27.
c. 10.

Cænosa incolere *loca* Oppianus prodidit, in alto veritari apud Rondeletium legitur. *Cois* etiam cum Raja. *incolis* nascitur, inter fe mutuò partim iupinarum attritu. Bis *parit* autumnò occafu vergiliarum, qui partus fecundus est; primus enim verno fit tempore, fed fecundus felicior Singulis foetus septeni aut octoni prodeunt. Singularis & his in venando altus est. Obruunt se arena, fic latentes verberant oris vi radios (pinnas exerere vermiculorum specie apud Plinium extat) his pifciculi vifis, quasi ad algam adnatant, fic capiuntur. Colorem mutare & pifcium quidem folas, prodidit Aristoteles, quod nec corpore fint pellucidæ, nec cute ita tenui, ut humorum spirituumque perturbatione varii earum colores perluceant, negavit Rondeletius. Concedi in metu potest. Nam & tum in hiatum pinnis fubjectum recipiuntur foetus, ut apud Oppianum legimus, in ventrem recipi Aldrovandus credidit. Rejiciuntur à *menfis*, quod flatuum crafforum humorum proveniunt, quod cartilagineis omnibus commune, proferant. Unde oculorum acies obtunditur. Olim Smyrnæ fecundum Dorionem, Mileti fecundum Arceftrostrum oræ, cæteris preferebantur. In *Medicina* invenire in tertio tabis genere locum. Oleum ex hepate ad hepatis duritiem confert. Ova exficcata sistendo alvi profluvio. Ex cute optimum fit in pfora & scabie smegma. Illitæ mammas crefcere non patiuntur, si Plinio fides est, duriusculas reddi, utrumque experientiam comprobasse, Rondeletius author.

PUNCTUM XI.

De Squatino raja & Lamia.

Piscis qui SQUATINORAJA dicitur Latinis, Græcis *incolis* ex Squatina & Raja procreatus creditur, Parte priore Rajæ similem facit Aristoteles, posteriore Squatinæ. Absurdum id Rondeletio, quod & Philosophus dubius pronunciet, & ex Galeno fieri secundum naturam non posse, ut tantopere diffidentia corpora commisceantur didicerimus. Stant tamen ab Aristotele plærique, Bellonius, Gellius, Jovius, Aldrovandus, Columna præcipui. Castelletus nudum ejus sceleton misit & paucis ita descripsit. Neapoli frequens est, quod miror, &c.

Tab.
XI. 12.

Aristot.
H. A. l.
6. c. 10.
Galen. 3.
de ufu
parti.

LAMIAM, quæ *παρὰ τὸν ἀλμυρὸν* à gula quibusdam dicitur. Nicander *Carchariam* & *Scyllam* vocari scribit, Rondeletius eandem cum Cane Carcharia facit. Plinius inter Cartilagineos planos enumerat. Descriptionem ejus nemo veterum suppeditat. Maximam evadere, cute integri scabra os in anteriore capitis parte habere, *dentibus* plus minus ducentis in utraque maxilla per quaternos versus dispositis, ad radicem latis, in acutem & pyramidem definentibus, ad latera crematis, refertum Bellonius prodit. Verè an falso, non dixerim. Generis Galeorum certè, qui longi pifces sunt, eandem pronunciat.

Athen. l.
7.

PUNCTUM XII.

De Lumpo Anglorum & Pifce gibbofo.

Piscem qui Anglis Lumpus, quasi massa informis dicitur, fic describitur à Turnero. Pifcis edulis est Lumpus noster, &c. Dorsum rubicundum, ventrem album habere, & in magnis deliciis reputari Massarias addidit. Nos cum molli & in ore diffiliente carne, esse experti sumus, cum Andreapoli in Scotia studiis operam daremus.

Tab.
XIII. 1.

Piscem GIBBOSUM Græci *ισιδιον* vocant, reperitur in mari Balthæo coriiporiuncula, quam Fabricius Gesnero misit. Craffiulcula & tenax est, punctis multis seu tuberculis exasperatur. Eminent etiam Spinæ quædam ceu rubi, sed mucrone recto, pyramides formæ, aliæ magnæ, aliæ parvæ ex fusco albicantes. De sua pictura sic Gesnerus, &c.

Tab.
XIII. 2.

TITULUS II.

De Piscibus Marinis Saxatilibus.

CAPUT I.

De Saxatilibus Squammosis.

ARTICULUS I.

De Scaro.

Tab.
XIII.
3. 4.

Athen.
1. 7.

Aristot.
H. A. I.
9. c. 50.

Athen.
1. 7.
Oppian.
Hal. 1. 4.

Absoluta Pelagiorum natura, Saxatiles sequuntur, inter hos primos *Scarus*, qui seu *ἀνθρώπου οὐρά*, id est, tripudiando, seu quod Athenæo placet, quod inclusis nassis, crebris caudæ ictibus, qui *οὐρά* seu *οὐρά* vocantur, aversus, fores laxat, atque ita retrorsum erumpat, seu quod algam, aliasque herbas depascatur; *οὐρά* enim interdum est *οὐρά*, ita dictus; *Meyrix* quoque, seu *Ruminax*, ut Scaliger vertit, ab Aristotele quod latis utriusque maxillæ dentibus solus ruminet, *Cerebrum Iovis* Ennio vacatur. Serò olim Romanis & toti Italiæ visus, idè nec latinum piscis nomen habetur. Duo illius sunt genera, unum quod *οὐρά*, benè ab Onisio distinguendus, quod asino concolor sit, dicitur. Alterum, qui *οὐρά*, ex Nicandro Thiatyreno nomen imposuit Athenæus. Oppianus modò *οὐρά*, modò *οὐρά* cognominat. *Onias* squammis est magnis tenuibus, colore ex cæruleo nigrescente, ventre candido, Sargo, corporis forma ad rotundam accedente, aculeorum pinnaeque situ, & numero similis, maculâ duntaxat nigrâ, in cauda, & quod lineis nigris in dorso ad ventrem careat, distinguitur. *Oculus* habet magnos, supercilia coloris Indici.

Dentes hominis modo planos imo solus latos, superioribus dentibus carere, quod Michael Ephesius prodidit, falsum, si *Meyrix* est, & habere compertum. *Branchiæ* ipsi binæ, simplices alteræ, alteræ duplices, plura & majora in maxillis ossæ tubercula.

Cauda lata in duas pinnas non divisa. *Cor* angulatum, *hepar* album in tres lobos divisum, à quo *fellis* vesicula intestinis alligata pendet. *Fel* coloris nigri. *Splen* ater, *ventriculus* cum quatuor appendicibus parvus. *Alia* seu *Varius* oculis, ventris inferiore parte, in qua podex, purpurei est coloris, cauda coloris Indici, reliquo corpore partim ex viridi, partim ex nigro cæruleo. Squammis veluti notis obscurioribus aspersis. Ore mediocri, *dentibus* latis in superiore maxilla densis, in inferiore raris & acutis. *Ventre* in medio duabus purpureis notis insigni. A dorso & cauda ferè *aculei* tenui membrana connexi, æquis intervallis dispositi, conspiciuntur. In singulorum summa parte membranula pendet vexilli instar. *pinna* ad

branchias sitæ latæ sunt, & veluti ovi ea figura. Intus habet *ventriculum* latis capacem, *hepar* subalbum, intestinalata & multa, *fellis* multum, *splenem* magnum. *Quem Bellonius in Creta observavit*, corpore erat ex livido rubescente, squammis latis & translucidis. Capite utrinque compresso, *dentibus* obtusis, quorum incisorii nostris erant perfimiles. gula non valdè magna. Ad caudæ latera appendices transversas atque eminentes, quales in nullo se observasse pisce ait, utrinque habebat Gigantes *Scarus*, dentes habebat utrinque quatuor. Latos in inferiore maxilla, in superiore serratos. *Locum* si attendas, Asiæ Græciæque littoribus Sicilia tenus frequentissimus exit, nunquam in Ligusticum, nec per Gallias enatavit, in Ibericis mare, In mari Carpathio est semper obvis, & quod miramur promontorium Troadis Lecton nunquam sponte transiit. nullibi tamen quàm in mari rubro frequentior. Bellonius in Propontide, Ponto & Hellesponto, Galliæ littoribus, & in Oceano inficiatur capi, in Euripo Aristoteles, Arcestratus tamen maximum circa Byzantium evadere prodidit. In Creta circa eum ubi ladanum colligitur locum, tam frequens, ut nullus crebrius capiatur. *A Carpathio advectos, Claudio Tiberio Principe*, (Octavium Macrobius vocat) è libertis ejus præfectus classis, inter Ostiensem & Campaniæ oram, sparsos disseminavit. Quinquennio ferè est cura adhibita, ut capti redderentur mari. Postea frequentes in veniebantur Italia in littore, non ante ibi capti, admovebatque sibi gula saporis piscibus satis, & novum incolam mari dedit, ne quis peregrinas aves Roma parere miraret. Saxatilem esse vix dubitandum. Si Oppianus dum inter littorales recenset, contrarium innuere videtur, vitium est, & benè pro *Scaris* legitur. In dulcibus quoque nutritum aquis innuere Columella videtur, nisi pro *Scaro* *Squalum* legi debere velis. Sanè haud perperam ex Varrone id conjicere licebit. *Vicitat* herbis, & algæ piscis, phaeolisque plurimum inhiat Mercuriali adeo, ut ea capiatur. Pythagoras *Τροχόδον* facit, si Gyraldo fides est. Diphilus tamen carnivorum esse & lepores marinos captare scribit, nisi error committitur. potius namque Mullo ista quàm *Scaro* conveniunt. quod solus inter pisces ruminet, superius dictum est. *Gregales* esse vel exinde quod sodales è nassis liberare conentur, colligas. Caudam capitis mordendam porrigunt. apprehensa educunt. Quod noctu non capiuntur, vigilantie ipsorum debetur. malè Galenius idè solùm inter pisces dormire scripsit. Melius dices, solere

Columella R.
R. 1. 8. c.
17.

Plin. H.
N. 1. 9. c.
17.

Aristot.
H. A. I.
9. c. 17.

Plin. H.
N. 1. 9. c.
17.

Oppian.
Halieut. I.
1. v. 109.

Columella 1.
8. c. 16.
Varro de
R. R. 1. 3.
cap. 3.
Aristot.
H. A. I.
8. c. 2.
Plin. H.
N. 1. 9. c.
17.
Oppian.
Hal. 1. 2.
v. 109.
Ælian.
H. A. I. 1.
cap. 2.
Athen. I.
8.
Ælian.
H. A. I.
2. c. 54.
Plin. de
solert. animal.

alicubi somnium nocturnum sublatebris capere, sic insidias vitare. Salacissimum esse Ælianus prodidit, idè scemina capiuntur.

Aristot.
H. A. l.
4. c. 9.

Celsus.

Ælian.
H. A. l.
14. c. 2.

Parere bis in anno fatendum: hoc Saxatilibus commune. *Vocalem* esse, quod apud Arthæ-næum Oppianum Tzetzem proditur, du-bium, cum pulmones non habeat, nisi ore aquam impellendo sonum edere dicamus. *Usum* si attendamus, in delicatissimis olim apud Romanos cibus erat, & jecinora eorum in Vitellii Principis patina inter lautiores primitias enumeratur. Primas inter Saxati-les tenere, & mollis ac friabilis carnis esse, nullum videtur dubium: quamvis Celsus & Philotimus aliter credidisse putentur. Insi-pidos esse nisi cum suis facibus edantur, credi-tum apud Græcos. Jecur in cibo sumptum ictericis prodesse, apud Ælianum legi-mus.

ARTICULUS II.

De Turdo.

Tab.
XIII. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11.
Athen.
1. 7.

Aristot.
H. A. l.
8. c. ult.
Aristot.
H. A. l.
2. c. 13.

Turdus Græcis *τῆξ* à macularum simi-litudine sic dictus, *πελαγονίον* olim te-ste Nicandro & Pancrate apud Athenæum fuit. Duo ipsorum *Genera* constituit Salvia-nus, *Majorem* & oblongum, qui vel viridis vel ruber est. Rondeletius duodecim spe-cies pinxit. Veteribus, apud Athenæum *μαυροὶ*, seu nigris oculis varius. Erato-stheni *ἰσπας* seu nigro distinctus, Pancrati *αἰνός* quasi vini colorem referens, Nume-nio *δαυδός*, id est purpureus dicitur. Pha-vorinus *μαυροὶ* vocavit. Mutare tamen colorem dicuntur. Circa ver magis exfatu-ratos, dilutos magis æstate videas. Bran-chias ipsis quaternas Aristoteles tribuit om-nes duplici ordine excepto novissima. Quin-que sunt ab Aldrovando observati, duode-cim à Rondeletio. *Primus*, qui magna ex parte aureus, amethystino, cæruleoque ac rubro variat, os intus habet ruberrimum, dentibus carens. Oculos maximos, quorum auream pupillam circulus ambit niger, ni-grum rursus aureus, aureum cæruleus, hunc iterum aureus, ac tandem niger, alias omnes ambit. Habet & duas è mento dependentes apophyses cutaceas, subflavi coloris. tres præ cæteris lineas sanguineas, & denticulatas. Pinnas ad branchias omnino aureas, in pe-ctore totas cæruleas, nervos earum aureos. Cujus coloris sunt & illæ, quæ ab ano, in dorso & cauda, qua uropygio junguntur, maculis duntaxat parvis sanguineis resper-sas, cæteras cæruleas conspicias. *Secundus* ad latera nonnihil albicat. in capite vermi-cularibus, alibi rotundis, ubique cæruleis maculis insignitur. Tergoris pinna ex aureo rubet, sicuti & cauda, quæ in extremo cæ-rulea est. Utrinque dentatus est. *Tertio* Cor-pus subviret, venter albicat. Squammarum extremitates cæruleæ sunt. *Caput* pro corporis proportionem parvum, totum cærulei sed dilutioris coloris, præter branchiarum opercula, quæ candicant, maculisque

oblongis & semicircularibus aureis con-sperguntur. Eiusdem coloris lineæ decus-satim & transversaliter per corpus ducun-tur. Dentes habet maximos, acutissimos, ingentemque oris rictum. *Quartus* toto corpore sanguineo, aureoque distinguitur. dorsum & corporis maculæ ex cæruleo ni-gricant. *Quintus* *μαυροὶ*, totus ruber saturatos. Maculæ in extremo tergore conspicuæ, oris cæcis non absimiles, sunt ni-græ, in capite longæ, & serpentis in mo-rem ferè contortæ, cæruleæ. Lineæ à capite ad caudam recta ductæ, rubræ sunt.

Turdus Rondeletii Primus admodum varius est. Vnde *αἰνός* dictus. ad auratæ figuram accedens, pinnarum situ numero-que cæteris saxatilibus similis, dorso fusco, ventre ex albo livescente. Dentes habet recurvos, labra crassa, & rugosa. Oculos sub quibus pars variis coloribus est illustris, magnos & rotundos. Pinnas ad branchias aureas, ad podicem & in tergo flavas, ni-gris cæruleisque maculis asperfas. *Alter* colore est ex viridi cæruleo, & quia co-lore colli *Paræus* in pinnis & in cauda re-ferret, *Pavo* dicitur. *Tertius* qui *Pulcher* dicitur, & à quibusdam *ferculum regium*, multas colorum differentias habet. Viri-dis est magna ex parte, sed punctis pur-pureis, cæruleis, Indicis, & aliis confu-sis coloribus conspersus. pinnis ad bran-chias flavis seu rufis, aliis omnibus partim cæruleis, partim viridibus, partim rufis. Branchiarum operculis punctis & lineis rufis, sinuosis, certis spaciis dilutis. Cauda ruffa punctis cæruleis, notata. Romæ & in Levino Insula frequentissimus est. *Quartus* circa Monspelium *Pittacus*, ab eadem co-lorum varietate dicitur. Dorso est nigres-cente, pinna ejus virescente. Ventre & la-teribus flavescens. A branchiis ad cau-dam lineæ virides ducuntur. Pinnarum in ventre infimæ cæruleæ sunt. *Quintus* Go-bionem flavum refert, hoc solo, quod li-neam albam ab oculis ad caudam ductam habeat, & maculis nigris, quibus *Gobius* aspersus est, careat, distinctus. *Sextus* quin-to est similis, nisi quod huic rostrum sit lon-gius & aquilinum, & linea ab oculis ad cau-dam ducta cærulea. *Septimus* coloribus va-riis est insignis, dorso aureo, viridibus ma-culis consperso, ventre candicante, lineis rufis & tortuosis, nullo ordine dispositis notato, labris viridibus. Cauda & pinnis magna ex parte cæruleis. Branchiarum o-percula purpureum quiddam habent. forte Scirrhis Wottoni, *Octavus* solis lineis in ven-tre sese interfecantibus ab isto distinguitur. *Nono* color est viridescens & flavus, linea ab oculis ad caudam alba, cum multis aliis aurei coloris confunditur & obliquatur. *De-cimus* colore est viridi. Extrema operculi bran-

branchiarum & pinnarum ventris purpura sunt. Oculi sunt rufi; os parvum, venter ex albo flavescit. A Monspelienfibus Menestrior, hoc est Tibicen vocatur. Undecimus inter Turdos maximus, ad Lupi magnitudinem accedit. Colore est rubricæ, quæ pro terra Armenia utuntur. multis nigris & magnis maculis respergitur. Ventre plumbei coloris. Duodecimo caput est cæruleum, dorsum virescens. Linea viridis & tenuis, à branchiis ad caudam porrigitur, in extremitate macula rotunda insignis. Quem Gesnerus observavit, ita ab eodem describitur: Dorsum & laterum dimidia pars superior, fusci sunt coloris, maculis crebris, subnigris, variantibus. Lineæ: Inter Saxatiles esse Galenus & Diocles nos docuere. Non qualibet tamen Saxa amat, sed quæ prope littora sita, musco & alga obducantur. nec longè ab hoc domicilio recedit. In Ponto cum Merula desideratur. Non solis herbis vel alga vivere; sed interdum pisciculis, loliginibus, & aliis crustaceis pasci, Salvianus author est. Hyeme aliorum saxatilium more latere ajunt. quo tempore etiam foetificant. A Merula specie non differre, hunc marem, illam scæminam esse, inter Oppiani errores poni potest. Singulare idem in eis conjugalis amoris exemplum, notat. Mortuo marito progressæ de thalamis scæminæ, errant, communemque cum iisdem mortem appetunt. Carnem habent mollem, teneram ac friabilem, ut Galenus prodidit. Trallianus cibum fastidientibus eum commendat, & Ptisanam marinam vocat. Platina quovis modo coqui, sed assum sinapum requirere scribit.

ARTICULUS III.

De Pavone Salviani, &
Lepræ.

Tab. XIII 12. Ambros. Hexam. Philostratus 1. 3. de vita Apoll.
Pavo piscis, quem Salviano debemus, cujus & Ambrosius & Isidorus Hispalensis meminere, diversus est à Pavone Philostrati, qui in Phaside Indiæ flumine reperitur, & cæruleas quasdam cristas, squammas versicolores, caudamque auream in quacunque voluerit partem versatilem, habet. Romæ Papagalo, à Lusitanis Budia vocatur. Bilibris sæpè est, ad cubiti mensuram perrarò ascendit. figura corporis, lacust. Tincæ absimilis non est. Squammis latis tegitur, & variis coloribus depictus est. Corpus enim ferè totum, inæquali varietate viret. Ventris pars posterior viret ex albo, anterior ex albo livet. dorsum & cauda, ex viridi nigricant. latera ex viridi partim flavescent, partim livent. Caput quod crassum est ex cæruleo viret, maculis que quam plurimis rubenti-

bus, nonnullisque cæruleis piscem totum nulla habita ordinis ratione pingentibus. Rostrum extensum, sed non acutum. Labia crassissima, quorum superius duplex apparet. Oculos magnos & aureos. Branchias utrinque quaternas, & juxta eas pinnas latas & rotundas, duasque alias minus latas in ventre. In dorso una satis longa erigitur, cujus anterior pars stricta & aculeis munita est: posterior latior & aculeorum experts. A podice, qui in medio ferè ventre una quoque, duobus aut tribus innixa aculeis, per imum ventrem ad caudam explicatur. Cauda in unam pindam latam ac ferè rotundam violaceam & maculis atque lineolis plurimis cæruleis insignitam desinit. Interiora si spectemus, ventriculum habet magnum, appendices multas, intestina ampla, hepar subalbidum, cui fellis vesicula hæret. Lienem subatrum. Viscus ipsi præter algam, & alia marina excrementa, pisciculi. Solitarius est, & sæpe singuli capiuntur. Verno inprimis & autumnali tempore, fortè quod æstate ob caloris, hyeme ob frigoris impatientiam lateant. Ignobilis inter cibos censetur.

LEPRAS seu Pforas quod iisdem præditus sit suggillationibus quibus qui lepra & pfora laborant, sicut nonnullis, sed metuo ne perperam videtur dictus, Lelepris Latinis, si vera prodit Rondeletius dicitur. Ex Turdorum est genere. Vix ad dodrantem in mari Adriatico excrecere solet, cum pedem & amplius in Oceano excedat. Totum corpus habet maculis nunc cancellatis, nunc rectis, nunc in obliquum sparsis variegatum. Squammas ad oram rubore suffusas, latas. Caput non ita multis coloribus cancellatum, quod lineas hinc inde ductas, ex cæruleo, viridi, ac rubro mistas, ostendit. Oculos parvos, rotundos: iridem oculorum aëri similem, quam si quando in gyrum contorqueat, cyaneum, deinde aureum, tandem argenteum circulum in crystallini coloris fulgorem referre conspicias. Os ipsi parvum, dentes albi, acuti. Maxilla superior tubi in modum cranio infarcitur, ut penè duo labia carnosa esse credas: lingua alba & penè soluta. Continuum tergoris pinnam gerit, sedecim aculeis munitam, atque aliam sub ventre ano vicinam. Omnes pinnae transparentes sunt, molles, leves, rubro, cæruleo, viridi, & aliis coloribus maculatae. Linea quæ piscibus utrinque latera dividit, nequaquam in hoc pisce recta procedit, sed à superiori branchiæ angulo arcuata secundum tergus deducta est: mox ubi tergoris pinna desinit, illuc quidem linea reflectitur & arcuatur, deinde rectà per mediam caudam defertur. Quantum ad internas partes peritoneum habet album, hepar ex pallido lacteum, ad sinistram magis protensum, tribus,

Tab. XII. 13. Aldrov. de Piscib. l. 1. c. 5.

lobis, uno tantum longo duobus brevibus, constans. *Lienem* planum, oblongum, minoris digiti magnitudine, rubrum. *Intestina* ejusdem capacitatis, ut propriè stomachus in eo videri non possit, semel à stomacho ad anum revoluta, multisque omentis obducta. *Lactes* copiosas, & vulvam bicornem. Hanc ex Bellonio, qui eundem cum *Marzapani* dici credit, fortè quod æquè in deliciis ob carnis suavitatem appetatur, ac panis Martius vulgò dictus. Est tamen alius Marzapanis piscis, qui *Rosa* dicitur, & totus maximè in dorso rubet, minus in ventre.

Tab.
XIV. 1.

ARTICULUS IV.

De Merula.

Tab.
XIV. 2.

Athen.
1. 7.

Aldrov.
1. de Pisc.
c. 6.
Ælian.
H. A. 1.
12. c. 28.

Aristot.
H. A. 1.
8. c. 15.
Plin. H.
N. 1. 9.
c. 15.
Columel.
de R. R.
1. 8. c. 16.
Ælian. H.
A. 1. 1. c.
14.
Plin. H.
N. 1. 9.
c. 15.

Merula, Oppiani interpreti & Apicio *Merulus*, Plinio medico prodente Bellonio *Piscis Aspratilis*, Venetis *Tincamarina*, Græcis *αἰσιν* & *αἰσιν* dicitur. De illius colore dissentiunt authores, Numenius apud Athenæum *Nigram* cognominat. Oppianus *αἰσιν*. Varinus *μαυροπύλιν*, vocant. Salviano & Rondeletio ex colore Indico & cæruleo nigricant. Hic & sexu distinguit, in mare, colorem ad violaceum magis accedere, fœminæ ex vario nigrescere, scribens. idem colorem Indicum aut purpureum exsaturatum nigrum ab antiquis vocari, quod purpuram nigram. Circæam flore nigro, qui tamen purpureus est, aut Indicus, prodidit. Invenitur & quoddam genus dorso nigro, ventre Indico, quibusdam partibus cæruleis. Aldrovandus totum viridem exhibet. Virentem & Ovidius reliquit: Colorem mutare apud Ælianum legimus. Omnes in eo conveniunt. Tincas figura corporis referre, & squammas latiores quam Turdum, vertebrae dorso valdè erectas habere. Hoc unum in ejus Anatomia dignum occurrit, quod cum *hepar* habeat album, in duos lobos grandes divisum: sed tamen exerat tenui vasculo inclusum, & revolutionibus duplicatum, cujus longitudo est sesquipedalis. Quam Aldrovandus describit, magis in cauda, obscurius in dorso virefcit. Pinnarum extremitates cæruleas, branchiarum opercula in fine rubentia habet. Oculorum pupillam circulus ruber, rubrum cæruleus ambit. Inter Saxatiles in quæ Petris stabulantes ab Aristotele & Plinio referri certum est, quibus & alii accedunt. Pontum tamen non intrant. *Vesuntur* iisdem quibus Turdi. Comestum vero primo tentant & premunt, mox jacere sinunt. ubi non palpitare viderint, devorant. *Generationem* quod spectat, marium quisque cum multis congregitur fœminis. Medicam aut Persicam vitam agere diceret. Zelotypia semper vehementer laborant mares, cum partus tempora instant maximè. Fœminis domi quiescentibus, incubant quasi illi foribus, ne insidiæ tendan-

tur. sub crepusculum vespertinum (nocte fieri scribit Oppianus) intermissa custodia, cibum exquirunt. solæ conjugum quæ sunt intus, algas in cavernis & circum petras ad victum reperiunt. Mortuo mare, foras egrediuntur, quæ semper antea domi manebant, fœminæ. Impetuntur à Squilla. ideo piscatores, cum eos fœminas observare vident, Squillam vivam hamo affixam demittunt. Merulus, dum se de illo ulturum sperat, arripit, sic capitur, & exigui animi voluptas fit ultio.

Ælian.
H. A. 1.
1. c. 15.
Ælian.
H. A. 1.
1. c. 14.
Oppian.
Halieut.
1. 4. v.
190.

ARTICULUS V.

De Iulide.

Tab.
XIV. 3.

Iulide, piscis Synesio *Ιουλίς*, Hermippo *Σμυρναῖο Ηίκα*, quo nomine Hermolaus Sturiorum intelligi arbitrabatur, aliis *Iurella*, & *Iura*, dicitur. Quia non una ipsorum species, ideo in descriptione variari, non mirum. Rondeletio digiti non excedit magnitudinem. Varius est, dorso violaceo. Squammis tegitur parvis pinnarum numero, situ, labiis dentibus recurvis, cauda, aliis saxatilibus est similis. A capite ad caudam subauream lineam cinctam habet, hinc inde rostri modo dentatam, cui pars quæ subest colore est cæruleo, ventre candido flavescente. Bellonius addit, corpore esse gracili & oblongo; tanto in tergore colorum varietate, ut in eo iridem utrimque depictam videas. Squammis tenuissimis, multorum colorum, super quibus ductæ lineæ rectæ, cæruleæ, virides, melinæ, rubræ ac fuscæ apparent, contegi. Caudam rotundam habere. Salviani descriptio ista est. Julis rostro est acuto, &c. Saxatilibus accenseri ex Oppiano coligimus. Antipoli & in toto Ligustico sinu frequentissimum esse, nec Adriatico mari infrequentem Rondeletius prodidit *Vesuntur* minoribus pisciculis, & eorum inopia, alga. Voraces Numenius testatur. Singulares in saxis vivere prodidit cum Salviano Bellonius, gregales facit Aristoteles. Cavent sibi ab hamo, haud tamen escam sæpè præripiunt. Os veneno refertum habere, & in piscatu urinatores & piscatores pertinacissimè persequi, eorumque sanguinem appetere, clarè ab Oppiano & Æliano affirmatur. Lævia, quæ in adversum Aldrovandus protulit. Ægris in albo jure elixari, sanis in sartagine frigi & assari prodidit Salvianus, fortè si caput amputatum. Jus alvum emollire apud Dioscoridem; urinas apud Plinium reperio.

Oppian.
Hal. 1. 1.
v. 124.

Aristot.
H. A. 1. 9.

Oppian.
Halieut.
1. 2. v.
434.
Ælian.
H. A. 1.
2. c. 44.
Dioscor.
in facile
parabil.

ARTICULUS VI.

De Phycide.

Tab.
XIV. 4.

Phycis, qui forte à Phycene solo sexu differt, *Fuca* Theodoro, dicitur. Nostri temporis Græci *Phycida*, ut Gellius ait, *Pho-*

Phocida, ut Rondeletius, *Phycam* ut Massarias, *Pephyca* ut Hermolaus, *Lampianam* ut Bellonius, appellant. Nomen, quod in musco marino (quod *Phycis* ipso *Phycis* dicitur Neophyro & aliis) nidificet, invenisse creditur. Idem est cum Tinca marina & pisce Ficu, Romæ vocato. (nomen huic quod passus ficus instat, carnis sit mollissimæ & succiplena) Rondeletio refragatur Salviannus, & illum ipsum esse, qui ob magnam cum Perca marina similitudinem Percia dicitur, contendit: nec abludit Aldrovandus. Sane æque repando est uterque tergore, color idem est. Rostro acuto & extenso, pinnarum situ, numero, & figura conveniunt. Non credendum tamen eosdem prorsus esse. Caput crassius Phycidi os majus, majoribusque dentibus in superiore maxilla munitum. Venter non ita prominet. Pinna parvis & rufis maculis non insigniuntur. Lineis transversis nigricantibus, quibus Percæ latera notantur, caret. In capite & branchiarum operculis, lineolæ & puncta quædam cærulea, conspiciuntur. Marem nigriorem & squammis amplioribus dixit Aristoteles, sed nec idem perpetuo color. Verno tempore sature, reliquis dilutior videtur. Quod *Phycis* apud Athenæum dicit, de aculeis quibus dorsi vel imi ventris spinæ horrent intellexisse, dicendum est. quia nunquam palmi magnitudinem excedunt, ideo *Phycis* ab Aristotele dicuntur. Bellonius non unum genus esse ostendit. Vidisse enim se fuscis, rubentes, virides, *Phycis* testatur. Addit, omnes pinnam tergoris continuam, duodecim aculeis munitam, rursus ad branchiarum latera utrinque unam, & sub ventre duas, quarum singulæ squammis tegantur latis, firmis, sæpe uliginosis, gerere; dentes in superiori maxilla utrinque ad latus unum vel duos videri; in inferiore plures, retro in maxillis molares multos. Omnibus lacteum est *jecur*, ad sinistrum magis extensum, fel lateri dextro, oblongo folliculo inclusum, colore subluteum, incumbit. Inter saxatiles Aristoteles, Plinius & Diocles posuere. *Phycis* Suidas vocat. & Ovidius inter littorales recenset. Luto, alga, & musco, quod *Phycis* vocatur, vescuntur; & quanquam cætera abstineant carne: squillas tamen sæpissime appetunt: Parituræ, *Nidum* ex alga sibi construunt, in eoque pariunt. Sic foetus contra tempestates tuentur. Bis anno parere Aristoteles author est, Eunuchos apud Oppianum dici falsum. Cynædum enim piscem illis verbis verecundo circumferibit. Laudantur à Xenocrate in *cibis*, Diphilo etiam *Phycis* *Phycis* & *Phycis*, tenera carnis pisculi, ac faciles *concolitu*, dicuntur. Sed & Hippocrates inter raram & levem carnem habentes recenset, eumque viri mulierosi, seu *Phycis* *Phycis* & cognomentum à piscatoribus ferre, innuit. Recensentur & in

Cotyris Thracum Reges convivio, hodie procerum patinas raro implent.

ARTICULUS VII.

De Perca marina.

PHYCIDI PERCAM, quæ Græcis *Phycis*, Tab. Dioscoridi & Paulo Æginetæ *Phycis*, licet Plinius in piscium catalogo pro diversis XIV. 3. habuisse videatur, dicitur, & nomen à colore, quem Græci *Phycis* dicunt, sortita est, propter similitudinem de qua superius subiungemus. Nota ipsi cum paucissimis piscibus communis, quod transversis per tergus lineis conspergatur. Propter istam varietatem Aristoteli est *Phycis*, ut apud Athenæum invenies, quod eadem vivida, *Phycis* Matroni Parodo dicitur. Duo vero ipsius sunt genera, *Fluviatile* nempe, de quo postea, & *Marinum*. *Marina* nunquam ad eam ad quam fluviatilis, magnitudinem excrevit. Ex colore veluti sanguineo nigricat, & unam duntaxat eandemque continuam pinnam in tergore habet. Squammis tegitur parvis. Venter livet, latera purpurant. Tergus ex flavo nigricat. Aldrovandus tres proponit. *Primæ* caput, pennæ, cauda ex rubro flavescunt, seu potius aureo perfunduntur. Supremum dorsum ferrugineum est, deinceps flavescit, mox per latera & ventrem albicat quidem, cæterum maculæ amethystinæ albedinem operiunt, Pinnarum tergoris nervi argenteo colore, reliquarum & caudæ aureo perfunduntur. Lineæ transversales quæ à dorso per latera descendunt, ad instar labentis ex alto aquæ, argento emicant. Os habet intus album, labra rubicunda. *Alteræ*, quæ Majoris nomine venit, rostro intus & extra rubet, in ambitu flavescit. Tergus rufescit. latera & venter albicant. Squammarum extremitates rubent. dorsi pinna tota, & toto fere in extremo crocea qua Uropygio hæret, dorso concolor est. Branchiarum opercula flava, latis vermiculatisque lineis cineritiis conspersis suggillantur. *Tertiæ* insigniter dentata est. Tergus & caput ex cinereo flavescunt. Pennæ & cauda nigricant. Latera cærulea. Venter ad amethystinum inclinatur. Lineæ laterales obscure rubescunt, quæ vero à branchiis ad caudam feruntur, in dorso rufæ sunt, reliquæ virides. *Degit* circa moscosa & algosa saxa. Ad littora Oceani Germanici dum reperiri Albertus scribit, de petrosis duntaxat & asperis id intellexisse credendus est. Saxatilem esse ex Galeno, Plinio, Oppiano, & Diocle clarum est. Carnibus vescitur. Tam mas quam fœmina saxatiliu more hyeme conditur, quo tempore quoque *fætiscat*, Marsilius Ficinus celerrimi cursus esse prodidit. In *cibis* salubritatis laude resplendet, hinc proverbium vetus *Phycis* *Phycis* cum optima posthabentur: sed saporis insulsi gratia rejicitur.

Tab. XIV. 3. 6. & c. Aldrov. de Piscib. l. 1. c. 9.

Oppian. Hal. l. 1. v. 121.

Oppian. Hal. l. 1. v. 121.

Arist. H. A. l. 8. c. 15. Zenob. Diogen. & Suida.

Arist. H. A. l. 6. c. 13.

Arist. H. A. l. 8. c. 2. Arist. H. A. l. 8. c. ult. Plutar. de solert. animal. Arist. H. A. l. 6. c. 13.

Hippoc. 2. de vict. ratione.

Plinius in *Medicina* invenisse usum testatur. Nam cinerem è capite falsæ, addito melle, verendorum pustulas discutere. eundem admixto sale, cumila & oleo vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere prodidit.

ARTICULUS VIII.

De Channe, & Canadella.

Tab.
XIV. 10.
11. 12.
Aldrov.
de Piscib.
l. 1. c. 9.

CHANNE Græcis *χάνη* si fœmina, *χάνος* si mas, dicitur: (*χάνος* & *χάνος* corruptum esse videtur) quibusdam *Hiatula* ab hiando nomen inditum habet, non quod moriens tantum hiet, ut Bellonius credidit, sed quod mandibulas ita constitutas habeat, & perpetuo hiare videatur. hinc Epicharmus *μεγαλοχάρμητος* vocavit. A Speusippo Perceæ & Phycidi ob colorum varietatem confertur. Unde Aristoteles citante Athenæo, *μεγαλοχάρμητος*, & *μεγαλοχάρμητος* appellavit. De figura nihil apud veteres occurrit. Tantam ei cum Perceæ similitudinem tribuit Bellonius, ut pisces pene eisdem esse credas, & pro iisdem vendantur. Salvianus rostri acumine, pinnarum situ, numero, & figura, oculis, branchiis, cauda, atque pictorato corpore, Perceæ & Phycidi similem Channen prodidit mediocritate oris, parvitate dentium, tenuitate capitis, exiguitate Squammarum ovata totius corporis figura, Perceæ. Colorum varietate, inferiore maxilla, & branchiarum aculeis, manifestè ab utroque distinguitur. Tergus Channæ ex rubro minus quam illarum nigricat. Venter & latera violacea quodam albedine notata sunt. Pinna dorsi flavet, quæ vero in imo ventre est, & cauda, rufis maculis insignitur. Ab ore per branchiarum opercula & latera, rubræ quædam lineæ, neque æqualis latitudinis, neque æquis distinctæ intervallis usque fere ad caudam deducuntur. Maxilla inferior non solum rubet, sed superiore etiam prominentior est. ideo perpetuo hiare videtur. In posteriore branchiarum operculi parte duo sunt aculei albi & acutissimi, non magni tamen, quibus Phycides & Perceæ destituuntur. Venter & intestina ampla habet, *hepar* subalbidum, *lienem* subrubrum.

Calculos in capite gerit, quod ex Bellonio habemus. *Locum* ipsi in pelago Aristoteles assignavit; sed Oppianus in saxosis degere docuit. nec piscatorum experientia abludit. Sola carne *vescitur* carcinis inprimis, & dum per impetum pisces insectatur, sæpe in os ventriculus procidit. *Sexus* discrimen ambiguum in eis. Omnes enim vulvas habere traduntur. & omnes ovis capiuntur gravidæ. Rem se ita habere, ex plurimarum sectione Rondeletius didicit, inusitatumque hunc conceptum plurimæ horum piscium fecunditati adscribendum retur. Mare ova perficit, & vice maris fungitur. De CANADELLA, sic Martegue stagni accolis voca-

tur) sic Bellonius: Ligustico mari cognitissima Canadella elegantem ac varium habet colorem, &c.

ARTICULUS IX.

De Hepato.

Pisces qui Græcis à colore & magnitudine hepatis Hepatus, à colore rutilo & subobscuris vocatur, Hermolaus *jecur marinum*, Gaza *jecorinum*, Galeni interpres *jecorinum* nominat. Diversum ab Hepato Æliani, pisce brevi & oculis conniventibus, cujus pupillæ ad cyanæum colorem accedunt, sequentia ostendunt, An ille, qui à *πύρε μέγας* *πύρε μέγας*, habitat, quia ad natandum, quamvis magnus, segnis, circa latibula sua duntaxat volutatur, idem sit, affirmari vix potest. Descriptionem si spectes, Phagrum Erythrinum & Hepatum pro similibus posuere veteres, sed illum rostro brevior, ferratis dentibus, colore nigro, oculis habitotius ratione majoribus, cauda macula nigra insigni, corde trigono, eodemque quod de suprema forte parte, quam *αίχμη* *αίχμη* vocat Aristoteles, sumendum est, nisi de hepate potius id dici debeat, albo, felle nullo, additum: nec omissum calculos in capite gerere, solitarium esse, & paucas ventriculi appendices habere. Hæ notæ an Belloniano, qui Gesnero describente, Pisceis est undequaque fermè rubicundus, circa ventrem albicat. in dorso dimidia sui posteriore parte tribus maculis atris notatur, ultima caudam attingente addente Bellonio. Squammis integitur asperis. Dentes habet quam Phycidis obtusiores, qui pectinatim coeant. Calculos in capite gerit, penes lectorem sit iudicium. Aldrovandus hunc cujus icon apponitur, ponit, & Rondeletii Hepatum, qui modernis Græcis *διδυμ* verum Hepatum esse opinatur. Et sanè pisces est Pagro similis, oculis majoribus, quam pro ratione corporis ut Melanurus, colore obscuro seu ex cæruleo nigrescente, pinnarum numero, situ aculeisque Pagro similis, latiore majoreque cauda, in qua maculam Melanuri instar nigram habet. Dentes ipsi non lati sed rotundi & ferrati, Branchiæ utrique quaternæ, ventriculus cum appendicibus quatuor magnus. Intestina tenuia, *hepar* album sine felle, *cor* angulatum, in cerebro lapides duo. Verbo, optime cum illo quem ex veteribus descriptissimus congruit. *Moribus* videtur esse insulsi, & parum ad vindictam pronus, quod apud Athenæum facete Eubulus innuit. Carnis in medio duræ & mollis esse, apud Galenum legimus. Frixi & paucio sale aspersi in cibo sunt suavissimi. Hepar tritum & emplastri modo impostum, omnem tumorem & podagram sanare mentitur Kiranides.

Tab.
XIV. 13.
14.

Ælian.
H. A. l.
15. c. 17.

Ælian.
H. A. l.
9. c. 38.

Athen. l.
3. & 17.

Arist. H.
A. l. 2.
c. 17.

Galen. l.
3. de A-
lim. fa-
cult.

ARTICULUS X.

De Melanuro, & Alpheste.

Tab.
XIV.
1. 5. 16.Athen.
1. 7.Columella R.
1. 16.
Aelian.
H. A. 1.
2. c. 17.
Aelian. H.
A. 1. 1. c.
41.Plin. H.
N. 1. 32.
c. 2.Aelian.
H. A. 1.
1. c. 4.
Oppian.
Hal. 1. 1.
v. 98.

MELANURUS à nigredine caudæ quasi Nigricaudam voces, ita dicitur. falso *oculatum* Gazæ appellavit, quia tanquam diversi pisces à Plinio ponuntur. An Plauti Ophtamiam recte dixeris, quod Rondeletius fecit, iudicio Tuo relinquo. *μαλινύρα* & *μαλινύρα* Athenæus dixit, quod nigræ lineæ latera ejus pingant. Hicelius Sargo similem seu corporis figuram, seu nigram caudæ notam spectes, fecit: sed hæc & in sparo, qui *σπάρου* invenitur. Palmi magnitudinem aliquando superat, nec amplius quam unam vel sesquilibrium pendit. *Squamis* tegitur, latis, nec facile decidit. Os habet parvum, dentibus parvis minutum. Oculos secundum corporis proportionem maximos ex cæruleo nigrescentes, pinnarum numero, situ, & figura, branchiis, & cauda cum Aurata convenit, hæc latam ac nigerrimam notam habet, latera lineis nigricantibus à branchiis ad caudam deductis pinguntur. Ventre est subalbido: dorso ex cæruleo nigricante. Quantum ad *interranea* Hepar habet magnum, ex quo fellis folliculus pendet. Ventriculum medium. Cor angulatum, in ventre *vesicam* aëre plenam, crassam, & densam. Quem Aldrovandus depinxit, & cujus hic Iconem damus, totus ex cæruleo amethystinoque nigricat, præter squammarum extremitates & extimum oculorum circulum, caudæque initium, quæ auro resplendent, pinnæ nigricant. Uropygium supinum candicat, primum intense violaceum, & velut nigram maculam constituit. *Vesitur*, prope littora in arenosis locis algæ. Ideo vix vere saxatilis dicitur. Aelianus varias incolere sedes tradit. Bellonius in Oceano Gallico perrarum, in Mediterraneo frequentissimum; Jovius Romæ raro videri, sæpe Neapoli prodidere. Tempestate fervente cibis quos è saxis erunt vivunt, & abjectissima quoque, quæ alii pisces nisi urgente fame non attingerent, sectantur; sereno mari in solo fabulo pabulum inquirunt, imo quia vagabundi pisces sunt, non uno solo pabulo contentos esse verisimile est. Sane in Stabiana Campaniæ ad Herculis petram Melanuri in mare panem abjectum rapiunt. Timidissimos esse pisces testantur, hinc *αἰσχυρὸν* Oppiano. Neque nassa capiuntur, nec ad eum accedunt. Mari quieto, in ima ejus sede ad petras & algas quiescunt, quocunque tandem tegumento protecti, fluctuante, cæteris ob impetum descendantibus, ad petras adnatant, & spumam ad sui tutelam tum sufficere, ac si natura edocuisset, nec tentari iaratum à piscatoribus mare, arbitrantur. Hepate tamen caprillo, & massa expa-

ne & caseo facta capi, Tarentino & Oppiano debemus.

Laudatur in cibo à Xenocrate, cui Hicelius accedit: à Matrone Parodo rejicitur, illi forte si alga viscatur, huic si cæno & sordidis maris excrementis.

ALPHESTES piscis ab inveniendō, nescio quare dictus, *Cynædus* quoque quasi præpostere libidinis studiosus (fama est semper binos capi, & alterum alteri ad caudam comitem videri) vocatur.

In *Descriptione* variatur ab authoribus si calorem secteris. Veteres omnino cerei coloris, purpurascens tamen, quibusdam in partibus faciunt. *Plinius* solos piscium luteos esse testatur. Apud *Rondeletium* & *Bellonium* corpore est Pagro strictiore, figura *Mœnis* similis, pedali magnitudine, dentibus serratis caninis similibus, dorso purpureo, cæteris partibus luteis, squammis in gyrum cre-natis, multa scabritie horrentibus. A cervice ad caudam spinas tenui membrana connexas, unde *πυκνὰ* habet.

Aldrovandus Cinædum totum fere Pagri modo rubentem, & aureis, argenteisque maculis exiguis, rotundis respersum, quam Illyrici Sebenicenses Cagnizam quasi Catulientem vocant, profert: dat tamen & alium tergore amethystino, lateribus ferè cæruleis, ventre candicante punctis cæruleis notato, pinnis tergoris & retro anum viridentibus, illa etiam maculis rotundis viridibus insignita. Cæteræ pinnæ & cauda ex aureo rubescunt.

Rondeletii Cinædo similis est ille qui *Venetis* *Brasavola*, Lusitanis *Salmoneta* vocatur. Rufus est toto corpore, cauda lutea maculis fuscis distincta, extremitate æquali non arcuata. *Macula* nigræ ad pinnarum, quæ luteæ sunt, juxta branchias initia habentur. *Linea* ruffa à branchiis ad caudam tendit, punctis incerepta nigris. De natura *Alphestis* nihil planè occurrit, *Rondeletius* carne & substantia eadem cum saxatilibus esse dicit, tenera nimirum molli, & minime glutinosa.

ARTICULUS XI.

De Coracino.

CORACINUS, Gazæ, *Corvulus* & *Graculus*, *Salviano* *Corvinus*, *Ausonio* *Corvus*, Tarentino forte *αἰσχυρὸν*, seu à colore nigro, ut Oppiano placet, qui apud *Vitruvium* *Coracinus*, seu quod *τὸς αἰσχυρὸν*, quod pupillas moveat, ut *Athenæo* visum est, nomen fortitus videtur, nisi fortè illud amnico, hoc marino magis conveniat. An idem *αἰσχυρὸν*, *αἰσχυρὸν*, Nili accollis *αἰσχυρὸν*, Alexandrinis *αἰσχυρὸν*, quod *Rondeletius* voluit, dictus sit, an vero, quod *Aldrovando* probatur, *Saperdæ* nomen *Coracino* amnico *Platistæ* eidem profectæ ætatis, *Peltæ* & *Hemineri*, *Nilotico* duntaxat sit proprium, in dubio

Oppian.
Hal. 1. 3.
v. 459.
Athen. 1.
7. Dipn.Tab. XV
1. 2. 3.
Athen.
1. 7.Plin. H.
N. 1. 32.
c. 11.Tab. XV.
6. 4.
Aulon.
Epist. 4.
Oppian.
Hal. 1. 1.
v. 139.
Athen. 7.
Dipn.

Oppian.
d. l.
Arist. H.
A. l. 5. c.
9.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 5.
Athen.
l. 8.
Strabo
Geogr.
l. 17.

dubio relinquo. *Megaron*, non esse Dorionis apud Athenæum verba ostendunt.

In eo ponitur à Rondeletio censu, qui mare simul & flumina frequentant: quod & apud Plinium, Athenæum, & Strabonem in veniri credit, sed quia saxatilem esse ab Oppiano & Aristotele proditum, & excitatis authoribus Coracinum duntaxat in Nilo esse; quin quod apud Plinium legitur, Nilo peculiares, colligitur; nec ullum piscem ex mari in Nilum ascendere propter Crocodilorum metum, præter Mugilem, Alofam, & Delphinum Strabo affirmat, duo potius Coracini ut Percæ genera dari credendum est, quam easdem anni & mari communes. Et sane multo in Mæotide palude degere & Dorione: plurimòs in lacu non procul Oceano è monte inferioris Mauritaniæ originem trahente stagnante, quam Nilidem vocant, ac Nili ortum credunt, ex Plinio discimus.

Quis veterum genuinus Coracinus sit, haud tuto affirmari potest. Speusippus Melanuro similem, dixit. Aristophanes ob alarum nigredinem *μυκαροπύργος*, Numenius ob varietatem linearum *αἰθίας* vocavit, *Αρεσσι-
τιορίβις* quoque diversimode describitur. Bellonius pro eo piscem mari & fluminibus communem ex Glaucorum genere, *Pesce
Scarpa* Commenibus nominatum, obtrusit. Rondeletius suum ita describit. Coracinus piscis est marinus &c. Salvianus duplicem dedit. Prior qui Romæ simpliciter Corvo & Corvetto dicitur, rostrum habet breve & retusum. Os, &c. Alter, qui Corvo de Fortie-
ra Romæ, Niger, jure merito, ut prior albus, quia multo minus nigricat, censendus est. *Rostro, ore, Capite, oculis, pinnis, cauda*, totius corporis figura, & interaneis omnibus cum priore convenit, in eo discrepat, quod totus fere nigricet, aculeum, cui pinna inhaeret, majorem & validiorem habet. Pedalem magnitudinem nunquam superat, & saporis suavitate, carnisque teneritudine inferior est. *Gefnerus* Corvulum colore rubro depinxit.

Arist. H.
A. l. 9. c.
2.
Aristot.
H. A. l.
8. c. 15.
Arist. H.
A. l. 8. c.
10.
Arist. H.
A. l. 8.
c. 19.
Pallad. R.
R. l. 4.
Tit. 10.
Arist. H.
A. l. 8.
c. ult.
Rhodi-
gin. An-
tiq. Lect.
l. 12.
Athen.
l. 7.
Dipnos.

Inter gregales ponuntur Coracini: hyeme latent, nec nisi statis diebus, iisque semper capiuntur, quod & Rondeletius affirmat. Nunquam messe Tritici pariunt, sed autumnò foetificant inter algas, longo temporis spacio uterum ferunt, & inter minora genera piscium celerrimo incremento perficiuntur. Anno squalente melius valere, quia per siccitatem tepor accidit, ab Aristot. proditum est.

An adversus arborum formicas polleant, quod ex *Palladio Calius Rhodiginus*, qui pro Coracina pice, Coracinum piscem legi debere ait, affirmat, ignoro. Rondeletium certe experimentum fefellit, sed & huic, vero veterum Coracino fidem non tentasse, objicitur. Meliores sunt cum uterum gerunt. Nilotici marinis, elixis assii, præferuntur. Hi-

ceus, parum alere, facile excerni, succi esse mediocriter boni, dixit.

Usum in Medicina quod spectat, lapides in capite repertos calculos comminuere, vel pituitam ex qua calculi gignantur exsiccando vel pondere seu pellendo, idque sibi experientia cognitum, reliquit Rondeletius.

N. Corvuli iconem refert. Tab. 2.

ARTICULUS XII.

De Exocæto seu Adonide.

EXOCÆTUM, qui *Adonis* & *Cirrhis*, fortè & *αἰθα* & *αἰθίον* aliis, inter saxatiles esse Athenæus testatur. Squamosis sit an lævis dubium. Nomen ab eo invenit, quod in littore seu sicco dormiat. Subruffum esse, corpore tereti, littoralis & pusilli Cestrei magnitudine, cui digitorum octo longitudo maxima est, pisciculo Hirco, (Moenam marem, quo tempore dat operam soboli hunc putat Casaubonus) præter nigram sub alvo maculam quam Hirco barbam vocant, simillimum facit Athenæus, inque eodem à branchiis in utraque corporis parte lineam albam uno continuo tractu ad caudam usque duci addit. Rondeletius sequentem Iconem pro Adonide posuit. Piscis vero est semipedali magnitudine, forma tereti *αἰθαῖος* secundum Athenæum, secundum Oppianum *αἰθαῖος* seu colore aureo, partibus quibusdam virescente, magis rubesciente aliis. Corpore Moenis jam foetis aut Gobionibus similis Branchias habet parvas, à branchiis ad caudam lineam candidam continuam.

Miratur eum Arcadia, tamen & in littore Monspelium stertentem, sapissime vidit Rondeletius. Quod vero Exocætum circa Clitorium vocalem & sine branchiis tradit Plinius, impossibile videtur, & habere ostendimus. Nec quicquam de istis Pausanius de vocalibus in Arcadia creditis duntaxat agit, & diversus ab Exocæto marino fluvialis *αἰθαῖος*. Diutina in sicco vite; quod magna aëris copia aqua suffocari possit, ob rimæ branchiarum angustiam non trahatur, causa, Rondeletio. Propter eandem & Anguillas diutissimè etiam sub terra vivere; credit: sed, quia in aqua, quæ frigidius elementum, sueti vivere pisces; & anguilla sine ea senis diebus Aquilone spirante, qui frigidior ventus est; Austro paucioribus; reliqui diutius verno quam æstivo tempore vivunt; difficulter, nimia aëris frigidi attractione extra aquas lædi posse pisces, persuadere poterit. Vide Scaligerum.

ARTICULUS XIII.

De Scienasive Umbra, & Glauco
Bellonii.

Piscis qui Græcis vulgò *σκινα*, Xenocirati *οἰαί*, *εὐαδία* & *εὐαδία*, Græcis modernis

Tab. XV.
7. 8.
Athen.
Dipnos.
l. 8.

Athen.
Dipn.
l. 1.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 19.
Paulan.
in Arcad

Ronde-
let. l. 4.
de pisci-
bus ma-
rinis c. 9.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 19.

Scalig.
Ex. 273.

Tab.
XV. 9.

nis *valde*, nonnullis *μικρὸν*, is alicubi *Ovis marina*, communiter Latinis *Umbrina* & *Umbra*, seu à colore nigrescente, quam umbrosū Isidorus, luteum Ovidius vocat; seu à lineis quibusdam obliquis à dorso descendētib; aureis & obscuris, quæ aliarum apparent umbræ; seu quod dum movetur adumbrantem quendam oculis colorem iridis in morem rutilet; seu à proverbiali joco, quo *valde* dicebantur, qui non vocati ad convivium veniebant, quasi multi convivas secuti essent, cum de hoc pisce edendum erat, dicitur.

Piscis est cetaceus, LX. plerumque librarum, quatuor plus minus cubitos longus. *Squammæ* ejus veluti obliquæ apparent, in Oceano nigriores & quasi opacæ, in Mediterraneo argentei, aurei, atque interdum ab his varii coloris, iridem dum piscis agitur imitantur, quod Bellonius prodidit. Rondeletius ei lineas obliquas quasdam aureas, manifestas, alias aliarum veluti umbras attribuit. Aldrovando fere unicolor est, tota videlicet ferruginea, in dorso, supremo capite, pinnis, & cauda obscurioris coloris; in ventre, lateribus, & branchiarum ossibus dilutioris, quia ad amethistinum inclinatur. Salviano, dum parva est argentea ferè tota apparet: major facta, ventre argenteo, dorso verò & lateribus subliventibus ac veluti opacis conspicitur. *Caput* ex descriptione Salviani habet magnum: in dorso duas *pinnas*, quarum prior octonis aculeis, nullis altera munitur, ad branchias, quas quaternas utrinque habet, una utrinque enascitur; duæque aliæ in ventre conspiciuntur, imo ab ano una alia hæret. Coracino tam similis est, ut ichtyopolæ unum pro alio substituant, magnitudine differunt. Sed & pro Glauco supponitur, in eo diversus, quod *deptes* in oris ambitu raros, firmos, acutos, prominentes, terretes, caninis longiores, & graciliores, quæ habeat; (negant habere Aldrovandus & Rondeletius) quorum superiores inferioribus majores, sic maxillæ inhaerent, ut ipsius pars esse videantur. De *Verruca* sub mento controversum: affirmant quidam habere, negant alii. *Caudam* in angulos veluti desinentem gerit, ut Scari & Iulides. *Calculos* in capite habet prægrandes, quorum Aristoteles & Plinius meminere; *ventriculū* magnum & carnosum; *intestina* mediocria & pingua; *jecur* pallidum, ex quo fellis vesica pendet. Lienem subatrum.

Marinum piscem omnes fatentur, sed de loco non conveniunt. Arenosos gurgites melius eas pascere, Columella prodidit. Oppianus petream cognominat, & saxa herbofa incolere asserit, hisce & Galenus accedit.

Quia perraro plures capiuntur, *solvaga* potius quam gregalis esse creditur *Carnivora* & agilis, & propter lapides in capite frigoris impatiens. Dum caput recondidere,

latere se totas Struthionum & Phasianorum instar, putant. Oppiani id fide asseritur. Cibos quod spectat. Inter nobiles ab Ennio, Epicharmo, & Numenio pisces numeratur. Romæ inter sapidissimos, canicularum imprimis tempore censetur, & pari tum cum Sluris precio venundari solet. Capita Triumviris rei Romanæ conservatoribus dono dantur, de quo faceta est apud Iovium de Tanusio historia. Apud Pictones ex aceto & capis minutim concisis editur. Salvianus cum laucophago comestam, caryophyllis transfixam, ac verrubus affatam laudat. Archestratus gulæ suo tempore procerum princeps, nobilem capitis condituram multis carminibus expressit. De *Carnis* salubritate non conveniunt Authores. Galenus Philotimum quod eas mollis carnis piscibus adnumerat, reprehendit. Xenocrates bonum ex eo nec admodum copiosum succum generari, & saporis esse jucundi scribit.

Invenit & in *Medicina* usum. *Interanea* & *squammæ* combustæ, panthos teste Plinio discutunt. *Lapides* argento inclusi tanquam colicæ amuletum gestantur. Non emptos, sed dono datos gestari debere, nugacis vulgi delirium est.

GLAUCUS Bellonii pelagiū est piscis, ex eorum qui plures patinas implent numero, Lutetia invisus, Genuensibus frequens, apud quas *Fegarus*, ut apud Venetos Corbetus, quasi Corvulus dicitur. Massiliensibus & Romanis nullo alio quam *Umbrina* nomine venit. Ita de eo Bellonius.

ARTICULUS XIV.

De Anthiis.

Anthiarum nomen omnibus piscibus latis imposuit Bellonius, sed malè: nec idoneum testem habet; nec omnes lati tam pulchri, ut vel Anthiæ, vel Callichtydes, vel Callionymi dici possint. Ex squammosarum esse genere, dubium; à corporis floriditate nomen apud Græcos accepisse, certum. *Ανθίσις* eundem ipse Aristoteles facit. Athenæo *καλλιχθυς* & *καλλώνυμις* dicitur, *θαλασσα* vocavere quidam; quo nomine & ille cui squammæ contra aliorum piscium morem ad os versus tribuuntur, insignitur: *sacrum* alii seu quod magnus sit, ut morbum comitiale, qui magnus est sacrum dicimus: seu quod quo loco Anthias est, ibi nullam bestiam esse confessum sit, vocant. Hicesius *ἀνθίον* dici tradit, quod malè in *ἀνθίον* Rondeletius vertit. Hesychius enim *ἐχθρὸν ποῖον* *ἀνθίον* appellari asserit. Quatuor ipsorum genera ab Oppiano ponuntur.

Ζαφύδ ἀνθίσις, πὸ δὲ ἡρίων ἄλλα καλὰνθι.
Ἀλλὰ δὲ ἀνθίσις τε, & ἀλλανθίς καλὰνθι.

Sunt flava & nivea, sunt atro sanguine fusca
Euops atque Auceps alios hoc nomine dicunt.

E

Toti-

Oppian.
Hal. l. 4.Galen. l.
3. de A-
lim.Plin. H.
N. l. 32.
c. 11.Tab.
XV. 10.Tab.
XV. 1. 2.
4. 5. 6. 7.Oppian.
Halieut.
l. 1. v.
254.Aldrov.
de Piscib.
l. 1. c. 17.Arist. H.
A. l. 8. c.
19.
Plin. H.
N. l. 9. c.
16.Columel.
R. R. l.
8 c. 16.

Totidem & Rondeletius posuit; quorum vix aliquis, cum omnes dentati sunt, Anthiæ vero Oppiano edentuli, probatur. Prior totus corpore & pinnis rubens, Pagri aut Cinnædi modo, ad imberbes Mullos referri potest. *Alter* A felli species est: quod neque salitus, neque vento siccatus, servari potest, vel calidiori in Gallia cœlo, vel obculta qualitate adscribendum est. *Tertium* ad Turdos pertinere stellulæ, quas in pinna ad anum gerit, & corporis forma testantur. Oculos habet magnos, rotundos, purpureos, & rubros. Podicem magnum è quo *intestinum* rubro viridique distinctum excidit. Pro *quarto*, (hujus generis Oppianus *ἰσθὶν ἄλκιμον* vocat, id est *isthmodon*: & *ἰσθμὸν ἔχει τὸν ἰσθμὸν*, ut Scoliastes meus exponit, Ælianus cetacei generis & ore robusto facit,) squamosus & latus piscis, quem ex eo, quod supercilia oculos ambiant, Aulopiam esse colligas, ponitur. *Aldrovandus* quatuor quoque Anthiarum nomine è diversis locis sibi missos ponit, sed pro iis non obtrudit. *Primi* venter totus argenteis squammis resplendet: lateribus aureæ intermiscuntur. In dorso, quod fuliginosum, unica tantum pinna duodecim armata aculeis visitur, ventris pinnæ ad castaneum vergunt. Branchiarum opercula ex aureo & violaceo variant. Labrum inferius tum intus, tum foris ex flavo virefcit, quod peculiaris notæ loco esse potest. *Alter* toto dorso pinnis duabus dorsæ & quæ retro anum est, viret. Vertice capitis aterrimo, cervice & labro inferiore interna parte purpurascens. Ossibus branchiarum auro resplendentibus, ventre toto argenteo purpura permixto. *Tertius* tam amplis violaceis toto corpore variegatur, ut violaceus quasi totus videatur. Pinnarum numero cum superioribus convenit, quæ ad branchias, vergunt ad violaceum, & in extremo rosæ sunt. Iris oculorum & mentum roseo sanguineoque colore, specificam & ob quam solam dignosci potest notam, in eo constituunt. *Quarto* inusitata est oculorum ac præsertim pupilla magnitudo & pulchritudo: iridem ex aureo roseoque permixtam habet. In capite retro oculos, cervice, & ad branchias, amethystino, aureo, argenteo, cæruleoque variat. Labrum superius habet viride, inferius cæruleum: *linguam* maximam candicantem. Ventrem primum viridem, dein argento & auro ad podicem usque splendidem, ad caudam usque roseum & sanguineum. *Locus* Anthiis in saxis, quæ tamen aliquando, cum *ἰσθμὸν ἔχει*, deferunt. *Ἀνθίας δὲ τὸν τὸν ἰσθμὸν ἔχει* locum absque bellicis esse ubi habitant: quod fortè inter *ἰσθμὸν ἔχει* reputandum est. Unde sacri, ut superius dictum dicuntur. Cum unum hamo teneri vident, lineam secare asperitate dorsæ fortè, traduntur, eo qui tenetur extendente, ut secari possit.

Capti illigeni huiusmodi, & ambostruque inuicem solantes
 doliis & quatuor tui inclusos, miserabile præbent spectacu-
 lum & mortem suam lugere, & quodammo-
 do supplicare videntur.

De ipsorum capiendi modo ita Plinius:
De Anthia pisce sileri convenit, quæ plerosque
adverto credidisse. Chelidonias insulas dixi-
mus Asia scopuli maris ante promontorium si-
tas, ibi frequens hic piscis & celeriter, &c.
Consentur ab Eustathio inter eos pisces,
qui ἀνθηράδης, quod ob magnitudinem sum-
ptuum, gancorum opes exhauriant: sed &
Dii, quod preciosissimi sint, vocantur.
Carnis est solidiusculæ. Unde χαλιδάδες apud
Athenæum (malè χαλιδάδες) dicitur.

Fel cum melle inunctum, exanthemata, tubera, scrophulas, & dothienas sanat. Lapid-
es capitis ad collum ligati, *Cephalalgiam*
domant.

ARTICULUS XV.

De Gobiis squammosis saxatilibus.

Gobiorum historiam loci & tegumentum differentia intricatam facit. Nobis de squammosis saxatilibus hic res est, eisdemque littorales adjiciemus, ne de iis pluribus in locis agere cogamur. Græcis dicitur *ὀβίος*. Numenio apud Athenæum *ὀβίος*. Phavorinus explicat, Latinis *Gobius*, *Gobio*, *Govius*, ut apud Ovidium, & *Cobio* ut apud Plinium legitur. Parvi sunt tam illi, qui in mari, quam qui in aquis. Tzetzes tricubitales fama accepit, quod fortè de illis, qui in rubro mari, prout ab Æliano proditum, sumendum est. Bellonius ex saxatilibus album quendam facit, quem Græci *ὀβίος* & *αὐχινίος*. Rondeletius flavescentem seu pallidum vocat. Est is palmi longitudine, toto corpore rotundo, non composito & spisso, squamis rotundis tecto, colore vario. Nigris maculis conspergitur, oculis sursum potius quam deorsum spectantibus. Ad branchias pinnas duas habet, in ventre non duas cæterorum more, sed unicam non divisam, quâ natâ Gobii maximè à reliquis piscibus internoscuntur, à podice aliam, in dorso non unicam velut alii saxatiles, sed duas, prior minor est, altera ad caudam usque extenditur. Dentes ei parvi, os magnum, ventriculus, cum multis appendicibus capax. Aristoteles complures supernè circa eum exire scribit. Hepar ipsi album non sine errore tribuit Hicelius. Qui Aldrovando Venetiis missus est, pinnas habebat in tergore binas conjunctas, quarum prior aculeis vigeat, altera levis erat, binas item in pectore, totidemque ab ano omnes nigras. Caudam & superiorem partem corporis nigra. Ventrem candicantem.

Ex littoralibus duplices apud Aurhores
invenio. *Albos & nigros.*

Illos

Ælian.
H. A. l.
13. c. 17.

Aldrov.
de Piscib.
l. I. c. 19

 ΔT
or VX

Tab. XV.
11. 12.

Athe-
naeus Di-
pnos. l. 7.
Tzetzes
Varior.
Ælian.
H. A. l.
17. c. 6.

Arist. H.
A. 1. 2.
c. ult.

Ælian.
Hist. A-
nimal. 1.
8. c. 28.

Plin. H.
N. l. 9. c.
59.

Illos Rondeletius ita vocat, non quod tam candidi sint, ut cum aliorum piscium candore contendere possint, sed quod candore ceteros Gobios superent.

Nigros ita Bellonius describit. Eminentes ac turgentes supra caput oculos gerunt. Cornea tunica alba, & ut serpentibus dura obductos, adversus aquarum impetum, & ut sursum facilius ut Uranoscopus cernant. Vix excedunt duorum pollicum crassitiem aut palmi longitudinem. Rarè enim pedales & branchiales evadunt. Et si autem lubrici sunt, tamen squammis integuntur hirtis, pinnamque habent unam in tergo continuam mollem & sine aculeis. Pinnas utrinque quatuor latas atque obtusas, ac præter has sub ventre etiam duas; sed ea, quæ caudam constituit, rotunda est. *Dentes* exerunt parvos, tenues, & subrubros. *Corpus* teres est, paucis spinis refertum, *Color* varius. Etenim qui Gobiones circa algam versantur ad viridem inclinant, alii ad cinereum accedunt, nonnulli albicant, alii ex fulvo in nigrum degenerant. Omnes grandiore sunt capite & lata ceivice. At quod ad internas ejus piscis partes attinet: peritonæum Gobionibus foris album est, intus nigerrimum. *Hepar* dextro lateri magis incumbit, pallidum, de quo *fel* pendet veluti janthinum. *Intestina* multis circumvolutionibus inflectuntur. *Stomachus* est oblongus, pylorus multis apophysis præditus vulva undecunque ovis referta.

Facit & Rondeletius Nigri mentionem, quia Venetis Go, à Gallis Boulerot nuncupatur. Digni is est magnitudine & crassitie, corpore rotundo ferè, non compresso, loco binarum pinnarum, quæ cæteris sunt in ventre, unicam habet nigram, barbam inquit dices, & exinde Athenæi *σπίδα* seu hircum, cui Exocatum confert, esse judicat. Vivit in littoribus & stagnis marinis.

De *Loco* proprio ambigitur. Ovidio littorales sunt, Diocli saxatiles, cui Synesius accedit, dum circa Africæ quoddam littus, loco petroso capi scribit. Aristot. in fluviis quoque pinguescere ait. A Theophrasto proditur in Ponto regione apprehendi in glacie Piscium maximè Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum fatentes; quod fortè de lacustribus vel fluviatilibus sumendum erit. Oppiano *ἀγρίοις* & *σπίδα* gaudet. Pariunt juxta littora, suæque ova latiuscula & arenida, ut Aristoteles prodidit, lapidum amplexibus mandant.

Ab Aliano inter illos ponitur, qui *ὀφιοειδὲς ἢ ἀγρίοις*. Venenum pungendo immittunt, annumerantur; Oppianus quoque *αἰὶνα* & *αἰαῖδα*, aculeos lethales ipsis tribuit, quod nec cum Ovidio, cui, *spina nocivis non gobius ulla*; nec cum Martiale, cui in *terris Venetis, principium mense gobius esse so-*

let, congruit. Et sanè invenit, & in *cibit* usum, etsi Juvenali vilissimus videatur. Alexandrides in Cotyis Thracum Regis convivio eos nominat. Anthiphanes laudat, Phalericos inprimis. Archephonti parasito, qui in Ægyptum ex Attica, à Ptolomæo Rege ad cœnam invitatus, navigavit, Gobiorum frustra tria non sine stupore convivis omnibus visa apposita sunt. Jovius enim persuavem, & pingui teneritudine delicatum facit. Galenus ad voluptatem, digestionem, & probum succum gignendum præstantissimum, ait. Mnesitheo *σπίδα* sunt & *σπίδα*, Hicetio facile excernuntur, & non multum nutriunt, flavescientium substantia rarior & magis putredinis experts. Apud Hippocratem parem in alimonia cum Dracone, Callionimo & Ciculo vim obtinet. Assus & sine sale mansus, nimia egerendi desideria sedat, si Kiranidi credendum, illitum, canum rabidorum, serpentiumque moribus prodesse Dioscorides prodidit. Dorycinii vim, crudum, tostum, elixum infringere, apud Nicandri scholiasten legimus.

ARTICULUS XVI.

De *Sphyrana* sive *Sudi*.

SPHYRANA, cujus præter Ovidium nullum alium meminisse, perperam scribit Plinius; nam inter Græcos Aristoteles, ex Latinis M. Varro meminere; Atticis *σπίδα* ut Athenæus affirmat, (significat hoc, ut & *σπίδα* stimulum aut stylum; item teli genus bello Persico inventum) Latinis *Sudis*, ut apud Plinium videmus, *Gazæ Malleolus*, sed malè, Romanis *Lucius marinus* vocatur, sunt qui pro Oxyrincho, quia acumenato est rostro, sumunt.

Duas ipsarum posuit species Rondeletius ex Oppiano, sed tam dissimiles, ut an ex eodem sint genere dubitari possit. Prior enim squammolam à capite ad caudam lineam habet, altera squamis omnino destituitur. Totidem & Bellonius innuit, quarum una Trachurum colore refert, atque eodem modo sub ventre albicat. Altera senescens Momyri laterales picturas colore assequitur. Quaternæ vix libram pendent, ut optime Plinius magnitudine inter amplissimos rarum scripserit: visi tamen aliquando bilibres. Colore Asellum æmulatur. *Rostro* est foris coelato, in extremo cuneato, nigro. *Ore* valdè recesso. *Maxilla* superior quæ obtusa & brevior, cum inferiore, quæ acuta & longior ita coit, ut vix oris rostrive scissuram ullam dices. *Dentes* utrinque habet, in superiore majores, in inferiore minores. In ipso oris hiato unus est, cæterorum longissimus & acutissimus, qui ore clauso in foramen anterioris ac membranaceæ partes ita suscipitur, ut extrinsecus etiam paululum emineat.

Athen. l. 7.

Galen. l. 2. de Aliment.

Hippoc. l. de inter affect.

Tab. XVIII. I. Athen. Dipn. l. 7.

Plin. H. N. l. 9. c. 2.

Plin. H. N. l. 32. c. 11.

Athen. Dipn. l. 8.

Arist. H. A. l. 8. c. 19. Theophr. l. de pisc. cib. in sicco. Oppian. l. 2. Halicut. v. 457.

Martialis in Xenis.

Lingua scabra est, denticulisque aspera. Linea, quæ à branchiis ad caudam usque per latius deducitur, & initio flavescit cum dorso, squammis parvulis & duriusculis, mirarte contacta est. De numero pinnarum Auctores non conveniunt.

Aldrov.
de Piscib.
l. 1. c. 21.

Aldrovandi Sphyræna per dorsum nigricat, cætera ad amethystinum vergunt, & ejusdem coloris maculis interstinguuntur. *Linea* flavescit, ruberrimis infra supraque punctis exiguis notata. *Caput* cæruleum. *Oculi* & *pinnae* pallescunt. *Cor* oblongum est, sub quadam vesicula alba inclusum. *Pylorus* à stomacho confurgit tam multiplici *apophysium* seu cæcorum cæsarie intertextus, ut penitus stomachum contegant, nec à quouam numerari possint. *Fel* ab hepatis loco dextrolatere in folle oblongo dependet. *Follem* ei natura vento plenum oblongum, anteriore parte bifidum, utrinque in acutum exeuntem donavit, ne ad imum sideret. *Spina* dorsi raris vertebrais coagmentatur.

Oppian.
Hal. l. i.
v. 168.
Arif. H.
A. l. 9.
c. 2.

De loco non est quod multa dicamus. Ælianus dum pelagias dicit, Smyrænas potius innuere videtur. Expressè enim ex quo ille de piscibus ferè omnia *ἀπὸ τῶν ὕδατος καὶ ἀπὸ τῶν ἀνέμων* *ῥίμνται*. Gregatim degere & Aristoteles testatur, & piscatores comprobant. Captis an *ἀπὸ τῶν ὕδατος καὶ ἀπὸ τῶν ἀνέμων* *lubricis excidere membris*, quod ex Oppiano Ælianus prodidit, an competat, ex superioribus colligi potest. Non fallitur, qui pro Sphyranas Smyrænas legerit.

Oppian.
Halieut.
l. 3. v.
120.
Ælian.
H. A. l. 1.
c. 31.

Athen. l.
7.

Quantum ad *usum* Romæ seu plebejus negligitur, nec peculiarem habet condituræ modum. Hicelsius apud Athenæum *προσφαισθηται* congris esse, *ἀναισθητοὶ δὲ τῶν γούρων & ἀσπιδων*, *διζωστὰ δὲ μύρον* gustui ingratos, ori insuaves, succum mediocriter laudabilem generare dicit: sed cum congris ex cartilagineorum sint genere, Philotimoque *δυσκαταίεστος* dicantur, & Rondeletius carne esse candida suavi, quodammodo friabili, & Aselli carnem referente, cui simul cum Lupo præcipuam authoritatem fuisse Cornelius Nepos, & Laberius Poëta tradiderint, quin Cestræ lumbi cum aliis lautissimis obsoniis ab Anriphane nominentur, vel librarios, vel Athenæum attractum superius errorem commississe, verisimile est.

ARTICULUS XVII.

De Acn.

PUNCTUM I

De Acu Aristotelis.

Tab.
XIV. 13.

Piscis quem Latini Acum vocant, Græcis longitudine & tenuitate *Βαλίσσα*, *Παχίς*, Athenæo *Αΐσκις*, quasi sine mucō, dicitur, suunt qui *Βαλίσσας* ut Varinus citat, & *Βαλίσσας* nuncupant.

Unam ejus duntaxat *speciem* Salvanus agnoscit. Bellonius cum Rondeletio duas. Nos de Acu Aristotelis, Oppiani, & Bellonii agemus. Hinc autem Rondeletius illum piscem esse credit, quem Bellonius *Typhlinen* & *Ceciliam marinam* ob corporis figuram, Plinii *Spondylem*, Græcorum vulgo *Herophidiam*, Massilienses *Gagnolam*, quod quoties piscantur, si alios pisces præcedere viderint, lucrum portendi crepant, vocant. Piscis est longus, cubiti longitudine, digiti crassitudine, totus subflavus. *Corpus* utriusque sexus angulosum, oblongum, à capite ad meatum excrementorum semper crassescens, sexangulum, sed deinceps, ut tenuius efficitur, pro sexangula quadrangulam formam induit. *Caput* habet exiguum, *Rostrum* oblongum, durum, nec acuminatum. Extrema pars latiuscula exstat, rictus in altitudinem dehiscit, figura tubam æmuletur, in extremo tubæ veluti *foramen* conspicitur, tam pusillum, ut tum propter ipsius parvitatem, tum propter rostri magnitudinem angustiamque, ne minimus quidem pisciculus ingeri possit, eo veluti per fistulam, ex humore alimentum attrahit. *Oculi* sunt tam exigui, ut vix milii magnitudinem æquent. *Branchiæ* utrinque quaternæ, podex in medio ferè corpore. De *pinnis* disputatur. Salvanus cum Aldrovando unam parvam & tenuissimam in medio dorso ponit. Bellonius cum Rondeletio duas in lateribus juxta branchias, eam quæ in tergo tam tenuem & exiguam, iste addit, ut vix nisi cum vivit, aut in aquis movetur, conspiciatur. *Interna* si spectes, habet *gulam*, qua plurimi pisces carent, ventriculum parvum, oblongum. *Hepar* pallidum, sub quo dextra parte *felcæsum* hordei magnitudine continetur. *Cor* vix milio majus. *Fulvam* cæterorum piscium more bicornem, ovis sesami magnitudine, rorundis, rubris, transparentibus plenam. De *intestinis* inter Bellonium & Rondeletium non convenit. Iste gracilia, recta, in spiras non contorta prodit, hic unum tantum album, recta expositum, multa pinguedine circumfessum scribit.

Quantum ad *Generationem* ; ova se in dif-
fectarum, rima, seu *ὄρις τῶν γαμῶν*, de qua
superius, multa invenisse, & multos foetus
jam profectos, quorum majores partes omnes
perfectas habebant, & movebantur ; Alii
tam tenues & exigui erant, ut oculi dun-
taxat & rostrum cernerentur, testatur Ronde-
letius. Emittit illa eo, & quasi in altero sinu
fovet donec excluderit, dilatat natura rimam,
donec pepererit : à partu vel ita coit ut coalu-
isse videatur, vel revera coalescit, quod & in
cæciliis serpentibus traditur, huicque omni-
nò tribuendum est, quod dehiscenti propter
multitudinem ovorum utero, adscripsit Plin-
ius; ex Aristot. malè de eodem vertit Gaza,
nec

Arist. H.
A. l. 6.
C. 13.

Plin. H.
N: 1.

Ælian. nec melius Ælianus deprompsit. *Ac* πῶς αὐτοῦ πρὸς τὴν τῆς αἰῶνος διαίτησιν ἔστι τῶν αἰῶν id est, ut
H. A. I. Scaliger vertit. *Multa earum parturientes*
11. c. 13. *disfrumpuntur ab ovis.* Quid sibi sequentia
Scaliger adl. 6. c. 16. verba velint, & αὐτοῦ τὰ φησὶς περιχαρῶς, & πρὸς τὴν αἰῶνος διαίτησιν ἔστι τῶν αἰῶν & οἱ αἰῶνες φησιν.
Athen. *Fætus circa parentem quasi phalangia circumfusi*
Dipnol. 1. 7. *sunt.* Ita enim parit, ut ei adhaerant, sed si tetigeris, fugiunt, difficile est dicere. De usu in cibo & Medicina dixisse sufficiat, Carnis esse duræ ac sicæ eoque difficulter concoqui. Unde Hicetio αἰχμῶν ὀνι succi, & combusti cinerem in potu ad stillicidium urinæ à Galeno commendari.

PUNCTUM II.

De *Acu* Oppiano.

Tab. XIV. 14. 15. 16. 17. Aldr. de Piscib. 1. 1. c. 24. **A**CUM Oppiani ab *Acu* Aristotelis debere distingui, tum quod hic dentatus sit, tum quod rima destituatur, ostendit. Haud in multam magnitudinem excrevit, feni vix libram pendeat. Vidit tamen & trilbrem Salvianus. *Ventre* est plano, candido & argenteo, reliquo corpore quodammodo ob lineam è squamis contextam utrinque protensam, quadrato, reliquis partibus lævibus, & sine squammis. *Dorso* cæruleo ad viride inclinante. *Rostrum* habet acutum, tenue, longum & durum, ut ait Athenæus. *Caput* triangulare viride. Inferiorem *maxillam* superiore longiorem, & in mollem quandam substantiam, degenerantem. *Dentes* utrinque parvos & frequentes. *Oculos* magnos, rotundos, luteos ante quos meatus ad audiendum vel odorandum triangulari figura observavit Rondeletius. *Branchiæ* sunt quaternæ duplices. *Pinnæ* ad branchias duæ parvæ; duæ aliæ sub ventre breves, quas rursus alia sequitur, longè à podice ad caudam se extendens, è cuius regione in dorso alia. *Cauda* brevis est in duas pinnulas terminata. *Podex* non admodum conspicuus. *Rimam* illam quam Aristoteles *Acui* tribuit circa podicem huius *Acus* foris quidem conspicuam esse, sed intus minimè videri, Salvianus author est. Rondeletius diligentissimus omnium circa *Acum* indagator ejus non meminit. *Partes interiores*, ventriculorum, hepar, intestina, quæ appendicibus carent, longa habet. *Hepati* vesicula fellis oblonga adhæret. *Cor* angulosum est. In arenosis, saxosisque locis degit. Solemne ipsis αἰῶνι δ' αὐτῶν ἀποτρέφεται, quando sinum retis effugerint, iterum reverti, & dum ira velut perciti id dentibus lacerant, in laqueos iterum impingere. Carne est dura & sicca. Frixus & omphacio vel succo maliaurantii irroratus edi solet; nec ingratus palato invenitur.

Acus Minor Bellonii *Lacertus* est, sue *Saurus Acubus similis*. Rondeletio *Piscis*

est marinus, pedis magnitudine, *Acubus* brevior & crassior. *Rostro* acutiore sed brevior & fursum recurvo. *Dentium* loco maxillas ferratas habet. *Branchias* quaternas, septem etiam, ut in superiore, quem Bellonius Majorem vocat, supernè ac infernè & in cauda propendentes *pinnulis*; his, oculis, & ante hos foraminibus, ventrisque squamis ac lineis, quæ ventrem ferè quadratum efficiunt firmantque, *Acubus* est similis, carnis substantia, & posteriore corporis parte *Scombris*. *Intra* ventriculus est oblongus. *Intestina* longa gracilia, in gyrum convoluta. *Hepar* longum & rubescens: *fel* & *splen* nigricantia. Cujus Aldrovandus Iconem dedit, toto corpore subviret, maculis ex amethystino & cæruleo mixtis, in dorso intensius, in pectore remissius variantibus. Rarus est, & in insula nomine Lissa, olim Phunna affatim capitur. Inde salitus navigiis transfertur, & maximo quæstu divenditur.

ARTICULUS XVIII.

De *Fabro*.

FABER piscis, seu exinde quod omnia fabrilia instrumenta in eo reperiantur, teste Salviano, seu propter multiformes dorsi ac ventris aculeos atque varia capitis ossa, quibus fabrilia omnia instrumenta representantur, seu ab atræ fuliginis colore, quod tamen, si ex Oppiano desumptum est, Coracino potius tribui debet, ita dictus est. An χαλκός sit, quod Salviano placet, dubitatur. Cum cum Gadibus principum obtinere scribat Plinius, rotundum vel orbicularem, Athenæus faciat. Si est, utique & χαλκός seu Jupiter dicetur, nam & hoc τὸ χαλκός nomen est, seu à χαλκός formatum; seu quod fortè, ut nunc sit, olim etiam in templi Jovis tanquam sacer suspenderetur. Quidam χαλκός nuncupant, an propter maculas laterales, digitorum Divi Christophori ut ajunt vestigia, vel quod cum quem jussu Salvatoris Divi Petrus cepit (macule prædictæ numismatis illius quodammodo figuram exprimere creduntur) opinentur, nescio. Romæ *Citula*, Liguribus *Rotula*, Hollandis *Gallus marinus* dicitur. Qui Chalciden, Acanthiam vel Citharum, vel Porcum marinum esse judicant, falluntur. *Primus* enim inter viles pisciculos à Columella; ab Aristotele inter fluviatiles reponitur. *Alter* cartilagineus & rotundus. Citharum piscem inferius dabitur. Porcus inter magnos pisces recensetur. *Zal* Hefichii idem fortè cum isto. Cum nec inter *Acubus*, qui una parte candicant, nigricant altera, nec inter planos, à quibus oculorum situ differt, referri possit, benè inter latus censetur, quamvis maximè compresso ac plano sit corpore.

Coloris est varius. *Caput* & dorsum obscura

Tab. XVII. 1. 2. Aldrov. de Piscib. 1. 1. c. 25.

Plin. H. N. l. 9. c. 18.

Oppian. Hal. l. 3. v. 605.

sunt, pinnæ nigricant, latera partim ex cæruleo virent, partim aurea sunt. In medio corpore macula nigra, orbicularis, vel ovata nummi minoris magnitudine, colore cælesti, cum tribus imaginibus, figura quodammodo Hippocampi, colore aureo, visitur. Squammis tam exiguis tegitur, tenuibusque ut nisi digito scalpas vix appareant. Caput ipsi compressum, extensum, osseum, ossibus quàm plurimis, variis, angulosis, tenuibus, atque perlucidis constructum, maculis quibusdam exiguis purpureis exornatum. Linea obliqua à capite ad caudam ducitur. Os latissimum, plurimum hians, edentulum, etsi quodammodo dentatum pinxerit Bellonius. Oculi magni, rotundi, aurei. Branchiæ utrinque quaternæ, quarum ossæ opercula in aculeos desinunt. Pinnæ duæ mediocres ad branchias, duæque aliæ in anteriore ventris parte paulo longiores, ac in quinos velut longos pilos aut fetas porcinas degenerantes, ab ano rursus duæ aliæ quarum prior pars quinque duntaxat aculeis constat, altera multo longior, & ad caudam ferè usque extensa, aculeis caret, in dorso unica tantum & magna, ut quæ paulò ante medium dorsum exorta, ad caudam usque ferè extenditur, figura huic pisci propria, & aliorum piscium dorfi pinnæ dissimilis. Primum namque in longissimos pilos ejus ferè modo, quàm in anteriori ventris parte conspici diximus terminatur; deinde plurimis robustissimis aculeis intertextis armatur; postremo aliis etiam aculeis osseis multò brevioribus, bifidis atque recurvis, secundum ejus exortum in dorso præmunitur. Pars ventris utrinque ossibus instar acuti cultri secantibus firmatur. Cauda in unam pinnam desinit. Ventriculus habet medioerem, gulam manifestam, intestina parva tenuius in gyros convoluta, inter quæ ova rubra latere Rondeletius ait. Hepar candidum sine felle, lienem rubescentem exiguum, mesenterio hærentem. Cordis pars infima rubet, suprema & media ex albo rubescit, quod in paucis piscibus spectatur.

Oppian.
Hal. l. 1.
v. 133.

In faxis cum degere tradidit Oppianus, in Atlantico & Gaditano generosissimis piscibus adnumerari Columella. Ita carnivorus est, ut nec alia maris purgamenta spernat. An ei stridor competat, quem Chalcidi Aristoteles tribuit, ita ut pro *χαλκίδος χαλκίδος* legatur, quod Aldrovando placet, aliis judicandum relinquo: mihi, cum branchiarum opercula tam horrida habeat, ut dimota sonitum edant, & verò plurimi ex piscibus *ἡδὲ θάλασσαν ὡς ἡδὲ τὴν ἀνθρώπου* (Aldrovando *ἡδὲ τὴν ἀνθρώπου*) hoc quod vox videtur, attritu branchiarum, quippe loca spinea sunt emittunt, verisimile videtur. Solivagus est, & erectus, non passerum more in latus conversus natat.

Reputatur inter pisces carne satis tenera

& friabili, concoctu facili, & boni succi. Apud veteres in multa fuisse estimatione ex Columella dum dicit, *Atlantico pascitur Faber: qui & in nostro Gadum municipio, generosissimis piscibus adnumeratur, eumque priscæ consuetudine Zeum appellamus*, didicimus. Cum ob corporis tenuitatem, commodè assari nequeat, aut frictum & omphacio aut aurantii mali succo irroratum, aut in aqua & vino partibus æqualibus, oleo, sale, beneque olentibus herbis atque aromatibus elixum comedit, Salvianus tradit.

Columell. R.
R. l. 8. c.
16.
Plin. H.
N. l. 9. c.
18.

CAPUT II.

De Piscibus saxatilibus levibus.

ARTICULUS UNICUS.

De Alaudis & Pholide

Inter Saxatiles læves, Alaudæ duntaxat, cum iis qui ad eas pertinent Gutturoso nempe pisce, & Exocæto Bellonii, & Pholis reperiuntur.

Tab.
XVII. 3.
Aldrov.
de Piscib.
l. 1. c. ult.

ALAUDAM duplicem facit Rondeletius, *Cristatam* & *non Cristatam*.

Illa corporis specie Scorpioidi admodum est similis. Colore fusco, multis maculis partim rotundis, partim oblongis & tortuosis notato, tenui, lævi & lubrico, ore parvo, dentibus anterioribus ferratis, posterioribus exertis, oculis parvis cæruleis, in vertice dum vivit erecta est *crista*, mollis & cærulea. Pinnæ ad branchias lævæ sed breves, in ventre parvæ & tenues. Podex non procul à branchiis distat, à quo pinna ad caudam protenditur, alia in cervice ad caudam continua. Peritoneum ex nigro viride est. Cor angulatum. Hepar ex albo rubet, à quo fellis vesica pendet, perspicuitate & coloris jucunditate smaragdum referens. Intestina lata sunt, coloris lutei. Ob parvam branchiarum scissuram sat diu extra aquam vivit.

Carne est molli, sed ob parvitatem negligitur.

Ad hanc Piscis GUTTUROSO dictus referri potest. Nigricat quidem ferè undique: sed & punctis cæruleis distinguitur, & color luteus per totam superiorem dorfi pinnæ partem, circa branchias & summo ventre visitur.

Tab.
XVIII.
3.

Littoralis est, & foramina lapidum aut ædificiorum littoralium subire solet, vel carne vasi injecta mox exempta capitur.

ALAUDA NON CRISTATA capite est parvo & rotundo, ore & oculis parvis, dentibus anterioribus ferratis, posterioribus longiusculis, acutis, exertis. Pinnulas duas habet ad branchias, duas in ventre, aliam

Tab.
XVIII.
2.

aliam statim à capite ad caudam continuam, item aliam à podice ori satispropinquo ad caudam usque ductam.

Cauda in unicam definit saxatiliū more; *Macula* multæ mediæ corporis parti aspersæ sunt.

Aqua, muco, parvis Atherinis & Aphyis vescitur. Carnis substantia & mollitudine cristatæ par. In petrarum rimis degit, hinc nomen Percepiere fortitus est.

Tab. XV. 7. 8. Huc & Exocetus seu A DONIS Bello-nii, qui cum Urticis plurimum delectetur, & istæ circa littora inter cautes hæreant, mari profundius mergi recusat, in rupibus Bononiæ, in cavis cautium quiescit.

Species illarum sunt plures, quarum una *Cristata* est Masiliæ frequens, primo aspectu Gobium referens. Cute glabra obducitur. Vulgus *Glinos* vocat, colore est subrufo, ut Scorpæna multis aliis coloribus confuso. *Dentes* habet ut Scarus, firmos, continuam tergoris *pinnam*, ac nescio quid supra oculos, quod veluti à pellis laxitate procedit, laterum pinnae inversas, duas sub ventre duabus tantam cirrhis radiatas. *Cristati* caput ad Chamæoleonem accedit, in cujus cacumine *pinnam* Galli cristam referentem videas. *Dentes* habet anteriores acutissimos.

Cauda pinnam, & laterum rotundam, sub sterno duas; alteram in tergo continuam, maximè latam. *Branchias* tectas, & parvo foramine pervias, sed & detectæ quatuor numerantur utrinque. *Cute* integitur laxa, multis coloribus ut Draco variegata. Chamas & conchyliis conficit: sed & urticis interdum pascitur. Triduum vel quatrimum absque aqua vivit.

Tertium Exocati genus, piscatoribus Byzantinis *Glini*, aliis *Chelidonii* nomine venit.

Rarò sex digitorum longitudinem, & duorum pollicum crassitiem excedit. *Squamis* caret, & lituræ melinæ cyanæ & fulvæ per tergus diffunduntur. *Pinna* tergoris continua est & mollis, caudæ & laterum latæ, varii coloris omnes. *Branchiæ* sunt connectæ Spine exterior, ut in Dracone marino, duobus aculeis obfirmatur: sed ab eo dissidet, quod quilibet aculeus duobus serratis denticulis repandis & aduncis fulcitur. *Caput* habet polymitum, *Os* grande, inferiorem *maxillam* latam & planam. *Dentes* Glini priore aliquantulum minores. Dum scinditur, *branchias* non ostendit integras sed rudimenta coloris paulò magis rubra quàm in Muræna. Non malè ad *Basiliscos* Oppiani referrentur.

Arift. H. A. l. 9. c. 55. & Scallig. in Arift. l. c.

Tab. XVII. 4.

PHOLIS à muco ita dicitur, quem emittit. *μυκωδότης* ὑπὲρ αὐτοῦ ἐστὶν ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ θαλάμου. In circuitu ejus is concrevit, ac fit quasi cubile. Antipoli & ab Italis *Barvosa* vocatur. Alauda paulò major est, dorso fusco, cute lævi, maculosa, ventre pallido. Pinnis

aliisque partibus à superioribus non differens.

Nec abludit ab his SCORPIODES Rondeletii sic dictus, quod capitis forma Scorpioni marino similis sit, totidemque supra oculos apophyses licet molles habeat. Galli *Leporem marinum*, quia rostrum terreni leporis *μυρμηκῶν* sive *scissura* admodum simile habet, nuncupant. Differt à Scorpio dentibus, quos ferratos quidem habet, sed renues & densos admodum, & in superiore maxilla duos exertos, ab eodem & Galerita pinnae dorsi magnitudine, duabusque ejusdem pinnae nigris maculis distinguitur. Littoralis est, muco vescitur & aqua.

TITULUS III.

De Piscibus Marinis Littoralibus.

CAPUT I.

De Squammosis non planis.

ARTICULUS I.

De Mullo.

Non minus benè primum *Mullo* inter littorales pisces locum dari, quam Scarò inter saxatiles datus est, inferius patebit. *Nomen* apud Latinos non tam à mulleorum colore, (calcei erant quibus priores Albanorum Reges, postea patricii usi sunt) quod Feneſtellæ teste Plinio placet, quam à mollicie invenit. Servitutis est indignatissimus, ut Columella loquitur, & in piscinis nihil vel parum saltem crescit. Græcis *μύλα* non *μύλα*, & *μύλα* quod de scæmina sumendum est, quod ter pariat. Hinc Oppianus *μυρμηκῶν* ἰσχυρὸς γὰρ *μύλα* dicit; vocatur. Cretensium vox *μυρμηκῶν* ex Græca & Veneta composita est. An *μύλα* dicantur, quod Hesychius innuere videtur, cum Triglas Græci *μυρμηκῶν* cognominent, in medio relinquo.

Tab. XVII. 5. 6. Tab. XVIII. 4.

Plin. H. N. l. 9. c. 17.

Oppian. Hal. l. 1. v. 590.

Duo ipsorum sunt genera. Alii sunt *Barbati*, quos *μυρμηκῶν* vocant, quique sola suæ bonitate, siquidem alii alga, alii carne vescuntur, differunt. Unde *Lutarii* apud Plinium nomen. *Imberbes* alii, quos quidam *μυρμηκῶν*, *μυρμηκῶν* Sophron, & quidem, *μυρμηκῶν*, quod umbilicus podexve aut magis quam aliis congeneribus pater, aut minus rotundus est; *μύλα*, quod in summo mari natantes tranquillitatem promittant, nuncupat. Dari tales Salvianus negat, nullum alium ex veteribus ejus meminisse, perperam prætendens. Xenocrates enim saxatilem barba destitui innuere videtur, dum pelagium describit. Mullastros rectè dixeris, quorum alium imberbem, alterum à squammis asperum Rondeletius facit. Figuræ est totus oblongiusculæ, magnitudinis me-

Invenalis
in Satyris.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 18.

Oppian.
l. c.

Sueton.
in Tibe-
rio.

Seneca
N. Q. l.
3. c. 17.
Plin. H.
N. l. 9. c.
17.

Scalig.
Exert.
226 l. 15.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 17.
Ælian.
H. A. l.
2. c. 41.

mediocri; binas libras raro exuperare, apud Plinium habetur, quadrilibris Seneca, sex librarum Iuvenalis meminere. Si verum est, octoginta librarum in mari rubro captum, ut Lucius Mutianus apud Plinium prodidit. Alterius is generis fuerit necesse est, dorso repando, unde gibbosas Epicharmus in nuptiis Hebes dixit, ventre plano albicante, cætera purpureo, hinc Mullorum apud Oppianum. Matronus Parodus colore miniaceo fecit. Squammis magnis, tenuibus, ferratis, obliquo situ dispositis, facile ut apparet deciduis, robustis tamen. (Tiberius piscatori sibi secreto agenti insignem adferenti Mullum, eo faciem perfricari iussit) Pallentes eadem seu ad viredinem vergentes, virgis quibusdam paralellis insignitæ. Si vivus desquametur, colorem sanguineum sortiri, hinc apud Plutarchum, & apud Nausicratem nomina, Massurius auctor est. Mortuum versicolori quadam & numerosa varietate spectari, rubescendumque squammarum multiplici mutatione pallescere, utique si vitro inclusus spectetur, à Seneca & Plinio proditum est. Caput habet repandum, multis velut cancellis aureis exornatum, in quo spinam Cani similem, quæ renibus apposita, miro sit remedio, Marcellus Empiricus asserit. Os parvum, edentulum, oculos mediocriter rufos, in Aldrovandi ex Hispania misso, nigricant. Duo cirri cutacei albi in quibusdam, in nonnullis rubri, molles, rotundi, longi, atque barbæ similitudinem gerentes propendent. Branchiæ utrinque sunt quaternæ, ad quas pinnae sunt duæ aurei coloris, in ventre totidem candidæ; à podice rufus alia; in tergore duæ, prior ex firmioribus, posterior mollioribus aculeis constat.

Cauda rubet, & in lunatam pinnam degenerat, ac propterea laterum pinnae, velut in acutum tendere Bellonius autumat. Interiora si spectes, gula est parva. Ventriculus cum innumeris appendicibus itidem, hepar ex albo rubescit, splen exiguus est & nigricat. Scaliger, sinistro illud ventriculi lateri adiacere, dextro hunc, scribit. Intestina sunt mediocria; cor triangulare.

Quæ huic adscripsimus Minori quoque Salviani Mullo conveniunt, hoc discrepat, quod purpureo pingatur, aureis lineis careat, & lituris quibusdam flavis ac liventibus notetur, & squammis medico contactu deciduis vestitur.

De Loco ambigitur inter Authores. Septentrionali Oceano & proxima occidentis parte gigni Plinius dixit; Galeno sunt pelagii. Oppiano modo humilia prope littora degunt: modo inter saxatiles cum Seneca referuntur; nec abludit Ælianus, ei à loco, quem incolunt nonnulli,

& rara tubercula, aspera illa habere, scribit.

Per incerta maris spacia vagari, & circa littora, corundemque saxa, ut plurimum vel quosdam duntaxat degere, verisimile videtur. Sanè imberbem inter saxatiles numerat Xenocrates, & Cantharo tribuit Ælianus; petris semper asperis delectatur apud Oppianum idem: quam tamen littoralibus annumerare Aristoteles non dubitavit.

Procreantur & in marinis lacubus, detinuit & in vivariis Hortensius ad Baulos, & maiorem sibi habebat curam, ne ipsius esurirent Mulli, quam Varro se habere profitebatur, ne sui in rosea esurirent asini. Gregalis est & autumnus viget. Pamphagi sunt, & præter cænum, unde ipsi Sargus, comes, ostrea, algam, & conchas, quibus apertis inhiant, piscium & hominum cadaveribus vescuntur, & magis sordidissimis & male olentibus, adde betarum folia, delectantur. De cadaveribus apud Oppianum & Ælium legimus, & videntur id pugnae navales & naufragia, quæ magna copia sublequi solent, Rittershusio declarare. Antiphanes tamen inter Helenæ cibos, quod homines non infestarentur posuit. Pisces insectari nullum dubium Orphum inquit Oppianus.

Vescitur lepore, marino unum tantum animalium ut non intereat nullus piscis, tenera se duntaxat & ingrator viliorque fit, verba sunt Plinii. Dum itaque carnivorum Aristoteles negat, ex iis, qui vel præter carnes nihil attingunt, vel viva tantum maris animalia venantur, eximere videtur.

Ter parere anno constans est Authorum opinio, his certe toties foetura apparet. Aristotele, in cano, itaque sero parere, diu enim frigidum est, addidit, solus Ælianus apud Aldrovandum, sterilem reddi postquam ter pepererit, natis in utero vermiculis, qui semen exedunt, prodit, quod mihi nondum apud eundem invenire contigit. Antipathiam cum lepore marino habere ex præcedentibus cognosci potuit; addit Aphrodisæus Torpedinem, cujus viribus stupefactivis ista resistere creditur.

Insignis est prodigo veterum luxu seu precium, seu coquos seu lances consideres. Argenti pari pondere sæpius à privatis etiam Quiritibus emptum, cum pedis longitudinem superaret, Iovius prodidit. Asinius celer Claudio Principe unum octi millibus nummum, id est, quadringentis plus minus Caroleis, mercatus est, licet magis luxuriam æstimare, quod Plinius suis temporibus neget facile Mullum repertum, qui duas libras excederet. Crispinus Ægyptius ex servili conditione ad equestrem dignitatem Domitiani indulgentia evectus,

Ælian.
H. A. l.
1. c. 26.
Oppian.
Hal. l. 3.
v. 340.
Arist. H.
A. l. 8. c.
31.
Varro R.
R. l. 3.
c. 17.

Oppian.
Halicut. l.
3. v. 435.
Ælian.
H. A. l.
2. c. 41.
& l. 12.
c. 42.
Ritters-
hus. ad
Oppian.
l. c.
Oppian.
Halicut. l.
3. v. 188.
Arist. H.
A. l. 9.
c. 37.
Plin. H.
N. l. 9. c.
17. & 15.

Arist. H.
A. l. 6. c.
17.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 17.
Macro-
bius.
Saturn. l.
3. c. 16.

Juvenal.
Satyr. 4.
Seneca
Epist. 96.
Sueton. in
Tiberio.

Mullam sex millibus emit

Aquantem sane paribus sestertia libris.

Publ. Octavius ingentis formæ (quatuor pondo & ad selibram esse aiebant) à Tiberio Cæsare in macellum missum, quinque millibus sestertii mercatus est. Idem tres, triginta millibus nummum vānisse, graviter conqueritur & annonam macelli Senatus arbitratu quotannis temperandam censet. Nec satis soluta luxuria videbatur, nisi & coqui maximo condicerentur pretio. *Reputatio hæc inquit Plinius, aufert transversum animum ad contemplationem eorum, qui in conquestione luxus, coquos emi singulos pluris quam equos queritabant. At nunc coqui triumphorum pretiis parantur, & coquorum pisces. Nullusque prope jam mortalis aestimatur pluris, quam qui peritissime censum Domini mergit. Lances quibus inferebatur, Chrisendeta Martialis vocat, vel crustis aureis ornabantur; vel gemmatæ fuere; gemmæ auro consertæ & contestæ tenebantur, ut Turnebus explicat. Non eadem tamen omnibus præstantia. Polluci Ionici maxime placent. At Etio Syncero qui ad rupes Herculeas capiuntur. Nausicari Æxonici: Æxonis Magnesiæ urbs est: sed Cratinus eos improbat. Archestratus laudat Tichuntinos; Tichus castellum prope Tachinam Campiæ oppidum est. Corsicæ & Taurominitanæ rupes à Juvenale celebrantur.*

Plin. H.
N. l. 9. c.
17.

Martial.
l. 2.

Turneb.
Adv. l.
14. c. 3.

Juvenal.
Satyr. 5.

Perothus præstantissimos in mari Tyrrheno juxta Corniculum, & Tarquinius capi prodidit. Iovius Romæ hyeme & suburbano mari captos maxime prædicari, Ligusticis, Venetis, & Neapolitanis non eam saporis gratiam esse, quamquam multo grandiores in convivia veniant, scribit.

Sed & longius à littoribus captis sua quoque gloria. Purior enim aqua in causa, corporis rubicundus, igneus, aureusque fulgor argumento. Magnas parvis gulæ proceres præferebant, seu propter majora capita, & jecinora; summopere ista expetita ex Galeno habemus: seu quod ita subtilioribus pabulis placeret, seu ut in explebilem gulam preciosissimo obsonio explerent, quas Philoxenum Poëtam apud Dionysium fecisse legimus. Heliogabalus non integros, sed quod præcipue stupendum Lampridius scribit; barbas eorum plenis discis, palatinis suis apposuit.

Galen. de
Aliment.
facult. l. 3.
Achias l.
2. c. 79.

De carnis qualitate inter scriptores non convenit. Xenocrates obsoniorum præstantissimum, stomacho idoneum, origratum, boni succi, carne plana, difficilem ad corrumendum, mediocre ad excernendum pronunciavit. Celsus medium inter duras & teneras carnes habentes reponit. Diocli, Philotimo & Psello difficulter concoquitur. Durissima est & valde friabilis, boni nutrimenti, si bene concocta fuerit, Galeno. Apparatus ad Oeconomiam pertinet. Olim

parum videbatur recens Mullus, nisi qui in convivia manu moreretur. Vitreis ollis inclusis offerebantur; & observabatur morientium color, quem in multis mutationes mors luctante spiritu vertit. Apicius ad omne luxus ingenium mirus, in lociorum garo (nam ea quoque res cognomen invenit) necari eos præcellens putavit.

Seneca
Quæst.
Natur. l.
3. c. 17.

Venit & inter Remedia. Sanguinis & hæmorrhoidum fluxus promoveret. Sæpe sumptus oculorum aciem hebetat, Vinum in quo suffocatus est inter virilis impotentia causas, numeravit Trepiates, nec mulieres si biberint concipere; ideo Dianæ in sacris offertur. Assus torminosus peculiariter prodest, à Tralliano dysenteria hepatica laborantibus præscribitur. Carnes ex capitibus decoctæ & cum melle subactæ, ani tollunt vitia. Percussis denique à Passinaca cum lasere medetur.

Impoten-
tia virilis.

IMBERBEM duplicem nobis descripsit Rondeletius. Prior, quem Occitani Imberago à rubore, quo ebriosorum facies inficitur, vocant, rarus est, veteribus parum notus. Hirundini & Cuculo corporis figura similis, colore magis rubro, capite magno, stellulis celato. Oculis magnis, Ore parvo, edentulo, pars inferior Cinnabaris colore inficitur. Os branchias operiens in aculeos ad caudam spectantes terminatur, ad quas pinnae duæ sunt rubrae cum appendicibus aliquot, in ventre duæ alia. Cute aspera & rubra in dorso & lateribus contegitur. Ventre est candido, ad quem à dorso lineæ multæ ducuntur. A capite ad caudam dorso medio acutorum ossiculorum ordines, cavum efficiunt, è medio pinna rubra aculeis ferratis constans erigitur, quod non nisi in Sagittario videbis; quam alia veluti è mollioribus pilis constans sequitur. Cauda rubra est Scorpionis caudæ similis. Ventrículo parvus cum multis appendicibus. Venter vere multis ovis distenditur.

Alter à squammarum asperitate, Asper nominatus, corpore est brevi, tereti, digiti magnitudine, colore minui vel valde purpureo. Capite, Branchiis, pinnis descripto similis, squammas habet parvas, ferratas, oblique litas, à capite ad caudam lineam ex squamis contextam, pinnas ad branchias extra candidas, intra ex viridi nigrescentes. Ventrículo cum appendicibus paucis parvum, hepar candidum, & sine felle. Splenem parvum ex rubro nigricantem.

Diversus ab hoc Aldrovandi Asper Mullus est, ut pote totus fere ruber, capite aureis cancellis ornatus, in vertice aculeatus, dorso planus & asper, ventre candicans, branchiarum ceruleis striis pictis, cætera flavescens.

Aldrov.
Histor.

ARTICULUS II.

De Hirundine & Cuculo

Tab.
XVII. 8.
9.
Plin. H.
N. l. 9.
cap. 16.

Quamnam sit Græcorum Hirundo, seu ut illi vocant *χουδὴν* ambiguntur. Rondeletius eandem cum *Lucerna* Plinii, quod noctu luceat, facit, & in Plinii loco transpositionem arbitrantur. Aldrovandus eum piscem esse, quem pro corace sive corvo Salvius, pro *Lucerna* Gesnerus posuere, iudicat, & Hirundinem Plinii ab Hirundine Græcorum distinguit, illamque Rondeletii Mugilem alatum, Bellonii & Salviani veram Hirundinem opinatur. Ut ut sit, videtur *Lucerna* dici, non quod lingua ejus per os exerta tranquillis noctibus luceat, (piscibus enim explanata ista, si Aristoteli credimus; & fieri id, piscatores negant,) sed quod vel pinnae versicolores noctu fulgorem quandam emittant, vel quod speciem antiquæ lucernæ gerat, vel denique quod oculi ejus noctu luceant, quod verissimum esse iudico. *Caponem* Romani à capitis asperitate & magnitudine dixerunt.

Arist. l.
2. de part.
ib. An.
mal. c. 16.

Dua ipsius sunt species, quæ in omnibus ferè cum cuculo conveniunt. *Ore*, *rostrum*, *capite* osseo, anguloso, cæato, aculeorum, pinnarum, cirrorum cartilagineorum numero & loco. Maxima in appendicibus, utrinque ternis, similitudo: in eo distinguuntur, quod binæ *rostri eminentia*, quæ in cuculo longiusculæ sunt, in hoc vix conspiciantur, pinna lateribus hærens, primum sit viridis, in extremo cærulea, tergus quoque variegatur. Cuculus denique sæpè tres libras attingat, duas nunquam hirundo. *Squamis* tam exilibus teguntur, ut Gesnerus pro his asperam habere cuticulam scripserit.

Altera Hirundo duas latas & cæruleas ad latera pinnas, Milvinis breviores habet, has per medium fere corpus expandit. *Corpore* quoque est recurvo, & crassiore, grandiore ventre.

Ælian.
H. A. l. 2.
c. 3.

Solitarios esse caput arguit, singuli & pauci capiuntur. Cum aliquid metuunt, ex mari exilire dicuntur, sed humiliter volant.

Tab.
XVII.
10. 11.

CUCULUM Græci *κικυλῶνα*, seu à sono, quo avis ejusdem nominis more obstreperit, ut Aristoteles & Athenæus testantur, seu quod cum retibus capitur vocem *κῆ* exprimat, dicunt. *Pfella* *κικυλῶνα* nominat. *Typhon* apud Athenæum cum *κῆ* sit similis, cum *Trigola* eundem à quibusdam haberi prodit.

Totus piscis rotundus est carnosusque, vix tres libras superat. Toto corpore præterquam in medio latere, in quo virga ex tenuibus squammis contexta protenditur, glaber est, in dorso à capite ad caudam duo squammarum ordines deferuntur. *Caput* ipsi magnum, osseum, angulosum, totum

cælatum, alicubi *aculeis* munitum. *Rostrum* in duas longiusculas eminentias semicirculum constituentes terminatur. Super utrumque oculum supercilii loco brevis, sed acutissimus & durissimus aculeus extat.

Utrumque branchiarum operculum alio & quidem longiori armatur *Maxilla* extrema sui parte asperiores dentium vice funguntur. Ante pinnas, cartilaginei cirri, utrinque terni dependent. *Ventrem* habet planum. *Caput*, dorsum, latera & pinnas rubra. *Ventriculum* cum multis appendicibus satis carnosum. *Intestina* lata, inter se convoluta, & multa pinguedine obducta, *hepar* subalbidum sine *felle*. *Splenem* rubrum & parvum.

Littoribus ab Oppiano accensetur. Aristoteles & Ælianus inter illos & pelagios ambigere dixerunt. Inter Brasiliam & Portugalliam densis agminibus volant, & aliquando milleni, sæpè centeni capiuntur. Pinnae magnitudine adjutus in nando celer est.

Oppia.
Halicut.
l. 1. v. 97.
Arist. H.
A. l. 8. c.
13.

Carnem habet plurimam, albam, duram & siccam. Diphilus Milvo præposuit, quia friabilis, haud temere salubrem censeas. Ab Hippocrate in pituitosis morbis conceditur. Romæ frixus & aurantii mali succo irroratus, editur, quidam nec elixum aspernantur.

ARTICULUS III.

De Milvo, Hirundine Plinii, & Lyra.

MILVUS seu *Milvago* Plinii idem est cum *Hirundine* Græcorum Rondeletii Aldrovando, Græcis *χουδὴν*. Oppiano id est Accipiter dicitur, quod Accipitris species inter aves Milvus sit. *Pinna* caudaque expansis Milvum avem omnino refert, latis nimirum & maculosis. *Corpore* est rotundo, oblongo, majori ex parte nigro, rubescente, aliquando omnino rubro. Sesiipedalem mensuram, vel maxime auctus non excedit. *Caput* habet osseum, quadratum, durum, asperum cujus pars posterior duobus iisdemque magnis & robustissimis aculeis, ad caudam spectantibus armatur. *Branchia* quæ tectæ, opercula ossea in duos aculeos robustos desinentia gerunt. *Pinnae* stellulis maculisque variis asperguntur: *Squamme* osseæ, asperæ & triangulares serpentium more inter se committuntur. *Cauda* unica atque lata pinna terminatur. Quantum ad interiora, *Lingua*, & palatum splendore Sandaracum vel Cinnabarim superant, his Noctu lux, ac si candentes carbones ore continerentur. *Ventriculus* mediocris multis appendicibus munitus est, *hepati* pallido vesicula fellis committitur. *Lien* est oblongus & subrubus. *Uterus* bifidus, ovis rubentibus refertus. *Cor* Angulatum.

Tab.
XVII.
11.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 5.

Qui

Tab.
XXIV.
3.

latam. *Squammas* gerit rotundas tenues & latas. Superior *maxilla* in tubi modum cervici veluti infarcta est, neque cranio inhæret. Cum oscitat exeritur, postea contrahitur. *Dentes* quoque habet acutos, quatuor exteriores parum falcantur, molares, qui rotundi & obrusi, duplici ordine disponuntur. *Interiora* si scruteris, sunt ei lapides in cerebro, *linguæ* in ore veluti rudimentum, *hepar* sine felle. *Cor* angulatum, vesica aëre plena. Numenius *scipias* quasi cristatum dixit, quod ea corporis pars, quæ cervici respondet, sublimis sit & alta.

Quem *Aldrovandus* exhibet, is *pinnis* omnibus tergo & cauda rubet. *Oculorum* ambitus ruberrimus, argenteis lituris conspergitur. A *branchiis* ad caudam linea excurrit, aurea, serrata. *Ambigit* inter littorales & pelagios, inter hos *Mnesitheus* locat. *Oppianus* in faxis degere scribit. Quod ex Indico mari salitum afferri *Oribasius* prodidit, de illo potius, quem *Syenitæ* in *Ægypto* sacrum habent, coque, quod una cum incrementum *Nilo* apparens, incrementum ejus denunciet, abstinent, intelligendus est.

Visitat alga & luto, sed & *sapiolas*, *squillulas*, *lorigunculos* appetit, *Echinis* an vescatur, quod nimis aculeati sint, dubito. *Isidorus* tam duros ei dentes tribuit, ut & ostreis in mari aliquoteat. *Hyeme* prægelida, quod lapidem in capite habeat, latet. Inescatur *channis* five *hiatulis*.

Quid sibi *Aristoteles* velit, dum citante *Athenæo* *Pagrum* id est *vere rigere* scribit, difficile intelligi potest, nisi *videtur* parere vere innuatur.

Archestratus *Syrio* exoriente comedendas esse suadet. *Suaves* & media carne *Hicesius* posuit. *Gellius* inter delicatos habuit. *Sanazarius* ex *Dicarchi*, nunc *Puteolos* vocant, littoribus, celebrat.

ERYTHRINUM, qui peculiare hoc nomen à colore invenit, moderni *Græci* *αἰθριν*, *Cyrenæi* auctore *Zenodoto* apud *Athenæum* *αἰθριν*, auctore *Clitarcho* *αἰθριν* vocarunt. *Thodorus* satis ombigue *Rubeculam*, *Plinius* rectius *Rubellionem* dixit. Idem ne cum *Ruburno* & *Ruscupa*, de quibus *Murmeli*, non disputo.

Palmi mensuram raro excedit. *Ruber* est ut *Mullus*, dilutior tamen, unde fortè *Oppianus* dixit, latus ut *Aurata*. *Rostrum* habet acutum, sed non valde extensum. *Os* parvum, mediocribus dentibus munitum. *Caput* utrinque compressum. Ante oculos, qui magni, foramina patula. *Branchia* quæ in dorso unica est, multis *aculeis* horrescit. *Bellonius* duodecim, quindecim *Rondeletius*, viginti duos, *Salvianus*, novendecim. *Gesnerus* numerat. *Cauda* in lunatam pinnam desinit. Intus candidissimus est.

Peculiaris est mari, hyeme in alto degit,

æstate circa littora capitur. Diversus est ab isto ille qui in lacu *Suerino* alluente, non procul Oceano *Germanico* visitur. Carnivorus est. *Cancellis* & aliis pisciculis infidiatur, nec locustis & cicadis parcat. *Grægalem* esse *Athenæus* *Aristotelis* auctoritate neminit. *Sexu* non distinguuntur. In omnibus enim reperiri ova *Aristoteles* auctor est. *Parium* ineunte æstate. Cum se sequi palmum exceßerint in dentes seu *Synodontas* abire, falso *Jovius* credidit. Ad formam duntaxat coloremque accedunt, minusque solito rufi, canescunt veluti.

Quantum ad usum copiosum alimentum præbent *Xenocrati*: nunc inter mediæ substantiæ pisces numerantur, si sint recentes, frigi & frigidi inter saporis jucundi cibos. *Aceto* & aromatibus in *Gallia* conspergere mos est. *Plinius* in cibo sumptum *Venerem* concitare & alvum sistere, quod à *Xenocrate* mutuatus est, scribit, in vino putrefactus, vini tedium adfert, cui illud propinatum fuerit.

ARTICULUS V.

De *Acarnane* & *Orpho*.

Piscis quem *Hicesius* apud *Athæneum* *Acarnanem* vocat, *Diphilo* *αἰθριν*, *Athenæo* alicubi *αἰθριν* ex *Gallia*, *Ethymologo* *αἰθριν*, *Plinio* *Acarne*, dicitur. Scribitur quoque *αἰθριν*, *αἰθριν* & *αἰθριν*, sine dubio mendose. *Mugilibus* infestum esse, si is est, quem *Aristoteles* innuit, & æstate extenuari, veteres prodidere.

Rondeletius pro eo piscem exhibet, album, *squammas* argenteis, ore mediocri, tenuibus dentibus, rostro aquilino *Pagri* modo, spacio quod inter oculos est compresso, oculis pro corporis proportionem magnis, aureisque pinnis candidis.

Erythrino adeo similis est, ut pro eo vendatur. Capitur æstate & hyeme, illa extenuatur, & laborat.

Carne est candidissima, media substantia, facile concoquitur & distribuitur, & bonum succum gignit.

ORPHUS *Polluci* *αἰθριν*, vel quod magis *Atticum* est *αἰθριν*, *Gazæ* *Cernus*, quis apud veteres piscis fuerit, difficile est conjicere, pauca enim quæ ad cognitionem ejus faciunt, reperias. *Benedictus* *Tincis* similem credidit. Alii *Capitonem* ab oculorum aspectu & rubro colore dixere, quidam quia majorem *Capitone* opinantur, sui generis piscem esse tradunt. *Gellius* ab eo qui hodie in *Græcia* ita vocatur, non distinguit. *Rondeletius* majorem hunc veter. *Orpho*, qui à *Mullo* devoratur, (viginti enim libras pendet) nec littoralem postquam dixisset, piscem *Pagro* similem, colore ex purpureo rubente, oculis magnis, dentibus serratis, *podice* adeo parvo, ut rimula vix animad-

Arist. H. A. lib. 4. c. 11. l. 6. c. 13. l. 2. de gener. An. c. 4. Plinius. H. N. l. 9. c. 16.

Plin. H. N. l. 32. c. 10.

Tab. XVIII. 7. 8. Athen. l. 7. & 8. Diphlos. Aristot. H. A. l. 1. c. 9. Plin. H. N. l. 32. c. 11.

Oppian. Hal. l. 1. v. 140.

Oppian. Hal. l. 3. v. 185.

Tab. XVIII. 6.

madverti possit, feminis meatibus carentem, pro eodem ponit; eidemque omnia quæ veteres de suo dixere, competere scribit. Bellonius denique alterum compressum magis quam teretem, squamis asperis, & corpori firmiter inhærentibus tectum: *Capite* rubeo; *pinnis* tergoris, laterum *ventris*, & *cauda* variis coloribus insignibus; labris scabrosis, maculam in radice caudæ gerentem, quem Cretenses. *Cheluda*, *Acheluda*, & *Petro psaro* nominant, pro eodem obtrudit.

Ut ut sit, de veterum Orpho scimus, Aristoteli & Athenæo littoralem, Aliano marinum, Ovidio pelagium esse. Numerius thalamis & cavernis delectari; Oppianus in petris cavernosis, quæ plenæ sunt Chamis & patellis, degere scripsit. Carnivorus idem. In Myrinensi Lyciæ sinu ad Apollinis templum, ad sparsas vitulinas carunculas adnotant, easdemque comedunt; brevi tempore adolefcit, hyeme latet; in biennium *vitam* non prorogat, & tarde moritur, ideo *ἰσχυρὸν* Oppiano.

In *ciborum* fuit deliciis. Nam & Dorion Opsophagus inter cæteros veluti ex piscibus, Deos ponit; & Lynceus Samius Attico Glaucisco, Ellopem & Orphum Rhodios opposuit, & Aristophanes inter regios pisces retulit. Athenæus *Ἐχθρὸν, πικρὸν, γαλῆρον, δασύ, δασύ, πικρὸν, & ἰσχυρὸν* facit, quæ sequuntur transposita esse, ut Rondelerius observavit, videntur, qui enim potest aliquid esse *πικρὸν* & *δασύ*, glutinosum, & concoctu facile. Philotimus tamen inter duræ carnis pisces reposuit.

ARTICULUS VI.

De Synodonte sive Dentice.

Tab. XVIII. 9. **S**YNODON piscis *πικρὸν τὸ ἰδιόμα* nomen invenit, quod si prima syllaba per jota scribatur, *πικρὸν τὸ ἰδιόμα* & *δασύ* τὸ *ἰδιόμα*, quod dentibus noceat, ita vocatur. Gaza *Denticem*, Albertus *Dentatum*, alii *Dentalem* nominavere. Plinius Græcam nomenclaturam retinuit. In Adriatico mari in insignem magnitudinem excrevit, in littore Auratam non superat. Vulgarium pondus trium aut quatuor librarum esse solet: decem librarum pondere observavit Salvianus. *Dorsum* habet repandum; latera satis compressa. *Caput* nonnihil fastigiatum, in quo lapides, qui *Synodontides* vocantur, gerit; *rostrum* acutum, *Os* satis amplum, valdeque denticulatum, præter minores ac ferratos, superior *maxilla* quinque aliis, inferior octonis permagnis, caninis simillimis armatur. *Oculi* sunt magni, branchiæ utrinque quaternæ. In *dorso* *pinna* unica viginti aculeis munitur. *Cauda* est falcata. *Venter* argenteus, unde album Numerius vocavit: latera & dorsum ex albo rubent. Unde ruber Ovidio *ἰσχυρὸν* Epi-
charmo.

Arist. H. lib. 8. c. 13. l. 5. c. 10. l. 8. cap. 2. & l. 8. c. 15. Athen. Dipnol. l. 3. & 7. Oppian. Hal. l. 1. Ælian. H. A. l. 5. c. 18.

Aristoph. in Vespis.

Galen. de Alim. l. 3. c. 30.

Plinius H. N. l. 37. c. 10.

Aldrovandus duas alios fortè *congeneres* huic addit; quorum priori *tergus* viride, *Synceput* aureum, *branchiarum* ossa violacea. Alteri os intus & extra subatrum, supra id macula cærulea: sub branchiarum pinnis macula insignis, purpuraceis, aureis decorata squammis. *Venter* flavus, *squamme* argenteæ.

Pelagium quidem Columella facit cum Ovidio, sed Aristoteli & Oppiano, quibus littoralis est, suffragantur piscatores. Probantur ex Dalmacia & Illyrico, præsertim Salana atque Tragurio Columella Punicas & indigenas nominat.

Carne tandem vescitur, & tanta cum aviditate, ut ventre in os procidat. Polypi carne inprimis delectatur, quem cubili suo extrudere non possit, ante ostium tanquam mortuus fluctuat, branchium extendentem, arripit, sed & in ostrea ac pisces innoxios grassatur: nec Boce, quod ab Oppiano proditum, parit. Gregales sunt, & *συνοδόντες* solent: per adolefcetes *ἰσχυρὸν* *ἰσχυρὸν*, separatim à reliquis natant. *ἰσχυρὸν* *ἰσχυρὸν* firmiori ætate inter se vitæ communitate junguntur. Cibo à piscatore demisso, in orbem consistente, & signum quasi eo arripiatur, dant.

Ab Antiphone inter lautissima obsonia recensentur. Hicesius copiosi esse alimenti, & difficulter excerni scribit. In Italia peculiare condimentum quod amarinare vocant. In Dalmatia concisus & semicoctus multo croco & perspicuo gelu conditur, detestatum Aponensi obsonium.

Columella l. 8. c. 16. Arist. H. A. l. 8. c. 13. Oppian. Halient. l. 1. v. 170. Arist. H. A. l. 8. cap. 2. Oppian. Halient. lib. 3. v. 185.

Ælian. H. A. l. 1. c. 46.

ARTICULUS VII.

De Synagride & Chromi.

DE SYNAGRIDE pisce diversa sunt apud Autores opiniones. Theodorus Gaza pro eodem cum Synodonte sumit. Massarius & Gellius adeo similes, ut vix discerni queant, volunt. Rondelerius sola ætate distingui judicat. Diversos pisces vel ex Aristotele colligas, qui diversis in locis, duobus his nominibus uritur. De Bellonio tacebo, qui & modernos Græcos distinguere scribit. Antonius Gigas sequentem iconem pro Synagride misit.

Piscis erat insigniter dentatus, squammis undique latissimis, & facile deciduis tectus. *Capite* superius sanguineo, inferius ex albo & cæruleo variante. *Ventre* ex albo flavescente, lateribus candicantibus. Bellonius Synagridem Cyprini in modum, veluti circino ita circumductum, ut pro longitudine ac latitudine magis crassus appareat, facit. *Caput*, inquit, utrinque compressum habet, &c.

CHROMIS & CREMIS *ἰσχυρὸν* idem esse piscis, vel propter nominum similitudinem videtur. A grunnitu, quem edit ita dictus est,

Tab. XVIII. 10. Tab. XL. 11. Aldrov. de Piscib. l. 2. cap. 13.

Tab. XVII. 14.

est, quod & apud Isidorum, quicundem eum corvo marino facit, legimus; sed isne, quem Rondeletius describit, pinnis, spinis & figura Metaurino similis, oculis tamen minoribus absque macula in cauda, toto corpore nigricante; an is, quem Bellonius, Chromis sit, dubitatur. Accedit tamen huic Aldrovandus, sola grunnitus ratione habita. Tenuibus autem in squammis vestitur exauro nitentibus, ac cæruleum interdum colorem concinû vibrantibus. Binas (verba sunt Bellonii) *pinnas* gerit in tergore, quarum anterior quæ minor est, &c.

In herbosis degere Ovidius author est, quia immundum nominat, & luto gaudere credibile est. Virentibus herbis vescitur. Parit quotannis semel. Exquisito esse auditu apud Aristotelem legimus. Grunnire superius dictum est.

Vilem suam Chromin Rondeletius facit, Bellonii inter laudatissimos censetur.

ARTICULUS VIII.

De Aurata.

Aurata, seu Orata, Græce, *χρυσωμένη* quod iis in locis, ubi in cæteris animalibus supercilia esse solent, aureo colore resplendeat, Ephesiis teste Arcestrato Hefychio *χρυσωμένη* dicitur. Ad denas libras cum maximè adolevit, vix unquam pervenit. *Dorsum* habet repandiusculum, ex cæruleo nigrescens. *Latera* compressa, argentea. *Ventrem* lactei coloris. Partes *oculis* superiores auro, in adulto maximè, resplendent. *Dentes* anteriores sunt longi, rotundiusculi, ferrati, internæ utriusque maxillæ partes, plurimis offeis tuberculis duris & inæqualibus muniuntur. *Ventriculum* habet amplum cum paucis, ut Aristoteles notavit, appendicibus. *Intestina* ampla pinguedine involuta. *Iecur* magnum pallidum, à quo *fellis* vesicula, longa, pinguedine obducta pender. *Splenem* subatrum.

Aristot.
H. A.
l. 3. c. 17.

Aristot.
H. A.
l. 8. c. 13.

Athen.
Dipn. l. 1.

Aristot.
H. A.
l. 8. c. 2.

Plinius
H. N.
l. 9. c. 16.

Aristot.
H. A.
l. 8. c. 19.

Sic est marinus piscis, ut & in lacubus etiam marinis nascatur, quod tales convectis marinis feminibus, Romani replebant. Commachium Bonnoniensibus eas subministrat, & olim Velimus, Sabatinus, Vultinensis, & Ciminus eas procreabat. Sed & circa Berenicem Lybiæ fluvium, qui *αἰθρὴ* dicitur, inveniuntur.

Cibus ipsi sola caro. Tellinas & conchylia robustis maxillis frangere; Mænide tanquam ejus usu vehementer oblectetur capi, certum ferè est. Scari modo *ruminare* asserit, sed fortè sine auctore, Rondeletius.

Æstate circa fluviorum ostia *parit*. Æstus impatientia, mediis fervoribus, sexagenis diebus *latere* à Plinio prodictum est: tempus Aristoteles non expressit. Timidissimos esse captura ostendit. Recedente maximè sub Arcturi tempus mari, arborum

ramos frondibus vestitos, in arenam piscatores disigunt: accedente plurimæ attrahuntur, reciprocante ramorum tu, quiescunt, & ab imperitissimis quoque capiuntur.

Ælian.
H. A.
lib. 13.
cap. 28.

In precio fuere olim, Ephesiæ inprimis, quas Archestratus celebravit. Sergium Romanum patritium, cognomentum inde sibi adscivisse, quod carissimæ ipsi essent Oratæ, apud Varronem Columellam, Valerium Maximum, & Macrobium legimus. De *nutrimenti* qualitate non convenit inter veteres. Mnesithæus difficulter coqui, concoctam multum alere. Celsus duriores esse. Diphilus cum Melanuro, qui succi bonitate Sargo, Hicesio judice, minus nutriti, inferior est, proportionem habere, asserit. Ideo Rondeletius carne media esse pronunciavit, saxatili duriores. Nostra ætate marinæ & quæ hyeme capiuntur, laudantur. Lacustres pinguidiores quidem, sed lutum, quod in eo degant, olent. Apparatum in Aldrovando vide.

Macrob.
Sat. l. 2.
cap. 11.
Colum.
R. R.
l. 8. c. 16.
Athen.
lib. 5.

ARTICULUS IX.

De Sargo.

Sargo an *σάρκω* dicendus sit piscis, dubitatur. Is quem Melanura Hicesius accommodat, vocatur *σάρκω*. Rondeletius geminum nomen agnoscit, à multa carne id habere judicans. Sparo squammis tenuibus, lato corpore, linea à branchiis arcuata, pinna continua affinem Bellonius pronunciavit. *Rostro* acutiore, *dorso* magis repando, *ventre* prominentiore, *dentibus* latis humanisque simillimis, lineis quibusdam, unde *πυλινγισμὸς*, & macula juxta caudam nigra; unde *πυλινγισμὸς*, & *ἰπποπόνη* Aristoteli dicitur, distinguitur. *Colore* alias est argenteo. *Pinna* quæ ad branchias sunt rubescunt. *Branchiarum* exterius tegumentum spineum est. Hepar subrubescit: ab hoc *fellis* vesicula pender. *Lien* subniger est, & ferè circinatus. Ad multam magnitudinem excrecere assolet.

Tab.
XIX. 1.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 16.
17.

Aldrovandus binos exhibet. Prior *ἰπποπόνη*, pinnas omnes, præter eam quæ ab ano est, habet aureas; maculam juxta Uropygium violaceum, totum caput ad eundem colorem vergens.

Alter *πυλινγισμὸς* aureis & argenteis quæ ferræ figuram exprimit lineis, elegantissimè condecoratur, pleræque ad rubiginem vergunt. Gesnerus in *mortuis* lineas evanescere tradit. Ægyptio cum mari vendicat Festus, sed & in Adriatico nascitur. Pelagiusne sit, an saxatilis vel littoralis, inter Ovidium, Ælianum, Oppianum, & Aristotelem non convenit. Ita littore gaudere dicerem, ut & cautes sæpè frequenter, quod radiis solaribus ibidem commodius fruatur. Sæpe quidem *canno* à Mullo excitato contentus est, sed & carnivorum esse certum, quia

Ælian.
H. A.
l. 1. c. 17.
Aristot.
H. A.
l. 8. c. 17.

quia Lycostomo pisce inescatur. *Gregalem* *Ælianus* facere videtur: dum confertos capi scribit. Ad motum ut ut bene *Oppiano* dicatur, in evitandis tamen piscatoriis insidiis *ἡμετέριος* est, seu quod lineam ad scopulos terat, quod apud *Plinium* legimus: seu quod vel retibus proximus spei piscatorum illudat. *ἡμετέριος* sanè & pro voti, & pro linea cui hamus affixus est, sumitur. Plures sibi adfiscunt *uxores*, pro his tempore veno pugnant. Vere & autumnoparere, apud *Aristotelem* legimus, siquid aliter ab eodem dicitur, de *Sargino* non *Sargo* sumendum est. Tam vehementer capras amare *Ælianus* prodidit, ut ad illarum in aqua umbram, odore fortè illecti, adnatent, & saltu contingere conentur. Ne itaque mirere pellibus earum capi.

Fit eorum ab *Epicharmo* in nuptiis *Hebes* mentio. Et sanè grati esse stomacho creduntur, probique succi. Cæterum ægriusculè, quia durioris carnis, concoquantur. *Hydropicis* *Garyopontus* præscribit. Dentest gestatos dentium avèrtere dolores. *Kirantes* fabulatus est.

Adjungit *Aldrovandus* *Sargo piscem*, quem pro *Melanderino*, *Athenæo* nominato, si exemplar mendosum non est, (*Casaubonus* *Melanderini* nomen ab aliis exemplaribus exulare scribit.) *Rondeletius* depinxit. *Melanuro* iste similis est. Toto corpore nigrescit, circa caput ex nigro purpurascit. Cauda saxatiliū more in unam latam pinnam desinit. *Hepar* habet ex rubro candidum. Splenem nigrum, felaqueum, lapides in capite.

ARTICULUS X.

De Sparo.

Quem *Græci* *ἀσπάργος* vocant, quod est palpitare, ut *Eusthatus* author est, Latini *Sparum*, seu à spargendo, seu aliunde vocant: hunc eundem cum *Rhyade* *Aristotelis*, & *Æliani* *Aspargo*, sed perperam, *Rondeletius* facit. Nec enim vel speciale alicujus piscis nomen est, quod *Salvianus* opinatur; nec videtur isto vocabulo in singulari uti. *Pisces* verò, quos *Aristoteles* fugere quoties vel piscium lotura vel navis sentina ejecta est, quasi foedo tactos odore scribit, & quos *Gaza* modo *stutas*, modo *spargos*, aliquando *sufaneos*, id est, *ἡμετέριος*, quod fusim retibus capiuntur, vocat: ii sunt, qui frequentes quidem & simul natant, fusimque & retibus capiuntur, ducem tamen, quod *ἡμετέριος* proprium, non habent.

De *Aspargo* nihil apud *Ælium* invenies. *Gyllius* duntaxat *Rhyades* *Aspargos* interpretatus est, & multis errandi occasionem præbuit. Haud parvam cum *Aurata* & *Sargo* habet similitudinem. Ab illa, corpore minore & magis rotundo, rostro acutiore, & quod circa branchias nullam neque purpu-

ream, neque nigram maculam gerat, distinguitur. Ab hoc verò, quod ex auro resulgeat, lituram in cauda habeat, capite sit magis protenso, tres *aculeos* sub spina quæ est ano vicina ostendet, lienem rubrum, gracilem, oblongum, rectum, in dextro latere habeat, differt.

Littoralem *Oppianus* facit, *Plinius* inter marinos recensuit. *Ovidius* pelagium voluit, sed & marinis stagnis gaudet, inque iis frequenter capitur. *Gregalis* est, *carnivorus*, venatur & marinos pulices. *Æstate* circa saxosa littora parit. Haud olim ignobilis in cibo. *Coquus* apud *Antippum* inter lautissimos recenset. *Epicharmus* inter eos ponit, quorum ne stercora quidem fas sit *Dius* abjicere. *Diphilus* acrem esse *ἡμετέριος*, pronunciat, elixum coctu facilem, *ἡμετέριος* difficilem addit. Rarò ob parvitatem elixatur.

ARTICULUS XI.

De Mormyro & Cantharo.

DE *Mormyro*, qui *Oppiano* *μυρμύρος*, *Ovidio* *Mormyr*, *Gazæ* *Mormur*, pauca prodidere veteres. Quem *Bellonius* describit, *Constantinopoli* & alibi, nomine veluti per manus tradito, *Mormyrus* dicitur, videturque notas ab antiquis traditas. (*ἡμετέριος* seu maculosum *Oppianus*, *pictum* *Ovidius* nominat) sibi vindicare. Piscis est corpore quam *Aurata*, *Sparus*, *Sargus*, & *Melanurus* longiore, & minus ad latera compresso. Capite item (ut or verbis *Aldrovandi*) tenuiore & cæato, rostroque acutiore. Os medioere habet, dentes exiguos, labia crassa, oculosque medios, branchias utrinque quaternas, &c.

Littoralem esse, præter *Archestrati* apud *Athenæum* & *Oppiani* auctoritatem, quotidiana piscatorum experientia testatur. Nullum non cibum attingit, parva animalcula, conchulas, & minora crustacea venatur; nec à terrestribus sordibus abstinet. Parit æstate, capitur vericulis, & plagulis, ut *Plutarchus* ait. Retibus inclusus, imis in vadis, sulco, crebro caudæ motu depulsis arenis factò, subterlabitur. *ἡμετέριος* *Hiccius* facit, quia lutum olet, vilis nostro tempore habetur.

CANTHARUS *Græcis* antiquis *κάνθαρος*, & genere foeminino *κάνθαρις*, modernis *καύτης*. *Gazæ* *Scarabeus*, *Plinio* & *Ovidio* *Cantharus*, forte à coloris bartici & ferruginei similitudine, dicitur. Squammis integitur parvis, ex indico splendentibus. Caput & circa oculos partes ex nigro rubescunt. Labrum superius veluti in calva infarcitur. A branchiis ad caudam lineæ ducuntur subaureæ. *Bellonius* lineam armatam utrinque in lateribus, cyaneam esse tradit. Observati sunt lineis albicantibus, cyaneis, ex luteo

Oppian.
Hal. l. 1.
v. 109.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 11.

Tab.
XIX. 3.

Oppian.
Hal. l. 1.
v. 100.

Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 19.

Oppian.
Halicut.
l. 3. v.
126 A-
then. l. 7.

Tab.
XIX. 3.

Oppian.
Halicut.
l. 1. v.
132. l. 4.
v. 267.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 59.

Arist. H.
A. l. 5. c.
9.
Ælian.
H. A. l.
11. c. 11.

Tab.
XVIII.
11.

Arist. H.
A. l. 4.
c. 8.

Ælian.
H. A. l.
9. c. 46.

nigricantibus, rectis quidem, sed non ita conspicuis variegati. Internis partibus non differt à Sparo, & lapides habet in cerebro. *Versatur* in cænosis littoribus ac portubus, in quæ loca maris sordes fluctibus pelluntur. *Pamphagus* esse creditur. Nam carnes, panis, caseus, aqua & stercus in cibum ipsi cedunt. Turgent amore foeminarum, & quia Zelotypi acerrime pro suis conjugibus pugnant, sed non aliter, quam Menelaus cum Paride, pro una tantum, quod ab Oppiano & Eliano pro ditum est. Inescantur Polypo, aut Carabo in nassam vimineam indito. Ingratum succo Ovidius dixit. Mollis & præhumidæ carnis fecit Rondeletius.

Elia.
H. A. 1.
1. c. 26.

ARTICULUS XII.

De Salpa & Stromatheo.

Tab.
XIX. 76.

Salpa Græcis *σαλπα* & *σαλπη*, Hesychio & Phavorino quoque *βίβ. bos* vocatur, quod nomen ipsi ab Halionorum (maritimi populi Cariæ vicini) piscatoribus inditum est, si bene Pancratis versus apud Athenæum, correxit Gesnerus. Possit & *Chrysopleuros* ab aureo, quo per latera Salpa resplendet colore, dici. A cervice in caudam per argentea latera, aureis rubentibusque lineis, certis intervallis distinctis, decentissimè pingitur: Undo Aristoteli apud Athenæum *σαλπίπιδος*, *σαλπίπιδος* & *σαλπίπιδος*, Oppiano *σαλπίπιδος* hoc est, ut Lippius reddit, variis distincta tergora signis, dicuntur. Caput habet parvum & rotundum, dentes in superiore maxilla sedecim, in inferiore octodecim serratos firmos. Oculos aureos supercilia quodammodo virescentes, pinnam in tergo unicam longam, multis spinis asperam. Caudam bifurcam, linguam mediocrem, Squammis tegitur latis & varii coloris. Ventre & lateribus candicat, dorso ex cinereo nigricat. Interanea nigerrimo peritonæo continentur. *Hepar* est magnum, subrubrum, in tres lobos divisum, cui fellis vesica appendet. Splen nigricat. Vulva bifida est, ovis innumeris plena. Bellonius raro duas libras excedere scribit. In nullo piscium genere exactiorem servat: magnitudinem Salvianus, ideo forte à Pancrate *σαλπίπιδος*, æquales magnitudine longitudineve, quamvis Dalechampius facta ad pisces, quos nominaverat comparatione, id fieri credat. *Duo ipsorum* videntur genera, commune unum & omnibus notum quod descripsimus. *Minus alterum* quod in Narbonensi Gallia *Virgadella*, id est virgis seu lineis distinctum nominatur, quodque in stagnis marinis reperiri, & non nisi ætate à communi differre ex Rondeletio habemus. *Locum* si attendamus, herbofa laxantur arena apud Ovidium. Oppianus *βίβ. σαλπίπιδος* *οὐδὲν* *παρὰ* *τὴν* *αἰῶνα*, scopulos mari cinctos, musco humidos, illis adscribit. Aristoteles in mari & stagnis marinis locat. *Cibus* ipsi alga

Oppian.
Halicut.
1. c. v.
125.
Aristot.
H. A. 1.
8. c. 2.
& 1. 4. c.
8.

marina, porrum, ut apud Philosophum extat, stercus & alia foetida. Unde *σαλπίπιδος* & *σαλπίπιδος* merdivoram, & foetidam in nuptiis Hebes Epicharmus, obscenum piscem Plinius nominat. Semel anno & quidem autumno paulo ante æquinoctium parit, quibusdam in locis & ætate, si Aristoteli habenda fides est. Turmatim ab imò gurgite ad littora ferri, moxque alga, aliisque marinis herbis pastos, celerrimè in mare demergi, tradit Bellonius, raro unam, plerumque plures simul capi Salvianus. Cucurbita capitur, quod ea delectetur nimium, idque uni ei ex omnibus evenire Aristoteles docuit. *Audit* valere apud eundem legimus. Nul- lum ferè inter *cibos* habet primum. Arche- strato semper mala, Diphilo dura & insuavis est. Platinæ sylvestre quid & ferinum respicit: circa Ebusam tamen capta haud spernitur. Alexandrina pariter maximè si in Autumno nata fuerit, humidum quid & album, idque non virosusum emittit, ut Diphilus refert, sed & circa Mytilenem tempore messis capta haud ingrata est. Omnium tamen dura caro est, ut Plinius percoqui possit neget, nisi ferula prius verberetur.

Plin. H.
N. 1. 9. c.
51.

Arist. H.
A. 1. 8. c.
2. 1. 4. c. 8.

Plin. H.
N. 1. 9.
c. 19.
Tab.
XVI. 7.
Athen.
Dipn. 17.

Huc *STROMATEUS* pertinet, piscis in rubro mari teste Athenæo nascens, Salpæ similis, & universo corpore, aureis lineis productis distinctis, unde nomen invenit. Rondeletius pro eo subsequenter piscem pinxit, sed non descripsit.

ARTICULUS XIII.

De Fiatola Romæ dicta.

Tab.
XIX. 8.

Piscem qui *Fiatola* Romæ dicitur, quidam veterum *Callionymum*, alii *Ellopon*, nonnulli *Lycon*, Bellonius *σαλπίπιδος* esse opinatur. Aurei est & argentei coloris, multique lituris variegatur. Latus item est ac planus, ut Bellonius scribit, rotundum ferè & compressum, Seferino non valde ab similem, Rondeletius facit. *Linguam* habet carnosam Delphini modo, ad humanam accedentem, suisque partibus omnimò absolutam, quod inter ceteros branchiis præditos solus habere videtur. Vendicat & hoc sibi peculiare, quod *pinnis* sub ventre careat, sitque omnimò inermis. Gerit quoque branchias utrinque quatuor superiorem maxillam immobilem. Caudam lunatam, lineam à capite sub ventre ad umbilicum extensam, atque utrinque in cervice maculam nigram, Squammis in eo duntaxat lineæ ductu, qui piscis latera distinguit. *Hepar* ipsi unius lobi nullo felle præditum. *Stomachus* in litteram V. efformatus, ejus infima pars, in mocronem terminatur, & ad pylorum tam numerosas appendices, ut nulla arte numerari possint, habet. Intestina fulcit glandulosum pancreas. Lien stomacho subest. Benè in hunc picem *σαλπίπιδος* Bellonius vocet, non disputo, hoc tantum addo, Ceta-

Cetaccis hunc ab Oppiano annumerari, dentes ferratos habere & gregatim degere, quod fortè Fiatolæ non competit. Adicio tamen Bellonii in icone Calluchtin, quem Gesnerus pro Hepate primo habebat. Quod reliquum est, frequens est Romæ Fiatola, alibi rarus & incognitus. Rondeletius suis littoribus nunquam visum asserit. Fertur expulsi mone marino nasci, & optimi saporis esse.

ARTICULUS XIV.

De Scorpio & Scorpide.

SCorpius piscis, qui Plinio aliquando *Scorpio*, ab insecto nomen traxit, non quod vel corporis figura id, vel colore æmuletur; sed quod, ut aculeo Scorpius terrestris, quem habet in cauda, ita hic spinis quibus in tergore & capite armatus est, venenum vulnerando infligit. Putatur à Scorpide sexu duntaxat differre, ut hic sit fœmina, ille mas: sed videntur specie distingui, & Scorpiis cum Scorpœna pro uno pisce habebuntur. Trilibris quandoque datur; in mari rubro ad duorum & trium cubitorum magnitudinem excrecere, Ælianus: ad tantum & apud Inoos Tzetzes scribit. Corpus habet rotundum, anteriore parte crassissimum, posteriore teniæ. Squammas tam exiles & tenues, ut nisi adverras, iis carere videatur. Solo ventre albicat, cætera rubet, unde Plinio rufus, Numenio *ἰσχυρὸς*, Hicetio *scorpius*, Diphilo *scorpius* nominatur, quia nigras quasdam Procopius notas habet, benè Epicharmus *scorpius* dixit. Caput ipsi magnum, angulosum, durum, osseum, plurimis acutissimis aculeis munitum. Os magnum, dentes confusos, densos, in inferiore maxilla triangulares, superciliorum loco aculeus acutissimus Cuculi instar, cum appendice cutacea molli, branchiæ utrinque quaternæ, osseo aculeatoque exprimento contritæ: juxta eas binæ latæ pinnæ, totidemque ex harum regione in ventre sed minores, in dorso unica à cervice ad caudam usque excurrens, anteriore sui parte undecim vel duodecim firmis aculeis horrida, cætera obruta & innoxia. Cauda unica ac lata pinna constat. Duo ipsius genera posuere veteres, *scorpius* nempe, & *pelagium*, ut apud Athenæum legitur; sed videtur idem utrinque esse. Alii fortè duntaxat sunt littorales, & nigri; alii rufi, & in altum quoque se effeunt. Inter littorales ergo ne sit, an pelagios ambigitur, cum & Mnesitheus apud Athenæum saxatiles esse testetur. *Carnivorus* est & *Aphyis*. Spatulis, Gobionibus, Canceris imprimis vescitur, nec algam spernit. *Fatiscit* in alto mari teste Aristotele; bis, eodem auctore, *parit*, vere & autumno, secundum Oppianum *ἀντὶ τοῦ χειμῶνος ὅτε τὸ ὕδωρ ἄνωγει* quaternis *sustinet telum partus doloribus*. Ictum ejus venenatum pestiferumque apud Dioscori-

dem & Avicennam legimus. Gravissimos infert dolores, quandoque & inflationem ventris accersit. Mullum dissectum & impositum remedio esse Ætius & Paulus tradidere. Rondeletius cum ipsius Scorpionis hepate, & lentisco contuso, ad vulneris ambitum applicato, expertus est. *Usus* & *in cibis* & in Medicina invenit Hicetius apud Athenæum abstergere, excoctu facilem, multi succi, plurimi nutrimenti, quod *scorpius*, id est, carnis solidæ, firmæ, callosæ, ac velut cartilagineæ (malè inter *scorpius* & *scorpius* referres) sit, facit. Commendatur, qui hyeme, locis saxosis, & puro mari captus est. Duritiem diuturna mortui asservatio emendat. Calore naturali evanescente, externo colliquante humidior efficitur. Archestratus in Thaso non longiorem pygone (viginti digitorum mensura est) emendum censet. *Medicinam* si spectes, jus alvum apud Plinium & Dioscoridem emollit. *Fel* ad menses vel secundas tam exceptum ab Hippocrate usurpatum. Plinio verrucas tollit, & unguium scabritiem emendat. Marcello à nebula & caligine liberat. Lapis, qui in capite è stranguriosis utiliter bibitur.

SCORPIDEM & SCORPÆNAM pro eodem pisce Aldrovandus sumit. Specie à Scorpio, ut supra dictum, quod colore & succo differant, ut Athenæus ait, distinguit. *Scorpidium* Psellus vocare videtur. Cinericia est Bellonio, & multo Scorpio minor, de cætero (tam etiam vivax, ut exenterato & corde carens moveri non desinat) Scorpio in omnibus ferè similis. *Vescitur* algâ & sordibus marinis. Castitatem immaculatam generi suo servat, itaque habet pudicitiam sui generis, sed venenum sui generis non habet. Non enim percutit Scorpæna sed reficit. Apud Athenæum Scorpio in cibo posthabatur.

ARTICULUS XV.

De Blenno & Peltine Romanorum.

Blennus Oppiano *ῥέον* contractè à *Blennio*. Athenæo fortè *ῥέον*, quod præ corporis crassitie brevis (nam idem quod minutus) Sophroni *ῥέον* potius qui idem cum Gobio, quam *ῥέον* specie similis, dicitur. Corcyrenses & Zacynthii *Cepolam* à *Cepæ* similitudine propter turgidum ventrem appellant, exinde *Bulbum* Plinii esse Bellonius coniicit. Rarò Gobiom magnitudine superat. Colore est vario. Licet totus ferè liveat, plerisque tamen locis rubet, quibusdam etiam flavescit. Squamis paucis, tenuibus, & tam faciliè deciduis tegitur, ut tum ad hoc, tum quod ob plurimum mucum, quo oblitur, adeo lubricus sit, ut vix manibus adstringatur. Caput habet magnum, oculos eminentes, nigros.

Dioscor.
l. 6. c. 61.Plin. H.
N. l. 32.
c. 9.
Hippo-
crat. de
morb.
mulier. 1.Tab.
XVIII.
12.Ambros.
Hexim.
l. 5. c. 2.Tab.
XIX. 17.
Tab.
XXXI.

Labrum superius capiti ceu tubum quendam infixum. Dentes serratos, sed adeo exiguos, ut os asperum potius, quàm denticulatum appareat. *Linguam* albam conspicuam. In latiore pinnæ tergoris parte, macula nigra, albicante circumdata circulo, parvi argentei numismatis magnitudine, oculorum in cauda pavonis figura conspicitur. Reliqua in icone videntur. In algoso littore *versatur*. Romæ rarus, in Græcia frequentior. Non longè à loco, quo degit evagari solet. *Vescitur* apuis, squillis, similibusque pisciculis, horum inopia ipsas depopulatur herbas. Gulosus est; sed & stultus Plauto, nisi Blennium ibi melius pro mucoso & pædido sumferis. Carnis est mollis glutinosæ & excrementitiæ. Cinis cum ruta vesicæ vitia & calculos sanat.

Oppian.
Halicut.
l. i. v.
109.

Tab. XXVII.
1. Plin.
H. N. l.
32. c. 9.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 2.

Quem PECTINUM Romæ vocant, hunc *Novaculam* Plinii Rondeletius esse suspicatur, quâ tacta ferrum olent, quod dorso sit cultellato; Gesnerus *Pavonis* nomine sibi transmissum Româ scribit. Piscis est latus, & Fabri instar compressus. Tegitur magnis squammis, & variis pingitur coloribus. Caput maxillæ & branchiarum opercula plurimis cæruleis lineis insigniuntur; Synciput coloris est punicei saturati, latera albicant. Imis ventris & caudæ pinna subflavis & virentibus lineis inter se cancellatim commissis decenter admodum depicta sunt. Pinna dorsi rubra nonnullis cæruleis conspergitur maculis, dorsum ipsum est puniceum, cætera ex albo flavescit. Palmi mensuram excedere non solet. Capite est magno, valde compresso, & prorsus omni rostro carente. Linea namque anteriorem capitis totiusque corporis partem terminans, longa sit & recta, atque fere ad perpendicularum, è summo capitis vertice ad inferiorem usque maxillam defertur; in cujus inferioris atque ferè perpendicularis partis loco inferiore, os positum est parvum, dentibus acutissimis, recurvis, exiguis munitum. Branchias utrinque habet quaternas. Ventriculum mediocre. *Intestina* valdè pingua, multis gyris circumacta: hepar pallidum, cui vesicula fellis annectitur. In saxosis & arenosis littoribus degit. Raris in Italia. in Rhodo, Siculo, & Hispano mari frequentior. Solus vagatur, & quia parvo est ore, loligunculis, sepiolis, & Apuis duntaxat vescitur. *Carne* ajunt esse tenera, friabili, boni succi, & concoctu facili. Nullis ferè aliis spinis quam iis, quæ dorsi spinam constituunt, interciditur, plænorum more.

ARTICULUS XVI.

De Aphyis seu Apius in genere.

Tab. XIX. 12. 13. **A** Pua, sive pro parvo piscitio, sive pro peculiari aliqua specie tantum accipiat, *αἰῶνα* potius quam *αἰῶνα*, ut Suidas &

Tab.
XIX. 12.
13.

Aristophanis scholiastæ pronunciant, dicitur, Atticos in plurali, in singulari rarissimè protulisse; quòd cumulatim edi soleant, Eustathius author est; nec aliam ob causam ἀφύα vocavit Aristophanes. An vel ἀφύα quosì non natæ, quod Rondeletio & Aldrovando placet; vel quasi βροχύντ, bis natæ, quod malignè & nimis pusillo corpore nascantur; vel ἀπὸ τῆς βροχίας, quod ex pluvia generentur; quod Plinius videtur velle, unde Gaza *Apluas* Latinè reddidit; ve quasi ἀφύα, id est spuma, ex qua ab imbre excitato oriuntur, dicantur; non disputo: nec an ἀπύα, cum Apuis quas *Cobites* veteres nominant, specie iidem sint, inquiri; hoc certum ἀπύα à pinguedine Varino; γένεσι θαλάσσης, quod cum semper sint exigui, semper sætus recens esse existimari possint, ab Athenæo dici: nec fortè à vero aberrant, qui ὀππιάνους Oppiano vocari, credidere. Plura ipsarum à veteribus recensentur genera: quorum ferè nomina sunt, *Apua vera*, *Apua Gobitis*, *Engraulis*, seu *Encrasicholus*, *Apua Phalerica*, *Apua Mugilum*, *Manidium*, *Mullonum*, item *Hepsetus*, *Atherine*, & *Membras*. Commune omnibus, candido colore esse. Caput majusculum & oculos elatos & nigros habere. Archippus apud Athenæum ἀρχιπύα vocat; veteres, quosdam ex femine, alios sponte nasci prodiderunt. In scopulis, quorum sinus multiplices unda excavavit, ad littora *versantur*, tamque densis natant agminibus, ut tam γαλακτὸν ὀκεανὸς ἀμυγδαλέα, cæruleum mare album reddi videatur, ita aliquando se implicant, ut earum compactarum occurso, vel navis retardetur, ut de aliis quæ Oppianus ponit taceam. Quantum ad *Generationem*, spontè sine coitu ex imbribus fumescente mari nasci; alias è limo putrescente scilicet & ipso, vel quicquid in fundo colectitium est oriri, prodidit Oppianus. Nec aliter Aristoteles, illud si excipias, quod quandam è piscibus oriri addit. Nam apud eum ἐν τῇ ἀμυγδαλῇ γένεσι seu ex sabulone, id quod apuæ spumam vocant, prodire legimus. Argumentum ortus, quod frigidis temporibus non capiantur; & traheis sculpta humo, sæpe numero & copiosiores & præstantiores sint prædæ. Oriuntur autem opacis tepidisque locis, ἐν τῇ ἀμυγδαλῇ ἡρῶν ἐν ἀμυγδαλῇ αἰθρῇ, cum cæli elementia terra concelescit, veluti in Atheniensis agri Salamine, ad Themistocleum, & in Marathone. Ejusmodi omnes sunt, ut neque gradescant, neque generent, neque diu durare queant, priore turbâ abolitâ altera succrescit. In nullo apud Athenienses patinarum honore erant, si Chrysippo apud Athenæum credimus, fortè ob copiam. Arcestratus μύθας seu oleti instar aspernabatur. In mediterraneis expectantur, inde piguium Athenis nomen. Nicomedes eorum desiderio flagrans, cum haberi

Oppian.
Hal. l. 1.
v. 290.
Oppian.
Hal. l. 4.
v. 470.

Oppian.
Cyneg. l.
2. v. 568.
Arist. H.
A. l. 6. c.
15. exer-
cit. Sea-
lig. c. 14.

haberi non possent, figuris ex rapis sceminis ad earundem speciem ab Apitio dissectis, ex oleo coctis, & sale atque papavere conditis, ventrem explevit, referente Suida. Apparatum apum Aldrovandum vide. De cætero humidum & flatulentum alimentum præbent. Diphilus gravis & difficilis coctionis esse putabat.

ARTICULUS XVII.

De Apuis in specie, & in primis
Vera, Phalerica, Membra-
de, Cobite, & Hep-
teto.

Tab.
XIX. 12. **G**enera Apuarum præterito recensui-
mus articulo.

13. 14.
16.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. cap.
29. 30
31. 32.

Prima est APUA VERA, cui, quæ generatim de Apuis dicta sunt inprimis conveniunt, quam Græci propriè *αἰσθή*, Athenæus *ἀπύρα*, aliqui *ἀπύρα* à spuma nuncupant. Suidæ *ἀπύρα* à *αἰσθητή*, quasi nullis orta parentibus dicitur. Pisciculus est vix auricularis digiti longitudinem adæquans, oculis nigricantibus. Duo ejus genera. *Album* in Hollandia frequentius; & rubicundum, *Aphyia Triglitis* Bellonio.

Altera est APHYTA PHALERICA, vel ab Atticæ portu qui Phalereus appellabatur, vel ἀπὸ τῆς φαλῆρας (alba hæc est & spumea Græcis) ita dicta. Sardinis est similis minor, tenuior. Squammas in mari habet, sed statim excidunt remanentibus earum vestigiis, & iis quæ ventrem firmant. Adeo est mollis & pinguis, ut si aliquando digitis tractetur, liquefiat, aut si magna copia in navicula vehatur, supernatans oleum piscatores colligant. Vidit Rondeletius unius diei capturam, quinquaginta coronatis aureis venditam. Erat apud veteres in precio si Polluci credendum.

*Tertia est MEMBRAS. Has Phrynichus apud Athenarum ῥομφαίας, Epicharmus & Sophron ῥομφαίαι, Attici μυρσίναι, Trallianus μυρσίναι appellasse videtur. Aristoteles ex Aphya Phalerica nasci author est; & inter μύρσιναι pisces, id est haud migrare solidos recenser. Cum verò Phrynichus ῥομφαίας cognominet, ac Aristophanes μυρσίναι, id est, cano corpore, Rondeletius eos pisciculos esse conjicit, qui Gallis *Celerias* vocantur. Sunt corpore admodum candido capite auri colorum æmulante, Sardinis valde similes. Coquuntur ex præcepto Dorionis, mutilato capite, si corpulentiores fuerint, & lotæ sale minuto & aqua. Contemptos fuisse Antiphanes ostendit.*

Quarta est APHYA COBITES, nunc
Græcis, Theodor Gobionaria. Putatur ab
ignobili quodam & terram subiente Gobio
procreari. Rondeletio est ille quem Galli
Logis denner, ad differentiam fluviatilis vo-

cant. Nunquam ad Gobionum magnitudinem accedit, aliqui marinis Gobionibus similimus. Corpore est rotundo, pellucido, dorso latiusculo, colore candido, nigris aliquot maculis asper, caudâ variâ, oculis quodammodo supra caput positis. Pinnæ eadem illi, quæ Gobionibus, maxime illa, quæ his peculiaris, barbæ instar ex ea ventris parte, in qua binæ sunt in aliis piscibus, propendens. *Hepar* est lactei coloris, & in eo fells vesica, *splen*, rubet, *intestina* & peritonæum ex albo nigricant. *Cor* ex albo rufescit. Gravis est, & difficilis concoctu.

De *Encrasicholo* sequenti capite agemus. De
Aphyis Mugulum inter istos agitur.

Apus MULLORUM exiguos admodum Mullos arbitrat *Rondeletius*, qui in stagnis marinis ex putredine nascuntur.

Aphyas MANIDUM verò pisculos *Manidum*
specie sine mare & femina sponte nascentes esse
judicat, etsi contra sentiat *Aristoteles*.

HEPHETI seu Hephēti nomen, ad multos parvos pisciculos extenditur; peculiarem aliquam speciem esse, exinde, quod apud Athenæum pro parvo pisciculo Aphyarum generis ponatur. Rondeletius à Gallis *loul* appellari credit. Est digiti magnitudine, argentei coloris, corpore pellucido, dempta ea virgâ, quæ à branchiis ad caudam extenditur. Oculos habet depressos, pro parvitate corporis magnos. Os ita scissum, ut inferior maxilla superiori sit prætensa, sitque velut oris operculum.

ARTICULUS XVIII.

De Encrasicholo & Atherina.

E Ncrasicholos, Græcis *ἐκρασικόλος*. quod Tab. XVII.
ἐκράσις id est *ἀπὸ τοῦ κέρου* seu *bilis follicu-* 15.
lum in capite gerat, hoc est, quod ejus caput Tab. XIX.
impensè amarum sit, unde eo mutilari affolet, dictus; aliis *κακίσκος*. quod dum 17. 18.
officit, amplum os aperiatur, ut serpentis Plin. H. N. l. 31.
potius quam piscis videatur; Plinio, multorum c. 8.
eruditorum judicio *Lupus* nuncupatur. An Chalcedoniis *ἰσχυρὸς* dicatur, quod Callimachus apud Athenæum prodidit, *ἰσχυρὸς* quoque Ælianus vocat. Magnitudine est plerumque digiti, palmi longitudinem nunquam assequitur. Argenteo colore micat, tergo ad caruleum accedit, si soli opponatur transparet, dempta argentea linea, quæ spinæ vertebra comitatur, quæ sanguinem continet. *Squamis* carere falsum, vel in sale adservatis argenteæ micant. Rostrium habet acutum; os amplum, utramque maxillam serræ modo asperam, branchias parvas duplices. *Cor* oblongum & acutum, hepar rubrum, maculis rotundis conspersum. Ventriculi appendices multas & nigras. Ventrem molissimum, ideoque plerumque absumptus in salitis conspicitur.

Ælian.
H. A.
l. 8. c. 18.

Ovis scetet rubentibus. Spinis caret, eâ exceptâ, quæ in dorso est, & ipsa tenuis, adeo ut vix dentibus negotium facessât. Arenâ, spurcitiis, atque cæno vescuntur. Capiuntur hyeme à Decembri ad quadragesimam usque, in Provincia numerosissimè, noctu igne è naviculis accenso. Quam confertis turmis densi, metu insidiarum natent, de Aphyis in genere dictum est. Hanc tam confertam Lycoptomorum natationem, *βίαν* à peritis nominari, Ælianus tradidit. De *Ortu* dissentiunt Authores. Suidas & Athenæus ex Apua Cobite; Aristoteles ex Phalerica oriri tradit. Satiùs est sui generis piscem statuere, quàm vel species in infinitum multiplicare, vel ex Apua Phalerica duos diversos pisces generari, concedere. Nam & ex hac Membradem oriri Philosophus author est. In magno plerisque in locis habentur precio. Comeduntur & crudi & sale asservati. Minutatim concidunt, capam pariter tritam addunt, sic ex oleo & aceto asperso pipere sumuntur, saliantur truncato capite, & fel aufertur simul. De Garo quod ex iis, vide Rondeletium. Huc referunt nonnulli *αὐτίς* *πύρι*, cuius effigiem exhibet Tab. 47. 19.

ATHERINAM, Græci *ἀθέρινω*, & per pleonasmum literæ *α*, *Ἀθέρινω*, seu *α* transverso, quem alterum Atherinæ genus in ventre habet aculeo, quod Gillio placet, seu ab aristis (*ἀριστὴς* idem est quod *ἀρίστη*, id est, arista, pars spicæ acuta, seu ut Erotianus explicat, tenuissimum illud, quod in hordeo acuminatum est) per metaphoram pro spina sumpta, quas multas & Sardinis duriores Atherinæ habent, quod Rondeletius voluit, dicunt. Posset & ab *ἀθρίστη*, quod pro *καθαρίστη* floccipendere & contemnere deduci, quod nimirum *ἀθρίστηται πύρι & αὐτὸ δὲ πύρι ob vilitatem negligatur*. Gaza *Aristam* & *Aristulam* vertit. Callimacho, in nomenclaturis diversarum gentium *ἰαρίδα* & *ἰαρίδα*, sine dubio à parvitate, (*ἰαρίδα* Adverbium Græcis sonat propè) vocatur, Romanis Laterina. Quid per suum Acerinam Plinius Medicus intelligat, difficile est dicere. Bellonius recentiorum Cernuum esse credit: ego mendum esse, & Atherinam legi debere iudico. *Descriptionem* si attendas, ita de eo Rondeletius: Pisciculus est marinus, litoralis: reperitur & in marinis stagnis, Aphyis similis, dodrantali magnitudine, parvi digiti crassitudine, dorso spisso, ventre leviter depresso, ore parvo sine dentibus, oculis magnis. Colore est vario: nam venter argenteus est, dorsum fuscum, circa caput, ex flavo rubescit Sardinarum modo. Locus qui inter oculos est, cælatius videtur. Pinnas habet quatuor, duas ad branchias, duas in ventre, aliam à popice, præter has, alias duas in dorso. Omnes candidæ sunt. Cauda duabus pinnis constat. (contra ostendit apposita icon) Pro linea medio corpore à branchiis ad caudam pro-

tenso, spissum quid habet sub cute, quod non possum aliter quam fasciam, per similitudinem vocare, quæ cum cocta Atherina editur, evidendissima est, & cum lumini objicitur, quia reliquo corpore pellucida est, hæc parte opaca. An Aphyæ Meletæ mas sit, quod piscatores credunt, dubito, tum quod illæ sine mare & scemina nascantur, hæc distinguantur sexu: tum quod mollissimo & depresso corpore sit illæ; istæ solidius & spissius habeant. Bellonius suum, quem vulgus Cræcum, Romani Latharinum, Massilienses Sencle vocant, ita describit. Pisciculus est digiti crassitudinem excedens, neque extenso digito longior: Argentei coloris, translucente corpore, & quod soli objectum, ut vitrum transpareat, lineamque ostendit internè obscuram, rectam, à capite ad caudam, à sanguine, qui in spina profunditur, provenientem. Oculis est grandibus, lingua candida. Pinnam utrinque in lateribus & geminam alteram habet sub ventre, quæ piscem in partes æquales secat: ac præterea tenuem aliam, & parvam fert in medio tergore pinulam. Cæterum *Cor* gerit, ut semen oxalidis triquetrum & oblongum, pericardio perbellè inclusum: branchias utrinque quatuor: *Costas*, item utrinque decem omni capillamento teneriores: vertebrae adeo exiles, ut vix ab acie oculi perspicacissima discernantur.

Pascuntur in algofo littore, *ἀπὸ παραλίτου* ut Oppiani verbis utar. Quam Rondeletius descripsit, non tantum in vicino Monspelio mari, ubi Melet dicitur, sed & Massiliæ, & in stagno quod Martegne vocatur, frequentissimè capitur, & nomen Sancelz obtinuit. Aristoteles gregales facit, eodemque testes inter Rhyades circa æquinoctium vernum *ἔτιν* *πύρι* juxta terram, alvum arenæ aterentes pariunt. Vilem in cibo Phavorinus fecit, & contemptum; delicatissimum suum Rondeletius, nisi spinæ negotium facesserent. Bellonius quoque quæstuosissimam suarum ob suavitatem piscationem scribit.

Oppian.
Hal. l. 1.

Aristot.
H. H.
l. 6. c. 17.

ARTICULUS XIX.

De Lavarono Bellonii.

Piscis, quem Romanum vulgus Lavaronum vel Lavonum, seu à beata que Lavarono, quod non videtur, cum marinus sit, seu aliunde, Massilienses Cabassonum, Genuenses à capitis magnitudine Capassonum, vocant, ita à Bellonio describitur. Grandiore sunt capite, quem Atherinæ, magis recurto ac compressiore ad ventrem corpore, & paulo latiore transparant, ut Atherinæ, maximamque habent cum iis affinitatem. Squamis multis integuntur, quæ detectæ argenteum colorem præ se ferre videntur.

dentur. Duas in tergore gerunt pinnulas, utrumque ad latera unam. *Dentibus* carent, ut Harengus: *Cor* exiguum, oblongum, triquetrum, habent: *hepar* pallidum, cui stomachus subest, pisciculis & Cardibus parvis nonnunquam refertus. *Intestina* ad anum tribus revolutionibus reflectuntur. *Fel* ob ejus exiguitatem conspicuum non habent: *spinas* quoque ferunt nullas. Carnem albissimam & levissimam. Calculos duos in capite gerunt, Sefamino minores: squammas paulo quam Atherina latiores & numerosiores. Magnam cum fluviatili Lavareto affinitatem habet.

ARTICULUS XX.

De Sarda seu Sardina.

Tab. xx.
I. 2. 3.
Galen.
Facult.
Alim.
I. 2. c. pe-
nult.

Plin. H.
N. 1. 32.
c. 11.

Sardæ nomen, si benè ex Galeno colligo, omnibus pisciculis, qui ad saliendum apti sunt, competere videtur, idque inde fortitas apud veteres credo, quòd ex Sardinia in alias regiones, eveherentur. A Sardinis & Sardellis magnitudine duntaxat & ætate differunt. Cum nondum adolevere, Sardinæ & Sardellæ dicuntur, adultæ Sardonum nomen capiunt.

Vnde Apicius Sardonem farciri solere dicit, Sardenam ob parvitatem non posse. Fateor tamen, & Pelamydi longæ apud Plinium Sardæ vocabulum impositum inveniri. Qui *Trichias* & *Trichides*, quas Dorion apud Athenæum non distinguit, Aristoteli dictas, cum nullibi tam vulgaris pisciculi tam diligens naturæ explorator meminerit, credunt easque *ἀπὸ τῶν τριχῶν*, quasi à capillis, seu parvis illis & capillaribus quibus abundant spinulis, à quibus etiam *ῥιχίαι* dicunt, quas recentiores Alosas nominant, deducunt, vix falluntur; nisi fortè hoc obstat, quod idem ex Membradibus Trichides, ex his Trichias nasci dixerit. Nam quod alibi *ῥιχίαι* (Sardas Gaza vocat) quædam adscribit, quæ Sardis nulla ratione competunt, ea *ῥιχίαι* seu Alosis, competunt, ut mendum subesse, & malè Gazam vertisse sit evidentissimum. *Chalcidas* quoque marinas Sardinias nuncupari, velex Callimacho colligitur, hæcque Columella intelligit, dum dicit, *Piscibus in piscinis præbere oportet, habentes Haleculas & salibus exesam Chalcidem putremque Sardinam*.

Invenio & à Dorione *χαλκιδεύς* dici. *Eritimum* vocari, vix ex Epeneti apud Athenæum loco *χαλκιδεύς τῆς* (legendum *τῆς ῥιχίαι* & *ῥιχίαι* *ῥιχίαι* *ῥιχίαι*), inquit colligi potest, Belonius etiam cum Chalcidibus easdem ponit; sed dum fluviatiles à Celerinis sola magnitudine differre, specie convenire putat, argumento sumpto, quod Galli qui ad Oceanum siti sunt, nullum piscem Sardinæ nomine agnoscant, præter cum, qui aliunde sale asservatus, ad eos perfertur;

Celerinus verò in Gallia tam sit popularis, quam à in mari mediterraneo ipsa Sardinia, ex Aldrovandi opinione fallitur. Sunt enim Gallorum Celerini (verba sunt Aldrovandi) ab Allobrogum Celerinis diversi, illi marini sunt, & nostro & Rondeletii etiam iudicio marinis Membradibus in Aquarum genere non Chalcidibus sive Sardinis iidem; hi lacustres, & Chalcides Aristotelis, Sardella, & Aquo Fracastorii. Anglorum Sprat, & Hollandorum Sprot, ad quos fumo siccatus adferri solet, haud alium puto quam Sardonem aut Sardinam sicuti & illum quoque, quem Rondeletius scribit Agathopoli magna copia capi solere, nominarique; Calliques vel Laschez; & Massiliæ Garengades, licet ipse Membradem esse velit: ut enim Calliques ex Chalcis corruptum esse videtur, ita etiam Lachez ex Laccia; quo nomine in multis Italiæ locis Alosa appellatur, cui simillima est Sardina, & ipse quoque cum Alosæ similem esse profiteretur. *Harengades* verò etiam dici videtur, quod & Harengo similis sit, & similiter salita per mediterranea loca venalis effertur. *Icones & Descriptiones* diversas quinque apud Aldrovandum invenies.

Prima, pisciculus est Aphyæ Phalericæ omninò similis, nisi paulo major, & spissior esset, à parva Alosa, ore, branchiis & oculis, pinnarum numero, situ, squamis, caudâ minimè discrepans, sed in hoc tantum quod Alosa sit latior. Sardina igitur squamas magnas, tenues habet: colore est vario, nimirum capite aureo, ventre albo, dorso cum viridi cæruleo, utroque splendido, rutilanteque dum viva è mari extrahitur: una enim cum vita viridis evanescit, cæruleoque manente; eoque habescente & splendorem suum amittente. Intestina habet parva & recta, Alosarum intestinis similia.

Altero loco picta, in qua pictor pinnae nullas expressit, capite est rubicundo, corpore toto subviridi, præter duas quæ in ea conspicuæ sunt, lineas, quæ sunt cæuleæ. Cauda ad castaneum in extremo vergit. Sardæ Flandriæ nomine missa est.

Tertia eodem quoque nomine, sed majoris cognomento communicata, pinnae habet nigras, quarum situs (dum modo pictor rectè expressit) alterius speciei piscem esse indicat. Colore est vario viridi nimirum violaceo, paleari & ruffo. Maculae in lateribus sunt nigrae: in pectore croceæ.

Reliqua duæ species, dorso sunt viridi, ventre argenteo. Prior in extremitatibus ossium, quibus branchiæ reguntur, rubent. Oppianus dum scribit:

Chalcides & Thrissæ passim Abramidesque feruntur,

Et curvis habitant scopulis & littora visunt, Atque catervatim percurrunt aquoris undas,

Oppian.
Hal. l. 1.

*Alternantque imas ponti, curruntque per
aquor.*

*Hospitium mutant semper, pontoque vagan-
tur.*

iis qui vagabundam vitam agunt, accenset. Capiuntur Mafsa ex ervis frictis & myrrha vino odorato excepta, confecta; aliquando foliis betæ, quâ impensè delectantur. Adhibentur quidem *incibis*, sed revera, ut Hicetius apud Athenæum dicit, *αγροδίου & αλνυδίου* id est squalidi, nec multum pingues, sunt, nec copiosum succum in alimentum præbent. Apicius farcire eas docuit, Galenus ad faliendum aptissimas dixit. *Medicum* usum quod spectat, in prima mensa sumptæ, alvum subducunt. Capite, in puero quodam, loco balani feliciter usus est Brasavolus. Marcellus exustas sine ossè, vel fassamentum, & confrictas, si varicibus supponatur, statim prodesse scribit. Idem Sardæ caput combustum, medicamento ad gingivarum tumorem, foetoremque admiscet. Privatum contra presteris morsum valet, si Plinio credimus.

ARTICULUS XXI.

De Mæna.

Tab. XX. 4. **M**Æna, Græcis, *Μαίνα*. Theodoro Gazæ Halec est, meruo ne perperam. Alecis enim nomen, vel omnibus pisciculis qui muriâ conduntur, quod Rondeletius docuit, competit; vel illis, qui apud Græcos Anthracides, seu Carbonarii vel prunarii pisces, quod in pruna & craticula commodè coqui possint, dicuntur, quod ex Hermolao discimus; vel ipsi piscium foeti, unde Plinius. *Laudatur & Clazomenegarum, Pompeiique & Leptis: sicut muriâ Antipolis ac Thuria: jam verò & Dalmatia. Vitium huius est Alex, imperfecta nec colata fex: vel denique pisciculo fluviatili seu dulcium aquarum, quem Plinius, ad ostreas, echinos, urticas, cammaros & mullorum jecinora pervenisse scribit.*

Columella inter parvi incrementi fluviorum animalia reponit, & piscibus majoribus præberi jubet, ut de Martiali taceam. *Descriptionem & Differentias*; quod spectat, Mænâ inquit Gillius, non modo speciei, sed etiam generis nomen esse conjicio, quod varium & multiplex est earum genus. Aliæ in utroque latere nigram maculam orbiculatam habent, quas ii, qui Adriaticum sinum accolunt, vulgo Mænas selavas appellant: aliæ leucomænides, hoc est, albæ Mænæ à Græcis sive Smarides nuncupatæ: itemque sunt Mænæ Boopes appellatæ. Bellonius duas observavit differentias in colore: alias enim luteo, alias lituris cyaneis aut azureis conspersas esse ait. Speulippus Mænidi similes facit Boacem & Smaridem: idem tra-

dit Rondeletius, nec non Bellonius, nisi (inquit hic) paulo latiores & breviores cernerentur, & squamis Smaride tenuioribus contegerentur, breviorique essent capite, rarissime siquidem palmum excedere, (Antiphanes quoque Mænas exiguos pisces esse dixit, & Martialis breves) lineam in lateribus rectam habere, quæ in Smaride arcuata est: pinnastergoris, laterum, & caudæ diaphanas esse, & maculatas. Os si clausum contineat, minimum quidem apparere: sed dum hiat, rictum magnum ostendere, labrumque superbius tubi in modum, ut in Harengo infractum esse: Oculos habere rotundos, iridem subrubram: maxillæ asperitatem quandam dentium vicem præ se ferre: si desquametur albissimam argenteamque spectari: sed tergus livore quodam sub oculis in prepureum gemmante depingi.

Addit Rondeletius, utrimque magnam & rotundam maculam habere in medio corpore, quam etiam in icone expressit, Bellonius omisit, & in descriptione non meminit, nisi eam intellexerit, dum inquit, utrimque lituris notari, quod tamen non asfero, quandoquidem icon mea cum Belloniana satis convenit, & ejusdem coloris lituras habet, item circum oculos. Pinnæ omnes etiam versicolores. Venter candicat. Cauda fusca est. Idem Rondeletius hyeme candidam esse scribit, vere & æstate variam: maculis cæruleis toto corpore & potissimum in capite & dorso sparsis: item lapides habere in capite maremque in eo foeminæ dissimilem, quod latior sit & porrectior, foemina rotundior: cum foetura foemina impleri incipit, maris colorem in varietatem quandam & nigrorem mutari. Aristoteles verò hanc mutationem tempori adscribit, & de Mænâ simpliciter id tradit, nec foeminæ nec maris facta mentione.

Mænâ & Smaris (inquit) mutantur; ut ex albedine rursus æstate ad nigredinem redeant, idque maxime suis pinnis & branchiis declarant. Ita & Plinius: Mutant colorem candida hyeme Mænâ, & fiunt æstate nigriores. Quem locum Massarius explicans: dixit, inquit, æstate nigriores: quia suscipiunt colores cæruleos, qui quod ad albedinem sunt obscuriores, & nigriores.

Et rursus: Mænâ pisculus est digitalis longitudinis, hyeme candida, & æstate varia, picturis cæruleis obliquis. Quomodo autem colores mutant, in Merula ac Phycide (ni fellor) explicatum est. Testatur denique Rondeletius, cum aliquando Româ Venetias venisset. Mænas se tanta colorum varietate conspexisse, ut vix primo aspectu agnosceret, quod suo in littore minus pictæ sint. Quod ad *partes internas* attinet: Mænâ *hepar*, ut Bellonius observavit, fungosum ex lacteo pallefcit: sub ejus lobo

dcx.

ARTICULUS XXII.

De Smaride.

dextro fel luteum oblongo vasculo includitur: *Splen niger, stomachus oblongus*. Rarò in Oceano capiuntur: in mari tam supero quàm infero frequentes esse, nomenclaturæ apud utriusque maris accolæ indicant. Mænaria insula ab earum frequentia nomen sortita est. Inter herbas in littore algofo, seu ut Ovidius, in herbosa arena *viſitare*, Oppiani fide tradimus. A carne non omnino abſtinere, quidam prodidere. Gregales esse apud Aristotelem legimus. *Parit brumâ*, vel ut Bellonius, post brumam, & omnium piscium fecundissima esse censetur. Cum foetu foemina impleri incipit, ob malignum foetorem, *vis* seu *Hircus*, ut apud Aristotelem extat, dicitur. Singularem cum vespis sympathiam habere ex eo quidam colligunt, quod illæ nassa, in quæ mænna cum Chalcide reperta est, capiantur, prodeunte Æliano: singulari in Xiphias odio ferri, ex eo nonnulli, quod eam balænæ metu, gladio suo in terra hærentem, conficiant, ut Oppianus testatur. Inter plebeios cibos reputantur, adeò, ut acervatim, vitato etiam emptore Venetiis vendantur, tum quod parvi sint, tum quod cum uterum ferunt, exquisiti foetoris. Unde Martialis:

*Fuisse gerres aut inutiles mænnae
Odor impudicus urcei fatebatur.*

& in Majali L. Pomponius Atellanarum Poëta, ut dicitur Agellio.

— *Cœnam queritat, si nemo cum
Vocat, revertit maſtus ad manam miser.*

Succi tamen bonitate Gobiis præstare Hicelîus, teste Athenæo, author est, quod forte de iis, qui in littore petroso aut arenoso, & suo tempore capiebantur, sumendum est. Nam aliàs, Gobius friabili est carne, & saxalitiū non multò inferiore. Liquamen seu gari speciem ex ipsis fieri solitam Plinius innuit, dum scribit. *Saletiam è muria salsamentorum recoquitur, iterumque consumpto liquore, ad naturam suam redit, vulgò Mænna jucundissimus*. Apud Persium quoque aliquid simile invenies, sit visceribus piscium in vas aliquod injectis, & sale conditis. De usu in Medicina hæc habero. Jus assumptarum alvum solvere, ut & salsas, si umbilico illinantur. Capitibus inveteratarum ulſis ad sedis fissuras, & columellam inveteratam Galenum uti: ad uvam diu jacentem, cum gallæ & floris æris, denariis duobus, Marcellum Empyricum: ad Anginam cum melle illitis eundem. Plinius earundem cinerem, admixto sale & cunila, oleoque, vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere, testatur. Cum alio tritus verrucas tollit, & verendorum pustulas discutit. In dysenteria quem præbeant. Mænnae usum, apud Galenum invenies.

S Marides qui & *Marides* apud Athenæum dicuntur. (Bellonius Græcos Anconæ se convenisse scribit, qui etiam Maridas appellabant) ex Mænarum sunt genere. Vocantur & *Leucomanides*, nempe, quia semper albæ sunt, cum Mænæ colorem immutent. Eum docti pisciculum esse volunt, quem Antipolitani hodiè *Garum*, Veneti hurrulam seu herrulam, Massilienses hiaret, Galli Narbonenses & Hispani Picarel, quod fumo induratus & salitus, linguam acrimoniâ vellicet, Neapolitani Cerrum, quod vocabulum Gaza retinuit, nominant. Rondeletius *Garum* veterum esse putat, tum earundem nomen claturarum affinitate, tum quod ex eo *garum* fiat, idque teste Plinio, optimum. Trium descriptionem Aldrovandus tradidit.

Primus, Mænæ & Boopi simillimus est; notis tamen quibusdam ab iis distinguitur. Boops enim lituris caret; quibus prædita Smaris est. Boopi rostrum quasi recisum, Smaridi longiusculum. Boops item quam Smaris rotundior est corpore, quam obrem Rotundetus Romæ nominatur. Differt verò à Mænâ etiam, quod & asperiores & paulo latiores squamas habeat. Lineæ laterum utriusque rectæ, sed in Smaride quadam serie, in Mænâ nullo plane ordine dispositæ: suntque argentæ & subaureæ, obscuræ, à capite ad caudam ductæ. Estque Mænâ minor, digitum nimirum vix superans, corpore item strictiore. Est denique peculiaris ei nota, quâ & à Mænâ & à Boope discernitur. Cum enim os aperit, labia exerit tanquam ex tubo pyxidatim infarcto. Pinnis alioqui, aculeis, cauda, partibusque internis Mænæ similis est: eodemque modo colorem, teste Bellonio, mutat.

Altero loco exhibitus piscis, Smaris Bellonii videtur. Capite est ferè violaceo prono nempe, nam supino albeat. Eodem colore totum corpus, sed multo dilutius tinctum est. Lineæ quinque insignes flavescentes à capite ad caudam perferuntur. Pinnæ etiam flavescent. Exiguam habet & vix conspicuam lituram.

Tertius Smaridis peregrinæ nomine missus, tergo est caruleo, cætera subviridi nigris & argenteis punctis conspersus. Prono capite ad violaceum vergit, supino vero candicat. Pinnæ omnes fere crocci coloris sunt, punctis conspersæ nigricantibus. Degunt inter herbas in algofo littore; eodemque cum Mænæ cibo vesci, verisimillimum est. Inter fecundas recenset Ovidius. Pastâ, ex pane, caprillo caseo, & purissimo polline, inescantur. Optimos pisciculos esse Hesychius scripsit. Optimum & suavissimum

Tab. XX.
5. 6. 7.Plin. H.
N. l. 31.
c. 7.Ælian. in
Hisor.
Animal.Martialis.
l. 12.
Epigr.
32.Plin. H.
N. l. 31.
c. 7.Plin. H.
N. l. 31.
c. 9.Galen.
simpl. l.
11.Plin. H.
N. l. 32.
c. 10.

CAPUT II.

De Squammosis plantis.

ARTICULUS I.

De Piscibus Psittaceis, spinosis

in genere.

Pisces, qui in latera compressi, latera ipsa in tenuem & latam extremitatem degenerantia habent, & quorum dorso spina, non in dorsum & ventrem, ut in piscibus reliquis, sed in latera, suas pinnas seu apophyses transmittit, Plinio *Plani*, Columellæ, *jacentes, prostrati, & cubantes*. Dorion apud Athenæum *πασχίς*, id est, lati, quibusdam, quod supinâ parte candidi, prona verò terrei sunt, ut passeris aves, *Passeres*: aliis *Psitta*, vel cum Aristotele *Psittacei* pisces, dicuntur. Duo ipsorum genera, Spinosum unum, Selache seu Cartilagineum alterum, non eo tamen sensu, quo Ælianus & Artemidorus, inter Cartilaginea, quæ squammis carent, ut Muræna, Conger, Torpedo, & cætera, referunt. Spinosi *ovipari* sunt. Cartilaginei ova quidem intus concipiunt, sed viperæ more fœtus, postmodum vivos excludunt. Sethorum alii levicute præditi sunt, alii squammis teguntur. Videntur omnes è duabus pellibus compositam habere corporis speciem, & spina per medium dividi. Omnes item quaternas pinnas habent, more squammosorum, duas in prona, totidem in supina parte, sed præter aliorum morem *pinne* earum in gyrum circumvallantur. *Branchiæ* utrimque quaternæ, *lingua* nulla, *oculi* in supina corporis parte. *Dentium* loco maxillæ in plerisque rugosa quadam scabritie asperæ sunt. *Gula* veluti ingluviei cujuspiam per similis, ventriculo contigua est. *Os* quamvis pro corporis portione exiguum omnibus, qui tamen in hoc genere majores sunt, nulum non concharum aut crustatorum genus deglutitque integrum, sicuti minores, qui in utroque genere minora sunt. Nullæ ad pylorum apophyses: *Cor* ab una parte gibbum, huic quædam caruncula atra quadrangula pulvini modo subsidet: ad ejus superiorem partem vesiculam annecti Bellonius testatur, & pulmonis officio fungi arbitratur. *Hepar* latum est & ventriculum amplectitur. *Vesicula felle* ab ejus extrema parte dependet. *Lien* ater, sub ventriculo situs, qui latus est, & cum intestinis anfractuose circumducitur. *Dei* in mari, sed & stagna & fluvios, quod lutum appetant, & commodè ibidem pariant, frequentant. Idè Columella, *Cænosa* regionem planum educare piscem scripsit. Quia in arena & limo latent, idè reciprocante mari facil-

limè capiuntur. In Belgii officinis tanta eorum copia, ut universo orbi sufficere possè videatur. Quia ova in omnibus reperiuntur, idè sexu masculino carere scripsit Aristoteles; quod tamen de certo duntaxat genere sumendum est. Conchyliis & crustatis, piscitius item vescuntur. *Pariunt* teste Aristotele semel in anno.

De natura eorum ita Aristoteles: Pisces Psittacei eo modo natant, quo Coelites, alteroque oculo capti incedunt, quia natura eorum transversa, distortaque est: itaque transversim natant, convolvuntque se strabonum more, suæque prorsus latitudine, quam pinnarum adminiculo, cursum dirigunt. Ingenium resipit, quod se arenâ obruant, & postquam se totos occultaverint. *Tunc de tunc capite in arenam in dente jactant, oris sui virgulis, ut vocant piscatores, verberant*, id est, ad quas pisciculi adnatant, tanquam ad algas, quibus vescantur. Certissimam securitatem esse Plinius tradit, vidisse planos pisces, quia nusquam sint ubi maleficæ bestiae, eaque de causa, ab urinantibus *sacros* appellari.

ARTICULUS II.

De Planis Squammosis in

Specie.

PUNCTUM I.

De Solea.

Planorum piscium alii sunt *squammosi*, quos fortè Aristoteles *επαβίς* vocat; alii *leves*, quos *φάρμα* dici conjicimus. Illi iterum vel sunt oblongo corpore, vel rotundo. Inter illos est *Solea*, à figura, quæ solo pedis ita subjicitur, dictæ, quæ Varioni *Lingulaca*, Gallis teste Bellonio, *Perdix marina*, fortè, quod in lautioribus conviviiis magnam obtineat claritatem, nuncupatur. Græci hodie *παραπύριον* linguam appellant; veteres *βίχινος* aut *βίχινος*, non tam ob bubulæ linguæ figuram, quàm ob longitudinem, dixerunt. Quidam sub nomine *επαβίς*, ab Alciphronè in epistolis piscatoriis nominari opinantur. Matrioni *Parodo*, in descriptione Cænæ Atticæ, *επαβίς* generis vocabulum est, quod omnes planos deliciores exprimit. *Sex* ipsius species Rondeletius exhibuit.

Prima, quæ *Solea* simpliciter dicitur, longiore contractioreque corpore est quàm *Passer*; & si in stagnis capitur, à marina, parvitate, & odore lutum respiciente differt.

Alteram oculatam vocat, quod licet corporis habitu, & internis partibus superiori

Aristot. H. A. I. 4 c. 11.

Arist. H. A. I. 5 c. 9.

Arist. de Anim. incesu.

Aristot. H. A. I. 9 c. 37.

Tab. XX. 10. 11. 12. 13.

Plin. H. N. I. 9. c. 20. 24. Columell. R. R. I. 8. Arist. H. A. I. 4 c. 11.

sit similis: in prona tamen parte, magnas habeat maculas; oculorum effigiem cum iride & pupillâ referentes, squamæ tam renaciter hærent, ut nisi diu in aqua calida maderit, desquamari non possit.

Tertis à prima, ut Rhombus à Passere, situ corporis differt, si enim juxta eodem situ componas, os ejus in sinistrum, prioris in dextrum latus vergere conspicias. Haut tamen ex Rhombis aut Passeribus esse, forma ipsa, qua plane Soleæ similis est, satis arguit. Galli Polam dicunt: ipse Epicharmo apud Athenæum *Cynoglosson* appellari conjicit. Vel si *Cynoglossos* hujus non sit: (nihil enim certi ex tam paucis verbis, quæ citat Athenæus, colligi potest) optimo tamen jure, ut à cæteris Buglossi generibus distinguatur, *Cynoglosson* appellari posse, neque aliud esse genus, cui hoc nomen aptius quadret. Nam cum vera Solea suavitatis saporis Perdicæ comparatur, hanc ferinò plane esse sapore, viscidamque duram, contumacemque coctioni, insuaveque quid & grave olere. Nec probat Rondeletius eos, qui pabuli tantum ratione differre credunt, quandoquidem pabuli varietas, etsi saporem succumque immutare potest; ad corporis tamen habitum formamque immutandam nullam vim habet. Frequens est in Oceano. Bellonius in Mediterraneo mari etiam *cap* scribit, & à Massiliensibus *Servatin* appellari, quod tamen falsum esse Rondeletius asserit. Totus, ut ipse etiam ait, fusco colore est.

Quarta eidem Rondeletio *Arnoglossos* sive *Arnoglossus levis* dicitur, quod quemadmodum plantaginis herbæ à figura vel foliorum levitate *Arnoglossi*, id est, agnæ linguæ nomen impositum est, ita species isthæc Soleæ, *Arnoglossus* à levitate vel figura rectè (inquit) nominabitur; squamis enim carere videtur, prorsusque lævis esse. Suis *Perpeire* vocari ait, & ex Solearum genere esse, ex corporis habitu, figuraque cognosci: Differre autem ab aliis, quod multis squamis tenuissimis & statim deciduis, integatur: corpore esse valde gracili, candido.

Quintam diminuto nomine *Ligulam* dicit, quod sit in hoc genere omnium minima, negatque majorum Solearum foeturam esse, quando quidem semper parva sit: nunquam dodrantalem magnitudinem excedens. Lineam quæ corpus dirimit, spinamque firmat vel tuetur, huic ex squamis ait esse compositam longe eminentioribus, quam in toto corpore, dempta ea parte, quæ circa maxillam inferiorem est: durior carne esse quam Buglossus lævis, glutinosaque nonnihil habere: satis rarum esse piscem, & ob corporis tenuitatem vilem.

Sextam ac postremam Gallis *Flettam* di-

ctam quod fluitando natet, antiquis (ut putat) incognitam, solisque Oceani accolis notam, Græcorum imitatione, qui rei magnitudinem & speciem particulis indicant, Hippoglossum appellat, quod cæteras non solum Soleas magnitudine vincat, verum etiam quatuor digitorum longitudine quandoque inveniatur. Esse autem ex Solearum genere vel ex primo aspectu judicari posse scribit: oblongo enim (inquit) contractoque est corpore, parte altera candida, altera nigricante, in qua oculi sunt. Ore est conorto, dentibus munito cithari modo, quibus Buglossi carent. Carne est dura, sed suavi, ad Rhombi naturam proximè accedente. Ossa habet spongiosa, quibus inest medulla, quæ à cupidum amatoribus expetitur. Piscis est maris Oceani, Antverpiæ salitus, & in frusta dissectus venditur. Capitur etiam sæpe in Oceano juxta Gallie Bononiam. Ibi hujus frusta farinæ massæ probe subacta & pasta inclusa, aromatisque condita in furno coquantur, ut diutius servari possint & exportari. Aldrovandus, non tantum aliud Hippoglossi genus, squamis præditum minoribus, undique sibi concolor, flavescens scilicet, quodque à latere uno lituras nigras, pinnam & caudas in extremo caruleas, habet, exhibet: sed & alterius Soleæ genus, quod squamis tegitur latissimis, estque unicolor & albicans. Quam Bellonius *Taniam* vocat, illa tenuis gracilisque piscis est, & quod Athenæus de *Taniis* prodidit, Alexandria, Canopi, & Seleuciæ in Antiochia, frequentissimè reperitur. Benè ab Aristotelis & Rondeletii *Tania*, in qua pinnarum numerus cum Anguillis convenit, distinguitur. Omnium ferè marium piscis est, sed cum Rhombis Pontum ingredi Plinius negat, flumina ingressos multum pinguescere, Londini Bellonius didicit, in stagnis deteriores evadunt. *Listorales* sunt Oppiano, Ovidio in herbosa arena degunt. Terrâ hoc est vado maris excavato per hyemem condicitur.

Nam quia lapides in capite habet, & corpore est tenui, frigus exhorrescit. Quantum ad usum in cibis, Matron Parodus apud Athenæum, mediocre succum præbere, ut saxatiliū vicem supplere possint, scribit. Galenus Passere molliorem, perperam asserit.

Duram enim esse, vel exinde, quod diutius servetur, longa vectura putrescat, sic melior reddatur, colligitur. Facile tamen concoqui & minimè excrementitiam esse, apud Rondeletium lego. Patinam ex soleis apud Apicium vide.

Aldrov.
Hisor.
Piscium.
lib. 2.
cap. 43.

Arist. H.
A l. 2.
cap. 13.

Oppian.
Halieut.
l. i. v. 99.

Athenæ.
Dipnol.

Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.
& l. de
Cibis bo-
ni &
mali suc-
ci c. 3.

Apic. l.
2. cap. 4.

PUNCTUM II.

De Citharo.

Tab. XX.
14. 15.
Ælian.
H. A.
l. 11. c. 23.
Oppian.
Halieut.
l. 8. 98.
Aristot.
H. A. l.
2. c. ult.

Citharus, Æliano *καθάρου*. Oppiano, cui littoralis est, *αἰθίου* dicitur. Nomen à lineis quibus à summo capitis vertice, ad extremam usque caudam distinguitur, invenit. Gaza, ex Aristotele, qui inter eos, quibus complures appendices circa ventriculum exeunt, numerat, *Fidiculam* vertit. Quatuor ejus nominis pisces, explanorum genere omnes, esse, Rondeletius luculenter ostendit. Galenus planum & Rhombo similem facit, & quod Philotimus cum inter *μυδιόμοις* omiserit miratur. Ælianus Buglossus seu solea assimilatur. Galeni Citharum, Rondeletius eundem esse arbitratum cum eo quem Athenæus ex Aristotelis libro de animalibus & piscibus sic delineavit: Citharus ferratis est dentibus, solitarius, alga vescitur, linguam solutam habet, cor album & latum: esseque illum Psittaceum piscem, qui Romæ satis frequens, *Folio* nominatur. Cum enim lingua piscibus à natura data sit ossa, & non soluta: vel dura, spinea & adhærens: isque unicus sit ex planis, cui lingua soluta sit teste Aristotele, contra omnium aliorum piscium naturam: haud temere sese judicasse existimat, cum ex hoc, tum quod reliquæ memoratæ notæ ex assè respondeant, hunc verum ac genuinum Citharum esse. Quod si verò quis hunc Rondeletii piscem pro Citharo non accipiat, quoniam squamosus cum sit ex Rhombis utpote lævi cute præditis, quibus à Galeno assimilatur, esse nequeat, huic responsum esse volo, assimilationem ad Rhombum, non ad corpus, sed ad carnis qualitatem, referendam esse. Ælianus vero suos Citharædos squamosos facere: quamobrem etiam admiror Rondeletium suum hunc piscem Rhombo quodammodo similem esse dicere, cum neque tegumento, squamosus enim est, neque figura, oblongus enim respondeat: quare prudenter subiunxit, Buglossus similem esse, si squamas excipias, quæ Citharo magnæ sunt, Rhombi instrumenti figura. Ab hoc Aristotelis Galenique Citharo differre putat idem Rondeletius, eum qui Archestrato apud Athenæum rufus sive subflavus cognominatur, assandusque & caeco multo, oleoque condiendus esse dicitur, quique, sine sumptu apparari non potest: esseque eum quem alii verum Buglossum esse volunt, non ob figuram solum, sed etiam ob asperitatem: Est enim bovis lingua magna & aspera, quomodo buglossum herba etiam nomen invenit. Superiori similis est figura, lingua magis soluta, oris scissura magna, dentibus ferratis, squamis intectus rotundis, aquarum asperitate *Citharum asperum* etiam appellari posse existimat, buglos-

sique nomine comprehendi. Virgam habet à capite ad caudam protensam, latiusculam, majoribus squamis constantem. Partibus internis superioribus similis est. Venæ optimus reperitur Carne est inter duram & mollem Galeno media. Stomacho ingratus malique succi Xenocrati. A Diole assus commendatur. Rondeletius, quod salpæ modo alga pascatur insuaviorem prodidit. Apollini qui Citharam invenit, sacrum, apud Athenæum legimus.

Athen.
Dipnol.
lib. 7.

PUNCTUM III.

De Rhomboide Rondeletii, & Passeribus squamosis.

Ælian.
l. c.

Athen.
Dipnol.
lib. 7.

Rhomboides Rondeletii, *Rhombi* nomine Romæ ab ichthyopolis venditur. Fortè melius, *rotundus Buglossus*, vel *rotunda folia* aut *lingulaca* vocaretur. Squammis parvis integitur. Oculi multum invicem distant. Linea à capite ad caudam per medium corpus ducta initio sinuosa: dein recta, corpus in duas æquas partes dirimit. Corpore est exiguo & brevi: nunquam enim palmi magnitudinem superat, quantum Rondeletio licuit observare. Internis partibus à Rhombo non differt. Carne est media, neque molli nimium, neque dura. Ejus nullam à veteribus mentionem factam fuisse credit. Junius in suo nomenclatore Belgico vocat Sarde. *PASSERUM SQUAMOSORUM* tres idem Rondeletius species ponit. Priorem *Limandam* Galli dicunt, ob corporis tenuitatem, ut Bellonius conjicit, quam cum diffilis dolabra asseribus communem habet. Angli un Brut. Hic teste Iunio, Batavorum Grieta est. Ego enim id non satis memini. Flavas in pinnis, quæ corpus ambiunt, & in reliquo corpore maculas habet. Linea corpus interfecans, sinuosa. Magnitudine ad Quadrantulum (de quo mox) accedit. Lucidiori aëri expositus, pellucidus videtur. Dentes teste Bellonio inter ceteros sui generis pisces, longiores habet: squamas conspicuas valde tenues atque asperas, quæque difficillime cuti adimuntur: quod cum solea quidem magis, cum ceteris vero minus, commune habet. Vento indurati ingenti quæstu ad mediterranea loca Germaniæ superioris venales feruntur. Gallis ex Britannico littore recentes adducuntur. Italiæ planè ignoti sunt. Carne aiunt esse candida, humida, molli, parum glutinosa; non multum Buglossis sive Soleis inferiore.

Tab. XX.
16.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 45.

Altera species Gallis Flez, Anglis Phlonder teste Bellonio, qui *Flesum fluviatilem* vocat, verum improprie, & contra piscis naturam: non enim in fluminibus nascitur, sed in mari, ex quo in flumina migrat, ceterorum planorum more. Corpore est, quam vulgaris passer, paulò longiore,

& ubi adolevit, crassiore. Squamis integitur parvis: colore est nigro. In corpore pinnaeque in ambientibus maculas rufas habet. Oculis munitur in capite, medioque corpore in parte supina.

Tertiam Britanni *Helbut* dicunt, Hollandi *Heilbut* vel *Eelbut*, Germani *Heilgbut*, Galli *Fletelet*, nomine (ut apparet) diminuto à *Flez*, cum alioqui sit major, cætera similis est. Utraque in Anglia & Belgio frequens: nobis, Gallisque & fortassis antiquis etiam incognita, quia ad Oceanum usque non pervenerunt, nec in Oceani piscibus cognoscendis multæ operæ studiisque posuerint. Utriusque caro candida & mollis, salubris & delicata: *Fletuletus* tamen paulo durior est.

CAPUT III.

*De Piscibus littoralibus
lævibus.*

ARTICULUS I.

*De Piscibus littoralibus non
planis.*

PUNCTUM I.

De Sandilz Anglorum.

Tab. xxj.
1.
Aldrov.
de Piscibus lib.
2. c. 49.

Piscis, quem jam descripturi sumus, Anglis *Sandilz*, id est Anguilla de arena, tum quod longo sit corpore, tum quod sese occultaturus sub arenam se citissime mergit, dicitur. Gesnerus *Ammodytem* vocabulo Græco vocavit. Capite est tenui ac rotundo, rostro longiusculo & acuminato: ore parvo: corpore reliquo ablongo, si latitudini conferatur. Nam cum ejus medium (caput enim & cauda arctiores sunt) pollicis crassitudinem non superet, longitudo ad palmi mensuram extenditur. Quamobrem sicuti longis, sic etiam & parvis annumerari piscibus debet. Cum neque pollicis latitudinem, neque palmi longitudinem excedat unquam. Dorso præterea (in quo pinnae duæ reperiuntur, in eo medio una, ac prope caudam altera) subcæruleus. Ventre verò in quo præter binas, quas utrimque habet pinnae, una etiam alia post excrementorum orificium subsistit argenteus conspicitur. Frequentissime in Britanniae littoribus capitur. Sepè etiam in Bononiensi, ubi idem nomen obtinet. Quibusdam anni temporibus, seu majorum piscium injurias fugiens, seu naturæ impulsu, aqua derelicta, sub arenam penetrat: inde pedibus & pectinatim incisilis lignis, ab incolis extrahitur. Pauperum duntaxat necessitatibus inservit.

Huc pertinet alter pisces *Meersuyn* id est, *Porci* marini nomine missus, quod Porci more rostro terram fodiat. Lituris & specie

corporis *Lucium* imitatur, sed aculeum rectum in fronte gerit. Lituræ omnes nigrae sunt. Pinnae ventris, caput supinum & cauda rubent: cætera flavescit. Marinus ne verò, an dulcium aquarum piscis sit, non satis memini, quamobrem historia ad priorem piscem pertinet. Marinum tamen esse nomenclatura docet.

PUNCTUM II.

De Dracone.

DRaco piscis, Græcis veteribus *δράκων* *Drakōn*, modernis *drakona*, unde Siculi, Neapolitani, & Romani suum *Tragine* deflexerunt, dicitur. Jovius *Trachurum*, qui in cauda, non cervice aculeos habet, perperam vocavit. Plinius qui *Dracōnis* marini nomine duos diversos pisces, ut ex libro nono capite vigesimo septimo colligi potest, intelligit, quorum unum serpens marinus est, quem Aristoteles libro nono capite decimo septimo describit, ab *Araneo* male specie distinxit, quem & *Isidorus*, qui *Araneum* ita describit, ut *Draconi* huic marino omnia competant, secutus est. Quod ab *Araneo* *Aristotelis* distingui debeat, mirum non est, cum ejus *Araneus*, à nullis Græcis authoribus venenatus esse tradatur: hunc omnes post *Pastinacam* venenosissimum asserant.

Salvianus duo ipsius genera ponit. *Primus* piscis est oblongus, & ut *Bellonius* ait, forma pugionis modo compressa, unde à quibusdam Gallis *Poignastre* vocatur quasi pugio. Salvianus squammis carere dicit, item *Bellonius*, vel saltem exiliores habere, quam sint serpentium. *Rondeletius* parvas ei tribuit ac tenues, *Ælianum* (ut apparet) secutus, qui asperas habere scribit *quidam* quæ fere serpentibus tribuuntur, & ipse etiam *Rondeletius* sine squamis & planè nudum *Draconem* pingit. *Percam* marinam quodammodo refert capite, magno scilicet & rotundo. Os non in longitudinem, sed in obliquum, nec recta sed curva scissura fissum habet: Connexa enim latera inferioris maxillæ (quæ paulò longior est superiore, nec recta nec oblique sursum porrigitur) à concavis superioribus lateribus, dum illud clauditur, suscipiuntur. *Dentibus* ut in *Dracone* serpente id communitum est. *Oculi* magni sunt, quibus magnitudine supercilia respondent, sursum spectantes, ac adeò splendide virescentes, ut smaragdum pulcherrima viriditate superent, iidem brevi intervallo à se distant, in quo triangulum expressum & aculeos parvos cernas. *Branchiæ* utrinque quaternæ, quarum exteriora opercula aculeo ad caudam spectante armantur, ut dictum est: quæ opercula post articulationem cum ossibus capitis, tenui membranæque simili substantia possunt

Tab. xxj.
2. 3. 4. 5.
6.
Aldrov.
de Piscibus l. 2.
c. 50.

cuiusquam ossa constant, quamobrem Draco ea cum extra aquam aërem trahit, inflat, non aliter quam nos buccas inflammas. Ad branchias *pinnae duae*, eo situ, ut in fluvialibus, hoc est, inferiores multo quam in marinis esse solent: inter has & scissuræ oris finem, in parte superna, duæ aliæ minores, candidæ. In cervice vel dorsi principio quinque habet *aculeos* tenues, nigros, præacutus, tenui membrana anteriori parte nigra, posteriori vero alba connexos, quibus venatum vulnus infligit, multoque perniciosius quam branchiarum aculeis. Ab hac, pinna incipit ad caudam usque continuata, quæ magna est, lata, atque adeo bifurca. Alia denique est à *podice* ad caudam etiam usque: qui diverso in hoc quam in aliis piscibus loco situs est: cum enim alii in medio cum habeant ventre, alii vero inferius versus caudam, in Dracone non procul à branchiis distat: unde fit quod brevis admodum ventris ejus sit capacitas interna, cum tamen carnosus sit & satis amplus *ventriculus*. Colore est vario. Dorso enim fusco est, ventre candido, lateribus lineis aureis transversis pulchre distinctis. *Alter* qui fortè non malè *Dracunculus* Plinii vocari poterit, quemque Salvianus minorem vocat, in nonnullis à priore differt. Cum enim major crebrò ad libræ unius & duarum etiam aliquando magnitudinem excreseat, (Rondeletius in Oceano aliquando cubiti magnitudinem attingere tradit) minor ne dimidiam quidem libram implet: præterea capite & corpore reliquo non rotundo, ut major, sed in latera compresso est: cujus denique latera non subluteo solum colore, quo major ille insignitus est, sed frequentibus etiam & obliquis ad cæruleum colorem vergentibus lineis pulcherrime depicta sunt. Aldrovandus *quatuor* Draconis species exhibet. Prior aculeo ad branchias, pinnarumque numero cum præcedenti convenit, colore vero & maculis lineisque differt. *Ossa* branchiarum colore sunt roseo, sed in extremitatibus aureo. Aculeus item aureus, sicuti & pinnae, quæ sunt ad branchias: quæ vero in pectore conspiciuntur, albicant, cæteræ subvirent. *Os* pronè quoque viride, supinè albicat. Dorsum ex subviridi fuscescit, maculis rotundis ad castaneum vergentibus densissimis conspersum. *Venter* argenteis lineis crassiusculis contrario invicem ordine oppositis decoratur. Cauda tota ex cæruleo ad amethystinum tendit. *Alter* species in vertice insignem habet aculeum; colore est in dorso subcastaneo, ventre albo, valde maculosa. Pinna cervicis inter quatuor priores aculeos in summitate atra est, cætera fusca: quæ verò ad caudam usque protrahuntur, & cauda etiam ipsa, coloris ferè sunt violacei. *Tertia*, capite est castaneo, præter os quod pronè supineque, ferè violaceum est. Oculi, in vertice ferè ut in *Callionymo*, inter

duos locati aculeos. Pinnae branchiarum & pectoris, item quæ in ventre est, roseo sunt colore: Quæ verò in cervice cernitur, ad quartum usque aculeum violaceo, cætera albicat, & rotundas, fusci coloris maculas ostendit, quemadmodum & subsequens, quæ ad caudam usque excurrit. Dorsum ad castaneum vergit, & nigricantibus maculis insignitur. Latera & venter viridescunt. *Quarta ac postrema*, magna ex parte castanei est coloris, dilutioris in capite, intensioris in dorso. Lineæ quæ à branchiis sunt ad caudam usque plane ferrugineæ. Tota pars supina candicat. Pinnae ad branchias & ad pectus, rubræ sunt: cæteræ cæruleæ, sed aristas habent rubras. Cauda præterea in extremo ferruginea est. *Locum* si spectes. Bellonius pelagium æquè ac littoralem scribit. Aristoteli simpliciter talis est. Oppiano in petris, & arenis pascitur. Loligunculis & aliis minutis piscibus vescitur, ideoque Nicander *maris vastatorem*, Epicharmus *maris* nominat. Gregalem non esse vel inde conjicies, quod nunquam plures capiantur. Mirum etiam, si verum est, si manu dextro attrahere coneris, violenter reniti, si sinistra, cedere & capi, quod *Ælianus* prodidit: nec minus, eo tempore cum piscium genus amore tenetur, in vulnere quod iste inflixisset, pisciculos illi similes procreatos fuisse, quod multorum piscatorum testimonio narrat Gillius. Ictum ejus venenatum esse, piscatorum periculo certum est, sæpe nomas, sæpe febres & inflammationes excitat, plusque à vivo quam mortuo periculi. Remedia varii varia ostendant. Plinio mulus illitus aut in cibo sumptus prodest. Dioscoridi & Galeno Draco proprio ictui applicatus placet. *Æginata* cerebrum piscis in potu præscribit & sulfur cum aceto imponit. *Aërius* locum affectum cum plumbo fricari jubet. Piscatorum experientia jecore illito dolor mitigatur, foliorum lentisci affricu punctura curatur. Genuenses exiguum *Thlaspis* genus, quod in ipsi littoribus nascitur, admovent. Recentis piscis è capite cinis, contra omnia venena prodest, mirabili discordia, si Rondeletio credimus. Plinius, ossibus gingivas scarificare jubet, ut dentium dolores sedentur.

PUNCTUM III.

De Dracunculo.

DRACUNCULI Plini. inter veteres meminit. Inter Recentiores à Rondeletio describitur. Est piscis marinus inquit, dorantali magnitudine, cotto fluviali non multum abfimilis, rostro acutiore, & capite latiore, Ranae etiam piscatrici quodammodo similis, sed Rana piscatrix ore est majore, pinnis concoloribus, quæ in Dracunculo variae sunt. Capite est magno, compresso, rostro

ÆL. H. A.
l. 5. c. 37.Aërius l.
13. c. 36.Aldrov.
de Piscibus lib.
2. c. 50.Tab. xxj.
6.

prominente, ore parvo sine dentibus, sine ulla ad branchias scissura; sed hujus vice supra caput utrimque *foramen* est, ut in Hippocampo, quod, nisi dum piscis vivit, eoque aquam trahit, & emittit, manifestum est. Oculos magnos supra caput positos habet: capitis os in aculeos definit ad caudam spectantes. *Pinnas* longissimas pro corporis magnitudine habet, partim aurei, partim argentei coloris æmulas. Quæ ad branchias sitæ, aureæ sunt, in radice argenteæ. Quæ in supina parte, à cæterorum marinorum piscium pinnis, situ magnitudineque dissident: nam & ori propiores sunt, & longiores iis quæ sunt ad branchias. In dorso duæ eriguntur: prior (hac in pictura vix apparet) parva est, aurea & argenteis lineis distincta; posterior magna admodum in medio dorso, papilionum alis non valde dissimilis, radiisque quinque hordei aristis similibus, membranaque constans. Radii priores longiores sunt, posteriores breviores, contra quam in membrana, quæ singula radiorum intervalla, veluti intertexta occupans paulatim crescit. Eadem quoque varia est, lineis etiam argenteis in medio duarum nigrarum sitis distinguitur. Hæc in medio dorsi cavo veluti in vagina conditur. *Alia* est à podice ad caudam, etiam aurea demptis ejus fimbriis, quæ nigricant. Corpus totum sensim gracilius fit, & in pinnam longam terminatur, cujus fimbriæ nigricant. Est & picto corpore: nam ab hujus medio, argenteæ lineæ ad ventrem ductæ sunt. In maxillis partibusque anterioribus veluti punctis argenteis notatur. *Ventre* est lato, plano, candido, cuticula tantum tegitur. Capitur in Agetesi littore, in primis Caniculæ vigentis tempore. Venustas & summum Dei in eo artificium pretium ei fecere. Carnis substantia Gobionibus parvis similis est, iisdem alimentis vescitur. Ictum minus venenatum habet.

Icon Dracunculi Tabula XI V. 2.

PUNCTUM IV.

De Uranoscopo.

Tab.
XXI. 7.
Aristot.
H. A.
l. 8. c. 13.
Ælian.
H. A.
l. 13. c. 4.

Piscis, quem *Uranoscopus* seu cœli speculatorum dicimus, Aristoteli, Dioscoridi, & Æliano *καλλιονομο*, Theodoro *pulcher* dicitur, non tam ob corporis pulchritudinem, deformis enim est, quam vel quod Uranocopi nomen sit pulchrum, & homine quam pisce dignius. Massilienses *Tapecon* quod, cum pelli instar conformatus sit, aliquam cum pudendis similitudinem habeat; & *Raspecon*, quod caput ob asperitatem ad scalpenda pudenda muliebria accommodari possit vocant; Oppianus *καρυσκον*, quod interdiu dormiat, noctuque vigilet, Hesychius & Varinus *καρυσκον* seu Arenarium dixere, quidam *Αἰνι*, id est, castum, Athenæo vocari credunt, sed mendum subesse putat Gesnerus. Piscis est levicure, eaque

dura, & quæ facile excoriari potest, præditus: corpore fere rotundo: capite magno os quoque & duobus aculeis ad caudam spectantibus aspero, quo Ranam piscatricem quodammodo refert: vertice admodum lato.

Rostro quodammodo caret. Os alio quam in aliis piscibus fieri solet, loco situm est, nimirum supra caput, & (ut Oppianus ait) inter medios oculos, estque magnum & valde paculum & inferiore maxilla sursum maxime attracta clauditur. *Dentes* habet exiguos, *linguam* brevem sed latam, quæ internas oris partes ita occupat, ut nisi digito eam comprimam & submoveam, non videantur. Ex ea parte quæ inter linguam est, & maxillam inferiorem oritur, teste Rondeletio, *membrana* in principio latiuscula, sensum in carnosam rotundamque apophysin definens, extra os propendens quæ pisculos allicit, & allectos devorat. Eandem cum vult, retrahit, & exerit, veluti serpens linguam. Pars inter oculos interjacens depressa est concava. *Branchiæ* utrimque quaternæ sunt, quarum ossea opercula, posteriore parte aculeo robustissimo ad caudam spectante horrent. Luxta branchiarum scissuram *pinnæ* duæ magne & robustæ, crassæ, & mucosæ & variæ exoriuntur. Subsunt in parte supina duæ alæ minores, albæ, maxillæ inferiori propinquæ. Has pinnas sequitur os veluti sternum, quod tribus aculeis horret. Succedit pinna alia à podice ad caudam. In dorso duæ sunt, quarum prior capiti propior parva est & nigra, ut in Araneo: posterior ad caudam eandem usque porrigitur, dorso concolor.

Cauda in pinnam latam definit, Pavonis caudæ, dum piscis vivit, æmulam, fimbriæ purpurascunt, *Venter* est subalbidus: dorsum vero ac partes reliquæ ex cineraceo fusca apparent, qui colores, dum vivit manifesti sunt, alioquin unâ cum vita pereunt.

A capite lineæ duæ ex squammulis constantes ad caudam protenduntur. *Ventriculus* amplus est, crassus & carnosus, cum appendicibus plurimis, intestinae revoluta, *hepar*, candicans, à cujus exteriore parte felle vesica pendet, admodum magna pro corporis ratione, felle valde distenta, quod substantia & colore oleum æmulatur: cujus rei meminit Plinius, nulli piscium hoc copiosius esse scribens: citat autem Menandri auctoritatem in comæditis, immemor fortassis ejusdem mentionem fieri ab Aristotele, qui nempe Callionymo in jecore vel inesse tradidit proportionem corporis omnium copiosum: addit Ælianus hunc Philosophi locum recitans, jecur ipsum tradere ad dextrum latus collocatum esse Menandrumque huic rei testimonio esse in Mesenia, his verbis: *Facito te felle habere Callionymo copiosius*: item Anaxippum in Epidicazomeno dicentem; *nisi moveas & sicut Callionymi fervere efficias*

Aristot.
H. A.
l. 2. c. 15.

efficiat omne fel. Lien exiguus, rotundus atque rubens, ventriculo hæret. *Vulva* bifida est & longa.

Aristot.
H. A. l. c.

Aldrov.
Hist.
Piscib.
l. 2. c. 51.

Hippocr.
lib. de
affect.
intern.

Non multum excrescit, & raro pedalem longitudinem excedit. *Littoralem* esse Aristoteles prodidit, post eum Rondeletius, *Carne vescitur*, & pisciculis apophysi illa quam extra propendere diximus, insidias struit. Adnatant tanquam ad vermem, & capiuntur. Si cibum capto obieceris, eo usque se infarcit, ut cibus ad ipsum os redundet. Adeo vivax est, ut si omnibus internis spoliis, moveatur adhuc. Comeditur à plebeis, quia virosi odoris est, unde *gravis* Diphilo apud Athenæum vocatur. Nec mirum, cum cœnolus aquis vescatur. Hippocratus tamen non solum non inprobat, sed & in victu præscribit. Nonnulli felle oculos Tobie curatos fuisse volunt. Cicatricee sanare & carnes oculorum supervacuas consumere Plinius tradit.

PUNCTUM V.

De Trachuro.

Tab.
XVII.
17.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 52.
Oppian.
Halieut.
l. 1. v.
106.

T *Trachurus* seu ut Oppianus & Galenus scribunt *trachurus*, quo nomine apud Latinos veniat, ignoratur. Lacertum male vocari vel exinde patet, quod iste si pro peculiari specie accipias, vocatur. Male & *trachurus* dici Oppianus, qui tanquam diversos pisces appellat, testatur. Forma ejus nisi paulò longior esset, *ovata* dici posset. Cum enim ejus medium corpus latiusculum sit, deinde utroque versùs arctatur, donec rostrum ore clauso, atque extrema pars caudæ carnea, acuetur. Inferior autem maxima, quæ superiore paulo longior est, cum os clauditur, non recta sed oblique sursum excurrit, unde os etiam non in longitudinem, sed in obliquum scissum est, dentibus adeo paucis & minutis munitum, ut edentulum videatur: revera tamen maxillarum pars denticulata est. Est autem ut Scombræ admodum magnum: item oculis, ut in Melanuro. *Branchiæ* utrimque quaternæ. *Pinnis* natat quatuor, quarum duæ majores ad branchias sitæ sunt, duæ aliæ minores in ventre: aliæ item duæ in dorso eriguntur: prior latior & brevior, in eminentiore dorso: altera paulo inferius arctior, sed longior, nam per dorsum reliquum fere usque etiam ad caudam porrigitur. *Podex* in medio ventre est, à quo alia denique pinna ad caudam usque demittitur. *Cauda* autem bifurca est, similis *Acus* vulgaris. In medio corpore *lineam* habet à capite ad caudam deductam, multis ossiculis, ita horridam, ut serra esse videatur, non rectam quidem sed media sui parte inflexam & obliquam, in cauda eminentiorem, asperioriorem quàm in aliis partibus, quæque ob id *caudam quadratam* efficiat. Squamæ caret, *levis* tantum cute præditus. Dorsò

subcæruleus, ventre verò & lateribus argenteus est, purpureoque aliquantulum emittitur, ut inde *varius*, id est, varium forte dixerit Numenius. *Trachurus*, cujus hic iconem damus, colore fere est albicante, aureis ubique lituris varius. Cauda ex violaceo fere ad cæruleum vergit. Ad pedalem magnitudinem perraro excrescit. Versantur circa littora. Numerosi omnibus anni temporibus seu nassis, quod veteribus apud Oppianum suctum, seu retibus, quod hodie in usu, capiuntur, ut inde gregales esse conicias, & Romæ *Friçture* nomine, venundantur. *Ælianus*, equam in utero habentem, si ei cauda Trachuri appendatur, piscis mox liber in mare dimittatur, non multò post abortum pati, prodidit, vere an falso non dicam. Inter duræ carnis pisces, à Philotimo censentur, ideo Diocles apud Athenæum aridos vocavit, nec dissentit experientia, nisi fortè externa pinguidine, aut jusculo tener aut jurulentus fiat.

Oppian.
Hal. l. 3.

Ælian.
H. A. l.
13. c. 27.

Athen.
Dipnos.
l. 7.
Galen. de
Alim. fac.
cult. l. 3.
cap. 31.

PUNCTUM VI.

De Scombro.

Qui Græcis *scombrus*, is Latinis Scomber & Scombrus, Horatio *Piscis Iberus*, plerisque nationibus, *Macarel* & *Maquereau*, non tam à Græco *scombrus*, quod Scaligero placet. hoc enim nomen iis potius conveniret, qui veteribus Opsophagis Dii vocantur, quam, leno, quasi, quod verno tempore parvas *Alaufas*, quas virgines dicunt, subinde subsequi soleant, dicitur. *Corpore* est terete, denso, carnoso, utrimque in acutum desinente, *rostro* scilicet atque corporis extremo, cui cauda annectitur: & si parva magnis comparare licet, Thynno (ut Scholiastes Aristophanis scribit) similis. *Oris* scissura ingens pro corporis portione, *dentes* exigui, *caput* rotundum, inferior maxilla in superiorem recipitur, & clauditur pyxidis modo. *Oculi* magni, aureo colore micantes. *Branchiæ* utrimque quaternæ: juxta quas pinnæ binæ, totidemque in ventre. A podice alia est, eique supra posita in dorso similis: quas ordine certisque intervallis, aliquot aliæ pinnulæ subsequuntur, quod tamen huic soli proprium non est, sed cum Thynno, Pelamydibusve commune. Alia denique est in dorso initio aculeis nonnullis horrida.

Tab.
XXIV.
9. 18. 11.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 53.

Cauda in lunatam pinnam degenerat. In ipsis aquis sulphurei coloris est, extra non qui cæteris, (ut Plinius ait) sed ferè cærulei, sulphureum autem colorem quem intelligat, alias explicat, inquiens: Fulmina & fulgura, sulphuris odorem habent, ac lux ipsa eorum sulphurea est. Est vero cæruleus ille eorum color potissimum in dorso: nam venter lateraque argentea sunt. Totus lineis nigricantibus, obliquis, insignis est: squamisque caret, licet apud Athenæum squamatum

tum esse quispiam velit, negandi vocula videlicet librariis omiffa. Ad cubiti magnitudinem accedit. Sunt *mari peculiares*, & aliquando juxta arenosa litorea degunt, saepe in petris, quæ chamis & patellis plenæ sunt. Et si autem tam in Oceano quam mari mediterraneo, sinu Adriatico, & Hellesponto, capiuntur: juxta Herculis tamen insulas, prope Carthaginem novam tam copiosi & frequentes sunt, ut una earum Scombraria teste Strabone dicatur: In Oceano tanta crassitudine proficiunt, ut pari cum Pelamydibus magnitudine, authore Bellonio evadant, in Adriatico parvi sunt. Existimavit aliquis in minore maris ambitu frequentes prædas exerceri, ideo non crescere. Vix ad Tergeste ac proximum sinum comparent Scombræ: atque ilico capiuntur. In Oceani laxitate fuga moram, mora parit incrementum, ideo grandescunt qui non capiuntur. *Gregales* sunt, & à locis frigidioribus calidioribusque, tanquam Thunni, ut qui imbecilliores, dulcioris pabuli gratia, discedunt. *Beneficii* memores esse, *Ælianus* exemplo singulari, prodidit. Mane à piscatoribus cibati, feras combros gentiles suos cogunt, & corporum suorum abjectu ita concludunt, ut fuga sibi consulere non possint, hinc capiuntur. *Inferviunt & mensis*. *Diphilus* leves esse, & facile è stomacho descendere dixit. *Hiccius* multum nutrire, minus vero facile excerni judicavit viscosiores & crassiores, concoctu difficiles, & excrementitios esse, experientia eos docuit. Venetiis verno tempore quo pinguiores sunt, in delitiis habentur. Romæ ob siccitatem inter ignobiles reposuit. Quia graves & ventriculo refectarii, id est, sale inveterari scripsit *Athenæus*, habenturque inter *varicina* optimi. Veteres ex iis *garum* quoddam habebant, de quo ita *Plinius*. Est etiamnum liquoris exquisiti genus, quod *garum* vocavere, intestinis piscium cæterisque, quæ objienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur è pisce, quem Græci *Garum* appellabant (ut supra ostendimus) Nunc è Scombro pisce laudatissimum in Carthaginis Spartariæ cæteriis: sociorum appellatur, singulisque milibus nummum permutantibus congios peno binos: Nec liquor ullus pene præter unguenta majore in pretio esse coepit, nobilitatis etiam gentibus. Scombros quidem & Mauritania, Bæticaque & Carteja ex Oceano intrantes capiunt, ad nihil aliud utiles: Laudantur & Clazomenæ garo, Pompeiique & Leptis, sicuti muria Antipolis ac Thurii: jam vero & Dalmatia. Vitium hujus (gari nempe, non muria, ut *Rondeletius* vult) est alex, imperfecta nec colata fæx. Coepit tamen & privatim ex inutili piscicula, minimoque confici, Apuam nostri vocant: Forojulienfes piscem ex quo faciunt Lupum (super quo no-

strum judicium supra diximus) appellant. Transit deinde in luxuriam, creveruntque genera ad infinitum: sicuti garum ad colorem mulsi veteris, adeoque dilutam suavitatem, ut bibi possit. Aliud vero ad castimoniarum superstitionem, etiam sacris Iudæis dicatum, quod sit è piscibus squama carentibus (legendum apparet non carentibus, nam Iudæi hodieque nisi squamosos edunt, & non squamosos abstinent, ut duo gari sint genera, unum è squamosis, ut ex Lupo sive Encrasicholo, Manaque & Smaride consimilibusque alterum ex Levicute præditis, ut ex Scombris) hic lex pervenit ad ostrea, urticas, gammaros, Mulorum jecinora, innumerisque generibus ad saporem gulæ coepit sal tabescere. Hæc obiter indicata sint desiderii vitæ & ipsa tamen nonnulla usus in medendo. Hujus usus apud nos desuit, apud Turcæ Constantinopoli non item: quia pisce plerosque frigos vendunt, iis intestina & branchias eximunt, immituntque muria, ut in garum vertantur. Sociorum vero Garum vocatur, seu quod ganeones & lurcones eo sociatim uterentur, ut quidam Galeni scholiastes putat, seu quod à lociis populi Romani, Hispanis nempe deferretur. Fæcosum ac plane foetidum fuisse, facile Martialis indicavit, dum dicit.

Unguentum fuerat, quod Onyx modo parva gerebat,
Nunc postquam olfecit, Papilus, ecce garum est.

Usus in Medicina si spectes, arquato morbo correptis comestis opitulari *Ælianus* scribit, in aceto putrefactos mulieres strangulatu oppressas excitare *Plinius*.

Ælian.
H. A. 1.
12. c. 46.
Plin. H.
N. 1. 32.
c. 20.

PUNCTUM VII.

De Colia sive Lacerto.

Piscis quem *colias*, *colias*, & *colias* in vulgaris Aristotelis exemplaribus, seu a pica varia, quam *colias* aut *colias* dici, nescio quo authore Bellonius credit, quod variegata latera habeat, unde *colias* *Athenæo*, seu aliam ob causam vocatur. Theodoro seu *Monedula*, & *Graculus*, Latinis ut C. Celfo, Columellæ, ac Martiali, *Lacertus* audit. Magnam eorum cum Scombris affinitatem esse, non tantum inde colligere licet, quod ab Aristotele & Columella semper simul nominantur: sed etiam quod Lemnicolæ magnitudine duntaxat à Scombris differre asseruerint, & *Plinius* Coliam Lacertorum minimum faciat, quod & apud *Athenæum*, qui Sardam Coliæ magnitudine esse scribit, habemus Pariunt semel anno. In cibis laudantur, qui in Propontide antequam pariant, Amyclani, Hispani, quos Sexetanos (Sexi authore *Plinio*, Boeticæ Hispaniæ oppidum est) Martialis vocat, ex quibus forte Salsamentum. Gadicitanum,

Tab.
xxviii.
12.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 25.

Aristot.
H. A. 1. 9.
c. 2. l. 8.
c. 13.

Colum.
mel. R.
R. l. 1. c.
13.
Arist. H.
A. 1. 5. c.
9.

Aristot.
H. A. 1. 8.
c. 13.
Galen.
de Alim.
facult.
Martial.
Epig. 1. 7.
Athen.
Dipnos.
l. 3.

Scaliger
in Exerc.
cit.

Aristot.
H. A. 1.
9. c. 2.
Aristot.
H. A. 1.
8. c. 12.
& 13.
Plin. H.
N. 1. 9.
c. 15.
Ælian.
H. A. 1.
14. c. 1.

Plin.
H. N. 1.
31. c. 8.

ditanum, cujus apud Hippocratem mentio, & Parii seu Pariani, unde Parium apud Archestratum nutritrix Coliarum dicitur. De Carnis qualitate non conveniunt Authores. Xenocrati est stomacho ingrata, arida, mali succi, excretu facilis, & copiose nutrienda. Athenæo glutinosa, acris, mordax, & deterioris succi. Cornelio Celso, gravissimi alimenti. Saliri solitas apud Martialem invenies. Muria ad dentium dolores Medici utuntur. Patinam ex Lacertis apud Apicium vide.

PUNCTUM VIII.

De Sauro.

Tab.
XXI. 13Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c.
55.Ælian.
H. A. l.
2. c. 25.

Quem Saurum Græci vocant, hunc præterque Latini *Lacertum* vocant, a Trachuro distingui vel exinde patet, quod & Oppianus de Trachuro & Sauro tanquam de diversis piscibus agit, & Speusippus apud Athen. Acui & Sphyræna similem esse, quod Trachuro non convenit, scribat. Duo ejus esse genera Ælianus tradit, videlicet *nostras*, & *peregrinum*, in rubro mari nascens: *Nostras* caput habet (inquit Salvianus) tenue & rotundum, rostrum oblongum, & acutum. Os magnum plurimis atque exiguis dentibus munitum: Oculos mediocres, rotundos & aureos: Branchias utrimque quaternas: prope quas binæ & parvæ sunt *pinnae*, utrimque scilicet una: alia duæ & majores in ventre, in medio dorso una haud magna quinis senisve aculeis horrida erigitur, aliaque una multo minor in medio dorso caudæ vicina reperitur: è cujus regione ab ano, qui in hoc pisce caudæ satis proximus est, alio paulò major intro ventri hæret. Cauda in unam lunatam pinnam degenerat. Corpus oblongum est & rotundum. Unde non ineptè à Speusippo in secundo similitum, Sphyræna, Acus & Saurus similes esse dicantur. Sphyræna enim satis similis est hic noster Saurus: similis & Acui, si acus illam rostri dempseris tenuitatem. *Ventre* est subalbido, lateribus luteis, dorso ex viridi nigricante, maculis quam plurimis virentibus, rubeis, cæruleis, luteis atque nigricantibus, dorsum, caput, & latera, nonnullorum serpentum instar, variè admodum pingentibus: Quamobrem non solum ore, rostro, capite, atque reliqua corporis figura, sed colorum etiam varietate proximè ad eò ad terrestres Lacerti accedit similitudinem, ut ei simillimus, si pedes ex ceperis, videri possit. Ventriculum habet oblongum & satis magnum: appendices non multos: intestina mediocria: hepar bifidum, & subrubeum: Lienem subatrum. Pedali mensura majorem adhuc non vidimus. Ab hoc nostro Sauro aliquantulum diversus est, qui in rubro mari reperitur, quem his verbis describit Ælianus: Rubri maris Saurus (interpretis reddit Lacertum) est, cujus ma-

gnitudo ei qui nascitur apud nos, æqualis est virgatus, spectatur, lineis nimirum aureolis circumdatur à branchiis ad caudam pertinentibus, quas media argentea distinguunt: ore est hiant, maxilla inferior eminet in superiorem, virides oculos habet, quos aureo fulgore palpebræ ambiunt. Ab hac delineatione non omnino abhorret *peregrinus* iste *piscis*, supinè subviridis, prone castaneus, lineis sive lituris, maculisque orbiculatibus subviridibus decoratus. Rictum oris habet maximum, Lacertorum terrestrium plane æmulum & validissimis dentibus instructum. Branchiarum opercula flavescunt, punctis referta ferrugineis. Pinna tergoris & branchiarum, & cauda ex ferrugineo rubent. Quæ vero in ventre sunt, ejusdem fere cum ventre sunt coloris. In mari vivit, & cœnosis locis delectatur. Carne vescitur, nec à putridis abstinere. Aristoteles inter gregales reposuit: sed cum in mari mediterraneo singuli capiuntur, solivagos melius dixeris. tam raro capiuntur, ut vix annis singulis Romæ in foro piscario bis deni capri videantur. Inter pisces molli carne præditos Philotimus reposuit; inter mollis & duræ medium, Galenus. Editur assas & frixus. Alexis apud Athenæum, branchiis exemptis, cæsis spinis, lotum atque incisum, & laferè probè pulsatum, caseo, sale, & origano implendum esse docet.

Athen.
Dipneff.Ælian.
H. A. l.
11. c.
49.Oppian.
Hal. l. 2.Galen de
Alim. fa-
cult. l. 3.

PUNCTUM IX.

De Corææ Rondeletii, Milvo

ejusdem, & Boopis ra-
ra specie.

CORÆA Rondeletii, Romæ nomine cum Lyra communi, *Capone* vulgò à capitis magnitudine dicitur. Piscis est marinus, corporis forma Milvo Rondeletii similis, aculeorum pinnarumque magnitudine discrepans. *Ossa*, branchias integritate, cæolata, in aculeos desinunt. *Pinnae* quæ ad branchias, minores quam in Hirundine Rondeletii, majores quam in Milvo sunt, ex viridi nigricantes parte interiore, exteriore albescunt, cum maculis rubescentibus. *Dorsum* ex cæruleo nigricat, latera rubescunt. *Venter* lactei est coloris. *Caput* est magnum: locus inter oculos cælatus. In dorso *virgæ* ex ossiculis contextas, instar Cuculi habet: in eodem pinnas duas: prior est brevior, cum aculeis longioribus, acutioribusque, posterior longior, cum longe minoribus aculeis. Linea simplex à capite ad caudam ducta est. Palato minus est flavo quam Milvus. *Ventriculum* parvum habet cum multis appendicibus, *intestina* tenuia, *hepar* ex albo rubescens. Carne est, si Athenæum sequimur, durior: si Celsum, teneriore, dura tamen.

Tab.
XXII.
1. 2.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 56.

Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 57.

MILVUS Rondeletii, qui Gallis *Lucerna*, quod noctu luceat, piscis est marinus corporis forma Corvo persimilis, corpore magis rubro, capite minus lato, utrinque compresso. Pinnarum numero caudaque similis, magnitudine & colore dissidens. Quantum ad colorem attinet, parti pinnarum quæ ad branchias sunt externæ, nullæ maculæ rubræ insunt: interna ex viridi non nigricat, sed pinna istæ partim flavescunt, partim nigricant. Linea à branchiis ad caudam ducta simplex non est, neque lævis ut incorvo: sed ex acutis brevibusque aculeis horret. Non squamis, sed cute aspera contegitur. Partibus internis. Mullo imberbi similis. Palatum parvum flavum est. Carne est dura & sicca.

Tab.
XIX. 6.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 58.

BOOPIS species ita à Rondeletio describitur: Rarus est piscis, cujus nomen neque à piscatoribus nostris neque ab aliis potui unquam extorquere propter raritatem. Palmi majoris est longitudine, totus à squamis nudus, ore parvo, oculis valde magnis pro corporis ratione; in pronis partibus pinnam habet ad caudam usque continuam, cauda lauta spissaque est. Ad branchias & in ventre binas pinnas habet. Sapore, carnis substantia, oculis Boopem refere.

ARTICULUS II.

De Piscibus litoralibus lævibus planis.

PUNCTUM I.

De Passere lævi.

Tab. xxij.
7. 8. 9.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 47.

PASSER lævis, Aufonio *Plateffa*, aliis *Pecten*, quod ejus pinna rectæ & parallelæ pectinis speciem præ se ferant, Hollandis *Scolle*, dicitur. Bina eorum apud Gallos genera. Unum, quod communiter *Plya* vocatur, & magnitudine excellit. Alterum, quod alibi *Carriet*, alibi, à quadrata corporis figura *Quarret*, *Quadratuli* nomen sortitum est. Etate tantummodo differre, à quibusdam proditum; ex corporis forma, quæ *Quadratulo* magis quadrata, & pluribus maculis rufis sive subflavis, ostendit Rondeletius. A Rhombis situ differunt. Si hos ita in latus componas, ut oculi in cælum suspiciat, & mentum deorsum versus spectet, pars supina erit dextra, si Passerem similiter constituas, supina pars erit læva. Ita *marinus* est, ut & dulcium quoque aquarum sit studiosissimus: In Oceano tamen numerosior quam alibi reperitur. Juxta Livoniam sunt pinguiissimi, & inde vento indurati ad mediterranea exportantur. Saxatilibus *Mnesitheus* accenset. Ovidius in herbosis. Oppianus de *μαῖναι καὶ τοις ὕδασι* degere credit. Vadum, ubi piscatorem sensit petere, terræ adhærescere, aquam,

ne videatur, turbare, Alberti M. fide habemus. Carnem ejus mollem Philotimus dixit, sicciorem Diocles, duram & probi succi Xenocrates, mediam Galenus. Optimi marini, qui etiam nigriores, secundum qui in stagnis albidiores & lutum resipiscentes, locum sortiuntur, mollissimi & insipidi, qui in fluviis vixere. Nonnulli in cibum, cum jam putrescere, & malè olere incipiunt sumptos, alvum perturbare asserunt.

Gesner.
de Aquatilibus.

PUNCTUM II.

De Rhombo.

RHOMBUS piscis, à figura quadrata, cujus latera omnia sunt æqualia, anguli verò obliqui, nomen sortitus est. Nonnullis dicitur, ut ex Plinio & Athenæo, qui Romanis Rhombum vocari testatur Græco nomine piscem, qui aliis Græcis nuncupatur, colligimus. Duo sunt ipsius genera, *Aculeatum* unum, *læve* alterum. Illud prona parte multos habet aculeos, circa caput, quod grandius & elatum est, & ab hoc caudam versus maximè. Magni in Oceano & mari mediterraneo capiuntur, ideo forte Rhombus latior est patella Martiali. Rondeletius vidit, qui quinque cubitos longus erat, latus quatuor, spissus pedem. Optimos Adriaticus sinus maximè circa Ravennam alit, & hos veterum exornasse mensas arbitratur Platina. Celebrantur & Attici circa Eleusyniam, quos Lynceus Samius *Psettarum* nomine dignatus est. Ei qui *verus esse* putatur, pinna & cauda in extrema rubescunt; Cætera est unicolor, subvirides, rotundis punctis stellulisque undique plenis. Omnium locorum & temporum piscis est. Ovidius in herba algosa, Jovius circa pinguiorem terram extremosque littorum margines versari scribit, in fluviis ostiis frequentissime piscibus insidiantur. Voraces sunt, & piscium, cancerorum imprimis avidissimi. Abditi pinnas exertas movent, specie vermiculorum. Terra, seu vado maris per hyemem condi, à Plinio sub nomine *psetta* proditum. Tardissimè propter corporis latitudinem moventur. Inter delicatissimos olim fuisse cibos, ex Horatio, & Juvenali potest colligi. Tempore Jovii, *Aquatilem Phasianum* quidam appellare erat solitus. Galenus inter pisces mollicarnes retulit, sed aliter Xenocrati, & Villanovano visum. Ille duræ esse carnis, & difficulter concoqui ait. Hic inter crassos viscidos excrementitios, reposuit: nisi forte superiores de lævi, cujus pulpa candida & pressa quodam humore succulenta; hos de aculeato, qui revera duri or, locuti sint. Vivus impositus medetur lieni, si remittatur in mare, si Plinio credendum.

Tab. xxij.
10. 11.
12. 13.
Aldrov.
de Piscib.
l. 2. c. 48.

Plin. H.
N. l. 9. c.
42.

HISTORIÆ NATURALIS

DE

PISCIBUS.

LIBER II.

De Piscibus, qui in mari & fluminibus degunt.

TITULUS I.

De Squamosis.

CAPUT I.

De Salmone.

Tab.
XXXI.
12.

PISCIMUM, qui in mare æque ac fluminibus degunt, alii quam longissimè à mari recurrunt, & ad fluviorum originem usque penetrant, alii in marium proximis morantes, mox id regrediuntur. Utrorumque quidam sunt *squamosi*, alii *Leves*. Ex illis sunt *Salmo*, *Lupus*, *Latus*, *Alosa*, *Ziga*, *Albis fluvii*, *Mugil*, *Capito* *Anadromus* *Gesneri*, *Caper*, *Sturio*, *Galeus* *Rhodium* & *Cataphraëtus*.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 18.

SALMONIS solus inter veteres Plinius mentionem facit. Aufonius hoc nomen adultæ ætatis ut *Sarionis* seu quod melius *Farionis* mediæ, & *Salaris* primæ imposuit, illud tamen *Truttæ* convenit. Circa *Rhenum* & apud *Helvetios* ætatis tempore ad *Jacobi* usque festum vocatur, *Salin* inde ob festum *Andræ* *Lachsi* *Lachsi* nomine gaudet. Cum *Essoce* *Plinii* eundem, quod *Georgio* *Agricolæ* placet, vix credo, cum alibi enim suo nomine appellet, & per *Essocem* *Lucium* intelligere videatur. An *Anchorago* *Cassiodori*, difficile dictu, nam à *Rheno* duntaxat venire scribit. Apud *Græcos* nullum invenio nomen, qui ait *Salangem*, cujus piscis tanquam delicati mentionem facit *Hesychius* aut *Andræ* vocari posse putant, suo iudicio fruuntur. *Descriptionem* si spectes. Piscis est sat magnus. Bieubitalis quidem ut plurimum est: apud *Mislenos* tamen & *Deßlaviæ* à *XXIV.* libris ad *XXXVI.* accedit, in *Helvetia* circa *Tigurum* graviores capiuntur. *Basilea* quinque aut sex pedes longos dat, nec temere *Cetaceum* piscem dici posse *Bellonius* reliquit. *Squamis* tegitur exiguis, & maculis ita notatus, ut totus ferè piscis subruellis & luteis notis insignis videatur, quia verè in capite iis caret. ideo *frontem lubricum* Poëta dixit. *Os* habet amplum, &

valde denticulatum; nam præter id quod maxillæ magnis & validis armatæ sunt dentibus, palatum etiam quadruplici eorundem ordine munitur, linguaque hamatis dentibus horret. Hunc quadruplicem dentium ordinem *Bellonius* huic pisci præter aliorum fluvialium morem, peculiarem esse ait, & cum *ceraste* serpente communem: additque plures esse inferiori maxilla, quam in superiori. *Tergus* colore fere est cæruleo, aut ex cæruleo, nigricat. *Oculi* magni sunt. *Narium* foramina utrinque gemina: *Branchie* utrinque quaternæ, quarum opercula lata, & rotundis puniceis maculis plena sunt. *Pinne* juxta easdem binæ, totidemque in dorso, quarum prior in medio fere dorso est, altera caudæ proxima, cutacea, carnosaque. In ventre tres sunt, binæ fere in medio, tertia à podice qui in imo ventre est. *Caudam* in unam latam, & rotundiusculam pinnam desinere *Salvianus* ait. *Rondeletius* verò bifidam esse testatur, indeque *Salmonem* jure *salmonis* nominare posse putat. Quoad internas partes, *Cor* angulatum est, ventriculus oblongus & angustas, hepar in nullos lobos divisum: rubrum *Rondeletius* tradit, *Salvianus* & *Bellonius* pallescere dixerunt: huic vesicula fellis ex viridi nigricantis annexa est. *Splen* ex rubro nigricat. *Alvus* ipsi prodiga nutat, & opimato abdomine fluit venter. *Gesnerus* à faucibus patulis duos se observasse meatus scribit, deorsum protensos, unum ad ventriculum, quem cesophagum vocant; alterum anonyum, (cujus usum ignorat, quandoquidem nihil in eo reperit, nisi forte ruminat (inquit) hic piscis & alimenti sui partem ibi repositam habet) qui cute candida & tenui constat. De *Maris* & *femina* differentia ita *Aldrovandus*. *Fœminam* à mare differre *Rondeletius* & *Salvianus* volunt, quod illa rostrum habeat magis aduncum, hami modo, indeque vulgo in *Gallia* *Beccard* appellari. *Bellonius* verò dum dubitat, num sit diversa species: fœminam esse interea insinuat, inquiens: Est & alius prægrandis *Salmo* (fœminam esse autumat) quem vulgus *Gallicum* ab ejus ore prægrandi *Beccard* vocare solet: alii à ferendis ovis *Portiere* (*Portiere* forte nimirum à portando.)

Aldrov.
de Piscib.
l. 4. c. 1.

Differtis à mare Salmone, quod labrum inferius in hami modum aduncum habeat. In superiore enim labro foramen est ad palatum tendens, in quod hamus maxillæ inferioris se recipit, pixidatimque in tubi modum insinuatur. Alii aliter de hac rostri curvitate sentiunt. Gesnerus testatur suos piscatores in mare tantum incurvari insigniter, in fœmina perparum. Rondeletius quoque mari recurvum esse ait, sed fœminæ magis. Quidam vero eruditus in epist. ad Gesnerum, in qua de Albis fluvii piscibus ad ipsum scribit utrumque sexum id ceu quid præter naturam pati arbitratus inquit: Salmo in Mulda (hoc flumen ex Albi ingressus) si obstaculum seu præcipitium aquæ juxta Dessaviam, secundo ac tertio frustra saltu superare conatus fuerit, vadum petit, eoque in loco sub lapidibus & saxis delitescens, emaciatur, & contabescens maculis rufi seu ænei coloris impletur & rostrum inflectit in magnum hamum, eo quidem majorem quo diutius manserit. Verum tamen credit vir ille doctus idem ei tandem contingere, etiam si obstaculis omnibus superatis ad summas fluviorum partes eluctatus fuerit. Ex rostri itaque curvitate sexus non sat tuto distinguitur, tutissime vero ex ovis. Addit Bellonius fœminam crebrioribus mare, iisque subrubris & rufis orbiculis in cute variegari: atque in Lepradis (de quo suo loco diximus) modum multis coloribus sugillari. *Marinus* magis quam fluvialis piscis est. Nam & in iis duntaxat fluminibus quæ in mare se exonerant reperitur: & observatione notum est, si supra annum in eis perseveraverint, inspidos fieri, si diutius, post annum secundum ceu sideratos interire. Observatus in Albi adeo tabidus, ut exanguis & nullis ferè intestinis apparet, nati vero ex eo pisciculi, nec longiores nec crassiores digito evalere, quamdiu ibi vel juxta stagnantibus aquis immorabantur. Uberrima eorum in Bothnico mari versus Lappones captura, circa solstitium in extremis littoribus circa Thornam tanta magnitudo capitur, ut fortissima retia pondere suo rumpant. Apud Vestrogothos quoque, in provincia Vermelandia, in qua dulcium aquarum locus certum millibus passuum in longitudine, & quadraginta latitudine patet, magna Salmonum est copia.

In Albi quoque, Vistula, Duna, Multavia, Sala, Mulda apud Misenos habentur. Rhenus & Mosella gratissimos alunt. Minus commundati quos Scaldis, Thamesis, Garumna, Sequana, & Ligeris exceperunt. In Rhodano, qui capi existimant, falluntur. Hoc præter Rondeletium & Scaliger Pater prodidit. In Occidentalis quoque Indiæ fluminibus numerosissimi capiuntur. *Cibus* ipsi Salvianus pisciculos tribuit. Alii ante XXV. Julii pediculis aquaticis vesci, à partu obvios pisciculos comedere, eosdem-

que in ventre repertos, prodidere. Nonnullis in dissecto spissus quidam humor, subflavus, & lapillus candidus, visus. Quidam in majoribus nihil unquam, in parvis nescio quid reperiri tradunt, illos sola aquæ turbidiore victitare opinantur. *Vita* est tenacissima, sub uno corde pullante, recentem captorum indicio, plures in frustra dissecti à piscatoribus venduntur. Robertus verò Constantinus, exenterati, aquosa sanie aspersum, ultra diem vivere vidit. De *Partu* proditum, per autumnum & hyemem, ad veris interdum initia, in fluviiis, & minoribus rivis lubentius parere. An & in Oceano nemo tradidit. Scrobs excavatur. Ova pisorum magnitudine fœmina ponit: mas rore genitali irrigat. Ova paulatim auferuntur, & spiritu vitali inflata, ultro per aquam deferuntur, & Salmulos producant. Salmulos mares aliquando genitura plenos reperiri, & cum fœminis adultis coire, eorumque ova rigare, cum in Salmulis fœminis nulla ova reperiantur, admiratione dignum est. De eorum *salu* ita Gesnerus: Muldam flumen præ cæteris diligit Salmo, & (ut quidam putant) ab aqua Albis fluvii qua cum permixta in mare se exonerat, discernit. Itaque plurimi eo in loco, ubi Mulda in Albim influit (Dessaviam vocant, quod oppidum est Principum Anhaltinorum) capiuntur, hoc modo: Ad Muldæ in Albim ingressum Principes vallum sive obstaculum quoddam excitant, ut ita redundans aqua ad molendina reverteretur, octo cubitis aliquando altius: vallo graves & magnas arbores imposuerunt, & perticis magnis intus cancellarunt, ne Salmo transiliat. Inter perticas alicubi nassæ sunt collocatæ. Hunc locum cum attigerit Salmo, qui per Albim ascendit, saltu adversus aquæ præcipitium se proripit in altum, ubi vel in nassam incidit, & capitur, vel arborem perticæve contigit, indeque violenter in Muldam se trajicit. Hoc si prima vice non successerit, secundo etiam tertioque experitur, & si ne tum quidem transilire aut assequi altitudinem valli potuerit, vadum petit, inique sub laxis delitescens emaciatur ac contabescit. Si tamen flumen Albis augeatur & crescat, adversus illud subinde fontium & originis cupidus ascendit, parit, & consumptus tandem macie ac siccitate moritur. Adeo verò nativus huic pisci saltus est: ut Salmunculi etiam, si in vase aliquo venales cum aliis permixti in aqua fuerint, aqua eis adempta exilient, unde & ab aliis piscibus dignoscuntur. Alii saltus causam in Robur, quidam in Hirundines, à quibus mense Junio & Julio infestantur, nonnulli in loca abrupta conscendendi libidem, conjiciunt, quod apud Hæctorem Boethium invenies, Singularem in *cibis* habent gratiam, ita ut omnibus piscibus præferantur, suavitatem si spectes. Habenda tamen ætatis, loci, & temporis anni

Plin. H.
N. l. 9.
c. 18.

anni ratio est. Salmunculi, qui sex vel septem digitos non excedunt, Aprili & Majo in diliciis habentur: adulti, tenuiores in fluviis evadunt, si ea non longè subiere. Moderati tum exerciti, si longius progressi sunt, nimio labore tabescunt. Plinius Aquitanicis palmam detulit, Rhenanis Albertus, qui mense Majo suavissimè eduntur. Miseni post Pentecosten placent. Partui vicini, cum & rostrum curvatur, & maculas ærei coloris gerunt, damnatur. Salitos & infumatos bona Europæ pars distrahit.

N. Icon. Salmonis Salviani ad Tab. 31.

CAPUT II.

De Lupo & Lato.

Tab.
XXIII.
3. 4.
Aldrov.
de Piscib.
l. 4 c. 2.

Quem Latine à voracitate *Lupum* vocant, Lucill. Catillonem vocavit, is Græcis *λῦρος* aut *παρα πῶς λῦρος*, ut Athenæus author est, ab ipsa vehementia: aut quasi *λῦρος* *βίβω*, valde vorax, ut Eustathio placet, vel *διὰ τὴν ἐκείνου αἰσὶν τὴν σίμα*, & *ἀδρίαν* & *οὐχὶν* *ἀδρίαν* quod illi os hiet, & repente cumque impetu avide vorat, ut Suidas vult, dicitur. Nec *Lucium* esse, quod Philadelphus voluit, quod hic in fluviis & lacubus degat, nec *Sturionem*, quod Volateranus & Poggius Florentinus tradidere, quod hic squamis careat, nec carnivorus sit, nec *Lacciam* seu *Ciepm*, quod hæc dentibus distituatur, certum est. Piscis est squamosus, squammæ argenteæ sunt, mediocres, & ferratæ, quæque carni & inter se validissimè coherent. *Rostrum* habet oblongiusculum, *Os* cum hiat valde patulum. *Linguam* oblongam, si Athenæo ex Aristotali fides, ossæam, & adhærentem. De *dentibus* non conveniunt scriptores. Carere Massarius, & Rondeletius, quod ob oris magnitudinem facile prædam devoret, tradiderunt, tenues confuso ordine undecunque Bellonius posuit, plurimos, tenuissimos, multiplici ac vario ordine dispositos, pectinum instar, quibus lanarii utuntur, Salvianus. *Oculi* sunt magni. *Branchiæ* utrimque quaternæ. Harum operculum duobus ossibus constat, quorum superius postrema sui parte squamatim committitur. A summis branchiis per utrumque latus linea fere recta ad caudam ducitur. *Pinnae* Aristotele teste, binas habet parte prona, totidemque supina. Quæ prona parte capiti proxima est, octo vel novem acutis & inæqualibus aculeis tenui membrana colligatis horret: altera unico tantum. Contra supina parte caudæ vicina aculeos habet ternos. *Cauda* in unam pinnam degenerat. In parvulo, ut diximus, nigræ apparent *macula*, quæ in paullo adultiore prorsus delitescunt, Grandiusculus enim argenteus est, dorso tamen paullo minus quam ventre candido. Locus etiam colo-

Aldrov.
de Piscib.
l. 4. c. 2.
Athen.
Dipnosl.
7.

rem mutat, nam qui in mari capitur, excaeruleo candicat, in ostiis fluviorum, totus albus est. *Carnem* habet secundum Iovium lacteam, secundum Bellonium rubescen-tem, seu is diversæ speciei, sive Oceanus aliquid mutat. *Cor* triquetrum, ut Athenæus ait: *ventriculum* amplum, & longum: appendices binas maximè conspicuas, *jecur* subflavum, in duos lobos divisum, quorum dextro fellis vesica committitur, *Lienem* rubrum & longum, *intestina* lata nec multis complicata anfractibus: *folliculum* plurimo aëre tumidum, spinæ dorfi validissimè annexum. Bellonius è pusillo *magnum* ac ceta- ceum, Salmonis more vadere solere testatur, ut ex Oceano libras quindecim nonnunquam pendere visus sit. Salvianus ad viginti libras, aliquando excrecere observavit. Quomodo Columella quosdam sine macula, varios alios faciat, & quid Plinius per suum Lanatum, intelligat, facilè hinc colligi potest. Ita marinum esse piscem, ut & *λῦρος* *βίβω*, & ostia fluviorum non refugiat, Galenus præter Oppianum author est. Sed & in dulcibus, Letho nempe Lybiæ circa Berenicem fluvio nasci, Athaneus memorat: nihil de Columella, qui Velinum, Sabatinum, Vulsinensem, & Ciminum, eosdem procreare inuere videtur, dicam: secus n. insequenti sentire creditur capite. In dulci portu quem Phaharium vocant, longè majores vulgaribus reperias, apud Miletum quoque prægrandes & plurimos, ut apud Aristophanis Scholiastem & Suidam legimus. Arcestratus apud Athenæum *δουβάρι* vocavit. Solet & mediæ cryptum penetrare saburræ. Qui in fluviis capitur, *Lane* à Martiale nomen accepit, & expressè de iis Plinius. In Lupis in amne capti præferuntur. In Tyberi amne inter duos pontes tanti precii, ut Philippus, apud hospitem Cassino in oppido, authore Columella Lupum sibi in cœna appositum gustabundus expuerit, dicens: Peream nisi piscem putavi: quasi in- nueret, solos Tyberinos lupos piscis nomine dignos esse. Lucillius isti Catillonis quasi Catillorum liguritoris nomen, teste Macro- bio, imposuit. Solet enim cloacas subire, & obvia quæque devorare. In India exundantibus in agros fluviis, in planis camporum vagantur, & ab aqua destituti prædæ sunt. *Vesitur* carnibus præcipuè, nec piscibus, vel corruptissimis escis parcat. In exenterati ventre serpens aliquando inventus est. Tan- git & algam, & stercorea: *λῦρος* *βίβω* Oppia- nus vocat. Iis maximè locis qua flumina in mare exeunt, ova parit æstate & hyeme, ideo alicubi bis idque inter fusaneos solus facere creditur, sed posterior partus infir- miorum. Sublimes *natant*. Athenæo sunt *μυρῖν* solivagi, Aristoteli *χόνι*, fusiles seu fusanei. Mugilum, Luporumque capturam uno retis jactu centū aureis coronis venisse,

Colu-
mell. R.
R. l. 18.
l. 17.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 17.
Galen.
Alim. l.
3. Op-
pian.
Halieut.
l. 1.
Colu-
mella R.
R. l. 8. c.
16.

Colum.
R. R. l.
8. c. 16.
Varro R.
R. l. 3.
c. 3.
Inven.
Satyra. 5.
Ælian.
H. A. l.
16. c. 12.
Arist. H.
A. l. 5.
c. 10.
Arist. H.
A. l. 6.
c. 17.
Idem l.
5. c. 9.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 15.
Arist. H.
A. l. 5. c.
2.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 2.
Oppian.
Halieut.
l. Plin.
tarch. l.
1. ultra ani-
mal.

Rondeletius oculatus testis est. *Solertia & ingenio* non destitui, docilesque sequentia docebunt. Rete circumdati harenas arant cauda, atque ita conditum transeunt rete. Et quamvis minus in providendo solertia quam mugiles habeant; magnum tamen robur in pœnitendo habent. Nam ut hædere in hamo, laxant vulnera, donec excidant infidia, quod præter Plinium, Oppianus, Ovidius & Plutarchus tradidere. In Eloro amne tam mansuetos esse, ut è manibus porrigentium cibum capiant, Nymphodorus auctor est. Et quia lapidem in capite hyeme sibi insensibilem se habere sentiunt, idè in abditos se tum gurgites demergunt, qui in sublimi natant, frigore congelati moriuntur. Cur inter alios pisces cum Mugile, Salpa & Chromide *clarissime audire*, post Aristotelem Plinius scribat, & in vado vivere addat, nescio, nisi fortè sublimem natatum in causa ponat. *Capiuntur* sæpenumero dormientes fuscina. *Inimicitias* cum Mugile & Squillis gerunt. Caudam illi prærodere Nigidius apud Plinium auctor est. Pugnantes invicem sæpè Puteolis, præfente Bessarione, Perottus vidit. Statis tamen mensibus concordantes sunt, & in unum gregem, si abundè cibarii, coeunt. Ab his cornu quod fronte exit, punctis interimitur, quem Oppianus & Ælianus describere: Magni olim apud Romanos opophagos æstimii erant. Plinius post Elopen & Acipenserem præcipuam iis & Asellis auctoritatem tradit. Archestratus Milesium *diversa* & quidem *duo* *si* *non* *antiqui* vocat, & Tripatinum summam cœnarum luxuriam ingrediebatur. Sed maximi, lactes, cerebrum & epar siebant. Illo Eliogabalus rusticos in mediterraneis pavit. Hujus gratia, Hermæus Ægyptius piscium institor, non nisi exenteratum vendebat. *Carnis qualitas* non nisi loci, temporis, & ætatis ratione habita, definiri potest. *Locus* si spectetur, in mari puro qui sunt, boni sunt Hicisio succi, sed pauci nutrimenti, sanguinem consistentia tenuiorem gignunt, & diutissimè citra putredinem, imprimis si nive circumdantur, servantur. Inter duos pontes Romæ capti, ob vitiosam aquam, graviter olent, & facillè putredinem concipiunt. Illaudati, qui in piscinis habentur. *Tempus* si respicias, deteriores sunt dum in utero habent: summa hyeme & Januario captis gratia, nisi fortè nimio exercitio soliditatem carnis ac quisiverint. *Lanatas* Plinius dixit, si ventrem attenderis quo mollitie & pinguedine blandiuntur. *Ætatis* ratione, tenelli suaves & stomacho grati sunt, copiosè nutriunt, & facillè per corpus descendunt: mediocres optimo se commendant callo. Apparatum alibi vide. *Ægris* in albo jure aut ex aceto optimè elixantur. An quod *εὐμαρῆς*, à Pythagora rejecti fuerint, dubito, Plutarchus certè postquam sic sentientium sententiam exposuisset,

patrocinari ipsis videtur. De usu in Medicina pauca occurrunt. Tanta est, si Marcello credimus, adversus strumas efficaciam, ut ad quamlibet corporis partem admotus, earum vitium persanct. Lapilli capitis dolorem levare, Euporistæ auctor tradidit.

L A T U S, inter Nili pisces à Strabone numeratur. Esse & marinum Archestratus apud Athenæum prodidit. Candidissimus est, ducentarum sæpe librarum magnitudine, & quovis modo paratus suavissimus. Rondeletius pro eo, Coracino ac Umbræ simillimum substituit. Tarentinus *Latili* piscis meminit.

Strabo, Geogr. l. 25.

C A P U T III.

De Alofa, & Ziga Albis fluvii.

A L O F A nomen, huic de quo jam acturi sumus pisci, post Strabonem Ansonius ex vulgari imposuit, Gregorius Tiphernas in Strabone, & Theodorus Gaza in Aristotele, *Spinos* quam moderni Græci *οἰσῶν* fortè quod spinis seu aculeis aliquando soleat inhorrescere, ejus nomine donarunt. Rondeletius Archippo & Mnesimacho *Spinos* appellari tradit; quam tamen à Thrissa diversam, ut Trissam cum Trichide eandem, Gesnerus, *varium* ut Panthera & Pavo Aristoteles facit. Nec *Lupus* est, quod Platina voluit; quod hic Mugili caudam prærodat, illam edentulam sciamus; nec *Clupea*, piscis magnus, qui crescente luna albus est, decrecente nigrescit, corpore minimum aucto à propriis spinis interimitur, in Areni Galliæ fluvio nascitur, in capite lapidem grano similem, qui ad quartanas sinistro lateri decrecente luna alligatus facit, & Attilem Padi, venam quandam in faucibus ejus mira cupiditate appetens, mori exanimat, ob rationem eandem. Universi corporis figura, si cum latitudine conferatur, oblongiuscula apparet, & in latera ita compressa, ut imus venter, rectâ lineâ præcutis aculeis & constructâ, & propterea non asperâ solum, sed ferræ etiam modo secante (si adversa deducatur manus) terminetur, *Spinis* sive *aristis* etiam scatet innumeris, & inter vescendum admodum molestis; quod cum Trichidibus quoque commune habet, unde Albertus, & Murmellius latinum ejus nomen Aristosium sive Aristosum confinxerunt. *Caput* habet in latera valde compressum, *rostrum* acutum. *Os* cum maximè hiat, admodum patulum, edentulum, atque omnis asperitatis expers. *Branchia* utrinque quaterne. *Squamis* tegitur magnis, tenuibus & facillè deciduis. In capite supra oculos, utrinque veluti gemmæ smaragdinae relucunt. *Lingua* nigricat, superiores mandibulae deorsum prominent. *Ventre* & lateribus argentum æmulatur. *Dorso* verò & capitis vertice ex albo flavescit.

Tab. XXVII. 3. 4. Strabo, Geogr. l. 15.

Aristot. H. A.

Plin. H. N. l. 4. c. 4.

Arist. H. A. l. 3. Plin. H. N. l. 9. c. 70. Plin. H. N. l. 9. c. 62.

Galen. de Alim. facult. l. 3.

Romæ

Aristot.
H. A. I.
9. c. 17.
Arist. H.
A. I. 8.
c. 2.

marinos in Cephalos & *scorpaenæ* distinxeris. *Næu* epithetum est omnibus Mugilibus commune, quod omnibus carnibus abstineant. *Næu* speciesi nomen est, sed speciem Cephalo alteram, quæ mucro suo vivit Epithetum, & idem cum *mugil* videtur. *Sargus* seu ut apud Aristotelem *σάργος*, quid sit, dubitatur, Rondeletius eundem cum *scorpaenæ* seu jejuno facit, Aldrovandus discernit. *Chelones* cum Bacchis Hicisio iidem, & Plinius Banchos inter Mugiles recenset, sed cum Myxone eosdem facit. Rondeletius Bacchum quintam quandam speciem Hicisio esse, insinuat. *Salmon*. Salviano cuneatus, Gesnero Cunealius, quod *σάλμων* & *σάλμων* *gracilis* & *quadratus* sit, ita dictus, à solo Eutydemo inter Mugiles reponitur. Alii *scorpaenæ* legunt, ut à *scorpaenæ* velpa, non *scorpaenæ* cuneo, isti pisces dicti fuerint. *scorpaenæ*, nomine Salvianus minorem aliquem in eodem genere ab Eutydemo poni putat, alii *scorpaenæ*, sed perperam legunt, cum duos in latitudine digitos non excedat: nec alii fortè fuerint, quàm quos Padi accolæ Canistrellos, quod in Canistris venaes ferri soleant, vocant.

Plin. H. N. l. 32. c. 7.

Galen. de usupart. l. 8. c. 6.

Cephalinus quibusdam cum *Blapsia*, teste Dorione idem, nisi mendum sit, & pro *Blapsia* *Blapsia*, quod idem quod *mugil*, ut Galenus scribit significat, legi debeat, & sic *Cephalinus* inter species *Nestium* numeretur.

Platarum nomen *Cestreis* à quibusdam imponitur, si Polemoni libro de fluminibus Siciliæ credimus. Actum de illis in capite de Murænis. *Species* *Mugilum* seu *Cestriorum* sunt quinque, apud Aristotelem, *Cestreus* nempe propriè dictus, *Cephalus* cognomento *Chelon* seu *Labeo*, *Cephalus pereas*, sive translitoranus, *Sargus* sive *Sargo*, & *Myxa* seu *Muco*. *Caput* nonnullis est magnum & depressum, *rostrum* breve ac retulum, ut *Capitonibus*, aliis minus & rotundius, *rostrum* magis extensum & acutius, ut *Cheloni*. *Os* omnibus parvum, rotundiusculum & edentulum. *Squamis* omnes teguntur. *Cestreus* magnas & crassas habet, quæ numismatis speciem mentiuntur. *Pinnas* utrinque binas gerunt, illos si excipias, quos lacus *Sipharum* gignit, quibus teste Aristotele, una tantum utrinque est, & supinis carent. Præter binas illas pinnas, quæ utrimque consistunt, unam habent abano; in dorso duas, quarum altera aculeata est, altera aculeis caret; ad caudam spectans. Omnes à branchiis *lineas* aliquot subobscuras ad eandem deductas habere videntur, etsi haud æquè in omnibus sint conspicuæ. *Dorso* sunt subnigro: *ventre* vero candido. *Ventriculus* teste Aristotele carnosus est: cui parte altera plures appendices exeunt: altera una tantum, ut idem ait. Rondeletius longè alium esse scribit quam in carnivoris piscibus, den-

Aristot. H. A. l. 6. c. 13. Arist. de part. l. 4. c. 13.

sum nempe & carnosum instar ventriculi avium, foris planum, intus rugosum, figura verticilli vitrei, quod mulieres fufis appendunt. *Intestina* quoque crassa sunt, pinguique & ingyros acta; in quibus splen latet, ut idem observavit, & sub pinna locum aère plenum reperit. Hepar pallet, parvum, & tanquam manu ventriculum amplectens. *Fel* rufum sive flavum, aquæ consistentiæ. *Cestreus* ejusdem Rondel. hepar ex albo rubeit: caro mollior, laxior, minus candida, minusque pinguis quam *Cephalo*, additque gulam habere; ventriculum in longam appendicem desinere, semper inanem esse, uti & intestina. Lapis quem *Cestreus* in capite gerit, *Echinus* & *Sphondylus*, ab echinata specie dicitur. *Lineæ* quæ à branchiis ad caudam ducuntur, *Cephalo* breviores sunt. *Chelon* sive *Labeo* nigricantes à capite ad caudam æqualibus spaciis distantes protensas habet. Habet & labra crassa, spissa, prominentia, unde *scorpaenæ* *Labeonis* nomen. Capite est paulo minore quàm *Cephalus*, oculis prominentioribus, sine pellicula illa concreta, quam veluti palpebram habet in capite. *Marinos* pisces esse nullum dubium, sed an omnes fluvios & stagna subeant, incertum. *Capitonum* alius translitoranus Aristoteli, quasi in alto mari degat. Galenus in stagnis quoque nasci scribit. Ut ut sit, *Cestreum* propriè dictum esse judico, qui longius à mari, ut in *Nisum* ita in alios fluvios recedit. *Cephalo* in ejusdem vicinia, propter dulcem aquam & limum morantur. Etsi autem aquas ament, ab imbribus tamen adeò vehementer læduntur, ut *visum* amittant, ut Aristoteles prodidit. *Cephaloni* imprimis oculi per hyemem albescunt: ipse tum & macer & cæcus, quod in *Nauplio* terræ *Argivæ* agro accidit, capitur: imprimis, si hyems alperrima fuerit.

Aristot. H. A. l. 8. c. 2.

Strabo Georg. l. 15.

Aristot. H. A. l. 8. c. 19.

Marinos à fluviatilibus, spinarum numero & quantitate distinxit Galenus, plures his & minores innuens: certius indicium sapor ipse suppeditat. Acriorem & pinguedinis expertem *Cephalum* dicunt qui præstantior.

De *Cibo* non convenit inter auctores. Carne abstinere Aristoteles tradit, vivente duntaxat Oppianus & *Ælianus*. Idem *Cestreum* alga & limo vesci scripsit. *Gulosus* autem maximè est & insatiabilis, idè in proverbium abiit, aviditas sæpè tanta, ut cauda verberando excutiat cibos.

Ælian. H. A. l. 1. c. 3. Oppian. Halieut. l.

Tanta iisdem salacitas, ut in *Phœnice* & *Narbonensi* provincia, coitus tempore è variis marem *linea* longinqua per os ad branchias religata emissum in mare eundemque *linea* retractum, scenimæ sequantur ad littus, rursusque foeminam mares partes tempore.

Plin. H. N. l. 9. c. 17.

De ipsorum *Generatione* ita Aldrovandus. Quod ad ortum generationemque eorum per-

pertinet: scribit Aristoteles esse qui omnes sponte oriri opinentur, quorum opinionem refellit, quoniam unicum tantum eorum genus sit, quod non coitu, sed ex limbo arenave enascatur: ceterorum veræ feminae ova, mares semen genitale habeant. Pariunt autem eodem tunc semel anno: sed an eodem omnes tempore, difficulter ex ipso colligas; alias enim Capitonem vere parere tradit ultimum, quoniam novissimè ejus foetus appareat: alias omnes Decembri mense gravescere ait, tricenisque diebus gerere, & in iis Capitonem quoque enumerat, alias Cestros ait inter primos partum accelerare, parere hyeme, locis iis maxime quæ flumina exeunt, dum uterum ferunt, præcipue graviter laborare; ideoque fieri, ut tunc potissimum ruant in terram ac excidant: ferri porro gravi stimulo agitato in terram, atque omnino in temporis motu perpetuo incitari, donec pariant, sed requiescere à partu continuo.

De Ingenio & aliis hoc habet. Tam veloces esse, ut jejuni transversa navigia superjacerent, & ubi dispositas piscatorum sensere insidias, retia supervolent, ut veluti sagittæ arcu emissæ videantur. Curvos hamos habere suspectos, ideo postquam diu circumnavare, cauda prius escam percellere, & quod avulserunt deglutire, mox ore in angustum collecto, summis tantum labris ac vellicatim escas stringere. Irritati, in sublime feruntur, & effugia quærunt, si aberrare, quiescunt, & necem prostrati expectant. *Usum in Cibus* quod attinet, Hicetius omnes Leuciscos & Mugiles boni succi esse, facile excerni, nec multum alere, scribit, nempe si mari puro capti sunt: Nam qui in cenosis locis, quales tum illi, qui in Etruria in Prillino lacu apud Orbatellum ad mediterranea deferuntur, tum hi, quos Padus atque ipsi luculenti Fossæ Clodiæ canales viscere prætenent, Ferrariensibus & Venetis copiosissimè præbent, pinguedinem humanæ naturæ infestissimam habent. Aristoteles in fluentis & lacubus, quod pinguioribus fiant, præstare dixit. Lynceus Samius hyeme post partum laudat.

Æstate lutum quod stagna exsiccantur, olent. Septembri, quod luto putrescente pinguioribus evadant, insalubres sunt. Optimi qui circa Abderam, deinde qui circa Sinopem capiuntur. Romæ maxima ovorum gratia, quæ teste Iovio, geminis folliculis circumcisa parte semines, recentibus Cephalis eximuntur, & nomen *ovorum salitorum* apud Græcos obtinere. Quantum ad *Medicinam*, Ventriculus Mugilum, seu in cinerem reductus, seu in fumo siccatus, & vel vino albo, vel aqua absinthii ablatus, & in cibo sumptus, ventriculi exsoluti vires non minus quam ventriculi gallinarum potus interna reficit. Elixus in

vino & ex aceto sumptus vomitum compefcit, prodehnt omnia Rondeletio. Lapilli in cerebro contra Nephritim valent.

CAPUT V.

Le Capiton Anadromo Gesneri.

Capitonem Anadromum, *Gesnerus* & *Kentmannus* descripsere. Nasurus, inquit, ille, videtur, prominente & carnosa superiore oris parte, ut in nostris fluminibus, is quem Nali nomine descripsimus: cui etiam reliqua corporis specie per omnia adeo similis est, ut discrimen nullum animadvertam, ne colorum quidem ferè, nisi quod Albinus hic Nasus magis albicat, noster fluviatilis, vero magis fuscus est. Sed noster plane fluviatilis est, Albinus è mari ascendit: præterea noster vilis & plebeius est, Albinus vero inter laudatos, præsertim assus. Hoc etiam notandum, cum Albinus alio nomine *Blicca* dicatur, longe alium piscem eodem nomine à nostris vocari, de quo egimus inter albos pisces. Miseni etiam Zertam dicunt, quod nomen etiam Polonis usitatum audio. *Zerta* inquit *Kentmannus*, piscis longiusculus, argentei nitoris, squamis parvis tegitur, dorso subfusco: *pinnis* quæ ad branchias sunt & parte supina rutilis, pauco ceruleo admixto. Linea utrinque à branchiis ad caudam tendit, in qua puncta fusci coloris digeruntur. *Caput* crassiusculum, oculi pulchri, magni, albicantes, nares magnæ non procul ab ore. *Os* molle prorsus, in quo nec dentes sunt, nec alia asperitas, sed ab initio gulæ seu faucium, maxilla utrimque valida, dentibus senis oblongis vallata. Maximi hujus generis pisces qui apud Misenos capiuntur, bilibres sunt. Libram XVI unciarum dico. Anno toto ex Oceano in Albim ascendit hic piscis, maxime vero circa Pentecostem, qui tempore parit, migrare solet, tunc etiam ad cibum præfertur, quod feminae oris plenæ sunt. Manent & pariunt in Albi, proficiuntque ipsi & soboles: augentur enim & pinguescunt. Velcitur omne genus pisciculis, qui nullis præsertim spinis & aculeis rigent: item muscis aliisque insectis, quibus intra aut proxime supra aquam potitur. Habetur inter optimos qui in Albi sunt, assari solitos pisces. Caro enim ejus optimi saporis est. Ritè etiam elixus non male sapit. Desquamatus nempe, exenteratus & elutus, in aquam fervere incipientem immittitur, conditusque ac salitus ad juris ferè consumptionem coquitur, quomodo permulti etiam alii fluviatiles pisces elixari solent. Sunt qui juri haud fere consumpto copiosum butyrum addunt, eoque liquato piscem inferunt. Potest & aceti aliquid affundi, & Zinziber aspergi, pro cuiusque palato. Assus vel simpliciter, vel cum embammate è cæpis minutatim concisis, vino, croco, saccharo & Zinzibere,apidissime estur.

Tab.
XXIII.
6
Aldrov.
de Piscib.
l. 4. c. 7.

Plutarch.
l. utra 2.
nimal.
Oppian.
Hal. l. 2.

Nec despicuerit desquamatus, in frustra concisus, quæ in polenta aut secalis polline volvuntur, atque ita in butyro sive crudo sive liquato frixus. *Hæc omnia Kentmanus.* Addit Gesnerus non in Albitantum, sed Sala etiam apud Misenos flumine Zertam capi.

CAPUT VI.

De Capro sive Caprisco.

Tab.
XXIII.
7.
Aldrov.
de Piscib.
l. 4. c. 8.

CAprum & Caprisicum eisdem Salvi-
nus, diversos Rondeletius facit. Maxi-
ma hic nominum affinitas, & uterque du-
ram pellem habere traditur. An vere *καπρί-
σκος* Strabonis, & aliorum, & *μύς* Op-
piani & Æliani sint iidem, dubitari potest.
Equidem Athenæus Aristotelis *καπρίσκος* vocat;
alii tamen *καπρίσκος*, quidam *καπρίσκος* legi
debere opinantur, nonnulli *Chalcidem* pis-
cem vocalem & in dulcibus aquis habi-
tantes credidere. *Porcus* etiam Niloticus
Strabonis potius porca fluviatilis minor est,
piscis rotundus, spinis in capite noxiis, &
vero *καπρίσκος*, quasi in Arena fodientem
facit, quod terrestres suis more rostro are-
nam fodiat, Numenius facit, eandemque
cum *καπρίσκος*, cui Simeon Sethi eas in nutrien-
do facultatis rationes attribuit, quas alii
fere Rhombo tribuunt, Aldrovandus po-
suit. Salvianus cum *καπρίσκος* & *χέλιος* eundem
judicat, *μύς* denique inter *εὐχέλιος* seu cartila-
ginea Athenæus ex Aristotele recenset,
inter quos, quis Caprum rostrum retulerit?
Athenæus eundem cum Capris, cum ait
καπρίσκος καὶ καπρίσκος & *μύς* esse censet. *Descriptio-
nem* ejus ex Salviano, eamque accuratissi-
mam damus. Caper, inquit, Molæ piscis
instar, *caput* utrinque admodum compres-
sum habet: *Oculos* rotundos, atque in superio-
ris capitis parte locatos: *Os* parvum, & val-
de denticulatum: utraque enim maxilla
ocentis dentibus validissimis, magnis, latis,
non serratis, sed continuis, atque humanis
simillimis minuta est. *Branchiis* utrinque
quaternas non osseo & de articulo (re-
liquorum squamatorum instar) operculo
sed cute contextas, neclata, sed modica scis-
sura (Molæ piscis more) pervias habet. Nec
si Aristot. dicat: *Habent quibus paucissima
sunt, singulas branchias utrinque easque du-
plices, ut καπρίσκος* (sive *Aper*, ut Theodo-
rus vertit) aliis *binæ utrinque sunt, altera
simplices, altera duplices, ut Congro*. Suspiciari
debemus hunc nostrum piscem Congrum
non esse, cum neque etiam verum sit, quod
binæ utrinque branchiæ Congro sint. Et
propterea mirari potius convenit, cur hæc
ita tradiderit Aristoteles. Utrinque una
tantum *pinna* & rotunda ad branchias con-
spicitur: nam illis, quæ in piscibus aliis ut-
rinque in ventre sunt conspicuæ, caret prorsus.
In dorso fere medio tres, membrana
inter se juncti reperiuntur *aculei* robustissimi

& magni, quorum prior reliquorum duorum
triplex est, quosque omnes non solum ubi
vult, deprimit, sed in sulcum etiam osseum,
in dorso ob id sculptum, recondit. Depressi
autem & reconditi uti quam facillimè simul
eriguntur, ita eorum unus duntaxat erigi ne-
quit. Et pari ratione erecti omnes deprimi
possunt, cum eorum unus nequeat, suntque
ea arte fabrefacti, ut cum prior & major
quantumvis impulsus deprimi nullo prorsus
pacto possit: postremi tamen depressione,
quæ facillima est, statim deprimitur, non se-
cus quam in arcubalistis vocatis, in quibus
parvo ac inferiori ferreo vecte compressus,
tensus ilico remittitur arcus: ob cujus simili-
tudinem hic piscis noster Romæ *Pesce balestra*
vocatur. Et quod majore dignum est admi-
ratione, si postremus aculeus non prorsus
deprimatur, sicuti prior quoque proportio-
ne duntaxat deprimitur, sic ibidem etiam ita
rursus consistit atque obfirmatur, ut nullo
impulsu ulterius deprimi possit, nisi reiterata
postremi depressione. Hos ternos aculeos
pinna sequitur, ad caudam usque deducta.
Osse autem valido, lato & recurvo, ex cordis
loco ad eam ventris partem, quæ è branchia-
rum regione est primum reflexo, deinde per
ventrem sub cute usque ferè ad podicem
extenso, ibidemque postremo in acutissi-
mum & conspicuum aculeum desinente, tota
anterior ventris regio roboratur atque muni-
tur. Quæ verò inter prædictum aculeum &
podicem, ventris portiuncula relinquatur,
plerisque aliis longè minoribus, sed satis ro-
bustis atque serratis aculeis armatur. A podi-
ce per ventrem reliquum ad caudam usque
alia singularis pinna deducitur. *Cauda* quæ
non sensim, ut reliquorum piscium, sed re-
pente extenuatur, in unicam & latam pin-
nam degenerat: *Ventriculum* habet amplum,
& crassum: intestina lata & valde reflexa: he-
par subalbidum, cui felle vesica hæret.

Corio tegitur squamoso, cujus tamen
squamæ serpentis potius quam piscis viden-
tur; nam præterquam quod eo ordine sunt
commixtæ, ut lineas, cancellatim sese inter-
fecantes constituent, firmæ etiam & valide
adeo hærent, ut desquamari nequeant; un-
de ita durum & asperum efficitur ejus co-
rium, ut vix diffecari queat. Rondeletius sese
expertum esse scribit, ne acutissimo quidem
gladio penetrari posse, utque ligna & ebo-
ra eo poliri possint. Quamobrem jure Ælia-
nus atque Oppianus marino Muri pellem
præduram tribuere, & Athenæus Aristotelis
testimonio, etsi apud Aristotelem id nunc
non legatur, inter pisces qui aspera cute te-
guntur, recensuit. Quod ad *colorem*
attinet, ex livido viret, nonnullis parvulis
notis cæruleis & rubentibus maculis quam
plurimis insigniuntur. Estque totius piscis
figura valde compressa, & lata, atque fe-
re orbicularis. Ad multam magnitudinem
non

non excrefcit, duas enim libras raro excedit, unde merito Oppianus & Ælianus eum haud magno corpore effe dixerunt. Hactenus ille. Non maris duntaxat, fed & fluviorum accola eft, ut Plinius & Ariftoteles fcripfere. In amne Acheloo grunitum habet. Vefcitur carne, cancris, squillis atque teftatis. *Solivagus* eft, & raro capitur. Pugnaciffimum effe, tum quod pelle prædura tegatur, tum quod dentium robori confidat, Ælianus & Oppianus fub nomine Muris marini prodidere. Carnem habet duram & fuavem. Virus namque olet. Athenæus inter *εὐαγρητὰ* retulit.

CAPUT VII.

De Sturione.

Tab.
XXIII.
8. 9. 10.
11.
Aldrov.
de Piscib.
l. 4. c. 9.

Pifcis quem nos Gothico vocabulo Sturionem, quafi *sturius* quod roftro fuo proræ roftratae fpeciem gerat dicimus, is Græcis noſtri temporis *στῦρις* quafi Oxyrinchus, Cypriis teſte Bellonio *Morona* vocatur. Nec eſt veterum *Lupus* quod Poggio Florentino placuit, ut capite quarto hujus tituli innuimus: Nec *Attilus*, ut Franciſcus Philolphus voluit, cum Attilus is ſit, qui hodie ab accolis Padi, veteri ſervato vocabulo *Attina*, Adilo & Ladino vocatur, piſcis ipſo Sturione amplior, effigie, ſapore, pretio & tota fere natura ab eo diſſimilis: Nec, *Turſo* Plinii, quod credidiſſe Theodorus Gaza creditur, cum hic Carchiæ, id eſt, Caniculæ, ut Archeſtratus apud Athenæum comprobatur, ſpecies ſit, & cum Turſo ſive Phocænæ in Ponto catulos pariat, hic oviparus ſit, & ubique naſcatur. Nec *Hycca* ſeu *Hyſca* ut Hermolaus Barbarus in epiſtola ad Cortuſium prodidit, cum vel ipſe Athenæus, qui ſolus Hyccæ meminit, qui piſcis Hycca ſit ignoret, & duntaxat, à Callimacho ſacrum piſcem, à Cyræncis *Erythrinum*, ab Hermippo Smyrnæo Hyccam Julidem vocari ſcribat.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 9.

Nec *Delphinus*, ut Carolus Figulus voluit, quamvis in multis quoad formam conveniant, quod iſte omnium veterum authoritate, inter cetos referatur. Niloum tamen Delphinum, de quo apud Solinum leges, quemque Delphino potius ſimilem, quam Delphinum Marcellinus vocat, Sturionem exiſtimare, nihil forte oberit.

Ælian.
H. A. l.
17. c. 32.

Nec *Oxyrinchus*, veterum, cum hic Carnivorus ſit, & hamo, ut apud Athenæum legimus, capiatur. An pro Oxyrincho Caſpio Æliani, haberi debeat, comparatio oſtendere poterit. Circaſſi ſane caterique Mæotidis accolæ, Sturionem Oxyrinchum vocant, ſi Geſnero & Scaligero credimus. *Silurum veterum* eſſe Salvianus contra Manardum apud Aldrovandum oſtendere conatus eſt, quem prolixiffime agentem vide.

Auſonii eſſe nullum dubium, & ita Sturio à venantio Fortunato Pictavienſi Epifcopo, qui duobus poſt Auſonium ſeculis vixit, vocatur: Veterum non eſſe, tum ex eo colligas quod non tantum teſte Juvenale & veteri ejus interprete, ſed etiam Antiphane & Theodoro Sinopenſi apud Athenæum, vilis apud eos piſcis fuerit; tum quod cum in Garumna non invenias, quod & Scaliger monuit. *Τακκῆλις* ſeu *τακκῆλις* vocari Galeno crederem, niſi eandem in Græciæ mari, in quo Sturionis dantur, naſci, negaret. Acipenſerem eſſe, qui ab Elope & Anthia diſtinguitur, Rondeletius erudite oſtendere conatur, quem ſequitur Junius: obſtare ejus ſententiæ videtur, quod rarus inventu, & unus omnium ſquamis ad os verſis contra aquam nando meare, apud Plinium dicatur, & id Nigidius Figulus, referente apud Macrobiū Sammonico Sereno, conſiſmet. Aldrovandus Sturionem Acipenſerem Romanis cum recens & in Italia captus eſſet vocatum fuiſſe; Silurum Græco nomine cum ex peregrinis Græciæ inprimis oris allatus, opinatur. *Descriptionem* ejus Paulus Iovius hanc dedit. *Corpore* eſt tereti oblongoque, inter rotundos & planos ambigente, ut qui ſubtus quodammodo planus ſit, dorſo verò ſemi rotundo. *Caput* quadratum eſt, & ad effigiem parvæ pyramidis protenſum. *Os* illi eſt ſine maxillis, ſine dentibus, diverſum penitus ab reliquorum piſcium forma, idque ſub mento in ipſa prope jugulum parte, ad ſimilitudinem fiſtulæ arundinaceæ rotundum, ſemperque patens, & cartilagineum & ſummè candidum; cujus hiatum in procerioribus haſta brachii haud facile impleret: cæterum totum caput dura potius & calloſa cartilagine quam certis oſſibus conſtat, quod ex lento quodam & præpingui mucore concretum eſſe videtur. *Naribus* omnino quæ illi prætenues ſunt ſupra roſtrum, refrigeratur. Sunt autem branchiæ utrimque quaternæ oſſeo operimento, non ſecus quam ſquamofis piſcibus contactæ. *Oculos* habet parvos. Ex roſtro gemina barba, ut in Mullo dependet. Toto dorſo craſſiores quædam ſquamæ oſſea duritie certo numero ordineque diſtinctæ, intercurrente ſpinæ acie, ad elegantiam eminent, ut in magnificentioribus valvis hodie videmus, quas ferrei atque inaurati clavi certa ſerie confixi decentiſſimè figurant. Cæteræ corporis partes cuticulari & ſcabro admodum operimento potius quam perpetuis ſquamis integuntur, idque ab ſubviridis atrique coloris ſpeciem. *Venter* cute levi & argentea tegitur. *Linguam* habet craſſam & duram, *gulam* unde quaque rugoſam. *Pinnae* ſunt ad branchias duæ & totidem in ventre ad podicem: præter quas in dorſo prope caudam alia unica erigitur, è cujus fere regione imo ventri alia etiam una ſubneſtitur.

Juvenal.
Scalig.
14. & 24.

Scalig. in
Leſt.
Auſon. l.
2. c. 1.
Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.

Plin. H.
N. l. 9. c.
17.
Macrob.
Saturn. l.
2. c. 12.

Cauda vero in duas pinnas degenerat, quarum superior crassior atque duplo longior extat. *Ventriculus* est carnosus solidusque atque pertinaciter inhaerescens tergori, ut nisi discissus divelli inde possit. *Oesophagus* in rugas contractus. *Hepar*, in duos lobos oblongos pallidi coloris dividitur, quorum dextro vesica felle validissime connectitur. *Lien* subruber: *intestina* crassa, & ternis gyris convoluta. Magnis piscibus annumerari debet, cum crebro & plerisque in locis centum librarum, & alibi longe major capiatur. Ego aliquando Ferrariae Sturionem mercatus sum centum & quadraginta librarum, donavique Illustrissimo pariter ac Reverendissimo Ioan Baptistae Compegio Episcopo Majoricensi Domino meo nunquam satis celebrando, qui paucis ante diebus ut labores meos promoveret, mille aureos donaverat. Quantum ad *Differentias* refert Bellonius, Ponticorum, Adriaticorum, Gallicorum, & Germanicorum inter se esse differentiam, quæ magnitudine, crassitie, cutisque asperitate, & subnigro, subflavo, aut argenteo colore distingui possit: Sequanicum & Ligerinum adultum interdum tres orgyas excedere, Galeum piscem pinnis & forma referentem, exili corpore, hirra sursum pelle, deorsum plana ac levi: apud Ferrarienses, & Bononienses argenteo colore fulgentem, dorsum, & latera tribus veluti carinis distincta ostendere. Scaliger quoque tria Sturionum genera, in Occa Sarmatiae fluvio tradi scribit, & pretiosissimum illum, qui Bialarybitza vocatur, ponit: sed Herbersteinus Bialarybitzam à Sturionibus distinguit. *Locum* si attendas, In Ponte, & circa Mœotidem paludem frequentissimus est, inde ova in molem coacta, salita, & cadis conclusa, per Turciam & Italiam distrahuntur. Tyrrheno & Adriatico mari si Bellonio fides, raro visitur.

Major tamen in fluminibus, quæ nonnisi quinque aut sex dierum itinere subintrat, quam Oceano, Tyberim si excipias, in quo parvi capiuntur. In Albi (hunc circa Penteosten gregatim, authore Kentmanno ingrediuntur) capti, ducentas interdum libras singulas sedecim unciarum appendunt. Captus tempore Iohannis Frederici Electoris sexaginta supra ducentas librarum pondere, quem totidem florenis Princeps redemit. In Ligeri quoque & Rheno delicatior. In Tanai, Danubio, Rheno, Tibisco, Vistula, Garumna frequenter capitur. *Cibus* Sturioni non pisces & conchyliæ, edentulus enim, sed fordes & mucus, quidam sed perperam aëris tranquillitatem ei ad cibum sufficere crediderunt.

Dum escam quærit, suis more terram sub aquis fodere. Isidorus prodidit. Cum branchiis omnino latis careat, naribus refrigeratur, & si quam hauriendo recipit aquam,

eandem prono ore statim regerit. De ejusdem *Robore*, ex relatione Kentmanni ita Gesnerus: Sturio in aqua validissimus piscis est: & in terra quoque cum ventri innititur. Cauda concussa hominem utcumque robustum prosternit, ubicunque contigerit, periticas etiam magnas & ligna per medium frangit. In terram extractus, lapides aliquando tantavi cauda ferit, ut ignis exiliat, attritu nimirum ossiculorum, quibus toto corpore mucronatus horret. Quamobrem cautè tractandus est à piscatoribus, ne vel crura eis confringat, vel retia disrumpat. Peritiores in aqua captum reti ad ripam impellunt, ita ut rete, non adversum, sed ad latus ei sit: secus enim rete vel sextuplex laniaret. Cum ripam attigere, caput ejus omni contentione in altum levant, & piscem totum in latus declinant: sic enim robore suo nocere non potest. Videtur cum Solmonte Amicitiam colore. Ducem enim istorum piscatores vocant. Zigam è mari pulsam, per flumina persequitur, sed frustra. Agilis enim hic & velox prævenit. Tanti olim *in cibis* apud Romanos, Trajani tempore, si excipias, æstimii, ut cum tibiis & coronis in cœnis circumferretur, & Gallonii mensa teste Horatio, eo famosa fuerit. Mares tamen fœminis præstant, hæc ovis plenæ probantur. Poggius Doctoris Poggii filius caput commendavit. *Caro* duriuscula est, præpinguis, viscosa, & ægrè concoquitur. *Hepar* adeo dulce, prodente Alberto, ut nauseam nisi felle tingatur, pariat. Græci sale inveteratos tribus nominibus insigniunt. *Rachis* ipsis dorsi portio pleura, costæ & latera, *hypocelium* alvus cum pube. Caviario, quod ex ovis paratur, Græci & Turcæ vescuntur. Julio II. Pontifici mirifice idem placuit. Paratur & ex Cyprinorum ovis in Iudæorum gratiam. *De usu in Medicina* nil occurrit. Quæ enim de Siluro Plinius, huic vix competunt.

CAPUT VIII.

De Galeo Rhodio.

DE Galeo Rhodio ita scribit Aldrovandus. Rondeletius hunc piscem, cujus modo icon exprimitur, Galeum Rhodium esse eruditissime ostendit, propter maximam similitudinem, non solum quoad corporis speciem & partes, verum etiam quoad gustum, & saporem, dempta, inquit, unica differentia, quæ non nisi ab iis potest percipi, qui citra ingurgitationem hujus cibum sumplerint, quique exquisito gustatu fuerint: ferinum enim quid resipit, quod tamen etiam non nisi paucissimum esse potest: nam Archelstratus, qui in nullis non terrarum Orbis angulis gulæ cupedias diligentissime perquisivit, id observasse in eo non videtur, quan-

Hælenus Iovius.

Macrob. Salmon. Archelstrat. apud Athen.

Tab. XXIV. r. Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 10.

quandoquidem Acipenferi plane eundem esse credebatur, ut Athenæus tradit, qui illius sententiam refellit. Athenæi verba non solum Acipenferis à Galeo Rhodio discrimen indicant, sed verum Galeum Rhodium hic depingi comprobant: Archestratus, inquit, qui Sardapali vitam vixit, de Galeo Rhodio scribens, eundem esse opinatur cum eo, qui apud Romanos cum tibiis & coronis in cœnis circumferebatur, vocantque Acipenferem. At hic quidem Acipenfer parvus est, & porrectiore rostro, & figura triangulari magis quam ille. Et paulo post, Archestratus de Rhodiensi Galeo loquens, amicis patrio more consulens, ait: Galeum in Rhodio quem Vulpem vocant, si tibi vendere noluerint, vel mortis periculo rape. Nominant illum Syracusani *αἰνα πύρα*, id est, canem pinguem. Hæc ille. Quod si Galeum Rhodium cum Sturione seu Acipensere contuleris, nullum planè comperies; (inquit Rondeletius) qui ei similior sit eo quem proponimus, his exceptis quod Sturio est longiore rostro & corporis figura magis triangulari. Nam alioqui Sturionem totius corporis figura, tergi ossibus acutis, & clypeorum modo efformatis, aliis item in lateribus dispositis, pinnis, cauda, ore in supina parte sito, omnino refert. Is quemadmodum Sturiones, relicto mari, amnes subit. Reperitur enim in Pado, & Rhodano, & pro Sturione venditur, nec ab eo distinguitur, nisi ab exercitatissimis & exquisiti gustatus hominibus. Hanc differentiam docuit ipsum Guilielmus Pelicerius Monspeliensis Episcopus, vir singulari doctrina præditus: tum ex capite crassiore, & rostro brevior, obtusiorque; tum ex gustu Galeum Rhodium sive Vulpem deprehendi. Ferinum quid recipit, quod de Sturione dici non potest, carneque est durior: à quo sapore Galei & Vulpis nomen habet, Galei enim & Vulpes ex Galeorum genere ferini sunt saporis & ingrati. Si tamen in dulci aqua diu nataverit, in cibis haud aspernandus est. A nonnullis eodem Rondeletio teste *Cops* vocatur, eoque nomine designatum atque optimè figura expressum ad ipsum Ferraria misit doctissimus medicus Antonius Musa Bravolus. Alii nominis affinitate decepti Cops appellat. Est enim id nomen alterius piscis.

CAPUT IX.

De Cataphracto.

Tab.
XXIV.2.
Schon-
veld.
Ichtyol.
P. 31.

Pisci huic Schonveldius nomen imposuit, sicque eum descripsit: Est palmarum duorum longitudinis ad summum, Capitis fere triangularis, depressi, angulosi, aclati pollices vel digitos duos, cujus duo latera tuberculis plerisque horrent in ambitu, anteriora quæ os spectant cirrhus multos te-

nuissimos alunt, posteriora aculei, retrorsum spectantibus mirra sunt. *Rostrium* habet resimul, quatuor apiculis munitum, quorum duo anteriores instar Lunæ cornutæ vel semicirculi se rotundant, reliqui post hos suis aculeis retro conversis conspicui sunt. *Os* in supina parte semicirculare habet, parvum, ad incisuram ejus utrinque binis, sub mento pluribus tenuibus cirrhis barbatum.

Truncus proxime caput depressior, octagonus est, prope caudam sexagonus, prona parte fuscus, nigris lituris intersparis, circa ventre plenum, in cujusque medio *podex* est, albicat. Totus *squamis* ossibus contextus est, in quarum medio tumor durus, reduncus, erigitur, qui in omnibus continuatus corpus angulatum efficit, quod versus caudam valde gracilescit. *Pinnas* circa branchias habet latiusculas duas, sub ventre totidem, sed longe minores, binis fibris constantes. In *dorso* inter squamarum extantias concavo, duas contiguas, parvas, omnes nigris lituris pictas. *Cauda* in pinnam subnigram exiguum & rotundam desinit.

Dentes nullos habet, sed horum loco labia aspera, & in faucibus ossicula aliorum in morem hirta. Frequenter circa Nortlandiam insulam Oceani Slesvicensi Ducatui subiectam frequenter & per totum annum, in ostio Albis & Ederæ sæpe capitur. Incolæ Steinbicker, Muller, & Bursbol vocant.

Vivitat squillis & aliis pisciculis. Habetur ob carnis dulcedinem in deliciis.

TITULUS II.

De Levis.

CAPUT I.

De Husone.

HACTENUS de *παραθαλάσσις* piscibus squammosis egimus, sequuntur non squamati seu *Leves*, *Huso* nempe, *Eperlanus*, *Lampetra*, *Anguilla*, *Orbis* & *Holosteus Bellonii*. *Husonem*, quem à domo quasi Hauso, Germanis dici Bellonius opinatur, Plinius fortè *Marionem*, quem Danubio Porcullo marino similem extrahi dicit, vocat, quidam *Esosem*, appellarunt. *Æliano* ni fallor est Antaceus, Germanicus. Magnitudinis est viginti quatuor pedum, & tantæ, ut vix biga à tribus vel quatuor equis trahi possit. *Vadianus* magnitudinis pondo quadringentorum minimos quinquaginta, frequenter centum, ducenta, trecenta, vidit.

Dorsum habet asperum. Nullum os in capite, si Alberto fides, si aliis multa, in corpore parva & pauca, cartilaginea potius, quam solida. Loco *spinae dorsalis* cartilago est, quæ foramen habet magnum & vacuum, à capite ad caudam tanquam terebello perforatum. Adipem pinguedini immixtum sicut

Ælian.
H. A. l.
14. c. 26.

porcus. Similia de suo Antacæo Ælianus. Cum ætate processerunt, ad maximi Thunni magnitudinem, in Istro accedere scribit, & tam pingui abdomine esse, ut eorum ventrem lactentis suos fetus scrophæ ubera dicas, sicque aspero corio tegi, ut eo perpoliantur hastæ. Addit item capitis medio à medulla ad caudam mollem & strictam membranam pertinere, ex qua ad asium solem exsiccata, flagella ad concitanda jumenta efficere possis. E Ponto Danubium subit, & per centum quinquaginta milliaria Germanica, adversis suavisque undis progreditur.

De ejus captura, ita quidam ad Gesnerum mercator: Mitto tibi, inquit, Hufonis piscis effigiem vivam. Is in Danubio, nec ubique nec tempore quovis capitur, sed quando migrat. Terra argillosa & pingui gaudet. Capitur fere ab autumno usque ad Januarium, spacium decem milliarium inter Viennam & Posonium, Presburgum vulgo vocant: ubi ad insulam Schutam nomine, cum arce minutissima, ultimus hujus piscis capturæ locus est.

Viennæ die Veneris plerumque quinquaginta vel septuaginta, & aliquando centum Hufones, veniunt, qui integri fere distrahantur. Copiosissima eorum captura fit in Vualachia juxta Chilian non procul ab ostiis Danubii, quibus in mare Ponticum se exonerat. Inde falsi exportantur in remotas regiones.

Vadianus mensibus Octobri & Decembri captos Viennæ invehi scribit. Timidius est, & à minimo etiam pisciculo in fugam vertitur. Sturio se ei per lusum affricare solet, in latebres profugum ejicit, & ventrem lancinat, dumque unus fugit, alter persequitur, aquarum agitatione se produnt, & capiuntur. Captus lacte vel vino potatur, non ut diutius vivat, nec citius inebriatur, quam sextarios quatuor ebiberit.

Gregatini natant & tubarum cantum sequuntur, ad eum postquam accessere, irretiuntur. In aqua tanto robore pollent, ut piscatorem cauda ictum è navi dejiciant; elato ex aqua capite, mortuis similes apparent. De Antacæorum captura, vide Ælianus.

Quantum ad usum in cibis, vitulinæ in dorso, porcina in ventre saporem habet. magna pars falsamentis cedit, lactibus nihil dicunt delicatius, sed & ova in cibum expectantur.

CAPUT II.

De Eperlano.

Tab.
XXIV.
3.
Aldrov.
de Piscib.
1.4. c. 12.

IN fluviorum in Oceanum, (verba sunt Aldrovandi) influentium ostiis, ut Rhotomagi & Antwerpia frequens est piscis, teste Rondeletio qui *Eperlan* (quam vocem

vulgarem secutus Eperlanum ceu latinum nomen fecit) dicitur, à nitido & splendido (inquit) colore, quo unionem (perlam) refert.

Ceterum si à perla ipsi nomen est, verendum est appellari eên peerl; nam Eperlam Belgi, cum vocabulum non est; & Bellonius Epelanum nuncupat. Ait tamen etiam, Atherina modo transparenere. Hic Angliis *Schmelt* vocari scribit ab odore. (violam enim gratissime redolet, quamobrem quidam *violam* vocari posse censent, argumento quod Ælianus ab odore thymi Thymallum piscem nominavit,) vel à pinguedine. Gesnerus priorem etymologiam probat, quoniam Smelle Angliis sit odorari.

Smel tamen apud Belgas est liquescit, & proprie de pinguedine dicitur, à quibus Angli fortè nomen mutuaverint. Uterque duo ejus genera esse scribit, *marinum* unum, *fluviale* alterum. Sed Rondeletius marinum litorale esse, Bellonius saxatile dicit.

Rurfus Rondeletius Eperlanum in marinum & fluviale distinguens, figura corporis nihil vel parum differre innuit, ideoque unam iconem exhibuit: Bellonius contra duas, admodum diversas, quare suspicari licet fluviale Rondeletii à marino non differre. Bellonius marinum item, partim marina, partim fluviali aqua gaudere tradit, & Rondeletius quoque ex mari ad fluvios ascendere insinuat, dum in Sequana ostiis optimum esse scribit, & in Angliæ fluviis.

Apud Neustricos Caudebeccanos Angliæ dopulos uberrimus est, major tamen proventus circa vindemias, quo tempore est delicatissimus. Tereti ac tenui est corporis compage, nonnunquam dimidium pedem æquante. Rondeletius ad pedis magnitudinem aliquando accedere innuit.

Afinos parvos refert, unde ex eorum genere esse judicant, quos refellit Bellonius, propterea quod glabro sit corpore. *Oris* hiatus satis magno est.

Dentes habet in maxillis, & in lingua. Truttam præter cætera dentibus refert. *Lingua*, ut ait Bellonius quasi gemina, hoc est, (inquit) in cujus radice posterior quædam appareat, in qua multo plures dentes sunt, quam in anteriore. *Pinnas* habet easdem quas Salmonum genus, maxime posteriorem illam dorso pinnam subrotundam & pinguem. Prior totum piscem in æquales fere partes dividit. *Cauda* bifurca est. *Branchiæ* sunt utrimque quaternæ, decolores, & *violam olentes*.

Transparenti est corpore dempta linea nigra, quæ spinæ internæ parti inhaeret. *Calciculos* habet in capite rotundos, albos, quosque faciliè forinsecus propter piscis transparentiam per cranium videre posse Bellonius tradit (qui diligentissime de internis. Eper-

Eperlani partibus egit) sub posteriori cerebri parte sitos, ubi medulla in cerebro definit. *Cor* branchiis semicircularibus & fimbriatis est admodum vicinum ac scutiforme: definit quoque in angulos, rubrumque est, cui molles ac sanguineæ sunt carnunculae, quæ huic tanquam aures in terrestribus famulantur. Illæ enim moventur cum corde, quod septo ab hepate dirimitur: unius tantum lobi, in longum demissi ad secundum latus. *Stomachum* definientem in mucronem habet in V. literam efformatum: *Lienem* admodum rubrum, seminis Atriplicis in modum latum.

Cumque stomachi dextrum latus sursum usque ad hepar reflectit, illic geniculo intercipitur: ubi *apophyses* duas latas emittit, quæ veluti secundum ventrem constituuntur. Aliud post hunc subsequitur, quod nec pylorum nec jejunum, neque ileon commode nominare possis, siquidem sine anfractibus recta ad anum procedit. Sed rectum geniculo intercipitur, estque ruberrimum. *Mesenterio* nullam admixtam pinguedinem habet, quo stomachus & intestina obsidentur, ut nihil aliud in ventre, quam adipem esse dixeris.

Caridibus, culicibus, Aphyis, æstro, lendibus, millepedibus, pediculis & ejusmodi dejectamentis vescitur. Carne est molli & friabili. Æstatis sine vel autumnii initio capit.

CAPUT III.

De Lampetra.

Lampetra, non tam à lambendis petris, quam ab *Alabeta* Plinii. Nilidis lacus piscis, qui *ἀλαβή*, quod manu propter lubricitatem capi non possit, dicitur, vocatur. Doctiores Plinii & Ausonii Mustelam esse opinantur, nec tamen vel ex *marinis* *Æliani* quas jecorino simillimas esse pupillis oculorum ad cyaneum colorem accedentibus, mento quam jecorini majori, quam Chremetis minore, algas depascere, saxatiles esse, & omnium cadaverum in quæ incurrit oculos conficere, idem author scribit, vel ex *Mustelis*, qui Aristoteli ceterisque *ῥαῖναι*, qui flumina nunquam subeunt, & vivipari sunt, esse judico. Sed nec ex *Murænarum* genere esse credo, quamvis Dorioni apud Athenæum *Muræna* fluviatilis haud ineptè dicatur, quod illæ Branchiis integriscareant, quas Lampetræ velut cartilaginem obtinent.

Lumbricum marinum Plinii non esse, exinde quod pinnis omnino careant, colliges. At ex *Vermibus aquaticis* ejusdem esse, quos in Gange Indiæ Statius Sebosus, haud immodico miraculo attulit, branchiis binis, sexaginta cubitorum, cæruleos, qui nomen à facie traxerunt, eisque tantas vires, ut elephantos ad potum venientes, mordicus comprehensa manu eorum distrahant, Rondeletius credidit.

Idem ex *ῥαῖναι* seu Hirudinibus Strabonis, quas in quodam Lybiæ fluvio septenum cubitorum perforatis branchiis, ita ut respirare possent nasci scribit, quod sanguisugarum instar saxi & navium clavis hæreant, opinatur. *Tineas fontanas*, de quibus apud Plinium, quod Hermolao placet, non esse, certum, quia illæ ex insectis. *Flutam seu Plotam* quod quoque Rondeletio visum, dici posse, quod nisi in summa aqua natat, ut ærem attrahat, facile suffocetur, concedimus. An *Anguilla copæa* sit, cujus Archesstratus apud Athenæum meminit, dubito.

Quamvis enim sit ex ossis seu *σπίλον*, quod Anguillæ vulgari non competit: in eo tamen, quod Anguillas Copaidas Agatharchides prodigiosæ magnitudinis esse scribit, diversa à Lampetra esse videtur. Echeneida Oppiani esse, Rondeletius censuit, nec abhorret ab ea Echeneidis descriptio, quam apud Oppianum vide. Bellonius quoque nautis præcipuè infestam esse ait, temonibus triduum fere inhærendo, caudamque in contrarium vertendo, recensque picatæ navis lateribus picem lambendo sic insigi, ut nautas ab itinere remoretur.

De *Generibus* ut dicam, non unum Lampetræ genus est. Sunt quæ à mari flumina subeunt, sunt quæ à salis aquis omnino abstinent.

Marinarum triplex genus est, majus, medium Germanis & Belgis *Prick* dictum, & minus à Salviano depictum, qui, licet ætatis ratione tantum differre quispiam suspicari possit, quoniam colore tantum & magnitudine à majori differt, differre tamen, & specie ostendit, cum majores semper & maculosæ & bicubitales, minores contra sine maculis & pedalis tantum reperiantur: *Prick* vero cubitalem magnitudinem haud superet, transversalibusque & nigricantibus lineis solum insigniatur.

Rursus ipsi majores haud ubique æquæ magni. Testatur enim Jovius in Arno & Tyberi ad generosum habitum adolescere: in omnibus autem Galliæ Cisalpinæ rivulis, ipsisque præsertim Ticini atque Adduæ emissariis multas reperiri pretiosas admodum, quanquam minimi digiti crassitudinem minimè superent.

Et Platina in Cisalpina (Gallia) parvas, in Hetruria mediocres, Romæ ex Tyberi per magnas capi tradit: nisi dicamus, haud recte ab his scriptoribus isthæc observata esse. Omnibus sive marinæ sint sive fluviatiles, commune est, Ceteorum more *σφύλακιν* *habere*, per quam cum navibus aut saxi hærent, aquam ad branchias attrahunt. *Spina* item omnibus cartilaginea à capite ad caudam usque deducta, chordam Galli vocant, quæ vere tenerior, ætate durior est, & insuavior.

Branchiarum numero, figura & ordine con-

Strabo
Geogr.
l. 17.

Athen.
Dipnos.
l. 7.

Tab.
XXIV.
5. 6.
Aldrov.
de Piscib.
c. 53.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 17.

Plinius
H. N.
l. 9. c.
20.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 15.

conveniunt, ore item & pinnis & totius corporis figura. Murænis valde similes sunt, si caput excipias. Os enim neque in longum neque in latum scissum est, sed excavatum velut in hirudinibus quas sanguifugas vocant. Gesnerus ab eo loculorum instar, qui ad servandos nummos loro contracti eliduntur, constricto lignum aut lapidem ita apprehendere ait, ut sugere videatur, idque tanta vi, ut ægrè avellatur, cucurbitularum medicinalium similitudine. Marginem item oris rotundum fibris quibusdam lacinosum esse, quæ nimirum ut firmitus hæreat, sugatque efficiunt. In cavo illo sparsi sunt *dentes*, plurimi flavi, acuti, hamati, quorum interiores majores esse idem Gesnerus observavit, eosque circiter viginti ordinibus distinguere; & tanquam à centro ad circumferentiam digeri, ordinibusque singulis quaternos, quinos, senosve inesse. Esse & in ipso oris recessu duplicem *dentium* minorum ordinem, quorum major, inquit, omnino feram denticulis utrimque denis refert, eos denticulos continuos esse, cæteros cutim habere interjectam. In ejusdem cavi imo teste Rondeletio particula est contraria occursum foramen interius ocludens. Cor habent sub branchiis & foraminibus reconditum, cartilaginea membrana, spongiosa ac prætumida inclusum, subrotundum, ciceris crassitie: *hepar* oblongum, cæruleum, unius tantum lobi. *Felle* carent. *Intestinum* omnibus unicum, rectum, minimè complicatum; reliquum corporis in foeminis matrix ovis referta occupat. Pinnis lateribus carent, nullasque ad natandum habent, sed flexuoso corporis impulsu aguntur, & *pinnulis* membranaceis iter derigunt, quarum una ferè supra caudæ extremum erigitur, altera paulo superior est. Lævi cute teguntur, quæ in majori nigricat pronè, supinè candicat, ad latera, & in dorso subluteis ac nigricantibus maculis conspergitur, quibus minor caret. Gesnerus majori maculam ait esse albicantem in vertice, in medio oculorum interstitio, & contiguum ei anterius foramen parvum membrana parum prominente circumdatum. *Prickæ* cum majori colore convenit, sed pro maculis quales diximus, transversales habet lineas. Omnes utroque gutturis latere *septem foramina* habent, quibus aquam acceptam reddunt. *Platina linguam* Lampetris tribuit, Rondeletius habere negat. Salvianus & Bellonius non meminerunt. *Oculos* rotundos & profundos habent. In majori cæruleam pupillam aureus circumambit circulus.

De *Lampetrarum migratione* & hoc habet, Veris initio migrare, & circa Donati diem, qui est dicemus septimus Februarii, nullas amplius apparere, sed aut recedere, aut corpore rellquo tabescente, licet capitis moles relinquatur, interire.

Initio Maji optimas, ab eo tempore irrequieto motu emaciari, & plerasque ante partum mori, parientium sobolem evanescere, nec unquam circa Argentinam apparere; adultas, quæ non percunt, cum fluvio aqua secunda, Majo mense auferri, Argentinensium piscatorum relatio est. In mari & fluminibus parvas parere, eoque tempore quo in fluminibus capiuntur, in mari etiam capi, reliquisque anni temporibus vel in abditis locis latere, vel à littoribus in altum pelagus longè secedere, majores in fluminibus rariores esse, Salvianus auctor est. *Vescuntur* aqua & musco. Quidam esca quadam composita in frontibus & aquis dulcibus eas nutriunt, & servant. Spumarum indicis comperiri solent: captræque perpetuò in aqua immergi, cum qua ex longinquis partibus in urbes deferuntur.

Usus in Cibus quod spectat, Albertus dulcem & in salubrem vinoque condiendum, Alexand. Benedictus optimi succi, facit. Salernitani crassum & viscosum, minus tamen Anguilla, & quia veneni aliquid habent in vino submergendas donec moriantur, posuere. Romæ olim proximam à Scaris quibus principatus debebatur habuere mensam. *Scribit Platina Romæ aule fortassis offensus*, bene à natura factum esse, quod Romæ ex Tyberi permagnæ capiantur, & delicatissimæ, quoniam vallatæ ibi gulæ inter se auctis pretiis certant. Emi (inquit) frequenter Lampetras quinque, sex, septem aureis, & olim à laticlavio viginti, cum alter secum auctionaretur, emptam scimus: nec passâ est ingenua gula tantam audaciam gratuitam esse. Dispensato enim, quod sui ipsius arrogantiam & fastum (nolo dicere stultitiam) imitatus esset, certum aureos dono dedit, ne secundo ad certamen singulare provocatus, timidus ac infractus animo succumberet.

Cæterum non quovis anni tempore, nec quovis loco tanti fiunt. Scribit enim Jovius Romanis, id est, Tyberinis præcipuam nobilitatem à magnitudine & sapore esse adeo ut denis sæpè aureis veniant, ipso præsertim vere: & rectè quidem, quoniam incipiente ætate, spinalis medulla iis nervi instar durior efficitur, & marinæ, hoc est, quæ in mari capiuntur, aridæ semper ac velut agrestes judicantur. Jovius delicatiore condimento, multo majorem quam ab ipsis pulpis nobilitatem accipere scribit. Necari enim solere in vino cretico, eique myristica nuceos claudi, & foramina illa (branchiarum utrimque septem) totidem caryophyllis adimpleri in reganoque convolutam in spiras, additis avellanis tritis, medulla panis, oleo, vino Cretico, aromatibusque ad temperatiores prunas certis momentis sedulo excoqui, quo condimento, inquit Leo x. in minori fortuna, joci causa, ut convivium exhilar-

exhilararet, Marianum cucullatum, falsum, & ridiculum hominem decept.

Namque funem instar Lampetræ incoctum, multoque illo jurulento immersum, grandi in patina apposuit, ut notam omnibus ejus edacitatem, gulamque eluderet: qui jam magna pultarii parte absumpta pseudolam petram aggressus, diu multumque cum ea maxillis ac dentibus inhaerente colluctatus, cachinnum cunctis collentibus, facetissime respondit: utinam sic mihi sapius illudatis. Nam in hoc condimento non modo funes, sed & ipsas catenas (quibus infani vobis similes vinciuntur) & cum voluntate quidem absumerem.

CAPUT IV.

De Anguilla.

Quem piscem Latini Anguillam ab anguis similitudine dicunt, illa Græcis veteribus ἰχθυόειον, ἀπὸ τοῦ ἰχθυός, quod commoto cœno felicius capiatur, modernis ἀχλὺς vocatur. Lacedæmoniis ἀχλὺς dictas, apud Hesychium legimus. Est ex piscibus αἰθιδίπνοι, qui in aquis dulcibus geniti, ad mare descendunt.

Duo ipsarum sunt genera, Majus & Minus. Illi caput brevius, crassius & latius, color fuscus: in profundo degit, & aqua deficiente sæpe in limo, ut inde effodiatur, occultat. Ad mare nunquam descendere, sed semper in vallibus degere, quidam affirmant. Mares Rondeletius vocat. Hæc, quod Anguilla simpliciter dicitur, caput longius & acutius, & in mare descendit. Læves sunt in universum & lubricæ, ut manu teneri non possint, si inclusæ tenentur, quacunque caudam exerere possunt, eadem totæ evadunt. Aristoteles eis quaternas utrinque branchias, sed simplices tribuit.

Alias quoque branchias pauciores minusque continentes habere scripsit. Athenæus verò ex Theophrasto exiguas. Cuticula quæ hæc teguntur, parvula in estrema, quæ causa est, quod in turbidis aquis facili strangulentur, & in aëre diutius vivant. Teste eodem Aristotele gulam quæ paucis piscibus contigit, habent, licet exigua, ventrequæ sunt exiguo. Fel jecori hæret. Hoc magnum est, illud aqueum. Pingue inest paucis, plurimæ eo carent. Hippocrates tamen pinguedinem habere scribit, eandemque naturæ hominis inimicam: cæterum hæc pinguedo à carne separata non est: quare alias dicebat Philosophus: seorsum enim à carne non pinguescunt: unde parvum eis in omento sevisse solet. Tergus earum quam Murenis crassius teste Plinio: cujus locum de pinnis hujus piscis, ubi lubricis pro lubricis legebatur, restitui in

Lampetra ex Aristotele, qui longorum vel lævium alios ut Anguillam & Congrum binas pinnas, alios ut Murenam nullas habere scribit. Has juxta branchias hæere idem asserit, supinisque pinnis carere. A medio dorso & ab excrementi meatu veluti limbus cutis potius, quam pinnarum substantia superiores corporis patres ambit.

Ventriculus & intestina in longum protenduntur. Color omnibus haud idem. Variat enim aquarum, in quibus degunt, ratione. Quæ puram & defluentem incolunt, ventre (inquit Salvianus) sunt candido, dorsoque cinereo sive subcæruleo: quæ vero in impura & stagnante commorantur, ventre sub albo, dorso vero subviridi vel subnigro apparent: Os habent satis apertum, dentibus, parvis, acutis minutim, multiplici ordine. Magnitudo quoque non ubique eadem. Plinio atque Solino testibus in Gange ad tricenos pedes augentur: & Athenæi Pausaniæque testimonio Copaidæ, item Strymonis eximie magnitudinis esse dicuntur. Arcestratus Copaidas apyrenos vocat: Gesnerus & Dalechampi Lampetras intelligi volunt, quoniam hæc pro spinis cartilaginem habent. Magnas vel ad brachii crassitudinem capi audio in aqua mortua (ut appellant) Gallie Narbonensis. In Italia ad viginti libras aliquando accrescunt; sed quæ superant, nunquam inventæ sunt.

Locum, si spectes marinarum quoque Dipphilus & Epicharmus apud Athenæum meminere, non quod ibi nascantur, cum paucæ & nondum adultæ nunquam, magnæ & adultæ raro ibi reperiantur; sed quod, ut Plinius, Aristoteles & Oppianus confirmant, maria ex fluminibus subeant. In nullo amnium qui Danubium influunt, reperiri; in omnibus, qui Rhenum, licet ex uno aliquando cum illis fonte scaturiant, Naucleus & Albertus prodidere. Frigiditas Danubii fortè in causa, cujus aquæ ante fauces Alpium ab Occidente in Orientem fluunt; major pars ex Alpibus descendit, & à parte Aquilonari, ante Alpes delabitur. Copaidum, quæ ἀπὸ τοῦ κοπαΐδος, Pollux & Aristophanes commendant. Prodigiosæ eadem interdum magnitudinis à Bæotiis hostiarum more coronabantur; asperaque mola, cum precibus Diis immolabantur. Rhegiæ, quas Lethus circa Berenicem fluvius sibi vendicat, sesquialteræ ad illas, quæ ex Macedonia & Copaide lacu habentur. Suus iis & qui in freto Rhegii, & in Mæandro fluvio capiuntur honos. Strymonis quoque, Elori amnis, & qui ad Euclea fluvium, in precio fuere. Pars Britannicæ Anguillarum terra à copia, quamvis ibi non degant, dicitur. Ad Aquas mortuas brachii crassitudinem æquant. In stagno Monspe-liensi Latera dicto, trium vel quatuor cubitorum sunt longitudine. Ex Tarni fluvio, qui

Plin. H.
N. l. 9.
c. 3.
Athen.
Dipnos.
l. 7.

Athen.
Dipnos.
l. 7.
Arist. H.
A. l. 6 c.
14.
Aldrov.
de Piscib.
l. 4 c. 14.

Athen.
Dipnos.
l. 7.

H. B. A.
l. 4 A.

Tab.
XXIV.
7. 8.
Aldrov.
de Piscib.
l. 4 c. 14.

Arist. H.
A. l. 1.
c. 5.

non solum auget, sed efficit Garumnam, qua parte in eum erumpit, tanta copia defertur, ut una die xvi m. in nassis inventa sint. In Mintio amne quandoque mille glomeratae capiuntur, ut apud Cardanum extat. Male ergo *à nati d'angl'p'ouu xijm'at, in stagnis promanantibus*, ut Scaliger vertit, reperiri negat Aristoteles.

Scalig. ad
Arist. H.
A. l. 6. c.
15.

Plin. H.
N. l. 9. c.
61.
Arist. H.
A. l. 6. c.
15. edit.
Scalig.

Athen.
Dipn. l. 7.
Oppian.
Hal. l. 1.
v. 156.

Arist. H.
A. l. 8.
c. 2.

Arist. H.
A. l. 8.
c. 2.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 21.

Arist. H.
A. l. c.

De ortu dissentiunt Authores. Plinius, Anguillas atterere se scopulis, ea strigmenta viviscere, nec aliam earum esse procreationem scribit. Secundum Aristotelem, in dissectis neutrum sexum, nec vel ova vel semen deprehendas; in temporibus siccis, sed post imbres, idque ex iis, quæ vocantur *in ripa terra intestina*: quæ fiunt in cæno & putredine; maritimis quidem locis, quæ algam producant; in stagnis verò & fluviis propè ripas, quia tepor sive calor istius putredinem gignit. Plinio Athenæus & Oppianus ex veteribus, ex recentioribus Rondeletius adstipulantur. Illi complexas coire, & strigmentitium, quid emittere, ex quo cum in limo fuerit, *à nati d'angl'p'ouu xijm'at*, animal generetur, prodiderunt. Hic inferiore ventris parte vulvam in fœminis, semen in maribus esse, multa pinguedine perfusas non apparere, corporum complexu coeuntes à se visas scribit. Utroque id fieri posse modo credo. Nam & Berniciæ in Scotico Oceano ex verme nascuntur, post ova excludunt. Eadem & Rondeletii sententia. Addit enim, cum equus mortuus in stagnum Megalonæ injectus fuisset, innumerabiles paulò post ibidem visas Anguillas. *Nutritum* ipsarum sunt, radices herbæ & cuncta quæ in limo offendunt, visæ, ranis, vermibus & piscium partibus vesci. Paxamus hirudines, Homerus cadavera, quidam se ipsas invicem, Plinius edulia si quæ apponuntur, devorare, testantur. Purissimam tamen aquam impensius amant, idè in quadam Britannia parte, ut Albertus ex Beda refert, in ortu Cosmico Plejadum hoc est xvi i. Calend. Junii, quod tunc propter ventos, qui initio veris è terra erumpant oppositos aqua nunquam luto turbetur, ingens ipsorum copia, & à turbida abhorrent adeò, ut Athenæo teste, cum ventis turbatur suffocari, & quidem propter exiguas branchias, soleant. In exiguis aquis mori dixit Aristoteles, hyemem malè ferre, Plinius.

De reliqua ipsarum natura hæc habet. Noctupasci, interdum limo quiescere, ideo separatim ab aliis degere piscibus; exanimis piscium more non superfluitare, ut apud Plinium legimus, quod ventre sint exiguo, pingue paucis insit, plurimæ eo careant, ut Aristoteles tradidit, aqua tranquilla efflare, id bullarum indicio colligi eodem genere motus, quo serpentes in terra, id est ce-

lerrimè, moveri, ita ut dum Phalacrocorax integras devoravit, mox per intestina delabantur, idque vel novies aliquando fiat, in sinu detentas, hominem aliquando ita circumplecti, ut nonnunquam suffocent. Annis septem vel octo, quod branchias pauciores minusque continentes habeant, & paucum humorem admittant, vivere; extra aquam ad quintum, sextumve diem si loco umbroso, & frigido, (si à sole tangantur in terra brevi moriuntur) reponantur, à motu non impediuntur, & ventus septentrionalis aspiret, excoriatas & in partes sectas sat diu. Tonitrua denique adeò timere, ut defundo ad superficiem enatent, frigoris adeò impatientes esse, ut cum Anno 1625. omnia gelu & glacie rigerent, in terram proreperent, & intra fœni cumulos se abderent.

Discipline non omninò expertes esse videntur. In Jovis Lebradii namque fonte Anguillas è manu vesci & in aures additas, à veteribus proditum Plinius refert; & in Arethusa Chalcidensi, Anguillæ & Mugiles mansueti inauribus tum argenteis ornati accipiunt à largientibus cibos, à sacerdotibus viscera & caseos, ut Athenæus scribit, & Ælianus, item Plutarchus, qui sacras hæc Anguillas vocari ait. Nymphodorus denique in Eloro amne tradit Lupos esse, & Anguillas magnas adeò mansuetas, ut è manibus etiam porrigentium panem capiant: quod & Apollodorus scribit in Chronicis. *Hospitaliter* eas tractant, Ardea, Corvus aquaticus Phalacrocorax ex avibus: ex quadrupedibus Lutra, quæ tamen amputato plerumque capite discedit, ut piscatores prodidere.

Quantum *ad usum in cibis*, delicatissimas olim fuisse certum est. Mænander inter paucas sumptuosissimi convivii, quæ talento ferè constarent cupedias enumerat. Phitetarus miseros divites, qui parcè viverent, & Anguillas non ederent, dicebat. Alii cœnarum Helenam, voluptatis reginam, præ Diis honorandam, &c. dicebant. Sybaritæ, iis, qui eas piscarentur aut venderent, immunitatem, teste Athenæo, decreverant. Hicetius denique succi bonitate cæteris præcellere, stomachoque gratas esse reliquit. At medicis quamvis carnem mollem habeant, succo tamen lento & pituitoso abundant, inflammationem pulmonis, quod pinguedine hominis naturæ maximè infensa oblinantur, inferunt; superflua humiditate, quam partibus alluunt, turbidam & sonoram vocem reddunt; & secundum quosdam, nescio quid, quod nisi eximatur in periculum vitæ conjiciat, habent, ideo fortè caput, cauda, & à quibusdam oblonga, quæ nigricans per dorsum fertur vena, abscinduntur. Platina ubi præparationem Anguillarum eximiam dedit, subjungit acutissimè,

Athen.
Dipn. l. 7.

Arist. H.
A. l. 8. c.
2.
Plin. H.
N. l. 9. c.
21.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 2.

Ælian.
H. A. l.
14 c. 8.

Athen.
Dipnol.
l. 12.

Hippoc.
l. 2. de
Diæta.
Gal. de
Alim. l. 3.

simè, sic paratas hostibus apponendas, quod nihil boni in se habeant.

His noxis infringendis, veteres betæ involutam, ut vitiositate sua humidum detergeret, comedebant: Salernitani vinum fortè hoc est generosum & crassum, quale est rubeum præscribunt, nam si tenuè biberetur, Chylus in venas ante perfectam coctionem abiret & in corpus raptus Cachexiam excitaret, icem accidit, nisi pedetentim, & parum velut pitissando hauseris.

De Usu in Medicina tantum observavi apud Authores, *Pinguedinem* in elixatione supernatantem unguentum ad plagas ingredi, de tosta destillatam, aurium & nervorum doloribus mederi; glabro capiti illitam capillos restituere; cum pinguedine anseris, succo rutæ, absynthii, hederæ terrestres, & Cynoglossi subactam, ad vulnera præstantissimam esse: Fumum ex salutarum cute exceptum; tormina ventris ex dysenteria sopire; in vino putrefactam vini tedium parere. Evisceratam, tusam, & in olla vitrea coctam, cum pinguedine ac liquore, qui in fundo vasis remanet, hæmorrhoidum cruciatus egregiè lenire. Cingari Anguillas Equis per anum inferunt, ut obesiores, & agiliores videantur. Hippia tri quidam equo asthmatico Anguillam vivam ori inferunt, ut per intestina elabatur. Alii & parvam imponi jubent purgationis causa. Nec propterea mortis periculum esse ajunt: quin Gesnerus asserit nautam sibi notissimum vivam integram deglutivisse, integram per alvum, vivam reddidisse. Idem author est, aliquos aureum & cholobaphicum colorem ex felle Anguillarum, aliorumve piscium vel boum parare: miscere autem aceti modicum & cum creta subigere in massam. Prætextatos earundem tergore verberari solitos Verrius teste Plinio tradit, & ob id multam his negat institutam. Prætextatos appellans impubes, eos nempe qui frugem aratro quaesitam nocte furtim secuisse, aut depopulati essent.

CAPUT V.

De Orbe.

Hujus piscis solus meminit Plinius. Durissimum esse piscem, inquit, constat, qui Orbis vocetur: rotundus est, & sine squamis, totusque capite constat. Gesnerus Apuleji, *Cranium* esse opinatur, quod ad cranii formam magnitudine, rotunditate, & dentibus humanorum similibus accedat.

Tria ipsius genera descripsit Rondeletius, quartum addit Aldrovandus. Primus qui Orbis simpliciter figura, si caudam demas, sphaericus est. Squamis prorsus caret, cutem tegitur admodum dura, quam asperam efficiunt aculei duri, quibus tota conspersa est. Rostro caret: Capitisque nullum ap-

paret vestigium, quin (ut Plinius ait) totus capite (malim ventre) constare apparet. Os habet parvum, dentes vero magnos & latos, utrinque binos. Supra os duo exigua sunt foramina, olfactus, auditusve instrumenta: Oculi mediocres. Circa corpus medium unica est & semicircularis utrinque branchiarum scissura; prope quam etiam utrinque unam haud magnam, sed rotundam pinnam habere Salvianus ait, & in icone exprimit. Rondeletius unicam esse ait, ut in Caprisco. Hic & in summo dorso pinnulam pingit qua Bellonii icon & Salviani quoque caret, & ipse in descriptione non meminit. Eam tamen etiam videre est in icone ad skeleton efficta à Gesnero, quæ hic exhibetur. Posterior corporis pars in caudam brevem & rotundam, inque latam & fere lunatam pinnam desinentem degenerat, in cujus parte media atque superiore, pinna una erigitur, altera quoque inferiori parti hæret. Color ei cineraceus, lineis quibusdam latis & obscurioribus ex pisce medio exortis posteriori ejus partem ad caudam usque pigmentibus. Est maris Ægyptii accola, ex quo Nilum quoque subit, & in ejus ostio, quod Saiticum vocatur, capitur. Ob insolentem corporis detractum corium tomento impletur, & in domibus ornatus causa suspenditur, suspensus, rostro cæti partem à qua flat ventus indicat. *Aliter Scutatus seu Scutifer* dicitur, & in Septentrionali Oceano capitur.

Est corpore terete, mucoso, capite magis exerto quam superior: oris scissurâ majore, dentes in eo sunt plures & minores; oculi parvi, & exquisite rotundi. Branchiarum rimam multo majorem habet: intra has pinnae duas. Subest prosterno os illud, quod scuti specie esse diximus. Neque prona neque supina parte pinnae habet, cauda in unam latam desinit. A capite ad caudam usque ossa ovi figura disposita sunt inter quorum intervalla aculei interjacent. Piscis est rarus & non edulis. Tertius est *Echinatus seu Muricatus*. Aculeis totus hic Orbis riget, ut manu tollere non possis, nisi cauda extrema apprehensa. Capite est multo minus exerto quam proximè descriptus, corpore magis rotundato & majore, in quo nullæ sunt pinnae præterquam in cauda, quæ in unam desinit. Sunt qui Hystericem ab aculeis, non inepte appellent. Possit etiam nonnullis videri *Æliani Sagittarius*, quem rubri maris piscem esse scribit. Sagittarius in eo mari procreatur, & quoniam erinacei speciem & similitudinem habet; firmis & bene longis armatur aculeis. Sed de hac re judicent ii, qui maris rubri pisces viderunt. Nihil temere de rebus parum compertis affirmare volo. Quartus, quem Aldrovandus edit, quod ad oris figuram potissimum cum Scutato convenit, *Stellatus* sive

Aldrov.
de Piscib.
l. 4. c. 16.

Aldrov.
de Piscib.
l. 4. c. 27.

Ælian.
H. A. l.
12. c. 25.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 23.

Tab.
XXIV.
9. 10. 11.
12.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 11.
Aldrov.
de Piscib.
c. 15.

Asterias cognominatur, quod totus confusus sit stellis seu asteriscis: differtque à cæteris, quod neque ad branchias, neque in caudæ exitu pinna habeat, sed ultra tergoris medium, nisi pictoris id incuria factum sit. Pinnae etiam caudæ in extremo viridi sint colore.

CAPUT VI.

De Duobus piscibus Orbibus annumerandis.

Tab.
XXIV.
13. 14.

OBlongi quidem hi Pisces sunt, Orbibus tamen, annumerari posse censet Gesnerus, tum quod mucrones ut illi in corpore eminentes habent, tum quod à muco, quem similiter ore emittunt, vulgo *Snottolf* quasi *Myxini* aut *Mucrones* appellantur. In prioris effigie color erat circa dorsum, qualis interrestribus ranis videtur: circa latera & inferius ex subcaruleo & viridi permixtus. Antverpiæ cinereo colore capi audio. Sic ille. Alterum & hic quoque depictum, *Snottolfi* nomine missum, ex iconè, sive ea, inquit, naturalis, sive aliquid etiam in ea artificiosum est, sic delineavit. Longa est dodrantem & palmos duos, lata palmum unum, circa medium præcipue ad caput attenuatur, sed magis ad caudam: *dorsum* medium fastigiatur, punctis notatur variis, subrotundis, & eminentiis exasperatur triangulis, per tres aut quatuor ordines digestis per intervalla. Oris hiatus, figuram fere ovalem refert. Pinnae ad branchias binæ, una in fine dorso, altera in fine ventris, inter quas corporis pars extrema veluti discretæ, & articulo distincta videtur. *Cauda* tripartita, sive natura, sive potius arte. Mucosus admodum est, inquit ille qui misit, non osium, non carniū quicquam habet: mucoso tantum lentore expletur. Captu difficilissimus. Nam ubi hamum vel retia senferit, suum illum mucum evomendo, lubrica reddit omnia, contractoque orbem exuvio præfilit. Mollem quidem & mucosam carnem, & eminentias trigonas, cum aliis *Snotolfis* communes habere videtur.

CAPUT VII.

De Holosteio Bellonii seu Ostracione Gesneri, & Catan.

Tab.
XXV. 7.
8. 9.

DE hoc Pisce sic ex Gesnero & Bellonio *Aldrovandus*. Hunc quoque à mari Nilum subire, etsi ignoremus, marinum tamen esse ex corii duricie conjicimus, quæ testam fere ostreaceorum imitatur, unde cum ob hoc, tum quod *icpaxius* à Strabone inter Ni-

loos pisces numeratur (in vulgaribus Strabonis codicibus impressis legitur *icpaxius*, sed interpres Latinus *icpaxius* legisse videtur, vertit enim ex testaceis, imperite: & in epitome scribitur *icpaxius*.) Gesnerus *Ostracionem* hunc piscem nominandum conjicit. Bellonius vero non aspernando nomine *Holosteion* appellavit, quasi totum osseum. Forma (inquit hic) ad pentagonum accederet, pedalis interdum longitudinis. Incolæ ab interaneis protinus emundari curant, deinde vero testam eam duram (testaceum corium) qua contegitur, multos annos incorruptam servant, ut inde lucrum consequantur, quod à negotiatoribus externis novitatis gratia hujusmodi piscis emi sit solitus.

Cæterum dum vivus est penicillum in cauda habet, & pinnae supra & infra caudam: ac rursus pinnam aliam utrinque, oculos albos, os parvum. Color ejus lactescit, & velut in pallidum languens. Is quem ego in musæo jam multos annos inter rariora reservo, & hic depictum ostendo, ab eo quod supra rostrum conspicitur tuberculo (nasum appellare liceat, piscem ipsum ab eo *Nasum Niloticum*) ad extremam usque caudam vix implet duos dodrantes. Totus est *pentagonus*, totusque item ex articulis ferme pentagonis (ut icon ostendit) constat, qui coctione, imo per se temporis diuturnitate dissolvuntur. Branchiarum scissura semicircularis: juxta quas utrinque pinna est, parva quidem si corporis magnitudine comparatur, sed perquam robusta: post podicem alia similis planæ sed brevior. Uropygium totum cutaceo corio tegitur, ut quod mereris, in ostreaceum totius corporis tegumentum ita infertur, ut à lateribus ei annecti non videatur, quin haud aliter corpori affixum est, quam navi clavus, oportuitque cutaceum esse, ut mortui promptus, idoneusque foret. Oris rictus pro corporis portione exiguus, in quo dentes utrimque fere octo, non absimiles dentibus murium. Utraque maxilla cutaceo etiam, non ostreaceo corio quod ad modum ineptum fuisset, constat.

Habes hic *hujus generis piscem alium* æque duro tegumento præditum, sed qui dimidio minor est, non pentagono corpore, sed ventre triplo quam tergo, latiore, lateribus quodammodo concavis: cujus item articuli non pentagoni, sed fere rotundi, & orbiculati, & in singulis asteriscus venustissime spectabilis. Eminentia quæ in medio dorso est, non pinna, sed plane ossea substantia gibbi speciei. Pinna vero in ejus conspicitur extremo. Cætera superiora similia habet, præterquam quod naso (ut vacabam) caret, & oculi sub majoribus tuberculis latent.

HISTORIÆ NATURALIS

DE

PISCIBUS.

LIBER III.

De Piscibus fluviatilibus.

TITULUS I.

De Piscibus fluviatilibus squa-
mosis.

CAPUT I.

De Trutta fluviatili.

Tab.
XXVI.
r.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 12.Antum de Piscibus
descripsit & tabulæpavit.Fluviatiles sequun-
tur, & hi vel mere
tales, vel qui etiam
in aliis dulcibus aquis
vivunt, vel lacu-
stres. Inter Fluvia-
tiles eosque squamo-

fos primus est *Trutta*, Ambrosio *Trotta*, à trutendo *Platinæ*, quoniam semper in adversum & impetuosum flumen nitatur, adversas undas superare. Itali *Torrentinam*, quod in torrentibus & rivis montanis abundet, vocavere. An veteribus fuerit cognitus incertum. *Theodonem* Aufonii *Figulus* putaris, *Rondeletius*, *Gillius*, & *Bellonius Salarem* ejusdem. *Jovius Lupum varium* *Columellæ*, *Gesnerus Athenæi Pyrantem*. *Figulo* obest, quod *Theodonem*, *Salarem*, & *Farionem* unum piscem faciat. *Salarem* parvum esse *Salmonem* superius dictum, & *Poëta* clarissimè indicat. Nec *Trutta Lacustris* seu *Salmonata* erit, cum hæc in lacubus nascatur. *Lupos* inter duos pontes in *Tyberi* capi diximus: *Truttas* suburbani amnes ex *Reatinis* *Sublaqueanis*que quotidie suggerunt. Illi frigus vehementer perrimescunt, frigidioribus duntaxat locis gaudent. Quod verò *Ælianus* in *Astræo Macedoniæ* fluvio pisces *γῆλα ὀφθαλμοειδής* gigni, & peculiare quasdam muscas circa summam aquam volitantes appetere; piscatores, pro his muscis purpurascens lanâ hamum vestire, & gallinaceas pennas duas cerei coloris addere, ut pisces decipiant, prodidit, egregie *Truttis* conveniret, si nomen additum fuisset.

De *Pyranthibus* credit *Gesnerus* *Mnesitheum* apud *Athenæum* loqui, cum ait: Ex fluviatilibus optimi sunt, qui in rapidissimis fluviis versantur, *ἢ τοὺς πυράνθους*. Hi enim non

gignuntur nisi in rapidis & gelidis fluviis & facilius quàm ceteri fluviatiles concoquuntur. Convenirentque ista *Trutta* nisi *Causabonus* pro *ἢ τοὺς πυράνθους* scribendum esse *ἢ τοὺς ὀφθαλμοειδῆς*, ita, ut sensus *Athenæi* sit, optimos ex piscibus fluviatilibus illos esse, qui in fluminum locis, qua maximè aquarum impetus vergit, quæque rapidissima sunt, quod plus exercitii habeant, vivunt, putaret. De ipsarum *Forma* sic scribit *Aldrovandus*:

Sunt *Truttæ* & *Salmoni* multa communia; formamempe tota, & corporis partes externæ & internæ: caro rubicunda, squamæ exiles, macule seu puncta, magnitudo, formæ mutatio, circa rostrum præsertim, ac simul nominis: (in *Truttis* *Salmonatis* peculiariter) ascensus ad summam aquam saltuum vis & agilitas, suavitas in cibo: quamobrem non est mirum si ex *Truttis* illis, quas Germani *Lachsforen* appellant, aliqui ætatis progressu *Salmones* fieri puta verunt: *Pinnis* etiam quatuor natant, quemadmodum *Salmo*. *Cauda* vero maxime invicem distinguuntur. In *Salmonibus* enim ea gracilescit, in *Truttis* semper lata est: in illis pinna caudæ longa & bifida, ut in *Alois*; in *Truttis* brevis & non divisa. Hic accedit rostrum acutius in *Salmonibus*, quam in *Truttis*. Rursus partibus internis à *Salmone* & *Umbra* fluviatili non differunt, nisi quod ventriculi appendices plures & evidentiores habent. *Cardanus* formam *Truttis* omnibus communem esse tradit, quod quidem de fluviatilibus verum fuerit. nam quæ *Salmonata* cognominatur, non parum ab iis differt, ut cuilibet icones conferenti notum esse potest. Quæ flavescunt & item nigricant, ab albis differre *Rondeletius* testatur, quoniam illis rostrum sit acutius, & veluti in fronte macula nigra. Præterea albas minores esse & carne minus flavescente.

Fluviatilis, corporis forma *Lupo* (inquit *Salvianus*) persimilis est, rostro tamen minus extenso, magis retuso & paululum recurvo. Ore etiam paulo minore. *Alba* testante *Rondeletio* capite *Mugilem* quodammodo referunt: brevi nimirum, subrotundo, carnosio, vel potius pingui, coloris lætei. *Maxillæ* & lingua acutissimis dentibus armantur. *Sylvius* sex eorum ordinis esse scri-

Ælian.
H. A. l.
15. c. 1.

bit, primum labris connatum, alios quinque à labro in pharyngem abscedentes; in quo tamen dentes sint in contrarium hamati, & qui cibum ex ventriculo regredi prohibeant. Idem ait, branchias utrimque quatuor dentibus hamatis & asperis & duris contumaces habere: quæ verba non satis precipio, Cardanus & Bellonius sex inquirunt in lingua dentes habere: addit Cardanus & certo ordine dispositos: scilicet duos ante, totidem in medio, ad latera positos reliquos juxta radicem. Qui vero in oris rictu sunt, eorum Bellonius, quinque ordines in superiori parte palati facile posse scribit denuerari. *Pinnas* duas sub ventre superiori tergoris oppositas, & duas ad radices branchiarum habet, unam rursus versum caudam proxime ad anum, quod idem è regione est superioris in dorso, quæ longo minor est & cutacea. *Oculos* habet rubentes. *Corpus* squamis parvis tegitur, & cute quæ facile rugatur, & carne divellitur, absceditque. *Dorsum*, imo totus fere piscis ex albo flavescit guttis, quales diximus. *Cauda* in brevem & latam pinnam degenerat. *Pinna* tergoris, iisdem quibus corpus maculis conspersa est. Cubitalem magnitudinem non excedit.

Differentias à coloribus duntaxat fortiumtur. Bellonius ex Rilla Neustriæ flumine variis notis pictas videri, aliis atque aliis multum diversas, tametsi in eodem tractu ceperis, scribit. In Santonum & Bojorum fluviis, reperiuntur, ut Rondeletius prodidit. Captam alicubi flavi coloris & admirationi fuisse, apud Gesnerum legimus. Subnigræ, maculis rubentibus notatæ, quem colorem ex senio contractum, quod ex maximæ sint, Rondeletius putat, in Misnia sunt vulgares. Sunt ibidem *Lachsforen* dictæ, nomine ex Salmone & Trutta composito, quæ aureis maculis pinguntur. Subnigras rivi ad Crottendorfum, & fluviu quem Nigram aquam vocant, Suarceburgum oppidum alluens, alit. Multis in locis optimæ reperiuntur, & quamvis in majoribus fluviis reperiuntur, in minoribus tamen frigidioribus, saxosis & inter montes delabentibus potius quam contra se habentibus, nasci & degere constat. In altis item montium rivi, etiam tenuibus & exiguis aquis, Truttæ satis magnæ & pulcherrimæ habentur. Ascendunt enim altissimæ, cum & contra aquam luctari magna vi, & saltu se promovere, ad tres vel quatuor ferè cubitos interdum, in ascensu queant. Ex quibus efficitur, ut haud falsa esse credamus, quæ de iisdem Paulus Jovius scribit, eas adversos amnes vel è præruptissimis etiam cautibus decedentes, incredibili impetu subire. Ab Nare enim fluvio in Velinum lacum, qui hodie Pedelucus est, stupendâ velocitate volucrum modo ascendere credi; qui lacus ab altissimo montis vertice certis primo coarctatus angustis, & mox

tota aquarum mole præcipitatus, nec subiectis quidem cautibus madefactis, veluti è cælo in ipsum profluentem Narem effunditur. Idem in Gardonis fluviis fieri experientia docuit.

Vescuntur aquarum dejectamentis, phryganiis vermibus, locustis aquaticis, & piscibus. Percarum sobolem, Fundulos, & Phoxinos læves, tanta sæpè aviditate appetunt, ut supra aquam elatæ in scaphas aliquando incidant. *Auro vesci* vulgus credidit. *Pariunt* mense Octobri, in modicis quas excavare serobibus. Laudantur vehementer in *Cibis*, maxime si in frigidioribus & purioribus annibus procreatæ sunt.

Quæ adverso eorundem impetu fatigantur, atque occurrentibus in æqualium vadorum petris illiduntur castigatiora sumina, & aridiusculas carnes ostendunt, sed recenter captæ comedi debent: mortuæ enim paucissimis horis, quia ob pinguem teneritudinem ocyssimè putrescunt, saporis gratiam amittunt. In Malacca regione Indiæ, salitæ ad comæatus servantur; Cajuba vocant.

CAPUT II.

De Trutta fluviali altera.

HUCH apud Bavaros (inquit Gesnerus) nuncupatur piscis boni saporis, Truttis nonnihil cognatus, cum alias ut pictura ostendit, quam ad vivum expressam Achilles Pyrminius Cassarus, præstantissimus Augustæ Vindelicorum medicus ad me misit; tum quod pinnulam illam adiposam similiter in fine dorsi habet, & punctis variatur: sicut & icon nostra, & quæ in libro Bavaricarum constitutionum publicato habetur, præ se ferunt: in quo etiam mensura hujus pisces proponitur, duodecim aut tredecim digiti, quibus brevior vendi non debeat. Augustæ, ut audio hic piscis vocatur, *tiin* *tiot* / *tiottle* / à colore rubicundo, quæ nomina nostri Umblis (ut Sabaudi nominant) lacustribus tribuunt. Voracem esse ajunt, in cibo Truttis inferiorem.

In Carinthia Huchæ rubræ (Rot Huechen) quædam cognominantur in fluviis, eas Salmoni comparant: carne etiam rubrâ & boni saporis esse ajunt, & saliri, ut inveterentur, solere: quod quomodo fiat Balthasar Stendelius ad finem lib. 4. Opfopœjæ suæ Germanicæ docet. Colores hujus piscis in pictura nostra hujusmodi fere apparent. Aureolus color passim aspersus est, copiosius tamen circa branchias & oculos. *Pinna* circa branchias rubicundæ sunt: cæteræ omnes, sicut & *cauda*, fusæ & maculosæ punctis partim nigricantibus, partim aureis. *Dorsum* fuscum est, utrimque ad Indicum vel cæruleum colorem vergens, ubi & punctis nigris creberrimis distinguitur. *Linea* nigra & recta fe-

Tab.
XXVI.
2.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 13.

re à branchiis ad caudam fertur. Latera media maculis quibusdam subcæruleis per intervalla distinguuntur. *Venter* candidat. *Circa rostrum* & branchiarum opercula roseus fere color, &c. In capite etiam viridis aliqua ex parte. Huchas istas quidam icone nostra inspecta in quibusdam Germaniæ locis ali, in piscinis nobis referebant: & in Traga flumine Carinthiæ reperiri, ætatis progressu in Salmones converti (specie rostri nimirum) sicut & lacustres Truttæ, quanquam & aliæ Truttæ Salmonum speciem præ se ferunt.

CAPUT III.

De Thymallo.

Thymalli solus Ælianus inter Græcos, Ambrosius inter Latinos mentionem faciunt. A Thymo quem olet ita dici, Salvianus contendit. Bellonius Thymum vocavit. Itali Temarum, quasi temerarium, quod stolidus piscis, dicunt. Truttarum generis esse, cum pinnarum situs, tum totius corporis figura indicant. Eratque Ælianus Truttis, si eas notas sibi habuisset, potius quam vel Lupis vel Cephalis, quorum communem & mediam speciem similitudinemque gerere scribit, assimilaturus: quanquam & his non absimilis multum: similior interim Mugili, quam Lupo. Caput pro corporis ratione parvum, in acutum tendit. *Os* aperitur non longo, sed quadrato ferè hiatu. *Ventre* est prominentiore. Rondeletius latiore, magisque ventrosus pinxit, quam par est. *Pinnas* duas habet ad branchias, duas alias in ventre inferiore, à podice unam. In dorso prior magna est, maculis multis, pulchrè varia: infra partim nigris, partim subrubentibus, supra rubicundis tantum. *Cauda* in duas lãras pinnas desinit. Rondeletius corpore ait esse cæruleo: Bellonius verò tergus ex livido in opacum tendere, & Gesnerus fuscum id, vel subcinereum facit: Atqui hic exprimitur, Rondeletius scribit: fierique potest, quod vel loci, vel ætatis ratione variet. Lineas per latera rectas habet, quarum quæ ea dividit à superiori branchiæ angulo spineo oritur, & rectà ad caudam deferitur: sunt & aliæ per totum corpus non paucæ, singulæque per singulos squamarum versus, non rectæ, sed innumeris veluti arcubus, minimis triangulis undulatæ; quod veluti operosum pictores nostri, inquit Gesnerus, non indicaverunt. Obscurè sanè & in meo pisce quem ad vivum depictum in musæo refero, pictor eas expressit. Latera præterea modo pluribus modò paucis punctis & lituris nigris temerè asperguntur.

Vidisse se idem Gesnerus in fine Decembris aliquando singulis tantum utrimque ad branchias *lituris* insignem scribit; aliumque initio Junii, uno altero puncto vix apparente. *Squamæ* ex ejusdem observatione, sin-

gulæ fere *punctatæ* sunt, hoc est, rhombi figuram imitantur. Latera enim, inquit, earumque utrimque circuli segmentum referunt, supra vero infraque in cunei acumen tendunt, quod tamen in iconibus suis expressum negat. *Branchias* habet utrimque quaternas, & ut Bellonius addit, Harengi & Sardinæ modo, solidioribus horrent, uncinatisque ossiculis constant. Idem Bellonius *linguam* ostendere albam scribit, dentibus carere, immo ne ullis quidem rudimentis eorum peditum esse: è contrario Gesnerus pro dentibus, inferius superiusque labrum exasperari, limæ instar, introrsum profitetur: & Bellonium haud bene istæ exanimasse apparet: nam alias *Lavaretum* Gallice dictum pisces, ossicula ad fauces atque Oesophagi ingressum utrimque habere senis hinc inde denticulis ait, ut in Themolo comminuta; cum alioqui in Thymallis, & in Lavaretis suis nihil quicquam tale reperias. *Ventriculum* habet mediocre, intestina crassiuscula, pinguedine multa obvoluta; & ut Bellonius ait, apophyses plures ex pyloro dependent, à quo statim sequitur intestinum unum gracile, rotundum, quod ad rectum tendit, in quo excrementa recipiuntur, & ad anum deferuntur. Idem Bellonius, *cor* tam exiguum habere scribit, ut ne inesse quidem ei credatur. *Splenem* Salvianus subrubrum facit, Gesnerus in suo quem manibus tractavit, ferè nigricare asserit. Bellonio teste hic tam magnus est fere in hoc pisce, quam hepar, quod in nullo alio pisce (inquit) unquam videram, oblongus rubra pinguedine mixtus. Unicus hepatis lobus est, ut idem Bellonius observavit, statim ubi gula finit, stomachum amplectens. Salvianus *felle* carere putat: Bellonius vero tam exiguum id esse tradit, ut vix rudimentum aliquod ejus appareat: & Gesnerus quoque suum Thymallum felle caruisse negat, sed flavum vel subaureum coloris id habuisse. Bellonius folliculum piscium natationi accommodatum plenum semper vidit, ac per spinam delatum. Cum maxime augetur, ad cubitalem *magnitudinem*, teste Æliano, excrevit: etsi qui crebrius capiuntur, minores sint, & ut Salvianus ait, libram non excedunt. Longitudo ad latitudinem ferè quintupla est, cauda etiam computata, ut Gesnerus advertit in eo quem manibus tractans descripsit, latus enim erat digitos tres, longus quatuordecim. *Gaudet* puris frigidis & saxosis aquis, in quibus circa saxa reperiuntur: nec ulli magis in montanis & præcipitibus fluviis, Truttas si excipias, capiuntur.

Cognunt eas in Germania Rhenus, Limagus apud Helvetios, & Floha apud Misenos; in Italia Ticinus, Abdua & Ambra. In Pado rarius capiuntur. *Vivunt* insectis aquatilibus, dejectamentis mille pedibus, pediculis, caridibus, pulicibus aquaticis ac

ter-

Ambros.
Hexam.
l. 5. c. 11.

Tab.
XXVI.
3. 4.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 14.
Ælian. H.
A. l. 14.
c. 22.

Ælian. 17.
A. l. c.

terrestribus. Ælianus alia quàm culice escā capi posse negat. Volaterranus Thymallo vesci, & solus quidem inter scriptores, voluit. *μυροβόλος*, id est aurivori dicuntur, seu quod minutula auri fragmenta propter splendorem appetant, seu quod cum majori pretio vāniant, obsophagorum aurum absumant, & loculos ex hauriant. *De odore ejus ita Ælianus*. Ejus capti odor non indignam admirationem habet: non n. ut ceteri pisces pisculentum quendam mittit odorem: imo vero existimes te ejus gentilem herbam, recentem ex terra lectam manibus tenere. Tanta sanè odoris suavitate fragrat, ut qui cum ipsum non videt, gratissimam apibus herbam, unde nomen duxit, in manu late re putet. Ambrosius de eo, qui gratam redollet suavitatem, dici facile scribit. Aut piscem olet aut florem: Omnibus sui partibus commendatur in *Cibis*: quibusdam tamen interiore tunica maxime blandiuntur. Circa Albim præferuntur Truttis. In Athesi & Addua capros tenerrimos Salvianus fecit. *Majo* mense maxime appetuntur, & loco marinorum saxatiliū præscribuntur à Medicis.

In *Medicina*, Adeps hujus piscis laudatur, tum contra auditum gravem, si mense Majo in vasculum conjectus soli exponatur, & quod distillat, auri immittatur, tum contra oculorum prerygia, ungues, ruborem, fervorem, &c. si quotidie binæ guttæ cum pinna instillantur. Vidisse se puellam chemosi affectam Gesnerus inquit, quod malum aliquando exanthemata puerorum sequitur, hoc remedio per septuaginta fere dies continuato, (ut quotidie gutta instillaretur) curatam, rubore mox primis diebus sublato. Addit insuper, habere & pharmacopolas apud suos hunc adipem, ut maculæ in eis deleantur, peti solere, deinde etiam ad curandas igne vel aqua adustas partes.

CAPUT IV.

De Umbra fluviatili.

Tab.
XXVI.
5.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 15.

Umbra fluviatilis Aufonius ex veteribus in Mosella sua meminit, Gesnerus pro eadem cum Trutta fluviatili, quod ista in Mosella in primis ubi se in Rhenum exonerat abundet, accepit. *Rondeletius ita descripsit*: Piscis est non solum nomine, sed & colore marinis (Umbris) similis, à quo utriusque nomen. Corpus enim est opaci loci modo subfuscum & subobscurum, cubitalem magnitudinem non excedens. Galli Narbonensis, demptis Monspelienfibus, Umbram vocant. Piscis est ex Truttarum genere, Carpioni Italico corporis aspectu affinis. Pinnis & earum situ à Trutta non differt. Duas itaque ad branchias habet, duas in ventre, ab ano unicam, in medio dorso priorem

majorem, posteriorem minorem, subrotundam, & pinguem, squamas parvas, & maculosas similiter habet. Carnis substantiam, partesque internas omnes easdem. *Capite vero à Truttis differt*, quo Carpioni (Italico, Gesnerus) similis est: capite enim longiore est, quam Trutta, ore minore nec tam hiant, rostro non acuto, sed obtuso, maxime in maxilla inferiore, sine dentibus, & sine magna maxillarum asperitate. *Oculis* est patulis, cornea tunica aurea, pupillâ nigrâ. Corpus à medio sensim gracilescit, in caudam latiusculam, & pinnam bifidam, latissimam deficit. Ad branchias ad caudam linea recta (hanc in pictura non expressit) per medium corpus producta est. *Branchiæ* intus sunt quaternæ; *Ventriculus* longus & spissus pinguitudine quæ lacte candidior est, obductus, à quo multæ apophyses pendent. *Hepar* rubet, cui alligata est fella vesica, *fella* nigrissimum est, *splen* longus & niger. *Intestina* sine gyris ullis ad anum demissa sunt. *Vesicæ* terræ, aquâ limo, unaque, cum his, & cum arena auri laminulas haurit: ob id vulgus auro nutriti Umbram credit: & revera in ventriculo & intestinis aurum reperiri certissimum est. Carne est sicca & alba, qualis est Truttarum parvarum caro. Hyeme latet: æstate cum Truttis capitur: cui cum in succo & substantia, permultisque aliis similis est, Truttarum generi & tractationi subjecimus. Pura aqua maxime delectatur. *Hæc Rondeletius*, nulla coloris facta mentione, quem Bellonius non tacuit: totum hunc piscem sub ventre argenteum, esse scribens: dorsum verò terribilissimum habere ex livido opacum.

CAPUT V.

De Barbo.

Barbi quoque solus inter veteres Aufonius meminit. Nomen ei Cutacei illi Cirri quæ barbæ quodammodo similitudine ex utroque hujus piscis labro dependent, fecere. Bellonius haud incongruo vocabulo *Mystum* vocat, & Græcorum vulgo *Mystracatum* vocari scribit. Sunt qui cum Mollis marinis piscibus, qui & ipsi barbati confundunt. Corporis figurâ Mugiles fere refert, aut Squalos, nam si latitudinem spectemus, oblongiusculus est rotundus, in laterâ modice compressus. *Differt à Mugilibus*, quod pinna quæ in medio dorso, firmiori aculeo innixa est: pinna ventris magis sunt flavæ, caudæ pinna rubescit: Rostro item est longiore & acutiore, cartilagineo & pingui. *A Squalo* etiam perspicuis quibusdam notis differt. Nam cum in extremo rostro Squalo sit os, infra rostrum in inferiore parte illud Barbus habet, unde & superior ejus maxilla paululum prominet: Labra item longe crassiora sunt quam Squalo, caputque compressius. Postremo è superiores rostri extremo ducit ap-

Tab.
XXVI.
6.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 16.

appendices, ex lateribus duæ aliæ propendent: quibus & Squalus & Mugiles carent. Est autem appendiculum earum substantia cutacea quidem, sed mollis, lubrica, teres, subrubra. *Venter* est colore lacteo, latera argenteo. *Dorsum* ex albo flavescit, nigrisque quibusdam ac parvis maculis conspergitur. *Branchias* habet quaternas: quarum rima admodum parva est: quamobrem extra aquam satis diu vivit. Ab iisdem linea ad caudam porrecta, minus evidens est, quam in aliis. *Dentibus* caret. *Oculi* parvi sunt, pupilla nigra, quam ambit aureus circulus. *Fel* adhæret jecori. *Intestina* in spiras contorta, plurima pinguedine oblita. *Uterus* oblongus est & bifidus, ovis innumeris refertissimus, cum prægnans est piscis. Pondere plerumque libræ unius, quandoque duarum, raro trium. Salvianus ad octo libras excrevisse observavit. Bellonius frequenter in Nilo capi testatur, sed quomodo Lucius Italicus, inquit, à Gallico differt, sic Nili Mystus à nostro diffidet. Noster enim Mystus oblongus est, & quasi teres: Niloticus vero crassus & recurvus est corpore: Ejusdem tamen coloris sunt: & eodem modo barbis quatuor, seu mystacibus exornantur. Niloticus nostrum Cyprium ipsâ formâ ferè æmulatur: ventrem enim habet expansum. Tantâ crassitudine in Nilo proficit, ut eum Memphis libras viginti pendentem viderim; quo in loco Mythus vel Mystus dicitur.

De loco ejus & Natura hæc Aldrovandus habet: In lacubus quidem nascitur; sed cum multo frequentius nascatur in fluviis, fluvialilis potius, quam lacustris erit dicendus. Scribit Salvianus paucos esse lacus, qui Barbis abundant: plurimos vero esse qui eis carent: contra in omnibus fluviis gigni atque ali: ideoque jure inter suos Mosellæ pisces Barbum recenseri ab Aufonio. Albertus author est, à piscatoribus sibi relatum, ova ab eo custodiri, ne ab aliis devorentur: additque se observasse in cavernis domus suæ ad Danubium sitæ, quotannis post æquinoctium autumnale congregari hosce pisces, tantaque copia convenire ut manibus etiam capiantur, ita ut meo tempore, inquit, incolæ loci aliquando decem plaustra fere manibus ejecerint. Nam hoc genus piscis frigus non sustinet: quare semper languidus hyeme invenitur; æstate verò mundus & sanus est. Hæc ille. *Vescitur* algis, cochleis & piscibus, & ne suo quidem generi parcere dicitur. Albertus cadaveribus capi quoque scripsit. *Degunt* gregatim, *pariunt* ineunte æstate prope litora. Gesnerus ex piscatorum observatione sub collibus & ripis prominentibus libenter versari asserit, & porcorum instar fodere, ita ut aliquando in cavernis inhæreant, & pereant: pinnaeque eorum ab hirudinibus nonnunquam infestari, quas faxis affricantes in fundo aquæ depellant, aut

rapidiora fluminis loca petant, ut aquæ impetu elidantur. Apparet verò cum Squalis quandam occultam exercere *amicitiam*. Nam quemadmodum in quovis lacuum, fluminumque Barbus, ibidem fere semper, & Squalus reperitur; ita è contrario ubi Squalus, ibi semper etiam Barbus, ut Salvianus refert. Clausura fert, & in piscinis æquè Squalus parit & pinguescit.

Quoad *usum in cibo* Cardanus cum omnino rejicit. Aliis, si in saxosis & puris fluminibus capitur benè sapit, concoctus est facilis, laudati succi, carnis candidæ & mollis, sed plurimis spinis firmatæ. Majo circa Rhenum ad Julium laudari, Augusto in Helvetia, Gesnerus prodidit. Salvianus ineunte vere sapidiores dixit. Aufonio grandiores natu, majore in pretio. Nonnulli propter mollem carnem vino prius imponunt. *Ova* venenata, Majo imprimis mense Platina author est. Gazius scribit, cum experiundi gratiâ, duos duntaxat de ovis hisce bolos comedisset, nihil inde aliquot horis postea noxæ percepisse: demum sub horam cœnæ, plurimam in ore ventriculi sensisse inflationem, quam ut dissolverem, inquit, anisum sumpsi, sed frustra. Post horam faciem apparuisse tanquam in syncope, ita ut astantes & admirari, & de mea salute timere inciperent. Se interim magnam non solum in stomacho & ventre, sed omnibus membris externis alterationem, & inæqualem quandam intemperiem in unaquaque carnis parte sensisse. Tum supervenisse passionem cholicam, donec infra supraque simul pluries ova purgarentur, magna cum anxietate & virium prostratione, & maximo vitæ periculo. Idem apud Gesnerum invenies. Sunt qui credant tum esse malefica, cum salicum, quæ fluviorum ripas obsident, floribus in aquam decidentibus vescuntur; sed quia nec salicibus nec aliis Barbi partibus istavis, præstat culpam in idiosyncrasiam conjicere.

CAPUT VI.

De Capitone.

ARTICULUS I.

De Capitone Aufonii, seu Squalo veterum.

Piscis, quem hic descripturi sumus; à magnitudine capitis, *Capito* Latinis dicitur. Apud alias nationes varia invenit nomina, quæ apud Aldrovandum, Gesnerum & Bellonium vide.

Quis sit apud veteres, difficile est dictu, Bellonius *Theдонem* Aufonii, quem nullo spicæ nociturum acumine dicit, Rondeletius Capitonem ejusdem, Salvianus Alburnum Aufonii, & Galeni Lencecium, Aldrovandus Squalum, ut Romæ vocatur, esse putat.

M

Ma-

Bellon.
de Piscib.
bus l. 1.

Tab.
XXVI.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 17.

Marino Capitoni Mugilibusque aliis corporis figurâ similes est: dorso tamen minus lato & corpore compressiore. In dorso item unicam duntaxat *pinnam* habet, Mugilum verò genus duas, unam videlicet in ejus medio, alteram inferius caudam. Mugiles denique lineas quasdam habent suboscursas à branchiis ad caudam productas, quibus carere omnino Squalum Salvianus scribit: unam tamen ei lineam esse Gesnerus proficitur, sed quæ leviter appareat. Idem Salvianus ait habere porvum, Rondeletius contra crassum & magnum: id quod pleræque etiam vulgares nomenclaturæ indicant. Rursus uterque dentes habere negat. Rondeletius ostentum asperum esse ait: Gesnerus verò dentes ejus latere in faucibus asserit, maxilla ferè semicirculari, supernè leviter aduncos, ordine duplici, exterius quinos, interius binos. *Dentes* enim ei tribuit Albertus his verbis: Piscium omnium dentes valde acuti sunt, exceptis perpaucis, qui in lateribus gutturis, mandibulas habent, ut pisces fluviatiles magnis vestiti squamis, Barbellus (at huic squamæ sunt exiguæ) Monachus, & alii quidam. Hi enim habent dentes latos aliquantulum, magis ad conterendum cibum, quam ad dividendum idoneos: quamobrem etiam omnes æquales sunt: & ideo naturâ abscondit eos in gutture, ut clauso ore aqua non suffocet mandentes hos pisces. Tales autem dentes maximè habet Carpo (ut Cyprianus) piscis. *Labra* sunt satis crassa. *Oculi* nigri, in circuitu aureoli; tempora subflava; *Os* rubicundum, *branchiæ* utrimque quaternæ, geminæ colore totus est argenteo: dorsum tamen minus quam venter & latera pollucunt. *Squama* splendida sunt, albicantes, angulosæ, latæ, cute ultra medium obductæ, minimis variante punctis. *Aristis* in carne multis abundat, quarum etiam in Capitone meminit Aufonius, qui item à squamarum magnitudine squameum cognominavit, dum canit:

*Squameas herbofas Capito interlucet arenas,
Viscera pratenero fartim congestus aristis.*

Gesnerum cum circa Octobris calendas unum ovis gravidum magnum item & præpinguem inspiceret, nullas in eo apparuisse aristas testatur. Quare vel non omni tempore, vel non omni ætate in iis reperiri credendum est. *Ventriculum* parvum habet, intestina parva, *hepar* ex albo rubescens, fel in medio viride, *vesicam* geminam aëre plenam, *peritonæum* nigricans. Circiter libram plerumque implet, aliquando tres & quatuor, aliquando sed rarissimè, octo aut novem. Non tantum in fluminibus sed & in lacubus, sed & iis paucis degit. In Lario invenitur, in Constantiensi non item. Ab Aufonio inter Mosellæ, à Bellonio inter Strymonis pisces refertur; sed nec claustra refugit. Dulci piscina inclusus, crescit, pingue-

scit, & prolem propagat. Expressè Varro. In tertia parte quis habebat piscinam nisi dulcem? & in ea duntaxat Squalos & Mugiles pisces? Servari diu & in aqua pura potest, si eandem sæpius mutaveris, vas ad summum repleveris, nec quicquam aliud injece-
ris, alias suffocantur. *Vescitur* cæno & fordibus, ideo un Vilain in quibusdam Galliarum locis dicitur: scarabæis & animalculis, qui in aquæ superficie natant; gryllis quoque campestribus, & uvæ acinis, & muscæ genere, quod propterea Aletmuggen Helvetii dicunt; cerebro denique bubulo, idè à piscatoribus hamo subtiliter alligatur. In locis litoribus proximis, in fine veris & sub æstatis initium parit. Mense Majo parere ab uno latere, ab altero Cerasa quæ Helvetii Amarella vacant, matura sunt postea, aliqui Gesnero teste prodidere. Inter gregales esse censentur. *Usum in Cibis* si spectes, inter viles censetur. Carne quidem est candida, sed insipida ac molli, & quæ mox extra aquam flaccescit, plurimis abundans aristis; utrumque tetigit Aufonius dum canit:

*Viscera pratenero fartim congestus aristis,
Nec duraturus post bina trihoria mensis.*

Improbantur præ cæteris, qui in lacubus, & in magnis cœnosisque fluminibus capiuntur, quamobrem Romæ, quod vel ex proximis lacubus, vel ex Tyberiafferatur, parvi sit, cum aliqui Tyberinus in ligneis vastis diu vivus conservetur. Contra, in limpidis, parvisque ac saxosis fluviis torrentibusque captus, haud omninò aspernari debet, maxime ubi adolevit.

Major enim factus, minus mollis est, ut hic etiam, sicut de Barbo diximus ex Aufonio in senectâ præferendus videatur. Commendantur apud nos verno potissimum tempore, cum prægnantes sunt: Alii tradunt per totam hyemen admitti mensis posse, & vere etiam usque ad initium Maji: æstate non probari.

Gesnerus apud suos commendari scribit mense Decembri, placereque circa Calendas Octobris, quo tempore unum ovis gravidum, inquit, reperi: magnus is & præpinguis erat: ova quoque sapiebant palato: nec ullæ apparebant *spina*. Idem caput in eo præferri asserit.

ARTICULUS II.

De Capitone fluviatili seu Squalo minore.

Requens in fluviis est, Inquit Gesnerus, vulgo nominatus *ein Bass* in lacu juxta Tugium Sanghaste/ vel communiori nomine *Wassfisch*/ quasi albus piscis, item alio nomine *Wassfisch*/ à Mense Majo, quo præferuntur, quod nomen Alausis, quoque attribui putat. Italicum hujus piscis nomen nisi *Stretta* sit, (à corpore longiusculo fortè, & stri-

Varro R.
R. l. 3. c.

stricto id est, minime lato) in Lario lacu, & in Verbano *Gravetta*, aliud se nescire profitetur. Hæc verò cum scripsisset, piscator Lucarnensis in Verbano vocari ei asseruit, *Letta* vel *Aletta*.

Conjicitque eundem fortè esse qui Papiæ *Cabaello* dicitur. Germanicum *Häszle* videtur lepusculum significare, fortè quod agilitate ac celeritate natandi lepores repræsentet. Ipse Cephalos aut Mugiles fluviatiles minores vocat, quod fluviatilem Cephalum sive Squalum magis quam Leuciscos referat, adeo ut icone opus esse neget. Pisciculi, inquit, sunt molles, duos aut tres palmos longi, albicantes, per dorsum in viridi nigricantes, cauda & pinna dorfi glaucis; cæteris rubicundis minime lati.

Squamulis tenuibus, argenteis branchiis ternis. Caro eorum aristis referta est, ut & Mugilum fluviatilium majorum. Ex his qui in fluvio apud nos capiuntur, oculis rubere audio, qui in lacu non item. Observavi postea lacustres superna oculorum parte flavere.

Dentes in faucibus utrinque couditos habet, ut Capito fluviatilis, in mandibula curva, exteriore ordine quinque majusculos, interius binos minores, omnes fere in summo leviter aduncos. *Parere* incipiunt medio Aprili; vel paulo ante. Suo tempore (Majo & Aprili præcipue, deinde Junio & Julio: à Majo quidem mense etiam *Meisfisch* alicubi nominantur) satis grati in cibo, & salubres habentur. Aliquando verò vermes eis innascuntur, (*Ligulas* nostri vocant, & *Netzel*) & omnino insalubres sunt. Hyeme marci sunt ac minime placent. Fluviatiles etiam lacustribus præferuntur. Elixari debent in vino fervido. Circa initium Novembris ova in hoc pisce reperi, quæ magis quam piscis placebant. Idem *Capitonem fluviatilem* *Cæruleum* cognominant differentie causa, quem Germani, Saxones potissimum, *Iesen* appellant. Quidam Alaufam interpretantur, sed male, quoniam è mari fluvios non ascendit: Capitur in Albi, & in Danubio quoque, ubi *Ientling* vocatur. Cum Capitone fluviatili similitudinem habet, sed colore est in dorso & in aliquibus capitis partibus cæruleo. Præfertur assus. Germani ad Viadrum *Jesitz* appellant, Marchici ad Viadrum *Jese* scribunt: alicubi *Bradsfisch* dicunt, hoc est piscem assari solitum, per excellentiam. Poloni *Jatzez*, Hungari *Zompo*. Non est in magno pretio, neutiquam salubris, quod pinguiusculus sit, & non, saxatili modo friabilis: suavis tamen satis, quantum ad gustum. Estur frigidus, assus potissimum, quamvis & elixus, & aliis modis. Longitudo ejus cubitum non excedit, nec latitudo tres aut quatuor digitos. Post Pascha potissimum capitur.

ARTICULUS III.

De Capitone fluviatili rapace
Gesneri.

HOc genus Capitonis, Miseni Rappe vocant, id est corvum, ut Kentmannus Gesnero communicata icone significavit, quod is volucris instar vorax & rapax sit, quamobrem Gesnerus rapacem cognominavit.

Piscis (inquit Kentmannus) est candidus, argentei splendoris, dorso tamen fusco, & subcæruleo, *Squamis* tegitur latusculis, tenuibus & perspicuis, quibus pellicula tenuis argentei nitoris subternitur, quæ per squamas translucens, piscem velut argento illitum ostendit, quales etiam cæteri pisces, quos communi nomine albos cognominamus (*Weisfisch*) apparent. Piscis est longus, crassus, & carnosus: caro *aristis* plena. *Longitudo* ad latitudinem quintupla. *Dentes* ei non in ore, sed in faucibus sunt (ut aliis quoque hujus generis) longiusculi, utrinque septem, è mandibulis prognati. *Ventriculus* & *intestina* simul, piscis longitudinem non æquant. Revolutio eorum triplex est, ita ut in summo ventriculus sit, inde tedius intestinum incipiens revolvitur, duas sub eo helicas efficiat.

Tegit hæc dextro latere *jeur* (in quo vesica fellis longa conspicitur) altero *lien*. Vesica in eo aëre plena, oblonga est, ut in Lucio, Cyprino, &c. Maximi qui apud Misenos capiuntur, ad sex aut septem libras, (xvi. unciarum) accedunt.

Addit Gesnerus sese audivisse *branchias* molles esse, ut in Salmone: *pinna* coloris è fusco punicea. Nomen à rapacitate tulit.

Est enim velut prædo vehemens in aquis: nec minus ferè quam Silurus (Glanis) & Lucius, aut etiam amplius, damnosus est vorandis piscibus: quos dum persequitur, in ripam aliquando expellit, & simul etiam ipse interdum impetu in sicum delatus, relinquitur. Hic piscis in Albi nascitur, non aliunde subit, & toto fere anno (sed rarius & per intervalla quædam) capitur. A *partu* valde augetur, & pinguescit. *Parit* autem circa annuntiationem Divæ virginis: quo tempore à statutionibus suis catervatim procedunt, magni & parvi: duobus aut tribus diebus ante aut post illum diem: idque ita fore certum est. Quod si nihil impediatur, sexaginta, plus, minus, uno retis tractu, interdum capiuntur. Piscis est *callidus* & extra hoc tempus, quo propter partum gregatim natat, difficilis captu: nisi vel nimii ventorum flatus, quo minus piscatores & retia trahenda audiat, efficiat: vel aqua perturbata, visum ejus impediatur: aliàs enim inter scamna, quæ arenâ accumulatur, manet, nec facile retibus

Tab.
XXVI 8.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 20.

Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 19.

includitur. Cæterum extra pariendi tempus hamo ferè *capitur*, hoc modo: Quoniam vorax est piscis, Phoxinus aliufve pisciculus hamo infigitur, & sic linea per aquam, ultro citroque agitur, eo in loco, ubi hujus generis pisces degere conjectura est: Hi cum pisciculo pariter hamum devorant, & capiuntur. Piscis est admodum laudatus & boni saporis, tum assus, tum elixus. A plerisque tamen parvi aestimatur, quod idoneum coquendi modum nesciant: nam nisi ritè coquatur, sive asses sive elixes, in partes aliquot dilabatur: quod si integrum servare velis, non in fervidam, ut alios plerosque pisces solemus, aquam, sed ab initio statim in frigidam præparatum immittes, ut pariter cum aqua concalcat: tum condies, saliesque, & ad juris ferè consumptionem coques. Assandum verò, desquamabis, exenterabisque similiter: deinde sale deligenter consperges & perfricabis, per & duas horas in sale relictum, tandem assabis: ita bonus & grati saporis piscis erit.

Sunt qui pisces assari solitos, simpliciter assent, ovis (aut lactibus) solum non exemptis & salvia infarcta. Alii ova seu lactes, cum hepate & liene exempta, minutatim concidunt, adduntque multum piperis ac caryphyllorum, salem, uvas passas minores, vitellum ovi, hanc impenfam in piscem infarciunt, & assant, putantque ita salubrior fieri.

ARTICULUS IV.

De Orfo Germanorum seu Capitone subrubro Gesneri.

Tab.
XXVI.
9.
Tab. II.
7.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 12.

ORfum Germani vulgo *ein Orff* / genus hoc Capitonis vocant, (inquit idem Gesnerus) quod mihi videre nondum contigit, præterquam Augustæ Vindelicorum olim in piscina quadam, ubi mihi intuenti Cyprini colorem præ se ferre videbatur, aqua forte visum meum mutante. Ibidem depictam iconem clarissimus medicus Achilles Pyrrminius Gassarus mihi communicavit.

Dorso est rubicundo, ventre albicante, *squamis* (ut apparet) magnis & latis. Assi laudantur, præcipue Aprili, & Majo mensibus. Linea à branchiis ad caudam, an probè adeo recta (præter plerorumque piscium morem) expressa sit inquirendum. Germanicus liber qui Bavaricas Constitutiones continet, eadem forma piscem hunc delineatum proponit, digitos 12. vel 13. longum, quâ longitudine inferiorem capi non liceat: cum vulgarem Aufonii Capitonem, vel novem digitos longum capere concessum sit: unde hunc (Orum dico, qui tamen ab Orpho marino pisce toto genere differt) ad molem multò majorem excrecere conjecerim.

In diversis Germaniæ partibus aliter at-

que aliter (proximis tamen se vocabulis) nominatur, *Orff* / *Erle* / *Doßling* / *Wurßling*: alicubi etiam *Elfr* / idem ni fallor. (Apud Hollandos *Elfr* est Alofa.) Intempestive captum, spinulis seu aristis redundare ajunt. Duorum generum hunc piscem esse audio: assatos alios carne alba esse, qui Augustæ vulgo *Weißfisch* appellantur: alios rubicundâ vel flavescente, Truttæ Salmonatæ instar. Piscem Norimbergæ quoque in Begniza fluvio frequentem esse ajunt, præferri genus illud, cujus caro rubeat: in superficie discrimen non apparere: *squamas* paulo latiores esse, quam in Thymallo: carnem siccam, & friabilem, salubrem, ut vel purpureis concedatur, minus suavem quam Truttarum. Bellonius quoque visa apud me hujus piscis effigie, forma ad Squalum (id est Capitonem fluviatilem) eum accedere ferebatur. Piscem audio lautum, & in pretio esse, muscis vesci. Cyprino minus lautum esse, sed crassiorem: non in aquis fluentibus, nec in lacubus, sed in piscinis fermè reperiri, apud Vindelicos, Norimbergæ, & alibi. Sunt qui *Pigo Picone* pisci Larii & Verbani lacus eum comparent: & similiter certo anni tempore è squamis ecclusos quosdam emittere mihi retulerint. Ad Cyprinos ne igitur magis an Capitones pertinet, judicandum illis relinquere, quibus in promptu hipisces sunt.

CAPUT VII.

De Leucisco.

Leuiscis nomine omne Mugilum genus Hicefio apud Athenæum venire superius, ni fallor, diximus. Galenus suæ speciei piscem *fluviatilem* & *lacustrem* facit. Salvi-nus Squalum esse, ideò quòd eum Galenus *ὀψίον* habere scribat (sed perperam, Legendum enim est, *ὀψίον* & *ὀψίον*) credit; Modernis Græcis *Leucorinus* dicitur. Bellonius, *Albicellam* commodè vocari posse scribit. Apud alias nationes, Germanos imprimis, varia sortitur nomina. In Germania, circa Argentinam *ein Lauck* / Helvetiis diminutiva voce *Laugela*, quo nomine Gelenus dici conjiciebat (inquit Gesnerus) quasi *ἀλβικέλα*, id est Albicellam, tanquam olim sic appellassent Græci, & ab iis mutuati essent Germani. In quibusdam Helvetiorum lacubus, ut juxta Tugium & Bielam *Uvinger* vocitatur, ut à Sabaudis circa Neocomum *Vengeron*.

Diversus tamen ab his piscis est Vageton in Lemano dictus, cui Helvetii à rubore pinnarum nomen posuerunt. Brelenpes etiam *Onhopr*, id est, acephalos nominant hos pisces: amputatis enim capitibus, sicatos, alio venales mittunt: cum minimi densis agminibus natant. Helvetiis *Seelen* / id est animæ dicuntur.

Acronii lacus accolæ nominibus variant;

Gra-

Tab.
XXVI.
10. 11.
12.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 12.
Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.
Bellon.
de Aqua-
til. l. 2.

Grasig Lindaniæ vocant: *Uberlingæ* *Laugle*; Constantiæ dum parvi sunt, *Zienfische* vel *Grasing*: adultiores, *Agonen*, *Agunen*, *Lagenen*. Ajunt enim pisciculos esse vix longiores palmo, *squamosos*, quibus multi abstineant, quod circa latrinas pascantur: suo tempore tamen commendari.

Æstate, inquit, innascuntur eis vermes, quos vulgus, *Nestel*, nominant, quo tempore insalubres habentur.

Ova gerunt usque ad Junium, deinde pariunt. Non solum autem inter se, sed cum illis etiam piscibus latis lacustribus, quos Helvetii *Kotten* vocant, & cum Scardulis sive Cyprinis latis *coeunt*, unde piscis genus enascitur, inter utrumque parentem medium, *ein Dittfisch*.

Sed alius est *Agonus* in lacubus Italiæ, & Germanicum nomen *Grasing* cavendum, ne quis cum diverso fluviatili pisciculo confundat, quem *Greszling*, vel *Kreszling* nominant. In Dunensi Bernensium Helvetiorum lacu, *Blauwinling*, id est, cæruleus, hoc genus *Leucisci* dicitur: nostri longè aliud lacustre tantum genus sic vocant. *Glyssen* à splendore factum, commune est piscibus illis qui vulgo dicuntur *Laugelen* aut *Swalen*.

Squamis mediis tegitur, quæ lineolis distinctæ sunt. Nonnulli cum priore *Rondeletii* *Leucisco* confundunt, sed corporis, inquit hic, latitudine differt, rostroque est acutius, alioqui pinnis, earum numero, & situ similis est, Romani piscatores à *Squalo*, teste *Bellonio*, non distinguunt: neque enim adeo exactè pisces fluviatiles, ut Galli, internoscunt. Etenim *Leuciscus* aspectu multo hilarior, quam *Squalus*, minoribusque squamis contegitur. Albo colore nitet, & veluti inter squamas striis rectis intertingitur. Caudam bifurcam & pinnas albas profert, neque ita latas, ut *Squalus*. Hic præterea *Leucisco* major evadit. *Alburnus* eidem similis est *Leucisco*; tamen est paulo latiore corpore, & squamis elatioribus, ac labro inferiore melius infarcto. Est etiam nonnihil discriminis in linea, quæ utrinque corpus interfecat: siquidem *Leucisco* non tam arcuata est, quam *Alburno*, & *Alburnus* rotundiori corporis compage constat, ad *Cephalum* magis accedente. *Bellonius* nulla ait habere *dentium* rudimenta, verum fortassis haud diligenter inspexit, *Gesnerus* namque in faucibus utrinque mandibulam curvam quinis armatam denticulis reperit, ut in *Bellero*. *Albertus* utrinque mobilem in faucibus mandibulam habere ait. In *Pado* (ut *Gesnerus* observavit) dodrantem nunquam excedit, crassitie fere æquali per totum corpus, à capite ad usque caudam. Os aperitur in oblongum, nec prominet mandibula superior. Addit item *Gesnerus* apud suos paulo majores capi in fluvio quam in lacu; longiusculos esse, non latos, *Hafelis*

non dissimiles specie, paulò breviores, si bene meminit: Dorsi colore esse fusco, flavo, & viridi ferè permixtum esse. *Pinnas* albicare, vel nimium rufi admixtum habere, lineam qua terminatur laterum color, instar iridis resplendere ex flavo & viridi colore. *Rondeletius* quoque ex fusco partim viridem esse, partim flavum dicit, *ventriculūque* habere parvum, hepar magnum, & in hoc felle vesicam: denique multum *pinguescere*. Quo loco in cibis haberi debeat, apud *Galenum* legimus, qui conditam seipso meliorem effici, quod quicquid in sapore est mucosi abjiciatur; meliorem recentem, diutius in muria servato, scribit. Testatur *Bellonius*, nondum prope magnum numerum veris initio capi, modicoque sale conspersum atque exiccatum, *Byzantium* deferri, vendique *Majo*, *Junio* & *Julio* mensibus. Eorum capturam majorem fieri ex *Epiri* lacubus, *Venetosque* his maximè uti, ad seque navibus adferri curare, & eodem vocabulo cum *Epirotica* lingua, quæ *Scouranicos* dicit, *Scourancas* nominare: quæ cum *Leucorinis*, inquit, majores sunt: ambo tamen pisces sale conspersi & fumo infecti atque exiccati, ad externos mitti, ut nostri *Harengi* foreti, consueverunt. Sic *Bellonius*. *Gesnerus* commendari scribit *Aprili* & *Majo* mensibus, *Februarioque* non insuaves invenisse, quo tempore lactes in mare pleni erant, eodemque mense à suis laudari. In Italia quidem, hyeme inprimis capi. Veru tostos, sale, aceto, olivo, pipere, & cinnamomo conditos *Grapaldus* laudat: & *Rondeletius* denique molli suavique carne esse tradit, & pinguedinem ejus aurium doloribus succurre, & cum felle ejusdem permixtam oculorum caliginem abstergere.

Bellon.
de Aquat.
til. l. 2.

CAPUT VIII.

De *Leucisco* primo *Rondeletii*.

HÆc *Leucisci* species, in Italia *Lascha*, in Gallia *Hardon*, quod faciliè per longum tempus in vasculis aquatilibus servari possit, alibi apud Italos *Dorada*, quod in eo tractu caput ejus aureo colore fulgeat, Helvetiis *Roterigle*, quasi *trytrophthalmos* dicitur. *Bellonius* *Sargum* *Sargoniæve*, qui inter marinos *Mugiles* fluviis subeuntes, ab *Aristotele* recensetur, perperam vocavit. *Capitoni* seu *Cephalo* fluviatili corporis aspectu, pinnarum numero, situ, figura, squamis similis: sed capite est minore, corpore latiore. Dorsum cæruleo cervice virescente, ventre candido, oculis flavescens. *Denticulis* caret. Imò palato ossa habet. *Bellonius* ad *Cyprini* magnitudinem unquam accedere negat: aitque corpore quam *Squalus*, compressiore esse, pinnaeque habere subrubras, parvos item *Gardonos* pinnae caudæ longiorem exerere quam *Leuciscum*:

Tab.
XXVI.
II.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 23.

Bellon.
de Aquat.
til. l. 2.

scum: (sic vocat piscem proximè præcedentem) & antequam in extremum pinnæ, quæ bifurcata est, desinat, rotundari: Latiusculis squamis contegi, ipsoque capite magis ad Leuciscum quam ad Squalum accedere. Oblongius & paulò crassius habere corpus, quam Abramis, ac denique tergore esse magis quam Squali nigricante, & auri colorem referente. In Ambra Melegnarum alluente numerosè capitur. Sed & Peni sinus lacus delicatissimos profert. Alacres sunt & vivi omnes ova habere, & fœminæ esse creduntur. Solidiuscula illa & ruffa. Partus Aprilis inchoatur, & ad Maji pergit medium. Laudantur antequam pariunt, Januario, Februario, Martio & tota hyeme mediocriter: sunt qui Aprilis, & Majo commendant. In vinum fervidum immissi elixantur. Rondeletius carne esse fluxili & parum nutriente dixit.

CAPUT IX.

De Oxyrincho Rondeletii, Corvo
Nilotico & Naso Alberti
Magni.

Tab.
XXVI.
13.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 24.

OXYRINCHI nomen inter polysema censetur. Diphylo apud Athenæum Mugil est, fluviatilis; idem, ut Rondeletius insinuare videtur, cum superiori Gallorum Gardono: Straboni, Æliano, aliisque inter Nili pisces recensetur: eidemque Æliano rubri maris quoque piscis est, ac denique maris Caspii, ut in Sturione dictum est. A quibus omnibus differt, (ni fallor) Oxyrinchus iste Rondeletii, Antverpiensisbus *Hautin* vocatus, rostro longo, tenui & maximè acuto, unde Oxyrinchium rectè à se appellatum fuisse putat, nisi mavis, inquit, Sphyrænam fluviatilem vocare, quia marina Sphyræna rostrum simile habet, molle & nigrum. Squamis melioribus tegitur. Pinnas in dorso tres habet, in æquali spatio à sese distantes: totidem in ventre habet, quot Barbus. Quærendum nunquid idem sit, qui Frisiis *Snepel* appellatur, à Scolopace ave, puto, quam Snepam dicunt; Galli verò à rostri proceritate *beccassam*. Gesnerus in Albi fluvio quendam quoque piscem *Sneppelsingen* vocari tradit, sed à superiori diversum; parvum nempe, & candidum, Capitoni fluviatili similem.

Tab.
XXII.
14.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 25.
& 26.

CORVUS Niloticus, corporis figura Mugilibus similis est, sed caput pro corporis portione (longum enim dodrantes duos) parvum Maxilla inferior superiore brevior. Pinnae ad branchias, utrimque una breves: in tergore ultra medium alia oblonga: in supina parte à podice alia: in ventre una, de pisce hoc, quod præterea dicam, non habeo.

Tab.
XXVI.
15.

NASUS ab oris figura seu naso valdè crasso, nomen sortitus est. Nasonem vel Nasutum benè dixeris: & quia labrum seu rostrum superius crassum, sinum obtusumque habet, non malè Græce Pachyrinchus & *επιρ*, Latine Simus vocabitur. Genere Squalo ac Leuciscis fluviatilibus adscribendum esse, & corporis totius figura indicat, & Albertus quoque attestatur Monacho, hoc est, Capitoni fluviatili similem esse, inquit, sed tenuiorem, naso valde crasso. Et Gesnerus esse tradit, qui fluviatilibus Barbis hunc piscem comparant, quoad ad corporis speciem: aliquos piscibus Erffen vulgo dictis apud Germanos. Ipsi vero specie, squamis & colore Capitonem fluviatilem referre videtur: sed ad eam magnitudinem, inquit, non perveniunt. Lonicerus duorum triumve palmorum magnitudine esse ait, & oris formam peculiarem habere. Venter eorum intrinsecus nigerrima membrana ambitur: unde joculari nomine Germani hunc piscem, scribam cognominant. Os modice deorsum vergit. Lapidem habet in capite, teste Alberto, Capiuntur in fluviis & rivis. Libenter enim in rivos ascendunt, inquit idem Gesnerus, in lacum non veniunt, nisi ad initium ejus tantum, præsertim vere. Albertus Danubii piscem esse ait, & aquarum in Danubium influentium. Cœno & spurcitiis vescitur. Caro alba & laxa est, spinulis referta, ut & Capitonis & aliorum multorum fluviatilium, præsertim circa caudam. Verno tempore præferuntur & pinguescunt. Apud Helvetios tamen Novembri mense laudantur: si modo unquam laudandi sunt. Nam caro eorum semper laxa & insipida est: quamobrem assare eos potius quàm elixare coqui solent. In Rheno præstantiores habentur. In libello quodam Germanicè vulgato de piscibus, Februario & Martio & cum salices stillant, eos præferri legimus. Hæc ferè Gesnerus.

CAPUT X.

De Gobio fluviatili.

ARTICULUS I.

De Gobio non capitato.

Tab.
XXVI.
16.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 27.

GOBIO fluviatilis est duplex. Unus non capitatus; alter capitatus. NON CAPITATI Dorion apud Athenæum inter fluviatiles meminit, fortassis & Aristoteles, dum eos in fluviis pinguescere scribit. Mediolanensibus Varira, fortè quasi varius. Vbiq; enim rotundis nigris maculis distinguitur, vocatur Germanis *Kressling*, aliis Leuteser, quod cadaveribus submersis vescatur. A Gesnero ita describitur: Gobio noster, ein Gressling / quem nuper captum in lacu, inspexi, mense Januario ovis gravidus erat: barbatulus, cirris singulis

singulis in angulis labiorum perbrevis. Pupilla oculorum nigra, ambitu candicante. *Macula* à capite caudam versus per media utrinque latera nigricantes, rotundæ, magnæ proportionē, circiter decem, singulæ deinceps digeruntur: & similiter per medium dorsum. Cauda etiam maculosa est, & dorso pinna. Vesica bifida, magna proportionē. Longus est plerumque quinque aut sex digitos. *Fel* habet subviride, caudam bifurcam. *Os* cum aperitur rotundum & veluti è præputio se exerens, deorsum nutat. *Lapilli* in cerebro perexigui sunt. Hæc ille.

Squamis tegitur parvis. Quamvis ab Aufonio, qui cum *Barbi jubas* æmulari cecinit, fluviatilibus accenseatur, in lacubus tamen quoque capitur. Degit in fundo & cœno, unde Fundulos quibusdam vocari etiam diximus. Vescitur musco vel alga, item arenulis, & hirudinibus minimis lacuum. Creditur cadavera hominum submersa depasci, unde nonnulli anthropophagum dicunt: quæ res aliis fortassis ansam præbuit, ut ex cerebro equorum procreari dixerint, quo quidem in aquas abjecto vesci, à ratione non est alienum, nam & Bellonius testatur calvariis bubulis in aqua projectis oblectari, ejusque gnaros Ligeris accolos, calvarias eas studiosè adservare iis denique in Ligerim immerfis, Gobios allicere, ut facilius eos postea capiant. Idem testatur Rondeletius. *Capiuntur* autem faciliè & magna in copia, inquit Gesnerus, circa ripas lacus nostri retis genere, quod Stofzbaren appellant.

Aliquando bis aut ter anno *pariunt*. Æstate vermiculis quibusdam in ventre vitari dicuntur, teste Alberto. Rondeletius *carne* ait esse molli insipida, virus nonnunquam respiciente: fallique medicos, qui Gobiones fluviatiles agris apponi volunt, his eam inesse succi bonitatem existimantes quam Galenus in marinis commendat, ab hisce enim illos hac dote multum superari. Coenunt aliquando respiciunt. Author de natura rerum, salubriores esse ait, ubi aquas arenosas in nutrimentum habent. Et Gesnerus elixum satis solidum esse testatur, nec contemnendum in cibo.

N. Ad Gobiones referimus piscem Rheac Mani alumnium rariorem, quem *Obresz* seu *Obresz* / q. *Obkresz* / Piscatores vocant Ambire enim videtur inter Gobionem & Percam. Hujus iconem, exhibet Tab. 31. ea figura ac magnitudine, qua cum duobus sociis captus est non procul Francofurti, 16. April. 1649.

ARTICULUS II.

De Gobio capitato.

Gobio Capitatus nomen istud à Capite pro corporis ratione maximo accepit.

Non tantum apud Italos, sed & inter Germanos varias fortitus est appellationes. *Gropp* dicitur inter Helvetios, *Cop* vel *Kop* in Carinthia, *Kaolrapp* in Franconia: alicubi *Mul*, circa Tridentum (qua parte Germanice loquuntur) *Tholiman*. Saxones & Miseni à capite, quod ferè globi instar rotundum habet, sed compressum, varia ei nomina fecerunt: *Keuling*, *Keulink*, *Kulheit*, *Kaulheupt*. Anglice à *Bulhed*, à capite taurino, quasi Bucephalum dicas, nempe ob magnitudinem, non similitudinem formæ. Rondeletius & Bellonius *silvæ* vel potius *silvæ* aut *silvæ* Aristotelis esse volunt, sed cum is duntaxat in fluviis sub saxis stabulari, quod & aliis competit, scribat, nihil definiri potest. Cremonensibus *Bot* vel inde vocatur quod Bufonem, qui Botto vulgo, deformi oris rictu referat. Pisciculus est ranæ piscatrici similis, si parva magnis (inquit Rondeletius) conferre licet, corporis figura & colore. Capite enim magno est, lato & depresso. *Oris* magno hiato, sine dentibus: sed pro iis labra instar limæ aspera habet, *pinnas* binas ad branchias, rotundas, & ambitu pulchrè cristatas: duas alias inferius parvas, longiusculas, albicantes in medio summi ventris: aliam ab ano ad caudam: in dorso quoque geminas, non singularem, ut Rondeletius scribit, qui aliam fortè speciem, inquit Gesnerus, nobis ignotam vidit: nam & cauda quam suo attribuit Cotto, proportionē multo longior est, quam in nostro. Ex his dorso pinnis brevior, quæ capiti propior, altera longior caudam versus, quam tamen non attingit: idque in fluviatili & lacustri genere similiter. *Oculi* sursum spectant. Branchias quaternas habet, *hepar* magnum sine felle. Si corpusculum spectes, ventriculum magnum. *Fœmina* *ovis* immodicè turgēt, quæ in pectore in globos collecta, geminas veluti mamillas præ se ferunt, & membrana vestiuntur nigricante. *Lapillos* in capite habet. *Qui* in lacubus degunt, (ut Tigurini lacus exemplo ostendit Gesnerus) non solum magnitudine inferiores sunt *fluviatilibus*: raro enim ultra digiti medii longitudinem excreseunt, sed specie etiam differunt, etsi vulgus forte non discernat. Nempe, colore magis albicant, cum illi nigriores sint. (Corpus varium est, partimque albicantibus partim fuscis punctis, & maculis etiam nigricantibus transversis distinguitur) *Spinulis* circa branchias pluribus & acutioribus, brevissimis tamen illis, & visum pene latentibus horrent, quibus digiti etiam, si retro ducas, configuntur. *Pupilla* oculorum aliqua ex parte pulchrè virefcit, & gemmæ instar resplendet, præsertim ad solem. Elacu in fluvium non migrant: neque fluviatiles in lacum Gustus etiam suavitæte fluviatilibus longe sunt deteriores. Icon quam dedit Aldrovandus Gesneri est, diversa nonnihil ab ea quam Rondeletius exhi-

Belloni
de Aquat.
til. 1. 2.

Tab.
XXIV.
9.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 28.

exhibuit, pinna dorfi singulari, & caudapenicilli instar, longiuscula: unde suspicari licet, aliud genus Cotti circa Monspelium haberi. *Degunt* in rivis frigidis ac montanis, & fluviis præcipitibus, sub lapidibus & inter Saxa. *Carnivori* creduntur, & à se mutuo devorari certum est. Mense Martio circa festum Paschatos *pariunt*. In aquæ fundo non tam natant, quam subito impeditu teli instar se vibrant, & quo volunt trajiciunt. *Gesnerus* testatur, legibus piscatoriis licere, eos capi in flumine à Calendis Novembris usque ad Pascha: extra verò illud tempus, nec fuscina, neque alio modo licere: hamo autem nunquam. Nassis uti permissum esse, à die D. Marci usque ad exitum Maji, non arctius tamen contextis, quam ut Gobii capitati evadere queant. Coctos esse suavissimos & ori gratissimos cum ovis, quæ pingua, copiosa, delicatissima, *Matthiolus* prodidit. Carne molli, *Rondeletius*, dura *Albertus* fecit. Apud *Helvetios* fluviatiles duntaxat, & quidem circa brumam & Januario mense in deliciis sunt, quidam à Calendis Decembris ad Calēdos Aprilis commendant; omnes, capita, quod spinis tantum cuteque constant, rejiciunt. Placent & frixi:

CAPUT XI.

De Aspero Pisciculo.

Tab.
XXVI.
18. 19.
Aldrov.
de Piscib.
1. 5. c. 29.

HUjus *Rondeletius* meminit, eidemque à maxillarum asperitate cognominatum inditum, atque *Lugdunensibus Apron* appellari propter squamarum asperitatem, *Rhodanoque* peculiarem ceterum non quovis ejus loco, verum in ea fere parte reperi, quæ inter *Viennam* & *Lugdunum* interjecta est. *Pisciculus*, inquit, est capite latiore, quam *Gobio*, in acutum desinente: ore medio, *dentibus* caret: sed maxillas asperas habet, foramina ante oculos. Colore est rufo, maculis nigris latis, à dorso ad ventrem oblique descendentes varia: Pinnas ad branchias, & in ventre similes cum Cottis habet, sed in dorso dissimiles: duæ enim sunt à sese sejunctæ. *Vulgus* ait pisciculum hunc auro *vesci*, quia arenam cum qua nonnunquam auri laminæ sunt, haurit. Carne est siccior quam *Gobio*.

Tab.
XXII.
19.

Ad hunc referri potest, & is piscis *Danubianus*, quem *Iulius Alexandrinus* ad *Gesnerum* dedit. De eo ita *Gesnerus*: Forma quidam tota, & singulæ ferme corporis partes, inquit, in utriusque pictura convenire videntur, nisi quod pinna ab uno in nostra iconce nulla est, pictoris forte incuria. Nulli enim piscium, opinor, hæc pinna deest. *Rondeletius Lacertum* peregrinum suum sine ea pinxit, quam *Salvianus* eidem addidit. *Belionius* in sola *Tania* hanc pinnam se non reperisse mihi retulit. Piscis quem exhibemus,

Germanicum nomen est *Zindel*: velut alii scribunt, *Zinde*, *Zindel*, *Zinne*, *Zingel*. *Un gari Kolerz* appellant. Icon ad me missa, digitos XII. longa est, quam longitudinem in hoc pisce mediocrem esse audio. Colore est, partim è fusco rufescente, partim nigris maculis satis magnis per intervalla distinctus: quarum aliquæ à dorso ad ventrem, qui cinereus est, oblique tendunt. Oculis color Indicus: & aliquid sub eis rubri. Audio eum ad libræ pondus, id est, unciarum XVI. accedere: (alii etiam trilibrem fieri retulerunt) caudam adeo duram habere, ut vix amputari possit: pinnas in dorso aculeatas in capite *Percæ* instar, (icon nostra pinnas molles, non aculeatas, præ se ferre videtur) nostrum acuminatum, carnem candidissimam. Sunt qui forma & colore *Canis marino* comparent: alii *Lucio*, præcipue quidem capite: absque squamis esse ajunt, instar *Anguillæ*. (*Rondeletius Asperum* suum à squamarum asperitate vulgo Gallicè *Apron* dictum ait) *Lautissimum* esse addunt simul & *saluberrimum*, omnium *Danubii* piscium, ita ut vel puerperis apponatur, & divitum duntaxat mensas oneret: quod equidem miror, si squamas non habet: ferè enim omnes qui squamis carent, minus salubres existimantur. Ferunt eum *Danubius* & *Tibiscus*. In *Danubio* prope *Bosoniam* magna ejus copia capitur. *Viennæ* etiam non deest, & in *Bavariæ* fluviis, ut *Isara* & *Leisaca*: hic quidem è lacu *Ammelfee* fluit in *Rachelfee* lacum, & inde rursus in *Iseram* fluvium. In piscinis servari non potest. Eiusdem piscis effigiem illi, quam dedimus, similem, coloribus tantum diversam (ventre & pinnis albicantibus) *Raphaël Seilerus* *Jurisconsultus* doctissimus, comes *Palatinus*, clarissimi *Augustanæ* reip. archiatri *Geryoni* filius, ad me misit: in qua similiter nulla ab ano pinna, nullæ squamæ apparent.

CAPUT II.

De Cobitide fluviatili.

ARTICULUS I.

De Cobitide *Rondeletii*.

TRiplex invenitur *Cobites*, fluviatilis *Rondeletii* nempe, *Aculeata*, & *Barbatula*. De illa ita ex *Gesnero*, & *Rondeletio* *Aldrovandus*: Idem *Rondeletius* fluviatilem hunc pisciculum antiquis, qui defluviatilibus parum fuere solliciti, inditum, *Cobiten*, *Cobitidem*, fluviatilem nuncupavit, quod *marinæ*, inquit, persimilis sit, cum alioqui neque situ neque numero pinnarum cum *marina* conveniat, quare similitudo isthæc ad *Cobitidem* *barbatulam* potius pertinet: ad hæc *Cobitis* *marina* levis est, uti & *Barbatula*, contra *squamosus*, quo de loquimur, piscicu-

Tab.
XXVI.
20.
Aldrov.
lib. 5. de
Pisc. c. 9.

pisciculus est, nisi figura exhibita nos fallat, quod quidem suspicari licet. Ipse enim Gallus *Loche franche* vocari asserit, vel quod totus laevis sit, & aculeis careat; vel quod mollior sit, & salubrior: quamobrem Cobiten forte hunc pisciculum, inquit Gesnerus vocat, quod ad Gobionem fluviatilem Aufonii accedat, non ad marinam Cobitin. *Degit* in rivulorum & fluviorem ripis, digitali magnitudine, rostro satis prominente. Corpus flavesceit, & maculis nigricantibus notatur, subrotundum est & carnosum. *Pinna* duae sunt ad branchias, duae in ventre, unica ab excrementi meatu, unica in dorso. Gesnerus cum hoc piscitio idem putat, vel saltem simillimum, suis *Ryserle* nuncupatum; *Digiti*, inquit, longitudinem parvi excedit, colore per dorsum è caeruleo virefcente, per latera & ventrem candido. In Silo torrente capitur ad Tigurum circa lapides: & ex eo Limagum amnem ingreditur, inter lautos pisciculos habitus Rondeletio suis Cobites carne est humida, & viscida: si in aqua sordida & coenosa nutriantur, pinguescit, sed multo insalubrior redditur. Pro Cobite Rondeletii nos aliam iconem dedimus, ejusdem ni fallor, piscis.

ARTICULUS II.

De Cobitide aculeata.

Cobites *aculeata*, quae Mustela parva imberbis dici posset, Gallis est Perce, quod Petras quasi videantur perforare (duos habent in branchiis aculeos, utrinque unum, ad caudam spectantes, dentium cerasitis longitudine, quibus sese impellunt, ut minima inter lapides foraminula subeant) Germanis Steinbeis, seu Dacobythus, Oxyrinchus non incommode, aliis. Pisciculus est inquit Albertus, eodem colore quo Fundula. Non est autem rotundus, sed quasi columnalis compressus, & habet spinam acutam juxta os, qua cum recurvato capite vulnerat manum se tangentis. Bellonius quoque & Rondeletius aculeum in operculis branchiarum utrinque unum habere tradunt. Albertus branchiis ipsum carere omnino ait; cujus errorem detegit nuper Georgius Fabricius, qui parva foramina circa oculos eis, sicut in Lampredis, inesse observavit, teste Gesnero, qui pisciculum esse ait exilem seu tenuem, & oblongum. Fundulo, de quo mox, similem, paulo longiorem: nam quatuor aut quinque digitos aequare solere: maculosum, capite acuto & deorsum vergente. Rondeletius spinam internam duram quam in praecedente rigidiorem esse monet, ideoque inter edendum molestiorem esse: saepius vero etiam ichtyopolas parum cautis imponere, & pro levibus vendere, ceterum imposturam inter edendum facile deprehendi. *Degit* in aquis fontanis & rivis praecipue. Ex his vero mi-

grans cum alios fluviis, tum Albim maxime subit, ut Gesnerus refert, qui & apud suos nullum aut certe rarissimum esse scribit, circa Argentinam vero frequentiore, & ex Georgii Fabricii testimonio in Misena optimos capi in Mulda prope Doblam oppidum: in herbis, algis & coeno *degere*, atque inde *vistitare*. Majo mense cum Fundulis parere, aliquando vel bis vel ter. Rostro lapidibus mordicus se affigere, & aliquando vasis etiam, licet aeneis, quibus in foro piscatorio à mulieribus, inquit, injiciuntur, ita ut fugere videantur. Fille quando complures gregatim haerentes inveniuntur. Rebus angustus, id est, quorum perangustae sunt maculae, capi, cum aliis pisciculis circa ripas fluminum. Bellonius pisciculum esse scribit admodum *vivacem*. Eidem delicatissimus est: contra insinuare nobis videtur Rondeletius in cautis pro laevi Cotitide obtrudi iniquens, fraudemque edendo detegi: & Gesnerus vilissimos vocat, carne tenaci. Fundulis multo ignobiliore. Aprili mense & Majo minus improbari, praeferrigravidos: frigi debere butyro: Misenos circa bacchanalia, & Martio mense eos commendare, antequam migrent, quod tum ovis gravidis sint: praestantiores apud eosdem non in Albi, sed in Mulda capi.

ARTICULUS III.

De Cobitide Barbatula.

Cobitis ista *Barbatula* nomen à Cirris tenuibus è rostro barbae modo dependentibus obtinuit. Albertus M. Fondelam, Germani Grindelam vocant. Gesnerus Mustelam fluviatilem dici posse putat. Indicis digiti crassitudine est, inquit Bellonius, quinque digitos longa (pinguis Lochia) tota puncturis seu punctis distincta: notaeque in tergore & lateribus habet, nunc grandes, nunc parvas ac nigricantes, quibus ipsa etiam quoddammodo pulla apparet, sed ventre candido. Pinnam utrinque unam in lateribus gerit: item in ventre duas, in tergore vero summo unam admodum parvam: item sub cauda ad anum alteram. Pinna caudae rotunda est: reliquae omnes, obtusae & latae. Cirris quaternis, utrinque, duobus (Barbi modo) tanquam mystacibus insignis est. Oshabet parvum sub longo *naso*: ejusque *intestinum* statim à stomacho (quem hepar fovet) recta per ventrem ad anum ducitur. *Fel* dextro hepatis labo adfuturum: *Lienem* insignem, & rubrum habet. *Cor* sub branchiis, suo pericardio obvolutum, *ova* singulari vesicula, ut aliis piscibus bicorni folliculo conclusa. Haec ille. Duo genera esse hujus pisciculi Georgius Fabricius Gesnerum in epistola monuit. Unum commune, quod in deliciis habetur, & insigni magnitudine apud suos (Misenos) capitur in Flohi amne: alterum

Tab.
XXVI.
21. 3.
Aldrov.
l. 5. de
Piscib.
c. 30.

Tab.
XXVI.
22. 23.
Aldrov.
l. c. 31.

alterum & tenuitate corporis, & colore & sapore diversum, quod à Saxi nomen est consecutum, Steinsmirlin. Limpidis & saxatilibus locis gaudent, quamvis & circa ripas & in cœno, unde Mossgrundel dicuntur, reperiuntur. Plurimi in rivis quibus, majora flumina ingrediuntur, capiuntur, idque præcipue Februario, Martio & Aprili. Gesnerus medio mensis Maji *captos*, ovis gravidos vidit; aitque post Pascha parere incipere: quamvis non desint, qui vel singulis mensibus eos parere asserant. De *Ufu* ipsorum in cibis ita Aldrovandus: Tam delicatus pisciculus est, ut Lonicerus inter omnes ferè primatum tenere scripserit. Teneros tamen præferim & nuper natos in deliciis haberi, Gesnerus ait, eosque cum jure coctos ex eodem, quod mireris, cum pane cochlearibus edi: quas delicias, inquit, aliquando circa summum Aeronium lacum gustavi. Salubres vulgo existimantur, ita ut medici etiam ægrotis alicubi eos permittant. Esse sane solidiuscula carne, & odore non piscoso, ut alii plerique sed magis grato, idem Gesnerus asserit, & cum exigui sint, nec pingues, non multum replere: præferri à Misenis majores, & qui à saxi denominantur: colore saporeque differre, corpore tenuiore, carne duriore, & quæ in elixis tenacius spinis hæreat: Commendari maxime à natali Domini usque ad Pascha, quoniam tum parere incipiant: alios Februario, Martio, Aprili mensibus eos præferre, usque ad initium Maji. Teneros verò nunquam non laudari, maxime si cum apio, petroselino, edantur. Vino calido injecto elixari debere, idque brevi tempore & sub finem modico aceto affuso, ad ejus fere consumptionem coquendos, quomodo Gobii capitati etiam parantur:

CAPUT XIII.

De *Phoxino squamoso*.

Tab.
XXVII.
5. 6.
Arist. H.
A. l. 6. c.
13. 14.

Quid de *Phoxino Aristotelis* statuendum sit, ex ipsius verbis colligere difficile est. Statim enim ac natus est ova habere, & semel in anno in stagnis fluviorum & arundinetis lacum, quæ *scumia* vocant, ova ponere dixit. Rondeletius eo nomine *duos* squamatos *pisces* describit. *Unus*, quem in Picardia sub nomine Rosiere vidit, dimidiati pedis longitudinem nunquam superat. Corpore est lato & compresso, oculis magnis, colore luteo, bramis minimis, corporis specie simillimus. Semper uterum *Ovis* refertum habet, ideo cum illis nasci piscatores tradunt. *Alter* vocatur à rubore caudæ, Rose. Reliquo inquit corpore caruleo est, paulo major, minus læso corpore, *ovis* semper plenus, etiam maximus. Cum priore eundem esse conjicit, qui apud Helvetios Bambela vocatur. Gesnerus, Pisciculus, inquit, est tres aut quatuor digitos longus, sex quidem digi-

Gesner.
in Phox.
xin.

tis longiorem non vidi. Caput ei crassiusculum pro sua magnitudine, nigricans, iris oculorum crocea: qui color etiam ad pinnarum initia omnia spectatur, in pinnæ dorso quoque initio, in majoribus & adultis. *Pinnarum* ad branchias articulus veluti carunculam quandam habet, in aliis parum, in aliis valde croceam (in aliis si bene memini, rubentem) pro ætatis nimirum & sexus differentia, fortassis & aquarum & regionum, in quibus degunt. *Squamas* habet albicantes. Linea fusca oblique à capite ad caudam fertur. Pinnæ in dorso medio unica est, binæ ad branchias, totidem in medio ventre, alia post anum. In principio caudæ macula atra notatur, & aliis minoribus, singulis, ad initia pinnarum utrinque. Dorsum & latera nonnihil flavescunt. Sapor in *cibo* subamarus. Reperiuntur influentibus solum aquis, ut audio: non etiam in lacubus & cœno, ut læves, quos è rivis, lacus & flumina majora ingredi diximus: unde eos, læves, nostri à rivis Bachbammele nominant. Idem in Glatto flumine apud Helvetios, parvo ac cœnoso, ab iis qui caneros captant, subinde inveniuntur, & abjiciuntur. A bacchanalium vel quadragesimæ initio usque ad Calendas Maji nassas non angustius contextas, quam ut Gobi capitati & Bambelæ ex iis evadere possint, in flumen immittere piscatoribus nostris licet. Bambelam nostram Itali quidam, ut audio, eodem quo Gobium fluviale nomine appellant, Varon. Verbanum vero accolæ circa Lucarnum Stornazzo, vel sterniculo.

CAPUT XIV.

De *Eubulea Bellonii*, & *Putilo fluviali Gesneri*.

Proximo *Eubuleam* Bellonii subjicimus, quia cum priori illi, quem Rosiere Piccardi vocant, cognatam Gesnerus facit. Ita verò de eo Bellonius: Sordidus admodum & vilis pisciculus Gallico vulgo è re ipsa Bouviera nuncupatur: aliis Peteuse, etymologia à bombis obscenis tracta. Piscis est Sequanæ alumnus, non tamen usque quaque frequens, ut qui non semper appareat. Nam quomodo Verones pisciculi nusquam Augusto, Septembri, & Octobri tibi, aut saltem raro apparebunt: sic Eubulca sero in conspectum venit. Plurima vere *capitur*. Bremmam aut Castagnolam marinam toto habitu æmularetur, nisi corpore esset minimo. Planus enim & latus est: sed & argenteo nitore refulget, atque orbicularem magis habet formam, quam in longitudinem protensam. Trium digitorum longitudinem excedit, neque fessui digitem latitudinem. Soli objecta, *nigri* nihil habere comperitur, quam in linea, quæ spinam comitatur ad caudam. Parvam in tergore gerit pinnulam, oculorum pupillam,

Aldrov.
5. de Pisc.
cib. c. 32.

omnem

omnem nigredinem superantem. Squamis tegitur magnis, & latis. Carneum quiddam, ut Cyprinus (quatenus parvum magno licet conferre) in fornice palati ostendit, *branchias* utrimque quaternas simplices, ac sub ventre totidem, caudam bifurcam. *Ore* est parvo, dentibus vacuo. Pisciculos istos respui credo propter fellis magnitudinem, quod vix possint exenterari, quin eorum *fellis* vesica dirumpatur: quo per totum corpus diffuso, plurimum amari in vescendo sentiuntur: id autem sub hepatis lobo dextro coloris Smaragdini, magnitudine pisi continetur. *Folliculum* vento plenum in utero gestat geniculo interceptum: *lienem* stomacho inhaerentem, rubrum atque orbicularem. Hujus etiam intestina multis in gyrum revolutionibus & infractibus circum voluta sunt. Haftenus Belonius.

Tab. II. RUTILIO *fluviatili* à rubro pinnarum colore nomen Gesnerus, ad differentiam Erythrini veterum imposuit. Circa Comum in Lario lacu, inquit, Piota, ut circa Verbanum quoque dicitur: à Germanis Oceani accolis Roddovu vel Roddau: Sabaudis circa lacum ad Bielam & Neocomum, Vingeron, vel Vengeron, unde Germanorum Wingeron, vel contra, (quo tamen nomine Lucernæ accollæ Louicisci speciem intelligunt eam quam Vendosiam & Dardum Gallis dici indicavimus) Anglis, Roche. Polonis, Piltrega. Piscis è foro ad Gesnerum delatus, latus erat ad digitos quatuor, longus duodecim. Pupilla nigerrima, iride aurea, labiis subrubris: colore in cauda, pinnisque in ventre & ab ano sitis, cinnabarino: nam ceteræ minus rubri habent. Linea à summis branchiis caudam versus obliqua, cauda bifurca: Supercilia & circa branchias locus, aureo colore nitent. Squamæ latæ, striatæ, validæ. Dorsum fuscum, venter pallidus: pinnæ quaternæ: *fel* viride, *vesica* gemina: *caro* arctis plena. In faucibus maxillas utrimque habet, recurvas dentibus minutas quinis, qui ab interiore parte singuli serræ instar asperantur: quod in aliorum piscium dentibus nondum memini animadvertisse. Piscis hic apud nos Helveticos, *lacustris* tantum est, satis *vivax*. In nostro & Aconio lacubus, abunde capitur. Piscatores Constantiæ, & circa Aconum ajunt eum aliquando cum Cyprino lato *coire*: inde Hybridam, (*ein Halbtsch*) gigni, qui inter utrumque ambigat. Rutilo major aliquando, minor autem Cyprino lato. *Parit* Junio mense. Muscarum *fluviatilium* (sive lacustrium) genus est quoddam magnum, oblongo, terete, varioque corporis alveo, has inligunt hamis ad inescandos Rutilos. Februario Martioque mensibus apud alios Germanos, Novembri apud nostros in cibo præfertur. Majo rursus deterior fieri, & imminui incipit. Parari jubent peritiores instar Cyprini, & vino frigido immisum eli-

xari. Haftenus ex Gesnero. Putatur cum Vangerone Rondeletii esse idem. Hic autem corpore Ballero, (de quo suo loco) rostro Mugilibus similem esse ait, rostro tamen esse longiore. Dentibus carere: pinnas ad branchias duas habere subaureas, in medio ventre duas alias croceas; ab excrementi meatu unicam, in dorso aliam. Caudam in duas definere hasque à squamis initio integri, etiamsi non adhæreant. Cyprino & corporis specie & carnis substantia succoque affinem esse, & vilem haberi.

TITULUS II.

De Piscibus *fluviatilibus* *Levibus*.

CAPUT I.

De *Attilo* *Padi*.

Tantum de Piscibus *fluviatilibus* squamosis, sequuntur *Laves*, inter quos præcedat *Attilus*, in Pado inertia pinguescens, ad mille aliquando libras catenato captus hamo, nec nisi boum jugis extractus, ut Plinii verbis utar. Piscis est Cartilagineus, Sturioni magna ex parte respondens. Hujus enim more *ossa* gerit clypeatâ, sed ea tempore dicitur abjicere, idque in causa esse cur alii sine ossibus, alii cum ossibus depingant: post quæ, *pinna* dorfi est unica, cui parte supina subjacent duæ, quales omnino sunt Sturioni. Cauda etiam in duas deficit. *O*s clausum ad obliquam lineam incisum est, sed apertum & hians rotundum. Ante illud pendente rostro *appendices* carnosæ & molles. Branchias opertas habet, ad quas pinnæ sitæ sunt. Quomodo vero à Sturione, quem Franc. Philephus Attilum esse credebat, differat. Coelius Calcagninus perquam eruditè docet his fere verbis: Quod à me percontatis, an Attilus, quem Ladanium vulgaris nomenclatura solet appellare, is sit quem Italia Moronem, Usonem Pannonia vocat: paucis respondebo, me eundem non existimare, vel ex Plinii testimonio, qui eum Pado vult peculiarem esse; quo loco de propriis quorundam annuum piscibus ait. Sed ego, & tecum agam liberalius, non modo te ad Plinii, sed ad oculorum etiam tuborum testimonium provoco. Totamque itaque Attili effigiem ac membraturam quanta potui brevitate perstrinxi. Et quia non satis perspicue id fieri posset, nisi noti alicujus piscis exemplo uteremur Hyccam sive Sturionem, qui nullo ferme loco non nascitur, mihi proposuisti. Qui licet in mari natales habeat, solet tamen adversus amnes mira subire voluptate, donec jam præpinguis redeat. Moronis sive Usonis exemplo nondum dixi, quod neque ii pisces non cognoscantur, neque mihi eorum imago satis memoriæ inhæreat. Sic ergo accipe: Attilus hoc differt ab Hicca sive Sturione, quod Sturio pelagius est.

Tab. xxviii. 2. Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 1.

Plin. H. N. l. 9. c. 15.

Elia. H. A. l. 14. c. 26.

est. Attilus amnicus est, & Pado peculiaris. Sturio non temere visus æquare quatuor talenta Attica, id est, trecentas libras: Plinius scribit Attilum ad mille libras, id est, supra XIII. talenta excrevisse. Quæ magnitudo sane insignis & raro perspicua. Attilus cum ad certam magnitudinem excrevit, squamas hispidas abjicit, quas per quinque versus dispositas gerit, in summa scilicet dorsi spina ex utroque latere geminatas, & sibi quasi parallelas, extremus versus pinnas attingit. His abjectis tactu lævis evadit, nec habet quod unguem offendit. Contra Sturio semper hispida squamas suas tota æstate retinet: Caro Sturionis callum habet, & mirifice palatum oblectat. Attili contra, fluxa est, & mollis, & palato parum jucunda. Existimant piscatores *sturio*, id est, partem priorem Attili, ad posteriorem vix eam habere proportionem, quam quatuor ad unum. Tota nix hujus piscis sita est in capite, & parte capiti attigua. Quæ observatio etiam ad Sturionem etiam, aliosque pisces pertineat, authore Aristotele & Plinio: cujus verba sunt, videlicet capita piscibus portione corporum maxima, fortassis ut mergantur, tamen in Attilo nescio quomodo præter ceteros luculenta est atque admirabilis. Parvi sunt oculi Attilo, in tanta mole capitis. Sturio & Attilus habent os in parte prona, (supina dicere voluit) eo prope in loco, cui in ceteris perfectioribus animantibus, respondent, omoplate. Os utrique sine dentibus, sed Sturioni ferme orbiculatum. Attilo multo majus, & ad lineam obliquam incisum, quo aperto, vasto illo hiatu pisces devorat, quos respirando *nares* devorant (ita piscatores putant) contaxit. Loca pisculenta maxime frequentat, hyberno præcipue tempore vorticosas voragines, ad quas pisces frigoris impatientes, teporis gratia se recipiunt. Rostrum Sturioni resimium ac latiusculum, ad imaginem fere Delphini & Oxyrinchi; Attili planum, & paulominus quam in mucronem desinens, Attilo tergicolor albicans & lanosus. Sturioni vergit in glaucum. Hæc itaq; Cœlius. De ejus cum clupea inimicitia ita Plinius: Minimus hunc piscis, appellatus Clupea, venam quandam ejus in faucibus mira cupidine appetens, morlu exanimat.

CAPUT II.

De Antacæo Borysthenis Rondeletii,
& Stellari.

Tab.
xxviii. 5.
Tab.
XXV. 5.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 2.

Antacæi pisces dicuntur prægrandes, inquit Rondeletius, & vastæ magnitudinis in Mæotide & Borysthenes; quos aliquando in ostiis in glacie concretos effodi author est Strabo. (Nec alios, ut conjicio, Solinus intelligit, inquiens: Apud Nuros nascitur Borysthenes flumen, in quo pisces egregii saporis, & quibus ossa nulla sunt, nec aliud quam Cartilaginis tenerimæ. Nec

dubito, quin Plinius de his loquatur his verbis: Et in Danubio Mario extrahitur porculo marino similis. Et in Borysthenes memoratur præcipua magnitudo nullis ossibus spinisque interstitis.) Ex his falsamenta siebant, præsertim ex maxillis & iis quæ circa palatum sunt partibus, quod eæ partes aliis suavitate præstarent. Ex his igitur unus est, quem hic proponimus rostro oblongo, acuto, *oris* vasto & rotundo hiatu in supina parte Bellonius similem figuram exhibet Attili nomine, nisi quod unicam eitantum in dorso pinnam appinxerit. Ingentis, (inquit) est magnitudinis: Cætera Sturionem tam internis quam externis partibus refert, hoc dempto, quod pro eminentioribus ac callosis illis elatis tuberculis, quibus Sturio quinque carinis præditus est; hic stigmatis tantum lividis sessilibusque maculis in cute minus aspera, ad latera sit distinctus: Præterea unicam tantum pinnam ab ano ad caudam gerit. Sturio autem duas habet. Cæterum Os Attilo prominet oblongum, fistulosum, sublongo etiam naso. Hactenus Bellonius, qui deinceps nonnulla de hoc pisce scribit, quæ vero Attilo conveniunt.

ANTACÆUS STELLARIS in Danubio prope Straubingam captus, & depictus, ad Gesnerum missus est. Colorem ubique ferè cæruleum ostendebat, venter erat candidior ad roseum inclinans. Spinæ in dorso & stellæ pallidi coloris puncta etiam passim ex pallido albicantia, vel fusci Indici coloris. Cognatus huic est, qui ick vel Tick vocatur, & in Danubio circa Pestam vel Budam capitur, mole corporis quæ ad XXV. libras accedat, cute varia undiquaque stellata, sed rostro longiore & graciliore quam vel in Hufone, anserino fere simili.

Aldrov.
l. d. c. 3.

CAPUT III.

De Ichthyocolla.

Ichthyocollæ meminit Plinius ex veteribus dum inquit: Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium, idemque nomen glutini ejus. Quidam piscem Judaicum vocari scribunt, quod nomen Zyganæ apud Parisienses competit, alii Antacæm ab Herodoto, à Pomponio Magnum vocari dicunt, nonnulli Plinii Marionem appellant. Bellon. Tanais accolis Barbotam dici, quod quaternis veluti barbis ad labia sit communitus, prodidit. Nec alium Dioscorides intellexit, cum gluten ventrem esse piscis cetacei, laudarique candicans, ratione Ponticum scripsit. Tale enim & hodie ex eique intestino ex Ponto mittitur. Est autem Piscis cetaceus figura oblonga ac prope tereti. Ossibus ac spinis caret, capite est crasso & lato, ore magno & in promptu posito: è superiore maxilla 4. apophyses carnosæ, velut barbæ dependent, unde Barbotta dicitur. Oculos parvos habet

Tab.
XXIX.
16.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 7.

Diosc. M.
M. l. 3. c.
102.

Bellon.
de Piscib.
l. 2.

habet pro corporis magnitudine. Bellonius ait hoc à Sturione atque Attilo præcipuè differre, quod rostro careat, magnum oris rictum præ se ferat, sitque sublutea, dura, lævi ac glabra cute convestita carne. Bina ante oculorum canthum, parva atque aperta foramina habet: pinnas in tergore duas (quas aliter Rondeletius, aliter Bellonius pingit) ad caudam erectas. Branchiæ veluti spineo tegmine communiuntur. Sturionis modo: Cauda quam huic magis bifurca; præcipua à cæteris piscibus nota discernitur, quod paulo supra spineum operimentum branchiarum, quodam ad ejus latera impresso foramine pervius sit. *Folliculus*, sive vésica, ex qua glutinum fit à capite ad caudam, per spinæ longitudinem extenditur. *Carne* est secundum Rondeletium prædulci, & glutinosa admodum, ob id salituræ idonea, qua melior redditur & rubescens Salmonis modo, atque etiam durior, quam ob causam aliquandiu maceranda, priusquam coquatur. Nam Tanais & Ponti accollæ Romam & Venerias transmittunt, illucque in foro piscatorio venditur. Ichtyocolla auctore Plinio epinyætidis tollit, erugat cutem, extenditque in aqua decocta horis quatuor, denuo contusa, colluta & subacta ad liquorem usque mollis. Ita præparata in vase novo conditur, & in usu quatuor drachmis ejus, binæ sulphuris, & anchusæ totidem, octo spumæ argentæ adduntur, aspersaque aqua teruntur una. Sic illita facies, post quatuor horas abluitur. Idem alibi. Lethargicos (inquit) coagulum vituli adjuvat in vino polum oboli pondere: idem Ichtyocollæ. Valet ad conglutinandas omnis generis chartas, atque instrumenta musica, reliquaque lignaria incrustamenta, quæ resselato, imbricato, & vermiculato opere fiunt.

CAPUT IV.

De Glanide.

Tab.
xxvij. 8.

Piscis, qui Aristoteli & Pausaniæ Glanis, Plinio sæpe Silurus, aliquando Glanis, Glanus, & Glanius vocatur. Ab Æliano Siluro explicatur. Veteres sequuntur recentium plurimi, interque hoc Gesnerus & Schonfeldius, nos quid sentiremus, superius diximus. Nomen à Glanide Italiæ & Cuniæ fluvio accepit, si Stephanum sequimur, ejusdemque vestigia apud Byzantinorum vulgus, qui hodieque Glangnum, teste Manardo, vocant, quasi Glanum, retinet. Descriptionem quod attinet, sunt ipsi spinæ pro ossibus non Cartilagine. *Corpus* fulcum, nigris maculis plenum, squamæ nullæ, corium latis crassum, & lubricum. Caput grande, depressum. *Os* obtusum. Oculi parvi. Rictus amplus & ad capitis latitudinem patulus. Labia superiora gemino, inferiora unico ordine denticulorum confusaneorum, in-

trorsum reclinatorum aspera, quibus prædam retinet. *Fauces* binis utrinque ossiculis, limæ instar asperæ sunt. A labro inferiore dependent barbulae quatuor, tenues, oblongæ, pallidæ, à superiore dux, ejusdem coloris, duræ, longissimæ, prætenturarum instar, quas ante se modo exerit, modo componit. *Pinna* illi in dorso post cervicem unica est, parva, quatuor aut quinque fibris elata, post branchias duæ: quarum primæ, faucesque proximè spectans, aculeo constat ossæo, duro, quo infestos sibi pisces arcet, &c.

Venter magnus est, deformis, & subalbidus, obscure fuscis lituris conspersus. *Cor* inter branchias utrinque quaternas situm est, à reliquo diaphragmate separatum, quod gula ampla perforat, à qua ventriculus dependet, & intestina, quæ unica revolutione in anum desinunt. Ventriculo incumbit *Epar*, ex rubro pallens, duobus lobis distinctum, cui vesicula fellis diluti aquei, adhæret. Dorso adjacet vesica simplex, peritonæum candidum est.

Ad multam magnitudinem excrescit: non solum enim ducentarum librarum, sed major etiam capi solet. Gesnerus testimonio eruditi cujusdam Ungari in Tibisco, qui Daciæ fluvius Danubio miscetur, aliquando captum fuisse scribit septem vel octo cubitorum, plaustrum occupantem: eum in fluvio annis sedecim sub culina Viri cujusdam nobilis latuisse: hamo tandem inescatum esse, dum faturam suam custodiret: ubi se captum sensit exsiliisse, secutos impetum ejus pisces ad milliaria duo, denique defatigatum cœpisse: barbas cum supra infraque os habere, rictum latum, caudam versus attenuari. *Dentes* habere instar pectinis illius quo laneæ vestes depectuntur, à carduis denominati vulgo: squamis carere: in aquis cœnolis *versari*. Ipse vero Gesnerus dentes habere negat, sed labia limæ instar exasperari, atque ita prædam facile retinere: retentam mandere & comminuere: ei opus non esse, sed faucibus & gula maximè patentibus integram vorare. Idem & in Viadro apud Silesios tantum esse scribit, ut captus, impositus currui, plerumque ultra currum emineat. Variat ab isto ille cujus Gesnerus Iconem sub Siluri tertii nomine ponit. Piscis, inquit, Similitudinem aliquam cum Mustelis fluviorum & lacuum habet. Oculi sunt parvi: barbulae fuscae, non longæ, è crassiusculis paulatim attenuantur, binæ superiore labro, ternæ inferiore. Pinnae ad branchias binæ, in dorso nullam ostendit pictura; sed tantum carunculam quandam mucronatam eminentem, qualis & in Mustela palustri majore, eodem fere loco vesitur. In ventre vero una & continua longissima pinna ad caudam usque albicat, maculis distincta fuscis. Corpus à capite retrorsum subinde attenuatur, finis latiusculus & obliquus est, &

Schonfeld.
Ichtyol. pag.
69.

quid mireris nullam caudæ pinnam habent. Os magnum & latum. Capitis colore cæruleo subviridis; reliquum corpus viridi & flavo colore mixto pingitur, sed maculas etiam diversi coloris habet. Hujus generis duos in suo stagno civis quidam aluit, qui cum ante annos triginta sex, (verba sunt Stuibii ad Gesnerum) ad Hundsfielden in Rheno cum aliis piscibus illis quos Argentinæ vocant Rufelken, simul nassa capti essent, vix digiti longitudine, & Argentinam in forum advecti, à cive quodam raritatis gratia empti, in piscinam coniecti sunt, in qua alter ab eo tempore usque adeo excrevit, ut jam sex cum dimidio pedes meos (hominis mediocris proceritatem aut amplius) longitudine contineat. Caput qua crassissimum est, filo complexus, duorum pedum & dimidii fere circumferentiam deprehendi. Alter huic per omnia similis, sed longitudine longe est inferior. Major ille piscibus quibusvis, excepto carpine, sive vivis sive mortuis, vescitur. Hyeme nihil quicquam gustare unquam visus est. Cornua quæ supra & infra os habet, quotannis decidunt, & rursus nova succrescunt, sicuti cervis.

Ælian.
H. A. l.
12. c. 29.

Reperiebatur in pluribus fluminibus tempore Æliani, temporibus Plinii præcipue in Mœno, nisi Rhenum velis legere. In Æno grassatum quem quidam Mœno & Rheno substituunt prope Visbium, quod ad ejus amnis ostia, conditum Aventinus prodit, tanquam loco magis cœnoso, verisimile est. In Cydno Ciciæ fluvio procreatos sed minores, quod ejus confluentis nitidus & frigidus apud Ælianum habetur. Pyramus, Sarus, Orontes plurimos producant, quia limosi nec pauciores in Ptolomæorum fluvio, Apamienli stagno. In Bubasto Ægyptia cicures aluntur plurimi. Strabo, & Athenæus, dum Siluros in Nilo esse scribunt, Glanides intelligunt, non Sturiones. Nam qui è mari fluvios subeunt, præter Delphinum Mugilem & Alosam, nullus alius Nilum intrat propter Crocodilos. Plinius dum maris peculiarem facit Gladinem, fallitur. Expressè Schonfeldius: Fluviatile hoc animal est, nec unquam aquam salinam ingreditur: ubi circa Hamburgum capitur, statim Albis ex aquis pluviæ aut nivalibus exæstuantis metus est, quas ut passim ex locis montosis, stagnis seu lacubus collectas, fugiens, Silurus cedit, & partes Albis spaciosiores sequitur: Reperitur & in Istro, Tibisco, Vistula. In Helveti. stagnis paucissimæ capiuntur in Bernensibus Neocomenli & Moretano aliquando. Vescitur carnibus; nec minoribus duntaxat pisciculis ventrem implet, sed & in majores, imo homines & equos grassatur. Captum in Pannonia fama receptum, in cujus visceribus humana manus ornata annulis reperta sit. Puerum in Danubio ad Pofoniam natantem ab hoc pisce devoratum, & in capti visceri-

Plin. H.
N. l. 32.
c. 11.

bus fragmenta ejusdem reperta, à fide dignis Pannonibus proditum est. In ejus, quem sub culina viri cujusdam Nobilis latuisse supra diximus ventre, caput humanum cum dextera manu & tribus annulis aureis inventum est. Aristoteles dentibus duntaxat valere, & ὀγκισσόμενον esse scripsit. Cauda concussa, pisces præsertim minores ori admoveat. Canicula exortu sideratur, & alias fulgure sopitur. De Coitu & partu apud Aristotelem legimus. Cohærentes foetus edere, sicut & ranas. Majores profundis aquis parere, quippe nonnullos etiam ubi sentum pedum altitudo sit: minores, locis brevioribus ferè ad radices falicis, aut alterius arboris cujuspian, juxtaque arundines, atque etiam muscum. Tardissimum eis ex ovis incrementum: atque idcirco assidet mas, quadragenos, quinquagenosque dies, ne devoretur foetus ab occurrentibus piscibus. Eodem quoque die, aut etiam post, capiunt ova incrementum, quæ contigerit semen. Glanii ad ervi magnitudinem. Quantum ad Usus in cibis, Salvianus duram carnem habere scribit. In Germania & Polonia pinguis est, & boni saporis: laudaturque; in cibo tum recens, tum sale conditus. Circa festum Johannis optimus est, trium librarum in primis Obsonatores venam candidam, quam per spinam dorsi tenuissimo rectam involucri, transire, Benedictus Martinus scribit, tanquam venenatam eximunt.

Arist. H.
A. l. 9.
c. 37.
Aristot.
H. A. l.
8. c. 20.
Aristot.
H. A. l.
6. c. 14.

CAPUT V.

De Barbota Gallorum.

A Glani, licet maximo pisce, non malè de hoc parvo dicetur, ob corporis barbæque similitudinem. Galli vulgo Barbotam vocant, non à barbis (inquit Bellonius) aut arunco, sed ex hoc, quod Galli barborare, cœnum & lutum rostro, anserum modo commovere dicunt. Ipse Clariam fluviatilem vocat, sed cum Lota Lugdunensium de quo suo loco, implicat. Anguillæ, aut Congri modo glabram cutem habet, atque idem caput. Cirro recto brevique & simplici in maxilla inferiori barbatur. Continuum in tergo pinnam gerit mollem, ad caudam (quæ illi rotunda est) desinentem. In nonnullis duas pinna, ut in Icone, quam à Bellonio missam ex Rondeletio exhibemus, in tergo videas: quarum exigua est, quæ capiti magis est vicina, sed & inter anum & caudam rursus aliam pinnam gerit: unam præterea utrimque in lateribus circa Branchias, quas utrimque quaternas habet: duas vero sub ventre capiti multum propinquas. Cæterum duos in inferiori maxilla habet denticulorum ordines admodum parvos: atque in superiori maxilla totidem, ut nihil quam asperitas in eis sentiat, nam alios etiam in fornice palati gerit. Tergus & latera fulvum vel sublividum colorem ha-

Tab.
XXVII.
9.
Bellon. de
Aquatil.
l. 1.

habent: *venter* autem albicat. Semipedalem non excedit longitudinem. *Hepar* lobum oblongum ad sinistram latus demittit, sub quo est *Stomachus*. In pyloro apophyses, seu cæcos viginti quinque connumerare potes: *lienem* quoque videas, neque dextro neque sinistro, sed in medio spina stomacho inhaerentem. *Anus* ejus propinquior est capiti, quam caudæ. *Intestina* pluribus quam tribus inflexionibus non circumducuntur. *Ova* in bicorni vulva fert utrinque permulta. Huc ferè Bellonius. Vita & moribus cum *Lota* Lugdunensium convenit. *Hepar* magnum habet ac delicatum; Carnem quam *Lota* glutinosiorem: mucore & cæno vescitur, in eoque delitescit.

CAPUT VI.

De Mustella fluviatili & lacustri.

Tab.
xxviii. 6.
7. 8. 9.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 7.
Cardan.
Variet.
Rer. l.
17. 37.

QUam nos Mustellam vocamus, illam Jovius inter Larii pisces Trisium Latine dixit. Mediolanenses Bortam vocant, seu quod utriusque similis sit, ut Cardanus scribit; seu quod capite ranas referat. Insubri alii Botarissias dixere. Specie fluviatilis è Lacustribus apud suos differre Gesnerus asserit; Esse enim minores, colore nigricare, carne albiore, solidioreque in cibo lautiores; duabus per dorsum pinnis, quamobrem separatim etiam describit. Cæterum corpus ait esse utrisque lubricum sine squamis (licet quibusdam, inquit, squamulæ minimæ radendo appareant) flexuosum, quod caudam versus attenuatur veluti in taniam. Coloris varietas maculosa, pinna ab ano ad caudam ferè, oblonga. Binæ omnibus ad branchias, & binæ aliæ eodem circulo inter caput & ventrem: pupilla *oculorum* alba, pars ambiens nigra. Branchiæ quaternæ simplices. *Caput* magnum, latum, & veluti compressum. In cerebro lapilli. Os grande rescissum. Barbulae circa os infra supraque; numero & magnitudine differentes in diversis generibus. *Dentes* nulli, sed veluti in lima exasperatum os. Voracitas, piscium quos devorare possunt. *Caro* mollis & dulcis *Iecur* magnum in delitiis *Vesica* (aut folliculus) nulla, *intestinum* parum anfractuosum, fere simplex. *Stomachus*: ab eo ventriculus, & in circuitu multæ appendices. Iam vero *Botarissiam fluviatilem* *feminam* (eam intelligit quam nigricantem modo dixi.) Januarii mense diligenter contemplatus his verbis (ex quibus tamen etiam nonnulla aliis hujus generis speciebus conveniunt) descripsit. Piscis est forma & flexibus serpentem ferme referens: Capite lato, caudam versus valde attenuatur. *Brachia* ei quaternæ. *Pinna* ad latera brachiarum utrimque una nigricat: & aliæ duæ paulo inferius in pectore parvæ albicant à podice exorta una oblonga, paulo citra

caudam definit: item in dorso oblongior alia; ultra medium dorsum continua tradit: & alia ante ea minor caput versus, quam pector in Icone per incuriam non expressit. *Pinnæ* omnes molles sunt & sine spinis. *Caruncula* sub mento pili instar prominet. *Cauda* non bifurca, sed circularis, nusquam omnino divisa, sed ubique sibi instar membranæ continua: Colore vario, è fusco & nigro dorsum tenerum albicat: latera juxta dorsum minimis punctis nigris in colore subalbido distincta sunt. *Os* aperitur hiato rotundo, totus piscis sine *squamis* & viscosus est. *Maxillæ* minimis *denticulis* serratæ. Color subalbidus (linea subalba nimirum) à capite incipiens oblique per latera caudam versus procedit. Nam cauda in colore nigricante variat. Membranea vero caudæ extremitas partim nigricat partim subflava est. *Lapillos* duos in capite gerit, albißimos & bene duos, figura & magnitudine granorum oryzae. *Lacustris* modò in Trisla in Grissolacu capta ab eodem considerata hujusmodi erat. Longa dodrantes duos cum palmo: filum ambiens Ventrem trium palmorum. *Denticuli* minimi, frequentes, ut serpentium. Superior pars oris duos ordines dentium habet, unum scilicet interius in medio, cui nullus respondet infra. Sunt & in intimo oris recessu, duo denticulorum ordines seu in maculis duabus. Branchiæ quaternæ. *Squamula*, rotundæ minimæ, quæ dum pellis cultro raditur, apparent, in parvis generibus v. tum fluviatili, tum Lacustri luteo minore nullo prorsus, per *cutim* passim ceu foramina, ceu puncta cava rotunda, conspiciuntur; quæ si quis caput versus validè radat, albißima videntur: sin iterum caudam versus, rursus obscurantur. In ventre meatos duo; unus excrementi, alter genituræ: qui compressus lacteo focco manabat. Et rursus alias *alia ex lacu* hujusmodi: subflava, punctis nigris, barbula à mento demissa, albicans. Ante initium pinnarum in dorso carnosâ particula, mollis, teres, intusque cava, prominet. Inde mox sequitur pinna brevis, longitudine pollicis: deinde una continua, octo vel novem digitos longa, ab ea nudum pinnis dorsum est, per tres fere digitos: cum sequuntur aliæ duæ parvæ, triangulares fere, inter quas digiti propemodum spatium intercedit: ex quibus infima & ultima, minor & caudæ conjuncta est. *Fel* subviride: vesicula ejus tum jecori tum intestinis affixa. In ventriculo pisces duo integri erant, uterque digitos septem longus, tres latus: nec aliud quicquam. Pondus totius, uncie quinquaginta. Coctæ pellis subviridi & deformi colore erat, caro albißima, bona, satis solida. *Iecur* album, non ut in minoribus subrußum; grande, suavissimum. In *alia Trisla parva*, *fluviatili*, forte digitos decem longa, pinnæ dorsi inquit, sic sunt: Primum, caruncula illi brevis non est, sed pin-

pinnulâ digito brevior: & minimo spacio intercedente, alia duos digitos longa: deinde post spatium duorum digitorum, alia paulo brevior, media, & mox cauda. Rursus ab hac differt alia, paulo longior, (ut semel animadverti: non enim simpliciter hæc accipi debent, quod ad magnitudines & colores) cui minus erat flavi in corpore, plus nigri, & ejus splendidioris. Primum enim pinna illi brevis est, deinde una longa continua usque ad initium caudæ: Ergo magna Trislia lacustris; præter carunculum illam, pinnas in dorso quaternas habet, ex minoribus, nigricans binas; luteola verò major ternas, minor binas: si modo species duæ sint luteolæ: quod accuratius considerandum est: Minoribus lacuum Trisliis pinnae in dorso binæ, adeo propinquæ invicem sunt, ut unica putentur: Colore fusco, non pulchro. Differentia à pinnis certior: nam colores multas ob causas variare possunt. In Rheno supra Acronium lacum aliquando ad tres libras sedecim unciarum accedunt. Constantiæ tanta capta, ut drachmis duabus cum dimidia venderetur. Captæ & Pragæ aliquando, pulcherrimæ, coloribus distinctæ, flavo, croceo, candido, roseo, atro, oculorum pupilla nigra, parte ambiente cærulea. Nigriores circa ripas fieri, magis in profundo flavas, quibusdam placuit. *Carnivora* sunt, nec ullus piscis pro sua magnitudine majores pisces devorat. Profunda petunt, adeo, ut Albertus scribat, in lacu circa Constantiam ad trecentos passus sub aqua hamis extrahi: sæpe cum ranis extrahuntur, quæ quia illis ore adherent, tanquam exfugendi cibi gratia, ideo ore cum ranis aquaticis coire, quidam prodiderunt. *Parere* incipiunt Decembri, alicubi & Januario. Solæ piscium senectute *obæcantur*. Maximè commendantur *in cibis*, illæ inprimis, quæ in puris rapidisque fluviis degunt, quod eandem ac solidiorem carnem habeant. In jecinoribus tanta saporis gratia est, ut apud Thuringos olim comitis cujusdam Bichlingorum matronam, omnes, dicant, principatus sui redditus in eorum delicias consumfisse. Laudantur hæc præcipuè ante Natalem Dominicum: circa partum improbantur, quod hoc tempore nonnullis in aquis grandinosa fiant. *Ova* ajunt semper valde noxia esse, quibusdam in locis, ut circa Neocomensem lacum Sabaudia. Caupones aliqui excisis jecinoribus, pisces vivos aquæ reddunt, confuto prius vulnere. *Ventriculum* hujus piscis cum suis appendicibus miras habere vires tradit Encelius. Inveteratum enim, ut sit (inquit) in Saxonia à matronis, trahere mirifice secundas hærentes aut relictas in partu, in potu datum: & magni momenti esse ad omnia vitia matricis. In Suevia passim in Cauponis & diverforiis parietibus hærentes hi ventriculi circa Zetarum fornaces visuntur, ab

edentibus illuc rejecti, ut exsiccati ferventur, & cum potione aliqua hausti à colios cruciatibus liberent. Colligi ajunt & oleum ex hepate ad solum vel ad fornacis calorem suspensio, intra vas vitreum: clarum id & flavum esse, adversus oculorum suffusiones utile, item nubeculas & maculas, quæ ab angulis oculorum nasci incipiunt.

N. Mustile marine Iconem vide, Tab. 46.

CAPUT VII.

De Piscibus Fossilibus.

Piscium Fossilium & Veteres & moderni meminere. Ex illis ita de eorum natura & ortu Theophrastus: Pisces alicubi fossiles sunt, ut circa Heracleam & alibi in Ponto. Nascuntur autem circa fluvios, & aquosa loca, quæ cum siccantur (certis temporibus) paulatim, pisces subinde humorem sectando terram subeunt: qua demum siccata, remanent in ea, veluti vivi sepulti, vel ut animalia quædam in suis latibulis hyeme condita durant, sine sensu ferè & motu torpida. Quod si loca illa priusquam denuò aqua accedat, fodiantur, pisces illi moventur. Sic & in Ponto contingit pisces glacie & gelu occupari, neque sentire, aut moveri prius, quàm in ollas coquendi inciantur. Præ cæteris autem Gobio hoc accidere videtur. Ferè autem fossiles pisces sunt, eo quod ab inundatione fluviorum, in locis quæ ressecantur, vel ova, vel alia principia gignendis idonea piscibus relinquuntur. Nonnulla enim non ex ovis oriuntur, ut Anguilla & Centriscus. Et hoc in Heraclea, circa Lycum fluvium contingit. Principia autem hæc in terra relictæ, perficiuntur, durantque. Neque absurdum est hos pisces durare.

Multa enim hujusmodi animalium exiguo egent nutrimento, sicut serpentes quoque & quæ latibulis se abdunt. Primum scilicet ipsa ova humore è terra manante, deinde eodem nati ex ovis pisces nutriuntur. Ad magnitudinem tamen aliquam eos ex crescere neque verisimile est, neque fertur, cum & loci angustia & alimenti penuria impediant. Cæterum durare in aëre hi pisces non æquè valent, ac illi qui ab aquis ad pastum egrediuntur, qui scilicet exigua refrigeratione, & quæ ab aëre eis præstari possit, indigent; nam vel ipsa branchiarum angustia indicat, non multa refrigeratione eis opus esse, quamobrem & Anguilla tum in aëre multum temporis vivit, tum in aquis turbidis illico suffocatur. Et similiter fossiles pisces à terra eos ambiente, quantum satis est, refrigerantur. Sed quod circa fossiles in Pophlagonia pisces contingit, peculiarrem & abditam rationem habet. Illic enim profunde admodum multos & bonos pisces effodi ajunt: cum neque inundare aquam

Tab.
xxvii. ij. 8.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 9.

aquam animum iis in locis neque aliter colligi animadvertatur, unde semina & principia generationis relinqui dicimus. Reliquum est ut sua sponte nascantur, idque continuo. Neque enim coire inter se possunt. Aut igitur hoc fieri existimandum est ratione loci, qui humidus sit, & omnino ferax huiusmodi piscium propter certam humidi calidique commodationem. Oriuntur autem & alii quandoque quidam pisces sponte; aut humores quosdam alicunde manare cogitandum est, qui generationis principia secum adferant: quæ mox locus idoneus & recipiat & alat. Præterea hoc inquirendum de utrisque, tum illis qui in aëre vivunt, tum fossilibus, utrum in aquam immissi vivere valeant, aut in proprio duntaxat loco, qui eis naturalis sit, sicuti sua & marinis & fluviatilibus aqua. Nam ex his quoque non nisi pauci mutationem sustinent. Nam qui in aquis resiccatis terram subeunt, & qui glacie gelati detinentur, iis familiarum esse humorem magis quam aliis (è fossilium genere) constat. Ergo piscium alii simplicis naturæ videri debent, alii amphibii secundum Democritum, ut & alia quædam animantes. Utuntur enim aëre quædam (ex aquaticis) ut prædictum est. Theophrastum sequitur Plinius, dum inquit: Circa Heracleam & Cromnam (aliàs additur, & Lycum amnem: probè nimirum, mox enim sequitur) eodemque Lyco amne, & multifariam in Ponto unum genus esse Theophrastus prodit, quod extremas fluminum aquas sectetur, cavernasque faciat sibi in terra, atque in his vivat, etiam reciprocis annibus siccatore littore, effodi ergo: motu demum corporum vivere eos approbant. Circa Heracleam eandem eodemque Lyco amne decedente, ovis relictis in limo generari pisces, qui ad pabula petenda palpitent, exiguis branchiis, quod fieri non indigo humoris, propter quod & Anguillas diutius vivere exemptas aquis. Ova autem in succo maturari, ut testudinim. Eadem in Ponti regione apprehendi glacie piscium maximi Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum fatentes. In his quidem, tametsi mirabilis, est tamen aliqua ratio. Idem tradit in Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis terrenos, altis scrobibus, in his locis, ubi nullæ restagnant aquæ, miraturque & ipse gigni sine coitu. Humoris quidem vim aliquam inesse, quam (qualem &c) puteis arbitrat, cum in nonnullis reperiantur pisces. Quicquid est, hoc certe minus admirabile talparum facit vita subterranei animalis, nisi forte vermium terrenorum & piscibus natura est. Neotericis est piscis fossilis ille, quem Germani *Beisker*, alii *Peisker*, quidam

Meerputten vocant. Duorum sunt Agricolæ generum. Majores nempe, & minores. Sonum omnes edunt acutum. E fluminibus, quæ currunt in locis paludosis egredi, per riparum venas longius, & interdum in proximi oppidi cellas, neque subterraneas penetrant. Quidam Eruditi *Musellam fossilem* vocant, eamque ita descripsit Fabricius: Longitudine est palmi crassitudine digiti, quanquam multo majores etiam reperiuntur. (Agricola palmos quatuor longos majores esse scripsit.) Dorsum coloris cinerei: cum punctis multis, maculisque transversis, partim nigris, partim caeruleis. In lateribus linea utrinque nigra & alba. Venter flavus cum maculis albis; & punctis rubris ac nigris, ita parvis ac si acu factæ essent. Ab ore carnea particula eminent, quos nando extendunt, extra aquam contrahunt. In Misena trans Albim duobus locis, quod scio fodiuntur. Ad Polnitium amnem, prope Orlantem: & ad Dobram rivum prope Hanam oppidum. Item in pratibus ad Roderam fluvium copiose effodiuntur, si flumen inundet. Ex terræ cavernis etiam ingrediuntur lacus & paludes: Cum aquæ extra ripas excrescunt, è terra prodeunt: aquis autem residentibus, in pratibus campisque relinquuntur, & ubi greges sunt, relictis vorantur à suis. Sordes amant, & in cloacas, quæ alia purgari ratione nequeunt, injecti, omnia consumunt. Cum in rivis paludibusque capiuntur recentes, solent à tenuioribus etiam mensis adhiberi. Serviunt imprimis fraudi agytarum, qui eos alunt, & vitris inclusos multitudini ostentant pro serpentibus, quia forma à parvo serpente non multum figura differunt. Sunt qui eos spirare putent. Ubi enim plures huius generis pisces simul sunt, spuma supra eos effertur. Vitro inclusi ore angusto, crescunt, & suo quodam succo vivunt usque ad semestrem.

CAPUT VIII.

De *Lampetra Fluviali*, & *Vario*, seu
Phoxino levi.

Quam nos *Lampetram fluviatilem* dicimus, in Tholosanis Chatillou, à titillatione, quod cum manu tenetur, quasi titillationis sensu variis fluxibus videatur contorquere se & elabi, Germanus Neunag seu *in diebus* dicitur. Marinis, inquit Rondeletius, partibus internis & externis & colore similes, sola magnitudine differunt: quædam enim magnitudine: aliæ vermibus terrestribus crassioribus assimilantur. Caro est tenax, spina nulla; pro spina dorsii, unus

Tabl.
xxviii.
10. II.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 9.

continuus nervus cavus, quo humor albus continetur, simplex, absque ullis nervorum costarumve ramulis. Intestina tenuissima. *Ventriculus* vix apparet: nec mirum cum solo fuctu vivat. Foramen in capite supra, sicut *Lampetræ* majores, habet. In fluviis & rivulis in quibus capiuntur, nasci vel inde liquet, quod nullis marinis *Lampetris* ibi aditus patere possit, cum neque illi in mare confluant, neque mare cum iis ulla parte sit conjunctum. Capiuntur sæpius reti cum Variis sive Phoxinis pisciculis. Vescuntur luto & aqua, iisdem Locis degunt quibus vermes: Autumno in brumam usque in Albi capiuntur, torrentur recentes in craticula, aceto condiuntur, & vasis ligneis exceptæ, in varia loca distrahuntur. Vernis quadragesimo jejuniis gratum delicatulis obsonium. Salitæ item leviter, fumo indurantur. Carne sunt satis molli & glutinosa, quod quantulumcumque est vitii, conditum & coctum facile beneficio corrigitur, nisi aquæ in qua vixerunt vitio, plus solito virosæ fuerint.

Tab.
xxviii. 1.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 10.

VARIUM seu **PHOXINUM** lævem, **Romani** *Morellam* quod nigris punctis & tenuissimis lituris sugilletur, **Insubres** *Sanguinerol* à rubore, dicunt: **Rondeletius** à Græcis quibusdam *ἰποδιδασκων* vocari scribit. Germ. *Etritz*. Diversis toto corpore coloribus depingi hunc pisciculum ex diversis imprimis nomenclaturis ostendi potest. **Dorium** (inquit **Rondeletius**) aurei splendoris est, venter argentei, latera purpurascent, Cauda in pinnam auream & latiusculam deficit. *Cute* lævi integitur, punctis notata, nigris nempe. Pinnæ laterum multum ad ventrem tradunt: quarum radices, quæ corpus pertingunt, rubro sunt colore perfusæ, inde sanguinaria dictus. Nigricat quoque in tergoribus per intervalla. Linea quæ latera utrimque secat arcuata est. Digiti longitudinem seu palmum, nunquam excedunt. Circa lacuum & fluviorum oras aquis stagnantibus capiuntur reticulis **Bellonius** *ovis* semper prægnantes esse asserit, ideoque **Aristoteles** *Phoxinum* esse autumat. **Gesnerus** vero sexu distingui dum ait, coire invicem etiam insinuat; quin, quod si (inquit) *Phoxini*, minimi isti pisciculi sint; nil mirum si propter parvitatem mediocres etiam ex eis nuper nati videantur. Verum nec ipse **Aristoteles** simpliciter nuper natos, sed verbis *de ovibus*, id est, prope dixerim, additis, gravidos capi tradit. Verisimile est autem tantillos pisciculos, sicut & mures inter quadrupedes, brevi tempore perfici & generare posse. Carne est molli & satis suavi: sed non nisi evisceratus coquendus est.

CAPUT IV.

De *Salmerone*, seu *Salmerino*.

TRIDENTINI, piscem sibi peculiarem, *Salmerinum* vel nomine ab *Salmone* detorto, quo cum carnis rubedine convenit, vel quasi *Salmonem* lacustrem, nuncupant. **Aldrovandus** à **Cardinale Madrucio** acceptum ita descripsit: Corporis forma pinnarum, numero ac situ cum *Truttis* ac *Salmonibus* fere convenit: Cæterum squamis caret; etsi squamosum esse profiteatur **Salvianus**: Capite est rotundiusculo, retuso rostro. *Oculorum* pupillam nigram aureus, qui in mortuo postea fuit ruberrimus, circulus ambit: ac quam maxime splendens. Ante eos foramina duo, auditus vel olfactus instrumenta, rotunda, manifesta. Oris maxilla inferior nonnihil recurva, Unco sursum vergente: estque tota ea mandibula alba. Lingua ejusdem coloris, item palatum. Totum os insigniter dentatum. Piscis ipse rotundus porius, quam latus est. Pinne sunt numero septem, omnes sine aculeis: quinque supino binæ prono corpore, juxta branchias duæ, totidem in medio ventre, quinta ac postrema à podice, longæ omnes ac latæ. Quæ ad branchias sunt, triplici colore præditæ. Ubi enim longiores sunt, hoc est, in ipso exortu, albicant, mox totæ rubent, exceptis nervis, qui nigricant, reliquæ tres sicuti in exortu magis quam illæ albescent, ita quoque rubedo in his intensior est, nigredine vero plane carent. Priores quatuordecim nervis constant, subsequentes novem, novissimæ decem: quæ vero in medio fere dorso conspiciuntur, duodecim nervos habet, altera non longe à cauda, iis caret, mollis & cutacea, ut in *Truttaceo* genere: malèque cœu nervosa à **Salviano** expressa est: utraque dorso concolor, id est nigricans. Cauda Lunata est, ejusdem coloris, non rubra, ut ille ait. Podex in imo ventre juxta exortum posterioris pinnæ. A branchiis ad caudam linea exilis, recta ad caudam usque fertur asperiuscula. Latera nonnihil albicant, & nunc rotundis, nunc oblongis, iisdemque nunc majusculis, nunc exiguis maculis subfulvi coloris consperguntur. Totus venter coloris ferme crocei, aut vulgaris minii. Uterum habet admodum procerum atque latissimum, utpote qui totam corporis capacitatem occupat, ovis refertus ejusdem fere magnitudinis, vulvis auroque resplendentibus, margaritas aureas dices. Intestina alba, pluribus circumvolutionibus intorta. *Iecur* breve, latum, unico duntaxat lobo constans, flavescens. Vescicam fellis invenire

Tab.
xxviii.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 11.

venire non licuit. *Lien* majusculus ex atro rubens. *Ventriculus* longus & carnosus. Caro, ut in Salmone, rubra. Longitudo totius pisces à capitis initio ad caudæ extremum, Spithamas binas explet. *Locum* si attendas, in lacubus Tridentinorum montium capi innuit. Salviandus in frigidissimis & saxolis fluminibus nasci prodidit. *Vesitur* pisciculis, & in horum defectu, recrementis. Quia singuli capiuntur, ideo solitarios esse concludimus. *Coit* in fine Novembris & Decembris. Piscis est, si quis alius delicatissimus. Caro ei tenera quidem, & quæ brevi tempore putrescit, sed minimè viscida, fatisque friabilis.

TITULUS III.

De Piscibus, qui præter fluvios alias quoque dulces aquas incolunt.

CAPUT I.

De Perca Majore.

P Antum de Piscibus Fluviatilibus, tam squamosis quam lævibus sufficiat, sequuntur illi qui præter fluvios alias quoque aquas dulces incolunt: *Perca* nempe *Major*, *Perca fluvialis minor*, *Scrollus*, *Pungitius Alberti*, *Alburnus Aufonii*, *Epelanus fluvialis*. *Lucius*, *Cyprinus latus*, *Ballerus*, *Tinca*, & *Lota Galorum*.

PERCA MAJORI, quæ Germanis Baers & Bersich, corporis figura lata & compressa est: *rostrum* prominenti non aliter quam marina, verum non adeo acuto: Ore etiam ut illa mediocri, imò pro corporis ratione parvo. Dentibus caret, sed labia habet denticulis horridula, ut Bello-nius testatur. Squamis tegitur parvis ac aridis, quæ difficillime à corpore avelluntur, maximèque ancillis fastidio esse solent. Color ei varius, venter nempe; Corpus reliquum fere cineraceum; nigricantibus quibusdam ac latis maculis à dorso descentibus (non aliter ac in marina) latera depingentibus. Pinnæ ac cauda rubescunt. In *femina* verò nihil, vel parum saltem. *Pinnæ* in tergo duæ, quarum quæ capiti proxima, major est & aculeata, posterior minor sine aculeis: totidem ad Branchias quos Rondeletius altiores esse putat, quam in reliquis fluviatilibus: totidem item in ventre: quæ vero ab excrementorum est orificio, aculeo crenato vellatur. Branchias habet utrimque quaternas easque duplices, id quod Aristoteles quoque vidit. *Cauda*

bifurcatim dividitur. Ad majorem *magnitudinem* excrevit; quam marina: nam & trilibris aliquando capi solet, inquit Salviandus: in Lario lacu ad pedalem etiam, teste Jovio, magnitudinem. In Suerinensi vero lacu ulnam id est cubitum æquare Gesnerus intellexit. Ventriculum habet mediocrem; intestina pauca & tenuia, *hepar* subpallidum; à cuius majori lobo vesica pendet, in qua fel est tenue & aqueum: *Lien* subrubet. *Lapillos* habet in cerebro. Plinius eam mari & fluviis communem facit, sed perperam. In dulci enim aqua vivere & usu, & Aristotelis Aufonii-que testimonio, qui cum cum Cyprino, Glanide & aliis nominat, constat. *Ælian-*us in Danubio capi scribit. Rhenus eo caret, forte quod altiores aquas amet. *Præ-*cipua in Verbano lacu & Pado flumine producit, prodente Platina. Fama est Larii lacus Percas fuisse advestitas & inquilinas, tralatis scilicet è lacu Euplyi, qui Lambrum emittit amnem, seminibus. In omnibus *jecur* grandine affectum est, nec quoquam alio vitio laborant. *Devorant* alios pisces tum proprii generis sobolem. *Parant* circa littora & frutices ut Aristoteles prodidit, in Helvætiis lacubus verno tempore in profundo, Aprili & Majo mensibus, ut Gesnerus. Partus tempore facile capiuntur in Sleia, & frequenter, hinc à littoribus ad pastum excurrunt, vaganturque locis spaciosioribus. Circa Johannis festum rursus capitur, dum littora ex profundo repetit. Lucio læso opitulari, fabulosum puto; nec ille huic parceret, nisi propter pinna cogeretur. Gesnerus narrat, piscatores in Lemanno lacu observasse, Percas hyeme emittere per os *Vesiculae* quandam rubram ex ore pendentem quæ vel invitata, inquit, supernatare cogit: conjectant autem id ab eis fieri præ iracundia, quod in retia inciderint: hoc enim tum maxime pati, cum retia trahunt piscatores: sed mirum esse quod hyeme tantum id ipsis accadat. De ipsarum *salubritate* diversæ sunt Authorum opiniones. Rondeletius dotibus illis quibus marina instructa est carere, scribit. Gesnerus Rhennas, & quæ in fluviis & lacubus majoribus purioribus versantur probat: quæ in minoribus minusque puris aquis degunt, non item. In Gallia summam alendis febri-citantibus dignitatem obtinent, si Jovio credimus; In Italia quæ in Lario lacu laudatissimi, eadem ad pedalem magnitudinem crescunt, & maturescentibus præsertim uvis, ab ipso pingui & præterea interaneis commendantur. In Germania quovis anni tempore, April. & Mart. mensē si excipias, laudantur. Aufonius in pretio habitam fuisse testatur alibi inerti gustu prodidit. Minimas quas *Hornas* cognomi-

Arist. H.
A. l. 6. c.
14.

Tab.
XXIII.
13. 14.
Tab.
XXIV.
9.

Aldrov.
5. c. 33.

Bellon.
Aq. l. 1.

nant, coqui peritiores vino calido immerfas elixant. Majusculæ propter spinas & aculeos pinnarum dorſi, veſcentibus moleſtæ ſunt: in minimis propter teneritudinem non curantur. Parvulæ etiam, butyro frigidi ſolent, frequentius quam ulli alii piſces. Circa Verbanum lacum Percas modice apertas, verubus ligneis tranſverſas inferunt & aſſant: ſemiſſas butyro illinunt. Ibidem omne genus piſciculorum ad ſolem inveterant, maxime vero Perculas. Vultus aculeis pinnarum dorſi inſiſtum, non facile ſanatur.

CAPUT II.

De Perca Fluviatili minore.

Tab.
XXIV.
8.
Aldrov.
l. 5. c. 34

Perca fluviatilis minor, quibuſdam Cernua, & Acerina medici Plinii, Straboni Porcus Niloticus, quia porcum continente ſpinarum ſerie admodum ſetarum mentitur, Trago Aurata fluviatilis, quod extra aquam eduſta ac ſuo humore deterſa, aureo fulgore in Cæruleum abeunte inſignis ſit; Cajo Anglo Aſpredo, Pictorio Aſpretilis dicitur. Piſcis eſt toto corpore aſper, pinnis ſpinofus.

Bellon.
Aquil.
l. 1.

Percæ forma & magnitudine, colore per ſumma ſcuſus, per ima cum pallore flavus; duplici per maxillas ſemicirculorum ordine notatus: oculo ex dimidio ſuperiori ſcuſus, ex inferiori ſubaureus, pupilla niger. Linea per dorſi longitudinem porrecta, & veluti filo tranſverſo corpori affixa ſingularis: notis per caudam atque pindas nigris maculoſus: quæ, pinne, cum ira ſubeſt, inhorreſcunt: cum animo conquieſcunt, reſident. Bellonius ſcribit nullo alium Channam exanimem melius exprimere: mortuum enim hiare & oris riſtum apertum tenere. Idem ait, recens captum hilari quadam ac ſubvirenti opacitate ceu pavonis torqueus, refulgere: imo vero extra aquam eduſtum, ac ſuo humore deterſum, aureo fulgore in cæruleum abeunte inſignem eſſet. Percam plurimum æmulari, nullo tranſverſis lineamentis (quæ Percæ inſunt) careret: oreque magis eſſet recurto. Hoc potiſſimum ſigno dignoſci, qui ſpineum branchiarum tegumentum, crenatum ut in Lupo & ſua rima luxatum habet. Ubi autem linea quæ piſcium latera ſecat, ad branchias incipit, ibi aculeum caudam ſpectantem ut in Dracone marino videri. Sed & hoc à Percâ diſſidere, quod Percâ duas in tergore pinnas habeat. Cernua (ſic vocat) unicam tantum, nullisque dentibus, ſed neque lingua manifeſta præditam eſſe, ſquamæque habere quadrangulas, robuſtas, crenulis tenuibus in gyrum inciſis, quæ

piſcem Scabrum admodum efficiant. Radiis denique ſolaribus objectam, maculis nigris per dorſum diſtingui percipi: at totam ſub ventre candicare. Cæterum non advertit Bellonius extremis branchiis, id eſt, branchiarum margini alterum paulo inferius aculeum adjunctum eſſe, quod obſervavit Geſnerus, qui tamen neutrum in duabus, quas dedit, iconibus expreſſit. Sunt enim inquit, perexiles: ut in mediis etiam branchias denticulatæ aliquot ſpinulæ crenatim (ut ita dicam) apparentes, ſi de proximo intuearis: ſuperius minores & frequentiores: inferius majores, pauce & majoribus intervallis. Sunt autem illæ, inquit, digeſtæ in margine portionis cujuſdam branchiarum, quæ à parte ſubjecta deduci & elevari poteſt. Eſt & ſupra branchias ſpinea pars obliqua, utrinque verſus occipitium ſe colligens tantillis ſerrata denticulis, ut tactui magis quam viſui pateant. Item alia pars ſupina triangularis ſuperinnata, à branchiarum ſciſſura, ſtatim ſupra pinnas ibidem, retrorſum ſpectatur & in breviffimum ſed acutum ſpiculum deſinit. Idem Geſnerus ſquamas rotundas eſſe negat, ſed rotundas eſſe fere ut in aliis piſcibus ait. Pinnam etiam dorſi unam eſſe oblongam & continuam, ut Bellonius dixit, & Cajus in communicata iconè probe repræſentavit: diſſerre tamen partibus: nam anteriorem iculeis conſtare quatuordecim, quorum primi duo breviores propius juncti ſint, medii longiores, longitudine paulatim ad ultimum uſque decreſcente: partem poſteriorem, molliorem eſſe, fibris non aculeis diſtinctam, breviorẽ, & ab anteriore intervallo quodam inchoato diſcerni. Jam vero tres eſſe pinnas in ſupina parte, unam poſt anum, & binas ſummo ventre quæ nigris lituris, ut cæteræ omnes non diſtinguuntur. Ferunt amare torrentia. In Hollandia copioſe in ſtagnantibus aquis capiuntur. Rarus eſt in Tameſi, plurimum in Ranello, quod Oxonium præterfluit. Cum natat Gobii & Cottæ more univerſas pinnas movet, ſi Cardano credendum. In vivaria conſectus, piſces alios exurere, quod ipſis aculeis moleſtus ſit dicitur. Hyeme later, in quadrageſima commendatur. Lapilli quos in cerebro gerit, adverſus regum lapillos & pleurit in commendantur.

CAPUT III.

De Scrollo, & Pungitio Alberti.

SCROLLUS Danubianus piſcis eſt. Color in Iconè, quam Raphaëli Seilero acceptam

Tab.
xxviii.
15. 16.

Aldrov.
l. 5. c. 35
& 36.

ceptam Gefnerus refert, dorso fuscus est, lateribus subviridis, plurimis punctis fuscis intervenientibus: quales etiam in pinna dorsi (cujus aculei albicant) conspiciuntur: venter candidus est. Initium pinnarum ad Branchias rubet, &c. Raro longior sit, quam figura ostendit. Quoquo modoparatus, in cibo optimus est.

PUNGITIUM Alberti, Rondeletius *aculeatum* vocat. Author de rerum natura *Spinochiam*. Pisciculus est, inquit Albertus, minimus, qui lanceolas (aculeos) binas habet in radicibus pinnarum ventris. *Mas* sub gutture rubet, *famina* rubore caret. *Squamas* non habent. Piscatores hoc genus piscium sponte *generari* ajunt, & ex ipsis alios omnes, hac observatione inducti, quod in lacunis novis primo statim anno inveniantur, & postea sequentibus annis pisces alii diversi, quanquam nulli fuerint immixti.

CAPUT IV.

De Alburno Aufonli & Epelano fluviatili.

Tab.
XXIX.
Bellon.
Au. l. 1.
Aldrov.
l. 5. c.
37. & 38.

ALBURNI meminit in sua Mosella privatim Aufonius. Bellonius circa Vercellas in amne Lagogna Ticinum influenti, *Scavardinum* à piscatoribus appellari scribit, Germani *Weissfischlin* & *Worau-gen* id est, *Wurgen* dicunt. Piscis est & fluviatilis & lacustris, Alphyis albis similis, oculis magnis, rubescentibus, dorso virescente, ventre candido. Bellonius lineam utrinque esse ait arcuatam, quæ ejus latera dividat. Sed Rondeletius duabus distinguere proficetur, altera à branchiis ad caudam ducta, medium corpus dirimi: alteram minus evidentem à radice pinnæ branchiarum orta deficere, priusquam ad caudam perducta sit. *Nare* est parum refina. Pinnas easdem habet quas Gobio. Capite est parvo: corpore latiusculo, sed depresso, vixque ad duorum digitorum latitudinem extenditur. *Felle* caret. Argenteis tegitur *squamis* ac tenuibus. Carne est molli & parum pingui. *Vorax* est piscis, quam ob causam facile hamo capitur, unde Aufonius prædam puerilibus hamis, recte dixit. Observavi Alburni duas alias species, quarum prior tergo fere ad castaneæ colorem vergit: altera ad cœruleum. Utriusque pinnæ & cauda etiam ad castaneum vergunt. Cætera argenteo colore resplendent.

EPELANUM fluviatilem Bellonius Sequanicum cognominat, à Gallie fluvio, ubi abundat, additque sic vocari quasi excellens à præstantia, qua cæteros sui generis

pisciculos excedit. Ferrarienses *Borbulum* vocant, Alburno simillimum atque hoc tantum ab eo dissidentem, quod ruffas radices pinnarum Gardonis & Veronis modo habet, ac lineam, quæ latera ejus secat, versus caudam admodum inflexam & velut arcuatam. Quinque digitorum longitudinem, pollicis latitudinem interdum exuperat. Pisciculus est *odoratus*, de bonitate & principatu cum aliis omnibus contendens. Rothomagenses *Ovellame* eo argumento nominant, quod semper ovis prægnas sit. Epelanum si suas *Squamas* habentem conspicias, præ nimia albedinis terfitudine tibi resurgere videbitur. Squamis autem exutus *tergens* ostendit variis coloribus emicans, in iridis aut arcus cœlestis morem. Marino crassior est & brevior.

CAPUT V.

De Lucio.

LUCIUS vel *Lucius* à lupo, vel à lucendo dictus est. Nulla ejus apud veteres Græcos mentio, & ostendit egregie contra Philelphum Salvianus Oxyrinchus Niloticus quod Bellonius vult dici posset, nisi Plurarchus eundem marinum, tanquam è mari Nilum intraret, faceret. Esocem Plinii, quem in Rheno magnitudine excellere putat, haud difficulter concedi potest, & videtur abinde Belgicum Snock originem suam traxisse. Apud Anglos & Gallos diversa, pro diversitate ætatum sortitur nomina. Corporis figurâ oblonga est, eademque ideo oblongior videtur, quoniam piscis latera nodice dilatantur.

Dorsum latum est, & fere quadratum, perpetuoque æquale donec ad postremas pinnas ventum sit: & cum reliquis fere *Squamis* piscibus dorsum ipsum magis aut saltem æque atque venter extuberare solent: huic uni venter, quam dorsum magis extuberat potissimum ubi pinguior sit factus, quod tamen aliquando ichthyopolarum impostura etiam fieri Romæ observavit Rondeletius, piscium quorundam ventres in farcire tradens vilibus herbis, atque ita eorum pinguiore carius vendere. Caput habet macrum osseumque ac quadratum. Ossium seu *spinarum* in capite formas diversas reperiri ajunt: unam vulgo cruci comparant, aliam lanceæ, tres alias clavis seu paxilis, passionis Dominicæ instrumentis. Author obscurus de natura rerum scribit, Lucium in cerebro lapidem crystallo similem gerere, sed hunc cum ævum in longum duxerit. Gefnerus vero testatur sese in capite Lucii etiam parvi, lapillos geminos candidos reperisse. Rostrum habet longum & rectum maximum, Anserino rostro comparet Rondeletius.

Tab.
XXIX.
Aldrov.
l. 5. de
Piscib. c.
39.

Tab.
xxviii.
17.

nugæ sunt. Quantum ad *Usum in cibis* Jo-
vius inter obsonia plebeja recenset. Pog-
gius etiam ex Cymino lacu, & quidem
præpingui, nullam unquam inesse gratiam
scripsit, nisi cum solus in maxima convi-
varum inedia prandiis aponitur. Thrasy-
menus lacus laudatioris profert. Braccia-
nus, qui olim Sabatinus, inferiores. In Gal-
lia tamen, Germania & alibi tanta putatur
salubritatis, ut Adamus Lonicerus etiam
puerperis concedat. Pinguiores tamen sunt
Julio mense & Octobri laudatioris, qui-
bus Cyprini soboles: in piscinis esse de-
teriores cum semina spargunt. Ab Ar-
noldo inter duræ carnis pisces recensetur,
sunt qui caudam & partem posteriorem
preferunt. Mediæ ætatis meo judicio op-
timi sunt. Ova piscatores circa Argentinam
tanquam medicata abjiciunt. Gesnero
sunt æque ut Barbi noxia. Apud nos ab-
que periculo in usu. *Usum in Medicina* quod
spectat, Mandibula in pulverem redacta in
Calculo, urinæ difficultate, & pleuritide
usurpatur Saliti ossa pulverizata spodii vi-
cem præstant, & ulcera exsiccant.

CAPUT VI.

De Cyprino.

Tab.
XXVII.
11. 12.
Tab.
XXIX.
2. 3. 4. 6.
Aldrov.
1. 5. c. 40.
Crassio. 1.
12. E.
pist. 4.

CYPRINUS Oppiano *carpius* dicitur. No-
men forte à Cypride, ut Gesnero pla-
cet, quod fecundissimus sit, sortitus est,
ut *carpius* apud Athenæum, vel à squamis
seu latissimis & maximis, ut Rondeletio
visum, seu ita firmiter vallatis, ut lapidis
ictus facile repellatur, ut Bellonius credi-
dit. *Carpam* Cassiodorus vocat, Brasavolus
ob magnitudinem *Reginam*, *Carpionem*
alii. Crassior est magis quam longior, nec
ulli piscium magis quam Tincæ similis. Su-
perius enim *labrum* rotundum est ac cro-
ceum, ex quo utrimque (Tincæ instar)
gemina barba pendet, longior una, mol-
lis flavescens, in acutum deficiens; *Morax*
(inquit Rondeletius) possis appellare:
brevior altera, & ideo minus evidens, ni-
gricans. Capite est brevi pro corporis ra-
tione, Tincis hac etiam parte similis. Ore
medio, labris adiposis, carnosisque; *lingua*
caret: sed ejus loco palatum carnosum de-
dit natura saporum percipiendorum causa:
quod evulsum, linguæ formam adeo re-
ferre Salvianus & Rondeletius ajunt, ut
non solum vulgus, sed etiam viri docti
(Albertus linguam sapidissimam esu dixit,
improprie itaque) linguam vocent, & lin-
guam veram esse perfectè defendant. Im-
perfecta tamen piscibus esse linguam, &
carnosum Cyprino palatum non modo ve-
tustati & Arist. visum, sed & experientia,

quæ substantiam illam palato affixam infe-
riori parti nullo modo hærentem, necullo
pacto solutam aut liberam testatur. Gesne-
rus tamen testatur sese linguam (ut vocant)
separatam à palato, in parva etiam Carpa
duos digitos latam vidisse, linguæ in qua-
drupedibus propriè dictæ figura: substan-
tia quoque & gustu saporeve simili. Usum
quoque ejus & facultatem gustandi, similem
esse, inquit, dixerim. Quare linguam ap-
pellare, nihil prohibere putat, quoniam ut
lingua sit, vel dicatur, neque locus aut si-
tus facit, cum aliæ etiam partes situ diverso
nomen idem retineant. *Dentibus* carere
hoc genus piscis Rondeletius asserit, ho-
rumque vice os palati medio infixum pla-
num habere, læve, triangulare: ex adverso,
in parte inferiore ossa duo incisa, in gulam
recurva. Bellonius vero Cyprinum dentes
quidem in ore non habere ait, sed tantum
in ingressu faucium; & Gesnerus intra fau-
ces ejus dentes latere asserit, sed neque vel
oculis diducto ore, neque tactui immisso
digito apparere. Esse autem in maxillæ re-
curvæ medio dentes qui nos fere accumu-
latos charadum instar, situ & magnitudine
inæquales tres majusculos, duos exiguos
præduros, cavos, superficie summa lata
sive plena, obtusa, sed lineis quibusdam
exasperata, unum tantum & candidiorem
cæteris & superficie lævi in mucronem bre-
vissimum fastigiata. Idem Gesnerus lapil-
lum in capite habere tradit juxta linguam,
candidum, durum, ad minimi numisma-
tis magnitudinem, interdum paulo majo-
rem. Habere & in medio capitis substan-
tiam quandam majusculam, crassam, cor-
dis fere figura, duram sed tenacem & flexi-
lem, dum recens est, sub dentibus mor-
dentis, tanquam in acetabulo quodam re-
positam, similiter ut Leuciscus fluviatilis,
quem Gardonum vocant Galli. De hac for-
te sensit, (inquit) Encelius, & improprie
lapidis nomine appellavit, his verbis:
In Carpæ faucibus reperitur gemma seu la-
pis, forma triangulari, magnitudine pro-
portione piscis, coloris candidi extra, in-
tus flavi, *Oculis* est mediis, ante quos sunt
foramina. *Pinnis* natat latis. Duæ sitæ
sunt ad branchias magnæ, in medio Ven-
tre duæ: inter quas & caudam alia est unica:
quæ serrato aculeo & valido innittitur: inter
hanc & præcedentes est excrementi me-
tus. Ex medio dorso unica erigitur, ad cau-
dam ferè continua, robusto etiam inciso-
que aculeo fulta. Cauda lata est ex nigro ru-
bescens, ut & postrema pinna. Ipse vero
colore est flavescens, maxime cum senuit.
Junior enim colore magis est ad fuscum in-
clinante. *Branchias* utrinque quaternas, du-
plici ordine, novissima excepta habere Cy-
prinum testatur Aristoteles: Gesnerus
vero

Bellon.
Aquat. l.
1.

Arist. H.
A. l. 4.
c. 8.

vero quaternas in eafe reperisse tradit, sed omnes duplices. *Squamis* magnis, validisque regi, ideoque Lepidotum Dorioni vocari. Eas etfi *argenteas* id est, argenteas vocaverit Orpheus, docti haud necesse propterea esse putant, alias esse statuendum, cum de coloribus Poëta sæpe loquatur improprie, & epithetis aliquando abutantur, creditque Gesnerus commune hoc squamarum epitheton esse, quod ut facile credo, ita hic *argenteas* si quis splendentes vertat, cum peccaturum non puto. Ipsa autem ad aureum inclinant. Sunt qui hunc piscem pro sua magnitudine, plus sanguinis habere dicunt, quam ceteri pisces, ideoque minus frigidi temperamenti esse probabile videri. *Ventriculum* mediocre habet; *Hepar* subrubrum, cui sub nigra *fellis vesica* hæret, & *intestina* admodum pingua, *splenem* magnum. Crebro quinque & sex librarum pondere reperitur, aliquando etiam viginti: Jovio vero teste in Lario lacu ducentarum quoque Maximum enim ajunt, qui in eo nascuntur piscium. De loco non convenit inter authores. Plinius marinum facit, Oppianus littoralem. Aristoteles inter fluviatiles reposuit, Ælianus in Danubio quoque capi scripsit. Dorion inter fluviatiles & Lacustres collocat. In Lario lacu admirandæ magnitudinis capi, Jovius author est. Larius, inquit, lacus, ob longitudinem à Virgilio maximus nuncupatus, pisces longe omnium maximos Troctas (Trutas) centum aliquando librarum pondere, & Bulbaros ducentarum; Sed Bulbari illi ingentes videri potius liquidis ac perspicuis in undis quam capi retibus possunt, cum ea impotenti impetu plerumque dilacerent. Subeunt solstitii diebus umbrosos specus in rupibus Licinianis, quæ sunt in adversa Larii ripa contra insulam, Euripumque illum gemmeum à Cæcilio Plinio celebratum. Eos industrius quidam sacerdos sagittis arcubalista emissis, cum in profundo quiescentes fuscinis atque tridentibus attingi non possent, vulnerare conabatur, neque tamen sagittæ longo alligato funiculo, nisi averfi officiebant, cum illa squamarum serie thoracati earum ictus facile repellerent. In lacubus Alobrogum maximi quoque proveniunt. Alicubi in piscinis & vivariis includuntur, alicubi in paludes & stagna conjiciuntur, in quibus plurimum proficiunt. Ut vero scribit Albertus: Hic piscis in aliquibus aquis generat, & in aliquibus grassatur & crescit, sed obtime valet in fundo argilloso, tritico primo seminato, & postea argilla desuper sperfa, & postea aqua superfusa. De partu & quæ circa ipsum eveniunt, isthæc fere Aristoteles prodidit. Cyprini &c. vide Scaliger. Sponte etiam nasci & Rondeletius ex experientia comprobant.

Vidi inquit ille, in aquis, in cava loca & montibus septa receptis, & collectis sponte generatos Cyprinos, in quæ loca nec rivus, nec stagnum, nec palus, nec lacus, nec fluvius ullus, nulla denique aqua præter cælestem influxisset. Fœminam lac ore suscipere, inde futura ova concipere falsum est. Herbis, luto, muro, & aliis vescitur. Athenæus carnivororum dixit. Astu plurimum valere, & ut reti capiendus evadat, varia machinari Albertus atque autor de natura rerum tradunt: primum enim circumeuntem, foramen querere: hoc non reperto transilire conari, vibrato in aërem corpore: aliquando sub reti, suffodiendo scilicet in fundo, effugium querere: alias herbam aliquam ore tenere, atque ita retinere sese, ne trahatur à reti: alias caput fundo ingerere, haud ignarum, rete, dum nisi caudam tangit, elidi. Refert Gesnerus se cognovisse ex homine fide digno in Palatini regione Germaniæ, in loco cui nomen à Michaele & campo vel agro, in fossa circa arcem Carpam esse, quæ centesimum vitæ annum attigerit, unde longævum piscem esse conjicere possumus. Carne sunt in universum molliore, nec tamen ita insalubres, quod humiditas non sit viscosa, præsertim eorum, quod in rapidis & puris aquis nascuntur. Martio in primis commendantur. Majo & Junio, quod genituram vel emittat vel recens emiserit, non item. Mas fœminæ præstat, majusculus minori. Caput à ganeonibus expetitur, propter linguam forte, quæ si assetur, prædulcis est, & bene cum succo citri apparatus. Ex ovīs Caviarium rubrum apparatus, quod Judæis dicatum est. Medicinam si spectes, lingua vim augendæ Veneris habet. Lapillus de capite, crudo pisce extractus, febricitantium æstum sedat, & sanguinis è naribus fluxum cohibet.

CAPUT VII.

De Cyprinis Monstrosis.

Miram hanc piscis speciem Lugduni in foro piscatorio vivam aliquando venditam, nullus fuit (inquit Rondeletius) qui non demptis capite & Rostro Cyprinum esse judicaret. Nam squamarum figura & Colore, pinnis earundem situ, cauda idem plane est cum Cyprino. Pinna dorsi initio aculeum incisum habet, ut in Cyprino. Eundem aculeum habet alia pinna quæ excrementorum meatum sequitur, quæ rubescit, item caudæ pars ei respondens. Tota cauda lata est, ut in Cyprino. Duas alias pinnas habet ad branchias, similiter duas in ventre. Caput habet non protensum ut Cyprinus, sed Delphini capi

Tab.
XXVII.
10.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 41.

piti simile, rostrum satis longum, sed obtusum, quale revera pictura representat. Ex superiore rostri parte juxta oris scissuram appendix carnosae utrimque una dependet, ut in Cyprino, hac superior est alia brevis & vix apprens, nisi propius inspicias utrimque etiam unica. Hæc Rondeletius *Similem huic monstruoso Cyprino*, sed barbulis insignem, quas in suo Rondeletius non expressit, Gilbertum Cognatum Nozerenem ad se misisse testatur Gesnerus, in Nozerethano stagno repertum, anno salutis 1554. In Cognati vivario novem tantum diebus vixisse. Verum longe pulcherrimum fuisse nec specie coloribus ratum & admirandum Cyprinum illum, qui anno Domini 1546. Omburgi in Ditione Comitum Palatini, Marchionis Ioachimi Brandeburgensis captus & Augustam missus est ad Carolum V. Cæsarem in comitiis illic agentem, qui eum Sorori Mariæ donavit, coctum etiam colores retinuisse. Picturam ejus sibi communicasse Io. Thanmyllerum juniorem chirurgum Augustanum peritissimum, in qua longitudo, inquit, apparet trium dodrantum: latitudo digitorum novem, quæ est in medio dorso ad ventrem medium. Pinnæ dorso initium partim aureo, partim rubro colore est, deinceps v. pulcherrimè cærulea: reliquis pinnis omnibus color aureolus, ut capiti etiam magna ex parte ac ventri, sed passim etiam rubedo intervenit, quæ barbulas quoque quaternas tingit. Dorsum ex viridi cæruleum, latera superius viridia, inferius aurea, &c. In summa suavissimis floridissimisque coloribus undiquaque adeo eleganter pictus atque distinctus est, ut vel cum rubri maris elegantissimis quibusdam, maximique variis piscibus certare posset. Narrat item captum esse aliquando apud suos Cyprinum hermaphroditum, in quo utriusque sexus notæ (hoc est & genituræ & ovorum vasa) comparuerunt. In piscinis vero contrarium quandoque reperiri, nempe neutrius sexus Cyprinos, nec mares nec fœminas, & hos forte esse, quos sponte nasci Rondeletius auctor est. Idem Gesnerus hac quoque forma Cyprinum alium captum esse testatur in Acronio sive Constantiensis lacu, prope Retz, duos fere dodrantes longum in præsentia illustri & Generosi viri Comitum Wolff de Schamburg. anno salutis 1545. idibus Novembris Picturam ad se misisse Archillem Pyrminium Gassarum medicum eo tempore præstantissimum. Pronam partem nigro colore pictam fuisse, latera fusco, supinam luteo. Spectabilem in eo præcipue faciem, æmulam humanæ latitudine sua, nec non oculis, ore, naso, buccis ac mento. Hæc scripserat, cum eundem piscem Rephaël Seilerus juvenis Augustanus clarissimi medici Geryonis filius, cum omnimoda eruditione, tum juris scientia & comitis Palatini dignitate nobilis, pictum ad eum dedit, cum

descriptione hujusmodi: Piscem hunc omnino qualem depictum mitto, fuisse captum in flumine Austriæ (quod vocant die Eris) in ditione comitis Julii de Hardegg prope urbem Retz anno 1545. mense Octobri, viri quidam eruditi & graves, mihi veluti testes oculati confirmaverunt. Faciem non averfam, prout reliqui, vel obtusam sed repressam, ab aliquo in planum aspectu tendente, cum temporibus utrimque latis, oculis binis, naribus, ore, mandibula, omnia effigie humana habuit. Pinnis, squammis, cauda, totoque corpore posteriore, ipsaque adeo magnitudine atque colore Carpam præ se tulit. Rete captus est solus, & ob raritatem ac maxime quod sensibus etiam ignotus esset, diu conservatus, & veluti miraculum quoddam passim asportatus.

CAPUT VIII.

De Cyprino Lato Rondeletii.

CYPRINUS latus Germanis *Bresem*, Italis *Scarda* seu *Scardula* dicitur. Bellonius *Abramidem* veterum nullo fundamento adjecto arbitratus est. Cyprino adjungitur, quia est squamis, corporis specie & vita similis. Piscis est maximus & latissimus, Capite parvo pro corporis magnitudine, dorso repando & cultellato, corpore compresso, *squamis* magnis tecto. Linea à branchiis ad caudam ducta curva est. Ad branchias pinnæ duæ sunt, in medio ventre duæ aliae, ab excrementi meatu alia ad caudam continua. Hujusmodi pisces in lacubus maximis nascuntur. Vidit Rondeletius in Arvernæ lacu quodam istiusmodi pisces, qui binum cubitorum, pedum totidem latitudinem æquarent. Nostro in foro copiosissimè prostant: minores Scardas, majores propter dorsum insigniter repandum Gobbos quasi gibbosos nuncupant, suntque pedales plerumque bipedales rarissimi. Scribit Gesnerus *vadum* amare argillosum, vel albicanti argillæ simile: ideoque in lacu Tigurino non passim, sed superiore ejus parte capi. Stagnantibus a. aquis præcipue delectantur, illicque muco, luto, herbisque vescuntur. Quare in iis tantem capiuntur fluviis, qui tardius fluunt, turbidaque sunt, & crassiore aqua, qualis est Araris: multi item in Gallia Belgica: nec in his ad eandem unquam magnitudinem accrescunt, ad quam in lacubus & stagnis. Mirum quod narrat idem Gesnerus, nimirum quendam in Polonia per multos horum piscium coniecisse in piscinam quæ mox superveniente hyeme tota congelata esset: cum parendi convivii causa, remoto gelu pisces capere vellet, ne unum quidem invenire potuisset: sequentia, vere rursus omnes apparuisse. Ad hosce latus Cyprinos referri debet piscis hujusmodi è Polonia missus, ubi Klosszez dicitur, totus ex subcæruleo ad violaceum vergens, exceptis pinnis &

Tab.
XXIX.
5.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 42.

cauda, quæ albicant. Pinna quæ ab ano est, longior & in exortu latior quam pars est, à pictore puto, expressa est. Habentur à quibusdam in pretio in Arvernia imprimis, ubi in lacu quodam magni & pingues capiuntur. Nonnulli partem in eis mediam expetunt; alii plus molestiæ ob minutissimas spinas inter edendum quam voluptatis afferre arbitrantur.

CAPUT IX.

De Cyprino lato alio, & Ballero.

Tab.
XXIX.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 43.

Gesnerus ex relatione Kentmani, tria hujusmodi piscis genera in Albi reperiri tradit. Primi generis pisces esse parvos, tenues, latos, colore subaureo, cui circa dorsum fuscus admiscetur. Dupla eis ad latitudinem longitudo, caput parvum. Pinna dorsi & cauda fusci coloris sunt: reliquæ verò quinque pinnae, è fusco puniceæ. Squamæ ut in Cyprino. Genus hoc Miseni parvum cognominant, *kleinkarass*, vel à colore *Giblichen*. Vivaces sunt admodum. E piscinis & stagnantibus aquis in Albim veniunt. Raro octo digitos longitudine excedunt. Vescuntur gramine & argilla, ut & reliqui hujus generis pisces: quamobrem magis amant piscinas, quam fluentes & lapidosas aquas, propter vadum herbosum & argillosum. Itaque rarius in Albi reperiuntur. In piscinis quidam multiplicari eos non patiuntur domini: impediunt enim incrementa & faginations Cyprinorum, quos à pabulo depellunt. Alterius verò generis *karas*, aliquanto crassiores & longiores sunt. Squamæ similiter ut prædicti vel ut Cyprini, è gilvo seu flavo nigricantes habent: vocantur autem *Halbkarass*, id est dimidii Carasi, quoniam è Caraso & carpa veluti compositi videntur. Hi quoque ut primi generis Carasi, & piscinis aut stagnantibus aquis Albim ingressi, pariunt in eo & crescunt. Utrisque caro est subflava, & in cibo viscosa, quomodocunque parata. Quo diutius verò in Albi immorantur, eo sapidiore solidiorisque carnis evadunt. Tertiū demum generis Carasi tenuiores & latiores sunt quam dimidii nunc dicti, similes primis, sed majores & pulchri. candoris argentei. habentque pinnae parte supina rubentes: superior vero pinna cum cauda obscurius è fusco punicea est. Hi pisces in Albi nascuntur, non aliunde (ut prædicti) ingrediuntur. Pariunt primum Junio mense, secundò Januario, sicut & superiores, quibus temporibus etiam præcipue capiuntur. Mediocriter augentur, ut sesquialibres aliquando aut bilibres capiantur. Assari solent & in pretio habentur. Fœminæ ovīs gravidæ, elixæ etiam in aqua ad juris ferè consumptionem, vel copioso butyro ad jus sub finem adjecto, non displicuerint. Est in Frisia orientali piscis, quem *karutz* appellant, Carpa multis par-

tibus minor, tergo magis arcuato & gibboso. Sexies in anno parere unanimiter affirmant, qui ipsum in vivariis servant.

DE BALLERO ita Aldrovandus: Aristotelis Bellerum inter fluviatiles & lacustres bis meminit. Ballerus, inquit, & Cyprinus & cæteri fere omnes, cum parturiunt, undis se intrudunt. Et alibi: Ballero & Tilloni lumbricus canis exortu innascitur, qui debilitat, cogitque ad summa stagni efferri, qua æstu intereunt. Hunc Rondeletius eum esse conjicit, qui à Lugdunensibus, & lacuum qui in Allobrogibus sunt, accolis Bordeliere nominatur, quod littora semper sectetur & quærat. *Bord* enim littus significat. Cæterum cur Ballerum faciat, nullum adducit argumentum, nisi quod vita & moribus à Cyprino, quo eum nominatur ab Aristotele, non differat. Vilis est piscis. Strymonis amnis accolæ vulgo *Plestyam* teste Bellonio vocant, in Macedonia ad Pischiacum lacum, ubi plurimus est, modo *Platanos*, modo *Plestyam*, modo *Platogniam*. Hollandi, apud quos cum ob copiam, tum quod per se insipidus sit, vilissimus habetur, *een Bleye*. Bramæ, inquit Rondeletius, tam similis est, ut parum cautis pro Bramis sæpè vendatur, sed ab iis magnitudine corporis & squamarum differt & pinnarum & caudæ colore. Est igitur Ballerus capite brevi, ore parvo, sine *dentibus*, sed horum loco ossa habet aspera: sine lingua, sed *palato* carnosio: Pinnas duas habet ad Branchias, duas alias in medio ventre, ab excrementi meatu unicam ad caudam usque in dorso aliam. Posteriores pinnae cum cauda rubro colore perfusæ sunt, ut in Percis fluviatilibus videre est, quæ in dorso est, nigricat. Linea à branchiis ad caudam curva producta est. Branchias quaternas habet, os in medio palato, ex adverso sita sunt ossa duo loco inferiore, altera parte ferrata, quibus contrario occurso cum palati ossè herbæ atteruntur. Venter pinguedine oblita, hepar ex albo rube-scens, in quo fel viride splenem rubrum. Multis spinis abundat, frequentes squamæ habet, rotundas & tenues. Tergus ejus nigricat, venter candicat. Oculorum pupillam Bellonius non ut in aliis nigram, sed veluti crystallinam esse asserit, iridem vero al-bissimam, ac tredecim squamarum ordines utrinque in lateribus habere.

Tab.
XXVII.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5.
cap. 44.

CAPUT X.

De Tinca.

Tincam vulgatissimum ubique terrarum piscem, à solo inter veteres Aufonio memoratum, ab aliis quod nullo in pretio fuerit, neglectum. Jovius existimat. Bellonius Aristotelis *τίνα*, quem Gaza *Fullonem* vocat Dorionis apud Athenæum *τινίς*, id est Fullonem dici, credit: metuo ne perperam.

Non

Bell. de
Aq. l. 2.

Tab.
XXIX.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5.
cap. 45.

Non tantum n. Tincæ decocto, sed & aliorum glutinosorum piscium, Ichtyocellæ, Anguillæ, &c. maculæ eluuntur. Fullo quoque Aristoreli marinis piscis est, Tincam inter fluviatiles & Lacustres reponimus. *Menam* non esse, quod Platina placet, vel ob ultimam hanc rationem, quia marinus est, certum est: Quid si verò, inquit Aldrovandus, Romanam vocem esse dicamus, à qua sententia idem Jovius non videtur declinasse. Celebratur enim apud Ciceronem, quidam facetus Orator Placentinus cognomine Tinka, fortassis, inquit, ab hoc pisce cognominatus, quemadmodum Florentiæ Laurentius Medices senior, uti erat perurbanus, euidem celebris familiæ civi, sc. domi Tincam ingentem exquisita arte coctam falso jactanti, Tincæ cognomen, quod illi postea fuit æternum, indidit. Quemadmodum Merula ob similitudinem cum Tinka, item Callarias noster, Tinka marina vocari meruerunt, quid verabit, si Tincam etiam Merulam palustrem dixerimus? Hoc sanè nomine usus est doctissimus Scaliger his verbis: Aufonius sui temporis secutus plebem, usitatis nominibus, pulcherrimum poemata non est veritus inficere potius, quam aut ipse in ambiguo versari, aut jactare Authorem in obscuro: sic Alosam pro Clupea sive Thrissa, Tincam pro Merula fluviatili posuit. Habet quibus cum Cyprino similis est, habet item quibus cum plurimum ab eo discrepat. Corporis enim specie, pinnis earumque situ, & palato carnosio, cum eo convenit: squamis verò non item. Hæ Cyprino majusculæ, Tincæ vero perquam exiguae tenuesque & mucosæ semper obductæ: adhuc Tinka juxta oculos circum habet rubrum, qui in Cyprino flavescit. Color omnibus haud idem, aliquæ enim subalbidæ sunt; plurimæ ex albo flavescentes, nonnullæ virides, quæ verò in maris degunt paludibus, ut in multis Hollandiæ locis, subnigræ sunt. Aufonius viridem dixit, cum plerumque flavescat potius. *Rostrum* habet breve ac retusum: os fere rotundum, ad ventrem inclinans, planè edentulum, at pro dentibus serrata ossa. Ex utroque oris latere, ubi inferius labrum superiori committitur, appendix pendet, ut in Cyprino, cutacea, rotunda, brevis, mollis, ac lubrica adeò, ut nunquam explicetur, conspicuave fiat, in digitis comprehensa extendatur. *Oculi* sunt magni & aurei. pinnæ binæ sunt ad Branchias, totidem aliæ in ventre, à podice una, in dorso alia brevis sine aculeo. Cauda in latam pinnam definit. Branchias habet quaternas duplices, lapillos in capite Auratæ & reliquorum marinorum more, binos exiguos. Stagnantes potius quam currentes aquas amat, ideoque in stagnis, lacubus ac paludibus quàm in fluminibus frequentior, & inter arundines ulvasque plerumque victitat, omnique anni tempore hisce in locis capitur.

E rivis a. flumina majora quandoque intrat, sed degunt maximè, ubi vadosa sunt, vadumque ipsum limosum. Gregalis est, putrescentis limi sordibus vescitur, carne nequaquam. De *amicitiis* ejus cum Lucio supra dictum est, quibus si lubet, adde, quod cum Lucius in ceteros tyrannidem exerceat, à Tinka quasi beneficii memor, prorsus abstinet. Cum occiditur, diu supervivere fertur. *Usus* in cibis quod spectat, insuavem habent carnem, quia impurum & damnatum alimentum: ideo commune est apud Italos mulierculas diverbium. *Nassuno mangia Tenca, che febre non sente*, & Aufonius vulgi solatia dixit. Diebus tamen canicularibus inprimis noxiæ putantur, quanquam Marsicana è Tucino lacu, qui nunc Celanus, quæ labio inferiore trito, quod saxoso ejus loco voluntur, à vulgaribus distinguuntur, laudantur: nec non illæ, quas parvus lacus quarto decimo ab urbe lapide, apud Bacanam sylvam, profert. Hæc teste Jovio, nobilis quidam propinalis lautitiæ studiosissimus, autumnino captas, allio lardoque contritis, additisque odoratis oleribus & multo aromate, in teganis ad vaporem tepidioris furni felicissime percoxit. Laudatur denique Thrasymena Tinka, de qua idem Jovius: Cum in coena Leonis X. Pontif. discumbentes, pelagios pisces vario judicio certatim atque impensius laudarent, nobilis quidam Florentinus Tincis fortasse solum assuetus, extollatis, inquit, convivæ, ut lubet marinos pisces: ego certè Trasymenam Tincam conditam leucophago, his vestris Triglis, Spigolis & Rhombis prætulero: quo suo insulto dicto lachrymas omnibus præ risu excussit.

Veteres medici (inquit Medicus quidam apud Gesnerum) ad sopiendos capitis & artuum dolores, torpedines admovebant, quarum loco à mediterraneis Tincæ forsan usurpari potuerunt. Sunt qui non febrientium modo æstus Tincis pedibus subditis, seu alligatis vivis temperari, sed idem remedium adversus arquatam etiam morbum proficere putent. Jovius quoque scissas per dorsum longitudinem, pedum & manuum plantis applicatas, ardentis febris ardoribus plurimum adversari, quosdam tradit putare ex secta Judæorum, qui quanquam sordidæ admodum, inquit, & ridentibus aliis talia experirentur, aliquando tamen ipsis æstuantibus exoptata blandimenta feliciter attulisse comperti sunt. Monet vero Rondeletius, ut id opportunè fiat, quod alioqui non modo nihil profuerit, sed contra maximè obfuerit. Frigiditate siquidem intro repellente ac magis constringente augeri incendium. Alii ictericorum jecori aut umbilico vivam imponunt. Icterici aliqui Tincam viventem alligant umbilico, donec immoriatur, postmodum rursus aliam alligant, idque etiam

certo die repetunt. Tinca immortua intus ac foris veluti croco tineta redditur, & plerique hoc remedio restituntur. De *felle* hoc ex libro Germanico manuscripto habet Gesnerus: Fel de Anguilla, Thymallo, Tinca & porcello lactante, misce ad aurium remedia. Hoc enim infuso, pelliculas rumpes, fluxiones curabis, vermes aurium occides.

CAPUT XI.

De Lota Gallorum.

Tab.
XXIX.
Aldrov.
de Piscibus
l. 5.
cap. 46.

Lugdunenses, inquit Rondeletius piscem qui in Arari invenitur, *Lotam* vocant, qui à Gebennensibus *Motella* quasi Mustella nominatur. Si quis Mustellam lacustrem vel fluviatilem appellaverit, non ineptè mea quidem sententia fecerit, modo non eam accipiat, quæ ex mari fluvios petit, qualis est Mustella Aufonii, qui Mustellæ nomine Lampretam nostram describere videtur. Lota Piscis est fluviatilis & lacustris. Mustellæ marinæ vulgari, de qua alibi diximus, similis admodum, nisi esset corpore rotundiore & spissiore. Ex maxillæ inferioris extremo pilus unicus veluti ex mento barba propendet, nullus in superiore eminet, ut in marina. (Gesnerus tamen in suis putat etiam supra duos pilos esse, sed in mortuis ferè latere, ut in maxima observavit.) *Pinnis* quatuor natat, duæ sunt ad Branchias sitæ, duæ in ventre, ab ano unicam continuam habet ad caudam, huic æqualem & similem in dorso, quam præcedit alia pinnula. *Cauda* mucroni gladii figura similis est. Parvulis *squamis* corpus tegitur, quod è ruffo fuscum est, & maculis nigris undulatis dispositis conspersum. *Dentes* parvulos & tenues habet. Mucro oblita & lubrica Lota est, ut Anguilla. *Ventriculum* parvum habet cum multis appendicibus, intestina convoluta, *hepar* albicans, in quo fella vesica, quæ ex viridi flavescit, splenem rubrum, *vesicam* oblongam aëre plenam, branchias quaternas & duplices. *Nascitur* in lacubus & fluviis leniter fluentibus, ut in Arari. *Hepar* pro corporis ratione magnum est, & delicatum habetur. *Ova* noxia, quemadmodum ova Barbi, quæ ventriculum lædunt & alvum turbant. Caro tota à Lugdunensibus habetur in pretio.

TITULUS IV.

De Piscibus lacustribus.

CAPUT I.

De Umbla vulgari, & Rondeletii.

Tab.
XXX.
1. 2.

Inter Lacustres pisces censentur, *Umbla*, *Trutta*, *Lacustris*, *Carpio*, *Lavarelus Allobrogum*, *Bezola*, *Albula*, *Albus Salviani*, *Farra*, *Pigus*, *Sarachus*, & *Schilus*. *Umbla*,

quasi umbra, quod haud exiguum cum umbra fluviatili similitudinem habeat, dicitur. Rondeletius *Salmonem lacus Lemani*, quod corporis specie, pinnarum numero, situque & partibus internis. *Salmonem* referat, vocat. Helvetii à Colore circa ventrem rubicundo, *Rotele* nomen indidere. Duo ejus esse genera magnitudine maxime differentia in Lucernensi lacu Gesnerus tradit. Majorem circa Bielam Rott, alicubi Roote appellari: à Sabaudis *Toutte*; circa Lemannum vero Umble minorem diminutivo nomine Rotele privatim dici. (Est & alius in Suevia & circa Augustam Rotele dictus, sed fluviatilis, non lacustris pisces, Truttis quoque affinis, Germanis cæteris ferè Huch nuncupatus, de quo suo loco diximus) Sabaudia circa Bielam *Ronson* vel *Bondelle*, illo nomine colorem indicari, hoc forte bonitatem. Denique piscem qui in lacu Bavariae Ammersee vocatur, Germanice *ein Bisling* non alium quam Umblam minorem videri: conferri enim Salmoni parvo; & à dorso usque ad media latera coloris lutei esse dici, adeoque tenerum, ut statim extra aquam exspiret, nec in alio ullo ejus regionis lacu inveniri. *Umbla major* corporis forma partibusque omnibus Salmonibus & Truttis similis est. Os habet magnum, *dentes* vero non solum in maxillis, sed etiam sex magnos in lingua. Caput livefcit, branchiarum opercula argentei sunt coloris in extremo aurei. Magis albicat quam minor. Nullis fuggitur lituris, unicam esse parvam tergoris pinnam Bellon. scribit: Rondeletius tamen non longe à caudæ exortu aliam sed admodum exiguum depingere videtur, & ipse Bellonius eandem in icone exprimit, & mox puto apophysim carnosam vocat. Idem Bellonius juxta ventrem, pinnam (in impressis codicibus branchia legitur sine sensu) utrinque unam esse ait, sed quam nec ipse, nec Rondeletius quoque pingit: duas sub ventre huic appositas, omnes sine aculeis: postremas piscem in duas æquales partes interfecare, sed partem quæ ad caput est, paulo longiorem esse. *Cutim* adeo glabram esse, ut squamis carere videatur. Tergus præ multo livore opacum apparere: ventrem præ albedine uti argentum micare: apophysim carnosam habere supra caudam, Umbræ, Truttarum, &c. more. Quaternis præditam esse *dentium* ordinibus in palato serpentium more, *linguam* ostendere aduncis in gyrum dentibus, crenatis, exertis & hamatis senis, vel eo pluribus communitam, præter hoc maxillam etiam inferiorem parvulis aliis exertis & parum falcatas in ambitum vallari, branchias habere utrimque quatuor: latera ejus virgula recta secari utrimque per medium corpus, parum repandum versus ventrem. Tres aut quatuor dodrantes plerumque longa est. In Lucernensi lacu brachii fere lon-

Bellon.
de Aq.
lib. 2.

longitudine excrefcere Gefnerus testatur, & Rondeletius duos aliquando cubitos longas à Lemano lacu Lugdunum advehi. *Minor Umbla* (ut idem Gefnerus refert) dodrantalis plerumque aut brevior, pedem raro excedit, aut fi amplius, increfcit. Vidi n. inquit, aliquando palmos quinque longam. Octobri mense in Lacu nostro captam corpore latiusculo, nunquam tamen Umblæ majoris magnitudinem attingit *Ventre* turgidulo aliquando fpectatur, propter *vesicam* nimium inflatam. Est a. *vesica* ei oblonga, ut Albulis, non diftincta per medium. *Dorsum* totum cum dimidia laterum parte fubrofeum: Inferiora latera albicant. *Venter* albiffimus est: caudæ color idem, qui dorfi pinnulam mollem & parvam, ut Truttæ, dorfo extremo gerit. *Maxillis* est dentatis. Spinæ etiam ceu dentes in *lingua* habet. Pinnæ omnes partim fubalbent, partim crocei coloris funt. Branchiæ quaternæ. *Lapillos* in cerebro habet. *Mares* ventre, pinnis & cauda magis rubent, foeminae candicant: eadem capite fuperius & dorfo magis virent. Non tantum in Lemani lacu, fed & in aliis capitur. *Vefcitur* pifciculis, quifquiliis & aliis. Si vel parum *faucietur*, velut moribunda fupernatat. Capta quam primum aquas reliquerit, exfpirare traditur. *Carne* est fuavi, ficca, & cum fenuerit dura, & quæ multorum iudicio Afellis, imò faxatilibus fuccedere queat. Pinguis potiffimum apud Allobroges capitur tantique fit, (inquit Bellonius.) quanti ditiorum burfa æftimare poteft. Commendatur ab Helvetiis Novembri mense, & alias circa initium Decembris: quo tempore Gefnerus ova habere ait bona & folida, tardius vero caro ejus infulfa, pinguiufcula & flaccida apparet & ova dilutiora funt. Tempore partus menfis inepta eft. Cum elixatur, vino prius fervido injicitur, ne nimis mollis reddatur. Apud Allobroges pafiticiis includi Bellonius refert.

Facit Rondeletius alterius mentionem, quam Lemani lacus accolæ *Umble chevaliere* forte ob magnitudinem, præftantiam & robur nominant. Neque verò à fuperiore folum differt, vel fexu, vel ætate, ut ex fequenti defcriptione perfpicuum fiet. Est igitur hic pifcis Salmonibus & Truttis, quæ vulgo Salmonatæ dicuntur, fimilis, *roftro* recurvo, quo à fuperiore differt, id n. longius habet & acutius. Maxillæ inferioris extremum incurvum in maxillam fuperiorem, ejus rei gratia excavatum recipitur ut in Salmonibus videre eft. Maxillæ lineis multis diftinctæ funt. *Dorsum* ex cæruleo nigricat. *Venter* aureo colore eft. *Hepar* flavefcit, in eo fel: *splen* nigricat. *Ventriculus* gulæ fubjectus eft, longus, fpiffus, cujus innumerabiles funt appendices, quemadmodum in fuperiore. In infignem magnitudinem excrefcit. Carne eft ficca & dura: in afulas dividitur, quæ Caryophyllis confixæ in

craticula affantur, & oleo five butyro irrigantur. Paratur etiam hic pifcis Truttæ modo. Caput maxime commendatur, ut Salmonis.

CAPUT II.

De Trutta Lacuftri.

Quam nos Truttam Lacuftram vocamus, eam Galli *Truttam Salmonatam*, Rondeletius *Salmonem lacuftrum* vocat, cumque Truttis vulgaribus grandior fit, Salmone minor, *Sarionem* ab Aufonio dici Bellonius & Rondeletius opinantur. An fit *Anchorago* Caffiodori quod Gefnerus opinari videtur, fuperius diximus. Ex Truttorum genere effe. Salmonique fimilem cum ex corporis forma, partiumque externarum & internarum fimilitudine, tum ex nomenclatura Gallica notum eft. *Differt à Salmone* magnitudine & maculis. Minor n. & maculas in lateribus purpureas, multo quam Salmo copiofiores habet Truttæ, itemque in fluviis rapidis & limpidis inveniuntur, non funt adeo maculoſæ, magnitudineque, fucco, carnis colore & fubftantia multo inferiores. Umbla vero nullis ut dictum eft litturis fuggillatur. *Gefnerus hunc pifcem diligenter intuitus, his verbis defcribat: Squamulis* tegitur minimis, bene dentatus eft, & *lingua* etiam utrimque dentibus munitur. Caput colore nigro, cæruleoque mixto, dorsum partim glauco, partim fubnigro, partim cæruleo, partim fubviridi. In lateribus puncta nigra. Pinna in medio dorfo multis nigris maculis variatur, reliquæ alben. Habet & ultimam illam dorfi mollem pinnulam, ut reliquæ Truttæ: branchias quaternas. *Appendices* non toto circuitu intefitini, fed ab una tantum parte magnas, oblongas, bipartitas, utrimque circiter 18 habet, & alias fex feparatim ex oppofito, ventriculū feu majus intefitinum verſus. Hæc ille. Ad duum triumve cubitorum *magnitudinem* accreſcit, in Lario lacu ad 50. quinimo, Jovio auctore, ad 100. etiam libras. Initio æſtatis *caro* ejus rubere incipit, duratque is color uſque ad Auguſtum, vel faltem ad Divi Jacobi diem, quo tempore partu jam abſoluto, colorem rubicundum amittit. Gefnerus loco differre invicem iſtiusmodi lacuftræ teſtatur, alias n. in vado ipſius aquæ degere, præſertim argilloſo, hæſque magis pingueſcere, & palato ſapidioreſſe, alias circa ſummas aquas, ubi muſcas appetunt, minus pingues & vilioris pretii: illas apud ſuos *Gyndſoymen*/ has *Schwabſoymen* appellari. Duo item genera capi in montanis lacubus quos Atheſis facit, quorum unum ab aureo colore *Goldſoymen*/ alterum à nigredine *Schwartzſoymen* appelletur.

De loco & natura hujus pifcis ita Aldrovandus: Lacuftris pifcis eſt, fed qui ex lacubus fluviis quandoque ſubit certo tempore, inſtante nempe partu. E Lemano in Rodanum aſcendere ajunt vere, inquit Gefnerus, ut &

Tab.

XXX.

3.
Aldrov.
de Pifci-
bus l. 5.
cap. 59.

circa Sedunum capi: at in Tigurino & Acronio lacubus neque eodem tempore migrare putat. Acronii lacus incola *paritura* ad Rhenum influentis ostium ascendit, ubi cum pepererit, rursus descendit. Conferri ajunt hunc piscem junipero, nam sicut hæc tertio demum anno fructum perficit, ita etiam ejus foetus ad tertium usque annum crescens, perficitur: *parere* plerumque Julio & Augusto, alias citius tardiusve, prout cælum magis minusve calidum fuerit. Jam vero magnolice sit corpore, suâ tamen naturâ agilis quoque est, aliarum Truttarum more. Tradit Jovius sese audivisse majores istas Truttas lacus ripis lascivo excursu extremos arenæ margines aliquando justis passus longitudine profusasse. Laudantur vehementer in cibis, *Carnem* habent solidam, rubicundam, & saporis optimi: aliquando tamen præ nimia pinguedine nauseam movent, & mortuæ paucissimis horis, quod pinguis illa teneritudo quam sæpissimè putrescant, gratiam saporis amittunt. Larianæ multo succo corpora replent, & genitalem humorem copiosè suggerunt. Præferuntur, si Jovio credimus, Soranæ aliis, in Acronii lacus parte inferiore captæ, illis quæ in superiore parte capiuntur: item quæ circa fundum pascantur, iis quæ circa summam aquam. Ab Helvetiis Februario commendantur, ab aliis simpliciter æstate, dum pulpæ earum rubent. Spinæ dorsi & Caudæ assæ, vel principum mensis inferuntur.

CAPUT III.

De Carpio.

Tab.
XXIX.
2. 3.
Aldrov.
de Piscibus
lib. 5.
cap. 50.

Qui sit apud Veteres Carpio, ignoratur. Moderni quidam in solo Benaco lacu reperiri, & à carpando auro dici ajunt. Alii ablata priori syllabâ, *Pione* vocatum fuisse, ac tandem *Carpione* quod cum quidam piscem edisset, careque supputanti solvisset, carè se Pione edissere diceret, perhibent Fracastorius à carpo nauta, à Saturo Benacum trajecturo, quod aurum ipsi extorqui vellet, in carpionem mutato derivat. Lacustri potissimum Truttæ congener statui potest. Nam & corporis figurâ, partium numero & carnis substantiâ ei similis est: punctisque similiter nigris notatur, ac denique pinnulam dorsi posteriorem mollem, ut illa habet. Evidentibus tamen ab eâ interstingitur notis. Prominentiori enim rostro, majoribus oculis, candidiore & turgidiore ventre, ac nigricantiore dorso est: *magnitudo* Truttæ lacustri duorum triumve plerumque cubitorum, cum Carpio pedem excedere nunquam visus sit. *Dentes* habet non in maxillis solum, sed etiam in palato & lingua, *squamis* tegitur tenuibus. Ven-

trem habet candidum atque argenteum, dorsum subnigrum. Qui ab Aldrovando exprimitur, lateribus est fere rubicundis, intensius verò rubet lineâ corpus dividens. Ventre pinnisque candicat, *Tergus* ad cæruleum inclinat. Solius Benati lacus alumnus esse omnes ajunt: negatque Petrus Bembus alibi capi, huncque piscem capere atque cognoscere Friderico Imperatori voluptati fuisse. Atqui Salvianus revera reperiri nascique asserit in parvo & limpidulo lacu, haud procul ab Alvito Campaniæ oppido ex-oriente, (vulgo illago della posta appellato) ex quo Fibrenus fluvius exoritur: esse tamen Benacinis minores, & vix libram unam implere. Profundiora aquæ loca amat. Pisciculis *vescitur* & quibusdam lacus recrementis. Bellonius Phrygani edacem esse tradit. Auro *vesci* paulo ante negavimus. Carne est duriuscula, siccaque, minime glutinosa, rubescente, Truttis & Salmonibus simili. Plus æquo servatos contabescunt & deteriores fieri ajunt, id quod & multis aliis piscibus accedit, maximè iis qui delicatiore & friabili sunt carne quam obrem Benaci accolæ, in sartagine frixum, foliis involutum, aceto in quo aromata prius ebullierint, irrigatum, per proximas urbes circumferre, quem condiendi modum vulgus ab hoc pisce acarpionare, alii amarinare nuncupant. Platina spinam in capite gerere scribit perniciosam, eamque inter edendum cavendam: cujus tamen apud alios nulla mentio est.

CAPUT IV.

De Lavareto Allobrogum, & Bezola.

Lavaretus à munditie & candore, quod nunquam sordidus sit, nomen sortitus est. Bellonius ex Truttarum genere esse ait, Rondeletius, Salmonum, Truttarumque generi adjungendum suaderet, inquit, pinnula illa dorsi posterior adiposa Salmonum & Truttarum generi propria nisi multa alia reclamarent, ut oris constitutio Thrillisquam Salmonibus similior. Os sine dentibus, caput compressum, corpus *maculis* carens caro mollis & candida. Quam obrem Lavaretum inter Salmones (Truttasque) & Alosas, ambigere judicat. Bellonius exactissimè delineavit his verbis: Piscis Lugduni satis cognitus. Umbra similis, nisi *simus* esset, *dentibusque* omnino careret: *Bisulcam* (Bezolam) tamen vulgarem magis refert: sed Lavaretus nunquam pedem excedit, neque crassior est eo quod pollex & index capere possunt. Capite est oblongo, *squamis* tenuibus, albis, atque ut in Trutta parvis exiguum in tergore gerit pinnam, duas ad ventris latera utrimque circa branchias, ac totidem sub ventre ei oppositas, quæ tergoris fastigium occupat: aliam quo-

Tab.
XXX. 4.
Aldrov.
de Piscibus
lib. 1. 5.
cap. 51.

Bellon.
de Aqu.
lib. 2.

quoque parvam in eo interstitio, quod est inter caudam & anum, quæ omnes nigricantes apparent. *Linea* à supercilio subrubra per latera ad caudam protensa insignis est: *cauda* bifurca, pinnisque ad extrema nigris, fimbriatis ac laciniatis. *Ventre* laxo & prægrandi, ut in *Trutta*. Hoc item à cæteris piscibus differt, quod *nare* est recurta, atque (ut in *Harengiis* ac *Logiis*) ossiculis quibusdam prominentibus insigni, labiis nullum *dentium* rudimentum ostendentibus, appendice glabra ac carnosa *caudæ* insidenti, in *Umbrae* modum. Neque tamen *denticulus* caret: ossicula enim ad ejus fauces atque oesophagi ingressum utrimque conspiciuntur, fenis hinc inde denticulis, ut in *Themolo*, comminuta. *Branchiæ* illi sunt utrinque quaternæ ac simplicissimæ, quarum extrema, quæ capiti inhæret, reliquis sane minor est, nullis lateribus maculis est insignitus, totumque hujus piscis corpus, dempto tergo argenteum est. Verumtamen si ad ejus internas partes advertas, *costas* quinque & triginta utrinque connumerabis, cernescque cor illi esse pallidum ac trigonum, pericardio inclusum: *hepar* album, unius tantum lobi, ut in *Exocoeto* & *Delphino*, in cujus latere dextro felle vesicula adfuta est. *Lien* à sinistris apophysibus & stomacho incumbit. *Intestina* nullas habent revolutiones. Nam gula usque ad ventriculi fundum deducitur, qui per piscis longitudinem delatus, ac sursum quidem reflexus, duodenum parit à dentibus suffultum, in cujus gibbo innumera apophyses spectantur: ex quibus vena oritur, per quam sanguis deferretur ad hepar. *Apyloso* sequitur aliud intestinum, quod nullis anfractibus circumductum, rectà ad anum tendit. *Fulvam* utrinque bicornem habet, tenuibus *ovis* conspicuam. Cætera in congeneribus piscibus describentur. *Lacus Allobrogum*, ut *Burgetii* & *Æquibetii* proprium *Rondeletius* facit. *Bellonius* ex *Lemano* quoque adferri scribit. Caro ei candida, mollis, suavis, minimè glutinosa, boni succi, mediocriter nutriens. *Bellonius* in tantis in Gallia delitiis haberi scribit, ut regionem œconomorum chartæ frequenter inscriptum habent.

BEZOLA nomen huic pisci *Latus Lemani* accolæ dedere, *Bisulam* *Bellonius* dixit. Latine *Cephalum* vel *Mugilem Lacustrem*, vel potius *Leuciscum Albalam*ve lacustrem appellare licebit. *Bellonius* semel tantum hujus piscis meminit, *Lavaretum* *Bisulam* magis quam *Umbra* referre inquit. Sed *Rondeletius* exactius, ut *Lavaretum*, inquit, *Lacus Burgetius*, & *Æquibetius* ferunt, ita *Lemani* *Bezola* vulgo dictam, non admodum dissimilem, nisi quod colore minus est candido ad cæruleum inclinante: rostro acutius, capite minore, ventre latius & prominentius. Nullum piscem re-

perias, cum quo melius comparari possit, quam cum *Harengo*, quam in marinis depinximus. Carne est molliore quam *Lavaretus*, & ab eo saporis suavitate & succi bonitate multum superatur, nec in pretio habetur. Proprius est *Lemani* lacus.

CAPUT V.

De *Albula parva*, & *minima* *Gesneri*.

Albulam parvam non sui generis piscem esse, sed *Albulam* sive *Bezola* cæruleam secundo tertiove suæ ætatis anno ita vocari, quidam opinantur, quibus piscatores nostri, inquit *Gesnerus*, contradicunt, quod cæruleos observarint, secundo etiam ac tertio anno forma coloreque à genere *Albularum* (de quibus hic loquimur) differe. Cognatus est hic piscis cæteris lacustribus albis. Nam & species & sapor fere omnium non dissimilis est. *Albula* magis quam *Bezola* albicat: cauda tamen & reliquæ pinnæ, præter eas quæ juxta branchias sunt, nigricant in extremitatibus. *Dorso* color glaucus: alicubi tamen purpurei quiddam & cærulei mixtum videtur. Caput ex glauco cæruleum. Inter caput & dorsum color viridis, ceu gemma relucet. *Branchiæ* ei quaternæ. Hyeme aliquando memini me videre hunc piscem *squamis* per latera exasperatum, eminentibus per singulas squamas veluti tuberculis. Aiebant hoc indicium esse recentium & vivarum. Capiuntur *Albulæ* in summa parte *Tigurini* lacus, juxta locum quem *Buchberg* vocant, diebus ferè quatuordecim post diem *divi Martini*, & ad oppidum *Rapperswillam* circa ipsum *divi Martini* diem. *Apertu* in lacum nostrum descendunt (sed non tam procul ut cæteræ *Albulæ*) usque ad *Ver*: deinde rursus ascendunt tota æstate, usque ad *divi Martini* diem. Capiuntur etiam in *Gryphio* agri *Tigurini*, multo majores quam in nostro, & in *Halvillensi* *Bernensi* agri. *Augusti* & *Septembri* mensibus præcipue laudantur, quod suaviores eo tempore solidioresque sint. Postea enim pariunt, & mollior earum caro fit, & succus in foetura consumitur.

De *ALBULA MINIMA* sic *Gesnerus*: *Albulam* minimam hunc piscem voco, inquit idem *Gesnerus*, quem nostri *Hagele* vel *Halting*, quasi *Haleculam* appellant. *Friburgi Helvetiorum* (ut audio) *Nachtzungen* / *Lucernæ* *Nachtzungen* / quod noctu fere irretitur, ut quidam putant. Sed mihi piscator *Lucernensis* affirmavit, *Nachtzungen* vocari *Albulam* cæruleam anno primo, cum circa diem *divi Johannis* ætate jam ad digiti longitudinem excrevit. Tota specie accedit ad illam quam proxime *albulam* parvam nominavi, sed plerumque minor est, & in capite minus viridis.

Tab.
XXX.
7. 8.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 53.

Tab.
XXX.
7. 8.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 53.

Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 53.

Tab.
XXV. 5.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5.
cap. 52.

viridis. Si piscem erectum inspicias per dorsum aliquid coloris purpurascens in lateribus apparebit. Branchiæ ei quaternæ sunt, pinnulæ albescentes. Ore aperto superioris mandibulæ extremitas deorsum tendit. Os habet longiusculum, *dentes* nullos. *Julio coeunt*. Noctu tantum capiuntur retibus ad passus quadraginta aut quinquaginta demissis. Cum cælum serenum est, altius descendunt cum nubilum, ascendunt. Densissimis gregibus præ cæteris Albulis capiuntur, non passim in lacu nostro, sed maxime à pago Vædesuilla, usque ad Insulam & versus alteram ripam à loco Surenbach usque ad arborem longam. Diebus quatuordecim fere à natali Domini capi incipiunt & immixtæ eis Albulæ cæruleæ aliquot, & mox expirant. Cum captæ mox expirent, in recentes habeantur matutino tempore potius ad prandium coemuntur, & assi in craticula quam calidissimi à gulonibus devorantur, qui eam ob causam non universos, sed paulatim alios assari jubent, ut statim assumtis prioribus, fervidi posteriores mensis afferantur. Embamma additur ex aceto, sapa, pipere, sale & potri aut cepæ foliis concisis. Placet item recens in jure albo frigido, apio copiose insperso, maxime per mensem Decembrem. Sale idem conditus infumatusque comendatur.

CAPUT VI.

De Albo Salviani & Farra.

Tab.
XXX.
9. 10.
Aldrov.
de Piscibus
l. 5.
c. 55.

Albus Salviani, Capto lacustris Gefneri est. Quamvis Squalo Alburnove appellato pisci persimilis sit, ab eo tamen evidentibus quibusdam notis faciliè internosci potest. Primum enim etsi uterque latitudinis ratione oblongus appareat, eadem nihilominus utriusque existente latitudine, Albus paulo longior Alburno conspicitur. Deinde rostro acutiore, oculis majoribus ac dorso magis repando Albus est. Nam cum Alburni sensim atque modice, Albi repente ac plurimum à capite extuberat dorsum. Pinnarum autem tum in lateribus, tum in dorso ac in imo ventre existentium, situ ac numero ei cum Alburno conveniente, earundem colore ab invicem discrepant: subnigras enim Albus: subrufas verò Alburnus eas habet. Postremo amplioribus squamis albus tegitur. Ventreque atque lateribus, æquè atque Alburnus candidus atque argenteus est: capite vero ac dorso magis quam ille subviridis. Magnitudine non differunt. Uti enim Alburnus, sic & Albus pedalis, frequens: bipedalis verò aliquando tantum reperitur. Lacustris piscis est, non tamen in lacubus omnibus aut eorum quam plurimis, ut Tinea, Lucius, Squalus ac Barbus, sed eorum nonnullis solum reperitur. In Trasymeno enim lacu, ubi etiam Albo vulgo vocato, frequens

quens satis in fine veris capitur. In fluminibus cum reperiri huc usque non observavimus: estque advertendum, ne quispiam eum in fluminibus etiam reperiri contendens, Squalum pro Albo nobis ostendat, in mari nec nascitur, neque ex lacubus fluminibusve ad id descendit. Duram carnem habet Albus, & propterea ægre coquitur. Insuper adeo est, ut piscium omnium jure vilissimus censeatur. Nec enim ulla condiendi ratione sapidus effici potest. Torrefactus tamen paulo minus ingratus est palato, solumque in aliorum piscium penuria eo vesci solemus.

FARRA, Fora & Pala quoque dicitur. Lavaretos vel Thrissas refert, ut scribit Rondeletius, magnitudine cubitali, ore parvo, sine dentibus ut in Thrissis, colore cinereo, corpore depresso & lato, squamis, pinnarum situ & numero Lavaretis similis, linea à branchiis ad caudam recta & candida ducta est. Pinnulam dorsi mollem pinguemque habet, caudam latissimam. Carne est candida & suavi, quæ Lavaretorum Truttarumque carni non cedit.

Æstate & autumno capitur, hyeme in altis gurgitibus latet. Sale conditur & servatur in hyemem. Sic ille. Cæterum monendus est Lector in Rondeletii codicibus diversum piscem, quem in Lemano Vangeronem vocant, huic capri haud recte per librarium incuriam præfigi.

CAPUT VII.

De Pigo, & Schilo.

Pisci, quem descripturi sumus, Verbanus Larique lacus accolæ Pici, Pigi & Picqui, quod clavis suis seu aculeis pungat, nomen imposuere. Rondeletius Cyprianum clavatum, Albertus Vergiliadem, quod Vergiliarum ortu apparent, dixit. Cypriano, describente Rondeletio ita est, similis ut demptis aculeis Cyprianum esse affirmes. Est enim eodem corporis habitu, pinnas totidem eodem in loco sitas, os, oculos, eodem modo carnosum, interna omnia similia habet. Vita item, moribus, sapore, succo Cypriano similis, nisi quod paulo melior est. *Salvianus diligenter sic descripsit*. Pigus piscis est capite rotundo: rostro obtuso, nec admodum extento, ore mediocri & edentulo.

Branchias habet utrinque quaternas, & juxta eas, pinnas binas, utrinque unam: aliasque in imo ventre, caudæ magis quam capiti vicinas. In dorso ferè medio una haud magna, nullis aculeis armata reperitur: Imo ventri propè caudam alia una etiam minor hæret. Cauda ipsa in falcatam pinnam desinit. Totius figura ni paulo longior esset, ovata censeretur posset. Squamis magnis tegitur, ex quarum medio albi & pyramidati aculei, in fine veris & ineunte æstate, enascuntur. Quibus cum primis 40. æstivis diebus horreat,

Tab.
XXV.
11. 12.
Aldrov.
l. c. cap.
56.

Tab.
XXX.
13. 14.
Aldrov.
l. c. cap.
57.

CAPUT VIII.

De Saracho.

reat, æstate procedente imminuuntur primum, demumque prorsus delitescunt. Quapropter primis illis æstivis diebus demptis, reliquo anni tempore prædictis pyramidatis aculeis omnino caret: unde cum Plinius scribat: Duo lacus Italiæ in radicibus Alpium Larius & Verbanus appellantur, in quibus pisces omnibus annis vergiliarum ortu existunt squamis conspicui crebris atque præacutis clavorum caligarium effigie, nec ampliusquam circa eum mensem visuntur. Dubio procul Pigum piscem, etsi innominatum eum relinquit, describit, cum is (ut infra monstra bimus) Larii & Verbanilacus alumnus sit, & (uti diximus) in prima æstate (quo quidem tempore vergiliæ exoriuntur) ejus squamæ parte media, clavorum caligarium instar, præacutæ fiant. Habent enim caligares clavi, qui à caligis militaribus, quibus suffigebantur, dicti sunt, pyramidata capita. Ejusmodi a. aculeos, sicuti Majo & Junio tantum mensibus, in dorsoque solum & lateribus, & non in ventre, Pigo enasci asseverant omnes, sic non foeminas, sed mares tantum inhorrescere, testantur nonnulli: Venter ex albolanguide rubet: tergus ex cæruleo nigricat. Quod ad interanea attinet, nil habet præ cæteris piscibus peculiare atque animadversione dignum. Cum maximè excreverit, quinas aut senas libras non excedit. Solius Larii atque Verbanilacus accola est. Nemo enim in alio lacu flumineve eum reperiri hucusque (quod sciam) animadvertit. Ut licet frequentiores in prima æstate, cum clavis illis caligariis insigniti apparent, in iis lacubus capi soleat, reliquis etiam omnibus ferè anni temporibus, in eisdem, etsi non æque crebro, capiuntur. Majo Mense circa lacus littora parit. Sapore & succo Cypriano est similis, paulo tamen melior. Salvianus ei sapidissimam, ideoque cum optimis quibuscumque dulcis aquæ piscibus conferri posse & maxime in æstatis principio captum: hoc enim tempore nulli piscium esse secundum, & quovis denique modo conditum, probe semper sapere.

Aldrov.
l. c. c. 59.

SCHILUM, qui & *Nagemulus*, ita describit Gasserus: *Magmaul* piscis est in Ambronis lacu Baviaræ, qui raro capitur, quoniam raro altius natando evchitur. Longissimus ulnam æquat. Formâ non dissimilis est Lucio, nisi quod in aqua subviridis, extra aquam verò dilutior apparet: oculis albicantibus, ore retro juxta maxillas minus lato. Squamarum magnitudine, ordine & asperitate Percam refert. Pinnæ dorfi erectæ, aculeis tres fere digitis rigent. Præter dorfi spinam paucas alias & parvas habet. Parit Martio. In cibo quidem optimus est Majo & Junio. Elixatus, assatus & frustatim concisus etiam frigi solet. Pinguis est admodum, & carnem etiam coctus albidissimam servat.

Piscem quem Albanenses *Sarachum*, Ichthyopolæ *Sarachinum* vocant. Bellonius *Agonum*, Jovius & Salvianus *Aconem*, Fracastorius & Jovius *Aquonem* vocant, ab officulis sine dubio illis acutis, quæ asperam spinosamque in ejus ventre lineam constituunt, & veluti acus quidam sunt. Rondeletius *Chalcidem*, quem Gaza *Aericam* vocat, dici opinatur, alicubi fortè *Sardanella* dicitur. De ipsorum Generibus ita Bellonius: Tres sunt apud Insulæ lacus in quibus piscem vulgari Mediolanensem idiomate, *Agonum* nominatum capiunt, varium quidem eum.

Tab.
XX.
Aldrov.
de Piscibus.
l. 5. c. 5.Bellon.
Aquatibus l. 2.

Larius enim lacus, qui hodie Comensis cognominatur, Agonos educat exiguos ac magis populares, Sardis similes, dempto quod ventre sunt latiore: neque alio quam Mediolanum transferuntur, aut saltem raro Mantuam prætergrediuntur. Eos doliis muriâ conditos adservant, quanquam etiam mediocriter sicci sine muriâ comperiantur. Verbanus lacus, quem lacum majorem cognominant, multo majores Agonos quam Larius educat. Indigenæ urbium, quæ ad ejus litus sitæ sunt, Aronan, Palencza, Cornobio, Locaria & Eugudræ vocatos pisciculos magno proventu capiunt, mediâ magnitudine inter Larios & eos ex lacu Lugaræ, quos Indiginæ urbium nominant *Campignon* & *Buiffon*. Benacus autem Lacus magnitudine insignes Agonos profert. Sed nec Urbani aut benaci Agoni muriâ condiri solent, ut minores. Hæc ille, & mox rursus de Saracho. Duo, inquit, tresve lacus sunt in Epiro, in quibus Sarachi capiuntur, quos ubi sale condierint, exiccarent, & fumo infecerint, Venetias, Anconam & aliò navigiis transvehunt. Quorum eos maximè in pretio habere solent, quos de la Bojane hujus nominis flumine ac lacu cognominant. Horum verò duo comperiuntur genera, alterum minus, alterum autem Clupeæ ferè magnitudinis. Minores Sarachi quadrante longiores non sunt, majores pedalem implent longitudinem. Ambo eadem linea sub ventre præditi sunt, quâ Clupea insignita est. Cæterum Agoni omnes (inquit idem Bellonius) squamas habent levi contactu decedentes, tenues, latas & transparentes: corpora argenteo colore nitentia, sed parum nigricant in tergo. *Desquamati* super argentum tersissimum refulgent. Oris rictum habent grandiusculum sine dentibus: pinnam in tergo simplicem, parvam, duas in lateribus sub branchiis, quarum omnium exterius tegumentum spineum in medio crenatum est. Oculos valde grandes proferunt, caudam

Q in

in penicilli modum discissam. Utrunque nonnunquam lituris duabus, rotundis, ac nigris, interdum pluribus sigillatur in tergo. *Lineam* sub ventre habent serratam, ad anum desinentem, quam si digito in adversum confricis, cūlri modo acutam percipias. *Branchias* habent utrinque quatuor, internā parte veluti fimbriatas, quod etiam Harengis, Celerinis & id genus piscibus accidit. *Cor* ut semen Cicerculæ trigonum inter anteriores pinnae sub branchiis occultatum. *Hepar* subrubrum sinistro stomachi lateri & oesophago incubans, ipsumque pylorum amplectens. *Stomachi* figura in conum turbina- tur, à cujus superiore parte pylorus exit, ac multis apophysibus cœcis circumdatur. *Lien* dextræ Stomachi parti, inhæret ruber, à pyloro intestinum non reflectitur, sed recta ad anum tendit. Triginta sub ventre *officula* acuta, asperam in hoc pisce lineam constituentia, connumerare potes. Hæc omnia itaque Bellonius, quibus addi potest, Hosce pisces ita pinguescere referente Rondeletio, ut cum in craticula assantur, pinguitudo veluti oleum distillet, adeo ut

ab hac pinguedine, sint qui *Liparim* appel- lent. *Carnivori* sunt, & pulices aquaticos venantur. De *generatione* prodit Salvanus, Acones sœminas ovis gravidas, maribus semine refertis consequentibus, ad saxosa litora Majo mense adnatate, ibique illas parere sua ova, hos suos semine sœcundare, moxque pusillos inde procreari pisciculos, qui intra paucos dies ad digiti augeantur magnitudinem, tuncque vulgo *Antefitos* vocari. Aqua exempti mox emoriuntur. *Gregatim* vivunt, & temerè in retia incidunt. Adeo sunt *timidi*, ut vel à tremula umbra terreantur. A Lucii, Cyprinis & Truttis adeo sibi metuunt, ut aliquot aliquando millia, insequentem inimicum longo per lacum tractu pavidi fugiant, jucundo in- tudentibus spectaculo. Alosis sapore persimi- lis, verè graciles, autumnio optimos Jovius facit. Salviano Julio, Augusto, Septembri & Octobri mensibus probantur. Crassiuscu- lum tamen succum gignunt, difficulter con- coquuntur, & mediocriter nutriunt. Cum salendi causa exenterantur, *oleum* ex intera- neis ad lucernarum usum colligitur.



HISTORIÆ NATURALIS DE PISCIBUS.

LIBER IV.

De Piscibus Exoticis.

TITULUS I.

De Piscibus squamosis.

CAPUT I.

De *Tajassica*, *Paru*, *Pira-Acan-*
gata, & *Acarauna*.

Poterant quidem & isti, quos hoc libro trademus pisces, ad sua genera in præteritis referri: verum cum tardè nimis ipsorum descriptiones & icones in manus nostras pervenerint, coacti sumus eos peculiari libello includere.

Tajassica itaque prout Brasiliensibus vocatur: piscis est octo aut novem digitos longus, corpore obterete & pyramidalì, extenuatur enim versus caudam. *Caput* est illi grossiusculum & compressum: *Oculi* eminentes & nigri, circello aureo: os edentulum. Sex habent pinnas, nimirum sub qualibet branchia unam oblongam, sub his in medio inferius unam brevior: unam in medio dorso, aliam longiorem versus postremam dorso partem, & è regione hujus unam in infimo corpore: septima est cauda, oblonga & in exitu rotundata. Tegitur squamulis parvis, coloris hyalini pallidi, maculis variis fuscis vermiculatis variegatus per totum, exceptis pinnis postbranchialibus & infimo ventre quæ ex pallido subflavescent. Cauda est undata fusco. Latet in arena absconditus; ideoque capitur pedibus, eos ponendo super arenam ubi latet.

Coctus atque assatus bene sapit & convenit cum Hollandorum *Post*: est enim carne albissima & friabili.

PARU. Piscis est latus & subrotundus, verum haud crassus, novem aut decem digitos longus ab ore ad pinnam caudæ quæ duos & semis digitos longa & totidem lata: latitudo piscis septem digitorum. *Pinnas* obtinet sex: duas magnas ac latas duos circiter ditos; unam in dorso, alteram in ventre quæ utrobique ad caudam extenduntur, habetque quavis pinna in fine prominentiam instar funi-

culi, ea videlicet, quæ in dorso quinque digitos, quæ in ventre tres digitos longam. Post branchias in quolibet latere etiam pinna est duos digitos longa, unum lata, & duas in inferiori ventre sub his, duos digitos longas, angustissimas. *Caput* est parvo, ore elato, angusto, minutissimis dentibus albi coloris, oculis conspicuis, flavo circulo circumdatis. Totum corpus vestitur squamis mediocribus, quarum dimidius numerus niger est, dimidius autem flavescent, ita ut lunulas flavas in nigricante corpore gestare videtur. Circa branchias flavedo est, & in initio pinnarum, post aures macula flava in qualibet.

Piscis est edulis.

PIRA ACANGATA, id est, piscis duro capite: *Percæ* mediæ magnitudine, septem aut octo pedes longus, ore haud amplo, oculis nigris, circello nigricante aureo & ruffo colore mixto. *Pinnas* habet sex & septimam pro cauda: duas postbranchiales, duas infimo ventre junctas, unam versus posteriora in ventre, & unam per totius dorso longitudinè usque ad caudam extensam & erectam, firmis spinis suffultam quam in vaginam recondere potest. Pinna caudæ furcata. Tegitur squamulis argenteis, aureo & igneo colore transplendente, præsertim in dorso: in ventre in argenteo thalassinus color translucet.

Pinna dorso argentea transplendens & maculis fuscis insignita. *Pinnæ* laterales albæ, quæ in ventre cærulescentes. Caudæ quoque pinna in extremitate cærulescit. Est edulis.

ACARAUNA. Piscis magnitudine æquat *Paru*, sed non est ita latus, & squamulas habet nigricantis coloris. Cauda est bifida, pinna tres digitos longa, duos lata. Pene utramque branchiam etiam pinnam habet, inferius in antica parte duas angustas. Per totum dorsum & per ventrem etiam pennam utrobique extensam, acutam, continuam, in postica parte corporis circiter unum digitum latam. *Os* parvum, angustum, denticulis minutissimis. *Oculi* haud magni. In utroque latere prope caudam acutissimum habet aculeum, quos in latera potest recondere & evaginare & alios pisces lædere: quilibet aculeus ferè digitum longus ossè piscino constans.

Piscis est edulis.

Q 2

C A.

Tab.
XXXII.
I. 2.
Mareg.
Hist.
Brasil. I.
4. C. 2.

CAPUT II.

De *Guaperua*, *Piranema*, & *Acarapucu*.

Tab.
XXXII.
3.
Marcg.
Hist. Bra-
sil. 1. 4.
c. 2.

GUAPERUA Brasiliensibus. Piscis est corpore lato & compresso, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus. Ore parvulo, denticulis minimis. Pinnae habet sex: post quamlibet branchiam unam, parallelogrammi figura: in infimo ventre duas oblongas: in dorso & inferiore ventre extremo longam ac latam, quæ in acumen desinunt, subulæ figura. Cauda quadrata seu potius parallelogramma, unum digitum longa, duas tertias digiti lata. Tegitur squamulis coloris nigri, splendentis instar bombycini, quarum oræ (non omnium sed quarundam) fimbrias flavas habent instar semilunularum. Pinnae sunt nigrae, Circa os linea crassa purpurei est coloris, & illi perpendicularitur altera supposita Corpus tres lineæ lata ambiunt, quarum duæ per latus & posticas pinnae extenduntur. Caudam etiam talis secat linea & ejusdem coloris, una pro fimbria ipsi est oculorum pupillâ nigra, circulo aureo.

PRANEMA, Piscis mediocris Capionis seu Percæ magnitudine, novem, decem aut undecim digitos longus, latus ubi maxime, tres digitos aut paulo amplius. Os habet amplum, subrotundum, edentulum quidem, sed acutissimis prominentiis asperum: oculos magnos instar solidi Hollandici, pupilla crystallina, circulo aureo splendente, qui superius ad dimidiam partem coloris est miniati. Branchias habet admodum amplas. Pone has in quolibet latere pinnae digitum quidem longæ sed haud latæ, & subter has in ventre duæ sibi propinquæ duos digitos longæ & sesquidigitum latæ, triangulares, spinis suffultæ. A ventris medietate ad caudæ exortum usque pinna protenditur tres & semis digitum longa, unum lata, itidem spinis intertexta, quam abscondere fere potest in rima ad hoc comparata: per universum dorsum ab occipitis sine ad exortum caudæ pinna extenditur quinque digitos longa, paulum plus digitum lata, tenui membrana constans, duabus & viginti spinis intertexta, quam erigere atque deprimere & fere abscondere potest in rima. Cauda quæ à corpore protenditur sesquidigitum est longa, unum lata, pinnam habet tres & semis digitos latam, & plus quam sesquidigitum longam. Color totius piscis est argenteus lacatus lacea florentina. Squamulas habet minutulas quasi triangulares: in ventre plus albeat, seu argenteo minus laceæ intermixtum cernitur.

Capitur in mari & boni est saporis, edulis.

ACARAPUCU, fluviatilis piscis, in sesqui-

pedalem longitudinem excrevit, ubi latissimus quatuor aut quinque digitorum. Os acuminatum circiter duos digitos longum, haud amplum, labia abscondere & contrahere potest, ut solum hiatus appareat, nullos habet dentes. Oculi magni, pupilla nigra splendente, circulo ex albo & fusco mixto. Pinnae habet septem: unam per dorsum longitudinem ad caudam fere extensam, non latam, quam erigere & spinis sustentare, atque recondere potest: post branchiales duas, totidem in infimo ventre, unam post anum: Septimam pro cauda, furcatam quatuor aut quinque digitos longam. Totus splendet squamis argenteis minoribus: in dorso tamen aliquid aurei admixtum: & in quolibet latere sex oblongæ maculae cæruleæ rufescentes, non ita conspicuæ. Pinna dorsum & cauda dilute cinerei sunt coloris, ut & laterales: duæ in infimo ventre flavescent paulum, ut & ea quæ prope anum. Edulis est.

CAPUT III.

De *Pudiano vermelho*, *Pudiano verde*, & *Iurucapeba*.

PUDIÃO Vermelho vulgo, sed rectius *Podiano*: Brasiliensibus *Aipimixira*, & *Tetimixira*, Piscis mediocris Percæ magnitudine. Latitudo corporis ubi maxima, duorum digitorum prope caudam unius aut paulo plus. Corporis fere æqualis latitudo est. Caput parvum, os acutum, superius in anteriori parte tres denticuli acuti, minimi, inferius item, & versus interiora in utraque mandibula alii minimi denticuli. Oculos habet paululum eminentes, pupilla nigra, exteriori albo, hinc flavo circulo. Pinnae habet septem: nimirum duas plus digito longas, haud latas, post branchias in utroque latere unam: sub his duas junctas in ventre: aliam in ventre versus caudam duos digitos longam, secundum longitudinem adnatam: unam item talem in dorso, tres & semis digitos longam: & septimam pro cauda, quæ est quadrata, digitum longa & lata. Tegitur piscis squamis subtilibus, ita arctè complicatis, ut ad tactum glaber esse videatur. Color totius corporis flavus cum aureo mixtus. Summitas aurem capitis & totum dorsum ad media utrimque latera, & fere usque ad finem dorsalis pinnae purpurei est coloris egregii cum lacea mixti: extrema ora pinnae majoris in ventre versus caudam etiam purpurea ut & pinnae flavæ cum aureo colore mixtæ, ut & totum reliquum corpus. Pars ultima pinnae majoris in dorso etiam flavæ ut & cauda. Piscis est edulis.

Pudiano Verde Lusitanis. Piscis oblongus, nimirum decem digitos ab oris extremo ad caudæ

Tab.
XXXII.
4. 5. 6.
Marcg.
Hist. Bra-
sil. 1. 4.
c. 3.

caudæ initium; corpus tres digitos latum, circa caudam autem sesqui. *Os* acuminatum, haud amplum, antè in superiori mandibula habens duos dentes acutos, longos; & seriem denticulorum minimorum: inferius in anteriore parte quatuor, longos, acutos, & seriem minorum candidorum. *Oculos* habet parvos, pupilla nigricante, circello primum aureo, dein exterius albescente. *Pinnae* obtinet septem, nimirum unam per dorso longitudinem extensam, sex & semis digitos longam, dimidium latam, quam spinis erigere & sustinere potest: post utramque branchiarum unam, duas digitos longam, paulo plus uno latam: sub ventre duas parvas junctas: à medio autem ventre inferiori una tendit pene ad caudæ exortum, quatuor digitos longa, unum fere lata: Septima pinna est cauda, quæ est quadrata aut parallelogrammi figura, sesquidigitum longa, duos lata.

Totus piscis vestitur squamis latis quæ ita compositæ sunt, ut meri cubi sibi apppositi videantur; lutei seu aurei coloris ac per totum ambitum linea seu simbria elegantissima azuri seu cærulei coloris. *Caput* superius aureum est cum magna macula coloris ex viridi thalassini, circumdata azureo & azureis flavis subviridibus & albicantibus striis variegatum. *Pinnae* duæ laterales seu postbranchiales & duæ in ventre albicant, in laterali ambitu cærulea lineola præditæ. *Pinna* dorsalis aurei est coloris & striis undulatis cæruleis secundum longitudinem notata, quæ in ventre major ex rufis ad brunum vergit colorem, striis itidem cæruleis secundum longitudinem. *Cauda* rufescit striata thalassino ac cæruleo secundum longitudinem, in extremitate autem paululum virescit.

Piscis insignis coloris & edulis. Capitur in mari.

Iurucupeba, aut etiam *Itaiara*. Piscis longus septem aut octo digitos, duos aut tres latus, ubi latissimus: ore satis parulo, & ex triangulari rotundo, lingua angusta, brevi, denticulis minutissimis: oculis rotundis, pupilla crystallina & circulo rubro. Post branchias in utroque latere habet pinnam sesquidigitum longam, quadratam & exterius circinatam: subter has, duas in inferiori ventre junctas; paulo post occipitium incipit pinna anteriori medietate spinis suffulta, posteriori mollis, quæ tendit secundum longitudinem dorso ad caudam usque, & semper fit latior, prope caudam digitum lata. In inferiore corpore versus caudam etiam pinnam habet haud amplam. *Cauda* constat pinna sesquidigitum longa, plus uno lata & quadrata.

Squamatus piscis, sed squamis ita complicatis ut lævis esse videatur. Piscis universi color egregiè ruber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus; in lateribus autem

constanter maculas habet puniceas, nigras, varias, majores & minores. *Pinnae* omnes sunt rubrae & nigro maculatæ.

Pinguis est piscis & boni saporis, optimus tamen assatus. Capitur in mari inter scopulos. Parieti recens appensus noctu toto corpore clare lucet.

CAPUT IV.

De Iaguaraca, Caranna, Cururuca, & Guatucupa Iuba.

IA GUARACA. Piscis est mediocris Perceæ magnitudine, ore acuto, edentulus. Oculos habet magnos, pupilla crystallina nigra, magna & ampla, circulo coloris argentei, & superius maculam sanguineam habente. *Pinnae* habet in lateribus & infimo ventre similes præcedenti pisci: per dorsum verò secundum longitudinem extenditur pinna digitum lata, usque ad unum digitum ab initio caudæ, constans tenui membranula undecim spinis acutissimis suffulta, quam potest elevare & substernere pro libitu: atque non solum componere, sed & abscondere in rima cui pinna insidet.

Hanc sequitur alia contigua unum digitum lata, pertingens ad caudæ exortum, duos digitos longa, triangularis & superius desinens in acumen. *Cauda* autem pars reliquo corpori subtenso rotunda est, sesquidigitum longa, continens pinnam furcatam, cujus pars inferior duos digitos longa, superior paulo longior. Ad branchias in utroque latere, in quolibet duos habet aculeos, in quorum medio alii sunt minimi: his branchiis & aculeis ferit & vulnerat: ferit etiam cum spina dorsali & cum iis quæ sunt in infimo ventre, ad quarum singularum latus aculeus est satis longus, & quidem in pinna prope caudam in infimo ventre spina est unum digitum longa.

Totus piscis tectus est squamulis eleganter dispositis; & qualibet squamula in ambitu minutissime est serrata. Color totius corporis est argenteus, in ventre plane albicat. *Caput* superius incarnati est coloris, & hispida testa munitum. *Pinnae* omnes coloris sunt dilute incarnati: ea autem quæ in dorso spinis suffulta, prope spinas auro est umbrata.

Caro pinguis & boni saporis, præsertim si piscis assetur. Capitur in mari inter scopulos.

Caranna. Magnitudinem & figuram habet ut *Iurucupeba*, differt tamen capite & colore corporis. *Pinnae* quoque eodem modo positæ habet ut ille. *Os* autem obtinet lunatum; dentesque habet acutissimos, sed minores: *Branchias* amplas, quæ aculeis in postica parte sunt munitæ. *Oculi* versus summitatem capitis in lateribus positi non longe

Tab.
XXXII.
7. 8. 9.
Marcg.
Hist. Bra.
fil. 1. 4.
c. 3.

ab invicem haud magni, pupilla ovali nigra, quam ambit circulus ruber. Squamulis in universum vestitur lunatis, coloris miniati per totum, & ubique punctula nigra, magnitudine seminis papaveris insparfa habet, præterquam in ventre.

Capitur in mari inter scopulos: estque edulis, molli admodum carne atque boni saporis.

Curruca, species *Corvine*; Piscis fluvialis, sesquipede longus, corpore oblongo; ore satis amplo, oculis mediocribus, nigris. *Pinnas* habet septem: unam per dorsi longitudinem ad caudam ferè protensam, quæ divisa est & prior pars latior, tres digitos ferme, & totidem longa, triangularis, spinis suffulta, posterior longior, sed exilior. Cauda fere quadrata. Squamas habet mediocris magnitudinis argenteas cum auro & subfusco pauco mixtas, præsertim in dorso & lateribus. *Pinnæ* in dorso & lateribus ac cauda, cinereæ; in medio ventre flavescunt, & fufescunt. Edulis est.

Idem. l. 4. cap. 4. *Guatacuba Iuba*, in duorum pedum longitudinem excrescit, dorso paulum incurvato. *Os* habet triangulare, acuminatum, dentes parvos acutissimos. *Oculos* magnitudine stufferi Hollandici, pupilla magna, nigra, splendente circulo rubro. *Pinnas* habet molles sine spinis in lateribus, nimirum unam in quolibet latere, post branchias, angustam, duos & semis digitos longam: duas tales junctas & ventre subter illas unica spina munitas: & unam prope anum digitum longam ac latam, unica quoque spina armatam. Ante medium dorsum versus occiput, incipit pinna desinens ad caudæ initium, quinque digitos longa, unum fere lata; quæ duabus & viginti spinis erigitur: cauda duos pene digitos longa, unum lata, pinnam habet plus uno digito longam & quatuor latam paululum. que exterius versus interiora arcuatam. Vestitur squamis paulo majoribus, coloris argentei & striis flavis & ex argenteo rufescentibus secundum longitudinem extensis à capite ad caudam usque. In utroque latere etiam à capite ad caudam eminens linea tendit. *Caput* ex argenteo, rufo, flavo mixtum. *Pinnæ* albæ sive argenteæ, caudæ pinna rufa: venter albus.

Capitur in mari inter scopulos. Boni est saporis, & lingua & caro circa mandibulas longè optimi ut in Carpione.

CAPUT V.

De Pira lurumenbeca, Tamoata, Acara, & Pira Pixanga.

Tab. XXXII. 11. 12. Idem lib. 4. c. 4. **P**IRA JURUMENBECA vulgo Bocamol-le, quia molliore & aquis extractis statim moritur: vivit in mari in cœno: oblongus piscis haud latus: novem aut decem interdum pedes longus, duos & semis latus, ubi latif-

simus. *Os* habet elevatum, quod ampliare & rotundare potest: oculos magnos, pupilla crystallina, circulo ex argenteo & brunno mixto. *Septem* habet pinnas, duas angustas postbranchiales, duos digitos longas: duas in infimo ventre junctas, duos fere digitos longas, unum latas: unam post anum firma spina suffultam: sextam per dorsum extensam & bisectam; anterior ejus pars sesquidigito longa, unum lata, triangularis, quam erigere & in rimam recondere potest, mollis & translucens, altera pars usque ad caudam fere porrecta, tres digitos longa, semidigitum lata, iridem mollis. Septima est cauda, duos fere digitos longa, sesquidigitum lata. figura pentagoni cujus basis inserta in corpus.

Squamas habet toto corpore argenteas, splendentes, mediocris magnitudinis: in dorso viridis & aureus color transplendet. *Pinnæ* argenteæ & in medietate exteriore aureæ. In quolibet latere tinea tendit paulum elata, etiam argentei coloris ut reliquum corpus.

Edulis est & boni saporis.

TAMOATA. Lusitanis soldido (quia armatus) piscis fluvialis seu aquæ dulcis, edulis. Longitudo corporis ab occipitio ad initium caudæ trium & semis digitorum; longitudo capitis unius digiti; latitudo paulo major. Crassities corporis; ubi maxima, nimirum post occipitium, trium, circa caudam duorum. *Caput* latum ranæ fermemodo; *Os* haud amplum; ad cujus quodlibet latus filum habet unum digitum longum instar barbæ, os edentulum. *Oculi* minimi crystallini, magnitudine seminis papaveris, circello aurato cincti. *Pinnas* obtinet octo, ad quamlibet branchiam unam, digitum longam, firmam instar cornu in uno latere, directe à latere protensam: duas in infimo ventre, non ita firmas at ejusdem magnitudinis: unam in medio dorso, alteram in eodem dorso prope caudam, minimam: unam parvam in infimo ventre prope caudam & octavam pro cauda, digitum longam & latam. Totum caput superius tegitur testa dura instar clypei: & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis squamosis corporibus composita: suntque hæc corpora per ambitum minutissime ferrata & quadruplici ordine tota lorica disposita: id est, coeunt partes seu squamæ lorice in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre. Color totius piscis obscure ferreus, præsertim in capite. Carne bona est.

Piscis hic aqua carens in fluvio ubi est, tempore sicco, per terram abit ut aquam quærat.

Acara Pinima. Piscis est latus, dorso incurvato, sex aut septem digilos longus, quatuor latus, ubi latissimus, parvi Carpionis figura aut verius Percæ misnixe. *Os* habet haud amplum, denticulos minutissimos: oculos fati-

Idem lib. 4. c. 5.

Idem lib. 4. c. 6.

fatis magnos pupilla nigricante transplendente, circulo rubro fusco, & albo: *Pinnas* septem; unam per totum dorsum extensam & continuam versus anteriora minus uno digito latam, versus posteriora latiore: hujus pinnæ medietas anterior spinis suffulta est & illam in rimam potest recondere: post branchias in utroque latere unam duos digitos longam, haud latam, in medio ventre duas junctas semidigitum ferme longas firma spina sustentatas: inter anum & caudam inferius itidem unam firma spina munitam: Septima pro cauda est furcata, plusquam sesqui digitum longa, totidem lata.

Totus vestitur squamulis argenteis ex auro splendentibus: in quolibet latere septem magnas habet strias secundum longitudinem ad caudam usque extensas, coloris fusci splendentis (in quibusdam aurei seu lutei) à summo item capite per utrumque oculum ad extremitates oris, in quolibet latere capitis lata stria nigra descendit, ad cujus oram aliquid cerulei admixtum est. Ultra harum striarum exortum in dorso, nimirum ubi pinnæ dorsii initium sumit, itidem per quodlibet latas descendit nigra stria usque ad exortum pinnæ lateris seu oram branchiarum. Omnes pinnæ & cauda coloris sunt lutei seu aurei splendentis. Capitur in mari inter scopulos: & est edulis atque boni saporis.

Pira Pixanga, Belgis *Sarvisch* quia in initio antri inter scopulos degit in mari Longus est novem digitos, ab initio oris ad exortum caudæ. Cauda duos digitos longa. Os sesquidigitum amplum, minutis sed acutissimis denticulis præditum. Caput haud magnum: oculi magni, prominentes, pupilla coloris instar Turcoidis optimi, circulo nigro, cum aureo & sanguineo mixto. Branchiæ in triangularem figuram desinunt, ampla & acuta spinula prædita. *Pinnas* habet septem: unam per totius dorsii longitudinem extensam, unam ferme digitum latam, & in postica parte latiore, cujus prior medietas undecim firmis spinis sustinetur, posterior est mollis.

Post branchias in utroque latere unam, duos digitos longam & totidem latam, subrotundam & carnosam: duas junctas in medio pene infimo ventre, unica spina singulas firmatas: unam mediocrem post anum spina munitam. Septima est pro cauda, duos fere digitos longa & totidem lata, non secta sed extremo ambitu subrotunda. Tegitur squamulis parvulis per totum corpus, ad tactum glaber nisi à cauda versus caput digitis fricetur. Totum corpus, caput, pinnæ, cauda ex albo flavescunt: & per totum variegantur maculis sanguinei coloris diluti: rotundis, magnitudine seminis canabis: quædam etiam in ventre majores. Pinnæ eodem modo maculatæ in ambitu suo obscurius rufescunt.

Figuram ferè Auratæ habet. Edulis est ac boni saporis.

Captus per trihorium extra aquam potest vivere: bihorium postquam mortuus esset, aperiebam illum & cor adhuc movebatur exemptum: coritum erat statim post fauces, & aspera arteria in id inferebatur, eratque digitum remotum à reliquis visceribus per mediastinum; minimum utique & vix granum tritici æquans etiam quando spiritu inflatur.

CAPUT VI.

De Vubarana, Capeuna, & Acarapitamba.

VUBARANA. Piscis figura corporis Trutæ nostrati similis, ubique ferme æqualis crassitie, paulum tamen in dorso exaltatus, versus caudam autem angustior. Corpore oblongo, quadrante cylindraceo: pedalis longitudinis, semipedem crassus. Caput acuminatum seu coactum, haud magnum: oculi stufi magnitudine, pupilla nigra, circulo primum aureo, exterius argenteo: Os edentulum & lapis illi pro lingua. In medio dorso unam habet pinnam duos pene digitos longam, unum anterieus latam, trapezii figura, non tamen duris spinis firmatam. Post branchias in quolibet latere versus inferiora parvam pinnam oblongam & angustam obtinet & duas tales laterales ad infimum ventrem è regione dorsalis: prope anum unam parvam. Cauda constat pinnæ furcata instar harengi plus duobus digitis longa. Squamulas habet ordine lineari secundum longitudinem corporis positas, ita affabre ut ad tactum quaquam versus glaber videatur. Superne si aspiciatur olivacei est coloris; at eminus aut lateraliter si intuearis plane argenteus ac splendens videtur, & dorsum carulescit ex argenteo: venter plane albus: branchiæ ita glabræ sunt ut laminæ argenteæ videantur.

Affatus boni est saporis, nec opus est desquamare: coctus non ita commodus ob multitudinem spinarum per carnem dispersarum.

CAPÉUNA. Piscis corpore oblongo non lato qui in septem digitorum longitudinem excrescit. Os illi obtusè acuminatum, habetque in superiore atque inferiore mandibula unam seriem minimorum denticulorum: tota cavitas oris cum lingua sanguinei coloris insignis: Oculi illi parvi, stufi magnitudine, crystallini, circulo partim argenteo colore variegato. *Pinnas* obtinet septem, in quolibet latere post branchiam unam oblongam, tenuem quasi triangularem: duas triangulares in infimo ventre; unam post anum firma spina munitam: unam per dorsii longitudinem excurrentem, cujus anterior

Tab.
XXXIII.
F. 2. 3.
Idem
H. B.
l. 4. c. 7.

rior medietas spinis munita, quem recon-
dere potest, posterior mollis & sine spinis:
cauda bicornis, molli pinna. Tegitur squa-
mulis parvis argenteis, in quibus aliquid au-
rei transplendet. In quolibet latere habet
duas lineas crassas aurei coloris, unam à sum-
mitate oris per oculos & medium latum ten-
dentem ad caudam, alteram magis superius
per dorso latum pergentem. In summitate
capitis livefcit. Pinnae omnes sunt cinerea:
Venter albus ut & ejus pinnae.

Coctus boni est saporis. Capit in mari
inter scopulos.

Idem 1.
4. c. 8.

A CARA PITAMBA. Piscis oblongo
corpore ut mullus seu barbus, in duorum
pedum aut etiam majorem longitudinem
exerescit: *Os* habet minutum & dentes: *Ocu-
los* amplos, pupilla crystallina, circulo mi-
niato: *Pinnas* septem; unam à summitate
dorsi tendentem ad exortum caudae fere,
spinis suffultam, digitum latam aut paulo
amplius: post quamlibet branchias unam te-
nuem & longam, subtus in ventre duas jun-
ctas, & prope anum unum: *cauda* constat
pinna quinque digitos longa, quae in duo ob-
liqua cornua definit. *Squamis* totus vesti-
tur modo Carpionis, eleganter ex purpureo
caeruleis. In utroque latere in medio ab ocu-
lis ad caudam tendit linea sesquidigitum la-
ta: aurei coloris, per totum autem dorsum &
latera usque ad hanc lineam puncta aurea
majuscula habet: sub linea in lateribus sub-
tiles lineas aureas seu flavas, secundum lon-
gitudinem. *Venter* albicat. Pinnae laterales
& ventris ex albo flavescent. Dorsalis pinna
& tota cauda aurei sunt coloris.

Optimè sapit assatus, & melius quam co-
ctus. Pinnae ejus lucent noctu. Capit in
mari.

Hic piscis à crustaceo quodam animalcu-
lo vexatur, sesquidigitum longo, digitum
crasso, figurae oblongae, ut cauda Gamma-
ri & eodem modo formato & crustato: con-
stat autem septem juncturis, & habet qua-
tuordecim brevia crura, unguiculis acutis
praedita, in quolibet latera septem: antè
corpusculum paululum ampliatur. *Corpus*
molle est sub crusta instar cochleae lenta cute
obductum: nec oculi nec os apparent. Hoc
animalculum ori piscis se ingerit & unguicu-
lis suis arcte faucibus inhaeret, nec unquam
piscis se ab illo liberare potest. Postero die
adhuc vivebat capto pisce & pridie mortuo,
in totum albi est coloris.

CAPUT VIII.

*De Iaquacaguare, Curimata, Ta-
reira, d'Alto, & Tarei-
ra de Rio.*

Tab.
xxxiii. 4.
5. 6. 7.
Idem. 1.
4. c. 8.

I A GUACAGUARE, Lusitanis *Iaqueta*,
Id est, interula, à colore, quia nigritae ejus-

dem coloris amiciuntur. Piscis instar Percae
nostrae latus & obrotundus, ad summum oc-
cto digitos, quinque aut sex latus. *Os* habet
parvum, cum minutulis dentibus ordine di-
gestis: *Oculos* mediocres crystallinos, circulo
fusco: *Pinnas* porro septem, unam à medio
dorso ad exortum caudae protensam, spinis
suffultam, anteriore quidem parte semidi-
gitum latam, posteriori latiore & trianguli
figuram desinentem. Duas postbranchiales,
duas in inferiori ventre; unam post anum la-
tiusculam: caudam denique duos digitos lon-
gam, parallelogrammi figura, quae in duo
cornua definit. Squamis vestitur, instar per-
cae, majusculis, quae è cinereo caerulefcunt.
A dorso autem per latera latae lineae descen-
dunt ad ventrem nigrae, in quolibet latere
quinque. Superius caput quoque nigrescit,
venter verò albescit atque erubescit. Pinnae
omnes è cinereo caerulefcunt & quodammo-
do nigricant versus extremitates. Tota de-
nique cauda nigra est. Edulis est piscis.

Haud malè convenit cum Mormyro Ge-
sneri, nisi quod Icon in eo differat, quod in
Mormyro Gesneri plures lineae nigrae vel
pullae à dorso ad ventrem per latera descen-
dant.

CURIMATA. Piscis Carpioni, figura,
colore, carne valde similis: sesquipedem
longus, quatuor & semis digitos latus: *ca-
pite* Carpionis, ore rotundo & edentulo: *cor-
pore* oblongiori, & squamis majusculis. *Pin-
nas* habet septem praeter caudam; nimirum
duas postbranchiales, duas in medio ventre
inferiori, unam post anum, & unam plane
parvulam parallelogrammam huic opposi-
tam in dorso; unam denique in medio dorso,
magis longam quam latam. Totus piscis co-
loris est argentei ut Carpio, & ejusdem sa-
poris. Non capit nisi in dulcibus aquis.

TAREIRA DALTO, id est marinus,
piscis tereti corpore, decem digitos longus
(reperiuntur & majores) quinque crassus,
ubi crassissimus, nam versus posteriora sen-
sum minuitur. *Caput* habet colubrinum, su-
pra oculos in duo tubera elatum: oculos pu-
pilla nigra, circulo flavescente; os acumi-
natum satis amplum, interius flavum denticu-
lis acutissimis munitum, quales & lingua ha-
bet. *Pinnas* obtinet octo, nimirum in quolibet
latere post branchias unam, uno plus digito
longam, trientem latam, directè à latere pro-
tensam: post has interstitio pene sesquidi-
giti in infimo ventre duas junctas figura tra-
pezii, duos digitos longas & totidem fere
latas in extremitate: versus caudam in infi-
mo ventre unam duos digitos longam in cor-
pore extensam, sed plane angustam, supra
hanc in dorso parvula est instar cuspidis cul-
telli: in medio dorso una pene quadrata,
duos digitos lata, plus uno longa: Octava
est cauda vix sesquidigitum longa & furca-
ta. *Pinnae* a. instar foliorum papaveris sunt
tenues

tenues & mollioribus spinis sustentantur. *Squamulis* vestitur peltatis, ita affabrè compositis ut ad tactum glaber videatur. Venter totus albicat: latera & dorsum secundum longitudinem lineas habent alternatim flavas & virides. *Ore* squamularum circumcirca brunneae sunt, & videntur quasi rhombi ordine positi essent brunnis lineis circumscripti, & ac si per unum ordinem tenderet linea, flava, per latera viridis. Pinna in dorso secundum longitudinem strias habet brunneas reliquae flavas. *Cauda* itidem striata brunneo. Caput superius maximam partem brunnum. Piscis aspidus, nam coctus non ita bonus est. Sapore autem multo antecellit Tareira do Rio, qui multas habet spinas.

TAREIRA do Rio, id est fluviatilis, oblongo corpore, dorso recto, ventre paululum protuberante: inferior illius mandibula longior superiori: dentes habet acutissimos & inter eos duos longiores in medio inferioris mandibulae & quatuor tales in superiore: mordet vehementer: *Oculi* satis magni, prominuli, pulchri, pupilla atra, caetera nigri. *Caput* Lucii capiti parum simile. Longus est piscis quindecim aut sedecim digitos. *Pinnas* habet sex: nimirum duas oblongas postquamlibet branchiam unam, duas junctas oblongas in infimo ventre, unam post anum parallelogrammi figura, unam in medio dorso magnam, rectam, parallelogrammam, plus tribus digitis longam, duobus latam. *Cauda* parallelogramma pinna constat, duos & semis digitis longa, sesquidigitum lata, in extremitate circinata. Totus tegitur squamis satis magnis, fuscis in dorso & lateribus, verum in lateribus fuscum argenteo est variegatum, ut ita per fuscum argenteum videatur. *Caput* tegitur dura testa fusca. Venter totus albicat. Pinnae omnes fuscae, sed nigro undulatae transversum ut Nisi cauda: itidem & cauda. Capitur in fluviis. Edulis est, sed multas habet spinas.

CAPUT VIII.

De Paratiapia, Ceixupira, & Piquitinga.

Tab.
xxxij.
Idem.
Hist. l.
4 c. 9.

PARATIPIA piscis est oblongo corpore & satis crasso, interdum tantam magnitudinem acquirit ut quinquaginta libras aequet: *Oris* pars inferior longior superiori. *Denticulos* habet acutos, inordinate positos & tota oris cavitas cum lingua est rubra. *Oculi* prominentes, pupilla crystallina ovali & circulo rubro. Ante utrumque oculum habet foramen. *Branchiae* desinunt in triangularem figuram, & sunt amplae. A summitate dorfi ad caudam usque extenditur pinna, quae ad medietatem anteriorem spinis surrigitur, reliqua medietas est mollis. In inferiori corpore prope anum etiam pinnam mol-

lem habet ob rotundam: in quolibet latere post branchias unam, & duas in infimo ventre junctas, oblongas. *Cauda* fere quadrata est, at in extremitate paulo latior quam in exortu. *Squamis* vestitur parvis. *Dorsum* & infimus venter cinnabarii sunt coloris, latera ex gryseo fuscescunt.

In totum praeterea est maculatus, & in dorso quidem maculas habet majores numero minico, ex gryseo fuscas, in lateribus vero & infimo ventre minores ejusdem coloris. *Pinnae* omnes cinnabarii coloris, in extremis oris lineam albidissimam habentes, adque eam fimbriam latam nigerrimam. Postbranchiales pinnae totaliter cinnabariae sunt sine fimbria nigra aut alba. Dorsalis pinnae medietas anterior tota rubra, reliqua fimbriata albo & nigro ut reliquae. Optimi saporis carnem habet si coquatur.

CEIXUPIRA, acquirit interdum longitudinem novem ac decem pedum, atque crassitiem corporis humani corpore oblongo & capite atque figura corporis. Tuberoni haud absimilis. Quem describo tantum duos pedes erat longus cum semisse. Erat illi *caput* compressum & latum, septem digitos longum & fere quinque latum: *O*s haud inaplum pro mole corporis, parabolicae figurae, edentulum, prominentiis tamen acutissimis confertim repletum: lingua lata: oculi albi haud magni, paulo majores duplo stufero Hollandico, pupilla crystallina. *Branchias* habet satis amplas: *Pinnas* septem, nimirum postquamlibet branchiam unam, directe à latere protensam triangularem, semipedem longam: duos & semis digitos latam, ubi latissima. Interstitio fere sex & semis digitorum ab occipite in medio dorso incipit pinna quatuordecim digitos longa, in initio triangularis, & quatuor digitos alta, hinc sensim minuitur & ad caudam ferme pertingit, ibique triangulo desinit. Huic opposita est ejusdem figurae una in infimo ventre, undecim digitos longa, desinens cum superiore, sed non cum illa incipiens. Infra duas postbranchiales in infimo ventre duas habet junctas, quamlibet tres & semis digitos longam & sesquidigitum latam. Septima pinna est cauda, incipiens duorum digitorum interstitio à fine dorsalis & ventris, bicornis, superius cornu fere octo digitos longum, inferius paulo brevius, nimirum septem digitorum. Pinnae omnes anteriores spinas habent, sed molles. In interstitio inter occiput & dorsalem pinnam, octo osses triangulares aculeos prominentes obtinet, quos recondere in carne & erigere potest, ac pro armis usurpare. Ante quemlibet oculum, intervallo unius digiti foraminulum habet duplex. *Caput* osseum & glabrum. Totum corpus exiguis squamulis vestitur, ita ut totus piscis glaber videatur. Colore totus est niger, excepto tamen ventre, qui albidissimus instar cretae, in lateribus

(inter album & nigrum) paululum canescit nigredo, cætera, ut dictum, nigerrima. *Pinnæ* omnes nigre, exceptis duobus infra post branchiales in infimo ventre quæ albæ sunt, oris nigricantibus. In utroque latere piscis linea quædam profundior reliquis squamulis tendit ad caudam usque ejusdem cum corpore coloris.

Piscis gravis ac pinguis est, ac pro optimo habetur inter omnes in Brasilia, præsertim quando adhuc mediocris est magnitudinis. Capitur in Mari.

PIQUITINGA est duos, aut paulò plus digitos longus, figuræ pene ut *Parabucu* a quo non multum differt ut dicam. *Os* habet parvulum, sed quod ample aperire & rotundare potest: *Oculos* satis magnos, nigros, circulo argenteo: branchias amplas: pinnas sex & septimam pro cauda: nimirum duas postbranchiales, triangulares, inferius positas: duas junctas in medio infimo ventre: unam triangularem in medio dorso, unam post anum: cauda constat pinna furcata. Color capitis argenteus splendens superius olivaceo imbutus. Tegitur squamulis albis, in dorso tamen olivaceus color translucet. *Pinnæ* omnes albæ. Differt à *Piabucu*, quod ille paulò major evadat, & linea illius lata non splendeat, cum reliquum corpus splendeat, quod in hoc contrario se habet. *Piabucu* etiam pinnam habet in dorso prope caudam, qua hic caret. Cæterum caro similis, edulis.

CAPUT IX.

De Camuri, Guaracapema & Miivipera.

Tab.
xxxiiij.
Idem l.
4. c. 10.
& 11.

CAMURI Lusitanis *Robalo*, piscis est duos pedes longus. Lupo nostro figura corporis similis atque etiam ore, crassus plus uno pede, ubi crassissimus: caput sesquipedem pene longum: *os* semilunare, in medio paulum acuminatum, sex digitos longum, sed quod magis dilatare atque rotundare potest, ita ut circumferentia ejus fiat tredecim digitorum: *oculos* habet dupli stufieri magnitudine, pupilla crystallina, circulo aureo: *Pinnas* octo, nimirum duas in dorso, priorem tres digitos longam & paulo plus latam, firmis spinis sustentatam, quam in rimam recondere potest: alteram huic magnitudine parem, sed spinis destitutam, nec habentem quo condatur: duas postbranchiales, paulo plus tribus digitis longas, duas in infimo ventre quatuor digitos longas, duos & semis latas, unam talem post anum; octavam pro cauda, quæ est furcata, quinque digitos longa, sex lata. *Squamæ* habet ut *Carpio*, coloris argentei, splendentes, in dorso autem & lateribus aureus admiscetur. Venter plane albicat: *Pinnæ* sunt aurei coloris, quibus aliquid fusci admixtum est, in quolibet latere superius à fine branchiarum usque ad

medium exortus caudæ, ductam habet lineam crassam, nigram.

GUARACAPEMA mas est Doradæ. Piscis compresso corpore & latus, licet non ita crassus. *Caput* definit in figuram quadratam, estque in fronte ita in aciem eductum, ut facilius fluctus maris natando secare posset. In sex aut septem pedum longitudinem excrescit: latitudo sive altitudo, ubi maxima, nimirum versus anteriora & pone caput, sesquipedalis. *Os* habet haud ita amplum, pro magnitudine corporis, mandibulas compressissimas, denticulos acutos. Paulo supra *os* & quidem versus ejus interiora oculi positi inferiori loco, ne nimirum in aquis imperiose ageret, qui alius linceus. *Oculi* autem sunt magni, rotundi, pupilla crystallina, cæterum argentei coloris. Branchias habet amplas: *Pinnas* septem, nimirum unam insignem à summitate capitis per totum dorsum extensam usque ad caudæ exortum, laram in medio septem aut octo digitos, quæ sensim minuitur, constans membrana ad tactum coriacea, & spinis mollibus interius sustentata: hanc natans in æquore erectam tenet. A medietate infimi ventris ad caudæ initium itidem pinna producit, sed vix unum digitum lata, in exitu triangulata: post utramque branchiam pinnam habet oblongam octo vel novem digitos: sub his in infimo ventre duas propinquas paulo longiores. *Cauda* circiter sesquipedem longa in duo cornua ampla distenditur. Squamulis minimis vestitur totus, quæque ad tactum vix sentiuntur, ita ut glaber videatur. Color in capite, dorso, lateribus ex viridi & argenteo mixtus, uti & in pinnis, in ventre vero albicat. Per totum autem corpus (nimirum latera, dorsum, caput) maculis variegatus cæruleis, variæ magnitudinis, milii, grani hordeacei, ervi. Carnem habet siccam, boni saporis. Velocitate natandi superat porcos marinos, & eodem modo saliendo progreditur. Vescitur pisce longo vulgo *Petumbo* appellato.

MIIVIPIRA & *PIRABEBE* Brasiliensibus, *Peixe volador* Lusitanis. Piscis est volans, vel hirundo piscis: variæ est magnitudinis: major erat *Halece*, quem hic describo, & formæ rarioris. Figuram corporis habet (instar *Xandæ* Pomeranorum) terebrem & posteriora versus acutiorem. Totius longitudo ab ore ad finem caudæ tredecim digitorum; crassities, ubi maxima, nimirum circa exortum alarum, septem fere digitorum, ad exortum a caudæ duorum. *Caput* crassum habet, superius compressum & latum, nimirum superius fere duos digitos & quasi in tubera supra oculos elatum, *os* non ita magnum, edentulum, ac ossa ejus paulum ferrata instar limæ. *Oculi* magni, rotundi, stufiero Hollandico æquales, pupilla nigra, circulo flavo, & exterius altero fusco. *Pinnas* ha-

habet sex cum cauda; duas in dorso, unam parvulam in medio, paulum tamen versus anteriora, alteram post hanc duos digitos longam, sesquidigitum latam, tenuem, at octo spinis sustentam; duas robustas in infimo ventre, subter illa, duos & semis digitos longas, firma spina constantes sed angustas, & unam parvam in inferiore corpore ex opposito majoris in dorso; septima est cauda, duos digitos longa, toridemque lata & furcata. Præterea habet duas alas magnas, in quolibet latere unam, habentes exortum suum sesquidigitum fere post oculos, post branchias paulum; estque alarum longitudo septem digitorum, latitudo in exortu plus uno, in extremitate sex digitorum: constant alæ tenui membrana instar chartæ puræ (Postpapier) ex albo seu cinereo subfusci coloris: habent aliquot plicas & sustentantur spinis tenuibus per longitudinem extensis. Ad utramque alam in initio ejusdem parva quasi ala exit, duos & semis digitos longa, sed planè angusta & sua spina munita. Totum caput cum initio dorli (ab ore nimirum ad quinque digitos numerando) vestitur testa ossæ, dura, quæ versus suum finem dupliciter divisa in duos aculeos desinit quasi spinas. Branchiæ a. ad duos digitos extenduntur in aculeos usque subalis. Totum autem corpus vestitur squamulis elegantibus, ordine dispositis, quæ in ventre triangulares, in lateribus & dorso verius ellipticæ figuræ. In ventre a. ita dispositæ sunt ut piscis ad tactum glaber videatur: at in lateribus & dorso quælibet in sui medio habet tuberculum, ita ut ordine naturæ dispositæ in recta linea, repræsentent lineas rectas, elatas, tuberculatas. In toto ventre albicat, in lateribus & dorso subfuscus, & splendens ut Harengus. Spinæ quæ alas sustinent, & per eas extenduntur etiam albicant. Alæ ipsæ ex cinereo fuscescentis sunt coloris, maculis nigricantibus variegatæ. Volat hic piscis super aquas instar Hirundinis per spatium quantum sclopeto pertingi potest: nimirum usque dum ficefcant alæ, tunc n. iterum aquæ se immittit alas hamectandi gratia & denuo volat. Natura a. huic pisci alas dedit, ut se salvare posset, dum hostis ejus Dorada magna cæterva ipsum persequitur. Sæpiissime mille eorum simul volantes vidi in Oceano Tropicis interjecto: interdum etiam volando incidunt in naves, ut nobis etiam factum memin. Caro boni est saporis cocta. Actum & de Hirundinibus superius, sed quia hujus Icon ab illis diversa, addere & hanc placuit.

CAPUT X.

De Guaibi Coara, Guaperua
& Pyraya.

GUAIBI COARA Brasiliensibus, Bura-
co de Velha Lusitanis; Piscis est corpore

latiusculo; dorso elevato & à capite arcuato duodecim aut quatuordecim digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus. Caput & os acuminatum, satis amplum, habens in utraque maxilla seriem minimorum denticulorum, linguam conspicuam; quæ una cum cavitate inferiori oris, sanguinei est coloris: Oculos stufieri magnitudine crySTALLINOS, circulo coloris ex aureo & fusco mixti. Pinnas obtinet septem, nimirum post branchias in quolibet latere unam, quasi triangularem, mollem: in infimo ventre duas junctas: unam post anum duplici spina munitam: per dorsum a. una extenditur, cujus medietatem anteriorem undecim spinæ erigunt, quam recondere potest in cute, posterior medietas mollis & sine spinis. Cauda constat pinna bicorni, & parallelogrammi figura à corpore extenditur. Squamas habet mediocres, instar Perçæ, argenteas, quæ per oras sunt melini coloris, & aspectu referunt meros cubos: in occipitio & dorso summo squamæ ex argenteo cærulescunt, & per oras itidem sunt melini coloris. Totum a. caput superius & ad latera est aurei coloris, striis cæruleis secundum longitudinem variegatum. Pinnæ omnes melini sunt coloris, exceptis duabus in infimo ventre, quæ magis albescunt: per latus a. utrumque versus dorsum secundum longitudinem tendit linea melini coloris ad caudam usque. Piscis boni saporis coctus: capitur in mari inter scopulos.

GUAPERUA Brasiliensibus, Peixe Porco Lusitanis, Græcis ἀνθρῶπις. Ab ore ad initium caudæ quindecim digitos longus, in medio ubi latissimus, octo latus: corpore paulum compresso ac lato: dorso arcuato, ventre adhuc magis curvo: capite porcino: dentibus caninis, albis, longis; octo in quolibet mandibula, duo medii tam inferius quam superius longiores sunt reliquis: dentes inferioris mandibulæ aliis quasi brevioribus sustentantur. Os subrotundum, angustum: quatuor fere digitorum interstitio ab ore superius sunt oculi, sesquidigitum à se invicem distantes, majores grosso misnico (& ante eos quasi vestigium foraminis) pupilla crySTALLINA, circulo aureo maculato cæruleo. Branchiarum loco rimam habet duos digitos longam, plus uno latam. In dorso tres penè digitos post oculos, duo habet cornua, unum pennam olorinam crassum, tres digitos longum, quod versus posteriora paulum inclinatur, alterum parvum per membranam alteri adnexum, utrumque in rimam recondere potest demissum. Trium & semis digitorum intervallo post hæc pinna est, in initio fermè triangularis, hinc magis magisque angustatur ad caudam fere, quinque digitos longa, initio paulo plus duobus lata: & è regione in infimo ventre talem, initio duos & semis digitos latam, magis magisque arctatam versus caudam.

Cauda quadrata figura à corpore extenditur, & pinnam habet quatuor digitos latam, duos longam, quæ in duo cornua dilatatur, ut totius longitudo sit quatuor digitorum. In medio inferioris corporis parvam habet pinnam & ante eam cornu sesquidigitum longum. *Pinnæ* omnes sustentantur spinis & sunt cærulei coloris, venter albicat. Squamis vestitur elegantibus, in superficie sua punctulis thalassinis cum cæruleo indico umbratis, in dorso magis cæruleis. Ab oris summitate in utrumque latus ad pinnas postbranchiales, semilunari figura, duæ lineæ crassæ cæuleæ, unius digiti intervallo, ducuntur. Comeditur assatus, coctus non valet.

Dedimus hujus & in superioribus descriptionem, sed quæ cum isto non convenit.

PIRAYA & PIRANHA Brasiliensibus: Piscis pedalis longitudinis, lato corpore circiter sex digitos, ubi latissimus: dorso incurvato, capite obtuso ut Dorada. *Oris* hiatus parabolicus, quod exactè claudere potest, habet labia parva quibus dentes tegit; obtinet enim tam superius quam inferius ordinem dentium triangulorum, alborum, acutissimorum, quatuordecim in qualibet mandibula (minores habent duodecim) quibus uno morsu partem carnis ex quacunque parte hominis potest abripere quasi novacula esset abscissa. Si quis ingreditur aquam vel saltem immittat pedem vel manum, statim ab illo lædi potest, ita sitiens est sanguinis & cupiens carnis humanæ, quare caute ab illo cavendum. *Oculos* habet rotundos, parvos, crystallinos, pupilla nigra, & inter illos duo foraminula seu spiracula: branchias amplas, exterius duras & osseas: sex pinnas & septimam pro cauda; duas nimirum postbranchiales paulum elatas à ventre infimo, duos digitos longas, unum latas: in medio infimo ventre duas junctas parvas, vix unum digitum longas & angustas: è regione harum in medio dorso incipit pinna, & ad duorum & semis digitorum longitudinem extenditur versus posterià, paulo plus uno digito lata: duorum autem digitorum interstitio à parvulis in infimo ventre incipit pinna firma, spina antè munita, cætera mollis & maximam partem squamulis recta, & paulo plus duobus & semis digitis longa extenditurque ad exortum caudæ, unum digitum lata: exortus caudæ sesquidigitum longus, ipsa bicornis, & quodlibet cornu in exitu arcuatur. *Squamulis* tegitur: tota summitas capitis dorsum & latera usque eo si linea ducatur à postbranchiali pinna ad medium pinnæ squamosæ, coloris est cinerei diluti cum paucis cæruleo mixti, ac squamula quælibet fimbriam habet ignei & cærulei coloris transplendentis, reliquum laterum seu inferior pars & venter coloris sunt flavi obscuri, ut & capitis inferior pars, ac pinnæ

postbranchiales & omnes infimi ventris.

Pinna dorsalis & cauda coloris est è cinereo cæruleo.

Edulis est, & carnem habet albisimam, paululum siccam & boni saporis. Sapissimè comedi. Hæc species maximè gaudet cæno fluvii fundo.

Pyraxæ alia specus hic reperitur magnitudine & figura plane similis priori, excepto quod parvulam adhuc pinnam habeat squamatam inter dorsalem & caudam, & quod colore differat: nimirum summitas capitis, totum dorsum & laterum superior parseo usque si linea ducatur à pinna postbranchiali ad medium pinnæ squamosæ, coloris sunt aurei cum cinereo mixti, & cæruleo transplendente.

Capitis inferior pars, reliquum laterum & infimus venter insigni colore croceo fulgent, qui aureus persplendet. Ejusdem coloris croceo aurei sunt pinnæ postbranchiales & infimi ventris. Dorsales duæ & cauda cinerei diluti cum paucis cæruleo mixti, ut & dorsum.

Hæc species magis gaudet arenoso fluvii fundo. Edulis est ut prior.

Reperitur & alia *Pyraxæ* species alba, figuræ ut antecedentes, solum caput non ita obtusum, sed os paulum prominere figura conica: color ventris & laterum argenteus: dorsum & caput argentei coloris cum paucis cæruleo transplendente: pinnæ omnes argentei coloris cum gryseo mixti.

Dentes habet parvulos triangulares ordine dispositos, nec ita mordet ut cæteri. Paulò minor quoque est reliquis speciebus, cæterum non minus edulis, quam illæ.

CAPUT XI.

De Amore Guacu & Guacari.

AMORE GUACU Brasiliensibus; in semipedis longitudinem excrescit; corpore oblongo, capite crassiusculo, branchiis amplis, minutissimis in ore denticulis: *Oculi* illi parvi nigri circello aureo. *Pinnas* habet septem: nimirum duas postbranchiales oblongas, quasi triangularis, duas sub his junctas, duas in dorso, anteriorem minorem posteriore; & è regione posterioris unam in infimo ventre. *Cauda* oblongiuscula, parallelogramma, in extremitate circinata. Tegitur squamis pro sua magnitudine majusculis. Piscis in totum ferrei coloris, in ventre tamen paululum è ferreo albicat. Est edulis.

GUACARI. piscis subrotundo seu pyramidalis corpore, pedalis vel paulo majoris longitudinis; octo digitorum crassities, ubi maxima est. *Caput* inferius planum, lateribus ellipsin describit, superius subrotundum.

Tab.
xxxiv.
4.5.
Idem l. 4.
c. 13.

Os parvum rotundum habet subter in plano capitis: loco dentium in utroque latere processus habet quasi setis equinis factos: inferius labium explicatum, lunatum, membrana constans, quæ in lateribus oris in suis extremitatibus in cirrhum definit, triennem digiti longum, qui chirri pro barba serviunt. *Oculi* parvi, rotundi, nummi misnici magnitudine, cinerei fusco maculati, superne positi & inter quemlibet foramen, distans dimidium digiti ab oculo versus interiora. *Branchiæ* angustæ inferius versus & ante quamlibet proxime corpusculum parallelogrammum, semi ferme digiti longum, quod extendere & recondere potest, ita ut reconditum vix videatur. Continet illud corpusculum in extremitate denticulos acutos setaneos, quibus alios pisces pungit. Et post branchias in quolibet latere inferius ad planum, triangularem quasi pinnam, quatuor digitos longam pene, plus uno latam, oblongam, spinâ ossæ in extremitate laterali sustentatam & aliis minoribus secundum longitudinem discurrentibus: spatio autem sesquidigiti versus posteriora directè post has jam descriptas, iterum duas inferius pinnas habet quadratas, in quolibet latere unam, duos & semis digitos longas, duos latas, eodem modo spinis hispidis ossæ sustentatas. Post anum in infimo ventre angusta est pinna, parallelogramma, duos digitos longa. In medio dorso pinna est, quatuor digitos longa, duos longa, spinis hispidis ordine dispositis sustentata, ac antè spinâ dura crassiore suffulta, post hanc prope ortum caudæ superius parva quædam est pinna, membranosa, quæ antè corniculata spinâ fulcitur. *Cauda* constat pinna tres digitos longa inferius, duos superius, bicornis, spinis firmis suffulto. Totum caput testa vestitur dura ad tactum hispida: totum corpus squamis triangularibus, versus anteriora majoribus, ordine positis.

Sunt autem squamæ omnes ad tactum asperæ, quasi exsculptæ, quælibet in sui medio extuberantiam habens: scilicet totum corpus loriatum est, & quælibet pars lorice habet quatuor angulos, & in quolibet existit tuberculum, ita ut in quolibet latere sit quadruplex ordo tuberculorum. *Color* totius piscis croceus dilutus, in ventre saturior, ac per totum maculatur maculis rotundis, magnitudine seminis sinapi, fuscis. Maculæ hæc in lateribus & pinnis paulo sunt majores, in capite minores, ac in summitate capitis maculæ ruunt quasi rivuli. Posterior medietas ventris nullas habet maculas. *Pinnæ* omnes ut corpus coloratæ & maculatæ, excepta pinnula prope caudam, quæ constat membranula nigra, corniculata autem illius spinâ crocea est & maculata ut reliquæ.

Diu vivit extra aquam, ad quinque horas. Editur defracta lorica, sed paucam habet

carnem: intestina longissima, æqualis omnia crassitie, instar crassioris fili quo vela consunt. Habebat unus piscis quindecim digitos longus, intestina viginti octo pedes longa, quæ dimensus sum.

Reperitur & hic *Guacari*, magnitudine & figura plane similis priori, qui in flumine S. Francisci capitur, solo colore differens & bonitate carnis: est enim totus umbræ coloris obscuri, & per totum maculis adpersus ob rotundis, nigris, seminis sinapi magnitudine. Caro hujus boni est saporis.

CAPUT XII.

De *Piraumbu*, *Acaraja* &

Acara.

PIRAUMBU Brasiliensibus; *Chayque rãrona* Lusitan. Piscis Carpionis magnitudine & figura, decem digitos longus ab ore ad initium caudæ, paulo plus quatuor digitos latus, ubi latissimus: versus caudam angustior & æqualis latitudinis, duorum nimirum digitorum. *Os* habet instar Carpionis, oculos magnos prominentes, pupilla crystallina, circulo aureo cum albo mixto. *Pinnas* obtinet octo, nimirum unam in medio dorso, paulo plus tribus digitis longam & unam latam, quam in rimam recondere potest, & erectum novem firmis spinis sustentare: huic contigua est alia tres fere digitos longa, minus uno lata nullis innixa spinis: post utramque branchiam unam habet tres digitos longam, unam latam in exortu: in infimo ventre duas junctas, duos digitos longas, vix unum latas, firma spinâ munitas; post anum unam, digitum latam, dimidium longam, iidem firma spinâ sustentatam: octava est pro cauda, tres digitos longa, totidem lata & furcata. Squamas habet majores, instar Carpionis, argentei splendentis coloris, pauxilo aureo mixti: quælibet autem squama mediam partem usque ab insertionem suam coloris est *feulimort*: sub capite & ventris priore parte magis argenteus est: Omnes pinnae dilutè cinerei sunt coloris. In ore superius & inferius lapidem habet, denticulis minimis præditum, vix sensibilibus.

Edulis est ac boni saporis.

ACARAJA vulgo corrupte *Garanhã*: Piscis qui trium pedum longitudinem adipiscitur, figura Carpionis. *Dentes* in inferiori mandibula habet acutos, instar acicularum: in superiori duos longos paulo crassiores, quibus interjacent minutissimi vix sensibiles. *Oculi* ipsi magni sunt, pupilla crystallina, circulo sanguineo primum, hinc argenteo. *Pinnam* longam habet per dorso longitudinem expansam, cujus mediam partem versus anteriora spinis surrigere, & in rimam recondere potest: reliquas quinque pinnas communes habet cum aliis piscibus: septi-

Tab.
xxxiv.
6 7 8.
Marcgr.
Hist. Bra-
sil. lib. 4.
c. 14.

nam pro cauda, quæ lata & penè bicornis est. *Squamis* vestitur argenteis, mediocris magnitudinis, quæ sanguineo colore umbratæ sunt, ita ut maximam partem sanguineus videatur, argenteo colore transplendente; in ventre totus est albus, ut & sub faucibus. Pinnae omnes sanguinei coloris, exceptis iis quæ sunt in infimo ventre, quæ albæ sunt, in extremitatibus tamen sanguineæ.

Edulis est piscis. Sale etiam conditur & servatur.

A C A R A piscis palmum longus, dorso curvo, & alto corpore ut Perca. *Os* habet angustum, & dentium loco limam. *Oculos* habet magnos, nigros, circulo aureo. *Pinnas* obtinet sex, nimirum sub qualibet branchia unam longam, triangulum acutum referentem: à summitate autem dorsi pinna extenditur, firmis spinis sustentata & in triangulum acutum prope caudæ exortum desinens. *Cauda* oblonga est, parallelogramma, in extremitate recta. Vestitur squamis satis magnis, argentei coloris, sed in capite, dorso & lateribus ita umbra mixtis, ut fuscus videatur. Venter albicat. Pinnae omnes & cauda fusci sunt coloris ex umbra. In medio quolibet latere magnam habet maculam nigram, ut & prope exortum caudæ.

Edulis est piscis, & capitur in dulcibus aquis.

C A P U T XIII.

De Guarú-Guarú, Cucupú-Guacú, & Maturaque.

Tab.
xxxiv. 9
10. 11.
Idem l. 4.
c. 14.

G U A R U - G U A R U pisciculus est minutus, nunquam major sesquidigito, exili corpore, oblongo, instar minimi *Eleotris*. Caput habet compressum: ocellos nigerimos, circulo aureo: pinnulas quinque, nimirum duas postbranchiales, & duas subtus ferè in infimo ventre, & unam in posteriore medietate dorsi. *Cauda* constat pinna parallelogramma, in extremitate circinata. Vestitur squamulis, & totum caput superius, & dorsi anterior medietas sunt fusci coloris, posterior & latera aurei, squamulis umbratis umbra: caput inferius & venter albi splendentis ut mater perlarum, pinnulae flavæ. Prope caudam utrimque maculam habet nigram.

Edulis est & capitur in lacubus & stagnis.

CUCUPU-GUACH Brasiliensibus, Lusitanis *Meros*, Belgis *Jacob Everssen*: ingens sit piscis: habui, inquit Maregravius, quorum corpus cum capite quinque pedes erat longum & cum cauda sex. Corporis ambitus quatuor pedum, octo digitorum, altitudo unius & semis. *Caput* & *Os* magnum habet, quod apertum in rotundum dilatat, e-

dentulum: oculos mediocres, pupilla crystallina nigricante, circulo flavo: *Branchias* in ambitu rotundas, medio autem in triangulum desinentes: *Pinnas* quinque, nimirum unam à summitate dorsi incipientem & non ita longe à cauda desinentem, ad anteriorem partem seu medietatem plane angustam & acutis spinis munitam, posterior autem medietas lata est, & semilunata in ambitu, spinisque haud firmis erigitur: prope anum unam ejusdem figuræ, cum medietate posteriore dorsalis, sed dimidio minorem: Post branchias prope infimum ventrem duas longas & latas, tenuioribus spinis intertextas. *Cauda* magnam pinnam habet quadratam, in extremitate latiore, quam in exortu. *Squamas* habet parvas. Totum caput, dorsum ac latera cinerei sunt coloris cum umbra mixti, & versus dorsum paulo saturatioris. *Venter* albicat. Pinnae omnes cum cauda dilute brunneæ. Per totum caput, dorsum, latera & pinnas postbranchiales maculae parvæ nigrae, seu puncta frequentissima dispersa. Venter verò & reliquæ pinnae cum cauda his punctis carent. Bonam habet carnem. Capitur in mari.

M A T U R A Q U E piscis est corpore oblongo, & fermè parallelogrammo, figura scilicet *Tamotæ*. Quinque aut sex digitos longus, sesquidigitum latus ubi latissimus. *Caput* habet latiusculum, dura testa tectum. Oris pars inferior paulò longior superiori: & in inferiori sex denticulos acutissimos habet, in superiori aliquot minimos: Branchias satis amplas: oculos rotundos, nigros, circello aureolo, exterius fusco: Pinnas sex, nimirum duas postbranchiales oblongas, haud latas: duas tales in medio infimi ventris, & unam post anum trapezii figura, & similem in medio dorso. *Cauda* constat pinna quadrata, unum ferè digitum longa, in extremitate circinata. Tegitur magnis squamis ordine positis. Totum caput superius, dorsum & latera nigra sunt, venter ex albo obscurè canescit. Pinnae omnes nigrae.

Capitur solum in lacubus & paludibus, non in fluviis. Boni saporis est.

C A P U T XIV.

De Carapo, Piaba, Piabucu, & Nhaquunda.

C A R A P O prima species, corpore oblongo figura cultri, dorsum nimirum crassum & obtusum, venter acutus ut culter: posterior autem corpus desinit in acumen: unum pedem circiter longus, duos digitos latus, ubi latissimus. *Caput* acuminatum, sed compressum, inferius labium paulo longius superiori, os angustum, inferius ordinem denticulorum minorum, superius nullos habet.

Tab.
xxxiv.
12. 13.
Mareg. l.
4. c. 15.

habet. *Oculi* minimi, nigri, vix grani papaveris magnitudine. *Branchiæ* angustæ, & post quamlibet parvula pinna oblonga. Unius ferè digiti intervallo à capite in infimo corpore incipit pinna tenuis, angusta, & per totum ventrem aequaliter porrigitur ad finem corporis: nam caudam nullam habet, nec ullam aliam pinnam in toto corpore. Squamas habet mediocres. Totus piscis est coloris ex fusco & paucò rubro mixti, ac in dorso & capite magis nigrescit. A branchiis in quolibet latere linea tendit ad finem corporis usque, quasi cultri acie tracta, & sub hac linea macula nigra per corpus dispersa, seminis sinapi magnitudine.

Capitur in lacubus, & est edulis.

In flumine S. Francisci capiuntur Carapo huic priori speciei similes, excepto quod longiores sint, & in extremitate acuminati instar subulæ, ad trium digitorum longitudinem, squamulas parvas habent.

CARAPO secunda species, priori figura, colore & lineis lateralibus similis, excepto quod dimidiæ tantum sit latitudinis, nec ullas maculas habeat. Capitur in lacubus. Caro spinosa, sed boni saporis.

PIABA magnitudine *Phoxini*. pisciculus duos aut tres digitos longus (interdum quatuor aut quinque quando maximus) ocellos habet nigros, circello aureo. Squamulis vestitur. In medio dorso pinnula erecta triangularis: post quamlibet branchiam unam habet oblongam, duas in medio infimo ventre & post has unam, quæ ad caudæ exortum protenditur: cauda est furcata. *Caput* ad latera auro & argento splendet: totum dorsum argenteo viridi & multo Indico: medium laterum secundum longitudinem argenteo & Indico mixtum: *Venter* aureo & argenteo & paucò Indico. Post quamlibet branchiam maculam habet rotundam, satis magnam Indici coloris, & statim post hanc ejusdem coloris maculam lunæ corniculatæ figura, ejusdem coloris oblongam in quolibet latere ad caudæ exortum. *Pinnæ* omnes & cauda aurei coloris, quæ in infimo ventre rubræ. Capitur in omnibus fluviis currentibus Brasiliæ, ac summa vi contra aquæ cursum nititur.

Brasiliiani involvunt foliis arborum, & cineribus condunt, desuper ignem imponentes; sic præparatos comedunt: Saporis sunt haud contemnendi.

PIABUCU pisciculus sex digitos longus, sesquidigitum latus, ubi latissimus; ventre paululum exuberante, oculis elegantibus, pupilla crystallina, circulo argenteo, cui superius parum rubri admixtum. Septem habet pinnas, octavam pro cauda furcatam: nimirum post branchiales duas in infimo ventre, unam in medio dorso, circa anum unam longam extensam versus caudam; & è regione hujus in dorso parvulam. Tegitur squamulis argenteis splendentibus. Per me-

dium laterum secundum longitudinem tendit linea alba lata, non splendens. Dorsum autem ad hanc lineam olivacei est coloris, cui viridis hyacinthinus persplendet. *Pinnæ* albæ.

Capiuntur facillimè aciculis, vel corbe, aut olla immissa in aquam, cui parum farinæ de mandioca, aut mica panis intrita. Cocti comeduntur & frixi. Si quis vel leviter vulnerato uno aut altero membro, vel ulcusculum tenens aquam ingrediatur, statim hic piscis vulnus petit mordendo, ita sitiens est sanguinis humani.

NHAQUUNDA: Mas & scemina reperiuntur. Mas corpore est oblongo, ferè ubique æquali, septem, octo, aut decem digitos longus, duos altus, ubi altissimus: *Caput* & os ferè *Lucii* habet, superius labium extendere, & oris hiatum rotundare potest: Dentium loco habet limas, linguam tenuem, branchias amplas, oculos conspicuos, pupilla nigra, circulo fusco: septem pinnas, post quamlibet branchiam unam, duos ferè digitos longam: sub his in infimo ventre duas junctas, & post anum unam penè quadratam. Ab initio ferè dorsi una propenditur penè ad caudæ exortum, tres digitos longa, unum ferme lata, æqualis, mollihus spinis suffulta, quæ in fine paulo latior, & in triangulum desinit. *Cauda* testa dura tegitur nigra. Totum corpus squamis mediocris magnitudinis vestitur, ac totum dorsum & latera obscuri grysei sunt coloris cum argenteo transplendente. Venter albus. In utroque latere unum ordinem habet macularum, rotundarum, nigrarum, pisi magnitudine, & inter has dispersa punctula multa cærulea. *Pinnæ* omnes aureæ, ut & cauda: & pinna dorsi insuper variegatur per totum punctulis cæruleis. In utroque latere per ordinem macularum nigra tendit linea, incipiens à fine superiore branchiarum, & ad regionem finis pinnæ dorsalis desinens, & semidigiti ferè interstitio sub hujus fine, alia linea incipit, ac in medio exortus caudæ desinit. *Linæ* hæc elatæ sunt ac aureæ.

Capitur in fluviis, ac boni est saporis.

Scemina mari per omnia similis, excepto quod punctulis cæruleis in lateribus & pinna dorsali destituatur, & quod venter circa anum rubescit. Comeditur ut mas.

CAPUT XV.

De Amore Pixuma, Amore Tinga,
Guara Tereba, Piracoba
& Corocoro.

AMORE PIXUMA Brasiliensibus, vulgo corrupte *Amorea* piscis magnitudine *Tamontæ*, capite lato, ore amplo, & edentulo, corpore oblongo, ita ut fere *Tamontam* referat. Coloris est obscure ferrei, in ventre, qui

Tab.
XXXV.
2. 4. 5. 6.
Mureg.
Hist. Bra-
sil. l. 4.
c. 17.

qui exuberat, albi. Tegitur cute molli: pinnas habet septem & octavam pro cauda in ambitu circinatam. Carne est sicca & bona, ut *Tamoata*.

AMORE TINGA Brasiliensibus, piscis est ejusdem plane figuræ cum *Amors Guacu*, sed tantum minor: habetque squamas in totum albicantis, seu pallidi coloris, & in totum maculatur maculis fuscis, ut *Tajassica*. Cauda tamen illius est fusco undata. Edulis est ut præcedentes.

Guara Tebera. Piscis magnitudine septem aut octo digitorum: capite obtuso, oculis crystallinis, circulo aureo: os denticulos habet minimos: Branchias amplas: dorsum incurvatum, unde & *Corcovado* minor potest appellari. Pinna obtinet septem: post quamlibet branchiam, unam longam: sub his duas junctas in infimo ventre: in medio autem ventre duas spinulas acutas, quæ membranula conjunguntur, & post has triangularem, quæ deinceps angustata ad exortum caudæ extenditur: in summitate dorsi triangularem mediocrem, & post illam aliam similem majorem, quæ angustata ad exordium caudæ porrigitur. Cauda in duo cornua extenditur. A branchiis linea tendit ad medium piscis, quæ dein obliquè deorsum vergit, & directè usque ad caudam porrigitur: hæc posterior lineæ medietas hamulis posterius versis armatur, & utroque latere triangularibus vestitur squamulis, quæ minimæ sunt, ut ad tactum glaber videatur. Coloris est in dorso & lateribus usque ad medietatem longitudinis ex hyalino cærulescentis: reliquum laterum & venter albicat, sed aureus color transsplendet. Pinnae ventris albæ, reliquæ cum cauda aurei sunt coloris.

Edulis est piscis.

Piracoaba piscis pedalem longitudinem adipiscitur, corpore oblongo, ut *Zandat Pomeranorum*. Os habet acuminatum, amplum, edentulum; mandibulam superiorem longiorem inferiore, & superior pars oris prominet in rotundum conum cartilagine constantem: Oculi illi satis ampli, pupilla crystallina. circulo aureo. Pinnae habet octo: nimirum duas in dorso triangulares erectas, interstitio sesquidigiti: post quamlibet branchiam unam longam, angustam; duas his breviores in infimo ventre junctas, & prope anum unam triangulatam; octava est cauda furcata. Sub qualibet pinna postbranchiali barbam habet sex pilis crassiusculis constantem, tres digitos ferè longis, estque ejus exortus propè exortum pinnarum, vergens retrorsum. Totus vestitur squamis mediocris magnitudinis argentei coloris, & in dorso ac summitate capitis paulum canescit. Pinnae quoque omnes cani, seu cinerei sunt coloris: postbranchiales tamen nigredine dilutæ sunt. Barba alba. Capitur arenosis locis in mari. Boni est saporis.

COROCORO piscis dorso incurvato, capite & ore obtuso: pedalis longitudinis. Denticulos habet parvos, haud acutos: branchias satis amplas, quarum anterior pars in spinam definit acutam: sex pinnae: nimirum in quolibet latere post branchias unam tres digitos longam, subtus in infimo corpore duas triangulares ferè, sed in extremitate circinatas & antè firmæ & acuta spina suffultas, post anum una crassa, dura & acuta spina nixam, cui parvula spina antistat. A summitate dorsi pinna incipit, quæ arcuatim ad medium dorsum tendit, firmis ac acutis spinis sustentata, hinc definit & contigua illi est mollis, quæ & arcuata fere est, & penè ad exortum caudæ protenditur. Cauda duos digitos longa, quatuor lata. Squamis majusculis vestitur totus argentei coloris, sed in toto dorso, & ejus summitate diluta umbra mixtis & per latera transversim (non tamen ad ventrem usque) in quolibet octo striæ, digitum latum crassæ, ex diluta umbra descendunt: venter totus albus, ut & illius pinnae. Pinna dorsalis, post branchiales & cauda ex argenteo & diluta umbra mixta. Pinnam autem anteriorem dorsalem in rimam potest recondere. Capitur in mari, & est edulis.

CAPUT XVI.

De Guatucusa, Uribaco & Guatucusa.

GUATUCUSA Brasiliensibus, *Balabolla* Tab. XXXV. Congensibus, *Corvina* Lusitanis. Piscis 7. 8. 9. corpore oblongo, dorso paulum, ventre minimum curvo: longitudinem duorum pedum non raro adipiscitur. Os habet acuminatum, cujus inferior pars paulo longior superiore, quodque ample potest diducere; dentes minimos, linguam conspicuam, branchias amplas; oculos stuferi magnitudine, pupilla nigra, circulo argenteo. Pinnae obtinet septem; post quamlibet branchiam unam oblongam; duas sub his in infimo ventre paululum versus posticam partem, unam post anum triangularem, unam triangularem ac latam in summitate dorsi, duriusculis spinis suffultam, & huic fere contiguam alteram in posteriore parte dorsi oblongam, quæ æqualis fere latitudinis, atque ad exortum penè caudæ protenditur. Cauda constat pinna fere quadrata & lata. Parvulis rotundis squamis totus vestitur, coloris per totum argentei splendentis, cui tamen in dorso aureus transsplendet, & ad tactum videtur lævis. Pinnae & Cauda, ut & venter albicant. A summitate autem branchiarum per medium latus ad caudæ exortum tendit linea argentei coloris. Capitur in mari, ac optimi est saporis.

URIBACO piscis dorso incurvato, ventre protuberante, quindecim aut sedecim digitos

gitos longus, quinque, aut sex altus, ubi altissimus. *Caput* & *os* obtusum, conum referens triangularem: dentes parvuli, acuti, lingua lata: branchiæ amplæ in triangulum definientes: Oculi dupli stufere magnitudine: pupilla crystallina, circulo argenteo, cui aliquid cinnabarii mixtum est. *Pinnas* habet sex, nimirum post quamlibet branchiam, unam longam triangulum acutum referentem, sed exterius paulum circinatam: sub his in infimo ventre duas triangulares, antè firmam spinam munitas: post anum unam oblongam, in exteriori ambitu circinatam, molliusculis spinis per medium suffultam, antè autem dura & acuta spina: à summitate autem dorfi ad exortum fere caudæ pinna latiuscula, latitudinis fere ubique æqualis, & acutis spinis sustentata. *Cauda* itidem lata in duo veluti cornua distenditur. *Vestitur* squamis magnis, in totum argentei coloris, sed cui parum cinnabarii transluet. *Pinnæ* laterales, & infimi ventris albæ seu argenteæ, dorsalis & cauda plus cinnabarii, quam argentei habent. A summitate denique branchiarum ad caudam usque (paulum arcuatim) tendit linea rubra, & supra eam in posteriore parte corporis, in utroque latere, maculam habet nigram. magnitudine grossi misnici. *Capitur* in mari. *Edulem* habet carnem & bonam.

Guarervæ, piscis corpore lato, compressoque quatuor digitos longo, tres lato, ubi altissimus, ore patulo, denticulis minutis. *Pinnas* habet sex, nimirum postbranchiales duas, parallelogrammi figura; duas oblongas & latas in superiori dorso, & infimo ventre posteriori, quæ in acumen definunt, figura subule. *Cauda* quadrata, seu potius parallelogramma, unum digitum longa & duas tertias partes digiti lata. Squamulis tegitur nigri coloris splendentis instar bombycini, quarum oræ (quarundam tantum, non omnium) fimbrias habent flavas instar semilunularum. *Pinnæ* omnes nigre. Circa os linea crassa est ferrei coloris, & alia illi perpendiculariter superposita. Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latas & posticas pinnas extenduntur; (caudam etiam talis linea secatur, & ejusdem coloris) una pro fimbria ipsi est. Oculorum pupilla nigra, circulus aureus.

CAPUT XVII.

De Camaripuguacu, Piratia pua, Curema, Parati, & Aramaca.

Tab. XXXV. 10. Marcg. Hist. Brasil. l. 4. c. 18.

Camaripuguacu piscis dorso recto, ventre paululum extuberante; pinguis ad tactum & revera. *Caput* habet antè acuminatum, *os* amplum, edentulum, quod in rotundum diducere potest, nimirum supe-

riore mandibula, inferiori immota permanente, ita ut duos pugnos humanos juxta se, vel etiam humanum caput possit admittere. *Linguam* habet conicam, crassam, superior autem mandibula brevior est inferiori, ita ut clausum os superius habeat: *Oculos* latiores Imperiali, rotundos, crystallinos, & argenteos, branchias amplissimas. Longitudinem adipiscitur undecim aut duodecim pedum, crassitiem viri. *Pinnas* obtinet septem; duas haud procul distitas à branchiis, in lateribus proximè ventrem anteriorem, longas, triangulares; culibet autem harum parvula subest, quæ tamen natando vix videri potest: in medio inferiore ventre itidem duas conjunctas, triangulares, latiores prioribus, sed breviores: has versus posticam partem corporis inferioris sequitur alia solitaria pinna, triangularis, lata, squamata, quæ appendice continua, angusta, protenditur ad caudæ ferè exortum: in dorfi altera medietate versus posteriora, pinna est elata triangularis, lata, quæ appendicem habet versus posticam partem vergentem, elevatam, triplo longiorem, instar funis crassioris. Septima pinna est pro cauda, quæ secta est, & in amplam extenditur furcam. Squamis vestitur magnis, obrotundis seu peltatis, majoribus Imperiali, in dorso tamen minoribus materia squamarum alba, pellucida instar matris perlarum; sunt autem arctè sibi impositæ squamæ, ita ut quadruplices aut quintuplices jaceant, ac de qualibet ante aliam prominet pars figura lunæ bisectæ, quæ argenteo obducta est (revera repræsentat argentum) & rivulos hinc inde discurrentes monstrat argenteos in argenteo campo; ita totus piscis argento obductus videtur, præterquam in dorso ubi caruleus est, argento tamen translucente. *Pinnæ* omnes argenteæ, præter dorsalem, quæ eundem colorum habet cum dorso. Carnem habet lentam, quæ diu coqui debet, multæ in carne spinæ, sed satis crassæ, ut faciliè inter edendum extrahi possint. Magis aspectu quam esu piscis delector.

Comedi sæpius ejus carnem, sed lenta est, & tantum famelico conveniens. Os superius ossa habet duritie æqualia ossibus alicujus animalis.

Piratia Pua ingentem adipiscitur magnitudinem, ut *Capuripima*. Inferior mandibula paulo longior superiori: dentes acuti in tota mandibula inferiori, in superiori solum in medio, qui longiores, quemadmodum & medium in inferiori: *Os* ampliare amplissimè potest in rotundum foramen. *Oculos* obtinet non ita longos pro corporis mole, pupilla crystallina. Branchias amplas, duras seu armatas. Corpore a. est oblongo, dorso paulum incurvato versus caput, & ventre mediocriter amplo. *Pinnas* habet septem: Unam à summitate dorfi (incipientem versus

capitis ferè exortum) ad caudæ usque initium protensam, quoad medietatem anteriorem spinis suffultam, quoad posteriorem mollem sine spinis, in medio a. sui angustior, antèrius latior, postèrius adhuc magis latam & quasi circinatam in extremitate. In quolibet latere post branchias, unam latam, & in extremitate circinatam, cætera quasi quadratam: sub his in infimo ventre duæ propinquæ sunt oblongæ, haud latæ, firmis spinis nixæ: prope anum unam habet satis amplam, itidem circinata fimbria postèrius, uti ea quæ in dorso. Corpus postèrius quadratè extenditur, & continet septimam pinnam pro cauda, quæ ampla est, & figuræ penè quadratæ. Squamulis vestitur parvulis, ita ut ad tactum glaber videatur, etiam si antrosum mulceatur. Coloris est per totum corpus ex obscuro aureo epatici, qui tamen obscurior in dorso & summo capite huic a. coloris lituræ obtenduntur. Pinnæ omnes ejusdem cum corpore coloris, laterales a. præterea fimbrias habent aureas: reliquæ epaticas. Carne satis probata est, si junior sit, nimirum sex, septem aut octo pondo, & assatus magis quam coctus, nam pinguis est: adultior verò ducentorum aut plurium pondo carnem habet pro bajulis, nec delicatior carne *Camarupim asu*, nimirum lentam, tenacem, ac difficilis coctionis. Capiuntur in mari.

Curema species *Tainha* grandis & crassa. Piscis marinus, in duorum pedum longitudinem excrecens, corpore oblongo, ferè cylindræo, more Trutæ fluviatilis, crasso & præpingui. Caput in conum obtusum desinit. superius compressum & latum, durum, squamis duris tectum. Os pro mole corporis parvum, parabolicum, labio superiori conspicuo, mobili. inferius a. os triangulare, obtusum discumbit, & paulo brevius est superiori, edentulum. Oculi magni, rotundi, antèrius positi, nigri, circulo argenteo. Duo narium foramina supra os. Branchiæ semilunares, haud amplæ. Pinnas habet septem (octavam pro cauda, quæ in duo cornua desinit) nimirum duas postbranchiales, triangulatas duas, magis versus postèriora in infimo ventre, junctas: in summo dorso parvam, tribus suffultam duriusculis spinis: post anum unam bicornem. & illi oppositum in dorso ejusdem fere magnitudinis. Tegitur squamis magnis clypeatis, planis: color totius piscis in summitate capitis, dorso & medietate laterum obscure cinereus, cui hyalius transplendet: reliquum laterum, venter & caput inferius argentei splendentis coloris, uti & pinnæ ventris, reliquæ pinnæ cum cauda ejusdem cum dorso coloris. Præpinguis est & coctus vel assatus sine oleo vel butyro comedi potest. Salitus & in sole siccatus asservatur magna copia. Salitus quoque & in muria servatur. Optima illius pars venter.

Parati Lusitanis Tainha, piscis est in longitudinem pedis excrecens, figura corporis ut *Curema*, cui per omnia similis est excepta magnitudine, & quod circulum aureum habeat circea oculos. Carne est sicciori, & quæ inter coquendum pinguedinem flavam de se fundit. Magna copia saliti in sole exsiccantur & reconduntur. Capiuntur retibus, ut & *Curema*, transiliunt a. retia eleganti spectaculo, quando illud trahitur: quando malacia est magno numero ex aquis exsiliunt.

Aramata Lusitanis Lingoda & vulgo *Cubricuncha*, soleæ est species compresso corpore, & figuram habens soleæ quam Belgæ vocant *Tongt*. Os denticulis acutis proditum: caret lingua: Oculos habet duos in uno latere (ubi lapidei est coloris) in altero nullum. pisi magnitudine, unum prope latus postèrius oris, alterum superius & magis versus postèriora vergentem. pupilla lunata, crystallina, hyalino colore transplendente. Branchiæ satis ample, in quolibet a. latere post branchias est pinna una, duos digitos longa, angusta, superius in pilum tenuem desinens, ad branchiarum finem in infimo corpore sunt duæ parvæ pinnæ junctæ. Per totum a. corpus tam superius, quam inferius secundum longitudinem habet pinnam usque ad caudam extensam, tenuem, vix semidigitum latam, cauda ferè quadrata constat pinna tenui. Vestitur squamulis parvulis, & in toto sinistro latere, ubi oculos habet, lapidei est coloris, in latere dextro albi, vivit in mari inter arenas. Edulis est & boni saporis.

Tab.
xxxvj. 1.
2.

TITULUS II.

De Piscibus Exoticis Lævibus.

CAPUT I.

De Piscibus in totum lævibus.

ARTICULUS I.

De Guamajacu, Ape & Petimbuaba.

Pisces Exotici læves sunt in duplici differentia: Vel enim sunt in totum læves, vel cum aliqua lævitate spinosi. Ex istis sunt quos hic describemus.

Tab.
xxxvj.
3. 4.
Marcgr.
1. 4. c. 1.

GUAMAJACU APE Piscis triangularis, duplex est, unus cornutus, alter sine cornibus. Cornutus ab ore ad initium caudæ septem digitos est longus, (interdum & longior) à ventre ad dorfi summitatem tres digitos latus seu altus: venter vix duos digitos latitudine complet: cauda unum digitum lata, desinens in pinnam duos digitos longam & totidem latam. Os ipsi parvulum, & pisi tantum capax: habens in superiori mandibula duodecim denticulos angustos, acutos, in inferiori quinque. Caput ab ore ad cornua usque in gibbum

gibbum affurgit, convexitate sesquidigiti; dorsum autem ad eundem modum in gibbum arcuatur: & unicum tantum habet pinnam in postica parte versus caudam, & quidem exilem. *Oculos* habet satis amplos, diametro trientis, supernè in capite in fronte positos prope cornua, ab ore circiter sesquidigiti intervallo; & ante singulos oculos foraminulum unum. *Pinnas* in universum obtinet quinque unam in extremo dorso, ut jam dixi, & in quolibet latere unam, longè infra oculos versus posticam corporis partem paulum vergentes, unum digitum longas: & prope utramque rimam, unam plus semidigito longam, branchiarum loco unam denique pinnam inferius in ventris extremitate prope exortum caudæ, unum pene digitum longam, dimidium latam: quinta facit caudam. *Cornua* duo directè ante se protensa in fronte gerit prope oculos, magnitudine calcaris galli gallinacei, duo itidem æqualis magnitudinis in infimo ventre versus quartam pinnam. Caret squamis, sed tegitur densa cute, in ventre quidem alba, reliquo a corpore fusca, atque in ventre & lateribus usque ad altitudinem oculorum figuris trigonis, tetragonis, pentagonis, sexagonisque mirè distincta & notata. Ubique a. (excepto infimo ventre) eadem cutis variis maculis nigricantibus est insignita. De altera specie superius egimus.

Idem
H. B.
l. 4. c. 4.

Petimbuba piscis tres aut quatuor pedes longus: corpore instar Anguillæ. *Os* edentulum acuminatum, superiori mandibula breviori quam sit inferior: estque longitudo oris sesquidigiti, amplitudo, ubi maxima, vix unius. *Caput* novem digitos longum est ab oculis ad oris extremum, crassities ejus post oculos quinque digitorum, hinc paulatim minuitur, ita ut prope os sit trium tantum digitorum. In summa a. longitudo capitis à fine branchiarum ad oris extremum est unius pedis & unius digiti. *Oculos* habet satis magnos, magnitudine nucis avellanæ & pene figura, pupilla splendida cærulescente, quam tunica ambit argentea, in parte anteriori & posteriori macula miniata notata. Post branchias in utroque latere, pinna directè protenditur à latere sesquidigitum lata & longa rufescentis coloris: hinc sex & semis digitorum intervallo versus posticam corporis partem, duæ pinnae parvæ rufescunt in quolibet latere una, sed magis versus ventrem.

Post has pedis intervallo sequitur pinna rufescens duos digitos longa, sesquidigitum lata: sub hac autem ejusdem magnitudinis & coloris una in infimo ventre: demum à fine harum intervallo ferè quinque digitorum, sunt adhuc duæ pinnae rufescentes paulo minores superioribus, una sursum, altera deorsum elata, & inter has ortum sumit cauda instar murenæ tenuis, teres, sex digitos longa. Corporis a. longitudo à fine branchia-

rum ad caudæ initum est duorum pedum & trium digitorum. Cute est instar Anguillæ glabra, coloris in toto corpore & lateribus ab ore ad caudam, hepatici, in dorso triplici, in lateribus unica serie macularum cærulearum magnitudine nummi Mifnici ferè: hæc macula à medio corporis in lateribus ad caudam usque in lineas coeunt: inter omnes a. maculas cæruleas ordine intercedunt maculae virescetes. In inferiori corpore tam sub capite quam ventre albescit, & videtur aliqua rubedo inspersa. Corpus a. universum non exactè teres est, sed compressum & latiusculum, ventris non latitudo prope secundum par pinnarum, ubi latissimus, duorum digitorum, crassities ibidem totius corporis sex digitorum. Hinc paulatim attenuatur, donec prope exortum caudæ sit sesquidigitum paulo plus aut minus crassum. Edulis est piscis. Potest *Acus* piscis vocari. Iconum quas supra dedimus, nulla cum hac convenit, nisi fortè *Acus* minor Bellonii.

ARTICULUS II.

De *Nhambdia* & *Guaperua*.

NHAMBEDIA Brasiliensibus, *Bagre do Rio* Lusitanis, piscis corpore oblongo, obeso, ventre molli, versus posteriora angustiori. *Capite* compresso, & ore parabolice figuræ, & denticulis minimis prædito. Est autem corpus duodecim aut quatuordecim digitos longum, duos & semis altum, ubi altissimum. *Oculi* parvuli, paululum protuberantes, rotundi, pupilla nigra, circulo ex auro & umbra mixto. Branchiæ satis, amplæ, & barba sex filis constans, duobus supra & quatuor infra os: Eorum quæ supra os versus latus stant quodlibet crassitiem habet filii, quo literæ obliquantur, quinque digitos longum, & post cujusque exortum fovea est oblonga, in quam barbæ initium incumbit, vertendo illam posticam parte, ut semper facit: quatuor inferiorum quodlibet exterius duos & semis digitos longum, interius sesquidigitum, suntque inferiora fila barbæ non ita crassæ ut superiora. *Pinnas* habet septem, & octava est pro cauda: nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam, firmissima & acuta spina munitam (quemadmodum & in exortu ipsius post branchiam os durum est, triangulare) ad medietatem corporis ante anum duas junctas oblongas, in extremitate circinatas: versus caudam in inferiore ventre unam ferè quadratam & in extremitate circinatum: in summitate dorfi magnam quadratam multis spinis suffultam & post illam unam longam angustam; cute carnosam constantem, qua & corpus est tectum. *Cauda* bisecta est, & quælibet pars in exitu circinata. *Cute* tegitur non squamis.

Tab.
xxxvj.
5. 6.
Marcg.
l. 4. c. 5.

Caput dura testatectum, osque superius to-

tum umbræ coloris: dorsum & latera cinerei cum pauxillo cæruleo mixti: Venter albus: pinna dorsalis prior prope exortum ejusdem coloris, cætera in totum nigri, spinis cinereis: posterior ejusdem coloris cum dorso & lateribus: pinnae postbranchiales totæ nigrae: barba nigra, uti & pinnae ventris & cauda, licet in exortu paululum ruffæ. A summitate branchiarum per quodlibet latus tendit in medio linea rubra usque ad caudæ initium. Capitur in fluviis, & est optimi saporis, vulgoque comeditur.

Guaperina piscis cujus longitudo ab initio oris ad exortum caudæ paulo plus duorum digitorum (reperiuntur tamen & duplo majores) corporis medii crassities, ubi maxima, trium: laterum quodlibet unum digitum altum. Caret omnino branchiis: Os habet satis amplum & elatum, projectum instar canis, minutissimis denticulis, loco linguæ lapidem habet instar Carpionis: ocellos vix grani milii magnitudine, colore egregii turcoidis. Inter ocellos in medio superioris labii, seu in fronte cornuculum gerit sursum erectum, & paulum retrorsum versum, & ante illud corniculum etiam filum tenue, & dimidium ferme digitum longum versus anteriora directe propensum paululum tamen elevatum, cui appendiculum adhæret ut in Liliis: filum hoc retrò recondere potest: nam post corniculum fovea est invertice, hinc parva eminentia & iterum vallis, tunc ad unius digiti longitudinem pinna in dorso porrigitur quadrantem lata. Cauda pinulam habet plus semidigitum longam: à cauda interstitio aliquo versus anteriora circa ani regionem iterum pinnula est semidigitum longa & duæ parvulae in inferiori corpore sub pectore. In medio a. ferè corpore, magis tamen versus anteriora, in quolibet latere brachium obtrinet, definens in pinnam duas trientes digiti longam, & penè ita latam, pinna a. branchiorum octo constat spinis, quæ per pinnae longitudinem disparguntur, & antè prominent instar octo unguiculorum acutorum. Brachium quodlibet unica constat junctura ac versus anteriora deflectit, ut ita naturæ piscis commodius serviat. Caret in totum squamis, sed tegitur cute in ventre molli, reliquo corpore ad tactum aspera & scabra, ut in Tiburonibus. Color cutis est obscure rubricans, cui fuscus admixtus, & per totum corpus maculas habet nigras, figura undarum. Pinnae & brachia etiam ejusdem sunt coloris cum fusco mixti. Sed pinna in dorso in quolibet latere quatuor habet maculas nigras majores: cauda verò & omnes pinnae minores eleganter variegatae sunt. Ventriculum habet duos digitos longum, cum orificio tres digitos longo, & duos circiter amplo, quod in ipsas fauces inferitur: Unde ventriculum inflare instar utriculi potest. Caro ejus non comeditur. Ad orbium

classen pertinet. Vescitur squillis: natans egregie explicat pinnas & inflat se, ut instar orbis, seu pilei appareat rotundus. Habui alium totum colore differentem, duos & semis digitos longum qui totus erat coracini coloris splendentis, & se inflabat. Cutis horum piscium facile detrahi potest, & tomento impleta servari.

ARTICULUS III.

De Curvata Pinima, Puraque & Pisce innominato.

CURVATA PINIMA, *Lusitani* Bointo. Piscis est *Cordcovadi* magnitudine, vel etiam major, corpore oblongo, satis tamen lato & crasso, amplis branchiis, oculis grandibus argenteis. Caret squamis, & tegitur solummodo cute præterquam in medio laterum: nam cujuslibet lateris medium à branchiis usque ad caudam permeat lata linea aurei coloris; hinc à branchiis incipiens alia parallelus superius ducitur ad duas partes totius longitudinis; hinc hæc parallela secat oblique auream, & pergit parallelus usque ad caudam: linea hæc parallela aureæ antè, & usque dum auream secat, duplici squamularum serie minimarum insignitur, & tota est glabra, postica parte, ubi secat auream, & infra itidem duplici serie squamarum notata, sed majorum, & linea ipsa non est glabra, ut antè, sed aculeata quasi denticulus piscium. Color piscis in dorso & lateribus subvirescens, in ventre albus & splendens. Pinnae habet septem, nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam: duas sub his versus posteriora junctas in infimo corpore: unam in medio ventre, & huic oppositam unam in summo dorso, & adhuc in dorso unam magis versus anteriora. Ab ultima dorsali & ventris pinna continua, haud lata, acuta utrobique abit ad exordium caudæ: quæ furcata est. Capitur frequentius in mari, & boni est saporis.

PURAQUE, *Lusitanis* *Piexeviola*, ob figuram quam cum Cithara communem habent qua ludunt *Lusitani*. Piscis est latus, non crassus, cartilagineus. Longitudo ejus ab initio capitis ad finem caudæ unius pedis, & novem digitorum. Ab initio seu acumine capitis ad octo digitorum intervallum versus posteriora, cordis lati figuram habet, uti pingi solet, latitudo ejus, ubi maxima septem digitorum, excurritque ibi in latere in pinnas instar *Raijæ*, estque pene transparens cum luci obvertitur. Caret branchiis. Caput in conii figuram definit. Ab acumine capitis tres digitos & semis retrò numerando, occurrunt oculi unum digitum ab invicem distantes, rotundi, prominentes, medio-cris avellanæ magnitudine, pupilla nigra, circulo aureo. Ad utrumque oculum versus posteriora habet fistulam, minimi digiti

Tab.
xxxvj. 7.
8. 9.
Marcgr.
H. Bras.
l. 4. c. 5.
& 6.

giti apicem capientem, per quam aquam evomere potest. Sub oculis, in inferiori tamen corporis parte, os habet, distans tantum ab initio capitis quantum oculi, sesquidigitum amplum, edentulum, & duo spiracula sesquidigitum post os versus posteriora: In quolibet latere quinque incisuras habet, ut Rajae & Tiburones.

Post anteriorem illam cordiformem corporis partem reliquum corpus teres, aliquantulum tamen compressum, & ibi latum tres digitos, & in quolibet latere habet pinnam mollem, tres digitos longam, & sesquidigitum latam: hinc angustius fit corpus usque ad caudae pinnam, ubi digitum est crassum. *Cauda* pinna ferme duos digitos longa, paulo plus uno lata, superius longior, quem inferius, ut in Tiburonibus. Inter duas a. illas pinnas secundas laterales versus caudam in dorso, distantia duorum digitorum ab invicem adhuc duas pinnas erectas habet, ad tactum instar membranæ crassioris, triangulares, duos digitos longas, sesquidigitum latas. Tegitur cute molli, nullis squamis, ac in toto inferiori corpore in medietate anteriori est albus, in posteriori incarnati coloris cum albo mixti. In dorso, aut superiori corpore glutinis est colore, fuscis maculis variegato, insperaque egregia varietate puncta ex albo caeruleo. Pinnæ quoque glutinis habent colorem, ac in lateribus aliquid rufescentis mixtum. Acumen capitis cartilaginis colorem obtinet, qua etiam constat. Per totius dorsi longitudinem ad tactum spina dorsi, quasi tuberculis minimis eminet. *Caput* illius recens lucet noctu. Caro ejus non comeditur. Sed si comedatur, asserunt piscatores, per tres horas semifatuos reddi homines, dein sponte ad se redire. Unius attactus, crepitum articulorum manus & brachii causat, qui tamen statim desinit: & si in medio tangatur, artuum tremorem efficit.

Capitur mensibus pluviosis, quando tempestuosum est in Bibribi fluvio, longè externa adveniens, cum Rajis & Pastinacis.

PISCIS INNOMINATUS in septem digitorum longitudinem excrevit, figura similis illi, quem vulgo *Harder* appellamus, pinnis tamen aliter firmatis: duæ enim quæ in infimo ventre anteriore sub branchiis sunt, magnæ & latæ, duæ post branchias in lateribus parvæ, in dorso duæ mediocres, & in inferiori ventre posteriori parvæ. *Cauda* constat pinna furcata. Os parvum, oculi magni. *Cutem* habet glabram, sine squamis: in dorso nigricantem, ac in utroque latere quatuor nigricantes maculæ magnæ à dorso protenduntur, in ambitu suo violacei coloris: Inter maculas autem versus dorsum prominet thalassinus color: reliquum corpus argenteum. *Pinnæ* nigricantes cum violaceo mixtæ, & duæ illæ magnæ sub ventre quinque argenteis maculis singulæ insignitæ. Insignis colo-

ris piscis, quando natans videtur. Vicitat venenis illis Befacenen.

ARTICULUS IV.

De *Mucu*, *Abacatuaja*, & *Acaramucu*.

MUCU Brasiliensibus, piscis tereti corpore, ut *Enneoptalmus*, vulgo *Lampræta*, Germanis *Neunauge* nec crassiori: circiter duos pedes fit longus, magis aut minus: Capitulum habet acuminatum, conicum; ocellos parvos nigros: os item parvulum: guttur inflare aliquo modo potest. Caret pinnis: per latera lineas obliquas nigras habet, angulos obliquos per medium laterum invicem facientes.

Edulis est & capitur in lacubus & paludibus. Iconem ejus Nobilissimus de Laët in Americæ descriptione, sub nomine *Ubirre* dedit, verum descriptio *Mucu* cum icone non satis convenit, ideo non est mirum, quod diversum à *Mucu* esse sentiat.

Abacatuaja, Lusitanis *Peixegallo*. Faber & Gallus marinus. Passeris magnitudinem habet, altus & latus instar illius, subrotundus; neque illo crassior: Os illi est haud amplum, edentulum; Oculi nigri, circulo argenteo. *Pinnas* habet quinque, unam in dorso, unam in ventre, utramque descendentem, & continuam ad caudam usque: itidem post branchias utrimque unam: *Cauda* constat pinna furcata. Præterea habet duo quasi fila in longum extensa ab inferiore corpore, & unicum tale in dorso ante pinnam dorsalem. Caret squamis, sed tegitur cute levissima, splendente, coloris argentei, totusque est illius coloris, exceptis filis illis, quæ nigra sunt. Carnem habet boni saporis. In descriptione Americæ sub nomine *Awah kattoo*, sive *lawke* datur. Icon superius data, non in totum convenit, ideo repetimus.

Acaramucu Piscis corpore est compresso, nec crasso, verum oblongo, decem enim digitos longus est, quatuor latus, ubi latissimus. Os illi parvulum, angustum, rotundum, apicem minimi digiti admittens, ut piscis triangularis. Superius & inferius in anteriori parte oris utrimque dentes triangulati acuti. Oculi stufieri magnitudine, crystallini, pupilla nigra. Distant oculi ab ore, duos digitos & semis, plane in alto positi, tres quartas partes digiti à dorso sub utroque oculo, in quolibet latere, branchiarum loco fissuram habet oblique factam, unum digitum longam, trapezii figura. In dorsi summitate directè supra oculos, instar fili majoris, seu crassioris cordæ violæ, corniculum habet oblique erectum versus posteriora, quatuor digitos longum & teres. In postica corporis parte inferius & superius utrimque pinnam habet tenuem, tres digitos & semis longam, tres quadrantes digiti latam, quæ desinunt

Tab.
xxxvij.
1. 2. 3.
Marcgr.
H. Brasi.
l. 4. c. 11.

Idem
Hist. l. 4.
c. 12.

circa caudam, quæ parallelogrammi figura exoritur à corpore, habetque pinnam sesquidigitum longam, paulo plus duobus latam. Caret squamis, sed tegitur cute glabra, parum tantum hispida, ut Xiphie, coloris albicantis, cui gryseus est admixtus, & in dorso paulum fuscus; pinna quoque grysei coloris. Non est edulis: in ventriculo algæ seu musci marini multum inveniēbam. Parieti appensus noctu clarissimè lucebat in tenebris.

ARTICULUS V.

De *Punaru*, *Timucu*, &
Guebucu.

Tab.
xxxvij.
4. 5. &c.
Marcg.
H. Brasi.
l. 4. c. 13.

PUNARU pisciculus est quatuor digitos longus, corpore oblongo, capite crassiusculo, & antè obtuso. Os habet parvum, in maxilla inferiore duos solummodo denticulos, longos, acutos instar acicularum: oculos superius & in fronte positos; pupilla nigra, circello aureo: & supra hos duo rubra fila brevissima, prominula; branchias amplas: utpote quæ una ei est à duabus confata. Pinnas postbranchiales duas oblongas, & sub his duas plane angustas. Paulo post occiput incipit pinna, quæ ad caudam usque producit, spinulis prominulis suffulta. In medio infimo ventre incipit similis, ferme ad caudam usque pertingens. Cauda a. longiuscula, & parallelogramma. Tegitur cute fusca, & pinnae sunt ejusdem coloris.

Reperitur hic & alia PUNARU species, figura corporis priori similis, sed mandibulas habens rostratas, quasi è minimis denticulis compositas. A summitate capitis pinna latiuscula extenditur usque ad exortum caudæ, quæ mollibus textitur spinis non prominulis. Postbranchiales habet ferè ut prior, ut & in ventre & cauda. Color ut prioris, sed variegatus est in lateribus lineis curvis obscure purpureis. Utraque species inter scopulos vivit, & intrat etiam testaceorum domicilia.

TIMUCU Lusitanis *Peixe agulha*, Piscis duos est pedes longus, corpore tereti instar Anguillæ. Rostrum habet osseum, tres vel quatuor digitos longum, acuminatum, utrobique dentibus minimis refertum: inferior rostri pars paulò longior superiori, & id quod prominet molle, non osseum; caret lingua. Oculos habet rotundos, crystallinos, circulo argenteo: sex pinnas, nimirum duas oblongas postbranchiales, duas junctas in infimo ventre ante anum parvas, post anum unam, quæ ferè ad exortum caudæ porrigitur, & similem huic oppositam in dorso. Cauda pinna quasi bisecta constat. Caret squamis, sed tegitur cute. Summitas capitis & rostri ac dorsi cum medietate laterum olivacei est coloris: inferior medietas cum ventre argentei. Per utrumque autem latus se-

cundum longitudinem linea tendit virefcens, distinguens olivaceum ab argenteo. Pinnarum color respondet parti cui appositæ sunt.

Edulis est. Capitur in mari, & fluviis salis Boni est saporis, præsertim frigus butyro: Caro ejus non est spinosa.

GUEBUCU Lusitanis *Bicuda*, piscis rostratus; oblongo & fermè tereti est corpore, ut *Dorada*: capite porcino; rostrato, cauda in duo cornua diducta ut *Albacara*, rostrum acutum, osseum, durum: partis superioris longitudo sedecim digitorum, inferioris decem. Crassities totius prope insertionem septem digitorum: utramque autem rostri partem movere potest. Branchias habet amplas: Os interius orbicularis figuræ, in medio sui hyperpolico foramine: lingua oblonga, alba, dentibus omnino caret. Oculos habet solidi magnitudine, pupilla crystallina, circulo argenteo. A rostri insertionem caput in altum assurgit, ut in *Dorada* mare: Est autem caput ab oculis ad occiput longum septem digitos, novem altum. Corporis longitudo ab occiput ad caudæ exortum quatuor pedum, & altitudo lateris post occiput unius pedis, in medio autem corporis decem digitorum, & prope caudam duorum. Cauda in duo cornua extenditur & ampliatur, quodlibet octodecim digitos longum, ad ejus exortum in quolibet latere duæ auriculæ membranaceæ. Pinnas habet sex: proxime postquamlibet branchiam unam, directè à latere protensam, dura membrana constantem in *Tiberone*, figura trianguli acuti, undecim digitos longam, & in exortu, ubi latissima, duos tantum latam: è regione harum in infimo ventre duo bacilli formia corpora juncta habet, ex osse nigro constantia, dura, plane ut os *Sepia*, quodlibet novendecim digitos longum, utrumque junctum, in rima longa, profunda recondere potest, quæ à natura secundum longitudinem ventris facta est ad caudam usque. Interstitio duorum pedum à fine hujus fissuræ seu ano, in infimo corpore pinnam habet triangularem sex digitos longam, latere anteriori firma spina munitam; etiam hanc in rimam quandam recondere & rursus surrigere potest: Octo digitorum interstitio ab hac pinna, parvam habet versus caudam, in acutum triangulum versus posticam partem desinentem, & è regione hujus similem & æqualem in superiore corpore, has duorum digitorum intervallo sequitur cauda, quam supra descripsi. Maxima a. omnium est pinna dorsalis, incipiens à summitate occipitis, quæ præten-ditur per dorsum in trium pedum longitudinem, constans membrana pergameni æmula, costis intertexta, hanc quoque totam demittere potest ac in profunda rima condere: lata est sesquipedem, ubi latissima, & versus posteriora paulum angustatur.

Cute

Idem
H. B.
l. 1. c. 14.

Cute crassa, sub aspera vestitur, tota subfusca: spinulis oblongis, trientem digitis longis, ut ita solida sit & aspera, cum squamis careat. Venter & caput inferius albicant, latera cinerei & argentei coloris: dorsum ex cinereo argenteo obscure fuscum, ut & caput superius & rostrum; reliquum rostrum cinerescit flavo. *Pinnae* omnes cum cauda ex cinereo argenteo fuscescunt, ut & dorsalis, quæ præterea maculis orbicularibus, nummi mifnici magnitudine est variegata, illa post anum paulum undulata maculis fuscis: Carnem copiosam habet, non spinosam, pinguem, non glutinosam, ideo ad comedendum aptiorem, quam caro Marforum. In ventriculo interiore multos integros pisces pedales inveniebat author.

ARTICULUS VI.

De Bagre aliquot Speciebus.

Tab.
xxxviii.
1. 2. 3. 4.
5.
Marcgr.
H. Braf.
1. 4. c. 16.

BAGRE piscis sex ponit author Species. *Prima* est oblongo corpore, initio dorsi paulum elevato, capite acuminato seu conico, quod dura testa est tectum ad initium elevationis dorsi, pedalis longitudinis: Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum quatuor inferiores sesquidigitum longi, duo superiores longitudinem totius piscis æquant. *Pinnas* obtinet septem, octavam pro cauda: nimirum duas postbranchiales loco inferiori positas, & ante quamlibet fortem aculeum, dentatum osseum, unam in summitate dorsi elevatam, & ante illam item aculeum fortem, æqualis cum pinna longitudinis: duas junctas in medio ferè infimi ventris, magis tamen versus posteriora, unam membranaceam sine spinis versus caudam, & huic oppositam medioerem mollibus spinis suffultam. *Cauda* constat pinna furcata, caret squamis, sed tegitur cute per totum argentei coloris splendentis. *Pinnæ* omnes argentei sunt coloris, ut & barba & caput. Per medium utriusque lateris tendit linea argentea ad caudam usque constituta ex 77. protuberantiis. *Oculi* nigri facis ampli, os parvum, edentulum, labiis elavatis. Piscis est edulis, si quis ab eo læsus fuerit, difficulter sanatur, & magnos patitur dolores.

Secunda corpore oblongo, capite compresso & plano, ore inferius parabolicæ figuræ, obtuso, edentulo. *Caput* octo digitos longum, testa dura punctulata tectum. *Oculi* parvi, rotundi, crystallini, quatuor ferè digitos ab invicem distantes. Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum exteriores longiores, quatuor digitorum, reliqui breviores: septem illi pinnæ, octava pro cauda: una nimirum in summitate dorsi, firma spina antè munita, erecta, tres digitos longa, totidem lata: duæ postbranchiales, itidem firma spina munitæ, quatuor digitos

longæ, duos latæ, interstitio sex & semis digitorum post branchiales in infimo ventre (qui paulum extuberat) duæ junctæ, tres digitos longæ, duos latæ, in ambitu circinatae: septem digitorum intervallo à dorsali, alia in extremo dorso, carnosæ, sesquidigitum longa, unum lata, in extremitate mollibus spinis munita, & sub hac in infimo ventre alia paulo major cauda sequitur trium digitorum intervallo, in duo cornua diducta, crassa seu molli membrana constans duos & semis digitos longa, in quolibet cornu duos lata. Totum caput superius, & ad latera, dorsum totum & latera ad protuberantiam ventris usque, candidum diluto flavo & aureo mixti est coloris, in testa capitis etiam aliquid viridis transplendet: *Pinnæ* omnes & cauda gryseæ sunt: Venter & laterum inferior pars & caput inferius (quod planum est) albi coloris. Caret squamis, sed vestitur cute. Bona satis est carne, melior quam Camarupi, cujus magnitudinem ferè æquat.

Tertia figura & magnitudine ut præcedens, sed barbam habet quatuor tantum cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos, & latiusculis instar ligulæ, duobus brevibus: ad pinnam dorsalem similis ligula novem digitos longa, & post branchiales pinnas eodem modo: cætera similis præcedenti.

Quarta Belgis vulgo *Clipbagre* decem digitorum longitudinem habet, corpore oblongo: Capite lato & compresso: ore parabolico, edentulo. Barba constat sex cirrhis, quorum quatuor inferiores unum digitum, superiores duos longi. Oculos habet parvulos, cærulescentes, quatuor digitorum interstitio ab ore in summitate dorsi tegitur testa dura ossæ, & post branchias in quolibet latere pyramidalis testa angusta regit latera. Pinnas habet septem, & octavam pro cauda: nimirum unam in summitate dorsi, elevatam, mollem, sesquidigitum altam, plus uno latam, antè spina ossæ crassa dupliciter ferrata, duos & semis digitos lata sustentatam. In medio ventre infimo duas parvas: in fine penè dorsi, carnosam, parvulam, angustam, & è regione hujus inferius aliam parvulis spinis suffultam; cauda diffisa in duo cornua sesquidigitum longa. Tegitur cute: ac in capite, initio dorsi & lateribus, ubi testaceus est, umbræ est coloris, per reliquum totum dorsum & latera umbræ dilutionis, & fuscis maculis mediocris magnitudinis variegatur: in ventre albicat. A testæ latiore fine ad caudam usque in quolibet latere, per lineam tectam tendit ordo denticulorum acutorum, posterius versorum, qui clypeo duro ferrato in medio insunt, nam anguli obtusi figura positi sunt usque ad caudam hoc modo 7.

Edulis est, sed pauca carne, quæ non magni sit.

Quin-

Quinta præcedenti similis, & maculis nummi miltici magnitudine variegatus: Vtrum caret denticulis illis in lateribus: lineam solummodo habet: & duos cirrhos, & sex longiores quam alter. Hæc species habet carnem bonam & pinguisimam.

Sexta magnitudine & figura similis illi, quem secundo loco descripsimus: sed barbam habet tantum quatuor cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos & latiusculis instar ligulæ, duobus admodum brevibus. Ad pinnam dorsalem similis ligula est novem digitos longa, & ad postbranchiales eodem modo; cætera per omnia similis illi, quem diximus; nam & ventrem ita protuberantem habet.

ARTICULUS VII.

De Ajereba, jabeirete, Niqui, & Guatacupu.

Tab.
xxxviii.
6. 7.
Marcg.
H. Bral.
l. 4. c. 16.

AIEREBA Brasiliensibus *Raja* species, piscis planus, circinatus. unum pedem & novem digitos longus, & totidem latus (reperiuntur & duplo majores) Quatuor digitorum interstitio ab anteriori circumferentia in superiori superficie duo foramina habet satis ampla, tres digitos ab invicem distantia, prope caudæ exortum orbicularis incisura est in quolibet latere: *cauda* teres, quatuor pedes longa, & circiter in medio sui, duas osseas spinas crassas retro dentatas habet, quibus pungit, quando ad spiracula apprehenditur, caudam incurvatam supra corpus levando. *Os* inferius habet, haud amplum, edentulum, incisuræ quasi parabolice. *Cute* regitur in superiori corpore ferrei coloris, & in medio dorso insignitur tuberculis nigris, parvis: inferius corpus totum album. Caro nihili æstimatur in cibis.

Jabeirete *Raja* species, ejusdem magnitudinis cum *Ajereba*, figura autem obtusi vomeris ad latera extuberantis: sectiones prope caudam ut in illa, & præterea duo corpora cylindracea digiti crassitie protuberantia. Cauda longa. Color piscis superius è cinereo fuscus, inferius albus, carne probata est & bona.

Reperitur hic & alia *Raja* species præcedenti similis; excepto quod processibus illis cylindraceis prope caudam destituitur. Color totius corporis superius umbræ punctulatus per totum maxulis nigris, seminis sinapi magnitudine: *Cauda* aculeis caret. Carnem habet bonam.

Reperiuntur hic & *Raja*, quarum caudæ tres & semis pedes longæ, crassæ in initio tres digitos, & in fine plane acuminatæ, plenæ tuberculis nigricantis in totum coloris, flexiles ut scutica.

N I Q U I Belgis Pieterman: Piscis est ca-

pite crasso, ore ranæ amplo, edentulo, crassa lingua, inferiore mandibula paulo longiori quam superior. Anterior corporis medietas est paulo latior, posterior angusta & teres: estque ut plurimum sex aut septem digitos longus, latus antè quidem sesquidigitum aut paulo latior: Ocelli ipsi parvi quidem, sed exserti, cylindracei more cancrorum terrestrium, pupilla nigra, circulo è cinereo fusco. Branchias habet amplas, & post quamlibet pinnam unam, digitum longam & latam, in ambitu circinatam: in ventre sub his paulo inferius duas junctas: à medio dorso pinna ad caudam pene continuatur, semidigitum lata, at in fine paulo angustior, cui respondet similis in infimo ventre: *Cauda* plus digitum longa, minus lata, parallelogrammi figura, in extremitate circinata. Ante exortum pinnae dorsalis duos habet aculeos fortes, & supra postbranchialem utramque unum acutum. Tegitur cute, cujus color ex nigro & umbra, gryseoque mixtus, nimirum in toto dorso, capite & lateribus, pinnisque omnibus; Venter albicat, & in lateribus etiam plus albi, quam nigri aut grysei est. Per totum dorsum, caput & latera, puncta nigra, magnitudine seminis papaveris, dispersa.

In arena absconditus jacet prope littus Maris, acincedentes vulnerat.

Edulis est, si jecur & fel bene separetur, aliàs lethalis.

Guatacupu Lusitanis *Cavala*, Belgis *Kooringfish* est corpore oblongo, fere æqualis ubique crassitie, excepto versus posteriora, ubi magis magisque attenuatur. Ut plurimum in septem pedum longitudinem excrevit, & crassitiem corporis humani. *Caput* & *os* habet acuminatum, dentes acutos, rotundos, ordine positos, oculos magnos crystallinos, circulo argenteo: *Pinnas* octo, videlicet post quamlibet branchiam unam triangularem, directè à latere protensam: unam tenuem angustam ferè in initio dorso, post hanc unam in eodem dorso triangularem erectam, sub hac in infimo ventre triangularem; duas mediocres triangulares in infimo ventre subter postbranchiales. *Cauda* constat magna pinna in duo cornua amplè extensa. A pinnis autem triangularibus, tam in dorso, quam in infimo ventre, parvulæ ordine pinnulæ oblongæ sunt dispositæ usque ad caudam. Vestitur cute argentei coloris, cui in ventre paulum cærulei, in dorso multum miscetur, ut color resplendeat. In quolibet latere linea subtilissimis squamulis contorta describitur ad caudam usque. Boni est saporis. Est quidem *Scomber*, sed quia Icon quam supra dedimus, non convenit, ideo & hanc adjicere placuit.

CAPUT II.

*De Piscibus non omnino la-
vibus.*

ARTICULUS UNICUS.

*De Guacucuja, Guamajacu guara, &
Guamajacu Attinga.*

Tab.
xxxix.
2. 3.
Marc-
grav. H.
Braf. l. 4.
cap. 1.

GUACUCUJA. *Monoceros* piscis: *Ves-
pertilio* Aquaticus posset appellari. Corporis figura antèrius est instar vomeris: Corpus octo digitos longum, quinque latum in medio, ubi latissimum: medietas autem corporis posterior rotunda est, & versus caudæ pinnam fastigiatur in conum: medietas autem anterior vomeris seu lati cordis figuram obtinet. Piscis autem non crassus, sed latus; caput vix prominet seorsim à corpore, estque illi inter oculos supra os cornu impositum, durum, duos pene digitos longum, conicum. Oculos habet nummi misnici magnitudine, pupilla crystallina lenticulari, reliqua pars variegata maculis, & lineis flavis albisque. Oris hiatus castaneum potest capere, ipsum edentulum est. Supra os carnea prominentia est instar tonsillæ humanæ ferè. In utroque latere in medio piscis, brachium eminet, quatuor digitos longum, una junctura constans, inferior medietas brachii duos digitos longa est, unum lata in infimo ventre inter brachia duas habet pinnas sesquidigitum longas, quæ quasi pedes sunt. Cauda constat pinna duos digitos longa, sesquidigitum lata, ac fere quadrata. In inferiore corpore, sesquidigiti interstitio à cauda etiam pinnulam habet parvam, & talem etiam in dorso, trium digitorum intervallo à cauda. Cute tegitur, non squamis, quæ superius fusca est, multis tuberculis duris, per dorsum insignita versus anticam partem, & utrumque latus. In utroque autem latere undecim nigras habet maculas lentis magnitudine & figura, binas ac binas juxta se positas. Prope insertionem utriusque brachii etiam multas ejusmodi maculas nigras habet, & ibidem in quolibet latere foramen parvum in corpus.

In summa, in lateribus, circa oculos, in extremis branchiis, mirè variegatur punctulis albis, nigris, lineisque iridem albis & nigris, ut vix exprimi possit à pictore. In toto autem inferiori corpori egregii miniati est coloris, atque ibi cutis æqualis, verum ad tactum paulum hispida.

Guamajacu Guara, Lusitanis *Pexe Porco* & *Diabe*: Orbis est species. Longitudo ejus ab initio oris ad pinnæ exortum in cauda quatuordecim digitorum: pinnæ caudæ longitudo plus duorum digitorum: Rotundo est corpore, & crassities ejus duorum & vi-

ginti digitorum. Caret squamis, tegitur cute, per totum corpus ex fusco ochræ coloris pallidi, in ventre albi. Totum corpus aculeis munitum est, qui in lateribus longiores, in reliquis partibus breviores (longiores autem sunt duorum digitorum) teretes, in extremitate valdè acuti, & singuli tribus insertionibus, quasi triquetris cuti infixi. Inter aculeos cutis ubique maculis nigris scatet, excepto ventre. Oculos habet magnos eminentes: Os parvum obrotundum, edentulum: pinnas tantum quatuor, duas in lateribus duos & semis digitos longas: unam in dorso versus caudam ejusdem magnitudinis, & minorem sub ano.

Potest orbis muricatus Gesneri dici.

Habui inquit author, alium minorem vivum Mense Febr. anni 1639. item alios duos mense Septembri vivos. Cutis eorum erat è fusco virescens, in ventre nigricans: aculei ut prioris, & planè similis figura corporis: prope quamlibet pinnam, maculam habebant nigram, ut & utrimque ad latera prope os. Pinnarum color erat flavus: oculorum pupilla nigricans, circulo luteo. Supra utrumque oculorum cornu exile, satis longum, molle, cutacea substantia constans, quod præ se fert natans, quando autem extra aquam est, flavescit. Inflare se potest & iterum confidere. Sonum edit *Ulch / Ulch*. Si velis ut se inflet, trahe pinnam quæ in dorso est.

Guamajacu Attinga Brasiliensibus, Marcgravio Orbis muricatus Ranzæ dictu, septem digitorum longitudinem habebat, & corpus oblongum: os Ranzæ simile, & loco dentium tam superius, quam inferius, os durum; oculos magnos, rotundos, protuberantes, pupilla crystallina circulo flavo: Branchiarum loco foramen in utroque latere digitorum admittens, & pone hoc pinnam trapezii figura, unum digitorum longam, duos latam: In extremitate dorso versus caudam etiam pinnam oblongam, haud amplam, & è regione hujus similem in infimi ventris extremitate. Cauda constat pinna sesquidigitum longa, unum lata. Totum corpus tegitur cute spinosa, quæ in capite in duram testam abit. Spinæ illæ constant duris ossibus & acutis: in infimo tamen ventre caret spinis, sed mollis est instar Ranzæ. Totum corpus & caput superius ex gryseo & fusco est maculatum: magis tamen rufescit, inferius totum ex albo flavescit, ut & spinæ totius corporis, Pinnæ omnes flavescunt. Post utramque pinnam postbranchialem maculam habet nigerimam stuferi magnitudinis, & supra hanc utrobique, paulum tamen magis versus anteriora aliam minorem nigerrimam. Ad utrumque latus exortus pinnæ dorsalis etiam similem habet, parvulas item sub oculis & ore. Utris modo se inflare potest. Edulis est, & capitur in fluviis dulcibus.

Idem l.
d. c. 14.

Tab.
xxxij. 9.
Idem l.
4. c. 10.

CAPUT III.

De *Narinari*, *Tiburone*, &
Iperuquiba.

Tab.
xxxix.

NARINARI. Sunt aliquot illius species, hæc quam hic describimus, appellatur *Narinari pinima*: Lusitanis *Raja*, Belgis *Pulsteert* vel *Deicle*. Pastinaca marina. Corpus habet magnum, latum, fermè triangulare: constans ad utraque latera latissima pinna triangulari, carnosa: & prope caudam habet duas pinnas, palmi magnitudine, subrotundas æqualis longitudinis: caput magnitudinem habet mediocris porci, crassum, compressum, in medio quasi fossam habens. *Os* triangulo subrotundum, compressum paulò & in promuscidem desinens: nam oris hiatus quinque distat digitos ab extremitate promuscidis versus ventrem: amplitudo oris duorum & semis digitorum: edentulum, sed loco dentium *os* habet linguæ figura inferius in ore, quatuor digitos longum, sesquidigitum latum, ad fauces usque pertingens, & simile *os* superius, transversim positum, duos digitos longum & totidem latum. Inferius *os* constat septendecim ossibus, albis, duris literæ *U* figuram habentibus, quæ arctè per membranas conjunguntur, hisce alia septendecim subjacent, singula singulis, spongiosa ad aspectum, nec ita dura, superius *os* constat quatuordecim ossibus literæ *J* figura, quæ eodem modo per membranas sibi invicem agglutinantur, iisque etiam alia quatuordecim ossa superjacent: duo autem illa ossa per membranas annectuntur aliis ossibus capitis. *Cranij* cavitas sex circiter digitos longa est, vix duos lata, in qua cerebrum latet. Promusci tantum constat cartilagine. *Oculos* habet parvos, nummi misnici magnitudine: post oculos in quodlibet latere spiraculum amplum, pomi vulgaris capax; intra hæc branchiarum folia recondita jacent: ad latera inferius à fine capitis in quolibet quinque oblongas incisuras. *Color* totius superius ferreus, maculis albis per totum inspersis, magnitudine nummi misnici, inferius totum album. *Cutis* tota glabra lævisque. *Corporis* longitudo ab occipite ad exortum caudæ sesquipedalis, latitudo inter extremitates pinnarum triangularium, trium pedum, & decem digitorum.

Pinnarum prope caudam longitudo septem digitorum, latitudo quatuor. *Capitis* longitudo decem, latitudo septem digitorum, crassities sesquipedis. *Caudæ* longitudo quatuor pedum & trium digitorum: crassities sesquipedis. *Caudæ* longitudo quatuor pedum & trium digitorum: crassities in exortu quinque digitorum, quæ sensim gracilescit. Paulo post exortum caudæ superius

parvam pinnam curtam habet, paulo plus digito longam, & mox post eam duos hamulos sibi invicem super erectos, piscatoriis hamulis similes & incurvatos, longitudine trium digitorum. Caro boni est saporis, sufficiens quadraginta hominibus saturandis.

Tiburonis species minor. Belgice *Cruphæpe*, à figura. Convenit eum majore, excepto capite, quod triangulare habet seu prout cor vulgo pingitur. *Oculi* parvi ad latera ipsius capitis. *Os* parvum, triangulare longe infra positum, triplici ordine dentium minorum, unde ita nocere non potest, *os* quippe habens angustum. Caro melius sapit, quam majoris.

Iperuquiba, & *Pirauquiba*. Lusitanis *PieXe pogador* & *Peixe piolho*, nostratibus *Dupger*, quia Tiburoni adhæret sugens. Octodecim digitos longus, ferè teres, quatuor digitos crassus, ubi crassissimus, in postica parte attenuatur. *Os* habet triangulare, cujus pars superior brevior inferiori, etiam linguam. *Caput* superius ad dorsum usque duos digitos longum, circiter planum & figuratum, ut palatum alicujus piscis striis transversis, hac parte Tiburoni firmiter adhæret in ventre, & capto illo simul capitur. *Oculi* parvi, flavi, pupilla nigra, semicirculo flavo. *Dentes* nulli, sed eorum loco multæ minutissimæ prominentiæ. Post branchias utrobique pinnam obtinet triangulatam, duos & semis digitos longam, subter in ventre duas junctas: à medietate corporis tam superius, quam inferius, etiam pinna extenditur angusta usque ad caudam, quæ pinna constat sesquidigitum longa. *Cute* tegitur per totum corpus cinerei coloris.

Tab.
xxxix.

Tab.
xxxix.

TITULUS III.

De aliquot aliis, & inter hos monstriosis
piscibus.

CAPUT I.

De pisce *ἀλφειοειδής* & *Remoranti*.

PISCem *ἀλφειοειδής*, ita describit Kircherus: Capitur certis anni temporibus in mari Orientali Indiæ ad insulas Vissajas, quas insulas Pictorum vocant, sub Hispanorum dominio, piscis quidam *ἀλφειοειδής*, id est, humana prorsus figura, quam idè Peche muger vocant, ab indigenis Duyon. Caput habet rotundum, nulla colli intercapedine trunco compactum. Extremæ aurium fibræ, quæ & auriculæ nominantur, ex cartilaginea carne eleganter vestita, quarum interior pars amplissimis formata anfractibus, veram hominis refert aurem; Oculos suis

Tab. xl.
Kircher.
Artis
Mognet.
l. 3. par.
l. 6. p.
675.

luis ornatos palpebris, situque & colore non piscis sed hominis judicares; naso non nihil aberrat: malam inter utramque non usquequaque eminet, sed levi tramite bipartitur; sub eo verò labra magnitudine specieiue nostris simillima. Dentium non quales in sunt piscium generi ferratiliū, sed plenorum & candidissimorum continua series. Pectus alba cute contextum, hinc atque hinc paulò latius quàm pro corpore in mammas extuberans; neque eas ut foeminis pendiculas, sed qualis virginibus globosas, plenas lactis candidissimi. Brachia non longa sed lata ad natandum apta, nullis tamen ipsa Cubitis, ulnis, manibus, articulisve distincta. In administris soboli propagandæ membris, in utroque sexu nulla ab humanis distinctio: posthæc in piscem cauda desinit. Hactenus ingeniosissimus Kircherus. Ossâ hujus piscis insignem vim sanguinem sistendi & attrahendi habent: visâ, ita sanguinem currentem stringere, quasi venâ ligaretur. Efficaciora tamen foeminarum, & ex his quæ maculis ad nigrorem accedentibus distinguuntur. Alius quidam dicit, carnem carni hominis applicatam, ita omnes spiritus ad se attrahere, ut hominem veluti stupidum reddat. De *Remoranti pisce* apud Hugonem Linchotanum habemus. Historia talis est: Navis quædam Lusitanica per Morambicum in Indiam decurrebat. Vento hæc adeo secundo & optato utebatur, ut vela omnia plenissima navem proferre felicissimè viderentur. Diebus ergo quatuordecim integris cursum versus Lineam æquinoctialem nautæ tenentes, & quotidie altitudinem matientes, tandem observarunt, gradus ad metam propositam, non minui aut pauciores fieri, verum quotidie multiplicari, seque ab æquinoctiali Linea quam longissime dispelli & arceri. Quæ res non saltem præter omnes naturæ causas esse videbatur, ad admirationem universorum, verum etiam qui in navibus erant, certis se præstigiis & incantamentis agitari, liquidissimè rebantur, cum scirent, illius loci mare hujus apulsus neutiquam causam esse, & vela secundis ventis interim nihilominus ex voto turgida procedere. Sese ergo anxie invicem contuentes, partim terrore, partim anxia vi & admiratione diu exercebantur; dum tandem, nescio quo casu, nautarum quidam, attentis & sollicitis in undam oculis despectans, latam & ingentem quandam caudam proræ intortam innexamque contuitus est, qua piscis quidam navem firmiter prehenderat, reliquumque corpus per navis longitudinem exporrexerat, adeo ut caput ipsius post puppim prominere. Hoc ille situ navis omnem molem ita violenter torquebat, ut illam contra violentissimum quoque resantis venti impetum vi & robore suo immensè retroageret, se cumque tot diebus

rapide proferret. Jam itaque hoc pacto causa repulsus præcognita, adactis sudibus furcisque & organis, conferentibus cæteris, ad arcendum eum tamdiu studiosissimè laboratum est, donec tandem, cauda plicatili avulsa, navem ille destitueret, cum jam diebus quatuordecim integris illi agglutinatus adhæsisset, & violento renisu eandem, omni impetu ventoque contrario spreto, natando secum abripuisset. In æternum itaque memoriæ signum historiam hanc Pro-Rex in atrio suo depingi accuravit: quam effigiem his meis oculis per sæpe egomet cum magna admiratione usurpavi, & circumstantiis supradictis subnotatis diligentissimè perlegi.

CAPUT II.

De Pisce Goensi.

Idem Hugo narrat, ex flumine quodam Guæ, cujus ostium hyberno tempore pro loci more obstructum erat, piscatores quosdam monstruosum piscem extraxisse, cujus similem nec in India nec in aliis locis uspiam videre contingit: qui ob novitatem Archiepiscopo, ejus jussu à pictore ad vivum exprimebatur cujus Icon seu effigies Regi Hispaniarum postmodum transmissa est. Animal illud mediocris magnitudinis erat, canem domesticum vulgarem altitudine haud excedens, cujus rostrum porcino simile protuberabat. Oculi ei parvi erant; nullæ aures, quarum loco duo saltem foramina hiabant. Pedes elephantinis (respectivè tamen) per omnia similes erant. Cauda ad dorsum fines lata, sensim in acumen desinebat. Per atrii pavimentum cursitans, suum porcorumve grunniebat ritu. A capite ad caudam universum corpus squamis, pollicis articulum prioris æquantibus, constitutum erat tam solidis ac firmis, ut nec ferrum, nec æs plus resisterent. Grandibus & frequentibus, non secus ac incus quædam à nobis plagis contusus, nihil aliud quam convolvebatur, & echini more caput caudamque intro condebatur, ut globi exquisitam rotunditatem præstaret: nemine interim juncturarum proportionem satis observante. Conglobatus, nulla, vel vi, vel machina develli aut expediri poterat; relictus tamen, sponte se iterum pandebat aut explicabat, & qua via patebat errabat.

Nie-
remb. H.
N. l. 11.
c. 5.

CAPUT III.

De Pisce ludicro, Pusta, &
Michipillin.

Illuvies menstrua, & ludicrus gestus, unde nomen meruit, commendant

Nie-
remb. H.
N. l. 11.
c. 13.

sole, h. est, lufum aquarum. Genus quoddam est piscium lacustrium molli cute inteetum, ac lacertarum more quadrupes, dodrantis longitudine pollicemque crassum, etsi interdum cubitum excedat. Vulvam habet muliebri simillimam, ac venter ejus maculis fuscis distinguitur, corpore medio ad caudam usque, nempe prolixam & quæ juxta finem tenuissima sit, paulatim ac sensim gracilescit. Pro lingua est cartilago brevis ac lata. Quaternis natat pedibus, in totidem digitos, persimiles ranarum, fissis. Caput depressum est, & reliqui corporis proportionem magnum. Hiscens rictus, aterque color. Huic menstrua singulis quibusque mensibus fluere observatum sæpe sæpius est, haud aliter ac mulieribus, tum venerem abunde excitare, haud secus ac scinci facere solent, quos terrestres crocodilos quidam vocant, ad quorum genus fortasse pertinet. Salubre ac gratum præbent alimentum, nec dissimile anguillarum carni. Multis modis parari solent, frixi nempe, assi, elixique. Verum ab Hispanis magna ex parte ex aceto mulso, addito pipere, caryophyllis, atque siliquaastro Indico: à Mexicanis vero siliquaastro solo, seu intacto, seu integro, familiarissimo illis ac prægrato condimento.

Nie-
remb. H.
N. l. 11.
c. 14.

Nie-
remb. H.
N. l. 11.
c. 41.

Pusse capiuntur in fluminibus Panucinarum, minimi digiti vix æquantes longitudinem atque crassitudinem, sed ventre ranuncolorum instar paulo protuberantiore, quibus simul cum miltomame permixtis & admotis, subvenitur passis erisypelata, brevitate & facilitate mirabili. *Michipillin* seu ova piscium, dicitur genus quoddam lacustre, album, quod ex omni piscium in lacu degentium Mexicano conflatur multitudine, unde factum est illi nomen. Statis anni temporibus eadem capitur palude, haud aliter quam thynni, trichiae, scombri, similesque pisces, alii gregatim vagantes in Oceano. Agmen pisciculorum esse creditur, haud lendibus majorum. Medio id procedit alveo, in neutrum littus inclinans, tam numerosum à multitudine, ut quinque cubitorum intervallum aut amplius occupet. Non prætermittunt occasionem piscatores, sed diligenti observatione & cura vagantes pisciculos captant excipiuntve retibus, atque ita non mediocri solet sæpenumero fieri captura. Coquuntur iidem alienis fictilibusve vasis, ferculisque ubi opus est, adii-ciunt, addito siliquaastro chillive: quo apparatu neque modico neque ingrato cibo constant, sed quo non modo Indi, verum advenæ quoque Hispani sæpenumero vesci gaudeant.

CAPUT IV.

De Ambiza & pisce mulari.

A Dneetam quod Philippus Pigafeta scribit de quodam pisce Zairi, qui membra duo habet manus humanas referencia, & caudam clypei & forma & magnitudine. Vocatur hic ab incolis *Ambize angulo*, id est, *porcus aquatilis*, propter pinguedinem quam porcum refert. Caro, quæ ab incolis fumo induratur, & ad lautitias reservatur, & gustu & odore est grato. Aquam dulcem non relinquit. Pabulum ejus est gramen, & omnis generis herbæ in littore enatæ. Ore bovem refert. Tantæ interdum & magnitudinis, ut quingentas libras pondere elevet. Capitur à piscatoribus non ut piscis, sed fere ut bos. Observato enim loco diligenter, ubi pasci solet, scaphis suis expectant, & advenientem contis aut remis occidunt: occisum ad aulam regiam deferunt, aliter enim capitali proposita pœna (ut & alios pisces, qui hinc Regii dicuntur, nempe trutas, & cacongo piscem singularem, salmonem figura referentem, sed colore diversum, caro enim ea est alba, & tam pinguem, ut prunis superimpositus eas extinguat) vendi non potest. Unde diligenter ne impunitas audaciores reddat, observantur piscatores ab Aulicis, & deprehensi absque ulla remissione plectuntur. De *pisce mulari* sic scribit Nierembergius.

Nie-
remb. H.
N. l. 11.
c. 55.

Sub Philippo II. visa in Oceano bellua duabus velificans alis, navis specie. Fregit unam bombardæ ictus. Irrupit per fretum Herculeum bellua furens, & horribilibus frendens mugitibus atque illapsa per mediterraneas Hispaniæ oras, Valentiam appulit, ubi demum exanimata, centum & quinquaginta dodrantes prolixa, molis circuitus centum, vacuitas cerebri septem homines capiebat.

Nie-
remb. H.
N. l. 11.
c. 62.

Eques in os consistere posset. Maxillæ servantur in Escuriali usque ad decem & septes pedes porrectæ, viginti armatæ dentibus duorum dodrantum, minimi unius. Genitalia immodica. Appellatum idcirco monstrum piscis mularis. Aliqui eruditi lamiam fuisse putarunt ob fauces & ingluviem. Duo cadavera in stomacho reperta. Creditum quoque aliquibus hujus generis belluam devorasse Ionam Prophetam. Quis certo sciet?

CAPUT V.

De Pisce tauriformi & Amiloti.

Piscis tauriformis est Francisco Hermando pisculus vix duos palmos longus, sed pin-

Nie-
remb. H.
N. l. 11.
c. 24.

pinna munitus caudæ instar, sed pæne prolixia digitos: corio intectus duro, fusco, sed circa ventrem candenti, & ubique pentagonis sex angulifve distinctos figuris. Os est minimum, sed longiusculis munitum dentibus: Oculi magni, pinnæ circa aures binæ satis parvæ, quemadmodum & aliæ duæ, quarum altera circa extrema ventris est, altera verò juxta postremum dorsum; mirum est, in hoc pisciculo duas prominere juxta frontem spinas acuminatas, infractæ duritiei, instar corniculorum, ac totidem alias eadem magnitudine & forma circa ventris postrema. Vide an ad Boopa vel Acanthiam referri possit. *Amirol* vero est piscis teres, lacustris, squamosus, candescens, maculis aspersus pullis, sesquidodrantem longitudine, & pollicem crassitudine excedit. Binas pinnas habet in dorso, totidem in ventre, utrimque unam, ac infra ven-

trem alteram. Caput est oblongum, rostrum acuminatum: sed inferna maxilla prominentior. Oculi sunt nigri, iris aurea. Aureum caput, venter luteus, adeoque reliquum pæne corpus. Victum ejus sic commendat Franciscus Hermandus. Optimum & concoctu facile præbet alimentum; nam & ovis capitur magna ex parte onustus, adeoque gratum, ut cum gravem quandam evalissem ægritudinem, mihiq; nutrimenta omnia, à sanis hominibus & sagacioris palati vehementer expetita, sorderent displicerentque vehementius, hoc uno cibi genere suavissime usus sim, & advires instaurandas non mediocriter adjutus. Sed magnitudo ipsa adeo gratiam commendat, ut quo in majorem amplitudinem adoleverit, eo majori habeatur in precio, expetatur avidius, rarius inveniatur venalis, inventusque ematur carius.

Nierem.
N.H.L.
II. c. 16.



T 3

HISTO-

HISTORIÆ NATURALIS

DE

PISCIBUS.

LIBER

De Cetus.

CAPUT I.

De Cetus in genere.

Galen. 3.
de Alim.
facult. c.
21. & 37.



Æl. H.
A. l. 17.
cap. 6.
Plin. H.
N. l. 9. c.
7.

Arist. H.
A. l. 9. c.
2 & 4. de
partib.
c. 13.

Etorum nomine sepe tam apud Græcos quam Latinos ingentis molis pisces intelliguntur; hic pro illis duntaxat sumimus, qui pulmones, arteriam, collum & alia membra cum terrenis quadrupedibus communia habent, quibus omne propriè dictorum piscium genus destituitur. Specialius aliquando, seu pro Pistrice, seu pro Balæna sumi, apud Ciceronis Aratum, & Oppianum videbis. Integuntur corio, qui Macedonibus, dum è Mesambria Tocam navigarent, visus, corio squammoso, tam crasso ut cubitum æquaret, ostreisque patellis, & algis oppletus, pro monstroso habendus est. Lora ex eo fiunt, quibus maxima pondera per cochleas sublevantur, simili duritie & nervose esse, & chordas ex iis ad bellica instrumenta confici, prodidit Ælianus. Pulmones habent, quod plus caloris, quia ingentis molis animalia, ut possint moveri, requirunt. Branchiis idè carent, sed fistulas (ora vocat Plinius, nares Ovidius, Cardanus oscula) acceperunt. Ductus hæc ab ima palati ad extimam parte duplex, septo distinctus, & nostrarum narium foraminibus ad palatum deductis, proportionem quodammodo respondens. Unicum in extima parte literæ C. figura foramen apparet, quod carne pingui, tanquam operculo, regitur. Respirationis gratia datas, vel exinde colligas, quod obturatis, citius moriantur, quod in Delphino Rondeletius observavit. Os ipsos subter habere, Aristoteles & Plinius reliquere, ut dum resupinantur, pisces quoscaptant, evadendi tempus habeant, in promptu habere, observavit Rondeletius. Resupinatos tamen cibum capere, tum ob dictam causam, tum propter longam & multum infra descendentem oris scissuram. Carent quidam Dentibus, instructi quidam, ferratis, planis, exertis, aliquando hominis similibus. Eboris instar can-

didos, ad opera firmos, anteriores latos, ne hæreret cibus, posteriores acutos, ut promptius divideretur, apud Cardanum legimus. Mammæ feminæ habent, detractos aliquando ex una in Aquitanico littore duo lactis cados, Rondeletius prodidit. Audire certum, & nulla manifesti instrumenti vestigia, ut putat Aristoteles, Rondeletius tamen in Delphini cranio, meatum qui ad cerebrum usque excurrit invenit. Vehementer pinguescunt, quod piscium carne alantur, & moveantur tardissimè, quod tardo motu digeri posset, densitate corii præpeditur. Internas partes verbis Rondeletii describam. Sub peritoneo, inquit, partes quæ ad nutritionem & generationem conformatae sunt, ad quadrupedum terrestrium magis quam ad piscium partes accedunt. Nam Epiploon habent, sed minus pingue, quo ventriculus & intestina incalescunt, & foveantur. Ventriculus, magnum, cum ad justam magnitudinem accreverint: in recens natis exiguus est, & geminus videtur. Ejus fundo pancreas hæret, definit in intestina, quæ in multos gyros convolvuntur, eadem ferè ubique crassitudine, præterquam in extremis, quæ mediis paulò sunt latiora. Mesenterium, vertebrae annectitur, glandulas nigras, venas, arteriasque intertextas habens. Renes venæ magnæ trunco, arteriæque magnæ per emulgentes annectuntur, sunt inter epar & testes siti. Urina per ureteras in vesicam percolatur: quæ terrestrium animalium vesicis similis, sita est inferiore ventris parte. In iis qui utero adhuc gestantur, in urachum definit, per quem urinam deponit in allantoidem tunicam ad diem usque partus. Editi in lucem, per pudendum urinam veluti terrestria emittunt, & per musculus sphincterem retinent. Vracho arteriæ umbilicales adhærent, arteriæ magnæ inferioribus ramis insertæ. Utrinque sunt testes oblongi, quibus præparantia vasa præposita sunt, infiniti scilicet venarum arteriarumque è magna vena ortarum ramuli, qui post varios & multiplices anfractus, in epidymis inferuntur. Cum enim magna sanguinis copia, multo semini generando necessaria sit, quæ longo vasorum ductu, ob spatii brevitate transmutari & elaborari non potest, folerter

Cardan.
variet.
cap. 37.

Aristot.
H. A.
l. 4. c. 8.

solenter admodum natura gyros illos vasorum constituit, ut illis, id quod longitudini deest, pensaretur, & quibus singuli meatus capreoli intorti dependent, & glandulosa corpora radici pudendi adnata desinunt; ex quibus meatu urinario, nervo cavo *genitale* constat humano simile, cujus extremum foris propendet, in glandem tenuem linguis avium similem desinens, quæ præputio non omnino integitur: intus replicatum latet, ad veneris usum exoritur. Venas suas, nervos, arterias, idem pudendum habet. Ossi innitur, quod os pubis proportionem respondet. *Thorax* costis veris ac mendosis, sterno, vertebis, musculis constat: cujus capacitatem *pulmones* magni complent, densiore substantia quam in terrestribus: crassitudine & colore hepar quadrupedum referunt, tum, ne aqua in rariorem substantiam penetrans, ejici non posset; tum ne in magnis expirationibus, quibus in aquis ferè semper coguntur, tenuior substantia ferè disrumperetur. At in duas partes divulsi sunt, parte inferiore adeò gracilescunt, ut membranam esse affirmes. Undique *Cor* complectuntur pericardio conclusum, in medio thorace locatum, nulla in re porcorum cordi absimile: duos sinus, totidem auriculas, denique omnia similia habet. Adhæc, asperam arteriam, Oesophagum, musculos & quæcunque in terrestribus corporibus sunt, clavicula exempta, reperire est. *Caput*, cum vertebis articulatur. *Cerebri* dispositio diversa. Nam in antèrius & posterius divisum est, non in dextrum & sinistrum, ut in homine. *Nervorum* conjugationes ex eo nascuntur, plexus *χορδæ*, in eo rete mirabile, meninges duæ pro integumento. *Vulva* in foeminis cervicem palmum unum longam habet: ea deinde in ramos duos distribuitur, veluti in quadrupedibus terrenis videre est, testes ad uteri cornua positi, pudendum inter umbilicum & podicem. De *Magnitudine* in singulis speciebus dicitur. *Locum* si spectes, in solo nec tamen omni mari (Pontus Euxinus nullo habet) reperiuntur. Semperque ferè in alto versantur. Circa solstitia maximè visuntur, quod tunc illic ruant turbines, tunc imbres, tunc delectæ montium jugis procellæ ab imo vertant maria, pulsataque ex profundo, belluas cum fluctibus volvant. Aliàs in fundo maris ferè degunt, molis suæ pondere. *Cibus* ipsis pisces, harengi inprimis, quos quandoque tam avidè persequuntur, ut in littora vadosa impingant. *Generant* intra se, & catulos enituntur. Hi teneri sequuntur matrem, quod à nautis visum. *Motu*, ob corporis molem, & ventris ingluviem tardo feruntur. *Visus* & *ruditus* ipsis hebetior. Hinc curiosæ omnium naturæ beneficio, pisciculis, si credere fas est, tanquam duce utuntur. Odore piscis adeò delectantur, ut sese navi affricent. Strepitu

terreri Arrianus in rebus Alexandri M. prodidit. *Usus* in cibus, apud Ichthyophagos, prodente antiquitate invenere. Præparationem vide apud Aldrovandum.

CAPUT II.

De Cetis in specie.

ARTICULUS I.

De Balena.

EThæc de Cetis in genere sufficiant, in specie jam de iisdem agentur. Numerantur autem inter eos, *Balena*, *Balena vulgi*, *Physeter*, *Pristis*, *Orca*, *Delphinus*, *Phocæna*, *Scolopendra*, *vitulus marinus*, & *Manati Indorum*.

BALÆNA, Græcis *καταλία*, vel *κατα το βάλανον*, id est emittere, quod maris aquas per fistulas emittat, vel a *βάλανος* quo vocabulo Græci meatum in galeis militibus, cui plumas inferebant, indigitant, vel à Chaldæo *ph* quod & devorare dicitur. Ingentis est magnitudo. Visa in Indico mari, quaternum jugerum, seu nongentorum sexaginta pedum longitudine. Centum & quinquaginta cubitos, obtinebat, quem Nearchus ejectum vidit. Describitur à Bellonio, Rondeletio, & Aldrovando. De suo scribit Bellonius, adipem ejus velut oleum non condescere: pinnas habere utrinque unam & tertiam in dorso, quæ totum corpus dirigit. Caudam lunatam, Corium nigrum, cui pinguedo pedis altitudine subit, lardum quadragesimale appellant. Lingua eidem aliquot librar. pondo. Ante oculos prætenturæ, seu tenues quædam assulæ, quatuor ulnas longæ, ac sesquipedem latæ, longissimis villis præditæ, quibus iter prætentat. Ossa tam magna, ut postes ex iis fieri soleant. *Rondeletius* suæ parvam linguam, & quæ quatuor duntaxat vel quinque vasa fassamentaria adscribit. Alibi, penem se unius vidisse, qui à procero homine humeris deportatus terram contingeret, scribit. In ejus, quam *Gesnerus* describit, ventriculo tria dolia crudorum pisciculorum, inter quos salmo unius ulnæ longitudine, inventa sunt. Pelle nigro undique tegebatur, nisi quod maculæ duæ candidæ, utrinque supra medium oculi inciperent, & retro tenderent. Tota maxilla inferior erat candida, & pars quædam sub ventre. Plura apud Gesnerum vide. *Aldrovandi* prior colore erat subcæruleo, tota maculis nigricantibus confersa, ventre candido. Altera, quam Bufalinam vocat tota nigricabat. Capra erat An. M. D. LXXVII. in Scaldi decem ab Antwerpia milliariis monstrofa, quam Pareus descripsit. Longitudo ejus erat pedum octo & quinquaginta, altitudo sexdecim. Cauda quatuordecim pedes lata, ab oculo ad extremum rostrum intervallum sexdecim pedum, Ma-

Tab. xlii.
Tab. xlii.Vossius
de Idol.
l. 4. c. 32.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 3.

Schonfeld. in Ichtyol.

Ælian. H. A. l. 16. c. 18.

Plin. H. N. l. 9. cap. 6. Schonfeld. in Ichtyol.

Philostr. l. 2. de vita Apollonii.

Arist. H. A. l. 4. c. 10. Oppian. Halieut. l. i. v. 404. Ælian. H. A. l. 9. c. 50.

Maxilla inferior fenum in singulis lateribus pedum erat, viginti quinque dentibus armata, qui totidem foraminibus in superiore dentibus omnino carente excavatis, recondi poterant. Tot dentium longissimus sex pollices non excedebat. *Locus* ipse procul à terra ubicunque degit. Plurimas autem circa Islandiam, Gronlandiam, & vicina Septentrioni loca, à Biscainis, Anglis, Hollandis, circa æstivum in primis solstitium, quo tempore sinus recessusque maris pacatiores quarunt, capiuntur. In Taprobana mari Thunnis insidiari, apud Ælianum legitur: in Gaditano Oceano non ante brumam conspici: statis temporibus in quodam sinu placido & capaci, mirè gaudentes ibi parere, condi, Plinius prodidit. *Vittus* ipsis pisces, visus qui quadraginta asellos devoraverat, eosque adhuc recentes, quos oculatus testis dissectos & sale conditos ad solem siccavit. Sunt qui comedere masticando negent: pisces deglutire integros, eosque minutos, quod interna gutturis membrana nil magni ingredi sinat, dicunt. Quidam carne vesci negant, quod in capta visceribus præter mucum & spumam nihil reperitur. Pisciculum Lodel venatoribus dictum, si copiose voravit inobviatur quasi, & in furem acta, nec hominibus nec aequalibus suis parcat. De *Coitu partuque* (verba sunt Schonfeldii) venatores referunt, Balenas contracta societate & consuetudine in amorem mutuum, quum conjunctione, saltatione, aliisque affectuum conjugalium significationibus inter se testantur coire; hinc unà natate semper, amicitiamque captam conservare, donec accensa ad libidinem foemina, erecto ad perpendicularum & in caudam corpore, marem eodem posito obvium, pinnis suis, tanquam brachiis duobus, amplectatur, mutuoque complexu per horæ dimidiam, vel integram utraque hæreant: Inde conjugium & conversationem ad mortem usque colere. Famellæ fatum autumnio inter Octobrem & Januarium pariunt, unicum, tauro non minorum, imò majorem pro matris quantitate, qui sub maternas pinnarum præsidii & tutela tutas, non deserit parentes, nisi ablactatus. Philostratus faucibus ab eis filios abscondi, si quando majorem belluam fugere contigerit, prodidit, quod & apud obscurum de natura rerum authorem invenies. Terræ defectu aquæ affinis, aquâ ore recepta & ejaculata succurrere, fide ejusdem dicitur. *Dormire* edita per summa fistula, Aristoteles author est: stertentes audiri, Plinius: in sicum exire ut à Solis radiis calefiant, Oppianus & Ælianus. *Inimicitiam*, cum Delphino, Thunnis & Orca gerit. A gladio pisce ut supra diximus vehementer timetur. Ziglerus castoreo aqua diluto & in mare effuso adeò terreri, ut totus grex dissipetur prodidit. De *vena-*

tione & captura vide Schonfeldium. *Ufus* adipis in lucernis, ad inungenda coria, currum rotas, & alia. Cardanus viscera quia pingua, & sapore & violæ quasi odore commendari scribit. Galenus eis mucosum saporem tribuit. Viginti balenarum genera apud Hartenium inveniuntur, ex quibus *Primum* quot Ninting vocatur hominem fugit, & comestibile est. *Decimum*, quod Filsraake, haleces versus terram fugat. *Undecimum*, quod triginta ulnarum, ultra septuaginta dentes habet, & eos tam magnos, ut inde tabulæ ac manubria cultellorum fiant. *Duodecimum*, non habet pinnas in dorso. *Decimum quintum*, quod Rodkemling vocatur, subvertit naves, & X L. est ulnarum. *Decimum sextum*, quod Nahwal, antierius in superiore mandibula, dentem longitudinis septem ulnarum, adeò exactè tortum in circuitu, ut humano ingenio melius fieri non posset, habet. *Decimum septimum*, quod Skeling, octuaginta ulnarum, diversos superciliorum supra oculos habet ordines. *Decimum octavum*, quod Nordhwal, nonaginta ulnarum, vivit nisi de pluvia & rore cœlesti, quod Haffnegruffæ, magis insula esse videtur quàm piscis. Fides sit penes authorem.

Galen. l. 3. Alim. Schonfeld. in Ichtyol.

ARTICULUS II.

De Balena vulgi, & Physterere.

Bellua hæc ut plurimum triginta sex cubitos longa est, octo alta, ut Rondeletius describit. *Oris* scissura ad duodeviginti pedes porrigitur. *Dentes* in eo nulli, sed horum loco in utraque maxilla, corneæ sunt laminæ nigræ, sensim in pilos suillis similes desinentes, quæ in anteriore & posteriore sive interiore oris parte breviores sunt, in media longiores. Ab interioribus *Lingua* intus continetur & coercetur: inde abducta vel abscissa ita diffunduntur, ut in eundem locum iterum recipi non possit. *Oculi*, quatuor ulnarum spacio à se distant, foris parvi apparent, intus capitis humani magnitudinem superat. *Pinnas* duas maximas in lateribus habet, quibus natat, & catulos in metu occultat, in dorso nullam habet. *Cauda*, situ caudis Delphinorum similis est, figura non multum ab similibus, quam cum movet, ita mare agit, ut naviculas submergat. *Rostro* est brevi. *Fistula* caret. *Corio*, duro, nigro, integitur, sine pilis, cui lepades, & ostrea hærentia aliquando reperiuntur. *Internæ partes*, veluti in Delphino. In ventriculo mucus, spuma, aqua, alga foetida, ambra inveniuntur, ut exinde Carnivoram non esse colligas. Vitulos vivos parit. Carnis nullus in *Cibis* usus, sola lingua commendatur, sale condita. Viginti tria sape

Aldrov. de Cetis cap. 7.

Aristot.
H. A.
l. 3. c. 12.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.

sæpe vasa eâ implentur *Mysalæ* Aristotelis esse, vel exinde colligitur, quod pro dentibus setas, quibus intus os hirsutum est, habeat. Plinius musculum manuum benè dixit, sed pro duæ Balænæ malè posuit.

PHYSETER. qui & Physalus, *μαρὰ τοῦ οὐρού*, id est à flando dicitur, quod copiosorem aquarium eluviem præ cæteris efflare scribatur. Gesnerus eundem vel saltem affinem cum Pusti, qui *μυστὴρ, μυστερ & μυστιν*, dicitur, facit, quem vide. Diversum esse à Physalo maris rubri, ex descriptione videre est. Magnitudine hic adulti Gobionis, sine ore, cum branchias tamen habeat, perniciem ei qui gustaverit creat. Intumescit enim, tandemque ventris profluvio vita finitur. De *Descriptione* inter authores non convenit. Plinius ingentisque columnæ modo se attollere scribit. Solinus super antennis navium velis quondam diluvium eructare addit, quod Strabo commune cetis in mari extero circa Turdetaniam facit. Turnerus portentosæ magnitudinis cetum facit, & singulos se eorum tantum aquæ è fistulis, quas in capitibus habent ejaculantes vidisse, ut singuli singulas naves aquarum copiâ in profundum submergerent, adjicit. Bellonius hoc solo à Balænis differre, quod nullas prætenturas habeat, neque tam vastâ corporis mole, figuraque sit magistereti. Rondeletio est ore maximo, dentibus acutis, serratis, linguâ carnosâ & magnâ, fistula longè quam reliquis crassiore, pinguedine multa.

ARTICULUS III.

De Puste & Orca.

Tabula
XLIII.
Aldrov.
de Cetis
c. 5.
Bellon.
de Aquatilib.
l. 1.

Aloysius
l. 6. Navigat.
Clusius
Exot.
l. 6. c. 19.

PUSTES à secando, quod perniciosissimè nactet, dictus est. Perperam à Bellonio capite vasto, rotundo, & cacabi figuram exprimente describitur, quo modo namque aquam velociter secaret? Rondeletio est rostro, valdè longo, osseo, utrinque aculeato. Aculei validi sunt, & Delphinatorum dentibus similes. Aloysius Cadamustus feram aquaticam vocat, eaque in assamenta secari ligna scribit. Clusius ipsius formæ ratione inter Galeos seu canículas reponi debere affirmat: cumque ita ex pictura describit. Erat hic piscis, inquit, corporis formâ & colore Galeorum generibus, aut Caniculæ Aristotelis valdè similis: nullis tamen maculis ut illa, conspersam cutim habens, perinde tamen rudem, & instar Zygenæ cutis asperam, fusci in dorso coloris, in ventre candicantis, & sex pinnas habet, in lateribus, medio videlicet pænè corpore binas, &c. Caput in longum & angustum, planum & firmum rostrum porrigebatur, utrinque cum iis dentibus, sive osseis firmisque & rectis spinis, ex adverso sitis serræ instar munitum, viginti vel etiam pluribus, &c. Binos oculos in prona capitis parte habebat,

binas nares in supina, & infra illa oris scissuram, at Zygenæ fere transversam. Reperitur plerumque in Oceano occiduo.

ORCA Latinis à vasis olearii aut vinarii similitudine dicitur. Quodnam apud Græcos habeat nomen, vix compertum, nisi vocabulo Orygis apud Strabonem, quem in mari extero circa Turdetaniam ponit, veniat. Bellonius ocrynum Oppiani esse credit, sed perperam. Thunni enim hic genus maximum. Delphino est corpore toto vigesies crassior, potissimum circa ventrem: Toto tergo atrâ, ventre ex albo roseo, ad latera ferè cærulea. *Rostrum* habet sinum, sursum repandum, cujus labri inferioris tanta est crassitudo, ut à superiore sejungatur dum piscis pronus est, quadraginta triculenti in eo dentes, quorum anteriores obtusi & graciles, posteriores acuti & crassi sunt. *Oculi* eidem sunt parvi, pinnae pro corporis magnitudine pusillæ. *Cutis* glabra & politissima. *Cauda* lugata, & ulnam distenta excedens. *Pudendum* mari in medio ventre abstrusum, duor. pedum longitudinem excedens, in scemina ano vicinum est, ad quod utrinque duorum digitorum intervallo, quædam foramina visuntur, in quibus mammarum papillæ delitescunt. Sæpe octingentas, aliquando & mille libras excedunt. *Lienem* unico orbiculari globo in placentæ formam effectum habet. Plurimum aquæ per fistulas ejaculari, Plinius author est. *Orca*, inquit, in portu Ostiensi visa est oppugnata à Claudio Principe. Venerat tunc ex adificanti eo portum, invitata naufragiis tergorum è Gallia advectorum, satiansque se per complures dies, abveum in vado sulcaverat, accumulata fluctibus in tantum, ut circumagi nullo modo posset, & dum saginam persequitur, in littus fluctibus propulsa, eminentie dorso, multam super aquas, carinæ vice inverse. Pratendi iussit Cæsar plagas multiplices inter ora portus, profectusque ipse cum prætorianis cohortibus, populo Romano spectaculum præbuit, lanceas congerente milite, è navigis assultantibus quorum unum mergi vidimus restans belluæ oppositum nuda. De earum & Balænæ pugna ita quoque Plinius: Balænæ & in nostra maria penetrant. In Gaditano Oceano non ante brumam eas conspici tradunt. Condi autem æstatis temporibus in quodam sinu placido & capaci mirè gaudentes ibi parere. Hoc scire orcas, infestam his belluam & cujus imago nulla representatione exprimi possit alia, quam carnis immensæ dentibus truculentæ. Irrumpunt ergo in secreta, & vitulos earum & scetas vel etiamnum gravidas lancinant morsu, incussa que ceu Liburnicarum rostris fodiunt. Illæ ad flexum immobiles ad repugnandum inertes, & pondere suo oneratæ, tunc quidem & utero graves, pariendive pænis invalidæ, solum auxilium novere in altum profugere, seseque oponere, & cautum

Aldrov.
c. 6.

Strabo
Georg.
l. 3.

tium angustis trucidare, in vada urgere, faxis allidere. Spectantur illa praelia ceu mari ipso sibi irato, nullis in sinu ventis, fluctibus verò ad anhelitus ictusque, quantos nulli turbines volunt.

Hucusque Plinius.

ARTICULUS IV.

De Delphino.

Tabula
XLIV.
Aldrov.
de Cetis
c. 7.

Piscis quem Latini Delphinum vocant, is Græcis *δελφίν* & *δελφί* & si minutus *δελφινέριον*, plerisque Europæ nationibus, Porcus marinus dicitur. Ex Cetis esse, quod branchiis careat, pulmonemque & arteriam habeat, Aristoteles reliquit. Repando dorso incurvum esse plerisque proditum, unde incurvè cervicem pecus Pacuvius vocavit, seu quod talis oculis nostris, dum ab undis exiliens in mare præceps fertur, propter celeritatem motus appareat, seu quod, quia branchiis destituitur, revera corpus, cum se vibrat, incurvet, ut promptior in gurgitem pronus feratur.

Plinius
H. N. I.

Rostro ei est simum, unde Simonis nomine gaudere Plinius scribit. *Linguam* mobilem, brevem, latam, carnosam, exertam in ambitu serratam, suillæ non absimilem. *Dentes* parvos, acutos, pectinatim coeuntes. *Oculos* magnos, sed cute adeo reclusos, ut pupilla solum appareat, non longe ab oris scissura, quin in eadem propemodum linea sitos. De *Fistula* situ non convenit inter auctores. In dorso esse scribunt Aristoteles & Plinius, ante cerebrum Rondeletius, cuius verior sententia, inter oculos Bellonius. In dorso esse creditum veteribus, quod magis ad posteriorem partem quam in balena spectet. *Pinnis* duabus validis natat, quæ veluti hominis brachia cum omoplati articulis junguntur. Earum musculi quatuor robusti dorsi pectorique annectuntur. Hæ in ventre sunt, ita sitæ, ut non solum natatum, sed & motum, quo sursum se effert respirandi causa, adinvenit. In dorso quæ est, aculeatam Plinius, & Pausanias faciunt, propter duritiem sine dubio. Nam rigidam satis esse Rondeletius testatur, duæ quæ in cauda, ex ejusdem lateribus, altera dextram, altera sinistram partem versus, ita ut cauda, quæ lunata, aquam latitudine sua verberet. *Sextum* si attendas, pudendi in *femina* orificium, ano vicinum est ad terrestria animalia accedens. binas eadem, si Plinium sequimur, in ima alvo papillas tantum gerunt, nec evidentes, & paulo in obliquum porrectas. Aristoteles mammas prope genitale continere ait, papillas quadrupedum more conspicuas habere negat, sed velut alveolos quosdam humoris duos esse scribit, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore catulorum parentem sectantium excipitur. *Vulva* cervicem pal-

Aristot.

lum unum longam habet, quæ deinde in ramos duos veluti in quadrupedibus terrenis videre est, distribuitur. Testes ad uteri cornua, pudendum inter umbilicum & podicem gerit. *Mari* foramen quoddam in medio ventre apparet, è quo pudendum quadrupedibus simile exit, quod in congressu erigitur, & extra eminens profertur. Ideo fortè Aristoteles genitale foris esse dixit, testes intus, qui secundum Plinium prolongi, ad alvum necti. *Felle* omnino caret. *Locum* si spectes, nullum ferè sine Delphinis mare, adeo ut & in Ponto, quem nulla piscibus inimica belluâ ingreditur, reprian- tur, & in Adriatico quamvis raro capian- tur, sed & aquas dulces subit, & Nilum ipsum, ibique piscibus aliquandiu pascitur. Illos tamen non esse, quos Solinus serratas cristas habere. Crocodicolos studii ad natandum elicere, demersosque astu fraudulento tenera ventrium subternantes secare & interimere, scribit, facile mihi persuaderi patior, quod Marcellinus non Delphinos, sed Delphinis similes vocat. Accipit à Græcis qui circa Propontidem salitant Bellonius, eosdem instar aliorum piscium migrare, è mari mediterraneo videlicet Septentrionem versus, Hellespontum & Propontidem emetiri, Euxinum ingressos certo tempore immorari, tum denuo loca prius relicta repetere. *Cibus* Delphino pisces, in quos crudeliter grassatur, habetque Cephus aves comites, quæ ab eo accisorum sanguine pascuntur, ut Oppianus scribit. *Vita* longa, ad tricenos sæpe annos produ- citur, fortè quod felle careat. *Coitus* humano similis, illeque paulò quam piscium qui attritu ventrium coeunt, diuturnior. Aristoteles tamen cæterorum more congregi scribit. Gestat utero decem mensibus, & singulos uno partu, interdum & binos edit. Parere æstate, nec ullo alio in vulgatis Plinii codicibus legimus. Rondeletius foetum verè aliquando extraxit, alteram foeminam Octobri dissecuit, inque ejus utero tum demum formari ceptum foetum invenit. Chorion amnio & allantoido tunicis, is in utero involvitur, sanguine per venas umbilicales nutritur, spiritum per easdem arterias recipit. Proles celeriter adolescit, quippe annis decem ad summam magnitudinem perveniat, ut tradit Aristoteles. Pro *voce* ipsis gemitus est humano similis, ut Plinius prodidit. Rondeletius stridore medere scripsit, vocisque nonnihil. *Visum* habent acutissimum, ita ut piscem etiam sub lapide vel in caverna aliqua latitantem videant. Omnium tum terrestrium tum aquaticorum velocissimos Aristoteles dixit, ocyores volucre, ocyores telo. Nam cum fame concitati fugientem in vada ima piscem, diutius spaciū continuere, ut arcu emissi ad respirandum, emicant, tantaque vi exiliunt,

Plinius
H. N.

Solinus
Polyhist.

Aristot.
l. 5. c. 5.
Aristot.
H. A.
l. 6. c. 13.

Aristot.
H. A.
l. 9. c. 48.
Plinius
H. N. I.

Ælian.
H. A. lib.
12. c. 12.

exiliunt, ut plerumque vela navium transvolent saltu. Perniciei sæpe causa ista velocitas. Nam aliquando, dum Mugiles persequuntur, nec incitatum cursum inhibere possunt, terræ impacti, præda fiunt; quod & tum fit, cum vel asylo infestantur, ut Rondeletius observavit, vel nimio piscatorum strepitu gravantur. Plinius tellure tactas mori ait, repugnante experientia. Nam & Aristoteles extra aquam mutientem & anhelantem cæterorū spirantium more reliquit, & Gesnerus Arimini captum tres dies in terra vixisse scripsit, & Rondeletius vivos à Mospeliensibus Lugdunum usque deportari affirmat. Gregatim ex ætatum ratione dispositi natant. Parvuli præcedunt, adultiores sequuntur. Hoc singulari in prolem amore fit, quo etiam motus tenellos in fauces recipere, ut Solinus dicit, vel saltem eos in faucibus aliquando gestare, quod Oppiano & Gesnero visum, solet. De ipsorum somno ita Plutarchus: *Delphinus dormiens de summo per altum demittitur, tantisper dum in vadum inpingat, solumque sentiat: Hic excusso somno ronchoque edito ad summum rursus meat, rursusque demittitur, ac pronus fertur, imo quodam mirabiliter composito quietem captans. Ingenium singulare respicit, quod parentes senio confectos alant, sui que corporis nifu natatum tanto amore prolequantur, ut sæpe aliquem ex se captum ad portum usque comitentur, mortuum verò quasi ad sepeliendum efferant; quod Hesiodi à latronibus interfecti in mare projectum cadaver, ad Rhium & Molycriam deportasse legantur, quod navibus in qua aliquis ex delphinicidis, coorta tempestate, quali in ultionem perniciem struant, quod à Græcis, Italis, Venetis inprimis nautis creditur, quod Serapidem & Dyonisium, jussu Ptolomæi Soteris revehentibus, & supra Maleam abreptis, ducem se ad stationem præbuerint; quod Simonis nomine miro modo gaudeat, ut post Plinius, Gillius cum ad Antipolin provincie Narbonensis urbem navigaret expertus scribit; quod captus miserationem gemitu moveat, ut auritus testis Gillius prodidit, quod denique cantu & Musicâ, unde illa de Arione in mare injecto & à Delphino liberato, seu fabula, seu Historia, oblectetur. Tempestates lasciviendo præfigere nautæ, Bellonio refragante affirmant, & à nobis cum ex Anglia Scotiam aliquando peteremus observatum est; seu quod aëris mutationibus non aliter ac ægri afficiantur; seu quod procellâ exsurgente, consurgentes ab imo maris exhalationes, calorem in Delphinis excirent, quem ut temporent, crebrius erumpunt. Piscatoribus Euboicis in piscatione subsidio esse, authoribus proditum est: Verum rectissimè Bellonius, non suo ingenio sed fortuito id facere, observavit. Si enim in Celerinorum aut Sardiniarum gre-*

ges inciderint, capitibus absumptis, truncos capientibus relinquunt. Pisces verò irruentis Delphini impetu consternati, postquam in aërem exiliissent, tam denso interdum in mare agmine relabuntur, ut pluviam repræsentent. Quæ de Delphinor. in pueros amoribus dicuntur, apud Gellium & Aelianum invenies. *Inimicitias* cum Balæna, ut apud Philen legimus, Pompilo, & Amisgerit. Ex pisciculis, Pediculum parasitum habet, de quo ita Aristoteles: Maris quod à Cyrena in Ægyptum panditur, piscis Pediculus nomine circa Delphinum est, qui omnium pinguis sit pabuli copiâ, quæ Delphini operâ suppeditatur. *Usus* ejus quibusdam gentibus in *Cibis*, & quidem tantus, ut in mensas Principum veniat. Maxime tamen hepar & lingua commendantur. Illud tenerum, sed mali succi. Hæc, tenerior pinguior & hepatis præferenda. Cardanus viscera non solum sapore sed & odore quasi violæ commendari scribit. De *Usu in Medicina* pauca occurrunt. Kiranides ventrem siccum & tritum spleniticis prodesse, jecur assum & in cibo sumptum, tertianam & quartanam integre sanare scribit. Plinius febrium circuitus tolli ait, si ante accessiones degustatum fuerit. Dentium cum melle Cinis infantium gingivis dentitionibusque confert. Alligatus, pavores repentinos tollit.

ARTICULUS V.

De Phocæna & Scolopendra Cetacea.

Phocæna Delphini species est. Rondeletius quidem diversum à Tursione facit; sed Gaza, motus sine dubio Plinii verbis, qui Tursiones Delphinorum similitudinem habere scripsit, Phocænam Tursionem vertit, & pro iisdem, Scaliger, Bellonius, Gesnerus, Jovius & alii agnoscunt. Differt tamen & ab eo qui Athenæo ^{Sopæda} dicitur, & à *Platanissa*, quem Plinius in Gange Indiæ rostro & cauda Delphini, magnitudine verò quinque cubitorum, facit. *Descriptionem* si attendas, ita de iis Plinius: *Delphinorum similitudinem habent, qui vocantur Tursiones. Distant & tristitia quidem aspectus: abest enim illa lascivia; maxime tamen rostris. Canicularum maleficientia assimilati.* Nobis ex Bellonio & Cardano, ista placet. Phocæna Delphini est magnitudine, brevior tamen crassioreque corpore. Captus aliquando in Neustria, qui mille libras pendebat, adeo pinguis ut teres videretur. *Caput* habet obrusum, *Rostrum* tam simum ut cum capite ferè rotundetur; *Meatus auditorios* admodum obscuros si reperire volueris, ab oculi majore cantho, sex digitor. intervallo caudam versus accuratè disquirere, illucque grandem culmum inferere oportebit. *Pinna* eidem solidæ ac nigræ.

Gell.
Noct.
Atticar.
l. 7. c. 8.
Ælian.
H. A. l.
6. c. 15.
l. 8. c. 13.
& l. 2. c.
6.
Arist. H.
A. l. 5. c.
31.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 10.

Tab.
XLI.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 6.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 3.

Cardan.
in variis.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 8.

Plutarch.
l. utra a-
nimalia.

Arist. H.
A. l. 9.
c. 47.

Plutarch.
in Sym-
pos.

Plutarch.
l. utra a-
nimalia.

Plin. H.
N. l. 8. c.
35.

Tergoris color ex ceruleo in obscurum livens. *Cauda* lunata. Cardanus eum qui Diepæ in Neustria captus erat, *fistulam* in medio perquam aquam effunderet, *digiti* magnitudine habuisse scribit. *dentes* quoque obtusos, & hominis molaribus similes. Minxisse, ore aperto respirasse & suspirasse; *Lachrymatum* fuisse, profluentibus ex oculis guttulis; diuque supervixisse, quamvis sanguis è vulnere, non secus ac vinum è siphunculo flueret, addit. Nullius non maris est incola. Bellonius sæpius in Oceano Gallico quam Delphinos capi scribit. Rondeletius etiam in Ponto vivere, & in loco illo, Aristotelis, *ἔν τῳ πόντῳ ἐστὶν ὁ δελφίνος ὅστις ἴσται ἐν τῷ πόντῳ*, &c. *ἔστιν* pro *quandam* ex eodem Aristotele, qui antea Phocænam in Ponto nasci scripserat, legendum esse putat. Hoc alii de vitulis marinis accipiunt. *Parit* magna ex parte binos vel singulos ut Aristoteles prodidit. Bellonius in forum Parisiis, diebus Veneris inprimis adferri reliquit. Delphino tamen est deterior, quia pinguior.

Arist. H.
A. l. 8.
c. 13.

Ælian.
H. A. l.
13. c. 13.

SCOLOPENDRA CETACEA. Ælianus solus meminit. Exerunt aliquando totum è mari caput. Narium pilos magna excellentia apparere, caudam perinde atque locustæ latam conspici, reliquum corpus aliquando in superficie æquoris spectari, & cum triemi justæ magnitudinis conferri posse: Per multis pedibus, utrinque ordine fissis, tanquam ex scalmis appensis natare. Ad dunt inquit harum rerum periti ac fide digni, ipsos etiam fluctus ea natante leviter subsonare. Pro hac Cetacea Scolopendra, hanc quam exprimi curavimus Aldrovandus exhibet. Tota ad colorem ceruleum vergebat, ad latera tamen & in ventre nonnihil rufescebat.

ARTICULUS VI.

De Phoca, seu Vitulo marino.

Tab.
XLI.

ET si Phoca animal sit amphibium, quia tamen humore potissimum victitat, nec diu extra aquas vivere potest, inter aquatilia referre placuit. Græci *φωκά* dicunt, seu ex *φωκ* boatu quem edit, unde Servius apud Virgilium, *Phocas*, *marinos boves* interpretatus est, seu aliunde ducto vocabulo. Plinius & Gaza vitulos marinos, ille, quandoque Vitulos simpliciter dixit. Festo *Βοκάς*, ut Gesnerus conjicit, vocatur. Varinus *φωκά*, Oppianus *φωκά* dixit. Differt *Corporis figura* ab omnibus tum piscibus, tum Cetis, adeo ut quadrupedum vocaverit Aristotel. Habet quippe, ut oculatus testis Rondel. scribit, veluti *brachia* sine cubito, sine ulna, brevissima: Quod sequitur, Carpo nostro respondens, ex multis ossibus constat: Metacarpium verò, ex quinque ossibus quæ pelle tantum teguntur: inde tanquam manus indivisa, præ-

terquam in extremo, in quo quatuor linearum distinctiones, tantum spectantur, ungues autem quinque distincti. Quia pinna- rum vicem agunt, ideò Homerus *φωκά* *ἰσται* cognominavit. *Corio* tegitur duro, solido, pilis nigricantibus & cinereis, quædam maculas parvas albicantes in ventre habent. Plinius *Cartilagine* non ossa habere scribit, sed Aristoteles carne abundare mollemque esse, & cartilaginibus ossibus constare, author est. *Caput* est breve, & pro corporis magnitudine parvum. *Collum* longius, quod pro arbitrio extendit & contrahit. Inferior *maxilla* Lupinæ similis est, superior quam in lupo latior, hacque & naribus vitulis terrestribus affinis est. Oris scissura mediocris. *Superciliorum* locum & superius labrum pili duri alias nigri, aliàs albi tegunt. *Dentes* sunt serrati & lupinorum similes. *Oculi* splendent & subinde in mille colores ut hyænæ transeunt. *Lingua* est scissa, id est bifurca. Plinius duplicem facit, Rondeletius latam esse addit. *Auribus* caret, quod vitam in humore traducat, partes verò aurium meatibus additæ, ut motus æris à longè delatus servaretur: sed loco eorum meatus angustissimos & exiguos habet, qui in viventibus sunt evidentes, in mortuis difficillimè inveniuntur. Lato est *pectore*. Omoplatas enim habet quaternis musculis connexas, superiore vel posteriore in parte quam canes terrestriaque alia animalia, quæ in lateribus eas habent. *Fel* in hepate habere negat Aristoteles, omnino habere, Bellonius. *Plinius* tribuit, sed partem non exprimit. *Renes* ei sunt firmissimi & solidissimi, cum reliquor. omnium magis minusve cavi. *Genitale*, maribus oblongum, fœminis ad terrestria accedens. Aristoteles simile *Rajæ* esse ait. *Locus* Phocæ aqua & terra. Nec penitus illa carere potest, nec in ipsa agere secus, nisi per intervalla quædam respiret.

Vesuntur piscium carnibus, & in vivaria immissi, furibundi in eos fœviunt; apud Troglodytas extra sinum Arabicum piscium capturæ non minus ac homines intenti. In retia delapsi, dilacerant eadem, & piscibus una captis effugiendi ansam præbent. Leporum & aliorum retro mingentium ritu *mingunt* & *coeunt*, nempe averſi, inque medio coitu coherent. *Pariunt* in terra pecudum more, nunquam geminis plures, scribit Plinius. Secundinas emittere scripsit Aristoteles. Prolem circa duodecimum à partu diem in mare deducunt, quod Calpurnius inter impossibilia recensuit. Maxima ex parte per littora vagantur, & vicinos agros, vineta & pomaria deperdunt. Si quando colliculum ascenderint, indeque secedere coguntur, pedibus ac capite in ventrem contractis, ac toto corpore in globum constricto, maximo impetu in mare devolvuntur.

Aristot.

Plin.

vuntur. Non procul tamen à littore recedunt, quod ipsis difficilis pedum in terra usus sit. Difficiliter interficiuntur, nisi capite eliso, quod corpus totum carnosum sit. Extra aquam ad solem in arena littoris vel super saxa, dormiunt, ut liberius respirent. Nullum animal graviore somno premi auctor est Plinius. Non aliquoties, cum Andream in Scotia studiis operam daremus, tam prope ad stertentes accessimus, ut lapidibus infestari potuerint. Postquam se in aquas coniecissent, elato ex undis capite nos intuebantur. Inter dormiendum tam altè stertunt, ut mugitum edere videantur, quod Aristoteles quoque & Plinius meminere. In causa pituitosus humor, qui in aspera arteria, inspirando & expirando exagitur. Sed & in aquis fortè dormiunt. Nam & ranæ, quarum more sub aquis diu urinantur, longissimo anni tempore, sub aqua latere possunt, ne quicquam de pulmone dicam, qui exiguus, spumofus, nec sanguineus. Ingenium si spectes. Sæpissimè murescit, & naturam ferinam deponit, & quod mireris, accipit disciplinam, voceque pariter & visu populum in spectaculis exhibitus salutat, & incondito fremitu, nomine vocata, respondet, sed & in hominem amore fertur, hac in parte nihil à Delphini natura abhorrens. Visus aliquando vitulus marinus, qui ad principis Christiani nomen gaudio perfundi videbatur, obmutescere ad Turcæ. Is etiam cujus Rondeletius iconem dedit, in Lerini insulæ Cænobio, nullo metu cum hominibus per multos dies versabatur, adeo ut & gradus ascenderet. Damnis apud Philostratum, Phocam à piscatoribus captum, filium quem in cavea pepererat, ita deplorare mortuum vidit, ut per triduum à cibis abstineret. Tzetzes verò testatur, cum suis catulis mori, istos cum suis matribus, parentisque senio confectos, in natando juvare. Summa ipsis cum mari *Sympathia*. Pili enim excoriati si mare turbatum in fluctus surrexit, similiter eriguntur; si desedit, in planum sternuntur. Quod cum non crederetur, factò in Indico mari circa Hispaniolam insulam periculo, non amplius fabulosum haberi Cardanus asserit. Plinius sensum æquorum retinere, semperque æstu maris recedente inhorrescere scripsit: Rondeletius verò mutationis aëris significare, austrinis ventis furrigi, borealibus ita desiderare, ut nullos planè affirmes, sæpius observavit. Fulmina & grandines corium prohibere Plutarcho & palladio proditum. Ideo & summas velorum partes eo obtegi, & Augustum Cæsarem pellem vituli marini perpetuo circumferre consuevisse, & Severum Imperatorem eadem testum voluisse legiti. Grandini verò obviare Palladius credit, si per possessionis terminos circumferatur, & in villæ aut cortis ingressu suspendatur,

cum malum videris imminere. Urso metuere Oppiano debemus, congressos aliquando cum iisdem in spectaculis. Lycostæ rusticus apud Calphurnium; fugere & arietes marinos, & fortè anhelitu è cavernis extrahi, Aliano. Negligitur etiam ab in sima plebe in *Cibis*. Caro enim ipsius mollis est, spongiosa, & pinguis, adeo ut liquetur si diutius manibus contrectetur. In *Medicina*, dextra pinna capiti subdita somnum adfert, quod nullum animal graviore somno prematur. *Pellis* à podagra præservat, si ex ea calceos gestaveris. Adeps in muliebribus morbis vehementer ab Hippocrate laudatur. *Coagulum* quod evomere dicunt, ne in hominum manus incidat, cum panace, vel succo punici, Comitiales morbos sanat. Celius Aurelianus tamèn id reprehendit.

ARTICULUS VII.

De Manati Indorum.

Hujus piscis nemo veterum meminit, nisi fortè Bos sit Aristotelis, quem in Historiis inter Cetacea reponit. Belgæ vaccam marinam vocant. Nec incongruè iste dicitur, cum quod capite terrestrem bovem referat; tum quod ejusdem more herbis in terra pascatur. Utri est similis, ideò sædissimus aspectu. Caput habet bovis instar, Oculos exiguos, Pedes circa caput binos, crassos tanquam alas brachiorum loco, quibus natat. Annum loco duo foramina exigua quibus audit. *Lapides* seu ossa in cerebro bina parvæ pilæ palmariæ magnitudine, orbicularia. Circa *caudam* strictior est & quasi præcinctus, quæ etiam ab inde ad extremum tota conspicitur nervosa. Foeminae duo sunt ubera in pectore, quibus catulos lactat. *Corium*, quo integritur est simile ustulati porci corio, digitum densum, cineraceo colore, rarisque pilis præditum. Adeo magnus est, ut jugo boum opus sit ad unum vehendum. Nonnunquam quatuordecim aut quindecim pedum longitudinem superat, octo verò palmarum crassitudinem. Circa insulam Hispaniolam in mari capitur. Subit tamen & flumina, & secundum ripas eorum herbas depascitur. *Manus* fuit aliquando. Aluit quendam per viginti sex annos in lacu Guaynabo Caramatexi Regulus, tam mansuetum, licet jam grandem, ut nomine Matonis in clamatus, è lacu egrederetur, & ad ades cibi sumendi gratia perreptaret, iterumque in lacum remearet, pueris atque viris, quorum cantu delectari videbatur comitantibus. Idem denos simul pueros tergo exceptos ex una lacus parte n. oppositam transvehebat. Cum quidam ex Hispanis hastam in eum vibrasset, etsi non latus, nunquam tamen impostet, emergere voluit, si viros vaste indutos, & barbatos conspexisset. Intumescere fluvio Hayboico, & in lacum illum se effundente, in mare regressus est. *Usum* & in *Cibis* & in *Medicina* præstat. Caro enim ejus refecata, Anglicæ bubulæ similis est, & diutissime incorrupta manet; cocta Thygni carne est præstantior. Cauda in partes concisa, & soli per quinque dies exposita, tandem in patella cocta, multa pinguedo elicitur, quæ, quia rancorem non contrahit, ad ova in sartagine frigendo adhibetur. *Ossa* in capite colicæ passioni & doloribus nephriticis valdè adversantur, si primò adusta, contrita & per cribrum transmissa, in vino dyachmæ unius vel alterius ponderis, assumpta fuerint. Ex Corio cingula etiam & calceorum soles fiunt.

Ælian.

Plin.

Plin.
Theop.
H. l. 9 c.
12.Tab.
XLIII.
Arist. H.
A. l. 6.
c. 11.
Lopez.
Hist. Ge-
ner. c. 13.
Cluf.
Exot. l. 6.
c. 19.Plin. In-
venal. Sa-
tyr. 3.Philostr.
l. 2. de
vita A-
pollonii.Plutarch.
Sueton.
in Augu-
sto.Pallad.
R. R.

ADDITAMENTUM

D E

CANE ARISTOTELIS

Nie-
remb. H.
N. l. II.
c. 20.



PISCIS qui hodie Tubero dicitur, Canis Carcharias esse vulgò creditur. At quia ille quem Franciscus Hernandus describit, exactè descriptioni, quam attulimus, non responderet, ideo placet & hanc apponere. Cetaceus inquit piscis est, ex genere oblongorum, Oceani incola, quindecim interdum dodrantes longus, voratissimus, cursu volens, nec omnino stupidus, & bina humana corpora sæpe numero crassus; ore quòd rostro unciarum decem intervallo subjacet, lunato, vallatoque supernè trino dentium præacutorum, ac sese mutuo ferræ modò subintrantium, ac quaternò infernè binum dodrantum rictu, & brachiis utrimque quinis: rostro ranæ obrotundo, pinnis singulis utrimque juxta branchias, totidem juxta pudenda, juxta caudam unicà alterà omnium maxima imminente dorso statim à branchiis, alteraque juxta caudam modicà, à contrario alterius parvæ, sed in oppositam partem vergente caudà magnà, crassà, falcataque, & superna parte triplo aut quadruplo longiore atque latiore, & juxta extortum quibusdam parvis cavitatibus insigni: oculis modicis longo inter sese distantibus intervallo: pupillà magnà, & sublutea iride, corio verò ceterorum cartilagineorum, cum sese tendit, nullis ictibus penetrabili: dorso ac lateribus cæruleis exsaturatis, ac ventre candenti. Mirum est, bina pendere mari, ossæ pudenda, cava alba, dodrantem longa, & ternis singula, glandis loco, longiusculis noxia acuminibus, quibus novacula modo facillè quidvis obvium abscindit. Maleficum animal est, atrox, ac hominum devorator, adeò vivax, ut in perquam tenues etiam divinum apalectos, affixumque veru, ac vitam adhuc videatur mordicus retinere. Mediocre præstat, & quale alii congeneris pisces, dum parvum est alimentum, sed provectius, durum, ingratum, insalubre, & fluxum alvi ciens. Unicum est illi intestinum, satis amplum, unde tam improba contigit voracitas. Cor parvum subalbidum, laxum, & usque adeò vivax, ut eductum, & in varias partes sectum, diutius conspiciatur moveri, ventriculisque distinctum. Stomachus vastus est, hepar candens, in duas partium ténias, quatuor dodrantes longas, ac decem uncias latas. Splen vero jecinoris longitudine, sed duas tantum uncias longus.

Nie-
remb. H.
N. l. II.
c. 19.

Cæterum solent circa tuberoses pisciculi quidam natæ Romæ dicti, de quibus ita

Hernandus: Piscis est spinosus, Oceani Septentrionalis alumnus, dodrantem plus minus longus, tres uncias crassus, corio tectus molli & pæne teres. Lunatà constat caudà, & rostro resimo atque compresso, oculis magnis, si magnitudini corporis comparentur, pupillà nigrà ac luteà iride. Senis natat pinnis, quarum altera medio pæne dorso in caudam usque procedit, sensim sese attenuans, & à quibusdam præacutis spinulis sumens exordium: altera à pudendo pæne ipso in caudam ferè descendit, utrimque à brachiis singulæ, binæque paulo ante initium ventris.

Color universi ex albo in cæruleum tendit, quamquam dorsum caputque cyaneo exsaturato videantur nitere, universumque corpus senis pavonini coloris transversim in discurrentibus orbibus ambiatur. Extrema corporis caudam contingentis quadrata sunt, & quaternis veluti dorsis distincta quarum bina quæ in latera excurrunt, desinunt in acumen. Caudæ initium pavonino exsaturato splendore. Micant mediæ utrimque partes, dilutiores sunt sequentes exsaturatæ, ac demum postremæ candentes.

De Glauco Æliani.

AD Glaucom Æliani videtur referri debere, & hic quem Clusius exenteratum & resicatum ita describit: Erat, inquit, corpore longo, trium ferè pedum longitudinem explente coloris (resicatum enim & exenteratum dumtaxat conspiciebam) ex cineraceo fusci, in quo tamen quidam candor, præsertim in tergore, adhuc eluceret: vivum enim & recenter captum argentei pæne coloris ambitus pedis, hoc est, duodecim unciarum longitudinem æquabat.

Nie-
remb. H.
N. l. II.
c. 21.

Cartilagineus vero erat, & lævi cute præditus; rostro lato, sed in obtusum deinde acumen desinente. Oculi magni erant, è quorum infima parte enata erat membrana, quæ sursum sese attollens, velut nubes caliginem illis offunderet.

Oris rictus non valde latus, in supina capitis parte maxillas in obtusum angulum desinentes habebat, ferè ut simiæ: quaternis autem dentibus os præditum erat, binis in superiore maxilla, totidem in inferiore: iisque firmis, quorum singuli quibusdam sulcis erant distincti, ut pluribus dentibus armatum os esse videretur. Corpus à cervice sensim gracilescebat: spina sive aculeo in eà parte, quæ dorsum cervici connectebatur, sito, eoque sex uncias longo, infimà parte lato & cavo supernà autem valdè acuto. Pinna surrecta innitebatur quatuor pæne uncias longa. Binas dumtaxat in lateribus branchias valdè aper-

apertas observabam, utrumque videlicet unam, cum aliorum galeorum genera denas habeant, in singulis lateribus quinas.

Has sequebantur duæ pinnae ad natandum idoneæ, longiores quam in ullo galeorum genere conspexerim, novem videlicet unciarum longitudinem æquantes. Binas alas habebat ex utraque podicis parte, quatuor uncias longas, illasque bifidas, hominumne industria sic fissas, an à natura nihil pronunciare possum.

Alia deinde pinna in dorso paullo infra eam, quæ ad aculeum erat, exoriebatur, ad extremam ferè caudam usque inæqualiter porrecta, hoc est, ad eam usque caudæ partem, quæ tenuissima, & septem uncias longa, muris caudam quodammodo æmulabatur. Podici, qui in supina parte, ut in reliquis piscibus, situs, vicina apparebant bina foramina, in quem usum, ignoro.

Capitis porro cutis siccitate adeò erat contracta, ut nulla circa oculos: nulla ante eos, foramina observare potuerim.

De Pisce Gibbo.

Nierem.
H.N. lib.
II. c. 25.

HUic similis est *Acacana*, qui est dodrantalis piscis, insignis prolixitate inferioris labri, & eminentià gibbâ, quæ à capitis exordio usque ad os, quod perexiguum est, arcuato descendit flexu.

Dorsum lateraque cyanea sunt, venter ac laterum pars alba, ac præter duas pinnas quæ circa branchias sunt utrimque, unicam angustam & longam, & aliam parvam, duæ aliæ visuntur breves, altera à medio ventre, altera vero à dorso in caudam usque procedens.

Squamosus non est, & tamen bono constat alimento. Mare illum ad me misit Australe; etsi quidam referant, in Septentrionali quoque reperiri.

De Ostracione Gesneri.

Nierem.
H.N. lib.
II. c. 15.

OSTRACIONI affinis est *Catan* qui piscis est quindecim pedes, cum in perfectam magnitudinem adolevit longus, cortice rectus durissimò, laminis rhomboidis figuræ, paucisque contexto, testaceæ parè duritiei, nitidis, ac circa alia elatis, qui vicem lorice præstare posset. Rostrum est prælongum & acutum, ferrati dentes, & quaternò ordine dispositi, ac pinnae crassissimæ binæ juxta branchias, ac juxta caudam unica. Vivit in lacubus aut magnis fluminibus provincie Panucensis. Salubri constat nutrimento: sed cum parandus est, hic piscis, spoliatur corio. Vivit ex aliorum piscium canumve raptu, homines quoque interdum aggreditur.

Editur vero assus, non coctus aut elixus.

A D L I B R U M V.

De Phoca.

De Læter.
Ind. Oc-
cident.
I. 2. c. 6.

PHOCARUM generis est *Wallrus* seu *Mors*, animal amphibium, quod *Vorstius* apud

Deleatium ita describit: Belluam hanc marinam vidi, magnitudine vituli, aut canis Britannici majoris. *Phoca* non dissimilem: capite rotundo, oculis bovillis, naribus depressis ac patulis, quos modo contrahebat, modo diducebat, aurium loco utrimque foramina; rictu oris rotundo nec ita vasto, superiore parte aut labro mystica gestabat setis cartilagineis, crassis ac rigidis constantem. Inferior maxilla trigona erat, lingua crassa brevisque, atque os interius dentibus planis utrimque munitum, pedibus anterioribus posteriobusque latis, atque extrema corporis parte *Phocam* nostratam planè referebat.

Pedes anteriores antrorsum, posteriores retrorsum spectabant cum ingrederetur.

Digitus quinque membrana intersepiente distincti, eaque crassa. Posterioribus Digitis ungues impositi, non prioribus caudâ planè incedebat. Postica parte repebat magis quam incedebat.

Cute crassa, coreacea, pilisque brevibus ac tenuibus obsita vestiebatur, colore cinereo. Grunntum apri instar edebat, seu crocitetabatur voce gravi & valida. Repebat per aream extra aquam, quotidie per semihoram aut amplius dolio aqua pleno immittebant, ut se ibi oblectaret. Catulus erat, ut ferebant qui attulerant ex nova Zembla, decem hebdomadarum, dentes seu cornua exerta, ut adultiores, nondum habens, tubercula tamen in superiori labro præcipiebantur, unde brevi proditura facile apparebat. Ferum & validum animal calebat ad tactum, valideque per nares spirabat.

Pulmentarium ex avena, miliove comedeat lentè & suctu magis quam deglutendo, herumque gestantem cibum ac offerentem magno nisi ac grunntu accedebat, sequebaturque, nidore ejus allectus. Lardum ejus gustantibus haud insuave visum est.

Conspiciebantur ibidem duo majorum capita, dentibus duobus exertis Elephantorum instar, longis ac crassis & albicantibus munita, qui deorsum versus pectus spectabant. Eorum coria cccc. aut Is. pondò pendisse ferebant Angli qui attulerant.

Hiscè dentibus rupes ascendere seque sustinere ajebant. Et prodeunt in continentem seu terram ut somnum ibi capiant gregatim.

Pabulum ajebant illis esse folia oblonga ac magna, herbae cujusdam è fundo maris nascentis. Nec piscibus vivere, aut carnivorum esse. Vidi ibidem penem ejusdem animalis osseum, rotundum, cubitum & amplius longum, crassum, ponderosum ac solidum, in fine prope glandem longe crassiorem ac rotundiorem. Hujus pulvere ad calculum pellendum Moscovitæ utuntur.

Appendix Nova

D E

UNICORNU
MARINO.

Nicolaus
Tulpius
observ.
Medic.
cap. lviij.



Quantumvis acriter disceptetur, utrum etiamnum alicubi extet unicornne illud animal, cui Sacre Literæ, præter indomitam ferociam, pretiosum attribuunt cornu, extra tamen omnem controversiæ aleam est, pleraque omnia quæ à magnatibus asservantur cornua, adeò non esse feræ alicujus terrestres, quin potius prodire ex belluâ marinâ, cujus cornu passim reperire est, cum in mari Boreali, tum etiam in Islandiæ, Gronlandiæ, aliarumque vicinarum insularum littoribus; sive sejugatum, à corpore, sive cranii particulis etiam nunc insidens. cujusmodi certè cornua nobis oblata fuere quàm plurima, vel ex direptis Principum Germaniæ gazis, vel à nautis ceu opima maris spolia Amstelredamum delata.

Inter quæ unum cæteris longè præstabat, colore, ac formâ oculis gratum, capitiq; tam accuratè adhuc infixum: ut, ad rei memoriam, id æri lubens incidissem, nisi haud diu possit, oblatum fuisset integrum monstrum, à chirurgo marino depictum, cujus caput cum unicornu ipsi inhaerente, coram conspeximus. cujus speciem propterea malui spectatorem oculis repræsentare, sed eâ fide, quâ illam in tabellâ delineavit, Chirurgus, id temporis, navi huic à Medicinis.

Erat autem hic piscis, (cujus cadaver anno c 15 15 c XLVIII. IV. nonas Junias, inventum fuit in Mari aquilonari, prope Insulam Majam) admodum obesus, longus pedes duo de viginti, latus duodecim, capite cyprino, sive carpioni simili. Os latitabat infra cornu, quod protuberabat ex ossibus maxillæ superioribus, inter se deficientibus, ibidem propemodum loci, ubi Pristis dentatam emittit ferram. non quidem exactè in maxillæ medio, sed loco aliquatenus dextrorsum vergente. licet laevorsum in neutro, quod conspexi, cranio ullum alterius cornu occurreret vestigium. Corium autem erat fuscum, & sub illo plurimum lardi, è quo copiosum quidem igne mercatores eliciuere, oleum, attamen præ odoris fœditate parum ipsis lucrosus. Spina dorsi ut ex validis constabat vertebris, sic desinebat in caudam bifidam, adhaerente utrique lateri pinnâ satis validâ. Cornu verò erat rectum, durum, ac album, striisque profundis, à latiore basi, usque ad acutum mucronem, tam æquabiliter ornatum: ut jurasses te videre nitidum, ac niveum ebur, exquisitissimâ arte expolitum. Longitudinis erat novem pedum, septem cum dimidio extracranium protuberantibus, sesquipede verò eidem etiamnum insidente, cujus exemptæ superficies etiam reliquo corpore fuit asperior, minusque splendicans.

Sed quid dicam de Cajo Plinio l. xi. cap. xxxviii. asserente, vera cornua solis quadrupedibus dari? at non vidisti fortè Plini vel summam hujus unicornu elegantiam, nitoremque, vel solidos illos Rosinari,

sive elephantis Marini, (quem nostrates walrussæ vocant) dentes; qui ut pretio non cedunt elephantinis, sic neque marinum hoc cornu, ullis terrestrium animalium cornibus, quibus etiam virtute nequaquam inferius est, sive in expellendis variolis ac morbillis, sive in domandis febribus malignis. Quæ alexipharmaca vis, cum pulcherrimâ ipsius venustate, conjuncta permovit fortè Reges, ac Principes cornu hoc carè emere, neque minoris æstimare, quàm gemmas, ac lapides pretiosos quorum admirabile atque excellens artificium adeò non hominibus quin etiam ipsi Deo dignum videtur quâ ametur, atque in honore habeatur.

At negat Casparus Bartholinus Vir limati iudicii Arctoo huic unicornu inesse vim singularem adversus venena, quam tamen nos non semel in ipso evidenter animadvertimus. sed imposuit fortè viro incluto, quod in canibus fecit periculum, sive per arsenicum, sive Mercurium sublimatum, quibus duobus potissimum in ejuscemodi tentamentis utimur. quæ sicca, atque adurentia venena ut maximè temperat lene aliquod oleum, sic adeò non refrænat nedum coërcet, quin potius exasperat siccus non modò hujus unicornu, verùm etiam quorumcunque cornuum pulvis.

Sed dicat quis? anne igitur nigrum veri monocerotis cornu, à Plinio, Æliano, Solino, aliisque prioris ætatis, memoriæ proditum, venenis tam expressè adversatur, uti constans fama est, ac passim in ore omni populo? vis me veritati litare? nullus è prisca auctoritate suâ id adstruit, nedum cuiquam illius ævi, ejus unquam in mentem venit. quin potius quicquid illius alexipharmacæ virtutis est, id passim acceptum ferunt, non tam monocerotis cornu, (de cujus virtute altum ipsis silentium) quàm asini sylvestris. cujus encomium perperam intellectum, procul dubio ansam dedit spisso illi errori, in quem quidam adeò non delapsi, verùm planè immersi nescio quàm gloriose prædicant antiquorum hoc cornu seu præsentissimum ad venena remedium. in quo futili commento equidem profectò non possum ulterius connivere, sed dispudet mundo tamdiu verba data. in remedio, à nostri seculi hominibus, cogitatione potius, quàm usu, aut eventis deprehenso. uti videre est apud Hieronymum Mercurialem, Ambrosium Pareum aliosque artis nostræ Coryphæos.

Quo veriloquio antequam tamen orationi huic finem imposuerim, operæ fuerit æquâ animorum bilance explorare impetum illum, quo Olaus Magnus lib. xxi. cap. x. affirmat ferocem, ac fidens hoc monstrum, in Boreali mari efferri in naves obvias. quo illas cornu suo, (quod tamen malè in fronte collocat) perfodiat. quam eandem vim etiam Xiphie pisci, sive Gladio Plinii, legimus attributam. ab Ovidio, Oppiano, Paulo Iovio, aut nautis nostratibus, à quibus fragmenta cornuum inventa fuere in navium carinis, rubente undique mari à profuso belluarum sanguine. unde illud Poëtæ:

Ac durus Xiphiæ, istu non minor ensis.

— à remige laci

Cum sint perfoffi sua membra tricuspside telo

Sæpè repellentes, hostem mucrone carinam

Irati penetrant.

Cujus Xiphie speciem meminisse me vidisse captum, ad quatuor millia passuum ab insulâ Texaliâ, circa initium belli intestini Britannici, quasi præfagium illius xavaspæ, quæ Regem, cum regno pessundedit universo. exprimente hujus piscis ense, ad amussim, illam gladii speciem quam nostrates ceu pedorm, indignant.

Ajellus



Callarias Ajellus minor



Ajellus alter sine Aeluctus



Mustela



Tuca marina



Hippurus



Harengus



Liparis



Aper



Scolopax





Glancus



Monoceros





Acellus



Acellus minor



Acellus mollis



Acellus alius



Reuersus Indicus Anguilli


formis



Molra



Rutilus



Coruulus



Coruulus



Salpa






Callinectes



Callinectes



Callinectes



Callinectes




Callinectes



Callinectes



Callinectes



Recurtus

Indicus squamosus



Thunnus



Pelamys Cærulea



Corynus




Pomphiles



Amia







Gladius

sive

Xiphias



Remora



Myliobatis balena dux



Serpens marinus






Serpens Marinus verus





Conger














Mandibula Canis marini

*Canis Carcharia
dentium feries*



*Galeus
Centrina ditus*



Vulpecula Marina



Alus Galeus seu Centrina



Simia Marina



Simia Marina Danica



8

Zigana



Zigana seu





Libella altera



9

Amphipoda

Amphipoda



Catulus major 1



Catulus 2

Canicula Aristot



Canis

Marinus 3



Canicula 4

Galeus canis



Mustelus Spinax

5



Mustelus

Lævis 6



Galeus



Galeus Asterias seu stellatus

8




9



Galeus Stellaris

Galeus Glæucus Venetianus Gesn











Gesneri

Raia Oculata
alia

Raia
Oculata
et levis

Raia levis

Spiegel Raie



Raia Aspera
Aspera

Raia asperima





Raia Oxyrhynchus minor



Raia Oxyrhynchus major







Monstruosi Pisces Volantes



Raja exierata, et concinnata ad formam Draconis volantis. Tab. XII



Oua Raiarum

Raja Lævis



Raja Olaj.



Oxyrinchus


minor. alius

Raja piscatrix minor.



Squatina






Tab. XCV.



Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus




Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus



Surmugus

Merula



Marzapannus



Fuca Phycis



Iulis



Perca



Marina

Perca Marina



Perca Marina



Perca



Perca



Hiatula



Canadella



Hepatus leber



Hepatus





Melanderinus



Melanurus





Cinædus Alphestes



Alphestes Cinædus



Cinædus alvus



Coracinus




Coracinus minor



Coracinus niger



Alois Exocetus Bellon alaudia adnumerandus



Ammocetus Exocetus Ammocetes



Umbra



Glaucus



Acus



Gobius minor Gofu. Paganellus



Acus alia Species




Gobius minor




Acus minor




Acus maior



Acus alia





Anthias Rond.
Ajellus conformis.



Anthias Rondeleti




Anthias prior



Anthias prior



Anthias secundus







Anthias quartus



Anthias Congener







Sphyræna sine Sude



Alanda non cristata




Piscis gutturosus



Mullus unerbis



Xirundo Plinii



Erythrinus



Acanth



Orphus



Synodus



Dentex


Synagris










Sparus




Scorpius minor Scorpæna














13 *Solea alia*








Sandely Anglorum.

Draco marinus maior



Draco minor.
Araneus Rondel.




Araneus minor.

Dracunculus ara-
nei Species



Araneus



Vronofcopus



Dracunculus



Tranchurus

Scombræ Species



Scomber.



10

Scomber



Lacertus

peregrinus nel Rubei maris.




Scombrus albus.

11




Saurus





Milvus alius.

Corax seu Corvus



Rhombus Levis uerus

Rombus aculeatus




PLATE 12



Salmo



Salmo alius



Lupus



Mugil



Mugilis

Species alia



Capito Anabromus



Caper Caperis



Acipenser

Zeelandicus



Acipenser Sturio



Acipenser seu Sturio



Acipenser seu

10

Sturio





Plate 1st



Galens Rhodius

Eperlanus



Cataphractus Gabler

Lyræ



*Lampreta seu
Lampetra*



Lampreta alia



Anguilla



Anguilla alia



Orbis Species


Orbis

eckbinatus



Species alia Orbis

12



Orbis Stellatus

11



Orbis Annumerandus

14



Orbis Annumerandus Piscis

13


Orbis Britannicus



1817

1817





Alius Hufo.




Antacarus

Rond.



Ostracion prior Aldron

Orbis Scutatus Rondel





Holosteon Bell. Ostracion Nili

Ostracion America




Tab. 21.





1740





Araneus minor



Alosa



Alosa seu Clupea



Phoxinus Squamifus Maior



Blicca Ballerus

Phoxinus Sqam. minor



Glanis

Barbota




Cyprinus megalostomus



Cyprinus

Cyprinus Albus






Phoxinus Locus



Phoxinus



Phoxinus



Antillus . Padi .



Antacrus Stellatus



Mustela



Mustela fluviatilis



Mustela fessilis



Mustela alia



Lambreta



Lambreta



Perca

major dicta



Salmerinus



Perca



Schrollus




Epelanus




Pungitius



1847
1848





Top view



2 Umbra min.



Umbra major.



Trutta Lacustris, Trutta Salmonata.



Lavaretus Albula



Albula Lacustris



Albula Caerulea



Lacustris

Alb. minima.



Carpio Benaci.



Albula Parva.



Alburnus Albus Sabini.



Schillus.



Clavatus cyprinus



S. Qualus



Barra. Alius generis.



Barra albula lacustris species




Chalcis altera Rondelety



Agonus.



Porcus Supinus Saluiani



Gobius Bottatrix



Alburnus Salu



Mesora uel Blennius Salu



Thymus Salu



Cyprinus Salu



Salar Varius



Obis



Rubellius Salu



Barbus Salu








Salmo Salu





Parn 2


1 *Taiafica*

















1843







Paratia Pua.



Aramaca.




Guamatacu apu.



Petimbaba.



Nhamdia.



Guaperua.



Curnata Pimma.



Purague.





Piscis innominatus.

Muol.




PLATE 1



Abacatuia.

2




Mucu.

1



Acaranucu.

3




Punaru.

4




Punaru.

5




Limucu.

6



Gubucu.

7





Niquy


8





Fig. 1225. 12.

1225.










Tiburon



Thunnus




Thunnus



Thunnus



Thunnus



Thunnus



Thunnus



Thunnus



Anthra pomorphos



Piraretara

Pracama Brasil



Potin Buzza

Sallema seu Salema




Camari Puguacu

Leo Marinus



Frater

Xugo





Galerita

10


Synagris

11






Balæna



Balæna



Balæna

Monstrosa



Balæna



Phocæna





Balæna magna 60. perticas longa. 41. alta.



THE


THE



Utilis Piscis ferram ad instar
Piscis habens



Delphinus prior




Delphinus Alter



Antiq

Metal



Delphinus

Femina




Antiq
Metal

Delphinus alius





Caput Delphini



Gladius Piscis Xiphiæ



Scolopendra Cetacea



Vitulus



Phoca sine



Vitulus marinus

Bos Marinus



Bos Marinus

Vetus

Bos Marinus Luencus





Cete Admirabilis forma.



Galci genus.




Orbis spinosa.



Histrix piscis.



Orbis Rana rictu.



Piscis triangularis.



Scarus Cretens.



Orbis oblongus testudinis Capite.



Sargus Aldrou.



Amphiprion



Chelodactylus



Heterostichus



Chelodactylus



Chelodactylus



Chelodactylus



Chelodactylus



Chelodactylus




Chelodactylus




Albula nobilis.



Albula.



Asellus Viridescens.



Asellus Varius.



Cataphractus.



Lania Cornuta.





Idem superius.



Mustola marina Vagabunda.



Table X.





Tab. XLVII

Lupus Marinus

Schonfeldij



Lycostonius

Balticus



Scorpius Marinus



Midom Supinus



Spirinchus



Siluri vera affigios



Tilapia

Sciaenidae



Sciaenidae

Sciaenidae



Sciaenidae

Sciaenidae




Sciaenidae



Sciaenidae



Sciaenidae






Sciaenidae





Caput piscis cornuti.





THEATRI UNIVERSALIS
ANIMALIUM

PARS SECUNDA.

S I V E

HISTORIÆ NATURALIS

D E

A V I B U S

L I B R I V I.

Cum Enumeratione Morborum, quibus Medicamina ex his Animalibus
petuntur, ac Notitia Animalium, ex quibus vicissim Remedia præstan-
tissima possunt capi,

C U R A

HENRICI RUYSCH,

M. D. Amstelædamsis.



AMSTELÆDAMI,

Prostat apud R. & G. WETSTENIOS,

Anno MDCC. XVIII.

THEATRUM UNIVERSALIS
ANIMALIUM

PARS SECUNDA

SECV

HISTORIAE NATURALIS

DE

AVIBUS

LIBRI VI

Cum Investigatione Morborum, quibus Medicamina ex his Animalibus
petuntur, ac Notis Animalium, ex quibus vicissim Remedia petuntur
colligi possunt capi,

CURAE

HENRICI RUYSCII



AMSTELÆDAMI
Prolegomena R. & G. WESTERHOF

Anno MDCCXVIII

ENUMERATIO MORBORUM,

Quibus petuntur Remedia ex AVIBUS.

A Biceffus	Pag. 7. b.	Fluxus alvi	45. b.	Podagra	35. b. 38. b. 61. b. 101. b.
Albugines	33. a.	Genituram augmentia	42. a.	Parulentic remedium	42. a.
Alopecia	66. b.	Hectica febris	53. a.	Renum affectus	41. b.
Alvum infantibus		Jecinoris dolores	7. b.	Sanguinem fistentia	93. b. 95. b.
solventia,	93. b.	Illæo resistens	53. a.	Scabies	30. a.
Angina	33. b.	Iliaca passio	46. a.	Scirrhus	35. b.
Angina occulta	53. a.	Impetigines	38. b. 43. a.	Secundinæ	96. b.
Anus	79. a.	Lateris dolores	85. b.	Somnum impediencia	35. b.
Asthma	30. a. 53. a.	Lentigines	74. b.		35
Articulorum dolor	14. a. 27. a.	Lumborum dolores	62. a.	Stomachus	53. a. 66. b.
Articulorum vitia	66. b.	Leuce	6. a.	Strumæ	7. b. 62. a.
Arthritidem præservantia	101. b.	Lues Venerea	45. b.	Suffocatio matricis	40. b. 42. b. 46. a.
Calculus	6. a. 692. a. 66. b.	Mammæ puerperio vexatæ	43. a.	Suffusiones oculorum	3. b. 33. a.
Caligines	33. a. 84. a.	Melancholica	53. a. 74. b. 121. b.	Temulentia medentia	33. b.
Capilli	43. a. 81. b. 84. a.	Mentem restituencia	119. b.	Tempora	85. b.
Capitis dolor	7. b. 24. b. 84. a.	Menstrua alba	59. b.	Tonillarum dolores	79. a.
Cervicis dolor	62. a.	Morbus Gallicus	119. b.	Trichiasus	35. b.
Chronici morbi	24. b.		bis 121. b.	Tussis puerorum	24. b.
Clavi pedum	53. a.	Morbus Venenati	95. b.	Tympanites	64. a. 66. b.
Colica	6. a. 53. a. 64. a. 95. b.	Nephriticorum remedia	42. a.	Varices	6. a.
Comitialis morbus	7. b. 46. a. 101. b.	Nubeculæ	3. b.	Venena digerentia	95. b.
Concoctio	6. a. 7. b. 36. b. 92. a.	Oculi	61. b.	Venerem augmentia	48. b.
Condylomata	7. b.	Oculus læsus ictu	84. a. 93. b.	Venerem incitantia	14. a. 66. b.
Corporis dolores sedantia	119. b.	Oculorum hebetudo	27. a.	Ventriculi dolores	15. b.
Coxendicis dolores	62. a.	rubor	ibid & 38. b.	Vermes expellentia	85. b.
Dentium dolor	66. b. 79. a.	dolor	ibid	Vesica	93. b.
Dysenteria	64. a. 74. b.	Oculorum vitia.	48. b.	Vigiliam præstantia	90. a.
Dysuria	61. b.	Oculorum vulnera	64. a.	Virgam erigentia	66. b.
Elephantiacus morbus	45. b. 64. a.	Paralysis	61. b.	Virum restauratio	59. b.
Epilepsia	14. a. 24. b. 38. b. 42. a.	Parotidis sanantia	33. b.	Virus	46. a. 79. a. 90. a.
	61. b. 66. b. 84. a. 124. b.	Partus	65. a.	Vomitum educantia	53. a.
Epileptici infantes	93. a.	Parturientes adjuvans	7. b.	Vulnera	121. b.
Facies	92. a.	Pestilentia	64. a.	Ulae dolores	79. a. 121. b.
Faciem purgantia	66. b.	Pestiferi morbi	61. b.		
Febris	53. a.	Pilos denigrantia	24. b.		
Febris Quartana	84. a. 96. b.	Pituitas	64. a.		
Fistula	59. b.	Pleuritidem sedantia	38. b. 95. b.		
Fœtus	62. a.	Pfiothra	33. b.		

NOTITIA AVIUM,

Ex quibus Remedia Præstantissima capiuntur.


A Nas	95. b.	Gallus Galinaceus	53. a.	Passer	66. b.
Anser domesticus	93. a.	Haliætus	3. b.	Perdix	45. b.
Attagen	42. a.	Hirundo	84. a.	Phasianus	40. b.
Aura	121. b.	Larus	93. a.	Pica	27. a.
Bubo	30. a.	Luscinia	90. a.	Picus martius	79. a.
Capo	59. b.	Mergus	96. b.	Struthocamelus	36. b.
Ciconia	101. b.	Merops	81. b.	Tominejum	124. b.
Columba	61. b.	Merula	74. b.	Turtur	65. a.
Cornix	25. b.	Milvus	14. a.	Tutupa	119. b.
Corvus	24. b.	Noctua	33. b.	Vespertilio	35. b.
Coturnix	48.	Offifraga	6. a.	Vultur	7. b.
Cuculus	15. a.	Oris seu Tarda	43. a.	Ulula	30. a.
Cygnus	92. a.	Palumbes	64. a.		33. a.
Gallina corylorum	42. a.	Pavo	38. b.	Upupa	85. b.

I N D E X.

HISTORIAM NATURALEM

A V I B U S,

*Juxta seriem Alphabeti concinnatus, in quo numerus prior
Historiae paginam, posterior tabulam designat.*

	P.	T.		P.	T.
 Cachoatli	127. 183.		Domesticus	92.	84
Acacaloti	127.		Magellanicus	126.	56
Acanthis	68.	43	Sylvestris	93.	48
Accipiter in genere	18.	7	Anthus	88.	45
Asterias	10.	8	Apos	84.	
Fringillarius	10.	8	Aquila in genere	1.	
Palumbarius	10.	8	in specie	3.	
Sacer Ægyptius Bellonio	12.	9	Aquila alba seu Cygnæa	6.	
Accipiter major		11	anataria seu Morphnos	4.	2
minor		11	anopea	6.	
Achalalactli	128.		Chrysaëtos	3.	1
Acitli seu aquatilis lepus	158.		Bellonii		5
Acolchis Indiarum	157.		Gesneri		1
Acolin	127.		Haliærus	3.	2
Acototloquichiti	127.		Heteropos Gesneri	6.	5
Æsalonus accipitris species	10.	10	Melanæetus seu Valeria	3.	3
Æsalo falconum species		13	Alius	3.	3
Ajaja	139.		Morphnos Bellonii	4.	4
Ajuru species	140.		Morphno congener	4.	5
Alauda	69.	38	Pernopteros	4.	4
cristata	70.	38	alius		4
cristata senex		38	alius peregrinus	153.	5
non cristata	70.	33	Pygargus	4.	2
maxima seu Calandra		38	alius	4.	3
pratorum	71.	38	Aracari	148.	
Alaudæ congener	71.	38	Araracanga	141.	59
Albulus aquaticus		47	Ardea	102.	50
Alcedo vocalis	107.	52	minor		50
Alchata seu Filacotona	64.	32	Cinerea major	103.	50
Aluco	32.	19	minor	103.	50
Amalozque	128.		alia seu congener	103.	50
Ampelides	191.		alba	103.	51
Ampelides Aldrovandi seu Garrulus			Egretta Gallorum	103.	
Bohemicus Gesneri	28.		Garletta Italarum	104.	
Anas	95. 158. 49		Garzetta bianca dicta	104.	
campestris Bellonii	43.		Squajotta Italarum	104.	51
Carina	99.	49	congener	104.	
Domestica	96.	49	Nigra		15
Indica	96.	49	Ardea asteria seu stellaris major	104.	51
Lybica	96.	49	altera minor		51
Anas fera seu sylvestris	96. 146. 49		Congener	105.	
Boscas major	97.	49	Cristata	105.	
Caudacuta	98.		Ardeola	143.	61
Circia	97.		Arquata	108.	51
Fistularis	98.		Alus	82.	42
Fusca major	97.	49	Alio		18
Glacius	97.	49	Alio seu Otus	31.	18
Herle	98.	49	Alio seu Scops	32.	18
Muscaria	97.	49	Attagen	41.	26
Nigra	98.	49	Atricapilla	90.	45
Penelope	98.	49	alia		45
Platyrinchos major	97.	49	Atinguacu Camacu	147.	60
Platyrinchos minor		49	Aves diurnæ	1.	
Puffinus	98.		nocturnæ	29.	
Querquedula	96.	49	Aves exoticæ Aquaticæ	126. 150.	
cristata	97.		Terrestres	117.	
La Tardone	98.	49	Aves Farrenses	229.	
Anas marina		49	Aves Carnivoræ canoræ	68.	
Anas fera		49	Aves terrestres carnivoræ	1.	53
Anas fera	146.	49	Avis cucullata aquatica	160.	
Andira Aca	144.		longa	122.	
Anhima	147.	61	montana	122.	
Anbinga	148.	60	Indica	113.	
Ani	132.		Diomedica	91.	46
Anser Bassanus	94.	47	Paradiſia seu Manucodiata	117.	55
			Pugnax		

I N D E X.

Pugnax
Scythica **Mitternachtlicher Adler**
Stellata seu Stella **Sternvogel**
Avium natura in genere
Avosetta seu Spinzago d'acqua
Avosetta species
Aurora
Aurivittes carduelis species
Ayayam

P. T.
105. 52
6. 5
43. 26
4.
90. 48
121.
68. 43
150.

B.

B Arge Gallorum
Boarina
Bernicla
Boudree Bellonii
Branta seu Bernicla
Brenthus
Bubo
Bubo **Bergfalcon**
Bubo **Nachtweib**
Bubo **Nacht** dictus
Buteones

106.
87. 44
94.
12. 7. 11
94. 48
90.
29. 18
29. 18
29. 18
11. 7. 11

C.

C Abure
Calcamas
Calidris Bellonii chevalier, rubra
nigra
Canarias **Zuckerbrot / Canarienvogel**
Cannevarola
Caprica
Caprimulgus
alio
Capella **Apfelfalk**
Capo
Caracara
Caracara
Carduelis **Distelfink**
ciliis albis
mas
Cariama
Caripira
Cathartidae
Caryocatactes **Rufbinder**
Cenotzqui
Ceoan
Cephus
Cercio
Certhia
Charadrios
Chulandra
Chicuatli
Chloris **Grünfink**
congener seu chloris Indica
Chloropos Gallinula aquatica
Ciconia
nigra
Cinclus
alio
Cinclus Gallinago minima Bellonii
Cinnamomus
Circus
Citrinella **Grünfink**
Cocci ardeae species
Coccyzastus
Indica
Columba domestica
varii coloris
Cypria
alio
Indica
Hirfutus pedibus major
Livia
Columba
Sylvestris
Columbus
Collurio
Colymbus major
major Bellonii
maximus
minor
Coracia
Cornix
frugivora

145.
150.
108.
109.
88.
94.
34.
27.
59.
144.
150.
68. 36. 37
36
36
138.
150.
94.
27. 40
123.
123.
94.
113.
80.
113.
70.
123.
71.
71.
109. 111. 31
99.
112.
53
53
53
152.
10.
71.
143.
76.
77.
62.
32
32
32
32
32
64.
59.
63.
62.
12.
89.
89.
90.
89.
26.
24.
25.

cinerea
coerulea
Corvus
Aquaticus
Sylvaticus
Cotta Anglorum
Coturnix
Cozquaxeli
Crex
Cuculus
alter
Cantur
Curicaca
Curucui
Cygnus
cuculatus Nieremb.
Cynchramus

P. T.
25. 17
25. 17
23. 16
95. 47
95. 47
98.
47. 157. 27. 28
121.
108.
14.
14.
124.
130.
144.
90.
122.
49.

D.

D A aje
Diabolus marinus Parisienfium
Diomedea avis

118.
98.
91. 46

E.

E Mbriza
alba
pratensis mas
femina
Embriza pratensis **Wiesenmetz**
Emeu Clusii
Nieremb.
Erythra gallinulae aquaticae species
melana Indica

35
68. 35
68. 35
68. 35
119. 56
56
35
35

F.

F Alcinellus seu Falcata
alia species
Falco
Albus
Alius
Arborarius seu Dendrofalco
Baumfalk
Cyanopus
Gentilis
Gibbosus
Italicus
Lanarius Gallorum
Falco lapidarius
Montanus
Oenontanus
Passagis
Peregrinus
Rubeus
Sacer
Tenetanus
Ficedula
Ficedula, Canabia
Flamenco avis Hispanis dicta
Fringilla **Fink**
montana
sublutea
Fulica **Wasserhuhn**
Fulica seu Mergus niger

105. 51
16. 12. 13
18. 12
12
19. 10
19.
18.
18.
19.
18.
19.
17.
12
12
12
16. 13
19. 12
16.
18.
33
33
110.
69. 33. 36
69. 36
70. 36
98. 31

G.

G Algulus
Gallina
Africana
Gallinula Aquatica
Gallina Corylorum **Wasserhuhn**
Gallinula Erythropus aquatica
Gallinula Hypoleucos aquatica
Gallina Indica cum ovo ejus
Lanigera
Gallinula Ochra aquatica
Gallina Patavina
Gallina Persica
Pumilio seu Nana **Wasserhuhn**
Quinca
Gallinula Rhodopos aquatica
Gallina Turcica
Gallinarum ova

27
53. 29
131. 57
109. 31
42. 25
110.
109. 31
58. 24. 30
30
110. 31
57. 29
57. 30
57. 29
58. 30
110. 31
57. 30
53.

I N D E X.				P.	T.
Gallinago minor sclopax <i>Marschneppf</i>	110.	31	Jacamacaii	136.	58
sylvestris aquatica	160.		Jacamaciri	138.	57
Gallinula chloropus vide chloropus gallinula.			Jacana	130.	57
Serica <i>Samethumlein</i>	110.	23. 31	Jacarini	143.	
terrestris	111.	31	Jacapu	131.	
Gallo-Pavomas	39.	24	Jacupema	136.	58
Gallus gallinaceus	59.	29	Jacurutu	136.	58
Cornutus	57.	29	Jaguacati guacu	133.	57
Indicus	58.	29. 33	Jaja U qui tototl	119.	
Indicus mirabilis		30	Jambu	131.	
Monstrosus candatus		21	Japacani	144.	
Palustris	58.	30	Ibi jau, Noitibo	133.	57
Patavinus	57.	29	Ibi jau magnitudine noctuae	133.	58
Peregrinus Clusii	122.	56	Ibis	101.	50
Perficus	57.	30	Jochaulcuachili	126.	
Scoticus sylvestris	57.		Ipecati Apoa	148.	60
Turcius	57.	30	Ipecu	142.	59
Gambetta Aldrovandi Itatorum	109.		Ipida <i>Epfbogel</i>	107.	31
Garagay	121.		Itzquautli	153.	
Garrulus Bohemicus Gesneri, vide			Juncus Bellonii	112.	53
Ampelis Aldrovandi	28.		Jupujuba	111.	
Generatio pullorum	53.		Lynx seu Torquilla	80.	42
Goyrani seu Boudree Bellonii	12.	7	Congener	81.	42
Graculus	26.	16			
Graculus palmipes seu Corvus Aquaticus minor	95.	47			
Granivora aves	37.		L Agopus	46.	28
Grigallus major	41.		altera species		28
Grus balearica mas	116.	54	Lanius prior	12.	9
foemina		54	alter	13.	9
crispa		54	Lanius albus	13.	9
Japponensis	116.	54	Cinereus	13.	9
Vulgaris	114.	54	minor		10
Gryphus	151.	62	alius		11
Guacugacu	139. (58.	56	Lanius collurio		11
Guara	139. 151.		Milvus		
Guarauna	139.		Larus	92.	
Guainumbi variae species	134.	58	albus	93.	46
Guira Acangata	147.	60	cinereus	93.	46
Guira coereba	144.		Fidipes	94.	46
Guira guacuberaba	144.		major		46
Guira guainumbi	132.	57	minor Sterna	94.	46
Guirahemgatu	142.		niger	94.	46
Guiranejoa	142.	61	piscator	93.	46
Guirapereza	144.		Ligurinus Gazae	68.	36
Guirapunga utraque	137.	59	alius		36. 37
Guira Quereza	138.	59	Limosa Venetorum	106.	
Guiraranheengata	143.	59	Linaria	69.	36. 37
Guira tangeima	131.	57	marina Aldrovandi	69.	38
Guira teonteon	151.		rubra	69.	36. 38
Guiratinga	143. 150.		Lomabay	129.	
Guiratinica	143.		Loyia	29.	
Guit Guit	118.		Luscinia	88.	45
Gulo <i>Seesluder</i>	89.		Lusciniola	88.	45
Guranae-engeria	125.		Lutea mas	71.	38
			foemina	71.	38
H. Hematopus Bellonii	106.				
Haemantopus mas	106.	52			
foemina		52			
Halcyon	107.	52			
Harpa	13.		M. Acucagua	146.	
Harpyis	151.	62	Macucagua	125.	
Heatototl	128.		Maguari	139.	
Helorius Creci	106.		Maiae	118.	
Herle Bellonii	89.		Manucodiata Aldrovandi prima	117.	137. 53
Heuhquecholtototl	157.		secunda	118.	55
Himantopus	108.		longa	118.	55
Hirundo	83. 160.	42	Mareca	146.	
Apos	84.	42	alia species	146.	
Agrestis	84.	42	Matuitui	136. 148.	58. 60
exotica aquatica	106.		<i>Meerganser</i> Gesneri	89.	47
marina		46	Mergus	95. 159.	
riparia	84.	42	Arcticus Clusii	159.	56
Hoacli	128.		Bellonii		47. 48
Hoaftzin	119.		Albus	97.	
Horion	106.		Cirrhatus	97.	47
Hortulanus mas	49.	28	Glacialis	97.	
foemina	49.	28	Longirostratus	96.	47
Congener	49.	28	Niger	97.	
Hortulanus <i>Brach Amstel/ Crostel</i>		37	Raucedulus	96.	
Hypolais seu Curruca	90.	45	Rhenanus	96.	47
Hypotriorchis	12.		Ruber	96.	
			Merops <i>Seeschwalb</i>		27
J. Abiru	137.	59	Merops <i>Imbenskratz</i>	81.	42
Jabiru guacu	137.	59	Congener		42
Jacacintli	128.		Merula	73.	39. 40
			mas	73.	39
					foemina

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
foemina	73.	39	Passer stultus Bononiensium	67.	126
alba & nigra	73.	39	Torquatus	67.	
bicolor	75.	39	Passer Troglodytes Bellonii	82.	42
braslica	75.	40	Armeniacus	82.	42
Indica Apos	76.		Passer in juglandibus degens	67.	
aquatica Wasser Amsel		53	Passeris species seu congener	67.	34
montana	75.		Passeres fabri	158.	
rosea mas	75.	40	Passerculus Brachyurus nostras	67.	34
Merula saxatilis Stein Amsel	75.	39	Passerculus Troglodytes Zaunschlupfferle		42
torquata mas	75.	39	Pavo	37.	22
foemina	75.	39	foemina	37.	22
Merulae congener duplex	76.	39	albus	39.	23
Merulus passer, solitarius	74.	39	sine cauda Chinenfis		21
Milvus	13.	11	Japonensis mas	39.	23
Mituporanga	133.	57	foemina	39.	23
Mitu mutu	133.	58	Pauzi	123.	
Monedula	26.		Pelecanus sive Patea Hoffelgans	91.	46. 62
aliud genus	26.		Perdix	44.	27
Montifringilla	69.	33. 36	alba seu Lagopus	46.	28
Congener		38	altera		28
Morfex	89.		Cinerea	46.	28
Mot (shoto)		27	Damascena	46.	28
Motacilla		43	Græca Bellonii	46.	27
Mas	86.	44	Ruffa	46.	28
alba	86.	44	Phalacrocorax	95.	47
flava	86.	44	Phalaris	90.	
Muscipeta	87.	45	Phasianus	40.	24
Mutu	125.		alius		24
			Phœnicurus	88.	45
N.			altera species		45
N Handugazcu	130.		Phœnicopteros	101.	50
Noctua in specie sic dicta	33.	152. 19	Phœnix	152.	62
Noctua Hautzlein		19	Plytivora aves	37.	
Noctua saxatilis Steinhauz		19	Pica	26.	157. 17
Numenius Indicus Cluf. ardeæ spe-		20	braslica	28.	56
cies, vide Curicaca			alia		56
Nycticorax Gefneri	95.		caudata f. varia	27.	17
			caudata Indica mas	27.	17
O.			foemina		17
O Edionemus Bellonii	43.	26	caudata alia Elster Amsel		27
Aldrovandi	44.		Garrulus Argentoratenfis	27.	17
Oenanthe	88.	45	Glandaria Heger		17. 43
Oenas seu Umago	64.	32	species alia		17. 43
Oæcrotalus sive Pelecanus Koppfgans	91.	46	marina	27.	17
foemina		46	Perfica	28.	
Ortygometra	48.		Pica Cureba	139.	
Ostrifragus	4.	5	Piciciti	123.	
alius	4.	4	Picui pinima	139.	
Otis cum Cicere Arierino		26	Picus Cinereus	80.	41. 43
Otis sive Tarda	42.	26	Chlorio-Indicus	80.	41
Ouriffia S. Tomincio. Nicremb.	124.	56	luteus cyanopus	79.	41
			Martius	78.	
P.			Maximus niger	78.	41
P Alumbus major	63.		Major bundter Specht	79.	41
minor	63.		murarius	79.	41
Paradisea avis majoris generis Cluf.		55	Nidum suspendens	80.	41
Parus caudatus	86.	44	Varius minor	79.	41
ater	86.	44	alius		41
cœruleus minor	86.	44	Viridis grun Specht	79.	41
cristatus	86.	44	major		41
Indicus	86.		Pitanguo Guacu	147.	60
major	85.	43	Pluvialis	113.	
palustris	86.	44	cinerea	114.	53
Sylvaticus	86.	43. 44	flavescens	113.	
Passer	65.	34	major Aldrovandi	114.	53
Albus	66.	34	Polyglotta	123.	
Albicilla	66.	34	Porphyrio	106.	52
Canarius	69.	34	Prunella		36
Domeslicus		34	Pittacus	20. 153.	140. 14
Alius		34	Pittacus albus cristallus	21.	15
flavus	66.	34	Cinereus	23.	15
Illyricus	67.		Erythrocyanus	22.	15
Indicus macrourus duplex	67.	35	Erythroleucus	23.	
Brachyurus Indicus	67.	35	Erythrochlorus cristatus	23.	
Cyanerii thromelanus	67.	35	macrourus	23.	
Erythromelanus	67.	35	Erythrocyanus Gefneri	23.	
Porphyromelanus	67.	35	Erythroxanthus Gefn.	23.	
Maculatus	66.	34	Leucocephalos	22.	15
Montanus	67.	34	Major	21.	14
alius		34	Minor	22.	14
Solitarius, merculus Steinamsel	74.	34. 39	Maximus	21.	15
Mas		39	Maximus alter	21.	15
foemina		39	Poikilorchinus	22.	14
Congener	75.		Torquatus macrourus	23.	
			Viridis	22.	14
			Viridis melanorinchos	22.	15

P.	T.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

INDEX

I N D E X:

Quibus paginis Tabula arrium sint subjungende.

Tabula	I.	pag: 2.	XXXII.	Pag: 61.
II.	}	4	XXXIII.	64.
III.	}		XXXIV.	66.
IV.	}	5.	XXXV.	68.
V.	}		XXXVI.	
VI.		7.	XXXVII.	69.
VII.		10.	XXXVIII.	72.
VIII.		11.	XXXIX.	74.
IX.	}		XL.	79.
X.	}	13.	XLI.	81.
XI.	}		XLII.	86.
XII.	}	17.	XLIII.	88.
XIII.	}		XLIV.	
XIV.	}	22.	XLV.	93.
XV.	}		XLVI.	94.
XVI.		23.	XLVII.	91.
XVII.		25.	XLVIII.	95.
XVIII.	}		XLIX.	100.
XIX.	}	31.	L.	104.
XX.		34.	LI.	105.
XXI.		35.	LII.	
XXII.	}		LIII.	114.
XXIII.	}	37.	LIV.	118.
XXIV.			LV.	121.
XXV.		39.	LVI.	131.
XXVI.	}	40.	LVII.	133.
XXVII.	}	42.	LVIII.	138.
XXVIII.		46.	LIX.	146.
XXIX.	}		LX.	147.
XXX.	}	57.	LXI.	151.
XXXI.	}		LXII.	

I N D E X

P R Æ F A T I O

I N

HISTORIAM NATURALEM

D E

A V I B U S:

In qua de Operis ratione, & de Avium natura in genere, agitur.



Scaliger
in Hist.
anim. l. 1.
p. 48.
Arist. H.
A. l. 2.
cap. 15.
edit. Scaligeri.

Arist. H.
A. l. 3.
cap. 11.

Arist. l. c.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 45 &
Plin. H.
N. l. 8.
cap. 39.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 47.

Quaticos greges, æ-reus *Avium* seu volucrum grex insequitur, *Benevole Lector*. Inditum iis id nomen, non tam quod pervia discurrant, iisdemq; delectentur, ut Isidoro & Perotto placet: vel ab adventu, quod inde venient, unde quis non suspicetur, ut Festo: quàm vel à volando, quod Æbreis *per* dicitur, ut Martinius in Lexico deducit, vel ab *per*, audiendo, quod Scaligero patri visum. Græcis, *per* ab *per*, *per*, *per*, &c. vocantur. *Collum* omnes & *dorsum* & eas quæ terram spectant, quæque pectoris vicem gerunt, partes, cum ceteris animantibus communes habent: peculiare præ cæteris, *alas*, *pennas*, quibus caulis plumas & *rostrum*, quod in senectâ durefcit. Neque *labia* ipsis sunt, neque *dentes*, neque *manus* pedesve anteriores, neque *auriculae*, neque *nares*, sed meatus horum sensum, ad odoratum in rostro; ad audiendum in capite. *Oculos* similiter atque aliæ animantes, duos sine palpebris habent. Connivent inferiore gena graviore: nictant ab angulo obeunte membrana omnes. Aristoteles, *per* simile coxæ, longum, ad medium usque subeuntem atque affixum ventrem: quod cum avulsum est, *coxam* putes: At ipsa coxa, quæ inter hoc & tibiam est, alia quædam pars esse videatur. Maxima uncungibus, & *Peetus*, aliis robustius. Pro cauda clunis est, iis quibus aut crura longa, aut pedes continuata planicie dati, brevis, longus alii. Alas in priora curvant. Omnium animalium *bipedes* sunt ut homo: quamvis retrorsum curvant crura, quadrupedum modo, uncos habentium longi, & quæ ad aquas versantur. Carent tamen iis Cyseli, & quoddam Manucodiorum genus. Omnes sunt *per*, sed & omnes quodammodo *per*. Plurimis namque digiti discreti sunt: & *per* quidem, dearticulatos tamen atque distinctos habent digitos. Plinius eos alias habere dixit, palmipedes esse alias, alias inter utrumque divisos digitis, adjecta latitudine. Quæ volatu sublimis feruntur, omnibus quaterni digiti, tres in anteriore parte, unus ponè pro calcaneo plurimis. Paucae binas ante,

totidem post habent. Quibusdam etiam calcaria sunt, Uncungues autem & calcarigeræ, nullæ. Plinius; ni fallor, radios dixit. Illæ sunt volucres; hæ humiles. Data nonnullis & surrectis pennis crista. Soli gallo peculiaris, quæ nec caro est, nec à natura carnis aliena. *Interiora* si attendamus, *Lingula* sortitæ omnes sunt, sed diversam: aliæ longam, latam aliæ, quæ præter cætera animalia, literas sono exprimunt: aliæ ante ex cornu acutissimo, retro ex carne compositam, ut in historia occurret. *Lingula* quæ gurgulioni imposita est, nulli: apertione & contractione ita meatum temperant, ut prohibeant, ne quid gravioris in pulmonem demittatur. *Viscera* & inter se & ab aliis animalibus differunt. Præjacet in quibusdam ventriculo ingluvies, seu cavum amplumque corium, in quod receptus cibus per initia coquitur, à gula angustius, dein laxius, & rursus, quo ad ventriculum demittitur, arctius. *Ventriculus* plurimis carnosus & compactus: pelle interiore robusta, etiam cum à cornoso ablata est. *Ingluvie* destituta, gulam capaceam latam, aut totam qua ventriculo jungitur obtinuere, ut monedulæ, corvi, coturnices: quæ tali carent, longam habent, & liquidius præ cæteris excernunt, ut Porphyrio. Complurimis *intestinum* tenue, & si explicetur simplex. *Appendices* explicatæ sunt, sed paucae, neque superne ut piscibus, sed in ima parte ad intestini extrema. *Fel* non eodem loco habent, quædam enim *per* quædam *per*, ut columba, hirundo, &c. *Testiculos* *per* Antequam coeant, quibusdam sunt parvi, quibusdam obscuri & *per* tempore coitus majores sunt. *Genitura* alba est. Vesica carent, quod larga humoris copia ad pennarum ortum & incrementum requiretur, ut Aphrodisæo visum Pennigeri hujus exercitus locus sunt Aër, aqua, terra. Illum fulcant, unde Aves cœli dicuntur; in hac gradiuntur, in ista quædam natant. Sunt tamen quæ in quibusdam locis non inveniuntur, de quibus ira Plinius: *Hæc quoque mira natura differentia: alia aliis locis negat, tanquam genera frugum fruticumve, sic & animalium non nasci translatitium; invec̃ta emori, mirum. Quid est illud unius generis saluti adversum, quæve ista natura invidia? aut qui terrarum dicati avibus termini? Rhodus aquilam non habet: Transpadana Italia juxta Alpes Lariumla-*

Arist. H.
A. l. 2.
F. 213.
edit. Scal.

Albert
M. de A-
nimal.
2. tr. 1.
cap. 6.
Arist. H.
A. l. 2.
c. 22.
edit.
Scaliger.

Arist. H.
A. l. 2.
cap. 16.
Arist. H.
A. l. 3.
c. 1.
Arist. H.
A. l. 6.
cap. 9.
Arist. H.
A. l. 6.
cap. 2.
Aphro-
dis. Probl.
p. 1. q.
108.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 29.

cum

cum appellat, amaranthum arbusculo, agro, ad quem Ciconia non permeant: sicuti nec octavum circa lapidem ab eo, immensa alioqui finitimo Insulbrum tractu examina graculorum monedularumve. Picus Martius in agro Tarentino negatur esse, &c.

- Arist. H. A. l. 8. c. 28. Plin. H. N. l. 10. c. 28. Sed nec eadem semper omnibus regio. Faciunt enim *μυζάνου* quædam, ut in gruibus, Ciconiis & aliis dicemus. Unde Plinius. *Temporum magna differentia avibus. Perennes, ut columba, semestres ut hirundines: trimestres ut turdi & turtures, & quæ cum fatum eduxere abeunt, ut galgali, upupa, Scilicet. Migrant quædam, alio non procul à locis in quibus morabantur secedunt, & seipsas abdundunt, & quidem nullo discrimine, tamquam* *ισθμίου* *quam* *γαλγίου*. *Viclitant carnibus, insectis, herbis, granis, & seminibus, piscibus & ranis. Sola Emmo prunas etiam devorat, ut in ejus descriptione dicitur, Bibunt suctu ex his quibus colla longa, intermittentes, & capite resupinato velut infundentes sibi: Porphyrio solus morsu. Non bibunt* *γαλγίου* *quod Herodotus, ut Aristoteles scribit, ignoravit. De Generatione notandum, duobus modis fieri coitum; foemina humi confidente ut in gallinis: aut stante, ut in gruribus. Quædam omni tempore coeunt, ut gallinæ, & pariunt, præterquam duobus mensibus hyemis brumalibus: plerumque tamen vere & ineunte æstate: quo tempore etiam pleræque pariunt, & quidem semel. Oscimes præter exceptas, inquit Plinius, non temere fetus faciunt ante solstitium vernum, aut post autumnale: ante solstitium autem dubios, post solstitium vitales. Ova ferunt omnes, vespertilionem excepto, qui animal. Infœcunda sunt quæ ad uncas habent unguis. Tribuit hoc avium generi natura, ut foecundiores essent fugaces earum quam fortes. Ovorum alia sunt candida, ut columbis & perdicibus: alia pallida, ut aquaticis: alia punctis distincta, ut meleagridi: alia rubri coloris, at Phasianis. Intus omne bicolor. Exeunt rotundissima sui parte dum pariuntur, molli putamine, sed protinus durefciente, quibuscunque emergunt portionibus. Tempus à coitu, partus excubationis, & numerus variant, ut apud Plinium videre est. Aliquando foemina tantum incubat, aliquando mas. In columbarum genere, interdum mas, noctu foemina: inter palumbes post meridiem in matutinum foemina, cætero mas. A coitu inhorrescunt & se excutunt, sæpe etiam aliqua festuca lustrant: quod & edito ovo faciunt. Sunt etiam quædam his bella amicitiaque, unde & affectus. Dissident olores & aquilæ: corvus & chlorio, noctu invicem ova exquirentes. Simili modo corvus & milvus, illo præripiente huic cibos. Rursus cum terrestribus, mustela & cornix: Ægithus avis minima cum asimo, &c. De Motu ita egregie Plinius. Omnibus animalibus re-*
- Arist. H. A. l. 8. c. 18. Plin. H. N. l. 10. c. 52. Plin. H. N. l. 10. c. 53. Arist. H. A. l. 5. c. 8. Arist. H. A. l. 6. c. 1. Plin. H. N. l. 10. c. 31. Plin. H. N. l. 10. c. 52. Plin. H. N. l. 10. c. 58, 59, 60. Plin. H. N. l. 10. c. 41. Arist. H. A. l. 6. c. 1. Plin. H. N. l. 10. c. 73. Plin. H. N. l. 10. c. 38.

liquis certus & uniusmodi & in suo cuique genere incessus est: aves solæ variomotu feruntur, & in terra & in aëre. Ambulant aliquæ, ut cornices: saliant aliquæ, ut passeræ, merulæ: currunt, ut percides rusticulæ: ante se pedes jaciunt, ut ciconiæ, grues: expandunt alas pendentesque raro intervallo quatiunt (*ut milvi*) aliæ crebrius sed & primas duntaxat pennas: aliæ & tota latera pandunt: (*ut corvi*) quædam majore ex parte compressis volant (*ut pici*) percussoque semel aliquæ & gemino ictu aëre feruntur: (*cardueles*) vel ut inclusum eum prementes ejaculantur, sese in sublime, in rectum in pronum. (*hirundines*) Impingi putes aliquas, (*perdices*) aut rursus ab alto cadere has, (*alaude*) illas salire, (*coturnices*) Anates solæ, quæque sunt ejusdem generis in sublime protinus se tollunt, atque è vestigio cœlum petunt, ut hoc etiam ex aqua. Itaque in foveas, quibus feras venamur, delapsæ solæ evadunt. Vultur & fere graviore, nisi ex procursu, aut altiore cumulo immisæ non evolant, cauda reguntur. Aliæ circumspiciunt, aliæ flectunt colla. Sine voce non volant multæ: aut è contrario semper in volatu silent. Subrectæ, pronæ, obliquæ, in latera, in ora, quædam & resupinæ feruntur: ut si pariter cernuntur plura genera, non in eadem natura instare videantur. De cætero, dorrectis ad caudem cruribus volant, quibus longi pedes: quibus breves, contractis ad medium. Uncos unguis habentes altivolæ fere sunt, exceptis nocturnis. De voce hoc dicere sufficiat, loquaciores quæ minores, & circa coitus maxime. Aliis in pugna vocem, ut coturnicibus, aliis ante pugnam, ut perdicibus: aliis cum vicere, ut gallinaceis. Iisdem sua maribus: aliis eadem, ut foeminis, ut lusciniarum generi. Quædam toto anno canunt, quædam certis temporibus. Palumbibus omnibus similis & idem trino conficitur versu, præterquam in clausula gemitu. Est quæ boum mugitus imitetur, in Arelateni agro *taurus* appellata, alioquin parva. Est quæ equorum quoque hinnitus *anthus* nomine, herbæ pabulo adventu eorum pulsa imitatur, ad hunc modum se ulciscens. Varium & vitæ inter eas pacium. Mares passeræ negantur anno diutius vivere. Columbæ & turtures octenis durant. Cornicibus & cervis, nescio quot tribuuntur lustra. *Morbis* infestari nullum dubium, & habentur apud authores remedia. Conferunt illis *si αλγυι*, incommodant *si ινιμυια* *ινα*. Invaletudinis indicium in pennis. *παρδελισται* *γὰρ* *εἰ* *οὐ* *αὐτῶν* *εἴχον* *καὶ* *ἀνέστην*. Quæ de Natura, ingenio, circumtione, docilitate, & affectibus occurrunt, abunde in Historia explicabuntur. Divinationis iisdem aliquid inesse, compertum est. Grues ex mari in mediterraneo volantes, si silent, serenitatem pollicentur, si clamant, atro-

Plin. H. N. l. 11. c. 47.

Plin. H. N. l. 11. c. 51.

Plin. H. N. l. 10. c. 35.

Plin. H. N. l. 10. c. 42.

Plin. H. N. l. 10. c. 35.

Arist. H. A. l. 5. c. 13.

Æl. H. A. l. 7. c. 7.

atrocem turbinem. Idem sonans in crepusculo matutino Ardea, prænunciant; quæ & pluviam si ad mare recte tendet, prædicit. Sereno canens noctua; volubili sono crocitantans corvus, crepusculo vocales cornix & graculus; monedulæ modo sursum, modo deorsum versus volantes, &c. tempestatem innuunt, &c. *Usum* homini præbent, in cibo, Medicina, venatione, re vestiaria & plumaria, oblectatione & aliis. Caro earum levior & sanior, purgatissimaque in suo genere est, & Albertus dixit. *Differentia* Avium sunt infinitæ, ex multisque fontibus petuntur. *Partes* si respicias, aliæ habent *rostrum* rectum, aliæ, superius, inferius, aut utrinque incurvum, *Pedes*, quædam longos, breves quædam. Aliæ sunt digitatæ, aliæ palmipedes, aliæ inter utrumque divisæ digitis, nonnullæ apodes: *Caput* aliis cristatum, sine crista aliis, sunt & cornuæ, ut apud Ælium videre est. *Collum*, tliæ longum, ut grues; aliæ breves obtinere. De *Lingua* superius attigimus. *Ala*, plerisque proportionem: sola Dodo tam exiguas habet, ut se à terra tollere non possit. Omnes plumis vestiuntur, recens natas si excipias, & Dodonem, quæ lana quasi tegitur. *Cauda* quoque sunt fere omnes. Cæcato insulæ Mauritæ avis cauda caret, &c. *Ratione Magnitudinis*, sunt, parvæ, mediocres, magnæ, apud quantitate, & bovis majores, ut Ælianus fabulatur. *Ratione Loci*, sunt terrestres, marinæ, lacustres, palustres, domesticæ & villaticæ, sylvestres, campestræ. Aliæ arboribus insident, vel illis se affigunt, aliæ cavernis delectantur. Quantum ad *Qualitates*, sunt albæ, nigræ, versicolore, & quidem tales pleræque. Mutant quædam colorem, vocemque tempore anni ac repente fiunt aliæ, ut oscimes & grues: non matunt aliæ. *Ratione Cibi* sunt carnivoræ, ut rapaces, insectivoræ, granivoræ, &c. Deglutiunt & lapillos & ferrum quædam. *Ratione Generationis* omnes fere, ut dictum, ovum ponunt, sola vespertilio animal. Infecundæ sunt uncungues: fecundiores aliæ. Columbæ decies anno pariunt: hirundines, turtures, merulæ bis. Nihil de congressibus, partus, incubationis, exclusionis, differentiis dicam. *Motus* diversitatem superius jam attigimus. Sed & de *vocis* varietate actum. Philomela modulatur: Aquila clangit: Accipiter pipat: corvus crocit, crocit, corniculat. Perdix cacabat: Anser, gratitat, glacitat: Cygnus drensat. Turtur & Columba gemunt: Palumbes plaufirat: Ciconia gloterat. Gallus cucurrit: Gallina gracillat, glocit: glocitat. Pavo pupillat: Grus gruit. Vultur pulpat. Graculus frigulat: Milvius lipit, lugit. Anas tetrinit: hirundo trinsat. Passer pipit: Sturnus pisitat. Turdus trutilat: Acredula mittat. Coturnix grylissat: Gal-

gulus glocitat. Merula stridet vel modulatur: Upupa popissat. Meleagris caccissat: Vespertilio stridet. Pica picatur: Cuculus cuculat. Bubo bubulat: Noctua cucubat. Ulula ululat: Buteo bubit. Regulus zinzilutat, Parustinninat. Reliqua, ne nimis prolixus sim, non attingo. Ego eas in hoc Opere, in *Terrestres & aquaticas distinxi*. Illas iterum in *Carnivoras*, sub quibus sunt Aquilæ, vultures, Acipitres, Falcones, Plittaci, Corvi, Cornices, Noctuæ, Vespertilio, &c. *Insectivoras* non canoras & canoras: *Granivoras*, sub quibus pulveratrices, sylvestres & domesticæ, pulveratricesque & lotrices simul, &c. & *Baccivoras*. *Aquaticæ* in *Palmipedes & Fissipedes* quæ etiam sua sortiuntur genera, dispescuntur, prout in syllabo librorum & Capitem præfixo apparet. Et tantum de Avium natura in genere præmittere placuit. Quod reliquum est, scire te *Benevole Lector* velim, exhiberi hic Tibi quasi in tabella, quicquid de Avibus veteres & recentiores habent. Addidi enim omnia illa quæ à Gesnero & Aldrovando omissa sunt. Ideo & totum quintum librum Marcgravii de Avibus Brasiliensibus Appendicis loco adjeci, paucis quibusdam omissis, quæ alibi abunde explicata sunt. De *Uso* si quæ desiderabuntur, in Additamentis, Deo bene volente, prostabunt, in quibus una quæque Exoticarum suæ Classi restituetur. Quapropter, si aliqua nunc bis occurrerit, veniam dabis. Similes aliquando appareant species, quæ tamen vel icone, vel quibusdam in descriptione positis differunt. Quia vero duplici Aristotelis Historiæ Animalium editione usus sum, vulgari nempe & Scaligeranana; ideo illam absque addito, hanc cum nomine Commentatoris citare soleo. Iudicem tibi dabo, postquam totum de Animalibus opus paratum fuerit, illumque totius operis ad species, partes, & affectiones reducti, prout Plinius Historiæ suæ libro undecimo, capite trigesimo septimo & aliis pluribus in locis fecit, Compendium, sed Alephabetico ordine dispositum: si tituli marginales omissi sunt, ne mirere. Primus hic in hac Historia labor, & jam fere per triennium apud Typographum delituit: nec tum mihi istos addere animus, prout & in historia de Piscibus vidisti. Fruere interim, *Benevole Lector* his, cum Deo, & auctori juventutis literariæ studiosissimo, prosperam valetudinem & ad plures curas vitam apprecare, ut Tuo bono, opus Historiæ Naturalis, de Homine inprimis, quod parat, aliaque huc spectantia, feliciter absolvere possit. Vale. Lsenæ ex Musæo. 10. Febr. A C M. DC. L.

Arist. H.
A. l. 1. c. 2
Edit. Scalig.

Æl. H.
H. l. 17.
c. 10.

Herbert.
i. Itine-
rar. p.
347.

Æl. H. A.
l. 17. c. 14

Plin. H.
N. l. 10.
c. 53.

HISTORIÆ NATURALIS

D E

A V I B U S

LIBER PRIMUS.

De Avibus Terreſtribus Carnivoris.

TITULUS I.

De Aquilis.

CAPUT I.

De Aquila in genere.

Nomen.



QUILLA Græcis seu *ἰαπετὸν* concitus feror, seu *ἰαπετὸν* quod semper augurium ejus veridicum esse soleat, *ἰαπετὸν* Cypriorum dialecto *ἰαπετὸν* & *ἰαπετὸν* Macedonum *ἰαπετὸν*, *ἰαπετὸν* vocatur.

Descriptio.

Totam avis molem si spectes. Corpus ipsi densum, figura erecta. Ossa solida & nihil ferè medullæ habentia. Magnitudo determinari non potest. Viginti cubitales in Ptolomæi pompa delati fuere. Inter Misenam & Dresdam tres in nido, pulli, totidem patulas quercus ingenti spacio complexo, inventi; quorum maximis alæ per transversum extensæ septem ulnas, ungues viri grandis digitos æquabant, crura leoninis majora erant. Partes, si in rationem veniant, anterior Capitis pars paulatim arctatur & in rostrum definit; quod durum, aduncum, ad senectutem crescit, sed tractu temporis fit inutile. Oculi sunt, parvi, charopi, concavi, profundi, nec nimium oblongi, nec exactè rotundi. Dentes nulli. Cerebrum adeò calidum, ut in pulverem redactum, maniam, exhibitum, inducat. Alæ rectæ & extensæ; in summitate recurvæ, nervosæ, paucæque carnis, magnitudinis tantæ ut eas Homerus, januis thalami comparavit. Pennæ in iis sunt duræ & aliarum, Anserum inprimis & Columbarum permixtæ pennis easdem absument. Dum pulli excluduntur, inediâ albescent. Pes dexter sinistro major, colore uterque difformis. Ungues adunci & recurvi, quos in incessu, intro semper vertit; nisi solem aut prædam intueatur, perpetuò inspicit, & hebetatos, rostro, aut ad Lapides atterent-

Athen. Dignos. l. 5.

Homerus Iliade ult.

do, acuit, quique cum pullos nutriunt, invertuntur. Alvus propter cibi humiditatem mollior. Fel ærugineum, impense acre & mordax. Sanguis crassus & fibrosus. Stercus tantæ acrimoniæ, ut nulli in Medicina usui esse possit.

Quantum ad Sedes & loca, nec in insulis, parvis inprimis, (cum Rhodi in culmine domus Tiberii confedisset, portentis loco fuit) nec in locis propè Mæotidem paludem, nec in extrema Scythia, & Sarmatia, ob aeris fortè inclementiam reperiuntur. In Caucaſo, Tauro, regno Peruano, Germania, Polonia, Britannia, Dania, &c. in quibus prædæ copia, eas invenias, & quidem locis præsertim (de Pygargo & Morphno id sumendum non est) seu *ἰαπετὸν* id est ut tutiores ab insidiis sint; seu *ἰαπετὸν* quia difficulter à terra attolluntur.

Nutritum ipsi Carnes sunt, Columbarum, Anserum, Cygnorum, Gallinarum, Ovium, Cervorum, hinnulorum; ob sui à morbo tutelam, leporum, testudinum terreſtrium, piscium, etiam & cancrorum: serpentum inprimis, seu propter odium, seu propter eam quam ex humido & frigido cibo capiunt, voluptatem. Sed nec à sui generis avibus iratæ & famelicæ abſtinent. Cadavera tamen non tanguant, Percnoptærum si excipias. A meridie venari quædam incipiunt, ab orto sole quædam. In prædam conspectam, & injuriæ patentem (lepus in planis, testuno post coitum supina invaditur) velocissime & tormenti instar (hinc *ἰαπετὸν*) se demittunt, posteriore pedis digito feriunt, & occisam in nidos deferunt. Falluntur tamen interdum, quod in Falcone Scalig. Exerc. 237. Scaliger observavit: sed & à Polypo apricante in profundum detractas, Ælianus annotavit. Potus iisdem nullus, fortè quod ad eum sanguis animalium sufficiat. Vix tam

Galen de Compos. Medic. f. l. lib. 4. Galea. l. 10. de simplig. facult.

Locus Sueton in Tiberio. Strabon. Geogr. l. 7.

Arist. H. A. l. 9. c. 32.

Nutritum.

Ælian. H. A. l. 7. c. 11.

men aquam bibisse, medicina gratia, & ultimo in senio, rostro præ siccitate incurvato, vitam aliquandiu bibendo sustinere coguntur.

Sexus.

Generatio.

De *Sexu* Aquilarum dubitari non debet. Datur genus, quod propter tres testiculos, *Triorchis* appellatur. *Coeunt* vero frequenter, & femina ter decies in die compressa, si mas revocet, denuo accurrit. Unde *Ægyptiis* & *Venus* dicitur, & soli dicitur. Commiscentur aliquando cum accipitre, sed ovis incubare non dignantur: sed & marem cum lupa aliquando coire, scriptores *Africani* referunt. Ovis majoribus XXX. minoribus XX. diebus incubant, & ad exclusionis promotionem lapidem ætitem, qui æstum ovorum ab incubatione contractum, utpote frigidissimus, temperat, & peculiari qua pollet vi partum accelerat, in nido deponunt. Duos plerumque *excludunt* pullos, quandoque tres. Exclusos solem adversos intueri cogunt, & invitos eidem obvertunt. Si forte oculos vi splendoris inflexerint, aut nictatione obnubant, tanquam adulterinos abdicant, si immotis eum aspexerint, genuinos agnoscunt. Volatum affectantes, in altum sublatis, dimittunt, sibi relictos, aut forte dilapsos suscipiunt, grandiusculos, logissime tanquam rapinae æmulos, à nido fugant, & in nido clare se ipsi dicitur matris dicitur.

Sinehus in Dione.

Arist. H. A. l. 9. c. 32. Volatus.

Quantum ad *volatum*, à meridie ad vespeream moventur, manè, quiescunt, donec hominum conventu fora impleantur. Tam sublimes rectâ viâ feruntur, & deorsum tanta mole corporis labuntur, velificatas alas modico caudæ gubernaculo advertentes, ut ceteras omnes aves superent, & vel ideò à Poëtis *Altivolantes* dicantur. Tempore incubatus, & nutritionis pernicitas illa imminuitur, sed motus tonicus perpetuo peculiaris manet.

Homerus Iliade o. Oppian. Cyneget. l. 1. Lucret. l. 9. Vox. Homerus Iliade µ.

Vocem ipsis clangere seu *χάλεον* quidam, ut *Homerus*, & *Author Philomela*, tribuunt, qui reboatus quidam est propter strepitum gravem, avicularum motum obtundens: nonnulli penè mutas aut vix vocales, quod de tertio genere *Aristoteles* affirmat, tradunt. Pullos mutos esse constat, quod illis lingua humore quopiam tenellis impeditur. Sed de hoc inferius dicitur.

Sensuum externi. Plutar. de Homer. Aug. l. 2. de morib. Manich.

De *sensibus externis* non est quod multa dicam, tam exacti est visus, ut sola contra rotantis jubaris lucem immotam teneat aciem; sola sublime ita volans, ut à nobis tanta luce difficile cernatur. latentem sub frutice lepuseulum, sub fluctibus nantem pisciculum, videre comperta sit.

Ingenium.

Animam ipsi olere certissimum est, propter quam contacta ab ea corpora facillimè putrescunt. De *ingenio* ac docilitate pauca

occurrunt. *Callitrichum* herbam in nidum suum contra noxia animalia ingerere affirmant. Subvenisse *Aristomeni* in Ceadam demisso, gratiam virgini *Sefteni*, & puero pro educatione, rustico pro lato contra serpentem auxilio, retulisse, infantem recens natum ab exitio servasse, apud *Autores* invenies. Inde pullos educatos ad leporum, vulpium venatum, descripto ab *Aeliano* modo, instituebant. Tales & *Cublai Tartarorum Imperator* habuit. Sed & *Pythagoras* aquilam ita mansuefecisse, ut certis vocibus fisteret & devocaret, *Superodantem*, dicitur.

Inimicitias gerunt cum *Cygnis*, (pugnae apud statium descriptionem vide) *Trochilo*, *Gruibus* quæ ideo montum *Taurum* transmissuræ, lapillis vocem cohibent, & noctu transvolant. *Ardeolis*, *Ciconia*, *Hierofalcone*, *vulturibus*, *Dracone* & *Serpentibus*.

Vita quamvis salaci diuturna est. In senectute visus hebetudine, & rostri aduncitate tentatur, cum vero se illa gravari sentit in sublime fertur, inde, oculorum caligne solis calore dispersa, fervida, in aquas frigidissimas se dat præcipitem, quibus tertio immersa, nidum petit, & inter pullos captura aptos quasi febre correpta, cum sudore quodam plumas exuit. Opetit ergo mortem non tam senio vel agitudine, quàm fame, in tantum superiore accrescente rostro, ut aduncitas aperiri non queat.

Paulan. l. 4. V. G. Plin. H. N. l. 10. c. 5. Aelian. H. A. l. 17. c. 37. Aelian. H. A. l. 12. 21. Aelian. H. A. l. 4. c. 26. Plur. in Numa.

Antipathia. Arist. H. A. l. 9. cap. 1. Stat. Thebaid. l. 3.

Vita. Rhodig. Antiq. l. 7. c. 41.

CAPUT II.

De Aquila in Specie.

ARTICULUS I.

De Chrysaëto.

Chrysaëtos Aquilæ genus à fulvo colore ita dictum est. *Aristoteles*, *Albertus Herodius*, *Aelianus* Aquilam stellarem, *Pindarus* Jovis alitem, *Hesiodus* *Ægioped*, &c. vocat.

De *externa ejus constitutione* veteres hoc duntaxat, produnt, quod maxima sit omnium inter ceteras aquilas eademque ruffa seu vulva aut subrutilla (qui color interdum cum ætate mutatur) & oculis *Charopos*. Quæ *Aldrovando* à *Ferdinando Mediceo* missa erat, pendebat libras duodecim, coloris, in minutioribus totius corporis plumis, ex fusco castanei albis sparsim intercurrentibus maculis, paucis dorso, pluribus ventre, radicibus albis; in alis & cauda fusci, eò magis quod majores pennæ, in cruribus ad pedes usque furrugini: Longitudo ei ab extremo rostro ad ultimam caudam, quinque dodrantum, à rostro ad extremos ungues, quatuor Spithamarum, & ultra.

Nomen. Aelian. H. A. l. 2. c. 39. Pindarus Lythio. Ode 4.

ultra. *Latitudo* expansis alis Spithamarum octo. *Rostro* quod palmam superabat ad uncitatem infra inferiorem mandibulam ad pollicem unum propendebat, latitudo plusquam duorum digitorum, medii præsertim, erat. Color, in acie nigrior, alibi. Corneus ad cæruleum dilutum tendens, fusco maculatus. *Oculos* habebat Charopos, quos palpebræ in uno quoque bine, supernè, & infernè integebant, inter nictandum tunica quadam crassâ, ab infra sursum exportecta, musculo conspicuo, cujus initium haud procul ab eruptione nervi optici à cerebro erat, quamque palpebræ superioris loco à naturâ datam, & ad angulum internum inprimis collocatam, quod cutis capitis ob duritiem inpalpebras abire, nequeat, creditur instructa; ab angulo majori ad minorem, obducebantur. Humor aqueus in iis copiosus, Crystallinus, Sessilis, utroque latere compressus, & solidus. *Lingua* erat humanæ similis, lata, extremo teres, versus radicem duobus utrinque ceu hamatis utrique appendicibus corneis armata. Sinistri pedis posticus *unguis* sex digitos in circumferentia longus erat, dextri quatuor, singulos digitos, quatuor semicirculares tabellæ, extremos propè ungues, integebant; maximo interiori excepto, quem tres duntaxat vestiebant. De ingluvie, Oesophago, ventriculo, consulat Aldrovandum qui volet. Musculos collum moventes anticos & posticos habebat duodecim, seu sex paria, laterales tres. In thoracis utroque latere tres; Abdominis quatuor paria; Alas moventes decem, Scapulæ quatuor; Ulnam moventes, sex; eam partem qui carpo in homine respondet totidem, crura quinque, Tibiam octo, Tibiam & digitos, plurimos.

Cibus ipsi carnes leporum, gruum, Anserum, Hinnulorum, Cervorum, quos ex declivi præcipites agit; & Taurorum, quos magno & ausu & astu aggreditur: aliquando fame premente fructus, & fruges, ut hac in parte deceptus videatur Aristoteles, qui fruges etiam si in os ingeras respuere asferit, comedit.

Ova ad summum tria ponit, si juvenis est & vegeta, ut plurimum duo, quorum alterum sapissime putre deprehendi testimonio acupum, per octennium nidum explorantium, Albertus affirmat, quæ de ovorum vel ab alterius generis Aquila Crysaëto, vel à Chrysaëto alteri Aquilæ suppositione scribuntur, dubia nimis sunt. Si duo excludit, alterum pullorum ejicit, seu nutritus difficultate, seu quia minus generosus apparet. Prædam nisi fame coacta sola minimè absomit. Impertitur avibus regiâ magnificentia portio, quæ ea spe sectantur, adulatorum aulicorum ingenia experientes.

ARTICULUS II.

De Haliato & Melanato.

Haliætos, Haliætos Phavorino, Aquila marina Latinis, Nisus, sed non recentiorum, Ovidio dicitur, German. *Water Adler*.

Qui à Bellonio exhibetur, *magnitudine* est Milvi. *Caro* ei cinerea ad nigrum vergens, fibrosa. *Alarum* ad pedes duos Romanos, & digitos undecim extenditur longitudo. *Caput* album & fuscis lineis distinctum, *rostrum* aquilinum, *Oculi* in medio nigri, in ambitu aurei. *Lingua* ferè humana, appendice ad radicem utrinque instructa. *Colore* per summa Asturis, per ima albo, Guttur maculis rufis notatum. *Pectus* purè candidum. *Venter* gutturi colore respondens. *Crura* crassâ & squamosa. *Cauda* ad commoditatem volatus lata, *Pedes* fissi, hamati, cærulei. *Digit*i quatuor per superna ad dimidiam longitudinem squammosi, ad reliquam incisi, per inferna asperi & aculeati, tam validi, ut flexos vix ulla vi distendas.

Species Aquilarum marinarum plures esse videntur, ex quibus, tum illa est Bellonii quam testas in cruribus & ungues omnino rotundos habere scribit: tum illa Alberti M. & Anglorum, quæ pede est uno anserino & natante, altero fisso & prædæ dicato; adipem in cauda gerit, quo guttatim in aqua dimisso, pisces attoniti, prædæ fiunt opportuni.

Habitat circa mare, littora & oras.

Cibus ei interdum columbæ, interdum aves marinæ; quas universas nunquam invadit, singulas cum emergentes observavit aggreditur, & immensas vel strangulat in humore, vel per summa corripit, sed piscibus præcipuè victitat, quos in sublimi inprimis natantes, in altum mare se præcipitans aquis pectore discussis rapit, & interdum pondere victa demergitur. *Quod* de adipe superius dictum, quia & testimonio fide dignorum nititur, & pari, in ardea pede in aquam demisso, pisces alliciente, exemplo comprobatur, fidem videtur mereri; & viribus narcoticis, quales, seu in torpedine, seu in opio, seu in spiritu vini sentimus, adscribendum est. Vixit quidam & quidem quietus ad septimum sine cibo. De ipsius *Ortu* mira Plinius, quæ quia mendo non carent, diligentius expendi debent.

Fel ipsius ad oculorum suffusiones & nubeculas cum melle mixtum prodesse scribit Plinius.

MELANATOS, Aquila Valeria Hermolao, ἡλζαυρίδης Aristoteli, ἡλζαυρίδης Hesychio & Phavorino, aliis Hyperionis avis dicitur.

Nomen & descriptio.
Ovid. l. 8. Metamorphosi.

Bellonius de Avib. l. 2. c. 8.

Differentiæ.

Locus.
Arist. H. A. l. 9. c. 32.
Nutritio.
Ælian. H. A. l. 3. c. 45.
Oppian. l. 2. l. xent. Aldr.

Plin. H. N. l. 10. c. 3.

Usus.
Plin. H. N. l. 29. c. 6.

Nomen.

Aldrov. Ornithol. l. 2. c. 2.

Nutritio.

Arist. H. A. l. 8. c. 8.

Generatio.

Descri-
ptio.

Minor est reliquis nigra, *roſtro* adunco extremitate nigro cæteris corneo subcæruleo. Initium ejus supra narium foramina, membrana quadam transversim obvestit. *Vertex* ac *cervix* obscuro ferrugineo tinguntur; *Oculi* pupilla est nigra, iris charopa, & ex luteo rufescens. *Dorsum* ternis exiguis notulis albicantibus aspergitur. *Alæ* ad ultimam ferè caudam exporriguntur. *Crura* tota propemodum plumis operiuntur, quod nudatum est, id luteum, vix ad digiti unius spacium ad pedes patet.

Locus.

Cibus.

Arist. H.

A. l. 9. c.

32.

Pugna.

Degit in sylvis & montibus. *Vicitat* leporibusquos, sensim in terram delapsa, in plana digressos opprimit. Pugnat tamen & cum cervis animosè. Multum pulverem volatu collectum, insidens cornibus excutit in oculos, pennis ora verberans, donec præcipitet in rupem; sed & cum Dracone, Ova hic consecatur Aquilæaviditate malefica: at illa ob hoc rapit, ubicunque visum. Ille multiplici nexu alas ligat, ita se implicans, ut simul decident. Sola Aquilarum foetus suos alit, est liberalis, sola sine clangore & murmuratione.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 3.

ARTICULUS III.

De Pygargo & Morphno.

Nomen.

Pygargus, Gazæ Albicilla, Hinnularia aliis Melanæto & Morphno majore est, at minor Percnoptero.

Descri-
ptio.

Qui ab Aldrovando exhibetur, majusculi Gali erat magnitudine, *vertice* ac collo dilute castaneo ex cinero. *Oculi*, pupilla nigerrima, iride lutea, *Roſtro* adunco, & paulo quam cæteris Aquilis, proportionē habita, longiore. *Dorsum* alarumque pars superior, ferrugineis obscure plumulis ac subnigris integuntur, uti venter ac femora. *Cauda* ab Uropygio ad finem usque tota albicat: dux tamen pennæ minores, majorebus incumbentes extremo nigrae sunt. *Tibiae* totæ fere nude, impen-seluteæ, tabellis super intectæ. *Ungues* acerrimi.

Locus.

Colit oppida & campos, plana & lucos, sylvas & montes nonnunquam. Romæ raro visam ex Symmachi epistotelis colligitur. Adoritur nervos, ut Melanætus, cum hinnulis, à dextro latere insilit, in oculos involat, & tamdiu alis percutit, donec præcipientes agat. Aëtitem in nidum infert, à quo & is nomen obtinuit. Sed in alendo foetu reliquis est difficilior.

Differen-
tia.

Duplex illius *genus* Bellonius recenset. *Unum*, corpore colore inter album & cinereum ambiguo, extremis alarum nigris, supina parte tota candicans, quod Ardeam volatu refert; *caput* versus terram depri-mes & perdicibus cuniculis, gallina-ceis, & aliis minutis volucris, *vicitat*, & ut plurimum Oriente & Occiden-

te sole conspicitur. *Alterum* Milvo regali adeo simile, ut nisi hic & minor esset, & ventre intensius albescente, (pennas circa Uropygium cum superioribus candidissimas obtinet) unus ab altero non dignosceretur. *Ungues* habet atros, crassos, & in fornicem curvatos. Insectatur alaudas per campos, & cum subbuteone de præda tam acriter certat, ut uterque alis & pedibus confertis in terram delapsus, sæpissime aucupibus in prædam cedat.

MORPHNOS, *μορφνος*, *κλῆρος*, *Νετλοφίος*, Nomen.

& *τριπλῆς* Græcis; Nævia, clanga, Planga aut Plancus, Anataria seu Avicida Latinis, dicitur.

Plin. H.
N. l. 10.

c. 3.

Descri-
ptio.

Arist. H.

A. l. 9. c.

32.

Veteres cam magnitudine Melanætum superare, & nigro ac sub obscuro colore, qui tamen nævis quibusdam interstinguatur esse scribunt. Homerus alas ejus tantum patere, quantum valvæ ostii cujusdam viri divitis, cecinit. Ex recentioribus Aldrovandus nullam se vidisse cui omnia veterum competerent, fatetur. Turnerus apud Gesnerum, nomen hoc Balbulsarde Anglorum, qui est Buteone major, nævo in capite albo colore fusco proximo; quique ad ripas degit, in terra inter arundineta super aquas nidificat, volatu non admodum valet, pisces & cuniculos dilaniat, adscribit. Bellonius avem falconem secuplo majorem, pedibus cæruleis digitis oblongis, Unguibus patulis, Gallis Gerfault dictam, & terrestri venatui adhibitam, pro Morphno, sed dubius, obtrudit. Saltus convalles & lacus incolit. Aquaticis avibus ut fulicis & anatibus plerumque, sæpe & piscibus *vicitat*. Spectanda dimicatio est, inquit Plinius, ave ad perfugia littorum tendente, maxime si condensa harundo sit: Aquila inde ictu abigente alæ, & cum appetit, in lacus cadente, umbranique suam nanti sub aqua, à littore ostendente; rursus ave in diversa, & ubi minime se credat expectari, è mergente. *Nāscitur* ex Ossifragis si Aristoteli credimus.

Locus.

Pugna.

Plin. H.

N. l. 10.

c. 3.

Morphno CONGENER Aldrovandus appellat aquilam sibi missam, cujus magnitudo galli gallinacei erat. Color totius ferrugineus, *roſtrum* deorsum recta propemodum tendens, membranula lutea capiti conjunctum. Extremæ alæ versus ventrem maculis ovalibus insignitæ, remiges extremo apice albicantes. *Crura* hirsuta, & albis notis è bætico aspersa digiti superne squammis, inferne tabellis seu annulis intectæ.

Genera-
tio.

ARTICULUS IV.

De Percnoptero, & Ossifraga.

Percnopteros, qui & Cypaëtos, vel Hypaëtos, Ægyptias, & Oripelargus dicitur.

Nomen.

Bre-

Discri-
ptio.

Breviter à veteribus, diversim à Neotericis describitur. Aristoteli est capite albicante, corpore, quam cetera dicta majore, sed brevioribus alis, longiore cauda, vulturis referens. Aldrovandus binos ejusdem icones exhibet. Prior Chrysaëto non multo minor, habet *Corpus* coloris castanei ad nigrum vergentis, *rostrum* mediotenus rectum, extremo in uncum insignem curvatum, principio juxta frontem album, cetera nigrum. *Caput* subalbidum ad fuscum vergens. *Oculos* iride subalbida, pupilla nigra. *Collum* dimidia fere parte eaque superiore propemodum calvum, & paucissimis iisque exilibus plumulis confutum, candicans, ad cujus finem, medio prope collo instar pilorum quorundam hirsutorum ac crispiorum, plumulae veluti setae oblongae supra ceteras, plumas extabant. In tergo veluti cucullus quidam, ad medium usque protensus in acutum finem, velut triangulum quandam definebat. Alter ignavus, colore pennarum totius fere *corporis* erat fusco ad castaneum obscurum vergente, quem in ultimo collo nonnihil albicantium ordo continuus, angulum acutum in dorsum excurrentem constituens qui veluti cuculli humeris inducti basis erat, distinguebat. *Capite* ad occiput usque; calvo, ita ut pennae post verbum surrectae, cuculli speciem exhiberet. Bellonius avem Gallis busard dictam, buteone majorem, coloris nigri, alis brevibus ignavam Cypaëtum vult esse. Gesnerus aliam ciconiae forma & coloribus similem. Frigoris impatientem, corporis intense calidi, carnivoram, sed pisces respicientem, quae quatuor horas uno loco sedebat, & solem aliquando splendentem intuebatur, si non Gypaëtum, ex altero saltem parente natum, credit.

Locus.

Incolis lucos & plana, ut plurimum, montes, quandoque, in Syria & Aegypto maxime invenitur.

Nutri-
mentum.
Arist. H.
A.1.9.c.
32.

Cibus soli inter aquilas, cadavera. Gravis enim, & ad rapinam iners, à corvo ceterisque id genus alibus verberatus, fugatur, capitur. Muribus quoque circa Gazaram Aegypti urbem victitat. Pullos statim parere, Aelianus auditione se reperiisse scribit. Avicenna fel ejus destillatum cum oleo violaceo ad aurium dolorem & tinnitum; simum ad abortum commendat.

Nomen.

OSSIFRAGA & Ossifragus, Graecis *οσσιφραγος* Aristoteli *οσσιφραγος*. Harpa quoque, Sanqualia, & Immussulus dicitur.

Discri-
ptio.
Arist. H.
A.1.8.c.
3.

Aristoteles de ea. Ossifraga magnitudo major est quam Aquilae (Chrysaëto nempe excepto) Color ex cinere albicans. Parum oculis valet. Nubecula enim eos habet oblitos. Quae ab Aldrovando exhibetur, quatuor dodrantes & medium erat longa, novem, alis extentis Spitha-

mas, lata, libras undecim pendens. *Plumae* totius corporis, sub-albo, fusco, & ferrugineo colore variabant. Cutem proximè vestientes, molliculae & candidissimae erant, remiges ex toto ad castaneum tendebant. *Caput & collum* angustis & oblongis pennis rigeat. *Rostrum* ei duos digitos latum, palmarum longum, subnigrum, è Corneo fuscum, ab initio membrana quadam ultranavium foramina protensa, marginibus suis literams. exprimente tectum, ita aduncum; ut uncus solus pollicem latum adaequaret. *Lingua* humanae simillima, lato apice, hamatis utrinque duris & corneis appendicibus, membranula tenui ad inferiorem mandibulam connexa. *Mandibula* inferior canalis instar excavata; palatum medio rimam quandam exhibebat per quam pituita à capite destillabat. De mento plumulae tenues villorum instar, ad barbæ speciem quod ossifraga Plinius tribuit propendent. *Crura* fuscis plumulis aliquantulum fulvescentibus fere tota obtegebantur. *Ungues* nigerrimi, prætorre splendebant, & semicirculum ad amussim repræsentabant. Substantia ipsorum intus alba & ossea, foris fusco cortice intecta erat. Duodecim *candae* pennae albo & nigro maculabantur, intus albæ, extus fuscae. Et hæc *externarum* partium ratio est. *Interna* si attendantur, Uvea, quæ homini in pupilla perforatur, tenuissimam quandam membranulam pupillae prætenfam habebat unde, ut Philosophus notavit, minus visu pollet. Pars, quæ iridis ambitu clauditur, ne prorsus visio præpediretur, subtilissima, & pellucida erat, *Abdomen* pinguedine copiosa redundabat. *Lien* illi rotundæ figuræ, *ventriculi* corpus membranofum, fundo superiori orificio latius, ingluvie carens, quod de sua ossifraga Plinius, cujus vicem Oesophagus, simul atque jugulum transit, paulatim ad ventriculum usque dilatatus, gerere videbatur. *Vesica* fellis nullum cum epate consortium hoc sub ventriculo multo immersum erat adipi. *Uterus* crasso corpore, pyri forma, semine plenus. *Uropygium* medii pugni crassitudine, & adiposum conspiciebatur &c. Ad hujus genus Bellonii illa, quæ corpulentia colore & specie milvi est, duabus maculis nigris ad alarum latera notata, capite accipitris stellaris, cruribus & pedibus vulturinis, &c. non pertinet: sed illa quæ in comitatu Tyrolensi, colore accipitrum in dorso, in ventre albicante, orgyiae, distentis alis latitudine, rupicapras ex alto ad montes præcipitat, frustra ossium etiam majuscula deglutit, referri huc potest: ut & illa, quam Gesnerus, plumis albis, capite undò & flavo, Saxi injecta ossa confringentem, amici verbis describit.

Plin. H.
N.1.10.
c.23.

Cibus ipsi Rupicaprae, Hinnuli, canes

Nutri-
mentum.

Venatici, Anguillæ, cujus frustra in dissecto ventriculo inventa, tam acuti foetoris erant, ut spectatores in animi ferè deliquium conjicerentur.

Generatio.

Arist. H.

A. l. 9. c.

34.

Plin. H.

N. l. 10.

c. 3.

Antipa-
thia.

Lucr. l.

5.

Vox.

Ufus.

Plin. H.

N. l. 30.

c. 7.

Probè *fætificat*, ut pullos suos & Aquilæ, quos ista nido volandi facultatem adeptos, & edaciufculos, ejicit, nutrit, & abreptos *deflet*. Vultures minores ex iis generari, & ex iis magnos qui omninò non generant, scribit Plinius.

Pugnat cum vipera, & fauciata, herba foncho simili, sibi medetur.

Voces alias alio in tempore jacit.

Usum si spectes, fel ejus cum melle potum leucen curat: sterces aridum tritum concoctionem promovet. Venter potus calculos pellit. Intestini extremum ad alligatum, colicam sistit. Os ad coxam suspensum, varices sanat.

ARTICULUS V.

De Anopæ, Aquila alba, Aquila heteropode & Scythica Ave.

ANOPÆ fit in Homero Odysf. 1. mentio, quæ quibusdam est *ἀνὰ πτερόν* invisibilis, seu *ἀνὰ πτερόν* id est fursum eversa Alii *ανόπτερος* scribunt, & hirundinem intelligunt.

AQUILA ALBA seu Cygnea, magnitudine est Chrysaëti, candoris nivei, in rupibus circa Rhenum invenitur. Leporum, cuniculorum, procellorum & piscium venatu vivit, & volatu tarda est.

HETEROPOS Gesneri, sinistrum crus cæruleum, dextrum fuscum albicans habet, de cætereo, pectus, collum, & venter fusca sunt, punctis nigricantibus maculosa. Capitis & cervicis pennæ rigent. Oculi subrubent, dorsi initium circa alarum summitates in gibbum attollitur.

Arist. H.

A. l. 9. c.

33.

DE SCYTHICA ave ita Aristoteles. In Scythia genus avium Otides. Hæc duos pullos parit. Ovis non incubat, sed in pelle leporis aut vulpis impositos pullos relinquit. Observat in summa arbore an adsit qui pullos furripit. Quod si quis ascendat, pugnat & verberatalis, ut Aquilæ. Olaus M. oculatus testis, utriusque historiam confirmat, quam Albert. M. falsi imsimulat.

NB. *Ad Aquilas pertinent Itzquantitli & Tla-coquantli Indorum, vide infra Mantissam. N. 1.*

TITULUS II.

De Vulturibus.

CAPUT I.

De Vulturibus in genere.

Nomen.

VULTURIS nomine intelligitur, quæ Græcis *ἰεῖς*, *ἰεῖας*, *ὄϊας*, *Ἀλκυονίδες* Latini

etiam Vulturius, à tardo forsan volatu, & per periphrasin, Avis Titii, torva, avida, magna, Palatina, caucasica, dicitur. Lycophron eas olores rapaces, Hermogenes *τὸν ποτὶ τοὺς νεκρούς*, seu sepulchra animata vocat.

Lycophron in, Cassandra. Descriptio.

Toto corpore Aquilam ferè imitatur, illamque, sesquialtera proportionem, si Bellonio credendum, excedit; nec tamen, quod in rapacium genere solemne, marem femina magnitudine superat. *Rostrum* ipsi obuncum, oculi truculenti; quatuor, apud Philen, narium spiracula, unde *τετραπύρρον*, quod fabulosum est. *Collum* implume, seu potius capitis plumæ ita breves, sicut Aquiles conferantur, ut implumes videantur. *Guttur* longitudine & capacitate, quod propendens ante ventrem ingluvies ostendit, igne, sub quo spaciū palmilatitudine, non tam plumis quam pilis, ruffis, vitulinis simillimis, instar lenissimi cujusdam velleris, omni scapo calami destitutis, vestitur. *Alarum* incumbens corpori pars, leni tota vellere, quod soli inter rapaces peculiare integitur. *Crura* tota ad pedes plumosa, contra gelu & frigus munimentum. *Ungues* adunci.

Sedes in altissimorum montium jugis, poni, Aristoteles, Plinius, & Homerus sunt authores. Poëtæ Caucasas vocant.

Locus. Arist. H. A. l. 6. c. 5. Plin. H. N. l. 10. c. 7. Homerus Iliade 2.

A recentioribus in Creta, Zazyntho, Apennino, monte Gallia Aureo, visi sunt. Æstate in aprica, frigoris vitandi causa demigrant, & in Arabia desertis & Ægypti inter Cairum & mare rubrum planis, numerosos Bellonius vidit, quod iter illud Camelorum cadaveribus plenum, pastum ipsis suppeditet. Agricola in sylvis degere asserit. Juvenali nidulantur etiam in arboribus. In Creta & alibi in præcipitiis, montium mari imminentibus. Propterea Herodotus Brissōnis Rhetoris pater ait, esse vultures in terra altera nobis ignota, eo argumento, tum quod nemo vulturis nidum conspexerit; tum quod magno numero repente apparent sequentes exercitus.

Agricola de subterran. Juvenal. Satyr. 14.

Arist. H. A. l. 6. c. 5.

Vitant morticinis & quidem solis, illi, qui cum Aquilis, Ossifragis, & Accipitribus nullam cognationem habent, sui generis volucres mortuas, si Herodoto Pontico credimus, ne attingentes quidem. Vivis etiam tum volucris (ruunt enim in anseres) tum quadrupedibus, illi, qui Spuri sunt. In Creta & Helvetia agnos, hæcos, lepores, cervorum hinculos, In Chile America provincia pecudes, infestant.

Nutri-
mentum.

Datur quoddam genus quod Torgos & Hamatorrhophum dicitur.

Bellon. l. de Avibus c. 23. Monard. l. de Aromat.

Venantur à meridie usque ad noctem, ab ortu solis ad illud tempus quiescunt.

De eorum *Sexu*, *Coitu*, *Partu*, & *Intubatu* non conveniunt Authores. Feminas duntaxat

Generatio

Ælian. taxat inter eos reperiri, *Ælianus*, *Orus*,
H.A.l.2. *Philes*, *Tzetzes* & alii authores sunt, vel si
c. 46. L. *Auster* non spiret, ad *Eurum* ventum oris
I. Hic. hiatu se pandunt. Spiritus ventī influens,
rogl. intra quinque dies, quibus nec cibum nec
Phile de potum capiunt, ipsos implet. Tercio à con-
prophet. ceptu anno, non ova sed pullos parere,
Animal. *Geoponicorum* scriptor, *Philes*, & *Simocattus*
Tzetzes produnt, intra centum & viginti
Chil. 12. dies ova deponere, *Orus* & *Tzetzes*. *Aristoteles*
c. 439. & *Plinius* nidificare scribunt. *Niphus* nidum in Italia vidit. Ille bina complurimum ova ponere reliquit: hic ex *Umbricio Aruspice* tria. De tempore partus nihil determinat, hoc interim à *Divo Hieronymo* proditur, vulturem cum cœperit ova edere, quippiam ex *Indico* tractu adferre, nuci instar, intus habens, quod moveatur, sonumque subinde reddat. His veritas subscribere videtur; attamen cum *Aquilæ*, *ossifragæ* & *vultures*, ut ex *Aristotele*, & *Plinio* palam est, promiscuo coitu inter se utantur: facili ex diversarum specierum avibus, tertia sterilis, ut ex equa & *Afinio Mula*, generari potest, quæ ob similitudinem cum vulturibus, quam *Aquilis* majorem, inter illos potius collocetur. *Edu-*
Educationem, si videas, apud *Orum* centum & viginti diebus pullis nutriendis infumit, alimento deficiente femoribus suis rostro vellicatis sanguinem ciet, ipsisque sugendum præbet. Apud *Albertum* verò unguibus eos vulnegrat, & de superfluo sibi cibo pascit.

Extendit aetatem ad centesimum annum
Quantum ad facultates & actiones animales,
Oriente sole in occasum, occidente in ortum prospicit, ut apud *Orum* extat. non ultra maria tantum, sed per quingenta etiam millia passuum cadavera odoratur: seu quod instrumenti sit exquisiti & sicci; seu quod copiosa ab integris quandoque exercitibus exhalatio sit, seu quod eadem cōglobata, ventis eodem deferatur.

Movetur tardè propterea corporis molem, & volant turmatim.

Ingenium exinde colligas, quod *Regiones* frigus evitaturi mutant. *Ægypto* non minus, quàm *Ciconiæ* advenæ, quod ad idem cadaver, à quo satiati, sæpius recesserunt, identidem redeant, expeditos ad bellum exercitus præsentione quadam consequantur: ac ut aliqui addunt, bido tri-duove, imò septenis diebus antè ea loca circumvolent, in quibus cadavera futura sunt, quod domi cadavera à venenoso serpente percussâ fugiant, & hepatis morbo laborantes magnarum avium jecinora vorent. Suaveolentia adeò averfantur, ut ne armenta quidem mortua, unguento adorato illita, attingant; imò unguentorum odore perimantur; perit & mali *Punici* grano vultur: sed semine *Si-*

ne *Siferis* *Cretici* vehementer oblectatur.

Inter ejus morbos sunt, Hepatis obstru-
ctio, & pediculi, insectum venenosum, pediculo par, vel ei qui in inguine nascitur, persimile.

Usus in medicina partes ejus, magnum obtinent. Medicamentum ex integro ab *Aëtio* paratur, ad abscessus, condylomata, strumas. Cerebrum capiti vel naribus cum oleo cedrino illitum, dolorem ejusdem sedat. Cor pulli adalligatum adversum comitalem morbum prædicatur. *Serenus* jecur ad jecoris dolores commendat. *Fel.* *Opthalmicis* benè ex *Sammonico* admiscetur. *Penna* pedibus subjecta parturientes adjuvat; sed nisi tempestivè auferatur in uteri procidentiam conjicit. Si dentes ea scalpentur, acidum anhelitum reddit. *Nidore pennarum*, si utantur, serpentes fugantur. *Pellis* ventriculo apposta concoctionem egregiè juvat. *Nervi* ex cruribus & summis pedibus collecti, & ad talos ægri alligati, podagram curant. *Externa* si attendas, ex ossibus vulturis tibiae *Scythæ* *Anthropophagi*, *Malenchleni*, *Arimaspi* conficiebant. E cruribus candela-
bra quidam, quod ipsa, innatâ vi venenum explorare & attrahere crederent.

C A P U T II.

De vulturum Differentiis.

Vulturum duo duntaxat genera *Aristoteles* agnoscit; at *Neoterici* plura esse observant.

Primum est *Albicantius*, & parvum, quod in montibus *Rheni*, *Danubii*, *Helvetiorum* circa *Clavonam*, apparet, in *Scythia*, & subjectis *Septentrioni* regionibus frequens est.

Alterum exochloriceps seu magis cinereum, cujus pilos seu plumulas albas capillaceas & capillamentorum instar subtiles, adeò candidas esse *Bellonius* scribit, ut pellem subdititiam & elaboratam, mustelæ alpinæ albæ, seu etiam vulpis albæ esse, quispian existimare posset.

Tertium *Bæticum*, quod *Aquilâ* paulò minus habet pennas colli, dorsi, ventris, totiusque adeò corporis, castaneo colore tinctas, dorsi & laterum exiguas, & squamarum instar latiusculas, quæ dorsum, ventriculum, ventrem, & uropigii radicem vestiunt, rufas plumas verticis breviculas ac curtas, si *Aquillis* comparetur. Colli angustas ac longiusculas, quales gallis gallinaceis, & sturnis propendent. Crura breviora, plumis undiquaque ad superiorum usque digitorum partem contecta.

Quartum *Nigrum*, quod est cauda brevi, alarum & caudæ pennis ejusdem cum *Bætico* coloris. *Albertus* minus hoc, sed viribus præstantius scribit.

Quin-

Morb.

Usus.

Aet. l.

1. c.

124.

Galen.

Euporist.

1.9. c. 91.

Leinn. de

occul.

Naturæ.

c. 26.

Trailian.

l. 11.

Pollux

Onom. l.

4 c. 10.

Arist. l. 7.

8. c. 3.

Albert. l.

de Ani-

malib. c.

2.

Albert. l.

de Ani-

malib. c.

2.

Albert. l.

de Ani-

malib. c.

2.

Albert. l.

de Ani-

malib. c.

2.

Albert. l.

de Ani-

malib. c.

2.

Albert. l.

de Ani-

malib. c.

2.

Albert. l.

de Ani-

malib. c.

2.

Quintum Leporarium, rostro obunco, nigro, fœdis oculis, corpore firmo & magno, alis latis, cauda longa & directâ, collo- re in rutilo nigricante, quod ex vulture & Aquila compositum videtur, & illud quod Homero Albertus *melanocon* vocari scribit. Huic enim peculiare leporibus insidiari: & solus inter cæteros velox & ad docendum aptus est.

Sextum Aureum Gesneri, quod ita describit. Longus est à rostro ad extremam caudam sex dodrantes & paulò amplius, ad extremos ungues quinque dodrantes aut paulò minus, longitudo superioris rostri quantum illud aperitur, septem ferè digiti transversi. *Caudæ* longitudo circiter tres dodrantes. *Tota pars supina*, id est collum inferius, pectus, & venter & pedes quoque ruffo colore sunt, dilutiore quidem caudam versus, rubentior versus caput. Digiti pedum fusco vel corneo colore sunt. Alarum penna longissima quatuor dodrantes æquat. Subnigricant seu fusco sunt omnes alarum pennæ uno ferè colore: parvulæ tamen supremæ in alis nigriores sunt, ut per medium alæ subrufis maculis, alæ subalbidæ circa imum distinguuntur, eo nigriores autem sunt, quo propiores dorso, ubi præ negredine splendent. Pennæ per medium dorsum nigrae sunt, splendentque in earum medio cauliculi albi, præsertim quæ circa medium dorsum sunt, & dimidia colli parte, reliqua enim colli pars, pennas ex albedo rufas habet. *Caudæ* pennis idem color est qui alarum, nempe fuscus. Hisce addit Albertus quoddam collo crasso, alisque ad dorsum valdè retortis & magno pectore, quod frequenter in ripis maris degit, & quod venatur, eò defert.

TITULUS III.

De Accipitribus.

CAPUT I.

De Accipitribus in genere.

Accipiter vultures excipiat, avis ejus tanta apud veteres veneratio, ut & presagiendi post exactam hanc vitam vi pollere, crediderint: & legem qua capitis damnatur, qui cum etiam imprudens occidisset, tulerint: tanta apud Ægyptios, ut ipsum Soli acceptum putarent, plectro Osirim proponerent. Tentyritæ & Philarum incolæ sanctissimè colerent, interfectum sepulchri honore afficerent, & in urbem Butim asportarent, seu quod ipsius substantiam ex sanguine & spiritu constare dicerent, seu quòd regionem à venenatis animalibus eos repurgare cernerent, seu quòd Accipiter priscis temporibus li-

brum puniceis literis scriptum, in quo cultus Deorum forma continebatur, Thebas ad sacerdotes, detulisse crederetur.

Dicitur Græcis communiter *ἰσῆς*. Macedonibus *μαρμαί*, apud Lybias *ῥαῖς*, Hefychio, *κακίτης*, Tyrrhenis *ἀρκαίος*; aliis *πύρρος*. Latinis Accipiter, seu à rapacitate, seu quòd ter sit acceptus. Unde & facer ales vocatur.

Avem ipsam si spectes, corporis ipsi moles incerta. Nonnunquam vix Aquilis cedit, in Ægypto minores quàm in Græcia, in regionibus Aquiloni obversis & rupibus, quia sanguine & spiritu abundant, majores. Major mare fœmina, quòd in illo humidum ab immodico absumatur calore; in hac, sanguis cum moderato calore copiosior, multum argumento materiæ supeditet. *Color* ipsis ut plurimum ex albedo fulvo & nigro diversus, maculisque distinctus alibi, albi & leucophæri reperiuntur, & qui in frutice spinoso aut acere habitant, ad rufum aut nigrum declinant: qui in fago, ad gilvum seu pallidum. *Caro* est asperior, quàm cuculi, copiosioribus plumis integitur, quàm graviore aves, quòd superflua materia ad pennas admandetur, eorumque generationi serviat. *Rostrium* habet aduncum extremo plerumque corneum. *Oculos* splendidos, unde Soli sacri, & perpetuò mobiles, quorum calor cum ætate mutatur. *Cerebrum* copiosum, linguam laram, principio obtusam, nec bifidam, nec acutam. *Pectus* acutissimum, modicâ carne munitum. *Alas* rapacium acutiores. *Anhelitum* foetidum, *cor* magnum, cuspide obtusa. *Lienem* adeò exiguum, ut sensum propè modum effugiat. *Fel* nonnunquam ærugineum, jecori & intestino adjunctum.

Si loco spectes, frequentissimi sunt, in Anglia, Succia, Prussia, Livonia, Russia, quod istæ avibus tardioris volatus, & multæ carnis abundant: minus frequentes in Syria, Persia, Africa, Græcia, & Cretâ. *Nidulantur* in præruptis & altis rupibus, in Alpibus inprimis, sed vel inter vepreta, vel in arboribus, acere imprimis, fago, quercu, abiete, pinu. Qui Massiliæ agros incolunt, humifecificant, nec alibi nascuntur.

Poru omni, Tinnunculo excepto, abstinent, si Aristoteli & Suidæ credimus: bibere Plutarchus, etiam postquam hominis defuncti corpus tetigerit, si affluentis copiarum aqua invitetur, Gyllius, prodidere; quandiu viventium sanguis sedandæ siti sufficit, non bibere: si exanguibus vesci cogatur, potare, credibile. *Cibus* ipsis aves, gallinacei inprimis & columbacei generis, Turdi, Fringillæ, Coturnices, Corvi, Picæ, Cornices, nobilioribus cancri & caro leporina vehementer sapiunt: vilioribus etiam mures, ranæ, & talpæ; mansuetis quo-

preparat. Evangel. Diod. l. c.

Nomen.

Descriptio.

Arist. l. 9. Hist. A. C. 28.

Athen. H. A. l. 8. c. 9.

Locus.

Homerus Odyss. 1.

Plin. H. N. l. 10. c. 8.

Nutritio.

Arist. l. 8. Hist. c.

38. Suidas, in voce ἰσῆς.

Plut. de ἰσῆς & Osiride.

Gyllius in Ælian.

Aristot.
9. Hist.
cap. 11.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 8.
Aldro-
vandus. l.
23. de
Animal.
Alb. l. c.

Colu-
mellal. 9.
dere ruit.

Arist. H.
A. l. 6.
cap. 7.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 9.

Genera-
tio.
Arist. 3.
de gener.
Animal.
cap. 1.
Arist. 2.
de gener.
Animal.
cap. 5.
Ælian. l.
2. de A-
nimal.
cap. 43.

Albert. l.
10. c. 8.

Ætas.
Ælian. l.
10. de A-
nimal.
cap. 14.
Demetrii
ed. Rigal-
tii.
Morbi.

quoque fruges & panis. Nec à cordibus, quod cum Aristotele, Plinius & Ælianus non credidere, teste Alberto & Aldrovando abstinere, quin cerebro è cranio divulso & absumpto, reliquum corpus involant. Nulli ad reliquias prædæ suæ revertuntur, dum sylvestres sunt; nec unquam cadaveri insidere visi: sed omnes interdum tam avidi, ut stercore præ fame deglutiant. Venatur autem Accipiter, non tantum Turtures; Gallinas albas maxime propter candoris insigne, Anates, Cornices, Sturnos, Picas &c. sed & proprium genus, quod præterquam Aquilæ & Olori, ut quibusdam placet, nulli aliarum avium cum eo commune est. Cuculus ab eodem absumitur, si quando una apparuere. sola omnium avis à suo genere in terempta. Leporem postquam cœpit, sinistram pedem terræ insigit, dextro prædam retinet, & quam primum potest oculos ejus eruit. Venatur solus volitat; præda conspecta humilis prope terram fertur, & omni conamine instar si primo nisi frustratur, persequi desinit, & sibi indignatur.

Fœcunditate negata, quod humorem ad crura, ungues, pennas, & genitalia loca simul nequeat transmittere natura; *salacitatem* ipsi adscripsit antiquitas. Certe, & cum Aquilis cœunt, & Asteria cum Accipitre congregitur. Quoddam genus, cum in venerem ruit, minimarum etiam avium moribus patet: aliud, more hominum amatoria levitate flagrantium, fœminas semper sectatur; absentes clangore prosequitur. Ægyptii fœminam una die requisitam, quantumlibet secesserit, à marito vocatam, obsequi tradunt, & inde fœminas morigeras titulo Accipitris honestant. Tria ut plurimum quatuor aut quinque quandoque ova pariunt, & vicienis diebus incubant.

Ætas hujus avis in multos se protendit annos. Ægyptii ad septingentos pervenire, sed falso asseruerunt. Multis etiam infestatur morbis, nempe difficultate respirandi, & tum sonum elidit, aliquando oscitatur, & vomit: tinea, & tum ipsi venter & collum glabescunt: cholera, in qua liquorem viridem evomit. Spongia, qua affectus, præter consuetudinem bibit, multum sessitat, nec ex manu, nec expertica discedit. Febri, tum pustulas filigini similes in ore habet. Tinea, tum caudam, frequenter motitat. Suppressione alvi, tum cerebro anulum perticæ admovet, & excrementa nigra reddit. Intemperie frigida, & tum excrementa crocea aut cruenta reddit, alas autem remissas & laxas, capitis plumas horrentes habet. Pituita sicca, & tum liquorem per nares non emit. Gravedine, & tum ipsi liquor per nares, spuma per oculos, elabitur. Tremore,

& tum pinnas ut struthiocamelus habet, & volare nequit. Plura apud citatum Authorem vide. Vox Accipitribus alia alio tempore, & generi. Apud Græcos verbo *ἰεῖον* per onomapopœiam conficito, apud Latinos Pipandi exprimitur. Gallinæ si eam audierint, dum interim incubant, ova vitiantur. *Vifus* tam acer, ut nullo negotio adversos Solis radios intueatur. Hinc dicitur Aristophani *πανόculus* omnioculus. Cum Apolline, qui est sol, magnam convenientiam habere credebatur; & ejusdem imagine solem denotari Ægyptiis solitum.

VOLATU sunt velocissimi, & adeo celeres; ut vel ideo *ἰπποπόδες*, & *ἰπποπόδες* à facili motu dicantur; soli qui velocissimus sacri sint; & summam cum igne cognationem habere credantur. Ita sane se aliquando efferunt, ut humanum visum effugiant; nihilominus prædam inde visam, jaculo citius demissi, assequuntur. Peculiare illis & cum sola Noctua commune, in aëre sese resupinare, caudam deorsum, & alas expandere, his vice soli uti.

INGENIUM ex parte attigimus, solitariam semper, præterquam tempore coitus volare; justæ magnitudinis cum vulpibus etiam, Aquilis, & vulturibus certare; in Thraciæ parte supra Amphipolim cum hominibus societate quadam aucupatum fuisse; in toto avium genere docillimam esse; avem sibi sorte sub noctem oblatam totam noctem sub pedibus tenere, ex oriente sole manumittere, obviam non persequi, tandem, succo Hieracii herbæ oculus tingere, sic claritatem pristinam recuperare, addi potest. De cætero, mortuum lugere, & in oculos ejus terram ingerere, noctuæ à reliquis avibus infestare auxiliari. Turturem deprehensam dimittere; unde Ægyptii, ne quando imprudentes avem ab Accipitre dimissam gustent, toto eorum genere in cibo abstinere, à Tinnunculo, crocodilo, & vite nigra sibi metuere, cum salvia, mentha, abiete & salice sympathiam habere; Authores quidam prodiderunt.

Usus si spectes, pulli suaves sunt valde, adultorum caro dulcis & levis. Totus assus & in cibum sumptus, morbum sacrum, in rosaceo elixus, oculorum vitia, pulvis in quo se volutavit, lino rutilo agri collo alligatus, quartanam, adeps oculis inunctus caliginem, oculi à collo suspensi tertianam, depellere, sed frustra creduntur. Stercus in veno dulci tritum, conceptum juvare, frumum vero ex eo, spolio serpentis, opoponace, myrrha, galbano, castoreo, sulfure citrino, & felle vaccino excitatum, & per fistulam in uterum exceptum, fœtum educere, credibile est.

Vox

Vifus.
Ælian. H.
A. l. 10.
cap. 14.

Plut. l. de
Iside &
Homerus
Iliad. 2.
Volatur.
Aristoph.
in Avid.
Ælian. l.
10. c. 24.

Ingenium.

Ælian. H.
A. l. 2.
cap. 42.
Plin. l. 10.
cap. 8.

Ælian.
lib. 10.
c. 17.
Porphyr.
l. 4. de ab-
stinencia.

Plin. l. 10.
c. 37.
Plutar. in
Iside &
Osiride.

Vifus.

Hippoc-
rat.
de mor-
bis mu-
lier.
Villaniv.
in Brevia.

CAPUT II.

De Accipitribus in specie.

ARTICULUS I.

De Asteria, Accipitre Palumbario, & Fringillario.

Arist. lib.
9.
Hist. c.
36.

ASTERIAS, qui & Astur aliis, corpore est grandi & oblongiore, unde Palumbario comparatur, punctis & notis quibusdam stellas referentibus respergitur, hinc ipsi nomen. Capitis pars anterior extensa paulatim est in rostrum. Oculi varii & pellucidi: collum longius Aquilino. Femora longiora quam falconum, crura horum respectu brevia, & crassa. Pedes magni. Cauda ob longitudinem dependet. Est ex eorum genere, qui, quod emissi præterito pugno revocentur, Pugillares mansuetiarii dicuntur. *Differentias* fortiuntur Astures varias. *A natura.* Alii aut rupes mari adjacentes incolunt, aut flumina & aquas dulces sectantur, qui humilem prope terram volatum exercent, & clandestino astu prædam adoriuntur. Alii disitis à mari locis delectantur, & ex excelsis arboribus prædam despiciunt, & infestant. *A sexu,* in quo femina colore ad Aquilam accedit, nisi quod maculis densioribus & ruficis aspergatur. *Amagitudine,* quæ Astures ira commendat, ut in Syria aves quæ prædæ ac aucupio servant, ad pondus emantur. *A loco,* sunt namque *Armeni,* qui oculos habens virides: & si cum dorso nigricantes, optimi censentur, crura candida pedes magnos. *Persis,* corpus grande, plumis bene vestitum, oculi concavi, supercilia pendentia. *Græcis* caput grande, & raræ in collo plumæ. *Africanus* dorsum nigrum, oculi, in juventute nigri ætatis progressu rufescunt. *Sardis* pennæ nigrae, crura brevia, femora longa, pedes pallidi. *Illyricis,* sive Sclavis, statura mediocris, pennæ rubrae, majori ex parte prunarum candentium adinstar, pedes magni, femora ab interna parte plana, volæ manus instar æqualia. *Alpinis* corpus magnum, oblongum, pedes fere candidi, sufficiens ad leporum venationem robur. *Germanis* oculi iris & suprema capiti contingua rostri pars, crura, tibiæ & pedes, crocea. Pennæ caudæ nigris & canis iisque latis & obliquis maculis asperguntur, colli superioris & capitis rufescunt, & punctulis, nigris interstinguuntur. Carcani Astocellus, est forte Tardici & Bellonii Semi Austur.

ACCIPITER PALUMBARIUS, qui Græcis est *αετορίς*, *αετορίς*, & *αετορίς*. seu columbicida, quis sit, certo dici non potest. Aristoteles meram nomenclaturam suppetat, & simpliciter Accipitrem nominat. Ephesius à Nispho citatus, Falconem gentilem vulgo dictum ex eo facit. Alberto cum

Asture idem esse videtur, Turnero cum Fringillario idem. Aristoteli est Chalcidis avis magnitudine, & Carnivorus: Porphyrio omnium celerissime volat.

l. 3. de ab-
stin. ab a-
nimal.

ACCIPITER FRINGILLARIUS Græcis veteribus *αετορίς*, recentioribus *ευνόχος*, corrupto forte ab Oxyptero vocabulo; Latinis Nisus, quod ei Alberti ni fallor primum ævo impositum est, sed non Ovidii, cui Nisus idem cum Haliæto, aliquibus Sparverius, ab Itolorum Sparviero dicitur. Mas qui Muscetus vocatur, & femina minor est, quique ab Aldrovando exhibetur, rostrum habet breve, unco acutissimo præditum coloris cornei subcærulei. Oculi pupillam ochrae colore pallido, lutea iris excipit, quod reliquum est intentu flavet. Caput, collum, pectus, venter, crura albicant, & variis maculis distinguuntur. Dorsum & alas muculae multæ albæ respergunt. Cauda nigris & fuscis maculis transversim ornata, eelique fere corporis longitudinem æquat. Pedes & tibiæ crocei sunt coloris. Femina, vertex, collum, dorsum, alæ coloris sunt obscure fusci. In *Syncope*, & alarum medio, qua dorso incumbunt, alba macula conspicitur. Pars totius corpora *prona*, est candida, & transversis lineis luteis intersecatur. Degit tempore hyberno in sylvis cædus, earumque gracilibus. Non ante occidentem solem ad sedem suam revertitur. Plærumque adverso vento volat. In legibus Salicis de eo legitur, quod qui furatus fuerit, centum & viginti denarios persolvere deprehensus teneatur. *Dividuntur* ab Aetate, in *Nidarios*, *Ramularios* qui necdum plumarum deposuerunt exuvium & mutatos. *A loco natali* in *Illyricos*, qui ut plurimum lumbos, ac dorsum nigra abtinent, & vitam brevem agunt. *Orientales* quibus cauda duodenis pennis instruitur, *Africanos* quibus oculi nigri, pectus nigris & transversis maculis varium, alæ longæ. *Tridentinos*, qui sunt proceri, volaces, sæpe captas, alaudas in terram deorsum dejiciunt; mox sursum arripiunt. *Vincentinos*, qui aut in montibus Vincentinis nascuntur & omnes statura sunt exigua; aut in Mucrofticanis Spiranolis dicti, capite magno, reliquis minores, & ad aucupia inepti: & *Ignotos*, qui corpore mediocres, maculis ferrugineis ad rubrum inclinantibus, resperguntur. *A colore* Albos namque in Septentrionalibus oris reperiri, Olaus Magnus author est.

ARTICULUS II.

De Circo, Afulone & Timunculo.

CIRCUS Hesiodo *εἰς αἴρα*, Homero *Νομῆς* & Aristoteli *αἰρα* simpliciter, Festo Circanea vel Circenda, forte, quod, cum insidiatur, circuitum in aëre faciat, dicitur. Si

Descriptio.

Si descriptionem Bellonii sequimur, haud multo milvo minor est: *Capitis* vertex & guttur inferius ex ruffo albicant, plumulae quae auditus foramina tegunt nigrae sunt. *Rostrum* capiti continuum plumbeum est, extremum atrum, *collum* breve. *Crura* gracilia, lutea; falso altero claudicare, Plinius prodidit.

Locus.

Galliae est inquilina, & ibidem in Arveniae planis nidulatur.

Nutritum.

Cunniculos, vulpes, columbos, Turtures, Mures infestat. Bibit cum in maritimis versatur. Amariginem, lactucam sylvestrem, vel crocum nido imponere creditur.

Descriptio. Plin. l. 10. H. N. c. 8. Arist. l. 9. Histor. cap. 5. Aelian. l. 3 c. 45. de Animal. Homer. in Batrachomyomachia. Vox. Volatus. Homer. Iliad. x. Eustat. in citati. Homeri locum. Odyss. v. Nomen. Nutritum. Crescent. l. 10 c. 13. Plin. l. 10 cap. 8. l. 8. Hist. cap. 2. Inimicitia. Arist. l. 9. Plin. l. 10 cap. 74. Nomen.

Vox ipsi acuta, & clangere dicitur, idque tum facit, cum praedae propinquus, de ea apprehendenda est sollicitus. *Volat* in gyrum, & quidem velocissime, hinc Homero *ἰακίαντες*, *ῥάχου, ὄρνιθες*. Oppiano Equis Iberis velocissimis celerior.

Æsalo, qui Turnero Smerillus, Isidoro Merillus, Crescentienſi Ismerlus, Alberto Mirle, inter rapaces minimus est, & tum coporis specie, tum pennarum colore, Falcones refert.

Perdices & columbas venatur. Alaudas tam avide ut adelibanum usque ardentem, puteum, vel hominum vestes offendet, si peritia, & usus accedat, quatuor merilli, cygnum etiam dejiciunt. Solus omni tempore apparet, quod tamen Buteoni Aristoteles adscribit.

Inimicitias cum vulpe & corvo gerit; illius catulos interficit; hujus ova confringit. Corvi vulpibus auxiliantur.

Tinnunculus Gazæ aliquando Tristunculus, ut Italis Tristarellus, & Canibellus & Gavinellus. Græci *ἀνθρακίς*, *ἀνθρακίς*, & *ἀνθρακίς*, quod multis milii instar punctis insignis sit, dicitur.

Descriptio. Plin. l. 10. H. N. c. 8. Arist. l. 9. Plin. l. 10 cap. 74. Nomen.

Mas, prout ab Aldrovando describitur, habebat, *caput* in summo vertice nonnihil compressum, coloris cum universa cer vice ad dorsi initium ferme cinerei. *Rostrum* statim deorsum molli declivitate tendens, unco isigni ac longiusculo, cujus pars capiti contigua fulvescit, media colore est cinereo, ad latera appendixerat, hemicycli forma. *Alas* & dorsum ferrugineis pennis notis atris distinctis; gulam, pectus, ventrem flavis maculis nigris perspersis vestitum. *Alas* oblongas, & quinque digitorum spacio ultra Uropygium extensas. *Caudam* maxima sui parte cineream, reliqui corporis longitudinem aequantem. *Femina*, quæ major erat, *rostrum* brevius cum rostro magis recurvo, cinereum. *Dorsi* & alarum pars superior ferruginea ad rufum accedens. *Pennæ* extremæ dorsi cinerei coloris, & notis transversim fuscis obliquis utrinque in angulum medio scapo coeuntibus maculatae. Habet Aldrovandus & Tinnunculum foeminam alteram,

cujus descriptionem apud eundem vide.

Nidulatur in altis ædificiis, muris, turribus & cavis quercubus, monedularum more, non super fronde, sed in latibulis.

Locus.

Foeminas Mas semper sectatur, de absentibus dolet. Illæ supra quaternaria edunt, minii modo rubentia. Pullos tam diu alit, donec proprio volatu reverere possint.

Vistitat papilionibus, Locustis, vespis, muribus. Inventus aliquando in nido ejus & serpens: sed & ipse in picarum nido cum pullis inventus est. Bibat annon dubium. Aristoteles raro & solum inter uncungues tradit. Aelianus & Suidas nullo potu indigere scribunt.

Cum columbis singularem colit amicitiam, cum Accipitribus aliis, etsi sui generis capitalam hostilitatem exercet. Ideo, Plinius. Avis, quæ Tinnunculis vocatur, cum columbis habenda est. Defendit enim illas terretque Accipitres naturali potentia in tantum, ut visum ejus vocemque fugiant. Hac de causa præcipuus columbis amor eorum, feruntque si in quatuor angulis defodiantur in ollis novis oblitis, non mutare sedem columbas. Fumus ejus albugines oculorum extenuat.

Generatio. Aelian. l. 2. de Animal. c. 43. Arist. lib. 3. de gener. c. 1. Nutritum. l. 3 de gener. c. 1. l. 2. de Animal. cap. 43.

l. 10. Hist. Nat. cap. 37.

Plin. H. N. l. 29. c. ult.

ARTICULUS III.

De Eubeone, Subbuteone, aliis Accipitrum apud Aristotelem generibus, & sacro Egyptio.

BUTEONES, qui & à numero testium Triorchis, Marcello, Millo dicitur, quæ ternam descriptionem Aldrovandus exhibet.

Nomen. Plin. l. 10. c. 28.

Prima sub nomine Buteonis ex montibus Vineolanis allati ponitur. *Corpus* erecti duarum Spithamarum erat. *Caput* habebat compressum, figura trigona. *Rostrum* nigrum membrana circa nares lutea vestitum. Iridem circa pupillam in oculis nigerrimam. *Collum* breve & plumosum. *Dorsum* ad caudam coloris ferruginei. *Altera* ex Gesnero sub Bushardi ut Sabaudis dicitur, maris cognomento, eaque duplex. Magnitudine prior magnam Gallinam referebat. *Caput* pennis fuscis integebatur: *Collum* brevissimum erat. *Pennæ* nonnihil ruffi coloris præ se ferebant; in ventre & pectore albicantes nigrisque pleræque maculis per medium insignes vixebantur. *Testes* deerant. *Alteri*, circulus in oculis flavissimus iridem nigram ambibat, colore nonnihil à superiore variabat. *Venter*, latera & crura superius plumis albis vestiebantur, quas latiusculi circuli obscure ruffi per transversum distinguebant. *Testes* bini albi & pusilli ad spinam dorsi inter utrumque renem consederant,

Descriptio.

rant, in quorum medio particula teste minor & flava, testiculo proportionem respondens, viscebatur. *Tertia* est Bellonii sub nomine Guyrani seu Boudree. Huic rostrum est curtum, acie nigrum & hamatum, narium regio & rictus flavescent. Venter candidis plumis, quarum apicem macula nigra, juxta scapi medii ductum insignis, vestitur. Rectrices alarum plumæ, crenas instar serræ exhibent nigras, ubi albere incipiunt. Caudæ color varietate Attaginis similis. Crura antica & postica annulis imbricata. *Quarta* est illius in quo dissecto tres testes inventi, & qui hætenus descriptis in omnibus fere conformis erat.

Victus ipsi ex herbis selarea, asperula seu alyso & Matrisylva; ex animalibus, mures, ranæ, rubetæ, lacertæ, limaces, serpentes, scolopendræ, crucæ. Erepta illi aliquando ab ardea & anguilla; inventa in dissectione ventriculo & talpa. *Volatus* est tardi, tam deses etiam, ut telo petitus vix ad tertium ictum cedere dicatur, ideo nullo negotio capitur.

Ufus ipsius tum in cibo, tum in Medicina. Sane & in Balearibus insulis, & apud Arvernorum Galliarum populos in honore mensarum est. Carnem quippe habet teneram, hyeme præsertim, & dulcem. Testiculi ex aqua fontis cum melle decocti ad venerem commendantur.

SUBRUTEO seu Hypotriorchis, quod nomen Aristoteles illis qui in Accipitrum genere latiores sunt adscribit, prout ab Aldrovando describitur, verticem habet ex cinereo & castaneo ad nigrum vergentem; ejusdemque coloris macula, uua à capite per tempora ad gulæ latera descendit; altera ab initio rictus sub oculis utrimque per gulam in longum protenditur. *Palpebre* sunt subluteæ. Plumæ menti & gulæ totæ albæ, & color ille continuus, ad cervicis & verticis per tempora initium, quod minori oculorum cantho ex opposito est, perducitur. Pectoris totius plumæ, nec non & ventris medio macula fusca oblonga notatæ in oris albicant. In pedum *planta*, tubercula veluti calli ubique eminent. In nemoribus celsis & densis degit, & homines quos Perdicum vel Coturnicum venationi operam dare conspexit, ipsi insequi solemne est, ut aviculas Canum metu subvolantes arripiat. Sed hæc de istis sufficiunt: quid vero Aristoteles per Pernem, Percum, Rubetarium, & Levem, intelligat, disquiratur. *Pernos* apud Hesychium & Phavorinum genus venatorii est accipitris, ultra ignoratur. *Percus*, seu Percuus idem cum Fringillario propter alarum nigritiem, esse videtur. Aristoteles per Fringillarium, Nisum foeminam; per Percum marem vulgo Maschettum dictum, forte intellexit. *Levis* quis sit ignoratur. Bel-

lonius Smerillum esse existimat. *Rubetarius* vel idem est cum Levi, quia de utroque Aristoteles. Abunde vivunt, & humivole sunt, vel Milvi species. Qui *SAGER ÆGYPTIUS* Bellonio dicitur, corporis magnitudine Corvum refert, capite Milvum, colore ad Falconem sacrum accedit. In Ægypto est frequentior, quàm ulla alia Avis quæ raptu vivit. Rara in Syria conspicitur; sed & in Caramania aliquando. Serpentibus potissimum vescitur. Unde ei olim apud incolas tanta reverentia, ut illius vel per imprudentiam occisor, morte multaretur; ipsa mortua honorifice sepeliretur.

Herdor.
in Euter.
pe.

ARTICULUS IV.

De Lanariis & Collurionibus.

DE Lanariorum ignobili genere, Buteonibus rectius annumerando hic res est, de nobili inter Falcones agemus. *Nomen* ipsi seu à laniandis avibus: seu quod plumas lanarum instar molles habeat. Aliquando Lanius Molliceps Falco albus, degener, & buteo albus dicitur.

Aldrovandus duplicem iconem exhibet. *Prior*, accipitri palumbario magnitudine par, *vertice* erat lato, capite & collo crassis, omnibus uti & ventre, tota parte prona, femoribus uropygio, & cauda inferna. Inter oculi canthum majorem & rostrum, maculam habeat nigram, alas oblongas, longe ultra uropygium protensas, *tibias* luteas, & pro reliqui corporis proportionem valde graciles, easdem à poplite ad ungues paulo plus palmo longas, & culmo triticeo vix crassiores. Unguiculos uncis, sed tenues. *Alteri* lingua erat lutea & nigra. *Caput* & dorsum cum leucophæo fuscum, pectus totum leucophæum, ad anum usque maculis in longum ferrugineis distinctum. Alarum remigia ex sex ordinibus ratione coloris constare videbantur. Uropygium totum caudicabat. *Pedes* habebat luteos, femora plumis ad poplites usque vestita. Tibias erectas & instar stipitum. Ungues longos & admodum recurvos.

Aldrovandus l.
5. c. 11.

Victum ex muribus in agris quærit; sed & avium pullos, in nido, vel cum per terram volandi impotentes, reptant, rapit.

Albert. l.
23. de
Animal.
c. 15.

COLLURIONIS de minore sunt Lanariorum genere; illique vel *Majores*, vel *Minores*. Ex *majoribus*, qui Eliano Merula venaticæ, Foemina est turdi medioeri magnitudine, è longinquo contemplanti tota cinerea. Capite ad reliqui corporis proportionem triplo majore. *Rostrum* habet parte superiore valde inflexum: inferiore sursum modice curvatum. *Linguam* in extremo multifidam, & in fibras acutas, & quasi capillamenta quædam desinentem. *Otulos* totos nigros. *Caudam* picæ similem;

Differen-
tia.

Natri-
morum.
Bellon. l.
2. de A-
vib. c. 10.
c. Arist.
9. Hist.
c. 1. Si-
monid. a-
pud A-
then.

Ufus.
Plin. l. 10.
cap. 49.

Bapt.
Portal. 3.
cap. 34.
Pythag.
nom.
Deseri-
ptio.
Arist. H.
A. l. 9. c.
36.

Arist. l.
9. Hist.
c. 36.

lem; que explicata, corniculatæ crescentisve lunæ imaginem exhibet. In Mare gula, pectus, venter, femora, cauda prona dilutius quam in femina albicant. Vertex & dorsum obscurius fusciscunt, plumulæ harum partium adeo sunt tenellæ, ut pili potius glabri ac leves esse videantur. Erat & alter totus albus, rostro, tibiis & unguibus exceptis. Interdum semper fere arbori summae aut dumeto insident: in Helvetia inter frutices spinosos, & confidentes caudam erigunt.

Nutri-
mentum.

Victus ipsis Papiliones, scarabæi, vermes, juli, erucæ hirsutæ, locustæ, grilli; quos, præda uberior si contingat, defectum penuria providi in aculeis & spinis arborum fingunt: inter aves Turdi, Fringillæ, Picæ sylvestres. Ossâ comminuta devorant, & famelici, tantos carnis bolos in gulam ingerunt, quantos rictus capere potest.

Genera-
tio.
Bellon.
l. 2. de
Avib. c.
23.

Nidos ex musco, lana, fundos eorundem ex erica, componunt. Senos pullos excludunt, parentibus rostro, cruribus, pedibusque exceptis, quia plumularum radices ad virorem nonnihil vergunt, omnino dissimiles.

Vox.

Voce, cannum à longè auditum latratum, aut Noctuæ aliam appellantis ululatum referunt, & vocem Houin, quam sapius iterant, expriment. Uniformis ea hyeme & autumnus; verè & æstate varias Avium modulationes imitati, eas ad se capiendas alliciunt. Capti in caveam inclusi, muti & e-lingues permanent. Hyberno tempore facile capiuntur. Nam avem caveæ inclusam invadunt, decipula decidente, intercipiuntur.

lib. 5. c.
14.
Collurio-
nes mino-
res.

Collurionum minorum quinque genera observavit Aldrovandus. Tria aliqua sui parte rubescencia: duo cinerea. Aviculæ sunt Alaudis paulo majores, duos palmos & pollicem circiter longæ. Omnes utraque rostri quod recurvum est, modice tamen parte, ternos pilos instar barbæ prominentes habent. Utrorumque pulli, antequam frequentibus integantur plumis, virefcere nonnihil apparent. Tanta eis (expertus Bellonius) similitudo, ut difficillime dignosci possint. *Cibus* ipsis forices, mures, laceræ, talpæ. Inter edendum, uni tibiæ insistentes, cibum pede altero sursum retractoprehendunt. Humilius volant, & prædæ inhiantes aliquandiu sese in aëre librando suspendunt. In cardius sapissime quiescunt. Oëtonam aliquando, senam nonnunquam prolem excludunt. Rubore verticis qui infligens, in Italia inter delicatos cibos.

Bellon. l.
2. de A-
vibus c.
25.

ARTICULUS V.

De Milvo & Harpa.

Nomen.
Plin. l. 9.
c. 26.

Milvus, quod vocabulum & piscem, & stellam in Septentrionali parte

significat; Græcis *εἰς* Cretensibus *εἰς*, Hesychio si locus suspectus non est, *εἰς* eidem & Phavorino *εἰς* & *εἰς* dicitur. Plinio ex Accipitrum est generibus: Aristoteli inter carnivoras, sed vix rapacium nomine dignus.

Tria ipsorum sunt genera. Unum, Aristoteli dictum, minus nigrum & robustum. Alterum majus, colore propemodum ruffo, infirmius. *Milvi regalis* nomine gaudet, quod à binis falconibus facris in ipsum emissis, intra nubes etiam se condens, summa cum Principum voluntate in terram dejiciatur. Cui & Milvus palustris accenseri debet. Tertium, albidius & rapacius, Angliæ, & Septentrionalibus regionibus, in quibus nigredo & albedo in candorem vertitur, frequens.

Descriptione operosa opus non est. *Rectum* habet rectum, nulla marginum appendice à freno seu lateribus extremis ad unci usque initium. Intestino & hepatis fel adjunctum habere Athenæus tradit.

Loca temperata Milvo sunt familiaria, nisi quod in Lybia, circa fontes Nili perennare dicatur. Ideo & insula S. Dominici, vicinorque mari multi, quibus bifurcata cauda, visi sunt: & in Anglia, nullo non anni tempore apparent, & quod spurcitiem in plateis & ad flumen Thamesin legant, lege ab omninoxa immunes sunt. Ideo hyeme adventante vel calidiores regiones Ætolii citius, quam Regales petunt, ibidemque hybernant; (sane ultimo Aprilis tot circa Pontum Euxinum Bellonius vidit, ut, si quindecim dierum spacio tot prætervolassent, hominum superaturos fuisset numerum crederet) vel in nidis ad breve tempus plumarum suarum vellere corpus à frigore tuentur: vel in quercubus aliisque arboribus carie exesis, coprus foveant. Ideo denique æstu accedente, calidas regiones deserunt, & in Europam, tardius tamen Ætolii, quam Regales revertuntur, & estu in eadem urgente supra nubes, quò radiorem solarium reflexio pertingere non potest, ideo nec æstus ita urget, elevantur, ibique aliquantisper hærent.

Vitæ carne animalium, pullorum imprimis gallinaceorum & anserinorum tam vivorum, quam mortuorum, & fructibus. In Ægypto in palmas devolasse, & dactylos comedisse visi sunt. Fruges respuere Aristoteles credidit. Bibunt raro, quia sicco cibo rarissime utuntur, & si quando, ex solis pluvialibus aquis, si Tzetzi credimus; à quibus tamen dum pluit, abstinent. Quod ad fenestras domum in Ægypto advolant, & in insula S. Dominici prope ad homines accedunt, in eorumque conspectu corpus à pulicibus expurgant, mansuetudinis est indicium: quod pueris

Oppian.
l. 1. de
Pulcib.
Ovid. l. 3.
Fallor.
Plin. l. 10.
c. 10.

Differen-
tie.
l. 6. Hist.
Anim.
c. 6.

Et Bou-
tati Sa-
baudo-
rum, qui
maximus
est.
Descri-
ptio.

Athen.
l. 8. c. 8.
Locus.
Herodot.
l. 2.

lib. 2. c.
28.

Nutri-
mentum.
Arist. H.
A. l. 8.
c. 3. Bel-
lon. l. 2.
de Avi-
bus c. 2.
lib. cap. 8.
Arist. l. c.

Bellon.
lib. 2.
de Avib.
c. 28.

cibum è manibus, carnes abluentibus, pisces exenterantibus, pileos deambulantibus in urbe, nidulationis inprimis tempore, eripiunt, rapacitatem arguit: quod in Elide nihil ex funerum ferculis esculenti; nihil Olympiæ ex ara carniū Jovi sacrificatarum, auferre dicuntur, vel falsum est, vel timiditatis, quia turba præsens, argumentum præbet. Creduntur primo anno præ audacia nihil mortuum gustare; secundo præ metu nihil vivum edere; tertio fame interire.

Generatio. Pariunt bina, magna ex parte, interdum tamen terna, totidemque excludunt pullos, post vicenorum dierum incubatum: sed qui Ætoliū vocatur (male Plinius Ægoliū vertit) quaternos.

Vox. Vocem si spectes, lippire vel jugere dicitur.

Visus. Visus ipsi fatis acutus. Unde Aristophanes *παραδοξάμηναι* dixit.

Volatus. Volatu & præstant, & in eo aliquid peculiare habent. Illud, tum quia intra nubila se recondunt, & indefesso labore maxima aëris spacia emetiuntur: tum quia tanta velocitate se præcipitant, ut sæpe projecta in altum pulmonem bubulorum segmina, unguibus antequam in humum delabentur, arripuisse, visi sint. Hoc, tum quia ducunt per aëra gyros, unde Circææ, *κυκλῶν*, & *πεποδιῶν*, aves dicuntur; tum, quia immotis alis diutissime in aëre, motus tonici beneficio hærent. Scilicet, elata ea ex parte paulisper ala, unde subit aura, motum aëris in reliquum etiam corpus excipiunt, & ita sustententur. Sufficitur lata in alarum vicem cauda, quam, prout res postulat, dilatant, constringunt, deprimunt, attollunt. Videatur, inquit Plinius, *artem gubernandi navium docuisse caudæ flexibus, incalo monstrante natura, quid opus esset in profundo.*

Amicitia. Amicitiam colunt cum Harpa & Cuculo. Inimicitias cum vulpe, corvo, gallinis & columbis exercent. A solstitiis afficiuntur podagra, ideo tunc frequentius latent.

Ufus. Ufus ipsorum apud pauperiores nonnullis in locis in cibo. In Medicina cinis cremati bibitur, contra Epilepsiam; testiculi ex aqua fontis, contra impotentiam; fimus, contra articulorum dolores, quod & vermes, qui ex eo XL diebus in fimo macerato, nascuntur, faciunt, commendatur. De HARPA inter Aristotelem, Plinium & Oppianum non convenit. Gesnerus vulturem aureum Harpam Oppiani, quod sub mento plumas harpæ instar habeat, esse credidit. Aldrovandus Milvum palustrem opinatur.

ARTICULUS VI.

De Cuculo.

CUCULUS, quo nomine mons in agro Bononiensi, piscis marinus, herba, involucrum papyraceum, & alia veniunt, Græcis *κικλῶν*, nomen à voce sortitus est. Accipitri appohitur, quod eum tanta similitudine referat, ut Aristoteles ætate hoc ipso creditus sit prognatus, & apud Gallos Falco cuculi parens communi proverbio dicatur. Plinii is videtur error. Nam Aristoteles, dum Cuculum ab Accipitre interim scribit, quod nulla avis in suo genere solet facere, accipitrini generis eundem non esse docet.

Duo sunt ipsorum genera, Majus nempe & Minus, quæ sola inter se magnitudine differunt. Nec est quod curiose describantur. Neque aduncis sunt inquit Aristoteles unguibus, ut Accipitres, neque capite accipitribus similes. Sed ea utraque parte columbos potius quam accipitres imitantur: nec alio quam colore repræsentant Accipitres, nisi quod isti maculis seu lineis distinguantur cuculi velut punctis. Cave tamen, illud quod de pedibus, extra aduncitatis defectum intelligas. Nec enim iis terni ante & retro unus ut columbis; sed bini antici & totidem postici, ut Picis, & nocturnis avibus, quod Antiquitati ignotum. Sed & id, quod de punctis dicitur, stricte sumendum est. Nam quos Aldrovandus describit, prona parte tota tam cinerei sunt, quam albi, lineis seu maculis transversim ductis oblongiusculis, fuscis, & interruptis interdum, interdum magis continuis distincti. Crura corporis magnitudini in iis non congruunt. Nam & femora brevia, & tenuia sunt, & tibiæ vix pollicem latum longæ. Juvenem totum nigricantem maculis subruissis per alas respersum, Aldrov. notavit, foramina narium in rostro multum eminebant. Oris pars interior flavi coloris erat.

Loca, si attendamus, ubique fere gentium reperitur, novum orbem, & Æthiopiam, si alvarezius fidem meretur, si exceperis. Æstate pro natura avis, in cujus nido parit, in arboribus, petris, & fluminum ripis degit: hyeme interræ, lapidum, & arborum cava se abdit, in iisque per totam hyemem latet. Auditam ejus latentis vocem fabulantur, cum truncus fornaci calefaciendæ immitteretur.

Cibus ipsi cruceæ, muscæ, fruges, sed & carnes, si verum est, grandiusculos nutricis pullos, imo ipsam devorare, quod quibusdam creditum, quamquam exinde carnivorus esse negetur, quod nonnunquam Accipitri in cibum cedit. Hyeme dum latitat & implumis est, vel congestis & ibidem reperiunt vivere, vel hirundinum & urforum modo vitam sustentare, credendus est.

Quantum.

Nomen.
Athen. l.
7. c. 27.
Fernel. l.
6.
Methodi
c. 20.

Bellon. l.
2. de
Avibus c.
29.
Aristoteles
H. A. l. 6. c. 6

Differentia, &
Descriptio.
Arist. l. c.

Locus.

Nutritio.
Arist. H.
A. l. 9.
c. 29.
Arist. H.
A. l. 6.
cap. 7.
Plin. H.
N. l. 10.
c. 9.
Author
de Natura.

Genera-

tio.

Arist. lib.

3. de

Gen. c. 1.

Idem 1.6.

Hisor.

An. c. 7.

Hist. A-

nimal. 1.

6. c. 1.

Arist. lib.

Hist. A-

nimal. c.

29.

Ælian. 1.

3. de A-

nimal. c.

30.

Plin. H.

N. 1. 10.

c. 9.

Arist. lib.

3. de gen.

c. 1.

Ælian. 1.

3. de A-

nimal. c.

30.

Ingenium.

Arist. lib.

6.

Hist. c. 7.

Isidor. 1.

12.

Orig. c.

7.

Oppian.

in 1. lib.

1.

Ælian. 1.

c.

Niplius

apud Al-

diov.

Arist. lib.

9. H. A.

c. 29.

Plin. H.

N. 1. 10.

c. 9.

Idem 1. c.

Volatus.

Plin. 1. c.

Ælian. 1.

3. de A-

nimal.

c. 30.

Vox.

Arist. 1. 9.

A. H. c.

49.

Anipa-

thia.

Sym-

thia.

Plot. de

fluviis.

Morbi.

Quantum ad *Generationem*, quia natura est frigida, majori ex parte singula parit ova, raro bina. Genus quoddam in petris *nidificat*, (sic Aristotelis verba sumenda sunt) reliqua in palumbi, alaudæ, luteolæ, sed curruæ inprimis nido ovis jam facta, ova sua deponunt: seu, quod ob metum & ignaviam non fore tutam generi suo stirpem opinentur; seu quod propter frigidam corporis constitutionem, ex ovis pullos excludere non possint.

De *ingratitude* in nutricem, non conveniunt Authores. Alii, negant, dum, vel avis cum duntaxat in cujus nidum sua importat, ova comedere, propria subjicere: vel deprehensa postquam adoleverint fraude, à nutrice relinqui; vel ad volatum firmos, sibi conscios ad parentem evolare, vel nutricem, seu viso cuculi, cujus ovum citius excluditur, pullo, tanquam eo contentam à suis incubandis desistere; seu exclusos, specie cuculi elegantiore captam (arripit hic cibos avidus, & pinguescit) tanquam superiores occidere, & in cibum cuculi pullo dare, scibunt. Alii affirmant dum, vel pullos nutricis ab iis vel conculcari, vel cibo fraudari, vel ipsa inspectante absumi; & jam volandi, parentes, ipsam nutricem corripere credunt. Ut sit, hoc certum est, educare curruam subditum cuculum, adulterato factam nido.

Volatus ipsis brevis, interruptus, humilis, & ut hostem effugiant, instabilis. Ideo Milvorum scapulis, quo tempore adveniunt, suscipi putantur, ne per longa aeris spacia defatigati deficiant. Solent autem incunte vere apparere; cujus adventantis primi post amphispænam sunt nuncii. Caniculæ ortu occultantur, post rarissimè cernuntur. Hyeme deplumes in cavernis torpent.

Vox ipsorum propria Cucu. hanc minus explanant, cum se abdituri sunt. Ad ultimum alibi Julium, ad S. Johannis, apud nos, festum, perfectam edit, si ultra, uvæ vix maturescunt.

Inimicas tum omnes fere aviculas præcipue cum ova pariunt, habent, seu quod illorum sint fraudis conscie: seu quod Accipitri per quam sunt similes: tum cicadas ex ejus saliva ortas, quæ eos frequenti agmine invadunt, & postquam sub alas irrepere, moribus lancinant. Ideo sub ortum caniculæ, quo raucis.

Sole sub ardenti resonant arbusa cicadis. cantilenam suam abruptit. De ejusdem cum Milvo amicitia superius dictum est, quod de paliuro in monte Coccygio à Plutarcho refertur, omne animal, solo cucule excepto quod infederit, tanquam visco retinente hæreere, non minus fabulosum est, ac quod de cicadis ex ipsis saliva natis dicitur.

Inter corporis affectus referri potest, quod

hyeme deplumescit, pennas imutat, & simul colore immutatur. Exuvio deposito, corpus ejus scabrescit.

Usus ejus, & in *Medicina*, qui cineres usti ad dolorem ventriculi valent; & in cibo, quia ejus pullo, qui jam volare potest, nulla avium suavitatem carnis comparari potest, obtinuit.

Usus.
Plin. 1.
10. H. N.
c. 9.

TITULUS IV.

De Falconibus.

CAPUT I.

De Falconibus in genere.

Falconis ut avem significat, vocabulum adeo generale est, ut eo omne rapacium genus Authores incluserint; & Aquila, cum Theodotione & Symmacho, omnes quarum in venatu volatice usus est, Falcones nominarint: Recentiores illis avibus à falcato unguium hamo nomen indidit, quæ Thulcis Campanis vernacula Capys decebantur, & à nobis jam describentur; nec tamen tam stricte, ut non quædam Accipitribus communia intercursura sint.

Nomen.

Albert 1.
23. de A-
nimal.

Ad tres ipsos *classes Migratores* nempe, *Campestris*, & *Riparios* Bellonius redigit; ad *nobiles*, *ignobiles*, & *Hybridæ* seu medi generis, quod promiscuo generosorum & ignavorum coitu generentur, Albertus. Sub illis Falconem sacrum, Hierofalcum, Falconem montanum, peregrinum, gibbosum, album, rubeum, cynopodam arboreum, & lapidarium; sub *istis* Buteones, Lanarios, Tinniculos, sed perperam, comprehendit. Sub his, Germanos & Tuncanos quidam enumerant, sed & hi omnes, ætate, colore, & corporis forma variant. Hinc *Hornotinorum*, qui eodem anno nati sunt: *Nidulariorum*, qui statim à nido domi adoleverunt, nec ita ut ramularii penas producant. *Ramalius*, qui circa nidum ramulatum obvolitant; *Mutatorum*, qui vel deplumes sunt, vel plumam veterem cum nova jam commutarunt; nomina.

Differen-

1. 23. de
Animal.

Quantum ad *descriptionem* exactam, In capite, dorso, superiore colli, exteriore alarum & caudæ parte cinereus sit & subniger, in aliis passim partibus varius, & virgulis quandoque interruptus: sed primo anno secundus color rufus est, remissæ rubedinis, albescit deinceps paulatim, eo magis, quo pennas mutavit sæpius. Caput habet crassum, nec oblongum, nec strictum, superiore parte à rotunditate dificiens. Collum & rostrum brevia, maculas in maxillis nigras, circa oculos albas, oculos croceos ad rubedinem accedentes, pectus cum osse pectoris acato & duro. Pedes patulos, creceos, & ad albedinem declinantes.

Descri-

p. 10.

Crura

Crura breviora. Coxas longas, & pennatas &c. *Morantur* in tota septentrionali plaga, & quidem optimi. Bosnia albos profert, sed & Orientis regiones haud malos. Degunt vel in altissimis montium verticibus vel sylvarum arboribus excelsis.

Vox.

Vox ab acuto in graviolem flectitur.

Volatur.

Mira quadam *volandi* ratione, in principio, medio, & fine venationis utitur. Ad prædam pergens celeri volatu in sublime adscendit, & rursus compositis ad pectus, quibus icturus est unguibus, tanto impetu in avem obliquo volatu descendit, ut strepitum quasi concitati venti suo descensu excitet, in descensu avem percussit, adeo longum vulnus infligit, ut à capite ad caudam usque discissa, aut toto capite truncata, nonquam in humum decidat.

Pugna.
Parvus l.
de hom.
& Anim.
præst.

Cum Ardea ipsi periculosum certamen. Hæc enim ubi infra positam se videt, rostro suo prælongo ac acuto, quod prius absconderat, sursum elato, irruentem ita excipit, ut eo semet Falco sæpissime medium pectus induat, & ambo interdum illis intertraneis humo affligantur.

Morbi.

Cum multis sæpe *Morbis* conflictantur, Febri: Apoplexia, Apostematibus capitis, vertigine, oculorum suffusione, asthmate, vermibus, podagra, pediculis, &c. *Antipathiam* cum illis gerit, tum Alauda, quæ in hominis manus, quam falconis unguem mavult incidere: tum Drepanis avicula lacustris, quæ auditis falconis tintinnabulis, tantoperè consternatur, ut malit lapidibus ab homine obrui, quam volatu se in aëra attollere.

Antipathia.

CAPUT II.

De Falconibus in specie.

ARTICULUS I.

De Falcone peregrino, sacro & Gyrfalcone.

Falconum species superius exposuimus. PEREGRINO qui primum ob audaciam & generositatem locum sortitur, nomen ex eo est inditum, vel quod semper de regione in aliam migret, vel quod nidus ejus nullibi gentium inventus, fuerit.

Differen-
tia.

Quatuor ipsorum à colore *genera* posuit Carcanus, duo ab eodem Belisarius. Unum quod pennis arcum colorem præse fert, & in singulis pennarum capitibus ad coronæ modum albedine sigillatim distinctæ pennæ, quasi figuram ostendunt. Si excellere debet, Caput necesse est aliquantum in fornem, vertice leniter elevato acrotundo, curvatum, cinereo colore habeat: simul atque volandi potens evasit, in rostri

parte superius plumulas quasdam, quæ veluti barbulae speciem gerant; ostendet. Gula lineis in longum ductis nigris maculatur. Supercilia & maxillæ admixto modico rubore albicent. Dorsum livescat. Alæ sint longæ in ultimam caudam recumbentes. Cauda longa, crassis pennis constans, in acumen paulatim desinens, femora longa, tibiæ breves, pedes colore inter flavum & plumbeum ambigente tincti, digitigraciles. Ungues magni, nigri & acuti &c. *Natales*, Sardinia, Ægypto, Cipro, Cretæ & Rhodo debet. Si qui in Italia vel alibi capiuntur, vi ventorum eo depulsos fuisse creditum est. In Alpibus etiam nidulari, fide veteri cujusdam Falconarii, Albertus M. refert. Alterum, Nigrius, quod multis à priore notis variat, femora lineis transversim distincta, crura item colore croceo sed diluto maculata, gerit. Qui ex hoc genere ab Aldrovando describitur, verticem capitis habebat planum ac compressum, Rostrum membrana lutea intensi coloris, nares ambiente, capiti conjunctum. Caput, cervicem, dorsum, alas fusca, per singulas fere pennas maculis atris transversim per alarum majores resperse conspiciebantur. Gula ex albo nonnihil flavescerebat, parte sui infima, maculis veluti guttis nigris transversis distincta. Pectus, venter, & femora alba, lineis lariusculis nigris transversis variegata. Videtur hoc genus idem cum illo esse, quod Alii Nigrum absolute, alii Carbonarium & Falconarium appellant.

Aldrov.
l. 7. c. 11.

Creditur primo in montanis prope Babylonem visum, post in Salamine apparuisse. Nunc in alpibus & Pyrenæis *reperiuntur*: in Germania adhuc rarum est.

Locut.

Utrumque rarius in *volando* alas movet, sic à montano distinguitur: & à sublimi in pronum velocissime descendit.

Volatur.

Adeo mites sunt, ut quandoque irasci nequeant; ad hominumque nutus magnitudine quadam animi potius, quam inedia venantur. Cretenses capiunt etiam Grues, Anates, Mergos, Tardas, Phasianos: Ardeas, inprimis si cibi abstinentia inducantur. Si aquilam viderint nunquam inopsterum acupantur.

Ingenium.

SACER, qui & Britannicus, Ælyus, & Aëriphilus apud Avicennam Falco Saccari, vel Græcorum imitatione quasi Hierax Accipiter, per excellentiam dicitur, vel à corporis magnitudine viriumque præstantia, ita appellatur. Sane à Bellonio Accipitrum adjicitur numero. Tria ipsorum apud Tardivum *genera*; Unum, quod lepores & hinnulos; alterum, quod capreas parvas capit, tertium peregrinum exprimit, de quo superius.

Bellon.
de Avib.
l. 2. c. 14.

In descriptione Albertus & Fridericus Imperator dissident, si Carcanum sequimur,

Descri-
ptio.

mur, corporis ipsi statura plerumque oblongiuscula. Capite vertice plano canum. Rostrum cæruleum; Nares exiguae, pectoris, dorfi, & alarum superiorum maculae fuscae, femora interiora alba. Crura pedesque tota fere coloris cærulei. Cauda maculis circularibus phaseolorum aut renum figuram exprimentibus varia, &c. Excellit, cui color rubicundus, rufus aut incanus, lingua crassa, pes amplus, digiti crassi, & colore cæruleo diluti.

Locus.
Paulus
Iovius in
libro de
legat.
Moscho-
vitico.

Inveniuntur apud Tartaros, & Moscovitas. In Polonia, quod Maximilianus Cæsar per suos exploratores comperit, in arboribus non ita proceris nidulantur. Cum versus meridiem victus querendi gratia proficiscuntur, ab aucupibus adventus gnaris, in Ægei maris insulis intercipiuntur, & Venetias etiam à Creta afferuntur.

*Nutri-
mentum.*

De *visu* scriptores inter se non consentiunt. Belisarius cadaveribus etiam vesci dicit. Tardivus cibos etiam crassiores facile concoquere scribit. Albertus delicate, eos cibandos, cibo semper recente, cerebellis, fanis carnibus, reliquit. *Volacissimi* sunt, nisi è nidis abducantur, & nubes etiam transcendunt. *Capiunt* Anseres sylvestres, Grues, Ardeas, Lepores, Capreolos. His insident, & cerebrum capite perforato excutiant. In eorum conspectu ne Aquilæ quidem volare audent.

*Descrip-
tio.*
Aldro-
vandus l.
7. c. 3.

Gyrfalco seu Gyrfalcus (male à quibusdam Herodius dicitur) qui id ab Aldrovando describitur, verticem habebat compianatum colore cinereo. *Rostrum* breve cæruleum, unco modico, deorsum incurvato, subcæruleo, instructum. *Dorsum*, alæ, venter, cauda albaerant. Verum tergi, alarumque plumæ pene singulæ nigra macula notatæ, quæ cordis quodammodo figuram æmulabantur. Alæ erant admodum longæ. Remiges prope extremum apicem nota majori ac longiori nigra ornabantur, quæ tamen albo clauderantur margine. *Gula*, pectus, & venter pura tingebantur albedine. *Cauda* erat breviuscula notis nigris transversim variegata. *Pedum* digiti oblongi, validi, late expansi, tabellarum continua serie per totum intecti.

*Differen-
tia.*

Genera ipsorum à colore petuntur. Alii sunt, flavi, rubei, & cinerei. Albos etiam in Moscovia reperies. Qui in pectore albicant, magis etiam albi sunt, & primo anno dorsum partim albicat, partim subruffum, vel subrubeum est. Ubi vero mutati sunt, color ille subruffus in nigredinem permittitur.

Locus.

Paulus
Venet. l.
1. c. 61.
Mischov.
c. 14. A.
sianæ Sar-
mar.

Locus ipsis natalem Norvegiam & Hiberniam Belisarius ponit: at certum in Tartaria quoque & Moscovia inveniri.

Vescuntur imprimis Columbibus, & id genus aliis: & postquam semel de aliqua ave gustarint: illa deinceps relicta, novam sem-

per prædam persequuntur. Aggrediuntur & Aquilas. Accipitres, Nisi, Falcones, iis advolantibus, prædam ulterius non prosequuntur, sed pavidæ persistant. Si in quinque Grues libero aëris campo unus emittatur, non prius persequi desinit, quam singulas in terram dejecerit.

*Nutri-
mentum.*
Pugna.

Duo habent *peculiaria*. Unum, quod cum simul aliquot vehuntur, certo quodam sensu ordine cibum capere soleant. Alterum, quod præter cæterarum rapacium morem, nunquam sese aqua abluant, sed sola arena utantur. Frigore etiam tantopere gaudent, ut perpetuo, aut super glacie, aut lapide, marmoreve algido stare gestiant.

Ingenium.

ARTICULUS II.

De *Falcone Montano*, *Gentili*, &
Tunetano.

FALCO MONTANUS, quod sit magis reliquis indomitus per excellentiam ita dicitur. *Caput* habet vertice fastigiatum & nigrum, coronula quadam cinerea cinctum, cui in fronte non longe à rostro plumulæ quædam exiles, & capillares eminent. *Guttur* ad sternum usque nonnihil candescit, maculis conspersum majusculis, *pectus* reliquum versus inferiora, notis quibusdam, quandoque ferrugineis, nonnunquam rubeis nigricantibus aliquando insignitur, quibusdam guttur & pectus nigris plumis vestiantur, *dorsum* ac lumbi majori ex parte plumis fuscis, minutis obteguntur. Alique eorum post medium dorsum, lineas quasdam albicantes, aut rubescientes, quæ deorsum vergunt, habent. *Crura* & pedes plerumque crocei, vel ex flavo paleari flavescientes, & squammis densissimis integuntur. Mutatos facilius est cognoscere: & optimus est hornotinus fuscus.

*Descrip-
tio.*

Non Anates solum, sed & Anates & Ardeas capit, & persequitur. Visus aliquando & Aquilam, quæ sibi prædam præripuerat, & seipsum interemisse.

*Nutri-
mentum.*

Ponit & alterum ejus *genus* Aldrovandus, quod *Leucophæum* nuncupat. *Corpus* ejus totum cinerei est ad cæruleum vergentis coloris, pro diversa partium ad lucem observatione dilutioris obscuriorisve. *Rostrum* crassum, breve, nigrum, robustum, pollicaris crassitudinis, tam validum, ut vix ulli alteri fortius. *Pectus* valde teres ac grande. Diversum primo ab aliis Aldrovandus putabat: sed cum cum descriptione Montani apud Albertum conferret, & verò Montano, qui aliquoties plumas veteres cum novis commutavit, mediam partem dorfi cæruleam affingi, & quo frequentius senectum exuit, eo tergum magis cærulescere, gulam cum pectore, abolitis, quæ distinguebant cum ætate maculis, albe-

*Differen-
tia.*

albescere, observaret, alterum Montani esse genus conclusit.

Descri-
ptio
& Diffe-
rentia.

GENTILIS per excellentiam propter generositatem ita dicitur. Frederico Imperatori alii sunt Gentiles *Peregrini*, alii simpliciter ita dicti. Illi Falconibus sacris sunt minores, & quo plus cum Gyrfalconibus participant, eo elegantioris esse formæ existimantur. Vertex capitis debet esse planus, occiput latum. Rostrum crassum, & recurvum. Collum breve, prope caput subtile, prope spatulas crassius. Habere debent pedes foris prominens, & carnosum, cavitationem inter pectus & collum magnam & profundam. Coxas plumis complurimis operatas, & sub genibus etiam dependentes. Crura crassa ac breviora, pedes amplos, digitos expansos & macilentos. Cum adhuc hornotini sunt. Alii sunt absolute fusci: alii rubris, nonnulli pallidis maculis ceu guttulis perornantur. Alii rufi sunt, aut simpliciter, aut ad nigredinem vergentes. Alii fulvi, vel absolute, vel cum quadam rubedine. Maculae à collo ad pectoris furculam parvae sunt, inde vero progressæ ad anum usque majores evadunt. Fulvis ad rubeum vergentibus, color est ex æquo permixtus. Laudabiliores in suprema capitis parte ceu corona quadam in circuitu perornantur; prope nares durities rostri virescit. Maxillæ sub oculorum parte subrubæ sunt. Dorsum fusco est colore, ac rubedinem inclinate, marginibus rubescentibus & majusculis sine guttis tamen exornatum. Pennæ alarum majores fuscae cum marginibus. Cauda ejusdem cum dorso pennæ coloris, modo quod margines in ea in plurimis sint pallidiores, seu quod à corde sit remotior; seu propter aliam causam. Simpliciter dicti trium eidem sunt generum, sicut & peregrini, de quorum datis notis quopluces obtinent, eo magis probantur. Aldrovandus eisdem cum Carcani GERMANIS facit, qui Peregrino forma, capite, rostro & pedibus sunt simillimi. Corona albicans caput ipsis prope collum cingit, femora interna plumis albis vestiuntur. Mutatis caput, collum, & humeri fusca sunt, dorsum cyanea tingitur. Mares seu Tertiarii à maribus Peregrinorum nulla possunt ratione discerni. In volando crebriore spissioreq; alarum motu utuntur. Rapiunt omne avium genus, Aquaticum præsertim, quod si è nido exemptus adhuc pullus ad hoc instituitur. Grues etiam capere audent. In eo solum Peregrino cedunt, quod non sola animi magnitudine, sed etiam cibi aviditate prædam invadere dicantur.

Bellon.
l. 2. c. 8.

De TUNETANO inter Carcanum & Bellonium non constat. Ille corporis esse exigui, coloris perpulchri, capite flavo, alas nigro, peregrinos pedibus præsertim ita exprimere, ut multi fallantur, scribit.

Hic magnum esse, ad Lanarii similitudinem, plumis & pedibus accedere, diutius & constantius volare, capite crasso & tertiarii esse, strenue sublimem aëra scandere, reliquit.

ARTICULUS III.

De Falcone Gibboso, albo, & Gallorum Lanario.

FALCO GIBBOSUS, quod ei ob brevitatem colli, caput ante juga alarum dum eas supra dorsi latera componit, vix appareat, ita ut gibbum gestare videatur, ita dictus est. Corpus habet exiguum, planum collo fere continuum. Caput reliqui corporis proportionem magnum. Rostrum perbreve & rotundum, oculos flammeos. Alas prælongas, & valde exertas, in facie guttas. Crura proportionem cæterorum membrorum longiuscula & squamosa. Pedes in articulis digitorum, præcipue ad anteriorem plantæ pedem nodosos. Nidulatur in montibus inaccessis. Tam alte volat, ut hominis visum effugiat. In aucupio non statim inter descendendum percutit, sed potius cum à descensu rursus ascendere incipit, tunc posteriore ungula ante pectus disposita ferit, & quandoque tam fortiter, ut unguem sibi amputet, pectus lædat, imò seipsum aliquando occidat.

Descriptio.

Est & aliud Falconis Gibbosi genus, quod semper alas tanquam ad volandum extendit, animosius quam robustius. ALBO nomen color imposuit. Albertus eum in dorso & alis subalbum esse, alibi guttas valde albas aliis guttis subpallidis interpositas habere, & regionem frigidam, & humidam in causa esse, scribit. Addit, Falcone Peregrino majorem, & ad similitudinem Lanarii albi, qui per campos muribus insidiatur, accedere. Mittit eum septentrio, & ex illo inprimis Norvegia, Suecia, Estonia. Non tam est in volando velox ut Niger: diutius tamen in avium persecutione perdurat. Non debet ad venandum emitti, antequam pennas mutaverit. Ad eum refert Aldrovandus quendam Sparverium, cujus descriptionem Roma acceperat, qui corpore toto colaris lactei, maculis flavis perspersi, rostrum habebat album magis quam cæruleum, alas candidissimas ac sine maculis, in cauda pennas duodecim candidas & flavas maculis conspersas: quarum conspectum pennarum præcipua & aliarum quasi tegumentum, tota candida, eripiebat, easdem quasi in vaginam recondens. Pendebat mortua tredecim uncies, pondus in ejusmodi ave haud leve. LANARIUS (generosum intellige) GALLORUM dicitur, quod Reiacipitrariæ authorum testimonio, Gallie peculiaris & proprius.

Falco 2.
lius.

Aldro-
vandus
l. 7. c. 10.

Ro-

Descri-
ptio.
Lanarii.

Rostrum & crura cum pedibus habet cærulea, plumas anteriores albo & nigro varias, maculis non transversis, sed plumas in longum distinguuntibus. Plumæ dorſi, alarum & caudæ, partem externam si spectes, non admodum sunt variegatæ. Extensarum interiora notis rotundis, instar exiguorum nummularum per superficiem disseminatis, conspiciuntur. Sic à Tardivo & Bellonio describitur Xqua Gallia est perpetuus, semperque tam hieme, quam æstate ibidem conspiciuntur.

Ingenium.

Ingenii sunt tractabilis, & ad omne aucupii genus idonei. Picas, Coturnices, Perdices, Cornices, Phasianos; imo Anates & Grues, si institutio accedat, capiunt, & societate maxime gaudent. Quoniam alis diutissime in æthere supra prædam suspensi hærent, tantopere Anates fatigant, ut & canum opera, & fustibus plurimæ occidantur.

Italicifal-
cons.

Carcanus *Italicorum* meminit. Habent isti caput totum planum Rostrum falconis, peregrini & montani rostro minus & cæruleum. Pectus flavum raris & ferrugineis maculis distinctum. Extremas alas veluti ocellis rotundis albisque pictas. Mutatis, caput universum ad humeros usque, flavo colore ad rubeum vergente, & lineis tenuibus distincto, tingitur. Pes, qui ante cæruleus fuerat, in luteum abit. Nascuntur in montibus Vincentinis & Alpibus, quæ Germaniam ab Italia dividunt. Solent alarum æquilíbrio, in aëre sese diu admodum & frequenter suspendere, sic metu incusso, ne Perdices, Coturnices, aut Phasiani diffugiant, faciunt, rarerer occisas in terram præcipitant. Visus aliquando qui & Accipitrem exanimaret.

ARTICULUS IV.

De Falcone Dapidario. *Arbarario & Rubeo.*

Aldrov.
l. 7. c. 11.

FALCO LAPIDARIUS recte Lethofalcus dicitur. Est mediæ inter Peregrinum & Gibbosum magnitudinis. In præruptis petris, & Alpium rupibus nidificat. Regitur & nutritur simili modo quo Peregrinus.

ARBORARIUS quem Gesnerus descripsit, rostro erat cæruleo, oculis nigricantibus, pectore albidis & nigricantibus maculis variegato; pennis alarum nigrioribus; dorso nigro, cujus pennarum margines infimos, muculæ ex candido rufæ distinguebant. An idem sit cum Accipitre Fringillario dubitatur. Nidum in arboribus exstruit. Rarus ipsius in aucupio usus; jucundum in conspectu cum monedula spectaculum exhibet. Adeo quoque placidus est, ut per sylvas & agros emissus ad dominum redeat. In dissecti ventriculo plumas & Cantharides reperit Gesnerus.

RUBEUS à guttarum seu notularum quibus distinguitur, rubro colore dictus est. Peregrino minor est, nec citius rubere apparet, quam alas exerat. Calor debilis in superficiem corporis effusus, & fumosum humidum, quod ad generationem pennarum excernitur, adurens, rubedinis causa esse putatur. Invenitur in locis planis & palustribus. Phæniceos in Moscovia dari perhibent.

Albert.
l. 10. c. 9.
Circut.
l. 23. c.
12.

Volatus est agilis, sed non diu perseverantis. Nam penna rubea, quia mollior, non diu volandi impetum sustinet.

Volans.

Facile cicurari, Albertus innuit, difficulter regi Tardivus. Post secundam aut tertiam pennarum mutationem melior, quod remittentibus per ætatem humoribus calidis, non parum temperamentum juvetur. Vita est minus quam reliqui longæ.

Ingenium.

Ad istum duos ex *Indiis Orientalibus allatos* Aldrovandus reducit, qui parte anteriore tota & alis internis adeo rubebant, ut qui pronos inspexisset, nihil præter colorem rubeum vidisset. Majorem putat fuisse feminam; minorem, marem. Mares enim ob hoc ipsum Tertiarii dicuntur, quod tertia parte sceminis sint minores. Mentum in scemina, macula oblonga cinerea, quæ inferne desinebat, distinguebatur. Pectus quoque ejusdem coloris notulis anteriori sterno raris respergebatur. In mare color rubeus, saturior & evidentior erat. Mentum nulla macula insigniebatur. Pennæ remiges interioris notis fuscis transversim frequentibus; statoque intervallo distinctis, albebant.

Alti.
Aldrov.
l. 7. c. 14.

ARTICULUS V.

De Falcone Cyanopode, & illis, qui promiscuo coitu gignuntur.

FALCO CYANOPUS ad quod referri debeat genus, cum quatuor Falconum genera pedibus cæruleis instructa inveniantur, difficile est dicere. Ad Lanarium tamen potius, quam aliam speciem pertinere videtur. Est Falconi Peregrino & magnitudine æqualis, & figura similis: sed in hoc differt, quod dorsum ejus, & exterior alarum pars minus nigredinis, & pectus plus albedinis habeat; alæ sint breviores, cauda longior aliquantum; pedes hyacinthini.

Aldrovandus
l. 7. c. 14.

Vocem acutiorem, quia humidior, Peregrino habet. Raro aves Pica, vel cornice majores invadit. Plurimum se præcipitaturus, propter metum loco manet, & suspenditur. Audacior evadit, si aucupis accedat præsentia. Qui in Helvetia reperitur, diversus est ab isto.

Vox.

Nidificat in excelsis juxta aquas, aut profundas valles, petris. Nidis exemptus mansuefit.

Luc.
Aldr. l. 7.
c. 15.

mentiam minus eo valent, impotentiam, reptandi facilitas, qua sursum, deorsum, & in maximam altitudinem scandunt; ob congruam rostri & pedum conformationem, compensat. Illius unco, dum pedes promovere nituntur, appensos sese sustinent; dum provolant, ne pedes ob corporis deorsum labentis pondus debiles offendant, sese obvio adminiculo apprehenso, eodem velut anchora & præsidio excipiunt.

Vox. *Vocem* articulata nullam naturaliter habent, quidam etiam fere muti sunt; nec quicquam unica illa voce Perroquet excepta, quæ in ipsorum nomen abiit, ingeminant.

Amicitia. *Amicitiam* singularem colunt, cum lupo, cum quo simul pascuntur; homine, unde in America relictis sylvis interdum prope domicilia agunt, & Turture, quod Ovidius notavit.

Ingenium. *Ingenio* prope ad hominem accedunt. Accipiunt namque verba & pronunciant articulate omnia; facilius, si intra alterum ætatis annum docueris: seigniores, ferreo in caput verberantur radio. Non sentiunt aliter, propter duritiem, ictus. Sic Afcanii Cardinalis continuatis perpetuo verbis symbolum Apostolicum pronuntiabat. Henrici VIII. Angliæ Regis in Thamesin delapsus auxilium implorabat, viginti libras promittens; extractus, quatuor denarios hospitatori suo dari iussit. Meditari eisdem Cardanus addit; Phereides masculos, eos observare, & deferre, qui venena propinare moliantur, & in domos important, refert. Quosdam circa Javam intelligere, & ad interrogata respondere, quidam narrant. Non facile crediderim. At pueros interdum imberbes amare, blande attræctatos libidine, ita ut oscula figant, tangi; quosdam pueros ita odio prosequi, ut in eorum capita de sublimi loco non aliter impetum faciant, atque Falco in Anatem; si inter lugentes agant, lamentari, quod Constantinus Manasses in historia Basilii Imperatoris testatur. Saltantes capitis gestu, depressis agitatique alis imitari, dubitandum non est. Fœminas nunquam aut rarer humanas reddere voces, Tiraquellus reliquit. Virides macrouros, quibus collum torque rubro cingitur, annulo illo primum apparente, nil præterea discere quidam affirmant. Scaliger acceptas è via publicitus voces reddidisse scribit. In insulis vero S. Michaëlis & Divite simplicitatis tantæ esse, ut ad crocitantem Psittacum innumera, ex arbore in cuius ramis acceps latet, multitudo convolet, facileque se capi patiat, apud Martyrem legimus.

Albert. lib. 23. *Scalig.* Ex. 236.

Manasses in Anna-lib.

Scalig. lib. cap. De leg. glo. 1. p. 12.

Ufus Psittacorum apud Occidentales Indos in cibo, apud Orientales olim, Æliano teste, sacri habebantur. Heliogabalus

capita ipsorum in convivio exhibuit, iisdemque leones, pantheras, & alia animalia pavit. Oblectamenti loco apud Romanos olim fuere. Nam cum Gallinis rusticis & Merulis in publicis ornatibus ponebantur. Viros Psittacos manu gestare M. Cato conqueritur. Articulatam ipsorum vocem in tantum eosdem miratos esse, Suidas author est ut eos Indi mercem fecerint. Unde caveis eburneis, argenteis, vel ex alia pretiosa materia factis includebantur. Indis pennæ ipsorum in magno usu. Ex his imagines varias, papiliones, flores, herbas, pileos & perizomata conficiunt; vestes, aulæ & tapetes contexunt; enses & clypeos exornant, aliaque utensilia miro artificio conficiunt. Sed de plumario opere alibi.

De Psittacis vide quoque infra Mantissam N. 4.

CAPUT II.

De Psittacis in specie.

ARTICULUS I.

De Psittaco maximo Cyanocroceo, Maximo Psittaco altero, Psittaco albo cristato, & Psittaco viridi alarum costa superna rubente.

Psittacus maximus Cyanocroceus in aula Ducis Mantuæ ab Aldrovando visus est. Magnitudine bene saginatum caponem exæquabat, ab extremo rostro ad caudam extremam bicubitalis. Vertex capitis erat planus & viridis, rostrum aduncum, in hemicyclum compositum, extrinsecus in perfectam dimidii annuli rotunditatem formatum, palmum longum, totum nigrum; superius longitudine duobus digitis, inferius excedebat. Oculos habebat albos & nigros, quos ternæ lineæ nigra à rostro ad colli initium ductæ, figuram literæ S. jacentis representantes, in longum succingebant. Guttur veluti torques nigra ambiebat. Pectus, venter, femora, Uropygium, cauda inferior, crocea erant. Cervix superna, dorsum, alæ, caudæ pars superior, colore cæruleo vestiebantur. Qui apud Comitum S. Floræ erat, semel singulo die instante vespera bibebat, notis & familiaribus adblandiebatur. Æstivo tempore aquis se immergebat, aut pluvix donec totus maderet exponebat, à madore frigore correptus, ad solem se vel focum siccabat, ex podagra mortuus est.

Maximus Psittacus alter apud eundem Principem fuit. Corpus ei non ita ut superiori crassum. Capitis vertex compressus, palmo longior. Rostrum quam superiori brevius, nec longo adeo hamo incurvum, tres propemodum digitos longum, & totidem,

Ælia. H. A. l. 13. cap. 18. Lampr. in Heliogab. Vatro. 3. de rer. sic. c. 9.

Descriptio. Aldrov. lib. 11. Ornith. cap. 2.

Aldrov. l. cap. 3.

Aldro-
vandus c.
5.

qua capiti comittitur latum; mandibula superiore alba, inferiore nigra. Oculorum regio & tempora albescencia. Dorsum, alæ incipientes, gula, pectus, venter, femora, cauda tota superne, punicea. Remigum tegetes secundo in alis ordine lutei, puniceis marginibus, cæruleo velut oculo prope apicem ornatae, &c. *Psittacus albus cristatus* magnitudine erat columbo domestico par. Corpus universum candido plumarum Agmine vestiebatur. Capitis verticem habebat plumis grandiusculis, sesqui palmum altis, retrorsum nonnihil incurvis, acuto apice denuo antrorsum reflexis, candidis, denis, velut crista perornatum. Rostrum cinereum, ad nigrum vergens, qua capiti committitur naribus patulis pervium, ac harum medio tuberculo, quodam tereti clivofum. Oculos iride lutea, pupilla nigra. Linguam latam, rubicundam. Caudam in altum plumis dodrantalibus frequentibus, candidis, surrectam. Crura cum pedibus sublutea. *Psittaco viridi alarum costa superna rubente* pullastri anniculi erat corpulentia, capitis vertex luteus. Rostrum superius extremo nigrum, post subcæruleum, reliqua rubicundum; inferius vero album. Oculi iride croceo aut potius rubente, cincti pupilla nigra, corpus totum viride, parte quidem prona virore flavescente ac diluto, alis vero & dorso saturiore, & qui in maxima & extrema penna remige ad cæruleum nonnihil tendat. Costa superna alarum in tantum rubet, uti & cauda eaque breviuscula, parte inferiore ad latera, rubra in longum macula insignitur; superne vero flavescit.

ARTICULUS II.

De *Psittaco poikilorincho*, viridi melanorincho, *Leucocephalo* & *Erythrocyano*.

Aldro-
vandus l.
II. c. 6.
7. 8. 9.

P*Psittacus poikilorinchos* magnitudine erat gallinæ minores. Corpore plerumque virefcens, dorso obscurius, pectore & ventre, interlucente luteo, radicibus ubique cinereis, dilutius. Rostrum superius in parte superiore habebat ex viridi cæruleum; ad latera, colore ochrae, in cuius extremitate macula transversalis candida percurrerat, inferius circumcirca coloris plumbei in medio lutescentis. Vertex plumulis aureis ornabatur. Remiges parte exteriori, ventrem versus, initio virides, paulatim in colorem subcæruleum, seu amethystinum, purpureumve potius terminabantur, nigra cætera. Secundæ in ordine longissimæ totæ luteæ erant. Quæ mediis ferme alis conspiciebantur, ad principium latere exteriori, quod ventrem respicit, primum viridi, dehinc minaceo obscuro, inde viridi, postremum apice ipso partem violaceo,

partim nigro vicissim variabant. Cauda duodenis instructa pennis, quarum quæ è latere sunt, utrinque quaternæ, quæ enascuntur, initio sui primum virides erant latere exteriori, luteæ interiori, inde rubeo, coccineove colore, tertio ordine denuo viridi, postremo luteo variegatae. Reliquæ quatuor mediæ totæ virides, at fine sui nonnihil lutei habebant. Pedes plumbei, quaterni digiti biniant, retro totidem, ut in *Picis Martii*, interiores quidem exterioribus multo breviores. Ungues ut rapacibus adunci. Tibiæ brevissimæ, nempe inter poplites & talos, digitum longæ sed crassiusculæ. *Psittaco viridi melanorincho* collum, dorsum cum alis virore pleno tinguntur. Costa alæ, qua corpori adnectitur, extrema, coccineo rubet, penna in extremis alis, qua ventrem spectant, est nigra. Uropygium inferius coccineum. Rostrum totum nigrum. Caput & pectus lutea. *Psittacus Leucocephalus* ita ab Aldrovando describitur, &c. Dodrantem & digitum unum longus est. Rostrum duos digitos crassum, album: & pars capitis rostro continua item alba. Oculi pupilla nigra, iris ferruginea. Vertex & frons, quæ albet, maculis nigris variegatae sunt. Occiput, collum, dorsum, alæ, uropygium superum obscuro ac pleno virore tinguntur. Gula & alatum costa superna rubore cinnabario. Pectus ac femora virent denuo. Pars ventris inter femora & pectus interjecta fusco subrubido, aut eo colore, quem pictorum vulgus terræ umbræ vocat, insignitur. Alarum latera pennas quasdam, quæ remiges tegunt, easque extremas cæruleas habeat, albo tamen nonnihil admixto. Venter postremus uropygio proximus lutescit. Cauda medio rubra, ad latera rubro & luteo, inde cæruleo variegata est. Pennæ pene omnes extremo apice nonnihil nigrescunt, cætera virides sunt. Tibiæ & pedes cinerei. Possit & hic idem ob multiplicem colorum varietatem *Psittacus* vocari, id est versicolor appellari. Est enim coloribus non paucioribus quam septem distinctus, quorum tamen præcipuus est viridis. *Psittaco Erythrocyano*, caput, pectus cærulea sunt. Vertex summus macula lutea insignitur. Rostrum haud ita ut prioribus grande, nigrescit. Oculorum regio albicat. Pupilla nigra, Iris fusca. Ventris latera subsummis alis lutea sunt. Venter viridis. Femora è viridi albicant. Uropygium luteum est. Summum dorsum dilute cæruleum est. Alarum tegetes viridi, luteo, roseo promiscue conteguntur. Sic remiges & cauda totæ roseo perfusa sunt. Dorsi extrema pars seu lumborum regio flavescit. Caudæ denique pennæ pauculae, eaque virides obtegunt. Crura & pedes cinereo imbuuntur, cætera roseo. Hic forte ille est, quem in Tarnasari urbe Indiæ pulcherrimum ac septem-

ptemplici colore distinctum reperiri Ludovicus Patricius scriptum reliquit.

ARTICULUS III.

De Psittaco Cinereo, Erythroleuco, Torquato macrouro, Minore macrouro toto viridi, Erythrochloro macrouro, Erythrochloro cristato, & aliis & Gesnero positis.

Aldrovandus l.
l. 11. c.
10. 11.
12. 13.
14. 15.
16.

Psittaco Cinereus ex Mina adfertur, & à potissimo partium colore ita dictus est. Corpus enim totum cinereo obscuro, seu potius aequaliter subcæruleo tingitur, remiges paulo saturiore visuntur. Oculos macula candida cingit. Cauda vix ultra extremas alas protenditur, & tota cinnabario colore tincta est.

Psittaco Erythroleuco magnitudo est caponis grandiusculi, corpus candidum, post rema tergi pars, uropygium, cauda tota, alarum remiges miniaci coloris. Rostrum unco quam in aliis longiore.

Torquatus macrourus solus antiquis cognitus fuit. Caput & corpus omne habet viridi. Rostrum minaceum. A rostro inferiori sub mento &c. *Minor macrourus totus viridis* in Hispaniola reperitur, nec totus turdo major est. Rostrum habet superna parte rubrum, inferna è rubro ingricans. Iridem oculi rubicundam & croceam. Corpus herbaceo virore amœnum. Pedes & tibiae rubicunda.

Erythrochloro macrouro ex Japonia allato, corpus quatuor coloribus, quorum potiores viridis & ruber insignitum erat. Verticem habebat planum; rostrum rubeum, exiguum, & inferius etiam aduncum. Retro & ante oculos maculam cæruleam. Caudam corpore toto longiore.

Erythrochloro cristato alæ, cauda ac crista, quæ sex pennis, tribus majoribus, totidem minoribus constabat, sunt rubri coloris, corpus reliquum viridis.

Hic adde *Psittacum Erythrocyantum*, nec non *Erythrocyantum* Gesneri, quorum ille, parte supina rubet, alis superius in flavo viridibus, cætero cæruleis; cauda partim rubra, partim cærulea, hic, illi per omnia similimus, in hoc tantum discrepat, quod per medium alarum plurimum flavioris coloris habeat, nonnihil etiam in cauda.

Huc etiam Aldrovandus Avem illam, quæ in Hispania capta, magnitudine erat fringillæ; rostro nigro, adunco; capite, collo viridi, vertice ut in Garrulo Bohemico crista insignito, alis cæruleis, extremo nigricantibus; uropygio ferrugineo; femoribus albis; pedibus nigris, digitis quaternis, binis ante, retro totidem; refert.

TITULUS VI.

De Corvino genere, & alijs nonnullis Avibus, quibus rostrum durum ac robustum est.

CAPUT I.

De Corvo.

Corvus, Græcis, seu à colore nigro seu à capitis magnitudine *aliqui*. L. Floro Satyra avis, seu propter salacitatem. Virile enim membrum veteres Græci *satyræ* appellabant; seu à Satyra palude, quæ & Pomptina, viginti quatuor olim urbium capace loco, dicitur. Locus ipsi post Psittacos vel eam ob causam datur, quod & ad rapacium naturam accedat, & oliam apud veteres in tanto precio fuerit, ut per illum jurarent. Magnitudine Cornicem superat, & adeo est ater, ut præ nimia nigredine cæruleus quodammodo appareat, nec ab aquis mutetur. Rostrum habet aterrimum, nonnihil aduncum utrisque marginibus incidens; Oculos lucidos; Linguam in apice latam, ad radicem rotundam, nigram. Visi tamen in Septentrionalibus regionibus, Anglia, Neapoli apud Alphonsum Siciliae Regem, Lestorum Indiae extra Gangem regione, quin & tempore Aristotelis. albi; seu quod ob aspectum nivium in nivosis locis tales nascantur, seu quod frigus id efficiat, seu quod alimento id attribuendum sit. Interiora ejus si attendas, gulam patentiore prope ventriculum pro ingluvie habet. Fel renibus, & parte tantum altera intestino jungitur. Excrementa alba esse apud Horatium legimus. Cuidam vero apud Livones & Botnios generi, quod *marinum* dicitur, rostrum dentium fere instar serratum, sed forte falso, adscribitur.

Quantum ad Locum, in Asia non nasci Theophrastus prodidit. Locis desolatis, humidis, excultis, turribus, celsis ædificiis, morari, nec ea, dummodo cibus suppetat, deferere, in agris uberrimis gregatim ferri, & ejus frequenti suo numero bonitatem, quam innata sagacitate cognoscunt prodeire, compertum. Binos per sterilem & infructuosum campum, nec non arctiora loca volare, quod non satis cibi pluribus, unde in Cranone Thessaliæ oppido nunquam plures duobus reperiri, à quibusdam notatum. In Galliæ oppido, quod Corvatum dicitur, annos plus, quam centem egisse, Albertus nescio, qua fide refert.

Vestit corvus frumento, pomis, ficibus, cerasis, quæ cum pediculus deglutit, & dum binis è pastu, horis pulpam rejicit, ossa evomere solet; nec non vermibus, hinc aratoris vestigia rodit; piscibus, unde apud Anglos lege sub gravi multa cautum, ne quis

Descri-
ptio.

In Histor.
Val. Cor-
vini.
Rhodig.
Antiq.
lect. l. 29.
cap. 25.

Aristoph
in Avi-
bus.

Scalig. ad
lib. 2. de
caus.
plant. c.
17.

Olaus
Magn. l.
19. cap. 8.
Aristote-
les l. 5.
de gener.
cap. 5.

Arist. H.
Ad. 2. c.
ult.
Arist. H.
N. l. 2. c.
15.

Locus.
Plin. H.
N. l. 10. c.
29.
Ela. c. 34.
Theon. in
Aratum.

Æl. l. 2.
de Anim.
cap. 48.
Arist. H.
A. l. 9. c.
31.

Nutri-
mentum.
Athen. l.
12.

Aldrov.
Ornithol.
l. 12. c. 1.
Bellon.
lib. 6.
de avib.
cap. 1.

quis vim corvis inferat, cadaveribus, quæ si non attingit, infecta esse conjiciuntur. Quin nec à vivis animalculis abstinet. Alaudam & passerem devorasse visus est, pullos vero alimonia destitutos, parentem ipsum invadere, & devorare Ælianus auctor est. In Bothnia non tantum lepores & cuniculos interimant, sed agnorum etiam & arietum stragem edunt. Constitutum è publico præmium, qui eos occidissent. Potus est vehementer appetens. Tradendum putare memorie quidam, visum corvum per sitim lapides congerentem in situlam monumenti, in qua pluvie aqua durabat, sed quæ attingi non posset, ita descendere paventem, expresse tali congerie, quantum potaturo sufficeret. Æstivo tamen tempore sexagenis diebus, dum ficus maturefcunt, non bibit, seu quod, nisi Hyginus fallit, guttur pertusum, dum ficus maturefcunt, habeat, seu quod eo tempore relaxatione alvi se laborare sciat.

Generatio. Generationem quod attinet. Ore coire vulgus prodidit, inde fellatorum ipsis noman, sed falso. Nam & vulvas habent, & ova juxta septum, nec cogitare quomodo semen per ventriculum, qui semper quod injectum est concoquit, perveniat, absurdum est, & visi duo Avicennæ, qui aliorum congredebantur more. Rostrorum sit inter eos ante coitum conjunctio, seu ut alii, cantu prius quodam velut hymenæo demulcentur foeminae; tum mares admittunt, hinc exorta fabella. Ponit bina, saepe quaterna aut quina ova, post viginti dierum incubatum pulli excluduntur. Exclusi, forte quod color ipsis sit albicantior, negliguntur à parentibus, & ad septimum diem, quo atrocem induunt, seu coelesti rore, ut Cassiodorus credit, seu à muscis prætervolantibus aluntur. Agniti recipiuntur in curam, donec firmiores evaserint, mox pulsi, quæ sunt ad vivendum necessaria inquirunt. Circa Cranonem tamen singula perpetuo paria degere, & genitores soboli loco cedere Plinius asserit. Ætatem eis longævam Hesiodus tribuit, fabulose si pro centum sumas annis; verisimiliter si pro uno, intra quem & omnia, quæ terra profert perficiuntur, & ipse homo in utero: Sic longævitas intra CVIII. annos consistet. Vox eidem minime sonora, quamvis cantare Plautus dixit, quia crocit, raucedine & stridore aures offendens; hanc seu propter diversos effectus, seu imbrum & ventorum instantem incursum, ita mutat, ut Fulgentius sexaginta quatuor diversas habere dixerit. Odoratu cum vulture fere certat, in volatu tardior & gravior est, ideo non mirum aliquando populi clamore dissono gravius ictum, & decidisse.

Mores & ingenium admirationem merentur. Ad trigessimum & quadragesimum

una viventes, conjugii jura servant, uno defuncto alter per vitæ reliquum viduus permanet. Nummos quidam Erfordiae furabatur, & sub lapide abscondebatur. Alter Augustum ex Actiaca victoria reducem, verbis, Ave Cæsar, victor, Imperator, salutavit, viginti millibus seu D. aureis solatis emptus. Quidam sub Tiberio Principe singulis matutinis in rostra evolvans, in forum versus, Tiberium, deinde Germanicum & Drusum Cæsares nominatim, mox transeuntes P. R. salutabat. Occisi funus innumeris elatum est exequiis, interfectus, qui occiderat. Taceo illum futoris, Cæsarem salutare edoctum, in quo opera & impensa periisset, nisi operam & impensam periisset, eloqui potuisset. Nec non illum, qui Cunradum coquum in fame implorabat, adeo expresse ut ab homine vocatus crederetur. Difficillimum elementum, optime expriment. Venatici (primum Ludovicus Gallorum Rex instituit) perdicæ & corvos feros venantur. Phasianos aliquando.

Amicitiam naturalem colit, cum lauro, quem depasto Chamæleonte comedit, cum asaro & aro, quibus remediis in quibusdam morbis utitur, cum salice Amerina, qua tanquam amuleto nidum munit, cum Coracio, qua vim toxici degustati frangit, cum Oenuta qua sead ebrietatem exhilarat.

Inimicitias autem gerit, cum Milvo & Percnoptero, propter cibum, cum Æsalone, propter ovorum fractionem, Chamæleonte, Circo, Turture, & aliis. Cum Erucæ semine, quo interit.

Tempestatem plenam præfagiunt, si cum singultu quodam diu multumque vespertino præsertim crepusculo latrant, & si de arbore pendent alas sæpenumero motitant. Serenitatem, si contra solum hiantes mane per arborum ramos plumas & alas expandunt, si privatim primo crocitant, mox turmatim congressi liberius vociferantur, aut si sub nocturnum crepusculum gregarim versantur, & dum separantur iunime crociendo ad nidos advolant.

Uti ejus in Medicina aliquis est. Pulli mense Martio combusti contra Epilepsiam propinati sunt. Ova ad denigrandos pilos adhibebantur, à Villanovano ad Epilepsiam commendantur. Cor portatum vigilias inferre quidam asserunt. Pes à collo pueri tussientis suspensus eum, si Psello credimus, sanat.

CAPUT II.

De Cornice in genere.

QUæ Latinis Cornix, Græcis vulgo *κρηνα*, hæc iisdem hodie *κρηνα* vel *κρηνα*. Polyrhæniis Cretæ populis *κρηνα*, Vari-

Albert. l. 23. de Animal. Macrobi. l. 2. Saturn. c. 4. Plin. A. N. l. 10. c. 43.

Macrobi. l. c.

Scalig. Exerc. 237.

Scaliger.

Amicitia.

Ruell. l. 1. de Nat. stirp. c. 2.

Arist. de Mirabilib.

Inimicitia.

Cicero. l. 1. de Natur. Deorum.

Arist. H. A. l. 9. c. 1. Ælianus. l. 6 de Animalia.

c. 46. *Præfagium.*

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Ælianus. l. 17. de Animalib. c. 7.

virg. Georg. 1. Ujor.

Ujor.

Ujor.

Ujor.

Ujor.

Ujor.

Ujor.

Ujor.

Ujor.

Serabo
lib. 3.
Georg.

tudine vincit graculos. Rostrum, crura, & totum corpus habet undiquaque nigerima, (falsus Strabo, dum peculiare esse Hispaniæ, ut nigra ibi sint cornices scribit) illud tamen, durissimum alias & acutissimum, prope caput albicat, superiori parte barbula quasdam veluti setas circa palpebras habet, inferiore nigra, eaque minima veluti granula. Albam, capite nigricante, cæteris alarum apicibus in rubedinem vergentibus, Rhodiginus vidit.

Rhodig.
Antiq. le-
tion. lib.
11. c. 11.
Locus.

Versantur circa urbes, domos, maris ripas, fluminum littora & sterquilinia. In Britannia ingens ipsarum copia, quoniam in pabulo humido ejus soli vermes abundant.

Vitruv.

Vicitant frugibus, nucibus, olivarum baccis, vermibus, piscibus, & carnibus, & vere *dicuntur*.

Arist. H.
A. 1. 8.
cap. 3.
Genera-
tio.
Ælian. de
Animal.
1. 3. c. 9.

Generationem earum quod spectat, *Nidulantur* in summis arborum frondibus. Non temere nec impudenter inter semiscentur, & candem cum corvis in conjugio fidem servant: hinc solitariae cornicis occursum, malum in nuptialibus auspiciis omen: eliminare cornicem virgo jubebatur. *Ova* pariunt post solstitium gemina, natura ita dispensante, ut quæ diu vivunt pauca procreent; *Incubant* feminae tam impense, ut assiduo, in incubitu plumas exuant. Pullos à cauda de ovo exire, seu pedibus primo prævolutis, falsum; cæcos nasci verisimilius est. Non prius pasci quam plumis vestiri incipiant, vulgo creditur. Volandi potentes diu prosequuntur, & avolantes subinde comitantur, ideo iusta naturæ ratione & decreto, quantum tempus impendere in fatibus educandis, tantum & ipsæ senio confectæ, à pullis suis aluntur.

Aphrodis.
1. 2.
Probl.
64.
Oliodor.
Orig. lib.
12. c. 7.
Arist. de
Generat.
1. 4. c. 6.
Arist. H.
A. 1. 6. c. 8.
Isidor.
lib. cap.

Male à solstitio æstivo *habent*, seu quod scapie & lepra afficiantur, seu quod carnes à lupo semefas comedant, *Ætates* ipsi humanas ter tres auctores tribuunt. Aratro *dicuntur*, forte quod diu vivat *dicuntur* namque Theon exponit. Aristophani *quique* generationis virorum vivit. *Vox* ipsius est *vel* *vel*, ob assiduitatem obstreperant cantus, garrula & loquax dicitur. Quamvis vero cas *Homerus* vocet, id est lingua longa & extensa, tamen tempore Plinii allata, è Bætica, plura contexta verba exprimens, & alia atque alia crebro addiscens.

Porphr.
1. 2. c. 10.

Plin. 1. 7.
cap. 48.

Odyss. 1.

Plin. 1.
10. c. 43.

Volatus.

Volat celeriter. *Graditur* lente instante pluvia, celeriter dum pullos pascit.

Affectus.
Arist. H.
A. 1. 9.
cap. 1.
Plin. 1. 10.
cap. 74.
Ælian. de
Anim. 1.
3. cap. 9.
Ingenium.

Amicitias colit, cum Ciconiis quibus maria transvolantibus Ducem se præbet, & cum Ardeola, cum qua contra vulpem pugnat. *Intimica* est, Noctuæ cujus ova merdie absomit; Mustelæ, quod ipsius nidos sæpe diripiat; & cum Tympano ave, quam occidit. *Ingenium* earum & singularem

solertiam multa ostendunt. Si nucem perfringere nequit, in altum sublata ad saxa & tegulas præcipitat. Verbenacæ supinam nidis imponit, ut ab iisdem blattas aliasque bestiolas abigat. Apud Marrem Ægyptiorum Regem educata, literas, quocunque, juberet, detulit. Mortuæ sepulchrum ad lacum Myridis prope Crocodilorum urbem erectum est.

Plin. H.
N. 1. 10.
cap. 12.
Z. rostr.
in Geop.
Ælian. H.
A. lib. 6.
cap. 7.

Quantum ad *Usus* cerebrum coctum & in cibo sumptum inveteratis capitis doloribus remedio esse Plinius testatur. Carnem in morbis chronicis utiliter sumi, nidum corpori illicitum vitæ dies prolongare, olim vane creditum est.

Ufus.

Plin. H.
N. 1. 20.
cap. 6.

CAPUT III.

De Cornice in specie.

ARTICULUS UNICUS.

De Cornice Frugivora, Cinerea, & Cæruleo.

Cornicis tres sunt species. *Frugivora* nempe, *Cinerea* & *Cerulea*. *Frugivoram* Aristoteles vocat, frugilegam & granivoram alii. Nigra est tota, rostro excepto, quod albicat. Magnitudine est inter Corvum & Cornicem media.

Descriptio.

Vicitant ut diximus frugibus, nec tamen lumbricos respuit. Quia Ardea in earum nidis *nidulari* solet, ideo circa villas nobilium, qui Ardearum ancupio delectantur, in summis arboribus impune nidos faciunt. Angliæ sunt maxime infestæ. Ideo olim sancitum est, ut funditus extinguerentur; precium occisori daretur.

Vitruv.

Cinerea Turnero Marina dicitur. Minor est Spermologo. Dorsum totum, collum superius, alarum latera, nates & totum ventrem cinerea habet. *Æstivo* tempore altos montes *incolit*, in quibus soboli propagandæ incumbere, ex eo colligi potest, quod nullibi in planis nidulari reperitur. Sub autumnii finem ad plana descendit, ibique totam post hyemen prope oppida & pagos degit. Fit id ob rupium asperitates, & nives continuas, vel ob intolerabilem frigoris sævitiam. *Vicant* ipsius idem qui nigra. Quadrupedum, hominum suspensorum cadavera & pisces affectat: nec à lacticiiniis abstinet. Gesnerus in dissecto ventre, quasdam quisquilias, & cortices granorum, nec non substantiam quandam albam, pinguem, ex iisdem forte granis concretam & lapillos invenit. Nunquam in Helvetia nidulari dicitur. In inferiore Germaniam cibum à plebecula admittitur.

Ceruleam cornicibus, quamvis vix sciri potest, an ex earum sit numero, Gesnerus, Kentmannus & Aldrovandus annumerant. *Ceruleo* passim colore, in capite, alis,

Aldrov.
lib. 2.
Ornithol.
cap. 5.

D

cauda,

cauda, circa Uropygium & tota parte supina, nitet, alibi sinceriore, alibi viridi admixto. Dorsum & colli proni color fuscus est: majores alarum pennae nigrae. Crura fusca, & pro corporis proportionem parva habet. Reperitur trans Albem in saltu Luchoviano, & sylvis finitimis. Versatur in locis non frequentatis. A projectis, praeter caetera, cadaveribus victitat, & nidum ut upupa ex oleo construit.

CAPUT IV.

De Graculis in genere, & in specie.

Varro l. 4. de Lingualatina.
Quintilia. l. 1. Instit.
Ogar.
Vistur.
Plin. H. N. l. 10. c. 29.
Aelian. l. 3. de Animal. c. 12.
Vox.
Affectus.
Aelian. l. 9. c. 1.

Graculus seu quod gregatim volet, quae etymologia Quintiliano improbat, seu quod jacta segetum semina plurimum gerat, seu quod ex olivetis cubitum sese recipiens binas baccas pedibus, ore vero tertiam ferat, dicitur.

Victitat praeter segetes, carnibus glandibus, & locustis. Unde à Lemmi insula incolis, quod adverso volatu locustarum exitio occurrat, colitur.

Ad coitum verno tempore excitatur.

Vox ipsius est *κρόνκ & κρόκον*, ut Pollux tradit, quorum istud & Gallinaceo quodam generi tribuitur. Amicitiam cum Gavia gerit, hospitalitatem cum Accipitrè. Hoc Homerus sub Hectoris & Aeneae Graecis infensissimorum exemplo prodidit. Avem congregem esse, vel vulgaris parèmia, semper graculus affidet graculo ostendit. Mas mortem potius subit, quam conjugem derelinquat, coitus mortuo, alter dolorem perpetua viduitate testatur.

Loquacissimi sunt, coitus inprimis, & quopullos enutrient, tempore. In vini potumira ipsis lascivia. Manibus retenti, oculos impetere maxime solent, seu quod effigiem suam in illis cernentes, velut ad cognita desideria tendant, seu quod à rebus fulgentibus & mobilibus quales oculi, facillime alliciantur. Cicures voces pronuntiare discunt adeo, ut è caveis emissi sponte sua eas repetant. Matutino, vero suboriente sole tempore, citius eas capiunt, & memoriae tenacius mandant. Suetum id & veteribus. Paxillos enim in parietibus domi suae, quibus insisterent faciebant. Epileptico morbo obnoxii, velut extincti ex arborum, tectorumque culminibus decidunt. Annuum fastidium lauri purgant folio.

Nicolaus Leonicius.

Bruter. l. 15. c. 78. de rectibaria.

Aristoph. in vespis.

Dalech. in Plin. l. 3. c. 22.

Ufus.

Generatio. Arist. H. A. l. 9. c. 24.

Ufus ipsorum apud plurimos in cibis. Quantum ad genera, tria Aristoteles posuit, quartum palmipes, tria & Gesnerus, Tullam nempe Becuam, & Taham. Nos Coraciam, Pyrrhocoracem, & Lupum seu Monedulam ponimus.

CORACIA magnitudinem habet cornicis, illa inprimis, quae nigra & pamphaga. Rostrum quatuor fere digitos longum,

quodammodo arcuatum, coloris puniceo, seu inter aurantium, rubrum & subflavum medii. Pedes ejusdem coloris, unguibus exceptis, qui simul cum toto corpore sunt nigerrimi. Incolit praeruptos montes, & raro ad plana descendit. Cicur simila ex lacte, carne, pane, & tritico vescitur.

Pyrrhocorax Cornice est minor, Monedula aequalis, luteis cruribus & rostro, quod parvum Turnerus, in extremitate nonnihil aduncum. Bellonius dixit, caetera nigerrimis. Tam frequens est in Alpibus ut peculiarem Alpium Plinius scribat, sed & in Anglia, Creta, Cycladibus monte Jura & alibi reperitur. Apud Rhetos hyeme duntaxat cernitur. Agros frumento confertos depascitur. Altum vociferat, & vocem Merularum acutam, ac ad fistulae sonum nonnihil accedentem imitatur. Ex ejus volatu alto frigus augeri, humili minui quidam colligunt. Pulli in cibum pauperioribus mensis cedunt.

MONEDULA, Aristoteli *κρόνκ* omnibus nota avis est. Caput, pedes, totumque corpus & rostrum nigra sunt. Nigredo de cinereo aliquid participat, rostrum circa narium foramina albicantibus punctulis insignitur, prope ventriculum gulam pro ingluvie patentiore habet. Loca plana amant, sed & in altissimis turribus saepe tam numerose nidificant, ut in una centum interdum nidi conspiciantur. Quia frumenti aliorumque granorum, ubi satiata fuerit reliquias terra recondit, & spicas subsequenti anno ex iis colligit, ideo frumentum ferendi rationem hominibus ostendisse creditur. Auri & argenti furacitas in eamira. Unde Monedula à moneta dicta creditur. Gaudet in capite fricari, quasi pruriret, ideo carnem ejus pruritum inducere Albertus credidit.

Est & aliud Monedulae genus, quod collum habet albo torque circumdatum, forte illud quod Hesychius & Phavorinus *κρόνκ* seu coronatum dixere, forte & illud, quod in Helvetia circa Tugium albo circulo collum ambiente distinctum, caetera alteri simillimum, reperiri, Gesnerus prodidit.

CAPUT V.

De Ficis in genere.

Picai, quae Atticis *αἰῖα* communiter *αἰῖα*, Laconibus *αἰῖα*, Hesychio & Phavorino *αἰῖα*, & *αἰῖα*, aliis *αἰῖα*, *αἰῖα*, & *αἰῖα* dicitur.

Genus ipsarum unicum duntaxat agnovisse Aristoteles videtur. Alii in urbanas & sylvestres dividunt. In nulla non regione obvix sunt. Glandaria in Batavia rara.

Victum si attendas, est pamphaga. Suum alveos quandoque cibi causa petit, & quosvis acrodryos fructus. Vifa passerem devorasse;

Plin. H. N. l. 10. c. 48.

Bellon. l. 8. c. 6.

Arist. H. A. l. 9. c. 24.

Plin. H. N. l. 14. c. 17. Ovid. l. 7. Metamor.

Genus.

Vistur.

Cardan.
17. c. 35.
de variet.
rer.

vorasse, sed & una, à cancro, quem è flu-
vio abreptum in arborem vicinam porta-
verat, collo sub forcipibus compresso, mi-
fere interempta legitur. In libidinem val-
desunt proclives.

Generatio.

Ova circiter novem parere; multos sed
imperfectos imo cæcos pullos excludere
Aristoteles prodidit. In nidis constru-
endis singulari utuntur artificio. Nam cum
in locis spinosis figunt, terra intus obli-
nunt, foris in circuitu, infra & supra spinis
diligentissime muniunt, foramen unum
(duo quibusdam placent) idque arctissi-
mum pro introitu relinquunt. Ova verò
interdum alio transferunt. Binos frequen-
ter extruere; ut qui pullis insidiantur du-
bios reddant, prodidere nonnulli.

Arist. H.
A. l. 9.
cap. 13.

Volatus ipsis raro altus, quem etiam ala-
rum brevitate impeditæ parum protrahunt.
Saliunt, & caudam more Metallicæ

Onomast.
15. c. 13.

perpetuo moverit. Pollux
scribit; sed singulis fere diebus imò ho-
ris, vocem mutare, & unius cujusque ani-
mantis imitari, certum. Puerili vagitum
expressisse quandam, alteram hæc di pri-
mum veluti à matre separati querulam vo-
cem edisse, mox vituli instar mugisse, ovis
more balasse, tandem ad instar pastoris,
cum post pascua oves ad potum deducit,
sibilasse, fidè digni authores prodidere.

Paula-
nias in
Arcadic.

Plut. l. de
solert. a-
nimaliū.

Aliquid illi apud Plutarchum ne subfuerit
metuo, quæ alioquin loquacissima, auditis
Romæ buccinatoribus obstupuit, pau-
cos post dies quasi expergefacta, omnem
eam buccinatorum harmoniam summa
cum admiratione expressit.

Affectus.
Arist. H.
A. l. 8.
cap. 3.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 29.
Ufus.

Infestantur ab Alucone & ulula. Epilep-
tico eas corripit morbo quidam prodidere.
Variæ quotannis cum rapæ feruntur: cal-
vescere, proprium. In Augusto id fieri Ge-
snerus prodidit.

Ufus ipsarum & in cibis & in Medicina ali-
quis. Glandariæ Bononiæ in foro vendun-
tur, sed duræ carnis sunt; Athenæus tamen
Corhyin Thracum Regem apposuisse te-
statur. Quidam seu vino albo ad consum-
tionem coctas, seu in ollatoftas, & in pol-
linem redactas, seu distillatas, oculorum
hebetudini, rubori, & dolori prodesse, pro-
didere. Nonnulli vivam in partes disse-
ctam, laborantibus articulis imponunt.

CAPUT VI.

De Picis in specie.

ARTICULUS I.

De Pica varia seu Caudata, Caudata Indica,
Glandaria, Garrulo Argentoratensi, Pica
Marina, & Persica.

Aristoteles unicum duntaxat genus
Picarum, glandarium nempe ponit.

Plinius id duplex, sumpta à pedibus diffe-
rentia, facit, nec de vario reticet. Nos & has,
& quæ sequuntur, huc pertinere credimus.

Variæ seu Caudatæ caput dorsum, col-
lum, pectus, alæ femora, cauda, pedes
eorumque; digiti atque ungues aterrima,
extremum alarum albicans, dorsum & cau-
da & maxima nigredine viridescendentia,
tota ventris superficies candida.

Caudata Indica quam Aldrovandus exhi-
bet, ex Japonia allata erat. Rostrum, tibie
& pedes rubescebant. Caput totum & col-
lum, quod torquis albus ambit, erant cæ-
rulea, dorsum & scapulæ ferruginea. A su-
periore rostri parte inter utrumque ocu-
lum macula tres fere digitos longa, &
pollicem lata punctulis seu potius lineolis
nigris transversalibus conspersa ad dorsum
usque protendebatur. Alarum pennæ ve-
stitrices castaneæ, sed lineis nigris crassius-
culis per longitudinem positis resparge-
bantur, reliquæ virides erant. Pectus & ven-
ter ad anum usque candescebant, &c.

Glandaria, Aristoteli seu
Molliceps, recentioribus Græcis
aliis Picata Granata dicitur. Differt
à varia, tum magnitudine, tum maxime
colore. Habet ad alarum latera transver-
sales notas cæruleas, quales in nullo fer-
me volucrum genere conspicias; tam am-
plum oris hiatum, ut glandes integras de-
glutiat. Nares plumis albis & nigris operi-
untur. Rostrum aliquantulum recurvatur,
lingua bifida est. Color corporis varius est.
Nam cervix ex rufo & cæsis mixta est.
Uropygium candicat, dorsum pallescit.
Cauda longiuscula est; & duodecim pen-
nis nigris constat.

GARRULUS Argentoratensis à garritu,
& loco in quo maxime degere solet, no-
men sortitus est, veteribus vel ignotus,
vel saltem non descriptus. Caput ipsi cras-
sum colore ex cæruleo & viridi mixto, ma-
culis per longitudinem albis, quæ per to-
tum pectus ventremque deorsum ferun-
tur. Rostrum mari duos digitos longum, cras-
siusculum, aliquantulum recurvum. Oculi
magni, nigri, Dorsum à secunda, vel ter-
tia vertebra ad Uropygium usque casta-
neum. Alarum color varius. Cauda superna
parte virescit; inferna partim violaceo, par-
tim cæruleo permiscetur. Femina toto coe-
lo à mari diversa est. Caput, collum, pectus, ven-
ter ex castaneo ad Leucophæum vergunt.
Rostrum est crassius. Alæ prope scapulæ cæ-
ruleæ; mox ex cæruleo virides, remiges
nigræ. Cauda latiuscula, ex viridi & cæru-
leo ad fuscum inclinans.

PICA MARINA, quæ & Gaza dicitur,
tota, caput, cervicem, pedes, & alarum par-
tem si excipias, subviridis apparet. Ro-
strum habet robustum, paulo quam in Pi-
cis longius. Capitis verticem coloris castanei
diluti,

diluti, inferiorem ejus partem ad temporaleam. *Digitos longos*, pedes insigniter aduncos, secundi ordinis alarum pennas ex castaneo dilutas.

PICA PERSICA, tota fere subfusca est, rostrum habet breviusculum & albicans. Oculos albos. Alarum secundi ordinis pennas, cum Uropygio, & prioribus in cauda luteas, pedes subcæruleos, tabellis nigris insignes.

NB. De *Picarum generibus quibusdam exoticis vide Mantissam. Num. 5.*

ARTICULUS II.

De Garrulo Bohemico, Gesneri, seu Ampelide Aldrovandi.

Descrip-
tio.

Aldrov.
l. 12. Ornith. c. 18.

AVem, quæ Garrulus Bohemicus Gesnero dicitur, Ampelidem, à potiori victu, Aldrovandus appellat. Magnitudine Merulas exæquat. *Caput* habet quodammodo compressum, coloris ferruginei, more alaudæ cristatæ apice retro vergente, coloris versus rostrum sub castanei diluti, retro subcinerei ad fuscum vergentis, terræ Umbriæ haud dissimilis, insignitum. *Collum* breviusculum, antica & postica parte nigrum, ad latera rufum, prope rostrum candidum. *Pectus* castaneum dilutum ad rosum vergens. *Dorsum* subcastaneum, prope Uropygium leucophæum. *Ventrem* totum subcinereum. Exteriores alarum pennas nigras maculis spectatu jucundissimis insignitas. Nam primæ numero septem solidæ & quodammodo cartilagineæ albæ sunt, appendices cinnabaris instar rubescunt, has aliæ maculis luteis perornatæ, literam L. figura experimentes subsequuntur, sicque dispositæ sunt, ut in quibusdam septem, in aliis sex, in quibusdam quinque tantum appareant. Ultimæ maculas albas habent. Cauda maris decem, fæmellæ duodecim pennis constat. *Interiora* si spectes, ex Anatome habeto. *Intestina* in dissecta duos do-drantes longa fuisse, absque revolutionibus & anfractibus, ideo celerius fæces exercebat. *Ventriculum* in medio epatis duro callo obductum; tunicam in eo substantiæ diversæ, utæ quoad colorem non dissimilem, durissimam & quasi cartilagineam; *Tecur* in duas partes æque divisum, pro sua magnitudine maximum. *Lienem* exiguum, linguæ humanæ figura, oblongiusculum: *Pericardium* duplicatum, & veluti pinguedini mersum: *Pulmones* qui in omni fere avium genere ad medias usque costas protenduntur, colli & dorsi vertebrae & costarum duntaxat superiorum principiis adherentes, *asperam arteriam* in principio laxiorem & ovalem, mox angustior, tandem latior iterum: *Linguam* duram & osseam, & in

extremo, ubi velut alas quasdam habere & sagittam præ se ferre videtur, bifidam, & quasi in duas aciculas divisam. *Os hyoides*, quod reliquis animantibus pro implantatione linguæ datum est, ab osse occipitis ad latera foraminis, per quod spinalis medulla à capite ad dorsum transmittitur, originem suam deducere, & ubi ad radicem linguæ conjungitur, acutissimum angulum efformare videbatur. Ejus medio asperæ arteriæ caput insertum erat. *Oculi* intus adeo magni, ut cerebri ipsius magnitudinem superare viderentur. *Cerebrum* sphericum referebat figuram, superiores ipsius ventriculi ad mediam regionem capitis collocabantur.

Locum si attendas, Bohemiæ quidem peculiaris est, sed migratoria eadem. In Italiam delatæ, in Placentino & Mutinensi agro, ubi XL. simul capiebantur, morabantur, in Ferrariensi, nullæ viscebantur, forte quod terræ motum ibi futurum præsensissent. Anno 1552. inter Moguntiam & Bingham, in tanta copia apparuere, ut, qua transvolarent, ex earum umbra, veluti nox induceretur.

Victus ipsis uvæ, ligustri, juniperi, Cy-norrhodæ baccæ, pinæ nuclei, uvæ passæ, poma, amygdala. Baccas hederæ, carnem, & frumentum nonnisi famelicæ attingunt. *Volant* perniciosissime & gregatim.

Vox earum erat ziziri, unde forte zinzivellæ quibusdam dicuntur. Facile cicurantur.

Cibum sibi invicem offerunt, mas foeminae, foemina mari. *Caro* saporis est in cibo gratissimi. Nec ergo vere esse Pica videtur, quamvis jam, quia de genere non constat, inter eas reposita sit; quia linguam latam non habet, nec incendiaria Plinii, quia nec in incendiis nascitur, nec carbones apportare visa est, nec avis *Hereynia* Plinii, quia ei noctu lucere non competit, ut in Voilandia sylvis, quædam Turdi minoris magnitudine, colore partim cæruleo, partim aureo, quam croceo, talis esse dicatur, Nec avis *Nova* Plinii, quia columbo minor est. Nec denique *Merops Aristotelis*, qui nec apibus insidiatur, nec vermibus vescitur.

ARTICULUS III.

De Pica Brasiliæ & Rhinocerote ave.

PIca Brasiliæ, aliis à rostri magnitudine Ramphastos, Hipporynchos, & Burynchos, aliis Barbara & Piperivora dicitur. Magnitudo ipsi inter Picam & Merulam media. *Caput* pro corpore majusculum & crassiusculum & atrum. *Rostrum* duos palmas longum, unum latum, serratum, & velut è squammulis quibusdam compactum, substan-

substantiæ ad instar membranæ tenuissimæ, ossæ, splendida, levissimæ, cavæ, atque aëris intus capacissimæ, unde Naribus carere crediderim. *Oculi* in medio capite, illique majusculi. *Collum*, *Dorsum*, atque alæ nigræ. *Pectus* aureo colore cum quadam rubedine prope initium micans. *Venter* & fœmora cinnabarino colore vestita. *Cauda* nigra, & in extremitate insigniter rubescens.

Vivitat pipere, quod avidissime devoratum, inconcoctum & crudum adhuc ejicit. Incolæ, vim ea ratione piperis domitam credentes, recenti illud præferunt.

RHINOCEROS à cornu, quod in fronte gestat, ita dicitur. Occisa in ipso volatu esse dicitur, cum Turcas Christiani ad Naupactum superarent. Caput erat duorum propemodum dodrantum, cirrhis nigris, altis, deorsum spectantibus ornatum. Rostrum quatuor fere dodrantes longum, instar arcus cujuspiam recurvum. Inferior pars tota ex luteo albicabat; supina versus caput colore miniaceo, reliquum ex luteo, albescat. Cornu è fronte enascebatur, & supinæ rostri parti adhærebat, prope frontem palmum unum latum, in fine recurvum, colore supra & infera parte miniaceo, media luteo, &c. Fit talium Avium apud veteros mentio. Nam & Hesychius Rhinocerotem avem in Æthiopia reperiri scribit; & *Tragopanda* Plinii, Aquila major, capite phæniceo, cornibus in temporibus insignitur; & *Tragopa* Golini in capite arietinis cornibus armatur; & Pomponius Mela ejusmodi aves *Tragopemanas* appellat. Et Cardanus avis meminit Aquila majoris, ex luteo & rubro splendida, ex cujus rostro fulvo cæruleoque capuli parentur.

Scalig.
Exerci.
231. f. 3.

C A P U T VII.

De Loxia.

Descriptio.

LOXIA seu corvi rostra, Trogon Plinii Roberto Constantino esse, videtur; ignota sine dubio Aristoteli. Magnitudine parum maximum vincit. Rostrum habet contra omnium avium morem ab utraque parte recurvum, crassum, & admodum robustum. Unde ipsi nomen est. Colorem singulis annis hyeme inprimis, mutat, ita ut nunc ad viridem, flavum, nunc ad rubrum & cinereum vergat. Rbere primum solet pectore, collo, & ventre, deinde flavescere. In vertice, cervice, & circa oculos cæruleus apparet; in cauda & extremis alis nigricans, crura rubicunda.

Locut.

Plurima Germaniæ loca incolit, in Italia rarius videtur.

Vitum.

Vivitat seminibus cannabis, nucleis abietum, & ut quidam produnt, cadaveribus. Voracissima autem est.

Generatio.

Nidificat in abietibus, & verisimile est à

cauda de ovo exire, seu quod, si reliquarum more prodiret, exitus à rostri curvitate impediretur; seu quod, cum media hyeme nascatur, subinde ab ambientis inclementia, calor animalis suffocaretur. Hyemali tempore *cantat*, & quidem suaviter, in æstate abstinet. Caveis inclusa Psittacorum more sursum atque deorsum reptat. A potu pocillum rostro si potest abjicit imaginem forte suam in aqua conspicata.

TITULUS VII.

De Noctuis.

CAPUT I.

De Bubo.

ABSOLUTA Avium diurnarum Carnivorarum historia, ad Nocturnas deflectendum est. Hæ vero ob cæcios oculos *γλαυκῶνες*, dicuntur, & magnitudine inter se differunt. Oculos magnos amplos & cæcios habent. Non solum in tenebricosis montium & rupium cavernis, sed & in cavis arboribus, desertis ædificiis, domorum, templorum, & turrium tectis latent. Inter duo denique crepuscula, (de nocte parum aut nihil vident, de die excedens sensibile sensum lædit) lacertas, scarabæos, apes, vespas, mures, hirundines, interdum lepusculos, & cuniculos rapiunt. Numerantur autem inter rapaces nocturnas. *Bubo*, *Asio* *siue Otus*, *Scops*, *Aluco*, *Ulula*, *Noctua*, *Strix*, *Caprimulgus*.

Aldrov.
l. 8. c. 1.

BUBO, qui Græcis *βουβων*, *βουβων*, *καλὸν*, *βουβων*; Goropio Becano, cum Aristotelis Cyminde, Chalcide, Hubride, & Ptynge, idem: Aristoteli forte Ascalaphos, omnium nocturnarum est maximus, nec Aquila minor. *Corpus* ipsi breve, & propter caudæ brevitate veluti decurtatum. Corporis tegmen plumeum ferrugineo seu obscuro quodam æris colore est. Maculis nigris sparsim & incerto ordine respergitur. *Caput* habet, adeo grande, ut ob ejus magnitudinem pulvis à cauda primum in lucem prodire credatur; frontein orbiculatam seu teretem, plumis velut auribus eminentibus in regionibus prout in Oto, insignitam. Cavernas ad auditum patulas, hocce pennarum ornamento ob magnitudinem tectas. Oculos maximos, & qui igneo splendore, ingenti magnitudine, & truci obtutu, terrorem spectantibus incutiunt. *Rostrum* aduncum; *Collum* pro sua magnitudine perbreve; *Ungues* Aquilinis majores; crura brevia. Cujus Gesnerus iconem exhibet, magnitudine Anserem vincebat. Alas habebat ad tres dodrantes longas. Caput magnitudine & forma felinum. Pennæ supra utramque aurem nigricante, & tres digitos subrigebantur, Cujus Aldrovandus, in multis ab illo

Arist. H.
A. l. 9.
cap. 34.

Arist. H.
A. l. 8.
cap. 3.
Strabo
Georg.
lib. 17.

Plin. H.
N. lib.
10. c. 16.

Gesnerus
in Ornith.

Aldrovandus
Ornit. lib.
8. cap. 2.

differebat. Nam huic quidem etiam ad extremos usque digitos crura; sed breviora, graciliora, nec ita supragenu torosa. Color ei erat per totum corpus ex cinereo ferrugineus, in postore potissimum, ubi etiam subnigris maculis per longum ductis, promiscue respersus erat. Dorsum & alae è ferrugineo magis successebant. Et cum ille Gesneri in singulis totius corporis plumis magis variegatus, & tenuibus quibusdam lineolis, transversim ductis Accipitrum & Anatum instar, minatim distinctus fuerit: & universo corpore magis vero dorso & capite, maculas quasdam incerti ductus, lituris nigris, crassis, & quodammodo figuratis gesserit: hic in alarum pennis majoribus, & cauda, lineis subnigris, transversis, largiusculis, distinguebatur; quae ita efformatae in cauda praesertim fuere, ut singulae latiores superne & inferne instar fimbriarum triplici ordine dispositae, aliis subtilioribus, clauderentur.

Locust.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 12.

Ovidius
in Epist.

Locum si spectes deserta incolit, nec tantum desolata, sed dira etiam & inaccessa. Inter sepulchra etiam diu noctuque versatur; aliquando propter mures, & juxta horrea reperitur. Coetum aliarum avium fugit. Hinc solicana & devia vocitatur. Nidulatur in altissimis rupibus, ne foetum injuriis exponat, & ut secutius ad praedam evagetur. Ovum ejus Plinii tempore vix visum est, nostris non adeo rarum.

Plin. H.
N. l. 29.
cap. 4.
Cibus.
Arist. H.
A. l. 8.
cap. 8.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 12.

Cibus ipsi carnes avicularum, cuniculorum, & leporum. Tantum praedae, dum pullos educat congerit, ut & venatoribus satis lucri adferat. Templi noctu frequentare, ut se oleo ex lampadibus ingurgitet, vix credi potest. Noctu autem victum quaerit, & sublustri crepero gaudet in vespere. Unde Nocticanica, & noctis monstrum vacatur. Si diuturno tempore prodeat, ab aliis avibus seu visu insolens, convellitur. Roboris est magni. Visus & feroces canes abegisse, & cum Aquila depugnasse. Si se viribus imparem sentit, in dorsum supinus procumbit, unguesque ac rostrum sic adversum erigit, ut hostium nullus accedere audeat.

Volatus.
Ovid. l. 5.
Metam.
Plin. lib.
10. c. 12.
Plin. l. c.

Quantum ad *volatum* vix movet natus per inertia brachia pennas, nunquam volat quo libuit, sed transversus. Hebetes ipsi interdum oculi, minus tum quam Noctua vidit. Non cantu aliquo, sed gemitu vocalis est, & bubulare, quod Grecis est *βιβν* dicitur.

Ufus.

Ufus ejus est, tum in *Ancupio*. Nam & aviculae dum eam interdum circumvolant, & percutiunt, facillime retibus capiuntur; & Galli ejusdem opera, Milvos venantur: tum in *cibo*. A quibusdam enim editur: tum in *Medicina*. Cerebrum vulnera cum adipe anserino glutinat; cum aphronitro scabiem sedat. Sanguis asthmaticis est u-

Fe'lon.
lib. 2. de
Avibus
cap. 28.

tilis. Cor ejus, si impositum mammae mulieris dormientis sinistrae fuerit, ut omnia secreta pronunciet; si axillae, ut canes obmutescant, efficere; sed falso tradunt. Creditur Agrippae Romae captivo, primo regnum cum libertate, post mortem portendisse; Chingis Canum ab hostibus victum, quasi servasse, ideo à Tartaris honorari, serenitatem denique si totam noctem cecinerit, portendere.

Plin. H.
N. l. 20.
cap. 4.

Joseph.
lib. 8.
Antiq.
cap. 8.

CAPUT II.

De Asione seu Oto.

ASio seu Otus forte ab auribus, qui Alexandro Myndio apud Athenarum Lagotia, quod aures leporinas habeat, aliis apud Aristotelem *Nyctiorax*; quia Buboni per omnia, magnitudinem si excipias (magnitudine columbae esse scripsit Athenaeus, quod de maximis intelligendum,) est similis ternos quoque digitos habet anticos, posticum unum (male noctuae similem Plinius dicit, male & Gaza *visulina* per Asionem apud Aristotelem vertit; & Oppianus, cum Athenaeo Otum cum Otide confundit) Bubonem sequitur. Aldrovandus binos describit. Priori *caput* erat auribus velut cornibus plumis insignitum, cinereo baticeo diluto & nigro ad supercilia usque & nares propemodum colore varium. *Facies* tota anterior, è cinereo candicabat, minutissimis plumulis veluti pilis tota obsita. *Corpus* totum è cinereo seu leucophaeo ad ferrugineum dilutum vergebat, maculis ubique fuscis conspersum, tam majusculis, quam punctorum instar minutissimis. Per *ventrem* notae fuscae in longum recta ducebantur, & in acumen desinebant, &c.

Desert.
p. 10.

Athen. l.
Dipnol.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 13.
Oppianus
in Cyneg.
Athen.
lib. 9.
Aldrovandus
Ornit. l.
8. cap. 3.

Alterum semipalmum in longitudine minus, Fulvum Aldrovandus appellat. Toto propemodum anteriori corpore maculas fuscas, in longum protensas, & singulis plumis albicantibus decus datas, ut crucis aut lillii Francici referrent figuram, habebat. *Crura* & pedes ad unguem usque hirsuti, uti totum corpus, flavesciebant. *Cauda* infra alarum longitudinem, uno fere digito erat. Describit & Bellonius tertium, auribus patulis, cruribus ad unguem pilosis, facie Aluconi simili, ventre maculis nigris variegato. Cauda alarum longitudinem aequante, ulula multo majorem, qui vel superiori est similis vel Aristoteli in cognitus & Arvernus in Gallia montibus peculiaris species, dicendus. Cranii Anatomen vide in Aldrovando. Auris & oculi hisce verbis idem exequitur. Avi huic supra aures cutis in longum prodicatur complicata, rugosa, sponte concidens, & meatum eo loco occludens, instar membranarum, quae tamen in amplissimum, si voles, ambitum de-

Bellon.
l. 8. cap. 2.

deduxeris. Sunt enim laxæ, implumes in-
tus, candidæ, foris vero minutissimis &
pulchellis plumulis confitæ, & que orbem
venustum in marginum ambitu constitu-
unt. Non alteri rei magis appositæ, hæc
cutaneas valvas, quam branchiis piscium
compararim. His apertis, auditus fora-
men amplum ac patulum in medio appa-
ret, multis anfractibus instar humani tor-
tuosum. Oculi inventus fuit substantia
quadam cartilaginea, velut capsula cir-
cumclusus, non tamen undique. Nam in-
fra in parte oculi posteriori haudquaquam
membrana hæc substernebatur, sed cir-
cumquaque ad latera, à qua circulus supra
totum oculum exporrigebatur, ante qui-
dem hæc membrana angusta erat, intra ve-
ro & qua magis ad posteriora vergebat, di-
latata. Oculi ipse ante orbicularis erat
retro sessilis, & compressus, longe quam vel
in medio latior. Refecta cornea uveam ab
illa intus plurimo nigrore tinctam & veluti
atramento perfusam, quippe quæ etiam
humores subiectos digitis contrectata rin-
geret, observavi. Huic in orbem alia tenuis-
sima pellicula instar annuli circumpone-
batur, crocea, seu aurea per totam substan-
tiam, ita uveæ conata, ut nullo modo in-
tegra ab ea secerni posset. Hujusmodi sa-
ne nullam, quod equidem sciam, in aliis
animantibus reperiri puto. Dux igitur hæ
membranz coloribus diversis tinctæ, & per
corneam transparentes, horrendum illum
nocturnarum avium oblutum faciunt, con-
currentibus simul è nigro & croceo exad-
verso radiis & velut flammæ è filice excus-
sæ micantibus. Humor crystallinus mini-
me durus aut soliduserat, qualem in Aquil-
is & aliis observavimus, sed tener & molli-
culus, utpote qui facillime vel sua sponte
dissolutus refecta cornea simul cum aqueo
humore efflueret.

Locus.

Locum si attendas, montes plerumque in-
habitat, locaque edita. In montibus Ar-
vernæ copiosi inveniuntur, & in Italia in
monte Plumbicio passim sunt obvii. In
Ciliciæ campis de die inter Ambrosiæ
plantas abditum Bellonius invenit, cum
tamen eo loci, ne ad quartum quidem mil-
liare, arborem ullam nascentem videre li-
ceat. Nidulatur in arborum cavernis, &
foraminibus Aristoteli & Plinio migratorius
est. Nam cum Lingulaca, matrice, & Cyn-
chramo, Coturnicibus hinc proficiscenti-
bus ducem esse scribunt.

Arist. H.
A. 1. 8. c.
12.
Plin. H.
N. 1. 10.
c. 23.
Volatus &
Vox.

Levi facillique volatu fertur. Vocem edit
ei similem, qua homo frigore affectus re-
clamare solet hu, hu. Repetit eam solis
occasu instante, aliquanto intervallo in-
terposito, sonoram, tanquam si fistula te-
nui ederetur. Cum à quopiam laceffitur,
sibulum aut crepitum emittit, qualem felis
solet. In pugna eadem ratione se defendit

ac Bubo. Aristoteli, seu
quod instar mimorum ac parasitorum
collum contorquendo nunc in hanc,
nunc in illam partem ridiculos & mimicos
gestus edat, seu quod imitatione gaudeat:
Quicquid facientem aucupem cernit,
idem quoque agit. Stant illi è regione, &
viscoso quodam Pharmaco oculos inun-
gunt, illud post in pelvibus relinquunt &
abeunt. Accedit Otus & oculis sibi con-
glutinat, sicque capitur. Aristoteles eum
in altero aucupe intentum, ab altero circum
veniri reliquit. Magi recenti Asionis felle
glaucomata curari dicunt.

Arist. H.
A. 1. 8. c.
12.

Athen. 1.
9.
Dipnoso.

Arist. H.
A. 1. 8. c.
12.
Athen. 1.
c.

N.B. Est & genus exoticum Oti, de quo vide
in Mantissa. Num. 2.

CAPUT III.

De Scops.

Scops, Alexandro Myndio absques a-
Spud Latinos nondum invenit nomen,
quamvis Bellonius Ululam ex ipso faciat.
Græcis vel à voce inepta, vel quod
habeat inter, seu noctu maxime cer-
nat, vel quod varietate gesticulationum,
quibus naturaliter utuntur homines,
id est, qui alios deludere solent, re-
ferat, sic dicitur. Habet fere cum omni-
bus nocturnis aliquid commune. Cum Bu-
bonibus & Otis, quod auritus sit. Cum
Ululis & Alucone, quod pedes utrinque in
æquum digitorum numerum dispersitos
habeat. Cum Noctuis, quod pedum com-
positione, figura, colore denique & ma-
gnitudine, his quam aliis propior sit. Ab
Athenæo & Eliano ita depingitur, ut mi-
nor Noctua esse, in colore plumbeo albi-
cantia puncta habere, & ab utrisque tem-
poribus duas pinnas subrigere, dicatur.

Athen. 1.
9.
Dipnoso.
Bellon. 1.
2. de A-
vibus c.
35.
Eustat. in
Odyss. 5.

Duplex apud veteres ipsorum genus. Alii
sunt vocales, qui omnibus temporibus pa-
tent, ideo dicuntur, glauci sunt
ac esui propter vitium carnis inepti. Alii
muti qui autumnus interdum apparent, nec
plus uno vel altero die commorantur, Sco-
pes absolute dicuntur, & ab Aëscopibus
crassitie differunt, turturi & palumbo si-
miles. Tot & apud Neotericos differen-
tiæ. Una Italiæ frequens, quam isti Chiu-
vino vocant. Altera huic apud Germanos
similis, paulo albidior, cauda & auriculis
longioribus. Illa prout ab Aldrovando
describitur, noctua est minor, palumbo
par, omnium fere nocturnarum minima,
illam si excipias, quæ Alaudam non supe-
rat, & rara est. Caput ei teres plumulis co-
loris ubique plumbei vestitum. Aurium
plumulæ una tantum pinnula constabant,
quæ in mortuo vix appareat. Torius cor-
poris superficie tenus color cinereus est,
hinc inde nonnihil admixto, plumbeo,
macu-

Genera-
tio.
Athen. 1.
9.
Dipnoso.
ex Calli-
macho.

maculis albicantibus distinctus. Majores alarum & caudæ pennas; maculæ albæ, transversim ornant; minores reliquas omnes etiam lineæ in longum nigra secant. Circa collum & alarum initium ruffo decore promiscue respergitur. *Pedes* habet exiguos fuscios, ad plumbi colorem abscurum accedentes, squammosos, depiles, in digitos binos anticos, & totidem posticos dispartitos, unguibus fuscis instructos.

De Generatione ipsius nihil exploratum esse scribit Aristoteles, nisi quod Favoniis flatibus appareant. Plinius amplius nasci negat, forte quod ipsorum satyricos motus, cum insident, plerisque memoratos concipere mente non possit.

De Voce superius dictum est. Quod ei ex Athenæo potius quam Æliano à Gyllio applicatur, *πάλιν γὰρ αὐτὸν ἔκρινεν ὡς ἀνθρώπου*, quasi omnes oris expressione & articulata voce longe superet; ad aves, quarum lingua latiuscula pertinet. Ridiculos sæpe exercent gestus. Cum enim colla retro agilia habeant, caput modo adducendo, modo protendendo, vertice nutando, humeros, jactando, & saltitando, histriones imitantur. Unde Scops saltationis apud antiquos genus, quod & Scopiam nominabant, *ἡ σκὸς τῆς ἀνθρώπου*. Habebant quandam colli circumvolutionem ad avium imitationem. Periri mali Punici grano, Gyllius in Æliano addit.

CAPUT VI.

De Alucone & Ulula.

ALUCONIS, qui Græcis *ἀλὺκων*, non *ἀλὺκος* nec *ἀλὺς*, nomen, vel ab Itolorum Alochone Gaza formavit; vel à Germanorum, ut Lazijs vult, locken, quod allicere significat, desumptum est. Duo ipsorum sunt genera. Unum majus, alterum minus.

Majus Caponis est magnitudine, hoc peculiare habet, ut palpebram à summo oculo ad imum ad ducens, conniveat. *Auriculis* caret; sed eorum loco coronam quandam è plumis constructam, quæ faciem totam, pinnulis supra oculos superciliorum altorum modo, elevatis, & utrinque per tempora nec non sub mentum descendendo in orbem coeuntibus, flammei muliebris forma, habet. *Rostrum* ipsi album. *Oculi* cavitatem profundam, à plumulis undique surrectis constitutam, magni, & toti atrii immerguntur. *Dorsum* coloris est plumbei, notulis albidis variegatum. *Crura* plumis candidis conteguntur, *pedes* duntaxat pilis. *Incolit* tam laco campestris, quam saxa prærupta, rimas turrium, & cavernas quercuum. Muribus & aviculis & inter has picis

visitat. Quod forte animalculum cœpit, deglutit, integrum. Tam ampla enim ei gula, ut bolos ovo majores integros transmittat: neque quicquam cibi sumit antequam ossa, pilos, & plumas rejecerit. Transversim, Ardearum more inter volandum fertur.

Minus simili cum majore maculorum diversitate variegatur; domesticam columbam magnitudine non excedit. Vertex capitis, collum, dorsum, alæ ad pennas remiges usque plumis vestiuntur ab initio prope radicem cinereis obscuræ; reliqua ferruginies dilutis. Anterior capitis pars, plumulis candidis informam flammei cincta videtur, quas circulus luteus undique ambiens claudit. *Oculi* nigerrimi versus interiorem canthum plumeis luteis obsidentur.

Tibiae & pedes villis horrentes nonnihil rubent, binis ante & totidem retro digitis instructi. *Unguibus* armatur longis, validis, acutissimis, & aterrimis.

Vocem noctu edit adeo terribilem, ut pueris & foeminis terrorem incutiat. Rarior multo conspectu est, quam major. *Ulula flammeata* Gesneri eadem cum Alucone.

ULULA, Græcis *ὀυλὺλα*, & *ὀυλὺλὸς* dicitur. Quæ à Gesnero describitur, magnitudine erat Gallinæ, vel supra, colore ruffa, vel nigro respersa. *Rostrum* breve & aduncum albicabat. *Oculos* habebat magnos nigros, pupillam obscure ruffam, pinnulas inter oculos & rostrum multas, densas, cinerei fere coloris, margines palpebrarum rubicundi, membrana niçtanti superne abducebantur. *Collum* erat multum retro agile. *Crura* albicantia punctis conspersa lividis, hirsuta ad pedes usque. *Pedum* digiti bini ante, totidem retro. Quam Aldrovandus describit, & inter ululas, quod vocem non flebilem ejulando, sed Gallinaceorum haud ab similem rostro frendendo, ediderit, reponere metuit. *Caput*, dorsum, alas, caudam colore cinereo, maculis albicantibus ac nigris distinctam habebat, sub ventre albicabat, & nigris maculis variegabatur. *Capite* erat valde magno, tereti, enormiter crasso, admodum plumoso. *Oculis* ex toto nigricantibus, & plumulis albis undique in orbem cinctis, in quorum ambitu, ad palpebrarum oras lippientium, instar rubescens circulus conspiciabatur, superiori tantum palpebra inter niçtandum oculos contegebatur. *Rostrum* erat subvirescens, &c.

Colit & campestris & saxa, *incolit* est, seu gemeni cibi. Fruges in humilioribus colligit. In excelsis rapinas agit, & carnes in cibum parat. *Picas* venatur: sed & colorem (subest mendum, nec nota cuiquam avis) forte collurionem, rapit. Est

Arist. H. A. 1. 8. cap. 3.

Vox.

Gesner. in Ornithol.

Aldrov. lib. 8. Ornithol. cap. 6.

Locus & Cibus. Arist. H. A. 1. 9. cap. 17. Arist. H. A. 1. 8. cap. 3. Idem. H. A. 1. 9. c. 1. Idem lib. 9. c. 17.

Generatio. Arist. H. A. 1. 9. c. 28. Plin. H. N. 1. 10. cap. 49. Vox. Athen. lib. 9. Dipnos.

Pollox. 1. 4. c. 14. Meurs. in Orchestra. Æli. H. A. 1. 6. c. 46.

Bellon. lib. 2. de Avibus cap. 32. Aldrov. 1. 8. c. 5. Arist. H. A. 1. 8. cap. 3.

Νύκτα δὲ, σπάνις φησιν εἶναι. Noctu vagatur; de die raro
apparet.

Parit quaternos, si bene Plinius Aristotelem intellexit. Nam ne de *Ætolio* Milvo res sit verendum est. *Vox* ejus est ululare, seu *mœsta* & flebili voce plangere, idque vespertino tempore.

Fel ejus prædicatur ad albugines, suffu-
siones, & caligines. Adeps ad claritatem.

CAPUT V.

De Noctua in specie sic dicta.

Noctua Latinis quod noctu canat & volet, Græcis *νυκταλ*, *μυκταλ*, *αλβη*. & dicitur. Duplicis ipsarum generis mentionem faciunt Authores, *Majoris* nempe & *Minoris*. Utrique *collum* breve, *gula* pars inferior paulo latior. *appendices* seu *lieni* tam parvus *sen* *multorum* effugiat. *Cauda* brevis, & si Bellonium audimus, pedes pilosi. *Capitis* vertex ex plumularum ibidem positu veluti introrsum excavatus. Quæ ab Aldrovando describitur, erat columbæ magnitudine, *capite* majusculo superne depresso *Oculis* magnis & glaucis. *Rostro* longiusculo, dilute flavo, *corpore* toto plumis partim bætico, partim albo distinctus. *Cruribus* plumosis, & ad pedes usque hirsutis, coloris è cinereo bætici. *Pedum* digitis subfuscis, cinereis, implumibus. Quam Germani *saxatilem* nominant, tota parte pronas fulci, modico ruffo permixti, & albicantibus maculis distincti est coloris. Crura & digitos pedum habet hirsuta, plumis albidis. In extincta *rostrum* superius rubebat, cum prius in viva rubere non videretur. Inter oculos & rostrum pennulæ quædam ceu pili aut barbulae rigent.

Locus. Locum si attendans, in Creta nasci negat
Plin. H. Plinius, illatam mori tradit, nec in Alpibus
N. l. 10. Helvetiæ regionibus inveniri scribit. E
cap. 29. Gallia Cisalpina, Longobardia, & Germa-
Apost. nia ad Rhenum eò advehuntur. In Attica
Cent. 6. plurimæ. Unde Noctuas Atheneas. Saxa-
Prov. 41. tiles montana & saxosa incolunt. Ideo ad
 frigus arcendum plumas cruribus & digitis
 natura induit.

Vitæ. Cibus ipsis vespæ, apes, lacertæ, mures,
Arist. H. quarum cicuratæ, in domibus etiam vena-
A. l. 8. tionem exercent, semel saturatæ trium
cap. 3. dierum inedia perferunt, nec novem ab-
Crescent. l. 10 c. 16- stinentia læduntur.

de Agric.
Generatio.
Plin. l. 10.
H. N. cap.
17.

Quantum ad *Generationem*, quod de Bu-
bone, id & de hac Plinius dicit, solam in-
ter uncungues, & carnivoras non cecos
parere pullos, Eustathius & Varinus falso
tradunt; nec verius, cum formicas à suis
pullis abigere cupiunt, vespertilionis cor
in nido tanquam amuletum habere, Op-
pianus reliquit. Si enim ipsa lepus est,

cur aliunde pulpamenta quærat. Nec de die omnino *cacutire* verum; nec propter infinitam vim igneam *tenebras penetrare*, a cluna silente videre, quod Eustathius, & Varinus scribunt. Die exorto quasi splendore visus ejus hebetatur, & quasi quibusdam errat in tenebris. Sicca nimis & tenuis humoris substantia facili negotio dissipatur. Noctu, quia aëre, qui visionis medium est, non illuminato, objectæ colorum species non exprimuntur, si proprius accesseris, haud loco sese movebit. Moderata lux quia Nocturæ conveniens, ideo *ἄσπερον* *ἀσπερον* *ἀσπερον* per vesperam & circa matutinum crepusculum venatur. Sonum edit duplicem, unum tou, tou, alterum vocant cucubare. Aristophani *κικυβήσθαι*. Pollux eam *κικυβήσθαι* scribit. Nigidius novem habere voces prodit. Apulejus serum & intortum ejus cantum vocat.

Est etiam *saltatrix*, & corpus & cervicem frequenter in orbem contorquendo, nunc torvo & fixo obtutu hominem aspicit, nunc capite huc illuc acto scurras & histriones imitatur. Luce vagantem aviculæ reliquæ sturnatim admirantium specie primo circumvolitant, mox impetunt. Ab his circumdata, resupina pedibus repugnat, collectaque in arcum, rostro & unguibus tota tegitur.

Intimicitias gerere dicitur cum cornice, seu quod sibi ova meridie absumat, seu propter aliam causam. Lucretius sane cornices metu Noctuarum in Athenarum moenibus unquam volasse negat: cum orchilo, ejus ova itidem exedente, cum Pico Garrulo, & ovibus. Contactu frondium platani torporem contrahere, sic à ciconiis à nido submoveri, fabulatur Ælianus. Auxiliatur ei contra aviculas collegio quodam naturæ passer, bellumque partitur.

Ufus capræ tum in *aucupiiis*, prout in *Oto* dictum est: quod genus aucupii hodie, à pipatu avium circumvolantium noctuam Pipatam vocant. unde Pipare quod decipere; tum in *cibis*, apud tenuioris fortunæ homines; tum in *Medicina*. Nam cibus aqua in qua Noctua lavit perfusus, Gallinarum piritam pellit. Sanguis inter psilothra numeratur, jecur parotidas sanat. Anginis cerebro succurritur. Ebriosius ova per triduum in vino data, tædium ejus adducunt.

Præſagia ſi reſpicias, ſi nemore deſerto frequentior in urbibus apparuerit, ſterilitatem; ſi veſpertina crepuſculo de ſuis luſtris citius pro conſuetudine egreſſa, plurimum concubaverit, pluvias; ſi pluvia durante, ceſſaverit, ſerenitatem, polliceri creditur.

NB. De Noctua genere exotico vide Mantissam. Num. 2.

Ambr.
lib. 5.
Hexact.
cap. 24.

Ballon. 1.
2. de A-
vibus c.
24.
Arist. H.
A. 19. c.
34.

Inzib.
Poilux.
Oom.
l. 5. c. 13.
Plin. l. 10.
cap. 17.
Apulejus
l. 3. Mile-
fior.
Ingenium.
Crescent.
Agricola
l. 10. c. 6.
Plin. l. 10.
H. N. c.
17.

Inimici-
dia.
Arist. H.
A. l. 8.
cap. 1.
Lucre-
tius l. de
Natura
rerum.
Arist. l. 9.
H. A. c. 1.

Plin. l. 10.
H. N. c.
17.
Usur.

Prasid.

Aratus in
phæno-
menis.

CAPUT VI.

De Strige & Camprimulgo.

STRIX quam sit avium, non constare arbitrat Plinius. Ovidius eam brevi compendio descripsit, dum scribit.

—Strigum

Grande caput, stantes oculi, rostra apta ruina, Canices pennis, unguibus hamus inest.

Ubera eas infantium labris immulgere, sanguinem in cunis noctu exugere, imo & dilaniato unguibus corpore mortem afferre, credidit superstitiosa Antiquitas. Isidorus vero propriis pullis lacteum humorem instillare, eosque ultra modum amare prodidit.

Ovid. 6.
Fastor.
Isidor. l.
12.
Origin.
cap. 17.
Vox.

Vox ipsarum proprie stridor est Latinis. Omen semper triste habebatur.

1.8 O. ni-
thol. c. 8.

Aldrovandus huc *nocturnam* quandam *avem* refert, quæ habebat caput magnum, rotundum, anteriore parte plumulis exiguis, in orbem velut flammeum positis exornatum. *Oculos* grandes cum iride dilute flavo ac pallente, pupillas maximas, & vehementer atras. *Rostrum* corneum, fuscum. Pennas universi corporis ferrugineas, maculis fuscis in remigibus transversim distinctas. *Caudam* palmo fere alis longiorem *Crura* ad digitorum ungues usque instar pedis leporini pilosa. *Digiti* pedum binos ante, totidem retro. Magnitudine erat Afionis. Dicebatur caprarum ubera exugere.

Descri-
ptio.

CAPRIMULGUS etsi specie à reliquis multum differat; nocturnis tamen, ratione visus, accensetur. Græcis *Αγροδίνος* πηγάς ἢ ἀγροδίνος, quod capras fugat, dicitur. Magnitudine est paulo major quam Merula, minor quam cuculus, seu ut Plinius, grandioris Merulæ aspectu. Cujus iconem Aldrovandus exhibet, erat cuculo ita similis, ut nisi inusitata pedum, crurumque exilitas & brevitudo cum diversa constructione obstitisset, is idem esse crederetur. *Caput* habebat vertice longo & compresso. *Oculos* grandes, iridem & pupillam nigerimas. *Rostrum* vix passerino majus, modicum aduncum, pulmulis tanquam pilis quibusdam superne ad nares & inferne sub mento, ornatum, &c. Quam Gesnerus exhibet, rostrum habebat aduncum, & tibias plumis obvestitas.

Locus.
Arist. l. c.

Degit in montibus circa mare inprimis in Creta, propter viciniam stabulorum quibus capræ includuntur. Intran namque isti fures nocturni pastorum stabula, caprarumque uberibus advolant; propter suctum lactis, qua injuria uber emoritur; capræ, quas ita muliere, cæcitate percutiuntur. Adeo terribilem clamorem habent, ut etiam audientibus pavorem incutiant. Duo aut tria cum plurima ova pariunt. De visu ita Aristoteles: *ἵνα ἐν ὁρῇ*

Arist. l. c.

τῆς ὁρῆς, ἀλλὰ τὰς νυκτὶς βλέπει. Parum acute interdum videt, sed noctu perspicax est.

TITULUS VIII.

De Carnivoris mediæ naturæ.

CAPUT I.

De Vespertilione.

VESPERTILIO, LXX. *νυκτερίς*, Hesychio & Phavorino *φάλας*, Philo *νυκτερίς* & *φάλας*. Victorino Avis forex, Vallæ semimus, Platoni in ænigmate, Avis non avis dicitur. *Τὴν αἰνῶς ἐπεὶ οὐκ ἔστιν ἰσχυροτέρη ἐκείνῃ τῇ ἀπο-
θήκῃ τῇ ἐν ἀέθρῳ περὶ τῆς* bene scripsit Philoso-

Descri-
ptio.

phus, male Macrobius, quatuor pedibus ingredi, & inter quadrupedes referendum, ut inferius patebit. Color nonnullis fulvus, aliis niger, subalbus, cinereus. *Magnitudo* diversa. Majores in urbe Assyriæ Borsippa, quam alibi, in novo orbe columbas adæquant, in Brasilia monedulas, circa Urabam turtures, in Orientali India, si Pompilio Azalio credendum, tanti, ut illas transeuntes, alarum verbere prosternant, multos etiam occidant. *Caput* quibusdam murinum est, caninum aliis.

lib. 4. de
partib.
Anim. c.
13. l. 7.
Macro-
bius. Sat-
urnal. cap. 16.
Scrab. l.

Rostrum à cæteris avibus diversum. *Nares* vituli instar. Dentes XXXIV, in mandibula inferiore octodecim, sedecim in superiore Bellonius observavit, viginti quatuor in singulis mandibulis duodenos, eosque ferratos, teretes & longiusculos Aldrovandus utrinque in superiore mandibula senos, in inferiore septenos quorum anteriores cæteris longiores; omnes valde albi, Clusius. *Maxillas* intus & foris pilus oblongus, niger, obvestit. *Auriculas* interdum binas, quaternas interdum habet: similitudo eis Asininarum, & superiores quadruplo sunt inferioribus majores. *Mamille* soli volucrum datæ sunt, lacte sola nutrit ubera admovent. *Alas*, quæ pellitæ, exangues quidam dixere. Ab armis incipiunt, & per latera per axilas continuo ductu ad crura usque feruntur, easque circumambiunt. Quatuor hæ flexus, plicas seu articulationes habent, quibus alas inter volandum dilatant, & contrahunt, medius superiorum, (cubitos Albertus nominat) quique in plures alios deorsum flaxas divaricantur, *digituli* singuli, unguiculis hæmatis instructi, quibus parietibus se affigunt, annectuntur. In supremis aliis rudimenta, quædam *brachiorum* nervosa apparent, quæ in uncum desinunt. *Pedes* illi bini, in quinos digitos dissecti & unguiculis acutis instructi, singuli in medio, ac si palmam efformarent, ampli. Innituntur inferiori alarum membranæ, atque ex ventre ad caudæ, si quæ est, latera, exporriguntur. *Cauda* quippe aliis nulla, ut recte Aristoteles, A-

lib. 4. de
partib.
Anim. c.
13. l. 7.
Macro-
bius. Sat-
urnal. cap. 16.
Scrab. l.
15.
Livyus
Hist. c. 10.
Gomara
Hist. cap.
61.

1.9 Orni-
thol. c. 1.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 61.
Scrab. lib.
15.

ffricanis

de partib. Animal. l. 4. c. 11. Bellon. l. 2. de avib. c. ult.

fricatis murium instar oblonga, & quatuor digitos extra membranas alarum prominens. Aldrovandino mediis atque infimis alarum membranis sub ventre involvebatur, & ad extremam earundem exporrigebatur apicem. *Penis* mari sat magnus, exertusque, qualis simiarum est, genitalis foeminae meatus pone podicem apparere solet. Quid sibi Plinius, verbis, *Coxendix huic avi una traditur*, velut, cum duo crura habeat, intelligi vix potest.

Locus.

Locum si spectes, loca obscura, cavernas, & meatus subterraneos amant. Ideo & in labyrintho. Cretæ inter Cnossum & Cortinam, Borsippam, urbem adde, plurimi, & in Appennini prope Puteolos, speluncis multa millia, & in monasterio quodam Misniæ tanta, ut excrementorum acervis multi carri onerari possint. Delectantur in *visu* culicibus & muscis, sed & lardum, candelas, & alia pingua arrodunt. Succidiam sæpe ita exedunt, ut in excavata scrobe stabulentur. Invadunt & nudam corporis partem culicum more, & sanguinem exugunt, in Dariene ita infestatos Hispanos, tabe contracta obiisse, Martyrauthor est. Gallinas, canes & catos morsu aculeo in cristam in fixo interemisse addit. Solus volucrum, animal tantum *parit*, & foetus lacte uberibus admotus nutrit. Recens nati musculus sunt similes, glabri, infantis humani instar; sed omnibus partibus absoluti, matris uberibus, cum primum enixa est adeo tenaciter adherent, ut ne à mortua quidem sponte decident. Nullis secundinis obiectos quidam putavere produci, refellit Bellonius, qui plures vigenis se in Pseudolabyrintho Cretæ prægnantes secuisse tradit, has etiam mater devorat, dum proli nuper natæ ob teneritudinem metuens, primo vel secundo die ad pastum evolare prohibetur. Cum duo tantum ei natura ubera dederit, plures geminis uno partu non edit, quia vero magna eorundem interdum copia ingruit, haud male quidam è putri etiam materia oriri, opinati sunt.

Strabo. Geog. l. 16.

Plin. H. N. l. 10. c. 61.

1. 6. dec. 3.

Plin. l. cit.

1. 2. de Avib. c. 2.

Gemma Cosino c. 8. Volatus.

Volant mane & vesperti potissimum; foeminae sæpe geminis implexæ infantes; volatu ob timorem indirecto seu tortuoso, atque haud longe à terra semper. Volitatione fessi, hamis digitorum, quorum in mediis alis rudimenta habent, parietibus faxis, arboribus, aut cavernarum fornicibus sese appendunt, & continuata serie, ac veluti catena quadam inter se coherant. Melius de nocte *vident*, quia spiritus ipsorum visorius tenuissimus & lucidissimus, per noctem modice incrassescens, idoneus ad conspectum redditur, de die extenuatus, expanditur & evanescit, ideo face vel gladio volantibus objecto, decidunt.

Homer. Odyss. μ. Homer. Odyss. α. Alex. Aphrod. l. 1. prob. 66.

Ingenium.

Vox.

Vox exili gannitum potius & latratum canum imitantur, quam murium sibillum.

Latinis stridere, Græcis *σφίζεν* *σφίζαντες* & *σφίζοντες* dicuntur.

Singularis ipsis cum columbis *amicitia*, dietinentur istæ, si caput vespertilionis in peris summo columbari fastigio suspendatur. *Inimicitias* vero gerunt cum Ciconia, qua à solo illius contactu hujus ova sterilescent, ni platani foliis in nidum positis sibi caverit: Cum *platano*, qui præ foribus suspensus ne involent; prohibet; cum hederæ, cujus suffitu & odore perimuntur; cum formicis, ad quarum nidos si alas suspenderis, nulla ipsarum egreditur; cum locustis, quæ locum ubi vespertilio suspensus non transvolant.

Ufus vespertilionum est tum in *cibis*; nam à Borsippensis condiebantur, ab incolis in fularum Catigan & S. Johannes eduntur, ferventi aquæ immersi & excoriati eduntur, in Oriente gallinas sapore vincunt; tum in *Medicamentis*, toti præparati, beneficirho, & podagræ adhibentur. Sanguinem trichiasî conducere, Archigenes & Serenes credunt, Galenus & Julius Alexandrinus negant. Cor & lingua hydrophobiam inducit. Caput dextro alligatum brachio vigilantis somnum impedit. Magicæ revera vanitatis est quod tradunt, si ter circumlatus domui vespertilio vivus per fenestram in verso capite infigatur, amuletum esse, præsertimque oyilibus circumlatus toties, & pedibus suspensum in superliminari.

Demon. crit. in Geop.

Ufus. Strabo. l. 16. Scalig. Ex. c. 236. Nicremberg. Naturæ Exot. l. 10. cap. 93. 94. Galen. in Euporistis. Galen. l. 4. de Compos. med. l. 1. c. 8.

CAPUT II.

De Struthocamelo.

Struthocamelus *στρουθοκάμηλος* Philostrato & Aristoteli, *στρουθοκάμηλος* Hesychio, *στρουθοκάμηλος* Oppiano, *στρουθοκάμηλος* recentioribus Græcis dicitur, melius Chænocamelum, quia *χῆνος* sive anserem potius, quam *στρουθία* sive passerem, nisi cum Scaligero, gallinam reddere malis, dixissent. Plautus cum Passeram marinum appellavit, Phavorinus Lybicam avem, Diodorus Siculus Cervinam dixit. Aristophanis *στρουθία* Horatii *Afra* avis, gallinæ potius sunt, quas prægrandes Africæ terræ tulit. Maximus est omnium avium. Diodorus Camelo parem esse. Plinius equitis equo insidentis magnitudinem excedere; & verum est, si collum quantum potest erigat. *Rostrum* habet exiguum sed acutum. *Caput* in quo fere nullum cerebrum, parvum, exiguis pilis, in foemina pallide lutescentibus, in mare flavescens, collo ad rubrum colorem vergente. *Palpebras* utrinque solus omnium alitum ut homo, pilos in superiore palpebra. *Collum* longissimum. *Dorsum*, cujus pennæ in mare nigerrimæ, in foemina fusæ, lanæ quandam substantiam sua mollicie efficiunt, tam latum, ut puerum la-

Descriptio.

Diodor. Biblioth. l. 3. c. 12. Plin. H. N. l. 10. c. 1.

Oppian.
Cyneget.
l. 3. v.
490.

Albert. l.
23. de A-
nimalib.

Oppianus
l. c.

Locus.
Theo-
phr. l. 4.
Hist.
plant. c.

4.
Pli. H. N.

l. 10. c. 1.

Xenoph.

l. 1. Exp.

Strab. l.

18.

Diod. Si-

cul. l. 3.

c. 13.

Villus.

Strabo.

l. 6. Ge-

ogr. Lan-

gius E-

pist. 12.

Aphro-

dis. in

proem.

probl.

Vossius in

emend.

ad l. 3. de

Idol.

Genera-

tio.

Plin. l.

20. c. 52.

Arist. H.

A. l. 9. c.

15.

dentem insidentem ferre possit. *Alarum* pennæ ejusdem sunt coloris, sed in superiori parte candidissimæ. Gordianus miniatos habuit. In interioribus alarum cubitis spicula secundum quosdam, quibus ferit, habet; ossæos in extremis alis, secundum alios, mucrones, quibus ceu calcaribus ad cursum velociorem se incitat. Aldrovandus observare eos non potuit. *Caudæ* pennæ in mare subalbidae, in fœmina subfuscae sunt. *Coxæ* prægrandes, quod in angustum sensim juxta femur finiantur; *femur* humanum potius imitantur. *Pedes* Camelorum cruribus similes *δρακόντι ἀνδρῶν ποδῶν*, frequentibus firmati squammis ad geminos, usque duos poplites integuntur. Pedes more boum bifidi, in binas *ungulas* dividuntur. Cur bisulcum potius quam solipedem aut digitatum natura fecerit, ignorare me fateor.

Reperiuntur, in Africa, Lybia, Æthiopia, Arabia, & Syria. Amant deserta & fere aquosa, & tanta eorum aliquando conspicitur copia, ut velut equitum quandam aciem eminus efforment.

Quantum ad *Victum*, Carphophagum esse ex Strabone colligi potest. ferrum, lapides, ossa, & quicquid obtigerit, sine delectu devorare certum fere est: sed an eadem concoquet, dubitatur, si sit, quod Languis credidit, specificæ potius proprietati, quam intensissimo calore tribuendum iderit. Nam leo strutho camelo calidior, ferrum concoquere non potest. Interrogatus, qui circumducebat, à Brentio, deglutire quidem ferri particulas sed iterum, vel integras, vel summum perpusillo imminutas, respondit.

In Venerem proclivis est, & Cameti Bactriani instar, averfus coit. Complura ponit *ova*, octuaginta nempe, & quidem mense Julio; illaque lapidea quasi crusta

munita, & XV. plus minus libras pendencia. In arena condita, & neglecta, solis calore fovetur: solo visu ex iis pullos excludi quidam credidere, quod intueri ea avem viderent, nec propter gravitatem iis incubare posse scirent. Non *excluduntur* simul. Pars intra ova formatur, pars in lucem prodit, pars fovetur.

De ejus voce nil memoratu dignum occurrit. Non elevatur à terra propter corporis molem; festinantissime tamen interdum incedit, ingruente in alas vento, & tanquam vela eas extendente. Naturaliter cum *calvere* Plinius dixit; equum odisse alii tradunt. Collum frutice occultat, seu quod *δὲ ἀπὸ τοῦ τοῦ σώματος τοῦ καυτοῦ*, latere se ita existimet; seu quod eam corporis partem, quam se inferiorem habere novit, contra persequentium injurias muniat.

Usum si spectes, ova propter amplitudinem pro quibusdam habentur vasis. Garamantes potoria & capitum tegmenta ex iis conficiunt. Pennæ conos bellicos & galeas adornant, quas apud Turcas solis Janitzaris gerere concessum. Lapis in ventriculo repertus, & collo suspensus, concoquendi vim promovet. Sebum efficacioris ad omnia quam adeps anserinus usus: ideo cum auctio regia per Catonem Uticensem fieret, LXXX. sestertiis vœniit; & apud Æginetam emplastrum diacinnabarios ingreditur. Carnes Arabibus, Æthiopibus, Numidis & aliis in usu, hinc Struthophagorum nomen. Heliogabalus sexcentorum capita una cœna, ad edenda eorum cerebella appofuit. Firmus Seleucius, qui Hippopotami adipe delibutos inter crocodilos impune natabat, totum uno die comedisce dicitur. Sceletum apud Pareum vide.

NB. Est & alia *Struthocamelorum species*. Vide *Mantissam* N. 3.

Ælian. de
Animall.
14. c. 13

Vox.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.
Plin. H.
N. l. 10.
c. 1.

Ufus.
Plin. l. c.

Lamprid.
in Heliogabalo.

l. 24. c.
22.

HISTO-

HISTORIÆ NATURALIS DE AVIBUS,

L I B E R II.

De Avibus Phytivoris.

TITULUS I.

De Avibus Granivoris, Non Canoris.

CAPUT I.

De Pulveratricibus Sylvestribus.

ARTICULUS I.

De Pavone.



Absoluta Avium Carnivorarum historia ad Phytivoras pergendum est, inter quas pulveratrices tam sylvestres, quam domesticæ primo occurrunt. Inter illas primus *Pavo*, propter

exquisitum pennarum ver, & gemmantes colores, quos adverso maxime sole, quia sic fulgentius radiant, expandit; Junonium incensum, ingenium, de quo in sequentibus singulare, & magnum apud veteres æstimum occurrit. Athenis statuto precio singulis noviluniis per anno XXX. spectabatur, multi Lacedæmone & ex Thessalia spectatum confluebant. Alexan. visis iis apud Indos. gravissimas in eum qui occideret pœnas constituit. Tiberius ob substractum è viridario unum, capite multavit. In Lybia si quis tantummodo lædisset, non impune ferebat, si Eustathio credimus. Quod si *precium* spectes, mille drachmis marem & fœminam venditos fuisse Antiphon scripsit: & tempore Varonis ova earum denariis vœniebant quinis, ipsi facile quinquagenis, grex centenarius facile quadraginta millia sestertia reddebat, ut quidam Albatius ajebat, si in singulos ternos exegisset pullos, perfici sexagena potuisse. Dicitur & Medica, Persica, Junonis; & picta avis.

Diversitas illorum à colorum in primis, & loci diversitate sumitur. Nostrates satis sunt noti. In Terra Firma quidem ventre & pectore nigris, cætera flavi; alii pectore & ventre flavi, cætera nigri conspiciun-

tur. In Curiana regione sunt sylvestres, qui per nemora vagantur, & adeo viles sunt, ut unica sunt, ut unica duntaxat vendantur acu, alibi in palustribus inveniuntur. Quod si & *Sexum* attendamus, fœmina mare multo minor est, neque in cauda oculos illos gerit, Japonensem si excipias, quæ quatuor in Uropygio obtinet.

Placet maris & fœminæ *descriptionem* exhibere. Mas igitur capite, collo, & pectoris initio intense cærulei, seu sapphirini coloris est. *Caput* pro corporis proportionem habet exiguum, & quodammodo serpentinum, maculis duabus oblongis candidis, quarum una oculos superequitat, altera brevior at longe crassior subjacet, ornatum. *Apicem* in vertice è nudis quodammodo scapis tenerrimis, viridescentibus, in summitate ejusdem coloris liliorum flores ferentibus conspicuum. *Rostrum* candidat & insigniter hiat. *Collum* est longiusculum tenue & exile. *Dorsum* ex albo cinereum, maculis atris transversalibus conspersum. *Cauda* in duas quasi dividitur. Non longioribus quæ ex dorso prope pœdicem oriuntur pennis, in rotam extensis, minores quædam exque fuscæ non rigent, sed ut in reliquis avibus extensæ conspiciuntur, datas ut longiores sustinerent crederes. Oculi *quatuor* circularis, aureo, castaneo, viridi & sapphirino constant, & varios ad solem obversæ colores jaciunt. In *famina* pauca colorum conspiciuntur varietas. Alæ totæ, dorsum, venter, coxæ, ac pedes coloris sunt fusci ad cinereum vergentis. Capitis vertex & apex ejusdem coloris, in vertice tamen aliquot maculæ exiguæ, veluti puncta virescentia interseruntur, &c.

Quantum ad *Locum* in Asia fuisse inventos Theophrastus author est, transmarinos Varro. Babylonia multos pulchriorum quam alibi varietate aluit. Media gu-

Martyr.
dec. 1 de
reb. Oc-
casi 1. 8.

Descri-
ptio.

Locus.
Plin. H.
N. 1. 10.
c. 29.
Varro de
re rust. 1.
3. c. 6.
Diod. Si-
cul. 1. 2.
c. 53.
Rhodig.
Antiq.
lect. 1. 1.
c. 10.

Lucian.
de domo.
Plin. H.
N. 1. 10.
c. 20.
Varro 1.
3. de re
rust. c. 6.
Oppian. 1.
2.
Lucret. 1.
2. de Na-
tura re-
rum.
Ælian. de
Animal.
1. 5. c.
21.
Ælian. 1.
c.
Sueton.
in Tiber.
In Orat.
contra
Erasist.
Varro 1.
3. de re
rust. c. 6.
Suidas.
Aristoph.
in Avi-
bus.
Scatius 1.
2. Sylv.
Athen.
Dipn. 1.
9. c. 19.
Genera.

Clemens
Alexand.
in Pæda-
gogo.

Æl. l. 5.
de Ani-
mal. c.
21.

Gell. 1.7.
No. 1.

Attic. c.
16.

Athen.
Dien. 1

14.
Geometric

Columella 1.8

de re ru-
stica.

II.
Pallad. I

I. cere
rusti. c.

28.
Columel

& Pal-
lad. l. c.

Ælian. l.
5. c. 12.

Colu-
mella l. 5

C. 32.

loſis celebratos. Ex Aſia in Græciam primum, Samum imprimis, unde Samii tanquam præſtantiores commendantur, poſt in Italiam & alias oras delati ſunt. Athenis in precio fuiſſe ſuperius dictum. Roma tempore Athenæi plures fuere quam Coturnices. In Suetia quoque, Oſtrogothia, & apud Normannos in agro Lexoviendi aluntur. Amant edita *loca*, paſcuntur tamen cum Gallinis, & Gallinarium ſub veſperam ſimul repetunt.

Summa ipsis *Coeundi cupiditas*. Mâculus quinque foeminas desiderat, & ni adfuit alia, incubantem invadit, ac ova frangit. Agnoscitur irruisse libido, quoties circa se amictum caudæ gemmantis incurvat, & singularum pennarum capita occulta, locis suis exerit, cum stridore procurrens. Accenditur eadem, si leviter tostam fabar tepidamque jejunis quinto quoque die exhibeas. *Coeunt* ab Idibus Februarii ad Martium, vere præsertim, locis fere apricis, cum Favonii spirare ceperunt. *Partus* à trimatu obvenit, cum varii colores funduntur, brevi à coitu agitur tempore. Tertiis anno à foeminis, quæ non incubant editur: at quæ fovent ova totum tempus fecunditatis aut excludendis, aut etiam educandis pullis consumunt, ita ut vere semel in anno parere Aristoteles dixerit. De numero *ovorum* non consentiunt auctores. Aristoteles octona in primiparis numerat, duodecim aut paulo pauciora in aliis, nec ista continuatis, sed binis ternive interpositis diebus ponuntur. Alii primo anno unum & alterum, sequenti quaterna quinave, cæteris duodena edere volunt; nec hic numerus transcenditur. Quæ ter pariunt, earum primus partus, quinque ovorum est, quatuor secundus, trium aut duorum tertius. In Temistana viginti imo triginta aliquando enituntur. Concipiunt tamen & *sine coitu*, & ova Zephyria seu *ὄνεια* Gallinarum more, non plura tamen duobus ponunt. Ut commodius excludantur Gallinis, sed non Rhodiis supponi possunt, recentiora; luna nonaria existente, hoc est, novem à primo Lunæ incremento diebus. Commodius inquam. Nam & mas seu libidine turgens, seu incubandi flagrans desiderio, illa interdum frangere solet; ideo à foemina celantur, & quia foemina non continue duorum dierum intervallo incubat, refrigerata, infœcunda evadunt.

Atas ipsis viginti annorum tribuitur. Indicus centum memoratur vixisse. *Volatu* parum valent; seu quod *Uropygium* flecti ineptum obtineant, seu quod longitudine caudæ & corporis gravitate premantur.

Vocem si attendas, Philomelæ author eas pupillare dixit, Varro à voce sua dictos tradit.

Si *Ingenium*, incessum suum ita componit, ne maculetur, pullus adhuc, si madescit (fide Alberti refero) moritur. Laudatus gemmantes expandit colores, adverso maxime sole, quia sic fulgentius radiant, simul umbræ quosdam repercussus cæteris, qui in opaco clarius micant, conchata querit cauda, omnesque in acervum contrahit pennarum, quos spectari gaudet, oculos. Si tacitus spectes recondit suas opes. Refrigerationis indigus, passis penus, & in anteriorem reflexis, corpus suum operit ingruente à tergo vento, alas pandit, & suaves auras excipit. Lini radicem naturale fascini amuletum, sub altera larum retrorsum gestat. Qui eos venenum detegere, defossim eruere referunt, fidem suam exsolvant.

Duplici imprimis morbo afficiuntur. Doloribus nempe dentientium infantum similibus cum crista produci incipit, & penarum defluvio, de qua Plinius. Idem cauda annuis vicibus amissa cum foliis arborum, donec renascatur iterum cum flore, pudibundus ac mœrens, quærit latebram.

De *Vi praefagiendi* hoc dixisse sufficiat, cum plus solito clamitant, noctu inprimi pluviam imminere. Vocis enim illius obstreperæ congeminatio, vegetum & acutum intus cum calore vocalem Spiritum, per arteriam vaporoso aëre imbutum, erumpere testatur. Quod vero extra tempus cantillantem, Paracelsus mortem alicujus ea in domo praefagire tradit, fabula est.

Usum & in Medicina & in cibis aliquem præstat. Nam jus pavonis pingue pleuritidem sanat, linguarum usus ab epilepsia præservat. Ova usta & in aceto trita impetigines emendant, fumus è pennis excoctus rubescens oculos, propter signaturam curat. Fimus podagræ fervorem mitigat. Caro propter siccitatem & frigiditatem, dura & concoctu difficilis audit. Etiam mortui post annum nec olet; nec putrescit, visa post quadriennium cariem fœniculi odore, saporis amari & falsi contraxisse. Primus eos Aufidius Lurco circa novissimum bellum piraticum saginare instituit, & ex eo quæstu, redditus seu sestertium seu minorum sexaginta millia habuit. Hortensius Orator, primus editiali cœna cibi causa occidit, & ideo in jus vocatus est. Cerebella Vitellius in famosa illa patina, quæ Minervæ clypeus, cum aliis prodigiis cibis apposuit. Quæ vel de virgine à Pavone in Leucadia adamata; vel de Pavone Indico, Jovi consecrato, quem sacrilegi suffurari non potuerunt, dicuntur; interhistorica recenseri debent.

Ingenium.

Plin. H.
N. l. 10.
C. 20.

Ovid. l. 2.
de arte a.
mandi.

Ælian. l.
II. H.
A. C. II.

Morbi.

Pin. H.
N. l. 10.
C. 20.

Præfa-
gium.

Mizald.
in E-
phem.
text. I.
C. 43.

Ufer.

Porta
Phytogn.
l. 3. c. 29.

Auguft.
de Civit.
Deil. 21.

c. 2.
Aldrov.
Ornithol.
1. 1. 1.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 20.

Ælian. l.
5. de A-
nimal. c.
21.

Sueton.
in Vitel-
lio.

Athen. l.
13.
Ælian. l.

11. de A-
nimal, c.
33.

ARTICULUS II.

*De Pavone albo, Pavonibus Japonensibus
& Gallopavone.*

PAVONES ALBI Septentrioni peculiares esse credebantur: & in calidioribus regionibus eosdem nasci, successu temporis compertum est. Vidit Aloysius Cadamustus in Maderis, Johannes Laurentius Ananias in parva insula, plures, Scaliger in Gallia binos; Gaudentius Merula Mediolani plures; Aldrovandus unum Bononiæ natum. Cum ex Norvegia Coloniam adveherentur, numero per seminum aucto, cum penitus in frigidiora loca commearent, & matres in ipso vere ovis incubantes nivosa loca perpetuo ob oculos haberent, vulgariis facti sunt. Tales & in calidioribus regionibus nascentur, si caveas in quibus incubant & excludunt ova, ex parte albis velaminibus obtendas.

PAVONUM JAPONENSIVM maris & famellæ descriptionem Marchioni Facchineto, qui eam à Julio IX. Pontifice accepit, Aldrovandus debet. Mas nullam cum nostrate præterquam in cauda & pedibus similitudinem gerebat. Rostrum erat, ut in nostrate cineritium, sed longius & subtilius. Vertex capitis, qui planus erat, & collum superius virecebant, & maculis cæruleis ceu punctis, quæ pariter in medio exiguas lineas albas deorsum descendentes habebant, respergebantur. Apex in capite quatuor ferme digitos longus partim viridis, partim cæruleus, figura siliginis spicæ non omnino dissimilis. Oculorum pupilla nigra, iris lutea, hanc ruber circulus ambiebat. Pectus & dorsum velut ex squamis, sed colore variantibus constabant. Pectoris enim squamæ, si ita vocare licet, ex cæruleo, viridi & aureo: dorfi ex cæruleo & viridi tantum tingebantur. Alarum principium ejusdem cum dorfi erat coloris, sed squamæ illæ virides haud ita apparebant, cæruleæ vero majores erant & lucidiores. Pennarum secundi ordinis primæ ejusdem erant cum superioribus colores; reliquæ in medio virides, ubi lineis nigris transversalibus notantur: post subluteæ similiter nigris lineis notatæ; in extremitatibus denique nigræ. Venter, coxæ, & denique pedes colore leucophæo & maculis nigris insigniuntur, quarum quæ in ventre sunt, lineas albas habent. Cauda pennis, quam in nostrate rarioribus colore, magis fusco ad castaneum vergente, calamo candidissimo. Oculi caudæ multo quam in nostrate majores, primum aurei, dein cærulei, postremo virides, ut in nostrate. Famina mari quidem minor est, sed capite toto, collo, dorso, pectore & alis similima. Illud vero in hac admirandum est, supra uropygium, nempe ad dorfi finem, quid veluti cau-

dam habere, eamque oculatam, ut in mari: sed oculi, licet quam in illo sint minores, sunt tamen pro pennarum portione magni. Habebat itidem caudam viridem pennis in ambitu cæruleis, & calamis albis. Postremo in eo etiam à mare differebat, quod ventrem haberet prorsus nigrum. GALLOPAVO, aliis Gallus Indicus, Peregrinus, & Calecutensis dicitur, & idem esse cum Meleagride, cujus synonyma sunt, Gallina Africana, Numidica, Afravis, Numidica guttata, & alba Lybica, videtur; si vera est illa descriptio, quam ex Clyto Milesio Athenæus adfert. Verba ejus sunt. Circa templum virginis, Minervæ nempe in Levo (sic legendum non Olero. Insula est maris Icarii Sporadum una) Meleagrides aves sunt. Locus ubi aluntur est non paludosus, (ut quidam vertunt, Meleagrides enim Aristoteles ab avibus paludicolis distinguit, & Hesychius *καταμαρτυρεῖ* ipse vocat) sed arboribus consitus. Animal illud non ita prolem amat, & juniores pullos adeo negligit, ut sacerdotibus illos curare necessum sit. Avis magnitudinis ut gallina generosa est, capite ampliore, quam pro modo reliqui corporis, glabro, ac super ipso crista carnosæ, dura, rotunda, quæ clavi modo super caput extuberat, colore ligneo. (Sic lege, *κῆρυξ* non *οἰῆς*. Lignei coloris facit & Theophrastus mentionem; forte est subflavus.) Ad malas jacet instar barbe longa caro, incipiens ex ore, rubentior quam in gallinis: at eam quæ rostro Gallinarum insidet, & quam barbam nonnulli vocant minime habet, tanquam ea parte sit mutila: rostrum acutius & grandius quam gallinæ. Cervix nigra, crassior & brevior quam Gallinæ. Corpus totum varium. Attingit enim totum, crebris maculis albis notatum ac punctum, lenticula majoribus, quæ rhomborum figura parvis nigris que circulis ambiuntur, & pennarum illam varietatem efficiunt, quia niger color aspergitur candido, & vicissim candidus nigro. Alarum pennæ linearum ductibus candidis serratisque distinguuntur, in spiras protractis, intervallo pariter diremptis. Nullum calcitrare in cruribus, quæ gallinæ similia sunt. Maribus adeo fæminæ similes, ut vix Meleagridum sexus discernatur. Similitudinem in colore & mole corporis intellige. Eo enim veluti clavo ligneo carent. Quem Aldrovandus ex Gyllo describit ex novo orbe allatus erat, eadem qua Pavo proceritate. Collum ei simul cum capite à plumis omnino nudum, tantum purpurascens pelle obducebatur, & tam erat crassum, ut pellem quæ antea laxa & vacua; cum vocem emittebat, spectabatur, sic inflaret, ut ad brachii crassitudinem accederet. Cum quis ad Gallinam accederet, totis inhorrescebat plumis, & gradu superbo exterrere accedentes conabatur.

Quantum ad Locum Bæotii soli indigenæ Meleagrides esse videntur. Ætolia peculiares, Menodotus sanius facit, & inde

Cadam.
Cap. de
Navigat.
In fabri-
ca.
Anan.
Mundi
to. 3. cit.
Aldrov.
Aldrov.
Ornith. l.
13. c. 2.

Descri-
ptio.

Varro l.
3. dere
rust. c. 2.
Plin. H.
N. l. 10.
26.
Athen. l.
14.
Dipnosc.
Cassau-
bon. ad
Athen. l.
14. c. 20.
Dalech.
ad Leond.
Æl. l. 5.
cap. 27.
de Ani-
malib.

Cassau-
bon &
Dalech.
Theo-
phrast.
ad l. c.
Histor.
Plant. l. 7.
cap. 3.

Locus.

Villus.
Athen. l.
14.
Diodor. l.
3. Bibliot.
cap. 12.
Strab. l.
16.
Geogr.
Scylax
Carian-
denfis in
Periplo
orbis.
Plin. l. 16.
H. N. c.
44.
Columella lib.
8. de re
rust. c. 2.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 26.
Generatio.
Bapt.
Portal. 2.
Mag.
Nat. c. 14.
Vex.

Pausan. in
Boeoti-
cis.

de in alias partes translatas credit. Diodorus ultimam Syriæ partem, Strabo Arabiam ipsis tribuit. Certum, nostras calidioribus locis delectari, una cum Gallinis pasci, & longius à domo per agros divagari. Quod autem Scylax Carianensis lacui Chephifio, in Africa, Mnaseas lacui ibidem Cratum amnem de se promenti, eas vendicat; vel error est, vel Gallinis, quibusdam Africanis, quæ paludes amant, rutilam galeam & cristam in capite gerunt, quæque novissimæ peregrinarum avium in mensas propter ingratum virus (quod nostri Meleagridibus non competit) receptæ sunt, nomen Meleagridum propter similitudinem indidere.

Coëunt aliquando cum Pavonibus, & excluduntur pulcherrimi pulli, nitidissimis pennis fulgentes. *Incubant* verno tempore diebus tricenis.

Ad *Vocem* earum extendit Pollux verbum *καραζου*. Crocicationi Gallinacæ Pavoninæque non dissimilem edit, cum fragore per collum longe lateque vagantem, & instar liquoris in dolium infusi opstrepentem. De usu ipsorum in cibis non est quod dicamus. Olim Isidi Tithonæ à pauperioribus immolabatur.

ARTICULUS III.

De Phasianis, Urogallo seu Tetraone, majore & minore.

Phasianus, Galeno Gallus Sylvestris, Statio Phasidis ales, Scythica volucris Juvenali, Itis quibusdam dicitur. Magnitudo non omnibus eadem. In regionibus Ergimul & Cerguth quæ Magno Chamo subsunt, maximos reperiri Paulus Venetus scribit, cum tantæ prolixitatis cauda, ut decem & octo palmos excedant. Is quem Aldrovandus describit libras tres duodecim unciarum pendebat. *Rostrum* coloris erat cornei, pollicis transversum longitudine, in extremo recurvum, superius inferiore longius. Membrana carnosa, qua capiti conjungitur tuberosa, sub qua nares occultantur, instructum. *Caput* in vertice colore cinereo fere micabat; ad latera supra coccineam maculam, & prope rostrum viridi, & admodum vel in sole, vel in umbra varia. Ab utraque capitis parte è regione aurium pennæ, quas Plinius cornicula vocat, elevabantur, sub his caruncula seu musculus qui cornicula illa movent, apparebant. *Aures* erant admodum latæ, profundæ, & rotundæ. *Colli* pennæ infra prope pectus, & pectoris etiam prope collum tribus coloribus variabant, fusco nempe prope radices, dein aureo & viridi; sed viridis nisi complicatis simul pennis non conspicitur, si unicam à corpore ablatam examines,

niger jam apparet, sed & aureus, si pennas invertas splendorem amittit. *Tergoris* pennæ erant totæ ferruginæ ad rufum vergentes, & velut in exigua flamenta desinebant. *Cauda*, quæ organi pneumatici figuram obtinet, duos dodrantes, cum duobus palmis explebat. &c. *Fœmina* mare per omnia deformior est, Coturnicis fere colore.

Locus ipsis Phasis amnis, unde nomen sortiuntur Athenæus ex Media accersiri solitas quasi meliores, tradit, in Indiæ hortis cum Pavonibus enutritas Ælianus. In Curiana regione tam numerosi capiuntur ut singuli duabus aciculis venditi fuerint.

In Scandinavia aliquando absque cibo sub nive latent. Fridericus Saxonix Dux ducentos emissos capi vetuit. *Vivitant* granis, seminibus & baccis. Avena inprimis delectantur.

Coëunt mense Martio & Aprili. Unus mas duabus fœmellis sufficit. Viginti fere ovis, illisque rubris pariendi ordi concluditur. Semel in anno fœtificant, & trigesimo die maturos pullos emittunt. Optime Gallinis incubanda committuntur, ut una matrix quindecim ova operiat. Quomodo vero ex Phasiano mare & Gallinis Gallinacis simul coëuntibus Phasiani procreari possint, docet apud Aldrovandum, Longolius. Interiunt pediculis nisi se pulverent. Pennas dum nimis pinguescunt, si quibusdam credendum, amittunt. Capite in terram immisso, totos se latere existimant; & dum propriam imaginem admirantur prius se capi sinunt, quam aufugere possit.

Quantum ad *usum medicum* non pingues bene purulentis in cibis exhibentur. Vinum in quo unus extinctus est bibitum, torsiones, si Marcello Empirico credimus, tollit. Adeps, tetanicis, marricis suffocationi, & renum affectibus prodest. In *cibis* vehementer laudantur, nec vel Perdicibus vel gallinis domesticis, si pulli edantur, cedunt. Olim inter summas delicias numerabantur, à quibus Ptolomæus abstinerebat: at quibus Heliogabalus Leones & alia bruta pascebat.

UROGALLUS major, qui veterum Tetrao Aristotelis Tetrix, ut Gesnero, Agricola, Jovio & Aldrovando placet, à quibusdam cum Otide seu Starda, vel Tarda, à nonnullis cum Ortygometra confunditur; ex Gallinaceorum est genere. Quem Aldrovandus describit, habet *collum* dodrantale, palmis nigricantibus, cinereo diluto colore sparsum notatis. *Caput* nigrum, rostrum breve, gibberum, latum. *Supercilia* & pelliculam circa oculos rubra. *Pectus* & ventrem coloris nigri. *Alarum* pennas longissimos palmorum quinque nigricantes,

Locus.
Athenæus
Dionys. l.
Ælianus
l. 13. de
Animal.
cap. 18.
Martyr. l.
8. Decad.
Ocean.
cap. 1.
Villus.

Generatio.
Pall. de re
rust. c. 29.

Aldrov. l.
13. Ornith. c. 5.

Usus.
Trullian.
lib. 7. c. 2.

Galen. de
ren. affect.
cap. 4.

Philosof.
l. 8. de
vita A-
pollin.
Lamprid.
in He-
liog.
Descri-
ptio.

aut potius fufcas, minores fub alis albiffimas. *Poplites* & femora plumis albis, crura ad digitos ufque fufcis veftita. Ex albis in cauda maculis atas conjicitur, quo majores funt, cò pauciores illas habere feruntur. Reperiuntur qui libras quatuordecim Germanicas: imò & viginti tres Italicas pendunt.

Genera.
109. De coitu ipforum mira tradit Encelius. Ore coire, Gallum fperma ex ore tempore coitus emovere; Gallinas poftquam id deglutiverunt, concipere; mox comprimi. Reliquias rore vel pluvia fuperveniente, putrefacta materia, in serpentes mutari, non fupervéniente, in gemmam translucidam & candidiffimam abire, fit penes authorem fides.

Ufus.
Sutorum. Saporis funt gratiffimi. Caligula fibi eos immolari voluit.

Urogallum minorem Stumpfius, Phafianum montanum appellat. A Gefnero confpectus multo majora fupercilia & pelli-
cula rubente, quandoque cærulea, quam Urogallus habebat, Roftrum longitudine tranfverfi digiti, plumas in vertice nigras. Collum plumis Indicis, &c. In Septentrio-
ne, fi Olao fides, fub nive duobus aut tribus menfibus latitant. Capiuntur laqueo, ita ut collo adftriçto fuffocentur.

ARTICULUS IV.

De Grigallis & Attagine.

Grigallus vel major, vel minor eft. Illam fub nomine Tetracis Nemefianus Poëta defcribit, dum ait.

*Et Tetracem Romæ, quem nunc vocitare Taracæ
Caperunt, Avium eft multo ftultiffima.*

Aldrovandus duplicem tradit defcriptionem. Prima eft illius quia à Medico Cracoviensî miffus fuit. Erat magnitudine anferina, roftro nigro adunco, gibbofo. Capite plano, à roftro ad narium foramina ufque cinereo, nigris maculis confperfo. Reliquum, collum item, pectus, venter, & coxæ coloris erant ruffi, modo nigris, modo albis maculis afperfi. Cauda ruffa, fed magis quam reliquo corpore ad caftaneum accedens, maculis nigris maximis confpergebatur. Digiti nudis, cinereis, quatuor erat inftituta. Oculorum cilia coccineus color ambiebat. Tota avis fi roftum more rapacium & unguis aduncos habuiffet, & parvo fuiffet corpore, vel Lithofalcus, vel Accipiter Fringillarius videri potuiffet. Altera ex Gefnero defumpta eft, cujus Grigallus erat toto corpore Perdices fere, præfertim rufficæ inftar colorato, & punctis maculisque nigricantibus diftincto, ima colli pars prona intercedentibus lineis ex cæruleo virentibus rubebat, in ventre plurimum albedinis confpiciebatur. Propter mirificam colorum varietatem, Attagenem Alpinum vocare poffes. Minor perdice eft

major, fed eidem perfimilis. Creditur à betula colore Germanis Birckhun dictus. Supremum à betula corticem fi detrahas qui albo fubeft, in nigroque ruffefcit, præcipuum hujus alitis colorem imitatur. Densa & opaca loca ut bombardarum minas fugiat petit, ideo fæpe in betueto latet, & inde in fata & familia callidiffime excurrit.

ATTAGEN, Perdix Afelepica quibusdam inter pulveratricis ab Aristotele ponitur, quod inter paluftres ab Aristophane & ejus fcholialte, vel error eft, vel ideo factum, quod interdum ex montibus ad loca vicina defcendat ibidemque moretur; vel illa, nifi Turnetus fallit, intelligenda eft, quæ ad ripas fluminis moratur. Gallinagini ita fimilis eft, ut nifi paulo major effet, & pectoris color magis ad cinereum vergeret, altera ab altera difficulter diftingui poffet; roftum habet longum, fed capta triticum non fecus ac columbi comedit. Quantum ad veterum defcriptionem, Alexander Myndius, perdice paulo majorem, totum circa dorsum *καρδοφυγι*, id eft verficoloribus maculis pictum, figulinæ testæ colore, fed magis ruffum, corpore gravi, alis brevibus facit. Quantum ad Recentiorum, Gefnerus Attagenem Corylorum Gallinam effe putat. Bellonius fuum Anati campeftre, quem coturnicibus bene maculatis comparat, fimilem effe fcribit. Julius Alexandrinus genus quoddam longiore collo & cruribus, plumis non iisdem macularum notis diftinctis, ex Hispania allatum fe vidiffe refert. Florentiæ obfervatus roftro nigro fed in extremo rubefcente, oculi pupilla nigra, iride cinerea, maculis per ventrem albis, dorfo ferrugineo, nigris maculis insignito, pedibus ferrugineis. Aldrovandus avem ex Sicilia montibus allatam pro Attagene ponit, quæ magnitudine & toro habitu ad Phafianum accedit. Roftrum habet breve, nigrum, & in acuto recurvum. Colorem totius varium. Caput inprimis afpectus pulcherrimi, criftam in medio vertice erectam, subluteam, nigris & albis maculis variatam. Pupillam oculorum nigram, iridem luteam, fupercilia ex pelli-
cula coccineo colore rubente. Sub roftro & gulæ principio ceu barba ex tenuiffimis plumis dependet. Collum eft longiusculum, & ad corporis habitum affimilatum, tenue, & exile, cinereum, maculis albis nigris confperfum. Pedum digiti anteriores longi, pofterior brevis, finguli adunco hamo armati.

Loci fi ratio habeatur, nulli funt in Campania, quod ibi aconitum, quo purgantur, non proveniat. In Creta nonnifi in Cydoniatarum regione. In Cypro etiam domi aluntur. In Rhodo & Jonia laudatiffimi habentur, fed & in Hispania Pyrenæis, Arvernien-

*Defcri-
ptio.
Arist. H.
A. l. 9. c.
49.
Aristoph.
in Avi-
bus &
vellus.
Bellonius
l. 5. de A-
vibus c. 6.*

Bellonius
l. citato.

Jul. Alex.
l. 13.
Ialab. c. 5.

Aldro-
vandus
lib. c.

Loem.
Ambr.
Leo Pro-
blem.
343.
Plin. H.
N. l. 8.

Aldrov.
Ornithol.
l. 13. c. 9.

vernientibus Galliae & Alpibus reperiuntur.

Vitellus.
Athen.
lib. 9.
Dipnol.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 48.
Æl. H.
A. l. 15.
cap. 27.

Vitellus granis & frugibus. Loquuntur nomen suum qua possunt voce, & decantant. Vocales capti, obmutescunt, si Plinio & Aliano credimus: in suas sedes dimissi & in Ægyptum aliquando deportati, & in sylvam dimissi, coturnicis primo vocem emisere, post *quæ vult unanité nâpaxa* explanatissime protulisse finguntur.

Affectus.
Ælim. de
Anima-
lib. 1. 6.
cap. 45.

Amant cervos & dorsis illorum insiliunt. Cum Gallinaceis vero inimicitias exercent. Caro in *Cibo* est laudatissima, seu sanguinis optimi generationem seu excrementi paucitatem, seu concoitionem alimenti attendas. Candida est, tenera, & fibris prorsus carens. Conceditur purulentis à Traliano; Nephriticis à Galeno. Cerebrum genituram augere Avicenna reliquit.

ARTICULUS V.

De Gallina Corylorum.

Descriptio.

Gallina Corylorum Alberto Bonafæ & Orix, Longolio falsò Otis, Bellonio Gallina rustica M. Varronis, aliis Perdix montana & Sylvatica dicitur. Caput ipsi & rostrum ex descriptione Bellonii & Gesneri, est instar Perdix, rubet in superciliis. *Dors* pennæ superiores Ascolopacis similes: sub ventre è regione ventriculi albescunt, nigro maculatæ, in utroque latere sub alis. Remiges alarum ad instar Aluconis maculantur. *Cauda* grisea, in extremitate alba, deinde nigra ad pollicis magnitudinem; macula, qua superiores pennæ quæ ceteras tegunt, carent, tinctæ, cætera colli Tetraonis colore. *Tibiae* plumis ad digitos usque teguntur, quæ villos leporinos fere referunt. Digni pedum corticosi, squammosi, glauci, multis lineis articulati. Aldrovandus fuscae maculae meminit, è qua ejusdem coloris tenues quædam pennæ ceu villi dependentes, tanquam barbam efficiunt.

Locus.

Reperiuntur in Hercynia sylva; sed & circa radices Alpium, ubi Corynæ & rubia abundant. Iis enim insident, rapacium volucrum insidias magis timentes quam hominum altum.

Vitus.

Vescuntur granis, sed inprimis julis seu nucamentis, quæ piper longum referunt.

Generatio.

Pullos educatos extra locum educationis ipsorum abducunt: illi vero bini, mas & femina aliorum se conferunt.

Usus.

Cibus suppeditant laudatissimum, & caro earum quatuor diversis coloribus secundum Gesnerum tingitur, secundum Albertum foris est nigra, intus alba. Mulieres quædam pennis certo tempore decerpitis, adversus uteri suffocationem, utuntur. Stumpsius Epilepticis salubres tradit.

Gesnerius.

Hippiatri tres quatuorve earundem ventriculos una cum cibo in eis contento, equis asthumaticis devorandos, dari precipiunt.

ARTICULUS VI.

De Otide sive Tarda.

Otum & Otidem ex veteribus Aristoteles, Athenæus, Plinius & Oppianus confudere, Starnam & Stardam seu Tardum ex recentioribus Conciliatoribus rapacem Albertus facit, & Bistardam vocat. Tetraoni congenerem non esse, quod ex Plinio Bellonius opinatur, vel peculiaris pedum constitutio, trydactilos enim est, evincit.

H.N. lib.
10. c. 22.

Quantum ad *Formam* fidipes est Athenæo, tribus insistent digitis, magnitudine Gallinacei majoris, capite oblongo, oculis amplis, rostro acuto, lingua ossea, gracili collo. Bellonio & Gesnero, crassior est & validior, gravis, tredecim cum dimidio libras interdum pendit. *Caput* habet inconcinnum, cinerei cum collo, & ad ventriculum usque procedentis coloris. *Rostrum* robustum valde, linguam ferratam, utrinque acutam, & in extrema duram. *Meatus* auditorius adeo patulus, ut extremitas digiti immitti possit. Si introspectas duo apparent sub plumis anfractus, unus rostrum versus, alter recta ad cerebrum vergens. *Pectus* crassum ac rotundum, cum ventre & cruribus quatenus plumis vestiuntur ad media usque femora albicans. *Dorsum* castaneis ac subnigris maculis respersum. *Alarum* pennas majores candidas, circa finem nigras. Pennarum radices rubras. *Caudam* pennis ruffis, cum tenuis quibusdam & maculis nigris superiore interioreque parte albis ornatam. *Tibiae* pollicem crassas, medium pedem longas, squammosas. *Pedes* admodum crassos, sub quibus talus magnus instar muscoli conspicitur. Dignos pedis utriusque contra reliquarum avium morem ternos tantum. *Interiores partes* si spectes, ventriculum habet magnum, in quo interdum calculi albi inveniuntur, in extrema gula ante stomachum partem capaciore ex multis rotundis carunculis compactum. *Intestinis* diductis & extensis id quod à fundo ventriculi ad alvum recta procedit, dodrantum est septem cum dimidio, appendices vero duæ ab alvo retrocedunt; quarum altera tenuior est tres dodrantes longa; altera amplior, duos cum dimidio; tres vero isti meatus juxta alvum in unam capacitatem conveniunt.

Descriptio.
Athen.
Dipnol. 9.

Bellon. l.
2. de Avibus c. 1.

Gesner. in
Ornith.

Locus.
Aldrovandus
Ornithol.
l. 13. cap. 12.

Quantum ad *Locum* in Italia non visuntur, nisi forte turbine advectæ. Hispaniæ peculiare esse credit Plinius, sed falso. Nam & in Græcia circa Cephissum Bceotiae

10. c. 22.

Hector
Boetius
in Hist.
Scotica.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.

Vitam.
Longol.
Dial. de
Avibus.
Genera-
tio.

Arist. H.
A. l. 6.
cap. 6.
Volat.
Xenoph.
lib. 1.

div. de
Affectu.
Aelian.
lib. 2. de
Animal.
cap. 28.

Plut. de
Solertia
Animal.
Oppian.
lib. 3.

Aelian.
l. 6. de A.
nimal.
cap. 24.
Idem lib.
5. c. 24.

Ufus.
Athen. in
Dipnos.
Demetrio
l. de Ac-
cipitrum
cura.

Alex. lib.
13. de
Sabba
cap. 5.
Plinius in
H. N.

tiae nascuntur, & in Britannia magnosunt numero, & in Belgium sub autumnum gregatim advolant, ibidemque in agris procul ab urbibus distitis morantur, nihil de Polonia dicam. Falsum itaque cum coturnicibus quod à Plinio traditur, quæ ab eo tempore Italiam deferunt, avolare. Arboribus nunquam insident, nec aquas nisi eas, quas post pluvias in camporum foveis relinquuntur, sitis sedandæ causa, frequentant.

Vescitur frugibus sed & herbis, ut auricula muris; & rapis ventrem implet.

Nidificat in terra, tricenis diebus incubatum absolvit, & parit cum matura seges est.

Volatu est propter corporis pondus admodum brevi & tardo, & capitur manu, si quis celerius instet.

Amicitiam cum Equo colit, huic appropinquare & finum dejicere gaudet, ita capitur. *Inimicitiam* vero cum vulpe & cane exercet. A vulpe inversa in terram abjecta, caudamque ut collum avis extendente, capitur. *Humilitatis* ob ponderosam corporis molem sibi conficia, simul ac canes latrantes audiveris, confugit.

Usum & in *Cibus* & in *Medicina* præbent. In *Cibus* caro Xenophonti apud Athenæum suavis, à Demetrio Constantinopolitano Accipitribus tanquam suavissima præscribitur. Julio Alexandrino quamvis nigra & durior, valenter tamen alit; si vel exquisitam in ventriculo concoctionem adepta fuerit, vel captæ & jugulatæ durities dometur.

In *Medicina*. Nam adeps apud Phryges & Lycaones mammis puerperio vexatis applicabatur. Fimi usum Avicenna contra impetigines prædicat. Ova eodem teste capillos nigro colore tingunt. Piscatores repræsentatis ex ipsarum pennis muscis, piscibus insidiantur.

ARTICULUS VII.

De Anate Campestris & Ave Stella dicta.

ANas Campestris propter consimilem digitorum numerum Oridi succedit. Bellonio Anas Campestris, Canne Petiere Gallorum: & Tetrax, & Galliæ peculiaris esse creditur; à rusticis Gallis Oliva dicitur. Ex ejusdem descriptione, est Phasiani corpulentia, *Capite*, si crassitiem demas, Coturnicem; *rostrum* quod nigrum pullum gallinaceum refert. *Dorsum* tribus aut quatuor coloribus, nempe flavo tendente ad rubrum, subcinereo, & rubro intermixto variegatur. Quatuor pennæ alarum in superiori parte in extremitatibus suis nigrescunt. *Pectus* alba torquis juxta ingluviem circumdat. Radices omnium plumarum

rubræ sunt & sanguineæ. Tres duntaxat in pedibus *digiti*. Omnia intus in avibus granivoris communia.

Vescitur granis absque discrimine omnibus, nec non formicis, scarabæis & muscis. Quamvis color colli & capitis semper idem non sit; & in hoc maris à femina differentia consistat; dorsum tamen & alæ nunquam colorem immutant.

STELLA tribus quoque digitis incedit. Totum corpus, si ventrem & caudam & alas majores excipias ex albo, luteo, & nigro ita variegatum est, ut qui color superet difficile sit judicare. *Rostrum* est longiusculum, in extremitate parum recurvum, nigricans. Venter & coxæ candicant. *Cauda* maculis nigris plurimis, quarum binæ transversales insigni sunt magnitudine, consperguntur.

ARTICULUS VIII.

De Oedicnemo Bellonii, & ejus congeneri Aldrovandi.

AVis, quam Bellonius Oedicnemum à tiliarum infra genu propter os quod valde crassum est, qua nota vel sola agnosci potest, singularem crassitiem, vocat, magnitudinem habet Elori, *rostrum* longiusculum, in extremo nigrum & flavum qua capiti jungitur. *Alis* intus albis, extra nigris Otidem, *dorso* Attagenem refert. Coloris enim est fumosi, maculis nigris per longitudinem ductis variegati. *Digiti* habet in pedibus ternos, *tibiis* ut supra. Tarde parit; & ineptæ ad volandum, sub finem mensis Octobris repertæ sunt. Huic respondet illa quam sub **CHARADRII** Aristotelici nomine Gesnerus descripsit. Galliæ parvæ aut columbæ ei magnitudo. *Rostrum* longiusculum, anterius nigricans, posterius flavescens, extremis partibus inferiore & superiore leviter decussatis. *Pennæ* in collo, capite, & pectore maculosæ, posteriore colli parte ad fuscum tendente; in dorso & alis fusæ, maculis quibusdam rufis insignitæ. *Crura* oblonga, coloris sublutei. *Digiti* terni, brevibus interiore parte membranis juncti. *Ungues* brevissimi & mutili. *Degit* in pratis palustribus; & aliquando in lacu Tugurinenfi glacie adstricto manibus se capi permisit.

Viscitat muribus quos, de nocte venatur.

Vocem tanquam fistulæ edit. Domi inclusa subinde ambulat, aliquando in orbem ad multum tempus, circa columellam aut aliud quidpiam; aliquando recto tramite; & si quid impedimento fuerit, transilipotius, quam à via recta deflectat. Oculos etiam si digitos admoveas, non claudit.

Addit Aldrovandus aliam Oedicnemo

Vitam.

Descri-
ptio.
Bellon.
l. 5.
de Avib.
cap. 5.

Gesnerus
in Ornith.

Vitam.

Vox.

congenerem. Crassitie corporis & pedum constitutione Otidem refert. *Rostrum* habet superius & inferius æquè longum, rutilum, rictu amplissimo, naribus valde, ut in Anserie patulis. Caput, cervicem, dorsum, caudam, & alas, ex flavo & castaneo elegantissime diluta & maculata. Ventrem totum, & femora, intus candida. Gulam & pectus albicantia, intercurrentibus maxime in pectore, maculis. Tibias si digitos pedum compares longissimos.

ARTICULUS IX.

De *Perdicibus* in genere.

Perdix, Græcis *πέρδιξ* & *πέρδινα*, Creten-
sibus *πέρδιξ*, Pergæis *Περδική*. Hefychio
dicitur. Quo nomine nostra ætate
hæc avis indicetur, non satis est
compertum. *Perdicem* rufum, veterum
minorem vulgarem *Perdicem* esse placet
Turnero; sed *rostrum* illius cinnabarinum
non admittit. Quidam apud Longolium
Otidem cum *Perdicibus* confundit. Bel-
lonius ex eo quod Aristotelis *Perdicem*
cum aliis avibus modo magnitudo par sit,
coire scribit, Coturno Græcorum, qui cum
Gallinis rem habuisse visus est, id nominis
imponit. Aldrovandus cui Coturnus, &
Coturnix, magnitudinem quæ pro diversitate
terrarum variat, (sunt in Allobrogibus
Perdices midiocri pulso non minores,) si
excipias, eadem; Coturnicem, *Perdicem*
rufam esse sentit, & *Perdices* minores
ab Athenæo appellatas, easdem cum
Avibus novis Plinii esse, & Starnas tan-
quam externas vocari contendit; Rusticu-
lam autem Plinii, quam Dalechampius
& Suesianus *Perdicem* minorem esse cre-
dit, Gallinagini quam Aseolopa seu Scolopacem
Aristoteles vocat, ex descriptionum
tollatione accenset.

Genera ipsarum sunt plurima. Strabo In-
dicos vulture & Anserie majores tradit. De
Græca seu majore ruffa aliquid diximus.
Ælianus Syroperdicem vocat avem, per-
dice minorem & nigram, rostro ruffo, man-
fuescere nesciam, quæque circa Antio-
chiam Pisidiæ lapidem exest, & conficit.
Idem *Perdices* Cyrrhæos vocat, qui neque
ad certamine valent, neque pulchre cantare
sciunt, & alio vescuntur. In Chio insula
sunt rubræ, Gallinæ magnitudine. In
Ægypto cineræ, alibi albæ. Apud Tro-
glodytas Gallinacei magnitudine, rostro
& cruribus seu fuscis seu luteis. In regno
Barnagassi, quædam Caponum magnitu-
dine, pedibus & rostro luteis, minores Gal-
linis, alias pedibus & rostro purpureis, non-
nullas rostro & pedibus cineris. In Hispani-
ola diversicolores, suavissimi saporis. In
continente, si Oviedo credendum, Hispani-
carum Gallinarum magnitudine, duplici

pulpa, alia alteri substrata, eæque tantæ molis, ut unam ne insignis quidem helluo absumere queat. Colore sunt in pectore, alis & collo cinereo. Ova ponunt ovorum nostratum Gallinarum magnitudine, colore lapidem cæruleum æmulante.

Quantum ad *internam constitutionem* bina habere in Paphlagonia corda, falso forte, prodidit Teophrastus, hybernis mensibus nullos habere, testes eadem fide alii. Ingluviem ventriculo in ipsis præjacere appendices non superne ut piscibus, sed inferne ad extrema intestini haberi, cum coeunt turgidos valde testes obtinere; verissime Aristoteles prodidit.

Loca si quæras, In Hibernia & Lemniorum insulis nullæ sunt, si Botero & Liberali credimus, nec minores in Creta, ruffæ in Belgio raræ. A duabus in Anapheu insulam immisiss, tanta vis procreata, ut incolæ de loco deferendo cogitarent. Apud Tarnassaros, Æthiopus, Samios, Creten-
ses, &c. eximia ipsarum fecunditas. In insula Caprea adeo pinguescunt, ut adipem eximant incolæ, & in futura convivia servant. Quæ in Bœotia, fines in Atticam non transvolant, si Athenæo fides, & si forte aliquo migraverint, voce ab indigenis dignoscuntur.

Vescuntur limacibus, unde ibi nulli, ubi *Perdices*, in Sciatho insula cochleis, alio, quod de Cirrhæis Ælianus prodidit; Sabulo, granis & aliis. Pamphagam esse suspiceris.

Libidinis sunt profusissimæ, unde salacitatis veneræ Symbolum. Sane *Mares* non tantum visis fœminis, sed & voce illarum audita, semen emittunt, ex animi forte impressione. Nam & si speculum contra eos posuerimus ad imaginem suam accurrentes idem faciunt. Idem, si Alexandro Myndio credendum, hiantes coeunt, & toto coitus tempore lingua exerta volant.

Nata jam ova, ne circa pullitei educationem occupatis fœminis, earum societate frustentur, frangunt, in aucupantes interdum Veneris impatientia ruunt, & capitibus ipsorum insident. si fœminarum copia non detur, vociferantur & pugnant inter se. Victum ajunt Venerem pati, & quidem tamdiu donec ipse alterius victor evaserit, quin in proprios pullos idem scelus committunt, eosdemque simul ferme ac exclusi sunt, subagitant, nec Gallinaceo parcunt generi, ex quorum cum *Perdicibus* congressu, tertium quid progigni Aristoteles reliquit. Nec remissior *Famella* salacitas. Si contra mares steterint, aura ab his flante prægnantes fiunt. Hiantes per tempus exerta lingua æstuant, concipiuntque supervolantium afflatu, sæpe voce tantum audita masculi. Adeoque vincit etiam libido fœtus charitatem, ut illa furtim & in

Plin. H. N. l. 10. cap. 35. Ælian. de Animal. l. 16. c. 15. Arist. H. A. lib. 3. cap. 1. Arist. H. A. l. c. ult. Arist. H. A. l. 3. cap. 1.

Athenæus l. 9. Dipn.

Vitruv. Arist. H. A. l. 9. cap. 37. Athen. lib. 9. c. 4. Æl. H. A. l. 4. c. 13.

Scalig. in Arist. de plantis. Generatio. Athenæus Dipn. l. 9.

Ælian. l. 2. de Anim. cap. 5.

Arist. H. A. l. 9. cap. 8. Plin. H. N. l. 10. cap. 33.

Ælian. de Animal. lib. 10. cap. 47.

Arist. l. 2. de Gener. cap. 2. Plin. H. N. l. 10. cap. 33.

Athenæus Dipn. lib. 9.

Athen. lib. 9. In Dialogo de Avibus. Bellon. l. 5. de Avibus c. 13.

Scaliger Exerc. 236. l. 3.

Athenæus Dipn. l. 9.

Genera. Geograph. lib. 17. Ælian. l. 17. de Animal. cap. 17.

Athenæus H. A. l. 4. c. 13. Athen. lib. 9. Dipnol. Nicol. de Nicolais lib. 2. Itin. Orient. c. 8. Scal. Ex. 236. 13.

& in occulto incubans, cum sensit foeminam aucupis accedentem ad marem, recanat, revocetque & ultro se præbeat libidini; quod tamen Plutarchus inficiatur. *Nidum* cæterarum avium more non exstruunt, sed partui vicinæ aream seu receptaculum è festucis substernunt, idemque spina & frutice; tum ut contra feras abunde valentur; tum ne ova à rore decidente vel imbribus & sic infœcunde evadant, afficiantur, muniunt, nec in quo loco peperere incubant. Septem vero diebus nidum contexunt, septem in pariendo consummunt, septenos pullos enutrient, si *Æliano* credimus: *Ova* bis quotannis ponere *Albertus* dicit; decem, sæpius quindecim & sedecim, illaque seu alba, seu ovis columbæ familia, alii addidere. An utraque *Perdix incubet*, ab aucupibus inquirendum est. *Exclusionem* quod spectat, pullos moræ impatientes, occupatis spatiis sponte erumpere pertusisque ovis, ubi primum caput exeruerint, pedesque protulerint, reliquo corpore adhuc adhærescente, procurere, sibi que cibum ductu matrum inquirere, ajunt. Sane more Gallinarum, plumis obvestiti, in agros ubi messis stetit, deducuntur, quod mater suo volatu iis cibum subministrare nequeat. *Vitam* ad quindecim vel sedecim annos extendunt, quod ad vigesimum quintum pervenire, apud *Aristotelem* legimus, mendum est. *Olfactus* ipse exquisitus.

Volatus ob corporis gravitatem & brevis & humilis; velox tamen & impetuosus, hyberno tempore gregatim, verno, cum proli student, binæ tantum volant. In *Beœtia* sui cum volant non esse juris, sed in ipso aère, quas transire non audent, metas habere, inde ultra notatos jam terminos nusquam exire, nec in Atticum solum transmeare, *Solinus* fabulatur. *Vocem* non eandem habent. *Beœticas* exili voce uti ajunt. *Athenis* circa *Corydali* pagum oppidum versus caccabant, ultra vero *nequid*. *Hesychius* *κακῆται* scribit; *Ælianus* quasdam vocis contentione & cantu valere ait. Ex ipsarum cantu certissimum jam appropinquantis diei signum, sed falso asserit *Bellonius*.

De *Pugnacitate* earum quædam produntur. *Alexander Severus* *Perdicum* & *Catulorum* certamine sese oblectabat. *Cyprii* easdem ad ejusmodi certamina enutriunt. Apud *Gesnerum* è *Sedunis* allata, selem mordebat. Pugnant & inter se cum gregatim per nemora pascentibus, foemina ceu futuri certaminis spectatrix sese offert, & nisi victori copiam sui faciens.

Victus nunquam in conspectum prodit. *Pulli* cum primum ad coitum educuntur, sua cute armati, quam vel ad arbores affricando, vel luto oblinendo asperam red-

dunt, pugnant. acuitur pugnacitas, si *trichomannes* & *polytrichum* in cibo offerantur, si *Liberali* credimus.

Sed & singulari pollere *Perdices ingenio* certum est. Si ad nidum cœperit accedere aucups, præcurrit ad pedes foeta, prægravem aut prælumbem sese simulans, subitoque in procursu aut brevi aliquo volatu cadit, fracta aut ala aut pedibus, procurrit iterum jam jam prehensurum effugiens, Spemque frustrans, donec in diversum abducatur à nidis. Eadem pavore libera, & materna vocans cura, in sulco resupina, gleba se terræ pedibus apprehensa, operit. Discurrunt & pulli astum, & quamprimum hominem adesse sibillo significavit mater, supini se collocant, & corpus quicquiliis tegunt. Nec deponit has venator fraudes. Antereta propositus, cantum ad pugnam lacescentem orditur. Sylvestribus ingruentibus pedem refert, ipsi in laqueos incidunt. Nolo sermoni humano enunciando aptos dicere, quod aliqui ex scriptoribus innuere, & latiuscula earundem lingua suadere videtur: Non caret tamen fide, interdum ita cicurari posse, ut, cum Gallinarum domesticarum cohorte promiscue habitent, quod apud *Aloysium Mundellam* factum; domi educatæ, ad montes interdum victum inquirendi ergo sub custodibus dimittantur, sibillo revocatæ sub vesperam redeant, quod *Nicolaus* à *Nicolaïs* in *Chio* insula communiter fieri prodit; & ab homine de loco in locum ad quatuor millia, ita ut ille terra iter faciat, istæ per aërem volent, quiescente quiescant, ducantur, quod in *Ponto* visum, *Odoricus de Foro Julii* tradit. *Ova* deperdita per alterius matris damna, ut adoptione alienæ sobolis suæ orbitatis incommoda reparent, resarcire, Natos in campos eductos, ut fuerint materna voce commoti, ovorum genitricem petere; ubi sensere medicamentum lætale parari, vociferari. *Cirrhasas* seipsas, ut ab aucupibus spernantur emaciare: porro ad vocem sonoram conciliandam uti; vulneri ori anum, mansum imponere; lauri foliis annum fastidium purgare; arundinis lecta, & seu comesta, seu in nidum imposita coma, oculorum fascinationem vertere, adductorum Authorum fide refertur.

Ufus *Cirrharum in cibo*, nullus aliis enim vescuntur: nostrates laudem apud omnes, Martialem si excipias, muruerunt, qui pullos veteribus, alas reliquis partibus præferunt. Fuere & exta & ova in usu. *Helio-gabalus* *Palatinis* ingentes dapes iis refertas exhibuit. Sed nec *Medicina* illis destituitur. Caro *Elephantiacis*, luc venerea affectis, fluxu alvi laborantibus prodest. Medulla & cerebrum cum vino, ictericis; ventriculus ex vino

Liberis in cong. mit. narrat.

Ingenium. *Plin. H. N. l. 10. cap. 33.* *Arist. H. A. lib. 9. cap. 8.* *Ælian. l. 3. de Avim. c. 16.*

Plut. de solertia Animal.

Scatius lib. 2. Sylv. Athenæus Dipn. l. 3.

Aldrovandus l. 13. Ornithel. cap. 16.

Nicol. lib. 2. Navig. Oriental. cap. 8.

Cassiodor. var. l. 2. Ætius l. 13.

Ælian. l. 4. de Avim. cap. 13. Arist. lib. 2.

Problem. lib. 19. Ælian. lib. 5. de Avim. cap. 46.

Plinius in H. N. Ælian. l. 1. de Avim. cap. 35.

Idem lib. 4. c. 13. Ufus.

Lampr. in Helio-gag. Car. din. in Comm. in Aphor. rif. Hippocr. l. 3. de diarr. Plin. H. N. l. 30. cap. 6.

Plin. l. c. Ælian. l. 3. c. 16. & l. 10. cap. 35.

l. 17. de Avim. cap. 15.

Arist. H. N. l. 9. cap. 8. Ælian. l. 10. de Animal. cap. 35.

Ælian. l. 4. de Avim. cap. 12. l. 10. Variæ hist. c. 3. Athen. Dipnos. lib. 9. Plin. H. N. l. 10. cap. 33. Arist. H. A. lib. 9. cap. 7. Volant. Ovid. l. 8. Metamorph.

Polyhist. cap. 12. Athen. lib. 9.

Æliana. l. 4. de Animal. cap. 13. l. 5. de Avib. c. 14.

Pugna. Lampid. in Severo. Lufignus in hist.

Victus. Ælian. l. 4. de Animal. cap. 1.

Idem l.
16. c. 18.
Galen. l.
10. de
simplic.
Disco-
rid. l. 2. c. 72.
Plin. lib.
30 c. 14.

nigro iliatis; jecur aridem comitali morbo laborantibus, sanguis suffusioni oculorum; fel in hebetudine visus, & albuginibus cum melle commistum; pennæ combustæ ad uteri strangulatum; ova ad lactis copiam, facere creduntur.

ARTICULUS X.

De Perdicibus in specie.

PUNCTUM I.

*De Perdice Græca Bellonii, Perdice ruffa.
Cinerea & Damascena.*

Bellon. l.
5 cap. 13.

PERDIX GRÆCA crassa quoque & Coturnus ex descriptione Bellonii dicitur. Nostratibus duplo crassior est; rostro pedibusque rubris, maculis ad anteriorem ventriculi partem eisdem quibus rostra respersa, mediocris Gallinæ magnitudine. Frequens est in rupibus Colmenis, insulis Cycladibus & Cretæ maritimis. Vox nostrarum voce major, coitus imprimis & partus tempore. Nidificant sub dio mense Majo. Ova edunt sub aliquo magno lapide octodecim, quandoque sedecim, ovis Gallinæ similia, minora, alba, maculis subrubris exiguis respersa, usui peridonea, sed quorum vitellus non congelatur.

PERDIX RUFFA sive major, columbam exprimit, rostrum habet Cocci colore, pedes minus rubent. Color cinereus per dorsum, pectus & caput decurrit. Oculorum palpebræ in marginibus rubent, ab iis linea nigra retro per collum tendit, inde reflexa per pectoris partem supremam sæpe circumlocum facit: quod intra eam est albicat.

PERDIX CINEREA, seu minor, Græcis ignota, ex descriptione Gesneri, coloris est varii, nec descriptu facilis. Rostrum subfuscum. Caput è ruffo fuscum; synciput, partes circa oculos, proram capitis simpliciter ruffa: collum & pectus cinerea, exiguis maculis nigris quasi per versus, crispis & undantes, interstincta: Dorsum, caudam & alas varios colores præ se ferendo, crura ex fusco albicantia. Gregatim volat, vere vero bimatim.

Perdix quæ sub DAMASCENÆ nomine Aldrovando transmissa est, brevitate & crassitie corporis ad Perdices accedit, minor tamen est, rostrum habet prolixius, pedes quodammodo luteos. Nec tamen Æliani Syroperdix est, etsi magnitudo respondeat. Nec enim est nigra, neque rostrum habet ruffum, imo illa mansuescit, cum hæc semper in feritate perseveret.

Æl. H.
A. l. 16.
cap. 7.

PUNCTUM II.

De Perdice alba, seu de Lagopode.

PERDIX alba, Lagopus à pedibus leporinis & villosis; Aristoteli, qui nullum animal præter unum leporem pedes villosos habere scribit, incognita; Hesychio & Phavorino *λεγοπιδος*. Horatio Lagois, nisi fortè piscem Romæ rarum & ideo carum, quod interpretes volunt, intelligat; aliis Perdix petrosadicitur.

Duorum autem sunt Generum.

Præ est columbarum magnitudine, tanti candoris, ut à venatoribus hoc solo, quod nives superat, visu deprehendatur, pedes tamen & rostrum nigricant, supercilia in mare inprimis rubent: collum maculis quibusdam nigricantibus perspergitur, & radices pennarum nigrescunt.

Alterum nomine eodem à coturnicibus magnitudine tantum differens croceo tinctu, quod Aldrovandus Perdicem Bellonii Damascenam, seu Syroperdicem esse credit. Dorsi & colli colore Gallinaginem æmulatur. Alæ quæ corpori junguntur, albas, fuscas & fulvas pennas habent; decem remiges cinereæ sunt; pars interior & venter albet, & torquem in pectore rubro, fulvo, flavoque coloribus constantem habent.

Describit & Gesnerus aliud, quod per æstatem fulvescere, & ne per hyemem quidem albescere dicitur.

Reperiuntur Lagopodes in Alpibus, & Pyrenæis montibus inque summis jugis imminentibus ei valli cui nomen Arbusi, qua fauces aperiunt, iter. Ita vero frigore, nive, & glacie delectantur, ut ubi locis inferioribus liquantur nives, altiora & soli averfa prosequantur loca, in quibus nix perennat.

Vocem edebat, quam Gesnerus describit, cervinæ non dissimilem.

Naturam si spectes, non extra terram, in qua nascuntur, iis vesci facile; quando nec vivæ mansuescunt, & corpus occisarum statim marescat. Latent quidem homine conspecto; eoque dissimulato sese motu prodere cavent, tanta iis fallendi similitudine nivis fiducia; sed tantæ etiam simplicitatis sunt, ut à venatoribus dispositam lapidum seriem transire non audeant, sed secundum illam, quasi secus murum insuperabilem decurrentes in decipulas incidunt.

Ufus earum & in cibis est. Præcipua sapore esse Plinius dicit. Saluberrimas teste Scaligero Norici credunt gustu, subamaras Gesnerus reliquit.

NB. *Perdices Indicas vide in Mantissa. N. 8.*

Arist. H.
A. l. 3.
cap. 12.

Horat. l.
2. ferm.
Satyra 2.
Aldrov.
l. 13.
Ornith. c.
21.

Genera.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 48.
Scalig.
Exercit.
59.
Aldrov.
lib. cap.

Gesner. in
Ornith.

Locut.
Plin. l. c.
Scal. l. c.

Vox.

Ingenium.
Plin. l. c.

Stumpf.
apud
Aldr.

Ufus.

Scaliger
Exerc.
59.

ARTICULUS XI.

De Coturnice Latinorum.

Genera.

Coturnix Græcis antiquis *ἰππεύς*, modernis *ἰππεύς* & *ἰππεύς*. Villa-novano, Quisquila, Gasio Quaquila dicitur. Unum duntaxat ipsarum observatum *genus*. Vifa tamen & Alba, si Aristoteli credimus; & in campis Russicis & Podolicis virentibus pedibus, quarum usus spasmus inducat, inveniuntur. Notæ quas suis veteres tribuunt, & in nostris reperiuntur. Parvæ sunt, pedes fissos, & pinnas duras habent. Theophrasto forte Perdices nanæ dicuntur. *Mas* & *Famina* distinguuntur, quod *Fœminæ* totus color quodammodo testaceus superius ad cervicem, dorsum, caudam & alas, ad mentum & pectus subluteus; ad ventrem fere albus. A rostro ejus supra oculos & aures linea insignis longitudinis alba, circulares aliquot maculas habens excurrit. Cauda pro proportionem major est. In *Mare* rostrum magis nigricat. Supra illud capilli quidam extant. Collum lineolis albis intercurrentibus rufescit. Pedes minus lutescunt; digitus vero eorum ita constituti sunt, ut medius primo & tertio longe major sit, posterior quem pro calce habet, longe exiguus. In *internis partibus* singulare quid obtinent. *Ossa* ipsis dura & solida. *Ingluvies* & gula prope ventriculum ampla & lata. *Cor* *quadrilaterum*, seu muricis modo in tres cuspides divisum. *Iecur* & fellis confectaculum intestinis agglutinata. *Fellis* ad intestina labentis canalem vix aspectabilem. *Testes* jecori subditos.

Arist. l. de colorib. Crome- rus l. 1. de Poloni- a. Plin. H. N. l. 10. cap. 23. Athen. lib. 9. Aristot. in Phy- siogn.

Arist. H. A. l. c. Athen. l. 9.

Gal. l. de promi- scua do- strina. Athen. l. 9. Joseph. Antiq. l. 13. c. 1. Procop. l. 13. de bello Vandali- co.

Polyhist. c. 18. Plin. H. N. l. 10. c. 23.

midioris. Plurimum se Aquilonibus credunt, ut corpora pinguiuscula atque eò tarda facilius provehat, siccior & vehementior spiritus. Ortygometra dicitur quæ gregem ducit. Eandem terræ proximantem speculatus Accipiter rapit, ac propterea opera est universis, ut sollicitent ducem generis externi, per quem frustrentur prima discrimina. Quod de tempore dixit erratum est, nisi de terris tepidioribus æstate apud eos depulsa intelligantur: quod de continuo volatu cum malis & velis infedisse observavit Bellonius, in Delum sæpissime delatas alii, in Ponticis insulis inquiescendi causa paucos dies morari Varro, falsum, quod de navigantium exitio vix credibile, nec tantam simul abire multitudinem verisimile, cum nonnullo corporis pondere & vento apto destitutæ, in locis apricis & tepidioribus remaneant. Austro nunquam exire falsum. Cum & Bellonius à Septentrione in meridiem tendentes, cum è Rhodo Alexandriam Ægypti navigaret, observavit; & Aristoteles Austro tanquam humido & gravi moleste volare prodiderit. Sec nec de Ducibus inter authores convenit. Aristoteles hæc loca adeuntes, sine Ducibus pergere; abeuntes. Lingulacæ, Otum, Ortygometræ, & Cynchramum Duces habere; ab hac noctu etiam revocari, scribit. Plinius id ad ventum transfert, & de Ducibus ita. Glottidem seu Lingulacæ initio blandita peregrinatione avide profectam, pœnitentia in volatu cum labore scilicet subit. Reverti in comitatam piget, & sequi, nec unquam plus uno die pergit. In proximo hospitio deserit. Verum invenitur alia anno intercedente relicta: simili modo in singulos dies. Cynchramus perseverantior festinat etiam pervenire ad expetitas terras.

Vicissim granis milii, tritici, & aliarum frugum. In Capreis insulis Acinis herbarum; apud Holandos Bryoniæ, secundum Portam malo Punico, semine canabæ, lolio, & tritico saginantur, sed & Hellebori semen perinde ipsis cibis, ac sturno cicuta, quæ hominibus venena esse creduntur; (ideo Plinius veneni semen dixit) recuperandæ sanitatis causa, cum Epilepsia tentantur, quod Aquæ placet, seu peculiari quadam naturæ suæ prerogativa, concoctio enim non vi duntaxat caloris, sed tota ventriculi substantia perficitur; seu, quod, cum pertenuis habeant ad corda penetrantes meatus, antea devorata cicutam concoquant, quam inde lethale gelu ad præcordia pervenerit, ut Divus Basilii censet. Aquam simul ac bibere, turbant, seu quod tali delectentur, seu quod singularem cum Camelis & Elephantis, quibus idem solenne, amicitia gerant.

Bellon. l. 5. de Avibus c. 20.

Varro l. 3. de re rust. c. 5.

Bellon. l. 5. de Avibus c. 17.

Arist. H. A. l. 8. c. 11.

Plin. H. N. l. c.

Vicius.

Junius in Novendil.

Lucret. l. 4. de naturæ.

Arist. l. de plantis. Galen. ad Pison.

Aphrodis. in proem. Problem.

Ambr. l. 3. He- xam. c. 6.

Plin. H. N. l. 10. c. 23. & 72.

Solin. Polyhist. c. 18.

Genera-
tia. H.
A. l. 9. c. 8.
Athen.
lib. 9.

Salacitas ipsis quæ Perdicibus, sapius coitum repetunt, & humi nidulantur. Sunt qui quotannis quater *prolem edere* velint; bis in his quas petunt, bis in his ad quas revertuntur regionibus. Ut sit, quo loco pariunt non incubant, ne quis locum longiores temporis mora percipiat. Sed eam ova cornicis similia, si, Bartholomæo Anglico credendum, excludunt; ex his pulli foeminae, rursus ad decem mense Augusto pariunt. Unde non mirum tantam Coturnicum copiam, & mense Majo incubanti insidiantem, spem centum & amplius perdere.

Volatus.

Volatus sunt modici, Austro præsertim flante, cujus humiditas corporis gravitatem auget, sed defectum cursu compensavit natura, hinc Comestori Currelii dicuntur.

Vox.

Vocem mari Aristoteles ademit, exilem Albertus credit, foeminae crassam. Mensis Aprilis initio canere incipiunt; num subito cum ad nos venerint, dubium. Vox nemini nota non est, & ideo apud Athenæum Pratinæ placuit, ut aliquis dixerit. Sapientes olim pro gnomone utebantur, quod verum cantu suo horoscopi emersum signare crediderint; cum in eo certum numerum servet.

Pugna.
Arist. in
Physiolog.
Dioscor.
in l. 4. c.
131.
Aristoph.
in pace.

Pugnacitas quæ avibus duræ pennæ communis, in istis adianthi usu accenditur, & occasionem, ut Aristophanes Carcini Poëtæ filios, *ἡρώων δαυανίτι* dixerit, & pugna *ἡρώων δαυανίτι* dicatur, dedit, satis olim Athenis & alibi nota fuit: ubi ad certamen tanquam ad gladiatores ludos effusissime conveniebatur, & Solon pugnantibus spectandis tempus impendere jubebat. Nec ignota Neapolitanis hodie, aliquoties victrix, duodecim saepe aureis venditur. Augustus quoque tanti fecit, ut Erotum Ægypti Præfectum, quod victricem per contumeliam edisset, morte infami multaverit, & Arcopagita puerum, quod Coturnicibus quas comprehendere posset, oculos erueret, damnaverint. *Antipathia* ipsis cum Pelicano, sed & cum Luna & Scole exorientibus, si Oro credimus. His visis terram fodiant, pupillasque identidem conscribillant.

Quintil.
lib. 5.
Instit.
Orat. c. 9.
Ælian.
l. de Ani-
mal. c. 49.
Morbi.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.
Hippocr.
l. re mor-
bo sacro.
Arist.
Com-
ment. in
Aristot.
in Plan-
tis.
Rhod.
lib. 6.
Antiq.
lect. c. 7.
Ingenium.
Oppian.
in Ixenti-
cis.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 29.

Epilepsia eas laborare, experientia comprobavit, sed solas præter hominem quod Plinius prodit, falsum; cum Hippocrates, capras & oves, Scaliger canes, Rhodiginus feles & arietem, Absyrtes Equos, Brodæus Accipitres & Graculos, eodem morbo vexari scribant. Quæ de *Ingenio* ipsarum Oppianus & Plinius, nempe adverso statu pondusculis lapidum appensis aut gutture arena repleto stabilitas volare, & cum mare transvolant, singulas ternos ore lapillos ferre, singulos per intervalla dimittere, sic utrum mare tranarint observare,

produnt; *ὑπερβολὴ & περισσὴ πλῆθος* esse videntur. Bellonius in naves lapsas aperuit, & milium duntaxat reperit, lapidum non obliturus, si aliquos invenisset.

Ufus Coturnicum olim in cibis apud quosdam nullus, quod veratro vescantur, & comitali morbo laborent. Galenus quosdam, qui edissent, in Doride, Bœotia, & Thessalia musculorum distentionibus correptos observavit. Nos nihil tale sentimus, ut nec ex capris vel avibus quicquam, ex modico esu assarum inprimis optimum pollicetur sanguinem Aldrovandus, ex immodico, pinguiorum inprimis, putredinalem febrem minatur. *Usum in Medicina* si requiras, cerebrum ex unguento myrteo tritum, & stanneo vase repositum, Epileptico paroxysmo medetur, si faciem eo illeveris. Adeps cum pauco helleboro membro pudendi inunctus, venerem auget, cum melle, myrrha, & chalcanto albo oculorum vitia corrigit. Cum Zingibere tritus, Equorum oculos incolumes servat. Caro inveterata porcorum & piscium escæ immiscetur.

Vox.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.
Galen.
lib. 6.
Epidem.
comm. 5.

Galen. de
Euporist.
cap. 155.

NB. *Coturnicis genus exoticum vide in Mantissa. N. 7.*

ARTICULUS XII.

De Ortygometa.

DE Ortygometa quam Plinius & Gaza Matricem, Villanovanus Ethygometa, Scaliger Coturnicomatrem, & verius vocat; vix, quid certi dicendum sit, habemus. De forma nihil fere ab Antiquis traditum est. Aristotelem si excipias, qui palustribus avibus facie similem esse reliquit. Sed nec ex Recentioribus quicquam certi colliges. Scaliger non ab similem gallinagini, magnitudine partem, colore tamen dilutiore, facie tota coturnicis, esse, & ab aucupibus matrem Qualearum, ab aliis Rasele dici, scripsit. Bellonius duplicem ponit. *Unam* quam Rasele quoque nuncupat. *Alteram* quam in genitis degere affirmat, magnitudine Ortygometræ nigræ, quam falso Rallum nominat, colore præcipue ruffo, in alarum costis subrubente, in femoribus castaneo, maculis albis interstincto; capite perdici cinereæ simili. Aldrovandus, qui aquaticarum hanc fere speciem esse putat, ut crura habeant oblonga, digitum qui pro calce est perbreve, corpus gracile, plumas plerumque varias, ventrem albicantem, caudam brevem, rostrum longiusculum, modice flexum, avem, quam à Cardinali Palcotto acceperat, quæque rostrum coturnice majus, caput, collum, dorsum, & majorem alarum partem testacei coloris, alas qua ventrem contingebant rufescentes, crura pe-

Plin. l. 10.
Scaliger
in Comm.
ad l. 8.
Arist. H.
A. c. 15.
Arist. H.
A. l. 8. c.
12.
Scalig. lo-
co citato.

Bellon.
lib. 4. de
Avibus
cap. 19.

coloris in regno Mangi pilis more felis nigri visuntur. De reliquis suis locis agemus.

Forma.

Arist. H. A. l. 9 c. 8.

Laert. in Salone.

Plin. H. N. l. 10 c. 17.

Arist. H. A. l. 2 c. 8.

In itinere Moscovico.

Apic. l. 6 c. ult.

Plin. H. N. l. 10 c. 56.

Galen. l. 11 de ulaparium. Arist. H. A. l. 3 c. ult.

Plin. H. N. l. 11 c. 37.

Quantum ad *Formam*, Gallum galinaceum Alucone scilicet majore *minorem* prodidit Aristoteles. Soli fidipedum altitulum *colores* diversi sunt, & nitorem hunc si attendas, majori speciositate quam Croesus vestuntur. Spectatissimum insigne ipsis, corporeum ferratum, nec carnem id esse, nec cartilaginem, nec callum jure dixerimus, verum peculiare. Christam Latini

καυκαλόν, *καυκαλίαν* vel *καυκαλίαν*, *καυκαλίαν*, & *καυκαλίαν*

Græci, dixerunt. Semper est exerta & rubens dum integra sanitate fruitur, & mirum de ea Herbersteinus. Cum cuidam in Moscovia frigore jam fere enecto, abscissa fuisset, sibi restitutum, erecto statim collo cantasse. Plicabilem Gallinæ obtinere, & per medium capet deorsum dependentem. *Oculos* omnes habent splendidos, salacitatis indicium. *Paleæ* (Aristoteles *καυκαλίαν* ob purpureum floridumque colorem vocat) ex rutilo albicantes, sub mento & collo, velut incanæ barbæ dependeant. *Rostrum* robustum, in superiori parte aduncum, coloris plerumque corni visitur. *Caro* quæ rostrum undique cingit, nonnullis mentum, Columellæ gena est. *Subæ* (sic longiores cæteris plumas Columella dixit) collum & cervicem undique ambiunt. Velpetus vel pars ventris posterior *Navis*, à qua pullum aperiri jubet Apicius, vocatur. *Cauda*, quam *ὄνυξ* Hesychius vocat, maribus major, quam foeminae, binæ longissimæ incurvi arcus imaginem propter teneritudinem præ se ferentes, in foeminis sunt, quæ capis saginandis sub cauda evelluntur, pinguefactorias Germani dicunt. *Calcaribus* quæ *καλκάρια* & *κάλκαρα*, arman tur mares; inque iis in magnam quandoque molem excrescunt, sed & gallinæ cum mares vicerint, cucuriunt, crista etiam caudaque erigitur, ita ut difficile sit, an sint foeminae, cognoscere, nonnunquam calcaria parva, errore naturæ an opere ignoro, iis enascuntur. Plinius Gallinas probat imparibus digitis, aliquando & super quatuor transversos uno, Columella quinque, ita tamen ne cruribus emineant transversa calcaria, sed hæc ad Oeconomiam spectant.

Internarum partium ista est ratio. *Ossa* habent consistentiam laxam, cavam & levem. *Ingluvies*, quæ *πτερόθυρον* & *φάρυγξ* ventriculo præposita est. Appendices habet infra, quæ desinunt intestina, ut vere ultra ventriculum esse Plinius scripserit. Pellicula intra ventriculum stercorei destinata, Echinus, ab aspredine dicitur, Dioscorides *καυκαλίαν* vocavit. *Testes* gallinaceis sunt subjecore, foeminae supra caudam. Uterus ex descriptione M. Antonii Ulmi duplex habet foramen. Infernum per quod ovum ab externa respiciens jam perfectum egreditur:

supernum & internum per quod sub septo transverso inchoatum, ad formam perfectam suscipiendam ingreditur. Totus in parte sinistra ad spinam situs est, dextram abdominis & centrum, intestina obtinent. Exitum ipsi in superna ad spinam desinente parte dedit natura, quia animalia supergressu coeuntia, instrumenta in proximo habere oportebat, in inferiore podicis ad ventrem positus, quia infra illius est officium. Uterque tam proxime cute, quod præputium dixeris, & musculo, sphaerica figuræ, ut extensioni magis accommodi essent, obteguntur, ut arctissime conniventia, sensum ipsum aliquando fallere possent. Uteri substantia membranaea & crassa est, figura concava, trium digitorum longitudine, qua ad exitum pertinet latior. Porrigitur ab infimo abdomine, juxta ipsorum intestinorum exitum, ad locum conceptionis ovorum sub septo transverso, estque cum extenditur longitudine dodrantali, cujus longitudinis ratione, membranam obtinuit à spina dorsi proportionalem omnino ac persimilem intestinorum mesenterio, quam & venæ frequentes percurrunt, cum ad nutritionem ipsius uteri, tum ad ovi intrinsicis contenti, dum pertransit à loco sub septo transverso, ad ipsius uteri exitum, alitionem. Membrana autem (verba sunt Ulmi) spinæ colligans, eadem prorsus existit ipsi mesenterio intestinorum, quin imo eadem est & substantia, & origine: quapropter consensum habet uterus cum ipsis intestinis. Figura uteri inæqualis, alibi angusta, oblonga, alibi lata, brevis, juxta hanc varietatem, varia quoque sortiri nomina debet. Nam uteri latitudo infimo abdomini proxima, & in qua ovum jam absolutum continetur, estque ipsemet uterus, reliquum vero corpus angustum, oblongum, rotundum, quod ad septum transversum extenditur, vel *uteri stomachus*, vel *uterus productus* extensivus, vel *uteri gula*, nuncupari posset. Est autem membranaea & tenuis, admodum diversa à reliquo utero protenso, & à substantia ipsius uteri, qui ad exitum jacet. Nam finis hic membraneus subtilis & pellucidus existit, ac exanguis. *Intestinum* quoque *uteri*, ratione figuræ & quantitatis, cum cum longitudine rotunditatem cavernosam habeat, merito diceretur. Cui accedit membranae occasio hanc uteri extensionem, vel productionem spinæ colligantis, quod *Mesenterium uterinum* appellamus. Intermedia pars uteri, quæ est illius portio ab utero propriè dicto, finem interjacens, crassam obtinet substantiam, albam, lacti similem, & in semetipsam confidentem, cujus mesereon multiplices venas habet. Hujus substantia cocta ovi albuminis gustu saporem exhibet.

De *Vitæ* non est quod multa dicamus. *Vitæ*.

Præ-

Præcepta faginandi ad Oeconomiam pertinent. Uvis & ficibus impense, sed infelicer vefcuntur. Steriles enim evadunt, & pituitosi, si vel semen cannabis apposueris; numerosorum ovorum partu gaudent, si vel hordeum semicoctum, vel Nasturtii semen cum fursure & vino subactum, exhibueris, majora deponent, ad faginandum tum triticum cum aqua coctum, potu interdicto, tum Cytisus vehementer laudantur.

Generatio. Quantum ad *Generationem*, & quæ ei adhaerent. *Sexus* in hac ave manifestis signis distinxit, & mas erecta crista, juba, à cervice per collum dependente, cauda majore, & insigni ad præliandum calcari superbit. *Salacitatis* vero sunt inexhaustæ. Nam et si peculiare ipsis coeundi tempus, vernum esse, unde majores forte tum testes, Aristoteles innuere videatur, & ad unum ovum fecundandum multoties cum eadem gallina gallus coeat, quin & quidam effeminati à primo ortu nascuntur, ut nec cucuriant, neque fœminas ineant, & Theophrastus agrestes cortalibus ad venerem procliviores dicat: certum tamen simul, singulis diebus quinquagesies & amplius uxores suas Gallum inire, si eas mori contingat, mœrore animi interdum contabescere, si illæ desint, ne à masculino quidem genere sibi temperare, unde lege vicomburio damnabatur, alias non sui generis volucres, Phasianos nempe & Perdices aggredi, & semen ad Gallinarum & conspectum & vocem emittere. Quin nunquam qui in æde Herculis pascebantur ad Gallinas, quæ in Hebes, interfluente utramque ædem rivo perenni, transvolabant, nisi cum libidinis vexabantur stimulis. Non æque tamen falaces omnes, laceratosi, rubenti, erectaque crista, rostro, brevi, pleno, acuto, oculis ravis aut nigris, palea rubra, collo vario, fœminibus pilosis, unguibus longis, cauda magna, frequentibus pinnis, profusissimi in Venerem esse creduntur. *Coitus* tempus mari, statim ac à cubili surgit, fœminæ, progressio jam die, superveniente illo, confidet ista humi à coitu inhorrescit, sæpe festuca aliqua se lustrat, & vapore per libidinem excitato membra extendente, sese excutit. *Departu & ovis* ne hoc caput nimia mole legentes perturbet, in sequentibus separatim dicemus. *Animales actiones* quod spectat, quia Gallinæ unico oculo sursum elevato, rapaces aves observant, *Visu*, quia aridissimum quodque modo id ore recipere queant, illico judicant, gustu pollere videntur.

Vox Gallinæ mutabiles. Circa partum *xxxxx* seu singultit, dum incubat, glocit seu glocitat. Cum iniri debet, mancam & exilem vocem format, in genere gracillare & pipare dicitur. Cantus, pro malo

omine accipitur, & inter obstetricum numeratur observata. Galli prope Thessalonicam nullam habent, apud nos graviores, sed vere *xxxxx*, qui nec choro, nec fidibus concordat, *xxxxx* & cucurrere solent. Vigiliis hos nocturnos excitandis in opera mortalibus, rumpendoque somno natura genuit. Norunt sydera, & ternas distinguunt horas interdum cantu, cum sole eunt cubitum, quartaque castrensi vigilia ad curas, laboremque revocant, nec solis ortum incautis obrepere, diemque venientem nunciant cantu, ipsum vero cantum plausu laterum, hinc *xxxxx*, & lucis prænuncius dicitur, & veteres gnomonibus horariis destituti, noctis deliquium & diei accessum commetiri solebant. Marutinum cantum, quidam alimenti desiderio, (avide animal calidissimum nutritur) alii salacitati (initurus cucurrere incipit) nonnulli auræ mutationibus, quæ ex solis contingunt motibus, multi cum & satur, & à coitu canat, occultæ cum sole a micitiæ vendicant. Qui profunda nocte validius, mane remissius cantare putant cantum vento ferri, ventum noctu magis quam sub crepusculum spirare, sic gallum longius audire, opinantur. Muri evadunt, si vel circulum è sarmentis callo addideris, vel caput & frontem oleo inunxeris, si Plinio & Alberto credendum.

Singularum iis inesse *Fastum* tum inde colligi potest, quod imperitant suo generi, & regnum in quacunque domo sunt exercent: tum quod nullam ineundi sui absque atrocissimo certamine copiam faciunt, tum quod ædes ingressuri, sese, ne scilicet crista uspiam offendantur, inclinent.

Pugnacitas nulli est ignota. Ejus spectaculum, quo Miltiades Græcos in Persas felicissimo successu animavit, Socrates Iphicrati Duci animos adjecit, Themistocles exercitum contra persas ducens instituit, Pergameni quotannis celebrare. Eo Tarnassari Indiæ populi, Ambivariti, apud quos per octo dies summo partium studio in curia quotannis committuntur, Galli, Angli, hocce tempore delectantur. Accendi, & alio, unde *xxxxx*, politricho, trichomane & adiantho, forte quod cristam Galli quodammodo æmuletur, dicuntur, apud veteres stimulis ferreis aeneisque, quos pleetra vocant, armabantur, ut se facilius tutarentur in pugna. Nec hæc caret singulari artificio. Videre est ibi intenta projectius capita, in flatas comas, vehementes ictus, cautissimas evitationes, & in omni motu animalium rationes expertium nihil non decorum. Si ex certamine victoriam reportavit, tum oculorum eminentia, tum cervice erecta simul, & cantus contentione insolenter effertur, & triumphantis similis est, vere *xxxxx* Martis pullus.

Mathioli
in Dio-
scor. l. 3.
cap. 148.

Generatio.

Oppian.
in Ixeuti-
cis.
Arist. l. 9.
cap. 49.
Theophr.
apud A-
then. l. 9.

Ælian. l.
4. Plur.
in l. num.
brutara-
tione u-
tantur.
Athen.
lib. 9.
Dipnol.
Ælian.
lib. 7.
cap. 46.

Arist. H.
A. l. 5.
cap. 2.

Scaliger
Exer.
266.
Vox.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 21.

Plin. H.
N. l. 29.
cap. 4.

Plin. H.
N. l. 29.
cap. 4.

Plin. H.
N. l. c.
cap. 21.

Athen.
lib. 9.

Ælian. de
Animal.
l. 4. c. 29.
Pugna.

Bezan. in
Gortoda-
nicis. l. 7.

Rhodig.
Ant.
Lecl. lib.
16. c. 13.
Plin. H.
N. l. 22.
cap. 1.
Porta
in Phi-
togn.

August. l.
1. de or-
dine Po-
litico. in
Rusticis.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 20.
Ælian. de
Anim. l.
4. c. 29.

Videtur.

Victus idcirco non canit, quod ex illa mala pugna spiritus, fracti vocem supprimunt. Cujus offensionis verecundia confusus, in primam quamque latebram sese occultat. Ad *sympathiam* & *Antipathiam*,

Affectus.
Colu-
mella de
R. R.

Æl. H. A.
l. 5. c. 28.

Ambros.
Hexam.
lib. 6.
Æl. H. A.
l. 8. c. 28.

Plin. H.
N. l. 29.
cap. 4.
Lucret. l.
4. de Na-
tura re-
rum.

Ælian. de
Animal.
l. 3. c. 31.

Dioscor.
l. 4. c. 75.

Arist. in
H. N.
Plinius in
H. N.
Colu-
mella de
R. R.
Plin. H.
N. l. 29.
cap. 5.
Scaliger
Exer. 88.
Morbi.
Plin. H.
N. l. 20.
cap. 6.
Colu-
mella de
re rust.

quæ sequuntur, pertinent. Quod de Gallinis circa præsepia decedit, immixtam pabulo necem bobus affert. Porphyriorem tanto amore Gallum prosequutum, ut hoc occiso, ille inedia perire voluerit, Ælianus oculatus testis est. Apes deficiente cibo gallinarum carnibus, & uvis passis resocillantur. Leo Gallum, & maxime album, ut Ambrosio placet, metuit, quem ex cantu à longe, ex crista propius agnoscit, seu ob occultam quandam causam, nam à leonibus & Pantheris homines non attingi, qui jure Galli peruncti fuerint, maxime si ei allium admisceatur, Plinius vere an falso prodit: seu quod sint

*Gallorum in corpore quadam
Semina, quæ cum sint oculis immixta Leonum,
Pupillas interfodiunt, &c.*

Basiliscum, cum cucurrientem audit adeo tremere dicunt, ut emoriatur. Sic in Cyrenensium arenis ab itinerantibus abigitur. Vulpes una nocte quadraginta interdum & amplius aufert. Voce mustellæ Gallinæ sero exanimantur. Superventu vero eorum, qui serpentis vel canis rabidi morsu læsi fuere, incubitus vitiantur. Eo tamen die quo peperere, à serpentibus non læduntur, & caro earum tum à serpentibus morsis remedio est. Florem vitis si comederint maturescentium uvarum esu abstinent. Ex Sambuco magis conoram buccinam fieri pastor credit, si ibi cædatur, ubi Gallorum cantum frutex ille non exaudiat, seu quod in locis sylvestribus, in quibus Gallorum cantus non auditur, ficciora & solidiora ligna nascantur, ex talibus tibia magis sonora torquetur, seu & ob aliam causam. Nam ob streperam Galli vocem, stridore suo fungosam sambuci materiam convellere, vix verisimile fuerit. Denique taxi baccis quidem impunè vescuntur, sed sparti semine, & hominis qui helleborum bibit excremento, ut Avicenna testatur, intereunt: si cum incubant tonuerit, ova pereunt, & semiformes pulli interimuntur. Auro liquescenti si Gallinarum membra misceantur, consumunt id in se, ita hoc venenum auri est, falso scripsit Plinius, & ab experientia confutatur.

Morbi Gallis peculiares, Phtiriasis & Pituita. Hac inter messis & vindemiæ tempus, & cum ficus ac uva immatura ad satietatem permixta est, laborant. Aqua in qua origanum maduit, præservantur, restituntur sanitati, si vel urina rostrum ablueris, membrana qua tum lingua obducitur leviter unguibus avulsa, vel scillam in aqua maceratam cum farina exhibueris.

Aphthirias maxime dum incubant instantur, si arena littorali vel saponariorum è lixivio relicto cinere cura mulierum sese pulverent, liberantur. Solent & cum abortu canflictari, qui ovi candido assato, cum uvis passis tostis æquo pondere tritis & ante alium cibum exhibitis, præcavetur. Pulli facile Podagra tentantur, si sterco pedibus eorum adhæreat: quanquam an Galli quibus calor multus, cibi abstinentia non minor, ea laborent, dubitetur. Capis sane quibus pusillus calor & edacitas multa familiaris est.

Scaliger.
Ex. 277.
f. 2.

Quæ de *Ingenio* dici poterant superius sunt attracta, singulari familiam amore prosequi, & simul ac aliquid escæ nactus est, Gallinæ & pullos ad vescendum invitare, easdem contra Milvos defendere, parientibus foeminis condolere, & mororem exili testari voce, Luna exoriente letari, & quod summa admiratione dignum est, cum sese sanguinis copia aggravari sentit, unguibus sanguinem ex cristis prolicere, sic plethora levare, helxine se herba purgare, adjecisse sufficiat.

Ingenium

Porphyr.
lib. 3.
Ælian. de
Animal.
l. 4. c. 29.
Plin. H.
N. l. 8. c.
27.

Nec omittendum, Gallos si tempore pluviae canant serenitatem, si noctu citius, quam solent, aëris mutationem & ventum, si paulo post solis occasum vel à vespertino crepusculo, insolentes in raucifonum cucurritum non sine alarum motu prorumpant, tempestatem prædicere. Scilicet, Auster vocalia instrumenta replet, ea sarcina dum se per motum exonerare volunt, ad cantum insolito modo stimulantur. Sed & Gallinæ, si vel mane exire recusant, vel pediculos quærant, & paludes more Anatum alis verberent, vel pectora rostro purgent, vel in arena ultra solitum sese concutiant, vel in principio pluviae locum operum quærant, imminentes imbres maximos prælagire, creditum est. Tempestive serendum esse monent, si pennas, cum deplumantur, ut ante hyemem solent, à capite amittere cœperint, ferotinè, si à posterioribus.

Præsa-
gium.
Ælian. de
Animal.
lib. 7.
cap. 7.

Aldrov.
Ornith. l.
14. c. 1.

Ufus harum avium in cibis frequens & ab omnibus laudatur, saginatarum in primis. Ideo hoc primum antiquis cœnarum interditi exceptum invenio jam lege C. Fannii annis undecim ante tertium bellum Punicum, ne quid volucrum poneretur, præter unam Gallinam, quæ non esset altilis, quod deinde caput translatum, per omnes leges ambulavit. Inventumque diverticulum est in fraudem earum, Gallinaceos quoque pascendi lacte madidis cibis, multo iragratiores appobantur. Nec tamen in hoc mangono quicquam totum placet. Pertinax Imperator lumbos amicis mittebat, & dorso laganis sunt similes. Messalinus Cotta cristas cum palmis pedum & Anseribus torrere, atque patinis condere reperit

Ufus.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 50.

Capito-
lin. in vi-
ta ejus.
Athen.
lib. 14.

Ce-

Galen. l.
de cib.
boni mali
& succi.

Galen. l.
3. de ali-
ment.
Alpin. l.
3. de Me-
dic. Æ-
gypt.
cap. 16.

Hippocr.
lib. de
morbo
sacro.
Cesar. l.
5. de bel-
lo Galli-
co.

Hippocr.
l. 3. de
morbis.
Trallian.
l. 12. c. 5.

Cerebrum assum cum pauco sale & pipere editur. Jecinora inter omnia edulia Cardanus celebrat. Ventriculus si concoquatur, uberrime nutrit. Intestina quæ & Gileria vocabantur, cum aliis quibusdam rebus incocta edebantur. Testes apud Bononienses Calend. Augusti comedere solemne est. Uropygium inter militares cibos à Gallis computatur. Erant Galeni tempore, qui & sanguinem Gallinarum edebant. Apud Ægyptios nigra arte certa saginata in familiari sunt usu. Jus foeminae in balneis potant, sic pingues evadunt. *Apparatum pullorum Conchiliatorum, Parthiorum, Oxyzoniorum, laferatorum, cum cucurbitis exiliatorum, Varrianorum, Frontonianorum, tractogalatorum, farfilium, leucozoniorum, & his similia, in Apicio vide, ex quo multa Aldrovandus desumpsit. Olim tamen qui morbo sacro laborabant, Galli carnibus abstinebant. Britannis olim nefas Gallinam gustare, hodie in Socotora insula eandem contingere, religio est.*

De *Ufu in Medicina* quis unquam dubitaverit. Inde olim superstitione Æsculapio immolabantur, nec quisquam fere est morbus cui depellendo non adhibeantur. Reperti qui ex forbili ovo ter quaterve ex creverunt, si Brasavelo fides. Febrientibus albumen ovorum in aqua concussum exhibuit Hippocrates. Testes in hectica commendantur. Cerebrum Gallinarum in tremore & narium fluxu. Melancholicis Gallina nigra per medium dissecta bene supra caput imponitur. Sunt qui Gallinæ pennam in aceto intictam ad somni profunditatem conferre tradunt. Jus Galli veteris Asthmaticis prodest. Stercus album Galli ad occultas anginas commendatur, & cerò vomitum educit, nec male in colica exhibetur, & cum oleo & nitro mixtum clavos pedum sanat. Membrana ventriculo subdita cornu similis trita, stomachicis feliciter exhibetur. Jecur assatum Illæo resistit. Marcellus denique Empiricus prodidit, ossiculum extremum ex ala Gallinacea cochleari terebratum, nodisque septem litio ligatum, atque ita brachio vel cruri ejus partis, quæ inguina habet suspensum, iis mirabile remedium exhibere. Pro Colophone notandum est, quod Coelius Aurelianus reliquit, quandam à Galla pugnante leviter læsum, in rabiem cecidisse.

AD ARTICULUM I.

A P P E N D I X I.

De Gallinarum ovis.

Dupliciter Gallinam ova concipere, Per se nempe, & Ex congressu, constans

ferè veterum & recentiorum est sententia. Priori concipiuntur modo, quando mare absente, desiderio ipsius projiciunt intra sese semen gallinæ; sic, tanquam maris initum passæ essent, prægnantes fiunt. Excitat ingentem in partibus genitalibus pruritum, seminantis materiæ abundantia, quam mutua inter se libidinis imaginatio laudet, sed & si tempore certe suaviter attraherentur, idem motis attractione humoribus faciunt, ut haud falso, etiam pulvere Plinius dixerit. Accedit ventorum Austrinorum Autumno & vere auxilium. His flantibus, aves multiparæ loca ani per quæ concipiunt, obvertunt, iis ad libidinem concitantur. Continuis caudæ ut motus, semen quod copiosum, nec menstruorum discessio ulla, ad matricem attrahit. Hinc à vento concipi aliquando creditum. Hæc ova *congressu* seu subventanea & zephyria dicta sunt, ut cynosura & urina illa, quæ æstate ab humore contento inutili generantur. Neque tamen omnino inania credas. Omnes enim partes habent, minora *zephyria*, liquidiora, minus suavia, & infœcunda per se, à superveniente Gallo fecundantur. Nec obest vel ex luteo in album mutatio, ut Aristoteles credidit, vel utriusque à membrana ambitus. Ex albumine enim pullus generatur; ova piscium jam exclusa, post à mare injecto semine fecundantur, & ovum in matrice subventaneum, præter testam & pellem completum, à semine Galli fecundari Albertus M. testatur. Quanto tempore maturefcent, incertum; tardius propter caloris in semine penuriam, verisimile. Reliquias eorum quæ à semine generata sunt esse falsum. Nam in gallinarum & Anserum genere, à novellis sine coitu edita, compertum est.

De *Ovis quæ ex congressu* sic habet. Postquam foemina de superiore loco quæ præcincturæ seu septo transverso subest genituram excepit, formantur ex ea à facultate formatrice ibidem ova, quæ spinæ pedunculis adhærent, exiguum tum primo quiddam ut candidum videtur, & venulis distinctum, rubrum dein & sanguineum, luteum, & flavum totum tandem. Mox de spina in intestini uterini principium decidua & ad primos uteri loculos transmissa continuato congressu eo citius, quo iste frequentior, augescunt, & albugo à croceo secernitur. Tum in secundos loculos detrusa, justam molem acquirunt, & luteum albumine involvitur. Deveniunt tandem in tertiam cellulam, in qua testæ natura duritiem largitur, eam tamen, ut mollia adhuc exeant, nec nutritio, quæ per eadem fit, impediatur. Sic vitello & albugini constantia, (gallatura seu sperma Galli, si Alberto & Aldrovando credimus, per to-

Aristot.
H. A. lib.
10.

Arist. H.
A. lib. 6.
cap. 2.

Varro R.
R. l. 2. c. 1.
Arist. l. 6.
H. A. c. 2.
Scalig. in
l. 10. Arist.
lib. Hist.
animal.
cap. 6.

Arist. l. 6.
H. A.
cap. 2.
Aldrov.
Ornith.
l. 14. c. 1.

tum albumen, usque ad vitellum pertingit, huic versus partem ovi acutiorem infigitur. Decimo à coitu die perfecta, tribus tunicis, quarum una vitellum ambit, altera tanquam pia mater albumen complectitur, tertia inter quam & illam humor crudus nascitur, & dum formatur foetus excernitur, testæ adhærens, duræ meningis locum implet, intus instructa, mollia, ne dolorem pariant, latiore parte, ut mollius deponantur, & quia acutior adhæret, ideo postrema exit, egrediuntur, ac refrigerata, evaporato humore qui exiguus, reliquaque portione terrea, justam duritiem, sed acuta parte, qua pullus exit, & ubi grandinem generationi inutilem, qui non cernitur nisi fracto putamine, & injecta parte lutei infra, Aristoteles ponit, exactiorem, servata sua figura, acquirunt. Poni confecta brumâ incipiunt. Circa Calendas Januarii etiam locis tepidioribus ac fecundissimis. Optima foetura ante æquinoctium vernum editur, post solstitium nata, magnitudinem non implent, tantoque minus, quanto serius provenere. Parituras se singultu produnt, eodem, peperisse testantur, facilius, si festucam ore apprehensam dorso imposuerint, si Oppiano credendum, libentius, si jam prius ovum in nido conspexerint sine dolore, vel exinde quod testamembrana mollis fuerit, egresso demum induretur, colligas.

Numerus pro ætatis ratione variat, quæ multa pariunt, bis in die ponunt, sed hyperinæ evadunt, & cito commoriuntur. Sunt qui quasdam noctu tenera, & nisi ad magnam diei partem, dura, eniti credunt, tenera edituras, dura, si aliquot horis antelucanis lumen viderint, ut sub ortum solis ponere cogantur, & falsis supponatur paululum. *Monstrosa* interdum circa ea accidere certum. Vidit Aldrovandus cujus putamen punctis & lineis sanguineis conspersum. Uterum læsum vix dixerim. Sanguinem quo uteri interdum turgent venæ transfudasse verisimile est. Vidit & Albertus totum sphaericum, duabus testis inclusum, absque ullo vitello, cum albumine aquoso tenui, & altero intra interiorem testam. Dantur & sine testa tam hypenemia, quam vera: forte quod illa aquosa sint, & exiguo, si humidus Gallinis cibus apponatur, calore dotentur: his propter ictum, vel ex multitudine compressionem tale quid accidat, si Nicandri opinioni standum est. Nec inter rara trilecitha, id est triplicis vitelli habentur; illaque plerumque in medio testæ cavitatem habere Elluchasis prodidit. Vidit & Gesnerus aliquando cujus putamen, ab altera parte extrema, in angustum velut collum instar cucurbitæ se colligebat. Unum sphaericum ad columbarum vix accedens: alterum anserino haud

minus, plicis rugisque insigne in Aldrovand. Musæo reservabatur. Cæterum *ponatve* & *Gallus ova* inter doctos quaeritur. Nonnulli decrepitum & ad coitum ineptum, septimo, nono, aut ad summum decimoquarto ætatis anno, pro virium vel imbecillitate vel robore ponere ajunt. Ortum id putrefacto intus semini debet, vel ex humorem colluvio conflat. Editur sub caniculæ exortum, quod tunc maxime ab ambientis calore expultrix languida in alite decrepita juvetur. Visum in Imperati Musæo oblongum, ab Aldrovando rotundum, colore modo luteo, buxæ, flavescente, lurido, sed & quoddam ruptum, vitello omnino carere dixisses. Quin & Lemnius Zirizæ duos annos Gallos non tantum ovis incubasse, sed & ægre fustibus ab illo opere abigi potuisse, reliquit. Confracta tandem ova, & strangulata à civibus Gallus, quod, ne Basiliscus excluderetur, metu erent. Et hæc est quorundam opinio. Ovo simile aliquid ex conglobata intus putri concretionem, in ultimo senio, cum non amplius coit, concipere, verisimilius est: At ovum cum non magis testa excludere potest, quam vir foetum; cum parere non didicerit. Basiliscum ex eo produci in primis si rubeta incubaverit, nugæ, testa carere, & adeo duræ pellis esse, ut fortissimis ictibus resistat, fabulosum.

APPENDIX II.

De Generatione Pullorum.

Absoluta ovorum historia, de generatione pullorum aliquid nobis dicendum est. Horum vero principium veteres Græci, & inter eos Alcmaeon Crotoniates, & Hippocrates Cous in vitellum; nutrimentum in albumen coniecere. Recentioribus contrarium sentire placuit. Ex albo liquore ovi corporatur alimalibus vitellus alimento destinatus est, & inde membris subinde constituendis incrementum administratur. Et certe pullo jam constituto sæpe vitellipars extat, & cum albumen *ignitum*, quod incubatione fit & foru, *solidum* fiat; luteum *gelu duratur* & *coit*, calore *humescit*. Excluduntur in cubatu, vel *in terra*. Nam in Ægypto & defodiuntur in fimo terra obruto, & turmatim fornacibus Cairinis exclusi prodeunt. Syracusis, potatorem quendam ovis sub storea humostratis tandiu potare nunquam opera intermissa solitum fuisse dum excluderentur, proditum est. Liviam ovum in sinu exclusisse, apud Plinium legitur; & vas in quo absque Gallinæ opera excluderentur, à Porta descripsit. Oblonga & acuta excludunt: foeminam, obtusa rotundaque

Arist. l. 3.
de Gener.
cap. 2.
Hippoc.
de Natura
pueri.

Arist. H.
A. lib. 6.
cap. 3.

Colu-
mella de
R. R.

Oppiano
in Ixecti-
cis.

ab ea parte quæ acutior esse solet marem. Incerto id argumento ab Aristotele proditum, contrarium apud Columellam legitur. Dies ter septem exclusioni adscripsit Philosophus, minuuntur, si tepidus aer accesserit, *ἀντὶ τοῦ θερμῆς αἰέρος* Concoctio calor quidam est, sed & depravantur aliquando nimio, & urina evadunt, *ἀπὸ τοῦ οὐροῦ* quemadmodum vina facie subversa in calore acescunt. Formationem, & quomodo alimentum pullus factus assumat, diligentissime exposuit Aristoteles; hunc Aldrovandus secutus, sequentia nobis reliquit, quæ ipsius verbis proponemus. *Secundo* inquit ab incubatu die, luteum observavi deferri ad cacumen, aliquo pacto alteratum, & in medio quasi subalbidum: cuius rei inprimis Aristoteles non meminit. In aliqua vero parte albuminis, quæ pariter erat alterata, semen Galli apparebat, quod tres illas videbatur obtinere qualitates, quales jam ante diximus. *Tertia* die ablato putamine in parte ovi obtusa, vidi albumen, & reliquam substantiæ ovi partem in superiori putamine separatam. Recesserat autem albumen aliquantulum à putamine, quemadmodum fieri videmus in ovis omnibus, quæ minus recentia sunt. Hinc Plinius ova schista appellat tota lutea, quæ triduo incubatu tolluntur. Vocat autem *schista*, teste Hermolao, quia dividantur, & discedebat vitellus à candido. Videbam item manifeste admodum membranas illas tres quas ovis inesse ex Alberto dixi, & ex Aristotele etiam colligitur: neque verum est, quod secunda earum sit recenter genita. Si enim illud ita esset, minime in ovis nondum incubatis conspiceretur. Inest autem & his, ut etiam vidi, sed aliorum in incubatis calor causa. Eadem die vitellus videbatur versus ovi partem acutam: atque hoc est, quod dicebat Philosophus. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumen, ubi est ovi principium, nam ibi est major calor, & vis spermatis. Apparebat etiam in albumine exiguum velut punctum saliens, estque illud quod Philosophus cor statuit. Ex eo vero evidenter admodum videbam enasci venæ trunculum, & ab hoc duos alios ramulos proficisci, qui meatus illi fuerint sanguiferi, quos ad utramque tunicam ambientem vitellum, & albumen protendi ille dixerat. Sum autem omnino ejus sententiæ, ut ejusmodi vias credam esse venosas, ac pulsátiles, sanguinemque in iis contineri puriorem, principalium membrorum generationi, jecoris nempe, & pulmonis, similiumque idoneum: adeo ut recte dixerit Philosophus, tertia die signa apparere, an ova fecunda sint futura: licet ejusmodi observatio in majorum avium, utpote Cynorum, An-

serum, ac id genus aliarum ovis locum minime habeat. In ejusmodi enim, ut idem Philosophus testis est, paulo tardius ea signa apparent. *Quarta* die bina videbantur puncta, & quodlibet eorum sese movebat: quæ haud dubio cor, & jecur fuerint, quæ viscera in ovis triduo incubatis idem dixit. Apparebant item duo alia puncta nigricantia, nempe oculi: & jam luteum manifeste ad acutam ovi partem, ubi major calor est, & spermatis vis sese receperat. Trahitur autem à spermate illud pro carnis generatione, ut in omnibus animantibus fit, quæ sibi simile generant. *Quinta* die non amplius punctum illud, quod cor esse diximus, extra videbatur moveri, sed obtegi, ac coperiri, & duo illi meatus venosi evidentiores conspiciebantur, alter vero major altero: nec verum est, quod Albertus scripsit, apparere in tunica illa, quæ albumen includit: nisi forte id de tertia tunica, seu secundaria dixerit, cui evidenter venæ insunt, nam alioqui in illa nullius venæ vestigium inerat. Harum venarum insita vi reliqua albuminis portio quasi in palearum colorem immutatur. Videbantur etiam ramuli ad locum tendere, in quo caput formatur, eo scilicet puriorem materiam, à qua caput, ac in eo cerebrum fiat, una cum virtute formatrice deferentur: Erat autem capitis fabrica valde rudis adhuc ac informis: oculi vero conspectiores, atque ervi quasi magnitudine. *Sequenti* dein die ablato superiori partis obtusæ putamine, ejectisque duabus prioribus tunicis, tertia evidenter cernebatur venulis referta: de hac locutum fuisse Philosophum arbitror cum inquit: Membrana etiam fibris distincta sanguineis: atque hæc meo judicio secundina dici potest. Dein inter hanc, & quartam membranam, quæ foetum involvebat, humor erat aquosus: quem autumo serosam albuminis partem esse, quæ post natum foetum superest, tanquam ad generationem inepta. Eam vero membranam innuere videtur Aristoteles à meatibus illis venarum ortum ducere, quatenus scilicet vi fibrarum à venoso illo meatu ortarum in palearum, vel sanguinum colorem immutatur. Cernebatur deinde totus foetus moveri, & oculi jam majores erant, quam in præterita die: at partes inferiores, thorax nempe, venter, & pedes, erant valde imperfectæ, nec discerni adhuc poterant, & rostrum erat mucosum: ut recte dixerit Aristoteles: pars inferior corporis nullo membro à superiori distingui inter initia cernitur. Caput denique tota inferiori corporis parte majus erat. *Septima* die aperta quarta tunica foetum conspeximus parvum adhuc, ac indistinctum cum oculis tamen magnis, triplicique in illis humore, crystallino nempe, vitreo & aqueo. Aperto capite jam

jam cerebrum aperte cernebatur, minus vero reliquæ partes. Unde dicebat Philosophus. Paulo post (intelligit meo iudicio diem quintam usque ad nonam inclusive) & corpus jam pulli discernitur, exiguum admodum primum, & candidum, conspicuum capite, & maxime oculis inflatis, quibus ita permanet diu, uti nos conspeximus: & sero, inquit, decrescunt oculi, & se ad ratam proportionem contrahunt; quod quidem verissimum est: siquidem in quarta decima, aut quinta decima die aliquantum resident deminuti propter caloris digestionem. *Octava* rursus die oculi majores adhuc videbantur, utpote ciceris fere magnitudine. Totum corpus tunc sese velociter movebat, & jam crura, & alæ distinctè cerni incipiebant. Rostrum tamen interim mucosum adhuc erat. Sed forte quispiam quærat, cur prius superiores, quam inferiores partes in ejusmodi formatione appareant: cui responsum velim, virtutem, seu facultatem formatricem in superioribus magis quam in inferioribus vigere, quod spiritales sint, & per consequens plus caloris obtineant. Cæterum isthæc omnia, quæ hac die videbam, *sequenti* manifestiora apparebant. *Decima die* non amplius caput toto corpore majus erat, magnum tamen, ut in infantibus etiam videmus: magnitudinis autem causa est humidissima cerebri constitutio. Quod vero Aristoteles dicit oculos fabis majores esse, id profecto minime verum est, si de vulgaribus nostris fabis locutus fuerit, cum alioqui ervi, vel ciceris albi, magnitudinem non excederent: atque hinc etiam non absurde quispiam colligat fabas antiquorum fuisse rotundas, quales araci sunt, quem ideo fabam veterum quidam existimant. Neque etiam verum est: quod tradit, tunc scilicet oculos pupillis adhuc carere. Etenim hæc non tantum hac die apparebant, sed duabus etiam præcedentibus, una cum omnibus partibus ac humoribus. Quod vero ait, detracta cute nihil solidi videri, sed humorem tantum candidum, regidum, & resurgentem ad lucem, nec quicquam aliud, id de crystallino humore mihi dixisse videtur, qui tamen haud solus apparebat, sed vitreus quoque & albugineus, unde non parum hallucinatus videri potest Philosophus, uti etiam Albertus, qui eo tempore nil duri, & glandulosi in iis reperiri existimat, cum crystallinus humor solidus sit, ac quam maxime conspicuus. *Eadem* item die vidi omnia viscera, nempe cor, jecur, pulmonem. Cor autem, & jecur erant albicantis coloris: & cordis motus non solum apparebat, antequam foetum aperirem, sed jam secto etiam thorace moveri videbatur. Brat autem pullus involutus quartæ illi membranæ plurimis venis

refertæ, ne in humore jaceret. Cernebam etiam vasa umbilicalia prope anum ad umbilicum deferri, ibique inferi, ut cibum per illum petat foetus. Vide denique, quod Aristoteles non advertit, in dorso prope uropygium pennarum principia nigricantia menti humani cuti non absimilia, cui pili abradi sint. *Die subsequenti* hæc omnia erant manifestiora, & in superioris rostellæ extremitate erat quid albidum: cartilagineum, & subduriusculum, quod rursus die decimertia magis erat conspicuum. Erat autem rotundum milii grano haud absimile. Sagacissima rerum parens natura id ibi fabricasse videtur, ut impediatur, ne rostellæ suo vel venulas, vel membranulas, vel alias quascunque tenerrimas particulas pertundat. Ajunt mulierculæ, pullos jam natos cibum capere non posse nisi prius id aufertur. *Decimaquarta* die pullus jam totus plumefcebat. *Decimaquinta* in digitis ungues albicantes apparebant. *Die vero decimasexta* ovum aperire placuit in opposita parte, ubi nativa tunica, sed unica tantummodo apparebat, eaque alba. Alteram enim quam in altera parte semper videram, hic observare minime datum est. Itaque dubitabam an ea tantum pro albuminis tutela nata sit, cum scilicet ovum non sit recens, vel ad pulli defensionem in ovo incubato. Nam indies illa magis magisque decidere videtur, & foetum sequi, qui sui gravitate deorsum decedit. Aristoteles etiam unicam tantum esse ejusmodi tunicam his verbis innuere videtur: Sunt, inquit, quandoque locata ova hoc ordine, prima postremaque ad testam ovi membrana posita est, non testæ ipsius nativa, sed altera illi subjecta: liquor in ea candidus est, quasi diceret, omnes partes in ovo locatæ sunt hoc ordine: nempe prima, postremaque ad testam ovi membrana posita est. Intelligit meo iudicio per primam, & postremam membranam, eas membranas recens in incubato ovo genitas, eas videlicet, quas aliquoties appellavi tertiam secundinam, & quartam, quam involventem foetum dixi. Nam cum dicit testæ nativam non esse, ostendit nec primam, nec secundam esse, quæ ab altera ovi parte reperitur. Videtur igitur excludere hanc nativam sive primam, vel secundam, & intelligere tertiam, quam secundinam sæpe vocavi. Cum vero dicit, sed altera illi subjecta, intelligit eandem secundinam, nempe testæ subjectam, quod vel ex hoc maxime liquet, quod candidum in ea liquorem inesse dicat. Is enim, ut supra ostendi, inter tertiam & quartam continetur. Hinc manifesto errore Suefsanus convincitur, qui ex Ephesio per primam interpretatur eam, quæ testæ adhæret, per postremam vero, quæ albumini.

Quæ

Quæ omnia à nobis observata quotidie in sequentibus diebus evidentiora, utpote in perfectissimo pullo apparebant *Die vero vigesima* pullus putamine à parente Gallina ablato hora vigesima secunda sua sponte exivit. Post exclusionem reperiri in putamine tunicas duas albas natives una cum duobus aliis in incubatu genitis secundina nempe, & quæ foetum ipsum involverat, in qua excrementum adhuc inerat subalbidum. Evidenter adhuc apparebant in pullo tria illa *vasa umbilicalia*, duæ scilicet arteriæ, & vena una, & orificium umbilici valde erat contractum. *Vena* vero jecori per alium rarum, qui recta ad illud tendebat, inferi videbatur. Mirum autem erat, quod extra id nihil lutei appareret, cum tamen in cavitate abdominis, ubi intestina sunt, prope anum pullus per umbilicum totum fere id absorbuerat, simul cum quinta tunica, quæ id involverat. Tanta autem ibi lutei inerat copia, ut vix duplo plus sit in ovo nondum incubato. Aristoteles etiam scripsit, decima ab ortu die, si alvus abscindatur, aliquid adhuc lutei in ea conspici. Sed consideratione inprimis dignum est, quomodo ejusmodi membrana, quam una cum vitello à pullo absumi diximus, post ejiciatur. Videtur autem dicendum, quod per eandem viam, umbilicum videlicet, regredi debeat, vel per anum, quod potius credo. Tunica huic duo vasa implantantur, quorum unum arteriam esse, & à corde proficisci, pulsus indicat: alterum vena est, deferiturque ad intestina, lutei videlicet vehiculum: Hepar erat coloris admodum lutei, forte quod ex luteo per venas attracto nutriatur. *Hætenus Aldrovandus.* Auxit naturæ dotes ingenium. Fœminas habebis si luna plena nata, eadem supposueris. Eo colore nascentur, quo tincta ova fuerint, pulcherrimi excludentur, si cum Palumbi mare Gallina creverit, & ne de monstrifis laboremus, à Johanne Baptista Porta absque causa provisum est. Solent in partu numeroso quod conceptus cohereant sæpe monstra nasci, nec vel geminas vel quadrupedes pullos, nulla sectis membranæ vitellis, vidisse, rarum est.

ARTICULUS II.

De Gallis Gallinaceis & Gallinis in specie.

PUNCTUM I.

De Gallinis Patavinis, Pumilione, & aliis quibusdam monstrifis.

HÆTENUS de Gallis & Gallinaceis, in specie occurrunt nobis Gallinæ, Pumilio, Patavinæ, Gallinæ Turcicæ, Persicæ, Galli Scotici sylvestres, Palustres, Gal-

li & Gallinæ Indicæ, Guineenses, Capi. Gallina PUMILIO seu Nana, quam Aldrovandus describit, erat fere tota nigra. Majores alarum pennæ in extremitatibus candicabant. Maculis in collo mediam lunam æmulantibus ornabantur. *Oculos* macula sublutefcentis coloris rotunda ambiebat. Caput erat cirratum. Paleæ & crista intensius rubebant. Ungues impense candicabant.

Ex PATAVINIS Gallina tota ex nigro virescebat. *Cristam* gerebat exiguam coloris vix rubri. Pellicula quam prope aurium foramina obtinent, albebat. Mas quinque duntaxat coloribus ornabatur, nigro, albo, viridi, rubeo & luteo. Corpore erat ater, caput cirrhatum, cirrhi radices erant albæ, rostro & pedibus luteis. Vifa aliquando Gallina tota candida, cristata, vifa & alia in lapideam substantiam inter parietes conversa, caudiculis suis absque pennis histricis instar horrida. Dantur & pedibus pennatis seu hirsutis quarum descriptionem apud Aldrovandum vide. *Cristam* Gallus habebat duplicem non admodum magnam. Vifi aliquando & monstrifis. Tacebo gallinam quæ tres pedes, tertium prope anum nascentem habebat, pullum, qui totidem instructus, tertium velut ex Uropygio enatum ostentabat. Nihil vel de eo dicam, cui pes à podice natus, quinque digitis instructus, visebatur, vel cui seu quatuor, priores imperfecti & pallidi, perfecti & lutei posteriores, seu quinque erant, vel de eo pullo cui quatuor alæ erant: non tantum contrarium alarum pennæ situm, sed & cervicis plumulas caput versus cirri instar erectas Tagliaferus Medicus observavit in quodam. At qui in aula Hetruriæ Ducis visebatur Gallus, habebant caput & paleas ex plumis militum, conos quibus galeas exornant æmulantibus duos in fronte pennarum calamos velut duo cornua surrectos, totidem ab utraque rostri prope nares parte, qui in extremitate plumas tenuissimas setarum instar edebant, unum in cervice, qui è principio fere ejusmodi setis ornabatur. Pennæ veluti squammas toto corpore æmulabantur. Prope Vropygium qua cauda exit tuberculum rotundum & subalbidum visebatur. Cauda carnosæ, pilis nuda, in extremitate floccum album habens propendebat. Tibiæ velut ocreis induebantur.

PUNCTUM II.

De Gallinis Turcicis, Persicis, Gallo Scotico Sylvestri & Palustribus.

TURCICUS Gallus, quem Aldrovandus describit corpore erat candicante. Alis & alvo nigris. Cauda partim viridi,
H partim

Aldro-
vandus l.
14.
Ornit. c.
5.

partim nigra. Tibiis & pedibus sub cæruleis. Toto corpore, modo argenteis, modo aureis lineis variegato. Gallina tota erat alba, maculis ubique nigris conspersa, pedibus subcæruleis. Vifa & alia cum pedibus cæruleis ex albo & nigro maculata. Post carneam cristam, aliam ex pennis albis Alaudæ instar habebat, ut in icone expressum est.

PERSCICUS cristam veluti caudam obtinebat, pedescinereos, ipse totus niger erat. Gallinæ totæ coloris ferruginei vituntur.

Gallus SCOTICUS sylvestris Phasianæ carne ac magnitudine est similis, sed nigra pluma, rubentibus admodum palpebris. Mas collo, pectore, alis, coxisque punctis rubicundis aspersus est; foeminam leucophæam, maculæ nigræ variant, supercilia & barbulae in utroque sexu maculis nigris asperguntur. Similis est huic ille, quem Turnerus Morhenam vocat. Mas enim totus splendentis est nigredinis, eam caudæ partem, quæ podicem tegit, quæque alba est si exceperis. Caput ruber sed corneus cirrhus tegit, & circa genas duobus veluti lobi rubri & carnei. Foemina tota maculis distincta est, & à Perdice nisi major esset, & ruffa, magis ægre dignoscitur. Degunt in desertis, & erica confitis locis. Granis, & summis crucæ germinibus, vescuntur.

Gallo PALUSTRIS corpus est subrufum aut sufflavum, punctis nigricantibus undique distinguitur. An idem sit cum illo qui frumento abstinet, & enascentibus minutisque Cytisi foliis vescitur, ut Boëthius prodidit, dubito.

PUNCTUM III.

De Gallinaceis & Gallinis Indicis.

GALLUM INDICUM duplicem nobis Aldrovandus exhibet. *Primus* est auritus, tridactylos, nulli volucrum generi pulchritudine inferior. *Rostrum* illi in superiore parte aduncum, totum rubrum. *Caput*, *pectus*, & *venter* integer colore roseo diluto, qui in pectore maculis subroseis dilutioribus exiguis, in ventre longe majoribus, quas alba linea transeurrit, insigniuntur. *Cristas* habebat duas, carneam unam, quæ prope rostrum est, inter quam & rostrum superius, macula oblonga cærulea est: alteram pennis luteis prope primam cristam parvis, mox majoribus quæ sursum primo ascendunt, mox descendunt deorsum, constantem. *Oculi* eundem fere qui in homine est præ se ferebant situm, oblongum scilicet, in cuius medio illi positi. *Aures* habebat erectas asininis non absimiles. *Alas* admodum diversi coloris. *Caudam* duplicem. Priorem exiguam, quinque pennis ruberrimis constantem. Aliam novem longissimis, diversum colorem obtinentibus.

De collo superiori & Vropygium pennæ cæruleæ albis calamis ornatae dependent. *Alterum* simpliciter Indicum idem nominat. Coloris toto corpore erat atterrimum. *Rostrum* superiore adunco, utroque caput versus luteo, cætera atro. Ubi foramina narium aliis, ibi rotundum quid & luteum cerasi magnitudine conspicietur. *Cristæ* loco cirrosgerebat. *Cauda* & calcaribus carebat. *Tibiæ* pedesque tabellis albicantibus præditi erant. *Gallinas INDICAS*, tres idem exhibet. *Primam* colore corporis fuso. *Capite* cirrhato, *rostro* in medio ruberoseo, albicante, nigris maculis insignito. *Coxis* ex ferrugineo lutescentibus. *Cauda* nulla. *Vropygio*, simiæ instar, nudo. *Alteram* corpore à rostro ad caudæ extremitatem exiguo, ad cæruleum vergente, *rostro* recurvo & rubicundo. *Cauda* longa, ut in Pica extensa, candida, & lineis nigris conspersa, quæque in fronte tuberculum magnum, figura ficus, coloris fere cærulei gerebat. *Tertiam* colore fusco, in collo & alis ad cinereum vergente, *rostro* rubicundo, sed non adunco, tuberculum simile in fronte gerentem. *Numidica* dicebatur.

PUNCTUM IV.

De Gallinis Guineis.

GALLINÆ GUINÆ à regione ita dictæ, *Perdices Terræ novæ* quoque dicuntur. Corpulentia vix nostrates Gallinas superant, iisdemque quoad mores & vocem tere similes sunt. Peculiare ipsis acervum quendam pilorum supra caput obtinere, sed qui in anteriori parte reflectuntur, à prima vertebra aut ossæ colli procedendo per posteriorem capitis partem. Gallum Mauritanum ita Gesnerus ex Cajo descripsit. Pulcherrima inquit avis est, magnitudine corporis figura, *rostro* & *pede* Phasianæ simiis, vertice corneo in apicem corneum à posteriori parte præcipientem, in anteriori leniter acclivem elevato, armatus. Eum natura videtur inferiori capitis parti tribus veluti laciniis se promittentibus committere atque deligare: inter oculum & aurem utrinque una omnibus ejusdem cum vertice coloris: ita ut insideat capite eo modo quo Ducalis pileus Duci Veneto, si quod jam adversum est aversum fieret. Rugosus is est inferius per circuitum, qua se attollit in directum in summo collo ad occipitium, nascuntur erecti quidam atque nigri pili in contrarium versi. *Oculi* toti nigri, æque & in orbem palpebræ & cilia. Si maculam in summa & posteriori parte supercilii utriusque demas. Imum caput per longitudinem utrinque caro quædam callosa colore sanguineo occupat, quæ ne propendeat veluti palea, ut replicaretur, natura voluit, & averso ductu in duos proces-

Bellonius
l. 5. de Avib. c. 9.

Boëth. in
descript.
Scotiæ.

processus acutos à capite liberos finiret. Ex hac carne atollunt se utrinque carunculæ, quibus nares in ambitu vestiuntur, & caput in anteriori parte à cetero rostro pallido separatur. Harum ad rostrum margines inferiores, replicantur leviter sub utraque nare. Quod inter verticem & carnem est à dextra & sinistra parte, squamosa duplici incisura notatæ: in posteriori nulla sed læves, & vultui punctis quibusdam sui coloris resperstæ. Color illi in faucibus exquisitus est purpureus: in cætero corpore per summa contuenti, qualis consurgit, si album & nigrum pollinem, ut cunque tenuiter tritum, colori fusco rarius aspergas, nec tamen commiscens. Tali colori maculæ ovales aut rotundæ per totum corpus inesse visuntur, per summa majores per ima minores comprehensæ intervallis linearum, ut apparet in plumarum compositione naturali, quæ se mutuo interfecant obliquo hinc inde ductu per summa tantum corporis, non item per ima. Id non ex toto corpore solum deprehendes, sed ex singulis avulsis pennis. Superiores enim obliquis lineis se interfecantibus, aut si mavis, orbiculis quibusdam ex albo & nigro, ut dixi polline confectis, & per extremitatem conjunctis, ut in favis aut retibus, maculas ovales aut rotundas, in spaciis fuscis comprehendunt, inferiores non item. Utræque tam simili lege positæ sunt. Nam in aliis plumis ordine ita junctæ sunt, ut fere triangulos acutos faciant; in aliis ut ovalem figuram repræsentent, &c. *Vox* illis divisus sibilus non sonior, nec voce Coturnicis major. Similem Gallinis communibus scribit Bello-nius. Fœcundæ sunt, & nutriendis pullis sedulæ.

ARTICULUS III.

De Capo.

CAporum tot sunt genera quot Gallorum, & sola castratione ab his differunt. Capitis tamen juba major est quam Gallis, caudæ pennæ longiores sunt, & calcaria in majorem mollem excreseunt. *Vox* etiam magis demissa & rauca. Scaliger unum insigni magnitudini, perpetuum convivam habuit, qui cum ater fuisset totus, anno quarto evasit candidus, quamquam erant alii quibus nulla pluma nigra fuerat. Duobus olim *castrabantur* modis, lumbis nempe adustis candente ferro, aut calcaribus ad infima crura usque. Hodie vulnere tanto quantum digito superius lumbos subsepto, ubi testes adherent im-mittendo sufficit, inflicto, testiculi per posteriora evelluntur. Mori interdum contingit, si erratum fuerit: & Gallum à castratione ita intumuisse Aldrovandus observavit, ut pellis digitis pulsata, tympani bellici

instar sonum ederet. Breve quidam *pingue-scere* scribunt, si cerevisiam aquæ loco apposueris.

Ufus in cibo multus est. Optimum enim sunt nutrimentum & perfectum generant sanguinem, ut omnium avium laudas quantum ad obsonia pertinent, una caro Gallinacea, cujus patina stomachum juvat, pectus lenit, vocem sonoram facit, corpus obesat, Platina comprehendat. Maxime circa sex, septem, vel octo mensium ætatem probantur. In *Medicina* jus caponum ad virium restaurationem commendatur. Quidam ossa crurum medicamentis ad alba mulierum menstrua, immiscunt. Alii Fistulæ indolenti pelliculam ventriculi interiori, in sole torrefactam, & in pulverem redactam inspergunt. Græci asserunt, fabæ semina caporum sanguine macerata, ab adversantibus herbis immunia fore; & si pridie quam seruntur aquæ simplici infusa fuerint, citius nascituras; sin nitrata difficilimam coctionem non habituras.

CAPUT III.

De Avibus, quæ se pulverant simul
& lavant.

ARTICULUS I.

De Columbibus.

AVes, quas Latini Columbas, seu quod in culminibus villarum degere soleant; seu quod bibentes rostrum aquæ diutius immergant, ut Hermolao videtur, (*αὐτοὺς* Urinare est) seu quod lumbos frequenter colant, ut Alberto M. placet, dicunt; Græcis *ἀσπίδες*, & *πυλίδες*, *πύλας* aliquando *πυλίδες* *πυλίδες*, & *ιουγενίς* apud Homerum, Hefychium, Phavorinum & alios dicuntur. Descriptionem non est, quod apponamus. Proprium omnibus utraque connivere palpebra. Aristoteles pedibus & ungibus cucullum repræsentare dixit. *Internas* si spectes *partes* Ingluviem parvam & fere rotundam ultra ventriculum, id est geminos sinus habent; unum in quo merguntur recentia, ut guttur: alterum in quem ex eo dimittunt concoctione maturata. *Ventriculus* ipsis ferventior. *Lien* tam exiguus, ut visum fugiat. De *felle* inter eruditos non constat. Sunt qui habere negant, Galeno rediculi, sunt qui affirmant, seu in Vropygio vel dorso, quod vesimile non est: seu non eo loco, quo cætera animantia, sed & inter eas aliis ventri, aliis intestino jungitur. Cysti carere dum affirmat Galenus, ne discipiatur metuo.

Quantum *ad Locum*, ubique fere conspiciuntur. Ingens olim earum in Assyria circa Ascalonem, quia sacræ, & lege edi vetitæ; in Cyprio, Papho, Cythera, Sicilia, Cnido, quia Veneri dicatæ, copia. Tanta apud

Ufus.

Varro l. 3. de re rust.

Arist. l. 2. de partib. Anim. c. 13. Arist. H. A. l. 3. c. ult.

Arist. l. 3. de partib. cap. 7.

Galenus de atra bile.

Locus. Eusebius præp. Evang. l. 8. cap. 5. Athenæus lib. 14.

Arist. H. A. l. 9. c. 50. Varro de R. R. l. 1. cap. 2. Plin. H. N. l. 10. cap. 21. Columella R. l. 8. cap. 2.

Pœonas & Illyrios, ut incolas militari contra eas ordine exire, Textor nescio cujus fide, prodiderit. Nil de portu, & navali, Thisbæorum, Insula Columbaria Solini, quæ in Tyrrheno mari sita est; Lucæ infulis, in quibus columbis quandoque onerantur naves, regno Pegu, Fessâ, & aliis dicam. Amant vere propter innatum pavorem eminentia loca: naturaliter tamen specus & latebras quærunt. quæ de nidulatione in arboribus dicuntur, Palumbis potius competunt. Sexum difficulter, nisi interiora scrutentur, discernas. Vox tamen exigua famellam, gravior marem prodit.

Coituri mutuo se exosculantur, & senior quidem primum congressum ob osculo exorditur, sequentem sine osculo celebrat, at junior quoties libet coire, osculatur. observatum tamen sine osculo marem admitti, si fœmellæ creptus post triduum eidem restituitur. Si mares defunt, ruunt in mutuos amplexus fœminæ, ita singulis diebus ad octiduum & ultra hypenemium ponitur. *Ovum* quinto à coitu die perficitur: per oblivionem factum, quod Plinius intra decem maturefcere scripsit, & fœmina sæpe ipsa qua peperit, postridie aliquando, marem repetit, ut forte ad partum alterius ovi alacrior accedat. Vexata, vel sponte paulo morosior, ovum per tristitiam retinet. Bina fere ponuntur, ita natura moderante, ut aliis crebrior sit fœtus, aliis numerosior. Sed & quia volaces, consumitur volatu materia, & in alas pennasque abit. Ex priori marem, fœminam ex posteriore edi veteribus creditum, visæ tamen binas fœminas aliquando, binos aliquando mares uno exclusisse partu. Bene autem Plinius crebriorem iisdem fœtum innuit, & falso *tygon* appellavit Varinus. Singulis namque seu tricenis, seu quadragenis diebus concipiunt, pariunt, incubant, & pullos enutriunt. Continuatur toto anno fœcunditas, si locum apricum, unde Ægyptiæ duodecies pariunt, & cibum, quem facile acquisitum eximio corporis & ventriculi calore nullo negotio conficiunt; (hæc fœcunditatis causa Aristoteli) habuerint, si horum aliquid deest, à bruma ad æquinoctium hybernium otiantur. Sic duodecim ex eis imo tredecim & quatuordecim, haberi possunt paria. Æstate enim binis interdum mensibus terna edunt, sæpe inter pullos ova inveniuntur, & alii provolant, alii erumpunt, hi rursus simul ac creverunt, & robur habent, cum matribus pariunt, & quam Aristoteles intra annum eos coire, semestres incipere Venerem agnoscere scribat: Plinio tamen quinquemestres fœtificare scribenti, Albertus & experientia subscribunt. Non est ergo mirum quod M. Varronis temporibus, quinque millia

columbarum quandoque in uno peristeprothio colebantur, cum vel decem paria paucis annis in talem numerum excrefcere queant. *Incubatio* maris & fœminæ perficitur opera, hæc noctu, ille interdum incubat, de tempore inter scriptores non constat. Plinius, ætato octave decimo die excludere putat, vicesimo aliàs. Apud Aristotelem, quod ovum prius editum fuerit, intra vicesimum diem & absolvitur & excutitur à pullo. Pertundunt ovum pridie quam excludatur pullus. Alberto denique completur septem in utero diebus, fovetur per quatuordecim, postea fisso ovo, pullus exit. Experientia ab Aristotele militat, qui etiam cæcos & imperfectos, quod, quia pauciparæ sunt, copia alimenti cum prole parere soleant, pari affirmat. Possunt ab ortu versicolores haberi, si miscentibus jam oscula maritis,

*Sargula flammeolis oculis rubrosque tapetes
Et vestes ostro persusas objicit auceps.*

Vitam culumbarum octonis annis Plinius definivit; quos etiam allecricibus, excœcatis Aristoteles tribuit. Albertus domesticis viginti annos adscribit. Athenæus ad triginta producit, fuit, quæ viginti duos annos vixit, & semper, excepto ultimo generavit.

Vocem per γαγγίζω, γαγγίζω, γαγγίζω, & γαγγίζω. quod Latini gemere, murmurare, & meditari dicunt, expressere Græci.

Volatum quod attinet, nullæ domesticarum neque longius domo, neque diutius abvolant, sed & alte per æra volitasse, in Paphlagonia Bellonius observavit, ut conspectum effugerent, seu iis cum ære tanta intercedit familiaritas, ut securius in eodem degant: seu alia causa. Celeritatem multi testantur authores, hujus opera uno eodemque die victoria Taurosthenis ex Olympia Æginum parenti ipsius nunciata est. Sueta intacta fides, ut Hircius & Brutus in Mutinensi obsidione; Lydenses in sua; Romani in Circum vel Theatrum euntes, quæ vellent domum nunciaturi; Ægyptii, Cyprii, & Cretenses nautæ ad terram appropinquantes; Benenses Cattiæ urbis incolæ eis usi tanquam rebellionibus fuerint, effecit. Frustra valum & vigil obsidio per cælum eunte nuncio. Duplicitur celeritas, dum se à rapacibus insectari sentiunt. Sed & strepitum in volatu quandoque edunt, qua ostentatione, ut vinctæ præbentur Accipitri implicatis strepitu pennis, qui non nisi ipsis alarum numeris eliditur. Speculatus occultus fronde latro, & gaudentem in ipsa gloria rapit.

Ad *Ingenium* & *Mores* Columbarum pertinet, quod cum bibunt, collum non refupinant, sed quia breve & amplum, multarumque

Textor
in Cornu
copiæ.
Polyhist.
c.p. 9.

Horat. l.
1. oda 2.

Centra-
tio.

Arist. H.
A. l. c. 2.
Aldrov.
Ornithol.
l. 11. c. 1.

Plin. H.
N. l. 10.

Athenæus l. 9.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 52.
Aristot.
de Anim.
Generat.
l. 3. c. 1.
Arist. H.
A. l. 6.
cap. 4.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 48.
Aelian. l.
1. var.
Hist. c. 1.
Arist. H.
A. l. 6.
cap. 4.
Varro.
l. 3. de re
rust. c. 7.
Idem l. 5.
cap. 13.
Plin. l. 10.
cap. 53.
Varro. l.
3. de re
rust. c. 7.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 58.

Varro. l.
3. de re
rust. c. 7.
Arist. H.
A. l. 6.
cap. 4.

Athen. l.
9. c. 16.

Plin. H.
A. l. 10.
cap. 58.
Arist. H.
A. l. 6.
cap. 4.

Arist. l. 4.
de Gene-
ribus c. 6.

Oppian. l.
1. de ven-
nat.

Ætat.
Plin. H.
N. l. 10.
Arist. H.
A. l. 9.
cap. 7.
Athen. l.
9. Di-
pnof.

Vox.

Volat.

Bellon.
lib. 6. de
Avibus
cap. 23.

Virgil.
lib. 5.
Æneid.
Aelian.
variat.
lib. 9.
Plin. l.
10. c. 37.

Bellon. l.
6. de A-
vib. c. 21.
Botter. in
Relatio-
nibus.

Virgil.
Æneid.
lib. 5.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 36.

Ingenium.
Athenæus
Dipn. l. 9.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 34.
Arist. H.
A. l. 9.
cap. 7.

rumque aquarum capax habent, large jumentorum more bibunt, quod

— ubi mollia frangunt

*Nubila, jam longum caeloque domoque gregate,
Si junxit pennas, diverſoque hospita tractu
Venit avis, cuncta primū mirantur & horrent,
Mox propiusq; volant, ſocium jamq; in aere ipſo
Paulatim fecere ſuum, plaufuque ſecundo*

Circumeunt bilares, & ad alta cubilia ducunt.

quod corpus primo humectant, dein pulvere ſeſe conſpergunt, ſic à pulicibus & omni ſorde mundantur, quod mane ſcēminas vagantes in nidum compellunt, & incubare cogunt. Sape ex hac cauſa caſtigatio pigrius intrante ſcēmina ad pullos, quod conjugii fidem non violant, communemque ſervant domum. Niſi cōlebs aut vidua nidum non reliquit, & imperioſos mares ſubinde etiam iniquos ferunt: quippe ſuſpicio eſt adulterii quamvis natura non ſit. Tunc plenum querela guttur, ſævique roſtri cibus, mox in ſatiſfactione exoſculatio, & circa veneris preces pedum orbibus adulatio. Appetunt tamen maribus deſunctis, cujuſcunque coloris, non digrætantur, quod proditum quibuſdam, novas nuptias; & ſi domini juſſu conjugia permurent, priſtino domicilio redditæ, prioribus ſpretis, noviffimis adhæreſcunt, quin & nonnullas ex maritatis cum aliis coire Ariſtoteles dixit: & ut nigra apud Ægyptios mulier perpetuo vidua, quod pulla ſemper incederet ſignificabatur: ſic ingrati apud eoſdem columba, quod maſculus validior factus, partem roſtro inceſſit, & à matre abigere conatur. Huc etiam pertinet, quod mas adultos pullos, cum ex nido tempus prodeunti eſt, ſubigit, quod eis pavore percuſis (ſunt autem timidiffimæ) mediæ natiū partes tremunt, quod, dum etiam ſub menſis cum Gallinis converſantur, hominum cenſuetudine ſe delectari oſtendunt, quod denique Aquilam ſublūmipetam ab humipeta diſcernere norunt, & ſi hic invadit, in ſublime feruntur, ſi ille, deorſum verſus ruunt. Nec tacendum, recens natis pullis vel terram ſaluſginofam, quam in locis lotio conſpergi ſuetis quærunt, vel ſalis ipſius grana, ſeu ut livorem abigant, ne ſaſcinantium noceant imprecationes; ſeu, ut ad recipiendos cibos præparentur; ſeu, quod verſimillimum, ut eis tam ſcēcunditatem quam cibi appetentiam ingrant; inſpuere, corporis mundiciei impenſius ſtudentes, nidos à ſimo repurgare. Helxine, herba ad evacuationem uti, laurinos ramulos tenues primum pro amuleto colligere, deinde ad pullorum cuſtodiam nidis imponere. Colores ſuos varietatemque diſpoſitam noſſe. Memoria, ideo temporis, quando ſcēminæ in cucubitū ſuccedendum eſt, nunquam mas oblivifcitur, pollere. Ita denique

cicurati, ut & literas ferant, & cibum ex auribus, quibus præſtigiis nebulo ille Saracenus Muhamedes uſuſ eſt, capiant.

De Pugna ſatis eſt dixiſſe, in nidorum vicinia mares pro uxoribus has pro illis pugnare. Antequam coiverint, mares adhuc cōlebes, ſuas aliis ſubtrahere conantur. Vidit & Avicenna duas pro ſcēmina pugnantes; hæc victori adhæſit, quem, pugna repetita, deſeruit victum.

Amicitia eis intercedit cum homine. Alliciuntur in columbaria & manent, ſi vel humano ſanguine cum piſis integris in vaſe figulino circumactō illinantur, & piſa deglutiant; vel cranium hominis ſenis in iis ſuſpendatur; vel lorum quo homo ſtrangulatus eſt, deponatur; vel lac mulieris puellam à bimatu lactantis, occultetur. Cum capite captæ, quod excruciatum, cum multo ſale, & cumino Romano coctum, ac ibidem deſiſitum, eos retinet. Cum tinnunculo & veſpertilionibus ut ſuis locis expoſiſitum eſt, denique cum vite agreſti, perifterione, ſaliva, carlina, ſemine viticis, & aliis. Detinentur vel peregrinas adducunt, ſi aliquid horum vel in columbario ſparſeris, vel ſuſpenderis in nido.

Inimicitia autem exercent cum circo, ad cujus vocem perhorreſcunt, quod vociferans invadat; Milvo, Aquilis, marinis inprimis; Bubone, qui ova exſorbet. Noctua, corvino genere, vulpibus, catiſ, Muſtellis, hellēboro albo, & dentibus humanis, quibus virus quoddam ineſt, quod & foetus implumes necat, taceo de aliis.

Affectus ipſorum ſunt, Pulices & pediculi, quibus niſi mudentur, macilentæ evadunt; varioli circa oculos, qui menſe Auguſto inprimis infeſtant; & vitiligo ac lepra ob quam à Perſis pulſas apud Herodotum legimus.

De Uſu columbarum in Medicina multa prodita ſunt. Ventriculo quia ſunt ferventior, lapillos comefos conſciunt, Margaritas eis exhibitæ poliri Cardanus prodidit. Peſtiferis haud corripit morbis, qui carne aſſidue in cibo uſi fuere, ex Ægyptiorum accepimus arcanis. Odor etiam ſylveſtrium in aërem reſolutus, ab Epilepſia & Paralyſi, ſi Villanovano & Abenzoari credimus, præſervat. Cerebella cōcitatem inducendi proprietatem habere, metuo ne falſo, dicuntur, medicamentis venerem promoventibus recte præſcribi, certum. Sanguis cruorem membranæ cerebri emanantem cohibet, & oculis ſuffuſis eximie prodeſt. Luſcioſis bene illinitur. In maſculis efficaciori Hierocles eundem medicamento ad ſtranguriam Equi admifcet. Adeps ad dyſuriam commendatur. Pennæ primum enatæ & cum urtica uſtæ podagræ dolores leniunt, ut Marcellus author eſt.

Pugna.

Amicitia.

Gefnerus de columbis. Albertus de Avib. Palladius l. 3. c. 44.

Inimicitia.

Hont. l. Epod. od. 16. Alian. l. 3. de Animal. cap. 45. Serapio. l. 4. de Methodo cap. 11. 4. Plin. H. N. l. 11. cap. 37. Morbi. Creſcent. l. 9. c. 90. Herodotus lib. 1. Uſu.

Cardanus de varietate Rer.

Dioſcorides. Galen. de Simp. Medic. cap. 3.

Ariſt. H. A. l. 9. cap. 49.

Plin. H. N. l. 10. cap. 34.

Aldrov. Ornithol. l. 15. c. 1.

Ariſt. H. A. l. 9. cap. 7. Ezechiel. cap. 7. Tzeket Chilia. 12. 433.

Æl. H. A. l. 3. c. 45. Ariſt. H. A. l. 9. cap. 36. Ariſt. H. A. l. 9. cap. 24. Æl. H. A. l. 3. c. 45. Gomeſius l. 1. de Sale. Athe-næus Dipn. l. 9. Æl. H. A. l. 1. c. 35.

Rhodig. l. 20. c. 10.

est. Ovis recte condyloma fovetur; sed desiderare ante aeger in aqua debet, in qua verbera decocta est. Fimus tanti est fervoris, ut ignem saepe concipiat, & in ea Mysia quæ est Asiæ pars, domus hac ratione conflagrarit. Cum hordeacea farina vel aceto mixtus, strumas discutit; arefactus, & cum nasturtii semine tritus, inveteratos coxendicis, cervicis, & lumborum dolores extirpat, ut scriptum Fernelius reliquit. Prodest calculosis, si vel in aceto maceretur, illud propinetur colatum; vel in eodem septem diebus infusus, & aquæ rosaceæ instar destillatus exhibetur. Excudit foetum, si cum Castoreo, opoponace, myrrha, vel felle facchino suffitus excipiat. Emplastrum cum aceto forti, recte super ani ficus posueris. Imbecillius tamen domesticarum sterus, validius earum quæ in montibus vagantur. De reliquis consule Aldrovandum.

Laudatus & in cibis Columbarum usus. Commendantur in epatico morbo ab Hippocrate, in virum, post diuturnum morbum imbecillitate à Rhase; & Peguani ita iis delectantur, ut advenis, interdum vendere nolint. Sylvestres, quas elixabis, domesticis, quæ assæ, magis valent. Pulli propter molliorem succum veteribus, vernaes æstivis & autumnalibus (vescuntur tamen & hæ melioribus granis) præferuntur. Et videbis exiis, apud scriptores Messos, Cruistas, Miranse Catalonicum ludebat, quod & Rui dicitur, & alia cibarii genera. Pullos tamen, caput & oculos lædere, lepram nimio usu gignere, Simeon Sethi, Cynanchen inducere Rhasis, meminere. Quod vero Varronis tempore, singulorum paria ducentis nummis, & si eximia essent, singulis millibus sestertiorum vendebantur, quod Columellæ diebus sunt inventi, qui quaternis millibus nummum bina paria mercabantur: quod denique Plinius L. Axiu Equitem Romanum ante bellum civile Pompejanum denariis quadringentis singula paria venditasse scribit, luxuriæ potius & deliciis quam usui adscribendum est.

ARTICULUS II.

De Columbibus Domesticis.

Genera columbarum tria Varro posuit. *Unum* agreste, seu saxatile, quod in turribus & culminibus villæ habetur, quod falso Perottus *tridactylus* esse credidit, quidam male cum illo saxatili, quod in agro Bononiensi capitur, prorsus ferum, saxatilibus Varronis majus, coloris lividi, rostro rubicundo, conferunt; quodque Galeno *ripus* & *siurus* dicitur. *Alterum* elementius, quod cibo domestico contentum, intra limina januæ solet pasci. *tertium* seu

Domesticum Galeno. *Tertium* ex his stirpibus Miscellum fructus causa. Aristoteli sex sunt species, nempe, *Columba*, *Oenas*, *Gazæ* vinago, *Phabs*, *Phassa*, *Pelepas*, & *Turtur*. Aldrovando vero ex magnitudinis ordine, *Phassa* primum, *Phabs* secundum, *Oenas* tertium, *Columba* quartum, *Livia* seu *Pelias* sextum, *Turtur* postremum locum occupat. Palumbum *Pyrallidem*, *Columbam*, & *Turturem*, nihil inter se similitudinis habere falso à Callimacho dictum, in sequentibus exponetur. In Sylvestres & Domesticas commodissime distinguuntur. Et Domesticæ quidem, si Differentias attendas coloris, magnitudine partium, & coitus ratione variant. Fuere in insula Capitis viridis & Madera sylvestres adeo mites, ut domesticarum more se capimanibus paterentur. In Therapne maximas nasci ait Perottus, Spoleti perexiguas. Tantum duodecim passuum millia efficiunt descrimen. Habentur in Norvegia totæ albæ, quas & alibi vulgatissimas conspicias. In Græcia eo primum tempore visæ sunt, quo Persicus exercitus circa Athon montem interit. In Eryce Sicilia ingens numerus unum rubrum tanquam Ducem sequitur. In Persia denique Columbi si qui sunt, oblongo & anserino illi sunt collo. Genera tam indigenarum quam Exoticarum plurima apud nos sunt, quæ an veteribus cognita fuerint, jure dubitari potest, etiam si Romanos Columbarum amore insaniisse Plinius prodiderit. Sunt *Gutturosa* vulgaribus domesticis duplo fere majores, pedibus hirsutis, quæ inter volandum, & dum murmurant, fauces in ingentem tumorem inducunt, Plinii Campanas dixeris. Aliæ *Cyprie*, seu ut Gesnerus nominat, Rusticæ, Anglicæ, Monachicæ, seu Ferrarienses, ex quibus quædam *Cucullate*, cristam gerunt, & pedes vel pennas ornatos vel nudos habent: quædam cristæ carentes, rostro sunt admodum exiguo, pedibus nudis. Aliæ *Turcica* & *Persica* colore toto pullo seu betico, præter oculos, qui miniaci, pedes qui pallide rubent, & rostrum, quod lutescit. Aliæ *Indica* rostro Anatis, nihil præter pedes, & magnitudinem cum columbis commune gerentes, quarum illa quam Aldrovandus Vienna acceperat, rostro albicabat, circa nares rubescebat, postremo serpentum instar subcæruleis & nigris maculis, quæ per totum ferme verticem producebantur, variegatam erat. Sub oculis macula longa alba totum caput tanquam torquis ambiebat. Aliæ, quæ, quod in honorem fœmellæ, vel suæ vel aliarum post longa murmura à terra sese elevent, & ultra illas volando alas quatiant, Belgis *Overflagers* dicuntur. Aliæ *Gyratrices*, quæ dum in orbem supra fœmellas maxime obvolitant, tam fortiter alas quatiant, ut duorum af-

Galen. l. 9. de Tempore.

Gesnerus de Columbibus.

Hippocr. libro de intern. affectibus.

Varro de R. Rust. l.

Columella de Re Rustic.

Plin. H. N. l. 10. cap. 37.

Genra. Varro l. 3. de re rust. c. 7.

Gal. l. 10. de Compos. simpl. Medicament.

Alcianus l. 1. varia. hist. c. 15.

Athenæus. Dipn. l. 9. cap. 16.

Alcianus l. 4. de Animal. cap. 2. Scaliger exerc. 231. c. 7.

Plin. H. N. l. 10. cap. 17.

asserum simul colliforum sonitum superent. Unde remiges earum pennæ semper ferinæ fractæ conspiciuntur. Aliæ *Galeata*, quarum caput, cauda, remiges, semper alius coloris sunt, quam reliquum corpus. Taceo hic *monstrosas*, quarum una in Germania prope pagum Rikenhoven capta, præter quatuor pedes, duplicem alvum habebat; altera duplici quoque alvo Bononiæ nate est; tertia bicorpor quodammodo erat, ex uno nimirum corpore, alterum par pedum remittens, cum reliqui duo alteri corpori perfecte inessent.

ARTICULUS III.

De Columbæ Sylvestribus.

PUNCTUM I.

De Palumbis.

Sylvestres columbæ quæ sint, præterito ex Aristotele articulo recensuimus. Primus ex illis *Palumbus*, qui vel *Major*, vel *Minor*. Hic Phabe Philosopho dictus, à nemine hæcenus descriptus est. An ille sit, qui in Marchia Anconitana *Palumbo* vocatur, incertum.

Nomen.

Majorem Græci *qânos*, Attici *qânos*, moderni *qânos*. Niphus Torquatum, Servius, Titum vel Titium; sed per hos forte vultures intellexit Persius ut Aldrovandus opinatur; Villanovanus Cadonem vocant. An *Generis* diversitatem admittat, nondum liquet. Hispani in quadam novi orbis insula grandiores nostris. Gustu & sapore meliores *Perdices* qui aromaticum spirabant, odorem, & quarum dissecta ingluviæ floribus plena deprehensa, invenere.

Martyr. Decad. Oceani l. 10.

Descriptio.

Corporis crassitie ad Gallinas propemodum accedunt, magnitudine haud multo minores. Color est cinereus, caput ex rubro & cæruleo mixtum, alæ in lateribus maculis albis insigniuntur, torquis coloris est à capitis, dorsique colore diversi. Ingluviem ventriculo præpositam habent. Ideo bene Plinius, Aves quædam sinum unum habent, quo merguntur recentia, ut guttur alterum, in quem ex eodem mittunt, coctione maturata, ut *Palumbes*. *Testes*, cum Venerem exercent, insigni magnitudine augentur, hibernis mensibus, ne ullos quidem habere arbitrantur nonnulli.

Arist. H. A. l. 2. c. ult.

Locus.

Locus si spectes, nullibi noti non sunt. Apud Delphinates, & Vefates Aquitanos, magnus eorum proventus. Raro humi insidere visæ arboribus vel editioribus locis delectantur. Aristoteles dum campestres vocat, per loca campestria, illa quæ arboribus consita sunt, intelligere videtur. Migrare prodidit Plinius, nec abnuet experientia. Nec hybernare quidem apud nos sese pati, falso apud Aristotelem dicitur. Nam si tepidiora de fuerint loca, in angu-

Arist. H. A. l. 1. c. 1.

Plin. H. N. l. 10. c. 24. Plin. H. A. l. 8. c. 12.

stis montium jugis sese recondunt. Ideo verno tempore deplumes conspiciuntur. Phattas semper conspici, quod apud Aristotelem extat, error est. De Phabis id intelligendum Athenæus innuit.

Cibus eis inprimis Fabæ. Vnde Fabarianum apud Ferrarienses nomen, Gallia glandibus sæpius, cum ilicis cocciferæ tum suberis, ilicum viridum, nec non fragorum repletum inventum in Gallia stomachum, Bellonius affirmat. Hinc Glandiferarum appellatio. Alia vehementer saginantur.

Nutritio. Scallig. in Arist. de Animal. l. 5. c. 12.

Cœcum & foetificant trimestres, unde tanta ipsarum copia. In Venerum accensæ, mutuo sese ante initium exosculantur. Ante veris ingressum, intenso adhuc frigore nidificare, & plumas sibi, ut pulli calidius recumbant evellere; ex inspectione, an

Generatio. Arist. H. A. l. 6. c. 4. Epim. de venat.

authoritate. Aleiat prodidit. *Nido* locus arbores, juniperi inprimis, si Theocrito credimus. Bis quotannis parere ex Plinio habemus; semel ex Aristotele. Terna plurimum pariant ova. Sed quamvis torperint, nunquam plus duobus educunt. Tertium quod irritum est, Vrinum vocatur. *Palumbes* incubat scœmina post meridia, in matutinum cætero mas. Incubatus citius quam à columbis perficitur. Decem & quatuor diebus uterum ferunt. Totidem iterum fœtus, sed cœcus & imperfectus involucris evadit, atque perficitur. *Vivere* palumbes ad XXX. annum, aliquos ad XL. habemus auctores, uno tantum incommodo unguium eodem & argumento, senectæ, qui citra perniciem reciduntur. *Marem* prius mori credunt, cum in avibus cæteris scœminæ prius albicant. Salacitas forte in causa. Nam & in passerum qui salacissimi genere idem contingit.

Matutin. lib. 1. de Cal. Tempor. Eidyll. Plin. H. N. l. 10. c. 58. Arist. H. A. l. 6. c. 4. Plin. l. c. Arist. H. A. l. 6. c. 4. Arist. l. 4. de Gener. c. 7. Plin. l. 10. H. N. c. 35.

Quantum ad *Vocem* gemere Philomela authore, minurire Spartiano dicitur. Cantus omnibus similis, inquit Plinius, atque idem trino conficitur versu, præterquam in clausula gemitu. Hyeme mutis, verè vocalibus. Audiunt tamen, si ex asperima hyeme placidem & serenum tempus successerit, si aurito testis Nipho credimus. Genere ordinarie verè incipiente, & nisi confecto solstitio incipiunt. Sic hujus tempus indubitatis notis signavit natura. Et vox rusticis præsentis veris signum habetur.

Arist. H. A. l. 9. c. 7.

Vox.

Plin. H. N. l. 13. c. 35.

Plin. H. N. l. 18. c. 28.

De *corporis affectibus* nil occurrit, unguium in senectute incrementum, de quo supra, si exceperis.

Morbi.

Sed nec de *Ingenio & Moribus* multum. Amisso corporali consortio solitariae incedunt, nec carnalem ultra copulam requirunt. Adulterio corruptæ, corruptorem, si assequi possunt, interimunt. Ingenii sunt simplicis, ideo in eorum nidis deponit ova cuculus; & Plautus hominem ignavum, Palum-

Ingenium. Isidor. in Originib.

Porphy. l. de Abstinentia.

Æl. H.
A. l. 4. c.
46.
Ufur.

Dipn. l. 4.
Hippocr.
l. 2. de
morb.
mul. er.

Portal. r.
Phytog.
c. 14.
Plin. in
H. N.

Palumbem vocat. Vulnere denique accepto origanum imponunt, & ad sanitatem redeunt.

In venere & in cibis & in Medicina Usus. In Carani nuptiis appositus Athæneus; in Nasidieni convivio sine clune ceu lautiores Horatius meminit. Carnes in flexu mensium pituitoso Hippocrates: in tympanite Trallianus; in Elephantiasi Aretæus, in colico affectu Aëtius; in pestilentia Alexander Benedictus; in dysenteria & colica Plinius præscribere. M. Cato Censorinus ægrotis exhiberi voluit. Paulus tertium inter aves locum eidem assignavit. Venerem propter glandium esum extinguere creditum quibusdam Oculi, quia confossi renascuntur, ad vulnera oculorum & cicatrices commendantur. Jumentorum verminatio finitur, ter circumlato verendis Palumbo, palumbus emissus moritur, jumentumque liberatur confestim. Sanguis vulnera purgat. Fimus urinam provocat, & calculo in faba sumptus resistit. Lapilli in ventriculis inventi, potioni contra eosdem insperguntur.

PUNCTUM II.

De Oenade seu Vinagine, Alchata seu Filacoa Arabum & Columba Livia.

Oenas Tzetzi Omb, non tam à fibris carnis, quæ dura, & nisi tergus detraxeris esui inepta est; quam, vel à colore uvarum nigrarum maturarum, quas inuicem Græci vocant; vel à vindemiæ tempore, quo & conspicitur & capitur; unde Lycophroni dicitur. Gaza vinaginem, Josephus Scaliger Vinitorculum, alii viniferam, Julius Scaliger Rupicolam vocavit. Major est columba. Rostrum habet, si Oenas est quam Aldrovandus exhibet, cinnaberinum, longum, in extremo acutum. Caput totum ventrem & alarum pennas cinerea. Remiges notabilis magnitudinis & nigricantes. Cervicem, intercurrentibus plumis nigris viridem. Caudam versus Uropygium cineream cætero nigram. Pedes rubros.

ALCHATÆ quam cum Filacotona eandem Aldrovandus facit, alæ sunt oblongæ, pennæ & plumæ coloris coturnicum, cutis extrema dura, in Syria pedes nigri & breves. Ad eam proxime accedit illa, quæ nomine Angeli Monspeffulanis venit, quamque Perdici persimilem, rostro & pedibus nigris, plumis ex fusco colore in nigrum vergentibus, & luteis rufum, esse Rondelerius ad Gesnerum scribit.

COLUMBA LIVIA Alberto Cavernalis, Græcis ex descriptione Gesneri, est columba domestica minor Rostrum ipsi albicat, & circa nates parum

purpurei habet. Collum pronum ad latera habet pro diverso ad lucem posita varie splendens, in se partim subviride, partim purpureum. Supinum ex cinereo tale. Plumæ ubique cinereas, alarum pennas quatuor longiores cinereas, medias, partim cinereas, partim ad extrema nigricantes, ultimas dorsum versus subrufas. Pedes rubros.

Vescitur glandibus & granis. Nidificat in arborum cavis & templorum muris. Migrat, & in cibo, palumbo tantum tenerior, præfertur. In India, prodente Æliano, virides pennas, habent, Psittaco simillima: Cruribus & rostro Græcam refert Perdicem.

PUNCTUM III.

De Turture.

Turtur in Columbaceo genere ultimo loco ponitur. Tria aut quatuor eorum in Hispaniola observata genera. Visæ in locis frigidioribus, & nivosis candidæ & in Aquitania duas ejusmodi se vidisse testatur Scaliger. Turcarum vero imperator, par rari & Peculiaris generis Henrico Galliarum Regi transmissit. Ex Alexandria diversi à nostratibus adferuntur coloris. Observatum & nostro ævo quoddam genus, cujus femella candicat naturaliter, mas coloris est cinerei ad subrufum vergentis, habetque torquem nigrum.

In Descriptione non est quod immoremur. Falso Orus Apollo soli inter omnes volucres dentes & mammas tribuit. Falso Ovidius nigrum dixit. Collum torquis ambit longe aterrimus, viridibus maculis conspersus, ante vix conspicuus. Alæ sunt verficolors. Dorsum & pectori vicinæ elegantissimo colore rufescunt, nigris, quarum extrema viridia, intercurrentibus. Hinc virides cum ruffis marginibus sequuntur. Remiges sunt atræ; si albi aliquid occurrit, in extremitate illud est. Foemina nisi interiorum aspectu difficulter cognoscitur. Ex Indicis foemina, pedibus exceptis, qui rubri, & rostro quod nigricans, tota est candida. Mari caput, collum, pectus, alæ ad remiges, dorsum ad Uropygium dilute rufescit, nec ulla macula respergitur. Iris in oculis minaceo colore resplendet. Torquis tenuis & nigra circum quoque collum ambit. Venter prope anum lutescit. Pedes rubri tabellis albicantibus ornantur.

Nullibi fere non visuntur, rarius alicubi vel frequentius. In Æthiopia tanto numero per aëra volare traduntur, ut nebulas effundant, & solis radios impediunt. Apud Tartaros quia in cibis prohibita, abundant. Sed & Peru numerose easalit. Morantur fere semper vel in montium jugis vel ulmi aut aliarum arborum cacuminibus,

Differentia.

Scalig.
Exerc.
19.

Description.
Ovid. in
Epistol.

Arist. H.
A. l. 9.
cap. 7.

Locum.

ARTICULUS IV.

De Passeribus in genere.

Varro de
de Re
rust. l. 3.
cap. 5.

bus Hyeme vel latent, vel tepidiora loca petunt. Vnde Trimistres, quod totidem mensibus nobiscum agant, Plinio. Cum ad Italiam veniunt, in Pontiis insulis, prima volatura requiescendi causa paucos dies morantur. Redeunt ad nos adventantis veris nunciæ, cum jam prolem fecerunt.

Nutri-
mentum.
Arist. H.
A. l. 8.
cap. 3.
Columella de
R. R.
Scaliger
in Theo-
phra. l. 5.
cap. 20.
Generatio.

Vescuntur frugibus, glandibus & olivis. Milio vehementer delectantur. Æstate sua sponte dummodo sit facultas cibi, hyeme offa panis vino madefacta pinguescunt, & si novella sunt ætate, in tantum, ut pinguedine suffocati intereant, tanquam nimio infartu elisis faucibus.

De Generatione eadem fere quæ in Palumbis occurrunt. Bis anno pariunt & trimestres fecerunt. Mas & foemina vicissim incubant. Nidus inter densos arborum ramos ex duris & nodosis lignis construitur. Indicæ quotiescunque ova rumperentur, nova pariebant: forte non facturæ, si illa exclusissent. Proprium omnibus crepitus ventris; & cum vocem edunt, novissima pars alvi vehementer citatur.

Ætæ.
Barthol.
l. 3. de
propr.
Anim.
cap. 34.
Vox.

Octonis annis vivere, reliquit Aristoteles; quindecim iisdem cubare Bartholomæus Anglicus.

Genere Latinis dicuntur; Græcis quibusdam. Tum volatu, tum pedibus plurimum valent.

Amicitia.
Scaliger
in Theo-
phra. l. 3.
cap. 16.
Inimicitia.
Æl. H. A.
l. 6. c. 45.
Ingenium.
Mantuan. lib.
2. Part.
Mir.
Ambr. 6.
Hexam. 4.

Amicitiam colunt cum Psittaco, Merula, Pavonibus.

Inimicitiam cum corvo, & chloreo exercent. Helleboro, quo columbæ intereunt, propter peculiare temperamentum impune vescuntur; malo punico trito perimuntur.

Ad Ingenium pertinet, quod si mori alterutrum contingat, à secundis nuptiis abstinere, soli volare, nec ramis frondentibus insidere, nec limpida aquam bibere, nido suo contra lupi incursus, squillæ folia, quæ isti fugere consueverunt, superjacere, & gladiolum, seu tanquam fascinationis amuletum comedere, seu nido imponere; quæ fide non addo, prodatur.

Usus. Usus quod spectat, Ægypti iis, quod Accipitris sacri sibi alitis ungues aliquando evaderent, abstinebant. Martialis, cuius ævo capita Turturibus amputabantur, clunes laudat. Vulgus pinguioribus commendat. In Medicina idem quod Palumbes præstant; Fimus albugines extenuat. Facilitatur partus, si tribus juniperi septem lauribaccis, cum cinnamoni drachma & corticis cassiæ drachma una & semis facta afflata & pinguedine Gallinæ ad ignem inuncta, vespere bis in hebdomade sumatur. Non tangi venereis, qui in corio lupi cor Turturis delatum gustavit, falso à Mizaldo proditum est.

Porphyr.
l. 4. de
Abstinent.
l. 7.
Epigr.

Passeres, Græcis *παραδοί*, *παραδοί*, *παραδοί*. Nomen. *παραδοί*, Macedonibus *παραδοί*, *παραδοί*, *παραδοί*. Eleis, *παραδοί*, *παραδοί*. Athæ- aliis *παραδοί* & *παραδοί*, ut apud Hesychium extat, dicuntur. Eidem *παραδοί* passer- Dipo. l. 3. culus est.

Aristoteles vix alios præter domesticos novit: ideo omnino quæ de illis scripsit, hisce conveniunt. Athenæo ex Alexandro Myndio, alii sunt *sylvestres*, quorum foemina corpore sunt debiliores, rostri colore magis testaceo, facie id est anteriore parte, nec nigra, nec valde alba; Hollandorum forte lignipetæ: alii *Domestici*, qui *παραδοί* Galeno, *παραδοί* modernis Græcis.

Differen-
tia.

Alberto sunt quidam in vertice rubei, in cavis arboribus nidulantes. Visuntur & alibi, & semper, si Pseudo-Aristoteli credimus, tempestatem nunciant conspecti.

Galen. l. 3. de A-
ment.

Sunt in insula S. Thomæ virides, canori. Meminit Avicenna cuiusdam, qui quindecim diebus continuis in principio veris suavissime cantillet, post colorem immutet, mutescat, & sese abscondat. Est in India *Passer Nocturnus*, qui noctu volat, interdum quiescit.

Pseudo.
Arist. in
lectet.
Scaliger
in Exerc.
236.
hist. 2.
Avicenna
l. 8. de A-
nimal.
cap. 7.

Hirundinibus est alis & volatu similis, ex cinereo niger, nisi quod in mediis alis albam habeat fasciam. Noctuam odio ingente prosequitur. Forte Aristotelis *Colares*, quem abulula capî affirmat, vel Actuarii *Passer sylvestris magnus*, in summis fruticum furculis desidens, colore & magitudine Alaudæ, voce garrula, hyeme latens, quique à Noctua capitur.

Sunt ibidem & Turdo minores, velocissimi volatu, qui aquas sequuntur, & natant. Sunt & alii de quibus inferius dicetur.

Arist. H.
A. l. 9.
cap. 1.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Discri-
ptio.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Arist. H.
A. l. 2. c.
ult.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Diodo-
rus Sicul.
l. 4. c. 3.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Arist. H.
A. l. 2. c.
ult.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Diodo-
rus Sicul.
l. 4. c. 3.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Arist. H.
A. l. 2. c.
ult.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Diodo-
rus Sicul.
l. 4. c. 3.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Arist. H.
A. l. 2. c.
ult.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Diodo-
rus Sicul.
l. 4. c. 3.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Arist. H.
A. l. 2. c.
ult.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Diodo-
rus Sicul.
l. 4. c. 3.

Discriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsi sgula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. Ad imum intestinum pauca appendices visuntur. Fel aliis ventri, aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia, ut incolæ, quia semina terris concedita absumebant, alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpe una die in uno cerevsiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, foeminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quando iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

bus milio, muscis, formicis, grillis, scarabæis, vespis, apibus delectatur & hordeo, cujus corticem celeriter à grano separant. Sed nec grana sambuci rejiciunt. Et hyosciami semina absque ullo detrimento, seu propter venarum exilitatem seu causam de Coturnice redditam, devorant.

Generatio. *Generationem* quod attinet, salacissimi esse comperiuntur. Vidit unum Scaliger in cavum quoddam plus decies ad foemellam quam iniret, ex adverso muro, pusillis interpositis momentis advolasse. Vidit Aldrovandus alterum, qui longe minori quam hore spacio, vigesies foeminam inivit, pluries initurus, nisi ista locum mutasset. *Nidulantur* vel sub tegulis tectorum, vel in foraminibus parietum, & ut pulli mollius cubent in sceno & plumis. Occupant & hirundinum aliquando nidos. Vnde apud Ægyptum ob limum, quem invehit Nilus, cum hirundinibus artem parietum è luto construendorum invenisse, creduntur. Pariunt cecos & imperfectos pullos: bis terve quotannis, octo ad summum, quatuor ad minimum, ut plurimum septem.

Ætas. *Ætas* passerum diversimode definitur. Mares negantur anno diutius vivere, argumento, quia nulla veris initio appareat nigritudo in rostro, quæ ab ætate incipit. Foeminas longiusculum spacium, ait, Plinius. Albertus id à tempore coitus computat. Scaliger nullum excedere bimatum verisimile esse credit. Ex illis, inquit, parum captatur, minimum capitur; fecundissimi sunt, frequentia non magna. Aldrovandus eam ad quadriennium extendit, quod columbæ etiam salacissimæ, decimum sextum imo plures attingant. Cognoscitur ætas ex rostro, cinereum hoc, & circa fauces croceum juvenibus, nigrum ac durum provectis. *Vox* eorum apud Græcos est *quidizem*, quod stridere vertitur. Apud Homerum *quizen* apud authorem Philomeli pipere. Rhadivus cantillare dixit. Cum gradiuntur, saliant.

Ingenium. *Ingenium* si attendas, ita sunt timidi ut sæpe à somno excitentur, ad domorum fastigia concurrunt, ut à suspectis casibus reddantur alieni, qui multis periculis probantur obnoxii. Visus qui ab Accipitre impetus in Xenocratis linum confugit. Taprobanenses in alto mari emissos, terram petitori, sequuntur. Evadunt interdum ita domestici, ut ad puerorum manus vocati advolent. Ad Noctuam confugere, dum aucupis artes effugere conantur, quod Orus Apollo prodidit, falsum. Quid iis nocturnis avibus?

Inimicitia. Gerunt & *Inimicitias* cum Vulture, Mustela & aliis. Calamodyles, qui ex Passerum genere esse videtur, folio cedri perit. Pestem à milio atque panico, Sturnorum, Passerumve agmina, scio abigi herba, cujus

nomen est ignotum, in quatuor angulis segetis defossa: mirum dictu, ut omnino nulla avis intret, inquit Plinius: Eodem referente multi ad remedia ejusdem segetis rubetam noctu arvo circumferri jubent, priusquam ferriatur, defodique in medio inclusam vase fictili: ita nec Passerem, nec vermem nocere, sed eruendam priusquam metatur, alas amarum fieri.

Uusus Passerum in *cibis* rarus. Galenus tamen eos alibi cum columbis, Perdicibus, & Phasianis inter cibos attenuantes numerat. Alibi autumno maxime laudabilem carnem habere testatur, & Suidasin deliciis habitas prodit. At Platina ob nimiam caliditatem male alere, difficulter concoqui, & libidinem excitare ponit. Invenere & in *Remediis* locum. Caro venerum excitat, & rite Epilepticis, Tympaniticis, renum calculo, vel articulorum vitio laborantibus præscribitur. Idem de cerebellis & ovis prodidere scriptores. Adeps Nicolai ad tophos Emplastro inferitur. Fimus, faciem purgat; quæ facultas ex maribus agnoscitur, quod guttatim albis, & nigris punctulis distinguantur. Idem cum vino potus virgam erigit. Cum sputo hominis illitus, varices extirpat, cum adipe porcino inunctus alopeciam sanat. Stomachum exsolutum & nauseabundum inspersus corrigit. Cum oleo calefacto proximæ auriculæ infusus, dolorem dentium pellit. Cinis denique pullorum utiliter ad eundem infricatur.

De Passeribus in Specie.

PUNCTUM I.

De Passere albo, Flavo, Maculato, Albicilla, & Montano.

Passer *Albus* totus est candidus, rostrum, pedesque, quæ partes flavæ sunt, si excipias. Oculorum etiam nigram pupillam lutea iris ambit.

Flavus ad Aldrovandum delatus, totus erat flavus, præter oculos, qui nigri. Supra per dorsum, caput, alas, & caudam ad castaneum vergebat colorem. Quali etiam femora, tibiæ, & pedes tegebantur.

Maculatus qui dicitur, albo, nigro, & subflavo constabat colore. Caput totum, ac collum alba, intercurrentibus maculis subluteis. Rostrum erat flavescens in superiori parte, in inferiore omnino flavum. Alæ tribus prædictis coloribus ornantur. Oculorum iris candida. Cauda tota pene flava erat.

Albicilla rostrum & cauda ex cinereo candicat. Caput & omnes inferiores partes ex alba lutescunt. Dorsum maculæ coloris ferruginei amplæ, lineolis admodum candi-

Plin. H. N. l. 18. cap. 17.

Ufus.

Platina lib. 5.

Plin. H. N. l. 30. cap. 15. Galen. l. 6. de sanitate tuenda cap. 2.

Porta. 5. Phytogn. cap. 16.

Arcehi-gen. apud Galen. lib. 8. sec. loca cap. 4. Plin. H. N. l. 30. cap. 3.

Idem Var. Hist. l. 13. c. 31. Acolta. lib. 1. Hist. Ind.

Inimicitia. Burtholus. Aogl. l. 12. c. 33. Plin. H. N. l. 6. c. 46.

candidis, exiguis decoratæ, percurrunt. Pennæ alarum castaneæ sunt, circumcirca luteæ, tibiæ pedesque fuscæ.

Aldrov.
Ornith.
l. 15. c.
15.

Montanus est omnium Passerum nostratum pulcherrimus. Vertex capitis est coloris fere punicei, vel potius castanei. Mentum, ut vulgaribus atrum; inter quod & verticem color albus est, qui descendens totum ventrem occupat. Ad oculorum latera maculæ sunt binæ, una altera major, utraque nigra. Dorsum atque alæ partim flavæ, partim nigrae. Alæ, qua ventrem contingunt, modo ferrugineæ, modo atræ, modo albæ. Cauda tota ex luteo fuscescit. In fœmina sunt omnia pallidiora, & mentum eam maculam non habet.

PUNCTUM II.

De Passere Sylvestri, Torquato, Pusillo in juglandibus degente, stulto Bononiensium, & Illyrico.

Aldrov.
Ornith.
l. 15. c.
16.

Passer Sylvestris verticem capitis habet ferrugineum ad cinnabarinum vergentem. Oculorum ambitum album, iridem flavam. A mento ad podicem cinereus est, sed plumarum extremitates ad subrufum inclinant. Mentum & collum inferius lineæ admodum continuæ, transversales. Nigriusculæ percurrunt; cum aliâs in omnibus Passeribus maribus totum atrum statuendum sit. Dorsum, cauda, & pedes ex ferrugineo fuscescunt, nisi quod pennæ in extremitatibus suis omnino sint luteæ. Alæ eundem colorem exhibent, sed pennæ primæ costas obregentes, in notabilem desinunt candorem.

Idem lib.
c. 18.
Bellon. l.
7. de Avibus c.
20.

Torquatum Bellonius ab albo torque oculos sub supercilio ambiente vocat. Macula ei lutea est. Dorsum & alæ cinerea. Habitat in sylvis, in cavis arborum nidulatur, vocem edit magnam, & aliter se & pullos, quam is, qui in urbe degit, alit.

Passer in juglandibus degens omnium est minimus. Rostrum admodum brevi, nigro, crasso; pedibus, cruribus, capite, alis, Passeri murali similis.

Idem c.
20.

Passer stultus Bononiensium, est avicula habitu Passeribus similis, sed colore diversissima. Totus namque flavescit, maculis ubique ferrugineis, aut potius ruffis, oblongis, sed per dorsum multo longioribus & crassioribus, ubique deorsum descendentibus conspersis. Rostrum ipsi est ruffum, crassum, curtum. Oculi majusculi, quorum pupillam lutea iris ambit. Cauda & alæ ad nigrum vergunt; extremitates tamen penarum minorum in alis candidæ sunt, pedes toti ex luteo rufescent.

Idem c.
2.

Illyricus nostratibus majori est, colore fere similis. Pronus enim plane candicat. Supinus pallide rufescent, nullo intercurrente alio colore. Oculi & rostrum, quod candi-

cat, pro corporis proportionem sunt magni. Cauda bifurcata, pedes lutei, lineis transversalibus coloris pene carnei ornati.

His adde *Passerculum Brachyurum nostratium*, cui cauda admodum brevis. Totum corpus flavescit. Pectus & venter magis albicant, Rostrum intensius luteum est.

Sed & avicula *Passeribus congener* huc refertur, cui rostrum, ut in domesticis, candicat, totum corpus maculis subruffis, oblongis, deorsum descendentibus tingitur. Venter ac femora albescent. Tibiæ, pedesque sub flavi sunt.

Idem c.
17.

PUNCTUM III.

De Passeribus Indicis.

Passeres Indici sunt varii, sed præcipua ipsorum genera sunt quatuor. *Unus est macrourus, & hic duplex. Alius rostro miniaceo* magnitudine domesticis, caudam si excipias, par, rostro brevi, crasso, & prædicti coloris. Capite plano prope cervicem elevato, intercurrente subviridi ad caruleum vergente colore, subnigrum. Guttur, collo inferiore, pectore & ventre candicantibus. Alis subviridi ad caruleum vergente, albo, nigro, & lutescente colore tinctis. Cauda duplici minore nempe, alba, quæ majoris fulcrum; & majore quatuor pennis longitudine dodrantale angustissimis constante aterrima. Tibiis & pedibus ex nigro & albo maculatis, unguibus nigris & acutissimo hamo armatis.

Aldrov.
Ornith. l.
15. c. 22.

Alius rostro caruleo, cui caput ut in illo planum, sed in cervice magis elevatum totum nigrum. Oculi nigri, circulo albo circumdante, & inde lutescente. Collum & pectus coloris coccinei; venter & coxæ candicant. Alæ, tergus, & caudæ nigricant. Caudæ longiores pennas, quæ sunt binæ longissimæ quinque nimirum palmarum, & latissimæ, tertia primum etiam lata, sed in exilia admodum filamenta desinens, minores alæ sustinent.

Idem c.
27.

Alter est Brachyurus superioribus omnino dissimilis, minor nempe, & præter pedes & rostrum, quæ carnei coloris, totus niger. Cauda brevior. Oculis nigris, albocirculo cinctis.

Idem c.
26.

Tertius est sine Uropygio, & hic vel Erythromelanus, in quo totum corpus prone & supine, item alarum principia coccineo colore splendent. Reliquum alarum atrum est. Rostrum pro corporis proportionem exiguum, & domesticorum rostro minus, colore qua capiti jungitur albo, cætera nigro, acutum & exile. Uropygium nullum. Inde ex ejus pennis opera plumaria conficiunt: vel *Cyaneris thromelani* superiori longior, rubri, cyanei, & nigri coloris; quique habet caput, collum, pectus & inferiora omnia coloris rubri faturati: ad colli latera macu-

Idem c.
27.

maculas binas, contiguas, similes, magnas cæruleas; rostrum parvum, recurvum, nigrum, prope frontem album; alas admodum longas, nigras, ad latera cæruleas; pedes breves & nigras.

Idem c.
28.

Quartus Porphymelanus, cui caput, dorsum, Uropygium coloris sunt purpurei saturati. Rostrum collurionis æmulum, superius nigrum, qua capiti adhæret album. Remiges alarum nigræ. Cauda quinque digitos longa, decem pennis nigerrimis constans.

PUNCTUM IV.

De Emberiza Alba & Pratenfi.

Gesner.
in Ornithol.

HÆ Passerini etiam generis esse videntur. *Albam* ita Gesnerus describit. *Emberiza alba*, quæ mihi demonstrata est media hyeme apud nos capta. major est flava, *rostro* brevi, latiusculo flavi nihil habet. *Colore* similis *Alaudæ*, alioqui dissimilis, ventre albicante, à quo etiam *Albam* cognominavimus. In superiore rostri parte retro mucronem, tuberculum intus conspicitur. Digiti fusci sunt; crura album & puniceum colorem præ se ferunt.

De *Pratenfi* sic idem: *Emberizam pratensem* voco quam aucupes nostri *Wise Emberitz* è pratis in quibus versari solet appellant. Hæc, ut pictura indicat, colore est testaceo, seu figlino, cruribus, pectore, ventre, alis & cauda media. Utrunque enim in ea nigræ sunt pennæ. *Dorsum* quoque nigricat, & in alis superius maculæ nigræ sunt subrotundæ: inferius vero margines pennarum secundum longitudinem nigricant. *Rostrum* fuscum, *vertex* niger, infra quem utrinque macula albicans retrorsum tendit: tum rursus alix duæ nigræ & albicantes per intervalla sequuntur. Hanc avem circa lacum *Verbanum* *Cepa* vocant.

TITULUS II.

De Avibus Granivoris Canoris.

CAPUT I.

De Carduele, Spino & Passere Canario.

Nomen.

CARDUELIS, *Carduelus*, & *Cardelus* *Gazæ*, *Hermolao* & *Gesnero* *Thraupis*; *Aldrovando* ab aurea in alis vitta, *Chrysomitres*. *Aurivittes*, *Kirandi* *Jena*, & *Avis Jovis*; aliis *Corydalis*, *Græcis* *ἀκονίτις*, *ἀσπυρίδις*, *πυρροδίτις*, *πυρροδίς*, *πυρροδίς* etiam dicitur.

Descriptio.
Schwëkfeld, in Aviar. Silesiæ.

Avis est parva, cui dorsum cinereum & fuscum, *Ala* croceo colore, nigroque mixtum & alternatim variatæ, albisque notatæ maculis; *vertex* nigricans; *rostrum* acutum

rubens apice fusco. *Oculi* ambitus exterior niger, hunc miniatus, miniatum cæsius circumdat. Nec tamen hæc colorum pictura in omnibus apparet. *Femina* alas habet cinereas, guttur album. *Visa* nondum adulta ubique unicolor, ex cinereo ad rufum tendens. *Visæ* & alix, quarum quædam in anteriori capitis parte & in mento aliquid rubri obtinent, dorso, pectore, ventre, & reliquis capitis partibus albescunt: quædam totæ prorsus albæ sunt, capitis partem rubram si demas, & aliquat lutescentes in alis pennas.

Aldrov.
Ornithol.
l. 18. c. 3.

Sexus facile cognoscitur, si coloris, ut supra attingi, vocis & plumarum habeatur ratio. *Vox* fœminis exilior, nec diuturnus cantus. *Plumæ* costas obvestientes cinereæ aut fuscae, maribus aterrimæ.

Sexus.

Visitat seminibus lapparum, papaveris, rutæ, dipsaci. *Cannabino* adeo pinguescit, ut cantandi alacritatem amittat. Quæcunque vero edit, *rostro* decorticat, ut puta medulla vescatur.

Nutritio.
Porta l.
I de Vill.

Nidum in truncis arborum & spinis construit, ter in anno, Majo nempe, Junio & Augusto. Aliquando & in hypocaustis pullitiam educit. Septem sæpe ova, octo interdum, quinque aliquando ponit. Præstant cæteris, qui mense Augusto excluduntur. In dumetis nascuntur, atriores sunt, & prunis aut malis aurantiis potius quam aliis arboribus insident.

Generatio.

Cantant omni tempore, sed maxime, cum alias è suo genere adventare cognoscunt.

Vox.

Volant gregatim, & ad duo millia quandoque.

Volatus.

Ætatem ad XX. annos producant. *Visa* *Moguntia* viginti tres egressa, cui singulis annis rostrum ac ungues præcidebantur, ut cibum potumque capere posset. Depositis geminis pennis canæ, quo locabatur vel prona vel supina jacebat. Plus voce quam patina hominem delectant. Haud mali tamen sunt alimenti, si pingues, & non nidificant. *Assas* *iliacis* & *colicis* prodesse *Kirani*des author est.

Ætas.

Sinus seu *Ligurinus* *avicula* est, pectore luteo, *rostro* mediocri, tenui & acuto. Duas habet maculas nigras. Alteram in fronte, alteram sub mento. *Mari* capitis macula multo nigrior; idem toto corpore magis quam fœmina lutescit.

Descriptio.

In frigidioribus regionibus vel nunquam vel raro apparet, nec in Italia quotannis cernitur.

Locus.

Iisdem quibus *Carduelis* vescitur, nasci inprimis & comizæ femine.

Vitæ.

Nidulatur in montium sylvis. Ova secundum nonnullos duodecim, secundum alios quatuor aut quinque ponit. Amantissime cantat; & non tantum *Carduelis*, sed & aliarum avium aliquando vocem imitatur.

Generatio.

Vox.
Aldrov.
Ornithol.
l. 18. c. 4.

Volant

Volant. Volant gregatim, & toto agmine facillime autumnu capiuntur. Sanguis ejus cum fali sanguine non coit. Afino vero, quod spinas tempore verno depascens, nidum deiciat, infensus est.

Descriptio. P A S S E R C A N A R I U S ab insulis Canariis, unde adfertur, ita dictus, avis est vulgaris Pari magnitudine; rostro albo, parvo & in acutum tendente; alarum & caudæ pennis totis viridi colore. Mari pectus, venter, & pars superior capitis, quæ rostro adjacet magis lutea sunt, quam fœminæ.

Vitus. Pasceitur Phalaridis semine, saccharo, & auricula muris, qua ad cantum excitatur.

Vox. Concentu est valde amœno & acuto, quem spiritu diu non interrupto nunc in longum, nunc in altum varia vocis inflexione extendit.

Præferendi quibus cauda longior, corporis magnitudo minor.

C A P U T II.

De Fringilla, Montifringilla, & Linaria.

Descriptio. F R I N G I L I A, seu quod frigus prænunciet, seu quod plures in frigore convolent, ita dicta, Spiza est Aristoteli, modernis Græcis Fringillaro. In ea capitis & colli pars prona ad subcæruleum vergit; quod hinc ad Uropygium subvirescit. Pectus & venter inter rubrum & spadiceum ambigunt. Fœmina minus vegetis ornatur coloribus; pectus & venter ex ruffo albescunt. Vifa toto corpore candida. Vifa & ex albedo flavescens.

Locut. Locis gaudent hyeme moderate frigidis, æstate tepidis. Nam in Helvetia fœminæ per hyemem recedunt, & valido frigore ita offenduntur, ut volare nequeant; & manibus capiuntur.

Generatio. In infimis arborum, & summis fruticum ramis nidulantur. Nidus intus ex lana & araneorum telis, extus ex musco constructitur. Quinque aut sex ponere ova aucupes referunt.

Vox. Non uno eodemque modo cantant. Quædam concise quasi quæulantur, quædam in longum trahunt. Maribus vox alta est & plena. Fœminis exilis & submissior. Fringutire vel frigere authores dicunt, si suavius ut canat volueris, locustam mandendam appone.

Ingenium. Difficiliter ob astutiam capiuntur; facilius vel zephyro flante, vel fudo. Nam & demissius tum volant, & melius alleetricum voces audiunt. Quædam nunquam manuescunt, & inedia consumptæ commoriuntur. Omnes primis captivitatis mensibus præ mœstia obmutescunt; nec nisi blanditiis exhilarantur. Mane si canant, tempestatem præfagiunt.

Descriptio. M O N T I F R I N G I L L A magnitudi-

ne fringillam excedit. Color in capite, dorso & cauda nigrior quam Fringillæ. Supina pars albicat. Pectus cum gutture nonnihil ruboris habet. Alæ duabus transversis lineis ex ruffo flavescens distinguuntur, media linea interjecta. In fœmina, vertex, cervix & dorsum plus habent ferruginei: alarum linea superior adeo est angusta & brevis, ut ferè delitescat. Non adeo suave canunt, & caveis inclusæ aliarum altum Passerum inprimis voces imitantur.

Descriptio. L I N A R I A Passeris est magnitudine, specie admodum similis, colore testaceo seu ferrugineo ad cinereum vergente, coque in mare intensiore. Idem in pectore maculis respergitur ruffis, fœmina fuscis & majoribus. Alarum rectrices pennæ nigricant, sed ad latera & in extremitatibus suis candicant.

Nutritum. Cibis ipsi Phalaridis, lini, cannabis, raparum, & caulium semen, panicum, avena fracta, &c.

Morbus. Laborat interdum morbo, quem subtilem dicunt, in quo mœstia silet, pennæ obrigent; venter solito tumidior venis rubris conspergitur, pectus ex carne apparet.

Vox. Exoriente canicula obmutescit, ac plumas vellicando circa medium excutit, sic certum canicularis syderis exortum indicat. Celebris est apud Italos ejus astutia. Unde proverbium egiit un Fanello.

Gefner. *in Ornithol.* Huc pertinet Linaria Rubra Gefnero à coccineo verticis colore dicta, sive illa Aster Oppiani, sive aliud quid. Advolant aliquando turmatim, & fere pestilentiam brevi futuram circa Norimbergam indicare putantur.

Aldrov. *l. 18. c. 9.* Nec non Linaria marina Aldrovandi, quæ rostro lutea, vertice miniacea, pectore & ventre candicans. Collo & dorso ex luteo fusca est. Alteri quam exhibet per tergus & superiora prorsus leucophææ, percurrentibus strijs deorsum vergentibus, color miniaceus magis splendet, alæ sunt longe pallidiores; Gula & pectus leviter lutescunt; retro oculos macula fusca, rotunda data est.

Quæ circa Argentinam Gynel nominatur, per caput, dorsum & caudam fusca est, pectore ruffo, fuscis distincto maculis, cruribus rubicundis; ventre inferiore alquicante; seminibus papaveri & aliis vescitur; & gregatim volat.

C A P U T III.

De Alauda in genere, & in specie.

Nomen. A L A U D A, seu Cassita & Galerita, quæ tamen cristatis vocabula proprie conveniunt, Græcis veteribus αλφεινισκος, αλφειν, ut apud Hesychium lego; modernis Cuzula, & in Creta, teste

Scaliger
Exerc.
233.

teste Bellonio, Chamæchilados nuncupatur. Cirim non esse, tum cirri seu innulæ oblongæ pulcherrimæ, tum pedes rubri, qui in alauda non sunt, Scaligero agente, evincunt. *Formam* non describam, obvia omnibus est avicula. In posteriore digito pedis longissimum habet unguem.

Locus.

Arist. H.
A. l. 9.
cap. 8.
Agrico-
la. l. de
Animal.
subter.
Nutri-
mentum.
Plut. l. de
Iside.

In Andalusia non reperiri, Averroës tradit; nunquam arboribus insidere Aristoteles. Visæ tamen in illis cristatæ, si rugosum nec levem habuere corticem. In angustis montium hyeme alicubi conduntur: in Italia & Gallia omni eas videbus tempore.

Vescuntur granis, sed & vermes deglutiunt, attelaborumque ex genere locustarum ova diligenter perquirunt: ideo à Lemniis coluntur.

Generatio.

Nidum ex siccarum herbarum radicibus humi ter in anno, nempe circiter Calend. Maji, Junii, & paulo post Idus Julias construunt, eundemque auræ obversum ita in segetibus & gramine recondunt, ut præterentium & accipitrum minime obvius sit oculis. *Ova* quinque pariunt, quæ à bufonibus foveri falsum; quia auræ exponuntur. Superincidentes solis radiis parentum defectum supplere videntur. Pulli exclusi implumes adhuc deducuntur ad pastum, ut prædantium eripiantur injuriis.

Arist. H.
A. l. 6. c. 1.

Vox.

Quantum ad *Cantum* mira alacritate pennis exertis in aëre vocis modulatione, lætæ serenitati temporis, quasi applaudit. Nam nubilo pluviove cælo, vix aut unquam canit, ut neque humi, sed inter ascendendum. Ascendit autem paulatim, subito vero & instar lapidis descendens cantillat. Matutino vero potissimum audiuntur, meridiano silent.

Inimicitia.

Arist. l. 9.
H. A. c. 1.

Inimicitias exercent cum Pella ex ardearum genere, cujus ova diripiunt, ut Aristoteles vult; cum Acanthyllide, ut Philus & Ælianus; cum corvis, quod ab iis devorentur; cum Accipitribus Alaudariis, à quibus adeo expavescunt, ut in hominum sinus confugiant; cum Arcturo sydere, quia in ipsius cum sole exortu, obmutescere incipiunt, ægrotant, & plumas vellicando excipiunt. Denique cum sinapis semine, quod nulli non innoxium, alaudas conficit.

Anton.
Myzald.
cit. Al-
drov.
Ælian.
H. A. l.
6. c. 46.

Morbi.

Laborant morbo comitali, & alterius oculi cæcitate, idque nono accidere anno Albertus experientia propria nixus testatur.

Usus.

De *usu* in cibis taceo. Juniores & pinguiusculas nemo non appetit.

Species.

Species Alaudarum sunt, *CHRISTATA* & *NON CHRISTATA*. Illa est vel *Major* vel *Minor*, quarum hæc Aristoteli incognita, Schwenckfeldio *Arborea*, *Fera*, *ἀνθρώπου*, apicem pro corporis magnitudine longiusculum, & pedes rubros habet.

Cum frigus intensum est, & nix agros tegit in sterquiliniis & prope horrea *versatur*, per æquinoctium avolat, si Longolio credendum; nidum in fossis senticosis sternit; nullam particularem cantunculam habet; sed inepte aliarum quibus cum victitat vocem refert: Congener est ipsi Alauda *Sylvatica*, quam Germani *Waldlerche* vocant, parte inprimis prona albicantior.

Major rostrum habet cavum; cristam, cujus radices inter utrumque oculum situantur, aliquantulum nigricantem. Dorsum cinereum albo maculatum. Ventrem albicantem, pectus cinereum albis maculis conspersum. Caudæ plumas nigras. *Lingua* exigua fere furcatam, quia ramis raro insidet; unguis longiusculus. *Habitat* in agris, circa flumina, & lacus; hyemis tempore ad vias. Non volat aliarum more, sed vento cogente, nunc ima nunc summa petit.

Non cristata suavius canit.

Laudatur ad colicos dolores, seu coctæ seu assæ. Quidam cor alligari femori jubent: alii recens tepensque devorant. Consularis Asprenatum domus est, inquit Plinius, in qua alter è fratribus colo liberatus est ave hac in cibo sumpta, & corde ejus armilla aurea incluso; alter sacrificio quodam crudis laterculis incluso corde, ad formam camini, atque ut sacrum peractum erat, obstructo sacello. Thraces vivente adhuc Alauda cor exemptum sinistro femori pelendæ colicæ ergo circumdebant, ut Alexander Trallianus scribit. Porta causam in loquacitatem conjicit. Nimia enim garrulitate, flatus, ex quo morbus sæpe exoritur, eximitur.

Non CRISTATA, Hermolao, Sipontino, & Grapaldo Terrancola, Niphò falsò Aristotelis Tetrax, colore similis est cristatæ, sed magnitudine minor. *Caput* habet nigris fulvo colore intermixtum. *Dorsum* spadiceum, cinereum, & subnigrum. *Pectus* pluribus maculis distinctum. *Ventrem* subalbidum. Posticos digitos & unguis ejusdem magnitudinis cujus & posteriores. *Degit* in planis locis, erica & Junipero confitis. Hyeme gregatim volant, æstate binæ. Alta petunt volatu, diutius in aëre hærent, & majora spacia conficiunt. Amoenitate *vo-*
cis inter omnes excellunt. Galli ex uno temperamento in alterum facile transire, & proventorum diversitate, diversimode etiam immutari, tradunt. Flante Austro macrescunt, Aquilone pinguescunt. Captura hyeme largissima, nisi nives diutinae sedcant, & maxima sit frigoris inclementia.

Ad hanc *Colandra*, *Alauda pratorum*, & *Alaudæ* congener spectat.

Calandra Græcis *χαλάνδρα* & *χαλάνδρος* forte *ὄντι τῷ κατὰ δίδου*, seu suavitate cantus; aliis, sed falso *Acredula*, *Charadrios*,
Gur-

Bellon. l.
5. de A-
vibus c.
22.

Usus.
Galen. de
simpl.
Medic.
facult.
l. 11.
Diosco-
rid. lib. 2.
c. 48.

Arist. H.
A. l. 9. c.
25.

Bellon.
H. A-
vium l.
5. c. 23.

Gurgulio, ad Sturni magnitudinem accedit. Alaudæ de cætero in omnibus similis. Collum qua jubæ Capite connectuntur gracile habet, & rostrum crassius. Victitat duriusculis granis. Vocis modulatione audientes mirifice oblectat, ac omnes avium voces expressissime imitatur. Capta, vix unam diei horam sine cantu præterit.

Bellon. H.
Avium.
l. 5. c. 24.

Alauda Pratorum Alaudis est minor. Rostrum habet tenue, & longiusculum. Plumæ cutem contegentes omnino nigras. Caudæ, in extremo albicantes. Humi dormit. In pratis nidificat. Difficulus educatur, sed educata suavissime canit. Cum Accipitrem supervenientem adspicit, in arborum ramis latitat.

Alaudæ Congener illa Aldrovando dicitur, quæ Bononiæ Petrone, Genuæ Petronella & Chiapparone dicitur. Cristatæ majoris magnitudinem æquat, vel superat. Eisdemque colore fere similis est. Pectoris & totius ventris color magis ad subflavum vergit. Ungues in tantam longitudinem non excreverunt. Tibiæ & pedes albicantiora sunt. Humi sæpe quiescit vel curstat, in arboribus vero & fruticibus summa semper cacumina petit, quibus diu immobilis insidens, suavissimas cantilenas modulatur.

CAPUT IV.

De Chloride, Citrinella & Serino Gesneri, & Luteis earumque congeneribus.

Descriptio.

CHLORES Germanis Grünfinken / seu Fringilla viridis, magnitudine est alaudæ, aliquando tota viridis, aliquando valde lutea. Mas à femina in hoc differt, quod hæc spadiceo partim, partim, cinereo ubique coloratur, minusque multo lutei coloris, imo modicum admodum habet. Pedes ei & crura mollicula, carnea fere substantia & colore. Gula, venter, pectus, uropygium, & alarum suprema ora, pulcherrimo ochræ colore flavescit.

Victus.
Arist. H.
A. l. 8.
cap. 3.

Aristoteles vermiculis victitare scribit. Verum pascitur quoque seminibus, Carduorum majorum, Lapparum, raporum, & phalaridis. Adeo aliquoties cicuratur, ut una manu detenta, cibum altera porrectum, capere non recuset. Nidum ex hymphito stirpitibus evulso facit. Sed stragulum ex lana & villo subijcit. Quatuor aut quinque ova parit.

Arist. H.
A. l. 9. c.
23.
Generatio.
Æl. H. A.
l. 4. c. 47.
Aldrovandus
Ornithol.
l. 18.
cap. 18.

Congener est huic illa, quam Aldrovandus *Chloridam Indicam* vocat, quæque prono ventre nimirum & pectore est candidissima, rostro subviridi ad fuscum vergente, capite toto dorso & Uropygio viridibus; pennis, alarum remigibus & tota cauda cæruleis, scapis albis, pedibus nigris.

CITRINELLAM Gesneri, quam Gal-

li Tarin vocant, Thracipedem Aristotelis Bellonius esse opinatur. Color capitis dorfi caudæ intensior est quam in Ligurino, ideo ob flavedinem magis fusca videtur. Mas plus flavi coloris in toto corpore & præsertim in pectore circa nates habet, quam femina. *Vesitatur* iisdem seminibus, quibus alia canora. Raro plures quam septem, aut octo uno incubitu excludit, & in cantu omnibus hujus generis excellit.

SERINUS Gesneri Ligurinum magnitudine & colore refert, pectore & ventre ex viridi flavescens; parte superiore, partim ejusdem coloris, partim fusca. *Congener* est illa, quam Germani Hirngrylle vocant, magnitudine Ligurini, sed magis lutea. Capitur in Helvetiæ montibus. Aupeps cum sexum utrumque domi aleret, ita ut aliqua volandi libertas esset, pullos etiam ex eis habuit. Sed cum aliquando pro mare Gryllo marem Ligurinum adhibuisset, ova quidem nata sunt, sed ex quibus foris nihil provenit. Suavissime cantillat.

Gesner.
in Ornith.

LUTEARUM duo sunt genera; *Unum*, quod Ciam simpliciter Itali vocant; *Alterum*, quod à colore paleari, Ciam Pagliariam, seu Pagliariccam, Angli Gelgostam dicunt. Capiuntur facillime omni aucupii genere. *Vesuntur* granis hordei, triticeæ, panis; hyeme alimentum in equinis stercorebus quarunt. Capta per duos vel tres menses merum Cici ingeminant; servitutis oblitæ ad suos modulos revertuntur. In caveis sæpe cum morbo comitiali conflictantur. Media hyeme magno numero in Italia apparent, & in pratis ingentes earum catervæ conspiciuntur. Quæ de harum *congeneribus* addit Aldrovandus vide si libet capite vigesimo primo, libri decimi octavi.

TITULUS III.

De Avibus Baccivoris.

CAPUT I.

De Turdis in genere.

Avis Latinis, seu per Onomatopœiam, seu à colore, Turdus dicta, à Græcis veteribus τῦρδα, τῦρδα; à modernis Schynopoullus, ac si lentiscinas aves diceret, vocatur. *Genera* ipsorum tria prodidit Aristoteles. *Viscivorum* seu τῦρδα picæ magnitudine. *Τῦρδα* à stridore dictum, quantitate Merulæ; & *Ilia*, omnibus minus, minusque maculis distinctum, quod gregatim volat, & nidos à luto hirundinum more construit, & apud Gallos non extare putatur. Recentiores plura enumeratis annumerant. Nam & *Turdela* Hermolao est genus Turdi alterum, quod in Veneta provincia Drexanos vulgo vocant, major Turdo, penna subfusca, varia; & Tur-

Bellonius
Obser. l. 1.
cap. 10.

Athenæus
Dipn. l. 2.
Scaliger
in H. A.
Arist. l. 9.
cap. 26.

Turnero illa, quæ Saxonice *Brachvogel* (commune hoc fere illis nomen, quæ in novalibus & quiescentibus agris immorantur) color fusco, terreo, obscuro, ut humi sedens agnosci vix possit, ex Turdorum est genere. Idem Germanorum *Trostel* / Turdum pilarem esse putabat. Scaliger secundi apud Aristotelem generis, *duas species* facit; quarum una *Trida* à Vasconibus, altera *Turdus* dicitur, figura & facie adeo dissimiles, ut nonnunquam in agnoscendo fallantur. Saxonum *Ziepdruschel* colore Iliaco similis, quæque circa rubos versatur, & fructibus eorum victitat, minimum Turdi genus, & *secundum* Aristotelis quibusdam, Germanorum vere *klein Ziemer* / Merula minor, rostro acuto, brevibus pedibus, ejusdem nonnullis Cyanus. Helvetii habent Turdum sylvestrem. Carinthiorum avis dicta *Heimtrostel* / pedibus albis, Turdis minoribus annumeratur. De *Albis*, qui in Septentrione, non est quod aliquid dicam.

Genera.
Scaliger
Commentar.
citato. l.

Forma.

Arist. H.
H. l. 9. c.
49.
H. N. l.
10. c. 29.

de Re
Rust. l. 1.
H. A. l. 8.
cap. 3.
Gefo. in
Ornithol.

Hexam.
l. 5. c. 14.

Aldrov.
Ornithol.
l. 16. c. 1.
Videtur.

Forma si spectetur, cinereus color eis fere peculiaris est, huic quam illi remissior vel intensior. Omnes per collum inferius, pectus & ventrem maculis æstate consperguntur, quas per hyemem deponunt. Unde Plinius, *Turdus color æstate circum collum varius, hyeme concolor*. Visus tamen visci vorus, nescio quo anni tempore captus, qui ita plumbei coloris evaserat, ut quodammodo ad amethystinum accederet. Visus & Turdus vulgo dictus, tribus diversis coloribus diversis nimirum temporibus captus. *Rostrium* omnibus est longiusculum, crassiusculum, rectum. *Lingua* lata, & ad imitandum humanum sermonem parata. *Pedes* figura similes, & colore non in omnibus eodem. *Intestinum* appendices non habet, nec gula versus stomachum dilatatur, nec superius ingluviem habet. Nullibi non sunt obviæ. *Daphnios*, seu à Laureto illo Alexandrino, ubi baccis vesci poterant; seu à Daphne delitioso quodam Syriæ suburbano ita dictos, Clemens Alexandrinus celebrat. Advenas esse, & quotannis in Italiam circiter æquinoctium autumnale transmare, verno revolare. Author est Varro. Unde trimestres Plinius dicit; per hyemem latere scripsit Aristoteles: nec tamen omnes, vel ex eo evidens, quod in Helvetia circa Tigurum per hyemem abundant, hyeme in Italia loca maritima juniperis & myrtis confita, frequentent. Ab Ambrosio inter eas quæ sub hyemis initium ad nos accedunt, numerentur; Bononiæ denique Martio etiam mensē copiose habeantur.

Quantum ab *Victum*, delectantur baccis myrti, juniperi, sambuci, hederæ, nec non olivis, ut est apud Calphurnium Poëtam. Unde Olivariorum nomen; fagi glandibus, insectis, lumbricis & culicibus. Ex

femine ab ipsis excreto provenire viscum Theophrastus & Plinius prodidere, tam falso quam Satura & Orchides ex eorum genitura nasci, falsum est. Quot enim in arboribus Turdus stercois excernit, & tamen viscum non generatur? Quot in regionibus Turdi non sunt, ubi viscum nascitur? Concoquitur in Turdi ventriculo granum cum labruscarum longe duriora & majora concoquantur gigarta: & exhibitis uni visci baccis, nulla in excrementis reperiata est species. De saginatione videantur *Oeconomica*.

In cacuminibus arborum *nidificantes*, pene contextim in successu, generant. Ova, decem à conceptu diebus pariunt & fovant. Increbuit alicubi mos, ut vasa ibidem collocentur.

Vox eorum trutillare, ut Philomelæ author inquit. Sermoni assueti, tanquam è modulis sermocinantur. Habuit Agrippina, qui omnium sermones imitabatur. Et mirum est adeo furdos dici, ut vitium in proverbium cesserit. Invenere & in

Medicina Usus. Myrtorum baccis farti & affli ventris profluvio laborantibus exhibentur. Tempore pestis in cibo, macerati, laudantur.

Quid de usu in cibis dicam? Duriores quidem concoctu, Perdicibus, Attagenis, Phasianis & Gallinis, Galenus facit: sed quia idem Phasianos Gallinis concoctione & nutriendi pares, edendi suavitatem superiores alibi scribit; alibi laudatis cibariis, quæ neque tenuem neque crassum succum gignunt annumerat, vel locus prior mendosus est, vel sibi ipsi contradicens, fallitur. Græci sane ova cum Turdis, leporinis carnibus, ac mellitis placentis secundæ mentis frequentius inferebant. Iisdem Turdorum turmæ in propomatibus seu primis cœnæ ferculis in usu. Eorundem pectora in patinam Apicianam conjiciebantur. Et quantus circa eos Romanorum luxus, sive copiam, sive prætia spectes. Tanta Turdorum aliquando fuerit aviaria, ut ex iis stercorearentur agri. Lucullus alios videbat Turdos in mazomo positos coctos, alios volitare circa fenestras captos. Ex uno Ornithone quinque millia scio vennisse Turdorum denariis ternis (id est computante Budæo denis solidis Turonicis & semisse) ut H. S. sexaginta millia ea pars villæ reddiderit eo anno, inquit Varro. At nunc ætatis nostræ luxuries quotidiana fecit hæc prætia, &c. Nostra ætate quoquo modo capti eduntur. Quibusdam jecur ovis integrum cum medulla panis contunditur, & per linteum transmittitur. Hinc aromatibus ad saporem colorumque commendandum inspersis fervefcit. Turdi in jure carniū elixi, & modice frixi imponuntur.

Theophr.
de Caus.
Plant. l. 2.
cap. 23.
Plin. H.
N. l. 16.
cap. 49.

Scaliger
in Exerc.
168.

Genera-
tio.

Vox.
Scaliger
in Exerc.
217.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 42.

Usus.
Plin. H.
A. l. 30.
c. 7.

Bellon. l.
9. de A-
vib. c. 31.
Galenus
Method.
lib. 7.
lib. de ci-
bis boni
& mali
succu.
Alex. ab
Alex. l. 3.
Genial.
dier. c. 26.

Athen. in
Dipa. l. 2.

Plin. H.
N. l. 17.
cap. 9.
Varro de
R. R. l. 3.

Varro l.
3. de R.
R. c. 2.

C A P U T II.

De Turdis in specie.

A R T I C U L U S I.

*De Turdo Viscivoro & Trichade.*Gefner.
in Ornithol.Aldrovandus l.
16. c. 2.

Turdus Viscivorus, Aristoteli *ἰσχυρὸς*. Athenæo *ἰσχυρὸς* dicitur. Major est cæteris Turdis, & paulo infra columbam. Capite, alis, & ventre fuscus; plumis tamen juxta caudam aliquid flavi admixtum apparet. Cutum intra rostrum pallidum & subrubum colores mixti tingunt. Collum parte prona, venterque totus nigris punctis in albicantibus plumis, & alicubi flavis variant. Pedes digitique, posteriore præsertim tibiæ nervo, flavescunt. Aldrovandus semel unum adeo, in cauda maxime, & alarum remigibus albescentem observavit, ut pene albesceret; capite vero, tergo, & supernis alis omnino cinereus esset. Nullo non tempore apud nos visuntur. *Cibus* ipsis albiæ viscum & resina; æstate inprimis, hyeme fructiferarum arborum semina. Sed & baccis arborum, Juniperi præsertim & Ligustri, inhiant. Dum singuli singulas visciferas arbores occupant, & prope eas morantes, alios persequuntur, facilius capi, prodidere nonnulli. Observata in iis à rusticis & præfagia. Diu nempe duraturæ hyemis, si circa hujus finem in cacumine arboris cantillent. Futuræ æstatis, si in ejus medio considerant.

Gefner.
in Ornithol.

TRICHAS, qui Pilaris perperam dicitur, & à stridore nomen fortitus est, totus fere magnitudine & figura est Merulæ. Rostrum habet subflavum in extremo nigricans. Os & linguam flavo colore tincta. Collum pronum cinereum maculis nigris aspersum. Dorsum charopum, & per medias pennulas nigricans. Pars circa Vropygium cinereis plumis obtegatur. Caudam nigræ pennæ constituunt. Collum supinum & pectus varia sunt. Pennæ alarum partim nigricant, partim ruffo colore tinguntur, &c. Nunquam aut raro in æstate in Anglia visuntur, hyeme tanta illorum multitudo, ut nullius avis major. Vescitur baccis juniperi, Aquifoliæ, & sorbi minimæ. Apud Helvetios postremo advenit. Acutè sonat, & quamvis colorem mutet: vocem tamen non variat. Volat gregatim, & inter volandum obstreperus est.

Arist. H.
A. l. 9.
c. 20.

A R T I C U L U S II.

De Turdo Illade, & simpliciter dicto.

Turdus Illas, Tyllas Alexandro, Mynodio dicitur. Fuscus est per totum dorsum. Pectus est varii coloris, medius venter albicat; utrinque rubet. Eodem

colore pars sub alis tingitur. Interiora oris penitus flavescunt. *Nidificant* in Bohemia vel Hungaria. Gregatim plarumque in dumetis *degunt*. Initio hyemis per quatuordecim fere dies ante Pilares in Helvetiam advolant, circa Pascha recedunt. Racemis *visitant*, vineisque multum damni inferunt. Ideo tempore vindemiarum capiuntur. Gefnerus in dissecti ventriculo mense Novembri baccas spinæ albæ quam Oxyacantham dicemus, repetit.

Quem Aldrovandus *Turdum simpliciter dictum* vocat, is Bellonio *Turdus primus Aristotelis*, & *Turdus viscivorus minor* dicitur. Crura in eo ex descriptione Gefneri albicant. Pectus, ventrem, & latera puncta nigra insigniunt; illud subflavo & ruffo colore in unum commixtis insignitur. Idem sub alis color merus. Tota fere pars prona fuscescit. Alæ fusco ruffum miscuerunt, & maculas subflavas habent. Venter candidus est. Crura albicant. Proprium illis esse apparet, ut circum oculos maculentur. Sexum solo cantu discerni posse dicunt.

NB. *Genus Turdorum exoticum vide in Mantissa. Num. 9.*

C A P U T III.

De Merulis.

Merula, Græcis *ἰσχυρὸς* & *ἰσχυρὸς*, quibusdam à nigro colore Nigretta; Latinis quod solivaga sit & sola pascatur, *Merula* dicitur. Duo ipsarum *Genera* Aristoteles ponit. *Vulgare* seu nigrum, & *candidum*, quod tantum circa Cyllenam Arcadiæ nasci scribit: nos & in Norvegia, & in novo orbe inveniri scimus. Varro inter resinusitates reponit. Addit & *tertium* fusco colore, & minoris magnitudinis, quod Passerem solitarium vel Merulam montanam quidam esse judicant. Vidit Aldrovandus totam ex flavo ad castaneum vergentem, mutato forte priore colore. Magnitudinem ei Turdi Trichadis Aristoteles tribuit citante Athenæo, colorem nigrum; rostrum puniceum vere an falso nescio. Albertus rostrum & pedes crocea. Sed ut plumarum colorem pro temporis diversitate mutant: ita & rostrum idem non servat. Nam id anniculis, teste Plinio, in ebur transfiguratur, at maribus duntaxat. Scaliger pullos nigrum habere, anniculos buxum affirmat. *Sexus* optime discernitur. Fœmina namque fusca est, rostro inferius tantum lutescente, supra plane fuscido. Gula pectusque totum ex albicante & fuscescente coloribus maculantur. Nominat Aldrovandus quandam *Leucophalum*, cujus caput præter tres maculas oblongas nigras, quæ retro oculos conspiciebantur, prorsus candidum erat, rostrum & oculorum

Gefner.
Arist. H.
A. l. c. 9.
c. 19.
Var. de
R. R. l. 3.
c. 9.In Aristoteli
H. A. l.
9. c. 5.Ornith.
l. 16. c.
6.

iris lutea, pedes fufceſcebant. Cauda & venter aterrimicoloris. Alæ albo maculabantur. Apponit & *candidam totam*, roſtro duntaxat rutilo, & pedibus luteſcentibus. Alia ex albo & nigro ſunt maculata, minus quam ſcæmina, cauda nigra, roſtro & pedibus intenſe in mare rutilis, pallide in ſcæmina flaveſcentibus.

Locus. Quantum ad *Locum*, verſantur in locis denſis conſitis arboribus, ſpinetis, anguſtis montium angulis, & lapidum fiſſuris. Arist. H. A. l. 9. cap. 16. Mutant ut Turdi locum, & hyeme in vicina demigrant aprica. Paraſitus tamen apud Athænæum, ſi aliorum ſub dio perpetiendus ſit, ſe Merulam eſſe profiretur.

Vitus. *Vefcuntur* iſdem quibus Turdi. Sed & promiſſis forborum, orni ſambucique acinis. Caveis incluſæ etiam carnibus. Plantæ ex quibus præcipue cibum decerpunt, ſunt Oxycedrus Dalechampii, Ilex Aquifolia ejusdem, Myrtacanta, philyrea anguſtifolia, myrtus laurea maxima, myrtus exotica Plinii, & arca Theophraſti effigie alni.

Generatio. *Nidos* figura hæmiſphærica oblongiuſcula, admodum ſcutellæcavos, ex ſurculis ramuliſque exilibus, & fibroſis radiculis luto inter ſe contextis, ſubſtrata molliore materia conſtruunt. Bis anno, omnium avium primæ, ante exactam hyemem, in Helvetia menſe Martio vel Aprili *pariunt*. Numerum pullorum nemo exponit. Nido Aldrovando allato quinque inerant. Perfarum Magos ex ſalvia ſub ficu putrefacta, dum ſol & Luna ſecundam ſolis faciem occupant, avem Merulæ ſimilem procreaſſe, cujus aduſtæ cinere lampadi inſperſe domus ſerpentibus repleta videbatur, author eſt Langius.

Epith. Medic. 38. Vox. De earum *Voce* fringulicire quidam uſurpat. Veteres ejus non exprimunt proprium, ſed inter canoras ponunt. Quandam adeo in novem vocum modis exprimendis excelliſſe, ut nullus hominum perfecte eam imitari potuerit, Albertus author eſt. Incipiunt autem vere canere, continuant per æſtatem. Hyeme cohibendo vocem, ſtrepunt & tumultuoſe vocalantur Plinius hyeme balbutire, circa ſolſtitium mutas eſſe ait.

Arist. H. A. l. 9. cap. 49. Plin. H. N. l. 10. Amicitia. *Amicitiam* cum ea Rubecula colit. Sequitur enim eam, & noctu, vel juxta ipſam, vel in proxima arbore conquieſcit. Ipſas Nocturæ ita inſenſas quidam volunt, ut quotieſcunque clamantem audiverint, tanquam injuriam vindicatorum, advolent. Mali Punici grano perire Ælianus author eſt.

Æl. H. A. l. 6. c. 46. Ingenium. Philoſtr. l. 7. in vita Apollon. *Ingenium* reſipit, quod humanum ſermonem, quamvis linguam ſtriſtam, roſtrum rectum, & anguſtum habeant, imitantur: & quod Laurifolio annuum faſtidium purgant.

De *Uſu in cibis*, hæc pauca dixiſſe ſufficiat. In pectore ipſarum aduſto haud parvam collocaſſe voluptatem Romanos. Inter popinæ vero profeſſores cluneſne tergoribus ſint præferendæ, diſceptatum. Tarde tamen concoquantur, parumque alunt, ſi Platinæ credimus; interlaudatas cenſeri debent, ſi Salernitanis. Nonnulli à Noctua captas præferunt. Alii pingues & retibus vel laqueis captas eligunt.

Quantum ad *Medicinam*, bene illis qui laxa ſunt alvo præſcribuntur. Plinius inafſatas cum myrti bacci dyſentericis mederi ſcribit, Porta Melancholiæ. Fimex acceto miſtus, ſi orizam avis comederit, extirpat lentigines. Caput ad brachium ſiniſtrum, cum leporis pedibus portatum, audaces facere, mendacium eſt.

Uſus. Horat. l. 2. ſermon. Plin. H. N. l. 10. cap. 50.

Platin. l. 5. de tuenda ſanit.

Porta l. 3. Phytogn. cap. 11.

CAPUT IV.

De Merulis in ſpecie.

ARTICULUS I.

De Paſſere ſolitario & ejus congeneribus.

Paſſer *Solitarius*, quod cum nullo ſui generis unquam, niſi tempore generationis verſetur vulgo dictus, quem tertiam Ariſtotelis Merulam eſſe Geſnerus, Niſphus, & Aldrovandus aſſerunt, Merulus ſolitarius circa Tridentum, Merulus ſtercoroſus, quod in latrinis habitare credatur Romanis, ſi Alberto credendum; Merula ſaxatilis Placentiæ dicitur. Avis eſt Merula paulo minor, tota nigra, roſtro longiuſculo, parumper arcuato, capite pro corporis proportionem parvo, ſuperius plano, nigroque ad latera, nempe circum oculos, aures, & in collo inferiore cæruleo. Fœmina tota fuſca eſt, & pectore maculis luteſcentibus variegatur, mari plane diſſimilis. In ſaxis & teſtis (non teſtis, *neque*, namque textus habet) diverſorium habere Ariſtoteles dixit. In parietibus aliis Paſſeribus conjungi, & cum eis ad paſtum volare Albertus. In dumoſis rupibus circa Larium lacum nidulari, neque cum aliis avibus degere, Geſnerus affirmat. Canorus eſt, & Mediolani ac Genevæ magno propter cantum precio venditur. Quem Bellonius deſcripſit, & Charadrium eſſe primo aſpectu putabat, Turdi Iliaci eſt craſſitie, Luſcinia moribus præditus. *Roſtrum* habet rotundum, acutum, ſubalbum, in extremo nigrum. *Pennas* ſub pectore & duabus coſtis colore daſtylorum, maculis interſtinſto. *Dorſum* cinereum, fulvo macularum. *Pedes* Turdo ſimiles, *Caudam* ut in Luſcinia ruſſam, quam mox ut è nido eximitur, immutat. *Mas* quia pulchrior, coloris elegantia à fœmina diſtinguitur.

In rupibus ſolitariis nidificat, & raro in plano

Geſner. in Ornithol.

Ariſt. l. 9. c. 19.

Forma.

Generatio.

plano aut per valles cernitur. Certo anni tempore sub tegulis seu imbris *degit*. Canit noctu æque ac interdiu ad lumen candelæ maxime: Franciscus Gallorum Rex tanti ejus cantum fecit, ut nullam præter hanc audire dignaretur.

PASSERI SOLITARIO *congener* est illa avis, quam quidam Petrocos scyphum, Germani *Steinrotele* & *Blauvogel* vocant, Bellonius Cyaneum Aristotelis, sed falso (Ex Picorum enim genere est, rostro etiam ad saxa durissimo; & quis Merulam totam cæruleam vidit) dixit. Magnitudine est Sturni, pectore, cervice, & lumbis Cyanea: dorso & alis nonnihil nigricans. Rostrum ei sesquidigiti longitudine subter nares fuscum, imo aculeatum superiore parte adunca, inferiorem ut plurimum contingente.

Bellonius
Observ.
l. 1. c. 11.
& de A-
vib. l. 6.
c. 6.
Seiler. ad
Gesne-
rum.

Locut.

Degit in altissimis, præruptis, & nivosis scopulis, in Creta, Citharea, Corcyra, Zacyntho, Eubæa, & circa fluvium Athe-
sin.

Genera-
tio.

Nidificat in deviis solitudinibus, pullosque, quos ternos aut quaternos excludit, ut à rupicapris etiam tuti sint, in cavernas deorsum condit.

Vox.

Vox ipsi articulata, amœna & varia. Media & intempesta nocte expergefata, ad astantis provocationem claro spiritu canit. Ante tempus autumnii cum colore etiam vocem mutat, ac alis expansis novos, secum continuo murmurans, excogitat cantus, nec veteris obliviscitur.

Color sub hyemem niger è cæruleo evadit. Circa veris initium, in pristinum commutatur. Adulta vel è nido semel egressa & volatui adsueta, nullis astutiis capitur. Moris denique ei, oculos hominum aliorum alitum more adpetere. Tamque diligenter res observare, ut plæraque, vocis aliquo articulo indicet.

ARTICULUS II.

De Merula Montana, Germanorum Torquata, Bicolore, & Saxatili.

MERULA Germanorum *MONTANA*, avis est paulo infra Turdum majorem. *Caput*, dorsum & alæ, ruffo quodam modice admixto nigricant. *Pectus* est, ex plumis partim subfulvis, partim nigricantibus obscure maculosum. *Os* interius & lingua lutei seu melini coloris. Ventris color ex nigro & cinereo mistis, crura ex glauco nigricante, & ruffo, constant. Cauda est atra.

TORQUATA, quæ & Montana, Saxatilis, & Equina, quod in sylvis vermiculos in simo equino quærat, avis est barbatula, magnitudine fere & colore Turdi. Parte pro-na inter collum habet albas duorum digi-

torum latitudine plumas, reliqua maculosas, nigris in medio pennis, ambitu albis, superiore fuscas, alarum pennis, margine extrinseco albicantibus. *Famina*, quam Aldrovandus descripsit, erat corpore toto subnigro; rostro circa nares, & in apice nigro, ad latera flavescente, pennis remigibus alarum nec non ventris, extimis oris, nonnihil albicantibus, cætera candicantibus. In ultimo gutture seu pectoris principio macula albilissima pollicem lata ad humeros pertingente, vel torque candido, ornabatur.

Merula *BICOLOR* quod duobus potissimum coloribus fusco aut subnigro, & luteo rubescente variet, dicta, est avis Merula paulo minor, capite fusco, lineolis candicantibus variegato, rostro in luteo rubescente, qui etiam color in tergore & cauda intensior, in pectore & ventre remissior, videtur. Alarum remigibus fuscis, in extremis oris albis, pedibus breviusculis, digitis pro proportionem longis luteis, unguibus rubicundis.

SAXATILIS, quam Turnerus ex Graculorum genere facit, quidam Cyanon Aristotelis credunt, nonnulli Rubiculam Saxatilem, Nucifragam, Merulam Alpinam vocant, avis est cum *Caryocatactæ* Gesneri eadem, merula major. Sturni ferè instar maculata, supra nigricans, minus tamen in capite & dorso, quàm in alis, maculis ubique distincta semilunaribus, quæ pariter per tergus & alas majores sunt quam per caput. Prone à rostro ad anumusque lutea maculis ferrugineis albisque, quæ & ipsæ magnitudine variant, percurrentibus. Alarum pennas majores habet nigras, & in extremis oris candicantes. Caudam supine nigram, prone ferrugineam, pedes fuscus. Vaga est, nec invenusta.

ARTICULUS III.

De Merula Rosea, Exoticis, & Merule congener.

MERULA *ROSEA*, ab aucupibus, Italici Sturnus marinus vocatur. Est merula paulo minor, tergore, pectore, & alis supernis roseis seu carneis, capite cirrhato, rostro qua capite jungitur nigro, cætera carneo, alis & cauda nigris, remigibus fere subcastaneis. In *fæmina*, color est dilutior, caput si excipias. Reliqua enim pars colli, alæ & cauda minus quàm in mare nigrescunt. Plurimum adipis corpori adjiciunt, & in cibo maxime commendantur.

EXOTICA est duplex, *Brasilica*, & *Indica* Apoc. *BRASILICA* ut à Bellonio describitur, differt magnitudine à Merula. Rostrum illi breve. Color totius corporis, si

Aldrov.
Ornith.
l. 16. c.
15.

Bellon.
de Avi-
bus l. 6.
c. 27.

Aldrov.
Ornith. l.
16. c. 16.

caudam & alas, quæ atræ sunt, adeo intense rubet, ut nullus intensior rubor possit excogitari. Cauda oblonga est, crura nigra. Illius, quam Aldrovandus exhibet, pennæ superius omnes ad scapulas rubent, dein nigrae succedunt, has rufus rubrae excipiunt. Rostrum est insigniter recurvum, intus luteum. Pedes, qui pro tibiæ proportionem majusculi ex cinereo leviter fuscescunt. APOS monstrato forte est. Rostrum habet Merulae in extremitate nigrum & recurvum, infra qua capiti jungitur candicans. Caput, venter, dorsum, colore coccineo intenso & vegeto, alæ & cauda nigro, unde Porphyromelanos dici posset, tinguntur.

CONGENER Merulae est duplex. Una rostro, prope quod linea rubra conspicitur, nigro; capite, dorso, & cauda, ad subcastaneum vergentibus, extremis oris albicantibus. Prone pectore, ventreque toto & cauda, lineis quibusdam cinereis per transversum ductis albicat. Altera Merulis erat minor, Passeribus major, capite cinereo, oculis nigris aureo circulo circumductis, rostro pro corporis proportionem robusto, luteo, crassiusculo, in extremitate nigro & acuto. Dorso ad caudam castaneo obscuro, pennis alarum quæ dorso junguntur albis. Qua ventri nigris. Remigibus in extremis oris cinereis. Simelisi Collurioni cinereo videbatur.

CAPUT V.

De Sturno.

Genera.

STURNUS, Græcis *στέρνα*, *στέρνα*, *στέρνα*, & *στέρνα*, quod apud Hesychium & Phavorinum leges, dicitur. Avis est ob colorum varietatem, & conspersas per corpus maculas, elegans, & bene, picturata a Poëtis dicitur. Non tantum autem albis maculis tingitur; sed rubescit quoque, lutea aliquando; in alis, prope oculos, & in infimo tergore viridescit. Rostrum habet Picorum non ab simile, in fine fuscum. Caudam brevem & nigram. Pedes fere croceos. Aristoteles solum vulgare genus, quod super tecta cantu suo aures fatigat, agnovisse videtur. Aldrovandus tres exhibet.

Unum totum album, rostro quod ex luteo rubescit, & pedibus, qui leviter carnei, exceptis. *Alteri* caput, collum, & rostrum erant alba; Macula supra oculos binæ nigrae: venter candidus, alarum principia maculis subcaeruleis varia. Remiges alarum & cauda ut in Sturno vulgari. Pedes lutei. *Tertii* totum corpus ex cinereo lutescebat. Pectus punctulis conspergebatur. Rostrum & pedes nigri coloris erant.

Locus. & *Vitus.* Locum si attendas, nullibi non inveniuntur. Avenis, pratis aquosis, ubi armenta pascuntur, & agris gaudent. Turribus in-

primis & tectis hyeme latent. Si victum, pamphagi sunt. Nam præter baccas & uvas, quibus impense delectantur, & pinguescunt; milium quoque, panicum, cicutam, stercora, & lumbricos, imo suspensorum cadavera, ideo ab eorum esu Belgæ abstinent, depascuntur.

Nidulantur iisdem fere locis, eodemque pene modo, ut Passeres. Ter anno parere dicuntur; & uno tempore septem vel octo ova ponunt. Græcis dicuntur *στέρνα*; authori Philomela pifare. Summo mane maxime sunt obstreperi, nocte silent. Vifi qui omnium avium voces imitabantur. Et in Galliæ urbibus habentur, qui sermonem explanate, longiori etiam contextu, exprimunt. Habebant & Cæsares juvenes ejusdem peritiæ unum.

Proprium ipsis catervatim volare; & quodam pilæ orbe circumagi omnibus in medium agmen tendentibus. Vespere potissimum aggregantur, & tanta multitudine atque impetu quandoque volant, ut nubem facere, & tempestatis modo sonare videantur. Dicuntur sibi ipsis medicinam facere. Atterebat pedi luxato ova formicarum, comminuta, & sub alis calefacta, unus. Sic integer intra paucos dies evasit. *Metuunt* Accipitrem, eundemque superne vel à latere accedentem, alis eventant, subtus volantem stercoribus opprimunt. Semine alii intereunt, & à canibus metuuntur.

Galenus eos inter cibos attenuantes & boni succi refert; quod vel de juvenculis, vel de illis, qui in montibus degunt sumendum est. Vindemiæ tempore pabuli melioris copia non improbantur. Suaviores evadere, si mox captis capita amputentur, Cardanus author est. Stercus oryza pastorum ad faciem exornandam facit.

NB. *Sturni genus Indicum vide in Mantissa.* Num. 6.

CAPUT VI.

De Coccythraustis.

DUPlicem Coccythraustem Aldrovandus exhibet, vulgarem Gesneri, & *Indicam cristatam*. Illa ita dicta, quod rostro suo coccos & interiora ceraforum grana confringere soleat. Circa Verbanum Lacum Fringilla Montana, Bellonio, à rostri magnitudine Grosbec dicitur. Putabat hanc esse Aristotelis Pardalum quiddam. Falso, ex collatione utriusque patebit. Pardalus enim colore toto cinereus est, magnitudine par Sturno. Coccythraustes autem est, si Bellonii descriptionem sequemur, sturno paulo minor, rostro duro, & magnitudine pro corporis proportionem insignis. Capite superiore mali aurantii colore,

Generatio

Brujer. l.
15. de re
cibar. c.
42.
Plin. H.
N. l. 10.
c. 42.
Volatim.

Gesner.
in Ornith.

Usus.
Galen. l.
6. de sanita-
tat. tuenda.
Alex. l.
13. salub.
c. 8.
Æginera
l. 28. c. 8.
Cardan. l.
3. de sanita-
c. 21.

Descri-
ptio.

Arist. H.
A. l. 9.
c. 23.
Bellon. de
Avibus l.
7. c. 30.

re, cum macula sub gutture nigra, collo cinereo, dorso fulvo, alarum extremitatibus ex viridi lutescentibus sicuti torques Palumbis, caudæ extremitate alba subtus fulva. Ventre, pectore & gutture ejusdem coloris. Gesnerus ei tribuit, Alaudæ aut Loxiæ magnitudinem. *Rostrum* durum, validum, breve, latum, quod inferius à pennis nigris ambitur. Colorem capitis, in fœmina, charopum, vel ex flavo ruffum; in pectore & ventre ex cinereo rubicundum. Pennas alarum superius nigricantes, in medio albentes, in imo colore fere cærulei seu Indici. Collum pronum, & utrinque ad latera plumis cinereis vestitum. Dorsum ex fusco nigricans.

Locus.

Æstate in sylvis capitur, & tum in Italia in montibus agit. Sub Octobrem ad plana descendit. In Germanis ætato rarius, hyeme frequentius cernitur. *Nidificat* in arborum cavis. *Vicitat* nucleis ceraforum, quæ rostro confringit; nec non olivis, & aliis baccis. Non servat accrescente ætate

Vitus.

colorem. Caveæ inclusa, non solum raro cantillat, sed ne institutionem quidem admittit.

Indica incolis capitis viridis apud quos reperitur, dicitur Fruso, Lusitanis Cardinalitius, quod galerum purpureum gestare videatur. Habet cirros in capite figuratrigona coccineos, quò colore pariter collum, pectus & venter refulgent. Alarum extremitates dilute purpurascens. Caudam pro corporis proportionem, longiusculam, digitum auricularem latam, aliquantulum surrectam. Tibias breves & albicantes, ungues robustos & nonnihil recurvos. *Vicitat* panico, amygdalis, & alfine herba, & cibum è manibus accipit. *Voces* avium, lusciniæ maxime imitatur. Sæpe se aquæ immergit, unde temperiei calidissime esse putatur. Visa iconesua in speculo, mirabilibus modis sibilos edendo, cristam deponendo; caudam more Pavonum erigendo, alas motitando, gesticulatur, & speculum impetit.



HISTORIÆ NATURALIS

D E

A V I B U S :

L I B E R III.

De Avibus Insectivoris.

T I T U L U S I.

De Insectivoris non Canoris.

C A P U T I.

De Picis Martiis.

Deseri-
ptio.A. i. H.
A. l. 9. c.
9.

Picus Martius quod Marti sacer sit dictus, *ἑρμιακός* Hefychio, *ἑρμιακὸς* & *ἑρμιακός* Aristoteli, *ἑρμιακός* Aristophani, *ἑρμιακός* Miletio, recentioribus Græcis *καρμιακός* vocatur. Genera ipsorum tria Aristoteles recenset; nos de pluribus inferius dicemus. An vero vel illa quæ occidentalibus Indis Alcatran teste Cardano dicitur, rostri & corporis magnitudine celebris, cinerea croceave pluma distincta, rostro duorum palmorum, in acutum tendente; vel Picurus dicta, cui rostrum toto corpore majus, ubi capiti jungitur tribus digitis latum, aduncum, quo & arbores terebrat, & à parvis simiis se defendit, quæque linguam loco pennæ habere dicitur, ad Picos pertineat, penes eruditos sit judicium. *Formam* ipsorum si attendamus, habent omnes *rostrum* rectum, durum, rotundum, & ad pertundendas arbores per commodum. *Linguam* iis Aristoteles tribuit *πικρὴν καὶ μυρῖαν*. Aldrovandus longam quidem in omnibus & ad occiput usque extendi, & super totum capitis verticem ceu in glomum convolvi, adeo ut cum exoritur, tanquam è multis involucribus in longum admodum extendatur, observavit; latam minime; quin est acutissima, & in extremitate quodammodo cartilaginea. Anatomen vide apud Aldrovandum. *Crura* quoque omnibus sunt breviuscula, at admodum robusta. Digiti pedum

ante bini, totidem retro, iique valde conjuncti, ut arborem quam scandunt firmius apprehendant. Cauda rigida, & duriuscula, cujus pennæ in extremitatibus ferme nudæ, quibus haud aliter quam pedibus inter rependum innituntur.

Locum si spectes, in quibusvis reperiuntur regionibus, raro in Belgio, in Tarentino agro negari scribit Plinius; sed Aldrovandus omnia genera in Italia ali, maximum si excipias, affirmat.

Victrant vermibus, culicibus nempe formicis, quas exporrecta lingua velut in veru infigunt, & latitantibus sub lignorum corticibus, & medulla cossis. Ideo arbores tunc, quarum percussu corticis sono pabulum subesse intelligunt, & tam vehementer eas interdum excavant, ut ipsas sternant. Quidam apud Aristotelem amygdalum tertio ictu pertudit, & nucleum comedit.

Nidificant in cavis arborum, olearum inprimis. Tanto artificio nidum exstruunt, & excavant, ut admoto circino rotundius reddi foramen à perfectissimo Geometra non posset; & ligna quibus inter se confertis constat, facilius manibus separantur, quam ferro dissecantur. *Pullos* septem vel octo educant, quos exire ex ovo à cauda Hylas, referente Plinio, tradidit. Quoniam pondere capitum perversa ova posteriorem partem corporum fovendam matri applicant. Nunquam humi consistunt, vel in saxis confident, ne aciem unguium obtundant. Scandunt vero per arbores omnibus annis *κατὰ τὴν ὁδοὺν* tanquam stelliones, seu ut Plinius vertit, feles, non modo sursum per arborem reptando, sed deorsum etiam & sub ipsis ramis, pedibus & ventre sursum, tergore deorsum terram

Locum.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 29.
Aldrov.
Ornith.
l. 12. c.
30.
Victrant.

Plin. l. c.

Arist. H.
A. l. 9. c.
9.Genera-
tio.

ver-

versus converso; quod Aristoteli est *ὀπίσθιον*
ἢ πρὸς τὴν γαστέρα.

Vox.
Scaliger
in Exer-
citat.
237.
Albertus
lib. 23. de
Animal.

Humano ipsos *sermoni* assuescere Scaliger author est: sed minus apte, & rariora & pauciora quam Picam reddere, addit. Albertus perfecte aliquando loqui scribit. Validius quam soleret stridens pluviam præfagire credebatur. Hinc ei pluviae avis apud veteres nomen.

Ufus.

Ufus ipsorum & in cibo; ideo tota fere hyeme & autumno Bononiæ in foro venduntur; & in *Medicina*. Nam cum sale torrefactum quidam ad internas ani eminentias applicant. Assatum vel elixum incantatione ligatos solvere; oculos, gestantibus visum acuere; rostrum è collo suspensum, dentium, uvulae & tonsillarum dolorem curare; Kiranidis sunt deliramenta. Idem ferentes ab apibus etiamsi mella earum eximant, non feriri, Plinii. Clavum & cuneum arbori, in qua nidificant infixum, diu non hære. Foramen vero nidi lapide vel ligno obstructum, herba apposita, seu illa linaria major, seu æthiopis, eundem aperire, pari fide affirmatur.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 18.
Æl. H. A.
l. 1. c. 45.

C A P U T II.

De Picis. in specie.

A R T I C U L U S I.

De Pico Maximo, Majore, Variorum minore Viridi nostrate, Pico luteo Cyanopide, Viridi majore, & Murario.

PICUS MAXIMUS, est omnium longe maximus, cornicis interdum magnitudine, infra gallinam aliquid, & excepto capitis vertice *totus niger*. Plumæ tamen in vertice coccineo vel flammeo colore egregie micant, & velut cirrhum efficiunt. *Rostrum* habet longum, robustum, digitum parvum, longum, cujus superior pars, quæ juxta caput lata eminet, & duas strias, ut folium Cyperi, obtinet. *Linguam* oblongam duram & in extremitate asperam. *Digitos* binos ante & totidem retro. Ungues recurvos.

PICUM MAJOREM *ἰσχυρὸν* Aristoteles vocat. Magnitudine merulam vincit, scribente Aristotele. Is quem Aldrovandus depingit, *rostrum* habet canaliculatum, *linguam* longissimam, musculosam, extremo apice duro nervo aculeatam. *Caudam* robustam, & ob superiores reliquas cooperientes plenas duro calamo donatas & inflexu difficillimas, renitentem. In tota ave triplex color conspicitur. *Plumæ* medio vertice rubicundæ, & saturo cocci colore conspicuæ sunt, quæ in scemella mari aliquin per omnia simili desiderantur. In oculorum ambitu, ventre toto, & alis in-

ternis insigni macula albicat. In alis & cauda nigri aliquid conspicitur.

PICUS VARIUS MINOR majori per omnia similimus est, & prorsus videtur idem. Nisi rubrae illæ maculae in vertice & Uropygio deessent. *Dorsum* ejus versus lumbos magis quam superioris varium. Et ex albo nigroque promiscue maculatum, lineis interim obscuris transversalibus quæ alarum notis respondere videntur, conspersum est.

PICUS VIRIDIS *ἰσχυρὸν* est Aristotelis, inter Picos quidem eidem non recensitus, inter Picos tamen vel ob solam pedum & Caudæ dispositionem (duobus digitis ante & totidem retro insignitur, & caudam rigidam habet) numerandus. Turem magnitudine equat. *Rostrum* habet nigrum, durum, robustum, acutum duos digitos longum. *Caput* crassiusculum in superiori parte ex maculis partim miniatæ, partim nigricantibus variegatum. *Oculos* alia quædam macula nigra ambit, sub qua rubrae illæ maculae superioribus correspondentes pallidiores sunt. *Dorsum* & *ala* virides cum luteo tamen intermixto. *Mentum*, pectus, venter, crura pallide virescunt, adeo ut ex albo & viridi permisceri videantur. *Æstate* eum filere ajunt. Idem cum mense Aprili quidam clamitantem audivisset, hyemen adhuc metuendam prædixit. Altissimas arbores volatu trajicit.

Ossa ipsius tosta in pollinem redacta, & in vino epota validum sunt contra calculum remedium.

PICUS LUTEUS CYANOPUS ex Persia adfertur. Magnitudine à superiore nihil differt; caput tamen & collum crassius, & rostrum prolixius obtinet. Pennæ à medio vertice ad extremum *cauda* usque aliquid ferruginei habent, *rostrum* vero omnino ferrugineum. *Pedes* subcærulei, *ungues* nigri, cætera lutea, nisi quod *alarum pennæ* omnes in extremo quodammodo ferrugineæ sint.

PICO VIRIDI MAJORI seu Maximo, *Rostrum*, quod in omni Picorum genere rectum est, incurvum, pedes ad similitudinem aliorum, varias maculas in alis, tribuit Bellonius.

PICUS MURARIUS muris turrium maxime adhæret, & vermiculos in eorum rimis inquirat. Passere domestico paulo major est, sturni fere crassitie. *Rostrum* habet oblongum, tenue, nigrum. *Caput*, *collum*, *dorsum* cinerea. *Pectus* albicans. Alas partim cineras, partim rubeas. *Caudam* brevem. *Digitos* pedum longos, tres ante, unum pro calce. Alas in volatu semper motitat, nec uno loco insidere novit. In foraminibus parietum *nidulatur*. Suavem *vocem* edit.

Aldrovandus
Ornithol.
lib. 12.
cap. 35.

Bellon. l.
6. de Avibus c.
15.

ARTICULUS II.

De Pico Cinereo seu Sitta, Pico nidum suspendente, Chlorione Indico & Picis congenerem.

PICUS CINEREUS Aristoteli *οἰστρον* seu *οἰστρον*; aliis *οἰστρον* quasi materiem contundens, nomine omnibus communi; quibusdam *οἰστρον* & *οἰστρον*, quod Vropygium motitet; modernis Græcis *οἰστρον* dicitur. Annumeratur Picis, quia eorum more super arbores repit. Caput ei parvum; Oculi exigui; Rostrum longiusculum, nigrum, rotundum Collum, dorsum, alæ, nec non & cauda superius è plumbeo ad cinereum vergunt: sub collo verò & ventre è castaneo ad rufum. Cervix ad latera lutescit. Qua parte inter rostri principium & retro oculos macula oblonga nigerrima insignitur. *Vivit* materiem contundens. In foraminibus arborum, quas terra & limo artificiosissime claudit, angusto aditu sibi relicto, *nidulatur*, & prolem numerosam progignit. Frangit Aquilæ ova. Res malefica ei tribuitur, quasi rerum cognitione calleat.

PICUS NIDUM SUSPENDENS cum Oriolo Alberti, Aristotelis Chloreo, & Plinii Chlorione, Galbula seu Galgulo, Ictero, & Bononiensium Regalbula idem esse ab Aldrovando creditur. Modernis Græcis *οἰστρον* dicitur. Chloreum & Chlorionem Aristoteles & Plinius appellaverunt, ut luteum & viridem in ea reperiri colorem innuerent. Junior virefcit, adultior aut saltem annua facta alistantum modo exceptis tota evadit lutea. Magnitudine est par Turturi, colore pro ratione ætatis variat. In juniore rostrum est subfufcum. Adulta inter rostrum & oculos maculam habet nigram. Junior minimè. Illa alas habet nigerrimas, quarum pennæ & remiges maxime in extremitatibus suis albefcunt: junior superiores pallidas, inferiores nigricantes.

Locus. *Locum* si attendas Germaniæ esse peregrinam Gesnerus reliquit. Migratoria vero est. Plinius & Ælianus hyeme eam videri negant; æstivo tempore in conspectum venire, exortu arcturi syderis discedere, & pullis editis Italiam relinquere, adjiciunt. In Helvetia mense Majo apparere incipit, in quibusdam Galliæ locis Martio. Dependens pedibus somnum capit, quia se tutiorem sperat, si Plinio credimus.

Vermibus more picorum *vescitur*, sed & ficibus. Unde ipsi *οἰστρον* nomen.

Proprium ipsi *nidum* in arboribus suspendere. Constat ille ex musco & lanugine quandoque, ex fœno & culmis nonnunquam, ex cannabe & festucis interdum.

Forma ipsi corbis vel calathi ficarii è juncis intexti; vincula de quibus pendet sunt, culmi, junci, fila è lino, serico, setæ equinæ & cætera. Iconem in Aldrovando vide.

Cum *cantillat* orio vel loriot sonat, imminente pluvia fistulæ instar canit. *Vox.*

Ufus ipsius in cibo est & *Medicina*. Pinguescit mirum in modum. Emoritur si ab icterico conspicitur æger, ipsa evadit. Ad Germanos accedens, non amplius nascituras pruinas promittit. *Ufus.* *Plin. H. N. l. 30. cap. 11.*

CHLORIO INDICUS maxima sui parte, quin toto corpore luteus est; si coronam verticis & caudæ alarumque maculas cæruleas, & rostrum pedesque quæ insigniter rubent excipias.

PICIS CONGENEREM Aldrovandus Marchioni Fachineto debet. Erat, quantum ex pictura conjicere licebat, Coccythraustis magnitudine, rostro luteo, acuto, Picorum haud absimili; vertice, cervice & toto dorso viridi, Vropygio albo, pennis alarum vestitricibus viridibus, remigum superioribus albis, inferioribus, & cauda cæruleis. Prona pars à rostri initio ad anum usque coloris cinnaberis erat.

NB. *Picarum genera exotica vide in Mantissa. N. 5.*

CAPUT III.

De Iynge seu Torquilla, Iynge congenerem, & Certhia.

Propter rostri & linguæ constitutionem, Picis Iynx subjungitur, quam Galenus & Suidas *αἰστρον*, Tzetzes *αἰστρον* & Cinclida, Athi montis incolæ, teste Bellonio, Alcionem, Theocriti interpretes *αἰστρον*, alii Turbinem, Gaza Torquillam vocat. Vincit magnitudine fringillam, Rostrum habet firmum ex plumbeo & nigro permixtum. *Lingua* aculeum tam acutum & validum, ut humanam cutim haud aliter ac acicula penetret. Ea infra arteriæ summum subit, & supra cranium reflexa, prope nares inferitur. Est autem gemina ubi ab occipitio reflecti incipit, & in syncephite rursus utraq; partes conveniunt. *Digiti* pedum utrinque duos habet. *Digitorum* utrobique longior alter, cum altero brevior conjungitur. Conspicitur in quavis regione circa arbores.

Vescitur formicis, easque exerta lingua *Villus.* velocissime aculeo transfixas venari & devorare solet; nec unquam rostro attingit. Dicitur *αἰστρον*, id est stridere. Sed Ælianus obliquam tibiam voce sua æmulari ait.

Nidulatur in arborum foraminibus, villis & domibus. Octo vel novem ova uno partu excludit. *Ægerrime* cicuratur. Si manu

manu teneatur, caput in utramque partem circumagitur. Apud Gesnerum enutrita, accessum hominis æger ferebat, collum in sublime erigebat, rostrum sine morsu modo extendebat, modo retrahebat. Plumæ capitis rigeant. Caudam erigebat & dilatabat. Ufus ipsius est in cibis.

Aldrov.
lib. 12.
Ornith.
cap. 43.

JYNGI CONGENER, quem Aldrovandus describit, magnitudine erat par Jyngis; colore capitis, dorso, alarum, & totius caudæ ferrugineo; maculis luteis transversalibus distincto, pectore & ventre albicantibus, & lineis luteis per longitudinem exornatis. Tibiis luteis; digitis picorum more oblongis.

CERTHIA, Aristoteli *αἰσῆς*, vel ut Robertus Constantinus opinatur, ab astu *αἰσῆς* dicta, avicula est exigua, Regulo paulo minor. Rostrum habet arcuatum, in superiori parte longius & crassius. Guttur & pectus candicans; dorsum & alas fulvescentia, nigris maculis ubique distincta. Caudam brevem, rigidam, & in extremitate acutam. Ungues valde aduncos. *Vititat* insectis minoribus. In cavis arborum *nidificat*, & viginti quandoque ova ponit. *Vocem* ipsi claram tribuit Aristoteles. Perpetuo fere nunc in hanc nunc in illam partem volitat. Toto anno eandem patriam incolit. Arborum ramis fringillaginis instar sese annectit, & Picorum more arbores perreptat. Sagax ipsi in vitæ officii *ingenium* Aristoteles adscripsit.

Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 17.

CAPUT IV.

De Merope.

Meropis nomen Albertus Pico viridi, Niphus Grallo suo, alii Paro majori, sed male imposuere. Convenit illi aviculæ, cujus vox multiplicem partitionem capit, ideo à *μερῶν* dicta est; quæque Cretensibus *μερῶν*, seu Apialter, Rasi Alkenius, vel Alkerius; Alberto Muscipula, aliis Riparia, Parra, & Gangrena teste Kiranidis interprete dicitur. Magnitudine sturnum superat, Merulis par est. Aristoteles hoc tantum de illa habet. Pennas ejus inferiores pallidas esse, superiores cæruleas, ut Halcyonis, postremas pinnulas rubras. Plinius Aristotelem secutus, pallido intus colore pennarum, superne Cyaneo, priori subrutilo esse dixit. Aldrovandus & maris & feminae descriptionem tradit. Mari rostrum est longum, durum, ad instar falcis messoriae arcuatum, & quasi triangulum. Iris ita rubescit, ut aliam omnem rubedinem superet. *Femina* color ubicunque minus intensus. Tergus quodammodo virescens. Linguam habet sublongam & gracilem: oris rictum tam amplum, referente Alberto, ut multas muscas in osejus humoris insiden-

Prob. in
lib. 4.
Georg.
Bellon.
lib. de
Avibus
c. 27.
Arist. H.
A. l. 9.
cap. 13.
Descrip-
tio.
Plin. H.
N. lib. c.

tes capiat. Vesiculam fellis amplam humore viridi smaragdi instar refertam.

In Creta insula tam vulgaris est, ut nusquam non in ea conspiciatur: reperitur & in Italia. Græcis per continentem, inco-

Locut.

gnitam scribit Bellonius. *Vititat* apibus; ideo Virgilius Meropis nidum prope alvearia prohibet, & cicadis. Sed nec lamsanæ caucalidis, & raparum seminibus, vel tritico abstinet. *Nidificat* in cavernis, interdum ad sex pedem altitudinem, interdum ad quatuor cubitos, defossis. Et sex aut septem pullos parit.

Vititat.
Arist. H.
A. l. 9.
c. 40.
Georg.
lib. 8.
Arist. H.
A. l. 8.
cap. 1.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 33.
Arist. H.
A. l. 9.
c. 13.
Volant.

Volat gregatim; circa montes qui thymum ferunt frequenter; & cum reliquæ aves quasi sursum ad oculos versus volitent, illi retrorsum caudam versum eum exercet.

Vocem instar hominis quodammodo edit, qui ore in rotundum clauso sonet grul gruru, urubul, & longe auditur. *Ingenium* & *Mores* si spectes, migratoria est. Pullos ne facile capiantur de loco ad locum transfert, & author est Aristoteles esse qui confirmet, Meropes parentibus senescentibus vicem reddere; imo eosdem quam primum facultas datur, liberorum opera ali.

Vox.

Ufus ejus in *Medicina* aliquis. Fel si cum gallis & oleo omphacino miscetur, firmam capillis nigredinem inducit. Frixæ in oleo manus ab apum punctationibus immunes reddit, si credere fas est. Est & alius *Merops* quem Germani Hirundinem marinam vocant. Et superiore paulo longior, & crassior. Rostrum habet nigrum, longum, acutum, & proprius ad falcem messoriam, quam in illa accedens. A rostro maculam nigram, quæ per oculos retro ad colli initium usque defertur. Alarum pennæ, variis coloribus insigniuntur. Primæ cæruleæ sunt. Secundæ excæruleo & flavo mixtæ. Tertiæ omnino flavæ, remiges nigrae & in extremitatibus rubrae.

Ufus.

CAPUT V.

De Regulo.

Regulus, Græcis Trochilus, Orchilus, Tyrannus, *ελαφύρις*, *θερινόλας*, *ελαφύρις*, *θερινόλας*, & Tettigon, in Creta imprimis, aliis Rex Senator, Parra, Bitricus, & Acalanthis dicitur, quæ omnia nomina Passeri Troglodyti communiter tribuuntur. Aristoteles ipsi corpus non amplius tribuit quam Locustæ, & cristam è pluma elatiuscula rutilam. Quem Aldrovandus describit, à capitæ ad extremitatem caudæ mensuratus, vix palmum ex superabat. *Cristam* in fronte erectam colore fere aureo gerebat, quæ in mortuis non conspicitur. Caput, collum, dorsum, &

Arist. H.
A. l. 8. c.
3.

medix alæ ex viridi lutescebant. Remiges nigricabant, & ad latera flavescabant. Prope earum exortum notabilis viscebatur macula. Guttur & pectus ex albo flavescabant, venter candicabat. *Femella* pallidioribus capitis sunt conspicuæ. Minores etiam ipsis crista pennulæ, quarum caput linea crassâ satis velut corona eleganter ambir. In alis duashabent albas maculas, parvam unam, longam alteram, cum mas hanc solam habeat.

Locut. Hyeme degunt in urbibus & foraminibus, reliquo tempore in sylvis, inter fruteta & juniperos.

Vitæ. *Vescuntur* vermiculis, quorum nomine muscæ, formicæ, cossi, & similia insecta intelliguntur. Muscis adeo ingurgitari quidam dicunt, ut aliquando de vita periclitentur.

Generatio. Bis anno pariunt & ova septem aut sex pisorum ponunt magnitudine. Volant solitariae; & aliqui post migratices recedunt.

Vox. Vox ipforum zinzulare, ut Authori Philomelæ placet. Magni & sicci in hyeme frigoris tempore, præcipue cantant. Parvitem corporis ingenii solertiæ in ipsis natura pensavit. Ausu enim magno contra

Arist. H. A. l. 9. cap. 11. Aquilam pugnare conantur. Cum se proxime quasi manu capiendas obtulerint, casso hominis conatu profugiant. Multi uno specu in hyeme conduntur, ut parvus in tam minimis corporibus calor, societate augeatur. Cum in veruculo igni apponuntur, tametsi nemo vertat, tamen per se convertuntur: scilicet, ubi ea pars, quæ igni obversa fuit, assata est; altera, quæ non est assata, quia gravior, descendit. Motu insolito & cantu quamvis suavi gestientes, quia ariduli vaporosum aërem plausibiliter excipiunt, & adventantem humiditatem, qua refocillantur implorant, pluvias affuturas denotant. Eadem ingruunt, Arato teste, si cava terræ subierint. Unde floricomis hymenæis infestos dixit Avienus, quia isti sereno cœlo gaudent.

Aratus in Phænom.

Datur & alius REGULUS NON CRISTATUS, qui quandoque in agro Bononiensi capitur. Similis hic, cristam si excipias, superiori Regulo. Rostrum ei gracile, oblongiusculum, saturrimo atro colore resplendens, interna capacitate, & utraque mandibula, unâ cum linguis rubicundis. Vertex, collum, Dorsum colore bætico ad flavum nonnihil vergente. Oculi nigrescentes, quos plumæ cinereæ ambiunt. Alæ & cauda exteriori superna superficie ex fusco ad spadiceum vergunt. Pectus, alæ internæ ac supremæ, caudæque inferioris initium sunt flava. Postici digiti unguiculus omnium est maximus; digitus à medio anticorum magnitudine secundus, duo cæteri antiqui minores & æquales inter

se sunt. Mascula alba, quam cristatus habet, in hoc non conspicitur.

CAPUT VI.

De Passere Troglodyte, & Asilo ave.

Passer Troglodytes, quem Ætius *guarmita* vocat, etsi multo minor Regulo, quod hic pluribus pennis vestiatur, appareat: duplo tamen plus carnis possidet. Rostrum habet longiusculum, acutum, superne fuscum, inferne albidum, lingulam admodum exilem, bifidam, continens. Ventrem, collum, ac dorsum ex fusco ad spadiceum inclinante vestitum. Pectus cinereum; Caudam semper subrectam & albo colore interpunctam. *Vitæ* vermiculis. *Nidum* sæpius in sylvis, aliquando in posticis ædibus, & stabulis stramineo tectis, juxta parietes domuum, & sepes, ex musco foris, ex plumis intus construit. Ovis erecti, & in altero suo sine consistentis formam habet; in medio latere ostiolum. Per hoc ingreditur, & egreditur. Bis anno parit, & ova novem, uno tempore deponit. Volat solus, nonnunquam gregatim, semper breviter; & quoties aliam sui generis offendit, eam aggreditur. Mira ipsi *Cantus* inprimis si cicuratur, (cicuratur difficulter) suavitas; quem Majo præsertim, sæpe hyeme exercet. In festo trium Regum, cum omnibus, quos eo anno educavit pullis cantillare Galli fabulantur. Cinis in pulverem exusti, & ex vino bibiti, calculosis opitulatur. Cerebellum in Diafalyrion recipitur.

Quem Bellonius pro *Passere Troglodyte* quemque Galli Favette ronse à colore fulvo vocant, ponit, Rutilicæ admodum est similis, paulo vero minor, corpore oblongiusculo, rostro gracili & oblongiusculo. Mas magis quam femina rubet. Vix plus carnis obtinet, quam digiti extremum. Vnus tantum in eo color, qualis in Luscinix cauda. Hyeme non videtur. Nidulatur, sæpe inter dumos hortorum, & in ramis cicuta; aliquando retro parietis in urbibus & pagis. *Nidum* ingeniose intus ex setis equinis construit. Quinque plerumque ova edit, eaque cinerei coloris, nigro maculati.

ASILUS seu *iro* inter aviculas vermivoras ab Aristotele numeratur; quanquam hoc nomen & insecto volatili, quod Equos infestat, tribuatur. Si ea est, quam Bellonius ob parvitatem Philosopho ita vocari scribit, & depingit; habet cristam capitis flavam, rostrum nigrescens, sed in his extremitatibus aliquando luteum, longiusculum, & debile: Caudam, tergus, alarum plicas & extremitates, lutea: crura, pedes, & ungues nigra. *Degit* in umbrosis nemorum locis. *Vitæ* bestiolis vivis, & grana averfatur. Semper canit.

Bellonius l. 7. de Avibus cap. 4.

C A P U T VII.

De Hirundinibus in genere.

Hirundo, seu à voce sua, ut Varro credit; seu ab hærendo, quod testis ædium, vel trabibus, ubi nificat, adhæreat, dicta, à Græcis *Χαίτης, χαίτη, κοίταις, αἰσιν.* *κοίταις, αἰσιν, αἰσιν, αἰσιν, αἰσιν,* & *αισιν* vocatur. Vagam volucrem Ovidius, Daulidem avem Plutarchus, Bistonis alitem Seneca, Pandione natam alii dixerunt. De Generibus Hirundinum non conveniunt authores. Aristoteles, *Domesticas, Apodes, & Falcas* agnoscit. Plinius, *Domesticas, Rusticas, Apodes, & Riparias.* Gesnerus, *Dofmecas, Sylvestres & Riparias.* Scaliger, *vulgares nigras, Subfulvas,* simili forma in ripis nidificantes. Quater illis grandiores, toto corpore atras, fœdissima facie, cruribus brevissimis, crassissimis, hirtis, & *Euteonis* magnitudine, sed facie nullo modo ab his dissimili. Dantur & albæ, seu quod præ nimio frigore albescant, seu quod canescant ante tempus, ut alia quædam animalia, seu quod artificio tales evadant. Si quis albas, inquit Aldrovandus, desideret, ova earum dum cubant, oliva illinat.

Descriptio longa opus non est. Formæ est grata, nigredinis decentissimæ, modicæ carnis, plumarum multarum. Albedo totum cingit ventrem; hinc ^{muscula} Aristophani. Color cæruleus, ad latera per caput alasque refulget, unde Cyanea. Simonidi. Rubedo sub gutture potissimum & pectore emicat. Unde Ovidius.

— Neque adhuc de pectore cadis
Excessere nota, signataque sanguine pluma est.

Oculi eruti renascuntur, seu quod pulorum acu puncti visum recipiant, quod *Ælianus* de alba in Samo nascente ab *Aristotele* proditum ait, seu quod laceratis eorum oculis, alii subnascantur, ut nonnulli prodidere. *Cauda* est bifurcata, & longa. *Pedes* breves nigri & debiles. *Interna* si spectentur, *fel* alii ventri, aliis intestino adhæret. *Ventriculus* ipsis longior. In dissectis pullorum qui primo partu exclusi sunt, ventriculis luna crescente, lapilli, chelidonii dicti, magicis narrati artibus reperiuntur. De colore non constat. Nigrum & album *Trallianus*, candidum & rubenti colore *Plinius*, varium & parvum *Dioscorides*, prodidere. *Al-drovandus*, unum intus albicantem, extra melinum, alterum subrubentem habuit.

In nulla non regione inveniuntur. A Thebarum duntaxat, quod urbs illa sæpius capta fit, & Bizix in Thracia, propter Therei scelera, abhorrent. In Ægypto perennant, nostræ hyeme mense Septem-

bre seu Octobrem vel conduuntur, vel in vincta tepidiora loca abeunt. Inventæ multæ in apricis montium recessibus nudæ atque deplumes. In quadam Germaniæ superioris sylva, incisa quercus putrida, plena Hirundinibus inventa est. In Septentrionalibus locis inter canas descensuræ, sese colligunt, & sapissime in modum conglomeratæ massæ, à piscatoribus extrahuntur, & in æstuatia deportatæ, caloris accessu resolutæ, volare incipiunt, sed exiguo tempore durant. Redeunt sub veris initium: ideo à Rhodiis sub hyemis finem invitantur. Et Calpurnius illis visis oves ab hybernis stabulis educi jubet. Easdem redire indicio observatum. Migraturæ cum rubro filo pedi alligato dimissæ sunt, idem retulere reducēs.

Vesitant infectis, ut cicadis, ideo eas in
ædibus haberi vetabat Pythagoras; api-
bus, unde nidos earum alveis propinquos
tolli, Aristoteles jubet; muscis, culici-
bus, papilionibus, & aliis. Carne vesci,
credidit Aristoteles, an granis dubita-
tur.

De artificiosa *Nidorum* structura, in sequentibus dicemus. Quantum ad *coitum* cum ceteræ aves in eo à maribus conscendantur, Hirundines, contrario quam aliarum modo miscentur, aversæ nempe. Bis anno, quinque, semel ova, magnitudine olivæ, ferrugineis maculis conspersa pariunt, nec plura utero gerunt. Primi parvus, injuria frigoris (prima namque parit) corumpuntur; posteriore pullos, sed cecos proferunt. *Fœtus* educatio summa peragitur à mare & foemina æquitate. Alterant cibum, & à primo natu, finitur in ultimo. Nil amplius, qui accepto cibo locum mutavit, accipit, donec in pristinum redierit. Hesiodus citante Æliano, dimidium tantummodo somnum perficere ait.

Vox ipsarum perfrutinnire, thrinsare vel drinzare, zinzilulare, minurizare, à latinis; per *ῥιρρῖζος, θρῖνσιζος, & ριρρῖζος*, à Græcis, exprimitur. Canunt stantes; aliquando in volatu clamant breve & abruptum quiddam. Mane & tempore coitus magis strepunt.

Rarissime propter pedum debilitatem & brevitatem *incedunt*. Volucrum vero folis, flexuosi volatus, velox celeritas, quibus ex caufis neque rapinæ cæterarum avium obnoxie funt.

Ingenium & in eo qui quidem quod cicurari nequeant pullis *Chelidonia* amplicata, visum restituant, blattas ovis infestas apio fugent, & postquam pullos à serpente laniatos animadverterint, circa ejus maxillas se tamdiu, donec conficiantur, volvant; testantur, sed in *Nidorum* structura maxime. Hos luto construunt, str-

Arist. H.
A. 1. 8.
c. 16.

Votius
de Idolol.
l. 2. c. 82.

ViEus.
Plut. 1. 8.
Sup. q. 7.

Arist. H.
A. 1. 9.
C. 40.

A. 18 c.

3.
Generation
Æl. H. A.
1. 2. c. 3.

Arif. H.
A. lib. 6
cap. 5.

Pli. H. N.
l. 10 c. 33
Æl. H. A.
l. 3. c. 25.
Oppian.
in Cynege

Vol. x.

PLI H.N
S 110C33

Ingenium

Oppian.
Halicut.
l. 5.
Plin. H
N. l. 10
c. 33.

mento roborant. Si quando inopia est luti, madefactis multa aqua pennis, pulverem spargunt. Ipsum vero nidum mollibus plumis floccisque consternunt, tepe faciendis ovis, simul ne durus sit infantibus pul-
lis.

*Præsa-
gium.*

Putantur pluvis *præfagire*, cum circalacus ita proxime volitant, ut etiam ventre contingant; vel hac & illac volantes parietibus subinde hærent; vel usque adeo humiles feruntur, ut pedibus humum vertere videantur; seu quod tum muscas & alia animalia venentur; seu quod commotam fursum auram perhorrescentes deorsum pavitent.

Affectus.

Quantum ad *Sympathiam* vel *Antipathiam*, vix aliquos videntur, vel amicos vel hostes habere. Cum passeribus tamen, qui initio veris earum præoccupare nidos conantur, pugnant, & observatum Coloniae, Hirundinem cum Passerem ejicere non posset, stridore suo multas convocasse. Hæ cum impetu advolantes, luto, quod ore singulæ gerebant, nidi foramen obstruxere. Passer inclusus suffocatus est.

Usus.

Usus ipsarum pullorum in primis sylvestrium in *Medicina* maximus. Cor cum melle devoratum, quartanas pellit. Lapilli, croceo linteo involuti, linoque ad collum suspensi, easdem tollunt. Caput matutino pascenti præcisum, & luna plena lineo panno adalligatum; capitis medetur doloribus. Idem lapilli si manu singuli teneantur, faciunt, si Marcello credimus. Aqua hirundinum destillata Epilepticos sublevat. Lapilli ad brachia alligati, si Sexto credimus, eosdem sanant. Nec male finis cum aceto & castoreo à quibusdam iisdem exhibetur. Stercus cum felle taurino inunctum capillos denigrat. Fel & sanguis mire caliginibus profunt. Idem, si tepidò applicetur, oculum ictu læsum restituit. Celebris nidorum in angina usus, sed & crematarum cinis eandem discutit.

C A P U T VIII.

De Hirundinibus in specie.

A R T I C U L U S I.

De Hirundine Agrestis, & Riparia.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 33.

Hirundo *agrestis*, quam Plinius *Rusticam* vocat, in capite, collo & dorso, hirundinis domesticæ est colore. Sub rostro, gutture, & toto ventre ad caudam usque candicat. Pedes habet pennis obsitos. Sed & maculam prope caudam albam tantæ magnitudinis, ut dum volat, nihil in ea nigredinis, caudæ extremitates, caput, alas, & dorsum si excipias, appareat. His notis à domestica distinguitur. Caudam quidem etiam bifurcatam habet; sed longissimis

illis, quæ in domestica visuntur, distituitur. Raræ sunt in domibus. Diversos figura, sed eadem materia confingunt nidos. Totos supinos, faucibus porrectis in angustum, utero capaci; mirum qua peritia, & occultandis habiles pullis, & substernendis molles. In Ægypti Heracleotico ostio molem continuatione nidorum evaganti Nilo inexpugnabilem opponunt; stadii fere unius spacio, quod humano opere perfici non posset. In eadem juxta oppidum Coptom insula est sacra Isidi, quam ne laceret amnis idem, muniunt opere, incipientibus diebus vernis palea & stramento, rostrum ejus firmantes, continuatis per triduum noctibus, tanto labore, ut multas in opere emori constet. Ea militia illis cum anno redit semper.

Idem
ibid.

RIPARIA Marcello Empirico *Ripariola*, Gazæ *Falcula*, Græcis *Drepanis* dicitur. Fœmina prone præter pectus candicat, supine fusca est: mas vero magis nigricat, collo toto, præterquam sub rostro, ubi macula est, lutescens. Hoc tantum cum *Hirundinibus* omnibus commune habet, quod pedibus sit curtis, multum volat, & insecta in volatu capiat. *Nidos* non faciunt. *Ripas* excavant, atque ita internidificant. *Aldrovandus* illatis tantum plumis & stramentis nidulari audit. Æstate tantum apparent, mense Augusto cum Solest in Leone, & cum imber incessit. Eo tempore pariunt, cumque pulli convaluerint, moriuntur. *Plinius*, migrare multis diebus antequam futurum est, ut amnis auctus attingat ejus nidum, author est. Huc refer *Hirundinem* *MARINAM* aucupibus Italis dictam, quæ corpore est major, pedibus longioribus, ventre toto ad pectus usque candicante, capite, alis, & dorso fuscescentibus. Rostro robusto, nigro; Rictu maximo eoque coccineo. Cauda bifurcata, pedibus aterrimis. A rostro per oculos ad pectus fere usque notabilis linea atra defertur, & velut torquem prope pectus constituit.

NB. *De Hirundine exocica vide Mantissam. Num. 11.*

A R T I C U L U S II.

De Apode.

APos, aliis *abluu*, nonnullis *Hirundo marina* vocatur. Est toto corpore plumis egregie munita, unius coloris, qualis in murium pilis, conspicitur. Caput habet supra admodum latum; collum brevissimum, rictum adeo amplum, ut integros scarabeos deglutiat; rostrum exiguum, nigrum, alas longas, caudam bifurcatam, crura brevifera, ad digitos usque pennis obsita, ad rependum potius quam insistendum facta. Digitos utrinque binos,

binos, ut in Picis Martiis, unguibus acutis armatos, quibus quod rapuit adeo constringit, ut id perfodiat.

Vistitat insectis per aëra volantibus, eaque nisi volans capit & edit. *Oculorum* vero acie ita valet, ut permille passus muscam observet, & subito insequatur. *Volant* plurimum, & gregatim, arcus tensi figura, sæpe alas non movendo. Hæ sunt quæ toto mari cernuntur, nec unquam tam longo naves tamque continuo cursu recedunt à terra, ut non circumvolitent eas Apodes. Cætera genera resident, & insistent: his quies nisi in nido nulla, aut pendent aut jacent. Nidificant in foraminibus turrium. Visæ & in speculis & abruptis fluminum littoribus. Fœtus earum Bononiæ magno vaneunt.

CAPUT IX.

De Upupa.

UPupam avem, quæ Græcis communiter *ὑπὸς*, Orus Cucupham, alii *αυαυαυα*, Phylincopeteron, Agriopetion, & *αγριοπετιον* appellant. Magnitudine paululum Coturnicem excedit. Color in ea cinereus albus & nigricans, quem mutat autumnus inprimis. Unde apud Æschylum *ἡὺς μὲν γὰρ ὅτε* dicitur. *Rostrum* ei nigrum, rotundiusculum, falcatum, parumper à lateribus depressum. *Capiti* plicatilem cristam, *κρανίον* Græci dicunt, ex viginti sex plumis constantem, dedit natura, quæ per medium caput à rostro residet, & per capitis longitudinem proavis arbitrio, furrigitur & contrahitur. Hinc *μυαυαυαυα*, & *αυαυαυα* poëtis cognominatur. Fit id beneficio musculi, qui inter vericem capitis & rostri initium in quodam cavo locatus, totus continuus, à verticis extremo, & frontis carnosiore initio nascitur, & utrinque supra nares, infima parte carnosior, & rubicundus, extrema & suprema, cui cristæ plumulæ profunde implantantur, membranosus magis, ac cutaneus, desinit. *Lingua* ipsi parva, trigona, initio lata, extremo, instar æqualium laterum trianguli acuta, in profundo latitat. *Aspera arteria* initio divaricationum, quibus in pulmones utrosque finitur, duo velut oscula, extrinsecus laryngis vicem suppletia exhibet, quibus pellicula tenuissima prætenditur. Annuli semicirculares in utrumque latus terminati, nequaquam interna parte coeunt, sed tota interior facies hiat, subtilissima membrana obrenta tantummodo cooperata, quæ aëre & spiritu & copioso, vocis efformandæ edendæ gratia, concepto, in amplum distendi potest.

Montes & sylvas incolere Aristoteles testatur. In sepulchris, & humano stercore

commorari Isidorus. Rarius arboribus insidere, sæpius in terra, maxime ubi immundities est, experientia. Plurimo anni tempore, in montium angustis, & arborum cavis locis latitat. Ideo verno tempore de plumis solet conspici.

Vescitur myrti baccis, vermibus, formicis, muscis. *Vvis* sæpe tam immodice, ut ebria evadat. De *Nido* non convenit inter Authores, nec sibi constat Aristoteles. Gesnerus sub stipitibus arborum. Olaus M. in paludum tuberibus nidificari tradit. Hic modo nidum luti vice stercore humano, seu ut intolerabili odoris foeditate homines ab eodem fuget, seu ne venenata ad eundem animalia accedunt, circumlinire; modo, stipites arborum subire, & sine ullo instrumento in cavis parere, scribit. *Terna ova* Perdicum similia, sed minora, duriora, aspectu deformiora, & odoratu graviora, parit.

Lente admodum *volat*.

Vox ipsi per æstatem alia, alia per hyemem, si Alberto credendum, si Pollucem semper, si poëtis, *ἡὺς ἡὺς* semper clamat. Si gemit, pluviam indicat. Si clamat, vulpem in vepretis hærere innuit. Si ante vitium tempus canit, insignem vini copiam prænunciat.

Ingenio non destitui certum, si ex uvarum esu ebria adiantum herbam ori inferre, & circumambulando sibi mederi, gramen adversus *βακχίαν* edere, clausum nidum, herba quadam, prodente Æliano aperire, verum est. Senescentes, inter pullos jam adultos plumas deponunt, & visum amittunt. Ab iisdem, donec vires recuperent, pascuntur. Visus admota herba, restituitur.

Invenit & in *Medicina usum*. Cor in lateris doloribus laudatur. Mira in somniis videbis, si sanguine tempora illeveris. Lingua obliuio suspenso prodest. Pennarum suffitus vermes expellit. Corium capiti impositum dolorem sedat. Ala dextra cum dente hominis ad caput dormientis suspenso, non expergisci, donec auferatur, fabulam esse credo.

CAPUT X.

De Paris in genere, & in specie.

PARUS, Ægithalus, Parix, & Parula dicitur. Tria ejus *Genera* agnoscit Aristoteles, plura adjiciunt alii. Omnibus juxta oculos maculæ albæ sunt. Unguibus etiam omnes reptare, & facile, ubi volant, adhærere possunt, ita ut nucem è filo illis suspensam adhærescentes comedant.

Semper fere in arboribus *degunt*; raro terram petunt. Ad Belgas & Anglos quotannis sub initium Octobris accedunt.

Vescuntur muribus, cute tantum detracta.

Vitus.
Generatio.

Olaus M.
l. 29. c.
21. H. A.
l. 9. c. 15.
Ælian. l.
6. de Animal.
cap. 1.

Anglicus
lib. 119.
cap. 116.

Volatur.
Vox.
Pollux. l.
5. c. 13.

Ingenium.

Ælian. de
Animal.
lib. 1. 3. c.
26.

Ufus.

Locus.

Vitus & Vox.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 39.

Pausan.
V. G.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 24.

Aldrov.
Ornith.
lib. 17.
cap. 11.

Locus.
Arist. H.
A. l. 9.
cap. 11.

Objectis, vermibus, apibus, nucibus, canabino semine, quod dum rostro perforant, sonum fabri malleum in asserem adigentis excitant. Sebum eis exhibetur, ut lentore fauces demulceantur, & suavius cantant.

Generatio. Nidificant in cavis arborum quidam, nonnullæ nidos de arborum ramis miro artificio suspendunt. Ova plurima edere scripsit Aristoteles. Gregatim & impetuosè volant. Tinnire per noctem author Philomelæ scribit. Veniunt apud Helvetios in cibum, & regium morbum, patientis aspectu in se, si nonnullis credimus, recipiunt. Species Parorum sunt, Major, Palustris, Sylvaticus, Ater, Cæruleus, Caudatus, & Cristatus.

Aldrov. l. 17. Ornithol. c. 13. PARUS major Aristoteli *αὐτὸν αἰετὶν*, Turnero & Longolio Parus Carbonarius, Gazæ Fringillago vocatur. Coloribus quinque viridi, luteo, albo, nigro, & cæruleo elegantissime variat. Caput integit vitta, præ intenso nigrore instar corvi resplendens. Tempora & oculorum ambitus alben. Lingua extrema in duas partes fissa est, quarum utraque denuo in exigua quasi capillamenta subdividitur. Cauda est bifida, partim cinerea, partim nigra, cujus extremitas utrinque pennæ duæ, exteriori parte candent. Propter cantus suavitatem alitur, eumque per totum continuat. Pulverizatus colicos & nephriticos cruciatus tollit.

PARUS INDICUS tribus potissimum coloribus, oculos si excipias, cæruleo, albo, & nigro, constabat. Guttur, pectus, & totus venter candibat. Vertex capitis & collum coloris erant cærulei diluti; Pedes nigerrimi.

PARUS PALUSTRIS in agro Bononiensi Paronzino, Bellonio, quartum Pari genus, Turnero Schæniclos Aristotelis dicitur. Capite est prorsus nigro, ut à Gesnero describitur; pectore & ventre albicat. Dorso & cauda frigesceat, crura sunt rosea.

SYLVATICUS macula per medium verticem rubente est conspicuus, partibus utrinque nigris, cruribus fuscis, alis nigricantibus, reliquo corpore viridis, ventre dilutius.

ATER qui & Carbonarius, albam maculam infra oculos habet, aliam in occipitio, caput nigrum, ventrem luteum, crura fusca.

CÆRULEUS ab Aristotele tertio loco, & absque nomine peculiari positus, quod solus cæruleo capite sit insignis, ita dicitur.

CAUDATUS Aristoteli *αἰετὶν*, Bellonio Monticola, aliis, sed male *αἰετὶν* vocatur. Niger est, parte prona, albus supina, in mediis alis rubet, circa imum ventrem dilutius. Vertex ei albus, rostrum fuscum, cauda bifurcata, & tantæ longi-

tudinis, ut retro per tergus super caput posita, hoc longitudine sua vincat. In foemina omnia sunt pallidiora, & color tergoris in mare castaneus, in hac ferme fufcescit.

Incolit montes & sylvas, & raro, nisi frigido tempore invenitur. Vescitur vermibus, araneis, & similibus animalculis. Sed & arborum germina principio veris amputat. Nidum struit inter frutices, duos fere palmos cum dimidio longum, ex musco & araneorum filis compositum, aditu semper angusto.

Species quæ Mourier Gallis audit, rotundum aditu gemino ad arboris alicujus truncum suspendit, & multa ova parit. Visus ex lanugine illa, quæ in salice vetusta & populo, extra ex lino aut cannabe extractus. Quem Aldrovandus à Presbytero quodam Colonienfi descriptum exhibet, avicula est Wyntepfker, quasi vini primum Colonienfes dicunt.

Volant Pari caudati invicem, & modo hanc, modo illam petunt arborem. Vox ipsis non ita incondita, altum vero veris imprimis tempore clamant. CRISTATO magnitudo est Paro majore minor, montano par. Caput cum paucis punctis albis nigrum, crista retro extensa, corpus primum fuscum, pectus album, crura cinerea. Degit circa abietes & Juniperos.

CAPUT XI.

De Motacillis, & Muscicapis.

MOTACILLA, Hesychio *αἰετὶν* & *οὐρανοῦ*, à motivatione caudæ dicta, à quibusdam cauda tremula vocatur. Commune omnibus muscis vesci, & circa aquas & pecora, ideo versari: combustarum pulverem contra lapidem vesicæ vehementer laudari Faventinus & Massæ reliquere. Species ipsarum sunt Alba & Flava, ad quas Spipola, Spardæ, & aliæ Muscicapæ referri possunt.

ALBA, quæ & communis Gazæ Albicula, Bellonio Aristotelis Cnipologus, sed forte male, avicula est oblonga, vertice, collo superiore & pectore nigris, dorso cinereo, rostro longiusculo, tenui, nigro, gula candida, ventre toto candido. Foemella vertice est cinereo, gula lutescente, cætera mari similis. Versatur circa equas: sæpe & aratrum vermium causa sequitur.

FLAVA duplex est. Alteri caput proportionem parvum, fuscum: rostrum longiusculum, nigricans. Cranium mollissimum, alæ breves, venter cum paucissimo luteo albicans, qui color initio caudæ inferius intensior est. Pennæ in alis nigricantes, in medio per transversum albidæ, extremæ totæ nigræ, cauda bifurcata, reliquo corpore longior. Ab Accipitre persequente si evaserit, egregie cantare dicitur.

Alteri

Arist. H. A. l. 7. c. 23. Bellon. l. 7. c. 25.

Aldrov. Ornith. l. 18. c. 22.

Alteri rostrum gracile, atrum, in extremo parum recurvum, flavedo à gula ad podicem usque præcedente intensior. Caput & dorsum ferruginei ferme coloris, mentum albicante macula velut barba cana vestitum.

Ornith.
l. 18. cap.
26, 27.

SPIPOLARUM, ut aucupes Bononienses appellant, tres describit Aldrovandus species. *Una* habebat caput leucophæum, albam sub mento maculam, pectus rubicundum. Dorsum cinereum, ventrem ex rubicundo & albo varium. *Alter* pectus maculis fuscis deorsum descendantibus interstinctum, ventrem albescentem, maculam retro ad oculos majusculam ad ferrugineum accedentem. *Tertia* cui & Boarinæ nomen, tota erat ex albo lutescens, rostro & pedibus fuscescentibus.

STOPAROLAS idem exhibet binas, unam pectore & ventre fere candido; Capite, quod maculis nigris in vertice, conspergitur, collo, tergore, cauda subfuscis: *alteram* rostro oblongo, recto, supra tamen parumper declivi, superius nigro, inferius corneo: collo, pectore, & ventre pallidis, oculis exiguis.

Ornith.
lib. 18.
cap. 28.

MUSCICAPARUM, quæ forte Opiano, quod circa boves volitent *Busfary*, plures exponuntur ab eodem species; ex quibus illa quam Pigliamosche aucupibus Italis vocari scribit, in collo maculam albam velut torquem habet, in medio alarum aliam: *Alter* Magnanima quasi munus fabri obiens dicitur, forte quod rostro sonore tundat, Muscas capit. *Tertia* quæ Gesnero Glarea, cruribus roseis, & ante hyemem avolar. *Quarta* quam Germani *Todtentvogel* vocant, forte quod imminente pestilentia sint frequentiores, solitaria est, & per arbores irrequieta volitat. *Quinta* Gallis Moucherolle dicta, quæ passeris adeo similis est, ut non nisi moribus dum vivit, & rostro cum mortua est, ab eo distinguatur. In sylvis & dumetis latitat; & crura habet rosea. Quidam Linariis eas comparant. Gesnerus eandem cum sua Prunella esse conjicit.

C A P U T XII.

De Rabeira, Rubecula, Pyrrhula, & Phenicuro.

Arist. H.
A. l. 8. c.
3.
Scalig. ad
H. A. l. 8.

QUÆ Aristoteli Græce *ῥαβείρα*, illam Gaza Latine RUBETRAM, Scaliger Rubicolam transtulit. Non convenit de ea inter Authores. Niphus Italorum Baradam esse opinatur. Germani quidam Turdorum minimum genus quod rubi fructu victitat: Longolius Linariam seu Milariam; Turnerus Anglorum Moretetteram, aut Stonchatteram; Bellonius Galorum Traquetum, quod continuo alas motit. Si hunc sequimur, fringilla paulo

minor est. Capite supremo nigricat, unde Melanocephalos Cretensibus dicitur. *Cololum* & dorsum habet cinerea. *Mas* à fœmina discrepat, quoniam ventre candicat, dorso, capite, & collo albicat, gerit & albam per alas lineam. In Græcia, Creta & Gallia continuo, migratoria enim non est, visitur, & semper dumetorum cacuminibus insidet. Unde fortu ei apud Græcos nomen, nec ad pagos vel vicus propius accedit. Solitudine gaudet, & gregatim duntaxat, dum soboli intenta est, volare conspicitur. *Nidum* tanta struit industria, ut difficulter quo intret vel exeat invenias.

RUBECULA, quæ Græcis *ῥαβείρα*, *ῥαβείρα*, *ῥαβείρα*, & *ῥαβείρα*. Gaza etiam Sylvia, pectore est aurantio ad ferrugineum accedente, lingua bifida, cauda duodecim pennis instructa, quam sæpe motitat, postquam submisit absque tremore statim erigit, & sic ejus pulli à Phænicuri, seu Rutilillæ fœmina, & pullis, quibus ita similes sunt, ut vix ab oculatissimo dignosci possint, quæ simul atque caudam moverit non cessant, donec ter aut quater simul moverint, dignoscuntur. Æstate cum prole ad desertissima quæque loca secedit, cum Rutililla comparet. In fine Autumni perfectam in pectora rubedinem nacta, ad oppida & pagos confugit, quo tempore Rutililla delitescit. Nunquam fere in eodem saltu nisi una reperitur; unde Phavorino *ῥαβείρα* *ῥαβείρα* *ῥαβείρα*, & natum inde illud, una arbor non capit duos Erithacos. *Voc*e homines imitari, prodidit Porphyrius. Si cava terræ subierit, pluviam prædicit. Merulam amore tanto prosequitur, ut noctu fere in proxima arbore prope eam quiescat. Dicitur & morbo comitiali esse obnoxia.

Hesych.
& Phavorin.
Lex.

Porphyr.
l. 3. de ab-
stin. ab a-
nimal.

Aldrov.
Ornith.
l. 17. c.
31, 32.
Scalig. ad
lib. 8.
Arist. H.
A.

PYRRHULA seu Rubicilla, Scaligero Byriola passeris est magnitudine; gula, pectore & ventre, miniaceis seu purpureis (fœminæ pectus totum castaneo cinereo colore diluitur) rostro brevi ac lato, bituminis instar splendente, trigone ferme. Lingua pro corporis magnitudine latiore & crassiore; cujus pars extrema quæ palatum tangit, & sapes dijudicat carnea est & unda, reliquæ cornea pellicula obteguntur. Degit æstate in montibus & sylvis, sub hyemem ad plana descendit, & facillime capitur. Colorem per totum annum servat. *Vesitur* vermiculis; sed in primis semine cannabino, & primis illis arborum mali præsertim & pyri gemmis, quæ ante folia & flores erumpunt. Sed & nucibus ac acinis rubentibus sambuci aquatici, & solani perpetui, delectatur. *Nidulatur* in sepibus & quatuor ova excludit. *Voc*e fistulam imitatur etiam fœmina, & omnes cantus avium canendo & sibilando exprimit: forte & humanum sermonem.

PHOR-

Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 49.

PHOENICURI seu *Ruticillæ*, quam Aristoteles & Plinius cum *Erithaco* confundunt, plura fortassis sunt genera. Turnerus enim caput scribit ei esse nigrum, Gesnerus macula alba insigne. Aldrovandus quatuor diversas observavit, binas iisdem ex Gesnero adjecit. Tota ætate nobiscum degit, hyeme advolat, aut se abscondit. *Vesitur* muscis, nucleis juglandium concisis, ovis formicarum & araneis. *Nidulatur* in arborum, murorum, & posticarum ædium, ubi hominum minor frequentia, cavis. Bina aut terna ova parit. Cuculi pullum, qui aliquando in ejus repertus fuit nido, alit. In sublimi aliquo ædificio, primo inprimis diluculo, idque veris tempore, canit. Hyeme & pullis exclusis fileat. Inter incubandum prætereunte aliquo clamat.

CAPUT XIII.

De Antho, Cannevarola Bononiensium, Oenante, & Luscinia.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 42.
& 74.

ANTHI avis, quem *Florum Gaza* vertit, facit mentionem Aristoteles, eisdemque fringillæ magnitudinem, pedes fissos, pulchrum colorem, domicilium circa aquas & pecudes; victum ex herbis & vermiculis facilem, oculorum imbecillitatem, hinnitum equorum, quem herbæ pabulo, adventu ipsorum pulsa imitatur, ad hunc modum se ulciscens, odium cum *Spino* & *Ægitho* tantum, ut sanguinem eorum credant non coire, multisque ob id beneficiis infament, tribuit. Quænam illa hodie sit avis, non convenit inter scriptores. Bellonius illamquæ *Gallis Bruant* dicitur, esse credit, illamque fringilla esse majorem, mares fere lutescere, cauda flavescere, cruribus & pedibus nonnihil rubescere, circa altas & proceras arbores procul à pratis dissitas versari, plerumque canabino semine vesci, ad minimum quinque pullos excludere, dum volat strepitum edere, scribit. Aldrovandus, qui modo descriptam avem *Chloridem* esse putat, spipolam esse judicat, cum & pulchra sit, & omnia fere ea, quæ *Antho* Aristoteles adscribit, admittat. Circa amnes, inquit, & prata uliginosa degit, & si ab equis ibi pascentibus pellatur, aufugit quodammodo imitari videtur. Gesnerus denique illam *Aviculam* quam circa *Argentoratum Gaulammet* vocant, Aristotelis *Anthum* esse conjicit.

Aldrov.
lib. 17.
cap. 33.

CANNEVAROLA Bononiensium, quod in viridi crescenteque cannabe & nidulatur, & degat sic dicta, Germanorum *Crasmuscho*, & Anglorum *Titlingæ*, si Aldrovando credimus, per omnia similis est. *Lusciniam* tam exacte corporis figura exprimit, ut nisi pau-

lo esset minor, nec tam rufesceret, prorsus eadem videretur. Tota parte prona, gula nempe, pectore, & ventre ex albo flavescit, supinè capite, collo, dorso, & alis ex luteo fuscescit. Rostrum habet lutescens longiusculum. Caput planum. Caudam breviusculam infra lutescentem, supra ad ferrugineum vergentem.

OENANTHE Aristoteli & Plinio memorata, *Gazæ vitiflora* seu vitifera, vel à colore simili uvis germinantibus; vel quod vini tempore appareat, vel quod uvis delectetur, ita dicitur. Abdit se sub caniculæ exortum, eadem occidente conspicitur. Vitat interdum frigus interdum æstum. Quænam sit avicula ambigitur. Bellonius illam esse credit, quæ *Gallis*, *Cul blanc*, *Italis Culo blanco* dicitur. Avis est *Sittæ* magnitudine; rostro, alis, cruribus, & caudæ extremitate nigris; dorso cinereo; lingua oblonga ac plana, pedibus parvis: cruribus oblongiusculis. Quia quicquid sub ventre, infra, & supra *Uropygium*, & anteriorem partem caudæ album est, *Cul blanc* vulgo vocatur. *Vesatur* in parvis dumetis, neque in volatu perseverat. *Nidulatur* in foraminibus veteris maceræ, quandoque etiam in lapidicinis, quin & in terra, ubi bos aut aliquod jumentum vestigium impressit. *Vesitur* crucis & vermibus terræ. Plures *Couli* *blanci* descriptiones apud Aldrovandum vide.

Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 49.
Plin. H.
N. lib. 10.
cap. 29.

Quam Bellonius **LUSCINIOLAM** appellat, avis non est obvia. Pectore, capite, dorso, & collo coloris est cinerei. Pennæ alarum, & caudæ fusæ; rostrum acutum, subnigrum, gracile, in extremo & intus aureum, celeriter per terram cursitat. Numerose quando æstus ingravescit, & potandi gratia in palustria sese conferunt, capiuntur. Huc refer illam, quam aucupes Itali *Giarolam* vocant, magnitudine alaudæ. Rostrum habet fragile, intus rubicundum. *Rictum* admodum amplum. Verticem, collum, dorsum, & alas coloris varii. Linguam bifidam, Caudam adeo brevem, ut vix ulla appareat, illamque bifidam, variam, angustissimis plumulis compositam. In pedibus posticus digitus admodum longus, parvis longitudinis unguem annexum habet, ita ut ambo pollicem expleant, isque primum rectus fere totus, extremo tantum, admodum exiguo unco modice inflexo, armatur.

Aldrov.
Oenich.
lib. 17.
cap. 38.

TITULUS II.

De Insectivoris Canoris.

CAPUT I.

De Luscinia.

INter Insectivoras Canoras primum *Luscinia*, alterum *Hypolaidi*, tertium *Atricapillæ*

Nomen.

capille locum tradimus. Causa in voce patebit. Illa Græcis *Αἰδύς* & *Αἰδύς*: Latinis, seu quod in lucis canat, seu quod ante lucem, seu quod lugens Luscinia; sed & Acredula, volucris Attica, Ales Daulia, Pandionia &c. dicitur.

Descriptio. *Formam* non est quod describam, cum ubique sint obviæ. *Lingua* summo acumine caret, nec tenuitatem illam primam habet, quam cæteræ aves, atque hoc illi cum *Atricapilla* commune intercedit. *Mari* fœmina corporis habitu similis, aliquando tamen ad cinereum vergens, quod & junioribus competit. Illa quam Schwenkfeldius majorem vocat, tota fere cinerea est, & parum rubedinis obtinet. *Sexum* male ex corporis colore, mole, oculo dextro, qui mari major dicitur, collegeris: *Mares* adulti vere capti, quod tum in venerem ruentibus genitalia turgeant sese produnt; extra id tempus, quæ frequentes, & modulatos edit cantus, qui continuo spiritu in longum trahuntur, quæ unico sæpe insistit pedi, & diu immobilis permanet, mas est, Cursitat per caveam fœmina, & cantum brevem concisum ac intermissum promittit.

Locus. *Locus* ipsis diversus. In sylvis quædam vitam agunt, quæ majores sunt forte, quia se in histiores à serpentibus credunt, in sepibus quædam, nonnullæ montana loca amant, palustria nonnullæ; plana aliæ. Hybernia iis caret si Botero credendum, Batavia si aliis; imo mori illatæ dicuntur. Athenis tanta ipsarum copia, ut Philomelam Atticam Poëtæ fixerint. Sunt & prope Arduennam sylvam plurimæ. Æstate adulta non diu apparent, & sub autumnus usque ad dies vernos conduntur. Maximi vaneunt, quæ in caveis hyemem pertulere. *Cibus* eis vermiculi, sed inprimis formicæ, & illarum ova. In caveis duris ovis & mica panis vescuntur.

Partus. *Nidum* vere mense Majo, vel etiam prima æstate, quandoque humi sub sepibus, & arborum truncis, aliquando in ipsis fruticibus viridibus, & densis, ex foliis arborum, paleis, & musco oblongiusculum construunt. Cum plurimum sena ova pariunt; & dum incubant, à cantu, si Aristotelem sequimur, cessant, si Albertum & alios, Luscinia pervigil custos, cum ova quodam sinu corporis & gremio fovet, insomnem longæ noctis laborem (solam ex omnibus somnum negligere, & sic vixit dicitur Hesioidus apud Ælianum author est) cantilenæ suavitatem solatur, quo possit non minus dulcibus modulis quam fonu corporis, ova animare.

Vox. Cantum & vocem earum, quam *ivocant* Pollux vocat, Sidonius sibilare dicit, Plinii verbis explico. Luscinia inquit ille diebus ac noctibus continuis xv. garrulus sine

intermisu cantus. Denfante se frondium germine, non in novissimum digna miratu ave. Primum tanta vox tanto in corpuseculo, tam pertinax spiritus. Deinde in una perfecta Musicæ scientia modulatus editur sonus: & nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc variatur inflexo, nunc distinguitur conciso, copulatur intorto; promittitur revocato, infusatur ex inopinato. Interdum & secum ipse murmurat: plenus, gravis, acutus, creber, extensus, ubi visum est vibrans, summus, medius, imus, breviterque omnia tam parvulis in faucibus, qui tot exquisitis tiliarum tormentis ars hominum excogitavit: ut non sit dubium hanc suavitatem præmonstratam efficaci auspicio, cum in ore Stesichori cecinit infantis. Variant tamen. Nam in palustribus, relaxante instrumenta vocis humiditate nimia, tam sonoræ non sunt. In Hispaniola & Insula S. Johannis, Martyre teste, nunquam à cantu cessant. In Scotia non tam suaviter ac in Italia canunt; & circa Orphei sepulchrum, vocaliores à Thracibus credebantur.

Amicitiam & cum Phænicuris colunt, cum quibus etiam coire creduntur, & cum aviculis mollioris rostri, ad quas caveis inclusas advolitant. *Inimicitiam*, cum collusione qui visco implicatas capit, Accipitre qui eisdem insidiatur; & vipera, à cuius suppositæ oculorum fulgore in certissimam perniciem trahuntur, descendentes enim paulatim ex arbore in prædam ipsi cedunt, ut Merula scribit, quod tamen Cardanus negare videtur, exercent Inter *affectus* corporis præcipua pinguedo. Sæpe adipis mole obrutæ extinguuntur. Si aliquo alio liberos corripere contingat, formicarum ovis sibi ipsis medentur.

Ingenium singularis in herum cicuratarum fides; sæpe emissæ, (tale Alcon Donaci se dono dedisse canit)

Scit rursus remeare domum tectumque subire Viminis, & caveam totis præponere sylvis;

imo multæ venditæ vel dono datæ aliis prioris domini desiderio contabescentes commoriuntur; & obstinatus libertatis amor, (si adultæ caveæ includantur, cantus & cibi abstinentia, pro servitute venatorem teste Æliano, silentio ulciscuntur) restantur: Cantus maxime, & Docilitas. Simplex ille, si in solitudinibus degunt; varius & multo apparatu composuit, si in auditores inciderint. Non quiescent duntaxat, sed & *curiosius* cum Charmide Atheniensi agnoscas *ut xipho intoret ut pithor* Nec minor posteritatis cura. Meditantur aliæ juniores: versusque quos incitentur accipiunt. Audit discipula intentione magna & reddit, vicibusque reticent. Intelligitur emendatæ correctio, & in do-

Martyr.
in Hist. Occiden.
Ind.
Pausan. in
Botic.

Affectus.

Merula
in Mira-
bil. Car-
van. l. de
bar. rer.

Ingenium.
Apud
Nemet-
fin. Ec-
loga. 2.

Ælium in
variis.

cente quædam reprehensio. *Docilitas* mira. Cæsares juvenes habuere Luscinias Græco atque Latino sermone dociles; præterea meditantur in diem & assidue nova loquentes, longiore etiam contentu. Visum jam sæpe iussas canere cœpisse, & cum Symphonia alternasse: sicut homines repertos, qui sonum earum, addita intransversas harundines aqua foramen inspirantes, linguæ parva aliqua opposita mora, indiscreta redderent similitudine. Fuere tres Ratisbonæ, Anno M.D.XLVI. quæ, intra noctis silentium, quicquid interdiu ab hospitibus colloquentibus inaudierant, Germanico sermone ita promere solebant, ut ab audientibus optime intelligerentur.

Usus. De ipsarum in *cibosu* non est quod multum dicam. Plumis nudata vox est prætereaque nihil, ut Lacon ille apud Plutarchum dixit. Appositam fuisse in centenaria illa Æsopi Tragici, cui quendam civem Romanum donatione unica x. aureorum dedisse legimus. Patina, vel exinde colligas, quod centum aviculis, quæ cantu aliquo excellerent, constaret. Arrii etiam filios magno cœmptras esitasse Horatius testes est. *Medicinam* si spectes. Cancrorum oculi cum Luscinia carnibus in cervina pelle alligati vigiliam præstant fugato somno. Fel cum melle illitum visum perfecte acuit, ut vult Kiranides.

Plin. H. N. l. 10. c. 42.
Gefner. in Ornithol.
Plutarch. in Æsop. Lacon.
Horat. l. 2. Scm. Satyra. 3.
Plin. H. N. l. 32. c. 10.
Æl. H. A. l. 1. c. 43.

CAPUT II.

De Hypolaide & Atricapilla.

HYPOLAIDEM seu Currucam Aristoteli debemus, qui quidem Cuculum in ejus nido parere scripsit; sed cum corporis formam non addiderit, par fere de ea ac Antho inter scriptores concertatio. Niphus cantu & magnitudine Philomelam imitari, & quod in oculi Equi mortui concavitate nidificet, Hypolaide vocari scribit. Bellonius Luscinia in cantu similem, Gallis Fanette brune, facit. Turnerus, Tictlingam seu Lingettam Anglorum, quæ Luscinia minor est, colore subviride. Culices & vermiculos in ramis arborum sectatur; raro humi consistit; hyeme non cernitur, cuculi pullum proprio educat, & sequitur, esse, & Germanis Passerem gramineum *Grasmusche* seu *Grasemucke* vocari lirequit. Gefnerus dictionem Germanicam *Grasmusche* per metatesin à Latinorum curruca factam esse conjicit, & quatuor ejus genera facit. *Majores* vel colore sunt fusco præ cæteris canoræ. Circa lacum Verbanum Piccasigas, id est, Ficedulas, vocant, vel pectore albo, capite cinereo. Ex Lino nidum struunt.

Atricapillis, maribus caput prima ætate rubet, deinde nigrescit, foeminis semper rubet. *Minores* ventrem album, oculos albicantes habent, inter sepes fere degunt, & hyeme discedunt. Eliota Anglus Passerem sepium esse putat, quem Turnerus Passerem Troglodytem interpretatur, Germanis *Zaunschlipffe*. Aldrovandus nullam observavit, cui proprie illud nomen convenire existimaret. Schwenkfeldius, *vernula*. Græcis, Andothiam Alberto dici opinatur, & supina parte totam cineream, prona albidam, partim dilute cinereo colore respersam, vertice punctulis nigris maculato, describit. Secundum eundem, *nidum* inter gramina rotundum suspendit. *Ova* Majo plerumque quinque, aliquando septem, subviridia, punctis minutissimis varia, parit; eaque si digitis tangantur, non amplius foveat, sed relinquit.

ATRICAPELLA *μυλαγκίρρις* & *μυλαγκίθαλος* Græcis, falso Gallinago ab Alberto Magno, ab aliis Guger Germanorum, qui capite quidem atro est, sed pectore rubet, à nonnullis avis Phœnicuro adeo similis, ut nisi cauda differrent, quæ illi rubea, huic cinerea est, vix dignosci possent, esse putatur. Quam vere Aristoteli & Plinio cum Sycalide, seu Ficedula, vel ut Scaligero placet Ficula & Ficilla eadem sit, & ineunte quidem autumno Ficedula, ab autumno protinus Atricapilla evadat, putetur; cum Schwenkfeldius Atricapillam vere & Autumno deprehenderit, judicandum relinquo. Aliquot earum exhibet Aldrovandus icones. *Una* capite, dorso, cauda, & remigibus alarum pennis tota nigra erat. *Alterius* vertex colorem castaneum gerebat. *Tertia* notabili macula supra rostrum in fronte notabatur. *Quarta* tota ex albo & nigro variabat. Schwenkfeldius Passere paulo minorem, vertice nigerrimo, collo dilute cæruleo, ventre albicante, podice subflavo, pedibus glaucis, unguiculis fuscis, esse scribit, & summae linguæ acumine carere addit. In Anglia non habentur, si Turnero credimus. *Nidificant* in caveis arborum, & plura quam viginti ova ponunt, sed numero semper impari. Non tantum vermiculis, sed & forbi Alpinae bacculis, *vescuntur*, imo & uvis inhiant. Unde Ampelides vocantur. *Pullos* tanta sedulitate alunt, ut in nido etiam pinguislimi existant. *Optimæ* sunt in cibo autumno, propter alimentum tum in iis abundans. Phavorini tempore negabant ullam avem præter ficedulam totam comedi oportere. Dioscorides frequenter in cibo sumptas, visum acueretatur.

Arist. H. A. l. 9. c. 49.
Plin. H. N. l. 10. c. 29.
Scaliger ad Arist. H. A. l. 9. Schwenkfeld. in Aviar. Siles.

Gel. Noct. Atricapilla. l. 15. c. 8.

DE

AVIBUS:

LIBER IV.

De Avibus Aquaticis, Palmipedibus.

TITULUS I.

De Palmipedibus Piscivoris.

CAPUT I.

De Onocrotalo seu Pelicano, & Ave
Diomedea.

Onocrotalus, qui nonnullis falso Avis Diomedea, Catharacta Jubæ, Butaurus seu Ardea stellaris, Porphyrio dicitur; quemque diversum à Pellicano Aristotelis Gesnerus facit. Alberto

Osina, Kiranidi Ramphius. Verrio Flacco Truo, Isidoro Canopus Ægyptius, Aldrovando Pelecanus Aristotelis, & Oppiani Pelicinus vocatur; & nomen hoc quod collum mergens & spirans quasi rudum asini edat, sortitus est. Duo ipsius Genera Albertus facit, *sylvestre* nempe & *Aquaticum*; ex quibus hoc duntaxat doctissimi agnoscunt. Videntur tamen & in provincia Manzi in India Orientali esse toti albi, cum osse supra caput, colore sanguineo, nisi nos Odoricus de Foro Julii fallit; imo & avis, quam Ælianus Indis Celam appellari scribit, quæ est magnitudine triplo major Otide, ore permagno, ingluvie maxima, longis cruribus, summis alis pallidis, cæteris pennis cinericiis, Onocrotalus Indicus dici potest.

Quantum ad *Magnitudinem* visus Rhodi paulo minor cygno, multo anseri; visus, cujus longitudo ab initio rostri ad pedes ultimos extensa, hominis proceritatem æquabat; ab Aldrovando emptus hominem justæ staturæ non adæquabat tantum, sed vincebat etiam: ideo quorundam pondus ad XXIV. libras duodecim unciarum accedit. *Corpus* habet album. *Rostrum* coloris fusci, rubrum interdum, ut in Machli-

nensi Onocrotalo visebatur, validissimum ac plane osseum; cujus superior mandibula, ut Aldrovandus in Ferraria allato observavit, tres digitos lata, duas Spithamas longa. Inferior palmi longitudine superiorem excedit, cum ab interiori parte capitis ortum ducat; superior in curvum quandam hamum crocei fere coloris desinit; & intus plantaginis angusti foliæ pentapleuri figuram exacte exprimit, extuberantibus per ejus longitudinem quinque lineis asperis, & ob longa tubercula referentibus. Sub hac insigne quoddam capacissimum membranofum, rugosum, & omni fibrarum genere præditum, coloris fere crocei percurrentibus ubique maculis nigris, & facile dilatatu, dependet ceu uter quidam, receptaculum. Ingentis staturæ hominem ocreatum pedem usque ad genu immittere in fauces & educere potuisse vidit Perottus; parvulum Æthiopem in eodem inventum scribit Sanctus. Crura ipsi Anserina, præ tanti corporis proportionem breviuscula. Capitis plumæ albæ, mollesque, in radicibus suis nigræ, in occipitio longiores. *Interiora*, si spectes, in eo, quem Aldrovandus describit, quam scæminam esse ova ciceris magnitudine ad septem conspecta ostendere; *lien* erat rotundus, nucis avellanæ magnitudine, aliquanto crassior. *Ventriculus* ex membranis crassioribus constabat, digitos decem longus, duos latus, materia chylosa lutea cum quibusdam quisquiliis & capillis, refertus (Gesnerus succum quandam viridem vermiculis scætentem in suo invenit.) *Vesicula fellis* in concavo jecoris hærebat, & ab ea meatus velut canalis ad intestinum duodenum porrigebatur. *Intestina* sex ulnas longa appendices duorum digitorum longitudinis habebant. *Gula* erat longa, crassiuscula, carnosâ, quæ subinde latorevadens, ubi ad ventriculum

Aldrov.
Ornithol.
l. 19. c. 2.Æl.H.A.
l. 16. c. 4.Descri-
ptio.

pervenisset, comprimebatur. *Cor* maximum, *ossa* levia, alba, pellucida & sine medulla. *Ulnæ* alarum membrana quadam integebantur insigni, ex qua tendones viginti quatuor oriebantur, tam tequiter in eas inserti, ut nullo pacto separari possent.

Locus.

Versatur in aquis piscosis & diffusioribus. Visus in Ægypto à Septentrione versus meridiem tendere. Observata & circa Gazanum Ægypti civitatem greges, quæ versus mare volitabant. Mittitur & à Gallia Septentrionali; & Marcellus Onocrotalum Ravennatem cognominat. Reperitur etiam in Hetrurix maritimis, circa Herodis portum, & Orbitelli stagnum. Circa Lufannam in lacu Lemano semel tantum anno apparere creditur. Gesnerus in lacu ad Tugium captum commemorat.

Videtur.
Gesner.
in Ornithol.

Vicitat inprimis piscibus, eosque dum venatur, non toto corpore mergitur, sed collum subinde demittit. Cicuri si libram (quinque librarum piscis haud magna ipsi esca est) exhibueris, ita invertit, ut rostro præmisso deglutiat. Devorat & cum testis conchas, easque calore interno intra ingluviem apertas, revomit, & hiantibus jam testis carnem ab ocreis seligit. Solum scilicet visceris habet ductum, qui ab introitu oris ad naturæ secreta pertingit. Visus dimidiam endromedem, qua miles unus tegebatur, in se projectam absorpsisse integram, quæ ex gutturæ interfectæ sine jacturaeducta est.

Generatio.

Nidum ex ramulis ad ripam fluminis alijus vel stagni ponit; ibique tot ova Anserinis similia, quot cygnus solet, edit, fetusque enutrit.

Volatus.

Volant nonnunquam soli, nonnunquam gregatim: & cum volant sonum alarum cient.

Vox.

Vox ipsi ruditui Asini similis: sonum cum edit rostrum in aquam vel terræ lutum infigit, si Alberto credendum. Dicuntur (Bartholomæus Anglicus ex Isidoro author est) erecto ad cælum rostro, Accipitrum metu, sed forte falso, dormire; & in Lycia ad flumen Xanthum, quotannis cum corvis, cornicibus, & aliis carnivoris prælium committere. Si vicerint, abundantiam frugum sibi promittunt incolæ; si vincantur, ovium, boum, & aliarum quadrupedum fecundum provenit.

Præstigium.

Usus.

Ingluvie ea parte qua capiti adhæsit colligata, ad quam ejiciendam, Ægyptii piscatores utuntur: qui humiditate corrumpi nequit, multo tempore utilis est.

AVIS DIOMEDEA ab insulis Diomedis sic dicta, de qua multa veteres fabulati sunt, Servio, Stephano Grammatico & Isidoro Ardeæ genus est: quibus Sal-

masius accedit. A Plinio & Solino cum Fulicis comparatur. Aldrovandus Arternam hodie nuncupari, & in insula Sanctæ Mariæ de Tremiti duntaxat inveniri, credit. Cui Dalechampius adstipulatur. Hoc an verum sit ex comparatione colligi poterit. *Magnitudine* ista est Gallinæ satis copulenta. Color ei fuscus seu cinereus obscurus. Tota fere prone candicat. *Rostrum* est luteum prædurum & aduncum. *Oculi* ignei. *Degit* in cavis ut lucem solis declinet; noctu circa scopulos non longe super aquam *volitat*. Piscibus *vicitat*, quos noctu tantum venatur. In cavernis scopulorum & terra *nidulatur*, & vocem vagitui infantium similem promit. De Diomedis vero ita Plinius: Nec Diomedas præteribo aves: Juba Catuructas vocat, eis esse dentes oculosque igneo colore, cætero candidis tradens. Duo semper iis duces: alterum ducere agmen, alterum cogere. Scrobes excavare rostro, inde crate consternere, & operire terra, quæ ante fuerit egesta. In his fortificare. Fores binas omnium scrobibus. Orientem spectare quibus exeat in pascua. Occasum quibus redeant. Alvum exoneraturas subvolare semper, & contrario flatu. Uno hoc in loco totius orbis visuntur, in insula, quam diximus nobilem Diomedis tumultu atque delubro, contra Apulix oram, fulicarum similes. Advenas barbaros clangore infestant, Græcis tantum adulantur. Miro discrimine, veluti generi Diomedis hoc tributentes. Ædemque eam quotidie pleno gutture madentibus pennis perlucet atque purificant. Vnde origo fabulæ, Diomedis socios in earum effigies mutatos.

Aldrov.
Ornith.
l. 19. c. 3.

Salmas.
ad Solin.
cap. 2.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 44.
Solin.
Polyhist.
cap. 2.

CAPUT II.

De Laris in genere & in specie de Laro albo.

Larus, quem Augustinus Fulicam, alii Mergum, Herodium, Suidas & alii apud Græcos *αἰγίον*, quidam etiam Gaviā vocant; ab Aldrovando describitur, quod sit avis à rostri acie ad alarum fere finem duas spithamas longa, capite maximo & crasso, ex albo & cinereo variegato; *pectore* ejusdem fere coloris, illoque amplo; *rostro*, crasso lutescente, in extremo nigricante & insigniter acuto; in cujus superiore parte narium sunt foramina oblonga, rictu amplissimo. *Oculi* iridem auri instar splendidam niger ambit circulus, hunc albus, album cinereus. *Alæ* ex albo cinereo, & ad castaneorum colorem simul commistis tendente constant, & caudam palmi longitudine excedunt. *Cauda* cinerea tota. *Pedes* lutei; posterior digitus satis conspicuus, ungue etiam armatus. *Corpore* est leviss-

Aldrov.
Ornith.
l. 19. c. 4.

Descrip-
tio.

fimo,

fimo, & multis ac densis plumis indutur.

Ælian.
H. A.
l. 3. c. 20. Frequentes in locis maritimis stagnis & fluminibus, cum ingens aliqua tempestas coorta est, *conspiciuntur*.

Locus.
Victus. Præter pisces lumbricis etiam, cochleis, quas sursum raptas, ad saxa demissas confringunt, Locustis & Phalangiis à quibus Tarentinos agros repurgant, *vescuntur*. Delphinos etiam in littora dejectos devorant. Olivis denique in Liguria perniciem adferunt.

Generatio.
Aristot.
H. A.
l. 5. c. 9. *Nidulantur* in faxis maritimis, à quibus potabilis aqua manat, & bina ternave ova æstate pariunt. *Volant* præcipientes & faciles leves quippe. Hinc Laro apud Homerum Mercurius confertur. Sed & pennæ per se aliarum avium leviores putantur. Has enim pelamydum piscatores, teste Æliano, ad hamum lineæ alligant, ut propter earum levitatem ab occurrente aqua sensim ac leviter agitentur.

Affectus. *Amicitiam* cum homine utilitatis gratia, quia piscibus vescuntur, & Monedula, ut Ælianus prodit, colunt. Malo puniceo interimuntur. Imminentibus ventis sublimes in aëre volitant, & vento sese obvertunt. Copiæ piscium capiendæ augurium, si ad piscatores retibus piscantes advolarent, facere creduntur.

Ufus. Cerebrum Lari siccatum & concisum infantibus Epilepticis odorandum quidam commendant. Pennæ proprietate quadam occulta, simul atque mare intumescit, in pulvinaribus etiam eriguntur, & decumbentem sublevant.

Inter species Larorum, est primus Larus ALBUS forte Gavia peralba Apuleii, quæ superfluctus marinos natat, demergit se prope ad Oceani fundum & gremium. Duo ipsius sunt genera prodente Bellonio, *Majus* & *Minus*. Ille minor est cinereo, pulchritudine corporis ad columbam accedit, quanquam male hanc vincere videatur. Nivis instar candidus est. *Rostrum* habet teres, acutum, rubicundum, cujus coloris & cauda est. Recta cruribus insit, posteriora corporis magis elevata gestans, ita ut inferiora in arcum quasi curvari videantur. *Minor* summitatem capitis nigram habet, statim atque frigora ingruere incipiunt, in mediterraneis locis supra flumina volitans apparet, & cæteris in volando diutius perseverat. Captus intrabiduum fere cicuratur; facileque nutritur, intestinis nempe, carne & piscibus. Adeo clamor est, ut aërem clamore suo percellat. Videtur esse Turneri & Gesneri Cephæus, qui ex illius descriptione, est avis marina, magnitudine Monedulæ, sed alis acutioribus, & longioribus, colore tota albo, excepto nigro quem in capite gerit cirro: rostro etiam & pedibus puniceis. Diuti-

no clangore defatigata tandem keph profert. Schwenkfeld. Lari albi facit mentionem, cum capite rubeo.

Schwēka
feld. in
Aviario
Silesiæ.

CAPUT III.

De Laris Cinereis, Piscatore, Nigro, Sterna & Fidipedibus.

LARORUM CINEREORUM
tria ponit inprimis Aldrovandus genera.

Primum columbam magnitudine parum superat, colore undique est albo, in dorso tantum & alis cinereo. *Caput* supremum, macula nigra utrinque ad extremum oculi angulum insigne omnino candicat. *Rostrum* habet longiusculum, & aliquantulum velut armatum, introrsum ad instar thecæ ejus, in qua novacula reconditur cavum, colore corneo. Os interius totum, & linguam cujus extremitas bifida, rubentia. Ora extrema Palpebrarum rubra instar circuli oculos exornat. *Crura* interdum rubent, interdum fuscescunt. *Digit* membranis rubris sepiuntur. Posterior *pedis* digitus aciculæ caput non excedit. Credunt quidam pennas capitis à Martio mense per trimestre quo tempore soboli dant operam nigrescere. Reliquis novem mensibus candidas esse. *Interiora* si spectentur, *Gula* amplissima, ventriculo longiusculo, crassiusculo, cujus interior tunica crassa rubra est, præponitur. *Hepar* maximum flavicans bilobium, *ventriculum* infra amplexatur, supra cor mucrone recipit. *Lien* est longiusculus sanguinei coloris; *Fel* viride. *Vesicula* in hepate continetur, & intestino ramulo jungitur. Ad intestinum rectum appendiculæ binæ graciles, & tenues antrorsum reflexæ spectantur. *Vescitur* piscibus, insectis palustribus, muscis & conchulis. *Nidulatur* in densis piscinarum & lacuum arundinetis; Majo & Junio mensibus ova quinque columbinis paulo majora parit.

Schwēka
feld. in
Aviario
Silesiæ.

Alteri quod vix spithamam excedit, dorsum & alæ sunt coloris leucophæi ad cæruleum quodammodo vergentis. *Rostrum* pro proportionem corporis exilius, arcuatum, nigrum, pedes, tibiæ membranæque digitos intersepiens coloris crocei.

Tertium est capite nigro, rostro recto, & in fine acuto, coloris miniacei; oculis & pedibus ejusdem coloris; costis alarum & remigibus albis, dorso & in reliqua parte cinereis.

Larus PISCATOR, circa Argentinam privatim *Fischerlein* dictus, circa Oppenheimium Fel, minor est, Laro cinereo, vertice nigro, rostro & cruribus è fusco pal-

lidis, totus albicans. *Volatus* est celerissimi, & dum pisces captat, etiam in aquam se mergit.

Larus NIGER, à colore sic dicitur. Quamvis enim sit alis cinereis ultra caudam extensis, cruribus levi rubore notatis; oculis ex fusco purpurascens; rostro tamen, capite, collo, pectore, & ventre nigrescit. Schwenkfeldius ipsi crura & pedes latiusculos rubentes, nigricantibus transversim antierius maculis adscribit: & nidum in arundinibus piscinarum suspendere, ac mense Maio parere, addit.

Quam Turnerus STERNAM appellat, marinis Laris ita similem esse, ut sola magnitudine & colore ab illis differre videatur, minorem duntaxat & paulo nigriorum adjicit. Tempore quo parturit improbe clamosa est. Apud Frisios dicitur esse vertice nigro, rostro & cruribus rubidis.

Lanorum FIDITEDUM duo sunt genera. Unum alis longis, utpote quæ trium fere digitorum longitudine caudam exuperant. Cui oculi, caput, collum, rostrum sunt nigerrima: Pedum digiti insignibus mucronibus armantur. Alterum brevibus, cui magnitudo Merulæ, caput nigrum, Alarum costæ albescentes, Pennæ sub cauda candicantes, pedes rubescens, digiti, membranulæ quodam rudimento interjecto, quatuor.

CAPUT IV.

De Catharracta & Ceppho.

Catarracta, Aristotelis & Oppiani, ex eo quod cum impetu ad prædam capiendam decedat, ex hujus descriptione avis est instar Lari minoris, sed robustior, colore candido, & Accipitri Palumbario similis; ex Aristotele, Accipitre minor, gula ampla, & lata. Aldrovandus avem rostro acuto, crasso, supra non modice adunco, prone per alas, dorsum, betico, albo, & luteo mixtis variegatam, supine totam albam maculis beticis distinctam, tibiis, pedibus, & membrana eos interserpente cinereis, ponit. In mari viſitat, sed & scopulis, littoribus, & petris, quas charades vocant, supra aquam eminentibus insidet. Pisces captat exiguos. Ubi vero nantes conspexerit (perspicacissima enim est, & vel adfundum usque maris) altius subvolat, & contractis omnibus pennis, quovis telo celerius delapsa, ad cubiti spacium immergitur, & piscem extrahit; nec diutius manet, quam jugeri spacium transierit. Mirus *incubandi* mos ovis, si Oppiano credimus. Fucum aut algam iis super petram insternunt, si ventris exposita relinquunt. Mas illa unde marem procreandum conjicit, foemina unde foeminam in sublime per aliquot dies sublata, in pel-

Arist. H. A. l. 9. c. 12.

agus mittit; motu concalefactis ovis, pulli excluduntur. Pullis luce aspecta, nulla in nidis mora, parentes volatu sequi conantur: à parentibus suscepti, in mare demittuntur, mox extrahuntur. Acie oculorum in senio obtusa, dum ad prædam se ferri arbitrantur, præcipitiis illusi intereunt.

CEPPHUS Aristotelis, Fulica est quibusdam, Aldrovando, avis, habens rostrum colore corneo, ad mandibularum latera ruffo, in extremo quod aduncum est, nigro, oculos exiguos rufos. Caput, collum, pectus, ventrem, coxas, ex albis & fuscis, intercurrente etiam betico & luteo, maculis variegata. Crura & tibia viridescens. Pedes & membranam digitos secantem fusca. An sit Cepphus veterum, ignoratur. Nam de hoc, si foramen corporis spectas, id duntaxat habemus, Laro esse similem, cum quo descripta parum habet similitudinis, plumis abundare, sed carnis esse exigua, ideo facile vento impelli. De cætero, apud mare viſitant, ejus & spumam vorant. Thunnos, propter pisciculos, quos dentibus suis discerpunt, sequitur. Ad tonitrua adeo perhorrescit, ut sonitu exaudito ex aëre in mare decidat. Spuma inspersa alliciuntur, capiuntur allesti. Cum relicto mari gregatim in terram adverso vento revolant, imminentis venti indicium præbent. Carnem habent probi odoris, partem posteriorem, quæ sola limum olet, si excipias.

Aldrov. Ornith. lib. 19. cap. 12.

Oppianus.

Aratus in Phænom.

CAPUT V.

De Anſere Bassano, Phalacrocorace, Corvo Sylvatico, Nycticorace Gesneri, & Graculo palmipede.

ANſER BASSANUS seu Scoticus, incolis Solendguse dictus, avis est domestico Anſere longior, sed minus lata, Anserem tamen & forma & voce per omnia referens. Nullibi quam circa Castellum Bas, viribus humanis inexpugnabile, reperitur, ad quod incipiente vere appellant. Tres vel quatuor primo tanquam speculatores advolant; has aliquot post diebus reliqua multitudo insequitur, quod egregiorum virorum relationi debemus. *Nidulantur* in caſtri prædicti rupibus; & construendis nidis tantam lignorum copiam comportant, ut auferentibus, qui illic habitant, abunde in annum ex ea parte prospectum sit. Ova in rupibus deposita, superposito pede altero, unde forte nomen à solea accepere, excludunt. Pullos delicatissimis piscibus nutricant. Quod si avolantes novum videre, illo abjecto, iterum se magno impetu immergunt. Tanta autem piscium ab ipsis evomitur copia, ut & præſidiariis arcis in cibum cedant.

Gesner in Ornith. Heſt. Boetius in descript. Scotie.

Ha-

Habent intestinum quoddam parvum, oleo singularis virtutis refertum. Ischiadem & arthritim sanare creditur. Pulli capti & assi halecis nidorem emittunt. Caro est durior, & vinum exigens, quod aliquoties experti sumus cum Anno M.D.C. XXIII. in Scotia ageremus.

Ex adipe Uguentum fit, quod cum Comageno Plinii de bonitate certat.

PHALACROCORAX, quem cum corvo Aquatico Plinii eundem esse vel exinde conjici potest, quod calveat, quamavis sit inter Historicos Naturales non convenit. Gesnerus an sit illa, quæ in Burgundia Crottescherot seu Corvus Piscator, cui unus pes est ad natandum palmipes, alter ad rapinam uncis unguibus armatur; sic cum piscem in aqua arripuit, nec facile propter pondus volare potest, piscem altero pede retinens, altero ad ripam navigat; dubitat. Alii Corvum aquaticum Plinii, Phalacrocoracem, Corvum Sylvaticum, & Graceculum palmipedem, easdem esse opinantur. Bellonius quidem simillimam avem cum ea, cujus hic pro Phalacrocorace ex Aldrovando iconem dedimus, exhibet: sed corvum aquaticum, Cornicem marinam easdem Aristoteli aves esse, & Phalacrocoracem, innuit. Gallis dicitur Cormorant, quo nomine Angli avem insigniunt, quæ anguillas integras edit, per intestina elapsas rursus devorat, & vel novies aliquando unam absorbet, priusquam retinuerit. Aldrovandus Phalacrocoracem scribit esse capi *magnitudine*, rostro longo acuto & rubesciente. *Capite* fere plumis nudo & cute tecto, quæ carnem substantia & colore æmulatur. Ex collo velut jubæ dependeat, quales in capis cernuntur. In pedibus plumas quasdam aureas gestat. Solus inter palmipedes Fibro excepto in arboribus sedet, in iisque nidulatur, aque in aqua marina atque dulci degit. Magnum stagnisdamnum quod pisces devoret, adfert, interdum Anguillam medioeris magnitudinis ex aqua abrepta aërem desert, & antequam devoret, diu cum illa colluctatur.

CORVUM SYLVATICVM hisce adjicio, non quod sit vel palmipes, vel aquatilis, sed quod ab aliquibus cum Phalacrocorace confundatur. Magnitudo ipsi est Gallinæ, color toto corpore niger, si minus videas; sin propius ad solem præsertim, cum viridi permixtus videtur. *Rostrum* rubicundum, oblongum, & angustis terræ vel arborum foraminibus inferi aptum. A capite crista retro tendit, haud scitur an in omnibus aut semper. *Pedes* habet, ut Gallinæ longiores, *crura* oblonga obscure rubentia. *Digitos* fissos. *Vescitur* piscibus, ranis, locustis, gryllis. In rupibus, turribus desertis & pylis, unde Claustrapp Germanis, *nidulatur*. Bina aut terna ova

parit. Altissime *volat*, & primis fere omnium, circa, initium Junii ni fallor, migrat. Pulli diebus aliquot antequam volare possunt, nidis exempti ita facile cicurantur, ut in agros evolent, & subinde revertantur. In Istria circa promontorium Polæ homine per funem demisso eximuntur, & inter mensarum delicias habentur. Aucupes in singulis nidis, singulos relinquere solent, ut anno sequente libentius redeant.

Huc pertinet & *NYCTICORAX* Gesneri quamvis palmipes non sit, qui juxta aquas & inter arundines versari dicitur. Vescitur pisciculis. *Nidulatur* in altis arboribus, ita vel quaterna ova parit. Inter arundineta abscondita voce vomiturientis instar clamat.

Sed nec *GRACULI PALMIPEDIS* Aristotelis, seu Corvi Aquatici minoris, hic obliviscendum, quem alii Phalacrocoracem, alii Corvum Sylvaticum vel Mergum magnum nigrum esse judicant. Colore in toto corpore est subnigro, collum si excipias, ubi nonnihil rufi admisceri videtur. *Rostrum* aduncum acutum, prope frontem subalbicans, cætero subnigrum. *Crura*, *pedes*, & *membranæ*, fuscæ sunt.

CAPUT VI.

De Mergis in genere.

Mergum, quem Græci Poëtæ Dypeten, Poingam & Bungam dicunt, veterum esse, vel ex eo colligitur, quod omnes eandem avem esse tradiderint, & pleraque de Æthiopia Græcis tradita, Plinius de Mergo interpretatus sit. Bellonius tamen Æthyiam veterum quandam *MERGI MARINI* speciem, quæ Cretenfisbus Vultamaria & Calicatzu dicitur, esse judicat.

Magnitudine est Querquedula, albo ventre, capite & dorso nigro, itemque alis & cauda Pluma ei instar lanuginis, valide cuti inherens. *Rostrum* marginibus acutis cavum & plane fere, lanuginosis plumis bona sui parte obducitur, nigrum superiore, album inferiore parte, vertice lato. *Frons* tuberositate quadam verrucatur, cui floccus plumarum niger innascitur. *Digito* pedum posteriore sola inter palmipedes caret. Utut sit, certe & Salmasium hic consentientem habemus, hoc solo dissentit, quod Mergum & Fulicam easdem esse contendat. *Formam* si spectes, de ea quidem Ovidius.

*Fecit amor maciem, longa internodia crurum
Longa manet cervix. Caput est à tergo longe:*

sed quis ille sit, unusquisque conjicere tentet. Nostri contra omne genus avium pedes habent in cauda, ita ut in terra stantes

Bellonius
observ. l.
1. c. 11.

Descriptio.

Salmasius
Solin. c.
2.
Ovid.
Metamorph.
lib. 12.

tes instar hominis corpus erectum proferant, ut Author de natura rerum scribit. Ab Anatibus dentibus & cruribus discrevit Gesnerus. Magis enim duri ac rigidi, utrinque tantum in marginibus, rostri; ceteris, quibus rostrum latum non est, sed in acutum desinit, nulli. Crura vel non æque absoluta habent, vel breviora, vel non eodem situ, vel posterius, quamobrem incommode ingrediuntur.

Locus. Versantur prærumque in mari, fluminibus, stagnis & paludibus: amant tamen & aprica loca, ut siccescant. Diutissime in aquis, dum se immergunt, morantur, & summa ac ab Homero allata natandi polent peritia. Alam namque alteram sæpius ad ventum erigunt, & ejusdem tanquam veli adminiculo navigant, quod Pighius prodidit. Soli inter amphibias inter volandum piscantur.

Congros, Anguillas, & alios lubricos pisces deglutiant, ingestos, interdum etiam vivos, mox alvo, quod eis à ventre mox recto intestino cibi transcant, egerunt; quod Oppianus & Plinius observare. Schwenkfeldius in omnium quas secuit ventriculis, plumas avicularum copiosissimas, quasi cum pisciculis, & avena compactas invenit.

Parus. Nidificant à bruma ineunte vere. Sæpe in maritimis faxis, in arboribus interdum. Utrumque se juxta ostium Thinx fluvii, & in Nortfolcia observasse Anglus quidam scribit. Ova ut plurimum bina ternave ponunt. Pullos ab ovis exclusos si matrem perdiderint, adeo validos esse ajunt, ut ipsi cibum sibi comparent.

Nullam eas vocem emittere, arbitrati sunt quidam. Lucretius de iis.

— *Mergique marini*

*Fluctibus in falso victum, vitamque petentes
Longe alias alto jaciunt in tempore voces.*

Ingenium. Cicurari posse, tum ille qui Venetiis ab hero è cymba emissus, non sine spectatorum & voluptate & admiratione sub aquis sibi cibum capiebat, satur redibat ad herum, ostendit; tum illi in Oriente, qui ab hero, postquam eis guttur filo, ne pisces captos devorarent, ligasset, dimissi, & pisces capiebant, & in cistas huic negotio destinatas injiciebant; Piscatione heri peracta, soluto gutture, sibi piscabantur, pasti ad herum redibant, testantur. Alii tempestatem præfagire, cum maria fugiunt, & clamorem ad littora ferunt, dicunt; seu quod dimisso in profundum capite aurarum signa sub fluctibus colligant: seu quod vapores ab aquis ad imbriferam nubem erigendam sursum attolli sagaciter subodorentur; seu quod pisces pleræque per eum cœli statum, è mediis aquis ad littora enatare soleant. Alii cam in mare

frequentius sese immergunt, seu propter aliam aliquam causam, seu quod tranquillo mari metu belluarum progredi non audeant; in altum sub tempestatem regressis, audacter progrediuntur. Plinius pennas rostro purgantes ventum indicare alicubi innuit. Ælianus gestu alarum exultantes, idem facere tradit. Huic & Aratus accedit, dum eas in χυρῶν τρυφῶνται πύργους, in siccoalis plaudere ac ludere, scribit.

Ufus illorum in cibo nullus: quantum ad Medicinam. Magi contra quartanus devorari jubent cor Mergi marini sine ferro exemptum, inveteratumque conteri, & in aqua calida bibi. Ventriculum in cibo sumptum stomacho mederi falsissimum comperit Galenus. Fel cum cedria inunctum evulsos palpebrarum pilos renasci non paritur. Jecur sale asservatum ex hydromelite duobus cochlearibus potum, secundinas pelleret scripsit Dioscorides.

Æl. H. A.
l. 7. c. 7.
Aratus in
Phæ-
nom.

Galen. de
simp. l.
11.

CAPUT VII.

De Variis Mergorum generibus.

Mergorum varia sunt genera. Mergus Rhenanus, quibusdam Moenialis alba appellatus, qui omnium Mergorum Anatiformis maxime est, corpore undique albo atro colore distincto, prona colli & pectoris parte cum ventre candida, sed passim cinereis punctis aut maculis distincta. Frequens est apud Sueffiones & Bellovacos, Major, qui rostrum denticulatum angustius, è fusco ad caruleum dilutum vergens, extremitate deorsum incurvata; pectus, collum, & ventrem tota alba: in dorso supremo egregias quasdam plumas alternatim albas nigrasque, inde etiam ad latera versus pectustænias similiter discolores utrinque procedentes habet; & gobiis inprimis atque troctis vescitur.

Gesner in
Ornith.

GLACIALIS, quod per summa frigora in aquis capiatur ita dictus, magnitudo Querquedula, collum digitos octonos longum. Dorsum undique nigrum, alæ nigre sed albo distinctæ, crura brevius fusca, membranæ inter digitos nigris; quique per hyemen apud Helvetios, non minus quam Anas fera laudatur.

LONGIROSTRUS, cui rostrum nonnihil rotundum, digiti longitudine; caput cristatum, collum subrubrum, corpus præter alas totum nigrum. Pedes crocei, membranæ luteæ.

RAUCEDULUS, cui corpus & alæ cinereæ; gula & venter alba, pedes nigri.

RUBER cui pars superior capitis & colli rubescit. NIGER cui rostrum nigrum, collum spadiceis colore, corpus ut in Fuli-

Odoricus
è Foro
Julii in
itin. Vir-
gil. Ge-
org. l. 1.
Isidor. O-
rig. l. 1.
12. c. 7.
Persius
Satyra 6.

Fuligula, alæ cum transversa linea alba nigra.

ALBUS, cui rostrum rufum, caput cum collo nigrum, viridibus aliquot punctis respersum. Crura rubicunda.

CIRRATUS qui habet caput rufum vel testacei coloris cirrho retrorsum eminente. Dentes serratos, duos, retrorsum flexos; Crura & digitos pedum, interjectis membranibus ex rufo fuscis, rubentes. Rostrum tres digitos longum, inferne rubicundum, superne nigricans. Duobus foraminibus odoratus causa pervium. Bellonius Fibrum seu Castorem vocat. Asperam arteriam ab aliis aquatilibus diversam habet. Nec enim est rotunda, sed compressa & inæqualis, modo crassior, modo angustior, & in medio duobus velut nodis extuberans. Cum ad ventriculi regionem pervenit, in cavitatem quandam ex membranibus & ossæ grandiusculo inæquali constructam dilatatur. Semper in aquis manet, & in iis se diutissime omnium continet. Urinando ad quadraginta aut quinquaginta pedes procedit. Caput inter natandum sublime attollit, & inter arundines nidulatur.

MERGANSER denique ut Gesnerus vocat, cui caput cum tertia colli parte ex viridi nigricat. Collum reliquum cum aliquo pallore album est. Inferior colli pars nigrescit. Plumæ ventris & supinæ caudæ gilvæ sunt. Crura & pedes cum membranibus inter digitos minii colorem habent. *Ventriculus* est corneus id est firmissimus. Pondere interdum ad libras duodecim accedit.

Huc pertinet *Mergus* ille, quem Bellonius Gallice *HERLE* vocat, anatem magis quam anserem referens, rostro longo, terete, & mucrone reflexo, colore subrubro.

Item *GULO* Germanis *Seesluder* / magnitudine Anseris, colore gilvo, gregaria, mensis lautioribus contempta.

Nec non *SCHELDARACHUS* Anate major, varius rostro lato, adunco, dentibus acutissimis pleno, ex gilvo subruffo.

Albertus
H. A. 1.
5. c. 3.

MORFEX, denique tota nigra, rostro ferrato & valido, quæ sub aqua mergitur, & anguillas capit. Easdemque si se gravari senserit, evomit. Gregatim in arboribus juxta aquas nidificat. Volatura caudam diu in aqua trahit. Saturata ad solem ut siccat, expandit. Fimus siccatur arborum ramos in quos inciderit.

NB. De mergis exoticis vide *Mantissam*.
Num. 11.

CAPUT VIII.

De Colymbis in genere & in specie.

AVIS quæ Græcis Colymbus, Colymbis, & Colymbas; Latinis Vrinatrix dicitur. Unum tantum illius genus Aristoteles commemorat; alii plura; Turnerus tria vidit. *Primum* totum nigrum, si cirrum quem in capite gerit, exceperis; Mergo, quo tamen triplo minus est, quoad corporis effigiem non dissimile. Angli Doukeram vocant. *Alterum* Turdo non majus, Anati colore & corporis effigie simile. Anglis media Vrinatrix dicitur. *Tertium* adeo nuper ab ovo exclusum refert Anserculum, ut nisi Rostrum hujus paulo tenuius esset, ægre alterum ab altero discerneres. Non enim pennas, sed lanuginem quandam earum loco obtinet.

Gesnerus, Colymbos facit *Maximos*. *Majores & Minores*. *Maximus* qui in Acronio lacu raro capitur, ab inepto per aquæ superficiem motu Fluder dictus, Anseris major est. Rostro oblongo, angusto, acuto. Neque volare potest recte, neque ingredi commode, nisi simul pedibus alisque nitatur. Tam profunde urinari dicitur, ut orgiarum viginti spacio, quandoque reti aut mucrone ferreo sub aqua capiatur. *Major* duorum est generum. *Primus* Anseris paulo minor, collo est oblongo, dorso nigro, collo inferiore & ventre albo, plumis fere niveis. Digitos pedum habet ternos, adherentibus membranibus latos, sed aliquo usque divisos. Ungues latiusculos præsertim medium, teretes & in mucronem attenuatos. Crura juxta anum fere retrorsum prorecta, natationi potius quam ingressui apta, femora in ventre condita, inæqualem interdum tibiæ situm. *Alter* cristatus seu cornutus est, plumis circa verticem, & collum supremum eminentibus, superius nigris, ad latera ruffis. Aliquot ejus sunt descriptiones. *Minor* Germanis *Succhelin*, ut major *Succhel*, magnitudine est columbæ, digitis latis, adherentibus membranibus fuscis, non continuis tamen sed trifariam dissectis. Inferiore rostri parte tota sanguineo colore rubente. In femore multa ossicula tenuia, circa articulum agglutinata, dimidia ossis femoris magnitudine, ab una tantum parte habet.

Bellonius etiam *Majorem* sub nomine Vriæ veterem describit, Anatis magnitudine, rostro longo, rubicundo, ac serrato. Cristam habere videtur. Nam cum nigro sit vertice, plumæ oblongæ ab occipite pendunt, quas cum excandescit, aut exhilaretur, attollit aut demittit. Voce est horrida, sed ad sui tutelam utili. Idem nec *Minoris* obliviscitur, qui adeo aquæ familiaris est, ut ei per terram gradi posse, propter

N

femo:

femora in ventre ita recondita, ut nullo modo appareant, & crura, quæ extrorsum protenduntur, ut omnino è lumbis censerì possit, natura negasse videatur. Caudam habet nullam, nullumque Uropygium. Alas pro corporis proportionem exiguas. Plumas lanuginosas. Digitos ab invicem separatos, latos tamen. Rostrum rotundum exiguum, rubicundum. Crura parte posteriore ferræ instar crenatæ. Jecur tenellum; intestina à reliquarum avium intestinis diversa, gracilia & tenuia si in pauca aqua deprehendatur, vix se in aërem attollere potest. Prope terram in cespite aliquo palustri nidificat. Addit & Aldrovandus suas descriptiones, quas hic adferre non est necesse. Addidisse sufficiat. *Colymbos* Athenæo inter omnes Aquaticas aves minimos esse, atro & sordido colore tingi, & acuto rostro instrui; Oppiano *Colymbos* semper natate, & ne somni quidem vel cibi gratia in continentem exire, nisi partus tempore; eosdem adversis ventis natate; ne illorum vi aliquando inviti in terram extrudantur. Circa medium Augustum propter pennarum mutationem volare non possunt. Et tam celerrime merguntur, ut bombardæ etiam ictum effugiant. Referri ad *colymbos* potest, avis Anglis Coote dicta, forma & colore Fulicæ similis, paulo minor, incujus rostro parvum tuberculum rubeum eminet, quæ subinde ad fumum usque urinatur. Non piscibus tantum, sed alga, lineo, gramine, parvisque cochleis victitat. Et vulgo fertur, non posse diutius volare, quam pedis cavo arreptam aquam retineat.

Oppianus
Ixeutic. l.
2. cet.
Aldro-
vando.

Athe-
næus
Dipnos.
lib. 9.

Huc pertinet *URIA* Anata multo minor, rostro longiore ac tenui, colore sordido testaceo. Gesnerus colore tantum, & magnitudine à *Colymbis* differre putat.

CAPUT IX.

*De Brentho, Phalaride, Avosetta Italo-
rum & Trochilo.*

BRENTUS quænam sit avis dubitatur. Niphus monticolam esse credit, generis unci. Plinius pro eo Anatem vertit, quod & Gaza secutus est. Albertus Meruguli pisces venantis speciem interpretatur. Et forte est, quia piscibus vivere Aristoteles reliquit.

Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 1.

Nec magis notum, quænam sit *PHALARIS*; Bellonius pro ea Mergum varium majorem substituit. Gesnerus Folægam Italarum eam esse credit. Apud Athenæum habet rostrum angustum; corpus aspectu magis teres quam Anas, colorem in alvo & dorso cinereum.

Athe-
næus
Dipnos.
lib. 9.

AVOSETTA Italarum, quam Lucarni circa lacum Verbanum Spinzago de aqua

vocant, *Recurvirostram* vere dixeris, avis est magnitudine columbæ aut paulo gracilior, rostro nigro, sursum tendente, in extremo acuto, quinque digitorum fere longitudine. Corpore supino toto albo; capite & cervice superius ex fusco nigricante, pedibus coloris cyanei diluti, digitis membranis junctis. Cruribus longis, ac ideo posteriore digito, qui pro calce est, minuto.

Vox ejus est *Crex*. *Crex*.

TROCHILUS juxta ripas fluviorum oberrat, & tanta sæpius teleritate discurret, ut cursus volatu ejus velocior sit. Obvia quæque depascitur, hirudines etiam quæ faucibus Crocodili inhaerent, *Cladorynchos* seu potius *καλαρυγχος* inprimis, legit. Mira de illis Oppianus, nimirum, mares à fœminis, fœminas à maribus pasci. Incunte vere priores fœminas, sollicitare cantu vel stridore potius peculiari, masculos ad coitum. Fœtu procreato separari, & ad sua pascua redire. Tunc mares omnem fœturæ & Veneris curam relinquere, fœminis laborem solum incumbere, cumque eas inter se partiri. Alias ova in nidis fovere, alias fœventibus cibum congerere. Pullos adultos ad littus ubi mares versari solent perducere. Ibi fœmellas cum suo sexu remanere, masculos ultro separari. Gesnerus esse putat generis Gallinarum Aquaticarum; Aldrovandus *Corriram* seu *Ta-bellariam* vulgo dictam. Avis hæc est varia, rostro recto, luteo, in fine nigro. Rictu magno. Oculis nigris albo circulo circumdatis, quem rursus alius spadiceus ambit. Cruribus longis, coxis brevibus, digitis membrana junctis. Si *Corrira* *Trochilus* non est, *Celeris* est.

Æt. H. A.
l. 3. c. 11.
& l. 8. c.
25.
Arist. H.
A. l. 9.
cap. 6.

TITULUS II.

De Avibus Palmipedibus Herbivoris.

CAPUT I.

De Cygno.

CYGNUS, qui & *Olor* quasi *ὀλός*, totus candidus, Græcis modernis *Cyprinus*, veteribus *ὀλός* & *κύβη* seu *κύβη* quod cibi causa cœnum scrutetur, & turbet, seu quasi *κύβη* quod sit clamor, seu quod teres collum habeat, dicitur. Totus est candidus. Horatius purpureum, & pulchrum & splendentem, poetica licentia nominasse creditur. *Rostrum* habet parvum turbinatum, in extremitate obtusum, serratum & falcis instar dentatum, colore rufio, in cujus summa parte quæ capiti committitur, tuberculum rotundum, nigerrimum, & rostrum in se inflectens visitur. *Collum* longissimum, viginti octo vertebis constans, unde *κύβη* Homero &

Descri-
ptio.

Homer.
Iliad. 6.
Euripid.
in Iphig.

Εὐριπίδης Euripidi dicitur. Et Lineæ velut piscatoriæ usum in aqua porrectum præbet. *Pedes* nigris notis partim cæruleis partim rubicundis & albis distinctos. *Membranas* digitis interjectas squamulis minimis rotundis inæquales. *Digitos* vero veluti annuli quidam in latum interfecant; eorum medius omnium & crassissimus & maximus est, longus digitos decem, internus novem, externus septem. Uno pede pro remo, altero pro corporis sui gubernaculo utitur. *Linguam* mediam, quod superius ponendum erat, sulcus denticulis palatum medium secantibus respondens dividit, & ipse prope radicem scaber. *Interna* si spectes, *Intestina* omnia quatuor dodrantes, & palmum longa, multoque adipe, qui vicem emeriti obit interfecta, in illo quem Aldrovandus secari curavit, erant; & cum simplici tantum in se media spiræ revolutione inflectantur, ne aliquid non plane distributi alimenti præterlaberetur, natura, cæca duo dodrantis spacio inter anum & ipsorum initium interjecto, recto intestino appendit. *Arteria aspera* admirandæ planæ est structuræ. Nam Oesophagum subiectum comitata, ad jugulum descendens cum pervenit, non recta, ut in cæteris animantibus, ad pulmones tendit, sed supra claviculas elevata, in costam ossis pectoris seu sterni, quæ ex duobus laterilibus ossibus, & tertio superno his pro operculo incumbente fabricata, vaginæ seu thecæ figuram & usum præbet. Ad hujus finem postquam pervenit arteria, inferne in se instar serpentis reflectitur, & S. literam exprimit; moxque sub priore jam dicta portione ipsi superposita, hanc capsulam denuo egreditur, & claviculis mediis conscensis, harum jugo tanquam fulcro innititur; atque ita sustentata, denuo in morem tubæ revolvitur, thoracisque cavum subiens, antequam ad pulmones fertur, prius quasi laryngem alteram efformat, transversim secta, ossiculoque quantum ipsa lata est longo, & quod tenui membrana obtenditur, hiulcam fistulam, seu siringem arganorum musicorum, quæ inferiore sui parte simili fissum patulæ sunt, figuram repræsentat. Sub hac larynge arteria in duas canales divaricatur; quorum singuli in medio ampliori capacitate protuberantes, recta in pulmones exiguos costis retro totos affixos abeuntes, distribuuntur. Talem structuram & cantus, de quo postea, & respiratio reposcebat. Ne enim, dum aliquando horæ dimidiæ spacio toto capite & collo pronis, vado alimo niam haustus immergitur, periculum suffocationis incurrat; ex ea arteriæ, quæ pectoris dictæ vaginæ reclusa est, portione, spiritus quantum satis suppeditatur.

Locus.

Locus si attendas, est avis amphibia

Maxime tamen aquis delectatur. *Ælianus* greges eorum in Pstro mari apparere prodidit. In fluviis Caystro, Istro, Tanai, Strymone, Mæandro, Eridano, Mintio, Tamesi & quidem magna copia degere, apud Ovidium, Senecam Tragædum, Theocritum, Lucianum, Statum Papinium. Mantuanum, Polydorum Virgilium, & alios invenies. Innumeris in agro Engolismensi, Francisci primi opera, in fonte Tenario educatos Brujerinus testis est: sed stagna vehementer appetunt; seu quod quietiora nec natatum impediunt, quod *Æliano* visum, seu quod in illis major herbarum suppetat copia.

Cibus ipsi herbæ at segetum grana, ova piscium. Rostro cribratæcenum, & algam inprimis quærit. In Scotiæ lacu Spina, herbæ cujusdam semine, quæ ab iisdem nomen sortita est, delectatur. Ea autem natura est, ut agris injecta nunquam putrescat.

Tempore *libidinis* blandientes inter se mas & fœmina, alternatim capita cum suis collis inflectunt, velut amplexandi gratia; colla mares applicant fœminis, deinde mas fœminam conscendit. Ubi coierint, mas conscius læsam à se fœminam fugit, illa impatiens fugientem insequitur. At non diutina hæc est eis discordia, noxa cessante reconciliantur; & fœmina maris persecutione relicta, post coitum frequenti caudæ motu, rostrum in aquis mergens, se purificat. Semel tantum anno initio veris pariunt. Quia plures & speciosos fœtus produciunt *καλλιπαιδες* & *ποικιλοπαιδες* dicuntur. Aristoteles *ιστιανος* dicit. Pariunt ova tertio anno, illaque magna, oblonga, testa dura obtecta.

Probe natant, velociter sylvestres, tarde ob corporis pondus domesticæ volant. Aristoteles longius in pelagus efferri scripsit. Et Hesiodus *ἀβαντος ἀνδραπόδατος* nuncupat.

Cantum quod attinet, scinduntur in sententias Authores, *κίανον ὅτι ἰστίανος μωρὸς ἐστὶν ὄρνις*, prodidit Pausanias, cum eo Socrates apud Platonem, Aristoteles, Cicero, & Philosophus, ex Poëtis Callimachus, Æschylus, Theocritus, Antipater, Euripides, Lucretius, Virgilius, Seneca, Ovidius, Martialis, sentiunt. Diluculo ante solis ortum tanquam in aëre vacuo per id tempus audiendi clarius, in maris littoribus, nisi tempestas dissuadeat canere; nec cantus in senecta morti vicinus (remissioris tum) oblivisci. Favonium vel canendum observare, fati certos, ne à quoquam interpellentur secedere, apud Oppianum legitur. Fabulosum id, apud Lucianum, Plinium, Alexandrum Myndium & Scaliger invenies. *Ælianus* vacillat, & modo his adstipulari, modo in illos propendere

N 2

vide-

Æl. H. A. l. 10. c. 36.

Ovid. Metam. l. 2. & 5. Seneca in Agamem. Theocrit. Eidyl. 19. Stat. l. 14. Theb. Polyd. l. 1. H. Anglor. Æl. H. A. c. 17. c. 24. l. 15. de re cib. c. 61. Vissur.

Pariunt. Hest. Boëtius in descriptione Scot.

Volant. Hesiod. in scuto Herculi. Vox. Pausan. Arist. H. A. lib. 9. cap. 12. Cicero l. 3. de Orat. Ovid. l. 5. Trist. Eleg. 1. Seneca in Hyppol. Martialis. in Xenii. Oppian. in Ixeutic. cit. Aldrov. Lucian. in Electro. Plin. H. N. l. 10. c. 23. Myndius apud Athen. l. 9. Scalig. Ex. 232.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.
Myndius
apud A-
then. l. 9.
Scalig.
Ex. 232.
Ælian.
H. A. lib.
10. c. 30.
l. 11. c. 1.
Idem var.
lib. 1.

videtur. An funeris sui cantator sit, quod & Brasavolus observasse dicitur, nescio. De Elephantis sane id proditum. Cantare, nullum fere dubium. Audivit in lacu Mantuano cantantes Pendasius. Prope Londinum in Tamesi festivis cantibus subeuntes classes excipiunt. Canorum quiddam lamentantium in morem quovis tempore obstrepere, observavit Aldrovandus. In hoc denique duplex ille flexus, qui ossis pectoris primum capsulæ inseritur, deinde altera revolutione in furculam inclinata recumbens, in pulmones decidit, factus videtur, ut vox in ipso revolutæ arteriæ angulo, percussio, majori cum clangore erumperet, ac veluti morulæ exiguæ in eo anfractu quiete recreata, vires acquireret cundo.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.

Ingenium in volatu potissimum ostendunt. Liburnicarum more rostrato impetu feruntur, facilius ita findentes aëra, quam si recta fronte incederent. A tergo sensim dilatante se cuneo, porrigitur agmen, largeque impellenti præbetur auræ. Colla imponunt præcedentibus, fessos duces ad terga recipiunt.

Ætat.
Arist. l. 9.
H. A. c. 1.
Ælian.
H. A. l.
14. c. 13.
Scalig.
Homerus
Iliad.

Quod de ætate apud Ælianum legitur ducentessimum nempe attingere annum incredibile videtur.

Inimicitias interdum tantas inter se alunt, ut alter alterum devoret, vel, ut Ælianus perimat. Nec pullis, vel ovis parcitur. Ab Aquila sibi metuant. Attacti, non iniquo Marte repugnant: sed nec cum fulgure, serpentibus & draconibus ipsis convenit. Cicuta interiisse non mirum, cum & proci illius esu periisse visi sint.

Præsa-
gium.

Pluvias expectabis, si rorem aquæ inspergunt; si profundos eidem immergunt humeros, serenitatem. Apud Helvetios ingen frigans metuitur, si hyeme in quodam lacu apparuerint.

Ufus.

Ufus in cibis laudatus apud veteres. Alexandrines inter aves lautas numerat, & Diopnosophitis apponuntur, nec minore quam Anseres habitos, precio ex Plutarcho potest colligi. Recentiores nigram, & duram, forte quia annosi adferuntur, carnem acufant. Moscovitarum tamen Duces, quoties carne vescuntur, assos hospitibus apponunt. In Medicina, faciem purgat, & erugat adeps. Ova ad ignem sacrum celebrantur. Pellis ventriculo apposita, concoctionem vi peculiari juvare creditur.

Plut. l. de
esu car-
nis.

Herbert.
in Mo-
sco.
legat.
Scaer.
hammon.

CAPUT II.

De Anser.

ARTICULUS I.

De Anser Domestico.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 22.

Anser, Plinio alicubi Ganza, Græcis veteribus *χελύς*, *χίνα* modernis, avis est

vulgo tam nota, ut descriptione non indigeat. Inferum & domesticum distinguitur, quorum ille minor Aristoteli, varius esse à Columella manifesto errore prædicitur, cum apud nos varii candidos numero exsuperent. In regno Senegæ colore & peninis multi jugis variantur. In Hispania nova capite rubeo, olores candicis superant.

Deseri-
ptio.

Vifus cum duobus capitibus, totidemque linguis, collo unico, quatuor pedibus, quorum unum par alarum locum occupabat, alterum circa podicem. Alæ duæ circa collum pandebantur. Proditus ab Alberto & alter, dupli collo, quaternis pedibus, & totidem alis, dorso uno, adeo ut duæ aves, altera alteram ferens, viderentur. Frequentissima scilicet in illis ob humorem & stoliditatem monstra sunt. Interiora si spectes, testes sub diaphragmate lumbis annectuntur, hisce duo ex vena cava rami insident. Duo vasa ex infima utriusque parte emersa, & deorsum per lumborum regionem recto delata, prope os sacrum, coeunt, & canalem teretem, qui in plures orbes circumvolvitur, & cujus pars superior, tota carnea, inferior intus cartilaginea conspicitur, efformant. Penis loco extremam portionem datam, quæ in coitu arrigatur, haud male conjeceris.

Arist. H.
A.

Locus ipsis fere ubique, eam Arabiæ partem quæ Austrum versus assurgit, si excipias. In Blæsia agro aquarum fere experte greges copiosi spectantur, magnumque ex his plumæ pretium. De victu non est quod dicam. Tenella arborum germinæ absomit, viridariorem herbas penitus depascitur, & vitium pampinos rodit. Trifolio, fœnugræco, lactuca, & aliis delectatur.

Locum.

Quantum ad Generationem in aqua coeunt, nec humi insistentes; à coitu aquis sese ingurgitant. Singulis maribus tres olim destinabantur fœminæ; sex hodie. Tempus admittendi aptissimum à bruma, pariunt & juvenes absque coitu, sed hypenemia. Coitus expertæ si absque eo posuerint, plura quidem, sed sterilia, minora, & minus jucunda, quam fœcunda saporis erunt. De numero & partus & ovorum inter scriptores non convenit. Ter parere scribit Columella si fœtus non excludunt. Bis Plinius, si primum fœtum gallinæ excludant. Ova plurima sedecim, paucissima septem, huic pariunt. Si quis furripiat, pariunt, dum rumpantur. Illi singulis fœtibus pariunt, primo quina, sequenti quaterna, novissimo terna. Quintilius ad duodecim, & ultra procedere ait. Carolus Stephanus, si non incubent duodecim, & singulis fœtationibus plura. Recentiorum quidam ad centum & ducenta ascendunt. Tempus pariendi aliis à Calend. Martiis ad solstitium: si bruma coiverint, Plinio post solstitium XL. prope diebus pariunt.

Partus.
Varro de
Re R. lib.
8. cap. 3.
Arist. H.
A. l. 6. c.
2.
Columel-
la de Re.
l. 8. c. 13.
Arist. H.
A. l. 5. c.
33. l. 6. c.
2. H. lib.
2. cap. 1.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 59.

riunt. Si appropinquant partus, digito tanguntur ova, quæ sunt prima parte locorum genitalium. Incubatus à foemina duntaxat absolvitur, nec recedit, donec pullos excusserit. Commodissime à Calendis Martiis ad solstitium exercetur secundum Palladium; à principio Novembris ad Decembrem exactum secundum recentiores. Pulli intra triginta dierum spacium excluduntur, intra viginti quinque, si dies tepidiores sunt.

Arist. H. A. l. 6. c. 6.

Plin. H. N. l. 10. cap. 59. Vox. Vocem si atiendas, παραλή & παραλή Græcis; Aratus ἀαγγαδὶς adverbio de eadem usus est. Gratitare, gignere, strepere, clangere, Latinis dicuntur.

Volatur. Raro volatum domesticæ exercent, sed pedibus valent. Mirum in hoc alite, inquit Plinius, à Morinis usque Romam pedibus venire. Fessi proferuntur ad primos, ita cæteri stipatione naturali eos propellunt.

Plin. H. N. l. 10. cap. 22.

Affectus. De Affectibus corporis pauca occurrunt. Solus ex pedestribus à cane rabido morsus, rabie non corripitur, si Nipho credendum. Laborat pituita & phtiriasi, illam pimpinella quæ in pratis nascitur avertit. Huic frequenti ablutione & sideritides usu occurrit. Pullis eorum urtica contacta mortifera; nec minus aviditas, nunc satiate nimia, nunc suamet vi; quando apprehensa radice, morfu sæpe conantes evellere, ante colla sua abrumpunt. Discordia cum Aquila, ne morte quidem interrumpitur pennæ commixtæ certent, & Anserinæ ubi Aquilinis absumuntur.

Plin. H. N. l. 10. cap. 59.

Ætas. Ætas sexaginta annos attingit, si Alberto credendum. Non dedisset fidem Cardanus, nisi carduelem tredecim annis in cavea educatam scivisset, & sylvestris anseris tam duram carnem, ut ne triduum quidem cocta emolliri posset.

Ælianus. H. A. l. 5. cap. 29.

Ingenium. Quod folia lauri ne in extrema quidem fame attingunt; rhododaphnes ne coacti quidem edunt; quod humanum longe præsentiant odorem, & auditu cum apro certant; quod se ab Anseris dejectum Falconem vidisse Scaliger scribit; vigil, cura Capitolio testata defenso, per id tempus canum silentio proditis rebus, & fama amoris, Agris dilecta forma pueri nomine Oleni & Glaucæ Ptolemæo Regi cithara canentis, quam eodem tempore & aries adamasse creditur, ingenio debetur. Potest & sapientiæ videri intertusis esse. Ita comes perpetuo adhæsisse Lacydi Philosopho dicitur, nusquam ab eo non in publico, non in balneis, non noctu non interdiu digressus. Quod semper vociferatur, improbum dixit Virgilius. Si dum adaptum festinant, jugi clamore obstrepunt, tempestas imminere dicenda est.

Mizald. de Anim. lib. 5. cap. 29.

Plin. H. N. l. 10. cap. 22.

Theophrast. de signis Tempest. Usur.

Reperere olim in cibis æstivum: Regum Ægypti mentis solus cum vitulo ap-

ponebatur. Alexander Severus festis tantum diebus ad convivium recipiebat. Ab Annibale Numidicis Gallinis præferebantur. Quod si jecur respicias, Romani eos ejusdem bonitate novere inquit Plinius. Fartilibus in magnam amplitudinem crescit: exemptum quoque lacte mulso augeatur. Nec sine causa in quæstione est, quis primus tantum bonum invenerit, Scipio Metellus vir Consularis, an M. Sestius eadem ætate Eques Romanus. Hodie in Gallia non minoris fit Anseraltis, quam Romæ olim Lupus scarus, aut Mulus. Est & Judæis ubique terrarum in deliciis. Nec damnosus interdum, hyeme & juniores in cibum cedant. Aliorum excrementitia & concoctu difficilis caro est. Tenerescunt tamen, si collo per triduum suspendantur, gravi lapide pedibus aligato. Septentrionales sale conditis, & vento siccatis, tum coctis, post æstivale solstitium vescuntur. Messalinus Cotta, quod constat, Messalæ Oratoris F. palmas pedum ex his torrere, atque patinis cum gallinaceorum cristis condire reperit.

Plin. H. A. l. 10. cap. 27.

Quantum ad Medicinam, Plumæ ex ventre tritæ & insperse, sanguinem sistunt. Lingua peculiariter ad vesicæ vitia & involuntariam mictionem facit. Sanguis utilissime inter Antitoda miscetur. Fel contusis oculis prodest, si hyssopo postea & melle inungantur. De Adipis usu vide multa in Aldrovando. Puerperæ in Bohemia butyro in cibis præparant, si aqua aurem intraverit, præcipuum est remedium. Cum iridis nostratis pulvere permixtus, & umbilico in testanucis juglandis inditus, alvum infantibus solvit. Aliud reperit Syriæ pars quæ Comagena vocatur; adipem eorum in vase æreo cum cinnamomo nive multa obrutum ac rigore gelido maceratum, ad usum præclari medicaminis, quod ab gente dicitur Comagenum. Dioscorides Commagenes non meminit. De plumarum olim usu ita Plinius. Candidorum alterum vectigal in pluma. Velluntur quibusdam locis bis anno. Rursus plumigeri vestiuntur, molliorque quæ corpori quam proxima, & è Germania laudatissima. Pretium plumæ eorum in libras denarii quini. Et inde crimina plerumque auxiliorum præfictis, à vigili itatione ad hæc aucupia dimissis cohortibus totis. Eoque deliciæ processere, ut sine hoc instrumento durare, jam ne virorum quidem cervices possint.

Schwefelfeld. in Thier-troph. Siles.

ARTICULUS II.

De Anseris Fero in genere, de Vulpansere, & Borniela ave.

Anseris sylvestris plures sunt differentiæ. Plinius Chenolopes, & quibus lautiores

Descri-
ptio.

tiores epulas Britannia non novit, *Chenerotes* ponit. Apud Albertum *cinereos*, qui propter corporis levitatem altius volant. *Grandinosos*, seu ob candorem niveos. Qui præter extremas quinque remiges pennas albi sunt. Æstate nuspiam conspiciuntur; hyeme ingruente sublimi volatu gregatim migrant: *Arborum* qui ex arboribus nasci creduntur, quibus color capitis ut Pavoni, absque crista tamen, invenies. Schwenkfeldius eos in arborum cavis, cornicum & ciconiarum nidis, ova tredecim vel quatuordecim, illaque flaventia parere scribit. Apud Oppianum *Linurgi* & *Cenchrita* reperiuntur. Gesnerus *Anseris stellati*, quem Itali *Cicum* vel *Ocam* Sternam vocant, cui magnitudo inter Anatem & Anserem, pondus leve, pectus maculis aspersum, dorsum & alæ cinerea, meminit. Scaliger in Oceano *Brasiliæ marinos*, à colore atro, qui nunquam evolent, esse prodit. De *Bassano* seu Scotico superius egimus. Descriptionem non morabimur. *Caput* fere Anatinum magis quam Anserinum. Utraque *mandibula* intus oras ferratas loco dentium obtinet. *Palatum* quibusdam denticulis acutis instar limæ est scabrum & asperrimum. *Membrana* quæ digitos connectunt in extremo ferræ instar denticulata videntur.

Locus.

Locus ipsis maxime circa paludes. In Æthiopia adeo frequentibus agminibus grassantur, ut tum morfu tum stercorebus omnia demoliantur. In Septentrione cubationis tempore, quo à meridionalibus plagis redeunt, copiosissime visuntur, circa Aprilis initium. In Bataviam, Hannoniæ, Artesiam migrationis tempore copiosissimi confluunt. Novam Hispaniam mense Decembri prætervolant. In *India* pulcherrimi conspiciuntur. Totum ipsis corpus, præter pectus & ventrem, nigrum. Oculos circulus coralli æmulus ambit. Ex minore oculorum *Cantha* linea ejusdem substantiæ & coloris extuberat, versusque collum deducitur. Inde sex septemve ramuli exigui utrinque ad medium colliusque descendentes, devaricantur.

Partur.

Coire post hyemale solstitium incipiunt, initio veris ova ad summum sedecim ponunt. Steriles evadunt, si mites reddita fuerint.

Volatur.

Migratoriæ sunt aves. Migraturæ vociferantur alte volando, forte ne quæ earum remaneat. Meridiem petunt cum Septentrio propellit; istum cum Austro, nec cessant, nisi esurie coacti. Ordo ut Gruum cum silentio literatus; nec clangunt nisi rupto ordine. Vide quæ de domesticis ex Plinio diximus. Oppianus nec Ducibus, nec somni tempore custodibus destitui scribit. Taurum montem superaturi *Aquilarum* metu lapillos rostris ad coercen-

Author
de Natura
rerum.Oppia-
nus Ix-
ent. l. 2.
c. Aldro-
vand.

dam linguam ferunt. Cilicibus id quidem tantum attribuit Plutarchus: sed feris ascribi apud Ælianum & Marcellinum legimus. Tardius adveniunt quam Grues. Vidit aliquando Gesnerus sexto Octobris permultas avolantium turbas, quæ ab Oriente in Galliam & Occidentem versus per turmas triangulas volabant.

Quantum ad *usum*, caro propter exertationem minus est excrementitia. Cruda adhuc suaviter olet. Linguae assæ bene à calculosis in cibo sumuntur.

Æl. H.
A. l. 5. c.
29.

Ufus.

ARTICULUS IV.

*De Vulpanfere, Capricalca, & Berni-
ciæ ave.*

AD Feros Anseres referri debet *Vulpanfer, Capricalca, & Branta*.

VULPANSER seu *Chenalopex* quibusdam, est avis pectore rufescens, aquatica, in cuniculorum foveis, interdum & rupium cavernis nidificans, quam Angli *Bergandram* vocant. Gesnerus an *Anser Stellatus* sit *Chenalopex* considerandum reliquit. Aldrovandus nihil certi proferre potest. Inter palmipedes quæ circa aquas versantur, ab Aristotele numeratur. Ova hypenemia quandoque parit. In pullis tendis eandem quam perdix operam collocat. Et ab Aquilæ, felis & cæterorum hostium injuriis sese defendit. In Cupediis olim apud Britannos fuisse ex Plinio superius diximus.

Arist. H.
A. l. 8. c.
3.
Æl. H.
A. l. 5. c.
30. l. 19.
c. 16. l.
11. c. 38.

De *CAPRICALCA* occurrit. Corvo paulo majorem esse ac in deliciis haberi. Tenuis transversis fuscis per colum pectus & ventrem distingui, caudam nullam habere. *BRANTA* seu *Bernicia* & *Bernichia*, Scotis *Clakguse*, Gallis *Crauant*, & Oye *Nonnete*, Isidoro *Barliata*, Alberto *Barbates*, Hollandis *Kotganfen* dicitur. Bellonius *Chenalopecem* veterum esse putat. Minor est fero *Anfere*, *Monacharum* ornatui, quæ colorem album atro superimponunt, similis. Alis & dorso coloris plumbei, cauda brevi & nigra. Anserum ferarum more volat, strepit, paludes frequentat, & segetem depopulatur. De ortu magna est inter doctos controversia. Quidam coire volunt: alii ex putridis navium rudibus; nonnulli ex pomis cujusdam arboris in insula *Pomonia* nascentibus corruptis; alii ex fructu foliis conglomeratis simili, qui cum opportuno tempore decidit in subjectam aquam, reviviscit; convertiturque in vivam, oriri existimant. Isidorus, Alexander ab Alexandro, Olaus Magnas, Hector Boëthius; Scaliger, Mejerus, Gesnerus, & alii, communi famæ adstipulantur.

Bata-

Batavi ex propria inspectione in Grönlandia Barniclas, quæ ovis incubarent, pullosque educarent sese invenisse affirmant.

CAPUT III.

De Anate.

ARTICULUS I.

De Anate in genere.

Descri-
ptio.

ANas, Græcis antiquis *νάνα* vel *νάνα*, recentioribus *χάνα* vel *παριζάνα*, vel Pappos, avis est apud nos notissima. Dorsum ipsi & rostrum lata, pedes cartilaginosis membranis intersepimentibus, amplius; crura breviter crassa, & retroversus disposita, ut in natatione valentius instantes; aquas propellere possent. Gulam habent amplam; linguam pleræque interius asperiusculis utrinque eminentiis dentatam & quasi plumatam: Musculos circa corporis superficiem separatos, interiores albos: quod si exteriores liveant, quod vi frigoris fieri videtur, bonam securam ætatem rustici apud Helvetios conjiciunt.

Locus.

Aquis tum ut earum frigiditate congenitam intemperiem, quæ calida est, contemperent; tum ut pabulum quoque naturæ suæ & palato conveniens, illic quærerent, gaudent, inque iis maximam temporis partem versantur.

Vitus.

In cibo herbarum aquaticarum radicibus & seminibus, vermibus, & animalium aquaticorum ovis, lenticula inprimis palustri, quam Crescentiensis Anatinam, alii Pavarinam vocant, delectantur. Sunt qui pisciculis & limo vesci, nec à venenatis abstinere, quod Scaligero placet, volunt.

Scaliger
in Theo-
phras.
de caus.
plantar. l.
2.
Partur.

Quantum ad *Generationem* tantæ sunt, Authori de natura rerum, salacitatis, ut plures mares solam foeminam certatim coeundo, occidant. Mense Martio & in sequente concumbunt. *Pariunt* juxta aquas & rigua; pulli exclusi statim recondita quadam natura aquam prosequuntur; & mox ut ovum exeunt, tanta agilitate vigent, ut etiam si matrem mori vel alienari contigerit, sine nutrice vivant. Super omnia autem est earum ovis subditis Gallinæ atque exclusis admiratio; primo non plane agnoscens foetum, mox incertos incubitus sollicitè convocantis; postremo lamenta circa piscinæ stagna, mergentibus se pullis natura ducit.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 55.

Vox.

Vocem Anatum Author philomelæ per tetrinire exprimit. Scaliger quiratricem appellat. Foeminæ crassior est, maris acutior.

Incessus.

Lente ob crurum brevitatem *incedunt*, ad natandum potius apti.

Ingenium ipsis cum Anseribus fere commune. Aquilarum quomodo declinaro soleant ictus Ælianus describit. Merguntur dum involant, & sub aquis natando, ex alio loco extra aquam eminent. Cum sese aquis mergunt, plumas; cum pennas rostro purgant, diuque & multum alas excutunt, ventos spondere Theophrastus, Ælianus, & Plinius tradunt. Ventris & intestinalium in bubus dolorem, visu natantium Anatum levare, eandem majore profectu mulos & equinum genus conspectu suo sanare, Columellæ & Vegetio placet.

Ingenium.

Æl. H. A.
l. 5. c. 33.

Theoph.
de signis
ventor.

Æl. H. A.
l. 7. c. 7.
Plin. H.
N. l. 18.
cap. 25.
Columel-
la R. R. l.
6. c. 7.

Ufus.
Plutarch.
in Cato-
ne.

Ufus in cibis notus est. Cato Censorinus agrotis etiam teste Plutarcho præscribi jussit; duram, concoctu difficilem, nec laudati succi esse, apud Hippocratem, Galenum, & alios legere est. Alii Anserinæ præferunt. Alexander Benedictus in peste damnavit. Fracastorius lue venerea laborantibus prohibuit. Pectus & cervicem laudat Martialis, cætera danda coquo.

Usum in Medicina superius etiam attigimus. Mithridates Ponti Rex solitus earum sanguinem miscere medicamentis quæ digerendis venenis valent; ipse talium medelarum usu ab intestinalis epularum insidiis cavebat. Idem, sanguinem à cerebro defluentem infusus sistit. Adeps per Clysterem injectus dolorem sedat colicum, & emplastro ad pleuritidem apud Myrepsum immiscetur. Fimum, Villanovanus utiliter moribus venenatis imponi scribit. Chineses adeo numerosa agmina alunt, ut sæpe xxx. excedant, his in evellendis noxiis oryzae herbis utuntur. Quæ Campofulgus, de Anate cum tredecim pullis, mense Decembri, festo Nicolai, in Gallia prope urbem Redonensem, templum tempore Missæ ingrediente, & aram circumeunte, ac unum pullum ibidem relincente (nescitur quo is se recipiat,) scribit, an fidem mereantur, penes Lectorem judicium esto.

Gel.
Noct. At-
ticar. lib.
17. c. 16.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 6.

ARTICULUS II.

De Anate Domestica, Indica, Lybica,
& Cairina.

ANAS DOMESTICA Græcis *νάνα* *domestica*, Arato *παριζάνα*, interdum alba, aliquando cinerea, sæpe compositi ex utriusque coloris invenitur. Inter marem & foeminam hoc est discriminis, quod ille plumas in Uropygio versus caput surrectas habeat. Quod tam acutam & magnam vocem edit, & tam diu caput sub aqua tenet, asperæ arteriæ debetur, qua bifariam in pulmones devaricatur, vesicam quandam duram & con-

concavam, quæ ubi major apparet, dextrorsum vergit, habet. Famis aliquando & pestis præfagæ domesticæ, mansuetudinis oblitæ, Sylvas cum Gallinis, Anseribus, & Pavonibus petiisse dicuntur.

ANATIS INDICÆ tres descriptiones habentur. *Primæ* caput quod auctum plumis, in summitate cristam plumeam candidam per totam colli longitudinem, quam cum excandescit, erigit, gerit, sanguinis instar rubescit. Totum *collum*, callosa & incisuris distincta caro est. *Rostrum* totum cæruleum. Collum, qua corpori jungitur, circulo plumeo nigro, rara pluma alba, maculosa, per ima angustiore, per summa latiore, nitescit: *Extremæ* alæ atque cauda cum splendore ut in Cantharidibus vilescunt. *Fœmina* non ita variegatur, marialioquin similis. *Alterius* caput albicabat. *Rostrum*, crurac auda, & alarum longissimæ pennæ atri coloris erant. Collum supremum angusta linea nigra ambiebat. In *Tertia* nihil singulare apparet, tuberculum rubrum rotundum si exceperis, quod posteriori rostri parti & cruribus infidet. Id ipsi cum Anate maritima Rondelerii; cujus rostrum & crura rosæ sylvestris colore rubent, caput non sine viridibus maculis, nigricat; commune est.

NB. De anatibus Indicis vide etiam *Mantissam*. Num. 10.

LYBICA ut à Bellonio describitur, media est inter Anatem & Anserem magnitudine. *Rostrum* habet breve, latum, & in extremo aduncum. In capite inter duos nasi foramina *tuberculum* cerasi instar rubidum. Tempora sine plumis, cute corium rubrum præ se ferente. Genitale sanguinis instar rubrum, tam magnum, ut digitu unius crassitiem, quatuor vel quinque longitudinem æquet. Vocem interruptam tanquam male affectos pulmones haberet. Quam Aldrovandus describit, rostrum denticulatum habebat, toto corpore nigrescens, pectore duntaxat paulo albicante. Scaliger Indicam vocat; & nullam emittere vocem; ova, quæ unicoloria, fusca, rotunda pene sunt, si ad solem despicias, eandem in summo nigredinem, quæ in earum rostris est, habere, adjicit. Si duas nostrates singulis maribus destinaveris, magnum numerum ovorum pariunt. Sed pulligeniti nullam sobolem procreabunt, si Augustino Gallo credibus.

Anatem CAIRINAM & marem & fœminam descripsit Aldrovandus. Mas qui fœmellæ major, habet rostrum qua capiti conjungitur valde crassum & tuberosum, in hamum tandem acutum & curvum deficiens, nigricans fere, sed prope finem rubidum; caput atrum & cirratum; guttur

sub rostro punctulis subcandidis interstitum. Corpus totum fere atrum. Crura breviora sed robustiora. Fœminæ rostrum erat minus tuberosum, qua capite connectitur, linea partim alba, partim rubra satislata distinctum. Macula illa, quæ in maris rostro rubra, cinerei coloris erat, cui nonnihil rubri admixtum, &c.

ARTICULUS III.

De Anatibus feris in genere, & in specie de *Querquedula*.

ANatum Ferarum multæ sunt differentie. Nam ut de illis taceam, de quibus acturi sumus, sunt in Insula S. Johannis in America albissimæ, capite rubeo. In Ancyra aliæ quæ voce cornuum sonitum imitantur, libertatis ita amantes, ut per totum etiam triennium in corte nutritæ, si occasio detur, erumpant. Cæterum latirostris omnibus corneus quasi in extremitate unguis est, quo cibos apprehendunt; *denticulum* loco striæ circa rostrum asperiusculæ, *membrane* pedum in extremo ferratæ.

Videbis ipsas passim, in septentrionalibus tanta copia, ut fere cunctas aquas operire videantur: in iis tamen inprimis, quibus subterraneæ venæ calidam exhalationem subministrant, quas apertas circulari & obliquo natatu servare conantur; si vehementia frigoris vincantur, vastum mare pro statione petunt. Migratorias esse, & ad Xanthum fluvium adversus corvos pugnare, quidam credunt. Hyemis tempore aut in ripis fluviorum aut piscinarum aggeribus, aut paludum frutetis latere, aut sylvarum propinqua, hortorumque præsidia petere, verisimilius esse existimo. Sane omni alicubi tempore conspiciuntur. Que in Tugurino lacu versantur, sæpe ad vicinum fluvium Silum, transvolant. Quia minus ibidem à lupis & vulpibus læduntur.

Si frequentes & conglobatas ferri animadverteris, quanquam coelo sereno, imminet expectabis pluviam; si alas in continente concutiunt, ventum instare existimes.

Præcipuæ ex illis sunt *QUERQUEDULÆ*, quæ *Rosces* & *Phasces* dicuntur, quæque in Minores & Majores dividuntur. MINORES quæ Querquedula proprie dicuntur, Anatibus sunt minores, rostro, pedibus, & cætera similes. Gula ipsis alba atris notata punctis; venter candidus, alæ in cæsis viridantes; pedes cum membranis nigris cinerei. Vivis ventre deplumato in colica malum ad se trahere Abdomini appositas, experientia docuit. Species plures apud Aldrovandum invenies, ex quibus *Japonica* priores quæ ad scapulam sunt

Martyr.
de ut. O.
ceanil. 1.

Locus.
Olaus
Magnus
H. Sept.
l. 19. c. 6.

Præsa-
gium.

Schwëk-
feld. in
Avenario
Siles.

sunt pennæ, rosei obsoleti coloris, sed maculis semilunaribus nigris notatæ erant. Sequentes partim albæ partim virides conspiciantur; omnium longissimæ cæruleo vegetissimo decorabantur colore.

Ad has *ANAS circa*, *Kernell* circa Argentoratum dicta, *Querquedula cristata*, referuntur. *Circia* mergulo paulo major est, corpore fusco, rostro latiusculo. Calculis & seminibus herbarum aquaticarum victitat. *Kernell*, habet Rostrum Indici coloris, caput rufum, punctis albis respersum, verticem nigrum, gulam albam, alas cinereas transversis duabus lineis albis distinctas. Pectus rufum, crura fusca. *Cristata* quam Bellonius Colymbim vocat, corpus est rotundum viriditate gemans; occiput Onocrotali insiar cristatum, oculi ære polito splendidiore, sub quibus juxta rictum lata utrinque visitur macula. Crura brevia, pedes lati, pectus cum capite & collo nigrum, venter plumbeus.

BOSCADES MAJORES sunt aspectu cinereæ: Mas in collo radiantes quasi Pavonis pennas colore ex viridi & cæruleo composito habet, torquem circa collum album, & in alis versus ventrem colore splendente sunt, vel *Minores*, quibus caput viride, rostrum subflavum, venter ex albo cinereus & varie maculosus, crura rubentia, Aristophani forte *ἁγροκοίτης* dictæ: vel *Majores*, quæ coloribus cum illis magna ex parte conveniunt, & Stertentem quod rostro fundum fodientes victum perscrutantur, dicuntur. Amant glandes & avenam. Congeneres ipsis *Anates* à victu *Gramineæ* seu *Junceæ*, *Schmitentem* dictæ, rostro & pedibus nigris, corporis colore dilutiore. Quam Bellonius *Anatem Torquatam* esse credit, & *ἁγροκοίτης* Aristophanis, mediæ est inter Anserem & Anatem magnitudinis, moribus Anserinis, sed voce magis obscura, quæ ex ovis à rusticis inventis & Gallinæ subjectis prodidit, dicit, illam Gesnerus Picam marinam esse, pedibus palmatis rubescentibus, & ad posteriora magis positis quam cæteris palmipedibus; rostro, renuiore magis latitudine se demittente, quam longiore processu se extendente, quatuor incisuris rubis à summa, duabus ab ima parte sulcata, in colore pallentis ochræ, esse asserit.

ARTICULUS IV.

De aliis Anatum ferarum speciebus.

PRÆTER Boscades, sunt & inter Anatum ferarum genera, *Glancius*, *Anas fusca*, *Muscaria*, *Platyrinchos*, *Fistularis*, *Caudacuta*, *Nigra*, *Herle Tadorne*, *Puffinus* & *Pe-*

nelope avis, de iis quorum Aldrovandus lib. xix. cap. 45. mentionem facit, taceo.

Pro *GLANCIO*, quem Athenæus ab oculorum colore ita dici, & Anate minorem esse scribit, Morillanem nobis Gallicum Bellonius obtrudit. Cujus rostrum in margine ferræ instar incisum est. Collum circulus quidam coloris albicantis cingit. Caput totum ad mediam colli regionem ferrugineo saturato ornatur. Linguam habet adeo carnosam, ut prope radicem gemina videatur. Nullum fel, jecur in duos distinctum lobos, quorum unus ventriculo incumbit, intestinis alter. *Victitat* seminibus herbarum, quæ in ripis nascuntur, astacis tenellis, limacibus, mellepedibus aquaticis & aliis. Congenerem ipsi eam, quæ Gallis un Tiers, dicit, medio inter Morillonem & Anatem marem colore.

FUSCA à colore dicitur. A media magnitudine, quidam *MEDIAM* dixere. Gesnerus eandem cum Rothalsæ, unde Erythrocephali quoque nomen meruit, & veterum Penelope, quod similiter *ἁγροκοίτης*, & *ἁγροκοίτης* sit, hoc est collo puniceo & vario, facit. Triplicem ejus descriptionem apud Aldrovandum invenies. Fœminæ caput non rubet, sed maculas aliquas flavas habet.

MUSCARIARUM (dicuntur ita quod muscas capiant) tria sunt genera. *Unum* quod laminam rostri superiorem habet plane croceam, dentes utrinque serratos, membranaceos flexiles, eminentes. Colorem plumarum per totum corpus varium. Helvetiis Muggrate. *Alterum* corpore magno, coloris elegantissimi in lacu Podamico circa Constantiam visitur. Murente & Mossente à palustri cœno vocantur. *Tertium* Miscenis Pillente dicitur, rostro longo, molli & cinereo. Musci fuscis suspensio gradu ingrediens insidiatur, & vocem noctu lamentati similem edit.

PLATYRYNCHI seu Latî rostræ in plura genera disperguntur. Sunt qui rostrum clypeorum instar convexum & longum nigricans habent. Et quia inter volandum alis suis ita perstrepunt, ut sonus crepitaculorum representetur, *Schelenten* dicuntur. Quibusdam qui *Taschenmaul* Helvetis, inferiorem rostri laminam superiorem ita ut tota intra eam includatur, subire, dentes ab utraque rostri parte molles, flexiles, rectos, & omnium longissimos esse, adjicit Gesnerus, sunt quibus idem duplo fere quam in cæteris latius habetur: idque in mare nigrum, in fœmella modo flavescens modo maculis varium visitur. Dantur & *platyrrynchi pedibus rubris*: & *alii rostro nigro & plano*, quorum descriptiones apud Aldrovandum habentur. Pertinet ad eos, *Clangula* cujus mas secundum oculos, qui pulchri sunt, utrinque maculam

Bellon. apud Aldrov.
Ornith.
l. 19. c. 38.

Gesner. in Ornith.

Bellon. in Hist. Avium.

albam, caput magnum, & in nigro viridans habet; foemina & virore & macula destituitur. *Fuligula* à fuligineo totius corporis colore ita dicta, cujus rostrum breviusculum latumque, linea alba, alas prope finem transversim secat. *Cirrhata*, Volente à corpulentia, gallinae magnitudine, cujus mas apicem in vertice gerit nigris pennarum cirrhis conditum, prope quem pennae utrinque ex nigro virent.

FISTULARIS, à sono acutioris quem fistulae modo emittit denominata, rostrum habet colore isatidis, circa unguem ductus quasi fila nigros, collum nigro rubroque varium, tergum partim plumbeum, partim rubris nigrisque pennis temperatum. In Foemellis nihil tale cernitur.

CAUDACUTÆ rostrum superne nigrum, à lateribus isatidis dilutae imitatur colorem. In foemella cum maculis nigris cinereum. in alis pennae infimae transversim albae; mediae in nigro gemmantes, viridi, & damasceno, extremae nonnullae flavicantes, quae foemellae denegatae sunt.

NIGRA à corporis colore ita dicitur. Linea alba per ejus alarum longitudinem excurrit. Rostrum nigro luteo & rubro distinguitur. Pedes rubeunt.

HERLE, ut Galli vocant, rostrum habet rotundum & in extremo recurvum, rubrum, utrinque striatum, colorem mali aurantii, Linguam ferratam, alas candidas, pedes rubeos. Gesnerus eum inter Mergos relegat.

LA TARDONE corpus totum esset candidum, nisi alae superius nigrescerent, ubi & linea rubra utrinque conspicitur. Rostrum habet breve, in superna parte rubicundum, à lateribus utrinque versus narium foramina macula nigra notatum, extremitate in aliam unguis instar desinens. Crura paulo altiora. Torquem, qui pectus ambit rubrum, cum tota ventriculi regio candicet.

PUFFINUS avis est marina, colore fusca; pennis caret, sed plumis tantum ceu lanugine quadam vestitur. Itaque subvolare non potest. Si quando ocyus locus mutare instituit; alarum, pedumque extremitate nixus, aquas celeriter quasi prorepens praeterlegit. Alga & cochleis victitat. Sale conditur & tempore quadragesimae editur in Anglia.

PENELOPEN avem Anati similem, magnitudine columbae, scholiastes Aristophanis facit. Jon *φεναια*, id est, phoeniceae coloris collum habentem ponit. Gesnerus illam esse putat, quam Germani *Kotthalf*; Bellonius Canne à la teste rousse vocat. Capite est rubro, gutture & pectore

nigro, reliquo corporis colore plumbeo; rostro, cruribus & pedibus fuscis. Marem descripsit Aldrovandus exacte, quem vide.

CAPUT IV.

De Fulica, Cotta, & Rallo Italarum.

FULICA, quam quidam Phænen, quæ ossifraga est, esse credunt; quidam ex veteribus, ut Cicero, Erodion, nonnulli Cephphum Aristotelis; alii nec forte male *didux*, cum à fuligine ita dicatur, putant, quæque Kiranidi Phalaris, Alberto Mergus niger, & pullus quaticus dicitur, avis est magnitudine Gallinae, colore per totum corpus nigro, in collo & capite nigerrimo, collo oblongo, syncipite glabro figura ovali, alba pellicula, figura cristae gallinae respondente, intesto, specie calvitii. Digitis pedum membranae nigrae latae, sed divulsae adhaerent, & utrinque aut ab altera saltem parte secantur. Internodia membranarum semicirculos fere constituunt. Recta pedibus incedit, velociterque currit. Lingua quam Gallinae mollior, ungues grandiusculi ac nigri. Alae ad reliqui corporis convexum incurvatae. Ventriculo *lien* adhaeret, una ex parte gracilis & tenuis, altera vero in extremo crassior, atque soleae equi instar inflexus, dimidia juglandis latitudine. Lobo *hepatis* dextro folliculus fellis auricularis digiti magnitudine annectitur. *Pulmones* costis adhaerent. *Intestinum* rectum appendicibus utrinque singulis palmi longitudine, extremo sursum reflexo, instructum invenies, si illud in superna parte aspexeris. Ova intus formata & lumbis annexa jam inde ab hyeme etiam obtinent. Nullum *sexus* discrimen, ut in cæteris avibus agnoscitur. Sunt tamen aliae aliis interdum in ventre colore magis spadiceo.

Locus palustribus & stagnantibus delectatur. Maro marinas appellavit. Herbis & quovis seminum genere vescitur.

Nidulatur humi, & ova magnitudine ovorum Gallinaceorum aestate ponit. Cum per serenitatem relictis paludibus in sicco ludunt, vapores ab aquis ad imbriferam nubem erigendam, sursum attolli sagaciter odorantur, & ventos praesagiunt, ut apud Virgilium legimus. Procellas voce testari, Cicero author est. Obscurus quidam, dum alas quatit, aquam; dum se submergunt, simulque alas quatit, ventem praedicare tradit.

Genus illud quod *Marcol* Frisiis audit, cadaveribus pascitur. Ova inter arundines parit; quibus ab incolis, uno relicto, ablatis,

De la Cerdasus per Virgil. Georgic l. 1. Descriptio.

Bellen. apud Aldrov. l. 19. c. 13.

Locus & Virtus.

Partura

Arat. in Phænon. Virgil. Georg. l. 1. Cicero in Progn.

tis, & nido perforato, reversa alia & alia, fraudes nescia ponit, donec effæta exhaustur.

Quam parisienses *Diabolum marinum* vocant, colore est tam exquisito nigro, ut penicillo inductus esse videatur, albam capitis maculam latiore quam Fulica habet, crura ad se attrahit.

COTTA Anglorum avis est. Fulica paulo minor, forma & colore similis. Rostrum tuberculo quodam rubeo insignitur, crura rubent, nulla syncipitis conspicitur macula. Urinando ad maris usque fundum, alga, limo, gramine, parvisque

cochleis nutritur: piscibus abstinet. Negant eam diutius posse volare, quam pedis cavo hausta, priusquam volet, aqua, retineatur.

RALLUS Italogum in eo à Fulica differt, quod rostrum habeat nigrum, plus albi in alis & circa oculos coloris, crura subviridia, calvitium nullum, membranas inter digitos non ita dissectas. Mœstris rure non procul Venetiis distante magnis capitur expensis. A famulis, qui venaticorum canum vice cothurnis induti per aquas errant, fustibus exturbantur. Hinc præda Falconum insidiis fiunt.



HISTORIÆ NATURALIS

DE

AVIBUS:

LIBER V.

De Avibus Aquaticis, Fissipedibus.

TITULUS I.

De Aquaticis Fissipedibus Carnivoris.

CAPUT I.

De Ciconia.

Descri-
tio.

Iconia Græcis *πικωνία*, & *πικωνίς* quibusdam *κίονα*, & *κίονα*, avis est apud nos notissima, pennis albis & nigris, cruribus albis, rostro Gruino subrubro & crasso. Tempore Plinii affirmabatur lin-

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.Aldro.
Ornith.
l. 20. c. 1.
Locus.

guam non habere, habere, illamque subrubram & brevissimam notum est. Degebant quoque olim in Italia, nunc nullas esse opinatur Aldrovandus.

In Fiderate agro, nec nidum fecisse apud Plinium legimus, qui pariter easdem amœnum arbusculo locum in Transpadana Italia non permeare, sicuti nec octavum citra lapidem ab eo, refert. Sed & in Britannia ignotas esse audivimus, creditumque vulgo nonnisi in liberis regnis versari. Migratoriam esse avem certum est, sed quonam è loco venirent, aut quo se referrent, in compertum antiquiserat. Ex longinquo venire non dubium, eodem quo Grues modo, illas hyemis, has æstatis advenas. Extractus ex quodam prope Metim in Lotharingia lacu junctarum globus, quæ thermis excalefactæ revixerunt, si Campofulgoso credimus. Sed & ex Lario lacu eductus (simul rostra in ano inserta habebant) & rite eodem restitutas modo, Gaudentius Merula author est. Bello-nius in Ægyptum in Æthiopiam avolare scribit. Septembrique & Octobri mense totam Ægypti planiciem occupare, oculatus testis affirmat. (Cum circa Abydum, inquit, essem, vicesimo quarto die

Campoful.
Memorab. l.
1.

Augusti, ingentem ciconiarum vim conspexi, quæ ad tria vel quatuor millia accedere videbantur. Volabant illæ à Russia & Tartaria, & Hellespontum agmine decussato transversum trajiciebant. Et cum supra Tenedum insulam essent. Longo per anfractus tractu se convertebant, donec in circulum omnes collegerentur. Inde priusquam longius à faucibus Propontidis pergerent, in minores aliquot turmas supra viginti se distribuebant, & se invicem versus meridiem sequebantur.) Abituræ congregantur in loco certo, comitatæque sic, ut nulla suigeneris relinquatur, nisi captiva aut serva, ceu lege, prædicta die recedunt. Nemo vidit agmen discedentium, cum discessurum appareat: nec venire, sed venisse. (De incolis ubi moraturæ sunt, intellige) utrumque nocturnis sit temporibus. Et quamvis ultra citrave provolent, nunquam tamen advenisse usquam nisi noctu existimantur. Pythomes comen vocant in Asia patentibus campis, ubi congregatæ inter se commurmurant: eam quæ novissimo advenit lacerant, atque ita abeunt. Notatum post Idus Augusti non temere visas ibi.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.

Vescuntur ranis, anguibus & piscibus, bis in ejus ventriculo dissecto aviculæ ossa reperit Schwenkfeldius. Bufonem non nisi summa fame gustant. Hinc nocere iis, omnibus quidem locis nefas ducunt, sed in Thessalia vel maxime, ubi serpentium immanis copia est, quos dum escandi gratia insectantur, regionibus Thessalibus plurimum mali detrahunt. Capitale itaque occidisse, eademque legibus poena quæ in homicidam.

Videtur.

Solin. in
Polyhist.Plin. H.
N. l. 10.
cap. 22.

Nidulavi in agro Varro innuit. In summis urbium tectis, ipsis etiam fumariis, certum

Partus.

certum est, nec dubium aridarum aliquando arborum summitates sectari. Primo adventu veteres nidos repetunt, salvos à foribus repurgant, tempestate laesos instaurant & constabiliunt. In iis duntaxat Veneri indulgent. *Ova*, triginta non amplius diebus, foeminam quatuor Anserinorum tum magnitudine tum colore similes ponere, eaque quamprimum variatis utrumque plumis Fovere Encomiastes author est. Incubatus spatio mensis tempestate benigna absolvitur, & tam impense nidos fovent, ut incubitus assidue plumas exuant. Tam flagranti amore foetus prosequuntur, ut in incendio Delfensi, cum subtrahere non possent, cum iisdem alis contactis interire, quam deferere maluerint.

Solin.
cap. 41.

Vox.

Vox earum est apud quosdam *glotterare*. Quia sonus ille ex duabus rostri partibus ad instar crotali vel crepitaculi, quod ex duplici aëra lamina, vel duobus ossiculis se invicem collidentibus inter se colisis fit, Crotalistris à P. Syro vocatur.

Volatus.

Nunquam Austro flante volant, dum feruntur, pedibus cursum moderantur, porrectisque in caudam que brevior illis contigit pedibus, per aëra contendunt. *Dormientes* uni tantum pedi innituntur, & caput humero alteri imponunt.

Affectus
& ingenium.

Æl.H.A.
Paul.
Diacon.

Cum Cornicibus, Aquilis, Mergis & Vespertilionibus inimicitias gerere proditum à quibusdam Præfagam esse avem docuere exempla. Pressa obsidione ab Attila Aquileja, urbem cum pullis deseruit. Inde augurium ab oppugnante sumptum est, & urbs in potestatem redacta. Cum tempestas imminet, utroque pede innixa, pennas tristior infundit, rostrum in pectus condit, & vultum eo unde tempestas ingruit obvertit. Ex earum cum carnivoris in Lycia conflictu de proventu judicatur annuo. Si penes has victoria, pecora feliciter succedunt. Si illæ palmam abstulere, frugum fertilitas præfagitur. Quod vulnera origano sanant, & Platoni foliis vespertilionis à nidis arcent, quod rostro cum alvus non dedit, excrementa ejiciunt, quod denique lapidem lychniten, serpentum averruncam nido imponunt, ut apud Philostratum legimus; ingenio debetur. Lapis in mulieris Tarentinæ sinum coniectus, quod ex Eliano & Oppiano habemus; & recens Zingiberis radix Vesaliensi hospiti allata, in gratitudinis exempla ibunt.

Æl.H.A.
l. 6. c. 47.

Philos.
Strat. in
vic Apol-
lon.

Æl.H.A.
l. 8. c. 22.

Gesner. in
Ornith.

Ælian.
H. A. l. 8.
cap. 20.

Ciconiam foeminam adulterii, postquam hospes prohibuisset aquam, compertam, à maritis aliis disceptam: Alcinoën in Cræone Thessaliæ foeminam, quæ thorum Domini absentis polluerat, excecata, tanquam castitatis testimonia legimus. Ciconiarum legum apud Aristophanem nomen, inde originem traxit, quod in senectute parentes & alunt, & humeris gestant.

Edubantur ante Plinii ævum, id Semporius Rufus, quem Horatius tangit, instituisse creditur. Nemo jam attigisse velit, seu quod venenatis vescatur, seu quod flavam, duram, & mali succi carnem habeat.

Usum in Medicina si attendas, Assam si semel anno edatur ab arthritide præservare nugatur Kiranides. Nec capras, nec oves peste infici quidam scribunt, si ex ventriculo aqua intrito singulis cochleare unum infuderis. Fimum ex aqua haustum nonnullorum fide comitialibus prodesse prodidit Dioscorides, refutavit Galenus, cum adipe suillo in Emplastri formam mixtam inveteratam podagram tollere, apud Aëtium & Myrepsum invenies.

Datur & Ciconia, quæ quod dorsum totum nigrum si eminus spectetur, habeat, NIGRA dicitur. Reperitur in montanis & sylvosis Helvetiæ locis. Forma & magnitudine à Ciconiis proprie dictis non differt, qua parte alæ junguntur corpori, oblonga cavitas retrorsum extensa cernitur. Intestina sunt involuta. In femore dissecto nervi quatuordecim magnitudine differentes, quorum duo latissimi in genu partem cartilagineam se inferebant utrinque. Vescitur scarabeis & locustis. Nidulatur in abietibus. In cibo ferinum & piscosum præ se fert odorem. In festatur pediculis.

Diosco-
rid.
Parab. l.
1. Galen.
simp. lib.
10. c. 17.
Aëtius.
lib. 12.
cap. 44.

Gesner. in
Ornith.

C A P U T II.

De Ibide & Phanicoptero.

IBIS in multis cum ciconia convenit, *vere* *maxime ibi*. In duplici autem sunt apud Ægyptios differentia. *Candida*, quæ ad Pelusium tantum non sunt, cum in tota habeantur Ægypto; & *Nigra*, quas Pelusium duntaxat alit, tota Ægyptus abhorret. Capite ista est corvi aquatici, rostro mucronato, incurvo, fornicato, rubente, & qua capiti jungitur, pollicis crassitiem superante. Abdito in pennas quæ sub pectore, capite & collo, cordis signaturam exprimit. Simulac nata est, duas æque drachmas ponderat, ut Plutarchus prodidit. Majus pro corporis proportionem cor habere, Gaudentius Merula author est. *Intestinum* Nonaginta sex cubitorum, ex aliena fide apud Ælianum legimus. Comprimitur id defectione lunæ, donec aucto rursus splendore fulgeat.

Ægypto est peculiaris, mortem sibi fame exportata consciscit. Nullum non Alexandria trivium iis plenum est. Dicuntur tamen & circa Licham in extrema Aphrica, ubi lacus quidem dulcis est conspici. Quam se in Alpibus vidisse referente Plinio. M. Egnatius Calvinus prodidit, Nigram fuisse suspicamur.

Descri-
ptio.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 30.
Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 27.

Merula?
l. 3. Me-
morib.
cap. 30.
Ælian.
H. A. l.
10.
cap. 29.
Locus.
Ælian. l.
cap.

Vetus.

Cicero.

l. 1. de

Nat.

Deorum.

Æl. l. 10.

cap. 29.

Ammian.

Marcel-

lin. Me-

la inde-

script.

orb. Jo-

seph.

Antiq. l.

2. c. 10.

Arist. de

Gener. l.

3. c. 6.

Parsus.

Vescuntur serpentibus, bruchis, locustis. Illos volucres ex vastitate Lybiæ ventito Aphrico insectas interficiunt atque consumunt. Nec hoc intra Ægypti fines tantum. Sagacitate enim excitatæ, venturis in procinctum eunt universæ, & priusquam terminos proprios eternum malum vastet, in aëre occurrant catervis pestilentibus. Ibi agmen devorant universum. Moses in Æthiopas per loca serpentibus infesta iturus, papyraceis inclusas secum tulit.

Quantum ad *Generationem*, Ægyptii ore coire & parere nugabantur. Nidificant in palmis metufelium. Ex ovo Basiliscus nasci putatur, translato ex venenatis cibis in illud seminio. Vita ipsis longissima adeo ut Hermopolis sacerdotes immortalem jactaverint. Penna, Crocodilus, scribente Æliano, & Ovo immobilis redditur; sed omne serpentum genus ad ejus contactum rigere, Philes tradidit. More lautarum mulierum tardo & molli gradu ingreditur; cubile petitura se purgat. Rostri aduncitate per eam partem se prodiit (falsugine autem utitur) qua reddi ciborum onera maxime salubre est.

Plin. H.

N. lib. 8.

cap. 27.

PHANICOPTERUM qui à calore ita dicitur, Lingulacum seu Gloridem Aristotelis esse credit Bellonius, si Scaligeri descriptionem sequimur. Rostrium neque rectum planæ, sed neque aduncum habet. Seythici arcus potius partem imitatur. Cinereum colorem nobilitant alarum puniceæ pennæ, à quibus & nomen. Earum quoque nonnihil ad caudam, quam hujus generis longi cruris levibus brevissimam habet, ac veluti præcisam. Sub rostri initium ad colli commissuram sinus turgidus est qualis in Ardeola. Crura pedesque alis habet concolores, sed adeo breves, ut cum in homine Galenus agnoverit longissimos, huic omnium quæ nota sunt nobis animalium, brevissimos attribuire potuerit. Magnitudo ei Ardeæ. Flammant nomen in Provincia. Habet & alterius iconem Aldrovandus, qui ex cinereo phæniceo & albo mistis coloribus spectabatur. Superior mandibula, in medio notabili extuberantia insignis, inferiore longior erat, & in acutissimam aciem definebat.

Locus.

Helioc.

lib. 6.

De loco nihil fere certi. Nil avem discretissime facit Heliocorus; ex Flandria hyeme ad Narbonensis Gallie provinciam volare scribit Gesnerus; in mediis stagnis marinis degere, piscibus & cochleis vesci, reliquit Rondeletius.

Usus.

Apitium linguam Phænicopteri præcipui esse saporis pronunciasse, Plinius Auctor est. Heliogabalum vero palatinis suis ingentes dapes extis & cerebellis illorum refertas exhibuisse, tradidit Lampridius.

Lamprid.
in Helio-
gab.

CAPUT III.

De Ardeis in genere.

Uam Latini Ardeam seu ab ardendo, quod finis ejus exurat, seu quasi arduam propter arduos volatus vocant, illam Græci *ἰπιδίον*, seu quod *ἰπιδίον*, id est sanguinem coitu exudet; seu quasi *ἰπιδίον* avem Amori & Veneri propriam, dixere.

Genera ipsarum tria Aristoteles & Plinius faciunt, *Leucum*, *Pellum*, & *Asteriam*; Scalliger album, nigrum & subfulvum, quod Pigrum Vasconia vocat. Aldrovandus innumera observavit. Corpus ipsis leve, exile, macilentum. Collum longum. Rostrium longum, crassiusculum, robustum, intus cavum, in extremo acutum. Dignitatem pedum terni longi, membranis modice juncti. Quartus retro pro calce similiter longus est.

Deunt numerosæ circa paludes & stagna in Bononiensi, Ferrariensi, Mantuano, & Ravennate agro; reperiuntur & in Angliæ quod ibi capitale sit eas occidere. In Gallia Ardearia instituta habentur. Pulli volandi compotes ultra citroque commean, deinde domicilia repetunt. In Insulis novi orbis quæ Ardearum dicuntur, tantam ovorum Hispani invenerunt copiam, ut multos iis currus onerarent. Ab Agricola inter eas aves numerantur, quæ calidiora loca quærunt. Confecta hyeme ad solita revertuntur.

Vescuntur piscibus & ostreis. Illos dum capiunt, solis radios ita excipiunt, ut vis ipsorum umbra refugiant. Hos cum testis devorant, quas à colore interno apertas, revomunt. Anguillas quoque integras deglutunt. Ad pedem tanquam ad illicium concurrere pisces creduntur. Si oleo ex ipsis per descensum distillato inungantur manus, pisces ita advolabunt, ut sponte capi possint. Piscatores Hirschbergenenses illicium ex farina hordei, carnis cancrorum ex chelis & caudis, placentæ lini expresso oleo parte una, vitellis ovorum tribus, pinguedine Ardeæ & olei laurini ana unc. 11. cum petrolei & Camphoræ ana drachmis duabus faciunt. Mirifice pisces illiuntur.

In coitu angi, mares etiam cum vociferatu sanguinem ex oculis profundere, nec minus ægre parere gravidas, Aristoteles, sed falso prodidit. Vidit sæpe cocentes Albertus, cruribus super dorsum feminae flexis, ita ut pedes maris ad caput feminae sint, & genua versus excrementi sedem super dorsum. Motu alarum se sustinent & semen infundunt. *Nidificant* in sylvis, locis paludosis, alnis & salicibus confitis ac fere inaccessis gregatim. Sic & ab aucupibus

Genera.
Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 18.
lib. 10. c.
60.
Scalig.
Exercit.
233.

Locus.

Vetus.

Schwefk-
feld. in
Aviar.
Siles.

Parsus.

cupibus, & à rapacibus immunes se putant. Cancros ceu fascinationis amuletum nidis suis imponunt, si Æliano credimus. Carvo adversus infestantia nidos suos animantia se munire, prodidere nonnulli.

Ælia. H. A. l. 8. c. 35.

Volatur. Arist. l. de incessu Animal.

Volant extensis retro pedibus. Ideo illis Uropygium inutile; collo contracto; tam alte, ut supra nubes transcendant, maxime cum jam futuræ imminet pluvix.

Affatus. Ælia. H. A. l. 5. c. 35.

Inimicitias cum Alauda, ovorum suorum hoste, vulpibus, cochleis & Rapacibus exercent. Sæpe cochleæ è nativis egressæ testis, in magna securitate pascuntur; Ardeæ in vacuas involant. A Falcone depressa, rostro sub alis condito ac sursum elato, irruentem excipit. Sæpe ambæ elisis interancis humi affliguntur enectæ. Accipitrem excrementis suis, quæ pennas ejus & pedes insiciunt, & exurunt, repellunt. Fertur Falcones, quod Crescentius prodidit, si sanguinem Ardeæ gustaverint, omne desiderium capiendi Grues amittere, si carnem absque sanguine, videri non teneri.

Crescent. de Agri- cul. l. 10. c. 15.

Præsa- gium. Oppian. in Ixuc- tic. Ara- tus in Phœ- nom. Plin. H. N. l. 18. c. 31. Ælia. H. A. l. 7. c. 7. Usur.

De *Præsaigiis* hoc sufficiat. Ventum vel pluvias innuere, vel cum caput pectori imponit; vel cum notas paludes deserit, & supra nubes attollitur, vel cum terra relicta multo cum clangore adfestinat; vel cum obstrepero clangore à mari ad terram avolat; vel cum in mediis arenis tristis residet.

Mensis in Gallia experuntur. Sed cum caro illarum pisculentum quiddam redo- leat, & fibrosa sit, salubris esse non potest. Quæ de rostri seu in pelle asinina fronti aligati ad somnum conciliandum, seu cum cancri felle in eadem ad vigilantis collum suspensi, ad vigilias inducendas Plinius vel Kiranides prodire, inter fabulosa re- puto.

Plin. H. N. l. 30. c. 15.

CAPUT IV.

De *Ardeis in specie.*

ARTICULUS I.

De *Ardea Cinerea.*

ARDEA cinereæ tria sunt genera, *Major*, nempe, *Minor*, & *Congener*.

ARDEA CINEREA MAJOR quæ Aristoteli Pella, seu pulla & fusca, cui superius dicta omnia fere congruunt; Rostrium habet longum, prope frontem crassum, quod ita tenue pedetentim evadit, ut tandem velut in acum aliquam magnam desinat. Capiti cinereus, cirrhus ex tenerioribus pennis insidet, qui à syncipite incipiens sursum supra oculos per verticem erigitur. Digitus posticus longiusculus est, & fere anticis longitudine æqualis.

Nidulantur in excelsis arboribus non procul à fluminibus, tam apud Anglos quam Gallos. Quia piscibus pullos nutriunt, & multi, cum ori inseruntur, in terram decidunt, idem cum pluvia à multis decidisse putantur. Franciscus I. Rex Gallorum tam cicures reddidit, ut à pastu redeuntes ad Ardearia sese reciperent.

MINOR prout à Bellonio describitur, rostrum habet nigrum, concavum; Lineam in fronte ab uno oculo ad alterum candidam. In capite & dorso pennas coloratas. Alas cinereas inter pennas verticis nigras exoriuntur candidæ exiles, aspectu jucundissimæ. Nidificat in rupibus.

CONGENER, Ardea, rostrum habet pollicis crassitudine, digiti minimi juxta nares latitudine, intus canaliculatum, inferne corneum & roseum. Plumas capitis, colli, dorsi, & superiorum alarum ex cinereo fuscescentes, extremas omnes macula ruffa notatas. Ventrem fere ex cinereo album. Crura subviridia, & pedes in digitos fissos, quos tamen divaricationis initio breviuscula membra conjungit. Ad hanc refert, quam Gesnerus describit, cui rostrum est subflavi coloris, marginibus acutis, & parte anteriore leviter dentium loco exasperatis, ferratisve. Caput & collum candida. Crista capitis è plumis nigris retrorsum tendit. Dorsum & alas cinereas. Unguem medii digiti ab altera parte denticulatum.

ARTICULUS II.

De *Ardea Alba.*

ARDEA alba, Græcis λευκοπτερος. Ciceroni Platelea, Plinio Platea, Alberto Cochlearia dicitur. *Corpus* habet instar cygni candidum. *Rostrium* nigrum pauculis notis ferrugineis superiori parte respersum, substantiæ coriaceæ duræ, cochlear referens. In quibusdam ad carneum colorem proxime accedit. *Fœminæ* superius maculis rubeis conspergitur. In maris vero rostri medio, linea quædam qualis etiam in circumferentia conspicitur, à fronte ad rostri apicem usque conspicua est; prope oculos macula cærulea, quæ in fœmina lutea est, visitur. Quædam maculis in collo & dorso pulcherrimis, colore coccineo consperguntur. *Interiora* si spectes in dissecta apud Aldrovandum fœmella, *Lien* erat exiguus, nigricans, rotundus, dextra parte, prope folliculum bilis non procul à ventriculo. *Intestina* sinuosa, uniformia, novem spithamas longa. *Cor* nullo pericardio vestitum. *Ventriculus* lævis, intus & simplex. *Ingluvici* loco pars ventriculi superiori orificio imminens, ampla capacitas. *Aspera arteria* cygneæ valde similis, licet contrario modo sita. Nam quemadmodum in

Descri- tio. Plin. H. N. l. 10. c. 40. Cic. l. 2. de Nat. Deor.

in Cygno ad sternum ascendens post descendit; ita hæc ad pulmones recta percurrens, suos flexus agit invicem oppositos. *Ossa* tibiæ aperta, medulla rubra erant plena. *Reperitur* in Gallia, Anglia, Bohemia, non tantum marinis locis, sed & palustribus. In Holandia non longe à Lugduno infinitos earum nidos vidimus.

Videtur.

Arist. H.
A. l. 9. c.
18.

Vescuntur piscibus, ranis & serpentibus, ut quidam produnt. nec vel herbas aquaticas virides, & ramenta radicum geniculata arundinum, vel intestina Gallinarum aspernantur. Facile *coquantur*, in arboribus nidulantur, & pariunt, ad quatuor foetus alunt, qui à ferini saporis cultoribus commendantur. Gesnerus sibi gustanti Anseri non dissimilem visam ait; & apud Anglos in deliciis habetur.

Huc plurimæ aliæ Ardeæ referuntur.

Gesner. in
Ornith.

I. *GARLETTA* Italarum, ut Gesnerus vocat, avis cum Ardea per omnia, colore excepto, congruens. Quam Gesnerus Ferrariæ vidit, *rostrum* habebat longum acutum; in crista capitis dorsum versus pennæ oblongæ ad duos cum dimidio dodrantes, circiter sex nascebantur, quæ aliquando magno vendebantur precio. *Pedes* nigricabant: inferius tamen subito in medio cruris, nigre color desinebat, & viridis è glauculo suberat ad extremos usque ungues. Minimus *pedis* digitus binis articulis constabat; proximus ab eo ternis, medius quaternis, ultimis quinis. Cum hac eandem illam Aldrovandus facit, quæ habebat *rostrum* supra nigrum, infra cæruleum, oblongum; caudam brevem, rariores aliquot in dorso illasque oblongas pennas, quibus pileos & galeas proceres exornant, tres in capite pinnas, breviores & coloris albi, quæ cristam efficiebant.

Aldrov.
Ornith.
l. 20. c.
14.

II. *EGRETTE* Gallorum, quæ & *Hæmatopus*, *Phœnicopus*, & *Cirris* Virgilii ut Scaligeri pater & filius adstruunt, dicitur. Omnibus fere Ardeis minor est, tota fere ex croceo, ad colorem castaneæ vergens, prone intensius, supine & super alis remissius. *Collo* brevi; *rostro* robusto, longo, acuto, bicolore; qua caput tangit viridi, vel ex viridi ad cæruleum inclinante; *cruribus* & pedibus, rubri saturati coloris; *cauda* tam exigua, ut ea prorsus carere videatur.

III. *SQUAIOTTA* Italarum. *Cauda* brevi, *pedibus* viridibus, *rostro* luteo in extremo nigricante. *Apex capitis* triginta plumis constat, quarum mediæ albæ sunt, extremæ nigrae, in tergore pinnae elegantes coloris rubicundi in suis radicibus albæ.

Congener ipsi & ista *rostro* maxime arcuato, colore prorsus leucophæo. Avis est aspectu non inveniusta. Prone ad col-

lum & pectus, quod nigris maculis, ut in Ardea deorsum descendantibus conspersum cernitur, albicat. Cætera tota est leucophæi coloris, prone remissioris, supine intensioris. *Femora* in ea, contra ac in reliquis pennis vestiuntur.

Ex Ardeis quoque albis sunt, tum ea, quæ *Garzetta bianca* dicitur, *rostro* longo gracili, acutissimo, digitis postico omnium minimo, anteriorum medio longissimo, inter oculos & rostrum maculata, tum ea quæ vertice est croceo, pedibus pro portione corporis longissimis, fuscis, albicantibus annulis circumdatis. Ungue medii digiti cæteris longiore, serrato.

ARTICULUS III.

De Ardea Asteria sive stellari.

ARDEA stellaris triplex genus est, *Mi-* *Descri-*
nus, *Majus* & *crissatum*. *MINUS* *iside*
Aristoteli, Taurus, Plinio, Botaurus, Butorius & Buttora aliis, dicitur, & quibusdam Ornocrotalus esse putatur. *Collo* est longo & mire plumoso. *Capite* nigro, corpore reliquo fusco & pallido maculis nigris densissime asperso. *Pedes* habet longissimos & inter extremos ungues medii digiti pedis unius & calcis ejusdem, spithamæ longitudo intercedit; *ungues* longissimos; & ille qui calcis vicem in avibus gerit longitudine sesquiunciam superat. Medius digitus utriusque pedis qui cæteris longior dentatus & serratus est. *Cauda* illi brevissima; *Stomachus*, quo ingluviei loco utitur, capacissimus, canino similis. *Arteria aspera* in eo tota continua est, larynx nulla, nec quod huic analogia quadam respondeat. Damnum hoc compensare voluisse Natura videtur, *canalium duorum* hinc inde in pulmones utrosque abeuntium structura. Ita enim fabricati sunt, ut annuli cartilaginei minime totum absolvant circulum, sed exteriori duntaxat parte medium; interiori, ubi aliis avibus hi circuli fissura tantummodo in longum dissecantur, membrana quædam tenuissima, alteram canalis devaticati exacte medietatem absolvens, plana & æquabilis obtenditur; quin & hemicycli lateris exterioris componentes rari admodum, interjectis subtilissimis membranis sive tunicis, ad faciliorem & majorem distentionem facti sunt, quo nempe largissimus, & hoc facili tumescere meatu conceptus aer, *rostro* in aquam inserto aliquandiu retentus, tandem per apertum & extractum, qua data porta, maximo impetu erumperet. Prolobo caret, at ejus loco amplissimum oesophagum habet.

Videtur ranis & piscibus, inprimis anguillis.

Nidum

Partur.

Nidum ex arundinibus intertextum cum ovis duodecim in lacu quodam se vidisse, ipsamque avem colore ita ad arundinem accedere, ut inter arundines sedens vix deprehendatur, reliquit Gesnerus. At eundem ex furculis in celsarum arborum ramis struere, & ita aut quatuor ova excludere, reliquit Bellonius.

Pax.
Aristot.
in Pro-
blem. f. 11.

De *Voce* diximus, cui similes illi soni dicuntur, quos *Opus* Aristoteles appellavit. Dicitur in *Ægypto* mansuescere, & adeo præclare humanam vocem intelligere, ut si quis eam servum appellaverit, vel pigrum (nugantur olim è servo in avem transiisse) indignetur. Non facile hominem refugit, eo proximo, aut arundinibus se abdit, aut aquæ immergitur.

Volatur.

Non citius *evolat*, quam prius salierit. Ubi pisces frequentes novit, adeo quieta consistit, ut planè videatur mortua: & ne colli longitudine se prodat, breve id incurvando facit. Capta stat immobilis, & venatorem apprehensurum incautum vulnerat.

MAJOR ex Pella & Stellari prognata esse creditur. Illam enim capite, pectoris maculis, alarum colore, ipsa denique magnitudine refert. Reliquarum partium colore Stellarum minorem, maculas si excipias, quæ in ea non sunt: imò pedibus adeo eandem exprimit, ut simul positas vix peritissimus etiam auceps discernat. Apicem quoque in vertice habet, ex quo duæ longiusculæ pennæ exorientes, totum caput velut galeam, colore nigro exornant. Gesnerus *Elaphin* Oppiani esse conjicit, quæ pennas in dorso varias & maculosas hinnulorum instar habet, & linguam longissimam, qua in aquam protensa, sensim ad fauces, pisces ad conspectum adnantes solet attrahere. Hanc Aldrovandus & CRISTATAM seu Cirrhatam esse opinatur.

Congener est hisce, quam idem *Ardeam Nigram* vocat, colore per totum, collo excepto, quod albo torque circumdatur, & rostro quod luteum est, nigricante, collo longo, longis *cruribus*, digitis pedum longissimis, unguibus acutis, & cauda brevi.

CAPUT V.

De quibusdam Avibus ad *Ardeas* relatis.

AD *Ardeas* refero *Falcinellum* sive *Falcatam*, & *Pugnaces*, quas Belgæ *Kemperkens* vocant. *FALCINELLUS* avis est magnitudine, & tota corporis specie *Ardeam* referens, eleganti colore, viridi fere, alicubi puniceo admixto, capite & collo fusco. Superior pars colli antè albicat, maculis nigris intercurrentibus. Ro-

strum ei oblongum tenuè & antèius *falcatum*. *Crura* oblonga, pedes fissi. Nulla magis ad ibidem accedit. *PUGNACES* quotannis immenso numero, ex Septentrione in Belgium, verno tempore sub Majum advolant, plures mares quam feminae. Hinc inter mares tanta contentio, ut sese mutuo occidant, donec cum feminis numero pares evaserint. Exclusis educatisque foetibus, una cum his unde venerant, revolant.

Octo ipsorum genera, seu formas potius descripsit, & depingi curavit Aldrovandus.

Prima *Perdicis* instar toto corpore maculis respergitur. Caput *Galeritæ* velut apice insigne est. Rostrum exile, in extremo nonnihil recurvum. Lingua longa, acuta, subatra. Caput, cervix, dorsum, alæ, venter, & femora ex luteo ad castaneæ fere colorem tendunt, & maculis, quæ in capite adeo exiguae sunt, ut exigua punctula potius videantur, respergantur. *Alteræ* cristam quoque in vertice gerit. Ventre nigricat, candicat pectore. Mentum macula nigricans ceu barba quædam exornat. In fronte albicat, in occipite, & in reliquis partibus ex albo ad fuscum vergit.

Tertia tota fere est ruffa, nigris maculis lunam æmulantibus undique excepta cer vice inspersa, apice caret. Femora & infernum *Uropygium* colore sunt bætico. Alarum pennæ majores nigræ, in fine, & ad latera fere crocæ.

Quarta colore fere cum ista convenit, nisi quod venter sit fuscus, podex albicans, alas subalbicantes maculæ multæ, magnæ, transversales, tortuosæ transcurrunt. Caput nigrum magnæ pennæ velut galeam eleganter exornant, quas proculdubio dimicatura erigit.

Quinta ejusdem fere est coloris, sed pennas eas, quas erigit dimicatura majores, candidas, & in extremitatibus suis nigras habet.

Sexte pennæ illæ sunt candidæ, color plurimum diversus. Toto enim corpore fusca est exceptis femoribus & cauda, quæ sunt colore bætico. Ante albas illas in collo surrectas, alias habet in vertice quæ minores sunt, & nigræ. Caput ex cinereo flavescit.

Septima pennis omnibus variat, viridibus, albis, rubris, amethystinis, luteis, & quod observatu dignum est, nulla earum alterius colore permiscetur.

Octavam auritam Natura fecit. Rostrum est gracili & oblongo, à capite per collum pennæ undiquaque pendent, magnitudine æquales, sed in quibus varios cernere est colores, qui velut varios torques formant, modo ferrugineos, modo rubros, modo albos. Collum habet longum, valde

P

graci-

gracile, tenue, ad latera candicans, cætera lutescens, lineolis longis undiquaque conspersum. Caput ad latera maculam miniatam magnam habet, in qua oculi siti sunt. Aures alpinis non dissimiles, crura duplo quam præcedentibus breviora. Digitum posticum admodum brevem.

CAPUT VI.

De Porphyryone, & Horione.

Dipnol.
lib. 9.
Descri-
ptio.

Porphyryon, à colore ita dicta, quam Calimachus apud Athænum à Porphyride diversam facit, quæque in agro Patavino Telamon vocatur, avis est secundum Athenæum Galli magnitudine, colore cæruleo, rostro ad caput vehementius obstricto, phœniceo, longis *cruribus*, fissis pedibus, in quibus quinque digitos habet, & maximum illum, qui medius est. Oppianus ei *cristam* in capite qualem sagittarii Persæ gestant, tribuit. Isidorus pedem unum latum ad natandum, alterum fissum ad ambulandum addit. Apud Aldrovandum duplex ejus exhibetur Icon. Prior habet rostrum crassum, acutum, purpureum, à frons ad verticem fere usque macula ejusdem coloris extenditur. Pars capitis quæ hujusmodi maculæ subjacet, & collum primum virescunt. Ex remigibus alarum pennæ, quædam in extremo albicant, quædam sunt fusæ. Reliquum totum corpus, cæruleo vergeto colore insignitur. Cauda fere caret. Digitis tantum quatuor ex purpureo subalbescens insitit. Alter rostro, *cruribus*, pedibus, & oculis descripto est similis, nisi quod ungues habet fuscios, & macula in fronte purpurea ornatur, & quod in illius capite & collo viride erat, in hac cæruleum apparet. Cæuleæ pariter sunt alæ. Reliquum caput, cervix, dorsum, pectus, vertex, & femora nigricabant. Laudatissimi sunt in Comagene. Nobiliorem vero Baleares insulæ mittunt. Fert eas & ultima Syria, ut Diodorus prodidit. Athenæus avem Lybicam, Diis ejus regionis sacram indigitat.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 47.

Athen.
Dipnol.
l. 9.
Videtur.

Athen.
Dipnol.
lib. 9.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 46.
Aristot.
H. A.
l. 8. c. 6.

Vescitur piscibus, & in occulto quidem, ne à quoquam videatur. Non prius autem cibum capit, quam se lavaverit; nec prius se vel in pulverem vel in lavationem dat, quam in ambulationem veniens certa spacia confecerit. Solu hæc mersu bibit, ex proprio genere omnem cibum aqua subinde tingens, deinde pede ad rostrum veluti manu afferens. Polemon apud Athenæum de cibo quem apprehendit, paucas buccellas decerpere, scribit, si *repulsi* ita fumendum est. Alvi excrementum, ut & reliquæ aves longi augustique colli, humidi, quam cæteræ solent, rejicere, Aristoteles autor est.

Ad *volatum* dirigendum loco Uropygii, quod parum latum habet, pedes protendit; & quia spectaculo saltationis adeo delectatur, ut & ipsa ad saltandum membra componat, haud difficulter eo modo capitur, si Oppiano credimus.

Volatur.

Oppian.
in Ixent.
tic.
Afficius.

Incredibilia fere de ejus castitate Authores. Nunquam in conspectu hominum conjugi misceri, & ne virum quidem uxori concumbentem videri posse, retulit Oppianus. Tantum sensum obtinere stupri, ut si id deprehenderit, vitam seu laqueo seu inedia finiat, apud Ælianum, Athenæum, & Tzetzem legimus. Quædam cum Gallo tantam societatem contraxerat, ut cum iste occideretur, convictore privata, inedia sibi mortem conscisceret.

Æl. H. A.
l. 5. c. 28.
Athen.
Dipnol. l.
c. Tzetz.
Chil. 9.

Nunquam cibi gratia apposita esse videtur. Magnificis ædibus, ut Ælianus habet, pro ludicra est delectatione.

Usus.

Cognata est ipsi *HORION*, avis amatorio affectu flagrans, magnitudine Herodii, *cruribus* rubris, oculis cæruleis, sic à Musica instructa, ut naturæ munere suavissime canat.

Æl. H. A.
l. 17. c. 22.

CAPUT VII.

De Helorio, Limosa Venetorum. Barge Gallorum, & Hamatopode Bellonii.

HELORIUS Creci, de quo postea, Athen. l. 9. similis esse traditur. Clearchus cum apud Athenæum cum Trochilo & Carulo inter *marulivæ*, seu aves, quæ cælo sereno in littore pasci solent, meminit.

LIMOSA Venetorum, quæ ad lacum Verbanum Giraldel, circa Neapolim Leverina, Germanis, *ein Meerhuhn* dicitur, Arquæ majori, de qua in sequentibus, per dorsum est similis, maculis varia, tota parte prona, capite & collo præsertim.

BARGE Gallorum, quam *Ægocephalum* Bellonius facit, minor est Helorio, colore vero non absimilis, rostro breviori, recto. *Liene* omnino caret. *Feljecori* simul & ventri adhærere conspectum est, quod de *Ægocéphalo* Aristoteles scripsit. *Vitellum* in saluginosis paludibus frequenter, rarius in remotis à mari, ubique noctu, quaritat. *Vocem* hircorum & caprarum edit. Hominis accessum non fert. Et apud Gallos in deliciis habetur.

Arist. H.
A. l. 2.
cap. 15.

HAMATOPUS Bellonii, rara est in Gallicis littoribus avis. Corpore Ardeolæ, alis Lati, capite, collo, & cauda extrema nigris. Interiore alarum parte & ventre albis. Gula magna admodum ampla & robusta. Binos habet digitos simul cohærentes, interior vero ab aliis sejunctus est. *Calcar* in pedis calce, ut reliquæ aquaticæ aves, non habet.

Bellon.
in obs. l.
l. cap. 11.

bet. *Pedes* sunt molles & delicatuli. *Digit*i breves, unguæ ut in Tardis fornicatæ.

CAPUT VIII.

De Alcyone.

HAlcyon & Alcedo sic dicta, Avis Possideonis nonnullis, Ceycis quibusdam, modernis Græcis mas, & dicitur. Paucissimis, inter mediterraneos inprimis, nota est. Omnium rarissimum est, inquit Aristoteles, vidisse Alcyonem, & fere circa Virgiliarum occasum, brumamque apparet, & ubi primum per portum non plus quam navem circumvolat, statim abit, & nusquam præterea visitur. Duo hujus Avis genera, *Mutum*, & *Vocale*, ex Aristotele quidam faciunt, sed falso. enim apud eum sunt intelligendæ. Turnerus & illam inter Alcyones reposuit, quæ Sturno paulo minor, corpus totum nigrum habet, ventrem album, caudam breviusculam, rostrum alcedone paulo brevius, quæque ante volatum, Alcedonis more nutat, in volatu gemit. *Alcetraces* quoque, quæ in Peruvia marinis lupis, carabis, piscibusque insidiantur, & quia cadaveribus delectantur, adeo sunt lethales, ut ad earum usum necessitate redacti, non secus quam aconito toxicove victi intereant, inter earumdem referuntur genera.

Forma. *Formam* si attendas, non multo amplior est Passere, colore cæruleo & luteo, & subpurpureo mixto insignis. Tale corpus totum & alæ. Tum *colli* partes non seorsum positæ coloribus. *Rostrum* subluteum, longum, tenue. Mari adeo delectatur, ut pectus aquis aspergat, cauda in terra sicca imposita: non spernit tamen & aquas dulces.

Vitus. *Vitit*at piscibus, quos ex alto se in mare recta immittens capit.

Partus. *Quantum ad Generationem* senes in coitu extingui creduntur. Alæ, ut apud Plinium legimus, fecundant bruma, pariunt ova quinque, qui dies Alcyonides vocantur, placido mari per eos & navigabili. Siculo maxime: (hinc Siculi maris cives Scaliger vocavit) In reliquis partibus est quidem mitius pelagus, Siculum utique tractabile. Faciunt autem septem ante brumam diebus, totidemque postea sternitur mare Halcyonum fœturæ, unde nomen hi dies traxere. Nec tamen de tempore omnes assentiuntur. Columella enim in octavum Calendas Martii, quibus in Atlantico mari summa notatur tranquillitas eos conjicit. Sed & in numero dierum dissentitur. Quinque statuit Simonides & Aristoteles, septem Samius Demagoras, novem Philochorus, quatuordecim alii. De maris tum temporis tranquillitate, & ventorum

quiete molliore cælo, apud Theocritum, Ovidium, Plautum, Plutarchum, Ælianum, & alios passim invenies. *Nidi* locum Ambrosius arenam; alii littus, quidam undas ipsas, hinc Statio, domus fluctivaga; Silio Italico nidus natans dicitur, ponunt. Saxo cuidam proxime aquam, ita ut aquæ videatur, agglutinari, credibilis est. Rostrum autem suo nec alio nidum fingit Halcedo, imo navis instar fabricat, opus everti mergique fluctibus nescium. Componit devincitque confrens invicem acus pisciculi spinas, ac rectis aliis ceu stamini transversas alias veluti subtegmen implicat; mox confertim recurvat, & in orbem reducit; sic coopat denique, ut opus navigii specie turbatum, ac qualo propemodum piscatorio simile evadat. Perfectum littori, quo fluctus extremi pertingunt, applicat. Hic unda molliter feriens, nondum firma satis hiantiaque, procellarum verbere deprehensa, sarcire docet. Solide vero & jam coherentia constringit, figitque, adeo, ut nec saxo, nec ferro dissolvi diffringive facile queant. Magna cum primis admiratione ostiolum dignum est, sic modificatum figuratumque, ut hanc unam subeuntem recipiat, cæcum cæteris & abditum, & aliud prorsus nihil admittens, ne undarum quidem quicquam.

Mores ejus exinde metiare, quod maritum adeo diligit, ut non uno aliquo stato tempore, sed per rotum annum consuetudine ejus utatur; senem & ad sectandum tardum, gestat & nutrit, nunquam relinquens solum. Cum ad tepidum solem penas in littore expendunt, pluviam denotare dicuntur. Virgilius hoc inter cætera serenitatis signa numerat.

CAPUT IX.

De Ispida, & Rousserolle Gallorum.

ISpida, quam nonnulli Alcyonem veterum vel simpliciter vel fluviatilem esse putant, Genus Martini piscator, à nonnullis aliis Italis Avis Paradysi, sed & Piscator Regis dicitur. *Rostrum* ei est nigrum, rectum, in summo acutum, tres digitos longum. *Caput* pronum cum cervice viridis coloris transversis lineis ex albo cæruleis distinctum. Virent & alæ, sed interior pars plumarum ad purpureum ferè violaceo dilutum colorem tendit, asperguntur lucidis aliquot punctis. Per medium dorsum à principio usque ad finem caudæ, plumæ sunt cærulei coloris diluti, & ad album inclinantis adeo splendide, ut oculos etiam visu immorantes offendant. *Pedes* breves, rubicundi, in quibus duo longiores digiti ad mediam usque partem connexi,

Plut. de felert. animal.

Mores. Plut. l. c.

Mizald. Ephem. l. 1. Virgil. Georg. l. 5.

Descriptio.

postea finduntur. *Lingua* perbrevis est latiuscula ac subrubens. *Oesophagus* valde oblongus. *Ventriculus* in imo corpore juxta anum. *Adeps* ruffa.

Est & aliud *Ispidæ* genus, quod ex India adfertur. Regulum magnitudine vix superans. Rostro oblongo, tenui, nigro, reliquo corpore ad caudam ceruleo, viridi & nigro. Cauda pro corporis proportionem longiuscula tota fere nigra. Pedum constitutione cum superiore eadem. Solitaria est, & in agro Bononiensi, Helvetia, & alibi media hyeme circa ripas glacie concretas reperitur.

Locus & Parit. In arena vel scopulo aliquo juxta aquam nidificat. Nidum forma rotundum, eminente in angulum foramine exiguo, ex floribus arundinum, mollem construere ajunt. Pullos interdum novem in nido uno reperiri.

Ufus. Pellis ejus cum pennis asservata peculiari vi adversus *lineas* pollere creditur. Non tangi fulgure domum, in qua ejus nidus suspensus fuerit, nugantur quidam. Moschi instar cum pullis suis suaviter olere, *Tragus* prodidit. Suspensam pennas quotannis tanquam in vivo corpore mutare, falsum comperit *Aldrovandus*.

ROUSSEROLLE seu *Roucherole* Gallorum, *Aleyone* vocalis est *Bellonio*. Rostrium habet ferratum *Picæ* Græcæ seu *Colurioni* simile. Plumæ capitis longiores cristæ quondam speciem præ se ferunt. *Nidum* si quis inversum aspiciat adarcem primo intuitu referre videtur. Sena ut plurimum ova parit, & quinque sexve excludit pullos. *Cantu* adeo valet, ut omnibus canorus à *Bellonio* præferatur, tamque in eo indefessa, ut dies & noctes absumat; tam seria, ut vacillet, totoque corpore tremat. Inter reliquas voces has inprimis proferre videtur *Toro tret*, *fuis*, *huy*, *tret*. *Aristophanes* ejus cantum expressisse creditur.

TITULUS II.

De Aquaticis fissipedibus Insectivoris.

CAPUT I.

De Arquata, Crece & Totano.

A *Arquatum* ab arcuato rostro si dictam, *Numenium* veterum, qui forte à *Neomenia*, quod rostri figura arcum lunæ recens à novilunio crescentis in cornua representet, ita dicitur, esse *Gesnerus* credit; *Bellonius* *Elorium* *Aristotelis* conjicit. Rostrium habet circiter octo digitos longum, post tres digitos flecti deorsum incipiens, nigrum. Pennas coloris fusci varias & maculosas, ex quibus maxime fulgent instar serici villosi, quæ inter alas & dor-

sum sunt, in medio nigrae, in circuitu per interstitia subruffæ. *Digitus* sunt fissi, sed aliquatenus membrana conjuncti, quæ etiam utrinque juxta digitos descendit, & inferiorem digitorum partem dilatat. *Lingua* pro tanta rostri longitudine brevissima est, & sagittæ effigiem representat. *Femina* est aliquanto minor, & maculæ illæ, quibus totum fere corpus respergitur, in hac magis fuscescent. Omnium vermium genere vescitur, eosque in plantis quibusque quærit. Turmatim volant, voa parvum quanta *Gallinæ*, quaterna, pallidæ, mense *Aprili*. Carnem habent siccam, solidam, leporinæ similem. In *Gallia* in deliciis habentur.

C R E X, quæ & *aspix*, quænam sit avis, vix à recentioribus observatum est. *Athenæus* *Helorio* similem esse dicit; *Aristoteles* vero crura alba habere, & posteriorem digitorum qui pro calce est minutum asserit. *Herodotus* ei *Ibidis* nigrae magnitudinem; *Scholias* *Aristophanis* rostrum acutum & ferratum assignat. *Bellonius* avem circa *Nilum* visam, cruribus longis, rostro longo & nigro, nigris quoque tibiis & toto capite: collo tergore & pectore candidis, quæ è terra victum petit, & in muscas debacchatur, & cum volat magnum edit strepitum, *Crece* veterem esse opinatur. Pugnat cum *Galgulo*, & *Merula*, *Vireone*, eorumque pullis nocet. *Aristoteles* esse *Philes* annotavit.

Arist. lib. 9. c. 1.

TOTANUS avis est aquatica, capite nigricante, præsertim antè; posterius enim & magis anteriori parte rufum est. Vertex cinereus, ut & reliqua pars prona. Alarum ima pars alba, extima nigra est, reliquæ plumæ in ambicu variæ (circiter) sunt & albicantes. Cauda palmi longitudine transversis lineis albis, nigrisque depicta, ut etiam limosæ. Penna super caudam ad medium dorsum usque albicant. Pars omnis supina alba est: in collo tamen, & superiore alarum ambitu nigricantes maculæ visuntur. Totius avis longitudo ab extremo (rostro) ad pedis extremum extensæ, dodrantem cum duobus palmis æquat. Rostri longitudo circiter tres digitos, colli totidem. Fidipes est, verum duo majores digiti pedis aliquousque membrana junguntur ut & limosæ. Pedes duos palmos longi ex pallido rubent, unguiculis muniti nigris. Corpus avis ea fere crassitie est, qua *Mergulus* noster rostri acuti.

CAPUT II.

De Calidri Bellonii, Nigra, & Himantopode Plinii.

C *Alidris* *Bellonii* avicula est columbæ magnitudine, cruribus proceris adeo, ut

ut equo insidere videatur, unde Chevalier, id est, equitem nominarunt. Plumis optime instructa est, ideoque longe minus carnis obtrinet, quam appareat. *Rostrum* & crura rubra, longa, manifesto sane argumento aquaticam esse volucem. Superior rostri pars nigricat, venter albus est: *caput*, *collum*, & *pennæ* sub alis, & *uropygio* cinereæ: quare Aristoteli *Calidrim* dici arbitramur, cujus meminit his verbis: *Quin etiam Calidris*, cui cinereus color distinctus variet. Radices plumarum sicut in *Bistarda*, & la *Cane petiere* (*Tetracem* interpretatur) rubent, sic in hac nigrae sunt. In temporibus utrinque maculae sunt binæ, nigrae, quæ ceu umbram præbent superciliis, quæ & ipsa alba macula insignia sunt. Priores digitos membrana conjungit, ut in *pica marina*, (*Pie de mer*) *Digitus* posticus admodum exiguus. *Alæ*, ut in *pluvialium* corpori junguntur, magnitudine corpori respondent. Tam parva itaque ales proceris cruribus insistens, alacriter, hilariterque incedit, prata stagnaque & ripas frequentat, & plerumque aquam ingreditur ad femora usque. Caro nihil ferinum redolet, sed delicatum quid, & aromaticum. In sui generis avibus, in deliciis habetur.

NIGRAM à rubra differre certum est. Nigrae enim ab ipso ortu crura & rostrum atra sunt, excepta superiori rostri parte, quæ subrubra est. Color item huic nigrior: quin amputatis capite, cruribus, atque alis, reliquis corporis partibus *Palumbis* colorem inter cinereum, & nigrum videbitur referre. Sin sermo sit de *Calidribus*, quæ jam pennas mutarunt, distinguendusque color ab iis, quæ prioribus etiamnum vestiuntur, asseremus nos *Pluvialem* aliquando observasse in autumno nigram, adeo ut post mutationem plumarum eum non agnosceremus: nihilominus tam huic, quam alteri pedes nigri sunt. Foetus earum mense Aprili prostant, maculis undique *Ortygometrae* instar (*d'un Ras le*) conspersi, cum alioqui hyeme tantum appareant. Ad hanc reducit *Aldrovandus Gambettam* Italici dictam: Quæ est capite, collo & pectore cinereis & maculis fuscis plurimis, undique respersa. Alarum pennæ rectrices nigricant, corporis cinereæ sunt, in dorso & alis ad rufum vergentes, venter candidus est. *Rostrum* nigrum: oculorum iridem ex luteo subviridem niger circulus ambit. Pedes exluteto rutili, quo colore potissimum à nigra *Calidri Bellonii* discrepat. *HIMANTOPUS* à flexitate crurum ita dicta, quam alii *Hæmotopoda*, à rubedine pedum vocant, à Gelleno ita describitur. *Rostrum* digitos fere quatuor longum est, *caput* parvum, *collum* digitorum quinque, reliquum corpus,

quod leve, & gracile est, instar avium palustrium fere, quas *Gallinulas* aquaticas vocamus, digitorum sex, cauda quatuor, crura quindecim. Color rostri nigricat, in capite, & collo prono fuscus: dorso, & alis niger, paucis subviridi admixto, si diligentius intuearis, cauda cinerea. Partes prone omnes, & latera quoque albi coloris sunt. *Crura* sanguinea digitis duntaxat ternis, sicut in *Bistarda*, *Oenade Rondeletii*, *Morinello Gaii*, *Struthiocamelo*, *Pluviali*, & *Cane Petiere Bellonii*, ejusdemque *Pica marina*: quorum medius longiusculus, brevissimus interior: jungitur autem medius cum exteriori brevissima membranula, tanquam palmipedum. *Poplitum* cavitas insignis est, articulo tam flexili, ut in scelecto etiam tibia ab femur tota reflectatur. Videtur sane non cursu tantum valere, sed etiam volatu hæc avis: quoniam oblongæ ejus alæ sunt, ita ut longissimæ earum pennæ caudam, seu *uropygium*, duobus, aut amplius digitis excedant. *Oppianus* hoc novum in eis, quod maxilla inferiore fixa, superior solum in ipsis moveatur notavit, sed in descripto, nihil ab aliarum avium natura variat.

CAPUT III.

De Gallinulis Aquaticis in genere & in specie, de quibusdam.

Gallinulae aquaticæ hoc commune habent, quod eis sit corpus gracile & adductum. *Caput* parvum, pennæ variae *Rostrum* longum, modice inflexum, nigricans. *Ventrem* & supinam eam capitis partem, quæ inter rostrum & collum est candida. *Crura* oblonga, *digitum*, qui pro calce est admodum brevem; quædam etiam eo carent. *Plumas* ad media tantum crura descendentes. *Vermiculis* potius quam piscibus vescuntur; quamvis & ex his minimos comedant. Circa initia autumnii in *Helvetiam* adveniunt; hyemis exitu denuo avolant. *Aucupium* earum mane ante solis exortum, sit, aut vespere, quo incipiente tam sublimi volatu evehuntur, ut non amplius appareant. Ob carnem suavem & teneram, in deliciis mensarum habentur. *Species* ipsarum sunt *Chloropus*, *Erythropus*, *Ralla Anglorum*, *Rhodopus*, *Phæopus*, *Ochropus*, *Atelampus*, *Poliopus*, *Erythra*, *Oebra*, *Hypoleucus*, *Gallinula serica*, & *Scolopax*.

CHLOROPUS est triplex, *Major*, quarum altera *Fulicam* & magnitudine & corporis figura refert, tota rostro longiusculo, sursum parumper elevato; altera Italici, *porzana* dicta, collo & capite nigricantibus, Dorso cum superiore alarum parte castaneo; inferiore ventre toto albedo, femoribus plumis cinereis usque ad genua coop-

pertis. *Tertia* Gefneri, quam Glottidem Aristotelis esse credit, colore est fusco, cruribus viridibus. Vocem instar fistulæ argutam edit. Germanis *Glutt* dicitur. Prælongam exerit linguam unde ei nomen. Hanc initio blandita peregrinatione (cum Coturnicibus) avidè profectam, pœnitentia in volatu cum labore scilicet subit. Reverti inconcitam piget, & sequi, nec unquam plus uno die pergit, in proximo hospitio deserit.

ERYTHROPUS vel est *Major*, vel *Minor*, de utraque nihil singulare occurrit. *RALLAM* Anglorum aquaticam intellige, cujus rostrum & crura sunt rubra; plumæ undique magis cinereæ, quamque male volare, sed egregie pugnacem esse, Bellonius prodidit. *Montana* & sylvestris in Ericeto degere solet. Ortygetram esse credidit Bellonius; *Perdicem* rusticam Gefnerus.

RHODOPUS nihil habet singulare. Sed ne de aliis præter descriptionem, quam apud Aldrovandum & Gefnerum invenies, quicquam. In Ochropode *maiore* septem distincti colores apparent, nec digitus posterior pedis visitur. Mediolingua in oblongum mucronem definit. *Minori* collum est quam cæteris altius.

ERYTHRA, quam Germani *Matkerca* vocant, vocem & clamorem edit, quo sonus fullonum lanas ferientium repræsentatur.

OCCHRA à totius fere corporis colore subviridi, sed sordido & obscuro si dicta est.

De *HYPOLEUCO*, quam Germani *Fpsterlin* appellant, nihil habeo quod dicam.

SERICA ideo dicitur, quod color ater in ea holoserici instar splendeat.

CAPUT IV.

De Scolopace seu Perdice rustica, Rusticula sylvatica, Scolopace seu Gallinagine minori.

SCOLOPAX avis, à rostri figura, quod instar pali longum & rectum habet ita dicta (palum Græce *εὐρύστη* dicunt) Volaterrano Aristotelis Alektoris, sed falso, vulgo Græcorum *Εὐρύστη*. Herodiano Sylvestris *Perdix*, Martiali *Perdix rustica*, nonnullis *Rusticula major*, Alberto quod suavis & pinguis sit *Ficedula*, plerisque populis *Beccassa*, Germanis *Schnepf* & *Kietschnepf* dicitur. Similes ipsi quasdam in Frisia aves facit Gefnerus. Ea, quæ Vulp nominatur vulgo, rostro & pennis colore illi confertur, sed magnitudine vincit. Item Grutte dicta rostro. Magnitudine est. Gallinæ, colore *Attagenis*, ut Aristoteles

Arist. H. A. l. 9. c. 26.

prodidit. *Rostris*, quod longum, antè asperiusculum, pars superior ultra inferiorem extenditur. *Linguam* habet gracilem, oblongam, nervosam. *Crura* fere rosei coloris. *Felle* carere vulgo creditur, quod apud Bellonium legimus.

Nullibi non invenitur, in Gallia, Suecia, Helvetia. Non ubique tamen iisdem in locis, nec semper æstate in altis Pyrenæi, Helvetiæ, Sabaudia & Arvernæ montium jugis degit. Hyeme cibi gratia ad campos & sylvas cæduas descendit. Circa Brixiam principio Autumni, in Helvetia mense Octobri capitur. A Germania inferiore æstate recedit, in fine Autumni redit. Aquas inprimis tepidas, loca pulverulenta & humida, sepes, & hortos amat. *Cibus* ipsi vermes. Spiritu in cava immisso, unde sonus etiam procul audiat, eos extrahere, proditum à nonnullis. Visi, qui ex farina fagotritici cum aridis ficibus pascebantur. *Volatus* debilitatem cursus velocitate natura compensant. Cum proximam sibi aucupes existimant, longe recessisse inveniunt. *Oculis* est obtusioribus, quamvis grandes habeat, odoratu potius cibum quærere creditur. Homine delectari ab Aristotele relictum.

Locus.

Arist. H. A. l. 9. c. 26.

Habetur inter ciborum delicias, sed postponitur *Perdici*. Aliqui deplumatum exenteratumque in furno torrent & cremant, remedio calculosis futurum.

Gefner. in Ornithol.

RUSTICULA SYLVATICA. *Rusticula* palustri majore, major est. Gallinam enim fere æquat. Colore saturiore, rostro minus longo, ventre albicante, cruribus cinereis. Tendiculis seu laqueis capitur.

SCOLOPAX seu *Gallinago minor*, & *Scolopax minor*, Molliceps Aristotelis quibusdam, dorsum habet ejusdem fere cum *Alauda* coloris. *Rostrum* canaliculatum, maculosum, in extremo nigrum, quatuor digitos æquat longitudine. Alæ extensæ maculam albam in extremitatibus ostendunt. Quæ ab Aldrovando exhibetur, *rostrum* habebat palmi longitudine canaliculatum, latiusculum, nigrum, tuberculis quibusdam asperum, in extremo acutum, cujus superior pars inferiorem aliquantulum longitudine excedebat. *Lingua* longitudine rostro fere par erat canaliculata, in extremo cuspide acus instar acuminata.

Frequentem in locis mediterraneis Gallia videt, nec Batavi eadem carent. In Germaniam circa æquinoctium vernum venit, si Longolio credimus. Nec à marginibus stagnorum & lacuum recedere idem affirmat. *Migratoriam* inde colligas. In dissectæ ventriculo initio Decembris, scarabæos, & vermes albicantes, tenues, ob-

longos,

longos, quales farinarios appellant, invenit Gesnerus. Neque incaveis, neque in aviaro vivere dignatur. Vocem auditam (hæc talis est, ut si quis cultrum per sertam ducat) pluvie prognosticon quidam faciunt.

CAPUT V.

De Gallinula terrestri, & alia Chloropode.

HUc & Gallinulam terrestrem & aliam Chloropodem. Fulicæ similem Bellonii refero. Illa circa Verbanum lacum Polle, à Germanis aucupibus Hoggeschar / quod turmatim juxta sepes decurrant, dicitur. Gesnerus Rallum terrenum, seu Thochilum terrestrem dicit. Corpore est brevi, crasso. Digitis pro sua magnitudine longissimis. Postremus ad anteriores circiter dimidiam longitudinem obtine. Vocem ejus dicunt asperam ger, ger, ger serpentum instar, Capta sciuri vocem, si fides referentibus imitatur. Angli ceu lautissimam inter segetes capiunt.

De GALLINULA CHLOROPODE alia, ita Bellonius. Necessario plane Gallinulam aquaticam (la Poulette d'au) à Fulica, & Fulica majori (de la Porle, & Macroule) separavimus: quoniam aquæ non innatat, nec palmipes est. Pullettæ autem aquaticæ, sive Gallinulæ nomen à similitudine cum jam dicta impositum est, etsi multo minor sit major tamen Ralla, adeo ut de utraque hac particeps esse videatur. Aucupes, quibus ostendimus, cum Fulicæ similem esse cernerent, magnitudine tantum differre aiebant hancque ad perfectam necdum ætatem pervenisse. Unde nos diligentius peculiare aliquas notas discriminantes investigavimus. In quibus ea præcipue fere est, quod hæc Gallinula pedibus sit viridibus, & non ab similibus Botauri, neque etiam iraplanis, nec denique lata membrana conjunctis, ut in Fulica. Cauda etiam Gallinulæ longior est. Mucula frontis item minor. Colore Rallo similis quidem, sed ad Fulicæ colorem tendit: quare ex primo aspectu Rallum esse putabam, sed cum diligentius inspicere, animadverti, palpebras oculorum candidas esse, quod Rallo non convenit, sed neque Fulicæ. Caudæ binæ pennæ albæ sunt, utrinque nempe una. Sub pectore nonnihil ad cyaneum, sive cæruleum vergit. Dorsum colore est castaneæ intenso. Alæ item aliis nigriores sunt, & alarum plicas albas habent, & aliam insuper albam lineam in minori ala, quam primæ plumæ ejus per calami longitudinem constituant. Idem cibus reperitur in ejus ventriculo, qui in Rallo, & Fulica. Os sterni &

ischion, sive os coxendicis ab aliis avibus habet diversa, etiam à Fulica. Caro Gallinulæ coctu facilis, ac tenera est, ossa fractu facilia, ingluvies ampla, jecur quoque fragile, cæterum intestina, & relique partes internæ, ut in Fulica. Assa ejusdem cum Fulica saporis est. Nidificat, & pullos alit, & educat, ut Rallus.

Huc pertinet illa quam CORRIRAM vocant, avis rostro pro corporis proportionem crasso, pectore, & alis supernis albicantibus, cætera nigra.

Nec PORZANA MINOR, quæ Mediolani Girardina à Gallinularum aquaticarum censu eximenda est. Rostrium habet breve, qua caput tangi flavum, & in extremitate nigrum, pedes atros, ventrem album, pectus, dorsum, alas, colore fumido, albis maculis consperso, alarum pennas majores nigras, &c.

CAPUT VI.

De Trynga.

DE Trynga, Juncone, & Cinclo hoc duntaxat Aristoteles prodidit, quod caudam motitent, lacus & flumina petant. Trynga Turdo æquiparetur, Cinculus & Junco minores sint. Hinc factum, ut diversæ Aves pro iis ab Authoribus obtrudantur, haud paucae tanquam congeneres referantur ad easdem. Turnerus eam totam pulchram, ea parte, quæ podicem tegit, quæque candida est, excepta, facit. Breves volatus facere, in stagnis quæ nobilium ædes obducunt, & in piscinis apud Anglos prærunque degere, si quando periclitatur, ad arundinetæ densiora confugere, adjicit. Germani quidam Tryngam nigram totam, sidi pedem, candido vertice ad rostrum usque demisso, pedibus altis & nigris, caudam continue motitantem, & loca aquosa incolentem ponunt, ad eandem Gesnerus avem quæ Claronæ Wasser Trostla // id est, Turdus aquaticus nominatur, rostro brevi, cruribus altis, sidi pedem, refert. Aldrovandus aliquot ad Tryngam reducit, quas alii ad Cinculum retulere.

Prima ei ex illis quas Chiarolos & Chiaroncellos in Italia vocant, Turdo magnitudine par. Rostro duos digitos longo, nigro, in extremo nonnihil recurvo. Lingua acuta paris fere longitudinis. Capite superno, collo, dorso. & alis fuscis ad colorem castaneæ nonnihil vergentibus, oculorum ambitu, mento, pectore, ventre & Uropygio albicantibus. Digitis tribus anterioribus ad medium fere palmum exportectis, posteriore brevissimo. Inter anticorum extimum & medium membranula est divaricationis initio, quæ inter alios desideratur.

Alteræ

Altera Pinarolo dicta, huic fere per omnia similis, nisi quod rostrum habeat nigrius, aliquando brevius, cujus superna pars infernam longitudine nonnihil excedit.

Tertiam Bellonius ad Gallinaginem minorem refert, Gesnerus Samethünle esse putat, uterque Cinculum Aristotelis esse opinatur. Corpulentia est fere eadem cum Scolopace minore simpliciter dicto: plumarum tamen colore differunt, & rostro, quod utrinque quidem tenue, longum & acutum est; præcedentis tamen in extremo maculatum est, & crassiusculum. Maculis albis in capite & universo collo maculatur. Pectus vero, totusque venter, femora & plumæ sub cauda nivem candore æquant. Ripas potissimum & loca, quæ bono aliquo odore recreant, & moschum redolent, frequentat.

Quartum inter cinclos reposuit Turnerus. Alauda est major, colore in tergo nigro, ventre albo, tibiis longis. Vere circa fluminum ripas *clamosa* est. Breves & crebros facit volatus. Anglis Hirundo Aquatica dicitur.

Quinta ex Motacillis credita, *Pilwendergen* & *Pilwegichen* Germanis in Misnia vocatur. Palmipes quidem non est, sed rostrum longum, molle, cinereum: crura alta habet. Duo ipsius sunt genera, *Majus* & *Minus*. Hoc magnitudine Merulæ, tergo cinereo, ventre albo.

Locut. Flumina colit, & in ripis vagatur. In arenis nidificat & incubat, interdum inter saxa ova ponit. Supra octo pullos uno tempore non excludit.

Victus. Muscis, vermibus, & pisciculis vescitur. *Ingressus.* Domi, pane & malorum vescitur putaminibus. Singulari in muscis capiendis arte pollet. Lento enim suspensoque gradu accedens, rostro elevato primum designat, tum captam prædam deglutit. Manusfacta conclavia ab araneis purgat.

Vox. Vocem noctu lacrymantis instar edit.

Quarta congenerem Merulam aquaticam Gesnerus facit, quam Germani *Bachamsel* / Lucarni & circa Verbanum lacum Folot vel Folum d'acqua nominant: nec non cornicem aquaticam, Sturno paulo minorem, quam in Alcyone describit.

CAPUT VII.

De Iuncione & Cinclo.

JUNCO *χύνια* & *χύνια*, quod in juncis libenter degat, quæ Græci *χύνια* nominant, ita dicitur. Aristoteles Trynga minorem, Alaudæ amicam facit. Addit, fluvios & lacus petere, ac caudam motitare, Bellonius pro ea quandam ostendit, quæ Gallis Alouette de mer, seu Alauda ma-

rina dicitur. Est quidem hæc ejusdem cum Alauda magnitudinis, *rostro* oblongiusculo; *cruribus* nigris gracilibus & oblongiusculis, *lingua* nigra universum rostrum longitudine æquante; linea alba sub alis insignitur, & dum volat ejusdem fere est cum Galerita coloris: sed quia maritima est, nescio an pro Iuncione sumi vel possit, vel debeat. Aldrovandus aviculam, quæ Passere d'acqua vocatur pro Iuncione ponit. Passeris est magnitudine, rostro nigro candiculato, satis duro & in extremo adunco. Lingua candiculata, & qua definit bifida & duriuscula. Cauda tres digitos longa denis pennis constante. *Mas* à fœmina hoc solum differt, quod in hac colores sint magis obsoleti; in illo magis vegeti.

Congenerem facit eam, cui eadem species, rostri pedumque conformatio, & colore tantum variat. Collum pronum, & pectus albicant, sed venter totus ex cinereo ad fuscum vergit. Cætera fusca est. Turnerus dum Parum sylvestrem pro Iuncione obrudit, vehementer fallitur.

CINCEUS Græcis *αἰγῶν*, Suidæ, nisi loca sint corrupta, *αἰγῶν* & *αἰγῶν* Hesychio & Varino, quod armenta sequatur, tertia est ex illis avibus, quæ caudam motitant, & circa stagna & flumina versantur. Caudam motitare præter Aristotelem, Aristophanes in Tympanistis prodidit. Volaterranus palmipedem esse scripsit, sed falso. Suidas gracilem & nullo ferme corpore scribit. Gesnerus cum rostro recto nigro & longiusculo, ventre albo, pectore cinereo, cauda brevi ita ut eadem alarum longitudo sit, alis, dorsoque fuscis, cruribus ex ruffo fere luteis facit. Bellonius secundam Gallinaginis minoris speciem Cinculum Aristotelis esse putat. Idem Gallinaginem minimum genus, Cinculum minorem appellat. *Tertia* inquit Gallinaginis minoris species primo generi magis quam secundo similis est. Rostrum enim sicut Scolopax major, crassiusculum habet, & in extremo maculatum. Dorsum Sturno simile. Aliquibus *Deux* pour un appellatur. Duæ enim hujus generis, precio unius majoris vaneunt. Aldrovandus de ea quam exhibet, an apud mare etiam degat dubitat. Magnitudine inquit Motacillam aliquanto superat. Color totius fere corporis inter fuscum & cinereum ambigit, sed alarum pennæ majores subnigricant. Venter & femora albicant. Rostrum nigrum tenue, & longiusculum. Crura nigra, breviora & exilia.

Congeneres ipsi duas alias facit, quarum quoque Icones exhibet. Prior sub Cinceli minoris nomine describitur. Altera iisdem quidem est coloribus, sed caudam albam & li-

Aldrov.
Ornith. l.
20. c. 56.

& lineis nigris transversim secantibus ornata habet. Rostrum quoque qua capiti jungitur crassiusculum, & sensim deinde magis magisque attenuatum. Quia posteriore sui parte debilis est, suapte & per se nidum non construit, sed in alienis parit. Apud homines vivere non dedignatur. Captam maxime mitescere tradit Philosophus. Videtur in Coryis Thracum Regis convivio apud Athenæum apposita, quidem ibi extat, seu legendum offerebatur.

CAPUT VIII.

De Vannello & Cercione Ave Indica.

VANNELLUS seu quod alis instar vanni aut ventilabri commotis strepitum excitet, seu aliam ob causam ita dictus, Fulica quibusdam, Stymphalis veterum aliis, sed falso, quibusdam à voce, sive Capella, Bellonio Parrus, Parus, vel Parcus de quo apud Plinium, dicitur. Alcyoni congenerem. Gelenius facit, Pluviali Gesnerus. Candidos reperiri audit idem, nisi Lari fuerint. Sine crista, iique aliquando colore fusco, & maculis variis observati alibi. An Tremulus avis in provincia Salernitana dicta, quæ minor est Gallina, coloris fusci, alte clamans, & velocissime volans, quæque prope mare teste Villanovano versatur, & cum super terra incedit, cauda tremat, unde ipsi nomen, sit ejusdem generis, disquirendum cum Gesnero relinquo. Exactissime à Bellonio describitur. Magnitudine inquit Plaridem vix excedit. Dens admodum plumis contegitur, quæ in radicibus suis quæ corpus attigunt, omnino nigricant. Color enim alius est in parte exteriori. Avis inversa, supinaque collocata, & alis ejus extensis magna plumarum pars in ventre, & in femoribus nivei sunt candoris. Ale in superiori quoque parte nivæ, in inferiori nigricant, &c. Hepar habet magnum, in duas partes utrinque divisum. Fel in ea reperire Bellonius non potuit. Intestinum appendices habet.

Circa lacus & amnes versatur: aquas tamen non ingreditur, sed in planis & erica constitit, ut plurimum degit.

Vermibus, muscis, cicadis, bruchis, scarabæis & aliis vescitur. Albos lapillos deglutire, certum est. Æstate sola volat, hyeme gregatim, & tam frequenti numero, ut prata etiam amplissima vix totum agmen capiunt. Alis est obtusioribus, & inter volandum magnum strepitum edit.

Vocem videtur Germani & Galli per nomen ipsi inditum expressisse. Illi tūw; hi Dixhuiēt vocant.

Dum pullos fovet, ad hominem à quo nidum inquiri suspicatur proxime accedit, &

velut deditionem simulat, donec à nido abduxerit, saepe multæ unum hominem ita persequuntur, ut eo facilius à nidis abducant.

Habetur in ciborum in Gallia deliciis, & eodem quo lepus precio venditur. Adeo pinguescit, ut faginata videatur. Gesnerus boni saporis & probi, sed levis & tenuis alimenti esse comperit.

De CERCIONE quam Capellæ seu Vannello præmittere debuit, caudam enim motitat ita Ælianus. In India avis ad Sturni magnitudinem accedens, variis coloribus picta nascitur, quæ & humanam vocem effingit, & Psittacis vocalior, & majore est docilitate ac ingenio: non ramen humanum victum æquo animo sustinet, sed libertatis desiderio famem potius quam servitutem deliciis ciborum referam amplectitur. Urbes, quas Alexander in India excitavit, & Macedonibus incolendas dedit, ut Bucephala cum adjacente agro, & Cyropolis, aliæque ideo Cercionem appellant, quod similiter caudam, atque Cinclus movet.

CAPUT IX.

De Pluviali & Charadrio.

PLUVIALIS. Rhintace forte Plutarchi, quia nihil in ejus intestinis excrementi reperitur, in agro Bononiensi Pivier, Gallis Plovier, Germanis Pulvet & Pultrouss audit. Quomodo antiquis vocetur, ignorare se fatetur Bellonius.

Duo ejus genera, flavescens unum, cinereum alterum, quod Itali montanum vocant. Pulli Guillemot privatim vocantur. Illud Palumbi est magnitudine. Rostrum brevi, rotundo, nigro, acuto, & in extremo nonnihil adunco, lingua triquetra, totam inferioris rostri canalem implente, prona parte fere cornea retusa. Pennæ superne fusco albo luteoque colore ita distinguuntur, ut ferratæ appareant; cauda quoque lineis fuscis luteis interfecatur. Bostico digito caret. Inter anticos tres membranula interjicitur, major inter medium & extremum, minor inter eundem & internum. Bellonius plumas ejus lutescere scribit, seu maculis luteis respergi.

Frequens est in Gallia, in Helvetia rarissima. Bononiæ non raro in foro venditur.

Rore vitare prodidere quidam, quod in ventribus earum nihil inveniatur. Nihil falsius. Ex humidis campis vermes eruit. Scarabæos in dissecta. Invenit Bellonius. Lumbricos edere asserit idem, quia solum intestinum jejunum habet. Ideo in eo nihil invenitur. Migratoria est. Æstate nulla in Gallia cernitur, vere paucæ. Non minore numero, quam quinquagenario volant. Volatura ventum sequuntur,

Q raro

Bellon. de
Avib. l.
4. c. 17.
Plin. H.
N. l. 11.
cap. 37.

Videtur.

Vox.

Parrus.

Locut.

Videtur.

raro adverso tendunt, ut Bellonius prodidit.

Vox.

Vox ipsis huius, huius sibilu qui porrectis labiis edi solet similis. Noctu solæ degunt; summo mane diversis in locis spargæ conspicuntur, quartamque aut dimidiam milliarii partem occupant. Imminente die, ut simul convenient, sibilum, sese mutuo vocantes emittunt. Uni in toto grege tanquam Regi obeditur. Huic vox maxime sonora. Ad auditum undique confluitur. Aucupes *Appellatorem* vocant. Inter Cupedias in Gallia ponuntur. Ita ut in hominem delicati cibi nimium appetentem, ne Pluviali quidem opposita contentum fore, alicubi tanquam proverbio dicatur. Apparanda non exenteratur.

Aldrov.
Ornith. l.
20. c. 65.

Pluvialem Cineream Aristotelis Pardalum esse credit Aldrovandus, tum quod tota fere sit cinerea, quod de Pardalo prodidit Aristoteles; tum quod maculata, unde Pardalo nomen. Pluviali simpliciter dicta est aliquanto major. Rostro paulo crassiori & longiori, postico digito admodum exiguo. Tota fere cinerei est coloris, & multis undique respergitur maculis, quæ inter cinereum, & castaneæ colorem ambigunt. Alæ caudam quæ brevis est, excedunt. Magna ex parte gregatim volat, nec singularem videris, quod apud Aristotelem legimus. *Vocem* frequentem nec gravem emittit.

Huc refer illam, quæ *Pluvialis Major*, Aldrovando. Rostro est procero, supina parte per pectus, ventremque candicat. Majores alarum pennæ nigricant, pedes sunt longi, & ad cæruleum vergunt. Digito posteriore fere caret.

CHARADRIUS Gazæ Hiaticula, quod circa fluminum alveum & rivorum hiatus versetur, qualis Aristoteli avis sit, ignoratur. Nam colore & voce pravum esse, noctu apparere, interdum aufugere, quod de suo Philosophus reliquit, multis avibus competit. Et cum Aristoteles Icterus Chlorem seu Galgulum vocet, haud verisimile videtur, eam avem Charadrium esse, quam in Perside & raro quidem reperiri, atriis regum requiri, quod multi ei propter auxilium quod icticis præstare creditur, Albertus ex Heliodoro, Æliano & aliis asserit. Aldrovandus pro Charadrio aviculam exhibet corpore toto ex cinereo fuscum, Rostro brevi, si cum aquaticis, longo, si cum aliis conferas. Capite toto nigra vitta cinctam, cruribus oblongis & gracilibus, colore ad rutilum accedente, fronte & collo candicantibus, pedore nigrescente. Quia interdum latet, noctu progreditur, dedit proverbio locum. *Charadrius* *μυρομυρο*, qui rem utilem occultat, dicitur. Ictericos solo aspectu sanare multi produnt. Philes Rubetam spectantem icte-

Arist. H.
A. l. 9.
cap. 11.

Helidor.
l. 3. Hi-
stor.
Æthiop.

ricia affici, rursus Charadrius, liberari nungatur.

TITULUS III.

De Avibus Fissipedibus Herbivoris.

CAPUT UNICUM.

De Gruæ.

A Vis quam Gruem Latini à gruendo, Martialis. Poëtæ Palamedis avem, quod is Trojano bello, quatuor literas *ο* *ε* *χ* & *θ*. ordinem aciei, & tesseras à Gruibus didicisse dicatur, vocant, Græcis communiter *γρυπας*, quod colore cinereo & quasi cano tanquam *γλυπας* appareat; Tyrrenis Tiris, & *συγρυπας*, Polyrrhænis *ολυγρυπας* appellatur. *Genera* ipsarum apud Tartaros plura Venetus observavit. Sunt quædam alis *nigris*: aliæ *candide*, pennas oculis aurei coloris plenas habentes. Nonnullæ parvæ, pennis longis rubro nigroque colore perunctis instructæ; quædam denique magnæ, grisei cinerei coloris, oculos rubros & nigros habentes. In Cuba duplo nostris sunt grandiores. In alia Americæ parte rubras colore coccineo Columbus observavit.

De *descriptione* non est quod simus solliciti. *Collum* ipsi duos dodrantes longum, quod Philoxenus seu os Eurixidis. F. seu Cytherius, gulæ circa pisces mancipium, sibi optabat. Anterior ejus pars ad latera nigricat, prona albet. Vertex cum macula rubente niger. Omnia reliqua cinerea præter majores alarum pennas. In alis retro versus caudam pulvæ & crispæ sunt, quas auro & argento ornatas juvenes pilis affigere solent. *Arteria* aspera penitus in carnem ad os sternon inseritur. Ideo non mirum ex tam longinquo audiri.

Nulla non in orbis parte visuntur, universum enim fere, caloris amicæ, peragunt. Circa Hebrum, Strymonem & Cnistrum magna ipsarum copia. Ex Thracia, ubi æstate vivunt, hyeme ingruente trajiunt in Lybiam: ibi in Ægypto & in Æthiopia hyemen transigere Ælianus prodidit. De Tartaria superius diximus, quæ vero de Pygmæis Plinius habet, fabulosa sunt. *Cibus* ipsis fruges, & herbæ.

Illud & Suidas innuit, cum dicit, *γρυπας* *κατὰ τὸν οὐρανὸν τὸν χεῖρον ἐπὶ τὸν οὐρανὸν, τὸν κατὰ τὸν οὐρανὸν* Grues agricolæ depascebantur agrum noviter tritico satum; & Mantuanus cum scribit.

Strymonie de more Gruis, quæ semina campi læta legens aque tepido sub sydere libra.

Hoc apud Claudianum legitur.

*E Nilo Pygmæa Grues post bella remenso
Ore legunt rubri germina cura maris:*

Putantur tamen & serpentibus interdum vesci.

Vener.
Rerum
Orient.
l. 1. c. 64.

Descri-
ptio.
Athen.
Dipnos.
lib. 1.

Locus.

Æl. H. A.
l. 3. c. 13.
Plin. H.
N. l. 4.
cap. 11.

Viñus.

Mantuan.
l. 1. de co-
lum.
temp.

Partur.
Æl.H.A.
l. 5. c. 2.

Moventur in *Venerem* cum obvio vento ad occidentem fugiunt. Fœmina stante ut Passeres, non sedente ut Gallinæ, coeunt. Ova bina, inter quæ lapidem fortuito etiam inventum deponere solitas, Albertus Coloniae per annos aliquot observavit, nec plura pariunt. Quomodo *excludant*, à nemine quantum sciam hæcenus proditum est.

Vox.
Virgil.
Æneid.
l. 10.
Luctet.
l. 4.
Aristoph.
in Avib.

Vocem ipsarum Græci per *αααααα* vel *αααααα* Latini per clangere & clamare exprimunt, quod intenso & magno cum impetu prolata vociferentur. Aristophanes *αααααα* nuncupat. Q. Calaber *αααααα* id est longum & protensum sonum edentes dicit.

Ætat.

Ætatem earum diversi diversimode definiunt. Honorius anno octavo senescere tradit. Leonicus Tomæus quadraginta continuis annis unam domi aluit. Aristoteles pennas Gruum in senectute nigrescere tradit. Seu quod pennarum earum natura albicet, plusque humoris senescentibus iis constituatur, quam ut facile putredini pateant: seu quod terrestris humidi ipsarum natura à calore imminente non satis concoquatur. Solinus fulvas reddi scribit. Ingrediendo pedes ante se jaciunt, & implumes tam celeriter aliquando currunt, ut cursu hominem vincant.

Volatus.

Nec minor *Volatus* velocitas. Cyrus per intervalla locorum suos tabellarios ita disposuisse legitur, ut fatigatis recentes & nocturni diurnis succederent, sic volantes Grues superarentur.

Plutar. in
Arist.
Æl.H.A.
l. 5. c. 1.
Teetres.

De *Migratione* mira ab Autoribus produntur. Ex Græcia Mæmaeterione in quem Æquinoctium incidit, discedere notavit Plutarchus, ex Helvetia XI. Septembr. audivit Gesnerus. Thraciam relictam ad Hebrum fluvium conveniunt, & in turmas disponuntur. Maxima nata lustrato ter exercitu, corrui; sepulta ad iter in Ægyptum accinguntur. Volant alte, seu ad prospiciendum, quod Plinio & Isidoro placuit, seu ut, conspectis in tempestatem nubibus in terram sese referant. Exacte secundum ventem servant, raro contra impetum nisi fugiendo nituntur. Et in tergo præter volantium colla & capita reponunt. In volatu trianguli formam efficere animadvertum ab Aristotele. Ejus autem summo angulo aer ab iis adversus pellitur: deinde sensim ab utroque latere, tanquam remis ita pennis cursus avium levatur. Balis trianguli tanquam à puppi ventis adjuvantur. Tempestate mota, vel in triquetram figuram conducto agmine cuspide ejus circumfluum aëre scindunt, vel immixtæ glomerantur in orbes, vel contentæ in sinum falcataeque feruntur. Literam ypsilon quibusdam exprimere, A vel a aliis creduntur. Unam sequi ordine litterato, & pen-

Plut. de
solert.
Anima-
lium.

Cicer. 4.
de Nat.
Deor. l. 2.
Plutarch.
lib. cap.
Lucan. l.
5.

narum notis inscribi aëra, certum est. Duce quem sequantur ex robustis & senioribus eligunt. Ubi cum defatigatio, quia non habet, ubi nitatur, cœperit, proximam iis quæ acquirere substituunt, eaque vicissitudo in omni cursu servatur. In extremo agmine per vices qui acclament, dispositos habent, & qui gregem voce contineat. *Excubias* habent nocturnis temporibus, lapillum pede sustinentes; qui laxatus somno & decedens indiligentiam coarguit. Cæteræ dormiunt capite subter alam condito, alternis pedibus insistentes, Dux cum aliis erecto providet collo ac prædicit. Lapidem decessuras deglutire auri indicem postquam deciderit utilem, seu ut ita facilius ventorum turbini pondere resistatur, quod Ælianus voluit; seu ut de via fessæ, & quietem parantes, jactu terram & aquas explorent, quod Aristophanes Byzantius credidit, prodidere quidam. Rostro cum suscipere, ne in volatu navis instar fluitent, Maximus Tyrius scripsit; ut vocem Taurum montem Aquilis plenum cohibeant, alii: Falsum id Aristoteles reliquit: lapides pedibus complecti, cum digitis iis incurvantur ex Alberto habemus. Certum est, inquit Plinius, Pontum transvolaturas, primum omnium angustias petere, inter duo promontoria Criu metopon & Carambim; mox faburra (sed non ut alantur, quod Ælianus fabulatur) stabiliri. Cum medium transierint, abjici lapillos è pedibus, cum attigerint continentem è gutture & arenam. Cum ab Ægypto in Europam volant. Duces non adhibent.

Arist. H.
A. l. 9. c.
10.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 23.
Solin.
Polyhist.
cap. 10.

Afflicti.

De *Antipathia* hoc dantaxat occurrit, ab Aquila infestinari. Ita inter se interdum ira exardescere, ut dimicantes capiantur. Visus aliquando mas fœminæ ad interneccionem usque undecim vulnera infixisse, quod pullos quo minus se sequerentur, abstraxisset, si Alberto fides est. Quæ de *Pygæorum* cum Gruibus pugna ab Aristotele, Philostrato, Menele & aliis produntur, fabulosa esse ex Strabone cognosces. Adventus earum, Arationis tempus indicat. Si vel vociferantur, vel per apertum sponte trepidant; nec sese audacius æthræ committunt vel vespere, & ad multum tempus volant, tempestatem minantur: Si mane & gregatim volent, serenitatem promittunt.

Arist. H.
A. l. 8.
cap. 12.
Strabo l.
1. Georg.
Hesiod.
in Die.
Theophr.
l. de fig-
nis tem-
pest.

Ufus earum olim in cibis expetitus. Indiovis vesciebantur, ut Strabo habet. Varro Grues Melicas apud Gellium inter *idææ* reposuit. Grues oculis consutis in tenebris saginatos Plutarchus testis est. De suis temporibus Plinius. Cornelius Nepos qui Divi Augusti principatu obiit, cum scriberet turdos paulo ante saginari captos, addidit, ciconias magis placere, quam

Ufus.
Strab. l.
15.
Gellius.
l. 7. c. 16.
Plut. l. de
estu Ca-
navor.

grues: cum hæc ales inter primas expetatur: illam nemo velit attigisse. Sed & hodie hybernos apud Gallos cibos nobilitat. Inassant caryophyllis per fossas & pipere. Tenere seunt, si ex ficu suspendantur. Galenus, Aegineta, & alii carnem earum inter fibrosas & duras reponere. Anaxandrides, cum Iphieratis nuptiarum cum Thraciæ Regis filia convivium ridet, Gruem ibi fuisse, quæ frontem distenderet, hiantem podice, discissis lateribus, dicit.

Quantum ad *Medicinam*, Torminosi in cibo profunt. Jus vocem clarificat, & sperma auget. *Caput*, oculi, ventriculus exusta in pulverem fistulis & varicosis ulceribus insperguntur. *Adeps* omnes duritias cum Anserino dissolvit. Pulmonis vulturini dextræ partes venerem excitant viris adalligatæ gruvis pelle. Penna serpentes stupidos reddit.

Plin. H. Et hæc de Grue in genere sufficiant. *Speciem* quod attinet, quia *BALEARICAM* Plinius Cirrhos in capite more Pavonis gerere scribit, Aldrovandus eam substituit,

quam Bellonius cuidam *Ardeæ* generi adscribit. Vulgaris est Gruis magnitudine, & eodem plane corporis habitu, rostro è cinereo fusco, vertice nigro, in quo cirrhus erectus nascitur, plurimis tenuibus & subtilibus aurei coloris pennis. Vtrinque in temporibus maculam habet oblongam, candidam, ex cujus inferna parte utrinque oriuntur palearia rosei carnei coloris. Collum, pectus, venter, cruraque tota ex cinereo fusca sunt. Circa caput viride invenitur. Alas erigit, & quandoque velocissime currit. *Vescitur* herbis viridibus, quandoque furfuribus & hordeo. Sub noctem altos parietes aut arbores more Pavonum quærit.

De *JAPONENSI* nihil singulare occurrit. Tota fere candicat, rostro, collo inferiori, pedibus & alis internis exceptis. Vertex capitis insigniter rubet, ac nigris maculis respergitur. Media pars colli inferior nigricat. Sub alis pennæ dependent satis magnæ, multis insignitæ appendicibus, nigræ, cætera tota avis nigricat.



HISTORIÆ NATURALIS

DE

AVIBUS:

LIBER VI.

De Avibus Exoticis, Americanis inprimis.

TITULUS I.

De Avibus Exoticis Terrestribus.

CAPUT I.

De Manucodiatis in genere & in specie.



Poterant & istæ superioribus inferi, nisi accuratam, plerumque descriptionem Authores nobis invidissent. Hac quia destituimur, dicendum promiscue de illis erit, ne aliquid in historia Avium scitu dignum omisisse videamur. Si quid occurreret, quod superioribus annexi possit, Additamentis Deo volente inferetur. Incipiemus à MANUCODIATIS sive avibus Dei, ut Moluccani vocant. Hæ aliis interdum Apodes Indicæ: interdum Aves Paradyfi, seu ob corporis speciem, seu quod ubi locorum nascantur, unde veniant, quo sese recipiant, ignoretur, vocantur, quamvis & ad Phylonem fluvium quædam observatæ sint, quibus idem, ob miram corporis speciem, & plurimam colorum diversitatem, nomen inditum erat, & in Ægypto fusæ & subrutilæ Monedulis minores, sub eodem nomine videantur. Magnitudo certa non potest illis adscribi, quædam hirundine paulo majores visæ sunt. In Java columbarum magnitudine observari, à se Pica maxima non minorem visam, Scaliger reliquit. Omnibus peculiare est, ut pedibus careant (quamvis Aristoteles nullam absque pedibus avem dari asserit, & Pigafetta pedes illis palmum unum longos assignet) & in cauda veluti fila quædam vel nervos obtineant. *Caput* ipsis non rotundum, sed pressum, nucis juglandis ferme magnitudine. *Rostrum* non omnibus æque magnum, neque ejusdem etiam coloris. *Alæ*

& cauda expansæ, Accipitrinis Milvinisque magnitudine respondent. Pennæ sunt tenuissimæ, & præter tenuitatem pennis Pavonum foeminarum ex toto persimiles. Alæ in arcum contrahi, vel in latum diffundi pro animantis lubitu nequeunt, sed naturaliter uno tantum eodemque modo perpetuo consistunt. *Dorso* fila gemina annectuntur, tres & amplius palmos longa, neque exacte rotunda, neque perfecta angulata, sed figura inter quadratum & rotundum media. Intus continuata ac perpetua, pinguedine totæ expletæ sunt. Falso perpetuum *volatum* exercere, quod non nisi mortuæ in terra vel mari inveniuntur, traduntur; nec verius affirmatur rore duntaxat *pasci*, & *ova* in masculorum dorso cavitate incubari & excludi. Sane quiete necessario indigent, & filis illis in cauda facile ramis arborum annectuntur, nulla hætenus in visarum dorso observata cavitas; & cum tum alte volent, tum animalia sunt perfecta, quomodo rore, qui prope terram nascitur, nec solidum alimentum suppeditat, illas ali dixeris? Magni à Moluccarum Regulis fiunt, qui se, si illarum pennas portent, in prælio vulnerari non posse, etiam si in prima acie collocati fuerint, credunt.

Species ipsarum quinque describit Al-drovandus. *Prima* hirundinem magnitudine, & forma, si corpus spectes, pene æquat. Pennarum ambitus discolor est, sed admodum venustus, & visu undique jucundissimus. *Caput* quale Hirundinis, & pro corporis parvitate majusculum: cujus plumæ, quæ superiorem partem à prima cervicis vertebra ad rostri usque initium exoriant, breves sunt, crassæ, duræ, spissæ, colore luteo egregie micantes, & ad instar purissimi auri, radiorumque solarium more respondentes: reliquæ, quæ mentum contegunt, molliores, tenuiores, & ex cyaneo

mire virides, ut in Anatum masculorum capitibus, dum lucidissimo sideri obvertuntur, conspicimus. *Rostrum* quam Hirundini prolixius. Alarum pennæ forma Ardearum similes sunt, tenuiores tantum, ac longiores, fuscæ, inter nigrum, & rufum fulgentes: quæ una cum cauda in orbem expansæ, rotæ similitudinem exhibent. Etenim plane immobiles sunt, & veluti infixæ quædam spicula cuti adherent. Cæterum minores quoque aliæ pennulæ, eæque profecto haud paucae juxta singulas majorum pennarum, quæ alas constituunt, origines, exoriuntur, quæ supra majorum principia extensæ, ea obtegunt, dimidio quisquiliatæ, ruffæ, coccineæve, cætera crocæ, & fulvo auri colore splendidæ, multum mehercule gratiæ ac venustatis aviculæ ob eximiam illam & singularem colorum disparitatem conciliant. Corporis reliqua moles tota pennis fulvis in rufum vergentibus obducitur, ita tamen ut aliquid adhuc inter eas discriminis advertas. Nam quæ in pectore & ventre collocantur, & frequentissimæ sunt, & pariter latissimæ duorum triumve digitorum amplitudine fulvo sunt colore, & eo quidem nitidissimo, haud sane alio quam jecur ipsum splendentes. Quæ vero dorso infiguntur, rariores, neque ita frequentes sunt, atque insuper amplis divisuris pennarum omnino Ardearum tergo adherentium similitudine hiant: neque etiam ad tam insignem latitudinem accedunt: aut præstantem illum hepatis colorem adæquant, quinimo puniceo potius colore, carni æmulo, obscurione etiamnum relucet. Fila illa gemina quæ dorso annectuntur, quodammodo nigra sunt.

Altera caput habebat album fere, maculis luteis, aureisque perfusum, oculos pariter luteos, cilia rubicunda, rostrum inter luteum, & viride medium, duos digitos longum, in supina parte quodammodo recurvum; *linguam* rubicundam, longiusculam, acutam, Picorum haud plane dissimilem, ad lacinanda animalcula perquam idoneam. In pectore aliquo pacto rubescebat. Venter, dorsum, & alæ candicabant, hæ tamen superius ubique, & in fine erant ferrugineæ. Dorsum primo ad flavum quodammodo tendere videbatur, posteaquam vero uropygium attingit, ad rubicundum, seu ferrugineum colorem vergebat. Alarum longitudine, utpote, quæ quinos palmos adæquant, primam speciem superabat. Caudæ pennæ, ubi dorso inferuntur, candicabant: cætera ferrugineæ erant. Ejus duæ pennæ reliquas duorum palmorum longitudine vincebant, & reliquæ etiam quam in prima longiores adæquant. Carebat hæc avis geminis illis filis, quæ omnibus è dorso enasci supra dixi:

quare vel itineris longitudine, vel temporis vetustate decidisse ea judicandum est, non autem sceminam ideo dicendam, ut perperam vulgus hætenus sibi persuasit. Duarum vero longissimarum illarum pennarum fortassis ad velociorem motum usus fuerit.

Tertiam ob corporis longitudinem *Hippomanucodiatam*, quoniam longiorem videre mihi nunquam contigit, appellare placuit, quæ videlicet à principio rostri ad caudæ, & alarum extremitatem tres dodrantes longa erat, & ad duos palmos, cum alæ complicatæ sunt, lata. Rostrum erat satis aduncum, in supina maxima parte, tres digitos longum, inferna vero paulo brevius. Tota vero avis erat alba præter nempe collum, & ventrem, quorum color est castaneus. Superior capitis pars ferruginea, quem colorem flavus excipit, ut hunc viridis. Prope dorsum pennæ admodum prominebant longitudine duorum, vel trium digitorum. Erat præterea unicum duntaxat *Avi filum*, idque asperiusculum, & admodum flexibile, quare alterum casu quodam amissum fuisse existimare debemus.

Quarta à rostri principio ad alarum extremitatem usque commensurata duos dodrantes explebat. Rostrum pro corporis exiguitate longissimum, nigrum & quodammodo aduncum. Capitis, colli, & alarum pennæ nigrescebant, ubi tamen rostro adnectebantur, flavescebant. Cirrhum prope cervicem tres propemodum digitos altum habebat, rigidum, coloris flavi, quique ex setis potius, quam pennis constare videbatur, atque eo maxime à subsequenti *Manucodiata* differebat.

Ultima magnitudine est *Turdela*, miræ levitatis, alis oblongis prædita, teneris & visui perviis, & pennis (si pennæ dici possunt) potius quam setis: deplumes enim sunt) duarum longis, angustis, nigris, duritie cornea, pedes nulli, perpetuo volat, nec usquam quiescit, nisi in arbore aliqua, longis illis setis ramo implicata pendens. Nulla navis tam celeriter pergit, & tam procul à continente, quam non circumvolet.

Huc *Ryntace* cresiæ pertinere videtur, quæ ovi magnitudine, gallinacei forte, in Persis nascitur. Hesychio & Phavorino avis est quam *ῥαυδὴ μυστερὶς* id est columbæ magnitudine. Nonnullis Pluvialis avis dicitur, nec solido cibo vescitur.

CAPUT II.

De Avibus Daje, Guitguit, Maja, Xochitencatl, Et Iajauhquitotl, &c.

Americanis nominibus utimur, quia de Exoticis nos aucturos recipimus. Pos-

Possent & Latina imponi; quod Nierembergius fecit; sed metuius, ne Lectoris iudicium turberetur. Unicuique ad sua genera unamquemque revocare licebit. Avis *DAIE* columbam non excebit. Nidum quatuor spithamas altum, locis fabulosis, cauda ac pedibus excavat. In eo ova perimbres anserinis majora, & pugnū ferelata, quinquagena plurave, citra ullum albumen, crassæ & pinguis substantiæ, ponit. Excluduntur hæc citra incubantis parentis opem atque teporem. Exclusi pulli statim evolvant. Avis est commode edulis. Ova assa costaque boni & pinguis sunt alimenti; frixa mali & concoctu difficilis.

GUIT GUIT minima est avicula, Regulo similis, viridi colore, & suavi nutrimento. Ea est naturæ rerum vis, ut hæc tanta avis ac fere nulla, audeat persequi corvorum examina, eosque cogat ubilibet latitare, & se adversus illam arundinetis tueri. Corripetam Nierembergius dixit.

MAJÆ colore fulvus est, & in colli postica parte caput (dictu admirandum, & nulli alii animali concessum) ventriculus, primumque nutrimenti receptaculum, si Authoribus credendum. Gregatim in Cuba volant, & *Oryzæ* cuius maximus apud eas gentes proventus, fata devastant. Cedunt mensis, & grati multique nutrimenti esse dicuntur.

XOCHITENACATL columbæ est par, rostro crasso acuminato & nigro, oculis nigris, iride lutea, alis caudaque albo & nigro colore variatis, tænia nigra à rostro ad dextrum usque pectoris procedente, alis vero circa priores partes etiam luteis, ac universim reliquo corpore pallenti, si demas pedes & crura quæ fusca sunt, & ungues ipsos, qui ex albo nonnihil pallescunt, vivit juxta arbores floridas, quarum melligine victitat. Educat sobolem, habeturque à Tototepocensis apud quos est frequens, maximi.

JAJAUQUITOTOTL corpusculo sturnum æquat. Viridi, cyaneo, fulvo & cinereo variegatur. Dum illi ab extrema cauda pennæ prodeunt reliquis longiores, priori parte depiles, in extremitate cyaneis ac nigris ornata pilis. Videtur ad Passeres Indicos referri posse.

CAPUT III.

De Avibus Tuputa, Tentzon tototl, Tritono, & Hoactzin.

Insolens in *TUPUTA* natura. Viva tota vermibus farcitur. Hos pro carne habet, his singula membra imbuta: præter hos & pellem nihil carneum. Cutem non perforant densis exornatam pennis. In carectosis & herbosis locis versatur, ad

proceras arbores nauscat. Hæc ab Hernando habemus, si eximie fidei is author est.

QUAPACHTOTOTL octo nucas longa est, ac totidem cauda; Rostrium è cyaneo nigrum, longiusculum incurvumque, oculi nigri, iris alba; pectus cinereum, ac inde ad caudam usque venter niger, cauda ex nigro fulvescens, alæ vero collum atque caput fulva. Risus humani est æmula, hinc Ridibunda quibusdam. Et propterea inauspicati ominis infamia Indis erat infensa.

TENTZON TOTOTL appellatur avicula Passere minor, colore fusca, pilis quibusdam ad rostri radicem circumcirca propendentibus, barbæ instar. Inde nomen usurpavit.

TRITONUS pulcherrima, & mirifico colorum ornatu variegata proditur, Patria ipsi Hispaniola. Tribus vocibus canit. Scilicet pæne indivisibilibus modulis variat cantum, ab avita voco in alias subito dilapsa, ut videatur una omnes edere, unoque spiritu multos formare tonos, tanquam si à tribus gutturibus fabricarentur.

HOACTZIN Gallinæ Indicæ fere est magnitudine, rostro incurvo, pectore candido in luteum inclinante, alis caudaque maculatis per intervalia pollicis, colore candido & pallenti, dorso ac suprema parte colli fulvis, sed utrisque in fuscum colorem inclinantibus, præterea etiam & temporibus usque ad rostrum & oculos. Unguibus nigris, ac fuscis cruribus. Gestat cristam è plumis è candido in pallidum colorem vergentibus, sed dorso earum nigro. *Vesitur* anguibus. *Vivit* in calidis regionibus, qualis est Yautepecensis, magna ex parte arboribus juxta flumina confitis insidet. Apparet Autumno. *Vox* ei magna; & ululatum quendam repræsentans. Inauspicata ab incolis habetur. *Usus* in *Medicina* invenit. Ossa dolorem cujusvis particulæ humani corporis laciniatione sedant. Suffitus quoque plumarum, mentem restituit his è morbo aliquo ea parum constantes evasere. Pennarum cinis intra corpus sumptus, morbo Gallico affectis opera mirabili medetur.

CAPUT IV.

De Ave Emeu.

AVem Emeu seu Eme Clusii potius verbis, qui eam accuratissime descripsit, quam meis depingere malo. Hæc, inquit iste, dum surrecto capite incedebat, quatuor pedum, & aliquod unciarum altitudinem excedebat: nam collum à summo capite ad dorfi initium tredecim pæne uncias erat longum, ipsum corpus binos pedes latum, femora cum cruribus usque ad

Nieremb.
Naturæ
Exot. lib.
10. c. 6.

Idem lib.
cap. 7.

Idem l. c.
cap. 10.

Nieremb.
Hist. Nat.
Exot. l.
10. c. 14.

Nieremb.
l. 10. H.
N. E. cap.
34.

ad pedum inflexionem decem & septem uncias longa; corporis autem ipsius longitudo è pectore ad Uropygium trium pedum ferme erat. *Penna* seu verius plumæ totum avis corpus cum infima parte colli, dorso & pectori proxima, atque femora tegentes, perpetuo erant geminæ, ex eodem parvo brevique tubulo prodeuntes, & sibi invicem incumbentes; superna quidem paullo crassior, inferna vero tenuior, & delicatior, illæque varix longitudinis, ut in similis avis exuvio, quod Christianus Porretus Leydenfis pharmacopæus diligentissimus, habebat, observabam. Quæ enim in infima colli parte breviores erant, quæ in medio corpore & lateribus longiores, sex videlicet aut septem unciarum, quæ autem in extremo corpore circa oropygium (nam cauda carebat) novem uncias longæ & reliquis duriores. Quanquam omnes duræ aut rigidæ, attamen non latæ, sed angustæ, & rarioribus lateralibus pilis ex adverso sitis præditæ, nigri coloris, quæ tamen circum femora ad cinereum fere tendentis, nigro permanente nervo, ut in reliquis: cam vero formam, & situm habebant illæ plumæ, ut à procul aspicientibus non plumis sed villis duntaxat tectum ejus avis corium existimari possit, quale ursinum est, & alis carere, tametsi alas haberet, sed sub plumis latera tegentibus latentes, & quatuor majoribus pennis nigris præditas, ut in exuvio observabam, tametsi illæ abruptæ essent, nec de illarum longitudine ceati aliquid ponuntiare possim; caules tamen confracti satis crassi, durique & solidi erant, atque in extimam alæ partem alte penetrabant. *Ala* vero pars superior corpori contigua pennas sive plumas vestitricas, illis similes, quæ adhuc in pectore retinebat; adhuc enim patas hujusmodi alas censendum, ut currentem adjuvent, quia hanc avem non esse volucrem, nec à terra tolli posse arbitrör. *Crura* in ambitu quinque unciarum crassitudinem superabant, crebrisque corticibus seu squamis latis tecta erant, præsertim supra pedis inflexionem. *Pedes* habebat crassos, duos, tribus crassis digitis præditos, prona parte velut squamis tectos, supina prorsus callosos: quorum medius, qui reliquis longior, tribus articulis constabat, interior uno, exterior binis. Omnium *ungues* valde magni, binas pæne uncias longi, crassi, duri & cornicei: Ejus *caput* exiguum pro avis magnitudine & fere glabrum, coloris ex atro cærulei cum colli suprema parte, in quo apparebant rari pili nigri: oculi paullo supra rostri fissuram magni, ardentes & truces, leonis oculis pæne similes, quos cingebant niger pili, quemadmodum & meatus illos aurium parvos & detectos, quos pæne oculos habebat. *Rostri* prona pars

quemadmodum arcuata erat, paulloque supra mucronem binis foraminibus, narium usum præbentibus, prædita: à cujus medio ad capitis usque verticem porrectum diadema assurgebat cornæ substantiæ, tres fere uncias altum, coloris ex flavo fusci, quod cum plumario defluvio cadere, & cum plumæ renascuntur, novum crescere intelligebam. Supina rostri pars, ab ejus scissura ad extremum mucronem quinas uncias longa. Anterior colli pars quatuor pæne uncias infra rostrum, bina velut membranacea palearia, seu barbulas, propendens habebat duas uncias longa, coloris rubri miniati. Postea similiter colli pars deplumis, à capite secundum longitudinem rubri miniati coloris erat; deinde infirma ejus pars aliquot rubris plumulis, quibus nigræ intermixtæ tecta. Cæterum tametsi hæc avis aliquas notas habere videatur cum struthiocamelo communes, velut exiguum caput, natura pæne calvum, quodque sine delectu vorat quidquid objicitur. *Pedes* tamen bisulcos non habet, sed tribus digitis præstitos, ut ante diximus, sine calcari, oridis sive tardæ pedum modo: ideoque adeo firmos & robustos, ut in illustissimi Comitris hortu, (quem cum ipso Comite ingressus eram ut avem conspicerem) arborem humani femoris crassitudinem æquantum prorsus contusam viderim, & ejus corticem sublatum ab hujus avis, comite, id asserente, pedibus & unguibus: etenim non rostro antrorsum, sed oblique se convertens, aversis retrorsum pedibus, eos, cum quibus pugnabat, impetere solebat.

Licet vero quæcumque objiciebantur *Videtur.* voraret, ut aurantia mala integra, & similia: ordinarius tamen ejus *cibus* erat similagineus, sive primarius panis, quem in magna crassaque fragmenta divisum, objectum vorabat, maxime enim recentibus gallinarum ovis delectari intelligebam, quæ integra cum ipsa testa glutiebat, si autem parum firma esset valetudine, illa ipsa integra per anum rejiciebat, deinde rursus ea vorans retinebat & concoquebat. Mihi autem affirmabant, hanc avem fuisse marem, & ex postica parte penem, cameli instar, interdum exerere esse conspectum. Audio porro, illas naves quæ anno à Christi nativitate millesimo sexcentesimo tertio ex Molluccis in Hollandiam redibant, binos simul aves quidem attulisse, sed in itinere mortuas projecisse; tametsi earum exuvie sive coria, ob raritatem, censervari potius sent: illius avis aliquot ova nihilominus relata certa terna aut quaterna eodem anno Amstelredami conspiciebam à mercatoribus redempta, & paullo etiam ante unum Leydæ apud Porretum videram, omnium, mea opinione, maximum & pulcherrimum:

mum: dimensi enim per longitudinem, ambitus, quindecim unciarum erat; per transversum autem, duodecim, aut paulo amplior, ut propter amplitudinem pro quodam vase non minus haberi posset, quam struthiocameli ova, quibus, teste Plinio, veteres nonnunquam utebantur, & adhuc nostra ætas ejus rei gratia usurpat; nam non semel videri memini struthiocameli ova argento excepta & inclusa, poculorum vicem præbere. Hujus tamen avis ovis testa non erat valde densa, nec alba veluti ovorum struthiocameli, sed extrema parte viridescens ex cipericio coloris, & perpetuis, saltem creberrimis, quasi tuberculis saturata viriditate præditis ornata: illorum autem quæ Amstelredami conspiciebam, unum ejusdem pæne erat cum illo magnitudinis, formæ & coloris, quædam vero magis orbiculata, aliqua minora, nonnullorum etiam color dilutior, & minus elegans. Porro mihi relatum, hujusmodi aves Moluccarum insularum non esse peculiares, sed etiam in Sumatra sive Taprobana, vicinoque illis insulis continente reperiri.

CAPUT V.

De Avibus, Xochitototl, & Auris.

XOCHITOTOTL, forma æmulatur passerem nostrum, multicolor est penna, pallet, nigrescit, candet: partim quoque est fusca. Vbique incola. Vermiculis & exiguis feminibus vescitur. Ex arborum ramis nidum construit pendulum. Ibi incubat ovis.

AURA aliis Gallinassa aut Gallinasso, in maritimis locis Zamuro, Peruanis Suguntus, Mexicanis Tropillotl, dicitur. Corvinum est genus, & ad magnitudinem Aquilæ accedit, quibus vix Gallinæ superat. Color illi niger, Rostrum Psittaci instar. Frons depilis plicatili cute obtegatur, circumstant pili rari & nigri similes Æthiopum. Crus hobet fuscum. Aduncum unguem & atrum. Hornandes incertæ originis esse credit, nec sciri ubi nidificent & educunt prolem. Frequentissimas omnibus Hispaniæ nova angulis hodie scimus. Pernoctant in arboribus & rupibus, mane advolant ad urbes, & ab editioribus locis plateas speculantur.

Quicquid immundum est aut exanime devorant, nec à stercore humano abstinere, foede ingluvie famosæ.

Pullos Acoffa albos esse scribit; adolescentes in corvinam nigredinem degenerant.

Gregatim volant, & sublimipetæ sunt. Nec clamant, nec canunt raro murmure contentæ. Ingratus ab eis odor. Si quis insequatur, exonerant se ut leviores vola-

tui sint, pari festinatione evomendo quicquid glutierunt. *Usum invenere in Medicina.* Caro si edatur, Gallicum morbum juvat. Pennæ exusta cinis vetat pilos nasci, æque ac stercus formicarum, vulnera quoque medicatur. Stercus drachmæ unius mensura potatum prodest melancholicis. Cor sole exsiccatum impense odoratum est. In aliquibus Provinciis lege lata penna infligitur occidenti has aves. Reginam Aurarum.

CORQUA URULI Indi vocant. Accedit magnitudine gnæsis Aquilis, alii gallinæ Egyptiæ parem faciunt. Corpus univsum præter collum & eas partes quæ juxta pectus sunt, ex nigro purpurescens, fulvum est ac pullum. Ala circa exortum nigra, cætera cinerea, desuper vero mixtum fulvæ nigrae, & nonnihil in purpureum vergentes. Rostrum extrema (quæ Psittaci esse judices, tam est indistincta similitudo) alba sunt. Cætera sanguineo colore tincta. Amplum est narium foramen, oculi nigri, iris fulva, rubra palpebræ, frons sanguineo colore perfusa, ac plicatilibus rugis torva, quas tamen nonnunquam explicat, qua in re vocatos Gallo-pavos æmulari videtur, & pilis quibusdam veluti retorridis rarisque. Æthiopum pilis haud absimilibus. Cauda est Aquilæ, inferne cinerea, foris vero nigra. Crura rubra, ungues unci.

Indigne est Mexicanæ provinciæ. Anguibus, muribus, lacertis, sed morticinis maxime & humano stercore *vivunt*. Sublime volat & nimium extensis panisque alis, vix volatum intermittens. Vi incredibili obstitit ventis, contra nititurque adversantibus, eisdem sedibus perstans immobilis. Unde ipsi apud Mexicanos nomen.

Caro est inutilis, nutrimento, quantum compertum est, à nomine, nisi *Medicina* gratia degustato. Audio, inquit Author noster, hujus avis plumis admotis mederi Indos ulceribus, carnibusque elixis durante affectu devoratis, quas etiam ajunt morbo Gallico præsentaneo quodam remedio mederi.

CAPUT VI.

De Avibus Garagay, & Quetzaltototl.

GARAGAY quæ dicitur, avis est rapax, Milvi magnitudine, capite ex extremitate alarum albo. Crocodilorum & testudinum ovis infensa est. Odoratur illa sub arena in ripis fluminum condita, eruit & vorat. Solivaga est, nisi quod Auræ aves eam sequantur, ut potiantur furto, auro enim scalpere terram nesciunt, ut effodiant ova.

QUETZALTOTOTL, cristata est picæ columbæve magnitudine, pavoninis magna ex parte plumis ornata, rostro incur-

De Laet.
l. 5. Ind.
dix. Oc.
cid. c. 4.

Nie-
remb. H.
Exot.
bel. 10 c.
56.

Locus &
Volat.
Volant.

Usum.

Nie-
remb. H.
Exot. 1.
10. c. 57.

Nie-
remb.
l. 10. c.
41.
Herrera
Decade
3. l. 3. c. 9.
Historia
Novi or-
bis.

Vitæ.

Partur.

Volant.

Descri-
ptio.

vo & luteo, & pedibus nonnihil luteis, cauda tzanatl plumis prælongis vestita, atque virentibus nitidisque pavonini coloris, iridis foliis forma similibus, opertisque, alis superne nigricantibus, inferne vero, & qua parte pavoninas attingunt, quæ in medio sunt, inclinantibus in virorem, quasi cavente natura meliorum pulchritudini. Crista constat plumis splendentibus pulcherrimis, pectus collumque inferne rubris & micantibus, ac pavoninis superne, qualibus etiam tegitur dorsum, nec non ex partes quæ subter alas sunt, interque crura, sed dilutis exilibus, & mollibus. Plumæ alarum prælongæ sunt, virore tinctæ diluto, & in acumen desinentes. Pennæ tegentes humeros virescunt, sed subter sunt nigrae, quæ vero alas interstant, nonnihil incurvæ ac unguium colore.

Locus.
Hæman-
des in Pa-
ralipom.

Vivunt in provincia Tecolotlan ultra Quauhtemalan versus Honduras. Loca aprica amant, nec compertum cicurari vel ali in domibus voluisse.

Vitæ.

Vescuntur vermiculis, pineisque quibusdam sylvestribus, ex his quas Mexicanī matzatli vocare consueverunt. Arbores excavare, & in earum cavitatibus sobolem educare dicuntur. *Sonitum* proferunt Psittacis non admodum dissimilem: verum sibilis edunt alacris, ter de die, mane, meridie, & sub occasum Solis cecinisse observatum est.

Volatur.

Agminatim *volant*, & visco hærentes ne plumis detrimento sint, non contorquentur, quasi naturæ duæ divitiarum suarum cognitionem haberent.

Usus.

Et sane maximi plumæ apud indigenas habentur, & aurum precio superant. Longiores ad cristas & cætera corporis ornamenta, cæteræ ad textilia opera usurpantur. Plumis captas exuere, undas dimittere dominis, quibus loco prædiorum sunt, & ad hæredes transeunt, licet, ne quisquam occidat, cavetur. Vere Reginam plumarum dixeris.

CAPUT VII.

De Avibus Tzinitzian, Totoquestal, Ave montana, & Longa.

Nic-
remb.
H. Exot.
l. 10. c.
65.

TZINITZIAN parva est avis, columbæ pæne par. Rostrum habet breve incurvum & pallidum. Columbinum caput & collum, sed quæ plumis virentibus ac nitidis vestiuntur, pectus & ventrem rubeæ, præter partem caudæ proximam, quæ cyaneo candentique colore promiscue tingitur. Caudam superne virentem, inferne nigram Alas partim albas partim sub nigro-atras. Crura ac pedes cinereos. Vivit in calidis juxta Oceanum Australem, vescitur fructibus. Alitur in caveis.

Ex plumis miræ subtilitatis imagines intextunt indigenæ.

TOTOQUESTAL columbina magnitudine minor est, viridis omnino. Caudæ pennæ longissimæ sunt, magno pretio habitæ & receptæ in commerciis. Depilata dimittebatur. Capitis reus erat qui occidebat.

De Laet.
Ind. Oc-
cid. l. 7.
cap. 4.

AVIS MONTANA Indis Tepetototl, & Tecnecholi, Hispanis Phasianus, anseris est magnitudine, colore nigro splendenti, plumis tamen nonnullis inferne candentibus, circa caudam in postremis alis, cruribus pedibusque cinereis. Rostrum incurvo partim cinereo partim luteo, ac circum radicem velut tumentis, plicatili cristâ, oculis nigris, sed iride pallenti.

Alitur frumentaceis frugibus aliisque similibus. Mite animal. Nam apprehenso domesticorum pallio cibum exigit, & clausam januam ubi aliquo intrare opus sit, pulsât. Horum si liberum sequitur, reducem cum applausu excipit.

Eduis est ac pinguis caro, nec dissimilis illi chortaliū Indicarum.

AVEM LONGAM Indi Hoitallotl dicunt. A rostri acumine ad caudæ usque exortum, quæ spithamam quoque longa est, dodrantem prolixa conspicitur. Rostrum desuper nigrum, subter vero cinereum, quadrantem longum ac mediocriter crassum. Cauda virens sed pavonino splendore. Plumæ totius corporis ex albo fulvescunt, fulvescuntque prope caudam è nigro: sed quæ corporis vestiunt superiora, nigrae sunt maculis candicantibus conspersæ. Calidis regionibus vivit. Humipeta est, ac modici volatus, sed adeo pernici cursu, ut equorum velocissimorum agilitatem longe excedat.

CAPUT VIII.

De Cygno Cucullato Clusii, seu Dodone Lusitanorum.

CYGNUM Cucullatum, seu Gallum galinaceum peregrinum Clusii. (Hollandi *walgh-vogel*, seu nauseam moventem avem vocant) Mauritii insulæ, quam Lusitani Ilha de Cirne dixerunt, debemus. Magnitudine cygnum superat aut æquat. Caput habet magnum, membrana cucullum referente tectum. Rostrum crassum, oblongum, parte capiti proxima subflavum, extremo mucrone nigrum. Prona pars adunca est & curva, in supina quæ subcærulea, macula mediam partem inter flavam & nigram occupat. Raris & brevibus pennis tegitur. Alarum loco quaternas & quinas duntaxat longiusculas nigras pennas habet, posteriore corporis parte, quæ præpinguis & valde crassa, pro cauda quaternæ

Clusius
Exot.

terna aut quina crispae convolutaeque pen-
nulae cineracei coloris conspiciuntur. Cru-
rum quae crassa potius quam longa, superna
pars genu tenuis nigris pennulis tegitur, in-
ferior cum pedibus subflavi est coloris. Pe-
des in quatuor digitos dividuntur. Terni
longiores antrorsum spectant, quartus bre-
vior retrorsum conversus est. Omnes in-
struuntur unguibus. De Crure ejus genu
tenuis rescisso, ita Clusius. Erat, inquit,
non valde longum, sed à genu usque ad
pedis inflexionem paulo plus quam qua-
tuor uncias superabat: ejus vero crassitudo
magna, ut cujus ambitus fere quatuor un-
cias aequabat, crebrisque corticibus seu
squammis testum erat, prona quidem par-
te latioribus & flavescens, vero supi-
na minoribus & fuscis. Pedis etiam digi-
torum prona pars singularibus iisque latis
squammis praedita, supina autem tota cal-
losa. Digniti satis breves pro tam crasso cru-
re. Nam maximi sive medii ad unguem
usque longitudo uncias binas non admo-
dum superabat, aliorum duorum illi proxi-
morum vix binas uncias aequabat, poste-
rioris fescunciam: omnium vero unguis
crassus, duri, nigri, minus uncia longi, sed
posterioris digiti longior reliquis, & un-
ciam superans. In unius ventriculo lapilli in-
venti sunt, unus planus & orbicularis un-
cialis magnitudinis, alter inaequalis & an-
gulosus, in maris littore lectos & devoratos
verisimile est. Herbertus cum Lusitanis
Dodonem vocat, & unam capitis medietatem
ferruginei coloris plumis tegi, alte-
ram nudam esse, addit.

CAPUT IX.

De Avibus Ceoan, Cenotzqui & Pauxi.

Ceoan seu avis nivea turdo viscivoro
paullo major est. Circa pectus ven-
trem atque alarum exortum fulvescit, per-
mixtis ad caudam cinereis plumis. Alarum
extrema caudaque ipsa cinerea sunt, super-
ne vero universum corpus è fusco nigres-
cit. Rostrum quod parvum est atque exi-
le, cruraque fulvescunt. Mentum candet,
insertis tamen aliquot nigris pennis. Ser-
monem humanum aemulatur, veluti irri-
dens transientes, quos tamen ubi licet, in-
sequitur.

Avi **CENOTZQUI** seu evocatriei ni-
vium dictae color illustris variegatione. Pe-
ctore fulvus, crure pallidus, ungue niger,
ventre notis candidis & atris permixtus,
sub finem albis notis conspersus, cauda sub-
tus niger & candidus, super fulvo nigrore
maculatus. Caput nigrum est fascia cin-
ctum cinerea. Rostrum parvum cinereum
superne atque inferne, sed superne juxta
exortum linea ambitur lutea. Quovis caelo
gaudet, montana colit, & roris tempore

subolem educat. Antequam ningat clami-
tat, postea silet. Ita convolvit huc & illuc
caput, contorto in varias partes collo, ut
eodem situ immota perstans, cuncta cir-
cumspiciat.

PAUXI gallinaceum aequat aut supe-
rat. Nigra est, maculis nonnullis albis &
nigris perspeffa, collo nonnihil provento,
capite amplo, quod aliis cristatum, aliis pro
plumea cristalapis aut globus insurgit, (la-
pidem vocant, licet non nimis durus) ovo
similis aut major, ferruceo colore, Her-
nandus tumorem quondam radici rostri
affigi, qua parte est tenuior, pici firma,
lapidis duritia, & caeruleo colore, scribit.
Alitur frumentaceis seminibus & libenter
mansuescit.

Huc pertinet alia Avis **Ciconiae** magni-
tudine, colore cinereo. Cristam gestat un-
cias octo longam, è multis subjectis agge-
ratam plumis ejusdem coloris, & in ampli-
tudinem orbicularem, praecipue circa sum-
mum dilatatis atque excrefcentibus. Vi-
sam in horto Hispaniarum Regis descripsit
Hernandus.

CAPUT X.

De Avibus **Piticilli**, **Polyglotta**, &
Chichuatli.

Piticilli avis est parva. Cinerea tota nisi
capite & collo, quorum utrumque ni-
grum, solum oculos nigros candens ambit
macula. Est ignobilitate quadem originis
nobilis. Nesciunt adhuc Tetzcoquenses
ubi fatiscit. Muta est. Educatur domi, bre-
vi perit. Palato & stomacho est accepta-
bilis.

POLYGLOTTA quam Indi Concont-
latolli seu quadringentas linguas vocant,
sturnum non superat. Subtus albescit, su-
periore parte fusca, pullis & candentibus
intermixtis pennis, maxime ad caudam &
caput, quod imagine quadam coronae ar-
gentae redimitur. In caveis ad blanditias
auditus, ad ostentum naturae servatur. Vin-
cit omnes aves suavitatem & arbitrio guttu-
ris, nullius non imitatur, nullius non supe-
rat. Calidas regiones amat, temperatas
tolerat. Contenta est quovis cibo. Similis
ei est Tzanpan. Aliqui suspicantur femi-
nam esse ejusdem speciei, paribus magni-
tudine, cantu, forma, nisi quod plumae
inferne albae sint, cinerea & nigrae: superne,
pullae, nigrae, albae.

CHICHUATLI nostratem rusticulam
exaequat. Rostrum est longo, tenui, & pul-
lo, ac tenuis juxta utrumque oculum lu-
teis & incurvis. Inferiora corporis pallida
sunt, nigris quibusdam plumis circa col-
lum interfertis. Iris lutea, ac nigri oculi.
Caetera ex fulvo, fusca, & cinereo per-
mixta.

Nie-
remb. l.c.
c. 75.

Herber-
tus in Ite-
nerario.

mixta. In montibus versatur. Calidis frigidisque regionibus capitur. Pane & vermiculis alitur. Humipeta est, & in vimineum alteriusve materiae conjecta carcerem, haud vulgariter garrit. Pingue & non omnino aspernandum præbet alimentum.

CAPUT XI.

De Avicula Tominejo.

Gomara
Hist. ge-
neral. In-
diar. c.
194
Oviedus
Hist. ge-
neral. l.
14 c. 4.
Augu-
stin. Ce-
rato Hist.
Peruanæ
l. 1. c. 5.
Lerius in
Historia
Brasilie.
Thevet.
singul.
Franc.
Antar. c.
48.
Joseph.
Acosta
Hist. Na-
tur. &
Mor.
Ind. l. 4.
cap. 37.

Mira sunt, quæ de Avicula, quam Hispani Tominejum, Indi Hoitzi tzil-tototl, ut Hernandez scribit, Huitzitzil ut Ximenes, Vicielin ut Gomara, Quenti ut de Laet, Brasilienses Guonambuah, ut Lerus & Thevetus testantur. Oviedus Paserem mosquitum vocant, produntur. Tam parva est, ut quidam ei magnitudinem crabronis, alii cicadæ, nonnulli extremi pollicis articuli, & evulsipennis vix dimidia ejus partis, alii scarabei Lucani assignent. Oviedus in monetario trutina quæ aurum appendi solet cum nidulo suo positam, bina tantum pondera. Acosta unum duntaxat dicit, Hispanis Tominos dicta, id est XXIV. grana, unde Tomineii nomen, pependisse vidit. Capitis & colli plumæ miram elegantissimorum colorum quocunque obvertas varietatem repræsentant. Pectus igneum quendam auro splendidiorem inprimis. Reliquum corpus subcinericium est. Oviedus nigerrimum colorem tribuit. Rostrum habet oblongum, illudque acus qua vestes sarcuntur, exilitate. Linguam rostro duplo longiorem. Pedum & unguum exilitate, cum illarum avicularum pictura, quæ ornatus gratia in librorum marginibus interdum adjici solet, comparari potest.

Locut. Invenitur in Peruanis montibus & Brasilia. Melle, rore, & florum succo alitur. Rosæ tamen non insistit, at in præalto milio quod Auati ab incolis dicitur, & aliis similis magnitudinis plantis insidet.

Origo. Duplex earum proditur origo. Nam aliæ quidem ex ovis excluduntur uti reliquæ volucres. (Construunt autem ex xyli floccos nidos) aliæ, quod haud dubio fabulosum, ex muscis transformari vulgo creduntur. Sunt qui dicunt visam esse partim muscam partim avem: primum ejus colorem nigrum, mox cinereum, deinde roseum, tandem rubentem. Nullus Hispanorum cantus mentionem facit. Soli Levius & Theretus Galli valde canoram esse, & in cantu adeo assiduum ut nemo qui non audiret & conspiceret, ex tantillo corpusculo tam suavem & sublimem cantum prodire posse sibi persuaderet.

Volant. Volat celerrime, editque inter volandum quendam instar apiculæ strepitum, ut apes magis quam avis videatur. Non diu

tius, quod maxime virum, vivit, quam flores herbarum durant superstites, postquam marcuerit, ad pinus aliasve arbores, quadam naturæ providentia sese confert, eique se rostro affixo servat appensam, donec sex plus minus quam transactis mensibus, ac decedentibus jum pluviis, vernantibus agris, denuo revirescat, similes vices plures subitura. Gomara exspirare mense Octobri, pedibus ex aliquo ramo appensam aprico loco, renasci autem Aprili scribit. Hinc Renati nomen. Servata est sapius avis affixa stipiti intra cubiculum, & cum sex menses exanimis jacuisset, quo tempore natura sibi comparatum est, revixit, ac dimissa in agros volitarit.

Quam Clusius describit, & Urusiam ac Tominejum vocat, an eadem cum jam descripta sit, ignoro. Erat, inquit, hæc avicula, ut expectura observabam, à rostri mucrone ad pennarum caudæ extremitatem tres uncias longa. Caput vero cum integro rostro uncialis cum semisse erant longitudinis: alæ ad extremam fere caudam porrectæ, parem habebant longitudinem: dorsum vix unciam latum erat, ejus & alarum color ex cinereo fuscus, ventris cineraceus. Pennæ quæ in cauda obscure rubescunt, earum extrema pars nigra. Capitis, colli gutturis plumæ elegantissimi coloris ex auro rubro & flavo mixti, quæ Soli expositæ, admirabilem varietatem, prout obvertebatur caput, ostendebant: rostellum nigrum tenuissimum & maxime acutum, pedes valde exiles, nigri, quatuor digitis ut reliquarum avicularum præditi, quorum tres in anteriorem partem porrecti, quartus in posteriorem, &c. Videtur tamen esse ex istis. Diversæ enim speciei sunt istæ parvulæ aviculæ, & promiscua nomina communicantur invicem. Urusia Solis radium significat.

Ajunt pulverem ejus intra corpus sumptum epilepsiæ mederi. Pennæ præsertim quæ in collo & pectore nascuntur, aureis staminibus à phrygionibus intexuntur.

Usur.

CAPUT XII.

De Avibus Cuntur, & aliis quibusdam Insula Maragnanæ.

Cuntur avis est mole vasta. Visæ quæ expanfis alis XV. aut XVI. pedes occuparent. Pedes habet gallinis similes, caret aduncis unguibus. Rostro tam valido instruitur, ut eo vaccinum tergus perforet. Plumis albis nigrisque mixtis ornatur. Cristam parilem instar novaculæ, & non servatam instar gallinæ. Inter Carnivoras censeri debent. Duæ illarum vaccam occidere & comedere valent, nec ab hominibus abstinere. Non modo ovem dila-

Joh. de
Læet. In-
diar. Oc-
cid. lib.
10. c. 5.

dilaniant, sed & juvencam. Pauciores sunt. Plures si reperirentur, pecus universum in Peruvia destruerent. In Insula Maragnana quatuor inprimis occurrunt.

De Laet.
Ind. Oc-
cid. l. 16.
c. 13.

Prima quam *Ouyra Ovaßon* (observa, barbaros *Toupinambautios* universas aves uno & communi nomine appellare *Oura* sive *Ouyra*) vocant. Aquila est pæne duplo major. Plumis vestitos elegantissimis, Rostro valido, Unguibus inprimis acutis. Visa penna ex alis hujus avis extracta, quæ ulnam nostratam longe superabat, elegantissimo colore, & rotundis maculis distincta, instar Gallinarum quæ ex Africa advehuntur. Tanti est roboris, ut ovem integram abripiat atque dilaniet, homines facile prosterнат, & nec à cervis abstineat.

Lerius in
Hist. Bra-
zil.

Altera est *Moyton* seu *Mouton* pavonis nostratis magnitudine aut paullo major, præ alta crista spectabilis, & per universum fere corpus nigris albisque plumis eleganter variegata. Carnes illarum cibo sunt opportuna, & multæ ejus visuntur species.

Huic *Toucan* accedat, palumbi magnitudine, rostro oblongo atque lato, ingluvie sub pectore tres quatuorve digitos transversos lata, crocei coloris elegantissimi & miniatis plumis circa oras distincta, pectore candido, dorso exquisite rubente, alis atque cauda nigris, pulchra aspectu & carne palato admodum grata. Hujus & alia species appellatur à barbaris *Ovaycho*, cui rostrum est paulo diversum & è rubro flavescebat.

Quartum, locum avi *Ouru* dictæ damus, perdicis quidem magnitudine, sed galli gallinacei in modum cristata; plumis rubris, nigris atque candidis insigni varietate. Sunt ibidem & plures ejusmodi rapaces aves Aquilis aut majores aut paullo minores, singularis adhuc formæ, & plumis variorum colorum eleganter distinctæ.

Sunt & quædam *Perdicum* forma, sed majores paulo, cæruleis plumis ornata, & cærulea ova ponentes. *Tata Ouyra Ovaßon*, & *Tata Ouyra miri*, itemque *Aroumara* singula sunt columbarum nostratarum magnitudine, sed singulari plumarum varietate & elegantiâ.

Iandou struthiocamelorum est species. Proceritate staturam humanam superans. *Salian* denique *Turcici Galli* magnitudine, rostro & cruribus ciconiæ, licet volare nesciat: tamen tam pertinaciter currit, ut venaticos canes effugiat.

C A P U T XIII.

De quibusdam Brasiliæ Avibus.

INter cæteras Brasiliæ aves, quarum alibi mentio facta & adhuc fiet, censentur

Guramba-engera, *Tangara*, *Quereiva*, *Tucana*, *Guirapanga*, *Macucagua*, & *Mutu*.

De Laet.
Indiæ
Occid. l.
15 c. 7.

GURAMBÆ-ENGERA magnitudine est *Fringillæ*, tergo & alis cæruleis, pectore & ventre flavo; diademate supra caput flavo. Caterarum fere omnium cantum imitatur, & mille modis vocem flectit & mutat. Variæ ejus reperiuntur species, quæ omnes aviariis inclusæ summo opere delectant.

TANGARA Passeris est magnitudine, colore nigro, capite subflavo, non canit. Epilepsiæ quia obnoxia creditur, ideo illius carnibus abstinent barbari. Narrant iidem aviculas hæc inter se choreas ducere, & una mortuæ instar humi procumbente, inconditum murmur & strepitum edere. Hac confurgente, & eundem strepitum edente, omnes una avolare.

QUEREIVA totum pectus, pulcherri-
mo colore rubro tectum est, alæ nigro, reliquum corpus cyaneo. Propter exquisitam plumarum elegantiam maximi fit à barbaris.

TUCANA, quam *Lerius* & *Thevetus* vocant *Toucan*, picæ magnitudine, flavo pectore, reliquo corpore nigro. Rostro ingenti & minimum palmum longo, extus flavo, intus late rubente. Cicuratur ita ut sub recto pullos suos excludat.

QUIRAPANGA est tota alba, & cum modicæ sit magnitudinis, stentoream habet vocem, & quæ instar tintinnabuli, ad dimidiam pæne leucam exaudiatur.

MACUCAGUA phasianæ avi non dissimilis, Gallinas Europæas magnitudine superat, & triplici cute munita est. Ova quotannis bis tredecim aut quindecim ponit. Graditur quidem humi, sed petit ad conspectum hominum arbores. Largam delicatamque carnem habet. Multæ illius species reperiuntur, quæ capiuntur facile.

MUTU Gallinæ est species admodum domestica. Cristam istar galli, nigri atque albis punctulis interstinctam gerit. Ova illius sunt grandia, alba, & ita dura, ut inter se collisa instar ferri tinniant. Quare barbari *Maracas* suas ex illis conficiunt. Ossa illarum canibus sunt lethalia, hominibus nihil nocent. An eadem sit cum *Moutone* de qua superiore capite actum est, ex comparatione liquebit.

Huc pertinet quedam ex rapacibus magnæ molis & tam clamosa, ut ad dimidiam leucam audiatur, tota nigra, pulchris oculis, rostro galli gallinacei, cui cornu impositum palmi pæne longitudine, quod iis qui linguæ vitio laborant, ad collum appensum occulta, quadam naturæ vi mederi, experientia comprobatur volunt. Coronidis loco hisce *Bambiayæ* in *Cuba* insula frequentes accedunt. Paulum

De Laet.
Indiæ
Occid. l.
1. cap. 9.

supra solum feruntur magis quam volant, ita ut incolæ ferarum instar illas venentur. Carnes coctæ jus croceo colore inficiunt, saporis alioquin pergrati, & phasianarum avium æmuli.

TITULUS II.

De Avibus Exoticis Aquaticis.

CAPUT I.

De Passere stulto, & Anser Magellanico.

Nie-
remb.
Hist.
Exot. I.
10. c. 4.

Passer stultis nomen ex eo accepit, quod manus apprehendentium nec fugiat nec timeat, admiratur solum aut stupet. Præter frontis partem rostro adjacentem, quæ cinerea est, palmipes, rostro tres uncias longo, tenui, obrotundo rectoque, sed prope extrema nonnihil incurvo, pedibus quoque qui cæterorum palmipedum sunt, & cruribus nigris, pupilla etiam nigra, & membrana oculos tegente in ambitu cinerea.

Vescitur pisciculis. Vose imitatur graculum. Magnitudine picam, forma Larum. Nobilis est avium insulæ Mauritiæ mansuetudo. Appellentibus nautis perinde insident ac arboribus. Eadem securitas venatus est. Accedunt ac subeunt manus.

Clus.
Exo.

ANSER MAGELLANICUS à loco ita dicitur. Batavi forte à pinguedine Penguinem vocant. Describam cum verbis Clusii. Marina est hæc avis, inquit, & ex Anserum genere, tamen rostro dissimilis. In mari viſitat: pinguis oppido est, prægrandis anseris magnitudine; nam adultiores in eo genere tredecim, quatuordecim etiam, sedecim interdum, juniores vero octo, decem & duodecim libras pendere observantur. Prona parte, nigris pen- nis tectæ erant. Supina & in ventre albis. Collum, quod crassum & breve habebant nonnullæ, albis pennis tamquam torque cinctum. Earum cutis crassa & densa inter suillæ. Alarum erant expertes, sed earum loco binas parvas coriaceas pinnas habebant, & latera tanquam parva brachia propendentes; prona parte brevibus, angustis & rigidis pennis confertim tectas, supina autem minoribus & rigidioribus, iisque albis, quibus nonnullis locis intermixtæ nigræ; minime quidem aptas ad volandum, sed quarum adminiculo velociter natarent. Maxima enim ex parte in aqua versari intelligebam, & terram duntaxat petere fœtificationis vel pullationis tempore, & plerunque quaternas aut quin- nas in una scrobe latere. Rostrum corvino majus habent, non adeo tamen elatum, & valde brevem caudam, pedes nigros, planos adserinorum pedum forma, non

adeo tamen latos. Erecta & sublimi capite incedunt, demissis in latera pinnis, tanquam brachiis, sic ut procul intuentibus homunculi aut pygmaei appareant. Piscibus duntaxat vesci, referebant Diaræ; non ingrati tamen saporis esse illarum carnem, nec piscem sapere: serobes vero valde profundas in litore fodere, cuniculorum instar, totum solum adeo cavum interdum efficientes, ut per illud gradientes nautæ, sæpiuscule genutenus in eas serobes inciderent. Hi sunt fortasse anseres, quos Gomara ait sine pluma esse, nunquam è pelago prodire, plumæque loco villo longo protegi.

CAPUT II.

De Avibus Iochualcuachili, Xochitena-
catl, & Tlanquechul.

Avis quam Chillenses Iochualcuachili seu caput nocturnum appellant admirandi est opificii. Assurgit illi à rostri exortu corona quædam, aut orbis in tres divisus cuspides, superiori parte mediocriter crassius, & è luteo rubescens: ab anteriori alarum bini aculei contorti exeruntur. His armis avicula imbellis adversus fortiores defenditur. Nullius vitam natura contempnit. Avis est litoris Oceani Septentrionalis alumna, salforumve lacuum, è quibus victum sumit. Inventa apud flumen Tupsæ, vix æquat sturni nostratis magnitudinem, sed collo constat tenui & longo, capite parvo, & in longum producto, prolixo rostro luteoque, prolixisque cruribus, & pedum digitis atque unguibus: ungues autem lutei sunt, digiti & crura cinerea cum inferiorum femorum parte, nam superior fulva est cum anteriori alarum parte, quarum posterior cyanea est. Reliquum corpus nigrum, quibusdam tamen fulvis circa ventrem permixtis pen- nis.

Nieremb.
Hist.
Exot. I.
10. c. 16.

XOCHITENACATL est columbæ magnitudine, rostro præ corpore mole maximò, superiori parte luteo, inferiori vero subnigro, & in purpureum colorem vergente, oculis nigris, sed iride rubesciente ex luteo, ac reliquo corpore ceruleo cinereoque. Vivit circa litora Oceani Australis; piscibus, quos rapit, vesci solet.

Nieremb.
I. 10. c.
9.

TLANQUECHUL dicitur avis peregrinæ gulæ: vivis duntaxat piscibus vescitur, mortuos non attingit; raptu gaudet, specie similis est platæ aut pellicano, sed coccineo pulcherrimoque universi ferè corporis colore, aut ex albo rubescenti, lato atque obrotundo circa finem rostro, cinereoque pupilla nigra, iride rubra rugosa, fronte galli pavonis, auræve depili

depili pæne capite, candentique cum universo fere collo, & parte pectoris, & fascia nigra latiuscula, capet à collo distinguente. Circa littora maris aut fluminum vivit.

CAPUT III.

De Avibus Acolin, Quachiltone, & Acacalotl.

Nie-
remb.
Hist. E-
xot. l. 10.
c. 22. 28.
24.

Acolin, Coturnicis est magnitudine fusca, prolixo rostro & curvo in inferiora, pedibus longis: juxta aquarum summitatem cursitat celerrime, nunquam fere volat. Versatur in lacu Mexicano. Vescitur pisciculis & ipsa esca vulgo. Bene Coturnicem aquaticam dixeris.

QUACHILTONEM, seu *Avem siliquastrini capitis*, aliqui Jacacintli vocant. Color illi purpureus, ex nigro intersestis pen- nis. Rostrium initio pallet. Adolescentibus rubet calvities juxta rostri exortum. Ful- cam imitatur. Lutea crura invirorum assur- gunt, in quatuor desinentia digitos palli- dos, citra ullam membranam. Oculi nigri, iris fulva.

Lacustris avis est. Piscibus vescitur, ip- saque non ingrata palato. Intempesta no- cte, & sub primo mane gallinaceorum ri- tu canit.

ACACALOTL mas seu corvus aqua- ticus à cauda extrema ad rostri usque acu- men quatuor fere spithamas longa, & me- diocris amplitudinis; crura sesqui spitha- mea, rostrum arcus instar incurvum, duos palmos longum, ac mediocriter tenue: pe- des in quaternos finduntur digitos nigerri- mis munitos unguibus: crura minus nigres- cunt digitis, rostrum cyaneum est, ac ca- put exiguum. Plumæ infernæ fuscae inser- tis rubris, superiores vero promiscue pur- pureæ, subnigræ, virides atque splenden- tes: *cervix* est septem digitos longa. Caput collumque pennis fuscis, albis & viridibus teguntur ac paulisper fulvescentibus. *Oculi* sunt nigri, iris vero sanguineo tegitur colo- re. Cæterum ab externis oculorum angulis usque ad rostrum, uncia unius intervallo deplumis & glabra est, pellis rubescensque in albo. Alæ viridi splendentique subtus pellucet colore, & qui pro variis solis re- percussibus evariet atque mutetur; super- næ vero prope exortum passæ sunt, dein- de vero viridi atque pavonino spectabiles colores. *Indigena* Mexicanæ plagæ avis est: versatur circa lacus, ac piscibus victitat. Masculus fortassis est ejus avis, quam re- centiores vocant Arcuatam, aut illi saltem congener. *Educat* filios veris tempore juxta lacustria loca.

Bonum præstat alimentum, nec valde injucundum, crassum tamen, atque (ut lacustres aves decet) pisciosi odoris.

CAPUT IV.

De Avibus Xomotl, Acototloquichitl, & Acacahoatli.

Xomotl palmipes est, dorso & alis desu- per nigris, pectore fusco. Cristatam iracundia facit. Pennas intexebant Indi suis vestibus.

Nie-
remb.
l. 10 c.
41. 35.
36.

ACOTOTLOQUICHITL seu *Passer a- quaticus mas*, passerem similitudine & forma simulat. Rostrium tamen nigrum, crura & pedes fulvi, inferiora corporis plarum- que candida. Cætera fulva, candore aliquo & nigrore variegata. *Reperitur* in Mexicanis plagis. Juncetis & carectis insi- det, ibique nidificat. Non minus occinit quam Sol pergit. Ab ejus exortu ad occa- sum contumaci garrit sonitu mures imitan- te.

ACACAHOTLI seu *Avis aquatica raucum sonans*. Halcyonum species illa est inquit Nierembergius, quam nostri mari- netum Piscatorem vocare solent, circa a- quarum fluentia victus gratia à congenita quadam versantem natura. Anate fera paullo minor est, colloque & rostro spitha- meo: hoc tres digitos latos prominet, me- dio, cum sortitur crassitudinem, in aciem definit, ac morsui est peropportuno. Su- perne vero nigrum est, inferne album, & pallescens circa latera. *Oculi* nigri sunt, iris rubra prope pupillam, deinde pallida, ac demum candens. Ab oculis ad rostri usque exortum fascia procedit viridi pallescens. *Crura* pedesque in digitos fissi virescunt extrinsecus, intrinsecus vero inclinant ad pallorem, color totius corporis magna ex parte albus est, fulvis pennis insertis, ve- rum superna magis fusca sunt, inferna ve- ro candida. *Alæ* infernæ cineræ, ac desu- per circa extrema nigræ, mox è fulvo ru- bescentes, deinde pallescentes ex fulvo, ac demum fulvescentes ex fulvo, ac de- mum fulvescentes circa dorsum. Piscibus victitat: mitescit minimo negotio, nec est cantu insuavis, indulgenter tamen ac blan- de vermiculis & aliis animalibus exiguis, quæ in paludibus gignuntur, ex alenda. Carne etiam vescitur, & aliis non paucis, ubi fieri aliter non possit. Crassi est nutri- menti, neque dissimile ei, quod anates fe- ræ præsentare solent. *Indigena* est Mexica- næ plagæ, & vere educat inter juncta sobo- lem. Mirum est, cum sit cervix pro ratione reliqui coloris longissima, in quam brevi- tatem illam. Cum libet contrahit, quod frequentius facere solet. *Caudæ* pusilla est, nigraque, & nihil præ se ferens splendoris, quæ in majorem procedit amplitudinem. Patrio nomine appellant *tolcomotli*. Simi- lis omnino esset hæc avis compari, nisi ro- strum

strum desuper nigricaret, subtus rubesceret, velut pedes & crura, nec per univ-
ersum corpus fulvum, nigrumque promiscue
cerneretur.

CAPUT V.

De Avibus Iacacintli, Xlepantototl, &
Hoaçtli.

Nie-
remb.
H. Exor.
l. 10. cap.
43-44-
45-
Jacacintli seu rostrum spica mayzii, tres
pæne spithamas est longa, virentibus
cruribus, capite ventreque cyaneis,
sed in purpureum vergentibus, alis promi-
sue fulvis nigrisque, luscis oculis ac ro-
stro, sed in coccineum prope exortum ver-
gente, quod tres pæne digitos latas lon-
gum est, anteriori parte capitis depili &
calva. Piscibus juxta lacus & flumina vivit
Edulis est ejus caro, sed nec bono, nec
grato alimento.

XLEPANTOTOTL Anatis fere
species est, importuna Mexicanæ paludi,
rostrum tamen in acutum finit: nullus illi
negatus color. Pulchritudinem varietas de-
dit, pulchritudo nomen.

Nec contemnendi spectuaculi est HO-
ACTLI, sive TOBACTLI, id est, avis
ficca, lacus Mexicani alumna, ternas spitha-
mas à rostri ipsius acumine ad caudam po-
stremam longa, ac gallinæ nostræ magni-
tudine. Crura proluxa, pedem, rostrum cum
uncia trientem, crassitudine vero polli-
cem æquans. Superne id nigrum est, late-
ribus autem pallens, ac inferne nigrum &
subfulcum. Oculi sunt magni, iris lutea, &
palpebræ rubæ: vertex plumis nigris tegi-
tur, itemque crista insigni, similiter nigra:
collum, venter, corpusque univ-
ersum candet: sed cauda cinerea est, velut & de-
super alæ, nam infernæ sunt albidiores,
superiores alarum partes virore quodam
splendent. Dorsum, et si candidis tegatur
plumis, pennæ tamen nigræ in virentem
splendorem inclinantibus vestiri solet. Pe-
des qui in digitos fissi sunt, & crura quo-
que, pallefcunt. Alba fascia circumcingi-
tur caput, à rostri exortu ad oculos usque
procedente Lacus Mexicani advena est,
vocaturque ab Hispanis indigenis, velut
& quædam aliæ aves, martinete piscador,
ob piscium quibus alitur capturam. Arun-
dinetis educat sobolem, gravem infert
morsum, ac gravem similiter vocem edit.

CAPUT VI.

De Avibus Heatototl, Achalalactli, &
Amaloçque.

Nie-
remb.
H. E. l.
10. cap.
47-48.
IDoneum quoque conspectum HEA-
TOTOTL, seu avis ventis exhibet. Ma-
gna crista exornatur, orbiculari, ac coronæ

modo eminenti, & paulisper candida. Pe-
ctus è fulco vergit in cinereum: venter al-
bus est, ac pedes plani: crura fulva, & pen-
næ circa ea ortæ: cauda orbicularis, & va-
riata inferne candido, pulloque colore,
superne vero fusca. Alæ subdus canden-
tes, cinereæ ac pullæ sunt, desuper nigre,
candidis tamen quibusdam infertis pen-
nis, reliqua vero eadem quæ aquaticis est
natura.

Similis alteri HEATOTOTL, quæ ana-
te domestica paulo minor est, rostro atro,
tenui, obrotundo, ac prope extrema con-
torto, plumis inferne candidis, superne
vero juxta femora fulvis, lineis tamen ni-
gris intercurrentibus, circa residuum ve-
ro, & caudam fulvis. Alæ sunt subtus cin-
ereæ, supernæ vero fuscae, nigrae atque al-
bæ. Caput est nigrum cristatumque, sed ab
occipito tenia albæ utrimque procedunt
ad oculos, qui atrii sunt, & lutea constant
iride, cum cætera sint similes avibus inco-
lentibus paludes.

Suus quoque torques argenteus hone-
stat ACHALALACTLI, seu avem piscium
vibratricem. Alii vocant Michalactli. Colum-
bina est magnitudine, & forma, rostro nigro
acuminato, tres digitos longo, & pro cor-
poris proportionem crasso, caput crista ornā-
tur è colore cyaneo in nigrum tendente,
longaque. Venter candidis tegitur plumis,
& collum torque candenti insignitur: Alæ
inferne albescunt, sed postremis partibus
videntur fuscae, & candicantibus maculis
interstinctæ, superne vero sicut reliquum
corpus sunt cyaneæ, extremis partibus ni-
græ, & albis undique resperstæ maculis.
Cauda partim nigra, partim cyanea est, sed
maculis albis per intervalla quoque varia-
ta. Crura rubea sunt, pedes diversi in digitos,
in atros unguis desinentes, oculi nigri, &
iris candescens. Advena avis est huic Me-
xicanæ regioni, versaturque juxta fontes
& flumina, pisciculis & aliis aquatilibus
victitans edulis, sed reliquarum avium pa-
lustrium sapore atque nutrimento.

Neque exiguus decore est AMALOSQUE,
seu avi rubescentis colli. Palustris ea est, no-
strati turturi magnitudine par, cruribus pe-
dibusque in digitos fissis, atque ex albo ru-
bescentibus nigris unguibus, rostro medio
circiter longo, exili & nigro, atris oculis,
& iride rubra, pectoris & ventris, & ala-
rum inferna alba sunt, sed cauda, quæ me-
diocrem magnitudinem nanciscitur, ful-
vo & nigro colore est inspersa: at collum
pectusque torques bini, minimi fere digi-
ti distantes intervallo, nigrisque cingunt,
quorum anterior undique circuit, po-
sterior superna deficit ac dispareret parte.
Ex utroque latere macula binæ candentes,
pari amplitudine, supra oculos versus col-
lum, illud fere attingentes, discurrunt. Su-
perna

perna corporis, adeoque ipsa cauda, albo, nigro, fulvoque sunt colore; alæ vero de super fulvo & fusco. Indigena est avis, lacus Mexicani alumna, ac veris tempore educans sobolem. *Estur* caro, quæ eodem quo cæterarum aquaricarum est nutrimento. *Vescitur* ipsa culicibus, pisciculisque & vermibus lacustribus: vehementius *perstrepat* quam pro corporis ratione, nectamen potest garrulis avibus adnumerari.

CAPUT VII.

De Avibus Farrensisibus.

INsula Farræ à plumarum copia nomen adeptæ videntur. Cum enim avium sint fœtura felices, nod mirum & plumarum abundare copia. Cæterum aves quæ ibidem reperiuntur, in aliquot distinxit classes Hojerus.

In prima CLASSE *Lundam*, *Alkam*, & *Lomviam* invenies. Illa mole corporis Anate est inferior, rostro rubente & latiusculo, pectus candida, tempus & alas nigra, pedes rubra. Revertitur primo vere. In præcipitibus celsarum rupium cavernis nidificat. Ova gallinaceis tum colore tum magnitudine paria edit. Quo sub autumnum abeat ignotum.

Alka illa aliquanto major est, rostro lato & nigro, itemque corpore, nisi quod sub pectore & extremis alis albicat. Pedes nigri, caput denique fuscum, nisi linea alba ab utroque oculo ad rostri partem proximam duceretur. Nidificat in editissimis scopulis. Ova ex albo & nigro maculata ponit.

Lomvie quæ illa major, corpus totum est nigrum excepto pectore quod albet. Pedes nigri, rostrum nigrum acutum, oblongumque. Ova in editioribus scopulorum marginibus excludit, cyanei quidem coloris, sed lineamentis undique diversorum colorum mire variegata ac velut picta.

In altera CLASSE, duas diversas species ponit, quæ quod pedes ad incedendum inutiles habeant, nunquam terram ingrediuntur, & mole corporis minorem æquant Anserem. Prior *Ildbrimel* vocatur. Caput ejus fuscum, sub collo circulus albus, pectus candidum. Tergum & alæ nigricant, maculata passim punctis albis; pedes nigri. Forte est mergus Farrensis maximus Clusii. Creditur in undis marinis Alcyonis more fœtum producere.

Altera est *Goisfugel* rostro admodum lato & incurvo. Capite oblongo atque nigro. Alis exiguis, pedibus nigris ad incedendum ineptis. Oculorum margines candido circulo tinguntur. Rarissime & nonnisi aliquibus annis visitur, nec ubi fœtura operam det, ignotum.

Tertiam CLASSEM tres species for-

ma discrepantur, tempestatum prænuncie, & quæ in alto tantum Oceano versantur, constituunt. Primo est *Hasslert* seu Equus marinus, ut inconvenienter appellant, quæ magnitudine gallinam mediocrem, forma falconem utunque æquat. Cinericio est colore, maculis albis passim interstincta, rostro incurvo velut falconis sed brevior. Ad ejus conspectum exhorrescere & littora legere piscatores solent. Certe tempestatem in propinquo esse noxiam.

Altera dicitur *Stormfinck* passerem paulo major. Tota est grisea, sive maculis, rostro admodum exili. Pesagum præ superiore rectius dixeris. Siquidem super ipsos fluctus incredibili pedum velocitate transcurrere, ac nimbi instar ferri solet. Videtur illi cognata quam Oviedus Patines à Nautis vocari reliquit. Catervatim si navigantibus appropinquet, deponenda esse subito vela innuit.

Tertiæ nomen est *Barnsiard*. Magnitudine hæc Passeri par, sub pectore candicans, collo dorsoque nigricans, rostro nigro & nonnihil latiore, pedibus rubris. Tam velocem se natando præstat, quam *Stormfinck* currendo.

In quarta CLASSE duæ diversæ Anserum species censentur. Prior *Helsingegans* capite & collo nigro, circulo albo cincto, pectore albo, alis gryscis, tergo cyanei coloris, pedibus rubris, magnitudine Anati respondens dici.

Altera *Erangans* anserem sylvestri pane minor, capite & pectore griseis, collo rubro circulo cincto, alis, collo, pedibus rubris. Rarissime in Farris conspiciuntur, neque ibi fatificant. Unde veniant, & quo migrent, nemini cognitum. Mutationem magistratus ubi apparuerunt imminere, superstitione ex longa experientia credidit.

Ultimum locum sibi *Skua* vendicat, avis aquilino generi & corporis mole & rapacitate respondens. Rostrum habet curvum. Sed non admodum latum, pennas corpus tegentes griseas, sola alarum extremitate albicante, pedes griseos. Pisce vescitur, sed & in omne genus avium grassatur. Fœtum negligenter ex ovis griseis, grandioribus, anatinis similibus, quæ exilibus nigris maculis notata sunt, in apertis campis producit. Aliter eam describit Clusius, & eandem fere cum vulture aquatico Oviedi existimat.

CAPUT VIII.

De Avibus Lomsbay, Vulturibus aquaticis, Flamencos dictis, & aliis quibusdam.

AVES LOMSBAY ab Hollandis dictæ, corpore sunt magno, alis parvis, ut mirum sit, tam gravia corpora attollere posse,

Hojerus
in Epist.
ad Clu-
sium.

Ovied.
Hist. Ind.
l. 14. c. 1.

Clusius
Exoticor.

Navigat.
Holland.

Clus.
Exo. l. 5.
c. 5.

posse. Frequentes circa portum Lomsbay in insula Aurangia, volant, unde & nomen invenere. *Nidulantur* in præruptis montium locis. Unicum duntaxat ovum pariunt. Ab hominibus nihil metuunt, etiamsi in suis nidis comprehendantur.

Nie-
remb.
H. Exot.
l. 10. c.
82.

VULTURES AQUATICOS facit *Oviedus* mole tam grandis quam magnus *Larus* est. *Rostrum* habent *Larorum*, sed magis mucronatum. *Pedes* diversi generis, sinistrum anatum & anserum instar planum, dextrum curvis unguibus instructum. *Vescuntur* piscibus & avibus, iidemque cum illis qui *Astures* aquatiles ab Hispanis vocantur, de quibus *Hernandes* in *Paralipomenis* agit, esse putantur. Frequentes sunt in Hispaniola & insula quæ à Divo Johanne nomen accepit.

Avis quam Hispani **FLAMENCO** vocant, grui est forma non absimilis. Juniores habent plumas candidas, ubi adoleverunt, mira elegantissimorum colorum varietate distinguuntur. Gregatim volant, sed haud alte. Juxta littora insulæ Cubæ atque in ipsis marinis fluctibus *visum* quærun, falsis undis ita assuetæ, ut quum ab Indis domi aluntur, (nam & cicurantur) sal potui earum necessario admisceatur.

De Laet.
Indiæ
Occid. l.
1. c. 11.

Habent & insulæ *Bermude maritimas*, quæ in subterraneis cavernis cuniculorum instar, nidulantur & ova sua ponunt, magnitudine & colore gallinarum ovis paria, ipsæ carne sunt obesa, & grati nutrimenti.

Idem. l.
1. c. 20.

Colophonem isti de Exoticis Avibus promiscuæ historiæ imponant illæ in Peruano ciconiis majores. Plumis sine ulla mixtura candidissimis, cruribus altis Ratiore sunt. Binæ ut plurimum incedunt. Et piscibus victitant. De reliquis quæ ad sua genera referri poterant, vide Notas.

Idem. l.
10. c. 5.

TITULUS III.

DE

AVIBUS BRASILIANIS:

Ex Georgii Marcgravii Historia
Naturali Brasiliæ.

De Avibus Brasilianis in genere notetur: Vix ullibi elegantiores Aves reperiri quam in Brasilia, si varietatem plumarum & colorum spectes; verum nulla fere suave canit, ita ut cantu longe à nostratibus superentur.

CAPUT I.

*Nhandugvacu. Iacana, varia ejus species.
Curicaca.*

NHANDUGVACU Brasiliensibus, EMA Lusitanis; Struthio avis. Ingentes hic reperiuntur, minores tamen a-

liquanto Africanis. Longa illi *crura*, inferiora sesquipedem, superiora pedem circiter longa. Tres habent in pedibus digitos antèrè versos, unguibus nigris, crassis, haud acutis præditos; posterius unum digitum, sed rotundum, grossum, unde difficulter in area levi aut tabulato possunt incedere, sed facile labuntur. *Collum* gestant incurvatum, ut *Cygnus* vel *Ciconia*; Longitudine circiter duorum pedum: *Caput* anserinum, *oculos* nigros habent pulchros; *rostrum* compressum, non admodum latum, duos & semis digitos longum. *Alas* habent parvas, & ad volandum ineptas, quarum tamen unam instar veli erigentes citissime cursum promovent, ut vix, ac ne vix quidem à cane venatico superari possint. *Plumas* habet gryscas per totum corpus, ut *grus*, in dorso longiores & elegantiores, & corpus plumis tectum fere rotundum apparet. *Caudam* non habet ejusmodi cristis præditam, ut vulgo pingitur, sed plumæ sunt per dorsum expansæ ad anum usque.

Tesseræ lusorias, aliaque ferramenta lubenter deglutit, sed non concoquit, at integra per anum reddit: *Vescitur* fructibus & carne.

Frequens in Capitaniæ Serigippo campis, itemque in Capitania Rio Grande. In Pernambuco non visitur. *Caro* illius bona ad comedendum.

JACANA Brasiliensibus, gallina aquatica, *Waterhun* diversæ reperiuntur illius species, colore differentes. Hæc elegantissima, magnitudine Columbæ, sed cruribus multo longioribus, flavi coloris, cui viriditas immixta. *Crura* inferiora plus quam duos digitos longa, superiora (maximam partem nuda ut aquaticis) paulo minus: quatuor habet in pedibus digitos, quorum medius è tribus antèrè versis, duos digitos longus, reliqui duo paulo breviores, quartus retrorsum versus, pedem, aut etiam amplius longo: omnes autem unguibus semidigitum longis & flavis armantur. *Cauda* brevis ut gallinæ sylvestris; *pennis* in dorso, alis & ventre ex viridi & nigro mixtæ, sub cauda albæ; versus collum, & in toto collo & pectore ejusdem coloris cum plumis quæ in collo pavonum aut columbarum quorundam visuntur. *Caput* habet parvum, ut gallina sylvestris, quod tegitur membranaceo quodam tegumento rotundo, coloris ut gemma Turcois. *Rostrum* rectum gallinaceum, plus uno digito longum; ab initio ad medietatem egregii miniati coloris reliqua pars eximii flavi, cui aliquid viriditatis admixtum. Frequentissima in palustribus Brasiliæ locis ubique. *Caro* illarum edulis, sed haud magni pretii, sunt enim plerumque macræ. Alia species appellatur à Brasiliensibus

Aqua

Agua pecaca, priori figura & magnitudine par; verum colore diversa & inferior. *Pennae* illius sunt ut in dorso prioris, *ale* magis brunefcentes: Carent autem mitella, at in qualibet ala interius habent corniculum directum, quibus se defendunt.

Tertia species prioribus figura & magnitudine equalis, colore autem differens, totum caput, collum, dorsum, cauda, nigri sunt coloris, initium alarum brunni: reliqua viridis, extremitates remigum brunni: *pectus* & infimus venter itidem brunni coloris, & uti crurum superiorum medietas superior. *Rostrum* rectum, crocei coloris, cum cuticula ruffa in exortu illius & parte capitis anteriori. *Crura* nuda, *pedes* cinerei. In qualibet ala, antica parte habet corniculum simile flavum.

Quarta species itidem figurae est ut reliquae. *Rostrum* illi flavum, mitella cutacea in initio capitis prope rostri exortum rubens, processus habens ad latera extensos more gallinarum Numidicarum. Totum caput, collum, *pectus* & infimus venter plumis vestiuntur nigri coloris, dorsum, cauda, & initium alarum ruffum, seu dilute brunnum; remiges alarum pennae thalassici coloris cum extremitatibus nigris. Sed haec remiges teguntur ruffis illis in exortu alarum, nec videri possunt nisi cum avis volat. *Crura* longa, digiti pedum longi, quilibet quatuor internodiis, cinerei coloris. Quilibet ala in anteriori parte habet corniculum acutissimum coloris crocei.

CURICACA Brasiliensibus à clamore dicta, *Masarino* Lusitanis, avis Numerio, iudicio Clusii, similis: magnitudo illi mediocris Anseris: capitis autem magnitudo ut Anatis: collum sex digitos longum, tres crassum, aut paulo plus: *Rostrum* sex digitos longum, incurvum plane ut ensis Hungaricus, coloris ex igneo fusci. Corporis longitudo à collo ad podicem undecim digitorum, caudae novem, desinentis cum fine alarum. *Crura* octo digitos longa, pedes duos & semis; rubri instar anatis sed non plani, quatuor digitis & unguibus nigris, tribus antierius, uno posterius verso. Caput & collum habet plumas albas flavo mixtas, & in superiore parte paulum oblongas: Oculi illi sunt nigri, circulo ruffo. Circa oculos & sub origine gutturis cutis nigra. Totum corpus nigris pennis vestitum, excepto dorso, capite & ventre, ubi cinerea obscura, & in medio alarum alba, cano mixta, ut in ciconiis. Reliquae pennae corporis, initii & finis alarum, & totius caudae nigrae. Tibiae superiores ad medietatem usque carent pennis, nam aquatica est avis.

Carnem bonam habet, quam saepe comedi coctam & frixam butyro.

Alia species reperitur huic similis, sed

multo minor, & magnitudine fere gallinae, quae vocatur *matui tui*.

Frequens est ad Flumen S. Francisci, in Itapuama & alibi.

CAPUT II.

Tjjeipiranga. Iacapu. Iambu. Gallina Africana.

Guiratangema. Iupujaba, Sayacu. Ani.

Guira guainumbi.

TJJEIPIRANGA Brasiliensibus, Avis alaudae magnitudinem paululum superat, & cantum passeris nostratis æmularur. Totum corpus, collum & caput egregie rubicundi seu sanguinei est coloris: ale vero & cauda splendide nigri, præterquam in initio alarum, ubi aliquid rubicundi admixtum est. *Crura* nigra inferiora quidem nuda, superiora autem nigris penis vestita. *Rostrum* instar passeris, superiori parti nigrum, inferiori versus acumen nigrum, reliqua versus caput album. *Pennae* in capite breviores, quas crispare interdum solet more Passerum. Omnes pennae totius corporis interius sunt nigrae, exterius rubrae, ita tamen complicatae, ut exterius totae rubrae appareant. Cauda longitudine ferme tres digitos æquat. Digiti pedum quatuor & ut in plerisque avibus dispositi.

Alia hujus species reperitur passeris magnitudine; quae pennis per totum corpus vestitur ex cinereo ceruleiscentibus; alae tamen quodammodo ad thalassinum colorem accedunt. In ventre & inferiori parte colli seu gutture albicat, vel potius argenteo colore niter. *Crura* cinerei coloris, ut & *rostrum*, quod ipsi simile Fringillae. Digiti pedum quatuor secundum communem avium modum.

JACAPU, Brasiliensibus; Avis magnitudine Alaudae, cauda extensa, alis brevioribus: cruribus brevibus & nigris; unguibus acutis ad quatuor digitos: rostro paulum incurvato & nigro, semidigitum longo. Totum corpus vestitur pennis nigris splendentibus; sub gutture tamen nigredini illi maculae coloris cinnabarii sunt admixtae.

JAMBU Brasiliensibus dicta avis est perdix, nostratibus quidem, magnitudine par, uti & figura. Pennae autem per totum corpus obscure flavescentes, verum fusco mixtae atque maculatae.

GALLINA Africana ex Insula do Majoro, magnitudine nostratium gallinarum, figura corporis fere ut perdix: collum item coronatum portans, & caudam perdicis habens inferius dimissam: pedes gallinaceos: rostrum flavum: & in capite mitellam cuticam fuscam: ad latera porro capitis alba, ut & ad quodlibet latus prope rostrum cri-

flam rubram ad latus protensam. Totum corpus vestitur pennis nigris, quæ elegantissimis maculis albis variegata sunt, in alis quidem oblongis, in reliquis autem partibus rotundis, suntque in dorso minores, quam in reliquis partibus. Huic similes vidi è Sierra Lyona advectas, sed eorum collum circumligatum seu circumvolutum, quasi linteamine membranaceo coloris cinerei cærulescentis. Caput tegit crista obrotunda, multiplex, constans pennis eleganter nigris. Punctula albicantia per totius corporis ambitum, quasi umbra thalassina variegantur.

Congensibus hæc avis dicitur *Quetele*.

QUIRATANGEIMA Brasiliensibus; Avis paulo major Alauda, Picæ variæ æqualis. Corpus habet circiter tres digitos longum, collum sesquidigitum: Caput parvum, rostrum rectum, acutum, digitum longum, crura pedesque, ut reliquæ aves communiter: Caudam longam, rectam, quatuor digitos longam: Color rostri niger, excepta inferiori parte, ubi inferitur quæ aliquid fusci habet: Caput nigerrimum & collum usque ad initium pectoris. Colli superior pars à capite fere ad initium dorso uranica est: per initium dorso transversam habet maculam nigram usque ad alas extensam: alæ autem sunt nigerrimi coloris, verum in medio secundum longitudinem habent maculam albam sesquidigitum longam: Cauda quoque tota nigra: reliquum corpus coloris uranici: crura subcærulea. Oculorum pupilla subnigra, albo subflavo.

Nidificat in altis arboribus *Acaya*, idque libenter prope ædes. Nidos egregios extruunt hæc aves, cylindraceæ figuræ, & appendunt magno numero extremitatibus ramorum, qui constant è virgultis. Clamant fere ut picæ variæ nostrates.

JUPUJUBA seu *JABU* Brasiliensibus, ejusdem formæ cum præcedenti, & eodem modo in eadem arbore nidificans (una est fœmina, alter mas) cauda paulum breviori. Corpus habet totum nigerimis pennis vestitum: in utriusque alæ medio maculam flavam digitum longam, in extremitate dorso, & prope anum tota est flava (vidi quoque totaliter nigras, dorso sanguinei coloris) cauda inferius ab exortu ad medietatem flava, reliqua medietas nigra, superius nigra in totum, solum in ea ad latera utraque usque ad medium pennam habens flavam. Crura nigra & pedes. Rostrum sulphurei coloris: oculi Sapphyrini, pupilla nigra: linguam cæruleam habet antèrè fissam seu duplicatam.

Prope ædes domini Ingenii *Tupacuraj* arbor *Uti* sita, in qua plusquam quadringenti nidi harum avium pendent, maxi-

moque numero sunt hæc aves, quæ ter quottannis ibi pullos excludunt: nidos autem quilibet ex arido gramine, & pilis equinis aut suillis mixtis est compositus, coloris fusci, figura cucurbitæ angustæ cum suo alembico, longus in totum sesquipedem circiter, & ab infimo ad unum pedem altus, cavus ut bursa, reliquem superius ad semipedem simplum est, & sua extremitate pendet à ramulo extremo: omnes autem nidi ex ramulis minimis extremis arborum dependent.

SAYAGU Brasiliensibus, Avis Fringillæ magnitudine: totum corpus vestitur pennis, coloris è cinereo & thalassino mixti, in alis autem & dorso thalassinum admiscetur, ita ut Sole illustrata egregie splendeant; rostrillum nigrum, oculi quoque nigri in totum.

ANI Brasiliensibus, Avis Turdelæ magnitudine, totaliter nigra, pennis, rostro, oculis, pedibus Caudam longam erectam habet, sex digitos longam: Rostrum altum, latum, digitum aut paulo plus longum: inferior pars directæ ferè, superior alta, lata, semilunaris figuræ, & compressæ, ita ut acumen fere superius habeat. Crura & pedes satis exiles, & in iis quatuor digiti, duo antèrè, duo posterius versi, more psittacorum. Clamat elata voce yiiiij uno tono, in medio elevatori.

Frequentes sunt in sylvis omnibus, verum cibo inutiles.

GUIRA GUAINUMBI Brasiliensibus *Tupinambis*; avis magnitudine Columbæ ad visum, quia plurimas plumas habet, sed revera corpus non superat magnitudinem Turdelæ. Caput paulo majus habet quam Turdela: rostrum nigrum, duos circiter digitos longum, cujus superior pars paulo longior inferiore. Est autem rostrum superius & inferius in latera serratum instar serræ, inservitque dentium loco. Crura habet breviora, haud multum digitum excedentia, nigra, quatuor in pedibus digitos, quorum unus retrorsum vergit, tres antorsum, sed primus versus interiorem pedis partem brevior, medius longissimus, & tertius iterum brevis, sed non æqualis cum reliquis exortus: primi enim exortus est ad pedem, secundi itidem, tertii vero prope tertium articulum medii, habetque primus tres, secundus quatuor, tertius ibidem tres articulationes, qui retrorsum vergit duas. Ungues nigri deorsum incurvati. Cauda longissima, directæ pennis paucis rectis, digitum circiter lata, sed decem longa: & quidem duæ tantum pennæ extremam caudam constituunt, quæ ad duos digitos plumis carent, in extremitatibus autem rursus plumas habent ad duos digitos. Corpus totum sex circiter digitos longum

gum est. *Penna* elegantissimæ: nimirum in capite quasi mitram gerit ex pennis Sapphyrinis, quæ prope exortum rostri Turcoidis colorem referunt: in medio autem hujus mitræ macula visitur nigra magnitudine grossi Misnici. Infra oculos (qui flavi sunt, pupilla nigra) etiam nigras pennas habet Sapphyrinis mixtas: *guttur* inferius, totum pectus & totus venter obscure luteum habet colorem; superior colli pars, totum dorsum, alæ & cauda viridis seu graminei est coloris, sed cui (præsertim in alis & cauda) thalassinus admixtus, ut in collis anatum & pavonum; à genibus ad ventrem crura superiora pennis virentibus sunt prædita. In medio collo inferius quasi pro insigni gerit tres vel quatuor pennulas nigras, & circum eas Sapphyrinas, quæ maculam quandam seu notam constituunt.

CAPUT III.

Iaguacati guacu. Mitu. Mituporanga. Ibijau.

IAGUACATI GUACU Brasiliensibus, *Papa Feixe* Lusitanis, nam piscibus victitat. Avis Turdelæ magnitudinem æquat, figura corporis ut Picus major. *Rostrum* habet nigrum, rectum, & in extremitate acutum, tres ferme digitos longum: *Oculos* nigros & *crura* brevissima nigra: superiora crura ex parte carent plumis; in pedibus digitos quatuor, (unum retrorsum) inæqualis longitudinis, duo enim versus exteriora pedis breves sunt, tertius interior longe brevissimus & remotior. *Ungues* nigri. *Cauda* duos digitos longa, excedens alarum fines. *Penna* totius corporis superiores, nimirum in capite, collo, alis, cauda sunt ferruginei coloris & splendentis: Circa collum transversim, annulum habet ex albissimis plumis; *guttur*, inferius collum, pectus, & totus venter pennis vestiuntur albis, prope utrumque oculum etiam maculam habet ex albis pennis: in cauda autem albæ pennæ interferuntur guttatim, ut & in alis, sed quæ vix videntur, nisi cum alas explicant & volant.

MITU vel **MITU** Brasiliensibus dicta avis ex Phasianorum est genere, major gallo gallinaceo. *Corporis* longitudo à collo ad exortum caudæ est decem digitorum: colli longitudo sex digitorum, totaliter nigris pennis est vestita, excepto ventre & sub ano, ubi brunni coloris est, fere ut perdix. Tenuiores sunt pennæ ad collum, caput, & in pectore, & holosericum illosum nigrum pulchritudine æquant. In summo capite habet pennas nigras complicatas in planissimam quasi mitellam, ut

nesciens vix possit agnoscere, quas irascens, aut etiam alias in cristam erigit. *Rostrum* habet insigne, non crassum, incurvatum, sesquidigitum fere longum; inferior pars ejus parva, superior ferme quadruplo major. *Rostrum* autem coloris est egregii incarnati, versus acumen tamen albicat. *Crura* habet gallinacea decem digitos longa, nimirum quatuor à pedibus ad genua, & sex superius, atque hæc vestita pennis nigris: digitos item quatuor gallinaceos, qui in exortu usque ad primam juncturam cuticula sibi invicem annectuntur, ut in aliis quibusdam avibus. *Caudam* habet pedem longam, instar gallo-pavi, quam semper in latum movet, *Kit, Kit*, clamando, ut illi. *Caput* bene formatum, anserini magnitudine: *Collum* sex circiter digitos longum: *Oculos* habet magnos, egregios, nigros, & pone aures maculam cuticam albescentem ut gallinæ. Mansuescit facile. Lubenter in alto sedet ut gallo-pavi, scanditque arbores, ut illi. *Carnem* denique habet admodum bonam. *Reperitur* & alia ejusdem species, quam *Mituporanga* vocant Brasilienses, solo rostro & pennis capitis differens; hæc *rostrum* habet haud longum, satis crassum non tamen ita altum ut *Mitu*, neque sic lunatum: ejus extremitas utrobique nigra, reliquum totum crocea cute vestitum, qualem & circa oculos habet. *Oculi* nigri egredi: collum & caput nigerrimas habet plumas instar holoserici, & in summitate capitis crispas atque cochleatim tortas habet pennas usque ad initium colli; has erigere in cristam crispam potest. Reliquum totius avis nigrum, cui nigredini hinc inde aliquid viridis transplendet. Circa anum albas obtinet pennas. *Crura* cinerea, figura ut *Mitu*. *Cauda* nigra, sed extremitates illius pennarum albæ. Et hæc quoque avis optime mansuescit.

IBIJAU Brasiliensibus, *Noitibo* Lusitanis: Avicula Hirundinis magnitudine: *Caput* habet latum & compressum: *oculos* magnos, elegantes, nigricantes, pupilla atra splendente ellipticæ figuræ, exterius autem oculos ambit circulus ex albo flavescens. *Rostrillum* minimum habet, quod non excedit crassitiem dentis aranei, nec tam est longum: nares tamen parentes in rostro: *Os* amplissimum, quod clausum non potest videri, at quando *rostrillum* aperit, os ad oculos diducere potest, ita ut digitum fere sit amplum; *Linguam* habet minimam. *Crura* albæ, & secundum corporis molem parvula, vix semidigitum longa; quatuor in pedibus digitos, tres antérieurs, quartum retrorsum versus, unguibus incurvatis nigricantibus. Secundum longitudinem in unguiculo digiti medii cujuslibet pedis versus interiora habet pinnam quasi

multipliciter sectam, seu dentatam, videturque unguiculus quasi plumatus versus interiora, sed non sunt plumæ, verum cutacea materia & aspera. *Caudam* habet elegantem, quam in latum potest explicare, duos digitos longam, cum ejus extremitate etiam alæ desinunt. *Pennas* in toto inferiori corpore habet ex albis & nigris mixtas, ut Nilus: In capite, dorso, alis & cauda nigricant, & albedo inspersa grata varietate: nonnihil quoque flavedinis albedini admixtum: uno verbo, nigra est & punctulata subtiliter hinc inde.

Reperitur & species hujus magnitudine Noctuæ, ejusdem coloris & conformationis. *Os* quando aperit, pugnum humanum facile admittit.

CAPUT VI.

Guainumbi varia species.

GUAINUMBI quæ & *Guinambi*, item *Aratica* & *Aratarataguacu* vocatur à Brasilienfibus, à Lusitanis *Pegafrol*, à nostratibus potest appellari *Bloemen Specht*. Hujus autem multæ hic reperiuntur species.

Prima: Totius corporis aviculæ longitudo ab initio capitis (ubi rostrum est insertum) ad exortum caudæ duorum digitorum. *Capitis* magnitudo una cum pennis magnitudinem cerasi dulcis mediocris æquat. *Colli* longitudo tres quartas partes digiti, corporis longitudo unius digiti est & quadrantis. Magnitudo autem corporis cum pennis olivam grandem vix æquat, *Rostellum* habet sesquidigitum longum, subrotundum, æquale, tenue, & valde acuminatum, rectum palulum tamen versus extremitatem dorsum versus; color hujus niger, excepta inferiori parte prope exortum, ubi rufescit. *Linguam* habet duplicatam, seu bisectam, tenuissimam instar serici fili tenuissima, albam, longam, ita ut illam longe extra rostellum possit exserere: *Ocellos* parvos nigros. *Crura* & *pedes* minimos brevesque, nigri coloris, in pedibus quatuor digitos, tres antérieurs, unum posterius versus, longis, simularibus, acutissimisque unguiculis nigris præditos. *Caudam* habet directam, digitum longam, quatuor ut plurimum pennis constantem. *Alæ* autem quæ duorum digitorum longitudinem habent, ad extremitatem caudæ fere pertingunt, pennæ singulari arte à natura sunt compositæ. Ab exortu enim alarum ad tres quartas partes digiti circiter duplex ordo pennarum est, unus longior altero, & superpositæ sunt sibi invicem pennæ, quasi alæ breves super longas. Hinc post has pennas, alæ pennæ (quarum circiter decem sunt) sequens interior semper longior sit antecedente exteriori, ita ut intima sit omnium longissima

finem alæ definiens. His alis expansis volare diu potest, ac in aëre quasi pendula manere; inter volandum strepitum edit instar bruchi, seu rectius *hur, hur, hur*, instar rotæ linteariorum quæ circumvolvitur: admodumque tenues apparent & transparentes pennæ alarum expansarum. *Color* plumarum aviculæ per totum caput, collum superius & ad latera, per dorsum totum & initio alarum est resplendens mirifice, nec à pictore bene exprimi potest; nam viriditati, qualis in Pavonum & Anatum collo, aureus, igneus, flavus mire admixtus est, ita ut Sole illustrante mirifice splendeant. In gutture, inferiori collo, pectore & toto infimo ventre, cruribusque superioribus albæ sunt pennæ, quibus in collo inferiori eximii coloris simul sparsim admixtæ, in ventre albis subjacent nigræ.

Alarum initium miro colore constare dixi, reliqua pars tota brunna est, seu spadicei coloris splendentis. *Cauda* pennis constat coloris instar chalybis politæ caerulefcentis. *Vicinat* floribus solum, ideo capta viva detineri non potest, sed moritur. Frequentes autem in floribus arboris, quæ Mense Januario potissimum florer, & potest aliquis vel sexaginta uno die sclopeto figere. Inveniuntur & super aliis arboribus variis. Toto autem anno, magno numero in silvis inveniuntur, & præsertim matutino tempore ingentem strepitum excitant. Non autem canunt, sed clamant, *Screp, Screp, Screp*, uno sono & continenter, fere ut passeris. *Volantes* velociter alas movent, & cum vix videantur, & per longum temporis spatium in aëre velut quietæ, vel se moventes hæere possunt alarum ope. *Flores* rostellis carpunt inter volandum. *Nidum* faciunt in ramis arborum solidi Hollandici magnitudine. *Ova* ponunt albissima testa, duo ut plurimum, ovalis figuræ, piso haud majora.

Secunda: Pulchrior priori, ejusdem magnitudinis & figuræ. *Rostellum* tamen brevius, nimirum duas tertias partes digiti longum, ejusdem figuræ & coloris cum prioribus; *Lingua* eadem, ut & ocelli, crura, pedes, cauda & alarum figura. Plumarum color in capite, collo superiori, dorso, alis, cauda similis priori; at in gutture, seu collo inferiore, toto pectore & infimo ventre usque ad extremum corporis, tam eleganti & splendente viriditate cum aureo colore transplendente sunt plumæ, & mire resplendeant. Prope anum macula est satis magna (respectu aviculæ) constans plumis candidissimis.

Tertia, minor reliquis omnibus. Ab initio capitis, seu exortu rostri ad exortum caudæ duos & semis digitos longa. *Collum* unum fere digitum longum: *Caput* haud magnum. *Corpus* sesquidigitum longum.

Rostell-

Rostellum paulo plus digito longum, nigrum, subrotundum, acutum ac fere rectum. *Crura* & pedes, ut reliquarum. *Pennarum* corporis & alarum etiam eadem dispositio, sed color diversus. *Caudam* longiorem habet reliquis omnibus, paulo plus tribus digitis longam, pennis constantem, quarum ea quæ exortui ejus vicinior, brevior, secunda semper longior, estque cauda furcata, & avicula volans eam in duo amplissima cornua expandit, ita ut extremitates cornuum sesquidigitum à se invicem distent. Totum *Caput* & collum hujus aviculæ ex nigro serico colore elegantissime cæruleum transplendet, ut in collo *Anatum*. Totum *dorsum* & pectus viride, aureum, & thalassino transplendens, ut in secunda specie, atque etiam prope anum talis macula est è plumulis albis. *Alarum* color epaticus est. *Cauda* ex nigricante cœrulenti instar politi ferri cœruleo imbuti.

Quarta, paulo minor tertia: Corporis figura & plumarum dispositio eadem, sed alio colore, nec non differens rostro, & crurum colore. *Rostellum* sesquidigitum longum, deorsum incurvatum instar ensis Polonici, subrotundum, ubique æqualis crassitie, & in extremitate acuminatum. Superior ejus pars nigra est, inferior flava, excepta extremitate quæ etiam nigricat. *Caput* superius, collum superiori parte, ut & alæ, colore sunt, ut prima species, guttur, collum inferius, totum pectus & infimus venter ex albo rufescentis sunt colores. *Caudam* habet plus digito longam, desinentem cum fine alarum, constatque pennis ex nigricante virentibus, quæ in Extremitatibus albæ. *Crura* eodem modo disposita habet, ut ceteræ species, sed haud nigra, verum alba seu flavescentia, similibus digitis, & unguiculis semilunaribus, acutis, & nigris.

Quinta, magnitudine par tertiæ speciei: *Rostello* nigro, paulo plus quam digito longo, & paulum deorsum incurvato, ocellis nigris, uti & cruribus & pedibus. *Guttur*, collum inferius, & totus venter nigris holosericeis vestiuntur pennis, cui nigredini quasi paulum cœrulei transplendet. Prope anum macula est albis plumulis. Extremitates autem nigri, nimirum ad latera colli, pectoris & ventris mire thalassino, aureo & viridi mixti resplendent. Totum *caput* superius, collum superius, & totum dorsum ornantur pennis, aureo, igneo & viridi mixtis, ut & initium alarum. Reliquum alarum ferreum est, seu fuscum. *Cauda* paulo plus digito longa, eleganter brunnis, cui cœruleus transplendet, pennis constat, circa oras autem pennæ illæ habent colorem, qualem chalybs politus cœrulescens.

Sexta, quintæ magnitudine par. *Rostel-*

lum habet paulum curvatum, digitum longum, inferius album, superius nigrum. Totum *caput*, collum, dorsum & venter, ac initium alarum insignis coloris resplendentis pennis vestiuntur, nimirum plurimo aureo, dimidio fere igneo, & minimo viridi mixto. In summa, splendet ut Sol. In ventre pennæ albæ pauca mixtæ. *Crura* nigra sunt. *Alæ* nigricantes. *Cauda* sesquidigitum ferme longa, elegans & lata, constans pennis quibusdam insignis illius coloris, quo reliquum corpus, quædam ex viridi & aureo mixti coloris, & per oras albæ, quædam in uno latere, seu medietate albæ altero virides, cui transplendet aureus.

Septima, paulo minor quinta & sexta speciei. *Rostellum* habet non omnino digitum longum, coloris per totum corpus cinerei fere, ut passer, cui hinc inde mire resplendens rubrum instar Rubini perlucet.

Octava: omnium elegantissima. *Rostellum* rectum, nigrum habet, semidigitum longum; *Linguam* longam duplicatam: magnitudo & conformatio est ut secundæ speciei. Totum *caput* superius & collum superius miro rubini colore fulgent, ac si rubinus radiis solis illustraretur. *Guttur* autem & collum inferius merum aurum Hungaricum politum, & radiis solis illustratum exhibent, ita ut impossibile sit perfecte similitudinem horum colorum reddere, multo minus à pictore representari. Initium *dorsi* holosericea nigredine tectum est, reliquum fuscis pennis, quibus tamen aliquid obscuræ viriditatis admixtum. Totus infimus *venter* ejusdem cum dorso coloris pennis vestitur, *Alæ* fusco ut in reliquis speciebus: prope anum maculam habet albam. *Crura* exilia nigra. *Cauda* digitum, & paulo plus longa, pennis constat brunnis rufescentibus (*sculemori*) quæ in extremitatibus per oras fuscescunt. *Cauda* lata, quam inter volandum egregie explicat. *Alarum* extremitas cum cauda desinit.

Nona, figura & magnitudine, ut prima. *Rostellum* superius nigrum, subtus rufum. Totum *corpus*, exceptis alis, insigni illa splendet viriditate cum aureo transplendente, quali secunda species in ventre. *Alæ* fuscæ, *Cauda* digitum longa, latiuscula, pennis constans coloris, ut ferrum politum cœrulescens.

Sortitur autem avis hæc varia apud Brasilienses nomina, præter generale *Guainumbi*, ut *Guaracyaba*, id est, radius Solis, & *Guaracigaba*, id est, capillus Solis. Fr. Ximenes scribit à Mexicanis appellari *Huitzitzil*. Avicula est, inquit, quæ habet plumas pictas variis coloribus, è quibus mixtis & compositis cum artificio, & admirabili industria faciunt Barbari imagines Sanctorum & aliarum rerum, atque ita conjungunt, ut optime similitudinem representent.

tent. Hujus aviculæ ea natura est & proprietas, quod non diutius vivat, quam flores plantarum durant, cujus melle victitat, quibus decidentibus, rostello suo se affigit arborum truncis, & sex mensibus ita immota manet, donec flores renascantur: quod tam multis testimoniis confirmatur, ut de eo dubitari non debeat. Ajunt pulverem hujus aviculæ haustum, curare arthritidem coralloidem. Hæc ille. Vidimus plures ejusmodi icones artificiose ex hujus aviculæ plumis concinnatas ita dextre, ut coloribus picta viderentur; si autem Soli obvertas, mirabiliter splendet.

CAPUT V.

Iacupema. Iacacaii. Iacurutu. Socco. Matuitui.

JACUPEMA Brasiliensibus, Phasiani est species; paulo major gallino minore domestica nostrate. *Caput* illi gallinaceum haud magnum; *Rostrum* gallinaceum: *Oculi* nigrescentes, *collum* septem circiter digitos longum; *corporis* autem longitudo ab exortu colli, ad exortum caudæ novem circiter digitorum. *Caudam* habet longam & latam, longam nimirum pedem. *Crura* longa, superiora plumis vestita & quinque digitos longa, inferiora tres, aut paulo plus. In pedibus quatuor digitos gallinaceos, quorum medius è tribus anterioribus duos digitos longus. *Plumis* tota avis vestitur nigris, quibus brunni aliquid mixtum. Ac capitis quidem plumas in cristam erigere potest. Cingunturque illæ nigrae aliis albis in ambitu. *Guttur* sub capite, & ad sesquidigiti longitudinem, in collo plumis nudum est, & rubra cute tectum. *Collum* totum inferius plumulis albis in nigris dispersi est variegatum, ut & totus infimus *venter*, ac alarum medietas posterior: superiora crura & cauda solis nigris constant, cui aliquid brunni mixtum. *Crura* inferiora & *pedes* elegantis rubri coloris. Cicurantur. *Carnem* habet bonam. Hæc avis à clamore suo nomen accepit, clamant enim *Iacu, Iacu, Iacu*.

JAMACAII, Brasiliensibus. *Avicula* Alaudæ magnitudine. *Corpus* tres digitos longum, *collum* plus digito, *crura* duos digitos, *cauda* fere quatuor. *Caput* habet parvum: *Rostrum* digitum longum, directum, paulum deorsum inclinatum, acutum, nigrum quidem, at inferius prope exortum paululum cœrulescens. *Caput* nigris vestitur pennis, uti & *collum* inferius, superius luteis: totum *dorsum*, *pectus*, & infimus *venter* luteis, *ala* nigris, in quorum medietate albæ insertæ, quæ maculas albas faciunt, in qualibet ala unam: ad exortum alarum transversim per dorsum tendit nigra

macula: *Cauda* etiam nigra. *Crura* & *pedes* fusci. Elegans est avis.

JACURUTU Brasiliensibus. *Bufo* Lusitanis. Noctua est, magnitudine æquat *Anseres*: *Caput* habet rotundum instar felis. *Rostrum* aduncum, nigrum, superiori parte longius. *Oculos* magnos, elatos, rotundos, & splendentes instar Cryalli; in quibus interius circulus flavus versus extrema apparet. *Latitudo* oculorum aliquanto major grosso *Misnico*. Prope aurium foramina plumas habet duos digitos longas, quæ instar aurium in acutum desinunt & attolluntur. *Cauda* lata est; neque alæ pertingunt ad illius extremitatem. *Crura* pennis vestita usque ad pedes: in quibus quatuor digiti, tres antè, unus postè versus, atque in quolibet unguis incurvatus niger, plus quam digitum longus, & acutissimus. *Penna* totius corporis variegata è flavo, albo & nigricante pereleganter.

SOCO Brasiliensibus, avis Aquatica, cujus multæ hic observari possent species; hæc cujus Iconem addimus, magnitudinem habebat *Ardeæ* minoris. *Rostrum* obtinet rectum, nigrum, & in extremitate acutum, duos & senis digitos crassum, ubi crassissimum. *Caput* illi instar *Ardeæ*, uti & *collum* pedem longum. *Oculi* nigri circulo aureo. *Ala* & *cauda* simul desinunt: *Cauda* enim brevis, nec supra quinque digitos longa. *Crura* satis longa, superiora quippe quatuor, & inferiora totidem digitos: in pedibus porro quatuor digitos, videlicet tres antè, unum postè versus. *Crura* autem superiora ad medietatem sunt nuda pennis: cætera fusca cute tecta. *Caput* & *collum* brunnis quidem pennis, sed quæ punctulis nigris variegatæ sunt, vestiuntur. Per totum collum inferius ad pectus usque tendit linea plumis albis, nigris & brunnis mixta. *Dorsum* & *ala* nigris quidem, sed quæ minutissimis punctulis flavescentibus variegatæ sunt, vestiuntur; *Venter* quoque ad eundem modum: sub alis denique nigrae, & albo maculatæ sicut pennæ.

MATUITUI Brasiliensibus, *Avis* Alaudæ magnitudine. *Rostrum* habet rectum, nigrum quidem, at in exortu inferius croceum. *Oculos* elegantes nigros. Totum *Caput* superius, *collum*, *dorsum*, *ala* & *cauda* superius coloris sunt obscure grysei, & remiges alarum nigricantes. *Caput* inferius, *guttur*, *pectus*, & infimus *venter* albicant; ut & *crura* superiora, quæ mediam partem pennis vestita, more avium aquaticarum. Supra exortum rostri in fronte maculam habet albam, & anulum album circa collum. & inferius semiannulum obscure gryseum, huic contiguum: nam guttur totum album est, collum superius totum

tum obscuru gryseum. *Crura* sunt subluteola; digiti autem pedum aliquid fusci admixtum habent. Tres solummodo digitos habet in pedibus, omnes antierius versos, qui in exortu cute ex parte junguntur: Unguiculi nigri.

Avis hæc ad littora maris & ripas salforum fluminum discurrit.

CAPUT VI.

Iabiru. Iabirugacu. Manucodiata.

IABIRU Brasiliensibus, Belgis vulgo Negro. Avis hæc magnitudine superat cygnum. *Corpus* illius quatuordecim digitos longum: *Collum* totidem, & brachii humani habens crassitiem. *Caput* satis magnum, *Oculi* nigri, *Rostrum* nigrum directe extensum; & superius versus extremitatem paulum incurvatum; undecim digitos longum, duos & semis latum; versus exteriora acuminatum; estque superior rostri pars paulo altior, & major inferiori. Caret lingua, & sub gutture ingluviem habet mediocris magnitudinis. *Crura* longissima, duos nimirum pedes: superiora enim unum pedem & digitum longa, & mediam partem pennæ nuda; inferiora undecim digitos. Sunt autem crura recta, nigricantia, & quasi squamata, digitorum medium crassa. In pedibus digiti quatuor, tres antierius, unus posterius versus; quorum medius quatuor digitos longus, cæteri paulo breviores. Tota avis vestitur albis pennis instar cygni aut anseris. *Collum* fere totum, nimirum octo digitorum, longitudine à capite numerando, caret pennis; ac hujus medietas cum capite tegitur nigra cute, reliqua alba cute. Sed puto in cute hæsisse pinnulas albas, & fuisse abreptas. *Cauda* lata definit cum extremitate alarum.

JABIRUGACU Petiguaribus, *Nhandu opoa* Tupinambis: Belgis *Deurvogel*. *Rostrum* habet magnum, septem & semis digitos longum, in extremitate teres & inferius incurvatum; caret lingua, & rostrum inferius canum est. In summitate capitis mitram ossæam coloris albi, & cinerei mixti gerit. *Oculi* nigri, & pone eos aurium foramina ampla. *Collum* decem digitos longum, cujus medietas, uti & caput, plumis, ac cute squammosa cinerea est tecta, cujus squamæ albicant. *Corpore* æquat Ciconiam; *Caudam* habet brevem & nigram, cum qua alæ definunt. *Crura* superiora ex parte albis vestita pennis, cætera tota cinerea, & quidem superiora crura longa sunt digitos octo, inferiora sex, aut paulo plus: digiti pedum quatuor, ut in priore. Totum corpus & collum albis vestitur pennis, & à collo longiusculæ pennæ propendent & circum. *Ala* albæ, remiges illarum pennæ

nigræ, rubini colore transplendente in nigro. *Pellis* detrahitur huic avi, ac caro ejus cocta comeditur; pinguis est & sicca, boni saporis, præsertim si cocta butyro frifetur. Comedi sapissime.

MANUCODIATA, & quidem Rex creditus; ad aspectum Columbæ, sed revera hirundinem æquabat. *Caput* habet parvum; *Oculos* parvos, rostrum rectum, satis crassum, acuminatum; sesquidigitum longum: *Collum* digitorum longum; *Corporis* autem longitudo à collo ad caudæ exortum vix trium digitorum & semis. *Alæ* supra septem longæ; *Cauda* lata & sex digitos longa. *Crura* duo habet, quodlibet inferius duos digitos longum; quatuor digitos in pedibus, tres antrosum, unum retrorsum versus, more communi; medius anteriorum paulo longior cæteris; posterior etiam satis longus; quilibet ungue lunato, seu adunco accipitrino forti præditus. Suntque crura & pedes satis crassi, ac ad rapinam comparati. *Ala* & cauda pennas habent latas & fortes digiti latitudine. Totum dorsum, infimus venter, alæ, cauda elegantis sunt brunni coloris; superius ad rostrum pennulas habet holosericum leve referentes, viridi & fusco mixtas; inferius ad rostrum similes nigri coloris. *Collum* superius flavi, seu aurei est coloris, inferius viridis cum aureo transplendente. *Pectus* saturate brunnium; sub alis in lateribus inter alas & crura, exoriuntur multæ pennæ, pedem plus, vel minus longæ, elegantis structuræ, quæ supra caudam longe extenduntur: sunt autem prope exortum flavi, seu aurei coloris, reliquæ ex albo flavescences, brunno umbratæ, seu dilute intermixtæ: inter has pennas duo quasi fila extenduntur; quodlibet longum duos pedes & amplius, ac versus extremum incurvata, obscure brunni coloris. *Crura* fusca sunt, unguibus magis albicantibus. *Rostrum* coloris est ex viridi & cæruleo mixti, versus acumen tamen albicans.

Hæc est illa avis, quam alii Paradiseam vocant: cujus aliquod reperiuntur species.

CAPUT VII.

Guirapunga utraque. Guiraquerea. Iacamaciri. Cariama.

GUIRAPANGA Brasiliensibus; Avis cujus sonus longe auditur; Turdellæ majoris magnitudinem superat, & columbæ fere æquat. *Rostrum* habet digitorum longum & latum, antierius acutum, cujus superior pars paulum prominet super inferiorem, ac deorsum est incurvatum; nigrum, naribus patentibus. *O*s illi amplum, quod aperire potest usque sub

oculos, ita ut oris apertura cum rostro triangulum formet. *Linguam* habet brevem. *Oculos* è nigro cœrulescentes. Sub gutture autem, quod latum habet, & in collo inferiori, multas digitum longas propendentes particulas carneas nigras habet, figura spiculi hastæ, vel quasi ligulæ. *Caput* obscure brunnis pennis vestitur. Totum *collum*, pectus, venter, dorsum & crura superiora leucophæis teguntur pennis, (quibus potissimum in dorso) nigricantes admixte, ac versus caudam etiam virescentes. *Caudam* habet tres digitos longam, leucophæis ac nigricantibus pennis pauca viriditate admixta. *Ala* (non multum post exortum caudæ desinentes) in initio sunt nigræ, reliquam partem nigricantes, quibus obscure virescentes pennæ admiscuntur. *Crura* inferiora nigricant, suntque plus digito longa; digitos quatuor habet cum cæteris communes, nigris unguibus: *Pectus* bifidum est, seu convallem habet per medium secundum longitudinem; tracheam amplam, unde etiam fortem clamorem potest edere. Duplicem autem sonum edit promiscue, una vice quasi quis securi percuteret cuneum ferreum, in silva (*cock, cick*) altera autem quasi quis campanam fissam tangeret *Kur, Kur, Kur*, &c. Clamat autem solum mediâ ætate, Decembris & Januarii initio per quinque aut sex septimanas, reliquis mensibus non auditur; unde Lusitanis *Ave de Verano* vocatur.

GUIRA PUNGA, fœmina; Turdelæ nostræ majoris magnitudine est & figura, & eodem modo carnosâ. *Caput* habet latiusculum, *rostrum* quoque latum, haud longum, *oris* hiatus amplius quando aperitur. *Rostrum* nigrum. *Oculi* satis magni. *Cauda* tres digitos aut paulo plus longa, nec alæ ad illius finem pertingunt. Tota avis vestitur pennis nigricantibus, quibus fusca & dilute virentes sunt mixtæ: magis tamen fuscus est in dorso color, in gutture, pectore, & ventre magis dilute virens, & mixtus ut nostræ turdelæ. Avis est pinguis & copiosæ carnis. *Crura* & pedes nigricant, cætera nihil differunt à communi norma.

QUIRAQUEREA Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine, sed quia longas alas, & caudam habet multo longiorem, videtur major. *Caput* latum, compressum, ac satis mangum habet. *Oculos* magnos & nigricantes; *rostellum* parvum, triangulare, compressum, & superiore parte aduncum. *Os* amplum, longe amplius rostro, quod apertum triangulum efformat. Ad utramque autem extremitatem rostri superioris ad latera digiti fere longitudine, in quolibet decem, aut duodecim circiter setas crassas suillas habet pro-

tenfas antè & ad latus. *Corpus* haud longum, sed rotundum fere est. *Pedes* quatuor digitis more communi constant, quorum medius longior reliquis; & unguiculo suo (quos omnes habet nigras) pectine corneo subtiliter serrato dotatus est. *Alas* longas habet, nimirum semipedem. *Cauda* octo digitos longa, constans in extremitate duabus pennis longioribus reliquis. Tota avis ex fusco cinerei coloris cum maculis obscure flavis aut albicantibus mixtis, more Nisi. Circa totum collum autem pone caput annulum habet obscure aureum. *Crura* cinerea seu fusca. *Digit* exigua pellicula connectuntur, non ita lata, ut in anatibus, nam non est avis aquatica.

JACAMACIRI Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* rectum, acutum, nigrum habet, duos digitos fere longum. *Linguam* brevem. *Oculos* cœruleos. *Alas* breves, quæ paulo post exortum caudæ desinunt. *Cauda* autem tres & semis digitos fere longa, recta, septem aut octo pennis constans. *Crura* superiora pennis vestita, inferiora nuda, cute flava & viridi mixta. *Pedes* itidem. In quolibet pede quatuor habet digitos, duos antè, duos posterius verfos; estque uterque interior, tam antè, quam posterius, dimidiam tantum partem longus præ exterioribus. *Unguiculi* nigri.

Totum caput, collum superius, totum dorsum, alæ, cauda superius coloris sunt viridis cum aureo & igneo mixti, ita ut mirifice resplendeat; ejusdem coloris annulus etiam circumdat collum. Sub gutture autem, in pectore & infimo ventre, & sub cauda obscure flavi coloris est, ut cera vestita.

CARIAMA Brasiliensibus; Avis Ardeæ majoris magnitudine; ex aquaticarum est genere: In capite super exortu rostri cristam plumatam gerit nigram cinereo mixtam, erectam. *Rostrum* breve, superius paulo aduncum, ex obscuro flavo fuscum. *Oculos* habet elegantes aureos, pupilla nigra, longis superciliis nigris. *Ala* desinunt paulo post exortum caudæ. *Crura* habet longa, superius mediam partem pennis vestita, cætera nuda & obscure flava: *digitos* tres in pedibus, medium longissimum posteriorem brevior, anteriorem adhuc brevior. Suntque digiti ad partem cute connexi. In postica parte pedis digitum parvum habet, altiori loco positum, & calcaneum rotundum, more Struthionis. *Ungues* digitorum breviusculi, lunati, fusci. Totum *corpus* pennis vestitur gryseis, seu cinereis fusco undatis, ut in falconibus, & obscure flavo mixto: extremitas alarum & caudæ fusca est, obscure flavo, & gryseo undata: in pectore & inferiore ventre plus habet grysei. *Caudam* demissam, collum ere-

rectum gerit. *Clamor* ejus instar gallo-pavi foeminae, & longe auditur. *Carne* est valde probata.

CAPUT VIII.

Guara. Urutaurana. Maguari. Guaranna. Ajaja. Picui pinima. Pica Cureba. Tuidara. Guacaguacu. Tapera.

GUARA Brasiliensibus (in Marahoon frequentissima, & Rio pe Ieneiro) avis est aquatica & terrestris, Albardcolae magnitudine. *Rostrum* habet ensis Polonici figura, longum, ex albo subcinerescens. *Oculos* nigros. *Collum* & *corpus* instar Albardcolae. *Alae* desinunt cum cauda, quae brevis & demissa. *Crura* longa, quorum superior medietas pennis vestita, reliqua nuda. *Digit*i pedum quatuor communi modo longiusculi, brevibus unguibus, prope exortum cute inter se connexi: crura autem nuda cum pedibus coloris ex albo grysei, uti & rostrum.

Tota avis vestitur pennis elegantis coloris coccinei; remiges tantum alarum nigras habent extremitates. Hæc avis primum exclusa coloris est nigricantis, hinc evadit cinerei, deinceps albi, sensim autem rubescere incipit, & secundo ætatis anno coloris est in totum, quem *Columbin* vocant, quoque magis senescit, elegantissimum illum colorem coccineum acquirit. *Vestit* piscibus, carne, adjuncta semper aqua.

Brasiliiani è plumis hujus avis varia componunt corporis ornamenta.

URUTAUANA Brasiliensibus: & *Urutau cuquibhu Cariviri*, Avis Aquilæ magnitudine. *Rostrum* habet nigrum, cujus superior pars adunca, prope exortum tamen flavum; *Oculos* eleganter aureos, pupilla nigra, quos cuticula cinerea obducere potest, licet palpebras non claudat. *Caput* aquilinum quidem sed superius compressum, seu planum, in cujus summitate duas habent pennas nigras, duos circiter digitos longas, cum duabus parvulis ad latus quod libet: illas autem quando vult, in altum surrigit, atque iterum componit, *Alae* paulo post exortum caudæ desinunt. *Cauda* ei lata instar Aquilæ. *Caput* superius fuscis tegitur pennis, quarum oræ subflavescent. Totum *collum* superius, & ad latera brunnis (ut perdix:) totum *guttur* cum collo inferiori est album, ita tamen, ut albedo ad latera pennis nigris sit variegata. Totum *pectus* & *infimus venter*, crura superiora & inferiora usque ad pedes pennis vestiuntur albis, quibus nigræ squamæ admixtæ sunt. *Alae* & *cauda* fusci sunt coloris cum umbra mixti, atque oras habent subtiles albicantes. Remiges alarum

pennæ sunt fuscae & nigris undis variegatae. In pedibus digitos habet quatuor flavos, unguibus lunatis fuscis. Clamat *Geh*, *Geb*, ut pullus gallinaceus qui matrem perdidit. Rapax avis, crudam comedens carnem Projectam sibi avem, sive vivam, sive mortuam, unguibus arripit, & rostro egregie deplumat, dein dilacerat, & carnem ossaque deglutit; unam harum diu vivam alui in munimento Mauritii ad Flumen S. Francisci.

ANNOTATIO. Icon hujus avis haud male convenit cum Icone Nycticoracis Gesneri; non tamen Nycticoracis veterum, sed vulgo sic dicti circa Argentinam, & alibi circa Rhenum, avis piscatoriæ) nisi quod in Capite tres pennas habeat.

MAGUARI Brasiliensibus; Avis Ciconiæ similis figura & magnitudine, atque etiam ex parte colore. *Collum* habet pedem longum. *Rostrum* rectum, acutum, novem digitos longum. *Crura* longa & nuda, ut ciconia. *Caudam* brevem, cum qua alae desinunt. *Rostrum* in exortu ad medietatem usque ex viridi flavescens, reliqua medietas extrema ex cœruleo cinerea. *Oculos* habet parvos, argenteos, pupilla nigra, & circa eos cutem cinnabriam, ac similem etiam inferius prope exortum rostri, seu inter rostrum, & guttur: quam more *Senembi*, irascens dependere sinit sub gutture.

Totum *Caput*, *collum*, & totum *corpus* albissimis vestitur plumis; ac inferiori parte colli pennæ albæ illæ sunt longiusculæ. *Cauda* autem quoque alba, at superius nigris aliquot pennis tegitur. *Alae* in exortu albis teguntur pennis, sed prope dorsum nigris: nigredini autem persplendet viriditas. *Crura* sunt rubra, ut & pedes, quos cum Ciconia communes habet. Rostro crepit, ut ciconia nostras. *Caro* illius edulis.

GUARAUNA Brasiliensibus, Rusticola aquatica, magnitudine *Iacu*. *Rostrum* habet teres, paulo deorsum inclinatum, flavum at in extremitate fuscum, quatuor & semis digitos longum; *corporis* autem illius longitudo est totidem. *Crura* superiora mediam partem pennis vestita, sex digitos longa: *Digit*i pedum quatuor ita dispositi, ut communiter; quorum medius tres digitos longus, cæteri breviores.

Tota avis vestitur pennis fuscis, multa umbra mixtis. *Caput* autem & *collum* totum ejusdem coloris, & præterea albo punctulatum, ut in *Iacu*.

Carnem habet satis bonam, quam sæpius comedi.

AJAJA Brasiliensibus, *Colherado* Lusitanis, Belgis *Æpelar*. Avis figura conveniens cum Europæis, solo colore differens. Anserius magnitudine. *Rostrum* instar cochlearis lato, albo: *Collo* longo, pedibus latis.

Tota alba est, sed in dorso & alis dilute incarnati coloris persplendentis. *Caro* illius edulis, & sæpe comedi. Frequens est ad Flumen Sancti Francisci, & alibi passim in locis palustribus.

PICUI PINIMA Brasiliensibus. *Columbæ* silvestris species, paulo major *Alauda*, *Rosellum* habet columbinum, fuscum. *Ocellos* nigros, circello aureo. Totum *caput*, collum superius & ad latera, dorsum & alæ pennas habent obscure cinereas, seu lividas, oris nigricantibus lunatis. Longiores autem alarum pennæ, seu remiges, quæ inter volandum videntur, rufi sunt coloris, uno latere nigricantes, ut & in extremitatibus. *Cauda* longiuscula ex pennis constat è cinereo fuscis, quarum & quædam nigræ, & medietate exteriori albæ. *Venter* albas pennas habet oris lunatis fuscis. *Crura* & pedes columbini albescentes. *Carnem* habent bonam, & sunt admodum pingues.

PICA CUREBA Brasiliensibus; quoque *Columbæ* silvestris est species, coloris cinerei cum ruffo mixti; pedibus & cruribus rubris.

Avicula (cujus nomen *Auctor non prodit*) passeris magnitudine & figura, tota nigra, capite tamen albo, & cauda ex multo nigro & gryseo colore mixta. Clamat *zip, zip*.

TUIDARA Brasiliensibus; *Ululæ* est species, Germanis *Schleier-Euln* / Belgis *Kierckuple*. Capite rotundo, naso elato, & plumis compexis constrato; sub naso rostrum habet aduncum, album: oculos autem nigros. Tota avis faciei superficies, cordis, uti pingitur, habet figuram, plumulis obscure ex albo flavis, cum paucis nigro mixtis, quasi fimbria circumdata essent. *Plumæ* totius avis mixtæ albo & pallide flavo ac gryseo: *Alæ* undatæ, uti & cauda. *Corpus* subtiliter punctatum cum fusco. Describitur & à Gesnero.

GUACA GUACU Brasiliensibus, Lusitanis *Gairvota*, Belgis *Mecutwe*. Avis gallinæ vulgaris magnitudine, rostro recto, longo, crasso, flavo. *Caput* superius nigris tegitur pennis, ut & ultima medietas alarum & *Cauda*. Guttur, totum collum, pectus & infimus venter, ac initium alarum sunt alba. *Ova* ponit in arena, gallinaceis figura, magnitudine & colore similia: quæ quidem boni sunt saporis, sed *caro* avis nullius est pretii.

TAPERA Brasiliensibus, *Adorinha* Lusitanis, *Hirundinis* species, nostratibus similis, ejusdem magnitudinis, & eodem modo circumvolitans. *Rostrum* breve, latiusculum habet & nigrum. *Os* amplum, quod aperire ultra oculorum regionem potest, ut *Ibia* junior. *Oculos* elegantes, nigros. *Alas* longas, desinentes cum fine caudæ, quæ latiuscula est. *Crura* & pedes ut nostra-

tribus. Totum *caput* superius, collum, dorsum, alæ & cauda pennas habent coloris ex fusco cum gryseo mixti, remiges alarum & extremitas caudæ paulo magis fuscescunt reliquis partibus. Sub gutture & in pectore grysei est coloris cum albo mixti. *Venter* est albus, uti & sub cauda albet. *Crura* & pedes fusci.

CAPUT IX.

*Psittacorum majorum & minorum
varia species.*

PSITTACORUM in Brasilia maxima est copia & summa varietas; quos Brasilienses communi nomine vocant *A JURU*. Aristoteles lib. IV. *Histor. Anim.* cap. X. scribit; *Ea quæ ova pariunt, an somnient incertum est, manifestum vero ea dormire.* Ego utrumque adfirmo cum Jul. Scaligero in *Commentariis*, & quod ille de suo *Turdo* & *Accipitribus*, ego de meo *Psittaco*, quem *Lauram* vocabam, nam sæpius de nocte seipsum expergiscens semisomnis sublocutus est. Idem Lib. VIII. cap. X. scribit, *Psittacum à Græcis etiam ψιττακον vocari.* *Psittaci* nidificant in cavis arboribus, ubi foramen extra rotundum faciunt, ac ova duo aut tria columbinis similia imponunt sine nido aliquo ficto. *Ova* si tangas, nihilominus excluduntur, nec *Psittacus* ea deferit. Pullos excludunt medio Junio & fine: plumati autem pulli inveniuntur apti ad eximendum fine Julii, & medietate Augusti. *Psittaci* juniores primum exclusi vermes crassiusculos habent, in quolibet narium foramine unum, ac præterea in summitate capitis tuberculum, in quo itidem vermis crassus latet. Omnes autem vermes brevi sponte excidunt, ac locus per se sanatur. Fiunt varii coloris à *Tapuyis*, deplumando juniores, & cutem variis coloribus inficiendo, Lusitani vocant *Papagios contrefeitos*. Nullus *Psittacorum* Brasiliensium, præter *Curicos* se manibus tangi in corpore permittit.

Prima species A JURUCURAU elegantissima est. Supra *Rostrum* in capite micellam habet eleganter cœruleam: Guttur, latera capitis & superior illius pars eleganti flavo vestiuntur, totum corpus læto viridi. In alarum extremitatibus pennæ una medietate nigræ, altera crocæ, partim etiam in extremitate cœruleæ, partim hinc inde virides. In summa, elegantur variegatæ. *Cauda* viridis, sed quando illam explicat, fimbriata nigro, rubro, cœruleo. *Crura* & pedes cinerei coloris. *Rostrum* ex cinereo fuscum. *Oculi* nigricantes, circulo aureo. *Lingua* omnibus lata & crassa.

Secunda species priori similis, paululum aliter

aliter variegatur coloribus, nimirum in summo capite mitella flava, cui albedo mixta, super oculos, & in gutture clare flavo. Circa rostrum superius macula est thalassina.

Tertia species; AJURICURICA. Mitram habet in capite ex cœruleo & paucō nigro mixtam, in medio mitræ maculam flavam. Infra oculos flava, & in gutture cœrulea est macula. Viriditas in pectore, alis & dorso paulo saturatior, in extremitatibus alarum & cauda dilutior. Extremitates pennarum alæ flavæ & rubræ, & Indico colore mixtæ. Cauda inferius ex flavo & viridi mixta, superius dilute viridis. *Crura* è cinereo cœrulescentia. *Rostrum* superius cinereum, in extremitatibus nigrum, ungues pedum nigri.

Tui, vulgo *Perroquet*.

Prima species: Magnitudine *Hirundinis*: in totum viridis coloris: cauda longissima, rostrum nigro, aduncum.

Secunda: *Tui* apud *juba*, viridis in totum & quidem dilutius in reliquo corpore, in ventre flavescens, in alis obscure viridis. Cauda longissima: magnitudinis ejusdem cum priori; *Oculis* magnis, subnigris, circello ex pennis circa oculos luteo, & supra rostrum, quod nigrum & aduncum, in capite maculam habet magnam ex pennis *Aurici* coloris.

Tertia Tui TIRICA, paulo majores sunt *Guineensibus*, in totum viridis coloris, qui tamen in dorso & alis plerumque saturior, in reliquis partibus dilutior: rostro incurvato incarnati coloris. *Oculis* nigris; *Pedibus* cœrulescentibus; Cauda paulum ultra extremitatem alarum protensa. Admodum hi mansuescunt, & cibum ex alicujus ore capiunt, & manibus se tractari sinunt. Item instar *Psittacorum* garritum addiscunt.

Quarta: Magnitudine *Sturni*, ejusdem coloris cum secunda specie, sed breviori cauda.

Quinta JENDAYA: Sunt magnitudine *Merulæ* aut minoris *Turdæ*, rostro & cruribus nigris, oculis nigricantibus, circulo aureo, exterius albo: Dorsum, alæ & cauda, ut & anus viridibus pennis vestiuntur, quibus thalassinus mixtus: Extremitas alarum quodammodo nigrescit. Totum caput, collum & pectus flavi coloris sunt, cui luteus intermixtus.

Sexta TUJETE, magnitudine *Alaudæ*, in totum dilute viridis coloris. At initium alarum egregie cœruleum est, & omnium pennarum in alis oræ cœuleæ, ita ut complicatæ, quando quiescit avis, maculam longam cœruleam prope oram lateralem alæ ostentent. In dorso ad exortum caudæ usque etiam macula cœrulea est. Cauda brevis. *Rostellum* incurvatum,

incarnati coloris. *Crura* & pedes cinerei.

Septima: TUIPARA *Tupinambis*, magnitudine *Alaudæ*, in totum dilute viridis coloris, cauda brevior, ita ut cum alis desinat. Rostro incarnato; cruribus gryseis. Prope rostri exortum in fronte, maculam habet semilunarem miniatam, quasi coronam, quæ & inferius est, in cujuslibet alæ medio lutei, seu *Uranici* coloris. *Nidificant* in cumulis à formicis relictis, qui in arboribus reperiuntur.

Psittaci & *Tui* semper catervatim volant nimirum bini ac bini juxta se invicem. Sylvæ his plenæ sunt, & sæpe quadringenti & quingenti simul volant, strepitum magnum clamore excitantes. Confident in altissimis arboribus: nidificant potissimum in mediterraneis. Caro boni saporis, si assentur, maxime *Perroquet*.

ARARACANGA *Brasilienfibus*, *Psittacus* maximus, majores sunt corvis nostratibus. Caput magnum, superius planum, & latum habet. *Oculos* pulchros, cæcios, pupilla nigricante: *Oculos* autem exterius ambit membrana alba, ut & maxillas & rostrum inferius: hæc subter oculos semilunari forma est producta. *Rostrum* incurvum, magnum, superius albicans, inferius nigrum. *Linguam* habet ut *Psittacus*, & eodem modo edit. *Voces* etiam quasdam sonare discit. *Rostrum* superius tres circiter digitos longum, altum seu latum. *Crura* & pedes, ut *Psittacus*, habet nigros. Totum caput, collum, pectus, venter, crura superiora, & cauda inferius, ut & initium alarum superius elegantibus rubris pennis vestiuntur, per medietatem autem alæ tectæ sunt viridibus, extrema autem medietas alarum usque ad finem cœruleis ornatur. Extremitas dorso prope anum superius, & cauda cœruleis constant, quibus aliquot brunni coloris admiscetur. Cauda longa est decem circiter digitos, & longe prominent ultra finem alarum.

ARARAUNA *Brasilienfibus*: Figura alteri similis, sed alteris coloris. *Rostrum* nigrum, *oculi* cæcii, *pupilla* nigra. *Cutis* circa oculos alba nigris pennulis variegatur quasi acu picta esset. *Crura* & *pedes* fusci coloris. *Caput* anterius supra rostrum mittellam habet viridibus pennis; sub rostro inferiori ambiunt guttur pennæ nigræ: *Collis* autem latera, reliquum guttur, totum pectus & infimum ventrem tegunt pennæ flavi coloris. Extremum caput, collum posterius versum, totum dorsum & alas exterius cœrulei. Extremitatibus alarum plumæ flavæ sunt admixtæ. Cauda constat longis pennis cœruleis, quibus aliquot flavæ immiscentur. In genere autem cœruleæ pennæ interius sunt nigræ, & quodammodo etiam nigredinem ad latera de se spargunt.

A N A C A Brasiliensibus: *Perroquet*; magnitudine *Alaudæ*. *Rostrum* fuscum, aduncum. In capitis summitate epatici coloris pennæ, ad latera circa oculos brunni; *guttur* cinereum; *Collum* superius & latera viridia. *Venter* habet pennas & brunno rufescentes. *Dorsum* viride maculam habet dilute brunnam. *Cauda* quoque dilute brunna. In alarum initio sanguinea macula sive fimbria est: reliquum alarum viride, extremitas thalassini coloris. *Crura* superius viridibus vestita pennis, inferius cute cinerea, unguibus nigricantibus. Elegans plane avis.

M A R A C A N A Brasiliensibus, avis *Psittaco* plane similis (cujus & species) sed major, plumæ totius ex gryseo subcœrulescunt, clamat ut *Psittacus*. Fructus amat, *Murucuja* imprimis.

M A R A C A N A Brasiliensibus, itidem *Araræ* species minor: magnitudine *Psittaci*, figura *Araræ*, cauda longatili, rostro, & cute circa oculos. *Rostrum* nigrum, cutis circa oculos alba punctulata plumulis nigris. *Oculi* flavescentes, pupilla nigra. Totum caput collum & alæ saturate viridis coloris ut in *Amuricurica*; summitas capitis dilutior & quodammodo cœrulescit. *Cauda* superius viridibus & in extremitate cœrulescentibus, inferius saturate constat pennis. *Ala* interius etiam rubræ, exterius virides, & extremitates cœrulæ obscure. In exortu cujuslibet alæ maculam habet miniatam. Super rostri exortum, superius maculam habet parvam fuscam. *Crura* & pedes fusci. Clamat *Oe, Oe, Oe*.

Q U I J U B A T U I flavus est totus, magnitudine *Tuiapara*; *rostro* incurvato gryseo, *Oculis* nigris. Extremitas alarum obscure viridis est: *cauda* longa flava. *Crura* coloris incarnati. Facile & valde mansuescit.

P A R A G U A *Psittacus* est niger, magnitudine *Ajurucariu*, pectore dorso & ventre medietate anteriore insigniter rubro. *Oculis* nigris, circello rubro. *Rostro* fusco, seu obscure cinereo. *Cruribus* & pedibus obscure cinereis.

T A R A B E Brasiliensibus, *Psittacus* est viridis: major quam *Paragua*, capite rubro & pectore atque initio alarum. *Rostro* & pedibus obscure cinereis.

A J U R U C A T I N G A Brasiliensibus, *Psittacus* magnitudine pulli gallinæ mediocris, totus viridis, oculis rubris, & circa oculos cute alba. *Rostro* albo, & cruribus albis. *Caudam* habet longam, viridem.

A J U R U A P A R A Brasiliensibus, in totum convenit cum præcedenti, sed minor est.

CAPUT X.

Ipecu. Urubu. Tamatia utraque. Guirajemoja. Gurraru nheengeta.

I P E C U Brasiliensibus, *Cortapao Lusitanis*, Avis magnitudine columbæ. *Colli* longitudo duorum digitorum, corporis autem quatuor, & *cauda* idem quatuor, crurum fere sesquidigiti; in pedibus quatuor habet digitos, duos antrorsum, duos retrorsum versos, ut in *Psittacis*. Caput vestitur pennis cinnabii coloris, in quo & cristam habet instar columbæ: collum ad rostrum usque inferius nigrum, ut & superius; In utroque autem latere linea est alba, crassa, quæ divisim ad dorsum protenditur. *Ala* exterius totæ nigræ, interius albæ; *Cauda* nigra; in ventre & cruribus superioribus pennæ sunt nigræ, & albæ. *Rostrum* illius rectum, acutum, sesquidigitum longum, quæ arborum cortices exscindit, ut *Picus*.

U R U B U Brasiliensibus, vulgo *cin Men-schen-esser*; Avis rapax, magnitudine *Milvi* & *Nisi*, pedibus gallinæis subalbicantibus, *cauda* longa, & alis ea longioribus. *Penna* totius corporis sunt nigræ cum paulillo ravi coloris hinc inde mixtæ. Caput habet parvum, figura pene gallinarum *Indicarum*, cute testum paululum rugosa. In summitate autem capitis secundum longitudinem quasi dividitur cutis, & in sinistro latere capitis infra oculum crocei est coloris, supra oculum cœrulei, in summitate item, reliqua parte ex ruffo subbrunni. In dextro latere capitis circa oculum superne & inferne crocei coloris, in summitate itidem, reliqua parte ex croceo albicantis. *Rostrum* habet satis longum, exterius aduncum, acutum, & ad medietatem usque à capite cute obtectum ex croceo cœrulescente. In medietate rostri superioris narium foramen unum amplum transversum positum; extremitas rostri, quæ cute caret, est alba. *Oculos* habet elegantes rubini fere colore, pupilla rotunda nigra: *Palpebre* sunt crocæ: *Linguam* carinatum, in ambitu denticulis acutis præditam. Fœter ejus caro instar cadaveris: nam & cadaveribus vescuntur, & in maxima copia statim advolant in *Capitania Sirigippo*, & *Flumine Sancti Francisci*, quando quis bestiam aliquam mactat. Fœda avis, semper macra, nunquam satuta.

T A M A T I A Brasiliensibus; Avis *Alaudæ* magnitudine, seu *Pici*. Tota punctulata, & variegata maculis ut *Turdus* minor, Germanis vulgo *cin Trostel*: in ventre albas habet pennas, maculis fuscis: sub gutture autem flavescit uti & circa collum. *Rostrum* habet longum rubrum, superius

rius paululum fuscum; cujus superior pars paulo longior, quam inferior. Supra nares subtiles aliquot extant pennulæ instar pilorum. In pedibus quatuor habet digitos unguibus aduncis. Caret cauda. Caput illius majus quam proportio corporis requirat, uti & rostrum.

TAMATIA itidem Brasiliensibus dicta, avis aquatica, forsan gallina. Nisi rostrum obtinet, magnitudine Yassana asu: dorso incurvato incedens & collo incurvato. Caput habet magnum, oculos magnos nigros, prope exortum rostri existentes. Rostrum duos digitos longum, plus uno latum, instar anaticis quidem, sed antierius acuminatum: estque superior ejus pars nigra, inferior flavescens. Crura superiora pennis nuda, satis autem longa: Digiti in pedibus quatuor, quorum tres antierius, unus posterius versus, more gallinarum, suntque longi ut in Waterhoen. Crura & digiticoloris ex virescenti flavi. Cauda brevissima, & non longior quam in Yassana. Caput nigris pennis vestitum, reliquum corpus brunis; in ventre autem albicanter pennæ intermiscuntur.

GUIRAJENOJA Brasiliensibus, Avicula magnitudine Fringillæ. Rostrum habet vix semidigitum longum & nigricans, ocellos nigros. Totum caput, collum inferius, pectus, infimus venter & dorsi medietas extrema pennis vestiuntur cœruleis: Collum superius & dorsi medietas anterior nigris: Alæ quoque nigræ, sed quibus in initio illarum insperæ cœruleæ, reliquæ nigræ sunt, sed oras habent cœruleas. Cauda sesquidigitum fere longa & itidem nigra, desinuntque alæ paulo post initium caudæ. Crura fusca, in pedibus quatuor digiti vulgari modo.

GUIRARI NHEENCETA, Brasiliensibus; Merulæ aquaticæ magnitudine, aut paulo major. Rostrum habet rectum, compressum, nigrum, plus dimidio digito longum: Oculos Sapphyrinos, pupilla nigra. Crura quæ superius vestita, sunt pennis cinereis, inferius nigra cute teguntur, uti pedes, in quibus more vulgari quatuor sunt digiti, unguibus acutis nigris.

Totum caput, collum, pectus & infimus venter pennis vestiuntur albis ad gryseum dilutum accedentibus, dorsum autem leucophæis sive cinereis. A rostro in utroque latere per oculum usque ad finem laterum capitis, macula oblonga tendit nigra. Alæ nigræ, non tamen obscure. Cauda nigerimas habet pennas, quarum tamen extremitates sunt albæ, & superius quoque aliquot albis teguntur.

CAPUT XI.

Cocoi Ardea Species: alia Species. Guiratinga, Ardeola. Iacarini. Guiratirica, Guiranheemgatu.

COCOI Brasiliensibus, Ardeæ species est elegans, Ciconiæ ferme magnitudine. Rostrum habet rectum, acutum, sex circiter digitos longum quod in exortu ex flavo virescit: Oculos crystallinos, circello aureo: circum oculos cutem cineream. Colli longitudo quindecim digitorum, corporis decem; cauda, cum qua alæ desinunt. Crura superiora mediam partem plumata, octo digitos longa, inferiora sex & semis, cute tecta cinerea; digitos in pedibus quatuor, vulgari modo, quorum medius digitum longus, ceteri breviores unguibus lunaribus, fuscis. Guttur & totum collum sunt albæ, summitas capitis & latera nigri coloris cum cinereo mixti. Ejusdem coloris cristam elegantem gerit erectam; arque ab ea duæ elegantes plumæ deorsum posterius dependent, coloris ex nigro subcinerei, quælibet quinque digitos & semis longa. Anterior collum secundum longitudinem maculatum est plumis è nigro & cinereo mixtis. In colli parte anteriori & inferiori, elegantes habet plumas longas, albas, subtiles propendentes, quas in pileis gestare solemus. Totum dorsum, alæ & cauda cinerei sunt coloris diluti cum pauxillo albo mixti; superior medietas crurum superiorum, albis vestitur pennis. Per dorsi autem longitudinem cinereæ plumæ extenduntur subtiles, elegantes, figura similes illis in collo. Caro illius bona est, & sapius comedi.

Reperitur hic & alia Ardea, Anatis domesticæ magnitudine, aut paulo major. Rostrum habet rectum, acutum, medietate anteriore, tam superius, quam inferius, dupliciter ferratum, quatuor & semis digitos longum. Caput & collum habet Ardeæ: Oculos nigros, circulo aureo; Collum pedem longum; Corpus quinque digitos & semis, caudam quatuordecim cum qua desinunt alæ. Crura tota novem & semis digitos longa, superiora mediam partem pennis vestita: quatuor digiti in pedibus vulgari modo. Rostrum superius est fuscum, prope exortum autem virescit è flavo. Totum caput & collum superius pennas habent longiusculas, pallide flaves, nigro undatas; sub gutture albicat. Collum inferius, pectus, & infimus venter plumas habent albas fusco undatas, quod in ambitu flavo est fimbriatum. Totum dorsum & alæ teguntur pennis fuscis flavo undatis, & remiges alarum pennæ sunt è nigro & cinereo, æquali parte, mixtæ, extremitatibus albis. Cauda constat ejusmodi pennis, qua-

qualibus extremitas alarum, sed transversim albo lineatis. *Crura* & pedes sunt obscure gryfei coloris, ungues fusci. *Caracomeditur*, sapit ut aliarum Ardearum.

QUIRATINGA Brasiliensibus, *Garza* Lusitanis, Ardeæ species, Alberdeolæ magnitudine & corporis figura. Erecte incedit, collo longo, rostro extenso, recto, acuto, flavo, quatuor digitos longo, cuius pars superior nigra, inferior alba. *Crura* alta, ut Ardeæ, sex circiter digitos longa, pedum digiti ad vulgarem modum: crura exterius (ut & digiti) sunt flava, interius ex viridi & fusco mixta. Per totum corpus albissimis vestitur pennis: In collo elegantissimis plumis albis, quæ subtiliores sunt plumis Struthionum.

Aquatica est avis. *Crura* superiora sine pennis.

ARDEOLA columbæ magnitudine vix par: *Collum* habet longissimum. *Rostrium* rectum, acutum, superius fuscum, inferius ex albo flavescens, duos & semis digitos longum, *linguam* brevem, acutam. *Oculos* mediocres, circello aureo, pupilla nigra. *Caput* parvum, *Collum* tenue, ac septem digitos longum, cum corporis longitudo vix sit quatuor. *Crura* longa, quodlibet quinque digitos; superior medietas mediam partem nuda. In pedibus digitos quatuor communi modo dispositos, unguibus lunatis acutis. *Color* talis est: prope oculos, ubi rostrum inseritur, cutis melini coloris est. *Caput* superius vestitur pennis chalybei coloris pallide fuscis inspersis: totum collum cum pectore & infimo ventre plumas habet alas leucophæis mixtas & pallidis, ut variegatus appareat. *Dorsum* nigrum est, ex parte chalybeo fuscum cum cerei coloris pennis mixtum. Alarum pennæ longæ virentes, in extremitate maculam habent albam, reliqua superficie ex fusco, chalybeo, cereo, & leucophæo eleganter variegata. *Cauda* duos digitos longa, quam tegunt alarum extremitates, quæ cum illa desinunt. *Crura* superius leucophæo & cereo mixta. Nuda pars & pedes cute melina testæ sunt. *Ungues* leucophæi. Erecta incedit avis & decenter.

JACARINI Brasiliensibus, Avis carduelis magnitudine. *Rostellum* habet crassum, cinereum. *Crura* & pedes cinereos, cum quatuor digitis more vulgari. Totum corpus nigris vestitus pennis, sed in quibus resplendet color instar chalybis politæ. *Alæ* interius albicant. *Oculi* cœrulei, & pone illos amplum foramen loco aurium.

GUIRATERICA Brasiliensibus, Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrium* habet crassum, rectum, superius fuscum, inferius album, & paululum incarnatum. *Crura* cinerea cum quatuor digitis more vulgari. Totum *caput* cum gutture, & colli in-

feriore & media parte egregie sanguinei sunt coloris: *Oculi* cœrulei sunt; aurium foramina ampla. Latera colli, totum pectus & infimus venter albis vestiuntur pennis. *Collum* superius habet nigricantes, quibus paucae albæ mixtæ. *Dorsum* gryseum est (inspersis nigris paucis) ut & initia alarum: reliquum alarum nigrum, ut & *cauda*, quæ tres circiter digitos longa: *Oræ* laterales in alis sunt albæ.

GUIRAN HEEMGATU Tupinambis, Avis passeris magnitudine. *Caput* superius luteum, & guttur: *Collum*, pectus, & infimus venter flavi coloris, alæ ex virenti & flavo mixtæ ac fusco distinctæ, uti & cauda, ocelli & rostrum sunt nigra. *Crura* fusca; hic mas egregie canens ut Fringilla, vulgo *Dincke*.

Fœmina ejusdem magnitudinis plumis passeris vestitur, nec ita canit, sed clamat 'tschrip, 'tschrip, ut passer.

CAPUT XII.

Curucui. Caracara. Tyeguacu. Teitei. Guiraguacu beraba. Guiracereba. Guiraperea. Iapacani. Cabure. Andira aca.

CURUCUI Brasiliensibus; Elegantissima avis, fere magnitudine Picæ. *Rostrium* habet breve, latiusculum, coloris sulfurei. *Os* amplum, & quando aperit, triangulatum. *Oculos* pulchros cœruleos circulo aureo; & sub quolibet oculo maculam cutaceam albam, ut gallinæ: in palpebris superius & inferius pilos nigros duriusculos. *Collum* haud longum. *Crura* breviora, & ad pedes fere plumata pennis nigris. *Caudam* habet quinque & semis digitos longam, latiusculam. Sub rostro inferiori in medio, & ad atrumque latus quasi barbam setis compositam nigris, sed in quibus transplendet cœruleus, ut in Anatum collo: sub gutture autem plumæ tantum nigræ. Totum *pectus* & infimus venter egregie miniati sunt coloris; totum *dorsum* & cauda superius ex cœruleo & igneo splendide virent. Extremitas *cauda* oram habet nigram: inferius autem cauda pennas habet albas, nigro transversim eleganter striatas. Initium alarum etiam insigni illa viriditate splendet, media pars canescit, nimirum plumis nigricantibus, minutissimis punctulis canis conspersis, ut anates esse solent. Ultima pars, scilicet longæ alarum pennæ ex fusco nigrescunt. *Crura*, ut dixi, fere tota vestita, nigris pennis, cætera cum pedibus fusca sunt & cinereo. *Digitos* habet dispositos ut Psittacus. *Pennæ* subter alas sunt canæ.

CARACARA Brasiliensibus, *Gaviao* Lusit-

Lusitanis, Nisi species, Avis magnitudinis Milvii, *caudam* habet longam novem digitos, *alarum* longitudo quatuordecem digitorum, quæ tamen nondum ad finem *caudæ* pertingunt. *Color* pennarum totus est rari coloris cum albis & flavis punctulis. *Cauda* albo & fusco est variegata. *Caput* Accipitrinum, *rostro* adunco, mediocriter magno, nigro. *Crura* habet lutea, pedibus accipitrinis, unguibus semilunaribus nigris acutissimis & longis. Avis gallinis valde infesta.

Habui aliam ejusdem magnitudinis, & colore pennarum ut præcedens, sed pectus & venter erant alba. *Oculi* aurei, & cutis circum eos flava. *Crura* lutea.

TIJEGUACU Brasiliensibus, Avicula passeris magnitudine, aut paulo major. *Rostellum* habet breve, triangulare, latiusculum, nigrum. *Ocellos* sapphyrinos: *Crura* & pedes cerei coloris, unguiculis fuscis, digiti dispositi more vulgari. Tota avicula vestitur pennis coracinis: at in summitate capitis maculam habet clypeiformem splendentis sanguinei coloris. Totum *dorsum* autem fere & utramque alam superius ad partem obtendit macula nigro-cærulea, *Cauda* brevis & nigra.

TEITEI Brasiliensibus quam etiam vocant *Guiranhemgeta* & *Guraundi*. Avicula Rubeculæ magnitudine. Aviario includitur pro canca ave, sed pipit tantum ut Rubrica, Germanis *Simpel*. *Vestitur* paco & mamao. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, nigrum. *Caput*, collum superius, alæ, & totum dorsum, & cauda nigris vestiuntur pennis, quibus aliquid cærulei, admixtum, ita ut splendeant instar chalybis. *Guttur*, collum inferius, pectus, totus infimus venter, & crura superiora sunt lutea: ad exortum rostri superioris post nares maculam habet è pennis luteis. *Crura* & pedes fusci sunt coloris, & hic est mas.

Fœmina proportionem & magnitudine plane respondet mari, eodem rostro, & iisdem cruribus; sed color plurimum differt, est enim viridis, ut Acanthis. Germanis, *Zeischen*. Alæ ac caput cum collo superius paulum fuscescunt & cærulescunt mixtum. *Delectantur* hæ aviculæ quinque aut sex conjunctim aviario includi.

GUIRAGUACU BERABA Brasiliensibus. Avis Carduelis magnitudine. *Collum* inferius, *dorsum* & ventris extremitas lutei seu aurei est coloris. *Caput* superius & collum, dorsi medietas anterior, alæ & cauda dilute viridis. In alarum extremo fuscae pennæ mixtæ sunt. Sub gutture ad oculos usque maculam habet magnam, nigram. *Rostellum* habet rectum, acutum, flavum, superna parte paulum nigricans. *Crura* & pedes fusci coloris.

GUIRACOEREB A Brasiliensibus:

Avis Fringillæ magnitudine. *Rostellum* habet nigrum, tres quartas partes digiti longum, acutum, & paululum deorsum flexum. *Oculos* nigras. *Linguam* multipliciter fissam: In capite superius mitellam thalassinis pennis, reliquum caput, guttur, & totum corpus inferius, pectus, & totus infimus venter, cum dorsi medietate posteriori cæruleis vestiuntur pennis, lactescentibus, & à pectore per initia alarum ad dorsum, ubi incipit cæruleus color, linea lata cærulea transit transversim per exortum alarum: totum autem collum superius cum medietate dorsi anteriore profunde nigris subtilibus holosericeis vestitur plumis. *Cauda* sesquidigitum longa est & nigra. *Alæ* magnæ, quæ ad medietates laterales flavescunt. Plavedo autem illa tegitur, nec videri potest, quando avis consistet, quando vero volat, alæ ex nigro & flavo eleganter striatæ videntur. Interius alæ ferme totaliter flavæ sunt. *Crura* superiora pennis nigricant, & cærulea quodammodo sunt: Inferiora nuda, & cinnabarii coloris una cum pedibus, unguiculi in pedibus nigri. Habent autem pedes digitos quatuor, vulgari modo dispositos.

GUIRAPEREA Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, nigricans. *Caput* superius & collum, totum dorsum & infimus venter, pennas habent obscure flavi coloris, ut cera citrina: *Caput* inferius, guttur & collum inferius cum pectore nigras, quales & paucae in ventre flavis sunt intermixtæ. *Cauda* duos digitos longa, & præterit alas. Constat autem cauda & alæ pennis fuscis & nigricantibus, quarum quælibet cum laterali extremitate thalassina, ita ut fuscae alæ thalassino videantur striatæ. *Cauda* itidem. *Crura* superiora etiam cerei coloris; inferiora cum pedibus obscure cinerei. Digiti quatuor modo vulgari, unguibus nigricantibus.

JAPACANI Brasiliensibus, Avis magnitudinem *Bemtere* aut *Schanepue*. *Rostrum* habet nigrum, oblongum, acuminatum, & paulum deorsum incurvatum. *Oculos* aureos, pupilla nigra. *Caput* vestitur pennis nigricantibus, collum superius, dorsum, alæ ex umbra & nigro mixtis. *Cauda* superius albo maculata est. *Pectus*, & totus infimus venter ac crura superiora ex albo & flavo mixtes, ac lienis seu striis transversis nigricantibus intertexta. *Crura* fusca. Digiti in pedibus quatuor vulgari modo, unguibus acutis & nigris.

CABURE Brasiliensibus; Nocturæ species: Avis magnitudinem Turdæ. *Caput* habet rotundum, rostrum breve, aduncum, flavescens, duo foramina narium. *Oculos* pulchros, magnos, rotundos, flavos, pupilla nigra. Sub oculis, & ad latera rostri

multos habet pilos, longiusculos, fuscus. *Crura* brevia, totaliter pennis vestita, flava, uti & pedes. In iis autem quatuor digitos, more vulgari, unguibus semilunaribus, acutis, nigris. *Caudam* latam, prope cuius exortum alæ desinunt. In tota capite, dorso, alis, cauda, coloris est umbræ dilutæ: ac in capite & collo minimis, in alis majoribus maculis albis variegatur. *Cauda* vero albo est undata. *Pectus* & infimus venter albicant, & maculis umbræ dilutæ variegantur. Facile mansuescit. *Collum* ita circumagere potest, ut rostri acies exacte dorso medietatem ostendat. *Ludit* cum hominibus instar simiæ, & varios mimos facit adspectu suo, & crepitus rostellæ; præterea pennas ad latera capitis erigere potest, ut cornicula, seu aurículas repræsentent. *Vicitur* carne cruda.

ANDIRA ACA Brasiliensibus, Vespertilio cornutus. Multi hic reperiuntur in Palmis nuciferis degentes; paulo majores nostratibus, præpingues, cinerei coloris, mollibus & longioribus pilis, auribus latis. In singulis pedibus habent quinque digitos, acutis unguibus armatos. *Dentes* candidi, & supra nasum corpusculum, ejusdem cum auribus longitudinis, satis grande ex materia qualis illius rictus, flexile seu mobile. Alarum longitudo æquat semipedem Rhyndalicum.

CAPUT XIII.

Macuacagua. Columba silvestris species. Anas silvestris. Urubitinga. Mareca utraque.

Tyegnacua parvula. Tangara utraque.

MACUACAGUA Brasiliensibus: Gallinæ silvestris species, magnitudine Gallinæ nostratis vel etiam major. *Rostrum* habet nigrum, plus sesquidigito longum, antè paulo incurvum, ut perdicis: In rostri medietate duo narium foramina ampla. *Oculos* nigros, post eos aliquanto spacio aures more gallinarum. *Corpus* crassum, *Alæ* cum eo desinunt, nullam enim habet caudam. *Crura* inferiora nuda, duos & semis digitos longa. In pedibus tres habet digitos antrorsum versos, crassiusculos, unguibus brevibus, obtusis. *Calcaneus* rotundus, ut in Struthione, & paulum supra illum breviusculus digitus versus interiora, ungue obtuso. Totum *caput* & *collum* punctulatum est obscure flavo & nigro, sub gutture albicat. *Pectus*, venter & dorsum obscure cinerei sunt coloris. *Alæ* umbræ coloris per totum undatæ nigro, præter remiges pennas, quæ totaliter nigre. *Crura* superiora pennis vestita, uti venter, inferiora cærulescunt cum pedibus, ungues gryfei. *Carnosa* admodum est avis, &

tantum carnis habet, quantum duæ gallinæ domesticæ vix habeant, estque boni saporis. Sub cute crassa & pingui cuticulam habet, aliam qua caro tegitur. *Vicitur* variis fructibus qui ex arboribus silvestribus decidunt. In ventriculo illius inveni fabas silvestres, semina Araticu. Humi currit, nam pedes inepti ab arboribus scandendum. *Ova* ponit Gallinaceis paulo majora, coloris cæruleo viridis.

COLUMBA silvestris species ex Infula. S. Thomæ allata, nostratum magnitudine & figura: sed rostro superius aduncum, & coloris in medietate anteriori tota cærulei, cum albo & paucis flavo mixti, in posteritate tota sanguinei. *Oculi* nigri, circulo cæruleo. Pennis tegitur per totum viridibus, ut Psittacus. Remiges alarum ex viridi fuscescunt, ut & extremitas caudæ. Sub ano flavo habet pennas. *Crura* & pedes eleganter crocei coloris, ungues autem fusci.

ANAS Silvestris, magnitudine Anseris. *Rostrum* habet nigrum; *Crura* fusca, uti & pedes. Tota nigra est, exceptis principis alarum, quæ alba; Nigredini tamen illi viridis color transplendet. *Cristam* in capite gerit nigris plumis constantem, & massam carnosam corrugatam, rubram supra rostri superioris exortum. *Cutem* quoque habet rubram circum oculos. *Caro* bona & copiosa. *Finguntur* plerumque in altis arboribus confidentes; nam post lotionem in aqua frigida altas subeunt arbores, captandi aeris & Solis causa.

URUBITINGA Brasiliensibus (sed dubito adhuc de hoc nomine, nam nobilior est hæc avis quam Urubitinga) Avis Aquilæ similis, Anseris semestris magnitudine. *Rostrum* habet crassum, aduncum, nigrum, & circa nares cutem flavescentem. *Oculos* magnos, splendide aquilinos. *Caput* grossum. *Crura* & pedes luteos; in pedibus quatuor digitos vulgari modo dispositos; *Unguibus* lunatis, longis, nigris: *Alas* amplas: *Caudam* latam. Tota vestitur plumis fuscis & nigricantibus; Per alas autem undatim quasi cinereus miscetur. *Cauda* novem digitos longa, ad sex alba, in extremitate ad tres nigricans, in extremitate tamen rursus minimum est albi. Egregiæ staturæ est avis.

MARECA itidem Anatis silvestris species, sed parva. *Rostrum* habet anatinum fuscum, ad cuius exortum in utroque latere macula rubra. *Caput* superius est leporini gryfei coloris, latera capitis sub oculis tota alba. Totum pectus & infimus venter ligni querni secti colorem obscure æmulatur, variegati præterea punctulis nigris. *Crura* & pedes nigri. *Cauda* grysea. *Alæ* elegantes, in exortu ex gryseo subfuscentis coloris, remiges autem sunt in uno latere prio-

prioris coloris, tota autem medietas extrema dilute brunefcentis, qualis in pedibus esse solet, immedio autem coloris viridis transplendentis, cum fimbria nigra, qualis in anatum collis. *Caro* valde bona.

MARECA alia species, ejusdem cum antecedente magnitudinis & figuræ. *Rostrium* habet nigrum splendens. Summitas capitis, collum superius, totum dorsum umbræ coloris cum fusco mixti. Subgutturæ albicat. *Oculi* nigri, & antequemlibet macula parva rotunda, plumis ex albo flavescens. Totum pectus & infimus venter obscure grysei coloris cum aureo mixti. *Cauda* nigra. Alarum pennæ fuscae, quibus viride transplendet: & mediæ pennæ alarum eximia viriditate & cœruleo in fusco transplendent, hic & undam nigram habent, extremitas autem remigum tota est alba. *Crura* & pedes insigniter rubri seu miniati coloris. Assata avis pedibus apprehensa manus & linteamina tingit colore miniato-sanguineo. Boni saporis habent carnem, sed paulum amaricantem.

TIJEQUACU PAROARA Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrium* habet breve, crassum, superius fuscum, inferius albicans. *Caput* superius, latera ejus & guttur ac collum inferius habent pennas flavas, sanguinei coloris pennis punctulatas (& hæc scœmina quidem, mas enim hæc tota habet sanguinea) *Collum* superius, & totum dorsum cinereas, umbra aliquatenus mixtas. *Alæ* fuscas oris albescentibus præditas, ut & cauda; sed alæ teguntur cinereis, dorsum maximam partem exceptis extremitatibus. Latera colli, pectus & totus venter, & crura superius albis teguntur pennis. *Crura* inferiora & pedes fusci sunt coloris; quatuor digiti more vulgari positi. *Ocellos habet nigros.*

TANGARA Brasiliensibus. (Reperiuntur ejus aliquot species colore variantes.) *Prima* elegans, magnitudine Fringillæ. *Rostrium* habet rectum, crassiusculum, nigrum. *Oculos* nigros. *Crura* & pedes ex cinereo fuscis. Supra rostri exortum superne maculam è pennis nigris. Totum *Caput* & collum splendentibus viridibus seu thalassinis pennis vestiuntur. Initium dorsi instar collaris ambiunt nigerrimæ pennæ. *Dorsum* autem sub alis usque ad exortum caudæ vestitur plumis luteis. Totus infimus venter egregie cœrulescit. Alæ nigrae sunt, & earum extremitates laterales cœruleæ, ita ut totaliter cœruleæ appareant complicatæ, & sola extremitas nigra videatur. Initium alarum exterius etiam thalassinis pennis nitet, & cuique alæ superius in dorso, seu in extremitate superiori laterali flavæ pennæ sunt mixtæ. *Caudam* habet latam, sesquidigitum circiter longam, nigram pennis, sed quarum extremi-

tates laterales cœruleæ sunt. Extremitas caudæ est nigra. Includitur cavæ, & clamat *zip, zip*, seu ut Rubrica Germanis **Schnipel**. *Vestitur* farina & pane.

Secunda species: figura & magnitudine passeris nostratis. *Rostellum* habet ex flavo fuscum, latiusculum, in extremitate acutum, cujus inferior pars multo brevior superiore. *Ocellos* nigros. Totum *caput*, egregie miniatis tegitur pennis, totum reliquum corpus cum alis & cauda splendide nigris. *Crura* superiora albis pennis, & in latere exteriori maculam ablongam miniatam habent, quasi sanguine maculata. *Crura* inferiora & pedes cinerei sunt. In pedibus digiti quatuor more vulgari. *Cauda* brevis digitum longa, & alæ prope illius exortum desinunt.

CAPUT XIV.

Anhima. Pitangua guacu. Attinguacu camacu. Guira acangataru.

ANHIMA Brasiliensibus: Avis aquatica ex rapacium genere, major cygno. *Caput* habet haud magnum, Gallinaceo simile & rostro nigro: cujus superior pars paulo longior inferiori, & in extremitate deorsum incurvatum. *Oculos* pulchros, aureos, pupilla nigra, & exterius nigro circulo. In capite prope exortum rostri cornu gerit erectum, extremitate sua antrosum versus incurvatum, paulo plus quam duos digitos longum, crassitiei chordæ majoris in Viola majore, rotundum quasi tornatum esset, coloris albicantis, seu ossei. Circum cornu plumellæ subtiles breves eriguntur albæ & nigrae. *Collum* habet plus septem digitis longum, reliquum corpus ad caudæ exortum fere sesquipedem. Alas amplissimas, utpote quarum plumarum longitudo sesquipedem superet. In cujusque alæ antica parte duo cornua recta triangulata ex ipso ossè alæ enata obtinet, crassa minimi digiti apicem, & conicæ triangulatæ figuræ. Est autem quodque anteriorum digitum longum, posteriora paulo breviora coloris fusci. *Caudam* habet decem digitos longam, instar anserinæ latam. *Crura* superiora quatuor digitos longa, & quoad medietatem inferiorem pennis nuda: Inferiora quinque digitos longa, fere duos crassa. In quolibet pede quatuor digitos obtinet more Gallinarum dispositos, quorum mediis trium anteriorum quatuor & semis digitos longus, reliqui duo, tres & semis: posterior autem fere duos. Quilibet unguem habet corniculatum nigrum, digitum longum, & in posterioribus digitis paulo longiorem. *Cute* fusca & squamosa teguntur & digiti, & crura nuda. *Capitis* vertex plumulis variegatus

gatus est albis & nigris: ad latera, in guttore & colli medietate superiori nigricat, inferior medietas colli & pectus variegantur albis, cinereis & nigris pennis. *Venter* inferior albus in totum habet pennas, ad latera sub albis, & in dorso sunt nigrae, sed quibus albae hinc inde permiscuntur. *Cauda* est nigra; *Alae* etiam nigrae exceptis oris extremis (prope ossa) ubi ex albo flavescentibus pennis variegatae sunt. Terribilem clamorem edit *vyhu*, *vyhu* vociferando. Nunquam sola invenitur, semper parmas & foemina junctim incedunt, & una mortua, altera à sepultura nunquam discedit. *Cornu* quod in capite gerit, remedium est contra venenum, si in vino per noctem infundatur. Idem remedium est contra suffocationem uteri, & in difficili partu. Hæc quam descripsi, foemina est; mas duplæ magnitudinis. *Nidum* suum facit è luto ad caudices arborum super terram, figura furni.

PITANGUA GUACU Brasiliensibus, *Bemtere* Lusitanis, magnitudine æquat Sturnum. *Rostrum* habet crassum, latum, pyramidale, paulo plus digito longum, exierius acuminatum. *Collum* breve, quod sedens contrahit. *Corpus* fere duos & semis digitos longum. *Caudam* latiusculam, tres digitos longam, crura & pedes fuscis, quatuor digitos more vulgari. *Caput*, collum superius, totum dorsum, alae & cauda coloris sunt è fusco nigricantis, pauxillo viridi admixto. *Collum* inferius, pectus, & infimus venter habent flavas pennas, superius autem juxta caput corollam (quasi monachicam) albi coloris. Sub guttore ad exortum rostri albicat. *Clamat* alta voce.

Quædam harum avium in summitate capitis maculam habent flavam, quædam ex parte luteam. Vocatur à Brasiliensibus *Cuiriri*, alias per omnia *Pitanguaguacu* similis.

ATINGUACU CAMACU Brasiliensibus: *Avis* Turdelæ fere magnitudine. *Caput* habet satis grossum, collum mediocriter longum; *Corpus* tres digitos longum: *Rostrum* paululum aduncum, coloris ex viridi & flavo mixti. *Oculos* sanguineos, pupilla nigra. *Crura* cinerea mediocris longitudinis, superius pennis vestita. In pedibus digitos quatuor, vulgari modo. *Caudam* longissimam nimirum novem digitos longam, decem circiter pennis constantem, quarum quædam inferiores sunt breviores superioribus. Totum caput, collum, dorsum, alae, & cauda pennas habent brunnas seu fuligineas, quæ in cauda paulo saturiores sunt reliquis. *Extremitas* cujuslibet pennæ caudæ semidigitum longa, alba est, & inter album & rufum nigro umbrata. *Guttur*, pectus, & infimus venter ac superiora crura cinereis pennis

vestiuntur. In capite longiusculas habet pennas, quas instar duorum cornuum potest surrigere. Elegans avis ob longitudinem caudæ.

GUIRA ACANGATARA Brasiliensibus. *Avis* picæ variæ magnitudine. *Rostrum* habet digitum longum, cujus superior pars paulum adunca, totum autem obscure flavescit. *Oculos* crystallinos, circulo fusco. *Collum* duos digitos longum. *Corpus* tres. *Cauda* longissima, nimirum octo digitos, constans octo pennis rectis. *Crura* superiora pennis vestita, & sesquidigitum longa, ut & inferiora. In pedibus digiti quatuor, more psittacorum, & quidem versus interiora sunt duo breviores, versus exteriora duo longiores in quolibet pede. Totum caput pennis vestitur, quæ in medio secundum longitudinem (proxime scapum) fusca, in lateribus flavescentes, ut crista. *Collum* & alae è contrario pennas habent in medio flavescentes, & ad latera fuscas. *Extremitas* alarum fere plane fuscescit. Totus venter, dorsum, (exceptis alis) crura superiora, & exortus alarum, ad trium & semis digitorum longitudinem pennis constant ex albo pallide flavescentibus, reliquum caudæ fuscescit, extremitas autem albas oras habet. *Crura* inferiora, & pedes thalassini sunt coloris. In capite longiores pennæ in cristam eriguntur. Ingentem in sylvis excitat clamorem.

CAPUT XV.

Matuitui. Aracari. Anhinha. Ipecati apoa. Pul-lus gallinaceus. Innominatæ tres.

MATUITUI Brasiliensibus, *Avis* sturni magnitudine. Brevi collo, pectore forti, cruribus brevibus, cauda duos & semis digitos longa. *Rostrum* habet rectum, forte, cujus superior pars paulum prominet acumine inclinato, cinnabarii coloris. Totum caput, collum superius, dorsum, alae, & cauda constat pennis fuscis pallide flavo maculatis; apparentibus partim punctulatis, ut in Niso. Sub guttore flavas habet pennas. Pectus & venter albis vestiuntur, quæ fusco sunt punctulatae. *Crura* obscure cinerescunt.

ARACARI Brasiliensibus: *Avis* magnitudine picæ Martiæ. *Rostrum* habet quatuor digitos longum, sesqui latum, seu altum, tres & semis crassum, ubi crassissimum, paulum deorsum incurvatum, instar gladii Turcici, & in extremitate acutum, instar psittacini; estque superior pars paulo longior inferiori. *Rostrum* superius & inferius plus mediam partem ab extremitate numerando serratum dentibus: superior pars rostri major inferiore; est autem rostrum canum, levissimum, levius spongia,

gia, superius album, linea in summitate crassa nigra secundum longitudinem distinctum: Inferior tota est nigra; totum inferitur in caput triangulatum, & ubi inferio est linea triangulata alba circumscriptum. *Lingua* habet quatuor digitos longam levissimam, aspectu plane pennam referentem, aut etiam plumata est & nigra, (si pennam habere lingua dici possit.) *Caput* non ita magnum habet, latum, compressum. *Oculos* magnos, pupilla nigra, circulo flavo, reliquas extremitates nigras. *Collum* haud longius Psittacino. *Corpus* à colli exortu ad caudam usque quinque circiter digitos longum. *Cauda* instar picæ latiuscula, & sex digitos, vel paulo plus longa. *Crura* & pedes nigricantes ex viridi, Psittacorum similes, duos digitos habent antè, quorum unus longior altero, duos retro, itidem inæqualis longitudinis; unguis incurvatus, fuscus, seu niger. *Crurum* superiorum longitudo duorum digitorum, inferiorem sesqui. Totum caput & collum usque ad initium pectoris nigras habet plumas, & ubi desinunt, circulariter finiuntur. *Pectus* vero & infimus venter totus eleganter flavis vestiuntur pennis, cum pavonino mixtis: Per Pectus autem transversim linea digitum lata sanguinei coloris ducta est ab uno latere usque ad alterum. Totum dorsum, alæ, cauda, & crura superiora vestiuntur pennis ex nigro viridicantibus, uti in nostratibus piscis color esse solet. Extremitas dorsi ante initium caudæ etiam sanguinei coloris, plus uno imperiali in circumferentia. *Alæ* desinunt ad exortum caudæ, & interius è cinereo sunt subfusci coloris. *Rostrum* interius est nigrum. Avis hæc quasi suum nomen profert, clamando acuto sono, sed non admodum clangoso *Aracari*.

ANHINGA Brasiliensibus, Tupinambus Mergi aquatici species elegans, *corpus*, excepto collo, anatis domesticæ Europææ habet magnitudine. *Rostrum* rectum, haud crassum, acutissimum, tres digitos longum, & per rostri midietatem anteriorem tam superius, quam inferius duplicem ordinem acutissimorum hamulorum retro verforum. *Caput* parvum, longiusculum, serpentini æmulum, paulo plus sesquidigito longum. *Ocellos* nigros, circulo aureo. *Collum* tenue, teres, pedem longum, corpus autem tantum septem digitos, crura breviora, superiora duos digitos longa, pennata, inferiora vix sesquidigito; quatuor digitos, tres antè, versus, membranis junctos more anatum, aut corvi aquatici, quartus digitus brevior ad latus inferius extenditur, itidem membrana reliquis connexus; unguibus lunatis omnes acutissimis. *Caudam* latam, decem digitos longam, duodecim pennis constantem, alæ circa medietatem caudæ desinunt.

Rostrum gryseum est, & post exortum paulum flavescit. Caput totum & collum plumis subtilissimis tegitur ad tactum holosericum referentibus; Coloris in capite & collo superius ex gryseo subflavescentis: sub gutture, in collo inferius grysei coloris, ut pelles illæ (*Berchfelle* vocant) ex quibus mitræ fiunt muliebres, & ad tactum, & ad spectum illius pellis pilos refert. Totum pectus, & infimus venter, & crura superiora plumis mollibus vestiuntur coloris argentei. Initium dorsi pennis fuscis, sed quarum quælibet in sui medio maculam habet oblongam ex albo pallide flavam, ita ut punctulatim appareat: reliquum dorsi nigras habet pennas. *Alas* obtinet longas, quarum initium totum ejusmodi brevibus pennis tegitur, uti initium dorsi, sequitur ordo mediam partem, id est, uno latere canarum, altero nigrarum: Remiges autem nigræ sunt. *Cauda* nigris splendentibus pennis constat, quarum extremitas grysea. *Crura* & pedes ex obscure flavescente grysei sunt coloris. Solertissima in capiendis piscibus: nam, more serpentum, contracto prius collo, ejaculatur rostrum in pisces, ac unguibus eos præhendit. *Carnem* illius comedi, sed haud melior est, quam caro Lari.

IPECATI APOA Brasiliensibus: *Pata Lusitanis*, id est, Anser, nobis Anas silvestris magnitudine anseris, octo vel novem mensium, figura plane ut nostrates anates. *Venter* & interior pars caudæ, collum totum cum capite pennas habet albas, dorsum usque ad collum, alæ, summitas capitis nigras, cui viriditas mixta, ut in nostrarum anatum collis. In collo & ventre albis pennis nigræ passim sunt insparse. In his differt à nostratibus, quod sit *prima* major: *secundo* rostrum anatum quidem, sed nigrum, & in extremitate aduncum. Tertio super rostrum cristam gerit carneam, crassam, latam & rotundam fere, nigram, albis maculis insignitam. *Crista* altitudo eadem; inter cristam & rostrum (in summitate nimirum rostri) foramen transversum magnitudine pisi est, ab utroque latere conspicuum, quod narium vice fungitur. Quarto pedum & crurum color non ruber, sed è cinereo fuscus. *Carnem* multam & bonam habet, nam sæpissime comedi. *Reperitur* passim ad fluvios.

Alium habui per omnia similem priori, excepto, quod longiores illæ pennæ in alis, insigni brunno splendebant colore, puto marem hunc esse, alteram foeminam.

ANNOTATIO. Gesnerus pene similem dedit iconem sub nomine Anatis Indicæ, cujus picturam se à Cardano accepisse memorat. Sed color pennarum nonnihil differt ab Auctoris nostri descriptione.

PULLUS gallinaceus munstrosus, magnitudine pulli recens exclusi. *Caput* habebat

bebat anaticum, superius tamen magis in acumen deflexum, *rostrum* anaticum, latum, cujus superior extremitas deorsum inflexa. *Oculos* parvos, collum breve; *alas* parvulas juxta priora *crura* positas: quatuor *crura* gallinacea, carebat pectore, quippe eo loco, quo pectus esse debebat duo *crura* habens, quodlibet superius tres quadrantes digiti longum, inferius quadrantem; & in singulis quatuor digitos gallinaceos. Posteriora duo *crura* ejusdem figuræ & longitudinis cum anterioribus mire posita erant, sinistrum quidem more naturali, dextrum vero in exortu suo sinistro erat adnatum, & quasi sursum vergebat, eo modo quasi duo sinistra *crura* fuissent, & unum dextrum loco sinistri in exortu fuisset adglutinatum: atque ideo urypigio carebat, quia nullum intervalum inter *crura* hæc posteriora, & caudæ loco ipsi sinistro cruri exterius longiusculi pili canescentes erant adnati. *Pedes* habebat gallinaceos, & digitos eodem modo dispositos: sed quilibet pes totus inverso ordine positus erat, ita, ut inferior pars esset superior, & superior inferior, unguiculi quoque etiam sursum non deorsum vergebant. Totum *caput*, collum, venter, *alæ*, dorsum, & superiora *crura* non vestiebantur pennis, sed pilis nigris semidigiti longis, qui sub ventre & gutture paululum canescebant. In summa, plane monstrosus pullus. *Crura* inferiora & *pedes* fusci coloris, uti & *rostrum*; vitalia viscera habebat gallinacea, sed inordinate disposita. *Cor magnum*. Vivebat excluderetur.

Avis (cui *Auctor* nomen non adscripsit) magnitudine Alaudæ, figura Matuituy. *Rostrum* habet rectum, nigrum: *Oculos* nigros; *crura* communia fusca: *Caudam* latiusculam, & alias longiorem. Totum *Caput* superius, collum superius, dorsum, *alæ*, & cauda, rufescentis sunt coloris, ex rubro, umbra & albo mixti. Guttur, collum inferius, & infimus venter albi sunt coloris. Per oculum utrumque à rostro transversim maculam habet oblongam fuscam. Clamat *Gip*, *Gip*, ut junior gallo-pavus fere.

Avis (cujus nomen *Auctor* non prodiit) magnitudine Patæ, & ejusdem figuræ. *Rostrum* nigro, crassiusculo; capite nigro, pectore & ventre cano, dorso, alis & cauda fuscescentibus, *cruribus* fuscis. Clamat *Zip*, *Zip*, ut Passer.

Avis (quam *Auctor* non nominat, sed tantum admonet esse speciem Curucui, de qua cap. 12.) magnitudine Picæ fere. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, paulum deorsum incurvatum, gryseum seu cinereum: *Oculos* nigros, circulo croceo; *Caput*, collum, dorsum superius, & cauda superius coloris nigri cum viridi cæruleo persplendente, ut in chalybe polito: *Alæ* fusce; Totum pectus & infimus venter egregii coloris miniati:

Cauda inferius albas habet pennas, transversim nigro ordine undatas. *Crura* breviora, fusca sunt; digitis quatuor, more Psittacorum dispositis. Reperitur hic & alia *Aves* species: tota alba, rostro croceo, recto, acuto: *Oculis* nigris, circulo aureo, *cruribus* & *pedibus* nigris. *Rostrum* habet quinque digitos longum, collum longissimum, nimirum quinque digitos supra pedem. *Corpus* septem digitos longum, *caudam* quinque, cum qua *alæ* desinunt. *Crura* superiora octo digitos longa, & ex parte pennis vestita, inferiora sex digitos. *Digitis* pedum communi modo se habent, quorum medius anteriorum quatuor digitos longus, reliqui breviores, omnes unguibus lunaris præditi nigris.

D E A V I B U S AQUATICIS BRASILIANIS.

INter Aves marinas quæ in Brasilia reperiuntur, septem sunt notatu digniores.

Prima est QUIRATINGA grui magnitudine par, plumis candidis, rostro prolixo atque acuto, crocei coloris; *cruribus* oblongis è rubro subflavis. Collum ipsius vestitur plumulis tam subtilibus & elegantibus, ut cum struthionum plumis certent.

*Alter*a est CARIPIRA, quæ quod in binas partes bifurcatam caudam distinguat, interdum explicans interdum contrahens, sartoriæ forcipis instar, Raboforcado ab Hispanis dicitur. Reperitur passim in utraque India. Plumas ejus quod longo tempore durent, sagittis suis adhibent Barbari. Ximenes adipem ad cicatrices faciei delendas, & arthritidis dolores sopiendos, singulare esse remedium narrat. Et sibi donati alarum remigium ita ut volant distentum, amplius quam mortalis ullus distento utroque brachii possit complecti, occupasse spacium, addit. Non facile capitur, nisi forte in deserta aliqua insula, in qua pullos excludit.

Tertia CALCAMAR columbæ est magnitudine sed volandi nescia. In fluctibus ova ponit & excludit; quos etiam alarum atque pedum remigio secat per velociter. Malacia & pluviis imminuentibus tanto numero naves circumfluitant, ut à nautis fastidiantur.

Quarta AYATAM nominant, picæ magnitudine, longo rostro cochlearis instar, plumis candidis rubris maculis eleganter suffusis, singulari in piscibus capiendis industria.

CARACURA est quinta, exili corpore, subcinerei coloris, pulchris oculis, iride eleganter rubente, ita vocalis, ut majoris longe molis quis opinaretur. Ante solis

Nie-
remb. H.
Exot. I.
10. c. 38.
De Lact.
Ind. Oc-
cid. I. 15.
cap. 13.

lis forte ortum & sub occasum auditur, certo, ut volunt, serenitatis futuræ indicio.

Sexta est GUARA, pice magnitudine, oblongo rostro, & anteriore parte recurvo, longis pedibus. Primum exclusa nigricat, deinde evadit cinerea; ubi autem volare incipit egregie candicat, sensim autem rubescit, donec ætate plumæ illius colorem induunt purpuræ æmulum, quem ad senectam usque retinent. Viſitant piscibus, carnibus, & aliis eduliis semper aqua temperatis. Pariunt quoque subteſtis. Gregatim volant, & soli expositæ pulcherri- mum præbent spectaculum. Ex plumis diademata & alia ornamenta à barbaris conficiuntur.

Ultima est GUIRATEONTEON quasi dicas avem sapius morientem & rursus re- surgentem. Epilepsiæ enim obnoxia est ad- modum; alioquin candidis & pulcherri- mis plumis vestita.

A P P E N D I X.

De Avibus Fabulosis.

C A P U T I.

De Gryphibus & Harpiis.

PLacet & de Fabulosis aliquid adnecte- re, ne & in hisce quicquam nobis desi- deretur. Præcedat Gryps sue G R Y P H U S, cujus nomine major forte Aquila, ut sane in Oriente & Septentrione majora nostris animalia gigni experientia compertum est, venire potest. Ejus formam si spectes, fingitur esse quadrupes, antica parte, seu capite; alis, rostro, & pedibus aquilam referens, postica leonem. *Magnitudinem* alii Leonis, alii lupi tribuunt. Mandevillius octies Leone majorem reliquit. Dor- sum pennis integitur nigris, anterior pars rubris, alæ candidis. Montes *Riphaeos* seu Hyperboreos, haud procul ab ipso Aquil- onis exortu incolunt; sed & apud Indos & Bactrianos inveniuntur.

Nidos ex auro quod effodere construunt, & ova duo Aquilinis majora duriora, cali- diora & sicciiora, ponunt. *Volatum* avium par viarum ipsis Philostratus tribuit. Non enim pennatæ, inquit, sunt, sed rubra pellicula alarum costæ tanquam digiti con- nectuntur. Dicuntur aurum in Scythia Asia- tica custodire, ideo inter ipsos & Arima- spos internecinum vigere odium. Tractat de eo Ælianus, & quomodo aurum illud auferant incolæ describit, sed & equis pec- ualiariter infestis esse rumor est. Videtur

huc M. Pauli Veneri avis R u c dicta per- tinere, aquilæ effigie, sed magnitudine im- menſa. Viſitur certis anni temporibus in insulis ultra Madagascar sitis, tanti ro- boris ut sola, sine aliquo adminiculo ele-

phantem capiat, & in sublime raptum rur- sum ad terram labi sinat, quo carnibus ejus vescatur. Plæræque alarum pennæ pas- sus XII. sunt longæ, ea crassitie, quæ lon- gitudinis mensuræ conveniat. Fides sit pe- nes Authorem. Navigationes & præteriti & hujus seculi, omnino de tali ave tacent.

H A R P Y I S nomen à rapacitate indi- tum. Ex Electoo Oceani filia genitas He- siodus prodit. Ponti & Terræ filia aliis di- cuntur. Tres fuisse Virgilius dicit, Ocy- peten, Aello, & Celano. Hyginus Alo- pen Acheloën & Ocypeten appellavit; Ho- merus quartam nomine, Thyellam addi- disse creditur. De forma sic Virgilius.

*Virginei volucrum vultus, sædissima ventris
Proluvies, unaque manus, & pallida semper
Ora fæme, &c.*

Collocantur in Strophalidibus insulis. Ap- pollonius fugatas conjecisse in specie, qui in Creta sub Arginunte viſebantur, tradit. De ipsarum rapacitate, ingluvie, & fœdi- tate vide Valerium Flaccum, Virgilium, & alios.

C A P U T II.

*De Stympthalidibus, Sirenibus & Se-
leucidibus avibus.*

STympthalidibus, à Stympthala palude no- men datum est. *Magnitudine* grues æ- quant. Ibis cætera sunt simillimæ, ro- stra tamen, ejusdem nempe duritiæ, ut ho- minum scuta perforare, firmiora habent, & non ut Ibes obliqua. Plinius eas cirrha- tas facere videtur. Marinas eas Isidorus fa- cit. Apollonius circa Aretiadem insulam collocat. Timagenes & Pisander in Scyn- thiam avolasse tradit. Pausanias Arabiæ quoque deserta incoluisse ait. *Vescebantur* hu- mana carne. Hercules eas ex Stympthalide palude abegit, seu crepitaculi ærei sonitu, sed quod multas sagittis confecisset.

SIRENES qua forma fuerint, non con- venit inter Authores. Alii eas superiori parte virginis formam intulisse, inferiore in piscis caudam desiisse: alii infera aviciam speciem habuisse fabulantur. Nonnulli in superioribus speciem passerum, in inferioribus mulierum eis tribuunt. Boccatus pedes gallinaceos assignat. Eustathius vero à Venere, quod virgineam sibi delegissent vitam, in aves transformatas tradit. Bina sunt quibusdam, *Aglaopheme* nempe & *Thel- xiepeja*: tres alias *Parthenope*, *Leucosia*, & *Ligia*. Sunt qui quatuor & quinque fuisse fingunt. Sed nec de eorum ortu eadem tra- duntur. Quidam è sanguine è cornu Ache- loi destillante natas volant. Nonnulli ex congressu ejus cum Musarum aliqua, de Venere superius diximus. *Habitavere* pri- mum juxta Pelorum Siciliæ promonto- rium, postea in Capreis. Plinius Surren- tum

In Theo-
nid.

Virgilius
lib. 3.
Æneid.

Ovidius
lib. 13.
Meta-
morph.

Valer.
lib. 4.
Argo-
naut.
Virg. l. 3.
Æneid.

Pausan.
in Arcad.

Plinius
lib. 11.
cap. 37.
Isid.
lib. 12.
Origin.

Ælian.
lib. 17. de
Anim.
cap. 23.

Philostr.
l. 3. de vi-
ta Apol-
lonii.
Ælian.
l. 5. c. 27.
Apuleii.
lib. 11.
Milesiac.
Ælian.
l. 4. c. 27.
Barthol.
Anglic. l.
19. c. 94.
Philostr.
l. 3. de vi-
ta Apol-
lonii.
Solin.
cap. 25.
Polyhist.

Ælian.
l. 4. c. 27.

M. Paul.
l. 3. c. 40.

tum Campaniæ oppidum, una cum promontorio Minervæ, earundem sedem fuisse scribit. Finguntur tam suavem harmoniam voce, tibiis, & lyra edidisse, ut & mare & ventos mulcerent. Cantu vero suo navigantes occidisse passim apud diversos Poëtas legere est. Deorum cum Ulyssæ colloquio vide apud Ciceronem carmen.

Cicer. l.
5. de finib.

SELEUCIDES aves vocantur, quarum adventum Cassii montis incolæ, locustis frugum vastantibus, à Jove precibus impetrant nec unde veniant, quove abeant, compertum, nunquam conspectæ, nisi cum præsidio earum indigetur. Voracitatem eis antiquitas tribuit. Ingestas locustas nullo negotio per alvum excernebant.

Plin. l.
10. c. 27.

CAPUT III.

De Phœnice, Cinnamomo & Semenda

Herodot.
Hist. l. 2.

Plin. H.
N. lib.

Tzet. l.
5. Hist.
Chil. 6.

PHOENIX fabulosa est avis. Herodotus nonnisi pictum se vidisse testatur. Plinius unum in toto orbe, nec visum magnopere scribit. In ejus descriptione variant Authores. Herodotus non tantum ei Aquilæ magnitudinem tribuit, sed & toto etiam habitu eidem similem facit. Alii Pavone majorem scribunt. Herodoto pennæ rubore perfunduntur. Plinio vero & Solino circa collum auri fulgore micant. Cætera perpallidus dicitur, cæruleam roseis maculam pennæ distinguuntibus cristis, faciem, fauces caputque plumbeo apice cohærentes. Idem Claudianus, Baptista Mantuanus & Lactantius produnt.

Locus.
Amb. l. 5.
Hex. m.
cap. 23.
Plin. H.
N. l. 10.
cap. 2.
Solin.
Polyhist.
Tacit. l.
14.
Anim.
Vistur.

Athenæ.
lib. 14.
Dipnos.
Pariet.
Tacit. l.
14. Animal.

Ætat.

Locum ipsi quidam Arabiam assignant. alii Heliopoli civitate Ægypti primo visum reliquere. Quidam sub æquinoctiali ad Orientem & Meridiem reperiri scribunt. Claudianus, & Lactantius inaccessibleia loca habitare cecinerunt.

Nec de victu convenit. Plinius primum atque diligentissimum togatorum. Manilius de eo prodidisse auctor est, neminem extitisse, qui viderit vescentem, quidam rore victitare dixerant. Ovidius thuris lacrymis & succo amomi vivere scribit. De Nidificatione ejus & in parentem amore ita Tacitus: *Confecto annorum numero ubi mors propinquat; suis in terris struere nidum, eique vim genitalem adfundere, ex qua factum oriri, & primam adulto curam sepeliendi patris, neque id temere, sed sublato myrrha pondere, tentatoque perlongum iter ubi par oneri, par meatui sit, subire patrium corpus, inque solis aram perferre atque adolere.* Idem Herodotus, ex quo ille desumisse videtur.

Annorum illorum numerus varie definitur. Maxime vulgatum quingentorum spatium, sunt qui asseverent mille quadringentos sexaginta unum interjici. Plinio sexcenti sexaginta placent; Philostrato sexcenti, Herodoto, Solino, Melæ quin-

genti quadraginta. Alberto trecenti quinquaginta; Chæremoni Ægyptio, sex supra septem mille. *De terris quoque variatur.* Jarchas Indus apud Philostratum prope Nilum assignat. Alii in Æthiopia, ut Chæremon Ægyptius, & Orus Apollo. Alii in Phœnicia, ut Lactantius.

Nido materia aromata, Cinnamomum, Cassia, thurisque furculi. Ubi illum consendit, solaribus sese exponit radiis, alarumque continua ventilatione ignem excitare fingitur: sic se cremat. Ex cremato novum oriri pullum convenit inter omnes; quomodo vero id fiat, ambigitur. Plinius ceu vermiculum ex ossibus & medullis veteris Phœnicis primo procreari, ex eo pullum nasci scribit. Philostratus nulla vel ossium vel medullarum mentione facta, ex cinere vermem, ex verme novam alitem generari nugatur. Oppianus ex cinere pullum exoriri refert. Orus ex effuso è patris vulnere, quod sponte sibi nimia ad terram allisione infligit, sanguine procreari affirmat. *Sexum* illi nullum attribuit antiquitas, sed inter vitæ remedia reposuit. Nam Plutarchus cerebrum ejus dulce esse tradit, nescio à quo gustatum; & Plinius inter prima à Magis ex cinere ejus nidoque medicinas proditas esse scribit. Heliogabalus in convivii Phœnicem promittebat, aut M. auri libras pro eo.

Pariet.

Plut. l. de famet. tuenda.

CINNAMOMUS seu Cinnamologus, avis hætenus nobis incognita est. Herodotus grandem esse dixit. Vicentius Belunensis passere aliquanto majorem, coloris partim flavi, partim cærulei, rostri longi ad flavum vergentis scripsit.

Herodot. in Euterpe.

Locus ipsi ab Antiquis in Arabia assignatur. Dionysius Periegetes terram ignorari una cum Herodoto memorat. Albertus in Æthiopia eum locat.

Albertus l. 23. de Animal.

Nidum ponit seu in excelsissimis arboribus, earumque ramis, seu in montium præruptis, illumque ex cinnamomi furculis exstructum. Aromate hoc cum potiri Arabes volunt, boum, asinorumque defunctorum membra minutatim concisa, juxta nidos ponunt, & absedunt. Frustra aves in nidos comportant, quibus sustinendis illi impares decidunt, & ab incolis colliguntur.

De SEMENDA non est quod dicam. Multa quidem sed parum verisimilia de illa Indica commentaria produnt. Caput ipsius, quod esse putabat, quod Aldrovandus in Musæo Ducis Florentini vidit, erat curvum, & valde crassum, colore in anteriore parte albicante, in posteriore purpureo obscuro, figura ovali. Rostrum habebat palmum longum, admodum acutum, intus quidem cavum, sed sine tribus illis fistulis, quibus musicam harmoniam à Semenda edi, quidam fabulati sunt.

Aldrov. Ornith. lib. 12. cap. 28.

M A N.

MANTISSA

DE

AVIBUS

Exoticis ad nostrates accedentibus.

I. De Aquilis.

Nierem.
Hist.
Exot. I.
10. c. 30.
& 31.



D Aquilas pertinent
Itzquauhltli & Tlaco-
quauhltli Indorum,
nec non Leonis A-
fricani *Ners*. Venu-
stum illud aquilæ ge-
nus, & insignito ca-
pite regium. Rostro

est ad radicem luteo,
deinde vero nigro, nigris unguibus; pedi-
bus pallidis, cruribus ventreeque è nigro &
candido permixtis; collo fulvo, dorso &
cauda nigris ac fuscis, corona cristave ni-
gra. Magnitudinem circiter æquat vulga-
ris arietis, & vel ferocium audaciam ani-
malium, adeo ut homines etiam ipsos, post-
quam cicurata est, levi ex causa aggredia-
tur & involat: mitescit tamen, & aucupio
non minus ac reliqui accipitres, quorum
genus videtur, idonea est, atque inservi-
re solet. Avis digna quæ à Regiis aucupi-
bus alatur ac circumferatur. Viliior est *tlaco-*
quauhltli, seu aquila virgæ: frigidas amat
plagas: asturis magnitudine, fusca & cine-
rea, rapax avicularum, murium, lacerta-
rum, colorum, quibus vescitur. De *Nesir*
suo ita Leo Africanus: Avis est omnium
earum, quæ in Africa reperiuntur, maxi-
ma, græce procerior, crassiorque, prædita
rostro, collo & cruribus: adeo sublime vo-
lat, ut oculorum aciem effugiat, & conspe-
cto alicujus animalis cadavere, supra ter-
ram jacente, illico in illud irruat. Raro sola,
sed gregatim volare solet. Longæva est,
nam pleræque conspectæ sunt calvo & de-
plumi capite, tanquam vulsæ fuissent capi-
tis pennæ: inde colligere licet, prænimio
senio pennarum defluvium pati: ea de cau-
sa suos nidos veluti recenter natæ repe-
tunt, unde à suis pullis educantur. *Coronata*
in provincia Chiapæ habentur, ut apud
de Laet in Novo orbe habemus.

Leo Afri-
canus Afri-
cæ I. ult.

II. De Noctuis.

Nierem.
Hist.
Exot. I.
10. c. 39.
& 40.

EXoticum Oti genus *talebicuatli* vide-
tur. Cornuta avis est sive auriculata,
parva corpore, resima, rostro brevi, ni-
gra lumine, lutea erubescens iride, fusca &
cinerea plumis usque ad crura, atra & in-
curva unguibus. Cetera natura similis no-

strati Oro. Apud eosdem Americanos *Te-*
colest genus est bubonis auriti, spectaculo
dignum, nigro & fusco colore variegatur
huic oculi magni & aurei.

III. De Struthio-Camelo.

SPECIES quædam *Struthiocamelorum* in
Insula Maragnana invenitur. Proce-
ritate staturam humanam superant, & ma-
ximæ sunt velocitatis. Magis supra terram
feruntur quam volant. Barbari *yandeu* vo-
cant.

De Laet
Orbis
Novilib.
16. c. 14.

IV. De Psittacis.

PLacet hic quædam de Psittacis ex *Her-*
nando, *Ximene*, *Clusio* & *Nierembergio*
adjicere. Ille primus ita scribit, de *Tozne-*
ne: Psittacei id genus, viridi & luteo colore
micat, oculi rubeo, rostrum vero candenti
& nigro, fusco pede, sed in candidum in-
clinante. Propensius est, aptiusque ad ser-
mones humanos exprimendos cæteris, ac
frequentius apud Hispanos. Alterum ge-
nus *Coccho* vocant viridi colore, rubro &
candenti capite, ac minoris molis; quod
loquax est, nec admodum dissimile præce-
denti, etsi sonodistat. Hos Psittacos vo-
cant Hispani catherinas. Tertium *Quilito-*
ron, tinctum virore, talandriæ vocatæ, aut
galeritæ non cristatæ magnitudine. Fron-
tem candida macula insignitum, rostro
candido & nigris pedibus. Humanas vo-
ces imitatur, & gregatim cum congeneri-
bus volat, cum reliqui comparès tantum
reperiantur. Omnes vero in excelsis arbo-
ribus nidificant. Primum de quo diximus
genus, certas statasque arbores, quas nun-
quam deserat, eligit: quæ cum in hæredes
transcant, dominis illarum haud sunt pa-
rum utiles. Sunt & quas Haitini *Quaca-*
mayas vocant, Mexicanæ vero *Alo*. Totæ
rubeæ, præter humeros & caudam, quæ
cyanea sunt, & gallinæ corticalis nostræ circi-
ter magnitudine, rostro magno candenti
& resimo, pedibus nigris, ac carne similiter
nigra, ex quibus nonnullæ offenduntur,
quæ sermonem humanum doctæ æmulen-
tur, rustice tamen & incondite: filiosque
suos more aliarum avium domesticarum
educunt in domibus ubi aluntur. Offendas
& alios virore diluto tinctos, nigrante rostro
pedibusque, humeris & cauda virore tinctis

exaturato, nec præfatis minores. Vivunt hi juxta montium cacumina, excelsasque pinus. Acclamant vehementer, volantque bini. Sunt & montani incondita forma, qui non cicurantur aut aluntur domi. Nullius eorum caro est edulis, nam & atra est, & gustus injucundi. Omnibus est commune, utramque maxillam movere, quod nulli aliorum contingit animalium. Sunt & alia genera, de quibus alii Auctores latius.

Ximenes sic habet de Hispaniola loquens. Innumeri sunt Psittaci virides cum purpureis maculis, quorum tria in hac insula genera, *maiores*, *mediocres*, *minimi*. *Majores* ab Indis vocantur Higuaræ. Hi in eo distant ab aliis reliquarum insularum, quod maculam albam supra rostrum gestent, non viridem aut miniatam. Valde locutuleiæ sunt hæ higuaræ, si humanos doceantur sermones. *Minores* vocantur *xaxavis*, & viridiores sunt, à paucisque interstinguuntur miniatis plumis. Hi inquieti & turbulentissimi, mordaciores, iracundiores, & garuli, licet rudes humanis loqui vocibus, quas nunquam discunt. Decem ex his invadunt & fugant centum higuararum. Nulla inter hos pax. Diversis gregibus pervolant quacunque pervadant, garriunt. Higuaræ integriorem & corpulentiorē edunt sonum, *xaxavis* acutiorē & tenuiorē: & licet ignari humanis vocibus loqui, placent tamen in caulis assiduo garritu & inquietudine. *Tertia species minimorum* est, nec excedunt passeris mole, viridesque sunt. Hi silent, & pacatiorē sunt: viror dumtaxat in illis placet.

Clusii Historia hæc est. Inter Neotericos autem; nemo mea opinione exactius & diligentius de hoc avium genere commentatus est quam Ulysses Aldrovandus Bononiensis, qui totum librum 40. Tomi primi Ornithologiae suæ ei dicavit: Ille enim Philosophica methodo tradidit quicquid ad Psittacorum historiam pertinere potest, & quatuordecim diversas eorum species describit, tredecim vero icones exhibet, quarum duo priores maximæ sunt, & eorum magnitudine superant; tertia & quarta columbæ sunt magnitudinis; quinta, sexta, septima, octava, nona, & decima mediocres sunt magnitudinis, caudamque brevem habent, saltem non adeo longam, ut tres subsequentes, quæ longiore cauda sunt præditæ: decimaquarta brevem etiam habet caudam. Priorem illam elegantem, quæ Pectoris & ventris pennas flavas habet, tum & eas quæ alas dorsumque tegunt, tum etiam eas quæ in cauda cæruleas, non semel videre memini, & iconem habeo vivis coloribus expressam, atque illam ipsam esse arbitror, quam Joannes Lærius cap. XI. Historiæ suæ Americanæ, Canide à Brasilianis appellari scribit. Alteram

speciem etiam videre memini in arce Cæsaris Ebers dorfiana ad Danubium sita infra Viennam, tum etiam Lugduni Batavorum apud Sionem Lucium Danistam binas aves ejus generis, quas postea Magno Duci Moscovitarum dono mittebat. Reliquæ vero species, (præter tertiam quæ illi albicristata est, & decimam quartam, quæ erythrochloros, etiamque cristata) mihi etiam conspectæ, dum plerumque aliæ ab ipso non descriptæ, tam breviorē cauda præditæ, & majuscula corporis mole, quam minoris generis, quæ longiores caudæ pennas habent, & collum velut torquē rubro atque atro ornatum. Humana verba exacte exprimere solitæ: quibus similem unam habuit nobilissimus vir Philippus Marnixius Sanct-Aldegondius, quam sæpe cacchinum humano more extollere audivi, cum ab adstantibus Gallico sermone compellaretur hoc modo. Riez perroquet, riez; id est: Ride psittace, ride. Sed quod magis mirum, Gallico sermone etiam subiciebat illico, tanquam ratione prædita, haud dubite tamen ita edocta. O le grand sot qui me fait rire, hoc est, O magnum fatuum, qui me ad ridendum provocat. Illaque verba iterum ac tertio repetere solebat. Sed inter reliquas unam, psittacis primæ speciei magnitudine æqualem, apud Illustrissimam Dominam Mariam de Brimen, Ducem Croyam & Areschotensem felicissimæ memoriæ, priusquam ex Hollandia excederet, cui sane parem in coloris pennarum varietate & elegantia videre non memini. Etenim licet omnes fere pennæ corpus tegentes rubro colore essent infectæ, caudæ tamen pennæ, quæ valde prolixe, partim rubræ erant, partim cæruleæ; at quæ in dorso & alis versicolores ex flavo, rubro & viridi, quibus cæruleus color etiam permixtus. Caput circum oculis albi coloris erat, sinuosisque lineis nigris, quemadmodum caudæ caput, distinctum erat. Psittacum, qui similis esset, apud nullum Auctorem descriptum memini. Ea porro avis Annam Illustrissimæ Ducis neptem, nunc Comitem Mergensem & Dominam de Grosbete, adeo diligebat, ut quocunque per conclave spatiaretur, illam subsequeretur, nec quemquam vestem ejus attingere conspiceret, quin morfu illum appeteret, ita zelotypia quadam laborare videbatur. Ceterum psittacus ille majoris generis, quem Lærius capite supra memorato à Brasilianis *Arat* vocari scribit, valde elegans etiam esse debet: nam alarum remiges pennas, & caudæ, quæ sesquipedalis longitudinis, media ex parte coccinei coloris esse refert, altera prorsus elegantis cyanei tubo seu nervo, qui medias pennas per longitudinem secatur, diversos illos colores distinguente, reliquas vero

vero totius corporis pennas prorsus cæruleo colore tinctas esse. Addit utrumque genus illud majorum psittacorum. Arat videlicet & Canide, magna esse in æstimatione apud Brasilianos, quia illorum pennas ter quaterve in anno vellunt, ad vestem, pileos, clypeos & aulæa conficiendum, tametsi domesticum non sit, quia tamen in vastis arboribus medios vicos occupantibus frequentius versari solet quam in silvis. Præter binos illos ingentes, idem Lærius tria aut quatuor Psittacorum genera apud Brasilianos inveniri ait: *Primum* videlicet etiam majusculorum, & crassiore corporis mole præditorum cui *Aicurus* nomen indunt Brasiliani Tououpinamboutii, caput ornatum habens vericoloribus, flavo, rubro, & violaceo extremis alis sua verubentibus, & caudæ pennis oblongis & flavis, reliquo corpore prorsus viridi: hoc genus rarissime ad externos transferri, nulum tamen facilius & perfectius edoceri ad humana verba pronuntianda, quam istud. Addit etiam, Brasilianam quandam mulierem in pago, binis milliaribus ab Insula in qua ipse cum aliis Gallis habitabat, distante, similem psittacum in deliciis habuisse, qui eo intellectu & ratione præditus videbatur, ut comprehendere & discernere posset, quidquid ipsa diceret quæ illum educaverat. Nam cum, inquit, animi recreandi gratia, in illum pagum profecti, ante illius mulieris ædes interdum, transiremus, compellare nos ipsa solebat his verbis: Vultis mihi pectinem dare vel speculum, & illico efficiam ut meus psittacus coram vobis cantet & saltet? Si ejus petitioni annuebamus, simul ac quedam verba avi pronunciaverat, psittacus non modo in pertica, cui insidebat, saltare incipiebat, sed etiam garrere, sibilos edere, & Brasiliorum ad pugnam sese parantium vociferationes imitari. Breviter, quando in ejus heræ mentem veniebat ut diceret, Cane, canebat; Salta, saltabat; sin vero ægre ferens, se quod petierat non impetrasse, paullo acerbius avi diceret, Auge, hoc est. Sile, immobilis silebat, nec ulla ratione eum ad linguam aut pedes movendum excitare poteramus. *Secundum genus Margarinas* à Brasilianis appellatur, quale est eorum psittacorum, qui in Europam inferri solent, nec magni apud illos pretii, propter abundantiam non vero minus istic frequentes sunt, quam apud nos columbæ. *Psittaci tertii generis*, ab ipsis *Tonis*, appellati, majores non sunt sturno, & universum corpus tectum habent pennis impense virentibus, caudæ vero pennæ, quæ valde longæ, flavum colorem admixtum habent. Illud etiam addebat se observasse, psittacos illius regionis nidos ex arborum ramis propendentes non construere, ut topographi-

cis suis tabellis quidam persuadere conantur: at in arborum cavis, eosque orbiculari forma, satisque duros ac firmos. Ceterum cum sub extremum annum Christi millesimum quingentesimum sexagesimum quartum esse Olyssipone apud Sebaldum Linsium Germanum Ulmensem, memini filium ipsius Eodericum ex Fernambuco Brasilianorum, ubi commorabatur, eo appellere & navem mercibus onustam advehere, in qua etiam aliquod mancipia, & nonnulli psittaci quartæ speciei ab Aldrovando descriptæ, atque alii etiam minores, sturni magnitudinem non excedentes, prorsus viridis coloris pennis tecti, sed omnes brevi cauda præditi, & albo rostro: idque genus valde frugibus noxium referabat. Eos in itinere maizi granis alueret, cujus multas spicas cum adhuc habere observabam. In *secunda navigationem*, quam Batavi in Indiam instituerunt Orientalem, in Java vicinisque quibusdam Insulis psittacos observabant longe illis elegantiores, quos è Brasilia advehere solent, eosque à Lusitanis, qui in Java & Moluccis versabantur, noyras appellari intelligebant: & illos quidem corporis mola non valde magnos, sed adeo elegantis coloris, ut venustiores depingi non posse existimarent. Pectus enim & ventrem pennæ rubri coloris floridi splendentisque tegebant, dorsum aurei coloris pennæ, alas vero viridis & cærulei commixtorum colorum pennæ ornabant, sub alis suave rubens color splendebat. Valde autem ingens erat istic illarum avium pretium, ut non minoris æstimarentur, quam octo aut decem thaleris Germanicis. Linscotius scribit, Lusitanos sæpius periculum fecisse, an Olyssiponem transferre vivum aliquem possent, sed nunquam voti compotes factos fuisse, quod nimis tenelli & delicatuli sint: Batavi tamen eam Industriam adhibuerunt, ut unum vivum Amsteladamum usque retulerint, qui tametsi non esset è selectissimis, centum tamen & septuaginta florenis ejus Provinciæ, hoc est, paulo plurius quam septuaginta thaleris venundari potuit, quemadmodum in diario illius navigationis adnotatum comperio. Is in itinere pleraque verba Hollandica, quæ à nautis audiverat, pronunciare didicerat, adeoque cicurem ipsum ejus herus reddiderat, ut rostrum in os & aures ejus inferebat sine noxa, pilosque barbæ ipsius componeret; at si quis alius manum admovere vellet, illico morfu illam appetebat, haud secus quam canis quispiam. Anno porro Christi quinto supra millesimum & sexcentiesimum mittebat mihi Jacobus Plateau psittaci cujusdam iconem vivis coloribus expressam, cui cum similem hætenus non viderim, neque apud quempiam adscriptum

prum meminerim, in hoc Auctario ad Exoticorum historiam typis jam expressam adiunctam volui. Eum autem se plus quam biennio aluisse scribebat, columbæque esse magnitudine: caput illud habere pæne instar accipitris, ejusmodi nempe coloris pennis tectum, ardentes oculos. Collum & pectus versicolores pennæ obsidebant: quas, cum irascebatur, aut molestiam aliquis ipsi crearet, admoto ad caveam, qua conclusus erat, aliquo animali, furrigebat, ut cristatus quodammodo videretur. Erant autem illæ rubescentis coloris, & extrema parte cœrulei elegantissimi. Ventris pennæ similis fere erant coloris, fusco tamen insuper suffusæ colore. Dorsi pennæ virides & alarum remiges pennæ sub cœruleæ: cauda frequentibus pennis viridibus, sed non longis constabat. Prætermittere nequivi, quin psittaci pusillum, genus ex Ethiopia locisque Manicongo vicinis, proximis his annis à Batavis naucleris alatum, simul & marisiconem, (fœmina vero multo est elegantior, utriusque enim sexus allatus) Lectoris oculis proponerem. Corpusculi moles fringillæ magnitudinem æquabat, hoc est, duarum unciarum cum semisse longitudinem habebat ab infimo collo ad uropygium usque. Omnes pennulæ corpusculum tegentes viridis erant coloris, sed in quibus manifestum apparebat discrimen: nam quæ in dorso saturatiores erant, quæ in ventre dilutiores. Remiges alarum pennæ trium unciarum longitudinem habebant: & tametsi prona parte, eo videlicet latere quo brevioribus villis erant præditæ, quoque sese invicem tegebant, viridi saturo colore essent tinctæ altero tamen, quod longiores villos habebat, & tota supina parte fusci erant. Caudæ pennæ elegantissimæ erant & pæne binas uncias longæ, paulo minus semiuncia latæ, colore ea parte, qua uropygio infixæ, viridi cum flavo permixto tinctæ, deinde rubro eleganti, demum nigro, postremo viridi: & tres isti postremi colores ab invicem distincti, veluti in quorundam psittacorum viridum, majore corporis mole præditorum, caudæ pennis videre est: istæ autem vix conspiciantur, nisi cum caudam explicaret, quia ab aliis ejusdem longitudinis tegebantur, quæ prorsus virides. Collum breve & crassiusculum: plumula caput tegentes breves admodum & virides præter eas quæ verticem supra rostrum, quæque totum guttur tegebant, nam illæ rubrum, elegantem & floridum colorem habebant. De mare loquor, quia fœminæ pennulæ dilutius rubebant, neque tam amplum spatium occupabant, quam in mare. Oculi erant nigerrimi: rostrum crassum & firmum, superna pars adunca & mucronata, ut in reliquis psittacorum generibus

ejus color subrubens, crura brevia semuncie longitudinem vix æquabant, cineraceique coloris squamis erant tecta, ut aliorum vulgarium psittacorum pedes, iique in quatuor digitos divisi, quorum bini anteriores & imparis longitudinis, bini posteriores & illi etiam impares, brevioribus quidem articulis duobus præditi, hi interni, longioribus autem tribus, & hi externi. Ungues albi & satis longi. Valde exilem habere vocem, & dumtaxat pipire observabam. Gaudet Consortio. Cum edebat, altero pede cibum non tenebat ut alii psittaci, sed rostro carptim cibum arripiebat. Cibus autem magna ex parte phalaridis semen: illo enim libentius vesci observabam, quam ullo alio seminis genere. Mihi autem quidam conspecti sunt adeo edocti, ut panem aqua tinctum carptim morficando ederent. Potus est aqua. Illud præterea in hac avicula animadvertēbam, quod fœmellæ senescentes vix edere volebant, nisi cibum jam à mare carptum, & aliquamdiu in prolobo retentum, & quasi coctum suo rostro reciperent, ut columbarum pulli à matre soli solent.

Apud Nierembergium de Guacamayan hæc leges. *Guacamayan* genus psittaci est pulcherrimi, qui cum pueris ludit. Incompositæ formæ est, solo vestitu in pretio habetur, neque prætermittenda industria & mirificus instinctus hujus alitis. In Potosi quidam psittacus, quem lorum vocant, admirandi ingenii. Vocabat Indos occurrentes patriæ suæ nomine Colla, leuca, Huayru, Quechua, &c. quasi qui ipsorum mores & vestimenti ritus dignosceret. Dissimulatam Indam nobiliori natu & pæne Regio dignovit. Cum vidisset illam, dixit: Huayru, Huayru, Huayru. Ignobilior ista natio est, quam illa cujus generis se simularet fœmina. Finxerat se Pallam è Regia stirpe. Matrona partim pudens, partim irata, sputo & maledicto avem affecit. Hispani etiam alius psittacus agnovit Medicum indignum nomine & arte, quem, quotiescunque occurrebat, convitiis variis proscindebat è fenestra, donec lite impetravit Medicus ne suspenderetur ibi. Alius Psittacus tabernarii vinarii solitus audire illum domi querentem vinum non vendi, quod acetum esset. Didicit hæc verba, atque ad januam suspensus garriebat repetito præconio, Acetum est. Acetum est, quod facile fuit ementibus credere: donec herus mædificiens (aquam enim odio habent hæc aves) & castigans psittacum dictavit, Optimum merum, Optimum merum, quod psittacus sic animadversus didicit, & postea ad januam identidem publicabat, optimum merum esse. Multi psittacorum simplicissimi, ut ad crocitantem psittacum ex arbore, in

Nieremb.
Hist.
Exot. c.
63. & 46.

cujus

cujus ramis aucepslatet, multitudo ingens convolvit, capique facile patiantur: nil enim viso aucupe terrentur, sed ut laqueo trahantur ad collum coniecto expectant, nec aufugiunt uno captato, & in mantica, qua præcinctus est Venator ipsis cernentibus reposito. Psittaci faciem universim exprimit, quem quoque cantu ad amussim æmulatur *Neyra*, quæ ex Moluccanis Insulis in Indiam importatur, pennis tamen rubris crebrioribus vestita est. Illarum una viginti aut triginta pardavis in India venit, quæ postquam cum psittacis & aspectus amœnitatem, & garritus jucunditatem communem habeant, hoc sibi peculiare quoque vendicant, quod educatorum suorum, aut alias quoque adstantium capita & barbas, ut & aures dentefque linguis suis blande defricent aut allingant, quas partes studiose quasi ad vivum emungunt, & emundant, adeo utiliarum altoribus ex his gesticulamentis oblectationis emergat haud parum. Taceo, quod acutius attendenti coloris jucunda varietate psittacos haud leviter exsuperare videantur.

V. De Picis.

Nierem.
Hist.
Exot. lib.
10. cap.
48. 49.

PRÆter enumeratas Picorum species dantur adhuc apud Americanos duo Pice nempe *Salutiferi* & *Imbrifeti*. Ille *Heuhquecholototl*, seu avis capiti similis dicitur. Nobilis est à capitis dolore levando. Merula major est, rostro longo nigroque, sed inferna parte longe breviori, vertice ac pæne toto collo desuper rubeo, infernis partibus omnino cinereis, alis vero ac dorso nigris, sed albis transversisque lineis variatis. Degit Pavatlanicis agris provinciæ Totonacapæ. Pici species est arbores perforans, cujus capitis plumæ rubescences applicatæ & conglutinatæ, capitis feruntur curare dolorem; si ve in eam sententiam venerint, quod vertici avis adhæreant, si ve id ira se habere experimento aliquoprehenderint. Hic *Quatotoni* audit, Upupæ magnitudine & fusco colore variatur. Rostrium, quo excavat arbores perforatque, tres digitos longum est, firmum & candens, & inferne brevius. Caput est parvum, ac rubris contextum plumis, crista quoque rubra insignitum, ac tres uncias longa, sed superna parte nigra. Alterutro colli latere fascia candida descendit ad usque circiter pectus. Crura pedesque livida sunt. Vivit non longe à mari Australi. *Nidificat* in arboribus excelsis: *vescitur* cicadis, tlaolli, & vermiculis: imbrum tempore educat, hoc est à mense Majo usque ad Septembrem: edulis tamen non est, nec alium (quod acceperim) præstat usum. Pici Martii datur in Nova Hispania species maxi-

ma. Cujus pulvis salutaris est hydropicis.

In Nova Galacia *Pice* sunt exiles, nec passeribus multo majores, sed tanto numero, ut integram segetem, ubi semel aristis incubuerint, prosternant atque conculent, neque clamore aut aliis terriculamentis deterreantur. Est & *Pica Xochitmacatl* dicta columbæ magnitudine, rostro præ corporis mole maximo, superiori parte luteo, inferiori vero subnigro, & in purpureum colorem vergente, oculis nigris, sed iride rubescente ex luteo, ac reliquo corpore cœruleo cinereoque. Vivit circa litora Oceani Australis, piscibus, quos rapit, vesci solet. *Iconem* vide apud Nierembergium Historiæ Exoticæ pag. 209.

VI. De Sturno.

AD Sturnos videtur pertinere quæ *Pterophanicus Indiarum*, & *Acolchidic* dicitur, de qua sic Nieremberg. Alarum insignis commendat acolchichi, seu avem humerorum rubeorum, impetravitque ab Hispanis honorificum nomen, qui aves commendadorasillas vocant, quod æmulentur Equitum militarium insignia. Simili rubore ad latus fulgentia. Sturnorum, quos Hispani tordos vocamus, videatur species. Magnitudine, colore, & forma pares sunt, & cum eis ubicumque versantur, quanquam humeri primo fulvi appareant in rubrum vergentes, & cum ætate processere, in fulvum omnino mutantur colorem. In caveas coniecti, voces reddunt humanas, & lepide garriunt. Quavis reoblata vescuntur, sed pane maxime atque Indico frumento. Calidis frigidisque eas aves reperies regionibus, ab Hispanis colonis rubeorum humerorum commendadozas, ut dixi, vocatos, sed numerosis agminibus sunt oppidanis admodum molesti, eosque audacter incurfant, præcipue regionibus fervidis & maritimis. Malum insuavemque præstant succum, & in arboribus non procul ab oppidis hominumque commercio nidificant, & fara, in quibus forte confedere, devastant atque depopulantur. Cantant luduntque, seu caveis includantur, seu libere per domos permittantur incedere.

VII. De Coturnicibus.

DE Coturnibus idem Nieremberg. Corturnices vocabat Nova Hispania *Colin*, quarum genera ex Francisco Hernando dabo. Nostratibus sunt similes, etsi ad perdicum species sint citra dubium referendæ. Multa genera apud Novos Hispanos reperiuntur nonnulla fusca & cristata, quæ *quauhtzotzocolim*

De Lact.
Ind. Oc-
cid. l. 6.
cap. 1.

Nierem.
Hist.
Exot. l.
10. c. 59.

nuncupant, mediocris magnitudinis; alia fusca quoque, sed cristarum expertia, & paulo minora, alia omnium maxima fulvaeque, sed capite albo & nigro, colore variato, extremis vero alis dorsoque candentibus, pedes vero ac rostrum nigra sunt. Hispanis, ut dixi, coturnicibus assimilantur. Omnia & bono & grato constant alimento, si tamen jugules duobus tribusve diebus, antequam assa apponantur mensis. Exhibetur earum caro etiam male habentibus: nec est apud Indos ulla alia post cohortales, quæ illi possit anteferri, aut alimenti salubritate aut gustu. Canunt nostratium instar, etsi aliæ aliis suavius. Caveis includuntur: vefcuntur Indico nostrove frumento, & sunt quamplurimis hujus plagæ locis familiares. Alibi idem Auctor de *Coyolcozque* seu colli sonali inquit: species est colin, seu coturnicis Mexicanæ, inter quam plures alias, de quibus loquemur seorsim. Ergo coturnicibus vocatis à nostris similis hæc est, magnitudine, cantu, nutrimento, volatu & moribus. Sed diverso colore, qui superne est ex fulvo candidoque commixtus, inferne vero tantum fulvus, etsi verticem & collum nigrantes albæque plumæ occupent; & tæniæ ab utroque latere adeoque à collo ad utrumque collum efforment atque constituent. Oculi sunt atrii, & fulva crura. Indigena avis est, campestribusque locis, velut & nostras, frequens, ac simili etiam alimento, quod ad illud perdicis Hispanicæ (est enim ejus species) proxime accedat. *Coloniculic*, seu coturnicis simulacrum, coturnicis quoque nostræ species est, albis, nigris coccineisque variata plumis, & protractis desuper potius lineis quam circumscriptis maculis, subter vero potius maculis frequentibus, quam lineis, pedes cruraque cyanea sunt; sed cantu, magnitudine, moribus, cæterisque cunctis præcedenti omnino similis. Sturno est *Acolin* magnitudine par, cruribus pedibusque viridi pallefcentibus, & in quatuor divisis prolixiores digitos. Rostrum est luteum, & longiusculum pro corporis proportionem, tenueque & mucronatum, oculi nigri, iris fulva, caputque parvum. Inferna corporis candida sunt, lateribus fusco maculatis colore, superiora vero & cauda, quæ breviuscula est, fulva sunt, sed maculis nigricantibus distincta, & candidis lineis quasvis pennas circumambientibus, ejusdemque coloris punctis nonnunquam conspersis. Lacus incolit, piscosumque est, nec tamen admodum ingratum præstat alimentum. Vermiculis, muscis, & aliis parvis animalibus quæ volitant circa paludem, victitare solet. Indigena est Mexicani la-

cus. Caput mira colorum varietate micat; Quod medium atra linea secat, ac velut cinereæ aliæ latera, maculæ vero parvæ & candentes canthos externos: collum pedusque cinerea sunt, cætera è fulvo in viride potius inclinant.

VIII. De Perdicibus.

Sunt in Peruvia Perdices quas à sono *Sutu* vocant. Duorum generum. Aliæ majores, quæ mole accedunt ad Gallinas, & tantum in solitudinibus reperiuntur. Aliæ minores quam Hispanienses, sed carne longe optima. Utræque sunt colore pardo, rostris & pedibus albis. Ibidem sunt aviculæ plumis rubicundis, quos Hispani ob similitudinem nominant *Luscinias*, quanquam cantus harum sit adeo ingratus, ut mali augurii olim dixerunt barbari.

De Lact.
Ind. Occid. l. 10.
cap. 5.

IX. De Turdis.

Genus Turdorum Chrappam incolit, quos vocant *Passeres fabros*. Nigri sunt, solam in pectore & capite rubri. Fructu quercino dumtaxat vefcuntur. Rostrum perforant corticem pinum, glandem singulis foraminibus aptissime accommodant, ut manu extrahi nequeat, sic omnem pinum ornatissime cingunt glandibus incis, Mox pedibus hærentes cortici, tendunt rostrum glandem, & vorant. Alia sententia Gomaræ est de Passeribus, quos vocant Hispani *carpinteros*. In Dariene scribit nasci palmas, quarum truncus per extrema attenuatur: in medio nidificare quosdam passeris excavato rostris nidos. Hos passeris vocat ipse *Pitos*, & putat esse quos Plinius Picos dixit, Hispani Fabros. Addit ex Aliquorum sententia, vim recludendi nidos ferro impeditos non esse alijus herbæ, sed ipsius pici, cujus tactu infringi metallum.

Nierem.
Hist. Exot. l. 10.
c. 57.

X. De Anatibus.

Genus est Anatis quam *Acitli* seu *aquatilem leporem* consueverunt vocare Mexicenses. Hæc cum descripta delineataque à quibusdam recentiorum eadem prorsus esset, nisi caput longe majori insigniretur crista, atraque, venter colore argenteo splenderet, & collum inferne niveo, superne vero è nigro vergente infusum. Lacubus innatat, ac juxta eos perpetuo versatur: nam neque volandi potis est, neque per terram commode incedendi; femoribus ita reliquo corpori connexis atque coalitis, ut natatui non incuissui queant inservire. Piscibus quos involat vefcitur, indeque victitat. Prolem in juncetis atque arundinetis educat, nec anatum nostratium vulgarem vincit magni-

Nierem.
Hist. Exot. l. 10.
c. 35.

magnitudinem. *Masculus* aliquanto longior est, corpore, collo ac crista ampliori. Rostrum *fœminæ* brevius est, nigrum & utrimque juxta oculos plumis fulvis tectum, cum *mas* cendentibus tegatur. Hæc est avis illa, quam *Indi* fabulantur ventos evocare, ubi se peti ab *aucupibus* sentit, quibus flantibus turbatisque undis evertantur *monoxyla*, illamque insequentes submergantur, si quinque prius sagittis excussis arcu non contingat attingatque trucidari. In ejus dissectæ corde reperiri gemmam arbitrantur ad multa utilissimam, & maximo habitam in pretio, nec alii quam Deo consecrandam. Verum hæc nugæ sunt, & mendacia ab horum hominum profecta credulitate. Insuavi parumque salubri, velut & aliæ aves palustres, nutrimento constat, atque ideo à nullo facioris palati in cibos admittenda.

Est & apud *Indos* *genus quoddam anatis fere* (*hirundinem Hispani Indigenæ appellant*) *tempatlaboc* domesticæ magnitudine, quare idem usurpavit apud *Indos* nomen; rostrato est & longo, undeque nigrante. Lingua alba, cruribus palmisque ex pallido rubescentibus, collo & capite viridibus purpureis, & nigro splendentibus colore, adeoque pavonino aut *heliotropiæ* gemmæ; oculi nigri sunt, & pallens iris, pectus candens, reliquum vero corpus inferre fulvum, & binis maculis juxta caudam utrinque cendentibus insignitum, superne vero semicirculus quibusdam in ambitu ex albo, tendentibus in fuscum, intra vero è nigro in viridem splendentem. Alæ initio cyanæ sunt, mox candidæ, & tandem virenti micantes splendore: earundem tamen extrema altero latere fulva sunt, altero vero fulgida atque viridia: cauda desuper subtilisque per ambitum candescit, ceterum inferne nigra, ~~pavonacea~~ vero superne. *Advena* est lacui *Mexicano*, & quale aliæ lacustres aves solent præstare alimentum. In *Asia* quoddam est *genus anatum*, quod non immerito quis inter *cornicines* retulerit, ita voce *cornuum* sonitum imitantur, quæ inflare solent per dispositos equos iter facientium duces. Est ea avis, quamvis inermis, audax & strenua: quam etiam malos *Dæmones* terrere, *Turcis* persuasum est: certe libertatis adeo retinens, ut etiam per totum triennium in corte nutrita, facultatem nacta, libertatem saginæ anteponat, sedesque naturales & suctos alveos volatu repetat.

XI. De *Mergis*.

Nieremb. hist.
Exot. lib.
10. c. 27.

AD *Mergorum* historiam pertinent *Mergus Americanus*, & *Mergus maximus Farrensis* seu *Arcticus*. Ille exiguis est alis, ideo monstruosa. Hic ita à

Clusio describitur: *Avis marina* est, & *palmipes*, anseris domestico major, aut certe magnitudine illi æqualis: nam à collo qua parte pectori conjungitur, usque ad *uropygium*, binos pedes longa erat: corporis ambitus binorum pedum longitudinem superabat. Alæ quatuordecim uncias longæ; cauda brevis, vix trium unciarum, collum fere octo uncias longum, ejus ambitus paulo major, caput breve, tres uncias latum, rostrum nigrum, mucronatum, quatuor unciarum magnitudinem superabat. Lingua pæne tres uncias longa, nigra, mucronata, cartilaginea, quodammodo carinata, superiore parte qua rostri parti connexa erat, parvis dentibus introrsum recurvis utrinque prædita, media autem parte aspera: palatum similiter quatuor exiguum & brevium dentium introrsum spectantium ordinibus constabat, quibus escam retineret & conficeret: nam rostrum dentatum non erat. Totum corpus densis pennis tectum habebat, quæ in pectore, toto ventre, & alarum supina parte breves & candidæ, in dorso autem alarumque prona parte longiores & nigre, singulæ tamen circa extremum, geminis maculis albis insignitæ, quæ in dorso quidem lateribus longiores, majoribus, quæ vero circa collum in medio dorso aliisque supra caudam, minoribus, sic ut aliæ aliis incumbentes, invicemque tegentes ad maculas illas usque, eam fere varietatem repræsentarent, quæ in *meleagride* sive *Numidica gallina* conspicitur. Collum velut torque cinctum erat, è nigris pennis constans: caput etiam similibus pennis tectum: quæ tamen oculos & rostrum ambiabant, parvis maculis albis erant distinctæ; subgurgure etiam aliquas parvas pennas albas nigris permixtas habebat: prona similiter colli pars supra torquem illum nigrarum pennarum, ad unciam longitudinem parvis pennis nigris, latera tamen alba habentibus, erat ornata, quemadmodum & ea pars quæ infra torquem in pectoris atribus, infra podicem, nigrarum pennarum transversam lineam habebat, quas albæ subsequiebantur, deinde sub cauda aliæ nigre albis maculis notatæ. Crura habebat in extremo corpore sita, paullo longiora tribus unciis, plana, nigra; pedes quatuor uncias longos, plusquam tres latos, nigros, tribus digitis preditos (quorum interiores tribus articulis constabant, brevioresque erant, medii quatuor, exteriores quinque) nigra membrana simul connexas ad ungues usque, qui plani. Singuli etiam pedes, in posteriore parte paullo supra inflexionem, parvum articulum instar calcaris habebant. Circa *Farrensem Insulam*, quæ inter *Norvegiam* & *Islandiam*

diam sita, captam hanc avem scribebat Hojerus, foetum in undis educare, nec nisi procelloso mari ac circa Autumnum, hiemisque initium conspici, terram vero nunquam attingere, nec volentem unquam esse conspectam, adeoque nec alarum usum habere ad volandum, nec pedum ad incedendum: quo fit ut nonnisi capite extet (eo referente) quando se conspiciendam præbet. Huic non valde dissimilis videtur mergus ille marinus, cujus meminit Gesnerus in Paralipomenis ad Historiam de Avibus pag. 767. nisi illi in dorso cinereas plumas nigris maculis confusas tribueret. Huic similis est aqueus lepus, cujus jam meminimus. Iconem vide apud Clusium.

XII. De Hirundine.

Claudat agmen *Avis cucullata aquatica.* *Hirundo Exotica aquatica & Gallinago sylvestris aquatica.* Quas in suo Gazophylacio rerum Naturalium descripsit, & ære exprimi curavit Nobilissimus D. Doctor *Besslerus*, Amicus noster plurimum honorandus. De illa ita scribit: Animal hocce capite monstrosum, in aquis natæ ex decubitu naturali conjicere licet. Comam quam in fronte cernis, ferruginei est coloris. Ex parte maxillarum plumæ flavescentes repullulant, quæ in extremitate nigro-

Bessler. in
Gazo-
phylacio
Rer. Na-
tural.

res factæ, circulum egregie representant. Collum cum ventre albicat, dorsum cum aliis cineritii est coloris, extremitas tandem in albas definit plumas. Pedes cum adnatis membranulis, semicirculis distinctis albicant, ubi in quolibet pede unicum tantum unguem animadvertere licet. De *Hirundine Exotica aquatica* hæc habet: Quis non in volucre palustri summam colorum varietatem miretur. A capite enim inchoando, superior pars, candet, inferior rubro intermixto cœruleo colore splendet. Venter inferior floccorum nivis instar albicat. In dorsi principio pennæ duæ nigricantes, albis punctis distinctæ exsurgunt. Alias dorsum universum, una cum cauda ferruginei coloris; alæ quidem nigricant, punctis tamen niveis ornamenti instar distinguuntur. Pedes exporrecti subfusi coloris, rostrum nigricans, ad subulæ formam effigiatum, quo pisces quasi hamo excipere solet.

XIII. De Gallinagine.

DE *Gallinagine Sylvestri aquatica*, ita idem paucis: Rara hæc est avis, in locis paludosis victum quaritans, colore atro & rufo, per totum corpus instar holoserici splendente, rostrum oblongum, quodammodo incurvatum, crura alta & fusca, digitos longos habet.

ET hæc sunt, quæ de Avibus dicere volui. Quæ omiffa sunt, studiosus harum rerum Lector, aliunde supplere poterit. **CENSORI** cujuscunque tandem status & conditionis is fuerit, hoc subsequens inserviat. *Veritatem ad suum arbitrium exigere, & inter mendacia reponere, quicquid palato non arriserit, impudentes nimis, & in DEUM, universam naturam, & humanum genus, injurii hominis est.*


F I N I S.

Aquila Gefneri



Chrysætos Aquila.







Haliaeetus



Aquila



Fulgur



*Anathia seu
Morphnus*





Melanctes vel Melanctes.
Aquila Valeria.



Melanctes



Aquila Pygargus alius



Pernaptes



Morphus

Belloni



Ossifragæ alia Species



Pernaptes alius





Morphus Congener



Oxyfrangus



Tereuopteros Aquila peregrinus



Heteropus Aquila Species



Avis Scythica



Chrysaetos Belloni





Vultur Cinereus



Vultur Feticus



Vultur

Leporarius



Vultur Alpinus uel aureus









Asterias



Accipiter Palumbarius



Accipiter Fringillarius Nisus



Tyrunculus mas Wandwaber Sternschmatz



Tyrunculus Famina



177

Amphispiza bilineata




Amphispiza bilineata



Amphispiza bilineata



Amphispiza bilineata



Amphispiza bilineata



Accipiter Egyptianus



Subutes



Laniarius



Laniarius



Lanius albus



Lanius cinereus Faemina







Cuculus

Tinnaculus Cenchris



*Cuculus
Alter*

Dendro Falcus



*Aesalonus
Accipitris Species*



Lanius



Lanius Minor



Lanius Collurio



Lanius alius



Lanius Albus



Circus Guggauch



Buteo Trierches



Accipiter

minor



Accipiter maior



Albus





Falco Rubens



Falco

Falco alter



Falco Orientalis



Falco





Aesala Falconis Species



Falco



*Falco
Peregrinus*



Gyr Falco



Falco

Montanus



Mirle Smirlin





Psittacus Minor



Psittacus Maior



Psittacus



Psittacus



Psittacus Viridis



*Psittacus
Toikilorinchos*





Psittacus Maximus



Psittacus Maximus alter



Psittacus viridis Melanorhynchus



Psittacus abus Cristatus



Psittacus Versicolor sive Ergethroganus



Psittacus Leucocephalus



Psittacus Cinerens





Macaw



Macaw



Macaw



Macaw



Macaw



Macaw



Macaw

Corvus Rab



Corvus



Cornix



Graculus



Nebel



Coracias Arist



Pyrhocorax

Coracens



Pyrhocorax alius





Cornix Cerula



Cornix cinerea



Cornix Frugitega



Pica Indica
mas



Pica Caudata s. varia



Pica Indica
Femina



Pica glandaria garrula



Pica glandaria species alia



Pica

Pica marina





Bubo



Bubo



Bubo



Ula



*Asio
bubonis Species*



Bubo



Asio alius seu Scops



Asio seu Otus





Uhlala



Uhlala



Uhlala



Aluco



Noctua



Strix



Saxatilis



Noctua



Uhlala alia



PL. XIX



Nyctiorax

Tab. XX

Caprimulgus



Caprimulgus alius



Vespertilio



Vespertilio



Vespertilio lactans




Vespertilio



Tab. 22

Caprimulgus

Caprimulgus



Struthio camelus



Gallus Monstrosus Caudatus



*Tyrus Sine cauda
Chinensis*



Pavo



Pavo Fœmina Cum hœdo spurio



Pfavo





Peacock (Pavo) - Pavo



Pavo albus cum tritico multipli



Pavo Iapenensis mas



Pavo Iapenensis foemina



PLATE III
THE PEACOCK



The Peacock



The Peacock





*Gallina Indica Cum
Ovo Eius*



Phasianus

Gallina Africana



Phasianus





Colinus leucurus
the Quail



Colinus virginianus



Urogallus Maior



*Urogallus seu Tetrox
albus*



Urogallus minor



Urogallus Maior



Gallina Corylorum





Anagen



Otis Cum Capite Arietino



Otis Trada



Avis Stellata



Charadrius



Oedicnemus







Galgulus



Altagen seu Perdix



Ceryle alcyon



Pica caudata



Coturnix wachtel



Otus scops



Rusticula minor



Capella



Meleagris



Upupa



Merops





Perdix russa



Perdix cinerea



Perdix Damascena



Lagopus



Lagopus altera



Coturnix mas



Ortygometra



Hortulanus mas



Hortulanus samina




Hortulanus Congener



Gallus Cornutus



Gallus Indicus



Gallina Patauma



Gallus Patanius



Gallina



Gallina Pumiho



Gallus



Gallus





Gallina Turcica



Gallus Turcicus



Gallina Persica



Gallus Persicus



Gallus Indicus



Gallina Indica



Gallina Guinea



Gallus Indicus mirabilis

Gallina lanigera

Gallus palustris



Capo















Fringilla



Turtur



Montifringilla



Chalcophaps



Alauda non chryslata



Fucula



Fucula Canadensis







Passeres Indici



Eritra melana Indica

Passer Indicus



Passer Indicus alius

Embriza alba



Embriza prateusis Faminea

Embriza prateusis mas

Emberza









Canethraustes Indica

Canethraustes

Linaria

Linaria

Alauda Cristata

Alauda

Carduelis

Ligurinus


Ligurinus Spurius

*Chloris seu fringilla
Viridis*

Turdus

Hortulanus





Montifringilla Congener



Montifringilla mas



Linaria alia



Linaria rubra



Linaria marina



Cunetel



Alauda Cristata



Alauda



Alauda Cristata



Alauda Cristata



Alauda proterum



Chloris sylvestris



*Calandra
alauda maxima
Calandei*



*Alauda Congener
Cum loto Aethiopica*



Lutea mas



*Lutea sen Cirulus
famina*



Citrinella







Turdus simpliciter



Turdus Viscivorus



Merula



Turdus leucocephalus



Merula femina



Merula mas



*Passer solitarius
femina*



*Passer solitarius
mas*



Merula alba et nigra



Merula Congener



*Merula torquata
femina*



Merula torquata mas





Merula



*Merula Rosea mas seu
Sturnus marinus*



Merula apus Indica



Merula Braslica



Cariocatact



Sturnus vulgaris



Sturnus Capite albo.



Sturnus



Sturnus Cinereus



Sturnus pullus



Picus Varius Minor



Picus Maximus niger



Picus Viridis



Picus Maior



Picus Viridis Maior



Picus Murarius



Picus nidum Suspendit
Widwal Bynole Gold merle



Picus Cinereus



Picus Luteus
Cyanopus



Picus Varius



Picus Chloris Indicus





From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius



From Mauritius







Pica Cinctus



Pica Glandaria
Genus



Acanthis



Pica Glandaria



Parus
Sylvaticus



Aurimittis
Carduelis species



Rubecula



Rubicilla



Rubicilla



Collurio seu Laniarius



Motacilla



Parus Major



Pica Glandaria



Parus Cereuleus minor



Parus Major



Parus ater



Parus sylvaticus



Parus Palustris Kohlmeiß Aschmeiß



Parus Cristatus



Parus Caudatus



Monticola alba



Monticola flava



Sylvia



Monticola mas



Borin Genua



Stoparola



Sylvia alba



Beccina



Stoparola



171





Muscipeta



Rubecula seu Phoenicurus



Rubetra seu Batos



Rubetra Belloni



Pyrhulus



Anthus



Cannuarola Kaufsteleia



Rubecula seu Phoenicurus Rotzapel Rotzschwentzelein



Phoenicurus alter



Agelaius seu Carruca



Luscinola



Oenanthe



Luscinia



alia Ficedula sine Atricapilla



Atricapilla s. ficedula





Onocrotalus Fœmina



Onocrotalus sine Pelicanus



Larus Maior



Diomedea Aris



Pelicanus sine Plator



Larus Cinereus



Larus albus



Larus Minor



Larus Piscator



Larus



Larus Niger




*Marina
Hirundo*





















*Ardea stellaris
altera*



*Ardea stellaris
major*



Ardea Quaiotta



Falcinellus



Ardea nigra



Ardea alba

Auis pugnax



Auis pugnax



Falcinellus auis Falcata



Arquata seu Numerus







Porphyrion









Grus Balarica



Grus mas



Grus Laponensis




Grus Crissa



*Grus Balarica
Femina*




Avosetta Species








Manucodiata Aldr.





Manucodiata Aldr.

Manucodiata longa



*Paradisaea anis
Maioris generis
Clas*

*Rex anium Paradisaea
rum Clas*



*Pua Brasili-
alia*



Altera Xochi

*Pica Brasili-
ca Toncan
Xochitencatl*



Emeu Clus



Emeu



*Anser Magella-
nicus*



*Mergus arti-
Clus*



*Gallus peregrinus
Clus
Cygna Cuculat*



Skua

Holeri



Ourisia S. Tomincio





Iacana



Curicaca, Numenius
Indicus Clus
Ardea species



Iupuiuba



Gallina Africana



Icypiranga



Ibion Noitibo



Guira tangeina



Guira Guainumbi



Iaguacati



Mituporanga







Tab. 2.













Uruba



Maencagua

Cocoi ardeas species



Caracara



Anhima



Ardeala



Tangara



Virebitinga



Guiracienoua





Phoenix



Pelicanus



Harpia



Griffus





MVSEVM
BRITAN
NICVM









