

## **Nova plantarum Americanarum genera / Authore p. Carolo Plumier.**

### **Contributors**

Plumier, Charles, 1646-1704.

Tournefort, Joseph Pitton de, 1656-1708. Éléments de botanique.

### **Publication/Creation**

Parisiis : Apud Joannem Boudot, 1703.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/k4be2f4z>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>







*The Marquis of Stafford.*







41647/3

16852 216 c(6)

S.  
23.11.06  
1305



NOVA  
PLANTARUM  
AMERICANARUM  
GENERA,

Authore P. CAROLO PLUMIER Ordinis  
Minimorum in Provincia Franciæ, & apud Insulas  
Americanas Botanico Regio.



PARISIIS,  
Apud JOANNEM BOUDOT, Regis & Regiæ Scientiarum  
Academiæ Typographum, via Jacobæ, ad Solea Aurea.


M. DCCIII.

CUM PRIVILEGIO REGIS.



NOVA  
PLANTARUM  
AMERICANARUM  
GENERA

Authore P. C. A. ROBERTSON  
Ministerium in Provincia Franciae, &c. apud Indiam  
Americanae Provinciae Regiae



Printed by J. G. B. ...  
London ...





## BOTANICIS ET BOTANO-PHILIS

*FRATER CAROLUS PLUMIER MINIMUS S. D.*



NON omnibus concessum Corinthum  
adiisse, neque omnibus datum longas  
suscepisse peregrinationes. Ne ergo sibi  
solis vixisse videantur, qui exteras na-  
tiones, regionesque longinquas suis  
perlustrarunt itinationibus, æquissima postulat ra-  
tio, ut tandem patriis laribus redonati, nedum con-  
cives suos, sed & litterarium orbem aliquali saltem  
parte fructuum suarum peregrinationum oblectent,  
& ad peregrinandum curiosos invitent. Quis namque  
charam domum, gratamque patriam deserat luben-  
ter? Quis dilectis volens valedicat amicis? Quis tan-  
dem audax videat mare turgidum, infames scopulos,  
monstra natantia, & homines hospitibus feros, ni se  
merce, mercede aut fama, quondam fore beatum speret.  
Me equidem ( fateor ) nec merx, nec merces, nec  
fama, sed innatus tentavit in dulci juvena videndi  
discendique fervor. Puerulus namque vix bimus, cha-  
ræ genitricis ulnarum impatiens, invitam genitricem




puerili , sed celeri gradu , ad mare , ad rura trahebam ; adolescens remotis delectabar rupibus , maritima solus frequentabam littora ; me tandem sylvæ , & gelida nemora secernebant sodalibus. Deus Deus nam vocabat , & volebat me ultra patriæ limites salientem , ad Americanas insulas pervolare , quas bis & ter perlustratus , quid tandem ferat hæc tellus , summis sane laboribus ac periculis , ( divino me semper protegente numine ) didici , discendumque , eodem summo favente numine , curiosis lubentissime concedam. Interea Catalogum cunctarum plantarum , cunctorumque animantium , quas , & quæ tribus meis peregrinationibus ab anno 1689. ad annum 1697. delineavi , & descripsi , prælibanbum Botanophilis & curiosis meditabar. Distuli equidem , at dilatio emolumenta potius quam detrimenta fecit. Attulit namque optanti auxilium vir Turnefortius noster , totius sane Botanices Pharos fidissima ; cujus institutionum botanicarum face , per immensum plantarum pelagus præfulgente , nullus amplius in plantarum differentiis agnoscendis error pertimescendus ; illi , cui tali libuerit gaudere lumine , institutionumque leges illibatatas servare. His namque dirigentibus , sisymbrium pro mentha , aut ocimum pro serpillio nullatenus à quærente sumentur. Harum ego institutionum fretus rutamine , quales plantas in Insulis Americanis adinvenerim , noti scilicet fuerint generis , an ignoti , recta potui dijudicare , qui prius priorum Botanico- rum errores secutus , plantam lupulum appellabam , quia lupuli nostratis instar scandens erat , foliaque habebat fere lupulina ; nulla habita florum ac fruc-



tuum ratione , sed tantum totius plantæ facie , foliorum scilicet & caulium vimineorum dispositione. Hæ sunt ergo auspicatissimæ institutiones , quæ me tum ab erroribus in plantis discernendis , tum à Catalogo quem destinabam , liberarunt. Placuit namque benignissimo institutionum botanicarum Authori , institutionibus suis plantas generis jam certi & noti , in Americanis Insulis à me delineatas & descriptas inseruisse , & ex quibusdam ignoti generis nova quædam genera instituisse. Restabant sed plurimæ , quarum genera nobis adhuc incomperta , & ex quarum floribus & fructibus nova genera erant necessario stabilienda , ne deinceps pro talibus plantis apud Botanicos , aut quæstio , aut dubium moverentur. Libuit itaque curiosorum & Botanicorum ergo , plantas incertas certis generibus insignire , iis characterem generis ex florum , & fructuum constitutione imprimendo , ac nomenclaturam generum , partim ex Indicorum Botanicorum Libris , partim etiam ex celebriorum quorundam Botanorum , aut Botano-philorum nominibus desumendo ; sic namque potenti placitum justitiæ , dignos laude viros chartis vetare mori , ipsorumque comam cingere quæsitæ meritis lauro.

*Lutetie Parisiorum , ex Conventu Minimorum ad Plateam Regiam 27. Aprilis 1703.*





APPROBATIO DOCTORIS.

**E**Go infra scriptus, Consiliarius Regis, Medicinæ Lector ac Professor Regius, Doctor Medicus Parisiensis; jussu illustrissimi Galliarum Cancellarii, hunc Librum legi, cui titulus: *Nova Plantarum Americanarum Genera*, Autore Patre Carolo Plumier, Ordinis Minimorum in Provincia Franciæ, & apud Insulas Americanas Botanico Regio. In quo nihil reperi quod Philo- botanis summæ jucunditati, æque ac utilitati futurum, suoque Autori maxime laudi ducendum non censeam. Datum Parisiis, die sexta mensis Martii, anni 1703.

ANDRY.

FACULTAS REVERENDISSIMI PATRIS GENERALIS  
pro editione Operis.

**N**OS Frater JOSEPHUS GASCH, Lector jubilatus, Supremæ Hispaniarum Inquisitionis Qualificator, & totius Ordinis Minimorum Corrector Generalis.

Dilecto nobis in Christo, Patri Carolo Plumier, nostri Ordinis Sacerdoti, &c. Salutem in Domino.

Præsentium vigore litterarum, licentiam tibi impertimus typis edendi Opera quæ præ manibus habes, dummodo diligenter examinentur & approbentur à duobus Theologis nostris, à Reverendo admodum Patre Provinciali loci, in quo ea prælo mandabis, nominandis & deputandis; cæteraque servantur, quæ de jure servari debent. In quorum fidem, &c. Datum Romæ 9. Maii 1700.

Frater JOSEPHUS GASCH, humilis Corrector Generalis.

Locus † sigilli.

De Mandato Reverendissimi Patris Generalis, Frater JOSEPHUS  
BERTIER, Assistens Gallus.

LICENTIA



---

LICENTIA REVERENDI PATRIS PROVINCIALIS  
*Provincia Franciæ.*

N Os Frater NICOLAUS FOUCQUEREL, Ordinis Minimorum  
in Provincia Franciæ Provincialis,

Attenta Reverendissimi Patris JOSEPHI GASCH Generalis nostri  
licentia R. Patri Carolo Plumier, ejusdem Instituti ac Provinciæ Sacerdo-  
ti, Theologo, & Botanico Regio concessa, prælo mandandi omnia, quæ  
præ manibus habet, Opera; dummodo a duobus nostræ Provinciæ Theolo-  
gis diligenter examinata approbentur; tenore Præsentium nominamus Re-  
verendos admodum Patres Renatum Thuillier, & Joannem Franciscum  
Mangon, antiquos sacre Theologiæ Professores, amboque Exprovincia-  
les, ad *Nova Plantarum Americanarum Genera* perspicacibus oculis col-  
lustranda, quatenus servatis de jure servandis in lucem citius prodeant  
Datum in nostro ad Plateam Regiam Regio Conventu Parisino, sub nostro  
manuali signo, nostrique Provincialis Officii Sigillo, hac septima Aprilis  
luce an. 1703.

Frater NICOLAUS FOUCQUEREL, Provincialis.

Locus † Sigilli.

---

APPROBATIONES THEOLOGORUM ORDINIS

N Os infra scripti Ordinis Minimorum in Provincia Franciæ Theolo-  
gi, ex commissione Reverendi admodum Patris, P. Nicolai Fouc-  
querel, ejusdem Provinciæ Provincialis, legimus & evolvimus Librum,  
cujus titulus est: *Nova Plantarum Americanarum Genera*, Authore R. P.  
Carolo Plumier, Ordinis Minimorum in Provincia Franciæ, & apud In-  
fulas Americanas Botanico Regio; in quo plantarum Americanarum sedu-  
lam observationem, accuratissimam descriptionem generum, & specierum  
exactissimam discussionem vidimus, & probavimus: nec dubium nobis re-  
mansit quin futurus sit maximæ utilitatis rebus botanicis dignoscendis, sicut  
& jucunditatis ipsismet Botano philis; quare typis dignum, & citius tra-  
dendum judicavimus. Datum in hoc Parisiensi Conventu Minimorum ad  
Plateam Regiam, hac luce Aprilis duodecima, an. 1703.

Frater RENATUS THUILLIER, Exprovincialis.

Frater JOANNES FRANCISCUS MANGON, antiquus Provincialis.



P R I V I L E G E D U R O Y.

**L** OUIS par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos  
 Lamez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement,  
 Maîtres des Requêtes Ordinaires de nôtre Hôtel, Baillifs, Senechaux,  
 Prevosts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Justiciers & Offi-  
 ciers qu'il appartiendra ; Salut : Le Pere CHARLES PLUMIER, Minime,  
 Nous ayant fait remontrer qu'il desireroit faire imprimer un petit Ouvrage  
 de sa composition, intitulé : *Nova Plantarum Americanarum Genera* ; s'il  
 nous plaisoit luy accorder nos Lettres sur ce nécessaires. Nous lui avons per-  
 mis, & accordé, permettons, & accordons par ces Presentes, de faire imprimer  
 par tel Imprimeur, ou Libraire qu'il voudra choisir, ledit Livre, en  
 telle forme, marge, caractère, & autant de fois que bon luy semblera, pen-  
 dant le temps de trois années consecutives, à compter du jour de la datte  
 des Presentes, & de le faire vendre & debiter par tout nostre Royaume, à  
 condition que l'impression s'en fera dans nôtre Royaume, & non ailleurs,  
 en beau papier & bon caractère, conformément aux Reglemens de la Li-  
 brairie ; qu'avant que d'exposer le Livre en vente, il en sera mis deux  
 Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un autre dans le Cabinet  
 des Livres de nôtre Château du Louvre, & un en celle de nôtre tres-cher,  
 & feal Chevalier, Chancelier de France, le sieur Phelypeaux, Comte de  
 Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, & que ces Presentes seront  
 registrées és Registres de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de  
 Paris ; le tout à peine de nullité d'icelles. Du contenu desquelles vous man-  
 dons, & enjoignons de faire jouir l'Exposant, ou ceux qui auront droit de  
 luy, pleinement, & paisiblement, cessant, & faisant cesser tous troubles &  
 empêchemens. Voulons qu'à la Copie des Presentes qui sera imprimée au  
 commencement, ou à la fin dudit Livre, soy soit ajoutée comme à l'Origina-  
 l. Commandons au prenaier nôtre Huissier, ou Sergent, de faire pour  
 l'exécution des Presentes toutes significations, défenses, saisies, & autres  
 actes requis, & nécessaires, sans demander autre permission, & non obs-  
 tant clameur de haro, chartre normande, & Lettres à ce contraires ; Car  
 tel est nôtre plaisir. Donné à Versailles le dix-sept jour de Mars l'an de Grac-  
 ce mil sept cens trois, & de nôtre Regne le soixantième. Par le Roy en  
 son Conseil. Signé, L E C O M T E.

*Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs, conformément aux Reglemens. A Paris le 2. Avril 1703.*

Signé P. TRABOUILLET, Syndic.

Le Reverend Pere Plumier a cédé son droit à Jean Boudot, pour en jouir  
 suivant l'accord fait entr'eux. A Paris, le 12. Avril 1703.

NOVA





NOVA  
PLANTARUM AMERICANARUM  
GENERA.

PALMA.



PALMA inter plantas planta sane nobilissima, quæque genus suum inter plantas Americanas prima constituat summe digna ; inter cæteras quippe plantas in iis enascentes excelsius caput attollens. Unde tamen character ejus generis desumendus difficillimum determinare , cum in floribus & fructibus ejus specierum mira varietate ludat natura. In quibusdam etenim speciebus flores insunt monopetali , in aliis polypetali ; ex his alii fertiles , alii steriles ; in una specie fertiles & steriles in eadem vagina contenti , sed ab invicem separati ; in altera vero steriles in una vagina , & in alia vagina fertiles ; in quibusdam tandem speciebus flores omnino steriles & embryones nudi à floribus separati. In fructibus etiam spectabilis reperitur varietas. Apud namque quasdam palmarum species carnosî sunt & molles , ossiculoque durissimo fœti , ( has dactyliferas dicam , ) apud alias vero sicci , duri , seu in testam osseam abeuntes , cortice molli aut fibroso obvolutam , nucleoque fœtam , aut solido seu integro , aut vacuo , sed humore aqueo , pleno , ( istas cociferas appellabo. ) In tanta igitur florum ac fructuum varietate , qualis ex ipsis floribus & fructibus character sit assignandus dif-



ficillimum fane dijudicare. Quia tamen in omnibus speciebus quas aut ipse apud Insulas Americanas viderim, aut apud Authores observaverim, eadem insunt facies, similis florendi & fructificandi modus, ( scilicet e vaginarum seu spatharum sinu, florum & fructuum eruptio, ) caudex simplex, rectus, nullis pollens ramis, sed tantum costis foliosis, in orbem positus, in ipsa summitate instructus; ex ipsa facie & ex ipso flores & fructus ferendi modo characterem Palmæ esse desumendum existimavi, talem ejus characterem sic definiendo & stabiliendo.

Tab. I.

Palma est plantæ genus caudicis unius recti A, ramos non producentis, neque furculos ex radice proferre valentis, sed in summitate costis instructi, in orbem positus B, folia deferentibus, præ vetustate arefcentibus aut decidentibus, novis semper e reliquarum medio emergentibus; inter quas vaginæ seu spathæ C erumpunt ab imo ad summum dehiscentes, & floribus ac embryonibus racemosis foetæ.

Hoc Characterem Palma distinguitur à quibusdam Filicis arborescentis speciebus, quæ equidem caudice assurgunt simplici, recto, nec ramos, nec furculos proferente, sed tantum costas foliosas in summitate in orbem positas, & præ vetustate decedentes, novis semper per medias enascentibus. Distinguitur etiam ab speciebus illius plantæ quam vulgo *Bananier* seu *Musam* vocant; quæ etiam caudice seu trunco pollet simplici, foliis in orbem positus, in summitate instructo, vaginamque producente florum & embryonum racemo foetam; at e radice singularum specierum, seu cujuslibet trunci Stolones producuntur plantam perennandi causa.

Palma species sunt.

Palma major. C B pin. 506. Palma dactylifera, Linscot 4. part. Ind. Orient. fig. 14.

Palma minor, C B pin. 506. Chamæriphe Dod. pempt. 820

Palma indica, coccifera, angulosa, C B pin. 508. Tenga Hort. Mal. fig. 1. tom. 1.

Palma cujus fructus sessilis Faufel dicitur, C B pin. 510. Caunga, H M fig. 5. t. 1.

Palma coccifera complicato folio, fructu minore, Pauli Hermans. Carim-pana, H M fig. 9. t. 1.

Palma malabarica flosculis stellatis, fructu longo squamato, in



- H M 13. Ampana ejusdem fig. 10. t. 1.  
 Palma dactylifera fructu acerrimo, in H M 16. Schunda-pana  
 ejusdem fig. 11. t. 1.  
 Palma montana malabarica, folio magno complicato, acuto, flo-  
 re albo racemoso, fructu rotundo, in H M 6. Codda-panna  
 ejusdem primis duodecim fig. tom. 3.  
 Palma prunifera Iaponensis, Hort. Acad. Lugd. Bat. 472. Tod-  
 da-panna, H M 9. figuris novem, t. 3.  
 Palma sylvestris malabarica, folio acuto, fructu pruni facie, in  
 H M 16. Katou-indel ejusdem 15. fig. quatuor, t. 3.  
 Palma cocifera, vaginis ventricosus & liratis.  
 Palma cocifera, costarum lateribus aculeatis.  
 Palma cocifera, caudice tumido & aculeato.  
 Palma cocifera, altissima.  
 Palma humilis, cocifera, latifolia, major.  
 Palma humilis, cocifera, latifolia, minor.  
 Palma dactylifera, palustris.  
 Palma dactylifera, fructu globoso, minor.  
 Palma dactylifera, fructu globoso, major.  
 Palma dactylifera, coriaria, fructu subcæruleo.  
 Palma dactylifera & vinifera.  
 Palma dactylifera, latifolia.  
 Palma dactylifera, aculeata, fructu corallino, major.  
 Palma dactylifera, aculeata, fructu corallino, minor.  
 Palma dactylifera, aculeata, minima.  
 Palma dactylifera, radiata, minor, glabra.  
 Palma dactylifera, radiata, major, glabra.  
 Palma dactylifera, radiata, minor, aculeata.  
 Palma dactylifera, radiata, major, costarum lateribus aculeatis.

B O R B O N I A.

**B** Orbonia est plantæ genus flore A monopetalo, Campani-*Tab. 2.*  
 formi, aut Hypocrateri-formi & multi-fido: e cujus umbi-  
 lico B surgit pistillum, quod deinde abit in fructum D glandi-for-  
 mem, carnosum, intus in duos lobos divisum E. Floris autem  
 inferior pars C evadit in calycem fructus carnosum & pilea-  
 tum. F



## N O V A P L A N T.

Borboniæ species sunt.

Borbonia fructu oblongo, nigro, calyce coccineo.

Borbonia fructu globoso, nigro, calyce e viridi rubente.

*Serenissimus Princeps Gasto Borbonius, Regius sanguis, Magnorumque Regum genus, Henrici Magni filius, Magnique Ludovici patruus, inter ceteras virtutes Regias tanto Botanices delectabatur amore, ut apud Blesas & Parisios, Hesperideos hortos, plantas scilicet totius Orbis rariores immensis sumptibus transtulisset, quasve ne hyeme absentes sibi abessent, peritissimi Pictoris, Nicolai Roberti Blesensis manu in membranas transferri, nativis nempe coloribus ad vivum depingi amplis etiam sumptibus curabat. Miraris in tanto Principe tantum erga Botanicen amorem? Mirare tot Principum, totque Magnatum tam raros apparere nantes in tam vasto innocentium deliciarum gurgite, non animos obruente, sed oblectante. Quid etenim plantas intueri delectabilius & innocentius? Quid tandem plantis utilius? Plantæ nos nutriunt, plantæ nos sanant, plantæ nos tuentur; Achemenio costo, Mygdoniis opibus, Phrygio lapide, purpurarum sidere clariores; earum usus nos deliniunt dolentes.*

## G U I D O N I A.

Tab. 24.

**G**uidonia est plantæ genus flore A monopetalo quidem, sed coni trunci æmulo C & calyci B multi-fido insidente. Ex calycis autem umbilico surgit pistillum B quod deinde abit in fructum E ovatum, carnosum, quadrifariam ab apice ad basim dehiscentem F, seminibusque foetum ut plurimum oblongis H, Placentæ G adhærentibus.

Guidoniæ species sunt.

Guidonia ulmi foliis, flore roseo.

Guidonia ulmi foliis, flore niveo.

Guidonia aurantii foliis, aculeata.

Guidonia nucis juglandis foliis, major.

Guidonia nucis juglandis foliis, minor.

*Illustrissimus D. Guido Crescentius Fagon, Regi à sanctioribus Consiliis, Archiattrorum Comes, Guidonis Broßai, Medici & Botanici Regii amplissimi, Horti Regii Parisiensis amplificatoris, primique Præfecti, nepos; in Horto Regio Parisiensi, ceu ex Chirone in Parnasso natus, futura excellentiæ certa præsagia. Poeseos namque,*



## A M E R I C. G E N E R A.

*Medicinæ atque Botanices gloria nulli sane secundus. Cui non favor, sed virtus præstitit, ut ex millibus Medicis solum sibi elegerit Medicum Ludovicus Magnus.*

### P I T T O N I A.

**P**ittonia est plantæ genus flore A monopetalo, campani-formi, globofo & multi-fido. Ex cujus calyce C surgit pistillum C infimæ floris parti B ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum, D mollem seu baccam sphæricam succi plenam, & duobus feminibus E fœtam ut plurimum oblongis F. — Tab. 34

Pittoniæ species sunt.

Pittonia arborescens, chamædrifolia, major.

Pittonia arborescens, chamædrifolia, minor.

Pittonia humilis, Anchusæ foliis.

Pittonia scandens baccis niveis, nigris maculis notatis.

Pittonia frutescens, folio carnosio, hirsuto & obtuso.

Pittonia hirsutissima & ramosissima, baccis albis.

Pittonia racemosa, nicotianæ foliis fœtidissimis.

*Clarissimus D. Josephus Pitton Tournesort, Aquisextiensis, Doctor Medicus Parisiensis, Academia Regiæ Scientiarum socius, ac in Horto Regio Botanices Professor, Institutionum rei Herbariæ ac Botanici Parisiensis Author, peregrinatione ad Orientales plagas famosus, Joannis Scholastici Pitton, D. Medici eruditissimi, Patriæ & Provencæ Annalistæ, & Historio-graphi irreprehensibilis, nepos. Cujus familiam Patria Magistratibus decoravit, cujusque familia Patriam Magistratibus decoravit.*

### B R O S S Æ A.

**B**rossæa est plantæ genus flore A monopetalo, Campani-formi equidem, sed coni trunci æmulo & calyci B multi-fido insidente, ex cujus umbilico surgit pistillum C quod deinde abit in fructum E rotundum, quinque capsularem G feminibus fœtum H minutis, & calyce ipso deinde carnosio, molli, sphærico, & quinque fissuris pervio conclusum. D. Tab. 17.

Brossææ unicam vidi speciem.

Brossæa frutescens flore coccineo, fructu nigro.



Clarissimus D. Guido Brossæus ( Guy de la Brosse ) Medicus Regis ordinarius, de re herbaria & medica optime meritus, primus Horti Regii Parisiensis præfectus, qui Hortum vere Regium extruere & plantis undique conquisitis ornari curavit. Doctissimum tractatum edidit Gallice de natura, virtutibus & utilitate plantarum; opus sane doctissimum & utilissimum. Extat Parisiis apud Rollinum Baragnes 1628. in 4.

## XIMENIA.

Tab. 21.

**X**Imenia est plantæ genus flore A monopetalo, campaniformi, trifariam diviso, & oris plerumque repandis. Ex calyce autem C surgit pistillum G quod deinde abit in fructum ovatum, F. mollem, ossiculo factum Deiusdem formæ E nucleum includente. Ximeniæ unicam speciem agnovi.

Ximenia aculeata flore villosa, fructu luteo.

Luc. va-» Reverendus P. F. Franciscus Ximenes Hispanus, Ordinis Minorum  
ding. de » Provinciæ sancti Gabrielis, unus ex primis duodecim Patribus  
Script. » Minorum qui Indis Occidentalibus Evangelii lucem intulerunt.  
Ord. Mi- » Mexicanum idioma cum optime calleret, scripsit de natura &  
nor. 141. » virtutibus arborum, plantarum, & animalium novæ Hispaniæ,  
» & præsertim regionis Mexicanæ, quorum usus est in medicina,  
» libros quatuor in urbe mexicana impressos A C 1615. a Joanne  
» delaet in suo opere de novo orbe passim commendatos.

## HERNANDIA.

Tab. 40.

**H**ernandia est plantæ genus flore aut monopetalo, A campaniformi patente & multi-fido; aut rosaceo B plurimis scilicet petalis constante in orbem positis. Alii steriles sunt, alii fertiles. Horum calyx C abit deinde in fructum fere sphaericum, vesicarium & perforatum D, nucula factum, E striata, F nucleum condente rotundum.

Hernandiæ unicam speciem novi.

Hernandia amplo Hederae folio umbilicato.

Franciscus Hernandez Hispanus, in Mexicana novi orbis Regia primarius Medicus. Philippi I I. Regis Hispaniarum jussu, per quam sedula multorum annorum observatione de plantis, liquoribus



## A M E R I C. G E N E R A.

7

*bus & aliis rebus medicis præclarum opus condidit, impressum Roma A C 1651. Typis Vitalis Mascardi. Fol.*

## P I S O N I A.

**P**isonia est plantæ genus flore A monopetalo, campani-formi Tab 12.  
& multi-fido. Ex cujus calyce B surgit pistillum C infimæ  
floris parti, D ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fruc-  
tum C oblongum, angulatum, quinque fariam ab apice ad ba-  
sim dehiscentem, F & semine fœtum G ut plurimum oblongo.  
Pisoniæ unicam vidi speciem.

Pisonia aculeata fructu glutinoso & racemoso.

*Guillelmus Piso Lugduno-Batavus D. M. Brasiliam comitibus Geor-  
gio Marcgravio & H Cralitzio Germanis, medicinæ & ma-  
thescos, candidatis, adjunctis peragravit, deque medicina Bra-  
siliensi libros quatuor confecit & conscripsit, quorum quartus de  
facultatibus simplicium Brasilianorum tractat, iconibus supra  
quingentas, adjectis. Opus sane Americanis utile & curiosis dig-  
num. Extat Lugduni-Batavorum & Amstelodami apud Elze-  
virios & Hackios 1648. & 1658. fol.*

## M A R C G R A V I A.

**M**arcgravia est plantæ genus flore A monopetalo, campa- Tab. 13.  
ni-formi pistillo B staminibus C quibus reijci solet stipa-  
to, incumbente, pistillum autem abit deinde in fructum D fere  
sphæricum, mollem, carnosum, in quo E veluti nidulantur multa  
semina exigua F.

Marcgraviæ unicam reperi speciem.

Marcgravia scandens fructu radiatim posito.

*Georgius Marcgravius de Liebstad Misnicus Germanus Historiam  
rerum naturalium Brasiliæ libris octo ( quorum tres priores de  
plantis ) conscripsit, per sexcennium mediterraneorum locorum ex-  
plorator sedulus fuit, in Africam tandem transfretans succubuit.  
Opus ejus in ordinem digessit Joannes de Laet. Antverpianus,  
annotationes multas addidit & varia ab Auctore omissa supplevit  
& illustravit. Extat cum Historia Brasiliæ Pisonis Lugd. Bat. &  
Amstel apud Elzevirium &. 1646. in Fol.*



Tab. 35.

**C**Oa est plantæ genus flore B monopetalo, campani-formi, globoso, ex cujus Calyce A multi-fido surgit pistillum D polticae floris parti C ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum E, ex tribus capsulis compositum membranaceis, compressis, bivalvibus, & in duo loculamenta divisis, semine G foeta oblongo & alato.

Coæ unicam reperi speciem.

Coa scandens, fructu trigemino, subrotundo.

*Hippocrates Coss*, seu in *Insula Coa* natus, patre *Heraclide*, & *Pherenate*, aut *Praxitea* matre, primo *Olympiadis LXXX.* anno, hoc est, anno ante Christum 459. primus medendi Præcepta clarissime condidit, & volumina, *Herbarum* mentione referta. Obiit apud *Larissæos*, anno ætatis 85. vel 90. aliis 104. vel 109. hoc est, ante Christum 374. vel 369. aut 355. vel 350.

## ERESIA

Tab. 25.

**E**resia est plantæ genus flore A monopetalo, campani-formi, patente & multi-fido; ex cujus calyce C surgit pistillum D infimæ floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum E globosum, membranaceum, feminibusque foetum placenta adherentibus.

Eresia unicam vidi speciem.

Eresia foliis aquifolii longissimis.

*Theophrastus Eresius*, *Melanthii Fullonis Filius*, natus est *Eresi*, in *Insula Lesbo*, Homo suavitate insigni, Linguae pariter atque vite. Cui palma danda est ob eos quos de plantarum Historia & causis reliquit Libros sexdecim, & plures, quibus simile nunquam procuderunt Romana ingenia. Vixit annos quinque & octoginta. Moriens de brevitate vite humanæ conquestus est. Quæ si potuisset esse longior, futurum fuisset ut omnibus perfectis artibus, omni doctrina, hominum vita erudiretur.



## DIOSCOREA.

**D**ioscorea est plantæ genus flore A monopetalo, campani-<sup>Tab. 26.</sup> formi, patente & multi-fido : Ex cujus calyce B surgit pistillum, quod infimam floris partem perfodit, abitque deinde in fructum C trigonum, & in terna loculamenta E divisum, seminibusque fœtum planis, orbiculatis & marginatis F.

Dioscoreæ unicam observavi speciem.

Dioscorea scandens foliis Tamni, fructu racemoso.

*Pedanius aliis Pedacius Dioscorides, ex ea Ciliciæ Civitate oriundus quam Anazarbam, postea Cæsaream Augustam nominarunt, cæteros superavit studio ac diligentia, quibus materiam medicam, & potissimum Botanicam complexus est. Plantarum autem sexcentarum circiter mentionem fecit, quarum quadringentas & decem* <sup>Turnef. inst. r. herb. 6. 3.</sup> *vel descripsit, vel cum magis cognitis comparavit.*

## PLINIA.

**P**linia est plantæ genus flore A monopetalo, campani-formi, <sup>Tab. 11.</sup> patente & multi-fido ; e cujus calyce B surgit pistillum, quod deinde abit in fructum D mollem, globosum, striatum, & semine E fœtum, ejusdem formæ F.

Pliniæ unicam novi speciem.

Plinia fructu croceo, odorato.

*Cajus Plinius secundus Veronensis, rem herbariam cordi tam habuit, ut in Historia mundi, quam Vespasiano Imperatori, vel, ut aliis placet, Tito consecravit, à duodecimo Libro observante Gesnero usque ad vigesimum septimum variis omnino modis de stirpibus tractet, philosophice, historice, medice, rustice, &c. Miseni Classen imperio regens, incendio Vesuvii misere periit.*

## CAINITO.

**C**ainito est plantæ genus flore A monopetalo, campani-formi, <sup>Tab. 7.</sup> patente, multi-fido ; ex cujus calyce B surgit pistillum C, quod deinde abit in fructum D mollem, carnosum, globosum aut olivæ-formem ossiculis, vel ossiculo E fœtum nucleum includente F.

B



Cainito species sunt.

Cainito folio subtus aureo, fructu mali-formi.

Cainito folio subtus aureo, fructu olivæ-formi.

*Cainito nomen est Americanum. Oviedo Hist. Ind. Occid. lib. 8. 139.*

### CARAGUATA.

Tab. 33.

**C**araguata est plantæ genus flore A monopetalo, campaniformi tubulato, ut plurimum ad oras trifido; ex cujus calyce C surgit pistillum posticæ floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D oblongum, acuminatum, membranaceum, à summo ad imum in tres partes dehiscentem E, seminibusque fœtum papposis F.

Caraguatæ species sunt.

Caraguata latifolia, multiplici spica, flore albo.

Caraguata tenui-folia, paucioribus spicis.

Caraguata latifolia, clavata.

Caraguata clavata & spicata, foliis ferratis.

*Caraguata nomen est Americanum. Piso lib. 4. cap. 82.*

### KARATAS.

Tab. 33.

**K**aratas est plantæ genus flore A monopetalo, infundibuliformi, trifido, & calyci B infidente; is autem calyx abit deinde in fructum C fere conicum, carnosum, membranâ in quatuor partes sessili D contextum, & in tria veluti loculamenta E divisum, seminibus fœta oblongis F.

Karatæ unicam vidi speciem.

Karatas foliis altissimis, angustissimis & aculeatis.

*Karatas est nomen Americanum apud Insulas Vulgare.*

### ARAPABACA.

Tab. 31.

**A**rapabaca est plantæ genus flore A infundibuli formi, multifido; ex cujus calyce B surgit pistillum C, infimæ floris parti, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D bicapsularem E, seminibusque F fœtum ut plurimum minutissimis,



Arapabacæ unicam vidi speciem.

Arapabaca quadrifolia , fructu testiculato.

*Arapabaca nomen est Americanum. Marcg. lib. 1. 34.*

R O I O C.

**R**oioc est plantæ genus flore A monopetalo , infundibuli- Tab. 26.  
formi & multi-fido , teneris embryonibus D in capitulum  
quoddam congestis innascente. Cujuslibet autem embryonis um-  
bilicus C infimæ floris parti B , ad instar clavi infigitur ; ipseque  
embryo abit deinde in fructum F mollem , angulosum , semine  
G foetum duro , etiam anguloso ; e fructibus autem corpus  
quoddam componitur glomeratum E.

Roioc unicam vidi speciem .

Roioc humi fusum , fructu cupressino.

*Roioc est nomen Americanum , seu Hispanicum , Hispanorum sci-  
licet Americam inhabitantium , quod ex ejus radice telas ruffo  
colore inficiant , aut luteo.*

V A L D I A.

**V**aldia est plantæ genus flore A monopetalo , infundibuli- Tab. 24.  
formi , plerumque trifido , qui gemino calyce donatur ,  
altero scilicet B , à quo involvi , altero vero C , cui insidere so-  
let. Is autem abit deinde in fructum D globosum , mollem , &  
duobus ut plurimum seminibus foetum oblongis F.

Valdiæ unicam speciem agnovi.

Valdia cardui folio , fructu subcæruleo.

*Gonsales Ferdinandus d'Oviedo , alias de valde Hispanus Mattri-  
tensis , incola & Rector Sanctæ Mariæ in Darien Continentis  
Americani , & Aurifodinarum Præfectus , Historiam natura-  
lem & generalem Indiarum Occidentalium conscripsit , regnante  
Ferdinando V. Hispaniarum Rege. In qua Historiam peculiarem  
multarum plantarum in America nascentium complexus est om-  
ni fide dignam ; quam videre est in tertio Volumine itineratio-  
num & navigationum : Venetiis ex officina Giunctorum anno  
1556. in fol.*



## RUELLIA.

Tab. 1.

**R**uellia est plantæ genus flore A monopetalo, infundibuli-formi & multi-fido; ex cujus calyce C surgit pistillum infimæ floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D conicum, membranaceum, ab apice multifariam dehiscens E, & seminibus foetum plerumque exiguis & rotundis G.

Ruellia unicam speciem adinveni.

Ruellia humilis, flore cæruleo, Asphodeli radice.

a Fuch. » 2 Joannes Ruellius Gallus, Patria Sueffionensis D. M. supra Lin-  
Epif. nun » guarum peritiam non vulgari rerum cognitione præditus. b Ab-  
cup. » dicata medendi arte Sacerdotium in Templo Deiparæ Virginis  
b Paulus » Lutetiæ Parisiorum Poncherii Antistitis liberalitate promeruit,  
Jovius in » totumque id otium optimis Litteris, ut fortunis auctum decebat,  
elog. » impendit. Latini Sermonis puritatem ejus præclare indicat Dios-  
» corides in Latinum e Græco emendate traductus. Obiit Canoni-  
» cus Parisiensis, an. 1537.

## BRUNSFELSIA.

Tab. 11.

**B**runsfelsia est plantæ genus flore A monopetalo, infundibuli-formi, tubulato & multi-fido; ex cujus calyce C surgit pistillum infimæ floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D globosum, mollem, carnosum, seminibusque foetum subrotundis F, inter corticem & carnem positus E.

Brunsfelsia unicam agnovi speciem.

Brunsfelsia flore albo, fructu croceo, molli.

Otho Brunsfelsius Moguntinus Medicus. Cujus pater doliarius, sed gravis & probus. Bernæ Helvetiorum Medicinam exercuit feliciter cum successu, ibidemque fatis concessit, die 23. Novem. 1534. Primus in Germania herbariam medicinam propemodum extinctam, e crassissimis eruere tenebris tentavit. Herbarium conscripsit Tomis tribus comprehensum. Extat Argentorati apud Joan. Schottum, an. 1537. Fol.



## INGA.

**I**nga est plantæ genus flore A monopetalo , infundibuli-formi, qui tubum quemdam B excipit fimbriatum ; e calyce autem surgit pistillum E posticæ floris parti D , ad instar clavi infixum , quod deinde abit in fructum , seu filiquam F mollem , carnosam , seminibusque foetam anomalis H I. Tab. 12.

Inga unicam vidi speciem.

Inga flore albo , fimbriato , fructu dulci.

*Inga est nomen Americanum apud G. Marcg. Hist. plant. lib. 3. cap. 10.*

## MANGLES.

**M**angles est plantæ genus flore A monopetalo , infundibuli-formi , multifariam dissecto ; e cujus calyce C etiam multi-fido surgit pistillum D , infimæ floris parti B ad instar clavi infixum , quod deinde abit in fructum turbinatum F , carnosum , semen emittentem fusi-forme G ; cujus caput in ipso fructu reconditum , pileolo contegitur carnosum H. Tab. 15.

Mangles unicam vidi speciem.

Mangles aquatica , foliis subrotundis & punctatis.

*Mangles est nomen Americanum , Authore G. Pisone , lib. 4. cap. 86. pag. 113.*

## CORDIA.

**C**ordia est plantæ genus flore A monopetalo , infundibuli-formi , multi-fido , oris plerumque repandis. Ex cujus calyce I surgit pistillum C , infimæ floris parti B , ad instar Clavi infixum , quod deinde abit in fructum D turbinatum , carnosum , ossiculo F fætum in duo loculamenta G diviso , in quibus nucleus comprehenditur oblongus H. Tab. 14.

Cordia unicam adinveni speciem.

Cordia nucis juglandis folio , flore purpureo.

*Valerius Cordus Simesusii in Hassia natus ex patre Euricio Cordo Medico & Poeta Clarissimo an. 1515. 18. Febr. Illustrator sum-*



mus Dioscoridis & felicissimus indagator plantarum non antea cognitarum fuit. Ad quod pater exemplo inflammavit, qui eum ab innacunabulis inter ipsas herbas & flores voluit educari. Romæ moritur 1544. ætat. 19. Edidit *Historiæ stirpium* Lib. 4. Extant *Argentinae* 1561. Fol.

## TRAGIA.

Tab. 12.

**T**Ragia est plantæ genus flore A monopetalo, infundibuli-formi, plerumque trifariam diviso, sed sterili. Embryones enim C a floribus sejunguntur in eadem planta & abeunt deinde in fructum D tricoccum, ex tribus scilicet capsulis E compositum, semine foetis sphaerico F.

Tragiæ species sunt.

Tragia scandens longo Betonicæ folio.

Tragia alia scandens urticæ folio.

Melchior  
Adam.

*Hieronimus Tragus* alias *Hieronimus Boki* vernacule Bock de Heidespach, natus enim est Heidespachii sub an. 1498. Biponti vixit per aliquot annos ubi hortum Ducis Ludovici Palatini Rhæni varii generis plantis instruxit. Inde Hornbatum, postea Saræpontum se conferens *Historiam herbarum* condidit, in qua in tres Libros divisa de stirpium differentiis & facultatibus fuse differit. Mortuus est autem an. 1554. 21 Febr. ætat. 56. extat opus *Argentorati* 1552. in quart.

## FUCHSIA.

Tab. 14.

**F**uchsia est plantæ genus flore A monopetalo, infundibuli-formi & multi-fido; cujus calyx B abit deinde in fructum C subrotundum, mollem, carnosum, in quatuor loculamenta divisum D, seminibusque foetum subrotundis E.

Fuchsiae unicam speciem agnovi.

Fuchsia triphylla, flore coccineo.

*Leonartus Fuchs* Vembdingæ, Rhætiæ Oppido in ditione Ducum Bavariæ natus 1501. Medicinæ Doct̃or renunciatus Monachum adiit, deinde Tubingum, ubi 35. annis præclare docuit. Vir fuit assidui laboris, plantarum Germaniæ diligens explorator. Magno herbariorum commodo harum icones 510. amplioris for-



# AMERIC. GENERA.

15

mæ exhibuit. Tubingæ mortuus est anno 1566. 10. Maji, æta- Melchior  
tis 65. Scripsit de Historia stirpium Commentarios insignes: Ba- Adam  
sileæ 1542. in folio.

## RONDELETIA

**R**ondeletia est plantæ genus flore A monopetalo, hypocrati- Tab. 124  
teri-formi, tubulato & calyci C insidente. Is autem ca-  
lyx abit deinde in fructum D subrotundum, coronatum, bicap-  
sularem E, & seminibus fæctum exiguis F.

Rondeletia unicam speciem novi.

Rondeletia arborescens, tini facie.

Guillelmus Rondeletius Monspessuli natus, anno 1507. die 27.

Sept. Medicinæ arte præcellens, de piscibus & de piscium natu-  
ra præclarum Opus condidit, sed etiam simplicibus medicamen-  
tis dignoscendis & inveniendis summam operam collocavit, at- Turnef. inst.  
que in eo multum excelluit, Dioscoridem primus Monspeli enar- r. herb. 31.  
rans. Plura in Dioscoridem scripsisse apparet, ex Epistolis Gef-  
neri ad I. Bauhinum, à C. Bauhino editis. Cancellarius Scho-  
læ Monspeliensis mortuus est anno 1566.

## TURNERA.

**T**urnera est plantæ genus flore A monopetalo, infundibu- Tab. 125  
li-formi & multi-fido; ex cujus calyce C bicorni surgit  
pistillum infimæ floris parti B, ad instar clavi infixum, quod  
deinde abit in fructum D fere globosum aut turbinatum, trifa-  
riam dehiscens E, seminibusque fæctum F subrotundis, te-  
nuibus capillamentis, ceu placentæ affixis.

Turneræ unicam vidi speciem.

Turnera frutescens, ulmi-folia.

Guillelmus Turnerus Anglus, Medicinæ Doctor, vir solidæ eru- Raius Hist.  
ditionis & judicii, emisit plantarum Historiam Angliæ, anno plant.  
1551. in qua Figuras Fuchsi plerumque adhibuit, nomina expres-  
sit latine, græce, anglice, germanice, gallice, ordinem alpha-  
beticum secutus.



## MATTHIOLA.

Tab. 6.

**M**atthiola est plantæ genus flore A monopetalo , infundibuli-formi , & veluti tubi-formi ; cujus calyx C abit deinde in fructum mollem , subrotundum , ossiculo F foetum rotundo , in quo nucleus ejusdem formæ G continetur.

Matthiolæ unicam agnovi speciem.

Matthiola folio aspero , subrotundo , fructu nigricante.

*Petrus Andreas Matthiolus Senensis , Francisco Matthiolo , & Lucretia Bonninsegnia natus , anno 1500. magni nominis fuit Medicus , & imprimis famoso illo Botanico Opere toties recus clarus. Archiater Cæsareus , in Antiquorum lectione apprime versatus , medicamenta quam plurima non contemnenda docuit. Non defuerunt tamen ejus Operum censores & critici. Quid mirum , si cum ipse alios atro petebat dente , inulti non flebant ut pueri , sed tollebant asperrimi in mordentem parata cornua. Tridenti ubi sedem fixerat obiit anno 1577. etat. 77.*

## MARANTA.

Tab. 36.

**M**aranta est plantæ genus flore monopetalo , veluti infundibuli-formi , & in partes sex ampliato , quarum tres cæteris alternatim ampliores sunt ; calycis autem inferior pars abit in fructum ovatum , unicapsularem , semine foetum duro & rugoso.

Marantæ unicam agnovi speciem.

Maranta arundinacea , Cannacori folio.

*Bartholomæus Maranta Venusinus Medicus , condidit methodi cognoscendorum simplicium medicamentorum Libros tres eleganter profecto & erudite , atque ad Dioscoridis innumera loca recte intelligenda summe utiles. Subtili acrique ingenio fuit , & in stirpium observatione , iisque in examinandis diligentia profecto admirabilis. Obiit anno 1554.*

*Gess. de rei  
herb. script.  
ad Cordum.*

## LONICERA.



## LONICERA.

**L** Onicera est plantæ genus flore A monopetalo in plures Tab. 33.  
partes secto, quasi campani-formi & tubulato. Ex calyce  
autem C surgit pistillum posticæ floris parti B, ad instar clavi  
infixum. Calyx autem abit deinde in fructum D, seu baccam  
turbinatam glutinis plenam, & semine aut seminibus fœtam,  
compressis F.

Loniceræ unicam animadverti speciem.

Lonicera flore coccineo, baccis nigris.

Adamus Lonicerus Hessus, natus Malpurgi, anno 1528. die 10. Boissard.

Octob. ex patre Joanne Lonicero, viro virtute propria & eru- icon. tom. 3.  
ditione præclara insigni. Quid in re herbaria præstiterit, tes-  
tantur tum Botanicon, tum Historia plantarum diversimode ab  
ipso latine scripta, typisque Egenolphianis edita. Testatur &  
Herbarium vernacula Lingua sub ejus nomine publicatum. Fran-  
co-furti ad Mœnum vivere desiit, an. 1588. ætat. 58.

## DALECHAMPIA.

**D** Alechampia est plantæ genus flore A monopetalo, infun- Tab. 32.  
dibuli-formi, calyci B insidente tricocco, qui abit deinde  
in fructum C ejusdem formæ, in tres capsulas C fissilem, semi-  
ne fœtas rotundo D. His addidi tres plerumque flores e sinu  
duorum foliolorum E F, quæ trifariam secantur, prodire.

Dalechampiæ unicam speciem vidi.

Dalechampia scandens, Lupuli foliis, fructu hispido tricocco.

Inter eos qui plantarum cognitioni magis dediti fuerunt, emicuit Turnef. inst.  
Jacobus Dalechampius Cadomensis, qui maximam vitæ partem r. herb. 34.  
egit Lugduni inter medendum, tum civium, tum doctorum vi-  
rorum magna æstimatione. Ex recentioribus, primus ille cons-  
cribendam Historiam universalem stirpium suscepit; sed oneri  
impar, pluribus nempe occupatus negotiis, hoc Opus Historiam  
vulgo Lugdunensem absolvere non potuit, morte correptus Lug-  
duni, an. 1597. aut 98.



## TABERNÆMONTANA.

Tab. 30.

**T**abernæmontana est plantæ genus flore A monopetalo , tubulato , hypocrateri-formi & multi-fido ; ex cujus calyce C surgit pistillum D , infimæ floris parti B , ad instar clavi infixum , quod deinde abit in fructum E utriculatum , plerumque geminum , per longitudinem dehiscens E , seminibusque foetum oblongis G , & carne tenerrima obtectis F.

Tabernæmontanæ unicam speciem novi.

Tabernæmontana lactescens, Citrii foliis undulatis.

Turnef. inst.  
rei herb. 35.

Jacobus Theodorus, à Patria Tabernæmontanus dictus. Quippe Tabernis Montanis ( Berg Zabern ) Oppido in ditione Principum Bipontinorum natus est. Vir diligens fuit, & rei herbariæ maxime studiosus : In eo præcipue laudandus , quod præter multarum plantarum sibi propriarum notitiam , de viribus etiam vulgatiorem optime scripserit. E vivis excessit Haidelbergæ, an. 1590.

## CAMERARIA.

Tab. 29.

**C**ameraria est plantæ genus flore A monopetalo , tubulato , hypocrateri-formi & multi-fido ; ex cujus calyce G surgit pistillum C , infimæ floris parti B , ad instar clavi infixum , quod deinde abit in fructum D plerumque geminum , siliquosum , auritum , per longitudinem dehiscens E , seminibusque foetum oblongis F , foliatis , & squamatim positis.

Camerariæ species sunt.

Cameraria lato myrti folio.

Cameraria angusto linariæ folio.

Melchior  
Adam,

Joachim Camerarius Norimbergensis Medicus , Norimbergæ natus , die 6. Nov. 1534. ididemque mortuus 1598. die 11. Oct. anno ætatis 64. Puer Vittembergæ & Lipsiæ Medicinæ studuit. Romæ Medicinæ est renunciatus Doctor anno 1552. Medicinæ, & rei herbariæ semper studiosissimus fuit. Petri Andrææ Matthioli Herbarium latine & germanice , novis figuris & observationibus à se illustratum & auctius redditum edidit ; scilicet de plantis Epitomem utilissimam Petri Andrææ Matthioli Senensis : Franco-furti ad Mænum 1588. in quarto. Rerum etiam na-



*turalium, fossilium, lapidum, metallorum, & id genus aliorum diligentissimus fuit indagator.*

## R A U V O L F I A.

**R**auvolfia est plantæ genus flore A monopetalo, tubulato, *Tab. 40.* hypocrateri-formi & multi-fido; ex cujus calyce surgit pistillum B, infimæ floris parti, ad instar clavi infixum C, quod deinde abit in fructum D fere globosum, mollem, lactis plenum, & uno, aut duobus seminibus foetum E F duris G.

Rauvolfiæ species sunt.

Rauvolfia tetraphylla, angustifolia.

Rauvolfia tetraphylla, latifolia.

*Leonardus Rauvolfius floruit circa annum 1583. Patriam habuit Melchior Augustam Drusi. In Orientales Regiones navigare in animum Adam suum induxit, & anno 1573 Massiliæ navim ingressus, in Orientem venit, ubi sæpe cum præsentaneo vitæ discrimine peragravit. Scripsit itinerarium in Syriam, quod in sex partes distinxit, in quibus plurima rara de omni medica materia observata tradit, additis variis plantarum, animalium, aliarumque rerum iconibus. Laugingæ, an. 1583. in quarto.*

## B E L L O N I A.

**B**ellonia est plantæ genus flore A monopetalo, rotato & *Tab. 31.* multi-fido; ex cujus calyce D surgit pistillum E, mediæ floris parti B, ad instar clavi infixum. Calyx autem abit deinde in fructum E durum, ovato-acuminatum, seminibusque foetum exiguis F G.

Belloniæ unicam observavi speciem.

Bellonia frutescens, folio melissæ aspero.

*Petrus Bellonius Cenomanus, Medicus fuit, vir indefessi laboris Clu. in Episc. & studii, quemadmodum ex ejus lucubrationibus, quas partim ded. latino, partim gallico sermone evulgavit, percipere licet. Nam extant Libri de coniferis arboribus, &c. ab ipso latine conscripti. Gallice vero de avibus, piscibus, &c. tum Commentaria in Dioscoridem, & de Agricultura Liber. Alia quædam præterea meditabatur, sed laudabiles ipsius conatus, non sine magno*



*litterariæ Reipublicæ dispendio, inopina mors nefarii latronis manu illata, interrupt. Claruit circa an. 1564.*

## NHANDIROBA.

Tab. 27.

**N**Handiroba est plantæ genus floribus A B monopetalis, rotatis, & multi-fidis, quorum alii steriles sunt, alii vero fecundi C, insidentes scilicet embryoni, qui deinde abit in fructum D pyxidatum, carnosum, cortice duro præditum, in quo veluti nidulantur semina E, compressa & orbicularia F.

Nhandirobæ unicam speciem vidi.

Nhandiroba scandens, foliis hederaceis, angulosis.

*Nhandiroba est nomen Americanum. Marcg. lib. 1. cap. 22.*

## DODONÆA.

Tab. 12.

**D**odonæa est plantæ genus flore A monopetalo, hypocrateri-formi, trifariam diviso; e cujus calyce surgit pistillum B, quod deinde abit in fructum C mollem, seu baccam oblongam, & semine D foetam ejusdem formæ.

Dodonææ species sunt.

Dodonæa aquifolii, folio tricuspidato.

Dodonæa aquifolii, folio anguloso & aculeato.

Dodonæa aquifolii, folio anguloso, non aculeato.

Melchior  
Adam.

*Rembertus Dodonæus Archiater, & Medicus Cæsareus, natus est Mechliniæ anno 1517. Fortunis & musis propitiis, ad summum eruditionis culmen in omni artium genere ascendit, præsertim Medicinæ, quam lectionibus, scriptisque doctissimis Botaniciis mirum in modum exornavit. Obiit Lugduni-Batavorum anno 1585. ætat. 68. Extant de eo stirpium Historiæ pemptades sex, sive Libri 30, Antverpiæ 1616. in folio.*

## CLUSIA.

Tab. 10.

**C**lusia est plantæ genus flore A monopetalo, hypocrateri-formi ut plurimum, & multi-fido, interdum veluti e plurimis petalis constante, in orbem positis; ex calyce autem surgit pistillum D, globulo C perforato præcinctum, quod deinde



abit in fructum F ovatum, in plures partes à summo ad imum dehiscens I, seminibusque foetum oblongis N, pulpa tenerima M obtectis, & placentæ conicæ, & sulcatæ affixis.

Clusiae species sunt.

Clusia flore albo, fructu coccineo.

Clusia flore roseo, major, fructu subviridi.

Clusia flore roseo, minor, fructu flavescente.

Clusia alia minor, flore albo, fructu virescente.

Carolus Clusius Atrebatensis, natus est anno 1526. In inquirendis plantis diligentissimus, quarum sicut & rerum aliarum naturalium studio flagravat, ut Hispania, Lusitania, Gallia, Germania, Pannonia, Anglia, Belgioque peragratis, nondum satis ipse sibi fecerit, ac longiora & molestiora itinera suscepisset, si votis valetudo respondisset. Scripta sua omnia ad incudem revocavit, extremamque manum addidit, & in duos Tomos digessit. *Turnef. inst. r. herb. 41.* Lugduni-Batavorum obiit Cœlebs, an. 1609. die 6. Aprilis, atat. 84. omnibus desiderium sui relinquens tristissimum, simulque memoriam nominis numquam interituram. Scripsit de plantis exoticis, seu exoticorum Libros 10. Antverpiæ 1605. in folio, rariorum aliquot plantarum per Hispaniam observatarum, Historiam, Antverp. 1576. in octavo. Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam, &c. observatarum, Historiam, Antverp. 1583. Rariorum plantarum Historiam, Antverp. in fol. 1601.

L O B E L I A.

**L**obelia est plantæ genus flore A monopetalo, anomalo, *Tab. 31.* tubulato, in plurimas partes veluti lingui-formes, digitatim diviso, & calyci B insidente. Is autem calyx abit deinde in fructum C mollem, ovatum, succi plenum, & officulo D foetum oblongo E, in quo nucleus continetur ejusdem formæ F.

Lobelie unicam speciem vidi.

Lobelia frutescens; portulacæ folio.

Matthias de Lobel natus est Insulæ Fland. an. 1538. patre Joanne de Lobel, Jur. Conf. Fuit Antverpiæ, & Delphis-Bat. aliquando Guillelmi Auriaci Principis, postea Ordinum Hollandiæ; & postremo Jacobi I. Regis Magnæ Britanniae Medicus & Botanographus. Plantarum seu stirpium Historiam conscripsit,



cui annexum *Adversariorum Volumen*, Antverp. 1581. Multa alia Opera edidit, partim medica, partim pharmacopœa, partim tandem botanica. Obiit Londini, an. 1616. æt. 78.

## PENÆA.

Tab. 25.

**P**enæa est plantæ genus flore A monopetalo, anomalo, cujus petala duo B D, superius scilicet & inferius cochlearis instar, concava sunt; cætera vero cordi-formia C. Ex calyce autem E surgit pistillum, quod deinde abit in fructum F subrotundum, compressum, in duo loculamenta divisum H, semine fœta lenti-formi I.

Penæa unicam vidi speciem.

Penæa arborescens, Buxi folio aspero.

Lind. renov.  
503.

*Petrus Pena Gallo-Provincialis, in loco vulgo Iouques, Aquensis Diœcesis natus. Vir doctissimus, cujus auxilio fretus Lobelius, rariores plantas in Gallia Narbonensi nascentes divulgavit. Opera ejus extant Londini apud Thomam Purfootium 1571. fol. & Antverpiæ apud Christ. Plantinum 1570. & 1576. folio. Nempe nova stirpium Adversaria, perfacilis investigatio, luculentaque accessio ad priscorum præsertim Dioscoridis, & recentiorum materiam medicam, additis Guillelmi Rondeletii aliquot remediorum formulis.*

## TAPIA.

Tab. 21.

**T**apia est plantæ genus flore A polypetalo, anomalo, ex quatuor scilicet petalis sursum erectis constante. Pistillum autem C surgit e medio calycis, longo pediculo affixum, abique deinde in fructum D globosum, carnosum, in quo nidulantur E semina plurima, fere reni formia F.

Tapia unicam vidi speciem.

Tapia arborea, triphylla.

Tapia est nomen Americanum. G. Piso. lib. 4. cap. 17.



## CUIETE.

**C**uiete est plantæ genus flore A monopetalo, anomalo, *Tab. 16.* utriculato & multi-fido; ex cujus calyce C surgit pistillum posticæ floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D carnosum, cortice duro, in quo nidulantur E semina plurima cordi-formia F H.

Cuiete species sunt.

Cuiete foliis oblongis & angustis, magno fructu ovato.

Cuiete lati-folia, fructu putamine fragili.

Cuiete minima, fructu duro.

Cuiete angusti-folia, fructu minori, globoso.

Cuiete angusti-folia, fructu minori, ovato.

*Cuiete est nomen Americanum. G. Marcg. lib. 3. cap. 14.*

## BAUHINIA.

**B**auhinia est plantæ genus flore A polypetalo, anomalo, *Tab. 13.* ex quinque ut plurimum petalis constante, uno versu dispositis. Ex cujus calyce C surgit pistillum D incurvum, staminibus ejusdem formæ stipatum, quod deinde abit in siliquam E, seminibus sætam reni-formibus G.

Bauhiniæ species sunt.

Bauhinia aculeata, folio rotundo, emarginato.

Bauhinia non aculeata, folio ampliori & bicorni.

*Joannes & Caspar Bauhinus, nobile par fratrum, ex patre Gallo Turnef. inst.*

*Ambiano Basileæ nati sunt. Quos sæva, sed fœlix paupertas tam*

*utiles Medicinæ & Botanice tulit. Tantam inter Herbarios fa-*

*mam adepti sunt, vix ut minima planta seu herbula appelletur*

*sine utriusque commemoratione. Opera eorum medica, botanica*

*& anatomica ab omnibus Medicis, botanicis & anatomicis vel*

*minimis cognita, quam eruditi, quam laboriosi; quam tandem*

*utiles fuerint maximo sunt argumento. Joannes obiit Mont-bel-*

*gardî, an. 1613. Casparus vero Basileæ, an. 1624. etat. 64.*



## ISORA.

Tab. 37.

**I**fora est plantæ genus flore, aut monopetalo A, aut polypetalo B, sed anomalo patente, quasi bilabiato, & multi fido. E fundo autem floris surgit pistillum H, cujus apex D abit deinde in fructum E turbinatum, ex plurimis vaginis F constantem, in cochleam intortis, & seminibus foetis fere reniformibus G.

*Iforæ species sunt.*

*Ifora Althææ foliis, fructu breviori & crassiori.*

*Ifora Althææ foliis, fructu longiori & angustiori. in H. Mal. 55.*

*Tab. 30. Tom. 6.*

*Ifora est nomen Indicum. H. Mal. ibidem.*

## MUSA.

Tab. 34.

**M**usa est plantæ genus flore polypetalo A, anomalo. Floris petalum superius B, scaphulæ instar excavatum, nest, & in summitate trifidum; antè vero D concavum, interius tandem peltatum C, foliolisque duobus E angustis & acuminatis stipatum. Calyx autem F abit in fructum G cucumeriformem, mollem, carnosum, cute obtectum, in tria veluti loculamenta H divisum, in quibus apparent seminum quædam veluti rudimenta I.

*Musæ species sunt.*

*Musa fructu cucumerino, longiori.*

*Musa fructu cucumerino, breviori.*

*Musa est nomen apud quosdam Orientales usitatum.*

## BONDUC.

Tab. 39.

**B**onduc est plantæ genus flore A, aut polypetalo, aut monopetalo, profundius in plures partes secto, sed fere anomalo; ex cujus calyce B surgit pistillum C, quod deinde abit in fructum E filiquosum, rostratum, ut plurimum echinatum, unoque, aut duobus seminibus foetum E rotundis, duris & politis.

Bonduc



Bonduc species sunt.

Bonduc vulgare, majus, polyphyllum.

Bonduc vulgare, minus, polyphyllum.

Bonduc aliud polyphyllum, foliis tricuspidatis.

*Bonduc est nomen Indicum. Jacob. Zanoni Hist. Botan. 44. fig. 17.*

## VANILLA.

**V**anilla est plantæ genus flore A polypetalo, anomalo, *Tab. 23.* sex petalis scilicet constante, quorum quinque similia, & in orbem fere posita, sextum autem meditullium occupat, aqualisque in modum convolvitur. Calyx autem E abit deinde in fructum, seu corniculam F mollem, carnosam, seminibusque foetam minutissimis H.

Vanillæ species sunt.

Vanilla flore viridi & albo, fructu nigrescente.

Vanilla flore violaceo, fructu breviori, rubro.

Vanilla flore albo, fructu breviori, corallino.

*Vanilla est nomen Hispanicum, seu apud Hispanos Americam incolentes vulgare.*

## PARKINSONIA.

**P**arkinsonia est plantæ genus flore A polypetalo, anomalo; ex quinque scilicet petalis B C dissimilibus, constante. Ex calyce autem D surgit pistillum, quod deinde abit in siliquam E torosam, nodosam, & ad singulos nodos semine foetam F subrotundo G. *Tab. 34.*

Parkinsoniæ unicam vidi speciem.

Parkinsonia aculeata, foliis minutis, uni costæ adnexis.

*Joannes Parkinsonius Londinensis, Pharmacopæus Regius, Historiam universalem plantarum anglice tradere conatus est. In Parkinsonio enim terrestri, opere sic nuncupato, florum Historiam late persequitur. In Theatro vero Botanico plures plantarum species, quam quævis alia quæ hæctenus extet Historia.*



## CORTUSA.

Tab. 8.

**C**ortusa est plantæ genus flore A polypetalo, anomalo, ex quinque scilicet petalis inæqualibus & dissimilibus constante. Ex cujus calyce D E surgit pistillum F, quod deinde abit in fructum G ovatum, carnosum, ossiculo foetum H I, in duo loculamenta diviso K, semine foeta tenui & oblongo L.

Cortusæ unicam agnovi speciem.

Cortusa arundinacea, amplis cannaçori foliis.

Ricob. de  
Gymn. Pa-  
tav. &  
Thuanus in  
Gymn. Pa-  
tav.

Jacobus Antonius Cortusus, præter generis nobilitatem, sibi decus & ornamentum suis ipsius studiis ac virtutibus comparavit. Semper enim fuit studiosus quam qui maxime; ac tametsi Medicinam numquam professus est, tantopere tamen simplicium medicamentorum cognitione est delectatus, & herbarum omnium, fruticum, arborum vires tam exacte cognovit, ut qui hujus rei peritior suis temporibus fuerit nominari posse nemo videatur. Obiit anno 1593. nullo Opere edito, nisi Catalogo plantarum Horti Patavini, italice Venetiis excuso.

## ALPINA.

Tab. 11.

**A**lpina est plantæ genus flore A monopetalo, anomalo, tubulato, personato, tri-fido, petalum intus continente, cujus pars anterior A A excavata & alata, posterior vero in annulum definit pistillo C floris trajectum. Calyx autem D abit in fructum E ovatum, carnosum, trifariam ab apice ad basim dehiscentem F, seminibusque foetum H, tenuibus capillamentis placenta affixis G.

Alpinæ unicam speciem agnovi. Plurimæ tamen insunt plantæ apud Americanas Insulas nascentes, floribus & fructibus ei affines.

Alpina racemosa alba, cannaçori foliis.

Linden. re.  
nov. 225.

Prosper Alpinus natus est Marosticæ, Oppido ad montium vincen- tinorum radices amæno, an. 1553. patre Francisco Alpino, Me- dico sui temporis insigni. Nactis Patavii an. 1578. Medicinæ Doctoris insignibus, biennio post, simplicium exoticorum inda- gandorum gratia 1580. Venetiis solvens, in Aegyptum trajecit,



ibique per triennium commoratus, Venetias rediit, & paulopost Genuæ, ab ejus Reipublicæ Principe, Joanne Andræa Auria, ad propriæ valetudinis custodiam accersitus, medicam artem feliciter exercuit. Plantas rariores, quas aut in Ægipto ipse observaverat, aut ex Creta, & aliunde ab Hieronimo Capello, & Nicolao Centareno, Senatoribus amplissimis, acceperat, descripsit ac depingi curavit. Multos Tractatus, tum Medicinæ, tum Botanices, ipse, aut filius ejus Alpinus Alpinus post eum, in lucem edidit. Vivere desiit an. 1616. ætat. 63.

## GESNERA.

**G**esnera est plantæ genus flore A monopetalo, personato, Tab. 91  
anomalo; ex calyce autem C surgit pistillum posticæ floris  
parti ad instar clavi infixum. Calyx autem abit deinde in fructum  
D membranaceum, coronatum, in duo loculamenta divisum  
E, & feminibus foetum exiguis F.

Gesneræ species sunt.

Gesnera humilis, flore flavescente.

Gesnera arborescens, amplo flore fimbriato & maculoso.

Gesnera amplo digitalis folio tomentoso.

Conradus Gesnerus Tiguri Helvet. an. 1516. natus, vir publicum bonum juvandi adeo studiosus, totius Historiæ naturalis parens, ac veluti promptuarium, primus omnium veram aperuit viam ad plantarum cognitionem assequendam, Generum adjumento. In Melchior  
nulla naturæ rerum parte diligentius est versatus, nulli plus tem-  
poris & operæ impendit, quam plantarum cognitioni; etenim adolescens, aut potius puer ab Avunculo Joanne Friccio, rei herbariæ perito, ad hoc studium assuefactus est, quod deinde semper amavit. Quantis laboribus sudaverit, declarant immensa ejus Opera, quorum tamen, proh dolor! perierunt multa. Mortuus est in Musæo suo, quo paulo ante quam expiraret, reduci voluit, lue pestifera quæ Tiguri grassabatur, correptus, an. 1565. ætatis 49.



## C O L U M N E A.

Tab. 33.

**C**olumnea est plantæ genus flore A monopetalo , personato , cujus labium superius non nihil fornicatum & excavatum , inferius vero tripartitum. Ex calyce autem B surgit pistillum C , posticæ floris parti D , ad instar clavi infixum , quod deinde abit in fructum E globosum , mollem , seminibusque plenum F exiguis , & oblongis G.

Columneæ species sunt.

Columnea scandens , phæniceo flore , fructu albo.

Columnea scandens , flore lutescente , fructu albo.

Turnesf. inst.  
536

*Fabius Columna , Nobilis Romanus , ex antiqua illa , & perillustri Columnarum gente oriundus , quæ inter nobiliores Italiæ familias primas partes occupat , præ aliis commendandus , & ob exquisitam Historiæ naturalis cognitionem. Nihil profecto adeo absolutum , nihil in hoc genere cum tanti Viri Operibus comparandum est , sive icones Auctoris manu exaratas , sive descriptiones & dissertationes criticas spectes. An. 1592. Opus omnino eruditum , Φυτεβλαχον nomine , cum iconibus 35. in lucem emisit. Deinde ~~supra~~ plantarum iconibus 156. ornatam , juris publici fecit , an. 1606. ejusque partem alteram 1616. cum iconibus 43.*

## C Æ S A L P I N A.

Tab. 9.

**C**æsalpina est plantæ genus flore A monopetalo , personato , anomalo , in quatuor partes dissecto inæquales , quarum superior major , & cochlearis instar excavata ; e fundo autem floris surgit pistillum B , staminibus incurvis stipatum , quod deinde abit in siliquam C , seminibus fatam D oblongis E.

Cæsalpinæ unicam vidi speciem.

Cæsalpina polyphylla , aculeis horrida.

Turnesf. inst.  
66.

*Andreas Cæsalpinus Aretinus , præstantissimus peripateticus , Clementis VIII. Archiatros , Romæ scriptis famam nominis propagavit , & rationem plantarum per classes disponendarum solus inter Herbarios Philosopho dignam reliquit , petitam scilicet ex seminum forma. Ejus Historiæ plantarum nihil deest præter icq-*



nes. Romæ decessit initio anni 1602. 7. Cal. Mart. Extat  
ejus Opus de plantis lib. 16. Florentiæ apud Georgium Mares-  
cottum 1583. in quarto.

B E S L E R I A.

**B**esleria est plantæ genus flore A monopetalo , anomalo , *Tab. 8.*  
tubulato , bilabiato , aut personato. Ex cujus calyce D sur-  
git pistillum E posticæ floris parti B , ad instar clavi infixum ,  
quod deinde abit in fructum H mollem , carnosum , ovatum ,  
feminibusque foetum exiguis F.

Besleria species sunt.

Besleria Melissæ , tragi facie.

Besleria virgæ aureæ foliis , flore luteo , minor.

Besleria virgæ aureæ foliis , flore luteo , major.

Besleria scandens , cristata , fructu nigro.

Basilus Beslerus Philater , & Pharmacopæus Norinbergensis ,  
vir sane magnæ memoriæ dignus , quippe qui maximum Opus ,  
Hortum dico Eystetensem , seu plantas in horto illo celeberrimo  
Eystetensi , in Franconia olim exhibitas , tot tantisque iconibus  
ad virum æri incisiss , non solum diligenter repræsentare , sed  
& sedulo describere accuravit. Sumptus tanti Operis , largiente  
Reverendissimo , ac illustrissimo Principe , Domino Joanne Con-  
rado à Gemmingen , Eystetensium Episcopo. Extat Opus No-  
rimbergæ in maximo folio , an. 1613.

D O R S T E N I A.

**D**orstenia est plantæ genus flore A monopetalo , anomalo , *Tab. 8.*  
carnoso , pedem anserinum referente ; ipsemet autem flos  
fit fructus carnosus ejusdem formæ , intra quem plurima nidulan-  
tur semina subrotunda , & apice donata.

Dorstenia unicam novi speciem.

Dorstenia sphondilii folio , dentariæ radice.

Theodoricus Dorstenius Germanus , forte Marpurgensis , Medicus Linden. 12-  
optimus , & simplicium explorator eruditissimus , Botanicum *nov. 293.*  
edidit , continens herbarum , aliorumque simplicium , quorum usus  
est in medicinis , cum descriptionibus & iconibus , ex præcipuis



tam Græcis, quam Latinis Authoribus concinnatum. Francofurti apud Christ. Egenolphum, in fol.

## KODDA-PAIL.

Tab. 39.

**K** Odda-pail est plantæ genus flore A monopetalo, personato, anomalo, cucullato. Ex floris autem fundo surgit pistillum B, apice donatum clypeato, quod deinde abit in fructum membranaceum, utriculatum, unicapsularem, feminibusque fœtum D oblongis E.

Kodda-pail unicam vidi speciem.

Kodda-pail palustris, folio oblongo & spongioso.

Kodda-pail nomen est Indicum. H. Mal. tom. 2. Tab. 32. pag. 63.

## CASTOREA.

Tab. 17.

**C** Astorea est plantæ genus flore A monopetalo, personato, cujus labium superius surrectum, inferius vero in tres partes divisum, media parte bifida. Calyx autem B abit in fructum C carnosum, globosum, unicapsularem, & quatuor semina recondentem D angulosa F.

Castoreæ species sunt.

Castorea repens, spinosa.

Castorea racemosa, flore cæruleo, fructu croceo.

Castor Durantes, Medicus Romanus, Herbarium novum cum figuris plantarum, quæ in tota Europa, India Orientali & Occidentali nascuntur, italice edidit, viribus latinis versibus expressis, ordinem alphabeticum observavit, & plantarum figuras 879. adposuit. Romæ 1585. in fol.

## GERARDIA.

Tab. 12.

**G** Erardia est plantæ genus flore A monopetalo, personato, cujus labium superius surrectum est, subrotundum & emarginatum, inferius vero in tres partes divisum, media bifida. Ex calyce autem C surgit pistillum posticæ floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D oblongum, gibbum, septo medio E, in duo loculamenta divisum, feminibusque fœtum orbicularibus F.



Gerardiæ unicam speciem vidi.

Gerardia humilis, Bugulæ foliis, Asphodeli radice,

Joannes Gerardus Angelus, ( referente Johnsono in Præfat. ad Gerardum emaculatum, ) natus est Nantvici in Comitatu Cestriensi, unde Londinum venit, ubi Chirurgiæ operam dedit, in qua adeo profecit, ut magisterium in ea Facultate adeptus sit. Historiam edidit plantarum Anglicam, cum figuris ipsius Tabernmontani, non nullis etiam Lobelii, & insuper 16. novis additis. Londini 1597. in fol.

B A R L E R I A.

**B** Arleria est plantæ genus flore A monopetalo, personato, Tab. 31. cuius labium superius surrectum est, inferius vero tripartitum. Ex calyce autem C surgit pistillum floris parti posteriori B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D membranaceum, oblongum, quadrangularem, unicapsularem, seminibusque foetum E F planis & orbiculatis G.

Barleria species sunt.

Barleria solani folio, flore coccineo.

Barleria aculeata, solani folio angustiore, flore cæruleo.

Reverendus Pater Jacobus Barlier Parisinus, & Doctor Medicus Parisiensis, sacrum Ordinem Fratrum Prædicatorum professus est; ubi Magistrorum, seu Generalium Ordinis Assistens fuit generalis. Magna in eo exitere omnia, studium Religionis, & morum integritas, recondita litteratura, scriptionis venustas, gravitas & puritas, tum omnis Medicæ, tum vero Botanica rara peritia. Testantur Opera ejus immensa Botanica manuscripta, ( orbis scilicet botanicus, quem orbi litterario parabat ) in Bibliotheca Conventus Parisiensis ad sanctum Honoratum custodita. Parisiis vivere desit in eodem Conventu 17. Septembris, anno 1673. ætatis 68. in cœlestibus Hortis in æternum victurus.

C A M A R A.

**C** Amara est plantæ genus flore A monopetalo, personato, Tab. 2. anomalo, cuius labium superius surrectum, inferius vero



tripartitum. Embryo autem, cui flos insidet, abit deinde in fructum mollem, seu baccam D officulo foetam E rotundo. His addendum ex multis embryonibus glomeratum quoddam corpus componi C.

Camarae species sunt.

Camara trifolia, purpurascente flore.

Camara spinosa, flore variegato.

Camara alia flore variegato, non spinosa.

Camara arborescens, salviae folio.

Camara est nomen Americanum. G. Marcg. lib. I. c. 4.

## BONTIA.

Tab. 23.

**B**ontia est plantae genus flore A monopetalo, personato, cujus labium superius surrectum, inferius vero tripartitum. Ex calyce autem C surgit pistillum G, posticae floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum D ovatum, mollem, succi plenum, & officulo E foetum oblongo F, in quo nucleus continetur ejusdem formae G.

Bontiae unicam vidi speciem.

Bontia arborescens, thimelaeae facie.

Jacobus Bontius Retoredamensis D. M. & Civitatis Bataviae novae in Java Medicus ordinarius. Historiae naturalis, & Medicae Indiae Orientalis Libros sex congeffit, quorum sextus de Historia plantarum in iis locis nascentium. Extant cum Pisonis de utriusque Indiae rebus lib. 14. Amstelredami apud Lud. & Dan, Elzevirios 1658. in folio.

## CORNUTIA.

Tab. 17.

**C**ornutia est plantae genus flore A monopetalo, personato, cujus labium superius surrectum, inferius vero tripartitum; ex calyce autem C surgit pistillum, posticae floris parti B, ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum, sed baccam D succi plenam, sphaericam, & semine E foetam plerumque reniformi F.

Cornutiae unicam vidi speciem.

Cornutia flore pyramidato caeruleo, foliis incanis.

Clarissimus



**Clarissimus D. Jacobus**, Cornuti **D. Medicus Parisiensis**, Canadensium plantarum, aliarumque nondum editarum Historiam conscripsit, adjectis iconibus; cui additum est ad Calcem Enchiridion Botanicum Parisiense, continens indicem plantarum quæ in pagis, sylvis, pratis & montosis juxta Parisios locis nascuntur. Extat Opus Parisiis apud Sim. le Moyne, via Jacobæa 1635. in quarto.

C A A P E B A.

**C** Aapeba est plantæ genus flore A rosaceo, quatuor scilicet Tab. 29. petalis in orbem positis constante, sed sterili; e cujus medio surgit pistillum C planum, orbiculare & umbilicatum. Embryones autem D, in eadem planta à floribus separati nascuntur, abeuntque deinde in baccam E mollem, sphericam, & semine foetam F rugoso D.

Caapebæ species sunt.

Caapeba folio orbiculari, & umbilicato, lævi.

Caapeba folio orbiculari, umbilicato, tomentoso.

Caapeba folio orbiculari, non umbilicato.

Caapeba est nomen Americanum. G. Piso. lib. 4. cap. 54.

I A N - R A I A.

**I** An-raia est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet Tab. 29. petalis B in orbem positis, constante. Cujus calyx C abit deinde in fructum unicapularem D, alatum, & unico semine foetum rotundo E.

Ian-Raiæ species sunt.

Ian-raia scandens, folio tamni.

Ian-raia scandens, folio oblongo, angusto & auriculato.

Ian-raia scandens, quinque-folia.

**Clarissimus D. Joannes Raius** Anglus, socius Regius Londinensis, in plantis, & quibuscumque naturalibus dignoscendis mens ænea, Turnef. inst. & in conscribendis, ac describendis manus ferrea, qui nullam <sup>53</sup> ferme Historiæ naturalis partem intactam reliquit. Non fuit satis quæcumque optima in singulis plantarum Scriptoribus occurrunt, in unum corpus coacervasse, digessisse & illustrasse, &



quam plurima nova addidisse, plantas etiam huc usque cognitae in sua genera pulchre distinxit, singularum proprias notas recensens.

## CURURU.

Tab. 35i

**C**ururu est plantæ genus flore A rosaceo, quatuor ut plurimum petalis B in orbem positae constante; e cujus calyce C polyphylo, surgit pistillum, quod deinde abit in fructum D pyri-formem, trigonum, in tres partes à summo ad imum dehiscens E, tribusque seminibus foetum carnosiss G, calyptraque H tenerrima contextis.

Cururu species sunt.

Cururu scandens, enneaphylla, fructu racemoso, rubro.

Cururu scandens, pentaphylla.

Cururu scandens, triphylla.

Cururu est nomen Americanum. G. Piso, lib. 4. cap. 88.

## SERJANIA.

Tab. 35.

**S**erjania est plantæ genus flore A rosaceo, quatuor ut plurimum petalis B in orbem positae constante. E cujus calyce C surgit pistillum, quod deinde abit in fructum D tricapsularem, seu tricipitem & trialatum, quolibet capite E, semen continente F rotundum G.

Serjaniæ species sunt.

Serjania scandens, polyphylla & racemosa.

Serjania scandens, enneaphylla & racemosa.

Serjania scandens, triphylla & racemosa.

Reverendus Pater Philippus Sergeant Caletanus, Ordinis Minimorum Provinciæ Franciæ, Botanices peritus, Medicinæ peritior, quam viginti quinque annorum decursu Romæ tam feliciter exercuit, ut parvis æque ac magnis ob charitatem semper extiterit gratissimus. Tota lugens amisit Roma, tota exultans suscepit Lutetia.



## PERESKIA.

**P**ereskia est plantæ genus flore A rosaceo , plurimis scilicet Tab. 26.  
 petalis B in orbem positis constante ; cujus calyx C abit deinde in fructum D globosum , carnosum , mollem , foliolis instructum , in quo nidulantur E ut plurimum tria semina orbicularia & compressa F.

Pereskiaë unicam speciem agnovi.

Pereskia aculeata , flore albo , fructu flavescente.

*Illustrissimus D. Nicolaus Fabricius Peireskius , Senator Aquisextiensis , quem virum vel nominare laudare est , ut ait Salmasius , nedum Voluminum , sed & plantarum amantissimus & studiosissimus ; nam & bibliothecam & hortum innumeris voluminibus & plantis , ex toto fere orbe immensis sumptibus conquistis construxerat , plurimaque etiam & præclara orbi litterario paraverat Opera physica , mathematica , & Botanica ; at proh dolor ! perierunt excellentissimi viri prætiosi fœtus , priusquam in lucem mitterentur. Bibliothecam ejus & hortum ditaverat Reverendus Pater Theophilus Minuti Ordinis Minimorum Provinciæ Provencæ , Linguarum Orientalium peritissimus , & ad Orientem ter peragratus , Pentatheuco scilicet Samaritano Manuscripto , & quam plurimis aliis sacris Voluminibus etiam manuscriptis , nec non & rarissimis plantis , quarum ut præstantia , ita & odore omnes superavit Hyacinthus ille Indicus odoratissimus , tuberosa radice , ( vulgo tuberouse , ) quem primus ille ex Indiis Orientalibus in hortum Belgenferianum ( Boisgencier ) prope Telonum adspportavit.*

## BOCCONIA.

**B**occonia est plantæ genus flore A , ex duobus petalis B const- Tab. 25.  
 tante ; ex cujus meditullio surgit pistillum C , quod deinde abit in fructum ovato-acuminatum D , compressum , succo turgentem , & semine fœtum rotundo F.

Bocconiaë unicam speciem vidi.

Bocconia racemosa , sphondilii folio tomentoso.

*Reverendus Pater Dom Sylvius Boccone , olim D. Paulus Boccone*

E ij



*Nobilis Siculus Panormitanus, præclaris Operibus tum botanicis, tum physicis toti orbi litterario præclarissimus, qui per varias mundi partes terrestria diu contemplatus, tandem cœlestia meditaturus, Florentiæ Cisterciensem Ordinem est amplexus.*

## GUAZUMA.

Tab. 18.

**G**Uazuma est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; e cujus calyce C surgit pistillum D, quod deinde abit in fructum E ovatum; exterius carnosum & tuberosum, intus vero ligneum, & in locula F divisum, seminibus G fœta fere reniformibus.

Guazumæ species sunt.

Guazuma arbor ulmi-folia, fructu ex purpura nigro.

Guazuma frutex, chamædryfolia, fructu lanuginoso, major.

Guazuma frutex, chamædryfolia, fructu lanuginoso, minor.

*Guazuma est nomen Americanum. Oviedo Hist. lib. 8. cap. 7.*

## MORISONA.

Tab. 23.

**M**Orisona est plantæ genus flore A rosaceo, quatuor scilicet petalis C in orbem positis, constante; ex cujus calyce B surgit pistillum D, cujus apex G abit deinde in fructum D globosum, cortice duro, carnosum, in quo nidulantur E semina reniformia F.

Morisonæ unicam agnovi speciem.

Morisona arbor nucis juglandis foliis.

Raius Hist.  
plant.

*Robertus Morisonus Aberdonensis Scotus, M. D. Botanices Professor Oxoniensis, & horti medici Præfectus, edidit Hortum Blasensem auctum, una cum plantarum inibi contentarum nemini huc usque scriptarum brevi & succincta delineatione. Plantarum etiam umbelliferarum distributionem novam per tabulas cognationis & affinitatis. Oxonii 1672. in folio. Item Historiam plantarum universalem. 1680. in folio. Obiit Londini an. 1683. (ut aiunt) e rheda præcipitatus, & rheda capite contritus.*



S U R I A N A.

**S**uriana est plantæ genus flore A rosaceo , plurimis scilicet Tab. 40.  
petalis B in orbem positis , constante ; ex cujus calyce surgit  
pistillum C , quod deinde abit in fructum D , ex plurimis capsu-  
lis constantem , in capitulum conglobatis , & semine fœtis ple-  
rumque rotundo F.

Surianæ unicam speciem novi.

Suriana foliis portulacæ angustis.

Clarissimus D. Josephus Donatus Surian , Massiliensis , Medicus ,  
Pharmacopæus , Chymicus , Botanicus ; alter tandem , si diu vi-  
xisset , Dioscorides Americanus futurus : quippe qui Pharmaco-  
pæam Americanam , quam ipse experientia comprobaverat , me-  
ditabatur exhibere. Opus cum ipso obiit Massiliæ. Extat tamen  
de eo ad calcem illius Tractatus ( Traitté des Drogues ) per  
Nicolaum Lemery Parisiis editi ; curiosus Catalogus plantarum  
Americanarum , quas apud Insulas Americanas , ubi Botanici Re-  
gii munere fungebatur , observaverat ; at nomenclaturis tantum  
barbaris ut plurimum designatas.

R E N A L M I A.

**R**enalmia est plantæ genus flore A rosaceo , ex tribus scili- Tab. 38.  
cet petalis B constante , in orbem positis ; e cujus calyce C  
triphylo , surgit pistillum D , quod deinde abit in fructum E  
membranaceum , cylindraceum , in tres capsulas fissilem F , semi-  
nibus fœtas oblongis & papposis H.

Renalmiæ species sunt.

Renalmia ramosissima , floribus variegatis & circinatis.

Renalmia non ramosa , squamata , & floribus niveis.

Renalmia alia , non ramosa , clavata , floribus aureis.

Renalmia spica multiplici , flore albo.

Renalmia alia spica multiplici , angusti-folia.

Clarissimus D. Paulus Renealmus Blesensis , D. M. Medicinæ theo-  
ricæ , practicæ & chymicæ peritissimus , ac in Botanicis versa-  
tissimus. Peritiæ ejus argumento sunt clarissimo , ex curationibus  
observationes ejus , quibus videre est morbos tuto , cito & jucun-



de posse. debellari, si præcipue Galenicis præceptis chymica remedia veniant subsidio; specimen etiam plantarum, ubi plantæ quædam typis æneis perbelle exprimuntur. Opus extat apud Hadrianum Beys, Parisiis, an. 1611. in quarto.

## ZANONIA.

Tab. 38.

**Z** Anonia est plantæ genus flore A rosaceo, tribus scilicet petalis B constante, in orbem positis, & calyci C insidente infundibuli-formi; is autem calyx abit deinde in fructum D mollem, convolutum, succo plenum, & duobus ut plurimum seminibus E subrotundis foetum.

Zanonix unicam novi speciem.

Zanonix graminea, perfoliata.

Clarissimus D. Jacobus Zanon, Botanicus, & in Horto publico Bononiensi Præfectus, plantarum ab antiquis memoratarum discretor perspicacissimus, & dissertator sapientissimus, Historiam Botanicam edidit, in qua tum antiquorum, tum recentiorum plantæ non antea observatæ, ac ex variis orbis partibus adjectæ, ad vivum tabulis æneis representantur, & genuinis descriptionibus referuntur. Extat Opus Bononiæ apud Josephum Longhi 1675. fol.

## MAGNOLIA.

Tab. 7.

**M** Agnolia est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis I in orbem positis, constante; ex cujus calyce H surgit pistillum B, quod deinde abit in fructum C clavatum, durum, tuberosum, in quo veluti nidulantur L ossicula oblonga E, ejusdem figuræ nucleum F continentia.

Magnoliæ unicam speciem vidi.

Magnolia amplissimo flore albo, fructu cæruleo.

Clarissimus D. Petrus Magnol, Regis Consiliarius, in alma Monspeliensium Medicorum Academia Professor Regius, nec non ejusdem Horti Præfectus, & Professor Botanicus per triennium à Ludovico Magno designatus. Inter Botánicos nostri ævi fama magnus, & magna mercede dignus, ut qui à juvenilibus annis tum in Medicina ediscenda, tum in re Botanica amplificanda



& illustranda, non sine fructu magno contulerit operam. Quam magnus sit ejus labor testatur Hortus Regius Monspeliensis, siue Catalogus plantarum quæ in Horto Regio Monspeliensi ab ipso sunt demonstrata, in quo obscura multa illustravit, novarum aliquot plantarum icones & descriptiones dedit, ac virtutes etiam juxta Neotericorum principia breviter explicavit.

G U A I A C U M.

**G**uaiacum est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet Tab. 17.  
petalis B in orbem positis, constante; e cujus calyce L  
surgit pistillum C, quod deinde abit in fructum D carnosum,  
subrotundum, officulo, aut officulis foetum E ovatis H, & pulpa  
tenerrima involutis F G.

Guaiaci species sunt.

Guaiacum flore caruleo, fructu subrotundo.

Guaiacum flore caruleo, fimbriato, fructu tetragono.

Guaiacum, vulgo Guaiac, nomen est Americanum, satis apud  
Europam notum.

C A L A B A.

**C**alaba est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet Tab. 18.  
petalis B C in orbem positis, constante; e cujus calyce E  
surgit pistillum, quod deinde abit in fructum sphaericum F car-  
nosum, officulo, seu semine foetum G, ejusdem formæ nucleum  
includente H.

Calabæ unicam novi speciem.

Calaba folio citrii splendente.

Calaba est nomen Americanum apud Caraibas vulgare.

B R E Y N I A.

**B**reynia est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet Tab. 16.  
petalis B in orbem positis, constante; ex cujus calyce C sur-  
git pistillum G, quod deinde abit in fructum D, seu siliquam  
mollem, carnosam, seminibusque foetam E reniformibus, & car-  
nosis F.



Breynia species sunt.

Breynia Amygdali, foliis latioribus.

Breynia, Elæagni foliis.

Clarissimus D. Jacobus Breynius Gedanensis, typis aureis apud Botanicos commendandus, quippe qui tam nitidis typis, iconibus æri incis, tam belle delineatis & sculptis; & quod magis, propriis sumptibus, præclarissima Opera, Botanicorum voluptati obtulerit, quæ multa quidem enumeranda essent, seu plurimæ Centuriæ, (quarum, proh dolor! una superest prima & ultima;) sed iniquis flammis consumptæ: perire etenim, uti referunt, fortuito incendio, domus, opes & Opera tanti viri, memoria apud bonos & botanicos, nec flammis, nec undis usquam interituri.

### TRIUMFETTA.

Tab. 8.

**T**riumfetta est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis H in orbem positis, constante; ex cujus calyce surgit pistillum B, quod deinde abit in fructum C durum, sphaericum, echinatum, & quatuor seminibus F angulosis foetum E.

Triumfettæ unicam novi speciem.

Triumfetta fructu echinato, racemoso.

Clarissimus D. Joannes Baptista Triumfetti Bononiensis, Philosophiæ ac Medicinæ Doctor, rei herbariæ diligentissimus & peritissimus perscrutator & professor, insuper arcanorum Physicæ oculatissimus observator. Perspicacitatis ejus ingenii specimen ostentant, observationes ejus de ortu ac interitu plantarum, cum novarum stirpium Historia, iconibus elegantissimis illustrata. Romæ, typis Dominici Antonii Herculis. an. 1685. in quarto.

### MENTZELIA.

Tab. 6.

**M**entzelia est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante, calyci C insidentibus, qui calyx abit deinde in fructum D tubulatum, membranaceum, seminibusque foetum exiguis F.

Mentzelia unicam vidi speciem.

Mentzelia



*Mentzelia* foliis & fructibus asperis.

*Clarissimus D. Christianus Mentzelius*, *Furstenwald. March. Philosoph. & Medicin. D. Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarius & Archiater*, indicem nominum plantarum multi-linguem, Latinorum, Græcorum & Germanorum litteris per Europam usitatis conscripsit, & construxit; cui adjecit pugillum plantarum rariorum, cum figuris aliquot æneis, quibus intertextus est indiculus plantarum nonnullarum, Brasiliæ nondum editarum. Prostat Opus Berolini apud Danielem Reichelium Bibliop. Ex officina Rungiana 1682. in fol.

## MUNTINGIA.

**M**untingia est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; ex cujus calyce G, surgit pistillum C, quod deinde abit in fructum D globosum, carnosum, mollem, in quo nidulantur E plurima semina exigua F. Tab. 64

Muntingiæ species sunt.

*Muntingia* folio sericeo, molli, fructu majori.

*Muntingia* folio ulmi aspero, fructu minimo, glomerato.

*Muntingia* folio corni, fructu minore.

*Clarissimus D. Abrahamus Munting Groninga-frisius*, *Medicinæ Doctor*, atque in Patria Groningæ & Omlandia Academia Botanices professor, multis botanicis Operibus insignis, præcipue dissertatione historico-medica, de vera antiquorum Herba Britannica, ejusdemque efficacia contra Stomacacem, seu Scelotyrben. Historiam etiam generalem plantarum, (inter quas plurimæ rarissimæ pretiosis iconibus expressæ) sed Belgico Hollandico sermone conscriptam edidit, in folio. Lugd. Batav. apud Petrum Vander Aa, & Franc. Alma 1696.

## IABOTAPITA.

**I**abotapita est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; ex cujus calyce C surgit pistillum, quod deinde abit in tuberculum E carnosum, cui affiguntur ut plurimum duo fructus D, olivæ-formes, molles, carnosissimi, ossiculum G condentes ejusdem formæ, nucleo foetum H. Tab. 324

F



*Iabotapitæ* unicam vidi speciem.

*Iabotapita* pyramidato flore luteo , fructu rubro.

*Iabotapita* est nomen *Americanum*. *Apud G. Marceg. lib. 3. cap. 5.*

## CEIBA.

*Tab. 32.*

**C**Eiba est plantæ genus flore A rosaceo , interdum plurimis scilicet petalis B in orbem positis , constante , interdum vero monopetalo , campani-formi ; e calyce autem ejus C surgit pistillum , quod deinde abit in fructum E lageni-formem , quinque-fariam à summo ad imum dehiscentem , seminibusque fœtum F rotundis , mollissima lanugine G involutis , ac placentæ pyramidata , & pentagoniæ adhærentibus.

Ceibæ species sunt.

*Ceiba* viticis foliis , caudice aculeato.

*Ceiba* viticis foliis , caudice glabro.

*Ceiba* est nomen *Americanum*. *Auth. Oviedo Hist. lib. 9. c. 9.*

## OLDENLANDIA.

*Tab. 36.*

**O**ldenlandia est plantæ genus flore rosaceo A , quatuor scilicet petalis B in orbem positis , constante , calyci C insidentibus ; qui calyx abit deinde in fructum fere globosum , siccum , bicapsularem D , seminibusque fœtum exiguis E.

Oldenlandiæ unicam novi speciem.

Oldenlandia humilis , hyssopi-folia.

*Turnef. inst.* Clarissimus D. Henricus Bernardus Oldenlandius Germanus , Pauli Hermanni M. D. & in Academia Lugduno-Batava nuper Medicinæ ac Botanices Professoris Discipulus , Medicinæ ac plantarum studiosus , quarum gratia ad caput bonæ spei se contulit , & paucis ab hinc annis periit vir , meliore fato & longiore vitæ dignus.

## GUANABANUS.

*Tab. 19.*

**G**uanabanus est plantæ genus flore A rosaceo , tribus ut plurimum petalis B in orbem positis , constante ; ex cujus calyce etiam tripetalo C surgit pistillum D , quod deinde



abit in fructum E subrotundum, aut turbinatum, carnosum, mollem; in quo plurima nidulantur F semina dura, oblonga G.

Guanabani species sunt.

Guanabanus fructu e viridi lutescente, molliter aculeato.

Guanabanus fructu virescente, reticulato.

Guanabanus fructu subcæruleo.

Guanabanus fructu purpureo.

Guanabanus fructu aureo, & molliter aculeato.

*Guanabanus, aut Guanabano nomen est Americanum, apud Gonzales Oviedo sommar. Ind. Occident. 63. cap. 64.*

S A P O T A.

**L**icet iisdem prorsus characteribus insigniatur hujusce plantæ genus, ac plantæ superioris; quia tamen tota facie, communi omnium Americanorum consensu & usu, florum, fructuumque natura ab ipsa omnino differat, ut facile ipsam in America consideranti patebit, ideo hujus genus peculiare instituendum censui. Est igitur Sapota plantæ genus flore rosaceo A, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; e cujus calyce C surgit pistillum D, quod deinde abit in fructum E fere turbinatum, aut ovatum, mollem, carnosum, in quo nidulatur F unum, aut duo semina subrotunda G, compressa, polita & rostrata. Tab. 41

Sapotæ species sunt.

Sapota fructu turbinato, minori.

Sapota fructu ovato, majori.

*Sapota nomen est Americanum vulgare.*

I C A C O.

**I**Caco est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; e cujus calyce C surgit pistillum D, quod deinde abit in fructum ovatum E, carnosum, mollem, nucula fœtum F, ejusdem formæ G, fragili, rugosa, & nucleum condente rotundum I. Tab. 51

Icaco species sunt.



Icaco fructu ex albo rubescente.

Icaco fructu nigro.

Icaco fructu purpureo.

*Icaco est nomen Americanum apud Insulas Americanas vulgare.*

## MAMEI.

Tab. 4.

**M**Amei est plantæ genus flore A rosaceo, ex plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; e cujus calyce C surgit pistillum D, quod deinde abit in fructum D fere sphericum, acumine donatum, carnosum, semine, aut seminibus fœtum callosis E.

Mamei unicam vidi speciem.

Mamei magno fructu, persicæ sapore.

*Mamei est nomen Americanum apud Gonzalez d'Oviedo, Hist. Ind. lib. 8. cap. 20.*

## MONBIN.

Tab. 22.

**M**Onbin est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; ex cujus calyce C surgit pistillum H, quod deinde abit in fructum D ovatum, carnosum, mollem, ossiculoque F G fœtum, quatuor nucleos, quemlibet in suo loculo, includente E.

Monbin unicam agnovi speciem.

Monbin arbor foliis fraxini, fructu luteo, racemoso.

*Monbin est nomen Americanum apud Insulas Americanas vulgare.*

## PERSEA.

Tab. 20.

**P**ersea est plantæ genus flore A rosaceo, plurimis scilicet petalis B in orbem positis, constante; e cujus medio surgit pistillum C, quod deinde abit in fructum D carnosum, mollem, semine fœtum duro E, bilobato, & membrana G, ceu pericardio, involuto.

Perseæ unicam vidi speciem.

*Persea Clusii, Hist. plant. 2,*



## CUPANIA.

**C**Upania est plantæ genus flore A rosaceo , plurimis scilicet Tab. 12.  
 petalis C in orbem positis , constante ; e cujus calyce D  
 surgit pistillum L , quod deinde abit in fructum E coriaceum ,  
 pyri-formem , trifariam F ab apice ad basim dehiscens , & se-  
 minibus fœtum rotundis G , singulis pileolo carnosio affixis I.

Cupaniæ unicam vidi speciem.

Cupania castaneæ folio , fructu sericeo & racemoso.

*Reverendus Pater Franciscus Cupani , tertii Ordinis Sancti Fran-  
 cisci , sacræ Theologiæ Magister , Siculus Myrthenensis , pauper  
 opibus , sed dives Operibus theologicis & botanicis , Hortus Ca-  
 tholici numerositate plantarum ditissimi , Author , quas ex remo-  
 tissimis mundi plagis , nullis parcens sumptibus transferri in hor-  
 tum Catholicæ apud Siciliam celeberrimum , curavit illustrissimus  
 & excellentissimus D. Josephus Del Bosco , Princeps Catholicæ , Dux  
 Misilmeris , Comes Vicaris , &c. quasque ipse Reverendus Pater  
 Cupani ordinatissimo digessit Catalogo. Opus extat Neapoli apud  
 Franciscum Benzi , 1696. in quarto.*

## VANRHEEDIA.

**V**Anrheedia est plantæ genus flore rosaceo A , plurimis sci- Tab. 18.  
 licet petalis B C in orbem positis constante ; e cujus medio  
 surgit pistillum D , quod deinde abit in fructum E citri-formem ,  
 membranaceum , aut carnosum , duobus , aut tribus seminibus fœ-  
 tum F ovatis , & carnosis G.

Vanrheediæ unicam vidi speciem.

Vanrheedia folio subrotundo , fructu luteo.

*Nobilis D. Henricus Van-Rheede , Van-Draakehstein , Malabari-  
 ci Regni Gubernator , & clarissimus D. Joannes Casarius ,  
 Ecclesiast. in Coch. Batavi & Horti Malabarici , operis sane  
 immensi promotores , & directores laudatissimi. Opus hoc immen-  
 sum , immensa etiam promovit opera Reverendus Pater Joannes  
 Mattheus Neapolitanus , Ordinis Carmelitarum discalceatorum ,  
 integræ & probæ vitæ Religiosus , apud Indias Orientales Mis-  
 sionarius Apostolicus , cui Deus infirmos sanandi virtutem usu*



plantarum Orientalium dederat. In plantis Orientalibus scientia ;  
& earum virtutum longa experientia excellens ; nullatenus tamen  
sui Apostolatus neglecto munere , plantas 745. in præfato Horto  
Malabarico contentas , iconibus & descriptionibus expressit.

## MALPIGHIA.

Tab. 36.

**M**alpighia est plantæ genus flore rosaceo A, plurimis scilicet petalis B in orbem positis , constante ; ex cujus calyce C surgit pistillum D , quod deinde abit in fructum E carnosum , fere globosum , mollem , unicapsularem , ossicula F condentem ut plurimum tria alata , nucleo fœta oblongo G.

Malpighiæ species sunt.

Malpighia mali punici facie.

Malpighia lati-folia , folio subtus spinoso.

Malpighia angusti-folia , folio subtus spinoso.

Malpighia angustis & acuminatis aequi folii foliis.

Malpighia humilis , ilicis cocci-glandi feræ foliis.

Clarissimus D. Marcellus Malpighius Bononiensis , Professor Medicus , Innocentii XII. Summi Pontificis Archiater , Philosophus præstantissimus , Regiæ societatis Anglicanæ Socius , ac tandem naturæ operum explorator accuratissimus. Veram plantarum anatonien instituit Opus sane admiratione dignum , scilicet Thesaurum locupletissimum botano-medico-anatomicum , viginti quatuor Tractatus complectentem. Extat Opus Londini apud Rob. Scott, & Georg. wells , an. 1686. in fol. & Lugduni Batav. apud Pet. Vander Aa , an. 1687. in quarto. Obiit Romæ præclarissimus Doctor an. 1694. 29. Novemb. apoplexia correptus.

## BROMELIA.

Tab. 8.

**B**romelia est plantæ genus flore A rosaceo ; ex tribus nempe petalis B constante in orbem positis , & calyci C insidentibus : is autem calyx abit deinde in fructum D ovatum , in tria loculamenta divisum , seminibus fœta longiusculis , & fere cylindræis E.

Bromeliæ species sunt.

Bromelia pyramidata , aculeis nigris.

Bromelia ramosa & racemosa , foliis arundinæis , ferratis.

Clarissimus Dominus Olaus Bromelius Suecus , artis medicæ Doctor



celeberrimus, rerum botanicarum peritissimus, Civitatis Gothoburgensis practicus ordinarius laudatissimus, & ab ipsa Flora floribus meritis coronandus, qui circa nemora & prata Gothica florum studiosus, per laborem plurimum flores carpens, Chlora Gothica, Catalogo scilicet stirpium circa Gothoburgum nascentium, ipsam Floram botanicam coronavit. An. 1694.

P L U K N E T I A.

**P**luknetia est plantæ genus flore A rosaceo, quatuor ut *Tab. 13* plurimum petalis B in orbem positis, constante, sed sterili. Embryones enim D à floribus sejunguntur in eadem planta; hi autem embryones quadrangulares sunt, & quadam proboscide insignes, abeuntque deinde in fructum E membranaceum, quadrangularem, in quatuor loculamenta H divisum, semine I fœta subrotundo, compresso, & intra loculum membranaceum recondito F G H.

Pluknetiæ unicam vidi speciem.

Pluknetia scandens, hederæ foliis serratis, fructu tetragono.

Clarissimus D. Leonardus Plukenetius Anglus, Botanicus, apud Botanicos alta mente reponendus propter Opera ejus botanica sane mirabilia, & voluptate Botanicos trahentia; phytographiam & Almagestum dico botanicum, sive phytographiæ Onomasticon methodo synthetica digestum, sex fere plantarum chiliadas complectens; Opera propriis sumptibus exculpta & excussa extant Londini, in fol. annis 1691. 1692. 1696.

R I V I N A.

**R**ivina est plantæ genus flore A rosaceo, quatuor scilicet *Tab. 32* petalis B in orbem positis, constante; ex cujus meditullio surgit pistillum C, quod deinde abit in fructum D mollem, seu baccam globosam, succo plenam, semine E rotundo fœtam, petalisque florum superstitibus stipatam; aut si mavis, est plantæ genus flore A apetalo, plurimis scilicet staminibus constante, ex calyce tetraphyllo surgentibus; pistillum autem abit deinde in fructum D mollem, seu baccam globosam, succo plenam, semine E rotundo fœtam.



Rivinae species sunt.

Rivina scandens, racemosa, amplis folani foliis, baccis violaceis.

Rivina humilis, racemosa, baccis puniceis.

Clarissimus D. Augustus Quirinus Rivinus, Lipsiensis, introductione generali in rem herbariam inter Botanicos eximios merito recensendus; quippe qui summis laboribus, propriisque sumptibus non pepercit, ut difficultates ex confusione plantarum in scientia botanica occurrentes, declinarentur. Extant ejus Opera Lipsiæ 1690. in folio, Chartæ-Augustæ; nempe introductio generalis in rem herbariam, ordo plantarum quæ sunt flore irregulari, monopetalo, & ordo plantarum quæ sunt flore irregulari, tetra-petalo.

### COMMELINA.

Tab. 38.

**C**ommelina est plantæ genus flore A duobus petalis B constante, uno versu positis, & calyci quadrifolio insidentibus C; e cujus medio surgit pistillum D, quod deinde adit in fructum E membranaceum, tricoccum, seu in tres loculos divisum semine fœtos subrotundo. His addi potest flores plures simul in uno loculo concludi conchi formi.

Commelinæ species sunt.

Commelina graminea, lati-folia, flore cæruleo.

Commelina graminea, angusti-folia, flore albescente.

Clarissimi D. D. Joannes Commelinus, Urbis Amstelodamensis, (dum viveret,) Senator, & Casparus Commelinus M. D. & Horti Medici Botanici, Horti medici Amstelodamensis, rariorum plantarum, tam Orientalis, quam Occidentalis Indiæ, &c. descriptionum & iconum ad vivum æri incisarum, Authores. Extant duo Volumina Amstelodami apud P. & J. Blaeu, & Abrah. Sommeren, in folio. 1697. 1701.

### SLOANA.

Tab. 15.

**S**loana est plantæ genus flore A, aut monopetalo, campaniformi & multi-fido, aut apetalo, plurimis scilicet staminibus B constante, inter quæ surgit pistillum, quod deinde abit in fructum C orbicularem, membranaceum, echinatum, quadrifariam



drisariam dehiscens D, & seminibus E foetum oblongis, intra loculum carnosum reconditis G.

Sloanae unicam vidi speciem.

Sloana amplis castaneae foliis, fructu echinato.

*Clarissimus D. Hans sloane Anglus, D. Medicus peritissimus; Coll. Reg. Med. Lond. nec non Soc. Reg. Lond. Soc. illustrissimi Principis Ducis Albemariae, Jamaicae Gubernatoris Medicus. Res omnes naturales, potissimum plantas Insularum Maderae, Barbados, Nieves, Sancti Christophori, & Jamaicae sedulo observavit, observatasque chartae commisit, quarum extat peramplus Catalogus Londini 1696. in octavo. Integram ejus Historiam naturalem in dies expectamus.*

## COURBARIL.

**C**ourbaril est plantae genus flore A papilionaceo; e cujus *Tab. 36.* calyce surgit pistillum B, quod deinde abit in fructum C, seu filiquam duram, unicapularem, seminibusque D foetam duris, subrotundis, polline & fibris, obvolutis E.

Courbaril unicam vidi speciem.

Courbaril bifolia, flore pyramidato.

*Courbaril est nomen Americanum apud incolas Americanos vulgare.*

## ARACHIDNA.

**A**rachidna est plantae genus flore A papilionaceo, cujus *Tab. 37.* pistillum B terrae se se infigens, abit deinde in fructum C membranaceum, oblongum, unicapularem, seminibusque foetum D, uno, aut duobus, teneris & oblongis E.

Arachidnae unicam vidi speciem.

Arachidna quadrifolia, villosa, flore luteo.

*Arachidna, planta ad Aracum accedens.*

## MANÇANILLA.

**M**añanilla est plantae genus flore A amentaceo, plurimis *Tab. 38.* nempe apicibus B constante, denso agmine D, axi E cui-dam affixis. Embryones autem F in eadem arbore à floribus



separati nascuntur, abeuntque deinde in fructum G globosum, carnosum, nucleum I lignosum, rugosum, ejusdemque formæ includentem H.

Mançanillæ species sunt.

Mançanilla pyri facie.

Mançanilla aquifolii foliis.

Mançanilla lauri foliis oblongis.

*Mançanilla est nomen apud Hispanos Americam incolentes vulgare.*

### PETIVERIA.

Tab. 39.

**P**etiveria est plantæ genus flore A fere cruci-formi, quatuor scilicet petalis B constante; ex cujus calyce C surgit pistillum, quod deinde abit in fructum D, ora suprema scissum, seu emarginatum, peram inversam quasi referentem, semineque foetum E oblongo F.

Petiveriæ unicam speciem observavi.

Petiveria solani foliis, loculis spinosis.

*Clarissimus D. Jacobus Petiver Anglicus, Pharmacopæus Londinensis, & Regiæ Societatis Socius; cui sane maxima laus, valde similia posse distinguere; distinguit etenim sagaci mente & vivido ingenio rariora naturæ. Vix animalia, fossilia, plantas ex variis mundi plagis advecta, ordine digesta, & nominibus propriis signata. Opus, seu Museum curiosum extat Londini apud officinam S. Smith, & B. Walsford, &c. 1695.*

### BIHAI.

Tab. 3.

**B**ihai est plantæ genus flore A fere liliaceo, monopetalo, tubulato, in duas partes lecto, & pistillum D duobus foliis & staminibus stipatum, concludente. Pistillum autem abit deinde in fructum E carnosum, trigonum, tribusque seminibus F foetum oblongis, duris & rugosis G. His adde flores plurimos simul vasculis contineri.

Bihai species sunt.

Bihai amplissimis foliis, florum vasculis coccineis.

Bihai amplissimis foliis, florum vasculis subnigris.



Bihai amplissimis foliis, florum vasculis variegatis.

Bihai est nomen Americanum. Gonz. Oviedo Lib. 7. cap. 9.

## SAURURUS.

**S**aururus est plantæ genus flore B apetalò, duobus nempe *Tab. 12.*  
apicibus constante bivalvibus D, & pulvere minutissimo plenis; embryo autem A inter duos apices sedens, abit in fructum G ovatum, mollem, ser. ine unico fœtum. His addendum flores & fructus uni axi affixos, veluti caudam lacerti efformare; unde nomen *σαυρος* enim Græce lacertus, & *οὐρα* cauda, ceu cauda lacerti.

Saururi species sunt.

Saururus racemosus, seu botryites, major.

Saururus racemosus, seu botryites, minor.

Saururus cauda adunca.

Saururus foliis plantagineis, cauda breviori.

Saururus botryites, major, foliis plantagineis.

Saururus foliis amplis, rotundis & umbilicatis.

Saururus foliis amplis, cordatis, non umbilicatis.

Saururus procumbens, minor, Botryites, folio carnosò, cordato.

Saururus humilis, folio carnosò, & acuminato.

Saururus alius humilis, folio carnosò, subrotundo.

Saururus repens, folio orbiculari, nummulariæ facie.

Saururus repens, triphyllus, folio rotundo.

Saururus cauliculis maculosis repens.

## HYPERICOIDES.

**H**ypericoides est plantæ genus flore A tetrapetalò, quatuor scilicet petalis constante, in orbem positis, sed inæqualibus, duobus majoribus B oppositis, & duobus minoribus C etiam oppositis; e calyce autem H bifolio surgit pistillum D, quod deinde abit in fructum oblongum E, ab apice ad imum bifariam dehiscens, feminibusque fœtum exiguis H. *Tab. 7.*

Hypericoidis species sunt.

Hypericoides frutescens, erecta, flore luteo.



Hypericoides frutescens, humi-fusa, flore luteo.

*Hypericoides* tanquam planta hyperico accedens, ob folia ejus hyperici vulgaris modo foraminulis pervia.

## BUCEPHALON.

Tab. 20.

**B**ucephalon est plantæ genus flore apetalo A, duobus scilicet staminibus B constante, embryoni C instar cornuum tauri insidentibus. Embryo autem abit deinde in fructum D carnosum, ovatum, striatum, & ossiculo fœtum E fragili, nucleum F includente.

Bucephali unicam vidi speciem.

Bucephalon fructu racemoso, rubro.

*Bucephalon* dicitur à vocibus Græcis βας & κεφαλή caput, tanquam si diceret caput bovis, propter similitudinem quam habent stamina & embryo cum capite bovis, cornibus suis instructo.

Benedicite universa germinantia in terra Domino.  
Daniel. 3.







# INDEX

## GENERUM PLANTARUM.

*Prior numerus tabulam indicat, secundus paginam.*

### A

<b>A</b> Lpina.	11. 26
Rachidna.	37. 49
Arapabaca.	31. 10

### B

<b>B</b> Arleria.	31. 13
Bauhinia.	13. 23
Bellonia.	31. 19
Besleria.	5. 29
Bihai.	3. 50
Bocconia.	25. 35
Bonduc.	39. 24
Bontia.	23. 32
Borbonia.	2. 3
Breynia.	16. 39
Bromelia.	8. 46
Brossæa.	17. 5
Brunsfelfia.	22. 12
Bucephalon.	20. 52

### C

<b>C</b> Aapeba	29. 33
Cæsalpina.	9. 28

Cainito.	9. 9
Calaba.	18. 39
Camara.	2. 31
Cameraria.	29. 18
Caraguata.	33. 10
Castorea.	17. 30
Ceiba.	23. 42
Clusia.	20. 20
Coa.	35. 8
Columnea.	33. 28
Commelina.	38. 48
Cordia.	14. 13
Cornutia.	17. 32
Cortusa.	8. 26
Courbaril.	36. 49
Cuiete.	16. 23
Cupania.	19. 45
Cururu	35. 34

### D

<b>D</b> Alechampia.	38. 17
Dioscorea.	26. 9
Dodonæa.	12. 20
Dorstenia.	8. 29



**E** <sup>E</sup>  
Refia. 25. 8

**F** <sup>F</sup>  
Uchia. 14. 14

**G**  
Erardia. 12. 30  
Gesnera. 9. 27  
Guaiacum. 17. 39  
Guanabanus. 10. 42  
Guazuma. 18. 36  
Guidonia. 24. 4

**H** <sup>H</sup>  
Erandia. 40. 6  
Hypericoides. 7. 51

**I** <sup>I</sup>  
Abotapita. 32. 41  
Iau-raia. 29. 33  
Icaco. 5. 43  
Inga. 19. 13  
Ifora. 37. 24

**K**  
Aratas. 33. 10  
Koda-pail. 39. 30

**L**  
Obelia. 31. 21  
Lonicera. 33. 17.

**M**  
Agnolia. 7. 38  
Malpighia. 36. 46  
Mamei. 4. 44  
Mançanilla. 30. 49  
Mangles. 15. 13  
Maranta. 36. 16  
Marcgravia. 29. 7  
Matthiola. 6. 16  
Mentzelia. 6. 40  
Monbin. 22. 44  
Morisona. 23. 36  
Muntingia. 6. 41  
Musa. 34. 24.

**N** <sup>N</sup>  
Handiroba. 27. 20

**O** <sup>O</sup>  
Ldenlandia. 36. 42

**P**  
Alma. 1. 2  
Parkinsonia. 3. 25  
Penea. 25. 22  
Pereskia. 26. 35  
Persea. 20. 44  
Petiveria. 39. 50  
Pisonia. 11. 17  
Pittonia. 3. 5  
Plinia. 11. 9  
Plukenetia. 13. 47



# R

<b>R</b> Auvolfia.	40. 19
Enalmia.	38. 37
Rivina.	39. 47
Roioe.	26. 11
Rondeletia.	12. 15
Ruellia.	2. 12.

# S

<b>S</b> Apota.	4. 43
Saururus.	12. 51
Serjania.	35. 34
Sloana.	15. 48
Suriana.	40. 37

# T

<b>T</b> Abernæmontana.	30. 18
Tapia.	21. 22
Tragia.	12. 14
Triumfetta.	8. 40
Turnera.	12. 15

# V

<b>V</b> Aldia.	24. 11
Vanilla.	28. 25
Vanrhedia.	18. 45

# X

<b>X</b> Imenia	21. 6
-----------------	-------

# Z

<b>Z</b> Anonia.	38. 38
------------------	--------











# CATALOGUS

## PLANTARUM AMERICANARUM,

Quarum genera in Institutionibus rei herbariæ jam nota sunt, quasque P. Carolus Plumier Minimus, Botanicus Regius, descripsit & delineavit in Insulis Americanis.

- B** Elladona arborescens, flore exalbido, nicotianæ foliis.  
 Belladonna frutescens, flore albo, nicotianæ foliis.  
 Polygonatum scandens, altissimum, foliis tamni.  
 Convolvulus luteus, polyanthos.  
 Convolvulus polyanthos, niveus, folio subrotundo, majori.  
 Convolvulus amplissimo folio, cordi-formi, flore maximo, purpurascens.  
 Convolvulus amplissimo folio, cordi-formi, flore albo maximo.  
 Convolvulus marinus, catharticus, foliis acetosæ, flore niveo.  
 Convolvulus marinus, catharticus, folio rotundo, flore purpureo.  
 Convolvulus minimus, villosus, helianthemi folio.  
 Convolvulus coccineus, heptaphyllos, radice crassissima.  
 Convolvulus albus, folio laciniato, maritimus.  
 Convolvulus polyphyllos, flore & fructu purpureis maximis.  
 Convolvulus pentaphyllos, folio glabro, dentato, viticulis hirsutis.  
 Convolvulus, pentaphyllos, hirsutus.  
 Tithymalus arborescens, cotini foliis minoribus, & verticillatis.  
 Tithymalus arborescens, foliis amygdali obtusis.  
 Tithymalus arborescens, foliis linariæ angustioribus.  
 Tithymalus arborescens, foliis linariæ latioribus.



*Tithymalus fruticosus*, foliis buxi verticillatis.

*Tithymalus humi fusus*, floribus in capitulum alis adhaerens congestis.

*Tithymalus erectus*, serratus, floribus in capitulum longo pediculo insidens, congestis.

*Oxys lutea*, frutescens, trifolii bituminosi facie.

*Apocynum scandens*, amplo flore villosa, luteo, filiquis angustissimis.

*Apocynum*, foliis amygdali longioribus.

*Apocynum scandens*, foliis amygdali, filiquis Emeri.

*Apocynum scandens*, filiquarum extrema parte vestibis harente.

*Apocynum scandens*, foliis citrei, filiquis maculatis.

*Apocynum scandens*, foliis lauri, flore albo, umbellato.

*Apocynum scandens*, amplissimo flore luteo.

*Periploca*, fructu molliter echinato.

*Periploca scandens*, salicis angustissimo folio, flore albo.

*Periploca latifolia*, filiqua dura, oblonga, tumida & glabra.

*Periploca*, humi se spargens, linariae folio.

*Periploca*, repens umbellata, foliis citrei, flore coccineo.

*Periploca scandens*, nummulariae folio, flore albo.

*Periploca scandens*, folio citrei, fructu maximo.

*Periploca scandens*, folio convolvuli, fructu alato.

*Malva frutescens*, hirsuta, floribus luteis in capitulum congestis.

*Malva ulmi-folia*, floribus conglobatis ad foliorum alas.

*Malva pampinea* fronde, fructu subrotundo, echinato.

*Malva folio hederaceo*, flore coccineo.

*Malva hederæ terrestris* folio & facie, capsulis bifurcatis.

*Alcea hirsutissima*, frutescens.

*Abutilon*, amplissimo folio, caule villosa.

*Abutilon fruticosum*, folio oblongo, flore luteo, fructu aculeato minori.

*Abutilon palustre*, spica florum pyramidata, flore parvo exalbido.

*Ketmia gossypii* folio, acetosæ sapore.

*Ketmia arborescens*, malvæ folio, acetosæ sapore.

*Ketmia*, aculeata, flore amplissimo, coccineo.

*Ketmia alia aculeata*, flore amplissimo ex purpura nigro.



- Ketmia frutescens*, mori folio, flore purpureo.  
*Ketmia amplissimo folio*, cordi-formi, flore vario.  
*Ketmia amplissimo folio*, angulato, fructu hispido, clypeato.  
*Ketmia indica*, tiliæ folio.  
*Bryonia racemosa*, foliis ficulneis.  
*Bryonia olivæ fructu rubro*, major.  
*Bryonia olivæ fructu rubro*, minor.  
*Tamnus tuberifera*, radice fungi-formi.  
*Tamnus racemosa*, minor.  
*Tamnus racemosa*, major.  
*Tamnus amplis foliis*, subtus purpureis.  
*Tamnus anguriæ folio*.  
*Sicyoides fructu echinato*, foliis laciniatis.  
*Sicyoides fructu lævi*, corallino.  
*Anguria fructu echinato*, eduli.  
*Anguria triphyllos*, parvo fructu.  
*Anguria polyphyllos*, parvo fructu.  
*Anguria fructu parvo*, folio tricuspidato.  
*Anguria fructu parvo*, florum segmentis ramosis.  
*Colocynthis flore albo* fimbriato, fructu oblongo.  
*Quamoclit foliis tenuiter incis*is & pennatis.  
*Quamoclit folio digitato*, flore coccineo.  
*Quamoclit*, heptaphyllos, flore coccineo umbellato.  
*Quamoclit foliis amplissimis*, cordi-formibus.  
*Quamoclit*, foliis amplissimis, angulatis.  
*Quamoclit hederæ folio* trifido.  
*Quamoclit solani folio*, flore roseo.  
*Menyanthes*, nymphææ folio, flore albo.  
*Nicotiana arborescens*, spinosissima, flore exalbido.  
*Centaurium minus maritimum*, amplo flore caruleo.  
*Centaurium minus* ad alas floridum.  
*Ialapa flore purpureo*, fructu rugoso.  
*Trachelium sonchi folio*, flore albo longissimo.  
*Heliotropium caruleum*, foliis hormini. A. R. Par. 83.  
*Plumbago*, betæ folio ampliori.  
*Valeriana humilis*, folio rotundo subtus argenteo.  
*Solanum molle*, foliorum nervis & aculeis flavescentibus, fructu mammoso.



- Solanum frutescens , acanthi folio.  
 Solanum aliud arborescens , acanthi folio.  
 Solanum fruticosum , persicæ foliis , aculeatum.  
 Solanum fruticosum , lauri foliis , aculeatum.  
 Solanum scandens , foliis tomentosis.  
 Solanum tomentosum , folio verbasci , parvo fructu flavescente.  
 Solanum arborescens , folani hortensis folio , parvo fructu coc-  
 cineo.  
 Solanum arborescens , amygdali folio undulato , magno flore al-  
 bo , fructu rubro.  
 Solanum fruticosum , acanthi folio , monospermon.  
 Solanum scandens , aculeatum , hyoscyami folio , flore intus al-  
 bo , extus purpureo.  
 Solanum arborescens , verbasci folio , fructu flavescente , majori.  
 Lycopersicon fructu cerasi rubro. *inst. r. herb. 150.*  
 Lycopersicon arborescens , amplissimis foliis angulatis , fructu  
 aureo.  
 Alkekengi flore albo , folliculis e rubro virescentibus , fructu fla-  
 vescente.  
 Capsicum fructu oblongo , dulci.  
 Arum amplis foliis virentibus , esculentum.  
 Arum amplis foliis violaceis , esculentum.  
 Arum aliud minus , esculentum.  
 Arum scandens , amplissimo folio , flore albo.  
 Arum scandens , angustiore folio.  
 Arum scandens , foliis cordi-formibus , minus.  
 Arum hederaceum , amplis foliis perforatis.  
 Arum arborescens , sagittariæ foliis.  
 Arum caulescens , cannæ indicæ foliis.  
 Arum foliis rigidis , angustis & acuminatis.  
 Arum amplis foliis cordi formibus , radice nodosa rubra.  
 Arum amplissimo folio , flore & fructu rubro.  
 Arum scandens , cauliculis maculosis.  
 Arum scandens maximum , flore flavescente.  
 Arum scandens , amplissimo folio , fructu longissimo.  
 Arum acinis amethystinis , flore parvo.  
 Arum amplis foliis acuminatis , & pergamaceis , ex Insula Sancti  
 Thomæ.



*Dracunculus scandens maximus.*

*Dracunculus scandens, triphyllus & auritus.*

*Dracunculus, colocasia foliis laciniatis.*

*Dracunculus humilis, flore & fructu albo.*

*Dracunculus alius humilis, villosus, flore & fructu albo.*

*Dracunculus triphyllus, laciniatus & perforatus, caule serpentem referente.*

*Aristolochia longa, scandens, foliis Ferri equini effigie.*

*Aristolochia scandens, foliis oblongis, radice repente.*

*Aristolochia flore e viridi flavescente, radice repente.*

*Aristolochia folio cordi-formi, flore longissimo, auro purpureo, radice repente.*

*Aristolochia folio hederaceo, trifido, maximo flore, radice repente.*

*Aristolochia asari folio, umbilicato, flore longissimo, radice repente.*

*Rapuntium altissimum, foliis cirsi, flore virescente.*

*Rapuntium aliud altissimum, foliis sonchi laciniatis.*

*Rapuntium foliis cirsi lucidis, flore multiplici, coccineo, conglobato.*

*Rapuntium aliud, cirsi foliis lucidis, floribus conglobatis, & e viridi rubescentibus.*

*Rapuntium trachelii folio, flore purpurascete.*

*Bignonia arbor, flore luteo, Fraxini folio.*

*Bignonia, capreolis aduncis donata, filiqua longissima.*

*Bignonia bifolia, scandens, filiquis latis, & longioribus, semine lato.*

*Bignonia bifolia scandens, flore violaceo, odore, fructu ovato, duro.*

*Bignonia bifolia, scandens, flore e luteo purpurascete, inodoro, fructu ovato, duro.*

*Bignonia arbor, buxi folio tenuiore.*

*Bignonia arbor, folio singulari, filiquis longissimis & angustissimis.*

*Bignonia arbor, pentaphylla, flore roseo, major, filiquis planis.*

*Bignonia arbor, pentaphylla, flore roseo, minor, filiquis angulatis,*



- Digitalis sesamum dicta*, rubello flore.  
*Linaria palustris*, fœniculi folio.  
*Melissa altissima*, globularia.  
*Melissa humilis*, caule hispido.  
*Melissa spicata*, lavandulam spirans, major.  
*Melissa alia spicata*, lavandulam spirans, minor.  
*Lavandula frutescens*, foliis latioribus crenatis.  
*Teucrium halicacabos*, & *Alopecuroides*.  
*Sinapistrum pentaphyllum*, flore albo.  
*Sinapistrum arborescens*, pentaphyllum, flore albo, folio angustiori.  
*Sinapistrum frutescens*, triphyllum, nasturtii sapore.  
*Amaranthus altissimus*, longi-folius, spicis e viridi albicantibus.  
*Portulaca marina*, latifolia, flore suaverubente.  
*Portulaca lanuginosa*, sedi foliis, flore rubente.  
*Portulaca alia marina*, rotundi-folia, amarissima.  
*Argemone Mexicana*. *inst. r. herb.* 239.  
*Opuntia* vulgo Herbariorum I. B. 1. 154.  
*Opuntia major*, validissimis spinis munita. *Inst. r. herb.* 239.  
*Opuntia minima*, flagelli-formis.  
*Opuntia arbor excelsa*, cerei-formis, flore albo.  
*Opuntia arbor*, foliis reticulatis, flore flavescente.  
*Opuntia arbor spinosissima*, foliis portulacæ cordatis.  
*Opuntia altissima*, cerei-formis, aculeis validissimis, flore amplo, fimbriato.  
*Opuntia minima*, repens, spinis tenuissimis & aduncis.  
*Granadilla folio amplo*, tricuspidi, fructu olivæ-forma. *Inst. r. herb.* 240.  
*Granadilla*, folio angusto tricuspidi, fructu olivæ-forma. *Inst. r. herb.*  
*Granadilla fœtida*, folio tricuspidi, vittofo, flore albo. *In r. h.*  
*Granadilla polyphyllos*, fructu colocynthidis.  
*Granadilla polyphyllos*, flore crispo.  
*Granadilla folio hederaceo*, flore & fructu minimis.  
*Granadilla folio hederaceo*, flore albo, fructu globoso, villosa.  
*Granadilla* flore suaverubente, folio bicorni.  
*Granadilla* fructu rubente, folio bicorni.  
*Granadilla lati-folia*, fructu mali formi.



- Granadilla fructu citri-formi, foliis oblongis;  
 Granadilla fructu minore, corymboso.  
 Granadilla androsæmi foliis, fructu jujubino.  
 Granadilla heterophylla, flore albo.  
 Murucuia, folio lunato.  
 Mitella maxima, tinctoria. *Inst. r. herb. 242.*  
 Alsine auriculæ ursi foliis.  
 Alsine glabra, rotundi-folia, repens.  
 Helianthemum betonica folio, caule hirsuto.  
 Helianthemum frutescens, portulacæ folio.  
 Damasonium maximum, plantaginis folio, flore flavescente;  
 fructu globoso.  
 Corchorus folio ulmi major.  
 Corchorus folio ulmi minor.  
 Nymphæa foliis circinatis, maximis, acute crenatis, flore albo.  
 Nymphæa foliis circinatis, minoribus, obtuse crenatis, flore albo.  
 Capparis arborescens, lauri foliis, fructu longissimo.  
 Capparis alia arborescens, lauri foliis, fructu oblongo, ovato.  
 Tribulus terrestris, fructu turbinato, foliis lanuginosis.  
 Tribulus terrestris, fructu aculeato, amplis cisti floribus, luteis.  
 Ranunculus aquaticus, asari foliis, ad nodos umbelliferus.  
 Ranunculus aquaticus, plantaginis folio, flore albo, calyce purpureo.  
 Ranunculus aquaticus, sagittæ folio breviori.  
 Aralia humilis, spinosissima, folio malvæ subrotundo.  
 Onagra foliis persicariæ amplioribus, parvo flore luteo.  
 Onagra foliis persicariæ angustioribus, magno flore luteo.  
 Onagra frutescens & hirsuta, nerii folio, magno flore luteo.  
 Eryngium planum, serratum, fœtidum.  
 Hydrocotyle maxima, folio umbilicato, floribus in umbellam nascentibus.  
 Lilio-asphodelus, flore umbellato, albo, costa purpurea notato.  
 Lilio-asphodelus, foliis aloes, flore umbellato, maximo, odoratissimo.  
 Lilio-asphodelus foliis scillæ, flore umbellato, maximo, purpureo.  
 Lilio-asphodelus bifolius, flore singulari, purpureo.



- Xiphion* flore e luteo nigricante.  
*Aloe* vulgaris , C. B. *pin.* 286.  
*Cannacorus* lati-folius , vulgaris , *inst. r. herb.* 367.  
*Ephemerum* folio cannaconi.  
*Narcissus* flore multiplici , albo , odore balsami peruviani , *inst. r. herb.* 358.  
*Lilio-narcissus* Jacobæus , lati-folius , rubro flore. *Mor. Hist. Oxon. part. 2.* 366.  
*Orobis* fructu coccineo , nigra macula notato , *inst. r. herb.* 666.  
*Ochrus* tomentosus , floribus luteis.  
*Ochrus* scandens , amplissimo flore , sagittariæ folio.  
*Galega* frutescens , flore purpureo , foliis sericeis.  
*Hedysarum* triphyllum , majus.  
*Hedysarum* triphyllum , minus.  
*Hedysarum* humi fusum , hispidum.  
*Hedysarum* arborescens , foliis mimosæ.  
*Anonis* folio latiori , subrotundo , *inst. r. herb.* 409.  
*Medicago* arborea , aculeata , polyphylla.  
*Phaseolus* strumosa radice , flore purpureo , siliqua angustissima.  
*Phaseolus* strumosa radice , flore luteo , siliquis quasi nodosis.  
*Phaseolus* hirsutus , siliquis quasi nodosis.  
*Phaseolus* amplissimus , siliqua maxima , fructu coccineo , duro.  
*Phaseolus* amplissimus , magno flore , siliquis tenuioribus falcatis.  
*Phaseolus* hirsutus , siliquis articulosis.  
*Phaseolus* radice tuberosa , esculenta , siliquis quasi articulosis , hirsutis.  
*Phaseolus* flore cochleato , siliquis falcatis.  
*Phaseolus* maritimus , fructu duro , semine variegato.  
*Phaseolus* fructu minimo , semine variegato.  
*Phaseolus* , florum spica pyramidata , semine coccineo , nigra macula notato.  
*Phaseolus* flore vexillo , amplissimo , siliquis rectis , teretibus.  
*Phaseolus* hirsutus , siliquis rectis & aduncis.  
*Phaseolus* hirsutus , virgatus , pruriginosus.  
*Phaseolus* floribus coccineis , ex Insula Sancti Christophori.  
*Phaseolus* flore peltato , cæruleo , siliquis nigris & angustis.  
*Phaseolus* siliquis latis , hispidis & rugosis.



Helleborine graminea, repens, biflora.  
 Helleborine rusci majoris folio.  
 Helleborine florum foliis maculosis & longissimis.  
 Helleborine floribus auro-purpureis.  
 Helleborine maculosa, foliis aloes carinatis.  
 Helleborine floribus albis, cucullatis.  
 Helleborine ophioglossio similis.  
 Helleborine coccinea, multi-flora.  
 Helleborine foliis rigidis, angustis & canaliculatis.  
 Helleborine amplissimo flore vario.  
 Helleborine purpurea, asphodeli radice.  
 Helleborine ramosa, floribus niveis.  
 Helleborine tenui-folia, repens.  
 Helleborine foliis carnosiss, carinatis & falcatis.  
 Helleborine spiralis, flore albo.  
 Helleborine aphyllis, flore luteo.  
 Helleborine purpurea, umbellata.  
 Helleborine maculosa, foliis junceis, sulcatis.  
 Helleborine ramosa, floribus minimis, luteis.  
 Helleborine cochleato flore.  
 Helleborine flore papilionaceo.  
 Helleborine graminea, foliis rigidis, carinatis.  
 Helleborine foliis liliaceis, asphodeli radice.  
 Helleborine purpurea, tuberosa radice.  
 Helleborine ramosissima, cauliculis & floribus maculosis.  
 Helleborine radice arundinacea, foliis amplissimis, liratis.  
 Elichrysum lychnidis coronariae folio tomentoso & undulato.  
 Elichrysum arborescens, ilicis cocciglandiferae folio.  
 Conyza frutescens, cydoniae folio.  
 Conyza arborescens, lutea, folio trifido.  
 Conyza arborescens, purpurea, folio verbasci, dentato.  
 Conyza arborescens, purpurea, folio verbasci, undulato.  
 Conyza alopecuroides, helenii folio, alato caule.  
 Conyza altera, foliis helenii angustis, alato caule.  
 Eupatorium frutescens, atriplicis folio, flore albo.  
 Eupatorium sophiae folio, flore purpureo.  
 Eupatorium frutescens, hederæ terrestres folio, flore purpurascente.



- Eupatorium petasitidis folio.  
 Eupatorium frutescens, cæruleo flore, atriplicis folio.  
 Eupatorium arborescens, floribus cæruleis.  
 Senecio altissimus, amplissimo folio. *Inst. r. herb.* 456.  
 Santolina pyrethri sapore, humi fusa.  
 Bidens frutescens, ilicis folio, flore luteo.  
 Bidens frutescens, sphondylii folio & facie.  
 Bidens triphylla, angelicæ folio, flore radiato.  
 Bidens pentaphylla, flore radiato.  
 Bidens apii folio, glabra.  
 Bidens apii folio, hirsuta.  
 Echinopus frutescens, ad nodos floridus, ilicis folio, subtus argenteo.  
 Hieracium villosum, pulmonariæ Gallorum facie.  
 Chondrilla foliis angustis, & ad oras punctatis.  
 Aster primulæ veris folio, flore luteo.  
 Aster primulæ veris folio, flore singulari purpureo.  
 Aster frutescens, stachadis citrinæ folio, flore umbellato, aureo.  
 Aster jacobææ amplissimo folio, subtus incano.  
 Aster flore minore albo, caule rubente, aspero.  
 Aster acaulos, hieracii villosis foliis.  
 Aster primulæ veris foliis, semiflosculis tenuissimis.  
 Virga aurea, flore maximo, asphodeli radice.  
 Jacobæa arborescens, helenii folio lucido.  
 Jacobæa foliis salicis, ad margines villosis.  
 Jacobæa humi fusa, hyperici foliis.  
 Tagetes foliis integris, perforatis.  
 Corona solis frutescens, lychnidis folio carnosio, flore luteo.  
 Corona solis frutescens, laureolæ folio, flore luteo.  
 Corona solis maritima, humilis, folio carnosio, tricuspidi, flore luteo.  
 Chrysanthemum humile, ranunculi folio.  
 Matricaria flore minore, albo, absinthii foliis.  
 Parietaria racemosa, major.  
 Parietaria racemosa, foliis ad oras villosis.  
 Parietaria latifolia, humilis, flore glomerato.  
 Milium latifolium, foliis latis.



- Cyperus panicula aurea, maxima.*  
*Scirpus caule pentagono, ad nodos florido.*  
*Lacryma job altissima, arundinis folio & facie.*  
*Equisetum altissimum, ramosum.*  
*Milium cyperoides, lithospermi semine.*  
*Urtica racemosa, amplo coryli folio.*  
*Urtica arborescens, baccifera.*  
*Filix arborescens, pinnulis dentatis.*  
*Filix arborescens, spinosa, pinnulis in summitate ferratis.*  
*Filix arborescens, latifolia, aculeata.*  
*Filix arborescens, spinosa & humilis.*  
*Filix latifolia, ramosa, cauliculis nigris & spinosis.*  
*Filix latifolia, laciniata, & ad lacinias molliter aculeata.*  
*Filix aculeata, repens.*  
*Filix latifolia, caudata, pinnulis lonchitidis, dentatis.*  
*Filix alia caudata & spinosa.*  
*Filix pinnulis lonchitidis, obtusis, non dentatis, ad oras pulverulentis.*  
*Filix latifolia, pinnulis fere acuminatis dentata.*  
*Filix latifolia, in pinnulas obtusas & leviter crenatas divisa.*  
*Filix latifolia, spinulis mollibus & nigris aculeata.*  
*Filix pinnulis latioribus, dentatis, minor.*  
*Filix pinnulis latioribus, dentatis, major.*  
*Filix villosa, pinnulis quercinis.*  
*Filix non ramosa, latius dentata, major.*  
*Filix latius dentata altera, polypodii radice.*  
*Filix ad alas foliosa.*  
*Filix taxi-formis, major.*  
*Filix taxi-formis, minor.*  
*Filix pinnulis oblongis, in summitate ferratis.*  
*Filix ramosa, villosa, major, crenis rotundis dentata.*  
*Filix furcata, pinnulis longiusculis, non dentatis.*  
*Filix altissima, globuligera, major.*  
*Filix altissima, globuligera, minor.*  
*Filix scandens, pinnulis eleganter ferratis.*  
*Filix aurea, ramosa, crenulis rotundis dentata.*  
*Filix hirsuta, & lutescente pulvisculo sordescens.*  
*Filix ramosa, pinnulis rostratis.*



- Filix ramosissima, cicutæ foliis.  
 Filix non ramosa, rotundis crenis incisa.  
 Filix foliis leviter aculeatis.  
 Filix pinnulis longiusculis, partim auriculatis.  
 Filix villosa, minor, pinnulis profunde dentatis.  
 Filix non ramosa, in obtusas pinnulas dissecta.  
 Filix dentata, pinnularum cacumine bifido.  
 Filix non ramosa, pinnulis rotundis, non dentatis.  
 Filix pinnulis crenatis.  
 Filix pulverulenta, pinnulis obtuse dentatis.  
 Filix arborescens, adiantoides, major.  
 Filix arborescens, adiantoides minor.  
 Filix pinnulis undulatis, & pediculis squamosis.  
 Lonchitis glabra, major.  
 Lonchitis glabra, minor.  
 Lonchitis auriculata & ferrata.  
 Lonchitis juxta nervum pulverulenta.  
 Lonchitis ramosa, limbo pulverulento.  
 Lonchitis ramosa, pinnulis longiusculis, partim auriculatis.  
 Lonchitis latifolia, in pinnulas obtusas, & leviter crenatas di-  
 visa.  
 Lonchitis minor, rotunde crenata.  
 Lonchitis ramosa, tenuis, pediculis spinosis.  
 Lonchitis latifolia, pediculis lucidis & nigris.  
 Lonchitis betonica folio.  
 Lonchitis aquatica, membrana tenui contexta.  
 Lonchitis longis, angustis, & ad oras pulverulentis foliis.  
 Lonchitis longis, angustis, & ad basim foliosis foliis.  
 Lonchitis ramosa, pediculis nigris, pulverulenta.  
 Lonchitis foliis superius incisis, major.  
 Lonchitis foliis superius incisis, minor.  
 Lonchitis auriculis subrotundis, laciniata.  
 Lonchitis ramosa, cauliculis squamosis.  
 Lonchitis folio cordi-formi.  
 Lonchitis minima, ramosa.  
 Lonchitis acuminata, auriculisque rotundis incisa.  
 Lonchitis in auriculas subrotundas divisa.  
 Lonchitis radiata, polytrici facie.



Trichomanes crenis rotundis , & nigricante limbo præcinctis.

Trichomanes foliis leviter aculeatis.

Trichomanes folio triangulari , crenato.

Trichomanes folio cordi-formi.

Trichomanes pendulum , serici instar molle.

Trichomanes argenteum , ad oras nigrum.

Trichomanes denticulis bifidis incisum.

Trichomanes latifolium , dentatum.

Polypodium majus aureum.

Polypodium radice tenui & repente.

Polypodium nigrum , tenuius sectum.

Polypodium incisuris asplenii.

Polypodium tenue & pendulum.

Polypodium rigidis & acuminatis pinnulis.

Polypodium pendulum , hirsutie rufa pubescens.

Polypodium pendulum & glabrum.

Polypodium aliud pendulum , minimum.

Polypodium crispum , struthionis pennas referens.

Polypodium asperum & dentatum.

Polypodium tenuius & undosum.

Polypodium crispum , calyci-ferum.

Polypodium glycyrrhizæ sapore.

Polypodium squamulis argenteis respersum.

Polypodium fuscum , tenuissimis denticulis serratum.

Polypodium totum translucens.

Polypodium radice subcærulea & punctata.

Ruta muraria , clematidis altissima , folio vario.

Filicula capillacea.

Filicula digitata.

Filicula pyxidifera.

Filicula nigra , laciniis acuminatis.

Filicula maxima , argenteo pulvere conspersa.

Filicula aureo pulvere conspersa.

Filicula pinnulis obtusis.

Filicula adianti nigri facie , minor.

Adiantum foliis hexagonis.

Adiantum triphyllum , & retusum.

Adiantum muscosum , lichenis petræi facie.



- Adiantum* ramosum, foliis trapeziis dentatis.  
*Adiantum* frutescens, spinosum & repens.  
*Adiantum* vulgari simile, & ramosissimum.  
*Adiantum* lunulis albicantibus signatum.  
*Adiantum* tenuiter divisum.  
*Adiantum* humile, trifoliatum & repens.  
*Adiantum* in lacinias profundas divisum.  
*Adiantum* capillaceum.  
*Adiantum* scandens, foliis tenuissime sectis & retusis.  
*Asplenium* altius & villosum.  
*Asplenium* alterum, propendens & crispum.  
*Lingua cervina*, rigida & glabra.  
*Lingua cervina*, latifolia, pediculis squamosis.  
*Lingua cervina*, lucida, pediculis articulatis.  
*Lingua cervina*, angusta & reticulata.  
*Lingua cervina*, scandens, ilicis cocciglandiferæ folio.  
*Lingua cervina*, villis, & squamulis aureis muscosa.  
*Lingua cervina*, villosa, minor.  
*Lingua cervina*, brevioribus & crassioribus foliis.  
*Lingua cervina*, minima, repens & hirsuta.  
*Lingua cervina*, amplissimis foliis.  
*Lingua cervina*, pulvisculo aureo posterius obducta.  
*Lingua cervina*, longissimis & angustissimis foliis.  
*Lingua cervina*, foliis acutis, & ad oras summitatum pulverulentis.  
*Lingua cervina*, non ramosa, rotundius crenata.  
*Lingua cervina*, longo lato, ferratoque folio.  
*Lingua cervina* scandens, caulibus squamosis.  
*Lingua cervina*, longis, angustis & undulatis foliis.  
*Lingua cervina*, villosa, major & rufescens.  
*Lingua cervina*, radice repente viridi, punctisque nigris notata.  
*Lingua cervina*, villosa, amplisque foliis subrotundis.  
*Lingua cervina*, geminato folio.  
*Lingua cervina*, angustifolia, costis & pediculis villosis.  
*Lingua cervina*, scandens, foliis laurinis, ferratis.  
*Lingua cervina*, squamata, & in cuspides divisa.  
*Lingua cervina*, multifido cacumine laciniata.  
*Lingua cervina*, ramosa, aspera & undulosa.



- Lingua cervina, ramosa, nodosa, major.  
 Lingua cervina, scandens & repens, eterophylla.  
 Lingua cervina, scandens & ramosa, citrii foliis, major.  
 Lingua cervina, scandens & ramosa, citrii foliis, minor.  
 Lingua cervina, ramosa, foliis acuminatis & sinuosis.  
 Lingua cervina, ramosa, folii querni divisura.  
 Lingua cervina, ramosa, punctis nigris notata.  
 Lingua cervina, scandens, angustis & undulatis foliis.  
 Lingua cervina, ramosa, foliis ensi-formibus, ferratis.  
 Lingua cervina, ramosa, ad margines pulverulenta.  
 Lingua cervina, latifolia, ramosa, membrana tenui marginata.  
 Lingua cervina, ramosa, aurea.  
 Lingua cervina, ramosa, nigris tuberculis pulverulenta.  
 Lingua cervina, ramosa, nodosa, minor.  
 Lingua cervina, sinuosa, in summitate trifolca.  
 Lingua cervina, quinque-folia, ramosa, foliis acuminatis, & pediculis squamosis.  
 Lingua cervina, triphylla, angusta, & leviter ferrata.  
 Hemionitis maxima, quinque-folia.  
 Hemionitis maxima, trifolia.  
 Hemionitis aurea, hirsuta.  
 Hemionitis profunde laciniata, ad oras pulverulenta.  
 Hemionitis laciniis crispis incisa.  
 Hemionitis varia & cuspidata.  
 Hemionitis trifolia, villis tenuibus & rufis fimbriata.  
 Hemionitis altera, pentaphylla, & elegantior.  
 Hemionitis maxima, linguæ cervinæ affinis.  
 Hemionitis pumila, pentaphylla, & rotunde dentata.  
 Osmunda hirsuta, lonchitidis folio.  
 Osmunda filiculæ folio, major.  
 Osmunda filiculæ folio, minor.  
 Osmunda linguæ cervinæ folio.  
 Osmunda latis crenis incisa.  
 Osmunda asphodeli radice.  
 Osmunda altera, asphodeli radice, pinnulis obrusis.  
 Osmunda verticillata.  
 Osmunda lanceolata, & leviter ferrata.  
 Ophioglossum palmatum.



- Ophioglossum cordiforme & reticulatum.  
 Lichen rufescens, cornua damæ referens.  
 Lichen anapodocarpus.  
 Lichen digitatus, geranii facie.  
 Muscus marinus, pennatus.  
 Muscus capillaceus, & sericeus nigricans.  
 Muscus squamosus, maximus, erectus, sabinæ folio.  
 Muscus squamosus, sive lycopodium altissimum.  
 Muscus squamosus, maximus, coridis folio, viticulis longioribus.  
 Muscus squamosus, maximus, coridis folio, viticulis valde ramosis.  
 Muscus squamosus, maximus, coridis foliis reflexis.  
 Muscus squamosus, ramosissimus, repens.  
 Muscus squamosus, maximus, coridis foliis aduncis.  
 Muscus squamosus, elatior, tenuissimus.  
 Muscus maximus, linariæ foliis.  
 Muscus linariæ foliis acutissimis.  
 Muscus squamosus, ramosissimus, erectus.  
 Fungus coccineus, squamosus & globosus.  
 Fungus rosaceus, candidus, aureis circulis signatus.  
 Fungus striatus, totus niveus.  
 Fungoides crispum, infundibuli-forme.  
 Fungoides reticulatum, flabelli-forme.  
 Fungoides ciathi-forme, purpureum, intus villosum.  
 Fungoides alterum, scutellatum, deforis purpureum & villosum.  
 Fungoides coccineum, oris pilosis, cyathi-forme.  
 Boletus cancellatus, totus purpureus.  
 Boletus phalloides, rugosus.  
 Boletus alius phalloides, pileatus.  
 Agaricus amplissimis squamis.  
 Lycoperdon globosum.  
 Lycoperdon vesicarium, candidum.  
 Lycoperdon coronatum.  
 Coralloides ramosissima, purpurascens.  
 Coralloides fusca & laciniata.  
 Tubera candida.  
 Tubera testiculorum forma, major.  
 Tubera testiculorum forma, minor.



*Fucus vesicarius*, coronatus.

*Madrepora cristata*, urens.

*Lithophyton polypodii* ramosi facie.

*Alcyonium cornua cervi* referens.

*Terebinthus*, pistaciæ fructu non eduli.

*Pinus* foliis quinis ab eodem exortu.

*Thymelæa frutescens*, roris marini folio, flore albo.

*Alaternus spinosissima*, buxi folio.

*Phillyrea humilis*, radice crassa lutea, foliis acuminatis.

*Phillyrea humilis*, radice crassa rosea, foliis rotundioribus.

*Ligustrum aculeatum*, fructu testiculato.

*Jasminum arborescens*, lauri folio, flore albo odoratissimo.

*Jasminum arborescens*, nicotianæ folio, flore albo.

*Jasminum arborescens*, foliis solani, baccis nigro-violaceis.

*Jasminum aliud arborescens*, foliis solani, minus.

*Jasminum inodorum*, repens, foliis violæ martiæ.

*Acacia indica*, Farnesiana. *Tob. Ald. 2.*

*Acacia* foliis amplioribus, filiquis cincinnatis.

*Acacia* foliis amplioribus, filiquis compressis, flore coccineo.

*Acacia lati-folia*, alopecuroides, flore albo.

*Acacia non spinosa*, filiquis latis compressis, flore albo.

*Acacia aculeata*, flore albo, foliis tamarindi.

*Acacia repens*, aculeata, flore albo, foliis filiquæ.

*Acacia non spinosa*, foliis juglandis, flore purpureo.

*Acacia repens*, aculeata, flore albo, foliis omnium minimis.

*Acacia frutescens*, non aculeata, flore purpurascente.

*Acacia scandens*, spicata, filiquis amplissimis.

*Acacia alia scandens*, spica multiplici, filiquis latis.

*Mimosa*, seu frutex sensibilis. *Inst. r. herb. 606.*

*Mimosa humilis*, frutescens & spinosa, filiquis conglobatis.

*Mimosa spinis horridiuscula*, & sensitiva magis. *Inst. r. herb. 606.*

*Periclimenum arborescens*, floribus luteis.

*Periclimenum arborescens*, ramulis inflexis, flore luteo.

*Periclimenum aliud arborescens*, ramulis inflexis, flore corallino.

*Viscum aphyllum*, baccis aureis, umbilicatis.

*Viscum portulacæ* foliis, baccis croceis & racemosis.

*Viscum aliud racemosum*, foliis latissimis.

*Viscum baccis niveis*, racemosis, foliis buxi luteis.



- Celtis, folio citri, subtus aureo, fructu rubro.  
 Hedera arbor, folio hastato.  
 Vitis abutili folio, acinis atropurpureis.  
 Vitis hederæ folio, ferrato.  
 Vitis folio subrotundo, uva corymbosa cærulea.  
 Vitis trifolia, uva corymbosa, acinis minoribus, rotundis.  
 Vitis trifolia, minor, uva corymbosa, acinis majoribus, turbinatis.  
 Vitis foliis cyclamini, uva corymbosa, acinis nigricantibus.  
 Acer scandens, convolvuli folio, flore ex auro coccineo.  
 Acer scandens, foliis citri, flore cæruleo, spicato.  
 Acer scandens, pseudo acaciæ folio, flore purpurascente.  
 Acer scandens, folio anguloso.  
 Staphylodendron foliis lauri angustis.  
 Evonymus lati-folius, racemosus, fructu pentagono, atropurpureo.  
 Senna ligustri folio.  
 Senna Alexandrina, five foliis acutis. *C. B. pin. 397.*  
 Senna Italica, five foliis obtusis. *C. B. pin. 397.*  
 Poinciana flore pulcherrimo. *Inst. r. herb. 619.*  
 Cassia, fistula Alexandrina. *C. B. pin. 403.*  
 Cassia filiquis planis.  
 Cassia foetida, foliis sennæ.  
 Cassia foetida, foliis oblongis, glabris. *Inst. r. herb. 619.*  
 Cassia foetida, foliis obtusis.  
 Cassia hexaphylla, filiqua bicapsulari.  
 Cassia humilis, filiquis fœnugræci.  
 Cassia sylvestris, foetida, filiquis alatis.  
 Cassia minor, arborescens, filiquis planis, articulatis.  
 Cassia minima, arborescens, filiquis longis & angustis.  
 Cerasus trifolia, racemosa.  
 Grossularia plantaginis folio amplissimo.  
 Grossularia plantaginis folio lato, fructu minimo, cæruleo.  
 Grossularia plantaginis folio angustiore, hirsuto.  
 Grossularia plantaginis folio glabro, flore roseo.  
 Myrtus pomifera, latissimis foliis.  
 Myrtus lati-folia, floribus purpureis, baccis aut niveis, aut nigro  
 purpureis.  
 Myrtus pomifera alia, foliis longis & angustis.  
 Myrtus foliis laurinis, baccis e cæruleo nigris.



- Myrtus cotini-folio.  
 Cornus racemosa , trifolia & quinquefolia , foliis foraminulatis.  
 Cornus alia racemosa , foliis filiquæ.  
 Crotalaria ari folio sagittato , flore luteo.  
 Crotalaria ari folio sagittato , flore purpurascens.  
 Spartium portulacæ foliis , aculeatum , ebeni materie.  
 Spartium scandens , citri foliis , floribus albis , ad nodos confertim nascentibus.  
 Cytisus spinosus , floribus luteis , ad alas nascentibus.  
 Cytisus frutescens , sericeus.  
 Cytisus arborescens , fructu eduli albo.  
 Pseudoacacia flore pyramidato , coccineo.  
 Pseudoacacia , filiquis alatis.  
 Pseudoacacia lati-folia , floribus purpureis.  
 Pseudoacacia ingens , fructu coccineo , nigra macula notato.  
 Pseudoacacia lati-folia , flore roseo.  
 Pseudoacacia fraxini folio , floribus violaceis.  
 Emerus filiqua incurva , ex quo paratur indigo. *In addendis inst. r. herb. 666.*  
 Emerus filiquis longissimis & angustissimis.  
 Barba jovis , lutea , foliis foraminulatis.  
 Ageratum , folio & facie rapunculi.  
 Melocactus India Occidentalis. *C. B. pin. 384.*  
 Melocactus purpureus , striis in spiram contortis.  
 Melocactus repens , tetragonus , flore albo , fructu coccineo.  
 Melocactus repens , trigonus , flore albo , fructu violaceo.  
 Melocactus arborescens , tetragonus , flore exalbido.  
 Melocactus arborescens , folio striato , spinosissimo , fructu aureo , tuberoso.  
 Melocactus ex pluribus globulis opuntia modo nascentibus , spinosissimus.  
 Melocactus monoclonos , fructu atro-purpureo. *Inst. r. herb. 653.*  
 Melocactus minimus , lanuginosus & tuberosus.  
 Melocactus tuberosus , lanuginosus , purpureis aculeis munitus.  
 Melocactus arborescens , trigonus , undulosus , aculeis validis munitus , fructu sub viridi.  
 Melocactus trigonus , brevibus aculeis munitus , flore albo , fructu coccineo.



- Melocactus repens, pentagonus, flore albo, fructu rubro.  
 Ananas aculeatus, fructu ovato, carne albida.  
 Ananas aculeatus, fructu conico, carne aurea.  
 Ananas aculeatus, maximo fructu conico.  
 Ananas non aculeatus, pitta dictus.  
 Tithymaloides frutescens, folio anacampserotis.  
 Tithymaloides frutescens, foliis nerii.  
 Amaranthoides lychnidis folio, capitulis purpureis. *Inst. r. herb. 654.*  
 Amaranthoides marina, repens, polygoni folio, capitulis argenteis.  
 Ricinoides arbor, folio multi-fido. *Inst. r. herb. 656.*  
 Ricinoides gossypii folio. *Inst. r. herb. 656.*  
 Ricinoides foliis populi hirsutis.  
 Ricinoides castaneæ folio.  
 Ricinoides frutescens, althææ folio.  
 Ricinoides verbasci folio.  
 Ricinoides æleagni folio.  
 Ricinoides folio citrii, argenteo polline consperso.  
 Ricinoides frutescens, linariæ foliis obtusis.  
 Ahouai nerii folio, flore luteo.  
 Acaiou. *Thev. Fran. Antarct. 120.*  
 Genipa fructu ovato.  
 Manihot. *Theveti, Juca & Cassavi. I. B. 2. 794.*  
 Manihot spinosissima, folio vitigineo.  
 Manihot ulmi folio ampliore.  
 Manihot ulmi folio angustiore.  
 Manihot minima, chamædry-folia.  
 Plumeria flore roseo, odoratissimo.  
 Plumeria flore niveo, foliis longis, angustis & acuminatis.  
 Plumeria flore niveo, foliis brevioribus & obtusis.  
 Papaya fructu melopeponis effigie.  
 Papaya fructu maximo, peponis effigie.  
 Papaya fructu oblongo, melonis effigie.  
 Sapindus foliis costæ alatæ nascentibus. *Inst. r. herb. 659.*  
 Begonia purpurea, maxima, folio aurito.  
 Begonia roseo flore, folio aurito, minor & glabra.  
 Begonia roseo flore, folio aurito, minor & hirsuta.  
 Begonia roseo flore, foliis acutioribus, auritis, & late crenatis.  
 Begonia roseo flore, folio orbiculari.



*Begonia nivea*, maxima, folio aurito.

*Guaiava*. *Clus. Hist. App.* 1.

*Cacao*. *Clus. Exot.* 55.

*Tamarindus*. *Raii Hist.* 17. 48.

*Corallodendron triphyllum*, spinosum, flore ruberrimo. *Inst.* herb. 661.

*Corallodendron fraxini foliis*.

*Corallodendron folio singulari*, oblongo, siliqua plana.

*Corallodendron foliis pseudo acaciae* subtus tomentosis, flore luteo.

*Ficus castaneae folio*, fructu globofo, maculato.

*Ficus maxima*, folio citri subrotundo, fructu umbilicato.

*Ficus folio citri acutiore*, fructu viridi.

*Ficus folio citri obtuso*, fructu sanguineo.

*Ficus foliis lauri*, fructu maximo.

*Ficus alia*, foliis lauri, fructu minori.

*Ficus dactyloides*, major, folio subtus argenteo.

*Ficus dactyloides minor*, folio subtus argenteo.





\*\*\*\*\*

A P P R O B A T I O.

**E**go infra scriptus, Consiliarius Regis, Medicinæ Lector ac Professor Regius, Doctor Medicus Parisiensis; jussu illustrissimi Galliarum Cancellarii, hunc Catalogum legi. In quo nihil reperi quod impedire possit quominus typis mandetur. Datum Parisiis, die vigesima quarta Aprilis, anni. 1703.

A N D R Y.

---

E R R A T A.

Pag. 14. lin. 3. innacunabulis *leg.* incunabulis.

Pag. 21. lin. 11. *lege* tanto studio.

Pag. 22. lin. 7. monopetalo *leg.* polypetalo.

Pag. 32. lin. 29. *sed leg.* seu.

Pag. 45. lin. 31. Draakeshtein *leg.* Draakeinstein.

Pag. 47. lin. 25. *lege* propriis Authoris sumptibus.

Pag. 52. lin. 1. Hispericoides *leg.* hypericoides.

I N C A T A L O G O.

Pag. 1. lin. 2. foliis *lege* foliis.

Pag. 1. lin. 12. Gonvolvulus *leg.* Convolvulus.

Pag. 6. lin. 31. vittoso *lege* villoso.

Pag. 16. post ultim. lin. Funus *leg.* Fucus.

---

A D D E N D A.

*Ad pag. 4.*

Borbonia fructu ex auro virescente, calyce corallino.

*Ad pag. 43.*

Guanabanus palustris, fructu lævi, viridi.


*Ad pag. 46.*

Malpighia aquifolii, amplioribus foliis.

*Ad pag. 51.*

Saururus minimus, lanceolatus.














*Ruellia*



P. Giffart fec.







*Pittonia**Bihai*

P. Giffart fec.

*Parkinsonia*









*Sapota*

4



*Mamei*












*Besleria*




















*Magnolia*





# h














































*Rondeletia*




*Gerardia*



*Tragia*




*Saururus*




*Turnera*

P. Giffart fec.

















P. Giffart fe.





















*Breynia*



*Cuete*










*Cornutia*



*Castorea*






*Brossæa*










*Guazuma**Calaba**Vanrhedia*

















*Bucephalon**Persea*

P. Giffart fec.







*Tapia**Ximenia*










*Brunfelsia*



*Mombin*


*P. Giffart fec.*







*Bontia*



Morisona

*P. Giffart fec.*








*Valdia*



*Guidonia*












*Bocconia*



*Penæa*

*Eresia*









*Dioscorea*

26



*Pereskia*



*Roioe*

P. Giffart fec.





Top compartment: A faint, stylized drawing of a figure, possibly a deity or a person, with a long, flowing robe and a pointed hat.


Second compartment: A faint, stylized drawing of a plant or a stylized animal, with a central stem and several branches or leaves.

Third compartment: A faint, stylized drawing of a circular object, possibly a moon or a planet, with a textured surface.

Bottom compartment: A faint, stylized drawing of a figure, possibly a person or a deity, with a long, flowing robe and a pointed hat.

Below the bottom compartment: Some faint, illegible text, possibly a signature or a date.























*Cameraria*




*Caapeba*



*Ian-raia*

*Marcgravia*










30




P. Giffart fec.









Bellonia



Arapabaca



Lobelia

Barleria









*Iabotapita*




*Ceiba*









Caraguata




Columnea















*Seriania*

35



*Cururu*



*Coa*




P. Giffart fec.

















*Arachidna**Lonicera**Isora*









*Dalechampia*



*Commelina*



*Renalmia*




*Zanonia*








*Petiveria**Kodda-pail**Rivina**Bonduc*



33

Rad



Bonae





