

**Epistola de sensibilitate pericranii, periostii, medullae, durae meningis,
cornae, & tendinum / [Domenico Vandelli].**

Contributors

Vandelli, Domenico, 1735-1816

Publication/Creation

Padova : Conzatti, 1756.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/axcuuh9qc>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



J. Jacobelli v. no.

Pls

Duplicate

54074/B

DOMINICI VANDELLII

PHILOSOPHI AC MEDICI

E P I S T O L A

De' *sensibilitate* Pericranii,
Periostii, Medullæ, Duræ
Meningis, Cornæ,
&
Tendinum.



C I D I C I C C L V I.

Superiorum Permissu.

DOMINICI ANDRELLI

PHYSIOTERAPIA AC MEDICA

1813. OLA

DE, 1813. OLA

LEONI, MEDICO, DOCTOR

MENANDER, COMEDY

303687

A'ει πράτισόν εῖ τὰληθῆ λέγεν.

Menander.

303687



(111)

ANTONIO VANDELLIO

PATRUELI SUO

DOMINICUS VANDELLIUS

S. P. D.



Inæ a te epistolæ
in eamdem ferme
sententiam redditæ
mihi sunt, altera
vi Calendas Januarii, altera
prid. Calendas Martii, quibus
de partium aliquarum *insensi-*
bilitate in animalibus viventi-
bus, meum judicium, atque ex-
perimenta postulabas. Jam re-
spondissem, nisi permolestæ oc-

A 2 cu-

cupationes me invitum alio avocassent. Sed ecce adsum, tuæ petitioni satisfaciendo , probandoque vetustis auctoritatibus , observationibus , atque meis quibuscunque experimentis , partes illas ab aliquibus Celeberrimis Viris insensibiles inventas , sentire , quæ sunt Pericranium , Perioстium , Medulla , Dura Meninx , Cornea , & Tendines.

2. Antequam ad experimenta deveniam , tria sunt animadvertisenda : Primum est : Quod parva spatia indiscriminatim per omnes corporis partes inveniuntur , quæ , quia nervis carent , fere insensibilia existunt . Secundum : Quod Homo haud raro fert dolorem absque ullo

ullo doloris signo, quod etiam in brutis animalibus accidit. Tertium: Quod ab *insensibilitate* aliquoties observata, certe deducere non possumus ita rem naturaliter esse.

3. Ad primum quod attinet, dico, totum animalis corpus instar retis contextum esse nervis, non vero totum corpus esse nervum, quia hic, illicque inter nervum, & nervum parva spatia a nervis vacua remanent, (hæc autem spatia non semper ejusmodi sunt, neque semper eodem in loco) quæ absque sensu doloroso vulnerare possumus. Cutis enim, quamvis maxime sensibilis sine ullo dolore traijci acu, vel aculeo potest. Hujuscemodi ex-

A 3 pe-

perimenta olim Florentiæ Homo pinguis in semetipso faciebat, cum longam acum per duos digitos in propriam abdominis cutim nullo dolore infligeret. Id Præclarissimus Puccinus Anatomiaæ Lector sæpius suis discipulis comemorabat. In hac urbe etiam anno CICICCLII quidam Circulator erat, qui inter musculum masseterem, & bucinatorem acu cutim traijciebat, nullo, ut ajebat, dolorifco sensu affectus. Quod ut probe intelligis a perforatis spatiis, quæ nervis privabantur, contingebat. Quapropter si pungamus, irritemusque, aut acu traijciamus spatia illa parva nervis destituta, ibi nullus excitabitur dolor in hominibus,

bus, ac nullum sensus signum a brutis animalibus dabitur. Nam, ut in his sensus signa appareant, dolorem adesse oportet (a). Itaque ad sensus signa exprimenda, non solum partes animalium viventium acu pungere, & traijcere oportet; quia fieri potest ut vulnus nervum non attingat; verum etiam latius scindere, ac lanicare debemus: Et hac ratione, nisi animal torpore languageat, ut saepenumero accidit, doloris signa videbimus. Quæ duobus Celeberrimi Laghii (b) tentaminibus partim elucescunt. Hic Doctus Vir duram Meningem Halleriano more ha-

A 4 bi-

(a) Ut vult Hallerus in *dissert. de irritab. & sensib.*

(b) *Epistola ad Cæsareum Pozzi.*

bito experimento, insensibilem reperit ; specillo autem inter illam, & cranium imisso, animal graviter commotum est. Ipse pariter Arteriam Crurali ligavit, punxit sine sensu ; forcipe vero sive parte, sive tota dissecta arteria succussions in crure ejusdem lateris excitavit.

4. Secundo animadvertem
dum est : Quod homo dolores
sæpe fert absque ullo doloris
indicio : Quod me observare
contigit in Nosocomio Octobri
mense in Muliere xxx anno
rum, quæ ulcus in crure dex
tero supra tibiam, & fibulam
habebat, quo ulcere Tendo
musculi tibiæ antici omnino
vagina detectus erat, quem
Ten-

Tendinem Rana Egregius in Nosocomio Chirurgus specillo vellicavit sine mulieris perturbatione externa; sed a me interrogata de Tendinis sensu, gravem dolorem sentire affirmabat. Numquid dubitas, quin bruta animalia ex aliquo dolore non concutiantur? quid in contrarium habes?

5. Ad tertium vero quod spectat: Bruta animalia, aut ab aliis prioribus acutissimis doloribus, aut ab aliquo in iis innato mortis timore, ac fugiendo summa cupiditate, concitata sunt; & eorum anima, seu spiritus, seu quidquid in iis vitae est cauffa, obrutum, & infirmum evadit; unde partibus quamquam valde sensibili-

bus

bus irritatis, fere dolorem animalia non sentiunt, ideoque Hippocrates aphorismum vi affectionis ii scripsit: *Qui aliqua corporis parte dolentes fere dolorem non sentiant, iis mens ægrotat.* His positis venio ad experimenta, & primum ad illa, quæ hanc animadversionem confirmant: His enim Cutis, quæ sensibilis est, insensibilis declaratur.

6. Experimentum i. Publice habitum in Patavina Universitate Februario mense hujus anni ab Excellentissimo, & Solertissimo Publico Anatomiae Incisore Nicolao Mezzavia, qui canis robusti Cutim abscidit in crure anteriori dextero, & in abdomine juxta illius lon-

longitudinem, nullis canis succussionibus excitatis. Dum vero eandem a subjacentibus musculis sejungeret, ob majores nervos abscissos, animal moestè ululabat.

7. Exp. II. Cui adfuere Praestantes Medicinæ Doctores Consilius, & Ulmus, nec non Rana. In Nofocomio Martio mense parvi canis Cutim supra bicipitis musculum cruris anterioris dexteri, & supra abdomen, & Achillis Tendinem cum nullo canis sensu doloroso incidi.

8. Exp. III. Post aliquot dies domi Doctoris Consilii, alium parvum canem ad Halleriana tentamina subjeci, qui maximas Cutis incisiones multis in lo-

locis factas, non sensit.

9. Exp. iv In Brixiensi Collegio pariter Martio mense, cani, qui *Pomer* vulgo vocatur, iisdem in locis Cutim scidi eodem cum eventu, ut, qui aderant Hyacinthus Salvatorius, Carolus a Magistra, Raymundus Gallina affirmare possunt.

10. Exp. v. Mense Septembri domi meæ, ubi aderant Doctor Bertossius in Physicis rebus Excellens, & Sographius Nosocomii Chirurgus Experientissimus: Canis *Pomer* Cutim supra Chordam magnam secui, qui nullum doloris, nec sensus indicium dedit.

11. Exp. vi. Eodem mense Doctissimo, ac Nobilissimo Co-

Comite Francisco Trento, &
Doctore Bertossio adstantibus:
Vervecis Cutim supra Achillis
Tendinem excidi sine animalis
sensu.

12. Exp. vii. Octobri mense,
dum aderant Antonius Puja-
tius Philosophiæ, & Medici-
næ Doctor, Bertossius, Sogra-
phius, & Rana, aliquique stu-
diosi juvenes: In Nosocomio
canis moloffi Cutim supra u-
trosque Achilleos Tendines nul-
lis sensus signis secui.

13. His postremo alia tria
experimenta addam; unum a
Præstantissimo Blanco (a) in
cane mastino habitum, qui
Cutim insensibilem vidit: Alia
duo a me instituta, quæ ma-

gis

(a) Lettera Stampata in Torino l' anno 1755.

gis soporem, animaque oppres-
sionem animalium, quibus pro-
pter experimenta utimur, de-
monstrant. Canis igitur (ex-
perimenti v. 10., & exp. iv.
71.) post Cutis, & Achillis
Tendinis vulnera in crure po-
steriori sinistro, a vinculis so-
lutus per aliquot minuta etiam
cum sauciato crure ambulavit,
deinde stravit se somno. Tunc
ego lapide infernali nervum
cruralem posteriorem, & Ten-
dinus vaginam, & Tendinem
ipsum, atque vulneratam Cu-
tim combusssi absque ullo canis
sensu: Quod ferme idem acci-
dit cani robusto, quem Novem-
bri mense ad investigandam
Tendinis Achillis *sensibilitatem*
supra tabulam vinculis affixi:

Ca-

Canis iste a verberationibus, mortisque timore oppressus, atque externatus ita erat, ut neque Cutis, neque Nervi, neque Musculi, & Tendinis vulnera supra thoracem, & crura non sentiret; quæ magna admiratione Diligentissimus Doctor Moya Nosocomii Medicus adstantis, & Aloysius Calza juvenis Anatomiae, & Medicinae studiosus, & alii viderunt.

14. Quæ cum ita sint, oportet semper aliquarum partium *insensibilitatem* in animalibus viventibus dubie proferre, dum hæc solum hujuscemodi experimentis nitatur. Nihilominus tamen mihi fas erit a meis experimentis aliquid certum deducere; nam hæc cum antiquorum

rum , & recentium Auctorum sententiis, atque observationibus conveniunt . His itaque animadversis, ordo postulat Pericranii *sensibilitatem* considerare.

15 Pericranii sensus, jam omnibus Chirurgis, (inter quos Helliodorus (a), Celsus (b), Joannes a Cruce (c), Ambrosius Paraeus (d), Joannes Dolaeus (e), Simon Rovhaultius (f), Elias Colius de Vilarfis (g), recensentur,) ob sympto-

- (a) *Oribasius ex Helliodori libris a Cocchio editis. De vulnere capit. 1.*
- (b) *L. 8. cap. 4. De Calv. fract. 2. p. 516.*
- (c) *Cap. 7. p. 26. de levi & simplici capit. vulnere &c.*
- (d) *L. 9. cap. 16. de cranii fracti cura part.*
- (e) *Encyclopædia Chirurgica ratio: lib. 1. cap. 3. de capit. contus. & pericranii vulnerat.*
- (f) *Traité des plaies de tête. Chap. 1. p. 7.*
- (g) *Cours de Chirurg. &c. T. 3. des plaies de la tête Chap. 9. p. 222, & 234.*

ptomata ab istius contusione,
laceratione constanter observa-
ta innotuit. Ziemermannus (*a*)
etiam sensibile Pericranium ex-
perimentis cognovit: Et Cele-
berrimus Lambertus (*b*) nuper
quinque observationibus habitis
in hominibus hoc confirmavit.

16. Quorum in fide, judicio-
que satis mihi spectatis, ut
nunc facilius acquiescas; expe-
rimenta exponam.

17. Exp. 1. In Patavii No-
socomio mense sextili hujus
anni maniacus furens xxxv an-
norum fervidi temperamenti
detinebatur, qui cum a vin-

B cu-

(a) *Dis: §. VIII. exp.*

(b) *Lettera del Sig. Gio. Michiele Lamberti Lettore di Chirurgia nella Città d'Alessandria ec. La quale contiene diverse osservazioni sopra la sensibilità del Pericranio, e Tendini negli Uomini. In Alessandria. 1756.*

culis solutus esset, caput contra ferrum parieti affixum, ita percussit, ut exinde vulneratus fuerit supra sincipitis os dexterum prope musculum temporalem usque ad Pericranium, quod per octo lineas detectum fuit: Quo vulnere æger resipuit. Cum vulneri mederetur egregius Sographius, ac linteo carpto Pericranium a pure detergeret homo querebatur. Tunc denuo ille majori diligentia cutim vulneratam evitando, linteo carpto Pericranium tetigit cum magno ægri dolore: Die sequente Pericranium specillo ubique irritavit, & semper infelix homo ingemiscebatur. Sic per quattuor dies experimentum Chirurgus re-

renovavit pari cum successu ;
quo usque Pericranium putre-
factum fuit ; cui experimento
semper adfuere laudatus Rana,
& alii Juvenes , qui ad Chirur-
giam practicam descendam No-
focomium petunt .

18. Exp. II. Ronconus in Chi-
rurgicis experimentis clarus , me-
certiorem fecit ; quod sextili
mense hujus anni , ob vulnus
capitis in homine XLII circiter
annorum melancholici tempe-
ramenti , omnino Pericranium
sub suturæ lambdoideæ angulo
detectum fuit . Dum pus ab
ipso Pericranio dergebat , ho-
mo dolore vexabatur .

19. Exp. III. Junii mense do-
mi meæ in ave , quæ vulgo *bu-*
bo appellatur , Pericranio nu-

dato, vellicationibus, oleo vi-
trioli , puncturisque irritato,
avis semper mœste ulula-
bat .

20. Exp. iv. Sextili mense
domi meæ felis juvenis cutim
supra sinciput absque ejus no-
tabili succussione incidi . Post
aliquot minuta Bertossius spe-
cillo leviter Pericranium velli-
cavit; & feles vix hoc sen-
tire videbatur . Ipsum porro
spiritu vini oblinivi , & tunc
infelix convulsa jactabatur .
Quum vero a convulsione li-
berata fuit , denuo Pericra-
nium vellicationibus , spiritu
vini , puncturisque irritavimus
nullis sensus signis . Quare in
occipitio aliam Pericranii por-
tionem deteximus , quæ diver-
ſe ,

ſe, & variis in locis irritata,
ſemper ſenſibilis fuit.

21. Exp. v. Novembri menſe in Nosocomio parvi canis Pericranium detexi ſupra ſincliput, illudque ſpiritu vini ma- defeci ac pluries laceravi, & ſemper canis vehementer ja- ētabatur, atque ululabat; ut viderunt Moya, Bertoffius, & Studiosiſſimus Doctor Ghirus, & Solers Petrus Arduinus, qui maxima patientia, & qua va- luit industria preparationem Tendinis Achillis delineavit, atque ſculpsit.

22. Quibus ex omnibus in- telligitur Pericranium ſenſu non carere. His ita expositis de Periostio verba facienda ſunt, quod inter partes ſenſi-

biles locum obtinet.

23. Parœus (*a*), Bellinus (*b*), Clopton Hauersius (*c*), Fayæus (*d*), Winslowius (*e*), & fere omnes Chirurgi Periostium sentire affirmant, & ulterius ossibus sensum tribuere, quamvis aliqui Præstantissimi Viri ossibus sensum auferant, eumque solum dentibus ob insertos nervos concedant.

24. Sed de his clarius tu videbis; ego enim eadem in medium relinquens ad experientia transeo; unde id, quod potissimum in hoc loco quærimus magis elucecat.

25.

(a) *De corpor. humani. Anat.* lib. 2. c. 61.

(b) *De morbis capit. Dolor in genere* c. 359.

(c) *Cap. 3. de periostio* c. 27.

(d) *Princip. de Chirur. chap. 1, des part. simil.*

(e) *T. 1. Trattato dell' ossa fresche* n. 60. *Trad. in Ital.*

25. Exp. I. Canis, quo usus sum (ob exp. III. 8.) Periostium in crure anteriore dextero prope humericaput, pupugi cum gravissimo animalis dolore.

26. Exp. II. Supradicti bubonis (exp. III. 19.) spiritu vini Periostium in cruribus oblinivi, ac laniavi ; quod semper fuit sensibile.

27. His addam, quam dolorosum fuit Periostium tibiæ propter singularem ipsius sectionem a Præclaro Francisco Stella Vicetiæ Chirурgo factam in Nobilissimo Comite Thoma Plovenio . Hic Nobilissimus Vir laborabat exostose fine dolore in tibia infra ipsius tuberculum faciei anterioris. Hæc

non multum elevata , sed in longitudinem ad sex , aut ad septem transuersos digitos extensa erat : In parte superiori non longe a prædicto tibiæ tuberculo aderat rotundum profundi sinus foramen : Hic sinus perpendiculari linea ferebatur ad magnam ossis tibiæ cavitatem . Hinc ob morbi gravitatem ad visendum Nobilissimum Virum Vicetiam accitus fuit hujus Universitatis Publicus Chirurgiæ Professor , qui una cum prædicto Præclaro Stella , & cum Celebri Joanne Maria Pigato Medico , habito consilio , necessarium existimavit incidenda esse scalpello integumenta per totam exostosis longitudinem , & sejungendum esse Perioстium ab ipso

ipso osse: Præterea in extrema inferiori exostosis parte terebra perforandum esse integrum os usque ad magnam ossis cavitatem: Postea forcipibus, scalpis, & serratis ferris aperendum esse os affectum in tota exostosis longitudine, & latitudine, ut omnes substantiæ ossis corruptæ eliminentur, & os infirmum exquisitis artis præsidiis ad sanationem restituatur. Hæc omnia summa dexteritate, & industria conferta fuere ab Experientissimo Stella, qui singulari hac chirurgiæ operatione Nobilissimo Viro optimam reddidit valetudinem.

28. Modo audi, ex Præclaræ Stellæ epistola mihi scripta,
quan-

quantum dolorem passus sit
Nobilissimus Vir in ipso Pe-
riostio, & hæc sunt verba Stel-
læ. Ella mi ricerca, se nell'
occasione di separare il Periostio
nella persona del Sig. Conte To-
maso Piovene, gli sia riescita
sensibile una tale separazione.
Tagliati, che io ebbi gli integu-
menti, e scoperto il Periostio,
procurai la di lui separazione
dall' osso; ma siccome questo s'in-
ternava nella sostanza male af-
fetta dell' osso stesso, non mi rie-
scì con le regole ordinarie di con-
seguire la di lui separazione;
cosicchè fui costretto ricorrere alla
applicazione del caustico del Ves-
salio; e gli riesci molto doloro-
so, e più di qualunque altra
sussegente dolorosa operazione
fatta.

fatta in esso Cavaliere. (benchè egli sia stato uno de' più sofferenti pazienti, che io m' abbia trovato.) Così pure Dolorosa è riescita la separazione del Periostio in occasione di fare l' amputazione d' una gamba ; ed anche nella separazione del Pericranio per qualche ferita di capo ; come chiaramente da qualche tempo tal verità ho fatta conoscere alli giovanini miei scolari . Se ella desidera maggiori riprove, non mancherò ec.

29. Cæterum ut te certiorrem faciam de Periostii sensu, ne te pigeat legere epistolam Laurentii Bellini (a) ad Archibaldum Pitcarnium de morbo, quo in spina tibiæ ipse Bellinus

(a) In secund. part. oper.

nus laboravit. Ex ipso intelli-
ges quantum dolorosum illi fue-
rit tuberculum illud spinæ ti-
biæ, & Periostii, quod corni-
culum ab ipso appellabatur.
Inter alia, quæ in descriptio-
ne morbi indicant, & osten-
dunt dolorem Periostii; scri-
psit. ... *Sed si corniculum,* sunt
verba Bellini, *spoliatum per se-*
ctionem integumentis, tentari ma-
nu, vel instrumentis ab Alghisio
permissem; tunc enim vero exci-
tabatur in ipso tam vividus do-
loris sensus, atque tam acer, ut
neque specillum, neque digitum,
neque gossipium, nullam denique
corniculum tentandi viam admit-
tere potuerim. Quum totam Bel-
lini epistolam de hac re lege-
ris, videbis num irrationalium
ani-

animalium experimenta testari,
& comprobare possint huma-
num Periostium insensibile ef-
se, ut aliqui contendunt.

30. Noli autem existimare
experimentum x Præstantissimi
Castelli contra nostram senten-
tiam esse; nam, etsi mulier de
Periostii dolore interrogata non
querebatur; tamen dolor ade-
rat; ast ab illo majori integu-
mentorum, musculorum, ner-
vorumque, quem mulier val-
dè sensit in pedis sectione, op-
primebatur ita dolor iste Perio-
stii, ut eundem mulier ab aliis
vehementioribus doloribus di-
stinguere nequiverit: In magno
enim vulnere, in nervorum
punctura, in brachii, crurisque
amputatione præcise in parte
af-

affecta dolor non sentitur; sed inordinate per totum mem-
brum; unde æger eo tempore Cutis, Tellæ Cellularis, Mu-
sculi, Tendinis, Nervi, Perio-
stii, Ossis sensus determinare,
atque distinguere nequit.

31. Hæc breviter attigisse
satis habui: Nunc de Medullæ
sensibilitate videamus.

32. Cum Celeberrimi Ver-
neyi (a) tentamina de Medul-
la sufficiant ad ejus *sensibilita-
tem* evincendam, mea præter-
mitto. Insignis itaque Vir in
Nosocomiis, quum manus, aut
medicamenta hominibus admo-
veri videbat, quibus aut bra-
chium,

(a) Memor. apart. alla Stor. delle Scienze di Pari. trad.
in Ital. T. 2. clas. I. p. 56. Della struttura della
Midolla, recit. nell' Acad. li 17. Lugl. l' anno
1700.

chium , aut crus amputatum fuerat , detectam in iis Medullam violenter tangi jubebat . Quod semper cum ægri dolore erat : Secari jussit etiam os femoris in vivente animali , & osse a carne solerter detecto ; quum animal a dolore quievit , specillum in Medullam intrusit , & tunc maximi doloris indicia obseruavit : Quod experimentum sæpe pari cum evenitu renovavit . Præterea , ait ipse , a Medullæ morbis ejus exquisitissimus sensus cognoscitur .

33. Hisce traditis . Experimenta , quæ duræ Meningis sensum ostendunt , hic pono .

34. Exp. i. Aprili mense anni transacti Cranii terebrationi ad-

adfuī a Celeberrimo quodam Chirurgo institutæ in homine xxxvi circiter annorum temperamenti fervidi, qui a verberationibus totum sinciput fractum habebat, a qua fractura auditum, vocemque amiserat. In hac igitur terebratione Chirurgus inopinata duram Meningem modiolo ferrato laceravit; quare æger convulsus statim evasit, adeo ut alter Chirurgus ob musculorum, tendinumque inordinatos motus vix venam secare vespere potuerit.

35. Exp. ii. Felis (quæ exp. iv. 20. infervivit.) Cranium terebravi in occipitio; & quum modiolo ferrato ad duram Meningem perveni; succussionibus, atque ululatibus gra-

gravissimum dolorem animal patefecit: Quod idem etiam accidit eam vulnerando.

36. Exp. III. Vervecis, cuius domi meæ mense Septembri Cutim incidi supra Achilleum Tendinem, [ob experimentum VI. II.] Cranium terebravi, cumque sauciarem duram Matrem absque ejus magna laceratione; vex moestos ululatus dedit.

37. Quid autem antiqui Medici de Meningis sensu docuerint, legi potest apud Hippocratem (*a*), Celsum (*b*), Paulum Æginetam (*c*), Joannem Bohnium (*d*), Baptistam Cor-

C te-

(a) *De vuln. capit.*

(b) *De fract. calvar. c. 4. l. 8*, & *l. eodem cap. 19. de vulnere duræ meningis.*

(c) *De arte medendi l. 6. c. 270.*

(d) *De renunciat. vuln. De cap. vuln. leth., c. 86.* (e)

tesium (a), Ambrosium Paræum (b), Gabrielem Fallopium (c), Oribasium (d), Paulum Barbettam (e), Rolandum (f), Magatum (g), Franciscum Peccettum (h), Mangetum (i), Brunum (l), Schenkhium (m), Baglivium (n), a Motte (o), & apud alios, qui omnes duram Meningem ma-

xi-

(a) C. 187.

(b) L. 4. de mening. cap. 5. c. 128.

(c) T. 2. de vuln. capit. cum secti. membr. Cap. 16. c. 350.

(d) Græcorum Chirurg. libri Sorani &c. a Coccio editi, & conversi. c. 92. de fissuris §. 59.

(e) Cap. 2. de partib. capit. intern. c. 115. usus chirurg.

(f) Chirurg. l. 1. de modis, quibus caput vulneratur cap. 1.

(g) De rara med. vulner. l. 2. cap. 19. De signis læsi- mening.

(h) De vuln. capit. l. 2. de vuln. duræ mening. cap. 17.

(i) Biblio. Chirurg. T. 4. l. 18. c. 366. cap. 13. De vuln.

(l) Chirurg. magn. l. 1. de fract. cran. cap. 17.

(m) L. 1. Obs. med. de dolore capit. c. 53.

(n) Cap. 5. de compara. motus cord. & arter. corol. & postu. 5.

(o) T. 2. Obs. XXXIV.

xime sensilem esse, fatentur.

38. Præstantissimi Antonii Heidei (*a*) experimentum quidem non ignoro, qui postquam terebra canis Calvariam perforaverat, forcipe sinum falciformem aperiebat eum in finem, ut symptomata, quæ hujuscemodi læsiones sequuntur, observaret. Hæmorrhagiam sanguine draconis, & linteo carpto brevi sedabat, adeo ut post breve animi deliquium ad se rediret canis, & pane sicco, [licet minus avide] vesceretur, nullis abhinc aliis gravioribus symptomatis correptus.

39. Quo experimento duræ Meningis *insensibilitas* non probatur; sed solum, quod vul-

C 3 neri

(a) *Obs. xix.*

neri arte , atque dexteritate facto , illa symptomata non accidunt , quæ , Meninge laniata , sequuntur ; ut Celsus (a) de Pericranio notavit .

40. Nec me quidem fugit , quod , dum pus , aut sanguis inter duram , & piam Matrem diù colligitur , illam incidere haud vereantur peritiores Chirurgi , inter quos Glandorpius (b) , Blankartus (c) , Fallopius (d) , Magatus (e) , Elias Colius de Vilarfis (f) , Petrus Marchettus (g) , qui quamvis sectionem pro-

(a) L. 8. cap. 4. *De calv. fract.* 2. c. 516.

(b) *Specul. Chirurg.* obs. 4.

(c) *Collecti. Qbs.* 27.

(d) T. 2. in lib. Hippo. *de vuln. capit.* Cap. 45. ad membra. abscessus .

(e) L. 2. cap. 42.

(f) *Cours de Chirurg.* T. 3. obs. 20. , & 24.

(g) *Obs. Med.-Chirurg. Sylloge.* Obs. 14. c. 30.

proponat, ait tamen, *periculo non carere.*

41. Verum hinc istius membranæ aut parvum sensum, aut *insensibilitatem* arguere non licet. Nos enim Fallopius docet, tunc Meningis sensum a vapore malo, seu potius ab ejus distensione facta a puris, sanguinisque copia, & qualitate obtundi, atque quasi extingui ; quod ipse Fallopius (*a*) experientia ostendit, ait enim ; *Sæpe advocatus sum ego ad secandos abscessus in variis locis, & observavi, quod quando seco abscessum, æger nullum, vel parvum sentit inibi dolorem; sed si altera die accedo, & tango cutim illam, acutissimus excitatur dolor.*

C 3 42.

(a) *T. 2. de vuln. capit. cum absces. tunic. Cereb. cap. 15.*

42. Ab ejusmodi igitur experimentorum, observationumque genere, non difficile, ut intelligis, mihi fuit duram Meningem sensibilem determinare.

43. Perge nunc mecum ad Corneæ sensum perpendendum. Peritiores Chirurgi in oculi, Corneæque inflammationibus collyria cum pulveribus non adhibent, ne Cornea dolorifico sensu irritetur: In hujus porro ulceribus utuntur mitioribus detergentibus, quia experientia norunt ab activioribus dolorem oriri. His addo, quod in Cornea acerbissimus excitatur dolor, dum a Chirurgo, licet summa dexteritate, sejungitur oculi unguis ab ipsa Cornea:

Prae-

Præterea hæc Corneæ *sensibilitas* clare sequentibus comprobatur experimentis.

44. Exp. i. In speculo me inspiciendo, pluma ubique oculi mei tum dexter, tum sinistri Corneam leviter tetigi, & semper moleste sensi.

45. Exp. ii. Bertossius hoc in semetipso pari cum successu periclitatus est.

46. Exp. iii. Septembri mense domi meæ dum Bertossius, & Sographius aderant; canis (exp. v. 10.) utriusque oculi Corneam acuti ferri acie leviter vellicavi. Tunc canis oculos velocius claudendo, & corporis totius succussionibus doloris signa perspicue dedit.

47. Exp. iv. Ejusdem verve-

cis [exp. III. 36.] oculi Corneam eodem modo irritavi, quæ etiam hac vice fuit sensibilis.

48. Exp. v. Septembri mense gallinæ Corneam pupugi, & sensibilem maxime una cum Præclarissimo Comite Trento, & laudato Bertossio observavi, ut diversæ illius concitatae succussiones testari potuere.

49. Exp. vi. Die sequente gallinæ corneam vellicavi, & pupugi cum perspicuis doloris signis.

50. Exp. VII. Canis [exp. VII. 12.] Corneam oculi sinistri cultri extremitate vellicavi cum canis ululatibus. Eandem porro fauciavi cum totius corporis succussionibus, & gravioribus ululatibus.

51. Quæ tentamina naturalem Corneæ *sensibilitatem* ostendunt. Quod item inter alios ab Ildano (a) animadversum fuit.

52. De acuto autem, & spastico dolore Corneæ , & Iridis pariter testari potest, Egregius juvenis Antonius Bonnus Collegii Somascorum Alumnus, & cum ipso omnes Collegii Alumni, Præceptores, & Rectores. Alumno huic secta fuit Cornea in orbem propter staphiloma a Celebri Joanne Tayloro ; a qua sectione operationis tempore ingentes, & spastici dolores excitati fuere , qui deinde incrementum sumfere a scari- ficationibus secunda die in Iride factis ad vacuefaciendum cry-

sta-

(a) Obs. 25. Cent. I. c. 30.

stallinum , & vitreum humorem . Spasticos dolores , qui per multos dies secuti sunt , comitabantur frequens vomitus , febris , & inflammatio totius vulnerati oculi , & ipsarum palpebrarum .

53. Petrus Pelliciarius pauper homo , qui hac in Urbe moratur , acerbissimum dolorem , atque convulsionem habuisse in Corneæ sectione affirmat , quæ secta fuit fere per quattuor lineas prope ejus circumferentiam in oculo dextero à quodam hujus Civitatis Celeberrimo Medico , Chirurgo- que , ut crystallina lens exiret , quæ inter Iridem , & Corneam , seu in anteriori aquei humoris camera erat .

54 Ultimo proposui de Tendinum sensu sermonem facere ; sed antequam ad experimenta progrediamur , oportet hic animadvertere : Quod nervi ingrediuntur Tendines , ut jam Melchior Sebizijs (a) , & alii a Goelikio (b) citati observaverre . Præstantissimus Vinslovius (c) ait , Achillis Tendini ramum nervi ischiatici cruralis interni concedere filamenta ; sunt hæc ejus verba . *Ce Rameau long se rencontre & s' unit en chemin avec un Rameau de la Branche Sciifique externe ou petite Sciifique , donne des Filets de côté & d'autre jusqu'en bas ; & après en*

(a) *Exercit. Med. c. 142. editio Argentina 1672.*

(b) *Differ. de Tendinis structura , & usu . §. XXV.*

(c) *Exposit. Anatomique &c. T. 3. Traité des nerfs . c. 213. n. 331.*

en avoir donné au Tendon d'Achille, il passe derrière & sous la Malleole externe. Celeberrimus Laghius (a) nervos ingredi Achillis Tendinem diligenter notavit ; ut etiam ego illos videre, & amicis monstrare facile potui. Cujus Tendinis duas præparations apud me adhuc adservo, & unius iconem in fine epistolæ habebis.

55. De hoc nervorum ingresu aliquid breviter dicere necessarium mihi videtur, ut absque microscopii auxilio hos nervos cultro detegere possis. Nervus itaque ischiaticus cruralis internus, seu nervus poplitæus internus una propagatione musculum gastrocnemium in-

(a) *Epistol. cit.*

ingrediens attribuit ramusculum in alios subdivisum Achillis Tendini in parte postica. Nervus porro ipse ischiaticus internus descendendo, quum ad Tendinis medium pervenit, ibi duos ramos emittit, quorum unusquisque subdivisus in duos alios, partim vaginam contexit, partim eam traijciendo multis ramusculis hic, illicque Tendinis substantiam in ejus parte postica penetrat.

56. Qua de causa Tendo cum omnes nervos, & vaginam habeat, valde sentit, [quidquid de vaginæ *insensibilitate* Celeberrimus Castellus (a) dicat.] parum vero sentit, dum vagina expoliatur, quia tunc abscinduntur.

(a) In *dissert. De sensibil.*

duntur omnes nervi, qui eam traijciunt, solumque remanet ramus ille a gastrocnemio discedens; quia vaginam neque traijcit, neque ei adhæret.

57. Veniam mihi dabis, si diversis rebus abreptus paulisper, sed fortasse non inutiliter, a proposito digressus sum. Nunc igitur statim ad experimenta pergamus.

58. Exp. I. Mense Januario domi meæ parvi muris Achilleum Tendinem cum sua vagina ferri acie pupugi, ex qua punctura convulsio orta fuit.

59. Exp. II. Iisdem ferme diebus muris utrosque Achilleos Tendines cum suis vaginis fauciavi, tum in Tendinum principiis, mediis, & finibus; & sem-

semper convulsione animal cor-
ripiebatur.

60. Quæ duo experimenta sa-
tis probant vaginæ , Tendinis-
que simul sensum . Modo ob-
servationibus in hominibus a
me factis in hoc S. Francisci
Nosocomio, & experimentis in
brutis animalibus Tendinis sen-
sum absque vagina considerare
oportet.

61. Observatio I. Augusto
mense hujus anni in Nofoco-
mio homo XL circiter annorum
mali corporis habitus moraba-
tur, qui a crassa spina vulnus
in cute duos pollices supra cal-
caneum acceperat. Quo negle-
cto vulnere , ulcus ortum fue-
rat , quod Tendinem Achillis
ab integumentis , atque vagi-
na ,

na, & partim musculum gastrocnemium detexerat. Hoc tempore convenientia remedia adhibita fuere; at nullo juvamine. Nam in ulceris labiis gangrenæ signa jam apparebant, quæ Chirurgus combussit cum nullo ægri dolore, atque sensu: Eodem tempore Chirurgus periclitari voluit Achillis Tendinis *sensibilitatem*. Quare candente ferro ejus principium tetigit; & hoc vehementer sensibile fuit, ut ex gravibus hominis gemitibus Sographius, & Rana cognovere. Usto dein Tendinis medio, mitius homo querebatur. Demum prope calcaneum ussit, & ibi parum æger sensit: Cæterum infelix homo decem dierum spatio ob
ma-

malignam febrem ab ulcere ortam obiit.

62. Observatio II. Octobri mense in homine xxxii annorum melancholici temperamenti principium Achillis Tendinis in crure dextero ab ulcere detetum fuit non solum ab integumentis, verum etiam a vagina. Quo Tendine infernali lapide variis in locis usto æger vehementer lamentabatur, ut viderunt Marcus Charburius in Historiæ naturalis, & Anatomiaæ studio versatus, & Rana, aliique. Hic ad rem facit etiam observatio in muliere (n. 4.) habita .

63. Obser. III. Homo quidam annorum L fervidi temperamenti Calendis Decembris ad hoc

D

S.

S. Francisci Nosocomium ob
fordidum ulcus in sinistro cru-
re delatus fuit: quod brevi tem-
pore non solum Tendinis va-
ginam musculi peronæi antici;
verum etiam multa illius fila-
menta corruptum. Hinc laudatus
Chirurgus Sographius abscissa
substantia corrupta sanam Ten-
dinis substantiam vitrioli oleo
tetigit molesto cum ægroti do-
lore. Postea sex in locis infer-
nali lapide ipsum Tendinem us-
fit, sed semper cum illius do-
lore. Altera die idem Chirur-
gus corruptam Tendinis par-
tem secuit, & volfelli sanam
Tendinis substantiam constrin-
xit, & dolorem excitavit.

64. Obser. IV. In dicto No-
socomio Homo xxxvii anno-
rum

rum mali corporis habitus ob
 fordidum ulcerus in crure dexte-
 ro commorabatur . Ulcus in
 parte cruris posteriori erat , te-
 nebatque totum fere spatiū
 a calcaneo usque ad musculi
 gastrocnemii ventrem ; ejus au-
 tem latitudo quattuor digito-
 rum erat ; adeo ut Achillis Ten-
 do integumentis , atque in par-
 te superiori externa exutus va-
 gina (ut microscopii auxilio
 diligenter vidi .) sequentia ob-
 servare permiserit . Primo ma-
 ne supradictus Chirurgus in-
 fernali lapide Tendinem denu-
 datum attigit ; ex qua lapidis
 combustionē homo vehementi
 dolore vexabatur . Die secunda
 volfelliis ego ipse fibras Tendinis
 constrinxi ; & hoc cum ægri-

dolor . Die tertia Sographius
forcipe aliquot ipsius Tendinis
fibras abscidit ; & æger acerbif-
fimo dolore excruciat .
Quarta die , cum major Ten-
dinus pars denudata esset vagi-
na , candente ferro hanc Chi-
rurgus combussit ; & tunc ho-
mo statim vehementius inge-
miscebat , quam in cutis ustio-
ne . Hæc operatio alia vice ce-
lebrata fuit pari cum effectu .
Sexta die Tendinem cultro pu-
pigit cum acerbissimo ægri do-
lore . Septima die alio in loco
recenter vagina detecto ipsum
Tendinem attigit cum vehe-
menti hominis dolore . Octa-
va die homo acerbissimis dolo-
ribus corripiebatur , dum Tendo
candente ferro urebatur . Hæ
chi-

chirurgicæ operationes pro ægrotum valetudine reddenda coram nonnullis Adolescentibus Chirurgiæ studiosis institutæ fuere.

65. De expositis observationibus minime dubitandum est, quippe hæ in partibus morbo affectis confectæ fuere: Nam partes, quæ in statu sano nervis, & sensu, ut Tendo, juxta Clarissimi Halleri placitum, carent; in morboso statu neutiquam nervos, & sensum adipisci possunt.

66. Quantum autem doloris contingat in Achillis Tendine ob compaginis solutionem, absque ulla præcedenti Tendinis læsione, intelligere poteris ex Joanne Aloysio Petito (a) qui

D 3 de

(a) *Traité des Malad: des os T. 2. chap: 15. De la rupture des tendons c. 320.*

de Tendine sic loquitur . En effet de ce la seul , que le tendon d' achille est rompu entièrement , il n' arrive aucun accident dans la rupture complete : & de ce la seul , que ce tendon n' est rompu ou cassé qu' en partie , il doit nécessairement survenir de fâcheux symptômes : c' est ce que j' ai presque toujours remarqué dans la rupture ou coupure incomplete des tendons des autres parties , la douleur , l' inflammation , la fièvre , l' insomnie , le délire , & la gangrenne même , qui y surviennent , quelque fois , rendroient cette maladie presque toujours mortelle , sans les socours de la Chirurgie .

Des trois personnes , à qui j' ai vu la rupture complete du tendon d' achille , aucune n' a senti de

de douleur , nien se rompant ce tendon , ni après se l' etre rompu ; & les deux ruptures incomplètes rapportées , l'une par Ambroise Parè , l'autre dans ce mémoire , ont été tres-douloureuses .

67. Ex his manifestum est sectionem Tendinis esse remedium in punctura ex vulnere ipsius Tendinis , (cum ex ipsa graviora exoriantur symptoma .) ut Petitus (a) indicat sequentibus verbis . Dans la rupture incomplete , en quelqu' endroit , que soit le tendon , si la douleur est suivie de fièvre , de délire , d'inflammation , de disposition gangreneuse , on fait cesser tous les accidens en coupant la portion du tendon qui étoit

D 4 re-

(a) C. 231.

restée entière, parce que celle ci étant coupée rien ne résiste à l'autre, tout obéit à l'action du muscle, qui fait la rétraction, & n'y ayant plus de résistance, il n'y a plus de divulsion, par conséquent plus de douleur ; & tous les accidens doivent cesser bien-tôt après.

68. Exp. i. Canis [exp. i. 6.]
vagina expoliato Tendine bicipitis in prima flexura cruris anterioris dexteri, & cultro varie vulnerato, vix doloris signa vidimus : Puncto quidem ejus musculi Tendine, qui humero adnectitur, jam a vagina solerter nudato, tunc succussionibus animal jactabatur.

69. Exp. ii. Tendinem pariter bicipitis omnino vagina nudavi

ca-

canis, [quo usus sum ob exp.
II. 7.] dolore sedato, illum
cultro pupugi, multasque fi-
bras orizontaliter, & oblique
secui. Quibus vulneribus mo-
do canis ululabat, modo non.
Nudato postea Achillis Tendi-
ne cruris posterioris sinistri, at-
que vulneribus irritato, vehe-
menter animal sentiebat. Idem
periclitatus sum in altero A-
chillis Tendine, qui parum
fuit sensibilis.

70. Exp. III. In flexura cru-
ris anterioris sinistri, Tendinem
bicipitis canis [exp. III. 8.] a
vagina detexi, saepe cultro la-
niavi; & canis fere somnicu-
losus, erat, nullumque dolo-
ris indicium dabat: Expoliavi
porro Achilleos Tendines inte-

gu-

gumentis, & vaginis, quarum
incisio convulsionis caussa fuit,
(ut in aliis experimentis fere
semper observavi.) qua sedata,
vulneribus modo dexterum,
modo sinistrum Tendinem irri-
tavi; & canis modo vehemen-
ter ululabat, modo non.

71. Exp. iv. Ejusdem canis,
(in quo exp. v. 10. institui.)
perfecte cruris posterioris fini-
stri Chordam magnam nudavi,
cujus externam superficiem vi-
trioli oleo madefeci , & cul-
trum per aliquot lineas in eam
influxi absque ullo doloris si-
gno; at quum cultro profun-
dius Chordam abradebam, ca-
nis fortiter ululare , atque se
jactare incœpit, quod tentamen
sæpius pari cum eventu insti-
tu-

tutum fuit. Chordam autem semiabscissam magna vi distendi cum animalis gravissimo dolore; cuius ratio optime a Garrengotio (a) affertur.

72. Exp. v. Posteaquam (exp. III. 36.) duram Meningem vervecis sensibilem observavi, illius Achilleum Tendinem cruris posterioris sinistri vagina expoliatum fauciavi, vulnusque vitrioli oleo attigi; quo facto vexerit totius corporis succussionibus sentire demonstravit. Totum postea Tendinem scidi cum animalis gravioribus ululatibus.

73. Exp. vi. Canis (exp. VII. 12. ipsis viris jam adstantibus.) Achilleum Tendinem cruris po-

ste-

(a) T. 3. art. I. chap. VII. Des plaies des Tendons c. 262.

sterioris dexteri a vagina Ber-
tossius perfecte detexit nullis
sensus signis. Illum vero sau-
ciavi in parte postica per tres
lineas cum canis ululatibus: ite-
rum duobus aliis in locis pu-
pugi sine sensu; at post aliquot
minuta vix cultrum in ipsum
Tendinem inflixi, ac statim
canis crus contraxit: Quod ex-
perimentum alia vice pari cum
successu institui.

74. Exp. vii. Solerter nuda-
vi Achilleum Tendinem cruris
posterioris sinistri canis (exp.
v. 22.) ac statim illum per
longum aperui; post aliquot
minuta ipsius Tendinis inter-
nam substantiam vellicavi, pu-
pugi, & abscidi; quibus irri-
tationibus animal signa acutif-
fi-

simi doloris perspicue dedit; quare adstantes Viri uno ore Tendinem sensibilem esse, quamvis vagina nudatum, dixerunt.

75. Placet extremo loco Sanctetis Zarini (*a*) Chirurgi Experientissimi observationem addere: Hæc sunt illius verba: *Dalla parte posteriore, cioè verso il calcagno pendeva, e stava fuori della ferita una non picciola porzione di tendine d' Achille, il quale da me più volte tentato per tirarlo fuora, non fù mai possibile per il dolore, che vi si rivegliaava.*

76. Ex his igitur colligere potes Tendines sentire; quod jam cognitum fuit Hippocrati

(a) *Alcune ragioni della cura fatta nella Città di Prato di una ferita nella corda magna. p. 10. Stampata in Luca l' anno 1718.*

ti (a) Galeno (b); qui quamvis videatur lib. 3. de fac. alim. sibi contradicere, ut Brasavolus deceptus est; revera Tendines exquisitissimi sensus ipse Gallenus cognovit; quod a Fallopio (c) optime demonstratur: Hoc etiam cognitum fuit Joanni a Vigo, (d), Paræo (e), Guidoni Cauliaco (f), Togaultio (g), Teodorico (h), Pecchetto (i), Magato (l), qui ait *Tendo absque periculo traici non*

po-

- (a) *Epidem. lib. 5.*
- (b) *L. 1. de motu muscul:*
- (c) *T. 1. cap. 10. c. 150. De part. simil.*
- (d) *Pract. aplic. lib. 1. c. 4. & 5.*
- (e) *De recent. & cruent. singul. part. vuln. l. 10. Femor. & crur. vuln. cap. 36.*
- (f) *Ars Chirur. tract. 1. d. 1. De unat. nerv. & chord. cap. 3.*
- (g) *Instit. Chirurg. lib. 2. De vuln. nerv. & tend. cap. 13.*
- (h) *Chirurg. l. 1. de vuln. liga. & chord. cap. 18.*
- (i) *L. 2. De vuln. nerv. & tend. cap. 45.*
- (l) *De rara med. vuln. l. 2. De vuln. in genere l. 1. cap. 59.*

poteſt. Dolæo [a], Elia Colio de Vilarſis [b], Marchetto [c], qui docet non esse ſecandos Tendines; quia ut idem ait, *ego obſervavi a quibusdam Barbitonſoribus eſſe conſutos, ſecuta convulſione, & morte patientium.* Heiſtero [d] demum, Fayæo [e], Garengeotio [f], Boerhaavio, Vanſvietenio [g], Acrelio [h], Quesnayo [i].

77. Obijcere tamen non debes cum Preclarissimo Hallero; quod antiquis Auctoribus de hac re fides danda non fit, cum il-

(a) Encyclope. Chirurg. rat. l. 5. cap. 2. De inflam.

(b) T. 3. chap. 8. des plaies des tendons c. 209.

(c) Obs. cit. Obs. 63. c. 144.

(d) Instit. Chirurg. c. 423., & anno 1739.

(e) Chirurg. de Dion. derniere edition c. 880.

(f) Operat. de chirurg. T. 3. ch. 7.

(g) T. 1. n. 163.

(h) Om. Frif-Kafor c. 261.

(i) De la ſuppurat. c. 222.

illi nomina Nervorum , & Chordarum , seu Tendinum confudissent ; sed hoc falsum est , ubi precipue de his rebus illi egerunt : Nam Gallenus de Nervorum dissectione verba faciens , istos cum Tendinibus non confudit , & ubi de Tendine agit , hunc a nervo distinguit ; & loquens de utilitate particularum , ait , *Chordam de Nervis una cum paniculis confitam esse.* Porro Joannes a Vigo (a) optime distinxit Tendines a Nervis , ait enim . *Tenantes , seu Chordæ sunt media inter ligamentum , & Nervum .* Quod confirmatur a Teodorico (b , Togaultio (c) , Cauliaco (d) , & Peccetto (e) , aliisque .

(a) Loc. citat.

(b) (c) (d) (e) Locis citat.

que. Quare antiquis Auctori-
bus de hac re fidem præstare
potes, quia, optime distinx-
runt Tendines a Nervis.

78. De ligamentis vero ex-
perimenta, & verba facere inu-
tile existimavi, dum jam omnes
antiqui, atque recentes Aucto-
res hæc insensibilia credunt,
inter quos recensentur a Cru-
ce (a), de Vigo (b), Paræus (c),
Cauliacus (d), Theodoricus (e),
Fallopious (f), Peccettus (g),

E Hie-

(a) *De præfig. mod. in nervis sauciatis. cap. 5. c. 81.*

(b) *L. I. c. 5. De ligamentis.*

(c) *Specialior inquist. in par. muscul. quamlibet cap. 10.*

c. 73. , & l. 5. De muscul. os. &c. anato.

De cervi: & partib. ipsius cap. 16. c. 155.

& de ligam. vuln. cap. 40. c. 322.

(d) *Tract. I. doc. I. de anat. nervor. & ligam.*

&c. cap. 3.

(e) *L. I. De vuln. ligam. &c. cap. 18.*

(f) *T. I. De cartilag. &c. cap. 5. c. 133. & cap. 9.*

(g) *L. 2. De vuln. nervor. prognostico cap. 45. &*

cap. 51.

Hieronymus Aquapendes (*a*),
Barbetta (*b*), Togaultius (*c*),
Mangettus (*d*), aliquique, quo-
rum nomina brevitatis cauſſa
relinquo.

79. Habes cur nondum fa-
tis mihi persuadere potuerim,
ut in diversam a recepta sen-
tentiam traducar.

80. Profecto excusatum me
habebis, si ad ea, quæ a me
de experimentis in ranis, &
piscibus tanta diligentia, & fo-
lertia a Celeberrimo Hallero (*e*)
factis postulavisti, nunc non
respondeo. Maturum judicium
ab

(a) *L. 2. De vulner. cap. 12. de vuln. ligament.*
c. 97.

(b) *Pars tert. anat. prati. cap. 5. de ligament. c. 25.*

(c) *L. 2. De vuln. nerv. tend. & ligam. cap. 13.*

(d) *Tom. 4. vuln. cap. 12. de vuln. ligam.*

(e) *Deux memoires sur le mouvement du sang. &c.*
A Lufanne 1756.

ab his potius expecta, qui ætate proiecti etiam in arte, atque usu pollent. Solum tibi dicam in Halleri experimentis inter alia, tria me animadvertisse, quæ vere nova mihi fuere.

81. Primum ait Celeberimus Auctor (*a*); sanguinem arteriæ, qui intra aneurysma ob imminutum motum concrescit, a vi deinde, & impulsu cordis resolvi. Res secus se habet; nam concretiones sanguinis duræ, & polyposæ quotidie reperiuntur intra aneurysmata tam hominum viventium, quam vita defunctorum.

82. Secundo (*a*), sanguinem arteriæ post aneurysma eundem

E 2 adi-

(a) *Du mouv. du sang. arteriel chap. 3. c. 55.*

(b) *Chap. 3. c. 55., & 56.*

adipisci motum , eandemque velocitatem in arctiori arteria , quam habebat antequam ingredetur in ipsum aneurysma idem Auctor decernit . Quod est contra hydraulicas , & hydrostaticas leges , & contra experimenta multis præsentibus a nobis habita .

83. Tertio (a) tradit ; absciso in ranis corde , & sublato motu sanguinis , ranam vivere , saltare , suosque musculos exercere ; ut ego quoque in ranis observavi . Ab hoc experimento arguit laudatus Hallerus , muscularum motum sine arteriarum concursu , & sanguinis auxilio a solis nervis haberet . Hanc universalem con-

(a) *De causes du mouv. du Coeur Chap. 6. c. 163.*

conclusionem falsam ostendunt horum animalium natura ab humana tam diversa, nec non experimenta Stenonis, Gasp. Bartholini (*a*), & ea quæ & Bononiæ, & Venetiis, & Patavii ab incomparabili nostro Morgagnio, qui jure, ac merito Anatomicorum Princeps appellatur, saepius instituta fuisse.

84. In experimentis Celeberrimi Morgagnii (*b*), devicta, aut compressa arteria in canibus, ovibus, aliisque similibus viventibus animalibus, illico cessat omnis muscularum motus in cruribus posterioribus;

fo-

(a) *De nervorum usu in motu muscularum Epistola ad Quigierium Jacobæum*, quæ extat in fine ejus observationum de ranis. Parisiis 1682. c. 102.

(b) *Adversaria Anat. II. Animadversio VIII.* c. 19.

soluta, & libera redditâ arteria, protinus muscularis crurum amissus redditur motus.

85. Cæterum Halleri experimentum superius allatum novum non est; hoc enim confessum jam fuit ab Olierio Jacobæo (*a*). Hic ranas post ablatum cor integras horas vivere in aquis discursantes vidit; quod testantur Boylæus, (*b*) Gasp. Bartholinus (*c*). In aliis animalibus accidere asserit Franciscus Redius, nempe in viperâ (*d*), & in pisce torpedine

(a) *Observationes de ranis.* Cap. 3. *Anat. ranarum*, c. 34.

(b) *Exercitationes circa utilitatem philosophiae naturalis experimentalis propositæ a Roberto Boyle Genevae 1654.*

Pars 2. exercitatio 1. c. 113. § 22.

(c) *Epist. citat. c. 89.*

(d) *Lettera sopra alcune opposizioni fatte alle sue osservazioni intorno alle vipere.* T. 2. p. 77. Venezia 1711.

ne (a), qui per tres horas continuas, demto corde, non desit manifestare evidentissima signa motus, & sensus, quibus ultimo cauda destituebatur, & aliam torpedinem ante multas horas mortuam, & frigore constrictam movere caudam vidisse testatur. Similia phænomena egomet anatomica sectione in sex lacertis conspexi. Id tamen mirum non est, quoniam lumbrici terrestres, ut sæpe expertus sum, per menses, & menses sine capite, & corde vivunt, & mouentur; imo partes abscissæ feruminantur, & consolidantur, nec non abscissas scolopendrias per dies moveri progress.

(e) T. z. p. 43. *Esperienze intorno a cose naturali.*

gressivo motu, uti etiam cochleas nudas observavi.

86. Si aliquid imposterum de his adnotabo, tibi scribam. Achillis Tendinis iconem subjicio, ut $\alphaυτοψία$ nervosas ejus propagationes videoas. Vale, &

*Qua potes excusa, nec amici
desere causam,*

Nam

... εγών ἐρέων ὡς μοὶ δοκεῖ εἶναι ἄριστα.

Dabam Patavii v. Id. Decembr.

CICICICLVI.

TA-

TABULÆ EXPLICATIO

Pars posterior Tendinis Achillis
cruris sinistri hominis
exprimitur.

1. Portio musculi gastrocnemii.
2. Portio musculi solæi 3.3. Ten-
do Achillis. 4. 4. Ejus vagina de-
ducta, ut videantur nervi. 5. 5
Nervus ischiaticus cruralis inter-
nus. 6 ejus ramus musculum ga-
strocnemium ingrediens. 7.7.7.7.
alii ejusdem nervi rami. 8 Ner-
vus, qui ut appareat, partem
musculi gastrocnemii abscindere o-
pus fuit. 9 istius unus ramus dex-
ter. 10 ramusculus, qui dat Ten-
dini 11 duo filamenta nervea. 12

F

Ra-

Ramusculus alter, qui duobus filamentis 13 pariter intrat Tendinem. 14. 14 Ramus sinister nervi 9 concedens Tendinis substantiae duo ramusculos 15. Hic 16 a nervo ischiatico egrediuntur duo rami, quorum ramus 17 in alios subdivisus vaginam contexit, unoque uervoso filamento unitur cum 18 ramusculo nervi 19 qui dividitur in tres ramos, quorum unus 20 in 21 duos ramusculos facit, nempe 22, qui sex filamentis 23. 24 penetrat Tendinem. 25 est secundus ramus concedens Tendini quinque nervosa filamenta 26. Secundus ramus 27 nervi 19, qui solum simpli- ci divisione permeat Tendinem in 28. Tertius ramus 29 nervi pariter 19, qui primo dividitur in

30, emittitque quattuor rami scolos 31, qui intrant Tendinem. Secundo dividitur in 32, a quo quattuor filamenta exeunt Tendinem etiam ista ingredientia. 33.







