

Institutiones medicinae legalis, vel forensis, in quibus praecipuae materiae civiles, criminales et consistoriales, secundum principia medicorum decidendae ... traduntur ... / [Hermann Friedrich Teichmeyer].

Contributors

Teichmeyer, Hermann Friedrich, 1685-1744

Publication/Creation

Jena : J.H. Schulz, 1751.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/epb7wayz>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

C. XVI.

18/t

50858/B

7 B. ⑦

18788

7/11 2
M. F. Pears
9/07

angefangen d. 5ten May 1751 bij H. Rath Kadornid
begrieff d. 16ten Oct. 1751.

Collegium angefangen bij H. Dr. Schröder im Nov. 1752
begrieff d. 26 Martij 1753.

J. J. Hartert
Gene compari
d. 5ten May 1751.
pro 14 pp.

HERM. FRIDERICI TEICHMEYERI, ¹⁸¹⁸

HEREDITARIUM IN CAMSDORF ET WENIGENIENAE
PHIL. ET MED. D. ANATOMIAE, CHIRURCHIAE ET BOTANICES P. P. O.
SERENISS. SAXON. DVC. VINAR. ET ISENAC. CONSIL. AVLIC. ET
ARCHIATRI ACADEM. NATVR. CVRIOS. IMPERIAL. LEOPOLD.
CAROLINAE ET REG. S. S. BORVS. SODALIS


INSTITVTIONES
MEDICINAE
LEGALIS

VEL
FORENSIS,

IN QVIBVS
PRAECIPVAE MATERIAE CIVILES, CRIMINALES ET
CONSISTORIALES, SECVNDVM PRINCIPIA MEDICORVM
DECIDENDAE, EX RECENTISSIMIS ATQVE OPTIMIS
EORVM HYPOTHESISVS ERVTAE,
TRADVNTVR,

IN VSVM AVDITORII SVI.

CVM INDICIBVS
EDITIO QVARTA, PRIORI MVLTQ EMENDATIO.



IENAE,
SVMTIBVS IOH. HENR. SCHVLZII.

MDCCL

HERM. FRIEDLICH TROCHMAYER

HEREDITARIUM IN CAMBODIA ET WHICKHAMIA
PHIL. ET MED. D. ANATOMICAE, CHIRURGICAE ET BOTANICAE P. 1. 0.
FARMACEUTICA, DVM. VIVAS. ET ILLUM. CONGR. TYING. ET
ANATOMIA ACUTUM. NATIV. CURIOS. IMMERIAL. ITIEND.
CAROLUS ET REGES. BONIS. SOBALS

INSTITUTIONES
MEDICINAE
LEGALIS

VEL

FORENSIS

IN QUIBUS

PRAECEPTAE MATERIAE CIVILES, CRIMINALES ET
CONSTITUTIONES, SEQUENDUM PRINCIPIA MEDICORUM
DECIDENDAE, EX RECENTISSIMIS AUCTORITATIBUS
FORVM HYPOTHESIS ERVAE,
TRADUNTUR,

IN VSVM AUDITORIUM SVL

CVM INDICIBUS

LIBRIS QVATVOR, IMMO VINCULO BINDATIS



RECEIVED
JAN 18 1891
WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY



PRAEFATIO

AD

LECTOREM.




ffero TIBI Honoratissime Lector, Institutiones meas Medicinae Legalis, in usum auditorum ante elaboratas, & praelectionibus, quibus eas illustravi, saepius iteratis, ansam praebentibus, ad hanc, quae publicum videre non veretur, formam tandem deductas. Praecipua in illis invenies argumenta, quorum in foro civili, criminali ecclesiasticoque occurrentium decisio a Medi-

Medicorum pendet effatis. Quicquid etiam ad resolutionem casuum, huc spectantium, medicam pertinere videbatur, secundum principia physica speciatim physiologica, anatomica, pathologica, chirurgica & chymica, & ea quidem, quæ præ reliquis vera & tuta merito judicari persuasus sum, expositum est. Ea vero, quæ mere juridica sunt, ne in iis, qui nimis curiosi falcem in alienam immittunt messem, censerer, Jctis reliqui. Si in uno vel altero error forte irreperit, cogites velim materiæ, in qua occupatus fui, indolem, ita nonnunquam comparatam, adeoque in profundum abstrusam, ut vel oculatissimus Argus in ea coecutire possit, lapsibusque commissis veniam impertiaris, quam eo certius abs TE mihi polliceor, quo pauciora hujus generis scripta a majoribus ad nos transmissa sunt. Vale.



CAP.



CAP. I.

DE

AETATVM DIVISIONE.

I. Qu. *An doctrina de aetatibus in Medicina legali pertractanda sit, & quare?*



Multa de aetate, ejusque divisione, apud Juris peritos, in distinctione aetatum humanarum rite constituenda sollicitos, in controversiam vocantur, sc. 1) ratione aptitudinis generandi & concipiendi. 2.) variorum actuum civilium sustinendorum, testamenti conficiendi, tutelae cessationis, tormentorum sustinendorum. Vid. de hoc casum in ff. *Medico-legalibus* celeberrimi VALENTINI, *Sect. I. Casu III.* ubi de constitutione & viribus adolescentis, fidiculis subijciendi, agitur, quo in casu *Timaeus* a GVLDENKLEE respondet: si justam & sanam staturam possideat. Igitur aetatum cognitio Jctis est necessaria, eaque a physicis & Medicis petenda, idque

eo potissimum nomine, quoniam de corporis & animi mutatione, quibus ætatum disparitas innititur, hi primario iudicium ferre possunt.

2. Qu. Quid sit ætas?

Ætas non est temporis mensura, a nativitate ad obitum hominis decurrens. Hæc enim definitio iusto est generalior, nihilque aliud, quam vitæ tempus, innuit, nec singulares, vel particulares ætates determinat. Sed ætas potius est quævis vitæ periodus, sive spatium, quo corporis & animi vires per se suamque naturam evidenter mutantur. Hæc ætas septimo quovis anno aliud accipit nomen, quia tum sit temperamenti in nobis notabilis transmutatio. Ter septima enim hebdomade infantis motus in utero percipitur, in sexies septima hebdomade partus fit exclusio, septimo mense incipit infans dentire, septimo anno prima infantia ætas clauditur, dentesque decidunt, decimo quarto anno in sexu foemino plerumque menses erumpunt &c. Hinc veteres ex hac observatione concludebant, numerum septenarium constituere climactericum fatalem, seu Decretorium.

3. Qu. Quomodo ætates dividantur?

Ratione divisionis scriptores in discernendis & determinandis hominum ætatibus in varias abeunt sententias. Alii enim duo, 4. 5. 6. vel septem, alii plures, alii pauciores articulos constituunt. Sed congrue, si mihi, quod sentio, dicendum, magis agere videntur, qui sex tantum sibi concipiunt. Tot enim mutationes sunt sensibiles animi & corporis, eorumque potentiarum. Istæ vero sunt I. *Infantia*, II. *Pueritia*, III. *Adolescentia*, IV. *Juventus*, V. *virilis ætas*, VI. *Senectus*, VI. *Ætas decrepita*.

Vulgo quidem annorum dimensione ac enumeratione

tione apud Ictos ætatum limites determinantur, in quo etiam acquiescendum, ut Imperator *Inst. Quibus modis tutela finitur. Tit 22. lib. 1.* sancit, hanc tamen cum cautela, ut in ætatibus determinandis semper mutationum, constitutionum & functionum naturalium magis ratio habeatur. Quotidiana enim id ipsum demonstrat ac comprobatur observatio, aliis citius, aliis tardius pubescenibus & senescentibus, citius sapientibus, iterumque desipientibus. Hinc & in numero septenario, supra allegato, non est absoluta semper & necessaria fatalitas. Vide Celeb. HOFFMANNI *Dissert. de annorum climactericorum rationali & medica applicatione, §. 12.*

4. Qu. Quid sit Infantia?

Infantia est ætas illa tenerior, a prima hominis, in lucem nati, origine ad tempus illud se protrahens, quo promte homo & expedite loqui discit, vel incipit, unde infans dicitur, qui fari nondum potest, linguave uti tantum quodammodo didicit. Unde ætati huic proprium & naturale est balbutire. *L. mulier ff. de verborum obligation. § Pupillus vers. Quod diximus Institut. de inutil. stipulat. L. fin ff. rem pupill. sal. for. BALD. in L. donatarum C. de acquirend. & retinend. Possess. ALBERIC. in Diction. in voc. infans.* Vel qui minor est septem annis. *L. 18. C. de jur. de lib. L. 14. ff. de Sponsal. L. 1. §. 2. ff. de administr. tut.* Infantes itaque cum fari non possint, vel expedite loqui, intellectus etiam non sunt capaces. Si etiam quidam infantes expedita loquela non destituantur, quia tamen negotia, præsertim civilia, eorumque vim non perspiciunt, hinc loqui non censentur. Nemo enim dicere existimandus est, qui quod dicit, non sentit, nec mente agit. *L. 7. §. 2. ff. de supellest. legat.* In juris igitur negotiis gerendis infans

furioso comparatur, quanquam utriusque iudicium multum a se invicem differat. Infantis quippe ratio quidem immatura est, sed sana adhuc, vitioque nondum corrupta, cum vitium non sit, quod ex communi lege naturæ proficiscitur. At furiosi ratio matura quidem est, sed vitiosa, & non sana. Hinc, etsi infans quoque negotium gerere nullum possit, nonnullas tamen præ furioso præcipuas in jure prærogativas habet. Vid. ZACCHIAS, *Quæst. Med. Legal. lib. I. Tit. I. Qu. III. n. 16. v. 9.* ubi singula sunt recensita.

5. Qu. Quid sit Pueritia?

Pueritia, seu pupillaris, ut vocatur *L. fin. §. 2. ff. de verb. oblig.* aut impuberum ætas, est tempus illud, a prima hominis nativitate in masculis ad annum usque 14. in femellis vero ad annum 12. sese extendens. Distinguitur hæc ætas in duo spatia æqualia, duove septennia, quorum prius infantia dicitur, posterius in duas rursus partes æquales dividitur, in duo scilicet $3\frac{1}{2}$ f. tripartialia cum dimidio, quorum prius infantia, posterius pubertati proximum appellatur.

Pueri æque ac infantes a Jctis furiosis æquiparantur, i. e. quicquid boni agunt, casu tantum agunt. *L. ultima in fin. ff. de administrat. tut.* MENOCHIVS, *Consult. 82 n. 207. vol. I.* Unde actus, ab ipsis editi, non sunt validi. Quamobrem nec testamentum eis condere licet. DEC. *in l. si frater C. qui testam. fac. poss. n. 3.* nec testimonium commode dicere possunt. *arg. §. 10. Inst. ne inutil. Stip.* WESENBEC. *ad tit. ff. de testib. n. 3.*

Hæc tamen, comparatio non est adæquata. Nam obtinet tantum, quando sola voluntate pupilli actus geritur, vel quando agitur de eo obligando. Ubi enim alius se pupillo obligat, valet, lege, & alterius voluntate, pupilli pfectum supplente. *pr. Inst. de auct. tut.*

6. Qu. Quid sit Pubertas?

pubertas est vitæ illud spatium, in quo primum pube in pudendis, & lanugine in mento erumpente, ad generandum homo aptus evadit. Dicitur etiam hæc ætas Adolescentia (quæ quidem strictiori in significato incipit anno 18. duratque ad annum usque 25.) vel Aetas potius discretionis, quia pueri rationis & iudicii videntur redditæ participes. Ut plurimum hæc ætas, secundum JCTorum & LL. harumque moderatorum sententiam, in masculis decimo quarto anno, in femellis vero XIImo incipit, juxta *Instit. Tit. 22. lib. I.* Sed profecto ætas hæc in femellis nimis præcox videtur. Nam puella concipere nequit prius, quam menstrua patiatur. Experientia vero docet, femellarum vix centesimam anno XIV. purificationem sustinere, teste HIPPOCRATE, *de Genitura* §. 4. MERCVRIALI, *de morbis mulierum lib. 4. c. 1.* LAVRENTIO, *in Anatomia lib. I. qu. 8.* BOHNIO, *in Circul. Anatom. Progymnas. XVI. p. 242. & seq.* ORTLOBIO. *in Historia partium dissertat. 19. §. 9. 10.*

Pati ratione de pubertate masculorum dubitare vel inde licet, quod Medici anno jam decimo quarto puberes masculos absolute pronunciare haud possunt. Sunt enim, si qui sunt, pauci, qui anno hocce pubescunt; plures, qui sexto demum ac decimo anno, immo etiam paulo nonnunquam tardius ad pubertatem maturiores evadunt.

Verum, ut cuncta ita se habeant, dubium hinc tamen JCTis relinquitur, quibus signis potissimum dignosci pubertas possit. Argumenta enim, quæ HOSTIENSIS, *lib. IV. de desponsatione impuberum. n. 5. & 7.* affert, ætate scil. XIV. aut XV. pilos, in pudendis erumpentes, coeundi posse potentiam indicare, dubia profecto

sunt, & falsa partim, partim inhonesta etiam censenda. Fallit enim 1) ætas, si ad individuum respiciamus, 2) pubis eruptio. Quemadmodum vero hæc sine pubis inspectione probari nequit: ita peccaremus contra honestatem, illam admittentes, contradicentibus inprimis LL. Vid. §. 1. *Instit. Quibus modis tutela finitur*: ibi, quod in feminis antiquis impudicum visum, hoc etiam ut ad masculos extendatur, Imperator jubet. Celeb. S T R Y - K I V S, *de Jure sensuum*, diff. 1. cap. 1. N. 56. & 57. ad probandam dijudicandamque ætatem Calendaria requirit ecclesiastica. *Kirchen Bücher*, quæ probanda annorum numero inserviant. His autem deficientibus & amissis, ad ocularem confugiendum inspectionem, quam Saxones etiam approbarunt *Landr. lib. 1. art. 42.* cit. PETR. HEIGIO, *Comm. Inst. ad pr. Quibus modis tutela fin.* Non tamen partium secretiorum inspectio hac ratione probatur; quæ an apud Romanos unquam obtinuerit, non immerito alii dubitant, sed & vultus & corporis vigor potius hoc casu judicium suppeditabunt. Denique 3) coeundi potentia fallax pariter est, atque ejus probatio minus honesta & casta esse videtur. HOSTIENSIS enim l. c. ad coeundum illum potentem judicat, *qui actu coit, semenque emittit.* Hinc pubertas jure civili ex annis, jure Canonico ex potestate generandi æstimatur.

Prudentius itaque, simulque castius agunt, qui, præter ætatem, ad insignem illam corporis mutationem respiciunt, cum corpora ad evidentem illam proceritatem & magnitudinem evehuntur, membra ad soliditatem crassitiemque perveniunt, vox acuta in gravio-rem abit, tandemque, cum mores simul hominum mutantur, ut prudentiæ aliquid videantur præ se ferre.

7. Qu. *Quid sit Juventus?*

Juventus, seu virilis ætas dicitur, quando post annum XXI. jure Saxonico, (civili vero XXV.) corpus sibi debitum incrementum cepit, vigorque adeo virilis completur, i. e. non corporis solum, sed & animi vires augentur. Unde etiam firma, integra, robusta, aut plena & adulta ætas vocatur. In hac ætate homo omnia rite & recte agere potest, & publica administrare negotia, rerumque gerendarum curam suscipere, tueri ac persequi.

Nonnullis quidem Philosophorum pariter ac Medicorum juvenus & virilis ætas distinctæ sunt ætates: At, quoniam leges inter unam alteramque non distinguunt, sed utramque inter se confundunt, Medicorum hæc distinctio hic non est attendenda. Neque enim apud JCtos quicquam est, quod juventuti cum virili ætate commune non sit. Aetas autem juvenilis Medicis antiquis, ratione temperamenti, vocatur calidissima. Calidissimi enim sunt juvenes, secundum GALENUM, *comment. 2. de morbis vulg. tex 78.* Virilis ætas, summo vigori succedens, etiam consistens dicitur, quia calor in eodem statu, in quo constitutus in juventute erat, permanere & consistere videtur, ita, ut homo in priori pulchritudine, ac prioribus corporis viribus conspiciatur. Interim tamen vires coporis in consistente ætate revera imminuuntur, sed non adeo notabili discrimine, & sine sensu. Hinc juventutem cum ætate, consistentem autem ætatem cum autumno comparare solent.

8. Qu. *Quid sit Senectus?*

Ætatem virilem & consistentem necessario excipit senectus, utpote quæ ætas illa est, in qua vires magis magisque in dies imminuuntur. Manifesta enim
virium

virium declinatio & roboris degeneratio in senectute incipit; cui diversa juris contingunt beneficia, v. g. 1) senioribus magis confidendum testibus, quam junioribus, 2) nulli tormentorum generi subiciuntur, & si subiciuntur, illorum tamen confessio, in tortura facta, illis non præjudicat. V. MASCARD. *conclus.* 1285. Et FARINACIUS, in *quæstion. Criminal. qu.* 41. n. 25. inquit: non posse torqueri, nec terri etiam, quamvis LAVTEZB. ad tit. ff. de quæst. in S. statuatur, etiam decrepitos terri posse, arg. L. 1. §. 33. ad Sctum Sil. 3.) in delictis mitius puniuntur, notante FARINACIO, in *praxi Crimin. lib. I. tom. I. parte II. concl.* 25. 4.) ab oneribus personalibus excusantur, v. g. tutela, sic major septuaginta annis a tutela & cura se potest excusare; *Instit. lib. I. Tit. XXV. de excusat. tut. vel curat.* §. 13. 5) in dignitatibus conferendis seniores semper præferuntur.

Est autem hæc ætas media intra annum L. & LXX. ubi vires hominis manifeste imminuuntur. Sed & termini ætatis hujus variare possunt. Nam senectus a morbis, curis, diætâ ac laboribus evidentissime acceleratur & retardatur, adeo ut etiam difficillimum sit, terminum vitæ ultimum præscribere. MENOCHIVS, *l. c.* Nihilominus, cum senectutis formalitas sit viciū defectus, & qui vires habet integras, senex dici nequeat, iudicis arbitrio de senectute judicare relinquitur, secundum MENOCHIVM & MASCARDVM, *lo. cit.* Circumstantiæ igitur & hic jus variant, vel potius applicationem juris v. g. Sexagenarius, corporis & animi viribus perfecte instructus, senex dici non potest, & vice versa vir quinquaginta annis minor, qui defectum virium tam corporis, quam animi, sentit, senex pronunciandus. Juvenes enim maturis senescere posse, experientia constat. Unde recte CARPZ. q. 118. statuit,

tuit, in tortura dictanda non tam annos, quam coporis vigorem spectandum. Hinc, quando quaritur; an senes generare, & concipere valeant? Resp. marem ultra annum sexagesimum ad generandum, feminam vero ultra 50 ad concipiendum inhabilem fieri, & exempla illa, quæ a variis allegantur,, (v.g. a CODRONCHIO, in *Methodo testificandi*, thes. 16. & SCHENCKIO, in *Observat.* p. 558. VALERIOLA, in *Locis Commun.* lib. I. c. 18. & FELICEPLATERO, in *Quæstion. paradoxis.* n. 38.) marium ac foeminarum, tardius adhuc generantium ac parientium, rariora tamen sunt, & LL. sese non applicant. Vnde etiam Imperator, *L. si major quinquagenaria Cod. de legitimis heredibus*, partum quinquagenarium quidem legitimum, sed mirabilem, appellat. Et quamvis pro feminis vetulis adduci queat, quod, præter mensium per ætatem cessationem, non necessario ad concipiendum inhabiles sint, cum experientia teste, plurimæ, quæ non menstruuntur, conceperint, ut ex SENNERTO, in *Praxi lib. IV. sect. II. c. 1.* & a GVLDENKLEE, *lib. IV. c. 7.* videre est: Regeri tamen hisce debet, quod, quando foemina, ad concipiendum inhabiles alioquin, concipiunt, (deficientibus nimirum mensibus,) hoc aliter fieri non possit, quam per miraculum, uti de Sara & Elisabeth sacra testantur litteræ.

Quod si proinde ex GALENO, *lib. I. de Sanitate tuenda*, c. 8. senectutem in tres, aut secundum alios, v.g. eundem GALENUM, & HIPPOCRATEM, *sect. I. Aphor. 13.* in duas partes dividamus: Priorem ad generandum & concipiendum habilem, alteram, binas-ut reliquas, secundum ordinarium naturæ cursum, functionibus hisce inhabiles & minus adæquatas censemus. FORT. FIDELIS, *de Relation. Medicis, Lib. 3. c. 9.*

Hæc senectutis divisio quæstionem movet: *an senes inter infirmos censendi sint?* cum senectus adjunctum naturale corporis sit, infirmitas vero præter naturam existat. Negat hoc, inter alios, MENOCHIVS, *Casu* 60. ad stipulante ipsi HIPPOCRATE, *Seci. I. Aphor.* 39. Nam affectus illi, aliis ætatibus præternaturales dicti, senibus sunt naturales, v. g. 1) dentium adfectus. 2) pituitæ abundantia. 3) appetitus imminutus. 4) somnus & parvus & turbulentus 5) rubor oculorum. 6) pruritus in superficie corporis. 7) obstructio, vel incontinentia urinæ. Alii affirmant, quorum argumenta ZACCHIAS affert, *lib. I. tit. I. qu. 10.* Legi meretur B. SCHELHAMMERI *Dissertat. de Morbis ætatum.* Si itaque dicendum, quod res est, in senio constituti quidem sint infirmi quoad corpus; sed non statim quoad rationis usum. Quando vero sensibus internis destituuntur, ad actus etiam civiles inhabiles redduntur. Unde WESENBECIVS, *ad Inst. de donat. inter vivos* ait: ob senectutem senem res suas donare non prohiberi, nisi talis sit senectus, quæ sensum aufert.

9. Qu. Quid sit ætas decrepita?

Ex his adeo patet, quod ætas decrepita, quam ab anno 70. usque ad vitæ terminum extendunt, & quæ tertiam quasi partem senectutis constituit, ea tantum vitæ pars sit, ubi non solum corporis vires cessant, sed & animus vigorem suum amittit.



CAP. II.

DE

PRIMOGENITIS.

1. Qu. *Quis dicatur primogenitus?*

Primogeniti nomen medice magis referri ad eum potest, qui primum concipitur, quam ad eum, qui primum nascitur. Nam genitus dicitur foetus, cum in utero conceptus est. Apud JCros vero Primogenitus dicitur is, qui primum natus est, vel utero exclusus.

2. Qu. *An possibile sit, posterius conceptum prius nasci, & contra?*

Utique hoc rationi non refragatur, ex gemellis, quem mater primo conceperat, posterius nasci potuisse, & contra. Idque variis ex causis potest contingere, nimirum 1) ex situ in utero. 2) ex priori ad partum adaptatione *wenn der eine für dem andern sich zu erst wendet.* 3) ex majori, vel minori robore, dum unus gemellorum præ altero semper robustior deprehenditur. Vid. MAVRICEAV, *des femmes grosses, livre 2. Chapit. 24.* 4) unus gemellorum in utero perfecte sanus est, alter, v. g. primum conceptus, in utero a morbo afficitur, adeoque debilitatur. Foetus enim in utero materno non minus, quam extra uterum morbis est obnoxius, unde & partus ejus necessario retardatur. At unius gemellorum agritudo non necessario alteri communicatur, quemadmodum nonnulli Medicorum arbitrantur. Nam duplici gaudent ut plurimum gemelli Placenta uterina, rarius, imo rarissime una. Vid. D. a DEVENTER, in libro *Neues Hebammen-Licht, Cap. 44.* MAVRICEAV, *l. c.* & alios. Primogenitus porro

porro dicitur, qui primum perfecte & totus natus est, non qui hanc illamve tantum corporis partem ex utero protrudit, ut brachium, aut crus. TIRAQVELLVS, *de Jure primogenituræ*, l. 1. n. 8. Et adducitur huc sacer textus *Genes. c. 38* de gemellis, quos Thamar, Judæ nurus, edidit, quorum is, qui Sera vocatus est, prior manum protulit, posterior vero natus est. Unde non ille, sed Phares, prior natus, primogenituram est consecutus. Prior enim natus jura primogenituræ consequitur, non prior conceptus TIRAQ. l. c. num. 9.

Prior natus a Jureconsultis ex hac ratione pro Primogenito habetur, quoniam, (teste HIPPOCRATE, *lib. de natura pueror. num. 38.* & MASCARDO, *de probation. concl. 1146. num. 31. Vol. 3.*) conceptionis dies incerta, momentumque incertum sit, nec medicorum ullus determinare queat, quisnam ex duobus gemellis, ex uno coitu conceptis, prior sit conceptus. Cum ergo de prioritate conceptionis in dubio res ipsa remaneat; contra vero de prioritate nativitatis evidens certitudo appareat: Dicendum omnino, instituentis primogenituram mentem fuisse, ut, qui primo nascitur, pro Primogenito habeatur.

3. Qu. Quis ex gemellis in statu dubio prior natus præsumendus?

Quæstio nulla est, in cujus decisione magis variant Doctores, quam hæc; quis nempe gemellorum prior natus haberi debeat, si forte obstetricum incuria, aliove simili casu, ignoretur? Alii utrumque, alii neutrum, alii præstantiorem admittunt, alii electoni parentum, alii procerum decisione in successione imperii hujus dubii resolutionem committunt, alii ad sortem confugiunt. Plurimi, ex coniecturis decidi rem posse,

posse arbitrantur, eumque esse Primogenitum præsumunt, qui robustior, formosiorve est. TIRAQVELL. l. c. ZACHIAS, in *Quæstion. medico-legal. lib. IX. Tit. XII. Qu. 5, p. 822. & seq.* Id quod ratione roboris concedi potest, pulchritudinis autem nulla hic ratio haberi potest. Pulchritudo enim vel ex diversa vi formatrice; vel ex structura fœtus, in ovulo delitescens; vel ex imaginatione; vel alia quoque causa evenire potest. Robur vero non tantum de membrorum mole, sed & habitudine ad actiones, imprimis mentis, perficiendas est intelligendum. De robore corporis judicare potest & debet Medicus; de mentis autem, quibus quis instructus sit, viribus & aptitudine ad imperium, in arduo hoc maxime negotio, alii; imprimis, ubi de principibus gemellis sermo est, quam doctrinam egregie pertractavit celeb. COCCIVS, in *Commentario ad ZACCIAM, pagina citata*, quæ in casu necessitatis rationes decidendi quam sufficientissimas suppeditabit.

4. Qu. *Uter gemellorum, ex matris utero exsectorum, prior natus præsumendus?*

De gemellis hujusmodi dubitare nonnulli volunt, an pro natis habendi sint, cum certum sit, eos non nasci. Nasci enim ex ipsa fœtus & matris virtute contingit, matris quidem expellentis id, quod sibi oneri est, tanquam aliud ejusmodi, quod suo tempore vitam & sanitatem matris conturbat; fœtus vero exitum ex utero quærentis, ut liberiori ad vivendum aura fruatur. At hi neque matris, neque propria virtute urgente, sed per vim, & aliena manu Chirurgi quippe, ex utero materno excisi, in lucem prodeunt. Sed hæc difficultates diluuntur per ea, quæ adducit ALPHONS. de CABBANZA, lib. de partu naturali & legitimo, cap. 6. Sect. I.

num. 12. ubi foetus, ex matris utero exsectos, non minus, quam qui naturaliter nascantur, pro natis habendos esse, affirmatur.

Quando vero gemelli sectione chirurgica, inprimis in matre mortua instituta, extrahuntur, is a Chirurgo primum extrahitur, qui primum in manus incidit. Hic vero primum natus dici ideo non potest, siquidem extractio hæc soli debetur voluntati, Chirurgi scilicet, adeoque est arbitraria. Gemellorum igitur is primo dicendus est genitus, non qui primum utero exsectus fuit, sed qui nasci primum debuerat, si nati naturaliter fuissent, id est, ex collatione & comparatione virium vivacitatis, structuræ corporis majoris & melioris utriusque, controversia decidenda. Is enim, qui vivacior est altero, non primum tantum conceptus præsumitur, sed, ob vim majorem, sibi etiam primum ex utero materno viam parasse, non est incredibile.

CAP. III.

DE

NECESSARIA FOETVS EX VTERO MATRIS, IN PARTU MORTVAE, EXSECTIONE.

Cum in priori capite de Primogenitura gemellorum, utero exsectorum, egerimus, haud supervacaneum esse duxi, hancce quoque materiam, Theologis pariter ac JCtis scitu necessariam, insimul pertractare. Quotidiana enim experientia, tristissimis sane exemplis, docet, quod singulis fere annis, omnibus in locis, parturientes pereant, antequam foetum in lucem ediderint, neque vero semper constet, an foetus in utero matris mortuæ adhuc in
vita

vita superstes sit, id quod tamen interdum per signa evidentissima, motum v. g. foetus, confirmatur. Vid. DOLAE. *V. M. Encyclopæd. chirurg. lib. 4. C. V.* qui in gravida, apoplexia mortua, se altero die motum foetus percepisse testatur. Sed & adsunt exempla ubi matre mortua, foetus, propriis suis viribus, se ex ergastulo suo & mortis faucibus liberavit, & ex utero exivit. Vid. Cel. VATERI, Witteb. *Diss. de Partu hominis post mortem matris.* Ideo plerumque contingit, quod foetus vivus in utero matris mortuæ, per negligentiam adstantium, sepeliatur. Ne itaque hoc fiat, ad foetum servandum, absolute sectio matris post mortem requiritur.

1. Qu. An in corpore Juris lex reperiat
de hac materia?

Utique, & quidem *Lib. XI. Dig. Tit. 8. L. 2.* ubi lex regia, a Numa, Rege religiosissimo, data, expresse præcepit, quod mulier prægnans mortua prius, quam partus ei excidatur, non sit sepelienda, qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur. Hoc pium, justum & utile præceptum legislatoris hætenus plane, tam a Theologis, quam Jctis, imo tandem Medicis ipsis, neglectum fuit, & dolendum, quod lex illa saluberrima, humana pariter ac divina, non sanctius hodie colatur, & in praxi observatur. Cum vero Magistratus severe puniat metrices, quæ, ob negligentiam & concomitantem anxietatem, funiculum umbilicalem infantis debita ligatura non constringunt, & ita infantem interficiunt: Non video quare non puniat & illos, qui ex intermissa matris mortuæ sectione foetum, adhuc vivum, in utero materno interficiunt.

Præsens quidem tempus hancce sectionem, olim neglectam,

glectam, restituere videtur, dum legum interpretes & DD. sint in ea opinione, quod illi, qui foetus, ex matre mortua excindendum, neglexerint, eadem poena sint puniendi, quam qui alio modo ei damnum intulerint. Vid. Ill. quondam, nunc B. WILDVOGEL. noster. *Diss. de Jure empyon.*

2. Qu. *An sectio illa semper sit necessaria, & effectus optatus sperandus?*

Utique. Si enim non semper, tamen saepe servatur ita foetus. Et quamvis motus foetus non amplius percipiatur, tamen non absolute concludi potest, quod sit mortuus. Debilitatur enim a partus molestiis, & ideo motum manifestum exercere non potest foetus. Quando vero per analeptica reficitur, facta sectione, non tantum ad se redire, sed & vivus permanere valet. Dantur quidem Medici, qui, ex falsa opinione persuasi, putarunt, sectionem ejusmodi semper esse frustraneam, quoniam vita foetus in utero a vita matris absolute dependeat, hincque matre mortua, actum quoque sit de vita foetus. Sed hi non sunt audiendi: Cum certum sit, vitam foetus quidem a matre in tantum dependere, sed non in totum. Corculum enim foetus proprio suo motu gaudet, & ideo circulationem sanguinis & fluidorum, per consequens quoque vitam, ac tempus post mortem matris continuare potest, quamvis cum aliqua debilitate. Est ideo & ipse deficiens motus foetus, in utero matris mortuae inclusi, non stringens argumentum, quod hancce sectionem plane interdicere possit. Foetus enim quiescit interdum, absque ullo motu, per aliquot dies, adeo ut ipsae gravidae & peritissimi Chirurghi ac Medici, expertissimaeque obstetrices illum pro mortuo habeant, quemadmodum hoc confirmant obser-

observationes, & inter alias illa notabilis, quam DE VENTER, in scripto, cui tit. *Neues Hebammen-Licht*; C. 32. refert.

Et posito, quod effectus & exitus dubius sit, tamen, juxta NYMANNVM, in *Tr. de vita foetus in utero*, p. 57. praestat, centum praegnantia cadavera frustra incidere, quam semel permittere, ut foetus vivus in utero matris misere pereat, & suffocetur. Præterea dantur exempla, quæ felicem foetus viventis ex utero matris mortuæ exsectionem confirmant. Vid. varia talia collecta non tantum in SCHENCKII *Observationibus Med. Lib. 4. p. 664.* sed & in Cel. HEISTERI *Diss. de Ruptura uteri in partu.*

3. Qu. An certa dentur signa, quæ confirmant, gravidam revera esse mortuam?

Signa illa non quidem absolute certa sunt: interim tamen expulsus, caloris naturalis, respirationis, motus & sensus absentia desumuntur, quando enim tales circumstantiæ ad sunt, Medicus & Chirurgus, salva conscientia, operationem suscipere potest.

Objiciunt quidem & hic contradicentes, & sectionem ejusmodi dissuadentes, quod dentur exempla parturientium, quæ exantlatis gravissimis partus laboribus in suffocationes hystericas & lipothymias inciderint, hincque, pro mortuis habitæ, sepultæ fuerint. Vid. SCHENK. *l. c. obs. de uteri suffocationibus*, quo pertinet omnibus notum illud exemplum feminæ *Coloniensis*, ex tumultu re-surgens, de qua hystoria, ob rituculas circumstantias, plerique dubitant. Sic de Vesalio Bruxellensi, Anatomico & Chirurgo Cel. refert ADAMI, in *Vita VESALII*, quod hic Medicus feminam, ab utero strangulatam & suffocatam, hinc pro mortuo habitam, tertio post mortem

C

die

i. e. sumpt.

die cultro anatomico subjecerit, post ea vero illam viventem deprehenderit.

Ex his allatis vero non sequitur, nullam prorsus gravidam esse mortuam, & posito, quod interdum parituriens adhuc vivens, & ex supra allatis signis pro mortua habita, aperiatur: Tamen illa a manu Chirurghi non interficitur; instituitur enim ita sectio caesarea primi generis, nempe matre & foetu vivente, quæ operatio, etiam quando foetus vivus per vias ordinarias exitum invenire haut potest, ad foetum servandum absolute suspicienda, vi conscientia.

Talis sectio quidem a nonnullis Chirurgis, v. g. PETR. DIONISIO, in sua *Chirurgia*, absolute lethalis habetur: sed hoc falsum esse, ratio & experientia confirmat; instituit enim hancce operationem ante aliquot annos Dn. D. FROBENIVS, Medicus Kœnigseensis, amicus noster honoratissimus, felicissimo cum successu, foetumque extraxit vivum, postea vulnus abdominis & uteri consolidavit, matremque ita & foetum ex mortis faucibus eripuit. Vid. plura in Ccl. VATERI & SLEVOGTII *Diss. de Sectione caesar.* item ROVSETTI, & aliorum tractatus de hac materia. Probabile enim est, quod vasa uteri, hac operatione dissecta, brevi tempore, dum uterus in pristinum situm properat, coarctentur, coeantque, & sic amplius sanguinis effluxum non permittant. Inprimis vero talis hæmorrhagia lethalis declinatur per convenientem stypticorum applicationem.

4. Qu. Quasnam præstet utilitates hæc sectio?

Varias. 1) Conservatur integritas rei publ. & futuri cives. Melius enim est, secundum effatum sapientissimi imperato-

ratoris, ANTONINI PII, unum servare civem, quam mille occidere hostes. 2) Ita conservantur Principum legitimi successores, & sic tranquillitas publica. 3) Conservantur familiae privatae. 4) Maritus ita fieri potest haeres bonorum uxoris.

5. Qu. *An fœtus, qui septimum mensem in utero nondum superavit, quoque matre mortua sit excindendus?*

Certum quidem, & per experientiam confirmatum est, quod tales fœtus nunquam sint vivaces & vitales; hincque in vita conservari non possint; Ast quoniam pleræque tempus imprægnationis & gestationis ignorant, & sæpe diutius sunt gravidæ, quam ipsæ sciant; ideo talis sectio & hic non negligenda. Ad minimum duplex ex tali incisione fluere potest utilitas, 1) baptisimus, 2) successio legitima in bona matris.

6. Qu. *An Chirurgus & Medicus, qui eiusmodi sectionem instituit, non vero omnes ceremonias, alias in hac operatione usitatas, observat, de crimine quodam sit accusandus?*

Veteres quidem hancce operationem suscipientes, statim os matris mortuæ aperiebant, & interjectio dentibus ligno, illud apertum servabant, imo plane pudenda dilatabant mortuæ per digitos obstetricum. Putarunt enim, per eiusmodi remedia conservari posse respirationem fœtus in utero. Sed eiusmodi actus plane sunt inutiles. Fœtum enim, tunicis inclusum, non posse respirare, cer-

est, & a nemine amplius in dubium vocatur. Sufficit ideo ad hancce operationem, ut Chirurgus quam citissime abdomen gravidæ longa incisione aperiat, eo quidem in loco, in quo alias cæsarea sectio instituitur. Sunt quidem qui cruciatam commendant: Quoniam vero illa adstantibus hororem excitare potest; ideo supro allegata methodus magis præferenda. Postea uterum simili incisione, provida tamen aperire, decet, ne foetus lædatur. Foetus, per aperturam uteri extracti, funiculus umbilicalis statim ligandus, & abscindendus, & si debilis est, analeptici & spirituosius aquis, ut cinnamomi, embryonum balsamo, &c. confortandus. Vid. plura in CAROL. STEPHANI *Lib. de Dissectione corporis humani, in specie de sectione uteri.*

CAP. IV.

DE

VIRGINITATE.

De virginitate femellarum integra & violata apud Jctos & Medicos est quæstio. Vide HEINRIC. KORNMAN, *de Jure virginum*, quando scilicet aliqua virginem se jactat, coitumque hinc admissum negat, aut stupro se vitiatam profitetur, judicis hinc opem atque arbitrium implorans. Quamobrem virginitatem pertractare etiam hic necessum, operæque pretium ducimus, nec a nostro alienum instituto existimamus.

1. Qu. Quid, & quotuplex sit virginitas?

Duplex datur virginitas, moralis altera, altera physica, seu materialis. *Moralis* quidem dicitur, ubi puella
nondum

nondum cum viro rem habuit, ne ipsis digitis, nec alio quoque petulanti instrumento, nec casu, aut saltu, claustra virginalia destruxit: Tamen quamdiu amoris compressione immunis fuit, virgo dici meretur.

Corporalis, physica, seu materialis autem virginitas illa dicitur, quæ per signa materialia, ex constitutione & integritate naturali organorum desumenda, dignoscitur.

2. Qu. *An ex certis quibusdam cognosci possit virginitas?*

Insignis, tam Jctorum, quam Medicorum, est numerus, qui solliciti hactenus, fuerunt de virginitate, tum absente, tum præsentem. Unde quæritur: An certa quædam, quibus dignosci possit, virginitatis integræ, aut læsæ corruptæve signa dentur? Plerique equidem Jctorum a Medicis persuasi fuere, certissima & infallibilia virginitatis integræ ac læsæ signa & criteria constare. CVJACIVS nihilominus, *lib. XVII. observat. c. 20.* & SANCHEZ, *lib. VI. de Matrimonio Disput. 113. num. 10.* certa ac infallibilia virginitatis signa dari, negant ac pernegant, quibus ex Medicis adstipulantur quam plurimi, ut HORATIVS AVGENIVS, in *Epistolis ad Olivarium, lib. I. Tom. II.* PINÆVS, de *Notis virginitatis.* CAPIVAC. in *tract. de Signis Virginitatis.* CODRONCHIVS, in *Methodo testificandi, Cap. II.* PARÆVS de *Renunciationibus.* JOVBERTIVS, *lib. V. c. 4. errorum popularium.* IO. BAPT. SYLVATICVS, de *iis, qui morbum simulant, c. 9.* RIOLANVS, *lib. II. Anthropographiæ, cap. 38.* FORTVNATIVS FIDELIS, de *Relat. Medicis l. 3. c. 1.* RANCHINVS, de *morbis virginum, Sect. C. 4.* GVILLEMAV, *l'abuse sur le procedure de l'impuissance.* MAVRICEAV, de *morbis mulierum gravidarum,*

Et parturientium, lib. I. c. 6. BOHNIVS, de Officio Medici, Part. II, c. 6. de Renunciationum difficultate, p. 636.

Hinc non immerito de notis veris ac infallibilibus virginitatis dubitare volunt. At auctorum hac de re diffensus rei ipsius veritatem non tollit, aut destruit. Vel enim certis quibusdam signis fundatam constare virginitatem & posse existere, in sequentibus spe freti videbimus.

3. Qu. Quibus signis dignoscitur virginitas?

Variis; quorum primum est *hymen*, seu pellicula aliqua, vel carnea, vel membranacea, cervice uterino, vel hujus orificio annexa, in medio ut plurimum quo ad longitudinem perforata; quæ quamdiu extensa manet, tam diu viri accessum quodammodo difficilem reddit. Hujus hymenis existentiam nonnulli negant, alii affirmant, alii diversimode id sibi concipiunt, alii pro præternaturali plane ac monstroso id habent, V. g. RIOLANVS pro-
tensionem carneam vocat; FALLOPIVS nerveam, ex ligamentis & vinculis retiformibus congestam; BERENGARIVS, & MERCATVS, ac olim AVICENNA congestionem caruncularum dicunt myrtiformium, id quod & BARTHOLINVS, alique Anatomici affirmant. Ast carunculæ myrtiformes in virginibus intactis non reperiuntur, sed tantum in defloratis: quoniam sunt dilacerati hymenis reliquæ & vestigia; id quod, cum RIOLANO & MVNNICKIO, existimat Celeb. MORGAGNI, *Advers. anat.* 1. Inter recentiores Anatomicos est ille Chirurgus Parisinus, PETRVS DIONYSIVS, qui in *Anatomia sua, sect. II. p. m. 243. l. 2. 3.* existentiam hymenis negat, imo & in *Chirurgia sua, 1712, epita Germ. p. 273.*
Omnibus

Omniſibus vero qui hymenis exiſtentiam negant, aucto-
ritatem & ἀυτοψίαν oppoſito excellentiſſimorum ſeculi
noſtri Anatomicorum, e. g. R V Y S C H I I, in *Obſerv. Ana-
tom. Chirurg. n. 22. 23.* REGNERI de GRAFF, in tract. *de
mulierum organis, generationi inſervientibus*, SWAM-
MERDAMMII, in tract. *de uteri muliebris fabrica.* VER-
HEYNI, in *Anatomia*, p. 84. & andem HEISTERI, in
Anatomico Compendio, p. 81. & 207. Hi omnes uno ore
hymenis exiſtentiam affirmant, figuris æneis depin-
gunt, atque in liquoribus adhuc balsamicis conſervant,
& deſiderantibus oſtendunt. Inprimis autem jam lau-
datus Clariffim. HEISTERVS in puella 14. annorum
hancce pelliculam invenit, atque in *Ephemerid. Natur.
Curioſor. Cent. VII. anni 1717.* deſcribit, & celeberrim-
us Patavinus Anatomicus, Joh. Baptiſta MORGAGNI,
in *Adverſariis anatom.* p. 1. p. m. 39. edit. Patav. uſe de
hymenis exiſtentia egit, & affirmat, a celeb. Anatomico
Bononiienſi, VALSALVA, intra annum bis hoc or-
ganum deſideratiſſimum oſenſum fuiſſe publice in Thea-
tro anatomico.

Ex his adeo luculenter apparet, de hymenis exi-
ſtentia non eſſe dubitandum. An vero ſemper invenia-
tur, ego quidem non aſſeram. Ejusmodi enim mem-
brana abeſſe poteſt, ſalva virginitate mentali, & hoc
quidem 1) ob conformationem partium irregularem, a
primo nativitatſ puncto. 2) Ob membranæ hujusmodi
exiguitatem, ut ideo neque a marito, neque ab Anato-
mico attendi valeat. 3) Interdum caſu, aut libidine de-
ſtruitur. Quod vero ejusmodi membrana ab Anatomiciſ
nonnullis haud obſervata ſit, illud ab incuria eorum,
& in convenienti adminiſtratione provenit.

Secundum ſignum eſt *rugofitas & arctitudo vagi-
nae*, quæ ex eo ſe fundamento exſerit, quoniam fibræ
a men.

a mentula nunquam expansæ fuerint. Sed & hæc arctitudo variat, 1) ratione ætatis, 2) ratione temperamenti humidioris, ficcioris & libidinosisioris, 3) ratione conformationis, juxta quam sic etiam hæc inter se magnitudine & amplitudine differunt, secundum tritum illud: noscitur ex labiis, quantum sit virginis antrum, 4) ratione fluxus menstrui antecedanei, 5) ratione morborum, v. g. quando fluore laborant albo, vel in statu cachectico & cacochoymico constitutæ, aut chlorosi afficiuntur. Vid. RANCHINVS. *de Morb. Virgin. c. 5.* ZACHIAS, *L. IV. Tit. 2.* PINAEVS, *de Not. Virgin. c. 5. 6.*

Notandum vero, hanc arctitudinem ad maris cujusvis mentulam eadem ratione sese non habere. Mentularum enim crassities, forma & longitudo mirifice differt, luditque hic in specie natura. Unde adeo videre est, hanc arctitudinem 1) non semper destrui evidenter uno alteroque congressu, 2) ad pristinum redire posse tonum, fibris nempe per diutinam a venerè abstinentionem restitutis, imo, id natura non ferente, fieri hoc potest per remedia, quæ vocant, adstringentia; de quibus ex instituto etiam agit laudatus RANCHINVS, ubi in corruptæ virginitatis recuperatione alchimillam commendat, in balneo, & fotu ad mammas, item bellidem, &c. quo pertinent acida, aluminosa & vitriolica constringentia. Unde adeo nonnulli auctores, signum hoc debile & insufficiens esse, existimarunt; v. g. CODRONCHIVS. *l. c.* RODERICVS a CASTRO, in *Medico politico*, *L. IV. c. XI.* PINAEVS, *l. c.* FORT. FIDELIS, *de Ration. Med. c. IV. L. II.*

Tertium signum est caruncularum myrtiformium magnitudo, color & connexio, quod signum ZACCHIAS, egregie commendat. Illæ enim carunculæ, secundum hunc auctorem, in virginibus primo tument, & quasi inflatæ

flata sunt, in corruptis vero exiles & flaccescentes. 2) in virginibus rubent; in defloratis vero pallent, atque livore corripuntur, 3) in virginibus, intercedentibus vinculis, colligantur; in defloratis vero, seu corruptis, distracta & destructa conspiciuntur. Sed quoniam 1) eorum connexio & colligatio integra manere sub uno alteroque congressu potest, a minori inprimis mentula instituto: v. PINAEVS *cap. 5. 6* & 2) color atque magnitudo a morbis turbari & mutari potest: Ideo signum hoc auctores omnes non admittunt.

Quartum, quod ex haftenus allatis fuit, signum est *dolorosa admissio*, in primo congressu frequentissima & solennis, quae a dilaceratione partim hymenis & vinculorum, carunculas myrtiformes connectentium, provenit.

Hinc, quando quaeritur: An virgo dormiens inscia corrumpi possit atque impraegnari? Respondendum, cum Facult. Med. Lipsiensi, in ZITTMANNI *Med. Forensi, Centurio V. cas. 21. & Centuria VI. cas. 77.* credibile vix esse, virginem illibatam sine sensu in somno viri sustinere compressionem posse. *Novell. M. L. VALENTINI, Cas. I.* Facultas quidem Jurid. Jenensis possibilitatem rei affirmare haud dubitat, certis tamen conditionibus adjectis, nempe in virgine, quae 1) ad affectus soporosos inclinat, 2) vel insigniter delassata, 3) vel ex ebrietate in somnum profundum delapsa; quae conditiones quidem probe semper, ne injuria cuiquam inferatur, sunt examinandae.

Quintum signum est *sanguinis profusio*, seu cruentatio in primo statim congressu, a dilaceratione vasorum hymenis proveniens. Nec temere profecto in sacris sancitum est literis, *Deuteronom. cap. XXII.* ut virginitas vestimentorum pannorumque sanguinolentia

D

pro-

probetur. Hoc vero signo, tanquam certo, non apparente, lapitare eas sacra lex jubebat, utpote jam defloratas, seu corruptas.

Neque vero & hic desunt contradicentes; qui & signum hoc non perpetuum, nec universale pronunciant, quoniam non in omnibus puellis observetur, 1) quidem in illis, quarum genitalia laxa aliquo modo existunt; 2) in iis, quæ, falacitate pruriente affectæ, digitis, aut alio petulanti instrumento, sese sæpius fricando angustias hasce perrumpunt. 3) Si etiam observetur sanguinis hoc profluvium in coitu: Hoc tamen signum non plane infallibile suppeditat; femellæ enim dantur, quæ non in primo tantum, sed secundo, tertio, imò sexto coitu sanguinem profundunt, natura arcte nimis nempe se contrahente, aut imminentibus mensibus nuptias celebrant, ut taceam, quæ fraudibus effusionem sanguinis simulant. Utcunque tamen ista se habeant, ex Canonistis TORREBLANCA, *lib. 2. de Delictis, cap. 19. num. 3. & 4.* & FARINACIVS, in *Praxi Crimin. Qu. 14. num. 148.* cruentationem hanc pro signo præcipuo virginittis agnoverunt. Et quoniam hoc signum in sacris fundamentum est litteris, omnesque femellæ ab Eva originem ducunt, non video, quomodo virgo Germ. ab Ebraica differre possit. De cruentatione vid. JO. BENED. SINIBALDVS, in *Geneanthropia*, L. IV. tr. 2. CASP. a REYES, in *Campo Elisæo quæstion. curios. n. 39.* MELCH. SEPIZII, *de not. virgin.* LANGII, *Opera Med. part. physiolog.*

Sequentia signa revera dubia esse possunt, & dici debent, quæ desumuntur v. g. 1) *ab urina*, quæ in virginibus tenuis esse debeat, & cum sibilo excernatur, in defloratis vero crassa & turbida. 2) *color papillarum mammarum* vividus in virginibus, post coitum vero mutatus.

tus. Nam urinæ color & substantia hic nihil certi ad probandum facit; quoniam ille mirifice, pro subjectorum varietate & ad morbos inclinatione, differt. Sibilus urinæ in defloratis & integris, secundum F. FIDELM & RANCHINVM; ll. cc. quoque nihil certi probat. Nam elater Sphincteris vesicæ a coitu, qua tali, non destruitur, sed tamen, quoniam hiatus meatus urinarii cum hymene cohæret, sequitur, quod hoc dilacerato, suo modo quoque foramen meatus urinarii ampliatur, ut majori impetu & strepitu urina transire valeat; modus autem virginitem per mictionem probandi dudum jam non amplius in usu fuit. Rubedo rosea papillarum in mammis, item mammarum soliditas ab uno alterove coitu lascivisque atque voluptuosis titillationibus tam manifeste etiam defœdari non potest. Certum quidem, & rationibus anatomicis confirmatum est, quod detur uteri mammarumque commercium; Sed quomodo ex coitu, etiam aliquoties iterato, statim color papillarum mutetur, nemo Anatomicorum & Physiologorum rationibus explicare potest sufficientibus. Sunt etiam nonnulli, qui a vocis mutatione argumentari student, quando nempe vox clara in graviores mutatur; Sed, debile hoc quoque est argumentum.

Virginittatis itaque examen si instituendum sit, ad sequentia probe attendendum; 1) an inspectio hæc post congressum statim, an vero aliquandiu post illum instituatur, ubi virgo a consortio viri abstinerit. 2) An una tantum vice, an multoties insultus viri sustinuerit. Quod si igitur puella, recens violata, & quæ plures passa sit congressus, conspicienda, lustranda & examinanda venit, hæcce violatio facile patebit ex partium genitalium tumore, inflammatione ac cruentatione. Hæc vero, ut ex supra dictis constet, signa quidem sunt

virginitatis violatæ : Non tamen semper & ubique apdicanda: quemadmodum ex casu XX. ff. *Medico Legal. Cl. VALENTINI, Part. I. Sect. I.* hoc satis liquet, ubi virgo 17. annorum stupratam se fatetur, & simul affirmat, intentato stuprato sanguinis nonnihil per pudenda muliebria effluxisse. Causidicus, qui tuendam in se rei causam susceperat, duas movet quæstiones, 1) an sanguinis profluvium legitimum sit atque adequatum signum stupri violenti? 3) an masculus unicus, sine adjumento alterius intervenientis, virginem 17. annorum sine voluntate & permissione ejus violenter stuprare possit? *Facultas medicorum Lipsiensis* ad primam quidem quæstionem respondet, sanguinis profluvium per loca muliebria, in coitu vel statim post coitum in nonnullis, potissimum tamen in virginibus contingens, oriri quidem a causa violenta, ab impetuosa nempe penis rigidi in loca angustiora intrusione, minime tamen pro stupri violenti, sed pro læsæ potius virginitatis signo habendum esse. Ad secundam vero quæstionem ita comparata eorundem erat responsio, ut ex circumstantiis, quæ in actu coeundi solent concurrere, minus credibile esse, statuerent, masculum aliquem nubilem virginem (excepta impube, tenera, delicata, aut ebria simul puella, CARPZ(V. l. 2 *Consistor. d.* 238. AMMANN. *fesp. ult.*) absque ipsius consensu, permissione ac voluntate vitare, aut violento stuprare modo posse, dum feminae cuique facilius sit, si velit, penis immiſſionem recusare, aliisque multis modis impedire, quam viro, eidem invitæ plane intrudere.

Cruentatio, satis notabilis inflammatio, tumorque item, & prorsus genitalium exulceratio a stupro, maxime impuberum, contingit, eoque violento, siquidem hujusmodi vel duo mihi nota sunt exempla puellarum stuprarum, s. circiter annorum, quarum in una, ab intrusione

ne

ne violenta mentulæ, non tantum sequebantur inflammationes enormes, sed exulcerationes etiam; in altera, præter modo recensita symptomata, pedum plane paralyfis, fere incurabilis, superveniebat.

Si vero septimana jam aliquot elapsa fuerint, dubia hinc illa erit lustratio. Ubi scilicet jam tumor subside-rit, partesque dilatata denuo coaluerint. Major adhuc difficultas erit, stuprum unius tantum congressus cognoscendi, mentula exigua perpetratum; siue illud recens, siue post elapsum temporis spatium commissum sit, ubi rarius fortassis partium illarum laxitas, & coloris mutatio quam ZACCHIAS innuit, comparuerit, imo ipsum temporis spatium hoc vitium quodammodo emendare posse, incredibile non est.

4. Qu. *An, ubi de virginitate queritur, obstetricibus solis inspectio ventris sit committenda, an vero Medici ad ejusmodi investigationem præcipue sint admittendi?*

Romani negotium ventrem inspiciendi obstetricibus committebant, juxta tit. ff. de ventre inspiciendo, item Constitutio criminalis Caroli V. art. V. & juxta hunc, plures etiam Jcti & LL. interpretes, ut CARPZOV. *Prax. Crim. Part. III. qu. 112. num. 19. seqq.* MATTH. STEPHANI, in *Not. ad d. artic. 35 l. c.* obstetrices quoque, vel matronas requirunt prudentes & expertas. At hæc vix idoneæ sunt, nostrates imprimis. Nihil enim amplius sciunt, quam puerum nascentem gremio recipere, umbilicum rescindere, obligare, in balneo a sordibus abstergere, ac fasciis tandem involuere. Cum vero de structura genitalium

anatomica, earumque constitutione, vel naturali, vel præternaturali, iudicium ferre debent, enormiter hallucinantur. Perita olim credita, & jam defuncta quædam obstetrix hic aliquot abhinc annis suspectæ virginis organa lustrabat, atque coram magistratu oppidano illibatam illam atque integram pronunciabat, præterlapsis autem aliquot deinceps mensibus in musæo studiosi patris pariebat. En ergo egregiam scientiam & experientiam obstetricum: De qua dubia obstetricum scientia plura legi possunt testimonia in Celeb. BOHNII *Officio Medici* p. 560. & *seqq.* Medici proinde ad examen virginitatis primario sunt requirendi, vel soli, vel cum obstetricibus. Obstetricum enim iudicium fallax admodum ab ipsa Rota Romano, in TAVRIN. *Dissolut. matrim.* 1590. coram Platata, num. 10. pronunciatur, & ZACCH. *Q. M. L. lib. IV. Tit. 2. qu. 1.* Praxis etiam ostendit hodierna, quod Medici primario ad examen virginitatis sint admittendi; id quod GEORG. BEYERVS, Jctus, & PP. Witteb. *Delineat. Juris Crimin.* p. 59 §. XVII. confirmat, & cum primis casus, ex ZITTMANNI *Medicina Forensi.* p. 747. & 797. desumptus, testatur, quem, utpote notatu dignum, omnibus perlegendum commendo.

§. Qu. Quomodo inspectio ventris in virginitate sit suscipienda?

Personæ deponentes, ut rite suo munere fungantur, quando de puellæ alicujus virginitate agitur, affirmantis, integram adhuc se esse, atque incorruptæ & illibatæ prorsus virginitatis, ante omnia fraudes detegant oportet fictæ, sive simulatæ virginitatis, quæ aquæ frigida applicatione, & adstringentium imprimis usu facile alias promovetur. Unde ante, quam inspectioni subjiciantur, geni-

genitalia puellæ aqua tepida sunt abluenda; hinc non oculis tantum (Vid. HERTIVM, in *Dissert. de inspectione oculari*) sed & manibus genitalium habitudo accuratius explicanda & examinanda (jubente sic PACIANO, de *Probation. Lib. II. c. 2. n. 17.* & ANGELLO ARETINO, l. *Consil. 142. num. 20.*) Obstare quidem videtur Tit. ff. de *ventre inspiciendo*, L. 1. §. 10. ubi dicitur, inspicere saltem, non invita vero muliere ventrem tangere, examinanti licitum est. Alia tamen probatio est imprægnationis suspectæ, de qua L. loquitur; alia virginitatis, quæ non aspectu tantum, sed & tactu dignosci debet, PACIANO observante, l. c. adeoque lex minime huc quadrat: ut taceam, in delinquentis non esse arbitrio, tactum corporis recusare, cum iudex omnibus sensibus veritatem inquirere teneatur; Vid. STRYK, de *Jure sensuum*, *Dissert. I. cap. 1.*

6. Qu. Quanam signa sint pueri stuprati?

Stuprum non modo in puellas, virgines & viduas committitur, sed a scelestissimis hominibus, natura abutentibus, etiam in masculos patrat; FARINAC. de *Delictis carnis*, Qu. 148. quod delictum quidem, cum gravissimum sit inter omnia, jure merito condignas poenas exposcit, ut per legem cum vir C. de adulter. CLAR. lib. 5. sent. §. Sodomia, num. 1. BOS. in *Prax. crim. tit. de stupro detestando in masc.* D.D. SIMON, cap. 2. de *Impotentia Conjug.* §. 1. 2. 3. 4. ubi prolixè de sodomia agitur. In ejus autem delicti examine ut de veritate iudices certiores fiant, per Medicos & Chirurgos ipsos pueros conspiciendos curant. Stuprum in puello quinquenni a puella libidinosa XIII. an-

norum

norum, mentulam cunno intrudente, commissum. Vid. VALENTINI, in *Novell. M. L. Cas. IX. p. 235.*

Facta autem ani stupratione, qualis in Italia pro dolor! aliisque regionibus calidioribus solennis est, intertrigines sequuntur, vel excoriationes ani, ejusque inflammationes & notabiles exulcerationes, fissuræ, Rhagadix dictæ, laxitas quoque & procidentia ani, item excrefcentiæ, verrucosa cristæ, ficus, mariscæ, de quibus Poetæ jam pridem cecinerunt, ut JUVENALIS, *Satyra 2.*

Sed podice lavi

Cæduntur tumidæ, Medico ridente, mariscæ.

MARTIALIS, *Epigr. lib. 1.*

Dicemus ficus, quas scimus in arbore nasci;

Dicemus ficos, Cæciliane, tuos.

Hi morbi in Nosocomiis Incurabilium (a l' incurabile) variorum Italiæ locorum in podicibus utriusque sexus ab ani stupratione orti annotantur, excinduntur, ferroque candente adurantur; id quod & PETR. DIONYSIVS, in *Chirurgia* sua, testatur. Unde dubium non est, quin signa sint ejusmodi congressus Sodomitici; quamvis non inficiandum, ab aliis etiam causis ejusmodi quid trahere originem posse. Unde in dignoscendis ejusmodi morbis maxima cautela utendum.

7. Qu. Quo tempore virgo fit nubilis?

Cum semen aliqua ferre potest. Non autem ferre hoc potest, antequam menstrua patiatur. Hæc enim ambo uno eodemque tempore evenire solent, quia tam semen, quam menstruum, ad generationem destinavit natura, mensesque fluentes indicium præbent, mulierem tanta sanguinis copia abundare, ut & suo ipsius corpori alendo, & foetui nutriendo sufficiat; 2) Ovula, seu semen
ad

ad debitam sui pervenisse maturitatem. Mensium vero fluxus, ut alibi jam diximus, communissime decimo quarto, vel quinto anno contingit, quo tempore virgo quoque nubilis evadit. At, quæ, secundum PLATONIS consilium, *lib. 5. de Republ.* vigesimo, vel decimo octavo nubit, onera conjugii majori cum securitate & felicitate perferre poterit, ob uteri, imo totius corporis conformationem meliorem; & foetus quoque postea excludit robustiores. De conjugio instituendo ita verba fecit HESIODVS:

Junge tibi uxorem, dum firmus adhuc vigor adsit:

Annos cum numeras ter denos, plusve minusve,

Aptum est conjugium; decimo sed femina quarto,

Anno pubescit, nubat mox deinde sequenti.

8. Q. *Quo tempore nuptiæ sint instituendæ;*

Præterlapsis, post fluxum mensium, quatuordecim diebus: Cum enim, BOHNIO in primis, & BERGERO observantibus, certum sit exploratumque, fluxum mensium primario fieri ex vagina uteri; Inde per se patet, post fluxum statim mensium vias paululum esse dilatatas, adeoque ut omnis suspicio declinetur, expectandum, donec ad pristinam coarctationem partes revertantur.

CAP. V.

DE

IMPRAEGNATIONE OCCULTA.

Duo inprimis casus emergunt, ubi femina imprægnationem diffitentur; 1) ubi uxor, post divortium, ex vi-

E

ro

ro se pręgnantem negat, *L. I. §. 4. ff. de ventre inspic. 2)* cum meretrices de fœtus abolitione & infanticidio cogitant. De singulis igitur ejusmodi indiciis, quibus median-
tibus feminę ejusmodi nefarię convinci queant, Medicus
rogatur interrogaturque,

1. Qu. *An pręgnantia signa dentur certa
& infallibilia?*

JCti pariter ac Medici hac de re dubitant, an scilicet pręgnantia cognosci queat per signa quadam certa, infallibilia & evidentia; ut HIPPOCRATES, *lib. de Natura pueror. fatetur*; SYLVATICVS, *de iis, qui morbum simulant, cap. 18.* CODRONCHVS, in *Methodo testificandi, cap. 12.* FORT. FIDELIS, *de Renunciat. medicis, lib. III. Sect. 4. c. 1.* ZACCHIAS, *l. c. L. I. Tit. 3.* BOHNIVS, in *Officio Medici, part. 2. c. 6.* idque ob hanc rationem: Quoniam conceptionis signa, & signa mensium deficientium interdum sunt eadem; v. g. in appetentia, nausea, vomitus maturinus, ephelides faciei, lac in mammis. Quo etiam alia huc facientia signa, ex ipsa relatione mulierum cognoscenda, pertinent, quę tamen ab ejusmodi suspecta plerumque supprimuntur, aut silentio prætereuntur. Utut tamen res se habeat, si impręgnatio infallibiliter non omni ex parte cognoscitur, cognosci tamen potest vel probabiliter per signa inprimis sequentia, collective sumta. Certum enim est, quod in omni gravida tota œconomia viscerum, inprimis abdominis, turbetur, quod RODERICVS a CASTRO, SENNERTVS, & alii, immo omnes, qui de morbis mulierum egerunt, & gestantium symptomata tractarunt, profitentur. Ergo ex hoc statu mutato fluunt quoque certa & specifica symptomata.

2. Qu.

2. Qu. Quenam signa sunt impra-
gnantiae?

Inter signa illa, a Medicis & Ictis inprimis, v. c. CAGNOLO in *L. si quis praegnantem. ff. de reg. jur. Tom. 3.* allegata, primum locum occupat intumescencia ventris (nam congressum p. avium suppono, sine quo nemo impraegnatur) de qua tamen nonnulli dubitant, quia ex hydrope, tympanitide, scirrho hepatis & lienis, mesenterii ac uteri pariter evenire illa potest. Vid. HIPPOCR. *de Morbis Mulier. Lib. II. textu 4.* MASCARD. *Concl. 1147. num. 16. Vol. 3.* Ventrismen ejusmodi tumores, qui a morbo producuntur, facile ab eis, qui impraegnationem testantur, dignosci possunt. Nam. 1) tumor, qui ab impraegnatione enascitur, sit successive, ubi venter, inprimis circa umbilicum, in regione hypogastrica, in dies augetur atque incrementum, absque manifesta feminae alteratione, seu sanitatis, actionumque vitalium mutatione & turbatione: In morbis vero sine ordine ejusmodi intumescencia observatur, cum variis sanitatis injuriis conjuncta. 2) In gravidis tumor observatur neque durus, neque inaequalis, ut hoc fieri solet v. g. in scirrhis. 3) Si tumor ejusmodi mollis nimis est, cum sono & fluctuatione conjunctus, ut v. c. in hydrope & tympanitide, ubi etiam alia simul symptomata sunt conjuncta. 4) Si tumor ejusmodi a mensium obstructione praeternaturali, seu morbosa enascitur, facies simul pallet, tumetque aliquo modo, imo alia symptomata sunt conjuncta, ut lassitudines, pedumque oedemata. 5) Si a mola, circa pubem magis, uterus incrementum.

Secundum signum a CAGNOLO & MASCARDO, *l. c. concl. 1208. num. 10. vol. 3.* allegatum, est lac in mammis, earumque tumefactio. In his enim si lac reperitur, hoc

pro signo graviditatis a compluribus habetur. Vid. M E-
 NOCH. *de Prasumpt. lib. 1. qu. 1.* & BALD. *in rub. C. de pro-*
bation. POCER. & ZANGER, de Inq. & Tort. cum qui-
bus consentit Constitut. criminalis Car. V. art. 35. & 36. Sed
 de hac quoque nonnulli dubitant, cum aliis etiam ex causis
 ducere hæc possit originem, v. g. secundum HIPPOCRA-
 TEM, *Sect. V. Aphor. 39.* a mensium defectu & suppressio-
 ne; item, secundum eundem, *lib. 2. de morbis mul. textu 59.*
 tale quid contingere ab uteri hydrope potest. Imo virgi-
 num castrarum observationes prostant, quarum mammae
 lactæ turgesciebant Vid. RODER. a CASTRO, *lib. de Natur.*
mulierum, lib. IV. c. 10. JVBERTVS, *de Erroribus populo-*
rum, lib. V. c. 3. DEVSINGIVS, *de Lacte*; RANCHINVS, *de*
Morb. virg. sect. 1. cap. 16. TH. BARTHOLINVS, *in Cista*
Med. p. 254 HAGENDORN, *anno 3. Ephem. Germ. Cur. ob-*
servat. 136. & LAVRENTIVS, *in Anatomia, lib. IV. qu. 2.* ut
 taceam, maribus aliquando lactis proventum contigisse;
 quale exemplum in juvene studioso mihi compertum est,
 Vid. etiam SCHENCK. *Obs. de lacte.* Sed res summe su-
 spectæ est, consentientibus in primis signis reliquis: Co-
 lostrum enim in mammis ordinarie ante partum, lac
 vero genuinum post partum ordinarie observatur. In-
 terim tamen notandum, turgescientiam mammarum a
 colostro ultimis tantum gestationis mensibus; mamma-
 rum vero incrementum, absque lacte licet & colostro,
 primis quoque mensibus esse conspiciendam, ob uteri
 & mammarum consensum, a Deo ita constitutum.
 Vasa enim hypogastrica uteri cum mammariis ideo
 habent commercium, ut æqualis in utrisque fieri pos-
 sit dilatatio & mammaria vasa durante gestatione præ-
 parentur insimul ad lactis elaborationem atque secre-
 tionem.

Tertium, secundum HIPPOCRAT. *Sect. V. Aphor.*
 61. signum est *mensium emanatio.* Sed & hoc a nonnullis
 in

in dubium vocatur, nec id quidem sine causa. Non omnes enim, quibus menses non fluunt, semper sunt gravidæ: Obstructio enim etiam ab alia causa provenit; ut toto quoque die praxis docet, & experientia confirmat, feminas interdum gravidas per integrum gestationis tempus tributum lunare persolvere valere, salva sanitate, & foetus vita. Vid. inter alia Celeb. SLEVOGTII nostri, *Dissert. de Mensibus gravidarum*; & LOTICH. l. 5. obs. SCHENCK. l. 1. Obs. de Gravidis. Interim tamen non negandum, feminam, virginemque, fluxum mensium destitutam, revera suspectam esse, secundum HIPPOCR. ll. cc. in primis, ubi sana ceteroquin est, beneque valet, & neque horror, neque febris, neque lassitudo, neque pallor faciei superveniunt.

Quartum signum *Ephelides* constituunt, five maculæ faciei, secundum HIPPOCRATEM, *de sterilitate, textu 6.* Sed hoc signum fallax admodum est: Quoniam gravidæ quam plurimæ his maculis destituuntur, imo ipse HIPPOCR. l. c. t. 7. his absentibus, feminam gestare posse affirmat.

Sed nec quinto certi quidquam judicare possumus de *fastidio ciborum, rerumque insuetarum appetitu*, qui alias *Pica* dicitur. Nam 1) ejusmodi symptoma gravidis non omnibus inest. 2) Primis ut plurimum mensibus observatur. 3) Hoc contingere etiam solet suppressione mensium laborantibus. Sed consentientibus signis reliquis, hoc quoque locum invenire potest, & debet.

Pertinet huc sexto & *vomitibus matutinis*, qui quidem in gravidis plerumque solennis est. At, quoniam hic in aliis quoque observatur, quæ vitio quodam ventriculi laborant, ideo quoque ad minus tuta referri debet signa, Vid. Exc. CAMERARII, *de Vomitu gravidarum*; it. Ill. WE-

WEDELII Dissert. de Notis gravidarum, in qua omnia signorum genera uberiusne pertractantur.

Septimo *motus fœtus*, quam gravidæ circa quintum ut plurimum mensem sentiunt, signum est, inprimis adnotandum. Et quamvis sint Medici, qui docent a ventositate, vel mola provenire hoc posse, ut v. g. FORESTVS, in *Observat.* Medicus tamen dogmaticus & eruditus facile motum fœtus a flatibus distinguere potest; molum enim ad instar fœtus movere se neutiquam posse, exinde patet, quoniam massa informis est, minusque vitalis & mobilis.

Interim, cum Medico judicandum sic hac ratione non de feminis honestis. sed de iis, quæ utero se concepisse & gestare audacter negant; ideo ejusmodi examen a Medico cum prudentia suscipiendum, ne fallatur. Nam possunt etiam morum fœtus occultare, possunt abdomen comprimendo tumorem ejus imminuere, possunt lassitudines, & alia obvenientia, quæ in laudata WEDELII dissertatione exstant, signa prorsus negare, adeoque Jctum pariter ac Medicum decipere. Dantur & allegantur quoque alia signorum genera, ex urina & conniventia orificii uteri interni desumenda. Qua pertinet experimentum illud, ab HIPPOCRATE allegatum, ubi nempe aquam mulsam mixturamve mellis cum vino, vel aqua, ejusmodi personæ suspectæ propinare jubet.

De urina prægnantis notandum, quod Medici in ejus descriptione admodum sint dissentientes. Alii enim claram illam, alii subcitinam cum nubecula albicante, alii crassam eandem ac turbidam, ac cum sedimento farinaceo mixtam, describunt, quod postremum praxi confirmatur. Cumque urina ejusmodi ab aliis etiam corporis mutationibus evenire possint, teste ipsius rei experien-

perientia: Urinæ propterea inspectionem in hoc casu merito, cum SENNERTO, *Instit. Med. L. III. Sect. 3. part. I. cap. 5. & Praxi Lib. IV.* fallacem pronunciamus. FORT. FIDELIS, *l. c. c. 5. de Relat. Med.* hanc quidem suadet inspectionem, sed ex hac tantum ratione, quia vulgo creditur, haberi signum aliquod posse ex urina imprægnationis occultæ. Hinc si persona suspecta inspiciendam Medico tradere recusat urinam suspicionem auget.

Orificii uteri interni conniventiam innuit HIPPOCRATES, *Sect. V. aphor. 51.* his verbis: Quæ ventrem ferunt, iis uteri os connivet. Hoc tamen signum plane infallibile non est, idque ob sequentes maxime rationes; 1) idem HIPPOCRATES, *L. I. de Morbis mulier. text. 14. 25 ac lib. 11. tit. 57. & 59.* idem uterî ostium non raro ab aliis causis occlusum existere posse, perhibet. 2) Primis tantum diebus conniventia hæc tangi potest. Utero enim sursum postea moto, ostium illud, hæctenus prominens, sursum retrahitur, ut digito attingi nequeat. 3) Colli uterini longitudo plerumque longitudinem digitorum superat, adeo ut orificium hoc tam in vacuis, quam recenter imprægnatis contingere digito haud vere liceat.

Aquam mulsam propinare idem jubet HIPPOCRATES, *Sect. V. aphor. 41.* ubi ab hac mixtura tormina excitari affirmat. Aliud experimentum idem suppeditat HIPPOCRATES, ibidem, *Aphorismo 59. & AVIGENNA*, ut nimirum aromatibus mulier suffumigetur, corpore probe tecto, ubi si odorem naribus & ore percipiat, vacuam illam esse asserunt. Verum 1) periculosa ejusmodi sunt experimenta, quoniam vel feminas, vel foetum lædunt. 2) In assuetis aqua multa, aliaque dulcia omnia non excitant tormina. 3) Ejusmodi symptomata in illis etiam subjectis excitantur, quæ mensium obstructione, vel

vel vitiato & cruditatibus repleto ventriculo laborant. 4) nulla horum dari potest experimentorum, item & aliorum, in ZACCHIA. *Q. M. LL. lib. I Tit. III & IV.* citatorum, vera ratio, unde ab illis minus licet concludere.

Ex his igitur, quæ modo diximus, luculenter satis meo quidem apparet iudicio, prægnantiam primis gestationis mensibus vix, ultimis vero certius paulo cognosci posse.

CAP. VI.

DE

IMPRAEGNATIONE AFFECTATA ET SIMVLATA.

Feminæ diversis ex causis utero se gerere nonnunquam fingunt, 1) ut supposito postmodum in fante, partum mentiantur. 2) ut sterilitatem dissimulent. 3) quandoque hoc fit spe successionis, inprimis quando maritus subito apoplexia, vel alio acutissimo morbo mortuus est. 4) cum ad hereditatem proximi admitti cupiunt. Nam si prægnans deprehenditur, hereditas ad ipsum uterum pertinet. *L. 30. ff. cum quidam, §. 3. de acquir. heredit.* CAGNOLVS, in *L. si quis prægnantem ff. de reg. Juris.* Aut alia ex causa id fit; v. g. ut 5) tormenta, & poenas corporis adflictivas, ultimum inprimis supplicium, subterfugiant. vel 6) ut, post divortium, se ex marito prægnantes adfirmant. *L. I. §. 4. de ventr. inspici. L. I. §. 12. de agnoscendis & alendis liberis. L. cum quidam cit. L. prægnantis ff. de poenis.* MENOCH *de Arbitr. Judicis. L. I. qu. 86. n. 10. seq.*

Cum itaque delictum hoc a Jctis falsi criminibus annumeretur, & capitale dicatur; imo cum præsumptionibus

bus solis fidendam non sit : Medicorum idcirco iudicia in auxilium vocant. Argumenta vero atque signa in hoc negotio sunt sequentia.

I. *Qu. Quanam signa potissimum sint, quibus dignosci imprægnatio possit affectata?*

1) Aetas incongrua, ratione cujus mares intra 14. & ultra 60. annos vix generant, cum femellæ ante 12. & post 50. vix concipiant, inprimis si conjugium antecedaneum non adeo fœcundum fuerit. Vid. ex Jctis ALPH. de CARANZA, de partu c. 5. sect. 2. n. 60. FARINACIVM, de falsis & simulatione, qu. 151. ZACCH, lib. III. & II. qu. 8.

2) Antecedanea sterilitas utriusque vel alterutrius conjugis. Arg. eorum, quæ habet GAIL. lib. 2. c. 97. n. 16. MASCARD. de Probat. concl. 1147.

3) Huc spectat impotentia generandi & concipiendi notoria ob vitia organorum.

4) In femina defectus mensium præternaturalis, & quidem in ætate congrua. Unde rarius conceptio in statu hoc contingit, quo suo etiam modo Fluor albus pertinet.

5) Pertinet huc ipsa ventris inspectio & contactus, ad motum fœtus explorandum. MASCARDVS, de Probat. vol. 3. Concl. 1147. Tit. ff. de ventre inspic.

6) Dantur nonnulli, v. g. ALPH. de CARANZA, qui a non supervenientia lactis præsumptionem prægnantiæ fictæ petunt : cujusmodi signum tamen cautius paulo est adplicandum. Nam verum est, ut plurimum transacto tertio, vel quarto gestationis mense mammae a colostro turgescere incipiunt : At lactis ille proven-
tus ab alia causa, vel naturali, vel præternaturali, ut

alias diximus, originem ducere potest; imo dantur exempla, ubi existente licet imprægnatione, mammae tamen non turgent, v. g. in subjectis ficcioribus, quæ humido non abundant. Interim tamen, cum in ejusmodi subjecto (ceteroquin sano, & quod prægnantiam adfectat, signum hoc non apparet, dubitare quodammodo licet, tutiusque est, expectare illa phaenomena, quæ circa medium gestationis tempus adparent, quale v. c. ipse est motus foetus.

De inspectione ventris hoc amplius monendum, illam alias institutam fuisse certis solennitatibus, ut ex *ff. l. c.* adparet. Sed praxis hodierna ceremonias hasce sustulit. In præsentem nempe instituitur ab obstetricibus, vel solis, vel Medicis associatis, atque ad actum hunc juramento confirmatis.

Ubi tamen subjectum plane denudandum, ne sub vestimentis ventrem fingant tumidum, quo facto videndum, tangendumque simul, an signis reliquis consentientibus intumescencia ventris, qualis esse in gravidis solet, appareat; cumque denudationem renuit, suspicionem simul auget, atque a Magistratu deinceps est adstringenda.

In statu vero ambiguo, quando ventris inspectio suscipitur, primis nempe mensibus, ubi foetus motus nondum appareat, applicandum illud consilium, & responsum Facult. Med. Lips. quod in VALENTINI *ff. Medico-Legalib. part. I. Sect. I. c. 17.* habetur, ubi suadet, inquisitam tamdiu in custodia tenere, donec motus foetus in utero appareat: Hoc autem fieri debet in fundamentali & rationali præsumptione consentientibus reliquis nonnullis signis, collective sumtis, ne fama subjecti ejusmodi periclitetur.

CAP.

CAP. VII.

DE

PARTV SUPPOSITO, NATORVM ITEM SIMILITVDINE ET DISSIMILI- TVDINE.

Iisdem plane de causis, quibus prægnantia fingitur, par-
tus supponitur, quod a Jctis ad crimen falsi refertur.
D. PETR. MULLERVS, *diff. de Jure prægnant. Cap.*
7. §. 3. & 6.

1. Qu. *Quibus signis partus dignoscatur
suppositus?*

Partum suppositum dignoscere, adeoque filia-
tionem probare, idsi Jcti pro re habent si non pla-
ne impossibili, admodum tamen difficili; consentiente
*L. quia semper ff. de in jus vocand. l. 38. ff. de condit. & de
monstr. quam difficultatem cognovisse etiam antiquiores
vel Telemachi testari potest dictum, apud HOMERVM,
Odyss. 1. dicentis:*

Mater quidem me dicit hujus esse, sed ego
Nescio. Nondum enim aliquis suum genitorem
novit.

Interim a MASCARDO & FARINACIO ut signum pri-
marium commendatur partus suppositi vel ficti cum pa-
tre dissimilitudo; quod argumentum quidem notatu
dignum est, non tamen plane infallibile. Nam similitu-
do quidem filiationem probat verisimiliter, sed dissimi-
litudo filiationem plane non negat.

2. Qu. *Quid sit causa similitudinis natorum?*

De causa similitudinis natorum variæ autorum
pro-

prostant opiniones atque sententiæ, quarum prima est HIPPOCR. *lib. de genitura, item de diætâ*, flatuentis, non sexum tantum, sed & ipsam natorum similitudinem multitudine seminis excessu superantis fere provenire: Sed, cum unica seminis virilis guttula sufficiens sit ad integrum imprægnationis opus absolvendum; ideo non in quantitate seminis hæc vis determinans delitescit, sed in qualitate potius, inprimis elasticitate, qua partes & stamina foetus, in ovulo existentia, similiter extenduntur, adeoque ad formæ suæ perfectionem perducuntur.

Secunda est GALENI, *lib. 2. de semine, cap. 2.* arbitrantis, ibi major vis seminis sit masculini, foetum nasci patri similem, & contra. Sed dubia & hæc est sententia, cum ita nullo modo posset contingere, ut natus alii personæ, quam uni parentum, assimilaretur; quod tamen ipsa experientia, ut falsum, refellitur. Interdum enim natus avo similis deprehenditur, avunculo quandoque, aut patruo, &c. immo ignotæ nonnunquam personæ: Vid. VOIGTS *Physicalischen Zeitvertreiber*, Cent. I. Qu. 18. HARSDORFERS *Schau Platz histor.* 98. REIES, in *Campo Elis. Quæstion. jucundarum* 54. p. 670. Unde credibile potius ac concludendum videtur, similitudinem & dissimilitudinem ex matris imaginatione, phantasia, aut impressione præcipue dependere ac proficisci, quibus & siderum influxus, soli & poli constitutio addenda, juxta tritum illud; Sol & homo hominem progenerat, quibus cum utriusque etiam parentis dispositio conspirat. Cæterum omni tempore gravidatis agere potest imaginatio, nunquam quiescens: Primario vero tempore conceptionis, vel proximis ab alia diebus, antequam partium stamina a seminis virilis vi & efficacia fortius jam sunt explicata, agit quam efficacissime. Ita etiam D. D. a GVLDENKLEE, ad quæstionem: an partus, patri dissimilis, alii vero similis, imo
simil-

simillimus, pro adulterino habendus [sit?] respondit. Vid.
VALENTINI ff. M. L. P. I. Sect. I. Cas. 38.

3. Qu. *An imaginatio potentiam seminis, effigiem-
que conceptus mutare valeat?*

Utique. Hoc enim variis probari argumentis potest. V. g. 1) in posthumis major semper similitudo observatur, quam aliis liberis, ob continuo ante oculos versantem patris defuncti ideam. 2) Navi etiam materni, *Mutter-Mäbler*, ab impressione ideali, vel objecto quodam terrifico pedentes, id ipsum probant. 3) Imaginationis vis, etiam in brutis, probari potest ex ovibus JACOBI in sacris. 4) Mira & fere incredibilis imaginationis gravidarum potentia elucet ex historia quadam, ab illustri quondam, nunc beato WEDELIO, in *Pathologia dogmatico*, Sect. II. c. 9. notata, ubi mater a visa decollatione paullo post partum edidit capite truncatum. De gravidarum imaginatione plura legi possunt in CASP. a REIES *Campo Elysæo jucundar. quæstion. qu. 54*. Similitudo magis intrinseca, oculorum hic attendenda: Quæ tamen non in recens natis, sed adultioribus demum conspicitur, secundum motum illud: Simile generatur a simili; & HORATIVM, *lib. 4. oda 4.* fortes creantur fortibus ac bonis.

CAP. VIII.

DE

TEMPORE ANIMATIONIS FOETVS.

Qui conceptum, per abortum, data opera interimunt,
jure merito a legibus puniuntur, ut in *L. Divus ff. de*

ravis & extraord. criminibus, & L. Cicero ff. de pœnis, L. si mulier ff. ad L. Cornel. de sicar. L. si quis necandi C. de Sicar. & Const. Crim. C. V. art. 133. Apud JCtos vero cum de crimine abortus sermo est, quæstio oritur de tempore animationis foetus. Recepta enim in jure divisio est inter foetum animatum & non animatum.

1. Qu. Quid foetus dicitur animatus?

Foetus animatus apud JCtos dicitur, cum motus ejus in utero percipitur, id quod fieri solet circa medium gestationis tempus. Vid. D. LVDOVICI, in Not. ad Caroli V. Constit. Crimin. ad 133. JCti enim hanc rem magis æstimare solent ex tempore operationum vitalium MENOCH. 2. de arbitrio Judicis, Cas. 357. FARINACIVS, §. Criminal. qu. 122. WESENBECIVS, in par. ff. ad L. Corn. de sicar. n. 7. CARANZA, de Partu nat. & legit. c. 16. §. pecul. de abortu procurato, & ejus pœnis, p. 606. HARPRECHT & LVDWEL, apud DIETHER. ad BESOLD. Thes. præf. Cum itaque abortus promovetur inanimatus, poena arbitraria, vel extraordinaria dictatur: Foetus vero animatus cum expellitur per medicamenta, abortum promoventia, poena capitalis est, ut in præsentī hoc observatur, ad normam Jur. Sax. ut ex CARPZOVII Jure Crim. P. I. q. II. n. 12. eluet. Sic & Gloss. in cit. L. divus ff. de extraordinariis criminibus, quam plures etiam DD. sequuntur. FARINACIVS, de Homicidio, qu. 122. num. 131.

2. Qu. An distinctio inter foetum animatum & non animatum sit admittenda?

DD. quidem, & ipsa C. C. C. V. Art. 133. illam admittunt, ut ex antecedentibus apparuit. Illa enim disertis verbis inquit: So aber ein Kind, das noch nicht lebendig ware,
von

von einem Weibes. Bilde getrieben wüßte, &c. Sed medicæ & phyficæ illa distinctio nullius est momenti. Animam enim in semine esse, præclare demonstravit NYSSEN, de *Opific. hominis* cap. 28 & 29. Eum plerique hodie sequuntur, imò omnes, qui animas per traducem propagari statunt, ex quorum sententia anima illico adest, simulatque conceptio facta est. Vid. LVDOVIC. in *Not. cit.* utrobique ergo homicidium committitur, siue embryonem quis interfecerit, siue foetum, hominis figuram jam habentem, ideoque pœna utrobique est decernenda. Sed Jcti, eandem utrobique pœnam decernendam necesse non esse, arbitrantur, cum gravius peccare videatur, qui hominem jam formatum & ubique perfectum, *ein lebendig gliedmæssig Kind*, ut C. C. C. V. loquitur, occidit, quam qui formandum enecat. Vid. *Constit. 4. part. 4. Juris. Elect. Saxon.*

3. Qu. Quid ansam dederit distinguendi inter foetum animatum & inanimatum?

Hæc distinctio inter foetum animatum & inanimatum originem duxit ex imperitia Physicorum & Medicorum, ac incertitudine hypotheseum de generatione humana, & animæ in primis cum corpore conjunctione: Sic Jcti, a Medicis & Physicis seducti, in hunc usque diem distinctionem hancce retinuerunt. Interim vero licitum erit, magis sobrie philosophari sententiasque ridiculas modeste examinare ARISTOTELES, II. de anima, Cap. I. text. 6 animam vocat *ἐντελέχειαν*. Quid illud sit, ignorarunt Philosophi, & ipse fortassis ARISTOTELES ignoravit, HERMOLAVS BARBARVS ita vertit, ut sic recti habia, vel perfecti habia, cui consentiunt SENNERTVS, *Phys. l. I. cap. 8.* CASP. POSNERVS qui duas quidem amplas, re ipsa vero parum, minusve utilitatis habentes, quam

quam quæ omnium desideriis satisfaciant, dissertationes conscripfit, alteram *de animæ cum corpore conjunctione*, alteram *de ordine partium in generatione humana*) & SPERLINGVS, *Instit. Phys.* MAGIRVS, *Phys. l. 6. c. 2.* animam per formam definit, quæ quidem rectius sese habet. Revera enim est forma hominis RENAT. des CARTES *lib. de affectibus*, alibique, cogitantem illam vocat substantiam, id quod claram omnibus perspicuamque animæ ideam suppeditat. Alii substantiam illam immaterialem atque immortalem vocant, naturæ cœlestis imperceptibilis, vel igneæ, ut ISAAC. VOSSIVS, in *appendice de natura lucis*; adeoque haud obscure materialem eandem pronunciare contendit.

De loco animæ, diversæ itidem & discrepantes doctorum sunt sententiæ. Vid. HOBOKENJVM & WINSLOVIVM, *de Sede animæ*. HIPPOCRATES & HEROPHILVS in cerebri ventriculis animam collocant; DEMOCRITVS in toto corpore; ERASISTRATVS circa membranam epicranidem; STRABO in superciliorum interstitio: EPICVRVS in toto pectore; DIOGENES in cordis arteriato ventriculo; STOICI, cum CHRYSIPPO, in toto corde, ac spiritu, circa cor versante EMPEDOCLES in sanguine. GALENVS in quavis corporis particula suam esse animam putat. HELMONTIVS animam in ventriculi pyloro; CARTESIUS autem in glandula pineali illam quærit, cum tamen sæpe in hominibus eadem vel aqua repleta, vel in calculum mutata, vel ulcere consumpta, post mortem, fuerit deprehensa, Illustris & Celeb. Romanus Medicus, & Pontificis Archiater atque Cubicularis, LANCISIVS, rectissime illam in septo pellucido existere demonstrat, in Epistola ad Celeb. FANTONIVM scripta, quæ exstat in Cl. MANGETTI *Theat. anat. Lib. 4. C. 2. p. 321.*

De animae cum corpore coniunctione differentes etiam doctorum virorum extant sententiae. V. g. HIPPOCRATES primus fuit, qui, in libro de *natura puerorum*. textu 10. & 11. alibique, statuit, in masculis 30. in puellis 40. aut 42. die animae fieri accessionem & cum corpore conjunctionem, cui assentit GALENVS, L. 15. de *usu partium*, c. 5. imo FIENVS, de *Formatione foetus*, quæst. 10. concl. 11. MERCVRIALIS autem, de *Morbis mulierum*, lib. I. c. 2. septimo coniunctionem hanc die fieri, contendit, quia homo septem dierum spatium perficiatur. Sunt et alii ex Icturorum ordine, imo ipse ZACCH. L. 1. Tit. 11. qu. 9. tb. 24. qui ante 60. dies animatum foetum non pronunciant, & quidem ex debili hac & infirma admodum ratione, quoniam constare non possit, an masculus quis sit, nec ne?

Fundamenta harum opinionum sunt varia. 1) Credebant olim, certum quendam ordinem productionis partium in generatione statuentes, primo hepar fieri, deinde cor, spinam dorsi porro, tandem caput & reliqua. Sed ridiculam hanc esse opinionem, tum sana ratio dicat, (quæ harmonicam ejusmodi vasorum mirabilemque organorum connexionem successive fieri, sibi persuadere nunquam potest) tum adcuratior in rebus physicis inquisitio experimentalis ad oculum id ostendit. Physici enim per Microscopia observant integram plantæ delineationem in semine plantarum, v. g. in faba: Vid. du HAMEL, in *Physica*; VALENTINI, in *Armentario Naturæ & Artis* p. 161. ubi de natura vegetabilium; LEEWENHOEK, in *Arcanis naturæ*, & alii. Nos pariter per Microscopia in ovulis insectorum perfectæ elaboratam & exstructam insecti machinam vidimus. Ex qua demonstratione liquido adparet veritas Davidis, in Psalterio dicentis: *Du hast mich gebildet ehe denn ich war.* Et ipsæ etiam sacrae literæ hypothesein recen-

tiorum Medicorum alias confirmant, qui de generatione statuunt, hominem in ovulo delineatum, quoad omnes partes, in exiguis flaminibus ante conceptionem. Vid. BRENDII differt. *de embryon. in ovulo ante conceptionem præexistente*, Witteb. 1703. Respond. Hannekenio.

Secundum fundamentum erat incertitudo de origine animæ, hujusque sede, & cum corpore conjunctione. Credebant enim, ut hodiernum, Theologorum quamplurimi, animæ creationem & infusionem, & eo quidem hanc fieri tempore, quo omnes partes, in specie sexum notantes, perfecte formatae fuerint, ne error in animæ conjunctione committatur.

Sed hæc hypothesis 1) militat contra principia philosophica. Omnes enim Philosophi in eo consentiunt, quod ubi materia sit, ibi forma etiam esse debeat, ac forma sine materia, & materia sine forma consistere unquam nequit. Unde eo momento, quo corpus existit, & anima existat oportet. Anima est forma hominis, cum qua thesi leges ipsæ consentiunt, in *L. Julianus §. sed si quis ff. ad exhibendum*. 2) Cum homo generatur, perfecte generatur, non quoad partes, sed quoad totum, cumque hominis materia in parentum sita sit semine, quare non formam etiam in semine simul admittamus? 3) Quid in Theologia hinc sequatur, facile fortasse patet. Nam anima, quæ creatur atque infunditur, aut pura esse debet, aut impura. Absurdissimum profecto illud hinc sequeretur principium: Deum auctorem esse peccati. Melius itaque ac sanæ rationi convenientius est, credere, animam a parentibus, conjunctim sumtis, proficisci, animæque conjunctionem ipso conceptionis tempore fieri. Quia & divinum illud: **MULTIPLICAMINI!** ad animas sese extendere, credibile est. Si enim falsum hoc esset, quo

quoad corpus filii essemus parentum, & quoad animam filii Dei. Cum itaque homo hominem generat, aura seminalis, in partis femine delitescens, ovulum maternum irradiat, idque vel in ovario antiquo, vel novo, h. e. in ipso utero constitutum, eoque momento conceptio contingit, atque ab aura seminali plastica, vel elastica, motus instituitur, vitæque principium nascitur, hinc et anima, modo licet incomprehensibili, quam communicationem tamen per traducem explicamus, ut cum B. Luthero & Wittebergenfibus vulgo consuevimus. Nostrum tamen nunc est, in tam ardua & admodum subtili dubiorumque plena hac re Jctis suam distinctionem adamatam relinquere, eruntque fortassis in posterum, qui rectius edocti, corrigendas hasce ac emendandas suscipiant opiniones suas, operamque hanc nostram omnem perditam frustrave collocatam censeant.

CAP. IX.

DE

PARTV PERFECTO ET LEGITIMO.

In hac vero doctrina, ubi de nascendi temporibus actum fuit, Jcti, fatente ipso COCCEJO, in *Comment. ZACCHIAE, Qu. M. L. lib. I. Tit. 2. Qu. I.* errores commiserunt quam maximos, tum partus legitimi tempus confundunt cum tempore partus perfecti. Ne adeo idem nos error implicet, veram prius, quam rem aggrediamur, terminorum significationem explicabimus. Cæterum summe hæc necessaria est doctrina de partu, in foro quippe tam Medico, quam Juridico, in hoc autem quam maxime, inprimis ubi quæstio agitur de hæreditatibus & successione.

1. Qu. *Quid intelligatur per partum?*

Per partum in sensu medico intelligimus non fœtum, utero materno adhuc inclusum, sed infantem potius, mutuis istis matrisque parturientis & fœtus maxime ipsius moliminibus ex utero exclusum, vel etiam Chirurgia per partum Cæsareum ex eodem exsectum.

2. Qu. *Quid partus sit vivus?*

Vivus partus dicitur, qui vivus excluditur, & exclusus per aliquot momenta diesve in vita potest subsistere, ob immaturitatem tamen diu vivere vitamque continuare haud valet. Hic alias dicitur debilis, immaturus, præternaturalis, abortivus. Abortus enim fœtus est immature editus, vel ante mensem septimum natus, qui a plerisque Jctorum neque legitimus, neque vitalis pronunciatur. LL. enim, auctoritate HIPPOCRATIS fultae, partum vocant legitimum, qui septimo mense contingit. *L. septimo ff. de statu hominum.*

3. Qu. *Quid partus sit vitalis?*

Vitalis ille dicendus est, qui non vivus tantum editur, sed ob majorem etiam integritatem virium, organorum, membrorumque perfectionem & soliditatem in vita perfecte potest subsistere, ut septimestris & octimestris.

4. Qu. *Quid sit partus legitimus?*

Partus legitimus, juridice sumtus, est, qui ex justo matrimonio, vel justis nuptiis, tempore ad vivendum apto, quo hæreditatem adire potest, atque in alios transferre, monstri abortionisque expers, perfecte in lucem est editus *pr. Inst. de Patr. Pot. L. 12. in fin. ff. de statu hom. l. 3. L. 6. ff. de his, qui sui & alieni juris sunt L. 5. ff. de in jus vocando. Tit. Cod. de Nat. Liberis.*

5. Qu.

5. Qu. *Quid partus sit perfectus?*

Qui iusto & ordinario fit tempore, a natura destinato, finitis nempe 40. septimanis, vel 280. diebus, vel novem mensibus solaribus, decemve lunaribus. Vid. VALENT. ff. *Med. L. part. 1. sect. 1. cas. 24.* Hinc naturalis quoque dictus.

6. Qu. *An natura terminum eundem constitutum semper observet?*

Negandum non est, naturam in partu statum plerumque terminum temporis observare, atque ordinarie finitis 280. diebus generationis opus absolvere, quem quippe terminum & Salvator noster, tanquam homo perfectissimus, observare, adeoque ita nasci etiam voluit. Interim causæ sunt variæ, quæ terminum illum naturalem vel ante vel postponunt.

7. Qu. *An homo, ut cetera animalia, certum aliquod tempus habeat nascendi?*

Alii hoc affirmant, alii negant. Qui affirmantem amplectuntur sententiam, dicunt: Integrum formationis foetus negotium, in homine non minus, ac in brutis, absolvi, secundum regulas proportionum, temporis atque mensuræ. Durante enim gestatione, omni temporis momento, certa quantitas materiæ foetus corpusculo, vi circulationis liquidorum, affertur, & cum illo conjungitur, ita, ut spatio 280. dierum summa totius incrementi & extensionis perfectæ ad finem perducatur. Hinc theoria de incerto partus tempore tantummodo fluxit ex falsa

calculatione et erronea computatione credularum mulier-
 ularum. Deus enim Deus ordinis est, qui in corpore
 humano, eiusque incrementis, haud secus ac in reliquis
 creaturis, ordinem, mensuram, numerum, temporaque
 certa constituit. Negantes autem certum partus tempus,
 regerunt: Non adeo probabile hoc esse ob sequentes po-
 tissimum rationes: 1) Quoniam homini a Deo concessum
 fit indeterminatum congressus tempus; unde concludere
 liceat, ei non esse partus tempus determinatum. 2) Quia
 in hominibus mira quædam temperamentorum præ reli-
 quis animantibus diversitas deprehenditur, ideoque cali-
 da et sanguinea temperamenta non plus tantum generant,
 sed suo etiam modo plus nutriunt, adeoque fœtus ipse
 citius paulo perficitur. 3) Quoniam seminis ἐνέργεια, vel
 efficacia, mirifice in subiectis differt, pro diversitate ha-
 bitus corporis. Unde liquet, semen spirituosius in ovu-
 lo humano motum instituere vehementiorem, adeoque
 & citiora fœtus incrementa posse efficere. 4) Quoniam
 diversitas staturæ in sexu fœmineo etiam observatur, ubi
 uterus, ob angustiam, qua clauditur, naturalem, per de-
 cem menses fœtui augescendo spatii præbere haud satis
 potest. 5) Quoniam sanitas etiam in subiectis, non in
 patre tantum, sed in matre etiam, imo & in fœtu differt;
 ex quo liquet, fœtum vel citius, vel tardius interdum ex-
 cludi posse. Atque hæc quidem rationes sunt fundamen-
 tales dubitandi, absolute nempe certum homini nascendi
 tempus datum non esse, in quo etiam consentiunt ARI-
 STOTELIS *lib. VII. Histor. animal. c. 4.* PLINIVS
lib. VII. Hist. Nat. c. 5. speciatim vero HIPPOCRATES,
 qui libro *de Partu septimestri*, item *lib. 2. de Dieta*,
text. 19. inquit: *Fœtum interdum serius, interdum matu-*
rius nasci posse. Hinc ARNISAËVS *lib. de Partus*
humani legitimo termino, §. 9. inquit: *Præcise autem*
diem, aut mensem, inde præfinire, non licet: Quia pro-
portio

portio illa, ut & mixtio, soli naturæ constet; & quicquid hujus cognitum exploratumque habemus, a posteriori dicimus. Hinc HIPPOCR. *de Partu septim.* ad observationes obstetricum provocat. Conf. insimul. FORT. FIDEL. *de Relat. Med. lib. 3. sect. 7.* JOH. PEYSSONEL. *lib. de Temporibus humani partus*; ALFONS. *de CARANZA, lib. de Partu natural. & legit.* ANDR. SPIGELIVS, *Tr. de Infante in utero*; BESOLD. in *Thesaur. Pract. voc. Geburts-Zeit*; CARZOVIVS in *Praxi forensi c. 27.* ubi integrorum Collegiorum sententiæ reperiuntur.

8. Qu. *Quid de partu ante mensem septimum sit statuendum.*

Sciendum, quod sub eo partus ejusmodi contineatur, qui 3. 4. 5. vel sexto mense editur. Hic jure civili non pro homine perfecto, sed pro abortu tantum, immo pro mortuo plane agnoscitur: Quia naturaliter vivere non possit, teste HIPPOCRATE, qui, *lib. de partu septimestri*, ita præcepit. *L. 12. ff. de Statu hom. L. intestato 3. §. 12. ff. de suis & Legitim. hæredit.* Sunt quidem Jcti ævi nostri, æquitatis amantes, qui partum ejusmodi, v. g. quintimestrem & sextimestrem, si vivus & organis integris instructus deprehendatur, non pro abortu, sed pro vero atque legitimo agnoscunt partu, eique jura omnia, privilegia & effectus tribuere contendunt, ut fecit ALPHONS. a CARANZA, *de Partu naturali atque legitimo, cap. 9.* quem plerique etiam sequuntur Jcti, prout videre licet ex RENATO CHOPPIN. *de privilegiis rusticis, lib. 3. Cap. 8. num. 8.* qui arbitrantur, quod *l. 3. C. de posth. hæred. leges ff. emendet*, vel corrigat CARPZOV. in *Jurispr. Eccles. lib. 2. definit. 22.* COCCEJVS in *Comment. ad ZACCH. lib. 1. Tit.*

27. qu. 2. p. 51. STRYCK. de *Jure sens. diff.* 1. Cap. 1. num. 40. & 41 ubi ait, semestrem partum regulariter pro immaturo reputandum. Sed addit: Quia vivit & perfectus est, secundum L. 3. C. de *posthumis*, juris beneficiis non privabitur, licet non sit integer. Integrum enim esse & perfectum, differunt. Ejusque filius, in *Controversiis Juris selectis ad Instituta*, disp. 2. thes. 16. & ex Medicis SPERLINGIVS, de *Formatione in utero*, cap. 9. THEOD. CRAANEN, Tr. de *Homine*, p. 758. HARVEVS, de *Partu*; ANDR. SPIGELIVS, de *incerto partus tempore*. Facultas Erfurtensis, in *Quæst. de partu trimestri*; VALENTINI, ff. *Medico-legal. part. 1. Sect. 1. c. 23.* partum ejusmodi pro vivo atque legitimo pronuntiant; ac Facultas Lipsiensis in partu quinquemestri simile quid fecit, de quo vid. AMMANVM in *Med. Crit. Reip.* 68. Plura ad ejusmodi quæstionem responsa videre licet in ZITMANNI *Medicina Forensi Lips.* Cent. I. cas. 15. 17. & alibi. Nonnulli tamen reperiuntur strictiores legum interpretes, qui rejecta nostræ ætatis ICtorum sententia, in juris tantum civilis decreto acquiescunt, & partum illum, qui 180. vel 182. die ex utero vivus egressus est, licet illico, postquam in lucem editus fuerit, animam dimittat, etiam in manibus obstetricis, pro vero & legitimo agnoscunt, secundum L. 12. ff. de *Statu Hom.* L. 3. §. *fin.* ff. de *suis & legitimis hered.* L. 3. C. de *Posthum.* In casu vero, quo IV. V. Ultio mense partus nascitur, ille, secundum commemoratum modo ICtorum rigorem, tamdiu immaturus abortivusque manet, donec 180. dierum terminum attigerit, quo ipso omnium statim jurium compos fit, quando vero ante illud temporis spatium spiritum reddit, nec successionis jus ei competit, nec testamentum is rumpit.

9. Qu. De partu septimestri quid statuendum?

De partu septimestri, sive illo, qui 180. vel 182. die post

post celebratum connubium nuptiasve in lucem hanc editur, non amplius est dubitandum. Nam medice quidem non vivus tantum, sed & vitalis utique esse potest, quamvis raro in vita longiorem annorum feriem persequatur. Sed & juridice, juxta L.L. civiles, pro legitimo agnoscitur. Ex Medicorum hinc ordine vitalem illum pronuntiavit HIPPOCRATES, *libro de partu septimestri*, Item *lib. de Carne*, ubi tamen simul plurimos horum periisse commemorat, paucos vero superstites evasisse, id quod Medicorum hodiernum experientia confirmat. Plerumque enim immaturi sunt, raroque ad perfectionis illud punctum, quo natura constituit, pervenerunt. Unde nec aerem liberiores, nec alimenta perferre possunt, ob integumentorum communium subtilitatem, pulmonis, ventriculi, aliorumque organorum imbecillitatem, imo caloris etiam proprii defectum. Interim tamen foetus mense septimo naturæ intentione non nascitur, ut multis id argumentis probatum ivit ZACCHIAS, *Lib. I. Tit. II. Qu. III.*

10. Qu. De partu octimestri quid statuendum?

De partu octimestri, an legitimus sit & vitalis, dubitant nonnulli Jcti & Medici, & quidem his maxime rationibus inducti: 1) auctoritate nixi HIPPOCRATIS, qui ll. cc. foetum illum, ob exeundi conatum, mense septimo adhibitum, postea, octavo scilicet, labefactatum pronunciat, adeo, ut non satis robore praeditum ad sustinendos partus labores se sentiat. 2) Arbitrantur Astrologi superstitiosi, Saturnum, ut planetam frigidum, octavo gestationis mense imperium tenere in foetum, qui, nimis eum refrigerando, ad motum minus reddat idoneum. Prioris argumenti imbecillitas ac

H

levi-

levitas ex hoc adparet, quoniam haud impossibile, foetus vires, in 7mi mensis principio imminutas, per mensem denuo restitui, & ipse etiam SENNERTVS, Medicus olim felicissimus, jam demonstravit, in *institut. Med. lib. I. c. 20.* & in *Praxi sua, lib. IV. part. 2. Sect. 6. c. 1.* motum illum, mense septimo foetui ab HIPPOCRATE adsignatum, utique in dubium vocandum esse, quoniam motus ille reliquis motibus ordinariis haud major, neque partus conatibus similis sit & appareat. Posterioris ratio a GODOFREDO, ad *L. 3. §. fin. lit. K. ff. de suis & legitimis hered.* refutatur, dum sententiam hanc de Saturno nugas vocat astronomicas. Unde adeo adparet, dogma de debilitate partus octimestris debilibus superstructum esse argumentis, id quod, prater Sennertum, fusiùs docuit BONAVENTURA, de *Partu octimestri*, imprimis *l. 9. 10.* ubi ostendit, merito ab HIPPOCRATE esse recedendum. Hoc plures simul fecerunt Philosophi & Medici nostri avi, v. g. celeb. WEDELIVS noster, in sua *Physiol. sect. 2. c. 31.* & VALENTINI, in *ff. Med. L. Part. 1. sect. 1. casu 33.* ubi integrorum collegiorum responsa reperiuntur. Si enim septimestres sunt vitales, tanquam minus maturi, cur non octimestres, qui prorsus maturiores illis sunt, magisque formati, & calore ac robore vegetiori præditi? Adversus JCROS, qui partum octimestrem non legitimum, alias crediderunt, disputavit DOMINICVS ARVMAEVS, noster, *lib. 2. decis. ult. num. 50 seq.* & FRID. BONAVENTURA, *l. c.* qui partus octimestris legitimisationem prolixissime deducit. Nec desunt alii, qui partum octimestrem pro justo atque legitimo pronunciant, ut HAHNIVS ad *WESENBEC. de Statu hominum, num. 3. verb. postquam nati, p. 165.* ubi plures DD. allegat. CARPZOV. *Jurisprud. forens. P. 4. Const. 27. Def. 14. & lib. 2.*
Juris

Jurisprud. Confist. tit. 13. def. 226. ZIEGLERVS in *Not. ad ZACCHIAM*, observantiam in Consistoriis quoque allegat. Interim, cum naturalis terminus sit finis noni, & principium decimi mensis, sequitur, quod foetus sine dubio, quo longius ab hoc recedat, tanto minus robustus atque perfectus sit; quo magis vero illum terminum attigerit, eo perfectior fuerit, ob soliditatem & incrementum membrorum & partium, ut hinc eo melius certiusque in vita valeat persistere. Hæc quoque ratio perspecta fuit HAHNIO ad WESENBECIVM, de *statu hominum*, & CARPZOVIO, in *Praxi forensi*. Cum itaque adpareat, quod partus præcox atque immaturus raro quoad corporis habitum perfectus sit, adeoque etiam vitalis: Ideo in his dijudicandis decernendisque cautus sit medicus & Jctus; Id quod fieri potest accurata lustratione & in vestigatione non circumstantiarum tantum, sed & subjectorum, partum aliquem semestrem atque octimestrem venditantium.

II Qu. Unde partus maturitas, ejusque perfectio noscenda?

Quemadmodum, cum de virginitate, prægnantia, abortu, vulnerum lethalitate quæritur, nemo judicat, nisi lustratis, perinspectionem, et contrectationem, distinctis inter se circumstantiis in subjecto illo, vel individuo, de quo depositio & renuntiatio postulatur: Ita vix paradoxon videtur, si Medicus, antequam præsumptionem de partu hoc vel illo, vitalisne ac legitimus sit; perfectusne ac maturus; an secus? deponat, subjectorum examen adcuratius præmittat. Ideo hoc in casu inspectio utique requiritur, in qua ad sequentia attendendum.

1) Ad magnitudinem, an iusta scilicet & adæquata illius sit proportio: *ob nemlich das Kind so groß sey, als ein Kind von solchem Alter (Monaten) zu seyn pflaget.*

2) Ad conformationem. V. g. in immaturiori, 1) Sutura Coronalis, vel potius Hiatus Rhomboides, verbo Fontanella infantium, plus hiat. Vid. KERCKRINGVS; in *Osteogenia* & *ἀνθρωπογενία*. 2) Auriculæ minus patent, & extrinsecus minus prominent. 3) Os & nares quoque veluti occlusæ sunt, minusque prominent. 4) Labia cum auriculis instar carnis cruentæ, acute minus perfectæ tectæ deprehenduntur. 5) Palpebræ arctius connivent, & quasi conglutinantur. 6) Digi-
 ti manuum pedumque indistincti quodammodo, & sine unguibus conspiciuntur. Quod signum quidem ab HIPPOCRATE, lib. de *superfoetatione*, proponitur. Sed hoc intelligendum tantum de embryonibus admodum exiguis, unius, vel duorum mensium. In embryonibus vero trium mensium ungues adsunt, id quod desiderantibus ad oculum exemplis ostendere possumus. 7) Tota cutis rubet, pilisque destituitur.

3) Ad vocem, num qua adsit, nec ne? præsertim, cum vox vivum vitalemque omnino fœtum designat. Unde dicitur: *Das Kind hat die vier Wände beschryen. Jus Saxon. im Lehnrecht art. 20.*

4) An perfectus membrorum motus sit, an vero imperfectus?

Ex quibus signis adeo elucet, an fœtus vivus sit, debilis licet; an vitalis.

12. Qu. *Quanam causæ sint fœtum debilitantes?*

Varia eorum quidem dantur, quæ tamen omnes probe sunt detegendæ, examinandæ, annotandæ & cum
 ratio-

rationibus decidendi annectenda. Hoc vero ut fiat, considerata sunt 1) Antecedentia partus; 2) Partus ipse; 3) Consequentia partus.

Quæ partum antecedunt, signa desumi plerumque solent v. g. 1) a dispositione mariti. Pater enim genitorque morbosus, v. g. phthificus, hæcticus, hypochondriacus, alioque notabili valetudinis vitio affectus, succos in corpore suo non præparat convenientes ad sui, multo minus ad generis sui conservationem. Ergo semen iners habet, minusque activum.

2. Matris quoque constitutio naturalis & præternaturalis examinanda. Hinc mater exigua, gibbosa, ob uterum exiguum, valdeque compressum abdomen, excludere vix potest fœtus perfectos, vitales, sanosque, cujusmodi, vel simile quid sentiendum etiam de matre hæctica, tabida. Dum enim quantitas liquidorum ad proprium ipsius corpus alendum non sufficit, sufficere illa multo minus potest ad incrementa fœtus præstanda, modo convenienti. Ad matris in hoc negotio habitum ipse respicit HIPPOCRATES, *lib. de Superfætatione text. 8.* ubi inquit: *Si qua partui vicina sit, & oculos cavos habeat, & facies intumescat, & ipsa tota, itemque pedes tument, ut veluti pituita alba apprehensa appareat, & habet aures albas, & summum nasi album, & labia livida, ea ipsa mortuos gestat quos pariet, aut vivos prave, & non vitales, & exsanguis, utpote morbosos, aut prius peperit non vitales. Sic & quæ mammas habet graciles & flaccidas, aut si multum ex iis lactis effluat, fœtus male sanos & difficulter vitales gerit, teste eodem HIPPOCR. aphor. 5. num. 52. & seqq. id quod confirmat CELSVS, lib. 2. cap. 6. Hæc enim omnia œconomiam fœtus, in utero materno turbatam, arguunt.*

3. Morbi matris antecedanei huc pertinent, ut fluxus mensium extraordinarius, casus ex alto, affectus animi, quæ causæ omnes partum intempestive ab utero separare, adeoque exclusionem immaturam promovere valent; qui partus tamen, ut fructus immaturi, minus durabiles existunt.

In partu illa imprimis observanda sunt symptomata, quæ in partu immaturo & intempestivo satis esse solent atrociora.

Post partum varia itidem incommoda se offerunt, v. g. nimia sanguinis profusio, summa debilitas, dolores post partum exquisitissimi ac vehementissimi, quæ accidentia pressio invicem se pede prosequuntur, cum partus ejusmodi sit intempestivus.

II Qu. *Quid sentiendum de partu decimestri, undecimestri & duodecimestri?*

Dictum a nobis superius, terminum partus naturalem esse post 9. menses solares, unde quæstio de partu decimestri, undecimestri & duodecimestri incidit. De decimestri revera dubium non est, quin fieri possit: De undecimestri vere merito quodammodo dubitatur, imprimis cum HIPPOCRATES, *lib. de Natura puerorum*, Text. 38. & 40. contendat, nullam foeminam ultra 10. mensem uterum gestare posse.

Interim ejusmodi nonnulli casus dantur extraordinarii, ac revera natura suo modo terminum naturalem retardare potest. V. g. 1) ejusmodi partus retardatio fit ob energiam seminis deficientem, morbosam partis constitutionem debilemve, ut fieri in senectute solet. 2) Partus retardatur ob matris dispositionem phthisicam, hecticam, ubi foetus sufficienti alimento destituitur. 3) Ob statum etiam matris cachecticum. 4) Ob fluxum mensium

*Cap. Eodre cap.
V. 41...*

fium, tempore gestationis contingentem. 5) Ob diarrhoeam, aliumve fluxum & morbum. 6) Hoc fit ob nimiam uteri amplitudinem. Vid. Cas. in VALENTINI *ff. Medico-Legal. n. 36.* 7) Fieri hoc potest ob affectum matris extraordinarium, tristitiam, qua tota matris massa sanguinea turbatur, adeoque & fœtus ipsius nutritio. 8) Ob diætam matris extraordinariam, imo inediã. 9) Ob fœtus debilitatem & dispositionem morbosam. 10) Quando plures fœtus in utero detinentur.

Patet itaque ex his, jam allatis, argumentis, partum undecimesrem & duodecimesrem ex principiis medicis legitimum pronunciari posse, certis positis circumstantiis, quamvis Jus Civile ejusmodi partum pro legitimo agnoscere haud velit. Recentiores quidem LL. interpretes secundum pronunciata Medicorum tutius paulo judicare solent. Vid. *ff. Med. Legal. Cel. VALENTINI, Part. I. Sect. I. Cas. 35. 36. 37.* in quibus undecimesris partus a Facultatibus medicis legitimus pronunciatur. Apud AMANNVM, in *Medicina critica, Resp. 44* quoque reperitur casus, ubi Lipsiensis Facultas partum duodecimesrem, und noch 13. Tage düber, Marthæ Blattin, deren Hauswirth vor einem Jahre gestorben, als er noch des Tages zuvor mit ihr am Tische gefessen pro legitimo pronunciavit, ex ea ratione, quia mulier per trimestre spatium dolores parturientium continuos, absque jactura virium, pertulerat. AMANNVS insimul in discursu ad eundem casum, plures dubitandi rationes quidem suppeditat, & responsionem illam in favorem matrimonii datam suspicatur. Reperiuntur quoque apud SCHENCKVIM, *Lib. IV. obs. n. 156. usque ad 160.* it. in comment. ad ZACCHIÆ *Quest. Med. Leg. Lib. I. Tit. 2. qu. 6.* casus de partu 13. 14. mensium, imo aliquot annorum. Sed quid de ejusmodi partu statuendum sit, nemo non novit, qui leges œconomix animalis quodammodo didicit. Ejusmodi nempe exempla plane impos-

impossibila sunt, & contra omnem rationem militant, ac vel ad fabulas, vel ad portenta potius pertinent.

Hoc quidem verum, & rationibus atque experientiis medicis contrarium non est, *fœtum, præternaturaliter conceptum, vel etiam in utero per certas causas obvenientes præternaturales læsum, & sic extinctum, ac e vita ereptum, absque detrimento vitæ matris per aliquot dierum, mensium, immo annorum spatia, in utero delitescere posse, non vivum inquam sed mortuum.* Tale exemplum contigit anno 1720. mense Martio, in pago Suevico, prope Gemundam, ubi fœmina 46. annos fœtum, osseis tunicis inclusum, utero gestavit, de quo casu, sub Cel. CAMERARII, *Prof. Tubing.* præsidio, eruditam inauguralem suam conscripsit dissertationem Dominus D. ORTH.

B. Parens meus simile quid fere observavit in fœmina militis, quæ in tuba uteri dextra conceperat, & sic tumorem sibi contraxerat, in hypochondrio illo eminentem. Hunc tumorem, finitis 20. mensibus, aperiebat laudatus Parens meus, Medicus in praxi felicissimus, & in observationibus curiosissimus, & extrahebat corruptum fœtum exiguum, tunicis tamen firmioribus inclusum, cujus skeleton, jussu SERENISSIMI DVCIS BRUNSVICENSIS, IOHANNIS FRIDERICI gloriosæ memoriæ, Romam transmissum, ubi asservatur.

Similes historiæ continentur in ELSHOLZII, Medici Berolinensis, *Obs. de conceptione turbarum*, it. in domini ABRAH. CYPRIANI, *Londinensis, Medici & Professor. Anatom. ac Chirurg. in Academ. Franckeriana, Epistola ad Domin. MELLINGTON, Præsidem Medicorum Londinensium, de conceptione tubarum.* Quo pertinet tandem D. D. MONTAGNIERE. Massiliensis, *de Formatione fœtus in loco insolito*, it. ea, quæ in MANGETTI *Theatr.*

*Theatr. Anatom. Lib. 2. P. 2. Cap. 3. reperiuntur de embryo-
nibus, extra uterum constitutis.*

Sed de eiusmodi conceptione & partu in foro medi-
co juridico sermo non est, quoniam Jcti pro objecto ha-
bent foetum vivum vitalem, & in loco convenienti con-
ceptum.

C A P. X.

DE

ABORTU.

I. Qu. *Quid sit partus, quid abortus?*

Partus est actio naturalis, satis tamen molesta & peri-
culosa, quæ justo tempore circa finem noni mensis
fætus vivus & perfectus excluditur.

Abortus vero vocabulum multis modis accipitur.

1) Sub abortu continetur *effluxus*, Græcis ἐκφυσις, & est
conceptus ejectio, quæ intra septimum diem fit.

2) Ἐκτρωσμός, qui intra quadragesimum contingit.
Distingunt nonnulli, e. g. NONIVS MARCELLVS,
inter abortum & abortum: *Aborsumque* hic dicit esse, qui
primis fit mensibus, ubi conceptui factum est exordium;
abortum vero, qui prope tempus pariendi obvenit.

3) *Abortus* dicitur foetus præternaturalis exclusio,
quæ ante diem, sibi a natura destinatum, non sponte, sed ex
aliqua vi, contingit, qualem abortum promovent illæ, quæ
ita infamiam suam, aut impudicitiam, impio conatu te-
gere volunt.

4) *Abortum fecisse mulierem*, dicunt Icti, quæ ante septimum mensem peperit. Hinc ZACCHI AS, *Lib. I. Tit. 2. qu. 10. n. 19.* inquit: Non obstaret, quod quis sexto mense nasceretur, & per aliquot horas, aut etiam dies, viveret, ut fieri posse non est ita impossibile: Tamen quia hic partus habet cum vita talem repugnantiam, ut vivere nullo modo possit, nisi ex miraculo, idcirco abortivus dici debet, neque testamentum, neque donationem rumpe- re, neque aliud quicquam illi prodesse, quod vero ac naturali partui prodesse solet; sic & mulieri, talem foetum parienti, nihil quicquam prodesse debet, ita, ut ex ea causa parientium, privilegiis gaudere debeat, nisi iis, quæ corporis valetudinem respiciunt. Ast, an in tali casu non sit mitior sententia ferenda, judicent alii ex supra dictis, in capite præcedente.

5) *Abortus* etiam dicitur foetus, in utero mortuus. Abortus enim nomen idem importat, ac si diceres non or- tus, vel frustra ortus, ac idcirco abortus parificatur ei, qui nunquam natus est. TIRA Q. in *L. si unquam.*

2. Qui. *An dentur signa partus & abortus?*

Dantur utique, & ipsa C. C. C. V. art 35. de illis quoque inter alia loquitur. Ast hæc quæstio semper tri- pliciter dividenda: Nam vel quæritur, an mulier abortum procuraverit? vel quæritur, an pepererit? idque rursus dupliciter; vel enim quæritur, an unquam pepererit, & mater fuerit facta? vel an pepererit de recenti?

Signa mulieris recenter enixæ plura, & minus falla- cia observantur: 1) Ventriflacciditas & rugositas, admo- dum conspicua. 2) Cruoris, vel sanguinis, per pudenda muliebria effluxus. 3) Dilatatio vaginæ uteri extraordi- naria.

maria. 4) Regionis pubis intumescencia. 5) Animadvertente PINÆO, *de Notis Virginitat. L. I. C. 7.* tumor pudendorum œdematosus. 6) Lactis in mammis præsentia. 7) Durities mammarum, a tactu dolorosa. Quæ signa, simul obvenientia, satis probant, mulierem peperisse, separatim vero sumpta fallere possunt. Ne tamen id fiat, accuratam dabimus horum signorum perlustrationem.

Fluxus sanguinis post puerperium non confundendus cum fluxu mensium. Ne itaque hoc fiat, probe observanda est 1) quantitas sanguinis, quæ in fluxu mensium parcior & brevior est, ad tres, vel quatuor tantum dies durans. Post partum vero lochia fluunt copiosa, imo ad instar grumorum & fragmentorum, *stückweise*, fluxusque durat 6. vel 7. dies. 2) Qualitas, ubi observamus, sanguinem lochiorum 6to, 8voque die post partum fluere cum aliquo fœtore ac purulentia, ac tandem desinit circa 9. & 10. diem; id quod in fluxu mensium nunquam observatur. Nam mensium fluxus oritur tantum a sanguinis abundantia naturali, quæ vasa uteri lateralia successive dilatat, a qua dilatatione illa quoque apperiantur, & ita sanguis superfluous ex illis exstillat. In fine fluxus mensium serositas aliqua tantum, nunquam vero purulentia observatur. In partu vero & abortu res longe aliter sese habet. Nam hic sanguis, post partum per pudenda muliebria exstillans, oritur a vulneratione vasorum, & placentæ uterinæ ab utero separatione. Ergo in fine fluxus lochiorum partim aliqualis purulentia, partim fœtor contingere debet.

Dilatio partium genitalium, imo rugositas abdominis, dependet a mole fœtus, hæc partes mirum quantum dilatate, in primis vero ligamentorum substantia in parte postica sinus pudoris circa perinæum, quæ furca dicitur,

notabiliter dilatatur, id quod examinanti facile patebit.

Tumor œdematosus pudendorum contigit plerumque a partium compressione, & simultanea forti extentione, quando foetus exitum suum affectat, ubi laxatis, & quasi contusis hisce partibus, imprimis in regione pubis, sanguis & lymphæ postea stagnant, & cumulantur, adeoque tumorem mollem & magis aquosum ibi producunt.

Lactis proventus in puerperis etiam facili negotio distingui potest a Medico erudito ab illo lactis proventu, qui supervenire solet, secundum HIPPOCRATEM *sect. V. aph. 39.* mensium obstructionibus. Hoc fieri potest, quando attendimus ad quantitatem & qualitatem lactis. Nam 1) in mensibus obstructis parva quantitas liquoris mammarum observatur, maxima vero in puerperis, primis præcipue post partum diebus, ubi ab ejus luxuria mammae non tantummodo insigniter tument, sed & dolore tensivo insimul afficiuntur, imo lac abundans sponte quoque in plerisque ex mammis exsillat. 2) In mensibus obstructis raro lac albidum & perfectum deprehenditur, sed potius liquor serosus & aquosus, in puerperis vero lac debitam suam consistentiam acquisivit. Ideo hoc signum prope attendendum est, monente in specie *Constit. Crimin. art. 36. welcher denn in denen Brüsten NB. recht vollkommene Milch erfunden wird, &c.* An olim vero aliqua pepererit dignoscere, res maioris momenti ac difficultatis est. Nam hic præsumptiones illæ, iam allegatæ, locum non inveniunt, & ideo concludere minus licet a ventris flacciditate & rugositate, partiumque genitalium ampliitudine ad partum occultatum, 1) in illis, de quibus certi sumus, jam antea peperisse, v. g. viduis, ubi dubius manet Medicus pariter & Ictus, an a pristino, an a postremo partu illa epigastrii flacciditas & rugosi-

tas,

tas, ac pudendorum dilatatio fit. 2) In virginibus etiam hoc non quadrat. Nam distensio illa abdominis etiam ab alia causa provenire solet, v.g. hydrope, fluxu mensium retento, colica, ad quam sexus foemineus in specie inclinatur. 3) Etiam illa rugositas, adhibito debito regimine, in primi-paris inprimis, facile invanescit, adeo, ut attendi haud valeat, inprimis vero quando praeterlapso aliquo temporis spatio partes subsederint. 4) Semel, vel bis puerperæ, quando obefiores sunt, param, aut nihil rugositatis in abdomine experiuntur, inprimis, si foetus minor fuerit. 5) Norunt etiam subligaculis, de collo suspensis, ventrem tumidum sustinere, & distensionem violentam reprimere. 6) Partium genitalium laxitas quoque nihil certi probat. Nam illa naturalis esse potest, uti supra monuimus de virginitate. Natura enim ludit in hisce partibus. Immo tractu temporis sponte cessat interdum hæc laxitas præprimis, quando diu a coitu & partu abstinerint foeminae.

Ex his jam allatis, facile patebit, quod ejusmodi examen summa cum prudentia & circumspeditione fit sciendum. Nam hæc investigatio interdum adeo difficilis est, ut vix, vel plane non cognosci possit abortus. Fit enim interdum abortus prompte, ut foemina ipsa vix illius plus, quam eruptionis mensium, rationem habere possint, & excernuntur ejusmodi foetus interdum sine ullo doloris sensu. Ast ad meliorem hujus rei notitiam acquirendam, probe attendendum, an abortus sit provocatus primis mensibus. Quando primis mensibus provocatur, ubi foetus ejusque placenta, non adeo firmiter cum matre cohaerent, fieri hoc potest sine evidenti matris alteratione; h. e. sine vehementi sanguinis profusione; (nam vasa adeo majora non existunt;) sine partium genitalium præternaturali amplitudine; (nam corpus exiguum foetus facile per aperturas transit;) sine febris; (nam massa sanguinea &

uterus a levissimo remedio exagitari possunt, & foetus separationem promovere.) Ex quibus patet, abortus signa primis mensibus admodum esse difficilia. Quando vero abortus fit ultimis gestationis mensibus, aliter fieri non potest, quin superveniant gravissima symptomata. Nam foetus aliquo modo firmiori nexu cum matre cohaeret, & ab irritante remedio non tam facile movetur.

3. Qu. *Quanam sint remedia, abortum promoventia, & quomodo agant?*

Ad abortum excitandum remedia varia pertinent, primario fortissima purgantia, vomitoria, sternutatoria, diuretica, emmenagoga, mercurialis salivatio, & ipsa venæ sectio, quæ omnia massam sanguineam partium caliditate, volatilitate, & elasticitate sua fortiter commovent, & expandunt; partim salibus acrioribus sanguinis fluxum per muliebria promovent; partim uteri & viscerum abdominis nervosas partes enormiter irritant ac stimulant, & sic convulsiones doloresque notabiles harum partium præstant, quibus mediantibus foetus vel expellitur, vel debilitatur enormiter, aut in utero extinguitur. Huc pertinent porro ipsa venena, de quibus vero alibi: Item violentiæ externæ, cursus, saltationes, præcipitationes, abdominis compressiones, fustigationes, uno verbo, omne id, quod uterum quasiare & sanguinis fluxus commovere potest. Ergo ut plurimum in ejusmodi statu, foetu nempe majori perpellentia expulso, succedunt & cumulantur gravissima symptomata, sanguinis nempe profusio maxima per pudenda muliebria, dolores intolerabiles, & interdum lethales abdominis, uteri, partium genitalium, renum, vesicæ urinariæ inflammationes, febres, & ex
his

his lassitudo, pallor faciei, inquietudo, appetitus prostratus, deliria, convulsiones, &c. quæ omnia a violenta illa separatione placenta uterina, & vasorum uteri vehementi dilaceratione, massaque sanguinea & nervorum exagitatione dependent.

Quando itaque ejusmodi symptomata in suspecta quadam persona annotantur, tunc revera suspitio mirum quantum augetur.

4. *Qu. An maturus fœtus, servanda matris causa, occidendus? Et an abortus provocandus sit, ut mater gravida a magno morbo morteque liberetur?*

Hæ quæstiones dudum a priscis Medicis jam sunt motæ ac ventilatæ. Cum vero varia vulgi judicia, de Medicorum actionibus, & gravidarum methodo medendi lata, sermoni huic ansam præbuerint, ideo, in fine hujus capituli, quoque eas annectere ex re esse duxi. Ad primam autem quæstionis partem respondet RIOLANVS. in *Enchiridio*, p. 2. C. 28. notabili tamen cum audacia: Si mulier, inquit, exegerit duos, tresve dies in tormentis partus; si moribunda & exanimis; si gangrænæ, in partibus pudendis, indicia compareant: Etiam si certo non constet de morte infantis, unco extrahatur, ut conservetur mater. Præstat, unum interire, quam duos: Vita matris præferenda infanti. Non debet mater mori, ut salvetur infans. Hæc RIO- LANI verba sane nimis dura, & obstetricandi artis regulis minus convenientia esse videntur. Ipse enim Chirurgus & Medicus non semper certus esse potest, an ita salvetur mater, dum non sufficit, extractionem fœtus interdum satis horrendam, unco, aliisque in
Chirur-

Chirurgia usitatis instrumentis, fulcipere, foetumque in frustra discindere, sed conscientiam suam servare potius debet Medicus, ac ideo caute atque circumspicte in ardua hac operatione procedere, secundum regulas eorum, qui foetum extrahere docent sine instrumentorum secantium adjumento.

Ad alteram quaestionem quod attinet, casus interdum emergunt, in quibus metuendum, ne gravida, natura tenera, in quibus oneribus succumbat, imprimis si uterus & vesica a magno morbo afficitur, ex quo in partu mortaliter laedi possit, aut affligatur aliter, a morbis nempe acutis, febribusque malignis, haemorrhagiis uteri (in hoc casu DIONISIVS, in *Chirurgia* sua, audacter quoque abortus promotionem suadet,) diarrhoeis, in quo casu Medicus, quid agat, sane interdum nescit. ZACHIAS, L. 6. Tit. 1. qu. 7. varios ex JCtis pariter ac Medicis, citat auctores, qui talem abortus promotionem suadent, atque commendant, quo mater a morte vindicetur, ne simul cum infante pereat. Consentit quoque AMMANNVS, in *Med. crit. cas.* 6. ubi ad quaestionem, an Medico abortum provocare liceat, ita respondet: Ego, inquit, distinguo 1) inter personas suspectas & non suspectas. 2) Inter morbos acutos, gravidas infestantes, in quo casu praestat, matrem servare, quam concedere, ut mater & foetus intereat. Medico tamen hic semper cautione opus est. Et quemadmodum, pro conservanda arbore, rami abscinduntur; aut navis, nimis onerata, oborta tempestate, evacuatur: Ita vita matris interdum per jacturam foetus conservatur. Vid. Celeb. BOHNII, *Dissert. de Abortu salutari*. Quid enim agendum in gravida, quae v. g. venenum assumpsit, an non statim pro-

propinandum vomitorium, quod tamen ad abortum provocandum infimul aptissimum est remedium, quid agendum in febribus gravidarum, tum continuis, tum intermittentibus, nonne venæsectio, purgans, vomitorium, generosumque bezoardicum concedendum, quæ omnia infimul abortum promoventia suo modo dici possunt remedia, quid faciendum in gravida, lue venerea laborante, nonne hic præbenda mercurialia, utpote quoque fœtum pellentia remedia. Necessitas durum telum quoque in praxi medica est, ubi sane interdum non cunctandum, sed aliquid agendum & suscipiendum potius, aut moriendum. Distingunt ideo Medici inter abortum directe & indirecte provocatum. Illum vocant, quando dolo malo spes prolis extirpatur; indirectum autem, quando remedia, in morbum quidem matris competentia, sed simul ita comparata adhibentur, ut tenello nocere possint. Huncce posteriorem modum inter licitos, priorem inter illicitos numerant.

CAP. XI.

DE SUPERFOETATIONE.

I. Qu. Quid superfœtatio sit?

Superfœtatio, sive superimprægnatio, Germanice *Uberschwængerung*, est conceptio, supra conceptionem facta, cum scilicet mulier, jam gravida, iterum ex novo coitu, & novo semine alium infimul fœtum concipit.

K

Vid.

Vid. COSMI VIARDEL *Hebammen-Buch*, lib. I. cap. 6. Quæstio ideo oritur apud Jctos & Medicos, an talis detur superfœtatio, in casu nempe, si vidua, prægnans a marito relicta, justo tempore fœtum pariens, post plures dies, septimanas, & menses alium fœtum excludit, qui ratione temporis non a marito generatus, sed superfœtatus esse videtur, & dubitatur simul de matris castitate, & nati posterioris legitimatione.

2. Qu. *An detur superfœtatio, sive, an post priorem conceptionem alia alio tempore fieri queat, ita, ut simul gestentur duo fœtus, distincta tamen ætatis, hinc diverso partus tempore excludendi?*

Dubitant quidem Medici de superfœtatione, inter quos primas tenet VALVERDA, Hisp. in *Anatomia sua* Lib. 3. Cap. 14 qui hanc rem risu dignam pronuntiat, & BLASIVS in *Not. ad VESLINGII Syntag. anatom.* Cap. 7. inquit: Nihil tam rarum, quam vera superfœtatio, quam neque unquam vidi, neque possibilem judico. Negantes vero nullo satis ponderoso argumento negativam suam communiunt assertionem, sed tantum plerumque vulgatissimum illud fundamentum, ex HIPPOCRATE, *Aphor.* 5. n. 51. desumptum, allegant, ubi dicitur. Os uteri internum post conceptionem clausum esse, & quidem adeo, ut neque tenuissimi styli mucronem admittat, cui alii porro addunt, quod uterus semen conceptum arcte & sollicite in sua cavitate complectatur, ita, ut nullum in eo spatium relinquatur pro nova, vel alia conceptione. ANDR. LAVRENTIVS, in *Anatom.* Lib. 8. qu. 22. superfœtationem quidem non negat, ast infimul

mul fatetur, rationem hujus rei multis difficultatibus implicitam esse. Inter illos, qui partes affirmantium tuentur, & existentiam superfoetationis admittunt, est HIPPOCRATES, *Lib. de superfoetatione*; it. ARISTOTELIS, *Lib. 4. de generatione animalium, Cap. 5. & 7.* PLINIVS, *hystor. natural. Lib. 7. Cap. 11.* FERNELIVS, in *Physiologia Lib. 7. Cap. 12.* SYLVATICVS, in *Controversiis medicis, n. 81.* ROVSETVS, *de partu caesareo.* PARAEVS, in *Obs. Lib. 23. Cas. 52.* FONTANVS, in *Epistol. ad Vesalium*; SALMVTHVS, *Cent. 3. Obs. 33.* PLATERVS, in *Praxi, Tom. 3. p. 514.* HARVAEVS, *de generatione animalium*; KERCKRINGIVS, in *Spicilegio anatomico*; ut alios taceam, allegatos a L. B. de Franckenau, in sua *Dissertatione de superfoet. §. 5.* Et si placet, evolvantur SCHENKII *Obs. Lib. 4. p. 560.* ubi reperitur stupendum superfoetationis exemplum, quod contigit in Ducatus Würtembergici urbe Binnicheim: Plura exempla, non ab antiquis, sed recentioribus observata, v. g. BLANCKARDO, BARTHOLINO, RVYSCHIO, reperiuntur in FRANCKENAVII cit. *Dissert. §. 8.*

3. Qu. Quomodo fieri possit superfoetatio?

Modum, five rationem superfoetationis, tradere, res admodum difficilis est. Nam non negari potest absolute, quod uterus post primam conceptionem arctissime claudatur atque contrahatur, ita, ut nullum plane spatium pro alio ovulo relinquatur. Porro ipsa superfoetationis exempla rara, imo rarissima sunt, etiam in illis subjectis, quæ inextinguibili amoris ardore flagrant. Unde apparet, quod nemo absurde dubitet de superfoetatione. Ast HIPPOCRATES noster revera rem acutè tetigisse videtur, quando, *Lib. de superfoetatione*, inquit, superfoetationem fieri in illis tantum

subjectis, quorum uteri osculum post conceptionem priorem aliquo modo apertum manet. Quod fit in subjectis, quorum muscoli sphincteres uteri natura sunt relaxati. In his nempe feminis virilis aura, per orificium tale apertum, transitum invenire potest, atque ulterius moveri ad ipsum ovarium, ovulumque ibi existens maturum irradiare, flaminaque, in illo contenta, commovere, ac vivificare, & sic superfoetationem præstare.

4. Qu. *Quo tempore plerumque fieri soleat superfoetatio?*

Plerique Medici, v. g. SPERLINGIVS, *de formatione foetus* p. 79. BAVHINVS, *ad Rousettum*, superfoetationem fieri posse statuunt intra 30. primos conceptionis dies, licet PAVLVVS, *Jctus*, L. 3. ff. *si pars hæreditatis petatur*, superfoetatum foetum, post diem 40. editum, admittat, & GLOSSA, supra L. *cum quidam suum hæredem* ff. *de acquirenda hæreditate*, superfoetationem sine certo dierum numero fieri posse statuatur, ideoque terminus superfoetationis hic ad 60. usque dies prorogetur. Quibus adstipulantur & Medici, inter quos est KERCKRINGIVS, *l. c.* qui foetum unum 8. alterum, sive superfoetatum, 4. mensium annotavit. Apud LAVRENTIVM, BAVHINVM HERCVLEM SAXON. & THOM. BARTHOLINVM, *Cent. 4 Hist. 14* varia quoque similia exempla reperiuntur, ne dicam de illa SCHENCKII supra citata observatione, in Ducatu Würtembergico, quæ sane varia superfoetationis tempora innuit. Ejusmodi observationes ideo confirmant, naturam in opere eiusmodi extraordinario non attendere, vel observare statum dierum numerum, sed interdum antepondere, vel postponere illum posse. Interim tamen

mem prioribus septimanis, ubi foetus prior admodum exiguus adhuc est, superfoetationem promptius fieri posse, ratio docet.

Glossa, supra allegata, monet simul, quod attenda sit temporis distantia intra partum priorem & posteriorem, & ex hac distantia, vel temporis intervallo, computare vult tempus superfatationis, sicuti v. g. ex partu contemporaneo concluditur plerumque gemellos simul conceptos esse. Ast hic concludendi modus fallax esse videtur, 1) quoniam, secundum LAVRENTIUM, *l. c.* secundi conceptus raro sint vitales. Nam locum suum non satis amplum in utero inveniunt, nec debitum ac sufficiens nutrimentum superfoetati capiunt. Quod confirmat etiam exemplum Montbelgardense, ubi scriniarii uxor foetum vivum & incolumem primum edidit, verum, quatuor inde septimanas post, alium, sed mortuum, enixa est. Vid FRANCHI *Comment in Zach. Lib. I. Tit. 3. qu. 3. p. 100.* Rarissime partu tempestivo, vel naturali, excluduntur, sed plerumque sub forma abortus abeunt, secundum LAVRENTII & BARTHOLOMI observationes. 3) Ut plurimum eodem die cum foetu priori excluduntur, testante KERCKRINGIO.

5. Qu. *An dentur signa superfatationis certa?*

An in hoc vel illo subiecto superfatatio contingit, difficillime, vel plane non dijudicatur, teste MAVRICEO, egregio de morbis parturientium & gravidarum scriptore, *I. I. C. 9.* Et argumenta, quæ ad demonstrandam superfatationem ab aliis proponuntur, sane non sufficiunt. Nam 1) inferre volunt ex utrius-

que partus diverso tempore: Quod tamen argumentum non itringit, vi supra allegatorum. 2) Si foetus superfoetatus cum priori simul excluditur, ex discrepantia magnitudinis superfoetatum dignoscere volunt: Ast magnitudo & perfectio diversa etiam hic nihil probat. Nam unus foetus in utero materno a morbo debilitatus & labefactatus, ob deficientem nutritionem, exiguus manere potest. 3) Rationes decidendi desumunt quoque ex secundinis, & arbitrantur, quod gemelli uno involucri contineantur, superfoetati vero distinctis gaudeant secundinis. Ast hocce argumentum quoque per observationes refutatur. Nam gemelli rarissime in una delitescent secundina, sed plerumque duplici, confirmante hoc experientia quotidiana scriptorum de partu, *oder der so genannten Hebammen-Bücher.*

C A P. XII.

DE

M O L A.

Duplici de casu in foro iudicio & medico de mola quaestio oritur. 1) Si mulier de mola suspecta redditur, cui tamen cum viro coire non licitum fuit, & ideo de ejus pudicitia & castitate dubitatur. 2) Quaeritur. An mulier, molam gerens, privilegiis praegnantium gaudeat?

1. Qu. *Quid sit mola?*

Mola est vitium conceptionis, sive falsa & depravata conceptio, ubi loco foetus veri massa informis concipitur & excluditur, & quidem modo sola, modo cum foetu conjuncta, modo mola ipsum foetum includit, & in centro suo

fuo fovet, quod quamvis rarissime contingat, observatum tamen fuit a KERCKRINGIO, in *Spicileg. anatom. Obs.* 25.

2. Qu. Quid sit causa mola?

Hæc quæstio sane primaria est. Nam ita respondendum simul ad illam quæstionem, an nempe virgines & viduæ castæ, sine viri cohabitatione, in utero molam formare valeant? Quod vero attinet causam molæ efficientem, non errabimus sane, si, omissis & neglectis veterum nugis, et ventosis theoriis, triplicem molæ admittamus materiam: 1) Sanguinem uterinum. 2) Semen muliebri solum, & sibi relictum, sive, quod idem est, ovulum. 3) Ovulum, ab aura seminali seminis virilis actuatum.

Sanguis quomodo sine ovulo, vel semine muliebri, in molam abire possit, explicare quidem difficile, sed non plane impossibile est. Ponamus enim, quod a semine masculino non tantum ovulum fecundetur, sed & uterus modo singulari ad fœtus nutritionem præparetur, id quod extra omnem dubitationis aleam positum est, & ex singulari uteri sensu post coitum confirmatur. Possumus itaque statuere, quod in congressu semen emissum intacto ovario agat tantummodo in uterum, eumque eo usque fecundet, ut sanguis ejus, nutritioni fœtus alias destinatus in molem indigestam coaguletur & coeat.

Porro sanguis ipse, in utero contentus, & forte ad cavitatem uteri exstillans, sine omni concursu seminis virilis, in talem massam informem concreescere potest. Talis mola e. g. generatur in castis, virginibus & viduis. Sanguis enim omnis, inprimis uteri, fluidum est facile coagulabile, & natura fibrosum, atque facile grumescens, & quemadmodum in aliis partibus sanguis extravasatus mutatur in tumores duros & chronicos, polypum, sarcoma, schirrhum, steatoma, ita multo magis in utero talis con-

concretio sanguinis possibilis atque probabilis est, imprimis cum sanguis menstruus quam frequentissime frustulatum in plerisque subjectis evacuetur, quo dispositio ad coagulationem prona indicatur.

Semen muliebre, sibi relictum, an unquam in molam commutari queat, dubitant auctores diversi. Interim de LA COURVE, *Libr. de Nutritione foetus*, P. III. C. 4. & LAMSWERDVS, *Tr. de Molis*, Cap. X. hoc non absolute negant, dum aliquam activitatem, quamvis insufficientem, seminini foeminino concedunt. Et cum observemus in pennatis, imprimis gallinis, quod ova excludant sine galli concursu, quæ tamen in pullos nunquam mutantur, quare dubitamus, quod in mulieribus virginibus atque viduis sanis, atque suo modo voluptuosis, ovulum, ad maturitatem evectum, possit ab ovario separari, a tubis Fallopiæ exceptum ad uteri cavitatem duci, ibique maturari, mutarique, non quidem in foetum, sed in massam informem, hoc est, molam.

Ovulum, five genituram, aut semen muliebre, a virili semine imprægnatum, multo frequentius in molam verti posse, vix probatione indiget. Fieri tamen hoc videtur 1) a defectu staminum ovuli, hoc est, particularum minimarum, machinam corpoream constituentium. 2) A defectu & inertia particularum activarum seminis virilis, quas five salutes partes organisantes, five digerentes, perinde mihi est. Nam stamina, ovulo insita, non convenienter ad ordinem legum œconomix animalis activantur, vivificantur, commoventur & expanduntur. Ergo non distincta organisatio, sed magis massa informis oritur. 3) Mola oritur, quando stamina viscerum, eorumque membranulæ, ab impetu auræ seminalis dilacerantur, vel a calore excessivo uteri, nimiumque fovente, destruuntur. Hujus theoriæ veritatem probant observa-
tio.

tiones in ovis gallinarum, in quibus utpote suppono, quod haud alia sit organisatio, partiumque conformatio, quam in ovis humanis imprægnatis. Quando vero ovorum gallinæ stamina invisibilia, membranæque subtiles & pellucidæ, vel a calore æstivo excessivo, vel a cœlo tonante, vel ab alio motu & agitatione extrinseca, rumpuntur, tunc mutantur ova in liquamen putridum, massamque informem. Simili itaque modo rumpuntur stamina, ovuli humani, vel a causis supra dictis, vel ab affluxu humorum acriorum, qui cum liquoribus ovuli miscentur, vel ab alia causa conceptionem turbante, quæ revera variorum sunt, & hic enumerari vix possunt.

Hiscæ præmissis apparet, molam quidem generari posse absque viri cohabitatione, in viduis & virginibus castris, rarissime tamen, & si generatur, generatur informis, immo absque omni vitalitatis signo. Hoc probant monumenta diversorum scriptorum. Sic in viduis 60. & 70. annorum (in quarum amplexus viri non facile feruntur, quoniam vix amplius amabiles sunt) observavit molas RHODIVS, *Cent. 3. Obs. 53.* quarum una jurejurando confirmavit, octo & decem annis nulla se viri consuetudine usam fuisse. Similes historiæ prostant in MARCELL. DONAT. *Histor. mirabil. L. 4. C. 25.* DODONÆI *Obs. C. 49.* In virginibus molas observavit HORSTIVS, *L. 5. Obs. 39.* STALPARD van der WIEL, *Cent. 1. Obs. rarior. 32.*

3. Qu. An dentur differentia molarum?

Utique, & sane non exiguæ, sed multifariæ, quæ etiam in foro juridico probe sunt attendendæ. Et quidem 1) dantur *molæ aquosæ*, ad instar vesicæ aqua repletæ, quæ revera speciem hydropis, & quidem uteri, constituunt. 2) Dantur *molæ vesiculares*, quales in tribus personis

sonis observavi. Nempe mulieres se gravidas esse putarunt, verum tertio, vel quarto gestationis mense cum doloribus partus, & sanguinis enormi profusione, excluderunt molam pugnae magnitudinis, & ultra, cujus substantia extus & intus placentulam uteri referebat, hoc est, vasculosa, carnosae & tunicata erat, hac dissecta, aqua mundificata & elutriata, in conspectum veniebant hydatides, sive vesiculae aquosae diversae magnitudinis, aliae ad instar granorum milii, aliae lenticulares, aut pisiformes, aliae oblongae, ovulis formicarum similes. Ejusmodi molas observavit quondam TVLPIVS, L. 3. Obs. 32. LOSSIVS, L. 4. Obs. 16. STALPART, van der WIEL, Cent. I. Obs. 70. BIDLOOVS, in *Exercitationibus Anatomico-Chirurg.* 3.) Dantur mola carnosae & vasculosae, verae dictae, vel solidioris vel laxioris substantiae ad instar sanguinis congrumati, & membrana involuti. KERCKRINGIVS, in *Spicilegio anatomico*, & RVYCHIVS, in *Obs.* putant, ejusmodi molas esse placentas, aut earum partes, quae vel post abortum, vel partum legitimum in utero relictae, a compressione uteri subsidentis, ejusmodi faciem acquirant 4) Reperiuntur mola dissimilares, ex membranis, pinguedine, glandulis, vasculisque sanguiferis, vesiculis aqueis, compositae. 6) Observantur interdum mola carnofo-membranosae, statu turgidae, sive ventosae, qualem in virgine, casu ab alto lapsa, observavit TH. BAKTHOLINVS, Cent. I. Obs. 97. It. BOHNIVS, tales bis observavit, quemadmodum testatur in *Colleg. M. S. de morbis mulierum*. 7) Dantur carnosae figuratae, certam figuram determinatam alicujus rei representantes, v. g. apud PLATERVM, in *Praxi*, T. 3. p. 898. stellae marinae, vel, annotante BARTHOLINO, Cent. 4. hist. 84. capitis ovilli, dentibus, pilis, ac oculis instructi, vel, secundum FORESTVM, L. 28. Obs. 62. & 68. capitis accipitris rostrati, vel, secundum HORSTIVM, L. 5. Obs. 39. mola murem referens, vel, secundum SALMVTHI observationem, Cent.

Cent. 3. Obs. 98. mola, piscem referens viventem. Quæ historia, utpote notabilis, ita sese habet: Civis Servestini uxor die 29. Mart. abortum fecit, hinc tertio die molam exclusit, & rursus die 5. April noctu massam carneam palmæ longitudinis & latitudinis, viventem, prodidit. Os larium erat ad instar piscis absque cavitate, aderant duo nigra puncta ad instar oculorum, hæc massa, in terram prolapsa, palpitavit, ad instar piscis, spatio vero trium horarum motus cessavit. Plures ejusmodi observationes apud auctores reperiuntur. Quemadmodum itaque non credendum, ejusmodi molam animatam esse: Ita consideratur a Phycis & Medicis ut ZOOPHYTON, quod haud diu in tali statu permanere potest, sed brevi tempore perit. Ex his, jam dictis, concludere licet, quod figuratæ molæ præsupponant certe prævium congressum; non figuratæ vero, informes, & motu non præditæ, generari possint absque omni inprægnatione, a solo vitio & præternaturali statu uteri, in viduis atque virginibus.

4. Qu. *Quanam sint signa, quæ mole præsentiam indicant?*

Signa molæ diagnostica vix primis mensibus differunt a signis inprægnationis veræ, ideoque hoc in passu falluntur interdum peritissimi Medici. Id quod confirmat historia GRADI, in propria uxore decepti. Vid FOREST. *Lib. 28. Obs. 62.* In primis non differunt signa, quando mola conjuncta cum foetu existit. Quando vero sola adest, tumor ventris, admodum durus, reperitur, & minus tractabilis, abdominis tensio major adest, quam in revera gravidis, & in pubis regione pondus immobile observatur, moles uteri quoque de latere in latus volvitur. Circa dimidium gestationis tempus nullus motus, motibus foetus similis,

percipitur. Mater molam gestans, languida redditur, & vel in cachexiam, vel in tabem incidit, ac demum vix signa partus naturalis sese manifestant tempore, ex natura destinato.

5. Qu. *An mulier, molam gerens, privilegiis gaudeat pręnantium?*

Quod hanc quęstionem attinet, ZACCHIUS, in *Q. M. L. lib. I. tit. 3 Qu. 7. n. 7.* & cum eo Cel. PETR. MULLERVS, *Jctus noster. Diss. de Jur. pręnant. Cap. 4. th. ult.* distinguit inter molam solam, & inter molam cum foetu junctam. Si mulier solam molam, absque foetu, in utero gerit, non gaudet illis privilegiis. Nam leges non respiciunt ad molestias, quas sentiunt gravidę durante gestatione, sed foetus magis miserationem habent. Cum vero arduum sit in abstruso generationis negotio determinare, an mola sola adsit, an cum foetu conjuncta, ideo tutius, nostro judicio, Jcti molaticis tribuunt privilegia pręnantium, dum foetum, pro mola habitum, juribus suis ita non privant, inprimis cum foetus aliquando in centro molę delitescat, sicuti hoc observavit KERCKRINGIVS, *Spicileg. anatom. Obs. 95.* Quid denique statuendum sit de baptismo molarum, illud sequentię docebunt. Si scilicet hocce sacramentum monstris non applicatur, multo minus molis concedi debet, utpote rebus, a specie humana maxime alienis.

CAP. XIII.

DE

MONSTRIS.

Non uno ex capite de monstris agitur in foro juridico & theologico, & quidem 1) quando quæritur de hæreditate, an monstrum rumpat testamentum? An filius, aut filia dici mereatur? An gaudeat privilegiis, quæ alias ex filiatione fluunt? secundum legem: *quod certatum est, in fin. C. de Posthum. hæred. instituend. L. 14. ff. de statu hominum L. 135. ff. de Verborum significatione.* 2) Ubi de redhibitionibus agitur, & quidem ob monstrositatem, in *ff. de ædilitio edicto.* 3) Quando de sodomitico hominis cum bruto congressu quæstio est. 4) Quando a Theologis quæritur, an monstrum sit baptismi capax? 5) An fœtus talis monstrosus pro mari, aut fœmella baptizari debeat? 6) An bicorporea monstra duo sint homines, adeoque semel, vel bis baptizanda? 7) Quando a Jureconsultis quæritur, an, ut duo, in hæreditate succedant? 8) An monstrum sit interficiendum? secundum *L. 18. a Romulo datum*, non obstante *L. Cornelia*, immo, an monstra in flumina sint demergenda? secundum *Commentar. GODOFR. ad L. 135. ff. de Verborum significatione; WEINREICHIVM, de monstris, Cap. 14. ALPHONS. DE CARANZA, de Partu naturali & legitimo.* 9) An alimenta a patre monstris debeantur? ex *Tit. ff. de alendis & agnoscendis liberis.*

I. Qu. Quid sit monstrum, quid portentum,
vel ostentum?

Monstri, ostenti portenti & prodigii variæ quidem prostant apud auctores definitiones, de quibus legi meretur

ZACCHIAS, *Lib. 7. Tit. I. qu. 1.* Interim tamen nobis placent Cel. LVDOVICI Hall. in *Ufu Practico distinction. Juris p. 23.* verba, quæ ita sese habent: *Monstrum* dicitur, cui caput humanum deest. Nam intellectus in capite esse præsumitur. Hæc sententia ab omnibus, ut vera, agnoscitur. Anima enim in cerebro operationes suas exercet, & a cerebri læsione rationis usus turbatur, id quod deliria confirmant. Est itaque monstrum, cui caput humanum deest. Hic defectus duplici modo a nonnullis sumitur, 1) quando excluduntur, sive nascuntur monstra sine capite, qualia exempla prostant in JOH. HELLWIG. *M. D. Observ. Phys. Med. cum Scholiis Cel. LVC. SCHROECKII, Jun. Obs. 1.* ubi Celeb. auctor scite judicat, non probabile esse, cerebrum in pectore extare, & ideo merito reprehendit illos, qui tale monstrum, ab aliis minus recte *infantem acephalum* dictum, ac in apice trunci per foramen quoddam spirans, baptizarunt. Sacramentum enim hocce solis hominibus tribuendum, non vero monstris, & imprimis sine capite natis, quod sane sine scandalo fieri non potest. Porro monstrum acephalum dici potest suo modo, cujus caput belluinam, vel bestialem faciem repræsentat. Nam a facie humana concludere licet ad statum cerebri, homini proprium, vel improprium; ergo ad præsentiam, vel absentiam animæ rationalis. Sed quoniam existentia animæ rationalis, quæ humanam formam dat, ex actionibus recens natorum haberi non potest: Ideo ejusmodi monstrum quidem non interficiendum, nec tamen nostro judicio statim baptizandum. Dubia enim hic res manet tam diu, donec tractu temporis per signa evidentia humanitas magis appareat. Nam in monstrorum conformatione non errat anima rationalis, sed anima brutorum potius, sensitiva dicta, sive, quod idem est, principium vitæ. Monstra enim in brutis etiam formantur, teste quotidiana experientia.

Osten-

Offentum, portentumque dicitur, secundum supracitatum LVDOVICI, illud, in quo natura membra humana mutavit, ampliavit, vel imminuit, vel cuius membra, capite excepto, a forma debita & congrua recedunt, v. g. quando digiti, manus & pedes, vel deficiunt, vel brutorum membra repræsentant. Sic conservo monstrum exiguum humanum digiti longitudinis, quod caput quidem humanum gerit, intestina vero non in abdomine, sed extra illud in tenui pellucidaque vesica continentur, sexum habet indistinctum, brachia deficiunt, & eorum locum organa, alias deplumatas (*einem abgeraufften Tauben-flügel gleich*) repræsentantia suppleant, pedes irregulariter contorquentur, uno verbo, totum corpus irregulare est, capite tantummodo excepto.

2. Qu. Quomodo dividuntur monstra?

Divisiones monstrorum variæ dantur ab auctoribus, v. g. a RODERICO CASTRO, *de Morbis mulierum*, P. I. L. 3. cap. I. BAVHINO, *de Hermaphrodit. Lib. I. Cap. 15.* LICETO, *de monstris*, Lib. I. WEINREICHIO, &c. ubi distinguuntur monstra 1) in illa, quæ totum corpus mutant, 2) in illa, quæ unam alteramve partem tantummodo mutatam habent.

Monstra, totam speciem mutantia, ac bruta repræsentantia, an unquam extiterint, merito dubitamus, & magis historias illas ad fabulas & figmenta referre volumus, ubi asseritur, quod homines ex brutis, bruta & bestię integræ, ut canes, vituli, &c. ex hominibus nati fuerint. Extant tales historiolæ inter alia in Cel. SCHVRIGII, M.D. nuper edita *Spermatologia*, p. m. 209. usque ad 215. Verum p. 219. eruditus auctor proprium suum annectit iudicium, quod nempe hætenus a
se

se recensita exempla fidem vix mereantur, & potius pro fictis habenda sint. Nam cum ovum, docente HARVÆO, non aliunde procedat, quam a foemina, ac in illo totius corporis humani compendium jam ante conceptionem contineatur, non potest aliud animal ex illo ovo produci, quam quod in eo delineatum est, etiamsi (posito, non concessio) aspersione peregrini seminis masculini irroretur & vivificetur, quis seminis masculini particulæ spirituosæ, secundum communem sapientiorum Philosophorum, & ipsius HARVÆI, sententiam solummodo stamina ovi rore foecunditatis imbuunt, eaque primum actuando, primitivum vitæ motum afferunt, & non de novo particulas, in ovo delineatas, peregrinis figuris describunt. Hinc generationes hominum ex vaccis, aut equabus, vel asinabus, item generationis canis & vituli ex hominibus, &c. fabulas sane sapiunt.

Secundum partes monstra humana speciem mutant, quando gerunt v. g. caput bovis, vituli, canis elephantis, qualia exempla in superstitiosi patris SCHOTTI *Physica Curiosa*, ære expressa, repræsentantur. Vel quando faciem repræsentant ranæ, simiæ, suis. Vel quando cornua gerunt, aut vittas, *Fontanges*.) Vel quando loco nasi proboscis elephantis adest, Vel quando adsunt aures asininae, oculi item diversimode defædatis, qualia exempla apud jam citatum SCHOTTVM, *Lib. 5.* prostant. Vel quando caput humanum adest, reliquum vero corpus totum monstruosum. Vid. SCHOTT. *loc. cit.* & PARÆVM, *Lib. 24. obs.* Vel si homo bubulis, equinis, anserinis, raninis, aliisve pedibus, vel ungulis animalium volatilium defædatus. SCHOTT. Et posterioris conditionis mihi exemplum notum est.

Mon-

Monstra sine speciei mutatione sunt, quorum membrorum conformatio turbatur vel secundum situm, vel quantitatem, vel numerum, vel figuram. Quoad *situm* monstrum est, quando v. g. oculi in pectore deprehenduntur, vel brachium in cervice, aut circa costas spurias, qualia exempla SCHOTTVS, *l. c.* recenset. Secundum *quantitatem* aberrat natura, quando manus, aut pedes, aut caput, & organa in capite vel nimium sunt exigua, vel nimium excedunt. Secundum *numerum* error committitur, quando omnes digiti in unum coalescunt, vel augmentantur, h. e. quando sex, vel plures digiti in una manu conspiciuntur, quo pertinent & monorchides, & triorchides, item huc referri debent monstra bicorporea, (Legi meretur Cel. ETMVLLERI, *Fil. Diff. de Monstro Hungarico bicorporeo*,) vel quando in uno foetus corpore quatuor brachia, vel quatuor pedes deprehenduntur, vel quando duo capita, vel plura observantur. Vid. SCHOTT. *l. c.* ubi monstrum biceps & septiceps reperitur, aere expressum, item HELVVIG. *Obs. num. 16.* WELSCHIVM, *Obs. physico-medic. num. 46.* aliosve.

Secundum *figuram* monstrum dicitur, quando organon, alias rectum, incurvatum deprehenditur, vel quando organon, quod alias situm perpendicularem naturaliter possidet, horizontaliter, vel plane inverso modo positum reperitur. Vid. FRID. HOFFMANN. Hallens. patris, Cel. ibi viventis Prof. & Consil. Aulici, *Tractatum de cordis inversione.*

3. Qu. Quid sit causa monstrorum?

Causa monstrorum, secundum auctores, varia esse solet. Primo tribuuntur *imaginationi*, impressioni & phantasiae perversae ac forti, vel in vigiliis, vel in somno

M

paren-

parentum, præsertim autem tempore veneris conceptus, que contingenti. Quantas enim planthasia pagnantium in peregrinis fœtui imprimendis formis obtineat vires, millenis observationibus fere physicis & medicis innotuit, ita, ut omnium monstrorum fœtuum effectricem causam nominare aliqui non dubitaverint. Sic ab intuitu leporis excoriati talem infantem peperit *Kunigunda* apud *HELLVVIGIVM*, *Obs.* 5. item ab intuitu imaginis *JOH. BAPTISTÆ* fœmina exclusit filium hirsutum. Vid. *MARCELL. DONATVM*, *Hist. mirabil. Lib. 2. Cap. I.* Similis historia etiam reperitur apud *BARTHOLINVM*, in *Obs. lib. 5. Hist. 28.* ubi ab intuitu ursu fœmina etiam exclusit infantem hirsutum. Infantes vero, labiis leporinis defœdati, vim imaginationis in gravidis toto die confirmant, quam ipse *FORIVNATVS LICETVS*, *de Monstris Lib. 2. Cap. 42.* pro vera monstrorum agnoscit causa. Quomodo vero agat vis imaginationis matris in fœtum, ita nobis concipimus. Nempe in omni perceptione fieri debet compulsio nervorum ab objecto, ex qua in nervis motus tremulus oritur, qui fortissimus est, in terribili insolitaque idea, percepta a fœmina inprimis debilioris judicii. Hic motus nervorum vehemens, per nervos placenta uteri ac funiculi umbilicalis fœtus, continuatus ad fœtum usque, in molli ejus corpore, aut plane tubulorum præstat dilacerationem, aut indecentem dispositionem & locationem partium formandarum, & ita inconveniens, irregularis & monstrosa oritur partium corporis incrementa. Vim imaginationis prægnantium confirmant porro observationes *HORSTII*, *tom. 1. de Similitudine & Dissiminatorum. tom. 2. de Morbis muli*; *MARCELL. DORATII Hist. mirab. DEVSINGII, de Fœtu Musipontan.* *DIGBEI, de pulv. symp. HILDANI, Obs. Cent. 3.*

n. 56. & Cent. 5. n. 5. SCHOOKII, de Signaturis fœtus. SACHSII, Ampelograph. Lib. 2. sect. 5. Cap. I. REIES in Camp. Elys. quæst. curios. 45. & 50. Pro secunda causa originis monstrorum, secundum nonnullorum placita, Diabolus venditatur. Statuunt enim, Diabolum, ut incubum, posse generare monstra. Ad confirmandam assertionem hancce præsupponunt 1) Diabolum, ut spiritum, habere absolutam potentiam in corpora, sive in materiam passivam, quod tamen falsum est, quemadmodum hoc demonstravit Cel. HOFFMANN, in sua egregia *Diff. de Potentia Diaboli in corpora*. 2) Ex aere & reliquis elementis Diabolum posse formare corpus humano simile, vel 3) posse corpora mortuorum utriusque sexus recipere, putredinem in illis extinguere, ea calore fovere, & vel in incubos, vel succubos transmutare. 4) Putant, posse Diabolum semen masculinum, succubis immissum, recipere, celeri motu, eodem tempore per aerem transferre, atque per incubos iterum adplicare, ex quo semine quidem fieri possit imprægnatio, quæ non a Diabolo, sed tantum modo per Diabolum contingat, ex qua generatione diffformes, monstrosi, & horrendi partus oriantur, vulgo *Elben, gute Kinder*, & *Vagiones, Wechsel-Bälge* &c. Vid. D. D. SIMON, quondam Jenens. postea Hallens. Prof. *Tract. de Impotentia conjugali*, Cap. 5. Tb. 2. & qui plura desiderat, evolvat DELRIO, *Disquisit. magic.* TORREBELLANC. de *Magia*, WIERVM, de *Præstigiis Demonum*. WESTPHAL. *Patholog. demoniacam*, BODINI *Dæmonomaniam*, aliosque. Sed argumenta supra dicta debili stant fundamento, dum varia præsupponunt, quæ tamen contra omnem rationem militant. Et posito, quod possit applicare Diabolus semen, succubis immissum, (si modo existant,) tamen ejus energia, quæ in sale volatili, facile evaporat.

bili, consistit, in momento exspirat, hincque ad generationem tale semen plane inutile est. Recentiores ideo Philosophi dudum pleraque, & nimis superstitiosa absurdaque placita veterum de magia deridere & rationibus destruere inceperunt, quo pertinet BECKER, in *seiner Bezauberten Welt*, Celeb. THOMAS de *crimin. Magia*, KLEINS, *Untersuchung des Bekantrüßes der Hexen von dem Bey Schlaf des Teuffels*, WEBSTERS, *Untersuchung der vermeinten und sogenannten Hexerey, nebst einer Vorrede des vortrefflichen Hn. THOMASII*, Abbatis BOVRDELOTS Medici primar. Reg. Galliae, *Abentheuerliche Einbildung des Mons. Oufle, vel Le Fou, cujus Frater, Mons. Non Credo, quam plurima placita veterum de magia deridet, & solide refutat.*

Tertiam monstrorum causam statuunt congressus sodomiticos hominum cum brutis, qualia exempla varia ab auctoribus adducuntur. Sed & talis congressus valde dubius videtur ex hac ratione 1) quia animalia, ob differentem ab homine conformationem, sese ad congressum haud facile applicant, & 2) ex ejusmodi congressu posse fieri generationem, credibile vix est, cum vis activa seminis masculini non deprehendat aptam materiam passivam, in quam agere possit.

Quartam monstrorum causam, secundum ZACHIAM, *Lib. 7. Tit. I. qu. I. num. 5.* item & alios, Deum esse aliquando, non vero semper, defendunt. Ast tutius est, hoc negare, & potius affirmare, quod omnis monstrorum proventus casu tantummodo fiat. Deus enim, ut ens perfectissimum, omnia quoque in summa perfectione creavit, hincque stamina monstrosa nunquam in ovulo existunt, sed post conceptionem casu ita formantur. Huc pertinent illi, qui ex praestabilita harmonia, vel

a siderum quoque influxu monstrorum originem derivant. Non video enim rationes, quibus mediantibus ejusmodi theorias adstruere & stabilire possint.

Nec 5) cum veteribus ad feminis virilis ubertatem refugiendum est. Nititur enim hæc sententia falsa PARACELSISTICORVM hypothesi, quasi a membris singulis patris, quicquid a nutritione superfluum est, ad semen constituendum confluat, adeoque simul, dum confluat, monstra generentur, membrorum pluralitate insignia. Qui vermiculos in semine virili, cum LEEWENHOEKIO, defendunt, infimul statuere debent eorum monstrositatem ante conceptionem, & ita tacite Deum pro causa monstrorum quoque admittere.

6) Majori jure semen maternum accusandum. Hoc enim ovulum est, & flamma ac rudimenta omnia futuri foetus delineata in se continet. Haec flamina, in se inertia, spiritu feminis virilis plastico actuantur & commoventur, & ita ipsa vita inchoatur. Quando vero motus auræ seminalis inconveniens est, fit, ut organa vel non convenienter expandantur, vel a motu irregulari auræ seminalis dislocentur, vel plane dilacerentur, & sic annihilentur, qualia exempla de brachiis dislocatis reperiuntur in SCHOTTI *PHYSICA* Lib. 5. cap. 7. quam & theoriam confirmat Histrio, sine manibus ac pedibus natus, qui præstigias suas in variis Europæ urbibus, magna cum spectantium, & nostra propria admiratione, perfecit.

7) In monstri generatione concurrere videtur ipse uterus, qui vel nimium natura angustatur, & ita in convenientes dimensiones durante gestatione non extenditur, vel nimium ampliatur, & ita irregularem conformationem incrementi foetui imprimit, quo pertinet

net suo modo ipsa uteri scirrhotitas, aliaque vitia similia.

4. Qu. *An monstra sint vitalia?*

Plerumque monstra, inprimis difformia, per abortum excluduntur. Ob organorum enim pravam conformationem diu æconomiam propriam in utero sartam tectam conservare haud possunt, id quod confirmat propria nostra observatio fœtus monstrosi trium circiter mensium, quem adhuc conservo. Porro, propter irregularem fœtus monstrosi conformationem, partus fit difficilis, & ideo tale monstrum neque vires suas debitas in partu exercere potest, neque per pudenda muliebria matris viam sibi parare & invenire, unde plerumque ante partum pereunt. Interim tamen dantur monstra vitalia, ut homo monstrosus Italus 27. annorum, qui fratrem suum, sub sterno ex corpore suo pendentem, in fascia gestabat. Vide HELLVVIGII *Obs. num.* 16. & Cel. ETMVLERI, filii, *Dissertationem de Monstro Hungarico bicorporeo*, quod per 6. annos vixit, in qua dissertatione plures aliæ historiæ hujus commatis reperiuntur.

5. Qu. *Quænam monstra anima rationali prædita sint dicenda, quæ vero non?*

Hæc quæstio maximi est momenti, & sub se comprehendit alias quæstiones, nempe an tale monstrum sit baptizandum, nec ne? an rumpat testamentum? an occidendum, & in sterquilinia abjiciendum, vel in flumina demergendum? Res vero decidenda ex sententia Physicorum de sede animæ. Veteres cor, utpote fontem & principium nativi caloris, pro animæ sede & officina agnoscebant. Ast recentiores omnes cerebrum

brum metropolim animæ esse statuunt. Et merito quidem. Nam a cerebro, & hujus fluido nervoso dependent omnes actiones, imo ipse cordis motus, dum cor suas operationes absque fluido nervoso perficere non potest, vi experimenti LOWERIANI, in *Tract. de Corde*, ubi abscissis, vel ligatis nervis cordis statim interit omnis cordis operatio, & quod maximum, omnis affectuum sedes in capite existit, omniumque operationum mentis ibi est habitatio. Ergo caput sedes animæ habetur, consentiente etiam ZACCHIA, *l. c. qu. 5.* & FORTVNATO FIDELI, in primis vero CARTESIO, *Lib. de Passion. animæ.* Hisce itaque præsuppositis sequitur, quod 1) monstrum acephalon neque sit baptizandum, neque pro infante in testamento & successione admittendum. 2) Monstrum, quod figuram humanam non retinet, animam rationalem habere non præsumitur, ut BALDVS, *Jctus, in L. 2. in princ. C. de postb. hered. instituend.* CARANZA; de *Partu humano, Cap. 17. n. 25.* Humanitas vero sive *τὸ* humanum esse maxime desumitur a facie, consentientibus Jctis, jam allegatis, & ipso ZACCHIA, item a voce humana, ubi videndum, an vocem humanam tale monstrum ediderit. Quis ideo tam absurdus est, qui foetum humanum, belluino capite instructum ranino scilicet, leporino, elephantino, stillo, canino, &c. pro homine agnoscere velit, qualia exempla in SCHOTTI, *Physica, Lib. 5. c. 6.* reperiuntur. Quando vero caput humanum adest, in reliquis autem partibus aliqua belluina monstrositas sese manifestat, tunc nihilominus humanitas adeste præsumitur, cum qua thesi consentit ecclesia catholica Romana referente FORTVNAT. FIDEL. & ZACCHIA, ideoque etiam sacra ac vitali baptismatis aqua caput respersit, non vero pectus, in capite animam esse existimans. Quando vero vera animalia bruta, ut ranæ, bufones

nes, vermes, &c. ab hominibus excluduntur, illa absque omni dubio occidi posse, ZACCHIAS statuit.

6. Qu. *Quid statuendum sit de monstro bicorporeo, an pro duobus, an vero uno homine baptizandum & an, ut duplex homo, succedat in hereditate?*

In hoc casu attendendum, an corpus duplex duplici regatur anima, an vero simplici id quod ex actionibus apparet, imprimis capitis. Nam quia cerebrum est organon animae principale, etiam in capite differentes actiones apparere solent. Credendum ideo, quod corpus simplex monstrosus, duplici capite instructum, duplex etiam sit homo, et corpus duplex, hoc est, quatuor brachiis, totidemque pedibus instructum, simplici vero capite ornatum, sit simplex homo. Magis vero probatur, quod monstrum, duplici capite formatum, duplex homo sit, si in duplici capite duplex affectus annotatus, in uno nempe tristitia, in altero lætitia, item si duplex sonus editur, ac unum caput dormit, altero adhuc vigilante, unum caput ridet, altero ejulante, &c.

CAP. XIV.

DE

HERMAPHRODITIS.

1. Qu. *Quid sit hermaphroditus?*

Vox hermaphroditi significat subjectum, cui vitiosa est organorum generationis conformatio, ita, ut utriusque

que sexus, maris & foeminae, genitalia adsint, vel adesse videantur.

2. Qu. *Quomodo distinguuntur hermaphroditi?*

Distinguuntur hermaphroditi commodissime 1) in illos, in quibus neuter sexus perfectus est, h. e. qui neque ad generandum, neque ad concipiendum apti sunt. De his AVSONIVS cecinit, *Epigrammate* 98.

*Concretus sexus, sed non perfectus utroque
Ambiguae veneris neutro potiundus amore.*

2. In illos, qui alterutrum tantum sexum, rite conformatum, possident. Talis hermaphroditus masculus, sive androgynus, mascula generationis organa, perfecte conformata, ostendit, in perinaeo tamen, vel etiam in pube rimam quandam, minime perviam, ad formam vulvae efformatam, possidet, per quam neque semen, neque lotium emittit. Ejusmodi hermaphroditum observavit anno 1676. in castris Brandenburgicis, ad Anclam locatis, Cel. CHRIST. MENZELIVS. Vid. *Misc. N. C. Dec. I. anno 8. obs. 8.* Hermaphroditus foemina vero, sive androgyna, praeter vulvam, naturaliter & recte constitutam, per quam quoque semen, sive potius glutinosus liquor ex lacunis, urina, item & menses excernuntur, adhuc, vel circa os pectinis, carneam quandam & cutaneam, sed imperforatam, habet substantiam, ad membri virilis similitudinem, erectionis tamen, & profusionis seminis impotentem, scrotoque & testibus carentem. Vel *clitoris*, in vulva existens, ita increscit, imprimis in salacioribus, ut mentulam virilem representet, imperforatam tamen. Hinc
N mulie-

mulieres, tali clitoride enormi instructa, viri mentulam admittere haud possunt, nec volunt interdum, sed potius cum aliis coire tentant. Clitoris enim suo modo cum mentula virili in structura anatomica convenit. Ad sunt puipe & hic bina corpora nervosa; sensibus voluptatis destinata, adest glans, corona, atque praputium. Hæc organa tamen natura admodum exigua sunt, in salacioribus vero ad digiti longitudinem interdum extenduntur, eum notabili insimul crassitie, qui morbus *cercosis* dicitur. Nymphæ quoque in ejusmodi salacioribus increscentes, dum ad latera clitoridis constitutæ sunt, testes quasi repræsentant. Hinc decipiuntur interdum optimi Medici, qui exactam partium harum structuram ex anatomia non didicerunt.

Tertium hermaphroditorum genus constituunt illi, qui utroque sexu valent, marisque & sceminæ munere potenter obeunt, hincque utriusque sexus genitalia, omnibus numeris atque conditionibus ad perfectum usum & generationem necessariis completa & perfecta, gerunt, immo, secundum auctores, mammam dextram, mammæ maris, sinistram, mammæ sceminæ similem, gestant. Vid. REIES, in *Camp. Esys. jucund. quæst.* 48. BAVHINVM, de *Hermaphroditis*, L. I. Cap. 4. PARÆVM, in *Oper. Lib. 24. Cap. 4.* RODERIC. a CASTRO, *Natura mulierum*, Lib. 3. Cap. 12. De ejusmodi hermaphroditi existentia plures dubitant, & nunquam in rerum natura tales exstitisse, sed mera figmenta esse arbitrantur. Interim tamen notabilis de tali hermaphrodito anno 1686. historia reperitur in JAC. MOLLER Tr. de *Hermaphroditis*. Cap. 2. p. 151. quæ ita sese habet. Zu Leyden hat sich ein seltsamer und wunderlicher Casus zugetragen: Nemlich eine Frau, die vor diesem einen Mann, und zwey, oder drey Kinder dabey gehabt, und selbst mit ibren Brüsten auch gesauget hat, nach der Hand, da ihr Mann nach Ost - Indien gefahren, ist diese Frau

Frau ins Waisen-Haus zu Leyden, als eine Zucht-Meisterin über die Waisen-Magdgen, bestellet worden, da hat man man wahrgenommen, dass von denen græßten und æltesten Waisen-Magdgen, von 16. 17. bis 18. Jahren alt, einige zeithero, wohl drey, vier, oder mehr seyn schwanger worden. Die Magdgen, nach gebaltener Examination, haben alle einmütig bekannt, dass diese Zuchtmeisterin der Vater davon sey. Die Frau, welche man examiniret und visitiret, hat man befunden, dass sie ein Hermaphrodit, oder halb Mann und halb Frau ist; welche auch bekannt, dass sie solches gethan, ist darauf ins Spinn-Haus zu Leyden gesetzt, und ist ihr der Process gemacht worden. *Sequentem observationem de hermaphrodito, liberos pariente, insuperque ancillam imprægnante, recenset BLANCARDVS, Collectan. med. phys. Cent. 3. observ. 80. p. m. 461. sequentibus verbis: Mir ist von O. B. und einem andern Frauenzimmer A.M. erzehlet worden, dass zu Læwarden ein Zwitter, oder Hermaphrodit sey, welche bey denen Reformirten öffentlich mit einem Manne getrauet worden, und auch von demselben etliche Kinder gehabt hatte; doch ware sie nicht zufrieden gewesen, sondern hatte sich zu ihrer Magd geleyet, und dieselbe, wie ein Mann seine Frau, bedienet. Als die Magd darauf schwanger worden, hat sie vor dem Richter öffentlich bekennet, dass sie niemand, als ihre Frau, geschwängert. Vide plura ejusmodi exempla, ex variis scriptoribus collecta, in Cel. D. D. SCHVRIGHI Spermatologia, Cap. 13.*

3. Qu. An dentur tales hermaphroditi perfecti?

Jam allegatæ observationes eorum existentiam quidem confirmare videntur, sed, an semper veræ sint historiæ, nos valde dubitamus. Nam fere videtur impossibile, quod in uno eodemque subjecto organa utriusque sexus deprehendantur perfecte formata. Alias enim

sequeretur, talem hermaphroditum sine alterius accessu intra se generare posse, quia ibi & masculinum semen, perfecte elaboratum, & vasorum uterique conveniens structura, adeoque ad foetum producendum & alendum sufficiens locus atque materia praesto esset, quare nihil obflaret, quo minus absque alterius coitu gravidaretur hermaphroditus, quod tamen magnopere rectae rationi repugnat. Divinum Numen enim ex singulari providentia creavit sexum distinctum, in Adamo atque Eva, cujus organa statim in principio adfuerunt, non vero, secundum HELMONTIVM, post lapsum demum formata sunt. Porro impossibile videtur, quod in uno eodemque subjecto possit duplex praeparari semen, quoniam natura interdum vix sufficit ad semen unius sexus perficiendum, id quod impotentiae conjugalis millena fere exempla confirmant.

4. Qu. *Quid sit causa hermaphro- ditorum?*

Variae ab auctoribus allegantur originis hermaphroditorum causae, & arbitrantur i. Astrologi, quod certa Veneris & Mercurii conjunctio tempore impraegnationis hermaphroditos efficiat. Vocabulum enim hocce compositum est ex graeco vocabulo *ἑρμῆς*, quod significat Mercurium, & *ἀφροδιτῆ*, quod significat Venerem. Alii, cum LEVINO LEMNIO, *Lib. I. de occultis naturae miracul. Cap. 9.* causam in certis a menstruatione diebus quaerunt, statuentes scilicet, a primo post mensium fluxum die usque ad quintum ex congressu foecundo, masculo; procreari, deinde ad octavum foeminas, postmodum ad duodecimum rursus mares, post hunc vero dierum numerum hermaphroditos. Alii hermaphroditos oriri credunt, quando congressus tempore menstruationis & fluen-

fluentibus adhuc mensibus celebratur. Quem adlūm tamen omnes fere omnino homines, sane propter nausēam, detestantur.

Veteres, propter ignorantiam anatomicam, uteri cavitatem in tres cellulas dividebant, & statuebant, si semen virile in dextram incidere, mares; si in sinistram, fœminas oriri, si vero in mediam injiceretur, androgynos nasci. Alii a seminis utriusque sexus conditione originem hermaphroditorum derivant, & arbitrantur, quod ex superabundante semine masculino procreetur masculus, ex prævalente vero muliebri semine fœmina, quod si denique contingat, unum semen alteri non prævalere, ex æquali tali virtutum pondere fieri hermaphroditum opinantur.

Quemadmodum autem Astrologorum sententiæ dudum, tanquam somnia & nugæ, sunt rejectæ, ita quoque reliquæ adductæ hermaphroditorum causæ recentioribus Phisicis & Medicis suspectæ evadunt. Cum pleræque falsæ hypothese, utriusque scilicet seminis, virilis atque muliebris, commiscela, nitantur. Quæ tamen plurimis rationibus a recentioribus refutatur, siquidem secundum horum fundamenta, semen virile in coitu raro uteri cavitatem ingreditur, & nunquam ad ipsum ovarium fœmineum materialiter penetrat. Deinde semen muliebre non in liquore isto, qui in congressu per lacunas fœminarum, durante titillatione venerea prorumpit, consistit, nec per hujus liquoris & seminis virilis miscelam imprægnatio fit. Excernitur enim talis liquor in voluptuosissimis, sterilitate tamen insimul laborantibus mulierculis. Sed omnis generatio ab ovulo, quod a semine virili imprægnatur, & in ovario successive ad maturitatem increscit, dependet. Unde sequitur, materiam hermaphroditorum, æque ac naturaliter constitutorum fœtuum, non in seminibus commixtis,

neque in mensibus, neque in media uteri cavitate, sed nice in ovulo muliebri quærendam esse. Unde porro, circa hanc satis obscuram hermaphroditorum originem, suspicari mihi liceat, in ejusmodi ovulo muliebri, statim a prima formatione, dispositionem quandam peculiarem, & fortasse gemellis aptam, casu tamen aliquo modo turbatam, extitisse, ex qua foetus, duobus generilibus fere instructus, formatur, pariter uti in monstris, ubi natura fortassis gemellos intendit, casu vero, & stamium confluxu bina capita, vel quatuor brachia, formantur, qualem sententiam nobiscum fovet de origine monstrorum Cel. Lips. Medicus, MICH. ERNEST. ETTMULLERVS, in sua *Dissertatione*, jam in priori capite citata, de *Monstro Hungarico* Tb. 5. p. 9. & 10.

5. Qu. *An. hermaphroditi sint monstra?*

Veteres hermaphroditos utique ad monstra referebant, & tanquam prodigii, atque sinistri omnis aliquid significantes interficiebant, vel in flumina projiciebant, teste SCHENCKIO, *Lib. 4. Obs. Medic. p. 519.* BAVHINO, *de Hermaphroditis, Lib. 1. Cap. 35.* ZAVNSCHLEIFFER, *Oper. Jurid. Tract. de Jure monstrorum*, MOLLERO, *de Hermaphroditis, Cap. 5. & 6.* ubi hujus acerbitalis originem refert ad *Legem 18. Romuli*, cujus legis exsecutores severissimi hermaphroditos in mare abjici curabant.

Constantinus Imperator etiam, lege lata, hoc tertium genus hominum e vita tolli & auferri constituit, ut ex EVSEBIO PAMPHILIO, *Lib. 4. de vitae Constantina*, refert EBERHARDVS SPECKHAN, *Quæst. Jurid. Cent. I. num. 77.*

Talis

Talis autem mos præfenti tempore amplius non observatur, sed potius hermaphroditi, quoniam formam humanam possident, hominibus perfectis annumerantur. Et Hermaphroditos monstra non esse, nec pro monstris a legibus haberi, sed in virorum, vel mulierum censu reputari, clarum est *L. queritur ff. de Statu hominum. L. Repetundarum §. hermaphroditus. ff. de test. L. Sed est quaestium, in fin. ff. de lib. & Postb.* Ergo potius ostenta, non verò monstra dicenda sunt, quia & hic naturæ membra ampliavit.

6. Qu. Quomodo sexus prævalentia in hermaphroditis sit dignoscenda?

Hoc fieri potest reflectendo ad subsequentes circumstantias, & quidem 1) ad organorum molem. Membrum enim genitale illud, quod magis conspicuum est, etiam sexus perfectionem necessario indicat. 2) Et præcipue ad eorum conformationem. Quo magis enim illa ad naturalem accedit, eo perfectior quoque est sexus. Medico autem ex anatomia innouit, quamnam partes forment sexum masculinum, quamnam vero foemininum. In masculino nempe adesse debet glans, eaque perforata, & præputio mobili tecta; corona glandem sperare & distinguere debet partim a præputio, partim a corporibus nervosis; in inferiori vero glandis parte adesse debet frenum; testiculi in scroto debent continere cum suis epididymidibus; per scroti denique mediam partem linea ducta esse debet, quæ futuram scroti constituit, & hæc per perinaum ad annum usque protendi. In pudendis muliebribus, rite conformatis, adesse debent labia, clitoris, nymphæ carunculaque myrtiformes, inter se vinculis quibusdam connexæ. 3) Ad situm. Quo magis enim

sexus

sexus organa occupant situm naturalem, eo potior quoque creditur sexus, & ad officium, suo tempore præstandum, aptior. ZACCHIAS, *lib. 7. Tit. 1. Qu. 8.* quidem tradit, prævalentiam desumendam esse a situ vel superiori, vel inferiori. Ast hæc ratio non sufficit; nam existere potest hermaphroditus masculus, qui supra pubem in regione hypogastrica hiatum quendam exiguum, vulvulam repræsentantem, possidet, interim tamen non sequitur statim, quod sit foemina. 4) Ad meatus. Nam ubi meatus patent, ibi sexus quoque datur prævalentia, inprimis, quando etiam per ejusmodi meatum urina exercitur. Si vero organa imperforata sunt, inprimis masculina, tunc ea ad seminis ejectionem natura non destinavit. Ejusmodi conditiones in recens natis inprimis sunt attendendæ, in adultis vero, quando organa generationis lustrantur. 5) Considerari debent pili. Quemadmodum enim hi pubertatem norant, ita sexus quoque præstantiam indicant. Hinc in sexu valentiori copiosiores & rigidiores, in imperfectiori vero nulli, pauci, & molliores, ad instar lanuginis tantum reperiuntur. 6) Eruptio pilorum in mento & perineo probe est observanda, nec minus capillorum rigiditas, exiguitas, crispatura, quæ suo modo etiam notabilem dant sexus distinctionem. 7) Nec minus negligendus hic est habitus corporis. Corpus enim oblongum, robustum, carnosum, & musculosum, magis virilitatem, contra vero staturæ exiguitas, & corpus molle, foeminei quid indicat. 8) Huc pertinet cutis color & crassities. Cutis enim in sexu masculino solidior, in foeminino vero ordinarie tenerior quodammodo deprehenditur, id quod etiam speciem pulchritudinis efficit. 9) Pectus ex carne virilem, mammosum vero, in quo inprimis notabilis, & crinibus minus cincta papilla prominet,

minet, femininum sexum indicat. 10.) Nec vox negligenda, quæ quo magis gravior, eo magis virili sexui conveniens est.

Quando vero signa distinctiora in structura genitalium non apparent, quid nunc agendum sit, nesciunt sane auctores, v. g. quando testes tantummodo adsunt, rite conformati, mentula autem deficit. Secundum nostram sententiam, mentula deficiente virilitas deest. Mentula enim absolute necessarium instrumentum est ad coitum, ergo quoque ad virilitatem. ZACCHIAS, *l. c. it.* & ROLFINCIVS, *Lib. de partibus genital.* a testium præsentia ad virilitatem valere consequentiam arbitrantur. Ast hisce non suscribo; testes enim, in ejusmodi partu monstroso deficientes, & extra non conspicui, interdum delitescunt in corpore, id quod observationes Anatomicorum confirmarunt. Ergo in tali subjecto potentia generandi non deficit. Quando quoque in hermaphroditico subjecto per organon illud, quod pudenda muliebria constituit, menses erumpunt, & quamvis excretio talis fiat in exigua quantitate, modo cum periodico recursum, tunc signum hocce utique notat sexus fœminei prævalentiam: Quale exemplum prostat apud ZACCHIAM, *l. c.*

7. Qu. *Quid sit statuendum de matrimonio hermaphroditorum?*

Illi, in quibus nulla sexus vera distinctio apparet, nec perfectio; (qualia exempla annotavit COLVMBVS, in *Anatom. sua, Lib. 15.* SCHENKIVS, in *Obs. L. 4.* ZACCHIAS, *l. c.*) ad matrimonium ineundum in habiles judicantur: Quoniam nec maris, nec fœminæ munere fungi queunt. Ubi vero aut sexus masculinus,

O

aut

aut foemininus manifeste prævalet, vel, uti leges loquuntur, ubi major deprehenditur incalescentia, ibi conjugium permittitur. STRUV, *Syntagmate Jur. Civil. Exercit. 3.* SIMON, *de Impotentia conjugal. c. 4. thes. 2. p. 86* VALENTINI, *Nov. M. L. Cas. 10. p. 244.* GARPZOVII, *Confessor. L. 2. def. 16.* SCHVRIGII, *Spermatolog. p. 661.* ubi integrorum collegiorum responsa reperiuntur. Cavendum vero, ne mas mare, foemina cum foemina combinetur, id quod accuratio inspectio Medicorum, non vero obstetricum (vid BOHN. in *Offic. Med. P. 2. c. 3. p. 569.* & SCHVRIGII *Spermatologiam, C. 13. p. 641.*) determinat. In casu vero dubio, secundum nonnullorum Jctorum sententiam, ut BALDI, in *Legem quæritur ff. de Statu hominum*, hermaphrodito electio conceditur, modo juramento promiserit, quod altero sexu uti nolit. Ast quoniam hoc sine scandalo fieri non potest, hæc sententia merito rejicitur. STRYK. in *Jur. sensuum, disp. I. C. 1. thes. 62.*

8. Qu. *An hermaphrodito, utroque organo ad generandum perfecto, concessum sit, utroque modo coire, & quando hoc fecit, an sit puniendus?*

1.) Uterque congressus nec sine scandalo, nec sine adulterio fit, immo consultius est, omnibus omnino hermaphroditis matrimonium plane interdicere. Quando vero matrimonium iniiit, juramentumque, quod altero organo uti non velit, præstitit, & tamen durante matrimonio utroque organo utitur, tunc hoc crimen, secundum nonnullorum sententiam, poena capitali punitur. Vid. argumenta, tum affirmativa, tum negativa, de hac re in SCHVRIGII *Spermatologia, p. 667. & sqq.*

9. Qu.

9. Qu. *An hermaphroditus in foro
testari queat?*

Respondeo, quod non. Dicunt quidem nonnulli, quod hermaphroditus, qui sexum virilem elegit, pro viro in republica sit habendus, & ad res, atque officia, viris concessa, admittendus. Ast, quoniam ad sexum foemininum insimul inclinat, ideo vir perfectus revera non existit. Quemadmodum enim, secundum communem Doctorum consensum, eunuchi, quia foemineæ naturæ propinquiore sunt, foeminis accensentur, & ideo omnium illorum jurium, ac privilegiorum, quæ viris attribuuntur, indigni judicantur, contra foeminis favorabiles leges illis applicantur: Ita etiam res se habet in hoc passu, quare ad testificandum merito inepti judicantur hermaphroditi.

10. Qu. *An muneribus publicis, civilibus, atque
ecclesiasticis fungi queat, & an succe-
dat in feudum?*

Ad primam quæstionis partem quod attinet, certum est, quod hermaphroditus muneribus publicis sine scandalo præesse non valeat, pariter quoque vix in feudum succedere, in primis ille, in quo sexus masculini prævalentia & exacta perfectio non reperitur. Nam, secundum RITTERSHVSIVM & LVDWELL, *Sinopsi Feudal. C. 6.* ROSENTHAL, *de Feudis, C. 7.* soli masculini sexus in feudis admittuntur, adeoque hermaphroditi, in quibus aut sexus paritas, aut masculini imperfectio, aut foemini prævalentia, observatur, feudi capaces haud sunt. In statu vero dubio nonnulli respicere volunt ad actio-

nes ejusmodi subjecti, & virtutum ac virium eminentiam. Ast hæc regula mihi non videtur esse universalis, nec ubique applicari potest, cum in successionem feudi non semper de adulto quærat, sed etiam de recens nato.

II. Qu. *Quid sit statuendum de baptismo hermaphroditorum?*

Cum certum sit, quod hermaphroditi non sint monstra, sed foetus, humanam formam habentes, ideo, ut alii homines rationales atque Christiani, merito baptismo abluendi, & nomine donandi veniunt. Antequam vero talis foetus baptizetur, organa probe inspicienda, quænam nempe magis formata & perfecta sint, hoc facto, aut masculinum, aut foemininum nomen etiam illis tribuendum. Quando vero in tali infante, recens nato, uterque sexus perfecte effigiatus est, vel quando sexus dubius est, arbitratur MOLLERVS, de *Hermaphroditis*, C. 5. quod eo in casu viri nomen eligendum, ex hac ratione, quoniam natura, omnium veluti rerum magistra, & opifex, semper ad meliora, & perfectiora inclinet. Quando vero hermaphroditus foemina pro masculo rite baptizatur, vel, vice versa, masculus pro foemina, baptismus ideo non reiteratur, sed tantummodo nomen mutatur. Actus enim ille sacer vitiosus minime est, quia hic substantialia baptismi observantur, sacrosancta quippe Trinitas invocatur, atque in nomine Patris, Filii & Spiritus sancti aqua effunditur. B. GERHARD. in *Loc. theolog.* Tom. 4. de *sancto baptismo* sect. 3. cap. 3. num. 26.

12. Qu. *An detur sexus mutatio?*

Affines hermaphroditis censentur personæ, quæ sexum mutant, de qua sexus mutatione varia hinc inde apud

apud auctores reperiuntur exempla. V. g. apud P A-
RÆVM, in *Chirurg. L. 24. Cap. 5.* extat historia de vir-
gine quadam Lusitanica nobili, quæ, cum ad ætatem
pervenisset illam, in qua mulieres primum lunare tri-
butum persolvunt, ecce! vice mensium priapum, us-
que ad id tempus intus latitantem, protrudit, & sic ex
fœmina facta est masculus, qui postea uxorem dixit,
sed an liberos procreaverit, non satis compertum est,
inquit auctor, interim tamen, virum hunc imberbem,
semper mansisse, ab auctore affirmatur. Aliam quo-
que sibi relata ibi habet historiam de persona, qua us-
que ad 14. annum fœmina fuerit, in fine autem subse-
quentis, cum ancilla quadam in lecto decumbens, atque
lasciviens, latens virile membrum ex improvise cum im-
petu emiseric. Idem auctor refert aliam historiam de
virgine 15. annorum, quæ cum saltu impetuoso subito
vincula pudendorum diruperit, ut penis, in corpore deli-
tescens, cum notabili dolore profiliret. Illam, ait, do-
mum reversam matri maxima cum lacrymarum effusione
intestinatorum suorum, ex abdomine pendentium, jactu-
ram ostendisse, Medicos vero vocatos pronunciaisse, fi-
liam ita in filium mutatam esse. Quid vero statuendum
sit de hacce sexus mutatione, disputent alii, nos illam
aut negamus, aut cercofin fuisse, affirmamus. Ipse
enim PINÆVS, de *Not. virgin.* quoque non credit
ejusmodi sexus mutationem, seu filia in filium conver-
sionem, &, cum de mutatione masculi sexus in fœmi-
ninum omnes fere auctores fileant, inde nostra theo-
ria magis roboratur & confirmatur.

CAP. XV.

DE

IMPOTENTIA CONIUGALI, INPRIMIS
IN SEXU VIRILI.

Ex mente Canonum, duplex est conjugii affectus, seu finis: Alter speciei humanæ propagatio, per procreationem partus; alter mutuum rei domesticæ, vitæque subsidium, quæ ratio quoque in sacris traditur, tanquam causa & occasio condendæ mulieris. *Gen. 2. v. 18. & 20.* Et quamvis duplex hic matrimonii finis ad validitatem matrimonii requiratur, tamen matrimonium præcipue causa procreandi liberos contrahitur. Ideo & ille ad conjugium primario ineptus existit, qui debitum conjugale reddere non potest, h. e. cui deficit coeundi, & seminis ejaculandi potentia. ZACCHIAS, *L. 3. tit. 1. qu. 1.* Sine qua nunquam fœmina a viro imprægnatur. Fœmina enim tantum per membra generationis secundum naturæ institutum, cum viro copulatur, & sane fabulæ, somnia, meraque mendacia sunt, & dici merentur, quæcunque jactantur de conceptione, facta ex semine virili in balneo rejecto, vel ex ejus effusione extra, licet prope vasa muliebria, aliæque nugæ, his non absimiles, ab AVERRHŒ, JOH. BAPT. SYLVATICO, ALBERTO MAGNO, aliisque traditæ. Copula hic carnalis requiritur, h. e. organorum generationis ad se invicem conveniens applicatio. Et cum in foro ecclesiastica multoties quæstio oriatur de coeundi & generandi sufficientia, sive potentia, ideo, illam quoque hic pertractemus, rei necessitas exposcit.

1. Qu. *Quid sit impotentia coeundi?
quid generandi?*

Coeundi impotentia est vitium vel naturale, vel accidentale, sive quod idem est, præternaturale, quo quis impeditur alteri carnaliter commisceri. HORSTIENSIS, in *Summ. Lib. 4. Tit. de frigid. & malef.* JOH. BRV-
NELL. *de spons. & matrimonio, concl. 28. n. 2.* Coitus enim est adplicatio maris & fœminæ in membris generationis, qua semen ad speciei propagationem & individuorum conservationem expellitur. Impotentia autem *generandi* quoque est vitium naturale, vel præternaturale, sive accidentale, quo quis, legitimo, vel naturali coitu utens, inhabilis est ad sui similis generationem.

2. Qu. *Quanam sint causæ impotentia
conjugalis?*

Tam coitus, quam generationis impotentia, plures habere potest causas, modo ex parte viri, modo ex parte mulieris provenientes, quæ dividuntur commode in externas & internas. Externæ causæ illæ sunt, quæ a Medicis alias non naturales dicuntur. Quo pertinet 1) aer, cujus efficacia in corpus humanum maxima sane est. Frigidus enim homines ad veneris lusus torpidos reddit. Calidus contra viros quidem interdum debilitat, fœminas contra salaciores reddit, & si, secundum HIPPOCRATEM, *Lib. de Aere aquis, locis, Text, 48.* Scythiis endemia est impotentia, illa magis ab aëro frigido, quam ab equitatione ac venarum post aures sectione oritur. Huc pertinent quoque victus ratio & alimentorum, medicamentorumque nonnullorum indecens usus. Sic ex alimentis sterilitatem fœminis afferre potest
abusus

abusus asparagi, qui contra viros confortat, atque salaciores reddit. Huc pertinent & medicamenta venenosa, quæ impotentiam præstant, qualia sunt inprimis laturnina, de quibus tamen alibi. Primario autem venerem excitant, vel supprimunt animi affectus & vitia. Sic discordia inter conjuges, morositas atque contemtus, ira ac tristitia venerem restringunt. Gaudium contra, atque vera amorum testimonia, blanditiesque & formositas veneris sensum atque stimulum notabiliter augent. Hinc, secundum TIRAQVELLUM, *de lege connubiorum*, p. 2. lege 2. gravius peccatum est, coire cum difformi, quam cum formosa. Insuper omnis odor foetens, corporisque immundities, libidinem suffocat, animumque avertit.

Causæ internæ dividuntur in universales atque particulares. Ad universales pertinet ætas, quæ naturalem impotentiam præstat. Non potest quidem certo annorum numero coeundi potentia circumscribi (nam de coitus potentia primario sermo est, cum generandi spes ex coitu habeatur; *Leg. final. C. de sponsal.*) interim tamen juvenes ante XVI. vel XVIII. annum vix libidinis stimulum sentiunt, atque ad coeundum potentes sunt, hinc eo tempore hireire & catulire, secundum ZACCHIAM, *Lib. 3. Tit. I. qu. 2.* incipiunt, h. e. in venerem accendentur. Senes quoque 70mo anno ordinarie impotentes sunt & aculeos amiserunt. Qui vero serius coire incipiunt, in illis serius quoque coeundi potentia recedit, & contra qui libidinosem exercent juventutem, effatum possident corpus in senectute, secundum SENECAM.

3. Qu. Quænam sint causæ præternaturales universales, impotentiam coeundi & generandi producentes?

Sunt morbi omnes, hominem debilitant ac vires

res tum solidorum, tum fluidorum infringunt. Morbum enim hominem ad generationem impotentem reddere posse, per *L. filium eum definimus ff. de his, qui sui vel alieni juris sunt. L. si pater §. final. ff. de adopt. & arrogationibus* confirmatur. Qui morbi omnes, quando ope medica reparari possunt, matrimonium non dirimunt; si vero sint irreparabiles, matrimonium dissolvunt, secundum *L. C. de frigid. & malefic. BRVNELL, de sponsal. & matrimon. concl. 28. n. 18.* Distinguunt quidem Icti inter vicia naturalia, & inter morbos, *ZACCHIAS, lib. 3. tit. I. qu. 3.* Ast hæc distinctio nullius est momenti. & fuit ex hypothesi veterum, qui tres hominis status admittebant, nempe 1) statum secundum naturam, seu sanitatem, 2) statum præter naturam, seu morbum, & 3) statum neutrum. Si vero sanitas potentia est exercendi actiones, homini competentes secundum sexum atque ætatem, sequitur, quod omnis impotentia actionum etiam sit morbus. In hoc consentiunt omnes, etiam scriptores institutionum medicarum. Interim vicio naturali ex hypothesi illi laborant, qui nunquam stimulo venereo agitantur, & genitalia torpida gerunt, ac in quibus mentula nunquam erigitur, nec glans rubet atque sensu prædita est. Tales personæ sane effœminatæ sunt, hincque pallidam faciem habent, & plerumque imberbes sunt.

Morbi universales, hominem impotentem reddentes, sunt, v. g. omnes evacuationes enormes, ut diarrhœa colliquativa, sudor colliquativus, hæmorrhagiæ, sive spontaneæ, sive ex vulnere. Hæc enim fluida viralia notabiliter imminuunt, & quoniam ab illis vires solidorum dependent, ideo torpidi, frigidi atque languidi homines redduntur, ipsaque in illis venus extinguitur, qui morbis dictis laborant. Huc pertinent porro vulnera capitis, ex observatione *MARCELL. DONAT. Hist. mirab. L. 4. C. 13. & AMATI*

LVSITANI, Cent. 6. n. 95. item capitis percussiones enormes, ex observatione HILDANI. Læduntur nempe ita nervi, a quorum integritate potentia generationis promovetur. Simili modo hydropici, herniosi, hectici & paralytici, dum corpus vix commovere possunt, dici merentur impotentes. Tandem huc referri debet incantatio & fascinatio. Hanc quidem non nulli pro imaginaria habent, BORELL. Cent. 4. obs. 68. sed experientia ejus existentiam probat. Modum vero hujus fascinationis exponere non possumus, dum certo modo hyperphysicus est, quatenus scilicet operandi modus nobis est occultus. Probabiliter tamen partim debilitantur spiritus, partim nervi obstruuntur, ac ita paralytis penis oritur; (nam masculi erectores penis neque mentulam erigere, neque semen, in vesiculis seminalibus contentum, exprimere possunt?) Aut ipsa vasa spermatica, testes, epidydimides & vesiculæ seminales in tali fascinatione constringuntur, quo perit omnis feminis elaboratio, secretio, atque stimulus venereus, a præsentia seminis copiosi, in vesiculis seminalibus existentis, dependens. Ac sane in frigidis, quos vocant, sive illis, qui in ætate habili ad venerem tamen neque inclinant, neque ullum sensum libidinis percipiunt omnia jam dicta contingunt.

4. Qu. *Quenam vitia particularia impotentiam coeundi & generandi præstant in sexu masculino?*

Omnia illa, quæ organa generationis lædunt, inprimis vitia mentulæ & testiculorum, de quibus fusissime egit Celeb. SCHVRIGIVS, in sua *Spermatologia*, C. 10

5. Qu. *Quenam sint vitia mentulæ?*

Ad vitia mentulæ pertinet 1) mentulæ defectus, sive

ve a nativitate, qualia exempla in SCHENCK I *Obs. Med.* L. 4. extant, five ab extirpatione, ubi a gangræna, sphacelo, & cancro morbisque venereis vel afficitur. & corrumpitur, vel plane consumitur, & Medicum ita ad abscissionem hujus membri necessitat, aut quando juvenes, custodiæ gynæceorum destinati in regionibus orientalibus ita impotentes redduntur. 2) Penis retractio, ubi membrum virile corrugatur, abbreviatur, & in abdomen asconditur, five hoc fiat a spasmo, ut in senili ætate, vel in calculosis, five a veneficio, qualia exempla reperiuntur in SCHVRLIGII *Spermatologia*, Cap. 3. 3) Penis paralyxis, five erectio deficiens, quæ erectio ad generationem absolute necessaria est. Dum enim penis erigitur, & rigiditatem acquirit, in antliam commutatur, qua mediante pudenda muliebria dilatantur, semenque virile in arvum muliebri infunditur. Hinc recte judicat ZACCHIAS, L. 3. Tit. I. qu. 8. quod absque penis rigiditate mulier a viro cum effectu non cognoscatur. 4) Penis situs in loco insolito, v. g. in fronte, BORELII *Obs.* 74. in facie, loco nasi, LICETVS *de Monst. Lib. 2. cap. 30.* in occipite, M. N. C. dec. 1. anno 3. *Obs.* 42. in mamma, M. N. C. dec. 2. anno 7. *obs.* 123. vel etiam in perinæo, aut supra pubem. 5) Huc referri debet phimosis, five impedita glandis denutatio, quæ diversi est generis. 1) Contingit a præputii clausura fere omnimoda. Hunc ROLFINCIVS *de Partibus genitalibus* P. I. c. 50. inquit, ubi præputium adeo angustæ orificii est, ut glans illud nequeat perforare, summa in coitu oritur difficultas: Neque enim urina, neque semen liberum exitum inveniunt. Novi exemplum tantæ angustię præputii in juvene studiofo, qui ipsam urinam semper maximis cum difficultatibus & revera guttatim emittebat, dum illa effluebat per foramen præputii vix notabile. Talis præputii clausura a nonnullis inter signa virginitatis juvenum refertur.

2) Ex angustia præputii paulo tamen angustioris, quam ubi fere omnimode clausum est, oritur *capistratio*. In hoc malo glans tumens & rigida in coitu ad dimidiam tantummodo sui partem denudatur, & insimul cum dolore & molestia comprimitur, quare non tantum extinguatur voluptatis sensus, sed & seminis ejaculatio impeditur. 3) Phymosis species est, qua coitus læditur, quando præputium, sive in totum, sive in tantum, cum glande cohæret. Ita enim convenienti modo erectio mentulæ & ingressus ad pudenda muliebria fieri haud potest. Cujus rei exemplum extat in VALENT. *ff. Med. Legal. P. I. S. I. Cas. 9.* 6) Mentulæ vitium est curvatura & tortuositas penis, sive a spasmō, sive a læsione penis a morbis inprimis venereis. Quando enim ita penis, falciformis redditur, vel ad alterutrum latus incurvatur, etiam ineptus est ad coitum & generationem. 7) Penis inconueniens perforatio, sive hypospadiæ. In tali enim morbo penis non in loco ordinario, seu anteriore glandis parte, sed in inferiori loco, circa glandis frenum vel in media urethræ parte, vel circa radicem prope scrotum perforatur, urinam & semen emittit. In tali morbo coitus quidem perficitur, at an ejusmodi vir coitum fœcundum exercere atque adeo ad matrimonium admitti possit, disputant auctores. Vid ZACCHIAM, *Lib. 9. Tit. 3. qu. 6.* ubi inquit: Conveniunt Doctores, quod quandoque foramen virgæ in suo naturali loco non adpareat, impediatur omnis generatio, quia semen recta ad uteri internum osculum pervenire non potest, sed ad latera, vel ad posteriorem partem, effunditur. Et pergit auctor, quod glans impedimento fit, ac, etiamsi uterus, seminis virilis avidissimus, illud a sollicite excipere vellet, tamen, ob impedimentum glandis, hocce fieri non possit, evanescatque hinc spiritus, semen infœcundum evadat. Hac

sterilitas

sterilitas in imperforatis experientia confirmatur. Vid. *Miscell. N. C. Dec. I. ao. 9. & 10. obs. 105. SCHENCKII obs. med. Lib. 3. 8.)* Mentulæ nimia proceritas. Vulgo mentula, solito major, minori præfertur, quoniam in sensu voluptatis acceptior, & ad generationem utilior judicatur. Quam sententiam vulgi Medici non semper amplectuntur, dum membrum virile nimis longum uteri orificium contusione molestare, & ideo generationem magis impedire, quam promovere, immo plane diversorum periculorum symptomatum causa existere solet, confirmante hoc ZACCHIA, *Lib. 7. Tit. 3. qu. 5. & 7.* ubi exemplum ANGELÆ adducitur, meretricis Romanæ, quæ, dum cum viro, probe mentulato, congredebatur, in sincopen incidebat, nil dicam de aliis morbis, qui ab uteri, per mentulam majorem facta, contusione producuntur, dolore, inflammatione, hæmorrhagiis, &c. quæ veneris jucunditatem omnem adimunt, & conceptionem impediunt. Vid. plura in SCHVRIGII *Spermatologia, Cap. 10. p. 496. & sequ.* Similia incommoda ex penis nimia crassitie fluunt. Hinc conjugium tale sterile merito judicatur, consentiente Facultate Medica Lipsiensi, in ZITTMANNI *Medicina Forens. Cent. 2. cas. 85.* & ideo, prævia habita inspectione divortium quoque permittendum. Celeb. VALENTINI, in *Novell. Med. Legal. Cas. 5.* ex judicio D. Dæbelii, siquentem curiosam allegat observationem, quod in nonnullis Consistoriis Daniæ asserventur penes, ex lapide ficti, vel ex ligno formati, ad quos in rebus dubiis, ceu ad regulam, mensurationis ergo, confugere soleant.

9) Quæstio oritur, an etiam vir, nimis parvo virili membro dotatus, ad liberorum procreationem & matrimonium ineundum habilis sit? Ad hanc quæstionem respondit ZACCHIAS, *Lib. 3. Tit. 1. qu. 6.* Si mulier hian-

tem admodum uterum habet, & virile membrum nimis exiguum existit, congressus inter ipsos vix sequi potest: Nam uterus, nimis patens, virile membrum ita amplecti non valet, ut inde delectatio, membrique intensior erectio, ac seminis conveniens ejaculatio sequatur. Hanc sententiam alii negant, & defendunt potius, quod penis brevis imprægnationem non impediat, 1) quoniam ad proles generationem non seminum commiscela, sed tantummodo ovuli per aram seminis virilis foecundatio requiratur. 2) Quod seminis virilis ad orificium uterinum internum projectio & effusio ideo non semper sit necessaria. Hinc Facultas Lipsiensis apud ZITTMANNVM, Cent. 6. Cas. 77. inquit: *Daß ein unvollkommener Congressus, da Mentula vaginæ uteri orificio nur einiger massen applicirt, diese aber a semine virili aspergiret worden, zur Schwængerung einer Weibes-Person zuweilen zulanglich befunden werde.* Et VALENTINI, in Nov. Med. Legal. Cas. 1. 33. & Cas. 5. p. 60. quæstionem movet, an mentula, iusto brevior, conceptionem & imprægnationem impediat, ibidemque negative respondet, quoniam, ratione viri, ad procreationem sobolis sola seminis prolifici ejaculatio non in uteri cavitatem internam, sed tantum in vaginam sufficiat.

Hac occasione, ubi de mentulæ statu sermo est, quædam simul dicenda veniunt de *circumcisis*, *recutitis*, & *infibulatis*, eorumque potentia. Quid circumcisio sit, nemo sane ignorat, & quod illa potentiam conjugalem non impediat, sed potius augeat, confirmant Judæorum, Turcarum, atque Persarum, conjugia. Nec minus de recutitorum, sive illorum, qui arte defectum præputii redintegrarunt, potentia dubitandum. Infibulati vero tam diu impotentes sunt, quam diu a fibula non liberantur. Erat vero infibulatio clausura, vel ligatura præpu-

præputii, filo vel fibula metallica facta, quæ congressum impediēbat.

Ejusmodi operationes olim erant in usu, in præsentī autem rarissime, vel nunquam contingunt. Nihilominus in Medicina Legali interdum de recutitione quaestio oritur, v. g. quando Judæus, mulierem christianam in conjugem desiderans, judaismum pernegat, vel, quando, perpetrato delicto, aut scelere, quodam, se Christianum simulat, & minime, se judæum, seu circumcissum esse, fatetur & quidem ex eo fundamento, quia glandem, præputio tectam, habeat, in quo casu de recutitionis possibilitate quaeritur, & an ex certo aliquo signo, tam præcedanea circumcissio, quam subsequens recutitio, in Judæis, vel ejusmodi nationibus circumcisis, dignosci valeat? Si ad primum respondere volumus, fatendum, recutitionem utique esse operationem possibilem, testante CELSO, *Liq. 7. C. 25.* DION. in *Chirurgia de operationibus mentulae.* AMMANNO, in *Med. Crit. Cas. 39.* A. WEDELIO, *Exerc. Med. Philolog. Decad. 5. Exerc. 1.* JOSEPHO, de *Antiquitat. Judaic. L. 12. c. 6.* ubi inquit: *Judæos sibi præputia adduxisse, ut in gymnasio nudi quoque non essent Græcis dissimiles.* Et olim apud Judæos in usu fuisse, testatur PAVLVS, *Epist. 1. ad Corinth. C. 7. v. 18.* ubi Judæis, christianisum amplexantibus, prohibet, ne signa circumcisionis obtegant, *ist jemand beschnitten beruffen, der zeuge keine Vorhaut.* Immo talem operationem hodiernum Judæis adhuc notam esse, confirmat AMMANNVS, *I. supra cit.*

Recutitionem autem, sive præputii restitutionem, dignoscere, res est, quæ maximam circumspeditionem exposit. Nam instituebatur olim 1) ad modum CELSI, per incisionem circa radicem penis, qua oriebatur notabilis & lata cicatrix, & cutis mobilis mentula prolongaba-

gabatur. 2) Restituebant præputium absque incisione certo instrumento attractorio, seu spatisterio, itaque febris successive actensis, defectu n præputii relarciebant. Prius modus facile ex cicatrice, posterior vero difficulter dignoscitur a Medico & Chirurgo peritissimo, nisi cicatrix in extremitate præputii, a circumcissione relicta, fraudulentiam hancce insinuat revelet.

6. Qu. Quænam sint vitia testium?

Ad vitia testium, quæ impotentiam generandi, (non vero coeundi) præstant, pertinet partim eorum læsio, siue illa consistat in schirrhositate, facta a contusione, contusione, vel morbo quodam interno, imprimis venereo, v. g. hernia venerea, ubi inprimis epiditymides afficiuntur & obstruuntur. Cum vero certum sit, quod testes, utpote partes nobiles, constituent promptuarium generis humani, in quibus liquidum genitale, siue semen virile, elaboratur, separatur, & conservatur, ideo per se clarum est, quod per vitia testium turbetur genuina seminis elaboratio, & ita generandi potentia. Personæ, vitiis ejusmodi testium laborantes, salutantur vel *Castrati*, vel *Eunuchii*, vel *Spadones*, vel *Ectomice*, vel *Thlibia*, *Tblastæque*. Hæc vocabula apud Medicos & Jctos promiscue plerumque sumuntur, immo pro synonymis interdum habentur, nihilominus autem a se invicem distinguenda veniunt.

Eunuchi sunt vel a natura, vel casu, vel ex instituto. Eunuchi a natura sunt, qui sine testibus nascuntur, & postea, crescentibus annis, in eodem statu permanent. Quod de DOROTHEO, *Antiocheno Episcopo*, narratur. SCENCKIVS, *Lib. 4. Obs. Tit. de testicul.* Porro Eunuchi dicuntur natura tales, qui neque inflammatione, neque ostentatione corporis nudi formosæ puellæ,

ellæ, neque ullo alio modo ad prælium in castris venereis accendi possunt, licet in illis penis debita magnitudine conformatus sit, & testibus, magnitudinem ovi columbini æquantibus, instructi deprehendantur. Vid. ejusmodi casum in MISCELL. N. C. *Decad. 3. anno 4. obs. 32.*

Eunuchi per artem, secundum AEGINETAM, *Lib. 6. cap. 68.* & BONE TVM, *Polyalthes Tom. 2. L. 4. C. 17.* sunt, quorum testiculi vel sunt contusi, & sic ad generationem inutiles redditi, vel excisi plane. Olim autem eunuchismi, seu eunuchos faciendi modus, duplex erat. Primus contusione abolvebatur, ubi puerorum, vel infantium, in aquam calidam collocatorum, testiculos digitis, vel ferulis fissis, contundebant, comprimebant, & constringebant paulatim, usque ad eorum abolitionem & evanescentiam. Quod genus eunuchorum *Tbllibia*, & *Tblasia*, sive *Tbladia* salutantur. Secundus modus fiebat excisione, hincque dicebantur *Ectomia*, *excisi*, *excisecti*, *semiviri*, *castrati*. Hæc castratio est vel 1) *incon-*
sulta, v. g. ex morfu animalium, vel jactu globorum ex tormentis bellicis, aut denique conquassatione inflammatoria &c. vel 2) *consulta*, sive ex consilio medico suscepta, in hernia affectis, maniacis, podagricis, leprosis, schirrho testiculorum venereo, aliove non maligno, item lucri aut quæstus iniqui causa. LANGIVS, *lib. 1. Epist. 69.* annotat castrationem, improprie dictam, ubi Ægyptiorum sacerdotes modica cicutæ sorbitione sese impune castrare consueverunt, id quod alio quoque veneno fieri potest, inprimis sacchari saturni usu. *Spado* quid sit, auctores valde inter se disputant. *Spado* enim dicitur 1) ab urbe Spada Persiæ, ubi castrationis mos primum invaluit & floruit. Semiramis enim, Regina Babylonix, prima eunuchos, sive spadones, præparari curavit. 2) *Spado* dicitur a *σπάω*, quod denotat convello. Hinc spadones

Q

dones proprie a Medicis dicuntur, quorum nervi, qui membra genitalia, & horum musculos commovere debent, a quacunque causa, vel morbo, convulsi sunt. In tali statu quoniam testes non omnimode deficiunt, ideo spado semen, in minori tamen quantitate, præparat. 3) Spado dicitur vir unius testiculi, sive, quod idem est, monorchis. *L. si serva §. si Spaduni ff. de jur. dot.* 4) Spadones a Medicis neotericis frigidorum præcipue, sic dictorum, hominum classi annumerantur, quod scilicet materiali quidem præditi sint, ast in efficiente causa ac formali utique laesi deprehendantur. Vid. D. D. EWALDI, Med. P. P. Regiomont. *Diff. de Eunuchis & Spadonibus.* Vel, secundum HANIVM, *Wesenbeckium, tit. de ritibus nuptiar. verb. Impotentes*, spadones sunt frigidioris constitutionis, vel talismodi morbo fontico impliciti, ut generatio inhibeatur. Quod tamen naturæ vitium adhuc ope Medicorum tolli & curari possibile est, adeoque nec dirimit matrimonium contractum, nec impedit contrahendum, argumento eorum, quæ proferuntur a D. SIMONE, *Tract. Impotent. conjugal. Cap. VI. §. 2. P. 102.*

7. Quid. *An illi, qui aut natura, aut alia vi externa castrati, seu penitus exsecti sunt, ita, ut ambobus destituantur testiculis, cum feminis coire, semen effundere, atque generare valeant, hincque ad matrimonium sint admittendi?*

Ad hanc questionem ut respondeamus, singula ejusdem membra considerata nobis erunt. Ad primum ergo, an scilicet eunuchi coire, & actum venereum

reum exercere possint, respondeamus affirmative. Eunuchus enim pene gaudet, qui in sensu voluptatis erigitur. Sunt enim omnia organa ibi, quæ hancce erectionem & rigiditatem præstare possunt, adsunt nervi pro sensu voluptatis, corpora nervosa pro penis intumescencia, ac tandem muscoli pro erectione. Id JUVENALIS olim observavit, dum Satyra sexta cecinit:

Sunt, quas eunuchi imbelles ac mollia semper
Oscula delectant & desperatio barbæ,
Et quod abortivo non est opus, illa voluptas
Summa tamen, &c.

Hi satyrici versus indicant, ipsos eunuchos arrigere penem, & incumbere, sed non implere mulieres, aut gravidas reddere valere. Nam, propter defectum seminis, congressus talis non est fecundus. Et quamvis in coitu liquorem quendam protrudant, tamen ille liquor proflatarum est, non vero testiculorum. In testibus enina unice, utpote in γονιποιήσεως vera officina, semen elaboratur.

An castratis, eunuchis, spadonibus, & toto patrimonio privatis, matrimonium sit concedendum, in præsentia non determinare volo, quoniam fusissime de conjugio eunuchi agat Celeb. VALENTINI, in *Novell. Med. Legal. Cas. 6. a p. 62. nempe usque ad 222*. Et quamvis ibi varia, pro sententia affirmativa roboranda, repariantur, nihilominus tamen, cum post gloriam divinam ultimus matrimonii finis sit sobolis procreatio, eunuchi vero, ob defectum testium, semen prolificum atque generationi aptum minime contineant, ideo merito a matrimonio excluduntur. Dum de eunuchis hic agitur, etiam quæstio oritur, an eunuchi ab ecclesia sint excludendi. Respondendum affirmative. Extat enim *Deuteronom. C. 26. v. 1. non intrabit eunuchus, attritis,*

vel ambutatis testiculis, ecclesiam Domini, immo, secundum *Levit. C. 21. v. 20.* nullum animal, quod vel contritis, vel tufis, vel sectis testiculis erat, offerre licebat, & in ecclesia Romana receptum est, ac Jure Pontificum confirmatum, quod eunuchus neque Papa esse possit, neque sacerdos.

8. Qu. *An monorchides, vel natura tales, vel quibus alter testiculus exsectus, aut alio infortunio ablatus est, ad generandum æque habiles sint ac alii, duobus aut tribus testiculis, vel pluribus dotati, vel an potius steriles atque ad matrimonium inepti?*

SCVLTTETVS, in *Armamentario chirurgico, part. 2. observat. 64.* de his inquit: Quamvis multi post alterius testiculi excisionem aliquot procrearint liberos, non pauci tamen antea fœcundi, licet in uno saltem latere excisi fuerint, steriles facti sunt. Et, secundum WILH. ten RHYNE *de Promontorio bonae spei Cap. 22.* incolæ hujus promontorii, Hottentottorum nomine venientes, omnes, quotquot nascuntur, masculos alterutro testiculo statim a nativitate castrant, & quidem ideo, ne infrugifera terra plures, quam alere possit, incolas recipiat. Hæc demonstrant per experientiam, quod monorchides ad generationem non sint inepti. Nam sanguis per arterias spermaticas, & spiritus, per nervos libere circulantes, in altero testiculo sufficientem materiam seminis ad generationem suppeditant, & sane in nullo scriptore medicinæ forensis monorchis propter impotentiam accusatus reperitur. Potentiam generandi

di insuper in monorchide confirmavit exemplis REGNERVS de GRAAF, Tract. *de virorum organis generationis*, p. 7. B. WEDELIVS, *Miscell. naturæ curiosorum*, anno 2. *observat.* 256. & in hisce collectionibus alia plura exempla reperiuntur v. g. anno 4. & 5. *observat.* 13. anno 3. *observat.* 66. item in VALENTINI *Novell. medic. legalibus*, casu quarto.

9. Qu. *An triorchides, tetrorchides, pentorchides, sive, qui tribus, quatuor, quinque armati sunt testiculis, alios potentia coeundi & generandi superent?*

De existentia ejusmodi subjectorum nemo dubitare debet, quod statim in limine monendum. Nam observationibus illa confirmatur. Sic de triorchide reperiuntur exempla apud FORESTVM, in *Observationibus medicis*, Lib. 27. *observat.* 15. BORELLVM, *Centur.* 2. *observ.* 60. de GRAAF, *l. c.* pag. 8. SCHVRIGIVM, *Spermatologia*, C. 2. *thesi* 23. ROLFINCK. *de Partibus genitalibus*, part. 1. Cap. II. tetrorchidum & pentorchidum exempla prostant apud BARTHOLINVM, in *Anatom.* Lib. 1. Cap. 22. BLEGNY, *Zodiaco medico-Gallico*, anno 2. febr. *observat.* 2. M. N. C. anno 5. & 6. *observ.* 89. De his omnibus vero Celeb. LANGIVS, in *Physiolog. thes.* 36. ita judicat? Quibus plures quam duos testes concessit natura, illi ordinarie laborant copia seminis, hincque vix coitu multiplici exhauriuntur. Idem testatur LEALIS, *exercit. part. semen conficientibus*, quod nempe sint fervidæ & indomitæ libidinis. Attamen nec hanc regulam perpetuæ veritatis esse, & ratio docet. & experientia confirmat. Sic juvenis bonæ valetudinis 25. annorum, triorchis, B. MERCKLINO ultro fassus est, se per omnem

vita decursum neque membri virilis erectionem sensitisse, neque unquam venerci amplexus expertum esse stimulum. Vid. *M. N. C. anno 7. & 8. observat. xii.* Nam cum semen a sanguine dependeat, ideo non semper seminis elaboratio in solo testium habitu & multitudine, sed potius in reliqua corporis constitutione quaerenda, id quod *VENETTE*, in *Tabula amorum, part. 1. cap. 2.* insimul confirmat.

10. Qu. *An ἀνευδὲς, sive illi, quibus testiculi, vacuo scroto, vel in inguine, vel in abdomine latens, ad generationem apti & ad matrimonium admittendi sint?*

ZACCHIAS, Q. M. L. lib. 9. tit. 3. qu. 6. & RIOLANVS, in Enchirid. Anat. lib. 2. c. 35. putat, quod testes, dum in situ peccant, hominem sterilem, & ad matrimonium validum minus aptum reddere soleant. Ast testes, in inguine siti, non semper ita comprimuntur, coarctantur, & constanter flaccidi, atque admodum parvi manent, ut semen in illis minus prolificum praeparetur. Hoc enim inter alia confirmat historia a *ROLFINCK. Tract. de Partibus genitalibus, part. 1. cap. 5.* relata: Scilicet vir quidam in magno honore habebatur a mulieribus, quoniam in venereo duello se strenuum exhibere poterat militem, & tamen testes nullos habere videbatur. Spem quoque concipiebant ancillae, non conjugatae, illum sic fore sterilem, neque se impraegnatum iri. Cum vero ad supplicium tandem propter varia crimina ductus, & decollatus esset, prosector, testes in inguine reconditos, observavit. Argumento hoc est, addit dictus auctor, *testicondos* salaciores esse reliquis, quibus testes sesquipede longius extra abdomen

abdomen propendent. Item BARTHOLOMÆVS CABROLIVS, Mospeliensis academiae Anatomicus, in suis historiis recenset observationem de juvene 22. annorum, de quo parentes, quoniam natura testiculi in illo deficiebant, dubitarunt, an ad matrimonium, an ad munus ecclesiasticum aptus sit. Medicus vero matrimonium commendavit, in quo complures quoque genuit filios. B. MOEBIVS, qui hancce allegat quoque historiam, in *Fundamentis medico-Physiologicis*, p. 464. addit, quod hic juvenis dubio procul testes, in abdomine latentes, habuerit. Certum ideo est, testicondos coire & generare posse. Hinc, quando talis testicondus a virgine, vel meretrice de crimine stupri & impragnationis accusatur, atque vel ad matrimonium, vel ad infantis sustentationem condemnari debet, semper videndum, an, pro excusatione & defensione sua, sufficienti argumento generandi impotentiam ex vacuo scroto, & plenario testiculorum defectu probare possit. Si enim non est castratus, id quod cicatrix in inguine & scroto comprobabit, tunc testicondus esse dicendus est, hincque ad generationem aptus praesumitur.

CAP. XVI.

DE

IMPEDIMENTIS COEVNDI ET GENERANDI EX PARTE MULIERIS.

Qu. Quomodo potentia coeundi turbetur in sexu sequiori?

Debitum conjugale, vel coitus, turbatur & impeditur etiam culpa foeminarum variis modis. 1) Quando tanta

tanta corporis infirmitate correptae sunt, ut debitum conjugale præstare nequeant, vel propter latentem ægritudinem cognosci non possint. D. SIMON, de *Impotentia Coniug. Cap. VI. §. 6* Quando prolapsus uteri & vaginae adest. ZACCHIAS, L. 3. Tit. 1. Qu. 2. & HEMMING, de *divortii caus.* Nam uterus, ita laxatus, & in situ suo mutatus, mentulam commode recipere non potest. Obex enim illi ponitur insuper vel globulis, vel annulis, vel pessariis, pyri formam habentibus, vel unculis, quibus machinis uterus intus in corpore sustinetur. 2) Ob matricem penitus destructam, vel deficientem. 3) Huc pertinet fluor albus, ac fluxus mensium nimius & continuus. Ita enim non tantum gratia coitus & appetitus venereus extinguitur, sed etiam mariti corpus variis obnoxium morbis redditur, Vid. *Casum 36. Centur. 2. Medicin. forens.* ZITTMANN. Accedunt 4) ulcera sordida, foetida, conerosa, maligna, uteri, vaginae & pudendorum, quæ non tantum voluptatem foeminae tollunt, sed in marito nauseam ad exhibendum debitum conjugale creant, coitumque insimul ipsum dolorosum & periculosum reddunt. Hinc non sine ratione a nonnullis Canonistis coitus cum tali impura pro peccato habetur. 5) Huc pertinet conformatio hermaproditica, sive clitoridis nimia prolongatio, vel præternaturalis hujus organi incrementa, ZACCHIAS, L. 7. tit. 1. Qu. 9. & tit. 1. it. D. SIMON, *Cap. VI §. 6. n. 3.* 6) Impotentiam conciliat, si propter naturalium nimiam latitudinem mulier cognosci minime potest. SANCHEZ de *matrimon. Tom. 2. lib. 7. Disp. 92.* Quo suo modo pertinet ruptura perinaei, a partu difficili facta, & male curata. Secus vero est, si foemina semen recipere potest, sed non continere, quia tunc consummatur matrimonium, & conjuges una caro efficiuntur, foemina autem modo sterilis est. 7) Quando foemina clausa & imperforata existit, aut nimis arcta

arcta est, ita, ut nec mulier fieri, nec aliqua arte juvari possit, notante *ULPIANO, lege 14. §. 7. ff. de Ædilit. edictō,* & *ZACCHIA, Lib. 2. tit. 3. Qu. 13. n. 23.*

Consistunt vero ejusmodi vitia 1) in labiorum vulvæ coalitu. 2) In connexionione nympharum. 3) In connexionione Caruncularum myrtiformium firmiori, vel nimia hymenis soliditate, ubi Carunculæ myrtiformes fortioribus atque solidioribus inter se invicem conjunguntur ligamentis, qualia exempla occurrunt varia apud chirurgiæ scriptores. In ejusmodi statu probe attendendum, an malum sit sanabile, an vero non: Si est sanabile, tunc matrimonium non dissolvitur; Si non est sanabile, matrimonium utique dissolvendum. Minus sanabile malum autem est, quando vagina uteri in superiori parte circa orificium uteri internum clausa existit, vel quando orificium vaginæ clauditur crassa quadam carnosa substantia. Nam ejusmodi mala manu Chirurgi haud tractari possunt. Quando vero arctitudo dependet a membrana quadam tenui, tunc sectio concedenda. Ejusmodi enim operatio & sectio in malo exiguo neque inflammationes, neque exulcerationes periculosas atque lethales efficere potest. In casu autem, ubi foemina ejusmodi operationem & sectionem permittere non vult, matrimonium utique dissolvendum.

Hic non movebimus quæstionem, an mulier arcta incisionem pati respectu mariti obstringatur? *SANCHEZ, de Matrim. 7. Diff. 93.* & alii, hoc affirmant, ex hac ratione, quoniam in matrimonio uxor jus sui corporis transtulit in virum. Interim probe semper distinguendum inter clausuram plenariam & arctitudinem. Clausura enim fit, uti dictum fuit, vel quando latera vaginæ cohærent plane, vel quando aditus ad vaginam per membranam solidam car-

R

nosam,

nosam, in medio tantum exiguo hiatu perforatam, clauditur.

Arctitudines vero non uno sese habent modo ad omnes mentulas. Sic v. g. mentula, nimis crassa, non intrare potest in antrum virginis, natura arctum, & mentula debilis ac minus robusta vincula virginalia quoque dissolvere non potest. Hoc confirmat exemplum *Medicinae forensis Lipsiensium. Cent. 6. cas. 29.* ubi mulier, aliquo modo arcta, a marito debili non poterat cognosci, Medicus, & juratae obstetrices, innocentem hancce pro clausa habebant, Consistorium, nixum hoc fundamento, matrimonii rescissionem suscipit, mulier autem a marito relicta, admittit alium, qui eam uno coitu sine molestia imprægnat. Fœmina, a iudicibus quæsitâ, cur alii corpus subjecerit, respondebat, quod hoc fecerit ideo, quoniam inhabilis ad matrimonium fuerit declarata. Commendo hac occasione monitum C. I. STRYKII, *de Jure sensuum, dissert. 1. Cap. 1. thes. 55.* quod nempe in casu dubio, ne fallatur magistratus, uterque sexus sit inspiciendus, ut proportio appareat.

An denique, propter sterilitatem conjugum, aliosve casus fortuitos, matrimonium sit dissolvendum, fusc pertractavit D. SIMON, *l. c. Cap. 7.* ad quem benevolam lectorem remitto.

CAP. XVII.

DE

MORBIS FICTIS, SIVE SIMVLATIS.

I. Qu. *An, & quare detur morborum simulatio?*

Varii dantur casus, in quibus homines malitiosi certos morbos simulant, ac variæ hujus simulationis sunt

sunt causæ, quæ a JO. BAPTISTA SYLVATIC. in *Lib. de his, qui morbum simulant, Cap. 2.* ad tria potissimum capita reducuntur. Nempe alii simulant morbos propter timorem, alii propter verecundiam, alii propter lucrum. Hisce accedit quartum hominum scelestissimorum genus, qui propter sanctimoniam opinionem morbos fingunt ecstasicos, aliosve convulsivos, dum nempe pietate prophetica se celebres reddere conantur, quo pertinet enthusiasmus, vel Chorea S. Viti.

Qui ex timore fingunt morbos, vel tormenta declinare vel poenas corporis afflictivas evitare student. Hinc se mente captos, aut insanos fingunt, argum: *L. congruit. §. furiosi & L. seq. ff. de off. Præsid.* Alii ad onera effugienda furentes se simulant, ut notatur per *L. observare ff. de curat. furios.* Alii ad immunitates obtinendas, aut ad coadjutores sibi in curis animarum adsciscendos morbos fingunt. Alii hoc faciunt, ut in judicio comparere non cogantur, aut ut a carceribus liberentur. Sunt & alii, qui propter ignaviam, mendicare, quam laborare malunt, & aliorum misericordiam sibi concilare; hinc varios morbos fingunt, de quibus vero deinceps. Huc pertinet tandem ficta impotentia, virginitas, imprægnatio & partus.

2. Qu. An, & quomodo morbus fictus a vero sit distinguendus?

Sicuti omnes morbi ex certis signis apparent: Ita fere impossibile est, morbum diu simulare, imprimis illum, qui in sensum incurrit, & signa habet evidentiora, & illum, qui febrim conjunctam habet, & acutus est atque periculosus. Plerique morbi ficti sunt interni, rarissime finguntur externi, exceptis paralyfi membro-

rum, & ulceribus chronicis articularum. Quoniam vero ejusmodi hominum nefandorum malitia reprimenda est, ideo Jurisconfulti Medicorum implorant judicium, ad quos hocce negotium quoque primario pertinet.

Artificium autem simulatos morbos manifestandi sequentibus comprehenditur. 1) Probe annotanda est personæ conditio, status & mores, an v. g. de ignavia sit suspecta, an in judicium trahenda, an tormentis subjicienda, &c. 2) Morbi ficti historia conferenda est cum historia morbi veri, dispiciendum nempe, an omnia signa pathognomonica insimul adsint. 3) Examinandæ sunt causæ, habitus corporis, ætas congrua, dispositio hæreditaria, vita ante acta, morbi antecedanei, morbi duratio, tempus, quantitas, modus, subjectum, in quo morbus primario existit. 4) Conclusio formanda ex symptomatibus adjunctis & supervenientibus. Nam omnis morbus sicuti dependet a certis causis: Ita etiam certis concomitatur symptomatibus. 5) Concludendum ex difficiliore, vel faciliore medicamentorum admissione atque effectu. 6) Ad detegendas imposturas multum quoque confert exploratio pulsus, & urinæ inspectio. Pulsus enim signum est motus cordis, hincque statum & motum sanguinis manifestat. A sagacioribus quidem ipse pulsus potest mutari atque turbari per vincula & ligaturas, quibus membra, brachia & pedes constringuntur. Hinc pulsus non tangendus tantum in loco ordinario, hoc est, in carpo, sed & circa tempora, alibique. Porro pulsus mutatur per affectus, item usu remediorum volatili-um, quæ massam sanguineam exagitant atque rarefaciunt. Ast ejusmodi pulsus diu non durat, quoniam ipsa causa mox cessat. Videndum quoque, an in pulsu vehementi, duro & celeri insimul sint signa alia febrium, v. g. calor excessivus totius corporis, rubor faciei, somnus denega-

denegatur, appetitus prostratus, lingua arida, fitis, &c. ex quibus indiciis, - collective sumptis, facile morbus verus a ficto distinguitur. Tandem urina quando examinanda venit, in præsentia Medici erit emingenda, ne additamenti adulteretur. In inspectione vero ejusmodi urinæ, secundum communem methodum, reflectendum partim ad quantitatem, partim ad consistentiam, partim ad colores, odores ac denique ad contenta. Sic interdum, teste ZACCHIA, *Q. M. L. lib. 3. tit. 1. Q. 2.* loco urinæ ostenditur vinum, hydro-mel, vel urina sanguinolenta redditur, usu ficus indicæ & cantharidum, vel assumptorum, vel extus applicatorum, quod tamen sine vitæ periculo interdum vix fieri potest.

3. Qu. Quinam morbi in specie per fraudem simulantur?

Varii, & nominatim febris, ulcera, cachexia, stultitia, dolor, syncope, apoplexia, epilepsia, ecstasis, obsessio. Nemo vero malitiosus tanta temeritate est, ut eos simulare audeat morbos, qui cum vitæ periculo conjunguntur. Et hæc est ratio, quare rarissime simuletur. 1. febris. Quicquid tamen sit, febris interdum saltem fingitur, teste ZACCHIA, *L. 3. tit. quæst. 3.* quæ promovetur torpedine & cantharidibus. Est enim torpedo piscis insulæ Zeilan, qui, manu apprehensus, in illo febrim accendit, qui eum tetigit. Huc pertinet, secundum RVELLVM, *de Natura stirpium L. 3. C. 107.* & MATTHIOLVM, in *Dioscoridem L. 4. Cap. 64.* semen *Alterci* (est species Hyoscyami) quod epotum non tantummodo febrim commovet, sed & mentem turbat, & quasi phreneticos homines facit. Secundum SYLVATICVM, *l. c.* febris corripuntur illi, qui cornuti scarabæi oleum coctum pulsibus, vel allium in

ano applicant. Huc pertinent omnia rarefactiva remedia calida ignea, aromatica, quæ massam sanguineam expandunt & commovent, eamque calore suo accendunt. FORTVNATVS FIDELIS, *lib. 2. de relationibus medic.* Cap. 2. huc refert decoctum *Mandragoræ* cum vino, quod tamen tantummodo narcoticum est & stuporem, immo & delirium præstat, quo pertinet & semen *Daturæ veræ Indicæ*, item *opium*, ac omne genus *solani*, quæ stupefacientia & narcotica sunt remedia, de quibus vero alibi. Notandum vero, quod ejusmodi simulata febris minime constans sit, & se habeat, ut ephemera, hoc est, spatio 24. horarum, vel, secundum nonnullos, trium dierum ad summum finiatur. Quæ vero febris altius radices egit, diutius durat, & non facile cedit remediis adhibitis, illa simulata vix dici potest. Commendandum ideo examen omnium circumstantiarum, quæ partim in sensus incurrunt, partim sollicita indagatione eruuntur.

Finguntur 2) *ulcera*, quæ corrosivis & urentibus remediis producuntur, quo pertinent & tumores, imprimis inflammatorii. Sic v. g. GALENVS, *Lib. de Morbis fictis*, historiam refert de servo quodam, qui, cum domino suo longum iter facere noluerit, per *Thapsiæ* applicationem tumorem pedis excitavit. Item historiam narrat PARÆVS, *L. 24. Cap. 18.* de cancro mammarum, singulari artificio simulato, splenis vaccæ frusto nempe mammis perbelle adaptato & agglutinato, quod, dum ex fulco rubram & fungosam refert substantiam, cancerum verum æmulatur. In ejusmodi ulceribus fictis consideranda & lynceis oculis perlustranda est eorum natura, & materiæ exstillantis conditio, an pus, an ichor, an sanies sit. Considerari porro oportet totam corporis dispositionem, an cachectica, an cacochymica sit. Oriuntur enim plerumque ejusmodi ulcera ex sanguinis impuritate. Tenda

tanda quoque sunt debita medicamenta. Si enim ulcera a læsione externa dependent, non vero ab impuritate sanguinis, facile sanantur. Ulcera contra maligna, & ex sanguinis vappescentia atque corruptione orta, difficillime consolidantur.

3) Simulatur interdum *cachexia*, ubi color faciei vividus mutatur in lividum, albidum pallidumve. Quando vero faciei color malitiose adulteratur, videndum, an reliqua quoque signa hujus morbi consentiant, qualia sunt appetitus prostratus, ventriculi dolor, tumor pedum, obstructions atque dolores hypochondriorum, &c. Fingitur autem & pingitur facies fuco ex pigmento terreo, umbra dicto, item radice curcumæ, quo modo mentiuntur inprimis *cachexiam ictericam*. Porro hoc suscipitur suffitibus ex sulphura atque cumino, cujus decoctum etiam haustum idem præstat, testante DIOSCORIDE, L. 3. Cap. 60. Talis vero fucus, externe applicatus, lotionem, aqua hordei cum aceto, aliisve lixiviis abstergentibus facta, facile tollitur.

4) Simulatur quam frequentissime *insania*, & virorum sapientum quoque præstant exempla, qui hoc fecerunt, ob laudabilem finem, uti Davidis insania simulata in sacris, & Ulyssis in profanis historiis memoriam prodita est. Quando vero ejusmodi morbus fictus examinatur, investiganda est ejus essentia. Est enim duplex genus deliriorum: Unum acutum, cum febre & inflammatione conjunctum, quo pertinet *phrenitis*, *paraphrenitis*, *cynantropia*, sive *rabies canina*, vel *hydrophobia*, aut *lycanthropia*, & in Apulia contingens *tarentismus*, alterum chronicum, *mania* & *melancholia*. Primum genus vix simulatur ob multarum circumstantiarum concursum, quo facile ipsa vita periclitatur, secundum vero frequentius. Est vero melancholia delirium, cum triflitiis

stitia & metu conjunctum, in quo aegroti hominum, præcipue gaudentium & latantium, consortia fugiunt, intra se loquuntur, suspirant, & lacrymas fundunt sine causa manifesta, dubitant de vita aeterna, vix dormiunt, & alimenta desiderant. Maniaci contra sunt furiosi, & in perpetua actione constituti, fortes insimul aut potius audaces, cum iracundia alios lædunt. Melancholici vero sibimet ipsis manus violentas applicant. CELSVS, a MENOCHIO, *Lib. 6 præf. 45. n. 3.* citatus, ita maniacos & melancholicos describit: Ex Phreniticis, inquit, alii hilares, alii tristes sunt, alii intra verba desipiunt, alii violenti sunt. Datur insuper tertium flulorum genus, quod constituunt *amentes*. Hi tolerabiles sunt, neminem lædunt, interdum clamant, mox corpus inepte commovent, variis cum gesticulationibus saltant, confuse loquuntur, & verum ac perfectum rationis usum non possident. Horum, jam recensitorum, morborum causæ sollicite quoque considerandæ sunt, videndumq; an malum sit hæreditarium, an productum a febribus intermittentibus diuturnis, aliave viscerum chronica & prava dispositione, ut cachexia, obstructione hypochondriorum hepatis atque lienis. Omnis enim melancholia & mania morbus est, qui non ex improvise oritur, sed successive, intra notabile temporis spatium. Nec minus signa sunt lustranda. In omni enim delirio chronico facies pallet & livet, oculi sunt excavati, retracti, fixati, ac circulo fusco circumducti, omnesque molestias perferre possunt delirantes. In specie autem maniaci nudo corpore injurias aeris frigidioris non sentiunt, omnia insuper vestimenta dilacerant. Sic & ex insaniendi modo veritas apparet. Qui enim revera delirant, ut plurimum circa unum objectum semper sunt occupati, & de hoc loquuntur, v. g. se mortuos esse putant, vel passerem in cere-

cerebro sibi fingunt, se principes esse, affirmant. Delirantes vero ficti varia confuse miscent. Tandem vires medicamentorum in tali subiecto sunt tentandæ. Nam veri maniaci & melancholici a purgantibus & vomitoriis fortioribus, in notabili dosi exhibitis, vix moventur: Quando vero minor dosis medicamentorum leniorum exoptatum præstat effectum, tunc merito ejusmodi insania pro ficta erit habenda. De insania plura in egregia Celeb. THOMASII, *Dissert. de præsumptione furoris atque dementiæ, Resp. Sperlette*, legi merentur, quam JCtis pariter ac Medicis perlegendam commendo.

5) *Dolor* fingitur frequentissime ab iis, qui fraudulenter, se ægrotare, simulant, quod figmentum etiam quam optime succedit, cum nemo de dolore judicare valeat, nisi is, qui dolorem sentit. Ne ergo Medicus prudens, ad examinandum vocatus, decipiatur, sequentia consideranda ei incumbunt. 1) Pars, quæ dolet. 2) Causa doloris. 3) Doloris species & duratio. 4) Symptomata & effectus doloris. 5) Remedia adhibita, vel adhibenda. Partes enim, quæ dolere simulantur sunt vel caput vel thorax, vel abdomen, & in illo ventriculus, intestina, renes, vesica, &c. Partium enim externarum dolores rarissime finguntur, partim quoniam judices ejusmodi dolores non curant, partim quoniam, utpote ab obstructione vasorum sanguiferorum & lymphaticorum dependentes, vel ex tumore rubente & calente, vel tumore aquoso & pallente, facili negotio dijudicantur.

Partium, supra recensitarum, dolores insuper specialibus concomitantur semper symptomatibus. v. g. in capitis doloribus adsunt vigiliæ, inquietudo, tristitia, vertigo, febris, imo interdum delirium. In doloribus pectoris observatur tussis, respiratio difficilis, sputum cruentum & purulentum, &c. In dolore ventriculi

adeſt appetitus proſtratus, ruſtus, vomitus, lipothymia. In dolore inteſtinorum ſeſe manifeſtat flatulentia, ſtrepitus in abdomine, diarrhœa, aut interdum alvi extraordinaria obſtructio. Dolentibus renibus & veſica, præter jam recensita ſymptomata, ut ſunt vomitus & nauſea, jungitur ardor, rubor & ſedimentum turbidum atque cruentum urinæ, aut urina plane non evacuatur, aut tantum guttatim ſummis cum conatibus excernitur. Omnes hi, jam recensiti, dolores inſuper plerumque non ſunt periodici, hoc eſt, certo tempore recurrentes, ſed conſtantes potius, & nocturno tempore maxime exacerbantur.

Dolorum ſpecies variæ ſunt. Etenim ratione gradus ſunt dolores vel vehementes, vel mediocres, vel leves. Hæc diſtinctio in medicina legali primario locum habet, quando v. g. homo propter dolores ex carceribus eſt eximendus, vel ab oneribus liberandus, vel quando ei concedendæ ſunt certæ immunitates. Levis enim morbus non impedit hominem, quin actiones ſuas exercere poſſit, *per L. quaſitum ff. de re jud.* & levis morbus non eſt dignus nomine morbi, argumento *L. i. §. ſed ſciendum ff. de ædilitio edicto*. Porro doloris duratio eſt vel longa, vel brevis. Raro vero dolores, exceptis doloribus maximorum & evidentiffimorum morborum, diu durant. Hinc ſi quis de dolore quodam conquerratur, & jam per aliquot dies eos ſe toleraſſe affirmat, nullo apparente evidente ſymptomate, huic fides non habenda, monente ZACCHIA, *L. 3. tit. 3. Qu. 4.* Diu autem durantes dolores alios morbos producant periculofus atque lethales, ut inflammationes, ſuppurationes, paralifeſ, apoplexias, contracturas, &c. Sic porro videndum, an dolor ſit gravans, pungens, pulſans, rodens, tendens, & an talis dolor, in hac vel
illa

illa parte, ab hac vel illa causa ortus, sit possit 'is. Insuper attendendum, an adsint etiam necessaria symptomata. v. g. ubi dolor, ibi imbecillitas & virium lapsus, vel excessivus calor vel extremorum frigus, pulsus irregularis, sitis aucta appetitus & somni defectus, urina turbata. Quando hæc non adsunt dolorem vehementem non adesse, concludendum. Tandem proponenda sunt & applicanda remedia. In doloribus enim vehementioribus aut larga venæ sectio instituenda, aut cauteria, vesicatoria, scarificationes applicantur. Si egrotus talia admittere non vult, de existentia dolorum dubitandum. Tentanda quoque sunt alia mitiora, qualia sunt bezoardica, cephalica, pectoralia, stomachica & carminativa, uterina quoque. Si post applicationem horum, cum anodynis mixtorum, remediorum status morbi non mutatur, hoc est, vel imminuitur, vel gravior redditur, etiam de morbi veritate dubitandum.

6.) Simulantur morbi sensuum & motuum, quo pertinet simulata *syncope, apoplexia, epilepsia, ecstasis*.

Syncope gravior est lipothymia, eine starke Ohnmacht, in qua subito motus & sensus cessant, facies pallet pulsus quoque, tum cordis, tum arteriarum, immo & respiratio, vix percipitur. Nam cessat in hoc morbo circulatio sanguinis. Quoniam vero hæc signa essentialia vix simulantur, ideo talis morbus fictus statim a medico dignoscitur. *Apoplexia* cum syncope quoad signa fere convenit. Nam sensus & motus cessant, facies rubet interdum, nec pulsus, nec respiratio plene extinguuntur. Ast quoniam apoplexia vel in mortem, vel in perpetuam paralyfin hujus vel illius partis, vel in hemiplexiam, vel in mutitatem, surditatem, cœcitatem, aut mentis stupiditatem, resolvitur, ideo in ipso eventu veritas, aut falsitas, appare-

bit. Nil dicam de remediis, in syncope & apoplexia applicandis, qualia sunt venæ sectiones, cauteria ignea, five inuisiones partium, vellicationes, verbera & urticationes, sternutatoria, errhina volatilia, quæ quando in ficta applicantur syncope & apoplexia, immo ipsa *passione hysterica mulierum*, facile ejusmodi maliciosum hominem excitare possunt. Impossibile enim fere est, horum vim arte reprimere, & corpus insensibile reddere.

Fingitur *epilepsia* interdum, quæ probe examinanda, imprimis in motibus ipsis, videndumque, an convulsio talis sit tantummodo an trorsum, an retrorsum, uti in opisthotano & emprosthotano, an adsit talis membrorum rigiditas & motus vehementia atque constantia, qualis in epilepsia vera adesse solet, an os spumescens cum ejulatu adsit, an medicamenta errhina fortiora applicata morbum mutant, an etiam causa adsit adæquata hujus morbi, immo an reliqua signa consentiant, v. g. an adsit tumor faciei durante paroxysmo, item & pulsus mutatio.

Ecstasis ab hypocritis fingitur ad homines decipiendos, & sanctitatem nominis sibi conciliandum. Vulgus enim fraudis nescius, raptum illum, non adeo visui frequentem, tanquam rem supernaturalem & miraculosam, admirans, eos veneratione dignos judicat. Huc pertinet suo modo *die Mucker Kranckheit*. Notabile est ZACCHIAM, ut pote Romano catholicum, deridere ejusmodi homines credulos, qui ita decipiuntur. Inquit enim, L. 3. tit. 2 Qu. 7. num. 8. Vidi ego mulierem, mihi satis notam, quæ se, ubi frequens hominum coetus in templis sacrisque locis convenisset, raptam in ecstasin effingebat, omnium cum admiratione. Stabat extensis brachiis, in crucis modum, palpebris immobilibus, oculis fixis, & per horæ spatium ac ultra eo in actu perseverabat. Interdum veluti ad cælum volatura,

tura, & in aerem se elevatura, corpus attollebat, illud mirum in modum extendens. Sed admirationem omnem superare mihi visum est, quod vultum in mille colores vel ictu oculi commutaret: Nam modo rubescebat, & quasi ardore quodam incendi videbatur, modo adeo pallescebat, ut quasi emortua langueret, denuo, ac dicto citius, rubore perfundebatur, ac denique, veluti animo deficiens, ad seipsam redire simulabat, ita, ut circumstantes omnes eam, divino raptu prehensam, pro sancta venerarentur, & ad illius vestimenta, devotionis ergo tangenda, quæcunque mulierculæ & homunciones aderant, turmatim accurrerent, non sine mei ipsius risu, & multo majori, ut credo ipsiusmet scæminæ derisu, quam ego quidem intus & in cute agnoscebam. Erat autem Sicula.

Ante sexennium fere etiam in litteris publicis curiose exstabat observatio duorum sacerdotum in Gallia, qui in massa, & imprimis in ipsa elevatione, ambo cataleptici redditi sint. Præsentes omnes dicebant, hoc esse miraculum, Medici vero vocati contrarium demonstrabant.

Fingitur interdum *obsessio*, vel per malitiam, vel per simplicitatem & morbum. Sic Romæ quotannis, die viridium, dieque parasceves, tales obsessi a sacerdotibus Carthusianis, aliisve, publice magna in copia curantur, ubi Diaboli, reliquis, aliisve consecratis rebus, expelluntur. Ast talis obsessio fingitur, & per hanc simulationem superstitio conservatur & propagatur, malitiosi vero ejusmodi homines eleemosynas magna in copia ita colligunt. Qui autem veram obsessionem a falsa distinguere cupit, ille ad sequentia respicere debet.

- 1.) Obsessi veri non solum per os, sed & per aliam partem voce articulata & distincta sermonem proferre possunt.

(2.) Colloquia instituunt lingua exotica, quam tamen nunquam didicerunt. Hoc signum, utpote præcipuum & pathognomicum, non sine ratione indicat beatus noster WEDELIVS, in *Patbol. sua dogmatica, Sect. II. Cap. 7. p. 269.* (3) Cogitationes aliorum hominum interdum manifestare possunt. (4) Sciunt ea, quæ extus aguntur. (5.) Varia extraordinaria suscipiunt, quæ contra leges sunt naturæ. Quod vero blasphemias attinet, notandum, eas non esse signa genuina oblessi. Omnes etenim delirantes, quales sunt phrenitici, melancholici, inprimis vero maniacy, hocce vitio plerumque laborant.

CAP. XVIII.

DE

MORBIS DISSIMVLATIS, SIVE CELATIS.

CElantur, sive dissimulantur morbi aut ad commodum impetrandum, aut ad damnum avertendum: Alii enim dissimulant morbos, qui, quando apparent, matrimonium impediunt, quo pertinent impotentia coeundi & generandi virginitas destructa & amissa, vel cum imprægnatione conjuncta; Alii dissimulant morbos, ne removeantur a muneribus publicis, vel a societate quoque humana excludantur, quo pertinent inprimis morbi contagiosi. De impotentia conjugali, virginitate, imprægnatione, immo partu ipso dissimulato egimus jam alibi: In præsentî primario examinandi veniunt morbi contagiosi, qui per certa signa à Medicis dignoscuntur.

I. Qu.

I. Qu. Quid contagium sit, & quinam morbi contagiosi sint dicendi?

Contagium est venenum quoddam destructivum, quod, ab uno homine in alium translatum, similes ibi morbos præstat. Communicatur autem vel per immediatum contactum, vel aerem, vel per vestimenta, vel per suppellectilia, vel per mercimonia, aut res promerciales. Omne ejusmodi contagium virulentæ est naturæ, vimque habet agendi in corpus humanum, & ejus partes destruendi. Agit nempe contagium in spiritus, sive fluidum nerveum, quod ita suffocatur, extinguitur & motum suum naturalem amittit; agit in humores, qui ita corrumpuntur & putredine afficiuntur; agit in partes solidas, quæ contabescunt, corroduntur, inflammantur exulcerantur ac sphacelo enecantur. Huc pertinent pestis, & morbi, pestilenciales dicti, ut variolæ, morbilli, dysenteria, febris Hungarica atque petechialis, purpura. Nec minus contagiosi morbi sunt scorbutus, rabies phthisis & febris hæctica, lepra, elephantiasis, scabies omnis generis, lues venerea. Omnes hi morbi recensiti, cum suis speciebus, sunt contagiosi, aliosque inficiunt. Et sane non sine ratione *Levitic. Cap. 13. v. 14. 15.* ubi de contagio agitur, Divinum Numen varia præcepit, quæ, ad adhibendam cautionem atque diligentiam, illis necessaria sunt, qui in societate cum infectis vivunt. Nam ita sonant verba de leprosis: *Alles Lager, daraufer er liegt und alles daraufer sizet, der Sattel daraufer reitet, item woraufer seinen Speichel wirfft, die irdene und hœlzerne Gefæsse, die er anrühret, werden unrein seyn. Wer was anrühret, das ein solcher Unreiner gehabt, oder getragen hat wird unrein seyn.* Commendantur simul lotiones & balnea, daß sie die Hände, Kleider und die

Gera-

Geraethe waschen sollen. Per lotiones enim salia maligna (contagium enim, vel malignitas, consistit primario in salino destructivo principio, consentiente celeberrimo J. A. WEDELIO, in Dissert. de contagio,) eluuntur, absterguntur, extinguuntur. Et porro Divinum Numen præcipit, daß das Haus eines Ausfaetzigen ausgeräumet werde, ehe der Priester hinein gehet, damit nicht alles unrein werde, was im Hause ist, und wenn der Priester befindet die Merckmable des Aufsatzes an denen Wänden, sollen die Steine ausgebrochen, und der Leimen abgeschabet werden. Huc pertinet ea immundities, quæ ex contactu mortuorum oritur, de qua B. GACKENHOLTZIVS, Prof. olim in Acad. Helmstad. eruditum schediasma conscripsit.

Omnes morbi contagiosi vel acuti sunt vel chronici. Ad acutos pertinet 1) *Pestis*, quæ febris est acutissima, summe maligna, atque contagiosa, ideoque breve tempore homines extinguit, dum sal virulentum, summe volatile atque acerrimum, subito corpus penetrat, atque pervadit massam fluidorum, eorumque circulum destruit & spiritus suffocat. De hac vero deinceps agendum. Hæc pestis in mitiori gradu generat morbos, vel febres alias malignas, quo pertinent

2) *Variolæ*, pestis illa infantium satis funesta. Sunt vero exanthemata, sive pustulæ purulentæ, cutem profunde exedentes, cum febris continua acuta conjunctæ. Et quod sint contagiosæ, non tantummodo omnibus notum est, sed & confirmatur per illam, præsentî seculo inventam, infusionem, *das Blatter-Beltzen*, de qua inter alia legi meretur tract. de hac doctrina editus celeberrimi VATERI, fil. Wittenbergenf.

3.) *Morbilli*, die *Masern*, qui maculæ sunt rubicundæ plerumque siccæ, nonnihil tumidæ, per totam corporis superfici-

perficiem citra suppurationem efflorescentes, cum febris acuta pruritu & ardore conjuncta.

4) *Dysenteria*, quae est febris admodum maligna, contagiosa, acuta & continua, cum intestinorum, inprimis tenuium, hinc & crassorum, dolore intolerabili, inflammatione & exulceratione conjuncta, cui accedit insuper diarrhoea torminosa, tenesmus, crebrior evacuatio materiae, vel cruentae, ut in rubra, vel purulentae, ut in alba.

5) *Febris Hungarica*, petechialis & anginosa. Hac a patria, Hungaria, ita dicitur, item et castrensis, quoniam inter milites inprimis grassatur. Est febris acutissima, in cujus principio statim vehementissima apparent symptomata, qualia sunt horror & subsequens aestus infabilis, lassitudo, anxietas praecordiorum, inquietudo, intolerabilis capitis dolor, item & dorsi, unde *die Haupt-Kranckheit* dicitur, tertio, vel quarto die accedit delirium phreniticum, inflammatio colli, in plerisque maculae apparent rubicundae purpureae, interdum lividae & nigrae, parvae & magnae, quae nihil aliud sunt, quam carbunculi pestilenciales minores, accedit interdum etiam perpetuus sudor, sive calidus, sive frigidus, & tunc haec febris vocatur sudor Anglicus. Vid. celeberr. ZWING. *Theatr. praxeos medicae*, pag. 323.

9) *Purpura*, sive febris miliaris. Vid. D. HAMILTON, Angl. tract. *de Febr. miliar.* Germ. *das Friesel*. Est febris maligna, puerperis, primis post puerperium diebus maxime, immo & infantibus junioribus, exitiosa, quae sese manifestat maculis rubicundis, paulo post purulentam materiam contrahentibus, interim tamen circulo rubicundo constanter munitis, & grana milii magnitudine representantibus. Quando vero nulla rubedo circa pustulas miliares apparet, dicitur purpura alba, *das weisse Friesel*, in qua vehementia malignitatis aucta magis est.

T

pur-

purpura scorbutica, utpote chronica, nihil hic dicendum.

7) *Rabies canina* etiam febris est maligna, acuta, cum angina, vel colli inflammatione, conjuncta. Nam saliva adeo corrosiva redditur, ut deglutitio absque summa molestia præstari nequeat. Ideo nec edunt, nec bibunt hoc morbo affecti. Quarto, vel quinto die delirant, & septimo plerumque moriuntur. Oritur hic morbus a morfu canis rabidi, hincque cynanthropia dicitur.

Omnes hi morbi febres sunt acutæ & contagiosæ, a miasmate, vel, uti veteres Chimici locuti sunt, a contagio mumiali, hoc est, animali ortæ, quarum signa sunt horripilatio, æstus, sitis aucta, appetitus imminutus, lassitudo, dolor capitis & dorsi, agrypina, sive somnus denegatus, delirium, anxietas præcordiorum, convulsiones, exanthemata, quæ omnia spatio 5. 7. 9. 15. vel 21. dierum plerumque contingunt, & hoc temporis decursu vel finem vitæ faciunt, vel successive cessant, & morbo finem imponunt.

Ad morbos contagiosos chronicos referri potest & debet 1) *Scorbutus*, morbus, qui in Germania inferiori, Frisia, Holsatia, Pomerania, Hollandia, Dania, Suecia, Norvvegia, primario grassatur, & in cacoehymia, humorumque corruptione & putrilagine consistit, ex qua milena alia mala oriuntur, uti sunt stomacace, sive scorbutus oris, fætor & putrilago gingivæ, maculæ & exanthemata crurum, dorsi, pectoris, vel rubicunda, vel fusca, vel purpureo-nigricantia, quo pertinent tubercula urentia, *die Nessel-Sucht*, erysipelas, ulcera pedum chronica foetida, cum tumore oedematoso duo renitente conjuncta, ut taceamus alia scorbuti diagnostica signa, ab illis, qui scorbuti historiam pertractarunt, allegata. Nam scorbutus plurimum affectuum syndrome potius, vnam unus aliquis morbus dici meretur.

2) *Phthisis*,

2) *Phthisis*, quæ exulceratio pulmonum est, conjuncta cum febris lenta hectica, & successiva totius corporis contabescencia, tussi purulenta, spūto cruento, respirationis difficultate, &c. Phthisin enim non tantum contagiosam, sed & hæreditariam esse, testatur quotidiana experientia.

3) *Scabies* est exulceratio cutis contagiosa. Species hujus morbi sunt *tinea*, *der Erbgrind*, scabies humida, ulcerosa, squamosa & crustosa, totam cutem capitis capillatam corrumpens atque corrodens, cum doloribus pungentibus atque rodentibus, capillorum fere plenario defluvio, qui morbus a notabili & eminenti humorum acrimonia & corruptione proficiscitur. Huc pertinet a ZACCHIA, *Lib. 3. tit. 3. Q. 5.* citata *alopecia*, quam particularem lepram vocat, item *ophiasis* & *achores*. Est vero alopecia affectus cutaneus, sive capillorum defluuium, non tantum in capite, absque manifesta exulceratione, sed & in barba, atque pudendis, dependens a corruptione humorum, & acredine succorum, glandulas subcutaneas, sive radices & bulbos pilorum in cute corrodente. Ideo citatus auctor alopeciam carnis superficialis corruptionem vocat. Ophi-asis etiam est ejusmodi capillorum profluvium, quando capilli decidunt in linea, a temporibus per regionem occipitis ducta, quo pertinet & *area*, quando tale profluvium capillorum hinc inde, areatim quasi, in capite contingit. Non sine ratione ZACCH. *l. c.* ex sententia ibi allegatorum Medicorum, inquit, quod ejusmodi homines ad elephantiasin & lepram sint dispositi. Tale enim profluvium capillorum character est malignitatis, & contagii chronici. Hinc in hecticis, & venericis affectibus, item febribus malignis, leprosisque subjectis contingit. Achores sive crusta lactea, etiam a ZACCHIA citatur, sed fatetur insimul, quod sit morbus, manans ex lactis vitio nutricum. Con-

firmatur hoc quoque quotidiana experientia. Ergo morbus est non adeo malignus atque contagiosus, immo tantummodo infantibus, recens natis, proprius, ac facile curabilis. Hinc JCTi huncce morbum non curant. Ad species scabiei insuper referri debet *psorophthalmia*, sive scabies oculorum, quo pertinet *lippitudo* oculorum, sive exulceratio palpebrarum in extremitatibus constans & chronica, item *pudendagra*, sive scabies pudendorum. A ZACCHIA quidem non citatur hic *gutta rosacea* faciei, *der Kupffer im Gesicht*. Hæc enim exulceratio totam faciem inflamat, corrodit & turbat, hominemque omnibus nauseosum reddit, & revera quoque semina malignitatis in se continet, inprimis, quando componitur ex variis furunculosis, callosis atque confluentibus, quippe quibus profunde cutis corroditur, haud secus fere ac in *herpete*. Huc denique pertinet *serpigo* *Schwindflecken*, scabies sicca farinacea, non adeo maligna, faciem circa mentum inprimis contaminans.

Datur & alia scabies furfuracea, aspera, ac prurigiosa, *psora* dicta, quæ, quando in capite existit, *porrigo* salutatur. Hujus oppositum est *scabies humida*, crustosa, profunda & maligna, quæ consistit in pustulis majoribus, vulgo *Brand Blattern*, quæ, quando aperiuntur, copiosam materiam purulentam fundunt. *Lepra Græcorum*, sive *elephantiasis Arabum*, ab HAFENREFFERO, lib. 1. de morbis cutis, Cap. 15. ad genera scabiei refertur, nec immerito. Est enim foeda scabies, in qua pedetentim corporis partes cum foetore cada veroso emoriuntur. Hinc a quibusdam dicitur morbus S. Lazari. Affectus hic, adpectu horrendus, profunde cutem, & subjacentem carnem, diversis in locis corrodit, depascit, findit atque ulceribus exasperat, quæ ulcera non cutem furfuraceam reddunt, ut in *psora*, nec ad instar granorum milii sese habent, uti in *herpete miliari*, sed
crustæ

crustae hæ se habent ad instar sequamarum piscium, pallidi, cinericii & sub nigricantis coloris, quibus ablatis caro cruda & rubicunda conspicitur. Interim hic morbus tanto pruritu ægrotantes molestat, ut vehementissima frictione non extinguatur, et quo magis scalpunt, eo magis exulceratur cutis, ungues ceterum summa aspredine contaminantur, id quod extremam massæ sanguineæ acredinem indicat. *Graecorum lepra*, vel *Arabum elephantiasis*, Græce σατυριασμός dicitur, quoniam homines, hoc malo afflicti, Satyris similes fiunt vultu. Ob rugarum frontis similitudinem quoque vocatur *leontiasis*, cum leones similiter corrugatam frontem possideant. Est scabies vel totius corporis vel certæ ejus partis, maligna, sicca, solida, squamosa, vel alba, vel livens, conjuncta cum tumore partium cancroso, breviter tota cutis pellem elephanti repræsentat. Hic morbus dum quoque in extrema sanguinis dyscrasia, & succorum nutritiorum, ad necrosin, dispositorum, habitu consistit eo tota machina destruitur & homo *insensibilis* & *stupidus* quasi redditur, adeo, ut vix puncturam acus sentiat.

Lues venerea, cum his fere conveniens, a nonnullis dicitur scabies Gallica. Est morbus admodum virulentus, qui, a pudendorum ulceribus initium ducens, brevi tempore per totum corpus diffusus, omnes vere partes corrodit, ipsaque viscera interna, totamque massam sanguineam corrumpit.

Affectus venerei quidem omnes species sunt luis venereæ, interim tamen nonnulli morbi venerei luem veneream præstant tantum particularem, alii contra vero totalem.

Particulares venerei morbi, a congressu impuro orti, sunt (1) *Gonorrhœa virulenta* utriusque sexus, quæ est in sexu masculino urinarii ductus, caruncularum

feminalium & prostaticarum exulceratio, quæ interdum satis diu durat, & in fistulas quasi commutatur. Hinc materia, quæ ita exstillat, neutiquam pro semine habenda, sed pus, vel sanies est, prorumpens ex meatu urinarii glandulis, & ductibus minoribus. In sequiori sexu quando gonorrhoea contingit, exulceratur vagina uteri, corroduntur lacunæ, glandulaque, in plicis vaginæ delitescentes, & in nymphis existentes. (2) *Caruncula urethrae*, sive carnositas penis, ex gonorrhoea antiqua, neglecta & non recte curata, oritur, ac non tantum urinæ, sed & seminis exclusionem impedire solet. (3) Contingunt *ulcera præputii, glandis atque freni*, vulgo *der Schanker*, quæ ulcera postea præstant (4) *Phimosin veneram*, sive *vesiculam crystallinam*, vulgo *den Spanischen Kragen*. Intumescit enim præputium tumore quodam pellucido, in principio molli, quasi oedematoso, qui tractu temporis solidescit, & callosus redditur. (5) *Tumor testium*, sive *testiculus veneris*, aut *hernia venerea*, oritur quoque a congressu impuro, ubi sal acidum, malignum, causticum, venereum, non tantummodo vasa testium & epididymidum corrodit, sed & fluida, inibi existentia, in specie massam seminis, coagulat. Hic tumor in principio cum inflammatione conjungitur, & dolore interdum satis enormi homines excruciat, in aliis contra in scirrhum mutatur, irresolubilem fere. (6) *Bubo veneris* est tumor glandularum inguinalium, qui, quando *verus* est, ad inflammationem & suppurationem inclinat, cum salutari tamen eventu. Virulentia enim ita educitur. *Spurius* autem id scirrhostate harum glandularum inguinalium magis consistit.

Luem veneream totalem signant sequentes morbi. Nempe consurgunt 1) ulcera, per universam cutem erumpentia, crustosa, nigricantia, quæ optimis quoque remediis, externis, & internis, exceptis mercurialibus, resistunt,

sunt, & averuncari nequeunt, sed potius cutem de die in diem ita profunde erodunt, ut, post eorum curationem, foveæ, in cute relictæ, observentur, haud secus, uti fieri solet post curationem variolarum infantium, unde quoque hic morbus *variola magna* dicitur.

2) Ulcera contingunt narium, sive *ozæna*, quando nempe a sale maligno corroduntur tubuli narium cartilaginei & ossei a carie, & tunica narium pituitaria exulceratur. Sequitur ideo foetida & saniosa materia constans stillicidium, loquelæ turbatio, & in fine partis prominentis narium casus atque turbatio.

3) Oriuntur in lue venerea totali *aphthæ* venereæ, sive ulcera oris, gingivæ, palati, linguæ, tonsillarum, immo ipsius uvulæ. Hæc ulcera non tantum diu durant, sed de die in diem maiora capiunt incrementa, communi gargarismatum usui resistunt, in superficie gryseo & viridi colore notantur, actandem uvulam plane consumunt palatumque hinc inde exedunt atque perforant.

4) Huc pertinet *alopecia*, *ophtiasis*, *areæque* venereæ, quæ dum in elephantiasi atque lepra affectis simul contingit, nobis indicat, quod lepra veterum & lues venerea recentiorum parum, vel nihil a se invicem differant.

5) In lue venerea totali porro contingunt *rhagades* labiorum, mammarum, ani, manuum atque pedum, quæ ulcera sunt sicca, interdum etiam humida, rimosa, oblonga, pruriginosa, odoris foetidi, coloris subnigricantis, vel viridescantis. Cinguntur quoque callo. Nam callositas in omni genere ulcerum venereorum admodum solennis est.

6) *Verruæ* venereæ, vel humiles atque depressæ, vel pendentes, vel certam figuram representantes quoque solennes sunt, quales sunt *ficus*, *mori*, *christæ*. Harum excrescentiarum venerearum sedes partes imprimis sunt genitales, perinæum & anus.

7) Gum

7) *Gummata Gallica* nodi sunt, circa tibiam, item in capite, aliisque partibus tendinosis, ac carne denudatis, excrescentes, hincque cum ossibus firmiter plerumque coherentes, et in fine cariem præstantes. Continent in se crassam quandam solidamque materiam, ac homines intolerabili dolore afficiunt. Interdum mutantur in ulcera sordida, cum carie ossium conjuncta.

8) *Tortura nocturna* sunt dolores venerei nocturni sævissimi, vel in capite, vel circa articulorum internodia existentes, qui homines miseros horrendo & ineffabili modo excruciant quam crudelissime. Hi dolores plerumque comites sunt aliorum, supra jam recensitorum, morborum, & tandem mutantur.

9) vel in *cariem*, sive ossium corrosionem, vel in *tabem*, & *hecticam* veneream.

10) Ad morbos venereos denique referri potest *aegilops*, sive glandulæ lacrymalis minoris intumescencia & exulceratio, id quod propria mea observatio in praxi mihi confirmavit.

2. Qu. *An dentur morbi hæreditarii, & an illis qui tali morbo laborant, matrimonium sit interdicens?*

De existentia morborum hæreditariorum dubitandum non est, & quod in semine parentum morbosa dispositio delitescat, confirmant, inter alia, familiæ podagricæ, hecticæ phthificæ, calculosæ, epilepticæ, melancholicæ, &c. An vero illis, qui ex tali familia originem ducunt, vel revera jam tali morbo laborant, matrimonium sit interdicens, quæstio est, quæ a nonnullis affirmatur, ab aliis contra negatur. Qui negativam amplectuntur sententiam, statuentes nempe, quod illis matrimonium conceden-

cedendum, dicunt, (1.) quod rarissime desideretur persona, vitio quodam evidenti laborans, & quod potius affectus amoris per representationem eiusmodi vitii pereat, (2.) quod morbi hæreditarii non semper ex necessitate quadam physica propagentur in liberos, quoniam rarissime personæ unius constitutionis & temperamenti per matrimonium uniantur, hincque morbosa dispositio unius corrigatur & superetur per prosperam valetudinem alterius conjugis, item, quod & circumstantiæ educationis, alimenta, vitæ genus, &c. possit invertere & emendare leve ejusmodi vitium connatum. Sed respondemus ad primum, quod proh dolor! auri sacra fames, dum mortaliū possidet pectora, etiam gibbosam, claudicantem, epilepticam ac melancholicam, aliove morbo defædatam, possit amabilem reddere, & cum in conjugium ducitur, & pro conjuge agnoscitur, etiam alter conjux obstringitur ad debitum conjugale, illi præstandum. At secundum si respondere volumus, notandum, quod semel in semine latitans prava dispositio incorrigibilis sit per victum, loci & vitæ mutationem, medicamenta, educationem, &c. Et cum homines, morbo quodam detestabili, incurabili & hæreditario laborantes, vix in republica sint tolerandi; item illi, in quibus sana mens non existit, vel illi, qui, ob morbum perpetuum, & vitia corporis, muneribus reipublicæ præesse vix possunt, onera reipublicæ fiant, quæ ab aliis panem & sustentationem expectant: Ideo consultius est, eiusmodi personis, in specie ad melancholiam & maniam ex hæreditariis vitio dispositis, matrimonium interdicere, quam permittere, ut stolidorum numerus in republica augeatur.

CAP. XIX.

DE

PESTE.

AD morbos dissimulatos revera pertinet *pestis*, cujus exploratio admodum necessaria est, quoniam integra salus universæ reipublicæ facillime alias periclitatur. Invaluit vero mos, homines, peste suspectos, extra moenia urbium per aliquod temporis spatium detinere; uti hoc communissime observatur apud Venetos, *die da alle aus der Türckey, Egypten und aus der Levande ankommende, entweder im Lazaret, oder auf ihren Schiffen, die Quarantaine halten lassen.*

1. *Qu. Quamdiu homines, de peste suspecti, e re- publica sint excludendi?*

Tempus ordinarium sunt 40. dies, quod tempus *Quadragera*, Italice *Quarantaine* dicitur. Hoc tempus a nonnullis ad plures quoque dies extenditur, sed præter necessitatem. *Pestis* enim est morbus acutissimus, ac extreme malignus, qui diu in corpore vivente non delitescit, sed brevi tempore vires suas exercet, seseque manifestat. Et, quoniam dies quadagesimus omnium morborum acutorum finis est, & contra omnium chronicorum morborum principium, secundum regulas Medicorum, ideo, pro *pestis* experientia, quadraginta dies in hominibus omnino sufficiunt.

2. *Qu.*

2. *Qu. An semper tempus quadraginta dierum in suspectis hominibus accuratissime sit observandum?*

Respondendum negative. Nam venenum pestiferum (1.) possidet celerrimam activitatem & immensam penetrationem; ideo corpora infecta subito lāduntur, & ab eo destruuntur. (2.) Sola expiratione, dum corpora & vestimenta per aerem transferuntur, effluvia contagiosa extinguuntur, difflantur & annihilantur, inprimis si (3.) congrua diætā, & convenienti remediorum applicatione corpora mundificantur, quo pertinet pilorum derasio, suffitus, bezoardicorum & antiputredinosorum remediorum usus, &c. Ita apud Venetos tractati homines in nosocomiis veniam quadragenæ impetrare possunt, ne, justo diutius prolongato termino, in negotiis suis turbentur ac molestentur.

3. *Qu. Quid sit statuendum de rebus promercialibus, vel mercimoniis, vulgo Kauffmanns-Gütern und Wahren, qui ex locis ac regionibus, de peste suspectis, apor-
tantur?*

Hæc quaestio altioris est indaginis. Venenum enim pestiferum, utpote salinum volatile, varia corpora intrare, cum illis coniungi, & satis diu in poris quiescere & detineri potest, teste experientia. Inprimis autem hocce venenum facillime recipitur & denitetur a corporibus villosis, ex lino, serico, lanugine, gossypio paratis, uti sunt suppellectilia, tegumenta, vestes, indusia, stragula ex plu-
mis,

mis, corium villosum, cannabis. Vid. *Leipziger Pest-Ordnung*. Huc pertinent chartacea, literæ, libri, imprimis ex antiquis & suspectis bibliothecis alportati. Quæ vero merces tuto admitti possunt, secundum ZACCHIAM, *Lib. 3. tit. 3. qu. 4. num. 29.* sunt frumenta omnis generis, aromata fructus, carnes recentes, vina, aceta, olea, quæ suspicionem nullam habent & contagium non suscipiunt. Ast an hæc omnia recte sese habeant, merito dubitamus. Si enim in consiliis pestis sebum interdictum est, etiam oleum & oleosa suo modo suspecta sunt. Ob viscositatem enim facile venenum pestiferum recipiunt. Fructus item & carnes sive recentes, sive muria conditæ, & fumo indurata, dum ad fermentationem & putredinem inclinant, tutius non admittuntur, quod pertinent quoque dulcia & saccharata, utpote æque fermentifica. Metalla, secundum ZACCHIAM, & ex metallis parata moneta non suspecta habentur. Sunt enim metalla corpora solida densissima, quotum pori ad recipiendam virulentiam pestiferam minus apti existunt. Interim RANCHINVS, *de purg. rer. insect. sect. 5.* cum ZACCHIA non consentit, & sequentia experimenta in contrarium adducit, ubi æs, allio atque absinthio tritum, & ferrum, moscho tractatum, *die perfurmirten Degen-Klingen*, diu servant odorem. Hinc concludit, metalla quoque posse recipere venenum pestiferum, imprimis, cum moneta plerumque undique a viscositate sudoris humani perfusa atque tecta deprehendantur. Tutius ideo mundificantur lotionem, aceto facta, secundum leges consiliorum pestis, *nach denen Pest-Ordnungen*, vel, quod adhuc tutius est, igne depurantur, *indem sie ein wenig ausgeglüet werden*. Sacculi autem & funes, ex lino, cannabe, lana, bombace, &c. confecti, tutius comburuntur, quo pertinent & ex junco, stramine, arundine, & ex huius generis materiis composita corpora,

4. *Qu. Quanam sint signa pestis?*

Non omnis morbus malignus, citissime homines ex vita eripiens, pro peste semper habendus, sed expectanda potius sunt in omni epidemico morbo signa pestis pathognomica, quæ sunt *vibices*, *carbunculi*, atque *bubones*. Sunt vero vibices tumores oblongi, solidi, rubentes atque urentes in partibus musculosis, citissime ad necrosin inclinantes. His parum absimiles sunt carbunculi, sive tales tumores ardentes inflammatorii, lati & rotundi, quoque citissime ad necrosin tendentes. Dolor enim est ardens ad instar prunæ. Adest extrema rubedo. In hisce tumoribus insuper succedunt vesicæ plures, vel una lata succrescit, & brevi post pars, a carbunculo affecta, sensum amittit, & cadaverosam nigredinem induit. Bubones plerumque glandulas inguinales & axillares occupant, quæ glandulæ, cum dolore, fere intolerabili, & tumore notabili, brevi temporis spatio purulentam præparant materiam, maxime corrosivam, citissime educendam. Non negandum vero, quod, pro dolor! durante pestilentia detur confluxus omnium morborum malignorum. Alii enim homines ex improvise interficiuntur, sine prævio alio morbo, *fallen auf der Gassen um*, alii dysenteria, alii petechiis nigricantibus corripuntur, alii carbunculis externis, vel internis, bubonibus & vibicibus intereunt. Nam corripuntur febri acutissima, coniuncta cum subitanea vigoris extinctione, accedunt capitis intolerabiles dolores, summus ardor, & delirium phreniticum.

5. *Qu. Quid sit agendum in peste, ad vehementiam huius mali vel declinandum, vel extinguendum?*

Ante omnia a Deo inchoandum, & ejus immensa
V 3 mise-

misericordia voce supplici veneranda, ut malum hocce futurum & instans vel declinetur, vel præsens imminuatur & extinguatur. Deinceps regulæ diæteticæ acurate observandæ. *Universa enim pestis cura præservativa consistit in convenienti usu sex rerum non naturalium*, inter quas primas obtinet aer. Per aerem enim, tanquam per vehiculum contagii, pestis affertur. Hinc aer purificatur duplici modo (1.) per motum, (2.) per destructionem inibi existentium effluviorum. Aer revera suo modo putrescit, quando non commovetur, sicuti hoc fit in angustis & angulosis locis atque plateis, inprimis illis, in quibus pauperes in copia habitant, qui regulas puritatis & decori in vita non observant. Vid. MERCVL. *de Pest. C. 15.* & DEVSINGIVM, *de Pest. part. 4. sect. 1. Cap. 1.* Huc pertinent loci, ad quos neque venti, neque radii solares pertingunt. Aer inquinatur a putredine fimi & stercoreis, corruptioneque animalium mortuorum, quo multum conferunt fullones, *die Gerber*, qui per putredinem corium præparant, item effluvia cœmeteriorum; quæ ideo extra mœnia urbium constituta esse debent, adeo, ut magistratus sepulturam in templis, vel eorum peripheria, merito ubique interdicare deberet. Jure porro omnes cryptæ sub terra, *allerley Brunnen, Keller und Gerwölber, so verschlossen sind*, tempore pestis non aperiuntur. Nam a vaporibus malignis, inibi inclusis, virulentis, in momento homines suffocantur, teste experientia, quæ suffocatio quidem ab imperitis ab anhelitu basiliscorum, inibi existentium, derivatur, a prudentioribus tamen merito vaporibus malignis tribuitur. Vid. CONNOR *de Antris lethiferis*, item ALONSO BARBÆ *Beschreibung der Indianischen Bergwercke*. Aerem depurare tempore matutino, convenit. (Nam nocturnus semper maxima effluviorum copia repletus existit. Hoc fieri potest 1.) per ignem. Ignis enim comburit & destruit effluvia nociva.

Com-

Comburenda vero sunt imprimis bituminosa & fragrantia ligna, ut lignum juniperinum, cum fructibus, cuius locum supplere potest lignum pini & pinastri, abietis, aloes, roris marini, nerulinum, item cortex chaccarillæ, &c. quo pertinent suffitus ex gummi, animæ, tacamahaca, thure, &c. Multum quoque confert ad aeris depurationem tormentorum bellicorum crebrior explosio. Per talem enim sonum vehementem aer non tantum agitur, sed & per ignem & fumum effluvia destruuntur nociva, consentiente ZACCHIA, l. c. qui insimul varios ibi allegat huius sententiæ auctores, & imprimis VNZERVM nostrum, Hallensem quondam Medicum percelebrem, in *Antidoto pestis*. Denique per sonum campanarum aer commouetur, & pestilentialibus effluviis ita tantisper purgatur. Non inane quoque consilium est, quando commendantur amuleta, quæ per vim magneticam aerem particularem corpora humana ambientem, purificant, quo pertinet radix plantaginis atque colchicum, a B. nostro WEDELIO iterum revelatum, magnes arsenicalis Chimicorum, bufones exsiccati, vel de collo gestati, vel in ædibus suspensi, quæ corpora omnem virulentiam, per aerem circumfusam, recipiunt. Laudandum quoque experimentum sequens, a nonnullis Chimicis inventum: Recipitur nempe later, in igne candidus redditus, hic solutione vitrioli perfunditur, fumusque excitatur ita in ædibus, hoc facto later deportatur extra urbem, vel domum, & terra tegitur. Ita enim vel per fumum aer particularis depuratur, vel later magnetice recipit effluvia maligna. Quotidie vero hocce remedium reiterandum. Juvat denique, aquis odoriferis, atque destillatis, item aceto rutaceo rosaceoque pavimenta conspergere, aeremque particularum depurare.

Durante peste selectus quoque alimentorum faciendus & vitanda omnia, quæ facile in corpore nostro putrescunt,

scunt, cepæ vero & allium, tempore pestis, laudantur. Inprimis autem commendandum vinum, sale mixtum, *gesaltzener Wein*. Sal enim sanguinem a corruptione præservat. Et vesperi cum hoc vino tantum pulveris cretæ miscendum, quantum cuspide cultelli capi potest. Hoc experimentum in peste Ratisbonensi multos a peste præservavit.

In somno atque vigiliis, motu atque quiete moderatio certa servanda, ne corpus debilitetur, & ad ita concipiendum morbum aptius reddatur. Evacuationes vero naturales, alvi inprimis atque urinæ, liberæ sunt servandæ. Coitus autem a ZACCHIA interdicitur, fortassis, quia debilitat, sanguinemque exagitat *L. c.* enim, & quidem *num. 15.* inquit, quod ab eo, coitu nempe, non modo in tantum, sed in totum plane abstinendum sit, & quod ideo arcendæ sint, tempore pestis, ex civitate omnes meretrices. (Loquitur de republica Romana, ubi alias publice tolerantur.) E re est insuper, crebriorem salivæ excretionem promoveri. Hinc laudanda sunt masticatoria, inprimis balsamica, ut zedoaria, cubebæ, myrrha, baccæ juniperi, cortices citri, &c. Saliva enim primario virulentiam facile recipit. Qui tempore pestis fonticulos quoque gerunt, illos a peste immunes manere, experientia confirmatur, purgantium vero & balneorum usus non commendandus, quoniam massa sanguinea inde exagitur. In animi denique passionibus moderandis unusquisque diligens sit oportet. Metus, præ omnibus, & tristitia abdicanda. Meticulosos enim, præ reliquis omnibus, pestem incurrere, non tantummodo testantur PLATERVS atque FORESTVS, sed & fusissime demonstravit celeberrimus RIVINVS, in *tractatu de peste Lipsiensi*.

CAP. XX.

DE

VENENIS ET VENEFICIIS.

Venenandi crimen gravissimum est, & gravius simplici homicidio; in quo nobilis deprehensu ab ignobili non distinguitur, sed a iudicibus eadem poena afficitur. ZACCHIAS, L. 2. tit. 2. Qu. 1. Medici autem venenorum perfectam habere debent notitiam, dum ab eorum iudicio dependet veneni inquisitio, & quia determinare debent in foro, an quis ex veneno perierit, nec ne? Secundum CARPZ. enim part. 1. Qu. 21. Praxeos criminalis, non sufficit veneficii confessio, sed requiritur insimul Medici iudicium, an venenum sat potens fuerit ad interficiendum aut ejusmodi damnum inferendum, item, an revera exhibitum sit, ubi ideo ipsius rei confessio irrita evadit, quando Medici deponunt, veneni quantitatem & qualitatem non fuisse aptam ad occidendum.

I. Qu. Quid sit venenum?

Venenum, late sumtum, dicitur omne id, quod nocet quantitate & qualitate, sive sit corpus naturale, sive artefactum, sive applicatum extus, sive intus datum, vel propinatum.

Distingunt inter venena proprie & improprie talia, sive, quod idem est, inter *mortalia* & *nonmortalia*. Proprie talia, sive mortifera, sunt illa, quæ vim habent occidendi, sive in momento, sive per temporis certum intervallum; hinc actiones vitales destruunt, partes solidas inflammant, humores corrumpunt, eorum circulum sistunt, &

X

spiri-

*Venenum ex lero
quod per os in
vitt
externum
quod per os in
plurim vitt.*

curius currens.

spiritus in nervis suffocant. Improprie dicta venena, five non mortifera illa sunt, quæ tantum insignem læsionem corpori afferunt; morbos præstant contagiosos, pestem, dysenteriam, phthisin, lepram, item, quæ rationis usum tollunt, qualia sunt philtrea, vel pocula amatoria, item pocula sterilitatis, impotentia & abortionis.

2. *Qu. Quotuplex est modus applicandi venena?*

Modus applicandi venena duplex est: Primo enim vel cum cibo & potu, immo ipsis medicamentis, miscentur; secundo extus explicantur per tela, unguenta, balsama, pulverem de cypro, sternutatorium, suffitus, vel denique clysteribus miscentur.

3. *Qu. An venena, extus applicata, tanta celeritate agere valeant, quanta per os assumta?*

Nonnulli sunt in ea opinione, quod exhausta venena, dum a visceribus resolvuntur, citius agere valeant, quam extus applicata, hæcque multum de virtute sua deponant, priusquam ad interiora penetrare valeant. Ast, quod hæc regula de extus applicatis non sit universalis, confirmatur (1) moribus viperarum, canum rabidorum, scorpionum, & puncturis tarantularum. Hæc venena, extus illata, summa celeritate agunt, horrenda symptomata excitant, & hominem vel mox extinguunt, vel enormiter lædunt. (2) Mercurius currens, five argentum vivum, intus datum, venenum vix nominari potest. Propinatur enim ad libras aliquot in horrendo illo morbo, miserere mei dicto. Quando autem ad uncias duas tantum unguentis miscetur,

tur, & sine regimine, praviæque præparatione, extus applicatur, v. g. in morbis venereis, aliisque rebellibus, fere lethalem excitat oris & colli inflammationem, ac gangrænosam exulcerationem, nec minus dolores capitis intolerabiles, convulsiones, suffocationes, dysenterias, &c. (3) Succus hellebori, extus applicatus cum sagitta, venenum est, teste veterum experientia, intus vero dari potest majori in quantitate, ut medicamentum purgans. Nam extus applicata venena citius & immediate cum fluidis vitalibus miscentur, lymphæ nempe, sanguine & fluido nerveo; hinc non alterantur ita, quemadmodum alterari possunt deglutita venena, quæ, quando ad ventriculum deferuntur, interdum ibi deprehendunt tantam viscosarum cruditatum copiam, qua virulentia supprimitur, obvelatur & notabiliter imminuitur, immo plane extinguitur, hoc confirmantibus, inter alia, quartanariorum observationibus, qui a fortissimis vomitoriis non commoven-
tur, immo granum unum alterumve arsenici crudi perferre possunt absque omni injuria, quod tamen in aliis lethalia præstat symptomata.

Qu. 4. *Quanam sint venena dicenda?*

Venena omnia desumuntur ex triplici regno, & quidem (1) minerali. Venena vero omnia mineralium sa-
lia possident corrosiva; hinc eo momento, quando ad ventriculum & intestina deferuntur, aculeis suis acutissimis hæc partes corrodunt, atque inflammant. subtilissimis suis spiculis nervos penetrant, eosque convellunt, & dum ventriculus copiosissimos possidet nervos, qui cum toto genere nervoso commercium exercent, ideo hoc sal
subtile, nervoso fluido mixtum, subito per totum corpus diffunditur, convulsiones & spasmos præstat, totamque œconomiam animale[m] turbat. Vid. Cel. HOFFMANN.

*animalia qui cre-
viunt et sent-
vegetabili, qui cre-
et vivunt
animalia qui cre-
mineralia*

Dissert. de Erroribus circa venena. Huc pertinent spiritus acidi, ut *aqua fortis*, *aqua Regis*, *spiritus solis*, *sulphuris*, *nitri* & *vitrioli*, *oleum vitrioli*: Hi spiritus acidi quidem, in se spectati, venena non sunt, sed potius medicamenta dici possunt, immo aliis medicamentis miscentur, quemadmodum hoc confirmat elixir. vitrioli Myns. elix, proprietatis cum acido, Tincturæ rosarum, & florum cordialium, vel cum spiritu salis, sulphuris, clysto antimonii, spiritu vitrioli philosophico paratæ, item dulcificantur, vel potius diluuntur, spiritu vini; *ast quando spiritus acidi uno præbio, sive una dosi & vice, assumuntur in notabili & excessiva quantitate, tunc corrodunt ventriculum, eumque cum cartialgia inflammant, item quando in excessiva dosi per temporis decursum continuantur, tunc visceribus nocere, & sanitatem invertere possunt.* Hoc probe notandum, quando de virulentia horum spirituum quæstio oritur, quale exemplum reperitur in Cel. VALENTINI Novell. medico-legalibus, casu 29. a pag. 588. usque ad 617. ubi iudicia diversa, cum rationibus tum dubitandi tum decidendi, reperiuntur *de spiritus vitrioli*, mane & vesperti in cochleari spiritus vini propinati, *efficacia*, & an uncia 2. huius spiritus, intra 3. septimanas data, de die ad guttas 20. vel 25. causa fuerit mortis uxoris Meyeri inquisiti?

Huc pertinet *mercurius sublimatus* corrosivus, *mercurius præcipitatus* ruber non edulcoratus, qui spiritus acidissimos corrosivos, concentratosque in se continent; hinc data ad granum unum alterumve venena sunt mortifera, præsertim in subjectis tenerioris texturæ, & debilioris ventriculi. Item *turpetba mineralia*, ut *album* & *flavum*, quæ quidem a nonnullis laudantur, ut vomitoria, *ast non sunt tuta remedia & potius venena dicenda.* Legi merentur hac occasione ea, quæ exstant in Celeb. HOFFMANN Dissertationibus *de Medicamentis infecuris*, item *de purgantibus minus usitatis.* *Mercurius dulcis, vel non rite præparatus, vel aucta dosi adhi-*

adbibitus. Est quidem mercurius dulcis remedium notissimum, sed cum prudentia semper in praxi applicandum. De hoc sequens fert iudicium BONTEKOE, *Fundamentorum medicorum pag. 64. der so genannte Mercurius dulcis ist so süsse nicht, wie man wohl meinet, weil er in allzu grosser Quantität eingenommen, sich gleichfalls in einen Gift verändern kan.* Quo itaque sine metu noxaque assumi possit mercurius dulcis, necessarium est, ut debito modo non tantum præparetur, sed & caute & circumspecte adhibeatur in dosi, & forma imprimis pilulari, non vero pulverulenta. Mercurium enim dulcem, sub forma pulveris exhibitum ad grana XV. adolescentem XV. annorum, sexto post haustum die, necasse testatur Dn. D. WAGNITIVS, in *Meditatione medica curiosa de mercurio pulverato.* Quedlinburgi 1730.

Vitrum antimonii, flores antimonii, crocus metallorum sunt quidem remedia emetica, nunquam tamen in substantia danda, id quod quidem circumforanei & mulomedici pro dolor! non observant. Ex hisce parata infusa, vina emetica, oxysacchara, sapa, syrupi emetici quoque a Medico rationali, quantum fieri potest, evitantur. Nam fortissime agunt, enormiter & excessive vomitum excitant, & dum vomitus convulsio ventriculi est, facile in vomitu tali cholera jungitur cum convulsionibus, anxietatibus aliisque funestis symptomatibus, a quibus miseri ejusmodi homines vel intereunt, vel enormiter læduntur, & Medici tales imperiti fiunt veri artifices morborum, immo plane mortis, in republica non tolerandi.

Arsenicum album, flavum, rubrum, smalta item, cobalthum & arsenicum fixum, vera venena sunt.

Cobalthum enim officinarum nihil aliud est, quam fuscus pulvis, adeo venenosus & corrosivus, ut in nulla charta possit contineri, & quoniam muscas, aliaque insecta

enecat, ideo *Fliegen - Stein* appellatur, & ex Misnia imprimis, aus *Johann Georgen - Stadt*, affertur. De his vid. scriptores materiæ medicæ, SCHROEDERVM, HOFFMANN, in *Clave Schræderi*, ET MÜLLERI *Comment. in Schræder*. VALENTINI, in *Museo & Aurifodina medica*.

Arsenicum est cobalthum sublimatum, five flores cobalthi. Quando nempe minera cobalthi funditur, fumus candidus, pulverulentus, in camino colligitur; hic dicitur *Hütten - Rauch*, &, quoniam mures & glires enecat, etiam dicitur *Ratten - Pulver*. Pulvis talis candidus colligitur, & nova fusione mutatur in vitriformem substantiam, teste KVNKEL. *Glasfmacher - Kunst*.

Arsenicum flavum & rubrum ex albo paratur, addendo certam quantitatem sulphuris. Vid. HOFFMANN. supra citatam Dissert. *de Erroribus circa venena*. Ideo quoque non adeo corrosiva sunt venena, sicuti album.

Auripigmentum cum arsenico flavo a plerisque confunditur, sed male, teste HOFFMANN. *l. c.* Est enim minera nativa, pictoribus usitata, allata ex Austria, & meridionalibus regionibus, Corrosivitatem quidem possidet, at non tantam, quantam arsenicum flavum.

Smalta, five *blaue Starcke*, *Oel - Blau*, &c. dum paratur ex minera cobalthi, etiam virulentum est remedium. Extinguitur quidem sal corrosivum ab additamentis, arena nempe & sale alkali, sed ideo non in totum auferitur.

Arsenicum fixum, a nonnullis Chemicis laudatum, omnem suam virulentiam non deposuit, five sit paratum nitro, five antimonio. Hoc confirmat vis caustica, quam in ulceribus callosis exercet. Applicatum enim ibi calum destruit, haud secus, uti alia corrosiva, *Butyrum antimonii*, *Crystalli lunæ*, *Lapis infernalis*, quæ omnia ad venena corrodentia referri debent.

Anti-

Antimonium crudum a plerisque pro veneno habetur, ex hac ratione, quoniam multum de arsenicalibus particulis ramentisque sulphureis metallicis imperfectis comprehendat. Vid. Celeb. & Illustrem S T A H L I V M, in *Observation. Mens. 6. cap. 1.* Et, quod etiam sal arsenicale volatile in antimonio sit contentum, ego in dubium non voco, quoniam hoc processus chimici confirmant & ad oculum ostendunt: Ast, quamvis ex antimonio parata nonnulla in censum venenorum subeant, tamen *ipsum antimonium venenum dici non meretur*, id quod dudum ostendit W I L L I S, in *pharmacia rationali*, & K V N K E L I V S, in *Laborat. chimic. Cap. de antimonio*, qui contracturam ipsam pulvere antimonii crudi, in substantia ad grana 25. dati, vel morsulis suis mixto, felicissime curavit, & vim medicinalem antimonii non tantum in aliis, sed & in proprio suo corpore tentavit & expertus est. Terra enim mercurialis, in antimonio crudo existens, extinguit corrosivitatem salium causticorum. Quando vero hac destruitur, sive fusione, sive calcinatione, sive sublimatione, tunc hocce sal antimonii corrosivum & arsenicale, a vinculo suo mercuriali liberatum, vomitorium & venenum fieri potest, quo pertinent *reguli antimonii, vitra, flores, croci, cales*, ex antimonio parati, *mercurius*, item *vitæ dictus*, qui, quando non perfecte edulcoratur, mercurius mortis fieri solet, ac denique *bezoardica mineralia, antimonía diaphoretica*, sive cum, sive sine igne parata, & *sulphura*, sive *aurata* sive *cordialia* quæ omnia si non ab experto & exquisito Chimico physico elaborantur, veneni naturam non deponunt.

Saccharum saturni, sive ex lithargyrio, sive minio, sive cerussa, sive plumbo calcinato paratum, remedium quidem est adstringens, immo in inflammationibus & fluxioni-

xionibus proficuum: Interim tamen maxima cum cautione in usum vocandum. D. D. ERNDL. Ill. jam. Reg. Maj. Pol. Archiater, in sua *Dissertat.* pro loco habita Lipsiæ, cujus titulus est, *Diss. med. ex veneno salutem sistens*, inquit thes. 21. nullum est dubium, lenta illa Gallorum, Italarumque venena, quæ *la poudre de succession* communiter appellantur, saturninis ejusmodi concretis suam debere originem. Nam potentissime adstringunt, & obstructions alvi pertinacissimas præstant, vasæque spermatica quoque constringendo impotentiam efficiunt. Et paulo post inquit: Novi quendam Chemicum, qui labores chemicos sumtu cujusdam magnatum dirigit, hic jussu patroni sui, (nescio an laudabili, an vero illaudabili ausu) multum in exantlandis & moderandis venenis sudoris profudit, temporisque consumsit, hic ipse falsus est, quod ex saccharo saturni, additione, volatilis cujusdam, corrosivi, possit parari lentissimum venenum, quod, canibus v. g. propinatum, eos insensibiliter, citra omnia violentiora symptomata, post decursum aliquot septimanarum, aut mensium, enecare soleat, contabescentibus animalibus successive, dum vasa viscerum constringuntur. Sic & vinum, lithargyrio adulteratum, virulentum redditur. Vid. Cel. ZELLER. Tubingensis *Docimastiam vini, lithargyrio adulterati*, item Dn. D GOEKELEII *curiæse Beschreibung des durch Silberglett verfaßten sauren Weins, und der davon entstandenen neuen, und vormahls unerboerten Wein-Krankheit*, item STOKHVSII *de Lithargyrii fumo noxio*, & exinde nato morbo metallico, vulgo *die Hütten Katz* appellato. Hic auctor probare satagit, morbum hunc neque fieri a mercurio, neque ab arsenico, sed unice ab exhalationibus saturni, & fumo dulci, *von dem süßen Bleydampff, so auf den Capellen und Herden nicht alleine sichtbar ist, sondern auch bey der Respiration im Geschmack empfunden werden kan.*

Possent hinc, jam adductis, ex regno minerali desumtis

tii, & per artificia chimica paratis venenis alia addere; ast, cum in institutionibus omnia sint in compendio tractanda, etiam hic amplissimam de venenis doctrinam integre exhaustire non possum. Fortassis sese offeret alia occasio de his ex instituto agendi. Hoc modo addam in præfenti, quod varia dentur remedia, ex *antimonio*, *mercurio*, *vitriolo*, aliisque mineralibus parata, quæ quando non rite applicantur, sive interius, sive exterius, vel quando in malignorum hominum manus incidunt, vitæ læsiones præstare possunt, quo pertinet *vitriolum album*, *Guilla Paracelsi*, *mercurius vitæ*, *bezoardicum minerale*, &c. Item *cosmetica*, v. g. *mercurius cosmeticus*, *magisteria* & alia cosmetica, ex *marcasita*, *talco*, &c. fabrefacta, & corrosivis spiritibus elaborata. Hæc in facie, collo, manibus, mammis, imo, secundum præsentem consuetudinem, in dorso, & scapulis denudatis, applicata, venena fieri possunt, quæ successivam contabescentiam, cæcitatem, oris fœtorem, gingivæ putrilaginem, dentiumque nigredinem inducunt. Et dolendum, quod virgines & scæminæ, a superbia & voluptate seductæ, sibi ita manus violentas applicant, suamque vitam & sanitatem lædunt. Dantur & subtilissima venena alia. Sic, teste ZACCH. L. 2. tit. 2. §. 2. Clemens septimus, Pontifex maximus, toxico fumo facis venenatæ interiit, & ZIEGLERVS, in notis, refert; quod vespilio per pulverem, in plateis dispersum, pestem excitaverit, quæ ultra mille homines ex numero viventium exturbavit. Hæc venena sine dubio a Chimicis expertissimis sunt parata.

Ex vegetabili regno desumpta venena partim sunt corrosiva, partim vaporosa atque narcotica, hoc est, talia, quæ particulis suis subtilioribus, stypticis, vasa cerebri constringunt, & fluidorum, inibi contentorum, motum sistunt; hinc stuporem & somnum profundissimum

Y

atque

atque lethalem inducunt, vel vomitum & choleram præstant. Huc pertinet, secundum auctores, *coronæ imperialis* copiosior vapor. *Solanum*, quoad omnes suas species, imprimis *solanum furiosum*, sive *bella donna*, *poma amoris*, *mandragora*, *semen daturæ*, *hyosciamus*, *crocus* & *opium*, largiori dosi data, non tantum vomitum excitant, sed & stuporem, ac somnum lethalem efficiunt. Item huc pertinent *fungi venenati*, qui subito, spatio unius horæ, intolerabiles abdominis cruciatus, vomitum, choleram, vertiginem & deliria excitant, quale quid ante sexennium in quinque personis, *so unter denen gelben esculenten Schwämmchen einige giftige mit gekauft und gegessen hatten*, observavi.

Cicuta & *napellus* veterum erant primaria venena. Hinc succus *cicutæ* inspissatus semper olim Athenis aservabatur in pœnam hominum. Venena vegetabilium hoc quoque præcipuum præ reliquis possident, quod quam commodissime dari valeant; nam eorum salia, in viscoso terreo principio involuta, delitescunt, hincque acredinem notabilem non possident & nauseam in organo gustus non excitant. Huc referri debent, ut insipida venena, *vina venenatu croco metallorum*, *vitro*, *floribus* & *regulo antimonii*, item *vina lithargyrio adulterata* & *dulcificata*. Non ita diu est, quod certum quoddam ex regno vegetabili innotuit exoticum sub nomine *ligni Panave*, quod, uti communis fert fabula, in morbis chronicis curandis, febribusque intermittentibus depellendis, magnæ esse solet efficacix. Hoc enim remedium largiter vomitum excitat, alvum evacuat, sudorem expellit, saporis est caustici, instar *granorum tilli*. Hæc sane, dum caustica sunt, remedia venena dici possunt, quando largiori dosi propinantur, haud secus, ac alia vomitoria & purgantia fortiora, ut *esula*, *belleborus albus*, *elatheryum*, quorum usus inter Medicos recentiores jam cessavit fere penitus, quoniam facile hyper-

catar-

catarsin post se relinquunt. Hisce jungitur merito *belleborus niger*, *asarum*, *colocynthis*, *scammonium*, *gummi de Peru*, quæ sane gradu tantum a venenis differunt. Et quamvis a nonnullis auctoribus talia, ut prorsus in se bona, incontaminata & innoxia salutantur; vid. Celeb. VATERI *Physiologiam experimentalem*, pag. 838. Cap. de venenis: Tamen ipse autor fatetur, quod maxime activis qualitatibus, præ omnibus aliis corporibus, prædita sint, quarum respectu etiam in minori quantitate brutis non minus ac homini, nisi rite & prudenter adhibeantur, noxam, imo mortem afferant.

Denique his addenda venena illa emmenagoga, si-
ve foetum & menses pellentia, quo pertinet *sabina*, *artemisia*, *euphorbium*, imo *sagapenum*, & his similia alia, ex quibus pocula partim impotentiae, partim abortionis conficiuntur.

Animalium venena quoque in potestate hominum sunt, & malitiosus illis pro lubitu uti & abuti potest. Exempli loco sit pulvis cantharidum, bufonum. Sic, (quemadmodum relationes testantur Anglicanae de jam ubique fere inter eruditos nota variolarum insitione) quando purulenta materia variolarum, ab uno homine infecto collecta, per turundines naribus applicatur, excitatur hic morbus, quemadmodum ille quoque prævia vulneratione circa carpum, & applicatione hujus materiae purulentæ inoculatur. Et credibile sane est, quod applicata talis materia in ano atque pudendis similem effectum præstet. Si enim virulentia venerea per pudendorum applicationem in congressu, & per salivam in osculis transplantatur, non video, quid impedire possit eo modo institutam variolarum transplantationem. Salia enim virulenta peregrina, volatilia & corrosiva, etiam hic agunt, si modo immediate corpori applicantur, & cum sanguine commiscantur. Venena talia animalium, cum corpore

humano mixta, turbant motus sanguinis naturales, humores vitales destruunt, & ad putredinem disponunt, immo inflammationes lethales producunt, quo pertinent *araneæ* etiam nostrates, quæ haud secus, ac illæ, quæ in regionibus calidioribus reperiuntur, quales sunt *tarantula Apuliæ*, succum virulentum, acrem, corrosivum atque volatilem possident. *Bufo*num, animalium illorum aspectu horridorum, in locis subterraneis impuris, squalidis, nutritorum, pulvis teste MONCONYS, in suo *Itinerar.* exterius in capite applicatus, non tantum vesicas, sed & deliria infert. De canis rabidi veneno alibi jam dictum fuit. Hoc, solo morfu communicatum, interdum per aliquot annos in corpore delitescere potest, donec ex improviso, solo motu corporis excessivo, agere incipit, quale quid in rustico pagi *Dorndorf* observavi.

Viperæ, *serpentes*, *lacertæ*, five *salamandræ*, *scorpiones* morfibus atque puncturis homines lædunt, & virulentam salivam, vel venenosa excrementa, ita humano corpori communicant.

Cantharides autem, scarabæi isti splendentes, & quasi deaurati, in Germania nostra ubique communes, apprime continent sal volatile acerrimum causticum. Si enim modo exterius cum emplastris applicantur, partes adurunt, & vesicam excitant, quando vero improvide dantur intus, si ve in pulvere, si ve in essentia, non tantum ventriculum & intestina inflammant, sed & ardorem urinæ, mictum cruentum, & spasmum penis, si ve dolorosam penis erectionem, producunt, inprimis, quando dosi aucta propinantur. Similis virulentus effectus expectandus a *stynco marino*, *pulvere millepedum* & *nucleis*, si ve fructus, *anacardina*, quæ alias, ut aphrodisiaca laudantur.

ZACCHIAS denique ad venena refert animalia, venenosis cibis nutrita, item animalia, venenosis sagittis vulnerata. De his posterioribus suo modo assertio auctoris con-

concedi potest. Venenum enim ante interitum circulatione sanguinis per corpora animalium diffundi potest. Prior vero sententia merito in dubium vocatur. Dum enim in omnibus animalibus alimenta invertuntur, & in forma destruuntur, ideo ipsa virulentia per vim ventriculi extinguitur, & si virulentia nutrimenti non agit in ventriculum, intestina & sanguinem animalium, multo minus agere potest in carnem, & reliquam substantiam, postea comedendam. Et, quod maximum, quotidiana observatio contrarium docet. V.g. anas & trutta comedunt bufones, gallina araneas, & alia insecta: Attamen carnes horum animalium nullam virulentiam possident, cum contra vegetabilia, ovulis & excrementis insectorum contaminata, & ab hominibus deglutita, choleram lethalem excitare soleant.

5. *Qu. Quales sint effectus venenorum?*

Omnia venenorum genera, ad ventriculum delata, in illo cardialgias, nauseam & vomitus præstant; ad intestina vero promota, ibi tormina atrocissima, diarrhoeas, vel etiam interdum alvi constipationes efficiunt. In thorace producunt spasmos diaphragmatis, & musculorum intercostalium, singultus, respirationes difficiles. Immo ipsum cor insimul afficitur, ideoque ejus muscoli in systole cordis enormiter contorquentur. Hinc oriuntur in principio palpitationes cordis, anxietates præcordiales, syncope, sudores frigidi, & in fine pulsus debilis, celer & intermittens. Facies denique vel extra ordinem pallet, vel interdum enormiter tumet, cum livore. Si vero venena ad cerebrum deferuntur, item ad nervos & membranas cerebri, tunc irregulariter fluidum nervosum commovent, circulumque spirituum turbant. Inde sequuntur inquietudines, deliria, convulsiones & epilepsia.

6. Qu. An effectus, jam recensiti, semper sint effectus veneni, an vero ejusmodi symptomata etiam sint aliis morbis, sponte in corpore natis, communia?

Operosum quidem, atque satis difficile est semper, absolute determinare, an hæc symptomata sint de veneno, an vero ex aliis morbis nata, id quod confirmat CONDRONCHIVS, in *Methodo testificandi*, cap. 6. SYLVATICVS, de *Morbis simulatis*, cap. 21. & FORT-FIDEL. de *Relation. medicis*, Lib. 4. Sect. 3. cap. 1. quo pertinet Celeberr. HOFFMANNI *Dissert. de Conversion. morbi benigni in malignum*, ubi de generatione veneni in corpore humano agitur. Et sane non sine ratione dubitant magnæ famæ & experientiæ Medici, an dentur signa specialia veneni, quibus mediantibus venena ab aliis morbis distingui queant. Cacochymia enim & cachexia, sponte in corpore nata, vel ab erroribus diætæ promota, similes interdum effectus præstant, quemadmodum sunt v. g. erosiones, dolores, cardialgiæ, item inflammationes ventriculi, febres, deliria, &c.

7. Qu. Quomodo præsentia veneni in corpore humano possit dignosci?

vicum iustitiam
an oal barbare
gustat
Lupus, magis ab
aqua pluvialis.
n. h. vinum
bonum ward. Phil. d. d. glorig.

Signa, quæ præsentiam veneni in corpore humano indicant, desumuntur ex circumstantiis, quæ ante assumptionem, in assumptione & post illam observantur. Sic v. g. quando homo, ceteroquin sanus, qui alias, secundum regulas diætæ, optime vixit, ex improvise in morbum incidit, quem concomitantur gravissima symptomata, immo, quando hoc fit eo tempore, quo morbi epidemici

demici maligni non grassantur, tunc præsumitur, quod hi subitanei, extraordinarii & vehementissimi affectus etiam nati sint a causa quadam extraordinaria; hæ sunt circumstantiæ, ante assumptionem veneni, non contemnendæ. In assumptione quoque nonnullæ circumstantiæ contingunt, quales sunt odores, colores & sapes. Hinc quando odor alimentorum adfuit ingratus, saporque nauseosus, adesse suo modo potest præsumptio veneni, in specie, quando, post deglutitionem talis virulentæ materiæ, fauces & organa deglutitionis molestantur, ac cum dolore afficiuntur, item, quando post assumptionem statim nausea oritur, vel sequuntur cruciatus ventriculi & intestinorum, ructus ingrati, singultus, vomitus, diarrhœa dolorosa, renum & vesicæ dolores, urinæ odores, pallor faciei, intumescencia abdominis, & reliquarum partium, motus impotentia, oscitationes & pandiculationes. In fine junguntur sudores frigidi syncoptici, inflammationes, gangrænosa, & maxime dolorosa, partium internarum, deliria, convulsiones, lypothymia, pallor faciei, labiorum & unguium livor, ac tandem mors.

Post mortem in cadaveribus varia extraordinaria apparent & insolita, qualia sunt tumor abdominis, ventriculi & intestinorum maxima inflatio. Maculæ etiam deprehenduntur lividæ in dorso & pedibus. Aperto cadavere similes maculæ cadaverosæ conspiciuntur in ventriculo & intestinis, item & in aliis visceribus, v. g. pulmonibus, hepate, liene, renibus, &c. Ventriculus & intestina interdum perforata sunt a veneno, imprimis corrosivo, item in plicis ventriculi, præter liquamen corruptum, foetens, nigricans atque sanguinolentum, reperiuntur interdum nonnulla ramenta de substantia veneni, quemadmodum hoc in duobus subjectis, ab arsenico interfectis, observare mihi licitum fuit. Cor deprehen-

ditur

ditur quoque flaccidum & corrugatum, ac notabilis in ventriculis cordis existit sanguinis congruescentia. In capite, imprimis in arteriis carotidibus, venisque jugularibus, magna & extraordinaria sanguinis coagulati copia plerumque deprehenditur. Dum enim a venenis convellitur & constringitur cerebrum, sanguinis circulus per hæc vasa impeditur.

Non vero tantum de defunctis, & per venenum extinctis subjectis, sed & de illis simul, qui a venenis non perierunt, & tantum in morbos inciderunt chronicos, vel tales, per quos ad actiones humanas & civiles inhabiles redduntur, interdum quæstio oritur. In hac quæstione solvenda Medicus semper cautus esse solet. Arduum enim est, determinare, an quis a veneno ægrotet, an vero ex alia causa? Sic v. g. 1) impotentia & sterilitas a medicamentis, vel potius venenis, promovetur, id quod omnes concedunt, e. g. per saturnina, atque emmenagoga fortiora, aliaque similia. Interim tamen talis effectus ab alia causa quoque oritur, v. g. nimia voluptate, erroribus diætæ, item a morbis, in corpore sponte natis. 2) Ulcera in facie, & aliis cutis partibus, sordida & crustosa, maculæ item, cum ingenti capitis dolore, defluvio capillorum, artuum tumore, nodis, & tortura, non tantum a venenis, sed a lue venerea, scorbuto & arthritide quoque producuntur. Hinc in dijudicando cautus debet esse Medicus.

CAP. XXI.

DE NECESSARIA CADAVERVUM INSPECTIONE.

I. Qu. *An in genere necessaria sit inspectio cadaveris occisi?*

Vtique necessaria est, ut appareat, an quis ex percussione, vel vulnere, vel alia læsione, obierit, nec ne. Hancce inspectionem 1) S. Scriptura haud obscure præcipit, ne multus maneat sanguis, temerarie effusus. Extat enim Exod. 29. v. 12. Qui hominem percusserit, ut inde moriatur, morte morietur. Quod si enim INDE, sc. ex plaga, vel contusione, vel vulnere illo, mortuus non fuerit, consequentia e contrario petita, illum morte mori non debere, clarum est. Reperitur quidem particula INDE non in versionibus; Sensus tamen Textus hujus clarissime hancce connexionem exhibet. Id quod Celeb. STRYK. in *Programm.* 1691. edito, fusius exposuit. 2) L.L. publicæ ad inspectionem cadaveris magistratum obligant, præcipue *Const. Crim. Carol. V. Art. 147. & 149.* qui articuli fundamenta sunt legalis inspectionis. 3) Præcipiunt itidem L.L. statutiariæ omnes. Nam magistratus loci cadaver defuncti, vel occisi, vi officii sui, nemine etiam postulante, nulloque accusante, etiam si delinquens aufugerit, a Medicis, Chirurgis, & Scabinis, diligenter inspicere, & vulnerum quantitatem & qualitatem notari, curare debet. Inspectio ejusmodi cadaveris adeo necessaria est, ut, omissa ea, nihil certi de

reo statui possit, ob defectum certioris indicii, an occisus a vulnere mortuus sit, nec ne, & an tale vulnus simpliciter lethale fuerit. Innuit hoc CLASSEN. in *Comm. ad C. C.* ubi inquit: Si inspectio, quæ ad corpus delicti spectat, omittatur, ob defectum certæ scientiæ, an vulnus fuerit lethale, nec ne? pœna ordinaria statui nequit. Quippe quæ nunquam decerni potest, nisi facta prius diligenti cadaveris inspectione. Hinc etiam multi homicidæ ordinaria pœna non puniuntur, ob culpam, vel negligentiam iudicis, qui vel plane omisit cadaveris inspectionem, vel non legitime, & legaliter, in isto actu processit. Eiusdem tenoris sunt, quæ CARPZ. in *Praxi Crim. P. I. Qu. 26 n. 30.* habet, ubi inspectionem cadaveris, partem necessariam Inquisitionis nominat.

2. *Qu. Si quis derepente, telo lethifero vulneratus, obierit, an & tunc ipsa sectio necessario ad vulneris lethalitatem determinandam requiratur?*

Verum quidem est, si quis percussus derepente moriatur, quod ibidem nec error diatæ nec imperitia, aut incuria Chirurghi accusari possit. Hinc JCI, in primis STRYK de *J. S. diss. I. c. 3. n. 23.* cum aliis, ibi citatis, BRVNNEM. OLDEKOP. MENOCHIO, MASCARDO, inspectionem necessariam esse negant, cum, ex vulnere discessisse hunc, præsumatur. Verum salva tot viror. Celeb. auctoritate illis subscribere non possumus. Nam vulneratus ex inflictio vulnere solo interdum non moritur, sed ex alia causa simul, v. g. per morbum quendam latentem, & fieri potest, quod terminus fatalis, cum tempore illius vulneris, coincidat, aut hoc brevi post excipiat. Vid. BOHN.

BOHN. *de Off. Med. P. 2. C. 4. p. 588.* Ejusdem sententia est. Cl. VALENTINI in *ff. Med. Legal. P. alt. Introd. Tb. 8.* qui notabilem historiam refert, quod quidam a pollice, ab instante in pectus impacto, exanimis corruerit, in cujus sectione Empyema, a longis temporibus ibidem latens, a contusione tali ruptum, causa mortis fuit. Hac itaque repentina mors a morbo latente potius producta fuit, quam a læsione. Sicut a levi ictu scuticæ, einer Peitsche, in manum, vetula quædam repentine periit, quam tamen non tam ab ictu, quam apoplexia, mortuam esse, Colleg. Med. Augustanum ostendit. Vid. VALENTINI, *l. c. p. 36. & 37.* Tutissimum itaque est, immo absolute necessarium, cadaverum sectionem instituere, ut veritas causæ magis evidenter appareat.

3. Qu. Quanam personæ ad inspectionem legalem sint necessariae?

Const. C. Carol. V. judicem, cum duobus Scabinis, Actuarium, & unum, vel plures Chirurgos, ad hunc actum exposcit. Vid. Art. 149. De personis politicis, ad hunc actum deputandis, non sumus solliciti; sed tantum de medicis. Neesse enim est, ut in omni inspectione Chirurghi, seu, quod magis est, Medici (nam Chirurgis solis vix creditur, vid. Cel. & Illustr. LYDOVICI, in *Comment. ad C. C. C. V. Art. 147.*) adhibeantur, quorum judicium requirendum, an lethale, an vero non sit vulnus inflatum. Eorum quoque sententia standum, & duobus, vel tribus Medicis hac in re magis creditur, quam decem, & viginti testibus non Medicis. CARPZ. *l. cit.* nempe in *Praxi Crim. n. 43.* Medici vero & Chirurghi (non Balneatores, non Barbitonfores & Pharmacopæi) sint in Anatomia periti & exercitati. Anatomia enim fundamentum est legalis inspectionis. Anatomici soli partium læsarum

fitum, connexionem & usum norunt; hinc functionem turbatam describere, & quantitatem, qualitatemque vulnerum determinare possunt. Ejusmodi artificii, vel Anatomico, in sua arte creditur, consentientibus LL. legumque DD. Vid. STRYK. *de J. S. diff.* 1. c. 2. n. 20. Cum autem Chirurghi, in Anatomia versati, rarissimi sint, inprimis, degentes in Germania; ideo etiam haud accuratum iudicium de quantitate, & qualitate vulnerum ab illis expectare possunt iudices. Et consuetudo, quæ vim legis habet, ubique recepta, obtinuit, ut Medici, inprimis Doctores, Licentiati, non bullati, sed legitime promoti, vel Physici jurati, in inspectione cadaverum adhibeantur, utpote qui sine Chirurgis, non vero exclusis plane his, lethalitatem determinare possunt. Medici enim, inprimis promoti, publica habent eruditionis, doctrinæ, & experientiæ testimonia, hincque illis, ob depositum in Promotionis actu iuramentum, certior fides habenda. Vid. *Resp. F. L. M. in ZITTMANNI Medicina Lips. for. C. 2. Cas. 34. & 61.* It. WELSCHIVM, in *Renunciatione Vulner. lethal.*

4. Qu. *An Medicus solus, sine Chirurgo, inspectionem legalem instituire valeat?*

Utique Medico soli munus inspectionis legalis concedi potest. Nam finis per omnia obtinetur, legitima scilicet sectio, & inspectio, & genuina depositio, vel relatio speciei facti, cum sufficienti de ea iudicio. Vid. BOHN. *de Renunciat. Vulner. lethal. c. 8.*

5. Qu. *An senior, vel juvenis Medicus ad testificandum, & inspiciendum, sit adhibendus?*

Perinde est, dummodo senior iudicio adhuc polleat, nec in ipsa senectute juvenis in eruditione existat.

6. Qu.

6. Qu. *An postulari debeat ille Medicus, & Chirurgus, qui vulnerato vivo medebantur?*

Si haberi potest alius non. Nam, quando de lethali-
tate vulnerum per accidens quaestio oritur, in propria
causa testari non possunt.

7. Qu. *An Medici ad singulos ejusmodi actus, in specie inspectionem, sint juramento confirmandi?*

Jurati Medici in *Constit. Crim. Carol. V.* requiruntur Art. 19. cum testibus non juratis, secundum axioma juridicum, non credatur, nec peritis quoad effectum juris, & sine juramento, hinc nec Medicis, ne in favorem renunciasse videantur, fides plenaria adhibeatur. Quod si tamen Medicus in Doctorem, vel Licentiatum, promotus fuit, & juramentum solemne in promotionis actu jam praestiterit, vel si ab initio officii sui juraverit, vel si ad cadavera inspicienda in specie vocatus fuerit, & sub primo actu juramentum dixerit, illud reiterare non tenebitur, sed primum ad omnes actus extenditur. Ita judicat CLASSEN. & LYDOVICI, in *Notis ad C. Crim. Art. 147. & 149.* BRUNNEM. in *Proceff. de Testibus c. 20. n. 63.* CARPZ. *loc. cit. n. 40.* STRYK. *de J. S. l. c. n. 30.* Consultum autem est, secundum mentem posterioris, n. 32. ut, qui ab initio officii juravit, in actu inspectionis admoneatur istius juramenti, ad majorem curam in inspiciendo adhibendam. De Chirurgis itidem erit judicium, ut in actu inspectionis admoneantur istius juramenti. De eruditis tamen Chirurgis hic sermo est. Imperitis autem,

licet centies juraverint, fides nunquam erit adhibenda. Per juramentum enim ejusmodi imperitus & rudis non emendatur, & false observata nunquam per juramentum vera evadunt, sicuti recte judicat BOHN. *Lib. de Off. Med. p. 444.*

8. Qu. Num 'unus, vel plures' Chirurghi & Medici ad inspiciendum cadaver requirantur, & cuinam, si lis oriatur, plus credendum?

Unus quidem expertus Medicus ad inspectionem cadaveris sufficit; quando vero plures adsunt, tunc & melius, & evidentius inspectionem peragere possunt. Plus enim vident oculi, quam oculus, & alter alterum juvare potest. Hinc *Const. Crim. Carol. V.* plures, si haberi possint, Medicos requirit. Interim tamen unus sufficit. Unus etiam Chirurgus, absque Medico, sufficeret, si de ejus peritia hac in re constaret. Sed cum ejusmodi Chirurgus in Germania rara sit avis, vix Chirurgus soli hoc officium committitur, sed Medicus semper addi solet, & debet (vid. *LVD OV. Comment. ad Constit. Crim.*) ne Inquisitus ansam habeat dolendi, & conquerendi, aut de imperitia Chirurghi, aut de inspectione, ob absentiam Medici, minus legali. Medici autem, qui actui inspectionis interesse volunt, sint requisiti, rogati & vocati. Hinc communiter in Attestatis præmittunt formulam: *Auf ergangene Requisition.* Interim aliis curiosis Medicis non præcluditur occasio aliquid addiscendi in ejusmodi casu, sed passive sese habeant, & spectatores agant, non inspectores. Contingit tamen interdum, quod, si unus Medicus a magistratu ablegetur, a parte rei, vel Inquisiti, alius adhuc ad rite inspiciendum cadaver inviteatur, quod jure propitio fieri potest. Illius enim aucto-
ritati

ritati nihil detrahatur, cum in re, sanguinem humanum concernente, omnem respectum, & auctoritatem, seponere debeamus, nec in re tam ardua nimis cauti, ac providi, esse queamus. Medici tamen hi in inspectione amice consentiant, in relatione non varient, speciem facti unanimiter referant, cum ante oculos ipsorum sit positum cadaver, quod tamdiu inspicere valent, donec in descriptione vulneris consentiant. Quando autem hi duo, aut tres, vel plures, a magistratu simul requisiti, postea in iudicio de vulneris qualitate, & effectibus, dissentiunt, tunc, secundum STRYK. *l. c. n. 21.* standum a parte peritioris. Ast, cum difficile sit, peritiam unius præ altero dignoscere, plerumque integris Collegiis, & Facultatibus, Medicorum horum lis, ad decidendum, committitur.

9. *Qui. Quanam sint requisita Medici, inspicientis & deponentis?*

Sunt sequentia. 1) Peritus sit. Peritia vero consistit in exacta notitia partium corporis humani. Noscat enim oportet ejusmodi Medicus omnium partium denominationem, situm, connexionem, structuram & usum. Hinc optimus Anatomicus est etiam optimus Medicus deponens. 2) Conscientiosus sit, pius & vir probus. Rationem enim reddere debet & suo tempore de hac actione coram summo tribunali Dei omniscii, qui sanguinem humanum, innocenter effusum, non inultum finet. 3) Sit laboriosus. In inspectione enim omnem diligentiam adhibere debet. Singula necessaria notet, summa cum circumspeditione, & in relatione, observata sua describat, non obscure, sed perspicue, secundum LL. artis, neque nimium concise sed pro rei necessitate. 4) Honestus insuper sit, nec lascivis oculis, impuris manibus, indecenti joco,

joco, verbisque obscœnis tractet id, quod cum verecundia rimandum.

10. Qu. *Quomodo inspectio ipsa sit suscipienda?*

Ad inspectionem legalem rite perficiendam varia requiruntur. 1) Illa, quæ ante inspectionem. 2) quæ in ipsa inspectione, 3) quæ post illam sunt necessaria. Vid. VALENTINI ff. *Med. Leg. Part. 2. in Introd. Th. 5.* & BOHN. *de Renunciat. Vuln. lethal. P. 10.* Ante inspectionem 1) est tempus, ubi quæritur, quando inspiciendum cadaver. Respondetur: Satis tempestive, brevi tempore post mortem vulnerati, pro declinanda putredine superveniente. Hinc *Constitutio Crim.* etiam præcipit, ut fiat inspectio ante sepulturam. Putredo enim mutat 1) formam cadaveris, & læsionem, & in tali casu etiam Medicus peritissimus sugillationem vulnerum a sugillatione cadaverosa, necrosin cadaverosam a necrosi vulnerum, distinguere non potest. 2) Nec Medicus ejusmodi putridum corpus, cum dispendio sanitatis, ac propriæ salutis, inspiceret enetur. Vid. BOHN. *de Off. Med. P. 2. p. 582.* qui in duplici casu, ob foetorem, sectionem postulatam renuit. 3) Talis inspectio nullius est usus. Nam Medicus, & judex, finem suum, scilicet exactum judicium de lethali-
tate, assequi non possunt. Interim tamen contingit, ut post sepulturam, si forsân illa antea neglecta, vel illegaliter peracta fuerit, inspectio occisi & effossi corporis instituatur. Hoc fieri potest tamen tantum in certis casibus, imprimis ad detegendas fracturas in ossibus, præsertim capitis, molliores vero partes citissime corrumpuntur. 2) Ad inspectionem legalem requiritur locus commodus, satisque lucidus, & si fieri potest, illa magis instituenda in libe-

ro aere, quam clauso conclavi. Inprimis autem evitetur enormis hominum confluxus, ne turbetur Medicus in suo opere. 3) Aliæ circumstantiæ ante inspectionem sunt examinandæ, scilicet nomen & ætas occisi, constitutio naturalis, & præternaturalis, ante, vel post vulnerationem. Arma, quibus læsus vulneratus fuerit, inquirenda sunt, si fieri potest, & inspicienda, ictus vehementia indaganda, item & situs corporis, qui in ipsa vulneratione obtinuit, examinandus. Diæta ante & post percussione accurare indaganda. Adstantium Chirurgorum & Medicorum solertia, & methodus medendi inquirenda. Tempus denique mortis probe investigandum, ob efficaciam dierum criticorum. Vid. D. KNAUTH *Diss. inaug. sub. Præsid. Ill. WEDEL. de Efficacia dierum criticor. in vulneribus.* Ejusmodi circumstantiæ inspectionem non tantum exactiorem faciunt, sed & postea ad melius dijudicandum vulnus, & de lethalitate promptius ferendum judicium plurima subministrant argumenta. Examen ejusmodi circumstantiarum etiam exposcit C. C. C. V. Art. 147. 4) Curet Medicus, inspectioni destinatus, ne ante adventum suum Chirurgus initium inspectionis, & inprimis sectionis, faciat. Hoc ipso enim dubius redditur Medicus, an ita sese res ante inspectionem & sectionem habuerit? 5) Ante sectionem profunditas vulneris neque stylo, neque ipso secante, vel pungente instrumento investiganda. Profunditas enim vulnerum nihil facit ad rem, & ipsa sectio profunditatem vulnerum manifestare potest, & debet, &, quod maximum, vulnera nova ita fieri possunt. Attamen comparatio vulneris & instrumenti lædentis institui potest.

II. Qu. *Quanam in ipso inspectionis actu
sint observanda?*

Ad legalem inspectionem sectio legitima & anatomica requiritur. Non enim sufficit sola externa contemplatio, vel vulneris exploratio mediante stylo. Vid. VALENTIN. *ff. Med. Legal. P. II. Sect. I. c. 6.* Sed requiritur sectio sufficiens, quæ absolute necessaria est. Quod si tamen factum ipsum plane obvium & evidens fuerit, v. g. si infanti gula præcisa fuerit, aut si caput gladio bipartitum fuerit, tunc proluxa sectio non requiritur. Inspectio autem, vel lustratio, necessaria est. Sectio ipsa more Anatomicorum suscipienda est, provida & suspensa manu, ne vulnera prius efficiamus, quam investigemus, monente BOHN. *in Off. Med. P. 2. p. 593.* Commendat quoque hic Celeberrimus auctor, ut Medicus conscientiosus, inspectionis director, propriis manibus sectionem administraret. Præstat enim manus, quam conscientiam eruentare & contaminare. Sectio etiam instituenda usitatis culttris anatomicis, non aliis. Querela enim sæpe oritur a defensore rei, quod instrumento inepto, quo facile partes incidi, & vasa amputari queant, ad arduum ejusmodi negotium Medicus, vel professor, fuerit usus. Sic apud VALENTINI, in *ff. Med. Legal. P. II. Sect. I. Casu 8.* sectio, novacula instituta, nullitatis fuit accusata. Nam Medicum adhibita novacula arteriam subclaviam incaute disseccasse putarunt. Porro non solum pars vulnerata & lassa sectione est aperienda, examinanda, eluenda, spongiis mundificanda, & adstantibus Scabinis demonstranda, sed & cæteri ventres & cavitates sunt disseccandæ & aperiendæ, quia occisus non a vulnere forsitan, sed ab alio quodam morbo

morbo latente perire potuit, notante hoc VALENTINI, *l. c. in Introd. th. 7.* Immo BOHN. in *Officio Med. p. 590.* aliquod exempla læsionum internarum partium refert, absque externis violentiæ signis. Hinc apertio omnium cavitatum interdum requiritur, imprimis, si causa mortis sufficiens nondum inventa sit. In ipsa inspectione Medicus notet & conscribat, quæ viderit, aut conspexerit, aut aliis dicat, Actuarius nempe, ea, quæ annotanda, & de Specie facti, ac qualitate vulneris, consignanda fuerint. Memoria enim labilis est, vel evenit sæpius, ut, inter inspectores, lis oriatur, an hoc, vel illud in vulnere ita sese habuerit? Quod si sub ipso inspectionis actu hæc annotata fuerint, nulla dissensione, aut altercatione, opus erit.

12. *Qu. Quanam tandem post inspectionem sint facienda?*

Concipienda & extradenda est relatio, seu depositio, in cujus forma sequentia sunt annotanda. 1) Quod Medicus & Chirurgus sit requisitus, & a quonam. 2) Quibus præsentibus facta fuerit inspectio. 3) In quonam loco, & quo tempore inspectio facta sit. 4) In relatione nomen & ætas occisi, interdum quoque statura notetur. 5) Tempus vulnerationis, & tempus mortis, observetur. 6) Diæta, medicamenta, & tempus applicationis medicamentorum, aliæque circumstantiæ non sunt omittendæ. 7) Quomodo corpus externe se habuerit. Notandæ enim sunt, juxta *C. C. Carol. V. l. c.* omnes plagæ, livores, tumores, vulnera, ictus & contusiones, fracturæ in singulis regionibus. 8) Quanam partes læsæ, laceratæ, ruptæ, fractæ, dissectæ, & quomodo fuerint, 9) Genus vulneris, figura, longitudo, latitudo, & profunditas consignanda est.

10) Quid intus vulneratum, & quæ viscera, quæ vasa.
 11) Sanguinis effusi quantitas vel æstimanda, vel ponderanda, & alia materia, in cavitatibus inventa, denominanda. 12) Ubi cruor hæsit, ubi festuca in capite. 13) Status viscerum reliquorum rimandus. 14) Tandem iudicium de vulnere addendum, cum rationibus anatomicis, physiologicis, pathologicis, chirurgicis, ubi consulendi sunt ZITTMANN. in *Medicina for. Lips.* BOHN. in *Officio Med. & in Tract. de Renunciat. Vuln. lethal.* WELSCHIVS, de *Renunciat. Vuln. lethal.* AMMANN. in *Medicina Critica, & Praxi Vuln. lethal.* VALENTINI, in *ff. Med. Legal. & Nov. Med. Legal.* FORTVNATVS FIDELIS, in *Tr. de Relat. Med.* ZACCHIAS in *Qu. Med. Legal.* aliique, ubi casus præsens semper cum aliis est æquiparandus, ne hallucinetur in iudicio Medicus. Non enim præcipitanter rem maximi momenti in chartam conjiciat, sed præmeditato consilio, & sufficienti rationum & argumentorum numero. Iudicium enim medicum semper de qualitate vulnerum expectat iudex, quod fundamentum sit omnis inquisitionis, & talis processus criminalis, (Vid. CARPZ. in *Praxi Crim. P. 1. Qu. 26.*) non tamen inutili prolixitate.

CAP. XXII.

DE

VVLNERVM LETHALITATE.

I. Qu. Quid per vulnus intelligendum?

Vulnus significat alias solutionem continui partium molliorum ab instrumento acuto, & contradistinguitur ulceribus, rupturis, &c. In Medicina legali autem sub se comprehendit omnem lationem externam, tum violentia factam, continuitatem partium solventem, siue illa sit con-

tu.

tusio, punctio, sectio, plaga, fractura, distorsio, luxatio, percussio capitis, thoracis, dorsi, abdominis, &c. quæ omnia vulnera dicuntur, quando de lethalitate quæritur.

2. Qu. *Quid per rò lethale sit intelligendum?*

Lethale est id, quod mortem infert. Confunditur cum insanabili, sed false. Non enim omne insanabile statim mortiferum est. V. g. pars externa amputata per se non restituitur, uti auris, nasus, digitus, pes. Phthisis & hydrops interdum existit malum insanabile, non vero statim mortiferum est. Nec omne quod mortem infert, insanabile statim dicendum. Nam per incuriam Medicorum, Chirurgorum, errores ægrotantium & adstantium, &c. vulnera efficiuntur lethalia, quæ alias sanabilia existunt. Nec omne id, cujus pedissequa mors est, lethale, five mortale, appellandum, ut communiter vulgus, immo prudentiores, qui in hoc genere non sunt versati, volunt. Sed id demum *lethale dicitur, quod revera per se, sua natura, & ut tale, consequentis mortis causa existit.* Hinc in scholis medicis distinguitur inter vulnus 1) per accidens lethale. 2) Inter vulnus ut plurimum lethale. 3) Inter vulnus simpliciter & absolute lethale. Vid. AMMANNI *Praxis Vuln. lethal.* Per accidens lethale est id, quod curari potuisset, nisi hoc, vel illud intervenisset, quod tamen non essentialie isti læsioni fuit, sed accidentale, vel committendo, vel omittendo, advenit. Vel vulnus per accidens lethale est id, ex quo, ut tali, nullus vulneratorum perit. Ut plurimum lethale, vel frequenter lethale, est, quod sæpius ex se male cedit, non tamen semper, aut saltem tardius quoque hominem interficit. Dicitur etiam *periculosum.* Per se lethale dicitur, quod im-

mediate hominem ex vivis aufert, seu, inter quod & mortem nulla alia causa reperitur. Hoc per se lethale sapius aequiparatur & conjungitur cum *necessario, seu simpliciter & absolute lethali*, sed perperam, quemadmodum BOHNIVS *de Renunciat. Vuln. lethali. p. 31. & 32. & de Off. Med. P. I. c. 5.* monet, cum absolute & necessario lethale quidem per se lethale dici mereatur, sed per se lethale non statim ex necessitate, & sic absolute lethale existat. *Simpliciter & absolute lethale* ideo est id, quod, omnem medelam effugiens, semper, brevi tempore, vitam aufert, & omnem Medici & Chirurgi curam excludit. Hi termini quidem in Medicina legali sunt recepti & usitati. Ne vero confusio oriatur, & JCrīs, ac defensoribus Advocatis occasio detur, sinistre Medicorum renunciationes interpretandi & distorquendi, ideo, secundum monitum BOHNII, *l. c.* vulnera potius distinguenda sunt 1) in per se, & 2) per accidens lethalia. In certis vero casibus addi potest terminus *absolute lethale*. Vid. ZITTMANNI *Medicina forens. p. 700. & seqq.* ubi notabile reperitur responsum.

3. Qui. Itaque, quodnam vulnus in genere lethale per se fit dicendum?

In renunciatione non adeo attendendum, an vulnus hujus, vel illius organi in genere ab auctoribus lethale dicatur; sed potius examinandum, an hoc praesens & individuale vulnus, de quo quaestio est, & de quo judicium ferre debet Medicus, sit lethale, an non: Nullius enim partis corporis humani vulnus, secundum nonnullos, in genere lethale dici potest; sed, pro diversitate, & variorum laesionis modo, in hoc individuali subiecto taliter, vel taliter pronunciari debet. Hinc, secundum sententiam certorum auctorum, nec cordis, nec cerebri, nec ventriculi vulnera

vulnera in genere, sine omni respectu, simpliciter & absolute lethalia æstimari & dici debent, nisi profundiora fuerint, cum superficialia ad mortem non semper tendant, quemadmodum observationes confirmant, & confirmarunt olim. Deinde nec auctoritas venerandorum nostrorum in arte partum, HIPPOCRATIS, GALENI, CELSI, aliorumve neotericorum sententia, renunciatio & casus, pro regula lethalitatis absolute est statuendus. aut cœco consilio obtemperandum. Eorum enim auctoritas & experientia non semper sufficit ad arduum hocce negotium expediendum. Agitur hic de vita inquisiti, vel rei. Ideo in ejusmodi renunciatione potius omnes circumstantiæ probe sunt examinandæ, & judicium ferendum postea de Specie facti, de casu hoc individuali, secundum principia anatomica, physiologia, pathologica & chirurgica. Hoc facto experientia aliorum in subsidium vocanda, & auctoritate eruditorum renunciatio confirmanda. Generalis itaque regula, ad quam vulnus in genere lethale dici meretur, & ex qua speciales regulæ formari possunt, est hæc: *Quodcunque vulnus corporis nostri machinam hydraulico vitalem lædit, ejusdem œconomiam turbat, ut vel in momento, vel post aliquod tempus, illa tollatur, & cui ruinæ subvenire nemo potest, illud mortale, sive lethale dicendum.* Minor propositio ex specialibus casibus desumenda, & postea conclusio formanda. E. hoc speciale. Rite hinc omnia sunt perpendenda, antecedentia, concomitantia & consequentia, ut subsumtio recte inferatur. Cum autem a parte læsa præcipua sumatur indicatio, si ad lethalitatem per se, aut absolute talem, pervenire velimus, lustremus ipsas partes corporis nostri. Describuntur autem, secundum notam Hippocratis divisionem, in continentes, contentas, & impetum facientes. Sub istis intelliguntur partes solidæ, ut cor, pulmones, ventriculus, vasa, &c.

Sub

Sub illis humores, ut sanguis, chylus, bilis, urina &c. Sub his spiritus, vel fluidum nerveum, qui sunt motores corporis nostri, & præsides actionum, quæ in œconomia nostra peraguntur. Ex hac divisione partium fluunt regulæ aliæ speciales, & lethalitatem indicantes, & quidem prima hæc: *Quodcunque vulnus spiritus vel dissipat, vel coagulat, vel influxum eorum, aut in totum, aut in tantum tollit, & sedem spirituum destruit, illud lethale est dicendum.* Locum hæc regula invenit in vulneribus venenatis, capitis, cerebri, cerebelli, spinalis medullæ. Nam ibi spiritus elaborantur, secernuntur & distribuuntur, quæ lethalitas etiam mox se manifestat per subsequentem *ἀνεσθησιαν*, stuporem, apoplexiam, epilepsiam, vomitum. Hæc regula etiam applicari potest ad vulnera nervorum præcipuorum.

Secunda regula specialis est: *Quodcunque vulnus enormem effusionem humorum vitalium præstat, sive uno impetu, sive successive, & quidem in loco inaccessibili, cui medicamenta styptica, aliaque balsamica necessaria, non possunt applicari, illud lethale est.* Nam tollit circulationem sanguinis & humorum. Circulationem sanguinis principium esse vitæ, & sanitatis præsidium, omnes concedunt. Vid. Ill. BERGER. *Diss. de Vita & Morte.* Hæc vero fieri non potest sine sufficienti sanguinis quantitate, quæ vasa convenienti modo replere & impellere debet. Hinc sacer Codex, *Deutr. Cap. 12. v. 23.* sanguinem etiam animam esse, affirmat. Quando itaque arteriæ & venæ, earumque rami majores imprimis, læduntur & secantur, vel in totum, vel in tantum, in loco inaccessibili, lethalitas absoluta & momentanea sequitur. Vulnera enim arteriarum ubique difficillime coeunt. Nam sunt in perpetuo & notabili motu. Hinc interdum in locis extremis quoque lethalitatem inferunt.

Huc

Huc pertinent & vulnera ductus thoracici, & choledochi.

Tertia reg. specialis hæc est: *Quodcunque vulnus corporis nostri organon, vel partem, ad vitam simpliciter necessariam, notabiliter, atque profunde lædit, ejusque actionem sufflaminat, vel tollit, per se lethale est dicendum.* Hinc vulnera cordis, cerebri, ventriculi, intestinorum, hepatis, lienis, renum, diaphragmatis, secundum HIPPOCRATEM, *Aph. 18. S. 6.* mortalia pronunciantur, id quod CELSVS confirmat, *Lib. V. de Re medica, c. 26.* Hæc tamen pronunciata cum grano salis semper sunt intelligenda. Nam levem læsionem organa talia interdum perferre possunt.

4. Qu. *Quanam circumstantiæ porro ad τὸ per se lethale pertineant?*

Circumstantiæ hæc sunt sequentes. 1) Vulneris quantitas, qualitas, & figura. 2) Partis læsæ textura, situs, & usus. 3) Vulneratiætas, & dispositio naturalis corporis, morbi ejus antecedentes, & præsentis, ac tandem supervenientia symptomata, quæ omnia periculum variant.

Ratione quantitatis *per magnum vulnus* secundum trinam dimensionem sæpissime mortale esse solet. Nam ita enormiter structura, & actio organi læditur, magna hæmorrhagia sequitur, & consolidatio difficillime procedit.

Angusta vulnera, profunda tamen, quoque periculosa sunt, imprimis si dilatari non possunt. Nam sanguis, & pus, item & alia materia, ibi stagnans, corruptionem præstat. Hoc applicari potest ad vulnera cranii, capitis, thoracis, & abdominis.

Ratione qualitatis notandum, vulnera, cum contusione, & dilaceratione facta, pessima esse.

fe. Nam habent statim gravissima symptomata, nempe inflammationem, convulsionem, & *véρωσις*. Punctum vero & cæsum facta fibras æqualiter segregant. Hinc ejusmodi symptomata non sequuntur.

Vulnera sclopetorum, & tormentorum bellicorum, contundunt, dilacerant, & adurant partes. Hinc statim ad véρωσις disponunt. Ergo præ reliquis sunt lethalia.

*Vulnera instrumentorum venenatorum inflictu etiam minimo lethalitatem inducunt. Nam venenum ita immediate sanguini communicatur, & vehementius in illum agit, quam venenum ore assumptum. Et sicuti alibi jam dictum fuit, in ventriculo, & intestinis a viscositate, ibi existente, venena in tantum alterantur, ac in activitate sua imminuuntur, id quod REDI, in *Observ. ad Dn. MAGALOTTI scriptis*, fusius ostendit.*

Ratione figuræ vulnera rotunda aliis periculosiora judicantur. Nam latera ejusmodi vulnerum magis a centro distant, hincque difficillime coeunt, quæ observatio tamen magis ad πρόγνωσις in vivo homine pertinet. Simile quid dicendum de vulneribus, cum imminutione substantiæ conjunctis, quæ etiam difficillime reunionem admittunt.

Ratione texture membranosarum partium, tendinosarum, nervosarum, item ex meris vasculis coagmentatarum, periculosiora sunt, quam musculosarum partium vulnera, quia, propter graviora symptomata, difficillime consolidantur. Hoc applicari potest, & debet, ad vulnera diaphragmatis, in centro nervoso, vesicæ in fundo, lineæ albæ, vel etiam circa ἀπνεύρωσις.

Ratione situs vulnera, quibus medicamenta immediata applicari non possunt, lethalia fiunt. Ex hac ratione censentur lethalia vulnera ventriculi, intestinorum, lienis, renum, pulmonum, &c. Ob situm quoque in-
conve-

convenientem vulnera nonnulla fiunt lethalia, imprimis, quando hæ partes comprimi non possunt. Hinc vulnera vasorum colli, jugularium, atque carotidis, axillarium, brachialium, & cruralium in partibus supremis, mortem inferunt. Vulnera in loco abdito, quo oculus Chirurghi, ejusque manus pertingere non possunt, imprimis, si externe nulla vulneratio in oculos incurrat, lethalia plerumque sunt, & fiunt. Huc pertinent vulnus plexus choroidæi, vulnera meningum, vasorum duræ, & piæ matris, a sola capitis contusione, sine cranii læsione. Nam etiam non læso cranio vasa interna rumpi possunt. Moritur igitur vulneratus ex sanguine putrescente.

Ratione usus omnium maxime lethalia fiunt vulnera in partibus nobilibus, & ad vitam simpliciter necessariis. Hinc vulnera cordis, &c. ex supra dictis, sunt lethalia. Nam turbant enormiter œconomiam corporis. Nec reliquæ circumstantiæ, supra allegatæ subjectum vulneratum concernentes, sunt negligendæ, ut ætas, dispositio naturalis, & præternaturalis, animi affectus, &c. De lethalitate enim semper quæritur in subjecto individuali, Cajo, Titio, Sempronio, &c. Hinc si Cajus vulneratur lethaliter, nihil obstat, nec excusabit reum, quod infans fuerit, vel individualement conditionem habuerit, quæ eum disposuerit, ut facilius ad mortem lædi poterit. Augat potius illa conditio lethalitatem, quia concurrat ad immediatam mortis causam. Valet hic, quod alias de contractu ex *L. 19. ff. de R. J.* Jcti proponunt: Qui cum aliquo contrahit, non est, vel non esse debet ignarus conditionis ejus, cum quo contrahit. Simili modo, qui lædit infantem, vel senem, vel morbosum, scire debet, se ejusmodi subjectum vulnerare, quod ex hoc vulnere perire potest, præsertim cum in re illicita sit constitutus percutiens, omnem even-

tum hinc voluisse censetur, ex tali actu illicito provenientem.

Ratione ætatis si percussus fuerit infans, aut puer tenerioris texturæ, illa læsio semper erit major, & periculiosior, ob partium corporis mollitiem, & sic minorem resistantiam. Inprimis autem læsio capitis minima, ob mollitiem cranii, evadere potest lethalis. Accedit & hoc, quod in infantium capitibus vulneratis non possit institui trepanatio, quæ ad sanguinem, sub cranio latitantem, educendum, unicum est remedium. In senili ætate etiam omnes læsiones sunt periculosiores, partim ob spirituum defectum, & nervorum debilitatem, partim ob sanguinem crassiores. Hinc facile sequuntur gravissima symptomata, apoplexiæ, *ἀναισθησία*, convulsio, inflammatio, *πνευμονία*. *Zalt. Bras. in omni p. cap.*

Dispositio certa corporis etiam lethalitatem præstare potest, v. g. cranii extraordinaria constitutio, & subtilitas, partium internarum extraordinarius situs, immo inversus plane. Vid. HOFFMANNI *Diss. de Inversione cordis*. In statu morbofo, v. g. hectica, phthisi, obstructionibus lienis, hepatis, hydrope, vulnera, etiam minima, & alias vix lethalia, lethalia fieri possunt, & causam mortis immediatam constituere. Nam ejusmodi personæ per se sunt debiles, & vitia sanguinis augment vehemementiam symptomatum, ideoque lethalitatem. Vid. celeb. BOHN. *de Lethalitate Vuln.* Ed. nov. p. m. 47. qui solide ibi ostendit, morbos antecedentes lethalitatem vulnerum non tollere, & argumenta contradicentium ibi destruit. Interim tamen omnes circumstantiæ probe ponderandæ, ne fiat injuria.

Animi affectus, ut ira, terror, &c. si accesserint in vulnere, per se lethali, ejus lethalitati nihil derogare possunt. In vulnere autem non lethali per accidens illud lethale reddunt. Quando vero dubia est lethalitas, absolutam lethalitatem non inferunt, cum credibile sit, quod non vulnus, sed

sed potius animi affectus, immediata mortis causa extiterit, secundum notam in iure regulam, quod nempe in statu dubio semper mitior sententia sit ferenda.

1. r. casus levis

Symptomata quod attinet, ex eorum congerie & pluralitate, & vehementia in homine, adhuc vivo, concludunt Medici, tale vulnus esse lethale, & contra, vulnus, gravioribus symptomatibus destitutum, non lethale ordinarie praesumitur. Si vero de symptomatibus vulnerum post mortem vulnerati quaeritur, tunc magna disputatio plerumque oritur inter Medicos, & causarum patronos, de quaestione nempe, an vulneratus ex symptomatibus potius, an vero ex vulnere perierit? In tali casu symptomata probe sunt examinanda, & distinguenda. Nam sunt triplicis generis. Vid. celeberr. BOHN. *l. c. p. 53. & seqq.* 1) Quaedam symptomata a vulnere ipso, & parte laesa oriuntur, hincque inseparabilia fere sunt a vulnere. V. g. stupor, stertor, epilepsia, convulsio, delirium, vomitus, sunt effectus laesionum capitis. Et porro vomitus, singultus, nausea, in ventriculi vulneribus semper observantur. Si ideo ejusmodi symptomata statim post laesionem observantur, & ad ultimum vitae terminum usque perdurant, tunc genuinae istius vulneris sunt filiae. Hinc aequae lethalia sunt, ac vulnera ipsa, cum sint effectus vulnerum. 2) Quaedam contra symptomata rarissime contingunt, & fere nullum habent commercium cum vulnere, nec ex vulnere oriuntur, sed ex alia causa, v. g. si in vulnere capitis oritur gangraena in pede. aut quando in vulnere vesicae oritur pleuritis, aut in vulnere abdominis apoplexia. Si ex ejusmodi symptomate aeger moritur, non moritur ex vulnere. Nam ejusmodi symptomata cum laesionibus nullam fere habent connexionem. 3) Quaedam symptomata dicuntur media. Possunt saltem originem ducere ex vulnere partim, partim ex alia causa. Haec symptomata

maximam in renunciando pariunt difficultatem, id quod BOHN. *l. c.* confirmat, qui insimul ibi argumenta contradicentium exposuit. Optimo ideo hic iudicio opus est. Nam regulæ generales hic non semper applicari possunt ad singula individua.

§. Qu. *Annon aliæ circumstantiæ, v. g. a telo lethifero, & tempore mortis desumptæ, ad lethali-
tatem, per se talem, quid faciant?*

Officium Medici quidem exposcit, & de his ex adstantibus quærere, instrumentum lædens oculis usurpare, tempus læsionis, insequentium symptomatum, immo mortis indagare, vulnerisque externam figuram considerare. Nullum tamen horum ad absolutam lethali-
tatem determinandam quid conferre potest. Præsumtio equidem est, quod gladio acuto, aut baculo grandiori, gravior læsio fieri possit, quam alio instrumento levi, & minus acuminato. Sed potest etiam levis tantum percussio fieri grandiori instrumento, secundum vires percutientis, ut non adeo notabiliter, multo minus ad lethali-
tatem usque, percussus vulneretur, & contra quando quis levi alias instrumento, magna quidem cum vehementia moto, percutitur, percussio talis lethalis evadere potest. Hinc ex solo instrumento lædente non desumitur argumentum lethali-
tatis per se, sed ex inspectione id demum innotescere debet. Hæc autem si negligenter instituitur, in ancipiti relinquitur, quousque penetraverit instrumentum lethiferum, aut quamnam partem, & quomodo læserit. Telum ideo lethiferum non semper certi quid in lethali-
tate determinare potest, quemadmodum ex instrumen-
to,

to, alias non lædente, non statim quis argumentari potest ad lethalitatem per accidens. V. g. si sola manu alterius caput quis feriat, commotio cerebri lethalis exinde fieri potest, & læsio hæc erit lethalis. Sic si quis percutitur circa regionem epigastrii, præsertim circa scrobiculum cordis, statim sequitur asphyxia, respirationis interceptio, immo mox ipsa mors. Quis itaque dubitat de lethali hac læsione? Item si quis ferula, aut parvo baculo, caput hominis tenerrimæ constitutionis lædit, læsio fieri potest tethalis. Nam percussio non dijudicari debet, nec potest, ex instrumenti quantitate, & qualitate, sed vires percutientis primario effectum præstant. E. g. Milo Crotoniensis, athleta robustissimus, in certamine Olympiaco taurum ictu nudæ dextræ jugulavit, & Simson maxilla cariola asini mille Philistæos.

An vero Inquisitus, qui instrumento non lethifero hominem vulneravit, & interfecit, ordinaria pœna puniendus sit, Medicus non determinat, sed hoc JCtis relinquendum.

Ex tempore mortis, mox insequentis, lethalitatem plerumque concludere solent JCti. Dicunt enim, naturam ipsam demonstrare per breve temporis spatium, percussum ex vulnere mortuum esse, ut CARPZ. in *Praxi Crim. P. I. Qu. 26. n. 9.* MASCARD. de *Probat. Concl.* 1079. n. 5. BRVNNEMANN. *Proc. Crim. Inq. C. VII. n. 27.* FELTMANN. de *Cadav. Inspect. C. VII. Th. 7.* STRYK. de *J. S. Diss. 1. C. 3. n. 23.* Dolendum vero, quo in termino constituendo admodum inter se sint dissentientes. Nonnulli enim ad duos, vel tres dies, alii octo, alii triennium, lethalitatis terminum extendunt, teste FARINACEO, in *Praxi Crim.* CLASSEN. in *Not. ad Const. Crim. Carol. V. art. 147.* CARPZ. *l. c. n. 90.* Sed dissensus

JCto.

ICtorum in hac materia indicat, quod a tempore non tutum formetur argumentum, imprimis, cum non præsumptiones, sed probationes in criminal. a LL. desiderentur, secundum *L. fin. C. de Probat.* Quemadmodum enim ex traditate mortis non semper concludi potest, quo vulnus sit per accidens lethale; differunt enim subiecta, differunt circumstantiæ, quæ sane infinitæ sunt: Ita ex celeritate mortis non possumus concludere absolutam lethalitatem, monente hoc celeberrimo BOHNIO *l. c. & III. WEDELIO*, in *Dissert. de Fundamentis lethal. Vuln.* V. g. pinguedo obstruere potest vulnus vasorum, cuius hæmorrhagia alias lethalitatem momentaneam præstat, & sic per tempus mors differtur, non aufertur. Vid. *SCHOEPPFERI Diss. de Hæmorrhagia Vuln. 2.*

CAP. XXIII.

DE LETHALITATE VVLNERVM SINGV- LORVM ORGANORVM CORPO- RIS HVMANI.

I. Qu. Quid statuendum sit de vulneribus capitis?

Ad vulnera capitis pertinent vulnera integumentorum communium, cranii, duræ & piæ matris, cerebri, cerebelli & spinalis medullæ.

Sub vulneribus integumentorum comprehenduntur vulnera cutis, siue in parte capillata, circa verticem & regiones sincipitis, siue in occipite, siue in fronte, siue circa tempora. De his notandum, quod talia vulnera non sint
letha-

lethalia, & se habeant, ut *schlechte Fleisch-Wunden*, sicuti Chirurghi nostro loquuntur.

Vulnera cranii, quæ penetrant vel externam tantum, vel externam & internam laminam simul, quoque non sunt lethalia, quo pertinent fracturæ, fissuræ & contra-fissuræ cranii. Hæ enim læsiones omnes ad vulnera simpliciter lethalia non pertinent, docente hoc ratione, & confirmante experientia. Cranium enim est murus, & munitum mentum cerebri, injurias removens. Ideo ad vitam simpliciter necessarium organum non est, adeoque vulnus ejus, utut profundum, vitam hominis per se non tollit, remedia potius admittit, symptomata per se lethalia non efficit, multo minus causâ esse potest immediata mortis. Sic TVLPIVS, Medicus celeb. olim Amstelodam. fracturam cranii ingentem sola trepanatione curavit. Vid. *Observat. ejus, L. I. c. 14.* Et quamvis quamplurimi reperiantur, qui trepanationem periculofam, & difficilem operationem vocant; tamen infinita exempla non tantum, sed & ipsa ratio anatomica ejus certitudinem & excellentiam confirmat. Vid. BOHN. *Diss. de Trepanationis difficultate.* Sic & fungos cerebri, ex vulnere cranii, & meningum, post trepanationem natos, absque metu, excidi posse, testatur COWPERVS, in *Anatom. Corp. hum. fig. 8.* Vid. *Acta Erud. Lips. anno 1699.* Hancce de vulneribus cranii sententiam confirmant plures observationes aliæ. Sic in Dn. MANGOLDT, Med. Prof. in Acad. Rintelens. *Dissert. de Vulner. leth. reperitur sequens historia:* Vir generosus, cujus caput, ante aliquot annos, acinace in Hungaria vulneratum, atrocissimis capitis doloribus vexatus fuit, ob cavitatem cariosam, stylum majorem ad duos digitos transversales admittentem, in concursu suturarum, coronalis & sagittalis, natam. Hic, ex consilio Professor. in Acad. Regiomontana, sustinuit trepanationem, & quidem pri-

mam prope dictum futurarum concursum, secundam vero, & tertiam prope futuram lambdoidæam. Hisce tribus foraminibus demum in unum triangulare, singulari ad hancce operationem confecta serra, redactis, in conspectum veniebat fungus ingens cerebri, cum sanguine corrupto, intra meninges, & cranium contento. Hoc vulnus autem postea consolidatum fuit, & sic ager felicissime pristinae sanitati restituebatur. Notabilem fracturam, immo comminutionem, in homine, per 40. annos superstite, speciali differt. exposuit celeberr. Prof. SALTZMANN, Argentorat. *von einem Böttger, oder Weinküfer, dem ein Stück Faß Wein, so er vom Lager heben lassen, unversehens niederfället, und ihm gleich das gantze Os frontis abschläget.* Sic & Dn. Dr. VOLLAND, Med. Greufenfis, nobilem juvenem, qui a casu ab alto fractura cranii, cum festucis laboravit, adhibitis debitis remediis felicissime curavit. Simile exemplum in puero octo annor. legitur in BONETTI *Medicina Septentrional. T. I. L. I. Sect. 3.*

Vulnera musculorum temporalium, item vulnera, in fronte, supra orbitæ oculi limbum superiorem, inflicta, a nonnullis quidem valde periculosa pronunciantur, sed absque sufficienti fundamento. Hinc merito illis contradicit BOHNIVS, *Tr. de Vulneribus leth. p. 77.* ubi exempla plura reperiuntur profundorum musculi temporalis vulnerum, felicissime tamen restitutorum. Non tamen negandum, quod fiant læsiones cranii aliquando lethales, & secundum HIPPOCRATEM, nullum vulnus capitis, ne levissimum quidem, negligendum. Contingere autem solet, ut vulnera capitis lethalia fiant, 1) quando fissura, vel contrafissura, contingit. Vid. BOHN. *l. c. p. 80. & 83.* Inprimis vero, quando ejusmodi fissura cœca est. Et 2) Vulnera cranii fiunt periculosa, quando non dignoscuntur, nec reme-

remedia convenientia applicantur, vel applicari possunt. Nec fractura cranii semper lethalis erit, id quod confirmant antea allegata exempla, & imprimis major fractura cranii minus periculum inducit, quoniam sanguis per maiorem fracturam citius educitur, quam per minorem. Quando vero, illa lamina externa, interna finditur, vel frangitur, imprimis in parte, læsioni opposita, qualia exempla BOHN. *l.c.* refert, tunc, cum PAWIO, in *Hippocratem, de Vulneribus Capitis, p. 82.* infelices, ac infortunatos ejusmodi percussos proclamare possumus, quoniam plerumque nec ipsi sciunt, an, & in quo loco sint læsi, nec Medicus, & Chirurgus de hac re certior fieri potest, nisi eo tempore, cum omnia conclamata sunt. Et PARÆVS inquit, „cum nullo certo signo fracturæ cranii genus dignosci possit, si quando ex tali vulnere mors consecuta fuerit, venia dignum censendum esse Chirurgum. De fracturis cranii plura legi possunt in BERENGARII speciali *Tract. de Fractura Cranii.*

Vulnera cranii, per meningem duram, sive duram matrem, penetrantia, sunt quidem ambigua, & periculosa, sed non semper lethalia. Est quidem dura mater embolus cerebri, sive causa primaria motus fluidi nervosi, quæ pressione sua fluidum nerveum a cerebro per nervos ad partes promovet. Hinc, quando motus duræ matris, & sic ejus actio læditur, tunc necessario mors sequitur. Cum vero dura mater sit musculus, ideo ejusmodi vulnus consolidari potest, id quod ratio docet, & experientia confirmat. GLANDORP. in *Chirurg. Observ. 4.* expresse inquit, quod dura mater, quando, facta trepanatione, sub illa pus, aut sanguis, appareat, tutissime sit incidenda. Hoc confirmat BLANCARD, in *Obs. Med. Phys. C. I. Obs. 27.* Vulnera quoque duræ matris, per sectionem inflicta, non adeo sunt periculosa, ac illa, quæ cum contusione, & dilaceratione quadam contingunt. Nam ibi erit in-

flammatio levis, hic vero enormis, & sic per consequens symptomata longe contingunt graviora, cum quibus vulnerati plerumque moriuntur.

Vulnera finuum duræ matris, imprimis majorum, sunt lethalia. Etenim, secundum PACCHIONIVM, in *Tr. de dura matre*, concurrunt circa sinus, falcatum imprimis superiorem, & laterales exteriores, tendinis musculorum duræ matris. & quemadmodum omnium tendinum vulnera periculosissima sunt, ita longe vehementiora erunt hæc vulnera, in quibus simul contingit enormis hæmorrhagia, quæ nullo remedio stiptico sisti potest. Hinc sanguis effunditur intra spatia duræ, & piæ matris) cerebrum comprimitur, ejus tonus destruitur, & vulneratus plerumque paulo post moritur. Interim MARCETTUS, in *Obs. Med. Chirurg. n. 4.* annotavit vulnus sinus falcati, ad corpus callosum penetrans, quod tamen gossypio usto, bolo Armena, sanguine draconis, & albumine ovi felicissime fuit curatum. Sed una hirundo non facit ver, & hoc exemplum non probat, quod ideo omnia ejusmodi vulnera sint sanabilia.

Vulnera cranii, per meninges in substantiam cerebri corticosam & medullarem penetrantia, sinibus sc. duræ matris ventriculisque & plexu chorroidæ illæsis, ad vulnorum, ut plurimum lethaliū, classem pertinent.

Hippocrates quidem omnia vulnera cerebri lethalia pronunciat, *L. 6. aph. n. 18.* & certum est, quod cerebrum sit pars nobilis, immo nobilissima, spirituum animal. fons & origo, metropolis animæ; interim tamen, quando vulnera cerebri non concomitantur gravissimis symptomatibus & ita sunt comparata, ut remedia applicari queant, sanguisque extravasatus, & purulenta materia educi, tunc nonnullos evasisse, experientia testatur. Vid. AMMANNI *Medicina Critica, Cas. 46.* Sic in Bibliotheca Boruffica Regiomontana

montana curiosis monstratur telum, quo nobilis Colonel-
li caput & cerebrum erat vulneratum, quod tamen postea,
cum salute ægri, per palatum exivit. Similiter prodigiosorum
vulnerum cerebri exempla, cum substantiæ effluxu,
reperiuntur in SCHENCKII *Observ. L. 1. n. 40.*
§ 74.

Vulnera cerebri profunda, five cum fractura cranii,
& particulis ossium acutis, per corticem, & medullam cerebri
penetrantibus, adacta, five cum ventriculorum,
corporis callosi, septi pellucidi, plexus choroidæi, corporum
friorum læsione, sanguinis extravasatione, intumescencia,
putrescentia, simpliciter, & absolute lethalia
judicantur. Nam 1) partis nobilissimæ actio hic plane
sistitur. 2) Gravissima symptomata efficiuntur, ut apoplexia,
ἀφασία, sopor, stertor; convulsio, vomitus, *ἀναισθησία*,
quæ omnia in vulneribus capitis plerumque funesta sunt
signa. 3) Non potest suppuratio fieri, 4) nec medicamenta
sufficientia applicari, unde mors statim, vel brevi
post, sequitur.

Vulnera cerebelli, & principii spinalis medullæ,
inprimis circa calamum scriptorium, omnia esse lethalia,
& ratio docet, & experientia confirmat. Cerebellum enim
primaria causa est motuum automaticorum, involuntariorum,
& vitalium, mittit nervos ad cor, diaphragma,
ventriculum, & intestina. Ideo vix, salva vita, lædi potest.
Experientia etiam hoc confirmavit, dum omnia animalia
a vulneribus cerebelli, & spinalis medullæ in principio,
illico moriuntur. *Die Jäger nennen es den Nick-Fang.*
PERRAVLT, *Mécanique des animaux*, P. I. c. 7. &
VIEVSSENS, in sua *νευρολογία*, it. & BOHN. *l.c. cap. de*
Vulneribus capitis, hoc experimentis tentarunt, nimirum
aperuerunt capita animalium, sic dissecto, & exempto ce-

rebello, illaeso cerebro, & spinali medulla, statim omnia animalia extincta fuerunt.

Vulnera, intra nasum, & oculorum angulum majorem per cranium in cerebrum penetrantia, lethalia sunt absolute. Læditur enim tota basis cerebri, & cerebelli, vulneratur origo nervorum, hincque in momento obmutescunt læsi, sensum & motum amittunt, redduntur apoplectici, &, cum stertore, brevi post extinguuntur.

Graviores capitis contusiones, & vehementes cerebri commotiones, a quibus, illaeso etiam cranio, & dura matre, vel vasa sanguifera piæ matris, plexus choroidæ, cerebri rumpuntur, tubuli cerebri, & surculi nervorum radicales contorquentur, comprimuntur, vel præternaturaliter laxantur, aut protenduntur, mortalia fiunt, & fieri possunt. Nam αφωρία ita producit, teste HIPPOCRATE, *sect. 7. aph. n. 58.* item surditas, sopor gravis, apoplexia, & mors ipsa, secundum eundem HIPPOCRATEM, *l. 5. Epidem. n. 59.* Hoc assertum etiam confirmatur observatione HEINRICI ab HEHR. *Observ. n. 12.* Singularis, & ad hancce thesin pertinens observatio reperitur in Dn. MANHOLDT *Diff. cit.* Nempe civis Lubecensis in osse frontis ad sinistrum latus prope futuram coronalem urceo, cerevisia pleno, contusim læditur, æger sequentibus diebus, neglecto vulnere, ambulabat, in convivio hilariter compotabat, aſt nono, aut decimo die post, subito in apoplexiam, & convulsiones incidebat, die 12. autem moriebatur. Medicus, & duo Chirurgi præsentia magistratus cranium aperiebant (nam externe nihil notatu dignum reperiiebant) in cranio neque fracturam, neque fissuram, multo minus sanguinem coagulatum in regione contusa inveniebant, sed aliquot digitis transversis a loco læso contra-

fissuram

fissuram in interiori lamina cranii reperiabant, instar parvi semicirculi, *wie ein halber Marien-Groschen*. Remota pia & dura matre cortex cerebri in sinistro latere magna copia purulentæ materiæ oppletus conspiciebantur, quæ materia, cerebri medullam, usque ad basin, ultra os petrosum, corruerat. Testantur itaque, materiam purulentam arte medica tolli non potuisse, sed ægrum gravitati symptomatum ex necessitate succubuisse. An vero percussio, hujus materiæ purulentæ causa fuerit, nec ne, vel an æger potius, ante contusionem, dispositus fuerit ad talem cerebri suppurationem, ex sanguinis grumescencia spontanea fere natam, determinare noluerunt.

Vulnera profunda, spinali medullæ inflicta, absolute sunt lethalia. Nam ea observantur symptomata, quæ in vulneribus cerebri & cerebelli profundioribus adesse solent. Sequitur enim paraplegia, paralytis in organis inferioribus. Motus etiam spirituum ad cor, pulmones, musculos intercostales, & diaphragma turbatur, vel plane tollitur, ideoque vulneratus mox, vel suffocatus, vel convulsus, moritur. Ex hac ratione vulnus, cultro intra quartam & 5 colli vertebra inflictum, septimo die ægro moriente, pro lethali habuit F. Lips. teste WELSCHIO, in *Ratiocin. vuln. lethal. c. 3.* Sic juvenis, apud TVLPIVM, L. III. *obs. C. 27.* pugione in spinali medulla vulneratus, prævia alvi, & vesicæ obstructione, & abdominis intumescencia, tertio die lipothymicus mortuus est. Simile quid dicendum de luxationibus & fracturis vertebrarum, vel colli, vel thoracis, vel lumborum, quæ læsiones, quando spinalis medulla infimul læditur, comprimitur, vel disrumpitur, absolute lethales esse solent. Statim enim sequitur paralytis, & brevi post ipsa mors.

Ast non tantum enormia vulnera spinalis medullæ sunt lethalia, sed & fortes contusiones, immo exiguæ

guæ puncturæ mortem inferre possunt, ob symptomatum vehementiam, spasmos nempe, & convulsiones, it. & gangranosas inflammationes. Conf. BOHN. *de vuln. lethal.* p. 116.

Quod de vulneribus cerebri, cerebelli, & spinalis medullæ dictum fuit, id etiam suo modo, ad nervorum vulnera applicari debet, & potest. Hinc læsiones illorum truncorum nervosorum, qui organis vitalibus ministerium, motus, & sensus præstant, inprimis octavi paris, plerumque sunt lethales. Nam nervi hi vulnerati, inprimis plane dissecti, lædunt statim respirationem, pulsum cordis, ventriculi, & intestinorum actiones. Hinc sequuntur spasmi in pectore & abdomine, vomitus item & spasmi organorum generationis. Et quamvis trunci hi nervosi, mox ab exortu suo vulnerati, per colli latera decurrentes, topica medicamenta admittant; hæc tamen non sufficiunt ad spasmos, aliosque effectus funestos tollendos. Est quidem alias in vulneribus nervorum ultimum remedium nervi abscissio: Ast talis in ejusmodi casu, vulnerato nempe ramo majori non instituenda. Alias perit statim omnis sensus & motus in organis vitalibus, cordis nempe & respirationis. Et porro ejusmodi abscissio fieri exinde non potest, quoniam nervi plerumque profundius paulo latitant, inprimis circa vasa majora.

Vulnera nervosorum plexuum, inprimis profundiora, ex varia ratione lethalia evadunt. 1.) enim remedia commode applicari non possunt, 2.) turbantur actiones viscerum vitalium, & quidem notabiliter, & 3.) excitantur ab ejusmodi vulneribus dolores intolerabiles, spasmi, convulsiones, febres, deliria, quæ omnium sunt periculosissima symptomata.

Quid vero de nervorum caudicibus, summitati humeri, & femori implantatis, eorumque vulneribus sentiendum sit, Medici, etiam oculatissimi, determinare noluerunt. Nostro vero judicio ejusmodi vulnera utique
vel

vel ad lethalia, vel ad periculossima pertinent. Nam 1) ob situm, topica, seu externa remedia vix applicari possunt. 2) Incisione remediis via parari haud potest, ob viciniam vasorum sanguiferorum, quæ ita facile læduntur. 3) Nec amputatione membri, nec amputatione nervi, tuta hic suscipitur cura.

2. Qu. Quid sentiendum sit de vulneribus colli?

Missis vulneribus capitis, vulnera colli examinanda veniunt. Quatuor autem, præter spinalem medullam, reperiuntur in collo partium genera, quarum vulnera frequentius funesta & lethalia esse solent, nempe vasa sanguifera, nervi, aspera arteria, vel trachea, & gula sive œsophagus. Et quoniam hæ partes arctius paulo inter se unitæ existunt, ideo rarissime solitarie vulnerantur, sed plerumque conjunctim. Hinc & lethalitas per concursum plurium læsionum maxime augetur.

Vulnera arteriarum carotidum, & cervicalium, venarum item jugularium internarum, & cervicalium, propter hæmorrhagiam enormem, lethalia evadunt. Nam 1) sunt vasa majora. 2) Medicamenta hic applicari non possunt, v. g. styptica ex pharmaceuticis, nec ligaturæ, & compressiones ex chirurgicis, ob metum suffocationis. Nec cauteria locum inveniunt. Et quamvis hæc applicata sunt interdum in tali casu, & vulnere colli (vid. BOHN. de Vuln. lethal. p. 120.) tamen, eschara paulo post recedente, non solum hæmorrhagia recrudit, sed & post mortem in musculis a sanguine effuso notabilis corruptio observata fuit.

De vulneribus venarum jugularium externarum aliter sentiendum. Nam hæc remedia, jam laudata, admit-

Dd

tunt,

tunt, nempe styptica, compressiones, & in casu vehementiori ipsa cauteria, & apud veteres more recepta erat harum venarum sectio. Cujus rei veritatem, certitudinem & usum propria experientia confirmarunt MARCVS AVREL. SEVERIN. *Lib. de Medicina efficaci*, in specie HORNIVS, in *Μικροτέχνη*. RIVERIVS, in *Praxi*, L. I. c. 2. BOTALDVVS, in *Methodo incidendi venam*. BLANCARD. in *Collect. Med. Phys. obs.* 65. Et veteres quoque ἀγγειοτομίαν arteriarum carotidum externarum susceperunt, quamvis non semper felici cum successu. Hinc concludendum, quod vulnera venarum jugularium externarum, immo & arteriarum externarum carotidum, inprimis minorum ramorum, certis sub conditionibus non semper lethalia sint dicenda.

Vulnera asperæ, arteriæ, seu fistulæ aeris, diversimode contingunt, & contingere possunt, & quidem 1) fiunt externæ incisiones, vel longitudinales, vel transversales, vel cum substantiæ imminutione, ad instar semilunulæ, quæ, quando non sunt enormes, coalescere possunt, teste experientia, & inprimis notissima operatione chirurgica, quæ βρονχοτομία dicitur. Interim post coalitum ejusmodi vulneris remanet semper raucedo. Quando vero 2) aspera arteria plane abscinditur, adeo, ut pars abscissa, vi muscutorum, deorsum moveatur, tunc plerumque tale vulnus lethale est. Nam 1) extremitates abscissæ vix ac ne vix quidem conjungi possunt, neque per medicamenta, neque per futuras Chirurgorum. Ideo respiratio læditur, inflammationes graviores oriuntur, vel etiam, propter excrecentiam carnis, suffocatio fieri debet.

Contusiones ipsæ & percussiones circa laryngem, cartilaginem thyroidæam, & arytenoidæas, mortem inferre possunt, inprimis, quando, per violentiam illam, earum connexio ita turbatur, ut, sibi propius adactæ, seu arctius

Etius conniventes, glottidem, ejusque rimulam claudant, sicque & inspiratio, & respiratio prohibeatur. Cum vero illis diducendis haud suppetant remedia, excepta *βενχο-
ροπία* ideo communissimae mors sequitur, propter subse-
quentem inflammationem anginosam.

Trachea, sub claviculis, & in thorace recondita, vulnerata mortem post se trahit certissime. Nem 1) respi-
ratio totaliter laeditur, aer pulmones amplius non intrat, sed potius cavitationem thoracis, unde pulmones compri-
muntur, & non possunt distendi, ut fieri debet in respirati-
one legitima, & sic brevi post sequitur suffocatio. 2) In e-
jusmodi vulnere nulla adsunt, vel applicari possunt, medi-
camenta, quæ conjunctionem labiorum vulnerum, & sic consolidationem præstare valeant, ideo necessario mori-
untur hac ratione vulnerati.

Vulnera œsophagi cum alia sint majora, alia mino-
ra, alia longitudinaliter, alia transversaliter inflicta, alia
œsophagum penetrent, intra collum constitutum, alia
vero œsophagum, in thorace absconditum, ideo diversa de
illis judicia ferenda. Vulnera proinde exigua, & inprimis
summitati œsophagi, in collo constituti, illata, non dici
possunt absolute lethalia. Nam 1) propter exiguitatem,
tale vulnus neque lethalem inflammationem, neque dolo-
rem vehementem efficit. 2) Per vulnus hoc elabentia a-
limenta, talia spatia non intrant, in quibus nocere, & pu-
trescere possunt. 3) Per futuram non cruentam etiã
jungi possunt. Hancce de vulneribus œsophagi theo-
riam BOHN. confirmat observationibus, p. 522. Alia
vero res est, quando œsophagus, in thorace delitescens,
vulneratur. Tale enim vulnus absolute lethale dicen-
dum. Nam 1) alimenta intrant cavitationem thoracis,
ibique putrescunt, & inflammationem gangranosam
efficiunt. 2) Medicamenta convenientia ibi applica-

ri haud possunt. Vulnera transversalia œsophagi periculosiora sunt, quam longitudinalia. Nam tunica musculosa œsophagi interior ex transversalibus, vel spirali-
bus potius, composita est fibris, unde hæ fibræ, a se invicem separatae, magis recedunt, & difficillime conjunguntur. De gula, plane abscissa, nihil dicam, cum per se clarum sit, quod tale vulnus sit incurabile, & per consequens lethale. Neque enim futura cruenta hic locum invenire potest.

3. Qu. *Quid de vulneribus thoracis sit statuendum?*

In thorace varia existunt organa, quorum vulnera certo respectu lethalia esse solent, nempe spina dorsi, costæ, sternum musculi thoracis, & intercostales, pleura, mediastinum, corcum suis vasculis & pericardio, thymo, arteriæ, & venæ mammariæ, vena ἀζυγος, pulmones, cum suis vasculis, ductus thoracicus, diaphragma, nervi intercostales, phrenici, & octavi paris.

Vulnera musculorum thoracis, quando ad cavitatem thoracis non penetrant, non sunt lethalia. Quando vero cum aliqua latitudine, usque ad pleuram penetrant, tunc interdum fieri possunt lethalia. Nam succedit inflammatio pleuræ, vel pleuritis, quæ, mutata in empyema, vel in peripnevmoniam, mortem inferre solet.

Vulnera exigua, ad cavitatem thoracis penetrantia, illæsis modo organis vitalibus, in thorace contentis, non sunt lethalia. Nam neque organa, ad vitam necessaria, læsa sunt, neque symptomata lethalia exinde fluunt. Quando vero ejusmodi vulnera sunt lata, adeo, ut aer externus majori in copia, & notabili impetu cavitatem thoracis intrare valeat, tunc pulmones comprimuntur, respiratio difficilissima redditur, & plerumque homo brevi post exinguitur.

Et

Et cum ejusmodi vulnus per futuram conjungi non possit ideo lethale dicendum.

Vulnera thoracis, cum fracturis costarum, lethalia fieri possunt. Sunt quidem ex JCtis GIVRBA, *Consil.* 17. & CÆPOLLA, *L. III. Consil.* 61. qui fracturas costarum non pro vulneribus lethalibus admittere volunt. Ast hi celeberrimi viri, seducti auctoritate HIPPOCRATIS, GALENI, & CELSI, tale quid statuunt, quod tamen universaliter intelligi non debet. Nam costarum læsiones utique fieri possunt lethales. Lethales vero fiunt costarum læsiones 1) quando fragmenta intus latitant, quæ per Chirurgum extrahi non possunt. Hinc enim oritur lethalis inflammatio, exulceratio, & empyema. 2) In fracturis costarum interdum aer spatia musculorum intrat, sicque thorax intumescit, & respiratio enormiter læditur. 3) Costæ fractæ difficillime restituuntur, & per callositatem uniuntur. Nam costæ sunt in perpetuo motu, & sic unio vix locum invenire potest. Porro depressæ costæ vix attolluntur, neque instrumentis, neque manibus. 4) Et forte restitutæ costæ, & iterum unitæ, in situ vix contineri possunt. Nam organa hæc, ut jam dixi, sunt in perpetuo motu, & ex hac ratione consolidatio difficulter procedit. Concludendum itaque, quod fracturæ costarum facillime fieri possint lethales, subsequente nempe inflammatione, supuratione & empyemate.

Inter viscera thoracis primum locum occupat cor, ejus vulnera aut musculos cordis tantum, aut vasa coronaria, aut ventriculos, sive cavitates, lædunt. Vulnera cordis, quando ventriculum alterutrum, aut utrumque penetrant, absolute, & statim sunt lethalia. Nam circulatio sanguinis ita in momento sistitur.

Vulnera, quæ vasa coronaria cordis lædunt, quoque statim, vel brevi post lethalia fiunt. Nam 1) enormiter sanguis funditur. Hinc incidunt vulnerati in lipothymiam. 2) Sanguis spatia aliena intrat, v. g. pericardium. Hinc, quando pericardium repletur an sanguine, sanguis ibi coagulatur, cor comprimitur, & sic motus cordis sistitur. 3) Cum vasa coronaria sint motores cordis, qui motum diastolicum cordis præstant, ideo læditur motus cordis, & sic homo extinguitur.

Vulnera cordis, quæ, intactis ventriculis, & vasis coronariis, tantum substantiam masculosam, & quidem in minima quantitate, lædunt, tamen lethalia fiunt. Dubitarunt equidem Medici de lethalitate vulnerum cordis in superficie ex hac ratione, quoniam cor sit musculus, vel machina musculorum, vulnera vero musculorum non sunt lethalia, sed ita comparata, ut consolidatio possit expectari. Ast hæc ratio in vulneribus cordis locum non invenit. Nam 1) cor est musculus, in perpetuo motu constitutus. Ergo quemadmodum vulnera reliquorum organorum, quorum motus perpetuus est, difficillime consolidantur; sic etiam cordis. 2) Singulis pulsibus notabilis quantitas sanguinis ex vulneribus cordis exstillare debet, & ideo successive oritur lethalis hæmorrhagia. Vulnerabatur hic Studiosus nobilis. In cordis superficie læsio erat exigua, & sane vix notabilis, sed spatio trium horarum incidebat Studiosus ille ex improvviso in animi deliquium, & statim vita cessabat. 3) Cum vulnerum symptomata immediata sint inflammationes, ideo tale symptoma in corde lethalitatem quoque præstare potest. 4) Remedia non possunt applicari. 5) Cor non lædi potest, nisi cum vulnere pericardii. Cum itaque vulnera pericardii lethalia sint, multo magis vulnera cordis minima,

ma, & superficialia, cum vulnere pericardii conjuncta, lethalia sunt dicenda.

Porro in tota superficie cordis plura filamenta sunt nervosa. Ergo fieri aliter non potest, quam quod eveniat convulsio. Per convulsionem autem oritur ingens turbatio motuum cordis, & vita salva ita persistere non potest. Porro per vulnerationem nervorum cordis nervi a se invicem separantur, & ita oritur paralyfis in certo musculo. Per ejusmodi paralyfin vero turbatur circulatio sanguinis cordis, & per se consequens vita turbatur. Hæc sunt argumenta, quæ ad oculum ostendunt absolutam vulnorum cordis lethalitatem, quam & ipse OVIDIVS, *lib. i. de Pont. eleg. 3. v. 21.* agnovit, ubi inquit:

Afferat ipse licet cunctas Epidaurius herbas:

Sanabit nulla vulnera cordis ope.

Quæ prolata sunt de vulneribus cordis, argumenta, applicari debent ad vulnera auricularum, quæ etiam omnia sunt lethalia dicenda.

De vulneribus pericardii auctores non conveniunt. Alii enim omnia vulnera pericardii absolute lethalia pronunciant, alii vero sub conditionibus vulnorum pericardii lethalitatem admittunt. Quicquid tamen sit, vulnera pericardii certissime mortem inducunt. 1) Enim pericardium est membrana tendinosa-nervosa. Ergo spasmis & convulsionibus vulnera pericardii concomitantur. 2) Quando pericardium vulneratur, lymphæ pericardii effluit, cujus præsentia tamen ad motum cordis facilitandum absolute necessaria est. 3) Quoniam pericardium in superiori parte cum vasis sanguiferis, arteria magna & pulmonali, vena cava, & pulmonali cohæret, a parte inferiori vero cum tendinosa diaphragmatis parte jungitur, ideo diaphragma convellitur, & ab inflammatione pericardii etiam paraphrenitis, seu inflammatio diaphragmatis, lethalis oritur. 4) Neque pericardium, neque cor vix vulneratur, quin

quin & simul alia partes vicina vulnerentur. Hinc ex complicatione & multitudine vulnerum, lethalitas per se sequitur.

Quæ de vulneribus cordis dicta sunt, etiam applicari debent ad vulnera vasorum cordis communium, arteriæ nempe magnæ, arteriæ pulmonalis venæ cava, & venæ pulmonalis. Horum enim vasorum vulnera absolute lethalia sunt, & icti statim concidunt. Nam circulatio sanguinis in momento sistitur, sanguis ad cavum thoracis effunditur, & sic homo in momento suffocatur. Sunt quidem maliti si Medici & Jcti, qui ejusmodi vulnera, ut per accidens lethalia, defendere volunt, cum debili tamen argumentorum suppellectile. Dicunt enim 1) Vasa sanguifera non esse organa principalia, quod tamen absolute falsum est. Vasa enim sunt canaliculi in quibus circulatio absolvitur. Ergo sunt organa, ad vitam absolute necessaria. 2) Dicunt, non omnem sanguinis profusionem esse lethalem, & hoc argumentum in tantum concedendum, ast hic non applicandum. Nam vasa, in externis partibus laesa, comprimuntur, & sic hæmorrhagia sistitur; ast talis compressio vasorum in partibus internis nunquam fieri potest. 3) Dicunt, sanguinem e cavitate thoracis educi posse. Ast hoc non de omni quantitate, sed tantum de exigua intelligendum. 4) Venarum, & arteriarum vulnera coalescere posse affirmant. Ast hæc regula enim tantum valet in vulneribus vasorum manuum, atque pedum, nunquam vero applicari potest ad vulnera vasorum in partibus intrinsecis, sive ad vulnera capitis, thoracis, & abdominis.

Ob similem, supra allegatam, rationem hæmorrhagiæ ex venis & arteriis subelaviis mammariisque vulneratis, item vena ἀξύω, dependentes, mortem citissime accelerant. Nam sanguis impetuose profunditur, cavitas thoracis ab eo repletur, circulatio sistitur, & vulneratus suffocatur. In ejusmodi vulnere quoque medicamenta applicari haud possunt, hæmorrhagiam subito sistentia. De Hæ-

morrhæ-

morrhagiis vulnerum legi meretur Jcti Excell. SCHOEPPERI *Diff. Rostoch. habita, de Hamorrhagia vulneratorum, (von Verblutung der Verwundeten.)*

Vulnera & dilacerationes vasorum intercostalium, mediastini & sterni, in superficie hujus organi interna, etiam lethalitatem præstant. Nam 1.) remedia necessaria hinc non possunt applicari. 2.) Sanguis stillat ad cavitatem thoracis. Hinc motus cordis, pulmonum, & diaphragmatis impeditur. Et quamvis, per paracentesin, sanguis educi possit; tamen rarissime effectus speratus succedit. Nam cum vasa ejusmodi vulnerata sanguinem perpetuo fundant; hocce vero stillicidium remediis sisti non possit: Ideo vita quidem interdum ad aliquot dies prorogatur, plerumque tamen 5. vel 7. die fati cedunt lasi. Sanguis enim successively deficere incipit. Hancce nostram sententiam de vulneribus vasorum intercostalium confirmat BOHN. *l.c. p. 32.* propria sua observatione.

Pulmonum vulnera non quidem semper lethalia deprehenduntur, id quod quotidiana docet experientia; tamen omnia dici possunt periculosa, immo periculosissima, quod ex sequentibus patebit. Non vero sunt lethalia dicenda illa, quæ in extremitatibus pulmonum sunt. Nam 1.) hamorrhagia enormis non contingit. Vasa enim ibi sunt exigua. 2.) Sanguis ille, qui, in minima & tolerabili quantitate, ex ejusmodi vulnere ad cavitatem pectoris exstillat, vel per vulnus dilatatum, vel per paracentesin, in inferiori thoracis parte institutam educi potest.

Moriuntur vero homines ex vulneribus thoracis & pulmonum 1.) quando vasa pulmonum majora vulnerantur, & hoc fit propter enormem hamorrhagiam, quæ nullo remedio sisti potest. 2.) Quando sanguis ex cavitate thoracis non effluit, sive per dilationem vulneris, sive per suctionem, ore, aut

Ee

instru-

instrumentis institutam, sive per paracentesin. Ideo sanguis, in cavitate thoracis existens, putrescit, putrescensque inflammationem gangranosam & necrosin instituit. 3.) Quando rami majores asperæ arteriæ simul vulnerantur. Ita enim aer intrat cavitatem thoracis, pulmones ab eo comprimuntur, & respiratio sufflaminatur. At quoniam bronchia, sive ramificationes asperæ arteriæ, undique a vasibus sanguiferis pulmonum cinguntur, ideo vix asperæ arteriæ rami majores læduntur sine læsione majorum vasorum sanguiferorum, & tunc, ex duplici ratione, tale vulnus lethale evadit. 4.) Moriuntur ejusmodi vulnerati ex inflammatione pleuritica, & peripneumonica. Quando enim inflammatio conjungitur, & materia purulenta in suppuratione non per tussim evacuatur, fati cedunt plerumque septimo die. Et quoniam inflammatio, & suppuratio, effectus vulneris est, ideo cautus sit Medicus in sua renunciatione. Et quamvis ejusmodi vulnerati restituantur; tamen per totam vitam miserabiles esse solent, & valetudinarii manent. Oritur enim plerumque constans dispnoea & tandem phthisis, ex coalitu pleuræ irregulari, & pulmonum.

Ductus thoracicus organon ad vitam absolute necessarium est. Hinc ejus vulnera per se, & simpliciter lethalia dicenda, id quod ^{etiam} valet de receptaculo chyli lumbari. Nam 1.) motus chyli ad sanguinem intercipitur, & ita partes alibiles ad sanguinem non deferuntur. Sanguis & omnia fluida, item & solida ipsa, amplius non nutriuntur. Hinc ex tali læsione, vel repentina mors oritur, vel incurabilis hæctica acceleratur. 2.) Chylus intrat spatia aliena, vel cavitatem abdominis, vel thoracis, ibique corrumpitur, putrescit, & lethales inflammationes præstat.

Vulnera diaphragmatis probe distinguenda sunt. Alia enim partem musculorum, alia vero nervosam, seu tendinosam, penetrant. Vulnera, parti tendinosæ diaphragma-

phragmatis inflicta, per se lethalia pronunciantur. Nam
 1.) medicamenta non possunt applicari. 2.) Spasmodi-
 cæ oriuntur contractiones, quæ ipsam respirationem tur-
 bant, & enormiter lædunt, ac, subsequente inflammatione,
 lethale oritur delirium paraphreniticum. 3.) Consolida-
 tio non expectanda, partim ob motum constantem huius
 organi, partim quoniam hoc vulnus tendinum est. Tendi-
 nes enim, ob soliditatem substantiæ, difficillime reu-
 niuntur.

Vulnera vero, quæ partem musculosam lædunt, in-
 primis, in vicinia costarum, & insuper exigua sunt, peri-
 culosa tantum dicenda. Nam curam, quamvis difficillime,
 admittunt, hincq; non absolute lethalia dicenda. Experien-
 tia enim 1.) confirmat, quod tale vulnus sit consolida-
 tum. 2.) In ejusmodi vulnere medicamenta, extus appli-
 cata, ad vulnus ipsum successive deferuntur. Quando ve-
 ro vulnera talia majora existunt, mortifera sunt 1.) ob
 respirationem enormiter turbatam. 2.) Ob inflammatio-
 nem subsequentem enormem. 3.) Oriuntur spasmi lethales
 item & vomitus. 4.) Materia purulenta spatia aliena intrat,
 nec commode educi potest. Et 5.) quando vulnera talia dia-
 phragmatis non in momento fiunt lethalia, tamen læsi mo-
 riuntur brevi post. Observarunt enim Medici, quod vulne-
 ra talia diaphragmatis interdum repleta fuerint a ventri-
 culi, intestinorum, omenti, &c. notabili portione, quæ par-
 tes ibi interdum plane cum diaphragmate coalescere in-
 ciunt. Ast quoniam oritur situs & positus viscerum ir-
 regularis, ideo actio viscerum quoque turbatur, & ple-
 rumque post aliquot septimanarum, vel mensium, spatia
 læsi moriuntur. Contusiones fortes thoracis fieri pos-
 sunt lethales, ob contusionem diaphragmatis, inprimis, si
 fiunt circa scrobiculum cordis. Hæ subito & in momento
 motum diaphragmatis, ad respirationem & vitam absolu-
 te necessarium, tollunt, sublatam autem respirationem

Ee 2

sequi.

sequitur suffocatio. Lethalium concussionum thoracis & diaphragmatis exempla extant apud BOHN. *L.c. p. 138.*

Tandem vulnera nervorum intercostalium, & paris vagi, ad cor, pulmones, & diaphragma tendentium, lethalia sunt. Organa enim vitalia motore suo destituuntur.

4. Qu. *Quid sit statuendum de vulneribus abdominis?*

Viscera, in abdomine contenta, quoque ad vitam continuandam necessaria sunt. Hinc eorum vulnera quoque lethalia fieri possunt, multis & infinitis modis. Ad viscera abdominis vero pertinent ventriculus, intestina, hepar, cum vesicula fellea, lien, pancreas Virsungi, & Afelli, mesenterium, omentum, vasa abdominis sanguifera, nervosa, lactea, renes, capsula atrabiliaria, vesica urinaria, ureteres, vasa spermatica in sexu nobiliori, & in sequiori sexu uterus. Vulnera ventriculi ab omnibus fere Medicis, tum antiquis, tum recentioribus, absolute lethalia pronunciantur, quoniam fere omnes illis moriuntur, & rarissime, vel nunquam, sanantur. Interim tamen dantur nonnulli, qui non omnia vulnera ventriculi lethalia esse, statuunt. Assertionem vero probare volunt per exempla cultrivorum tum Prussici, ne qua historia Becherus peculiarem edidit tractatum, tum Hallensis quidam, qui anno 1691. die 3. Jan. cultrum deglutivit, die 2do Augusti autem ej. anni iterum, cum ulcere abdominis, exivit culter deglutitus. Vid. Acta Erudit. Lips. anno 1692. mens. Decembr.

Vulnera orificiorum ventriculi semper lethalia esse solent. inprimis vero vulnera orificii sinistri. Nam 1.) deglutitio impeditur. Est enim orificium superius continuatio, vel finis potius, oesophagi. Hinc in vulnere hu-

jus orificiï alimenta non ad cavitatem ventriculi depor-
tantur, sed potius ad cavitatem abdominis, ubi postea pu-
trefcunt. 2.) Circa illud orificium par notabile nervorum
existit, qui nervi in ejusmodi vulnere necessario insimul
læduntur. Hinc lethalis oritur spasmus, vomitus, cardial-
gia, aliaque pessima symptomata. 3.) Circa orificium
hocce vasa adsunt sanguifera copiosiora, coronaria nem-
pe, quæ vulnerata hamorrhagiam præstant lethalem. 4.)
Ibi ventriculus conjungitur cum diaphragmate. Ergo
phrenitis, convulsiones, singultus, respirationes diffici-
les, nullo remedio curabiles, producuntur.

Nec minus vulnera orificiï dextri, vel pylori, sunt
lethalia dicenda. Nam in motu ventriculi peristaltico, qui
constans & perpetuus est, chymus exprimitur ad cavitatem
abdominis, nec deferitur ad intestinum duodenum.
Ergo imminuitur chylicatio, nutritio, & putrescentia
insimul oritur in abdomine

Vulnera ventriculi, in fundo, ejusque parte inferio-
re existentia, imprimis, si latiora sunt, etiam mittunt ali-
menta ad cavitatem abdominis. Ergo sunt lethalia. In
summitate vero, si exigua sunt, interdum, quamvis rarissi-
me, sanantur.

Quando vero extra ordinem vulnera ventriculi
consolidantur, tunc hoc fieri solet ex quadruplici causa
extraordinaria occasionali. V.g. 1.) hoc fieri potest, quan-
do vulnera sunt minora, & quando per corrugationem
ventriculi naturalem constringuntur & clauduntur. 2.)
Quando labia vulnerum ventriculi aut cum peritonæo,
aut diaphragmate, aut omento, aut musculis abdominis,
conjunguntur & conglutinantur, quale quid factum fuit
in rustico quodam, apud SCHENCK. in *Observ.* qui
per vulnus epigastrii satis duæ alimenta effudit, tandem
vero

vero integræ sanitati restitutus fuit. 3.) Quando portuncula omenti vulnus tale ventriculi obstruit, & postea cum ventriculo coalescit. 4.) Quando labia vulnorum ventriculi cum abdominis integumentis per suturam chirurgicam jungi possunt. Cujus operationis possibilitatem confirmat SCHENCKIVS, in *Observat. Tit. de Vulneribus ventriculi*.

Intestinorum vulnera an omnia sint absolute lethalia dicenda, disputant Medici, tum veteres, tum recentiores. Distinguuntur vero vulnera intestinorum 1.) in superficialia, & penetrantia. 2.) In magna, & parva. 3.) In longitudinalia, & transversalia. 4.) In vulnera intestinorum tenuium, & crassorum. Hinc superficialia, parva, recta, vel longitudinalia, ac crassorum intestinorum, periculosa quidem, sed non simpliciter lethalia a nonnullis statuuntur. Penetrantia vero, & majora, transversalia, ac tenuium, per se lethalia pronunciantur.

Admitti quidem possunt hæ distinctiones in tantum, nunquam vero in totum. Moriuntur enim vulnerati a vulnere intestinorum tam exiguo, ut acu punctum esse videatur, propter inflammationem subsequenter, quale exemplum mihi notum est. Concludendum igitur, cum BOHNIO, in *Tr. de Vuln. lethal. p. 145.* & ipso HIPPOCRATE, in *Coacis*, vulnera quæcunque intestinorum, inprimis majora, & gravioribus symptomatibus juncta, per se lethalia esse dicenda. Nam 1.) omnia intestina, partim a statibus & fecibus, partim chymosa substantia, perpetuo distenduntur, ac motu gaudent constanti peristaltico. Hinc vulnera eorum difficillime conjunguntur, & consolidantur. 2.) Communissime intestinorum vulneribus jungitur gangranosa inflammatio. 3.) Chymus, flatus,

flatus, & feces ad abdominis cavitatem per hoc vulnus fluunt. 4.) Nec futura, nec alia remedia, v. g. injectiones, sufficientia, & convenientia satis, existunt.

Vulnera mesenterii per se lethalia esse non solent. Nam constat hoc ex tenuissimis tunicis, quæ perfoßæ facile consolidantur. Quoniam vero vasa varia in mesenterio existunt, ideo, ex læsione horum vasorum, vulnera mesenterii fieri possunt lethalia. Ad vasa mesenterii vero pertinent. 1.) nervi plexus nervosi abdominis, qui, quando vulnerantur, notabiles dolores, anxietates, convulsiones, singultus, vomitusque efficiunt. 2.) Vasa sanguifera mesenterica. Hæc vulnerata lethalem, vel per se, vel per accidens, præstant hæmorrhagiam. Nam vel sanguis in maxima effluit copia, & sic brevi post circulatio, & vita sistitur, vel sanguis abdomen replet, &, dum putrescit, inflammationem viscerum abdominis præstat. 3.) Vasa lactea. De hisce vero nota, quod, quando unum horum vasorum vulneratur, tunc vulnus absolute lethale non sit dicendum. Nam 1.) reliqui rami vasorum lacteorum tantam chyli quantitatem adducunt, quanta requiritur ad nutritionem, & vitæ continuationem. 2.) Chylus liquor est, non adeo dispositus ad corruptionem, ut sanguis, & reliqua liquida. Quando itaque chylus exstillat in cavitatem abdominis, ibique colligitur, nullum alium morbum, quam hydropem, præstare potest.

Vulnera glandularum mesenterii, imprimis, quæ centrum mesenterii glandulosum penetrant, sunt lethalia. Concurrunt enim in hoc centro omnia vasa lactea. Ergo 1.) maxima debet fieri chyli profusio. 2.) Glandulæ mesenterii sunt organa, quæ chylum filtrant, ejusque fluiditatem, & divisionem promovent. Quando itaque hoc organon vulneratur, hæc actio turbatur, & chylus crudus, ad nutritionem minus aptus, ad massam san-

sanguineam defertur. Hinc nutritio enormiter læditur. 3.) Ibi sunt copiosissima alia vasa lymphatica, quæ lympham, ex inferioribus ascendente, ad hunc locum deferunt, quibus vulneratis oritur hydrops. Sunt etiam ibi vasa copiosissima sanguifera, & inprimis truncus arteriæ meseraicæ superior ibi existit, quo læso oritur in momento lethalis hæmorrhagia. 5.) Est in centro mesenterii plexus nervosus, cujus læsio vehementissima, & lethalia symptomata, dolores, inflammationes, anxietates, & convulsiones præstat.

Vulnera vasorum lacteorum secundi generis absolute sunt lethalia dicenda. Effunditur enim 1.) in momento omnis chylus & lymphæ, ibi in maxima copia existens, a qua effusione abdomen mox intumescit, & hydrops acceleratur, immo nutritio læditur notabiliter. 2.) Sunt ibi tendines diaphragmatis, qui necessario insimul vulnerantur. Hinc oritur in momento respirationis maxima difficultas, paraphrenitis, & paulo post mors. 3.) Ibi truncus arteriæ magnæ descendens existit, & vix receptaculum chyli vulneratur, sine vulnere insimul hujus arteriæ.

Pancreatis Virsungi vulnera inter non lethalia a BOHNIŌ referuntur, ex hac ratione, quoniam pancreas non sit viscus, in œconomia animali absolute necessarium, hincque vulnera, & aliæ læsiones hujus visceris, non turbent enormiter sanitatem. Et si lethalitas ex vulneribus pancreatis sequatur, illam potius jam laudatus auctor læsionibus vasorum tribuere vult. Ast an ratio hæc decidendi sufficiens sit, judicent alii. Ego ita judico: Succus pancreaticus ad chyli elaborationem absolute necessarius est. Hic vero in vulnerato pancreate neque elaboratur, neque secernitur, neque ad intestinum duodenum defertur. Ergo læditur nutritio, sanitas & vita.

Omenti vulnera etiam non dici possunt lethalia absolute,

solute, nisi sint conjuncta cum enormi & insanabili vasorum sanguiferorum læsione, inprimis, cum certum sit, quod portio notabilis omenti, quando extra corpus pendet, salva manente vita, & sanitate, possit excindi.

Hepatis vulnera, distinguuntur in vulnera substantiæ, & vasorum. Priora per accidens lethalia, posteriora vero per se lethalia pronunciantur. Ast hæc distinctio nullius est momenti, immo potius falsa. Hepar enim viscus est, pure fasculosum, quemadmodum demonstravit RVYSCHIVS, in *Epistolis anatomicis*. Hinc nulla pars hepatis, absque notabili sanguinis profusione atque hæmorrhagia lethali, vulnerari potest. Id quod confirmat GLISSONIVS, in *Tr. de Hepate*, & quotidiana exempla hoc probant. In vulneribus enim hepatis statim sequitur hæmorrhagia sanguinis obscuri, adsunt statim & vehementissima symptomata, anxietates, dolores, per totum corporis truncum extensi, apparent vomitus biliosi atque cruenti, item similes alvi dejectiones, accedit æstus, sitis, lipothymia, & post breve tempus mors. Moriuntur enim ex hæmorrhagia & supra dictis symptomatibus, quæ nullo remedio fisti possunt. Sequitur ergo, quod omnes læsiones hepatis dicendæ sint lethales.

Non tantum autem vulnera substantiæ hepatis sunt lethalia, sed & nonnulla vulnera vasorum, in hepate existentium. Ad vasa hepatis pertinent & sanguifera, & biliaria. Hinc vulnera arteriæ hepaticæ, venæ cavæ, & portæ, in momento vulneratos interficiunt. Nam maxima fit hæmorrhagia, & ex hac ratione illico moriuntur vulnerati.

Quid vero de vulneribus vasorum biliariorum sentiendum sit, jam videbimus. Ad vasa biliaria vero pertinent vesicula fellea, ductus hepatici, ductus cysticus, & ductus choledochus. De lethalitate vulnerum vesicæ felleæ dubitarunt nonnulli Medici, & quidem ob sequen-

tes rationes. 1) Putant, quod laesa etiam vesicula fellea tamen sufficiens bilis copia affluere valeat ad intestinum duodenum per ductum hepaticum, quæ chylicationem, & sic nutritionem ac vitam, continuare valeat. 2) Dicunt, structuram vesiculæ felleæ ita esse comparatam, ut ex vulnere non semper fiant lethalia symptomata. Nam est tenuis musculus excavatus. 3) Dicunt, bilem esse liquorem balsamicum, & ad corruptionem minus proclivem, hinc eum, quando fluit ad cavitatem abdominis non ibi statim corrumpi, uti sanguis, ut adeo talis effluxus lethalis haud judicari possit. Quæ jam dicta sunt de vesicula fellea, applicant, in gratiam & favorem inquisiti, ad ductus hepatici vulnera.

Aliter verò sentiendum, quando ductus choledochus præscinditur. Tale vulnus absolute lethale esse oportet. Nam bilis amplius fluere non potest ad intestinum duodenum. Sic turbatur plenarie chylicatio, nutritio, & tota corporis œconomia, & si non subitanea, tamen lenta mors brevi tempore sequitur.

Vulnera lienis, sive ab instrumento secante, sive a contundente, inflicta, merito lethalibus annumerantur. Lien enim est viscus vasculosus, cujus vasa rupta, aut divisa, momentaneam, & lethalem præstant hæmorrhagiam. Dubitare nonnulli volunt de lethalitate vulnerum lienis, & quidem ex sequentibus rationibus. 1) Dicunt, quod lien sit viscus inutile, & novicum. Ast hoc dudum a Physiologis refutatum fuit, & potius demonstratum, quod lien sit viscus utilissimum, & summe necessarium in negotio bilificationis. 2) Dicunt, quod possit extirpari. Ast merito dubitatur, an extirpatio lienis operatio sit in corpore humano possibilis, & si detur extirpationis possibilitas, tamen ab hac operatione ad non lethalitatem vulnerum lienis concludi non potest. Quando enim extirpatio suscipitur,

tur, vasa vinculis constringuntur, hincque hæmorrhagia fieri non potest. In vulneribus vero lienis vasa vulnerata neque constringi possunt ligaturis, neque adfunt styptica sufficientia, quæ a vulnere natam hæmorrhagiam suppressere possint.

Renum vulnera quoque a nonnullis ad non lethalia referuntur ex hisce rationibus. 1.) Quoniam HIPPOCRATES de renum vulneribus nihil relatum reliquit. 2.) Quoniam renes, seu substantia renum, tota interdum ab exulceratione successive fuerit consumpta, absque momentaneo vitæ periculo. Sed respondeo 1.) Auctoritas HIPPOCRATIS hic nihil facit ad rem, & dantur alii, v. g. AVICENNA, & inprimis CELSVS, qui expresse inquirunt, servari illum non posse, cui renes sint vulnerati. 2.) Argumentum, ab exulceratione desumptum, etiam hic non potest applicari. Nam & pulmonum exulceratio toto die contingit, interim tamen vulnera pulmonum etiam dantur absolute lethalia. Concludendum ideo potius, secundum principia anatomica, 1.) vulnera renum superficialia, & non conjuncta cum inflammatione nephritica, feбри, anxietate, respiratione difficili, ischuria, vomitu, posse dici non lethalia. Nam substantia renum exterior ex vasculis paulo solidioribus componitur, in quibus consolidatio suo modo expectanda. 2.) Quando vero vulnus renum ad arcus arteriosos penetrat, oritur hæmorrhagia lethalis. 3.) Quando denique vulnera renum ad pelvim, & corpora mammillaria, penetrant, necessario non tantum supra recensita symptomata & hæmorrhagia contingunt, sed & stillicidium urinæ fit ad cavitatem abdominis, qui liquores, sanguis nempe & urina, ibi necessario putrescunt, & quod maximum, renum situs ita comparatus est, ut neque remedia styptica pro sanguine sistendo, neque balsamica pro vulnere consolidando possint applicari.

^{re} Uterum vulnera quoque mortalia dicenda. Nam
 1.) Urina perpetuo exstillat, quantitate sua abdomen extendit, viscera molestat, & putredine sua illarum corruptionem promouet. 2.) Organa sunt, quæ per futuram chirurgicam non conjungi possunt, nec medicamentis consolidari.

De vulneribus vesicæ quid statuendum sit, nesciunt fere Medici, & Chirurghi, & potius lethalitatem ex effectu dijudicare volunt. Veteres Medici, HIPPOCRATES, GALENVS, CELSVS, immo ipse ARISTOTELES, *L. III. Hist. Anim.* vulnera vesicæ lethalia pronunciant omnia. Alii distinguunt vulnera vesicæ in vulnera fundi, & vulnera cervicis, vel colli. Fundi vesicæ vulnera a nonnullis lethalia per se pronunciantur; Vulnera vero colli tantum per accidens. Ut vero, vulnera fundi esse lethalia, probent, dicunt, 1.) substantiam vesicæ esse membranaceam, ergo difficillime consolidari. 2.) Tale vulnus non tantum cum inflammationibus esse conjunctum, sed & doloribus intolerabilibus, & spasmis. 3.) Vesicam conjungi non posse per futuras, & 4.) urinam fluere perpetuo ad cavitatem abdominis. Ast hæc rationes decidendi non sufficiunt. 1.) Enim certum est, substantiam vesicæ non esse membranosam, sed musculosam, est enim musculus excavatus) musculi vero ad consolidationem admodum sunt proclives. 2.) Dantur observationes, & in primis notabilis observatio in DIONISII *Chirurgia*, de milite quodam, globulo sclopeti vulnerato, qui globus penetravit usque ad cavitatem vesicæ, ibique uucleum constituit calculi vesicæ, qui calculus postea per Lithotomum feliciter extractus fuit, & ipse auctor, jam cit. ex hoc fundamento commendat tertiam methodum, Franconicam, *die Obere Bereitschaft* dictam, & jam praxi confirmatam, ad calculum extrahendum.

De vulneribus colli vesicæ nemo dubitat, quod ejus vulne-

vulnera sint tantum per accidens lethalia. Hoc enim confirmant observationes Lithotomorum. Quando enim lithotomia, vel potius Kyflitomia, provide instituitur, vix centesimus moritur.

uteri vulnera rariora quidem esse solent, quoniam sexus sequior ad cruentas digladiationes non inclinat. Hinc quoque parum, vel nihil, de uteri vulneribus, eorumque lethalitate reperitur. Contingunt tamen varia uteri læsiones, de quibus Medici in foro interdum interrogantur. Putant tamen nonnulli, quod uteri vulnera non sint lethalia dicenda, & quidem ob sequentes rationes. 1.) Quoniam uterus tantummodo pars sit destinata ad procreationem sobolis, non vero ad vitam matris. 2.) Dicunt, vulnera uteri non esse lethalia ex hac ratione, quoniam in partu cæsareo lata sectione uterus vulneratur, 3.) Quoniam uterus abesse potest salva vita. Sed respondeo 1.) falsum esse, quod uterus non pertineat ad vitam matris. Est enim organon secretionis mensium, & sine mensium secretionem, quæ in utero & ejus vagina fit, sanitas matris persistere non potest. Secundum argumentum quoque facile corrui. Ab una enim observatione non possumus formare regulam. Plures insuper scemina in partu cæsareo moriuntur, quam evadunt. Tertium quoque falsum est, vel ad minimum observationes sunt rarissimæ. Læsiones uteri vero longe sunt periculosiores gestationis tempore, quam alio. Ita enim & mater & foetus læditur, imprimis, quando uterus contunditur in parte antica circa pubem, & umbilicum, vel circa latera. Ita enim 1.) stigmata monstrosa foetum signare possunt, vel 2.) abortus promoveri potest momentaneus, ac foetus ita extinguitur, posteaque corruptus excluditur, vel 3.) turbari potest structura uteri, cum disruptione ejus, quæ disruptio in momento matrem & foetum extinguit.

Sed non omnia gravidis inflictā verbera, aut pedibus factā læsiones, foetui immediate vestigia & stigmata imprimunt, quemadmodum scite judicat BOHN. *de vuln. lethal. p. 262.* dum imaginatio matris inprimis accusari potest, & debet. Quanta enim imaginationis vis sit, ubique per exempla comprobatur, & navi materni infimul testantur. Interim tamen, quando violentia cum imaginatione conjungitur, foetus magis lædi potest, vel defoedari.

Ad læsiones uteri lethales pertinent quoque illæ, quæ in partu contingunt ad improvida obstetricis manu. In partu enim multis modis læditur parturiens, dum, non tantum foetus inconvenienti modo extrahuntur, sed & secundinæ, quibus laboribus facile uterus vel dilaceratur, vel infimul extrahitur, vel hæmorrhagia enormis, & inflammatio gangrænosa lethalis accersitur.

Vulnera partium genitalium in sexu masculino paulo rariora existunt, interim tamen interdum contingunt, &, si contingunt, Medici legalis atque forensis judicium Jcti exposcunt. Contingere autem possunt 1.) vulnera vasorum spermaticorum, in abdomine delitescentium, quæ vulnera propter hæmorrhagiam, quæ nullo remedio fisti potest, dici debent lethalia. 2.) vulnera vasorum spermaticorum, extra abdomen existentium, non absolute dici possunt lethalia. 1.) Enim remedia admittunt, ut balsama, emplastra, liquores stypticos, &c. ac 2.) castratione ad minimum tale vulnus consolidari potest.

Vulnera testium, item & contusiones testium, læsiones dici possunt lethales, accedentibus nimirum convulsionibus, spasmis, & gangrænosis inflammationibus. Quæ symptomata in hisce organis læsis communissime contingunt. Interim tamen, quando tempestive castratio suscipitur, hocce remedium hominis hac ratione vulnerati, vitam conservare potest. Castratio enim, experientia teste, ope-

ratio

ratio est chirurgica, satis tuta, imprimis, quando conuenienti modo, & provida manu suscipitur. Plures enim conseruantur ita. Interim tamen, quando illegitimo modo suscipitur, Chirurgus quoque accusari potest.

Vulnera vesicularum seminalium non quidem absolute dici possunt lethalia, sed tamen sunt periculosa. Constant enim ex tunicis tendinose nervosis tenuioribus. Hinc vulnera dolores, & spasmos præstant, a quibus per accidens inflammatio gangranosa ac mors producit. Porro sunt receptacula feminis. Quando itaque vulnerantur, posteaque per callum consolidantur, aliqua producit impotentia. Nam semen virile amplius in conueniente quantitate neque colligitur, neque conseruatur neque ejicitur.

Vulnera corporum nervosorum penis non quidem absolute lethalia dici possunt; nam abscissio penis operatio possibilis est, id quod cubiculares Imperatoris Turcarum vivis exemplis testantur: Interim tamen valde periculosa sunt. Tale enim vulnus sine enormi dolore, siue excessiva hæmorrhagia, fieri vix potest, a quo dolore facile excitatur gangranosa inflammatio, convulsio, aliaque periculosa symptomata. Hæmorrhagia quoque, in tali abscissione contingens, non omnia remedia admittit. Nec enim ustio, nec cauterisatio, nec ligatura in loco hoc, sensu exquisitissimo prædito, applicari potest. Quando itaque pulveres styptici, & liquores styptici, non sufficiunt, moriuntur ejusmodi miseri.

Artuum vulnera an sint per se lethalia dicenda, dubitant nonnulli, & quidem ex his rationibus, 1) quoniam non organa sint, ad vitam absolute necessaria. 2) Quia possint amputari. 3) Quoniam vulnera conuenienti modo possint deligari, stypticis, suturis, cauteriis, aliisque similibus. Sed respondemus, quod jam allegata rationes
tan-

tantummodo possint applicari ad vulnera in artubus extremis. Quando vero vulnera artuum contingunt in partibus, trunco corporis propinquieribus, tunc rationes illæ non quadrant. Quando enim ibi vulnera contingunt, vasorum sanguiferorum, inprimis arteriarum, hæmorrhagia nullo remedio sisti potest. Et si sistitur hæmorrhagia, tamen sequitur in parte inferiori inflammatio gangranosa. Moritur enim illa pars ob defectum circuli sanguinis. Quando contingunt vulnera nervorum majorum, oritur in parte inferiori momentanea paralytis, in parte superiori vero, immo in toto corpore, contingunt convulsiones & spasmi, qui nullo remedio fere tolluntur. Ad vulnera artuum pertinent quoque vulnera tendinum majorum, v. g. chordæ achilleæ, tendinumque in regione poplitum. Huc pertinent quoque ligamenta articulorum notabiliora, quæ, quando vulnerantur, secundum sententiam nonnullorum, absolutam lethalitatem efficiunt. Celeb. BOHN. ipse ejusmodi vulnerum lethalitatem non in totum negat, p. 166. *de vulner. lethal.* Et insuper tum ratio hoc docet, tum experientia confirmat. In ejusmodi enim vulneribus observantur intolerabiles dolores, qui pessimum symptoma subito introducunt, inflammationem nempe gangranosam. BOHN. l. c. sententiæ hujus veritatem exemplo quodam confirmat, ubi ex vulnere tendinis majoris genu, (musculi nempe recti, cruralis & binorum vastorum) patellam involventis, sine prævia hæmorrhagia, & inflammatione, spatio 24. horarum sphacelus lethalis fuit productus, quamvis defensiva necessaria intus & extus fuerint applicata.

Ad vulnera merito referri debent aliæ læsiones, fustigationes, concussiones, & pedibus factæ calcitationes, nec non omnes læsiones instrumentis duris factæ, & sic plagæ incruentæ,

entæ, quæ, quamvis sine integumentorum communium dilaceratione fiunt, tamen profunde satis carnem, vasa sanguifera; limphatica, & nervosa disrumpunt, & dilacerant, nec non livores, fugillationes, & sanguinis periculosas evacuationes post se relinquunt.

Cum vero omnis fugillatio ita sit comparata, ut sanguis, ita stagnans, ad corruptionem inclinët, quæ corruptio, dum profunde latitat, nullo sane remedio averti potest: Ideo talis læsio citissime gangranosa præstat vestigia, ut febrim, convulsiones, sanguinis extraordinarias evacuationes, & mortem ipsam, inferre potest. In ejusmodi læsionibus aggressorum defensores semper dubium movent, an a verberibus immediate; an vero ab alia causa, morbo nempe latente, vel a morbosa dispositione, aut ab affectu quoque, vel antecedaneo, vel concomitante, vel superveniente, mors contigerit; Ad ejusmodi dubia respondere debet Medicus, ad legalem quæstionem antea requisitus. Quo vero hoc secundum conscientiam fiat, attendere debet & examinare, an percussus olim fuerit perfecte sanus. Si hoc certum, concludendum, ictuum gravitatem absolute mortis causam extitisse, inprimis, si statim post læsionem symptomata lathalia adfuerint, quæ ad finem vitæ usque perduraverunt. Inspectio denique & lustratio cadaveris omnia dubia solvere potest. Quando vero aliquis morbus, & dispositio gravis, præcesserit, utique dubius manere potest Medicus. Nescit enim interdum, an a morbo, an a læsione mortuus sit vulneratus. Considerari itaque debet morbus, ut causa socia, quæ cum læsione conjuncta, interitum acceleravit.

CAP. XXIV.

DE

INFANTICIDIO.

Quando de infanticidio sermo est, duæ semper moventur quæstiones: I. *An partus vivus, an mortuus exclusus fuerit?* II. *An revera partus manu violenta occisus fuerit?* Prius ideo demonstrandum est, quoniam communissime infanticidæ excipiunt, foetum vel in utero, vel in ipso actu partus extinctum esse, sine omni violentia adhibita. Posterius etiam demonstrandum, quoniam interdum miserrimæ personæ vel ex infania se accusant de hoc crimine, quod tamen ab illis non fuit perpetratum.

Vixisse autem foetum ad partum usque, & post illum, ex sequentibus concludi debet:

1) Ex integritate, & conformatione convenienti, omnium organorum, quoad longitudinem, & crassitiam.

2) Cognosci debet ex funiculi umbilicalis conformatione. Funiculus enim succulentus nodosus, & candidus vivum & vitalem notat foetum. Contra funiculus flavus, flaccidus, rugosus, putridus & dilacerabilis notat, foetum mortuum esse ante partum. Interim siatus funiculi umbilicalis rugosus fallere potest. Ab aere enim facile corrumpitur, & exsiccat.

3) Ex colore foetus, vel infantis dignoscere possumus, aut vixisse illum in partu, aut ante partum mortuum esse. Nempe, quando infans rubet, & carnosus apprehenditur, vixisse credibile est; quando vero pallet, livetque & ejus corpus flaccidum & corrugatum est, tunc concludere possumus, foetum ante partum mortuum esse. Quo pertinet suo modo calor corpusculi. Quando enim ab ad-

stanti-

stantibus statim post parum calidum fuit deprehensum; tunc credibile est, foetum in partu vixisse, & contra.

4) Videndum, an ex funiculo umbilicali, non deligato, sanguis copiose effluerit. Si hoc, vivum extitisse, concludendum, & contra. Inprimis autem in foetu mortuo mox ad putredinem inclinat funiculus umbilicalis. Et quando ex hæmorrhagia funiculi umbilicalis infans moritur, nulla, vel exigua sanguinis quantitas, in corpusculo, & visceribus, deprehenditur. Corculum, cum suis auriculis, flaccidum est nec sanguine repletum. Vasa omnia, inprimis majora, sunt evacuata. Hepar, lien & reliqua viscera pallent.

5) Examinandæ sunt circumstantiæ, durante gestatione notabiles, inprimis ultimis ante partum diebus, v. g. an per lapsum, & concussionem abdominis, medicamenta abortum promoventia, venæ sectionem largiorem, sternutationem, terrorem, iram, irregularem diætam, foetus laesus sit, vel debilitatus, & sic ad partum ineptus redditus.

6) Examinandæ sunt quoque circumstantiæ, in partu ipso præsentēs, quo pertinent sequentes. 1) An in partu motus foetus adsuerit (*Ob das Kind sich Zeit wæhrender Geburt bewege, und ob solche Bewegung die Mutter, oder die Adstantes empfunden?*) 2) An partus fuerit facilis, an vero dolorosus & difficilis? Facilis enim partus foetum vivum extitisse notat & contra. In foetu mortuo enim semper adest partus difficilis. Mortuus quippe foetus nullum motum exercet, & exprimitur unice per vim matris. 3) Huc pertinet situs funiculi umbilicalis circa foetum: *Ob das Kind in der Geburt sich umschlungen gehabt, in sonderheit um den Hals?* Ita enim in partu foetus suffocatur. 4) Examinandum, an ante partum, vel etiam in partu, sanguis per pudenda muliebria notabiliter effluerit. Hoc enim quoque notat separationem placentæ foetus, ante partum ab utero materno factam

*Schmilz an de
ambilici ab
necessaria sit
tam huius quærentis
Böhmer de ne
saria funicu
umbilicalis de
sione.*

& sic, per se consequens, mortuum esse foetum ante partum.

7) Circumstantia etiam, post partum evenientes, examinanda. V. g. An fluxus lochiorum enormis, & dolorosus, adfuerit, cum notabili imbecillitate? Hoc quidem in omni partu contingere potest: Interim tamen in partu difficili hoc primario fieri solet.

8) Videndum an separatio secundinarum sine molestia facta sit? Facillime enim separantur secundinae in partu naturali, difficillime in praeternaturali.

9) Si secundinae haberi possunt, etiam illae a Medico examinandae sunt. Secundinae enim turgidae, & ubique sanguine repletae, foetum vixisse, notant, contra putredine corruptae, flaccidae, & corrugatae foetum in utero mortuum esse, significant.

In inspectione cadaverum varia sunt notanda, quae violentiam illatam indicant. Hinc videndum: 1) An sugillatio hinc inde in corpore, in primis vero in capite, sit conspicua. Sugillatio enim vera cum livore, & sanguine extravasato, in vivo tantum corpore contingit, quum diu nempe circulatio sanguinis persistit. Talis sugillatio fit 1) in fontanella infantum, sive hiatu rhomboideo: *Wenn dem Kinde das Blutgen eingedruckt ist.* Et talis violentia mortis causa existit. 2) Sugillatio contingit interdum circa tempora a compressione, & violentia. 3) Contingit sugillatio talis cum fractura cranii, quod signum maximam violentiam illatam notat. 4) Sigillatio exigua in fontanella & circa tempora oritur, quando infans moritur a punctura aculeorum: (*Wenn das Kind mit einer Nadel ertodtet wird.*) 5) Sugillatio talis interdum contingit circa nucham, in loco connexionis primae vertebrae colli & ossis occipitis: *Wenn denen Kindern das Genick zerbrochen.* Idem moriuntur infantes ab acus punctura in nucha. 6) In toto collo, & aliis colli vertebribus, fit similis sugillatio, quando collum intorquetur. 7) Sugillatio contingere potest

potest in parte antica colli, circa laryngem, quando infans compressione violenta suffocatur. 8) Sugillatio etiam in pectore contingere potest: *Wenn, durch Zusammendrückung der Brust, sie das Kind ersticken.* 9) Sugillatio contingit circa scrobiculum cordis, item circa umbilicum: *Wenn, per compressionem daselbst, das Kind ertödtet worden.* Ex his apparet, quod dentur varii modi interficiendi innocentem infantem, recens natum.

Ast ejusmodi signa externa non semper sufficiunt, sed lustranda deinceps viscera interna, non in una, sed in tribus illis cavitatibus, thorace sc. abdomine, & capite. Aperto cadavere 1) in abdomine examinanda sunt vasa umbilicalia, an sint sanguine repleta, an non? An sugillata & rupta? 2) An in abdomine sanguinis extravasatus contineatur? 3) An color hepatis & lienis sit rubicundus? 4) An ventriculus sit repletus, & distentus liquore amnii, non corrupto, nec putrido, sed recenti?

In pectore cor lustrandum venit, cum auriculis, atque ventriculis, an sit flaccidum, an vero rubrum & sanguine repletum? Quando enim cor, cum auriculis, a sanguine turget, indicatur, infantem non esse mortuum ab hamorrhagia, per funiculum umbilicalem facta. Porro inspiciantur pulmones. De pulmonibus foetus, eorumque statu disputant Medici veteres & recentes. Ipse GALENVS, *de usu partium*, tit. 6. pulmonem, inquit, in foetu (h. e. in infante, in utero mortuo) esse rubrum, densum & ponderosum quoad suam substantiam, in vivo vero infante substantiam esse pulmonum albam, raram & levem. Hoc confirmat experientia omnium celeberrimorum Anatomicorum. Ideo etiam secundum hanc thesin instituunt docimasiam pulmonum in aqua, (*die VVasser-Probe mit der Lunge.*) & observant, quod pulmones foetus, ante respirationem, & sic in utero mortui, in aqua fundum petere solent, foetus vero vivi pulmones semper in aqua supernatent.

*Man Sie Lunge
nicht so fest drücken
in utero noch nicht
tödtet es V.V.*

*1. Wenn es resp.
hat nach der Geburt
2. Wenn es beim
partur einget.
worden.*

Hæc docimasia pulmonum in aqua, secundum regulas naturæ, vera, immo verissima est. Nam quando aer intrat pulmones, tunc nunquam penitus e pulmonibus egreditur, sed semper aliqua portio aeris in pulmonum cellulis manet, a quo aere pulmones fiunt leves, hincque semper supernatant. Hoc multoties tentavi in foetu vitulino, & semper experimentum successit.

Celeberrimus BEYERVS, Jctus, & Prof. P. Wittebergensis, in *Delineatione juris criminalis secundum C. C. C. V.* hancce pulmonum explorationem medicam probat, eamque infimul commendat, id, quod una facit Illustris LVDOVICI, in *Comment ad C. C.* jam citatam Art. 35. Interim tamen citatus BEYERVS, l. c. p. m. 59. infimul, non sine ratione, inquit, quod in hoc experimento caute sit procedendum, & quod 1) sit dispiciendum, an cadaver adhuc recens sit. Quando enim putredine resolvi pulmones incipiunt, & foetorem spargunt licet extrinsecus aerem non hauserint, in aqua tamen eminent, & hoc fieri putat ideo, quoniam fermentatio & putrefactio, in pulmonibus sponte facta, aerem in medijs eorum penetrahibus possit generare. Hoc argumentum etiam cauidici nonnulli arripiunt, qui infanticidarum defensiones in se susceperunt. Nos præsentibus auditoribus anatomix sapius sollicite hoc experimentum suscepimus in pulmonibus vitulorum. *Wir haben genommen die Pulmones derer todt-gebohrnen Kälber, und dieselbige zu 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tage lang faulen lassen, und sie in Wasser probiret, da wir denn gefunden, daß sie zwar nicht so geschwinde zu Boden fallen, und etwas leichter zu seyn scheinen, iedoch haben sie niemahlen oben schwimmen können, sondern sind successive gesunken und zu Grunde gangen.* Hoc experimentum confirmat, quod nulla putredo, ne extrema quidem, pulmones foetus ad eam levitatem perducere valeat, quæ reperitur in pulmonibus animalium, facta prius respiratione, vel aeris inflatione.

tionem. Et contra per putredinem pulmones gravitatem quoque non acquirunt, id quod quoque nonnulli putarunt, qui dubium moverunt, an non pulmo post contractam putredinem in aqua fundum petat? Ad hanc objectionem jam Celeb. Medici Lipsienses, RIVINVS & LANGLVS, dudum responderunt, quam responsionem videbis in Dn. D. SCHREIERI *Erörterung und Erklärung der Frage, ob es ein gewisses Zeichen, wenn eines todten Kindes Lunge im Wasser unterfincket, daß solches im Mutter-Leibe gestorben sey?* Zeiz 1690. item in eruditissima Cel. SCHOEPPFERS *Dissert. juridica de Pulmone infantit natante, vel submergente*, p. 10. Hoc responsum huius est tenoris. Nachdem derselbe unlängst auf die vorgelegte Frage: Ob dieses vor ein gewiß Anzeichen zu achten sey, daß ein Kind todt auf die Welt kommen, wenn dessen Lungen im Wasser unterfielen? von uns zur Antwort bekommen, daß man allerdinges, Krafft gegebenen Rationen und Experimenten, gewiß seyn könne, es sey ein Kind nicht lebendig geböhren, sondern im Mutter-Leibe gestorben; und er ferner von uns zu wissen begehret, ob, wenn ein Stück von der Lunge eines todten Kindes, zumahl etliche Tage nach der Geburt, im Wasser unterfincke, daraus abzünchmen, daß das Kind im Mutter-Leibe und noch vor der Geburt todt gewesen, oder ob solches aus andern Ursachen, ungeachtet das Kind lebendig zur Welt kommen, sich mit der Lunge gleichfalls zutragen könne: Als geben wir hierauf zur dienstlichen Antwort, daß, ob gleich nicht allein die damahl angeführten Rationes auch allerdinges auf diesen Fall sich extendiren, wir dennoch, zu mehrerer Versicherung dessen unterschiedene Experimente angestellet, und die Lunge von einem Kalbe, so lebendig geböhren worden, so lange in die Erde vergraben, eine andere ins Wasser gelegt, eine andere in die Luft gehencket, bis sie insgesamt zu faulen, und zu stinken angefangen. Es ist aber eine so wohl,

als

als die andere, gantz, und stückweiß oben geschwommen, eben wie zuvor, da sie noch frisch gewesen. Wenn denn unstrittig ist, daß Lungen, so einmahl Luft geschöpffet, weder durch Faulung, noch andere Art und Weise können darzu gebracht werden, daß sie unterfincken, als bleibt jederzeit auf festem Grunde stehen, daß wenn die Lunge eines todtten Kindes, oder ein Stück davon, auch etliche Tage nach der Geburt unterfincket, dieses aus keiner andern Ursache, als daher rühren könne, daß das Kind noch vor der Geburt im Mutter-Leibe todt gewesen. Solches haben wir, auf Begehren, hiemit bey unserm gutem Gewissen attestiren wollen. Geschehen Leipzig, den 18. Julii, 1684.

(L.S.) D. Aug. Quirin. Rivinus.

(L.S.) D. Christian Johann Lange.

Tit. Herrn D. Christian
Thomassio.

Secundum sententiam jam laudati BEYERI porro 2) fallere potest submersio pulmonum, quando pars pulmonum scirrhusa & calculis est oppleta. Hocce dubium quidem non sine ratione movetur, & concedo, quod talis materia scirrhusa & calculosa pulmonum gravitatem augere valeat, at, an tanta exinde consurgat gravitas, quæ descensum pulmonum plenarium in aqua efficere possit, merito dubito. Et si in frustra diversa secantur pulmones, veritas mox apparebit. Nunquam enim tota substantia pulmonum scirrhusa, vel calculis oppleta, reperitur in adultis, multo minus in infantibus, recens natis.

Contingit interdum, ut pulmones infantis, ante partum, vel in partu jam mortui, a mulierculis adstantibus, quæ eum adhuc vivere credunt, inspirato, vel potius inflato, aere, expandantur. Wenn dem todt-gebohrnen Kinde
starck

flavck in dem Mund geblasen wird. Ita per inflationem, in os factam, pulmones ab aere distenduntur, & postea supernataant. Huius rei possibilitatem ipse BOHNIVS admittit, cum Facultate Medica Lipsiensi. Vide cit. auct. Librum de Renunciatione vulnerum lethaliū, p. m. 182.

Fieri potest, ut infans, capite exclusus, (*Wenn das Kind mit dem Kopffe gebobren ist*) antequam totus excludatur, respiraverit, statim vero, antequam reliquo corpore utero egressus fuerit, moriatur, & quidem absque malitia matris. Hæc est circumstantia non contemnenda, aſt a Medico non dedicenda, sed a iudice in inquisitione investiganda. BEYERVS hancce circumstantiam pro naturaliter impossibili habet. Putat enim, quod, excluso capite, corpus reliquum statim facillime, absque mortis periculo, subsequatur. Veruntamen hic celeberrimus auctor fortassis non perpendit, quod infans, capite excluso, possit suffocari, vel a funiculo umbilicali, cum strangulante, (*wenn das Kind sich um den Hals, mit der Nabel-Schnur, umschlungen,*) vel quando uterus & pudenda muliebria externa constringuntur circa collum infantis, (*wenn die Gebäer-Mutter sich um den Hals des Kindes zuschliesſet, welches bey Geburten gar æffters geschiehet.*) Ita ex duplici causa foetus, capite exclusus, & qui semel respiravit, pulmonesque aere replevit, suffocatur in partu, ante exclusionem totius corporis.

Foetus vivus interdum excluditur, antequam vero respiravit & aerem in pulmones recepit, a matre malitiosa, vel adstantibus, statim interficitur. Hinc ejus pulmones in aqua fundum petunt. Cl. BEYERVS hoc quoque admittere non vult. Arbitratur enim, quod infans illaſis involucris in partu, nasci non possit. Inquit ideo *ibes. 29. p. 60. l. c.* denique, ut infans. *lymphæ innatans, illaſis involueris nascatur, impossibile est; iis vero ruptis, licet caput adhuc*

circumdant, partum non respirasse, nemo affirmare audebit, qui vim aeris, undique irruentis, perpendit.

Sed respondemus ad hocce dubium. 1) Quod infans nascatur illæsis involueris, in specie amnio, nullo modo impossibile esse, videtur. Contingit potius toto fere die non tantum in partu brutorum. ubi fere omnia animalia, tunicis & secundinis circumdata, excluduntur, sed & in ipso humano. Ideo Medici huncce partum perfecte naturalem vocant, quia, dum infans excluditur illæsis integumentis, & illæso inprimis amnio, excluditur, ut ovum. 2) Sæpissime contingit, infantem in laboribus partus debilitatum, & ita lipothymicum redditum, post partum se habere, ad aliquot momenta, ut mortuum. Hinc neque respirat, neque ullum indicium fere vitæ in eodem deprehenditur. Medici ideo & obstetrices tot commendant remedia, quæ excitantia sunt, & ejusmodi partum in vitam revocant, quo pertinent irritationes ani & pudendorum, inflationes aeris per os, frictiones factæ aqua Anhaltina, cinamoni, liliorum, convallium cum vino, balsamo embryonum, &c. Ex his, jam dictis, apparet, quod circumspicte sit procedendum, quando de infanticidio judicium est ferendum. De hac materia, tam ardua, tamque difficultatum plena, legi meretur ulterius *Celeb. ZELLERI Dissert. M. L. cujus titulus est: Infanticidas non absolvit, nec a tortura liberat pulmonum in aqua subsidentia; BOHNIVS de Offic. medici, part. 2. cap. de renunc. difficultatibus; it. hujus Cl. auctoris tract. de R. V. L. in appendice novæ editionis Dissert. de Infanticidio.*

Examinantur denique pulmones ex hac ratione, an nempe per suffocationem extinctus sit infans? in quo casu aspera arteria sero, & mucro spumoso repleta deprehenditur, pulmones etiam livent, ob stagnantem in pulmonibus sanguinem, facies & collum in suffocatis omnibus

bus quoque tumet, cum aliquo colore fusco. Quando vero per vinculum strangulatio facta fuit, linea rubra in collo conspicitur.

Modi vero suffocationis varii sunt. 1) Per compressionem oris & narium. 2) Per repletionem oris & narium, quavis materia facta, v. g. lintheaminibus, cinere, &c. 3) Facile suffocatur infans, quando sub integumentis crassioribus detinetur. 4) Quando infans a partu in faciem conversus ita per tempus relinquitur, (*wenn das Kind auf das Gesicht geleet wird.*) 5) Suffocatur infans per compressionem asperæ arteriæ in parte antica colli, quæ compressio multiplici modo, immo interdum casu, fieri potest.

Tandem caput aperiendum. Nam ibi quoque varia signa violentiæ externæ in oculos incurrunt. Omnis enim latio capitis in infantibus, recens natis, plerumque funesta est & lethalis. Talis latio fieri potest, 1) quando caput infantis in partu ab ossibus pubis matris comprimitur. 2) Leditur infans ab obstetrice interdum, quando nempe illa, vi quadam, ossa temporum luxat & comprimit. 3) Maliciose comprimitur fontanella infantum, vel acu perforatur, a quibus violentiis tamen semper oriuntur vertigia, stigmata, & sugillatio, sanguinisque profusio, vel circa meninges, vel etiam in ipso cerebro. 4) Tandem interire debet infans, si non statim a placenta uterina liberatur. Nam sanguis, qui per vasa umbilicalia a matre ad foetum movetur, refrigeratur, vitalitatem suam deponit, & calorem naturalem, hincque coagulatur, & ad circulationem minus aptus redditur, a quo vitio varia symptomata, inprimis vero lipothymia & syncope infantis oritur.

Denique interire debet infans, quando convenienti modo non fovetur & reficitur. Foetus enim atmosphæram intrat, hincque ex loco calido in frigidum. Ideo aeris libe-

rioris injurias perferre non potest. Oritur sic horripilatio, sanguisque coagulatio, unde circulatio sanguinis cessat, & infans ex frigore moritur.

CAP. XXV. DE TORTURA ET POENIS CORPORIS AFFLICTIVIS.

I. Qu. Quid sit tortura? quid poena?

Tortura Germ. *die Marter*, oder *peinliche Frage*, est actus, quo reus de crimine commissio interrogatur, & pro qualitate delicti & indiciorum, ad confitendam veritatem, certis tormentorum generibus a carnifice cruciatur. Hæc definitio indicat, quod sit cruciatus & dolor, vel corporis, vel animi, ab extra illatus, vel verbis, vel instrumentis. Si enim terrore verbalis instituitur, nullus corporis dolor excitatur, veruntamen animus rei afficitur & angitur.

Pœna criminalis est malum triste, corpus dolore afficiens, a iudice reo impositum, satisfactionis ergo, pro delicto commissio præstandæ.

Hic non movebimus quæstionem, an tortura ad veritatem extorquendam modus sit legitimus, & an tortura sit contra jus naturale, divinum & civile. De eo enim disputant Philosophi, Theologi & Juri. Vid. Diss. Illustr. THOMAS. *de Tortura ex foris Christianorum proscribenda*. Nam docet quotidiana experientia, multos, etiam, qui gravissimos sub quæstione sustinuerunt cruciatus, non tamen falsos esse id, cujus gratia in jus fuerunt tracti, & contra
alios,

alios, vel ex impatientia & animi imbecillitate, atque horrore tormentorum, confessos esse ea crimina, quæ nunquam perpetrarunt, qualia exempla reperiuntur passim apud scriptores. Verum cum hactenus alius modus veritatem extorquendi non fuerit inventus in hanc usque diem quæstione tali inquisiti exercentur. Tortura interim semper ita instituenda, ut salvi & illæsi permaneant inquisiti, & ne vel in morborum, vel mortis pericula incidant, disponentibus sic legibustit. ff. de quæstionibus, & C. C. C. V. art. 59. Hoc observarunt, inter alios Dn. Scabini Lipsenses, in inquisitione, contra nonnullos fures famulos, ob furtum, in ædibus Beichlingianis Dresdæ commissum, in responsione, quæ exstat in illustr. WILDVOGEL nostri Dissertat. de arbitrio judicis circa torturam. p. 22. cujus verba ita sese habent: Daraus so viel zu befinden, daß bey Vollstreckung der zu erkannten Tortur, in Ansehung der starken, wider sie streitenden, Indicien, und ihrer Hartnäckigkeit, auch anderer mit einlauffenden Umstände, die Bünde über den Ellenbogen, jedoch mit solcher Behutsamkeit, daß ihnen daraus an ihrem Leben und Gesundheit kein Schade entstehet, wohl zu gebrauchen, und sie auf solche Masse an denen Armen oben herunter zu schnüren. Plura ejusmodi responsa cum cautelis prostant in CARPZO V. Pr. criminal. part. 3. Qu. 27. & seqq.

2. Qu. Quot sint genera tormentorum?

Dantur varia tormentorum genera, immo & varii gradus, qui vero omnes semper ita applicantur, ne reus, ad tormenta damnatus, sub tormentis, vel injuste, vel intempestive, pereat.

Genera torturarum non tantum CARPZ. l. c. pertractat, sed & KEISER, Pr. criminali. Cap. 9. ZANGERS, Tractat. de Tortura, BRUNNEMANN. in Pro-

cessu inquisitionis; DAMHOVDER, in Processu criminali; aliique. Hi duo genera tormentorum statuunt. Primum Genus est territio, alterum ipsa tortura.

Tertio iterum duplex est: Verbalis & realis. Illa fit per carnificem, qui verbis & gestibus severioribus, ad torquendum compositis, irruit in inquisitum, non aliter, ac si ipsum deprehendere & torquere velit, absque tamen apprehensione & tactu, (*daß bloße Vorstellen des Scharfrichters,*) quæ territio a Scabinis hisce verbis indicari solet: *Daß ihr wohl befugt, Inquisitenden Scharfrichter vorzustellen, und durch denselben, als wolte und solte er ihn angreifen, jedoch unangegriffen, befragen lassen.*

Hæc autem, seu realis est, quando carnifex præter minas, manus quoque injicit, reum vestibus denudat, ad scalam ducit, instrumentis, quibus peragitur tortura, in conspectum ipsius ponit, forcipes digitorum affigit, (*Daumen-Stöcke, Daumen-Schrauben, sive forcipes, quibus pollices comprimuntur, uno verbo polletra*) & iisdem pollices inquisiti comprimit, quæ territio hisce verbis dictari solet: *Daß man wohl befugt, Inquisiten dem Scharfrichter auf diese Masse zu übergeben, daß er ihn mag ausziehen, entblößen, zur Leiter führen, die zur Peinlichkeit gehörigen Instrumenta vorzeigen, die Daumen-Stöcke anlegen, und damit zuschrauben, jedoch daß er bey dem, was ict gedacht verbleibe.*

Alterum genus est ipsa tortura. Hujus tres sunt gradus, & primus quidem, quando non tantum forcipes manibus rei affiguntur, ac pollices comprimuntur, sed etiam adhibitis funiculis junctura manum arcissime usque ad ossa constringuntur, (*Vid. CARPZ. l. c. Qu. 117. n. 60.*) quem gradum Collegia juridica hisce formalibus dictare solent, *Daß, wenn Inquisit sein Bekantniß in Güte richtig nicht thun will, ihr wohl befugt, ihn dem Scharfrichter auf diese Masse, zu übergeben, daß er ihn mag ausziehen, entblößen,*

entblößen, zur Leiter führen, die zur Peinlichkeit gehörigem Instrumenta vorzeigen, die Daumen-Stöcke anlegen, und damit zuschrauben, auch, da dieses nicht fruchtet, mit den Banden zuschnüren.

Secundus gradus dicitur, quando rei non tantum polletro, & funiculis, sed præterea etiam instrumentis ferreis, per intervalla excavatis, circa tibias applicatis, cruciantur, scalæ imponuntur, & violenta quadam expansione, seu extensione membrorum & articularum, affliguntur, (*wenn Inquisit auf der Leiter gezogen oder gefoltert wird,*) qui gradus a Dicafteriis Saxonice his verbis pronunciatur: *Dass man wohl befugt, den Inquisiten mit der Se^rarffe ziemlich^r massen anzugreifen, und befragen zu lassen.* Vid. CARPZ l. c. Hic non obliviſci debemus novi instrumenti, ante paucos annos adhiberi soliti, collare dicti, quando rei collo instrumentum ferreum, cuspidibus obtusis asperum, circumligatur, & mediante illo, per funes, ex trochlea pendentibus, in altum ille tollitur, & iterum dimittitur.

Tertius & summus gradus est, quando carnifex, ultra jam dicta & enarrata tormentorum genera, severioribus cruciatibus utitur, & vel caudentibus instrumentis, vel sulphure & igne, cutem in certis corporis partibus adurit, aut extremas digitorum partes, immisſis infra ungues pineis euneolis, iisque postmodum accensis, adustione lædit, & quæ plura a ZANGERO & CARPZ. enarrantur, qui ultimus gradus an licitus sit, judicent alii.

3. Qu. Quenam sint subiecta tortura?

Cum tortura, uti ex jam dictis apparet, sit res periculosa; ideo, non omnes personas omnia tormentorum genera perferre posse, per se clarum est. Hinc judicis officium exposcit, ut persona, tormentis subijcienda, & physice

&

& moraliter consideretur. Vid. WILDVOGEL. *Dissert. cit. cap. 7.* Quanam vero personarum conditiones morales sint, exposuit TABOR, in *Tract. de Tortura.* Et CARPZ. *l. c.* universalem ponit regulam, quod nempe omnes tormentis subijci possint, nisi qui specialiter, vel ob defectum iudicii, vel corporis debilitatem, aut etiam dignitatem, reperiuntur exempti. Nos Jurisconsultis relinquimus conditiones morales atque politicas personarum. Quales vero personarum, propter defectum iudicii, & corporis imbecillitatem, a tormentis sint exemptae, in praesenti examinabimus.

Absolute a tortura, si non omnimode, tamen ad certum tempus, liberantur 1) *gravidae.* Hac enim de re expressa lex reperitur *leg. 3. ff. de penis.* Ratio tam a foetus quam matris parte est petenda. Foetui enim, qui adhuc in ventre est, non nocere debet calamitas matris. Maximum autem detrimentum ei imminere, si mater torqueatur, obscurum esse non potest illi, qui considerat, quod foetus per vasa umbilicalia, atq; placentae cum utero matris cohaereat, atque per ea nutrimentum suum capiat. Quod si igitur mater in scala pendere cogeretur, aut funibus, hinc, illinc, cum impetu, traheretur, vincula illa facile lacerarentur, sicque embryo suo privaretur nutrimento. Ergo ad abortum necessario foetus promovetur. Talis tortura neque ultimis mensibus, neque primis diebus post conceptionem permittenda. Ultimis mensibus fieri non potest, ob molem foetus, qui facile a levi & extraordinario motu matris laeditur, teste experientia. Nec primis mensibus hac tortura locum invenit. Si enim famula illa, de qua HIPPOCR. *de Lib. de Natura puerorum,* loquitur, septimo a conceptu die abortum promoveri potuit per saltum, multo magis per motus tormentorum hoc fieri potest. CARPZ. quidem putat, quod primis mensibus gravida torqueri possit, ex hac debili ratione, quia foetus in tali gravida nondum animatus sit. Ast 1) ille aequè peccat, qui nascentem deturbat animam, quam ille, qui
jam

jam natam ejicit. Insuper ex antecedentibus jam notum est, quod omnes Medici recentiores, statim post imprægnationem animam foetus accedere, statuunt. Sequitur ideo, quod nec territio verbalis in gravidis locum inveniat. Nam terror omni tempore abortum promoverè potest. Quando autem abortus fit, non tantum foetus perit, sed & mater in pericula mortis, vel gravissimorum morborum, incidere potest, quæ vel ab hæmorrhagia, vel inflammatione, & subsequente uteri exulceratione, dependent.

A tortura immunes sunt 2.) *Puerperæ*. Et quamvis L. quæritur §. 2. ff. de ædilitio edicto, sanæ & integræ valetudinis pronunciantur; misera tamen semper earum est conditio, teste ipsa Sacra Scriptura. Debiles enim sunt propter gestationis molestias, debiles sunt propter sanguinis fluxum, quem Medici lochia vocant. Hinc, quam diu sanguinis fluxus durat, disponuntur per se ad febres, purpuram, hæmorrhagias uteri, inflammationes. Et quod terror puerperas insigniter lædere possit, quotidiana ostendit experientia. Ab Jctis quadraginta dies quidem assignantur, intra quos puerperas torqueri prohibetur; at & hic terminus non semper sufficit ad restituendum uteri statum naturalem, immo offium in nominatorum conniventiam, nihil dicam de morbis, a partu, inprimis difficili, interdum accersitis, qui in longa satis temporis spatia interdum perdurant.

3.) *Lactantes* quoque a tortura liberantur. Nam 1.) infans læditur, quoniam debitum nutrimentum nec in convenienti quantitate, nec qualitate, capere potest. 2.) Fœmina ipsa enormiter læditur, partim quia facile a violenta super scalis extensione vasa mammaria dilacerantur, partim quoniam hæmorrhagia uteri facile de novo excitatur, partim quia in epilepsiam, & alia gravissima symptomata, hisce subjectis communia, incidere possunt. 3.) Hactenus

nus in criminalibus usu receptum fuit, quod non tor-
queantur homines, nisi jejuno ventriculo. Lactantes vero
diu jejunia perferre nequeunt. Quando itaque, secundum
JCTOS, impastæ personæ tantum sunt torquendæ, lactan-
tes quoque ex hoc capite torturam perferre non possunt.
Nam abstinencia a potu & cibo in iis facile lipo-hymiam
præstat. Cum vero cibis nutritæ personæ ad torturam du-
cuntur, in illa quasi suffocantur, vel vomitus, & exeretio-
nes alvi, ad minimum hunc actum solennem dehonestare
possunt. 4) Nec ipsa territio in lactantibus locum inve-
nit. A terrore enim nervi, & vasa omnia, crispantur, & con-
velluntur, lacque in mammis coagulatur. Oriuntur inde
nodi mammarum, tumores inflammatorii, immo plane
cancrosæ exulcerationes, quæ cum horrendis ac lethalibus
conjunguntur symptomatibus. Porro lac a terrore in viru-
lentum sane liquorem commutatur, qui, ab infante hau-
sus, epilepsiæ auctor esse potest. Errant ideo C A R P Z. &
BRVNNEMANN, qui levius lactantes torqueri posse arbi-
trantur, modo scilicet hac ratione alumno nihil nutritimen-
ti decedat, quod per naturam tamen est impossibile.

4) Nec *menstruantes*, sive illæ, quæ fluxu mensium
laborant, facile torturæ subjiciuntur. Nam 1.) a levissimo
dolore, terrore, aliove corporis affectu, facile fluxus irre-
gularis contingit, sicut etiam mensium suppressio, quæ de-
finit postea vel in chlorosin, vel hydropem, vel phthisin,
aliave mortifera symptomata. 2.) Quando torquentur,
facillime vasa uteri, sanguine turgida, ab extensione illa
violenta dilacerantur, & sic in hæmorrhagiam lethalem
incidere possunt.

5.) Immunes sunt a tortura *infantes*, consentientibus
legibus ff. de *questionibus*, in primis quoniam perfectæ co-
gnitionis & judicii haud sunt capaces, nec intelligunt id,
quod agunt, immo constitutio ipsa, sive robur corporis, in
hisce

hiscæ subjectis torturam non admittit. Membra enim non sunt satis solida. Hinc ossa, ligamenta, vasa sanguifera nervi & tendines facile in his subjectis læduntur, a quibus læsionibus mortifera interdum producuntur symptomata.

6.) Quoque immunes sunt *decrepiti*, secundum legem *si quis in gravi, §. ignoscitur ff. ad S. C. Syll.* Senes enim sunt bis pueri, physice & medice, ideo quoque moraliter ac juridice. Corporis namque vires non tantum deficient, unde inclinant ad lipothymias, sed & insuper corpus possident aridum, unde ossa, ligamenta, tendines, & vasa in tortura facile franguntur. Ne quidem terrore in iis facile locum invenit, quia, ob debilitatem spirituum, facile incidunt in apoplexiam. Et, quod maximum, vigor mentis & iudicii in senili ætate imminuitur. Hinc ab ipsis legibus infantibus & furiosis æquiparantur.

7.) Neque si sunt torquendi, in quibus mens ægrotat, quales sunt *stolidi, stupidi, amentes, melancholici, maniaci*, quoniam in illis iudicium & intellectus deficit.

8.) Huc pertinent *muti, surdi*. Hi enim fatuis annumerantur, quia auditus mentis porta est, per quam ipse intellectus instruitur. Nec ex mutis confessionem veram iudex extorquere potest. In primis vero muti, a nativitate tales, ut plurimum sensu auditus destituuntur.

9.) *Valetudinarii, re vera tales*, neque terrorem, neque ipsam torturam, sine notabili morbi exacerbatione, perferre possunt. Tales sunt *apoplectici, epileptici, phthisici, hydropici*, ad *hemorrhagiam & hamoptysin* dispositi. Hi itaque omnes ab omni torturæ genere excipiuntur.

C. C. C. V. art. 59. expresse monet, ut rei valetudo, & naturæ debilitas, vel infirmitas, semper in quæstione criminalia iudice observetur. Hinc inquisiti, pro diversæ sanitatis conditione excipiuntur etiam a certis torturæ

gradibus atque speciebus. 1.) Speciatim torturam scalar perferre non possunt illi, qui *proximi* sunt *annis* *pubertatis*, item, qui *in senili aetate constituti* sunt. Nam, propter, ligamentorum, tendinum, & ossium imbecillitatem, ejusmodi validam membrorum extensionem, sine enormi injuria sanitatis perferre non possunt. Et in genere in omni torturæ gradu ejusmodi subjecta mitius tractantur.

2.) A polletris liberantur illi, qui *paronychia*, sive tumore enormi digitorum inflammatorio afficiuntur. Si enim horum pollices comprimuntur, non tantum inflammatio augetur, sed & gangraena, sphacelus, immo caries ossium ita accelerantur.

3.) Quæstio oritur, an illi, qui *chiragra* laborant, funiculis & polletris sint torquendi; item, an *arthritici* sint tortura scalar afficiendi; Alii enim hic affirmantem, alii contra negantem amplectuntur sententiam. Affirmativa placeat GVIL. FABRIC. HILDANO, cent. 1. obs. 79. qui refert, plurimos per torturam ab arthritide & podagra liberatos fuisse. Nos vero, cum celeberrimo AMMANNO, in *Med. Crit.* p. 159. torturam pro remedio medico non asstimamus, nec podagricis torturam commendamus, potius affirmamus, quod cum podagra ipsa sit tortura, ergo afflicto non sit addenda afflictio. CARDILVC. in *Officin. sanitatis*, cap. 161. egregiam de hoc morbo sistit observationem: Deus, inquit, articulari morbo flagellat ignavos, luxuriosos, & castigat voluptuosos, tradens plerosque invisibili torturæ, sive carnifici, nimirum podagræ, cujus tormentis, etiam in mollissimis lectis, subjiciuntur, ut vix a corporeo carnifice pejus torqueri possint; ipsi tamen tam stupidi sunt, ut neque advertant, neque delicta sua, uti alias in tortura convenit, confiteantur. Ab equuleo dimissi in pristina vitæ instituto pergunt, prætereaque itidem ad torturam rursus rapiuntur, donec tandem

dem in iisdem intereant. Utinam hocce monitum no-
tent & observent omnes illi, qui libidinofam exercent
juventutem. Arthritici itaque cum inflammationibus
articulorum sint expositi, merito a tortura funiculorum
& scalæ immunes manere debent, quoniam alias in ma-
jora inflammationum pericula incidere possunt.

4.) A tortura scalæ excipiuntur, qui *brachiorum fra-*
cturam, vulnera, & ulcera passi sunt, quo pertinent illi,
qui *fonticulos* gestant. Dilacerantur enim ita brachia in-
primis, si illa ab ulceribus antiquis, vel longo fonticulo-
rum usu, sint emaciata. Vid. ZACCH. L. 6. tit. 2. Qu. IV.
Porro si fractura ossium laboraverunt, illa denuo facile
franguntur, dum callus perfectam soliditatem osseam vix
acquisivit. His annumerantur illi merito, qui in tibiis
ulcera inveterata scorbutica, venerea, gummata gallica,
tophos, tumoresve alios fungosos gerunt. Hi a compe-
dibus merito liberantur. Item illi, quorum pedes ab *ce-*
demate tument, favente C. C. jam citata.

5.) A scalæ tormentis excipiuntur illi quibus *caput*
constanter dolet. Cum enim cephalalgia, & cephalæ af-
flicti vix ambulare audeant, ob augmenta dolorum,
multo magis tale quid expectandum, si concutiantur in
tortura. His annumerantur merito *vertiginosi*, qui sub
tormentis facile in apoplexiam incidunt, cum prodromus
apoplexiæ vertigo esse soleat, item *epileptici*, secundum
CARPZ. Pr. C. part. 3. qu. 18. Si enim vera epilepsia
adeft, a tortura liberantur, & extraordinarie puniuntur;
vel si incidunt, durante tortura, in epilepsiam, statim a
tortura remittuntur. Hinc Dn. Scabini Lipsienses, in
Dissertat. WILDVOGEL, citata, p. 43. in hoc casu ita
respondebant: *Im Fall aber, bey der Execution dieses Ur-*
thels, Inquisiten die Schuvere Noth anuvandelte, ist so
fort damit einzuhalten.

6.) A tortura scalæ excipiuntur illi, qui morbo pecto-

ris laborant, v. g. *phthisi*, *asthmate*, *dyspnoea*, *vomica*, *tussi inveterata*, dispositi item ad *hemoptysin*, *cordisque palpitaciones*. Hi enim facile incidunt in suffocationem, vel momentaneum mortis periculum. Nam organa, jam lasa, a forti extensione & quassatione facillime dilacerantur, empyemata, sanguinis excretiones, inflammationes & suffocationes producantur.

7.) *Debiles*, & ad *lipothymias* dispositi, facile a tortura scalæ in syncopen incidunt; *gibbosi* in suffocationem; *hydropici* in mortis pericula. Ideo tortura scalæ non subjiciuntur. Huc pertinent suo modo *obesi*, ob metum suffocationis.

8.) *Herniosi*, sive sit hernia scrotalis, sive inguinalis, sive umbilicalis, quando in scala torquentur, non tantum in vomitum incidunt, sed & strangulationem. Hernia enim incarcerata producit, quæ *Miserere mei*, sive *ileum*, post se relinquit.

9.) *Collarii*, sic dicti, cruciatus perferre non possunt, absque vitæ & sanitatis injuria, illi, qui *angina* laborant, aut quorum *tonsillae* atque *perotides glandulae* inflammatae existunt, vel suppuratae; quo pertinent & illi, qui *strumas* & *scrophulas* in gutture gerunt. Periculum enim est, ne inflammationes augeantur, vel de novo accedant, aut respiratio turbetur, aut suffocatio inducatur.

4. Qu. Quid statuendum de corporis poenis afflictivis?

Nulla infimitas quidem ab ultimo supplicio reos immunes reddit; interim tamen interdum occurrunt conditiones personarum, quæ a iudice non sunt negligendæ.

Excipiuntur hinc ab ultimo supplicio 1) *juniores*, qui scilicet intra impubertatis annos sunt constituti. *L. fere in omnibus ff. de regulis juris. L. infans ff. ad leg. Corn. de sicar.*

ficar. Quia enim delictum ex iudicio & animo dolo delinquentis aestimatur; iuniores autem perfectum iudicium non possident: Ideo mitius puniuntur, nisi malitia suppleat aetatem, secundum C. C. art. 164.

2) *Decrepiti*, quoniam mentis alienationem conjunctam habent, etiam mitius puniuntur. L. 7. §. 3. ff. ad S. C. Silan. Quo pertinent *furiosi, maniati & melancholici*; L. *Infans*. ff. act leg. Cornel. In maleficiis enim voluntas spectatur, non exitus. Illa autem in allegatis personis recte dirigi nequit; non dicam, quod furore perciri, suo furore satis puniantur L. 14. ff. de offic. praesulis. CARPZ. P. C. part. 3. Qu. 145. quidem arbitratur, quod, si furiosi eo tempore crimina committant, quando adsunt eorum lucida intervalla, tunc participes hujus privilegii fieri nequeant. Sed quid de lucidis intervallis furiosorum sit statuendum, videbis in Illustr. THOMAS. Diss. alibi citata, *Præsumptione furoris atque dementiae*.

3) Ab ultimo supplicio ad tempus excipiuntur *prægnantes* secundum leges ff. de poenis. L. ff. *prægnans* ff. de statu hominum, ne scilicet innocens partus, cum matre, pereat; item *puerperæ*, quæ, secundum usum modernum, non nisi exactis sex septimanis puniuntur.

4) Poenis corporis afflictivis mitius puniuntur *pueri*, *pubertati non proximi*, ob teneram corporis structuram; item *senes* debiliores atque *decrepiti*. Nam possunt ita interire, quoniam possident nervos debiles, ac corpus exsangue. Similis causa militat pro *invalidis*, atque ex morbo debilibus. Aut enim morbi sopiti denuo excitantur, aut præsentibus majora capiunt incrementa. In specie autem ab amputatione narium excipiuntur illi, qui *ozæna*, aliove ulcere narium, laborant. Hoc applicari debet quoque ad illos, in quibus, propter crimina militaria, amputatio aurium est suscipienda. Quando enim *strumis*, *scrophulis*, *parotidibus*, aut ulcere quodam, afficiuntur, tunc hæc mala facile

facile exacerbantur. Denique, qui ex affectu articulorum agrotant, amputationem manuum, absque vitæ periculo, sustinere vix possunt.

Ad poenas corporis afflictivas referri denique potest *exilium, relegatio, & carcer*. Inter exilium & relegationem statuitur differentia, quod exules libertatem habeant, sese vel ad hanc, vel ad aliam regionem convertendi, relegati autem obstringantur, permanere in certa tantummodo regione. Si itaque relegati aerem in illa regione perferre non possint, & in morbos incidant, tunc locus relegationis merito mutatur, monente ZACCHIA, *lib. 6. tit. 2. qu. 8*. Carcerem quod concernit, ille ad reos vel detinendos, vel puniendos, plerumque adhibetur. Quando autem in carcere aer peccat pravitate effluviorum, vel humiditate, vel frigiditate nimia, tunc merito mutatur, monente CARPZ, *part. 3. qu. 130*. Iudices, inquit, caveant, ne miseros reos detrudant in carceres horribiles atque immundos, id quod absque vitæ detrimento vix fieri potest; Nam per id interdum ansam præbent delinquenti, delictum majus in se ipsum perpetrandi.

S. D. L. & G.

INDEX

INDEX CAPITVM.

Praefatio.

Cap. I. de aetatum divisione.

Cap. II. de Primogenitis.

Cap. III. de necessaria foetus ex utero matris, in partu mortuae, exsectione.

Cap. IV. de virginitate.

Cap. V. de impraegnatione occulta.

Cap. VI. de impraegnatione affectata & simulata.

Cap. VII. de partu supposito, natorum item similitudine & dissimilitudine.

Cap. VIII. de tempore animationis foetus.

Cap. IX. de partu perfecto & legitimo.

Cap. X. de abortu.

Cap. XI. de superfoetatione.

Cap. XII. de mola.

Cap. XIII. de monstris.

Cap. XIV. de hermaphroditis.

Cap. XV. de impotentia conjugali, imprimis in sexu virili.

Cap. XVI. de impedimentis coeundi & generandi ex parte mulieris.

Cap. XVII. de morbis fictis, sive simulatis.

Cap. XVIII. de morbis dissimulatis, sive celatis.

Cap. XIX. de peste.

Cap. XX. de venenis & veneficiis.

Cap. XXI. de necessaria cadaverum inspectione.

Cap. XXII. de vulnerum lethalitate.

Cap. XXIII. de lethalitate vulnerum singulorum organorum corporis humani.

Cap. XXIV. de infanticidio.

Cap. XXV. de tortura, & poenis afflictivis.

INDEX RERVM.

Abdominis in puerperis rugositas unde? 67. viscera quam sint? 200

Abortum promoventia remedia quae sint, & quomodo agant? 70 provocandi modi quomodo distinguantur? 73 ultimis gestationis mensibus factum, quae consequantur symptomata? 70. 71

Abortus an provocandus, ut mater gravida a magno morbo morte-

que liberetur? 71. 72. 73. primis gestationis mensibus factus, cur difficulter cognoscatur? 69. 70 promoti poena cur, secundum Jctos, levior, quam foetus animati expulsi? 47 qualis? 46 promotos cur homicidium? 47 quid? 52. 65. 66.

Achores in quibus subjectis contingant? 148 quid? 147 unde oriuntur? ibid.

Kk

Ado-

INDEX RERVM.

- Adolescentem** quo in casu fidiculis subicere liceat? 1
- Aegilops** quid? 152
- Aer** quomodo pestis tempore purificandus? 158. 159
- Aeris** inquinatio unde? 158 putrefactio in quibus locis contingat? ibid. unde? ibid.
- de Aetatibus** quæ apud Juris peritos in controversiam vocentur? 1 quare in Medicina Legali tractandum sit? 1. 2
- Aetatis** decrepitæ termini. 10 virilis synonymum. 7
- Aetas** decrepita quid sit? 10 quid sit? 2 virilis quid sit? 7
- Aetatum** cognitio cur JCtis sit necessaria? 1 divisio. 1. 2. 3 limites quomodo apud JCtos determinentur? 2. 3 quomodo determinari debeant? ibid.
- Alopecia** quid? 147
- Amentes** cur a tortura exempti? 251
- ab Amputatione** aurium quinam exempti? 255. 256 narium quinam exempti? 255
- Angina** laborantes cur a tortura collarii exempti? 254
- Anima** quid? 47. 48
- de Animæ** cum corpore conjunctione sententiæ variorum 49. sententia auctoris 50
- Animæ** præsentia, vel absentia, ex quo concludi possit? 86. sedes 48. 86. 94. 95 cur non sit glandula pinealis? 48
- Animalia**, venenosis cibis nutrita, an sint venena? 172. 173
- Antimonium** an sit venenum, & quidni? 67
- Aphthæ** venereæ quid? 152
- Apoplectici** cur a tortura exempti? 251
- Apoplexiæ** cognatum. 139 remedia 140 signa. 139
- Aquæ** mulsæ propinatio cur sit signum fallax imprægnantiæ? 39
- Arctitudo** foeminæ an conjugium dissolvat? 129 an sanabilis? ib. quomodo a clausura differat? 129 130
- Area** quid? 147
- Arsenici** synonymia. 166
- Arsenicum** flavum quomodo paratur? ib. quid? ib. quomodo fiat? ib. rubrum quomodo paratur? ib.
- Arteriarum** carotidum vulnera an sint lethalia? 209. 210 cervicalium vulnera cur non sint lethalia? 209 vulnera, in parte inaccessibili contingentia, cur sint absolute lethalia? 192
- Arteriæ** asperæ vulnera an sint lethalia? 210 hepaticæ vulnera cur sint lethalia? 22
- Arthritici** cur a tortura funiculorum & scalæ exempti? 252. 253
- Artuum** vulnera an sint lethalia? 231. 232
- Asperæ** arteriæ vulnera an sint lethalia? 210
- Asthmate** laborantes cur a tortura scalæ exempti? 253. 254
- Auripigmentum** quid? 166 unde afferatur? ib.

ab Aurium amputatione quinam
exempti? 255. 256

Balnea cur pestis tempore vitan-
da? 160

Baptismus an hermaphrodito confe-
rendus, & cur? 108 an molæ con-
ferendus? 84 an monstro confe-
rendus? 86. 95 hermaphroditi ma-
sculi, pro foemina baptizati, & v.v.
an reiterandus sit, & quidni? 108

in Brachiis fonticulos gestantes cur
a tortura scalæ exempti? 253

Brachiorum fracturam, ulcera, vul-
nera passi cur a tortura scalæ ex-
empti? 253

Bruta an nasci possint ex hominibus?
87. 88

Bubo venereus quid? 150 quotu-
plex? ib.

Bubonum sedes. 157

Cachexia quomodo simuletur?
135 simulata quomodo cogno-
scatur? ib.

Cadaveris occisi inspectio an sit ne-
cessaria & cur? 177 telo lethife-
ro subito occisi, sectio an sit ne-
cessaria, & cur? 178. 179

Cancer quomodo simuletur? 134

Capillorum defluvium in quibus mor-
bis & subjectis contingat? 147

Capitis contusiones graviores cur sint
lethales? 106 dolore constante af-
fecti cur a tortura scalæ exempti?
253 dolores quibus symptomati-
cus concomitentur? 137 foetus
læso quibus modis fieri possit?

243 vulnera. Vide vulnera capi-
tis. Vulnerum effectus. 197

Carbunculi quid? 157

Carcer quando mutandus? 256

Carceris finis quotuplex? ib.

Caruncula urethræ unde oriatur? 150

Castrati an a matrimonio arcendi, &
cur? 123 an a muneribus ecclesia-
sticis arcendi, & cur? 123. 124 an
cum foeminis coire possint, & cur?
123 an semen effundere possint,
& quidni? 123 ex quo signo cogno-
scantur? 127 qui dicantur? 121

Castratio quotuplex? ib.

Caudicum nervorum, summitati hu-
meri & femori implantatorum,
vulnera an sint lethalia? 208. 209

Cercosis quid? 98

Cerebri vulnera an sint lethalia?
204. 205

Chiragra laborantes cur a tortura
funiculorum & polletrorum ex-
empti? 252

Ciborum fastidium cur sit signum
fallax imprægnantiæ? 37

Clausura foeminæ quomodo ab ar-
ctitudine differat? 129

Clitoridis structura. 98

Cobalthi officinarum synonymia 166

Cobalthum officinarum quid? 165
unde afferatur. 166

Coemeteria cur extra urbes esse de-
beant? 158

Coitus cur tempore pestis vitandus?
160 impedimenta ex parte foemi-
narum 127

- a Collarii tortura quinam exempti? 254
 Conceptionis consequentia. 74. 75
 Conceptus posterius an prius nasci possit, & cur? II secundi cur raro sint vitales? 77
 in Concubitu primo cur foemina sanguinem profundat? 25
 Concubitus foeminae primus cur dolorosus? ib.
 Conjugii finis. 110
 Conjugium quoto anno ineundum? 33
 Contagium in quo consistat? 144 quid? 143 quomodo corporis humani partes destruat? ibid.
 Contagium quomodo cum altero communicetur? ib.
 Contusiones capitis graviores cur sint lethales? 106 circa laryngem, cartilaginem thyroidaeam & arytenoideas an sint lethales? 210. 211
 fortes spinalis medullae & thoracis cur sint lethales? 107 testium an sint lethales? 230. 231
 Contusionum testium remedium ib.
 ad Cordis palpitaciones dispositi cur a tortura scalae exempti? 254
 Cordis vulnera cur sint lethalia? 213. 214. 215
 Costarum fracturae an sint lethales? 213
 Cranii fractura major cur sit minus periculosa? 203 vulnera cur non sint lethalia? 201
 Crypsorchis an ad generationem aptus? 126 quid? ib.
 Cynanthropia. Vide Rabies canina.
Debiles cur a tortura scalae exempti? 254
 Decrepiti cur a tortura scalae exempti? 251 cur mitius puniantur? ib.
 Delirii chronici signa. 136
 Delirium quotuplex? 135
 Depositionis forma qualis esse debeat? 187. 188
 Deus an sit causa monstrorum? 91. 92
 Diaphragmatis vulnera an sint lethalia? 218. 219
 Dolor fictus quomodo cognoscatur? 137. 138. 139
 Dolore capitis constante affecti cur a tortura scalae exempti? 253
 Dolores partium externarum cur raro fingantur? 137
 Doloris vehementis remedia. 139 symptomata. ib.
 Dolorum capitis symptomata 137 intestinorum symptomata. 138 pectoris symptomata 137 renum symptomata. 138 species. ib. ventriculi & vesicae symptomata. ib.
 Ductus hepatici vulnera an sint lethalia? 226 thoarcici vulnera cur sint lethalia? 218
 Durae matris vulnera. Vide Vulnera durae matris.
 Dysenteria quid? 145
 Dyspnoea laborantes cur a tortura scalae exempti? 253. 254
Ecstasis in quem finem fingatur? 140
 Ectomia. Vide Castrati.

Elephantiasis Arabum. Vide Lepra Græcorum.
 Embryo an respirare possit, & quidni? 19 an vitam ad tempus post mortem matris continuare possit, & cur? 15 cur lædatur tortura, matrem exercente? 248. 249
 Ἐντελέχεια quid? 47
 Ephelides cur sint signum fallax imprægnantiæ? 37
 Epilepsia ficta quomodo cognoscenda? 140
 Epileptici cur a tortura exempti? 251
 Eunuchi cur foeminis accenseantur? 107
 Eunuchus quoruplex? 120
 Excisi. Vide Castrati.
 Exilium quomodo a relegatione differat? 256
 Exsecti. Vide Castrati.
Fascinatio quomodo fiat? 114
 Fastidium ciborum cur sit signum fallax imprægnantiæ? 37
 Febris conciliata quomodo cognoscatur? 134 Hungarica quid? 145 Hungaricæ etymologia, symptomata, synonymia. ibid. quomodo concilietur? 135. 136
 Februm contagiosarum acutarum origo, signa 146
 Fidiculis subicere adolescentem quo in casu liceat? 1
 Filia an in filium mutetur? 108. 109
 Foemina quando menstrua primum patiat? 5
 Foeminae arctitudo. Vide Arctitudo

foeminæ. clausura quomodo ab arctitudine differat? 129 quando concipiendi potentiam accipiant & amittant? 41 quibus ex causis partum supponant? 40 quibus ex causis utero se gerere fingant? ib.
 Foetus, in utero delitescenti, cur noceat tortura, matrem exercente? 248
 Foetus debilitantes causæ quæ? 60. 61. 62. ex utero matris, in partu mortuæ, exsecans Medicus & Chirurgus, nec omnes ceremonias, alias in hac operatione usitatas, observans, an de crimine quodam accusandus sit, & quidni? 19. 20 exclusum fuisse vivum, unde cognoscatur? 234. 235 manu violenta occisum esse, unde cognoscatur? 236. 243
 Foetus animati expulsi poena qualis? 46 animatus quis dicatur? ib. capite exclusus, ex quibus causis mori possit? 241 conveniendi modo non foetus, cur intereat? 243. 244 ex utero matris in partu mortuæ, an exsecandus & cur? 15-19 ex utero matris, in partu mortuæ, exsectio quasnam utilitates præstet? 18 ex utero matris, in partu mortuæ, exsectio quomodo suscipienda? 20 ex utero matris, in partu mortuæ, exsectionem quomodo susceperint veteres? 19 humanus belluino capite instructus, an sit homo? 95 in animatum & non animatum distinctio an admitt-

- mittenda? 46. 47 cur phyſice non admittenda? 47 in animatum & non animatum diſtinctioni quid anſam dederit? ib. in utero deliteſcens, cur lædatur tortura, matrem exercente? 249 in utero matris mortuæ adhuc vivi, ſigna. 15 in utero mortui, ſignum an ſint pulmones ſubmergentes? 239 maturus an ſervandæ matris cauſa occidendus? 71. 72 mortui inſpectio quomodo fieri debeat? 234. 243 mortui partus cur ſit diſficilis? 235 mortui pulmones cur interdum in aqua ſupernatent; 240. 241 motus quando in utero percipi incipiat? 46 non ſtatim a placenta uterina liberatus, cur intereat? 243 partus cur retardetur? II qui excluſis fuit vivus, ex quibus cauſis interdum non reſpiceret? 241. 242 pulmones cur interdum in aqua ſubmergant? 241 pulmones cur ordinariæ in aqua ſupernatent? 238 qui ſeptimum meſem in utero nondum ſuperavit, an exſecandus, & cur? 19 quibus modis capite lædi poſſit? 243 interficiantur? 236 237 ſuffocari poſſit? 243 quomodo in jure dividatur? 46 ſeptimeſtres plurimi cur pereant? 57 ſtrangulati ſignum? 242 ſuffocati ſignum 242. 243
- de Foetus ex utero matris, in partu mortuæ, exſectione an in Corpore
- Juris lex reperiatur, & ubi? 15
- Fōnticulos in brachiis geſtantes cur a tōrtura ſcalæ exemti? 253
- Fractura cranii major cur ſit minus periculofa? 203
- Fracturæ coſtarum an ſint lethales? 213 vertebrarum colli, thoracis, lumborum cum ſpinalis medullæ læſione conjunctæ, cur ſint lethales? 107
- Fracturam brachiorum paſſi cur a tortura ſcalæ exemti? 253
- Furioſi cur mitius puniantur? 255 judicium quomodo ab infantis judicio differat? 9
- G**emelli an ſibi invicem agniti- nem communicent? I quot gaudeant placentis uterinis? ib.
- Gemellorum, ex matris utero exſectorum, uter prior natus præſumendus? 13. 14 ex matris utero exſectorum. is qui primum in Chirurgi manus incidit, quidni prior natus præſumendus? 14 poſterius conceptus an prius naſci poſſit, & cur? II pulchrior quidni in ſtatu dubio prior natus præſumendus? 13 quis in ſtatu dubio prior natus præſumendus? 12
- Gibboſi cur a tortura ſcalæ exemti? 254
- Glandula pinealis cur non ſit ſedes animæ? 48
- Glandularum meſenterii actio. 223 vulnera cur ſint lethalia? ib.
- Gonorrhœa virulenta quid? 149. 150

Gravidæ cur a tortura scalæ exemptæ? 249

mortuæ signa an dentur? 16

Gulæ dissectæ vulnus cur sit lethale? 212

Gummata Gallica quid? 152

Gutta rosacea quid? 148

ad **H**æmoptysin dispositi cur a tortura exempti? 251. 254

Hæmorrhagiæ, ex venis & arteriis subclaviis, mammariisque, item vena αζύγω, vulneratis, dependentes, cur sint lethales? 216

ad Hæmorrhagiam dispositi cur a tortura exempti? 251

Harmonia præstabilita an sit causa monstrorum? 92

Hepatis vasa quænam sint? 225 vulnera. Vide Vulnera hepatis.

Hermaphroditi an sint monstra? 102. 103 etymologia. 100 causæ 100.

101. 102

an Hermaphroditi masculi, pro foemina baptizati, & v. v. baptismus reiterandus sit, & quidni? 108

Hermaphroditis baptizandis an masculinum an foemininum nomen tribuendum? ib.

in Hermaphroditis quomodo sexus prævalentia dignoscenda sit? 103.

104. 105

Hermaphrodito affines personæ. 108

an Hermaphrodito, utroque organo ad generandum perfecte instructo, liceat utroque modo coire? 106

Hermaphroditus an ad matrimoni-

um habilis sit? 105. 106 an baptizandus, & cur? 108 an in foro testari queat, & quidni? 107 an munere publico fungi queat, & quidni? 107. 108 an succedat in feudis, & quidni? 107 foemina describitur. 97 masculus describitur. ib. masculus & foemina simul an detur? 98. 99. 100 quid? 96 quotuplex? 97. 98

Hernia venerea. Vide Tumor testium.

Herniosi cur a tortura scalæ exempti? 254

Homines an nasci possint ex brutis? 87. 88

Hydropici cur a tortura exempti? 251. 254

Hymen an detur? 22. 23 an in omnibus virginibus detur, & quidni? 23 quid? 22

Imaginatio an potentiam seminis effigiemque conceptus mutare valeat? 45 an sit causa monstrorum? 89. 90 quomodo in foetum agat? 90

Impotentia coeundi quid? III generandi quid? ib.

Impotentia conjugalis causæ III seqq. 176

Imprægnantiæ signa an dentur? 34 quæ sint? 35 signum fallax cur sint ephelides? 37 cur sit aquæ mulsæ propinatio? 39 cur sit lac in mammis? 36 cur sit fastidium ciborum? 37 cur sit orificii uteri interni conniventia? 39 cur sit pica? 37

- 37 cur sit suffumigatio aromati-
bus facta? 39 cur sit vomitus ma-
tutinus? 37
- Imprægnationem quibus casibus dif-
fiteantur fœminæ? 33. 34 simu-
lantes, in quibus motus fœtus
nondum apparet, an in custodia
tenendæ? 42
- Imprægnationis simulatæ signa quæ?
41
- Impuberes cur a supplicio ultimo im-
munes? 254. 255 cur a tortura
scalæ axemti? 252 cur mitius pu-
niantur? 255
- Infans cur in juris negotiis furioso
comparetur? 3 cur loqui non cen-
seatur? ib. quis sit? ib.
- Infantem furioso æquiparari, quo
sensu dicatur? 4
- Infantes cur a tortura exemti? 150.
251
- Infantia quid sit? 3. 4
- Infantis iudicium quomodo a furiosi
iudicio differat? 4 præ furioso
prærogativæ ubi recensitæ sint?
ib. ratio an sit sana, & cur? ib.
- Infantium vulnera cur sint pericu-
losa? 196
- Infibulatio quid? 118
- Inspectio cadaveris occisi an sit ne-
cessaria & cur? 177 post sepul-
turam cur nullius sit usus? 184
quando & quomodo suscipienda
sit; ib. fœtus mortui quomodo
fieri debeat? 234-243
- in Inspectione cadaveris cur Medicus
notare debeat, quæ vidit? 187 oc-
cisi quæ sint facienda? 186. 187
- Inspectionem legalem cadaveris oc-
cisi an Medicus solus instituere
valeat, & cur? 180
- ad Inspectionem cadaveris occisi an
Medicus & Chirurgus, qui vulne-
rato vivo medebatur, adhibendus
sit? 181 an Medicus & Chirurgus
juramento confirmandus sit? ib.
an, præter Medicum, a magistra-
tu ablegatum, etiam inquisitus
alium ablegare possit, & cur? 182
an senior, an junior Medicus adhi-
bendus sit? 180 an unus vel plures
Medici & Chirurghi requirantur?
182 quales Medici requirendi? 183
qualis locus requiratur? 184
- ante Inspectionem legalem cadaveris
occisi quæ sint facienda? 184. 185
- post Inspectionem cadaveris occisi
quæ sint facienda? 187
- ad Inspectionem legalem cadaveris
occisi quales personæ sint neces-
sariæ, & cur Medici, vel Chirur-
gi, Anatomix periti? 179
- Inter inspiciendum cadaver occisi
si lis oriatur, cuinam plus creden-
dum? 182
- Intestinorum dolores quibus sympto-
matibus concomitentur? 138 vul-
nera. Vide Vulnera intestinorum.
- Juventus an a virili ætate distincta
sit, & quidni? 7 quid sit? ib.
- Juventutis jura, synonyma, tempe-
ramentum. ib.

Lac in mammis cur sit signum fallax imprægnantiæ? 36 puerperis quomodo a lacte, a mensium obstructionibus superveniente, dignoscendum? 68

Lactantes cur a tortura exempti? 249. 250

Lactis in mammis defectus cur sit signum fallax prægnantiæ simulata? 41. 42

Læsiō capitis fœtus quibus modis fieri possit? 243

Læsiones uteri cur sint periculosiores gestationis tempore, quam alio? 229

Læsionum, siue integumentorum communium dilaceratione factarum, quænam sint lethales? 232. 233

Leontiasis. Vid. Lepra Græcorum.

Lepra Græcorum in quo consistat? 149 quid? 148. 149

Lepræ Græcorum cognatum. 152 synonymia. 148. 149

Lethale quid? 189. 190

Lethalitas vulnerum quomodo cognoscatur? 185

de Lethalitate vulnerum secundum quam regulam pronunciandum sit? 190. 191. 192

Lienis vulnera an sint lethalia? 226. 227

ad Lipothymias dispositi cur a tortura scalæ exempti? 254

Lippitudo oculorum quid? 148

Lochiorum fluxus quamdiu duret? 67

quomodo a fluxu mensium dignoscendus? ib. unde oriatur? ib.

Lues venerea quid? 149

Luis venereæ cognatum? 152 species & synonymia. 149

Maculæ faciei cur sint signum fallax imprægnantiæ? 36. 37

Mammarum soliditas an virginitatem probet, & quidni? 27 turgescencia in gravidis unde? 36

Mania simulata quomodo cognoscatur? 136. 137

Maniaci cur a tortura exempti? 251 cur mitius puniantur? 255 qui? 136

Mares quando generandi potentiam accipiant & amittant? 41

Masticatoriorum balsamicorum species. 169

Matre mortua an actum quoque sit de vita embryonis, & quidni? 15

a Matrimonio an arcendi sint morbo hæreditario affecti? 152. 153

Matrimonium quo anno ineundum? 33

ad Matrimonium an hermaphroditus sit habilis? 105. 106

Mediaſtini vulnera cur sint lethalia? 217

Medici cur venenorum perfectam habere debeant notitiam? 161

Melancholia quid? 135. 136 simulata quomodo cognoscatur? ib.

Melancholici cur a tortura exempti? 251 cur mitius puniantur? 255

Menses fluentes quid significant? 32 quo tempore fluere incipiant? 5. 33

LI

Men-

Mensium fluxu laborantes cur a tortura exemptæ? 250. fluxus quamdiu duret? 67. quomodo a sanguinis per pudenda muliebria effluxu, post puerperium contingente, dignoscendus? ib. unde oriatur? ib.

Menstrua. Vide **Menses.**

Mentula, iusto brevior, an imprægnationem impediat, & quidni?

117. 118

Mentulæ vitia quænam? 114. seqq.

Mercurius dulcis quando sine noxa assumatur? 165.

Mesenterii vasa quænam sint? 223. vulnera an sint lethalia? ib.

Metus cur pestis tempore abdicandus? 160.

Mola an absque imprægnatione generari possit? 83. an baptizanda? 84. an in castis generari possit? 79. 81. 83. quid? 78. quomodo ex ovulo, a semine virili actuato, & non actuato, generari possit? 80. quomodo ex sanguine uterino generari possit? 79.

de **Mola** quibus de causis in foro juridico & medico quæstio oriatur?

78.

Molæ causæ. 79. signa an dentur? 83. quænam sint? 83. 84.

Molam gerens an privilegiis gaudeat prægnantium? 84.

Molarum differentiæ. 81. 82.

Monorchis an generare possit, & cur? 124. 125.

de **Monstris** ubi in foro juridico &

theologico agatur? 85.

Monstrorum causa. 89. 93. 102.

in **Monstrorum formatione** an erret anima rationalis, an sensitiva? 86.

Monstrum an baptizandum? 86. 95. an occidendum? 95. 66. an sit vi-

tale? 94. an succedat in hæreditatem? 95. bicorporeum an sit homo

duplex? 94. cur partu difficili excludatur? 94. cur plerumque ante

partum pereat? ib. cur plerumque per abortum excludatur? ib. quid?

85. 86. quodnam anima rationali præditum sit, quodnam minus? 94.

Monstrum quomodo generetur? 93. 94. quotuplex? 86-89.

Morbi an conjugium dissolvant? 113. contagiosi acuti quinam sint? 144.

145. 146. chronici quinam sint?

146. 147. quinam sint? 143. quotuplices? 144. hæreditarii an den-

tur? 153. in quem finem celentur? 142. pectoris quinam sint? 254. vene-

neri partiales quinam sint? 149. 150. totales quinam sint? 150. 151.

152.

Morbilli quid? 144.

Morbo hæreditario affecti an a conjugio arcendi? 152. 153. pectoris

laborantes cur a tortura scalæ exempti? 253. 254.

Morborum, an venenis ortorum, signa an dentur? 173. 176. qui-

nam simulentur? 131-141. simulatio ex quibus causis fiat? 130.

131.

Mor-

Morboforum vulnera cur sint lethalia? 196

Morbus fictus, five simulatus, quomodo a vero distinguendus fit? 131

Morbus S. Lazari. Vide Lepra Græcorum.

Mortis, a venenis ortæ, signa. 575

Musculorum cordis vulnera an sint lethalia? 214 thoracis vulnera an sint lethalia? 212

Muti cur a tortura exempti? 251

Nævi materni unde? 45

a Narium amputatione quinam exempti? 255

Natorum similitudo unde? 43. 44

Nervorum intercostalium & paris vagi vulnera an sint lethalia? 220

Nuptiæ quo tempore instituendæ? 33

Obesi cur a tortura scalæ exempti? 254

Obsessionis signa. 141. 142

Oculorum lippitudo quid? 148

Oesophagi vulnera. Vide Vulnera oesophagi.

Omenti vulnera an sint lethalia? 224. 225

Ophiæsis quid? 147

Orificiorum ventriculi vulnera cur sint lethalia? 220. 221

Ostentum. Vide Portentum.

Ovulum, a semine virili actuatam, & non actuatam, quomodo in molam abire possit? 80

Ozæna quid? 152

Pancreatis Vîrsungi vulnera cur sint lethalia? 224

Papillarum in mammis color roseus an virginitatem probet, & quidni? 27

Parotidibus affecti cur ab amputatione aurium excipiantur? 255. 256 glandulis inflammatis, vel suppuratis, laborantes cur a tortura collarii exempti? 254

Partes corporis humani. Vide Corporis humani partes.

Partium externarum dolores cur raro fingantur? 137 inaccessibilium vulnera an sint lethalia? 194. 195 membranarum, tendinosarum, nervosarum, ex meris vasculis compositarum, vulnera cur sint periculosa? 194 nobilium vulnera cur sint lethalia? 195

de Partu, ante mensem septimum factu, quid statuendum? 55 decimestri & duodecimestri quid statuendum? 62 seqq. octimestri quid statuendum? 57 septimestri quid statuendum? 62 undecimestri quid statuendum ib.

Parturientes quibus modis lædantur? 230

Partus duodecimestris an sit legitimus? 63 causæ. 62. 63 foetus cur retardetur? 11 mortui cur sit difficilis? 235 intempestivi consequentia. 62 legitimus quid? 52 maturitas unde noscenda? 59. 60 olim factus, cur difficulter cognoscatur? 68 perfecti synonymum. 53 perfectus quid? ib. quibus de causis

- supponatur? 43 quid? 52. 65 recens facti, signa. 66. 67 suppositi signa. 43 tempus an sit certum? 53 ordinarium. ib. redecim mensium, & ultra, an possibilis? 63 64 vitalis quid? 52 vivi synonyma. ib. vivus quid? ib. undecimestris an sit legitimus? 63 causæ. 62. 63
- Pectoris** dolores quibus symptomatibus coucomitentur? 137 morbus. Vide Morbus pectoris.
- Penis** corporum nervosorum vulnera cur sint periculosa? 231 retractio unde? 115
- Pentorchis** an alios potentia coeundi superet? 125. 126
- Percussio** circa regionem epigastrii cur sit lethalis? 199
- Percussiones** circa laryngem, cartilaginem thyroidæam & arytenoideas an sint lethales? 210. 211
- Pericardii** vulnera cur sint lethalia? 215
- de Peste** suspecti an ante quadragenam in rempublicam admitti possint? 155 quamdiu e republica excludendi? 154
- Pestis** effectus. 144 quid? ib. remedia præservativa. 157-160 signa. 159 tempore cur a balneis, coitu & purgantibus abstinendum? 160 cur cryptæ subterraneæ non aperiendæ? 158 quæ alimenta assumenda? 160 quæ alimenta vitanda? 159 quæ merces excludendæ? 155. 156
- Pestis** tempore quomodo aer purificandus? 158. 159
- Phimosis** quoduplex? 115. 116 veneæ cur vesicula crystallina dicatur? 150
- Phthisici** cur a tortura exempti? 251. 254
- Phthisis** quid? 147
- Pica** cur sit signum fallax imprægnantiæ? 37
- quot Placentis uterinis gemelli gaudeant? 11
- Plexuum** nervosorum vulnera an sint lethalia? 208
- Pœna** mitior quibus obtingat? 255. 256 quid? 244
- a Pollektorum tortura quinam exempti? 252
- Porrigo** quid? 148
- Portentum** quid? 85. 87
- Posthumi** cur patri magis similes, quam alii liberi? 45
- Prægnantes** cur a supplicio ultimo ad tempus exemptæ? 255
- Prægnantiam** quibus ex causis foemina fingant? 43
- Prægnantis** urina qualis? 38
- Primogenitus** cur prior natus a Jureconsultis habeatur? 12 quis dicatur? 11. 12
- Privilegiis** prægnantium an gaudeat mulier, molam gerens? 84
- Psora** quid? 148
- Psorophthalmia** quid? ib.
- Pubertas** quid sit? 5
- Pubertatis** initium. ib. signa quæ? 5. 6 synonyma. 5
- Pudens**

Pudendagra quid? 148
 Pudendorum muliebrum tumor œdematosus in puerperis unde? 67
 Pueri cum furioso comparatio quousque extensa sit? 4 stuprati signa, 31
 Pueris cur testamentum condere non liceat? 4
 Pueris cur testimonium dicere non liceat? ib.
 Pueritia quid sit? ib.
 Pueritiæ divisio, finis, initium, synonymia. ib.
 Puerorum actus cur non sint validi? ib. tenerorum vulnera cur sint periculosa? 196
 Pueros furiosis æquiparari, quo sensu dicatur? 4
 Puerperæ cur a tortura exemptæ? 249
 Pulchritudinis causa. 12
 Pulmones foetus mortui cur interdum in aqua supernatent? 240. 241 qui exclusus fuit vivus, cur interdum in aqua submergant? 241 cur ordinarie in aqua supernatent? 238 submergentes an sint signum foetus, in utero mortui? 139
 Pulmonum foetuum docimasia in aqua quibus cautionibus instituenda secundum Beyerum? 238. 280
 Pulsus quomodo mutetur? 132
 Puncturæ exiguæ spinalis medullæ cur sint lethales? 107
 Purgantia cur pestis tempore vitanda? 160
 Purpura alba quid? 145 quid? ib.
 Purpuræ albæ synonymia. ibid. synonymia. ib.

Rabiei caninæ origo, synonymia. 146

Rabies canina quid. ib.

Receptaculi chyli lumbaris vulnera cur sint lethalia? 218

Recutitio an sit possibilis? 119 ex quibus signis cognoscatur? 119. 120

Relegatio quomodo ab exilio differat? 256

Relegationis locus quando mutandus? ib.

Renum dolores quibus symptomatibus concomitentur? 138 vulnera an sint lethalia? 227

Rhagades quid? 152

Robur quotuplex? 12

Sacchari Saturni effectus. 167. 168

Saccharum Saturni cur caute adhibendum? 168 ex qua materia paretur? 167

Salviæ crebrior excretio quomodo promoveatur? 160

Sanguinis ex pudendo muliebri effluxus in, vel post coitum an signum stupri violenti sit? 28 per pudenda muliebria effluxus, post puerperium contingens, quomodo a fluxu mensium dignoscendus? 67 unde oriatur? ib.

Sanitas quid? 113

Σατυριασμός. Vide Lepra Græcorum.

Scabiei species. 147. 148

Scabies Gallica. Vide Lues venerea.

Scabies humida quid? 148 quid?

147

- a Scalæ tortura quinam exempti? 252. 253. 254
 Scorbutus in quibus regionibus imprimis grassetur? 146 in quo consistat? ibid. quæ mala pariat? ib.
 Scrophulas in gutture gerentes cur a tortura collarii exempti? 254
 Scrophulis affecti cur ab amputatione aurium exempti? 255. 256
 Sectio cadaveris occisi cur usitatis cultus anatomicis instituenda sit? 186
 Sectio cadaveris occisi quomodo instituenda sit? ib.
 Sectio cæsarea primi generis an absolute lethalis, & quidni? 18
 in Sectione cadaveris occisi cur etiam ventres non vulnerati dissecti sint? 186 187
 Semen masculinum minus activum unde? 61
 Semen muliebri, quomodo in mo- lam abire possit? 80
 Seminis virilis ubertas an sit causa monstrorum? 93
 Semiviri. Vide Castrati.
 Senectus in quot partes dividatur? 9 quid sit? 7
 Senectutis formalitas, jura, termini. 8
 Senes an generare & concipere valeant? 9 an inter infirmos censendi sint? ib. cur a tortura exempti? 251. 252 decrepiti cur itius puniantur? 255
 Senum affectus. 10 vulnera cur sint periculosa? 196
 Sepultura in templis cur illicita? 158
 Serpigo quid? 148
 Sexum masculinum quænam partes forment, quænam femininum? 103. 104
 Sexus mutatio an detur? 108. 109
 Siderum influxus an sit causa monstrorum? 92. 93
 Similitudinis natorum causa. 43. 44
 Sinuum duræ matris vulnera cur sint lethalia? 204
 Sodomitici congressus hominum cum brutis an sit causa monstrorum? 92
 Smalta quomodo pareretur. 166
 Smaltæ synonymia. ib.
 Spado quid? 121. 122
 Spinalis medullæ exigua punctura, & fortes contusiones cur sint lethales? 107
 Spinalis medullæ vulnera an sint lethalia? 107. 205 cur sint lethalia? 107
 Sterilitatis causæ. 176
 Sterni vulnera in superficie interna cur sint lethalia? 217
 Stolidi cur a tortura exempti? 251
 Strangulati foetus signum. 242
 Strumas in gutture gerentes cur a tortura collarii exempti? 254
 Strumis affecti cur ab amputatione aurium exempti? 255. 256
 Stupidi cur a tortura exempti? 251
 Stupri, in puerum commissi, signa. 31. 32 violenti effectus. 28 signum an sit sanguinis expudendo muliebri effluxus in, vel post coitum? 28

- Stuprum in quos committatur? 31
 violentum an musculus virgini
 nubili inferre possit? 28
 Sudor Anglicanus quid? 145
 Suffocati foetus signum. 242. 243
 Suffocatio foetus quibus modis fieri
 possit? 243
 Suffumigatio cur sit signum fallax
 imprægnantiæ? 39
 Superfoeratio an detur? 74. 75 in
 quibus subjectis & quomodo fiat?
 75 76 quid? 73 quo tempore
 fiat? 76
 Superfoerationis modus cur difficul-
 ter cognoscatur? 75 signa an den-
 tur? ib. tempus an computari
 possit, & quidni? 77
 a Supplicio ultimo quinam exempti?
 254
 Sardi cur a tortura exempti? 251
 Syncope ficta cur statim cognosca-
 tur? 139 quid? ib.
 Syncopes cognatum, signa, ib. re-
 media. 140
Tendinum majorum vulnera cur
 sint lethalia? 232
 Territio cur in lactantibus & puer-
 peris locum non inueniat? 250 cur
 in senibus locum non facile inue-
 niat? 251 quid & quotuplex? 246
 realis quomodo fiat? ib. verbalis
 cur in gravidis locum non inue-
 niat? 249 quomodo fiat? 246
 Terroris effectus in fluxu mensium
 laborantibus & lactantibus. 250
 in puerperis. 249
 Testicondus. Vide Crypsorchis.
 Testiculi venerei origo, synonymia.
 150
 Testium vitia quænam? 120 seq. vul-
 nera, & contusiones. Vide Vul-
 nera testium, Contusiones testium.
 Tetrorchis an alios potentia coeun-
 di superet? 125. 126
 Thlibiæ qui dicantur? 121
 Thladiæ, Thlasiæ qui dicantur? ib.
 Thoracis contusiones fortes cur sint
 lethales? 219. 220 vulnera. Vide
 vulnera thoracis.
 Tinea quid? 147
 Tonfillis in pammatis, vel suppura-
 tis, laborantes, cur a tortura col-
 larii exempti? 254
 Tortura nocturna quid? 152 quid?
 244 quomodo instituenda? 245
 quotuplex? 245. 246
 a Tortura collarii quinam exempti?
 254 cur exemptæ gravidæ? 248
 a Tortura exemptarum personarum
 conditiones physicæ quænam sint?
 148. 254 polletrorum quinam ex-
 emti? 252 scalæ quinam exempti?
 252. 253. 254
 in Tortura dictanda quid spectan-
 dum? 9
 Torturæ strictæ sumtæ gradus. 246.
 247 subjectum? 246. 254 cur
 non omnes personæ? 247 cur
 solæ personæ impastæ? 250 sy-
 nonymia. 244. 245
 circa Torturam quodnam sit offici-
 um iudicis? 247

- Tracheæ, sub claviculis, & in thorace reconditæ, vulnera cur sint lethalia? 211
- Triorchis an alios potentia coeundi superet? 125. 126
- Trunci nervosi, organis vitalibus motus & sensus præstantes, cur non abscindendi? 208
- Truncorum nervosorum, organis vitalibus motus & sensus præstantium, vulnera an sint lethalia? 208
- Tumor quomodo concilietur? 139
- Tumoris testium origo, synonymia. 150
- Tussi inveterata laborantes cur a tortura scalæ exempti? 253. 254
- V**aginæ rugositas & arctitudo cur destructa ad pristinum interdum redeat tonum? 24 cur non semper destruat uno alteroque congressu? ib. quam variet? 24 unde? 23. 24 uteri dilatatio in puerperis unde? 67
- Valetudinarii cur a tortura exempti? 251 quinam sint? ib.
- Variola magna quid? 152
- Variolæ quid? 144
- Vasa biliaria quænam sint? 225 sanguifera cur sint ad vitam absolute necessaria? 216
- Vasorum biliariorum vulnera an sint lethalia? 225. 226 cordis communium (arteriæ magnæ, arteriæ pulmonalis, venæ cavæ, venæ pulmonalis) vulnera cur sint lethalia? 216 coronariorum cordis vulnera
213. 224 intercostalium vulnera cur sint lethalia? 217 lacteorum secundi generis vulnera cur sint lethalia? 224 sanguiferorum mesentericorum vulnera cur sint lethalia? 223 spermaticorum vulnera an sint lethalia? 230
- Venæ cavæ & portæ vulnera cur sint lethalia? 225
- Venarum cervicalium vulnera cur sint lethalia? 209 jugularium vulnera cur sint lethalia? 209. 210
- Venena animalium quænam sint? 171. 172. 173 applicandi modus quotuplex? 163 extus applicata an tanta celeritate agere valeant, quanta intus applicata? 162. 163 mineralium cur assumpta statim agant? 163 quænam sint? 164. 169 venena quænam sint? 163. 164 quotuplicia? 163 vegetabilium cur commode propinari possint? 170. 171 quænam sint? 170
- Veneni præsentia in corpore humano quomodo cognoscatur? 174
- Venenorum animalium effectus. 171. 172 effectus an aliis morbis sint communes? 173 quinam sint? ib. emmenagogorum species. 171
- Venenorum perfectam notitiam cur habere debeant Medici? 161
- Venenum, improprie tale, sive non mortiferum, quid? ib. pestiferum a quibus corporibus recipiatur? 155. 156 proprie tale, sive mortiferum, quid? 161 quid & quotuplex? ib.

INDEX RERVM.

Ventriculi dolores quibus sympto-
matibus concomitentur? 138 vul-
nera an sint lethalia? 220. 221.
222 vulnerum effectus. 197
Ventriculorum cordis vulnera cur
sint lethalia? 213
Ventris imprægnationem simulan-
tium inspectio quomodo suscipi-
enda sit? 42 inspectio quibus
committenda sit, & quidni solis
obstetricibus? 29. 30 quomodo
suscipienda sit? tactum recusare,
an in puellæ examinandæ sit arbi-
trio? 31 tumores, a morbo pro-
ducti, quomodo ab iis, qui impræ-
gnationem testantur, dignosci
possint? 35
Vermiculi in semine an sint causa
monstrorum? 93
Verrucæ venereæ quotuplices? 152
Verrucarum venerearum sedes. 151
Vertebrarum colli, thoracis, lumbo-
rum fracturæ, cum spinalis medul-
læ læsione conjunctæ, cur sint le-
thales? 107
Vertiginosi cur a tortura scalæ ex-
empti? 253
Vesicæ dolores quibus symptomati-
bus concomitentur? 138 felleæ
vulnera an sint lethalia? 225. 226
vulnera. Vide Vulnera vesicæ.
Vesicularum seminalium vulnera cur
sint periculosa? 231
Vibices quid? 157
Violenta manu occisum esse foetum,
unde cognoscatur? 236. 243

Virginitas quibus mediis restitui pos-
sit? 30. 31 quid & quotuplex? 20
Virginitatis, pluribus congressibus
recens læsæ, signa. 27. 28 signa an
dentur? 21. 22 dubia quæ? 26. 27
signa quæ? 22. 26
ad Virginitatis examen qui requiren-
di sint? 29. 30
in Virginitatis examine instituendo
ad quæ attendendum sit? 27
Virgo dormiens an inscīa imprægna-
ri possit? 25 quidni sit nubilus, an-
tequam menstrua patiat? 32
Viscera abdominis quanam sint? 220
Vlcera brachiorum passi cur a tor-
tura scalæ exempti? 253
Vlcerum crustosorum causæ. 176
præputii, glandis atque freni ef-
fectus. 150
Vlcus fictum quomodo a vero di-
gnoscat? 134. 135
Vomica laborantes cur a tortura
scalæ exempti? 253. 254
Vomitui matutinus cur sit signum fal-
lax imprægnantiæ? 37 quid? 165
Vreterum vulnera cur sint lethalia?
228
Vrina crassa & turbida, ac cum sedi-
mento farinaceo mixta, cur sit si-
gnum fallax imprægnantiæ? 38.
39 prægnantis qualis? 38 tenuis
an virginitatem probet, & quidni?
ib.
Vteri læsiones cur sint periculoso-
res gestationis tempore, quam
alio? 229

Mm

Vte-

Vterus cur pars sit, ad vitam destinata? 229

Vulnera angusta & profunda cur sint periculosa? 193 arteriæ hepaticæ cur sint lethalia? 225 arteriarum carotidum an sint lethalia? 209. 210 cervicalium cur sint lethalia? 209 in parte inaccessibili contingentia, cur sint absolute lethalia? 192 artuum ap. sint lethalia? 231. 232 asperæ arteriæ an sint lethalia. 210 baculo grandiori facta, an sint per se lethalia? 198 capitis an sint lethalia. 200 seqq. quænam sint? 200 quando fiant lethalia? 202. 203 caudicum nervosorum summitati humeri & femori implantatorum, an sint lethalia? 208. 209 brachiorum passî cur a tortura scalæ exempti? 253 cerebelli cur sint lethalia? 205 cerebri an sint lethalia? 204. 205 colli lethalia quænam sint? 209 cordis an sint lethalia? 213. 214. 215 corporum nervosorum penis cur sint periculosa? 231 cranii cur non sint lethalia? 201 cum contusione & dilaceratione facta, cur sint pessima? 193. 194 diaphragmatis an sint lethalia? 218. 219 ductus hepatici an sint lethalia? 226 thoraci cur sint lethalia? 218 duræ matris an sint lethalia? 203 per sectionem inflicte, cur sint minus periculosa, ac cum contusione, & dilaceratione conjuncta?

203. 204 gladio acuto facta, an sint per se lethalia? 198 glandularum mesenterii cur sint lethalia? 223 hepatis cur sint lethalia? 225 quotuplicia? 225 infantium tenerorum-puerorum & senum cur sint periculosa? 196 instrumentis venenatis facta, cur sint lethalia? 194 intestinorum cur difficillime consolidendur? 222 cur sint lethalia? ib. quotuplicia? ib. intranasum & oculorum angulum majorem per cranium in cerebrum penetrantia, cur sint lethalia? 106 lienis cur sint lethalia? 226. 227 mediastini cur sint lethalia? 217 mesenterii an sint lethalia? 223 morbosus inflicta, cur sint lethalia? 196 musculorum cordis cur sint lethalia? 214 thoracis an sint lethalia? 212 nervorum intercostalium & paris vagi an sint lethalia? 220 nervosorum plexuum an sint lethalia? 208 œsophagi an sint lethalia? 211. 212 transversalia cur sint periculosiora longitudinalibus? 212 omenti an sint lethalia? 224. 245 orificiorum ventriculi cur sint lethalia? 220. 221 pancreatis Virsungi cur sint lethalia? 224 partium inaccessibilium an sint lethalia? 192. 194. 195 membranarum, tendinosarum, ex meris musculis compositarum, cur sint periculosa? 194 nobilium cur sint lethalia? 195 per se lethalia.

lia quanam sint? 193-200 pericardii cur sint lethalia? 215 per magna cur sint lethalia? 193 profunda & angusta cur sint periculosa? 193 profunda spinalis medullæ cur sint lethalia? 207 pulmonum an sint lethalia? 217. 218 quæ mox mors sequitur, an sint per se lethalia? 199. 200 receptaculi chyli lumbaris cur sint lethalia? 218 renum an sint lethalia? 227 rotunda cur sint periculosa? 194 sclopetis facta, cur sint lethalia? ib. sinuum duræ matris cur sint lethalia? 204 spinalis medullæ an sint lethalia? 205. 207 sterni in superficie interna cur sint lethalia? 217 telo lethifero facta, an sint per se lethalia? 198 tendinum majorum cur sint lethalia? 232 testium an sint lethalia? 230. 231 thoracis, ad cavitatem ejus penetrantia, an sint lethalia? 212. 213 thoracis, cum fracturis costarum conjuncta, an sint lethalia? 213 trachæ, sub claviculis, & in thorace reconditæ, cur sint lethalia? 211 truncorum nervosorum, organis vitalibus motus & sensus præstantium, an sint lethalia? 208 vasorum biliariorum an sint lethalia? 225. 226 cordis communium (arteriæ magnæ, arteriæ pulmonalis, venæ cavæ, venæ pulmonalis) cur sint lethalia? 216 coronariorum cordis cur sint lethalia?

213. 214 intercostalium cur sint lethalia? 217 lacteorum secundæ generis cur sint lethalia? 225 sanguiferorum mesentericorum cur sint lethalia? 223 spermaticorum an sint lethalia? 230 vehementibus symptomatibus comitata, an sint lethalia? 197 venæ cavæ & portæ cur sint lethalia? 209 jugularium an sint lethalia? 209. 210 ventriculi an sint lethalia? 220. 221. 223 ventriculi ex quibus causis extraordinarie consolidentur? 221. 222 ventriculorum cordis cur sint lethalia? 213 vesicæ an sint lethalia? 228. 229 quotuplicia? 228 vesicæ felleæ an sint lethalia? 225. 226 vesicularum seminalium cur sint periculosa? 221 ureterum cur sint lethalia? 228

Vulneratus an ex symptomatibus, an ex vulnere perierit, quomodo cognoscatur? 197

Vulneris, ut plurimum lethalis, synonymia. 188

Vulnerum capitis effectus? 197 lethalitas quomodo cognoscatur? 185 symptomata an sint lethalia? 197 quotuplicia? ib. testium remedium. 230. 231 ventriculi effectus. 197

de Vulnerum lethalicitate secundum quam regulam pronunciandum sit? 190-193

Vulnus, enormem effusionem humorum vitalium in parte inaccessibili

INDEX RERVM.

præstans, cur sit lethale? 192
 læ disiectæ cur sit lethale? 212
 lethale quoduplex? 189. 190 per
 accidens lethale quid? 188 per
 se lethale quid? 189. 190 pericu-

losum quid? 188 vulnus quid? 188
 simpliciter & absolute lethale
 quid? 190 ut plurimum lethale
 quid? 188

INDEX AVCTORVM.

Adami. 17
 Aegineta. 121
 Albericus. 3
 Albertus M. 110
 Amatus Lusitanus. 113. 114
 Aristoteles. 47. 54. 228
 Ammannus. 28. 56. 63. 72. 119. 188.
 189. 204. 252
 Aretinus. 31
 Arnifæus. 54
 Arumæus. 58
 Averrhoes. 110
 Augenius. 21
 Aufonius. 97
 Avicenna. 22. 39. 227
Baldus. 3. 36. 95. 106
 Barba. 158
 Bartholinus. 22. 36. 77. 82. 99
 Bauhinus. 87. 98. 102
 Beckerus. 92
 Berengarius. 22. 203
 Bergerus. 33. 192. 193
 Befoldus. 55
 Beyerus. 30. 238. 240. 241
 Blancardus. 99. 203. 210
 Bocerus. 36
 Bodinus. 91
 Bohnius. 5. 22. 30. 33. 34. 71. 82. 106.
 178. 180. 182. 184. 186. 188. 190. 196.

197. 198. 200. 201. 202. 203. 205.
 208. 211. 217. 220. 222. 224. 230.
 232. 241. 242
 Bonaventura 58
 Bonerus. 121. 202
 Bontekoc. 265
 Borellus. 114. 115
 Botaldus. 210
 Bourdelot. 92
 Brendelius. 50
 Brunellus. 111. 113
 Brunnemannus. 178. 181. 199
Cagnolus. 35. 40
 Camerarius. 37
 Capiuac. 21
 de Caranza. 13. 41. 46. 55. 85. 95
 Cardilucius. 252
 Carpozovius. 8. 28. 29. 46. 55. 58. 59.
 106. 161. 178. 179. 181. 188. 199. 245.
 246. 247. 248. 250. 253. 256
 Cartesius. 48. 95
 a Castro. 24. 34. 36. 87. 98
 Celsus. 61. 119. 136. 193. 213. 227. 228
 Choppinus. 55
 Chrysippus. 48
 Clarus. 31
 Classenius. 178. 181. 199
 Coccejus. 13. 51. 55
 Codronchius. 9. 21. 24. 34. 174

Colum.

INDEX AVCTORVM.

Columbus. 105
 Connor. 158
 de la Courve. 80
 Cowperus. 201
 Craanen. 56
 Cujacius. 21
 Cyprianus. 64
Damhouder. 246
 Delrio. 91
 Democritus. 48
 Deventer. 11. 17
 Deusingius. 36. 90. 158
 Digbeus. 90
 Diogenes. 48
 Dionis. 18. 22. 32. 72. 119. 228
 Dioscorides. 135
 Dodonæus. 81
 Dolæus. 15
 Donatus. 81. 90. 113
Elsholzius. 64
 Empedocles. 48
 Epicurus. 48
 Erasistratus. ib.
 Erndl. 168
 Ettmullerus. 89. 94. 102. 166
 Eusebius Pamphilus. 102
 Ewaldus. 121
Fallopins. 22
 Farinacius. 8. 26. 31. 41. 43. 46.
 199
 Feltmannus. 199
 Fidelis. 9. 21. 24. 27. 34. 39. 55. 95.
 134. 174. 188
 Fienus. 49
 Forestus. 38. 82. 83. 60
 Francius. 77

Gackenholztzius. 144
 Gailus. 41
 Galenus. 7. 9. 44. 48. 49. 134. 213.
 228. 237
 Gerhardus. 108
 Giurba. 213
 Glandorpius. 203
 Glissonius. 225
 Godofredus. 58. 85
 Goekelius. 168
 de Graff. 23
 a Güldenkle. 1. 9. 44
 Guillemau. 21
Hafenrefferus. 148
 Hagedorn. 36
 Hamelius. 49
 Hamikon. 145
 Hahnus. 58. 59. 121
 Harprecht. 46
 Harsdörffer. 44
 Harveus. 56. 88
 ab Hehr. 206
 Heigius. 6
 Heisterus. 17. 23
 Helmontius. 48. 100
 Helwigius. 86. 89. 90. 94
 Hermolaus Barbarus. 47
 Herophilus. 48
 Hertius. 31
 Hesiodus. 33.
 Hildanus. 90. 114. 252
 Hippocrates. 5. 9. 10. 12. 34. 35. 36.
 37. 38. 39. 44. 48. 49. 52. 54.
 55. 57. 58. 60. 61. 62. 68. 111. 191.
 202. 204. 206. 213. 222. 228.
 248

N

Hobe-

INDEX AVCTORVM.

- Hobekeni**us. 48
Hoffmannus. 3. 89. 91. 163. 164. 166.
 174. 196
Homerus. 43
Horatius. 45
Hornius. 210
Horstius. 81. 82. 90
Hostiensis. 5. 6. III
Iosephus. 119
Ioubertus. 21. 36
Iuvenalis. 32. 121
Keiser. 245
Kerckringius. 60. 77. 79. 82.
 84
Kleinius. 92
Knauth. 185
Kunckelius. 167
Lamswerdus. 80
Lancisus. 48
Langius. 26. 125. 239. 140
Laurentius. 5. 36. 77
Lauterbachius. 8
Levinus Lemnius. 100
Leewenhoeckius. 49. 93
Licetus. 87. 90. 115
Loffius. 82
Lotichius. 37
Lowetus. 95
Ludovici. 46. 47. 86. 87. 179. 181.
 182. 238
Ludwell. 46. 106
Lutherus. 51
Magirus. 48
Mangettus. 48. 64
Mangoldt. 201. 206
Marcetus. 204
Marcus Aurelius Severinus. 210
Martialis. 32
Mascardus. 8. 12. 35. 41. 43. 178. 199
Matthiolus. 133
Mauriceau. II. 21. 77
Menochius. 4. 8. 10. 36. 40. 46.
 136. 178
Menzelius. 97
Mercurialis. 5. 49. 102. 108. 158
Mollerus. 98
Monconysius. 172
Montagniere. 64
Morgagni. 22. 23
Müllerus. 43. 84
Munnickius. 22
Nonius Marcellus. 65
Nymannus. 17
Oldekop. 178
Orthius. 64
Ortlobius. 5
Ovidius. 215
Pacchionius. 204
Pacianus. 31
Paræus. 21. 88. 98. 109. 134. 203
Pawius. 203
Perrault. 205
Peyssonel. 55
Pineus. 21. 24. 25. 67. 109
Platerus. 9. 82. 160
Plato. 33
Plinius. 54
Posnerus. 47
Ranchinus. 21. 24. 27. 36. 156
Redi. 194
a Reyes. 26. 44. 45. 91. 98
Rhodius. 81

INDEX AVCTORVM.

ten Rhyne. 124
 Riolanus. 21. 22. 71
 Rittershusius. 106
 Riverius. 210
 Rivinus. 160. 239. 240
 Rolincius. 105. 115
 Rosenthal. 106
 Roufettus. 18
 Ruellus. 133
 Ruyschius. 23. 82. 225
Salmuthus. 82
Saltzmann. 202
 Sanchez. 21. 129
 Sachsus. 91
 Scultetus. 124
 Schenckius. 9. 17. 36. 63. 102. 105.
 115. 117. 120. 205. 221. 222
 Schöpferus. 200. 217. 239
 Schookius. 91
 Schottus. 88. 89. 93. 95
 Schreierus. 239
 Schröckius. 86
 Schröderus. 166
 Schurigius. 87. 99. 106. 114. 115. 117
 Sebizius. 26
 Seneca. 112
 Sennertus. 9. 34. 38. 47. 58
 Simon. 31. 91. 106. 121. 130
 Slevogtius. 37. 38
 Sinibaldus. 26
 Speckhan. 102
 Sperlingius. 48. 56
 Spigelius. 55. 56
 Stahlius. 167
 Stephani. 20. 29
 Stockhusius. 168

Strabo. 48
 Struvius. 106
 Stryckius. 6. 31. 55. 106. 130. 177.
 178. 180. 181. 183. 199
 Swammerdammius. 23
 Sylvaticus. 21. 34. 110. 130. 133. 174
Tabor. 248
 Taurinus. 30
 Thomafius. 92. 137. 244. 255
 Tiraquelus. 12. 13. 66. 112
 Torreblanca. 26. 91
 Tulpus. 82. 201. 207
Valentini. 1. 25. 28. 32. 42. 45
 49. 53. 56. 58. 63. 106. 116. 117.
 118. 123. 164. 166. 178. 179. 184.
 186. 188
 Valeriola. 9
 Vaterus. 15. 18. 144. 173
 Verheyneus. 23
 Vieussens. 205
 Vipianus. 129
 Vnzerus. 159
 Voigt. 44
 Vossius. 48
Wagnitius. 165
 Webster. 92
 Wedelius. 37. 38. 45. 58. 86. 92.
 95. 119. 142. 144. 159. 185. 200
 van der Weil. 81. 82
 Weinreichius. 85. 87
 Welschius. 89. 180. 188. 207
 Wessenbecius. 4. 10. 46
 Westphalus. 91
 Wierus. 16.
 Wildvogelius. 16. 245. 247. 253.
 255

INDEX AUCTORVM.

Willisius. 167

Winslovius. 48

Zacchias. 4. 10. 13. 24. 29. 30.
34. 40. 41. 49. 57. 66. 72.
84. 96. 104. 105. 110. 112.
113. 115. 116. 117. 129. 133.
138. 140. 147. 156. 159. 160.
161. 169. 172. 188. 253. 256

Zangerus. 36. 245. 247

Zaunschleiffer. 102

Zellerus. 168. 242

Zieglerus. 59. 169

Zittmannus. 25. 30. 56. 117. 118. 180.
188. 190

Zwingerus. 145



250

