

**Exercitatio medico-chirurgica agens novam methodum extirpandi  
carunculas, et curandi fistulas urethrae / [Francesco Roncalli Parolino].**

**Contributors**

Roncalli Parolino, Francesco, active 18th century.

**Publication/Creation**

Brixiae : J.M. Ricciardi, 1720.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/vvw6ec3w>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





44537/B

H XXIX v

18

TAH 2660

8 lines  
168  
8 lines  
169-182  
169-182  
2 plates  
up to 182

A 28

XVI

10 264


~~10 264~~





Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library





FRANCISCI RONCALLI

Philosophiæ , & Medicinæ  
Doct̃oris

EXERCITATIO  
MEDICO-CHIRURGICA

AGENS  
NOVAM METHODUM

Extirpandi Carunculas , &  
curandi Fistulas  
Urethræ.



B R I X I Æ , M. D C C. X X.

---

Typis Jo: Mariæ Ricciardi,  
*Superiorum permissu.*



FRANCIS RONSALL

Philosophus & Medicus  
Doctores

EXERCITATIO

MEDICO-CHIRURGICA

DE

NOVAM METHODUM

Extrahendi Carunculas, &  
curandi Fistulas  
Utriculi.



B. R. I. N. E. M. D. C. C. X. X.

Typis Jo: Mariae Riccardi,  
Imprimaris Londinensis.





Illmo, & Excellmo Domino  
**MARCO ANTONIO**  
**S A L A**  
NOB. BRIX. ET PRO SERENISS.  
VENETORUM REPUB.  
GENERALI.

FRANCISCUS RONCALLUS FELICITATEM

**S***I Aristogenes Thasius ad  
bellicosum Macedonia Regem An-  
tigonum, si Asclepiades Pompei*

\* 3

Ma-



*Magni Familiaris ad Mitrida-  
tem suos de Medicina libros, at-  
que complura volumina conscri-  
pserunt, mirum non erit, Illm̃e,  
ac Excellm̃e Domine, si Tuo Præ-  
clarissimo Laureato Nomini hoc  
meum præcox, qualecumque sit,  
Medicum opus devoteam. Vete-  
res illi Gracia Populi, quorum  
Provincias Victorijs usque ab  
ineunte adolescentia peragrasti,  
Apollinem, qui primus Medici-  
næ usum attulit, & ob eam cau-  
sam Apotheosim promeruit, non  
modò Medica Facultati Præsi-  
dem, verùm etiam arcu, & sa-  
gittis armatum venerabantur, &  
deposcebant. Cur igitur & mihi  
non liceat Te optimarum Artium  
Mæce-*



Mecenatem Amplissimum simul,  
ac Odrisij Draconis acerrimum  
Hostem, ac strenuissimum Trium-  
phatorem huic operi Praesidem in-  
vocare? Domuit Pithonem Apol-  
lo, ejusque Triumphis hymnos to-  
ta penitus Græcia concinuit:

Phæbeo Domitus Python cum decedit arcu,

Membraque Cirrhæo fudit anhelæ jugo:

Omnis, Io Pean, Regio sonat; omnia Phœbum

Rura canunt. Tripodas plenior aura rotat.

Claud.  
lib. 1. in  
Ruff.

Tuisque Triumphis non modò  
Græcia, Illiricum, Epirus, Pelo-  
ponnesus, & Arcipelagus latè  
plaudunt, sed etiam Regia Vene-  
ti Senatus Munificentia per om-  
nes honorum gradus ad Genera-  
litiam Pugna Præfecturam eucto  
dignitatem auxit, & præmia. Te  
Supremi Venetæ Reipubl. vel

\* 4      Classis



Classis Praefecti, ac Duces Se-  
renissimi. Te Maximilianus  
Princeps de Bransuich, Te  
Adamus Enricus de Stenau, ac  
Matt. Joh: de Sculenburg prae-  
sertim in recentissima Corcyrensi  
propugnatione, Te Senatus Elo-  
gia, Te Ducalia Diplomata, &  
Constantia, & Fide, & Militari  
Scientia Pereximium concelebra-  
runt, Tuumque in Reip. Nego-  
tius laborem, in periculis fortitu-  
dinem, in conficiendo celeritatem,  
in providendo Consilium testan-  
tur. Tibi Brixia, quæ Veneto è  
Littore primævo Aetatis flore sol-  
venti Patrijs votis solemnia Ce-  
leusmata cecinit, toties reduci post  
peractas expeditiones, & Cydonis,  
&



Et Mitylene, Et Argorum, Et Tenedi, Et Andros, Et Chios, Et Epidauri, atque Chalcidis, ubi præcipuè hostili plumbo læsum Caput, non Mens, quæ semper eadem, Epicinium admodulat a gratulabatur. Eadem Te Civem suum excepit Palmis onustum, Et Gloria, quæ licet à Majoribus Tuis, Et Sago, Et Toga comendatissimis derivata hereditario splendore Te, Tuamque Familiam illuminaverit, attamen in Te præcipuo quodam fato collecta ipsis rependisse decus, eorumque promerita coequasse videtur. Quid plura? Te suismet oculis vidit inter exterarum gentium arma Patriæ, ac Reip. saluti, ac  
maje-



majestati consulere, præcipuè cum  
in Brixienti Agro Clarenfis Oppi-  
di præsidium, & mœnia Tua Fi-  
dei concredita tam inusitata  
prudencia custodivisti, ut inter  
ingruentia alterutrimque tela Pa-  
cis periclitantis decus, & com-  
missæ Provincia incolumitatem  
servaveris. Modò Te Patria  
fruitur, & quem omnium vota  
Victorem in prælijs, in Pace Glo-  
riosissimum expetebant, nunc læ-  
tabundi Cives adspiciunt, nunc  
Affines, & Consanguinei com-  
plectuntur, & Clientum catervæ  
certatim suis venerantur obse-  
quijs. Mihi pariter inter cete-  
ros dulci quodam fato concessum  
est, ut optatissimum diu reditum  
gratu-



gratularer, & praeclarissimas Tuo-  
que dignas Animo dotes suspi-  
ciens me Tibi penitus obsequen-  
tissimè devoverem. Hodierna ve-  
rò die solemni quodam gaudio  
mihi latandum esse videtur, dum  
humanissimo, quo excellis, Vul-  
tu Primogenitum juvenilis inge-  
nij mei fœtum intueris, & exci-  
pis, quem Amplissimi Tui No-  
minis initiatum auspicijs in lit-  
terarum Theatrum expono. Te  
igitur Auspice prodeat, ac si dif-  
ficillimis Bellis Venetas oras invi-  
cto Marte ab Othomanis ensibus  
propugnasti, minimè dubito,  
quin hunc libellum, qui à Tuo  
Nomine pretium sumet, ab expun-  
gentibus imperitorum novaculis

in



*in Pacis otio defendas. Interim  
Patria, Reip. ac Religioni peren-  
ni felicitate diu vivas.*

*Dat. Brixia 10. Febr. 1720.*



## AD LECTOREM.

**Q**uemadmodum elapsis jam seculis non defuere, qui de modicis rebus libros, atque volumina scripserant, ut Themison de Plantagine, Marcion de Raphano, Hippocrates de laudibus Ptisanæ, de Lipsimachia Erasistratus, de Bulbis Pythagoras, de Brassica Chrysippus, de Urtica Physicus Phantias, & Anonymos herba ab Icesio Medico celebrata fuit; Ita, candide lector, ne caperes supercilium, si vix juvenilem ætatem ingressus in litterarium Theatrum, & ipse irrepere videar, ut de Syringa vermiculari libellum Edam. Modica res fortasse videbitur, si exiguum opus perpendas. Verum, si novam hanc esse Methodum ad Carunculas, & Fistulas Urethræ faciliori negotio, ac sua vitate curandas animadverteris, minimè dubito



bito quin humanissimè probes Inventum,  
quod Deo Opt: Max: illustrante mihi  
videor reperisse . Premissis igitur de  
Carunculis Historia, & Fistulis tracta-  
tu , Vermicularem Syringam propono ,  
utilitatem ostendo , litteris , & Figuris  
describo , Praxim indico , rationes affe-  
ro , objectis respondeo , experimenta non  
omitto . Parcant obsecro , Eruditissimi  
Professores juvenili adhuc ingenio , quod  
eos non docere , sed consulere , ac vene-  
rari gloriatur . Tuque , Benigne Lector,  
equi , bonique consule Auctoris votum ,  
qui tibi non usum Syringæ , sed peren-  
nem incolumitatem auguratur . Vale.



Supervacuuſ foret in ſtudiis longus  
labor , ſi nihilliceret melius in-  
venire Præteritis

*Quint. Lib. 3. Rhet. Inſtitut.*



Superioribus fore in studiis longius  
labor, si nihil hecet melius in-  
venire poteritis  
Quint. lib. 3. Rhet. Iustin.



I  
O B S E R V A T I O  
H I S T O R I C A  
D E

*Carunculis in Urethra , Fistula  
Urinae in Perinaeo, & Febris Gal-  
lica habituali feliciter curata in  
Illmo, & Excmo N. N.*

**C**Um infelix Humanæ Naturæ  
conditio ex succidaneo Adami  
semine innumeros infausta he-  
reditate morbos contraxerit , ex hac  
turba nonnulli aliquando Morbi Phy-  
sici, & Chirurgici curis occurrunt ,  
quibus jam jam nascentibus nisi Ma-  
num auxiliariam præbueris, invale-  
scunt, & serò Medicina paratur. Non-  
nulli pariter emergunt, quorum illicò  
notis principiis obstat, eorumque  
malitia posset in cunabilis fausto Apol-  
line suffocari : Veruntamen, cum Pa-  
tiens in diversa distractus Medicis Le-  
gibus



gibus ritè obtemperare non valeat, clandestinum neglecti Morbi virus in dies ingravescit ita, ut non nisi temporis, & eximiae patientiae beneficio possit eradicari. Hoc enim verò fuit fatum Illustriss. & Excellentiss. N. N. qui primo ebullientis ætatis fervore inter Martis Castra Veneris lenociniis illectus, ea, qua solent peccare Reges, infirmitate [ut scripsit Ambrosius de Apolog. David] Morbum contraxit. Cui vix nato facile negotium erat consulere, atque radices penitùs evellere; Sed cum in Peloponnesi expeditionibus adversus Arabes neglecta sui Morbi cura, assiduus fractus laboribus terra, marique superatis, suę salutis immemor, Reipub. ac Religioni suam incolumitatem, Vitamque devovisset, contumax Malum adeò superbas vires exeruit, ut ad illius curationem diù fuerit laborandum. Morbus fuit Gonorrhæa, quæ tractu temporis exulcerato Meatu Urinario  
ansam



ansam præbuit carnosis Excreſcentiis cum quadam veluti Stranguria se manifestantibus. Emicuit prima in medio Glandis parenchymate, parum distans ab externo Urethræ orificio, vel quia in parva foveola in fundo canalis latitante sequeſtraretur materia virulenta, vel quia facta majori pressione à fibrosa Glandis structura liquido sanioso excurrenti, sublata exili Urethræ Cuticula paulatim Caruncula in aliqualem magnitudinem excreverit. Cognita primùm fuit ex tortuoso, & bifurcato Urinæ effluxu, cum torminosa ad mingendum difficultate, quæ facilè tolleretur media trusione Catheteris, vel cereæ Candelæ in Meatum Urinarium ad proportionatam Canalis dilatationem, pro Urinæ necessario effluxu.

Morbi pertinaciam auxerunt errores in diætâ à militari Vita indivisi, unde aucta corruptiva inquinatio in proſtratis glandulosis seminalem liquorem



elaborantibus, continuò fluebat per Urethram virulentus ichor, qui gallica ulcuscula per totum Mearum disseminavit; Quapropter irritatis ex corrosione Fibris oblungis, & circularibus interiore Utethræ tunicam constituentibus, atroces promanarunt cruciatus, qui mejendi occasione ab Urinæ salibus magis exasperabantur; Præcipua tamen doloris sensatio circa radicem Penis vigeat, propter continuationem prostaticarum, & vesicularum seminalium, quò venerei fermenti activitas in acido corrosivo summè volatili essentialiter consistens jam irrepsit, in virulentæ Gonorrhææ prima efformatione: Nihilominus difficilis seminis ad Coitum excretio, & potentia ad motum, quæ in Nob. P. maximè vigeat, solam relaxationem, vel excoriationem prostaticarum Lympham elaborantium pro seminis vehiculo manifestè portendebat, & potissimum, quia materia perpetuò  
fluens



fluens lymphaticam potius,quàm seminalem redolebat naturam ; Unde con-  
jicere licuit Medico tunc temporis ad-  
stanti, filamentosas , & purulentas Mo-  
leculas, quæ cum alba quadam ferosita-  
te fluebant , potius esse exulcerationis  
Urethræ Materiem,quàm Genituræ su-  
bstantiam : Quòd intendit probare  
*Ættmullerus* in suo Tractatu de Gonor-  
rhæa; Ubi prostratis glandulosis circa  
cervicem Vessicæ desinentibus, quan-  
dam assignat proprietatem sui generis  
lympham præparandi, hoc est *humo-  
rem limpidum , aquosum , tenuem , &  
lubricantem* , ad faciliorem densioris fe-  
minis ejaculationem .

Facta igitur læsione in continentibus  
hisce partibus à gallico Contagio , &  
forsan etiam,ut voluit *Musitanus*, cum  
continua affluentis,& nutritivi glutinis  
alteratione,saniosus perpetuatus est flu-  
xus,nullo propemodum delectamento,  
nec ulla voluptatis illecebra stipatus ,



qui tam Mercurialibus, quam appropriatis acidum corrigentibus non cessit; Quòd duplici de causa puto contigisse: Primò ex veneri fermenti activitate in solidis partibus jam radicata, secundò ex peculiaris Temperamenti constitutione ad calidum, & siccum cum adustione vergentis, in quo propter abundantiam partium sulphurearum facile inflammabilium, semper magis salinæ exaltantur, idcirco acquisita per effervescentiam volatilitate, à sanguinis massa, & ad acredinem disposita, à spiritu balsamico modificante privatur, & extirpatio veneri fermenti impeditur.

Præter quàmquod occasione Turcarum oppugnationis ad Peloponnesum, adque Insulas Arcipelagi excurrens die, noctuque animo, & corpore militariibus negotiis deditus, & assiduo Marte vexatus aeri maritimo se exposuit, qui falsedinem naturalem non parum ada-

uxit,



uxit, unde destructa naturali crassitie,  
& viscositate sanguinis, spirituosæ par-  
ticulæ per dissolutionem vinculo desti-  
tutæ avolarant, & relictis portionibus  
crassioribus, & excrementitiis in infer-  
nis Visceribus, aliquas obstructions pe-  
pererunt, quæ de quarto in quartum,  
dato turgescentiæ tempore à stagnan-  
tibus humoribus perterebratæ periodi-  
cas effervescentias toti massæ commu-  
nicarunt, Febremque intermittentem  
quartanam effecerunt cum levi, & ob-  
scura quadam in principio exacerba-  
tionis extremorum refrigeratione. Non  
obstupuerunt Medici tali morbo tenta-  
ri Nob. P., dum ad id dispositus fuerat  
à naturali constitutione totius, & Jeco-  
ris calida, & sicca, conspirante potis-  
simùm contracta Lue gallica, *Cujus cha-  
racterismus esse solet ipsa adustio.* Qua-  
re nil mirum, si per quatuor annos, re-  
stagnante humore noxio per intervalla  
à Febre quartana fuerit vexatus, quæ



tandem aliquibus peractis purgationibus evanuit; sed incassum.

Cum enim ad viginti annorum ætatem pervenerit, vaga Arthritide, in primis sinistrum cubitum occupante, aggressus est, ex referatis probabiliter ab Hypochondriorum Regione lixiviosis, & tartareis ichoribus præcedentem Quartanam generantibus, qui facta Methastasi in articulis sibi Imperium, arripuerunt. Ex lege etenim circulationis biliosæ, & tartareæ ferositates ab infernis Visceribus ad Cor, & mediantibus Carotidibus ad Cerebrum transmissæ catarrhales, & lymphaticas depositiones attenuarunt, quæ semper magis rarefactæ ex vicissitudinaria particularum agitatione ad infimas partes defluebant, & recedebant, inæquali semper ad motum relicta hebetudine.

Fuerit, vel fervida Viscerum naturalium intemperies, quæ æterogenea hujusmodi excrementa produceret, vel  
acris



aeris inclementia, quam in Castris evitare nequibat, ad tanti momenti muneris executionem, vel pravus ciborum, & præsertim carnis salitæ, & piscium suffumigatorum apparatus ferofas multiplicans humiditates, podagrica agitatio frequenter redibat, tumoribus foveam non concedentibus rubeo colore, atque calore annexis, qui in alterutro pede certatim sæviebant; Sed cum diverso invasionis modo, in quantum scilicet in diversas partes serpebant, & in quantum varii generis sales magis fermentabantur; In sinistro tamen Genu, & calcanei osse ad Tarsum se se extendente frequenter viscosa colluvies deponebatur, superstitie manente in tota Cruoris massa sæculentiarum proventu, & relaxato à nimia forsitan equitatione tendinum fibrosorū tono.

Adde, quod familiaris Vini meracioris abusus in Oriente consueti, principalem, & inevitabilem Podagræ fomi-

tem



tem ex labefactione primarum concoctionum, & fermentationum exagitaverit; Quam opinionem suggerit Eruditissimus Sydenham in parvo tractatu de Podagra pag. mihi 41. *Licet enim*, ait ipse, *pro verbo jactetur, Vinum potans laborabis podagra, & Vinum non potans Podagra laborabis*, extra controversiam tamen est, & variis experimentis confirmatissimum, *Vinum de facto officere*. Quod probabiliori jure suspicandum in N. N., eò quia abstemius usque ad viginti annos ex Idiosyncrasia naturæ vixerat.

Rebus ita se habentibus, & à tot recidivis conflictatus propriæ salutis studens anno 1689. curam radicalem meditabatur, quæ falcem ad radicem mitteret pro omnimoda reluctantis morbi eradicatione. Sola Chalcidis (Italici Negroponte) obsidio erat impedimento; Arduum satis opus, in quo Venetus Exercitus totum Septembrem impenderat;



derat ; Deficiente tamen Maumetanis  
Annona, & consumpto omni commea-  
tu, Urbis, aut spontanea deditio, aut  
sollicita oppugnatio sperabatur : Qua  
quidem absoluta, & fugatis Barbaris  
liberum autumnale tempus N. P. pro-  
priae salutis dicatum volebat mediante  
Methodica curatione totius morbi era-  
dicativa. Sed contrarius fuit voto even-  
tus: Dum etenim cum veterana Peditum  
Cohorte, sitim Othomano sanguine  
explere properante, circa muros excur-  
rit, à plumbea sclopeti glande Caput  
vulneratur, unde errante per vultum  
cruore in Castra euectus, ibi frenata li-  
quoribus stypticis sanguinis Hemora-  
gia à fauciatis vasis ubertim stillante,  
conveniente superaddita fasciatione,  
aliquantulum quievit.

Transactis vigintiquatuor horis, &  
noviter denudato Vulnere à primario  
Exercitus Chirurgo nomine *Fara*, ob-  
liqua reperta est penetratio plumbeæ  
Glan-



Glandis, quæ lacerato Musculo temporali dextero, ubi in parte superiore in Pericraneum definit, Cranium ipsum transversaliter perforabat; & quàmvis mortalia non adessent symptomata, læsio solius musculi, & ipsius ossis ad meditulum usque fractura magnum Vitæ periculum, vel saltem Morbi longitudinem præsefererat. Cuncta nihilominus generosa, invictaque fortitudine ferebat N.P., immò quod fuit durum pati pro Principe, dulce illi meminisse videbatur. Hinc est, quòd impensis duobus integris mensibus, scilicet Octobre, & Novembre in Vulneris curatione, se-viente jam Hyeme, cæterorum Morborum extirpatio fuit præpedita, quin etiam ipsa altiùs Serpente Gonorrhæa noxiori viru canalem inficiebat, unde in media Urethra aliæ Carunculæ incre-verunt, quæ levi quavis occasione difficiliorem mictionem inducebant.

Quare sequentibus annis, aut Febres,

tua



aut Urinæ supressiones recrudescebāt, semper cum renovata animalis Æconomia labefactione; sed, ut veris Veriora fatear, morbosam Iliadem, adeò ferre consueverat, ut vel ipsa non obstante sua munera obiret, aut solis paroxysmorum excādescentiis, in lecto ex necessitate jaceret. Talem cordis magnanimitatem novit & ipsa Venetorum Respublica; Idcirco æquo Consilio in altiores semper gradus provectus, tam Belli, quàm Pacis publico magis Bono vivebat, quàm suo.

Quid plura? Matt. Joh. Schulenburg S.R.I. Com. Ser. Venet. Reip. Campi Mareischallus Generalis solum N.N. à se indivisum *Corcyrae* voluit ad ferendam Barbarorum obsidionem eorumque impetus retundendos; Ubi quam strenuè pro Civitate, pro Principe, quàm malè pro sua incolumitate se gessit. Illum vidisses, nunc ordines committere, nunc promiscuè cum Militibus dimicare,



micare, nunc eminus Generalis dignitate perfungi. Ab externis Vallis non exhibat ad nocturnum de repente conflictum Mareschallus, quin ex alio aditu N. N. in Maumetanos non irrumperet, semper renovata Barbarorum clade, semperque redux, & onustus felici Victoria; Adeò, ut post quadraginta quatuor dies eluso Barbarorum conatu, & irritis omnibus tentatis oppugnationibus, sola fiducia in pedes versa, desperata fuga lætam Insulam dereliquissent.

Parta tamen gloria parùm potuit frui invictus noster Bellator; A peractis etenim occasione latæ Obsidionis in diæta erroribus, ab esu carnis salitæ, à noctibus insomnibus, & continua ingurgitatione Aquæ marinæ salina diathesis in universa fluidorum massa cæpit crudeliùs sævire, sicque noxiis introductis fermentationibus, & in ipso quasi dicam, vitæ discrimine constitutus,

œpræ,



operæ pretium duxit, etiam cum consilio adstantium Medicorum *Brixiam* petere, ubi conspirante potissimum nativa aeris constitutione, & Militarium curarum absentia, potiori fundamento, optata salus poterat vaticinari.

Parem nihilominus, & hinc fortunam habuit: Tertia etenim ab adventu die, dum per scalam descendit, nescio, quo Fato, à lapideo gradu præproperè labente pede validam adeò contusionem in parte postica Ossis Sacri contraxit, ut mutato cutis colore, & stagnantibus ichoribus utriusque Cruris motus fuerit præpeditus; Quinimò hac data occasione Arthriticis quoque particulis in motum positis Ischiadicus quidam dolor in ipsa parte fixatus est, ubi propter aliquam læsionem in partibus solidis, & successivam debilitatem, etiam in posterum per intervalla semper recrudit.

Aliquantisper tamen tunc temporis diminuto, & vix, ad dispositionem

ratio-



rationalis curationis expiatis primis vis, nobis, & ipso N. N. inscientibus, Supremæ adveniunt Litteræ sollicitum reditum in Orientem imperantes; Maumetani etenim, partim reliquiis fugati Exercitus, partim inermi Militum turba novam Classē instruxerant, quæ Venetis Regionibus vastitatem minitabatur. Tali nuncio non excanduit N. P. sed Principi, ed Honori se natum esse suspiciens, nec Amicorum precibus remoratus, nec Parentum lacrymis emollitus subitum, ac periculosum iter aggreditur, transfretat maria, & in Orientis littora allidit. Ibi ex Decreto Excellentiss. Andreæ Pisani præclarissimæ semper Memoræ, Supremi tunc temporis Venetorum Reipublicæ Præfecti, & Socio Marte cum Mareischallo Schulenburg- *Nicopolim*, & *Anactoriam* stricta Obsidione agit, brevissimoque temporis tractu memoranda Turcarum clade Veneta Vexilla in  
utraque



utraque Urbe defixit.

Sed, Heu ! Nimis importunè tanti laboris immeritas pœnas coactus est luere, dum à præpollente, ob tot errores, in liquidis morboſa Diatheſi, & irritata à continua equitatione Regione Perinæi, paulatim Tumor ſubortus eſt à Scroto, uſque ad Anum ſe extendens, qui vel Urethram comprimendo, vel Carunculis in Meatu radicatis inflammatorium eſtum ſuggerendo, Urinæ tranſitum omninò prohibuit; Quapropter crescente in dies Tumore, propter neglectā Meatus Urinarii deobſtructionem, ſuppoſita ab Adſtātibus neceſſaria ſuppuratione ſectionem *Antonius Garbellotti* celebravit, qua ferè dicam eodem momento repetita, & in profundiores partes inſculpta à *Jo: Baptiſta S. Marie* Chirurgo *Gallo*, nullum tamen, aut Pus, aut Urina exivit, ſed ſolùm ſanguinea quædam ichoroïſtas, à ſectis *Valis* tranſudans.



Delusi ab inexperta penetratione ambo Adstantes Chirurghi, & sævientibus doloribus, anodinum Cataplasma toti Perinaeo imponunt, immò Prudenti Consilio Semicupium aquæ dulcis instituitur, à quo emollita Fibra, & laxatis Vasis, mediante placidiori Humorum circulo Tumor aliquantulum diminutus fuit, præcipuè propter datam Meatus Urinarii portam; Ubi jam mitescente Caruncularum inflammatione, Urina pedetentim stillabat. Remansit tamen non exigua Tumoris portio, quæ per totum Hyemem 1717. variis remediis tractata à Domestico Chirurgo, scilicet *S. Marie*, tandem proxima Æstate in *Olcinii* Obsidione ad tantam magnitudinem est evecta, ut Caput Infantis æquaret, unde discontinuatis Vasis, & non solum Urina, verum etiam particulis sanguineis in ipsam cavitatem extravasatis, verè suppuratoria facta est fermentatio, quæ superato partium car-

nosa-



nosarum renixu , exitum in Perinaeo sibi aperuit.

Tentata incassum finis Coalitione *Venetias* ventum est , ubi repetita incisione , & balsamicis per quadraginta dies in usum positis , reluctante morbo, necessarium censuit celeberrimum *Lealem Leali* consulere . *Pata-vii* itaque a Sapientissimo Professore expiata non solum parte , verum etiam attentè considerata quadam Febricula habitualis specimen præseferente , methodicam meditatus est curationem in Patria absolvendam . Quacum *Brixiam* pervenisset 3. *Decembris* 1718. illico accercti fuerunt Medici, Eruditus scilicet Dom *Petrus Sala* , & *Constantinus Roncallus* Pater meus , ut socio studio, & diligentia saluti N. P. incumberent . Hora autem Noctis prima ipsum valida Febre correptum invenerunt , cumque Pulsus auctam agitationem itineris incommodo tribuendam tenerent , difficile fuit



cognoscere, utrùm ratio continuitatis, an ratio Periodi prævaleret. Inspecta parte, Tumor in primis durus, sed parvus ad tactum dolens circa radicem Penis apparuit, qui in dextero latere quandam veluti continuationem cum Scroto præseferibat. Inferiùs in regione Perinæi sinus fistulosus inventus est callosa, & profunda duritie circumvallatus, cujus tamen fundum, & insinuationis modum, tunc temporis brevitatis, & quietis gratia, non placuit inquire. Interim emplastro emolliente ex pane, & lacte Scroto, & Inguini superimposito filacea turunda digestivo rosato illita in Fistulam immerita est, summaque quies est imperata, ut refractæ vires ex longi itineris fatigatione aliquantulùm resurgerent.

Summo mane, nobis redeuntibus, notabilis exacerbationis remissio inventa est, quæ licèt duplici tertianario Circuitu stipata videbatur, nihilominus habi-



habitualis Gallica censita fuit, tam ratione vespertinæ invasionis, quàm essentialis continuitatis; Quare non fuit dubitationi locus, quin in tota Sanguinis massa continua succi nutritii labefactatio supponeretur, quæ corporis habitum colliquatis Humoribus ad tabidum statum paulatim reduceret; Fodina verò nocturnæ exacerbationis ultra Sanguinem statueretur, in loculis scilicet Glandularum conglomeratarum, ubi Lympha particulis crudioribus, & improporionatis à Gallico contagio detinebatur. Sic opinatus est D. *Petrus Sala* Galenicæ, atque Hippocraticæ disciplinæ fidelis Cultor, quòd nempe à ductibus lymphaticis unde quaque in Sanguinem refluxis febrile fermentum massæ Sanguineæ confunderetur. Indicio erant pulsus Arteriarum depressi, lassitudines in Cruribus, & frequentissimæ oscitationes, seu motus quidam Musculorum convulsivi Maxillam inferiorem depri-



deprimentes, & interdum aliqua extremorum refrigeratio, durante probabilitè extranei succi intra cruorem ingressu. In Cordis tamen ventriculis acquisito intimiori quodam cum Sanguine connubio, febrile virus à præpollente Sanguine comminuebatur, & secuto partium unibilium vinculo, & æterogenearum subactione Paroxismus febrilis solvebatur, sed imperfectè. In Sanguine etenim restitantes reliquię continuò radicabantur, quæ à novo adveniente succo tempore accessionis renutritæ continuam, sed lentam pulsus vibrationem inducebant.

Aberat sitis; Cibus honestè appetebat, & aliquibus per intervalla horis somno indulgebat, nisi quòd à recrudescente Dolore ad radicem Penis vexabatur. Tumor tamen in circumferentia minor, & ad tactum mollior apparuit, & per consequens cereæ candelæ experimentum per Meatum Urinarium

con-



concessit. Vix tamen in Penis canalem immissa est, quòd se se exhibuit callosum obstaculum in medio Glandis parenchymate ad Urethræ fundum radicum, quod prima insinuatione impermeabile videbatur, sed repetito suaviter impetu, ad miniculante diversa Glandis pressione, cum tolerabili dolore superatum est: Duobus digitis transversalibus circiter post primam secunda obstruens Caruncula occurrit, priori minor, sed exquisitissimi sensus, utpotè carnosæ, ad oppositum primæ, quæ in Callum Cicatrice facta obduruerat. Superata secunda insignis de repente dolor subortus est, propter contactum summitatis rectè candelæ in oppositum latus Meatus tortuosi; Interposita tamen aliqua temporis mōra, cerea Syringa propter nativum calorem ad sufficientem mollitiem redacta, Meatus Urinario, quàmvis exulcerato, coadaptata ad tertiam Carunculam pervenit. Varius fuit



modus insinuationis, variæ pressiones, multi impetus, sed omnes frustranei, Inflammata etenim Caruncula penitus Canalem obstruebat, immò renovato impulsu irritata majus spatium occupabat, quare ab ulteriori opere abstinendum, statutum est.

Interim Matula exhibetur, dum Penis dolorosa tractatio mejendi desiderium excitaverat. Exit Urina obliqua, bifurcata, & adeò subtilis, ut interdum omninò interciperetur. Obstupuimus omnes, facilèque conjicere nobis licuit Strangurias, & Urinæ stillicidia in Oriente passa, ubi circa mictionis finem, cum acerba mordicatione, immanis ardor usque ad Glandis extremitatem sentiebatur, à solis incrementibus Carunculis ortum duxisse. Major tamen Urinæ quantitas ex Mechanica necessitate per Fistulam in Perinæum præcipitabat, & cum ratione; Liquidum etenim urinarium, transacto Vessicæ collo à tribus  
validis



validis resistentiis identidem reperculsum, qua data porta debet fluere; & utinam felici cum exitu disiliisset, dum N.P. à tot dolorum, & inflammationum Iliade præservaretur; Attenta siquidem argentei specilli intrusio Urethræ foramen circa sinistrum latus manifestabat; Quapropter Urina in erectores Penis Musculos è directo propulsa per carnea interstitia filtrabatur, Tumoribusque Scroti, & Perinæi ansam facillimè præbebat.

Illud porrò observatu dignum fuit, quòd Urina lacteam indolem præseferbat, crustulis membranaceis, ac veluti furfuraceis saturatam, quæ cum motu spirali in gyrum circumagerentur, nec illicò in fundo Matulæ residerent, ancipites nos reddiderunt, utrum legitimi puris, aut seminalis genituræ naturam redolerent; Juxta illud *Ettmulleri pag. 834. in Gonorrhæa tam benigna, quam virulenta Genitura Urinæ supernatat*



*natat instar cremoris alicujus, contra Pus,*  
*& Pituita fundum occupant.* Augeba-  
tur difficultas, quia continuata Urethre  
exulceratio usq; ad Vessicæ collum tan-  
tam materiem plorare non poterat, &  
præcipuè, quia dum Sphincter à me jen-  
do feriebatur, purulentia supra tertiam  
Carunculam genitæ per Fistulam de-  
fluebant. Persuasi itaque mansimus a-  
cidum Gallicum suæ ideæ specificum,  
quod in Glandularum mæandris, *aliis-*  
*que corporis recessibus* statuimus, *sub Pu-*  
*ris viscidis fixioris, minusque volatilis*  
*forma* in Urethram posse derivari, ubi  
ab aliqua Prostatarum Glandularum  
exulceratione auctum, cum torminoso  
per totam Urethram cruciatu præterfluit.

Ex diversa itaque solidorum contrao-  
perantia, & fluidorum mixtione mani-  
festa, & occulta qualitate peccantium,  
serum ex glandulosis Corporis recessi-  
bus Venereis excrementis saturatum,  
nec ulla concoctione, aut remediorum  
genere



genere domitum in vias urinarias imbecilliores redditas derivatur, ubi ab Urethræ exulceratione multiplicatum Urinam lacteam, & purulentam constituit: Quòd brevissima temporis mora magis patefecit. Vagantes etenim moleculæ celerrimè dilabentes fundum occuparunt, mox exiguo Matulæ motu ascendebant, donec vitro quiescente in fundo denuò declinarunt, &, sublato dubitationis loco, genuinum puris characterem exhibuerunt.

Talis Affectuum diathesis, non tam à morbosæ constitutionis indole, quàm à laboriosi itineris incommodo succreverat. Ob nimiam quippe Corporis agitationem, & molestas aeris vibrationes, quæ potissimùm occasione menjendi in partem affectam desæviebant; Unde haud mirum, si à violenta Fibrillarum crispatione retardato debito fluore liquida ad stagnandum majorem



rem promptitudinem adsciverint, sicque subtilioribus particulis dilabentibus, crasiores prima subsidentiae rudimenta jecerint: Quibus in dies adauctis, immò novis jugiter ejusdem molis, & gravitatis noxias suppetias afferentibus aucta Villorum contractione, & effeminato partis tono inflammatoria dispositio ad radicem Penis in dextero latere excrevit, quæ ab interfluente per occultos Canaliculos Urina exacerbata suppuratoriam fermentationem minitabatur.

Rebus ita se habentibus, anteqam aliquod remedium executioni mandaretur consultatio Eruditissimi *Lealis Leaii* in Patavino Lyceo P.P. exhibetur, cujus verba ad auctoritatem hìc non pigeat inferere.

, Sono tutti tralci di una sola radice,  
 , cioè à dire di Lue venerea li fastidiosi  
 , mali di S. E. Più Gonorree poco, e mal  
 , curate furono li primi abbominevoli  
 frutti



, frutti della pestifera pianta , e queste  
, rodendo ben presto l' interior faccia  
, del Meato orinario v'eccitarono l'ulce-  
, re, da cui poscia germogliò come fuol  
, farsi la carne lussureggiante , che vol-  
, garmente Carnosità vien detta . Prof-  
, fondatosi l'Ulcere con il corso del tem-  
, po avvalorato da molti , e gravi errori  
, nel vivere , che porta ordinariamente  
, seco la Vita Militare , passò finalmen-  
, te a formare quel sino, che ora nel Peri-  
, neo si vede , da cui sgorga la maggior  
, parte dell'Orina, circonvallandolo con  
, evidente tumefazione , che sin alle ra-  
, dici della Verga si estende .

, Rimarcabili sconcerti della salute  
, son questi ; Ma offese però particolari  
, di parti destinate a bassi officj nell'ani-  
, mal Economia , e perciò incapaci per  
, se d'insultare la vita, quando espugna-  
, to il veleno venereo , non le andasse  
, accompagnata una Febbre lenta, tanto  
, più da stimarsi , quanto men conos-

ciuta



, ciuta da S. E., fuor che nello smarri-  
, mento delle consuete forze, e nella  
, danneggiata nutrizione del Corpo tut-  
, to. A questa, che insidiosa, e senza  
, mai cessare l'offende, altra ben mani-  
, festa, ma vaga di tempo in tempo s'u-  
, nisce, che posta in essere da copiosi tra-  
, lignanti fughi, viene per lo più a ter-  
, minarsi in un copiosissimo rimarcabi-  
, le sudore. Questo, che è lo stato pre-  
, sente di S.E., dimanda per mio giudi-  
, cio, a dispetto anche della stagione  
, qualche pronto soccorso, acciò che  
, rinvigoriti i mali, e rinforzata la loro  
, causa per l'oziosità medica, non ven-  
, ga l'una, e gli altri a farsi più contu-  
, maci, e men atti a intieramente cu-  
, rarsi.

, Una tal massima giustamente rice-  
, vuta, non men chiaro si vede, doverfi  
, principiare questa cura dalla espurga-  
, zione della causa, perche senza la di-  
, struzione d'essa, che incessantemente  
sostenta,



, sostenta, anzi di giorno in giorno sem-  
, pre più nutrice gli altri mali, che sono  
, sua prole, ogni opera farebbe vana, ed  
, ogni fatica gettata.

, E perche questa causa non si può vin-  
, cere, che con il mezzo de' specifici, ed  
, appropriati aleffifarmachi, che sono  
, decozioni di Guaiaco, Salsa, ed altro,  
, ò Mercurio in varie guise preparato, e  
, somministrato, volli ad uno di questi  
, gran rimedj, dopo qualche prepara-  
, zione del Corpo, dar animosamente  
, di piglio.

, In fatti, senza dubbio, quest' ultimo,  
, come più valoroso, e più sicuro, quan-  
, do specialmente si tratta di Lue celti-  
, ca antica si doverebbe presciogliere ;  
, Ma riflettendo alle Febri vaghe, che si  
, sciolgono utilmente in copioso sudo-  
, re, ed alla naturale facile disposizione  
, di S. E. a questa universale evacuazio-  
, ne, parmi, che servir possa sufficiente-  
, mente per il presente bisogno il decot-



, to de' nominati legni, accompagnato  
, da sudore, come quì appresso diràssi.  
, Pervenuta dunque S. E. in Patria ,  
, dopo il riposo di un giorno dia mano  
, a preparare, e disporre il Corpo per  
, l'uso dell'acennato rimedio con una  
, pozione di Manna sciolta nell'infu-  
, sione di Senna, e Tartaro alla quanti-  
, tà di sette in otto oncie. Da una simi-  
, le, che quì prese, s'ottenne copiosa, fa-  
, cile, ed utile evacuazione, onde se ne  
, può attendere simile anche in Brescia  
, l'effetto. Passate quattro ore con l'in-  
, termezzo di una tazza di brodo liscio  
, prenderà cibo; Cinque, o sei giorni se-  
, guenti si passeranno con due dramme  
, ogni mattina di bianca Magnesia ben  
, preparata, e spogliata da ogni sapore,  
, disciolta in brodo tenue, o acqua di ci-  
, coria a piacimento. Indi con un'altra  
, pozione ponga fine a questa picciola  
, purga, per dare sollecito principio al  
, decotto alexisfarmaco, qual si prepara-  
, rà in



,rà in questo modo *Rx. Lign. guai. ping.*  
 , in scobem recenter redacti unc. ii. *Sarsa-*  
 , paril. *S. A. incis. unc. i. Rad. chin. in tal-*  
 , leol. incis. unc. s. inf. *S. A. in aqu. fontis*  
 , lib. iii. s. per *Nyctemerum*, deinde igni  
 , ad mota bull. *S. A. ad consumpt. ferè di-*  
 , midii; *Ubi refriserit col. & ex hac col.*  
 , sumat mane simul cum *Merc. diaphor.*  
 , gr. v. *Dosis verò separetur ad exigen-*  
 , tiam. Il primo giorno passeràssi senza  
 , provocar sudore, ma nel secondo pas-  
 , serà *S. E.* un ora dopo il decotto ad ec-  
 , citarlo nella consueta Stufa vaporato-  
 , ria, osservando, che il Calore della ca-  
 , meretta non sii eccedente, o troppo ri-  
 , messo, ma quanto basta per aprire le  
 , porosità della cute, e mover modera-  
 , tamente il Sudore. A che fare con-  
 , vien sciegliere Ministro perito, dipen-  
 , dendo molto da questo il bon esito del  
 , rimedio. Promosso il Sudore passerà  
 , nel letto ben caldo, in cui si anderà se-  
 , condando per il spazio di un'ora. Scri-



, vo per minuto queste cose , perche co-  
, sì hà voluto S. E: per altro so quanta  
, Virtù, & esperienza distingue frà mol-  
, ti que' Soggetti , che dovranno affi-  
, sterle, e conseguentemente essere sov-  
, verchio ogni cenno sopra questi ordi-  
, ni, e cautele .

, Così a poco a poco anderà S.E. avez-  
, zandosi alla Stufa , in cui trattenerassi  
, con il passare de' giorni, quanto venirà  
, conosciuto necessario , per spremere  
, con tal mezzo dal sangue , e dalle par-  
, ti offese , con gli escrementi, che le in-  
, festano, il veleno, che li produce. Ogni  
, Settimana prenderà un Solvente a suo  
, piacimento, e mi piace sempre la sud-  
, detta pozione , per scacciar e con li ri-  
, masuglj del decotto gli escrementi più  
, grossi mossi dal Diaforetico, ma inca-  
, paci di uscire in figura di sudore dalli  
, pori, ancorche ben' aperti della cute.

, L'uso di questo gran rimedio dove-  
, rebbe estendersi a quaranta giorni ,  
poiche



, poiche radicato il male in stagione av-  
, versa, senza un tal tempo, non può  
, estirparsi: Chi sarà prescelto ad assi-  
, stere, regolerà senza dubbio la sua più  
, o minor estenzione a misura del biso-  
, gno. E quì mi sia permesso di raccor-  
, dare a me medesimo, doverfi per il  
, buon' esito dell' impresa sciegliere  
, stanza piccola ben chiusa, e conserva-  
, ta sempre ben calda, specialmente la  
, notte, acciò che si possano con tal mezz-  
, zo conservare le porosità cutanee in  
, quel diametro, che è necessario, per  
, dar loco, e facilità al novo Sudore da  
, provocarsi la mattina. Io me lo dico  
, un'altra volta, se si lascia chiuder la  
, notte ciò, che si è aperto il giorno, dif-  
, ficile, e scarso sarà il Sudore, e l' alle-  
, viamento imperfetto.

, Ogni mattina terminato il Sudore  
, si consolino le parti Spirituali, con lo  
, Stommaco, e Viscere adjacenti media-  
, nte l' uso di una copiosa scemata fatta,



, con semi di Melone in aqua d'acetosa,  
, e resa grata cō un pō di Zucchero fino.  
, Alla region delle Reni farà bene appli-  
, care l'unguento rosato bianco, non  
, meno che alli Ipocondrij il malvino. Il  
, temperamento fervido di S.E. diman-  
, da questi ajuti esterni, & interni, ed il  
, tralasciarli farebbe forse di non lieve  
, pregiudicio, anzi d'impedimento al  
, frutto, che intendiamo di raccogliere.  
, Nel resto per quello riguarda alla re-  
, gola del suo vivere, uscrassi una dieta,  
, ne troppo austerà, ne troppo piena. Pa-  
, ne biscotto, Mandole, Uva passa, co-  
, me si suole, ma due o tre volte alla set-  
, timana un pō di Carne arrostita, non  
, si disdice qualche Ovo fatto di fresco,  
, e si loda l'uso del sugolo d'orso la sera.  
, La decozione di Salsa fervirà per bere,  
, dandosi intero congedo al vino, fin  
, che durerà l'uso del decotto. Questo  
, terminato dovrassi per qualche giorno  
, temperar qualche poco il Sangue reso  
fervi-



, fervido dalla Natura de presi rimedj,  
, con bibite in ore opportune di fiero  
, Caprino depurato, aqua d'acetò, di cic.  
, o simili , con un Cuchiaro di Zuc-  
, chero rosato, lasciando al maturo giu-  
, dicio di chi assisterà il considerare , se  
, fosse bene, ancorche in tempo assai ri-  
, gido aprire la Vena , e lasciar uscire  
, sett' oncie , in otto di Sangue .

, Tutto il detto riguarda l'universa-  
, le , ma profitterà , non poco per sollie-  
, vo delle offese particolari , che esige-  
, ranno ancor esse nel tempo stesso cura  
, e governo .

, In primo luogo dovràsi conservare  
, aperto il sino d' onde scaturisce nel  
, tempo di scaricare la Vessica , l'Urina,  
, schivando , quanto sia possibile d' irri-  
, tare la parte assai di sua natura sensiti-  
, va , e in cui data ogni piccola occasio-  
, ne vanno a precipitare novi Sughi, ca-  
, paci di causar dolori , e ingrandire le  
, presenti tumefazioni . Tutto per altro



, sia leniente, e temperante, e in tal maniera composto, che vaglia a risolvere, il tumefacente, ma nel tempo stesso a dar vigore, e forza alla parte stessa. La, tasta de fili ben intorti sia per lo più, senz' altra medicatura; Con questa si, conservi ampio, e retto il fino, si che, spremuta per l' ulcerata Uretra l' Ori-, na esca liberamente, senza aver tempo, o luogo da farsi de nascondiglji, e prod-, dur novi fini, come ordinariamente, suol succedere a meno avveduti. Al-, diffuori il Cerotto Diapalma, con l'O-, xeleo bianco. Alcuna volta il linimen-, to semplice con l' Oglio rosato onfaci-, no, e l' onzione dell' unguento rosato, malvino, o del bianco servirà non po-, co a temperare qualche alterazione, che succedesse nel uso della Stufa. Il, tumore, che circonda la Verga verso, la Pube si ammollisca, come fin quì u-, tilmente si è fatto, con un linimento, di Oglio di Mandole dolci freschissi-,  
mo,



, mo , sperma di Balena non rancio , le-  
, gati l'un l'altro con il Malvino . Così  
, fino che si travaglia in ordine alla de-  
, purazione del Sangue , e l'estinzione  
, della Lue celtica . Ciò successo, reste-  
, rà l'ulcere finuoso da curarsi, e con ef-  
, fo da tentarsi la consolidazione del  
, rotto Meato orinario . Opere grandi  
, e sommamente difficili, ma da non  
, sperarsi ottenute, quando prima non  
, si levi la Caruncula, o sia Carnosità, ef-  
, fetto bensì dell' Ulcere istesso, ma cau-  
, sa poi potissima della perforazione nel  
, Perineo, la di cui cura è ben prima  
, nell'intenzione del Medico, ma deve  
, essere l'ultima, quando a Dio piaccia  
, di benedire l'opera nell'esecuzione.  
, Secondi il Cielo l'adempimento di  
, questa, come la cognizione, e l'espe-  
, rienza ne insinuano quella, il che, con  
, tutti li voti de proprio Cuore augura.

*Leal Leale.*

Consensit Eruditissimi Viri Auctori-



tas cum Adstantium opinione, nisi quòd  
P. Mannę Mag. ad *unc. vi.* tantum reda-  
cta est, cujus moderatis evacuationibus  
aliqua etiam Tumoris inflāmatorii ad  
radicem Penis facta fuit remissio. Sed  
hora vespertina Febris iterum exacer-  
bata est cum levi lumborum perfrige-  
ratione; Post mediam noctem nihilo-  
minus quievit, nobisque summo mane  
adventantibus consueta solum Febris  
pari semper tenore progrediens, cum  
acri ad tactum calore, & insigni corpo-  
ris macie inventa est. Interim parva  
quantitas Magnesię albę ad normam  
Consultationis exhibetur, per octo dies  
continuanda, & omne studium in com-  
pescendo inflāmatorio Tumore versa-  
tur. Rubicundus etenim ad radicem  
Penis in dextero latere prominebat, fu-  
turamque suppurationem minabatur.  
Remedium ad resolutionem erat diffi-  
cile, quàmvis causa esset manifesta; Te-  
nuiores siquidem Sales in Urina con-  
tenti



tenti in Musculorum interstitia penetrabant, quorum Fibrillæ à suis aculeis vellicatę, & lancinatę in violentas, & dolorosas vibrationes agebantur, sicque à Vasis sanguiferis, aut compressis, aut disruptis comprehensus humor effundebatur.

Ab antiquo etenim Urethrę foramine ad externos probabiliter Meatus Urinarii parietes continuato Urinæ, vel transitu, vel impulsu, pressa, & arctiùs unita omni ramulorum serie, Sanguinis stagnatio semper augebatur, & impedito spirituum animalium per fibras nerveas influxu, liquidis pigriori lapsu circulantibus, partes sulphurę allisione attritę deponebantur, subtilioribus evaporatis, viscidusque Sanguis insita volatilitate destitutus in parte jam fermentescebat.

In hoc statu rerum, cum Tumor verborum lenociniis nequaquàm abiret, præmissa Pubis, & Scroti inunctione,  
cum



cum ung. rosat. malvino, usi sumus  
 saltem ad dolores compescendos em-  
 plastro ex sequentibus, Scilicet *Nastur-*  
*tio aquat. Menth. fol. Sambuc. far. Faba,*  
*& Lupin. cum ung. alth. martiato &c.*  
 Tepidè applicato lancinantes puncturæ  
 aliquantulum videbantur mitigari;  
 Sed salinis particulis, quæ à crasso, visci-  
 doque sulphure irretiebantur, denuò  
 in motum positæ, extravasatique li-  
 quoris Moleculas perpetuo motu exa-  
 gitantibus, destructa fermentantis ca-  
 loris ope carnea Compagē, puris princi-  
 pia jam fluctuabant; Quare perfectæ  
 maturationis solliciti, ne materia intus  
 coercita, retuso impetu, majorem cavi-  
 tatem sibi strueret, cum adjacentium  
 partium manifesta jactura, superposi-  
 tum est cataplasma ex radicibus *lili alb.*  
*alth. fol. malu. Mercurialis, Branc. ursi.*  
*far. Hord. sem. lin. &c.*

Puris generationem immanis dolor,  
 & aucta Febris per intervalla excande-  
 scens



scens comitabatur, & quàmvis abscessus introrsum non properaret, sed potius versus cutem externam emergeret, atamen ne nimis extenuata difficilè agglutinetur, & ulteriorem per omne latus cavitatem metuentibus, ad sectionem deventum est.

Facta fuit secundùm Fibrarum longitudinem, & Musculorum processus, in parte ad possibilitatem decliviori, ubi scilicet major undulatio sentiebatur, ut sufficiens fieret incisio, quam requirebat partis laborantis natura, & Tumoris magnitudo; Exivit Pus album, leve, & æquale, cumque malè non oleret, citiùs salutem pollicebatur.

Non est hujus loci inquirere, utrùm Pus ex substantiali mutatione Sanguinis, aut ex humore partis nutritivo resultaret, his etenim est promptioribus ingeniis agitanda; Cum *Doleo* tamen crediderim, *Chilosas particulas Sulphure occasione fermentationis defraudatas*



no viter album colorem præferre, qui puris nomine nuncupatur. Interim stuppa ovi albumine quassato imbuta imponitur, spatium viginti quatuor horarum detinenda, quibus postea transactis, proportionata turunda digestivo illita purulenta fanies expurgaretur.

Cum ecce ab improvisa partium perfrigeratione aggreditur, cum tali Arteriæ depressione, ut vix obscurum quoddam audiretur Pulsus minutissimi Specimen. Duabus post invasionem horis accedimus omnes celeritè acciti, invenimusque Pulsum aliquantulum resurgere, & febrilem calorem se se exercere. Finis pugnae incommoda demulcebat; Depuratoria etenim erat Febris illa, quæ octo, vel decem dierum spatio recrudescentia ex multiplici forsan producta excrementorum genere ad turgescientiam redacta, cum blando, & universali Sudore judicabatur, quem Pulsus elatus, & turgidus jam jam portendit.



tendebat . Tota nocte sudavit , & mane cum tranquillo , & nunquam interrupto somno quievit , quodque admirationem inducebat , ædematosæ prominentiæ suppuratum Tumorem , & finum fistulosum in Perinæo circumvallantes penitus evanuerunt .

Itaque secundo Medicamine exhibitto , ut firmo tramite incederemus , de-nuò in consilium vocamur .

Decoctum alexipharmacum , & sudoriferum poscebat N. P. propriæ salutis desiderio , & fultus Pata vina auctoritate ; Sed obstabat Febris lentè depascens , & nocturnis stipata exacerbationibus , obstabant virium prostratio , & semper aucta corporis macies . Necessariò etenim actu sudoris ab aromatica , & oleosa vi Guaiaci, Salsæ, & Sassafras . Massa fluidorum confuso particularum motu fermentescit, & ad dissolutionem attenuata disponitur , unde toto intensius incalescente corpore , Febris auge-

tur



tur ; Præter quàmquod læviente jam frigore, Fibrae nervæ glandulas subcutaneas contexentes, non ita facilè ad tantam laxitatem deveniunt, ut Scoriarum excrementitiarum æterogenarum Gallico contagio coacervatarum, & ad ambitum Corporis diffusarum perfectè eliminentur, aut si ab aucto igne & stragulis violenter laxentur, ros quoque nutritivus latici aquoso immixtus diffluit, cum notabili spirituum animalium deperditione.

Interim, dum Adstantes oculatissimi in ancipiti hærebant, Lues crudelioribus phenomenis serpebat, & Sanguis in circulationis necessitate noxam de facili hauriebat. Remedium itaque statutum est, quod specifica vi polleret, tam ratione Luis, quàm ratione emaciationis, sed sine Sudoris auxilio; Nutriens, & Alexipharmacum distillatum præscribunt tenoris sequentis. *Rx. Sarsaparil. unc. vi. Rad. chinæ unc. ii. Medul. lign. guai. unc. i. v. Visc. querc. unc. i. Sant.*



*Sant. citr. dr. ii. Cinamom. acut. dr. i. incid. & contund. oīa S. A. & f. inf. in aq. Cich. end borag. aa. lib. ii. per noctem, manepon. in Baln. M. cui add. Pullus jun. deplumat. & exante. Ranar. decorticat. lib. ii. Caud. cancr. mund. lib. i. Lact. vacini lib. vi. distill. oīa S. A. pro usu.*

Quod etenim plus faciescebat negotii in N.N. erat universa Corporis Macies, quæ consumpta pinguedine ad tabem jam properabat, eo quòd imminuto activo corporis principio, & nutritivo glutine carnosis pororum diametris amplius non respondente, particulæ alimentares, non nisi cavitates majores replebant, reliquisque minoribus, in partibus carnosis vacuis remanentibus, interstitia muscularia ad contactum nitebantur. Hoc probabiliter succedebat à crebrioribus Massæ Sanguineę circulationibus, in quibus ros nutritivus parietibus vasorum adhærens de facili abripiabatur, unde impedita assimilatione  
tolle



tollebatur Nutritio. A continua tamen remedij exhibitione sperabatur salium peregrinorum obtusio, particularum æterogencarum attenuatio, ita ut tota Sanguinis Massa mitescere, & spatiis fuga, & dilapidatione humorum antea inhabitantium relictis denuò à nutritivo Glutine repletis, in statu pristino sub magnitudine jam acquisita Corpus nutriretur.

Hoc tamen difficile eventurum opinabantur, nisi aliqua moderatio fluxui seminali, & virulento impertiretur; Quemadmodum concepto à spiritibus animalibus in Corporibus nervosis hospitantibus caractere annosi Contagii, totius Urethræ nutrimentum altiùs insculpto Ulcere in faniem vertebatur & relaxatis Prostratis glandulosis supra cervicem Vessicæ excurrentibus putrescens Semen, semper sui juris in Uretram defluebat; Inibi repertis carnosis obstaculis in Meatu Urinario radicatis  
subti-



Subtilior, & serosa portio stillatim filtra-  
batur, quæ perpetuam Gallicam Gonor-  
rhæam constituebat, reliquis crassiori-  
bus per Fistulam in Perinæum præcipi-  
tantibus, & quàmvis semper majoribus  
turundis ex spongia cerata præparatis  
sinus fistulosus patulus sese offerret, tam  
Urinæ transitu, quàm purulentia; Ni-  
hilominus in tortuoso itinere novos  
semper Cuniculos Urina sibi struebat,  
cum partium adjacentium torminosa  
inflammatione sæpè, sæpiùs suppuratio-  
nem minante; Quapropter præmis-  
sa sinus quò ad profunditatem, & quò  
ad latera sufficienti dilatatione, usi su-  
mus cannula plumbea undique forami-  
nibus obvia, ut tam purulentia ab U-  
rethra, quàm ichorositates à tenuissi-  
mis, & cæcis Mæandris in Fistulam se se  
exonerantes data porta possent effluere.

Non obstante hac diligentia in par-  
vo Tumore ad radicem Penis arte sup-  
purato, occasione mejendi, aliqua Uri-



næ stillæ apparuerunt, quæ diebus antea actis à Puris particulis crassioribus superinductæ oculorum aciem effugiebant: Attamen balsamicè tractandum, & ad cicatricem perducendum Pater meus opinatus est, ne perenni Urinæ effluxu crassis, & terrestribus particulis ad Meandri latera tenaciter adhærentibus, inducto Callo, in Fistulam perniciosam migraret; Quòd facillimè poterat contingere ratione Partis affectæ imbecillioris redditæ, & potissimum, quia parvus Tumor ad radicem Penis, quamvis Brixia solùm suppuratus, antiquam, ne dicam annosam redolebat originem, per consequens conjicere licet, Urinam occulta via, occasione exacerbationis in ipsum migrasse, actu verò remissionis recessisse; Quam quidem viam ad Fistulam dispositam omnis in arte versatus fatebitur.

Pari etenim ratione, Fistula in Perinæo, inter duos extensores Penis Musculos



sculos ab Ani sphinctere prodeuntes sita, quæ Venetiis, & in Oriente tot exercuit Chirurgorum ingenia, non nisi ab Urina carneam compagem scindente, Scrobemque sibi excavante originem habuit, quæ adhuc cum foramine rotundo, labiis duris, & callofis, semper humida cum exiguo dolore perdurat. Deo tamen dante illam curaturam speramus, sed in favorabili temporis constitutione, & prius emollitis ab Hypocausto Carunculis, & appropriato medicamine penitus extirpatis.

Interim insistendum in usu distillati statuunt, quoniam à sola exhibitione 13. dierum Lues, Mitioribus Phenomenis fatiscebat, & nocturnæ exacerbationes aliquantulum Mitigabantur; sed, *Martii* 10., ab improvise recrudit Febris erratica, & depuratoria cum solita partium perfrigeratione in regione præcipuè lumbari, dorso, & scapulis. Post tres ab invasione horas Pulsus se se



exeruit, & suscitata intestina discordia à salium peregrinorum exaltatione, Massa cruoris ab inflammatorio infarctu, mediante Universali sudore liberata est.

Dubium erat, utrum erraticæ hujus excandescentiæ fermentum insensibiliter aggestum, & nunquam sanguini assimilatum, neque per repetitos circuitus in naturalibus pororum dispositionibus secretum, in glandulis mesentericis hæreret [modus etenim insinuationis in Sanguinem cum horripilatione in lumbis, & scapulis, ubi ductus Thoracicus vasa Chylolymphica excipiens excurrit] an potius ex detentis purulentiis in aliquo cæco sinu communicationem cum Fistula non habente, qui tractu temporis ad turgescentiam radactus mediis orificiis vasorum sanguiferorum, in absconditam cavitatem hiantibus in Sanguinem migraret; Ut ait *Waldischmidt*, illis verbis: *Si attendamus,*



*damus, quòd quoties portio de sanie, vel pure Sanguini refluo, vel humoribus circulantibus, & ad vasa lymphatica redeuntibus, admiscetur, mixtio, & crasis totius Massæ sanguineæ turbetur. Posteriori opinioni videbantur favere tumores in Pube, Scroto, & Perinæo, quæ in fine erratici Paroxyismi emollitæ, penitus evanescebant, duris tantum callosis circa radicem Virgæ, & Fistulam Perinæi pertinaciter remanentibus.*

*Temporis tractus rem patefecit, dum pluries recruderunt erraticæ Febres, quin in affecta Parte nullus præcederet Tumor, nullæ inflammationes: Quare inconcussa stetit opinio, ab occultis Viscerum, & Glandularum ambagibus excrementitiis ichoribus ad plenitudinem saturatis, fodinam Febrium supeditari, in quarum postea occasione, cum universali Sanguinis despumatione, etiam Tumores inflammatorii mitescebant, & criticè judicabantur.*



*Aprilis* tamen undecima, cessante hyemali aeris constitutione, assiduo per quadraginta dies distillati nutrientis usu à continua Febre, & tabe in dies magis, magisque liberatus reffectis Viribus, in Vultu minus adustus, & carne turgidus videbatur. Immò quiescentibus spiritibus, qui ex partis affectæ violēta Fibrarum oscillatione in motus inordinatos ciebantur, nutritivis moleculis ad Vasculorum parietes placidè restitantes, perfecta nutritio absoluebatur, ita ut Massa Cruoris primigeniis, & balsamicis pollens qualitatibus, novam parvi sinus ad radicem Penis coalitionem moliretur; Quapropter Balsamicis etiam extra adhibitis, & plurimum contribuentibus, perfectè consolidatus est.

Solus itaque remanebat sinus fistulosus satis amplus in Perinæo, qui tunc temporis, non alioquin tractabatur, quàm consueta cannula plumbea, ad faci-



faciliorem Urinæ, & faniosæ icho-  
rositatis transitum, cum hac tamen  
differentia, quòd purulentia à depaf-  
cente per totam Urethram Ulcere pro-  
ductæ, & à lymphatico Prostatarum  
latice auctæ, continuo, & perenni flu-  
xu citra voluntatis imperium deflue-  
bant; Urina verò ad libitum secerne-  
batur, quia Urethræ foramen post  
Sphincterem Vessicæ, & duobus digitis  
transversalibus ab ipso distans occurre-  
bat. Natura nihilominus, quamvis à  
tot, tantisque ærumnis conflictata, &  
attrita aliquam spem futuræ Victoriæ  
pollicebatur; Nec absre, si etenim in-  
noxia Hyeme tabes superata, vires re-  
sarcitæ, & parvus sinus ad Penis latera  
consolidatus est, potiori jure in fervi-  
diore aeris constitutione, opitulante  
decocto sudorifero, sub exacto diætæ  
regimine poterat vaticinari reliquo-  
rum symptomatum mitescencia, immò  
omnimoda antiquatæ Luis profligatio.



Contigit id *Aprilis* mense, in cujus fine novum quoddam Febris genus exortum est, cum vespertina invasione ad normam tertianarii circuitus sibi correspondente, quæ cum in dies incrementum fumeret (cum Partis affectæ torminosa inflammatione supra sinistrum Testiculum suppurationem minante, corniculum etenim vehementer dolens à basi sursum gracilescens prominebat, quod in nullam partem dimoveri non poterat), congruum visum est Assidentibus tertium Professore feligere. In Consilium itaque vocatur eruditus *D. Bartholomæus Verdura* Vir Meritissimi Nominis, Prudentia singularis, & inter Medicos Brixien-  
ses spectatissimus. Morbosa iterum series in medium adducitur, Viscera naturalia tractantur, quæ in regione Hepatis in obstructions sensibiles durecebant, reliqua symptomata minutim examinantur. Post varias hinc inde  
de-



decerptas indicationes sentit *D. Sala* phlebotomiam ex *Salvatella* esse instituendam, ut dempta Sanguinis portione, & faciliore reddito reliqui cruoris progressivo motu, in intestino inestum non abriperetur, & secretiones succorum in Visceribus instituendę perfectę absolverentur. Annuunt Reliqui, ea potissimum ratione inducti, quod emollita Fibra, nec amplius cruor angustis coercitus limitibus cursum placidę redintegraret, febrilis Orgasmus mitesceret, & exinanitis Vasis sanguiferis pars inflammata minus premeretur; In quem finem etiam externe in tota scilicet Pubis, & Scroti regione frequentibus fomentis, & continuis emplastris fovebatur. Sequenti mane restibus Medicis, quibus, & ego de more adjungebar, secta vena manus dexterę exit Sanguis, adeo floridus, & rubicundus, ut nec malam qualitatem, nec inflammatoriam indolem redoleret. Febris



bris tamen brevissimo dierum intervallo evanuit, & Scroti Tumor, qui supurationem fuerat minitatus, omnino annihilatus est.

His feliciter peractis, eò unicè collimabat Adstantium Animus, ut tollerentur obstructions, quæ à præteritis probabiliter Febribus suam nanciscebantur originem, sicque effectus in causam Morbi radicalem transierat: Quòd sæpissimè solet contingere, & præcipuè in continuis effervescentiis, ubi non semper ad Naturæ leges in secretoriis pororum dispositionibus ætherogeneæ fermentatæ particulæ separantur, sed errante fluidorum mechanismo, vel ob Sanguinis tenuitatem, vel ob evaporationem Spiritus salino volatilis, cui fluxibilitas debetur, partes fixæ, & tartareæ in aliquo Viscere decumbunt. Dubium fuit, utrum chalybeata, an potius Rhabarbari tinctura exhiberetur. Sed ratione ignei habitus viguit



guit Opinio exhibendi *Syrupum cachecticum Fernelii* alternis tantum diebus in quantitate *iii. unc.* In hoc stetit per viginti dies, donec tertianarius Character, quasi abolitus, Hepatis, & Hypochondriorum regio perfecte emollita videbatur. Quapropter ad dispositionem futuri Sudoris, quem tunc inæqualis temporum vicissitudo prohibebat, laudavit Eruditus *D. Verdura* usum Oxymel. Bened. querc. ad exilium obstructionum, si quæ remanserant, reserationem. Par fuit voto eventus; Successiva etenim per intervalla catharsi Corpus per epicrasym ab omnibus excrementis perfecte expurgatum est.

Jam satis, superque humoribus evacuatis, & dispositis, reliquum est, ut alexipharmacum penitus extirpativum proponatur, ne in tam favorabili aeris constitutione legitima, & necessaria Luis curatio procrastinetur; Quam absolvendam decocto sudorifero statuunt



ut recrementis æterogeneis, in carnosiss  
recessibus radicatis, vñ Hypocausli ex-  
pressis, aucta ope caloris Fibrarum vel-  
licatione Viscera à Gallico contagio li-  
berentur.

Et ne inconsultum, atque periculo-  
sum hujus remedii regimen videatur,  
sciendum oportet, quòd N. P. à tabe  
jam liberatus viribus pollebat, & non  
nisi per intervalla à Febris tantum de-  
puratoriis vexabatur, quæ & ipsæ à cri-  
ticis per sudorem evacuationibus judi-  
cabantur. Solus itaque obstabat igne-  
us habitus in temperamento calido, sic-  
co, & adusto ab efflorescentibus pustu-  
lis ad ambitum Corporis, manifestato,  
qui ab immodica vñ caloris undequaq;  
prementis poterat in flammam exsur-  
gere, & in novas excandescencias pro-  
clivis Naturam, & Medicos ab attenta-  
to opere deludere. Quòd tamen in-  
meditato regimine non poterat contin-  
gere, quia non ultra coctionis gradum,

nec



nec violenter partes ætetogenæ e suis tubulis erant excutiendæ, ut ad ambitum Corporis cum Sanguine arterioso sub Sudoris forma fecernerentur, sed Methodo intemperiei partium carnosarum accomodatissima, hoc est à *blando*, & *humido calore Fibrarum* genus debet affici, ut Massa cruoris quàmvis rapidiùs, regulariter tamen circulante, serofus latex ad angustissimas usque artèriarum appendices propellatur.

Modus autem operandi, & qua mechanica opus absolvatur, videantur *Willisius Phar. rat. p. i. s. v. c. i. & c. Wedelius de cog. Med. facul. L. ii. s. ii. p. 170.* Ab ulteriori etenim indagine jubet abstinere brevitatis studium; Sufficit namque remedium adhibuisse, quod Autopsia, & rationalis indicatio flagitat. Porro, si à Mercurialibus abstinendum est, solum decoctum sudoriferum ad Luis extirpationem aptum natum videtur, eò quod in Lympham specialiter agens



gens coacervatas fordes faciliùs abstergit, & foras eliminat. Quod supponit Clarissimus *Christianus Vater Wittebergens*. Diaphoretica sunt evacuantia universalia, quæ non minus ac purgantia, diuretica, ac salivantia generosa universam Sanguinis, & Lymphæ Massam, ac consequenter totum Corpus à superfluis, & recrementitiis humoribus liberant. Materia quidem, quam principaliter evacuant est latex, seu aquositas, sub cujus schemmate tamen recrementa varii generis, & præcipuè Gallica excluduntur, & reiiciuntur, nec semper volatilia, sed etiam crassa &c.

Sed, ut ad propositum revertar; Tota difficultas in eo erat sita, ut statueretur modus, quem in provocando Sudore tenere deberemus. Cogitandum autem diu, quod statuendum semel. Jam erat in promptu humidum Æstuarium ex ligneis tabulis compactum, & bullienti aqua calefaciendum [sicca verò,  
præ-



præterquàmquod laboriosa sunt, in corporibus ficcis usurpari non debent]. In parte anteriore sufficiens aderat Porta ad Patientis ingressum, quem commodissimum sedile excipiebat, ut brachia attollere, & pedes extendere potuisset. Nova iterum fenestrella è directo Faciei occurrebat, ut aliquibus inspirationibus liberi, & puri aeris interdum refocillaretur. Sed, quæso, ad quid tantus apparatus, si in lecto decumbens totum negotium poterat absolvi? Hoc est mediantibus Doliolis aqua calida repletis, & manu tractabilibus, ut, vel appropinquando, vel distrahendo calor juxta necessitatis exigentiam, & augeatur, & remittat. Sane calor hujusmodi Naturam subjecti debet sapere, & si non aliter, quàm ab aqua effluvia calida scaturiunt, probabiliter licet colligere talem methodum partium carnosarum texturæ se planè accomodaturam.

Ad



Ad perfectum etenim sudorem eliciendum tria requiruntur ; I. ut Sanguis plus solito , & alacriùs circuletur ; II. ut abundè scateat particulis aqueis , iisque solutis , ac facilè solubilibus ; III. ut Pori corporis satis patētes sint. Cumque tres hæ conditiones statum naturalem excedant , cavendum diligenter , ne nimis estuante cruoris mole , & hiscentibus poris , etiam partes spirituosæ , & nutritivæ resolvantur.

Ut tamen omnibus difficultatibus obviam irent oculati Adstantes , in Consultatione primo *Julii* mutuis sermonibus collata statuerunt ; Primò , quòd in usum poneretur decoctum ab Eruditissimo *Leali* habitum in Consultatione pag. 33. cum duplicata tamen Dosi *Sarsaparillæ* , urpote , quæ temperatior , & moderatè calida . Secundò , quòd assumeretur horis matutinis jejuno Ventriculo juxta monitum Clarissimi *Sylvii Deleboe* pag. m. 440. Tertiò , quòd  
 nullo



nullo pacto purgantia admiscerentur, sed statis tantum intervallis, ad saburram crassiorum humorum educendā, mitissima catharsis institueretur; Nec valet illatio Recentiorum aliquas difficultates affectantium, scilicet Naturam non deberi in diversos motus cieri ope purgantis, & diaphoretici. Sciant tamen illi Medicarum disputationum Ruspatores, hinc non agi de Catharticiis vī stimuli, hoc est expansiva pollentibus. Unde talia ignorantie figmenta ad *Herculem Saxonia Tract. de Lue Venerea pag. 17.* & *Sennertum L. vi. P. iv. pag. 250.* lubens remitto. Quemadmodum questio, ut ait *Verulamius*, per disputationes non tollitur, sed figitur.

Victus ratio difficilem conventionem cum N. P. permittebat; A voraci etenim appetitu continuo exercebatur ab acidis forsan particulis in fero liquatis, Lymphamque summa aciditate depravantibus, quæ continua Membranarum



Ventriculi vellicatione famem producebant ; Unde insistendum in mediocri victu , scilicet nec tenui , nec pleno censitum est , in columbis turriculis , carnibus Vituli , vel Pulli junioris , potiùs elixis , quàm assis , pane biscocto , Nucleis Pinus , passulis , amygdalis torrefactis ; Sed jam Manum de tabula hac ipsis Tonforibus nota .

*Julii* secunda una circiter hora ab assumpto decocto, doliola aqua calida repleta ad latera Patientis apponuntur, suspensis prius stragulis ab arcta exilium lignorum Compage, ut calor undequaque æqualiter premens feliciùs opus absolveret. In horæ quadrante totum Corpus blando calore afficitur , ita , ut hiscentibus poris sudor sensim prosiliat , novas semper à tergo suppetias Massa Sanguinis afferente . Ita etenim miliares Glandulæ sunt dispositæ , ut , dum Cruor ex arteriis per capillaria in Venas abit, subtilior feri portio à complexibus

San-



Sanguinis liberetur, quòd naturæ pororum, & corpusculorum est tribuendum.

Post semihoram abit in propinquum lectum de more calefactum, ubi madefacto indusio, & cessante rapidiore Sanguinis circulo Massa fluidorum in naturalem abiit consistentiam, jamque relegata ad ambitum Corporis materia ab intestino tumultu perfectè quievit. Siquidem à peracto Sudore fluida recentia, ac vix novo Characterè induta, levissimo etiam motu in excandescencias sunt prona, Anni tempore, & peculiari constitutione ad hoc opitulantibus.

In Prandio moderatè se exercuit, superbibendo vini ciathum; In reliquis fitis continuò fallebatur decocto secundario, & interdum potu *Thee*, vel *Caffè*, quos sudantibus *Waldschmidt* T.I. Instit. med. rat. pag. 108. ambabus largitur manibus.

Tertia die sudavit per horam solidam, ultra cujus limites, neque in posterum



non erat præerereundum, ne cum nimio Sudore vires deicerentur. Quod tamen in contrarium, Deo dante, successit; Spatio etenim decem dierum nocturnæ ebullitiones, & dolores articulares Venerum miasma in Viscerum folliculis delitescens præferentes penitus evanuerunt, & quod admirationem inducebat, Vires in dies adeò resarciiebantur, ut horis pomeridianis e lecto exurgens per Cubiculum læta fronte, & constanti animo in Amicos affabilis vagaretur.

Carunculæ nihilominus, ut pote quæ carnosam, imò potiùs callosam substantiam nactæ ab humido Æstuario, nec emollitæ, nec diminutæ, solita incommoda in parte inflammata efficiebant, & per consequens Urina à recto tramite semper devia in carnosæ interstitia sibi viam aperiebat cum Tumoribus, nunc in Scroto, nunc in Perinæo suppurationem molientibus.

*Inte-*



Interim renovata purgatione, & crassioribus excrementis evacuatis sequenti mane sub incerto regimine insistimus, Sudorem nempe promovendo non solum Doliolis ad utrumque latus, sed etiam ignito latere panno obvoluto, & divaricatis Cruribus Scroto, applicatis. Fluit consuetus sudor affecta excepta parte, quæ à callo, & inflammatoriis Tumoribus adeò obduruerat, ut impedita Fibrarum oscillatione sudor exprimi non posset. In reliquis sudor ex voto succedebat, cum universalium symptomatum mitescencia, & peregrinarum qualitatum attenuatione, ita, ut Domito Luis genio, & reſeratis Glandularum anfractibus Fluida, & solida æquali nisu Nature legibus obsisterant, & tam fermentationes, quàm secretiones perfectè absolvebantur.

In hoc statu rerum, labente mense *Julii*, quo per vigintiquatuor dies in humido Æstuario steterat, & jam emer-



gentibus optatæ Valetudinis primordiis ad Partem affectam totis viribus erat incumbendum, ne superveniente brumali Frigore Caruncularum extirpatio de medio tolleretur. Opus sanè difficillimi eventus à multis Auctoribus propositum, à paucis absolutum. Quàmvis physica res sit Caruncularum generatio, modus tamen curationis sub densa caligine obvolvitur, & veluti alta Nocte latent reposita apta Alexipharmaca, cum difficilè admodum sit eò remediis Chirurgicis collimare, quò oculorum acies non pervenit. Nihilominus eradicationis modum sollicitus inquiram; Aliorumque Placitis, pro viribus, examinis incudi subactis, methodum cum N. N. adhibitam ingenuè dilucidabo.

Scio etenim passim à *Nursinis*, & *Circumforaneis* curationem Caruncularum tentari, sed semper penitenda opera, dum lufcorum more in tenebris palpitant,



palpitant, & sine prævia morbi, vel medicaminis cognitione unum semper arcanum crepant, & nefariè in Genus humanum grassantur. Nihilominus magni habentur ab ipsis interdum Magnatibus, qui à sermonis suavitatem, aut novis verborum lenociniis allecti Methodum irrationalem approbant, & commendant. Hinc, fateor, non obstupui, si N.P. ab Arcanorum formulis, & candelarum ferragine munitus Caruncularum extirpationem irritò semper conatu tentaverit. Si etenim omnibus innotesceret, quantum uniuscujusque Idiosyncrasia ab alia dissentiat, tam ratione structuræ Viscerum, & compagis partium solidarum, quàm mixturæ fluidarum, eamque cognitionem non nisi à rationali Medico posse adfisci, non tam facilè se empiricis Agyrtarum Manibus committerent; sed, incidimus in mala tempora, *ea siquidem est nostri Ævi infelicitas, ut amet decipi, ad*



*meliozem viam reduci impatiens, solisque fucum facientibus plurimus honor, & maxima præmia parentur. Sed ad rem.*

Carnea omnis excrescentia, tam à nimia Sericopia, quàm ab abundanti succi nutritii proventu genita sub nomine Hyperfarcosis venit, quæ tamen si in Meatu urinario contingat peculiari, & specifico titulo superbit, & caruncula, vulgò (Carnositas) appellatur. Ferè semper diuturnæ Gonorrhææ succedit, si fidem meretur Clarissimus *Ettmullerus Tract. de læsa seminis excretionem lib. 2. pag. 793.*, cò quòd sublata à continuo ichoris virulenti effluxu tenuissima epidermide Ulcus adnascitur, quod secundum diversas solidi resistentias, & contagii activitatem per Urethram serpit, & carneam substantiam depopulatur. Quare *Natura* in nova carnis genesi plus justo occupatior, ut verbis Sydenamii utar, *laxam quandam, & spongiosam substituit*, quæ successu



cessu temporis callum contahens Urinæ suppressionem inducit, & Pubis, Scro-  
ti, & Perinæi inflammationibus, & suc-  
cessivis Fistulis ansam præbet.

Talia propemodum symptomata  
N. P. exercuerunt, ut jam pag. 25. in-  
nuimus, & quàmvis Joanni Baptiste  
S. Marie Chirurgo Gallo visum fue-  
rit curationem Fistulæ precedere debe-  
re extirpationi Caruncularum, [ quod  
N. P. fatetur, & continuus, semper in-  
cassum, balsamicorum usus probat ],  
nihilominus stetit Opinio Patris mei à  
solidis veræ scientiæ fundamentis ful-  
ta, scilicet exordium sumendi à Carun-  
culis, quæ Urinæ transitum impedi-  
do coalitionem labiorum Fistulæ im-  
pediebant; Si etenim ex Mechanica ne-  
cessitate lotium, qua data porta, debet  
fluere, omni in Arte versato patebit,  
impossibilem esse curationem Fistulæ  
sine prævia extirpatione Caruncularū,  
ad quam perficiendam Hoc opus, hic  
labor.

Agen-



Agendum siquidem est in parte delicata, Fibris undequaue trasversis, & tenuibus aspera, connexionem habens cum præcipuis partibus ad inflammationem pronis; Unde facile à fortioribus exedentibus, vel causticis irritatur, levioribus verò non cedit. Præterquàmquod remedia commodè nequeunt applicari, & præcipuè si Carunculæ ad Vessicæ collum pertingant, vel penitus obstructo Meatu cereæ candelæ perforationem impediant. Dum si medio Siphone corrosiva medicamenta intrudantur, Urethræ substantia in medio corporum nervosorum sita, & Textura rara, laxa, & molli prædita magis offenditur; Si verò summitati cereæ candelæ exedens ceratum incorporetur, ipso vix immisso, dum Penis hinc inde dilabatur, ab obstaculi contactu secedit.

Augetur periculum, quia Carunculæ quàmvis callosæ, nullo tamen modo



do amputationem permittunt. Quid-  
 quid jactitet *Ambrosius Pareus* pag. 548.  
 & 549. illis verbis; *Carunculæ exaspe-*  
*randæ sunt, excoriandæ, & atterendæ*  
*cathetere plumbeo, extremo suo surgenti-*  
*bis asperitatibus, limæ rotundæ instar,*  
*scabro; Immissum illum in Urethram*  
*Catheterem tandiù versabit iens, re-*  
*diensque, toties eandem viam Chirurgus,*  
*quândiù, & quoties ipsis comminuendis,*  
*& atterendis necesse videbitur, & paulò*  
*infra: Potest dimitti ductilis argentea*  
*virgula extremo suo rotundo excisoria*  
*&c.* Sanè si Erudito Viro in re Chirur-  
 gica cæteroquin meritissimo nota fuif-  
 set tenuissimæ affectæ Partis constitu-  
 tio, quæ levi quavis occasione, ( ne di-  
 cam limarum scabritiæ ) irritata infla-  
 tis corporibus nervosis intumescit, &  
 aucto succorum affluxu ad inflamma-  
 torium Orgasum disponitur, in le-  
 thalem Urinæ suppressionem abiturum.  
 Methodo, adeò crudeli in audaciam ju-  
 vandi



vandi manum non præcepitaret . Quò ad me ero semper humanioris experimenti Discipulus , & in ipso solius Nature faciem spectabo , quæ non mero ingenii lusu mentitur , sed ingenuè docet per necessarias leges , quo tempore , quo loco , & quæ remedia subsistant.

Siquidem Carunculæ molles, & laxæ, & dimidiam circiter Urethræ cavitationem obstruentes facilis sunt curationis, dum mitissimis excedentibus, cedunt , & successivis exsiccantibus ad cicatricem feliciter perducuntur . Antiquæ verò , grandiores, & callosæ, de quibus in Præfens inquirimus, maximū Negotii Chirurgis facefcunt , dum exedentia, nisi summè activa respuunt , & semper magna difficultate atteruntur .

Nihilominus à blandis semper est inchoandum ut egregiè suggerit *Carolus Musitanus Tract. de Lue Venerea pag. 71. scilicet balneis rad. lil. alb. alth. sem. tenug. rad. Bryon. fenic. Facto incessu renovando*



novando per aliquot dies Cataplasma ex  
supradictis Materialibus contusis, & tra-  
jectis, add. But. axung. suil. Ung. basil.  
Adip. Hum. &c. quæ apud Auctorem  
possunt videri . Taliter emollita Ca-  
runcula, videtur meliùs attenuari à con-  
tactu remedii corrodentis, quod me-  
diante Candela cerea ad Carunculam,  
immittitur.

Transilirem limites Mihi ipsi posi-  
tos, si omnia recenserem remedia, pas-  
sim ab Auctoribus adhibita, ac omnem  
operandi Methodum explanarem sin-  
gulatim. Nihilominus, ne opusculum  
mutilum, ac mancum videatur, sto  
promissis, omnesque medicamentorum  
formulas, etiam pro arcanis habitas,  
quas diligenti examine potui haurire,  
brevissimo conatu in medium profe-  
ram.

Joannes Fortis cent. 2. p. 454. pro arca-  
no habet præcipitatum in Porphirite lævi-  
gatum unc. i. vin. opt. unc. iii. m. repon. in  
olla



olla terrea vitriata ad lentum ignem, & spatula agitentur ad consumpt. spir. vin. Precip. excic. & pulv. & rursus in Porphirite lævigato uniatur cer. Gratia dei unc. iv. Frigef. & summitati Candela unito in Urethram immittatur.

Hercules Saxonia Tracta de Lue Venerea in fine pag. 23. ait. Docebo vos linimentum, quod pro secreto Quidam habent in his casibus, & eo satis feliciter utuntur. R̄. Precip. benè præp. unc. i. Merc. sublim. Plumb. usti aa. dr. i. axung. s̄vil. unc. vi. Cer. alb. veteris dr. i. s̄. Camph. sc. ii. S. A. ad firm. Ung. præp. Hoc medicamentum administratur per Candelas, carnem erodit, & sordem tollit.

Doleus in Encyclop. Chi. rat. Lib. iii. cap. v. de morbis Vessicæ, & Meatus urinarii pag. 647. utitur Fistula aurea, argentea, vel plumbea optimè lævigata, & per eandem pulveres consumentes immittit ex alum. usto, erugine, Mercurio rubro, Sulphuræ, & Sabina. Absumptis  
excre-



excrefcentiis ulcuscula relicta sanat lapis Calaminaris, Terra Vitrioli dulcis, sigillata, Lytarg. Plumbum ustum, Tutia, Camphora, vel empl. diapomph. Interdum fit Massa ex viride Eris, & Mercurio sublimato, ut videre est in Eph. Ger. ob. 92.

A Riverio comendatur sequens linimentum à supracit. Doleo com. R $\xi$ . Ol. ros. lib. s. Ceruss. ver. unc. ii. Camph. tut. aq. ros. lot $\xi$  aa. dr. ii. Lytarg. auri unc. i. s. Opii, thuris, mast. alo. epatici aa. dr. i. m. oia ser. ad usum.

Clarissimus D. Stalpart quatuor homines, quibus tota ferè erat occlusa Uretra, ita, ut per angustissimum tantum efflueret Urina foramen, sequenti cura vit remedio R $\xi$ . Off. s. epia tut. præp. aa. dr. ii. c. c. ust. Al. lot. Arist. rot. aa. dr. i. Alum. ust. unc. s. m. f. pul. v. cum ol. ros. & Lyt. aur. incorp.

Antonius Fuchsius Medicus Norimbergensis utebatur oleo succini cum vitello ovi comminuto, & Io. Heurn. ad Aphor. Hipp. 82. sect. iv. summis laudibus extollit



lit ol. cucumeris asin. remixtum cum ung.  
ros. cui parva grana sublim. vel præc. ad.  
Usque in præsens citati Auctores.

Liceat nunc mihi cum diligenti pen-  
sitatione examinari Methodum inge-  
niosè excogitatam à *Hieronymo Fabri-*  
*cio ab Aquapendente Tractatu de auferen-*  
*da Caruncula è Meatu urinario pag. 270.*  
Vult etenim ipse, quòd, immissa in sum-  
mitate argentei Catheteris cannula ex  
*linteo cerato* facta, & peculiari medica-  
mine oblinita, in Meatum urinarium,  
*longitudine digiti transversæ* latitudine,  
quæ canalē adæquet supra Carunculam  
placidè relinquatur, ut per ipsam exiens  
Urina remedia non abluat, & Opus im-  
pediat. Tale repertum videtur abun-  
dè approbari à *Sennerto Instit. Med. cap.*  
*de Rebus præternat. pag. 689. cujus ver-*  
*bis in Armamentario Chirurgico Scul-*  
*teti pag. 150. & tabul. 40. propriis, &*  
*specificis Figuris demonstratur.* Nihil-  
ominus, quàmvis hæc inventio Claris-  
simo,



simorum Virorum auctoritatem sapiat à Manuali executione relegandam cen-  
seo ; Nam præterquàmquod uni tan-  
tùm Carunculæ posset applicari, quis  
nescit cannulam ex linteo ceream ope  
caloris ingeniti momento temporis in  
mille plicas contrahi difficiliorem po-  
tiùs mictionem inducturam? Et dato, e-  
tiam, quòd non crisparetur, quomodò  
ad Carunculas actu trusionis sine errore  
perveniet, quomodò supra ipsas placidè  
quiescet? Si cæco adeò contactu in obsta-  
cula catheter occurrit, ut delineatas mè-  
suras effugiat, sicque tenuissima, & bre-  
vior cannula propter Caruncularum ni-  
sum spontè secederet, & sanæ Urethræ  
applicata inutilis, & inofficiosa maneret.

Hac data occasione, libenter exhibe-  
rem Methodum novissimam, quam  
Mihi autumnale Ruris otium, & fre-  
quens de hac materia meditatio suppe-  
ditarunt. Attamen cum adhuc à con-  
tinua praxi non sit excussa, nec à peritis



Chirurgis confirmata, lubens superse-  
deo, in futura exercitatione Chirurgica  
de Fistulis Urethrae ipsam publici Juris  
facturus.

Verum, ne à Scopo aberrem, redeun-  
dum mihi est ad investiganda Aucto-  
rum Arcana, potiùs sibi ipsis vicissim  
mutuata, quàm inventa. Ad Carun-  
culæ extirpationem *Draco mitigatus*  
commendatur à *Musitano*; *Stercus hu-*  
*manum*, & *caninum* à *D. de Mayerne*,  
& *Alexio Pedemontano*: *Mel in cinerem*  
*ustum add. præcip.* & *viride æris* à *Scul-*  
*teto*: *Sabina*, & *Portulaca* ab *Aqua pen-*  
*dente*: *Aqua viridis* à *Lanfranco*, quæ  
à *Thoma Burnet* pag. 332. describitur.  
*Auripigmentum*, *viride æris*, *vitriol.*  
*Alum. roch. acet. perf.* & in duos *Porphi-*  
*rites lapides ducta* ab *Amato Lusitano*.  
*Solum præcipitatum* à *Roderico à Fonseca*:  
*Pulv. Helleb. nigri*, *sal. Cal. vin. Aqu.*  
*fort. Chimi.* à *Francisco Peccetio*. Cæte-  
ra apud reliquos Auctores possunt vide-  
ri;



ri : Alter enim de altero participat .

Hac in re tamen si fides adhibenda est *Amato Lusitano cent. iv. pag. 432.* & *Sennerto Lib. iii. Part. viii. sect. i. pag. 590.* plurimum videtur emicuisse *Lacuna* quidam in re Medica non infimæ Sortis Auctor, qui libellum Romæ edidit, gloriaturque se arcanum sequens recepisse à *Philippo* Auctore magni Nominis .  
*Rx. Cent. mi. Apii. caud. equin. aa. m. s. Hord. cont. unc. i. coq. in aq. lib. ii. ad consump. partis dimidiæ. Coll. add. mell. ros. unc. ii. & per Siphonem iniicito;* Per aliquot dies sicca cerea Candela immissa, tandem cicatricem sequenti tentavit injectione . *Rx. aq. plant. Ros. aa. unc. iv. feri lact. capr. unc. ii. Cerus. unc. vi. Alum. roc. Marm. candidissimi, Spodii, Chryst. aa. dr. i. s. Camph. scr. i. Arida terantur accuratissime cribroque excussa tenuissimo humidis diligenter misceantur.* Periculosum tamen hujus remedii Regimen videtur propter pulveres lapideos, qui si



cavitatem Vesicæ ingrediantur, propter difficilem extractionem, sæva symptomata solent efficere. Quare ait *Lusitanus*: *Caueant igitur Medici Artem exercentes, ne quid calculosum, aut arenosum, lapidosumve per urinariam fistulā impellant, cum periculosum admodum sit Opus hoc, & in perniciē Egrotos trahat.*

Inter alios fundamentaliter egit in hac materia *Gabriel Fallopius Tractat. de Tumoribus pag. 106. Cap. de Caruncula subcreſcente in canali urinario, & in cereæ Candelæ imbecillitate asserit posse in usum poni Virentes Iuncos, in quorum aculeo portiuncula Unguenti ponatur tenoris sequentis. Arsenicum chrySTALLINUM supr. lap. PiCT. cum succo limonum agitetur, quater sub sole siccetur, & stillatitio aceto singula quaque vice diluatur, & cum ol. & cer. f. ung.*

Nihilominus, & ipse in principio Tractatus laudat præcipitatum, vel parum *Egyptiaci* cum mod. cereæ, & olei. Videatur



deatur *Rodericus à Fonseca* consul. 15.  
*Quàmvis*, inquit, *varia* proponantur  
*Medicamenta* pro consumendis *Caruncu-*  
*lis* tamen *præcipitatum* primum locum ob-  
*tinere* uidetur, & paulò infra: *Nullum præ-*  
*stantius est* *Argento vivo præcipitato*, &  
*Calcinato*. Quid plura: insignis ille  
*Petrus Gallus Venetys* degens, qui ab ip-  
 so *Fallopio*, & *Alexandro Maßaria* pag.  
 492. tot laudibus decoratur, eò quòd  
 non solùm *Carunculam* auferebat, ve-  
 rùm etiam *ulcus* factum perfecta cica-  
 trice obducebat, non ne ipso præcipita-  
 to utebatur? Et ne quis forsan pro fig-  
 mentis, & mero ingenii lusu habeat, quæ  
 modo de *Petro Gallo* asserui, sciat me in  
 quodam Manuscripto *Avi Mei* *Medi-*  
*cinam Chirurgicam Bergomi* profiten-  
 tis reperiisse formulam medicaminis à  
*Serenissimo Duce Parmæ* habitam, &  
 protestatione donantis insignitam se  
 illam recepisse à *Petro Gallo*, olim *Ve-*  
*netys* incola, cujus sequens est descripto



*Rx. Ung. cerus. camph. dr. i. de Tut. Jo: Vigo. sin. suc. dr. ii. præcipit. rubr. subtil. pul. q. s. ad Massam rubeo colore tingendam.*

Patet igitur ex accurato prædictorum omnium examine omnes Auctores in eam devenisse sententiam unicum præcipitatum Herculei hujusce morbi esse remedium, equaliter aptum, tam ad Carunculas attenuandas, quàm ad cicatricem feliciter inducendam, cum hac tamen differentia, quod actu erosionis debet associari aliis exedentibus, nunc acribus, nunc moderatis (argen- tum etenim vivum vult duci, non co- gi) pro ut Caruncularum resistantia re- quirat; Actu verò exsiccationis, in mi- nore dosi, cum balsamicis, & exsiccan- tibus, ut tenuissima Urethræ Membra- nula denuò restituatur. Opus fateor difficillimi eventus, dum omnes qui à Carunculis se liberatos jactitarunt, cum pejori recidiva in Urinæ supressionem inciderunt. Quapropter Magni facien- dum



dum est monitum *Durantis Sacchi*, qui Libro in subsidium Medicinæ edito Tract. de Caruncula pag. 45. vult, quòd post Carunculæ extirpationem per 40. dies gestetur in Urethra specillū plumbeum ponderis *unc. ii.* cum *dr. ii.* Argenti vivi amalgamatum. Sed talis durities, & pondus à parte delicata non potest sustineri; Si tamen aliquis Satyrorum more vult incedere, remedium experiatur.

In refractariis interdum Carunculis vim usitatorum exedentium effugientibus caustica magis potèntialia possunt in usum poni, sed cum sequenti circumspectione.

Tubus vel argenteus, vel plumbeus in Urinæ meatum intromittatur possibilis crassitudinis, quam ferat Urethrę latitudo; Cum ad obstruentem Carunculam pervenerit, sistatur ab actu trusionis, ne violenta pressio Sanguinis Hemoragiam efficiat. Dua dein specilla



in promptu sint, quorum primum in summitate gossipium habeat, alterum verò causticum potentiale à *Lapide infernali*, si lubet efformatum. Primum, omnem, vel ichorositatem, vel Sanguinem, qui ad Caruncularum Salebras solet restitare perfectè, & repetitis, si oportet, vicibus emungat, qui quàmvis lapidis fusionem promovendo exaltato Nitri spiritu, & aqua forti in aptiorem energiam excandesceret, attamen quia liquatum vicinioribus, & delicatis quoque partibus noxam inferret, debet adhiberi in forma ad possibilitatem ficca. Secundum verò ex Chalybe fabricatum, per longitudinem digiti transversalis in summo apice in duas laminas dividatur, ita tamen, ut tenuissimæ laminæ vi elastica ad sui contactum nitantur, corpusque causticum intermedium, adeò stringatur, ut nulla quavis impetus occasione queat separari. Tali modo specillum in cannu-  
lam



lam intromittatur, usque ad Carunculae contactum, opusque per aliquot dies innovetur, pro ut perito Adstanti videbitur.

Verum, ut ad praxim propius accedam, si rationi, & tot experimentis ad debellandas Carunculas in Meatu urinario, præcipitatum consonum videtur, qua de causa etiam in N. N. optatum effectum non respondebit? Ad rem igitur.

Preparatas habuimus cereas candelas, non supra filum instructas, ut *Nursini* assolent, sed subtilissimo linteo cerato efformatas longitudine decem digitorum transversalium, qui iter Urinae usque ad Sphincterem Vessicae admissim compensabant. Facta itaque diligenti commensuratione ad obstacula, quæ in Meatu occurebant, coacti sumus longitudinem trium digitorum transversalium ab ipsa candela abscindere; Ultima etenim excrementa omninò impene-



penetrabilis videbatur ; Quia forsan præter Carunculæ obstaculum aspera etiam aderat Urethræ inæqualitas propter rugosam antiquæ exulcerationis consolidationem . Quare in aliæ candelæ cereæ levigatæ mucrone pauxillum Cerati ad lentum ignem imposuimus ( quia oleosa in trusione candelæ per totum canalem disseminantur ) ; Dein docente mensura , ad quam prima candela fuerat immissa novam portionem cerati coadaptavimus , quæ è directo secundæ Caruncule responderet ; Prima etenim in medio Glandis cæteris callosior facillimè mensurabatut . Tres itaque occurebant Caruncule , singulæ callosæ , & præcipuè prima , quæ triginta annos redolebat . Secunda minoris erat resistentiæ , sed sensus exquisitissimi , dum ab aliqua exulceratione circumvallabatur propter perpetuam Gonorrhæam , cujus portio ad obices Caruncularum restitans , sua virulentia con-



tagionis ritu canalem inficiebat. Tertia, & ultima duobus digitis transversalibus à Sphinctere Vesicę distans plurimum Negotii faceſcebat, eò quòd totum obſtruens canalem ſolo candele apice ſe attingi permittebat. Nihilominus, ſi portioni Urinę, quàmvis ſtillatim, occasione mejendi dabatur adiutus, licuit ratiocinari, etiam ceream candelam fore penetraturam. Sequenti igitur mane ſolitum ceratum ex pari quantitate Tut.Plumb. uſt. & Præcipit. efformatum iisdem locis coadaptavimus, niſi quòd candelę mucronem per ſpatium ſemidigiti transversalis in ſubtiliſſimum filum redegimus, ut minima data porta faciliùs ſubingrediretur. Superatis primis duabus cum aliquo doloris ſenſu, dum ſummitatis aculeus in canalis parietes hinc inde occurebat, quàmvis totus Penis à niſtra manu in honeſtam diſtractionem protraheretur, ad tertiam Carunculam  
perve-



pervenit; Ubi renovata blandi impetus reciprocatione cū tolerabili dolore in tenuissimum Urinę Meandrum penetravit. Summa illico quies est imperata, quę partem ab omni motu tueretur, & ut membrum super inquina placidè quiesceret, ne hinc inde dilabendo, candela à Carunculæ contactu deturbaretur. Per tres horas sustulit remedium constantissimus Patiens, potiùs à quiete, quàm à dolore vexatus. Hoc etenim habet peculiare Præcipitatum, quod agit sine dolore, ut ait *Burnet pag. 329*. Quod etiam præstat pulvis Corrosivus *Philippi Masieri* Chirurghi Patavini Celeberrimi, à me multoties expertus; Utrum tamen, & in ipso præcipitatum latitet, promptioribus Ingeniis disputandum relinquo.

Successit immediata miectio plus solito majori Urinæ per Urethram gurgite, non quod tam citò remedium suam vim corrosivam exeruisset, (non etenim



etenim tam inepta opinio me tenet )  
sed à continua candelæ pressione , quæ  
suum characterem in ipsa Caruncula fi-  
gendo , liquido Urinario liberiores  
tramitem permisit . Interea , ne Carun-  
cula in priorem statum conversa crasti-  
nam operationem difficilem redderet ,  
nova iterum cerea cādela est imposita,  
nullo medicamine , sed solo ol. amyg.  
dulg. oblita, ejusdem ferè longitudinis,  
ut prima, & ejusdem tenuitatis in solo  
apice, ubi difficilis penetratio ultimæ  
Carunculæ occurebat . Per reliquam  
longitudinem canalem perfectè adæ-  
quabat ratione latitudinis . Vix ete-  
nim credibile est, quantum minori cum  
dolore gestetur , & intromittatur can-  
dela , quæ Urethræ parietes penitus im-  
pleat, quàm tenuis, & exigua . Mecha-  
nicè tamen hoc puto contingere ; Quia  
dum Corpus Sphericum ex determina-  
ta magnitudine restringitur , quò ma-  
gis ad punctum appropinquat , eò ma-  
gis



gis de plano deperdit, & de angulo veluti participans tenuissimis Urethrę fibrillis noxior evadit. Sed extra spheram non pergo, hanc litem agat, cui de meliori luto finxit præcordia Titan.

Noctem transegit N. P. sine cerea candela in Meatu Urinario, eò quod tota die à nova intromissione vexatus, liberas voluit Noctis horas ad Corporis levamen, & ad partis quietem. Nihilominus summo mane eadem mensura tractatus per quatuor circiter horas à mingendo abstinuit, & exedens Medicamen ad contactum Caruncularum permisit; Tandem extracta candela observavimus in summo apice albã quandam materiam specimen puris præferentem; Quia tamen etiam à Superiori exulceratione purulentus ichor continuo fluebat, difficile fuit cognoscere, utrum ab ipsa Caruncula, aut à Superiori Urethrę foramine provenisset. Exitus dubium redarguit, die etenim sequenti,



sequenti, quin candelæ mucro tenuior redderetur, ultima quoque Caruncula sine magno dolore perforata est. Sanè tunc victoriam cæpimus Canere, potissimum explorando, quòd usq; ad Vessicæ collum nullū aliud occurrebat obstaculū, quod curationem ulteriùs retardaret.

Itaque sub incepto regimine, & eodem semper medicamine insistimus, & præcipuè in locis, ubi candela quandam veluti Carunculæ imaginem simulabat, hoc est ubi aliquantulum cõtusa, & compressa Carunculæ contactum patiebatur. Immo ad imitationem *Francisci Peccetii Cælestini Cortonenfis* pag. 476. illam cultri apice excavatam abundanti remedio saturavimus, ut energetica vî polleret in Caruncularum radicibus penitus extirpandis; In quem finem etiam in dies candelæ semper majoris latitudinis in usū ponebantur, ut aptiori nisu undequaq; Carunculas præmerent, quæ in sui deper-



perditionem feliciter abirent.

Fateor tamen, multum erat Incommodi hæc repetita post mictiones intrusio, dum omnes Patientes ab hac operatione abhorrent, sed alia via non poteramus incedere, quia adhuc non extabat methodus novissima æqualiter felix, tam in extirpandis Carunculis, quàm in curandis Fistulis Perinæi. Ipsam Benevolus Lector proxima exercitatione judicabit.

Interim omni mane candelam cerato imbutam inferebamus, reliquis horis solo oleo oblitam, & post mictionem semper innovatam, ita, ut ab ipsa nunquam abstineret, juxta monitum *Amati Lusitani cent. iv. pag. 429. Continuo Eger in Urinario Meatu insertam habeat, neque absque ea, nisi mejendi Tempore agat necesse est.* Illud solum laboriosam remedii inquietudinem demulcebat, quod candelæ, non solum purulentis ichoribus, verum etiam Caruncu-



runcularum ramentis indutæ excava-  
bantur, ita, ut spatium viginti dierum,  
Urina recto tramite, & expeditè pro-  
flueret, candela absque ullo impedi-  
mento in Vessicam penetraret, aliquasq;  
mordicationes propter vivificata Ulce-  
ra N. P. persentiret. Ut autem, ne à  
continuis medicamentis pars alioquin  
delicata exasperaretur, blandis tantum  
injectionibus per aliquos dies usi sumus  
ex solo lacte, aut aqua rosacea; Semper  
tamen candelam inferendo, ita fabre-  
factam, ut in ipsa cera, in qua linteus  
candelas efformaturus dureſcebat plū-  
bum uſtum, cum pauxillo Mercurii  
dulcis supra lapidem Porphirii subtilif-  
simè pulverizatum confunderetur. Tali  
autem modo ulcera à consumptis Ca-  
runculis relicta blandè ad exsiccatio-  
nem disponuntur, & successivis balsa-  
micis meliùs consolidantur.

Tali regimine, Tumores, Scrotum,  
& Perinæum circumvallantes sensim e-



vanuerant, & quia parva Urinæ quantitas per Fistulam in Perinæum defluebat, minori per consequens nisu in sinus latera impulsa in carnosas partes non filtrabatur suppurationes inductura.

Ostreaceus tamen Callus, qui undequaque, & præcipuè in sinistro latere Fistulam circumducebat, usque ad radicem Virgæ pertinaciter adhærens, ipsis combinatus erectioribus Penis Musculis nullam, vel diminutionem, vel emolli-tionem referebat; Et quàmvis cum Urinæ diminutione cessaret potissima causa callositatis, nihilominus tali duritie erat stipatus, ut sine remediorum auxilio ejusdem attenuatio sperari non posset; Eodem itaque tempore, quo in Urethram liquor abstersivus ex Melle rosato simplici, & Hordei decoctione compositus iniiciebatur, qui quandoque etiam in Fistulam penetrabat, tale remedium quotidie in sinum fistulosum immissum est *Rx. Alum. roch. ust.*

*ung.*



*ung. egypt. aa. unc. s. Vin. alb. aust. unc. ii. m.*

Cautè tamen primis potissimùm diebus ipso utebamur, argenteusque Siphon, nec plenus, nec violenta pressione evacuabatur, ne obvio foramine, exedens mixtura in Urethrâ penetraret, ubi mitioribus erat agendum; Etenim partim ab antiquato, & depascente Ulcere, partim à Caruncularum ablatione tenuissimæ Urethræ fibrillæ, adeò nudæ, & carnosæ vestimentis ipoliatæ hinc inde occurebant, ut levi quavis occasione in torminosam diathesim excandescerent. Quapropter ad ballamica, & magis exsiccantia remedia deventum est, scilicet ad decoctionem *Rad. aristol. rot. & flor. Hyper. add. plumb. ust. & corall. rubr. præp. & subtil. pulv.* Quorum usu abiit omnis ardor, qui præsertim occasione mejendi per totam Urethram desæviabat; Cessarunt erraticæ inflammationes, quæ in regione Pubis, & Perinæi tot tragædias effecerant; Callus ipse in dies



adeò diminuebatur, ut jam jam Sanguis  
è venis capillaribus ad deperditæ sub-  
stantiæ repositionem, & distractarum  
partium unionem prolixius scaturiret.

Placuit nihilominus Adstantibus, ut  
Fistulæ coalitioni præcederet lactis asi-  
nini usus, ut penitus obtusis peregrino-  
rum salium cuspidibus balsamicam  
Massa fluidorum, & homogeneam te-  
xturam indueret, sicque lacteis, & chy-  
losis pollens particulis Fistulæ curatio tu-  
tiori tramite exequeretur. In quem fi-  
nem se transtulit N. P. in villam *Sale*  
quatuor M. P. à *Brixia* distans in Collis  
radicibus ad meridiem sita, & felicissi-  
mo aere perflata, ubi per totum Autum-  
nale tempus diætam lacteam observan-  
do, refocillatis in integrum viribus in  
præsentiarum carne turgidus inculpata  
Valetudine fruitur. Remanet tamen  
Fistula aliquas plorans Urinæ stillas oc-  
casione mejendi, quam proximo Vere  
sequenti nova Methodo curabimus.

Adsit



Adsit Summus Opifex primitiis cona-  
minum meorum, quæ, & si fortasse vi-  
deantur Ingenii imbecillis abortus, at-  
tamen, ut spero, in humani Generis  
emolumentum prodibunt.





At the same time, the  
 nature of the  
 human mind is such, as  
 to be in a state of  
 perpetual improvement.

The human mind is  
 a faculty which is  
 constantly improving.

The human mind is  
 a faculty which is  
 constantly improving.

The human mind is  
 a faculty which is  
 constantly improving.

The human mind is  
 a faculty which is  
 constantly improving.

The human mind is  
 a faculty which is  
 constantly improving.

The human mind is  
 a faculty which is  
 constantly improving.

The human mind is  
 a faculty which is  
 constantly improving.



NOVA  
METHODUS.



EXERCISES  
METHUEN

NOV  
METHUEN



# EXERCITATIO MEDICO-CHIRURGICA

AGENS

*Novam Methodum extirpandi  
Carunculas, & curandi  
Fistulas Urethrae.*

**A**cturus de Fistula superfluum  
autumo, procemii, & verborum  
ambagibus, illius vel etymo-  
logiam, vel synonymiam enucleare:  
Quare statim in ipso limine asseram,  
Fistulam esse Sinum angustum duris, &  
callosis labiis circumvallatum, qui in  
solidis omnibus occurens partibus,  
tam recto, quam obliquo tramite se  
profundans humores nunc saniosos,  
nunc sordidos plorat, pro ut diversus  
coctionis gradus, & multiplex liquo-  
rum qualitas præpollet.

A multis causis suam originem nan-  
ciscitur, quas in præsens enumerare præ-

ter



ter meum institutum est , ubi de sola Urethræ Fistula mihi agendum proposui , quæ succrescentibus Carunculis in meatu urinario solet succedere, eò quòd impedito necessario urinæ cursu inflammatoriis tumoribus , & successivis abscessibus ansa præbetur , qui si post supurationem Caruncularum ablatione illicò non curentur , in Fistulas abeunt perniciosas.

In Pube , Scroto , & Perinæo potissimum solent contingere , hoc est ubi ab obstaculis in meatu radicatis identidè repercussa Urina scrobem sibi excavat, exitum Molitura, & quàmvis semper deberet eò ferri , ubi minor adest resistentia , & renixus , attamen multoties per cæcos canaliculos serpens, in ipsum tendit Anum, ipsas Nates depopulatur.

Fistula Urinæ cæteris citiùs callum contrahit , eò quòd urinosum sal cum aluminoso Puris mixtum latera incrustat , ipsisque tenaciter adhæret , acidis,  
& vi-



& viscosis Sanguinis particulis, & succo partis alimentitio, non parum con-  
jurantibus.

Ferè semper à parvo doloris sensu  
stipatur, quia fibræ circulares penitus  
abscissæ, & induratæ ab acribus, & cor-  
rosivis succis in cavitate nunc delites-  
centibus, nunc transeuntibus, non al-  
terantur, quando tamen anfractuoso  
sinu procedit, nec libero Urina tramite  
potest effluere, in promptu sunt mæan-  
dri hinc, inde excurrentes, qui in in-  
flammatorios tumores abeunt, facta  
suppuratione in multiplicatas Fistulas,  
permutabiles. Quare in prima sinus  
formatione, si contingat, quòd Urina,  
nec recta, nec propiori ad exitum situ,  
foramen actu suppurationis Moliatur,  
sed sensim agat in distans, Fistula pro-  
fundior efformatur, pluribusq; vasculis,  
& canaliculis remora, & obstructio im-  
ponitur, quæ diversâ liquidorum conge-  
ciem percutiendo, nunc mixti in noxias  
fer-



fermentationes excandescunt , nunc inspissati à suo deshiscunt genio, & cepto callo fortiùs adhærent . Quare crescit in dies estuans affectæ partis Orgasmus ; Artariæ, & venæ Sanguinem referentes diversimode comprimuntur , unde mediantibus fibris in violentas explosiones coactis toti massæ spirituum summè irritativa modificatio participatur , quæ circuitus , nunc tertianarios , nunc erraticos minatur , semper cum metu renovandæ suppurationis.

Illud tamen observatu dignum est, quòd Febris symptomatice Fistulæ, ferè semper portendit aliquem finem in abscondita scaturigine delitescentem, qui, vel nullam, vel solo turgescentiæ tempore , habet cum Fistula communicationem ; Si nullam, Febris ab incæpta periòdo in salubrem intermittentiam , nec sopitur , nec consilescit , usquequò Materia cespitans, aut Manu Chirurgica arte suppuretur, aut per methastasin median-



mediantibus orificiis vasorum sanguiferorum, in absconditam cavitatem hiantibus, in venas resumpta, per secretoriam pororum dispositionem fecernatur; Si verò cum Fistula aliquam habet communicationem, hoc facile cognoscitur à quantitate purulentiarum, statutis tantum vicibus erumpentium, cum successiva Febris mitescentia, & symptomatum moderatione.

Sine talibus sinibus, materia, quæ ab Urethræ Fistula continuò stillat, neque est perfecta Sanies, neque perfectum Pus sed quædam veluti ichorositas de utroque participans, prout diversa cavitatis circumferentia, & ruptorum canaliculorum numerus præpollet. Ferè tamen semper Urina à saniosis particulis superinducta profluit; Et quàmvis Urethræ foramen post Spincterem Vessicæ occurrat, hoc est Urina ad libitum fecernatur, nihilominus, post mictionem, in anfractuoso itinere restitat, quæ nunc chylolis,



losis, nunc aqueis mixta particulis perenni fluxu sinus latera humectat.

Si verò contingat, quòd mundum debellata Lue, virulenta adhuc profluat gonorrhœa à glutine partis nutritivo, aut à putrescente in vefsiculis semine efformata, tunc morbus abit in deterius, eò quòd exaltata feminali portione tenuissimis, volatilibusque salibus prædita in corrosivum, & sylvestre abit mixtum, quod exulcerationes per Meatum adauget, & sensim excavato ulcere Urethræ foramen amplificat, unde libero gurgite exiens Urina, ferè tota per Fistulam secedit, nec ampliùs per reliquum Penem inter Carunculas, & Urinarii Meatus latera filtratur.

Multoties nihilominus, quàmvis amplum pateat fistulosum foramen, à tacito viru pedetentim serpente, tota Scroti regio à multis foraminibus perfoditur, sine prævia interdum suppuratione, à quibus successivè exeunte Urina,



na, partes musculosæ, & membranaceæ excoriantur, unde imminet Gangræna.

Imbecilliori reddita parte, & effeminato Fibrarum tono pituitosi quoque humoris stagnatio succedit, non quòd copiosius influat, sed quia ipsius circulatio retardatur, unde facili negotio, vel exiguo diætæ errore, aut inæquali temporum vicissitudine, portiones ferosæ, & æterogeneæ illicò colliguntur, eminenti ædemate regionem Pubis cingunt, & Perinæi.

Hiscæ præcipuè symptomatis animalis æconomia læditur, & quò magis labia in callosam duritiem obduruerint, eò magis Fistulæ curatio retardatur. Semper nihilominus est instituenda, quidquid jactitent quidam nostrates Chirurghi cum magno artis, & salutis damno, maxima scilicet detrimenta portendendo, si deleteriæ superfluitates, quæ è Fistula erumpunt, media curatione



ratione supprimantur, eò quòd in circulationis necessitate per totum corpus recurrant, & aliæ quoque partes labefactentur. Sed, quantum infirmo stet Talo hæc somniata opinio, facile videt, qui in Phisicis non claudicat, neque humana caret mentis trutina. Nam præterquamquod Fistula Urethræ, nec pendet à mala Viscerum temperie, nec à chachetico totius corporis habitu. Quis nescit purulentas sordes in sinu fistuloso delitescentes à toto haud influere, sed in ipsa parte à contagionis ritu coinquinari? Lacteum siquidem, & nutritivum Gluten æqualiter per omnes partes distribuitur; Ubi ad partem affectam fuerit eVectus, nunc à diversa fibrarum contorsione illaqueatus sistitur, nunc aliquo hiscente Meandro in ipsam cavitatem elutriatur, unde varia exsurgunt concreta, diversæ statim fiunt combinationes, fermentationes, &c. Absurda, quæ, methodo rationali curata Fi-  
stula



stula, non contingunt. Ad Naturalem etenim configurationem, & consistentiam redactæ partes fibrosæ, & musculares, amicabile motus reciprocatione inter se conspirant, sicque perfecta absolvitur circulatio, absq; ullo tumorositatis metu, & sine minima deleterii humoris efformatione. Sileant itaq; ac valeant similis farinæ Barbitonfores Fistulas potius inducentes, quàm curantes, & salubri etiam imprecatione, Fistulosi ad sollicitam sinus coalitionem disponantur; Et quàmvis, usque in præsens, Auctores insudaverint, semper incàssum, in curanda Urethræ Fistula, (quòd abundè testatur *Rodericus à Fonseca*, illis verbis; *Fistulæ ad Meatum urinarium pertinentes non sanantur*). Ego ipse, tamen auspice Deo, à quo lumen omne descendit, plausibile forsan inventum mihi videor posse gratulari, novissimam nempe methodum, quæ tutò, & suaviter hujusmodi morbos curabit.



Uti physica veritas est, quòd Fistula Urethræ ab Urina producitur; Ita quoque firma est regula à continua praxi confirmata, quòd perennis Urinæ fluxus latera sinus continuò humectans impossibilem reddit Fistulæ curationē. Dum supposito, quòd necessariò novæ carnis genesi debeat præcedere callosi labii ablatio, hæc irritò semper conatu tentatur. Si etenim exedentibus tantum potentialibus curatio instituitur, vix immissi sunt, quod ab Urina statim abluuntur (qui etenim laborant Urethræ Fistula, sæpissime mingunt). Si verò igne actuali utimur, ipso actu separationis escharæ, & partis demortuæ, nova quidem succrescit caro, sed dum sensim augmentatur, sensim quoque, & ipsa in callitiem obdurescit. Hæret etenim in parte fermentum à præterfluente semper Urina exaltatum, noxiam illicò inducens effervescentiam, qua mediante evaporatis particulis volatilibus,



latilibus, portiones sulphureæ ab acidis indurantur, & novæ carnis superfici ei tenaciter adhærent; Quam opinionem suggerit celeberrimus *Doleus*; *Quoniam*, inquit, *Urina eam semper alluit, & impedit ob acrimoniam suam salinam, quò minus curetur.*

Similis quoque difficultas oritur in extirpatione Caruncularum. Urina etenim, quæ frequenter fluit, vel ad Caruncularum obices restitat, vim medicaminis deludit, undè à replicata candelæ trusione, vel opus retardatur, vel Ægri excandescunt. Difficultas, quæ sicuti plurima præteriti, & præsentis Ævi Chirurgorum ingenia torsit, Ita pariter, & meum imbecillimum, proxima potissimum Æstate, exercuit. Attenta etenim pensitatione à me sæpissimè examinabantur, non proletariæ sortis Auctores in re Chirurgica, *Fabrizius*, scilicet *Aquapendens pag. 270.* & *Joannes Scultetus in suo Armamenta-*



*rio Chirurgico pag. 27.* Quorum ingeniosissimæ cogitationes in id potissimum incumbabant, ut Urina sine remedii, & partis affectû contactu proflueret; Sed methodo nimis infirma, & optatum finem haud assecutura. Primus cannulam ceream proponit longitudine digiti transversalis, quæ Carunculam à salinis lotii particulis tueatur. Sed præter difficilem situs determinationem, ubi cerea ex linteo cannula est derelinquenda, jam liquet, illicò à calore emolliri, diversimodè crispari, & obstructionem potius præterlabenti Urinæ inducere, ut fusiùs innuimus in præcedenti Historia pag. 80. *Sculptetus* verò Fistulam proponit, ex auro Ungarico fabrefactam, ante Urinæ excretionem, meatui urinario imponendam, ut per eam Urina exeat. Rectè sciens eruditus Auctor talem Fistulam perpetuò non posse gestari, utpote quæ, nisi cum perenni doloris sensu, meatui urinario est adaptabilis.

Hisce



Hisce itaque angustis obstrictus ;  
hærebam in ancipiti, nesciens, quid tali  
casu essem executurus. Eò tamen actu  
ratiocinandi potissimum collimabat  
animus, ut aliquod institueretur instru-  
mentum, quod semel missum, per ali-  
quos dies inferviret, & ipso mediante ;  
Urina sine Urethræ contactu proflueret,  
sicque determinato remedio, vel in ex-  
tirpatione Caruncularum, vel in coali-  
tione sinus fistulosi, placidè supra par-  
tem quiescendo, ne minima quidem  
Lotii guttula ab operando deturbare-  
tur. Tandem post varios exantlatos la-  
bores, & discussa aliorum placita (Di-  
vino favente lumine) rationalem inve-  
ni Methodum, meis non solum votis  
exactè respondentem, sed etiam, in cu-  
randis Fistulis, & Carunculis equaliter  
accomodatum; Talis est.



*Syringa Vermicularis.*

**A**Rgentea fumenda est chorda, pili  
Suis sylvestris latitudinem adæ-  
quans, quæ à perito Aurifice mediis  
duabus Rotis ad contactum nitentibus  
in tenuissimam oblungam laminam  
reducatur; Quo facto, supra cylindrum  
vel æneum, vel ferreum, majori plumæ  
columbæ turriculæ circiter respon-  
dentem, & sensim sine sensu in orbem  
circumactum, exilis lamina, eadem  
semper vi arctissimè cogatur, ita ut, &  
sibi, & masculo perfectè adhæreat. In  
determinata longitudine, obtruncata  
exili lamina, brevissima argentea can-  
nula semidigiti transversalis Infantis  
recenter nati, longitudinem non exce-  
dens, cum igne, in summo apice ag-  
glutinetur, ejusdem latitudinis, quam  
habet reliqua cannula, ex multiplici  
gyro tenuissimæ argenteæ laminæ ef-  
formata; Parte verò, qua calcem agit,  
cannu.



cannula pari ritu conjuncta, in circula-  
rem alam aliquantulum extendatur, ut  
impediatur totalis introitus difficilè  
alioquin removendus. His feliciter pe-  
ractis; Funiculus sericus (vulgo bindel-  
lo) cera, & pauca resina obductus per  
longitudinem ipsius Syringæ ita con-  
suatur, ut latera funiculi perfectè con-  
jungantur; Quinimò, in utroque ca-  
pite supra cannulas triplicata circum-  
volutione ita obligetur, ut nulla quavis  
impetus occasione, Syringa possit denu-  
dari. Si in futura, aut mucrone aspera  
adeft inæqualitas, penniculo in ceram  
tincto debet emēdari; Si tamen vel ma-  
nu, vel tabula supra tabulam in orbem  
fricabitur, omninò lævigata exurget.  
Vices funiculi serici optimè supplet Vas  
animalis, vel venosum, vel arteriosum,  
in quod sensim Syringa immittitur,  
fixis postea cum deligatione capiti-  
bus; Uterque tamen modus æquiva-  
let, ad conficiendam Syringam vermi-



cularem, in usum vocandam, ut in sequentibus.

Placuit ipsam sub Vermicularis nomine indigitare; Extracto etenim cylindro, adeò in omnes motus hinc inde est ptoclivis, ut terrestris Lumbrici similitudinem adepta, nunc dilabatur, nunc subsultet, pro ut diversa pressio participatur. Argenteam laudavi, cætera etenim metalla faciliè à rubigine læduntur, propter salinas lotii particulas, in Magnatibus tamen auro poterit confici, quod cæterorum est propriissimum. Ipsius magnitudo, neque per latitudinem, neque per longitudinem perfectè porest demonstrari, cum in diverso Subiecto non æqualis sit Urinæ iter, neque Carunculæ, aut foramen fistulosum Urethræ eodem semper loco contingant. Hoc tamen sufficiat monuisse, quod Syringa vermicularis in Meatu urinario, debet excedere per duos digitos transversales, vel Carunculam,



lam, vel foramen fistulosum Urethræ, ut canalis ex se fibrosus, & ad contactum nitens perfectissimè adhareat ipsi Syringæ, & totalis Urinæ transitus inter Syringam, & Meatum impediatur.

Quod ut feliciter succedat vermicularis Syringa debet tolerabili adhesionem Meatus parietes implere, unde ante Syringę edificationem, attentè examinanda est Urethræ latitudo, & ferreus axis super quem Syringa vermicularis est instruenda, debet esse talis latitudinis, ut simul cum Syringa, non excedat determinatam mensuram ab Urethra detinendam. Præterquàmquod cautè animadvertendum est, tam in seligenda argentea chorda, quàm in cera obducendo funiculo; levis etenim error, vel in qualitate, vel in quantitate, aut nimis duram, aut nimis exilem vermicularem Syringam efficiet, quæ alioquin debet esse talis, ut ratione suæ tenuitatis, & mollitiei motum virilis



virilis Membri sequatur, & tenuissimè  
lævigata ipsis amica sit Urethræ fibris,  
Ratione verò suæ consistentiæ, debet es-  
se ad latera omninò ab Urina impene-  
trabilis. Quod ut contingat, observan-  
da diligenter est argenteæ laminæ supra  
cylindrum circumgiratio, in quo qui-  
dem motu, dum exilis lamina sensim  
suum circulum absolvit, adeò incum-  
bat priori circulo, ut nullum spatium  
intermedium restitet. Funiculus verò  
à serico forti intertextus, ita cera debet  
obduci, ut Urina ab ipso, nullo modo,  
possit transfudare, sed violenta per lon-  
gitudinem futura, adeò supra Syringam  
cogatur, ut cum ipsa veluti identifica-  
tus, corpus molle, & fixum constituat.  
Quandoquidem argentea Syringa,  
quàmvis flexibilis, & vel à spirali la-  
minæ, inclinatione, aut quovis alio ne-  
xu intertexta nil proderit in Fistula-  
rum, aut Caruncularum curatione, ni-  
si peculiari tegmine obvolvatur, quod  
agglu-



agglutinationē medicaminis in determinatis locis permittat, & introfluentis Urinæ exitum ad Siringæ parietes coerceat. Dato etenim labentis Membri motu, dum Syringa ad exigentiam reflectitur in convexis ejusdem partibus laminæ à se invicem discontinuantur, undè varia illicò exhibentur spatiola, per quæ Urina locum quærens filtraretur, & in fistulosos Sinus excurrentes Fistulæ curationem præpediret.

Dato tamen casu, quòd non Fistula, sed Caruncula in ipso collo Vessicæ debeat curari; Tunc Syringa vermicularis in Vessicam usque debet pertingere, debetque ita fabrefieri, ut brevissima cannula in summo apice existens, caput habeat obtusum, foramina verò in utroque latere, non è directo sibi occurrentia [cannula etenim nimis debilis evaderet] sed alter, altero superior. Quin etiam similis Syringa poterit adhiberi in quavis Urinæ suppressione, cum



cum hac tamen observatione, quòd si debilis est Syringa, & omni obstaculo reluctans, cum infuso cylindrulo adhibebitur, in summitate reliquarum Syringarum more leviter incurvato, quòd si ab oleo amygdalarum dulcium fuerit oblitus, levisima tractione ab ipsa vermiculari Syringa, in Vescicam jam hiscente, secedet.

Felicissimam præstabit operam in illis potissimum casibus, ubi Vescicæ, vel Sphincter, vel Valvula a Paralysi læditur, aut ubi continua lapidis præsentia, supra Valvulam præponderans, impossibilem mictionem inducit. Syringa etenim vermicularis, semel immissa, per aliquos dies inservit, & adeò levis Membri motui obsecundat, ut Ægri quâdoque ipsam non habere fateantur.

Proximo Octobre ipsam expertus sum in milite quodam duabus callosis Carunculis sibi ipsis paulò distantibus, & in medio post Vescicam, Urinæ itinere



re radicatis; Etiam in principio, fateor, perforationem sunt passę, undę immissa vermiculari Syringa septem digitorum transversalium longitudinis, adeo feliciter per ipsam Urina perfluebat, ut Ager extractionem difficile permitteret. Nihilominus post 24. horas novam Syringam immisi, exedenti cerato turgidam, ubi Carunculis debebat occurrere; Prima verò Syringa in aquam est demersa, ut ab externis sordibus expurgata castino operi inserviret. Replicata per octo dies remedii exedentis supra Carunculas adaptatione, nullum amplius obstaculum, in trusione vermicularis Syringę distinguebatur, undę tutus de ablatis Carunculis, sequenti mane, Syringam solo oleo oblitam immisi, de illis tamen, quę sericum funiculum medicatum habebant, ut in præcedenti Historia pag. 97. Per quatuor dies solidos in Meatu urinario stetit, quin Patiens de ullo, aut dolore,  
aut



aut pondere quæreretur. (obiter moneo Syringam vermicularem, qua tali casu usus sum, ponderasse *scr.ii.s.*) Tandem Balsamicis, & exsiccantibus in usum feliciter revocatis, Æger, favente Numine, in tutum est collocatus.

Dantur tamen Carunculæ in tantam prominentiam extensæ, quæ, totum canalem obstruendo, sui perforationem impediunt. Tali casu adhibenda est Methodus, qua usus sum cum N. N. pag. 91. aut, si omninò sint refractariæ, deveniendum est ad caustica magis potentia, cum instrumentis pag. 87. explicatis; His mediis dato aliquo aditu, statim ponenda est Syringa vermicularis, minori potiùs cylindrulo fabrefacta, per quam Urina, occasione mejendi, secedat, & exedens Medicamen diu agat in Carunculas, quæ, quò magis cedunt, eò crassior Syringa est adhibenda, ut aucta pressione à profundioribus quoque radicibus extirpentur.

Ad



Ad facilem Syringæ vermicularis introitum multum proderit prævious Chordarum nervearum usus. Non tamen de illis sunt feligendæ, quæ perpetuam tensionem in Instrumentis musicis fuerint passæ, quæmadmodum in ipsis perit vis elastica restitutionis, quæ potissimum requiritur, ut immissa in Urethram chorda, atque laxata suorum tenuissimorum filaminum compage majus spatium, quo ad crassitudinem occupet. Quare congruum erit per aliquot horas violento pondere nerveam Chordam in majorem longitudinem protrahere ita, ut exilia filamina validam satis compressionem patiantur, & ad majorem semper constipationem coacta magis ad se invicem accedant, quæ tamen propter minimarum particularum unionem non disrumpuntur. Hinc est, quod majori tantum acquisita rectitudine in longitudinem excrescit, quod in crassitudine deperditur; Et quàmvis



vis sublato pondere illicò emergat elastica particularum vis, & per consequens totius Chordæ ad pristinum latitudinis statum reductio; Hoc tamen non continget, si nervea Chorda ante tensionem in aqua calida, per aliquod temporis spatium, fuerit humectata, dum laxato partium integrantium nexu, præterquamquod majorem patitur tensionem, & per consequens gracilior evadit, si cum appenso pondere exsiccabitur, talem induet rigiditatem, & duritiem, ut amissa reductionis vi, immò acquisita robustiori firmitudine ad superandas Carunculas aptior evadet.

Taliter immissa in Urethram Chorda à restituantibus post mictionem Urinæ reliquiis, addito partis Calore, sensim sine sensu laxatur, & immutata textura ab humidis particulis semipatulos Poros permeantibus nervea candela decurtatur, opusque expectatum felicissimo eventu absolvitur, dum ulterio-

rem



rem semper crassitiem naſta eminentes Caruncularum protuberantias depri- mit, & extracta, amplum hiat iter, aut ad ſollicitum Urinæ tranſitum, aut ad facillimam Syringæ Vermicularis tru- ſionem, cujus introitum impoſſibilem fateor, niſi prius ſufficiens patuerit adi- tus, qui pedetentim Cereorum, & Chor- darum uſu, eſt promovendus.

Notandum tamen, quod in Syringæ truſione, cum apex admodum latus ſit, æqualis ſcilicet diametri cum tota Sy- ringa in obvias facili negotio Caruncu- las reſiſtatur, unde aptum erit Syrin- gam vermicularem prius munire cerea candela, quæ ultra Syringam ſemper graciliori apice promineat. Hoc ete- nim modò Carunculæ faciliùs evitan- tur, & minori cum dolore Syringa im- mittitur.

Tali modo curatis Carunculis, ſi adeſt Fiſtula in id potiffimùm eſt incumben- dum, ut reperiatur ſitus perforatæ Ure-



thrae, quod obtinebitur, si immisso in Urethram cathetere, & in sinum argenteo specillo, fundus Fistulae attenta perquisitione explorabitur; Quando recta est Fistula, Catheteris latus facile ab apice specilli tangitur; Si verò anfractuoso sinu procedit, tunc adhibendum est specillum plumbeum diversimodè ad exigentiam reflexum, quo locus exulceratae Urethrae debet reperiri. Quòd si Fistula sit in Perinaeo, opus ex voto succedet, si Chirurgus artis suae gnarus, caput Catheteris extra Membrum emittens, leviter sinistra Manu, versus Umbilicum manuducat (eodem prorsus modo, quo *Lithotomi* utuntur in sectione ad lapidem extrahendum); Convexa etenim Catheteris pars adeò in Perinaeo prominebit, ut facili negotio mucroni plumbei specilli respondens, Urethrae foramen revelabit. Tunc Catheter per Urethram lenta tractione excavabitur, & vermicularis Syringa, quæ per duos digitos



gitos tranversales superet obstaculum specilli plumbei, adhuc in fistuloso Urethrae foramine delitescens, immitatur. Dein extracto specillo plumbeo, ad ea, quæ callum destruunt, & novam sinus coalitionem inducunt deveniendum est, semper tamen in Meatu relinquendo vermicularem Syringam, ut per eam omnis effluens Urina Fistulae curationem permittat, alioquin impossibilem.

Et ut mea tantum non inniti speculatione hoc effatum pateat, audiantur verba Celeberrimi *Fulvii Gherli*, qui in observatione sexagesima nona pag. 260. Fistularum Perinei Curationem sic aggreditur. *Indi intromisi una Cannella sottilissima di piombo nell' Uretra, oltre le sboccature delle Fistole, ed in tal modo impedii l'uscita delle Orine per le medesime.*

Illūnus, & Excūsus Comes de *Kinigsegg*  
S.C.M. Generalis in Prælio *Cassani* apud



*Abduam* 1707. contracto Vulnere, & per integrum Mensem ab Exercitus Chirurgis fatigatus, *Brixiam* petiit. Accersitus Pater meus audacem reperit plumbeæ Glandis ictum, a quo Penis prope Scrotum in medio fuerat perforatus, ultro progrediente Glande in Sinistram Coxam usque ad Contactum Femoris. Quòd tamen plus facescebat negotii Exc. Patienti erat tarda Vulneris Membri Coalitio, & omnis irrita Vis Medicaminis. Nec absre, quoniam denudato Vulnere, actu Mictionis copiosa visa est Urinæ quantitas, quæ ab utraque laterali Scatebra exundabat: Unde congruum fuit arbitrari Curationem Vulneris, quod jam jam ad Fistulam appropinquabat, ab urinario Lotio præpediri. Tali itaque innixus evidenti conjectura argenteam cannulam in Urethram ultrà foramina immisit, & miraculi ad instar, perfluente feliciter per Cannulam Urina, brevissimo dierum



rum tractu convaluit. Taceo Fistulam Urethræ in Perinæum, & sinistram Nartem duplicato sinu excurrentem feliciter *Mediolani* Curatam in Ill. & Excell. Ba. Martini S.C.M. Commissario Generali, aliasq; complures in hominibus inferioris conditionis.

Quid plura? *Scultetus* ipse Chirurgicæ supellectilis diligens adeò Inquisitor ad tollendos torminosos cruciatus, quos Lotium actu mejendi per exulceratam Urethram inducit, non ne aureo Tubo, utebatur? *Atque ita leniatur*, ait, *Sævisissimus ille dolor, & ardor, quem sentiunt Egri, quando Urinam sine Cannula reddunt.* Cujus inde emergens consequentia satis probat, quod si immissa in Meatum Cannula mictio absq; ardore succedit, nulla ne minima quidem Urinæ portio in summitate inter externa Cannulæ latera, & Urethram filtratur, sed felici gurgite per cannulam præterfluit, & quidem celerius, quàm



quàm absque Cannula etiam si nullum  
adesset in ipsa Urethra obstaculum .  
Quandoquidem membrum, dum mol-  
le dilabatur, & à suis muniis feriat,ur,  
membranacea, & spongiosa Vrethra  
ad contactum nititur; Idcirco, ut Urina  
labatur, major ipsi fluido requiritur im-  
petus ad superandum renixum parie-  
tum Urethrae, quorum continua pres-  
sio, & successiva à Sphinctere Vesicae  
usque ad exitum Glandis ad contactum  
inclinatio non levem resistantiam in-  
trofluenti Lotio impertitur. Contra ve-  
rò immissa cannula, apertum patet iter  
nullis pressionibus obnoxium, in quo  
Urina lato satis limite coarctata exi-  
tum festinanter absolvit; Et quamvis  
cannulae apex Lotii undae videatur a-  
liquantulum obsistere, hoc tamen e-  
vitabitur, si cannula ad tolerantiam  
fuerit ampla, & in suis parietibus admo-  
dum subtilis, & sufficientem advenien-  
ti Urinae aditum exhibeat. Cumque  
his



his præsertim casibus frequens occurrat Mictio, non tam facilè à pauca Urina tolerabilis illa adhæsió summmitatis cannulæ cum Urethra in parte sana, perturbatur.

Hæc de cannulis; Quorum usum Nemo potest criminari, quin omnium Medico-Chirurgorum censura expungatur. At quomodò exprobrabitur vermicularis Syringa, quæ Metallicis cannulis antehac usitatis æquivalet, immò favorabili disparitate antecellit? Quandoquidem, si primæ propter perpetuam suam tensionem dolorosæ erant gestationis; Hæc in omnes motus facillima amicabile reciprocatione cum Urethra hinc inde dilabitur.

In juvenili tamen ætate impossibilis interdum est tolerantie, sed si datur hujusce Morbi curandi occasio, signum evidens est, quod Patiens per annos integros à stranguriis, & Urinæ supressionibus fuit vexatus; Callosa siquidem fie-



ri Caruncula, nec sinus fistulosi ad Urethrae latera contingere possunt, quin morbosa Ilias in parte non præcesserit, & frequenti usu Catheteris, aut candelarum opus fuerit, quibus tenuissima alioquin Epidermis ad extranei Cylindri contactum assuescit.

Cautè ideò in Syringæ ædificatione animadvertendum est, ut externè adamussim expoliatur, & equalis sit diametri per totam longitudinem; Ab Anatomico siquidem examine patet Urethram quoque in toto sui decursu eandem habere capacitatem, ut testantur *Diemerbroeck* pag. 127. & *Blancardus* Tr. de Virorum Organis pag. 519. illis verbis: *Quam Urethram appellamus Teres, & caua est eandem ferè à principio ad finem amplitudinem obtinens*; In aliquibus quandoque tamen potest esse inequalis, quia Monstra contingunt.

In reliquis, quò ad hujusce Syringæ inventum mihi, & ipsi fateor in sola  
conje-



conjectura multæ difficultates occurrebant, sed cum in quotidiana praxi cum Patre meo, meis Votis satisfacere compererim, non potui, quin Publici Juris illud facere statuerem. Etenim in præsens nulla alia Utimur Syringa, quã ex Vermicularibus, tam in Urinæ suppressionibus, quàm in Sphincteris Paralisi, Fistulis Urethræ, Carunculis &c. quæ quidem si totum canalem occupaverint, candelis priùs cereis, vel chorda, ut jam innuimus, sunt minuendæ; Et tunc præcipuè Syringa est agendum, quando Carunculæ radices ad rugosam consolidationem pronæ perfectæ extirpationi reluctantur, dum Syringa, cujus lateri Medicamen fuerit agglutinatum, indesinenter in ipsas impellit, & naturali tentata conformatione ab æquali per totam Urethram nisu successivis balsamicis opus absolvitur. Hinc ingenuè fateor, à nostro Chirurgico Armamentario in inferiorem angulum relegatæ



gatae sunt Argentae antiquae Syringae, quibus utimur solum dato casu, quod de Vesicae Calculo dubitetur. Tunc etenim firmus satis debet esse Catheter, ut Lapidis contactus in manum resonet, & distinguatur. Sed è diverticulo in viam.

Quamvis totus cardo curationis pendeat ab impedito Urinae per Fistulam fluxu, nihilominus multum proderunt ad Fistulae extirpationem cetera quoque remedia, tam localia, quam universalialia; In quibus tam decantatus vulnerariorum usus, peculiari quasi virtute in partem affectam agens, non bene sonat cum aequali liquidorum, per totum corpus, circulatione; Explicari etenim nequit, quomodo vis medicaminis, per tot filtrationes enervata, & ad locum laesum pertingens, suas vires exerat in carnis reproductione. Sanè solutae unitatis coalitus opus est solius Naturae, & humorum glutinantium, à vitali Corporis nostri principio producto-



etorum, prudensque Chirurgus, verus Naturę minister, insufficientibus Naturę conatibus debet succurrere, callum abducendo, crispaturam læsarum fibrarum emolliendo, & diligenti ligamine Fistulę labia combinando. Sic sponte redibit humorum circulatio, & in cavum sinus continuò stillabit balsamicum Gluten, quod solutam unitatem conjunget; Frustra itaque tentabitur Fistulę curatio, si corpus vel cachochymum, vel Lue Gallica infectum, vel aliqua Viscerum intemperie fuerit labefactatum. His etenim casibus à præpollente in liquidis, aut falsedine, aut aciditate facile latex balsamicus deficit, corrumpitur, & ad glutinandum ineptus evadit. Non itaque determinata dantur Vulneraria ex simplicium potissimum ordine desumpta, ut Bistorta, Centauri Min. radix, Consolida, Hypericon, Sarsaparill. scord. salv., Scolopendr., Chinæ radix &c., quæ in Auc.



toribus possunt videri ; sed omnia ea lato modo dicentur vulneraria, quæ peculiari præexistente morboſo Viſcerû , aut fluidorum ſtatu admuſſum reſpondent, & vel in æterogeneitatum attenuatione, vel in animandis fermentis potiſſimam dabunt operam. Sic v.g. ſi Fiſtuloſus prævio laboraverit Scorbutto, tardum, & impoſſibile opus erit Fiſtulæ curatio, ſi ipſi non præcedant remedia antiſcorbutica, totius Morbi eradicatoria. Sic in Lue Gallica affectis, nunquam Fiſtula curabitur, niſi prius domito Luis genio ; Unde antiſcorbutica, & Mercurialia vulneraria dicentur. Robur addunt huic Hypotheſi verba Eruditiffimi Jacobi walſchmidt in Chirurgo Cartefiano pag. mihi 14. *Nunc ea, inquit, adhibenda ſunt vulneraria ; quæ acido debellando ſunt dicata, mox talia eligenda, quæ ſalinam intemperiem magis reſpiciant ; Sæpius nova ſubſtituenda, quæ vim etiam habeant turbatam.*



*batam sanguinis mixtionem restituendi*.  
 Clarè itaque patet, omnia jure merito  
 vulneraria dici posse lato modo, reme-  
 dia illa [*equidem, si verum velimus fa-*  
*teri*, ait Celeberrimus Christianus Joa-  
*nes Langius in sua praxi generali, pro-*  
*prie sic dicta remedia vulneraria vix*  
*dantur*], quæ morbosam diathesim Fi-  
 stulam, vel efficientem, vel concomi-  
 tantem compescant, ut inde emergen-  
 te balsamica Sanguinis constitutione,  
 gelatinosæ, & lacteæ portiones, debita  
 accedente digestionem, in fistulosi sinus  
 circumferentia transudent, quodq; de-  
 perditum, & discontinuatum erat, de-  
 nuò redintegretur.

Utrum tamen, quandoque sinus ru-  
 bicunda carne adimpleatur, medianti-  
 bus remediis illis vulnerariis specifica  
 activitate pollentibus, & immediatè à  
 Ventriculo per peculiare vias in sinum  
 derivatis, (quæ Veteres jactitant) sa-  
 gacioribus remitto decernendum.

Hoc



Hoc unum scio Clarissimorum Vi-  
rorum auctoritate, & continua expe-  
rientia fretus, cujuscumque loci læsi, &  
præcipuè Fistulæ Urethræ, optimum  
inter cætera vulneraria in usum poni  
debere decoctum exsiccans; addito, me-  
dio Hypocausti, sudore. Nimis etenim  
in circuli necessitate portiones omnes  
ferosæ, aqueæ, & æterogenæ in Pubis, &  
Ani regionem præcipitantur, & vel in  
sinus cavitate extravasantur, vel Tumo-  
res ædematosos inducunt. Cumque ef-  
fectus curationis pendeat ab actu exsic-  
candi, proprium erit ante Fistulæ cura-  
tionem decocti sudoriferi usus, à quo  
superflui omnes humores ad ambitum  
corporis expellantur, nec amplius ad  
partem affectam inclinent. Hoc fa-  
cto, dum sensim sudor agitur, Chirur-  
gica quoque Manus ad partem est ad-  
movenda.

Posita itaque Syringa Vermiculari  
in Urethram modo jam descripto; Hoc  
est,



est, quòd summus apex Syringæ per duos digitos tranversales proximior sit Sphincteri Vessicæ, quàm foramen fistulosum Urethræ; Tunc totis viribus est agendum, ut callus, sinum circumambiens, destruat, & quàmvis auserim dicere, quòd feliciter per Syringam vermicularem perfluente Urina, nec amplius Fistulam humectante, sensim callus ex se evanesceret, [quod assertum abundè probatur à modo, quo multiplices Fistulæ hinc, inde enascentes, curantur; Scilicet ampliato recto, & majori foramine, per quod liberè exiens Urina, per reliquas filiolas Fistulas amplius percurrat; Quæ dein sine exedentibus, sine balsamicis ad cicatricem perducuntur, & tamen ante dilatationem unius ex foraminibus, cetera omnia callum durissimum præseferabant, undè patet consequentia, quòd cessante Urinæ cursu, Fistula ex se curaretur.) Nihilominus opus citiùs absolvetur, si cæ-



tera quoque remedia adhibeantur, quorum, quàmvis apud Auctores constet abundans Catalogus, attamen cum pauci ex professo de Fistula Urethræ egerint, meliora placuit seligere, ad casum peculiariter respondentia.

Notandum itaque in primis est, quòd Fistula Urethræ, rarò vel ferrum, vel ignem patitur, cum nerveæ, & spermaticæ vicinæ partes facilè in inflammationem, & successivam Gangrænam abeant. Et quamvis Eruditissimus *Petrus de Marchettis in tractatu de Ulceribus, & Fistulis Urethræ, pag. mihi 166.* sectionem laudaverit; Pace tanti Auctoris, cautè procedendum est, præcipuè si callosi sinus propè ad Urethram hinc, inde delitescant. In Perinæo tamen, si callus eminentem, & ostreaceam naturam induerit, poterit caustico etiam actuali tangi, sed potiùs superficialiter, cum vicina Urethra facilè suas diatheses ipsi Vesicæ participet. Dato  
tamen



tamen casu, quòd fistulosi cuniculi in ipsas Nates dehiscant in partibus præcipuè carnosiss, aut in Scroti superficialibus, vitatis vitandis poterit sectio institui, vel Scalpello in mucrone cera munito, ne in transitu non fecandæ lædantur partes, aut Instrumento ab *Aquapendente* descripto, cujus gladius vaginatus, compresso manubrio, exit, ad sectionem limitatè perficiendam.

In reliquis, semper causticis potentialibus in calli ablatione agendum est, nunc acribus, nunc moderatis, prout calli resistentia requirit, quibus turunda oblinitur, ut suo circulari contactu callum destruat; Cumque sinus in principio semper ampliandus sit, aptum erit, vel Spongia, vel Surgi medulla turundam præparare, tali arte, ut, dum sensim à Fistulæ sordibus humectata crescit, causticum potentiale undequaque in sinus latera cogatur. Non confestim tamen, nec prima illicò vice hoc agendum est,

K

sed



sed pedetentim, & argentea cannula, vel in medio, vel ad latera spongiæ in ipsum sinum intrusa, ne coercitæ ichorositates ab impervio itinere in profundioribus partibus scrobem sibi excavent, sed dum sensim colliguntur, sensim quoque per cannulam secedant.

Non potest determinari, qualia corrosiva in Urethræ Fistula convenient, cum non innotescat qualis calli pertinacia obvia esse possit. Quia tamen, quò ad calli remotionem, quæ exedentibus potentialibus fit, cum cæteris Fistulis convenit, ideò appropriata ab Auctoribus, experientia duce, poterunt hauriri.

Principaliora, & magis usitata dividit citatus *Langius in sua praxi generali pag. 784.* in duas classes, scilicet *alcalicorum, & acidorum.* In primis pollent *Lixivia fortiora, & præ præ saponariū.* Teste *Tachen. in Hipp. chym.* qui exemplum refert de homine noctis tempore in *dolium lixivio tali repletum, lapso, qui*  
totus



*totus corrosus, & consumptus brevi fuit.*  
 Pro acidis habet oleum Vitrioli, Butyr.  
 Antim. Mercurium sublimatum, &  
 præcipitatum, calc. viv. &c. quæ vult e-  
 tiam distingui ab effectu, hoc est, quòd  
*Alchalia partes nigras relinquant, acida*  
*rubeas.*

*Gabriel Fallopius* in callis molliori-  
 bus utitur radice Hellebori nigri in ace-  
 to, vel oxymelite macerata, & in sinum  
 immissa. Sed præstantior modus est  
 in forma liquida, mediante Syphone in  
 ipsum sinum intrusa. Cum etenim fi-  
 stulosa cavitas, non semper undique tu-  
 rundarum, aut radicum obstaculo se  
 exhibeat, per consequens callus à cau-  
 stici præsentia remotus, non separabi-  
 tur. Præterquàmquod nullam vidi  
 Urethræ Fistulam, quæ tortuoso itine-  
 re non serperet, aut cuniculos hinc in-  
 de non efformaret. In quibus quidem  
 casibus turunda spongiosa caustico ob-  
 lita nil aliud præstat, quàm foraminis



dilatationem, ut ceteri quoque sinus  
faciliùs perſcrutentur, in quorum cecã  
ſcaturiginem turundæ difficilè poſſunt  
pervenire; Contra verò injectio ubi-  
cumque pervadit, præcipuè, ſi Siphon ta-  
li arte adhibeatur, ut liquor violenta  
preſſione evacuatus in ſinum è directo  
impingat, quod ex voto ſuccedet, ſi  
cannula Siphonis ad exigentiam refle-  
xa, cavernoſis hinc inde ſinibus appli-  
cabitur. In illis tamen Fiſtulis Urethræ,  
quæ nullam dilatationem, neque exter-  
ni quidem foraminis patiuntur, tunc ad  
mediam Siphonis cannulam Goſſipium  
alligandum eſt, quod dum Siphonis  
ulteriùs iter prohibet, adeò foramen fi-  
ſtuloſum obrurat, ut coercitus liquor  
ex Mechanica neceſſitate, in tenuiſſi-  
mos uſq; Meandros ſerpat, & calli ani-  
hilationem moliatur.

Liquores iniiciendi, ſecundùm Ve-  
teres, ſunt ſuccus Tabacci, Rad. Ariſtol.  
rot. ung. ægypt. Chalcanth. uſt. pulv.

can-



cantharid. trocisc. de minio, decoct. lupinorum, vitriol. ust. succus tithymali &c. Secundum Recentiores, Aconitum, Butyr. Antimon. Mercur. precipit. & sublimat. Mag. calcinat. Paracelsi, Aqua Mercurialis, Sal ammoniacum, & inter cætera summis laudibus extollitur à *Carolo Musitano*, tractatu de Tumoribus Tom. I. pag. 22. Balsamum Arsenici, eò quòd inveteratas, & malignantes Fistulas adequatè persanat. Videatur in citato Auctore modus præparationis,

Cautè tamen, & summa cum circumspèctione procedendum est in arsenicalium injectione, cùm sepe sæpius, quàmvis superficialiter callus undique impactus appareat, in profundioribus quandoque partibus, aut in cuniculis recenter efformatis, datur non solùm aliqua superficies bonæ carnis, sed etiam multoties, vel hiscunt aliqui furculi Sanguinei, vel nudæ apparent Fibræ mu-



sculares, undè remedii venenata qualitate, aut in Sanguinem irrepta, aut irritatis Fibris, facili negotio universæ fluidorum Massæ summè fermentativa modificatio participatur, quæ aut febres molitur, aut inflammatorios abscessus in ipsa parte producit in Gangrænam sæpè sæpius abeuntes. Quare sufficiat, si Tyrones sequenti utantur injectione, quæ Patrem meum per quadraginta annorum praxim in Fistularum curatione nunquam fefellit .. Æqualis pars Mellis ros. simplicis, & Ægyptiaci dissolvatur, vel in aqua Hordei, vel in vino albo, aut tenui lixivio, & in dies augeatur dosis Ægyptiaci, usquequò reluctante callo, solum Ægyptiacum adhibeatur, cujus exigua portio poterit in ipso sinu relinqui, ut agat, quod agere nata est.

Talibus remediis sensim callus annihilabitur, quod cognoscitur à putrescentibus ramentis, quæ sensim abeunt,  
& ab



& ab aliqua Sanguinis portione, quæ ab ulceratæ carnis superficie secedit. Tunc ad partis corroborationem, & ad sinas, ut ita dicam, corrugationem, aptum erit Vinum stypticum, mediante ampla Spongia externæ regioni Fistulæ applicatum, sequentis, si lubet, tenoris.  
*Rx. Rad. consolid. plantag. aa. unc. ii. Fol. caud. equin. Hyperic. menth. aa. m. i. Prunor. sylv. cont. unc. s. Bacc. myrt. Cupres. Cort. granat. Balau. fl. ros. rub. Damas. aa. unc. i. Mal. cot. num. ii. Cont. cont. & inf. in vino austero, & generoso per noct. m. bull. parum pro usu.*

Diverſo tamen modo procedendum erit, ſi exedentium uſu acutiſſimis doloribus anſa præbeat; Tunc etenim anodino ſupra partem cataplaſmate erit utendum, ex Parietaria cum croco in oleo chamomillæ cocta, & tepidè impoſito, ut particulæ ſuccorum corruptorum cuſpidatæ hebetentur, & frangantur, atque emollita Fibra, cruor bal-



famicas, & lacteas moleculas ad sinus latera evomat, optatam coalitionem producturas.

Quòd si ulcus fistulosum in ipso delitescat scroto, aut multis foraminibus ipsum perfoderit, tunc validè incumbendum est ad demulcendas exulcerationes ab undique humectantibus ichoribus productas. Membranacea, & rugosa etenim pars difficilè à putrescentium remedium sordibus munda tenetur, unde sæpe sæpius quædam veluti impetigo suboritur, totum circumambiens Scrotum, quæ Fistulæ curationem aliquantulum prolongat, propter delicatam, & denudatam partis texturam, quæ exedentium minimo contactu excandescit. Quo quidem casu, aptum erit ung. ref. Gal. ros. onphac. aut malv. vel empl. ex farina Hordei, lent. aut fabar. cum decot. semin. fenugr. subacta, add. ol. amyg. dul. rosaceo, & chamomellino; .Præ cæteris tamen sequens ung. com-



commendatur. *Rx. Thuris Lytargyrii, Cerus. lot. Sang. drac. Acac. Cort. granat. aa. dr. ii. Sarcocol. Aloe, Alum. aa. dr. i. Pul. add. ceræ, & ol. ros. q. s. fung.* Et si aliqua adesset suspicio non domitæ Luis Galli-  
cæ, poterit addi pauxillum Mercurii viv. cum saliva Hom. extinct. Quibus non sufficientibus, poterit etiam institui de-  
mersio, vel Semicupium in aquis ther-  
malibus, quæ si absint, substituatur de-  
coctum *Scordii, agrimonie, flor. Hyperic. &c.* à quibus non solum salina Scro-  
ti Diathesis enervabitur, sed etiam cal-  
lus mollior evadet.

Quinimò notandum est, quòd dum callus sensim annihilatur, & sub-  
stantia spermatica Urethræ detegitur,  
Tunc in usum ponenda sunt exeden-  
tia minoris aptitudinis, cum partes ner-  
vosæ similia remedia difficilè patiantur.

Sub hoc regimine sensim callus se-  
cedet, præcipuè, si attentè invigilet  
Medicus, ne una quidem Urinæ stilla



in sinum fistulosum defluat, dum sine tali diligentia operam, & oleum perdimus, unde non erit absre, si semel in die, aut ter in Hebdomada, Syringa vermicularis in Meatu mutetur, dum continuo Urinæ cursu, aliquando intrinsecus ab ichoribus catarrhalibus, & præcipuè mucosis obstruitur, aut à retentis in circumferentia fordibus, ipsi Urethræ noxior evadit. Impossibile etenim est, quòd, dum foramen fistulosum Meatus urinarii mundificatur, purulentæ quædam humiditates ad latera vermicularis Syringæ non incumbant, quæ autem, cum ipsi Meatui perfectè adhæreat, ab ipsarum attritione, aut foramen Urethræ dilatatur, aut nova ulcuscula generantur; Quare in dies Syringa mediante specillo internè perfectè mundificabitur, aut prævia lactis injectione ad canalem abluendum, nova immittetur, possibilis semper latitudinis, tum quia citius tramitem Urinæ permit-



permittit, tum quia Urethræ perfectè incumbens, ad externos Syringæ parietes, Urina non filtratur.

In quem finem, occasione mejendi, aptum erit, ut Æger, dextera manu membrum, & circularem Syringæ alam detineat, sinistra verò Perinæum, prope Anum, supra Syringam vermicularem aliquantulum comprimat, aut plumaceolo ipsi Perinæo superposito, & media Fascia in Collo, Pube, & regione Renum cingulo fixata (vulgò Staffa) suspenso; Hac etenim compressione sana prope Sphincterem Urethra ad eò ipsi Syringæ vermiculari incumbet, ut totalis Urinæ exitus inter Syringam, & Meatum impediatur.

Cavendum tamen est, ne pressio, quæ ad latera summitatis Syringæ debet fieri, ultra Syringam fiat, dum tali modo Urethra ad contactum cogeretur, & superfluous esset mejendi conatus; quod absurdum facile tollitur, si Syringa



ringa vermicularis tantæ erit longitudo, ut usque ad Vesicæ collum peringat.

Rebus ita se habentibus, & calli radicibus penitus extirpatis, tunc ad deperditæ substantiæ generationem, & ad perfectam sinus coalitionem deveniendum est, quod obtinebitur remediis ad talem operationem naturam coadjuvantibus, scilicet, Digestivis, & Sarcoticis. Cumque post Calli ablationem aliqua adhuc restitet fibrarum contorsio, in suis plicis detinens alterati succi nutritii particulas, aptum erit primis potissimum diebus in digestivis insistere, quæ crudas, & aterogeneas vicinas materias digerant, & humorum glutinantium affluxum promoveant. Talia erunt, ung. ex thereb. ol. rosarum, farin. tritici, croco, & vitell. ov. factum; Vel ex Basilico majori, syrupo de rosis siccis, & ol. Hypericonis. His etenim sinus perfecte mundificabi-



cabitur, & ab hiscentibus orificiis vasorum sanguiferorum, debita mediante digestionem, & immutationem symbolicam, & balsamicam transfudabunt portiones, quæ novam carnis genesim affabre efformabunt.

Tunc Balsamicis instandum est, in quibus pollent Balsamum Peruvianum, de Copayva, Hartmanni &c. *Thomas Alghisius* tamen Tractatu de Lithotomia, capite de curanda Urinæ Fistula summis laudibus extollit Balsamum *Arcei* sic ab ipso *Alghisio* descriptum  
*Rx. Gumm. elem. Thereb. venet. aa. unc. i. s. Ping. Hirc. unc. ii. Axung. s. villæ non salitæ unc. i. liq. filt. pro usu.*

Filacei inde Globuli, ex his, aut similibus tincti suaviter in Fistulam sunt immittendi, ita tamen ut non in externo foramine solum, sed usque ad fundum sinus pertingant, ubi caro debet succrescere: Frustra etenim substantia Urethre deperdita desideratur, unde sufficiat, si  
 ad-



adstans caro vicibus Urethrę fungatur, quæ temporis tractu, & exsiccantibus per Urethram injectis, aut Syringa vermiculari applicatis, summa Naturę operantis industria, aliqua cicatrice obducitur.

Globuli tamen, nec crassi, nec densi sed molles, & abundantiori balsamo turgidi in sinum sunt ponendi, ut ex fundo advenienti carni locum cedant, & perfectam sinus combinationem, mediantibus fasciis conficiendam, permittant.

Prohibeatur aeris frigidioris accessus, dum laceratę fibrę ab ipso semper constringuntur, quin etiam a peregrinis particulis, quibus est conspurcatus placida liquidorum circulatio turbatur, ad carnis reproductionem summè necessaria. Unde ante deligationem, arte fiat calidum Cubiculum per admotum vas carbonibus ignitis repletum, quo mediante Fasciæ, & plumaceoli  
sem-



semper erunt calefaciendi, & tali modo coadaptandi, ut labia Fistulæ accuratè sibi invicem respondeant; Hoc est talis instituatur ligatura, qua fundus Fistulæ arctè comprimatur, orificium verò externum laxiori vinculo in plumaceolos dehiscat, ut superflui omnes ichores in novam carnem non habituri, qui ex coercita mora malam qualitatem inducerent, promptè secedant.

Fasciarum magnitudo, Figura, & differentia ad absolvendum opus necessaria, videantur in *Jacobo de Marque traite des Bandages de la Chirurgie*. Illud solum monuisse operæ pretium duxi, quod labia Fistulæ mediante ligatura ad perfectam combinationem devincienda sunt; sed vitanda est arcta nimis deligatio, quæ subitam partis inflammationem produceret, ex denegata spirituum, & Sanguinis circulatione. Quare moderata, & tolerabilis debet esse deligatio, quæ dum sinus latera ad contactum



Etum disponit, lacteorum, & glutinantium humorum affluxum, non intercipiat.

Dum caro ex fundo succrescit, filacei globuli semper sunt diminuendi, & superponendum est aliquod ceratum, de chalcit. de bet. aut de Gratia D. cum vasta spongia regioni Fistule applicata, & vino austero styptico, jam descripto, madefacta. Quod si Fistula sit in Perinæo multum proderit ad sollicitam consolidationem suspensio Scroti, & unio Crurum, dum tali statu Fistula melius coit.

Generata æqualiter carne, promovenda erit cicatrix ung. de Tut. aut de Plumbo, additis pulveribus exsiccantibus Corall. rub. præ. & similibus, non solum extra, sed etiam in obturata Urethra, quæ, quàmvis impossibilis sit regenerationis, attamen adnata caro vires Urethræ gerit, & sufficienti cicatrice obducitur.

Aptum tamen erit etiam post consolidationem.



id ata inFistulam in Syringa vermiculari per aliquot dies insistere, ne Urethra, nova textura induta, à salinis Urinę particulis lædatur, sed, dato aliquo tempore, & remediis epuloticis, naturalem tonum, & consistentiam aquirat.

Plura adhuc superessent dicenda, ad Fistulæ curationem apprimè necessaria, quę, ne crambem bis coctam apponam, ab Auctoribus poterunt hauriri. In presentiarum sufficiat, invētum, à nemine, quod sciam, excogitatum publici juris fecisse, quod inveteratas quoque Urethrę Fistulas facili negotio curabit.



*Explicatio Tabula I.*

**M**irum non videatur, si præsens Tabula Syringas exhibeat ita dispositas, ut nullam cum Urethra proportionem præferant, cum ex præcedentibus abundè pateat nullam ipsis inesse flexibilitatis determinationem, sed in omnes motus esse æqualiter pronas.

FIG. I. Ostendit Syringam vermicularem, cujus dimidia pars à funiculo cerato tegitur.

A *Acus filo serico munita, qua latera funiculi perfectè conjunguntur, ita, ut undequaque argenteæ laminæ adhæreant.*

BB *Reliquus funiculus volans.*

CCC *Pars tecta Syringæ.*

DDD *Pars nuda Syringæ.*

E *Foramen inferius aliquantulum in alam protuberans, ut totalis introitus impediatur.*

FIG. II. Exhibet Syringam undique serico funiculo cerato obvolutam, jam-  
que



FIG. I




FIG. II



FIG. IV

a



FIG. V



FIG. III






FIG. I

FIG. II

FIG.

FIG. III



que mediis tabulis in orbem fricatam, dum adeò polita, & levigata exsurgit, ut ipsa futura oculorum aciem effugiat.

FIG. III. Nuda est Syringa à sola circumgyratione argentæ laminæ resultans, nullius tamen usus in Fistularum curatione, nisi cerato velo tegatur. Quandoquidem si exilis, dum extrahitur imminet fracturæ metus, si solida, aut angustus nimis Lotio datur exitus, aut propter tensionem, impossibilis est tolerantia, immò ab utraque per laterales striarum intercapedines Urina transfudat.

A *Exigua cannula argentea summmitati Syringæ Mediante igne agglutinata, supra quam triplicata circumvolutione fili serici Apex funiculi arctè satis cogitur, ne actu trusionis Syringa denudetur.*

B *Cannula inferior, supra quam pariratione funiculus deligatur. Vices cannularum gerit duorum, vel trium circulatorum laminæ ferruminatio.*

FIG.



## FIG. IV.

A *Cylindrus ex candela cerea fabricatus, ultra Syringam semper tenuiori apice protuberans, ut Carunculae Meatum obstruentes declinentur.*

B *Idem Cylindrus, qui in calce debet semper prominere, ut denuò possit retrahi, præcipuè cum Syringa, superatis obstaculis, ad suum penetrationis gradum per-  
tulerit.*

FIG. V. Exhibet Syringam, cujus cannula (C) in summo apice argenteæ laminæ agglutinata caput habet obtusum cum foraminibus ad latera, in illis casibus usurpandam, ubi Syringa in Vessicam usque debet pertingere.



## Explicatio Tabula II.

**I**Nstrumentum portatile est, quo mediante Urina à finibus fistulosis defluens recipitur, ubicumque contingant, hoc est per totam Urethram, Scrotum, & Perinæum in illis potissimum casibus usurpandum, ubi, vel Anni tempus, vel prævia alicujus morbi extirpatio Fistulæ curationem retardaverit, aut, ubi aliqua læsio ipsius Sphincteris Vessicæ contigerit, eò quia indefinens Urinæ fluxus, absque voluntatis arbitrio, à solo plumaceolorum usu non potest ita cohiberi, quin brevissimo temporis intervallo nova iterum fasciascione opus sit.

In Magnatibus argento, in reliquis orichalco, & liquato stamno perfuso poterit confici.

AAAA *Duo Ramiculi, qui perpendiculariter super Pubem excurrentes ad Umbilicum usque debent pertingere.*

B Conne-



B *Connexio ad conciliandam firmitudinem.*

CC *Situs ubi transit cingulum ad sustinendum pondus Instrumenti, quò ad partem anteriorem.*

DD *Cavitas ubi labens Membrum continuò residet.*

EEE *Alia profundior, & satis ampla cavitas ubi Scrotum decumbit.*

FF *Infundibulum tribus foraminibus pervium duobus scilicet in superiores cavitates hiantibus, & subitum Urinæ transitum concedentibus.*


G *Tertium foramen, per quod statuto tempore ad libitum Patientis effluit Urina, sublato exili obturaculo.*

H *Anulus, cui funiculus satis latus appenditur, qui ad Ani latera bifurcatus parte postica supra Renes cingulo firmiter adnectitur, ad sustinendum pondus instrumenti, quò ad partem posteriorem.*


I *Incisura Cavitates dividens.*

Notandum tamen, quòd si foramen  
fistu-











fistulosum in Perinæo deliteſcat, cavi-  
tas Scrotum detinens poterit affabrè in  
parte poſtica dilungari, ſed graciliori  
extenſione, ne motus occaſione, Inſtru-  
mentum cum dolore geſtetur.







# I N D E X

## R E R U M N O T A B I L I U M.

### A

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Æ</b> Gri à renovata Candelæ Trufione excande-<br>fcunt | pag. 96 |
| Aeris vis noxia                                            | 158     |
| Æftuarium humidum quomodò fiat                             | 62      |
| Arcanum Jo: Fortis in exedendis Carunculis                 | 77      |
| — Alexii Pedemontani                                       | 82      |
| — Amati Lufitani                                           | ibidem  |
| — Caroli Mufitani                                          | ibidem  |
| — Fabricii Aquapendentis                                   | ibidem  |
| — Francifci Peccetii                                       | ibidem  |
| — Lacunæ                                                   | 83      |
| — Lanfranci                                                | 82      |
| — Roderici à Fonfeca                                       | ibidem  |
| — Sculteti                                                 | ibidem  |
| Arthritis fuccedit Febri Quartanæ                          | 8       |
| Auctorum finis , ut Fiftulæ Urethræ curentur               | 115     |

### B

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Balneum ad emolliendas Carunculas          | 76  |
| Balneum Fibræ emollit                      | 18  |
| Balfamica , quando , & quæ in ufum ponenda | 157 |
| Balfamum Arfenici ad Urethræ Fiftulas      | 149 |

### C

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Caffè fudantibus convenit                                           | 67  |
| Calli occulti quomodò extirpandi                                    | 148 |
| Candela craffiuscula minori cum dolore gestatur,<br>& intromittitur | 93  |
| Candela extracta, Urina copiofa effluit , quare?                    | 93  |
| Candelæ quomodò instruendæ                                          | 89  |

### M

— Ut



|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| — Ut vim insitam habeant in domandis Carunculis                            | 97     |
| Cannula Aquapendentis ex linteo cerato ad curandas Carunculas nil prodest  | 80     |
| Cannula plumbea in Fistulis Urethræ                                        | 49     |
| Carunculæ, qua ratione in Glande Penis generentur                          | 3      |
| — Quibus signis cognoscantur                                               | ibidem |
| — Cereis candelis explorantur                                              | 23     |
| — Difficilis sunt extirpationis                                            | 70     |
| — Quomodo in Meatu Urinario generentur                                     | 72     |
| — Sunt extirpandæ ante consolidationem Fistularum Urethræ                  | 73     |
| — Non violenter irritandæ propter metum inflammationis                     | 75     |
| Carunculas exedens remedium                                                | 79     |
| — Aliud                                                                    | ibidem |
| Caruncula impenetrabilis curata                                            | 89     |
| Carunculæ ut curentur, semper Candela debet gestari                        | 96     |
| Carunculæ spatio viginti dierum curatæ                                     | 97     |
| Cataplasma dolores sedans                                                  | 151    |
| Catharsis an, dum Sudor agitur, instituenda                                | 65     |
| Cauticis, quando, & quomodo utendum                                        | 87     |
| Cautico actuali in Urethræ Fistula summa nisi cum circumspectione utendum  | 144    |
| Ceratum Auctoris ad exedendas Carunculas                                   | 91     |
| Chordæ nerveæ, quomodo præparentur, ad hoc ut, immixtis, Canalis ampliatur | 127    |
| Cibi saliti fermentationem in Sanguine inducunt                            | 14     |
| Cicatrix quomodo promovenda                                                | 99     |
| Coalitus labiorum Fistulæ ab Urina perturbatur                             | 115    |
| Consultatio Eruditissimi Lealis Leali                                      | 28     |
| Contusio Ossis Sacri                                                       | 15     |
| Corrosiva in Urethræ Fistula, quæ?                                         | 146    |
| Curaciones Morborum, quandoque in Hyeme sunt instituendæ                   | 30     |



## D

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Decoctum ad Luis Gallicæ extirpationem        | 33  |
| Decoctum sudoriferum tempore Febris non con-  |     |
| venit                                         | 45  |
| — Agit in Lympham                             | 62  |
| Digestiva ad Fistulas Urethræ                 | 156 |
| Disparitas inter Cannulas , & Syringas Vermi- |     |
| culares                                       | 135 |

## E

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Exedentia secundum Veteres       | 14  |
| — Secundum Recentiores           | 149 |
| Exesis Carunculis , quid agendum | 87  |

## F

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Fallopîi Methodus in exedendis Callis            | 147    |
| — In exedendis Carunculis                        | 84     |
| Famis Causa                                      | 65     |
| Fasciæ quomodo usurpandæ                         | 159    |
| Febris Gallicæ habitualis diagnosi               | 21     |
| — Lenta eò major , quò minus cognoscitur         | 29     |
| — Depuratoria                                    | 44     |
| — Quomodo Maciem inducat                         | 47     |
| — Erratica                                       | 51     |
| — Cum Fistula quid portendat                     | 108    |
| Fermentatio suppuratoria                         | 41     |
| Fistula quid                                     | 105    |
| Fistularum Urethræ origo                         | 106    |
| Fistula Urethræ , si tortuosa , frequentibus in- |        |
| flammationibus stipatur                          | 25     |
| Fistula Urethræ , ubi exitum sibi aperiat        | 106    |
| — Citò fit callosa                               | ibidem |
| — Si vigeat Gonorrhœa , aut Gallica Lues         |        |
| non fuerit extirpata , difficilis est curationis | 110    |
| — Fit ab Urina                                   | 114    |
| — Usque in præsens difficilis fuerunt cura-      |        |
| tionis                                           | 113    |



|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Fistula aurea , per quam Urina exit            | 116 |
| Fistulo sæpissimè mingunt                      | 135 |
| Francisci Peccetii modus in præparandis Can-   |     |
| delis                                          | 95  |
| Frigus in principio Paroxyfmi fodinam febrilem |     |
| in Glandulis meseraicis portendit              | 52  |
| Fulvius Gherli Fistulas Urethræ curat cannula  |     |
| plumbea                                        | 181 |
| Fundum Fistulæ explorandi modus                | 130 |

## G

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Gonorrhæa Ulcera in Urethra producit           | 4  |
| Gonorrhæa pendet ab alterato partis nutrimento | 48 |

## H

|                      |    |
|----------------------|----|
| Hyperfarcosis , quæ? | 72 |
|----------------------|----|

## I

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Inflammatiō partis venæ sectione mitescit       | 57  |
| In Hypocausto quibus cibus utendum              | 36  |
| Introitus Syringæ quibus mediis paulatim promo- |     |
| vendus                                          | 127 |

## L

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Labia Fistulæ , quò duriora , eò difficilioris cu- |     |
| rationis                                           | 111 |
| Ligatura non debet esse nimis arcta                | 159 |
| Linimentum ad Pubis inflammationem                 | 38  |
| Linimentum Herculi Saxoniz pro consumendis         |     |
| Carunculis                                         | 78  |
| Linimentum ad Scroti exulcerationem                | 152 |
| Liquor abstersivus in Urethram immittendus         | 98  |

## M

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Macies totius quomodo contingat | 47 |
| Me-                             |    |



|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Methodus Dolæi in curandis Carunculis                             | 78 |
| Mercurialia in curatione Luis non semper profunt                  | 6  |
| Mixtura ex pulveribus lapideis nunquam in Vescicam est immittenda | 84 |
| Morbus, si negligitur, ingravescit                                | 1  |

## N

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Nursini incausum curationem tentant Caruncularum | 70 |
|--------------------------------------------------|----|

## O

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Obstructiones viscerum Naturalium sunt effectus Februm. | 58  |
| Orgasmus Partis imminente Suppuratione                  | 107 |

## P

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Paroxysmus febrilis quomodo solvatur                            | 22  |
| Petri Galli Arcanum in exedendis Carunculis                     | 85  |
| Petrus de Marchettis Fistulas Urethræ secatur                   | 144 |
| Plumaceoli quomodo disponendi, ut Fistulæ curatione absolvatur. | 155 |
| Pondus Syringæ Vermicularis                                     | 126 |
| Præcipitato nil præstantius in exedendis Carunculis             | 85  |
| Præcipitatum agit sine dolore                                   | 92  |
| Præcipitatum Corrodit, & Cicatricem inducit                     | 86  |
| Puris generatio                                                 | 42  |
| Pus in cæca cavitate coercitum Febres inducit                   | 52  |
| Pus non à Sanguine, sed à Chylo                                 | 43  |

## Q

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Qualis Urinæ exitus latitantem Carunculam portendat | 24 |
| Quartanæ Febris Circuitus                           | 7  |

Ratio,



# R

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Ratio, cur in Gonorrhæa dolor ad radicem Penis vigeat | 4  |
| Requisita ad perfectum Sudorem                        | 64 |
| Riverii linimentum in curandis Carunculis             | 79 |

# S

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Sala Petrus laudatur                                          | 21  |
| Sanguinis Missio motum intestinum compescit                   | 57  |
| Sarcotica                                                     | 160 |
| Scrotum multis foraminibus pervium                            | 110 |
| Sectio Tumoris Suppuratorii instituitur, ne cavitas ampliatur | 43  |
| Sectio in Urethræ Fistula raro instituenda                    | 144 |
| Signa exesi Calli                                             | 150 |
| Signa Temperamenti Calidi, & Sicci                            | 60  |
| Signa exesæ Carunculæ                                         | 94  |
| Signa Futuri Paroxysmi                                        | 21  |
| Sinus Fistulosus, quomodo ampliandus                          | 145 |
| Sudor in Hyeme non promovendus                                | 46  |
| Sudor in lecto Doliolis melius quam æstuariocietur            | 63  |
| Sudor quomodo promovendus                                     | 61  |
| —— Quomodo fecernatur                                         | 66  |
| Suppuratio imminens supra Testiculum                          | 56  |
| Syringa Vermicularis quomodo fiat                             | 118 |
| —— Cur Argentea                                               | 120 |
| —— Cujus debeat esse magnitudinis                             | 120 |
| —— Quò debet pervenire actu Trusionis                         | 120 |
| —— Ejus usus in Urinæ suppressionibus                         | 123 |
| —— Est innovanda in Meatu                                     | 154 |
| —— Cur facilè toleretur                                       | 135 |
| —— Debet esse æqualis per totam longitudinem                  | 136 |
| Syringæ Vermicularis experimentum inixedendis Carunculis      | 125 |
| Syringa Spiralis non prodest in curatione Fistularum Urethræ  | 122 |



# T

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Thee Sudantibus convenit                                             | 67  |
| Tubus aureus in Urethram immissus ardorem tollit                     | 67  |
| Tumoris in Perinæo origo                                             | 17  |
| Tumor in Perinæo suppuratus                                          | 18  |
| Tumor inflammatorius ad suppurationem pronus                         | 28  |
| Tumor cæcus nullam cum Fistula habens communicationem Febres molitur | 108 |
| Tumoris Ædematosi Origo                                              | 111 |

# V

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verdura Bartholomæus laudatur                                              | 56  |
| Vinum Podagram ciet                                                        | 9   |
| Vinum Stypticum                                                            | 151 |
| Vis aeris in promovendis inflammationibus                                  | 27  |
| Urethra non patitur corrosiva nimis violenta                               | 153 |
| Urethræ longitudo                                                          | 89  |
| Urina, si ad libitum Patientis exit, signum nullius læsionis in Sphinctere | 55  |
| Urina quomodo in interstitia Carnea sibi viam aperiat                      | 41  |
| Urinæ lacteæ examen                                                        | 25  |
| Urina per Fistulam effluens curationem impedit                             | 132 |
| Urina celerius fluit per cannulam, quàm per Urethram                       | 134 |
| Urina per Syringam perfluente, omnes calli ex se evanescunt                | 143 |
| Vulnus Sclopeti, à quo Penis traicitur                                     | 132 |
| Vulneraria, quæ?                                                           | 135 |
| Vulnerariorum vis refellitur                                               | 138 |







LIBRERIA  
SCRITTA ALL'INCHIESTA  
DALLA BIBLIOTECA  
AN 1921  
VALLISPERI  
PUBBLICAZIONE  
del Tribunale di  
Lombardia di Milano

COMMERCIUM LITERARIUM  
NOVAM METHODUM  
COMPROBANS



120

J. E. T. E. R. A.  
SECRETARY

OF THE  
AMERICAN

YOUTH  
THE  
OF THE  
OF THE

COMMISSIONER

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE



# L E T T E R <sup>171</sup> A

SCRITTA ALL' AUTORE

*DALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR*  
**A N T O N I O**  
**V A L L I S N I E R I**

Pubblico Primario Professore di Medi-  
cina Teorica , e Presidente nell'  
Università di Padova.

**C**On incredibile mio contento ho ricevuto il dot-  
tissimo libro , e l'ingegnossimo ordigno da V.  
S. Illustriss. inviatomi , parto l' uno , e l' altro del  
suo felicissimo ingegno , del che glene rendo vivissi-  
me grazie , ed immortali , rallegrandomi seco ites-  
sa , con la Patria , e con l'Arte Chirurgica , per un  
invenzione sì nobile , sì utile , sì awantaggiosa . Lo-  
do in oltre la sua ingenuità in manifestare subito al  
pubblico il suo ritrovato , lodo la cura con tanta  
prudenza fatta , le Dottrine nel buon gusto del se-  
colo à suo luogo esposte , l' erudizione di tanti au-  
tori apportata , la latinità propria , ed espressiva , l' or-  
dine , e in somma tutto ciò , ch'è necessario per una  
cura cotanto difficile , ed azzardosa , per erudire i  
meno cauti , e per insegnare agl' indotti un modo  
sicuro per ben ridurre al suo fine la guarigione di  
mali , che fino ad ora sono stati lo scandalo dell'  
Arte , per non dire l' obbrobrio , per riuscire per lo  
più , o incurabili , o pericolosi . Segua intanto , o  
Illustrissimo Signore , l' incominciata via , attenda a  
illustrare sempre più un Arte non solo utile , ma  
necessaria , e dirò quasi più necessaria della Medici-  
na , essendo per lo più la Natura la vera Medica-  
trice del male de fluidi , come febbri , e simili , re-



golata sovente solo da un ottima dieta , e vivendo molti popoli , e molti anche senza la medesima , ma senza Chirurgia non può farsi , mentre la Natura ne da se sola tornerà un osso al suo luogo , ne curerà piaghe di molte forti , ne fistole , ne carnumi eccedentemente cresciuti , o caruncule , o simili , che ricercano l' ajuto de rimedj , e della mano operatrice dell' uomo . Mi dichiaro pure infinitamente obbligato al mio stimatissimo Signor Mazini , che mi hà dato così bella occasione di conoscerla , e di seco contraere un' amicizia sincera , e letteraria , che abbraccio con tutto l' amore , e tutto lo spirito , offerendomi pronto a servirla in ogni , e qualunque cosa si degnerà comandarmi . Mi conservi in tanto la sua stimatissima grazia , e mi creda sempre con tutta la stima , e tutto l' amore

Di V. S. Illustriss.

Padova? 21. Marzo. 1720.

ILLU.



ILLUSTRI, ET EXCELLENTISSIMO DOMINO  
FRANCISCO RONCALLI

Medico-Chirurgo Brixienfi  
Celeberrimo

S. P. P.

ROSINUS LENTILIUS

Consiliarius, & Archiater Ducalis  
VVirtembergicus.

**Q**Uas mihi, scriptas die 18. Jan. ac ad me perlatas die 25. Februarii destinare dignatus es literas eruditissimas, summa aviditate legi, iterumque relegi. Gratulor Venerando Seni, Domino Parenti Patrono meo, [quem Deus adhuc diu superstitem esse velit] de tanto Filio, cujus in rem Medico-Chirurgicam meritis, illustre nomen ejus, & gloria crescit, & in seros Nepotes feliciter perpetuatur: Gratulor & tibi, cui Deus ingenium ad rei Medico-Chirurgicæ augmentum, & ornamentum clementer largitus est vastum, atque ad penitiùs inspicenda naturæ mysteria acomodatum, a quo nos multa adhuc egregia sperare jubet, vigor ipsius, atque vivacitas, quam diuturnam, omnes, quibus res medica curæ est, atque cordi, mecum precantur. Ad rem verò ipsam quod attinet, à tua sedulitate recens inventum Syringam flexilem, quam tibi vermicularem vocare placuit, attentissima mente consideravi, imò & aliis meis Dominis Collegis (quorum unus Dominus D. Moeglingius venerando tuo Domino Parenti forsan adhuc est cognitus) considerandam præbui. Pensitatis ritè circumstantiis omnibus, non possumus non, quin calculum album adiiciamus, & libelli sub prælo sudantis conspectum desideremus. Evolvi libros meos Chirurgicos, veteres juxtim, atque recentiores, quos numero non exiguo possideo,



sed nihil horum inveni, imo ne ullius talis instrumenti volam, aut vestigium. Ideo te meritò laus manet inventionis primæ. Verum omnino est, quod scribis. Consolidationem Ulcerum, ac abscessuum Urethræ, tum, & exesionem ejus caruncularum (sive oriantur ab ulcerum callis, vel cicatricibus, uti Brunnero, Dioni, Heistero, Sajardo, & aliis placet, sive aliunde originem suam trahant) eò magis impedit, ac moratur affluxus urinæ per se acris, & salinæ, quò magis experientia nos docet, in ejusmodi malis plerumque & ipsam urinam esse solito acriorem. Particulæ enim medicamentorum balsamicæ ab affluxu urinæ acris proluuntur, & quasi abraduntur, antequàm coalitum præstare valeant, vel, si catheticis res peragenda, quorum virtus præcipua in particularum aciditate consistit, cuivis patet, ab urinæ portionum alchalicarum admixtione earum naturam inverti, atque in sal neutrum mitius, absorptioni caruncularum minus aptum, permutari. Necessarium igitur erat, excogitare medium, unde a contactu talis urinæ partes Urethræ læsæ immunes, atque salvæ prostari possent. Accedit & hoc, quod non rarò in praxi plus quàm annorum quadraginta, observavi, nempe in ejusmodi morbis patientes ad sæpius, quam par est, reddendam urinam incitari. Non equidem defunt exempla curatarum, & absumptarum ejusmodi caruncularum Methodo recentiori Candelæ cereæ; sed, quis non videt, quanto temporis impendio! Mensibus enim hîc opus est, ubi per dies hæud admodum multos ipsa tua Methodo res feliciter perfici potest; Ne dicam, de summa molestia, membri ferè semper in rigiditate, ac tentione sua manere coacti, si vulgari curationis tramite incedamus. Unum est, quod me adhuc suspensum tenet; an nempe sexui fœminino eodem, an alio ipsius genitalibus magis accommodato instrumento, quod tibi excogitare facile erit, apud has opus sit! quamvis, ut verum fatear, in hoc sexu rariores existant ejusmodi morbi, quam in masculino. Age igitur, vir Nobilissime, & in publicum mox procede cum isto tuo tam utili libello: Non dubito, quin universi, quos invidiæ pestis non vexat,



vexat, conatus tuos tam egregios, quos jam jam,  
uti scribis, experientia tua in diversis subjectis con-  
firmavit, sint approbaturi, tibi que, & animi, & cor-  
poris perennem incolumitatem apprecaturi, quod ipse  
ego, pro tanta tua in me, & ignotum, & immeren-  
tem benevolentia tibi obstrictissimum, cordicitus fa-  
cio, meque ulteriori tuo favori commendo. Ita vale  
Virorum optimè, remque tuam ex tota animi tui sen-  
tentia gere.

Scribo Stuttgartiæ d. 7. Martii A. S. R. MDCCXX.



FRANCISCO RONCALLI

ALTISSIMÆ SPEI JUVENI

Celeberrimo inter Brixienfes

Jatro - Chirurgo.

JOSEPH GRANDI

ΕΥΠΡΑΓΜΕΝ

**G**Ratissimæ mihi fuere literæ tuæ non tam Scriptoris novitate , quàm utilitate argumenti , & equidem chariores , quia una simul epistolam accipi ab utriusque nostrum conjunctissimo Domino Benedicto Martiale Carthusiano Priore , qui à Samuele (1) Libri primi Regum Scriptore vocaretur (2) *Anima custodita in fasciculo viventium* , propterea in solitudinem ducta ad fluxilem , & contradictorium fortunæ vultum deridendum , & præsentis sui conscia ponderis , & dignitatis ascetici cum Ecclesiastico [3] *loramentum Aedificii* nervosius confirmandum.

Gaudeo summopere , mi Francisce , quod viridi hac tua ætate Hippocraticam laudem sine assentatione , forsitan non sine invidia , quæ juxta Silium (4) o ! nihil unquam

Crescere , nec magnas patiens exurgere laudes fueris consecutus , quam Libro de Arte , Medicorum Vir ille summus exposuit (5) *Mibi verò invenire aliquid eorum , quæ nondum inventa sunt , quod ipsum notum , quàm occultum esse præstet , scientiæ votum , ac opus esse videtur , similiterque semimperfecta ad finem perducere , & absolvere.*

Provinciam sanè difficilem , & oppidò necessariam suscepisti , nam in practica Chirurgia multa omittenda forent , ac innovanda non pauca , multique profectò laudandi Chirurgi , & attentius introspectiendi non pauci . Digladiantur quippe inter se , ut elapso , ita , & crescente hoc sæculo , turbasque movent cum Magato , [6] cum Septalio , (7) cum Sennerto , (8) cum



eum Veslingio, [9] cum Bellotto, [10] cum Saccassano, (11) aliisque quam plurimis utrum in Vulnerum curatione, rariùs quàm ut soleat, illa debeant importuna Medicatione aeri inobservantiùs exponi, an mollioribus turundis illorum ora obduci, an durioribus, & refractariis intimos recessus pulsare, an finire diductos parietes obice nullo interposito clementiùs connivere, re adhuc infectâ ex disceptantium discordia. *Nam si quis rationes sequi velit, appositè scriberet Celsus religiosissimus linguæ latinæ custos, ut Terentius, & Cicero ab Henrico Petri vocabantur, (12) omnium posse videri non improbabiles, si curationes ab omnibus his egros perductos esse ad sanitatem. Itaque neque disputationi, neque authoritati cujusquam fidem derogari oportuisse, nam æqualibus*

Obvia signis

Signa, pares Aquilas, & pila minantia pilis e Pharsalicis in Chirurgica Castra Lucanum (13) traducerem. Sed fides non est Naturæ deroganda, dummodò cautiùs tractetur, & observetur diligentius, eadem semper manente Naturæ regula, subjectâ Mercuriè materiâ non semper eadem.

Verùm, mi Francisce, in rebus Chirurgicis illud plerumque accidit, quod non rarò occurrit in physicis; dum Pleuritis infestat unâ in regione accitâ, ac pluries repetitâ, in altera sepositâ funditus, atque damnata Phlebotomia, imò sub eodem cœlo opposita gliscit aliquando, ac tumet hæc Methodus Professorum ingenio pugnante, qui practicas flocci-pendunt, ut Lancisii (14) nuper erepti, & Baglivi [15] pro educto non mucoso, & palutri, & in posterum non educendo cruore necessarias animadversiones, & salubria Divini Senis (16) impedimenta in libro de humoribus oraculi ad instar paucis exposita, ni MAVIS, aureis involuta characteribus. Impedimentum, inquit, *in cruenta spuentibus tempus anni, Pleuritis Bilis* ab oculatissimo Prospero Martiano, [17] tamen Saxolensi, (18) non Romano, viriliter, & nitidissimè evoluta, additis doctissimi Dureti (19) Phlebotomiæ cautionibus in Corollario. Sed hæc hæcenus; redeamus illuc undè divertimus.

Argum en-



Argumentum arduum sanè præ manibus habes pro-  
perè quidem ad umbilicum perductum, quod mul-  
torum inflammavit ingenia, & exercuit Machinamen-  
ta. Fistulam auream, aut argenteam construit Scul-  
tetus (20) ad gallicum dolorem in urinæ transitu  
demulcendum, ne Tubam urinariam nimis insolenti-  
ter mordeat, cujus duplici in Tabula, videlicet XVII.  
& XL. meminit. *Cannulam* ex linteo albâ cera obli-  
nito Hieronymus Fabricius (21) ad delendas in Mea-  
tu urinario carunculas excogitavit, ut in illa, quam  
volumus canalis prædicti parte, Medicamentum *Can-  
nulae* superimpositum, duobus saltem diebus, felicis-  
simè adhæreat, ac lotii præterlabentis impetum, &  
asperfionem eludat; Ubi obiter vide, sit vel Typo-  
graphi Mendum, quod vix crediderim, vel Auctoris  
lapsus, non ob incitiam, sed ob expressionis incu-  
riam, dummodò hujus sensum Instrumentum suum  
describentis illis præsertim in verbis, *ita ut Cannula  
stylum intret*, perperam non fuerim affecutus. *Fit can-  
nula* [22], ait, *ex linteo cerâ alba oblinito longitudinis,  
quantum est digitus transversus; latitudinis, ut aequet  
argenteam Fistulam usurpandam, quæ filum longum ha-  
beat appensum, hæc in extremitate styli argentei, qui in-  
grediatur Fistulam argenteam, aptatur, ita ut Cannula  
Stylum intret &c.* Ut possibile est stylum cannulam  
ingredi, ita cannulâ stylum corporari, sive cannulam  
impervium styli corpus subire est impossibile, figuris  
munus proprium, & oppositum abundè monstranti-  
bus, ni styli corpus apertum foret, & patens, quod  
ab Auctore nequaquam exprimitur.

Septem circiter mentes sunt, cum quidam Joannes  
Brun Gallus *in aere nostro est*, ut inquit Cicero, dum  
hæc scribo, aliò migrasse mihi nunciatum est, qui in-  
strumenta quædam ad emendandas urinarii itineris  
labes cum Ruffo Ephesio (23) secum attulit, & præ-  
cipuè Catheterem, sive Fistulam quamdam à tua *Ver-  
miculari* Syringa non longè distantem. Argentea la-  
mina, sive bractea spiritaliter ducta conspicitur singu-  
lis in dimensionibus suis ad vulgarem Catheterem  
accedens, quæ tam concinnâ, & exquisitâ revolutio-  
ne conjungitur, ut nihil elegantius, vel elaborari  
queat,



queat, vel intueri. Concinnitas autem jucunda aspectu est teste nostro Præceptore. [24] Annulus annulum, an satius dixeris, quod osculetur, quam subeat ignoro, adhærere potius putes, quàm recipi, tam mirâ lævitate, dulcique marginis ascensione inter se imbricantur, ut mendosam futuram imitentur, ac totum Syringæ corpus incisam entomatum cutim spirantissimè repræsentet. Machina tota ductilis, & seguax est, corripitur, torquetur, producit, levis, æqualis, fibrosa. Hæc in lotii canalem sedula manus dexteritate paulatim admittitur, donec absconditam in Carunculam offendat, illic brevem, & paratam fistulam suscipit longitudine semidigitum, crassitie specillum, vel lyræ nervum non excedentem, cujus ab ora breve pendet filum, cujus ab ore antea leniter intrusum urbanâ quasi proboscide, & discreta petulantia, vel ut de Chamæleonte Tertullianus (25) *capitulum statim e dorso* profilit medicamentum, deindè vacuum per Syringæ corpus illam tam altè urget, donec destruendam carunculam attingat, tum demum remotâ pedetentim Syringa Fistula in apice medicata remanet, quam cum retrahere Chirurgus aut cupiat, aut velit filum e Glandis foramine deciduum arripit, ac illam educit.

Eodem prorsus ordine, & Collyria, & liquores in Vesicæ injicit cavitatem, nam altius inducta plicatili Syringa, donec urinilegæ Lacunæ fores aperiat, tunc per Siphunculum illam pervadentem in Vesicæ recessus medicamentum impellit. Isidem & lotionalis tubuli minutos abscessus, quos *φύματα* Græci appellant, ut Celsus (26) est auctor, & reliqua hujus urinæ ductus infortunia hoc venusto, & mechanico auxilio debellat.

Nihilominus, ut dicam quod super hac re sentiam candidè *sine ira, & studio, quorum causas procul habeo* cum Tacito (27) Methodus Fabriciana, si non officit, saltem non proficit, quia præterfluente à liquore, quicumque sit ille, *Cannula* mollescit, & officio suo crispando non fungitur, & cum columella [28] *laborem frustratur*. Scultetina Fistula si canalem non diutrahit, profectò illi non blanditur, neque salinos



linos urinæ dentes funditus evertit, Brunina castigatior est, & formosior cæteris, præter tuam, quæ in hunc usque diem in emporio chirurgico principem locum tenuere; Veruntamen urina non integrè per manufactum canalem effluit, ac inter hunc, & Urethræ parietes serpendo subtermeat, ut de occulto Syderum cursu, & nobis inviso naturæ Interpres (29) est falsus. Prima non juvat, altera claudicat, postrema non marginat.

Elegantissimum instrumentum tuum hoc singularis habet commodi, quod & medicamina nullo fœdamento e foraminibus, vel Cowperianis, (30) vel Ferraneis, (31) vel Morgagninis [32] expresso, aut cum extraneo corpore in itinere fœderata, sed pura, & illimia, morbidæque parti affixa, nec à lotii præterlabentis sedulitate, nec à musculosis circumstantibus columnis, pro diversa motuum tendentia, & impetu valeant dimoveri.

Insuper Canalis metallicus in membranaceum urinæ Canalem immissus velut solidum dulcissimè pugnat in solidum, absque eo quod vel irritet, vel lædat, vel urinæ descensus inflectat, aut supprimat declinato illustri illo, & obvio remedii vel adhibendi, vel adhibiti metu Ægrotantium sæpè pedissequo, & Ægri tudinibus sæpè majore.

Ad hæc profectò, & innumera alia beneficia singularis, & novus accedit modus, quo Vermicularis Syringa à Te reperta inter unum, & alterum, sive Annulum, sive incisuram ob involucrum cera oblitum, & dulci veluti crustâ personatum illam circumquaque apprimè contegens non oscitat, ut in cæteris evenit, à morbosæ, ac inæqualis Urethræ carunculis, quæ viam asperant, & salebrosam efficiunt. Qua de re compressa diversimodè à ductus rusticitate Syringa aperitur, & hiat, ac criniosa urinæ stillicidia confirmat. In tua etiam si impari pede ob canalem non levem, & æqualem à lotio descendente comprimatur, etiam si invita dehiscat, frustra dehiscet, quia vagina Syringam obducens lateralem egressum urinæ prorsus adimit, & quamcumque dolentem, & dolosam lacrymationem coercet.

Quid



Quid multis ; opusculum tuum quod nuperrimè legi , & mox avidiùs relegi , & non semel , atque iterum sum admiratus , quàm chirurgicâ eruditione amictum , quàm philosophico nervo vallatum , tum practicis ditatum luminibus , tum prudentissimis , quod in Medico caput est , observationibus , Scholiis , & præceptis aspersum ultra ætatem loquitur , non ultra mentem , & oppositionum tela basilicè infrangit , tensoque oppositorum arcus urbanè relaxat , nam , dum facta , & experientia de turba , & præjudiciis vocem extollunt , argumenta rigidiora mollescunt , & metaphysica lenitur asperitas . Habet enim liber tuus *aliquid quod doceat , quod placeat , quod juvet , quodve de multis admoneat* , ut in Epistola sua dedicatoria Theognidis Poetæ sententiis præfixa Plinii textum commentabatur , vel tuam exercitationem Medico - Chirurgicam CLX. ab hinc annis commendabat Michael Neander (33) Soraviensis .

Sicuti Chirurgos inter , ac Medicos , inter Anatomicos , & Botánicos multi emicuere , qui remedii , & operationibus , organis , & simplicibus ab ipsis inventis patronymica indidere nomina , ut cuilibet obvium est , ita & tu , mi Francisce , tuum eriges Instrumentum in æternam Auctoris , & operis commendationem imò , ut in gnomis Elegiacis Megarensis Poeta Theognides (34) de Cyrno amico suo cecinit

ἔδ' ἐ ποτ' ἔδ' ἐ θανάτῳ ἀπλείς κλέϑ , ἔδ' ἐ γε λήσεις

ἀφθιτῇ ἀνθρώποις αἰὼν ἔχων ὄνομα

Kύρνε            idest

Non inquam neque mortuus perdis gloriam , neque etiam latebis , Immarcescibile semper hominibus habens nomen Cyrne .

Maçte animo majora , & palladi tuæ paria meditare , atque , ut hæc , utilia . Clarissimum Parentem tuum Virum in Jatro - Chirurgia ultra Cenomanos etiam nomine pariter , atque Doctrina notissimum meo nomine salvere jube , & Cœlum Te ad maxima natum diu sospitet . Mihi quæso , ignosce in respondendo heu ! quàm tardigrado (135) Pacuvianæ Testudini non dissimili ; Non otia , sed Medica negotia , & inconstans valetudo culpanda sunt . Vale nec  
cœpti



cœpti Te pigeat, ac scias, quod Historiæ Romanæ (36) Princeps docuit: *non enim satis feliciter solent procedere, quæ oculis agas alienis*, quoniam in Chirurgia præsertim *oculis autem magis credere oportet, quam opinionibus*, admonitione tam nobili hanc jejunam Epistolam claudit Hippocrates (37) & Θεός σε ζῆται σε idest Deus te servet

Dabam Venetiis XXII. Maii MDCCXX.



[1] P. Cornel. à Lapid. in argument. lib. 1. Reg. lit. A. pag. 161. [2] in eod. lib. Cap. 25. vers. 29. lit. D cum Cornel. ut sup. pag. 266. (3) Ecclesiastic. Cap. 22. vers. 19. lit. D pag. 369. cum Cornel. (4) Silius lib. 17. de Bello Punic. (5) Hippocrat. num. 1. pag. 1. (6) Cœsar Magatus de rar. Vuln. curat. (7) Lodovicus Septal. lib. 8. animadversion. Medicar. (8) Daniel Sennertus Pract. lib. 5. Part. 4. Cap. 9. Tom. 9. pag. 509. (9) Veslingius in Epist. ad Sennert. vid. Giornal. de letterat. D' Ital. Tom. 5. Artic. 7. pag. 135. (10) Bellot. ut supra. (11) Sancaffan. ut supra pag. 131. & sequent. & Tom. 15. ejusdem Diarii art. 14. pag. 336. [12] Henric. Petr. in dictionar ling. lat. ad verb. fr. (13) Lucanus libr. 1. pag. 1. (14) (15) Lancif. cum Bagliv. Prax. med. 1. 1. fs. de Pleurit. pag. 56. [16] Hipp. n. 9. pag. 56. (17) Martian. vers. 198. Marinel. num. 9. pag. 123. (18) idem pag. 1. (19) Duret. in libr. 2. Coac. Hipp. pag. 387. 20. & 30. [20] Scultet. in Armament. Chirurg. fig. 8. pag. 26. & fig. 5. pag. 93. (21) (22) Fabric. ab Aqu. pendent. Part. 1. operat. Chirurg. cap. 67. pag. 241. (23) Ruff. Ephes. de corpor. human. part. appellat. lib. 1. cap. 12. litt. D pag. 8. (24) Hipp. Chir. Officin. num. 3. pag. 185. (25) Tertul. de Pall. pag. 4. cap. 3. (26) Cels. lib. 2. Cap. 8. vers. 10. pag. 75 (27) Cornel. Tacit. Annal. lib. 1. pag. 6. cum not. Pich. (28) Columel. in Præfat. lib. 1. [29] Plin. Nat. Histor. lib. 2. Cap. 97. pag. 37. a (30) Cowper. in Philosoph. Transact. anno 1699. Act. Erud. Lips. ann. 1700 (31) Laurentius Ferr. de Glandul. univers. & speciat. ad Urethr. Viril. novis cap. 3. pag. 90. (32) Morgagn. in advers. Anatom. primis pag. 4. & 5. (33) Neand. pag. 9. (34) pag. 63. cum Neand. [35] Verticulus Pacuvii de i. et iud. cujusmodi tres à Ciceron. referuntur cum Rhe. in Tertull. lib. de fal. in not. pag. 3. (36) T. Livius ex Neandr. in Annot. in Phosylid. Carm. pag. 94. (37) Hipp. lib. 1. de Diæta num. 5. pag. 42.











