De sectione symphyseos ossium pubis admittenda. Quaestio medica chirurgica ... / [Augustin Roussel de Vauzesme].

#### Contributors

Roussel de Vauzesme, Augustin, 1754-

#### **Publication/Creation**

Lutetiae-Parisiorum : The author, 1778.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/kt6du8s5

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



Pieces Contenues dans le volume.

quastice de Sectione Symph. ossimme pubis recherches Sur le Sect. Dela Simph. p. Le Bray reflexions in la Sect. par daniergat.

Malitel



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Wellcome Library

13

https://archive.org/details/b30514794

562791

# DE SECTIONE SYMPHYSEOS OSSIUM PUBIS ADMITTENDA,

QUÆSTIO Medico-Chirurgica, Parifis discussa in Scholis Medicorum, die Jovis septimâ mensis Maii 1778.

Nova Editio, aucta & emendata.


AUTORE AUGUST. ROUSSEL DE VAUZESME, Salub. Facult. Parif. Medico.


Id semper verum esse reperies, novitatem etiam expertis, maximètamen imperitis molestam esse. CAMPER, Epist. ad van Gesscher. Groning. p. 173.

Marteau Med.

LUTETIÆ-PARISIORUM, IN MEDICORUM SCHOLIS APUD AUTOREM.

M. DCC. LXXVIII.





ILLUSTRISSIMO ET NOBILI VIRO

DOMINO DOMINO JOANNI-CAROLO-PETRO

# LENOIR,

IN facro Confiftorio Regis Confiliario, urbis prætori vigilantisfimo, &c. &c.

VIR ILLUSTRISSIME,

Etsi rerum civilium in re moles immensa conquiescat, A ijj

non impar tamen humeris onus est. Dum ex munere, civium omnium fortunis & Saluti continuo & acriter invigilas; artibus etiam nova extruere monumenta, prisca tutari vel instaurare non definis. Novisti & ingenua litterarum studia excolere, & quidquid humano generi conferat, humanissime amplecteris. Cui ego potiori jure hunc libellum offeram &

consecrem ? Cujus quidem argumentum in eo versatur, ut verendam matrum sortem regat & sustineat; te veró nullus est qui civium salutis sit amantior. Illum igitur tibi dicatum, & tuis gloriantem auspiciis volo, eòque lubentiùs, quod tuam erga me benevolentiam perspexerim, indèque habeam quod mihi gratuler, hoc saltem quale-Aiv

cumque mei in te obsequii & reverentiæ specimen fore. Id felicitatis exoptat,

## VIR ILLUSTRISSIME;

Devotissimus & obsequentissimus tuns ROUSSELDE VAUZESME, Medicus Parisiensis,

Parifis die quinta Augufti 17784

# PRÆFATIO.

E x naturæ voto, quod utero gestat onus mulier, faustè subsidere semper debere, ideòque Symphyseôs pubis sectionem minin è necessariam nonnulli absurde vociferantur ; quasi sui semper ordinis conftans hæc eadem natura foret. Nec potiori jure, vir severioris not & CATO CENSORIUS, cùm ipfi semper sano & plusquàm octogenario nullius unquam emolumenti extitiffe Medicos videret, ut omnes

#### \* PRÆFATIO.

extra urbem ejicerentur, autor fuit. Permulti etiamnum de Philosophorum grege, optimèque valentes, vanam effe atque conjecturalem nostram prædicant doctrinam ; vix autem levi corripiuntur morbo, cum protinus timiduli, infulsis prorsus quæstionibus & lamentis medentem fatigant. Artem obstetriciam futilem, inanem, imòque ut exitiosam habent viri cætera eruditiffimi, qui ea omnia sceptice negant quorum commoda ipfissimis oculis non perspexerunt, quo-

## PRÆFATIO.

rumve in proprio corpore non fecerunt experimentum. Hos. facilius in veritatis tramitem, mox dicendis, adducemus. Hos edoceant & ipfæ mulieres. Unaquæque etenim de partubus operofis quos ipfa, aut proximæ perpessæ sunt, miserabiles narrat historias, quibus fæpe-numero anfam præbet prava pelvis conformatio. A conjugio igitur deterreantur puellæ omnes quæ primo afpectanti naturam nimiùm novercam expertæ videntur. Non - nullæ sunt attamen flo-

## xij PRÆFATIO.

ridulo nitentes ore, & sat procerâ concinnâque specie corporis eminentes, quæ inceffu composito, & palla artificiose indutà, offei pelvis ædificii vitia sedulo obvelant. Anne salubri parentum confilio, genialis thalami adhuc expertes chariffimæ natæ, blanda peritisfimi obstetricatoris manu solerter pertractandæ, ne in semetipsas suaque pignora fortaffe crudeles evadant, neve monftrofa hominum feries orbem infestet ? En salutiferæ artis ope futura præcaventur mala

PRÆFATIO. xijj quæ sæpiùs, heu! innocuos infantes & miserandas trucidant matres; aut si culpandà parentum incuriâ, viro nupferit deformis puella, jam in propatulo est recens operatio, quâ natus materque fimul incolumes servantur. Cum expertus effet CLAR. M. SI-GAULT, D. M. P. naturali in partu, pubis offium cartilagines ità nonnunquam intumescere, ut major inde nafceretur pelvi capacitas; primus his in rerum angustiis ubi via exituro fetui insupe-

#### xiv PRÆFATIO.

rabilis obstat, Symphysim pubis ferro dividendam pronuntiavit, primusque divisit feliciter. Hæc fimpliffima inventio omnium mentes subito percuffit. Sic inconspicuarum plantarum relliquias per mare, incognitorum odorum effluvia per ventos advehi cum multotiès observasset CHRIS-TOPHORUS COLUMBUS, novas regiones, novosque incolas adesse conclusit.Extemplo navi vectus novum fibi per æquora strenue patefacit iter, alterum terrarum orbem investigatu-

#### PRÆFATIO. XT

rus. Quænam tantorum laborum, periculorumque merces? Sui eum omnimodis appetunt infidiis adverfarii, & (dicere abhorreat) in carcerem & vincula conjicitur.

Erras graviter, fi fectionis Symphyfeôs actorem, gloriâ inventionis fecure potitum credideris. Vix ea in vivente peragitur, cùm fubitò ardent animi & invidiæ incendio conflagrantur omnes alienæ virtutis & gloriæ obtrectatores. A Doctore Medico hancce inventam & celebratam opera-

## XVI PRÆFATIO.

tionem tacito murmure indignantur. Experimenta iterant, eaque sic contorquent, ut ex iis, aut inutilis sectio, aut exitiofa videatur. Innumeras adhibent machinationes, & futilia comparant argumenta quibus inventioni notam infamiæ possint inurere, sicque magis ac magis se se inventoris laudi & famæ fervire non vident. Mox corum Coryphæus in arenam defcendit aperto marte dimicaturus, & præconceptæ opinionis suæ ministros huc & illùc

PRÆFATIO. XVI illuc mittit, qui palmariam operationem è medio veluti tollant, & penitus extinguere conentur. Nec satis, ficcas ille pelves, & omni suâ denudatas carne, idemque pro ligamentis rigida ex orichalco fila omnium exponit oculis, ut cunctis fane fucum faciat; apprime etenim ipfi, longe alio res modo in vivente gravida, aut in tepenti cadavere succeffuras persuasum est. Nil mirum ; eadem omnes clarorum inventorum auctores fors manet. Quid hic etiamnum

B

#### xvijj PRÆFATIO.

commemorem à detecto (1) fanguinis circuitu, à chemicis olim remediis (2), &c. &c.

(1, Motum fanguinis circulatorium fubodoratus Britanniæ Archiatrorum Comes HARVEUS, cùm experimentorum vi fuam demonstrasset inventionem, tùm Zelotypiæ stimulis agitata non levis detrectatorum cohors, regem supplicibus adiit precibus, ut virum illum immortalem, tanquam mentis suæ non ampliùs compotem, & tanquam exitiosæ novitatis magistrum depingeret, sticque eum à sua sede dejicere niteretur.

(2) Exempli causâ, prodamus antimonium, cujus nunc egregias adeò in praxi medicâ dotes cuncti agnoscimus. Sæculo circitèr duodecimo, Chemista quidam nomine BA-SILIUS VALENTINUS, usum stibili internum ad innumeros propè morbos mirabilitèr

## PRÆFATIO. XIX natos tumultus? Nobis nunc graviffimis rationum momentis

profecisse fcripsit in opere cui titulus : currus triumphalis antimonii. Quem usum deindè velut infalubrem & venenatum damnavêre permulti, & cousque deventum est, ut annis 1566 & 1609, supremâ Senatûs authoritate in nostrâ Galliâ sub gravibus etiam pœnis interdictus suerit. Vid. GUI PATIN. Lettres choisses. 1. 18.

Sæculis fequentibus continuò & acriter de ftibii qualitate falubri, vel lethiferâ certatum est; donec anno 1666, convocato omni ordine Parisiensi faluberrimo, adhiberi posse, & maximâ quidem cum utilitate hancce substantiam mineralem, majori suf. fragiorum numero statutum est.

Vid. Differtation fur l'Antimoine. Préface, &c. Par. M. LAMY, D. M. P. Paris. 1682.

Bij

#### X PREFATION

à Symphyseos sectionis autore, quem merito apud ultimos nepotes femper collaudandum conjicimus, tantam invidiæ tempestatem avertere animus est. Cùm jam in scholis nostris, hanc, quantum licuit nobis, quæstionem propugnaverimus & parvulo huic nostro labori annuerit SALU-BERRIMA FACULTAS; cum aliæ etiam, & regno externæ Societates Academica, in eodem argumento avide & ardenter versatæ sint, atque pro SIGUALTINA Sectione admit-

PRÆFATIO. XXI tendà concluserint ; nobis merito non ambiguum remanet, quin ea scilicet, non longam post elapsam annorum feriem, inter operationes vel maxime falutiferas annumeretur. Ea namque, Cæfareæ sectionis vices præstat sæpissimè, omnesque obvias fermè adimplet indicationes. Quotiescumque nos ad eam opportunâ occasione accingemus, nil erit indè periculi verendum. Serià tandem rerum inquisitione peractâ, & ratiocinio, ac autoritate freti,

Bijj

## xxij PREFATIO.

hanc efferre & prædicare non dubitabimus humano generi tanqu'am fumm'e proficuam; nec per nos ftabit quominùs hæc omnia omnibus innotefcant, *lippis* etiam & *tonforibus*.



voren duran Seria tandem ro-

rum sieguificione bergel, &

Tices pueffer familie



# DESECTIONE SYMPHYSEOS OSSIVM PUBIS.

#### ARTICULUS I.

PELVIS, Fetúsque capitis dimenfionum levior adumbratio. Partús naturalis conspectus. Errores tùm veterum, tùm neotericorum. Quibus in rerum circumstantiis hi, quibus illi Sectionem Cæsaream aggressi fint.

Hocomnes ad unum fatentur, id imprimis medici officii esse, ut, quemadmodùm omni ope atque operâ Biv

## 24 De Sectione Symphyseos

mortalibus fata procrastinare nititur; fic etiam horis præsit natalibus, ne vitam auspicatus (1) homuncio, ipso sub ortu, infausto sidere oæcidat. Ut autem in mentibus genuina notio pars tûs insideat, quænam Fetum inter ac Pelvim occurrat ratio, apprimè callere necessum nemo non dixerit.

Et primò de pelvi. Omnis ipfius compages quatuor offibus, geminis feilicèt Innominatis, Sacro & Coccyge, cartilaginum ope ligamentorumque firmitèr invicèm articulatis, contexitur. Variæ horum offium regiones, anguli, facies, limbi, &c. de induftrià filentur, utpotè

(1) « Utrùm vivere, an mori fit me» liùs, dii immortales fciunt : hominem
» quidem fcire arbitror neminem. Cicera
» Tufcul. 1. ».

Offium pubis. Articulus I. 25 de queis satis - superque in obvio quovis Obstetricantis volumine disseritur. Quædam tantummodo nostræ propositioni stabiliendæ apposita præmittemus. Duplex in pelvi fretum, superius unum, inferius alterum, multiplicesque diametri notantur. Inter sublimioris freti diametros, præ aliis illa pernoscenda est, quæ à pube ad facri basim protenditur, & à 3 1/2 usque ad 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pollices longa est. Transversa vulgo uno pollice anteriorem exsuperat; at obliqua (2) diametri ab utrâque iliacâ extremitate pubis ad facro-iliacas decuffatim expansæ commissuras, omnium longissime porriguntur, quod nempe

(2) Diametros obliquas primus descripsie Outo Anglus. Traité des accouch. 1742. 26 De Sectione Symphy feos

ficut transversalis, muscularibus malfis, non coarctantur. Humilioris autem freti diametri omnes à  $3\frac{1}{4}$ usque ad  $4\frac{1}{4}$  pollices emetiuntur.

Quùm igitur per hasce fauces viam fibi quærat infantis caput, oportet ut ipsis justâ proportione respondeat. Ovoïdem non malè resert. Ab apice menti ad occiput usque axis ejus maximus, inter  $4\frac{3}{4}$  & 6 pollices comprehenditur. Alter partem ovoïdis serè mediam secat & ab unâ parietali eminentiâ ad alteram perducitur, proutque in minorem majoremve creverit molem puellus, à  $3\frac{1}{4}$  pollicibus ad 4 usque extenditur; hæc verò linea *transversa* diameter audit (3). Obices in partu-

(3) Celeberr. artis obstetriciæ Professor

Ossium pubis. Articulus I. 27 riendo præcipuos opponit caput, quod ubi transiit, per tritum iter

M. GOUBELLY D. M. P. lineas omnes quæ ultra cranii centrum excurrunt, tanquam diametros respuit, illamque lineam cujus ultima puncta eminentiarum parietalium apicem efformant, minime ut diametrum haberi debere contendit. Maltoties ete nim in fetuum vel minimorum, in infanrum etiam vel craffiorum capitibus fe fe memorat observasse, quòd hæcce linea per cranii centrum non transiret, quòdque fit semper illa brevior, quæ squamosum inter offis parietalis limbum, & offis ejufdem tuberositatis extremitatem media, ad oppositum latus extenditur. Ultimam hanc lineam transversam diametrum vocat, quod scilicet in partes duas æquales rectis angulis anteriorem dividat diametrum, quam à parte frontis gibbosiore ad occipitalem protuberantiam desumit. Que omnia in

#### De Sectione Symphyfeos celeri posteà decursu feruntur cæteræ corporis partes, quibus egressuris

Scholis noftris, paucis abhinc diebus geometricè super tria fetuum capita Astantibus plurimis patefecit idem Professor. At permulti non infimæ notæ obstetricatores, in cunctis infantibus id semper fieri negant, majoremque lineam ab unâ parietali eminentiâ ad alteram perducunt. Nos autem hanc ultimam secuti sumus sententiam. Nullus indè in praxim error dimanare valet, ut - potè quæ differentia quàm minima, vel potiùs nulla est. Nam diversimodè possunt omnes (diametri capitis) haberi in partu, vel majores, vel minores, prout sexilitas, mollities cranii ossunt & corum Symphyfis sinunt ea produci.

Vid. Thesim : an in omni partu, propter angustiam pelvis, impossibili, Symphysis ossium pubis secanda? pag. 8. 1776. Auth. D. BAUDELOCQUE, Chirurg. hujusce urbis peritissimo. Offium pubis. Articulus I. 29 nimiùm attendentes Medici, capitis omninò neglexêre (4) mechanifmum. Hìnc concinna respectivarum dimenfionum capitis & pelvis æstimatio, res sanè maximi momenti. HIPPO-CRATES olim totam puelli compaginem olivæ nucleo in ampullam angusti oris immisso, qui transversus

Attamen ut clarius arti lumen affulgeret, optandum effet fanè, ut inter omnes obftetricantes, de descriptionibus tum pelvis, tum capitis fetus, nec non imponendis nominibus conveniret. Unusquisque etenim pro nutu dimensiones atque diametros exarat, exponitque, & ex his ambagibus, artis principia difficilius hauriuntur.

(4) Pratique des accouchemens, par M. ALPHONSE LE ROY, D. M. P. Paris, 1776, shez Leclerc. p. 54,61, 106 & feq.

#### 30 De Sectione Symphyseos

foràs educi non posset, assimilavit. Quòd si divus Senex id de solo capite, non de toto fetu dixisset, jam ultimum imposuisset arti fastigium. Multifariè etenim in pelvim decidens maxima capitis diameter, finiftrorsum vel dextrorsum, anticam aut posticam pelvis partem una alterave sua extremitate respicit; diversæ hinc posituræ, quarum aliæ magis, aliæ minus parturienti opitulantur. Dùm igitur prono diametri suæ longioris alter-utro termino, præceps in freta ruit caput, si inguini obversum occiput descendat priùs, res est in vado; si mentum, tunc iter inexsuperabile. Hujus impedimenti ratio cunctos, DEVENTERUM (5)

()) Cum mentum à pectore recedit, tune

Offium pubis. Articulus 1. 31 præter & SMELLIUM (6) latuit obftetricantes. Mutuam anterioris diametri pelvis rationem requirit tranfverfa capitis diameter. Ne verò egreffum capitis morentur eminentiæ parietales, fapientis naturæ beneficio, una prior alterâ in defcensu volvitur. Harumce mensurarum positionumque variarum ignoratione turpi, obftetriciâ in arte imis summa permixta funt. Utero duntaxat prospiciebant Veteres, de cœteris parùm solliciti. Cùm omnis partui præclusa via ipsis videretur, ut vita matribus superstes

perfici nequit partus, juxta DEVENTERUM. Observations sur le Manuel des Accouch. chap. 37, p. 207. 1733.

(6) SMELLIE, Traité de la Théorie & de la Pratique des Accouchemens. Paris, 1771.

#### 32 De Sectione Symphyseos

maneret, nec mora, puellos mactabant ; & fancitâ lege (7), tantummodo in parturientis cadaver sectionem Cæsaream instituebant, ut vivus in auras prodiret infans. Circa statum uteri, circa mensuras positionesque non-nulli cæcutivêre neoterici, qui naturalium nescii capitis positionum, varios illas sortiri difficultatis gradus, & non-nunquam per eas impossibilem fieri partum non noverunt. Hinc illegitimas positiones, quæ folâ manuûm industriâ ad naturales revocari potuissent, proportionis defectum existimantes, ad instrumenta confugêre & inconsulte ac immaniter intima ventris ferro

(7) Justinianus, Digest. lib. x1. tit. 8. sepè Offium pubis. Articulus I. 33 Ixpé Ixpiùs penetrarunt (8). In his verò extremis, ubi fectio Cælarea spes miseris ultima lucet, de alia recèns inventa operatione, nempè ossium pubis Symphyseos Sectione, cum omnibus bonis Ixtemur. Cæsarea operatione promptior tutiorque, ipsius loco ut plurimum celebranda venit. Nunc scrupulosa indagine, quibus hæc præ altera usurpari debeat, distinguendi casus; mòxque perpensos, quanta valemus diligentia, differentiarum modos enarra-

(8) Quod ubique legere est; vid. verb. gr. Parsum Cæsareum, Rossero Authore. Parisis 1590.

CRANTZ de re instrument.

LEVRET. Accouchemens laborieux, pag. 238.1751. 54 De Sectione Symphyseos bimus. Priùs autem, quo pacto duz natura, Sectionis Symphyseos inventori facem prætulerit, levitèr adum brare liceat.



Offium pubis. Articulus II. 35

# ARTICULUS II.

CARTILAGINUM pelvis per totum graviditatis curriculum intumefcentia. Ex offium pubis naturali diductione perspecta, eorum Symphyseos Sectio proponitur. Præclarum rejicitur inventum. Nova & in animantibus vivis, & in puerperarum cadaveribus tentantur experimenta.

A PRIMO gestationis tempore ad puerperium, emolliri Symphyseon (1) pubis iliûm que cartilagines

(1) Per omne etiam vitæ spatium moveri pubis osla multi opinantur; quotiescumque scilicet elatis sursum pedibus convolvitur C ij

### 36 De Sectione Symphy feos

& ligamenta, relaxari, elongariqué etiam-núm dubitare nefas. Ex providæ & fagacis naturæ inftituto ; craffiores in feminis quàm in viris occurrunt cartilagines. In gravidis quibuscunque non eadem fe fe diductionis figna proferunt ; attamèn fempèr ità mollefcunt cartilagines ; ut facillimè fcalpello dividi poffint: rariùs autem eò ufque disjunguntur , ut motui cuicunque offa pelvis ministrent & obsequantur : cujus dilatationis causam evolvere conantes Physiologi mechanici, vasa fanguifera ab utero ampliore sic comprimi

corpus; cùm truncatis infeliciter cruribus incedere animus est; & imprimis, cùm vehementi congressi venerei trepidatione motantur artus.

Offium pubis. Articulus II. 37 tradiderunt, ut seroso infarctu tumidæ cartilagines à se invicèm ossa pelvis dispellerent. Exemplum à ligno arido immensæ rupis in rimam immisso, quod posteà madefactum enormes ex ea divelleret tabulas, fumpfere. Media inter vertebras cartilago, quæ nocte accrescens, nos matutinis horis proceriores reddit, eorum etiam opinioni favere visa fuit. At corporis pondere interdiù comprimuntur, nochu restituuntur elasticæ vertebrarum cartilagines. Symphyses autèm pelvis continuo irrorantur humore, nec tamen, nisi graviditatis tempore, crassiores evadunt. Eorum ideo explanationibus rejectis, germanam horumce phænomenôn causam à principio vegetativo per totum gestationis decursum

Cijj

### 38 De Sectione Symphyfeos

ad has partes fensim appellente deducimus. Illa vis etenim quâ fefe attollunt fubftantiæ molles organis inftructæ, incredibilis eft & portenti fimilis. Nonne (2) tenerior herba ponderofos fubmovet lapides? Nonne ergastulum durius frangic intumescens germen nucleo densiffimo coarctatum? Nonne proferpentes polypi, ossa narium, palati & malæ, à sua fede, robusta quamvis articulatione concatenata dejiciunt?

(2) Vid. Observat. & Histor. de generatione è GUILL. HARVEO excerptæ, in ordinem redactæ studio JUSTI SCHRA-DERI. M. D. Amstelod. 1674, pag. 123. Hæc Giam observavit, & publicè professus est illustr. BERNARDUS DE JUSSIEU, dùm rem Herbariam in Horto Regio Philiatros edocebat. Offium pubis. Articulus II. 39 Nonne folius naturæ vegetantis impetu in immenfum turgent (3) uteri fibræ & expanduntur ? Eo tunc tempore, principii *folidificantis* folutionem moliri (4) natura videtur. To-

(3) Vid. GUILL. HARVEI, citat. Ob-Jerv. de generat. &c. pag. 49 & Iq.

(4) Hanc quoque, tum privatis, tum publicis lectionibus opinionem explicuit CLARISS. M. ALPH. LE ROY, qui artem obstetriciam dilucidius profitetur, & multa jam in artis incrementum excogitavit.

Vid. GALENI. lib. de semine, cap. 10. de modo quo singulæ setús partes oriantur.

Vid. CREMONINI de semine opusculum, in quo egregiè plurima de generatione agitantur.

Vid. Novas opiniones & experimenta nova de offibus, à Clariff. M. Hérissant, Mémoire Acad. des Sciences, in-4°. ann. \$758, p. 322. 419 & seq.

Civ

# 40 De Sectione Symphyseos

tum etenim prægnantis mulieris fyftêma hacce folidâ partim defraudatur materiâ quæ efformando fetûs corpori ad matricem devehitur; undê in gravidis mollior teneriorque offea compages, cartilaginofa, mufculofa, &c.; undè offa fracta nunquam ferè coalefcunt, nifi gravidæ fetum ejecerint; undè ficutì in Calculofis & Podagricis, vagi articulorum dolores; undè frequens cachexiæ confpectus; undè urinæ fæpiùs turbidæ; fedimentum deponentes; undè quædam infirmiores feminæ totis, ut ità dicam (5), liquatæ artubus, grandi-

(5) Mulieri SUPIOT, omnium offium folutione laboranti ineptè suasum est, ut denuò conciperet. Dum autèm utero gestabat, in dies ità mollescebant ossa, ut ea ductilia dixisses. Fetum denique vegetiorem Offium pubis. Articulus II. 41 ores tamèn fetus crassioresque, cunctis stupentibus, edunt.

Hanc genuinam naturæ agendi normam prope-modùm attigêre primarum Ætatum Medici, qui tres pelvis fymphyfes totidem veluti articulationum modos intuentes, cas in partu quafi difruptas hiare fcripferunt. Judæi (6) artes ægyptiacas

enixa est. Vide Histoire de la mal. singul. de la fem. Supiot, par M. MORAND, D. M. P. 1752.

(6) Exod. cap. I, v. 19. ZOAR. Comment. in hunc locum, fic fatur : « Haud » facilè quicquam aliud magis mirandum » in totà rerum naturà reperias, quàm » distractionem illam offis pubis quæ fit in » parturientibus, magno juvamento naturæ, » feu potiùs providentià quâdam dei, cui » natura ipfa ministrat ».

### 11 De Sectione Symphy feds

edocti, Medicinæ princeps HIPPO-CRATES (7), deindè GALENUS, hancce sectati sunt opinionem. Ex Arabibus, AVICENNA (8) hanc offium pubis divulsionem unum veluti ex validissimis Naturæ operibus celebrat. At recentiores cùm à longinquo post puerperium intervallo offium pelvis connexionem scrutarentur, ob firmiorem tunc cartilaginum compactionem, nullo modo hæc offa abscedere posse palàm pro-

(7) « Ex puerperis præcipuè laborant » quæ... & totum quidem corpus dolor » occupat, præcipuè verò lumbos & coxen-» dices quæ ipfis diducuntur ». De naturâ pueri, ex FOESIO.

(8) Lib. 3. fen 21. Tract. 1. cap. 2. pag. 924, tom. 11. Venetiis apud Juntas, ann. 1508. Offium pubis. Articulus II. 43 fessi funt. Hos inter præsertim eminet vir in rebus Anatomicis maximi ponderis VESALIUS (9), qui tamèn (rumorem vulgi referens quo dicebatur quasdam apud gentes, natis nupèr puellis, partûs facilioris gratiâ, comprimi pubis offa & disjungi) ex ipso errore veritatem educere debuisfet. FERNELIUS etiam noster (10) quem meritò Hippocratem gallum vocant omnes, mancâ delus experientiâ, benè multos sub opinionis sur subjunxit imperium. Verùm JA-COBUS D'AMBOISE (11), HEN-

(9) Fato functus ann. 1564, vide de corp. hum. fabricâ, libr. I, cap. XXIX, P. 111. Lugd-batavi, 1725.

(10) Moritur ann. 1557, vide de hominis procreatione, lib. 7, cap. 11, versus finem. (11) Vid. Notice des Hom. les plus

# 44 De Sectione Symphyseos

RICO MAGNO devinctifiimus & de co ob fervatas ipfi res publicas benè meritus, quem etiam unum è fuis clariorem finu fovisse gloriatur SAL. FAC. PAR., fallaci tantorum virorum judicio oppressa Antiquorum doctrinam restituit denuò & erexit. Anno 1579, in Chirurgorum amphitheatro, mulieris 24 annos naræ, decimo à partu die, suspendio enectæ secuit cadaver, & eœtui numerosissimo, ossium pubis & iliûm mobilitatem oculis digitisque conspicuam mirâ exposuit arte. Hujusce posteà

céléb. de la Fac. de Méd. de Paris, par M. HAZON, D. M. P. in-4°. pag. 87. 1778.

SEVERINI PINÆI opuscula Phys. & Anatom. lib. II. cap. 8. p. 181. Offium pubis. Articulus II. 45 opinionis tenax fuit Schola Parifienfis. Hanc nobis RIOLANUS pater (12) natufque, ambo in Anatomiâ verfatiffimi, paísim in operibus sparsam tradiderunt. Nostrâ ætate, illustriff. M. BERTIN (13), D. M. P. veterum opinionis se propugnatorem acerrimum præbuit. Persuasi sunt omnes, eum, sic rebus institutis, naturæ finem fuisse, ut

(12) Moritur Pater anno 1605, filius anno 1657.

(13) Vide Thesim : An offa innominate in gravidis & parturientibus diducantur? 29 Januar. 1739. Præside M°. M. PH. BOUVART.

Vid. Thefim : an sub partu emoveantur ossa? Discuss. Tub. 1774. A S. C. SEEGER. 46 De Sectione Symphyseos facilior (14) scilicèt salubriorque fetui excludendo sollicitaretur exitus. Osfa pelvis exarticulari & omninò quandoque operoso in partu, cartilagines lacerari animadvertentes artis ministri, quis solus effet naturæ conatibus auxiliandi modus, animo volutare nequidem ausi sunt. At tandem CL. SIGAULT, D. M. P. hæc altâ mente diù revolvens, solus (15),

(14) Les os du bassin souffrent écartement & diduction, & c. parce que les cartilages intermédiaires devenus insensiblement plus épais, donnent une plus grande capacité au bassin; le cercle des os qui le compose, en devient plus ample... de l'écattement des os du bassin. Mém. Acad. Chir. in-4°. Tom. IV, p. 71.

(15) Nonnulli sunt qui inventionis gloriam M°. SIGAULT invidentes, alios eadem

# Ossium pubis. Articulus II. 47 divino quali afflatus numine, quam

cogitaffe prædicant, & sequentibus suam sententiam confirmare conantur. Ex S. PINAO, opusculo citato, lib. II, p. 210 & seq. « Partes ignobiliores nec non con-» tinentes seu externæ non tantum dilatari, » sed etiam secari tuto possunt, ut internis » (nobilioribus) fuccurratur, ut GALENUS ait. At nemo fanè est mediocriter in Me-» dicina versatus, qui non noverit puellos » in utero contentos multo nobiliores effe » maternis offibus pelvim, ut vulgo loqui-» mur, constituentibus. Quarè ossa pubis. ab invicem necessariò & offa iliúm ab » offe sacro distrahi in puerperio naturali » concludimus. . . » SIGUALTINAM fectionem mente comprehenfam habuiffe PINÆUM primo quidem aspectu videtur. At ex ante scriptis, & ultimâ citatâ phrasi, euns his in rebus veterum imitatorem, naturæ potids agentis miracula observasse liquet, quam

# 48 De Sectione Symphyseos monstrarat natura, viam, ingreditur.

novæ operationis in artis augmentum inftituendæ inivisse confilium.

MAURIC. CORDÆUS in eos qui offium pelvis diductionem negant, fic invehitur : « De quâ qui diffident, ab omni ratione » fecandi fanè diffideant ». Quid autem fibi vult illa vox fecandi? Nonne Anatomifandi loco? Ut frequentiùs apud Anatomicos ufurpatur. Vide M. Cordæi Comment. 1. in lib. 1. Hippocratis, fub fin. in-fol. argentinæ, 1597.

Nodum penè expedit RIOLANUS Pater : Solvi tamèn jure dici poffunt (juncturæ,) quod fumma illa diftenfio, species quædam solutæ continuitatis esse videatur. » Anatom. cap. XI. p. 183.

Vid. AETIUM, JACOB. CARPUM, AL. BENEDICTUM, SYLVIUM, GORRÆUM, JOH. CAJUM, SPIGELIUM, THOM. BAR-THOLINUM, & alios innumeros quorum referre nomina supervacaneum ducimus.

Conceptam

Offium pubis. Articulus 11. 49 Conceptam animo & in cadaveribus expertam Symphyseôs pubis sectionem, ut Cafarea loco adhiberetur, R. CHIRURG. ACADEMIÆ, anno 1768, proposuit. Id tùm explosum rejectumque, aut faltem neglectum est. Laryngis costarumque cartilagines instrumento refecatas apprimè rursus coalescere norunt omnes; nihilo-minus tamen pubis Symphysim ferruminari posse negatum est. D. CAMPER percelebris apud Batavos Medicinæ professor, in cadaveribus iteravit experimenta (16), nova tentavit in animantibus, & divifas callo firmissime connecti partes certior factus, utilissimam fore syn-

(16) In Epistolà ad van Gesscher. P. 141.

D

#### 50 De Sectione Symphyseos

chondrotomiam confidentiùs & audacter afferuit. Celebratâ in cadaveribus hâc operatione, fupra pollicem unum fuâ fponte dehifcere pubes unà retulerunt illi infignes Viri (17), & hiatum in vivente longè majorem extemplò fucceffurum jurè fuspicati funt ; ipfifmet

(17) Vid. Epistolam mox cit.

Vide Thefim M. SIGAULT, Andes gavi propugnatam anno 1773: An in partu contra naturam, sectio symphyseos ossium pubis, sectione Casarea promptior & tutior?

Vid. etiam Thefim D. MORAND DE LA ROUSSIERE, Monspel. propug. ann. 1772 : An sectio Symphyseos, in partu difficili ubi sectio Casarea, aut instrumentorum usus requiritur, huic amplici auxilii generi sit anteponenda? Offium pubis. Articulus II. 51 enim frigidis cadaveribus cum crura dimovissient, ad duo, vel etiam, vi tum majori adhibitâ, ad tres usque pollices pubum diductio facta est. Omnes quoque, at longe multo post, ingenii sui nervos intendit M. ALPHONSUS LE ROX, ut rem novis tentaminibus illustraret; quam primo, cum hanc leviter tantum attigisset, sibi maxime dissidens publice proponere veritus est. Verum occasionne (18) datâ, super tepens

(18) Vid. Quæstionem Medico-Chirurgicam : An in omni partu, prægnanti vitam servare possit obstetricans expertus? Propugnatam Monsspelii, anno 1776, à J. H. V. СНАНДОН, pag. 8.

Quæ etiam legere est in opusculo, quod hoc ipso temporis puncto, quo prodit hæc nostra differtatiuncula, in lucem editur, sub

Dij

### 52 De Sectione Symphy Jeôs

nuper enixæ cadaver cui, ut ex ipfius ore didicimus, crura divaricaverat, ossa pubis scalpello divulsa à se invicèm vidit 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pollicum intervallo facillime recedere ; tum derepente visus est SIGUALTINÆ operationis patronus & defensor. Eumdem, instituta sectione, rictum obtinere si volueris, co ipsissimo ferè momento quo misella efflavit animam puerpera, ad operationem properes; cave alioquin ne ludas operam ; humidum etenim radicale, calor vitæ cito difflantur, & membra lethi gelu rigentia sese paululum elongari vix patiuntur.

titulo: Recherches historiques & pratiques fur la Section de la Symphyse du pubis, pratiquée le 2 Octobre 1777, sur la femme Souchot. pag. 17 & suiv.

# Offium pubis. Articulus III. 53

# ARTICULUS III.

Ex aptè & fatis amplè divisà pubis offium Symphyfi, atque è variis in pelvi deformatà cognitis angustiæ gradibus, partionis mechanismus evolvitur. Quibus in casibus anteponenda sit Cæsareæ sectioni sectio SIGUALTINA, & vice versa. Eorum quoque per transfennam exponitur opinio, qui partum suadent prophylacticum.

N E dulces expavescat hymenæos puella tempestiva viro, cùm se formæ opibus superbam cunctisque symmetriæ absolutam numeris agnoverit. Venustum etenim staturæ decus, conveniensque & adæquata mem-D iij

#### 34 De Sectione Symphy feos

brorum compages, omnes ipsi felices partus futuros, omine læto prænuntiant. Quæ autem vel morbo; vel naturæ erroribus deformis, vertebrarum dorsi portentosa declinatione, repandis cruribus, titubanti gressu, omnibus miserationem movet, sæpissime adhuc, in miseriæ cumulum, offium pelvis diftorfione & collapfu laborat. Hancce malam fortita fortunam virgo, nullos spiret amores, senescat inculta. Quòd si temere marito subjecta, aut sui si parùm compos, libidinis ardore plurimum incensa conceperit, quid maturo fetu peragendum? Convellitur uterus, exitum molitur infans; omnis via naturalis omninò præcluditur: fectio ne cæfarea, sectio ne Symphyseos offium pubis instituenda? Rem Offium pubis. Articulus III. 55 paulò altiori repetamus indagine, pelvimque rursus, infantisque caput parumpèr lustremus.

Triplici offeo quasi triangulo compingitur pelvis. Apices deorsum fpectant, sursum in orbem conjunguntur bases. Duplex fretum : inferius unum, tribus triangulorum apicibus terminatur, coccyge scilicet & duobus ischiaticis tuberibus. Bafibus in pelvis marginem coëuntibus alterum superius efformatur. Pelvi deterius extructa, sive nimium divergant apices, five ad symphysim anteriorem, plus justo accesserit Sacri basis, fretum inferius multum dilatabitur & angustabitur nimiùm superius ; sic etiam, vice versa, alternabit magnitudinis proportio; cæterum, ferme semper ità Div

56 De Sectione Symphyseo's res evenire diligenti constat obsert vatione.

Cùm autem transversa capitis diameter longa sit ut plurimum 3 = pollices, ultraque sæpiùs excurrat, ità & anterior freti superioris diameter non infra 3 = pollices debet consistere. Idem sit de inferioris freti diametro. In hâc ultimâ pelvis dimensione, si utramque inter capitis tuberositatem quatuor numerentur pollices, transmitti non poterit caput, licet una tuberositas altera prior descenderit. At hoc insolenter & raro contingit, nec ità sæpè ad 4 pollices crescit tranversa capitis diameter, & 3 - pollices fermè sempèr superare observantur anticæ pelvium diametri. Hoc posito tamèn leviori proporOffium pubis. Articulus III. 57 tionis defectu, nullà ratione transfretare poterit caput, nifi vel ipfum forcipe pressum fiat angustius, vel naturà (1) molliusculum, arctio-

(1) Fetus capitis Symphyles laxæ fune & hiantes. Hujus namque offium anguli tunc temporis membranacei, hinc & inde molliora efformant spatia quorum latiora Fontanellæ vocantur; & eò usquè fic remanent, donec paulatim coalescant, & tandem in lapideam fere duritiem solidentur. Omnis igitur formæ propemodum patiens est infantile caput futuris mollibus diftinctum & fontanellis. Hæc tenuia flecti queunt offa, & ità comprimi, ur unum super aliud transgredi, sicque mutari possit capitis figura. Ex dictis aliunde omnibus est in confesso dimoveri posse offa pubis & sejungi. En duabus utitur viis natura, ut nempe, cum vel grandius sit fetus caput, vel angustior pelvis, per capitis compres-

# 58 De Sectione Symphyseds rem permeando tramitem elongetur.

fionem, & fimul per ampliationem pelvis, major quandoque exituro fetui pateat hiatus.

Diarii cui titulus : Gazette de Santé, perfpicaciffimus Autor M. PAULET D. M. P. tantam in parturiente quâdam animadvertit pubis cartilaginum relaxationem, ut inter offa plusquam digiti latitudo immitteretur. Tum citò faciliù sque mulier enixa est. Vidit aliàs ità compressum infantis caput & elongatum, ut per arctius iter, nullà prævià operatione, celerius elapsum fuerit, cui emisso legitimam dextrâ leviori formam largita est obstetrix. Ex ejusdem adhuc colloquiis haufimus Monspeffulanum quemdam Doctorem Medicum extare, cujus caput in partu mirabiliter extensum fuerit ; & licet eodem in statu semper remanserit, non tamen ipsi mentis facultates ullo modo turbatæ sunt. At inde tanta difformitas orta est, ut ipsi peculiarem consultò petasum contexi necessum sit, utque ipfum cachinnis obvii omnes insectentur pueri.

### Offium pubis. Articulus III. 59

Vide insuper: Gazette de Santé, 1775, n°. 12. 1778, n°. 3.

Cùm Cælaream Sectionem aggredi meditaretur D. SOLEVERÉS D. M. M. fuper gravidam, cujus freti fuperiotis diameter anterior ad  $2\frac{1}{2}$  pollices vix accedebat, ingenti nixu fubitò elongatum caput, per minimum pelvis cavum traductum eft. Maxima interim capitis diameter, 9 pollicum longitudinem affumpierat.

D. COLON DE LA MOTTE dexterrimus Nofocomii generalis dicti *Bicêtre* Chirurgus, nuperrimè narravit nobis mulierem quamdam nono menfe gestationis peracto, gravissimis conflictatam doloribus, partus instare momentum omnibus indidisse opinionem. Diti versata est in extremis. Angustiorem pelvim, aut crassiorem setum prænuntiabant omnes. Naturæ tamen viribus omnind committitur. Subitd dolores cessant, recrudescuntque identidem; at octo

# 60 De Sectione Symphyseos

post dies, adhibitis frequenter aquæ tepidæ balneis, vegetiorem & vivum homuncionem expedité propellit.

Similia passim legere est in cunctis Clinicorum libris. Vid. imprimis Miscellanea curiosorum natura, &c. &c.

Vid. Traité des Accouchemens par Puzos, Chirurgien, &c. &c. corrigé & publié par M. MORISOT DES LANDES, D. M. P. Parif. 1759. pag. 10 & fuiv. &c.

Relative ad fetum majorem poteft esse angustior pelvis, ad fetum verò minorem, recte conformata. Hinc matribus quæ quondam promptiùs fetum ejecerunt, quidam alter partus difficilis, aut quandoque impossibilis fieri valet.

Quædam adhuc extant mulieres Cæfaream operationem paffæ, quæ tamen non ità multò post penè citra dolorem pepererunt. Sic non deerunt quibus, legitimè licet totis artubus extructæ sint & seliciter jam enixæ, pravæ tamen positionis, aut amOssium pubis. Articulus III. 61 Quæ si anteà prævideri queant,

plioris fetûs capitis causâ, secanda erit pubis osfium Symphysis.

Cum vitium duntaxat oritur tum ex paulò ampliori fetús volumine relative ad pelvim, tum ex paulo angustiori pelvi relative ad fetum, nobis non dubium est quin nimium sæpe veniant in usum instrumenta. Namque gradatim & fine fenfu viam natura tentat, ut grave tandem expellat onus. Huic ne citius occurras; sola plerumque perficie: operam. Interdum tamen impares esse ejufdem naturæ vires, tuncque matres aut puellos sub partu occumbere posse non ibimus inficias. Studiose igitur attendere Medicus debet, ut omnino plane cognoscat quousque cunctandum sit. Cum autem cogcognoverit prægnantis vires languescere, tum ne illa omnino fatiscat, sectionem Symphyseôs noxâ fine ulla usurpandam effe arbitramur.

### 62 De Sectione Symphyseos feptimo (2) aut octavo mense pro-

At ubi moram & impedimentum partui interponit pelvis offium pravitas, quamvis nonnunquam mirum in modum mollescat & extendatur caput : ne tamen fidenter & diutiùs expectes. Verùm enim verò notandum est capitis offa non rarò præmaturâ ferruminatione solida adeò firmaque repetiri, tu inflecti nullo modò possint.

(2) Prægnantis uteri hæmorrhagias fanare perarduum. Ità namquè fæpiùs marcefcunt fetus, contabefcuntque matres, ut brevi temporis lapfu ambo fimùl intereant. Cùm diù jam effluxit larga fanguinis copia, tunc, nifi fetus expellatur, nullâ ratione fervari matres poffunt, ut apprimè innotuit Clariff.° M°. CHOMEL D. M. P., qui tunc necmora, deveniendum voluit ad operationem quam fic defcribit : « Collocatâ » convenienter ægrâ, obftetrix digitis bu-» tyro recenti vel oleo inunctis, os uteri

# Osfium pubis. Articulus III. 63 moveri posse partum opinamur.

» tangat, fenfimque dilatet, ità ut digito-» rum omnium apices poffit intrudere. Om-» nia tunc cum judicio, arte & induftrià » peragenda funt, pro re præfenti, pro fetûs » ætate; ore uteri ampliato, membrana » digitis laceranda eft; in ruptam mem-» branam, favente aquarum lubrico flu-» mine, immittenda manus, infantis pedes » fuo loco quærendi, fepofito quovis alio-» membro, ipfo-met capite, &c. &c. »

Vid. Thefim : An prægnanti, superveniente uteri hæmorrhagiå, partus manu promovendus? §. IV. Propug. ann. 1742, turstis ann. 1778.

Iisdem institit vestigiis dexterrimus Chirurgus Puzos. Vid. citat. opus : Mémoire sur les pertes de sang qui surviennent aux femmes grosses, &c. pag. 334. & suiv.

Vid. Differtat. de necessitate accelerandi partum. Lipsiæ. 1755. 2 CHR. GOT. TRAUTMANN.

# 64 De Sectione Symphyseos Si verò ad ultimum usque nomi

De his quoque celeberiimi ipfius van-SWIETEN sententiam omnium oculis subjiciamus.

«Cum ante septimum mensem expulsus » fetus, rarò vel nunquam superstes ma-» neat, hinc tales sub abortus nomine com-» prehendere solent Medici: cum verò plu-» rima exempla habeantur setuum septi-» mestrium, qui soli non tantum super-» vixerunt, sed & ad bonam senectutem per-» vixerunt, fed & ad bonam senectutem per-» venerunt, hinc tales partus non vocantur » amplius abortus, sed simpliciter tantum » præmaturi. EOERRHAAV. comm. aphor. » 1296. Pariss , tom. 4. pag. 416.»

Alio in loco uberids fusidique præmaturi partûs promovendi methodum enarrat. Aphorif. 1308. pag. 452.

His omnibus rité perpensis, Autor suit Clariss. M. LE VACHER DE LA FEUTRIE, D. M. P. ut quibusdam in casibus hæcce pro mensis Offium pubis. Articulus III. 65 mensis diem pervenerit graviditas; si instet hora, resque male vertant, tentanda est illico sectio Symphyseos.

Hâc peractâ, duo præsertim animadvertenda sunt, ex quibus tota pendet sectionis utilitas : stupenda videlicet pubis ossum dehiscentia,

Cæsareâ admitteretur operatio ; ut nempè pro majori vel minori offium pelvis deformitate, septimo scilicet, vel octavo gestationis mense per artem sollicitaretur partus. Namque tunc temporis setuum capita legisimam non sunt molem adepta, eorumque molliora extenduntur officula, & è suo loco faciliùs dimoventur ; undè procliviùs per iter angustum transmittuntur puelli, viventes nascuntur, ad extremamque valent senectutem canescere; &, præmiss venæ sectionibus, balneisque &c. &c. neutiquàm puerpetis verendum est.

E

66 De Sectione Symphyseos & anterioris diametri pelvis elongatio. 1°. Etenim, si separentur ossa pubis, tum à lineis aliquot ad 2 ½ pollices & amplius à se invicem removeri possunt. 2°. Dum ea sejunguntur, hinc & inde (3), & simul antrorsum

(3) Pubum folutâ unione, non transversa tantum augetur pelvis diameter, sed & anterior : quæ si, pelvi integrâ, 3 pollicibus,
v. g., cum 6 lineis constaret, per sectionem semotis uno pollice offibus, ad 3 pollices cum 8 vel 9 lineis ascendit, &c. &c.

Die 12 Novemb. 1777, nonnulli Medici Doctores, & Chirurgi convenerunt, ut in puerperâ recèns fato functâ facerent experimentum. Unus è Chirurgis rem dexterè orfus est. In pelvi cujus erat Sacri ad pubem distantia 4 pollicum cum 2 lineis, cùm osfa ad 2 pollices discessifissent, planè & perspicuè demonstratum est distantiam Offium pubis. Articulus III. 67 divisa eorum extrema vertuntur. Indè fit horum - ce extremorum eò major ab osse sacro recessor, quò latiori

pubum à Sacro vilam fuisse 4 1 pollicum ad latus dextrum, ad finistrum verò 4 pollicum cum 7 lineis : quod discrimen ab inæquali femorum divaricatione quidam repetunt. Si igitur ad pollicem unum divisio fiat, augmentum erit 2 aut 3 linearum. Si ad 2 vel 3 pollices, augmentum erit 4 vel 5; 6 vel 7 linearum, &c. &c. Cum autem tres exuperat pollices hæcce divisio, tune ad externum facri parietem recedere offa ilium, & postea minui anteriorem pelvis diametrum, nedum augeatur, animadvertit jam laudatus Clariff. M. GOUBELLY. Ea autem tanta diductio nihil ad noftram Thefim refert, cum sola 2 aut 2 1 pollicum dehiscentia pro omnibus mox enumerandis cafibus sufficiat.

Eij

#### 68 De Sectione Symphyseos

pubes intervallo diffident. Jàm commemoravimus transversam capitis diametrum anteriori pelvis diametro ut plurimum respondere, & non minimas in partu nectere posse cunctationes. Divisa nunc pube, quò diftabunt magis offa sejuncta, cò major erit ejusdem anterioris diametri pelvis elongatio, còque major inter spatium adauctum prominebit parietalis tuberositatis, aut alia quævis tenelli capitis portio, quæ non ampliùs intra pelvis angustias continebitur; hinc patefacto in ambitum majorem itinere, quasi per viam regiam & patentem feliciùs erumpet infans.

Si quandò transversa pelvis diameter adeò minor esset, ut partui injiceretur obex, eò plus à SymOffium pubis. Articulus III. 69 physeos sectione sperandum foret; cùm exindè longè magis adhuc hæc transversa pelvis d'ameter quàm anterior, amplietur; quod quidem patet meridianà luce clarius.

Ex hoc folo mechanismo intelligi potest capitis infantilis per dilatata pelvis freta transgressio. Quidquid autem hâc de re disceptatum est, ex eo duxit originem, quòd & ad capacitatem (4) sectæ pelvis &

(4) Tum ligamenta pelvis cartilaginesque pro nutu, ut ità dicam, relaxantur & elongantur. Sunt tamen qui minimè illam ampliari posse contendunt. Hos in errorem adduxit CL. ROEDERER D. M. Vid. Elem. art. obst. §. 27. p. 11. & feq. 1753. Intro-ferri sacrum à divulsis vel paululum ileis ossibus sus fusurant, quasi infantis caput musculorum abdominalium contractione & ab utero ex-E ijj

#### 70 De Sectione Symphy feos

ad capitis formam ejulque politionem minùs attenderint adverfarii. Habuerunt enim infantis caput ut fphæroïdæum, pelvim ut circularem aut ellipticam, indèque extruxêre theoremata geometrica quibus rue-

pellente propulsum, cuneique vehementer impulsi vices gerens, non undequaque (dummodò tamen tres non excedat pollices divisio) osfa innominata & ipfum quoque facrum extra-pelleret. At sequentibus D. D. SIGAULT & CAMPER experimentis clarior elucescit veritas. Per pelvim angustiorem grandioris setus caput cum transmittere vellet M. SIGAULT, symphysim secuit; tunc mirum quàm facilè, solà adducente manu, pertransiverit caput. Dein circumjestà in pelvim ligaturà, russis soràs educi non potuit caput, nisi soràs educi non potuit caput, nisi soràs educi Laris. CAMPER. Vid. Epist. jam citat. Offium pubis. Articulus III. 71 tet operationis nostræ fundamentum. Verùm comparationibus usi sunt cum ipsâ re minimè convenientibus.

Quæ cùm ità fint, quò propiùs ad 3 ½ pollicum menfuram accedet diameter pelvis anterior, eò minori indigebit divifionis spatio. Hæsst tamèn aliquandò caput in hâc pelvis dimensione. Intra pelvim 3 ½ pollicum longitudine donatam incuneato capite, admissi forcipis ope (5) minimè pro-

(5) In pelvis ergastulo impeditum caput, ferreis tanquam manubus, forcipis adminiculo apprehendere tentat Medicus. Quod instrumentum ex voto semper intromitu mequit. Non rarò etenim omnia pelvis puncta contingit caput. Forcipis labia quæ certâ etiam crassitudine donantur, tunc intra setús caput & os uteri collocari nullomodo posfunt; undè medentis irriti conatus.

Eiv

### 72 De Sectione Symphyseos

motum fuisse partum expertus est peritiff. Chirurg. D. PEAN. Verum in his generatim cafibus, forcipem primò, qui si prosperè non succelferit, sectionem deinde Symphyseôs arripere debemus ; non enim fas rem omnem fortunæ committere. Nihil plerumque à forcipis adhibitione in 3 pollicum cafu sperandum est. Si demum pelvisad 2- pollices angustetur, nullum est omnino (nisi quid extra modum accidat), neque in vi manuum ullâ, neque in ROONHUZIA-NORUM vecte, neque tandem in forcipe SMELLII auxilium expectandum. In his igitur, sola Symphyseôs fectione, ad dias luminis auras, falva matris vita, præceps & vivus expelletur infans.

Hâc ultimâ politâ pelvis angustia,

Offium pubis. Articulus III. 73 fi modò fiat, fecta Symphysi, 2 pollicum divisio, ad 6, 7ve lineas fupra naturalem fuam longitudinem crescet diameter anterior : fiet igitur à sacro ad utramque pubem, distantia 3 pollicum. Nunc autem, si una è tuberositatibus parietalibus, aut alia quæcumque pars capitis intra semotas pubes excipiatur, tum capitis volumen câ portiene sublatâ minuetur, & ob divisionem simul & anterioris diametri elongationem, quod de capite reliquum est, facilius elabetur; adeoque 2 1 pollicum divisione facta, nullum erit ità latum amplumque caput quod per freti vel superioris vel inferioris ostiolum transgredi nequeat. Hoc enim observatum nuper fuit in muliere dicta Souchor, quæ, quam-

### 74 De Sectione Symphyseos

vis ipfius pelvis ad 2 ½ poll. angustaretur, transversa autem capitis setús diameter 3 ½ pollices attingeret, nihilo-minús secta Symphysi facillimè & selicissime peperit. Sed de hac susitive infrà.

Ex his folum duobus felix puerperii eventus deducendus eft : nempè magnitudine divisionis, quæ capitis partem haud exiguam debet excipere; diametrorum pelvis tùm transversæ, tùm anterioris elongatione, quâ dilatatur undequaque & expanditur utrumque fretum. Undè liquet apertè quòd in angustiori pelvi, ut in ipsâ duorum propè pollicum extensione, partus, paulò majori factâ Symphyseôs diductione, non improsperè succedere possit. Si viginti lineas distent à facro pubis ossa, tunc Offium pubis. Articulus III. 75 aliquid utilitatis præstituram sectionem Symphyseôs asserate non audemus. Ad pollicem unicum contractos reperiri pelves tarissimum, vel potiùs imaginationis figmentum hicce casus dici potest.

Noftræ operationis indicatio non ex folâ freti superioris angustiâ colligenda est; namque fretum etiam inferius nimis coarctatum permulti nacti sunt. Aliunde perversæ posituræ causa, quanquam recte conformetur pelvis, in alter-utro freto detinetur aliquoties caput, nec semper facilis est ejus in exitum naturalem deductio. Debet quippe verticalem sequi descendendo lineam maxima diameter, quæ si, v. g., horizonti parallelam ses obtulerit, ipsam, occipite infrà converso, in meliorem si-

### 76 De Sectione Symphyseos

tum (6), aut manús, aut vectis, aut forcipis ope, referre conabitur peritus obstetricans. Hæc omnia sorsån secundos habebunt exitus, si caput hæreat in inferiori freto, namque tunc effugio propius, minús ægrè dextrâ & instrumentis hinc & indè verti potest; quàm facillimè etiam sepellitur coccyx. Quòd si (at hoc infrequenciús evenit) ambo simul freta contracta sint & collapsa, aut si caput occurrat crassius, tunc quan-

(6) Si iniquè positus in utero moretur setus, tunc eum per pedes attrahi debere autumat D. MAURICEAU. Cum sæpissime alia methodus absque infantis aut matris discrimine usurpari nequeat, generale posuit præceptum, ut tunc per pedes educetetur puellus. Traité des Femmes groffes. Liv. 2. Chap. 21.

Offium pubis. Articulus III. 77 doque sublimius superatur fretum, & in cavitatem inter utrumque mediam elongatum descendit caput. Liberiori nunc spatio receptum, priori redditur moli, recurrentibus, jam sublata pressione, fanguinis rivis, ipfisque partibus elatere proprio & vi tonica fe fe reftituentibus. Tum rurfus mollescere nescium caput, infrà descendere aut furfum nequit affurgere ; hæret immobile; fit inclavatio vera. Mille recenfentur pravarum positionum & incuncationum species, quas omnes filentio premimus. Quòd si autem crebris molitionibus quidquam proceffurum desperatur, num dilaceratis in frusta membris, unco extrahendus est infans, ipsiulque vita morte horribili commutanda? Hic Symphy78 De Sectione Symphyseos seos sectio fola falutis anchora; hæc sola vincit, triumphat.

Cùm geminatis artubus, duplici capite portentofus infans uterum diftendit immanitèr, ne crudelioris Cæfareæ operationis aleam fubeat mater, Monstrum ne mactabis ablurdum, certæque aliundè devotum morti, & cujus onmes deformitatem horrent? Hosce confestim setus è medio tollebant (7) Antiqui; nos verd in re tanti quidem momenti,

(7) « Apud Spattanos erat Lycurgi lege » fancitum, ut speciosus puer & formâ li-» berali, publicè educari : mancus verò & » deformis in loca vasta & prærupta exponi » vel in ultimas terrarum otas ablegari de-» betet. Idem legibus Romuli à primo ortu » urbis constitutum ferunt, ut si mancum » quid editum, aut monstrissicum fuisset. Offium pubis. Articulus III. 79 quidquam afferere admodum veremur. Num, donec ab arte meliora confequamur (& spes illa blanditer mentibus arridet), eumdem in censum referendi setus hydropico capitis tumore, vel pectoris vel abdominis laborantes, necessariò serè, partu absoluto, perituri?

At si fretum utrumvis ad pollices duos, aut viginti cicitèr lineas angustetur; si enormes ex innominatis ossibus sacrove protuberent exostoses; si fetus in tubis, ovariis vel abdominis cavo sumpserit incrementum; si sacro-

» statim à partu in flumen aut mare expo-» natur. »

Vid. ALEXANDRUM AB ALEXAND. genialium dierum, libr. 2. pag. 98. Parif. 1575. 80 De Sectione Symphyseos iliacæ Symphyses offeam contraxerint duritiem ; tùm aliquot & sat felicibus experimentis (8) innixi, sectionem Cæsaream vel ipsi proponemus. Cùm verò sit horrenda matri, sponso, proximis ; cùm (9) hæmor-

(8) ROUSSET. RULEAU. SIMON, Mém. Acad. Chir. t. 1.

(9) Vià vulgò dictà Beaubourg uxon inauratoris cujufdam pictoris nomine Men-GINOT, cui humilior statura, angustataque & inordinatim composita pelvis natura contigerat, die quarta mensis Augusti hora verò quinta vespertina, operatione Cæsarea multata fuit à D. LAUVENJAT, Chirurgo haud tamen artis suz imperito, qui lineam abdominis quam vocant albam secuit. Quatuor in consilium adhibuit Chirurgos, & simul duos, ut nonnulli aiunt, Medicos Doctores ; duos tantum Chirurgos ipsi astitisfe contendunt alii. Nihilo-minus die rhagiæ Offium pubis. Articulus III. 81 rhagiæ, effusiones in abdomen, hernia, incarceratio intestinorum, in-

ab operatione quarto, horâ quintâ vespertinâ mortem obiit. Nullus extracto fetu lochiorum effluxus. Intumescentia ventris, tenfio, dolor, inflammatio plus plusque increverunt. Quidam à brachio, quidam à pede detractum sanguinem volunt. Multoties in balneum demissa fuit. De diæta & præscriptis medicaminibus tacent. Pridie quam è vivis excessit, per eamdem forte viam iter faciebat dexterrimus Chirurgus CABANY qui ab amicis rogatus ut ægram inviferet, gangrænam jam manifestam pronuntiavit. Misellæ cadaver incifum est & exploratum. Quidquid de his actum est, etiam nunc in occulto latet. At omnibus bonis persuasifimum est, hosce Chirurgos quàm maxime humanitatis cultores & amicos, rerum gefe tarum & phænomenôn quæ civium vitas tam graviter amplectuntur, memoriale jam jam

F

82 De Sectione Symphyseos flammatio, gangræna, convultiones; &c. &c. fæpé fæpiùs fubfequantur;

ante omnium oculos exposituros esse, & brevi propalàm rationes enumeraturos, quibus adducti funt ut hanc potitis quàm illam confecerint operationem. Omnes sedulo observationes, vel illæ etiam colligendæ sunt, per quas manifestum est ità remediis quandoque exasperatum fuisse morbum ut ægrotantem lethaliter oppresserit; cum quis enim quodam in casu peccatum fuille cognoverit, id maxime cavebit, ne eumdem admittat errorem ; & nos timemus reformidamusque, ne Cæsarea sectione temerè & imprudenter usurpatâ, neci penè ineluctabili tradantur innocuæ matres, quas nec dubio servaret simplicissima & tutissima fimul sectio Symphyseos, fi locus ipfi præberetur.

Cæsaream insuper operationem in maximo Nosocomio (l'Hôtel-Dieu) parisiensi bis Offium pubis. Articulus III. 83 hanc ideò excellentiffimi viri (10), ob ancipitis eventûs metum, omittendam & omninò è foro medico abigendam fenferunt. Nos modò in votis vehementèr habemus, ut oblivione ferè perpetuâ jaceat hæc operatio. Omnes etenim mulieres quibus hactenùs, avulfum è referatis ferro visceribus infantem vivum ad leve duntaxàt temporis punctum intueri forsan concessum est, nec ægrè nec periculos divinitùs missæ fectionis Symphyseos auxilio parturire potuissent.

infelicitèr tentatam ferunt. Alia etiam nuperrimè confecta est viâ gallicè Trousse-vache, at hoc ipso temporis articulo vivit adhuc puerpera.

(10) PARÉ. MAURICEAU. LA MOTTE. DIONIS. PEU. LEVRET, &c. &c. F ii

### 84 De Sectione Symphyseos

### ARTICULUS IV.

SIGUALTINE operationis conficiendæ methodus. In vivente tandem gravidâ perpetratur. Multiplex & felix in dies increscit experientia.

A NTEQUAM Symphyseôs fectioni manus admoveatur, quænam nimiùm coarctatæ diametro pelvis extensio detur fedulò perpendendum, ut scilicèt inter offa pubis, rictûs & divaricationis quantum satis erit, adipisci studeamus. Sic vaginam subeat index ut sus apice vertebro-iliacam sacri articulationem pertingat, basi verò, pubis angulo supponatur; quæ inter utrumque contactûs punctum digiti

Offium pubis. Articulus IV. 85 portio conttinebitur, ad amussim & absque ullo erroris metu anteriorem emetietur diametrum : hans etiam, ut & alias plus æquo decurtatas esse diametros, haud perperùm fanè dignoscitur, cùm obstetricatoris manus intromitti nequit, Non his folum methodis, deformem effe pelvim præsagitur : fetum enim freto sublimiori retineri cohiberique commonstrant nimia ventris intumescentia & partûs tarditas, legi. timis licèt excrucietur ægra doloribus, naturalem licèt fitum obtinuerit caput, licèt uteri cervix compla\_ netur fatis & attenuetur. Detentum effe in humiliori freto caput confestim callebunt omnes. Cum tandem effluxerunt aquæ, tùm properato opus est, namque citius peri-

Fijj

S6 De Sectione Symphyfeôs mitur infans. Permulti exiftimant quòd femel elapfis aquis, uteri ñifibus adeò prematur delicatulum corpus, ut fic contufum pereat. Nonne vivit infans in amnii aquis, (1) velut in oceano pifces ? Nonne ore receptam, naribus erudat undam? Antè partum nondium fpirat aërem cujus ope vitam novam victurus eft; fi defecerit etiam unda vitalis, moritur. Sua eft igitur agendi opportunitas. Statim etenim atque contractionibus validis exa-

(1) ILLUSTRISS. D. DE BUFFON editos in aquâ tepente catellos, deindè in lactis temperatè calidi laticem transtulit, eosque aliquandiù sanos detinuit & vegetos, &c. Histoire Naturelle. De l'enfance. T. II. in-4°. p. 447. Offium pubis. Articulus IV. 87 gitatur uterus, ipfiulque dilatatur cervix, cùm laceratis membranis eruperunt aquæ, tùnc falutifero inftructa ferro cautè accedat manus, exituro fetui denegatum iter apertura.

Supina lecto reponatur ægra, fpecillo in vesicam immisso, hujus collum ab instrumenti acie removeatur. Scalprum apice obtusum apprehendat Medicus, molliorem exploret tactu cartilaginem; tenfam cutim (mundatam priùs & pilis nudatam) incidat. Vulneris diducantur labia. Tùnc adacto musculos infra pyramidales ferro, ab imo ad summum dividantur, Statimque verticali cartilaginis & subjecti ligamenti præcisione laxetur pubum integritas. Abreptis illico

Fiv

#### 88 De Sectione Symphy feos

utrinquè, quafi per elaterem, ileis offibus, fubitâ ac fortiori pofteriorum ligamentorum jam antagonistis prorsús carentium retractione, fit hiatus ingens; quibus etiam æquum est addidisse, abimpacti capitis nixu, ut divisionem Symphyseôs multúm augeri, ità & non parúm increscere omnes pelvis diametros. Dextra interim duorum ministrorum utrinquè ad marginem ileôn firmiter apponatur, qui pro nutu, diductionem moderari & facro-illiacorum anticorum (2) rupturam

(2) Si forfan per maximam diductionem nimiùm distraherentur ligamenta & cartilagines, si gravia ex his scaturirent symptomata, nonnè resolventium ope & similibus sugarentur? At in parturientibus hoe Offium pubis. Articulus IV. 89 ligamentorum tantóperè à Cæfarianis reformidatam, præcavere poffint. Per unanimes deindè artis & naturæ vires, pauciffimis ad fummum minutis abfolvitur partus. In cubili repofita mollitèr puerpera, pelvim amplexante fafciâ (3) aptè vinciatur. Victus conveniens præcipiatur; nec præmaturè am-

ità rarum, ut ex iis infolitis penè factis nihil statuendum sit. Nullæ enim oriendæ sunt morborum accessiones, præter eas quæ post angores parturientium sæpids ingruunt, & sexcentas alias à rerum non naturalium errore, aut à pravo humorum habitu, non ab operatione pendentes.

(3) Hîc, v.g., fymmetricâ utendum fafciâ, quam folertêr excogitavit D. Housser Clariffimus apud Altiffiodoræos Medicus.

Vid. Précis de Chirurg. prat. 1768. t. 1. pl. 6 fig. 2. 90 De Sectione Symphyseos bulet, ut cità glutinatione internectantur divulse partes.

Omnis ferè doloris expers & periculi nostra sectio. Anterior etenim symphysis secta, distentæ item aliquantulum symphyses iliacæ levem duntaxat doloris sensum & toleratu facillimum procreant. Ligamentum cartilaginem que pubis impunè secari (4) posse fatentur Omnes. Clitoridis crura maximè quidem in actu diductionis elongata, servari quandoquè possum id casurum sit, nulla prorsus habenda est sollicitudo. Intacta remanet vessica, intactusque meatus

(4) Vid. D. CAMPER Epist. jama eitat.

Offium pubis. Articulus IV. 98 urinarius; nec vafa majora, nec nervi læduntur. Quid igitur fectione peractâ pertimescendum? Dolores, rupturas, effusiones, inflammationes, coalitûs impoffibilitatem, delufæ imaginationis phantafmata verè dixerim. At cicatrice inductâ, reddetur ne suum pelvi robur? Pelvis etenim omnem totius machinæ motum, pondus, quaffationes, vibrationes, impetus, jactationes, quasi centrum & nodus firmior, in cartilaginea pubis vindurâ experiri & suftinere nata est. Nùm in quam admiseris puerperam ruptæ Symphyfeôs facinus, ea rutsus stabit, & firmâ vestigia signabit planta? En istum terrorem, & si qui te rursus alii moveant, discutiet, pacemque fi-

# 92 De Sectione Symphyseos mùl cum luce afferet rerum potior magistra, Experientia. Quatèr extumescere ventrem gestiverat mulier nomine (5) SOUCHOT; quatèr

(5) Hæc mulier 3 tantummódo pedes & 8 pollices alta, hujusce offium distorsionis de quâ artº. 3º diximus, præsefert exemplum. Cum fetus priores per vim & peremptos jam extraxisset Laud. M. SIGAULT, in quarto gravidæ subsidium vocavit Clariffos. viros VICQ-D'AZYR & THOURET D. M.P. (ipfe & ego vocatus); nec non aderant dexterrimi Chirurgi D. D. LEVRET, D'Es-TREMAU, THÉVENOT, COUTOULY, DESAULT, MARCHAIS, BAUDOT, &c. Diametrum pelvis anteriorem ad 2 1/2 poll. contractam tactu perspexit D. LEVRET. Cuncti deinde in varias circa operandi methodum rapti sunt sententias. Quidam Cæfaream operationem in medium adduxerunt, suam proposuit M. SIGAULT. Utr2Offium pubis. Articulus IV. 93 acerbis cruciata doloribus, prolem luxerat fub primo vitæ limine mactatam. Nec melior faustæ prægnationis spes infelicem manebat. Omnes uno ore viduam tori solitudinem suno ore viduam tor

que autem repudiatâ, per pedes, post violenter repetitas commolitiones, extinctus infans eruitur. Quinto gravidam cum viâ naturali nequaquam enixuram videret M. SIGAULT, Clarisso. Collegæ Alphonso LERON mentem suam aperuit, quo præsente & juvante intentatam ad hoc usque tempus operationem feliciter aggressus est. Vid. Mém. de M. SIGAULT, lu aux Assenblées de la Faculté de Médecine, le 3 & le 6 Décembre 1777, pag. 9 & suiv.

### 94 De Sectione Symphyseos

fantem, an victimam. Mox, inftante partûs momento, in ancipiti verfatur ægra; protinùs ad miferæ auxilium convolant Clariff. MM. SIGAULT & LE ROY. Sectio Symphyfeôs celebratur. Angustior dilatatur pelvis. Dimovetur obex. Vivax & vegetus infans in lucem emergit. Tandem sibi maternum gratulatur decus fortunata mulier, vagientique protendit ubera. Fama volat. Egenti ministrantur opes. Ægrotanti affidentes MM. SI-GAULT & LE ROY, pio & indefesso labore curationi invigilant, dùm in ipsius falute cæterarum matrum falutem animo prospiciunt. Domo tandèm egressa, facili & firmo inceffu recreatam à morbo fese omnibus conspiciendam præOffium pubis. Articulus IV. 95 bet (6). Decies posteà variis in locis (7) eadem iteratur operatio,

(6) Vid. Res gest. in faluberr. Facult. Pariensi circa Sectionem Symphyseos pubis supra muliere dictá Souchor, cen lebratam, &c. &c.

(7) Recentissime apud Armoricos in urbe vocatâ St. Pol de Léon, Montibus Hannoniæ (Mons en Hainaut), Francofunti apud Germanos (Francfort), Atrebati (Arras), hæc feliciter perfecta fuit fectio; attamen ob ferids tentatam duo mortui prodierunt fetus. Aliam ferunt etiam Constantinopoli (Constantinople), & in locis gallice la Ferté-Vidame & Baunieres celebratam. Cum rem nondum sat exploratam habeamus, de his silebimus. Duas tantum sigillatim exponemus observationes, in quibus hoc mirum est & peculiare, quòd una Symphysim pubis ossen, altera concretiones in pelvi ossen.

### 96 De Sectione Symphyseos & huc-usque res prosperè cedentes, jam inventionis eximix invidis aut

Femina quædam ità rachitide deturpata, ut distortæ pelvis antica diameter vix 2 # pollices attingeret, septem in partu jam puello samiserat. Anno ætatis 35°., octies gravidam sævissimi à quatriduo excruciabant angores. Jam effluxerant aquæ. Tum (die quintâ Febr. 1778) duobus coram medicis, tribus famulis, duabufque obstetricibus, se se ad opus accinxit D. SIEBOLD Episcopi Wurzburgensis Confiliarius Medicus. Jam Synchondrofeôs pubis partem dimidiam præciderat, cum subito attonitus alteram omnino offeam expertus eft. Arripuit protinus serrulam, remque felicem ad exitum perduxit; non enim vesica, non urethra ullam jacturam paffæ funt. Emorrui fetús cuticula decidebat in frusta, ipfiufque amplum erat craffumque caput. Exiguo admodum tempore sedata est inflammatio, affenfum,

Offium pubis. Articulus IV. 97 assensum, aut filentium imperant. Nos in eâdem muliere bis, ter,

nec gravis ullorum ingruit symptomatum series.

Prope urbem Nemetum (SPIRE dans le bas Palatinat) mulier vocata ANNA-MARIA SCHMIDRINN, jam per tres continuos dies misere puerperii doloribus angebatur. Peritifimus Chirurgus obstetricans D. NAGEL callide pelvis diametros explorat, & internum offis facri parietem offeo tumore sic asperum esse animadvertit, ut omnis spes partûs naturalis præcideretur. Tum affentientibus gravida proximisque (die quinta Aprilis 1778) & præsentibus DD. BIERNSTIEL D. M., & ALBERT peritisfimo Chirurgo, Symphysis offium pubis scalpro dividitur. Extemplo ferme, vivus infans in lucem facillime propellitur & paucis post elapsis diebus, tam benè sese habebat puerpera, quàm benè

G

98 De Sectione Symphyseos plusve recentissimæ operationis periculum fieri posse merito conjicimus; nondùm etenim in tot puer-

valere potest quæ partûs difficilis pertulit incommodum.

Die vigefimâ-quarta Augusti 1778, accerfitus est CL. SIGAULT ad prægnantem quæ bis partûs infelicis ærumnas doluerat. Cùm diù incassim in fetu per pedes attrahendo insudavisset, cumque tumorem in osse sacro molestiam ingerere, manu comperiisset, de secanda pube rationem inivit. Protinus à carcere solutus est infans. Quòd autem anteà vertebræ colli commotæ nimium & distractæ fuerint, ad brevem duntaxat temporis tractum vitali potitus est aurâ. At hunc vivum adhuc facris undis ablui curavit pius obstetricans, illique Christianæ regenerationis bono frui dedit. Nunc cum prosperis enixæ rebus cito progreditur vulneris curatio.

Offium pubis. Articulus IV. 99 peris è synchondrotomia planè jam restitutis, sacro-iliacas versus arti-

Nulli invento tot patroni, totque fimul infurrexêre obtrectatores. Omnium quæ ex utrâque parte evulgata funt, opufculorum indicem hîe apponere, quibufdam fortaffis alienum non videbitur.

Adverfariorum primus D. BAUDELOC-QUE Chirurgus Parifienfis, anno 1776 confecit thefim cujus jam (pag. 28. not. 3. ad finem) titulum expofuimus. Propofitionis fuæ fundamenta falfo nituntur. Namque tune ROEDERERI (pag. 69. 70. not. 4.) principiis inhærebat. Hic fcilicet Medicus repudiatâ, folâ in phyficis judice, Experientiâ, motûs vitalis leges à Mechanices placitis tantoperè difcrepantes, theorematibus geometricis ineptè fubjicere conatus eft. At enim thefeôs Autori tune deerant in vivo corpore experimenta. Verùm hodierno die quo lux clarior afflulget, amicus veri palàm

Gij

### 100 De Sectione Symphyseos culationes, ulli, lustrante manu, de= prehensi sunt nodi, ullæ concretio-

principia falsissima hæc improbat & rejicir.

In omnibus fermè diariis perplura de his jactata funt & disceptata. Vid. v. g. Journal de Paris, ann. 1777. nos. 279. 281. 284. 285. 287. 295. 302. 305. 310. 314. 322. 343. 364. &c.

Maxima dendè inceffit eorum turba, qui minùs dialecticè ratiocinantes contra ipfa facta fine ullà intermissione arroganter argumentati funt : ex tentatis supra rigens & exanimum corpus ( p. 52. versus finem), ea quæ, vigente animà certò eventura essent, sestimanter & absurdè præjudicaverunt. Hos inter principem sanè locum obtinet autor libelli famosi : Réstexions sur la settion de la Symphyse du pubis. (Paris. Febr. 1778.) Nihil hîc nobis seriò confutandum opponitur. Contumeliis duntaxàt & conviciis saluberrimum ordinem prosOffium pubis. Articulus IV. 101 nes; eadem ac anteà stat in am-

cindit Aristarchus noster, autoremque sectionis & actorem velut deceptum pingit & decipere cupientem.

Ineunte Maio menfe 1778, Parifiis prodiit in lucem hic alter ejusdem farinæ libellus : Trastatus de anteponendâ sestione Cæsareâ sestioni Symphyseôs ossum pubis. Nihil ibi lucidum reperias, nihil ritè ordinatum, nec ullum aut propositum, aut adimpletum finem : exangue scribendi genus, jejunum exsuccumque, sub latini larvâ pseudo-gallicum idioma redolens, sœdis scatens solaceismis, stomachum legenti movens, oblivioni perpetuæ mandandum.

Circa Maii finem 1778, hic liber exiit : Examen des faits relatifs à l'opération de la Symphyse, pratiquée à Arras par M. RETZ, D. M. & M. LOUIS LESCARDÈ, Maître en Chirurgie, ou Réponse faite par nous Médecins & Chirurgiens de cette Gij

### 102 De Sectione Symphyseos bulando totius machinæ firmitas

Ville au détail de cette opération, publié dans les Affiches de Picardie, &c. n?. 19. pag. 74 & 75. Iniquum profecto & felleum opus, certumque indicium, hosce adversarios in rebus anatomicis æquè ac in arte obstetriciâ rudes esse & peregrinos.

En eorum ordo qui pro novâ encheiresi ferventer decertavêre.

Omnium primus CLARISS. SIGAULT de eâ commentarium anno 1768 (p. 48. 49. &c. &c.), & Thefim anno 1773 (pag.50 not. 17.), scientissimè contexit.

Ann. 1771; CLAR. D. CAMPER, hanc Groningæ publici juris fecit epistolam: De fectione Synchondroseôs pubis, ad VAN GESSCHER, &c. vir ille optimus & omni excultus scientiarum genere, Sigualtinum inventum meritis laudibus extulit, expetivitque à reipublicæ proceribus mulietem capite damnatam, ut rem tanti moment Ossium pubis. Articulus IV. 103 cartilaginea semper & sat lata

in vivâ dilucidiùs experimento comprobaret. Omnes penè ipfum cavillati funt ; quod hisce quidem verbis declarat : Nemo Clar. DE WIND excepto, animum adeò habuit generosum, ut hæc omnia apertè fateri ausus suerit, &c. Vid. Epist. citat. p. 184.

Anno 1772, in celeberrimo Monspeliens Ludoviceo medico hac de re quæstio habita est, & cunctis plaudentibus publice perpensa à D. MORAND DE LA ROUSSIERE (pag. 50. not. 17).

Mense Maio 1778, codem momento quo easdem tractaremus partes, M. ALPHONSI IE Rox typis mandatum est opusculum: Recherches, &c. (p. 51. n. 18.) stylus in re tàm abstrusâ magnificus & sublimior. Vix ullus unquâm tâm aridum æquor tâm variis florum respersit leporibus. Quanquâm quæstionem sat enucleate perscrutatatus sit, hæc tamen in eum increpantur,

Giv

# 104 De Sectione Symphyseôs remanet inter ossa pubis linea quæ

quòd nempè collegæ suo M?. SIGAULT soli inventori & actori soli, cuncta propè detraxerit, quæ in se, laudis & gloriæ ultra modum cupidus, invidiosè refunderet.

Mense Junio 1778, D. RETZ Medicus Atrebatensis asperas adversariorum infectationes scripto sequenti regessit : Observations intéressantes en faveur de la Symphyse du pubis ; ouvrage dont le but eft de répondre à un Mémoire des Médecins & Chirurgiens d'Arras, intitulé : Examen des faits, &c. Hic Medicus parturienti forte occurrit quæ jamdiù propter pelvis angultiam diris afflictabatur tormentis. Ità vehementer tum inflammatione correpta erant genitalia, ut in vaginam introgredi nequaquam digitus posset; jam de omnibus ferme conclamatum erat, cum fibi ad memoriam revocans illud CELSI monitum, satius esse in re desperata anceps experiri

Offium pubis. Articulus IV. 105 tuto iterum & facile secari potest,

auxilium quam nullum, à peritifimo Chirurgo LESCARDÈ pubem dividi jubet. Cujus fectionis ope egreffus homuncio, ad aliquot horas fpiravit, & ad diem quintum ulque fupervixit mater. Quæ fi protinùs non acta fint, nec miferæ præfto fuiffet Extremaunctio, nec baptizatus infans. Nihilo-minùs Medicum tot clara peragentem nefariè infimulant invidi, quos omnes responsione fuâ incomptâ licet & latiùs fusa, tanquàm victricibus armis conterit.

In urbe Gottingâ hæc (1778) prostat differtatio : Synchondroseôs ossium pubis sectio in partu difficili instituendam expendie JUST. CHRIST. LADER Doctor & Professor ordinarius.

Hac altera (1778) à D. LEPPENTIN, Amburgi, sermone Germanico exarata est, cujus sic verti latine titulus potest : De rislu Symphyseos pubis artificiali, in partione ope-

## 106 De Sectione Symphyseos cum haud dubie tempore gravidi-

rosa. Hîc inventionis Autor habetur D. CAMPER, quod, ut norunt omnes, veritati minimè consentaneum est.

D. JACOB. GUALTER. DAGOTY qui primus pictorios, ut ità dicam, typos invenit, & jam fingulis humani corporis par tibus quas ipse anteà inciderat, innatum codem momento induxit habitum & colorem; qui ad cognitionem artis obstetriciæ & scientiam faciliorem genitalia muliebria multiplicesque fetuum posituras & exitus simili expressit artificio; is etiamnum, ne quid arti & collectaneis deficeret aut desiderarerur, varias diverso sub aspectu Sigualtinæ fectionis icones (mense August. 1778) tradidit totamque rei explanationem paucifimis complexus est paginis, quibus hæc inscriptio : Opération de la Symphyse dans les Accouchemens impossibles, avec l'anatomie des parties exposées dans cette opération, & qu'il est effentiel de ménager, &c. Quæ omnia

Offium pubis. Articulus IV. 107 tatis, more folito intumescere debeat; & insuper aliam de novo cartilagineam efformarisubstantiam non nulli arbitrantur.

Parifiis venalia funt apud Autorem, viâ gallicè Saint - Honoré, vis-à-vis l'Oratoire. Etsi numerosæ & faustissimæ pro sectione nostrâ totidem invicta velut argumenta militent operationes, non tamen confidimus nos omnium mentes in nostram sententiam abrepturos esse; nam tantum in homines valet præconcepta opinio, ut cum ratione etiam infanire videantur.



### 108 De Sectione Symphyfeos

# ARTICULUS V. COMPENDIOS A rerum enumeratio. Opusculi clausula.

A M verò, quæ hactenùs de fectione Symphyseôs admittendâ multiplici argumentorum genere stabilire sategimus, eadem liceat in breviorem synopsim contrahere, quò magis magisque propositi nostri pateat utilitas. Ac primò quidem sectioni cæsareæ, quod suum est, reddatur, ut quid nostræ sit peculiare laudis & usus postremò constet, tollaturque omnis inter binas operationes arti probrosa disceptatio, nec verò qui novæ nimis detrahunt, dùm veteri plus æquo

Offium pubis. Articulus V. 109 tribuunt, honestam ambigendi rationem retineant. Revocetur scilicèt in usum, quasi jure postliminii, sectio Cæsarea, quoties erraverit ab utero puerperii farcina, aut in monstrosam molem increverit; quoties facro-iliacæ Symphyfes offeæ evaferint, aut pelvim dehonestaverint exostoses ; cum unum è fretis, aut alterutrum duobus vix pollicibus longius erit. Uno verbo intèr utramque operationem hoc litem dirimat, ut religiose perpensis quæ oboriuntur tùm ex culpâ fetûs, tùm ex parte matris difficultatibus, grande piaculum credas sectioni Cæsareæ committere, quæ tibi fecurè præftitisset sectio symphyseos. Feliciffimum autem ab eâ exitum, merito

#### 110 De Sectione Symphyseos

& æquissimo jure sperari certis in cafibus, prorsùsque in iisdem abnegandam effe fectionem Cæfaream, clamant invicté & æmulå laudum concertatione, celebratum in femina Souchor experimentum, & idem nupèr diversis in regionibus iteratum pari cum successu tentamen. Nova igitur in promptuarium artis accipiatur operatio, quæ cito & tuto perficitur; quam ipfamet natura commonstrat, expostulat, adjuvat; quæ fetum in auras vitales evocat, nullo parturientis discrimine; cujus hoc est commodum, ea laus, ut semel laxatis offeæ compagis carceribus, qui partus per artem inchoatur, idem obsequentis naturæ viribus absolvatur. Quæ tot & tanta com-

Ossium pubis. Articulus V. III moda sectioni Symphyseôs vendicasse contendimus, dùm assignaremus quibus in cafibus celebranda esset, dum capitis & pelvis dimenfiones reciprocas penfitaremus, variosque gradus angustiævocaremus ad calculum. Ipfam operationem aliunde à Natura quasi digito monftrari probavimus, quòd offa ab invicèm longo fatis intervallo spontè diducerentur; felicistima & quibus ad fidem nihil deeft, enarravimus experimenta; nemini non innotuit, quàm feverâ, quàm non præcipiti disquisitione, primo tentamini interfuerit Ordo Saluberrimus; mox quibus honoribus tam egregiè aufos (1) prospero beatos successu,

(1) a Collegæ Clariffimo Mº. SIGAULT

112 De Sectione Symphyseos ipse, plaudentibus omnium ordinum civibus, auxerit, ornaverit,

» operationis illius inventori, defenfori, » actori, eò majora deberi professa est Sa-» luberrima Facultas, quò majus arti me-» dicæ dedit incrementum, quò præstantiora » fecit ingenio, manu & opibus erogatis : » justum in suâ non esse potestate præmium » CIVIUM CONSERVATORI ; in honore » femper apud se suturum eximium illum » Collegam, & omnibus præsentibus ac » posteris commendandum laudandumque » voluit. Quapropter jussit in calculi argen-» tei aversâ facie incidendam esse hanc » inscriptionem:

» Anno1768 Sectionem Symphyseôs offium » pubis invenit, proposuit: Anno 1777, » fecit felicitèr M. SIGAULT, D. M. P.

» Ipfique centum calculos illos esse offe-» rendos.

» Cum verò, prædicante Mº. SIGAULT, cumulaverit. Offium pubis. Articulus V. 113 cumulaverit. Quid fupereft, nifi ut quas fimile premet infortunium, par fublevet obstetricantis induttria, ficque omnes numeros accipiat milliès iterata encheires, fuæ maneant inventori laudes intemeratæ, nosque ipsi & bono publico gratulantes, hanc admittendam esse publis offium sectionem æquè concludamus.

» conftet Collegam alium, M. ALPHON-» SUM LE ROY, fuis experimentis, fuis » laboribus, adhortationibulque, operatio-» nis faciendæ, abfolvendi partûs & vul-» neris fanandi partem haud ingloriam fuiffe, » juffit Ordo Saluberrimus, ad finem inf-» criptionis hæc addenda effe verba:

» Juvit M. Alphonsus LE ROY, D. M.P. » Cui quinquagenta offerentur calculi illi » argentei. Vid. Res Gest. p. 10. 11& seq.»

# 114 De Sectione Symphyseos

Quanquàm ex ipío hujuíce operis nomine, de solà Symphyseôs operatione agendum fore manifeftum fuerit, hoc infuper tamen noftri esse institutiduximus, ut ea etiam proferremus in medium, quæ aliquâ ex parte ad nostram spectarent propositionem; ideòque ne manca evaderet hæc differtatiuncula, de Cæsarea præsertim sectione sermo fuit, ficut & de partu ante terminum promovendo; de auxiliis fimiliter, in partione difficili, five à manu, five à vecte, five tandem à forcipe quærendis, perpauca ftrictim & concinné diximus, tanquam de iis quæ commune quoddam cum incœpto vinculum haberent.

FINIS.

# ERRATA.

	P.	I.	Pro	Lege
	48	r	viam, ingreditur	
	57	б		limbi
	ib.	8		mollia
	58	8	immitteretur	apponeretur
	60	19	post penè	post, penè
	61	4		cum vitium tamen
			taxat	duntaxat
	ib.	12	interdum tamen	interdum quidem
	62	2	&impedimentum	& impedimentum
	ib.	9	tu	ut
	67	6	ab inæquali fe-	ab inæquali tùm facta
	• 7		morum	femorum
	ib.		recedere	ferri
	ib.	14	& posteà	& illo ( facro ) fic
1	_			repulso
	75	17	maxima diame-	maxima capitis dia-
	20		ter	meter
	88		conttinebitur	continebitur
	95		facro-illiacorum la Ferté-Vidame	
		13	& Baunieres	la Ferté au-Vidame (Firmitati-Vicedo-
			or Duunieres	mini) & Baunierres
				en Artois
;	Ъ.	17	duas	tres
			altera	alteræ
			exhibeat	exhibeant
			puello samiserat	
	7	13	præcideretur	eximeretur
			palàm principia	falfifima hæc princi-
			fallifima hæc	pia palàm 🏾
XC	2	21	moment	momenti
IC	4	9	en faveur de la	en faveur de la section
			Symphyse	de la Symphyse
IC			fectio	fectionem
			anteà inciderat	anteà scalproinciderat
ib.		II	faciliorem geni-	faciliorem, genitalia
			talia	
II	I	I	vendicasse	vindicaffe

