Johannis Gaubii epistola problematica, prima [-tertia] / ad ... Fredericum Ruyschium.

Contributors

Ruysch, Frederik, 1638-1731. Gaubius, Johannes, active 1695-1720.

Publication/Creation

Amsterdam : Jansson-Waesberge, 1724.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/r67a6fe9

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

JOHANNIS GAUBII E PISTOLA PROBLEMATICA, PRIMA,

Ad Virum Clarissimum

FREDERICUM RUYSCHIUM,


M. D. Anatomiae ac Botanices Professorem.

DE

Pilis, Pinguedine, Septoque Scroti; Nec non de Papillis Piramidalibus; ut & de Corpore Reticulari, fub Cuticula fito, &c.



AMSTEL ÆDAMI, Apud JANSSONIO WAESBERGIOS. 1724:



Nobilissime ac Præclarissime IR.



Confideranti, animoque fubinde volutanti, quæ in publica nuper à Te, Clarissime Vir, habita Anatomices demonstratione vidi, quaeque ex Te ipfo haufi, & tacitè observavi, summam non tantum praebuisti mihi admirationis anfam, verum etiam, ut ea paulò exactius examinarem, ac in fcientia hac tam no-

bili tamque excellenti nonnullos facerem progressus, calcar mihi addidifti non exiguum. Ita omnium Spectatorum oculos & animos in Te convertifti, ut, fi non cuncti, plurimi faltem, & quidem Doctiflimi (ubique enim & omni tempore multi dantur Thyrfigeri, pauci verò Bacchi) maximo cum applaufu & approbatione demonstrationem hanc demirati fuerint. Et certè, quem non in admirationem rapuisset infolita isthæc Corporis contemplatio, elegantiffimam viventis instar præ se ferentis faciei formam, quae floridisfimo colore perfusa, & quasi ex albo rubroque mixta, verèque rosea, fine fuco & fallacia cuilibet arridere videbatur?

Quod fi quis accuratius mecum incorruptam illius perluftret & perpendat confervationem, haud inficias ire poterit, nihil quicquam fimile in corpore unquam fuisse tentatum atque exhibitum. Quàm scite & affabre totius corporis Venæ conspiciebantur integræ & illæsæ, membraque omnia flexibilia, quanquam folida & dura! prætereà Viscera, quæ aliàs, quod fidem superare videtur, corruptioni obnoxia & facile putrescere folent, Viris Principibus conspicienda præbuisti, integra, incorrupta & conspectu amoena. Ut cætera multa, rara equidem & præclara à Te exhibita, filentii velo tegam, notiora quippe, quam ego, meique fimiles, fatis dignè illa exprimere valeam: Ac ne pluribus ambagibus has meas exiguo ftylo exaratas lineas exornem, Teque, Vir Clariffime, ut par effet, fummis laudibus extollere videar, quod doctioribus & eloquentioribus me Viris relinguo, majorem in partem peto, ut calamo meo faveas, si rudi tantum Minervâ dixerim id, quod res est. Mirari interim noli, Vir Clariffime, quòd illotis, ut ajunt, manibus ad Te accedere, Tuaque, pro tenuitate ingenii mei, quasi A 2 ad ad examen revocare, ac nodorum quorundam difficultatem Tibi objicere fustineam. Quandoquidem fingularis Tua erga me humanitas & benevolentia, quâ ad Diffectionis Tuæ Anatomicæ inspectionem aditum mihi patefecisti, animum mihi addit, largamque aperit januam, ut omni mihi modo persuadeam, Te fiduciam hanc meam non finistrè interpretaturum, verum comi benignoque excepturum esse animo. Facilem proinde Te mihi præbeas, etiam atque etiam rogo.

1°. Oftendisti nobis, Vir Clariffime, Glandulas miliares cutaneas, partim per Cutim dispersas, partim verò sub ea consitas. Manet itaque difficultas, Utrum Piliex illis emergant nec ne?

2º. Demonstrationis quoque copiam dedisti omnibus spectatoribus, Scroti humani, peculiari & plane novo indurati artificio, tamque ritè præparati, ut varia diftincte magis in eo apparerent, quàm in ulla alia corporis parte, vel in ipfo Scroto fubjecti cujufdam recens defuncti. Si absque incommodo fieri potest, à Te, Vir Præstantissime, doceri desiderarem, Utrum dietum hoc Scrotum publice exhibitum, Eunuchi (qui tamen hifce regionibus rari) fuerit, an verd hominis testibus non viduati? quoniam, si benè memini, pinguedine in totum haud erat privatum; & quod tanto magis mirabar, sepimento præter suturam, in duas partes divifum mihi videbatur scrotum. Quotquot pervolvi Auctores, omnes quidem profitentur sub cute Scroti quandam Auprov dictam latere Membranam, nulla plane Membranæ adipofæ facta mentione. Cuncti enim uno animo convenire videntur, omni pinguedine, Testibus integris, Scrotum esse destitutum. Facile igitur excufabis, Vir Clariflime, quod non fine ratione admiratus fuerim, cum observati jam traditi nullam omninò mentionem factam fuisse deprehenderem, fub cute nimirum Scroti latere Membranam Adiposam, sicuti in cæteris exterioribus corporis partibus, Pene folo excepto, verùm fimpliciter folummodo adverti carnofam ad Scrotum contrahendum ac corrugandum aptam Membranam Adorov. Inter eos, quos hac de materia evolvi Auctores, Vir Clariffimus eft Veflingius, cujus hæc funt verba: Sed enim propendentia cum Testibus vasa seminalia studiosa securitatis natura Membranoso veluti sacculo abscondere voluit, quem Scrotum appellant, in medio Linea, tanquam sutura divisum. Non simplex tamen hujus compositio, nam & cute constat, cui cuticula sua jungitur, & Membrana Carnosa, quæ tenuior bic quidem, sed cuti firmiter annexa, quo 60kcolligere se juxta cum illa, corrugarique facilius possit, Ec. pag. 91 Sicut & Vir Clarissimus Andreas Vesalius, qui sequentia de Scroto tradit: Testes itaque, inquit, pluribus tunicis seu involucris integuntur, aliis quidem utrique Testi communibus, aliis autem privatim singulos Testes involventibus. Cutis enim E carnosa membrana ambos Testes non secus quàm universum corpus amplexantur, E duo illis communia statuunt involucra: Cutis quidem unum, quod reliquâ corporis cute tenuius est, E velut sutura quadam rugis interstinguitur: ac quibusdam Scrotum, quibusdam verò (qui se latinius loqui existimant) Scortum, Gracis vero secon dicitur. Alterum autem carnosa efformat membrana, hic perinde ac Cutis, longè quàm in reliquo corpore tenuior, sed venis frequentioribus intertexta: pag. 63.

Item Vir Clarissimus & Anatomicus Accuratissimus Spigelius, cujus hæc sunt verba: In insima sede lineam habet secundum longitudinem excurrentem, qua in dextram sinistramque partem dividitur & sutura vocatur: cap. xv1. hb. 8.

Cùm autem planam & dilucidam satis difficultatis hujus explicationem in dictorum Authorum scriptis invenire non potuerim, ad Recentiores me convertere, eosque pervolvere statui; Inter quos diligens Anatomicus, Dominus P. Blasius, primum tenet locum, qui hac de materia sequentia reliquit; in Miscellaneis Anatomicis hominis brutorumque, &c. ubi loquitur de Numero Scroti, cap.x. Unum est, dicit, in medio Lineâ quâdam distinctum.

Item D^{us}. Phil. Verheyen Professor Lovaniens, quem præ cæteris legendum mihi commendasti. Ejus hæc sunt verba, de Scroto loquentis: Dividitur in partem dextram & sinistram lineå intermediå, quam suturam vocant, quæque, ob vasa ibidem concurrentia, in sectione Scroti vitari debet, &c.

His adjunxi quoque elegantissime pictas Tabulas Professoris Lugd. Batav. G. Bidloo, qui Parte tertià de delineatione Scroti his utitur verbis: Forinsecus Testes extra abdomen propendentes Scroto vestiuntur, laxa æque ac plicabilis membrana, exterius atque interius sutura per ejus longitudinem excurrente, divisa, plurimisque vasis intertexta, &c. Sed in nullo ea ipsa quæ publice nobis demonstrassi, deprehendi, ita ut ad Auctorem ipsum, ex quo hæc emanasse audivi, me conferre necessarium duxerim, ut inde clariorem hujus rei explanationem haurirem, certoque cognos erem, num forsan ils in Auctoribus nonnulla ad claram distinctamque

per_

perceptionem necessaria præterierim, vel clarè fatis non intellexerim.

Proinde horum omnium à Te, Vir Clariffime, dilucidiorem petere aufim explicationem, ut & modum præparandi Scrotum, quo illud in confpectum veniat Septum, ut & pinguedo. Præterea, me dudum Corporis reticularis Malpigii, ut & Papillarum pyramidalium, verum Tactus organum, defideraffe demonstrationem. libens fateor; de iis non raro quidem hinc & inde aliquid legi, fed clarè & perfpicuè illas in fubjecto confpicere, nunquam antehac mihi data fuit potestas.

Fateri quoque cogor, me nunquam distinctius vidisse Spinalem medullam, constitutam scilicet este ex meris innumerisque fibris, tenuissimarum membranularum ope, sibi invicem cohærentibus, quam in publica demonstratione, eò tempore habita.

Hæc funt, Vir Clariflime, quæ planioris explicationis ergo Tibi proponere non erubefco, petitione me fruftrari nolis vehementer rogo. Est interim, cur gestiam, quòd Anatomicis Tuis demonstrationibus hactenus interesse indeque fructum & emolumentum certè non exiguum, capere, mihi data fuerit facultas. Multò magis autem mihi gratularer, si in juventutis Artis Medicæ usum ea delineare, (innumeris licet districtus negotiis) non gravareris; Ut ea, quæ adhuc in obscuro latent, Tuâ operâ & studio, majori facilitate comprehendi & addisci possint. Quod si facere non recusaveris, multùm certè gloriæ & ornamenti Nomini Tuo appones, ac studiosorum omnium animum voluntatemque Tibi devincies maximè.

Quod ad me, Vir Clariffime, fempiternâ memorià benevolentiæ Tuæ erga me beneficium colam, illudque altâ manebit mea mente repoltum, ac nomen Tuum re ipfà atque animo femper gratiffimo profequi, nunquam definam.

Valeas interim, Clarissime Vir, & divino aspirante Numine, rebus humanis, huic denique Literario, diu supersis. Vale iterum, meque Tui studiosissimum inter cos, qui toto Te pectore venerantur, habeto.

Amftelædami ipfis Calend. Septemb. M. D. C. XCV. Nobilitati Tuæ Addictissimus & Observantissimus JOH. GAUBIUS.

. Shebico.

FREDERICI RUYSCHII

RESPONSIO,

Ad Eruditum

D^{num}. JOHANNEM GAUBIUM,

Philomedicum, de Epistola Problematica prima.

Ornatissime Vir!

Entis tuæ candor & generofitas, mihi fatis fuperque perspecta, pro me ipso verba faciunt, meque excusant, quod in hoc primo literarum congressu, absque ambagibus, verborumque ornatu, ad literas tuas ipsis Calendis Septembribus, ad me datas, propter occupationes multifarias, ferius quam volui, respondeam. In illis, Vir Ornatissime, nonnulla video propofita, à me in nuperrima Anatomia, publicè in multorum conspectu exhibita & demonstrata, quorum dilucidiorem defideras explicationem. Doleo interim, quod objecta nimis à te diffita & remota, Oculorum acie vix ac ne vix quidem attingere potueris; in publica enim demonstratione minutiæ tam accurate à nonnullis spectatoribus conspici nequeunt, nec datur tempus unicuique speciatim ob oculos ponendi, quæ publice tractari solent. Proinde diffectionis eorundem subjectorum continuationem meisin ædibus instituere mihi animus fuit, (quoniam publicis in demonstrationibus unicuique fatisfieri omninò nequit,) & quidem in meorum discipulorum usum & fructum, nec non eorum, qui neutiquam aliena & fibi ignota Theonino dente rodere gaudent.

Interim temporis fuccessu, si quid rari in meas inciderit manus, ipsis quoque diffectioni privatæ interesse, dabitur forsan occasio.

Verùm, ut petitioni Tuæ, Vir Ornatissime, satisfaciam, ad propositas Tuas mihi quæstiones me conferam.

In prima itaque propositione rerum novarum desiderio captus, ex me audire anhelas, utrum Pili è glandulis Scroti emergant nec ne?

In prægreffa publica nuper demonstratione, luce meridiana manifenifestius indigitavi Vaginulas Pilorum plurimas productiores esse, quam ipsæ glandulæ, ut ex adjecta Fig. Prima, Lit. A. notata liquet.

Vidimus quoque tunc temporis dictas Pilorum Vaginulas, nullis glandulis inftructas, ut ex Fig. Prima Lit. B. videre eft: quod mihi perfuadet, & firmiffimo indicio eft, radices Pilorum non femper è glandulis cutaneis emergere, vel inde exortum habere; eo magis, quod vidimus aliis in locis Pilos tam profundas agere radices, ut è pinguedine ipfà originem habere videantur.

Quoad fecundum propofitum, Scrotum nuper exploratum hominis erat perfectæ fanitatis, Testiculis haud viduati, in cujus parte superiori pinguedo, ut ex Fig. 1. Lit. C. & Fig. 2. Lit. E. patet, sefe videndum exhibebat, quod in obefis non raro observavi; in parte autem inferiore nequaquam: Pars tamen Scroti interior ita disposita est, ut apta sit pinguedinem recipiendi, & coërcendi; non minus enim sub ejus cute latitat membrana adiposa, quàm in aliis corporis partibus; quamvis hîc maxima ex parte pinguedine deflituta fit, cellulis adipofis fibi ita incumbentibus, ut membrana hæc nil minus, quàm cellulofa, videatur : Quod si autem flatu hæc membrana extensa exficcetur, & post exficcationem in lamellas dissectur, cellulæ dictæ, Fig. 3. Lit. nimirum H. fignatæ, in conspectum producuntur: Idem videre est in eunuchis, quorum Scrota non rarò ab undiquaque parte pinguedine sunt infarta. Dicta hæc membrana adipofa infuper carneas habet intertextas fibras, ut Figura 3. Literæ G. G. indicant, quarum beneficio Scrotum contrahitur, corrugaturque; quæ fibræ proinde anfam Anatomicis præbuêre, ut toti membranæ carnofæ nomen imposuerint.

Quod ad tertium: Oftendimus quoque in fupradicta demonstratione Scrotum illad fepti beneficio in duas dividi partes, de quo nil apud Vefalium, Bartholinum, Verheyen, de Graaf, &c. Viros de re Anatomica alias fatis benè meritos; & quid mirum? Quandoquidem omnia circa Scrotum Hominis recenter denati, adeò funt lubrica atque mobilia, ut difficillimè vera fepti constitutio appareat: Quapropter, fiquis hoc demonstrare fatagit, inflandum est Scrotum, & post exsiccationem aperiendum, quo facto fefe videndum exhibet feptum Scroti, ut ex Fig. 1. Lit. D. notata liquet; estque hoc dictum feptum Vasis languiseris innumeris perfusum. Vid. Fig. 2. Lit. F.

Quod quartam attinet propositionem de Reticulari corporeMalpigii

8

pigii, fub cuticula fito. Nomen illud ab Inventore Clar. Malpichio fortitum est, qui primus jure merito habendus est detector, Vir, dum viveret, in Anatomicis exercitatiffimus. Vix ac ne vix quidem in conspectum venit dictum hoc Corpus Reticulare, nisi post macerationem in spiritu vini: Vixque demonstrari potest vulgari Encheirefi, & communi diffecandi modo, multo minus Papillæpyramidales, particulæ, quas Anatomiæ Professores ficco quasi pede in dissectionibus transire solent, quamvis studiosis Medicinæ scitu & visu adeo necessariæ censendæ sint, propter earum usum. quem præstant, ut neutiquam in administrationibus Anatomicis, præsertim privatis, sint negligendæ. Veram hujus Corporis Reticularis & fubcuticularis delineationem Microfcopio vifam, defignat Fig. 4. ut & Papillas pyramidales Fig. 5. Fig. autem 6. indicat Corpus Reticulare, sub cuticula situm, naturali magnitudine duplo circiter majus. & Fig. 7. Papillas pyramidales duplo pariter majores. Interim; si me, Vir Ornatislime, invisere dignaberis, omni tempore in iifdem nuper exhibitis fubjectis, à biennio confervatis, hæc & fimilia de novo confpiciendi, prolixa tibi dabitur occafio. Hifce curiofitati Tuæ, Vir Ornatisfime, me fatisfecisfe puto. Vale interim, & me studiis tuis optime velle, certo Tibi perfuade,

Datæ Amstelod. die 4 Octob. 1695.

FR. RUYSCHIUS.

M. Dr. Anat. ac Botanices Professors

E X-

9

FREDERICI RUYSCHII

EXPLANATIO FIGURARUM

TABULÆ PRIMÆ.

FIG. I.

Scrotum humanum post inflationem exsiccationemque parte superiore apertum, indigitat.

- A.A. Vaginulæ & radices Pilorum, glandulis cutaneis productiores.
- B. Vaginulæ&radices Pilorum, glandulis cutaneis privatæ.
- C. Pinguedo in parte fuperiore Scroti.
- D. Septum, Scrotum in duas partes dirimens.

FIG. II.

Septum supradictum Vasis sanguineis innumeris ditatum & exsiccatum repræsentat:

E. Pinguedo in cellulis coërcita.
F. Vafa fanguifera per feptum difperfa.

EIG. III.

Faciem interiorem Lamellæ dicti Scroti exficcati denotat.

G. Fibras carneas demonstrat.

H. Cellulas adipofas flatu extenfas.

FIG. IV.

Corpus reticulare Malpichii, sub cuticula locatum, Microscopio detectum.

FIG. V.


Agmen processium papillarium cuti inhærentium, Microscopio detectum.


FIG. VI.

Dictum Corpus reticulare naturali magnitudine duplò majus.

FIG. VII.

Agmen processum papillarium naturalem magnitudinem bis superans.





JOHANNIS GAUBII E PISTOLA

Anatomica, Problematica

SECUNDA,


'Ad virum Clarissimum

FREDERICUM RUYSCHIUM,

M. D. Anatomiae ac Botanices Professorem.

DE

Artificiosa Scroti Humani induratione, ejusque Vasorum sanguiserorum cursu ac copia; ut & de Arteriis per costarum periostium, spatia Costarum intercartilaginea, Pericardium, &c. disseminatis.



NOBILISSIME, CLARISSIME,

Nec non

DOCTISSIME VIR.

Anta Tua erga me est benevolentia & humanitas, ut, unde potius exordiar, Tibique grates quas debeo, referam, idoneis mihi verbis destitutus videar.

Jucundius certè nihil contingere mihi potuit, quàm, quod fepofitis innumeris & gravioribus, imò abfolutè neceffariis Tuis negotiis, tam placidà benignàque fronte priores meas infpicere dignatus fueris literas. Eft revera, cur gratiffimo femper agnofcam animo. Inexpectato quoque tam perfpicuam dilucidamque, Tibi aliquot ante dies exhibitarum Anatomices nonnullarum quæftionum, mihi non folùm dedifti explicationem, verùm etiam figuras addere non recufafti, adeòque quidem accuratas, ut nullus, quifquis fit, nifi parùm profpiciant oculi mei, in illis hærere, vel objectionem aliquam formare poffit.

Quapropter etiam sequentia hæc Tibi proponere non erubesco, nullus dubitans, quin pro Tua in naturam versa consuetudine & benevolentia, benigno quoque vultu illa sexcepturus.

In præcedenti epiftola clarè nobis tradidifti methodum, ut & viam præparandi Scrotum humanum, quo pacto fcilicet confpiciendæ fefe nobis exhibent Scroti Glandulæ, Septum, ut & ejufdem Pilorum Vaginulæ; cui, fi addere quoque dignareris Scroti præparationem, cujus ope vafa fanguiflua in confpectum prodeunt, idque abfque Scroti læfione, aut dilaceratione, nos, Clariflime Vir, perpetuò devinctos haberes. Ejufmodi Scrotum humanum corpori adhuc annexum & in Mumiam converfum nuper in privato Collegio Difcipulis Tuis oftendifti, non fine omnium admiratione. Scrotum illud non inflatum, attamen induratum mihi videbatur; in eo præterea rugas naturales, ut & Lineam longitudina-

lem,

13

lem, quibus præditum alias eft Scrotum hominis, recta nimirum valetudine fruentis, non folummodo obliterasti, ut vaforum curfus distinctius lustraretur, verùm etiam nullas contraxit rugas præternaturales. Quod ad colorem naturalem, non multum ille mutatus, fed ex albo rubroque adhuc mixtus erat, Scroti inftar hominis cujusdam perfectioris fanitatis, & quod admiratione præ cæteris certe dignum est, remotis simul cum linea, ut dixi, longitudinali, artificio rugis naturalibus, omnia vafa fanguifera, ne minimis quidem exceptis, facillime confpici poterant, fitum naturalem occupantia. Copiam porrò nobis dediffi videndi Trunculorum majorum, id eft, ramufculorum vaforum fanguiducorum exortum, & quo ritu illi in Scroti superficie disseminantur, quod nequaquam, meo quidem judicio fieri poteft in Scroto, vulgari methodo diffecto, ac in planum extenfo; ea propter non miror, quòd nullus hactenus Anatomicorum horum vaforum distributionem perfecte descripferit, multo minus in tabulis delineaverit.

Ingenue quoque fateor, Clariffime Vir, demonstrationem de Costarum Periostio, ut & de Membrana Pleura videndi, me diu defiderio flagrasse. Anceps enim hæss, Utrum Membranæ Pleuræ pars exterior; seu Lamella costas respiciens, Periostii esset loco, an vero Costæ peculiari gauderent membrana immediate costas interne amiciente.

Quum Clarissimum Spigelium evolverem, mihi innuere videbatur, Pleuram Membranam costis infervire pro dicto Periostio: Cap. enim tertio Corp: hum: fabr: Lib. 1x. hisce utitur verbis; Non ineptè costalem Tunicam dixeris, (loquitur de Membrana $\pi \lambda \epsilon \tilde{v} \rho a$) si Græcam exprimere velis appellationem. Est enim Membrana cùm universam Thoracis cavitatem, tùm imprimis costas obcingens, si mihi Clarissimum Vesalium, ut & Anatomicum Eximium Bartholinum legere non commendasse, in errorem facilè incidissem; Horum enim prior Cap. 2. Fol. 711. hæc tradit; Cæterum præter banc Membranam Costas Thoracemve succingentem, singulis costis alia particularis obtigit, quam alteram fuccingentem Costas Membranam Græcos vocasse reor, Sc.

Posterior i dem asserit, Cap. 1v. Lib. 2. Interim & Cost & suum habent Periostium : Tertia Pleur & Tunica nonnullis, aliis Circumossalis.

Quibus verbis dicti Auctores mihi contrarium illius quod ex Spigelii Anatomia conceperam, innuere videbantur. Ex ultima Tua demonstratione automaus nobis patuit: Costas præter Membranam Plen.

ANATOMICA PROBLEMATICA. II.

17

Pleuram peculiari gaudere Periostio: Neque hoc solum, verum etiam ostendisti, quo pacto Vasa sanguinea per illud Periostium sint dispersa, E per Pleuram porrò cur sum continuent; quod in nullis Anatomicorum Tabulis hactenus videre licuit.

Magna quoque admiratione conspeximus, Vasorum Intercostalium trunculos non per Membranam Pleuram, neque ejus duplicaturam, verùm sub iis decurrere, eosque immediate à Periostio investiri non minus, ac Costas, quod nunquam ab aliis notatum vidi: quotquot pervolvi Auctores, uno omnes ore asserunt, Vasa sanguinea bac inter dictam duplicaturam dispergi: Nobis autem, plurimos ramusculos, è trunculis Intercostalibus oriundos, ostendisti, presertim per Lamellam Costas respicientem, ut S paucos per Lamellam interiorem Pulmonem spectantem, nequaquam trunculi autem inter duas basce Lamellas locantur.

In cadaveribus Tuis, elapfo ab hinc biennio, confervatis, obfervavi porrò fupradictos Intercostales trunculos per inferiorem interioremque Costarum fulcos decurrentes, longè plures, imò innumeros Musculis intercostalibus soboles largiri, quàm mihi imaginari potuerim, aut ullus Auctorum manifestaverit; horumque reptatum mirabilem haud fine admiratione contemplari potui.

In eodem præterea fubjecto diftincte fatis Vafa fanguifera spatio costarum intercartilaginea perreptantia, & præsertim à Vasis Mammariis internis ortum ducentia, conspicienda erant: ut silentio præteream, quo ritu illa per Ossis sterni periostium & Pericardium quoque disseminentur.

Miror fanè nullum hactenus Auctorem hæc delineasse Vasa; sed quid dico, delineasse? Plures, ubi de eorum ortu agunt, valdè discrepant; & quod plus est, Pericardium quoque describentes, de Vasis ne quidem cogitant.

Inter Antiquos Vefalius: de Hum. Corp. Fabr. Cap. VIII. Fol. 728. Hoc (de Pericardio loquitur) nullas ferè Arterias in se dispersas obtinet, neque etiam Venas, nisi perquam tenuissimas, ab itlis ferè exortas, qua intersepientibus Membranis tanquam in Omentum digeruntur, Ec.

Andreas Spigelius de hum. Corp. Fab. Cap. v. Fol. 348. Pericardium defcribens, nullam planè Vaforum mentionem facit, quæ etiam in Tabulis Professoris Bidloi non video.

Andreas Laurentius de Pericardii Vafis hæc refert Cap. 1X. fol. 347. Venas habet communes à Phrenicis & Peculiarem à ramo SubclaSubclavio, quam Capsularem vocant: omnino de Arteriistacet. Clarissimus de Marchette, Pag. 113. inquit, Arterias Pericardium habere ab Arteriis Mediastinis, & propter exiguitatem vix observabiles.

Doctifiimus Blasius in sua Anat. Cap. 2. Fol. 124. sequentia de Pericardii Vasis tradit: Vasa habet, inquit, omnis generis, Mediastina dicta, Venas à Cava, Arterias ab Aorta.

Infuper Veslingius in Syntag. fuo Anat. Pag. 145. Pericardium vix conspicuas obtinere Arterias, refert; Cui affentiri videtur Bartholinus Pag. mihi 350. ubi dicit, Pericardium Venas habere parvas, infra à Phrenicis & supra ab Axillari, Arterias autem nullas facile apparentes; Verùm quàm alienum hoc sit à veritate, in antedictis Tuis cadaveribus sepenumero vidi. In quibus Pericardia facilè apparentibus & innumeris, miroque insuper reptatu decurrentibus scatent Arteriis.

Exhibuisti nobis præterea in Cadaveribus Tuis, Glandulam Thymum, in qua clarè oftendisti, quòd scilicet Vasis sanguiseris non solum gaudeat parte exteriore, sed & interiore, tantâque insuper copiâ, ut ubique summa rubedine persusa essente hæc Glandula.

Ita ut nemo certè contendere audeat, quin in Cadaveribus arte Tuâ præparatis non diftinctiùs quàm olim, tam Vasa sanguifera, quàm alia innumera conspici possint.

Proinde, Clariffime Vir, nifi iterata mea petitione nimis moleftus Tibi effem, omnibus hoc ftudium colentibus non inutile fore reor, ut aliquantum temporis ab aliis Tuis occupationibus animum abstraheres, & veram perspicuamque dictorum Vasculorum distributionem per figuras, publici juris faceres; Ea certè ratione omnibus facem accendes. Vale Clariffime Vir, & mihi meisque conatibus favere perge.

Nobilitati Tuæ

Dabam Amftelædami 1v. Nonis Septemb. M. D. C. XCV.

Vana have referre an refel

16

Addictissimus & Observantissimus

JOH. GAUBIUS.

FRE-

FREDERICI RUYSCHII

RESPONSIO

Ad Eruditum

D^{num}. JOHANNEM GAUBIUM,

Philomedicum, de Epistola Anatomica, Problematica II.



Esponsionem meam, Vir Ornatissime, tibi haud ingratam fuisse ex ultimis litteris 1v. Non. Sept. ad me datis, percepi, in quibus alia denuò & longè à præcedentibus diversa video proposita; & primò aftectare mihi videris, ut Tibi communicare velim alteram Scroti præparationem, quâ Scrotum lapidis

initar induratur. Id, Or. Vir, perficitur artificiò quôdam tam fingulari, ut in eo ultra triginta & quatuor annos defudaverim. Nil enim adeò difficilè puto, quam partes corporis humani, & præfertim Scrotum, deletis naturalibus rugis, ut & Lineâ fecundum Scroti longitudinem protractâ, ita præparare, & fervatô colore, & amplitudine naturali, fine rugis præternaturalibus, lapidis inftar, eô modô indurare, ut Vaforum reptatus longè diffinctiùs appareat, quàm in corpore vivo, aut jam demùm defuncto; Proinde facilè, ut fpero, connivebit Dominus, quòd voto tuo refpondere, Scrotique præparationem fupra citatam publicè notam facere nondum induci poffim, neque, ut mihi perfuadeo, id à me exiges, cùm mecum perpendas, quàm multi dentur, qui inftar Corniculæ Æfopicæ alienis fuperbire gaudeant plumis: Accuratam autem delineationem arteriarum anterioris partis Scroti Tibi denegare nequeo, quam Tabulæ fecundæ Figura fecunda repræfentat.

Hifce tranfactis, progredior ad fecundam Tuam petitionem, nimirum ad delineationem Vaforum per costarum Periostium, ut & Pleuram disseminatorum; equidem benè mones, à nemine hactenus id fuisse factum, quatenus in cadaveribus nostris, ultra biennium confervatis, necdum induratis, illa fese videnda exhibent: diffi-C cillimum foret omnia vafa fanguifera per integram Membranam Pleuram, ut & perioflia, per totum thoracem per icones illustrare, quam ob causam particulam aliquam sufficere posse, reor, in qua abunde satis omnia vafa, mirè repentia, videre est.

Integram Membranam Pleuram, ut & eam, quæ omnes coftas immediatè obvelat, in duas lamellas feparare, vix ac ne vix quidem poffible eft; ita fcilicet, ut in confpectum producantur omnia Vafa fanguiflua, fine quo curfus per interiorem lamellam, coftas refpicientem; non fatis diftinctè apparent: Quod fi autem cadavera hæc noftra, ultra biennium confervata, indurata, & in Mumiam converfa effent, accuratius id fieri poffet. Proinde,Orn: Vir, fi harum membranarum particula aliqua arteriis inftructa fufficere poteft, ficuti in privato Collegio Anatomico hifce diebus oftendi, Tabulæ fecundæ figura prima eam exhibet.

Venas non addo, quod, quum Arteriarum sint comites, eundem observant in hisce partibus cursum, & sic minus in figura obscuratur reptatus arteriarum.

Quoad trunculos Vaforum intercoftalium, neutiquam illos membranæ Pleuræ, ejufve duplicaturæ, fed coftarum perioftio inhærere, non folùm nuper indigitavi, verùm etiam dictos jam trunculos à mufculorum intercoftalium tendinibus muniri ac inveftiri, demonftravi.

Quo fitu trunculi à vafis mammariis internis oriundi per fpatia coftarum intercartilaginea decurrant, & qualis eorum fit diffributio non folum per mufculos, fpatia Coftarum intercartilaginea occupantes, verum etiam per membranam, Offis flerni utramque fuperficiem, præfertim interiorem inveftientem, diftinctiffime privatim exhibui in fubjecto quodam, in Mumiam converfo. In eo confpiciebantur Arteriæ Mammariæ internæ inordinata ramificatione trunculos largiri marginibus cartilaginum Coftarum, Variis enim in locis dictas arterias Mammarias non folum trunculis fuis irrigare demonstrabam inferiorem Limbum cartilaginum Coftarum, verum etiam fuperiorem, fecus ac in fpatiis interoffeis, ubi rariffime, fi unquam, binis trunculis fingularem Coftam infra fupraque ditari, obfervavi: In aliis autem objectis demonstravi quoque dictos trunculos intercartilagineos per folum marginem fuperiorem, in aliis locis, per inferiorem diffeminari.

Hinc patet post vulnera in parte Thoracis anteriore inflicta, illiusque cavum penetrantia, sanguinem copiosum, non minus posse promanare ex talivulnere, quatenus pertingit ad Limbum superiorem, rem, quàminferiorem, fecus ac in spatiis interosses; quandoquidem vasorum Trunculi, sicuti dixi, per utrumque Limbum cartilagineum inordinato cursu sepè distribuuntur. Authores in conficienda Paracentessi cultellum altera parte obtusum cautè commendant, quò minus in illa operatione vasa intercossalia Limbum inferiorem obsidentia, lædantur, & quia in Anatomicorum scriptis nullæ visuntur figuræ, verum reptatum vasorum sanguineorum per spatia costarum intercartilaginea illustrantes, nec sastè quoque Auctores, quem habeant situm, indigitarint, plures sibi imaginantur, vasa, spatia Costarum intercartilaginea prospicientia, pari passa modo per solum marginem inferiorem decurrere, quod tamen à veritate alienum esse.

Tertiam quod attinet propositionem, Recte in ea mones, Ornatiflime Vir, arterias per pericardium distributas non tantummodò à nemine hactenus delineatas, verùm etiam à variis neglectas, aut rudiori tantùm Minerva descriptas, neutiquam verò depictas fuisse; id quod nequaquam mirari subit, quandoquidem sub vulgari cultro Anatomico rarò aut nunquam apparent. In cadaveribus nostris ultra biennium conservatis tàm distincte cas in Collegio privato indigitavi hisce diebus, ut nihil manifestius in toto corpore demonstrari possit.

Petitioni itaque Tuæ, & in commodum denique Studiofæ juventutis ipfemet eas delineavi. Vide Tab. 2. Fig. 4. in qua arteriæ pericardiacæ adeò numerofæ per Pericardium diffeminantur, ut perpaucæ, fi ullæ, partes membranofæ reperiantur, copiofioribus arteriis inftructæ, & quod monendum; dictæ arteriæ per pericardium diftributæ, multò funt numerofiores, atque in fubtiliores ramufculos divifæ, quam dictâ figurâ exprimere potui; Arteriæ hæ a quinis locis ortum fæpiflimè ducunt, quemadmodum fubfequentibus literis repræfentatur in Fig. 1v. ubi A. A. arterias Pericardio-Diaphragmaticas defignat, à me fic appellatas, quandoquidem illæ non folùm Pericardio, verùm etiam Diaphragmati communes funt: Hæ arteriæ in utroque latere Pericardio annexæ, varios ramulos illi largiuntur, & fic ulterius diftribuuntur per Diaphragma. Quo ad exortum, in eo mihi ipfi haud poflum fatisfacere, cogor itaque hoc differre, donec clarius illud mihi conftiterit.

B.B. Ramos arteriofos, à Diaphragmaticis arteriis oriundos; furfumque delatos, ac per pericardium excurrentes, denotant.

C. Surculum proponit descendentem, & prodientem à sublimiore parte arteriæ mammariæ internæ, qui variis in locis unitur sur-C 2 cu-

FREDERICI RUYSCHII

culis Pericardio-diaphragmaticis, ut & iis, qui ortum ducunt ex arteria diaphragmatica, oriturque illa à superiore parte arteriæ mammariæ internæ.

D. Confpiciendos exhibet abscissos trunculos à Mediastina arteria productos, quorum ramusculi cum prædictis, variis in locis quoque copulantur.

Notandum interim, quod in omni quidem subjecto Pericardium tot Arteriis sit ditatum, verùm in alio plures emergunt ab hoc, in alio plures ab illo arteriæ trunculo.

Notatum infuper hîc volo, me venas non addidifle, quò arteriarum curfus distinctius possit conspici, aliâs enim inter utriusque tam venarum, quàm Arteriarum plexum facile consus delineatio oriretur.

In quarta denique propositione, Ornatissime Vir, à me exigis delineationem vasorum per Glandulam Thymum disseminatorum; temporis autem penuria hac vice Tuæ petitioni hac in re satisfacere, mihi non permittit, ideóque excusatum habeas peto


Tuum


FR. RUYSCHIUM.

Amftelodami IV. Nonis Novemb. M DC XCV.

20

EX-





RESPONSIO. 21 EXPLANATIO FIGURARUM

TABULÆ SECUNDÆ.

FIG. I.

Repræsentat portionemmembranæ pleuræ, arteriis innumeris instructam, & aciculis in planum extensam.

A.A.A. Ramuli arteriofi ex arteriis intercoftalibus oriundi, quorum extremitates miro reptatu per lamellam Pleuræ, coftas respicientem, ut & per perioftium coftarum, exspatiantur.

FIG. II.

Exhibet distributionem arteriarum per Scroti humani partem anteriorem & ut earum cursus distinctius conspectui nostro sesse offerat, ablata sunt omnia illa, qua visum obnubilare possunt, & sic aciculis extensa bæc pars offertur.
A. A. Arteriæ per Scroti partem anteriorem dispersæ, variisque in locis fibi invicem copulatæ; Harum origo est ex arteriis Hypogastricis, Pudendis, & aliis adsitis.

Conspiciendas exhibet portiones arteriarum mammariarum internarum, cum suis ramificationibus, idque è corpore pueri.

- A. A. Portiones arteriarum mammariarum internarum.
- B.B. Membranæ Pleuræ, ut & Perioftii arteriolæ, posteriorem offis sterni partem obsidentes.

- C.C. Dictarum arteriarum rami per fpatia Costarum intercartilaginea dispersi.
- D.D. Arteriarum intercostalium portiones abscissa.
- * Earum inofculationes cum iis quæ per spatia costarum intercartilaginea reptant.
- E.E. Rami arteriofi, fanguinem non solum per Limbum inferiorem, verum ctiam per superiorem derivantes.

FIG. IV.

Completitur partem Pericardii anteriorem, in planum aciculorum ope, expansam.

- A. A. Arteriæ Pericardio-diaphragmaticæ.
- B.B. Rami arteriofi ex arteriis diaphragmaticis orti.
- C. Surculus arteriofus à parte fuperiore arteriæ mammariæ internæ prodiens.
- D.D. Rami arteriofi à Mediastina arteria producti, præter hosce ramos, ditatur quoque arteriis pericardium, partem posteriorem perreptantibus, ex intercostalibus oriundis, quos hic repræsentare haud potuimus, parte scilicet anteriore pericardii hic tantum oblatâ.
- ut & E.E. Rami arteriofi pericardioeriorem diaphragmatici per diaphragma diffeminati.

Ca

JOa

FIG. III.

EPISTOLA

Anatomica, Problematica

TERTIA,

Ad virum Clarifimum

FREDERICUM RUYSCHIUM.

M. Doct. Anatomia, ac Botanices Professorem;

De Arteriis per Cordis substantiam, ejusque Auriculas dispersis, ut & de egressu Arteriæ Aortæ è Cordis Thalamo finistro.

Clarissime, nec non Doctissime

VIR.



22

unquam verum Senecæ illud effatum; multum quidem egerunt, qui ante nos fuerunt, sed multum adhuc restat operis, restabitque multum. Nusquam certè manifestum id magis quàm in studio Anatomico.

de

Quàm latè fefe extendat, nulli rectè notum effe potest, quàm qui ipse in illo versatur, operaque sedula manus applicat operi; cum primis autem Tibi, Clarissime vir, in Anatomicis adeò desudanti, qui diurna nocturnaque manu versare soles Anatomen, nec minutissimam corporis humani particulam intactam relinquis, quo minus accuratè adeo ante oculos omnia ponas, ut plures Anatomici parcè admodum & molli levique brachio de variis corporis humani partibus egisse videantur: Nunquam enim à Te discedo, quin aliquid novi ex demonstratione Tuâ viderim, doctiorque abierim, de quo cæterorum Anatomicorum perplures, vel adhuc inter ses dimicant, vel omninò tacent.

Firmiter mihi hactenus perfuafus fui, Cordis Auriculas pabulum haurire & nutriri à majorum vaforum fanguine, in illas copiofiffimè irruente: Quotquot etiam hac de materia evolvi Authores, eidem fubfcribere videntur fententiæ: Quandoquidem eorum nullus

EPISTOLA AN. PROBL. III.

23

de peculiaribus Arteriis per Auriculas difperfis, fcripferit: Cùm autem in privata nuper à Te habita demonftratione non exiguum modò aliquod vafculum, fed vafa fanguiflua permulta, & frequenti ramulorum ferie, per eas diffufa, arborifque furculos egregiè repræfentantia, nobis demonftrares, haud parùm demiratus fui: ea propter hifce vifis, denuò ad Authorum fcripta me conferre confultum duxi, eà fcilicet fretus ratione, num in iis forfan adhuc aliquid detegere poffem, quo dubitationis meæ nodus diffolveretur; nam in Authoribus evolvendis, vel attentè fatis ad ea non advertiffe, vel ab illorum fenfu & fententia in totum me aberraffe, opinabar; verùm poft affiduam tandem longamque fatis inveftigationem, & oleum & operam me perdidiffe, deprehendi, cùm nullus, quos legi Authorum, quod fciam, hac de re verbulum attigerit.

Eft & alia adhuc difficultas, Clar: Vir, quæ hactenus in fufpenso tenebat animum, nec à cujus partibus stare deberet, satis fciebat, quam mihi demonstratione Tuæ in Cadaveribus ultrà biennium nitidiffime conservatis, egregie discussifiti. Ostendebas enim Arteriæ Magnæ Truncum è finistro Cordis thalamo profilientem, & antequam Arteriæ Magnæ Descendentis nomen adsciscat, varios emittentem ramos, nequaquam autem ita constitutum, uti plurimorum authorum figuræ docent; verùm clarè demonstrabas, quo pacto ille ascendens Truncus, post trium, quatuorve digitorum transversorum ascensum, semicirculum quasi efficiens, descendat, nomenque ascendentis deponens, sese ad inferiora corporis humani membra effundat; Rectè ideò, quòd fi bifurcatio aliqua inter Truncum Aortæ afcendentem & descendentem inveniatur, contrà naturæ leges effe, monebas. Proinde hac in re Antiquos & plurimos quoque Recentiores, figuris suis crafse hallucinatos effe manifeste satis patet. Clarissimorum Virorum, Vesalii, Casserii, Bartholini & Laurentii figuræ hac in materia mihi nullo modo fatisfacere possunt : siquidem omnino à recta delineationis via discessifie, mihi videntur : Nec magis mihi quoque arridet illa delineatio, quam in Tabula vigefima tertia Professoris Bidloi deprehendo, in qua Aortæ Trunci cum ramis subclaviis crucem quasi referunt: Tale quid neque in præparatis Tuis, neque ullis in cadaveribus, me præsente, à te diffectis, me umquam vidisse fateor; in nonnullis autem bestiis tale quid reperiri posse, haud inficias eo.

Lubens infuper fateor, in nullis Authorum figuris tam veram

EPISTOLA ANATOM. PROBLEMAT. III.

perfectamque, Arteriarum per Cordis substantiam distributarum delineationem me antehac unquam vidisse, quâm in Cadaveribus Tuis, tribus circiter abhinc septimanis, ut & in Cordibus humanis à plurimis jam annis Balfamo induratis, quæ, quod certe admiratione dignum, præter colorem naturalem, pulchre indurata, nullas ferè exhibebant rugas, Pulmonisque haud destituta, naturalem tamen confervarant fitum, fecus ac in variorum Authorum Tabulis, quorum figuræ Corda, fecundum longitudinem corporis posita, exhibent; Tua verò planè obliquam sedem, mucrone nimirum in lævam vergente, retinuerunt, unde recte addebas, cordis pulsationem non in pectoris medio, fed circa finistram thoracis partem fentiri.

Non inconcinnum proindè, Cl. Vir. imò utilissimum & omninò necessarium fore existimo, si datà occasione, non modò antedictorum cordis Auricularum vasorum, verùm etiam ipsius Cordis, ut & Arteriæ Magnæ, illiufque divisionis, distinctam per figuras excudi curares delineationem, hac enim methodo, studio Anatomico incumbentes, ad perfectam cognitionem pervenire poterunt; Nec dubitare ausim, Vir Clariss: quin petitionem tam justam à Te flagitanti non sis recusaturus, quandoquidem certus sum, Te eruditionem potius promovere, ac in aliis fovere, quàm in Temetipfo admirari velle. Vale Vir Clariffime, & me, ut foles, ama.

nomentatind estimate ponents feltes difficution information

care nother: figuiden on one are delinering in an intertiel.

era Amreas Fremenciant carnis functionits concernation representes haie quid nequeun preparatis' i me, menuenille en cadeverabar;

prodente, 5 ve differis i me unquan vidiffer satur 1 maine-

as alimer fateor, in public Aurisian figures tara versar

man and an and a state man and a state of the state of th

the short . . There idea quad a blancatio eliqua erer

Dab. Amftelædami, IV. Non. Decemb. JOH. GAUBIUS.

24


FRE-

FREDERICI RUYSCHII R E S P O N S I O.

Ad Eruditum

D^{num}. JOHANNEM GAUBIUM,

Philomedicum, ad Epistolam ejus Anatomicam, Problematicam Tertiam.



Ornatissime Vir.



N ultimis & tertiis ad me datis litteris, video, quòd ultra merita laudibus me exornare coneris, id imposterum parcius, ut fiat, etiam atque etiam rogo: non enim ignoras, uti rectè mones, nihil mihi magis curæ cordique esse, quàm eruditionem promovere, ac in iis, qui digni habentur, fo-

vere potius, quàm in me illam admirari, aut tantis, auribus certe mihi ingratis, evehi velim laudibus.

Interim Cordis Auriculas à me nuper in collegio privato demonftratas, ad incudem hîc à Te revocari, percipio; quæ ne genio fuo vitali & pabulo fraudentur, peculiaribus arteriis opus habent, ut fanguis arteriofus requifita ad nutritionem quantitate ad illas prolaberetur.

Rectè judicas, tale quid à nemine hactenus Anatomicorum fuisse demonstratum; immò mirandum est quòd hasce arterias adeò magnas & fatis apparentes haud viderit Professor Bidlous, qui publice gloriatur, se hujus nostræ inventionis, præparandi & confervandi cadavera, gnarum non folummodo, verùm etiam jam ante me eam possedisse: Mirari certè subit, quòd figuras illarum arteriarum, quæ hoc nostro artificio facilè sefe videndas exhibent, non viderit, neque Tabulis suis inseri jusserit. Jure merito mihi filioque artificii hujus inventionem attribuo, & si illi ante me innotuit, cur publice, ficut ego feci, illud æstate, & quidem diebus canicularibus, non demonstravit? Ad artificium hoc requiritur, non folum, ut omnia totius corporis vasa sanguislua, & præsertim arteriosa, nullis, & nequidem illis, quæ per tunicam Osficula Auditus investientem sparguntur exceptis, sanguine justa quantitate infarcta, exhibeantur; sed etiam ut ita rigida sint, quò corpore humano eximi possint cum suis ramusculis; Non semel vobis exhibui in collegio privato vafa fanguifera per Lienem, Pulmonem, Hepar, & alias partes distributa, adeò rigida, rubroque colore perfusa, ut non solum rami, verum etiam ramorum ramusculi minutissimi, glandulosa substantia exuti & exficcati, conspici potuerint, suntque dicti ramusculi adeò subtiles, ut nunquam tale quid viderim, vel ab aliis audiverim.

Secundo, requiritur in hoc artificio, ut cadavera temporis fuc-D 2 ceffu 28

cessure faturatiorem rubedinem præse festant, Hoc palam estin cadaveribus nostris præteritô annô à me publice demonstratis, quorum alterum absque pigmento, penicillo, sucove nunc factum est multô venustius ac rubicundiore colore perfusum, ac olim.

Tertiò, postulatur in eo artificio, ut ejus ope in cadaveribus ita præparatis, & post biennium conservatis, variæ quoque particulæ, immò minutissimæ conspiciantur, quæ aliâs neque in vivo, neque in corpore jamjam denato, videri possunt.

Quartò, à contractione rugarum præternaturalium immunia effe debent cadavera, arte ea præparata, & confervata.

Quintò, qui gnarus est dicti artificii, noverit etiam Lymphæductus manifestare, idque aliquot post mortem annos, sicuti in collegio privato eos indigitare soleo: & quod magis mirandum, dicti Lymphæ ductus, Lymphâ griseâ turgidi, colorem ultrà biennium conservarunt, nec est cur dubitem quin per seculum eundem colorem retenturi sint, modò cadavera, ut soleo, conferventur.

Sexto, cui notum eft hoc noftrum artificium, illi quoque aperitur fenestra manifestandi arteriarum extrema quòd scilicet ea in omnibus corporis partibus haud sint ejus dem constitutionis, neque ubique in corpus reticulare facessant; & quòd per consequens in sanguinis transitu ex arteriis in venas diversitas quædam exsurgat, prout illa in hac vel illa parte peragitur.

Septimò, ignarus quoque non erit, quid fint Glandulæ conglobatæ, easque neutiquam tales esse nexus, quales dicuntur à Neotericis.

Octavo, noverit quoque, aut faltem facilè perveniet ad notitiam, quòd nonnullarum arteriarum extremitates fricatione in fimplici aqua fint diffolubiles, recenter quamvis è corpore exemptæ, hafce cum contentis fiquis pro parenchymate Antiquorum habere velit, non repugno.

Nono, ope hujus inventi manifestavi quoque discipulis meis, liquorem, ad humectandos oculos destinatum, & in tenuiss Palpebrarum vasculis contentum, ita posse condensari & præcipitari, ut post mortem distinctissime in conspectum producatur.

Ejufmodi Cadaveribus Juvenum, ultra biennium confervatis, fi ejus Mufæum instructum atque ornatum habet, quare hactenus non exposuit demonstranda, ut ego feci præteritis diebus canicularibus?

Artificium hoc nostrum in tenebris hactenus latuisse luce meridianà dianà clarius conftat, illudque confirmant variorum Anatomicorum figuræ, quæ parcè & frugaliter variis in librorum locis exhibitæ, conspiciuntur.

Si Deus T. Opt. Max. vitam, valetudinem, ac otium mihi dignabitur largiri, hujus artificii ope plura, Anatomicis hactenus incognita, me in lucem prolaturum spero. Sed ut ad viam, unde digressus fum, redeam: Arteriis Cordis substantiam pervagantibus Coronariarum nomen imposuerunt Authores, idque merito, quandoquidem trunculis suis ex Aortæ radice, supra valvulas semilunares oriundæ, Cordis basin ambiunt; nemo autem hactenus numerosam earum prolem, divaricationes, ut distincte sefe videndas exhibeant, perfecte delineavit (vide Tab. tertiæfig. 1.) multo minus arterias, per Cordis Auriculas innumeris ramulis superbientes; Hæ autem ab Arteria Coronaria in utroque latere prodeuntes, per Cordis Auriculas quaquaver fum disseminantur, dicunturque à me Cordis Arteriæ Auriculares, quarum ufus eft sanguinisarteriofi debitam quantitatem auriculis largiri ad nutritionem & calefactionem.

Supradictæ Arteriæ Coronariæ per cordis substantiam disseminatæ non folum Cordi, ut & ejus auriculis fanguinem impertiunt arteriofum, verùm etiam Tunicis radicis Trunci Aortæ, id quod ab aliis quoque nondum vidi observatum, neque delineatum, vid. Tab. 3. fig. 1. Lit. D. quam ut accurate repræsentarem, haud solum ipfemet delineavi, verùm etiam auxiliares manus sculptori adhibui, ficuti quoque feci in præcedente Tabula 2. qua Arteriarum ramusculi minutissimi repræsentantur.

Quòad divisionem Aortæ in Truncum ascendentem & descendentem, quemadmodum à Clar. Protessore Bidloo in Tab. vigesima tertia repræsentatur, eô pactô me nunquam in corpore humano Aortæ constitutionem vidisse, neque in præparatis meis extare, rectè notasti; multò minus memini, me unquam observasse in corpore humano Arterias Subclavias pari paffu & æquali ferè capacitate aut diametro emergere, idque è regione, ficuti in dicti Prosefforis Bidloi Tabulis repræsentatur: Præterea illud neutiquam convenire, cum figura ab oculatifimo Louwero in lucem prodita, palam est.

Arteriæ Magnæ, seu Aortæ, truncus è sinistro cordis sinu prodiens, sursum quidem vergit, statim verò arcuatus deorsum reflectitur, nomenque mutans, dicitur Truncus Aortæ descendens; in ea incurvatione, Aorta ramos aliquot largitur partibus fupra Cor litis,

D 3

FREDERICI RUYSCHII RESP.

fitis, & præfertim Subclavios Carotidesque, & quod notandum, in dextro latere ut plurimùm, finon femper, arteria carotis & fubclavia fibi invicem aliquantô fpatiô ad exortum in unum coalitæ funt, fecus ac in latere finistro, ubi feorfùm ex Aorta ut plurimùm prodeunt, quemadmodum Tabulæ tertiæ figura fecunda indigitat.

Ita ut Aorta propriè in duos Truncos à natura haud fit divifa, unus enim idemque est Truncus ascendens & descendens: Siquis tamen hanc Aortam, quatenus ascendit, ascendentem, & quatenus descendit, descendentem nominare velit, non renuam; neutiquam verò eam in duas partes ità separatam atque divisam offendi in homine, ut altera pars ascendat, altera descendat, quemadmodum in figuris variorum authorum repræsentatur; Hisce benè confideratis, constabit partes supra Cor sitas, non magis ditatas esse arteriis oriundis è trunco ascendente quàm descendente, nam inter ascension & descension largitur Aorta, ut dixi, arterias subclavias & carotides, vide tabulæ tertiæ fig. 2.


Hisce petitioni Tuæ mesatis fecisse reor, & sic finem, ob temporis penuriam, imponere cogor; maneo interim Or: Vir toto pectore


Totus Tuus

FREDERICUS RUYSCHIUS.

Dab. Amftelædami, 10. Decemb. 1695.

30





TABULA hæc tertia tres exhibet Figuras, quarum prima radicem Aortæ cum suis ramificationibus per Cordis humani substantiam ejusque Auriculas, nec non per Tunicas Aortæ diffeminatis, continet.

- Secunda autem demonstrat Cor Pueri cum annexis vasorum Truncis; eftque hæc figura facta ad objectum à biennio denatum & tam nitide præparatum atque induratum, ut omnia ferè vala arteriola cum suis ramificationibus, quæ fupra Cordis dorlum exipatiantur, conipici poffint.
- Tertia demum Aortæ Truncum, cum absciffis ramis, idque è corpore hominis adulti, indigitat.

FIGURÆ PRIMÆ EXPLANATIO.

- radicis Aortæ diffeminati. A. Radix Trunci Aortæ, è cujus E. E. E. Arteriæ numerofissima utroque latere emergunt
- B.B. Arteriæ Coronariæ.
- C.C. Arteriæ per Cordis Auriculas excurrentes.
- D. Ramulculi arteriofi ex Arteria Coronaria oriundi, & per tunicas
- prole per Cordis substantiam diiperiæ.
- F.F. Trunci Arteriarum coronariarum absciffi, ac pro Cordis poftica parte destinati.

FIGURÆ SECUNDÆ INDIGITATIO.

- A. Cor Pueri, decem circiter an- profpicientes. norum.
- B.B. Arteriæ per cordis substantiam diffeminatæ.
- C. Auricula cordis dextra.
- D. Truncus Aortæ, è finistro Cordis finu emergens, & affurgens.
- E. Truncus Aortæ descendens.
- F. Arteria Subclavia dextra, Carotidi dextræ aliquantô spatiô unita.
- G. Arteria subclavia finistra, Arteriæ Cervicali copulata, estque hæc præcedente diametro minor.
- H.H. Utraque Arteria Carotis.
- I. Arteria Cervicalis finistra.
- K. Arteriolæ ex Arteria Coronaria oriundæ tunicis radicis Aortæ

L. Truncus venæ Cavæ afcendens.

- M. Truncus venæ Cavæ descendens.
- N. Arteriæ per Cordis auriculam dextram distributæ, atque ex Arteria Coronaria oriundæ.
- O. Radix arteriæ Pulmonalis, è dextro Cordis Thalamo prodiens.
- P. P. Arteriolæ ab arteriis mammariis internis ortæ, & per tunicas Aortæ diftributæ.
- Notandum interim omnes dictas arterias productiores effe, quam hic repræsentantur; sunt enim ableifiæ, ità ut tantum corum exortus hic indigitetur.

FIGURÆ

FIGURÆ TERTIÆ EXPLICATIO.

A. Truncus Aortæ hominis adulti.
 B. Arteriæ Subclaviæ dextræ ramus, è quo arteria carotis dextræ ramergit Lit. C. notata.
 D. Arteria Carotis lateris finiftri.
 E. Arteria fubclavia finiftra.
 F. Rami arteriofi ex arteria coronaria orti.



athan 's contra as silonostan-st.

- service of service of a shart with

Participation of the product of the participation