

**Brevissima manuductio ad praxin medicam / opus postumum editum a filio,
D. Benj. Bened. Petermanno.**

Contributors

Petermann, Andreas, 1649-1703.

Petermann, Benjamin Benedict, 1680-1724.

Publication/Creation

Lipsiae : Heirs of F. Lanckisch, 1707.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qnnrcq3n>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



R R

Be 23
13

62974/B

H

a. 2


The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

- 1) PETERMANN, A.
- 2) PETERMANN, B.B.



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library





D. ANDREAS PETERMAN
Anat. & Chirurg.
Prof. Publ.

J. C. Oberdorffer sculps.

D. ANDREÆ PETERMANNI,
Anatom. & Chirurg. Prof. Publ. &
Practici Lipsiensis,

**BREVISSIMA
MANUDUCTIO**

AD
PRAXIN MEDICAM,
Opus posthumum

editum

à

Filio,

D. BENJ. BENED. PETERMANNO,
Practico Lipsiensi.



Sumpt. Hæred. FRIDERICI LANCKISII,
ANNO 1707.

SOCIETY OF LONDON MEDICAL



PRÆFATIO

AD
LECTOREM.

E schedis pater-
nis ea, quæ arti
Medicæ addi-
ti in usum suum con-
vertere possunt, prelo
committere in animum
induxi. Proinde pericu-
um jam facio in eden-

da ad praxin Medicam
manuductione. Ratio
hujus instituti expoſtu-
laret, ut in præſentia-
rum de uſu atque fine
hujus operis verba quæ-
dam proferrem. Diffi-
teri fane haud queo, li-
bellum huncce, quam-
diu in manibus audito-
rum beati parentis mei
fuit, tantum ſibi æſtimii
acquiſiſſiſſe, ut alii et-
iam magni nominis
Docto-

Doctorem discipuli ad
praxin medicam se ap-
plicantes copiam hujus
manuscripti , solutâ
certæ pecuniæ summâ,
ab iis emerint. Omnes
etenim lubenter conce-
debant , methodum ,
quam autor fecutus
est , adeò esse facilem , ut
ad praxin medicam in-
choandam nulla com-
pendiosior detur via.
Ast apologiam nunc
X 3 con-

conscribere superflu-
um erit ; liberrimum
potius expectabo Le-
ctoris judicium. Inte-
rim doleo, errores irre-
pſiſſe quam plurimos ex
incuria typographi.
Quantumvis enim cu-
ras ſecundas adhibue-
rim in corrigendo hoc
opere: nihilominus ta-
men omnes minutias
accurate annotare mi-
hi non licuit; ſiquidem
mate-

materiae, quæ tractantur, mihi fuerunt perquam notæ, & insuper unô correctô vitio, nescio, quo fato, plura alia addebat typographus. Circa stylum unicum adhuc moneo, scilicet, illum non esse adæquatum ad mentem scholasticorum, vel oratorum. Nam abhorruit autor â sublimi stylo & fesquipedali-


dalibus verbis in dictan-
dis doctrinarum sua-
rum principiis, longe
potius curæ cordique
ipfi erat, rem ipsam
verbis perspicuis deli-
neare. Et profecto,
si altiori mentis truti-
na id perpendimus,
monstri instar est, ty-
ronem in Medicina de
verborum & phraseos
ambiguitate magis de-
bere esse sollicitum,
quam

quam de vero & genui-
no sensu materiae addi-
scendæ. Quod si igi-
tur Lectori benevolo
non ingratum erit præ-
sens opusculum, suc-
cessu temporis publici
juris facturus sum jam
memorati parentis mei
Physiologiam, Chirur-
giam, Collegium for-
mulare, Praxin Medi-
cam, Enchireses in par-
tu difficili, casus Medi-
co-

co-legales, Epistolas medicinales, Orationes, Programmata & Medicum Pestilentialem: His subjungam quoque ex manuscryptis in castris pie de mortui Fratris mei Observationes Medicas, Pharmacopœiam Castrensem & Electa Recepta Chymica,

Dabam Lipsiæ die 2. Jan.
Anno 1707.

D. BENJAM. BENED. PETERMANN.



INDEX CAPITUM.

DE

- Alvi obstructione XIV,
Contracturis XVI,
Convulsionibus X.
Febribus continuis IX.
Febribus continuis intermittenti-
bus VIII.
Febribus in genere VII.
Fluoribus humorum ex habitu
corporis XII.
Herniis, prolapsu intestini recti,
uteri &c. XVII.
Lympha acidæ V.
Lympha acris & fluidiori. II.
Lympha nimium viscida. III,
Lympha Θ sa. IV.

Mor-

Morbis Archealibus. XVIII.

Morbis humoralibus. I.

Nonnull. infant. morb. & Dosi
medicamentorum in iis.
XIX.

Paralyfi. XV.

Sanguine stagnante circa vias, per
quas iusto tempore excerni
debet. XIII.


Stagnatione humorum in habitu
corporis. XI.

Vitiis sanguinis. VII.



Errata extantiora.

Pag.	II.	lin.	8.	pro Borwig	lege Warwich.
-	-	-	-	Conachino	Cornachino.
32.	ult.	⊖lat	- -	⊕lat.	
33.	antep.	femen	- -	femin.	
38.	15	spiciæ	. -	spicæ.	
-	-	16.	petila	- -	petia-
-	-	17.	Decocta	-	decoctum.
43.	25.	spacelata	-	sphacelata.	
44.	6.	artim		partim	
45.	23.	☿☾		☿☾.	
48.	1.	☿☾		☿☾.	
	16.	Lympha		Lymphæ.	
53.	19.	pinquia		pinguia.	
59.	18.	3ij.		3j.	
63.	8.	3j.		3j.	
72.	ult.	bus		deleatur.	
77.	3.	haſtuæ		haufæ.	
89.	17.	pilula		pilulæ.	
93.	3.	hemorrhagiæ		hemorrhagiæ.	
96.	7.	Iiaque		itaque.	
99.	12.	cremento		incremento.	
109.	14.	C.		D.	
110.	15.	terrore		terrere.	
119.	14.	bubonibus		bufonibus	
146.	10.	evaporet		evaporetur.	
-	-	addat		addatur.	
172.	4.	aliquod		aliquot.	
155.	3.	laudato		laudata.	
ult.		R. ʒij Roſ.		R. ʒij. ꝑſat.	





CAPUT I.

DE MORBIS HUMO- RALIBUS.

Thes. 1.

Humores in toto corpo-
re nostro primordiales sunt
lymphæ & sanguis, ex qui-
bus reliqui propagantur
omnes. Peccant autem hi
aut qualitate, aut quantitate, aut motu tam
intestino, quam locali.

Thes. 2.

Lymphæ naturaliter debet esse in tantum
viscida & temperata ex ♁ do. & ♂ chi, ut in-
de resultet temperies quædam \ominus so=dulcis.
Præterea vehitur ad singulas partes per ar-
terias cum sanguine. In partibus sequestra-
tur à sanguine ministerio glandularum. Re-
vehitur vero partim per vasa dicta venosa,
partim per lymphatica. Dum autem hæc
peraguntur, blandam etiam exercet lymphæ
in se invicem fermentationem.

Thes. 3.

Sic autem sequestrata per glandulas in
A cer-

certis locis etiam effluit in certas cavitates, v.g. Oris, Narium, Laryngis, asperæ Arteriæ, Intestinum cavum, interstitia fibrosa omnium musculorum, Juncturas ossium, oculos, cerebrum, in mammas, vasa spermatica; Hinc quotiescunque hæc lymphâ vitiatur, toties etiam morbus infligitur hisce partibus.

Thes. 4.

Declinat verò lymphâ hæc à qvalitate sua naturali, dum 1.) induit intemperiem aliquam acrem & fluidiorem 2.) viscidam, 3.) \ominus fam 4.) acidam.

CAPUT II. DE LYMPHA ACRI ET FLUIDIORI.

Thes. 1.

Lymphâ p. n. acris & fluidior causatur in cavitate oris Ptyalismum, in cavitate narium catarrhum tenuem vel Coryzam in larynge & aspera arteria tusim tenuem & humidam, in ventriculo nauseam aliqualem ut & appetitum prostratum, Græcis anorexiam, uno verbo, veterum intemperiem ventriculi frigidam, in arteriis, venis, & vasis lymphaticis, quoad motum intestinum, ebullitiones vagas, in musculis leves convulsiones

siones, unde oriuntur horrores subitanei. Quare ægrotantes conqveruntur de subitaneis mutationibus. (*Es sen ihnen bald heiß/ bald kalt.*) Præterea lassitudinem in juncturis, ratione perioftiorum dolores vagos, interim tamen non adeo intensos. In vasis spermaticis acrimoniam seminis, non raro etiam Gonorrhoeam benignam. In viis □ riis excretionem □ æ molestam. In oculis demum lippitudinem. In capite cephalalgiam mitiorem; Nisi forsitan cerebrum jamjam sit vitiatum per alios prægressos morbos.

Thes. 2.

Signa diagnostica sunt desumenda ex collectione horum morborum, aut omnium aut plurium duntaxat. Nam utut vitium aliquod in humoribus sit interdum; Attamen non omnes mox partes patiuntur, in quas humores influunt, sed aliæ præ aliis, dum nimirum ipsæ partes sunt subtiliores, aut antea jamjam sunt læsæ.

Thes. 3.

Signa prognostica sunt lymphæ talis acris frequentior ut plurimum demum degenerat in intemperiem fere corrosivam, unde oritur scorbutus, item Arthritis. Recentior curatu est facilis; frequentior vero difficilis.

Thes. 4.

Curatio instituaturs secundum has indicationes: Lympha acris temperetur, temperata evacuetur, tenuior inspissetur, convulsiones subortæ sedentur, fibræ laxatæ roborantur, dolores excitati sedentur.

Thes. 5.

Prima indicatio obtinetur per omnis generis medicamenta chia. Hinc v. g. ex Regno animali hic profunt omnia ppta dura v. g. c. c. S Δ e, ebur S. Δ e., Ocul. \mathfrak{S} , Dens equi mar., castor., apri, mandibul. luc. pisc., cran. humanum ppt., ossa microcosmi ppt., mater perlar., ipsæ perlæ ppt., item Θ ia Δ lia animalium, quæ tamen optime ppantur c. \mathfrak{V} , ut inde emergant quasi Ω \square si dulc. Val-dopere vero hic prodest. liq. c. c. succinat., item Ω c. c. Simpl., Ω \square æ vel Θ * ci etc. Composita v. g. ex Regno animali hic sunt \overline{R} a. corall. c., Ω Cord. c., Ω bezoardicus Busii, Esf. castor., p. march. antep. Ex mineralibus hic prodest \mathfrak{S} . diaph. (quod ob poros majores \dagger um absorbet) pptum c. \mathfrak{S} e, Bezoard. mineral. Sylv., fl. \mathfrak{A} ris, ZZ. etiam laudem meretur. Nam ut ut & hoc verum sit, quod ZZ. non destruat \dagger um quoddam; Attamen acrimonia corporis humani, quæ non est tam acida, quam acris omnino, etiam affici

afficit hoc corpus, ☿ ius dulcis hic etiam prodest. Convenit vero hisce affectibus, quatenus non duntaxat acrimoniam temperat, verum præterea etiam evacuationem juvat. Ex ♂e profunt varia pptā, limatura ♂is pptā, crocus ♂is aperitivus, crocus ♂is c. ☉ bus ♀ r. ♂us. Ex marinis profunt corallia, conchæ, hinc specifica antifebrilia Strobelberg., Crollii item succinata. Ex vegetabilibus primario hic profunt ☉ ia incinerata, quæ in tantum possunt saturari, ne nimium impetuosè afficiant genus nostrum nervosum. Hinc v. g. ♀ us ☉ latus, ☉ card. bened., absynthii, Cent. min.

Thes. 6.

Secunda indicatio obtinetur per medicamenta leniter purgantia, quæ sunt petenda præter ☿ um dulcem, primario ex vegetabilibus hic profunt Rhabarbar., fol. Senn., Rad. Iallap., Mechoacan., agar., alœ præprimis vero insuccata, vel succo violarum, vel rosarum, vel fumar., vel succo uvarum spinæ cervinæ, scammonium pptum hic valde etiam prodest, sive sit pptum c. fumo ♀ r, fitque scammonium ♀ ratum, sive scammonium c. succo Cydon. tostum, quod dicitur diagrydium, sive c. succo Cydon. fermentatum.

Thes. 7.

Tertia indicatio obtinetur primario per medicamenta ex Gummi Arabico, Tragacantho & papaverinis, parata, Lignum sanctum, Sassafr., Glycyrrhiz, & Caric. Hinc pulvis compositus anonymus, vel Hali contra Phthisin, item species Diatragacanth. Mynsicht.

Thes. 8.

Quarta indicatio obtinetur partim per superius commendata ZZbarina, partim & quidem primario per opiata, semel autem pro semper hic commendo opium fermentatum.

Thes. 9.

Quinta indicatio obtinetur per medicamenta ex Regno vegetabili lignea. Hinc nota sunt lignum sanctum, Sassafr. &c. præprimis cortex Chin. Chin. Item ex herbis Serpillum, Lavendul., Rosmar., Salvia, betonic., radix Chin., Sarsaparill. Ex marinis profunt medicamenta parata e succino. Ex mineralibus ☉ lica temperata gaudentia leni virtute styptica, v.g. R̄a ☿ ris ☉ li., R̄a ☿ ris Myns. Ex his lignis marinis vegetabilibus possunt parari varia composita v.g. decoct., Essent., R̄æ &c.

Sexta & ultima indicatio obtinetur per
medicamenta opiata, omnibus vero reliquis
præferimus rursus opium fermentatum.
Hinc inter opiata relata etiam volumus
Theriacalia, Theriacam nimirum, mithri-
datum, Diaiscordium Fracast., Phil. Ro-
man. &c.

Formulæ fiant tales:

R. ▽. Serpill.

Betonic. āā ʒj.

Ror. marin. c. ʒl.

(tenell. c. c. theriac. c. ʒ. ʒβ.)

Oc. ʒ. ppt. ʒβ.

ʒ. diaph.

Θ. fumar, āā. gr. XV.

succ. alb. ppt. ʒβ.

Syrup. de beton. l.

(Veronic. de cichor. c. Rhab.) ʒβ.

M. D. S. **Fluß = Träncklein gerüttelt
stündlich 3. Löffel voll zu geben.**

R. ▽. Salv.

Serpill. āā. ʒj.

tenell. c. c. ʒβ.

p. march. antep.

Specific. ceph. D. M. āā. ʒj.

ʒ. diaph. ʒβ.

perlar. or. ppt. gr. V.

Syrup. de Veronic. (l. Stoech. Arab.)

℥β.

M. D. S. ut supra.

R. ▽ Salv.

Serpill. āā. ʒvj.

tenell. c. c. ℥β.

Liq. c. c. succ. gt. L.

Esf. cast. gt. XXX.

p. march. antep. ʒβ.

Syrup. de beton. ℥β.

M. D. S. ut supra.

R. Ras. lign. Sanct.

Sassafr., c. c. āā. ℥β

Rad. Chin.

farfaparill. ʒj.

f. l. a. Decoct. in ▽ font.

R. Decoct. Colat. ℥β.

▽. tenel. c. c. ʒvj

Dent. equi mar.

matr. perl. ppt.

ʒ ii Diaph. āā ʒj.

Syrup. de stoechad. Arab. ʒj.

M. D. S. Fluß-Trancß gerüttelt stündlich ein Wein-Gläßlein voll zu trincken.

vel R. Decoct. Colat. ℥β.

▽. tenell. c. c. ʒvj.

℥ Θ* c. ʒij.

Syrup.

Syrup. de cichor. ℥j.

(NB. addatur Glycyrrhiz. ras. ℥β.

Caric. pingv. No. X.

quo pacto omittatur Syrupus, ne potio
nimis dulcescat.)

M. D. S. ut supra.

R. ocul. ☼. ppt. 3β.

☼ij diaph.

☼r. ⊕ lat. āā. 3β.

flor. ☼r. gr. V.

M. D. S. temperirend Pulver in ein
Nösel Bier zu thun und wohl gerüt-
telt darvon getruncken.

R. Croc. ☼ is. c. 0bus

matr. perl. ppt.

☼ij diaph. āā 3j.

M. D. S. ut supra.

R. Ebor. S. △ e. 3j.

☼ji diaph. gr. XV.

Arc. 2pt. M. 3β.

p. anod. confort. gr. IV.

M. D. S. Abend - Pulver auff 1.
mahl.

R. Esf. Serpill.

☼ ☼*c. āā 3β.

M. D. S. Fluß - Eßenz alle 2. Stunden
25. Tropffen zu nehmen.

R. ☼ ☼*c. gt. XL.

Esf. Cast. gt. XXV.

Anod. gt. XX.

A 5

M. D. S.

M. D. S. Abend - Tropffen auff 1.
mahl.

NB. Esf. anod. debet esse perspecta ratione consistentiæ. Siquidem interdum sufficiant guttæ XII. XV.

R. ▽. Scabios. ʒj.
tenell. c. c. ʒij.
ocul. ʒ. ppt. ʒj.

p. Ialap. gr. XII.

Scammon. ʒr.

ʒr. ⊕ lat. āā gr. VI.

Syrup. decichor. c. Rhab. ʒiij.

M. D. S. temperirendes und laxirendes
des Träncklein gerüttelt innerhalb
1. Stunde Löffel - weise zu nehmen.

R. Res. jalap. gr. VIII.

dil. in f. q. vit. ovor.

add. ▽. Serpill. ʒiij l. ʒβ.

Cinam. ʒβ.

Juleb. Ro5. ʒj.

M. D. S. Purgier - Milch auff 1.
mahl.

R. Resin. jalap. gr. VIII.

Amygdal. dulc. excoriat. no. ij.

arc. 2pt. M. gr. V.

M. D. S. Purgier - Pülverlein auff
ein mahl in warmer Suppen zu
nehmen.

R. Rad

R. Rad. jalap. gr. XII.
 Scammon. ℥r.
 ⚥ ij. Diaph. āā. gr. VI.
 Arc. 2pt. M. gr. VII.
 M. D. S. ut supra.

Qui pulvis convenit maxima ex parte cum decantatissimo pulvere comitis Borvvig alias dicto pulvere Conachino. Similem pulverem commendat Mœllnbrock. in Tract. de varis. Reticet vero stimulum θnum, qui tamen revera est Θ. ☿ri essentificatum: itaque formula esto hæc:

R. p. Jalap. ℥β.
 Scammon. ℥r.
 ⚥ Diaph.
 Θ. ☿ri. essentif. āā. gr. V.
 M. D. S. vel fiat Calomelanium Torqueti laudatum à Riverio.

R. p. Jalap. ℥β.
 ☉ fulm.
 Gum. Gutt. āā gr. IV.
 M. D. S. ut supra.

R. ☿ dulc. ℥β.
 Scammon. ℥r. gr. VIII.
 M. D. S. ut supra.

Qui vero dentibus metuunt à ☿ io dulci, transforment hunc pulverem in bolum hoc modo:

R. Con-

R. Conserv. ros. rubr. ʒjβ.

℥ dulc. ʒβ.

Scammon. ʒr. gr. VIII.

c. f. q. Syrup. de Cich. f. l. a. bolus.

D. S. Laxir-Zucker auff 1. mahl.

R. Aloës viol. gr. VII.

℥ dulc. gr. VIII.

Diagryd. gr. III.

f. l. a. c. Sirup. de Cichor. pil. no. 19.

D. S. Fluß-Pillen auff 1. mahl.

R. MP. è Succ. Crat. ʒβ.

Res. jalap. gr. V.

Diagryd. gr. II.

f. l. a. pil. c. Ess. Serpil. gt. i. no. XVII.

D. S. ut supra. Assumtis talibus pilulis,
semper deinde interjecto bihorio absor-
beatur ovum forbile.

R. Passul. min. ʒj.

Rad. Cichor. ʒβ.

Ras. c. c. ʒij.

Fol. Senn. Al. S. S. ʒiβ.

f. l. a. Decoct. in ∇a font.

R. Decoct. colat. ʒiv.

∇ Cinnam. ʒvj.

ocul. ʒ ppt. ʒβ.

℥ Diaph. ʒj.

Syrup. de Cich. c. Rhab. ʒβ.

M. D. S. Linde abführender Fluß
Tranck gerüttelt stündlich ein Wein-
Gläßlein zu trincken.

R. p. Dia Senn. Mont. ʒij.

D. S. Laxir-Pulver auff 1. mahl in
Pflaumen-Muse zu nehmen.

R. Elix. cath. purg. ʒij.

(Si menstruum sit fortius ʒj.,)

Syrup. domest. ʒß.

M. D. S. Safflein nach und nach zu
geben.

R. p. Anonym. l. Hal. contra Phthis.

Cort. chin. Chin. āā ʒß.

M. D. S. stärckend Pulver den Tag ü-
ber 4. mahl zu nehmen.

R. p. anonym. ʒß.

anod. Conf. gr. V.

M. D. S. Fluß-Pulver auff 1. mahl
gegen Schlaffens-Zeit zu nehmen.

R. Succin. alb. ppt.

p. Chin. Chin.

Spec. Diatragacanth. āā ʒß.

M. D. S. ut supra.

R. Ras. lig. Sanct,

Sassafr. c. c. āā ʒß.

Rad. Sarsapar.

Chin. āā ʒvj.

fl. bellid. p. ij.

f. l. a. Decoct. in ∇a fontan.

R. De-

R. Decoct. col. ʒv.

Sacch. pen. ʒβ.

Spec. Diatragacanth. frigid. ʒij.

M. D. S. Fluß-Trand gerüttelt stündlich
lich warin gemacht ein Wein-Glaß
lein darvon zu nehmen.

. Eff. lign. ʒj.

fuccin. ʒβ.

anod. ʒj.

M. D. S. Fluß-Öheng täglich 3. mahl zu
nehmen 50. Tropfen auff 1. mahl.

R. Eff. lign., theriac. āā. ʒβ.

anod. ʒj.

M. D. S. ut supra.

Tbes. 12.

Superius facta est mentio tussis humi-
dæ, quia vero hæc ipsa per motus invo-
luntarios cum vehementiâ quadâm peragi-
tur, fit, ut totum corpus debilitetur, exquisitis-
simusque dolor circa pectus excitetur. Itaque
hic dolor mitigetur etiam per externa ano-
dyn. pingvia; sunt illa vero ° sa, v. gr. ° fl.
chamomill., verbasco., lil. alb., præ reliquis °
petræ. alb. His ° is ob graveolentiam
admiscenda sunt alia relata in pauca dosi,
v. gr. lavendul., ror. mar., anisi, Serpill., Spi-
cæ. Præterea huic scopo inserviunt pin-
gvedines, quibus omnibus præripit palmam
axun-

axungia humana. Deinceps faciunt huc
etiam feva, hircinum, cervinum, item pin-
gvedo lucii piscis, caponum. Formulæ
sunt hæ.

R. \circ infol. fl. chamom. 3ij.

℞. Ror mar. gt. VIII.

petr. alb. 3β.

Axungia human. 3ij.

**M. D. S. Euserlich lindernd Del stünd-
lich warm gemacht auf die Brust
zu streichen.**

Vel faciunt etiam ad hanc indicationem
indipiscendam semina pingvia emolli-
entia cum vegetabilibus ad formam pultis
cocta.

R. Cremor. aven. m. ij.

fl. Chamom. m. j.

Sem lin. 3j.

f.l. a. Decoct. in lacte bubul.

**M. D. S. Euserlicher Umschlag auff
die Brust in einem doppelten Tu-
che zu legen.**

Thes. 13.

Formulæ ad ultimam indicationem sun-
to hæ:

R. \overline{R} Succin.

Essent. ther.

anod. āā. gt. XL.

M. D. S.

M. D. S. lindernde Tropffen alle Stunden 25. zu nehmen in frischem Bier.

R. Ω Θ dulc.
Eff. anod. āā. gr. XL.

M. D. S. Linderung 20. Tropffen im Bier zu nehmen.

R. p. anonym. \mathfrak{z} j.
anod. conf. gr. VI.

M. D. S. Abend-Pulver auff 1. mahl.

R. Spec. ceph. D. M. gr. XV.
p. anod. conf. gr. VI.

M. D. S. ut supra.

R. ∇ Scabios. \mathfrak{z} vj.
cinnam. bugl. \mathfrak{z} ijj.
Spec. ceph. D. M. \mathfrak{z} j.
p. anod. conf. gr. VI.
Syrup. Scabios. \mathfrak{z} ij.

M. D. S. Abend-Träncklein auff 1. mahl.

R. Extract. lign. Sassafr. gr. III.
Laud. opiat. gr. I.

c. f. q. flor. Δ r. f. l. a. pil. no. 7.

D. S. Ruhe-Pillen auff 1. mahl.

CAPUT III.

DE LYMPHA NIMIUM VISCIDA.

Thes. 1.

Quemadmodum lymphain corpore nimium fit fluida, ita etiam p. n. non nunquam fit nimium viscida. Hocque sub duplici respectu. Aut enim lymphasaltem coagulatur absque notabili aliquo +do coagulante; aut à manifesto +do coagulante, quæ lymphaviscida nobis dicitur lymphaaustera.

Thes. 2.

In præsenticonsiderabimus Lympham p. n. coagulatam, quæque deinceps stagnando producit varios morbos absque ulla notabili in corpore effervescentia.

Thes. 3.

Ex tali vero lymphaviscida in ore & naribus patimur catarrhos viscidos, in quibus perit noster gustus & olfactus, quatenus nimium lymphahæc nimium viscida impedimento est, ut ne objectahorum sensuum attingere valeant extremitates nervulorum sensoriorum.

Thes. 4

In faucibus, glandulis, amygdalis, item
B maxil-

maxillaribus causatur tumores œdematosos, qui multa quidem incommoda nobis pariunt ob læsam deglutitionem, interim tamen per se raro ad suppurationem tendunt.

Thes. 5.

Hæc lymphæ viscida in ventriculo tollit omnem appetitum: Imo alimenta assumpta etiam digerit vitiosè, ut inde exoriantur lenteria. In intestinis itidem multa parit incommoda, quatenus obstruit vasorum lacteorum orificia, intestinaque copiosiori muco replet; unde oritur Passio Cœliaca.

Thes. 6.

Ex intestinis delata per glandulas mesenterii inibi causatur stagnationem, quam sequitur non raro hydrops ascites, quatenus nimirum, glandulis obstructis, chylus novus aut rumpit vasa lactea, aut per porulos etiam horum vasorum tenuium transfundat in abdominis cavitatem.

Thes. 7.

Sursum delata in thoracem & consequenter in pulmones inibi causatur, speciem quandam Dyspnœæ, Asthmatis, Orthopnœæ, imo catarrhi etiam suffocativi, quæ species morborum dicuntur humidæ, ad differentiam illius, quæ progignitur ex convulsione organorum respirationi inservientium, quæque

que dicitur sicca, ab Helmont. Epilepsia pulmonum, vid. Tract. Asthm. & Tuss. In ipso corde interdum concrefcit, ventriculosque opplet, ut inde itidem subitanea suboriatur suffocatio, præprimis vero in puerulis.

Thes. 8.

Interdum in cordis ventriculis coagulatur in formam novi progeniti corporis quodque audit recentioribus medicis Polypus cordis, vid. Marcell. Malpig. de structura viscerum.

Thes. 9.

In cerebro hæc lymphæ viscida pro diversitate gradus causatur quandam Anesthsiam, quatenus nimirum principia nervorum non rite madefiunt ad objecta externa ministerio sensuum excepta percipienda. Unde oritur Lethargus, Coma vigil & somnolentum, pro diversitate nimirum gradus. Quo enim visciditas hæc est major; eo etiam magis adaugetur morbus. Coma enim somnolentum & Lethargus sunt majores morbi Comate vigili.

Thes. 10.

Quando vero extremum gradum est adæpta hæc lymphæ, oritur quædam species ipsius apoplexiæ.

Thes. 11.

In habitu corporis lymphæ hæc viscida
causatur aut hydropem universalem, qui
dicitur habitus leucophlegmaticus; aut
particularem, qui dicitur tumor œdema-
tosus.

Thes. 12.

Oritur hæc lymphæ visciditas aut eatenus;
quatenus in corpore partes viscidiores cum
fluidis non bene permiscuntur, quemadmo-
dum hoc in febribus ut plurimum observa-
tur. Quippe in quibus ægrotantes ut pluri-
mum sitientes nimium conqueruntur de
lymphæ tenaci & viscida, conglutinante qua-
si linguam cum palato, item buccas cum
gingivis. Qualis autem hæc est lymphæ,
talem etiam observare licet in reliqua M. S.
per V. S. emissæ. Unde non raro lymphæ
talæ sanguini dimisso innatans mentitur ve-
rum mucum vel gelatinam quandam. Dum
igitur ægrotantes avidè hauriunt fluida po-
tulenta, illæ particulæ viscidæ non uniun-
tur, verum præterea innatant liquori flui-
do instar partium caseosarum in lacte coa-
gulato. Idem evenit quatenus nimirum
febres per sola medicamenta Vstria curan-
tur, dum nimirum partes illæ Vstres +um
quoddam peregrinum ex lymphæ recipiunt
in sese. Quo facto, necessario deinceps se-
qui-

quitur F atio in lymphâ, per quam partes crassiores separantur â fluidioribus. Hinc partes illæ separatæ, penetrantibus habitum corporis, tanquam filtra, reliquis fluidioribus, inibi remanent. Demum coagulatur etiam hæc lymphâ â solo Δ e externo, quatenus nimirum hic variis modis corpus nostrum ambit, & per inspirationem pulmones nostros occupat, imo quadantenus etiam in ventriculum penetrat.

Thes. 13.

Signa diagnostica quoad lympham viscidam in naribus cognoscimus inde, quod nares sentiantur obstructæ, dolorque quasi quidam gravativus nos affligat. Interim tamen respiratio adest libera, quo sensu distinguitur ab aliis obstructionibus narium, in quibus meatus narium oppleti sunt. In ore deprehenditur visciditas quædam conglutinans quasi linguam cum palato, vel etiam quædam siccitas. In glandulis, amygdalis & maxillaribus deprehenditur ex difficili deglutatione dolor gravativus circa fauces. Imo glandulæ maxillares affectæ ab extrinsecis sunt tumidæ & prominutæ. In ventriculo cognoscitur ex appetitu prostrato, doloreque tensivo absque ructibus vel F dis vel etiam nidorosis. In intestinis cognoscitur ex fecibus alvinis viscidis albicantibus. In

glandulis mesenterii cognoscitur ex intumescencia abdominis. In habitu Leucophlegmatico cognoscitur ex colore cutis interdum livido, interdum albicante, item inde quod cutis digitis compressa ad tempus retineat foveas. In pulmonibus percipitur ex difficili respiratione, angustiis præcordiorum, rejectione pertussim materiæ viscidæ. Morbi verò specificati, nimirum Dyspnœa, Asthma humidum, & orthopnœa, differunt saltem gradu. In cerebro cognoscitur ex deficientibus sensibus, dum nimirum subito perit visus, auditus, olfactus, totumque corpus occupat lassitudo. Factæ vero jam jam apoplexiæ viscidæ signa sunt certarum partium subitaneus motus & sensus læsus absq; notabili faciei rubedine & incalescentia.

Thes. 14.

Signa prognostica sunt lymphæ viscidæ in naribus & in palato haut equidem frequenter aliquid monstrat in corporibus aliàs sanis, siquidem sensim rursus dissolvitur. In scorbuticis & ætis faciliè causatur erosione. In glandulis, amygdalis & maxillaribus item. In ventriculo faciliè degenerat in lympham acidiorē, unde oritur demum febris intermittens: In intestinis causatur icterum & passionem coeliacam, in glandulis mesenterii faciliè potest causari hydro-

per

pem incurabilem. In pectore etiam diutius retenta facilè causatur suffocationem, imprimis verò in pusionibus. In capite ut plurimum causatur mortem subitanèam.

Thes. 15.

Curatio instituatur secundam has indicationes: Lympha viscida attenuetur; attenuata evacuetur & hæc in toto corpore. In pectore verò reddatur lubrica. Vasa verò & partes continentes stimulentur, atque demum roborentur.

Thes. 16.

Prima indicatio obtinetur per medicamenta Θna: hinc profunt ex regno vegetabili omnia, quæ constant ex Θe quodam acri, v. gr. omnia dicta antiscorbutica, cochlearia, nasturtium, numularia, raphanus maritimus, & rusticanus, item Cichorium, fumaria omnibus verò reliquis palmam præripit rutum & Scilla, item ex Resinis Gummi arabicum, Benzoes. Ex his vegetabilibus varia profunt medicamenta præparata v. gr. ∇æ data simplices, ∇æ numulariæ, fumarici, cichorici, item compositæ antiscorbuticæ, v. gr. antiscorbutica Dornicrellii. Porro Ω9, v. gr. Ω9 Cochleariæ s. sine fermentatione s. cum fermentatione paratus, Ω9 antiscorbuticus D. Michaelis. Succus etiam recentiorum vegetabilium recenter expressi cum

tantillo vini, & sacchari in tantum edulcorati, laudem etiam merentur. Prostant etiam in officinis essentia, v. gr. cochlear, fumar, quæ etiam planè non sunt rejiciendæ, item Ra corallorum antiscorbutica. Palmarium autem medicamentum etiam est Rad. ari s. præparata s. ejus fœcula. Præparetur verò saltem per blandam macerationem in tantillo vini Rhenani, deinde in loco temperato lentè exsiccetur & pulverifetur. Fœcula verò omninò suam meretur laudem contra-zwelfer., siquidem nihil aliud est, quam pars radicis, quæ in proprio succo maximè est fluida. Saltem notetur in præparatione hæc cautela, ne evaporetur, sed colligatur in cella per subsidentiam. Gummi *um autem optimè præparatur quatenus dissolvitur in +to apprimè vero scillitico & sensim sensimque inspissatur, ut inde formari possint pilulæ. Nam gummi *um alias valdè est acre & fauces erodit, hinc non possum penetrare, quomodo Brunneri potio, qui recipit ʒij. Gummi *i & dissolvit in vino, deinceps verò edulcoratur cum syrupo quodam, poterit assumi. Autor itaque sum unicuique, ut abstineat ab hac ipsa fauces erodente portione. Deinceps Gummi *um, quatenus ingreditur ʒum asthmatic, etiam suam meretur laudem D. M. qui cum Vparatus, cautissimè etiam est adhibendus, quia est penetrantissimus.

mus. Ex Benzoë laudo Magisterium, item flores. Ulterius ad lympham viscidam dissolvendam conferunt etiam Θ ia \forall a in tantum saturata v. gr. arcanum 2pl. M. \mp 9. \oplus latus, Θ fumar, cichor. Hinc prodest ulterius ex compositis p. pectoral. D. Mich. it. Essent. antiicterica,

Thes. 17.

Ex regno minerali hic profunt \mathcal{J} ia cum \mathcal{J} libus bene mista, v. gr. \mathcal{J} diaphoreticum cum \mathcal{J} e, Bezoardicum \mathcal{J} e bene præparatum, item alia \mathcal{J} ia cum Θ bus præparata v. gr. Crocus \mathcal{J} is cum Θ bus, Essent. \mathcal{J} is liquida & cum succo pomorum, R. \mathcal{J} is aperitiva Zwelfer. Medicamenta \triangle ea hic etiam laudem merentur v. gr. lac \triangle ris, flor. \triangle ris. Succinata demum omnia hic etiam sunt efficacia, v. gr. Ra succini, succinum præparatum. Θ ' \triangle lat. succini,

Thes. 18.

Ex regno animali profunt hic Θ ia \triangle ia dulcià v. gr. \triangle 9 Θ *i dulcis, liquor C. C. succinatus, Ra \mp r. acr. Ubi probè notandum est mirificè commendari à multis \triangle us hos \circ is maritatos, ut proinde tanquam arcanum aliquod asthmaticum æstiment \triangle um Θ *i anisatum. Enim verò hæc ipsa \circ ia ut ut videantur intimè unita

hisce Ω bus, attamen accedente novo
 ætate rursus sese separant, ut proinde usus
 eorum diuturnior etiam noxam inferat.
 Quapropter tutius est parare hos Ω us ex
 ex seminibus materiæ Ω andæ commistis.
 Hoc enim pacto vis aromatica seminum in-
 timius jungitur partibus Θ inis.

Thes 19.

Secunda indicatio obtinetur primariò per
 medicamenta Scillitica. Vix enim dici pot-
 est, quantum auxilii afferat succus recenter
 expressus Scillæ taliter affectibus. Quia ve-
 rò Scilla est maximè mucilaginosà, hincque
 difficilis expressionis, admisceatur parum
 ∇ æ Ω atæ cujusdam, fiatque expressio. Quia
 porrò sapor est ingratiſſimus, commiscen-
 dum est aliquid sacchari, ut sapor nauseosus
 & amarissimus in tantum corrigatur. De-
 incept prodest ejus syrupus, mitior, item-
 que Oxymell scilliticum cum aliis v. gr.
 Gummi \ast o commistum. Scillam ex-
 cipit gumm. \ast um, quod non duntaxat re-
 solvit verùm etiam in tantum evacuat,
 adhibitis nempe stimulantibus. Hinc v. gr.
 profunt pilulæ ex \ast o Quercetani. Esula
 hic etiam non est contemnenda, modo pri-
 us bene præparata & macerata sit in vino.
 Hinc v. gr. Extr. Esulæ prodest. Gummi
 guttæ

guttæ etiam hic meretur laudem, dum nimirum insigniter resolvit. Cauti tamen simus, ne excedamus in dosi, malo tamen præscribere gumm. gutt. magisterium, item Elixir citri purgans, quod etiam ingreditur semen Carthami, Jalapp, Scammon, Mechoacann, laudes etiam suas merentur.

Thes. 20.

Hæc ipsa indicatio quatenus lymphæ viscida in ventriculo hæret, obtinetur etiam per vomitoria, quæ desumantur primario ex g° io & quidem per f° rum vel x° um extracto. Hunc namque in ∇ dissolvere ejusque syrupum addere possumus, ut inde emergat syrupus Angli Salæ, item Essent. Emetica Zvvelf. ∇ a benedicta Rulandi.

Thes. 21.

Quemadmodum verò in ventriculo hæc materia viscida specificè est evacuanda; ita etiam specificam vult evacuationem expectore. Expectoratio autem commode absolvitur per medicamenta pingua producentia in corpore humano lympham fluidiorem eamque pinguem, quo facto, lymphæ illa pingvis potest naturaliter extravasata cavernulas pectorales quoad parietes internos reddit lubricas, ut lymphæ tenax crassa sese separet à parietibus, hinc ad motum thoracis

cis per tussim exscreetur. Ex vegetabilibus verò talia pingua sunt desumenda (I.) Ex feminibus v. gr. papav. alb. cucurbitæ, ex nucibus pineis, amygdalis unde constat p. Hal. contra φθίσιν (semel a. pro semper notetur hæc semina esse assumenda recentia & non rancida, alias causantur vomitum, tædiumque parant ad præsentiam omnis medicaminis.)

Thes. 22.

Deinceps pinguedinem hanc & lubricitatem lymphæ producunt. etiam omnia saccharata, hinc ex saccharo & aliis emollientibus v. gr. Glycyrrhiza, Cichor. ipsis etiam amygdalis parantur medicamenta condita. Glycyrrhiza verò dicitur Glycyrrhiza cocta nec non avenacea, quæ tamen potius referuntur ad fontem diæteticum quàm Pharmaceuticum. Ex regno animali profunt hic omnes pinguedines v. gr. axungia humana, canina, quæ ideò maximè commendantur phtisi. Item medicamenta parata ex partibus animalium v. gr. Looch. de pulmone vulpis.

Thes. 23.

Ex mineralibus profunt hic ☿rata v. gr. lac ☿ris, flor ☿ris. Ex his parati Balsami per ☉ expressa v. gr. Balsam ☿ris amygdal.

Thes.

Thes. 24

Tertia indicatio obtinetur per medicamenta aliàs dicta diuretica i. e. talia quæ gaudent ☉ quodam acri. Hinc v. gr. ex vegetabilibus profunt, ononis, scolopendrium, centaurium minus, vincetoxicum, hepatica, matrisylva, acacia, carduus Benedictus, veronica, cherefolium. Deinceps ex regno minerali huc faciunt omnia ☉lica bene præparata, sic v. gr. ☿ aperitivus Penoti rite præparatus Ra ♂is c. ☉ ☿o parata (ut ut hæc maximè conveniat cum croc. ♂s c. ☉9.) Liqueur nephriticus D. Michaëlis, Ra nephritica Ammelung, aperitiva Knœffeli, Magisterium ♂is aperitivum Myns. plur. vid. apud Möllenbrok Tractat. de varis cap. X.

Thes. 25.

Ex animalibus profunt omnes ☿ ☉i dulc.

Thes. 26.

Ultima indicatio obtinetur per omnis generis capite superiori laudata ligna v. gr. Cortic. chin. chin. lign. sanctum, quercinum &c Formulæ ad Imam indicationem fiant tales.

R. ☿ ☉. dulc. 3j.
Cochlear. 3ß.

M. D.

M. D. S. Resolvirend Wässerlein alle
2. Stunden 30. Tropffen zu neh-
men / früh in warmer Suppe/
postea im Bier.

R. Liqu. C. C. 3j.

℞ Cochlear. 3ß.

M. D. S. ut supra.

R. Essent. Fumar. compos. 3ij.

Gummi *ic. V parat. gt. xxx.

M. D. S. Resolvirend Wässerlein alle
2. Stunden 15. Tropffen zu neh-
men.

R. ∇. Cichor. 3ij.

antiscorbut. Dorncrellii. 3vj.

C. C. S. Δe. 3ß.

Croc. ♂ is c. Obus 3j.

Syrup. Scelotyrb. Forest.

de Cichor. cum Rhabarb. aa 3ij.

M. D. S. Resolvirender Trancß gerü-
telt stündlich 2. Löffel.

R. Gummi *i in †to scill. solut. 3ß.

Magist. Benz. gr. v.

g. diaph. c. ♂e 3j.

F. l. a. pilulæ no. L. D. S. Sonderliche
Fluß-Pillen tägl. 10. zu nehmen.

R. C. C. f. Δe. 3ß.

g. diaph. cum ♂e 3j.

arcan. 2pl. M. 3ß.

M. D.

M. D. S. Temperirend und resolvirend
Pulver ins Bier zu thun.

Formula' ad secundam indicationem.

R. Succ. scillitic. cum ∇. scab. rec.
expr. 3vj.

Syrup. scillitic. 3β.

M. optimè D. S. Erweichendes Safft-
lein Löffel weise zugeben.

Tamdiu continuatur assumptio donec
equatur vomitus, qvi deinceps ut plurimum
st largissimus.

R. Syrup. de Scilla

Cichor. c. Rhab aa. 3β.

∇. Cichor. 3vj.

p Jalapp. gr. viij.

Scamm. 4r gr. ij.

7r. ⊕l. gr. viij.

M. D. S. Purgier Träncklein gerüttelt
innerhalb einer Stunde zu neh-
men.

R. Elixir. citri. purg. 3ij.

Syrup. fl. papav.

Cichor. cum Rhab. aa 3ij.

M. D. S Purgier Safftlein auff 1. mahl
zu nehmen.

R. Mag. gumm. gutt. gr. v.

dil. in f. q. vitell. ovorum

∇. Cichor. 3ij.

Syrup.

Syrup. Scillitic. 3j.

M. D. S. ut suprà.

R. M. P. ex *o. Quercetan. 3ß.

Resin. Jalapp. gr. v.

diagryd. gr. j.

F. l. a. pilul. no. 19. D. S. Erweichende
und abführende Pillen auff 1.
mahl.

R. Gumm. *i. in ✕to scill. sol. & insp.

Scamm. 4r. gr. vj.

3ß.

7r. ①lat gr. iij.

F. l. a. pilulæ ut suprà.

R. Herb. Scolopendr.

Cherefol. aa. M. j.

Flor. Hepatic.

Cichor. aa. p. iij.

Rad. Cichor.

Ononid.

Jalapg. pp 3ß.

Eful. pp. 3ij.

Fol. Senn. Al. S. S. 3x.

Crem. 7r. 3ß.

Incisa & contusa in sue sacco lineo.

D. S. Abführender Püschel in 3. Möse

Wein zu hängen / und alle Tag

2. Gläser zu trincken.

Formulæ vomitoria.

R. 7r. emet. M.

①lat. aa. gr. iv.

M. D. S.

M. D. S. Erbrech = Pulver auf 1. mahl.

R. crem. ꝑr. ʒβ.

ꝑr. emet. M. gr. iv.

ꝑr ʒij. Vis gr. iij.

M. D. S. Erbrech = Pulver auf 1. mahl.

R. ꝑr. emet. gr. iv. dilue in

▽. flor. borrag. ʒβ.

Juleb. Rosar. ʒj.

M. D. S. Erbrech = Wasserlein auf 1. mahl.

R. ꝑr. emet. M. gr. iv.

in f. q. ▽. Cichor dissolv.

Syrup. de Cichor, c. Rhab. ʒij.

M. D. S. Erbrech = Safftlein auf 1. mahl.

R. p. Jalapp. ʒβ.

ꝑr. ⊕l. gr. vi.

emet. gr. iij.

M. D. S. Brech = Pulver auf. 1. mahl.

Formulæ ad expectorat.

R. ▽. Scabios. ʒiβ.

asthmat. R.

Syrup. de Scilla.

Glycyrrhiz. aa. ʒβ.

Looch. de pulm. vulpis. ʒβ.

M. D. S. Erweichendes Brust = Wasserlein
stündlich 2. Löffel voll.

R. Semen Cucurbit. excor.

amygdal. dulc. excor.

Nuc. pinearum recent. excor. aa. ʒij.
papav. alb. ʒiβ.

F. l. a. Emulsio c. ▽. Cichor.
Scabios. aa. ʒij
adde ▽. Cinnam. bugl. ʒβ.
Antih. poter. ʒβ.

Edulcoretur c. s. q. Rotul. Man. Christ.

D. S. Temperirende Milch stündl. 1. Wein-
Gläßl. zu nehmen davon.

R. Rad. ver. Cichor. ʒj.
alth. ʒij.
Glycyrhiz. Ras. ʒj.

Ras. C. C. ʒβ.

Sem. papav. alb. ʒij.
passul. min. ʒiβ.

F. l. a. Decoctum in ▽a. fontana.

R. Decoct. Col. ʒij.
▽. Cinnam. bugl. ʒj.

Looch. de pulmone vulpis.
Syrup. de Scilla aa. ʒβ.

M. D. S. Erweichender Lungen-Tranc
alle Stunden 1. Wein-Gläßlein.

R. Bals. 4r. amygd. ʒj

D. S. Erweichender Brust-Balsam 15.
Tropffen auff 1. mahl / des Tages
4. mahl zu nehmen.

R. Conserv. Ros. rubr. ʒiβ.
Rad. Cichor. condit.

amyg.

amygdal. dulc. condit. aa. 3ß.

nuc. pinearum, rec. excor.

Sem. papav. alb. aa. 3ij.

Ebor. f. Δ e.

Antih. Pot. aa. 3j.

C. S. q. Looch. de pulmone vulpis f.
Electuar.

D. S. Linde und lösende Latwerge des
Tages 6. Messer- Spitzen zu nehmen.

Formulæ ad tertiam indicationem.

R. Liqv. Neph. D. M. 3j.

D. S. Täglich Del / täglich 3. mahl 16.
Tropffen zu nehmen.

R. R. neph. Ammelung. 3j.

D. S. Treibende Tinctur täglich 2. mahl
6. Tropffen.

R. R. \mathcal{J} is aperit. Zvvelfer. 3j.

D. S. Erweichende Tinctur 30. Tropffen
auff 1. mahl.

R. Ω 9. aperit. Penot. 3ß.

D. S. Eröffnend Wasserlein alle Morgen
36. Tropffen zu nehmen.

R. Acidul, artificial. 3ß.

D. S. ut suprâ.

R. \mathcal{B} diaph. cum \mathcal{J} e.

arc. 2pl. M. aa. 3j.

M. D. S. Pulver ins Bier auf 1. mahl

R. Croc. ♂is cum Θbus 3β.

D. S. ut suprā

R. Essent. lignorum c. 3ij.

Ra. ♀r. acr. 3j.

Misc. D. S. Stärcke Tinctur 40. Tropffen
auf 1. mahl.

Formulae ad ultimam indicationem repe-
tantur ex capite superiore, vel
fiant hæ.

R. Herb. Galeops. M. ij.

Ras. lingn. Sanct. 3l.

C. C. 3β.

Rad. Chin.

Sarsapar. aa. 3vj.

Pasul min. 3ij.

F. l. a. infusum in cerevisiæ secundariæ
mensur. ij. stent per noctem in loco
tepedo, manè coquantur & filtren-
tur.

D. S. Stärckender Trand tagl. ein Mo-
sel zu trincken.

Thes. 27.

Ad ultimam indicationem in apoplexia
obtinendam specificè conferunt ab extra ad-
mota. Alia acria, hinc v. gr. communiter
prostant ∇. apoplect. acetum rutaceum per
simpli.

simplicem infusionem paratum, deinceps
etiam per Nationem, Imprimis verò con-
ducunt, quatenus castoraceis stimulantur
hinc v. gr. ▽a hirundinum cum castoreo.
Ego verò utor in tali casu sequenti formul.

R. ∩ lil. convall.
rosar.

⊖* aa. ʒij. vel
addi possunt Essent. Castor. ʒj.
†ti Rutac. ʒij.

hac mistura imbuunt linteola quæ conti-
nuè sunt admovenda ægrotantium naribus.
hoc namque pacto excitantur egregiè ægro-
tantes tam apopleptici, quam lethargici.
non interne etiam hic conferunt sternuta-
toria, si nimirum ægrotantes sunt robusti.
sternutatoria autem hic sunt petenda ex
castor, helleboro alb. lil. convall. fl. anthos-
ol, majoran, nicotian.

Formulae sunt hæc,

R. p. fol. nicotian.
majoran.

fol. lil. convall.
Rad. helleb. alb.
- - Castor. aa. ʒj.

∞ Nat. majoran. gt. iij.

crassiore modo pulverisentur hæc. M. D. S.

Schnupff- Toback officers zuge-
brauchen. C 3 Thes.

Thes. 28.

Deinceps in affectibus his valdè etiam sunt
 proficua talia acria nervos stimulantia in
 Clysteribus, hinc v. gr. ex herb. salv. rut. ma.
 joran. fol. ror. mar. organ. stœchad. Arab.
 Ex purgantibus verò primariò hic conve-
 nit tanquam fortissimum Colocynthis,
 item fel tauri inspissatum & demum
 etiam ꝑ̄g emeticus in majori dosi assumen-
 dus.

Hinc formul. possunt esse tales.

R. Herb. Origan,

Rut.

Salv. aa. M. j.

fl. Stœchad. arab.

lil. convall.

spiciæ aa. p. iij.

Colocynth. in petila ligat. ʒiij.

Rad. helleb. alb. ʒij.

F. l. a. Decocta in Aqua fontana.

R. Decoct. Col. ʒx.

Dil. Electuar. de bacc. lauri.

lenit. Forenzol.

Mel. Anthos.

rutac. aa. ʒβ.


ꝑ̄r. emet. M. gr. xij.

Essent. Castor. ʒij.

vitelli ovorum no. j.

F. l. a. Enema. vel

R. Decoct Col. ꝑx.
 dilue rursus elect. & mell.
 deinceps adde
 fell. tauri inspissat. ꝑiij.
 vit. ovorum no. j.
 F. l. a. Enema.



CAPUT IV.

DE

LYMPHA ΘSA.

VIsis vitiis lymphaticis quoad fluidita-
 tem, nunc scrutabimur etiam vitia
 lymphatica quoad Θnam temperaturam.
 Vitiatur verò dupliciter lymphæ, quatenus
 nimirum induit naturam Θis cujusdam
 corrosivi, quæ vis corrosiva optimè potest
 conferri cum Θ**i*, quippe quod gaudet po-
 testate dissolvendi omnem pinguedinem to-
 tius corporis nostri, unde producit mara-
 smum, communiter dictum scorbuticum
 Germanis *die Darrsucht oder Vertrock-
 nung* / qui idem potest cum hæctica phtisi
 conjuncta.

Thes. 2.

Hæc ipsa intemperies dum lymphæ qui-
 dem inest, ast non quoad omnes, sed tan-

tum certas partes producit in hominibus scorbutum ita tamen ut marasmus scorbuticus ab ipso scorbuto non differat, nisi gradualiter. Scorbutus adducit in labiis fissuras apprimè verò in extremitatibus, in gingivis inflammationem, erosionem, hyperfarcofes, unde causatur gingivarum frequens cruentatio, in ipsis dentibus cariem, in lingua fissuras, in faucibus apprimè verè in amygdalis tumores, erosiones in ventriculo frequentes vomitus absque ejectione copiosæ materiæ, qui vomitus ut plurimum maximè est chronicus. Observavi olim talem vomitum semestrem ferme, quem deinceps intra octiduum curavi solo lacte, jejunio stomacho hausto cum tantillo Ω 9. cochleariæ. In intestinis convulsiones mesenterii frequentissimas, quæ communiter dicuntur **die Darm-Gicht**. In M. S ad habitum corporis delata hæc Θ ia causantur scabiem, quæ pro diversitate copię Θ ium talium aut fit humida aut sicca. Hæc oritur à minori copia; illa verò à largiori. Qt. autem paucissima talia Θ ia lymphæ insunt oriuntur in habitu corporis phlyctænæ, sudamina, chirones. Epinyctides. Qt. autem lymphæ illa ab extra stagnans attingit corpus nostrum, causatur erosiones, quas communiter vocamus **das Gratseyn**/ observa-
turque

turque in pusionibus mingentibus in fascias;
item in adultis delicatulis pinguibus, qua-
tenus nimirum cute sua pinguibus produ-
cunt rugas magnas inter quas hæc lymphæ
Θsa collecta, cutem erodit, maximoperè ve-
rò observatur hæc erosio in tibiis sub po-
plite. Quatenus verò Θia hæc insunt lym-
phæ, quæ ordinariè certas cavitates debet
irrorare, causatur pruritus etiam sic v. gr.
non rarò pruritus talis observatur in ocu-
lis, imo in toto habitu corporis continuo
adigimur ad scalpendum. Hæc Θia ulte-
rius in lymphæ nos ab extra afficiente læ-
dunt nostrum corpus, dum nos movemus,
hinc v. gr. equitantes veletiam pedibus pro-
perantes patimur erosionem circa podicem
in fissura nempe quam erosionem vocamus
lupum. In sexu sequiori æstivis diebus hoc
malum sæpissimè etiam observatur circa fœ-
minea, unde novi exemplum cujusdam, quæ
exinde circa femora & in pudendis maxi-
mos per pessa est cruciatus cum metu su-
pervenientis Gangrænæ. Hæc acrimonia
interdum observatur etiam in excrementis
alvinis, hinc sordes illæ propè podicem reli-
ctæ excitant pruritus molestissimum ani,
quem Germani vocant *Urschügel*. Quæ
mala inferat ☐a nimium Θsa in infantulis
excoriando np. femora, docet nos quotidiana-

na experientia. Demum sudor nimium
 Θsus in soleis & intra pedum digitos æstivis
 præprimis diebus nonnullos adeò affligit: ut
 interdum deambulantes ab acrimonia hæc
 rodantur, noctu verò ubi desinit sudor, &
 partibus pedum eorum digitorum resicca-
 tis & induratis non duntaxat summum pa-
 tiuntur dolorem, verum & gressibus for-
 mandis evadunt inepti.

Thes. 3.

Causa proxima hujus intemperiei residet
 primariò in ventriculi abundante aciditate
 nimia, & in bile etiam nimium alcalica, ex
 quibus duobus humoribus necessariò pro-
 gignitur tertius Θsus, quemadmodum in
 Chymia ex ㄣu Θis & ㄣri progignitur
 tertium Θsum aliquod acerrimum, vel et-
 iam ex ㄣu Θis & ㄣe □ item ex ㄣu Θis
 & ㄣio ㄣtus item ex ㄣ Θis & flor. ㄣij.
 butyrum ㄣij., quæ omnia maximè sunt cor-
 rosiva. Interim tamen hæ ipsæ causæ pro
 diversitate ipsorum subjectorum & affectu-
 um discrepant etiam à se invicem gradua-
 liter.

Thes. 4.

Signa Diagnostica Θsedinis nimix prima-
 riò sunt petenda ex affectibus sic v. gr. quo-
 ties cunque observamus aliqua in parte cor-
 poris nostri erosiones quasdam ab intra, to-
 ties

ies etiam possumus concipere hoc ipsum malum. Interdum etiam causæ externæ revelant hoc mali genus. Sic v. gr. perpes-
sus est ante aliquot septimanas puer octo an-
norum exulcerationem totius fere capitis
exinde saltem, quod pectine acutiori in ali-
quibus locis caput læderet, ubi profectò
Θsædo prius in corpore & in capite hærebat
iners, accedente verò læsione externa lym-
pha illa extravasata ab Δe externo actuaba-
batur, ita, ut deinceps valdè operativa vi-
cinas etiam exulceret partes, quæ à pectine
manferant illæ sæ. Hinc quotiescunque aut
omnia, aut plurima etiam saltim superiori-
bus relatis symptomatibus ægrotantem affli-
gunt, toties etiam certi sumus lymphæ in
corpore hærentis Θsæ.

Thes. 5.

Signa prognostica: Omnis lymphæ Θsæ
indicat morbos chronicos: Omnis lymphæ
Θsæ potest causari multos morbos complica-
tos: Omnis lymphæ Θsæ causatur erosiones
externas per diuturnitatem temporis: Cau-
satur etiam inflammationem; unde non
rarò possunt suboriri ulcera profunda pha-
gedænica, quæque deinceps degenerant in
ulcera maligna cancrofa np. & spacelata.

Thes. 6.

Curatio instituaturs secundum has indica-
tiones;

tiones : Lympha Θ sa immutetur, aut sal-
tim, mitigetur, correcta evacuetur, partes
dolorosæ leniantur.

Thes. 7.

Prima indicatio obtinetur partim per ea
quæ temperant aciditatem in primis viis ni-
miam, artim etiam per ea quæ bilem nimi-
am alcalicam temperant. Illud obtinetur per
medicamenta jamjam in capitibus superiori-
bus commendata e. gr. ex mineralibus per
omnis generis medicamenta σ ialia item
 σ ialia v. gr. σ . diaph. simpl. vel cum σ e;
specificè verò per antih. Pot. \hbar nina
equidem maximè sunt egregia in temperan-
da acrimonia lymphæ, interim tamen in cor-
pus assumpta & quidem frequenter maximè
sunt nociva: siquidem ab \times o lymphæ faci-
lè quidem solvuntur, enim verò non in ve-
rum \oplus lum, sed potius in Crocum saltem
quendam; qui deinde sese insinuat in prin-
cipia nervorum ideoque causatur convulsi-
ones, obstructions &c. Quamobrem et-
iam priscis Medicis \hbar nus semper habitus est
summe frigidus, quare nemini autor ero, ut
 \hbar num frequenter in corpus assumendum
præscribat. Ast quantum abhorreo internè
assumendum \hbar num, tantum eundem appe-
to ab extra applicitum in acrimonia lym-
phæ, hinc v. gr. sola \hbar ni limatura indiutur-
niori-

nioribus & contumacioribus erosionibus cutaneis multa præstat. Ut autem hæc limatura commode ægrotantibus accommodari possit, jubeo limaturam excoriationi inspergere & deinceps partem affectam emplastro de spermate ranarum circumcingere (quolibet die bis vel ter emplastrum mutari potest) quo facto non duntaxat limatura illa alterat lymphæ acrimoniam, dum nimium sese unit aciditas lymphæ cum ḥno; verum præterea & per emplastrum emolliens mitigatur partis inflammatio, impediturque intimior & molesta ḥni cum nova tenera cute cohæsiō. Huc pertinent etiam omnia illa quæ radicibus conveniunt cum ḥno v. gr. Nihilum, Tutia, Plumbago, Cerussa, item p. ḥni s. Minium, item Lithargirium.

Thes. 8.

Deinceps in corrigenda Θsa lymphæ plurima etiam præstant ḡialia quippe ad quæ in extremo gradu est deveniendum tanquam ad sacram anchoram. Medicamenta autem communiter parata sunt ḡius dulcis, item ḡntus R. nimirum ḡium bene depuratum dissolve in s. q. ∇. ḡntur °° ḡr. Fiat perfecta edulcoratio, pulvis autem remanens decur ad gr, iv. & v. in forma pilularum facile solubile v. gr. sumantur saltem micæ panis recenter pisti q. s. ad incorporandum pulve-

pulverem & dentur. Hæ pilulæ hominem adultum quinquies vel sexies mitissimè purgant. Et utut interdum aliqualem post se relinquunt Θivationem, attamen vix bidui aut tridui hæc est. Ulterius ex ꝑbus hic profunt zzabarina, quæ in acrimonia lymphæ temperanda omnino etiam laudem & locum inveniunt, & utut verum sit zz à nullo resolvi acido, attamen & hoc verissimum est, quod butyrum ☿ ii, tanquam corpus summè Θsum, intimè eam dissolvat, jam verò aliquoties assertum est, quod lymp̃ha in corpore nostro Θsa sit conferenda cum ☿z, Θ*o & consequenter etiam cum butyro ☿ ij.

Thes. 9.

Ex marinis Corallia etiam hic multa valent, præprimis vero absque vehementi calcinatione præparata. Mater Perlarum, Conchæ.

Thes. 10.

Ex regno animali profunt omnia dura f. Δe præparata, item omnes Ω9 □ si dulces.

Thes. 11.

Ex vegetabilibus commendantur omnia acria v. gr. nasturtium, cochlearia, raphanus, arum, item omnia quæ amaritie aliqua gaudent, v. gr. Cichorium, fumaria, Centaurium minus, Carduus benedictus, pimpinella, it. Θia incinerata quo pacto soli E
clavel-

clavellati etiam locum inveniunt. Ex his
 etiam variæ prostant compositiones v. gr.
 ☿a antiscorbutic &c.. Ex altera parte ni-
 nium np. alcali bilis temperatur per acida
 Alia, ita tamen ut acida etiam in sese conti-
 neant alcali aliquod ☿stre, cum quo vitio-
 um acidum ventriculi concurrens, dimittat
 acidum ad bilem, quemadmodum videmus
 in ☿atione butyr. ☿ij acidum ☿is in ☿io
 ☿to dimittere alcali ☿iale seseque unire
 cum alcali ☿iali in corpus butyr. ☿ij. Con-
 trā verò tum ☿iale relinquere suum propri-
 um alcali ☿iale, seseque combinare cum al-
 cali ☿iali in corpus pulv. Talia autem ☿a sunt
 ☿a illa ☿lica ☿ia. Nam utut verum sit in
 ☿ione remanere maximas partes ☿ies in
 ☿o cum ☿do fortiori ☿li; attamen & ne-
 no negare poterit, quod in ipsis illis ☿bus
 ☿licis ☿is adhuc latitent corporales partes
 ☿iles, probatur np. id inde quod ☿9 tales
 ☿l coagulati cum ☿bus ☿sis summe depu-
 atis, relinquunt partes quastam ☿restes, ad
 naturam Crocor. ☿is vergentes. Sic v. gr.
 ☿ola etiam ☿ saepe in se continet partes
 quasdam ☿les, hinc ☿ius in hac solutus &
 ☿tus ☿tur quidem in fundo, in superfi-
 cie vero apparet spuma ex flavedine rube-
 cens, contra vero quando assumimus bene
 epuratum ☿um ☿is vel ☿i, ☿iumque dis-
 solvi.

vimus & ☿mus, nanciscimur ☿tum albi-
cantem, item observare licet in ☿io ☿to ex
☿ō in in corpus Turbith. mineral. Hinc
☿li ☿is, aperitivus Penoti, Clyffus ☿ij
etiam sunt egregii in hac ipsa bile temperan-
da, communiter etiam hic Clyffus & hic ☿
superfunduntur floribus quibusdam v. gr.
bellid, rosarum, violarum, borrag, atque
guttatim potui ☿so v. gr. cerevisiæ instillan-
tur & tempore mensæ hauriuntur non sine
salubri effectū. Et utut hæ Ræ communi-
ter saltem commenduntur contra Phlogo-
ses, in dicta acrimonia etiam valde frequen-
tes, tamen omninò & præterea comenden-
tur bili nimis p. n. alcalicæ. Hinc v. gr. B. D.
Horn. non sine efficacia in usu erat R. flor.
bellid. cum Clyff. ☿ ij non duntaxat in Phlo-
gosi arcenda, verum & in omnis generis fe-
bribus ardentibus. Hisce ☿bus similes
acidulæ, unde & Clyffi communiter dicun-
tur acidulæ artificiales quæ nunquam ex asse
supplent vices naturalium. Illam enim in
☿. visceribus digestionem naturalem artifi-
ciali nostro ☿e, nostro artificiali consortio
mineralium nunquam satis æmulabimur.

Thes. 12.

Mitigatio lymphæ obtinetur ex regno
Animali primariò per lacticiam maximope-
rè verò per lac humanum, quo ante bienni-
um restitui atrophica scorbutica laborantem,
jam-

jamjam sceletoformem, ita ut nunc incedat abdomine tardo, similia aliquot exempla posthac observavi. Succedit huic lac caprillum & vaccinum, quippe quo posteriore puer undecim annorum itidem sceletoformis & per semestris spatium lecto affixus reconvaleuit. Hujus lactis usus egregius est etiam in vomitu scorbutico unde non duntaxat commendatur à Sennerto, Tract. de scorbuto, verum etiam ipse ejus usum saluberrimum multoties sum expertus; apprimè verò quando instillantur guttæ aliquot Ω Cochleariæ. Vid. præterea Tract. Medic. de curatione lactis in arthritide Joh. Georg. Greiseli ubi obiter saltem notetur ad arthritidem lac non esse adhibendum nisi in arthritide vaga scorbutica. Cæterum ab autoribus passim etiam commendatur serum lactis, cui tamen omnino antepono ipsum lac. Lacti succedunt pingua v. gr. Axungia humana, canina, caponum, brodia pullorum gallinaceorum, item ipsorum caponum non ita senum. Hinc etiam hæc omnia ex communi hominum observantia remederi creduntur phthisi, cum tamen potius opem ferant saltem in arcendo marasmo. Quare omnia etiam in acrimonia scorbutica temperanda sunt egregia. Ex regno vegetabili profunt temperatè adhibita semina & nuclei,

clei, pingvedine quadam constantia v. gr. amygdal. ; pineæ, sebesten, pistac, sem. 4. frigid. major, sem. papav, item 00₂ expressa v. gr. 00 amygdal. dulc., hincque paratus balsamus ꝑris amygdalatus. Item cremores frugum v. gr. cremor avenæ, orizæ, hordei etiam qui omnes suppeditant juscula pingvia. Ex regno minerali commendantur medicamenta ꝓia v. gr. antihect. Poter. quippe in quo residet visciditas quædam grata.

Thes. 13.

Tertia indicatio obtinetur quatenus nimirum hæc ꝑsedo observatur copiosior in primis viis vel etiam in artubus, per medicamenta evacuantia blanda. Cane etiam & angue pejus fugiatur omne purgans fortius. Itaque ex vegetabilibus hic maxime sunt proficua folia sennæ, manna, polypod. quercinum, Rhabarbarum. Hinc omnia etiam horum præparata v. gr. infusa, decocta, extracta syrupi v. gr. de polypod. de Cichor. cum Rhabarbar. manna etiam dissoluta & calide hausta. Ut autem hæc laxantia citius evacuent, addenda ipsis sunt ꝑrea. v. gr. ꝑr. & Cremor ꝑri, passulæ. His deinceps coanumeranda sunt aloëtica succis vegetabilium imprægnata v. gr. aloë violata, rosata, cum succo fumarizæ, item spinæ cervinæ imprægnatæ.

Thes.

Thes. 14.

Ubi acrimonia hæc Θ sa in solo corporis habitu apparet v. gr. in scabie, ibi his purgantibus addi possunt stimuli ex scammon, Jalapp, mechoac. & pro diversitate subjectorum etiam Gumm.gutt.

Thes. 15.

Ubique verò speciei medicamentorum commodissimè adjungi possunt superius laudata χ ialia. Nil enim melius Θ sedinem corrigit ipso χ io v. gr. χ io dulci, & pro renata arc. corall. licet nimirum lenis sequatur Θ ivatio.

Thes. 16.

Utraque verò indicatio cessantibus in tantum morbis conjunctis obtinetur, per medicamenta temperantia & evacuantia saltem in gradu remissiori, quæ observantia communiter apud auctores practicos exponitur per roborationem viscerum. Hinc prostant varia medicamenta, quæ nonnullis dicuntur usualia i. e. quotidiana, quæ nimirum lympham temperant, temperatamque sensim evacuant, ut ut vehementiora nondum patiamur symptomata. Talia autem sunt v. gr. Elixir proprietatis Paracelsi sive cum χ o Ω u Θ is, sive absque eo solo \forall i \mp rsato præparatum. Item Elixir proprietatis

cum Rhabarbar. M. P. de fumar. compos.
pilul. alëophangin, Marocostin Francofurt.
Pilulæ antiscorbuticæ Timæi von Guldens-
flee ꝛc.

Thes. 17.

Quarta indicatio obtinetur primariò per
medicamenta diaphoretica conjuncta cum
opiatís quoad interna. Dum enim sudor
per poros promanat, abluít inibi hospitan-
tia Θ a acria, quemadmodum verò sudor
absque medicamento adauget malum in vi-
tiis cutaneis, dum nimirum intolerabilem
ferè causatur pruritus solvendo nimirum
 Θ ia. Ita medicamentofus ea etiam corri-
git. Talia autem medicamenta sunt ex
Regno animali omnia Alia v: gr. Ω 9 C.C.
viperarum, \in *i item liquor C.C. succina-
tus, nec non decantatus in nostris provin-
ciis Ω 9 Bezoardicus Buffii Archiatri Ele-
ctoris Saxoniae qui componitur ex Ω u C.C.
card. bened. Hinc etiam efformant essen-
tias v. gr. viperarum, quibus tamen Ω 9 di-
cti sunt præferendi. Ex regno vegetabili
sunt medicamenta parata ex jam laudato
Card. ben. fumar, lign. sanct. sassafras, len-
tisci, frangul., ex quibus componunt Essen-
tias vel Ω 9 m. v. gr. Essent c. Lign. nec non
camphora.

Thes.

Thes. 18.

Ex mineralibus hic profunt Ræ ꝑij. legitime paratæ, item medicamenta ꝥrea v. gr. flor. ꝥris (Balsamus h. l. ab æo quod ei inest non adhibendus) Et hinc etiam reliqua ꝥialia v. gr. ꝥ diaphoretic. simplex, vel cum ꝥe, pulv. ꝥij Bezoard. ꝥiale & ☉re ritè præparatum. Bezoardica mineralium vulgari modo parata non conveniunt in malignis, quia sudorem quendam promovent, ast cum summa præcordiorum angustia.

Thes. 19.

Ex tribus regnis prostant etiam conjuncta multa v. gr. p. Bez. Senn. R. Bez. D. M. &c.

Thes. 20.

His sudoriferis commodè adaptentur opiata.

Thes. 21.

Externè verò anodyna primariò sunt sumenda præter superius laudata temperantia ꝥa, & ꝥialia quippe quæ item dolores sedent, ut ut eos prima fronte exasperent omnia illa pinquia ex feminibus cremore gaudentibus tosta, v. gr. farina secalicea tosta, cremor avenæ tostus, cremor triticeus paratus ad glutinanda linteola exsiccatus & tostus. Deinceps his accensenda sunt etiam folia rosarum exsiccata, quæ nimirum in se continent blan-

dam vim stypticam, hinc blandè etiam consolidantem.

Thes. 22.

Formulae ad primam indicationem sunt tales.

R. Ocul. 69. pp.
 ☼ diaph. c. ♂ aa. 3β.
 arcan. 2pl. M. 3β.

M. D. S. Temperirend Pulver ins Bier.

R. Matr. perlar. pp..
 Croc. ♂. c. Θ 9 aa. 3β.

M.D. S. Ut suprà. In morbo diuturno absq; vehementer urgentibus symptomatibus singulis septimanis bis potest assumi talis pulvis. Urgentibus autem symptomatibus quotidie.

R. Essent. ♂is liquid. 3β.

D. S. Temperirende Tropffen alle Morgen 40. in warmer Suppe zu nehmen.

(bene tamen hic attendenda est consistentia)

R. R. ♂is aperit. 'Myns. 3ij.

D. S. Tropffen wider die Schärffe alle Morgen 20. zu nehmen.

R. Essent. fumar.

Card. ben.

Cent. min.

Ω-Θ*. aa. 3i.

M. D. S.

M. D. S. **Egenß wider die Schärffe 50.**
Tropffen eine Stunde nach der Mahl-
zeit zu nehmen im Biere.

Thes. 23.

Formulae ad lnam & 2dam indicatio-
nem funto:

R. Herb. fumar.

scolopendr. aa. M. j.

Card. ben. M. β.

Flor. Cichor.

bellid. aa. p. iij.

Rad. Pimpinell.

Cichor.

polypod. quer. aa. 3β.

Fol. Senn. Al. f. f. 3x,

Croc. ♂ cum Θbus 3β.

Incis. & contus. contundenda & inciden-
a infuantnr sacco lineo f. l. a. nodulus.

D. S. **Temperirender und abführender**
Püschel in 2. Kannen Wein zu
hängen.

R. Herb. fumar.

fol. Cochlear.

nasturt. ▽at.

pimpinell. aa. M. β.

Fl. bellid.

Cichor. aa. p. iij,

Rad. Pimpinell.

armorac.

polypod. quer. aa. ʒβ.

Fol. Senn. Al. f. f. ʒx.

Croc. ʒis cum Өbus ʒiij.

Agar. albiss. ʒij.

Incis. & Contus. M. & insue sacculo D. S.

Species wider die Schärffe in 2. Kannen

Wein zu thun und täglich 2. Gläser
zu trincken.

NB. Si sequitur excretio cutanea, exina-
tur rad. Armor continueturque reliquus
nodulus,

R. Flor. beton.

fumar.

bellid.

Cichor. aa. p. iij.

Fol. Senn. Al. S. S. ʒij.

Croc. ʒis cum Өbus. ʒj.

Incis. & Contus. D. S. Species in ein Sack

zu neben / und in eine Kanne Bier

zu hängen / die Nacht im Keller zu setzen

und den Tag über zu trincken.

R. Fol. Senn. Al. S. S. ʒiβ.

p. Rad. Rhab. ver. ʒij.

passul. min. ʒj.

commista stent cum fero lactis ʒiij. in loco

calido, manè ebulliant & exprimantur.

adde

Ocul. 69. pp. ʒβ.

mann. calabr. ʒvj.

M. D. S.

M. D. S. Laxir- Träncklein auff 1. mahl
warm gemacht des Morgens zu
trindken.

Convenit ferme cum Decocto diasennæ
cum Rhabarb. Mynf.

R. Ras. C. C. 3vj.

Rad. Cichor. 3j.

polypod. 3ß.

Fol. Senn. Al. S. S. 3iß.

C. ♀r. 3j.

F. l. a. decoctum in sero lactis.

R. Decoct. Col. 3vj.

▽. Cinnam. borrag. 3vj.

antih. Pot. 3ij.

Sirup. de Cichor. c. Rhab.

scelotyrb. Forest. aa. 3ß.

M. D. S. Linde abführender Tränck den
Tag über zu trindken.

R. C. ♀r. 3ß.

Extr. fol. Senn. decoct. parat. gr.
viiij.

Scamm. ♀r. gr. iij.

M. Optimè D. S. Pulver auff 1. mahl in
warmer Suppe zu nehmen.

R. Conserv. rosar. rubr. cum mann.
℥. dulc. gr. xv. 3ß. (parat.

Scamm. ♀r. gr. iij.

Syrup. Scelotyr. For. 3ß.

M. D. S. Laxir- Cassi auff 1. mahl.

D 5

R.

R. ▽. Cichor, ʒj.

Zedoar. cum Vino. ʒij.

p. fenn. Montagn. ʒij.

Syrup. polypod. ʒij.

M. D. S. Purgier-Träncklein auf 1. mahl.

R. Aloës viol.

ʒij. dulc. aa. gr. vj.

diagryd. gr. ij.

F. l. a. Pilulæ cum. Syrup. scelotyr.

no. 21. D. S. Abführende Pillen des Morgens und Abends auf 1. mahl zu nehmen.

R. M. P. de fumar. simpl.

Extract. fol. Senn.

Croc. ʒis c. ⊖bus.

Scamm. ʒr. aa. ʒj.

c. Syrup. scelotyr.

F. l. a. Pilulæ instar pisi minoris D. in pyxide, S. Linde Abführende Pillen wöchentl. 2. mahl 15. zu gebrauchen.

NB. In vitiis cutaneis v. gr. Scabie.

R. p. Cathol. ʒβ. ad ʒij

D. S. Purgier-Pulver auf 1. mahl.

R. Extr. Cathol. gr. xij.

Scamm. rofat.

ʒ. dulc aa. ʒβ. Essent. fumar.

F. l. a. Pilulæ no. xxj. D. S. Purgier-Pillen auf 1. mahl.

R. Elixir, citr. purg. ʒiij.

Syrup.

Syrup. de Cichor. cum Rhab. ʒβ.
M. D. S. Purgier Saft auf 1. mahl.

R. ꝯ-ti alb.

Gumm. gutt. aa. gr. iv.

F. l. a. Pilulæ cum micapanis no. 3. D. S.
Purgier-Pillen auf 1. mahl.

Thes. 24.

Ab extra verò acrimonia temperatur hoc
modo

R. Decoct calc. viv.. ℥j.

▽ Rosar. (ob refragantiam) ʒij.

℥. ʒij.

Camph. subtiliss. trit. ʒβ.

M. D. S. Eüßerlich heilend Wasser den
Leib damit zu streichen.

vel R. Decoct. calc. viv. ʒiv.
fol. querc.

popul. alb. aa. M. ii.

incis. & contus. indantur colator. &
elixivientur c. f. q. ▽. fontan, calid.
aliquoties repet.

R. Decoct. col. ℥ij.

℥. ʒij.

Camphor. ʒβ.

M. D. Eüßerlich abheilend Wasser.

▽. hæc est arcana & egregia in omnibus ex-
ulcerationibus antiquis, & malignis,
quare & præstantissima est in lue & reli-
quis ▽is præferenda abstergentibus.

R.

R. Ungn. rofat. ʒj.

℞. vivi saliv. hum. extinct. ʒj.

℞. Nat lign. rhod gt. iij.

M. D. S. **Eüßerlich heilend Sälblein.**

Ubi adest ingens inflammatio potest adhiberi ℞. Rulandi cum sevo hircino & ossium medulla, item unguentum album camphoratum vel cerussa cum alb. ovorum.

R. Ungv. alb. Camph.

d. litharg. aa. ʒß.

℞. Nat lign. rhod. gt. ij.

M. D. S. **Eüßerlich trocknend und heilend Sälblein.**

In exulcerationibus phagedœnicis arcanissimum est remedium stercus humanum combustum hisque inspersum. Vel in unguentum redactum.

R. Nihil. alb. pp.

Cremor. Secal. tost.

p. ros. rubr. aa. ʒij.

M. D. In nodulo excipiaturque charta

Turcica. D. S. **Ein Streu-Püschel.**

Crocus ʒis pulveribus ejusmodi non miscendus, quoniam causatur erosiones, ob facilem in Plūm mutationem.

Thes. 25.

Ad mitigandam bilem.

R. ℞. aperit. penot. ʒß.

D. S.

D. S. Täglicher Spiritus 30. Tropffen in 1.
Nögel Bier zu tröpfen.

R. R. Fl. bellid. cum Ω \oplus l. σ . pp. $\frac{3}{\beta}$.

D. S. ut suprà.

R. Acidul. artificial. $\frac{3}{\beta}$.

D. S. Ut supra.

Thes. 26.

Ultima indicatio obtinetur per has formulas:

R. R. Corall. c. Ω Cor. C. M. $\frac{3}{j}$.

Ω Cochlear.

Essent. anod. aa. gt. XL.

M. D. S. Lindernde und Schweifstreibende Tinctur 40. Tropffen 2. mahl nach einander stündlich in 1. Gläßlein Wein oder Bier zu nehmen.

R. Ω Bezoard. $\frac{3}{j}$.

Essent. Θ eriac. $\frac{3}{\beta}$.

M. D. S. ut suprà

R. Ω Θ^* . $\frac{3}{j}$.

Cochlear.

Essent. anod. aa. gt. XL.

M. D. S. ut suprà.

R. C. C. S. Δ e.

σ ij. diaph. aa. gr. xv.

Mithridat. Damocr. $\frac{3}{ij}$.

Roob. Sambuc. $\frac{3}{\beta}$.

M. D. S. Schweiß Mixtur auf 1. mahl.

R.

R. Ocul. 69. pp.
 ℥ij. diaph. aa. ʒj.
 flor. ♀r. gr. v.

M. D. S. Schweiß Pulver auf 1. mahl.

R. Ocul. 69. pp. ʒj.
 ℥ij. diaph. c. ☉c.
 gr. xij.

flor. ♀. gr. v.

M. D. S.

Ut supra, in dolore vehementiore poterunt addi p. anod. conf. gr. v.

R. ♀. flor. Sambuc.
 Card. ben. aa. ʒβ.
 tenell. C. C. ʒij.
 Diascord Fracast. ʒiβ.

M. D. S. Schweiß-Tranck auf 1. mahl.

Thes. 27.

In scorbuto oris conveniunt hæc.

R. Conf. ros. ʒβ.

℥. ʒj.

℥. ☉l. gt. xxv.

M. D. S. Mund-Wasser mit einem Pinsel das Zahn-Fleisch abzuwaschen.

Ad labiorum fissuras.

R. Ungu. ros, ʒj.

℥. utat & probè edulcorat. gr. iv.

M. D. S. Eüßerlich heilend Sälblein die Leßzen damit zustreichen.

Ad tumores glandularum faucium.


R.

R. Flor. prunell.
 Calcatripp.
 borrag.
 bellid. aa. p. ij.

Coqu. in Cerevis. secundariæ M. β.

R. Decoct. col. dilue
 Mell. rosat. ℥j.
 ①. ſiat. ℥j.

M. D. S. Sürgel-Wasser.



CAPUT V.

DE

LYMPHA ACIDA.

Thes. 1.

Aciditas quando in lymphæ prædomina-
 tur, oritur intemperies lymphæ acida.
 Est vero duplicis generis aut enim lymphæ
 acida viscida. quæque dicitur styptica; aut
 corrosiva. Illa primariò observatur in pri-
 mis viis, dum nimirum partes alimentorum
 rassiore diluit, seseque hisce involvit, ut
 inde energia ejus ratione corrosionis impe-
 liatur. Et utut hæc lymphæ vim suam cor-
 rosivam non adeò exercere possit; attamen
 bene etiam est ponderandum: Dum, quod hæc
 particula viscida subinde adhuc aliquot par-
 tes fluidiores habeant commistas, quæ pro
 diversitate copiarum possunt inferre vires corro-
 sivas.

sivas. Corrosiva verò est fluidior, hincque observatur primariò in habitu corporis. Quia enim intra vasa semper est in motu, conjunctaque cum sanguine, obvolvitur etiam ejus acrimonia, quam demum exerit in habitu corporis, dum nimirum ope glandularum sequestratur M. S. aliquandiuque hæret in certis spatiis spatiolisque.

Thes. 2.

In spatiis namque majoribus v. gr. in pelvibus in juncturis artuum, in bronchiis pulmonum, in glandulis, causatur coagulationes, ex quibus progignuntur vere lapilli, in spatiolis verò habitus corporis coagulat succum nutritium remanentem ex S. M. non rarò etiam ipsum sanguinem cum substantia viscerum intra sese, ut inde exurgant varii tumores duri, qui in visceribus dicuntur scirrhi. demum ipsam aggreditur contentia vel partes nostras solidas easque dissolvit, unde oriuntur in partibus mollibus ulcera phagedœnica, in duris caries.

Thes. 3.

Quoniam autem hæc ipsa acrimonia non potest aggredi partes nostras solidas, quando simul premat etiam partes nervosas. Hæc verò pressæ mox agitentur in motum convulsivum, demumque in tetanum; apparet quomodo

quomodo ab acrimonia tali causentur ob-
structiones in partibus carnosiss, quas demum
subsequitur M. S. intra poros stagnatio.
Quia verò humores à corde vi summa im-
pelluntur quaquaversum ulterius liquet quo-
modo facta tali obstructione & M. S. stagna-
tione, subsequatur partium intumescencia,
& in hac à præsencia copiosi sanguinis rube-
do, & calor nimius, quæ omnia simul jun-
cta constituunt in partibus inflammatio-
nem.

Thes. 4.

Quia verò ulterius sanguis stagnans &
copiosus nimium nimiumque in se efferve-
cit, fit ut naturalem suam amittat dulcedi-
nem, degeneretque in qualitatem iti-
lem corrosivam, qua de re partes lymph-
icæ & cruentæ non duntaxat à se invicem
deficiunt, verum & ipsæ partes solidæ de-
ruuntur, ut inde progignatur suppuratio
vel ulcus.

Thes. 5.

Quia præterea vicinæ etiam partes con-
ringuntur à convulsis inferioribus partim
tiam compressis vasis majoribus, patiuntur
b denegatum affluxum stagnationem quan-
am, sequiturque etiam in his aliqualis in-
tumescentia.

Thes. 6.

Tandem fit sæpe etiam ut aciditas hæc aliquandiu hæreat in certis partibus erosis, magis magisque stagnando induat vim majorem corrosivam, quæ subinde partes vicinas corrodit, in quibus nihilominus ex continuo impulsis partibus viscidis nutritiis lymphaticis concrevit copiosa nova caro, æst inordinata, quæque inde dicitur hyper-sarcoma, secundum quem modum succrescunt ulcera cancrofa, quippe quæ ut plurimum occupant sedem in partibus glandulosis v. gr. in mammis, in parotidibus, salivalibus &c.

Thes. 7.

Ex his satis apparet quomodo in primis viis ex hac intemperie acida suboritur & quidem intemperie acida fluidiore ratione ventriculi appetitus nimius, caninus, vomitus ficcus, s. copiosi ructus, item cardialgia, affectus hypochondriacus; in intestinis passio colica, obstructions variæ interdum: Interdum verò pro diversitate nempe gradus, erosiones etiam intestinorum, in habitu corporis variæ inflammationes v. gr. in thorace pleuritis, in renibus nephritis, in manibus chiragra, in dentibus odontalgia, in pedibus podagra, in lumbis dolor

dolor ischiaticus, in cerebro phrenitis, in diaphragmate paraphrenitis; in pulmonibus peripneumonia. In singulis deinceps partibus Erysipelas.

Thes. 8.

In ossibus & perioostiis ostocopus gallicus, qui in capite dicitur Cephalalgia gallica.

Thes. 9.

In visceribus verò quando fit coagulatio absque inflammatione suboritur scirrhus hepatis, lienis, pulmonum, ipsius cerebri, glandularum mesenterii, testium &c.

Thes. 10.

Quando verò Scirrhi hi succrescunt cum suppuratione, dum nimirum quædam partes coagulantur, quædam verò molliores suppurationem patiuntur, oriuntur ulcera interea cancrofa, qualia sunt in pulmonibus phthisis.

Thes. 11.

Talia autem ulcera maciem summam causantia, non in solis pulmonibus verum prætereà frequenter etiam in renibus, in hepate, liene, mesenterio observantur. Imò in omnibus visceribus gallici cujusdam variolarum magnarum partim exsiccatarum partim, adhuc putridarum deprehendi vestigia. Hinc etiam non licet

argumentari, in Gallicis adest nullam exulcerationem in corpore, quando facies externa est integra. Non rarò enim viscera interna longè magis sunt corrupta, imò nullus gallicus extinguitur absque marasmo maxime lento.

Thes. 12.

Signa diagnostica sunt sequentia: Intemperies lymphæ acida in primis viis observatur ex continuis doloribus abdominis & præcordiorum gravativis & tensivis, absque notabili tamen abdominis intumescencia. Primariò etiam cognoscitur, quatenus hæret in ventriculo, ex frequenti laryngis constrictione, dum nimirum muscoli laryngis cum musculis æsophagi rapiuntur in consensum, adest summa respirandi difficultas, ob per consensum convulsam diaphragma, ingens dolor in utroque hypochondrio, quippe in quo diaphragma cum costis spuris cohæret, summus dolor etiam in lumbis, dum nimirum processus diaphragmatis inseruntur in vertebrae abdominis usque ad os sacrum. Hinc etiam talis dolor hypochondriacorum ut plurimum mentitur dolorem quendam nephriticum. Quatenus porrò nervi intercostales lateris sinistri per consensum etiam patiuntur, fit, ut & omnes muscu-

musculi lateris sinistri intercostales convellantur, quo facto, ægrotantes conqueruntur de dolore gravativo totius lateris. Præterea adfunt alvi constipationes, ructus præclusi, sternutatio ob diaphragma convulsum abolita, utut nares irritatæ reliquique musculi expirationis sese disponant ad sternutationem.

Thes. 13.

In M. S. satis se prodit hæc acrimoniara-
tione exulcerationum. In inflammationibus verò majoribus cognoscitur inde, quod ut plurimum ægrotantes primo exordio subito invadat horror cum subsequente incallescencia, & dolore in certa parte maximè notabili, sic, v. gr. in pleuritide oritur dolor in lateribus pectoris, si est vera, interdum etiam circa dorsum & regionem renalem, item hypochondriis si adest pleuritis notha. Discrepat verò peripneumonia à pleuritide, quod in pleuritide adsit vehementissimus dolor pungitivus fixus in certo latere; In peripneumonia verò aut nullus adest dolor punctorius aut vagus, dum nimirum pulmone inflammato, compatitur pleura, quippe cum qua in homine ut plurimum pulmo hic est conjunctus. Præterea in omni pleuritide adest difficultas respirandi cum tussi conjuncta. In nephritide adest dolor in regione

renali versus abdomen, præterea frequentissimus vomitus, adsunt dolores versus umbilicum, versus inguina & ut plurimum aut dysuria aut ☐æ totalis suppressio, quæ partim sequitur à dolore & inflammatione renum, patim etiam à convulsione ureterum, dum nimirum hi convulsi in consensum rapiunt vesicam ☐am, quo facto, illa sese constringit ut nondum adsit ☐. Quare & ægro-
tantes sæpe quidem interim tamen parum & quidem cum dolore quodam tensivo min-
gunt. Hæc ipsa convulsio vera & obstructio etiam sæpe suboritur in nephritide, dum ☐ coagulatur in sabulum, sabulum verò istud in ureteribus colligitur, quo pacto nova ☐æ intercipitur via, ut necessario in ureteribus subsequatur pressura quædam, quæ pressura & hæsi sabuli apprimè contingit in obliqua insertionem ureterum. Signa arthritidis sunt, quæ æque sicuti in pleuritide & nephritide ægro-
tantes invadat horror cum subsequente incalescentia, præterea vero dolor mox oc-
cupet artus cum aliquali inflammatione. Itaque quotiescunque in artibus oriuntur inflammationes, quas præcedit horror cum subsequente incalescentia, semper simus
cauti, ne pinguia ab extra admoveamus, ve-
etiam suppurationem intendamus, longè
potius diaphoretica, blanda in usum voce-
mus

mus. Dolor ischiaticus verò cognitus est difficilior. Siquidem sæpe est conjunctus cum nephritide. Potissimum itaque signum distinctivum consistit in diuturnitate doloris ischiatici absque difficultate mingendi. Erysipelas verò cognoscitur remotivè, dum nimirum adsunt symptomata allegata & pars affecta neque est in pedibus neque in manibus neque in ossibus abdominis, neque in thorace neque in dentibus. Odontalgia patet per se.

Thes. 14

Phrenitis cognoscitur ex febre continua & delirio. In Paraphrenitide vero præter febrim continuam & delirium, adest difficultas respirandi, unde ægrotantes ut plurimum cum stertore respirant.

Thes. 15.

Scabies maligna cognoscitur ex avtossia, dum nimirum præter communem scabiem suboriuntur exulcerationes sinuosæ, cum marginibus lividis. Cancer cognoscitur ex copioso hyperfarcomate partibus vicinis lividis & quoad partem duris, venis lividis, valde turgidis.

Thes. 16.

Lues & ea tandem cognoscitur ex ostiopo, quo laborantes primariò nocturno tempore cruciantur doloribus, qui ipsum

meditullium ossium afficiunt, adeo ut quiet
esse plane nequeant. Subsequuntur in his
apprimè verò in tibiis & ulnis item circa
manuum carpos gummata, vel tumores ma-
ximè dolorosi. Circa nares sæpe adest obstru-
ctio ita, ut conquerentur de difficultate
emungendi, circa ossa nasi vehementissimus
dolor. In faucibus sæpe adest erosio. In
pudendis sæpe adest excoriatio, adsunt ver-
rucae dolorosæ, adsunt pustulæ lividæ maxi-
meque dolorosæ, adest frequenter in sexu
masculino gonorrhœa, in famineo fluor al-
bus erosione partium.

Thes. 17.

Scirrhi cognoscuntur & quidem in hepate
& liene ex continuo dolore gravativo &
quidem hepatis ex dolore hypochondri
dextri, lienis verò hypochondrii sinistri, adest
præterea continua respirandi difficultas.
Scirrhus pulmonum cognoscitur ex ortho-
pnœa sine rejectione ullius materiæ viscidæ.
Distinguitur ab orthopnœa vel asthma
convulsivo, quod asthma convulsivum certa-
patiatur remissiones, scirrhus verò infer
orthopnœam continuam & diuturnam.
Scirrhus cerebri cognoscitur ex lenta amissi-
one facultatum animalium absque febre.
Scirrhus in testibus aliisque glandulis facili-
bus dignoscitur tactu.

Thes.

Thes. 18.

Signa exulcerationum viscerum sunt reiectio materiæ purulentæ sic. v. gr. exulceratio pulmonum cognoscitur ex copiosa reiectione materiæ purulentæ in tussi. Exrenum excretionem materiæ purulentæ per □am vesiciæ □æ ex reiectione materiæ purulentæ cum fibris membranaceis per □am cum intenso dolore in regione vesicæ.

Thes. 19.

Signa prognostica sunt omnis morbus oriundus ex lymphâ acidâ & ut plurimum chronicus. Interni autem morbi & universales rarò radicitus extirpantur, hanc v. gr. qui semel est perpeffus malum hypochondriacum, ut plurimum sæpius illo vexatur. Quomodo arthritidis species respondet in propatulo est. Lues ♀ ea inveterata rarò, imò nunquam radicitus est curata. Nisi forsitan quispiam confuderit scabiem pertinaciorem cum lue ♀ ea. Cancer exulceratus rarissimè etiam curatur. Exulcerationes internæ difficillimæ itidem sunt curationis, patiuntur tamen curationem faciliorem in pleuritide in pulmonibus etiam nisi accesserint suppurationes cancrôsæ, hinc facilè curamus pleuritidem, peripneumoniam, nephritidem etiam cum reiectione materiæ cruentæ; difficillimè verò imò totaliter nunquam perfectam
E 5 phthisin.

phthisin. Phrenitis est periculosissimus etiam affectus, attamen sæpe etiam curatur dum conjungitur soli causo; Difficulus vero dum comitatur morbos malignos.

Thes. 20.

Curatio lymphæ acidæ instituatür secundum has indicationes: lymphæ acidæ tracturæ etque evacuetur, nervi convulsi sedentur. Partes gangrænosæ vel etiam suppuratæ tollantur.

Thes. 21.

Prima indicatio obtinetur primariò per medicamenta omnis generis alcalia, inter quæ ex mineralibus agmen ducunt ꝯia v. gr. limatura ꝯis præparata, Crocus ꝯis aperitus ꝯꝯ ꝯus, ꝯ diaph. cum ꝯe, Crocus ꝯ cum ꝯbus, Essent ꝯis liquid cum succo pomorum. Polemannus equidem in Tractatu de ꝯrephilos. flor. suis ꝯis ex lap. hæmat tribuit magnam virtutem. Attamen quo minus eam hisce tribuam, suadet vis styptica illis inhærens. Item censendum etiam est de flor. ꝯꝯ ꝯis, Interim tamen penitus hos rejectos nolo, sed saltem volo ut ne adhibeantur quotidie. singulis septimanis juxta autoris dicti consilium. ꝯis ꝯis vel lixivium paratum ex minera ꝯis flavedinem ꝯ simulante, cum ꝯ pluviali factum, hic etiam locum invenit. Ex regno animali primario hic profunt ꝯꝯ

☐ si temperati, hinc v. gr. ♀ 9. carminativus
 D. Michaël. S. ♀ 9. ☐ si. Nam utut ☐ e
 ☐ a effodiatur, attamen valdè verò fit simile,
 quod hoc ipsum ☐ sum debeatur anima-
 libus in locis illis ☐ is degentibus. Huic suc-
 cedunt ♀ si reliqui, ut ♀ ☐ *i, C. C. cran.
 human. Deinceps ex regno animali confe-
 runt partes animalium duræ solum rasæ, vel
 etiam sine △ e præparatæ. Quare & com-
 posita ex his conferunt v. gr. pulv. Marchion.
 antepil. in pharmacop. Augustan. descriptus.
 Ex regno vegetabili sunt herbæ amaricantes
 v. gr. Card. ben. absinth. Cent. min. filix,
 fumar, scolopendrium &c. quæ communiter
 audiunt, herbæ spleneticæ, ex his compositæ
 sunt Essent. variæ quæ valdè amaricantes
 contrariantur aciditati nimia. Imo for-
 sitan etiam non fallax est conjectura pilulas
 recenter allatas Herbipolenses ex similibus
 herbis amaricantibus cum succo Glycyrrhiz
 in massam formatis (quibus contra arthri-
 tid. malum hypochondriacum, calculum &c.
 utuntur in aula Dresdensi) deinceps plan-
 tarum harum ☐ ia per incinerationem parata
 valdè opere etiam conferunt. Unde ☐ rea
 omnia etiam hic locum inveniunt imprimis
 Ræ ☐ r. tam simplices quam compositæ v. gr.
 Ra. ☐ r. acr. Ra. ☐ is z. aperit.

Thes. 22.

Secunda indicatio obtinetur dum ac-
ditas hæc est in primis viis v. gr. in malo
hypochondriaco extra paroxysmum per
purgantia fortiora v. gr. per medicamenta
ex regno vegetabili scammoniata, ex Jalapp.
mechoacan., ex quibus prostant varia com-
posita mixta cum ꝑreis primario, v. gr. crem
ꝑri. ꝑr. ☉ lat. ꝑr ♂rus, ☉ ꝑr. Essentificat v.
gr. pulvis cathol. purgans D. Michael. appri-
mè tamen huc faciunt medicamenta parata
ex gumm. *o & Benzoe, quippe in quibus
latitat ☉ aliquod acre fortissimum, quod
summæ est efficacæ in præcipitanda materia
viscida acida, & præterea etiam stimulandi;
evacuationes, hinc v. gr. profunt pi-
lulæ ex *o Quercetani vel quævis pilulæ ex
*o in ☉o primario Scillitico soluto paratæ,
quæ pilulæ pro diversitate temporis nunc
mitiores etiam porrigi possunt.

Thes. 23.

In paroxysmo verò hypochondriaco uti
in omnibus conjunctis inflammationibus v.
gr. pleuritide, erysipelate, Arthritide &c.
Exhibeantur sola purgantia mitiora ex sen-
na np. manna, polypod. &c. Quibus etiam
præprimis verò alvo obstructa vel duriora
substitui possunt Clysteres, qui parandi sunt
ex emollientibus & carminativis cum ☉is
commistis.

Thes.

Shes. 24.

Ad talia laxantia in malo hypochondriaco
tiam sunt referendæ acidulæ, qua copiosio-
res haustuæ item evacuant.

Thes. 25.

Ubi verò aciditas penetravit jamjam in M.
inibique causata est erosiones, coagula-
ones, adhiberi possunt purgantia fortissi-
ma, v. gr. ☿ lia, ☿ alia &c. nonnunquam
tiam, dum nimirum appetitus est prostra-
tus angustiaque observantur in præcordiis,
omitoria v. gr. ☿ vitæ in substantia, item
ellebor. alb.

Thes. 26.

Peculiaris est evacuatio usurpanda prima-
do in lue & ea, quæ tamen optime etiam ad-
ministrari potest in cancro aliisque ulceribus
agedæonicis & sinuosis sordidis curandis
mirum ☉vatio. De qua summatim hæc sunt
observanda (1) nunquam instituatur pulmo-
bus vel aliis etiam internis visceribus jam-
m valdopere erosis & suppuratis. (2) ☉va-
tionem semper prægrediantur temperantia
fortiter evacuantia (3) ☉vatio cau-
tur per ☿ium q. f. p. paucum. (4) ☉va-
tio semper instituatur in hypocausto satis
lido (5) ☉vatio nunquam inhibeatur,
nec cesset sponte. (6) Fauces & gingivæ
☉vatione erosæ optimè & frequentissimè
abulan-

abluantur, ne partes erosæ vel concreſcant, vel in iis etiam hyperſarcomata ſuccreſcant.

Thes. 27.

Purgantia verò hic præmittenda ante Θ vationem optima ſunt &ia cum aliis miſta v. gr. turbith minerale cum gummi gutt. in pilulas redactum, eſt ſufficiens purgans v. gr. turbith. gr. xij. gum. gutt. gr. iv. cum mica panis redigantur in unam pilulam majusculam vel turbith. min. gr. xij. ſcamm. roſat. gt. vij. f. l. a. pilulæ 4. vel 5. Exhibito tali purgante, deinceps fiat inunctio externa cum Θ io vivo v. gr. Θ us vivus vel cum unguento pomato vel roſato inungitur partibus externis, quo facto ſenſim atque ſenſim ſuboritur Θ vatio. Deinde promovetur etiam hæc Θ vatio per maſticationem bacilli, Θ ialis componuntur autem ex Θ io vivo cum ſaliva humana extincto & farina triticea cum melle. Hi bacilli in ore ſunt detinendi leniterque maſticandi. Commodioris conſiſtentia causa poteſt addi etiam tantillum thuris vel maſtichis: cum arc corall. verò res adhuc felicior ſuccedit; quippe quod Θ ivationem cauſatur absque adjumento inunctionis.

Thes. 28.

Cæterum gingivarum palati & faucium eroſioni ſuccurrimus per gargarisma pa-
rata

ta ex lignorum decoctis cum melle v. gr. osaceo rutaceo. Hyperfarcomati verò non potest præstantior accommodari medicina Rasea. ☉ li in hunc usum parata. & ☉ lum solve quoties, abstrahere ꝛa una cum tantillo ☉ infunde ☿ & habebis Ram laudatam. Quæ nim parantur ex ☉ ris nervis omnibus sunt imica, hinc ægrotantes maximè debiliti patiuntur Iverrigines, nauseam, tinitum aurium, imò omnia fermè mala. a. vero ☉ li saltem aliquantillum lædit acrimoniam prætereaque dolor hic est aliquot omentorum, subsequitur enim mox grata alcedo cum stypticitate gingivis & dentibus officua. Interdum ☉ vationem diuturorem sequuntur hæmorrhagiæ gingivæ, oris & narium largiores, à quibus men non metuendum, sponte namque cessant.

Thes. 29.

Quia vera postquam ☉ vatio aliquandiu gravit, dentes vacillant, palatum, lingua fauces cum gingivis excoriantur. fit ut asticatio ægrotantium tollatur omnino. uare alimenta sunt porrigenda fluida. v. gr. scula spissiora ex cerevisia secundaria & ne intrito simulque cocto, item ex creore avenæ. hordei &c. parata. Commuter equidem denegant ægrotantibus tem-

tempore Θ vationis vinum, attamen rigor nimius hinc etiam est supervacaneus, multoties enim summam vim analepticam observavi in agrotantibus ex haustulo vini generosi. Neque hic metuendum sibi esse à diuturniori alvi obstructione experientia me docuit. Siquidem memini viri generosi qui ultra 16. diem alvum non deposuit tempore Θ vationis, hanc tamen cum summa euphoria sustinuit.

Thes. 30.

Tertia indicatio obtinetur per diaphoretica cum anodynis conjuncta v. gr. per theriacalia cum Ω 9 Alibus \square is conjuncta. item \S lia \forall a, \forall a \S ialia v. gr. \S imprimis vero hic conducit Ra \S ii cum anodyno quodam mista.

Thes. 31.

Externè verò ubi nimirum fit partis affectæ contactus immediatus v. gr. in arthritide, Erysypelate, cancro etiam maximè est eo al- laborandum ut abstineamus à maturantibus vel suppurationem promoventibus, semper enim exinde oriuntur ulcera phagedœnica diuturna & difficillimæ curationis, prout quotidiana attestatur experientia. Potius verò operam demus ut externa anodyna applicemus. Talia autem sunt primariò omnis generis parata ex \S no. v. gr. ipsum
mini-

minium, nihilum album præparat. Tutia præparata, plumbago. Ex regno vegetabilium valdopere etiam convenit sambucus ratione corticis sui inferioris flavescentis, item folia solani officinalis recentia vel lacte moderata. Præterea valdè sunt proficua, ut utetulis etiam nota, semina secalicea, triticea & avenacea, communiter verò assumimus farinam, ne grana majuscula partem affectam nimium premant.

Thes. 32.

Ubi verò partes affectæ sunt intimiores .gr. in pleuritide, peripneumonia, nephritide, phrenitide, profunt hæc semina cocta ad consistentiam massæ & adeò calida, quam egrotantes perferre valent, applicata, multotiesque repetita.

Thes. 33.

Hæc ipsa Cataplasmata in arthritide denum sunt vocanda in usum quoque, quando bullitiō interna remittit, attamen ita, ut furoriferis & anodynis adhuc continuemus. Sint verò in omni arthritide composita ex solano, hyoscyamo, cicuta, cremore avenæ, ale enim cataplasma in podagra non solum multoties sum expertus proficuum, verum præterea commendatur etiam à Lindano in Collegio practico contra dolorem hypochondriacum.

Thes. 34.

Quibus interdum cataplasmata videntur
fordida, vel qui malo nondū nimium aucto
sunt incommoda, iis etiam præscribi possunt
emplastra v. gr. in malo hypochondriaco e
gumm *o. cicuta, nicotiana parata, commu
niter dicuntur **Milk-Pflaster**. Talia em
plastra imponi etiam possunt artubus. v. gr
emplastrum diaphor.

Thes. 35.


Quæritur de V. S. Utrum & quomodo
in his casibus conveniat. Pro responsione
notetur, quod V. S. in omni Erysipelate ex
terno sit periculosa, dum nimirum vena a
perta sanguinis fit revulsio, qua facta cessa
in artu dolor & pondus, quod præponderan
do internas convulsiones sedavit, unde
convulsiones istæ oriuntur de novo, nova
que in M. S. suboritur effervescentia. Qua
re & communiter dicunt **die Rose oder das**
Podagra ist ihm in Leib geschlagen. Con
tra vero in Inflammationibus internis omni
no prodest V. S. quantum per revulsionem di
solvitur illa interna inflammatio partibus no
bilibus vicina, imo quia partibus interni
inflammatis ut plurimum adhuc durat ebulli
tio, quæ inflammatione existente in partibus
externis, ut plurimum desit, illa citius seda
tur, hæc vero per modum recidivæ cujusdam

de novo excitatur. Quapropter in nephritide, pleuritide, peripneumonia, phrenitide, etiam omnino prodest, V. S. dum nimirum administratur primis diebus, Ultimis enim quando sanguis stagnans jamjam concepit p. n. motum intestinum, partesque inflammatae tendunt ad suppurationem parum proderit.

Thes. 36.

Maximè tamen etiam cauti sumus in V. S. instituenda, ne eam celebremus in his morbis, quando iis est conjuncta quædam malignitas, quæ dignoscitur primario ex pulsu inæquali tremulo debili &c. & ex contagio. Sic v. gr. anno 1682. in ædibus mente captorum nostris suboriebatur pleuritis maligna & contagiosa, quæ lecto affigebat 25. homines & nullum erat dubium quin omnes invasisset, nisi septem exempti essent alumni. Contra v. l. in vicinis ædibus vel in toto etiam suburbio simile quod non observabatur, ægrotantes interim sensim atque sensim affligebantur, ut proinde omnino liceret præsumere contagium. Ex his ægrotantibus moriebantur tres, Magister ædium, qui morosus renuebat omne medicamentum, deinceps mulier mente capta, & (3) puer VII. annorum phthisicus. Cæteri omnes restituebantur sanitati absque V. S.

Thes. 37.

Ultima indicatio obtinetur partim manu Chirurgi, partim per medicamenta. Manu chirurgi excindendæ sunt partes cancro-
sæ ubicunque in corpore commodè id fieri potest. Sic v. gr. quando cancer occupat mammam omnino tota mamma est præscindenda, si labium occupat itidem. Commoditatem verò demonstrat anatomia. Requiritur namque quemadmodum in dictis partibus fieri potest, ut partes undiquaque apprehendi, & constringi fortiter possint, quo nimirum præcaveamus largiorem & noxiam hæmorrhagiam. Contra verò ubi partes non undiquaque possunt apprehendi & præscindi, ibi medicamenta applicentur corrosiva v. gr. 1682. virgo quædam vetula in clitoride alebat scirrhum cancrösus, qui inferebat dolores exquisitissimos hinc persuasa à garrula vetula matrona, sese subiciebat manibus chirurgorum, qui præscindebant equidem partem clitoridis scirrhosam. Enimvero infelicissimo cum successu sequebatur etiàm excrecentia scirrhosa, quam ægro-
tans semper comparabat cum cornu durissimo, imo ipsa labia pudendorum, carunculaeque myrtiformes adeò transmutabantur in tumores cancröfos scirrhosos, ut deinceps neque am sine summo dolore neque

neq; excrementa reddere, neque sedere neq;
ambulare possit, imò anno V. præterlapso,
suppuratio pudendorum interna cum mara-
smo hanc miserrimam liberabat à vita & do-
lore. Qua propter omnino sumus cauti in
cissione talium tumorum & ulcerum. Me-
dicamenta verò corrosiva hic proficua sunt
sumenda primariò ex mineralibus, sic ⊕ egre-
gium est unde & unguentum Apostolorum
multa operatur in separatione & depuratio-
ne talium ulcerum. Applicito hoc | un-
guento, super imponatur emplastrum stypti-
cum Crollii vel dia. ☿is Rulandi. Idem
præstat unguentum Ægyptiacum, si nimirum
ei admiscetur à ⊕ aut unguentum Aposto-
lorum. Omnibus tamen palmam præripit,
▽ externa i. e. lixivium turbith. mineral.
▽æ hæ in cura luis ꝑæ communitè dicun-
tur **Tib-Wasser**. Quæ videri possunt apud au-
tores præstantiorem verò ego non sum ex-
pertus hæc, ut ut multas earum species pro-
baverim.

Thes. 38.

Hæc sunt dicta de partibus suppuratis ex-
ternis. Internæ verò v. gr. in pleuritide,
nephritide, peripneumonia &c. Tollun-
tur per medicamenta superius commenda-
ta in lymphæ viscida pertussim evacuanda.

Si verò vires id adhuc permittunt, tutissime
exhiberi potest intus arc. Corall.

Thes. 39.

Formulas ad indicationem primam vid.
superius.

Thes. 40.

Ad secundam verò & quidem extra paro-
xysmum in hypochondriacis sunt sequentes.

R. ♀r. ♂ial. ʒi.

p. Jalapp. gr. iiij.

diagryd. gr. j.

M. D. S. Erweich-Pulver auf 1. mahl
des Abends in frischem Biere zu neh-
men.

R. Limat. ♂is. pp.

fœcul. ar. gr. xij.

p. Jalapp. gr. iiij.

diagryd. gr. ij.

M. D. S. ut suprà.

R. R. ♂ij. ♀r. gt. xxx.

D. S. Erweichende Tinctur auf 1. mahl.

R. Essent. ♂is liquid. gt. xxx.

D. S. ut supra.

R. p. cathol. purg. gr. xxxv.

D. S. Purgier-Pulver auf 1. mahl.

R. ♀r. ♂lat.

♂ij. dulc.

Scamm. ♀r. aa. ʒβ.

M. D. S. ut suprà

R. Syrup. de Cichor. cum Rhab. polypod.

✓. Cichor. aa. ʒij.

p. Jalapp. ʒβ.

Scamm. ♀r. v.

arc. 2pl. M. gr. viij.

A. D. S. Purgier-Safftlein auf 1. mahl.

R. MP. ex *o quercetan. ʒj.

Resin. Jalapp. gr. viij.

1. a. Pilulæ cum Ra ʒij. no. 30. D. S. Purgier-Pillen 13. des Abends und 18. des Morgens darauf zu nehmen.

R. Herbæ Scolopendr.

filicis, aa. M, β.

Flor. Cichor.

genist.

bellid. aa. p. ij.

Rad. Cichor.

filicis.

polypod.

Jalapp.

mechoacann. aa. ʒβ.

Fol. Senn. Al. S. S. ʒx.

Sem. anis. ʒvj

C. ♀r. ʒβ.

Limat. ♂is pp. ʒj.

Incis. & Contus. insue Sacculo lineo. D. S.

Laxier-Püschel in 2. Kannen Wein

zu thun / und täglich 2. Gläser dar-
von zu trincken.

R. Fl. Cichor.
bellid.
genist. aa. p. ij
Rad. Jalapp. ʒj
Fol. Senn. Al. S. S. ʒiv.
C. ꝥr. ʒβ.

F. l. a. Nodulus. D. S. Laxir. Püschel in
eine Kanne Bier zu hängen / und
über Tisch davon zu trincken.

R. Spec. emoll.
carmin. aa. M. iij.
Sem. lin. ʒj.
Bacc. juniperi. ʒβ.

F. l. a. Decoctum in ▽ fontan.

R. Decoct. Col. ʒj.
Elect. hier. cum agar.
de bacc. laur.
mel. anthos.
ros. aa. ʒβ.

⊖ gemm. ʒj
vitell. ovorum no. j.

F. l. a. Enema

R. Fol. Senn. Al. S. S. ʒiβ.
passul. min. ʒiβ.
C. ꝥr. ʒj.

F. l. a. Decoctum cum prunis damascenis

R.

R. Decoct. Col. ℥ij
mann. calab. ℥β.

vel Decoctum Senn. cum Rhabarb. Myns.

A. D. S. Laxir Träncklein warm gemacht
auf 1. mahl zu nehmen.

R. Spec. Dialenn. Myns. p. decoct.

. l. a. infusum stent per noctem in loco
calido manè ebulliant colentur.

D. S. Laxir-Träncklein auf 1. mahl.

NB. In mulierum passionibus hystericis ob-
noxiiis semper poterunt commisceri
gutt, aliquot essent. castor. aut ∩ ⊖*:

Thes 41.

Formulae vero in cancro, lue & par-
tibus scirrhis externis sunt:

R. Extract. Glycirrhiz. f. q. ℥j.
Turbith. min. gr. xij.

. l. a. pilula no. 9. D. S. Purgier-Pil-
len auf 1. mahl.

R. Extr. fat ℥β. c. f. q. micæ panis
t, l. a. pilulæ no. 2. D. S.

Pillen auf 1. mahl.

R. Extr. dulc. ℥j.
Resin. Jalapp.

Gumm. gutt. aa. gr. iv.

. l. a. pilulæ cum Ra ℥ii Extr. fat. no. 15.

D. S. Purgier-Pillen auf 1. mahl.

F. 5

Thes.

Thes. 42.

Formulæ ad tertiam indicationem.

R. Ω us Θ *
 Essent. anodyn.
 cast. aa. gt. xxx.

M. D. S. Lindernde Essenz.

R. Ω . Carm. de β bus.
 Essent. anodyn.
 cast. aa. gt. xxx.

M. D. S. ut supra

R: p. March. antepil.
 spec. Cephal.
 aa. β .
 anod. conf.
 gr. v.

M. D. S. Abend = Pülverlein.

R. R. Corall. c. Ω . Cord. C. gt. L.
 Essent. Anodyn. gt. xxx.

M. D. S. Sonderliche Trank auf 2. mahl
 innerhalb 2. Stunden zu geben.

R. Extract. castor. gr. v.
 Laud. .hysteric.
 gr. ij.

c. f. q. Semin. lycopodii F. pilulæ no. 9.

D. S. Lindernde Pillen auf 1. mahl.

CAP

CAPUT VI.

DE

VITIIS SANGUINIS.

Thes. 1.

Sanguis noster naturaliter ita debet esse constitutus, ut gaudeat blanda quadam dulcedine prætereaque fit mediæ consistentiæ ratione fluiditatis & firmitatis. Hinc conjuncta lymphæ secundum omnes suas partes penetratur, quo facto, sanguis bene dilutus non duntaxat per totum corpus in arteriis admovetur, verum etiam per venas revehitur. Quo ipso motu insimul excitatur in sese blandum aliquem motum fermentativum, ex quo in corporibus humanis exurgit blandus totius corporis calor.

Thes. 2.

Hic igitur naturalis sanguinis status invertitur quidem nimirum primo sanguis suscipit qualitates peregrinas i.e. eas quæ non concurrunt ad constitutionem sanguinis dulcis blandeque fermentantis. Sunt autem tales qualitates, quæ ratione aciditatis naturalis excedunt, vel etiam ratione alcali abundant, ut inde exurgant, aut coagulationes sanguinis, ita nimirum ut sanguis totus degeneret
in


in mucedinem nigricantem viscidam, qualis observatur in sanguine hecticorum, aut faceffat in mucum tenacem albicantem, qualis observatur frequentissimè in febribus catarrhalibus, maximopere verò in Causo & demum in omnibus corporibus diuturnas febres perpeffis, ex quibus nimirum resultat sæpe cacochymia, quæ summum gradum adempta dicitur Cachexia. Hæc vitiosa sanguinis dispositio deinceps variis modis incommoda actiones naturales, unde etiam nova exurgunt vitia. Sic v. gr. naturæ conveniens est, ut decimo præterpropter quarto anno, & deinceps quovis mense in fœminis hæmorrhagia uteri spontanea instituatur. Quoties verò sanguis dicto modo est vitiosus, toties etiam hic observatur, aut totalis mensium suppressio, quæ simul etiam infert habitum quendam leucophlegmaticum totius corporis, frequentesque in sanguine ebullitiones febriles, unde oritur fœminarum chlorosis: Aut excernitur duntaxat materia quædam lymphatica albicans, o sanguinem nempe viscidiorum, unde exurgit mulierum fluor albus, aut materiæ talymphaticæ quædam saltem commiscentur particulæ cruentæ, unde oritur mensium decoloratio.

Thes. 3.

Non raro M. S. degenerat etiam fluiditatem nimiam, ex qua sequuntur hemorrhagiæ largissimæ adeò, ut sanguis & profluat sub forma cruoris, sed potius b forma xatis saltem tincti, id quidem quoties observavi in hæmorrhagiis nam.

Thes. 4.

Interdum M. S. etiam tota tota in grumos agulatur, ut sic coagulata instar cinorum rallinorum intra vasa hæreat, frustulatimq; imi queat vid. Pauli Tractat. de febribus alignis.



CAPUT VII.

DE

FEBRIBUS IN GENERE.

Thes. 1.

ARdua est quæstio de parte affecta primario febrium. Hippocrates enim, Galenus, plurimique tam veterum vide Senert. quam recentiorum vid. Willis, & Sylv. omnes febres imputaverunt M. S. p. n. fermentanti à vitiatis principiis fermentationi mini.

ministrantibus, v. gr. bile, fermento ventriculi, succo pancreatico. Helmont ver primis capitibus Tractat. de febribus his contradicit è diametro asserens, non in M. S. verum potius in arch. quærendum esse primum febrium nidum. Sæpius vero est demonstratum quod quicquid Helmontius per archæum furem ejusque exorbitantias exponere satagit, tribuendum sit systemati novo in varias convulsivas motiones actum. Hinc etiam ipse Willis eo devenit, ut horrores febriles imputet motibus convulsivis quos perpetiuntur plexus mesenterici et succo lymphatico per fermenta vitiata infecto, ita tamen ut demum hi succi vitiati in M. S. moti ebullitiones febriles causentur. Imo & ii, qui multa explicare student per 9, hos etiam allegant primario & primo affectos in febribus.

Thes. 2.

Nos hic brevitati studentes asserimus quod omnino Helmontiana argumenta sunt summi ponderis. Etenim dum sentis aculeus digitorum meum lædit, hic profecto ordinario infert digito febrim particularem. Suboritur namque sub exordium exquisitissimus dolor cum horrore totius corporis subsequitur digiti vehementissima inflammatio & non raro totius corporis languor

um agrypnia &c. Ubi profecto ἀποπνόν cer-
 nitur asserere aculeum hunc tanquam vitio-
 um fermentum læsisse sangvinem, coagula-
 tionemque causatum esse, longè potius ita-
 que statuendum est, aculeum hunc premen-
 do partes nervosas excitasse convulsionem,
 quam subsecuta est totius systematis nervosi
 convulsio, unde horror & ob remittentem
 cordis motum subitaneum totius corporis
 rigus. Ob factam vero convulsionem in fi-
 brillis propè aculeum infixum necessario
 subsequitur sangvinis stagnatio, qua facta, no-
 væ guttæ a cordis vi impulsæ magis magis-
 que fibrillas conantur dirumpere, unde no-
 vus dolor, novusque fibrillarum subsequi-
 tur spasmus. Quibus rebus fit, ut copiosa
 M. S. colligatur hincque copiosiore calor-
 em causetur, & demum per motum intesti-
 num, locali denegato, ulterius in sese effe-
 rescat, donec abeat in materiam purulen-
 am, aut aculeo subtracto anodynisque usur-
 atis, rursus diffuat.

Thes. 3.

Hæc omnia si conferimus cum febribus
 similem sibi quisque concipiet genesin ea-
 um. Haud enim facilè nos invadit febris
 bsque insigni horrore cum motibus convul-
 vis artuum, intestinorum, ipsius cerebri, ita
 t nunc patiantur præcedaneas diarrhoeas,
 vomiti-

vomitibus, animi deliquia, sensuum externorum subitaneas inducias, cum subsequente exaëstuatione totius corporis. Imo non facile quispiam invenerit profundius vulnus resanatum absque superveniente febre traumatica.

Thes. 4

Iaque in praxi ita nos geramus, ut haec quidem hanc controversiam dirimamus, interim tamen utrique sententiæ inhærentes tam rationem systematis nervosi convulsivam. M. S. in motum actæ rationem habeamus; siquidem per breve temporis spatium in febribus durat illa convulsio absque immutatione M. S. Imo plurimæ etiam febres originem suam trahunt ex vitia fermentis, quæ deinceps seu primo genus nervosum, seu M. S. lædant parum refert in praxi.

Thes. 5.

Dicimus vero naturam omnis febris consistere in p. n. quædam M. S. fermentatione, qua particulae \ominus næ sibi contrariæ vehementius se se penetrando excitant calorem fortiolem naturali. Unde & hic calor deinceps percipitur in singulis corporis nostri partibus. Oritur autem illa p. n. fermentatio à constrictione vasorum capillari-

um in certis partibus, quæ constrictio causatur horrorem nunc majorem nunc minorem in corpore humano. Hæc ipsa verò constrictio originem trahit aut à fermentis corpore nostro corruptis; aut à peregrinis miasmatis ab extra susceptis, aut ab ipsis interdum animi nostri vehementioribus commotionibus.

Thes. 6.

Hinc patet etiam, quod pars affecta in febribus ratione caloris p. n. sit M. S. hancque continens vasorum structura. Ut proinde quicumque cum veteribus truncos venarum majores loco partis affectæ allegat, habeat in quo cum veteribus conveniat. Horror verò & ut plurimum febres præcedens partem affectam agnoscit systema nervosum, quo sensu facilè consentiri possumus iis, qui febres conantur deducere ex Ω bus. Ratione causæ efficientis partes affectæ sunt sæpius stomachus & intestina, p. n. lymphæ viscidæ accumulata, unde & non refragamur veteribus afferentibus, febres originem trahere ex putredine. Ipsa etiam bilis non rarò fit viscidior, unde febricitantes in lingua sentiunt nigrem maritiem, quare rursus convenimus cum veteribus afferentibus certas febres biliosas. Cum affirmamus febres originem trahere tenuis, quatenus certa capillaria vasa con-

fringuntur, quo facto, sanguis in se ipsum agit, per naturalemque fermentationem concipit, satis apparet quomodo & veterum in febribus læsa transpiratio huc accommodari possit.

Thes. 7.

Causa itaque febrium proxima est, quicquid quocunque modo sanguinem in motu sufflaminare præter naturalemque effervescentiam excitare potest. Probatur autem hæc Thesis ex febribus artificialibus dum nimirum minus artificiose imperit Chirurghi non rarò in vulneribus, apprimere verò in fracturis per ligaturam fortiores item per casuales pressuras nosmet ipsi in nobis excitamus inflammationes, quas non rarò supervenit perfecta febris.

Thes. 8.

Divisio febrium communiter est hæc quod aliæ sint continuæ, aliæ verò intermittentes. Intermittentes verò rursus vel continentes i. e. eæ, quæ quidem continuo nos affligunt, interim tamen certis horis paroxysmos vehementiores causantur. Contra verò plenariæ intermittentes extra paroxysmum sæpenumero parum incommoditatis nobis inferunt. Ratione intermissionis febres quotidianæ, quæ singulis diebus hominem

minem affligunt, Tertianæ, quæ tertio quovis die & quartanæ, quæ quarto demum die recurrunt. Deinceps bene etiam sunt distinguendæ à se invicem, febris quotidiana à tertiana duplici, item tertiana à quartana duplici, quippe quæ satis frequenter observantur.

Thes. 9.

Causa talium paroxysmorum ita est abstrusa, ut à nemine hactenus satis digne sit exposita. Ut ut satis sit probabile, eam oriri ex causis naturalibus. Hinc etiam ut plurimum febris in cremento anticipando recurrit. v. gr. quando die Saturni hora 10. antemeridiana primus observatur paroxysmus, secundus verò die Lunæ circa octavam matutinam. In decremento verò postponendo, ita nimirum ut febris dictæ secundus paroxysmus repetet circa tertiam pomeridianam.

Thes. 10.

Hanc causam ut ut eruere nequeamus: attamen verissimum est, febres tales intermittentes originem suam sæpenumero trahere ex vitiatis reliquiis alimentorum in primis viis hærentibus, quæ proinde communiter etiam audiunt **Magen-Sieber**. Omnes autem his imputare non possumus, cum

constet, quod interdum febres tales, v. gr. intermittentes grassentur per longum terrarum districtum; v. gr. anno superiori 79. per Germaniam adeo frequens observabatur tertiana, ut in novellis aliquoties ejus fuerit mentio facta, imò ipse à Martio usque ad Julium quingentos curavi tertianarios. De quibus tamen non est præsumtio, quod vitium foverint in reliquiis alimentorum, cum in tot ac tam distantibus locis diversissimæ habeantur escæ. Quare potius suspicamur vitium hoc fuisse quærendum in Δ e tanquam causa aliqua communi. Imò hinc etiam tertianæ frequentes sunt, sub exordium veris, quartanæ verò autumnii.

Thes. II.

Signa diagnostica in omni febre intermittente ut plurimum quoad primum paroxysmum sunt communia, sunt autem primo ut plurimum subitaneus horror oriens circa regiones lumbares & dorsum cum subsequente horrore totius corporis; cum livore unguium, palpitatione labiorum, dentium stridore & tremore maxillæ inferioris, quæ omnia sensim atque sensim subsequitur anxietas in præcordiis, cephalalgia, lassitudo totius corporis, sæpe etiam vehementissimus vomitus, tandem vero incalescentia
totius

totius corporis cum pulsu frequenti, fortiori, celerique. Typus verò ipsius febris intermittens dignoscitur ex recurſu paroxyſmorum. Duplicatæ verò febres dignoſcuntur inde, quod ut plurimum in tertianis paroxyſmi ſibi invicem adeò exactè non reſpondeant ratione vehementiæ & ſymptomatum, ita tamen ut hodierno paroxyſmo ſimilis ſit tertio ab hoc die invadens; craſtino vero paroxyſmo ſit ſimilis paroxyſmus quarto recurrens die. Quartana vero duplicata cognoscitur inde, quod ut plurimum invadat nos primo & ſecundo die, tertio verò non, ſed rurfus quarto.

Thes. 12.

Signa prognostica ſunt omnis tertiana eſt facilè curabilis, ſi patiens fuerit moriger. Nam raro protenditur juxta Hippocrat. Ultra ſeptimum paroxyſmum, ſi vero ægro- tans fuerit moroſus non raro eſt diuturna. Tertiana raro etiam eſt lethalis, niſi forſitan in decrepitis atrophia laborantibus & aliis valdè debilibus, Tertiana in quibus ☐a primis paroxyſmis eſt ☐tata, ut plurimum etiam eſt diuturnior aliis juxta Bar- beth. Quartana eſt ſcandalosa planè. Nam ut ut etiam non ſit curatu impoſſibilis; attamen ut plurimum ſit diuturna ob ægro- tantes, qui medici diætam adornatam renuunt, quia

nimirum duos dies intercalares transigunt sine singulari molestia. Quartana vero maximè diuturna raro est lethalis, ut ut produxerit ad maciem, modo non supervenerit hydrops vel infarctus pulmonum. His enim præsentibus sæpenumero fit lethalis. In omni febre intermittente appetitus constans bonum est signum ratione vitæ, ut ut in quartana sæpe pronunciet morbi diuturnitatem.

Thes. 13.

Curatio febrium intermittentium instituatursæcundum has indicationes fermenta vitata corrigantur per ☿tantia, ☿ta evacuentur, convulsiones sedentur, viscera debilitata roborentur.

Thes. 14.

Prima indicatio obtinetur primario per medicamenta alcalia in tantum saturata. Neque etiam facile inventa fuerit Methodus perfectior in curandis febribus Barbethiana quæ tota tota fundatur in usurpatione talium. Sunt a. v. gr. ☿ Card. ben. Absynth. cent. min. fumar. Cichor. ʒ9. ☿lat arc. 2pl. Myns. ☿. antifebrile Myns. quoc ingreditur ☿*, ut ut hæc compositio in tantum videatur congrua, quia nimirum ☿ Ac *i post conjunctionem cum ☿bus vi
mo

noxabit. Enim verò hoc non obstante Θ antifebrile Myns. est revera tale, qt. tantil-
um nimirum Ω 9 accidi commiscetur
cum Θ bus Vis. Hisce succedunt ppæ
ex animalium partibus duris v. gr.
Ocul. Θ . C. C. f. Δ e mater perlarum,
quippe quæ ingreditur etiam pulverem anti-
febrilem Timæi von Gûlden = Klee.
Conchæ ppæ juxta methodum antifebrilem.
Strobelbergeri & Crollii, crania humana.
Sequuntur etiam Θ ia Λ ia \square sa, attamen
temperata v. gr. Ω Θ *i dulcis. Ω C, C.
dulcis, unde & Ω 9 Bezoard. Dresdensis.
Deinceps multa etiam hic pollent vegetabi-
lia amaricantia, v. gr. tumar, scord. Card,
bened. cent. minus, Cichor. pimpinell, an-
gelica &c. Quorum succi, essentia, syrupi,
pulveres imo ∇ æ etiam Ω atæ possunt esse
usui quantum nimirum in amaritie eorum
latitat alcali quoddam \equiv tans aciditatem per-
eigrinam, nimiamque visciditatem inde sol-
vens. Hinc prostant medicamenta etiam
composita v. gr. ∇ æ antifebriles, Essent. an-
tifebr. Mich. Imò vina etiam medicata ex
his parata profunt.

Thes. 15.

Nostri memoria increbuit cortex Peru-
vianus à nonnullis dictus febrifugus. Vid.
Bartholin in Cent. anat. Item Schröder in

appendice , item Sydenham. de febribus & Recentiore Jones. Audit communiter china de china. De hoc cortice quæstio est utrum tuto adhiberi possit in febribus arcendis? pro responsione notetur, quod non adulteratus omnino in se contineat \ominus quoddam amaricans , cujus intuitu omninò poterit esse antifebrilis. Porro hic ipse cortex notabili gaudet virtute adstrictoria, quo sensu remediari etiam potest convulsionibus febrilibus, prout etiam id ipsum quotidiana attestatur experientia , ut proinde vocari possit in usum medicum, ubi corpora febrilia nondum conceperunt principium quoddam cacochymicum vel planè cachecticum, ubi verò cachexia, vel cacochymia jamjam egerint radices, ibi non sine insigni damno imo ægrotantium exitiosa perniciæ adhibetur: siquidem adstringendo, causatur obstructions viscerum, in quibus partes febriles præcipitatæ hospitantur, magis magisque cumulantur & coagulantur, unde suboriuntur hydrops, asthma &c. Præterea semper etiam chin. chin. admisceri possunt alia antifebrilia v. gr. \ominus antifebr. Myns. Card. ben. &c. Simile ferme præstat rad. Gentianæ pulverisat. & cortex & radix infundi possunt vino Rhenano & una C. V. deglutiri b. horio ante paroxysmum. Vel para-

urari potest Elect ex Rob. passular, item
unor. nec non Sorbi & hoc cortice vel ra-
ce pulverisatis, Vid. potest hac de re
eckers in notis ad praxin Barbeth.

Thes. 16.

Ex mineralibus huc faciunt medicamen-
parata ex ꝑio v. gr. ꝑ diaph antihect. Pot.
diaph. c. ꝑe Bezoard. ꝑiale ritè præpara-
m, hoc est sudoriferum magnum Petri.
h. Fabri, quod ipsi est decantatissimum &
rtissimum antifebrile, quod & ipse aliquo-
es sum expertus.

Thes. 17.

His ꝑtibus in tantum præmissis adhibe-
tur purgantia quæ nunquam sunt omitten-
in curanda febre intermittente. Prima-
o autem hic profunt vomitoria, apprime-
ro ubi suspicio est alimenti cujusdam fe-
ilis assumpti. Inter emetica verò palmam
linquimus ꝑ ialibus seu itaque ꝑr. emetic.
yns. sive syrup. Angli Salæ, Essent. emet.
velf. ▽ bened. Rulandi vel etiam ꝑ vitæ c.
o substantia exhibueris perinde erit. Imo
mm. gutt. in corporibus robustis tuto pot-
adhiberi.

Thes. 18.

Purgantia verò sumantur præter vom-
ia ex Jalapp. mechoacann, scam. sive as-
nantur priora pulverisata, sive resinæ omni-

um. Nam Scammonium nunquam maximopere verò in febribus crudum porrigatur. Clysteres quoque hic conferunt imprimis in corporibus tenerioribus quatuor horis ante paroxysmum applicati. Valdoper namque paroxysmorum infringunt atrociam.

Thes 19.

Tertia indicatio obtinetur per theriaca lia, (multa debet Theriaca Camphoræ qu omnibus modis adhibita hic prodest vel collo etiam solum appensa ob effluvia continua) Θia Aia, castoracea cum opiatis nostro mixta. Apprime verò dum hæc exhibentur duabus horis ante paroxysmum corpusque disponatur ad sudorem blandum Vid. Tulp. monit. medic. Aphor. 65. Rec etiam monet Tulpius in aphorismis suis medicis doctissimis, quod sudor universalis præcedens febris intermittens accessum morbum ex toto solvat. Ubi tamen notandum, quod sæpe redeat febris intermittens etiamsi præter hunc sudorem alia etiam adhibeantur medicamenta methodica v. g. ætiantia & evacuantia. Notetur tamen quod semel exhibito purgante, non mox post paroxysmos emanantes de novo sit repetenda purgatio: Siquidem ut plurimum novos causatur paroxysmos.

Thes. 20.

Ultima indicatio obtinetur primario per
 edicamenta amaricantia $\circ\circ$ a partim, et-
 m per acida \ominus na bene temperata sic v. gr.
 lixiv proprietatis, seu acido poterit suffice-
 e, quibus tamen placet exhibere Elixir. \oplus li
 lynn. illi licitum esto, modo Ω \oplus li fuerit
 ene præparatus, qui aliàs solus optimus est
 a tertiana & quartana fuganda, sed requi-
 tur præparatio exacta, nimirum ut ut $\Omega\theta$
 θ li sit acidissimus; attamen demonstrat
 nchirisis chymica, quid concentratus post
 fusam ∇ m. vehementissime in se ipsum
 gat. Ex quo apparet diversitas \ominus ium hunc
 Ω um constituentium. Itaque hæc \ominus ia
 er digestionem & \mathcal{N} ationem optimè sunt
 nienda & à \propto e separanda; Interim tamen
 imium \forall a illa \ominus ia quæ constituunt $\circ\circ$ o-
 timum sunt relinquenda. Hic profecto
 $\Omega\theta$ optimum & maximum securum erit
 ntifebrile, quantum nimirum fermentum
 entriculi, fibrarumque tenorem refarcit,
 arili modo confert etiam mixtura simplex
 & ex hac parata Ra Bezoardica; quippe qua
 ola multoties præmissis evacuantibus, novi
 curatas multas tertianas.

Thes. 21.

Formula ad primam indicationem.

R.

R. Ocul. ☿. pp.
 ☉. antif. Mynf.
 ☿ diaph. aa. 3β.

M. D. S. Fieber-Pulver ins Bier un-
 den Tag über trincken zu lassen.

R. matr. perlar. pp.
 ☿. diaph. aa. 3β.
 ☉. Card. ben. 3j.
 arc. 2pl. M. 3β.

M. D. S. ut supra.

R. Croc. ♂. c. ☉bus. 3ij.
 ☉. Card. b. 3j.
 M. D. S. ut supra.

R. ▽. Card. b.
 Scord.
 antif. M. aa. 3vj.
 Cent. min. c. v. 3ij.
 matr. perl. pp.
 ☿ diaph.
 ☉ antif. M. aa. 3β.
 Syrup. card. b. 3β.

M. D. S. Fieber-Tranck gerüttelt stünd-
 3. Löffel voll zu nehmen.

Huic potioni commisceri etiam pote-
 chin. chin. 3β.

R. Herb. fumar.

Card. ben. aa. M. β.

fl. cent. min. p. ij.

Rac

Rad. Cichor.

Pimpinell. aa. ʒβ.

F. l. a. Decoctum in f. q. ▽ fontan.

R. Decoct. Col. ʒj.

☿ ☼. ʒj.

Pro ratione ægrotantium potest addi sy-
ous. Card. b. ʒj.

D. S. Bitterer Fieber Tranc̃ alle 2.
Stunden ein Wein-Gläßlein zu
trincken.

R. Essent. Absinth.

Card. b.

☿ ☼. aa. ʒj.

C. S. Fieber-Essenz täglich 50. Tropffen
zu nehmen.

Thes. 22.

Ubi verò quartana subest, ibi ut pluri-
m commisceantur laudatis formulis ☿ lia
v. gr.

R. ☼. Card. b.

☿ diaph. cum ☿e.

ocul. ☿. pp. aa. ʒβ.

D. S. Diegerir und Fieber • Pulver
den Tag lang zu trincken.

R. Croc ☿. cum ☼bus.

matr. perl. pp. aa. ʒβ.

☼. antif. M. ʒj.

M. D. S. ut supra.

Thes.

Thes. 23.

Formulæ ad secundam indicationem.

R. ☿r, emet. gr. ij.
arc. 2pl. M. gr. vj.

M. D. S. Erbrech = Pulver auf 1. mahl

R. ☿r. ⊕ lat.
p. gumm. gutt.
☿r. emet. aa. gr. iij.
M. D. S. ut supra.

In quartana.

R. Croc. ♂. c. ⊕bus. ʒβ.
☿r emet. gr. iv.
M. D. S. ut supra.

NB. quod sæpe exhibita ♂ia subsequatur
excretio nigricans, quæ neminem
terrore vel mirum habere debet.

R. Rad. Mechoacan. ʒj.
Scamm. ☿r. gr. vj.
☿r. ⊕ lat. gr. viij.

M. D. S. Purgier = Pulver auff 1. mahl.

R. p. Jalap. gr. xij.
Scamm. ☿r. gr. vj.
arc. 2pl. M. gr. viij
M. D. S. ut supra.

R. MP. ex fumar. gr. xij
Res. Jalapp.

Scamm

Scamm. aa. gr. iij.

diagryd. gr. j.

C. Essent, Fumar. pilul. no. XXI. D. S.

Purgier-Pillen auf 1. mahl.

In Quartana.

R. Extr. ♂is

Hellebor. nigr.

Res. Jalapp. aa. gr. v.

Scamm. ♀r. gr. vj

⓪. ♂iat gr. j.

l. a. Pilul. no. XXI. D. S: **Purgier-**

Pillen auf 1. mahl. Repetantur

autem hæ pilulæ singulis septimanis.

R. Summit. Absynth.

Herb. Card. b.

Fl. cent. min.

Cichor. aa. p. ij.

Rad. Cichor.

pimpinell. aa. ʒβ.

Hæ species infundi possunt in mensuras
uas vini Rhenani & deinceps singulis die-
bus jejuno stomacho hauriri potest consue-
tum vitrum. Ubi verò animus est purgan-
di addatur hisce speciebus,

Rad. Mechoac.

Jalapp.

Rhab. Mon. aa. ʒβ.

Fol. Senn. Al. f. f. ʒx.

C. ♀r. ʒβ.

Iciss.

Icis. & contus. insinuantur sacco lineo D.
Species zum purgierenden Kräutern
Wein ln. 4tana vero addantur his
speciebus limat. ♂ pp. 3iij.

Thes. 24.

Formulae ad tertiam indicationem.

R, Essent ther.

☿ ☉*

Essent. anod. aa. gt. xxxvj.

M. D. S. **Schweiß-Tropffen 2. Stunden vor dem Fieber zu nehmen.**

R. Essent. Card. b.

cast. aa. gt. XL.

anod gt. xxv.

Liqu. c. c. gt. XL.

M. D. S. ut supra.

R. matr. perl. pp.

☉. Card. b.

☿r. ☉l. aa. 3β.

Laud. op. gr. j.

M. D. in 3plo. S. **Fieber-Pulver jedes auf 1. mahl 2. Stunden vor dem Fieber zu nehmen.**

R. ☿. Card. b.

Scord.

antifebr M. aa. 3β.

spec. antif. i Strob. 3j.

☉. Absinth. gr. xv.

arc. 2pl. M. jß.

Mithridat. Dam. 3ij.

M. D. S. Fieber-Träncklein Löffelweise
2. Stunden vor dem Fieber zu
nehmen.

R. ▽. Card. b.

Scord.

Antifebril. M.

aa. ʒß.

Spec. antifebril. St.

⊖ Absinth.

Card. b.

aa. ʒj.

∩ ♀. gutt. xij.

sirup. Card. b. ʒß.

Misc. D. S. Fieber-Tranck gerüttelt Löff-
felweise zu nehmen.

R. Extr. Card. b.

Fumar.

Centaur. min-

aa. gr. v.

Laudat. op. L.

gr. ij.

. f. q. sem Lycop. f. Pil. No. XV. D .S.
Fieber-Pillen auf 1. mahl.

Thes. 25.

In quartana ante paroxysmum exhibean-
tur sequentes formulæ.

R. p. chin. chin 3ß.

☐. ☉. gr. xv.

☉. cinam. gt. j.

Essent. anod. gt. x.

M. D. in 3plo. S. Fieber = Pulver jedes
auf 1. mahl 2. Stunden vor dem
Fieber zu nehmen.

R. Essent. Absinth. gt. XL.

anod. gt. XXX.

☉. camph. gt. ij.

M. D. S. Fieber = Mixture auf einmahl
gerüttelt in frischen Bier zu nehmen.

Thes. 26.

Ad ultimam indicationem.

R. Elixir propr. f. acido. gt. XXX.

D. S. Magen-Tropffen auf 1. mahl.


R. ☐. ☉. li. optime rectific. 3ß.

D. S. Magen-Wässerlein 3. Tropffen des
Morgens in warmen Bier zu nehmen.

Thes. 27.

Ultimo quæritur de V.S. in intermittentibus
utrum conveniat? pro responsione notetur
quod omnino juxta Barbethi monita inter-
mittentes post institutam V.S. exasperentur
quatenus nimirum M. S. amplius conce-
ditur

ditur spatium effervescendi. Enim verò quia & hoc modo sanguini liberior comparatur motus tam localis quam intestinus, omnino V. S. etiam sunt instituendæ. Instituantur verò apprimæ in diebus intermittentibus & non adeo large, verum in adultis ab ℥ij. vel ℥iij. usque ad ℥vj. Nec sicco pede sunt prætereunda vesicatoria, cum jam olim nonnulla carpis applicare consueverint Medici sive sub forma herbarum contusarum sive Empl. v. gr. Strobelberg, his tamen anteponantur ipsa vesicatoria.



CAPUT VIII.

DE

FEBRIBUS CONTINUIS INTERMITTENTIBUS.

Thes. 1.

Febbris continua intermittens dicitur in qua nulla totalis apparet apyrexia, interim tamen certo tempore habet adjunctas exacerbationes constituentes paroxysmos.

Thes. 2.

Hi sunt autem certi ita, ut febris continua cum intermissione æmuletur nunc typum quotidianæ, nunc tertianæ, rarissimè verò

quartanæ, et si observatur, ut plurimum quartanæ degenerant in hæcticas.

Thes. 3.

Interdum verò hi paroxysmi sunt erratici ita ut nullo termino fixo redeant, quales febres observantur præprimis tempore autumnali & vernali communiterque dicuntur febres catarrhales.

Thes. 4

Talibus febribus erraticis annumeranda etiam est febris incurabilis à Medicis ad nostram usque memoriam observata, communiter dicta febris hæctica à Græco *ἥκτικα* habitu, quia nimirum tales febres semel obortæ, videntur nactæ talem inhæSIONEM, ut ne profligari possint instar habituum, qui secusquam dispositiones perire nequeunt.

Thes. 5.

Causa proxima talium febrium ut plurimum est duplex partim nimirum quærenda in causa febrium continuarum, partim vero in causa febrium intermittentium, quia verò in febribus continuis semper adest effervescentia quædam M.S. nimia, omnino etiam quærenda est causa hujus effervescentiæ nimie in causis naturaliter sanguinem ad calorem concipiendum disponentibus graduque saltem excedentibus.

Thes.

Thes. 6.

Ratione paroxysmorum causæ latitant in causis intermittentium concurrentibus simul cum superioribus.

Thes. 7.

Conveniunt autem moderni physiologi plurimi, calorem nostrum naturalem ortum debere contrariis \ominus bus fermenti ventriculi & bilis, quapropter & effervescentiæ . n. sunt deducendæ inde. Operantur utem p. n. hæc ipsa \ominus ia quantum qualitatem contrahunt excessivam, in stagnatione fermenti ventriculi in ventriculo, vel lymphæ etiam in pancreate, bilis verò in sua vesicula, vel quantum M. S. in motu suo impedita, concipit vehementiorem turgescentiam.

Thes. 8.

Signa diagnostica talium febrium sunt familiaria ei qui novit febres continuas & etiam intermittentes. Hæctica in specie dignoscitur ex febris diuturnitate, totali macie, venarum pallore, genis rubescentibus & collatis uno verbo ex facie Hippocratica.

Thes. 9.

Prognostica sunt omnis febris continua cum intermissione facile potest degenerare in continuam, hinc semper est observanda & non parvi æstimanda. Sæpe etiam sub tali-

bus febribus latitat quædam malignitas tandem sese prodens maculis, diarrhoea deliriis &c. in catarrhalibus angustia pectoris & stertor non sunt signa lethalia, quamdiu lymphæ est humida, ægrotansque per tussim rejicit sputum lubricum albescens, ubi vero lymphæ & tussis sunt siccæ ibi imminet mors. Convulsiones verò juxta Hippocrat. supervenientes tales febres ut plurimum etiam annuntiant mortem, præprimis tamen extra paroxysmum delirium. uti & somnus & vigilia nimia, in qua febris somnus malum adfert lethale est, ubi verò bonum non est lethale signum etiam in his febribus juxta aphor. 1. Sect. 2. In hectica copiosa rejectio materiæ viscidæ & tenacis per tussim est signum lethale: item omnis diarrhoea hecticam superveniens etiam est lethale. ☐a sabulosa ruffa uti & excretio sabuli ruffi per habitum corporis multoties mihi indicarunt reconvalescentiam in macie scorbutica & febris erratica, quæ ferme mentitur speciem Hecticæ

Thes. 10.

Curatio instituatur secundum has indicationes. Fermenta vitata corrigantur ebullitio sanguinis temperetur.

Thes. 11.

Prima indicatio obtinetur per methodum medendi institutam in febribus intermittens.

Thes.

Thes. 12.

Secunda vero indicatio obtinetur per
medicamenta sequentia in capite de febri-
bus continuis & malignis.

Thes. 13.

Hæctica ab hac methodo declinat, siqui-
dem ut plurimum inducit lentam maciem,
dum nimirum uti dictum pars sanguinis coc-
cinea sese non miscet cum parte serosa,
hincque etiam sanguinis ebullitiones sunt
lentæ & inordinatæ, magisque post aliqua-
lem esum & potum sensibiles, ut plurimum
verò maximè chronicae. Itaque omnis ope-
ra in hac profliganda dirigatur eo, ut aci-
dum peregrinum sanguinem rubrum coa-
gulans sensim atque sensim tractetur. Id
ipsum vero indipiscimur per medicamenta
ex mineralibus ꝯla ita tamen præparata, ut
ne cum impetu effervescent. Hinc ꝯ diaph.
c. ꝯe omnibus facile palmam præripit. Nam
jam olim practicus peritissimus Quercetanus
commendavit limatur ꝯ in pulvere suo
cachectico dum nimirum hæc paratur cum
acido ꝯris, attamen hæc ipsa limatura ni-
hilominus sæpius ventriculo adhuc est ini-
mica, unde post frequentiore hujus pul-
veris usum exurgunt ructus nidorosi. De-
inceps antih. Poter. omnino etiam egregiam
meretur laudem. Dresdæ nonnulli medici

egregiis laudibus in hoc affectu extollunt materiam perlata, quæ origine in suam debet Krügnero. Enim vero hæc ipsa materia perlata multis modis coincidit cum antihectico. In antihectico vero ratione alcali zialis inest adhuc alia vis. Quare hoc antepono ei.

Thes. 14

Tanquam optimum antihecticum experientia edoctus commendo perlas; quippe in quibus non est uti Zvvelf. ejusque affectu sunt arbitrati, nuda vis alcalica, verum præterea & vis medicamentosa Altilis, quam in præparatione perlarum per refraganti- am quandam animadvetere licet. Hæc vis in corpore humano præter rationem acidi insimul etiam in M. S. excitat novum quendam motum fermentativum, quo M. S. de novo quoad partes suas in se invicem adigitur. Hinc perlæ in hectica non sunt præparandæ per menstrua nimium acida vva, verum per acida Altilia vel etiam nudæ tufæ & præparatæ sunt exhibendæ. Acida autem illa Alia sunt ☿ item ☿ ⊕ is Zvvelfer. Unde exurgit ejusdem Magisterium resolvable perlarum. Item Magisterium perlarum cum succo citri. In pauperibus ægro-
tanti-

antibus suppleat defectum perlarum earum
mater.

Thes. 15.

Perlas sequitur ebur tanquam pars quæ-
dam animalis durior, ob quam suam duri-
em in corpore humano lentius etiam cum
cido peregrino efferfescit, hincque com-
muniter etiam refertur inter medicamenta
refrigerantium. Imo præter spodium hoc
milia alia etiam animalia Δ em non adeo
experta, huc etiam referenda sunt, quo
sensu ipse etiam pulv. marchion, antepil. lo-
am hic invenerit.

Thes. 16.

Tandem in hæctica pingua etiam tempe-
ta laudem merentur v. gr. semin. pingua
papaver. frigida majora præprimis cucurbit
nygdal. dulc. pineæ, & hinc præparatus
Hal. contra phthisin, & hoc sensu ipsum
iam lac. De quo obiter notandum, quando
communiter quæritur utrum lac conveniat in
marasmo **in der Schwindtsucht** / quod o-
minino sic quando nimirum marasmus oritur
sceribus adhuc integris, contra vero in ex-
cerationibus, v. gr. pulmonum, magis ad-
get materiam illam viscidam & purulen-
m. Utrum vero assumserimus lac capri-

H 5 num,

um, an vero vaccinum parum interfuerit
Hoc tamen credatur firmissime, quod lact
omni in hoc affectu sit præferendum huma
num. Quippe quod aliquoties expertu
fum saluberrimum.

Thes. 17.

Hunc Hecticam si quis cum febre scor
butica inveterata, vel etiam colliquativa ha
bet Synonymam, à vero non multum aber
raverit in curatione.

Thes. 18.

Formulæ ad hecticam curandam.

R. p. march. antepil.
alii contraphthif.
ʒij diaph. cum ʒe
perlar. Orient. pp.
a. matr perl. pp, aa. ʒj.

M. D. S. Täglicheſ Stårck-Pulver de
Tages über 2. Meſſer-Spißen ʒ
nehmen. Sive enim mane jejun
stomacho & à meridie circa quintat
in brodio assumatur, sive potui cere
visiæ injiciatur perinde fuerit.

R. Mag. perl. cum succo citri.
resol. ear. aa. ʒj.

M. D. S. Köstliches Perl-Pulver appl
cetur ut supra,

R. Cons. ros. rubr. ʒiβ.
amygd. dulc. exc. ʒβ.

nuc. pin. ʒij.

fem. 4. frigid. maj. aa. ʒj.

Ebor. f. Δ e ʒiv.

Antih. pot. ʒj.

c. f. q. Juleb ros. f. l. a. Electuarium.

M. S. Stärck=Latwerge täglich 4. oder 5.
Messer=Spitzen.

R. Amygd. dulc. exc. ʒvj.

nuc. pin. rec. exc. ʒiij.

fem. cucurb.

papav. alb. aa. ʒiβ.

F. l. a. emuls. cum Decoct hordei

ʒv. adde

∇ . Cinam. borrag. ʒvj.

Ebor. f. Δ e ʒij.

matr. perl. pp.

antih. pot. aa. ʒj.

Edulcoratur parum c. f. q. sacchari albissimi.

M. D. S. Köstliche Perl=Milch alle Stun-
den 2. Löffel voll zu nehmen.

Interdum etiam urgente nimirum calore febrili tali emulsioni addi potest \textcircled{D} iat. ʒβ. Interim tamen sæpe hoc non est repetendum ob metum diarrhoeæ. Dum autem utuntur ægrotantes lacte humano circa tempus somni porrigatur pulvis ex marchion, & perlis hoc modo.

R. p. march. antep. gr. xij.

perlar. or. pp. ʒβ.

Inter.

Interdum tali pulv. instillari possunt gt. præterpropter 5. ad 8. Essent. anod.

R. ▽. fl. borrag.

(Cichor. tiliæ.) ʒβ.

Cinnamom. bugl. ʒj.

p. march, antep. gr. xij.

perlar. or. pp. ʒβ.

Syrup. fl. tunic. ʒj,


Essent. anod. gt. viij.

M. D. S. Abend-Träncklein auf 1. mahl.

R. p. Hal. contra phthis. ʒj.

anod. conf. gr. iij.

Misc. D- S. Köstlich Abend-Pulver auf 1. mahl.



CAPUT IX.

DE

FEBRIBUS CONTINUIS.

Thes. 1.

FEbres continuæ non videntur aliæ, quam intermittentium paroxysmi continuati. Hinc etiam causa earum proxima coincidit cum causis paroxysmorum; Remotiores verò causæ in his ipsis febribus sunt vehementiores. Hinc quando febres continuæ originem trahunt ex vitiatis fermentis, ut plurimum

imum vitium latitat in bile nimium facta al-
alica, quæ in sanguinem penetrans excitat
effervescentiam talem, ita tamen, ut huic
illi non imputemus causam, tamdiu conti-
uata effervescentiæ, quemadmodum ♂i-
um ☿ ☿li comisto referimus causam e-
bullitionis. Verum duntaxat quemadmo-
um videmus varia fermenta excitare in
illis rebus fermentandis diutinam ebullitio-
em, quantum nimirum in illis jamjam præ-
xistentia ☿ia contraria sese cient in
notum.

Thes. 2.

Hinc etiam apparet quomodo & aliæ res
in corporibus optime sanis valeant excitare
febres continuas, bile antea illæsa v. gr. ani-
mi motus subitanei, quippe ex quibus non
rò observatur febris continua vehementis-
ma. Imo inde etiam apparet quomodo fe-
bris dicta traumatica, vel vulneraria possit
pervenire omnis generis vulnera, contusi-
ones, luxationes.

Thes. 3.

Communiter autem febres hæ continuæ
viduntur in febrem ardentem, quæ Græ-
cis audit Cavsus, in qua ægrotantes affligit ve-
hementissima & continua ebullitio sangui-
nis, quam subsequitur prostratio omnium
virtutum

virium, sitis vehementissima, agrypnia, sæpe delirium, ut plurimum alvi constipatio-

Thes. 4.

Deinceps sequitur species febrium continuarum quæ vocatur febris maligna, in quâ quidem etiam est continua ebullitio sanguinis; attamen sæpius nunc remissior, nunc vehementior, adsunt præterea symptomata teterrima v. gr. convulsiones, vomitus, diarrhoeæ, angustia in præcordiis, sensuum externorum corruptio, delirium, nunc agrypnia, nunc somnus nimius, nunc sitis, nunc ejus totalis carentia; interdum adsunt exanthemata cutanea, interdum certarum partium inflammationes maxime continuarum hæmorrhagiæ &c. Ut plurimum autem tales febres ob symptomata majora, quam quæ ordinariè febres concomitantur subsequitur eventus tristis. Harum verò febrium commune est nomen, interim tamen essentialiter se invicem discrepant, forsitan innumerabiliter. Vix enim hætenus præterlapsus est annus, quin sese prodiderint febres novæ symptomatibus stipatæ.

Thes. 5.

Communiore interim species sunt febres petechiales *Stect = Sieber* / in quibus proruunt maculæ nunc lividæ, nunc rubræ, nunc fuscæ cutaneæ; Purpura *Griesel*

ua proruunt vesiculæ minimæ cutaneæ nunc
 abescentes, nunc pallentes: morbilli **Ma-**
rn in quibus apparent tubercula minora
 bicundissima, sibi que maxime continua,
 æ tubercula deinceps sensim atque sensim
 emittunt absque suppuratione. Variolæ
ie Pocken in quibus itidem proruunt tu-
 bercula rubra, quæ magis magisque lattol-
 untur & demum per suppurationem suc-
 rescunt in vera ulcera. Morbus Castrensis vel
 Ungaricus item Pannonicus, in quo raro ve-
 re observantur petechiæ, longe potius adest
 delirium vehementissimum, angina vel in-
 ammatio faucium, unde & communiter
 dicitur **die Ungarische Krankheit**/ item
die Bräune/ quia nimirum Germani nostri
 milites proficiscentes in militiam Ungaricam,
 plurimum hoc vexantur morbi genere,
 deò ut hinc etiam Ungaria Germanis quem-
 modum Sicilia Gallis dicatur sepul-
 chretum. Hæc febris maligna si extra Unga-
 iam, in nostris provinciis grassatur absque
 notabili inflammatione faucium dicitur **die**
Haupt-Krankheit.

Thes. 6.

Quando verò has malignas febres conco-
 nitantur eruptiones bubonum & carbun-
 ulorum, tunc dicuntur febres pestilenciales,
 cum verò contagium accedit vehementius
 malum

malum, dicitur ipsa pestis. Nam apud auctores vix constat satis de discrimine inter ipsam pestem & febrem pestilentialem, nisi forsitan id in solo gradu observare liceat. Quando vero quaestio est utrum nimirum in peste semper adsit etiam febris? Res facili est decisa ex nostris superioribus traditis. dum enim febres assumimus in sensu Helmontiano, omnino est affirmandum adesse febrem ut non ut causam morbi, sed potius ut effectum, quando verò animus est definiendi febrem in sensu aliorum autorum tunc non adeo semper adest. Vid. præterea de pestis natura mea disputatio.

Thes. 7.

Causa efficiens febrium malignarum est varia, nunc enim originem trahit ex variis effluviis, nunc vero in ipsis etiam nostris corporibus progignitur. Nam omnes causae talium febrium non operantur, nisi convellendo systema nervosum, quod deinceps subsequitur in M. S. motus intestinus corruptivus, ut egregie dixerit Helmont. Tractat. progred. ad Morb. Cognit. Quod potentius vicinus magis domesticum ens exercitium in humanam vitam conscripserit. Nam quod tales morbi maligni in ipso nostro corpore sub oriri possint, nos docent febres maxime malignæ, vulnera, contusio-

es & fracturas interdum supervenientes. mo hoc ipsum etiam docet purpura frequens puerperis nostris non raro optimæ constitutionis.

Thes. 8.

Signa diagnostica sunt in febribus malinis, præter superius exposita de febribus intermittentibus pulsus inæqualis, nunc tardus, nunc celer, nunc frequens, nunc rarus, nunc durus, nunc levis &c. deinceps sæpe est difficilis respiratio; adsunt angustiae pectoris, quæ quidem etiam adsunt interdum in febribus intermittentibus; Attamen non continuæ. In faucibus ut plurimum est nimia quædam siccitas, quæ æque observatur in intermittentibus; Attamen etiam tempore paroxysmi duntaxat, extra hoc verò non eadem. Maculæ verò in petechiis, exanthemata variolarum, morbillorum, purpuræ, sola agnoscuntur inspectione, angina in morbo astrensi itidem observatur primario ex inspectione. Bubones verò & carbunculi agnoscuntur à Medico per inspectionem, & ab ægrotante per sensum. Bubo enim sentitur instar ponderis gravissimi & desuper dolorosi. Carbunculus verò apparet cum adius lædentibus motum plurimum vicinarum partium sic v. gr. carbunculus in pollice tollit motum totius manus & brachii etiam

magna ex parte. Dolorem vero ægrotantibus infert similem ei, quem accensi carbonēs nobis impositi inferunt. Contagium autem in malignis febribus hanc haberi potest aliunde, quam ex experientia & sensibus, dum nimirum observamus aliquot ægrotantes vel in iisdem ædibus, vel in vicinis vel etiam alios ægrotantes commercium curprimis habentes, simili affligi febre. Hoc equidem verum est, quod certæ malignæ febres v. gr. variolæ & morbilli, simul ac prodiguntur, nobis ingenerent suspicionem contagii, attamen de reliquis res omnino est dubia.

Thes. 9.

Prognostica signa sunt ex Hippocrat. Sect. 2. aphor. 19. Aucutorum morborum non sunt omnino, infallibiles prædictiones neque mortis neque sanitatis neque fidendum est in malignis. (aphor. 27. Sect. 2.) His, quæ non secundum rationem levant, non oportet credere, neque valde timere ea quæ prava sunt præter rationem. Pleraque enim ex talibus inconstantia sunt, & non valde permanere neque morari solent. Sed summa fides est adhibenda aphor. XXVI. febrem in convulsione fieri melius est, quam convulsionem in febre. Priorem enim aphor. in malignis eludunt, interdum levissima symptomata, quæ prima fronte vix videntur aliqui
mall

malum minari, dum presso pede subsequitur alteratio tristissima. In febribus his locum in tantum etiam invenit aphor. 33. Sect. 2. in omni morbo valere mentem, & bene se habere ad ea, quæ exhibentur bonum, contrarium verò malum. Universalitatem tamen hujus aphorismi præter febres malignas infringit catarrhus suffocativus, item Phthisis. Non facile moriuntur in malignis ægrotantes, quorum facies a primis diebus est rufa & clara, deinceps verò fit turbida. Nam intermittentibus facies ratio subita omnino prænuntiat morbi diuturnitatem juxta Bartholinum. In malignis vero & continuis non ita. In variolis apprimè deinceps etiam in aliis malignis primo invasionis tempore convulsiones apparentes sunt leviores, quam 7. 8. & reliquis diebus sic v. gr. Epilepsia sæpiissime concomitatur variolas circa ortum, quæ verò deinceps facile remittit. Quando verò 6. 7. die supervenit semper est lethalis.

Thes. 10.

Curatio instituatur secundum has indicationes, in omni febre maligna sedentur convulsiones, sanguinisque coagulatio præcaveatur. Exanthemata vero ad suppurationem vergentia, tractentur ut ulcera alia.

Thes. 11.

Prima indicatio obtinetur per medica-

menta diaphoretica moderatè mista cum anodynis quæ Praxis est nova ; siquidem jam olim methodus fuit recentissima in curandis febribus malignis exhibere Theriacam, Mithridatium, Philonium Romanum, quæ omnia ingreditur opium, adeo ut maximam etiam vim diaphoreticam Mithridatii & Theriacæ acceptam ferat Wallæus in Methodo medendi ipsi opio. Nec mirum quempiam habere potest, quomodo in tam pauca quantitate, opium tantam possit exercere energiam, cum constet aliquot saltem guttulas Essent. opii fermentati magnarum esse virium. Opium autem in Mithridatio omnino patitur etiam perfectam fermentationem prout testatur autopsia. Similem Methodum observamus etiam in recentiore adhuc Fracastorio, quippe cui ceu basis in conficiendo diascordio inservit etiam opium. Recentissimus autem Sylvius eo devenit, ut publicè in scriptis fateatur, sese malle non esse medicum, quam carere Laudano opiato. Willis verò in Pharm. rationali maximopere etiam commendat opium cum castoreo & Ræ Fr. pptum pag. 198. Hinc ex opiatis, præter Elect. nota hic profunt 9 theriacal. Essent. theriacal. Extr. theriacale. His verò sunt miscenda ex Regno animali omnis generis Θia Λa v. gr. 9 C. C. sive simplex si-

e succinat. Cor. C. viperarum, cran. hum.
 ☼i. Item castoracea, & lap. animalium
 .gr. Bezoar &c. Vel possunt etiam assumi
 artes animales duræ præparatæ sine Δ e.
 x regno vegetabili herbæ amaricantes Δ tiles
 .gr. Scord. Card. ben. Angelica. Pimpinella,
 edoar, Menth. Cent. min. Item Campho-
 a, omnia parata ex Sambuco, Junipero, item
 Galega, Scorzonera, breviter omnes plan-
 æ theriacam ingredientes. Ex quibus pos-
 unt fieri compositiones v. gr. Ω per fer-
 mentationem, ∇ æ Ω ata, Essentz. ipsi pul-
 eres v. gt. p. Card. ben. Contrajerv. quo
 ensu pulvis Contrajervæ ingreditur pulv.
 Bezoar. Sennert. Extracta opiata, $\circ\circ$ a Ω ata v.
 r. $\circ\circ$ antiloimicum Heunif. Hinc prostant
 tiam tam varia composita, theriaca Andro-
 nachi, Mithridat. Damocr. Philonium Ro-
 manum. Requies Nicolai. Electuar. Orvie-
 an. Diafcord. Fracast. Theriaca cœlestis
 Quercetan. Item ∇ æ compositæ v. gr. ∇
 ord. Hercul. Saxon. Cor C. Mynsicht. An-
 alt. Velthemian. &c. Essent. Compos.
 .gr. R. Bezoard. B. D. Michael. Cujus ge-
 uina parandi methodus est.

R. Ω theriac. Camph. part. v.

∇ r. part. iij.

Θ li. Δ lat. part. ij.

Iæc omnia digestionem bene unita tingan-

tur cum ligno santalo & confect. alkermes,
tandemque addatur camphor. tantum, quan-
tum dissolvi potest. Sed melior methodus
est conjungendi Camphor. cum ✠o hac

R. Camphor. v. gr. ℥iv.

℞ di ℥ij.

bene mista sublima ut evadat camphora acer-
rima & sternutatoria., quæ deinceps ℞ vi
theriacali est conjungenda. Menstruum hoc
Ræ Bezoard. absq; R. audit in officinis nostris
mixture simplex quæ celebris est etiam in ma-
lignis & etiam non contemnendarum virium
In hac indicatione obtinenda maxime etiam
profunt clysteres subducentes humores ex-
crementitios primarum viarum, siquidem
hoc modo facta constrictione intestinorum
deinceps intestina lenius ad se invicem pos-
sunt accedere: Proptereaque in respiratione
alias difficili non tantus observatur in dia-
phragmate movendo renisus.

Thes. 12.

Ex regno minerali hic primario prodest
✠ diaph. junctum vegetabilibus & animali-
bus etiam, item Bezoard. mineralia, quæ
præparata volo non per affusionem ℞ ① i,
sed potius per detonationem ① i ✠io succe-
dit ✠r. hujus flores sunt egregii in malignis
✠ magna ex parte constituit ZZ, quæ itidem
hic est eximia sive simplex, sive cum aliis par-
tibus

bus composita v.gr. specif. Ceph. D. M. &c.
 einceps sequuntur etiam ∇ æ v. gr. sigillata,
 olus &c. quæ ∇ æ olim jam jam sunt ingressæ
 medicamenta Theriacalia, & à Recentio-
 bus cooptatæ in censum talium alexiphar-
 mac. v. gr. in p. Pannonic. rubr. &c. Ex
 his etiam hic conferunt \oplus tata bene de-
 urata, inprimis verò \oplus um cum \S io. ∇ at.
 quodque bis erit solutum & evaporatum:
 osum etiam arcan. 2pl. laudem meretur
 ade.

Thes. 13.

Ad secundam indicationem obtinendam
 præter recensita in thesi antecedente confe-
 unt acida, quatenus nimirum miscentur
 cum alcalibus, ut inde resultet tertium quod-
 am \ominus sum. Quo sensu non duntaxat indi-
 cum euphonia observamus assumptum
 sanguinem hirci, ocul. \mathfrak{D} . & in $\mathfrak{+}$, verum
 præterea & ipse Sylvius adeo frequenter præ-
 ribit $\mathfrak{+}$ um cum ocul. \mathfrak{D} loco vero $\mathfrak{+}$ i assu-
 ni etiam poterit ∇ prophylactica Sylvii von
 er Schagen & Barbeth. descriptionem vid.
 pud Barbeth. in praxi.

Thes. 14.

Ut ut videantur symptomata gravissima
 as febres concomitantia multas adhuc sug-
 erere indicationes v. gr. delirium, Lipothy-
 niæ, convulsiones, vomitus &c. Attamen

his omnibus sufficientem medelam adferunt dicta superiora sudorifera, cum anodynis mista. Ab extra interim certa etiam adhiberi poterunt ☿osa, v. gr. ▽. Carbunculi Epileptica, Apoplectica; quibus misceantur ☿ refragantes, v. gr. rosarum, liliorum convall. melissæ. item ☿9 ☐si, v. gr. ⊕* tam simplex quam compositus v. gr. lavend. Ror. marini &c. quippe qui ☿9 egregie excitant totum systema nervosum subito irruendo in extremitates nervinas narium. Imo adauget etiam talium ☿osorum medicamentorum vim acetum commistum quantum concitat motum quendam internum: Hinc v. gr. aceta rosacea, rutac., liliorum convall. item varia composita etiam Bezoar. nominibus venientia. Imo inde etiam vires suas nanciscitur ▽a hirundinum cum castoreo, quæ profecto expertarum est virium in passionibus hystericis, unde & vulgo audit *Weiber Schlag-Wasser* / item *bitter* vel *sauer Schlag-Wasser*.

Thes. 15.

De V. S. ardua etiam est controversia inter autores, utrum nimirum conveniat in expositis febribus? in utramque equidem partem disputatur ab autoribus. Malo tamen legere vestigia Barbeth. breviter rem decidens his præter verbis. In malignis ve-

nam

am secari est patientem jugulare. Ut ut deo rigidus nolim existere, ut interdum etiam tantum nocuenti venam sectam adferre asseram, melius tamen omittitur quam instituitur.

Thes. 16.

Ab hac tamen regula excipiendæ sunt febres malignæ castrenses vel Ungaricæ, in his enim tutissime aperiuntur venæ sublinguales vel raninæ. Imò interdum etiam præstat has venas sectas repetere. Ubi nimirum faucium inflammatio fuerit contumacior.

Thes. 17.

Ultima indicatio obtinetur in inflammatione faucium vel angina primario per cataplasmata emollientia mista cum ☉sis. Hinc etiam communiter commendatur nidus hirundinum cum lacte cocto, dum nimirum hi ipsi nidi maxime sunt conspurcati à pullis hirundinum, in horum vero excrementis omnino latitat copiosum ☉. ☉i. Hoc ipso vero cataplasmate summo cum successu olim usus sum in virgine nobili. Mynsicht ex hoc nido præparat emplastrum quod etiam in usum poterit accersi, Fauces itidem ☉is benè abluendæ syphone per manum Chirurgi. Et ut ut hi communiter utantur decocto prunellæ cum ☉o trochiscato & melle rosaceo vel rutaceo; attamen sufficiens erit

gargarisma ex cerevisia secundaria cum ☉
paratum. Idem etiam est observandum in
inflammatione & non raro suppuratione
tonsillarum.

Thes. 18

Exanthemata qualia sunt morbilli & pe-
techia relinquantur soli naturæ; quippe quæ
hisceremedetur sponte. Observari etiam
petechias profundiores nigricantes suapte
exsiccati ita, ut deinceps absque ullo dolore
abradi possint. Imo in carbunculis mino-
ribus aliquoties etiam observavi spontane-
am exsiccationem, qualem observare licet
in variolis occupantibus locos corporis hu-
mani callosos.

Thes. 19.

Variolæ ad suppurationem tendentes tam-
diu intactæ relinquantur, donec appareant
femi exsiccata, quo facto inungantur un-
guento ex pinguibus animalium composito.
Communiter equidem hic laudatur axungia
asciæ piscis, huic vero præfero axungiam hu-
manam mistam unguento camphorato co-
mitissæ. Aliquoties etiam excoriationes
profundas præprimis vero cauteriis actuali-
bus inflictas felicissime curavi hoc ipso un-
guento camphor.

Thes. 20.

Bubones vero & carbunculi tractentur
&

quidem illi ut alii tumores ad suppurationem commovendi per suppurantia v. gr. emplastr. citrinum, dyachilum cum gummi, magneticum melilotum &c. Hi vero ut iæ partes gangrænosæ & sphacelatae primo idem per emplastrum magnet. cum melilotum junctum deinceps vero apparente carne nova in circulo rubicundo per unguenta acria digestiva v. gr. fuscum Würzii, Apostolorum, Ægyptiacum, cum digestivo quodam desuper vero in primis diebus imponi potest magnet., sequentibus vero diebus sticticum rollii.

Thes. 21.

Quæritur hic quid censendum sit de bubonibus exsiccatis, item pullis columbinis circa podicem deplumatis impositis bubonibus? pro responsione notetur, quod omnino inanes fiant hæc animalia bubonibus imposita, interim tamen non eatenus, quatenus extrahant venenum quoddam, sed quatenus colore vehementi Ar. internus inclusus magis magisque attenuatur & membranam externam distendit, tumoremque sic causatur hinc etiam requiruntur in hoc negotio transfossi capite. Alias namque in odomine transfossi plane non intument.

Thes. 22.

Formulæ vero ad omnes indicationes sunt hæ, & primo quidem in variolis, morbillis, purpura, febribus petechialibus, castrensi.

R. Liqu. C. C. succ.

R. Corall. cum ☐ Cor. C. aa. 3j

M. D. S. **Schweiß-Mixtur 30. Tropffer**
3mahl stündl. nacheinander zu nehmen.

R. Essent. theriac.

Liqu. c. c. succ. aa. 3j.

M. D. S. ut supra.

R. R. Corall.

Essent. Card. ben. aa. 3j.

anod. L. gt. XL.

M. D. S. ut supra.

R. Essent. Castor.

Theriac. aa. gt. L.

anod. L. gr. XXX.

M. D. S. **Austreibende Herz Tinctur auf**
3. mahl innerhalb eines halben Tages zu nehmen.

R. p. Bezoar. Sennert.

Unicorn. mar. 3ß.

☉. ♂ iat. 3ß.

fl. ♀r. gr. viij.

M. D. S. **Kühlend und austreibend**
Herz-Pulver ins Bier zu thun.

R.

R. Matr. perl. pp.
 ☼. diaph. aa. 3β.
 arc. 2pl. M. gr. xv.
 flor. ☼r. gr. viij.
 M. D. S. ut supra.

R. p. march. antep.
 Bez. Sennert.
 Spec. ceph. D. M. aa. 3j.
 fl. ☼r. gr. viij.

I. D. S. ut supra vel divide in 3. partes
 æquales. D. S. **Austreibend Herk-**
Pulver den Tag über zunehmen.

R. ▽. Scord.
 Card. ben. aa. 3j.
 Epilept. Lang. 3β.
 C. C. S. Δe.
 ☼. diaph.
 ⊙. ☼iat. aa. 3j.
 fl. ☼r. gr. viij.
 Syrup. Card. ben. 3β.

I. D. S. **Austreibender Herk-Trancē**
stündlich 3. Löffel voll vel loco pulve-
rum.

R. Diascord. Frac. 3ij.
 M. D. S. ut supra.

R. ▽. Galeg.
 Scorzoner. aa. 3j.
 Prophyl. Sylv. 3β.
 Ocul. ☼. 3β.

☼. diaph. gr. xv.

mumiæ. præparatæ ʒj.

Theriac. Androm. ʒj.

Syrup. Card. ben. ʒβ.

M. D. S. ut supra.

(imprimis vero urgente ardore)

R. Amygd. dulc. ambr. exc. ʒβ.

Sem. papav. alb.

4. frigid. maj. aa. ʒiβ.

F. l. a. emulsio cum decocto hordei C. C. C
ʒv.

adde

▽. Cor. C. Mynf. ʒj.

Ebor. f. Δe.

antih. Pot aa. ʒβ.

perl. or. pp. gr. xij.

Edulc. par. cum rot. m. Christ.

M. D. S. Kühlende Herz-Milch gerüttel
stündlich 4. Löffel.

R. Hord. mund. M. j.

Ras. C. C. ʒj.

Rad. Cichor. ʒvij.

Sem. papav. ʒβ.

pass. min. ʒiβ.

F. l. a. Decoctum.

R. Decoct. Colat. ʒij.

▽. Cinnam, borr. ʒij.

☼. diaph. ʒij.

sirup. flor. borrag. ʒβ.

M. D. S.

M. D. S. Kühnendes und Herz-stärcken-
des Wasser gerüttelt stündlich ein
Wein-Gläslein zu nehmen.

Formulæ Clysterum sunt:

R. Spec. emoll. M. iij.

Carmin. m. j.

℞. ℥ial. 3j.

F. l. a. Decoctum in jure carnis.

R. Colatur. ℥x.

Electuar. lenit.

Mell. ℥ial.

rutac. aa. 3vj.

Mithridat. 3β.

Vitell. ovorum. no. j.

F. l. a. Clyster. Talibus Clysteribus com-
mode uti possumus in morbo castrensi, pur-
pura & morbillis etiam. In variolis vero
non facile vid. hac de re Langii Miscellan.
urios. p. 136. Multoties namque sum ex-
pertus alvum adstrictam in variolis tempo-
re suppurationis ægrotantibus haud adeo esse
molestam, ut ut bidui aut tridui fuerit. In-
terim tamen & expertus sum, quod adhibi-
tus clyster aliquoties cum euphoria sit ap-
plicatus. Ut proinde non mox homicidii
et insimulandus medicus, denato ægrotante
d præscriptum Clysterem. Consultius in-
terim duco abstinere quam ordinare Cly-
sterem.

Tbes,

Thes. 23.

Externa præscribantur his formulis.

R. ▽. Carbuncul.

meliss. cum V. aa. 3vj.

∩ rofar. ʒij.

⊖*. ʒβ.

M. D. S. **Anstreich-Wasser.**

R. ▽. apoplectic.

lil. convall. c. V. aa. 3vj.

✠i Bezoard. ʒβ.

M. D. S. ut supra.

Ad fauces inflammatas.

R. Fl. Sambuc.

melilot.

Chamom.

crem. aven. aa. M. j.

nidi. hirund. no. j.

Incis. & contus. coq. in s. q. lactis.

M. D. S. **Æußerlich lindernder Umschlag**

Vel loco nidi commisceatur ☉i ʒiati ʒj.

Thes. 24.

In peste & febribus pestilentialibus omnia sudorifera sunt adaugenda, necessum namque est, ut per primos quatuor dies singulis horis sex elapsis, ægrotantes largiter sudent. sequentibus vero 14. diebus ad minimum largus sudor est necessarius matutinus & vespertinus, sudorifera vero potiora, quibus summus usus, sunt sequentia.

R. Essent. Card. ben.
castor.
theriac.

Liq. C. C. succ. aa. ʒj.

I. D. S. **Schweiß-Essenz 30. Tropffen**
auf 1. mahl allezeit 3. mahl stündlich
nacheinander zu nehmen.

R. C. C. S. Δe.

♂. diaph.

⊖ Card. ben. aa. ʒij.

fl. ♀r-. ʒj.

I. D. S. **Schweiß-Pulver alle 6. Stun-**
den 1. gute starcke Messer-Spize voll
zu nehmen.

Quia vero perpeſſo hoc sudore multum
lymphæ à corpore est subtractum, necessum
est ut novarurſusque addatur lymp̃ha. Ita-
que quotiescunque sudor est peractus, por-
gantur ægrotantialiquot cochlearia intri-
e, ex vino Rhenano & tantillo succi citri pa-
tæ.

Thes. 25.

Quia etiam in his morbis frequens est
symptoma vomitus, qui impetit sudorem,
liquot millies præscripti & quidem utpluri-
um felici cum successu,

R. Essent. menth. ʒj.

Laud. Opiat. L. gt. xxx.

☉ Nat. cinam. gt. iij.

K

M. D. S.

M. D. S. Anhaltende Magen = Mixtu
wohl gerüttelt innerhalb 1. Stund
im Weine zu nehmen.

Ab extra vero ventriculo in abdomine
imo interdum etiam in dorso imposui cata
plasma theriacale nunc cum myrrha nun
c sine myrrha. Myrrhatum est hoc:

R. Myrrhæ rubr. ℥ij.
dissolv. in f. q. vini rubri.

evaporet ad consistentiam linimenti & ad
dat Theriac. Andromach. ℥ij. 〇 scorpi
compos. ℥iv. 〇 Nat. menth. mastich. cort
aurant. aa. ℥ij. M. reponatur. Signetur cata
plasma theriacale cum Myrrha.

Præscribitur verò hoc modo:

R. Cataplasma ther. cum myrrha f. q
iuduc super alutam. D. S.

Anhaltend Pflaster.

Thes. 26.

Frequens etiam est symptoma in Peste
delirium & cephalalgia, hisce opposui species
cephalicas externas, constantes ex Herbo
verbenæ, anagallid. sem. papav. alb. & ane
thi; quæ species sunt irrorandæ cum ∇. ce
phalica externa constante ex ∇a sperm. rana
rum, carbunculi, ∇ prophylactica Sylvii.
Saccharo ℥i & camphora. Item unguentum
cephalicum, quod constat ex emplastr. de
betonica. de lap. calaminar, aa. subigitur

v. c. ☉ expresse Hyoscyam. sem. papav. &
cantillo ☉ Nat'anethi.

Thes. 27.

Hæmorrhagia sæpe etiam est concomi-
tata hunc morbum, qui optime remederi
pouit, flor. ros. rubr. ☉e condit. cum tan-
tillo ▽ prophylact. irrorat. formula esto hæc:

R. Flor. Ros. rubr. ☉e condit. ℥ij.

▽. prophylact. ℥β.

M. Optime. D. S. Umschlag über die
Stirne.

Thes. 28.

Bubonibus imponatur sequens empla-
trum.

R. Empl. citrin.

de melilot. aa. ℥j.

malax. cum ☉ scorp. composit.

M. D. S. Erweichend Pflaster auf die
Beulen zu legen/ usque maturuerint
per apponendum deinde sequens:

R. Emplastr. de melilot.

diachyl. cum gumm. aa. ℥ij.

malax cum ☉ scorp. compos. M. D. S.

Erweichend Heil-Pflaster.

R. Empl. Magnet.

de melilot. aa. ℥ij.

malax. c. ☉ scorp. compos. D. S. Lindernd

Pflaster auf die Carbunculi die er-
sten Tage zu legen.

R. Ungu. digestiv. 3vj.
apostol. 3iij.

M. D. S. Separirend Sälblein auf den
Carbuncul zu legen um den Rand.
Thes. 29.

Hæc sunt remedia in peste curanda, præ-
fervationis gratia vero prodest, bis vel ter
etiam singulis septimanis instituere sudorem
largum, per medicamenta v. gr. liq. C. C. R.
corall. Essent. Card. ben. &c. parata, quotidie
vero s. vivamus saltem in loco infecto vel te-
neamur etiam cum ipsis infectis versari,
omnibus alexipharm. palmam præripit po-
tus largior vini Rhenani.



CAPUT X.

DE

CONVULSIONIBUS.

Thes. 1.

VIsis hætenus morbis partium nostrarum
contentarum ratione motus sui intestini,
accingamus nos ad morbos partium conti-
nentium, quantum hæ principio interna
impetuoso vel enormontico (impetum fa-
ciente) moventur, ut secundum hunc mo-
tum diversimode vitientur omnes totius cor-
poris

poris nostri motus. Dicuntur autem hi morbi communiter convulsiones de harum vero nomine notetur, quod propriè convulsio notet subitanèam & fortissimam contractionem unius vel aliquot musculorum, qui partem certam alias mobilem, ita continent strictam, ut nullatenus moveri possit. Deinceps denotant etiam talem p. n. motum certorum musculorum antagonistarum quod partem naturaliter & voluntarie movendum, p. n. & cum summo impetu continuo citra voluntatem movere tenemur, qui motus communiter audit, motus convulsivus & contra distinguitur convulsioni vel tetano.

Thes. 2.

Convulsionum talium partes affectæ ratione formalitatis p. n. omnino sunt asserendæ. cum Barbeth. c. 1. Prax. ipsi nervi, qui tamen deinceps membranas & fibras carneas simul etiam commovent, quantum semper his copiosissimi sunt intertexti, ut proinde constans sit regula; Ubicunque est nervus & fibra motrix, ibi etiam potest fieri convulsio. Jam vero constat ex modernorum Anatomicorum traditis, quod nervi omnino etiam protendantur cum fibris motricibus inossissima etiam vasa in singulas etiam partes externas molles. Unde & jure meritoque his ipsis assignantur convulsiones.

Quas etiam vasis jam olim Hippocrat. libr. de morbis text. 23, p. m. 29. Tom. 2. tribuit his verbis: Tum caro quæ est in latere, tum venæ contrahuntur ac convertuntur, Vid. præterea Willis in sua Pathologia cerebri & antea laud. Barbeth.

Thes. 3.

Causa vero harum convulsionum proxima latitat in ipso principio nostro vitali æthereo, dum nimirum hoc diversimodè afficitur in poris partium nervosarum, ut inde sequuntur inordinatæ & impropportionatæ pressiones ita tamen ut illa ipsa substantia ætherea se ipsam etiam ciere possit in talem motum inordinatum, quemadmodum nos docent animi pathemata subitanea, quippe quæ præ reliquis causis omnibus, vehementes & subitaneas convulsiones excitare valent. Deinceps has ipsas convulsiones excitare etiam possunt varia p. n. Θ ia commista lymphæ, quæ continuo omnes fibras & nervos etiam irrigare tenentur, ut motui naturali peragendo fiant apti. An vero talia Θ ia semper sint juxta Barbeth, Deckers &c, Θ ia austera, relinquimus in medio. Interim tamen verissimum est, Θ ia austera tam mineralia, quam vegetabilia, maxime esse efficacia ad diversas convulsionum species excitandas. v. gr. succi austeri fructuum horæorum

um degustati tantas labiorum & linguæ con-
stant contrarias actiones, ut ne satis dein-
eps deprimi vel exprimi valeant. Idem
os docent etiam \oplus la. Quibus bene con-
derans, videtur probabilis doctrina Barbeth
Deckers. Imo adauget hanc probabilita-
em, ipsa experientia, qua constat varias
convulsiones esse familiarissimas hypo-
chondriacis, in quibus ad oculum lympham
alem austeram demonstrare possumus. Con-
vulsiones demum excitare etiam omnia
a, quæ quocunque modo nimium possint
remere & distendere partes nostras ner-
veas, quo sensu ipsa etiam plethora in nobis
potest causari convulsiones, dum nimirum
certis in locis humores stagnantes & cum
impetu adacti distendunt habitum corporis
interiorum viscerum, quo facto ob pressuram
tam p. n. sese commovet principium no-
strum vitale. Idem observare licet à causis
externis prementibus v. gr. in ligaturis, pun-
turis &c.

Thes. 4.

Quia vero totum nostrum systema ner-
vosum videtur contextum ita, ut unam to-
tam constituat texturam satis etiam appa-
ret, quomodo excitata convulsione in unica
intaxat parte convulsiones occupare possint
totum corpus. Exemplo nobis esse possunt

extremitates digitorum quæ prehensæ & fortius constrictæ tales causantur motus convulsivos, ut subsequatur totius corporis tremor. Unde resultat divisio convulsionum in convulsiones idiopatheticas, & sympatheticas.

Thes. 5.

Hæ convulsiones diversos causantur morbos. Sic, v. gr. convulsiones in specie sic dictæ, causantur in ventriculo & diaphragmat magna ex parte angustias illas non raro intolerabiles mali hypochondriaci, | anestisiam illam, quam persentiscunt mulieres hystericae, item diaphragmatis convulsio cum musculorum intercostalium convulsione causatur asthma recentioribus dictum fuisse siccum malum frequentissimum. Et maxime etiam Incubum vel Ephialtem, in cerebri convulsio membranarum in diversas partes externas protensarum v. gr. per suturas cranii in pericranium item in oculos &c. anestisiam quandam quæ in oculis producit scotomiam. In capite vero stuporem quasi. In ipsis verò cerebri fibrillis totalem ablationem sensuum & motus, quæ uno verbo dicitur Apoplexia. In artubus vero produci rigorem s. tetanum.

Thes. 6.

Convulsivi verò motus in abdomine excitant & (1) in ventriculo totaliter commovent vomitum.

omitus, in intestinis totaliter commotis diarrhoeas, qui motus ventriculi & intestinorum si simul frant dicuntur cholera. Dumero in tantum saltem convellitur ventriculus oriuntur ructus, nausea, in intestinis vero exquisitissimus dolor colicus, qui per consensum è renibus etiam potest excitari in affectibus nephriticis calculosis &c. item à vesica ☐aria in dyssuria, stranguria vel etiam ex utero; unde conjungitur cum passionibus hysteris tempore mensium, post partum &c. Thorace motus convulsivi excitant cordis palpitationem per diaphragma motus convulsivi actum singultum. In aspera arteria tussim, in naribus sternutationem, in musculis maxillæ inferioris oscitationem, in oculis strabismum, ut ut hic nonnullis fiat naturalis quasi, de quo hic sermo non est. Alio vero oculorum motus convulsivi, qui ut plurimum observantur, referuntur absque ratione specifica ad epilepsiam. In dentibus tridorem, auribus tinnitum, in cerebro denum epilepsiam. quantum nimirum totum concutitur cerebrum, quo facto concutitur etiam totum corpus. Qui in nervo optico obversantur etiam motus tremuli, qui constituunt vertiginem. In musculis excitantur convulsiones interdum cum dolore. sine dolore retinent nomen convulsionum

vel spasmi cum dolore vero constituunt arthritidem vagam scorbuticam. Ut ut propriè loquendo fundamentaliter hoc symptoma resideat primario in periostiis inflammatis & convulsivis. Interdum etiam convulsiones in musculis dorsi, capitis & vicinis observantur quæ dorsum & collum recurvant quasi *ziehen zurücke*. Unde oriuntur opisthotonus quæ recurvatio profecto morbus est difficillimus. Interdum etiam muscoli aliquot convulsi in gyros corpus agunt, aliosque motus involuntarios, qui revera mentiuntur gesticulationes hystrionum excitant: Observantur autem in hystericis, melancholicis, & unde novi tales ægrotantes ob miras actiones habitos esse à nonnullis adstantibus aut à Dæmone obsessos aut per incantationem, ita actos. Imo ad tales inordinatas vagas convulsiones referre etiam licet quantam choream S. viti & forsitan etiam Tarantismum. Ut ut non negem in his ipsis tanquam causam efficientem concurrere quoddam, quod mentem vitiet. Qua de re infra.

Thes. 7.

Convulsiones prout sunt traditæ superius in intestinis, omnino etiam observare licet in aliis vasis. e. gr. in arteriis, quæ inde causantur hæmorrhagias, quas Helmont. imputat furori Archæi, quæ hæmorrhagiæ non rarò sunt

nt tantæ, ut ad præsentiam earum stupefca-
 us. Ubi verò neque sanguis profluens
 mper sustinet vitiosam qualitatem, neque
 æcessit aliquod externum corrodens vasa
 pillaria arteriosa. Contrà verò non raro
 omentanea est curatio ad animi motum
 bitaneum vel exhibitum etiam opiatum.
 t alio modo immutatum corpus nostrum.
 oi tamen nulla potest præsumi sanguinis
 agulatio sic v. gr. novi aliquem ex æstuan-
 m obiter longius & justo citius peractum,
 i perpetiebatur hæmorrhagiam narium
 tra 4. horas. Ex inopinato vero accede-
 t comes, qui aquam frigidam pileo exce-
 am in nucham ægrotantis effundebat, quo
 cto, cessabat hæmorrhagia cum ægrotan-
 euphoria. Ubi profecto nemo asserere
 test, sanguinem tendentem ad nares hac
 gida esse alteratum: Siquidem ex anat-
 ia constat, arterias narium originem suam
 bere arteriis carotidibus, circa nucham
 rò distendi arteriam cervicalem. In oculis
 s convulsiones etiam observamus. Dum
 imad objectum molestum effundimus
 chrymas, omnino patimur ductuum ob-
 vandorum in glandulis oculi innominata
 mpe & lachrymali convulsiones, ubi ta-
 en nemo facile asseruerit, esse quoddam
 od lympham illam tam subito reddat flui-
 diorem

diorem. Idem observare licet in rebus ac
 particulas de sese spargentibus v. gr. in Θ b
 Abus subito oculis admotis. & ut
 aliquis hic posset urgere Θ ia talia Δ ia c
 summum suum alcali fundere lympham
 hanc; attamen & testatur experientia
 acida imo Θ sa id posse præstare. Hinc v. g.
 fumi lignorum imprimis verò quercini, ite
 effluvia raphani marini, ut & Ω Φ li Δ lat
 Φ posse idem. In ductibus seminalibus
 & urethra etiam non rarò observamus h
 convulsiones. Unde juvenes speculativ
 amplexantes tempore somni suas amasi
 patiuntur nocturnas pollutiones, ut ut ali
 optimè valeant. Imo novi quoque calcul
 losos, qui calculis in urethra hærentibus
 urgentibus perceperunt penis erectionem

Thes. 8.

Signa diagnostica convulsionum pater
 per se (1), in vomitu res est clara, uti & cho
 lera, diarrhœa &c. In passionibus colicis inno
 tescit convulsio ex dolore maximè exquisito
 apprime verò circa hypochondriacas regio
 nes, bene tamen colica passio est distinguen
 da ab affectibus nephriticis, qui non rarò
 iisdem cum colica stipati symptomatibus
 nos invadunt, dolor nempe ingens adest in
 regione umbilicali, in lumbis, imo omni
 adsunt signa passionis colicæ, accedunt præ
 terea

ea ut plurimum vomitus dysuria, vel anguria. Non rarò etiam hæc signa passivis colicæ coincidunt cum instantibus hæmorrhoidibus vel mensibus etiam quo casu distinctiva desumenda sunt in hæmorrhoidibus ex dolore quodam circa podicem, ne vero impossibile est distinguere hos morbos, antequam aliquantisper per ipsos vires sese revelent, nec multum refert. Inc enim primario ratio habenda est passivis colicæ in primis paroxysmis, si vero diutius duraverit dolor, suspitio erit vel hæmorrhoidum vel mensium. Passiones hysteræ vero ut plurimum observantur saltem tempore gestationis, post partum vel circa menses fluentes, aut instantes. Deinceps passionibus hystericis ut plurimum etiam sese iat asthma siccum s. convulsivum, quod erim tamen in nonnullis frequentius, nampe colica afflictis simul etiam observatur. gnoscutur autem asthma convulsivum ab humate humido, in sicco primo quod in gravidis tempore nullus adsit stertor vel etiam sonitus in respiratione, nulla etiam respiratio viscida. Præterea vero in musculis intercostalibus dolor ingens intensivus & constrictorius, non raro etiam circa humeros dolor maxime tensivus. Notanter vero dixi primò passionis tempore non adesse excretionem

mate-

materiae viscidæ. si enim præstiterit aliquan-
 diu asthma hoc siccum, lymphæ irrorant
 bronchia pulmonum intra horum vesicula
 ob denegatum pulmonibus motum stagnat
 & ab Δ e sensim adhuc subintrante, coagula-
 tur, quo factò paucoque tempore interjecto
 supervenit etiam materia viscida prout vi-
 dere licet in optime sanis suspensis, non
 autem nimium arctè larynge constricta. Hi
 enim aliquandiu pendentes veram spumam
 concipiunt in aspera arteria adeo ut etiam
 per os exuberet. Palpitatio cordis digno-
 scitur partim ex pulsu forti, frequenti; & in-
 æquali, partim vero ex aspectu, imprimis ve-
 ro in macilentis eam produnt arteriæ subcla-
 vear. Novi enim fœminam honestam cui sæpi-
 us collare acu in thoracem infixum ita agitaba-
 tur, ut suspicareris à tergo stantem & follium
 linteolum petentem. Convulsiones epi-
 lepticæ innotescunt etiam per autopsiam
 Si vero in artubus eveniunt cum menti
 constantia, ita ut tempore symptomatis ipse
 ægrotans sit conscius huius morbi, dicitur
 Spasmus, si vero ejus non meminit, sed post
 perpeßam convulsionem confitetur se igno-
 rare, quid ipsi contigerit (*wie ihm geschehe-*
sen) tunc vocamus epilepsiam.

Thes. 9.

Convulsio aliquoties perpeßa in quavis
 parte

arte deinceps sæpissime redit. Convulsi-
nes quævis in infantibus sæpissime sunt
ethales ob nervorum teneritudinem. Epi-
ephsia invadens teneriores homines, &
videm frequenter ut plurimum lædit etiam
atiocinationem sensusque tam internos,
uam externos. Convulsio melior est,
uam supervenit febris, quam supervenit
onvulsio juxta aphor. 27. Sect. 2. Sudor fri-
idus superveniens in convulsionibus cum
ebribus certo annuntiat mortem instantem
extra febres vero non facile.

Thes. 10.

Curatio omnium convulsionum institu-
tur secundum has indicationes (1) fibræ
ritatæ sedentur. (2) causæ vero fibras irri-
antes auferantur.

Thes. 11.

Prima indicatio obtinetur per medica-
menta anodyna. Secunda vero est obtinen-
a ratione diversarum causarum, diversi-
ode sic. v. gr. ubi lymphæ styptica vel
altera peccat, hæc ipsa est dissolvenda vel
quantum in primis viis progignitur per me-
dicamenta alcalia, quæ maxima ex parte sunt
lata capit.; de malo hypochondriaco, vel
quantum ipsas jam fibrillas musculorum vel
iam membranarum & in his existentes pro-
gines nerveas madefacit per medicamenta
blan-

blanda diaphoretica & blanda laxantia, qua
repeti possunt ex capite de malo hypochon-
driaco. Ulti pilul. de succino Crat. ant
¶reæ francof. &c. singulis septimanis seme-
vel bis sumendæ. Deinceps non raro etiam
convulsiones tales originem trahunt à ple-
thora sive universali, sive particulari. Par-
ticularis hæc observatur nunc in pulmonibus
ut mentiatur nunc catarrhum suffocativum
nunc in cerebro unde progignitur specie
apoplexiæ cum convulsionibus nunc etiam
circa uterum instantibus mensibus. Huius
causæ removendæ extemporaneam open-
fert V. S. Quotiescunque itaque subito in
corporibus alias sanis hæc convulsiones obser-
vantur toties etiam celebrari potest V. S. &.

Thes. 12.

Et quidem semper aliquanto largior. For-
mulæ ad primam indicationem, & quidem
in vomitu & cholera fiant sequentes:

R. Essent. menth. 3j.

Laud. opiat. gt. xxv.

℞ Ol. Cinnam. gutt. ij.

M. D. S. Magen-Essenz innerhalb einer
Stunde in Suppe oder Wein einzun-
nehmen.

R. Extract. Theriacal.

menth. aa. gr. v.

Laud. opiat. gr. iß.

F. l. a

l.a. Pillulæ no. 20. volvantur in pulv. cinnam

D. S. Magen = Pillen alle halbe
Stunden 5. zu verschlucken.

R. Conf. menth. ʒij.

Mithridat. Damocr. ʒij.

p. Cinnam. ʒβ.

Laud. opiat. gr. iij.

im tantillo sirup. menth. subige D. S.

Magen = Zucker innerhalb 1. Stunde
zu nehmen. Externè applicari potest

superius commendatum cataplasma
theriacale cum myrrha vel fiat Balsa-
mus.

R. Balsam nigr. de Peru. ʒβ.

☉ Rat menth.

mastich. aa. gt. vj.

caryoph.

cinnam. aa. gt. iv.

f. q. corpor. pro balsam. M. D. S. Eus-
serlich. köstlich. Magen = Balsam öfters
aufzustreichen.

R. Empl. de crust. pan.

Tacamahac. aa. f. q.

alax cum ☉ mastich per resol. & induc
super alutam formæ consuetæ. D. S.

Magen = Pflaster.

R. Herb. Calaminth.

menth. Crisp.

fl. cham. Rom. aa. M. β.

L

Sem.

Sem. anis. ʒvj.

Cinam.

Caryoph. Indic. aa. ʒj.

Nuc. Moschat. no. ij. incis. & contus. insu-
antur sacculo D, S, **Eusserlich Ma-
gen-Säcklein auf den Magen zu le-
gen.** Qui sacculus in iis ægrotantibus
qui famulis & ministris sunt stipati fre-
quenter potest irrorari vino calido.

R. Ferment. accerrim. ʒij.

flor. rosar. rubr.

balauft. aa. ʒvj.

c. f. q. **†** i rosacei subigatur ut induci possint
linteo. D. S. **Magen-Pflaster.**

R. Crust. pan. domest. in forma emp-
stomachalis scissam aspergatur.

p. cinnam.

caryoph.

Rad. Zedoar. aa. ʒij.

Irroretur sæpius vino Malvatico Canariem
vel Hispanico etiam imponatur. V.
assumatur etiam linteolum duplex
irroredur sæpius ▽ vitæ math. vel Her-
Sax. &c.

In Diarrhœa & dysenteria.

R. Essent. Theriac.

anod. aa. ʒß.

M. D. S. **Stillende Essenz, alle vierthe-
Stunden 15. Tropffen zu nehmen in
warmer Suppe.**

R. Extr. Theriac. ʒβ.

Laud. opiat. gr. ij.

I. a. pilulæ no. 15. D. S. Anhaltende
Pillen 5. auf 1. mahl und innerhalb
einer Stunde alle zu nehmen. In
passione colica, hysterica, asthmate
convulsivo:

R. Essent. Theriac.

castor.

anod.

Liq. C. C. succ. aa. ʒβ.

D. S. Stillende Tropffen 30. auf ein-
mahl 3. mahl nach einander stünd-
lich zu nehmen.

In Epilepsia,

R. Essent. castor.

anod.

Liq. C. C. succ. aa. gt. xxx.

D. S. Linderung auf 2. mahl in einer
Stunde zu nehmen.

R. ▽. Beton.

lil. convall. aa. ʒj.

C. ceras. nigr. e succo vel fl. til.
(tenell. C. C. ʒvj.) (antep.

Liq. C. C. succ.

Essent. cast. aa. gt. XL.

anod. gt. xx.

Syrup. de beton. vel stœchad, vel fl. tun.
cum succo ceras. acid. ʒβ.

Fl. tunic. cum succo ceras. nigr. infunduntur, digestioni committuntur & post epress. cum saccharo inspissantur.

M. D. S. **Stillend Herz-Träncklein** gründelt stündlich 4. Löffel.

Ab extra vero odoretenus percipiant

Θia Alatilia mixta ∟ osis.

R. ∇. Carbunc. ʒj.

Essent. Cast.

Liq. C. C. succ. aa. ʒj.

M. D. S. **Köstlich Anstreich-Wasser.**

R. ∇. Hirund. cum castor. ʒj.

∟ ☉*. ʒij.

M. D. S. **Anstreich-Wasser öftters** gebrauchen.

In Convulsionibus artuum.

R. R. ʒii ꝑr. ʒj.

Essent. anod. gt. L.

M. D. S. **Lindernde Glieder Mixtur** alle Stunden 25. Tropffen nachetnander zu geben.

Præterea vero adhiberi etiam possunt præmissæ formulæ in epilepsia.

R. Essent. lumbr. ∇. ʒij.

anod. gt. L.

M. D. S. **Glieder-Essenz** 30. Tropffen an 1. mahl / des Tages 4. mahl zu nehmen.

Thes. 13.

Formulae ad secundam indicationem in
nitū & cholera.

R. ▽ menth. ʒiβ.
vit. math. ʒij.
▽. sigillat.
C. C. uft.
ʒ. diaph. aa. ʒij.
firup. menth. ʒβ.

D. S. Temperirend und anhaltend
Magen = Träncklein wohlgerüttelt
stündlich 3. Löffel voll.

R. ▽. Plantag.
fol. querc. aa. ʒj.
Cinnam. cydon. ʒβ.
diascord. Fracast. ʒiβ.
Syrup. Plantag. e succo ʒβ.
M. D. S. ut supra.

R. ▽. Catech.
Croc. ʒis cum Θbus.
ʒ. diaph.
Θ. Absynth. aa. gr. xv.

D. S. Temperirend Pulver wider die
Schärffe ins Bier.

R. p. march antepil.
ʒij. diaphor. aa. ʒj.
⊙. ʒiat. gr. xij.
M. D. S. Ut supra.

R. Extr. Catd. ben.
absinth.
calaminth. aa. gr. v.

c. f. q. p. Ebor. S. Δ e pp. f. l. a. pilulæ no. xx
D. S. Stärckende Pillen den Tag üb
zu verschlucken

In Diarrhœa & Dysenteria.

R. ∇ . Sigillat.
C. mont. pp. aa. 3ß.
Succ. alb. pp. gr. xv.

M. D. S. Temperstrend Pulver ins Bi

R. Unicorn. mar.
Dent. eq. mar.
M. D. S. Ut supra.

R. C. C. uft.
ß. diaph.
troch. d. carab. aa. 3j.
M. D. S. ut supra.

R. Croc. σ is. adstring.
Unic. mar,
ß. diaph. aa. 3v.
Fr. \oplus l. gr. xij.
M. D. S. ut supra.

N. ∇ . Tormentill.
Fol. querc. aa. 3j.
Epilept. Lang. (vel. Zedoar c
Bol. Armen.
 ∇ . Sigillat.
Unicorn. mar.

♂. diaph.
arc. 2pl. M. aa. gr. xij.
Sirup. mirtill. ʒβ.

. D. S. Unhaltender Stärck-Tranck
gerüttelt stündlich 2. Löffel voll.

In Passione hysterica.

R. ▽. meliss. ʒiβ.
picarum. ʒβ.
p. march. antepil. ʒβ.
antih. Pot. gr. xv.

Essent. Castor.

Liqu. C. C. succ. aa. gt. XL.

sirup. meliss. iij.

. D. S. Stillender Tranck stündlich 2.
biß 3. Löffel zu nehmen.

R. ♀. ☉. dulc.
Essent. anodyn. aa. ʒβ.

. D. S. Mutter-Essenz alle Stunden
15. Tropffen zu nehmen.

In Passionibus colicis.

R. Spec. emoll.
carminat. aa. M. ij.
☉. Gemm. ʒj.

. 1. a. Decoctum in ▽a fontana.

R. Colatur. ʒxv.
dil. Electuar. hier. cum agaric ʒj.
d. bacc. laur.
mell. ʒial. aa. ʒvj.
anthos. ʒβ.

Essent. cast. ʒij.

(pro ditioribus hæc essent. addatur)

vitell. ovorum. no. j.

f. l. a. Clyster.

NB. Quia utplurimum in passione colica copiosi adsunt flatus, præstat exhibere clysterem divisum gemina vice, ideo applicari mandetur, ut dimidium saltem applicetur (quod vocant internodio intercipere, vel datur cum internodio) altera nempe dimidia pars cum vesica ▽. calidæ immittitur, & elapso semihorio vel una, imo interdum post bihorium applicetur.

R. Fl. cham. Rom. p. ij.

coq. in vin. Rhenan. ʒvj.

R. Colatur. q. v.

D. S. Träncklein wider die Colica Löffelweise zu nehmen.

In Asthmate.

R. Gummi. *i in ☩ solut. ʒβ.

Mag. Benz. gr. iv.

p. march. antep. ʒβ.

▽. Scabios.

Hyssop. aa. ʒj.

sirup. capill. ♀ ris. ʒvj.

M. D. S. Lindernder und zertheilender Brust-Tränck stündlich 2. Löffel.

R. Spec. cephal. D. M.

p. march. antep. aa. gr. vij.

Tucc.

Succ. alb. pp. gr. v.

. D. S. **Brust-Pulver** auf 1. mahl.

NB. Sed castor. anod. liq. C. C. succin.
em ㄥ9 Θ* i dulcis palmam omnibus fa-
le præripiunt.

In Epilepsia.

R. ▽. Ceras. nigr. e succ. ʒj.

Epilept. Lang. ʒβ.

Spec. cephal. D. M.

p. march. antep. aa. ʒj.

Liqu. C. C. succ. gt. xxx.

Sirup. fl. tunic. ʒβ.

. D. S. **Starch-Tranch** gerüttelt stünd-
lich 2. oder 3. Löffel voll.

R. ▽. fl. tiliæ.

pœon. aa. ʒj.

tenell. C. C. ʒβ.

unicorn. mar.

Cran. hum. pp.

δ. diaph. aa. ʒj.

Liqu. C. C. succ. gt. XL.

sirup. fl. pœon. ʒβ.

M. D. S. ut supra.

Item pulveres antea in cerevisia sumendi
commendati etiam adhiberi possunt.

CAPUT XI.

DE

STAGNATIONE HUMORUM IN HABITU CORPORIS.

Thes. 1.

Superius dixi in inflammationibus v. gr. pleuritide &c. concurrere tum ipsos humores, tum ipsas etiam fibras, tam carnosas quam membranaceas convulsas ad stagnationem humorum, sic v. gr. progignitur in corporibus Ecchymoma vel suffusio, dum nempe ab extra habitus corporis vehementer premitur, ut pars quædam fibrosa abrumpatur à vicina, quo facto, necessario in spatiolis illis datur foraminulum aliquod p. n. quod humores deinceps occupant inibi que stagnant. Eo ipso vero quo pressura & dilaceratio peragitur, patiuntur etiam propagines vicinæ nerveæ, ut inde suboriatur, convulsio seu constrictio partium vicinarum, qua facta, sanguis extravasatus non duntaxat concrescit in grumos, verum præterea hærens in habitu corporis vicino concipit à calore interno motum intestinum p. n. ex quo partes à se invicem magis magisque abiguntur, humoresque statum p. n. purulentum nanciscuntur. Unde satis apparet, quomodo in corporibus progignatur

tur in universum omnes inflammationes, exulcerationes, & in partibus duris erosiones seu caries. Imo huc etiam sunt referendæ contusiones factæ cum cutis reliquarumque partium mollium unitate soluta vel vulnera. Proprie enim loquendo vulnus infligitur per pressuram quandam, dum nempe ab externa causa vulnerante pars premitur tamdiu, donec à parte vicina sit amota. Et ut in vulneribus magna etiam sit habenda ratio hæmorrhagiæ sistendæ, attamen potior omnino cura eo est dirigenda, ut inflammatio vulnus superveniens sedetur. In vulneribus sordidis & ulceribus phagedœnicis omnino etiam maxima cura eo est dirigenda, ut sordes prementes in motus convulsivos carnem vicinam, abluantur, convulsioque sedetur.

Thes. 2.

Hæc sanguinis stagnatio non semper observatur secundum utramque sui partem, in casibus etiam, quos exposui, ut plurimum utraque portio hospitatur. Contra vero dantur etiam casus in quibus sola sanguinis portio lymphatica hæret. sic verb. gr. quotiescunque evenit, ut cuticula secedat ab ipsa cute, videre licet lymphæ stagnationem absque sanguine, prout hoc manifestissime nos docent vesiculæ ab attritu calceorum subortæ, item eæ, quas patimur ex levi combustionem.

stione. In his vero non tam esse attendendam unitatem solutam, quam ipsam convulsionem adjunctam, docent primario combustiones. Hæ namque per aliquod non raro durant septimanas, inferuntque ulcera cutanea phagedœnica, quæ non raro inferunt præterea sympthomata gravissima

Thes. 3.

Deinceps hæc sanguinis pars lymphatica stagnat etiam sola in habitu corporis absque notabili convulsione, saltem eatenus, quatenus in se continet partes viscidas p. n. quæ quamdiu sanguini sunt mixtæ, equidem in fluiditate sua asservantur, sibi vero solæ relictæ coagulantur, quomodo in habitu corporis progignuntur omnes tumores œdematosi. Hi namque si totum occupant corpus constituunt hydropem anasarcam. Sola pars coccinea stagnat in partibus pressis intra cardines forium; quippe qui producunt bullas liventes & nigricantes & maxime dolorosas in principio exortas. Licet postmodum indurescant ob defectum lymphæ adjunctæ & sub forma cruoris exsiccati excident.

Thes. 4.

Signa diagnostica hûmorum in habitu corporis stagnantium sunt desumenda ex sensibus, sic. v. gr. tumorem œdematosum
cogno-

cognoscimus facile in una parte, ex collatione cum altera, dum nempe tumida major apparet sana. Præterea tumor œdematosus cognoscitur inde, quod digiti tumori infixi retracti relinquant vestigia certa sub forma fovearum. Inflammatio autem dignoscitur itidem ex tumore, & quidem rubicundo doloroso & calido. Ecchymoma dignoscatur ex parte tumida & livida vel etiam nigricante.

Thes. 5.

Prognostica sunt: Nulla inflammatio flocci est pendenda, de hac enim verificatur diverbium, *kleine Feinde / kleine Hunde / und kleine Wunden / soll man nicht gering achten.* Apprime verò periculosæ sunt inflammationes vicinæ periostiis, item nervis majoribus ob vehementia symptomata superventura, item in glandulis ob morbi diuturnitatem, ex copioso affluxu pituitæ, hinc etiam, quia utrumque horum coincidit in parotidibus inflammatis fit ut parotides æpenumerò sint exitiales. Inde etiam apparet, quid censendum sit de vulneribus & ulceribus circa artuum juncturas. Quæ profectò valde etiam sunt periculosæ. Sola pars coccinea stagnans licet dolorem inferat, attamen deinceps suapte exsiccatur & excidit.

Thes.

Thes. 6.

Curatio humorum stagnantium instituatur secundum has indicationes. (1) lymphaviscida anasarcam & tumores oedematosos causans per ☿tia attenuetur. (2) attenuataque moveatur (3) convulsiones vero sedentur.

Thes. 7.

Prima indicatio obtinetur partim & primario per interna alcalia in tantum saturata sic, v. gr. omnia ☿ia lixivialia non adeo fortiter concremata, item ☿ri & ☿a essentialia huc faciunt. Unde communiter etiam commendantur ☿ia genistæ ononidis, scolopendiri, filicis &c. & maxime quidem hic conferunt talia ☿ia dum per lixivium uniuntur ☿i unde & talem crocum ☿is cum ☿b9 hisce tanquam specificum quoddam in tali casu usurpavit B. D. Michael. Deinceps ☿bus hisce accensenda etiam sunt ☿ia composita v. gr. arcan, 2pl. Myns. ☿g ☿ty, ☿ ☿ri essent. R. ☿ii ☿sata, quantum & in hac latitant particulae ☿næ in tantum saturatæ. Succedunt hisce ☿bus essentia vegetabilium amaricantes v. gr. Essent. Card. ben. Cent. min. fumar. agrimon. Ra myrrhæ Croci, item ex talibus composit. Elixir propr. item Ra ☿ri. Compos. Quæ amaricantia s. dixeris stomachica s. hydragoga perina

erinde dixeris. Proficui etiam sunt succi recens expressi vegetabilium acrium.v.gr. Succus recens expressus omnis generis phanorum. Ad quos succos jure merito referimus fœculas ari & Rad. iridis, quæ hoc affectu est singularissima. Ex regno animali hic conveniunt ☿☿ ☐si, quippe qui post pastum assumpti,etiam ex chylo non tant partes acidas peregrinas lympham quiescentem coagulantes. Ex regno minerali præter superius laudata ♂ia primario cum inveniunt acidulæ, quæ maximoperè participant de ♂e & ⊕lo ejus soluto.

Thes. 8.

Ab extra vero lympham illam stagnantem
in tantum coagulata[m] rursusque etiam
indunt impositæ herbæ partim acres, partim
iam amaricantes. Inter acres agmen
ducunt chelidon. majus, beccabunga, item
d. raphani rustici in taleolos incisæ. In-
ter amaricantes prominent absinthium &c.
protanum.

Thes. 9.

Motus verò lymphæ talis causetur aut per
purgantia aut per diuretica. Nam ut ut
erum, sit purgantia operari in intestina per
convulsionem quandam, ut inde videantur
arum medelæ adferre lymphæ extra primas
as hærenti; Attamen quia, evacuatis primis
viis,

viis, viæ sunt patulæ lymphæ in habitu corporis quiescenti: apparet etiam quomodo purgantia lympham talem stagnantem immotum cient. Purgantia verò hæc debent esse blandiora & quidem reiteratis vicibus exhiberi; sumantur vero secundum modo traditos primario ex Jalapp, & mechoacan cum ꝑis mistis,

Thes. 10.


Deinceps hunc motum etiam promoveri diuretica, quæ magna ex parte jamjam sunt tradita in ꝑibus. Plura vero videantur super de Nephritide.

Thes. 11.

Tertia indicatio obtinetur partim per interna opiata cum diaphoreticis mixta superiusque commendata. Capit. de convolutionibus, partim per externa pinguis inter quæ ex regno animali præ dominio gaudet axungia humana, item canina, caponis, anseris, item saliva animalium & ova unde & solum albumen ovorum cum tantillo ʒ v. gr. liliorum alb. & pinguedine quadam inservire potest loco unguentum digestivi sive albumen sive vitellum assumferis, perinde est, modo albumen pinguedine sit mixtum (sonst flebt es zuschr) Ex vegetabilibus ʒ expressa v. gr. ʒ commune seminum olivarum, raparum, lini, seu hæc ʒ simplici
cite

ter adhibeantur ſ. iis ſint inſolat. flores
gr. hyperici, lil. alborum, verbaſci, lina-
e &c. ſive demum etiam ☉is his ſint
nctæ particulæ quædam ☿æ. ſub forma
ſſam. ☿r. Adaugeatur autem horum ovō-
m ſenergia in tali paſſu per commiſtam
mphoram, unde miris modis extollit ☉
um ☿r. Rulandus. Ex regno minerali
imariò huc ſpectant ꝑna unde v. gr. un-
gentum album camphor. quod præ reliquis
nnibus in combuſtis palmam præripit,
ide & in pharmacopol. vendi conſuevit
nturis unguentum ad ambuſta. Imo hoc
lo ſoluto in tantum ☉ lini inſtinctu meo
ſanavit Chirurgus noſtꝛoſcomii
tulam peſſimam, cui in incendio ſubur-
no anno 1681 totum dorſum cum ſemipe-
pheria extrema utriusque brachii ita erat
mbuſtum, ut fruſta cutanea, conjunctas
eas volas (*große Stücke 2. Hände breit*)
agna exciderent. Deinceps verò convul-
ones hæ ſiſtuntur etiam eatenus, quatenus
rdes purulentæ abſterguntur, id quod
ſtinetur in ulceribus ſinuofis per jam jam
udata ꝑna ſ. ſint juncta aliis ſub forma
nguentorum ſ. emplaſtrorum hinc. v. gr.
odeſt emplaſtrum de lythargio, empla-
rum de minio, Emplaſtrum ſticticum
rollii. Ubi verò ſordes hæ intimius
M hærent

hærent, deveniendum est, ad ∇ am abster-
gentem & lem superius commendatam capit
de Lueſea. Hinc etiam in tumoribus cacoë-
thicis per ∇ tales abstergentes, si tumores
sunt aperti, mira præstamus, ubi vero tumores
non sunt aperti, ibi manus sunt abstinendæ
Ziegel Erde wenn sie noch weich ungebrant
umb den Schaden geschlagen etiam cum
successu adhibetur.



CAPUT XII.

DE.

FLUORIBUS HUMORUM EX
HABITU CORPORIS.

Thes. 1.

Quemadmodum p. n. humores non raro
hoſpitantur in habitu corporis : ita ſæpe
etiam p. n. effluunt per venas & vaſa lym
phatica nec redeunt ad centrum. Id quod
dum fit in M. S. eveniunt hæmorrhagiæ, dum
vero in ſola lympha apparent ſudores. Hæ
morrhagiæ autem iſtæ ut plurimum obſer
vantur in naribus, in utero ſ. extra partum
dicunturque menſes nimii, ſ. poſt partum &
audiunt nimius lochiorum fluxus, deinceps
circa podicem vocanturque hæmorrhoides
nimia

imiæ externæ vel in intestinis, & intitulantur hæmorrhoides internæ, ad quas jure meritoque Barbeth refert etiam veterum fluxum hepaticum. Tales hæmorrhagiæ observantur etiam frequentissimè in vulnibus, item in ulceribus licet rarius.

Thes. 2.

Causa talium hæmorrhagiarum per vias non vi, veluti in vulneribus apertas, sed spontè sese aperientes ut plurimum latitat, si præmonitum in convulsione quadam arteriarum, quam jam olim Gallenistæ censuerunt, dum in talibus hæmorrhagiis accusaverunt aut facultatem expultricem irritatam aut retentricem debilitatam. Idem jam voluit Helmont. per furorem Archei, nemini in tali casu accusat. Probatur autem hoc oculum hæc ipsa hypothesis inde (1) quod non rarò hæmorrhagiæ tales supprimantur momento per subitanam animi commotionem, item (2) per pauculas guttulas opii sent. quæ omnia non sunt apta nata, ut in momento sanguinem nimium fluidum crassare possint; item dum subito ▽ frigida imponitur partibus nuchæ vicinis, ubi profecto non dicere possum, ▽ am frigidam coagulare sanguinem; liquidum, ▽ frigida in vicinâ effusa non attingit sanguinem ad partes remotas, quippe qui per arterias carotides

ex imis partibus in hæmorrhagia narium ascendit. Potius itaque est credendum hanc ∇ m frigidam subito alterando motu nervorum, alterare etiam tonum fibrarum arteriosarum, ut hoc modo hæmorrhagiæ supprimant. r.

Thes. 3.

Oriuntur autem tales hæmorrhagiæ aut motu naturæ spontaneo naturaliter secundum certam impressam ideam, quo facti singulis mensibus naturaliter instituitur menstrua purgatio, item lochiorum fluxus in sexu sequiori, item certis temporibus hæmorrhoides naturales quæque huc non spectant, & suboriuntur etiam interdum in morbis acutis per crisin: Non rarò etiam hæmorrhagiæ largissimæ morbos acutos sub exordium maxime comitantur v. gr. in variolâ morbillis, ipsa etiam peste, quæ hæmorrhagiæ quamdiu non sunt nimix, etiam non postulant opem medicam, longe potius hæmorrhagiæ nimix, illas hæmorrhagias quas interdum observamus in ævis maternis, vidi namque ante septennium in infante semestri singulis mensibus in hypochondrio dextro suborientes vesiculæ rubescentes & sanguine turgidas, quæ tandem ruptæ largissimam suggerunt hæmorrhagiam.

Thes.

Thes. 4.

Signis diagnosticis in nulla hæmorrhagia
pusest, cum sensus eam patefaciant.

Thes. 5.

Prognostica verò sunt hæc: omnis hæ-
orrhagia diutina est periculosa. Hæmor-
agiæ in utero nimix ut plurimum sunt diu-
rnæ, non duntaxat ratione paroxysmorum,
rum etiam ut plurimum ratione recursus
uturnæ sunt; Post eruptionem variola-
m & morbillorum ut plurimum statim re-
ittunt hæmorrhagiæ, sicuti & hæmorrha-
æ concomitantes sub exordium morbos
os acutos ut plurimum cessant, morbo ad
μην accedente secus tamen in peste. Hæ-
orrhagiæ criticae, si non sunt nimix, ut plu-
rum sunt salutare. In vulneribus hæ-
orrhagiæ frequenter redeunt impedien-
t vulnerum consolidationem, in ulce-
ous verò ut plurimum denotant hyperfar-
mata, quæ non raro foveant cacoëthes
necrosam.

Thes. 6.

Curatio instituatur secundum has indica-
ones. Nulla hæmorrhagia naturalis est
pprimenda: Sed potius promovenda. Ni-
ix verò hæmorrhagiæ ab intrinseco prin-
pio pendentes sedentur, per anodyna vel
er revulsionem externè verò per blanda
lstringentia.

Thes. 7.

Prima indicatio obtinetur facile permittendo naturæ suum cursum. Secunda vero obtinetur primario per opiata quæ misceri possunt pro diversitate hæmorrhagiarum. Sic v. gr. in hæmorrhagia uteri Essent, C. stor. misceatur anodynæ in hæmorrhoidibus R. myrrhæ. In hæmorrhagia uteri nullum præstantius datur remedium decocto gallorum. In narium R. Corall. cum ☿. C. In vulneribus vero profundis internis itidem etiam R. Corall. In externa vero melius est abstinere à medicamentis internis, quia nimirum ab extra melius potest fieri arteriæ vel venæ scissæ obduratio.

Thes. 8.

Ad secundam indicationem obtinendam faciunt etiam omnia quæ quocunque modo causari possunt revulsionem aliquam, quæ consistit in hoc, quod nimirum sanguini data alibi via copiosior etiam fiat impetus in partem illam, qua facta, est via patula, quæ facto, minus sanguinis influit in locum hæmorrhagiam patientem, unde & arteriæ capillares non adeo distenduntur, sed rursus sensim atque sensim adstringuntur. Cauti tamen simus in tali revulsione, ne nimium subtrahamus sanguinis, itaque sufficere poterunt pro revulsione tali præter propter
3j. l. 3ij.

Thes.

Thes. 9.

Tandem obtinetur etiam hæc indicatio
r externe imposita, quæ partibus nervosis
inis imprimunt motum quendam pro-
um constrictorium; qui motus deinceps
am communicatur arteriis. Talia autem
nt omnia aceta, imprimis vero floribus
tis frigidis tincta v. gr. acetum rosac. bel-
. violarum, item tinctum fructibus v. gr.
o. ideii, item omnia \oplus lica temperata. v. gr.
 \oplus li, \oplus lum σ is solutum &c. interdum
am ipsi flores apprime vero \ominus e conditi
plicari possunt cum aceto irrorati.

Thes. 10.

Communiter vero commendantur
hanc indicationem obtinendam ad-
ingentia v. gr. R. \ominus ris \oplus li, Lap.
mat. ipse lap. hæmath. præparatus,
nea, sperma ranarum, ex quo componitur
lvis sperniolæ Crollii. Quæ omnia tamen
sufficiunt ad hunc effectum produ-
ndum. Itaque si animus est iis utendi,
amur iis cum opiatis mistis.

Thes. 11.

Ultima indicatio obtinetur. v. gr. ex regno
imali per stercorea. quædam v. gr. caninum,
llum, item capillis leporis; item fibrillis
uginosis, apprimè vero repertis intra ve-
menta, item telis arancarum, ex regno
nerali rursus huc faciunt egregiè o-

omnia ☉lica temperata, quantum nimirum adhuc sunt conjuncta cum suis ☿is hinc etiam omnia ☿stria, quæ originem suam debent ☉lo, possunt. v. gr. ☿a ☉li dulcis, item hic cognatus bolus, crocus ☿is adstringens. Ex regno vegetabili maximopere hic profuit quævis farina Ales (nostrates vocant **Stau Mehl**) sanguis draconis, thus, mastix, &c. Vid. Chirurg. experiment. & optim. Barbet. cap. 10. In omni interim hæmorrhagia e vegetabilibus commendatissimum est decoctum gallarum Turcicarum, quod cum gossypio exceptum vulneribus potest applicari imo in hæmorrhagia narium illo etiam multoties cum successu sum usus, dum nimirum formavi turundas ex gossypio easque decocto hoc madefactas immisi in meatu narium. Deinceps succus granatorum acidorum item etiam hic potest vocari in usum.

Thes. 12.

Non raro in vulneribus fiunt prominulæ arteriæ scissæ adeò ut nullatenus consolidari queant, præprimis verò quotiescunque a grotantes opus habent sese commoveri. Sic v. gr. superiori anno mercator equorum gravissime quater decies in capite vulneratus quinta demum septimana patiebatur hæmorrhagiam ingentem ex arteria rursus

per

erta per vehementiorem alvi excretionem, uæ quidem hæmorrhagia sistebatur rursus per superius laudato, interdum verò impossibile est compescere arteriarum hæmorrhagias hac via. Itaque arteriæ prominulæ tantantur ferramento Δ to, aut etiam filamento serico constringantur. Hæc enim constrictio quotidie accidit arteriis umbilicibus, dum nimirum in partu præscinditur umbilicus, hinc etiam bis hac constrictione um euphoria usus sum.

Thes. 13.

Coronidis loco apprehendimus huic capiti observanda quædam circa febres traumaticas, quæ raro absunt in profundioribus vulneribus, præprimis in vulneribus capitis, tendinum, juncturarum & viscerum internorum, quia in omni febre duo potissimum sunt spectanda, convulsio nempe generis nervosi & ebullitio in sanguine. Itaque & hic omnis cura eò est dirigenda ut nervinis remedeamur, aut præsentibus jam convulsionibus, aut resistamus etiam imminetibus. Ebullitioni deinde etiam succurramus per medicamenta convenientia; Ad primum scopum obtinendum faciunt omnia ea quæ commendavimus in capite de convuls. in specie de epilepsia v. gr. specif. cephalicum, pulv. marchion. antepil. unicorn. mar. dens equi mar. & quod omnibus est præ-

ferendum castoreum. His quoque opiata bene præparata commodissime interdum possunt adungi, apprimi, vero ubi imminet delirium, quæ misceantur sæpius laudato modo, cum Abus v. gr. castoreo, liqu. C. C. succinat. &c.

Thes. 14.

Secundum scopum attingimus per blanda diuretica, quæ nimirum aciditatem quandam ex sanguine stagnante oriundam & effervescentiam p. n. minitantem ☿tant. Ex regno vero animali præter superius commendata nervina, eminent hic Ocul. ☿. ipsi ☿. mandibul. luc. pisc. dens apri, quæ omnia ☿e saltem præparata possunt adhiberi. Interim tamen huic scopo etiam non contrariantur ☿ia Aia ex his parata apprime verò si acido quodam blandiori sint temperata; hinc egregii usus est in vulneribus talibus R. Corall. cum ☿ Cor C. Ex regno vegetabili hic profunt chærefol. fanicula pyrola, cariophyllata, scolopendrium, pimpinella, millefolium plantago. Veronica Matrifylv. Ros. ☉. &c. Ex quibus decocta paramus vulneraria, quibus ut mori satisfiat; Interdum etiam possumus jungere medicamenta parti vulneratæ specifica. v. gr. in vulneribus capitis, betonic. stœch. arab. Fl. bellid. Cichor. valde etiam conferunt,

item

em|aristol. rotund. Ex regno minerali
ommendo ☿ diaphoreticum in pulmon.
abios. galeops. &c. prostat etiam in offici-
s eff. vulneraria taleolis vegetabilibus para-
cui omnino etiam concedimus suam
udem.

Thes. 15.

Formulæ sunt tales in febribus trauma-
cis.

R. Essent cast. 3j.

ther. 3ß

l. D. S. Stärkende Abend-Essenz 40.
Tropfen des Abends gegen Schlaf-
fens-Zeit in einem Gläßlein frischen
Biere.

R. R. Corall. cum Ω Cor C.

Essent. castor. aa. 3ß.

M. D. S. ut supra.

R. Spec. cephal..

p. march. antep. aa. gr. xv.

unicorn. mar.. 3ß.

l. optimè. D. S. Präservierend Pulver
ins trinden zu thun.

R. Herb. fanicul.

fol. plantag.

pyrol. aa. M. j.

fl. bellid.

Cichor. aa. p. iij.

Rad. pimpinell. 3ß.

coqu in f. q. ∇ . fontan.

R.

ate ita etiam non raro fluxiones illæ con-
etæ plene supprimuntur ut ægrotantibus
ulta faciant mala. sic. v. gr. sexui fœmineo
boritur suppressio mensium, in utroque
xu hæmorrhoidum, quæ hæmorrhoides
ommuniter dicuntur die **Verstopfte Gül-**
neAder bene tamen hic sunt distinguendæ
emorrhoides cœcæ à suppressis, suppressæ
im dicuntur quodocunque statò tem-
ore hæmorrhoidalis fluxus non succedit,
ecæ verò, quando prætereà circà anum
teriæ & venæ evadunt tumidæ, adeo ut non
rò superveniat inflammatio, quo pacto,
iam causatur dolorem exquisitissimum.

Thes. 2.

Pars affecta in suppressis mensibus inter-
um est ipsa M. S. quantum nimirum dege-
erat in materiam p. n. valdè viscidam,
atenus per arterias uteri capillares exprimi
equit, aut in ipso utero etiam quatenus
mirum membranæ uteri diversimode
onvelluntur, hocque pacto orificia arteriosa
cluduntur. Et hæc etiam est ratio ob
quam in gravidis consueti mensium fluxus
essant. Ratione vero causarum pars affecta
equentissimè est ventriculus & bilis quate-
us progignunt M. S. adeo viscidam.

Thes. 3.

In fluxu hæmorrhoid. suppresso idem est
obser=

observandum saltem mutato loco, ita ut
quod antea asserui de utero, id accommo-
detur ad imam intestini recti portionem.

Thes. 4.

Causæ facile possunt erui ex dictis.

Thes. 5.

Signa diagnostica in mensibus suppressis
patent per se ex relatione nimirum ægro-
tantis, in hæmorrhoidibus verò adest dolor
circa umbilicum, circa renes, circa lumbos
frequens dolor in egerendis excrementis
interdum cum excrementis excernuntur
etiam striæ saltem cruentæ, præterea adest
ut plurimum lassitudo & torpor totius
corporis.

Thes. 6.

Signa prognostica sunt suppressiones utraque
que summe sunt periculosæ, partim quia
jam jam inducunt statum quendam p. n.
partim quia ille orgasmus qui per naturam
imprimitur sanguini vel etiam instinctus
qui communicatur eidem per naturam arte-
riis excitat in humoribus motum quen-
dam, qui non succedens rite, deinceps alte-
rat totam M. S. ut deinde partes p. n. in aliis
corporis partibus seponantur, in ibique
scirrhus aut tumores, quos sequitur inter-
dum inflammatio, causentur v. gr. frequens
est asthma in virginibus, quibus suppressio
funt

int menses quos non raro supervenit
inflammatio & formalis phthisis. Cujus
ei triste exemplum sub exordium veris alibi
non nemo est expertus mihi amicissimus.
æmorrhoides verò cœcæ renuntiant cruci-
bus infernales non enim commemini que-
clarum tantarum, quantas peragunt geme-
undi seseque miris modis contorquentes
gri, vidi namque ex parte nitentes ob do-
res insignes.

Thes. 7.

Curatio instituaturs secundum has indi-
cationes. Visciditas sanguinis corrigatur,
asa vero stimulentur in motum consuetum.

Thes. 8

Prima indicatio obtinetur per medica-
menta ex acacia Germanica, ex pulegio &
myrrha, aliis enim non utor, ex his com-
pendio vinum medicatum flor. acaciæ np.

R. flor. acaciæ. M. iij.

fol. senn. al. S. S. 3x.

cisa & contusa in sue sacco lineo. D. S.
Kräuter Püschel in 2. Maß = Wein zu
engen und alle Morgen 1. Wein = Glas
in zu trincken. Ex pulegio vero parari
potest ∇ a, quæ multoties est ∇ ta, semper
jectis novis foliis vel parari etiam potest
de Essent. Myrrh. verò optime usurpatur
Elixr. propriet. s. acido, quippe quo solo
etiam

etiam utor in suppressis hæmorrhoidibus Sabina propter acrimoniam copiosissimam non tuto adhibetur in his casibus, causatur enim dolores atrocissimos.

Thes. 9.

Ubi verò adest dolor insignis in hæmorrhoidibus cæcis, optime confert ꝑ fl. verbasco linariæ, lil. alb. per insolationem parata, vocuantur etiam hi flores in lacte & applicentur. Ubi vero sanguis jam videtur coagulatus, ibi necessum est ut applicentur hirudines aut aperiantur etiam lancetta valde eminentia livida, interne vero optimo cum successu exhibeantur anodyna cum diaphoreticis mixta, prout sunt commendata in aliis inflammationibus.

Thes. 10.

Semper etiam adhibenda est operatio excrementa alvina bene sint fluida, idcirco enim multos novi, qui abstinuerunt ab alimentis solidis ne sentirent dolorem illum exquisitissimum, quem alvinæ feces induratae causantur. Asservatur vero alvus lubrica apprimè per pruna cocta, quibus etiam tantillum fol. fenn. potest commisceri.

CAPUT. XIV.

DE

ALVI OBSTRUCTIONE.

Thes. 1.

VIsis hætenus convulsionibus & humoribus in habitu corporis stagnantibus hinc jubet & ordo pertractare morbos & symptomata, quæ dependent ex abolita & diminuta actione animali. Antequam erò ad ipsa nos accingimus, videbimus actionem animalem & certo respectu voluntariam etiam in intestinis s. alvi excretionem diminutam vel plane abolitam. Secernimus verò hoc caput ab aliis similibus ideo, quia penes intestina eorumque fibras motus non est situm semper exerere vires suas, ut ut sese habeant naturalissimè sed requiritur præterea ut & ipsa excernenda excretioni sint accommodata hinc v. gr. observavi, prostantque similia exempla passim contumacissima, alvi obstructionem in virgine 15. annos nata optimè florida & sana ex usu mespilorum non bene mitium, semina nimis lapidea fermè congregata intra plicas testini recti ita firmiter exitum obdura-
 rant, ut ne quidem Clyster ingressus
 iteret, sed opus esset matris digito medio,
 N qui

quī sensim atque sensim radendo semina hæc
concreta(compacta) subtraheret granulatim
tam vehemens autem fuit hæc alvi obstructio
ut insultus epileptici supervenirent, delirium
que immineret. Solam vero motus aboli-
tionem per paralyin quandam posse inferre
incurabilem alvi obstructionem, me docuit
quondam vetula quædam, quæ annos suos
computabat quindenis (*sic rechnet die
Jahre nach Mandeln*) septimanam enim
agebat, hæc vetula ab apoplexia tangebatur
quo facto, uti partes inferiores omnes fin-
etiam intestina privabantur suo motu, hinc
usque ad octavam septimanam decubuit
absque ulla alvi excretionem ut ut sæpius
tantillum jusculi assumeret alvusque variis
laxantibus per superiora & inferiora irri-
taretur.

Thes. 2

Alvi itaque obstructio secundum magis &
minus præsens, partem affectam cognoscit
intestina eaque omnia; & ut ut crassiora hinc
videantur aptiora tenuioribus: Attamen
hæc æque fiunt partes affectæ & quidem
ideo, quia alvus excernere non potest, nisi
cooperante intestinorum motu peristaltico
in hoc verò concurrunt omnes fibræ totius
intestinorum arundinis à pyloro nempe
usque ad anum. Patientem itaque intestini
que

modam superiori, omnino tollitur etiam
cretio. Hinc in miserrima alvi obstru-
ione patiuntur, & inflammatione tenuia
d. Barbeth. & alios Practicos.

Thes. 3.

Causæ sunt variæ aut enim hærent in inte-
nis tanquam partibus continentibus, aut
contentis; In intestinis continentibus
observantur (1) læsiones nervinæ, quarum
templum jamjam recensui, deinceps omnia
alnetæ intestinorum huc etiam conferunt, si
nt majora, etenim hæc non duntaxat ex-
ementis concedunt viam patulam in
dominis cavitatem magis quam deorsum
ersus, verum præterea ob supervenientem
inflammationem tollunt etiam motum
eristalticum. Inflammationes enim quæ-
sid ipsum possunt, quemadmodum enim
artubus nulli parti inflammatae licitus est
us motus, ita & intestinis inflammatis de-
egatur sua compressio partim ob dolorem,
artim etiam ob intumescuntiam, ex inflam-
atione oriundam. Demum patiuntur
iam intestina quatenus comprimuntur ab
tra. sic. v. gr. observavi in mercatore
lvena ante biennium incurabilem alvi ob-
ructionem ex nimia vesicæ □iæ repletionem,
ec enim turgida erat præter propter
uatuor mensuris □æ, hinc etiam simula-
N 2 bant

bant uterum mulieris gestantis, hoc pondus
ita incumbbat intestino recto circa junctura
ram ultimæ abdominis vertebræ, & ossi
sacri, ut ne tantillum contentorum intesti
num rectum dimitteret: Deorsum versus
intestinorum convolutio idem etiam potest
præstare, & ut ut tanquam rarius phænomenon
non reticeam illam involutionem quæ
portio intestini vel sursum, vel deorsum in
aliam vicinam tendit. vid. observ. Amstelod.
attamen frequentius malum est involutio
intestinorum in herniis. Nam licet etiam
pars mesenterii intestinaque retineat in sua
justa serie, attamen tales rupturæ per quas
prolabuntur intestina constringunt hæc un
ne contenta s. flatus, seu excrementa sint,
liberè moveri possint, quare necessariorum
subsequitur inflammatio & demum alvi
obstructio.

Thes. 4.

Ex contentis vero induunt naturam causæ
morbificæ vel excrementa duriora seu ex sua
natura sint duriora v. gr. mespilorum fructus,
unde & Germani audiunt **Ursch Klammern**,
ita pira exsiccata, hæc enim largius commestæ
alvum constipare valent. Contra vero bene
trita alvum potius laxant. Item spiræ ni
mium induratae etiam indurantur in inte
stinis a succis p. n., inter quos agmen ducit
fermen-

ermentum ventriculi nimium acidum, quale observatur in hypochondriacis quibus tiam alvi obstructio est malum frequentissimum. Hæc ipsa contenta non raro ita concresecunt in molem duram intra intestinorum cavum ut deinceps obstruendo & ab intra premendo intestinis concilient inflammationem cum subsequente sphacelo & angræna, quale exemplum ipse aliquando observavi in cane molosso.

Thes. 5.

Hanc obstructionem tanquam effectus infallibiles superveniunt omnia ferme symptomata, eaque pessima, miserrimum est motus intestinorum peristalticus inversus, qui producit passionem iliacam.

Thes. 6.

Signa diagnostica alvi obstructæ patent ex se ex relatione ægotantium & circumstantium.

Thes. 7.

Prognostica vero sunt: nulla alvi obstructio est negligenda ob symptomata supervenientia; vomitus superveniens obstructionem alvi cum sudore frigido semper est æthalis, in passione iliaca; in febribus ardentibus obstructio alvi maxime etiam est periculosa, exceptis variolis tempore proruptivæ & maturationis.

Thes. 8.

Curatio instituat^r secundum has indicationes : materia in intestinis contenta crassa emolliatur, fibræ intestinales stimulentur p. n. vero intestinorum dolores sedentur.

Thes. 9.

Prima indicatio obtinetur vel per medicamenta ore assumenda, vel per alvum admittenda, primi generis sunt ex regno vegetabilium omnis generis ☉sa, exceptis narcoticis expressa recentia, alias namque nauseam procreant ventriculo, vomitumque ciunt v. gr. ☉. raparum, lini, item olivarum (de quo patientes interdum duo cochlearia assumere possunt,) præ reliquis omnibus tamen amygdalarum dulcium. Exhibenda vero hæc ☉ sunt semper in vehiculo aliquo calido v. gr. brodio. His ☉is succedunt succi quidam vegetabilium v. gr. succus recens expressus pastinac. item succus pomorum borstorianorum nec non prunorum damascenorum uti & herba gal. Quia vero hi succi posteriore semper non possunt haberi, in locum eorum surrogandum est decoctum, apprimè vero quatenus tali decocto adjungitur tantillum expurgante quodam blando quod spectat ad secundam indicationem. Ex regno animalium hic profunt omnia pingua, præfero reliquis omnibus butyrum recens, non adeo Θ itum deinde

inde conferunt etiam juscula pingua
gr. ex pinguedine bubula, humana,
anina, anserina, notetur tamen quod talia
rodia non sint valdè aromatizanda prout
ias usus postulat. Quæ vero per alvum
intinjicienda, desumuntur rursus primario
ex regno vegetabili & animali ex minerali-
tiam profunt sola \ominus ia, & quidem ex illo
ræter jam laudata \circ , herbæ emollientes,
imирum species emollientes, flor. & fructu-
m, item electuaria v. gr. lenit: Florenzolæ
tem mella. Ex hoc vero animalium juscula
pingua item lac.

Tbes. 10.

Secunda indicatio obtinetur per medi-
amenta purgantia, præstat vero in contu-
naci alvi obstructione adhibere purgantia
eniora mista cum decoctis emollientibus,
hinc v. gr. decoctum prunorum cum fol.
enn. & manna calabrina, valde hic est profi-
uum, item misceri etiam tali decocto pos-
sunt aliquot grana Jalapp. cum \mathbb{C} , \mathbb{F} r. Idem
observandum etiam est in clysteribus, hinc
prodest Electuar. hier. cum agar. Confect.
Hamech: maximopere vero stimulant in
Clysteribus \ominus gemm. & \oplus iat. item \mathbb{F} us
emeticus. (quem præscripsi ad 33. in passione
liaca) ubi ægrotans foemina jam jam in fauci-
bus sentiebat saporem stercoreum tantæ vero

efficaciæ erat, ut cum alvi apertura moveret etiam menstruum fluxum.

Thes. 11.

Tertia indicatio obtinetur per solventia interna diaphoretica, quæ vid. cap. superius de inflammatione. Externè vero fiant inunctiones ex ois anodyn. v. gr. flor. chamom. verbasco. linar. scorpion, quibus misceri possunt animalia pingua v. gr. butyr. caprin. axung. human. canin. sebum hircinum quæ linimenta calide sæpius toti abdomini sunt inungenda.

Thes. 12.

Quæstionem movere aliquis posset, utrum in inflammatione tali etiam conveniat V. S. respondetur omnino felici enim cum successu, ante triennium eam adhibuit in studioso, qui in nuptiis mediis coqui galli fustibus erat petitus, pedibusque in latere dextro abdominis conculcatus, hinc patiebatur contumacissimam alvi obstructionem, huic properam adhibitis Clysteribus primis diebus, quinta demum nocte aperiebatur alvus, cum rejectione materiæ purulentæ nigricantis & graveolentis, postquam præcedente die administraveram in brachio V. S & quarta hora pomeridiana adhibueram medicamentum diaphoreticum cum anodyn. mistum. Possunt etiam adhiberi suppo-

opositoria item globuli majores moschar-
ni **Biesem-Rugeln.**

Thes. 13.

Formulae ad primam indicationem fiant
es.

R. $\circ\circ$ Rapar. $\mathfrak{z}\text{v}$. f. l. a.

Clyster tepefiat in ∇ a calida.

R. Spec. emollient.

flor. & fructuum aa. M. ij.

F. l. a. Decoctum.

R. Decoct. Colat. \mathfrak{ss} . j. dilue.

Electuar. lenit. Florenzol.

mell. \mathfrak{z} ial. aa. \mathfrak{z} j.

$\circ\circ$ insol. flor. chamomil. \mathfrak{z} ij.

F. l. a. Clyster cum internodio.

B. Interdum feces ita sunt induratae, ut
ima vice per canalem nihil possit expri-
i, sed opus est ut filo ferreo (**Eisendraete**)
eriantur aperturae canalıs.

Thes. 14

Formulae ad secundam & tertiam indica-
onem.

R. Prun. Damasc. no. XV.

Fol. Senn. Al. S. S. \mathfrak{z} i β .

Cremor. \mathfrak{z} ri \mathfrak{z} j.

cis. & contus. coqu. in ∇ . fontana ad re-
manent. \mathfrak{z} ij. adde.

Mann. calabr. \mathfrak{z} ij.

M. D. S. Temperirender Saft nach und nach zu nehmen.

R. Decoct. Colat. ℥ij.
p. Jalapp. gr. viij.
℥ii diaph: gr. v.

M. D. S. Purgier-Träncklein auf 1. mal

R. Spec. emoll. m. iv.

F. l. a. Decoctum in ∇ font.

R. Electuar. hier. cum agar. Decoct.
Mel. Rosac. aa. ℥j. (Col. ℥


⊙ ℥iat. ℥j

Vitell. ovorum, no. j.

F. l. a. Clyster vel substituiatur ⊙ ℥iat
tantum ⊖ Gemmæ vel ꝑr. emetic.

Thes. 15.

Formulae ad tertiam indicationem videntur supra.



CAPUT XV.

DE

PARALYSI.

Thes. 1.

Paralysis occupat corpus humanum, dum fibræ partium ita amittunt tonum suum ut ne satis sese possint rursus constringere hinc partes quas continent vel dirigunt etiam

tiam debent, vel movere, vel in naturali
tu asservare nequeant. Hinc tanquam
ffectus certissimus sequitur partium quasi
uædam prolongatio sic. v. gr. in paralyfi
nuscule huiusmodi totum dehinc brachi-
m apparet pendulum, collatumque cum
ltero adhuc sano brachio eminet.

Thes. 2.

Hinc satis apparet non solos musculos,
erum etiam quasvis totius corporis nostri
membranas, imo ipsos etiam tendines rati-
ne fibrarum induere naturam partium
ffectarum in hoc morbo.

Thes. 3.

Causa proxima latitat aut in sanguine,
ut in lympa, aut in nervis, aut in ipsis
bris. In sanguine latitat causa quatenus
ic deficit vel ob hæmorrhagias vel ob defe-
tum ipsorum alimentorum, seu alimenta
lane non assumantur, seu assumpta san-
uinem disponant, in liquorem viscidum,
enacem, nigricantem ex quo impeditur
utritio. Hinc observamus non raro in
ecticis talia symptomata. In lympa latitat
itium quatenus hæc irrorare debet fibras
a ut evadant aptæ motui dum nimirum
onstat ex materia viscidiori, ∇osiori,
incque fibras nimium quantum emollit,
edditque lubricas, quo pacto, observamus
para-

paralysin quandam in Rachitide Anglorum
In nervis latitat vitium quatenus hi læduntur
vel ab extra pungendo, premendo &c. ve
quatenus etiam læduntur in cerebro hinc
paralysis etiam observatur in hydrocephalo
& communissimè in apoplecticis, postquam
apoplexia aliquandiu duravit, ipsarum
fibrarum vitio accedit paralysis, dum fibræ
nimium quantum distenduntur, hinc vide
mus in durioribus diuturnioribus laboribus
ita distendi fibras, ut in justum tenorem redire
nequeant subito, unde & originem trahit
lassitudo. Imò inde etiam apparet quomodo
per continuum motum non duntaxat ani
malia subjugalia, verum etiam ipsi homines
per labores nimios vitæ possint privari.

Thes. 4.

Signa diagnostica patent ex relatione
ægrotantis & adstantium, distinctiva vero
sunt petenda ex anamnesticis, itaque opus est
ut repetamus ea, quæ olim acciderunt ægro
tanti. v. gr. si quis perpeffus est diuturnas &
largas hæmorrhagias, tutò his causam pos
sumus imputare, item si quis apoplexiam
nervi accusantur.

Thes. 5.

Prognostica: omnis paralysis est valde
difficilis curatu, imprimis vero quæ subsecuta
est apoplexiam, quæ hæmorrhagias subse
quitur

itur, facilius curatur nisi forsitan hæ-
orrhagia sit orta ex vulnerata arteria
agna, hæc enim si fuerit consolidata etiam
minuitur fluxus sanguinis in partem
lectam. Quæ dependet ex vitio lymphæ
iam curari potest, sed valdè successivè.
quæ dependet ex ipsis fibris si non subito
ratur, nunquam curatur.

Thes. 6.

Curatio instituatür secundum has indi-
tiones: Corpus post perpeßam hæmorrha-
am & jejunia sensim, atque sensim rursus
triatür, sanguis tenax & viscidus tempe-
ur, lymphalubrica evacuetür, nervi torpidi
eitentür, fibræque flaccidæ roborentür.

Thes. 7.

Prima indicatio obtinetür primario per
menta, hac lege ut sensim atque sensim
rrigantür juxta Hippocrat. Corpora quæ
sim emaciata, sensim etiam reficiantür,
as namque alimenta copiosa nimiumque
umpta catarrhum, difficultatem digerendi,
ylumque crudum produciunt, qui novum
lum causatur. Interim tamen præstat
hibere medicamenta digestionem juvan-
v. gr. ☿. ☐os dulces, qui hic creduntür
propriati, lumbric. ☿strium dulcificatus
m ☿ primul. ver. l. lil. convall.

Thes. 8.

Secunda indicatio obtinetur per medicamenta commendata capite de febre hectica.

Thes. 9.

Tertia indicatio obtinetur per medicamenta purgantia primò, quæ hic desumi possunt ex hermodactylis hinc prostat MP. ex hermodactyl. quæ stimulari potest diagrydio vel resina, etiam Jalapp., secundo per diaphoretica inter quæ agmen ducunt castoracea mista cum Alibus ☐sis & aromaticis vegetabilibus. v. gr. flor. primul. veris, salviæ, lavendulæ, spicæ, anthos, ex semine cubebæ cardemom, ex radicibus Zedoar, angelicæ aristoloch, rot. ireos florent. imperator. E quibus componi possunt ☐us aromatizati cum ☐sis v. gr. viperarum, & specificè hi lumbricorum ☐str. & formicarum. Deinceps hi ipsi ☐us de novo possunt affundi laudatis speciebus aromaticis, ut inde extrahantur essent. quo sensu prostat essentia arthritica item essent. lumbric. composita. Tertio hæc lymphæ corrigitur etiam per stomachica, quo sensu valde prodest Elixir propr. sine acido.

Thes. 10.

Quarta indicatio obtinetur per Alat ☐s cum castor. mista, item medicamentis ambrati

atis & moschatis hinc prodest essent, am-
æ cum liqu. C. C. succin. parata. Hæc
erò medicamenta tam internè quam ex-
erne commodè possunt adhiberi.

Thes. 11.

Quinta indicatio obtinetur primario per
edicamenta ꝯia ab extra adhibita, hinc
ostant omnis generis emplastr. ex bolo,
em medicamenta ex lap. Calaminar. ob
opiosam suam ☐am stypticam. Ratione
is vero hic præfero omnibus aliis reme-
is thermas, quæ mire non rarò præstite-
nt in hoc affectu.

Thes. 12.

Formulæ ad secundam indicationem vid.
p. de febre hectica.

Thes. 13.

Formulæ ad tertiam indicationem sunt o-
les.

R. MP. de hermodactyl. gr. xv.
diagryd.

resin. Jalapp. aa. gr. ij.

F. l. Pilul. cum R. ☐r. no. xxv. D. S.

Glieder-Pillen auf 1. mahl.

R. Flor. primul. veris,
anthos.

Salviæ, aa. p. ij.

Rad. imperat. 3ij.

hermodactyl. 3iij.

agar.

agar. albiss. ʒj.

fol. Senn. al. S. S. ʒβ.

Cubeb.

cardam. aa. ʒβ.

Incis. & contus. stent per noctem
 ▽primul. veris manè leviter exbull.

R. Infus. Colat. ʒij.

℞ lumbric. ▽str. gt. xxx.

sirup. de Cichor. cum Rhab. ʒij.

M. D. S. Purgier = Träncklein auf
 mahl.

R. Essent. lumbric. ▽str.
 castor.

Liqu. C. C. succ. aa. ʒj.

M. D. S. Schweiß = treibende Glieder
 Mixtur täglich 2. mal 50. Tropffen
 nehmen.

Thes. 14.

Formulae ad quartam indicationem.

R. Balsam. anglic.

℞ lumbr. ▽str.

formicar. aa. ʒij.

M. D. S. Euserlicher Glieder = Spiritus.

R. ∞ lumbric. comp. ʒj.

axung. human. ʒβ.

M D. S. Euserlich Glieder Sälblest
 warm aufzustreichen,

R. Essent. supra descript.

Thes. 15.

Formulæ ad quintam indicationem.


R. Flor. lil. convall.
 primul. veris.
 saly.
 lavendul. aa. p. iij.
 boli armen. ℥iij.

coqu. in vini Rhenani Mens. j. vase bene
 operto.

S. Gliederstärckender Umschlag warm
 gemacht eußerlich aufzulegen.

R. Emplastr. D. lap. calam. oxycroc.
 aa. f. q.
 malax cum ☉ lumbricor. D. S.

Eußerlich Glieder-Pflaster.



CAPUT XVI.

DE

CONTRACTURIS.

Thes. 1.

Actio fibrarum motricium læditur et-
 iam in corpore humano, dum nempe
 ræ motrices haud equidem prolongantur
 que abbreviantur, neque involuntarie
 oventur, sed quiescunt quasi ut antago-
 sta æque sit quietus veluti fibra & conse-
 enter musculus alter.

Thes. 2.

Hic affectus si affecerit diaphragma, musculos capitis & intercostales causantur catalepsi in qua subito omnes sensus corripuntur, patientesque rigidi permanent in eo statu, in quo sunt prehensi apertis & immotis oculis

Thes. 3.

In artubus hic affectus est frequentissimus in quibus etiam κατ' ἐξοχήν nomen contracturarum retinet german. dicitur **ganz und gar Contract werden.**

Thes. 4

Hic affectus si vehementior fuerit, ita ut fibræ motrices abbrevientur, abbreviatæque semper contineantur, progignitur rigor qui non raro in artubus etiam observatur maximopere etiam interdum observatur in pene, in quo dicitur priapismus malum valde molestum & nonnullis maxime dolorosum.

Thes. 5.

Partes affectæ sunt solæ fibræ motrices.

Thes 6.

Causa proxima vero ratione contracturarum latitat in lymphâ madefaciente fibras, quæ coagulata continuum quendam tenorem intra fibras causatur, quo pacto, tollitur motus voluntarius. In rigore vero firmitus adhuc coagulatur ea, ipsa lymphâ ita, ut deinceps

eps fibræ quasi reddantur rigidæ. Uti
c apprime nos docet frigus hybernum.
erim tamen & hic non est negandum,
od ipsum nostrum principium vitale, non
ò præter fibras illas rigidas concitet etiam
partibus rigidis spasmos sive convulsiones,
o facto, rigor magis magisque intenditur.

Thes. 7.

Causæ remotæ sunt variæ, imprimis verò
rbi chronici, scorbutus & alia mala, quæ
ympha nostra producunt. Sicut crassa acria,
e in artubus & in fibris ÷ta sese coagulant
a lymphæ, hinc etiam contracturæ adeo
t frequentes in arthriticis.

Thes. 8.

Signa diagnostica sunt: in contracturis
itur motus illius partis quæ patitur con-
turam, interim tamen pars non prolon-
ur, sed potius aut permanet in situ natu-
aut retrahitur, retractaque continuo as-
atur, unde patet quomodo discrepet vel a
lysi vel etiam à convulsione, raro etiam
st rigor quidam.

Thes. 9.

rognostica sunt: omnes contracturæ
tu sunt difficiles, quo vero contractura
vetustior eo etiam curatu est difficilior.

Thes. 10.

Curatio instituaturs secundum has indica-

tiones: lymphæ viscida cum \ominus bus coagulanti-
bus attenuetur, & immutetur, immutata
que evacuetur, fibræ vero per coagulationem
hanc immutatae roborentur.

Thes. 11.

Prima indicatio obtinetur per omnis ge-
neris medicamenta \mp tia partim quatenus
ex primis viis \mp tant acidum aliquod pere-
grinum, ne deferri possit deinceps ad fibras
partim etiam quatenus lymphæ sic depuratae
deinceps stagnantem jamjam lympham de-
purat, itaque \mp tia ex regno animali, seu
minerali, etiam vegetabili petantur, perinde
est, assumi vero possunt ex capite præce-
dente 15. v, gr. Ra gii ¶ rsat. essent. lumbrico-
rum, item Lus vel liquor C. C. succinat
commistus cum talibus essent. Item medi-
camenta ♂ ia v. gr. Crocus ♂ is cum \ominus bus
&c. etiam hæc \mp tia adhibita fuerint sub for-
ma digestivorum, seu etiam sudoriferorum
utrumque erit bene institutum.

Thes. 12.

Exhibitis talibus \mp bus ulterius assequi-
mur indicationem nostram per purgantia
quæ possunt desumi etiam ex capite præced.

Thes. 13.

Ultima indicatio obtinetur non tam per
 Losa , sicut in cap. anteced. verum potius
per pingua, hinc mira hic præstat axungi
humana

Epiplocelas. Apertura autem illa dum fit umbilico dicitur omphalocoele in inguinibus hernia inguinalis, in scroto vero scrotalis. Quæstionem hic movent quidem moderni Anatomici, utrum nimirum Epiplocelæ evenire etiam possit in hernia inguinali & scrotali, an vero solum contingat in omphalocoele? Ad hanc quæstionem Recentiores respondent negative, inde, quod omentum in homine sit brevius quam quod possit protrahi usque in inguina, quemadmodum hoc naturaliter observare licet in canibus. Enim vero ut ut ultro confitear omentum in homine raro multum protendi infra umbilicum, attamen bis etiam observavi in cadaveribus humanis omentum tantæ longitudinis, quanta observatur in canibus, ut proinde omnino sit possibile posse prolabi omentum hoc in inguina, aut sit quicquid voluerit quod prolabitur in praxi res eodem recedit.

Thes. 2.

Communiter quidem nullus alius denominatur locus, in quo extra dicta eveniant herniæ; attamen in virgine jamjam denata supra umbilicum hernia fuit observata, ita ut medium spatium occupaverit intra scrobiculum cordis & umbilicum, item in latere dextro, in medio inter umbilicum &

os ileum. Item sub umbilico ex ictu
ornu taurini, in quo ictu cutis externa &
musculi etiam erant integri operitoneum
men erat læsum, ita ut emineret tumor
igni. Quæ læsio omnino conveniebat
am herniis & ad modum etiam harum cum
ccessu curabatur.

Thes. 3.

Hæ sunt herniæ proprie dictæ. Dantur
nim & aliæ tumorum species præprimis
erò in scroto, quæ mentiuntur hernias, hinc
tiam nactæ sunt nomen herniarum v. gr.
arcocele quæ tamen non consistit revera
n apertura quadam peritonei, hinc etiam
x abdomine nihil prolabitur, sed potius
ritur ex excrecentia p. n. musculi crema-
eris, vasorumque spermaticorum, talis
xcrecentia si non constat ex genuina carne,
erum præterea habet interpositas viscidas
artes coagulatas vel scirrhosas dicitur
cirrhocele, interdum etiam soli flatus
istendunt peritonei processus huncque
amorem mentiuntur herniosum, dici-
arque hic tumor physocèle seu pneumato-
ele. Sæpe etiam ∇ hic reperitur unde tumor
ic audit hydrocele.

Thes. 4.

Ad curationem feliciter suscipiendam
erniæ proprie sic dictæ maxime sunt distin-

guendæ ab analogis tumoribus, hinc cognoscitur quævis hernia in abdomine, quod tumor adsit ut plurimum in tantum rotundus, si adest absque inflammatione, in hominibus supinis mox cessat aut digitis etiam potest reprimi, in erectis vero vel proni maximopere vero tempore inspirationi subito proruit rursus. Deinde ut plurimum etiam conqueruntur ægrotantes de subitanea eruptione talis tumoris, dum abdomen nimium quantum commoverunt, vel bajulando, vomendo, clamando, in se ipso premendo v. gr. in excretionibus induratum excrementorum, foetus secundinarum &c. Deinde hi tumores suboriuntur etiam dum ægrotantes ab aliis sunt læsi v. gr. dum conculcantur pedibus, petuntur fustibus lapidibus, præprimis item dum feriuntur cornibus hinc tales herniæ frequenter observantur in bobus sese mutuo cornibus ferientibus.

Thes. 5.

Ubi vero adest inflammatio, ibi dignotio herniarum est difficilior, siquidem tumores tunc non remittunt, ægrotus sive stet, sive procumbat, itaque quotiescunque adest in abdomine tumor cum inflammatione & prægressa sunt quædam ex antea relatis toties etiam concludere licet adesse herniam

am

n. Breviter in tali tumore ambiguo omnis cautela eo devenit, ut inflammationem illam in tantum sedemus, quo facto, ciliior deinde erit dignotio. Contra vero ubi mox ad suppurationem conamur tumorem deducere, omne malum inferimus ægrotantibus, rem expono exemplo. anno 1681 mens. Jan. discipulus quidam mercatoris ejusdam pannorum **Tuchhändlers** / titur subito tumorem in inguine, advocatur medicus, qui hunc tumorem æstimat bubonem pestilentialem, hinc jubet imponi emplastr. magnet. cum dyach. cum gumm. hoc emplastro causatur vehementissimam inflammationem, hinc ægrotans patiebatur immos dolores, agrypniam, adeo ut immineret delirium. Advocatus & ego deprehendi tumorem ab extra plane non confirmẽ bubonibus, hinc removi emplastrum impositum curavi cataplasma ex speciebus anodyn. extern. vino incoctis, quo facto, octidua hora post impositum cataplasma remittente inflammatio, quã remittente digitis sentiebam intestina, quã illico intrudebam in abdomen, ut in momento dispareret omnis tumor, adhibito vero subligaculo & ulterius anodynis surgebar ægrotans & obambulabat, mane vero eum visitans pater referebat herniam esse contractam, jam jam

ante aliquot annos. Dignoscitur hernia scrotalis à sarcocoele. Phlysocele, & hydrocele inde quod hernia scrotalis nunc sit major nunc minor, nunc plane remittat, id quod in ultimis tribus speciebus non fit: siquidem hi tumores sunt continui. Sarcocoele vero dignoscitur à suis speciebus, quod nimirum tumor sit continuus, mollis raro imo nunquam dolorosus fere. Scirrhusocoele vero cognoscitur ex tumore continuo & duro. Phlysocele cognoscitur ex tumore continuo, quod digitis fortius impressis sursum cedit, & deorsum, remotis verò digitis in momentum foveam explet impressam. Hydrocele non indiget signis diagnosticis patet enim suapte.

Thes. 6.

Signa prognostica sunt: Omnis hernia proprie sic dicta est morbus molestissimus & periculosissimus, siquidem ex nullo alio tam facile progignitur miserere mei seu passio iliaca, quam ex hoc. Omnis hernia cum inflammatione conjuncta, est periculosior reliquis: Contra vero hernia quæ sat cito subligaculis comprimitur non raro hominem admittit ad 80 annum, memini viri cujusdam qui 82. demum moriebatur herniam verò contraxerat anno ætatis 19. sic memini etiam faminae quæ ante obitum
ann

an. 30. facta fuit herniosa in inguine, dein-
e verò quater peperit, & demum annum a-
ens 69. vitam cum morte commutabat ex
affione iliaca ob herniam subortam.

Thes. 7.

Hernia carnalis seu sarcocoele hoc parit
incommodum, quod interdum scrotum
reddat tumidum, ut testiculi & ipse penis
oc tumore obtegantur, quale stupendum
exemplum ego vidi. Physocoele multa-
tiam potest parare incommoda. Hydroce-
vero coincidit cum hydrope abdominis.

Thes. 8.

Curatio instituatur secundum has indica-
ones: Intestina in herniis proprie sic dictis,
nam primum reponantur, quod si vero
obstet inflammatio, hæc prius in tantum
scutiatur, intestina reposita in loco naturali
conserventur, apertura peritonei consoli-
entur.

Thes. 9.

Prima indicatio obtinetur primario
inisterio aut pollicum aut duorum sequen-
um anteriorum digitorum, qui ipsi digiti,
forsitan hernia aliquandiu jam jam dura-
rit sunt inungendi ☉ anodynis v. gr. lil.
bor. verbasci, hyperici, rosarum, chamom.
c. si vero obstet inflammatio, adhibeantur
media inflammationi simplici convenien-
tia,

tia, v. gr. sacculi ex vegetabilibus anodynis
& carminativis compositi v. gr. fl. cham
meliloti, sambuci, verbasci, hyperici, lini
linariæ &c. item ex cremore avenæ, flor
viol, laurî, sem. lini, qui sacculi sunt imbu
buendi vino albo calido, vel potest etiam
componi cataplasma ex cremore avenæ
floribus dictis anodynis vel hujusmodi, huius
cataplasmati addi etiam possunt oia talia
anodyna, item pinguedines anodyn. axungia
humana, canina, butyrum recens & quod hic
specifice commendatur à nonnullis butyrum
caprinum, interdum etiam ubi alvus est ad
stricta, intestinaque prolapsa occupant
flatus, præstat applicare Clysteres emmolli
entes & carminativos, non ideo ut excre
menta eluant ex intestinis prolapsis, eo enim
usque nunquam operatur Clyster, ubi pro
labi possunt intestina per hernias. Verum
ideo ut intestina crassa reddantur patula
flatibus in intestinis contentis. Clysteres
tales vero sunt notissimi sedata tali modo
inflammatione, deinde reponantur intestina

Thes. 10.

Secunda indicatio obtinetur primario im
mutissime per subligacula quæ demonstrabo
in natura. Refert enim Guilielmus Fabri
cius Hildanus monachum qui herniosus ul
tra 17. septimanas ob dolores podagricos le
cto

o fuit affixus, & his remittentibus etiam natus ab hernia, quatenus nimirum ex continuo decubitu impedita est via patula colapsuris intestinis, unde apertura coaluit, em absque ullo emplastro, apparet itaque de quaesita sit vis in tali negotio subligacurum. Quia vero juxta dicterium bona non abundant, facile etiam possumus admittere emplastrum, quod prius herniæ adaptetur, deinde vero accommodentur subligacula, ubi tamen probe notandum, quod emplastra illa in pueris impuberibus, item in abdomine non hirsudorum facile possint applicari, difficulter vero, & summa cum ægrotantis molestia tantum non dolore exquisito, in viris etiam hirsutis, dum nimirum emplastrum conglutinat crines, quod deinde ad motum reversum causatur dolores molestissimos. alia vero emplastra sunt nota v. gr. de pellerietina ad hernias officinal. Simile etiam videtur in Ronhyfen. observ. chirurg. & apud chirurg. consummatissimum Dn. Barbeth.

Thes. II.

Tertia indicatio obtinetur primario beneficio naturæ; si exceperimus sectionem, quæ quoniam nostris moribus commissa est a chirurg. Circumforaneis hic adeo non attenditur; interim tamen per castrationem est

est facillima, felicius vero videtur quam audita & scripta legitur.

Thes. 12.

Sarcocele non potest curari nisi per sectionem. Scirrhusocle curatur ad modum reliquorum scirrhorum. Physocle ut tympanitis. Hydrocele vero ut hydrops.

Thes. 13.

De uteri prolapsu.

Agitatur controversia inter Chirurgos, utrum revera uterus prolabi possit, quod multi recentiorum negant. Vid. Ronhyfen Job von Meckern Barbeth. Ronfæum &c. an vero interior duntaxat membrana rugosa vaginæ uteri laxata prolabatur. Nos quoad prius autoritati Autoris non opponimus; interim tamen posterius frequentius fieri credimus. Germ, dicitur. **Ein Vorfall.**

Thes. 14.

Causæ hujus prolapsus ut plurimum debentur partui difficili; interdum vero humoribus etiam ferosis & lubricis. Si vero mulier semel perpeffa fuerit talem prolapsum deinceps etiam facili negotio per animi affectus & alias motiones rursus potest causari, dum nimirum si concitat convulsiones abdominis & consequenter etiam uteri.

Thes.

Thes. 15.

Signa diagnostica constant ut plurimum relatione ægrotantium & obstetricum.

Thes. 16.

Prognostica sunt: prolapsus uteri raro aliter restituitur, imprimis vero in iis & rursus admittunt coitum, demumque iunt. Præterea multa causatur incommoda, dum in nonnullis impedit gressus, in nonnullis etiam præprimis patientibus prem album causatur erosionem in pudendo, unde exurgit dolor exquisitissimus.

Thes. 17.

Curatio instituatur secundum has indicationes: pars prolapsa reponatur, reposita ligaculo asservetur, suffragiis aptis teneatur.

Thes. 18.

Prima indicatio obtinetur eodem modo, & repositio intestinorum in herniis cum libitis in simul anodynis externis. Secunda indicatio obtinetur per subligaculum pyrimæ. Tertia indicatio optimè obtinetur sequens suffragium.

R. pul asph^lath.

succin.

myrrh.

thur.

mastich. aa. ʒi.

A. D. S. **Sonderlich Räucher Pulver.**

Thes.

Thes. 19.

Quicquid dictum est de prolapsu uteri illud etiam attendendum est in prolapsu intestini recti, quod Germani vocant, **Der Austretendes Mastdarms**/ in hoc namque item membrana intestini recti interior rugosa valvulosa prolabitur.

Thes. 20.

Oritur autem hic prolapsus potissimum ex nimia lymphâ viscida lubrica aliisque nimium crebris alvi dejectionibus. Hinc interdum etiam post dysenteriam observamus intestini recti prolapsum, item et contumacioribus alvi expressionibus. Hinc mulieres difficulter parientes etiam interdum hoc occupantur morbo.

Thes. 21.

Signa diagnostica sunt, quod intestinum rectum appareat, cum suis rugis interioribus & protendatur nunc longius nunc brevius.

Thes. 22.

Curatio instituaturs secundum has indicationes: intestinum rectum prolapsum reponatur, repositum asservetur, alvus lubrica reddatur in tantum.

Thes. 23.

Prima indicatio obtinetur sicuti in prolapsu uteri. secunda indicatio verò per sequens emplastrum.

R. Gumm. opopon-
sagapen. aa. s. q.

Induc super alutam formæ triangularis.


.s. Euserlich anhaltend Pflaster auf das
Creutz zu legen.

Deinde frequentur etiam usurpatur superius descriptum suffragium. Tertia incatio obtinetur per decocta prunorum et foliis fenn.

Thes. 24.

De Diabete & Incontinentia ☐æ.

Diabetes curatur ut sudor nimius, nimirum
ex sudorifera blanda cum opiatīs mixta, sic
lus liqv. C. C. succin. cum essent. opii
ire prodest. Incontinentia ☐æ optimè
ternè curatur suffimigio illo vel emplastro
p. XVII. descripto. Interne vero cum
neribus erinacei cum ☿ & cinnam. assum-
is curatur, assumitur vero quolibet die
spis cultelli.



CAPUT XVIII.

DE

MORBIS ARCHEALIBUS.

Thes. 1.

Naturaliter principium nostrum vitale
seu archeus operationes suas exerit
iuxta sibi impressas suas ideas semina-

P

les

les vel secundum ideas ex his sponte formatas, quotiescunque igitur accidit archeo imprimi peregrinas ideas, toties etiam suboriuntur errores in actionibus principii nostri vitalis expediendis, sic v. gr. secundum ideam seminalem homini est impressus appetitus alimentorum petendorum ex vegetabilibus & animalibus p. n. tamen ut non raro seu à primo ortu, tempore gestationis nimirum à matre nobis imprimatur peregrina idea appetendi nimirum alimenta etiam ex regno minerali v. gr. cretam vel etiam alia alimenta consueta abhorrendi. v. gr. ☿ &c

Thes. 2.

Tales autem ideæ triplici modo nobis adveniunt aut enim à matre mox tempore gestationis imprimuntur, aut ab aliis animalibus communicantur: aut à nobismet ipsis formantur, prius observatur quotidie, posterius vero etiam observatur ut in nostris provinciis rarius, in Apulia vero & aliis locis frequentius, producant autem tales ideæ à cane rabido in nos translatae hydrophobiam, qua affecti non duntaxat abhorrent ab assumptione fluidorum, verum præterea & pessime sese habent ad humida vi infusa. Tristissimum hujus rei exemplum vidi duabus abhinc septimanis hic in juvene, quem sexta septimana antequam hæc ipsi acciderent, momorderat canis rabidus, vulnus vero

ro erat inflictum annullari dextro, totum-
 ne resanatum, quo ipso tempore ægrotans
 æter aliqualem tristitiam haud multa est
 ussus, sexto vero ante obitum die corpore
 axime commoto & æstuante sentit equi-
 em sitim vehementem, abhorret vero à
 otu postquam vero propria quasi vi pau-
 llum cerevisiæ secundariæ assumserat,
 ox cœpit pejus sese habere, tandem verò
 gente adhuc siti imbuuit strophium cere-
 sia secundaria, ex quo liquore sucto omnia
 acerbantur symptomata, adeò ut superve-
 rêt agrypnia vomitus continuus, ructus
 ontinuo nidorosus, screatus, tussis vehe-
 ens spumosa, continuusque ejulatus cum
 tuum sudore frigido, quo apparente dein-
 ps placide expiravit. anno 1681. æstivis
 lidis diebus pollinctoris seu vespillonis no-
 ri canes grandiores petunt in se invicem
 orsibus & alter quidem rabie infectus,
 io facto, Dominus pedibus interveniendo
 calcando mordentes abigere conatur, eò
 so à cane rabido mordetur in tibia fini-
 ra, & quidem in parte postica, quo facto,
 ntit quidem dolorem, curatur accersitum
 chirurgum, qui vulnus deligabat, exhibebat-
 ue blanda diaphoret. & theriacalia, quar-
 o die vulneris labia apparebant livida tan-
 um non nigricantia, livor occupabat totam

tibiam cum dolore insigni, sentiebatque ægrotans, mox horrorem, mox æstum, angustias summas in præcordiis, lipothymias, faucesque spumosas præterea verò patiebatur agrypniam, sudores frigidos, tandemque superveniebant insultus epileptici cum intermittente delirio. Humida equidem assumebat, attamen ad assumptionem quasi expavescebat; ut inde colligendum erat omnino adesse etiam hydrophobiam, ut nondum factam, verum saltem fientem. Quomodo viperæ mordendo homines, iis etiam impertiant venenum tale, quoddam observare licet passim apud autores. Item quomodo aranea Tarantula in Apulia inferat messoribus aliis incolis morbum quo adiguntur ad continuas saltationes videri potest apud Epiphan. Ferdinandum. Item apud Kircher. in Musurgia qui morbus communiter etiam audit tarantismus.

Thes. 3.

In nobismet ipsis vero progignimus tales ideas peregrinas, cum nimirum per motus inordinatos sensoriorum in nos irruunt falsa objecta, vel quatenus solum cerebrum continuo diversimode movetur ab aliis partibus, ut concussa objecta repræsententur ipsi principio vitali, ut secundum hæc tantæ peregrinæ formentur ideæ. v. gr. Memini medici cujusdam celeberrimi senioris qui
ab

b apoplexia, bis læsus amiserat oculorum
 ciem, prætereaque ipsa vis interna percipien-
 i in eo erat labefactata, hinc in lecto ober-
 antes muscas intuens, exclamabat: Proh
 Eum immortalem! devorabunt me, devo-
 abunt me. Sciscitantibus verò adstantibus
 ex eo, quinam sint eum devoraturi, monstra-
 at muscas & æstimabat ursos, hoc objecto
 illo percepto deinceps efformabat ideas vi-
 osissimas ut inde appareret delirans. In
 melancholia hypochondriaca res etiam fit
 rara, hypochondriaci enim patiuntur con-
 vulsiones ventriculi & diaphragmatis, hinc
 erferunt etiam angustias in præcordiis, quo
 cto, nunquam cerebrum est quietum, sed va-
 is modis movetur à talibus convulsionibus,
 unde ideæ de aliis objectis conceptæ & cere-
 ro impressæ variis modis sese repræsentant
 intellectui, qui deinceps inde novas etiam
 format ideas, easque vitiosissimas, unde de-
 ceptus subsequitur delirium illud triste, vel
 melancholia hypochondriaca. Ad vitiosas
 les ideas spectat etiam pica cum malacia,
 in nimirum vitiosæ ideæ de alimentis con-
 ceptæ homines vehunt in alimenta alias in-
 consueta. Suboriuntur autem hæ ideæ qua-
 nus fermentum ventriculi quidem irritat
 appetendum principium vitale; ast quia
 rmentum tum hoc vitiosum est, ut nunc
 mulet ad appetendum, nunc etiam rursus

nauseam creet, fit ut deinceps ideæ adeo in consuetæ formentur sic v. gr. in reconvallescentibus ubi fermentum ventriculi incipit exerere vires suas, adeo præcise vero ipse athenæus non eligit certa alimenta, fit ut cogitando diutius, tandem deveniamus in certa escam vel quatenus si etiam taliter reconvallescentibus forte fortuna nunc odore tenui aut visu aut auditu etiam in mentem veniunt certa alimenta, fit ut sibi concipiunt gratam ideam hincque per longum tempus ea avidius quam alia expetant, & ad ea etiam appetita & assumpta bene sese habeant. Item observare etiam licet in aliis ægrotantibus qui uni certæ rei nimiam operam cogitando impendunt v. gr. in animantibus, avaris, fastuosis vel certam spartam ambientibus, continuo etiam talibus ideis commovent ipsius cerebrum, & consequenter intellectum quo facto, aliæ ideæ cerebro jam jam impressæ sese immiscent illis ideis ex quibus dum intellectus efformat ideas novas vitiosas & absurdas; quo pacto, succrescunt omnigenis deliria. Quod si vero objecta sunt formidabilia excitatur principium nostrum activum ad illa arcenda, quo pacto, exurgit delirium cum furore absque febre tamen quod vocamus maniam. Dum vero in febribus nimia sanguinis succrescit effervescentia, oriturque continuus motus in val-

capillaribus, etiam evenit quod cerebrum continuo commoveatur quo facto, non duntaxat suboritur agrypnia, verum etiam ipsum delirium id quod adaugetur ubi in vasis capillaribus arteriosis sanguis stagnans causar tenuissimarum cerebri membranarum inflammationem prout hoc nuper vidimus in cadavere studiosi tali modo demortui, quod delirium dicitur phrenitis.

Thes. 4.

Signa diagnostica patent ex actionibus sensis sic. v. gr. ubi adest impotentia assumentis alimenta certa ibi agnoscimus vitiosam deam aut a matre impressam aut aliunde in eipso formatam. Phrenitis facile dignoscitur ex febre, quatenus vero oritur a causa externa. v. gr. assumpto philtro, vel venenosis aliis dignoscenda est ex antecedentibus & consequentibus. Primo enim intuitu non facile quispiam dignoscet ex facie, pulsu & aliis communibus fontibus phrenitidem ex philtro. Contra verò ubi adest phrenitis & ab adstantibus certi sumus egrotantem vehementer amatum esse ab aliqua persona, tamen rursus non reamaverit, eandem agrotanti communicata esse a persona ista vel alimenta, vel vestimenta, deliriumque subito supervenisse, ibi concludimus adeste phrenitidem ex philtro. Mania, melancholia hypochondriaca ex obstructi-

one alvi, mensium, seminis, hæmorrhoidum
&c. dignoscuntur ex relatione adstantium
ægotantes enim vix nobis quippiam referre
possunt. sic v. gr. anno 1679. vocabar ad fœ-
minam maniacam, ex qua nihil percipere
potui, adstantes verò nesciebant, quod per-
pessa sit mensium obstructionem bimestrem
alvi verò octiduam, hinc judicabam hæc om-
nia oriri ex hac suppressione, instituta verò
V.S. sanguis erat adeo viscidus ut digitos
meos conglutina-ret, itaque dijudicabam
adesse maniam, quæ suborta erat ex melan-
cholia hypocondriaca, deinceps vero
instituta curatione secundum hanc diagno-
sin bene etiam reconvalescere ægotans
Deliria ex moribus animalium etiam sunt
dijudicanda magna ex parte ex anteceden-
tibus sic v. gr. cum vocarer ante tres septi-
manas ad hydrophobum dijudicabam equi-
dem mox morbum ex hoc symptomate,
deinde vero cum quærerem ex adstantibus
numne ægotans sit læsus a cane rabido,
hicque referrent quinque esse elapsas septi-
manas quo tempore mororderit canis
rabidus ægotantem, concludebam ergo
adesse hic veram hydrophobiam ex morbo
canis rabidi. Tarantismus juxta traditi-
onem autorum dignoscitur ex saltatione.
Melancholia verò hypocondriaca distin-
guitur a mania certo saltim gradu, siquidem
facile

ile melancholia hypochondriaca mutatur
maniam. Sic etiam phrenitis ex philtro
plurimum etiam vergit aut in maniam,
t in stupiditatem aut amentiam.

Thes. 5.

Prognostica sunt: morbus archealis depen-
s ab idea a matre impressa est incurabilis,
ito vero quæ concipiuntur ideæ difficil-
è etiam possunt rursus aboleri. Ideæ vitio-
natae in nobis in suppressione excernendo-
n consuetorum item ex visciditate humo-
n &c. remittunt suapte remittente morbo.
lirium in febribus itidem remittit
sante febre, deliria ex philtris & venenis
o sunt diuturniora eo etiam periculosiora.
drophobia cum rejectione materiae
mosæ & sudore frigidus semper est lethalis.

Thes. 6.

Tota cura consistit in exhibitione blan-
um sudoriferorum cum V. S. (excepta
enitide). Curatio instituaturs secundum
indicaciones: evacuationes consuetae
pressæ aperiantur, ebullitiones in san-
ne sistuntur, veneficia vel philtrea recen-
evacuentur. Convulsiones sedentur,
æ denique roborentur.

Thes. 7.

Prima indicatio quomodo obtinenda
e suis cap. præced. secunda obtinetur per
dicamenta commendata in febribus.

R. Syrup. de Cichor. cum Rhab. ʒij.
 æsensim atque sensim possunt porrigi in
 chlear. min. pusioni recens nato, si nimi-
 ni nullus stertor ubi vero adest, sterto, adest
 mmuniter mulieres dicunt: **Es stehet**
nen so auf dem Herzen.

Tunc

R. Syrup. de Cichor. cum Rhab.
 squillit. aa. ʒi.

. D. S. **Lösender Saft / Löselchen weise**
zu geben. hic enim syrupus exhibitus
 excitat vomitum cum leni alvi dejecti-
 one, si adsunt tormina.

R. Syrup de Cichor. cum Rhab. ʒij.
 p. march. antep. gr. iv.

. D. S. **Säfflein nach und nach zu**
geben.

Ubi adsunt tormina alvus tunc rite non
 eritur.

R. spec. flor. & fruct. M. i.

F. l. a. Decoct. in jure carnis.

R. Decoct. colat. ʒx.

dilue mell. rosat. ʒβ.

Mithridat. Dam. gr. iv.

vit. ovorum. no. β.

l. a. Clyster cum instrument. infant.

In catharro suffocativo.

R. sem. anis. pulveri sat. ʒj.

sperm. cet. gr. viij.

foecul. ari.

☼ . diaphor.

Unicorn. mar. aa. gr. v.

M. D. S. Kinder Pülverlein wider die
Köchlen alle Morgen und Abends
eine Meßerspiße in Mutter-Milch
geben.

In vigiliis & torminibus.

R. p.unic. mar. gr. v.

march. antep. gr. xii.

☼ . diaph. gr. iv.

Essent. anodyn. gt. ij.

M. Optimè D. S. Ruhe Pülverlein auf
6. mal zu geben des Abends gegen
Schlafenszeit. si necessitas urget, dos
hujus pulveris bis de die assumenda.

Ubi metus epilepsiæ.

R. p. march. antep.

cran. hum.

Unic. mar.

spec.ceph. D. M. aa. gr. iv.

liqv. C. C. succ. gt. iij.

Misce Optimè D. S. Präservirend Pül-
verlein alle 4. Stunden zu geben in etwa
Mutter-Milch. Elapsis sex hebdomatibus
dosis quoad dimidium augeri potest & ultra

In ipsa Epilepsia

R. Essent. cast. gt. v.

anodyn. gt. i.

M. D. S. Stillend Del auff 3 mahl zu
geben in Mutter-Milch.

n prurptione dentium antepileptica
imum præstant auxilium. In dolore
minoso omnium optimè prodest sem.
æ. gr. iij. vel iv. in lacte muliebri exhi-
um.

In vomitu.

R. Emplastr. de crust. pan.

Tacamahac. aa. s. q.

Malax cum o mastich. F. l. a. Emplastrum
uc super alutam & obduc. sindone rubra
mætransmissæ.

S. Magen Pflasterlein.

R. Corall. rubr. pp. gr. viij.

croc. or. p. gr. i.

D. S. Kinder-Pulverlein auf 1. mal.

OTANDA QUÆDAM CIRCA GRAVID.

n partu difficili observandum, foetum
in recto situ positum vel non. Si prius
imum est abdomen externè anodynis
ngere. v. gr. o lil. alb. verbasco. Cham.
erne antepileptica propinari possunt.
r. p. march. antep. qui omnium optimus
Si posterius observatur, profecto magnus
mittitur error quando pellentia exhi-
tur, quoniam majora causantur mala.
nualis itaque operatio optimum hoc in
remedium, qua q. p. laborandum ut
foetus

foetus rectum consequatur situm, quare in tali casu mulieres non adeo saepe ut viribus suis foetui concurrant sunt admonendae quoniam hoc ut plurimum statum earum reddit pejorem, quale triste exemplum ipse vidi Lipsiae. In febribus sic dictis lactis omnium optimum est semen cardui mariani & nigellae.

Lac imminuunt: interne assumpta Radices externe fila ☿ obducta mammis impositae simul fortiter compressis. Item cicuta lacte incoquitur, cui decocto mammae sunt imponendae.

APPENDIX MEDICAMENTA SELECT. VOMITORIA.

☿9. emeticus qui paratur.

R. ☿ vitæ. ℥β.

C. ☿r. ℥ij.

Affunde aquae calidae ℥ij. stent in loco calido per triduum, deinde filtrentur calice & evaporentur usque ad consumptionem sextae vel septimae partis, deinde Csetur liquor remanens rursus evaporetur & quidem ultimo ☿ maxime blando.

succus de scylla,

succus de scylla recens expressus.
purgantia.

R. p. Jalapp. ℥ij

scamm. ☿r. ℥j.

☿. diaph. ℥ij.

arc

arc. repl. M. ʒiβ.

Dosis adulti est. 25. gran. ad 3β.

Elixir purgans officinale.

ulæ. R. ꝯ. dulc. ʒj.

extr. fum. ʒβ.

diagryd. ʒij.

. a. MP. dosis. ʒj. in scabie & aliis impuri-
tatibus.

R. Gumm. *i. in ☩ solut. & inspissat
diagryd ʒiij. (ʒiij.

Croc. ♂is cum ⊖bus ʒj.

. a. MP. Dosis. à gr. xv. ad ʒj in materia vi-
scida, S. **Mil's Pillen.**

R. Extr. Cathol. purg. ʒij.

Diagryd. ʒij cum.

R. ʒii ♀rsat. F. l. a MP. Dos. à. ʒj. ad
Sudorifera. (3β.

Essent. Theriac.

Essent. Castor.

Essent. Card. bened.

Liqv. C. C. succ.

☒. ⊖* dulc.

☿ diaph. cum ♂e & sine ♂e.

item talis pulv. Bezoardicus.

R. C. C. S. Δe.

☿. diaph. aa. ʒj.

flor. ☿r. ʒiij.

Lap. Bezoard. orient. ʒij.

M. optimè dos. aa. 3β. ad ʒij.

Spec.

Spec. cephal. dos. ʒj. ad ʒβ.
Antifebril.

R. Ocul. ☿. ʒij.

Θ. Absynth. vel Card. ben.
antif. Mynf. ʒiβ.

dos. ʒβ. vel ʒij.

Digestiva.

R. Croc. ♂is cum Θbus.
foecul. ari.

C. ♀r.

♂ii. diaph. aa. ʒj.

Dos. ʒij. ad ʒj. in mensura β. cerevisiæ

R. ♂ii. Ros. gt. xx. xxx. xxxx.

R. ♂is aperit. Zwelfer.

Stomachica.

Elixir propr. f. acido.

Externa.

▽. prophylact. Sylvii.

Carbunculi

Diuretica.

R. Lap. percar. ʒj.

Θ. Aat. succ. ʒij.

millep. pp. ʒiβ. Dos. ʒiβ.

Cordialia.

Ra Corall c. ♀. Cor. C.

item perlæ.

F I N I S.

