

**Commentatio de arbuto uva ursi. Jungitur invitatio ad orationem qua munus professoris medici ... extra ordinem concessum ... aditurus est / [Johan Anders Murray].**

### **Contributors**

Murray, Johann Andreas, 1740-1791.

### **Publication/Creation**

Göttingen : Pockwitz & Barmeier, 1764.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/y4a3yxy4>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>




38074/B

Lxvi Uva



Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30524040>



48921

L XVI Uva

COMMENTATIO  
DE  
**ARBVTO VVA VRSI**

---

IVNGITVR INVITATIO

AD

ORATIONEM

QVA MVNVS PROFESSORIS MEDICI

INDVLGENTISSIME

SIBI EXTRA ORDINEM CONCESSVM

SOLLEMNITER D. XXXI. DECEMBER. MDCCCLXIIII ADITVRVS EST

**IOANNES ANDREAS MVRRAY**

MEDICINAE DOCTOR



---

GOTTINGAE.  
TYPIS POCKWITZII ET BARMEIERI.





## COMMENTATIO DE ARBVTO VVA VRSI.

---

---

### PROOEMIVM.

**S**i Cicutam excipiam, vix alia planta proximis hisce annis magis medica sua virtute inclaruit, quam Vua vrsi. Neminem enim, qui aliquantulum modo nuditatibus medicis noscendis deleqtatur, latet, quantum huic in calculo, intra lotii vias generato, tribuerit ill. DE HAEN. Sed prout illa non vbiuis medentium iudicio probata fuit; sic nec hæc vituperatione omni caruit; dum vel eandem non satis efficacem, vel in tam protracto vsu, quem curatio sibi vindicat, ob noua incommoda, quæ nasci putant, non tutam satis iudicant. Hæc inter medicos dissensio vltiorem certe vuæ vrsi indaginem requirere visa est, ad quam equidem tanto alacrius accessi, quum summi WERLHOFII consilium annueret, incitauitque

A

me,

me, ut, quum mihi in præsentia aliquid exarandum esset, hanc potissimum scriptio[n]e persequerer. Præmissa igitur ea, ad quam Botanice dicit, plantæ consideratione, quid per analysin chemicam, tum quid per praxin veri de illa erui possit, explorare conatus sum, adiiciens, quæ ad oeconomicam eius utilitatem æstimandam faciunt.

## SECTIO I.

### BOTANICVM VVÆ VRSI SCRVTINIVM.

#### §. I.

In tantis tenebris, quibus veterum tempore res herbaria obuoluta latuit, dum nimirum laxissima stirpium delineatio, earundemque cum aliis plantis, æque nobis ignotis, lubrica comparatio, stabilitatem roburque illud, quod iamiam in Botanice obtinet, supplerent, scintillæ tamen quædam ex monumentis eorum emicant, quæ plantarum quasdam, Arbuti nomine hodie comprehensas, primis istis scientiæ botanicæ æstimatoribus notas iam fuisse credere finunt. Non hic iam inquiram, quænam istæ species fuerint; nec an inter has ea quoque, quam hac commentatione celebrandam mihi sumsi, occurrat; quoniam inferius de his dicendi commodior locus erit. Sed a generis arbuti characteribus definiendis orso laudare mihi conuenit sollertia, quam THEOPHRASTVS ERESIVS,<sup>a</sup> ιόμαρον (ita enim arbuti quandam speciem appellat) delineans, ad florem plantæ suæ adhibuit, quem vna cum fructu, inde ab immortalis CONRADI GESNERI tempore, generibus stirpium condendis aptissimum sanior quiuis botanicus agnouit. Non enim modo ad racemos, in quos flores digesti sunt, attendit, sed florem ιοῖλον ὥσπερ ὡύν ἐγκειολαμμένον describit. Et porro de illo dicit: ὅταν δὲ απανθήση, ή πρόσφυσις τετρύπεται. το δὲ απανθήσαν λεπτὸν, ὥσπερ σφόνδυλος περὶ ἄτραπτον, ή ιάργειος δωρικός.<sup>b</sup> Quam pulchre hæc in arbuti florem quadrant,

a) *Histor. plant. Lib. 3. cap. 16. Ed. BODEI A STAPEL p. 234.*

b) Locum hunc in se nonnihil obscurum non clariorem multo reddit THEOD. GAZAE versio. Ita vero illum interpretatur: “*concauus* (scil. *flos*) tanquam

drent, naturam ipsam cuicunque consulere volupe est, perspiciet. Etenim figura ouata flori competit, qui basi sua pistillum clavi instar infixum continet. Hoc itaque ex calyce surgens corollam quasi perforat; vnde caute illa auulsa, vel, quum marcescere iam incepit, sponte delapsa, in fundo eius minutum foramen cernitur. Decidua vero corolla, quæ succo priuata tenuior fit, cum verticillo, qui circa fusum, qua mulieres stamina nentes vtuntur, situs est, vel cum summa columnæ, siue Doricæ, siue alias cuiuscunque, parte, (Epistylum VITRUVIVS vocat,) quodammmodo comparari potest. Mirandum sane, quod nec DIOSCORIDES, nec PLINIUS eadem oculorum acie hanc plantam complexi sint, proletaria fructus descriptione tantum contenti, quam vero hic memorare, quum non ubique eiusdem indolis in hoc genere fructus sit, non attinet.

## §. 2.

Absit tamen, vt in istis suppetiis, quas in re herbaria LINNÆVS tulit, hanc THEOPHRASTI descriptionem ad discernendum arbuti genus (nam quoad florem in plerisque species eiusdem generis conuenire notum est) sufficientem existimarem. Multa enim hic cum Vaccinio, Erica, Andromeda aliisque communia sunt. Sed laudo nouos, veteres non sperno. Tutiiori contra ea via prodibimus, si singulas partes, florem fructumque componentes, seorsim perscrutemur.

Corolla nempe Arbutus instructa est monopetala, ad ouï figuram accedente, superius in 5 lacinias leuiter secta. Hanc extus calyx,

et

„quam ouum excalptum, ore aperto. Cum autem defloruerit, retinaculum perforatur. Quodque defloruerit, tenue sicut verticilis (verticillus) „circa fusum, vel carnius Doricus, extare videtur.” Haud commode GAZA vocem περσφυτις per retinaculum explicat, quum proprie nihil quam adhesionem s. coalitionem denotet, ideoque ad illam floris partem, qua cum vicinis cohæret, b. e. ad fundum seu basin corollæ congrue referri queat. Loco καρπος δαγκνος THEOPHRASTVM καρπον δαγκνον scripsisse quidem putant.

et quidem infra germen, cingit, quinques pariter, sed maioribus segmentis diuisus, corolla aliquoties minor, et ad maturitatem fructus usque superstes. Intus stamina 10 cum unico pistillo latent. Stamina antheras parum bifidas gerunt, et corollæ aperturam, per quam pistillum transit, circumdant. Stylus vero pistilli, germine globoso suffultus, in stigma crassius desinit. In parte ista, cui germen infixum est, receptaculum vocant, puncta decem conspicuntur. Fructus bacca est, rotundæ figuræ et 5 loculos, in quibus semina ossæ duritiei iacent, continens.<sup>c</sup>

## §. 3.

Maxima similitudo inter Vaccinii genus illudque Arbuti intercedit; unde et magni in Botanica viri CLVSIVS, BAVHINI, RAIUS, TOVRNEFORTIVS aliique, et inter meos FRANE-NIVS, RVDBECKIVS, TILLANDSIVS, BROMELIVS, LINDER-STOLPIVS, hanc vel illam speciem, quæ iam auctoritate ill. A LINNÆ Arbutus audit, Vaccinii vel Vitis idææ nomine insignierunt. Ad germinis vero situm qui probe attendit, discrimen facile animaduertit. Hoc enim in vaccinio extra vel infra calycem, in arbuto autem intra vel supra illum situm est, siue quod idem est, in illo germen infra receptaculum, in hac supra illud reperitur. Stamina insuper ibi 8, hic 10 collecta sunt. Notat præterea Eques A LINNÆ arbutos ad basin corollæ 5 vel 10 eminentiis pellucidis fere & melliferis distinctas esse et cortice deciduo vestitas, quod postremum et THEOPHRASTVS<sup>d</sup> et PLINIVS<sup>e</sup> iam memoriæ tradiderunt. Quin etiam fructus discrimen condit, ut qui in arbuto siccior et durior.

## §. 4.

- c) Cfr. TOVRNEFORTII *institutiones rei berbar.* p. 598. 599. Tab. 368. 370; vti et LINN. *genera plant.* Ed. 5. gen. 488. Ed. 6. a. 1764. gen. 552.
- d) *Hist. plant.* L. I. c. 8. Ed. cit. p. 17, vbi de cortice dicit, τὰ δὲ καὶ ὡς περιπτεῖν, οἷον ἀδεύχυντα μελέα, κομαγός. BOD. A STAPEL scribi mauult περιπτεῖν, vt φλοίον intelligatur. Veræ autem arbuti species plantæ istæ censentur.
- e) *Quibusdam, inquit, cadit (cortex) ut malo unedoni.* V. *Hist. natur.* Lib. 16, cap. 31. Ed. DALECHAMP. p. 723.

## §. 4.

Genericis igitur arbuti characteribus constitutis, ad species eius progredior, quarum 5 iam ill. A LINNÉ<sup>f</sup> numerat, *Vnedinem* scilicet, *Andrachnem*, *Acadiensem*, *alpinam* et *Vuam vrsi*.

Priores duæ in eo conueniunt, quod caule arborem firmitate referente baccisque multis seminibus foetis foliisque glabris instructæ sint. Differunt vero foliorum ambitu, qui hic omnino integer, ibi serratus est. Vtramque veteres iam cognouisse probabile. *Vnedo*, quam Romani alias speciatim *Arbutum*, Angli vero *Strawberry-tree<sup>g</sup>* et Germani *Erdbeerbaum*, ob fructus cum fragis similitudinem, nominant, THEOPHRASTI<sup>h</sup> κόμαρος esse videtur. Licet enim de fructu vix aliud hac occasione utile dicat, quam quod cibo idoneus sit, florem tamen corticem et folia (§§. 1. 3.) ita describit, ut coniecturæ huic aliquis locus sit. Fructum eius μεμαίνυλον vocat. Nolo me in eam litem, nunquam forsitan in istis descriptio- num nubibus componendam, immergere, an DIOSCORIDIS<sup>i</sup> κόμαρος pro eadem cum illa THEOPHRASTI habenda. Interea licebit cum CLVSIO<sup>k</sup> de eo dubitare, quum arbuti ista species nulla in re malo cotoneæ, ut DIOSCORIDES vult, similis inueniatur. PLINIVS<sup>l</sup> vero, aliud corpus, inquit, est terrestribus fragis, aliud congeneri eorum vnedoni. Et nomen inde natum esse afferit, quod nonnisi vnica eius bacca absque sanitatis quadam læsione edi possit; quoniam nempe, ut alio loco monet, fructum difficilis coctionis, et stomacho inutilis ferret.<sup>m</sup> Consentit ille quoad effectum cum DIOSCORIDE,<sup>n</sup> si modo de vna eademque planta sermo fuerit, et cum GALENO,<sup>o</sup> de

Epi-

f) *Syst. nat.* p. 1024. *Spec. plant.* Ed. 2. p. 566. Accessit in nouissima eius *systematis nat.* et *specierum* edizione *Andrachne*.

g) RAI Synops. stirp. Britann. Ed. 3. p. 464.

h) loc. cit. Lib. 3. c. 16. p. 234.

i) Mater. med. Lib. 1. c. 134. Ed. VERGILII a 1529. p. 152.

k) Rarior. plant. hist. L. 1. c. 30. l) Hist. nat. L. 15. c. 24. p. 684. Ed. c.

m) loc. cit. L. 23. c. 8. p. 1087. n) loc. cit.

o) de simpl. medicam. facult. Lib. 6. c. 5. Tom. 13. Ed. CHARTER. p. 174.

Epimelide, quam Græcos rusticos vnedonem nuncupare ait, loquente, præterquam quod hi, capitis dolores ex esu excitari, addant. Et hæc sine dubio illa arbutus est, de qua VIRGILIVS,<sup>p</sup> HORATIVS,<sup>q</sup> aliique veterum poetarum canunt. De loco vero Vnedonis natali sciendum est, quod in sylvis tum orientalis Asie, tum australium Europæ regionum, vti et Hiberniæ, crescat.

## §. 5.

Nec *Andrachne* vel  $\alpha\delta\varphi\alpha\chi\eta$ ,<sup>r</sup> quam interpres GAZA Portulacæ voce nominat, THEOPHRASTO<sup>s</sup> ignota fuit. Folia illi, arbuto similia, tribuit, quod quidem figuram si spectes, verum est, ambitum foliorum, non item, quippe qui, vt supra iam dictum, in hac specie omnis incisuræ expers est. Corticem porro facile dehiscere, dicit, immo etiam fructum eius comari baccas æmulari; qui characteres præ aliis huius loci sunt. PLINIVS<sup>t</sup> pariter eius meminit, similitudinem inter hanc et vnedonem agnoscens. DIOSCORIDES autem,  $\alpha\delta\varphi\alpha\chi\eta$  vbique scribendo, portulacam oleraceam manifeste intellexit. Orientem patriam habet.

## §. 6.

p) Ex multis istis versibus hos modo pictura poëtica præstantissimos, quibus Corydon temperatoris aëris umbræque beneficium pecori suo exoptat, adponam:

*Muscosi fontes, et somno mollior herba,  
Et quæ vos vara viridis tegit arbutus umbra,  
Solstitium pecori defendite: iam venit aestas  
Torrida: iam læto turgent in palmite gemmæ.*

*Bucol. Ecl. 7, 45. Sc. Ed. MARTYNI §. p. 305.*

q) *Impune tutum per nemus arbutos  
Quærunt latentes et thyma deuiae  
Olentis uxores mariti;*

*Carmin. Lib. I. Od. 17. ad Tyndarid. Ed. GESNERI p. 42.*

r) SCALIGERVUS et BOD. A STAPEL  $\alpha\delta\varphi\alpha\chi\eta$  legi volunt, suadente PLINIO, alterum scribendi genus ad designandum olus nobis portulaca dictum seruantes. V. eorum commentarii ad THEOPHRASTVM l.c. pag. 18. 19. 244.

s) loc. cit. p. 234 alia loca ut reticeam.

t) loc. cit. Lib. 13, cap. 22. Ed. DALECH. p. 620.

## §. 6.

Recensitæ ambæ species caulem erectum, vt innui, gerunt, in ceteris contra ea in terram prostratus extenditur. *Acadiensi*, cuius natale solum nomen iam indicat, flores hinc inde in caules sparsi competitunt, et baccæ multa semina fouentes. Folia vero ouata margine leuiter serrato habet.

Proxime huic affinitate *alpina* arbutus iungitur, cuius folia, in rugas crispata, serrato pariter ambitu terminantur. Fusius illam ill. LINNÆVS<sup>u</sup> in Flora sua Lapponica, et ill. HALLERV<sup>x</sup> descriptam, depictam vero elegantissime cl. OEDERV<sup>y</sup> exhibuerunt.

## §. 7.

Vltima huius generis ista est, quam *Vuam vrsi* appellant, quæ a proximis duabus foliis margine integerrimis satis distinguitur. Et hæc præcise est, ob quam illa omnia de arbuto præmisī, yt nimis, in quo tum a plantis congeneribus, tum ab aliis genere remotioribus, differat, clarum euaderet. Sed adhuc melius discrimen patebit, si stirpem istam, quoad omnes suas partes ipse definivero; cuius rei copiam mihi fecit celeberrimus TAVBE, regiæ aulæ medicus et Cellensium Physicus dexterinus, qui quæsto meo satisfaciens, plantam sine mora, vna cum Vaccinio vitis idæa, Cella mihi recentem benigne misit. Quoniam vero, quum adueniret, baccas iam ferebat: floris specialiorem descriptionem aliunde sumere cogor.

*Descriptio Vuæ vrsi.<sup>z</sup>*

*Radix* eius perennis est, lignosa, longe horizontaliter procurrens, numerosos ramulos s, fibras ad latera emittens, teres, ad exor-

u) loc. cit. p. 122.

z) *Enumer. stirp. Helv.* p. 415.

y) *Flor Dan. Fasc. 2. Tab. 73.*

z) Hæc, quam subministro, delineatio ex comparatione plurium exemplorum nata est. Dimensiones partium non possunt non pro soli diversitate,

exortum fibrarum nonnihil nodosa, in vetustioribus plantis usque ad pollicem fere, ubi cauli proxima est, crassa, in iunioribus vero culmum frumenti tantum, vel quod exilius est, crassitie aequans, cortice fusco tenui, facile siccescenti et separabili, vestita.

*Caulis* fruticosus est, procumbens, ultra pedem longus, crassitie pennæ cygneæ aequalis, vel illa inferior. In suprema eius parte, altera, quæ terræ incumbit, nuda, numerosi rami, horsum versus flexi, ad acutum non valde angulum, sparsim excurrunt. Teres præterea est et dehiscente cortice scaber. Truncus et rami maiores fusci sunt; minores vero et foliis instructi, virides et rubescentes. Liber cortici substratus colorem pallide brunum habet.

*Folia* simplicia, ramea, numeroque plurima. Situ alternant, sursum tendunt, marginem cauli quoad plurimam partem aduententia. Petiolis insident. Figura oblongo-ouata sunt, ad basin angustissima, ultra alterum dimidium latiora, latitudine dein decrescente. Vtrinque venis non extra superficiem, si medium illam excipias, eleuatis, notantur; pagina superiori late virente, inferiori vero pallida et venis obscurioribus picta, utraque denique glabra. Margo, qui integerrimus est, in iunioribus foliis pubescit, ubique autem versus inferiorem paginam acutior. Quoad apicem, aliquantum reflexum, iuniora folia parum acuta, cetera obtusa sunt. Ex duobus planis, ad venam intermedium sub angulo valde obtuso iunctis, composita esse videntur. Durioris compagis sunt. Ceterum ad pollicis fere longitudinem perueniunt, et perennant.

Pe-

sitate, ut de ætate plantæ nihil dicam, variare. V. hac de re cel. Witteb. Prof. BOEHMERI *Diss. de virtute loci natalis in vegetabilia* 1761. Unicum Vuæ vrsi exemplum, si senescere incepit, saepe spatium 6 pedum, diametri ratione habita, in terra Cellensi obtegere, prescripsit mihi cl. TAVBE.

*Petioli* foliis quadruplo breuiores, compressi, basi autem gibbi, alternis posterius cauli insertis, et rubicundi coloris sunt.

*Flores*<sup>a</sup> in apice ramorum racemis simplicibus propendent. Duo vero ad octo usque sociari solent; quorum quisque proprio suo pedunculo, breuissimo, tereti fere, ad basin squama aucto, infidet.

*Calyx* monophyllus, in quinque partes obtusas fissus, exiguis et pallide purpureus est, nec marcescente corolla simul perit.

*Corolla*, ouum figura referens, ad basin nonnihil plana cernitur. Superiorius in 5 minutis lacinias obtusas et reflexas, colore carnis tinctas, diuisa est.

*Stamina* 10, quorum filamenta supra crassiora, versus baseos corollæ marginem, ubi inserta sunt, gracilescunt, et vix ultra quartam eius longitudinis partem surgunt. Apice totidem *antheras*, duabus setis instructas, gerunt.

*Pistillum* unicum adest, cuius *germen* ouatum intra calycem collocatum est. *Stylus* stamina longitudine superat, et in *stigma* obtusum terminatur.

*Fructus* bacca est, glabra, aliquantulum depressa, primum alba, dein rubra, pisum magnitudine æquans, stigma orbiculare brunum ex calyce infra, punctum vero minutum eiusdem coloris ex stylo supra, habens. Discissa externa epidermide, pulpa farinacea alba insipida appetit, *loculos* 5 continens, in quibus

*Semina* totidem, ossea, extus conuexa et gibba, ad centrum vero, ubi vniuntur, linea recta et acuto angulo terminata, et plurimam baccæ partem impletia, iacent.

Rece-

a) Cfr. descriptio floris a LINNÆO in *Flor. Lapp.* p. 125., ab HALLERO in *Enum. Stirp. Helv.* p. 416, et SEGVIERO in *Plantar. Veronens.* Vol. 2. p. 275. suppeditata,

*Receptaculum*, quod vocant, inferum est, siue germine situ inferius reperitur.

§. 8.

Iam apparebit, quo iure vua vrsi ad Arbuti genus referatur. Attamen fuere quidam, iisque botanicorum præstantissimi, inter quos RAIUM, MAGNOLIVM, CHRISTIAN. KNAVTIVM et BOER-HAAVIVM nomino, qui separandam istam ab arbuto, paucitate seminum haud dubie præsertim inducti, arbitrati sunt. Vix vero unicum plantarum genus exploramus, quin modo hanc, modo illam floris fructusue partem in distinctis eius speciebus variare obseruemus. Sic in Gentianis corollas mox in 5, mox in 4, mox in 8 lacinias diuisas inuenimus. Campanularum pericarpia mox 3 mox 5 loculos foquent. Similis diuersitas in Valerianis ratione staminum numeri, et in Romicibus ratione eorum cum pistillis vel confectionis, vel ab iisdem separationis, obtinet. Et plura hac de re exempla nobis Verbenas, Daturas, Rhamnos, Scabiosas, Papauera, Thalictra, Cleomes, Valantias, Sidas, Fumarias, Cerastia, Conuallarias aliasque examinantibus, obuiam veniunt. Deinde respectu ad cetera rite habito, species istas omnino coniungere licet, quæ, fructu etiam si discrepant, flore tamen inter se congruunt.<sup>b</sup> Hoc perspicientes eximii viri HALLERV<sup>S</sup> et LVDWIGIVS illam arbuto addere cum LINNÆO non dubitarunt, in quo omnes fere postea nostri æui botanici imitatores habuerunt.

§. 9.

Nec stirpem nostram, a Vaccinii specie, Vitis idæa, Suecis autem Lingon, Germanis rothe Heidelbeere, dicta, discernere erit difficile. Nam in vitis idæa folia latiora sunt, et statim, vbi petiolis inseruntur, ouata fiunt, in superficie autem inferiori punctis crebris<sup>c</sup> notata apparent. Sed multos alios characteres, distinctioni struendæ

b) LINN. *Philosoph. bot.* §. 175. & 176.

c) Quum c. BAVHINVS (*V. Pinax* p. 470.) vuæ vrsi folia veluti puncta

struendæ peridoneos, obseruaui. Huius enim caules non procumbunt, sed oblique assurgunt; inferne insuper paucioribus tum ramis, tum foliis, instructi. Cortex heic non fuscum colorem habet, nec dehiscit, sed viridis et firmus est. Corolla profundius incisa campanulam fere refert; ut de staminibus, quorum modo 8 hic adsunt, et de receptaculo, quod superum est, nihil dicam. His adde, quod baccae, in vitis idæa magis globosæ, succo grate acido turgeant, et<sup>d</sup> loculos 4 tantum, semina numeroſa continentes, habeant.

## §. 10.

An vua vrsi iam in veterum cognitionem vsumque venerit, paucis nunc dispiciam. Sunt, e qui DIOSCORIDEM<sup>f</sup> illam sub ἴδαιας γίγης voce descripsisse existimant, non tam, me quidem iudice, characteres eius, quos allegat, externos, quam virtutem, quam illi tribuit, medicami considerantes. Etenim, ob adstringendi vim, in alui laxitate, muliebri fluxione et hæmorrhagiis sistendis, radicem istam commodam habet. Quam debili vero fulcro nitantur, qui ex effectu, quem stirpes in corpus nostrum exferunt, earundem vel affinitates vel discrimina hariolari satagunt, vel me non monente, quisque perspicit. Sed ut breuis et manca delineatio, quam de Idæa radice DIOSCORIDES exhibit, censenda sit: quum tamen folia illi, Rusco<sup>g</sup> (ρύζιμον) similia tribuat, quibus pampini vel ligulæ (ἔλικες), ex quibus flos surgat, adhæreant, non vuam vrsi, sed Hypoglossum potius, ab Equ. a LINNÉ ad rusci genus pariter re-

la-

ctata describit, respexisse ad venas censendus est, quæ, quippe infra crebras anastomoses facientes, punctis quasi obsitam reddere superficiem videntur.

<sup>d</sup>) V. eius icon in *Flor. Dan. Fasc. I. Tab. 40.*

<sup>e</sup>) Ex. gr. DALECHAMPIVS in *Hist. general. plant. p. 193. C. BAVH. Pin. p. 470.* Notari tamen debet, DALECHAMPII figuram non veram vux vrsi formam exprimere.

<sup>f</sup>) *Mat. med. L. 4. c. 42. Ed. VERGILII p. 487.*

<sup>g</sup>) Ruscum aculeatum LINNÆI procul dubio intellexit,

latum, indicare voluisse, cum FABIO COLVMNA<sup>h</sup> existimo. Nec huic opinioni vis hypoglossi contraria est. Quam GALENVS<sup>i</sup> Ideam radicem appellat, cum illa DIOSCORIDIS, saltim si virium nominisque conuenientia acquiescere liceat, congruit. Et idem de Idea herba PLINII<sup>k</sup> sentire fas est. Verum minus falli videntur, qui CLVSION<sup>l</sup> adstipulantes, inter ἄρκου σαφυλῆν GALENI<sup>m</sup> nostramque vrsi vuam nihil discriminis intercedere credunt. Planta nempe, quam hæmoptoicis commendat, secundum illum in Ponto crescit, humilis et fruticosa est, folio memacyli<sup>n</sup> fructum ferens rubrum et rotundum, gustu austерum. Hæ certe notæ haud ita commode ad Ribes rubrum, quod GALENI ἄρκου σταφυλῆν esse quibusdam placet, quos vero MATTHIOLVS<sup>o</sup> strenue increpat, applicari possunt. Quicquid demum sit, in tam dubio tramite de hac tota questione hæsitanter pronunciare præstat, quam intempestiuæ in veteres, magni alias faciendos, veneratione, et huius plantæ cognitionis laudem adiudicare illis velle.

## §. II.

Stirps tanta annorum serie cognita, non potuit non multis iisque diuersis plane nominib[us] cumulari, quorum tamen Vuæ vrsi vox maxime sollemnis est. Vuam, ni fallor, ideo eam dixerunt, quod baccæ in racemos, vuarum instar, congregantur; vrsis vero in deliciis esse, indeque epitheton eius traxisse ortum suum, docet BOERHAAVIUS.<sup>p</sup> Quam vagæ tamen significationis vuæ vrsi nomen

<sup>h)</sup> Φυτοθεατævæs, Neapol. 1592. p. 63.

<sup>i)</sup> de simpl. medic. facult. L. 6. c. 9. Ed. CHARTER. Tom. 13. p. 78.

<sup>k)</sup> Hist. nat. L. 27, cap. ii. p. 1209. Ed. DALECH.

<sup>l)</sup> Rar. plant. hist. L. 1. c. 41. p. 63.

<sup>m)</sup> de composit. pharm. sec. loc. L. 7. c. 4. p. 548. Tom. et Edit. cit.

<sup>n)</sup> Memecylum Comari fructum proprie significare, supra jam retuli, sed eadem denominatio ipsi quoque arbori nonnunquam competit; qua de re consule inter alios MATTHIOLVM in Comment. in DIOSC. lib. 1. Ed. C. B. p. 151.

<sup>o)</sup> loc. cit.

<sup>p)</sup> Histor. pl. bort. ac. L.B. p. 656.

nomen olim fuerit, ex DODONÆO<sup>q</sup> patet, vtqui Vitis idæam (Roode Crakebesien), Myrtillum (Swarte Crakebesien), et Pyracantham (Mespili speciem), sub eodem a quibusdam comprehensas esse indicet. Ut vero, quam auctoritatem quodvis nomen, plantæ huic tributum, agnoscat, et quinam botanici eius mentionem iniecerint, sciatur, eorum iam tabulam, quantum fieri potuit, locupletem, adponam.

*Vua vrsi: CLVSII rarior. plant. hist. p. 63. TABERNÆMONTANI Kräuterbuch p. 1488.<sup>r</sup> RAI method. plantar. emend. p. 161. SCHEVCHZERI Iter. alp. 7. p. 520. KNAVII compend. botan. p. 52. TOVRNEFORTII instit. rei herb. Tom. I. p. 599. BOER-HAAVII index alter plant. Hort. L. B. Tom. 2, p. 219. Item Hist. plant. Hort. L. B. p. 656. ZWINGERI neu-völlkommenes Kräuterb. p. 85. a. 1745. SEGVIERI plant. Veronens. Tom. 2. p. 275. LVDWIGII Defin. gener. plant. p. 38. MILLERI Gardeners Dictionary Ed. 4. 8. MISLEYI descriptio in Haenii rat. med. Tom. 2. p. 160. OEDER. Flor. Dan. Fasc. I. p. 8.*

*Vua vrsi Galeni apud Clusium: LOBELII stirp. hist. p. 547. PARKINSONII Theater of Plants p. 1457.*

*Vua vrsi foliis ilicis: WAGNERI Histor. nat. Helvet. 289.*

*Arctostaphilon: SIEGESBECKII primitiæ Flor. Petrop. p. 13.*

*Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis: LINNÆI Flor. Lapp. p. 123; Hort. Cliff. p. 163; Mat. med. p. 72; Flor. Suec. Ed. 2. p. 138; Spec. plant. Ed. 2. p. 566. HALLERI Enumer. stirp. Helv. p. 415. ROYENI Flor. Leyd. Prodr. p. 440. WACHENDOR-*

<sup>q</sup>) Cruydt. Boeck. p. 1297.

<sup>r</sup>) DALECHAMPIVM huc ponerem, nisi in sua vua vrsi spinarum et foliorum in ambitu dissectorum meminisset, quæ in nostram non quadrant; vt igitur aliam plantam eum indicasse certo certius sit. V. Eius Histor. gen. plant. p. 133.

- DORFII Hort. Ultrai. ind. p. 76. ZINNII Catal. plant. Götting. p. 201. SCOPOLI Flor. Carniol. p. 275. IAQVINI Enum. stirp. Vindob. p. 70. GOVANI Hort. Monsp. p. 208.
- Arbutus procumbens*, foliis ovatis, solidis: HALLERI Enum. plant. Götting. p. 164.
- Arbutus Noueboracensis* Bearberry: GOLDENI plant. Coldingh. in act. soc. scient. Vps. a 1743. p. 81.
- Arbutus foliis integris*: GERARDI Flor. Gallo-prov. p. 439.
- Radix idaea putata et Vua vrsi*: IOH. BAVHINI Hist. plant. Lib. 5. p. 523.
- Vitis idaea foliis carnosis et veluti punctatis*: C. BAVH. Pinax p. 470. RAIII Hist. Plant. p. 1489.; Stirpes extra Brit. p. 263.
- Vitis idaea rubra Bauarica*: CAMERARII Hort. med. et. phil. p. 182.
- Vitis idaea repens*, fructu rubro farinaceo: LINDERI Flor. Wiksberg. 40.
- Vitis idaea foliis oblongis acuminatis, baccis rubris insipidis*: RVD-BECKII Lapp. illustr. 9.
- Vaccinia rubra farinacea*: FRANKEN. Spec. botan. 38.
- Myrtillus maior et minor*: TILLANDSII Catal. plant. Aboens. 47.
- Myrtillus ruber minor humiserpens*, fructu farinaceo; *Myrtillus ruber maior*, fructu farinaceo: BROMEL. Chlor. Goth. 71. RVDBECKII Catal. pl. Vps. 29; Hortus botan. 77.
- Buxerola in Gallia vulgo*: SAVVAGESII Nosol. method. Tom. 1. part. I. p. 165. et part. 2. p. 200.
- An *Chamæbodendros alpigena odora* LOBELII: stirp. aduersaria p. 154, et GERARDI: herball. p. 1221. hic referenda, aliis dirimendum relinquo.

## §. 12.

Anglis vua vrsi sub nomine *Spaniſh Redwhort*, PARKINSONIO MILLEROQUE testibus, venit, *Bearberry* autem in Noueboracensi Americæ prouincia, vt supra indicatum, vocatur. Galli *Bouſſerole* f. Buxerole eam nominare secundum GOVANVM et SAVVAGE- SIVM, vti etiam *Vigne d'ours*,<sup>a</sup> solent. Et in Suecia voce *Mjölon- ris* vbiuis nota est, aliis etsi illa *Mjölon*, *Mjölbärsris*, sicut Got- landis *Linbär*, Ostrogothis *Mjölabär*<sup>b</sup> magis arrideat. Cum hac denominatione illa *Meelbär*<sup>c</sup> inter Noruegos vſitata conuenit. Germania stirpem nostram pariter multis nominibus ditavit. CAME- RARIVS nempe eam *Steinbeerlein*, ZWINGERVS *Bärbeerſtaude*, cel. KÆSTNERVS<sup>d</sup> *Mehlbeere*, et cl. GERHARDVS<sup>e</sup> *Bärentraube* dixerunt. Ill. HALLERO<sup>f</sup> vero vox *Sandbeere* præ aliis placet. An hæc ipsa eadem sit, quam CHARLEVOIX *petit Buis de Ca- nada*<sup>g</sup> vocat, de eo, quoniam baccis succum grate acidum adscribit, quodammodo ambigo. Equiti A LINNÉ autem olim sub no- mine *Iackashapuck*,<sup>h</sup> tanquam Americanis septentrionalibus fami- liari, ex Anglia missa fuit.

## §. 13.

Non is quidem sum, qui plantarum cognitionem ex imagini- bus addiscendam, sed naturam, omni imagine, Ehretiano licet penicillo picta, præstantiorem, consulendam, suadeam: attamen si plantam ipsam conspicere non contingat, multum ex comparatione bonæ

a) BARBEIRAC medicament. constit. Lugd. 1760. p. 217.

b) LINN. Flor. Svec. l. c.

c) Flor. Dan. l. c. PONTOPPIDAN'S natural History of Norway T. 1. p. 134.

d) Schwed. Abbndl. 1743. p. 237.

e) V. ei. Bärentraube chymisch-medicinisch betr.

f) Götting. Anzeig. St. 26. a 1764. in recensione præcedentis libelli, cuius, ni fallor, auctor est.

g) Histoire de la nouvelle France, Tom. 2. additament. p. 53.

h) Schwed. Abb. l. c.

bonæ eiusdem descriptionis cum icone fide delineata, adiumenti accedit. Eo igitur fine figuræ, vuam vrsi repræsentantes, indico. CLVSIVS primus est, qui eam delineandam curavit, quod rudius quidem factum, vt pote quum iconem in lignum incisam sistat, ita tamen, vt haud ægre eam cognoscas, quamvis folia pleraque nimis acuta appareant. LOBELIVS et PARKINSONIVS, prout totam CLVSI iconem in sua opera transtulerunt, nec hanc mendam transferre intermisere. TABERNÆMONTANI icon, quam ZWINGERVVS imitatus est, ex maiori exemplo, nec male, descripta est. IOH. BAVHINI figuram autem minorem, et præcedentibus facile postponendam, deprehendes; nec florem, sed fructum, sistit. In omnibus vero, vti et in quibusdam sequentium culpandum est, quod erectos caules, nec, vt fieri deberet, procumbentes depingant. DALECHAMPII figuram, Idææ radicis descriptioni additam, Vaccinum vitis idææ maiore iure sibi vindicat. IOH. GERARDI, Angli, icon, Chamærhododendro alpigenæ dicata, huius forsitan loci est. TOVRNEFORTIVS florem eiusque varias partes, nitide, vt solitus est, depictas, præstitit. Proximus huic ill. A LINNÈ est, qui in *Flora* sua *Lapp.* elegantem fidamque eius figuram dedit, quam cl. GERHARDVS suæ de vua vrsi commentationi adiecit. Quæ in CHARLEVOIXII historia nouæ Franciæ occurrit, modo ad vuam vrsi pertineat, pusillum nimis exemplar exhibet. Nouissimam denique in *Flora Danica*,<sup>i)</sup> eamque coloribus suis nitidissime pictam, inuenies, cui nihil perfectionis deest, nisi quod totam potius plantam, quam ramum eius exiguum, delineatam desiderares.

## §. 14.

Quanquam non omnibus, qui de plantis in sistema redigendis bene meruerunt, botanicis, hæc nostra stirps nota fuit: plerique tamen vel varias, sub communi arbuti nomine, species, vel vnicam saltem memorarunt. Cum hac ideo ob similitudinem copulare licet vuam vrsi. Quin illos etiam attingendos duco systematicos, qui plane

i) *Fasc. 1. Tab. 33.*

plane arbuti genus silentio præterierunt; vt nimirum, quodcunque aliquis sistema sectetur, statim sciat, quorsum collocare eandem, vel ubi exquirere queat. Pertinet itaque ad

CÆSALPINI<sup>k</sup> classem 2. arborum, corde e basi seminum, seminibus pluribus; ordinem 3. flore in sede fructus.

MORISONI<sup>l</sup> cl. 1. arborum; ord. 6. bacciferarum polypyrenarum.

RAII<sup>m</sup> cl. 29. arborum et fruticum bacciferorum non ymbilicatum, ord. 4. fructu polypyreno.

CHRISTOPH. KNAVTII<sup>n</sup> cl. 17. fruticum; ord. 1. bacciferorum perpetua fronde virentium.

HERMANNI<sup>o</sup> cl. 24. arborum fructu non ymbilicato; ord. 5. bacciferarum polypyrenarum.

BOERHAAVII<sup>p</sup> cl. 33. arborum et fruticum dicotyledonum, flore monopetalo; ord. 2. ouario intra florem, fructu seminibus offeis foeto.

RIVINI<sup>q</sup> cl. 1. florum regularium monopetalorum; ord. 13. bacca s. pericarpio molli paruo.

## LVD-

k) de plantis libr. 16. p. 103. Arbutum Vndinem L., non vero vuam vrsi tangit.

l) Huc LINNÆVS arbutum collocat (V. Classes plant. p. 38.) usus sine dubio ANONYMI, quem allegat, hist. nat. Sciagraphia, quam ego vero nunquam vidi.

m) Meth. pl. emend. p. 161. Vuam vrsi ab arbuto distinguit.

n) Non inserta quidem arbutus est ejus enumerationi plant. circa Halam, sed hunc in methodo locum haberet.

o) Flor. Lugd. bat. opera LOTH. ZUMBACH. p. 167. Vuæ vrsi speciatum non meminit.

p) Index alter. plant. L. B. Tom. 2. 219. et hist. plant. L. B. p. 656. Vua vrsi ab arbuto separatur.

q) Quanquam nec in RIVINI operibus nec HEVCHERI Horto Witt, obuiam venit, hisce tamen non inepte adiicitur.

RUPPII<sup>t</sup> cl. I. fl. regularium monopetalorum; ord. 15. bacca poly-pyrena.

LUDWIGII<sup>s</sup> cl. I. fl. monopetalorum regularium; ord. 9. decantherarum.

CHRISTIAN. KNAVII<sup>t</sup> cl. I. fl. monopetalorum uniformium; ord. 17. capsula simplici carnosa pentasperma.

TOVRNEFORTII<sup>u</sup> cl. 20. arborum monopetalarum; ord. 2. quarum pistillum abit in fructum seminibus ossibus foetum.

MAGNOLII<sup>x</sup> cl. 15. arborum et fruticum dupli calyce, externo et interno; ord. 2. flore monopetalo.

LINNÆI<sup>y</sup> cl. 10. decandriam; ord. I. monogyniam.

ROYENII<sup>z</sup> cl. 17. plant. diplosantherarum; ord. I. antheris bicornibus.

HALLERI<sup>a</sup> pl. petaloideas, dicotyledones, diplostemones.

WACHENDORFII<sup>b</sup> pl. pollaplostemonopetalas diplostemones.

GLEDITSCHII<sup>c</sup> pl. petalostemones decantheras.

### S. 15.

Qui in partiendis stirpibus ordinem naturalem sectantur, normam istam, quam solidior quisque botanicus tanci iure aestimat, ob-

- <sup>r</sup>) Flora Jenens. Ed. HALLER. p. 52. Occurrit hic modo arbutus vredo L.
- <sup>s</sup>) Definit. gen. plant. 1747. p. 38. Arbuto vuam vrsi iungit.
- <sup>t</sup>) Compend. bot. s. metb. plant. genuin. p. 52. Seorsim describitur.
- <sup>u</sup>) Inst. rei herb. T. 1. p. 599. Seiungit illam ab arbuto.
- <sup>x</sup>) Hic locus illi secundum ejus sistema adsignari posset. Omissa vero est, in novo charactere plant. a filio edito Monsp. 1720. In prodromo hist. gen. plant. 70. diuellitur ab aliis arbuti speciebus.
- <sup>y</sup>) Syst. nat. T. 2. p. 488.
- <sup>z</sup>) Floræ Leyd. prodrom. p. 440. Varias arbuti species completitur.
- <sup>a</sup>) Enum. stirp. Helv. p. 415; et Enum. plant. Götting. p. 164.
- <sup>b</sup>) Horti Vitrai. ind. p. 77.
- <sup>c</sup>) Syst. plant. a stat. situ a. 1764. Gen. 941.

defectum vero cognoscendarum specierum nondum stabiliri satis posse, dolet, *bicornibus* vuam vrsi adnumerare solent. Inter has plantas ab ill. LINNÆO<sup>d</sup> ROYENIO, ZINNIO et GERARDO collatur. Nomen ordo ex setis istis duabus, quæ, cornuum instar, antheris plerarumque ejus specierum insident, gerit. Conueniunt huius generis plantæ in eo, quod foliis alternis instruantur, virore perpetuo delectent, ex semine difficillime propagentur, et adstringendi vim habeant. Differunt vero corolla, quæ in quibusdam, ut Arbuto, Vaccinio, Erica, Azalea, monopetala; in aliis, ut Memæclo, Lawsonia, tetrapetala; in reliquis, ut Clethra, Ledo, Pyrola, pentapetala est. Cl. SCOPOLI classi suæ 12. *blattariarum* illam addit, et præter alias, innoxiae huic plantæ cum solanaceis, haud ita fidis sociis, connubium tribuit.

## §. 16.

In septentrionalibus Europæ regionibus in primis copiose crescit: interim nec australes plane respuit. Ita legerunt illam in ipsa Hispania, in colle prope vicum Venta el bahul, inter Guadix et Baçã, in regno Granatensi, CLVSIVS; in Gallo-prouincia, in monte Esperou, SAVVAGESIVS, GOVANVS, GERARDVS; in Italia, in altioribus Baldi montis iugis, et in montibus Tridentinis, SEGVIE-RVS; in Heluetia, circa Geneuam, in monte Iura, in Gemmio aliisque locis, BAVHINI, RAIVS, SCHEVCHZERVS, HALLERVUS; in Finnia TILLANDSIVS; in Lapponia et Suecia, præsertim in insula Gothlandia circa Wisbyam, LINNÆVS; in Norwegia passim OEDERVS, Petropoli SIEGESBECKIVS; in Austria prope Vindobonam, in alpibus pratenibus, IACQVINVS; in Carniola, in monte Grindowitz, SCOPOLIVS; in Styria, in alpibus niualibus dictis, MISLEYVS. In terra Hannoverana hucusque tantum in ducatu Cellensi versus Schel-

d) Gener. plant. a. 1764. Ord. nat. 18.

Oländska och Gotbländska resa p. 182.

Schelplau<sup>f</sup> reperta fuit. Nam nec catalogi Flor. Gött. nec opuscula botanica, quibus ill. ab HALLER itinera sua Hercynica inseruit, montes hosce vuæ vrsi patriam constituunt. Memorabile est, quod, testibus CHARLEVOIXIO, et LINNÆO, etiam ad fretum Hudsonis in *America*, crescat. Delestatuer vero ubiuis *locis apicis*, *incultis*, *sabulosis*, *sterilissimis*, et *aridissimis*, vel in *montibus*, ut exposui, vel in *sylvis* reperiunda.

## §. 17.

Hanc soli indolem imitari arte debent, qui de transferenda planta solliciti sunt. Vix enim, nec nisi difficultate summa, semi-nibus propagare se sinit. Attamen et ipsa eius translatio ob tenuem, quo radix vestitur, corticem, facillime, euulsa planta, siccescente, multum tædii parit. Vulgare est artificium, plantas in alia loca remouendas cum gleba radicem circumdante exscindere, quod MILLERVS,<sup>g</sup> hortulanorum princeps, et de Vua vrsi nominatim commendat. Interea tentari meretur, an cl. GERHARDI<sup>h</sup> consilium, qui eam in vas aqua recenti plenum coniiciendam ibidemque ram diu seruandam, usque dum transferri queat, suadet, melius succedat.

## §. 18.

Pharmacopolarum scire interest, quando flores suos emittat, ut tempestue eam colligere possint. Sponte autem patet, florendi tempus pro climate diuerso varium esse. In Hispania iam Martio m. florentem eam vidit CLVSIVS. In Austria vero Maio IACQVINO teste, hoc vigoris sui fastigium attingit: quod idem fere in Suecia est, ubi versus eiusdem finem floribus ornatur. Ex his regionibus tantopere a se remotis, tempora, quibus alibi floreat, augurari, haud ita difficile erit. Baccas tandem versus Decembris finem Cellæ maturescere, cl. TAVBE obseruavit.

## SECTIO

f) V. præter Catal. Flor. Gött. HALLERI et ZINNII ll. cc. HALL. Disp. abseruationes botan. et med. resp. cl. WILLIGIO Gött. 1747. p. 7.

g) GARDENERS Dictionary, sub titulo *Vua vrsi*.

h) V. Eius Bärentraube. p. 18.

## SECTIO II.

## ANALYSIS VVAE VRSI CHEMICA.

§. I.

**A**botanico isto vuæ vrsi scrutinio ad chemicum me confero; simpliciori tamen illam examini, nempe sensibus peracto, prius subiiciens.

Hora a. m. 10. ingessi pulueris *foliorum* grana 6, quæ vndique in ore lingua agitans palato demum firmiter admoui. Adstringentem s. stipticum *saporem* statim percepī, postea vero haud ingrate amarum. Intra 4 minuta temporis prima, tantum saliuæ affluxerat, ut vix illam ore continere possem, vnde eam deorsum glutui. Post 2 circiter inde minuta omnis fere amarities cesserat. Verum successit ardor quidam linguæ, palati et faucium, et leuis pharyngis quasi constrictio. Interim per quadrantem horæ sapor herbaceus remansit, saliuæ sensim sensimque dulcescente. Post deglutitionem saliuæ linguæque ad palatum deterisionem, humida tamen satis apparuit, imo adhuc continuo, et si minus copiose, saliuialis latex interna oris rigauit. Dimidia hora exacta, omnis fere faucium ardor siluit. Eadem semper repetito periculo animaduerti, modo quod pro pulueris copia vel magis vel minus intensa vis eius esset; adeo, ut maiori quantitate ingesta, linguæ papillas, præsertim maiores, turgere plus solito observarem. Amaritiei quoque sensus diutius durauit, quando, puluerem quo minus expue-rem vel deglutirem, mihi temperare poteram.

Caules teneriores, fragiles, s. *stipites*, foliis proximi, amaritudine foliis magnopere cedere, sed adstrictionis sensu istis potiores esse, mihi visi sunt; tanto magis austeri, quo proprius radici gustabantur, amaritie eadem proportione decrescente. Virtutes vero hæ soli cortici, vix ligno, inhærent,

C 3

Odore

*Odore omni folia destituuntur; nisi quod in puluerem redacta, dulce illud (liceat ita dicere), quod radix Liquiritiae vel eius sucus spirat, quodammodo æmulentur.*

*Color pulueris foliis integris, quæ viriditatem graminis habent, aliquantum pallidior est. Vnde, si ab isto deflectit, caules vel folia marcida et effoeta, utpote quæ bruna vel subnigra, admista esse, indicio esto.*

### §. 2.

Dum experimenta, quæ feci, chemica iam recensere animus est, nolo aliquem, quod statim ab initio monendum iudico, illa eo fine suscepta arbitrari, ut modum, quo in corpus nostrum vim suam stirps exferat, exinde eruerem. Nam probe persuasum mihi habeo, quod chemia corpora sæpe ita immutet, ut partes eliciantur longe aliis naturæ, quam quæ ante adfuerint; quod in recludendis iisdem crebro debilis nimium sit; quod vegetabilia, virtute licet diuersissima, easdem tamen paresque sub examine chemico partes exhibeant; quod corpori nostro non tanta vis, quæ igni vel menstruis fortioribus, competit; quod denique, etiam si per chemiam natura vegetabilium indagari posset, pro corporis tamen nostri diuersa conditione eorum vis variet: ita ut constanza effectus, cuius herbæ capaces sint, tamen non nisi experimentis apud ipsos ægros captis, addisci possit. Frustra igitur plurimam partem experimenta a membris academiæ scient. Paris. cum tanto plantarum numero instituta esse videntur, nisi utiliter facta esse dixeris, quoniam præiudicatis de harum analysium usu opinionibus multos exuere valuerunt. Hanc chemiæ ad virtutem medicamentorum explicandam impotentiam scriptis quoque suis, ut alios taceam, BOERHAAVIUS,<sup>a</sup> CHOMELIVS,<sup>b</sup> BVCHNERVS<sup>c</sup> et nu-

per-

a) *Elementa chem. Tom. 2. p. 11. seq. Ed. Lips.*

b) *Abregé de l'histoire des plantes usuelles Tom. 1. Præf. p. 36. seqq. Ed. 5.*

c) *Diff. de cautelis circa chemicam remediorum explorationem resp. I. G. D. KVRSSNER, 1753.*

perrime ill. Archiater Regius VOGELIVS,<sup>d</sup> quem ob merita in rem medicam, et insignem in me benevolentiam, tum valde suspicio, tum vehementer amo, agnouerunt. Et mirum est, tot nihilominus tamen adhuc existere eiusmodi tentaminum aestimatores, imo scriptorem nuperum vsque adeo iisdem indulsisse, vt chemiam ad cognoscendam vegetabilium vim ipsa praxi certiore pronunciaret.

Manet tamen et chemiae suus honos. Quamuis enim, in quo lateat plantæ virtus, præcise non detegat: multa tamen experiendo discimus, in medicina ipsa vsum habitura. Nisi MODELIVS<sup>e</sup> in corticem Peruuianum chemica arte inquisiuisset, etiam nunc rationem probabilem, cur puluis extracto eius longe præstet, nesciremus. In extracto nempe, quacunque ratione parato, ne minimum quidem particularum ferrearum vestigium inuenit, quum istæ e contrario magna satis quantitate in terra, ex cineribus corticis crudi elicita, sese proderent. Nec negari poterit, historiam plantæ tanto completiorem euadere, si chemice quoque considerata fuerit. Enfin en sondant et en interrogeant la nature de plusieurs manieres differentes, il y a toujours du profit à faire.<sup>f</sup> Sunt HOM-BERGII verba, cuius effatum tanto maioris hic faciendum, quum ipse laudem experimentorum chemicorum, prout par est, restrinxerit.

### §. 3.

Ante me, præter cl. GERHARDVM<sup>g</sup> et. cl. MODELIVM,<sup>h</sup> nemo, quantum scio, vuam vrsi chemico examini submisit. Quum vero

- d) *Diff. de analysi medicamentorum simpl. chem. ad virtutes ipsorum determinandas bacterius perperam adhibita, resp. G. C. WITTE 1764.*
- e) *V. eius (erstes) Schreiben an einen Freund die Bestuchbeffsche od. so genannte Lamottische Nerventinktur betreff. Ed. 2. 1762. p. 38. sqq.*
- f) *Hist. de l'Ac. des scienc. a. 1701. p. 70. et 113. 4.*
- g) *Bärentraube chymisch-medicinisch betrachtet. 1763. p. 16. sqq.*
- h) *Zweytes Schreib. meg. d. Bestuch. Nerventinktur, welchem eine physicalische chymische Untersuchung und Vergleichung der Fieberrinde mit d. Vua vrsi beygefuget ist. 1763. p. 17. sqq.*

vero partim noua quædam experimenta fecerim, partim ante iam facta meis corroborentur: nec, quæ ego obseruauerim, legere pigebit. Qui nouit, quanta sollertia in hisce laboribus opus sit, vt ne quod vitium committatur, non culpæ mihi vertet, quod in recensenda methodo, qua usus sum, solito fusi us verter. Herbam, quam adhibui, Cellæ superiori aestate (1763) collecta fuit.

## §. 4.

*Extractionibus*, siquidem non tantam ignis vim, ac ceteræ præparata, requirunt, ideoque magis ad corporis nostri naturam applicari possunt, in primis immoratus sum.

I. Ad *extractum aquosum primum*, quod vocant, obtinendum, d. 11. Aprilis, foliorum vñæ vrsi, in rudiorem puluerem redactorum, vnciæ 1. sufficientem aquæ fontanæ quantitatem infudi, & obturata probe cucurbita, eam in arenæ balneum, vt digestionem subiret, immisi. Digestionem per 14 fere dies continuaui, et tantum aquæ, defusione quavis vice, qua noua liquidi pars adiiceretur, prægressa, addidi, vt nullus denuo sapor colorue, ex foliis oriundus, perciperetur. Ad hunc vero laborem aquæ vncias 24 consumsi. Quod primis defusionibus obtinebam liquidum, fuit valde amarum et adstringens, coloris saturate bruni, vitro vero versus diuum directo, gratioris et rubicundioris. Nullum autem odorem, præter illum, quem puluis foliorum sponte spargit, sensi. Expressione liquidi per linteum digitis facta, illoque per chartam typographicam colato, pondus vnciarum 18 haud superauit.

Odor, qui sub spissatione eius, lento igne suscepta, nares feriebat, aliquid balsamici prodidit. Et spathula ferrea, qua extractum agitabam, nigra evasit, vnde illam reiicere aliquam substituere necesse fuit. Tanta enim stiptica vi polluit. *Extractum ipsum* drachmas 3 et grana 6 pendebat, residua parte siccata et librata vnciam  $\frac{1}{2}$  granaque 44 constituente; vt itaque totum pondus

dus granorum 10 dispendium passum esset. Mellis odorem habuit, saporem autem valde amarum et adstringentem, nonnihil insuper empyreumaticum. Postquam in lingua solutum esset, pars quædam insipida, ægre solubilis, remansit, quæ haud dubie resinosæ naturæ fuit. Ad accessum aëris semper mollius siebat. Colorem denique eius profundissime brunum inueni.

2. Residuæ massæ, quantum opus erat, spiritus vini fortissimi infudi, digestionem eius, ut antea factum, pariter per 14 dies perficiens. Impensis spiritus huius vnciis 18, tincturam nactus sum, oliuarum colorem referentem, amaritie infuso iamiam dicto longe inferiorem, et odorem a vini spiritu mutuantem. Media digestione ad cucurbitæ latera magina pingue conspexi, fasciam quasi ad superficiem liquidi constituens, quod autem agitatione, squamarum instar, se separabat, et dein soluebatur. Postquam infusum colatum esset, pondus vnciarum 13 habuit.

Hoc, ut extractum spirituosum secundum pararem, spissaui. Sed quum in ipso negotio flammam spiritus caperet: aliquid sub extincione eiectum est; ita ut dein modo vncias 10 reliquas haberem. Massa tum emersit coloris herbacei, cohæsionem respuens, et postquam siccaretur, sub leui inter digitos tritu in puluerem transiens. Grana 34 graue fuit, sed, si pars amissa pariter in calculum referatur, ad grana circiter 44 æstimari potest. Extractum hocce odorem spiritus vini diu conseruans, saporis initio amari, dein oleosi vel rancidi, fuit. Candelæ forficis ope admotum flammarum cepit, sed non omnino deslagrans carbonem reliquit, postea adhuc cudentem, fumo leue aroma spirante. Quoniam autem gummi admisti satis manifesta indicia aderant, ad illud separandum grana extracti 28 aqua tepida repetitis vicibus elui, solutumque gummi per chartam emporeticam transmisi. Tum resina pura ponderis granorum 20 remansit, tenax inter dentes, atro-viridis, et consistens colore herbaceum præ te ferens, odorem vero ceræ.

## §. 5.

1. An proportio inter gummi resinamque eadem semper esset, experturus, mutauit artificium, et iam primam infusionem cum spiritu vini fortissimo feci, *foliorum* rudius comminutorum vncia I adhibita. Digestio tum per 2 hebdomades durauit. Affuso defusque variis vicibus spiritu, et subinde solutis cucurbitae vinculis per lintea expresso, eius vncias 27 impendi. Nam non prius destiti, quam nulla amplius spiritus nec quoad colorem nec saporem mutatio appareret. Tinctura, prioribus defusionibus elicita, in vitro obscure viridis fuit, ita ut vix solis radii transirent, sed cochleari excepta grata viridis, amara insuper insigniter. Fortiori olsactu balsamici aliquid sentire mihi visus sum.

Infusum vnciarum 25, prægressa eius per colum transmissione, in extracti formam redegi. Notari meretur, quod charta bibula colando viridesceret, et ad marginem eius multum resinæ adhæret. Sub exhalatione nihil odoris specifici animaduerti. Elicui itaque extracti spirituosi primi, quod atro-viride erat, odoris parum balsamici, saporis impense amari, ad aërem mollescentis, drachmas 3 cum granis 26. Residuum vero siccatum vnciam  $\frac{1}{2}$  æquauit. Vnde patet dispendium hic maximum fuisse, nempe granorum 34, quod tum exhalationi, tum chartæ bibulæ, adscribendum. Dum extractum linguae imponerem, spumescere inde saliuia coepit, eoque fere omnino subacto, spuma tenui vndique lingua apparuit testa; quod in ceteris extractis non contigit. Etiam hic, spiritus multum gummosarum partium euoluerat, vnde veram vtriusque proportionem pernoscendi audius, extracti drachmam. I aqua tepida solui, et sollerter maceraui. Colato liquido gummi imprægnato, in charta hæsit *resina* tenuissime diuisa, quæ siccata grana 14 pendebat. Fuit profunde viridis, initio parum amara, mox vero insipida. Prunæ iniecta se crispauit, odorem leuiter aromaticum spargens, et carbonem relinquens. Gummi vero gr. 39 spissando adeptus sum; ut igitur toti ponderi gr. 7 deessent. Gummi istud atro-

atro-brunum deprehendi, vehementerque amarum et adstringens; odoris aliquantum balsamici.

**2.** Residuum superioris extracti digestioni cum aqua commisi. In hac licet supra 2 hebdomades steterit, vix tamen aliquid inde eductum videbatur. Nam præter colorem pallide brunum nihil mutatum fuit, siquidem sapor omnino fatuus, odor vero nullus aliis, quam qui a spiritu vini ante usurpato remanserat. Vncias ideo 10 aquæ adhibere suffecit.

Liquidum hoc colatum et spissatum gr. 26 *extracti aquosi secundi* dedit. Quum vapores ascenderent, balsamici aliquid olfeci. Extractum ipsum balsamici fere odoris, atro-brunum, ad attractum primo quasi resiliens, dein quum siccum esset, fragile fuit; prætereaque notabiliter salsum. Mirabar, unde sapor ille salinus profectus esset. Verum aliquo tempore post totam eius superficiem crystallis minimis cubicis obsitam, et, fracto illo, innumeras cauernulas, crystallis eiusdem generis, minoribus autem, vestitas, video. Parca nimis salis huius copia impediuit, quo minus indolem eius inuestigare sollicite possem.

### §. 6.

**I.** Nolui in extractionibus cum foliis factis acquiescere. Quoniam enim iam gustu inter folia caulesque minores *s. stipites* discri-  
men senseram: hosce ipsos singulari chemiæ examine dignos iudi-  
caui. En! quæ obseruauerim. Stipitum vuæ vrsi fragilium, colo-  
ris, quoad maximam partem, bruni, ruidiusque contusorum vn-  
ciam i cucurbitæ immisi, quam, debita spiritus vini fortissimi co-  
pia affusa, igni digestionibus accommodato imposui. Post 14 circiter  
dies non amplius ille tingebatur. Adhibitis igitur spiritus vini  
vniciis 26 liquidoque digitis expresso et per chartam transmisso, ad-  
fuit tinctura, primo adspectu profunde bruna, dein vero, quum, se-  
dimine deposito, ad diurnum lumen teneretur, grate rubicunda,  
instar granati, euadens. Amaritie fuit infuso spirituoso primo ex-

foliis inferior; austernitate vero manifeste superior. Odor non alias, quam qui vini spiritui peculiaris est.

Ex hoc infuso, vniarum 22 pondus æquante, extractum spirituoso primum obtinui, atro-brunum, quamuis, quod cochleari, quo infusum spissescens agitabatur, adhærebat, viride esset. Pendebat drachmas 2 cum granis 4; herba vero residua drachmas 5 plus scrupulos 2: ut ideo grana 16 omnino deficerent. Communis illi cum cortice Peruiano odor, qui stipticam eius vim iam prodit, infedit, inprimis, dum recens erat; nam dein balsamum leuiter oluit. Etiam huic mollescere datum. Sapor eius fuit insigniter adstringens, valdeque amarus. Quin adeo extractum aquos. pr. amaritie vicit; quod fortassis a maiori vi, qua linguæ papillas coarctat, et consequenter amaras partes illi magis imprimis, deriuandum est. Igni admotum non arsit, sed se crispans odorem haud ingratum sparsit. Ut resinam a gummi, quod copiose se admiscuerat, liberarem, extracti drachmam I aqua tepida solui, quæ pallide bruna et turbida inde fiebat, mox vero grisea et flocculenta. Flocis in fundum delapsis, supra stagnauit liquor brunus, infusum Coffæ referens. Resina statim in fundo vasis se separauit, quare haud ægre bonam eius partem elicere poteram. Liquore colato, in charta perstitit terra grisea, in qua resinosæ particulæ, viriditate sua conspicuæ, micabant; quibus vero, saepius et si affusa tepida aqua, se iungendis non par eram. Terra ipsa, crebro antea lota, dedit, postquam illam siccasssem, puluerem subtilissimum insipidum ponderis gr. 9. Ex liquore autem illo bruno post exhalationem recuperauit gummi coloris rufi, extracto ipso minus amari, et facile in lingua deliquescentis, scrupulos 2; resina autem viridis, inter dentes tenacis et insipidæ, gr. 6. Grana illa 5, quibus drachma destituitur, partim in charta bibula, partim in aqua, qua terra lota fuit, quæras. Etenim, quamuis hac in re magna aquæ copia usus essem, pallide tamen flava euasit, et infusa vitrioli martialis solutione, pa-rum fusca.

2. Reliquum fuit, ut ex residuo extracti istius spirituosi extractum aquosum secundum quoque elicerem. Omnia vero eadem fere, quæ in extractione secunda aquosa cum foliis facta, reperi; qua de causa illis repetendis supersedeo. De extracto ipso, cuius scrupulum I obtinui, tantum noto, quod tenacius esset, nec eiusmodi cauernulis constaret, falso denique sapore aliquantum debilius.

## §. 7.

Multum discriminis cl. MODELIVS<sup>i</sup> inter infusum foliorum vnx  
vrsi aqua factum et decoctum eorundem obseruauit, prout succum expressum vi vtrique horum antistare expertus est. Ut proprio hac de re periculo certior fierem, decoxi foliorum ruidus comminutorum vnciam I cum aquæ fontanæ vnciis 9, vsque dum tertia tantum eius pars remaneret. Decocto per linteum tenuius transmisso et claro facto, paullo obscurius illud, attamen pellucidum, magisque amarum, quam infusum aquos. pr. foliorum, deprehendi. Gustu pariter lingua magis constringi visa est. Odore eius quasi ex foeno sicco fuit. Decocti saporem subtilius explorare, quum illud ægris propinare commodum sit habitum, operæ pretium duxi. Post meridiem igitur, exacto vndecimo horæ 5. minuto pr. haustum decocti cepi, quem hinc inde ore volutaui; quod ob insignem amaritatem cum adstrictione, amari tamen sensu præualente, iunctum, haud sine molestia fieri poterat. Postquam tantum saliuæ affluxerat, ut non amplius retineri posset, eam expui. Raucitas vero et ardor notabilis faucium statim præsto fuerunt, quæ tamen incommoda 8 minutis post mitescere cooperunt, quum sapor haud ingrate dulcis succederet. Insignem dein siccitatem in lingua et fauibus percepī. Ast minuto 40. humiditas pristina redire visa est.

## §. 8.

i) zweytes Schreiben, p. 23.

## §. 8.

Iam quid infusis in connubio *reagentium*, quæ vocant, accideret, expiscari volupe fuit. Ne igitur iactura liquidi, ex quo extracta compararem, fieret, singulares infusiones eo fine feci.

1. Nempe primum vnciæ  $\frac{1}{2}$  foliorum partitis vicibus aquæ fontanæ vncias 5 infudi. Post hebdomadem sesquialteram liquidum emersit, omnibus criteriis supra descriptis vim, qua pollebat, prodens. Ut primum huic oleum tartari p. deliquum instillabam, turbidum euasit, et griseum, qui vero color post leuem moram superius in profunde brunum, dein obscure viridem, transiit, ita ut ferre colorem infusi spirituosi æmularetur. In fundum mucosa quasi materia dein deiecta, et totus liquor insuper leue coagulum contraxit. *Spiritu salis* fuscum statim exstitit, quamuis, prout antea, lumen transmitteret. Nitri autem *spiritus* nullam mutationem, neque quoad colorem, nec fluiditatem, nec claritatem induxit. Quum solutionem vitrioli martis affunderem, atramentum aëtatum natum est, quo litteras commode fingere poteram. Tam vero nigrum fuit, ut nec infusum Thæ, nec quod ex cortice Peruuiano paraueram, illi in eadem miscela æquiparari posset. Proximum hoc ex cortice factum, puluerem sensim dimisit, quo delapso, supernatans liquor viridescens apparuit. *Syrpus violarum* infusum nonnihil turbidum reddens colorem eius in profundius brunum mutauit. *Charta cœrulea* denique manifeste viridis inde facta.

2. Eadem pericula dein infusum spirituosum ex vncia  $\frac{1}{2}$  foliorum cum vnciis 9 spiritus vini fortioris digestionis ope confectum, nec minus viribus præstans, subiit. Quæ hisce occupatus viderim eodem ordine, quo ante, ut comparatio tanto facilior sit, exponam. Addito Oleo tartari p. del. turbidum statim euasit, colorem sordide viridem induens, et, paucorum minutorum pr. mora, terram griseam copiose demisit, cohærentem satis inter se, attamen in fundo vasis sub motu nonnihil fluctuantem. Hæc aliquot dies post

ite

ita induruit, ut agitatione vasis nihil eius separaretur; liquidum vero superius fluidum, ut ante, mansit. Experientia MODELII cum terra ex succo vuæ vris oleo tartari p. d. deiecta, imitatus, omnia fere similia hic conspexi. Lotione enim terræ illius griseæ, utrum sæpe, aqua tepida repetita, vi adstringente eam tamen exuere non valui, quæ scilicet, quum lixiuio solutionem vitrioli martis instillarem, nigrescente colore se prodidit. Dum hanc terram pluries lotam oleo vitrioli, quoad eius fieri potuit, soluerem et solutionem vitrioli martialis adderem, iterum nigrescere cœpit. Et affuso oleo tart. p. d., de nouo decidit terra, quæ siccata spiculorum salinorum copiam oculo microscopio instruðo obtulit. Sal vero hoc, in miscela soluti vitrioli, pariter nigrum colorem produxit. Tandem quoque massam caeruleam, in fundum demersam, cuius MODELIVS mentionem facit, obtinui, quanquam non infior, colorem non æque gratum in mea fuisse, rufum etiam postea euasisse, et postquam illam siccasssem, ochræ colorem retulisse. *Spiritus salis* infusum colore, inter nigrum viridemque medio, tinxit; posteaque terram griseam deiecit, omnem nexus inter se respuentem. Die uno vel altero post ad latera vitri magma ad primum aspectum griseum vidi, quod, quum digito eximerem, viride tenaxque ita reperi, ut pilulam exinde formare possem. Illud nec spiritu vini nec aqua solui potuit, sed, licet agitatione in hisce liquidis in puluerem dilaberetur, in pilulæ tamen formam iterum redigere se sicut. Liquor vero sedimini supernatans clarus esse perstitit. *Nitri spiritu* in colorem, pallide luteum instar cereuisiæ triticeæ, mox transit, materiam flocculentam paullo post demittens. *Vitrioli martis* solutio atramentum statim produxit, sed illo ex infuso aquoso initio pallidius, et tam fluidum, ut in charta etsi probe glutinata, etiam aliquot dies post, difflueret. Post maiorem autem moram firmior eius nigredo euasit. Sedimentum quoque depositum pallide nigrum, in quo, tribus diebus exactis, copiam crystallorum rhomboidalium reperi, quarum figura statim nihil aliud, quam merum martis vitriolum subesse, docuit. Quod tanto certius

tius factum, quum easdem in infuso soluerem, vtpote quod statim nigrificere coepit. Notare insuper incumbit, quod in omnibus supra dictis liquidis tenuis pellicula, sed exiguo modo spatio liquorem obtegens, postero die conspiceretur; maxima, vbi vitrioli martis solutio instillata fuerat *Syrupo violarum* pallide viridis liquor fieri visus est. *Charta vero cœrulea* omnem mutationem recusauit.

## §. 9.

In *resinæ* naturam quoque mihi inquirendum fuit; vnde oleum, tum destillato, tum expresso, tentare illam conatus sum. Priori scopo *Carui oleum* elegeram. Illo scilicet *resinæ* ex extracto spirituoso sec. vix instillato, nota solutionis apparuit, et maxima dein pars etiam sine calore disfluxit. Quod reliquum erat, omne fere calore modico disparuit. Color miscelæ viridis fuit, in luteum vergens. Vis igitur olei destillati in resinam hanc ex exemplo patet. Quid expressum valeat, *oleum Amygdalarum dulcium* ostendit. Hoc, licet per biduum *resinæ* superinfusum stetisset, pauxillum tamen eius tantum absorpscerat, ita vt leuem modo viriditatem contraheret. Nec calore et agitatione adiutum totam illam soluit, deiecta nimirum conspicua pulueris bruni parte. Interim colore satis viridi tintatum est.

Effectus eosdem ex resina ceterorum extractorum spirituorum animaduerti, præterquam, quod pro vario depurationis, quam subierat, gradu, mox plus mox minus solueretur; quare et in colore non nasci non potuit varietas.

## §. 10.

Experimentis superioribus iam satis conuictus esse arbitrabar, nihil volatilis *vnuæ vrsi* inesse. Ne quid vero ad hanc rem confirmandam omissum videretur, *destillationem* eius cum aqua institui. Vnciis igitur 3 foliorum rudiis contusorum aquam fontanam octupla

pla proportione, nempe ad libras 2 medicinales, superinfudi, ut  
tertia vasis retorti pars vacua esset; digestione per noctem præ-  
missa ipsum negotium perficiens. Ignem primo lenem, dein for-  
tiorem substrauit. Tres dies laborem continuare oportuit, antequam  
tertia aquæ pars in cucurbitam transcenderet. Tum refrigerio  
vasorum facta ea aperui. Nihil olei in aqua nec salis in collo re-  
torti vasis videre fuit. Color aquæ leuissime laetescens apparuit.  
Verum ut primum vasa seiungerem, odor quidam fortis et valde  
nauseosus, qualem fere Sennæ decoctum spirat, nares feriebat,  
ita ut mox remouere vitrum cogerer, grauitatem capitis sentiens.  
Empyreuma aquam contraxisse dici nequit, quum tantum eius ad-  
huc relinquem, nec cum illo odore, quem etiam inodoræ alias  
herbæ, e. c. foenum ipsum, sub destillatione exhibit, commode  
satis comparari potest. Odorem vero hunc sensim aqua perdidit.  
Sapor eius quoque parum nauseosus fuit, ceterum fatuus, nec ullo  
modo austerus; unde nouo exemplo constat, vim plantarum sti-  
pticam frustra in aquis destillatis quaeri. Experimentis cum  
reagentibus, quæ appellant, factis, nihil, præter solitum motum  
vermicularem, obseruauit. Liquidum, quod in vase retorto re-  
manserat, vehementem amaritatem habuit, coloremque obscurissi-  
me brunum.

## §. II.

Tandem *sal* eius alcalinum, foliorum vnciis 5 in crucibulo  
aperto combustis, erui. Fragorem quidem leuem, quum folia in-  
iicerentur, percepi, sed flammarum non ceperunt. Ad marginem  
crucibuli materia picea copiose collecta haesit. Fumus, cui quoad  
odorem nihil peculiare competebat, fauces satis coarctauit. Plus  
quam 2 horæ effluxerant, ante quam *cineres* albescerent, quorum  
denique nimis paruam quantitatem, nempe drachmam modo 1 cum  
graniis 9, obtinui. Ex hisce postea grana 16 *salis* alcalini exhalatione  
elicui, residuis scrupulis 2 cum gr. 13 cinerum pallide griseorum.  
An, quod quidam et animalibus et vegetabilibus tribuunt, ferri  
vesti-

vestigia cineribus inessent, experiundi cupido me incessit. Sed magnete etsi tam ante quam post salis separationem admoto, nihil eiusmodi detegere potui.

## §. 11.

Præter hæc iam enumerata experimenta alia quædam clari isti viri, qui vuæ vrsi naturam chemicis artificiis rimati sunt, instituerunt. Sic GERHARDVS<sup>k</sup> foliorum cum spiritu vini fortissimo destillationem; eorumque cum vino albo Gallico infusum extractumque fecit. MODELII<sup>1</sup> scrutinium vero præcipue circa foliorum recentium succum, pauxilli aquæ ope expressum, hæsit. Destillatione porro aperto igne suscepta ea torsit. Tum, vt discriminis, quod intercedere succum inter ceterosque liquores vuæ vrsi, siccatae prius, vi imprægnatos, suspicabatur, certior redderetur, in infusum eius aquosum et decoctum selectiori cura inquisiuit.

## §. 12.

Tantum sane ex experimentis, a me institutis, elucebit, plantæ nostræ vim, adstringentibus communem, competere. In hac enim re tum sapor, tum nigredo, quæ spathulæ ferreæ extractum motitanti inducebatur, tum experimenta cum solutione vitrioli martis facta, conueniunt. Insunt illi præterea partes insigniter amaræ, quæ in gummi latitant; vt pote quam resina, quæ viridis coloris est, insipida omnino sit. Tam arcte inter se hæc duo cohærent, vt alterum alterum in sui consortium trahat. Præualet vero gummosa pars, vnde aquam spirituoso menstruo, si virtus medica quæritur, præstare intelligitur. Præter resinam et gummi insigni terræ copia, eaque maximam eius partem constitente, instructa est. Hæc tamen non ita fixa reperitur, quin in igne abunde aufugeret, quod in

<sup>k)</sup> V. Eliis Bärentraube pag. 19. et 21.

<sup>1)</sup> zweytes Schreiben pag. 17. 19. 22. 23.

in causa est, ut tantillum modo cinerum obtineatur. Subtilior extractis sese iungit, non arctissimo tamen, quod de illo ex stipitibus præsertim valet, connubio. Quam facile enim nexus solui possit, tum, quum extractum ex stipitibus confectum, soluerem, tum quum iufuso spirituoso tartari sal liquefactum instillarem, expertus sum. Pauxillum salis insuper plantam nostram ingreditur. Stipites plus terræ quam folia souent. Odoræ partes in vuam vrsi non cadunt; nihil enim eiusmodi in foliis, neque crudis, neque varia arte mutatis, detegitur. Nec huic iudicio, quod de aqua destillata supra dictum, aduersum esse volo. Meum nimirum modo fuit, quicquid expertus fuerim, candide, et pro officio ingenui viri, indicare.

---

### SECTIO III.

#### VIRTVS VVAE VRSI IN CVRANDIS MORBIS.

##### §. I.

Panditur mihi nunc via ad practicam huius disputationis partem, qua virtutem vuæ vrsi, in calculo ex lotio nato, nec non in aliis morbis debellandis, nouis experimentis, pro re nata collectis, expendere satagam.

Antiquitatem plantæ, quatenus nempe ad medelam adhibita fuerit, si species, ad GALEN<sup>1</sup> vsque tempora regrediendum est, modo coniecturis celebrium quorundam virorum, de quibus supra fusius dixi, subscribere fas sit. Commendat<sup>a</sup> fuam ἄρκου σαφυλῆν in

a) V. GALEN. *de composit. med. sec. locos L. 7. c. 4. p. 548. Tom. 13. Ed. Charter.* Ill. DE HAEN hunc locum recensens eam proportionem constituit, qua libræ vuæ vrsi aquæ sesquilibra adiicitur V. Ei. Rar. med. P. 3. p. 157.

in hæmoptysi, librasque 16 vua vrsi cum aquæ pluuiæ sextariis ad tertias coqui et liquorem expressum seponi iubet. Sed neque ob hanc, neque ob aliam quamcunque in morbis vim, longa annorum intercapedine vua vrsi celebris fuit: vsquedum medici, Monspelii degentes, folia eiusdem hominibus *calculo*, in lotii viis stabulante, laborantibus præscribere inciperent. Quo vero anno seculi nostri hæc virtus, et qua ratione, illis innotuerit, definire non audeo, quum libros, quos horum aliquid meminisse vero simile videtur, peruvoluere mihi non contigerit. Interim ill. LINNÆVS<sup>b</sup> iam anno 1743 ab aliquot annis usum eius Monspelii in ualuisse, et ab ill. SAVVAGESIO probatum, notauit, Minus recte itaque cel. CRANZIUS<sup>c</sup> LINNÆVM, eximiis inuentis alias ditissimum, primum eius in calculum efficaciam perspexisse vel laudasse existimat, vt pote quum generosissimi viri propria verba hisce adversa sint. Vix vero tantum famæ, tamque cito, obtinuisset, nisi ill. DE HAEN,<sup>d</sup> consilio L. Baronis VAN SWIETEN, tam alacriter et sollerter, quid in calculo et ulceribus vias vrinarias afflgentibus valeret, non ratiociniorum ludibrio, sed crebro in ægris experimentis captis, innixus, inquisiuisset; et quos sub usu obseruaret effectus, in publicum commodum, in *ratione sua medendi*, inde ab a. 1756, candide exposuisset. His exemplis alii dein excitati eam ægris, iisdem vitiis affectis, commendare consultum duxerunt.

## §. 2,

Folia in puluere exhibere maxime commune fuit. Hac enim forma tum Monspelienses plerumque medici, tum HAENIUS, unicum inter recensitos casum si eximam, quo decoctum propinavit, præscriperunt. Nauseam in ægris puluerem excitasse non memo-

<sup>b)</sup> V. Progr. ad orat. de telluris habitab. incremento in Amoen. acad. 2. p. 407.

<sup>c)</sup> Mar. med. et chir. Tom. 2. p. 24.

<sup>d)</sup> Rat. med. Tom. 2. p. 160; et eiusd. lettre à un de ses amis, 1763. p. 92.

memorant docti isti viri. Sed ægre istos eundem ferre, ipse expertus sum, et idem ab aliis percepit; licet amarities, secundum meum quidem sensum, non adeo molesta, si haustus aquæ superbibitur, facile vincatur, et in saporem grata dulcem mutetur. Cl. FARION<sup>e</sup> a scrupulo vno ad drachmam vnam præcipiendum eum putat, præscribi tamen solere ad drachmam dimidiā, mane ieiuno ventriculo in sex aut octo dies, dicit. Suadet vero, ut alternis modo diebus in iuscule communi vel in cyatho infusi Theæ aut capillorum veneris &c. sumatur, et diebus ab vsu vacuis cyathus amplius leuis Parietariæ decoctionis, quia vias vrinarias abstergendo excretioni arenæ aut muci viscidi fauere existimat, bibatur. Ill. SAVVAGES<sup>f</sup> dosin solito parciore commendat, dum puluerem ad grana 15 usurpari iubet. Ill. DE HAEN drachmam dimidiā, semel bis vel ter, pro natura mali, per diem ingerendam tum senibus tum infantibus obtulit. Ast in infante bienni a granis 4 incipiens dosin ad gr. 40 sensim auxit. Paregorica, vbi dolor nimis vehemens fuit, subinde simul adhibuit; in diriori malo iniectione olei lini facta. Hac ratione ægri eius vua vrsi per aliquot hebdomades vel menses, prout illud necessitas requirere videretur, vsi sunt. *Infusum* foliorum minus fastidii excitat. Ea vero proportione secundum SAVVAGESIVM<sup>g</sup> optime conficitur, qua pro foliorum drachma vna, aquæ cyathi 2 vel 3 sumantur. Vsum medelæ huius, siue in puluere siue infuso datæ, quotidie per mensis spatium continuari vult; consilium addens, quum exinde vesicæ mucus abraderetur, et dysuria recrudescere posset, vt iusculum, ex herbis emollientibus, refrigerantibus, pullo vel ranis, paratum, sorbeatur, tum præcipue, si puluis eius vel infusum debilius ingratatur. Haud incongruum erit, vuam vrsi cum aliis remediis, aduersus

<sup>e)</sup> BARBEIRAC *medicament. constitutio.* Ed. Iac. FARION T. 1. p. 212.  
Lugd. 1760.

<sup>f)</sup> *Nofolog. method.* T. 3. P. 2. p. 200.  
<sup>g)</sup> loc. cit.

sus calculum proficuis, adiuandi eorum effectum scopo, miscere; cuius rei vero infra exempla afferam.

§. 3.

Quo de vix vrsi vi tanto melius constet, antequam nouos ipse exhibeam casus, ex historiis ill. DE HAEN, quarum 24 circiter nobis sistit, in variis rationis eius medendi tomis dispersas, ea momenta sollicite colligam, quæ de genuino eius pretio certiores nos facere queunt. Aegris illam dedit, et quidem æquali semper euentu, secundo (*Tom. 6. p. 177.*) ad octogesimum vixque ætatis annum (*Tom. 4. p. 253.*) constitutis. Nec vetustas mali inanem illum redidisse, quum in octogenario isto (*l.c.*) per 40 annos durauerit, deprehensa. In maximo ægrorum numero signa, quæ renalis calculi præsentiam (*Tom. 2. p. 170 & Tom. 3. p. 177.*) arguunt, tantum adfuere. Attamen medela et illis proficuum se præsticit, in quibus catheter manifestum calculi vesicæ vrinariæ (*Tom. 3. p. 143. 147. 150 et T. 5. p. 145.*) indicium dedit. Vim suam non vbiique æqualiter promte exseruit. Fuit puer, qui etsi per 4 annos dirissimis doloribus cruciatus, et calculus per catheterem detectus fuit, intra quatriduum maximum leuamen (*Tom. 3. p. 143.*) sensit. Alii vero per 7 menses illa vti (*Tom. 2. p. 164.*) opus fuit. Sunt, quos perfectæ omnino sanitati (*Tom. 2. p. 171. Tom. 3. p. 176. Tom. 4. p. 253, ibid. 265.*) restituit. Quibusdam vero leuamen modo malorum (*Tom. 4. 256. T. 5. p. 145.*) attulit. Singulare quoque est, quod in nonnullis, symptomata quamuis omnia ab vsu eius cessarint, calculus tamen cathetere (*T. 3. p. 151.*) tangi adhuc potuerit. Ad dolores sopiendos paregorica exhibere, oleumque iniicere sæpe, ut dixi, necesse fuit: nihilominus tamen absque hisce adiumentis interdum curationem (*V. l.c.*) absoluere licuit. Subinde incommode sublatis, mucus, quem huius generis ægri excernere solent, manare destitit; quorsum exempla perfecte sanatorum, et aliud pueri (*Tom. 3. p. 146.*) refero; in nonnullis parcius (*Tom. 3. p. 150. T. 5. p. 146.*)

p. 161.) fluxit; ast in aliis, deuictis etiam si ceteris molestiis, persistit. Sæpe etiam accidit, vt, qui sanati credebantur, in vetus malum (T. 2. p. 164. 166. T. 3. p. 144. T. 4. p. 254.) aliquo tempore post iterum inciderent. Quin adeo in quibusdam, vt in illo, qui per 9 menses frustra (T. 6. p. 197.) illam usurpauit, (V. etiam T. id. p. 202. T. 4. p. 255.) inanis reperta fuit. Addi his deberet, quod ægrotorum nemo ex protracto medelæ usu ullum aliud malum enatum esse animaduerterit. Hisce omnibus qui inter se conferendis intentus est, HAENII candorem laudabit, defectus æque ingenue, ac successus remedii, exponentem.

## §. 4.

*Historiae egrorum calculo laborantium.*

Aliorum obseruatione vtrum idem confirmetur, an refellatur, iam patebit.

1. Etenim illustris WERLHOFIVS, pro humanitate et benevolentia sua, qua vix vilum parem habere documentis locupletissimis ipse edoctus sum, a me obseruanter rogatus, quædam mihi de successu uxæ vrsi, quem in praxi sua percepit, perscrispit. Nec vitio, quod spero, mihi vertet, si, quæ ipse mecum litteris beneuole communicauit, ego publici iuris faciam. Defuit eximio viro occasio illam in vesicæ calculo tentandi; siquidem, qui Hannoueræ degunt, ciuibus adeo felices esse contigit, vt hoc malo immunes existant. In dysuria autem ex calculis renum minoribus et fabulo oriunda, conspicuum se leuamen ægris pluries sua vrsi attulisse fatetur. Verum simul me certiorem reddit, se in mictu cruento chronico cum tenesmo et dysuria insigni coniuncto, qui vesicæ vlcus causam habuit, haud ita pridem per aliquot hebdomades quotidie eam quater ad drachmam dimidiam, sed absque villa boni effectus nota, exhibuisse.

2. Quum

2. Quum ill. VOGELIVM eam usurpasse perciperem, petii, ut mihi successum, a se obseruatum, exponeret. Accessit desiderio meo, sequentem historiam benigne enarrans, quam ex relatione eius dein confignaui. Senex, per aliquot dies dysuria vehementissime vexatus opem celeberrimi viri quæsiuit. Ille quicquid suppetiarum ars haberet, adhibere non omisit: sed per 4 dies omnia conamina incassum; ita ut vera ischuria metueretur. Quam ob rem puluerem vuæ vrsi commendauit, cuius cochleare minimum ter de die æger caperet. Tres istas doses vix ille consumserat, quum libere lotium manare inciperet, omniaque sensim integra fieri.

3. Placuit etiam celeberrimo TAVBE, quum mihi plantam recentem mitteret, quædam de suis cum sua vrsi experimentis, in ægris captis, attingere. Inuitatus dein, ut eadem paullo plenius describeret, se plane de foliorum huius plantæ, siue pulueris siue infusi forma sumtorum, contra nephritidem efficacia convictum esse, retulit. Interim non diffitetur, se hucusque illam non solam, sed cum alio quodam remedio, plerumque cum Virga aurea mixtam, præscripsisse. Nempe, quum paroxysmus nephriticus et inde dependentes spasmi cessassent, infusum eius plerisque per 8 vel 10 dies mane ad aliquot libras bibendum dedit. Quod largissime tum lotium, tum mucum cum sabulo et lapillis mouit. Aegris hoc malo affectis infusum extra paroxysmi terminum prophylactice magno emolumento propinatum est. Puluerem, si solus ad drachmam dimidiadatus fuerit, tantam nauseam intra paucos dies creasse animaduertit, ut eam aegri redderent; de cuius vero incommodi culpa infusum absoluit. Ope virgae aureae et vuæ vrsi, quarum vtramque, ad scrupulum 1 mixtam, pro dosi quoquis trihorio in puluere praecepit, dirissima colica nephritica deuicta, aliquot calculos satis insignes expellere peritissimus vir valuit. Addit tamen ingenuæ, multa antea remedia oleosa, mannata, aliaque fuisse subministrata. Refert praeterea, quid cl. Berolinensis Professor, PAL-

LAS,

LAS, cui ante aliquot annos magnam herbae quantitatem transmisit, prescripserit; illum nimirum, quamuis adhibendi eam crebra adfuerit occasio, nullam aliam vim, quam magnum molestiarum nephriticarum leuamen inde percepisse; cui ipse sua experientia fultus cl. TAVBE adsentitur, hanc interim virtutem encomio dignissimam merito censens.

4. Ut denique propriis periculis de efficacia plantæ in calculo certior fierem, ad inuestigandos ægros hoc malo cruciatos nulli operæ pepercí. Verum non nisi in duos, quorum alter extra urbem commoratur, incidi, quum calculus vrinæ viarum rarissimum Gottingæ malum sit, adeo ut ill. et generosiss. ab HALLER<sup>h</sup> se inter 230 cadavera, quæ in theatro academiæ anatomico secuit, duo tantum se vidisse affirmet, in quibus huius generis calculi occurrerint. Refellitur simul cl. LOBBII<sup>i</sup> aliorumque opinio, qui eiusmodi aquas, quæ ahena ad Theam visitata, crusta densa lapidea obducunt, calculi humani generationi fauere suspicantur. Nam ahenis, Gottingæ aquæ decoquendæ dicatis, tantum lapidis huius aquei, idque tam duri, adhærescere solet, ut crebrius ad fabros ærarios mitti debeant, quo malleis crustam excutiant. En vero casus ipsos!

&. Primus æger, quem expiscari mihi contigit, erat vir 45 annorum, staturæ proceræ, habitus gracilis, militiae olim, nunc, per anni circiter spatium, arti pannum æstiuum ex lana contexendi (Camelotveber) deditus. Pater eius calculi plane liber fuit; nec  
vllus

<sup>h)</sup> *Opuscula pathol. p. 70. Obs. 33.* Tanto frequentius autem viro illustri calculi vesicæ felleæ sese obtulerunt. Mirum videbitur, quod hisce tam sëpe præsentibus, calculos vrinæ reperire ita rarum fuerit, quum vtrorumque tamen coniubium adeo crebro alias ab anatomicis obseruatum sit, ut VATERVS exinde caufas vtriusque generis communes esse crederet. V. MORGAGNI opus aureum *de sed. et caus. morbor. Epist. 37. Art. 43. et Epist. 57. Art. 12.*

<sup>i)</sup> *Treatise on dissolvents of the stone, Vers. Lat. Praef. p. 13.*

yllus ex ægri liberis, quorum nouem numerat, morbi huius molestias sensit. Ante 17 annos, quum in Brabantia castris interesset, prima calculi signa percepit. Præter dolores enim, renum et vesicæ regionibus infestos, merum fere sanguinem minxit. Hunc sifstere statim nouit cohortis, cui adscriptus æger erat, chirurgus. Sed intumescere inde coepit abdomen, omnisque lotii excretio supprimi. Remora vero, quæ vrinæ ponebatur, fuit calculus vrethram obturans, quem, quum nullo artificio eximere posset chirurgus, cathetere suo strenua manu retudit, eo quidem successu, ut sub atrocissimo dolore ingens sanguinis intus stagnantis copia prorumperet. Postea abdominis tumor subsedit, ceteraque symptoma mitescere coeperunt. Inde ab illo tempore continuis a calculo molestiis vexatus est, quæ subinde inter profectiones militares dirissime eum affecerunt. Nam vrina vel cruenta fuit, vel mucofa, sedimentum crassum arenosum interdum deponens, nec raro plane ad tempus suppressa, plerumque autem guttatum et cum ardore stillans. Veros quoque lapillos variae magnitudinis sæpe excravit. Aliquando dolor arthriticus<sup>k</sup> tumore iunctus, mox superiorum partium, mox inferiorum articulos occupans et tam vagus, ut a brachio vnius lateris opinione citius ad pedem alterius descendenter, eum valde torcit. Hisce malis interdum stupor pedis insura in primis sensibilis accessit. Ante duos annos meminit se cruciatum atrocissimum perpeccum esse, sub quo post magna conamina demum per vrinæ iter lapillum piso maiorem emolitus est. Multi vero postea calculi fecerunt, quorum mihi 3 attulit.

Maxi-

\*) Calculi et arthritidis affinitatem iam agnouit SYDENHAMVS (*Opera* Lugd. 8. 1742. p. 448.), etiamsi vtriusque materiem eiusdem generis esse affirmare præcise non audeat. Verum ita esse, tum alterui isti articulorum et vrinæ viarum cruciatus (V. HAENII rat. med. Tom. 5. p. 175. sqq.), tum ca'cis vtriusque comparatio, qua quoad colorem, odorem, saporem, analysin chemicam, compagem &c. conuenientia apparet (V. CHEYNE'S *Essay upon the gout*, p. 64.), docent.

Maximus ex his ex crustis variis conflatus erat, pisi magnitudinem æquans, pondere eius vnum modo granum constitue.

Iam pondus doloremque continuum in vtraque lumborum regione percipiebat, sub flexione corporis molestiore, latusque sinistrum præsertim afflagentem. Et quoniam sub laterali situ molestias increscere animaduertit, supino in lecto decubitu vti illi necesse erat. Dolorem quoque sub motu maiorem fieri, et quando sanguinem cum lotio meieret, tensiones dolentes inguinum se pati querebatur. Non minus incommodi rigoris in sinistro crure sensus et stupor circa genu praecipue perceptus pariebat. Lotium mane missum clarum et pallidum erat, in fundo vici mucum album perlucidum gerens, qui defusa vrina tenaciter vitro adhaerebat. Nulla eius cum nitri spiritu ebullitio ciebatur nec violarum syrapi coloris mutatio. Signa hæc sane non obscure calculi renalis præsentiam arguunt. An vero in vesica simul calculus haeserit, incertum manet, quoniam prima catheteris immissione perterritus, in commune emolumentum, vt ille MORANDI<sup>1</sup> aeger, secundum experimentum subire e re sua esse minus iudicabat. Interea occasionem vuam vrsi experiundi commodam censens, quouis mane pulueris foliorum drachmam dimidiā illi sumendam exhibui. Vide, quo successu! Iam 3io die bono effectu gaudebat, mitiorem longe dolorem esse, et liberius crus sinistrum se mouere posse, solito eius sensu redeunte, narrans. Sed 6to, postquam illa vti coepit, die in pubis regione ardorem dirum, per 2 horas durantem, sensit sub mingendo vehementiorem. Longe etiam plus muci, quam solitus est, minxit cum sanguinis leui stillicidio. Quæ tamen incomoda postero die, excepto tantum muco, iterum copioso, pacabantur. Die vero quo dolorem plane abesse, crus sensum suum

om-

1) "Il ne ingeoit pas a propos de se laisser sonder pour le Public." V. Mémoires de l'acad. des sc. année 1740. p. 191.

omnino recuperasse, et utriusque lateri sineulla molestia se in lecto incumbere posse lætabatur. Et hisce induciis per totum fere tempus, quo puluerem sumis, fruitus est, modo, quod cum vrina, quando corpus sub labore validius exercuisset, sanguis postridie vel fluidus vel grumosus, et quidem semper mane modo, proflueret. Motus istam vehementiam, quam muneris ratio illi imponit, veram fuisse huius et ceterorum symptomatum incrementi causam, vel exinde patebit, quod, quum festus dies præcederet, altero die se semper melius haberet. Multis præterea salinis spiculis toto fere tempore vitrum, lotium excipiens, obductum intus vidi. Mucus mox largius mox parcus fluxit, vrinæ riuum plerumque prægrediens. Semel etiam, forsitan, quod pulueres negligentius sumeret, dolorem lancinantem se in vrethra, qui vero succedente lotio mox siluit, questus est.

Quum, muci licet profluuium et vrinæ pallor persisterent, sanitati tamen, post usum puluerum per 6 hebdomades continuatum, restitutus videretur, an firma eadem constansque esset, experiri volui. Vnde per 8 dies pulueris nihil sumeret, auctor fui. Verum vix per 6 dies abfuit, quin rediret opem quæsiturus. Nam recruduere dolores in lumborum et postea in pubis regione et arthritica articulorum incommoda. Minxit vero eodem die sanguinem grumosum copiose et mucum ita tenacem, ut post meridiem ex vitro et si aperturæ satis capacis elabi recusaret; quod et alias passim accidit. Ex novo usu iterum leuamen cepit. Sed dein aliquoties mane lotium apparuit sanguineum, et semel ita album, quod tamen ipse non vidi, ut crederet se vlcus intus habere. Subinde lumborum regio plane non doluit, quum dolor supra pubis ossa vehemens esset. Semel per binos dies adstricta aluo laborauit. Dein puluere per 8 dies, sed me inscio, neglecto, nono regionem renalem sinistram dolor iterum acutissimus infestauit, cui mane tormenta dira cum magna abdominis distensione se adiunixerant, quæ vero multis per aluum secedentibus flatibus cessarunt.

runt. Verum etiam hosce nouos morbi insultus iterum deuicit, ex quo puluerem bis quotidie sumeret, ita ut mingendo ardorem modo leuem perciperet, superstite tamen muco in lotio. Quae-nam posthac valetudinis eius conditio fuerit, dicere nequeo; non enim rediit.

B. Alter, qui mihi sese obtulit, erat horologiorum automatum confector, homo 39 annorum et plurium liberorum pater. Per integros 15 annos calculi indicia senserat, dolorem scilicet in postica vrethræ parte, dum lotium mitteret, ingrauescentem, crebrum sed irritum mingendi conatum, vrinam denique mox cruentam, mox mucosam, et interdum materiam calcaream deponentem. Doluit simul dorsum circa renem sinistrum<sup>m</sup>, ast calculum secedere nunquam vidit. Contra hæc incommoda per totum tempus remedia sed frustra adhibuit. Verum vltimis duobus annis peior eius conditio fuit, ex quo agyrtæ cuiusdam, heic loci satis noti, consilio, quum caput doloret, drasticum remediem sumeret. Et ante aliquot hebdomades sanguinem per pulmonem emisit, quem vero sttit peritia medici, cuius cura ante meam, usus erat. Proximis tribus hebdomadibus nullum quidem sanguinem minxerat, lotio vero copiosum et tenacem mucum deiecerat, dolorem præcipue sub ingressum vrinæ in vrethram et stimulum mingendi inanem perpeccus. Dolor quoque in sinistri renis vicinia, tum in primis, quum diu erectus staret, eum crebro inuasit. Quum hæc signa renalis calculi præsentiam indubiam facerent, pulueres foliorum drachmæ dimidiæ mane ingerendos obtinuit. Catheterem autem reformidans, an vesica eodem vitio laborauerit, incertum reliquit.

Ter-

m) Vterque casus immunitatis, dextro lateri in calculosis concessæ, nouum exemplum affert. Vide hac de re PISONIS Observ. et consil. Ed BOERH. p. 38. et SCHVLZII Diff. de lithiasi, sinistro quam dextro reni magis infesta.

Tertio puluere sumto mane cum vrina multum muci, fabulo copioso mixti, profluxit. Diebus aliquot post omnis in renali re- gione dolor euanuit, et qui ad collum vesicæ molestus fuit, pariter mitescere coepit. Mansit tamen ingratus ille stimulus nec mu- cus in matula vnquam defuit. Vrina etiam subinde sanguine tincta apparuit. Postquam 14 diebus pulueres usurparat, ex eorum per aliquot dies neglectu pristina mala redierunt, ita ut dolor infernæ sedis, post prandium in primis, accedente ventris inflatione, mox tamen cessante, eum valde affligeret. Ad hæc vincenda vterio- rem puluerum usum illi commendauit.

### §. 5.

Casus, quos fautorum benevolentia collegi, tum et isti, quos propria obseruatione prolixius paullo, sed studio deditaque opera, quo inusitatæ medicinæ effectus tanto exactius cognosceretur, de- scriptos præstiti, ad calculum renalem in primis spectant; quapropter, quid in hoc malo valeat, decernere präcipue possum. Nempe dolores inde paullo post mitescere et tandem plane silere coe- perunt, crux cum vrina mistus rarius et parcus, nisi ægri culpa aliter factum, apparuit, fabuli multum profluxit, cruris stupor euanuit; aliaque inde in ægros commoda redundant. Verum breue solatum, quippe quod, cessante vsu, pariter cessauit. Le- nimen igitur modo symptomatum, fomite mali restante, ex allatis saltem historiis, vuam vrsi afferre colligere primum est. Idem SAVVAGESION<sup>n</sup> obuenisse videtur; nam medelam istam minus tu- tam appellat. Cum quo consentit dissertatio academica,<sup>o</sup> quisquis eius auctor fuerit, nuper edita, qua vasorum debilitatem illa qui- dem tolli, alteram causam vero calculi disponentem, nempe glutinosum principium, non tantum non tolli, sed augeri, perhibetur. Cl. GER- HAR-

n) Nosol. method. T. 3. P. 2. p. 200.

o) Diff. de frequentiori ortu calculi rerum et vesicæ eiusque causis, præf. ill. BÜCHNERO, resp. I. F. ACHILLE Hal. 1764.

HARDVS<sup>P</sup> his quoque addendus est. Nec hariolari difficile est, quale remedii genus Vindobenensis Chirurgus ci. PALLVCCI<sup>q</sup> intellexerit, dum contra illos, qui nostro tempore sine sectione calculo mederi se posse arbitrantur, adeo intonet, ipse, ut haud ægre coniicies, lithotomiam exercens, verum ita exercens, ut incommoda curationis FRATRIS COSMI, feliciter tamen toties Viennæ<sup>r</sup> adhibitæ, detegere et sua arte vitare didicerit. HAENIVS denique ipse, ut iam supra indicaui, non diffitetur, varios exstitisse ægros, a reditu mali non satis tutos. Hisce suadet, ut vuam vrsi perpetuo usurpent, quæ sane lex mihi non durior videtur, quam quæ podagricis saponem vel amarissimas plantas per totos annos ingerere iniungit.

### §. 6.

Notari meretur, quod in ægris meis tum, quum calculi molestiæ quiescerent, tum reduce mali sensu, (de lotii pallore iam non loquar) mucus stillare pergeret. Quæstio igitur nascitur, an, quo usque ille appareat, nihil veri præsidii sperandum sit? Haud incommode ille cum narium muco vel ouorum albumine comparatur, si ad eius consistentiam, quam vocant, colorem et perluciditatem, tantum respiciatur. Sed glutinantem vim hisce communem in mucum istum non cadere leui experimento constat. Nam quum supra chartam bibulam aëre libero illum siccarem, fluido ablato, materia calcis instar alba, leuiter modo cohærens, splendescens, quasi ex meris crystallis constaret, et ad attactum sabuli minimi instar dura, remansit, quæ nec in aqua nec nitri spiritu solui poterat. Carboni iniecta foetorem pilorum combustorum instar sparsit, cineribus

p) Bärentraube, pag. 66. sqq.

q) Lettre sur la cure de la Pierre, Vienne 1764.

r) HAENII R. m. T. 6. pag. 175. sq.

s) Cfr. HAENII experimenta cum muco hoc facta in R. m. T. 5. p. 172. et T. 6. p. 233. sq.

bus brunis residuis, qui digitis prehensi, calcem descriptam et duritie et splendore referebant. Eadem videtur esse materies, quam BOERHAAVIVS<sup>t</sup> in vitreis suis vasis cylindricis, quibus vrinam sani hominis, eamque tempestive captam, immisit, animaduertit. Post tertiam horæ partem lotium microscopii ope examinatum, flocculentum apparuit, tum aliquid materiæ albescens visum est. Postea strata pinguia, illis ex spiritus vini cum aqua miscela non absimilia, celeb. vir confpexit, quæ in nubeculas sensim sensimque densiores mutata sunt, vnde tandem verus emersit calculus. Eximium sane experimentum, quo ad generationem calculi explicandam vix aliud existit aptius. Non solum enim exinde, qua ratione vrina pedetentim calculosam materiam deponat, sed sanissimæ quoque vrinæ istam inesse, quæ vero non nisi quiete, quam partium lotio dicatarum debilitas parit, vt ibi vitrorum quiete accedit, vel solidiori quadam molecula oblata, quod rarius tamen fieri videtur, colligitur et coadunatur, disci potest. Hunc mucum HALLERV<sup>u</sup>s, dum renes incideret, in cadaueribus aliquoties offendit, comparans illum cum rudimentis crustarum arteriosarum, et stamina rerum calculi prima continere suspicatur. In plerisque etiam HAENIVS<sup>x</sup> calculo laborantibus eum reperit, et si pauci quidam eiusdem immunes fuerunt, et quum illum siccaret, semper in calcem transisse obseruauit.<sup>y</sup> Et mirum est, quod de homine, cui sectione calculus extractus fuit, narrat, gluten nempe, labiis vulneris adhærens, intra 24 horas in veros calculos concreuisse.<sup>z</sup> Hoc omnia videntur gluten istud constans calculi latentis indicium arguere. Nihilominus tamen dispiciendum esse puto, an mucus siccatus calcem vbiuis relinquat, quam interdum vel omnino defecisse,

t) *Prælect. de calculo in consultat. med. Vol. 2. p. 143. Ed. Gotting.*

u) *Opusc. patbol. Obs. 34.*

x) *R. m. T. 5. p. 172.*

y) *I. c. Tom. 6. p. 235.*

z) *I. c. p. 207.*

cisse,<sup>a</sup> vel parciori tantum copia adfuisse,<sup>b</sup> legitur. Nam, quoniam naturale gluten, quod interna caua lubrica reddit eaque ab iniuriis defendit, adeo nonnunquam copia crescit, ut morbosum fiat; unde, pro varia mali sede, catarrhum, vomitus et deiectiones pituitofas, quorsum pituitæ veteribus vitreæ dictæ secessus pertinet, aliaque mala creat: quidni igitur nonnunquam præter calculi suspicione idem in lotii viis fieret? Mixtus autem particulis istis calcaris si mucus occurrat, calculum iam intus delitescere, vel glutine commodo, quo inter se coadunentur, accedente, fore, ut in veros calculos compingantur, vero simile est. Tantæ illas duritie esse, quidam experti sunt, ut hac in re ipsi adamanti non cederent, et iisdem, pulueris huius gemmæ instar, vitrum poliri posset.<sup>c</sup> De singulari earum duritie meum etiam cum nitri spiritu experimentum testatur.

## §. 7.

Fuisse quosdam, qui vua vrsi adhibita omnino a calculo conuoluere, HAENII experimenta confirmant, quorum successum adeo lætum, ut cl. eorum auctor narrat, exstisset, et si cum illis a me allatis non plane hac in re conueniunt, in dubium vocare nolo. Et illa certe remedia, quæ calculi, dum ad notabilem iam magnitudinem peruenit, nexus plane destruere valent, et ut fabuli minimi forma foras eliminetur, idoneum reddunt, quæ vis, an plantæ nostræ, vel vlli alii medelæ competat, iam non disquiram, ceteris antistant, quæ symptomatibus modo demulcendis paria sunt.

Sed

a) BONETVS medici meminit, qui lotium hominis omnibus notis, confirmante id etiam sectione post mortem, calculosi, sollicite per colum transmittens, nihil tamen in muco arenosi reperit. V. ei. Sepulchret. L. 3. sect. 23. Obs. 9.

b) HAENII R. m. l. c. p. 235.

c) BLACKMORE *Dissertations on a Dropsey, a Tympany, the Jaundice, the Stone, and a Diabetes*, p. 158.

Sed demus, posteriorem tantum virtutem, vero calculo præsente, dolorem in primis sedando, vuam vrsi exferere; præterea autem, si fabuli forma in renibus latet, ad hocce expellendum<sup>d</sup> commodam esse, (quod vtrumque emolumentum tribui illi historiarum enarratarum vi potest) quantis laudibus non est prædicanda; et quorū in casibus sectioni non est præferenda!

## §. 8.

Aegri calculo affecti nihil aliud appetunt, quam vt cruciati-bus, quibus torquentur, liberi euadant. Dum vero vua vrsi dolorem, qui in ipsa calculi sede obtinet, soplit, omnes simul turbas, a consensu neruorum in remotioribus partibus oriundas,<sup>e</sup> pacat. - - Attamen ipsa mali causa manet? - - Manet. Verum tot exempla exstant hominum, in quibus post mortem calculi, iisque maxime insignes reperti, quorum nulla plane per vitam suspicio<sup>f</sup> fuit, et aliorum, per intervalla modo calculosis affectibus infestatorum: ita vt non tam calculi moli, quam irritationi inductæ agmen illud malorum tribuendum esse credas. Erit interim aliqua tum magnitudinis calculi, tum figuræ eius, tum loci, quem occupat, habenda ratio. Dein sectionis incommoda nobis ante oculos sistamus. Nostro quamvis tempore lithotomia adeo exculta sit, vt ad hanc artem vix perfectionis aliquid accedere posse videatur: omnium tamen virorum in illa exercitatorum, nisi nimis gloriose de se sentiant, testimonio, tam ob vitæ periculum<sup>g</sup> quam ob alia

- d) Adsentitur FARION in Barbeirac. medicam. constitut. P. 1. p. 212.
- e) V. L. B. V. SWIETEN Comment. ad Boerb. Apb. Tom. 3. p. 229 et 236. Ed. Hildb.
- f) MORGAGNI de sed. et caus. morb. Epist. 42. art. 10. BONETI Sepulchr. L. 3. Sect. 22. Obs. 24.
- g) Ita cl. ACREL, in hac quoque arte versatissimus, et si sectionem sollertissime peregerat, ægrum intra 38 horas, ex gangræna partium, mortuum vidiit, cuius nullam aliam causam, quam commercium cum ægris, empymate laborantibus, et quodam mercurium usurpante, indagare potuit. V. eius Chirurgiske Händelser, p. 225. sq.

alia vitia, quæ sœpe creat, et doloris tormenta, curatio est, ad quam, vt cum CELSO loquar, nonnisi vbi vltima experiri statutum est, confugere liceat. Senes in primis sub eadem periclitari obseruatum est: nonne igitur præstat vitam hinc vua vrsi tolerabilem reddere, quam mortem, sponte iam celeri gradu accurrentem, sectione citare velle? Nec in magna partium corruptela, nec quoquis anni tempore sectio æque tuta reperta est.<sup>h</sup> Sœpe scirrus vesicæ vel caruncula<sup>i</sup> et tumores extra illam in propinquis partibus nati,<sup>k</sup> medentibus imponunt, vt ad veros calculos catheterem allidere existiment. Contra ea, calculo vere præsente, nonnumquam muco ille nimio obducitur<sup>l</sup> vel cryptis<sup>m</sup> vesicæ morbosisis se abscondit, vel vesica tam contracta est,<sup>n</sup> vt catheter intrudi nequeat; quibus casibus ab instrumento isto nihil certi indicii, et consequenter nihil a sectione auxilii, peti potest. Sunt et causæ, quæ, licet calculus cathetere indagetur, eximere eum prohibent. Quis enim audet calculos, ad libram vsque supraque ponderosos, spe vitæ superstitis emoliri?<sup>o</sup> Sic calculus, si cum vesica cohæret,

<sup>h)</sup> Hæc tamen cl. PALLVCCI vilipendit, ex quo ægrum, qui multum puris tam vrethra, quam alio eiecerat, ipsis diebus canicularibus optimo euentu sectione sanauit. V. eius *lettres* p. 88 et 89.

<sup>i)</sup> RVYSCH *Theat. Anat.* 2. *Tab.* 2. *fig.* 1.

<sup>k)</sup> HAENII *rat. med.* T. 3. p. 161.

<sup>l)</sup> MORGAGNI *l. c. Ep.* 42. *Art.* 15. et 16.

<sup>m)</sup> Quomodo hæc nasci queaut, ex obseruatione ill. HALLERI (*Op. path. Obs.* 36.) iudicare licet.

<sup>n)</sup> MORGAGNI *l. c. Ep.* 20. 28.

<sup>o)</sup> Cuius generis sunt ille 19, et aliis supra 25 vnc., quos GROENEVELTIVS delineatos sistit in *Diss. lithol.* p. 34. et 67. GARDENIVS in *Philos. Transactions abridged Vol.* 3. p. 150. meminit calculi 32 vnc. Imo ROBINSON in *treatise of the gravel and stone* p. 86. Parisiis calculum 51 vnc. se vidisse testatur. Cfr. BONET. *Sepulchr. L.* 3. *Sect.* 23. *Obs.* 1. *sqq.*

ret, p. siue quod intra eius tunicas, dum ex vreteribus descendere, fauente horum directione, irreperserit, siue quod sauciata vesica illi accreuerit, siue quod mucus circa calculum in rugis vesicæ latens induruerit, siue quod ipsius vesicæ pars se circa calculum constringerit, q. sacculumque effecerit, sectionem non admitit. Nec minus a sectione deterrere potest, quod ter, quater, quinquies<sup>r</sup> illam repetere interdum opus fuerit. Regeret tamen PALLVCCI<sup>s</sup> necessitatem hanc duram non tam a malo corporis habitu, quam fracto ad ossium pubis arcum calculo, (de curatione FR. COSMI loquitur) relictis fragmentis quibusdam, profectam esse. Tandem etiam tum vua vrsi conferet, quando æger sectioni submittendus est, quum nimirum a lithotomo remotis, ad eum veniendi, moram aliisque, commodam tempestatem eligendi, occasionem concedat.

## §. 9.

Postquam hucusque, quanta commoda vuæ vrsi ysu exinde, quod symptomata leniat, emergant, ostendi: iam quanti ob vim, qua in eiiendo sabulo pollet, facienda, expendam. Sed de illo tantum, quod in renibus latet, dico, vtpote quum eodem modo ægri, quos adduxi, laborauerint. Nolo equidem calculi cuiusvis incunabula in renibus querere, sed sæpiissime ibidem nasci, et dein in vesicam deuolui, historiae medicæ exponunt. In hisce vero non semper verum lapidem constituit, sed arenæ forma, vt vrina indicat,

- p) Huc referri dignus est casus, a cl. WÄHLIN in *Kgl. Verensk. Acad. Handlins-*  
gar a. 1761. p. 380. addita icona descriptus, quem doctis notis cl. ROL.  
MARTIN et cl. OL. ACREL illustrarunt. Cohæsiones eiusmodi veræ  
obseruationis fulero niti PLATNERVS in *Diss. de calculo ad vesicam ad-*  
*bærescente numerosis exemplis demonstravit. Et quanto periculo sectio-*  
*tum coniuncta sit, vel vuicus a TVLPIO (Obser. med. L. 3. c. 5.) allega-*  
*tus casus docet.*
- q) Memorabile eiusmodi constrictionis exemplum suppeditat cel. MECKEL in  
*Histoire de l'ac. des scienc. de Berlin, 1754. p. 103. sq.*
- r) V. casus collecti in PLATNERI *Chir. p. 961.*
- s) *Lettre p. 39. sqq.*

cat, sine magno saepe aegri incommodo, plerumque adest. Ast semper verendum est, ne particulae istae, glutine vnitae, in magnum olim lapidem coëant. Consentit HOLLERIVS<sup>t</sup> aliique. Et calculorum, qui murales (Pierres murales) vocantur, structura, quorum iam aliquem coram habeo, idem confirmat. In hoc enim circa nucleus pyriformem innumeram calculosarum particularum, glutine albidiōri, instar laterum muris insidentium, coagmentatarum congeriem conspicio. Tanto plus vero periculi ex hoc sabulo in renibus stagnante nascitur, quum si in calculum, renibus impavidum et diram nephritidem causantem, concreuerit, illum nonnisi quando abscessus in lumbis ortus sit, nephrotomia eximere haud facile aliquis audeat: vt igitur illis, qui renibus calculum fouent, peius adhuc, quam qui vesicæ calculo laborant, consultum esse, appareat.

## §. 10.

Sed quomodo hæc commoda vua vrsi calculosis conciliat? Subridentes intueri WERLHOFIOS, TRALLESIOS, ROSENIOS, HAENIOS, mihi videor, quoties ingeniose istas in museo contextas virium medicamentorum explicaciones perlustrant, quibus quidam adeo delectantur, vt eo sapientiores se esse credant, quo magis in hac arte calleant. Mihi sufficiat, quid Peruianus cortex agat, scire, si quomodo agat, natura mihi patefacere detrectet. Sic quoque allatis de effectu plantæ momentis lubens acquiescerem, nisi, quid in calculi molestiis non efficiat, verius, quam quid præstet, indicare possem?

## §. 11.

t) "Cur igitur, inquit, multi arenas mingunt, neque calculosi sunt? Causa in promptu est. Non enim coguntur, nisi viscido aliquo et crudo humore, tanquam glutine. Opus est tempore." V. de morbis internis Lib. 1, p. 2. fol. 222. Lugd. 1578.

## §. II.

An soluendo calculum prodest? calculi molem vua vrsi non quidem minui, sed lapides granulatos friabiles in minora fragmenta, glutine soluto disrumpi, SAVVAGESIVS ait. De utilitate experimentorum LOBBII, HALESI, HARTLEII, MORANDI, STAECHELINI aliorumque cum variis liquidis, quibus calculos immerserunt, factorum, persuasus, diversæ compagis calculos vrinarios decocto vuæ vrsi saturato immisi, quum sperarem fore, ut si plantæ vis soluendi inesset, hæcce hac se ratione proderet.

1. Calculum vnc. 3 et drachm. 6, qui ex genere muralium, quos vocant, licet aliquo loco cortice externe obductis videretur, et tam durus erat, ut post repetitos mallei icts dissiliret, diffregi, eiusque fragmentum drachm. 1 et gr. 35, versus centrum nonnihil friabile, in decocti saturati libram dimid. inieci, et in fenestram se posui. Mox, haud violenter tamen, proruperunt bullæ, calculo adhaerentes. Postero iam die corticis externi aliqua pars deradi potuit, quod aliquot dies post adhuc melius succedebat. Sed per 5 supraque hebdomades quamuis in decocto fragmentum fuisset, interna tamen eius latera nullo modo molliora facta erant.

2. Alter lapis, quem ab ægro, supra memorato, obtinueram, ex crustis sibi impositis constitit, externe lœuis, aliquot locis detritus, et gr. 1. pendens. Immerso illo in decocti vnc.  $1\frac{1}{2}$ , ut ante, numerosæ bullæ prodierunt. Quatuor dies post crustam externalam durissimam reperi, sed nucleus molliorem. Sex fere hebdomadibus exactis, pristinam quidem molem adhuc seruabat, verum, fortius digitis compressus, in multa minora fragmenta comminuebatur.

Ne vero mihi obiiciatur, quod liquido tantum frigido usus fuerim, reliqua experimenta ignis ope, calorem animalem, quantum fieri potuit, æmulantis, peregi.

3. Quam-

3. Quamobrem fragmentum ex maiori isto lapide desumtum, ponderis gr. 25, in quo externæ superficie parum modo supererat, cum decocti vvae vrsi vnc. 2 $\frac{1}{2}$  digestioni in arena commisi. Postridie extus vngue aliquid deradi potuit, intus vero nihil. Sed 8 dies post, quum calculum eximerem, vbius haud ægre in frustula minora se decerpere sicut, quorum quædam, nucleo proxima, inter digitos, omnino fere conterebantur.

4. Alio tempore calculum pond. gr. 11 nucleus albidiorem intus continentem, at tam durum, ut in vitro lineas incideret, figuram insuper vrethrae, per quam transferat, mentientem, decocti vnciis 2 $\frac{1}{2}$  immisi. Nullae builae surrexerunt. Nec per 3 hebdomades, quibus liquido immersus iacuit, ullum solutionis indicium animaduerti.

Liquet ex hisce, vnam vrsi soluendi virtute orbam esse; quod etiam ex cito eius in calculosis auxilio et catheteris indagine eruire licet. Etiamsi enim quidam calculi friabiliores euaserint: hoc tutius tamen aquae soli, quam plantae admistis partibus, tribuitur. Hanc aquae communis in calculo soluendo potestatem, quam LOBIVS,<sup>y</sup> nonnisi sub maximo aquae ebullientis calore agnoscit, multi suis experimentis<sup>z</sup> vindicant. Quoniam vero hoc non de qualibet aqua locum habet,<sup>a</sup> ipse aquam, ad experimenta adhibitam, explorauit. Nempe fragmento calculi maioris, ponderis drachm. 1 et gr. 54, aquae fontanae libra  $\frac{1}{2}$  infusa, vitrum arenæ, digestionis causa, imposui. Postridie aqua nonnihil turbida fuit, et calculus extus aliquantum mollior. Diebus sequentibus externe superficies calce quasi

y) *Dissolvents of the Stone, Vers. Lat. p. 42. et 158.*

z) HARTLEY *Diff. epist. de lithontriptico* I. STEPHENS p. 47. STAECHELIN *Epist. eucharist. p. 28. 32. 35. LITTRÉ Memor. de l'ac. d. sc. 1720. p. 436. HALS Hæmostatique p. 177,*

a) *Mem. de l'ac. d. sc. a. cit. p. 23. sq.*

quasi porosa obductae<sup>b</sup> praesertim in lateribus fractis apparuerunt, quae ad attactum, laminarum figura, secedebant. Calculus substratus vero, quum post 8 dies eximeretur, ut ante durus tuit, excepta parte nucleo proxima, vbi mollior; et aqua supra stagnans valde foetuit. Siccatum dein et ponderatum, gr. 4 sui ponderis perdidisse, et alio tempore, postquam per 14 dies supraque iterum in digestione stetisset, dispendium gr. 12 eum passum esse reperi.

## §. 12.

An vua vrsi vi pollet mucum in lotii viis alliciendi, prout gustata saliuam in ore aduocat, et, dum ille se calculo interponat, iniurias parti vicinae illatas, expiat? Non omnino ita sentire absolum esset, si, quod quidam volunt, mucum in calculosis, vua vrsi ingesta, copiosius manare, et quidem sine calcis miscela, verum esset. Iure etiam ill. DE HAEN<sup>c</sup> eam ob causam hanc plantae vim denegat, quod, doloris etiamsi leuamen mucus ægro conciliaret, ponderis tamen sensum auferre non posset.

## §. 13.

Plurimi, qui plantae, vt calculi remedii, meminerunt, adstrictione sua efficacem esse coniiciunt, inter quos celeberrimos viros LINNAEVM,<sup>d</sup> VOGELIVM,<sup>e</sup> et CRANZIVM<sup>f</sup> referas. Cl. GERHARDVS<sup>g</sup> autem, et auctor dissertationis Halensis supra allegatae, dubium nullum hac de re admittunt. Probabilem sane hanc sententiam, tum vehemens adstrictionis sensus in lingua, tam experientia, quae medicaminum adstringentium in calculo pellendo usum extollit,

b) Idem huic lapidi, qui ex muralium genere fuit, quod antiquis muris, accedit, vt scilicet moleculæ ipsæ potius, quam gluten, quo coadunatae fuerant, soluerentur.

c) R. m. T. 3. p. 156.

d) Amoen. acad. T. 2. p. 408.

e) Mater. med. p. 128.

f) Mat. med. et chir. P. 2. p. 24.

g) Libro sæpe cit. a pag. 48.

tollit, reddunt, Nec est, ut quis adstringentibus calculum figi potius, quam propelli, metuat, quum, prout cadauerum sectiones innuant, viae vrinariae plerumque in calculosis valde laxae et debiles sint, et virtutem horum medicamentorum in maturando partu, et pellendis adeo mensibus,<sup>h</sup> obseruemus. Neque vua vrsi sistit, sed accelerat saliualem riuum. De his autem remediis generatim differere fusius, vix opus est, quum doctissime totam rem HEVCHERVS<sup>i</sup> singulari dissertatione complexus sit. Evidem amaritiem istam insignem, quae plantae nostrae inest, pariter in censem trahi debere existimo, tanto magis, quoniam remedia, in quibus amaritudinis sensus adstringione manifeste superior est, e.gr. Absinthium, Gentiana, Trifolium fibrinum, Acmella, Virga aurea, tantopere inter medicamenta, quae calculosis prospiciunt, emineant. Eminere quoque amara in podagra, malo maxime calculo affine, compertum est. Amaris vulgo vis saponacea adscribitur: licetne igitur emollitionem quandam saltem in externo calculi cortice assumere? Nihil eiusmodi experimenta extra humanum corpus facta confirmant: an vero in corpore nostro aliter fiat, nescio. Erunt forsitan, qui tum austeras partes, tum amaras iunctim in id vnum collimare putant, ut tonum fibrarum amissum restituant. Quicquid sit, comprehendere animo non possum, quomodo doloris tam celere leuamen praestet, quod ab aliis adstringentibus propulso modo calculo, nec saepe sine magno cruciatu prægresso, redimi solet. Definire hoc quibusdam haud difficile videtur, dum nimirum vuæ vrsi, ut adstringentibus generatim,

vim

b) Huius loci casus est notatu dignus feminæ melancholicæ, balneo frigido satnatæ, cui, quum adhuc in aqua commoraretur, menstruus sanguis, diu antea retentus, copiose prorupit. V. cel. MYZELL med. u. chir. Vabrenhmungen, zweyte Samml. 1764. p. 56. Quantum vero spei in ipso calculo ex balneo frigido concipi queat, ex propria experientia, in sua de balneis frigidis commentatione, Tal om kalla Bad i gemen, och Loka Badningar i synnerhet 1764. 8. cel. BERGIVS ostendit.

i) Diff. de calculo per adstringentia pellendo, Vitenb. 1711.

vim solidas partes contrahendi et naturale gluten spissandi adseri-  
bunt, vnde fibrarum soliditatem, elasticitatem, irritabilitatem, sen-  
sibilitatem, vasorum amplitudinem mutari, et nescio quid, fieri  
putant. Verum hæc omnia me non rite capere, ingenuus fateor.  
Si sensibilitas et irritabilitas in partibus, quos calculus infestat, immi-  
nueretur, quidni idem in aliis fieret? Aegrorum vero non prosterni-  
tur ciborum cupiditas, sed erigitur, non stringitur alius, sed laxa ma-  
net, non torpet arteriarum ictus, sed viget. Viget etiam animi tere-  
nitas, rubet facies, integra manent omnia. Nollem igitur (iam ill.  
BVCHNERI<sup>k</sup> verbis vtor) vua vrsi actionem in calculo ab imminu-  
ta partium irritabilitate deducere.

## §. 14.

Frustra itaque aliquid damni ab vua vrsi metui, sponte iam patet.  
Nec tanta copia sumitur, ut nocere posset. Ne calculi sedes constrin-  
gendo, eum firmet et immobilem reddat, non veretur, qui multum  
virium antequam ad destinata loca perueniat, amitti perpendit. Ama-  
rities insuper, quicquid mali ex vsu continuato resultare posset, im-  
pedire videtur.

## §. 15.

Coniecturis quoque longius progredi, et ad alias morbos plantæ  
vsum exigere, proclive iam erit, ad istos quippe omnes, in quibus ad-  
stringentia remedia et amara conferre experientia docuit. Nam quid  
in ultimis elementis corrigendum sit, cogitatione me assequi haud  
posse non diffiteor. Adstringentia nouimus laxitati partium succur-  
rere, amara autem, præter istam virtutem, fluidas partes balsami in-  
star condire, et ubi spissitudine quadam coierunt, hanc bilis instar re-  
soluere. Superuacaneum igitur dicens, morborum, quibus debellan-  
dis forsitan par esset, longam tabulam exhibere, eos modo indicabo,  
quos vere sanasse deprehensa est.

III.

k) *Diff. de destructa partium irritabilitate per incongruum adstringentium vsum,*  
*resp. I. V. KOEHLER 1763. p. 24.*

III. DE HAEN commodam illam in *ulceribus* (V. e. g. *Rat. med.* T. 2 p. 163, 166.) partium lotio vel secernendo vel transferendo dicatarum, ut et vicinarum e. c. scroti, declarat; neque tum modo, quando calculi præsentis iusta suspicio adfuit, sed ista quoque deficiente (T. 4. p. 253.). Successu, quem in harum partium ulceribus vidit, inductus etiam in alio quocunque viscerum ulcerare, non spennen- di tote usus sperauit (Tom. 4. p. 258.): sed experimentorum euen- tum nobis adhuc non exposuit. Cl. HASENÖHFLIV<sup>M</sup><sup>1</sup> vero per- peram eam in homine, phthisi laborante, aliquando usurpasse, legi- tur. Hinc addas, quod HAENIVS *dysuriam* et *stranguriam* (l. c. p. 261.), etiamsi citra calculum, perpeñis, pariter eadem consuluerit.

Insignem eius effectum in femina 46 annorum, *leucorrhœa* labo- rante, egomet expertus sum. Etenim per 6 annos, quibus vidua vi- xit, naturalis excretio nimis copiosa, et quod secessit, vel obscure ru- brum crassumque, vel albidum s. viride foetensque fuit. Iam ultra hebdomadem eodem vitio affecta, tantum sanguinis profuderat, ut ad cantharim ensuram iacturam aestimaret, ceteris memoratis incommo- dis denique se sociantibus. Vnde dispendium magnum virium et cre- bra animi deliquia passa est. Habitus corporis euasit cacoehymicus, appetitus cibi deletus, somnus turbulentus et tremoribus interruptus. Pilulis purgantibus semel præmissis, 6 doses pulueris vuæ vrsi drachmæ dimid. illi exhibui, quarum 2 de die sumeret. Mirari dein oportuit, quod adeo cito et tam parua pulueris copia iuuaretur. Nam paullo post cessasse fluxum cibique cupiditatem rediisse narravit. Co- lor faciei sanus et subrubellus simul rediit. Hoc igitur auxilio con- tenta tum purgantis remedii, tum vuæ vrsi usum, quem suaseram, continuare recusauit.

In *febre tertiana* illam semel præscripsi. Afflictus ea erat iuue- nis, qui emetico et venæ sectione, qua sanguis lardosus apparuit,

fru-

1) *V. Obs. Anat. 10. in. bistoria morb. epid. s. febris perech.* p. 69. 1760.

frustra administratis, et paroxysmo febris ter reuerso, meum consilium implorauit. Aluo conueniente medela soluta, vuam vrsi eadem lege, qua cortex Peruianus, usurpandam dedi. Verum quater nihilominus febris eadem vehementia reuertit, et si pars culpæ ægri neglectui tribuenda sit. Quare Chinchinam substituere necesse fuit, quæ tamen nonnisi nouo iterum paroxysmo ingruente desideratam opem præsttit.

Cl. GERHARDVS<sup>m</sup> prout hunc morbum, ita affectiones cacheticas et hydropicas, febres catarrhales, quum carpi pulsatio torpere insigniter inciperet, imo gangrenam ipsam (vtinam quasdam ægritudinum historias addidisset) se eadem sanasse narrat. Cortici Peuiano igitur illam æquiparare non dubitat. Nolle, quod in alterius remedii locum substitui quodammodo possit, pro eodem habere. Chemicis momentis innixus hunc eidem delatum honorem cl. MODELIVS<sup>n</sup> limitauit. Sed restringet adhuc magis, ni fallor, experimentorum, in ægris capiendorum, crebitas.

### §. 16.

Remedii tamen nomine, si quod vnquam, vua vrsi digna est, digna, quæ vbiuis in pharmacopolia recepta, medicorum formulas, explosa inertium farragine, crebro, in salutis ægrorum haud lubricam spem, ingrediatur.

### Sectio

<sup>m)</sup> l. c. p. 67. et 56.

<sup>n)</sup> Zweytes Schreiben - - p. 19.

## SECTIO IV.

## VSVS VVAE VRSI OECONOMICVS.

**N**on minoris vero pretii vua vrsi habenda, si ad usum, quem in oeconomia præstat, attendas, quem paucis adhuc libari non iucundum erit.

## §. 1.

Ruber licet color, qui baccis competit, ad gustandas istas facile inuitet, vix tamen ob fatuam farinam, quam continent, nisi fame valde urgente, crudæ, in cibum cedent. In annonæ caritate commodius, notante Equ. A LINNE<sup>a</sup>, prægressa siccatione, in panem redactæ comedì poterunt. Alias autibus, quæ eas valde appetunt, in escam relinquendæ.

## §. 2.

Quos Nicotianæ fumum haurire delectat, habent, cur Americanis gratias agant, quod, quum plantam illis dederint, ad fallendas molestas temporis moras adeo eximiam, aliam quoque, ut gratius iucundiusque eadem fallerent, detexerunt. Nam ante 20, et quod excedit, annos, herba quædam sub nomine Iackashapuck Londinum ex septentrionali Americes plaga translata fuit, quæ nicotianæ admista, sapidiorem et delicatiorem eam reddere dicebatur, usu laudem eius apud Anglos quoque comprobante. LINNAEVS tam barbara voce percitus, mox illam ex Anglia sibi mittendam curabat, qua aspecta, vuæ vrsi folia esse statim apparuit. Odorem foliorum et saporem haud ingratum esse, si tabaco miscetur, ipse ill. vir expertus est. Et quum adstringendi vi excellat, ductus saliuales nonnihil roborari, si diu adhibetur, et saliuæ affluxum minui, existimat.<sup>b</sup>

## §. 3.

Inter plantas tinctorias pariter locum non infimum, saltim in Suecia, obtinuit. Alumine enim coctam griseo colore, vitrioli vero ope, nigro,

a) Amoenit. acad. Vol. 3. p. 86.

b) V. Kgl. Vetensk. Acad. Handlingar 1743. p. 292. sqq.

nigro, laneas merces illam imbuere, compertum est. Quid ad posteriorem valeat, cl. HARALDVS VRLANDER<sup>c</sup> in primis abunde declarauit, qui incommodis, quæ in vulgari modo lanæ nigredinem delicatiorem, Hæmatoxyli campechiani auxilio, inducendi occurunt, descriptis, solam vuae vrsi herbam, omisso sumtuoso isto et exotico ligno, præstantissimum colorem nigrum, castoreum ab arte peritis dictum, impertire, consilio patriæ beneuolo, ostendit.

## §. 4.

Nescio vero, annon pluribus fortassis laudibus ob utilitatem, quam cerdones in subigendis et parandis coriis inde petunt, cumulanda. Multum omnino regionis interest, ut syluarum merita habeatur cura, ne in tanta ligni consumtione, quam quotidiana indigentia sibi vindicat, pretioso isto naturæ munere vel nosmet ipsis vel posteri nostri destituantur. Vnde vix ullam rem ardentius ciuibus suis, quam syluarum culturam commendare solet, quæ Stockholmiae flore suo viger, R. scientiarum academia, non tam suæ, quam venturæ ætatis<sup>d</sup> commodis, intenta. Haud exiguum arborum numerum, earundemque pretiosissimarum fere, quercus nempe præfertim et betulæ, ars coriaria extirpat,<sup>e</sup> quum tamen inter herbas vulgatissimas, et vix in alias commoditates vocatas, larga seges profet, quæ corticis harum arborum vices apte supplere posset. Multus in hisce stirpibus colligendis et designandis fuit cel. GLEDITSCHIUS,<sup>f</sup> qui et nobis harum cha-

c) Kgl. Svensk. Vet. Acad. Handl. År 1753. p. 123. sqq. Cfr. LINNAEI Ölandska resa, p. 10. et Wästgöta resa p. no.

d) För efterkommande.

e) Digna igitur altiori scrutinio erat questio, a societate R. scient. Gott. a. 1753 et 54 proposita, annon in hunc finem arborum corticibus alia quedam substitui possent. V. Gött. Anzeig. 1753. p. 1251 et 1754, p. 844. Idem momentum pars questionis est, quam academia scient. Succ. in annum 1766 denuo exhibuit, quum desiderio eius nondum plane satisfactum fuerit. V. Svar på frågan om Ekar och andra Löf-träd kunna, utan fara för röta eller Mask, barkas, förr än de fällas? &c. 1763, in Präf.

charakteres tam experimentis chemicis, quam leui doméstico superstructos indicauit. Igne enim eaēdem partes, quae ex arbore Rhus Sumach dicta, Gallis variisque corticibus, euoluuntur, fixae nimirum, terreæ, gummosae, aut resinoso-gummosae, quibus interdum aliquid volatilis se adiungit. Puluis vero, vel decoctum earum in miscela soluti aqua martis vitrioli colorem vel rubrum, vel caeruleum, vel plane nigrum creat. Secundum haec criteria, nemo erit, qui vua vrsi coriariam vim, vt experimenta superius allata testantur, denegabit. Plurimae ex plantarum bicornium classe, cui ista adscripta est, eadem virtute pollere videntur, quarum Ledum palustre, cuius oleo cum Betulae cortice corium Russicum odorem suum debet, eminet. Praeter hoc ex eadem classe Myrtillum et Vitis idaeam in tabula sua cl. GLEDITSCHIUS recenset. Et in actis académiae scient. Parisiensis Erica vulgaris eodem fine valde laudatur. Quamobrem Sueciam dudum vua vrsi in pretio fuit, ita vt, Stockholmiam magna copia missa, a coriariis copiose coemita sit, etiam adhuc in patria ideo usitatissima.<sup>s</sup>

### §. 5.

Duo tantum hucusque insecta nota sunt, quae in vua vrsi dapes suas quaerant, quorum vnum Phalaena est, a scientiae naturalis arbitro, Equ. A LINNE, Arbutella dicta. Haec a cognatis suis alis sanguineis fasciisque argenteis tenuissimis<sup>h</sup> dignoscitur; nec ullam ob rem valde inclaruit. Sed alterum insectum tanto dignius est, quod a quo quis naturae scrutatore cognoscatur. Est Coccii species. Qui in Cactis opuntiis commorantur cocci propter colorem, quem largiuntur, egregie purpureum, prae ceteris in magno honore haben-

g) LINN. Fl. Lapp. p. 124. et Fl. Suec. 138.

h) Syst. nat. T. 2. p. 538. et Fn. Suec. nouiss. ed. p. 358, ubi prolixior eius descriptio reperiunda est.

bentur. His dignitate inferior longe est, quoniam magnitudine illis cedit, coccus Polonicus, qui licet in Polonia et Verania in primis copiose, alibi tamen etiam in eodem pabulo, nempe Sclerantho perenni, reperitur. In Suecia rarius occurrit. In Germania vero in ducatu Megapolitano et circa Rostochium largum eius prouentum esse cl. BVRCKHARD<sup>i</sup> narrat. Minor adhuc est Pilosellae coccus, nec coloris iucunditate ceteris aequiparandus. Inter insecta a solis hisce purpureum colorem obtineri posse, creditum est, usque dum a. 1758 Maio m. aliquis auditorum, qui LINNAEVM ad conquireendas stirpes exeuntem, comitabatur, insecta in sua vrsi detegeret, quae cum praceptoris oculis subiicerentur, coccus esse constitit, et in papyro vel linteo contrita amoenissimum colorem purpureum exhibuerunt.

### §. 6.

Hos iam, et loca, quae obsident, ex scheda, quam ill. Eques actis Suecicis<sup>k</sup> inseruit, fusius describam, eo scilicet fine, ut qui in Cellensi ducatu in locis, ubi planta crescit, habitant, ad insecta ista colligenda, si adsint, et in usum transferenda, excitentur. Cocco Polonio duplo maiores sunt, vel oryzam magnitudine aequalit. Extus rufi apparent, et initio laeues, successu vero temporis pili albi incurui erumpunt, qui sensim ita inter se implicantur, ut cutem, niuis instar, candidam vel folliculum mentiantur, qui tandem se separat; unde quilibet vermis intra putamen album delitescere videtur.<sup>l</sup> Sub hac forma aliquoties eum ipse, in itineribus botanicis, ill. LINNAEO duce institutis, legi. Cacci isti caulis vuae vrsi, radici proximis, et quidem in infima eorum parte inhae-

i) V. Act. Societ. R. scient. Lips. a. 1742. p. 54.

k) K. Vet. Acad. Handl. för år 1759. p. 29.

l) Cfr. descriptio cocci vuae vrsi in Fl. Sn. p. 266.

inhærent, vbi sub terra fere vel musco latent; locis praecipue non-nihil humidis. Opus vero est, vt, si eorum copia quædam collecta fuerit, mox in fumo exsiccentur, ne in volucres mares mutati aufugiant, vel feminæ, grauidæ factæ, inutiles fiant. Quodsi modo circa Cellam hoc insecti genus degat, quod incertum ad-huc est, consilium existeret, quo ex ericetis eorum tractuum sterilibus, nullique fere vtilitati inseruientibus, commoda præstantissima resultarent. Suasor nimirum essem, vt vuam vrsi, vbi non crescat, copiose propagarent, caulibusque coccus imponerent. Quin imo, si coccus ibi locorum plane deesset, tentari meretur, annon ex remotioribus transmitti posset. Vnde magnæ sane pecuniae summae, quae quotannis ad arcessendum coccum Americanum impenditur, parceretur.



litteris in pectinibus lecteris  
litteris ex lectione aliquantum posse. Nam litterae ppe  
cum quo illud esse in locis quibusq; esset, ferebat me  
cetera ceteris. In obiecto, compendie coacto in monitione  
in rebus publicis, iuribus et ceteris, ut ait Virg., Alii non  
commodis tunc in sensibus, compendio pectinibus  
quod in modo significans, ut in locis pectinibus  
que sunt in modis litteris, quod interius. Quod  
debet pectinibus litteris, quod interius. Quod  
debet pectinibus litteris, quod interius.

