De praesagienda vita et morte aegrotantium libri septem. In quibus ars tota Hippocratica praedicendi in aegrotis varios morborum eventus ... nova methodo elucescit / Cum praefatione Hermanni Boerhaave. Nec non emendationibus, recensionibus, supplementis Hieron. Dav. Gaubii.

Contributors

Alpini, Prosper, 1553-1617.
Gaubius, Hieronymus David, 1705?-1780.
Boerhaave, Herman, 1668-1738.

Publication/Creation

Venetiis : Ex typographia Remondiniana, 1751.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/r3dajskk

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

coute huit livres.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30524283



PROSPER ALPINUS Marosticensis
PH. & MED. ac PROFESSOR MEDICINAE PATAVINUS.

PROSPERI ALPINI

Ph. & Med. Doct. in Gymnasio PATAVINO *Med. Prof. Ordinarii*

DE

PRÆSAGIENDA VITA

ET

MORTE ÆGROTANTIUM

LIBRI SEPTEM.

In quibus ars tota HIPPOCRATICA prædicendi in ægrotis varios morborum eventus, quum ex veterum Medicorum dogmatis, tum ex longa accurataque observatione, nova methodo eluceſcit.

CUM PRÆFATIONE

HERMANNI BOERHAAVE

Nec non emendationibus, recenſionibus, ſupplementis

HIERON. DAV. GAUBII, M. D. & CH. L.

Ac Capitum & Rerum duplici Indice.

Editio altera Veneta omnium emendatiſſima.



VENETIIS. MDCCLI.

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

MEDICÆ ARTIS PRINCIPI,

HERMANNO BOERHAAVE,

FAUTORI SUO ÆTERNUM VENERANDO,

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS

PERPETUAM FELICITATEM.

Maximo, quod apud Te, VIR CELEBERRIME, isthic ALPINI liber habuit semper, & etiamnum habet, ponderi junge immensam Tuorum erga me meritorum molem: Sic momenta cognoveris, quæ, hanc ut novam ejus editionem Tibi potissimum dedicem, me induxere. Te profecto Auspice his primum in oris lucem Ille vidit. Te commendante distractus est avidissime. Te adhortante ejus, jam alterum proditurî, in me curam suscepi. Quid ni Illustris adeo Patroni præ se ferat Nomen cliens? Sed vel prægnantior multo, alia, quæ ad me attinet, ratio id ipsum postulat. Tanta enim est Tuorum in me benefactorum magnitudo; ut dulcissima horum recordatione memet oblectans, sæpe dubitem, anne vel ipsis Parentibus meis plus debeam, quam Tibi? Quum vero acceptis paria unquam referre me posse, non nisi insanus sperarem; eo tamen adnitendum mihi fore credidi, ut aliquando perpetuum justissimæ gratitudinis, summæque erga Te reverentiæ meæ, monumentum palam statuam: cui equidem, si ullo tempore, hodie certe optatissimam nactus prehendo occasionem. Immortali quippe, & omnium manibus tritissimo id insculptum libro & propalabitur latissime, & delebitur numquam: quorum utrumque in votis est.

Tu igitur, Fautorum Maxime! quod mente Tibi devotissima sacratur, æquo id animo velim accipias. Vive diu, quam felicissimus. Dumque, quo nobis datus es, cœlum Te manet, serus saltem eo redi. Iterum vale. Dabam Leydæ $17\frac{27}{9}32$.

LECTURO

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS,

S. P.



Quanto ſe uſu commendet in Artis Medicæ exercitio, PROSPERI ALPINI hocce ſcriptum, novit, qui argumenti gnarus illi legendo dedit operam: ſed nec latere ipſum poteſt, quot quantiſque paſſim vitiis, quacumque demum culpa commiſſis, ſcateant, quotquot has in oras pervenerunt, ejus editiones. Enata hinc intelligentiæ obſtacula fructuum inde colligendorum & copiam minuunt & dulcedinem. Quam equidem rem uti dolui ſemper, ita tandem, vel in privata dumtaxat commoda mea, ipſi, quouſque poſſem, mederi, mecum conſtitui: utpote qui, Hippocratis lectioni intentus, Alpinum mihi elegeram pro indice, in quem loca, de præſagio in morbis occurrentia, ad ſuos quęque titulos referrem. Dum ergo hoc agenti plurima inibi, errorum nube obfuſcata, ſponte illucebant; hæc ſimul corrigendo, tacite quaſi voti reddebar compos, Alpinum nactus ſatis emaculatum, meoque deinceps uſui pulchre adaptatum. Interea temporis novam ejus parat editionem Bibliopola; qui, quum præter unicum, idque & mutilum, de priore editione exemplar nullum poſſideret, meum ipſi ut commodare velim rogat. Annuo: do: evolvit Ille; curas videt meas, novæque editioni ſuæ adjungi optat, perfectioni quippe operis inſervituras autumans. Celeberr. D. BOERHAAVIUM uterque id conſultum imus: probat & Hic propoſitum. Ita Hoc incitante, Illo rogante, inopinato adducor, aliunde ſatis occupatum hunc hominem novo ut labore onerem. En L. B. bona fide, quo caſu tota res contigerit. Nunc quæ præſtiterim, audi: Mendas, quotquot obſervavi, bene multas & graves correxi, ut potui: hiatus aliquot, mihi viſos, replevi: citata Hippocratis loca, juxta editionem Hujus Foeſianam, noviſſimam, utpote ceteris fere magis hodie pervulgatam, accuravi: quæ vero ex Galeno, aliiſve allegantur, non attigi; plus enim hæc, quam quo fruor, exegiſſent otii.

Quoniam vero, quo tempore manum ego primum admovi operi, aliqua jam ejus pars binis ſub prælis ſudaverat, quam abjici, & correctam de novo imprimi, haud patiebatur ſumtuum magnitudo; inde factum, hæc ut talis fere permanſerit, qualis fuerat antè. Habetur autem a pagina prima ad 57.mam uſque, in primo Alphabeto: in ſecundo vero a pag. 185. uſque ad 209. Interim ne quid deſiderari tamen poſſet, quæ hac in parte corrigenda & addenda fuiſſent, in peculiares quaſdam pagellas, indici præfixas, conjecimus. Ea igitur L. B. facili negotio, inter legendum, ad ſuos quæque locos, ſi ita videbitur, transferre poteris. Vale, & labores hoſce meos in Tua commoda converte. Dabam Lugduni Batav. 17 $\frac{27}{9}$ 32.

Quæ-

QUæcumque, Benigne Lector, Hieronymus David Gaubius aut addita, aut correcta in peculiares pagellas, coniecit, ea in hac noviſſima editione noſtra ſuis in locis collocata diligenter habebis.



AD LECTOREM

P. S.



Ina adhuc, præter ante dicta, monendus es L. B, quæ, opere jam impreſſo, demum incidere. Horum prius eſt, quod huicce editioni, in ornamentum ſingulare, Auctoris præfixerim effigiem. Qui ſtupendam ALPINI eruditionem tam vivide exprimit liber, quid ni Ejuſdem & in fronte gerat imaginem? Eam vero (quod publicum hic ſtet gratiſſimi pro tanta liberalitate animi mei monumentum) eximiæ debeo munificentiæ Viri incomparabilis, D. JOANNIS BASTISTÆ MORGAGNI, eodem in Gymnaſio, in quo ALPINUS olim, Profeſſoris longe celeberrimi: quippe qui, litteris ſollicitatus, exemplum, juxta tabulam a nobili Pictore, *Leandro Baſſano*, exaratam, deſcriptum, mihi tranſmittere haud eſt dedignatus. Expreſſit hoc Chalcographus noſter, quam poterat fieri, fideliſſime. Interim ne datam a *Thomaſino* in *Illuſtrium Virorum Elogiis*, ALPINI effigiem cum hac mea conferens, animadverſa diſſimilitudine hæſites: ſcias velim, illam ſenis eſſe, ætate vero florentis meam: id enim ex datis ſimul a CL. MORGAGNO ad me epiſtolis mihi conſtitit: utpote commemorantibus, in Tabulæ deſcriptæ tergo, majoribus olim conſignata litteris, adhuc legi ſequentia.

AN. A VIRGINIS PARTU MDLXXXVI
MEN. FEBRUARIO
LEANDER BASSANUS PROSPERI
ALPINO MEDICO, QUUM STATIM
EX EGYPTO BASSANUM
VENERIT, GRATO ANIMO
EFFIGIEM ITA EGREGIE
GALIDAM OB AMICITIAM
PINXIT
AN. SUÆ ÆTATIS
XXXI.

Quæ quidem inſcriptio, licet nonnullibi mendoſa, ætatis tamen ALPINI tum temporis index, ante dictis fidem facit.

Alterum eſt, L. B. quod, Tua in commoda, Vir quidam Doctiſſimus, Praxin hac in Urbe Medicam exercens feliciſſime, rerum, hoc in opere tractatarum, compendia pagellarum marginibus, Idemque & indicem adſcripſerit locupletiorem. Ita, dum ſuum tribuo cuique, haud videbor Tibi, alienis velle plumis ſuperbire. Iterum vale.

ME-

MEDICINÆ CULTORIBUS

HERMANNUS BOERHAAVE.

S. P.



D condendam medicinam requiri accuratam primo eventuum hiſtoriam, deinde vero ſeverum ex illa ratiocinium, cenſent omnes, quibus accuratius introſpicere in diſciplinæ hujus indolem umquam placuit. Qua autem lege, ex idonea experimentorum copia, diſputatione rationis proficere quis poſſit, olim indicare conatus ſui, qnum de vi ratiocinii mechanici in Medicina publice diſſervi. Qua vero via experimenta capere, vel jam capta diſcere, quis poterit, in commendatione ſtudii Hippocratici longe prius dixeram. Eſt enim HIPPOCRATES unus fere, penes quem ſilva reperitur obſervationum earum, quæ ad artem pertinent. Utinam, qui collegit accurate, ordinatim digeſſiſſet! Sed properum Viri fatum obſtitit, ne tam ſperatum abſolveret opus. Incubuere dein ſupplendo huic defectui illuſtres in Arte Viri, quos inter LUDOVICUS DURETUS excellit, & eo vel major forte PROSPER ALPINUS. Prior in immortali mehercle ſcripto ad Coaca Hippocratis, poſterior in abſolutiſſimo, quod vobis jam offertur, opere. Ego ſane, poſtquam prima id vice evolveram, judicavi meliorem in Medicos uſus librum alium vix inveniri; nullum ergo Medicinæ Studioſis magis commendandum eſſe. Quum vero rariſſimi libri ingens eſſet penuria, exarandum denuo curavi juxta exemplar, quod poſſidebam, editionis Francofurtenſis. Id autem quum verborum, ſententiarum, citationum, mendis ſcateret adeo, ut ſenſus Auctoris vix ſibi conſtaret, nec mihi curandi his vel minimum ſupereſſet otii, quærendus fuit, qui id in ſe ſuſciperet oneris. Hoc autem, grave licet & plenum tædioſi laboriis, ſibi imponi paſſus eſt RUDOLPHUS DYKER *Embdanus, ingenio, induſtria, eruditione & modeſtia ornatiſſimus, Medicinæ ut nunc ſumma cum laude Candidatus, ita brevi, Deo dante, ipſe magno hominum bono futurus Medicus. Atque idem ille feliciſſimo ardui laboris ſucceſſu rem optime abſolvit. De eo autem & gaudeo impenſe, & Vobis gratulor, probe gnarus, dignius hoc opus raro exiviſſe in lucem. Valete. Lugd. Bat. 22. Sept.* MDCCIX.

ILLUSTRISSIMIS AC SAPIENTISSIMIS

SENATORIBUS,

JACOBO FOSCARENO

Equiti, & Divi Marci Procuratori,

HIERONYMO CAPELLO

ATQUE

JOANNI DELPHINO

Equiti, & Divi Marci Procuratori,

Triumviris Litterariis.

PROSPER ALPINUS

S. D.



Nter partes, quæ artem Medicam perficiunt, Viri Illuſtriſſimi, ea, quæ occultarum morbos continentium cauſarum notitiam per ſigna exhibet, perinde ac Imperatori hoſtium inſidias, Medico morbos maligne ingraveſcentes detegit, præteritaſque moleſtias ægro non referente aperit, præſentia cernit, de vita & morte, deque longitudine ac brevitate morborum multo antea prænoſcere docet, atque demum hominem prædictionibus, quaſi oraculis, auctore Hippocrate Coo, admiratione dignum reddit, ab omnibus plurimum commendatur, ac veluti divinum quoddam ſuſpicitur. Neque immerito ſane, quum Medici hanc artem perdocti, veluti Dii oracula hominibus, ita morbos futuros prædicant, ægrotorumque ſalutem atque exitium ante prævideant, ac non minus, quanto tempore hæc futura Hippocrates Cous peſtilentiam ab Illyriis venientem prædixit, & diſcipulos ad opem ferendam in varias urbes dimiſit; cui illos honores, quos Græcia Herculi, propter ejus merita contulerunt. Libros ſcripſit Prognoſticorum, Morborum Epidemiorum, ac, uti aliis viſum eſt, etiam Prorrheticorum, & Coacorum præſagiorum, quibus tota prædicendi ratio Medicis innoteſcit: In quibus quidem Hippocratem, quaſi divinam naturæ mentem, loquentem audire licet. Quamobrem Eudemus olim Romanus & Senator & Philoſophus prædictionem a Galeno ſibi arte Hippocratica proditam maxime eſt admiratus, ita ut poſtea, ſicuti Galenus prædixerat, ſanatus, amicis alta voce clamando dixerit: Pythium Apollinem vaticinari

dinari ægrotantibus voluiſſe per os Galeni. Quibus ſane conſtat, hanc Medicinæ partem Græcis prognoſin dictam, ceteris nobilitate ac præſtantia eſſe anteponendam, Mediciſque ſplendorem multum & ornamentum afferre, & ad Medicinam faciendam eſſe ſcitu neceſſariam. Etenim quis quæſo occultis morborum cauſis per ſigna haud quaquam cognitis, naturæque morbo adverſantis ſtatu, ac humorum motibus ignoratis, ægrotis opportuna præſidia adhibere poterit? Hinc fit, ut Medici hujus artis ignari, ejuſdem naturæ ſtatum, humorumque motus in ægrotis minus accurate obſervantes, ſæpius ipſis intempeſtivo ac inopportuno medicamentorum uſu, aut impediendo, aut intercipiendo, utiles naturæ progreſſus, exitium inferant. Ego itaque eximia hujus partis Medicinæ utilitate, præſtantia ac nobilitate perſuaſus, quum multos annos huic ſtudio incubuerim, quum in variis, & regionibus & locis, varios morborum caſus atque eventus, tum apud præcipuos Medicinæ Scriptores obſervaverim, opus ad medicum præſagium maxime faciens compoſui, in quo de morbis prævidendis, de longitudine & brevitate morborum cognoſcenda, de præteritorum ſymptomatum cognitione, deque præſagienda vita & morte ægrotantium, ſatis accurate egi. Ac demum quum ultimam hujuſce operis partem, ſeptem libris diſtinctam, de præſagienda quippe vita & morte ægrotantium inſcriptam, multorum perſuaſione in lucem edere conſtituerim, idque libenter, ne Medicinæ ſtudioſi hoc etiam ad medicinam faciendam commodo carerent, extemplo vos Senatores Ampliſſimi mihi in mentem occurriſtis, quibus hoſce meos labores devotiſſime offerrem, ac dedicarem: primum, quoniam hoc opus, quod partem Medicinæ prope divinam (divinum enim videtur, Medicum ægrotos vel morituros, vel ſanitatem recepturos, antea prænoſcere, atque prædicere) complectitur, ſua nobilitate ac præſtantia non indignum etiam Ampliſſimorum Senatorum benignitate mihi ſit viſum. Addo mihi jamdiu fuiſſe in optatis, ut me Vobis, Triumviris Litterariis Sapientiſſimis, poſſim aliquando honoris, ac beneficii olim ſuſcepti memorem declarare. Quippe qui, nedum lectionem medicamentorum, vulgo ſimplicium vocatam, (quæ naturalium omnium vel plantæ ſint, vel animalia, vel foſſilia, ad uſum medicinæ facientium hiſtoriam docet, vireſque ac uſus omnes ad medendum, quod ipſum recte mederi eſt) ſtudioſis Medicinæ merito maximi faciendam, quod abſque medicamentorum notitia, neque ullus Medicus, neque ars ipſa Medica umquam eſſe potuerit, in ſtudio Patavino omnium celeberrimo, mihi interpretandam detuleritis, ſed etiam eam ordinariam in eodem ſtudio, ut majori quoque honore, majori veſtra benevolentia decorarer, declaraſtis, quod honoris & ornamenti huic lectioni alias numquam fuit tributum. Merito itaque hoſce Libros de nobiliſſima ac fere divina Medicinæ parte nunc in publicum evulgandos vobis Senatoribus humaniſſimis (quorum magnificentiam, ſapientiam, juſtitiam, humanitatem, prudentiam, omnes nationes maxime admirantur, venerantur, ſuſpiciunt) dedicandos duxi. Ut ea ratione quandoque etiam appareat,

quan-

quantopere iſtius Patavini Gymnaſii Medicinæ ſtudioſis utile foret, ac quantum ejuſdem ſtudii ornamentum, atque perfectio augeretur, ſi una cum aliis partibus Medicinæ hæc una quoque ad prognoſticum pertinens, ceteris nobilior, omnino Medicis neceſſaria publice in eodem Gymnaſio doceretur. Qui non avidiſſime audirent libros prognoſticorum Hippocratis, atque libros morborum Epidemiorum? Illos tamquam prædicendi rationis præcepta continentes, atque hos tamquam caſus peculiares, in quibus ſtudioſi ad prædicendi praxin ſeipſos exerceant. Undique (auderem affimare) Medicinæ ſtudioſi Patavium confluerent, ut præter alias Medicinæ partes prognoſis quoque ad Medicinam ſummæ utilitatis, ac ſplendoris facultatem, quæ olim a primariis Medicis jure, & merito in hoc ſtudio tractabatur, intelligere poſſent. Interim Viri Illuſtriſſimi hoſce Libros, Vobis a me devotiſſime dicatos, hilari ac perbenigno vultu accipite. At ſi quid ex ipſis ornamenti ad artis Medicæ ſtudioſos ac commodi aperiatur in hoc veſtro diſciplinarum omnium emporio, denuo vel reſtituendum, vel potius inſtaurandum, ſummæ prudentiæ veſtræ judicium eſto. Deum Optimum Maximum precor, ut Vos & Reipublicæ veſtræ feliciſſimæ, & huic Patavino Gymnaſio perpetuis annis tueatur incolumes & fortunatos. Patavii. Anno ſalutis humanæ MDCI. die 15. Menſ. Februar.

PRO-

PROSPER ALPINUS LECTORI OPTIMO.



Uum in editione Librorum de Medicina Ægyptiorum ſtudioſis Medicinæ polliciti fuerimus, Libros quoque noſtros de medico præſagio conſcriptos nos in lucem edituros, poſteaque multis Viris celeberrimis, quibus alii noſtri labores alias evulgati haud ingrati extiterunt, hortantibus, ac rogantibus, quum promiſſis ſtandum eſſet, non potuimus, neque debuimus ipſorum deſiderio plane non obſequi. Unde quum ſcripſerimus primo de morbis prævidendis, mox de præteritorum ſymptomatum cognitione, tertio de longitudine & brevitate morborum, atque demum de præſagienda vita & morte ægrotantium, ex quatuor partibus totum hoc opus, ad Medicum præſagium attinens, perficientibus, eam, quæ in morbis ægrotantium vitam & mortem prænoſcere docet, ſeptem libris diſtinctam primum publicandam conſulto duximus. Quos libros propter ipſius eximiam ad Medicinam faciendam utilitatem, tum quod a multis maxime expeti intellexerimus, tum etiam, quod libros de hac quidem prædicendi parte proſecutos in promtu magis, ut typis committi poſſent, habuerimus, eo libentius nunc in lucem prodire permiſimus. Itaque, optime Lector, hos interim legito, recte conſulito, reliquoſque libros de aliis prognoſis partibus conſcriptos propediem exſpectato. Atque noſtram fortaſſe Medicinam alias methodico modo informatam. Vale.

INDEX OMNIUM CAPITUM,

Quæ in hoc opere continentur.

LIBER PRIMUS.

CAP. I. EX quibus Medici in ægrotis ſalutem & mortem prænoſcant. Pag. 3

II. De cognoſcendis naturæ viribus atque in primis, ex quibus ipſarum quum robur, tum imbecillitas dignoſcatur. 5

III. De facultatum actionibus robuſtis cognoſcendis. 8

IV. De naturæ actionibus debilibus cognoſcendis, & primo ex animalis facultatis ſymptomatis. 10

V. De actionibus debilibus facultatis vitalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis. 14

VI. De debilibus actionibus facultatis naturalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis. 16

VII. De cognoſcendis morborum viribus, atque in primis ex quibus ipſorum quum robur, tum imbecillitas cognoſcatur. 20

VIII. De morbis debilibus ex morborum Idea, magnitudine, atque more, cognoſcendis. 22

IX. De morbis debilibus ab ipſorum cauſis cognoſcendis. 24

X. De morbis natura potentioribus ex Idea, magnitudine, atque more cognoſcendis. 27

XI. De morbis natura potencioribus ab ipſorum cauſis cognoſcendis. 28

XII. De futuri morborum ſtatus, ſeu vigoris cognitione ad prædicendi rationem. 34

XIII. De ſalutis ac exitii prognoſtico ex morborum futuri ſtatus cognitione. 37.

XIV. Ex quibus morbos ſalutares ac exitiales nonnulli cognoſcant. 39

LIBER SECUNDUS.

CAP. I. DE quibus in toto opere ſit agendum. 44

II. Quid mente conſtare in morbis ſignificet. 44

III. Quid ſit mente non conſtare, qualibuſque ſignis, quum præſens mentis inconſtantia, tum futura prænoſcatur, & de deliriorum differentiis atque cauſis. 45

IV. De ſalute a deliriis prædicenda. 51

V. De morte a deliriis prædicenda. 54

VI. Quid fatuitas & oblivio in morbis ſignificet. 58

VII. De prædictione ab externis ſenſibus. 59

VIII. Quid in morbis ægrotos non videre, tenebricoſam viſionem, viſus obſcuritatem habere, ſplendoreſque oculis apparere, atque oculos lucem ferre non poſſe ſignificet. 60

IX. De ſurditate in morbis acutis. 61

X. De tinnitu aurium in morbis acutis. 63

XI. Quid fœtores in morbis, quidque cibos potuſque graveolentes inſipidos, vel mali ſaporis ægrotis videri ſignificet. 65

XII. Quid ſtupor, ſeu torpor, & ſenſus factus deperditus ſignificet. 66

XIII. De prædictione ex corporis caliditate. 67

XIV. Ex frigiditate Corporum quid præſagiendum. 69

XV. De prædictione ex frigiditate extremarum partium. 70

XVI. De caloris ad frigus, & frigoris ad calorem in corporibus acute ægrotantibus mutatione. 74

XVII. De prædictione ex humiditate corporis & ſiccitate. 75

XVIII. De prædictione ex doloribus, qui in acutis morbis obſervantur. 76

XIX. De doloribus ſalutem prædicentibus. 77

XX. De doloribus exitium prædicentibus. 80

XXI. De prædictione ex laſſitudinib. 83

XXII. De vigilia, quidque ipſa in morbis præſagiat. 85

XXIII. Quid ſomni in morbis præſagiant. 87

LIBER TERTIUS.

CAP. I. QUantum ad prædictionem cognitio motricis facultatis medicis conducat. 93
II. De prædictione ex decubitu, & primo de optimo, qui ſalutem præſagit futuram. 93
III. De malo decubitu in acutis morbis, exitium denotante. 95
IV. Quid inquietatio, & anxietas, ſeu jactatio in acutis morbis ſignificet. 97
V. De prædictione ex tremoribus. 100
VI. De palpitationibus, quidque in morbis præſagiant. 103
VII. De convulſionibus, quidque in morbis præſagiant. 105
VIII. Quid convulſiones in febribus acutis ſignificent. 111
IX. Quid ſingultus in morbis prædicunt. 115
X. De rigoribus, atque quid in morbis ſignificent. 117
XI. De horroribus & ipſorum prædictione. 122
XII. De prædictione a torporibus in paraplegiis. 124
XIII. De prædictione ex aphonia, id-eſt, vocis interceptione, nec non ex aliis vocis differentiis. 126

LIBER QUARTUS.

CAP. I. QUantum vitalis facultatis cognitio ad venandum in ægrotis prognoſticum conducat. 131
II. Quid pulſus ſit, atque quot generibus pulſus omnes comprehendantur. 132.
III. De cauſis pulſuum, & quales pulſus robuſtam facultatem & quales imbecillam indicent. 135
IV. De pulſibus ſalutem & exitium indicantibus. 138
V. Cur pulſus in quibuſnam febribus exitioſis appareant, aliquando recte valentium ſimiles. 140
VI. De prædictione ex reſpiratione, quidque primo ipſa ſit, atque quot ipſius differentiæ obſerventur. 142
VII. De cauſis reſpirationis. 143
VIII. Quid bene & male ſpirare in morbis ſignificet. 146
IX. Quid reſpiratio magna velox, magna tarda, parva velox, parva tarda, & magna frequens, magna rara, in morbis ſignificet. 147
X. Quid reſpiratio parva frequens, parva rara ſignificet. 148
XI. De reſpirationibus exitialibus, quę in moribundis fiunt. 149
XII. Quæ a naturalis facultatis cognitione ad intelligendam præſagii rationem, ſit utilitas. 152
XIII. De appetentiæ ſymptomatis ad prædicendi rationem. 153
XIV. Quid cibi, & potus optima appetentia in morbis ſignificet. 154
XV. Quid in morbis ciborum appetentia prorſus ſublata ſignificet. 155
XVI. Quid ſitis intenſa in acutis morbis ſignificet. 157
XVII. Quid ſitis ſublata, ſeu non ſitire ſignificet. 158

LIBER QUINTUS.

CAP. I. DE partibus corporis, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem. 160
II. Quid corpus benevalenti ſimile, & diſſimile in morbis prænuntiet. 161
III. Quid in morbis corporis emaciatio ſeu extenuatio, & quid ejuſdem partes tumefieri ſignificet. 161
IV. De prædictione ex coloribus corporis ægroti. 164
V. Quid morbus regius in morbis prænuntiet. 167
VI. De prædictione ex faciei mutatione in morbis. 170
VII. De prædictione ex oculis. 173
VIII. De prædictione ex genis, auribus, naſo, labiis, atque dentibus. 182
IX. De prædictione ex linguæ obſervatione. 184
X. De prædictione ex faucibus & dorſo. 188
XI. De prædictione ex hypochondriis, & primo de iis, quæ ſalutem ſignificant. 189
XII. De malis hypochondriis, quę mortem in acutis morbis præmonſtrant. 191
XIII. De prædictione ex ignobilibus partibus corporis. 194

XIV. De prædictione in acutis morbis ab extremis partibus. 195

LIBER SEXTUS.

CAP. I. DE quibus ſit agendum in hoc libro, ac primo de prædictione ex coctione atque crudi. tate excrementorum. 197
II. De prædictione ab excretionibus. 200
III. An ante concoctionem excretiones ſint bonæ atque utiles. 202
IV. De diebus decretoriis ad prædictionem facientibus. 207
V. De prædictione a diebus decretoriis. 211
VI. Quid Criſis ſit, quotuplex & quomodo fiat. 212
VII. De morbis qui per criſin terminantur, & de iis, qui abſque criſi finiuntur. 214
VIII. De ſignis criſes futuras ſignificantibus. 216
IX. De criſibus ſalutaribus, quæ certam ſalutem ſignificant, cognoſcendis. 219
X. De criſibus ſalutaribus, quę tamen neque fideles, neque certæ perpetuo ſunt. 223
XI. De criſibus exitialibus cognoſcendis. 225
XII. De cognoſcendis criſibus, quæ per abſceſſus, & quæ per excretionem ſunt futuræ. 229
XIII. De prævidenda criſi per ſanguinis eruptionem ſeu fluxum. 232
XIV. De criſi, quæ fit per ſanguinis fluxum, quum ab utero, tum ab hæmorrhoidibus. 237
XV. De cognoſcenda criſi, quæ per vomitum fit. 238
XVI. De ſignis criſium per ſudores atque per urinas copioſiores futurarum. 239
XVII. De ſignis criſium per alvi fluxionem. 241
XVIII. De ſignis compoſitarum, ſive multarum, ſimul criſium futurarum, quibus morbi judicantur. 242
XIX. De tempore criſium, ideſt, quo nobis ſunt futuræ. 243

LIBER SEPTIMUS.

CAP. I. DE particularibus humorum excretionibus ad prædictionem eſſe agendum. 248
II. De prædictione a ſalubris ſanguinis excretione. 248
III. De malis exitialibuſque ſanguinis excretionibus. 253
IV. De ſanguinis excretionibus paucioribus, ſtatim deſinentibus, atque de ſtillis ſanguinis e naribus, quidque in morbis acutis præſagiant. 255
V. De prædictione ex ſudoribus, & primo quid ſudor, quotuplexque ſit, & de ipſius cauſis. 257
VI. De bonis ſalutaribuſque ſudoribus, ſalutem in ægrotis prænuntiantibus. 259
VII. De malis pernicialibuſque ſudoribus, exitium portendentibus. 261
VIII. De prædictione a vomitibus, & primum de ſalutaribus. 268
IX. De vomitibus exitioſis, mortem præmoſtrantibus. 370
X. De alvi dejectionibus, & primo de iis, quæ ſalutem prænuntiant. 272
XI. De malis alvi dejectionibus, quæ exitium ægrotis prænuntiant. 274
XII. De prædictione ab urinis, quid ſit urina, quomodo fiat, atque quantum faciat ad prædicendi methodum. 279.
XIII. De variarum urinarum cauſis. 281
XIV. De bonis urinis ſalutem prænuntiantibus. 286
XV. De malis urinis mortem prænuntiantibus. 289
XVI. De prædictione ex ſputis, & primo, quid ſit ſputum, quas partes læſas denotet, differentiæ, & cauſæ. 294
XVII. De ſputis bonis, ſalutem prædicentibus. 298
XVIII. De malis ſputis exitium prædicentibus. 300
XIX. De prædictione in ſuppuratis. 304
XX. Quid in morbis acutis Cerchon, vulgo ranticum, ſignificet. 307
XXI. De prędictione ab abſceſſibus. 309.

PRO-



PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS

Philoſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum Simplicium Profeſſoris Ordinarii

DE

PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER PRIMUS.

PRÆFATIO.

AD eam Medicinæ partem explicandam aggredimur, quæ, quomodo de ægrotantium ſalute & morte præſagiendum ſit, docet. De qua ob eximiam ad Medicinæ ſtudioſos utilitatem, atque commodum accurate nunc agendum duximus. Etenim hæc prædicendi ratio non minus Medicis, quam ægrotis plurimum emolumenti afferet. Hi quidem de ipſorum futura ſalute Prognoſticum audientes, facilius ac propenſius Medicorum præceptis obediunt, ac exinde tutius & citius priſtinam ſanitatem recipiunt. Illi vero prævisis ea arte ſymptomatis, quibus ægroti ſunt vexandi, facilius medicamentis occurrunt. Ex quibus morborum probe cognita ac perſpecta natura, curatio qualis recte profutura ſit, intelligunt; atque etiam (quod maximum curatricis Medicinæ partis eſſe exiſtimo) neglecta morborum prædictione, proba quidem vivendi ratio illis minime inſtitui poteſt. Ipſius enim inſtituendæ rationem ex ſingulorum morborum temporum, omniumque maxime ſtatus præcognitione pendere, Galen. *in lib. 1. cap. 3. de Criſibus* hiſce verbis prodidit: *Generoſi autem Medici atque arte Hippocratica digni eſt officium, futurum ſtatum prægnoſcere, quum omnem victus ratio-*

Prognoſtici ſumma utilitas.

nem ad ipſum inſpiciens inſtituat. Eadem ratione principium morbi, atque augmentum, non ubi jam perfecta ſunt, cognoſcere, ſed multo antea præſtabit prænoſcere. In hac prædicendi parte olim Galenus poſt unum Hippocratem, a quo artem didicit, maxime claruit. Cujus ſane illuſtria multa præſagiorum exempla in ejus libris leguntur.

Quid de illo præſagio, immo de divina ejus mente, quaſi natura loquente ad Eudemum olim Romanum Philoſophum clariſſimum? An non ei prædixit, qua febre eſſet laboraturus, non minus & diem, in qua critica alvi fluxione fuit indicata? Quid de Sexto Romano Senatore, Severo Imperatori multum familiari? an non prima die febrem adventuram, ſexta die ceſſaturam, & decimaquarta redituram, atque decimaſeptima per ſudorem prorſus ſolutum iri? Quid amplius? Quum, ut ex ipſius libro de præſagitione ad Poſthumum conſtat, in quodam juvene Romano, febre vexato, quo tempore alii omnes Medici mittendum ſanguinem conſulebant, ſanguinem abunde e dextra nare fluxurum, eoque ægrotum juvenem ſanatum iri, coram multis Medicis prædixit, continuoque erumpente ſanguine, uti prædixerat, juvenis fuit liberatus? Quæ omnia ut ex ipſius ſententia præter aliorum ſpem evenerunt, ſic ſummam in ipſo præſtantiam omnes Medici admirari ac ſuſpicere cœperunt. Martianus, unus ex primariis Medicis, Romæ in via obviam Galeno factus, ait: *Quæ ergo in eo libro ſecundo Prognoſticorum Hippocr. ſcripta ſunt, agnoſcis, atque eadem ſcio, nec tamen vaticinor*; At Eudemus a febre, uti a Galeno ipſi fuerat prædictum, ſanatus de illo alta voce clamando amicis, qui apud ipſum fuerant, inquit: *Vaticinari Pythium Apollinem ægrotantibus voluiſſe per os Galeni, & quibus remediis ad ſanitatem revocari poſſint, & qua die perfecte liberari debeant.* Hinc complures non ſolum medendi artis ignari, ſed etiam doctiſſimi Philoſophi, ac Medici Galenum in hac arte divinum eſſe prædicabant, diviniſque honoribus ac laudibus dignum ad cælum uſque efferebant. Cujus quum ægroti, tum Medici præſagia perinde ac certiſſima oracula exſpectabant. Ex quibus, prædicendi hæc ratio quanti ſit a Medicis facienda, facile intelligitur. Juvat quinetiam maxime Medicos in morbis acutis exitialibuſque: qui præcognitam futuram ægrotantium mortem ubi aſſidentibus prædixerint, mortis culpa plane vacare ſolent, ægrotoſque audito prognoſtico non Medicorum culpa, ſed morborum vi interemtos, aſſidentes judicant. Quod ſi antea exitium non prædixerint, ipſorum aut ignorantiæ, aut negligentiæ mortem omnes adſcribunt, interiiſſeque Medicorum cauſa pro certo habent. Hinc non pauci Medicorum noſtri temporis perdocti, propriæ conſcii ignorantiæ, omnes fere acutis morbis correptos indiſcriminatim morituros prædicant. In horum quidem morborum principiis morbum ſane fore graviſſimum, ingentibuſque periculis plenum, affirmant: morbiſque iisdem ad ſtatum properantibus, ſymptomata quum de novo oborta, tum vel alia, quæ prius fuerant, adaucta viderint, aut quovis modo ægrotos plus ſolito inquietos, vel anxios, deliros, aut ægre ſpirantes, aut plus ſolito dolentes, continuo exitium futurum affirmant, quibus, etſi paullo poſt ægroti ii ſanitati reſtituantur, tamen hæc prædicendi ratio nihil affert incommodi: cum ea via neque parum laudis hi conſequi ſoleant; ipſorumque in arte medica nomen atque fama non parum creſcat; artis ſiquidem medicæ ignari ipſorum ſanitatem, (etſi, iiſdem Medicos mortem prædixiſſe, memoria habeant) Medicorum ſtudio ac diligentia ſubſecutam putant. Ex quo eos Medicos maximis laudibus extollunt. At Medici, arte Hippocratica digni, non in omnibus acutis morbis exitium perpetuo prædicant, ſcienter enim, ac docte quidem ſanitati reſtitutum iri, & morituros eſſe ex veris prædicendi artis principiis affirmant: neque omnia gravia ſymptomatum incre-

menta

menta timent, neque nova oborta ſymptomata, vel hæc ipſa multum aucta. Quinimmo magis ex iis, quæ ignaris Medicis malum morem in morbis ſignificare videntur, ſalutarem aliquam criſim ſæpe eſſe exſpectandam affirmant. Ex his itaque, quum nos hanc prædicendi in ægrotis rationem Medicis non ſolum maxime utilem, ſed apprime etiam neceſſariam eſſe, intellexerimus; mirari aliquis non debebit, ſi nos plane, ut methodo, a nullo antea explicata, commonſtraretur, in ea tradenda, ac accurate ſcribenda plurimum ſtudii adhibuerimus. Sed nunc ad illa, quibus hæc prædicendi methodus inveſtigatur, veniamus.

CAP. I.

Ex quibus Medici in ægrotis ſalutem & mortem præcognoſcant.

Præſagium in ægrotis unde petendum.

QUI recte cupiunt in ægrotis præſagium aperire, in primis, a quibus ipſum indagetur, intelligere debent. Hæc vero duo exſiſtunt unum morbus, qui in corpus tamquam inimicus agens hominis corpus deſtruere conatur; atque alterum natura, quæ perinde ac arcis alicujus præfectus, in corpore reſidens, a morbo perinde ac duce aliquo exercitus, ipſum corpus tamquam arcem oppugnante, defendere ſtudet. Ut autem dux exercitus ad expugnandam arcem multis utitur militibus, ipſorum alii ut unam, atque alii ut alteram arcis partem aggrediantur, quo multis ſuperatis tandem arx univerſa in poteſtatem veniat: ſic & morbus militum loco pluribus utitur ſymptomatibus, ac aliis morbis, ut multas partes corporis eodem tempore expugnent. Ex oppoſitoque natura ejuſdem, & corporis acerrimus defenſor, ipſum a ſymptomatum inſultibus cuſtodit, & ne morbo ſuccumbat pro viribus operam dat. Eruditam enim eſſe naturam, atque arte etiam non carere, artificemque merito dici, atque animalibus conſulere, Hippocrat. *lib. 6. Epid. Sect. 5. text. 12. pag. 1184. Com. 5. in text. 2.* ſi Galen. *in lib. 6. Epidem.* credimus, ſtatuit. Hæc enim partes ſingulas corporis facultatibus multis muniit, quibus partes, tamquam militibus ad reſiſtendum, quum variis morbis, tum ſymptomatis utuntur. Itaque eæ partes corporis facultatibus perinde ac militibus utentes, a morborum ſymptomatumque inſultibus defenduntur. Ex quibus cuique liquido conſtabit, naturam corporis partes robuſtis facultatibus inſtructas habentem, difficili negotio morbo eſſe ſuperandam, ipſamque contra debilioribus partium viribus ſeu facultatibus inſtructam facile morbo ſuccumbendam. Colligamus igitur ab his, ut nuper dictum eſt, ſalutis atque mortis futuræ prænoſcendi judicium a duorum tantum, morbi nimirum, & naturæ invicem colluctantis obſervatione pendere atque fieri. Quod Galen. *in lib. de conſtit. art. medicæ cap. 18.* perbelle ita expreſſit: *Medicus quippe his duobus, morbo inquam & naturæ colluctantibus, animum ſemper intendit; atque dum diſcernit, quodnam horum robuſtius ſit, primum quidem ſecum de ſalute hominis, aut interitu præſagium depromit. Deinde vero, quo alterum altero fortius eſſe novit, tum & illius præfinitum tempus agnoſcit.* Nec mirari quiſpiam debet, ſi quis robur utriuſque recte perpendens victurum tandem deprehendat; cum videamus complures Gymnaſtas ex primis ſtatim motionibus, quibus contra ſe invicem luctantes feruntur, victurum prænuntiare, & ſæpe ante partam victoriam, quodque celerius adverſarius ſuccumbet. Hoc autem agunt, quum alterum altero non viderint validiorem. Quare ex alia nulla exercitatione ſalutem aut interitum prænoſcet, præterquam ex exacta virium tum morbi tum naturæ notitia, ex qua utriuſque præfinitum tempus exquirit; ut enim celerrime ſolvendus morbus eſt, quum validiores vires fuerint; ita cito mors adventabit, ſi hæ imbecilliores ſint, morbus vero fortior. Natu-

Morbi & naturæ comparatio.

Salut. atq; mortis præſagium ex quibus noſcitur.

ram vero morbo robuſtiorem ſignificabunt validæ, ac robuſtæ corporis facultates, quibus ipſa non carens, vel etiam contra magnum morbum, fortiſſime pugnat, nec ipſo facile ſuperatur. At interdum fit, ut quemadmodum arx firmiſſima munitiſſimaque, aut militum, aut victus, aut ceterarum rerum, quibus caſtra, ut defendi poſſint a fortiſſimo Duce exercitus, opus habent, defectu; ſic natura noſtrorum corporum vel etiam fortiſſima, ciborum inopia, aut mala victus ratione, aut medicamentis non recte adhibitis, aut denique longa morbi oppugnatione, ſæpe ſuccumbat. Ex quo ipſa aliquando caſtrorum Ducem imitatur, qui, quum a longa obſidione milites, victum & cetera neceſſaria ſibi defectura timeat, inopinanter aliquando e caſtris egreſſus repente contra obſidentem exercitum pugnam tentat, quem quandoque fortiſſime pugnando aut totum vincit, aut ingenti militum copia exciſioni mandata, ita debilitat, ut ab ipſo nihil amplius, aut ſane parum ſit timendum. Non diſſimili argumento corporis alicujus natura ſagaciſſima, robuſtiſſimis munita facultatibus, ex longa quandoque morbi pugna, virium defectum timens, morbo vel cauſis, vel ſymptomatis irritata, ſæpius in ipſum morbum ante opportunum tempus ad pugnam invehitur, ipſumque fortiſſime pugnando aut plane vincit, aut ſaltem plurimum ejus vires debilitat: Atque hæc miro quodam quaſi diſcurſu aut ratione (ſic probe ipſam Deus docuit) in ægrotis a natura non raro fiunt. Demum natura æque omnes partes corporis non curat, ſed præcipuas præcipue; quum ſingularum partium corporis non æquale ſit robur, quippe principaliores partes ſtatim ab initio natura majori robore donavit, ut Gal. *in l. de cauſis morborum c. 6.* docuit. Arcis enim alicujus præfectus ac defenſor, non æque omnes, ſed principaliores magis arcis partes curat, & defendit, quibus præſertim expugnatis arcem univerſam ſuperari ſit neceſſe; ita natura corporis cuſtos ignobiles, admodumque a viſceribus remotas non tanto ſtudio curat, quod ſi graviter aliquando a morbo vexentur, ſervata viſcerum nobilium ſanitate, deinceps priſtinæ ſaluti ea reſtitui ſoleant. Curæ igitur primum naturæ ſunt viſcera, ut a morbi inſultibus cuſtodiat, omneque ſtudium ad ipſorum conſervationem adhibet, maximeque ad ipſum cor defendendum. Sæpeque, ut iſthæc nobilia viſcera morbo aliquo vexata, ac oppugnata defendantur, ac ſerventur, natura permittit, aut ipſa procurat, ut ab his viſceribus totus morbi impetus ad aliquam partium ignobilium feratur: tantam ſemper, Gal. *in lib. 2. cap. de uſu partium* auctore, natura providentiam ſecuritatis principalium particularum habuit, ut non raro in longis morbis Medici obſervare ſoleant, naturam robuſtam, diu a magno morbo conflictatam, ad aliquam ignobilem partem humores noxios tranſmittendo membra præcipua exonerare, atque liberare. Quo pacto ſæpe multos cum acutos tum longos morbos judicatos vidimus, nempe in cruribus, cuteque, tumoribus, inflammationibus, exanthematis, variolis, morbillis, ſcabie, aut aliis hujuſmodi obortis: de quibus Hippoc. *in lib. 2. In text. 18. §. 13. Prognoſticorum pag. 43. lin. 18.* dixit: *Abſceſſus autem, qui ad crura fiunt in pulmoniis vehementibus, ac periculoſis, omnes utiles ſunt.* Colligamus itaque duo eſſe, a quibus Medici in ægrotantibus ſalutem & interitum prænoſcent, nimirum naturam atque morbum, ac ex utriuſque virium cognitione uter ſit victurus, eſſe judicandum. Quam rem Gal. 2. In text. 6. ita expreſſit: *Summa potius præſagitionis in morituris convalituriſque eſt, quoties vis morbi cum ægri facultate conferatur.* Si enim morbus vehementior eſt, æger omnino morietur, ſi debilior quam ægri facultas, haudquaquam morietur, ubi nihil committatur. At quum ſanitas non niſi declinantibus morbis, aut ſaltem in ſtatu contingat, Medici, diligenter naturæ & morbi viribus exploratis, an eæ eouſque perdurare poſſint, conjectura aſſequi debebunt. Quod ni aſſequantur, quippe, an natura poſt morbi ſtatum cum morbo pugnando

do perdurare queat, ni conjiciant, de salute & interitu præsagium haud probe prenoscent. Hinc præter naturæ & morbi cognitionem, futuri quoque statu seu vigoris cognitio erit necessaria. Etenim æqualibus quum naturæ tum morbi viribus observatis, ubi status morbi cito futurus sit, natura morbum absque dubio superaturam Medicus præsciet: at quo ex opposito tarde eodem morbi statu futuro, oppositum, atque difficile judicium fiet. Ex quo apparet sine status seu vigoris morbi futuri notitia, minime posse de salute & morte recte judicari: Quam rem expressit Galen. *in lib. 3. cap. de crisibus* ita scribens. *Et quidem sine horum trium exacta dignotione nihil de salute investigari contingit, non magis quam hoc sciri potest, hominis robore, oneris magnitudine, & viæ longitudine antea non perspecta: nam ægri vires portanti onus, morbus vero oneri, tempus autem, quod usque ad statum extenditur, longitudini viæ respondent.* Quo pacto igitur de ægrotante sciri potest, num quid sufficiat, si nulla status præcognitio habeatur? Ex iis itaque omnibus ratio cogit, nil tam studiose esse discendum, quam futuri status prænotionem. Itaque ex natura, morbo, atque morbi futuri status dignotione totam in ægrotis prædicendi rationem, seu methodum pendere merito diximus. At iis præmissis nunc ad singulorum notitiam assequendam declinemus, a naturæ viribus dignoscendis incipientes.

Status futuri cognitio necessaria ad prædicendum in morbis.

CAP. II.

De cognoscendis Naturæ viribus, atque in primis ex quibus ipsarum quum robur, tum imbecillitas dignoscatur.

QUum naturæ vires sint a nobis dignoscendæ, atque non minus, ex quibus ipsarum cognitio habeatur, de Natura, atque de ipsius facultatibus & actionibus prius est agendum. Naturam vero, illam (inquam) adversus morbos pugnantem, quamdam esse substantiam seipsam moventem, in iis, quæ ab ea reguntur, corporibus inhabitantem plures existimarunt; at quid illa sit, quave ratione varias in illis actiones edat; omnes fere vel etiam nunc latet. Multis tamen Medicis, Hippoc., Galeno (*lib. 9. de Hipp. & Plat. decr. c. 9. In 1. apb. 14. In 2. apo. 51 In 4. apb. 37. & in 5. apb. 22. & in 11. method. med. cap. 1.*) atque aliis, quemdam illam esse spiritum, vel calorem innatum, seu congenitum ex primorum elementorum commoderatione profectum, in partibus corporis spirituosis, carnosis, atque solidis viventem, pertusum est. Quam rem (etsi calorem ipsum naturam, vel animum non esse putem, sed ipso magis tamquam instrumento uti) nobis non pauca suadere existimo. Corpora siquidem, ut docet Hippocrates, pluri innato calore referta, perfectius ac robustius suas obeunt functiones, ac imbecillius, quæ illius caloris minus participant. Quod in puerorum & senum corporibus facile observamus, illa namque, quia plurimo innato calore valent, sua idcirco naturæ munera perfectissime præstant, seu exercent: etenim recte cibum appetunt, concoquunt, retinent, atque ipso ad nutritionem utuntur, non minusque genita excrementa inutilia rejiciunt & consumunt. Ex quo maximos gravissimosque morbos pueri aliis aliarum ætatum hominibus facilius ferunt. Senum vero corpora caloris inopia ac defectu omnium maxime languidissimis functionibus utuntur. Præterea in singulis quoque corporis partibus id licet observari, quo enim cerebrum, stomachus, hepar, cor, atque cetera alia membra, plus nativo illo calore valent, sive ejusce caloris plus habent, eo robustius naturalia munera obeunt, ac exercent. Quo vero minus, ad obeunda naturæ opera eo imbecillius se gerunt. Cerebrum plurimo calore utens recte concoquit, pauca excrementa gignit, ipsaque valenter digerit, resolvit, vel rejicit, in quo sensus omnes ob id purissimi

Natura, ejusque vires quomodo cognoscuntur.

exercentur. Frigidius vero debiliter concoquit, excrementa multa coacervat, ipsisque ea de causa assidue scatet, quo sensus non recte suas edunt functiones, vel eas debiliter & imperfecte. Quod eodem modo & de aliis nostris corporis membris demonstrari potest. Ex quibus quidem natura nihil sane aliud, quam calor temperatus, congenitus, sive innatus creditur probe (uti in brutis etiam animalibus apparet, quæ, quod plura ratione agere videantur, non omnino discursu carere quibusdam naturæ doctis persuasum est) ab Auctore nostræ creationis perdocta, atque erudita. De qua Gal. *in cap. 2. lib. 2. de dieb. decretoriis: Physicum esse convenit, qui hæc judicet, & persuasum habere naturam prorsus sufficere; & summa quadam providentia corpori nostro prospicere: Item propriis etiam motibus ordinatis, si quid aliud, ita & ipsam uti.* Et in lib. de causis morborum *cap. 2. Rationem enim quamdam, atque mentem naturæ tribuemus, si ita simpliciter ipsam quicquid inutile est, deponere affirmemus ex nobilioribus partibus ad ignobiles.* Ex quo Hippoc. *in lib. 6. Epidem. sect. 5. text. 1. pag. 1184. cap. 6.* idem ait: *Morborum naturæ medicæ*, atque ibidem Galenus *Com. 5. Text. 1. Hippocratem non esse ex illorum cœtu, qui naturam arte carere arbitrantur, sed eam esse artificem, animalibusque consulere*, tradidit. Hæc vero triplici differentia distinguitur; una siquidem *animalis* dicitur, quod functiones ad animam, seu ratiocinatricem facultatem attinentes obeat: *naturalis* altera, quæ ad appetitricem, altricem, generatricem: atque tertia *vitalis*, quæ vitæ custodiæ maxime præest. Has Galen. *in lib. IX. cap. 10. meth. medendi*, ita expressit: *Gubernans animal* (ut in lib. de Hippoc. & Platonis dogmatis est monstratum,) *tres diversi generis facultates toti corpori ex suo quodam veluti fonte, quæque distributæ: eas Plato animas vocat, propriam cujusque substantiam inveniens. Est enim earum quædam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis: quæ jecur veluti pro fonte habet: Canales vero ab hac in totum corpus sparsos, ipsas venas: hanc seu appetitricem, seu naturalem, seu altricem voces, nihil interest: veluti si animam aut facultatem. Altera est, quæ non modo, ut stirpibus at vita præditis, sed etiam ut animalibus anima est insita: Hæc sedem in corde habet, ipso quoque insiti caloris quodam ceu fonte. Ab hoc fonte canales arteriæ sunt, vocanturque hæ multis sane nominibus: nam & facultas, sive virtus vitalis, & facultas, sive virtus animosa, & anima vitalis, & anima animosa dicitur. Tertia anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet; ea voluntariis actionibus una cum sensibus præsidet.* Utitur & hæc particulis quibusdam seu canalibus, nempe ipsis nervis, sensum motumque per hos in totum animal trasmittens. Tres itaque hæ sunt facultates, quæ corpus a morbo defendunt, *animalis*, quæ cerebri, *vitalis*, quæ cordis, & *naturalis*, quæ hepatis curam habet. Hæ tribus alicujus arcis præfectis eam defendentibus comparantur, qui quum per se soli nequeant ejus defensionem tueri, seu recte sustinere, militibus utuntur, quibus ab arce infensos hostes propellant. Sic quælibet prædictarum facultatum pro militibus functionibus quibusdam contra morbos utitur. Donatæ etiam sunt facultates nonnullis instrumentis, quæ ipsis subserviant, quum corporum sanitatem curare studeant. *Animalis* siquidem facultas, (quam in cerebro sedem habere diximus) nervos, *vitalis* in corde arterias, ac *naturalis* in hepate venas habent; per has sanguis ad omnes corporis partes nutriendas labitur, ac per nervos iisdem partibus sensus & motus, atque demum per arterias vitalis spiritus a corde communicatur. Vivunt itaque corporis partes ope vitalis spiritus; Sentiunt, ac moventur ope animalis a cerebro per nervos in ipsas effusi atque emanantis; Nutriuntur denique a sanguine ipsis per venas a jecore accedente. Quælibet quoque pars vita non destituta a natura nervis arteriis venisque referta, continue ex sanguine, ac gemino nuper dicto spiritu, alitur,

Natura quomodo distinguitur.

Corpori tres in sunt facultates.

tur, vivit, ſentit, ac movetur. Hinc ſingulis corporis partibus adſunt ii ſpirituum calores, quibus functiones omnes, ſeu actiones, ſcilicet animales, vitales, naturales vitæ conſervandæ cauſa, obeuntur: hoſque calores, a quibus actiones eæ obeuntur, Medici merito vires appellant, quas natura ſingulis partibus, prout opus eſt, diſpenſat: quo etiam facultas diſpenſatrix a Medicis eſt nuncupata. Facultates vero omnes propriis actionibus perficiuntur. Naturalis quidem tres præcipuas habet, quippe nutritionem, auctionem, atque generationem; quibus multæ aliæ deſtinantur, quæ ſunt attratrix, retentrix, concoctrix ſeu alteratrix, ac expultrix: Sine his corporis partes neque generantur, neque nutriuntur, neque augentur. Non me latet his longe etiam plures, ſervientes huic facultati, actiones ab aliis recenſeri, quas tamen omnes ſub prædictis contineri haud ignoro. Attrahunt enim partes, quo nutriantur, alimentum, vel quo exonerent præcipuum, nobileque membrum, excrementum, ut veſicula bilem, lien ſanguinis fœcem, & urinam veſica. Retinent partes attractum alimentum, quoad ipſum perfecte coxerint, atque excrementum, donec copia diſtendendo, aut qualitate infeſta partes valde moleſtet. Coquunt non minus, quoad in ſubſtantiam partis nutriendam alimentum mutatur. Quod ut fiat, facultas pluribus utitur coctionibus, pro variis præparationibus, priuſquam partes ſimilares ſanguinem recipiant, ſibique ipſis ultima coctione edita aſſimilent. Variæ profecto in variis membris ad illud operis a natura deſtinatis concoctiones fiunt. Cibus in primis in ſtomacho ſuſceptus coquitur, poſteaque rurſus in venas attractus coquitur, quoad in ſanguinem mutetur; qui dehinc per venas ſingulis partibus conceſſus in ipſarum ſubſtantiam, poſtrema peracta coctione, mutatur. Expellunt etiam, aut quod alterari, ſeu coqui non poteſt, aut quod quantitate vel qualitate moleſta lædit. Hinc omnes partes, quoad poſſunt, noxios humores a ſe propellunt, ipſoſque partes aut naturæ, aut morbi alicujus ratione factæ debiles, recipiunt. Atque hæc de facultate naturali. Vitalis vero facultas, qua corporis partes vivunt, duabus tantum functionibus ſeu actionibus utitur, quippe pulſatione arteriarum, atque reſpiratione. Hac quidem frigidus aer per aſperam arteriam & pulmones ad cor vehitur, ut calor vitalis igneo temperamento donatus (qui abſque ventilatione, quin reſolvatur & marceſcat, ſervari non poteſt) ejus frigore coerceatur, neque diffluat, neque eſtinguatur. Pulmonum vero dilatatione (veluti eorumdem compreſſione innati caloris fuligines geniti evacuantur, puriorque vitalis ſpiritus redditur) cordis calor recreatur, fitque purior. Idem in toto corpore pulſatione arteriarum fit, quando ipſarum dilatatione (quam Græci *dyaſtolen* vocant) calor refrigeretur, & compreſſione, *ſyſtole* vocata, quod ex humorum deiiſtione in toto animante contractum eſt, veluti fumidum excrementum expellatur: quod Galen. in multis locis meminit, & *cap. 33. de cauſis pulſuum* hiſce verbis: *quod tuendi cauſa caloris univerſi corporis creati (ſcilicet pulſus) ſunt, quem refrigerent, & ſi quid ſit fuliginis ex ſuccorum aduſtione contractum, id excernunt e veſtigio.* Etiam illo loco dictum eſt, ad gigendum hos conferre animalem ſpiritum. Reſpiratio a natura facta eſt caloris innati cordis cauſa, ut refrigeretur, & a fumoſis halitibus expurgetur, & pulſatio arteriarum non minus addita eſt, caloris vitalis in toto corpore effuſi refrigerationis, atque purificationis gratia. Animales denique functiones plures exiſtunt, ſcilicet animalis ſeu voluntaria, quæ nervis atque muſculis eſt deſtinata, quintuplexque exiſtit, una ſenſitiva, quæ in alias quinque ſubdividitur, quippe in videndi, odorandi, audiendi, guſtandi, tangendique actionem, ſecunda eſt motiva, qua corporis ſingulæ partes moventur, tertia imaginandi, quarta ratiocinandi, & poſtrema memorandi. Hæque ſunt omnes facultatum actiones,

Facultas naturalis quæ?

Facultas vitalis quæ?

Facultas animalis quæ?

quæ inculpatæ, ac robuſtæ in corpore cognitæ naturam robuſtiſſimam præmonſtrant, plurimumque innati caloris ad ipſas facultates ipſam mittere, ac inſtrumenta quibus ea obeuntur: itaque primum ipſorum principium, nempe cerebrum facultatis ſedem nullo vitio teneri. Infirmæ vero debiles vel vitiatæ oppoſitum utique denotant; quando hæ, caloris (quem vires appellant) inopia, vel debilitate, aut vitio inſtrumentorum, aut ex cauſa morbifica ita obeantur. Ab actionum itaque robore & debilitate, totius naturæ potentia ſeu vis quanta ſit conjicitur. Sed quod nos hactenus univerſaliter conjecimus, nunc ſingillatim attingamus.

CAP. III.

De facultatum actionibus robuſtis cognoſcendis.

Facultatum actionum robur, unde cognoſcitur?

ACtiones, quæ in corpore perfectiſſimæ obeuntur, facultatis, a qua emanant, robur ideo ſignificant, quoniam nedum facultatis, ſed & illius ſedis (quod primum facultatis inſtrumentum Gal. vocat) atque aliarum partium, vel inſtrumentorum, primo inſtrumento inſervientium perfectæ ſanitatis certa ſunt indicia, ut Galen. *in* 1. *lib. cap.* 2. *de ſympt. cauſa* tradidit. Quum itaque in ægrotis, (ut ab animalis facultatis actionibus incipiamus), omnes quum interni tum externi ſenſus, ſcilicet viſus, olfactus, guſtus, tactus, nihil a ſtatu naturali mutati obſervantur, recteque, quod ad imaginationem, memoriam, rationem, atque motricem potentiam pertinet, tunc ſe habent, ſic robuſtam rectèque valentem facultatem cerebrum inhabitantem ſignificant, ut nihil omnino ipſam offenſam exinde præmonſtretur habuiſſe. Quod Hippoc. *in lib.* 2. *aphoriſm.* 33. nobis indicaſſe viſus eſt, quum dixerit: *In quovis morbo mente conſtare & bene ſe habere ad ea, quæ offeruntur, bonum: contrarium vero malum.* Naturaliter itidem homines reſpirare, atque arteriarum pulſus, magnos, vehementes, æquales atque ordinatos habere facultatis vitalis ſeu animoſæ fortitudinis nobis eſt indicio. Hoc Hippoc. in 1. *libro prognoſticorum pag.* 38. *lin.* 11. *text.* 25. ita exſpreſſit: *Spirationis autem facilitatem exiſtimari oportet, per quam magnam vim habere ad ſalutem in omnibus morbis acutis, qui cum febre ſunt, & in quadraginta diebus judicantur*, & Galen. *in comment. cap.* 7. naturalem reſpirationem appellavit ſpirationis facilitatem, ſignificantem neque thoracem, neque cor, ac pulmonem, neque præcordia doloris quamdam habere affectionem, quinetiam neque partes quaſdam iis admiſtas. Et *in lib.* 1. *de præſag. ex pulſibus*; de pulſibus, hanc facultatem robuſtam denotantibus, ita habet: *Vehemens enim pulſus a facultatis ſemper robore fit, ac quo ſit vehementior, tanto robur majus eſſe facultatis*. Non ſecus etiam de naturalis facultatis functionibus dicendum erit, ægrotos namque probe cibos appetere, atque ex ratione ſitire, optimum eſt, exindeque robur facultatis ſignificatur, non minus & partes ad ſe alimentum recte attrahere, retinere, concoquere, excrementumque per loca convenientia expellere; idem oſtendit *com.* 2. Ex quibus naturalis facultatis actionibus duæ ſunt præcipuæ, ad hujus potentiæ robur ac debilitatem denotandam, quippe excrementorum coctio atque excretio. De illa Hippoc. *lib.* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 948. *litt. F. text.* 45. *cap.* 9. & idem ait: *Coctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalubrem.* Et Gal. *in lib. de conſtit. art. medicæ* dixit: *Quibus omnibus hoc commune eſt, numquam morbum ſolvi poſſe, niſi prius in excrementis coctionis ſigna conſpiciantur.* Unde ſive aures male habeant, ſive oculi, ſive fauces, & ut ſummatim omnia dicam, coctiones omnes celerem criſin, ſalutiſque ſecuritatem indicant, & *in* 1. *de criſibus cap.* 8. ſcribit, coctionis ſigna numquam male

Animalis facultatis actiones robuſtæ unde noſcuntur?

Vitalis facultatis actiones robuſtæ unde cognoſcuntur?

Naturalis facultatis functiones robuſtæ, unde cognoſcuntur?

appa-

apparere. Non minus *in lib. 3. c. 4.* affirmavit, quum millies, dum criſes fierent, interfuiſſet, neminem umquam vidiſſe intereuntem, qui præcedentibus coctionibus criſin habuiſſet, & *in 1. aphor.* dixit, coctiones naturam morboſis cauſis prævalere perpetuo præmonſtrare. Hanc ſequitur excretio, quæ poſt coctionem apparens ſemper facultatis robur indicat, certamque ſalutem prænuntiat. Natura enim perpetuo hoc ordine procedit, ut prius concoquat, mox expellat. Quo omnis excretio poſt coctionem apparens optima & ſalutaris judicatur. Hæc vero duobus modis fit, uno modo, ſingulis corporis partibus propria excrementa in ipſis genita excernentibus; altero, quum multitudine humorum exſuperantium, vel qualitate, vel utroque modo eadem partes gravatæ excernunt. Quam excretionem præmonſtrant excrementa probe concocta, atque ſecundum naturam excreta. Quorum abſolutiſſimam tractationem poſtea, quippe in ultimo libro, inſtituemus. Hæc vero ita prodeuntia excrementa, perfectam, ut docet Hippoc. partium, a quibus procedunt, ſanitatem indicant. Altera vero excretio, in qua humores quantitate aut qualitate moleſti debito tempore vacuantur, expultricem faculcatem robuſtam, naturamque ipſam morbo prævalere, certo præmonſtrant. Cujuſmodi ſunt criticæ ſanguinis eruptiones, urinæ copioſiores, alvi dejectiones, vomitus, ſputa, atque ſudores. Hæ etenim omnes naturam quum robuſtam tum cauſis morboſis prævalentem ſignificant. De proba ſanguinis excretione Hipp. *lib. 1. epid. ſect. 2. pag. 951. litt. E. comm. 2. text. 65.* & idem ita habet: *Febribus autem ardentibus, quibus rite ac largiter ſanguis per nares erupit, ea de cauſa maxime ſervabantur.* Quod in Cleonactide *lib. 1. Epid. Ægr. 6. p. 982.* Pericle *lib. 3. Epid. Ægr. 6. p. 1102.* Virgine Abdera *lib. 3. Epid. Ægr. 7. p. 1103.* Herophyto *l. 3. Epid. Ægr. 9. pag. 1106.* Muliere moroſa *lib. 3. Ægr. 11. pag. 2108.* Lariſſa Virgine *lib. 3. Epid. Ægr. 12 p. 1110.* Metone *lib. 1. Epid. Ægr. 7. pag. 983.* atque in aliis multis ab Hippoc. *aphor 73* fuit obſervatum, de quibus ait: *lib. 1. Epid. pag. 951. litt. G. Sanguis autem plurimis erupit; præcipue adoleſcentulis, & adultis, quorum periit maxima pars, quibus ſanguis non erupit.* Et Gal. paullo poſt *com. 3. text. 88. de Metone* dixit: *Largæ de naribus eruptiones ſanguinis liberant fere.* Sane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus & ſervatus, quamquam non omnino tuta ſigna haberet. De urinarum vero probis excretionibus ſeu purgationibus poſt coctionem apparentibus Hippoc. *in 4. aphor. 74.* inquit: *In quibus ad articulos ſperatur abſceſſus, liberat ab abſceſſu urina multa, craſſa, alba facta.* Qua ſcilicet alba, craſſa, & copioſa cum multa ſubſidentia Nicodemum fuiſſe judicatum *in lib. 3. Epid. pag. 1108. Ægr. 10. com. 2. text. 2.* poſteritati tradidit, & Charionem *lib. 3. Epid. Ægr. 5. pag. 1072.* multis biliioſis. Nonnumquam etiam nigras tunc temporis excretas multis profuiſſe Gal. *in lib. 3. Epid. com. 3. text. 73.* his verbis affirmavit, dicens: *Equidem quamdam novi, quæ talibus urinis magna copia evacuatis, auxilium percepit:* & de dejectionibus ſalutaribus, naturam morbo prævalentem præmonſtrantibus, *in lib. 4. aphoriſm. 28.* Hippocr. ita habet: *Et, quibus ſurditas, ſupervenientibus biliioſis dejectionibus, ceſſat:* ac in *lib. 7. aphor. 17. Lippientem ab alvi profluvio corripi, bonum.* De Herophytoque judicato *in lib. 3. Epid. Ægr. 9 pag. 1106 Com. 1. Circa diem centeſimum alvus fuit turbata, multis biliioſis, durabantque diu multa talia.* Gal. vero clarius de hac excretione *in lib. 1. aphoriſm. 22* ita ſcribit: *Quando igitur poſt morbi coctionem aliquis humor vitioſus excernitur, tunc corpus a natura expurgatur, & propter hoc atrabilis, & alius omnis humor hujuſcemodi, ubi ſigna coctionis in morbi proceſſu apparuerint, bonam ſignificat evacuationem.* De ea itidem, quæ per vomitum fit, Hippoc. *in lib. 2. Prognoſt. pag. 41. lin. 3 aphoriſm. 15.* dixit: *vomitio autem utiliſſima eſt, quæ pituita ac bile permiſta quam maxime eſt*: & de excretionibus in ſuppuratis ait *lib. 6. Aphor. 15. Quicumque*

Excretio poſt coctionem duobus modis fit.

ex mor-

ex morbo laterali fiunt empyi, ideſt ſuppurati, ſi quadraginta diebus purgantur, a die qua fit ruptio, liberantur, & de ſudoribus *Progn. pag. 38. lin. 15. Sudores autem optimi ſunt per omnes acutos morbos, ſi per diem eveniunt decretorium, & integre ſedant febrem, ſi ex toto corpore prodeant, faciantque, ut æger ferat facilius morbum*. Atque hæ omnes ſunt excretiones expultricem facultatem robuſtam præmonſtrantes, quæ ſic valida contra morbum pugnat, ut interim ſola excretione ipſum ſuperet. Quod de Metone Galen. *in 1. Prognoſt. text. 35.* animadvertit, de quo ait: *Sane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione, & judicatus, & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet*. Ex hac prævalida excretrice facultate Hippoc. in iis, qui in ſecunda epidemica conſtitutione ægrotarunt, maximam utilitatem cognovit. Nam *in lib. Epidem. ſect. 2. pag. 558. litt. E. com. 2. text. 79.* hujuſce potentiæ tale commodum iis fuiſſe dixit, ut fere omnes, qui forte hac excretoria vi valuerunt, evaſiſſe animadverterit. Quæ res nobis ex ipſius ſermone conſpicua magis fit, qui eſt hujuſmodi: *At vero hoc ſtatu quatuor his præcipue ſignis ſervabantur; quibus enim aut ex naribus probe ſanguis erupiſſet; aut qui per veſicam urinas multas, & multo bonoque præditas ſedimento reddidiſſent; aut per ventrem, turbida bilioſa tempeſtive proceſſiſſent; aut qui in dyſenteriam incidiſſent. Multis vero uſuvenit, ut non ab uno illorum judicarentur, ſed per omnia plurimi excernerent, qui quidem gravius habere videbantur: Veruntamen omnes, quibus hæc acceſſerunt, ſuperſtites erant*. At de cognoſcendis robuſtis naturæ actionibus, hæc nobis ſufficient. Nunc ad debilium dignotionem declinemus.

CAP. IV.

De naturæ actionibus debilibus cognoſcendis, & primo ex animalis facultatis ſymptomatis.

Natura actiones tribus modis pralangueſcunt.

VAlidis ſeu robuſtis naturæ actionibus, quæ ipſam morbo prævalentem oſtendunt, recte perſpectis, ad debilium notitiam deſcendimus. Quæ ex Galeno *in 1. cap. de ſympt. cauſ.* tribus modis prælangueſcunt, ſcilicet ubi omnino tolluntur, aut diminuuntur, aut denique vitiantur. Unde in ipſis varius debilitatis gradus nobis innoteſcit: etenim maximam naturæ debilitatem actiones ſublatæ explicant, quippe quum ipſis facultas plane deſtituitur. Præſertimque ſi hæ, reſoluta aut emortua facultate, aut primo facultatis inſtrumento læſo, tales prodeant, ſeu deficiant. De his Hippoc. *in lib. 4. Aphoriſ. 49.* ait: *Si non videat vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, quicquid horum evenerit, mors proxima eſt*. Et in *Epidemiis lib. 1. Epid. p. 966.* in Philiſci Hiſtoria: *partes extremæ frigeſcebant, atque ad calorem amplius non redibant*. Et ex naturali facultate in Hermocrate *lib. 3. Epid. Ægr. 2. pag. 1062.* extincta: *perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat*. Minus malum vero portendunt, quod minorem quoque naturæ debilitatem denotent, quæ fiunt aut cum defectu, aut cum vitio, non tamen ex facultatis defectu vel vitio, neque primo ejus inſtrumento læſo (quando & hæ actiones imminutæ aut vitiatæ magnum periculum præmonſtrent) ſed læſis tantum inſtrumentis primo ſervientibus, cujuſmodi ſunt ſurditates, cæcitates, paraplegiæ, tremores, atque aliæ actiones diminutæ aut vitiatæ, quarum ii affectus ſymptomata exiſtunt, quæ læſis inſtrumentis primo quippe cerebro ſervientibus concitantur. At hanc rem accuratius attingamus & illuſtremus per ſingulas tres facultates diſcurrendo, ab animali exordientes; quæ quum triplicem habeat potentiam, nimirum ratiocinatricem, motricem, ac ſenſitivam; nunc de prima agamus. Itaque ut nuper diximus,

Animalis facultas pralanguida. Ratiocinatrix

ægro-

ægrotos mente conſtare optimum eſt, quippe quod facultatem adverſus morbum animalem viribus maxime valere denotet, ita ſublata ratione ac diſcurſu eamdem maxime languidam, atque morbo imparem viribus comprehendimus. Ipſamque facultatem, aut primum inſtrumentum, nempe cerebrum, quod alias ejus ſedem eſſe diximus, aut alia inſtrumenta, primo ſubſervientia, aut denique omnia ſimul læſa cognoſcimus. De quibus in *Prorrheticorum text.* 8. *Prælanguentium deſipientiæ peſſimæ*, ut & Thraſynonti contigit, &c. *Tremulæ*, *Prorrh. lib.* 1. *text.* 34. *obſcuræ*, *blandæque*, & *contractabiles deſipientiæ*, *valdæ phreniticæ*, ut Didymacho obvenit. Nec non *a ſanguinis*, dixit Hippoc. *in* 7. *aphoriſm.* 9. *profluvio deſipientia*, *aut convulſio*, *malum*. Hæc ſane ſymptomata ſunt, quæ facultatem reſolutam conſequuntur, Sicuti veras omnes phrenitides (quoniam cerebrum primum facultatis inſtrumentum maxime læſum explicant) Galenus plerumque letales eſſe, putat: quo in primo *Prognoſt. text.* 36. omne genus phrenitidis eſſe exitioſum affirmavit; & in primo *Prorrheticorum* dixit, *eas*, *quæ in tremorem finiuntur*, *quod fiant facultate reſoluta nervis ſupra modum arefactis*, *exitialiſſimas eſſe*. Idem fere denotare deſipientias, quæ cum ſtudio fiunt, Hippocrat. *Coac. Præſag. text.* 47. & *lib.* 6. *Aphoriſm.* 53. ſtatuit, quia a flava bile cerebrum lædente oriuntur; omnium maxime letales eſſe a flava bile, nimio calore ad exuſtam accedente, concitatas, qua amentes furioſi ferarumque modo effrenes, iracundi feroceſque homines redduntur. Continuæ itaque hæ deſipientiæ cum febre continua (quod & cerebrum peſſimo humore lædi, & ea læſione quam brevi facultatem exſtinctam iri præmonſtrent) naturam viribus morbo longe infirmiorem ſignificant. Quare quum ratio tum immaginatio admodum læſa virtutem maxime debilem oſtendit. Memoria quoque eodem modo ſublata aut imminuta, aut vitiata, idem fere in morbis acutis denotat: quam memoriam in ea peſte, quæ Athenas devaſtavit multos peſte infectos ita perdidiſſe, ut neque conſanguineos, neque amicos cognoſcerent, neque (quod mirabilius eſt) ipſorum nomina recordarentur. Thucid. hiſtoricus narrans, iſtius quoque potentiæ debilitatem attigiſſe, viſus eſt. De hac ipſa Hippoc. *in lib.* 3. *Epidem. pag.* 1085. *litt. E.* ſcripſit: *Oblivio ſub acceſſiones*, *languor*, *vociſque defectus*, & Gal. *in Comment. Et oblivio manifeſta eſt*, & *monſtrata frequenter eſt*, *de exitialibus eſſe*, & *in lib.* 1. *text.* 64. Prorrheticorum: *Ignorantia cum rigore malum*; *malum quoque oblivio*. Ex quibus actionibus ita læſis licebit facultatis impares cum morbo vires; & maxime prælanguidas cognoſcere. Ceterum quum hæc recitata ſymptomata, nonnumquam ſint ſigna judicatoria, quæ ante ſalutarem criſin conſpici ſolent, ideo accuratius ab iis, quæ facultatem debilem denotant, erunt diſtinguenda. Idemque faciendum in aliis omnibus cujuslibet facultatis actionibus læſis, naturam debilem ſignificantibus. De quibus Galenus *in primo de Criſibus* ita habet: *Quæ vero veluti horum ſigna indicativa ſunt*, *deliria exiſtunt*, *atque vigiliæ*, & *ſomni graves*, & *dolores*, & *lacrimæ*, & *difficultates ſpirandi*, & *tenebræ oculis obortæ*, & *quæcumque ſimilia*, *etenim hæc*, *ſi abſque coctionis ſignis apparuerint*, *ſunt peſſimarum diſpoſitionum indicia*. *Hæc in morborum principiis*, *quo tempore natura nondum humores concoxit*, & *ſuperavit*, *apparent*. De his Hippoc. *in ſecundo Prognoſticorum*, in hunc modum ſcripſit: *Ceterum in principiis febrium ſive delirium acceſſerit*, *ſive alicujus membri ſideratio*, *periturum hominem*, *ſciendum eſt*, *ſi non omnino aut ex optimis ſignis aliquod accedat*, *aut corporis vires adſint*. Signa vero criſin indicantia in ſtatu morbi obſervari Gal. in *primo de Criſib.* ſtatuit, ac ipſa poſt ſigna coctiones perpetuo eſſe ſalutaria. At modo ad id, ex quo digreſſi ſumus, redeamus. Cognitaque natura virium ex ratiocinatricis potentiæ actionibus læſis debilitate, nunc ſymptomata quoque, quæ motricem facultatem prælanguidam oſtendunt,

natricis facultatis debilitas unde noſcitur?

Motricis facultatis debilitas unde noscitur?

dunt, attingamus. Partes itaque corporis motu atque sensu destitutæ facultatem animalem resolutam indicant. Quo Hippoc. *lib.* 2. *Aphorism.* 42. dixit: *Solvere morbum, quem apoplexiam vocant, fortem impossibile, debilem vero non facile.* Quemadmodum optimum est corpora facile moveri, ita non recte moveri malum. Hippoc. *in lib.* 3. *Prognosticor. pag.* 39. *lin.* 33. *aphoris.* 46. ait: *Qui dolore vexatur, facile convertatur, sitque resurgendo levis oportet; si corpus omne grave est, & item manus ac pedes, majori cum periculo est.* Sunt itidem aliquarum tantum partium resolutiones (quas paralyses Græci vocant) prælanguentem naturam præmonstrantes, eæque præsertim, quæ læso cerebro excitantur. Cujusmodi in febribus continuis est aphonia, scilicet vocis resolutio, de qua auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 96. habet: *Quæ cum exsolutione fiunt & Catochæ, & aphoniæ pernicioſæ sunt.* Fiunt vero hæ non raro etiam ob convulsiones linguæ, vocis nimirum instrumentis multo humore imbutis, aut ab igneo calore admodum exsiccatis, quo pejus malum est. At quæ læso cerebro exsoluta facultate fiunt, letales existunt, uti in Sileno observatum est, de quo Hippocrates *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 969. ait: *Septimo die obmutuit, & in Philini uxore, ibid. Ægr.* 4. *pag.* 976. *die septimodecimo.* Sed hæ pernicioſæ resolutiones apparent semper cum aliquo ex exitialibus signis, quando nonnullæ, ut nuper dictum est, aliquando fiant, partium resolutarum læsis tantum instrumentis, ac aliquando criticæ, qualis in muliere trimestri fetu gravida *ibid. Ægr.* 18. *p.* 990. apparuit, *ipsa enim die tertia obmutuit, quæ quinto sudore fuit judicata.* Quæ vero læso cerebro fiunt, semper cum aliis pravis signis nobis innotescunt, qualis fuit, quæ in Pythione illuxit, de quo Hippoc. *lib* 3. *Epid. Ægrot.* 3. *pag.* 1098. ait: *Altero die sub meridiem extremæ partes frigebant, præter ceteras manus & caput, obmutuit brevispirans, redjit calor.* Hanc aphoniam Galen. *in comment.* docuit caloris refrigerationem, & maximam virium imbecillitatem prænotare. Atque sic ex sublato motu, ac diminuto, partium corporis facultatem animalem debilem, viribusque morbo infirmiorem cognoscemus. Ex vitiatis quoque motricis potentiæ actionibus, quarum symptomata sunt convulsiones, singultus, tremores, rigores, & horrores, idem perquirendum est, hæc enim symptomata itidem naturam, & præsertim animalem, morbo infirmiorem denotant. De convulsionibus Hippoc. *in lib.* 4. *Aphoris.* 66. ita habet: *In acutis febribus convulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum, & ubi lib.* 5. *Aphor.* 3. *sanguis multus fluxerit, convulsio aut singultus superveniens, malum.* Et postea *lib.* 7. *Aphor.* 3 *A vomitu singultus & oculorum rubor, malum; & lib.* 7. *Aphorism.* 10. *ab ileo vomitus, singultus, desipientia, vel convulsio, malum.* Tremores eodem modo in acutis morbis, quod hanc facultatem debilem præmonstrent, male apparent; omnium vero maxime, si a vehementi phrenitide appareant, letales existunt, teste auctore *Prorrheticorum in* 1. *lib. text.* 9. qui ait, *phrenitica in vehementer trementia finiuntur.* Et postea *text.* 14. *Mente ob melancholiam aberrantibus tremores supervenientes, maligni.* Galen. *in comm. text.* 2. ait: *Quum igitur talem ob affectionem tremor fiat, vehementer exsiccatos ostendit nervos, atque ob id hominem letaliter habere;* & paullo post: *Qui ergo ex atra bile, mente aberrantem superveniente tremore, certo moriturum affirmat, non fallitur.* Et de rigore itidem prælanguidam hanc facultatem indicante, *in* 1. *lib. Prorrhet. text.* 64. *Ignorantia cum rigore, malum, & a rigore text.* 65. *refrigeratio non recalescens, malum; & post text.* 69. *oculorum perversionem in febre laboriosa rigor superveniens, mortem fatetur.* Et Hippocrates *in lib.* 4. *Aphorism.* 46. *Si rigor inciderit febre non intermittente ægro jam imbecilli, exitialis.* Et *in* 7. *lib. Aphor.* 7. *Ex multa potatione rigor & desipientia, malum.* Rigor etiam in febre acuta, quam aut nulla evacuatio sequatur, aut non bona, facultatem maxime debi-

debilem oſtendit, veluti mulieri, quæ in foro mendacium decumbebat, eveniſſe Hippoc. *lib. 3. Epid. Ægr.* 12. *pag.* 1080. vidit, quam ait ante exitium rigorem habuiſſe, cum ſudore frigido, qui eſt peſſimus, ut poſterius oſtendemus. idem notant horrores, de quibus Hippoc. *in lib. 3. Epidem. com. 3. text. 3. pag.* 1089. *litt. G.* ſcripſit: *Horrebant & ſub mortem delirabant, ut Critoni lib.* 1. *Epid. Ægrot. 9. pag.* 985. *accidit*. Vigiliæ etiam debilem facultatem ea ratione ſignificabunt. Aſſiduæ enim vigiliæ vires maxime reſolvunt, cerebrumque ſiccant. Quo Hippoc. *Progn. pag. 39. lin.* 52. ait, *hominem neque noctu, neque interdiu dormire peſſimum eſſe*: hinc etiam addidit, *lib.* 2. *Aphor. 3. vigilias quæ modum exceſſerint, malas*. Interdum vero vigilant ægroti non ſiccato cerebro, atque exſtincta facultate reddita debili, ſed antequam fiant criſes ſalutares, ut Gal. *in l. 3. c.* 5. *de Criſib.* meminit, quod & *ad ſect. 4. Aphor.* 71. ita habet: *Vigilant enim magna ex parte & graviter ſe habent, ac febricitant vehementius ægri, quanto propius ad judicationem accedunt*. Sed, ut alias quoque dictum eſt, hæ vigiliæ, ſignis coctionis prægreſſis, excitantur, illæ facultatem debilem ſignificantes principio morbi, quo tempore omnia cruda exſiſtunt. Aſſiduæ vero & diu durantes peſſimæ exſiſtunt, quippe naturam partim exſolutam, & partim exſolvi præmonſtrantes. Quales in uxore *lib.* 1. *Epid. Ægrot.* 11. *pag.* 987. Dromeadai, atque in illo, qui caleſcens *ibid. Ægr.* 12. *pag.* 988. cœnavit. Hippoc. *in 3. Epid. 3. text.* 28. *Aphor.* 18. vidit. Hic quidem a die ſexta uſque ad undecimam, in qua obiit, aſſidue vigilavit. *Peſſimam itidem vigiliam in acutis morbis cum convulſione eſſe*, Hippoc. *in lib. 7. Aphoriſ.* 18. ſtatuit. A ſomno etiam hujus facultatis debilitatem cognoſcere poſſumus. Immoderatus enim ſomnus malus eſt, & exitialis longas vigilias in acutis morbis ſecutus. Loquor vero de ſomno profundo, quem *coma* Græci vocant, & Gal. in ſomnum delationem ſive inclinationem appellat; qua ægri quin dormiant, ſe continere nequeunt, atque etiam profunde ſic dormiunt, ut vix expergiſcantur, ſtatimque in ſomnum deferuntur. Hos ſomnos veternoſos Gal. in *6. Epidem. com. 6. in text.* 8. vocat, qui perpetuo prælanguidam facultatem denotant, omniumque maxime, ut diximus, qui calidioribus, ſiccioribuſque morbis ſuccedunt, quoniam frigiditas, ex qua fiunt, eſt letalis. Quod Gal. *in lib. 3. Epidem.* hiſce verbis expreſſit, dicens: *Nam inſanabilia ea eſſe demonſtratum eſt frigora, quum calidis & ſiccis morbis contingunt*. Addimus ſomnum eſſe actionem naturæ, qua humores in viſceribus concoquuntur, & digeruntur. Quod inde omnis calor ab extra intus feratur, ut Gal. *in 6. Eidem. com. 5. text.* 37. tradidit. *Quum vero ægri dormiant, morbuſque nihil exinde minuitur maximo eos teneri morbo, quem facultas vincere nequeat, nobis eſt argumento*. De quo Hippoc. *lib.* 2. *Aphoriſm.* 2. dixit: *Ubi ſomnus delirium ſedat, bonum, &c. ibid. Aphoriſm.* 1. Quibus in morbis ſomnus laborem facit, mortale. Si vero non juvet, mortale; ſomnus itidem nimius ſimul cum vigilia idem denotabit, quippe facultatem morbo viribus imparem, atque debilem. De his Hippoc. *in 3. Epidem. com. 3. pag.* 1085. *text.* 16. dixit: *Comatoſi rurſuſque inſomnes erunt*. Et paullo poſt, *detinebantur aut comate perpetuo, non ſomnolento, aut vigiles erant cum laboribus*. At ad ea ſymptomata, quæ actiones ſentientis facultatis debiles, quippe, aut ſublatas, aut imminutas, aut vitiatas, quibus hæc ſentiens potentia debilis ſignificatur, oſtendunt, deſcendimus. De quibus, ut a viſu incipiamus, Hippoc. *in lib. 4. Aphoriſm.* 49. habet: *Si non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, quicquid horum evenerit, mors proxima eſt*. Symptomata vero omnia, quæ viſoriam potentiam prælanguidam morboque imparem viribus, denotant, Hippocrates addidit *in primo libro Prognoſt. pag. 37. lin.* 15. *& ſeq.* ſic ſcribens: *Si enim lucem effugiant, aut nolentes illacrymant, aut*

Actiones ſentientis facultatis debilium ſigna.

aut pervertantur, aut alter altero fuerit minor, aut candidum rubidum habeant, aut lividas, aut nigras venulas, aut ſordes appareant circa oculos, aut ſublimes, tumidive oculi, vel cavi admodum fuerint, & obſcuri, quippe ſine ſplendore, vel totius color evariet vultus; hæc omnia mala eſſe atque exitioſa cenſendum eſt. Et poſtea: *Conſiderari autem convenit hunc in modum ſuſpectiones etiam oculorum per ſomnum; ſi quid enim candidæ partis ſubapparet commiſſis palpebris, nec alvi fluor aut medicamentum in cauſa eſt, aut nec ita dormire conſuevit, vitioſum indicium, letaleque admodum eſt.* Idem ſurditas ni fuerit critica, in morbis acutis oſtendet, de qua *in Coacis præſagiis text.* 196. legitur: *In febre acuta aures obſurdeſcere furioſum eſſe,* & in 1. *Prorrheticorum text.* 32. *Surditas in acutis & turbulentis, malum.* Idem ex aliis ſenſibus, aut ſublatis, aut imminutis, aut denique vitiatis in morbis acutis, crudoque exiſtente morbo, erit conjiciendum. Quotieſcumque etiam ægroti morbos non ſentiunt, aut delirium, aut emortuam ſentiendi facultatem prænotant. Hipp. *in* 2. *Aphoriſm.* 6. ait: *Quicumque dolentes parte aliqua corporis omnino dolorem non ſentiunt, iis mens ægrotat.* Addimus, ni id exſtincta ſentiente facultate fiat. Idem partes extremas corporis frigidas ſentiri, quum internæ urantur, nobis præſagient; quod Hippoc. *in lib.* 4. *Aphoriſm.* 48. ita expreſſit: *In febribus non intermittentibus, ſi partes exteriores frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeant, letale.* Peſſimum eſt, extrema refrigerata non amplius recaleſcere; quod de Sileno moribundo Hippoc. meminit, dicens: *Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem illæ amplius redibant.* Ex iis itaque omnibus actionibus, a ſuo naturali ſtatu valde mutatis, quippe vel ablatis, vel diminutis, vel maxime vitiatis, facultatem animalem debilem, morboque viribus imparem conjicimus: maximeque, ſi vel hæ omnes, vel plures eo modo læſæ ſua munera non recte obire comprehendantur. Ad quam rem accuratius dignoſcendam, omnia earum actionum cum ſymptomata, tum inſtrumentorum ipſis famulantium morbi erunt attendendi: veluti in videndi actione ablata nuper ex Hippocrate complura exempla adduximus: qui quum nobis ex illa ſublata actione prælanguidiſſimam facultatem viſoriam ſignificare voluerit, non ſolum ægros acuto morbo laborantes non videre, aut diminute quidem, at ſimul etiam viſus inſtrumenta varia quum ſymptomata, tum morbos pati docuit *in* 1. *Prognoſt. pag.* 37. *lin.* 15. *text.* 13. Nam non ſolum ægroti, ſi lucem effugiant, aut nolentes illacriment in acutis morbis, malum eſt; at longe pejus erit, oculorum altero alterum ſimul convelli, aut intumeſcere, aut inflammatum albumen rubrum videri, aut cavos admodum, vel ſine ſplendore oculos eſſe, & alia hujuſmodi multa in oculis obſervari: quæ & cerebrum, &, ei quæ ſerviunt, inſtrumenta maxime læſa oſtendunt, atque ex iis facultatem quoque unam periiſſe. Quæ omnia poſtea nos accuratius tractabimus, quum ſpeciatim de prædictione a cujuslibet facultatis actionibus, & a partibus corporis agemus. At ex aliis aliarum cognoſcendarum facultatum actionibus inſtitutum noſtrum proſequamur.

CAP. V.

De actionibus facultatis vitalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis.

EX multis ſymptomatis, quæ potentiam ſeu facultatem vitalem debilem, quippe aut ſublatam, aut imminutam, aut denique vitiatam oſtendunt, duo præcipua ſunt, reſpiratio nimirum, atque pulſus a ſuo naturali ſtatu mutatus, ad quæ nonnulla alia accedunt, uti cordis palpitatio, ſincope, & refrigeratio. A reſpiratione vero exordientes, dicamus, ipſa nimirum reſpira-

Reſpirandi actiones læſæ.

ſpiratione intercepta animal mori, uti in anginoſis, pleuriticis, peripneumonicis, orthopneicis, atque ſuppuratis obſervatur. Quæ itaque in morbis acutis reſpiratio magna eſt, atque rara, præſagit delirium; cujuſmodi in Sileno viſa eſt, de quo Hippoc. *lib. 1. Epid. Ægr. 2. pag. 969. text. ult. a primo hic ad finem uſque ſpiritum magnum habuit, & rarum*, & de Melibœæ etiam adoleſcente *lib. 3. Epid. Æg. 16. pag. 1117. Sequentibus diebus ſpiritus rarus, & magnus per intervallum*. Quæ vero rara & parva obſervatur, exitialis eſt: de qua Galenus *in 3. Epidem. com. 3. in text. 74.* ita habet, *parvum eſſe quemdam pariter & rarum ſpiritum, qui quum refrigeratur, & emoritur jam vitalis facultas, ſit*. De frigido vero, qui fere extincta facultate editur, ait Hippocr. *Progn. pag. 38. lin. 10. Si frigidum e naribus, & ore exſpiretur, exitiale jam eſt admodum*. Eſt etiam parvus & frequens ſpiritus non minus malus, quum& ipſe nativum calorem, ut Galenus docet, extinctum ſignificet; qualem in Pythione Hippocr. *lib. 3. Epid. Ægr. 3. pag. 1098. breviſpirum* appellavit. Pravum itidem eſt, magnum ſpiritum ſeu reſpirationem in parvam, & raram in frequentem mutari, quæ in Dealcis uxore fuit obſervata, de qua Hippocrates *in Epid. 3. Ægr. 15. p. 1114. text. 85. Decimoquarto, ſpiritus rarus, magnus per intervallum, rurſuſque breviſpirus*. Omnium maxime exitialis eſt etiam reſpiratio, quæ e ſolis naribus editur, & non ex ore; in qua quum thorax debilius, quam ad reſpirationem conveniat, moveatur, neque commode dilatetur, etiam pinnæ narium contrahi, & moveri videntur; quod Gal. *in lib. de Loc. Affect.* hiſce verbis docuit: *Quippe, ſi videatur laborans inter ſpirandum totum movere thoracem, ut in parte quidem anteriore ad jugulum, in utroque latere ad ſummum humerum, in poſteriori parte ad ſcapulas uſque motus ipſius aſcendat, tres ex hujuſmodi ſpiratione affectiones ſignificant. Una eſt flammea in pulmone atque corde caliditas, altera in aliquo ſpiritualium inſtrumentorum anguſtia, tertia eſt facultatis muſculos thoracis moventis imbecillitas*. Inæquales itidem reſpirationes, & interruptæ, quæ convulſionum modo fiunt, perpetuo peſſimæ exiſtunt. Reſpirandi hæ itaque actiones læſæ vitalis facultatis impotentiæ nobis ſunt indicio. Eodem quoque modo arteriarum pulſationes, vel prorſus ſublatæ, vel maxime imminutæ, vel vitiatæ, ſeu, ut unico verbo dicam, maxime a ſuo naturali ſtatu mutatæ, idem præmonſtrabunt. Itaque quum vehementes pulſationes omnium maxime robuſtam facultatem ſignificent, ut Gal. *in lib. 2. de Præſag. ex Pulſibus* eſt auctor, ita languidæ imbecillam, quam rem Gal. ita expreſſit, dicens: *Vehemens pulſus a facultatis ſemper robore fit, ac quo fit vehementior, tanto robur majus eſt facultatis. Languidus ex facultatis imbecillitate, ac quo ſit languidior, eo facultatem quoque imbecilliorem eſſe demonſtrat. Ceterum omnes pulſus*, (ait Galen. *in Synopſi de Pulſibus cap. 7.*) *qui a naturali ſymmetria multum recedant, non boni ſunt*. At certe languidiſſimus, & tardiſſimus, & rariſſimus, omnium eſt deterrimus; poſt hos autem minimus, & molliſſimus, & duriſſimus, poſtea frequentiſſimus, at non celerrimus, neque maximus; ſed hi ſunt modici: periculoſi, ſolus autem in extremis optimus eſt omnium vehementiſſimus. Infirmam vero denotant facultatem parvi, anguſti, humiles, tardi, languidi, intermittentes, minus deficientes, vermiculantes, formicantes, atque omnes, qui ad extremum pervenerunt, exceptis vehementiſſimis. Quare hi omnes pulſus, ſeu arteriarum pulſationes, debiles ac admodum a naturalis ſtatu mutatæ, conſpectæ facultatem vitalem morbo viribus imparem oſtendunt, & quæ nullo modo fiunt, eam exſtinctam prædicant; atque his non minus, tardiſſime quæ obeuntur ac rariſſime, nec numquam in pulſando ſæpius, & multum intermittunt. De quibus Gal. *in 2. cap. 4. de Præſag. ex Pulſibus* ita ſcribit: *Nam ſi hactenus procedat, ut unius pulſus, vel alterius videatur tempus quieſcere,*

Arteriarum pulſationum actiones læſæ.

inſtar

inſtar veterni eſt, aut apoplexiæ cujuſpiam, aut reſolutionis actionum voluntariarum; qualia enim hæc in aliud principium ſunt, quod ſedem habet in cerebro, tale quiddam pulſuum eſt quies adverſus principium, quod in corde ſitum eſt, & ut recte de illo eſt dictum, apoplexiam non poſſe fieri, ut propulſetur, ſi ingens ſit: ſin levis ſit, non ſine magno negotio: ita etiam dicitur hic recte, quies pulſuum ſi ſit diuturna, ut tollatur non fieri poſſe. Sin brevis ſit, non citra negotium. Porro diuturna eſt, quæ excedit duorum pulſuum tempus, brevis, quæ intra duorum pulſuum tempus manet. Quies vero temporum unius pulſus inter omnes intermiſſiones moderatiſſima eſt, multique ex ea ſenes pariter & pueri evaſerunt, juvenum autem ne ex hac quidem ullus. De raris vero ac tardis pulſibus *in lib. Synopſ. de Pulſ. cap. 33.* ſic ait: *Quæ igitur eſt in ipſo cordis corpore refrigeratio magna, eatenus etiam pulſus languidos efficit & tardos & parvos, quatenus & ipſa dominatur. Quæ vero ab aliqua alia parte proficiſcitur, raritatem pluſquam alia prædicta genera a naturali ſtatu amovet. Ubi ergo corpus ipſum cordis refrigerationem ſuſcipiat, mors inevitabilior eſt, ac raritas quidem pulſuum eſt uſque adeo perniciosa.* A reſpiratione itaque ac pulſibus arteriarum ſic nos vitalis potentiæ debilitatem diſcere quimus, tum vero ab animi deliquiis, quæ ſyncopes Medici appellant, tum a cordis palpitationibus, de quibus Hippocr. *in ſecunda ſect. Aph. 41.* ita meminit: *Qui frequenter ac fortiter abſque cauſa manifeſta exſolvuntur, derepente moriuntur*; & Galen. *in Commento: Sicuti & ille, cui dum exſolveretur, cor fortiter palpitabat, atque hic derepente mortuus eſt, non aliter quam illi, qui acutiſſimis cordis affectibus, quos ſyncopes vocant, arripiuntur.* Sed de ſymptomatibus vitalem naturam prælanguidam, morboque infirmiorem denotantibus hæc ſufficient. Nunc illa, quæ naturalis potentiæ impotentiam ſeu debilitatem declarant, itidem ſpectemus.

CAP. VI.

De debilibus actionibus facultatis naturalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis.

Nutritio quomodo perficitur, & hujus neceſſitas.

Dictum eſt alias, unam præcipuam eſſe actionem, qua corporis partes omnes conſervantur, ſcilicet nutritionem, ob hanc enim corpora diu vivunt, & ſine ipſa contabeſcunt. Hujus ope humidi ſubſtantifici, quod in partibus corporis conſumtum, ſeu exhauſtum eſt, ſeu reſolutum, continue reſtauratur, atque regeneratur. Huic autem quatuor actiones famulari ſuperius diximus, unam quippe cibum, ſeu alimentum, ſeu nutrimentum attrahendo, alteram retinendo, tertiam coquendo, ac quartam excrementum expellendo, ſeu excernendo; hiſque non minus actionibus robuſtis exiſtentibus, animal probe nutriri atque vivere. Nunc oppoſitum illis prælanguidis exiſtentibus fieri ſtatuimus; ſcilicet in corporis partibus innutritionem fieri, *atrophiam* Græcis dictam, qua corpora ſiccantur & contabeſcunt. Stomachus autem inſtrumentorum naturali huic potentiæ ſervientium præcipuus, ante eas quatuor actiones, alia etiam utitur, ſine qua aliarum uſus haud recte conſiſteret. Hæcque cibi atque potus appetentia dicitur, quæ a penuriæ ſeu carentiæ pabuli ſenſu prodit, atque innoteſcit. Duplexque hæc appetentia, ſive appetitus, unus cibi, quem famem, alter humidi ſeu potus, quem ſitim appellant. His ſi careant corpora, morbis inculpata, diu non vivunt, in morbis longis nihil cibi inappetentia eſt deterius. Quo dixit Hippocrates *lib. 7. Aph. 6. in morbo diuturno cibi faſtidium, malum*; & Galenus *in Commento: Faſtidium cibi per ſe ipſum pravum eſt ſignum in morbis diuturnis.* Nam in iis, qui a talibus morbis ſunt evaſuri, contrarius affectus ſolet accidere, vehemens ſcilicet ci-

Naturalis facultatis debilitatis cognitio ex nutritione vitiata.

borum

borum appetentia. Quod ſpeciatim *de Dyſentericis* Hippocr. *lib. 6. Aph. 3.* clarius hiſce verbis expreſſit: *In difficultatibus inteſtinorum cibi faſtidium, malum, & ſi cum febre pejus.* In morbis vero acutis nihil eſt deterius, quam ægrotos quum ciborum omnium, tum potus appetitu carere, etenim duorum alterum neceſſario ſequetur, aut eos mente motos eſſe, aut naturalem facultatem ſtomachi exſtingui, ut Galen. *in lib. 2. Aphoriſ. 6.* affirmavit. De quibus plura apud Hippoc. exempla habentur, quibus in morbis acutis ciborum, potuſque ſublatum deſiderium, ſeu appetitus, letalis, dignoſcitur, quod in Hermocrate Euryanactis virgine, Pario, muliereque apud frigidam aquam decumbente, & in aliis, qui obierunt, fuit obſervatum. De Hemocrate Hippoc. *in 3. Epid. Ægrot. 2. pag. 1062. com. 3 text. 3.* ait: *Toto tempore cibos averſabatur, & paullo poſt guſtare quicquam non valebat;* & de virgine Euryanactis in libro tertio *Epid. Ægrot. 6. pag. 1073. text. 3. Quoſvis cibos toto hoc tempore faſtidivit, neque appetivit quicquam, non ſitiit:* & de muliere apud frigidam aquam *lib. 3. Epid. Ægrot. 3. pag. 1096. Cibum faſtidiebat.* Idem de ſiti dicendum erit, nimirum ſublatam in ardentibus febribus aut delirium, aut facultatis naturalis exſtinctionem, denotare; de hac Galen. *in primo Epid.* ita ſcribit: *Huc acceſſit ad cumulum aliud ſignum exitioſum, quod quum antea æſtuaſſent, amplius non ſitirent, atqui, quando, qui antea ſiti ſtagrarent, poſtea eſſent a ſiti liberi, horum duorum ſit neceſſe eſt alterutrum, aut morbi ſolutio, aut virtutis exſtinctio, ita ut præſentia mala amplius non ſentiant.* Uti in Hermocrate atque in aliis moribundis viſum eſt, de illo Hippoc. *lib. 3. Epid. Ægrot. 2. pag. 1062. Com. 2. text. 75.* dixit: *lingua inaruit, non ſitiebat.* Atque hæc de naturalis facultatis infirmis, ſeu debilibus actionibus, ex appetitus ratione cognoſcendis, nobis ſufficiant. Nunc de reliquis quatuor agamus. Itaque partes corporis, ſi improbe humores, quibus nutriuntur, attrahant, in innutritionem (quem affectum Græci *atrophiam* vocant) neceſſario incurrent. Idem, & quæ attractum humorem, quod coquatur, non retinent, denotant, facultatemque debilem eſſe præmonſtrant. Uti in lienteria ſeu levitate inteſtinorum (quod ſymptoma quum perpetuo malum, tum in acutis morbis, quia ſublatam retentricem ſignificat, ſumme exitioſum eſt,) obſervamus. Eodem modo concoctricem, ſeu alteratricem ſublatam, diminutam atque vitiatam (quos affectus Græci *apepſiam, bradipepſiam* ac *diſpepſiam* vocant.) ejuſdem naturalis facultatis debilitatem denotare non minus, quam expultrix itidem læſa faciat, eſt dicendum. Quare ex quatuor iis læſis actionibus hujus facultatis imbecillitas nobis innoteſcet. *Ex ſiti.*

Quas actiones, quippe attractricem, retentricem, concoctricem, atque expultricem, læſas excrementa e corpore exeuntia maxime oſtendent, nimirum, quæ ex ventre, ſtomacho, pectore, veſica, & ex cutis meatibus rejiciuntur, non minuſque a ſanguinis eruptionibus. Quibus addimus abſceſſus tumoreſve in corpore erumpentes, qui ad excretricis vim dignoſcendam maxime faciunt. Itaque has quatuor actiones naturalis ſcilicet facultatis ſublatas, imminutas, atque vitiatas, primo ex malis alvi dejectionibus cognoſcamus, poſtea, ex malis itidem urinis, ſputis, vomitibus, ſudoribus, & a ſanguinis eruptionibus, ac vel etiam ab abſceſſibus erumpentibus. De malis vero dejectionibus actiones naturalis potentiæ debiles denotantibus, Hippoc. *in lib. 3. Epid. pag. 1085. lit. F. com. 33. text. 40.* ita habet: *Alvus his pleriſque turbata erat, atque dejectiones crudas excernebant, & multas & tenues.* Et in libro 5. Aphor. 12. *Quibuſcumque tabe laborantibus capilli a capite defluunt, iis alvi profluvio ſuperveniente, moriuntur.* Et in libro ſeptimo Aphoriſm. 16. *a pueris ſputo phtiſis, & fluxus.* Quod Gal. *in Com. Aph. 65.* ita eſt interpretatus: *Fluxum autem vel de capillorum defluvio, vel de humida dejectione, protulit:* ambo conſueverunt evenire, quum tabidi ad extremum mali, perducuntur: alterum ex ſiccitate, altera ex potentiæ debilitate. Eamdem facultatis *Ex dejectionibus malis.*

debilitatem, cruentam alvi dejectionem præmonſtrare Galen. *in primo libro Prorrhet. com.* 2. docuit. Idem & urinæ profluvium, *diabetem* Græcis dictum, ſignificat; præmonſtrare enim magnam retentricis & alteratricis facultatis debilitatem, ait Galen. *in* 1. *lib. cap.* 22. *de Criſibus*. *Copioſæ item dejectiones in principio morborum, bilioſæ, virides, lividæ, nigræ, verſicolores, meræ; pravę ſunt*. Quum, Galen. auctore *in primo lib. cap.* 7. *de Criſibus*: *Decernentia in melius non ſtatim appareant, ſed ubi natura humores concoxit*. Hæ retentricem debilem, aut excretricem immaturius, multitudine aut prava qualitate humorum gravatam excernentem, oſtendunt. Paucæ quoque in die decretorio apparentes, quæ continuo ſiſtantur, languorem & imbecillitatem expultricis, denotant. De his Hippocrat. *in primo Epidem. Sect.* 2. *pag.* 948. *litt. A. comm.* 22. *text.* 41. ita habet: *Ventres etſi forte humecti eſſent, ſtatim maligno modo ſiſtebantur*. Aquoſas vero candidas, aut admodum croceas, aut ſpumantes, Hippoc. *in lib.* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 12. *text.* 12 & 29. damnavit; non minuſque paucas glutinoſas, pingues, candidas, ſubcroceas, læves, quod colliquationis ſint indicia. His eſſe exitialiores nigras, lividas, opimas, & fœtidas. De nigris *in libro* 4. *Aphoriſm.* 21. Hippoc. dixit: *Dejectiones nigræ, qualis eſt ſanguis niger, ſponte venientes, ſive cum febre, ſive ſine febre, peſſimæ*. Et paullo poſt *Aph.* 23. *Quibuſcumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, ſive quovis alio modo extenuatis, nigra bilis, ſive uti ſanguis niger deſuper exierit, poſtridie moriuntur*. Atque hæc pauca obiter de malis dejectionibus naturalem facultatem debilem, ejuſdemque actiones maxime læſas præmonſtrantibus, diximus. Idem nunc ex urinis malis perſcrutemur, quatenus actiones naturalis potentiæ debiles oſtendunt: De his *in* 3. *Epidem. pag.* 1085. *litt. F. pag.* 40. *lin.* 47. ſcribit: *Urinas nigras in mulieribus & viris, & in pueris aquoſas, perniciales eſſe*. Et in lib. 4. Aphoriſm. 72. *Quibus urinæ albæ & perſpicuæ, malæ, præſertim ſi in delirantibus appareant*. Has Galen. *in Comment.* dixit, conſpici in iis ægrotis, qui exitio proximi ſunt. *Tenues aquoſæ in bilioſis acutiſque morbis peſſimę exiſtunt*, quod omnium maxime cruditatem humorum ſignificent, ut Galen. quum in loco citato, tum in primo *de Criſibus* docuit. Eeodem modo craſſæ, turbidæ non reſidentes, quod itidem naturam prælanguidam oſtendant. De his Gal. in 4. *Aphoriſm.* 70. *cap.* 4. *Quæ non reſident, ſi vires adfuerint, longum fore morbum oſtendunt, ſi imbecillitas adſit, ægri mortem prænuntiant*. Et in quarto lib. de Sanitate tuenda: *Si vero vel omnino nulla ſeparatio, vel id quod ſubſidit, malum ſit, imbecillitas naturæ ſignificatur*. Idem notant, quæ ſubſidentiam craſſam, farinæ craſſiori ſimilem habent. Galen. *in* 4 *Aph. Comm.* 31. enim dixit, *tales urinas exitiales eſſe, quod in acutis morbis exitium, & in mitioribus ſaltem longitudinem prænuntient, naturæ crudum humorem longo tempore coquente*. Plurimi vero morte præripiuntur, antequam ægritudo diutius protrahatur, & quicumque ex ipſis ſunt liberati, iis omnibus in longum producta eſt ægritudo. Nigræ etiam omnes pravæ ſunt, exitialiſſimæ cum nigro ſedimento, cujuſmodi minxerunt Phyliſcus & Silenus *lib. Epid. Ægrot.* 1. & 2. moribundi. Pingues itidem ac oleoſæ, quod liquentem calorem ſignificent, damnantur: Addimus copioſas crudas, quæ concoctricis potentiæ debilitatem, tum ipſam etiam excretricem læſam indicant. De quibus Hipp. *in* 3. *Epid. pag.* 1086. *inter litt. C. & D. com.* 3. *text.* 61. ita meminit: *Urinæ multæ erant, neque erant illæ ex potu ingeſto, ſed illum excedebant, neque enim inerat craſſitudo, vel concoctio, vel purgatio proba*. Idem ex malis ſputis comprehenditur, ſcilicet naturalis facultatis actionum imbecillitas in morbis ſane partium ſpirituoſarum. Etenim in pleuriticis, ægrotos nihil exſpuere, morbum crudiſſimum denotare, Galen. in primo *de Criſib. in* 1. *Aph. comm.* 12. poſteritati tradidit: & ſputum ſupprimi quum in his, tum in ſuppuratis exitium præmonſtrare *in*

Ex urinis malis. 9

Ex ſputi malis.

lib.

lib. de conſtit. Art. Medicæ teſtatum reliquit. Amplius ex Hippocratis *lib. 2. Prognoſticorum pag.* 41. *lin.* 40. *cap.* 18. in ſuppuratis excretionem bilioſam exitialem eſſe ſcimus, ſive ſejunctim bilis & pus, ſive ſimul excernantur. Nigra quoque ſputa, flava, viridia, livida & verſicolora, peſſima exiſtunt. Ex ſanguinis quoque eruptione potentiæ hujus infirmitas cognoſcitur, ubi ſane parcius, quam ſit opus, erumpat, debilis expultricis non raro eſt nota. Hinc omnes ſtillæ ſanguinis e naribus in febribus acutis ac inflammationibus maxime damnantur, quippe quod nobis expultricis facultatis prælangueſcentis ſint indicio. Quod Hippoc. *in primo Epid. Sect. 2. pag.* 944. *litt. F. com. 2. text.* 17. ita annuit: *Nec ſanguis de naribus niſi paucis & admodum paucus erupit*, & poſtea *ibid. pag.* 951. *litt. E. text.* 63. *Nam Phyliſcus quidem Epamenon & Silenus, quibus parum quarto die & quinto ex naribus ſtillavit, mortem obierunt*, & Gal. in 4. *com.* 67. *de Vict. rat. in acutis*: Novimus enim, quod ſanguinis e naribus ſtillationes, malum ſemper quippiam eſſe ait, propterea quod natura quidem incipiat, quod ſuperfluum eſt, excernere, ſed ob propriam imbecillitatem nequeat. Et in *primo Prorrh.* ait: *Sanguinis ſtillatione naturam collectam in cerebro abundantiam conatam eſſe, ut expelleret, ſed nequiviſſe.* In morbis ſiquidem, quorum proprium videtur, ut per ſanguinis vacuationem ſolvantur, ubi non eruperit, ſi tamen per alias vias ægrota corpora non fuerint vacuata, prælanguidæ naturæ expellentis eſt indicium. Ex quo dixit Hippoc. in *primo Epid. ibid. litt. G. comm. 2. text.* 65. *Sanguis autem plurimis erupit, præcipue adoleſcentibus & adultis, quorum periit maxima pars, quibus ſanguis non erupit.*

Ex ſanguinis eruptione prava.

Idem ſignificat in febribus continuis ægrotos ſine ſudore, vel alia bona vacuatione judicari, ut Hermocrati evenit, de quo ſcriptum eſt *lib. 3. Epid. Ægrot. pag.* 1062. *quarto decimo die a febre erat liber, non ſudavit*: & paullo poſt: *Iterum vigeſimo die eſt judicatus a febre liber, non ſudavit.* Aut ſi ſudores erumpant, ſed tamen pauci, vel morbum non ſolventes. De quibus Hippoc. *in quarto Aphoriſm.* 56. ait: *Febricitanti ſudor ſuperveniens, febre non deficiente, malum*: vel clarius de prælanguidam expultricem ſignificantibus in *primo Prorrh.* ſic habet: *Sudores quoque, qui cœperunt quidem, ſed protinus ceſſaverunt*, pravi ſunt. Et Hippoc. *Com.* 1. de iis, qui non ſolum ebrem, neque ægrotos allevant in eodem libro *Prorrh. lib.* 1. *text.* 7. *Qui ſin hypochondrio, febre refrigerata, ardores relinquuntur, cum alias, tum cum ſudoribus, mali ſunt*, & in alio libro *ib. text.* 67. *inquietatio cum ſudore eſt mala in acutis morbis, & flammans quoque cum ſudore facies his mala.* Aut mali ſunt, qui non ex toto corpore, ſed ex aliqua parte tantum erumpunt. Quos Hippoc. in *primo Epid. pag.* 940. *lin.* 9. *com.* 1. *text.* 24. ita meminit: *Sudabant ſemper quidem, ſed non ex toto corpore.* Et auctor Prorrheticor. *lib.* 1. *text.* 126. exiguum ſudorem cum extremis refrigeratis malignum atque pravum eſſe voluit: & Hippoc. in *primo Prognoſticorum p.* 38. *lin.* 21. frigidos, & qui circa caput tantummodo eveniunt, vultum & cervicem; hoſque cum acuta febre exitiales eſſe ſtatuit. Mali itidem ſunt, multi non juvantes, de quibus Hippoc. ſupra *in primo Epidemiorum Sect. 2. pag.* 945. *litt. E. com. 2. text.* 26. *Sudores multi bis tantum aberant, ut recrearent, ut etiam contra lederent.* Quare tales omnes ſudores naturalem potentiam debilem, morboque viribus imparem eſſe ab excretricis cognita imbecillitate, præmonſtrabunt. Nunc ex vomitibus quoque malis idem cognoſcamus. Quorum pauci, multique non juvantes, mali exiſtunt, de quibus in *primo Epidem. ibid. pag.* 948. *inter litt. G. & H. com. 2. text.* 64. Hippocrates ait: *Phreniticis convulſiones, ſed & virulenta vomunt, & ex his quidam ſubito moriuntur.* Significant enim naturam cœpiſſe expellere malos humores, & non potuiſſe, in principio quoque morborum copioſi mali ſunt, ſymptomaticique vocati, omnium peſſimi porracei,

Ex ſudoribus pravis.

Ex vomitibus pravis.

lividi, nigri, verſicolores, graviter olentes, ex Hippoc. in *Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 6. *text.* 39. ita ſcribente: *Si vero vomitio fuerit porracea, livida, aut nigra, quicumque ex his fuerit color, malum eſſe cenſendum eſt, & ſi idem homo omnes vomuerit colores, exitiale admodum eſt.* Ex abſceſſibus itidem mali ſunt, non juvantes, etſi magni ſint & plures, quia naturam omnem humorum copiam non poſſe deponere nobis ſunt indicio. Parvi itidem non ſubſiſtentes, neque venientes ad ſuppurationem, pravi exiſtunt, præſertim ſi ſtatim exorti diſſolvantur, atque intus recurrant. De his Hippoc. *in* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 946. *litt. G. comm.* 2. *text.* 35. dixit: *His ſuccedebant abſceſſus aut majores, quam ut ferri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſe quicquam. Sed ſtatim redierunt, & deteriores evaſerunt*: & in lib. 6. Epidem. *Sect.* 2. *text.* 7. *p.* 1168. com. 2. text. 10. *Abſceſſus veluti bubones, ſignum quidem ſunt germina habentium tum aliorum tum præcipue viſcerum, maligni.* His facultatem imbecillem eſſe, aut a morbi vi exſolutam, aut nobili viſcere ipſius primo inſtrumento, in quo ſedem habet, valde læſo, dignoſcimus. De his malis abſceſſibus ſatis accurate Hippocr. *in* 1. *lib. Epidem. Sect.* 2. *pag.* 946. *litt. H. comm.* 2. *text.* 38. ita meminit: *Papulæ parvæ, quæ non eſſent excernendis morbis, ſtatimque evaneſcebant, aut ſecundum aures tumores nigricantes, qui nihil denuntiarent.* Quibus in articulos præſertim in coxendicem decumbebant, paucis decretorie ceſſabant, ſtatimque ſupurati ad priorem ſtatum redierunt. Atque hæc obiter de actionibus omnium facultatum, quippe, animalis, vitalis atque naturalis a probo ſtatu in malum mutatis, naturam morbo, contra quem pugnat, viribus imparem nobis præmonſtrantibus, dicta ſint. Tranſeundum vero nunc eſt ab morborum virium dignotionem, ut ipſis etiam cognitis, naturamque ac morbi viribus invicem comparatis, & collatis de morborum exitu, certum prognoſticum aſſequi poſſimus.

Ex abſceſſibus itidem malis.

CAP. VII.

De cognoſcendis morborum viribus, atque in primis ex quibus ipſorum quum robur, tum imbecillitas cognoſcatur.

COgnitis naturæ viribus, morborum quoque nunc ſunt cognoſcendæ, quæ uti naturæ vim ex actionibus, tum fortibus ſeu robuſtis, tum debilibus cognoſci diximus, ſic nobis etiam ex ſymptomatis, quibus morbi ad varias partes corporis oppugnandas utuntur, innoteſcent. Horum quædam una cum morbo, quem ſequuntur, apparent, quædam poſtea. Hæc morem ſeu modum morbi produnt, illa ideam ſeu ſpeciem, atque magnitudinem. Ideam vero denotant propria morborum ſymptomata, quæ *Pathognomonica* Græci appellant, quæque ſimul cum morbo apparent, ipſumque perpetuo concomitantur, ut in pleuræ inflammatione, pleuritide vocata, dolor in altero laterum vel in utroque punctorius, febris continua, tuſſis, reſpiratio difficilis, pulſus inæqualis, durus, ſerrinus nuncupatus, ideam ſeu ſpeciem iſtius inflammationis denotant, & phrenitidem, febris continua, & delirium perpetuum explicant, & ſic de aliis omnibus. Quilibet enim morbus propria ſigna ſeu ſymptomata habet, quibus ejus ſpecies ſeu idea detegitur, ac ab aliis diſtinguitur. Hæc itaque recte perſpecta ac cognita non parum nobis erit adjumenti, ad cognoſcendum morborum quum robur, tum imbecillitatem. Etenim omnes Medici non ignorant, pleuritidem eſſe morbum, naturam corporis magnis viribus oppugnantem. Quod & partem cordi, viſceri præcipuo, vicinam inflammaverit, cujus febris aſſidua, dolor lateris, tuſſis, reſpiratio difficilis propria ac certa ſunt ſymptomata.

Morborum ſymptomata pathognomonica, & ſubſequentia.

Morborum levitas & magnitudo cognoſcitur ex morbi idea.

Hæc

Hæc vero vel pauciora, vel parva, ac levia obſervata, mitem morbum minus natura corporis, cum qua pugnat, fortem declarant. Contrarium indicant plura, magna ſeu vehementia, quippe magnum, naturaque robuſtiorem. Uti ſunt dolores pungentes, vehementes, aſſidui, utrumque vel unum latus vexantes, morbum ſane magnum ac difficilem detegunt, quod partem tum reſpirationi ſervientem, tum cordi, nobiliori viſceri proximam maxime lædant. Viſcerum vero nobilium affectus eſſe magnos & graves Hippocrat. *in ſecundo Prognoſt. pag.* 43: *l.n.* 32. *text.* 70. ita ſcribit: *Dolores, qui cum febre fiunt circa lumbos & inferas ſedes, & præcordia attigerint, inferas relinquentes ſedes, exitiales admodum ſunt.* Et *in lib.* 4. *Aphoriſm. Aphor.* 66. *In acutis febribus convulſiones, ſi circa viſcera dolores fortes gignant, malum.* Reſpiratio itidem in his quoque difficilis, tuſſis moleſtiſſima, ſicca ſeu inanis, aut cum ſputis pernicioſis, ſeu malignis, ægerrime eductis, nihil ægrotos juvantibus, pulſusque duri admodumque inæquales, morbum maximum nonniſi a robuſtiſſima natura ſuperandum, præmonſtrant. Crebra enim reſpiratio, ut Gal. docet *in* 1. *Epid. cum dolore gravem inflammationem ſupra ſeptum tranſverſum ſignificat tuſſis magna ſicca ſ. ſine ſputis morbum crudiſſimum, non ſecus ac urinæ aquoſæ in febribus ardentibus conſpectæ.* Gal. *itidem in* 1. *de Criſib.* auctore, *oſtendit, de qua in libr. etiam de conſtit. art. Medicæ* dixit. *ex Symptom.* ut nihil omnino exſpuere pernicioſum eſt, partim quod ſignificet fluxionem in phlegmone quaſi devinctam teneri, partim vero, quia ea univerſa interius contenta, corrumpetur. De quibus Hipp. in 1. *Epid. Sect.* 1. *pagin.* 939. *inter lit. D. & E. com.* 3. *in text.* 18. ait: *multi præterea infeſtabantur aridæ tuſſi, nihilque excreabant.* Cum qua etiamſi pauca cruda vel prava excernantur, malum eſt, magno enim ac difficillimo morbo naturam conflictari, nobis ſignificatur. De his Gal. *in lib. de totius morbi Emtor. cap.* 16. ita meminit: *Magnum etiam morbum oſtendunt, ſi etiam ſputum pleuritide & peripneumonia laborantibus, vel nigrum vel fulvum vehementer, vel ſpumans, vel impenſe fœtidum eſt; eoque magis, quod nihil juvat, ſeu quod dolorem non levat.* ut Hippocrat. *in lib.* 2. *Prognoſt. pagina* 41. *lin.* 33. *comm.* 1. *text.* 12. *cap.* 6. *text.* 51. nobis tradidit. Quare ex hiſce ſymptomatibus, pleuritide pernicioſiſſimam denotantibus, morbus magis veneno refertus ac propterea difficillimus, præmonſtratur. Veluti ab iiſdem, ut nuper dictum eſt, mitioribus ac levioribus, morbum natura viribus infirmiorem, ac quem haud difficulter ipſa natura ſuperabit, comprehendimus. In hac enim pleuritide neque febris magna ſeu vehemens apparet, neque magnus dolor, neque admodum ægri difficulter reſpirant, neque valida tuſſi vexantur, facileque & cito concoctum excrementum exſpuunt, neque in pulſu multa durities & inæqualitas obſervatur. Atque hic eſt modus prædicendi ſalutem & mortem ex morborum idea, ſeu ſpecie, qui penes propriorum ſignorum, quæ *Pathognomonica* appellant, magnitudinem ac vehementiam, ut recte a Galeno in *3. de Criſibus* proditum eſt, attenditur, atque nobis ex iis innoteſcit. Levia & parva, morbum debilem ac levem præmonſtrant, magna & vehementia, magnum & curatu difficilem. Idem nedum ſymptomatum vehementia, & parvitate nobis innoteſcet, verum etiam numero. Etenim ſi ſymptomata Pathognomonica ſ. propria, præterquam quod magna ſint, etiam numero plura exſtiterint, utique morbum natura potentiorem declarabunt, & debilem pauciora. Ceterum non quæ ſymptomata numero plura in morbo apparent, paucioribus ſymptomatis ad majorem morbi vim denotandam perpetuo erunt præferenda. Quandoquidem phrenitidem, quæ cerebri eſt inflammatio, duobus tantum numero ſymptomatis ſimul conſpectis, febre nimirum aſſidua continuaque, ac perpetuo delirio conſpectam, nuper dicta pleuritide, quinque ſymptomatis nobis præſcripta & indicata, mor-

Ex ſymptomatibus paucis, vel multis, parvis vel magnis, levibus vel fortibus.

Ex numero ſymptomatum.

bum non minorem esse, neque debiliorem, neminem Medicorum latet. Sed in eodem morbo, quo numerosiora illa prodierint, simul eo majus malum denotabunt. Veluti si una cum pleuritidis signis dolor capitis, vigilia delirium, aut aliud symptoma illuxerit, graviorem utique morbum ostendet. Idem in phreneticis, si veternosus somnus appareat. De quibus Hippoc. in *lib. 3. Epid. pag.* 1085. *litt. G.* ait: *Nec phreneticorum valde insanivit quicquam, quod usuvenit aliis, sed alia quadam cataphora segni gravati peribant.* In eodem itaque morbo plura conspecta symptomata, morbum reddunt graviorem & potentiorem. Demum a symptomatis in morbis postea apparentibus, quæ morem morborum, auctore Galeno, ostendunt, ipsorum quum robur tum imbecillitas cognosci poterit. Gal. in 1. *de Crisibus c.* 2. ait: *Ex supervenientibus symptomatis, si multa, si diuturna & valida atque maligna etiam exstiterint, morbum magnum natura potentiorem, & si pauca brevi temporis spatio, & parva & simplicia fuerint, debilem ac mitem nobis præmonstrari.* Itaque in parvis morbis non pernicioſis optima signa illucent, & prava in non salutaribus. In putridis siquidem continuis febribus ad salutem tendentibus, primo in excrementis signa coctionis apparebunt, omniumque maxime in urinis. Hæ itaque mutabuntur in bonum colorem & substantiam, habebuntque bonam hypostasin. Et sic cetera alia excrementa concocta prodibunt. De quibus posterius a nobis accuratius scribetur. A conspectis signis coctionis febres ac symptomata, aut resolventur, aut saltem diminuentur, ægrique facilius morbum ferent. Somno enim, exempli gratia, destitutis, somnus redit, veternosis vigilia, dolores, sitis, inquietudinesque abeunt, & amentes ad mentem redeunt, & male antea respirantes melius respirare incipiunt. Ex oppositoque, morbis naturæ prævalentibus, signa mala postea illucent. Nam præterquam quod excrementa cruda appareant, etiam prava observantur, uti in phreniticis urinæ albæ lucidæ malignitatem denotant. Ex quo Hipp. *in quarto Aph.* 72. ait; *Quibus urinæ albæ ac perspicuæ, malæ, præsertim si in delirantibus appareant.* Et in febribus ardentibus nigræ cum nigro sedimento, quod morem pessimum significent, ideo morbum natura robustiorem significant. Eodem modo ab aliis excrementis pravis conjicitur in morbis malus mos, qui malignos, ac magnos morbos denotat. At qualia sint & dicantur excrementa prava, posterius a nobis dicetur. At non solum prava excrementa in morbis postea apparentia, morbum natura potentiorem ostendunt, sed omnia itidem & prava symptomata. Cujusmodi sunt exempli causa, deliria, convulsiones, tremores, ciborum abhorrentia, non sitire in morbo calidissimo, si præsertim antea non parum sitierint, lingua squalida & nigra, malus decubitus, inquietudines & similia symptomata. De quibus postea accurate agemus. Ex iis igitur tribus explicatis, quippe morborum idea, magnitudine, atque more, morbos prævalidos & debiles cognoscemus.

Ex symptomatibus subsequentibus.

Bonis.

Malis.

CAP. VIII.

De morbis debilibus ex morborum Idea, magnitudine, atque more cognoscendis.

Morbi debiles, quomodo ex horum idea noscuntur.

NUnc speciatim quoque debiles morbos, atque a natura, ut superentur, faciles, ab ipsorum idea, magnitudine ac more intelligamus, ab idea principium facientes. Ideam vero in morbis signa indicantia sunt, ut dictum est, quæ simul cum morbo apparent, symptomata, & morem significantia, quæ postea. Itaque si pauca sint, levia, neque valde corporibus molesta, mitem sane & debilem morbum explicant, & quem natura haud difficulter superabit. Quos Hippoc. merito morbos simpliciſſimos, seu, ut Galeno

leno placuit, placidiſſimos ac mitiſſimos vocat, quoties ſecuritatis indicia exſtiterint, parvaque ſymptomata, pauca, leviaque fuerint. Etenim *in lib. 3. Progn. pag* 43. *lin.* 54. *text.* 3. dixit: *Simpliciſſimæ enim febres ac ſignis firmatæ ſecuriſſimis quarto die aut citius deſinunt*. Quæ ſigna ſecuriſſima eſſe poſt expreſſit *pag.* 44. *lin.* 25. dicens: *Qui enim convaliturus eſt, facilius ſpirat, ſine dolore agit, noctu dormit, & alia ſigna ſecuriſſima habet*. In pleuriticis levem ac debilem morbum conjicimus, ubi lateris dolor ſit levis, non difficulter ſpiret, tuſſis ſit parva, neque multum moleſta, facileque ægroti ſputum, quod neque malignum ſit, tuſſi excernunt, pulſus item neque valde duri neque inæquales ſint. Sic in anginoſis parvam & debilem comprehendimus eſſe inflammationem, ubi itidem dolor in gutture aut faucibus ſit debilis, exilis, facile reſpirant, & deglutiunt. Quæ ſane ſigna morbum debilem, quem natura non difficulter alteret, denotantia Hippoc. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 47. de ſuppuratis locutus, ita expreſſit: *Bona vero hæc ſunt: facile morbum ferre, bene ſpirare, dolore vindicatum eſſe, ſputum facile extuſſire, corpus æqualiter calidum videri ac molle, ſiti non detineri, urinas, dejectiones, ſomnos, ſudores, ſingula intelligere bona, uti præſcriptum eſt, ſuccedere. Quare pauca parvaque ſymptomata quum in principio morborum, tum poſtea conſpecta debilem morbum, viribuſque natura imparem, ſignificant*. Addemus vero hæc parva, & levia ſeu placida ex ratione videri oportere, quum ſæpius parva placidaque ſenſibus apparent, licet magna & prava (quod a morbis, cauſiſque fortiſſimis prodeant) ſint dicenda. Complura enim in multis morbis exitialibus ſymptomata parva ac levia apparent, ut ex ipſis quandoque Medici non leviter eruditi decepti ipſorum maligna natura, putent ægrotos nedum gravi morbo teneri ac conflictari, quinimmo ipſos ægrotare dubitent. Quæ tamen ſymptomata a fortiſſima, & exitiali cauſa foveri dignoſcuntur. Quorum non pauca apud Hippocratem exempla leguntur. De exitialibus hac nimirum ratione phreneticis *in primo Prorrheticorum text.* 34. hæc habuit: *Tremulæ, obſcuræ, blandæ & contrectabiles deſipientia valde phreniticæ*. Etſi enim hæc ſymptomata parva ac levia ſenſibus adjudicentur, tamen a maximis fortiſſimiſque cauſis oriuntur; quippe, ut Galeno placuit, humore bilioſo in cerebri ſubſtantia imbibito, ac ipſo cerebro ad hecticam affectionem deducto. Simile exemplum de Hermocrate moribundo *in* 3. *Epid. Ægrot.* 2. *pag.* 1062. *text.* 8. legitur hiſce verbis: *Quartodecimo die a febre liber: non ſudavit: dormivit, omnino mente conſtabat, urina eadem*: Et paullo poſt de eodem: *Iterum vigeſimo die eſt judicatus a febre liber, non ſudavit, perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat*. Sic quoque magna ſymptomata exiſtimanda duximus, quæ a fortiſſimis cauſis foventur, ſicuti, ut jam dictum eſt, parva a parvis proficiſcentia. Sæpius enim magna vehementiave aliqua ipſorum æſtimantur ſeu judicantur, quæ tamen non ſunt a Medicis timenda, quod a prærobuſtiſſimis naturæ viribus concitentur, præſertim natura corporis pravos humores deponere ac excernere volente. De qua Hippoc. *in* 6. *Epid. ſect.* 2. *text.* 15. *pag.* 1168. *com.* 2. *text.* 23. *Quæcumque tertianam naturam habent, his nox ante acceſſionem moleſta eſt, a quibus ſane acceſſionibus natura ſemper aliquam vacuationem moliri eſt ſolita*. Hinc auctor Prorrheticorum *lib.* 1. *text.* 52. dixit, *perniciosa ſine ſignis levantia mortem indicare*, & Hippoc. *in ſecundo Aphor.* 27. *His, quæ non ex ratione levant, non oportet fidere, neque multum formidare mala, quæ præter rationem eveniunt. Plurima enim ſtabilia non ſunt, neque multum durare & permanere conſueverunt*. Quod Galenum ſæpe affecutum, ipſius verba *in ſexto Epidem. com.* 1. *in text.* 16. ſcripta declarant, quæ hæc exiſtunt: *Interdum namque in vehementiſſima febre adjuncta vigilia, faſtidio, ſiti, impatientia, nonnumquam & delirio omnibus ægrotantis domeſticis perterritis ac flentibus, quempiam licet vi-*

Ex malignitate.

gorem & ſudorem morbique ſolutionem ſcienter prædicentem Æſculapium eſſe videri. Parva igitur ex ratione, leviaque ſymptomata, tum ſimul cum morbo conſpecta, tum ſupervenientia, ſeu poſtea in morbo apparentia, morbos debiles, quos natura facile ſuperabit, præmonſtrabunt. Omnino vero ſalutares, ſi multa aut aliqua optima ſigna illuxerint. Nullus enim ægrotus ad ſanitatem pervenit, in quo non prius aliquod ex optimis ſignis illuxerit. Hæc enim ex Galeno *in tertio de Criſibus*, bonum morem in morbis, uti mala malum denotare, nuper diximus, ex quo Medici morbos boni & mali moris appellant. Hos vero comprehendunt, uti dictum eſt, ex ſupervenientibus accidentibus ſeu ſymptomatis, ſcilicet, quæ poſt principium apparent, vel bonis malis, ut meminit Galen. *in tertio de Criſibus cap.* 4. dicens: *Si vero benignus aut malignus ſit morbus, ex ſubſequentibus ipſum accidentibus noſcitur.* Quæ in ea, quæ morem oſtendunt, & quæ criſin futuram, & quæ etiam criſis cauſæ exiſtunt, dividuntur. Ideo morem ſignificantia, ab aliis erunt diſtinguenda, aliud quidem quam hæc præſagientia. Etenim vigilia, deliria, lacrymæ involuntariæ, convulſiones, atque alia ſimilia, ſi cum coctionis ſignis in morbo, criſi judicando, appareant, criſin denuntiant. De his in *primo Epidem. ſect.* 2. *pag.* 948. *litt. H. com.* 2. *text.* 55. Hippocrates: *In ardentibus ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hyppochondrii etiam contentio, neque cum dolore corripit, his e naribus ſanguis erumpit.* Et paullo poſt *pag.* 956. *litt. F. text.* 88. etiam elarius: *Quibus in febribus acutis, atque adeo ardentibus ſpontaneæ effluunt lacrimæ, his (ſiquidem reliqua non ſint exitialia) e naribus ſanguinis eruptio eſt exſpectanda. Qui incommode habent, his non ſanguinis eruptionem, verum portendunt mortem.* Hactenus debiles parvi atque benigni morbi, qui ſint ex ipſorum idea, magnitudine, atque more, didicimus. Nunc eoſdem cognoſcere ab ipſorum cauſis diſcamus.

Ex more.

Symptomatum morbum ſubſequentium diſtinctio.

Symptomata criſin denotantia.

CAP. IX.

De morbis debilibus ab ipſorum cauſis dignoſcendis.

Morborum debilium cognitio ab ipſorum cauſis.

EX cauſis quoque debilium morborum cognitionem indagaturi, ab externis principium faciamus. Itaque varii in primis aeris ſtatus, variæ quum annorum conſtitutiones tum tempora, atque etiam morborum graſſantium ideæ, ſeu naturæ ſunt prænoſcendæ. Aer quidem nihil aut parum, quod ad ejus qualitatem & ſubſtantiam attinet, mutatus, nequaquam magnos ſævoſque morbos excitat. E contrario mutatus ſolet maximos in corporibus morbos concitare. Quippe illo maxime a naturali & conſueto temperamento recedente, morbos graviſſimos fieri obſervamus. Minus vero morboſus eſt, minuſque graves morbos, ad frigidum quam ad calidum mutatus ſive alteratus, hominibus invehit. Nam, ut ſcribit Hippoc. *in tertio lib. Aphor.* 17. *Quotidianæ conſtitutiones Aquiloniæ corpora denſant, & robuſta, & bene mobilia, coloratiora, & melius audientia faciunt. Et calidæ Auſtrinæ corpora diſſolvunt, humectant, auditum obtundunt, & vertigines faciunt. Oculis atque corporibus difficilem motum præſtant.* Ex paſſivis etiam aeris qualitatibus vocatis, ſiccitatem aeris præ humiditate, ſalubriores morbos facere, colligimus ex Hippoc. *lib.* 3. *Aphor.* 15. *cap.* 17. ita dicente: *Ex anni conſtitutionibus (quod in totum dixerim,) ſiccitates imbribus ſunt ſalubriores, & minus mortiferæ.* Atque ex anni quoque temporibus ver morbos ſaluberrimos, minime exitioſos parere, Hippocr. *ibidem Aphoriſm.* 9. tradididit. Quandoque obſervantur ſalutares graſſationes, quales Hippocr. meminit *in* 1. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 938. *inter* D. & E. *com.* 2. *text.* 9. ita dicens; *Ante ver exprione cælo,*

Ab Aere.

Ab Annorum variis conſtitutionibus.

Ab anni temporibus.

*cælo, quod huic ſubcontrarium fuerat, Aquilonium*que *paucos ardentes febres corripuerunt, eoſque admodum ſtabiles, pauciſque ſanguis erupit, nec ex his peribant. Tubercula vero multis ſecundum alterutram aurem, plurimis ſecundum utramque exſtiterunt, febri carebant, erant recti. Nonnullis parum accendebantur, ſed exſtincta omnibus ſunt citra incommodum, neminique ſuppurarunt, cuiquam, uti ſolent, quæ aliis ex occaſionibus extuberant. Erat eorum hæc natura laxa, erant magna, diffuſa, citra phlegmonem, atque citra dolorem obſcure omnibus evaneſcebant.* Venetiis, ac in aliis locis multis Italiæ, anno 1580. complures febres (quem *morbum Arietis* vulgus appellabat) graſſatæ ſunt. Quibus tamen pauciſſimi interierunt, & in Liguria, quo tempore Gennæ apud Andream Auream Principem ampliſſimum medicinam faciebam, febres ſynochæ, ardentes, tertianæ cum paucorum morte epidemicæ fuere graſſatæ. Æſtate quoque propriam ſervante naturam maxima ex parte, tertianæ, quæ ſunt ſalutares, vagantur. Febres enim quocumque modo intermiſerint, omnino vacare periculo tradidit Hippoc. in *Aphoriſmis lib.* 4. *Aphor.* 43. Ex proba etiam victus ratione, pauci, minimeque exitiales fiunt morbi. Qui enim optimam ſervant vivendi rationem, quæ præcipue qualitate proba ciborum, idoneaque quantitate abſolvitur, raro ægrotant, & morbis minime exitialibus capiuntur. Idem contingit illis, qui ſomno, vigilia, exercitio conſueto utuntur, quique hilarem vitam ſine moleſtiis ducunt, ſolitaſque naturæ excretiones nimirum quod ad alvi fæces, urinas, ſputa, menſes, hæmorrhoidas, attinet, habent, non minus corpora humida, ſuccique plena, ſi Veneri temperate operam dent.

Graſſationes ſalutares.

Victus ratio quid ad morbos.

Pueri etiam, quod ad ætates ſpectat, minus quam alii aliarum ætatum homines, morbis gravioribus laborant, quod ipſorum corpora præ multo calore innato & præ cutis raritate plurimum evacuentur, & reſolvantur. Ex internis vero cauſis eodem modo debiles morbos preſcrutabimur, incipientes a naturarum, & habituum corporum diſpoſitionibus, de quibus Hippocrat. ita meminit in 2. *lib. Aph.* 34. *In morbis minus periclitatur, quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus ſecundum nihil iſtorum congruit.* Proinde calida corpora periclitantur minus a morbis calidis, quamvis tamen facilius corripiantur, contra frigida. Quo æſtate febres minus ſunt timendæ, quam hieme. Eodem modo ſenum, quam juvenum erunt periculoſiores. In quo ſenſu Hippocrat. dixit, in morbis minus periclitari, quorum naturæ aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus ſecundum nihil iſtorum congruit. Ex variarum itidem, tum partium temperamento, tum diſpoſitione ab morbos, morborum quoque debilium ratio nobis innoteſcit. Partes etenim corporis, nihil a ſua natura in temperamento mutatæ, non facile magnis morbis tentari ſolent. Hæ namquæ partes recte valentes, plura gigni excrementa, & prava fieri non permittunt, eaque genita conſumunt, aut excernunt, aut ad partem aliquam ignobilem tranſmittunt, quo ne a magnis morbis corripiantur, defedunt. Eædem partes nihil aut parum, ad morbos, quibus tentantur, habentes aptitudinis, fortes ſunt, ægreque morbis gravioribus tentantur. Etenim quibus, exempli gratia ad phtiſin, aptitudo non eſt, quamquam ſæpe ii capitis diſtillationibus vexentur, tardiſſime tamen ac magna difficultate phtiſici evadunt, facillime vero ac citiſſime, habentes aptitudinem ſeu diſpoſitionem, uti Hippocrat. in multis, qui tabe interiere, obſervavit. De his *in primo Epidem. comm.* 1. *ſectione* 1. *text.* 18. *pagina* 939. *litt. F.* dixit: *Maxime moriebantur, quibus ad phtiſin natura vergebat.* Quod *in* 3. *Epidem. comm.* 2. *text.* 3. *pag* 1073. *Ægrot* 6. de Euryanactis virgine, quæ tabida obiit, ita expreſſit: *Erat autem nativum quoddam tabidum.* Qua ratione etiam *in libro* 6. *Aphoriſmorum* 33. dixit: *Qui acidum eructant,*

Ætatis quid ad morbos.

Morbi debiles ex internis cauſis cognoſcendi.

A tempore.

Ex temperamento.

non

Ab humoribus exſuperantibus.

non valde morbo laterali corripiuntur. Ab humoribus etiam exſuperantibus debiles ac ſalutares morbi conjici poſſunt. Quorum omnium ſanguis (quod qualitates ſit ceteris aliis humoribus benignior, atque naturæ amicior) morbos minus periculoſos parit. Ex quo Hippoc. *in 6. Aphor. 53.* dixit? *Deſipientiæ, quæ cum riſu fiunt, ſecuriores*. Et in pleuriticis ſanguinis excreationem morbum monſtrare ſecuriorem obervamus. Eſt tamen ſanguis quovis modo excreatus, malus, non ex ſua natura, ſed quod plerumque in pulmonibus aut thorace malum irreparabile denotet. Quod Hippocr. expreſſit *in Aphoriſmis lib. 4. Aphor. 25.* quum dixerit: *Sanguis qualiſcumque ſit per ſuperius, malum, & a ſanguinis (lib. 7. Aphor. 15. & 16.) ſputo puris ſputum, & a puris ſputo phtiſis*. Nos itaque loquimur hic de ſanguine, tamquam cauſa materiali, ex qua morbi fiunt, ad differentiam aliorum humorum, & propterea dicimus, ab ipſo, tamquam ab humore, qualitate benigniori, non fieri morbos magnos ac periculoſos. Etſi ipſius plenitudine, & copia exitialiſſimi non raro fiant, uti ſunt anginæ ſuffocantes, pleuritides & alii. Pituita vero ſanguine minus bona exiſtit, utraque tamen bile naturæ eſt humor accommodatior, quod hæc facile in ſanguinem vertatur, majorem quippe coctionem adepta, proinde immoderatius niſi fuerit copia aucta, utraque bile morbos benigniores facit. Flava bilis, majores, ac omnium periculoſiſſimos, crocea, porracea, æruginoſa atque nigra. Hic enim humor omnium eſt naturæ inimiciſſimus, difficillimus, & tardiſſimus, ut a natura coquatur, & ſuperetur. Simplices etiam humores quam miſti benigniores morbos concitant, & graviores plures ſimulmiſti, quam ſimplices. Quo Hippoc. *in 2. Progn. text. 4. pag. 41. lin. 8.* dixit, *ſi vero idem homo omnes vomit colores, exitiale admodum eſt*. Atque Gal. *in lib. de humoribus, & in 1. Epidem. comm. 3.* Ubi æque redundant bilioſi & pituitoſi, fieri morbos acutiſſimos & graviſſimos, docuit. Humorum quoque quantitas moderata & pauca non pariet magnos morbos, quod natura facilius paucum, quam multum alteret, & ſuperet. Ex humorum item commotione per corpus idem dignoſci ſolet, quandoquidem humoribus ab intro foras motis, ſalutaris morbus animadvertitur. Quod Hippocr. *in 3. Prognoſt. text. 30. pag. 45. lin. 20.* ita expreſſit. *Securiſſimum vero eſt, ſi œdema, aut rubor quam maxime foras vertantur*. Idem, ſi ad ignobiles partes e viſceribus traſmittantur. Quod itidem *de abſceſſibus in 2. lib. Progn. text. 67. pag. 43. lin. 18.* ita docet: *Abſceſſus autem, qui ad crura fiunt in pulmoniis vehementibus, ac periculoſis, omnes utiles ſunt*. Ab humoribus quoque ignobiles partes vexari idem comprehenditur, nam morbo licet aliqua ipſarum partium pereat, non ob id animal perpetuo moritur, ſiquidem multi, quibus crura vel manus fuere mutilata, ſuperſtites vixerunt. Idem & de lingua, naſo, oculis, auribus, genitalibus atque aliis partibus eſt dicendum. Ex quo febres intermittentes, quod fiant humoribus putreſcentibus in parvis capillaribus venis a magnis remotiſſimis, debiles ſunt, ac plerumque ſalutares, atque quo morbi plus intermittunt, eo benigniores exiſtunt, cujuſmodi eſt quartana febris, quam ob id Hippoc. *in 6. Epidem. ſect. 6. text. 9. pag. 1190. conf. lib. 1. Epidem. ſect. 3. pag. 96. ſub litt. G.* ſecuriſſimam omnium fecit. Addimus quoque iis, morbos ab aliis morbis concitatos ſæpius in magis ſalutares mutari, veluti ſunt exempli gratia, quæ ex continuis febribus intermittentes evadunt, & a peſtilentibus maligniſque, quæ benigniores fiunt. Morbum quoque ſimplicem ex multiplici; Convulſioni, Paralyſi, tremori febrem continuam aut intermittentem ſupervenire; ab Apoplexia, Paralyſin ſeu Paraplegiam; ab angina letali, colli pectoriſque tumorem apparentem, atque ita de aliis multis. Ab iis itaque omnibus morbi debiles, naturaque viribus infirmiores nobis innoteſcent. Nunc ad eos, qui natura viribus ſunt potentiores, deſcendimus.

A ſanguine.

A Pituita.

A bile varia.

Ab humoribus ſimplicibus.

Ab humorum quantitate.

Ex humorum commotione.

Ab humoribus ignobiles partes occupantibus.

A morborum mutatione.

CAP.

CAP. X.

De morbis natura potentioribus ex idea, magnitudine, atque more cognoscendis.

EX propriis cujusque morbi symptomatis, magnis vehementibusve, morbos gravissimos ac summe periculosos comprehendimus. Cujusmodi in pleuriticis diximus esse magnum lateris dolorem, febrem acutam, tussim molestam, siccam scilicet sine sputis, aut magna cum difficultate ægrotos exspuere, quod etiam pravum sit respirationem admodum difficilem habere. His omnibus nobis magna inflammatio & pernicialis indicatur, veluti ex febre continua, acuta, & delirio perpetuo, ac vehementi, phrenitis gravissima. Ceterum, jam diximus, non tantum illa symptomata magna sive vehementia intelligi, quæ talia sensibus apparent, sed, quæ a fortissimis morbis, atque causis promanant. Qua ratione in continuis febribus, calor exterius mitis & obscurus, quum tamen ægroti interius urantur, magnum est symptoma, febris quippe malignæ ac pernicialis certum indicium. Has febres exterius mites seu obscuras intus turbantes Græci *typhodes* appellant; quippe quæ naturam multitudine humorum gravatam, ac fere suffocatam, incendium foras transmittere, nequeuntem, significent. Hasque vulgus Medicorum appellat, foris mites, intus conturbantes; suntque eæ omnes admodum pernicioſæ. Delirium itidem vehemens, aut obscurum sine ratione, in his febribus, magnæ malignitatis est indicium. De illo Auctor Coacorum *in lib. Præsag. text.* 85. ait: *Quæ feroces desipientiæ in brevi desinunt, ferinam convulsionem prænunciant*, & de hoc, quippe de obscuro delirio, Auctor Prorrheticorum *lib.* 1. *text.* 34. *Blandæ, tremulæ, obscuræ desipientiæ valde phreniticæ*. Virium enim languorem significant. Quare accidentia simul cum morbo conspecta, aut quod vehementia sint, aut parva sine tamen ratione morbum maximis viribus adversus naturam fulcitum præmonstrant. De quibus *in* 1. *Epid. sect.* 2. *pag.* 954. *sub litt. D.* Hippoc. scribit: *at quum febres ardentes inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet*. Siquidem statim ab initio febris acuta eos corripiebat, a qua parum superrigebant, insomnes erant, sitibundi, fastidiosi. Dolor vehemens in pleuriticis, morbi fortissimi est indicium. Parvus vero, quum prius vehemens fuerit, absque ratione allevatus, vel etiam omnino sublatus, aut delirium, aut exstingui facultatem sentientem, aut materiam morbificam alio conversam. Morbum eodem modo natura potentiorem comprehendimus, si præter symptomata propria idem denotantia, alia quoque gravia simul illuxerint. Veluti in phrenitide, si præter acutam continuamque febrem atque delirium perpetuum, quæ hujus morbi signa propria, *Pathognomonica* Græcis dicta, existunt, dolor capitis acutissimus, perpetuæ vigiliæ, aut convulsio, aut tremor, aut partium extremarum frigiditas, aut aliud ex iis unum appareat, morbum magnis viribus præditum, naturæ prævalentem comprehendimus. Ex supervenientibus demum malis symptomatis, quæ morem significare dictum est, morbos perniciales eadem ratione comprehendimus. Quæ prava signa Hippocr. *in* 1. *Epid. comm.* 2. *sect.* 2. *text.* 75. *pag.* 954. *litt. E.* ita est complexus: *Paululum in fronte & claviculis exsudabant, sed nemo per totum corpus. Multum delirabant, timores, mœstitiæ, extremitates subfrigidæ, ut summi pedes magisque manus. Accessiones diebus paribus, plurimi* 4. *die maxime laborabant, sudores diutissime subfrigidi. Extremitates non ad calorem redibant, sed lividæ erant, & subfrigidæ. Nec sitiebant. Ad hæc erant urinæ his nigræ, tenues, paucæ, & alvi sistebantur. Nec erupit e naribus sanguis, ne his quidem, quibus hæc accidunt, sed parum stillarum.*

Morbi natura potentiores ex horum idea cognoscendis.

Ex magnitudine.

Ex more.

runt. Neque recidiva ulli horum advenit; Ceterum ad ſextum diem cum ſudore moriebantur. Hactenus multa ſymptomata prava in multis, qui morbis exitioſis laborabant, ab Hippocrate obſervata, vidimus, quæ ſi morbis ſupervenerint, aut poſtea in morbis appareant, pravum malignumque morbum, naturæ prævalentem denotabunt. Sed, ut lector hic ſingula legere poſſit, ad hoc, ut ipſa morbis ſupervenientia, ſeu poſtea apparentia recognoſcat, & ſciat morbum denotare abſque dubio letalem, utile fore duximus, omnia hic a nobis adnumerari oportere. Hæc itaque ſunt: Vigiliæ aſſiduæ, profundus ſomnus, veternoſus, delirium, oblivio, dolor acutus, ægrotos dolores non ſentire, ſurditas, aurium tinnitus; vertigo, oculis caliginem obverſari, lacrymæ involuntariæ, oculos lucem effugere, convelli, aut alterum altero majorem videri, aut ſi candidum rubeum appareat, aut lividas aut nigras venulas habeat, aut ſordem circa oculos, aut ipſos ſublimes tumidos, ut, vel cavos admodum videri, aut ſqualentes & obſcuros, vel totius vultus color evariet, tremores, convulſiones, reſolutiones, palpitationes præſertim cordis, anxietates, inquietudines, ſingultus, viſcerum dolores fortes, extrema frigida difficulter recaleſcentia, livida, lingua ſqualida, exuſta, nigra, livida, craſſa, cœnoſa, ſine ſiti, aut ægrotos ſiti ardere inexſtinguibili, cibos abhorrere, eos ſtomacho non continere, ſed vomitu rejicere. Pulſus arteriarum prælanguidi, duri, inordinati, inæquales, intermittentes, deficientes. Reſpiratio magna & rara, parva, denſa, intermittens, inordinata, ſublimis, frigida, fœtida, & quæ pinnis narium quoque & pectore editur. Malæ excretiones, non allevantes, in die decretorio. Sudores multi non allevantes, pauci, aſſidui, non ex toto corpore ſed ex capite, fronte, claviculis, frigidi. Stillationes ſanguinis e naribus nigræ, craſſæ in die decretorio, largæ itidem ſanguinis vacuationes non juvantes: Vomitus bilioſi, flavi, virides, nigri, fœtidi, virulenti, æruginoſi nihil juvantes: Hypocondrium cum dolore tenſum, atque cum ipſo ictericus color in corpore, ante diem ſeptimum. Si conſpiciantur exanthemata, parva, pauca, numero & magnitudine non augeſcentia, livida, nigra, intus recurrentia, atque ſine ratione evaneſcentia, copioſa, magna non ſublevantia. Tumores quoque poſt aures, Græci *parotidas* appellant, in inguine, aliiſque partibus, parvi, non augeſcentes, vel magni non venientes ad ſuppurationem, omniumque maxime cito, nulla prægreſſa vacuatione, intus recurrentes atque evaneſcentes. Urinæ item aquoſæ, turbidæ non clareſcentes, craſſæ, nigræ cum ſuſpenſis nigris, albæ lucidæ in phreniticis, cum ſuſpenſo elato, lividæ, ictericæ, non juvantes, pingues oleoſæ, cum ſedimento farinæ craſſiori ſimili. Dejectiones immodicæ, liquidæ, fœtentes, quas *colliquativas* Medici appellant, pingues, cruentæ, nigræ, lividæ, bilioſæ, ſinceræ, multæ non minuentes febrim, ſputa ſincera, bilioſa in tabidis & ſuppuratis, cruenta ex pulmonibus, livida, nigra æruginoſa, admodum viſcida & magna difficultate educta, dolorem non ſedantia, atque penitus ſuppreſſa in viſcerum internis inflammationibus, ad reſpiratoria inſtrumenta pertinentium. Hæc itaque, atque hujuſcemodi generis alia, poſt morbum conſpecta, (ni propter criſin futuram fiant, quod nobis ſigna perfectæ coctionis & alia ſigna ſalutaria indicabunt) morbum natura potentiorem, ſummeque pernicioſum, nobis præmonſtrabunt.

Morbum letalem indicantia ſigna.

CAP. XI.

De morbis natura potentioribus ab ipſorum cauſis cognoſcendis.

Morbi magni ac pernicioſi cognoſcendi ex cauſis externis.

NUnc eoſdem morbos natura potentiores ab ipſorum cauſis indagemus, atque ab externis exordiamur. Quarum primo occurret conſideranda, quæ ex vario aeris ambientis ſtatu, a variis quum annorum conſtitutionibus, tum

tum temporibus morbos magnos nobis indicare poteſt. Itaque aer a ſuo conſueto temperamento ad calidum maxime mutatus, quique diu talis prævaluerit, maximos morbos animalibus invehit. Etenim immodica ipſius caliditas, plurimum nativi caloris in corporibus reſolvens, corpora quum in magnos morbos, (magno quidem a ſuo ſtatu naturali facto receſſu) delabi, tum valde languida, & debilia, reddi, eſt cauſa: a qua ſane immoderata caliditate quandoque peſtilentiam gravem concitatam fuiſſe, Galen. *in primo de differ. feb.* hiſce verbis tradidit, dixit enim: *Contingit autem quandoque præcedere ambientis aeris caliditatem immodicam, quemadmodum in ea peſtilentia, quæ Athenienſes invaſit, ut Thucydides innuit: Sed in tuguriis ſuffocantibus æſtatis tempore habitantium corpora corruptione laborabant*, & in *3. Epidemicorum com. 3. text. 71. lib. 1 Æſtatem Eteſiis ventis carentem* (qui ſunt ſeptemtrionales frigidi) *admodum morboſam eſſe* ſtatuit. Ex quo Hippoc. *in Epidemiis pag. 1082. lin. 6. com. 3. text. 71. lib. 3.* peſtilentem conſtitutionem deſcribens, ait: *Æſtas ſerena erat & calida, magni erant æſtus.* Ex calore itaque aeris immodico corpora patiuntur inſignes corruptiones, & reſolutiones, cerebrumque ipſum inſignes noxas a calore patitur. Caput enim incalefactum a toto corpore humorum redundantiam trahit, præſertimque bilioſos, qui tali tempore quum multi tum tenuiſſimi ac acutiſſimi abundant. Facillimeque ex univerſo corpore ad caput rapiuntur, quibus cerebrum in morbos ſymptomataque pernicioſa incurrit. Qualia *Hippoc. in 3. Epidem. cap. 4. a pag. 1083. ad 1091.* meminit. Ubi ergo caliditati aeris etiam humiditas conjungitur, nihil corporibus morboſius, peſſimumque aeris temperamentum eſſe atque peſtiferum. Gal. *in lib. 1. cap. IV. de temperamentis* ita expreſſit: *Ommnium aeris ambientis temperamentorum peſſimum id eſſe, quod humidum eſt & calidum.* Quod & paullo poſt ita confirmavit, dicens: *Verum hic minus, utpote uno tantum e quatuor temporibus mutato malum fuit, quod ſi duo triave ſint mutata, aut etiam totus annus calidus humiduſque fuerit, neceſſe eſt, magna peſtilentia ſuccedat.* Cujuſmodi *in tertio Epidem.* ideſt, *graſſantium publice morborum*, narrat. Quid mirum? Quum humiditas in aere corpora redundare quamplurimis humiditatibus faciat, quæ facile, inſigniterque a calore computreſcunt. Siccitas vero humiditate minus eſt mala, quæ etſi acutiſſimos pariat, tamen humiditate ortis ſunt ſalubriores, & minus mortiferi, teſte Hippocrate *in lib. 3. Aph.* 15. Ex præimmoderata etiam aeris frigiditate, ſic nonnullæ partes corporis læduntur, ut exſtincto exinde calore emoriantur. Quæ mala in variis annorum obſervationibus, quas medici conſtitutiones appellant, ſæpius apparent. Hæque conſtitutiones aut a multis anni temporibus, aut ab omnibus ad unum idemque conſpirantibus temperamentum procedunt. Hippocr. *in lib. Epidem.* quatuor annorum conſtitutiones deſcripſit, quarum prima fuit auſtrina (*lib. 1. Aph ſect. 1.*) humida, ſecunda & tertia borealis *ib. ſect. 2. a pagina 942. ad 958.* atque quarta (*libro 3. Epid. ſect. 3. a pagina 1081. ad 1091. deſcripta*) calida, & humida, quæ pernicioſos ac peſtilentes morbos mortalibus intulerunt. Quippe *auſtrina* prima phthiſes, parotides, carbunculos, ardentes febres, peſtilentes: & *duæ boreales*, ophthalmias, dyſenterias, teneſmos, lienterias, diarrhæas bilioſas, febres ardentes, ſemitertianas, erraticas, malignas, phrenitides, & alias: & quarta *auſtrina calida*, & humida ſine ventis, pluvioſa, ſacros ignes cito undique depaſcentes, oris ulcera, *aphthas* Grecis dicta, atque pudendorum, febres ardentes, phrenitides, lippitudines, tabes multas, internas inflammationes, tubercula in pudendis carbunculos, abſceſſus ad ſuppurationem, quæ erat potius corruptio, non venientes, ex qua caro, oſſa, nervique integri decidebant multis, item ex maligna fluxione totum brachium, ut narrat Hippoc., vel totus cubitus, vel femur, vel tibiæ, vel pedes omni carne nudabantur. *Ex inconſtantibus etiam anni temporibus inconſtantes*

Ex aere.

Ex annorum conſtitutionibus variis.

mor-

morbos, ac difficiles judicatu fieri, Hippocr. *in sect. 3. Aph.* 8. docuit. Ex propriis item temporum anni temperamentis idem comprehendi nobis in *sect 3. Aph. 9.* indicavit, ita dicens: *In autumno morbi acutissimi atque exitiales magna ex parte: ver vero saluberrimum, & minime exitiale.* Et *Aph.* 10. *Autumnus tabidis malus.* Ab iis quoque anni temporibus, non servantibus proprium temperamentum, morbi magni ac perniciales fieri observantur. Anno MDLXXXVI. *Bassani*, & prope ipsum in Villa Novarum nuncupata, pleuritides pestilentes, contagiosæ, epidemicæ grassatę sunt, quæ quarta vel ad plus septima interimebant. Hoc itidem anno, quo hæc scripta revideo, Venetiis, & in aliis multis Italiæ locis, complures ab epidemicis febribus, semitertianis, ardentibus, pestilentibus cum morbillis malignis moriuntur. Hocque genus morbi non in pauperum corpora ex proxima annona exsiccata, sed divitum, quæ multis cibis se impleverunt, sævit. A mala quoque victus ratione diu servata morbi magni, ac pernicioſi, excitantur. In gravissimos morbos ii incurrunt, qui crapulis atque ebrietatibus indulgent, quando ex multo quum cibo tum potu calore corporum fere suffocato insignes putredines fiant. Quo Gal. in lib. *de caus. morb.* affirmavit, *Immodicum cibum & potum corpora refrigerare, frigidosque, & fortissimos morbos facere.* Ex potatione *Silenum lib. 1. Epid. Ægrot. 2. pag. 969. Charionem lib. 3. Epid. Ægrot. 5. pag.* 1072. *Nicodemum ibid. Ægrot. 10. pag.* 1108. *adolescentem Melibæum ibid. Ægrot. 16. pag.* 1117. *in pestilentes incidisse febres, Hippocr. in Epid.* meminit. Cibos vero pravi succi, ac potus pernicioſos morbos facere Medicorum neminem latet. Gal. in *lib. de succorum bonit. & vitio. Pestem sæpius annonam secutam fuisse* scriptum reliquit. Copia itaque ciborum immodica vel etiam boni succi, & longe plus pravi, concitari magno ac pernicioſos morbos, omnes perspectum habent. Ceterum corpora nedum ipsorum ciborum copia in pernicioſos morbos delabuntur, sed etiam inopia Galen. *in libro 8. meth. cap. 7.* scribit: *Complures in syncopas fastidiosissimas atque hecticas febres ex jejunio incidisse, & in lib. 5. de loc. affectis Grammaticum quemdam præ inedia sæpius convulsum vidisse*, dixit. Ex immoderato vini potu homines in summe pernicioſos morbos delabi, Hippoc. *in sect. 5. Aph. 5.* ita expressit: *Si ebrius quispiam repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit, qua solvuntur crapulæ, vocem recuperet.* Usum item aquarum palustrium jecur atque lienem durum ac scirrhosum reddere, exindeque hydropes, febresque malignas, veluti corruptarum seu fœtidarum morbos pestilentes facere experientia docet, & ratio nobis suadet; hæ enim humores nostri corporis ad suscipiendam excellentem putredinem faciunt opportunos, illæ sua crassitie obstruendo, viscera debilitant, quæ variis propterea excrementis qualitate pravis abundant, a quibus prædicti affectus concitantur. Alexandriæ in Ægypto habitatores quotannis, autumno aquis ad cibum corruptis utentes, in pestilentes febres exitialissimas incidunt, quibus epidemice complures interimuntur; de qua re nos in libris nostris *de Medic. Ægypt.* editis accuratius scripsimus. Ex somno item diuturno, atque immoderato, homines redduntur vertiginoſi, veternoſi, oblivioſi, epileptici, paralitici ac vel etiam apoplectici. Qui omnes sunt affectus perniciales. Non raro etiam phthisici, auctis scilicet ex capite ad pulmones destillationibus. Non minus & ab immodicis vigiliis, phrenitides fiunt, amentiæ, convulsiones atque alii gravissimi affectus. De quibus nos satis in opere de prævidendis morbis scripsimus. Ab immoderatis etiam exercitationibus corpora pletorica non raro in insanabiles affectus incurrunt. Non paucis ex iis rupto vase aliquo ex pulmonibus aut thorace sanguis profunditur, quo ad phthisin via fit. Alii in febres, atque in viscerum internorum inflammationes incidunt, ex nimio motu accensis & putrefactis humoribus, atque motis

A mala victus ratione.

Ex somno.

Ex vigiliis immodicis.

tis ad viſcera. Non minus paſſiones vehementes animi poſſunt ad concitandos magnos morbos. *Ex ira multos in acutiſſimas febres deveniſſe*, Gal. *in lib. de ſanit. tuenda*, meminit. *Ab ipſa tamen ſubito neminem mori in lib. 2. ſymptom. cauſ.* teſtatum reliquit. Quod ab ingenti gaudio, atque timore quibusdam contigiſſe, plures obſervarunt. Timor metuſque magnus ſæpe quoſdam interemit. Ex hoc complures febres acutæ & letales invadunt, quibus omnes fere moriuntur. Ab uſu Veneris quum immoderato, tum ab abſtinentia, hominibus graviſſimos ſæpe morbos contingere *in lib. 6. de loc. affectis* docuit. *Perpetuum tremorem quosdam incurriſſe ex immodica venere in lib. 3. Epidem. com. 1. in text. 2.* poſteritati tradidit. Idem interceptis naturalibus conſuetiſque vacuationibus fit. Ex fæcibus retentis & exſiccatis ſæpe in ileon incidunt. A ſuppreſſis quum menſtruis tum hæmorrhoidibus morbis graviſſimi ſolent concitari, iiſdemque immoderatis fluentibus. Quod Hippoc. *in ſect. 5. Aphoriſ.* 57. meminit, dicens; *ſi menſtrua plura fiant, accidunt morbi, & ſi non fiant, ex utero morbi contingunt*. Et Gal. *in Comment. Quocumque autem horum fuerit, neceſſe eſt proceſſu temporis & ipſum uterum pati aut ſimilem inflammationi diſpoſitionem, aut eryſipelati, aut duro tumori, aut cancro, quibus denuo totum compatitur corpus*. De hæmorrhoidibus Hippocr. *in lib. 6. Aphoriſ.* 12. *A diuturnis ſanato hæmorrhoidibus, ſi una non ſervatur, periculum eſt, aquam intercutem, vel tabem advenire*, & Gal. *in 4. de præſag. ex pulſibus, ex iis immodice tum fluentibus, tum retentis, aquam intercutem fieri* docuit. *Et in lib. de venæ ſectione cap. 9 adverſ. Eraſis. ab hæmorrhoidibus ſuppreſſis nonnullos melancholicos amentes factos*, obſervaſſe ſcripſit, *alios pleuriticos & alios hydropicos*. Urina ſuppreſſa brevi hominem perdit, quem longo tempore conſumit, diu immoderatiuſque fluens, uti in *Diabete*. At de cognoſcendis morbis natura potentioribus a cauſis externis hæc nobis ſufficiant. Nunc eoſdem ab internis cauſis perſcrutemur. Ab ætatibuſque exordiamur, quæ & ipſæ ad morbos natura potentiores cognoſcendos non parum faciunt. Pueri frequenter ab auſtrina conſtitutione pluvioſa in variolas atque morbillos malignos incidunt. Quo malo MDLXXXXIII. Venetiis Epidemice graſſante complures interierunt. *In Juvenibus*, ait Hippocrat. *in ſect. 3. Aphoriſm. 29. ſanguinis expuitiones, tabes, febres acutas fieri*: tabes vero ab anno decimo octavo uſque ad trigeſimum quintum ſolent concitari. Poſt juventutem hoc fieri quoque dixit *Sect. 3. Aphoriſm.* 30. *quippe aſthmata, morbos laterales, pulmonias, phrenitides, lethargos, alvi, profluvia, choleras, dyſenterias*. Senectus maximos quoque morbos affert. Quos meminit Hippocrates in *3. Aph.* 31. in hunc modum: *Senibus ſpirandi difficultates, urinæ ſtillicidia, vertigines, apoplexiæ, hydropes, tuſſes*: & alia, quæ omnia in hac ætate omnino ſunt letalia. Nam ut dicit Hippocr. *in lib. 2. Aphoriſm. 39. Senes juvenibus magna ex parte ægrotant minus, qui vero morbi ipſis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem*. Et poſtea *Aph.* 40. *Raucedines & gravedines in valde ſenibus concoctionem non admittunt*. Et Galen. *in Comment.* ait: *Neque enim hi ſoli morbi ſenes comitantur ad mortem, ſed nephritis, id eſt* paſſio renum, *podagra, morbus articularis coxendicis cum dolore, & quę laxiori inteſtino ac ſpleni frigidę inſunt diſpoſitiones, & prętera crebri anhelitus*, (quos Græci *aſthmata* vocant) *tuſſes, dorſi curvationes, recurvationes & obliquationes*, demum *quęcumque alia morborum genera ex frigidis humoribus ortum habent, quę in quibuſdam juvenibus, nedum in ſenibus, difficulter coquantur*. Et *in 6. libro Aphoriſm.* 57. *Apoplectici autem fiunt maxime a quadrageſimo anno uſque ad ſexageſimum*. Ex habitu quoque corporum non naturali graves morbi comprehenduntur. Obeſos ac pinguiores, quod hæc corpora minus habeant caloris innati, magnis tentari morbis, quibus etiam ob calorem prælanguidum ſeu debilem plerique moriuntur. De his Hippocrat. *in lib.*

Ab animi paſſionibus vehementibus.

Ab internis cauſis.

Ab ætate.

Ex habitu corporum non naturali.

in lib. 2. Aph. 44. ita habet: *Qui natura admodum craſſi ſunt, citius intereunt quam qui graciles*. Corpora itidem calidioris & humidioris temperamenti, febribus, ſynochis malignis, atque internis viſcerum inflammationibus ſunt obnoxia, veluti calida & ſicca in ardentes febres acutiſſimaſque inflammationes incurrere ſolent. In hiſce corporibus morbi omnes frigidi, admodum graves exiſtunt: veluti in corporibus frigidis, calidi, hocque fit ex magno ab ipſorum temperamento receſſu: & hoc eſt, quod Hippoc. *in 2. Aph. 34.* dixit: *In morbis minus periclitari, quorum naturę aut ętati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus ſecundum nihil iſtorum congruit*. Ceterum etſi hoc verum ſit, ex eo quod magni receſſus, qui perpetuo ſunt difficiles, ut a natura ad ſolitum ſtatum reſtituantur, in iis corporibus facti denotentur; tamen verum quoque non minus erit, eos, qui ad graves aliquos morbos inclinationem habuerint, ſi ipſis capiantur, peſſime ſe habere, difficulterque iis morbis reſiſtere. De Hippoc. in *Epidemiorum com. 1. Sect. 1. text. 18. pag. 939. litt. F.* ait: *Et maxime moriebantur, quibus natura vergebat ad phthiſin*. Calidioris etiam temperamenti homines deſtillationibus calidis acribus a capite in pulmones, ſunt obnoxii. Quod Hippocr. *in 1. Epid. com. 2. text. 19.* quoque dixit: *Qui calidiore erant temperamento, illos in primis laboraſſe ex deſtillationibus capitis*. Atque hinc etiam fit, quod qui calido ſiccoque capite ſunt, facile in phrenitim incidat. Humorum etiam copia ſeu multitudo graves morbos parit, qui in corporibus debilibus exitiales eſſe ſolent, omniumque maxime, ſi ea multitudo fuerit humorum crudorum & craſſorum. Ex his itaque morbi acuti concitati, ni fuerint vires robuſtiſſimæ, erunt plane letales. Natura enim robuſta longo tempore eos concoquet & ſuperabit. Ex quo de frigidis ſudoribus in continuis febribus apparentibus, (quod ſignificent, teſte Galeno, crudorum humorum multitudinem, quæ non niſi longo tempote poteſt a robuſta natura vinci) Hippocrat. *in ſect. 4. Aph.* 37. ſcribens, ita habet; *Sudores frigidi cum acuta febre mortem, cum mitiori longitudinem morbi ſignificant*. A vehementia enim morbi vires, etiam validæ, collabuntur. Idem præſagit calidorum non minus humorum copia. Neque etiam ſanguinis copia eſt ſalutaris (quamquam ceteris humoribus ſit benignior) quando ex ea maxime inflammationes fiant veluti ſunt anginæ, pleuritides, atque aliæ, ut Galen. in libro *de venæ Sect. cap. 1.* adverſ. Eraſiſt. meminit. Idemque & ex bilis multitudine erit æſtimandum. Pernicioſi item ſunt morbi, qui fiunt, ubi in corporibus æque exſuperant craſſi, viſcidi, crudi, & tenues calidi, ut docuit in primo *lib. Epid.* Humorum etiam inopia ſeu defectu morbi magni ac difficiles fiunt, uti ſunt, tabes, ſingultus, convulſiones, & alii hujuſmodi, de quibus Hippocr. *in quinto libro Aphoriſ. 3. Ubi ſanguis plurimus fluxerit, ſingultus aut convulſio ſuperveniens, malum*. Et *Aphor. 4. A ſuperflua purgatione eodem modo ſingultum atque convulſionem ſupervenientem, malum ſignificare tradidit*. Ex particularibus quoque humoribus morbi magni, & graves comprehenduntur. Ex quo dixit Hippocr. *in ſect. 6. Aphor. 53. Deſipientias, quæ cum riſu fiunt, eſſe ſecuriores: & quæ cum ſtudio, periculoſiores*. Quod illæ ex ſanguine, hæ a bile exuſta oriantur, a quo humore phrenitides ac pleuritides concitatæ, letales creduntur. Hæ ſputa æruginoſa, & nigra habent, illæ virulentos ſeu æruginoſos vomitus. Quæ omnia eſſe letalia ſigna Hippocr. & Galenus in multis locis docuerunt. Sanguis item a pulmonibus, eroſo aut fracto vaſe aliquo, ſi extuſſiatur, letalis morbi erit præſagium, atque hoc eſt quod dixit Hippocrat. *in 4. lib. Aph. 25. Sanguis quidem ſupra, qualiſcumque fuerit, malum*. Galenus itidem *in 4. de loc. affect. cap. 8.* ſcribit: *Omnes, qui ſanguinis ſputa per tuſſim purulenta reddiderunt, tabidos ſeu phthiſicos obiiſſe*. Plurimam quoque bilem ſine febre ex pulmonibus tuſſi rejectam, exitialis affectus nobis eſſe indicio,

Ex humorum copia.

A morbi vehementia.

Ex humorum defectu.

Ex humoribus particularibus.

ſcriptum

ſcriptum reliquit. Tres ibi narrat fuiſſe, qui quum plurimum flavæ bilis exſpuere tuſſi cœperint, quin tabidi morerentur, nullo modo effugere potuerunt. Omnium humorum atrabilis (quod maxime naturæ humanæ ſit inimica, difficillimaque, & tardiſſima, ut concoquatur, & ſuperetur) morbos exitiales parit. Hujus ſucci copia, ſi ad benignum vel reduci debeat, vel conſumi, vel excerni, prævalida facultate eſt opus. Qua debili exiſtente, caſus eſt pernicialis; quod nobis Hippocr. *in ſect.* 4. *Aph.* 23. expreſſit, dicens: *Quibuſcumque, ex morbis acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus, ſive quovis alio modo extenuatis, nigra bilis, ſive uti ſanguis niger, exierit, poſtridie moriuntur.* Pituitoſos quoque crudos humores difficillimos concitare morbos quotidie praxin facientes obſervant. Cujuſmodi ſunt tenebricoſæ vertigines, epilepſiæ, paralyſes, apoplexiæ, convulſiones, & alia hujuſmodi. Malignam etiam humorum putredinem pernicioſos morbos facere, Galen. *in libro quarto Aphoriſm.* 47. ſcriptum reliquit: etenim humores excellenter putrefacti qualitatem pravam acquirunt, quæ noſtris corporibus eſſet venenum. Quod Gal. in peſte infectis, & in quibuſdam etiam mulieribus ex corrupto ſemine morbis, ac ſymptomatis perniciosis vexatis, ſe vidiſſe & cognoviſſe in libro 6. *de loc. affect.* ſcribit: De his Hippocrat. *in* 1. *Epidemior. l.b. com.* 2. *ſect.* 2. *text.* 54. *pag.* 948. dixit: *Phreniticis convulſiones, & virulenta vomunt, & ex his quidem ſubito moriuntur nonnulli.* Et *in lib. tert. pag.* 1100. *Ægrot.* 4. *Phreniticus primo die vomuit virulenta, & multa & tenuia.* Et Galen. in Comment. *Nam ſi phreniticus primo die vomuit virulenta, quod febribus adurentibus fere eſt conſequens.* Ita ut veneno epoto letali quidam poſtridie vel tertio die moriuntur, qualitate ejus, non copia mortem afferente. His addimus, humores habentes aptitudinem ad vehementer putreſcendum, ex Galeno *in* 3. *Epidemior. exitiales morbos, peſtemque concitare.* Qualibus corpora in quarta conſtitutione peſtilenti, quam in libro tertio *Epidem.* Hippocr. deſcripſit, ſcatuiſſe Galen. meminit. Humores itidem aut ſuapte natura, aut ob inſignem putredinem tenuiſſimi, atque ad motum præcipites redditi, ſæpius nobile aliquod viſcus ocupantes morbos letales faciunt. Quo Hipp. continuo, ne ſcilicet præcipites ad aliquod viſcus ferantur, purgandos in Aphoriſmis præcepit. In libro quoque *de natura humana pag.* 229. *lin.* 15. *& ſeq.* dixit, parte aliqua principe noſtri corporis laborante totum corpus ægrotare morboſque fieri graviſſimos. Et Galen. *in lib. de conſtitut. art. Medicæ, cap.* 18. ſcribit: *Pravos humores in morbis acutis, ſi in principem partem ferantur, extremum periculum ægrotis facere.* Ex quo optimum eſt in morbis humores a viſceribus ad exteriora converti, peſſimum ab exterioribus & ignobilibus ad viſcera. Qua ratione Hippocrat. *in ſect.* 6. *Aphoriſm.* 25. dixit: *Eryſipelas ab exterioribus verti ad interiora, non eſt bonum.* Hincque conſtat morbos cerebrum, ſtomachum, jecur, cor, pulmones, diaphragma, atque alias internas partes præcipuas conflictantes eſſe graviſſimos atque difficillimos. A mutatione etiam morborum, idem comprehendimus; quippe in pejores quæ fit, in ipſis magnitudinem & periculum argumentatur, uti quum febres intermittentes in continuas mutantur, atque hæ in malignas ac peſtilentes. Simplices etiam fieri compoſitas, phlegmonemque adjungi, malum eſt. Ardentibus item febribus hecticas ſuccedere maraſmodes, phreniticis veternum, convulſiones; paralyſi, & epylepſiæ apoplexiam: tonſillarum inflammationi anginam; pleuritidi peripneumoniam, empyema, phthiſin; hepatis, & lienis tumoribus hydropem, & alia hujuſmodi in pejus facta mutatio: atque hæc ſunt, quæ morbos magnos naturaque potentiores nobis præmonſtrabunt, atque hic noſtræ methodi, qua quum naturam viribus morbo potentiorem, & debiliorem, tum morbum natura ipſa potentiorem, & debiliorem cognoſcimus, finis eſto.

Ex atrabile.

Ex pituitoſis crudis.

Ex maligna humorum putredine.

A parte aliqua principe corporis laborante.

CAP. XII.

De futuri morborum ſtatus ſeu vigoris cognitione ad prædicendi rationem.

Status futuri cognitionis neceſſitas.

DIximus neceſſariam eſſe futuri ſtatus præcognitionem ad naturæ & morbi victoriam nobis innoteſcendam. De qua Gal. *in lib. 3. de Criſibus, cap. 5.* ita habet: *Et quidem ſine horum trium exacta dignotione, nihil de ſalute inveſtigari contingit, non magis quam hoc, numquid aliquis portando oneri ſufficiat, ſciri poteſt, hominis robore, oneris magnitudine & viæ longitudine antea non perſpecta.* Nam ægri vires portanti onus, morbus vero oneri, tempus autem, quod uſque ad ſtatum extenditur, longitudini viæ reſpondet. Quo pacto igitur de ægrotante ſciri poteſt, numquid ſufficiat, ſi nulla ſtatus præcognitio habeatur? Ex omnibus itaque ratio cogit, nil tam ſtudioſe eſſe diſcendum, quam futuri ſtatus præcognitionem. Quandoquidem natura morboque æque viribus conſtantibus, ubi cito ſtatum ſeu vigorem morbi futurum conjecerimus, naturæ victoriam, & ſalutem ægrotis prædicemus. Contra, morbo longius, ad ſtatum ut veniat, retardaturo, morbi victoriam, atque exitium plerumque futurum nobis præmonſtrabitur. Itaque de hoc morbi tempore, quod neceſſario ad prognoſtici notitiam concurrit, nunc agemus, nonnullis de morborum temporibus in memoriam primum revocatis, & num ægrotantes ſanaturi omnia, aut quædam tantum morbi tempora tranſeant, neque minus morituri, quo morbi tempore intereant. Morborum autem tempora nihil aliud eſſe Medici dicunt, quam mutationes, quæ in toto morbi tempore, quippe a principio ad finem uſque obſervantur. Haſque ætates etiam morborum appellant, quæ, perinde ac ætates animalium vitam, ita etiam totius morbi tempus in tempora ſeu in partes dividunt. Quæ quatuor exiſtunt, prout tot mutationes in toto morbi tempore a principio ſcilicet ad finem uſque ſpectantur, quippe principium, augmentum, ſtatus atque declinatio. Quæ omnia quatuor tempora quilibet ſalutaris morbus habet, ut Gal. *in 3. de Criſibus, & in lib de totius morbi temporibus* docuit. *Morbi exitiales ſæpe prius ægros perdunt, ſive interimunt, quam nedum omnia at duo tantum prima tempora abſolvant, quando eorum, qui moriuntnr, quidam in principio, quidam in augmento, quidam in ipſo ſtatu ſeu vigore decedant.* Quandoque enim morbi uſque adeo ſunt vehementes ac pernicioſi, ut ſtatim in principio vel tardius in augmento homines interimant, de quibus Hippoc. *in 1. Epid. com. 3. text. 10. pag. 963. lin. 5.* ait: *ſtatim enim continua eſt, quibus incipiens floreſcit & viget.* Et *in Aphoriſm. 7. Ubi quidem peracutus eſt morbus, ſtatim extremos habet labores.* Hac eadem ratione natura aliquando uſque adeo eſt debilis, ut nedum totum morbum concoquere queat, ſed quinimmo vix incepta concoctione morbo ſuccumbat. Habent itaque ſalutares morbi quatuor tempora, & letales unum aut duo aut tria, quando ægroti, ut poſtea accuratius oſtendemus, aut in principio, aut in augmento, aut in ſtatu moriantur. Hæc vero tempora ex Galeno *in lib. de totius morbi temporibus cap. 3.* a nullo alio deprehenduntur, ac cognoſcuntur, quam a cruditatis & coctionis ſignis in excrementis conſpectis ac obſervatis. Non defuere tamen Medici alioquin doctiſſimi, qui præter hæc tempora a coctione ſeu tranſmutatione materiæ cognita, alia ab eſſentia morbi, aliaque a ſymptomatibus depromta faciant. Etenim inflammationis cutis partem occupantis principium faciunt, quod humor ad partem inflammatam confluit, & decumbit, eoque partim fluxo, partim fluente, augmentum ſeu aſcenſum, totoque humore affluxo quoad coquatur, ſtatum ſeu vigorem, atque demum ipſo concocto, quum etiam reſolvitur, declinationem. Ex quo ſymptomatum, & materiæ

Morborum temporum differentia.

Morborum tempora unde perquirenda.

tranſ-

transmutandæ tempora a temporibus morbi maxime differre atque distinguī affirmant. Veluti in pectoris, pulmonumque inflammationibus tempora morbi, & symptomatum simul procedere, minimeque cum iis temporibus, quæ a coctione, & cruditate excrementorum attenduntur, observamus. Vigere enim sæpius illa dicunt, nulla in humoribus coctione apparente. Quod tempus principium ex materiæ transmutatione esse statuunt. Quod morbus tunc erit in vigore seu statu, & natura seu materia ipsa, ut concoquatur, in principio, hoc confirmant ex Gal. *in* 1. *de vict. rat. in acutis*, scribente; Hippoc. dicentem: (*lib. de Vict. rat. in acut. p.* 386. *lin.* 3. *& seq.*) *Si dolor fuerit assiduus, qui fomentis minime cedat, & sputum etiam non procedat, sed lenteſcat citra coctionem, & ptisana offeratur, interficitur ægrotus*, statum intelligere voluisse inflammationis, in quo non debeamus ægrotos nutrire, vigentisque inflammationis signa esse dolorem assiduum, qui fomentis minime cedit, atque ubi ægri quicquam non expuunt, quum tamen hoc tempore ad materiæ coctionem comparatum principium sit. Amplius ubi morbus & symptomata vigenti, coctionis principium esse dicunt, atque ipsis declinare incipientibus augmentum esse. Quod vel ipsis fuit persuasum, primum ex Galeno, qui *in libro* 3. *de vict. rat. in acut. com.* 62. dixit; *Morbi vigorem interdum cum ipsa coctione existere*: ex quo plerumque morbi vigorem absque coctione observari colligunt: Et postea *com.* 59. quum scripserit: *Nam sæpius affectio ipsa, qua laborant, mitior quidem existit, sed symptomata augentur*. Et in *secundo libro Aphorism. Dispositio siquidem, ex qua hæc generantur, quam & morbum nominamus, non omnino dum morbus consistit, est fortior*. Quod etiam confirmant ii dicentes in vigore coctionis morbum aliquantulum declinasse, quum humores concocti ac superati minus naturæ molesti, quam antea sint. Non semper igitur a coctione sola tempora morborum perquirenda discimus, at a symptomatibus & a morbi etiam, ut aliis visum est, essentia. Quam rem Gal. meminisse visus est *in* 1. *lib. de Crisib. cap.* 29. quum de cognoscendis morborum temporibus ex accessionibus symptomatisque locutus, dixerit: *Ipsorum augmentum judicari non modo ex accessionibus solitum tempus anticipantibus longioribus & gravioribus, verum etiam a propriis morborum symptomatis, quæ ideam morborum notant, atque a supervenientibus non minus, multis assiduis, validis ac malignis*. Hæc vero ita habet: *Ex supervenientibus vero symptomatibus; si multa, si diuturna & valida, atque maligna exstiterint*. Quæ symptomata multa, diuturna, valida, atque maligna sæpius in morbis exitialibus observantur citra ullam humorum coctionem. A quibus tempora morbi differre a temporibus naturæ concoquentis (quam Medici tempora materiæ vocant) cuique liquido constabit. Itaque dividimus tempora morborum, quibus utemur ad prognosin, in ea, quæ ad morborum symptomata, & in ea, quæ ad naturam concoquentem, seu ad coctionem & cruditatem, (quæ ob id tempora naturæ concoquentis appellavimus) referentur. Morbi salutares omnia quum morbi tum naturæ tempora fere pertranseunt. Quod in exitiosis non fit. Horum namque nullus est, qui statum percurrat, & ad declinationem perveniat. Horum alii (ut dictum est) in principio, alii in augmento, ac alii in vigore seu statu moriuntur. Differunt vero augmenti statusque tempora in sanandis, & moribundis observata. Illorum enim *augmentum*, ut docet Galenus in *primo libro de Crisibus cap.* 8. *Incipiente humorum coctione fit, & status seu vigor perfecta apparente, letalium vero morborum augmentum & status signis cruditatis ac letalibus innotescit*. Quod Galen. *in libro de totius morbi temporibus cap.* 6. ita expressit, dicens: *Siquidem initium similiter in morbi generatione constituitur, ascensus non in coquendo, sicut in iis, qui superstites futuri sunt, sed in cruditate, letalibusque signis consistit*. Itaque sæpe contingit multa ob id tempora diversa in ægrotis eodem tem-

Morborum temporum divisio.

pore obſervemus, quorum alia principium, alia ſummum vigorem, atque alia declinationem demonſtrant. Uti pleuritici, qui nihil exſpuentes, ſeu quicquam quum exſpuere nondum cœperint, moriuntur, quod ad morbum & ſymptomata ipſum conſequentia pertinet, in augmento aut vigore exiſtunt, atque ad naturam nihil concoquentem, ſive ad materiam, quæ omnino eſt cruda, in principio. Verum Medici diſtinguere debebunt, quod non illa tempora a ſolius ſimplicis morbi vel multorum ſimul complicatorum ratione fiant. Quod Galen. *in cod. lib. cap.* 3. ita meminit: *Nam uno eodemque tempore duobus tribuſve morbi homo infeſtari poteſt, quorum alius jam declinat, alius principii tempus adhuc vel augmenti primordia occupat.* Itaque morbi principium ex ſymptomatum ratione, tempus eſt, in quo ægroti parum ab iis conflictantur, & ex natura concoquente, in quo nulla in humoribus appareat concoctio, & dum acceſſiones, ſymptomataque anticipant, augentur, & diutius ægrotos affligunt, augmentum ſignificatur. Idemque, quod ad naturæ tempora ſpectat, augmentum dicetur, quum humores concoqui manifeſte cœperint. Sicuti illis perfecte concoctis morbum in vigore eſſe dicimus, atque etiam in quo acceſſiones ſymptomataque conſiſtunt. Quibus quidem aliquo modo declinantibus, atque humoribus, & concoctis, & aliqua ex parte reſolutis, morbum declinare ſcimus. Sed quæ de vigore ſeu ſtatu morbi, diximus, forte dubia videbuntur, quum Hippocrat. & Galenus, qui de hoc ipſo tempore locuti ſibi ipſis omnino conſtare non videantur. Etenim modo dicunt, vigorem ſeu ſtatum eſſe partem totius morbi vehementiſſimam. Et *in* 1. *Aphoriſm. ſect.* 3. Galen. dixit: *Vigorem nihil aliud eſſe, quam morbi, quantum ad caſus attinet, maximum.* Et *in* 2. *libro de Criſibus cap.* 8. ut nuperrime diximus: *Circa ſtatum omnia eſſe fortiora.* Et *in lib. de tot morb. temporib. cap.* 3. docet: *Statum ſive vigorem inflammationis eſſe, & dici, quando pars inflammata maximis doloribus cruciatur, febriſque vehementius ſolito affligit.* Ex oppoſito alii negant vigorem eſſe moleſtum ac turbantem, at potius tunc temporis ægrotos melius quieſcere, neque febrem, neque ſymptomata, neque acceſſiones auctas videri, ſed hæc omnia æqualia eſſe & conſiſtere; quo ægroti minus, quam cum augmento turbantur & conflictantur. Neque immerito, quum Hippocr. *in ſect.* 2. *Aphoriſm.* 47. dixerit: *Dum pus fit, dolores ac febres accidunt magis, quam jam confecto.* Nemo tamen negat in vigore ipſum pus factum eſſe; veluti in febribus humores plane concoctos in ſtatu apparere, obſervamus. Quod forte etiam Galenus *in* 2. *Aphoriſm. com.* 29. intellexit, quum hæc ſcripſerit: *Diſpoſitio ſiquidem, ex qua morbi generantur, quam & morbum nominamus, non omnino dum morbus conſiſtit, eſt fortior: verum in his, qui ſalvari debent, multo melior quam in morbi principio.* Et in 3. *lib. cap.* 5. *Sicuti ipſas diſpoſitiones, in quibus hæc fiunt, ubi morbi conſiſtunt, neceſſe eſt, eſſe meliores in his, qui debent ſanitati reſtitui.* Nemo etiam non fatetur, criſin bonam fieri in ſtatu, veluti Galen. *in lib.* 3. *de Criſibus* affirmavit. Antequam vero ipſa fiat, neceſſe eſt vehementes turbationes, & agitationes fieri, non minuſque gravia ſymptomata, critica vocata, criſin illam prænuntiantia; uti ſunt vigiliæ, dolor, deliria, inquietudines, & alia. Tunc enim natura, dum concoquit humores atque eos ad excretionem parat, concitat in corpore magnam turbationem. Quod Galen. quum *in* 3. *de Criſibus c.* 5. tum *in* 2. *Aphoriſm. com.* 19. docet. Quare morbi ſtatus non ſic in ægrotis fortior moleſtiorque videtur. Quid igitur his auditis erit reſolvendum? An non ipſum ſtatum eſſe fortiorem, vel potius debiliorem ac quietiorem. Utrumque, ſi accuratius ſtatus tempus obſervabimus, verum erit. Etenim morborum tempus quodlibet habet ſuam latitudinem, ex qua quodlibet ipſorum tria tempora percurrit, ut puta principium, medium, & finem; ſtatus itaque principium eſt moleſtiſſimum,

Morbi principium quodnam.

Augmentum.

Status. Declinatio.

Morborum cujuslibet temporis diviſio.

mum, quia in eo tota pugna atque turbatio fit, quum natura maxime concoquat vel expellat; atque hoc est, quod dixerat Hippoc. *in sect.* 2. *Aphor.* 47. *Quum pus fit, dolores & febres augentur magis quam illo confecto*. Quod fit in principio status, atque in fine est confectum. Quo fit, ut ægroti summos labores ac turbationes patiantur in primo status tempore, quoniam natura valide totam materiam humorum agitat, atque alterat. Qua sane concocta seu alterata, quod circa finem factum est, melius ægroti se habent. Quo tempore morbus omnino coctus seu superatus a natura est. Unde ipsam minus turbari & offendi, non est mirum. Dicimus itaque in ægrotis, qui incolumes futuri sunt, totum status seu vigoris tempus cum perfecta humorum coctione non esse, sed ipsius tantummodo partem ultimam, seu finem, quam ex symptomatum ratione declinationem aliqno modo nominari liceret. In morituris vero status seu vigor nulla omnino coctione observatur, ob idque pessimum est in morbis vigorem absque ulla coctione observari, quod sane significat morbum esse fortissimum, qui usque ad ultimum cum natura venerit, summas ipsius vires oppugnando, atque naturam ita debilem, ut quicquam contra morbum toto illo tempore facere non potuerit, nihilque humorum concoxerit, & superarit. Quæ si hactenus facere non potuit, multo minus post faciet, ipso morbo viribus supra ipsam plurimum aucto, ipsaque debiliori reddita. Sed tempus est, ut ad prædictionem ex status observatione descendamus.

CAP. XIII.

De salutis ac exitii prognostico ex morborum futuri status cognitione.

Morborum status cognitio ad horum prognosticum plurimum facit.

EUm morborum statum, seu vigorem qui humorum coctione perfecta indicatur, ad morborum prognosticum, plurimum facere, non ignoramus, circaque ejus rationem propterea accuratius versari nunc sit propositum. De altero non tam ex naturæ, sed morbi potius ratione, ut nuper ostendimus, qui symptomatum auctorum consistentia atque vigore cognoscitur, non minus agendum duximus, licet multis ipsum statum seu vigorem appellari non libeat, at potius augmentum, quod nisi ægroti a vehementiori morbo, quem debilis ipsorum natura ferre non potest, tunc temporis interimerentur, morbus procul dubio ac symptomata multo plus augerentur. Salutis vero ac exitii præsagium nobis primo ab illius status celeritate, tarditateque innotescit, atque etiam quod vel solus vel simul cum naturæ seu coctionis statu in ægrotis observatur. Cito autem morborum status seu vigores apparentes, neque valde vehementes, optimi in omnibus ægrotis censentur. Siquidem natura melius morbi insultibus resistet, si brevi tempore sit dimicatura. Non latet etiam nos omnia morborum tempora, ut Gal. docuit, inter se proportione temporis convenire; etenim breve principium breve tum augmentum, tum status, tum declinatio sequitur, quodlibetque ipsorum æqualis temporis, proportione movetur, a brevi propterea observato principio brevi tempore augmentum atque statum, uti dictum est, expectare debebimus. Contra tarde ad statum morbum venturum sperabimus, prioribus duobus temporibus, principio scilicet ac augmento, tarde ad ipsum statum properantibus. Hip. *in sect.* 1. *Aphor.* 7. *Ubi morbus peracutus est, statim extremos habet labores*. Facilius igitur natura morbi vehementiam cito advenientem, & cito desinentem, feret. Attamen sæpe usque adeo morbi sunt graves aut a maligna humorum qualitate, aut ab ipsorum multitudine, aut a principe parte corporis læsa, aut ab iis omnibus simul, ut statim in principio ægrotos interimant; uti quum ex venenoso humore, corde insigniter læso, syncope oborta statim moriun-

Morborum tempora inter se convenientia.

Morbi graves unde sæpe oriuntur.

tur, & cerebro læſo phrenitici: veluti phrenitico, de quo Hippoc. *in 3. Epid. com. 3. Ægr. 4. pag.* 1100. meminit, contigit, qui quarta die obiit. Idem in anginoſis, pulmoniis non raro obſervatur, quod ii copia humorum paucis diebus ſuffocati pereant. Quare quoviſmodo principibus membris, aut partibus ipſis immediate ſervientibus, graviter læſis, ut gula, pulmonibus, inteſtinis, renibus, veſica; aut ab aliqua inflammatione, aut humore craſſo & lento obſtructis, continuo homines pereunt, etſi etiam brevi tempore ſic morbus ad ſtatum feſtinet. In morbis vero partem vel non principem, vel ipſam leviter offendentibus, vires non niſi longo tempore reſolvuntur, in hiſque quanto citius ad ſtatum ægroti veniunt, eo citius liberantur. Qui ſi longo tempore ac tardiſſime ad vigorem ſeu ſtatum veniant, ni ægroti præ-robuſtiſſima natura valeant, morientur. Ex ſtatus igitur tardius futuri præcognitione, ſalutis ſpes dubia redditur: in prælanguidioribuſque corporibus bonum non eſt, peſſimumque, ſi morbus valde vehemens fuerit. Quod Hippoc. forte intellexit, quum dixit: *In 4. Aphor. 37. & in Progn. p. 38. lin. 21. Sudores frigidi in morbis acutis ac vehementibus, mortem: atque in mitioribus, longitudinem prænuntiant:* quando, ut *Gal.* meminit *in Commento*, natura corporum ægrotantium a vehementi morbo longiori tempore conflictata, priuſquam ipſum, qui non niſi longiori tempore ſuperatur, concoquat, exſtinguitur. Celeritati quoque ac tarditati ſtatus morborum, ſi conjunxerimus ſtatum naturæ, judicium magis certum aſſequemur. Namque hoc ſemper erit veriſſimum ac fideliſſimum, ſi æque tum morbus, tum natura, quod ad ſua tempora ſpectat, ſimul moveantur, cito quidem, ſi ex aliis temporibus antegreſſis ſtatum, ſeu vigorem morbi & naturæ, ſeu coctionis ſeu materiæ, quo modo alii hunc ſtatum vocant, ſimul futurum conjiciemus, morbum ſanatum iri, atque omnino ſalutarem prædicemus Eodem itidem modo, ubi etiam una tarde morbi atque naturæ vigor ſperabitur, ſalutem futuram pollicemur. Siquidem æque totum offenſæ, quod corpori ægroto morbus intulit, natura eo tempore corrigere atque emendare poterit, Et merito ſane, etenim quum duo ſint, quæ invicem pugnant, morbus quipppe ac natura, ſi æque ambo robuſta fuerint, æque ſimul a principio ad finem uſque ſe habebunt, morbus quidem oppugnando, & natura defendendo totumque illud quod a morbo in corpore concitatur, natura æquali robore prædita eo tempore corriget. Nihil itaque in ægrotis melius creditur, quam tempora omnia tum morbi, tum naturæ a principio ad finem una æque procedere. Ubi vero morbus celeriori motu quam natura ipſa moveatur, malum ſignificat; non obſcurum enim eſt imbecillitatis naturæ indicium, atque quo magis naturæ tempora a morbi temporibus diſtant, eo pejus ad prædictionem eſſe creditur, & quo minus, eo minus malum. Quando enim morbus ſummum exercet vigorem, & natura adhuc etiam eſt in principio, utpote quod nondum morbum alterare, & concoquere cœperit, quid ſpei ad ſalutem erit? Ni natura ſit prærobuſta & morbus mitis, certum exitium præmonſtrabitur. Sed his de ſtatu morbi præmiſſis, nunc ad naturæ ſtatum redeamus, qui ſi cito ſit futurus, facultate valida exiſtente, brevi ſalutem certo oſtendet. Nam morbos habere celerem ſtatum, nihil quidem aliud, quam brevitatem, & ſecuritatem, teſte Hippocrate, ſignificat. Itaque in iis humorum concoctio cito incipit, & cito abſolvitur, & quo citius incipit, eo citius perficitur. Optimumque eſt in omnibus morbis Medicos ſigna coctionis obſervare, hæc enim numquam, ut Galeno placuit, male apparent, at perpetuo ſalutem ſignificant: atque eo citius futuram, quo citius ſigna illa coctionis nobis illuxerint. De his Hippocrat. *in 1. Epidemiorum ſect. 2. p. 948.* ait: *Coctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalubrem.* Et Gal. *in libro tertio de Criſibus cap. 8. Neminem vidiſſe intereuntem, qui præcedentibus*

Salus vel exitium in morbis quomodo ex ſtatu tum naturæ tum morbi prænoſcitur?

Natura ſtatus cognitio quid ad præſagium in morbis.

tibus coctionis signis crisin habuisset, meminit. Quo citius itaque hæc apparuerint, eo securiorem morbum præmonstrabunt. Contra, quo tardius illa illuxerint, eo statum tardiorem, ac morbum difficiliorem, ostendunt; in morbo siquidem graviori, ipso crudo existente, tardissime ex longo antegresso principio ad statum veniente, periculum est, ne, priusquam morbus concoquatur, natura exstinguatur. Quare colligamus ex iis statum morbi ad prædictionem æstimari brevi tempore fore minus malum, quam qui longiori tempore futurus est, ni morbus sit admodum vehemens ac symptomatis naturam prosternens. Majus malum quoque est, si sine statu naturæ appareat; & quanto magis tempora naturæ a temporibus morbi distabunt, eo periculosiorem morbum præmonstrabunt. Bonum itaque erit, ipsum morbi statum cito futurum prænosci, & eo melius, una cum ipso statum naturæ. Optimumque in morbis ad prognosin esse judicabitur, si perpetuo ambo hi status, quippe morbi & naturæ simul procedent, ac una moveri observabuntur. Atque hæc de ægrotantium prædicenda salute ac morte, a naturæ morbique viribus, atque a futuri status præcognitione, a nobis dicta sint. Quibus addamus ea, quibus alii Medici Empirico quasi modo morbos salutares atque exitiales dignoscunt.

CAP. XIV.

Ex quibus morbos salutares ac exitiales nonnulli cognoscant.

ETsi præter nostrum institutum videatur, non velle omnia, quæ alii Medici ad cognoscendos morbos parvos salutares, ac magnos exitiales Empirico quasi quodam modo cognoverunt, prosequi; quum nobis satis ad illud assequendum ea sufficere possint, quæ nos dogmatice ex Hippocrate, & Galeno hactenus sumus prosecuti: verumtamen ne aliquid omittamus, quod possit hanc nostram prædicendi Methodum illustrare ac ampliare, ea quoque omnia, quibus scio quosdam morborum vires adversus naturam dimetiri & cognoscere, atque morbos exinde salutares & pernicioſos animadvertere, accuratius quoque cognoscenda & illustranda duximus.

Morbi Salutares atque exitiales qui cognoscuntur Empirico quasi modo.

Dicunt itaque hujusce prædicendi modi auctores, illum morbum fortem, ac pernicioſum conjici posse, a virtute sive natura profligata, a maximo dolore, calore immodico, inquietudine, morbi difficili tolerantia, mentis alienatione, siti immodica, vigiliis assiduis, magnis inflammationibus membrorum nobilium vitæ necessariorum, ex medicamentis non juvantibus, copia humorum, turgentia atque ex aliis signis causisque pravis. Et a contrariis debiles facileque naturæ cedentes æstimantur. In his quidem virtutem seu facultatem ajunt prævalidam cognosci, ipsosque vel omnino doloribus vacare, vel saltem levissimis, vel non assiduis conflictari, neque si febricitent, vehementem calorem sentire, quietosque esse, ac facile morbum perferre, mente recte constare, immodica siti non ardere, neque plane eos vigilare, neque somno veterno so teneri: atque si aliqua vexentur inflammatione, ea non sit magna, neque membrum nobile occupet, sed aut a visceribus remotas, aut ignobiles, neque principibus immediate servientes. Qui morbi neque ingenti humorum multitudine neque turgentia, ut illi dicunt, foveantur. Atque demum, si ex medicamentorum usu quicquam fuisse juvatos observemus. Hæque signa salutaria statuunt, a quibus salutares morbos ipsi prænoscunt. An vero ex horum tantummodo accurata observatione in ægrotantibus salutem ac exitium præscire recte quis queat? In morbis acutis istud posse consequi non dubitamus: siquidem omnem morbum acutum, seu febris sit, seu inflammatio, vel aliud tale genus morbi, cum virtute, ut ii dicunt,

Morbus fortis & pernicioſus unde conjicitur.

Morbi debiles unde æstimantur.

cunt, proſtrata ſeu exſoluta exitialem eſſe, quis ignorat? Etenim, ut nuper dictum eſt, virtus prælanguida, naturam cum morbo pugnantem, non modo in pugna defecturam, ſed jam defeciſſe ac occubuiſſe, ſignificat.

Morbi exitioſi dignoſcendi a virtute debili.

At per virtutem omnes facultates intelligunt, quippe vitalem, quam Medici præcipue obſervant, animalem, atque naturalem. De quibus alias abunde a nobis dictum eſt. Itaque ea, ſi omnes profligatæ obſerventur a morbo, natura devicta præmonſtratur. Reliqua vero ſigna, quæ obſervant, ſcilicet calorem, doloremque immodicum, inquietudinem, difficilem tolerantiam, ægrotos non dormire, morbum principem partem tenere, a multitudineque humorum aut turgentia eſſe concitatum, vehementem quinetiam eſſe inflammationem, aut febrem, nihilque adhibita medicamenta juverint, omnino eſſe exitioſa ſigna, putant. Quæ ſi una cum malis vacuationibus ſpontaneis obſerventur, morbum plane letalem eſſe affirmant, omniumque certiſſime, uti nuper dictum eſt, viribus prælanguentibus, quando ab iis morbis non niſi robuſtiſſimi evadere ſoleant. At ne hæc nos ſigna ad judicandum fallant, ſingula a nobis quoque ſunt illuſtranda, ac diſtincte magis cognoſcenda. Namque per virtutem proſtratam, ſeu defectam, vitalem facultatem præſertim cum iis maxime debilem prælangueſcentemque intelligimus. Pernicioſi enim ac maligni morbi continuo ſolent vires proſternere. Sed præter vitalem, animalis non minus atque naturalis ſedulo erunt attendendæ. Quæ quanto debiliores evaſerint, tanto morbum pernicioſiorem ſignificant. Dolor, calor, inquietudo, & reliqua ſymptomata, ſi poſtea in morbo appareant, malum morem denotabunt, & quo plura vehementioraque fuerint, eo majorem atque maligniorem quoque morbum præmonſtrant. Sed nunc de his ſingulis nos accuratius. Dolores vehementes, aſſidui morbi fortiſſimi ſunt ſymptomata, omniumque maxime viſcera nobilia obſidentes, ſeu vexantes. Ex quo merito Hippocr. *in ſect.* 4. *Aph.* 66. dixit; *Viſcerum fortes dolores, malum ſignificare*. Dolor etiam eſt ex iis, quæ maxime vires reſolvunt. Quare magni dolores in omnibus morbis, tum ut ſignum, tum ut cauſam malum prænuntiant, iis exceptis, qui critice aliquando in aliqua partium ignobilium, & remotarum a viſceribus excitatur.

Morbi fortes vel debiles cognoſcendi. A doloribus.

Dolentes namque pedes, vigentibus morbis, quo tempore non raro dolores ægrotos invadunt, vel etiam ab ignaris mulierculis laudari ſolent, morbum in pedes nimirum decumbere putantibus. *Qui etiam dolores non ſentiunt* (ut Hipp. *in ſect.* 2. *Aphor.* 6. docet) *peſſimo morbo vexantur*, ii enim, *aut delirant, vel in ipſis facultas exſtinguitur*. De calore itidem vehementi magni morbi explicantur, ſed quandoque a prævalida natura fit, ideo accurate diſtinguendum erit, an ex morbo, an ex natura, ut dictum eſt, forti fiat, & an in toto vel in parte aliqua corporis ſit, rurſumque an internam vel externam occupet partem, atque an in extremis quidem partibus, aut in viſceribus ſentiatur. De his Hipp. *p.* 39. *lin.* 30. *in Progn. text.* 4. ita habet: *Si vero caput, manus, ac pedes frigida ſint, ubi & venter & latera calida ſunt, malum eſt*. Et *in ſect.* 4. *Aphoriſm.* 48. *In febribus non intermittentibus, ſi partes exteriores frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeant, letale*. Internarum partium inſignem caliditatem a magna inflammatione viſcus aliquod, vel aliquam ex internis partibus occupante, concitari Gal. docet. Quæ vero vel etiam eſt vehementiſſima caliditas, occupans externas partes, atque a viſceribus remotas, magni ſane vehementiſque morbi eſt indicium, non tamen exitialis. Quinimmo in febribus continuis, ſi in parte exteriore ac longinqua a viſceribus, veluti ſunt crura, brachia, & pedes, vehemens caliditas concitetur, optimum erit ſignum. In toto vero corpore vehemens, aſſidua, diuque durans caliditas corpus colliquat. Sæpe vero Medici decipiuntur a putridarum febrium miti ac leni calore in cute obſervato. Etenim quum natura opprimitur ac fere humorum

A calore.

mul-

multitudine ſuffocatur, quo calor nativus alioquin ardens ſeſe exinde intus contineat, nec foras moveatur, partes corporis exteriores parum calent. Has febres aliqui fumantes magis, quam ſuffocantes appellant, quod in ipſis non flamma, ſeu ardor calorve, foras per cutis meatus moveatur, ſed fumida potius neque ita urens exhalatio, ſeu fumus, uti in igne lignorum viridium vel temere congeſtorum copia obruto & ſoffocato pro flamma fumum excitari obſervamus, aut ubi ita natura deficit, ut niſi ex putrefactis ſuccis calor accenſus non multus ſit; neque ad cutim copioſe perveniat. De quo ſcribit Galen. *in 3. Epid. com.* 1. *text.* 10. Hermocratis caſum commentans: *Quem vide in 3 Epid. ſect.* 1. *Ægr.* 2. *Neque enim ſeptimo decimo accidit nativi caloris ratione, ſed ſola putredine ſuccenſis febriliter humoribus, aut venenoſæ putredinis cauſa, aut ob inſignem viſceris inflammationem intus cum ſanguine nativo calore recurrente, ſive retracto, aut a morbi vehementia, vel malignitate, in externis partibus corporis & remotis reſoluta externæ partes parum calent.* Quod in moribundis obſervatur. *Inquieti vero & anxii ſunt ægroti, qui loco ſtare nequeunt, quique decubitum, ut ait Galen. in* 1. *de humorib. text.* 17. *ferre poſſunt, ſed formas mutant, jactantur aſſidue, inæqualiter moventur, agitantur atque æſtuant.* Quod illis contingit, vel ſtomachi vitio, quum præſertim os ventris, ut docet Gal. *in* 2. *Prorrh.* 24. a pravis mordetur humoribus, vel quibus in ore ventriculi propria quædam moleſti humoris qualitas continetur, qui humor neque multus ſit, neque in ventriculi ſpatio innatet, ſed in ejus tunicis ſit immerſus, atque etiam a longa inedia, ventre ichoribus (Galeno auctore *in* 7. *Aphor.* 56.) repleto: vel a cibo intempeſtivo gravante, vel a corpore virtutem gravante, aut a febre ſtabili & æſtuoſa & maligna, vel ab acrioribus virulentiſque humoribus æſtu turgentibus, ferventibuſque circa præcordia, vel ab inſigni alicujus viſceris inflammatione, vel eryſipelate, aut denique ab infirmitate virium. Quare quandoque ægroti inquieti evadunt, quo tempore humor aliquis calidus vel acris ad excretionem movetur, quod in iis obſervamus, quos criſis aliqua judicare debet. De quibus Galen. *in* 2 *Prorrhet.* 44. hæc habet: *Nam ſi judicatorius rigor ex inquietatione fiat, morbum ſolvit ſupervenientibus ſudoribus, vel vomitibus commodis, vel alvo ſubducta.* Itaque hæ inquietudines, quæ ſtomacho ex aliquo humore læſo fiunt, morbum minime pernicioſum denotant: peſſimæque ſunt, ab æſtuoſa febre ſtabili & peſtilenti, ab inſigni viſceris inflammatione, & ab humoribus virulentis æſtu turgentibus ac circa præcordia ferveſcentibus obortæ, atque omnium maxime, quæ propter languorem virium excitantur, hæ ſumme pernicioſos morbos præmonſtrant. De his Auctor Coacarum *in* 1. *libro text.* 2. ait: *Quæ cum refrigeratione anxietates incidunt, peſſimæ.* Addamus diu etiam perſeverantes, nulla poſtea illuceſcente evacuatione. Idem forte de morbi difficili tolerantia videtur dicendum; nam morbum non facile tolerari, inquietudinem ſignificat. *Unde in loco ex Coacis paullo ante citato* δυσφορίαι *legitur, quod vocabulum ab Auctore noſtro tamquam* Anxietates *expoſitum, ſtricte tamen* difficilem tolerantiam *ſignificat*, quam vel a vehementi diuque perſeverante febre vel maligna, vel a virulentis ſuccis, vel inſigni inflammatione interna vel denique virium infirmitate fieri jam diximus. Ægris igitur morbum non facile ferentibus, hoc unum ſpeciatim nobis indicari videtur, quippe naturam morbo imparem viribus eſſe. Quod Hippocrat. *in Prognoſticis text.* 56. *pag.* 41. *lin.* 47. *ad finem uſque* de ſuppuratis ad exitium tendentibus expreſſit, quum dixerit *hos non facile morbum ferre, & facile eos, qui ſani futuri ſunt.* Somno etiam ægrotos bono carere per multos dies, nobis fortiſſimi morbi & pernicioſi erit indicium, omniumque maxime perpetuæ vigiliæ, quod hæ vires reſolvant, cruditatem in humoribus augeant, in deſipientiam, & phrenitidem non raro ægro-

Ab inquietudine.

A Morbi tolerantia.

A ſomno.

ro ægrotos deducant, atque non minus in exitiales tremores ac convulsiones. Somnus perpetuo magni momenti erit ad salutem prænoscendam, si bonus naturalisque sit. Nam pauciſſimi aut nulli sunt, qui morbo vexentur pernicioso, & probe, ideſt naturaliter seu secundum consuetudinem, dormiant. At dormientibus etiam non omnino fidere debebimus, quum ex iis non pauci sint, qui etsi sint moribundi, recte dormire videantur. Sed hic, quod una cum virium languore prodeat, a bono distinguetur, atque etiam, quod nedum non juvat, sed quinimmo etiam lædit. Quod fit tanta affectione cerebrum occupante, quam neque somnus digerere, & consumere queat. Hinc Hippoc. *in 2. lib. Aphoriſm.* 1. dixit: *Quibus in morbis somnus laborem facit, mortale. Si vero juvat, non mortale.* Alii vero gravioribus somnis & longioribus utuntur, qui non inter somnos, sed soporiferos potius affectus sunt adnumerandi. At de his in sequentibus libris accurate scribemus. Magnas inflamationes appellamus, quum ex ipsarum vehementia, tum si fiant in membris principibus, eæ omnes multum sunt merito timendæ; veluti parvę, atque in ignobili membro, parum aut nihil. Quid læsę partis varietas ad prognosticum faciat, alias dictum est. Cui hoc unum addimus, partem affectam vel principem, vel non principem tanti momenti esse Galenum docuisse, ut in acutis morbis humores malignos in principem partem recurrentes, exitium; & in non principem ac ignobilem, salutem ægrotis inferant. Graviſſimos itidem morbos esse ab humorum multitudine concitatos, omnes medici statuunt, præcipueque si multitudo humorum sit eorum, qui naturæ maxime adversantur, quos ipsa propterea difficillime ac tardiſſime concoquit, corrigit, aut a partibus affectis expellit, quales sunt bilis æruginosa, usta, atra vocata, summe putridi ac virulenti humores. Non tamen ob id, qui ab humoribus quantitate paucioribus excitantur, omnes periculo vacant. Sæpe enim valde exitiales observamus morbos a pauco, sed tamen virulento humore. Cujusmodi fuit phrenitis, qua ille, de quo Hippoc. scripsit *in tertio libro Epidm. sect. 3. Ægr. 4. pag.* 1100 quatuor diebus interiit. Hoc Galenus *in libro sexto de locis affectis*, exemplo quum ictus scorpionis seu veneni, perquam quantitate æxigui, tum seminis corrupti, quibus sæviſſimi morbi & symptomata concitari solent, verum esse demonstravit. Ex turgentibus etiam humoribus non minus graves, & periculosi morbi concitantur. Quando hi, præterquam quod turgentes periculum invehunt, ne in partem corporis principem irruentes, morbum graviſſimum faciant, id etiam habent, ut ipsorum mala qualitate morbis vim pernicialem addant. Medicamenta etiam, quicquam utilitatis seu juvamenti non afferentia, morbum usque adeo pernicioſum, quem natura neque arte adjuta superare queat, præmonstrant. De quibus Hippocor. *in 3. Epidem. com. 3. text. 65. pag.* 1086. *lin.* 13. *Et oblata ægre admittebant, nam purgationes multos offendebant.* Facta quidem tempore debito in acuto morbo sanguinis vacuatione, aut per venæ sectionem, aut per malleolorum scarificationem, aut alio modo, aut medicamentis vel lenientibus, vel purgantibus vomitoriis, aut dejectoriis, purgatione, si ægroti nihil juventur, judicium redditur difficile. Pravorum siquidem humorum crudorum, naturæ minime cedentium, multitudinem significant, unaque naturam morbo longe debiliorem redditam esse, quæ, priusquam morbum concoquere queat, succumbit. Hujusmodi vacuationis Hippoc meminit in *lib.* 4. *Aphoriſm.* 56. dicens: *Febricitanti sudor superveniens, febre non deficiente, malum.* Et *in* 1. *Prorrheticorum text.* 7. *Qui in hypochondrio febri refrigerata ardores relinquuntur, tum alias tum in sudoribus, mali sunt.* Et *in lib.* 1. *text.* 39. *& in Coac. præſag. text.* 53. *Inquietatio cum sudore, est mala,* &c. *Prorrheticorum libro primo text.* 67. *Flammans quoque cum sudore facies in his mala.* De sputis *lib. Progn. pag.* 41. *lin.* 33. *Omnes autem excretiones malæ sunt, quæ non sedant dolorem.*

A parte affecta.

Ab humorum multitudine.

Quantitate.

Turgescentia.

Ex medicamentorum utilitate.

lorem. Quæ itaque juvare deberent, cujuſmodi ſunt medicamenta omnia, & non juvant, aut exitii aut ſaltem difficilis judicii ſunt indicia. Quod Gal. *in l. 3. Prorrh. text.* 35. expreſſit, hunc in modum ſcribens: *Sanguinis eruptio non judicans, vel mortalis, vel judicatu difficilis, ita ſudor vel copia, tum urinarum, tum dejectionum, tum vomituum, vel quæ per hæmorrhoidas, vel uterum excernuntur, & parotides & ceteri abſceſſus*. Et paullo poſt: *Quæ namque ex judicatoriis nihil juvant, ſunt judicatu difficilia: Quæ non etiam in contrarium repunt, ſunt letalia*. Alibi dixit letalia eſſe, quæ cum ſignis letalibus, & judicatu difficilia, quæ non cum ſignis letalibus, apparent. Itaque hoc eodem modo remedia ægrotis nihil juvamenti afferentia, difficilis erunt judicii, & quæ nedum juvabunt, ſed quinimmo etiam ægrotos lædent, ſeu ab ipſis ægrotis in deterius mutantur, atque abeunt, exitium præmonſtrabunt, quod Hippoc. *in ſect. 2. Aph. 2.* de ſomno expreſſit, quum dixerit: *Quibus in morbis ſomnus laborem facit, mortale: ſi vero juvet, non mortale*. Quo ex medicis præſidiis, quæ juvant ægrotos, ſalutarem ſane morbum ſignificant. Idem ex omnibus naturæ excretionibus juvantibus, (quas criſes Medici vocant) judicari ſolet, quæ enim juvant, ſalutare itidem; & quæ non juvant, difficile judicium reddunt; atque quæ lædunt in acutis morbis exitium prænuntiant: omniumque certiſſimum, ubi aliqua ſigna prava illuxerint, cujuſmodi ſunt, in ardentiſſimis febribus tremores, convulſiones, refrigerationes extremorum cum ardentiſſima ſiti, deliria, atque alia multa, quæ alias accurate recenſuimus, atque poſterius de ſingulis accuratius agemus. Atque hæc de ægrotantium morte ac ſalute a naturæ morbique viribus, atque a futuri ſtatus cognitione præſagienda dicta ſint, & quod hactenus de iis univerſaliter ſcriptum eſt, nunc in ſequentibus libris ſpeciatim; de ſingulis ſymptomatis, quibus natura, tum robuſta, tum debilis, adverſus morbum dignoſcitur, agendum erit, atque his noſtra prædicendi methodus abſolvetur.

FINIS LIBRI PRIMI.

PRO-

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS DE PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER SECUNDUS.

CAP. I.

De quibus in toto opere ſit agendum.

QUum in primo libro de Ægrotantium ſalute, ac exitio Prognoſticum a naturæ morbique cognitione pendere dixerimus, atque etiam ex quibus vires utriuſque tum prævalidæ, tum debiles innoteſcerent, plane fuerit demonſtratum, ſupereſt modo, ut de earumdem virium fortitudine, atque debilitate ſpeciatim agamus. Ex his ſiquidem totum prædicendi artificium nobis innoteſcit, in ipſorumque accurata obſervatione conſiſtit. De hoc vero agentes, ab iis, quæ naturam morbo vel imparem viribus, vel firmiorem denotant, exordiemur. Itaque de his (quæ facultatum actiones firmas, vitiatas, diminutas, ac omnino exſtinctas ſignificare alias dictum eſt) ſermonem primo faciemus, & poſtea de illis agemus, quæ tum morbos fortes, exitioſos, tum debiles, ſalutares denotant, a quibus ad particularium morborum, illorum inquam, quæ hominibus exitium inferre poſſunt varios eventus judicandos, deſcendemus. In his vero ſingulis tradendis, ut ordine non careamus (quando nos ad dignoſcendum prognoſticum, ſingularum facultatum actionibus, uti inſtrumentis ſeu mediis, utamur) in primis circa eas actiones, vel ſanas, vel vitiatas, vel diminutas, vel plane ſublatas, quæ ab animali facultate, ſecundo a vitali, atque demum, a naturali proficiſcuntur, verſabimur. Sed rem aggrediamur, ab internis ſenſibus principium facientes, quorum cognitio, quantum ad ipſorum morborum exitus prædicendos Medicis conducat, ab iis, quæ poſterius ſcribemus, liquido cuique noſtrum conſtabit.

Prædicendi artificium in quibus conſiſtit.

CAP. II.

Quid mente conſtare in morbis ſignificat.

AD indagandum morborum prognoſticum exordiemur, ut nuper propoſuimus ab actionibus animalis facultatis, quæ immaginatione, ratione, ac memoria perficitur, atque ab iis primo, quæ mentis ſeu virtutis ratiocinatricis, robur & debilitatem ſignificant. Hæ ſi fortes, firmæ, ac perfectæ, vires iſtius facultatis prævalidas; ſi vitiatæ, diminutæ, ac omnino ſublatæ, prælanguidas denotant. Itaque multum intereſt, in omnibus morbis actiones, quæ vim hanc animalem fortem ſeu firmam ſignificant, atque prælanguidam, ſedulo

Animalis facultatis actiones quanam, harumque robur & debilitas quid ad prognoſim in morbis.

dulo cognoscere. Hæ namque in cerebri malis, exitium, illæ salutem futuram prænuntiant. Quæ nos haud fallent, si cum ipsis facultatum aliarum actiones æque responderint; fit enim aliquando, quum recte tum vitales, tum naturales vires valuerint, ut mens in ægrotis turbetur, quæ non raro salutaris crisis fit indicium. Ea quamquam Hippoc. *in Sect. 2. Aphorism. 33.* dixerit; *In quovis morbo mente constare; & bene se habere ad illa, quæ offeruntur, bonum*: Nihilominus in multis morbis mentis constantia licet ex bonis signis sit, nullo modo salutem prædicit, quandoquidem multi ex pleuriticis, peripneumonicis, anginosis, hepatis, lienisque, ac aliarum partium inflammationibus atque ex febricitantibus sine ulla mentis vacillatione morian. tur. In septi vero transversi, renum, uteri, cerebri, spinalis medullæ, nervorum, partiumque nervosarum juxta cerebrum positarum, aut quibus cerebrum maxime consentit, inflammationibus ægrotos sanos mente esse, non obscurum recuperandæ salutis indicium existimatur. Nullus etenim, aliqua supradictarum partium ex præcipuis, vel multis simul inflammatis, prudens ac sapiens moritur. Ex quo in talibus morbis ægrotos mente constare optimum est, præsertimque si id cum aliis signis bonis appareat: scitu vero dignum censet ad hoc, ut distinguantur mente recte valentes ab iis, qui modo aliquo vacillant, ut eos qui mente constant intelligamus, sæpe enim fit, ut medici hac in re plurimum decipiantur, atque errent, putantes quosdam viros prudentes & sapientes esse, qui vere delirant, & aliquos vacillantes, qui recte sapiunt. Mente vero hi constare dicuntur, in quibus omnes voluntariæ actiones plane firmæ, seu illæsæ spectantur, ac in ipsis obeundis partium solitum decorum ad unguem servatur, nec non ubi interni sensus recte atque secundum consuetudinem valent, suaque munera obeunt. Vel mente denique constare eos dicimus, ut Galeno quoque placuit, qui loquuntur, aguntque singula rationi consentanea. Sed de his nunc satis, in sequenti enim capite istud nos accuratius scribemus.

Mentis constantia in quibus morbis salutem non prædicit.

Mente constare in quibus morbis optimum.

Mente constare quinam dicuntur.

CAP. III.

Quid sit mente non constare, qualibusque signis, quum præsens mentis inconstantia, tum futura prænoscatur; & de deliriorum differentiis atque causis.

QUemadmodum ægrotos in omnibus morbis mente constare, seu quod ad rectricis facultatis actiones pertinet, recte ac secundum consuetudinem se habere, bonum esse affirmavimus; sic illos quovis modo delirare, seu vacillare, seu non recte secundum consuetudinem sapere, malum fore ad salutis prognosticum signum, dicimus. Quo signo in acutis morbis sæpe exitium prædicimus. Ceterum ad illustrandam prædicendi rationem, primo quid per mentis inconstantiam, & secundo qualibus signis præsens inconstantia nobis innotescat, & futura prænoscatur, explicandum; atque tertio de amentiarum seu deliriorum differentiis atque causis, non minus accurate agendum, duximus. Quod itaque ad primum attinet, mente non constantes seu deliros Galen. appellat, qui loquuntur, aguntque nihil rationi consentaneum, qui tamen, non recte omnes deliros, seu mente aberrantes expressisse visus est: quando nedum eos, qui nihil agunt vel loquuntur rationi consentaneum, at omnes, qui quippiam tantum agunt, aut loquuntur præter consuetudinem, etsi in multis sapientes, videantur, amentes, seu mente aberrantes, seu delirantes vocari oportere patet. Dux etiam primus Hippocrates, ex altera tantum rectricis facultatis actione læsa, delirium sæpe cognoscit, ut *in libro secundo Aphorism. Text. 6.* ex dolore quem non sentiunt ægri, dixit enim:

Mente non constantes quinam dicuntur.

Qui-

Quicumque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non ſentiunt, iis mens ægrotat. Et in *Prognoſt.* 1. *text.* 55. *Pag.* 37. *lin.* 45. ex ſolo decubitu: *In ventrem autem cubare, qui in ſanitate non eſt ſolitus ita dormire, quo tempore ſanus fuit, malum eſt, delirium enim, aut dolor circa ventris ſedes ſignificatur.* Galenuſque etiam in 1. *Prorrhet.* 6. a ſola ſputatione delirium dignoſci tradidit. Et *in primo Prognoſt. Pag.* 38. *lin.* 1. ex manuum indecora geſticulatione, quum ægri feſtucas colligunt, fruſtraque venantur muſcas: ac non minus ex ſermone, & reſponſione ægri; Auctor enim 1. *Prorrhet.* 44. *Et in Coac.* 51. ait: *Ferocem reſponſionem in homine modeſto, atque in feroci modeſtiam, delirium ſignificare, & garrulitatem in taciturno, ac ſilentium in garrulo.* Hæc & quam plura alia exſtant exempla, quibus homines ex una tantum læſa actione deliri reputantur. Quare dicamus nos illos mente aberrantes fore profecto dicendos, in quibus alia ex voluntariis actionibus præter rationem vel exſuperans, vel deficiens obſervatur, & in ipſa ſolidum decorum non ſervatur, veluti ſi manus indecore moveatur, feſtucas fruſtra colligendo, aut muſcas venando, vel aliquod præter conſuetudinem, atque ſine cauſa; ut etiam qui præter conſuetudinem, parum, vel multum, vel indecore obſcæna turpiaque loquuntur, verbaque incompoſita, & non conſtantia; & qui tardius, quam neceſſitas expoſtulat, reſpirant; aut pudenda coram aſtantibus denudant; vel eos deliros dicimus, in quibus ſenſuum defectus in animo obſervatur, in animo inquam non advertente ſenſibilium ſpecies, quæ iis objiciuntur, vel fruſtra eas, quæ non ipſis ſenſibus objiciuntur, ſentiant. Ex quibus ii profecto delirant, qui ſolitis ſenſibus, ſine cauſa defecerunt, vel iis præter conſuetudinem utuntur, aut quum ægri aliqua ex voluntariis actionibus careant, vel abutantur. Quæ notæ, ac delirantium conditiones in Coacis præſagiis 2. *coac. præſag. ſec.* 1. *text.* 10. *Coac.* 47. perbelle hiſce verbis exprimi videntur: *Facere quid præter conſuetudinem, velut inſtituere, velleque ea, quæ prius non conſueverat, aut contrarium iis, quæ fuerunt conſueta, malum, & proximum dementiæ.* Quævis igitur mutatio, in moribus, in geſtu corporis, in voce, ſermone, in ſenſuum judicio, hominem delirum, atque alium a ſeipſo factum denotant. Sed nunc ad particularia magis inconſtantis mentis ſigna accedamus, (quod eſt caput ſecundum a nobis propoſitum) illa in memoriam revocantes, quæ variis locis tum Hippocrat. 1. *Prorrht.* 44. *text.* 6. cum Galen. memoriæ prodiderunt. Quæ hæc erunt: *Ferocem reſponſionem in homine compoſito & modeſto, atque in feroci & incompoſito modeſtiam, delirium ſignificare.* Ex *libro* 1. *Prorrhet.* 49. & *Coacis* 213. ut nuperrime meminimus, & aſpectum audacem, atque ferocem eſſe phreniticum. Idem quoque ſignificari ab ægrotis dolorem non ſentientibus, atque lingua exuſtis nihil ſitientibus, vel exiguum potum expoſcentibus. Nec non pulſu hypochondriorum cum frequenti oculorum obtuitu. Quod & oculos ſublimes, atque inſtabiles denotare Galen. *in* 1. *Prognoſt. Hippocrat. Prognoſt. pagina* 38. *Linea* 37. & *Coacis* 227. & 228. tradidit. Eodem quoque modo ex decubitu in ventrem præter conſuetudinem Hippoc. *in eodem libro* 1. *Prognoſt. text.* 23. 24. *Prognoſt. pagina* 37. *linea* 48. delirium notari dixit. Et Galen. *in Comment.* idem teſtari ſupini cubantis crura admodum reducta, diſtractaque & inſolitum dentium ſtridorem, quod ibidem *linea* 52. Hippoc. docet, nec non in ſummo morbi vigore ægrotos velle reſidere, atque nuper commemoratas manuum geſticulationes, quippe ad os manus ferri, aut fruſtra ægrotos muſcas venari, feſtucaſque colligere, aut de veſte pilos evellere, aut de pariete ſtipulas carpere, uti in Dealcis uxore, quæ in Leio decumdebat, Hippocrat. *Epidem. l.* III. *Sect.* 3. *Ægrot.* 15 *pagina* 1114. *Confer.* & *libro Prognoſt. pagina* 38. *linea* 1. *libro* 1. *Prorrhet. text.* 34. & *Coac.* 76. obſervavit. Delirantis etiam non obſcurum ſignum erit, modeſtos ægrotos,

Signa quibus delirantes cognoſcuntur.

Mentis inconſtantis particularia ſigna.

tos, omniumque maxime mulieres, assidentibus devorato pudore pudenda sine causa nudare. Quod & respirationem magnam ex intervallis editam significare tum Hippoc. in Prognostic. *pag.* 38. *lin.* 8. tum Gal. *in* 2. *de respirat. cap.* 5. tum *in* 3. *Epidem. sect.* 3. *Ægr.* 15. & 16. *pag.* 1114. & *seq. text.* 3. 19. docuerunt. Idem notat palpitatio hypochondriorum, non minusque ægrotos non agnoscere familiares, ex Coacis præsagiis *text.* 282. 298. 300. 308. &c. delirium testatur. Atque *in* 1. *Coac. præs. sec.* 1. linguas *Coac.* 233. & 1. *Prorrh.* 19. & 20. vocesque *Coac.* 99. & 1. *Prorrh.* 19. obtremiscentes, frequentem *Coac.* 244. & 1. *Prorrh.* 6. spuitionem, urinasque *Coac.* 596. & 1. *Prorrh.* 29. mingi in non recordantibus, mictas *Coac.* 198. & 1. *Prorrh.* 32. prærubras esse cum sublimi. Vocem item *Coac.* 99. & 1. *Prorrhet.* 19. clangosam, linguas *Coac.* 234. &c. *Prorrhet.* 3. densas, vomitus *Coac.* 169. & 1. *Prorrhet.* 10. æruginosos cum surditate, tinnitus *Coac.* 131. & 1. *Prorrhet.* 18. aurium in acutis febribus, dolores *Coacis* 309 & 1. *Protthet.* 36. circa umbilicum palpitantes, atque 1. *Prorrhet.* 22. laterum raros & 1. *Prorrhet.* 37. coxæ occultatos, cum urinis suspensionem elatam habentibus, ipsasque *Coacis* 582. & 1. *Prorrheticorum* 4. urinas aquosas, albas, cum suspenso elato, rotundo, & capitis dolore in turbulentis, vigilibusque mentis aberrationem indicare, quemquam in Hippoc. & Galen. scriptis versatum, non latet. Auctor *Prorrhet.* 1. *Prorrhet.* 17 addit: *Ex vomitu fastidioso, vox clangosa, oculique concretum pluviosculosum habentes, insaniam ostendunt, ut Hermozygi uxori, quæ vehementi insania acute correpta, muta obiit.* Et in sequenti textu: *Si in ardente febre aurium sonitus cum caligine fuerit, proveneritque in naribus gravitas, mente ex melancholia aberrant.* Galen. etiam *in* 5. *de loc. affec.* scribit: phreniticis delirium non subito, sed paullatim fieri, neque affatim quiescere, ipsumque præcedere solent interim vigiliæ, interim somni turbulenti, cum manifestis imaginibus, a quibus clamant nonnulli, & exsiliunt; aliquando oblivio irrationalis accedit, ita ut aliqui, quum vas ad mingendum tenuerit, mingere non recordentur, aliqui cum tumultu insolito ac temeritate, ut nuper dictum est, respondeant, quum antea fuerint mansueti, ac mites; parvo item potu utuntur, respirationemque habent magnam atque raram, atque dolet iis nonnumquam occiput, pulsus parvi sunt & duri. Quum vero propius ad phrenitim accedunt, oculi apparent vehementer squalidi, lacrymia in altero oculorum acris, lippitudo, venæque oculorum sanguinis plenæ cernuntur. Item sanguinis stillicidium e naribus fit, quo tempore nihil prudenter respondent, floccos evellunt, festucas carpunt, febris aridior, æqualior, sine magnis mutationibus uniformis, lingua salebrosa, & aliquando surdastri, aliquando mæsti, & vix quicquam respondentes, dolorificumque non sentientes. Atque hæc signa ad dignoscendos mente non constantes seu deliros, nobis sufficiant. Ex quibus multa deliraturos ægros, seu mente casuros decernent, uti vigilia, quæ sæpe delirium antecedit: ut *in* 2. *Prognosticorum pagina* 39. *linea* 52. Hippoc. meminit: Utrumque enim quippe tum illam, tum delirium excalfacto aut exsiccato cerebro, excitari Galen. *in libro* 4. *præsagienda ex pulsibus* prodidit. Somni etiamnum turbati, atque tumultuosi, conspicuique, a quibus ægri clamant, exsiliunt, futuri delirii sunt præsagia: de quibus in Coacis præsagiis *text.* 83. *Turbulentæ, ferocesque excitationes e somno delirium adferunt.* Aurium quoque tinnitum, & sonitum insaniam sæpe præcedere Auctor Prorrheticorum *libro* 1. 18. meminit, non minus, & surditatem, *ibidem* 32. si præsertim cum urinis appareat habentibus suspensionem elatam ac sublimem. Oblivionem quoque sæpe ante phrenitim manifestari, Galenus *in quinto de loc. affectis*, ut nuper etiam meminimus, prodidit. Dolor item capitis vehemens, & assiduus in acutis febribus delirium portendit, præsertimque in auribus qui observatur,

Deliria futura ex quibus signis præsentiuntur & portenduntur.

ex

ex Hippocrate *in 3. Prognoſticorum pagina* 44. *linea* 45. Nec non ſi dolor cum præcordiis revulſis appareat, de quo *in Coacis præſagiis ſect.* 1. *text.* 119. *Capitis dolori in acuto morbo, præcordia revulſa, ſiquidem ſanguis non effluet, in phrenitim procedit*. Non minus & vigilia cum aurium ſonitu vel tinnitu, vel ſurditate, ni hæmorrhagiam indicaverint: Et *in* 1. *Prorrheticorum* 1. 38. hæc quoque una obſervata delirium prænuntiare, ita legitur: *Quibus alvus liquida, laſſitudo, capitis dolor, ſitis vigilia, obſcuritas & impotentia fuerit, ut hi mente moveantur, ſpes eſt*. Dolorem capitis aſſiduum ad prænuntiandam deſipientiam maxime facere, teſtatur Auctor *libri ſeptimi Epidem. text.* 120. & 121. Item dolor hypochondrii non raro fit delirii nuntius. Quod in muliere *Epidem. lib.* 1. *Ægr.* 13. *p.* 990. trimeſtri fetu gravida fuit obſervatum, idemque ſignificat palpitatio, nec non qui circa umbilicum continuant in morbo acuto dolores, *ex tertio Epidemiorum Ægr.* 3. *pag.* 1067. *conf.* 1. *Prorrhet.* 36. Idem dolores in ignobili parte exorti, qui occultantur fere continuo; *ex primo Prorrheticorum* ſparſim in eodem libro *Text.* 22. ſcribitur: *Rari in his laterum dolores delirium oſtendunt*: & *in* 1. *Prorrhet.* 37. *Si quippiam in urina ſublime petierit, occultato coxæ dolore, delirium portendit, & quæ circa aurium ſonitus talia exſiſtunt*, quod Hippoc. *Epidem. lib.* 111. *Ægr.* 5. *p.* 1101. Lariſſæ calvo vidit accidiſſe, cui occultato femoris dextri dolore ſtatim delirium accidit, 1. *Prorrhet.* 97. Lateris quoque dolor in pleuriticis, ſi abſque ratione evanuerit, portendit delirium. Non raro, & ſputa rotunda, ex Prorrheticis *Lib.* 1. 6. & *Epid. Lib.* 6. *ſect.* 3. *text.* 27. & *ſect.* 6. 21. *pag.* 1176. & 1190. frequenſque ſputatio ſine cauſa idem notant, & Hippoc. *in* 5. *Aph.* 40. ait: *Quibuſcumque mulieribus ad mammas ſanguis colligitur, furorem ſignificat*. Et *in quarto libro Aphoriſm.* 72. Galenus urinas albas lucidas, idem portendere tradidit, quod & turbidæ in acutis morbis minantur, maximeque in turbulentis, & vigilibus, habentes, ut alias dictum eſt, ſuſpenſionem elatam, *ex lib.* 1. 4. *Prorrheticorum & Coac.* 582 Pulſus item in alis atque in Hypochondriis, magnaque & rara reſpiratio *ex primo Prognoſticorum pag.* 38. *lin.* 8. & 34. Et *in Prorrheticis lib.* 1. 11. & *Coac.* 275. hæc de his quoque habentur: *In acutis morbis doloroſa in faucibus gracilia, puſilla, ſtrangulantia, atque quum æger hiaverit, non facile os tum cogere tum claudere mentis alienationem portendunt*. Vomitus 1. *Prorrhet.* 10. & *Coac.* 169. etiam æruginoſi, ſeu virulenti cum capitis doloribus aſſiduis, vigiliis, ſurditateque, certa delirii futuri, tum ſingula ipſorum per ſe ſola, tum multo magis omnia, & ipſorum etiam quædam ſimul in febre acuta conſpecta, ſunt indicia. Atque ex his futura deliria præſentiri, ac portendi, dictum quum ſit, nunc deliria in ſuas ſpecies atque differentias diſtincta ſpectemus, non minuſque ipſorum cauſas. Quibus quidem neglectis impoſſibile profecto videtur, nos delirantium Prognoſin recte aſſequi poſſe. Nomine autem non conſtantis mentis (ut hæc aggrediamur) nos mentis aberrationem, vacillationem alucinationem, amentiam, inſaniam, deſipientiam, delirium, atque phrenitidem comprehendimus, non conſtanteſque mente ægrotos hiſce nominibus intelligimus. Quæ affectio ſymptoma maxime eſt ratiocinatricis imaginatriciſque potentiæ. Hæc enim potentia, ut docet Galen. *in lib. de different. ſymptom. cap.* 3. vel eſt deficiens, ejuſque motus eſt imbecillus, uti in Coma, & Lethargo; vel eſt reſoluta, ut in catalepſi, *caron* vocato; vel denique eſt vitiata, ubi ejus motus pravus erranſque exiſtit, uti in delirio & phrenitide. Eodem modo de ratiocinatrice, nam vel ipſa quoque eſt deficiens ſeu diminuta, ſeu aliqua in parte reſoluta, quæ *moroſis* & fatuitas dicitur; vel omnino reſoluta ſublataque, quæ amentia vocatur: vel denique vitiata, ubi ejus motus depravatus erranſque exiſtit, quod ſymptoma delirium quoque appellatur. Accedit etiam haud raro, cum his duabus læſis potentiis, memoria iiſdem vitii differentiis læſa. Aliquando in

Mentis inconſtantia quænam affectio & unde.

men-

mente aberrantibus sola imaginatio læditur, aliis illæsis, ut Gal. *lib. de symp. diff. cap. 3.* in Theophilo observavit. Et aliquando ratio sola, illæsa tum imaginatione, tum memoria, quod phrenitico contigisse in libro nuper allegato Galen. memoriæ prodidit. Plerumque vero utraque tum imaginatio tum ratio vitiata simul deprehenduntur, ut in iis, qui quum delirant, imaginantur ea, vel quæ non sunt, vel ea profecto, quæ sunt, non imaginantur, observatur; loquunturque ac agunt nihil rationi ac imaginationi consentaneum. Dividuntur vero omnes mente non constantes in eam, quam proprie amentiam, insaniam, ecstasin, desipientiam, mentis aberrationem, vacillationem, alienationem vocamus, & in eam, quam Græci *paraphrenesin* & nostri delirium dicunt, atque tandem in phrenitidem. Quam Galen. cum Hippocrate ab aliis desipientiis, quod cum febre fiat, distinxit: De qua *in secunda de sympt. causis cap. 7.* Nominantur autem ex his, quæ quidem cum febre sunt, phrenitides, quæ sine febre sunt, insaniæ, Græce *maniæ*. Quæ a deliriis perpetuitate delirationis distinguuntur, nam etsi deliria seu paraphreneses cum febre fiant, non tamen sunt perpetua, veluti de phrenitide dicitur. Galen. quidem multis locis affirmavit Hippocratem vocare eos phreniticos, qui perpetuo delirant, uti paraphreneses vocat deliria, quæ tantum vel in acutissimarum febrium summo vigore apparent, ipsisque declinantibus declinare observantur; quare continuitate delirii, atque ipso etiam delirio sensim ac sensim prodeunte, phrenitici a deliriis destinguuntur, iis exceptis, qui septo transverso inflammato mente moventur, hujusmodi siquidem deliria non facile a phrenitide distinguuntur, quod & ipsa cum febre fiant perpetueque existant, ex qua difficultate antiqui putarunt septo transverso inflammato homines phreniticos evadere, atque ob eam suspicionem *phrenas* illi appellarunt, tamquam φρονῆν, ideſt, sapienti parti conferat quippiam. Distinguit vero ab his phreniticos Gal. quia phrenitici magnam edunt respirationem, atque ex longis intervallis, quum quæ in delirio ex septo transverso observatur, inæqualis sit ita, ut modo exigua appareat, atque frequens, modo magna & angusta, quæ respiratio in phrenitide non fit, nisi pars aliqua respirationi servientium simul, vel inflammatione laboret, vel aliquo dolore vexetur; quam Galen. *in 2. lib. de respir.* accuratius docuit. Præterea in delirio ex septo transverso statim hypochondria tenduntur, quod in phrenitide posterius fit, eaque statim a principio revelli, proprium est illiusce delirii. Demum ex omnibus accidentibus, quæ phrenitidem sequuntur, uti sunt, oculi rubentes ac inflammati, facieſque tota calore æstuans, & reliqua alias a nobis accuratius exposita, vel nulla, vel pauca, & levia in his apparent. Accedit quod delirium istud veluti repente fit, & in phreneticis delirium paullatim incipit. Phrenitidis etiam aliæ multæ differentiæ observantur, una siquidem est, quæ μανιώδης dicitur, in qua ægri calcitrant, pedibus feriunt, mordicus impetunt, excandescunt, eos, qui ingrediuntur, hostes habentes; quod ubi feroces esse incipiunt, ingentiaque mala perpetrant, vehemens dicitur, hancque Græci Θηριώδη appellant, & nostri ferinam ac melancholicam. De qua Auctor Prorrheticorum *Text. 26. & 123. Quæ pauco tempore feroces fiunt desipientiæ, ferinum est.* Altera obscura, mitis, in qua ægri obscure blandeque delirant, uti vix tales dignoscantur: Hi *in Coacis præsagiis Text. 65. ubi mentis emotiones cum taciturnitate in eo, qui voce defectus non est, pernicioſa dicuntur* (*Vid. & 1. Prorrhet. 54.*) moti mente cum silentio vocantur, de quibus *in Prorrheticis Lib. 1. 34. Tremulæ, obscuræ, contrectabiles desipientiæ, valde phreniticæ.* Græci has (ut alias dictum est) ἀσαφώδεις vocant, & nostri obscuras, quæ nedum ab idiotis, verum etiam a doctis Medicis non raro ignorantur. Tales enim ut Gal. *in 1. Prorrhet. 33.* sentit, nedum tumultuose non exclamant, non exiliunt, sed quieti quinimmo jacent, neque prorsus loquuntur, neque

Deliriorum divisio & differentia.

Phrenitides quomodo a delirio differant.

Paraphrenitides quid.

Quomodo a Phrenitide distinguuntur.

Phrenitidis variæ differentiæ.

Asaphodes quid.

figuram decubitus permutant, ſæpiuſque, qui ita affecti ſunt, familiaribus opinionem præbent, quod mox ſint, ſi quod fiat ſilentium, dormituri. Clauſis itaque feneſtris conquieſcunt cuſtodes, tempus in his interdum longum conterunt. dormire ægrum, quod neque loquatur, neque moveatur, arbitrati, ægro ipſo non dormiente, & manus quiete movente, non ſecus quam qui per levem contrectationem aliquid vel tangere, vel invenire volunt. Horumque alii clauſis palpebris hæc agunt, & interrogati de aliquo, neque prorſus oculos aperiunt, alii, poſtquam aperuerunt, aut paullo poſt claudunt, aut immoti obſervant affectionem a Gal. hecticam appellatam. Sed videtur hæc deſipientia ſignis profecto cum ea, quæ ex Comate & Lethargo fit, convenire. Quamobrem mutatio, diſtinctioque quælibet ipſarum erit dignoſcenda. Etenim quæ cum Comate, vel Lethargo, (quem Græcorum aliqui ut Galen. ait. *Typhomaniam* vocarunt) fit in principio morbi, perſeveratque diu: aſaphodis, ſeu obſcura, ſeu ut Gal. placuit, hectica dicta, numquam in morbi principio, ſed morbi progreſſu, poſt vehementem aliquam inſaniam. Etſi veternoſa comatoſaque etiam a frigido humore, atque etiam a multo ſanguine, poſt morbi principium ſæpe concitetur; quæ aliquando vel bonam vel malam criſin antecedit & apparet, in qua languidos pulſus, duros, anguſtos atque parvos obſervamus, quales in illa deſipientia non obſervantur. Sed jam de ipſarum cauſis agamus. Deliria omnia a calidis mordentibuſque ſuccis concitari Galen. *in lib. 2. de ſympt. cauſ.* tradidit, præcipueque a flava bile, atque ſæpe ex calidiori cerebri intemperie. Omnia vero deliriorum genera, vel inſaniæ, vel phrenitides, vel paraphrenitides a cerebri læſione oriuntur. Speciatimque deliria, quæ duplicia exiſtunt, ea inquam, quæ tantum in ſummo febrium acutarum vigore excitantur, quæque a calidis mordentibuſque vaporibus ſurſum in caput ſublatis, ortum habent. Alia vero deliria, quæ ſine febre manias, ſeu inſanias, Medici appellant, quas cum febre phrenitides Gal. vocat, quum tamen vere non ſint, niſi phlegmonem in cerebro, aut ejus membranis, ſanguis biliosus ex Gal. *in 2. ſympt. cauſis c. 7.* efficiat. Hęc vero raro fit, uti frequentius phrenitica illa deſipientia, quæ a calidis humoribus in cerebro, vel ejus involucris delatis ſine phlegmone concitatur. Quales Hippoc. *in 1. Epidem. com. 2. Sect. 2. text. 73. p. 954.* obſervavit. Hæcque fiunt tum a ſanguine, tum a bile, cerebri locum, in quo princeps animæ pars reſidet, prehendente, ut Gal. 2. *de ſympt. cauſ. c. ult.* meminit: vel a flava tantum bile, quæ etiam febris exurentis incendio exuſta, atque in nigram verſa, vehementem illam deſipientiam, Græcis *Maniodin*, *Thiriodin*, ac noſtris (ut alias dictum eſt) ferocem, furioſam, ferinam, melancholicamque, appellatam efficit, quæ fit ab exuſta bile cerebro, membraniſque immodice reſiccatis, cum qua ægri ſæpe in tremorem incurrunt, atque convelluntur: In hæc ſane ſymptomata non niſi vehementiſſimas ac exitioſiſſimas phrenitides illabi Gal. tradidit. Eæ vero deſipientiæ cum febre, phreniticæ quoque vocatæ, fiunt nedum ab humoribus calidis, verum etiam ut Gal. *in 3. Ep.* docuit, a frigidis, nempe pituitoſis in cerebro putreſcentibus, qui putredine calorem acrimoniamque, quibus in cerebro ejuſque membranis læſis delirium concitatur, acquirunt. At hæc deliria, ab iis, quæ calidi humores concitant, ſomno, atque etiam ſopore diſtinguuntur, quatenus qui ex frigido humore delirant etiam ſimul dormiant, vel veternoſum affectum ſimul habeant; & a calidis humoribus deſipientes vigiliis quoque ſimul infeſtentur. Fit etiam non raro, ut tum calidi, tum frigidi ſimul, humores permiſti miſtam deſipientiam ex delirio & lethargo, ut Gal. *in 1. Prorrhet.* meminit, pariant. Hique ambo contrarii affectus a principio ad finem uſque quum continuent, ægri tum vigilant, tum ad ſomnum inclinationem habent, interimque magis phrenetici obſervantur prout bilis pituitæ prævalet,

Typhomania quid & quo morbi tempore fit.

Deliriorum omnium cauſa.

let, & interim plus lethargici, seu Comatosi, prout pituitosus humor bilioso sit copiosior. Hæque sunt omnes phreniticarum desipientiarum causæ, a quibus quoque vera phrenitis, quæ est ab illis succis in cerebro ejusque membranis orta inflammatio, ortum habet, quæ a pallida bile mitior est, a flavaque vehementior, & omnium maxima ab eodem humore incendio febrilis caloris perasato. Ea vero desipientia obscura, asaphodis Græcis dicta, quæ cum silentio fit, pro causis prælanguentem facultatem animalem, atque hecticam quamdam, ut Gal. *in Prorrheticis* docet, temperiem habet. Quum enim vel inflammatio, vel flava bilis cerebrum occupat, initio quidem nondum per totum cerebri corpus permiscetur, sed in eo fervens spiritus alterat & agitat: unde clamant ægroti, exiliuntque; postquam vero imbibita est, atque hecticam cerebrum quamdam intemperiem acquisivit, ægroti silent, quietique manent, ut vix etiam deliri a Medicis dignoscantur: hanc superius diximus multis a veternosa distingui, sed præcipue prælanguidis pulsibus parvis durisque. Quæ vero cum sopore prodit, vel a sanguine fit, sanguineque ac bile permistis cerebrum invadentibus, vel a pituita bileque simul mistis, aut ab humore crudo pituitoso, putrefacto, caloremque, & acrimoniam exinde adepto, vel demum a caloris nativi extinctione.

CAP. IV.

De salute a deliriis prædicenda.

EX deliriis ea minus mala existunt, quæ non perpetuo ægrotos tenent, sed parvo tempore, atque cum signis bonis, vel non letalibus, prodeuntia. Quibus vires quoque debent æque respondere, quippe, ut sint validæ, quando deliria quoque prævalidas vires expostulent, quæ cum prælanguidis natura ægerrime vincit. Nullum vero ex diliriis, ut docuit Gal. 6. *Aphoris.* 53. securum reputatur: *Minus vero periculosa, quæ cum risu fiunt: sicut temeraria omnium sunt periculosissima. In medio autem ambarum desipientiarum sunt, quæ cum studio fiunt.* Nullum tamen delirium, etsi unum ex maximis malis existat, per se solum certum exitii indicium esse poterit, veluti neque mentis quoque constantiam solam in ægrotis salutem indicare alias meminimus. Simul vero cum bonis signis delirium concitatum minus est timendum, præcipueque si, præterquam quod non est perpetuum, neque vehemens, feroxque existat, sed quinimmo magis leve, & parvum, utpote quando ægroti in paucis mente aberrant; magnum siquidem delirium Gal. *in lib. de diff. sympt. cap.* 4. etiam vocat, ubi variæ deliriorum species in ægroto simul observantur. Parva itaque levia in paucioribusque actionibus deliria observata minime omnium sunt timenda, maximeque si tantum per accessiones fiant. Verum neque satis ad mitem benignamque deliriorum naturam denotandum, ut delirium non sit perpetuum, sed etiam est opus, ut omni ferocitate careat, quando auctor *Prorrh.* 1. *text.* 26. dicat: *Quæ parvo tempore feroces fiunt desipientiæ, ferinum.* De quibus Gal. dixit: *Quum videris quempiam cum ferocitate desipientem, etsi paullo post sedetur, cognosce mentem ejus non febris rationem læsam esse, sed phreniticam subali affectionem, quæ post adaucta ferina tibi videtur.* Itaque delirium intermittens, non vehemens, sed leve, scil. mite, parvumque, quod præsertim fiat per accessiones, numquam erit exitiale. Sed cavendum, ne parvum miteque falso creditum nos quandoque fallat; etenim multi exitio proximi sic delirare non raro dignoscuntur, quibus *in Prorrhet.* 1. *text.* 34. *num.* 13. *Tremulæ, obscuræ, & contractabiles desipientiæ, valde phreniticæ.* Quod facile ex prælanguidis viribus, ac aliis exitiosis simul observatis signis, perpetuitateque ab iis distinguitur. In eo namque vires prævalidæ, non perpetuumque est,

Deliria quænam minus mala.

Delirium mite & benignum quomodo a parvo falso creditio & exitiali dignoscitur.

atque ſine exitioſis ſignis obſervatur, quale in *Milidia* vidit Hippoc. *libro* 1. *Epidem. pag.* 991. *Ægr.* 14. In hoc pulſus ſunt languidi, delirium perpetuum, cum ſignis exitioſis: quæ ſane omnia, inquam, ſigna, tum cum delirio orta, tum quæ poſt ipſum illuxerunt, maximopere ſunt obſervanda. Hæc enim non raro ſalutarem criſin antecedunt. Quæ Galeno *in* 1. *libro Glaud. cap.* 15. docente, fiunt ſanguine, vel bilioſo humore, ad caput critice recurrente. Apparent vero iſthæc deliria, criſin portendentia, aliquando cum capitis dolore, gravitate, ſurditate, convulſione, atque aliis hujuſmodi multis. De his Gal. *in* 1. *Epidemiorum* (*Vide Hippocrat. Epidem. libro* 3. *pagina* 1066. *Ægr.* 3.) quum in Dealcis horto decumbentis hiſtoriam commentatur, ſcribit: *Nam quod deliraverit in nona, & dextro oculo ſtrabo fuerit, res ſunt, quæ ſolent in judiciis evenire*. Et in Abderæ virgine *Epidemiorum libro* 3. *pagina* 1103. *Ægr.* 7. delirium cum ſurditate judicium, quod tum pedum doloribus, tum ſanguinis e naribus eruptione, eſt ſecutum, præceſſit. Atque multo clarius id in muliere moroſa viſum eſt, de qua Hippocrat. *in* 3. *Epidemiorum pagina* 1108. *Ægrot.* 11. *Tertio convulſiones conquieverunt, coma, & in ſomnum inclinatio, rurſuſque vigiliæ excitaverunt eam, continere ſe non potuit, multum deliravit, febris acuta, ſub hanc noctem ſudor multus toto corpore & calidus prærupit, libera febre dormivit, plana mente conſtitit*. Item delirium, ſexta die in virgine Lariſſæ *libro* 3. *Epidemiorum pagina* 1110. *Ægr.* 12. obſervatum, largam ſanguinis eruptionem indicabat, quod etiam in Herophyto Abderæ *ibid. pag.* 1106. *Ægr.* 9. viſum eſt. Cum dolore itaque, gravitate capitis, vigilia, comate, ſurditate, convulſione, oculorum caligatione, ſplendore, lacrymis involuntariis, aurium tinnitu, ignorantia, oblivione, tremore, anxietate, inquietudine, clamore, ſurrectione, ſpirandi difficultate, urinæ ſuppreſſione, rigore vehementi, æſtu multo, ſitique intolerabili, repente obortis, delirium ſæpe judicium futurum prædicit, vel profluvium ſanguinis, de quo in 5. *Coacis præſag. text.* 184. ſcribitur: *In quibus morbis ab anxietate delirium derepente fit, profluvium ſanguinis ſignificat.* vel urinæ, de qua Hippoc. *in* 6. *Epidemiorum pagina* 1191. *ſect.* 6. *text.* 22. *Urina multam ſubſidentiam habens, ſolvit deliria, qualis fuit Deuxippi*: vel per ſudorem, de quo Galen. *in* 3. *de criſibus* ait: *Judicat autem phrenitidem ſudor bonus, & præcipue ſi ex capite multus & calidus fluxerit, ſudante ſimul reliquo corpore*. Et paullo poſt: *contingit autem aliquando, quod etiam per ſanguinem e naribus erumpentem phrenitis judicatur*. In Coacis vero prædictionibus *text.* 483. per ſudorem atque ſomnum ſolvi delirium docetur. Et *in* 7. *Aphoriſmorum* 5. Hippocrat. ſcribit: *A furore difficultas inteſtinorum, vel aqua inter cutem, bonum*. Delirium itaque, quod bona aliqua vacuatio ſubſecutura ſit, ſalutem prænuntiat, ac quoddam ſignum decretorium exiſtit. Veluti peſſimum erit, poſt quod mala ſequetur evacuatio; quale eſt e naribus ſanguinis ſtillicidium, ſudores capitis frigidi, & aliæ hujuſmodi vacuationes, de quibus poſterius nos accurate agemus. Ideo diſtinguendum, num eæ bonæ malæve ſint vacuationes, quod ſane ex multis ſignis innoteſcit, quippe ab exeuntium quantitate, qualitate, loco, per quem fit, tempore morborum, diebus in quibus apparent, atque morbi allevatione. Bonæ ſiquidem ſunt, ſi in ea copia, quæ multitudini humorum peccantium reſpondet, obſervantur, atque ubi, qualia deſiderantur, evacuantur, perque loca convenientia, & congruo tempore, quippe in ſtatu, atque in aliquo dierum decretoriorum, fiant, a quibuſque morborum, ſymptomatumque vel ſequitur allevatio, vel iiſdem plane ægri liberantur. Sed ad tria præcipue in omni prædictione, (quæ magni perpetuo momenti exiſtunt) animum adhibere oportet, quippe, ad arteriarum pulſationes, reſpirationem, ac ciborum appetentiam, quæ omnia profecto ſi inculpata, &

Deliria criſin portendentia.

Vacuationes bonæ & malæ quomodo cognoſcuntur.

firma,

firma, etiamsi cum exitioso aliquo signo sint, maxime ad prædicendam salutem valent. Quod Galen. *in tertio Epidemiorum com. 3. p. 1106. Ægr. 9. text. 89.* de Herophyti agens historia, meminit: *Cum delirio namque pulsus vehementes cum inculpata tum respiratione, tum appetentia, non incerta erunt indicia, quod ipsis natura prævalida ostendatur, quæ morbum sine dubio recte feret.* Ex his itaque, quæ simul cum deliriis per modum judicii apparent, quomodo salus interim præsentiatur, hactenus vidimus. Nunc ab iis, quæ postea illucent, quæque ipsorum deliriorum veluti morem significant, etiam perquiramus. Bonæ igitur post deliria factæ vacuationes, de quibus nuper satis a nobis dictum est, quales sunt largæ eruptiones sanguinis e naribus, de quibus egit Galen. *in 3. lib. de Crisib. cap. 8.* Menstruæ item purgationes cum delirio, & post ipsum conspectæ, quales observavit Hippocrat. in virgine Lariſſæ *lib. 3. Epidem, p. 1110. Ægr. 12.* & in morosa muliere *ibid. 1108. Ægr. 11.* (Galeno docente) simul cum copioso sudore apparuerunt, ex quibus, ut Hippoc. meminit, febre libera dormivit, ac plane mente constitit. Hæmorrhoides quoque delirium secutæ, salutem prænuntiant, quas in *6. Aphor. 21.* Hippocr. meminit, hisce verbis: *Ex melancholia insanientibus si varices, aut hæmorrhoides, supervenerint, insaniæ fit solutio.* Idem notant dolores vehementes, assiduique in coxis, cruribus, pedibus atque manibus, qui sentiuntur, quique humoribus ad partes ignobiles, principibus relictis, decurrentibus concitantur, estque judicium, quod natura per humorum transfluxionem molitur. De quibus Hippoc. de Herophonte scribens, ait *lib. 1. Epidem. p. 974. Ægr. 3. Octavo febricitabat, lien residebat, omnia intelligebat, doluit & inguen primum, secundum lienem, deinde in utramque tibiam demigrarunt.* Qui sane dolores etiam in uxore Epicratis *ibid. pag. 979. Ægr. 5.* non minimam partem judicationis habuerunt. Et in eo, qui in Dealcis horto decumbebat *lib. 3. Epidem. p. 1066. Ægr. 3.* die decimoquarto plane deliro, quintodecimo genua atque tibiæ doluerunt, ac decimoseptimo postea toto corpore sudavit, ad mentemque rediit: & die vigesimo pedum dolores in virgine Abderæ *ibid. p. 1103. Ægr. 7.* delirium surditatemque deleverunt. Somnus in ægrotis delirantibus perpetuo magni erit momenti, maximeque si ipse delirium sequatur, ipsumque vel resolvat, vel saltem minuat, de quo *in secundo Aphor. 2. Ubi somnus delirium sedat, bonum.* Idque merito fit, quandoquidem cum delirio semper vigilia adsit, & ab una eademque causa uterque fiat; si itque a delirio somnus fit, signum est, causam delirii superatam esse: ac accuratius somnus a delatione in somnum, seu coma, seu cataphora, seu lethargo est distinguendus; nam quemadmodum somnus bonum signum censetur, ita quoilibet prædictorum soporiferorum affectuum, malum, excepto veternoso affectu, qui sanguine in cerebrum judicii futuri causa irruente concitatur. Dormire itaque ægrotos a delirio semper bonum, præcipueque si quiete dormiant, ut in Herophonte, (*Vide sub litt. a*) uxore Epicratis, (*Vide sub litt. b*) in Metore, *lib. 1. Ep. p. 983. Ægr. 7.* in quo a somno delirium resolutum esse, Hippoc. observavit. Ex quo delirium a somno sedari semper bonum, uti contrarium malum, nam somnus laborem faciens, ut in Aphorismis *sect. 2. Aphor. 1.* habetur, mortalis. Si insomnia quoque delirantibus conspicua apparent, bonum ad judicandam salutem signum esse in Coac. præsaglis *text. 90.* legitur, præsertimque in phreniticis, quod tamen, (quamquam in Prorrheticis *libro 1. 5.* scriptum sit, insomnia conspicua phrenitidem ostendere) verissimum est, neque error a nobis committetur, si ita distinxerimus, insomnia conspicua, non turbulenta, sed quieta, bonum in Coacis significare, quod non nisi sedata in cerebro inflammatione, calore febrili, & motu humorum a vaporibus, ipsa conspicua claraque observentur, ex quo bonum semper

Vacuationes deliriorum morem significantes.

creditur ſignum. Turbulenta vero conſpicua, in quibus ægroti expaveſcunt, exſiliunt, præter id quod ex ſiccitate fiant, etiam inflammationem, febrilem, calorem, & ſpirituum motum, atque agitationem denotant, ex quo in mente motis ab his phrenitis portenditur. Sed num perpetuo deliriis ſedatis, vel plane reſolutis, bonum ſit? illis quidem omnibus, quæ vel a ſomno, vel a quapiam humorum transfluxione, ad crura, pedes, aliaſque ignobilium partium, vel critica evacuatione ſedantur, vel reſolvuntur, nobis, ad futuram ſalutem eamque prædicendam fidendum erit. At nunc ad deliria, quæ exitium portendunt, tranſeamus.

CAP. V.

De morte a deliriis prædicenda.

Deliria, quibus exitium ægrotis minantur, unde dignoſcuntur.

DEliria, quæ exitium ægrotis minantur, ex ipſorum differentiis, tempore, in quo apparent, virtute prælanguida, atque aliis ſignis exitioſis, vel una cum deliriis, vel poſtea apparentibus, dignoſcemus. Phrenitica omnia deliria letalia plerumque exiſtunt, etſi omnes phrenitici non moriantur. Phrenitides vero omnes deſipientias eſſe diximus, quas Græci μανιώδεις, θηριώδεις, atque ἀσαφώδεις, & noſtri feroces, tumultuoſas, furioſas, ferinas, melancholicas, atque obſcuras, ſeu blandas appellant. Hę aſaphodes ſeu obſcurę dictę, vel in morbi principio, vel poſt feroces deſipientias, obſervantur, & illę, quum fiant, ut ſuperius dictum eſt, vel a ſanguine, vel a bile, vel a bile pituitaque permiſtis, vel a pituita putri reddita, ceteris minus exitioſę creduntur, veluti omnium ſunt exitioſiſſimę, quę virium aut languore, aut hectica cerebri temperie concitantur. Ex quo auctor *Prorrhet.* 1. *text.* 34. has valde phreniticas deſipientias vocavit, etſi dixerit blandas, obſcuras, contrectabileſque videri. Harum proprium videtur, ut cum ſilentio fiant. De quibus in 2. *coac. præſag. text.* 65. *In frebibus inſaniæ vehementes ſilente ægro, ſed non etiam privato voce, letale.* Cum his vero triplex ſilentium obſervatur, unum quod a depravata mente fit, in quo ęger loqui poteſt, & non loquitur, vel ſaltem parum; ſecundum cum veternoſo affectu, vel extinctione caloris nativi; & demum cum aphonia, ideſt vocis, ſeu ſermonis privatione, facultate animali oppreſſa, vel emoriente, aut vocalibus inſtrumentis convulſis, aut interceptione vocis materię: deſipientia cum ſilentio, voce integra, levi motitatione manuum, pulſu languido, oculis ut dormientibus modo clauſis, modo leviter apertis, a languore facultatis concitatur. De quibus nedum in Prorrheticis, ut nuper meminimus, ſed etiam in 3. *coac. præſag. text.* 76. legitur: *Tremulæ, palpantes, deſipientiæ, phreniticæ.* Et, *coac. præſ.* 486. *moti mente cum ſilentio non quieſcentes, contentis oculis, vehementer ſpiritum foras evocantes, perniciosæ.* Ac Galen. de his *in Prorrheticis* dixit: *Atque ob id affectio humorum, ut febrium hecticarum, prava eſt, quas quidem, quum incipiunt conſtitui, vix ſolvi poſſe, exquiſite vero conſtitutas, abſolutaſque, ſolvi non amplius poſſe, demonſtravimus.* Præſertim ubi in ipſis affectus veternoſi calidiſſimum ſæviſſimumque ſequantur morbum, in veternumque, refrigerato poſt inflammationem cerebro, ægros delabi, ſane eſt letaliſſimum: nam ut *in* 3. *Prorrheticorum* docetur, inſanabilia ea frigora cenſentur, quæ calidis morbis contingunt. In vehementi vero ſeu ferino delirio, tum propter humoris malignitatem, tum propter immoderatam ſiccitatem non ſolum ſilent, at etiam ἄφωνοι, ideſt, muti evadunt; ut Hermozygi uxori, quæ vehementer furens, & muta obiit, contigiſſe auctor Prorrheticorum *libro* 1. 17. tradidit. Quod etiam Hippoc. phrenitico *libro* 3. *Epidem, pag.* 1100. *Ægr.* 4. & uxori Dealcis, quæ in Læio decumdebat, *libro* 3. *Epidem. pag.* 1114. *Ægr.* 15. contigiſſe, meminit, &

Silentium in phreniticis deſipientiis triplex.

Galen.

Galen. *in* 2. *Prorrhet. Si in febre aphoniæ, quæ convulsivo modo fiunt, desinant in eam, quæ cum silentio fit, ecstasim, perniciosum.* Quædam vero symptomata creduntur propria vehementissimarum desipientiarum, scilicet tremores, convulsiones, sanguinis e naribus stillicidia, urinæ aquosæ lucidæ, manuum gesticulationes, & alia hujusmodi. Tremores ac convulsiones non omnes phreniticas desipientias, sed tantum vehementissimas, utpote ferinas, sequuntur, uti Gal. *in* 1. *Prorrhet. text.* 9. meminit, exitiosasque emotiones sequi solent. Phrenitici vero prius tremuli ac postea convulsi moriuntur. De tremore scribit *auctor Prorrh. lib.* 1. 9. *Phreniticæ vehementer affectiones tremulæ desinunt.* Tremorque, ut Gal. ait, solum vehementissimas phrenitides sequitur, nempe nervorum infirmitates. propter affectionis siccitatem, phreniticis diutissime insunt. Exsoluta autem virtute, tum vigiliis, tum motionibus multis, simul vero, & nervis supra modum arefactis, tremores fiunt; indicant enim vehementer ab assata bile cerebro irrigato siccatos nervos, atque ob id letaliter se habere. De quibus in 1. *Prorrhet. text.* 14. *Mente ob melancholiam aberrantibus tremores supervenientes maligni.* Et paullo post *tex.* 16. *Phrenitici modico utentes potu, strepitum tentantes, tremorem incurrunt.* Atque etiam *text.* 19. quum dicit: *Vacillationes mentis cum voce clangosa, linguæque convulsiones cum tremore, & voces obtremiscentes, mentis indicant alienationem, duritiesque his perniciosa.* & Gal. *in text.* 20. linguas obtremiscentes in his ob facultatis debilitatem apparere, mentemque ex phrenitide vacillantem significare, tradidit. Ex quo tremulas vocavit phrenitides in Prorrheticis, quæ exstincta fere facultate oriuntur, quæque cum silentio observantur. Vi enim phrenitidis ingravescentis tria supervenire solent, silentium in ecstasi, tremor in vehementissima phrenitide, & convulsio imminente morte. At tremores letales superveniunt febribus ardentibus, vel vehementibus ab assata bile insaniis, quas ferinas & melancholicas appellari nuper docuimus; quo fit, ut tremores, qui vel ante deliria, vel cum ipsis simul apparent, quandoque (etsi ipsorum nulli, exceptis decretoriis, boni existant) exitium non prædicant, at quinimmo sæpe, perinde ac convulsiones, supervenientibus febribus solvantur. Quare tremores letales tantum observantur, qui deliriis, sive desipientiis, superveniunt. Non paucique in morborum principiis trementes observantur, qui tamen non moriuntur. Ut Pythioni contigisse Hippoc. *in* 3. *Epidem.* 1. *pag.* 1059. *Ægr.* 1. scripsit: Neque omnibus etiam deliriis, at solum vehementibus, supervenientes exitium portendent. Perbelleque hoc in 3. *coac. præsag. text.* 93. sic scribitur: *In vehementi phrenitide tremores mortiferi.* Meritoque Galenum *in* 1. *Prorrheticorum* dixisse dicimus, non omnes phreniticos in tremorem finiri, quum solas phrenitides vehementissimas tremor consequatur. Non tamen, uti convulsiones, phreniticorum proprii existunt, quum multis ipsorum non superveniant, sed tantum vehementissimis, ac ferocissimis, in quibus tum vigiliis, tum motionibus multis, vires exsolvuntur, nervique supra modum siccantur, atque arescunt. Quo fit, ut hi raro observentur, quando raro etiam phrenitides eæ feroces fiant. Omnes vero phrenitici ante exitium convelluntur. Convulsionesque omnes desipientiis supervenientes, atque arefactis nervosis partibus concitatæ, letales existunt. Vereque phreniticos omnes exitiosos definere in convulsionem, affirmamus, uti in tremorem easdem finiri (quod in 1, *Prorrheticorum text.* 9. affirmatur) Galen. 1. *Epidem. comm.* 2. *text.* 52. ut falsum reprehendit. Quod in multis phreniticis Hippocrat. 3. *Epidem text.* 3. observavit, præsertimque in uxore Philini *libro* 1. *Epidem. pagina* 976. *Ægr.* 4. atque in phrenitico, *libro* 3. *Epidem pagina* 1100. *Ægr.* 4. de quo ait: *Secundo die mane sine voce, febris acuta, sudavit, non intermisit, palpitationes per totum corpus, nocte convulsiones. Tertio exacerbata sunt omnia. Quarto obiit,* & de mu-

Desipientiarum vehementissimarum propria quidem symptomata, Tremores.

Tremores letales.

Cuinam Phrenitidi supervenient.

Convulsiones Phreniticorum.

liere Cyzici *ibid. pag.* 1114. *Ægr.* 14. *Decimoquarto convulsiones multæ, extremitates frigidæ, nihil amplius mentis compos, urinæ defecerunt, obiit.* Galen. quoque *in lib.* 13. *method med. cap.* 8. de iisdem dixit: *Succedit maxime exitiali phrenitidi, nec sanatum quempiam ita convulsorum, aut ipse vidi, aut alium narrantem audivi.* Et *in libr. quinto Epidem. pag.* 1160. Hippoc. tributo legitur Cononidem famulam phreniticam, quæ obiit die quadragesimo, decem dies ante exitum aphonam, & convulsam fuisse. Est & quæpiam palpitatio convulsionis cognata, quam aliqui convulsivum tremorem, alii convulsionem non veram, alii sublationem dicunt, in qua partes quidem ad manum subsultant, seu subsiliunt, non secus quam fiat in vellicatis a mordicante aut humore, aut vapore, nervis sese a mordicatione retrahentibus, seu auferentibus. Sic palpitant in arido pisces. Hæque palpitationes, etiam subsequentes vehementes desipientias, letales existunt, non secus quam tremores atque convulsiones sunt. Sed tamen distinguendum erit, quoniam tum convulsiones, tum hæ palpitationes, si a mordentibus aut succis, aut halitibus fiant, perpetuo non essent letales, quare in iis alia signa simul, vel postea, conspecta consulenda erunt, ut consultius ab ipsis præsagiamus. Addimus quoque virulentas vomitiones, in quibus bilis assata, æruginosa, vel nigra evomitur, ut Hippoc. meminit *in primo Epidem. pag.* 948. *sub fin. com.* 1. *text* 84. quum dixit: *Phreniticis convulsiones, sed & virulenta vomunt, & ex iis quidam subito moriuntur*, ut in Philista *lib.* 3. *Epidem. pag.* 1076. *Æg.* 4. phrenitico fuit observatum. Exitiali quoque desipientiæ accidunt manuum gesticulationes, quas Hippocrat. in 2. *Prognost. pag.* 38. *lin.* 1. *& seq.* sic docuit: *De gesticulatione manuum hæc cognoscere oportet, qui in febri acuta, aut phrenitide, aut pulmonia, aut capitis dolore, manus ad os fert, aut frustra venatur muscas, aut colligit festucas, aut de veste evellit pilos, aut de pariete stipulas carpit, id omne malum, exitialeque est*, quod symptoma in uxore Dealcis *lib.* 3. *Epidem. pag.* 1114. *Ægr.* 15. in Læio decumbente conspectum est. Stillicidium quoque e naribus exitiosis phreniticis supervenit. Nam Gal. *in* 3. *Prorrhet. text.* 49. nedum, ut dicebat eorum librorum auctor, stillicidium e naribus cum surditate, aut ignavia, signum est malum; sed cum omnibus aliis desipientiis, plane letale judicandum; in *primo Prorrhet. text.* 8. merito putat. Aquosa item urina, alba, lucidaque item, & fæces albæ, sunt in iis perniciosissima signa: de his Hippoc. *in lib.* 4. *Aphorismorum* 72. *Quibus urinæ lucidæ sunt, & albæ, malæ: maxime vero in phreniticis.* Quo in loco Galen. dixit: *Nullum siquidem vidi, in quo talis apparuisset urina, salvatum.* Et in primo Prorrheticorum *text* 29 *Urinæ excretio in non admonitis pernicioſa.* Et in primo Prorrheticorum *text.* 13. *Alba dejectio, malum.* Proprium quoque videtur pessimarum phrenitidum, etsi lingua sit torrefacta, ægrotos vel nihil sitire, vel saltem eos uti pauciſſimo potu, quo *in* 1. *Prorrheticorum text.* 16. ita expresso utitur: *Phreniticos exiguo uti potu, malum; sed nihil sitire, perniciosum.* Sed inter deliria letalia comprehenduntur etiam, quæ circa actiones vitæ necessarias observantur, quod Auctor 3. *Coacis præsagienda text.* 98. sic tradidit: *Deliria circa necessaria, pessima; quæ ex his exacerbantur, letalia sunt.* Tales vero sunt ex deliris, qui cibum abhorrent, potumque, quum tamen linguam habeant incendio caloris exsuctam, ac prætorrefactam. Letalia quoque deliria existunt, in quibus ægroti crebras insignesque habent permutationes, *in* 12. *Prorrheticorum text.* 12. *In phreniticis in principio clementer habere, sed crebro permutari, malum est.* Duplex vero est permutatio, una ex bono ad malum statum, atque altera ex uno malo symptomate in aliud malum; de hoc in 3. *coacis præsagienda text.* 101. *Ubi varii casus subinde incidunt phreniticis, pravum, & convulsionem denuntiant.* Quod sane aut turgere humores denotat, aut cerebrum multiplici vexari affectu, uti quando

Palpitationes.

Vomitiones virulentæ.

Manuum gesticulationes.

Stillicidium e naribus.

Urina aquosa alba lucida, fæces albæ.

Ejus læsa.

Permutationes crebræ.

ali-

aliqui diu mæsti, silentes, ac quieti jaceant, & post continuo garruli, ridentes, inquietique evadant, quod Hippoc. in uxore Dealcis, quæ in Leio decumbebat, observavit, de qua *in 3. Epidem. com. 3. p. 1114. Ægr. 15. text. 86.* dixit: *Ab initio cooperiebatur, & perpetuo tacita semper, villos straguli captabat, vellebatque, & scalpebat, plorabat, moxque ridebat, non dormiebat:* ac in fine historiæ: *Perpetuo cooperiebatur, aut verba multa, aut perpetuo tacita.* Desipientiæ etiam omnes præ debilitate contingentes sic, Galeno auctore, exitiosæ visæ sunt, ut nullum ex his sanari posse *in primo Prorrhet.* restatum reliquerit. Phreniticæ namque desipientiæ omnes virtutem robustam expostulant, quæ, si languida sit, morbum ferre non poterit. Quod in *3. coac. præsag. text. 100.* sic innuit. *Qui jam fractis viribus delirant, pessime habent.* In principio etiam morbi, quæ apparent, pessima deliria creduntur, vereque phrenitidis suspecta. Quæ enim ex his sine signis coctionis apparent, (quod ad principium attinere dicitur,) Galeno in 1. *lib. de Crisibus* docente, pessimarum dispositionum sunt indicia. Sed prosequamur judicium prognostici a signis, vel una cum deliriis concitatis, vel ipsa subsequentibus. Mala enim signa simul cum ipsis deliriis apparentia, mortem minari videntur; & letalia, certum proximumque exitium. Somnus, ut præcipua mala symptomata narrem, plane sublatus, & qui delirium concitat, aut auget, vel nihil allevat, signum cum delirio forte timendum ex Hippocr. Galenoque colligitur, veluti hianti ore deliri homines si dormiant, pernicioſum est Hippoc. *in 1. Progn. pag. 37. lin. 46.* Sopor item, seu ad somnum summa inclinatio, atque delatio veternosa, post vigilias assiduas, ex cerebri refrigeratione, atque ex virium languore, letale est; de quo loquitur Hippoc. *in 3. Epid. p. 1085. G. H. text. 20.* quum ait: *Nullus autem phreniticorum vehementer insanivit, ut in aliis, sed alia quidam veternosa in somnum delatione capite gravati moriebantur.* Interdum vero, ut posterius docebimus, tales affectus judicatorie apparent, crisin aliquam significantes, qui signis propriis decretoriorum signorum cognoscuntur. Delirium etiam cum notabili oblivione, ignavia, stupiditateque apparens exitii est indicium, de quo Galen. *in 2. Prorrhet. text. 30.* Quod enim non cognoscant familiares, neque factorum recordentur, ex cerebri refrigeratione enasci id constat; cerebri vero refrigerationem sequi calidam affectionem, ex qua ægroti delirant, semper esse pernicioſum, superius meminimus. Si vero cum his rigeant ægri, vel frigescant, inevitabile fatum significatur ex Galen. *in secundo libro Prorrheticorum.* Idem denotat stupiditas, etenim, ut docet Galen. 1. *Prognosticor. text. 13.* phrenitici etiam sunt, quicumque, comatosi quum sint, non sapiunt, sed deliria loquuntur, atque a præsentibus expergefacti stupefactis similes videntur. Summe etiam exitiosum est, si desipientes non videant; ipsis profecto haud longe aberit exitium: oculi etiam lucem effugientes, involuntarieque lacrymantes, aut perversi, aut altero major alter fuerit, aut candidum rubeum habuerit, aut pleni sint sanguine, uti *in primo Prognost. text. 14. & 33. p. 37. lin. 15. & seq.* Hippocrat. docet. Facies quoque flammans, vel qua boni videatur coloris cum mæstitia tamen, *ex Prorrhetic. lib. 1. 49. 67.* idem significat. Capitis viscerumque dolores vehementes atque assiduos exitium prænuntiare *ex 4. libro Aphorism. 66.* colligitur. Non minus quoque verendam esse totius corporis, vel manuum pedumque, gravitatem, item frigiditatem, atque lividitatem, Hippoc. *in secundo Prognostic. pag 39. lin. 30. & seq. text. 7. 8. & 9.* meminit. Necnon aphoniam, ægroique taciturnos, vocem clangosam, linguam exustam & præaridam sine siti, stridorem dentium insolitum, convulsionem, palpitationem, singultum, horrorem, rigorem, tremorem, frigiditatem extremorum, crebrasque in his partibus permutationes exitium significare exinde constat. Idemque facit inquietudo, anxie-

Signa mala simul cum ipsis deliriis apparentia.

anxietas, ſpiritus difficultas, cibos omnes abhorrere, nullumque potum ſuſtinere, vomitus virulenti, ſudores frigidi, cervicis, colli, ſcapularum, atque aſſidui, in toto corpore, quas deſudationes Medici appellant. Item ſtillicidium ſanguinis, urinæ aquoſæ, albæ, lucidæ, fæceſque albæ, ut nuper diximus, alvuſque turbata multis crudis pituitoſis, vel etiam bilioſis dejectionibus, nihil delirium levantibus. Item abſceſſus intro recurrentes, non minus quam exanthemata, aliæque cutis puſtulæ, atque effloreſcentiæ præter rationem evaneſcentes. Dolores etiam in ignobili parte oborti, ſtatim deſinentes. Cum his igitur vel multis vel paucis una apparens delirium, letale eſt, maximeque phreniticum. Non minuſque, etiam ſi iſtorum aliqua vel multa ipſum conſequantur delirium, exitium ſignificatur, omniumque maxime, ut nos alias meminimus, ſi deliria in tremores, convulſiones, ſingultus, vel aphonias deſierint, cum urinis, ut dictum eſt, albis, claris, lucidiſque, quales quinta die *Silenus lib.* 1. *Epid. p.* 969. *Ægr.* 2. minxerat, omnium vero maxime pulſus prælanguidi, reſpiratio mala, ciborumque appetentia exſtincta, ita ut quoſcumque abhorreant cibos, nullam ſitim ſentiant, etiamſi lingua præarida & multo calore aduſta ſit, poſt ipſum delirium obſervata, exitium denotant. Hæc ſiquidem tria poſtremo poſita (pulſus ſcilicet prælanguidi, cibos potuſque abhorrere, ac mala reſpiratio) magni momenti ſunt in quocumque morbo ad mortem prænotandam; maximeque, ſi quum ex prænarratis ſignis, ſimul quæpiam illuxerint, & quo plura, & principaliora erunt, eo certius citiuſque exitium fiet. At ex iis omnibus, tria tantum nuperrime dicta ſigna, inter multa ambigua ex bonis judicata, ad exitium prædicendum maxime valent. Quemadmodum his oppoſita, pulſus quippe vehementes, bona reſpiratio, probaque tum cibi tum potus appetentia, inter pernicioſa multa ſigna maxime ad ſanitatem prædicendam valere, Galen. in Herophyti hiſtoria ſatis demonſtravit. Atque hæc ſunt, cum quibus, ſi deliria apparuerint, vel ipſa quoque ſequantur deliria, exitium præcognoſcemus. De quibus hic brevis quidem ſermo eſt habitus, quum de iiſdem ipſis accuratius uberiuſque ſuis locis ſit a nobis agendum.

Signa mala deliria ſubſequentia.

CAP. VI.

Quid fatuitas & oblivio in morbis ſignificet.

FAtuitatem & oblivionem principis facultatis, in cerebro ſedem habentis, rationis ſcilicet atque memoriæ, ſymptomata eſſe, ab una eademque cauſa proficiſci, Galen. *in* 1. *de ſymptom. cauſſis cap.* 7. memoriæ prodidit. Quæ ſymptomata plerumque ſimul apparent, & aliquando ſola fortuitas vel oblivio, prout una cerebri pars aut altera læditur, in quibus ſpeciatim hæ duæ reſident potentiæ, atque exercentur. Stultitiam vocat Gal. 3. *de locis affect. cap.* 18. ubi ſimul fatuitas & oblivio apparet, quæ nota eſt magni in cerebro temperamenti receſſus, in homine præſertim ingenii perſpicacioris, atque firmæ memoriæ, quando hæc cerebrum refrigeratum denotant, quum ab ipſius frigida intemperie fiant, ut *in Prorr.* hiſce verbis exprimit: *Quod enim non cognoſcant familiares, neque factorum recordentur, ex cerebri refrigeratione id naſci conſtat.* Cerebri ſiquidem facta refrigeratio, uti Gal. 3. *loc. affect.* 5. docet, animales actiones torpidas efficit, atque tum ad memorandum, tum ad ratiocinandum ineptas. Ex quo quum rerum ſpecies ægre ad immaginationem, & rationem ferantur, mirum non eſt, ægrotos factorum non recordari, atque exinde, ſpiritibus animalibus frigore torpidis effectis, fatuos ſtultoſque evadere. Accedit non raro ad horum generationem, ut *in lib.* 2. *de ſymptom. cauſſis cap.* 7. nuperrime citato Gal. meminit, humor frigidus pituitoſus. Quod etiam affirmare videtur *in libro artis medicinalis*, quum dixerit, optimam me-

Fatuitas & oblivio quid, unde.

Stultitia quid, & unde.

mo-

moriam firmam cerebri ſubſtantiam, & oblivionem fluidam indicare. Fiunt quoque fatui atque oblivioſi cerebro una refrigerato & exſiccato; aliquibus enim ob laborem in ſtudiis & ob aſſiduas vigilias, non minus quam nonnullis ob labores, etiam agricolis, cum læſa ratione oblivionem acceſſiſſe, Gal. *in 3. de loc. affect. cap.* 5. tradidit. Verum ſiccato cerebro ex laboribus cum oblivione delirium, non tamen fatuitas, concitatur, hæc enim ab humiditate magis quam a ſiccitate, hacque homines potius ingenii perſpicacioris fiunt, ut in melancholicis obſervamus, & auctor *Prorr. lib.* 1. 5. in phreniticis (quod in ipſis cerebrum ſiccius fiat) inſomnia conſpicua obſervari, tradidit. Fatuitas igitur atque oblivio, in homine quoque non ægrotante eſt timenda, tamquam futuri morbi graviſſimi prænuntia; præſertimque ſi ambo hæc ſymptomata ſimul prodeant. In morbis vero acutis ſapientes alioquin viros ſtultos videri, vel illorum, quos recte valentes plurimum amabant, non recordari, ſumme eſt pernicioſum, ſi modo id non ex delirio, ſed deperdita tum ratione, tum memoria, ſeu exſtincta facultate fit. Quod ſane tum ex prælanguidis viribus, tum & ſignis aliis exitioſis comprehenditur. De quibus in 1. *Prorr.* 64. *Ignorantia cum rigore mala, mala quoque & oblivio.* Et Gal. in comment. *nam cum rigore & ignorantia & oblivio victum calorem nativum ab ea, quæ ſymptomatica eſt, refrigeratione indicant.* Et de oblivione Hippocrat. *in Epidemior. lib. 3. p.* 1085. *lit. E oblivio ſub acceſſione, languor, vociſque defectus*: quæ ſane ex exitialibus ſignis eſſe etiam Gal. in com. 3. *Prorr. text.* 37. ſtatuit. In acutis vero morbis, quæ poſt æſtuantem calorem refrigerato cerebro fit, ſemper eſt pernicioſa, victumque, ut nuper dictum eſt, calorem nativum ſignificat. Non minus quam ea, quæ a principio morbi uſque ad finem perſeverat, cum malis ſignis exitium denotat, maximeque in phreniticis, de qua mentionem Apollonii faciens, Hip. *in 3. Epid. p.* 1111. *Ægr.* 13. ait: *Extremæ partes undique ſubfrigidæ, aliquantum delirabat, omnium obliviſcebatur, quæ locutus eſſet.* Verum ex delirio videntur nonnumquam ægroti oblivioſi, quod ſane minus periculi habet, modo delirium, cum quo una oblivio apparet, non ſit letale: quod quomodo dignoſcatur, ſuperius docuimus. Hi quidem quum minime ſint oblivioſi, tamen ex delirio videntur factorum non recordari: quod etiam in nonnullis aliarum facultatum actionibus obſervatur, veluti quum aliqui putant ſe videre muſcas obverſari oculis, feſtucas adeſſe multas, vel alia, quæ colligere manibus ſtudent, vel reſpirare quum deſipientes obliviſcantur & bibere, quamquam multum ſitiant: necnon etiam mingere vel alia operari hujuſmodi. Sæpe etiam repente vel fatui vel oblivioſi fiunt, ſanguine in caput decretorie decurrente, quæ ſymptomata criſin tunc temporis futuram indicant: quod judicii nobis ex aliis decretoriis ſignis innoteſcit, vel demum oblivio fit aliquando collecto in cerebro pituitoſo humore, veluti in comatoſis & lethargicis. Sunt alii, a graviſſimo morbo ſanati, quibus oblivio ſupervenit, quod multis, qui a peſte ſuperſtites remanſerunt, accidiſſe, Thucydides hiſtoricus mortalium memoriæ commendavit.

Fatuitas & oblivio unde.

In morbis quid ſignificant.

CAP. VII.

De prædictione ab externis ſenſibus.

QUomodo ab internis ſenſibus animalis facultatis quum infirmitas, tum robur, dignoſci queat, atque ab ipſis quomodo ſit præſagiendum de ægrotantium ſalute ac morte, hactenus ſatis compertum eſt. Nunc vero idem ab externorum quinque ſenſuum ratione proſequimur. Horum enim (qui ſunt viſus, auditus, odoratus, guſtus, & tactus) cognitio, atque accurata

Animalis facultatis robur & infirmitas quo modo ab externis ſenſibus dignoſcatur.

rata obſervatio, apprime nobis ad morborum exitus prænoſcendos conducet; quandoquidem in acuto morbo hi recte valentes magni momenti ad prædicendam ſalutem eſſe ſoleant: neque immerito; quum ab ipſis, recte ac ſecundum conſuetudinem editis, proba cerebri atque partium aliarum ſanitas indicetur, & nobis firma vis animalis exinde innoteſcat. Cerebro quidem atque animali facultate læſa, ſenſus vel omnes, vel plures, vel aliquis ſaltem immunis a vitio eſſe non poteſt; neceſſe enim eſt, ut æger tunc vel non recte ac ſecundum conſuetudinem videat, vel non audiat, vel cum vitio odoret, guſtet, aut tactum læſum habeat. Non eſt tamen neceſſarium, ut, ſenſibus omnibus recte valentibus, ſemper ſalus ſit futura, quando in multis acutis morbis a cerebro illæſo, etſi alia viſcera patiantur, actiones nedum externorum ſenſuum, at quinimmo etiam internorum recte obeantur. Sed hæ omnes in perniciosis morbis, ad exitium inclinantibus, perpetuo, morbi tempore, firmæ, ac illæſæ non obſervantur. Viſcere enim aliquo præcipuo pernicioſe ægrotante, cerebro quoque læſio neceſſario communicatur, & in ipſis ante mortem ſenſuum aliqua vitia apparent. Plane enim ſingulis ſenſibus recte valentibus, homo quidem mori poſſe non videtur. His tamen actiones diminutas vel deperditas, vel cum aliquo vitio edentibus, cerebro ipſo læſo, aut facultate vitiata (exceptis actionibus ſenſuum, ex futuræ alicujus criſis turbatione vitiatis, quæ quum ſigna decretoria ſint, criſin ſalutarem prænuntiant, bonæque ob id exiſtunt, de quibus poſterius ſpeciatim agemus) peſſimum eſt; veluti non ita timendum erit, quum id ratione inſtrumentorum ſenſuum, neque cerebro læſo, neque facultate vitiata contingat, ut quando, craſſo humore occluſis opticorum nervorum meatibus ægroti non vident, & meatibus auditoriis non audiunt. Ubi vero ſenſus non recte ex cerebro, ſeu facultatis vitio ſecundum conſuetudinem obeuntur, in morbis acutis exitium prænuntiant, & procul dubio ſi actiones planæ ſublatæ videantur, vel cum virium languore ſi apparuerint: tunc enim de ſalute plane erit deſperandum. Sed de his nunc ſigillatim etiam agamus, ut ab ipſis ſenſibus particularibus accuratius prædictionem perſcrutari poſſimus.

CAP. VIII.

Quid in morbis ægrotos non videre, tenebricoſam viſionem, viſus obſcuritatem habere, ſplendoreſque oculis apparere, atque oculos lucem ferre non poſſe ſignificet.

Viſus læſus, quid in morbis ſignificet, & unde. Viſus laditur a critica cauſa

ÆGrotos non recte, ac ſecundum conſuetudinem videre, ſemper eſt malum, etſi aliquando exinde nihil certi ſciri queat, quum ægroti viſu aliquando propter inſtrumentorum vitium deficiant, ſeu vitioſe videant, viſoriis ſcilicet nervis aut obſtructis, aut in oculis orta ſuffuſione, viſu vel impedito vel vitiato: quin viſus aliquando tollitur iiſdem inſtrumentis a cauſa critica læſis, vel quando criſi ægroti perturbati vel non vident, vel tenebricoſam habent viſionem, aut caligo, ſeu obſcuritas, ſeu obtenebratio, aut ſplendor inſolitus oculis obverſatur, quo interim expaveſcunt, vel lucem ferre non poſſunt. De his in 1. *Coac. præſag. text.* 195. *Quibus ſurditas cum capitis gravitate & hypochondrii tenſione, & ſplendore oculi profluvium ſanguinis ſignificatur*. Et Galen. *in 3. de Criſibus ſect.* 1. *text.* 18. erupturi e naribus ſanguinis, motum fulgoris oculis apparentem cum viſus obſcutitate, ſignum conſtituit; cum his vero ſæpe, ut Gal. voluit, involuntarie lacrymantur, præcordia tenduntur ſine dolore, difficulterque reſpirant. De quibus *in 3. Prognoſt. p.* 46. *lin.* 16. *& ſeq. text.* 35. *quibus per talem febrem dolet caput, & pro tenebris ob oculos effuſis hebetudines ſubeunt oculorum, ac ſplendor obverti-*

Ubi ſanguis e naribus eruppturus.

vertitur, & pro ventriculi dolore circa ilia, aut læva parte, aut dextra aliquid contenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione, sanguinem de naribus in his fluere pro vomitione exspectandum est; magis tamen in adolescentibus sanguinis fluorem exspectare oportet. At paullo post *lib.* 1. *Prorrhet.* 137. oculos rubros addidit, quum ait: *Cervicis dolores impensi, oculi rubri, sanguinis eruptiones ostendunt.* Ex quibus signis Galen. ut *in lib. de præsag. ad Posthumum cap.* 13. testatur, erupturum sanguinem in juvene coram multis Medicis prædixit: *De quo, dum Medicis hæc admiranda videntur, æger e lecto se sustulit, tamquam prosiliturus, interrogatusque, cur exsilire voluisset, quum nihil adesset, ob quod id facere debuisset, rubri coloris serpentem per laquearia repentem a se visum expavisse respondit.* Addidit Gal. ruborem in dextra nasi parte usque ad malam conspexisse. Oculus enim rubeus per se cum capitis dolore sanguinis e naribus eruptionem, ut *in Coacis prædict. text.* 166. scribitur, prænuntiat. Vertigines vero obortæ cum iis, quæ objiciuntur oculis tenebricosis, & cum agitatione labri inferioris, & multa saliva, orisque ventriculi morsu, atque capitis dolore vomitum futurum (Galeno docente) indicant. Quæ *in* 3. *Prognost. p.* 45. *lin.* 54. Hippocr. ita habet: *In febre non exitiosa tenebricosum aliquod ob oculos obversari, vomitum biliosum indicat.* De quibus Galen. *in* 3. *de Crisib. Et tenebrosa quædam oculis obversantur, & allucinantur, & vertiginem patiuntur, & caput dolet, vaporante re aliqua ex humore bilioso, & præterea facta ex nervis compassione.* Sed hæc visus symptomata cum coctionis signis, atque cum virium robore, si ad salutem crisis inclinaverit, apparent. Sine quibus vel non fit crisis, vel si fit, est pernicioſa. Summe vero pernicioſum observatur, post crisin aliquam ægrotum non videre, vel tenebricosam habere visionem, aut caliginem seu obscuritatem, seu obtenebrationem oculis obversari, aut offundi splendores aliquos, aut illos lucem ferre non posse, præsertimque ubi mala evacuatio subsequatur, uti est sanguinis e naribus stillicidium, sudor frontis, temporum, colli, frigidus, assiduus etiam ex toto corpore, vomitus virulenti, atque aliæ hujusmodi vacuationes, non minus quam si post aures, vel in aliis corporis partibus ignobilioribus humores aut exanthemata statim intro recurrant, vel crurum dolores incepti, continuo desierint. Quod si vires etiam prælanguidæ, & præsertim vitales, quæ maxime pulsibus prælanguidis comprehenduntur, fuerint, non longe aberit exitium: de his in Coacis præsagiis *text.* 105. *Tumores juxta aures in morbis longis, parvi, si inde fluor sanguinis e naribus, & tenebræ oculis offusæ moveantur, letale.* Non vident ægroti ante exitium, exstincta animali facultate quod ceterarum facultatum actiones fere deperditæ denotant; omnium maxime pulsus prælanguidi, mala respiratio, atque appetentia tum ciborum tum potus deperdita. quomodo si ægri non videant, cito morituri sunt, Hippoc. *in* 4. *libro Aphorism.* 49. tradidit, quod etiam *in* 2. *coac. præsag. text.* 72. sic scriptum est: *Jam labescentibus viribus, siquidem æger non videat, aut non audiat, vel a labro, oculo, nare, distorqueatur, letale.* Sed jam ad auditum descendamus.

Ubi vomitus futurus.

Visus læsus quando summe pernicioſus observatur

CAP. IX.

De surditate in morbis acutis.

EX auditus actionibus mutatis surditas, atque in auribus sonus seu tinnitus observatus ad prodendum ægrotantium prognosticum magni momenti esse solent; maximeque surditas, quæ etsi per seipsam numquam bona censeatur, quando caput læsum, ut Gal. *in primo Prorr.* docuit, perpetuo denotat; vel quod pejus est, exstinctam nonnumquam sensitivam facultā-

Surditas quid notat in morbis acutis.

Unde. cultatem. Fit vero ſurditas (Gal. *in* 1. *Prorrhet.* 32. ſcribente) & ob humorem quemdam in auditoriis meatibus impactum infarctumque, nihil quo magnum ſit habens, & interdum ob exſtinctam facultatem, quam in acutis turbulentiſque morbis contingere cernimus. Verum tametſi occluſis meatibus auditoriis ſurditatem obortam dicat Gal. nihil habere malignitatis, nihilominus in acutis morbis ſemper mala, illa excepta, quæ ex critica perturbatione excitatur: nam hæc non ſecus, quam deliria, convulſiones, comata, vigiliæ, anxietas, dolores, & alia hujuſmodi ſymptomata, per ſe perpetuo mala, aliquando facta in corpore critica perturbatione, optimam aliquam evacuationem præmonſtrant; ſoletque aliquando criſis eſſe indicium. De qua *in Prorr. lib.* 1. *text.* 147. *Hypocondrii tenſio cum capitis gravitate, & ſurditate, quæ conſequenter fatigant, ſanguinis denuntiant profuſionem.* Sed certius ſurditas fit indicatoria, ſi aſſidua cum aliis ſignis judicatoriis fuerit, qualis in *virgine Abderæ lib.* 3. *Epidem. p.* 1103. *Ægr.* 7. fuit obſervata, quæ ab octavo die uſque ad decimumſeptimum, in quo multum ſanguinis e naribus fluxit, protracta eſt, neque plane etiam ſoluta adhuc perſeverans, priorem criſin imperfectam denotabat, aliamque pro morbo reſolvendo futuram prænuntiabat, quæ reiterata ſanguinis eruptione, ſudore, atque ad pedes noxio humore decumbente, poſtea die vigeſimo eſt ſubſecuta. Quibus vacuationibus neque etiam penitus illius febris cauſſis ſublatis, die vigeſimoquarto rediit ſurditas cum aliis ſymptomatis, quæ criſis abſolutiſſimæ die vigeſimoſeptimo futuræ fuit prænuntia. Sed non erit inutile hiſtoriam iſtius ægrotæ hic ſubjungere, quam Hippocr. *epid.* 3. *text.* 78. (*Vide locum modo citatum*) ita ſcripſit: *Octavo ſurditas, febris acuta, in ſomnis faſtidioſa, horrebatque, mentis erat compos, urinæ ſimiles, nono nihil eſt mutatum, nec proximis diebus, manſit item ſurditas, quartodecimo mens perturbata fuit, febris remiſſior, ſeptimodecimo multum fluxit ex naribus, ſurditas eſt nonnihil imminuta. Sequentibus diebus eam faſtidium ſurditaſque tenebant, eratque delira, vigeſimo ei pedes dolebant, ſurditas & delirium eam deſeruerunt, aliquantum e naribus erupit, ſudavit, febre fuit liberata. Quarto & vigeſimo repetiit ſurditas, pedes aſſidue dolebant, mente excidit. Vigeſimoſeptimo multum ſudavit, febre caruit, ſurditas eam reliquit.* Aliquando poſt aures abſceſſus futuros aures obſurdeſcere ſignificat, maximeque ubi morbus ex craſſo frigidoque humore foveatur, ex quo recte quidem Auctor *Prorrheticorum libro* 1. *text.* 159. dixit: *Surdis manſuetæ parotides fiunt, tum alias, tum ſi faſtidioſi quippiam ſupervenerit, & comatoſis magis. Ibid. Text.* 168. *In capitis dolore coma & ſurditas abſceſſum aliquem poſt aures eructant.* Sed diſtinguere debemus ſurditatem hanc criticam bonam a ſymptomatica & mala, per ſigna concoctionis, & cruditatis. Cum hac quidem nullum apparet coctionis ſignum: cum illa coctio in excrementis obſervatur, quod Gal. *in virginis Abderæ hiſtoria* meminit, optima eſt omnis ſurditas, quæ decretorie reſolvitur, optima evacuatione ſubſecuta, de Hippocr. *in* 4. *Aphoriſm.* 60. meminit: *Quibus per febres aures obſurduerint, iis ſanguis e naribus profluens, aut perturbata alvus, ſolvit morbum, vel alvi bilioſa dejectione evacuatur*, ut *in eodem libr. Aph.* 28. hiſce quoque verbis docuerat: *Quibus dejectiones ſunt bilioſæ, ſuperveniente ſurditate ceſſant; & contra, quibus ſurditas adeſt, bilioſorum dejectione finitur:* aut etiam ſi humor ad ignobiles quaſdam partes demandetur atque propellatur, in quibus decubuiſſe dolores oborti ſignificant, quippe propterea boni ſunt, decretoriique appellantur: cum his certo tolli ſurditatem obortam ſemper bonum erit; uti in virgine, *loco præced. pag. citato, Abderæ* fuit obſervatum. Atque hæc de illis ſurditatibus, quæ ſalutem prædicunt, dicta ſint. Mala vero, ut jam dixi, per ſe ſemper eſt ſurditas, quando, ut Galen. docet, cerebrum læſum denotat; letalis vero, quæ fit exſtincta facultate, de qua Hippocr. *Aphoriſm. ſect.* 4. 49. meminit, quum inquit: *In*

Critica.

Abſceſſus futuros poſt aures aliquando ſignificat.

Surditas critica quomodo a ſymptomatica diſtinguitur.

Surditas mala.

febre

febre continua, si non videat vel non audiat, jam debili existente corpore, mors proxima est. Hæc quidem cognoscitur primo ab aliarum facultatum languore, atque etiam quod necessario una cum surditate hujusmodi aliquod letale signum illuxerit, quam ægrotis in acutis turbulentisque morbis sæpe contingere, auctor *Prorrhet. in* 1. *text.* 33. memoriæ tradidit. Est illa quoque surditas letalis, quæ a criticis malis vacuationibus apparet, & merito sane, quum tales vacuationes sint ex signis judicatoriis non judicantibus letalibus; namque ex vacuationibus, quæ juvare deberent, nedum non juvant, sed etiam lædunt, letales existunt, ut Gal. *in Prorr.* 3. *text.* 35. docuit. Quum itaque ægroti ab evacuationibus nedum non juventur, sed etiam lædantur, ita ut exinde vel cæci, vel surdi, vel vigiles, vel deliri tunc evadant, sine dubio letaliter se habent. De his *in Prorreticor. lib.* 1. *text.* 141. *Quæ ex naribus cum surditate & ignavitate parva est destillatio, difficile quippiam habet.* Sed Galen. in commento, stillationem illam cum surditate nedum difficilem, sed exitiosam ita habere statuit, ut propterea surditas sit letalis cum evacuatione aliqua: itaque vel post evacuationem apparens surditas in acuta febre, plerumque est letalis, modo non ex humorum copia fiat, qualis fuit in Horophonte *lib.* 1. *Epidem. p.* 974. *Ægr.* 3. qui tamen, ut quoque Gal. annotavit, ex aliis signis in principio moriturus conjiciebatur, qui etiam præter artis spem superstes evasit. Eodem quoque modo, ut dictum est, si evacuatio subsequatur, qualem in Philista Hipp. *in Epid.* 3. *p.* 1070. *Ægr.* 4. observavit, de quo ita scribit: *Primo die biliosa, pauca vomuit, flava illa primo, sed deinde virulenta, pluraque alvo stercora excrevit, noctem habuit molestam. Altero die surditans, acuta febris, dextrum hypochondrium est contentum, ac intro inclinabat, urinæ tenues, pellucidæ, & cetera; qui quinto obiit phreniticus.* Si vero surditas, præterquam quod sequantur vacuationes, etiam una cum illa alia signa pernicioſa illuxerint, multo plus exitii judicium confirmabitur. De qua *in* 1. *coac. præsag. text.* 197. legitur: *Valde surdi, prehendendo tremuli, lingua resoluti, torpidi, malum.* Quæ postea *Coac. præs.* 176. clarius fere repetuntur sic: *capite dolentes, surdastri, intremiscentes manibus, dolentes a cervice, mejentes nigra condensata, vomentes nigra, letaliter habent.* Quæ surditas cum letalibus signis in *Philista loco præced. pag. allegato* moribundo, ut nuper dictum est, illuxit. Omnium vero maxime exitialis est, quæ fit cum prælanguidis viribus, de qua 5. *coac. præs. text.* 72. sic scriptum est: *Jam labascentibus viribus, siquidem æger non videat, aut non audiat, letalis.* Sunt demum quædam surditates, quæ delirii seu phrenitica signa existunt, de quibus auctor *Prorr. in* 1. *Prorr.* 10. habet: *Qui in capitis doloribus æruginosos vomitus habent, vigilantque cum surditate, cito vehementer insaniunt.* Sed hæ surditates, quum exitiosæ phrenitidis, ut nos superius docuimus, sint præsagia, propterea sunt exitiales. De his etiam *text.* 32. *Surditas, urinæque absque residentia prærubræ, & sublime petentia, mentis aberrationem portendunt.* Galen. quoque in eodem lib. in acutis turbulentisque morbis surditatem inter signa phrenitica reposuit; & auctor Coac. præsagiorum *text.* 197. ait: *in iisdem acutis febribus aures obsurdescere, esse furiosum.* Hæc itaque surditas delirii prænuntia eodem quidem modo judicatur, quo alias deliria fore judicanda prodidimus. Sed ad sonitum aurium in iisdem morbis observatum sermonem convertamus.

Letalis quænam.

Omnium maxime exitialis quænam.

C A P. X.

De tinnitu aurium in morbis acutis.

AUrium sonitus in acutis morbis sæpe apparet, atque aliquando ægroti falso de aurium sonitu conqueruntur, utpote eo modo delirantes ipso-

ipſorum læſa immaginatione ſcilicet, quod imaginentur ſonos audire, etſi vere non audiant, hinc ipſorum aliqui tibicinas abigi contendunt. Sed de his nunc non agimus, quum ſatis in capite de prædictione ex delirio a nobis dictum ſit. Hos vero aurium veros ſonitus, pro varia editi ſoni forma ſeu figura, Medici quandoque appellant *bombos*, a ſono quem apes edunt; aliquando *tinnitus*, ab illiuſce ſoni curſu interrupto, aliquando *triſmos*, ideſt, ſibilos, qui fiunt ex tenui flatu exiliter in aures delabente, ſibilorumque modo prodeunt; atque demum *ichos* ſeu ſtrepitus, prout cum ſtrepitu edi videntur. Galen. *in primo Prorrhetic.* docet, ex flatuoſo ſpiritu propter cerebri inflammationem, ex humiditate, quæ in capite redundat, aut ex aſſidua acuta febre in bilioſa materia, quæ per venas fertur, concitato, atque ſe in auditorios meatus inſinuante, tales in febribus tinnitus habere ortus putavit: a quibus cauſſis etſi fiant, non tamen ſemper, quando etiam ab humoribus tenuioribus in caput elatis, & etiam ad auditorios meatus motis, ita ut hic tinnitus ſymptoma ſit cerebri male affecti tenuiori humore, vel ſanguine vel bile, agitato ac commoto, exitum non habente, ex quo mirum non eſt, ſi ſanguinis e naribus eruptiones non raro aurium hi ſonitus, vel tinnitus, vel ſibili præcedant, qui a ſanguine exitum non reperiente agitato, ac auditorios meatus commoto fiunt, non autem ex flatu: quid enim ſonitus, hi, ſi ex flatu fiant, ad profluvium ſanguinis, e naribus erumpendum? Hoc quoque Galenus videtur innuere, quum *in ſecundum Prorrheticorum* dixerit: *humorem ad caput aſcendentem facere tum deſipientiam, tum aurium ſonitum*. Hujuſmodi autem ſonitus in auribus in acute febricitantibus duo præcipue notare ſolet, delirium quippe ſæpe phreniticum, ubi præſertim ab humore in caput aſcendente fiat, qui ſane cum ſignis cruditatis, neque in die decretorio apparentes, cum viribus prælanguidioribus, letalem phrenitidem denuntiat. Atque hoc modo fortaſſe tales tinnitus auctor Coacorum præſag. intellexit, quum *in* 1. *Coac. præſag. text.* 193. dixerit. *Bombus in acutis & ſonitus aurium letalis*. Hujuſmodi vero judicium fit de tinnitu permanente, atque non de continuo ſilente, ſeu ceſſante, quod genus ſonituum in auribus in febribus hac ratione non fore timendum, Galen. *in tertio, de Compoſit. Medic. Cap.* 1. ſecundum loca prodidit. Aſſidui itaque ſunt timendi, utpote qui vel delirium denotant, vel ſanguinis e naribus futuram eruptionem. Delirium quidem denotant in morbi principio, atque etiam morbo prægreſſo plane crudis exiſtentibus humoribus, phreniticum, ſi cum ſignis phrenitidis; qua ſuperius prodidimus, atque gravitate aliqua in capite obſervata, præſertim in naribus, hoc enim humore repletum caput ii indicant, ex quo fit phrenitis, quæ plerumque, ut alias docuimus, eſt letalis. De his auctor Prorrheticorum *lib.* 1. *Text.* 18. *Si in ardente febre aurium ſonitus cum caligine fuerit, provenerit que in naribus gravitas, mente ex melancholia aberrant*. In morbi tamen vigore, ſæpe ſonitus aurium ſanguinis eruptionem ſignificat, qui tunc temporis fit, ſanguine in caput aſcendente, qui ni excernatur a natura per nares, remanat in caput, inflammationemque ac delirium phreniticum parit. Vaporibus vero in caput aſcendentibus tinnitus obortus ſimplex delirium tantum denotat, idipſumque *paraphreneſin* Grecis appellatum; quæ affectio non eſt continua, ſed in acceſſionum declinationibus ceſſans. Decretorii vero aurium ſonitus propriis ſignis cognoſcuntur, quippe quod fiant in die aliquo decretorio, humoribuſque, vel plane, vel magna ex parte concoctis, una cum viribus conſtantibus. Aliquando aurium ſonitus indicant quum delirium tum ſanguinem e naribus fluxurum, ut in 1. *Coac. præſag. text.* 194. *Sonitus aurium cum hebetudine viſus, & gravitate narium, mentem movet, & ſanguinem e naribus brevi ſtillaturum eſſe ſignificat*. Sed recte quoque poſtea auctor eorum librorum *Coac. præſ.* 131. ſcripſit: *In ardentibus ſuperveniens ſonus aurium*,

Aurium veri ſonitus quomodo a medicis quandoque vocentur.

Quid notant in morbis acutis.

Quinam ſunt timendi.

Sanguinis eruptionem quando ſignificant.

Decretorii quomodo cognoſcuntur.

cum

cum alucinatione oculorum, & narium gravitate, ex melancholia mente aberrant, niſi ſanguis effluxerit. Quod ſane videtur eſſe verum, quando ſanguine in caput aſcendente, niſi foras excernatur, delirium cum inflammatione concitatur.

Demum ſunt, qui deſipientes læſa immaginatione tum ſonitus in auribus tum alios ſonos ſe audire contendunt, hinc aliquos tibicinas abigi, ut Galenus obſervavit, jubere. Hi vero in numero delirantium reponuntur, ab ipſiſque perinde, ac a deliris judicium de futura ſalute fiet. In morbis vero longis, vel in iis, qui adhuc non ægrotant, ſonitus aurium plerumque gravem morbum minatur, magiſque ſi cum capitis dolore, gravitate, aut vertigine, aut vocis tarditate, vel manuum torpore appareant, vel ab ipſis hæc fuerint ſubſecuta. Cum quibus auctor Coac. præſag. *text.* 161. ſæpe apoplexiam, epilepſiam, vel oblivionem portendere tradidit, neque immerito, quum frigidorum craſſorum in capite humorum multitudinem denotent; ex qua ſingula prædicta mala fieri poſſe, nemo in arte medendi exercitatus ignorat.

Ab immaginatione læſa.

In morbis longis quod notant.

CAP. XI.

Quid fœtores in morbis, quidque cibos potuſque graveolentes, inſipidos, vel mali ſaporis ægrotis videri ſignificet.

IN morbis duobus modis fœtores obſervamus, in ægrotis ſcilicet, quod ſpectat ad aſſidentes, quorum odoratus offenditur, atque in oblatis quum cibis, tum potibus, tum pharmacis, quæ ægrotantium odoratus vitium detegunt. Aſſidentes vero ſentiunt odores ab ægrotantium corporibus, vel excrementis, vel in reſpiratione, vel in ore, in naribus, vel in aliis partibus. In excrementis fœtores ſemper mali, ex Galen. *in tertio Epidemiorum*, qui fœtida ſemper exitioſa eſſe affirmavit, & Hippocrates in *Prognoſticis pag.* 41. *lin.* 10. vomitiones omnes fœtidas maxime damnat: idque, quod, ut Galen. docet, graveolentia omnia putredinis ſint indicium, quam ſane cum nigro atque livido humoris colore exitium prædicere Hippocrat. *in ſecundo Progn. ibid.* tradidit, quoniam, ut meminit Gal. exſtinctionem caloris nativi indicat. At ſcitu dignum exiſtimo, prænoſcendos eſſe tum graveolentiæ gradus, tum humorum ſeu excretorum varietatem, quæ varium prædictionis judicium reddent. Nam etſi dicat Hippoc. in excretis per vomitum omnes putres graveolenteſque odores eſſe malos; attamen non omnes letales exiſtunt, ſed qui impenſe graveolent, cujuſmodi ſunt alvi fluxus colliquativi, vocati, quos in peſtilentibus febribus obſervamus. In morbi vero vigore, cum ſignis coctionis interim ſumme putres & graveolentes humores critice excernuntur. Reſpirationes autem graveolentes maxime exitiales obſervantur. Sed de his hæc obiter dicta ſufficiant, verum ſuis locis de his accuratius, ubi præſertim de graveolentia excrementorum ſermonem inſtituemus. Ægrotis vero omnes tum cibos tum potus, tum medicamenta oblata putrida atque graveolentia videri, malum, quod ſumme putridos humores intus in corporibus redundare denotet; quandoquidem odoratus non ſecus quam guſtus vaporibus a variis humoribus putridis ad linguam & nares, ſeu cerebrum exhalantibus, vitiatur, intuſque quod eſt vel odoris vel ſaporis, ut Philoſophi dicunt, prohibet extraneum, quod offertur odoris atque ſaporis, quin recipiatur & dignoſcatur. Ex qua re, tum naribus, tum lingua, vapore, a ſumme putridis humoribus exhalante infectis, omnia, quæ tum odorantur, tum guſtantur, putrida videntur. Ægrotos quoque prorſus, ut etiam dictum eſt, deſtitui guſtu, etſi malum ſit, non tamen niſi exſtincta animali facultate id fiat,

Fœtores in morbis quid.

Cibos, potus, medicamenta, graveolentia videri, quid in morbis ſignificat.

mortem præsagire poterit; quare hæc ex aliis signis, aut bonis aut malis, judicii capient certitudinem.

Eodem modo etiam, quum ægroti omnia sibi oblata, amara, vel salsa, vel acria, esse putant, hæc enim nonnisi redundantium humorum qualitates notant, nihil ad præsagium ipsorum observatione faciente. Sed jam ab actionum sensus tactus symptomatis Prognosticam persequamur.

CAP. XII.

Quid stupor, seu torpor, & sensus tactus deperditus significent?

Torpor unde.

IN acutis morbis sæpius partes corporis torpescunt, seu stupidæ redduntur; qui affectus duplex est, scilicet vel animi vel corporis, atque hic, vel aliquarum partium, vel totius corporis; estque sensus obscurus, seu diminutus partis sentientis, qui *stupor* appellatur. Etenim quæ partibus sensum adimunt, stupefacientia propterea vocamus, veluti motum diminutum *torporem* aliqui dicunt, etsi non pauci velint, confundentes utrumque, tam stuporem, quam torporem, sensum motumque diminutum denotare, ut iis accidit, qui altero crurum compresso sedentes illud ipsum paullo post ægerrime movent, & fere sensu destitutum sentiunt. Fiunt vero, ut Gal. 2. *Prorrheticorum* 36. docuit, vel cerebro humefacto, vel refrigerato, vel ex humiditate atque frigiditate ipso læso, (quæ cerebri frigiditas duplex est, scilicet aut intemperies frigida simplex, vel cum materia frigida, aut exstinctio caloris nativi;) vel quocumque modo intercepto spiritu, nec ad partem affluat, ut si nervi obstruantur, si tamen verum sit, eos pervios esse, vel si incrassentur, aut comprimatur, veluti renibus inflammatis crura stupescunt compressis ab inflammatione nervis. Itaque si in principio pars aliqua obstupescat, periculum est, ne vel paralysis, vel apoplexia oriatur, quod in 7. *Coac. præsag. text.* 476. sic legitur: *Torpores & sensus privationes, præter, consuetudinem ortæ, futuras apoplexias denuntiant.* Quod sane in acutis morbis maxime erit exitiosum, ni febris magna succedat, quæ humidum tum absumat, tum frigidum cerebrum calefaciat. Unde Hippocr. *in* 5. *Aphor.* 5. dixit: *Si ebrius quispiam repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur.*

Stuporis & torporis differentia. Eorum causa.

Verum ut certe præsagias ex stupore in aliqua parte conspecto, alia signa consulito, quum a solo stupore nihil certi ad præsagium sciri queat. Prægresso vero morbo, si a læso nervorum principio stupor fiat, semper erit timendum, nam vel exstinctum calorem nativum, vel noxium humorem ad cerebrum decubuisse, erit indicium. Ex quo in *lib.* 1. *Sect.* 7. *text.* 14. *Coac. præs.* merito dictum est: *Torpores a multis rigoribus maligni*, quod hi fiant exstinctione caloris nativi. A calidissimo morbo partes refrigerari summe esse exitiosum Gal. *in* 3. *Epid.* docuit. Non minus pernicioſum forte est, noxios humores ad cerebrum nobile viscus decumbere, ut Gal. *in lib. constit. art. Med. cap.* 18. scriptum reliquit. Cognoscitur vero a cerebro læso hoc malum fieri, quod præcipue capitis partes torpeant & stupidæ videantur. De quibus Gal. *in* 7. *Aph.* 14. scribit: *stupor vero est, quum neque loquuntur, neque agunt quicquam sed apertis oculis immoti manent, iis, qui metu & timore perculsi & attoniti sunt, similes.* Quem stuporem a vulnere aliquando fieri, atque malum quoque esse Hippocr. *Aphorism. sect.* 7. 14. docuit. Mentis non minus stupor fit ab iisdem jam dictis caussis cerebro læso, Galeno *in libro quinto Aphorismorum* docente. Ignaviaque est mentis stupor. Si partes vero infernæ, quibus nervi ex spinali medulla procedunt, stupore afficiantur, minus est malum, a quo nequaquam exitium, nisi una illuxerint alia letalia signa, timendum erit. Tamen interdum cerebro, sanguinem ad ipsum per modum judicii ascendente,

Stupor quid in morbis significet.

læso,

læso, partes aliquæ superiorum stupent, sanguinis eruptionem denotantes, & inferiorum aliquæ etiam, eodem modo natura critice noxios humores ad ipsos deponente, stupidæ effectæ, humoris metastasin, ideſt, transmissionem criticam præmonstrant. Distinguentur vero decretoriæ ab aliis quæ exitiosæ sunt, signis coctionis, virium robore, facili ægrorum tolerantia, atque morbi symptomatumque allevatione. *Stupor quando critice fit.*

CAP. XIII.

De prædictione ex corporis caliditate.

QUoniam ad sensum tactus spectant caliditas, frigiditas, siccitas, humiditas, mollities, asperitas atque colores, quæ omnia quum non minus quam alia nobis ad prædictionem faciant, optimum erit, de hisce quoque nos agere, quod quidem nunc faciemus, a corporis ægrotantis caliditate exordientes ab ea enim tum salus, tum exitium, aliis non neglectis signis, præsentiri potest. Caliditas vero, quam nos ad Prognosticum observamus, aut mitis tepidave, aut vehemens, & acuta existit, atque ipsa rursum vel æqualiter in toto corpore, vel in quapiam tantum parte observatur. Mitis ac placida, perpetuo bona, si præsertim cum æquali totius corporis, (ut in Prognosticis *p. 39. lin. 32.* Hippocr. docuit) mollitie, aut quæ bene valentis calori sit similis. Alios siquidem recte valentes carnes subfrigidas, alios temperate calidas, atque alios intense calidas habere, observantur. Ex quo quidem ægrotantes, si calorem similem recte valentium habuerint calori, bonum est. Hincque vehemens acutaque interdum caliditas, & aliquando moderata & subfrigida in ægrotis laudari solet, ea inquam, quæ caliditati corporis antea benevalentis proxima videtur. Non secus quam urinæ, atque alia excrementa, si sanorum excrementis similia prodeant, bona existunt. Bonum igitur est ægrotantium corpora, quod ad calorem spectat, vel nihil vel parum alterata, aut mutata esse. Ex calore febrili, de quo fusius posterius loquemur, optimus est temperatus suavis, æqualis in omnibus corporis partibus, cum quodam humido, qui maxime nativo calori sit similis, quique ut Gal. *in 2. de nat. hum.* meminit, non modo temperate calidus, sed etiam humidus existit, ad differentiam ignei acutique, qui a nativo maxime est differens. Ille itaque temperatus calor, optimus perpetuo erit, nisi nos morbi malignitas fallat. Nam sunt ex malignis morbis plures, calorem blandum naturali apprime similem habentes, intus nimirium concluso calore, neque foras libere diffuso; quamobrem bono illi calori corporis una totius æqualem mollitiem conjungi oportebit, de quibus Hip. *in Progn. ib.* ait: *Optimum vero est, si corpus omne æque calidum, molleque est*; æqualis enim totius corporis mollities distinguit bonum calorem ab aliis, qui boni non sunt. Potest enim caliditas in aliquo ægrotante temperata æqualisque videri, quum tamen a morbo maligniſſimo proficiscatur. Hanc vero denotabit corporis inæqualis mollities, quippe quod dura hypochondria plerumque observentur, minimeque etiam caliditas ea æqualiter in universo corpore est diffusa: uti quum extremæ partes minus calidæ sint, quam ventres, qui his sunt calidiores. Itaque caliditas temperata æqualiter in toto corpore, cum æquali quoque molitie, semper bonum signum erit, siquidem fieri non potest, quod corpus caliditate ac mollitie observatum exitiose ægrotet, id enim viscera phlegmone, obstructionibus, intensaque putredine carere, nobis certum erit indicium. Molle etiam æqualiter corpus observatum, distinguet a bona caliditate hecticam, qua forte quod mitis placidaque sentiatur, aliqui decepti sæpe hecticos non dignoscant. Hecticorum caliditati non mollities, sed squaliditas potius solet conjungi. Hectica vero febris non iis solum cognoscitur, at etiam ipsiusmet caloris inæqualitate; quando ab assumto cibo Hecticæ fe-

Caliditas, quæ ad Prognosticum observatur, qualis est.

Calor in ægrotis quinam bonus.

Hecticorum caliditas quanam.

Calor in aegrotis quinam optimus.

bres, ut in 2. *Progn. text.* 60. Galen. meminit, exacerbentur. Optimus igitur erit calor temperatus, æqualiter per totum corpus diffusus, cum æquali quoque mollitie. At nedum hic, sed quin etiam intensus vehemensque calor per omnes corporis partes diffusus in ardentibus febribus, quum proprium ardentium malignarum sit (Galeno *n 3. Prorr. text.* 61. docente) ut eæ summas partes non calefaciant; vel non malignarum, ut totum corpus usque ad summas partes æqualiter exuriant: significant enim hæ, ut Gal. scripsit *in* 7. *Aph.* viscera vehementi carere inflammatione. Partes etiam quasdam corporis plurimum in acutis morbis incalescere sæpe optimum est ad prænoscendam salutem, maximeque cutaneas, ad quas sæpe natura tum caloris æstum, tum humores noxios deponit. Extremas corporis partes valde calidas, in talibus morbis sentiri optimum non minus est, veluti oppositum si observatur in his, magnum malum: hinc pessima est extremorum frigiditas in morbis acutis; itaque harum partium caliditas bona, ut signum existit, quod denotet interna viscera neque magno phlegmone, neque inflammatione, neque intensa aliqua humorum putredine offendi, neque naturam multitudine crudorum humorum gravari, atque etiam significet calorem febrilem viscera reliquisse, partesque longinquas invasisse, vel noxios humores ad easdem detrusos fuisse; ad pedes enim caliditas deducta morbum declinasse in multis indicat: ex quo Hippocr. *lib. de rat. vict. in morb. acut. p.* 386. *lin.* 52. *& seq. & p.* 398. *lin.* 28. *& seq.* dixit, in declinatione febris, calore ad pedes descendente, ægrotis cibum esse offerendum. Extremarum partium caliditas quoque, cum rubore atque inflammatione, in acutis morbis, bonum. De qua Hippocrat. *in* 3. *Prognost. pag.* 45. *lin.* 14. *Maxime vero juvantur, si cervix ac pectus traxerit ruborem, nec sacer ignis intro recurrat.* Et paullo post *ibid. lin.* 20. *Securissimum vero est, si rubor quam maxime foras vertatur.* Sed jam, his præmissis, quomodo corporis caliditas exi-

Caliditas quænam mala in aegrotis.

stit, cum quo totum corpus liquatur, marcescit, atque contabescit, qualis est hecticorum, quæ nisi, antequam solida corpora colliquaverit, corrigatur ac emendetur, plane ad exitium illos ducet. Hæc vero æqualis uniformisque existit, acuta, non multum tactui sensuique manifesta, ex quo multi propterea has febres in principio non cognoscunt. Diximus vero superius Galenum hujusce caloris tale signum docuisse, quod in 2. *prog.* 60. ita habet. *Per febres hecticas partes ipsæ corporis solidiores ignitæ evadunt, ob id igitur assidue febris in seipsa manet, calorem obtinens perinde ut calx, debilem contingentibus.* Itaque quoties esitant ac bibunt, simile quiddam accidit, quod in calce evenit aqua perfusa, quo fit, ut contingentes exterius ægrum multo calidiorem persentiant. Hæc vero totius corporis uniformis caliditas, quæ cum assidua febre est tepida, vel subfrigida apparens, suspecta erit, quod indicet totum incendium intra viscera contineri. Galen. ex Hippocrat. *in secundo de ratione victus in acutis*, & *in primo libro Prognosticorum p.* 37. *lin.* 43. dixit: *Corpus in acutis febribus non admodum pro ratione febris calere, membraque frigida vel tepida nudare, perinde ac si incendio conflagrarent, malignitatis est signum.* Hujusmodi tepida caliditas, etsi numquam bona, tamen per se sola nihil certi præsagit, veluti etiam vehemens facit caliditas, quæ etsi per se mala semper sit, non tamen certi quicquam ad exitium prædicendum habet, ac quinimmo non raro post rigorem corpus valde incalescere, crisis proximæ nobis est indicium, proinde ex aliis signis certitudinem capiet. Vehemens vero corporis totius, vel thoracis tantum, vel ventris calidi-

Quænam perniciosa.

tas, pernicios, si diu durat; resolvit enim vires, siccat, colliquatque, a qua quidem, si corpora convellantur, exitium prædicit, quando exinde ortæ convulsiones, quod fiant siccatis nervis, omnes sint letales, ex quo Hippocrat. *in septimo Aphorismorum* 13. dixit: *Ab æstibus fortibus convulsio, aut tetanus, malum.* Vehemens quoque caliditas tum in facie

tum

tum in hypochondriis, tum in thorace, peſſima exiſtit: hæc enim viſceris alicujus, illa autem cerebri phlegmonem indicat, quamquam non ſemper flammans facies phlegmonis ſignum exiſtat, & quinimmo ſanguinis criticæ eruptionis indicium, cui ſigno ſigna alia deteriora reſpondere debebunt: ſi vero hæc ſigno aliquo apparuerit pernicioſo, perniciem oſtendet, de qua in *lib. 1. Prorrh. 49.* legitur: *Faciei color bonus, & mæſtitia multa, malum.* Etenim, ut ait Galenus, quum florida quidem facies apparuerit, ægerque valde triſtis fuerit, quædam in cerebro valde calida affectio eſſe, videtur, quæ ſanguinem exurit. Cum ſudore vero facies valde flammans, malignitatem Galen. indicare prodidit; & merito exitium præmonſtrabit, quum ea cerebri magnum phlegmonem denotet, qui inter letales morbos recenſetur, ſicque ſudor, qui nihil juvat, unum ex ſignis exitialibus eſt. De hac auctor Prorrheticorum *lib. 1. 67. Æſtuoſi rigores quadamtenus pernicioſi, flammans quoque cum ſudore facies in his mala.* In ventre vero atque thorace æſtus, ſeu intenſa caliditas ſemper mala; nam ibi adeſſe teſtatur morbum ſæpe magnum, ac letalem, ut quando ex viſceris magno malignoque phlegmone procedit; quod ſi eſt, extremæ partes vel tepeſcunt, vel frigeſcunt, de quibus *in primo Prorrheticorum text. 7. Qui in hypochondrio refrigerata febre ardores relinquuntur, tum alias, tum in ſudoribus, mali ſunt.* Et Hippocr. *in 4. Aphoriſm. 48. In febribus non intermittentibus, ſi partes exteriores frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeant, letale.* Circa ventriculum vero cum cordis morſu æſtuoſos calores pernicioſos eſſe, Hippocr. *quarto libro Aphoriſm. 65.* tradidit. Item æſtus laterum cum dolore, atque rigore, damnat auctor Prorrheticorum *libro 1. 66. Lateris ſiquidem æſtus* (ait Galen.) *cum dolore ſignum eſt phlegmonis, quæ partem eam infeſtat, ſi vero & rigor ipſis ſupervenerit ſuppuraturum exſpecta phlegmonem.* Viſcerum autem phlegmonum ſuppuratorum rari ſunt, qui ſanentur: nulli, viribus jam prælanguidioribus factis. Corpora etiam quum ex aliqua prægreſſa evacuatione, ſi nedum calore febrili liberentur, at magis recaleſcant, malum eſſe tradidit auctor Prorrheticorum *lib. 1. 66.* quum dixit: *Si ex perfrictione ſudantes recaleſcant, malum. Ex his quoque æſtus doloroſus, & rigor ſuperveniens, malum.* Galen. enim in comment. ait: *Si in morbo quis, poſtquam ſudaverit, frigidior quidem protinus, quam naturæ conveniat, fiat, rurſuſque febricitet, non ſine periculo afficitur.* Sicut auctor Prorrhetic. paullo poſt *ibid. 68. Si in ſudoribus vigiles recaleſcant, malum.* Quod in *2. coac. præſag. text. 41.* hiſce verbis expreſſum eſt: *Exſudantes, vigiles, recaleſcentes, malum.* Sed de his nunc ſatis; addamus refrigerata corpora vix recaleſcere, ſumme in morbis acutis eſſe pernicioſum; exſtincto enim nativo calore vel reſoluto vel ſuffocato, id fit: non minus etiam letale videtur, ſi in extimis ſummiſque partibus obſervetur, quippe eas refrigeratas vix recaleſcere. Hinc *in primo Epidemiorum pag. 940. lin. 5.* Hippocr. ait: *Frigebant his multum extremitates, vix his calor revocari poterat.* Corpora quoque cito incaleſcere & frigefieri, malum itidem eſt ſignum. Significat enim, ut Galen. docet, morbum ſumme malignum, quod ſi non letalem, morbum ſaltem longum fore præſagit: in acuto vero morbo, qui cito vires reſolvit, exitium portendit. Sed jam tempus eſt, ut ad prædictionem ex corporum frigiditate veniamus.

CAP. XIV.

Ex frigiditate corporum quid præſagiendum.

FRigiditas corporis, quæ potius ſit moderata caliditas, poſt aliquam bonam evacuationem, pulſu reddito meliori ac vehementiore, appa- *Frigiditas corporis quandoque optima.*

rens optima eſt. Sublatam enim febrem eſſe critice denotat. Item refrigerata ſeu ſedata febris caliditate, cum urinis coctionem denotantibus, vel ſputis, vel alvi dejectionibus, (ubi morbus vel venoſum genus, vel partes ſpirituoſas, vel ventrem occuparit) pulſu ut jam dictum eſt meliori reddito, optimum eſt, tuto enim ſanitatem rediiſſe ſignificat. Frigiditas vero nonnumquam critica obſervatur, optimam criſin præcedens, de qua poſtea. Sed raro tamen contingit, ut quicquam boni corporis frigiditate præſagiamus. Hęc vel in toto corpore, vel in externis partibus obſervatur; plerumque continuis febribus eſt exitialis: attamen in quibuſdam corporibus robuſtiſſimis non exitium, ſed longitudinem præmonſtrat. In prælanguidis vero perpetuo letalis; ſi ſcilicet morbus præſertim magnus vehemenſve fuerit: quæ vero fit exſtincta facultate, exitium proximum præſagit. Sed ab hac cauſſa fieri, ſigna alia exitioſa præmonſtrabunt. Aqua inter cutem laborantes non pauci obſervantur, præſertim aſcite & leucophlegmatia, qui corpus fere totum frigidum habent, & non minus in ſuppuratis, moribundis. Illi enim fere totum corpus algidum habent, quod iis contingit, plurimo innati caloris reſoluto, vel uti illis ex frigido humore evenit. Verum in extremis partibus ea frigiditas nihil certi perpetuo prodit ad Prognoſticum. In quibuſdam enim ægrotis non acute ægrotantibus hujuſmodi frigiditas non eſt admodum verenda. In morbis enim, ait Galen. qui ſunt ſine febre, & hieme, & in ætate ſenili partes extremas corporis, veluti nares, aures, pedes, manus frigefieri, nihil abſurdum; quippe, ut ait Galen. 2. *Prognoſtic. text.* 4. quæ carne vacant ex natura, longeque ſunt a viſceribus poſitæ: non tamen in acutis, mediocre eſt malum; per illas enim calor nativus, præ debilitate nequaquam permeat ad extremas corporis partes; in morbis vero acutis, propter inflammationis magnitudinem in viſceribus fatigantis, parum ſanguinis in omne permeat corpus. In his itaque morbis corpus algidum eſſe, & nedum ipſius extrema, ſed totum inquam peſſimum eſt, niſi ab acceſſione id fiat: ea enim vel exſtinctum, vel multitudine humorum fere ſuffocatum calorem naturalem nobis indicat, cum qua frigiditate multa alia ſimul letalia aderunt ſigna. Frigidi quidem multi ex moribundis apparent, cum deſudationibus, viriumque languore. Hi quidem vehementer tum frigidi, tum duri apparent, ſi ab exſtinctione caloris, ex quo auctor Prorrheticorum *lib.* 1. 77. dixit: *Refrigeratio cum duritie, malum.* Idem accuratius ab extremis corporis partibus frigeſcentibus rurſum nunc perſcrutemur.

Raro bona.

Quando letalis.

In quibuſdam ægrotis non verenda.

CAP. XV.

De prædictione ex frigiditate extremarum partium corporis.

EXtremæ corporis partes, quas Hippoc. *in* 2 *Prognoſtic. p.* 39. *lin.* 30. vocat *caput*, *manus & pedes*, & Gal. diſtinctius 7. *aphor.* 1. *nares*, *aures*, *pedes*, *ac manus*, in acutis morbis frigeſcere ſolent, ex nativi caloris vel contractione, vel reſolutione, vel oppreſſione, ſeu ſuffocatione, aut demum exſtinctione. Contrahitur intus ad viſcera calor, extremaſque corporis partes relinquens, mediaſque quippe thoracem & ventrem calefaciens, vel ob inflammationis ac eryſipelatis magnitudinem in viſceribus fatigantis, ut Gal. meminit, caliditateque ſanguinem per modum curcurbitulæ ad affectam partem attrahentis, vel propter fortem dolorem in corde, in ventriculo, in colo, in tenuibus inteſtinis, in utero, in renibus, aut demum in acceſſione, ubi natura in internis partibus copiam humorum foras extrudendam aggreditur, ex quo aliquando ſalutem, & aliquando exitium præſcimus, prout prævalidam naturam, & prælanguidam tunc eſſe contingit. Reſolvitur vero a maximo

Extremarum corporis partium frigiditas unde.

ca-

calore, vel ab ingenti dolore, aut ex immodica evacuatione, vel a venefico ſucco aliquo cor atque os ventriculi lædente, vel ab immoderata lætitia continuo oborta. Opprimitur etiam nativus calor, vel ſuffocatur in viſceribus, ex quo ceteræ aliæ partes ab ipſis remotæ, ſolito calore carentes, refrigerantur, aut copia plurimi alimenti, ſeu ciborum ore ventriculi gravato, ſeu vehementer a mordentibus humoribus (Galeno *in ſecundo text.* 45. *de ratione victus in acutis* docente) commorſo, vel a multitudine vitioſorum ſeu crudorum humorum in viſceribus contentorum, calorem fere ſuffocantium, vel exinde inſigniter oppreſſo; non ſecus atque fit, ſi ſupra ignem viridium lignorum magnam copiam conjeceris, qua is nedum non cogetur, ſed ſuffocatur atque diminuitur: eadem etiam copia humorum in viſceribus concluditur calor, quo minus ad extimas partes permeare queat, quippe venis, arteriiſque exinde obſtructis, per quas calor a viſceribus ad illas partes diffundebatur, febreſque hoc modo obortas *leipyrias*, alii *aſaphodes*, ideſt, obſcuras, & latentes, atque alii foris mites, intus conturbantes, appellant, quippe quum a multitudine putridorum humorum, vel a multis frigidis, crudiſque, & craſſis, humoribus calorem ſuffocantibus, vel in viſceribus ab oborta plegmone, vel ex venefica putredine fiant, omnes cum partium extremarum frigiditate, vel ſaltem ſubfrigidis, vel non calidis iiſdem partibus apparent. Exſtinguitur quoque, ut jam diximus, nedum per ſtrangulationem, ſuffocationem nativus calor, ſed non minus ab intenſa tum frigiditate, tum venefica qualitate nobis occulta, qua vita noſtra corrumpitur, quod devoratis venenis quum frigiditate, tum ex proprietate totius ſubſtantiæ interimente obſervatur. Demum calore naturali in ſolidis partibus qui ſedem, ut Galen. meminit, habet, a majori vel flammea caliditate humidorum, quo ipſe calor conſervatur ac vivit, abſumente, reſoluto ac diſſipato, ut in hecticis, vel a viſceris alicujus ingenti dolore calorem naturalem viſceris corrumpente ac reſolvente, de quo merito ſcripſit Hippocr. 7. *Aphor.* 60. *in forti dolore ventris, partium extremarum frigiditas, malum*. Vel denique a quapiam immodica corporis, aut arte procurata, aut ſponte facta vacuatione, ut in Syncope fit, homines refrigeratis extremis moriuntur, atque demum ex apertis arteriis reſoluto calore. Sed jam his auditis, ad frigiditatis partium corporis extremarum prognoſin deſcendamus. Quæ ſi frigeſcant, natura criſin cum bonis ſignis aggrediente, ſalutare erit. Verum in acceſſione periodica, & in morbis longis quicquam certi ad prognoſin frigiditas partium extremarum non habet, neque in ſenibus: per hiememque extrema frigeſcere non eſt exitiale. *In acutis vero non mediocre eſt malum, ſed valde perniciоſum ſymptoma, utpote, quod magnis ſuperveniat viſcerum inflammationibus*, ut Galen. 7. *Aphoriſmorum* 1. tradidit. Excipitur tamen frigiditas extremorum a cibo intempeſtive aſſumto, vel ab acceſſione aliqua ortum habens, in qua nedum extrema, ut Galenus *in ſecundo Prognoſticor.* docuit, ſed cutis quoque circum coſtas & ventrem poſita frigida redditur. Extremorum vero frigiditas aliquando in principio una cum morbo incipit, quod ſymptoma in vagantibus hoc anno febribus malignis multis vidimus, quæ vel ab intenſiſſima putredine, perinde ac a veneno viſcere aliquo leſo, atque exinde naturali calore vel admodum reſoluto, vel intus ea de cauſſa retracto, vel a multitudine valde putridorum humorum fere ſuffocato, aut denique ex crudis pituitoſiſque humoribus ſuccenſa febre, veluti in amphimerinis obſervatur. Quare extremorum frigiditas perpetuo in febribus continuis eſt mala, quę ni exitium, ſaltem morbi malignitatem denotet, plerumque vero exitium. Malignitatem tantum præſagit in principio una cum febre apparens, quęque non admodum vehemens ſit. Symptoma propterea eſſe malignarum febrium pathognomonicum, Medici affirmant, cum qua

Extremarum partium corporis frigiditatis Prognoſis.

ſępe ęgroti non multum ſitiunt, neque linguam habent admodum ficcatam, & ipſa interim æqualis temperata per totum morbi tempus, interim inæqualis, modo parva, modo aliquantulum aucta obſervatur. Quæ vero non in principio apparet, ſed poſtea in die critico cum ſignis decretoriis, criſin prænuntiat, aut febris continuæ mutationem in intermittentem. Cum malis vero ſignis, perpetuo mala, peſſimaque in die decretorio eſt frigiditas intenſa, diu durans. Itaque extrema refrigerata, vix recaleſcere, letale eſt. De quibus Hippoc. *in* 1. *lib. Epidemiorum p.* 980. *lin.* 5. *comment.* 2. *text.* 28. *Frigebant his multum extremitates, ac vix calor his revocari poterat*; atque *in* 3. *lib. pag.* 1085 *E. comment.* 3. *text.* 38. *Extrema pedum ac manuum his frigidiora erant, & multo maxime circa acceſſiones, quibus calor pedetentim, nec probe redibat*. Et de tabidis ad exitium inclinantibus *ibid. pag.* 1089. *E. Multum vero frigus erat, & vix eis calor revocari poterat*. Et *in lib.* 1. *Prorrheticorum* 65. *Ex rigore refrigerationes, quæ non recaleſcunt, malæ*. Quod in *Philiſco* Hippocr. *Epidem.* 1. *text.* 18. *pag.* 966. *Ægr.* 1. obſervavit, de quo ait: *Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem iſtæ amplius redibant*. Quod & *Sileno lib.* 1. *Epidem. pag.* 969. *Ægrot.* 2. & aliis eveniſſe ante exitium Hippocrat. in *Epidemiis* memoriæ prodidit. Frigiditas vero in proxime moribundis non ſecus quam in marmoreo lapide obſervatur, atque non raro cum duritie & livore. Durities ſiquidem cum vehementi frigore in corporibus ex letalibus ſignis habetur, ut *in Prorrheticor. lib.* 1. 77. docetur, de qua Galen. *in comment.* 2. *text.* 5. *Refrigeratio autem ſi ita violenta fuerit, ut tota omnino refrigerentur corpora, indureſcantque, exſtinctionis ſignum exiſtit*. Non minus cum ea frigiditate extrema livida ſpectari, exitioſum eſt; etenim hoc ſymptoma omnium eſſe exitioſiſſimum, alias demonſtrabimus, atque in foribus mortem denotare. Significat autem in his lividus color exſtinctionem caloris nativi, ut Galen. docuit, qui *in* 3. *Epidem. text.* 8. extremarum partium frigiditatem, una cum lividitate, in febribus acutis, mortis apertum eſſe ſignum affirmavit. De quibus Hippocr. *in ſecundo Prognoſtic. pag.* 39. *lin.* 36. *& ſeq. Si corpus adeo grave, & ut ungues ac digiti lividi ſint, expectanda continuo mors*. Et poſtea, *Si digiti ac pedes omnino nigreſcant, minus peſtiferi ſunt, quam ſi liveant*. Idque non immerito, nam lividitas in his partibus ſemper ab exſtinctione caloris nativi fit, nigredo non ſemper, quandoque enim a nigro humore ad illas partes decumbente. Quare cum extremarum partium refrigeratione lividitas quoque ſi acceſſerit, ſignum erit maxime letale, paulloque poſt exitium futurum, præmonſtrabit. Quod Hippocrat. in *Philiſco*, *lib.* 1. *Epidem. pag.* 966. *Ægrotant.* 1. *Sileno*, *ibid pag.* 969. *Ægrotant.* 2. *muliere anginoſa apud Ariſtionem decumbente lib.* 3. *Epidem. pag.* 1075. *Ægrotant.* 7. *Eraſino*, *lib.* 1. *Epidem. pag.* 984. *Ægr.* 8. *Filiæ Eurianactis*, *lib.* 3. *Epidem. pag.* 1073. *Ægr.* 6. *Adoleſcentulo*, in foro mendacium, *ibid. p.* 1076. *Ægr.* 8. moribundis obſervavit. Sitis quoque intenſa cum calore vehementi in thorace, vel in ventre, extremis quidem partibus algentibus, maxime perniciosa judicatur, quod in viſceribus vehementiam inflammationis, ut ait Galenus, ſignificet, qui *in* 7. *Aphoriſm.* hujuſmodi ſymptomata accidere magnis viſcerum inflammationibus ſcribit. Quam rem Hippocr. prodidit in 2. *Progn. pag.* 39. *lin.* 30 dicens: *Si caput ac pedes frigidi ſunt, ventre coſtiſque calentibus, malum*. Et Galenus in commento ait, *nedum malum hoc eſſe, ſed letale*. Quod Cornelius Celſus ad unguem ſic expreſſit: *Cui febre æque non quieſcente exterior pars friget, interior ſic calet, ut etiam ſitim faciat, letale*. Ex perniciosis quoque ſignis cum refrigeratione extremorum quam plura alia exiſtunt, partim a nobis alias dicta, & partim inferius ſuis locis dicenda, cujuſmodi ſunt, capitis aut viſcerum do-

Extremorum frigiditas una cum malis ſymptomatibus exitioſa.

lor

lor vehemens & assiduus, vigilia, coma, delirium ferinum vel obscurum, amentia, oblivio, surditas, cæcitas, convulsio, tremor, aphonia, singultus, inquietudo, anxietas, respiratio difficilis atque frigida, ex ore præsertim, atque e naribus, urinæ turbidæ non clarescentes, nigræ, cum nigro suspenso, albæ, aquosæ, lucidę, interceptęque, stillę sanguinis e naribus, vomitus virulenti, dejectiones malę ac copiosę, nihil conferentes, & hujusmodi alia. Hęc singula cum extremorum frigiditate conspecta exitium nobis portendent, & quo plura simul, eo certius ac citius. De his in *Sileno* Hippocrat 1. *Epid. pag. 969. Ægr. 2. Sexto caput parum exsudavit, extremitates algebant, livescebant, multum sese jactavit, alvus nihil excrevit, urinæ restiterunt, febris acuta*: Et de *Pythione* in Thaso mortuo *lib. 3. Epidem. p. 1098. Ægr. 3* decem diebus: *altero die sub meridiem extremæ partes frigebant, pręter ceteras manus & caput, obmutuit, voce defectus est, diu brevi spirans, rediit calor, sitiit: nocte quievit, circa caput modicum sudavit*. Ex omnibus vero his signis diximus perpetuitatem refrigerationis, magnitudinem seu vehementiam, duriem, lividitatem signa esse longe omnium maxime pernicioſissima, extinctionemque caloris nativi denotare. A symptomatis etiam, quę prœcesserunt, exitii prognosticum indagatur, ut quando a rigore frigescunt eę partes, minime recalescentes, de quibus dictum est, *in Prorrhet. lib. 1. 65. Ex rigore refrigerationes, quæ non recalescunt, malæ*. Ex malis vacuationibus extrema admodum algere, est pernicioſum: præsertimque si eæ quoque fuerint letales, quales sunt stillæ sanguinis e naribus, sudores frigidi, in capite desudationes, urinæ aquosæ, lividæ, ictericæ, turbidæ non residentes, lividæ, nigræ cum nigro suspenso, & plane suppressæ, dejectiones pingues, liquidæ, valde fœtidæ, assiduæ, vel in immodica copia exeuntes; sputa nigra, livida, viscida, maxima difficultate educta, atque plane intercepta. Similiter ab omnibus malis symptomatis, quæ nuper, dum mala symptomata recensuimus, prodidimus, refrigeratio in extremis est pernicioſa. Quod sane nedum ab his signis malis, quæ præcesserunt, at simul etiam cum refrigeratione concitatis, non minus & ab his, quæ extrema refrigerata sequuntur, cognoscitur. At extremorum refrigerationem multa symptomata exitium cum ipsa significantia subsequi solent. Et quod ad refrigerationem: primum est, si frigiditas ea, primum moderata, mox admodum vehemens atque intensa reddatur, quod, ut ex Gal. meminimus, signum prælanguidæ facultatis existit: secundum quod illa frigiditas numquam amplius aut parum recalescat. De quo in *Philisco* moribundo Hippoc. in 1. *Epidem. pag. 966. Ægr. 1. Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem amplius redibant*. Et in Sileno *pag. 969. Ægr. 2. Septimo obmutuit, extremæ partes non amplius redierunt ad calorem*. Demum pars vehementer refrigerata livescit, atque aliquando indurescit; quod si fiat, diuque permaneat, in foribus, ut dictum quoque est, scito esse exitium. Idem prædicant subsecuta, & coma, amentia, oblivio, surditas, cæcitas, convulsio, tremor, aphonia, sudores frigidi, præsertim in iisdem extremis partibus refrigeratis, qui sane solius syncopes ac mortis proprii videntur, vacuationes non bonæ, ægros non sublevantes, vel interceptæ, respiratio difficilis, atque alia hujusmodi, quorum multa in *Sileno* moribundo Hippoc. post extremorum refrigerationem observavit, quę hisce verbis expressit: *Sexto caput parum exsudavit, extremitates algebant, livescebant, multum sese jactavit, alvus nihil excrevit, urinæ restiterunt, febris acuta. Septimo die obmutuit, extremæ partes non amplius redierunt ad calorem, nihil minxit. Octavo frigidus toto corpore sudor, papulæ cum sudore rubentes, rotundæ, parvæ, varis similes permanebant, nec abscessum efficiebant, alvus parvo irritamento stercora tenuia, veluti incocta, multa, cum labore reddidit; urinas reddebat cum dolore mordaces; extremæ parum recalescebant; somni tenues, comatosi; obmute-*

Extremorum frigiditas cum malis subsequentibus symptomatibus exitiosa.

mutescebat; urinæ tenues, perlucidæ, obiit undecimo. Quare si extremorum refrigerationem pernicioſa hujuſmodi ſymptomata, vel prȩcedant, vel ſimul illuceant, vel ſubſequantur, ſine dubio exitium prędicendum erit.

CAP. XVI.

De caloris ad frigus, & frigoris ad calorem in corporibus acute ægrotantibus mutatione.

Corporum ad frigidum mutatio quando mala.

SÆpe in acutis morbis fit, ut interim totum corpus a calido ad frigidum, & a frigido ad calidum mutetur, atque hoc aliquando ſenſim, & aliquando repente. Repente mutari ad frigidum corpora, niſi acceſſione id fiat, ſemper malum: aut enim, ut nuper dictum eſt, calorem nativum reſolutum, aut multitudine crudorum humorum ſuffocatum, vel impeditum; quo minus, vaſis obſtructis, foras expandatur, vel denique maligni humoris viſcus nobile laceſſentis, vel vehementis inflammationis ratione intus totum collectum eſſe ſignificat. Reſolutum conjicimus, ſi prius reſolutionis aliqua cauſa præceſſerit, uti febris vehemens, aſſidua, vigiliæ item aſſiduæ, dolores ingentes, immodicæque vacuationes quum ſanguinis, tum humorum. Suffocari plenitudo indicabit, crudorum humorum multitudine, venas arteriaſque obſtruente. Foras non expandi, notæ omnes hanc humorum multitudinem ſignificantes. Intus vero acri vel maligno humore os ventriculi, cor, vel aliquod aliud membrum nobile affligente, retrahi, dolores juxta afflictæ partis regionem, faſtidia, angores, nauſeæ, vomitus virulenti, bilioſi, animi defectiones, anxietates, vigiliæ, pulſus ſumme inæquales, prælanguidique, contracti, ac hujuſmodi alia prȩmonſtrant, uti in iis, quibus a vermibus, vel acri ſucco, os ventriculi mordetur, obſervari poteſt. Ubi retractionis caloris cauſa eſt inflammatio quȩpiam interna, ex calore partium internarum, atque a propriis ſignis cognoſcemus, quod Cornel. Celſus ex Hippoc. ut ſuperius diximus, expreſſit, quum dixerit: *Extremarum refrigerationem internis partibus ſic caloris incendio æſtuantibus, ut ægroti ſitiant, eſſe letalem.* Hęc namque refrigeratio inflammationem internam, & eam quidem maximam pro cauſa habet. Quocumque vero modo, ut diximus, corpus refrigeretur, numquam bonum, ſed ſępius ſumme exitioſum erit exiſtimandum, omniumque maxime, ſi diutius frigus perſiſtat intenſiuſque, & tandem cum duritie, vel lividitate, uti dictum eſt, prodeat. Nam tunc in foribus eſſe exitium denotabit. Continuo etiam ſeu repente partes calidas refrigerari, ſemper malum, illa excepta extremorum refrigeratione, quȩ, natura critice humores ad excretionem invadente, prodit; ſępe enim ante crifin futuram, maligno humore ad viſcus nobile irruente, atque defluxo, refrigerantur extrema, qui exinde a natura aliunde ad ignobiliorem partem compellatur, fere numquam ea tollitur in extremis refrigeratio aut tarde, & parum quidem partes eæ refrigeratę recaleſcunt. Contra refrigerata corpora ęque ſenſim ad calidum mutari, optimum eſt: nam neque intus laceſſere malignum, vel acrem, humorem nobile viſcus, neque aliquam adeſſe inflammationem, & nihil intus fieri impedimento calori, quin ad quamcumque partem corporis ęque defluat. Inæqualiter vero corporis partes calefieri, numquam bonum, & ſæpe peſſimum ſymptoma creditur. Repente etiam ſæpius extimas corporis partes, crebriuſque modo ad calidum, modo ad frigidum, & contra modo ad frigidum, modo ad calidum permutari, in malignis morbis peſſimum eſſe, Hippocrat. ſtatuit, veluti etiam minus malum exiſtimatur, in aliis ſymptomatis etiam conſimiles fieri mutationes. De his auctor *Prorrhet. l.* 1. 43. ita habet: *Summæ corporis partes ſi celeriter in utram-*

Corpora refrigerata ęque ſenſim ad calidum mutari.

que conditionem permutentur, malum. Sitis quoque hujuſmodi mala eſt. Et Gal. in *commento* ait. In morbis autem ſumme malignis, permutatio harum hora una ad contraria efficitur, interdum quidem ut hieme frigeſcant, interdum vero tamquam æſtate caleſcant. Id autem contingit quum propriam caliditatem non habuerint, atque a febrili calefiant, quæ a corporis medio incipiens, flammæque ſimilis corpus totum depaſcens, extrema concalefacit, quæ & quum tranſpiraverit, ſtatim ea refrigeſcunt, extincta ſcilicet naturali caliditate. Hujuſmodi vero corporis cleres caloris frigoriſque mutationes, item coloris, ac cujuslibet alterius ſymptomatis, ſæpe multiplices affectus in corpore collectos præmonſtrant, quos devincere natura quum nonniſi longo tempore queat, ideo morbi longitudinem oſtendunt, quod *in 4. l. Aph.* 40. ab Hippoc. hunc in modum ſcriptum eſt: *Et ubi in toto corpore mutationes, ut ſcilicet corpus refrigeretur, vel rurſus caleſiat, longitudinem morbi ſignificat.* In morbo vero acutiſſimo ac vehementi naturæ cito a vehementia morbi extinctæ tempus ſubtrahitur, ita ut prius ipſa morbo extinguatur, quam morbum vincere poſſit. Et hinc eſt quod in morbo ſumme maligno hujuſmodi mutationes Gal. *in Prorrhet.* dixit eſſe letales, eaſque extinctione naturalis caliditatis fieri. Aliorum etiam ſymptomatum mutationes obſervari, ut ſitire & non ſentire, & contra; ex quietudine in inquietudinem & contra; ex vigilantia in ſomnum, & contra; ſapientes ægrotos in deliros, & e deliris ſapientes fieri. Mutari etiam ſymptomata, ita ut modo capitis adſit dolor, modo ventris, modo crurum, modo dolor deſinat, & delirium accedat, & hoc ceſſante, aliud ſymptoma appareat. Horum ſymptomatum permutationis cauſa generalis eſt μετάπτωσις, ideſt humorum transfluxus; viciſſim namque facta migratio modo in hanc corporis partem, modo in illam, quaſi humoris turgentiam hanc, μετάπτωσιν dicas, quæ per ſe ſola nullum aliud, quam turgens humor faciat, prognoſticum denotat. Verenda vero ſemper quælibet humoris turgentia, quod principis alicujus partis læſionem minatur, ex quo Hippocr. atque cum eo Galen. & omnes alii Medici, turgentes humores, ne irruant in partem principem, continuo vel etiam in principio morborum, quo tempore omnia cruda exiſtunt, medicamentis purgari oportere, in *aphoriſmis Hippoc. Aph. Sect.* 1. 22. præceperunt. Cum ſignis vero coctionis illa permutatio caloris, frigoris, coloris, & aliorum etiam ſymptomatum, criticam humorum perturbationem oſtendit, atque in hunc ſenſum forte *in Coac. præſ. text.* 125. illud erit intelligendum, quod ſic ſcriptum eſt: *Color, qui ſæpe cum calore variat, utilis.* In malignis morbis hæ mutationes ſolent eſſe utiles, ſi in melius fiant, quod Hippoc. *in Epidemiis lib. 5. ſect. 6. text.* 16. ita dixit, *In morbis, qui* παλίμβολοι, *ideſt, doloſi ſunt, mutationes juvare.* Foeſius ſcribit ἐν τοῖσι παλιμβόλοισιν & vertit, *inconſtantibus*, aut *refractariis.*

Caloris frigoriſque celeres mutationes.

Symptomatum mutationes quid notant.

Harum cauſa generalis.

CAP. XVII.

De prædictione ex humiditate corporis, & ſiccitate.

EX humiditate totius corporis, atque partis, ſæpius in acutis morbis eventus præſcimus. In purulentis phthiſiciſque, ſæpe ante exitium multa humiditatis copia aliquando totum corpus, & aliquando crura, ventremque repleri obſervamus, ex quo aquam inter cutem, quod ex magno oriatur caloris languore, in acutis, vel ex acutis morbis, letalem eſſe, Hippoc. docuit: *Aqua enim inter cutem,* (ait *in Prognoſticis pag. 39. lin.* 16.) *omnis, ſi ex acuto morbo exiſtit, mala eſt, non enim ſedat febrem, ſed dolorem admodum infert, ac mortem.* Eodem modo ſiccitas, ariditas, duritieſque totius vel alicujus partis corporis ſæpe infelicem morbi præſagit eventum. Siccitatem ſiquidem totius,

Humiditas quid præſagit in morbis.

Siccitas quid in morbis notat.

tius, & gracilitatem ab ardente febre longa secutam, corporis hecticum habitum, ac ab eo postea exitium præsagire, nemo est in medicina versatus, qui ignoret. Ex fronte, lingua & aliis partibus admodum siccatis, non raro nobis exitium præmonstratur, ut Hippoc. in *Melibæa lib. 3. Epidem. Ægr. 16. pag. 1117. adolescente* moribundo observavit, in quo ante mortem cutis frontis præarida, ac tensa visa est. Sed de his accuratius nos posterius suis locis, præsertimque ubi de predictione ex partium corporis observatione sermonem instituemus.

CAP. XVIII.

De prædictione ex doloribus, qui in acutis morbis observantur.

Dolor multiplex observatur in morbis.

DOlorem, quod voluptati opponatur, tristem molestumque esse sensum; Galen. *in 1. de Elementis* docuit. Hic vero multiplex observatur, alius enim cum pulsu, alius cum ponderis incumbentis sensu, alius cum tensione, alius cum erosione, incisione, punctione, perforatione (quæ differentiæ subacuti doloris nomine comprehenduntur.) alius denique cum torpore affligit.

Pulsativus quis.

Primum Medici appellant pulsativum, qui ut Gal. *in 2. lib. de loc. affect. c. 3.* scribit, sequitur inflammatorios affectus notatu dignos, idque semper in ipsis arteriis, atque in partibus ipsas continentibus, quas & ob angustiam premunt, & quum attolluntur, modo pars affecta sentire nata sit, veluti percutiunt. Nonnumquamque in absessibus ad suppurationem venientibus dolores cum pulsu observantur.

Gravis.

Secundum gravem vocant, quod veluti cujusdam ponderis loco incumbentis sensum invehat, atque carnosæ substantiæ renum, hepatisque, inflammationem. (Gal. *in 6. Aph. Aph. 5.* docente.) Talemque dolorem renum esse proprium Hippoc. *Epidem. l. v. sect. 1. text. 5.* nobis prodidit, & Gal. *in 2. de loc. affect. c. 4.* hos dolores in renibus, in hepate, in splene, in cute, in adenis & in pulmonibus fieri meminit, eæ siquidem partes (ut ipse docuit) vexantur eo dolore a distensione, quoniam membrana viscera illa circumvolvens gravata, & distenta dolet.

Tensivus.

Tensivum vero dolorem dicunt, (quem distendentem *Archigenes* vocat) ubi partes, quæ vel sunt nervosæ, vel musculosæ, vel membranosæ distenduntur, convellunturve. Quod ipsis, vel ex humore, vel ex flatulento spiritu, vel phlegmone accidit.

Acutus.

Quartus, qui acutus vocatur, comprehendit illum, qui fit exesione, punctione, perforationeque: quæ nimis aut acria, aut salsa, abstergunt, abraduntque ex quo acutus oritur dolor, qualem patiuntur dysenterici atque alii, quibus exeduntur aliquæ partes.

Punctorius.

Punctorii proprii membranarum existunt, ab acuta bile vexatarum, quales in pleuriticis observamus, pleura quippe vocata membrana in his a bile inflammata. His similes videntur, quum vitreo humore, partes incidente seu perforante, intestina concitantur.

Cum torpore.

Cum torpore demum prodientes, seu torporem inducentes, vel ab ipsorum vehementia resoluto partis calore, aut phlegmone arterias nervosque maxime comprimente, ex quo calor ad partes prosilire nequit aut paucus, uti in renum dolore, ex inflammatione orto, crura sæpius stupescunt.

Dolores varii.

Sunt præterea dolores alii fixi, alii mobiles, atque vagantes, quales non raro turgentibus humoribus observamus, alii perpetui, alii intermittentes, alii vehementes, atque alii parvi existunt: rursumque nonnulli in principio morbi, atque alii postea apparent, aliquando in die decretorio, & aliquando non: quorum etiam aliqui occupant externas partes, aliqui internas, aliquique nobiles, atque demum ignobiles aliqui. Has omnes dolorum differentias ad Prognosticum ægrotorum plurimum facere, Gal. *in l. 6. Aph. 5.* meminit. Dolores vero omnes

Unde.

fieri ex qualibet re parti noxam inferente, non opus est, ut demonstretur.

Gal.

Gal. qui accuratius omnes dolorum causas cognovit, pluribus in locis ab altera duarum eos concitari tradidit, quippe aut a subita partis alteratione, seu a temperamento continuo parti illato, aut ab unitatis dissolutione. Alii unam tantum causam faciunt, scilicet unitatis solutionem, quando neque caliditas, neque frigiditas dolorem concitat, ni solvat continuum, atque omnes immodicas qualitates ii ex Gal. continuum solvere affirmant. Ipse sepius fatetur ac docet qualitates has solvere continuum, præsertimque *in 4. de simp. meden. facult. c. 2. in 3 de fract. in text. 34. & in libro de inæquali intemp. cap. 6.* Ex quo mirum dicerem. Quare dolorum causa erit continuitatis partium solutio, aut ab immodico temperamento confertim parti illato, aut ab incisione, aut exesione, aut a fractione, aut denique a tensione, facta. Partes vero internæ dolent interim propter febris vehementiam, nervosas partes siccando convellendoque, aut propter inflammationem, aut erysipelas, aut fortem obstructionem, aut abscessum in visceribus, aut propter flatulentum spiritum. Quum vero ab istis causis dolores fiant, merito, nedum cum aliis morbis, at soli quoque mali sunt; omnes siquidem vires resolvunt, cruditates fovent, humorumque coctiones impediunt; pessimi, in visceribus partibusque nobilibus concitati; longeque omnium pernicioſissimi existunt, vehementer viscera vexantes, perpetuo longoque tempore durantes, a quibus viscerum nativus calor destruitur, seu resolvitur, quo ademto visceri quis de aliquo bene sperare potest? minus mali censentur, parvi, mobiles, brevi tempore durantes, quique neque a viscerum quopiam læso prodeunt, sed ab ignobili potius parte quapiam. Quandoque vero in acutis morbis dolores, etsi suapte natura semper mali, bonum prædicunt, non parumque ad salutis prædictionem conferunt, veluti qui, in aliquo dierum judicatoriorum cum signis coctionis, aliquam ignobilem partem, uti crura, pedes ac alia hujusmodi, pervadunt. At de bonis ac malis doloribus, quatenus in acutis morbis bene ac male de ægrotis sperandum, significant, nunc accuratius agamus.

Omnes mali sua natura.

Aliquando boni.

CAP. XIX.

De doloribus salutem prædicentibus.

DOlores aut in principio morborum, vel postea apparent; qui in principio, plerumque pathognomicorum signorum rationem habent, viscusque phlegmone obsessum notant, uti quando dolor cum febre, timore vel tensione partem quampiam exerceat, inflammatoriique hi vocantur dolores. Optimum erit, si neque admodum vehementes, neque assidui dolores sint, brevique tempore, vel tollantur, vel saltem remittantur, atque simul cum ipsis aliud exitiosum signum non illuxerit. Qui vero horum fidelius, seu cum ratione, tolluntur, seu finiuntur, aut remittuntur, optimi sunt: cum ratione vero sublatos dicimus, ubi ipsi ex optima, aut natura, aut ab arte facta evacuatione, remiserint, aut plane finierint, ut quum vel ab emisso per venam sectam sanguine, vel sponte erumpente e naribus, vel a sudore, vel ab alvi dejectione, vel a sputis dolor remittitur, atque etiam si febris eos subsecuta suo calore ipsos resolverit: de quibus Hipp. *in 6. Aph. 40. Quibus dolor circa hypochondria fit absque inflammatione, his febris superveniens morbum solvit.* Et postea *7. Aph. 52. Quicumque hepar circumdolent, his febris superveniens solvit dolorem.* De iis vero, qui ex aliqua vacuatione tolluntur *in Prorr. l. 1. 152.* sic ait: *Quibus capitis dolores, cervicis labor, atque totius corporis cum tremore infirmitas, hæmorrhagica solvunt. Ceterum & tempore ita solvuntur:* & in 2. Progn. *p. 40. l. 26. Dolorem, qui in iliis affligat, ac tuberculum si recens fuerit, nec cum inflammatione, solvit murmur incidens circa ilia, sed potis-*

Dolores quinam optimi.

simum

ſimum ubi cum ſtercore, & urina excernatur; & in 2. Coac. præſag. *text. 66. Quibus in febribus dolores lateris fiunt, iis, alvo multa aquoſa bile permiſta dejiciente, remiſſio eſt.* Poſtea *in* 5. Coac. præſ. *text.* 172. *Capitis dolorem ſolvit pus per nares effluens, ſputa craſſa, & ſine odore, ſolvit quoque ulcerum eruptio aliquando & ſonus, & alvi profluvium.* Ac in Aph. Sect. 6. 10. *Quibus capitis dolor gravis cum calore ineſt, e naribus interin humidum, ex auribus, atque ex faucibus, cum utilitate effluere*, veluti *Echecrati* contingit. De quo *in 7. lib. Epid. text.* 65. ſic ſcribit: *Echecrati cæco capitis dolor gravis, præcipue in poſteriori parte, & cervicis, ubi connexio, & in verticem procedebat, progrediente autem tempore, & ad aurem ſiniſtram, & dimidium capitis dolebat. Mucoſa ſemper prodibat, leniter combuſta, & calor comitabatur tenuis, & cibum capere non poterat, interdiu facilius, noctu vero dolebat, poſtquam autem pus per aurem erupit, ceſſaverunt omnia, erupit vero per hiemem.* Hinc Hippoc. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 34. damnavit excreationes omnes, morbum non tollentes, aut non minuentes, præſertimque illas, quæ dolorem non ſedant. veluti ſedantes dolorem laudat. Quare dolores, qui cum ratione, ſcilicet ex quibuſdam optimis vacuationibus, abeunt, optimam ſalutis ſpem nobis pollicentur. Qui vero non tolluntur, ſeu diu perſiſtunt, ſæpius abſceſſus prænuntiant; qui autem boni exiſtunt, poſterius, quum de ipſis præſertim agemus, dicemus; hoc unum in præſentia dicam, quippe illos bonos fore a nobis putandos, qui in ignobilibus partibus fiunt, dummodo etiam alia ſigna id non negaverint. Eorum vero dolorum, qui morbo progreſſo oſtenduntur, illos optimos eſſe dico, quos judicatorios ſeu decretorios Medici appellant, utpote quod partim ut ſignum, & partim ut cauſa, criſin optimam denuntiant, ut ſignum, veluti dolores, ſanguinis eruptionem, vomitum, vel aliquam aliam vacuationem indicantes. De quibus Galen. in 1. *Epid. comm.* 2. *text.* 55. *In ardentibus autem, ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, & hypochondrii etiam contentio, neque cum dolore corripit, his e naribus ſanguis erumpit. At vero quibus totius capitis gravitas, tum autem cordis dolores, & faſtidia ſunt, bilioſa poſt ac pituitoſa vomunt.* Et Hippocr. in 3. Prognoſt. *pag.* 44. *lin.* 36. *Si vero ſine talibus* (ſcilicet malis) *indiciis fatigans dolor vigeſimum tranſeat diem, & febris detineat, exſpectari oportet ſanguinis eruptionem e naribus, aut ſuppurationem, ſi dolor alioqui circa tempora ac frontem affligat.* Et *in* 3. Prorrhet. *lib.* 1. 137. *Cervicis dolores, impenſe rubri oculi, ſanguinis eruptionem oſtendunt.* Et *ibid.* 142. *Quibus ex rigore febres laborioſæ fuerint, muliebria his decurrunt, cervix autem in his dolens ſanguinis indicat eruptionem.* Ac etiam poſt *ibid.* 147. *Hypochondrii tenſio cum capitis gravitate, & ſurditate, & quæ conſequenter fatigant, ſanguinis prænuntiant profuſionem.* Et in 4. Coac. præſ. *text.* 142. *Quibus febricitantibus rubores in facie, & capitis vehemens dolor, venarumque pulſus, iis ut plurimum fluor ſit ſanguinis.* Hique ſunt dolores, qui optimam criſin denotantes maxime faciunt ad ſalutis Prognoſticum. Longe omnium vero optimi exiſtunt, qui (hos enim decretorios Medici, ut cauſa, vocant) ignobiles partes, atque a viſceribus remotas, prævadunt, atque diu exercent; idque maxime (quod de aliis quoque intelligi volumus) apparentibus ſignis coctionis, qui in decretorio die cœperint. Ab his quidem doloribus certam ſalutem præſagimus, ſi modo, ut dictum eſt, coctionis ſigna una illuxerint, nullumque ex letalibus ſignis illuxerit. Naturam enim præcipua membra exoneraſſe, atque noxios humores procul a ſe protruſiſſe, nobis ſane non obſcurum erit indicium. Quo enim longius a principe membro natura propellit noxios humores, eo citius ſalus ſperanda, maximum naturæ quod robur denotet, exinde ſæpius tumores ipſi accerſunt, qui, ut inferius docebimus, optimi exiſtunt. De his Hippoc. *in* 1. *progn. pag.* 43. *lin.* 18. *Abſceſſus autem, qui ad crura*

Quinam abſceſſus prænuntiant.

fiunt

fiunt in pulmoniis vehementibus ac periculosis, omnes utiles sunt. De quibus Galen. *in comm.* ait, eos optimos esse, si maxime deorsum & quam longissime ab ægrotatione absistant. Et in 3. *Coacorum præsag.* 118. & *Aphor.* 44. *sect.* 4. *in longis febribus vel tubercula, vel in articulis labores fiunt, & si fiant, non inutiles.* Ex quo pedum, crurum. genuum, coxendicum, inguinum dolores diu durantes, optimi erunt, atque non minus etiam in brachiis, manibus, atque post aures, critice observati. Sæpe fit in febribus acutis, ut natura, parte humorum, quos ad aliquam supradictarum ignobilium partium expulit, exonerata, fortior supra residuum facta, aliquam vacuationem aggrediatur, ex qua postea atque doloribus ipsis, trahentibus continue ad ignobilem partem, perfecte a febre judicat. Plerumque vero fit, ut hi, qui doloribus judicantur, in recidivam recidant, quod neutiquam materia illa ad crura, vel ad aliam quampiam ignobilem protrusa, totam causam morbificam adimat; si vero illis copiosæ copulentur vacuationes, judicium totum perficietur: oportet vero partes illas, si debeant ad febrem juvare, vehementer atque diu dolere; siquidem tales dolores plurimum humoris noxii attrahentes, magnam quidem cau æ partem revellendo adimunt, ut in *Herophyto* observatum est, de quo *in* 3. *Epid. pag.* 1106. *Ægr.* 9. Hippoc. *Circa diem sexagesimum e naribus quidem subsiterunt eruptiones, sed dextra coxendix admodum dolebat, febresque increverunt, haud multo post partes inferiores omnes dolebant, fiebat autem, ut vel febres majores essent, majorque surditas, vel hæ quidem remitterentur allevarenturque, verum partes inferiores ad coxendices sitæ vehementius dolerent. Jam vero circa diem octuagesimum cuncta remissa sunt, nihil tamen destitit, etenim urinæ boni coloris, & copiosiores subsidentias habentes, extiterunt, deliriaque imminuta sunt.* Et *uxori Epicratis Epidem. lib.* 1. *p.* 979. *Ægr.* 5. crura decima die laborioſe doluerunt, quem dolorem altera die optima vacuatio, per sudorem secuta, febrem allevavit. Hoc unum in iis doloribus notandum, quod nuper quoque diximus, dolores raro recte judicare morbos per se ipsos, nisi ipsis aliæ humorum vacuationes opem ferant, atque hinc eos, qui doloribus judicantur, recidivare, quia dolores totam noxiam nequeunt a visceribus avellere, sed tantum partem, ex quo reiterari pugnam a natura, si totum morbum expugnare debeat, necesse est. Hinc multæ recidivæ, uti in *uxore Epicratis, loco ante allegato, Cleonactide lib.* 1. *Epidem. pag.* 982. *Ægr.* 6. *Abderæ Virgine lib.* 1. *Epidem. pag.* 982. *Ægr.* 7. Hippoc. 3. *Epid. text.* 79. accurate observavit, de qua præsertim dixit: *Vigesimo ei pedes dolebant, surditas & delirium eam deseruerunt, aliquantum e naribus erupit, sudavit, febre fuit liberata. Quarto & vigesimo repetiit, rediit surditas, pedes assidue dolebant, mente excidit. Vigesimo septimo multum sudavit, febre caruit, surditas eam reliquit. Restabat pedum dolor, ceterum fuit exacte judicata.* Hypochondrium etiam sinistrum, atque lien in acuto morbo dolere atque intumescere, non inutile esse, Gal. *in* 3. *Epid. com.* 1. *text.* 19. meminit. In ventre vero inferiori, acrioribus intestinis commorsis, dolores concitati, sæpe judicium per alvum futurum significant: post aures etiam oborti dolores diu perseverantes cum virium robore criticum tumorem futurum (quem *parotidem* vocant) denotant. Optimi vero non minus ii erunt dolores, qui supernas sedes derelinquentes, inferius descendunt, ad inferasve delabuntur. Morbum enim quocumque modo longe a principibus partibus recedere, optimum est. De quo Hippoc. *in* 2. *Epid. sect.* 5. *text.* 10. *p.* 1040. *lin.* 16. *Si caput doleat, in pectus descendit, deinde in hypochondrium, deinde in coxam, omnia autem non possunt dolere.* Et *in* 3. *Prorrhet. pag.* 114. *Dolores, si ad infernas dilabuntur partes, facile ab iis feruntur.* Ut in *Herophonte* fuit observatum, de quo Hippoc. *in* 1. *Epidemiorum pag.* 974. *Ægr.* 3. *Octavo febricitavit, lien residebat, omnia intelligebat, doluit ei inguen primum se-*

cun-

cundum lienem, deinde in utramque tibiam dolores. Noctem facilem habuit, urinæ erant melioris coloris, & residebant in iis pauca. Die nono sudavit, judicatus est, intermist. Die quinto rediit, simulque splen intumuit, febris acuta, surditas iterum, post recidivam die tertio, residebat lien, imminuebatur surditas, crura dolebant, recte sudavit, judicatus est die decimoseptimo. Atque hæc de bonis doloribus, de quibus, ut boni sint dicendi, hæc observari debent; primo eos in aliquo decretoriorum dierum incipere cum signis coctionis, ipsosque vel sequi, vel antecedere optimam evacuationem, vel per sanguinem, vel per vomitum, vel per ventrem, vel per urinam, vel per sudorem, vel per sputum: demum si boni sint, ab ipsis vel statim vel paullo post ægrotos melius se habere, vel ex toto sanari, est necessarium. Adde quod hi omnes, non parvi, at quidem magni ac laborioſi existunt, neque paullulo momento temporis cessant, ac tolluntur, sed quinimmo diu vigere debent. Sed jam ad illos, ex quibus præscitur exitium, descendamus.

CAP. XX.

De doloribus exitium prædicentibus.

Dolores quinam mali.

MAli omnes sunt dolores nobilem partem corporis exercentes, tum qui una cum morbo prodeunt, quique pathognomonica signa existunt, tum qui postea apparent; ii enim cum aliis signis pathognomonicis, seu propriis, prognosticum indicant, veluti in phrenitide capitis dolor vehemens atque assiduus, cum aliis phrenitidis signis propriis exitiosis, letalis est; sed de his aliis accuratius, quando de singularum inflammationum prognostico sermonem habebimus. Sunt vero ex his aliqui ex partis præstantia, qui plerumque exitium inferre soleant, utpote qui cor invadunt, os ventriculi, fauces strangulantes, caput, aures, pectus, ac vesicam. Semper enim in hisce membris dolores sunt pernicioſi, maximeque cum febre assidua atque aliis sævis symptomatibus, ex quibus phlegmone illarum partium significatur, qui plerumque letalis existit. De quo Hippoc. in 4. *Aph.* 64. dixit: *In febribus circa ventriculum fortis æstus, & oris ventriculi dolor, malum.* Et *Aph.* 65. *in acutis febribus convulsiones & circa viscera dolores fortes, malum.* Ac de faucibus *in Pror. text.* 86. *Fauces dolentes absque tumore cum implaciditate, strangulantesque supra modum, perniciosæ.* Et 3. *progn. Pag.* 45. *lin.* 4. Hippoc. ait hujusmodi dolorem cum orthopnæa, sine apparente in faucibus vel collo tumore, summe exitiosum: ex tali siquidem dolore gutturis internam atque magnam inflammationem, ut alias quoque dicemus, significari, Galen. *in com.* docuit, quæ sine dubio letalis est. Capitis item assidui, vehementesque cum febre continua ac magna dolores admodum sunt timendi; hi siquidem vires resolvunt, vigiliasque & deliria, inducunt, atque demum convulsiones letales. De quibus Hippoc. *in Progn. pag.* 44. *lin.* 34. *Capitis dolor vehemens, & continuus cum febre, si quod ex indiciis extiterit exitiosus, letalis admodum est*: quales Hippoc. *in Philista Epid. lib.* 3. *pag.* 1070. *Ægr.* 4. *Polyphante Epid. lib.* 7. *text.* 120. *pag.* 1238. atque *Evalcidæ famula* phreniticis observavit *ibid. text.* 121. De aurium vero dolore in eod. *lib. Prognostic. pag.* 44. *lin* 45. *Aurium dolor acutus cum febre continua, ac vehementi, difficilis est, periculum enim delirii abolitionisque imminet.* Et de ventre *in Coacis prædictionibus text.* 130. *A dolore ventris laborioso febris ardens, letale.* Et de pectore *in* 1. *Prorrhet. text.* 70. *Dolor pectoris firmatus, & ægre auferibilis cum torpore, malus, super,*

In partibus nobilibus.

Capitis assidui vehementes.

febri-

febricitantes hi ſi acute ardent, moriuntur. Et de veſica *in 2. prognoſt. pag. 43. lin. 42 Coac. præſ. 471. Si veſicca dura eſt, & dolore vexatur, difficilis omnium & exitialis eſt : exitioſiſſima vero eſt, quæcumque cum febre continua affligit, qui enim ex ipſa veſica fatigat dolor, interimere hominem ſufficit*. Quare dolores partium nobilium, ſi magni ſint, in principio morborum acutorum admodum ſunt periculoſi, & cum malis ſignis letales. Qui vero non in principio acutorum, viſcerum ac partium nobilium dolores, ſed poſterius, morbo præ. greſſo, manifeſtantur, ſi magni, aſſiduique ſint, pernicioſiſſimi judicari debent ; nam hi magnam phlegmonem præter febrem de novo nobile viſcus acceſiſſe oſtendunt, quæ nonniſi a robuſtiſſima natura vinci poterit : ex quo merito hos dolores ſæviſſima ſequi ſolent ſymptomata, quippe extremorum frigiditas nonniſi fortem dolorem ſequi ſolet, ut Hippocrat. *in Aphoriſm. 26. Sect. 7.* expreſſit: *In dolore forti ventris, partium extremarum frigiditas, malum*. Deliria ſequuntur dolores capitis, phrenitides letales, vomitus virulenti, convulſiones, abſceſſus & ſuppurationes. De iis *in 1. Prorrhet. text. 10. Qui in capitis doloribus æruginoſos vomitus habent, vigilantque cum ſurditate, cito hi vehementer inſaniunt*. In his etiam vomitus virulenti ſunt letaliſſimi, ut ait Hippocr. in 1. *Epid. pag. ſub finem. Sed & virulenta vomunt, & ex his quidam ſubito moriuntur*. Quod & in 1. *Coac. præſ. text.* 169. & 176. legitur. Convulſiones quoque vel exſiccatis partibus nervoſis, vel attracto multo ad dolentem partem humore, non raro viſuntur, de quibus *in lib. Prorrhet. text.* 115. ait: *In febribus tenuiter exſudantes ; cum capitis dolore & alvo intercepta, ad convulſiones proni ſunt*. Quod & in *Coac. præſ. text.* 154. & 177. iiſdem pæne verbis repetitur. *Et text.* 171. *In acutis capitis doloribus, & torporibus cum gravitate, convulſiones fieri in proclivi eſt*. Adde & *text.* 174. Et *lib.* 1. *Prorrh. text.* 104. *Faucium gracilium dolores ſuffocantes convulſivum quid habent, præcipue ſi ex capite oriantur. Et text.* 106. *Lumborum dolor, & oris ventriculi, cum forti exſcreatione, convulſivum quid habet*. Quibus ex locis Hippocratis & plurimis aliis patet affatim, dolores partium vehementes aliquando excipi a convulſionibus. Abſceſſus autem dolorum quoque ſequelæ ſunt, de quibus in *lib.* 1. *Prorrheticorum text.* 168. ait : *In capitis dolore Coma & ſurditas abſceſſum aliquem poſt aurem eructant*. Suppurationem vero indicant continui dolores, ut Hippocrat. meminit *in 7. Aphoriſmorum* 22. *A ventris dolore diuturno, ſuppuratio*. Et in *prognoſticis, pagina* 41. *lin.* 35. *& ſeq.* dolores, qui circa thoracis ac pulmonis ſedes diu conſiſtunt, quique neque ſputorum purgationibus, neque ventris dejectionibus, neque venæ ſectionibus, neque medicamentis ac victus ratione deſinunt, ſuppurationem ſignificare, dummodo nullum ex exitioſis ſignis adfuerit, nobis Galen. prodidit; ut in *Egiſipolis puero* tabido ab Hippoc. *in 7. Epidemiorum pagina* 1225. *text.* 60. fuit obſervatum. Quare hoc modo dolores viſcerum, ſeu partium nobilium, judicandos fore putamus, quibus ſi aliquod letale ſignum ſimul acceſſerit, vel eos dolores ſequatur, exitium præmonſtrabitur, atque non minus, ſi vel alii fuerint dolores, nobiles partes affligentes, vel alia gravia diverſi generis ſimul illuxerint ſymptomata; hæc enim (quum plures ſimul affectus graves oſtendant) ſimul cum gravi dolore, vel multis doloribus ſi illuceant, perniciem prædicunt: vix unum quidem ſimplicem morbum magnum natura expugnat, quid cum multis? certe ſuccumbet, niſi robuſtiſſima fuerit. De his in 2. *Prorrhetic. lib.* 1. *text.* 38. inquit : *Quibus alvus liquida, laſſitudo, capitis dolor, ſitis, vigilia, obſcuritas & impotentia fuerit, ut hi mente moveantur ſpes eſt*. Et in 2. *Prorrhetic. ibid. text.* 95. *Quibus manus tremulæ, capitis, cerviciſque dolores, ſubſurdique fiunt, & nigra denſataque mejunt, his ventura exſpectare nigra, pernicioſum*. Et de pluribus ſimul nobiles partes eodem tempore occupantibus doloribus in *eodem*

Dolores partium nobilium morbo præ. greſſo quinam pernicioſiſſimi.

Dolores partium ignobilium quinam boni.

lib. 2 text. 72. Stomachi dolor cum hypochondrio contento, dolorque capitis, malignum. Sed jam ad dolores partium ignobilium accedamus, quos superius diximus sæpe bonos esse, modo fiant cum humorum quapiam concoctione, diuque partes illas affligant, neque brevi tollantur, atque ab ipsis febris, ac alia gravia symptomata vel plane tollantur, vel, quod plerumque fit, mitiora reddantur, atque ab ipsis ægroti melius se habeant. Tales vero in diebus decretoriis incipere diximus, nullaque ab ipsis symptomata gravia fieri, neque augeri. Mali vero in ignobilibus partibus in principio morbi, quo tempore omnia cruda existunt, incipientes, a quibus nedum symptomata gravia membrorum nobilium tolluntur, vel mitiora evadunt, at quinimmo magis nova sævissimaque tales dolores sequuntur, obortaque sæviora reddantur. Pessimi vero ii sunt, quos in longinqua ignobilique parte obortos, uti in pedibus, cruribus, genubus, coxendicibus, inguinibus, atque in aliis hujusmodi partibus, febris continua sequitur, graviaque non minus ac sæva symptomata, a quibus ægroti in deterius labuntur. De quibus *in Coacis præsagiis text. 30. Convulsio in febre, manum pedumque dolor, maligna sunt: malignus quoque doloris impetus e femore. Sed nec genuum dolor bonus, ac etiam surarum dolor malignus est, & mentem emovet, tum alias, tum si urinæ sublimamentum elevent.* Quales fuere prorsus in *Critone*, & *Lariſſæ Calvo*, qui eo morbo interiere. De *Critone* enim Hippocrat. *in 1. lib. Epidem. pag. 985. Ægr. 9.* ait, *Critoni in Thaso recto ambulanti pes dolere ex pollice cœpit: decubuit eodem die horrescens, fastidiosus, parum calens, nocte desipuit, altero die tumor toto pede, & ad talum subrubens cum contentione, pustulæ nigræ, febris acuta, valde insaniens, &c. postridieque quam ægrotare cæperat, periit.* Et de Lariſſæ Calvo. *Epidem. lib. 3. pag. 1101. Ægr. 5. Dextrum femur doluit repente, nihil ex iis, quæ offerebantur, juvabat. Primo die febris acuta ardens paullatim, neque comitabantur dolores, febris non increvit, implacidior erat, non dormiebat, extremæ partes frigidæ, multa urina neque ea bona reddebatur. Tertio femur desiit dolere, mentis alienatio, & turbatio, multumque sese jactavit, quarto ad meridiem periit.* In ambobus his ægrotis dolores pedis, atque coxendicis pessimi exstiterunt, tum quia primo in principio (quo tempore Galen. *in 1. de crisibus cap. 8.* omnes dolores apparentes pessimos vocat) apparuerunt, a quibus febris acuta, delirium, anxietas, vigilia, & alia gravia symptomata prodiere, quæ multitudinem humorum præmonstrabant, quæ varias lædebat partes, varia symptomata ac morbos faciebat: idemque in eo, *Epidem. lib. 1. pag. 988. Ægr. 12.* qui calescens cœnavit, cui post sævum tum morbum, tum symptomata, decimo die crura doluerunt, a quo omnia exacerbata sunt, & paullo post obiit. In *muliere* vero *apud frigidam aquam Epidem. lib. 3. pag. 1096. Ægr. 2.* die 27. coxendix diu doluit, a qua febris accessit, & in deterius mulier abiit. Sunt vero non minus mali ignobilium partium dolores, tum qui cito evanescunt atque occultantur: tum qui primo a longinqua parte incipientes postea ad viscera ascendunt, indicio sunt humorum ad nobilia membra delabentium. De his Auctor *Prorrhet. lib. 1. text. 170.* (Ubi Auctor noster, Galenum secutus, παρ' οὓς omisit, quod tamen Foesius, juxta exemplarium fidem, adjungendum putavit; vide omnino hujus adnotat: in hunc Aphorism.) *dolores absque judicatione soluti, inutiles*: quibus Galenus in comment. addidit, *occultati*, de quibus ipse sic ait: *Repente vero occultari dolorificas affectiones absque hoc, quod in alia quadam, quæ manifesta sit, abscessus fiat, transmigrationem contristantium succorum ad viscera ipsa factam, ostendit.* Hi quoque, qui quum inceperint, statim evanuerunt, sed aut qui, quum magni fuerint, diminuuntur, pessimi existunt; nobisque sunt vel naturæ prælanguidæ, quæ totam noxiam materiam a se propellere nequeat, vel multitudi-

Dolores quinam pessimi.

tudinis humorum, quam pars dolens nequeat in ſeipſam capere, indicia, ut de *Critone* Gal. prodidit. De iis *in* 1. *Prorrhetic. text.* 36. *Suræ dolores abſque ratione derepente occultati, deſipientiam in ipſis parere.* Et *lib.* 1. *Prorrhet text.* 37. *Si quippiam in urina ſublime petierit, occultato coxæ dolore, delirium portendit.* Atque *ibid. text.* 97. *Lateris dolor ex ſputis bilioſis, ſi abſque ratione evanuerit, in furorem aguntur.* Quod neque, ut *Galenus* monuit, ſemper, neque ſæpius fit, poſſunt tamen nedum deliria, ſed alia ſæviora quoque ſymptomata prænuntiare, ex humore quippe ſurſum in cerebrum aſcendente. Quare peſſimi exiſtunt dolores in partibus ignobilibus facti, cito vel repente occultati. Quibus non minus, ut dictum eſt, timendi ſunt, qui in remota a viſceribus, ſeu longinqua parte, concitati ad ſupernas partes aſcendunt. Quos expreſſit Hippocr. *in* 3. *lib. Progn. pag.* 43. *lin.* 32. *& ſeq.* dicens: *Dolores, qui cum febre fiunt circa lumbos, & inferas ſedes, ſi præcordia attigerint, inferas relinquentes ſedes, exitiales admodum ſunt. Itaque conſideranda alia ſigna. Nam ſi quod & horum pravum extiterit, deſperandum de ægro eſt. Si vero, aſcendente in præcordia morbo, alia ſigna prava non extiterint, talem fore purulentum admodum exſpectabis.* Ex quo ſemper humoris ad ſupernas partes ab ignobilibus & longinquis recurſio, mala: uti in *Prorrh. lib.* 1. 69. ait, *ex lumborum recurſione, oculi perverſio, mala.* Et poſtea *ibid. text.* 83. *Ex lumborum dolore ad os ventriculi recurſiones febriles cum horrore, aquoſa, tenuia, & multa evomentes, mente aberrantes, voce privati, nigra vomentes, moriuntur.* Et in *Prorrhet lib.* 1. 100. *Quibus lumborum tenues & diuturni dolores ad hypochondria euntes, & ciborum averſio cum febre, dolor his valens contentuſque ad caput perveniens, cito cum quadam convulſione perimit.* Et in 2. *coac. præſ. text.* 70. *Qui dolores acuti paulliſper in claviculas, & in ſuperiores partes tranſeunt, letales.* Quamobrem dolores partes longinquas exercentes, tam qui occultantur, quam qui ad ſuperas ſedes recurrunt, peſſimi exiſtunt, ac cum ſigno pravo letales. Demum dolores etiam quamcumque partem occupantes, ac affligentes, qui ab ægrotis non ſentiuntur, pernicioſi exiſtunt, quod vel delirium, vel ſentientis facultatis extinctionem denotant. De his Hippocr. *in* 2. *Aphoriſm.* 6. *Quicumque, dolentes parte aliqua corporis, dolorem non ſentiunt, his mens ægrotat.*

CAP. XXI.

De prædictione ex laſſitudinibus.

EX laſſitudinibus homines ſæpius in morbos acutos incidere, neminem in Medicina verſatum latet, quod *Sileno Epidem. lib.* 1. *p.* 969. *Ægr.* 2. contigiſſe Hippocr. meminit. De ſpontaneis itaque laſſitudinibus, quas non ſimpliciter laſſitudines vocari Gal. voluit, ſed ſpontaneas, interius cauſas habentibus, tantum agendum eſt. Harum autem laſſitudinum triplex eſt differentia, una, quæ ulceris, altera, quæ tenſionis, tertia ex ambabus compoſita, quæ inflammationis ſenſum præ ſe fert; prima ex Cacohymia, altera ex plenitudine, tertia ex utriſque una coeuntibus habet originem. Hæ vero plerumque univerſum corpus, quippe omne genus muſculoſum, & cutem ipſam, occupant, aliquando dorſum ipſum, quod multis acute ægrotantibus accidiſſe quiſque noſtrum ſæpius in praxi vidit, aliquando caput, aliquando, ut docet Galen. *in libro de curandi rat. per ſang. miſſionem*: jecur, aliquando lienem, quandoque ventrem, interdum coſtas, ſeptum tranſverſum, vel os ventriculi, vel aliud ex internis membris occupat. Aliquando, etiam eæ laſſitudines in brachiis, aliquando in coxendicibus, cruribus, vel pedibus obſervantur, quædam etiam ipſarum in principiis ortæ diu

Laſſitudinum differentia.

durant, & aliquæ in augmento vel ſtatu, atque demum aliæ morbo declinante ſentiuntur. Bonæ vero ad prædicendam ſalutem æſtimantur, quæ in brachiis cruribuſque apparent, cum ſignis coctionis, forte enim decumbentis ac propulſi humoris a præcipuis membris ad longinquas ignobileſque partes, perinde ac dolores etiam, indicant, quæ nedum in hiſce partibus, ſi una cum ſignis coctionis, at quinimmo etiam in univerſo corpore, præſertimque in dorſo, obſerventur, bonæ ſunt judicandæ; ſæpe enim metaſtaſin, ſeu tranſmutationem humorum ab internis membris ad externa, quippe ad muſculos & ad cutem factam, ſequuntur: ignaræ etiam mulierculæ id ſcire putant, quum audierint ægrotos lamentari de corporis gravitate renſiva ac phlegmonoſa, morbo jam aliqua ex parte declinante, (quod laſſitudinis genus frequentius tunc temporis ſentitur) eos ſolantur; dicentes optimum ſignum eſſe, atque ex iis nobis ſignificari morbum foras exire; ſæpius enim ægroti, qui prius a vehementia morbi vexati, cutaneas illas partes laſſatas non ſentiebant, laſſitudine fracti obſervantur, vel ideo, ut jam dictum eſt, quod vere morbus internas ſedes deſerat, ad externas exeat. Una quidem omnium eſt conſpiratio partium, atque confluxus, ſæpeque noxii humores quocumque modo a natura concocti, e magnis vaſis delabentes, ſeſe in muſculos tandem atque vel etiam in cutem recipiunt, laſſitudinem efficientes. Hæc enim aliquando abſceſſus præcedunt, de quibus Galen. *in lib.* 4. *Aphoriſm.* 31. ſcripſit: *Quoquomodo in febribus facta ſit laſſitudo, ad articulos, & maxime circa maxillas fiunt abſceſſus: hoc vero ideo uſuvenit, quia a calore febrili ſublata in caput eſt humorum copia, quam inde poſtea vuentem maxillarum adenes ſuſcipiunt, quomodo fit, quum in alas, & inguina a ſuperioribus partibus aliquid pervenerit.* Optimæ quoque exſiſtunt, quæ aliqua vacuatione vel arte procurata, vel ſponte præſtita, evaneſcunt; optimam quidem vacuationem ac criticam denotant, qua ægroti juvantur: de qua in *Coacis prædictionibus text.* 182. *Qui comate preſſi, & laſſitudine fracti, obſurduerunt, erumpente alvo rubra dejiciunt circa criſin, idque juvat.* Quæ vero vel in toto corpore vel in dorſo, vel in aliqua alia parte, humoribus nihil concoctis, omnes malæ ſunt judicandæ, omniumque maxime cum malis ſignis prodeuntes, atque ſi una multa alia ſævaque fuerint ſymptomata. Non minus etiam eæ erunt ſuſpectæ, quas nulla vel arte vel a natura facta vacuatio levat, de quibus forte Auctor Prorrheticorum *in Prorrh. lib.* 1. 38. *Quibus alvus liquida, laſſitudo, capitis dolor, ſitis, vigiliæ, obſcuritas, & impotentia fuerit, ut hi mente moveantur, ſpes eſt.* Et in 1. *coac. præſag. ſect.* 1 *text.* 35. *Delaſſati caliginoſi, pervigiles, in ſomnum inclinati, deſudantes, recaleſcentes, malum:* Et 2. *Coac. præſ. text.* 36. *laſſitudine fracti cum horrore, quum exſudaverint judicii modo, & recaluerint celeriter, malum, quum alias, tum ſi eo tempore ſanguis e naribus ſtillaverit.* Ubi vero multa ſimul adſint ſymptomata, cum his peſſimum eſt; multitudine enim humorum naturam undique gravatam, ac oneratam ſignificant. De quibus *in* 3. *coac. præſ. text.* 45. *Laſſati, ſingultuoſi, ſtupore occupati, malum.* Et poſtea *text.* 221. *Ab oculorum perverſione cum laſſitudine, & febre, rigor letalis: coma quoque in iis accidere, malum.* Cum multis itaque ſymptomatibus laſſitudines malæ, letaleſque, ſi morbo plane crudo ſentiantur, & cum aliquo ſigno pernicioſo. Sed de his ſatis, atque de prædictione a vigilia, ſomno, comate, ac aliis ſoporoſis affectibus, nunc agamus.

Laſſitudines quanam bonæ.

Quænam malæ.

CAP.

CAP. XXII.

De vigilia, quidque ipsa morbis præsagiat.

TAmetsi vigilia, & somnus ad primum ac communem sensum, ut Gal. meminit, pertineant, de cujus symptomatibus superius partim egimus, atque nunc agere putamus; nobis vero placuit, absoluto de sensibus particularibus prorsus sermone, de vigilia & somno, soporiferisque affectibus, quatenus ad Prognostici cognitionem faciant, hic agere, priusquam a motricis facultatis symptomatis Prognosticum indagaremus. Vigiliam autem ac somnum hic primo naturalem statum non excedentes considerabamus, quando hi nihilo tum alterati, tum mutati, quippiam etiam nobis ad morborum prædictionem afferant. Uterque enim bonus est, optimumque ad præsagiendum erit, si ægroti vigilent, tum dormiant, ut antea, quum recte valerent, consueverant. Impossibile siquidem videtur, hominem ex morbo aliquo mori, vigilia somnoque inculpatis utentem, seu his non aliquo modo mutatis, de his Hippoc. *in Prognosticis pag. 39. lin 47. De somnis autem quemadmodum & ex natura in consuetudine nobis est, interdiu quidem vigilare, noctu vero dormire convenit. Si vero hoc fuerit transmutatum, pejus est.* Et in Aphorismis *sect. 2. Aph. 2. Ubi somnus delirium sedat, bonum.* Sed jam ad vigiliam, de qua sejunctim nunc agendum duximus. Ipsa quidem est, ut Gal. docet, animæ extensio a principio ad omnes partes corporis, quam contingit aliquando multam, aliquando paucam esse, quod diutius ac multum quandoque a suo principio extendatur, ac quandoque brevius atque parcius. Quare vigilia exinde fit multa ac pauca: hanc sub sermone de somno, posterius absolvendo, comprehendimus. De illa vero nunc agimus, quæ est multa innaturalisque animæ extensio, ac effusio a suo principio ad singulas partes corporis, quam cerebro exsiccato fieri, a calidis mordentibusque succis, vel halitibus, Galen. multis in locis tradidit, ut *in 3. de loc. affect. in 4. de rat. vict. in acut. text. 4.* Propriumque esse vigiliæ, ait *in 1. Prognost. cap. 8.* Et *in 4. de præsag. ex pulsibus cap. 5. in 1. progn. 5.* ac *in 3. de loc. affectis*, atque alibi, ut a siccitate fiat, veluti somni ab humiditate, uti proprium est caloris, desipientiam deliriumve movere, ita siccitatem vigiliam facere, ex quo eos, qui cerebrum nedum calefactum at simul siccatum habent, cum vigilia etiam delirare, Gal. in 4. *de præsag. ex pulsibus cap. 8.* nobis prodidit, atque senes ex siccitate vigiles fieri *in 3. lib. Aph. 31.* Sed ex his nunc vigiliarum prognosticum intelligamus, ac in primis illarum quidem, quæ salutem præsagiant. Sunt enim aliquæ, etsi omnes malæ sint, optimum significantes, utpote quæ antecedunt bonas crises, quas præcedunt in ægrotis nedum vigiliæ ipsæ, at inquietudines, anxietates, deliria, convulsiones, dolores, ac alia, ut docuit Gal. *in lib. 3. de Crisib.* Tales vero vigiliæ apparent in augmento vel in vigore morbi, quo tempore præsertim ægrotos magna ex parte vigilare, graviter se habere, & vehementius febricitare, quo propius ad judicationem acccedunt, Gal. *in 4. Aph. 70.* docuit. At quinimmo Galen. quoque *in 3. lib. de Crisib.* statuit in morbis acutis vigiliam cum signis coctionis crisin significare. De his *in Prorrhet. lib. 1. text. 232. 135. 136. Qui compositi perturbantur, pervigilant, naribus stillant, sexto die levantur*: et, *capitis affecti gravitate*: &, *sincipite dolentes, pervigilesque sanguinem profundunt*; et, *qui pervigilaverint, repente cum inquietatione quadam sanguinem profundunt, tum alias, tum si quippiam antea fluxerit*, atque etiam *lib. 1. Prorrheticorum 149.* quum dicit: *Qui in horrore simul judicatorie sudant, postridie vero ubi inhorruerint, præter rationem vigilant, hos sanguinis eruptionem*

Vigilia quæ salutem præsagiunt.

incurſuros, puto. Et in Coacis prædictionibus *text.* 110. *Quæ ſtatim turbulentum ægrum vigilemque reddunt, & alvi excrementa nigra & compacta, ſanguinis eruptionem e naribus quibuſdam adferunt.* Hæ igitur ex vigiliis ſalutis ſpem ægrotis promittunt, non alia ratione, quam faciunt dolores, convulſiones, deliria, anxietates, criſin prædicentes. Hiſque exceptis omnes, quocumque modo fiant, ac prodeant, malæ, ſiquidem vigilia ſiccat univerſum corpus, atque, ut Gal. *in 7. meth. med. cap. 6.* docuit, iis eſt infeſtiſſima, qui ex ſiccitate laborant, quos ipſa, ſi diu duret, ad convulſionem conſumtionemque deducit. Ex quo mirum non eſt, ſi in ardentibus febribus aſſiduæ vigiliæ convulſiones letales accerſant, quod immodice alia corpora inflamment, ut in quibuſdam febres concitare ſoleant, maxime que, ut Gal. *in 1. de ſanit. tuenda* animadvertit, in infantibus. Refrigerant etiam interna viſcera, ipſorum calorem reſolvendo, quod expreſſit Hippoc. *in Epidemiis lib. 6. ſect. 4. text.* 12. dicens: *Evidenter vigilans calidior exterius, interius autem frigidior.* Ibique corpora etiam digerere ac reſolvere vigilias, docuit, ex quo vires illis diu perſeverantibus valde lædi, ac exſolvi, Gal. *in lib. 12. meth. med. cap.* 8. prodidit. Addamus quoque, vigilias cruditates humorum, ex Gal. *in 1. de vict. rat. in acutis*, fovere, atque augere. Quamobrem hæc de cauſis vigiliæ in acutis morbis omnes malæ judicari debent, omniumque perniciosiſſimæ perpetuæ, quæ quum omnia prædicta mala ægrotis inferant, quis exitium ab ipſis non prænoſcet? Hæ ſane familiarius convulſionem accerſunt, atque delirium, quæ bifariam ab his fiunt, uno modo exſiccato, ac inflammato cerebro, atque altero humore calido oppleto; quatenus vigilia quævis, ut nuper docuimus, cerebri aut vacuitatem ſeu exſiccationem, aut humorum calidorum repletionem, ſeu phlegmonem adeſſe denotat: ex hac quidem cauſa, quum vigilia deliria & convulſiones concitantur, non omnino letales, quando interdum vacuato, ac reſoluto, aut ad aliam partem propulſo calido humore, reſolvantur, de quo *in 3. Coacis præſag. text.* 109. *Pueris acuta febris, alvi ſuppreſſio cum vigilia, adhæc exaltatio, & caloris mutatio, multus robur, convulſionem ſignificat.* Timendæ tamen cum his maxime ſunt, etſi perpetuo non ſint letales, ex quo probe Hippoc. de his *in 7. Aphor.* 18. dixit: *In vigilia convulſio, & deſipientia, malum.* Ex illa vero, cum vigilia, aut poſt ipſam, convulſiones, aut deliria plane letalia exiſtunt. Non ſecus atque convulſiones ardentibus febribus ſupervenientes, de quibus poſterius dicemus, irreparabile exitium prædicant. Qualia in *phrenitico* tribus diebus mortuo Hippocrat. obſervaſſe, *in tertio Epidem. pag.* 1100. *Ægr.* 4. meminit. Hæ vero cum aliis ſignis, quippe cum vomitibus æruginoſis, capitiſque dolore, delirium ferinum, ac letale præſagiunt. De quibus auctor Prorrhetic. *in 1. Prorrheticorum* 10. dixit: *Qui in capitis doloribus æruginoſos vomitus habent, vigilantque cum ſurditate, cito hi vehementer inſaniunt,* ut *phrenitico* nuperrime dicto accidit. Aſſiduæ itaque vigiliæ ac perpetuæ plane in acuto morbo letales exiſtunt, quales in *phrenitico lib. 3 Epidemiorum pagina* 1100. in *uxore Dromeadæ, Epidemiorum lib. 1. Ægr.* 11. *pag.* 987. quæ a prima die ad quartum uſque inſomnis. Inſomnes multos ardentibus febribus ægrotos obiiſſe, Hippocrat. *in primo Epidemiorum commento 2. pag.* 954. prodidit. Ex quo merito *in 2. Prognoſtic. pag.* 39 *in.* 52. dixit: *Peſſimum vero eſt, ſi neque interdiu, neque noctu dormiat:* Dolor enim ac labor, vel deſipientia, ab eo indicio ſignificatur. Cum vigilia vero ſi aliquod ex exitioſis ſignis etiam illuxerit, plane exitioſum erit. Conſiderandæ vero ſedulo ſunt vacuationes, ſimul cum vigilia non deſinente obſervatæ, quæ omnes malæ ſunt, quod vel ſymptomaticam naturæ excretionem, inutilemque, vel pravam præmonſtrent, certum exitium denotabunt. Malæ ſunt, ſi ſudor capitis frigidus, atque copioſus, aſſiduus, De quo *in 2. Coac. præſag. text.* 41. *Exſudantes, vigi-*

Vigilia ſere omnes malæ, & quare.

Quænam letales.

les,

les, *recalescentes*, *malum*. Excretionesque aliæ nihilo sublevantes cum signis cruditatis, pessimæ, stillæ narium, vomitus virulenti, existunt. Sequuntur vigilias aliquando vacuationes, quæ quum nihil juvant, pessimæ judicantur, sæpiusque ægros offendunt, morbum adaugent, quod in omnibus tum vacuationibus, tum symptomatis, ægros juvare debentibus, pernicioſum esse, Gal. *in Prorrheticis*, atque alibi docuit, ex eo, quod in morbis acutis excretiones, & alia quæ juvare solent, ni juvant, mala dicuntur; atque si, præterquam quod non juvant, etiam lædant, omnino letalia dici debent. Sæpe vero, quemadmodum assiduas vigilias in illis morbis diximus sequi convulsiones pernicioſas, phrenitides ferinas, ac tremores, ita aliquando comata letalia subsequuntur: si etenim, ut superius meminimus, a vigilia somnus longus, qui tamen ægros meliusculos faciat, sequatur, optimum; qui vero nihil nedum juverit, sed quinimmo ægrum oblæserit, letalis erit; de illoque *in* 2. *Aph.* 2. Hippocrat. dixit: *Somnus delirium sedans*, *bonum*. Et de hoc *Aphorism.* 1. *text.* 2. *In quo morbo somnus laborem facit*, *mortale*. *Si vero somnus juvat*, *non mortale*: Comata vero, assiduas vigilias secuta, plerumque exitioſa existunt; quia resoluto, ac refrigerato nativo calore fiunt. Quod summe exitioſum esse Gal. *in* 4. *lib. Aphor.* 67. scriptum reliquit: insanabilia enim esse frigora, quæ calidis siccisque succedunt affectibus, ibi docuit. Accidunt vero vigiliis aliquando comata, aut resoluta bile & sicca evaporatione, quæ vigiliarum causa fuerat, remanente pituitoso humore, qui cerebrum humectat ac diluit. Hæc cum signis coctionis, viribus valde consistentibus; haud pernicioſa apparent. De his (quum de vigiliis abunde scripserimus) nunc accusatiorem sermonem instituemus.

CAP. XXIII.

Quid somni in morbi præsagiant.

SOmnos veternoſos appellamus omnes, a quibus ægri aut non expergiscuntur, aut non minima difficultate, habentes ad somnum maximam propensionem, quod quidem observamus in Comate seu Cataphora, Caro, Catoche seu Catalepsi, atque in veterno seu Lethargo. Ut vero ex his somnis, ac vel etiam ex naturalibus, scite Prognosticum indagemus, quædam ad horum soporiferorum, ut ita vocemus, affectuum notitiam in primis sunt a nobis cognoscenda; & primo diviso somno in naturalem atque non naturalem: de naturali loquimur, qui nihil aliud est, Galeno auctore *in primo Prognost. com.* 12. quam animæ delatio secundum naturam a finibus ad principium, vel est quies vacatioque ab animalis actionibus. In hoc enim calor nativus labore fessus, ac per vigilias exsiccatus, copioso humido indigens, in viscera & ventrem convertitur, ibique existente humido recreatus foras erumpit, atque vigilias inducit. Hinc Hippoc. *in* 6. *Epid. comm.* 4. *text.* 12. ait: *Evidenter vigilans calidior exterius*, *interius autem frigidior*, *dormiens e contrario*: quod in ejusdem libri *comm. quinto text.* 28. scripserit: *sanguinem in somno ad interiora magis refugere*. ex quo Galen. *in com. text.* 30. scribit: *vigilanti exteriora magis calent*, *interiora magis frigent*, *& contra*; ex eo quod, ut paullo post, Hippocratis sententiam confirmans, scripsit, in somnis sanguinem & cum eo naturale calidum interius abdi, & in vigiliis ad extima profundi. Fit vero calore nativo intus retracto, ut exterioribus refrigeratis omnes sensuum actiones atque opera sileant: ex frigiditate hac obstructis meatibus nervorum, per quos calor & facultas exterius profunditur, animalia cessant, ut ait Gal. ab omnibus animæ actionibus; atque hic est somnus naturalis, qui fit, ut dictum est, calore per vigilias exsiccato in viscera ac ven-

Somni veternosi quinam dicuntur.

Somnus naturalis quid.

trem recurrente, ut recreetur: hinc ab assumtis cibis somnus solet familiarius fieri, atque etiam, quæ particularis somni quoque erit causa, quo tunc temporis plures vapores humidi & crassi, petentes caput, cerebri meatus obstruunt, a quibus obstructis calor intus clausus, quousque vapores ii non fuerint extenuati ab ipso & excussi foras, ad vigiliam conciliandam profundi nequit. Quare colligamus somnum fieri, aut ubi calor per vigilias exsiccatus, humido indigens, ad viscera, ut recreetur, convertitur, aut a vaporibus ciborum cerebri meatus obstruentibus: sed hic somnus ad innaturalium somnorum naturam accedere aliquibus pervidetur; atque ille plane est naturalis, & eo magis, ubi vapores ii copiosiores sunt, quales in ebriis observantur, qui cerebro vini epoti vaporibus oppleto profunde diuque dormiunt. Quod Hippoc. *in* 5. *Aphoris.* 5. ita meminit, *si ebrius quispiam repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi eum febris arripiat, aut ad eam perveniens horam, qua crapulæ solvuntur, vocem proferat.* Namque hi, nisi a calore vinum ejusque vapores digerantur, & discutiantur, suffocantur; hinc merito ait, *hos superveniente febre juvari*, quod calor febrilis, longe naturali efficacior, digerat vapores vini: atque hic unus est ex somnis non naturalibus, quos Medici ex causarum diversitate variis nominibus appellant, licet hos omnes *veternosos* vocet. Hic vero affectus foras progredi non potest, sed intus detinetur, aut ob multam humiditatem cerebrum occupantem, aut ob solum frigus, aut ob utrumque, aut ob virium languorem. Somnus is *veternosus* proprie dicitur, qui in *Lethargo* concitatur, veluti qui *Caros*, in affectu *Caro* Græcis, & Arabibus *Subeth* dicto, & qui in *Catoche* seu *Catalepsi*, aut, ut vulgo Medicis placet, congelatione, atque non minus qui *Coma Cataphora* dicitur. Hi omnes sunt somni præter naturam, quorum quoque non minus cognitio est illustranda, quum hæc ad præsagiendum ex somnis magni momenti sit. Primo hoc supponemus, quippe omnes, qui innaturaliter dormiunt, *comatosos*, & *veternosos* vocari. Vocat enim *comatosos* Galenus *in tertio Epidem. com.* 1. *text.* 7. qui habent in somnum delationem ac propensionem. Vocat vero in somnum propensionem, quum ægri vigilare nequeunt, non apertos habentes oculos, sed conniventes. *In secundo vero Aphoris.* 3. Hippoc. *Coma* vocat somnum longum, qui habet difficilem expergefactionem, qua quidem difficili expergefactione a somno longo naturali distinguitur, uti Galen. prius in hoc eodem *lib.* 2. *Aph.* 1. ita docuerat: *Sed falsos esse quamplures, quod veternosos incipientes affectus longum sibi persuaserint somnum esse. Verum ii a nobis edocti, veternum* (κῶμα Græcis appellatum) *prius dici non posse, quam in expergefaciendo difficultatem habeant conjunctam, nobis somnum recte longum appellari concedunt, qui tempore quidem naturalem superet moderationem, sed nondum ad expergefaciendum difficultatem habeat.* Quare lethargicos ac veternosos somnos appellamus, qui habent difficultatem ad expergefaciendum, quippe ubi ægri in somnum ita inclinant, ut oculos apertos non habeant, sed conniventes, palpebras claudere cupientes, simul dormire sperantes. Distinguuntur vero somni veternosi species ex eo, quod quidam somni nullum aliud quam ad somnum propensionem præ se ferunt, cujusmodi vere *coma*, *cataphora* & marcorem dicimus; alii vero nedum habent in somnum delationem, sed marcorem & inexpugnabilem pæne dormiendi necessitatem, qualis in *lethargo* observatur: & alii una congelationem seu deprehensionem omnium corporis partium ostendunt, cujusmodi sunt in congelatis, qui affectus Græcis *Catoche* & *Catalepsis* dicitur; alii denique cum somno, vel difficili, aut fere inexpugnabili dormiendi necessitate, motu omni ac sensu destituuntur, mensque non minus vitiatur, quales *Caros* Græcis, & *Subeth* Arabibus affectus, ostendit. Differunt etiam hi veternosi somni, quia ipsorum alii simplices ac tales exquisite sunt, & alii vigiliis mixti.

Somnus veternosus quinam proprie dictus.

Coma quid.

Somni veternosi species quamodo distinguuntur.

Pro-

Proinde coma distinguitur in *coma* simpliciter, & in *vigil* appellatum, quod Græcis *Coma ἀγρυπνον*, hoc est absque somno dicitur, veluti alterum *Coma hypnoticum*, hoc est, somniculosum. Veluti *Typhomaniam* affectionem appellamus ex lethargo ac phrenitide mistam, in qua dormiunt, vigilant, delirantque. De qua Hippocrat. *in Epidem. lib. 3. sect. 3. pag.* 1085. *Nec phreniticorum ullus valde insanivit, sed alia quadam Cataphora segni graviter interibant.* Sed jam causas veternosi somni differentiarum his præmissis prodamus. Comatis seu Cataphoræ Galen. *in 3. Epidem. com.* 1. *text.* 7. quatuor esse causas statuit, quippe primam ubi multum humecta pars sit, quæ est sensus fons: in qua vel etiam Aristot. fieri somnum recte demonstravit, ut nonnullis ebriis usuvenit. Secundam ait esse solum frigus, ut fit ex narcoticorum usu. Sed frigus aut principio obsedit, aut postea ab immodico calore flammeo naturali fere consumpto, quod mortiferum esse, postea intelligemus. Tertiam esse tum frigus, tum humiditatem simul, quinimmo his duabus concurrentibus causis fit somnus comatosus. Quartam esse virium infirmitatem, quod genus comatis fit in moribundis, ut ibidem Galen. habet, propter infirmitatem virium, apertas palpebras servare non valentibus, ac ita affecti hoc habent, ut postquam oculi conniverint, aut nihil prorsus aut parum dormiant, sed vigilent, nec attollere tamen palpebras queant. In *lib. 2. Aphorismorum* 3. ac *in 3. de locis affect. cap. 3. & in 4. de præsag. ex pulsib. cap.* 8. & in multis aliis locis docet Galen. siccitatis propria signa esse vigilias, & humiditatis profundum somnum, & frigiditatis fatuitatem itidem cum somno profundo, ut ex usu narcoticorum apparet, quum humiditatis tum refrigerationis cerebri lethargicum somnum, veluti frigiditatis & siccitatis Catalepsin, idest, deprehensionem seu congelationem, ex quo affectu non sunt comatosi, sed sublatis oculis intuentur inconniventer. Atque tot sunt ex Galeno causæ soporiferorum affectuum exquisitorum. Ubi vero misti sunt affectus ita, ut comatosi vigilent, ac vel etiam delirent, mistas quoque habere causas necesse est. Diximus Coma observari somniculosum, & vigil; illius audistis causas; hoc vero fit, Galen. auctore *in primo Aphorismor. & in eodem libro quarto de præsag. ex pulsibus, cap.* 8. ubi cerebrum quum humiditas tum caliditas occupaverit; eodem quoque modo ubi humores calidi & pituitosi fuerint in cerebro, ex quibus mistis humoribus fit mista illa affectio ex phrenitide ac lethargo, quam Græci *Thyphomaniam* appellant, in qua quidem ægroti perpetuo dormiunt & vigilant, de quibus Hippocrates *in 3. Epidem. commentar. 3. pag.* 1085. *Nec phreniticorum ullus valde insanivit, sed alia quadam cataphora segni graviter interibant, & comatosi diu, rursusque insomnes erant.* Galenus *in commentariis* ait, fieri coma vigil, ubi etiam humores frigidi in cerebro putrescunt, ab humiditate enim comatosi, & ab acrimonia ex putredine concitata vigiles atque deliri evadunt. Atque tot hi affectus habent causas, quibus præmissis reliquum est, ut ad somnorum prognosticum descendamus, a naturali facto principio. Nam quemadmodum innaturalis omnis malus, ita naturalis omnibus bonus; hic enim humores concoquit, ut Galenus docuit *in 4. libro Aphorismorum*. Hippocrat. *in 6. Epidem. comment. 4. text.* 12. a calido interiora petente: per somnum enim aucto interius calore, ut ait Galen. *in 3. de caus. pul. cap.* 9. In venis arteriisque ac in toto animali meliores fiunt concoctiones, ob quam causam in principio internarum inflammationum sunt fugiendi, quod materiam ad profundum & ad viscera trahant, eodem Gal. docente *in eod. 4. Aph.* 67. in quibus affectibus Galenus dicit, somnos esse plane perpetuo fugiendos propter allatam causam, nisi coctionis ratione plus afferant utilitatis: utiles sunt in morbi declinatione, quo tempore si lædant, sunt pernicioſi, ex Galen. in 2. *Aphorismos.* 2. Cognoscuntur vero boni ac utiles ex eo, quod vel inflammationem, vel febrem,

Somni veternosi differentiarum causæ.

Somni unde cognoscuntur boni & utiles.

brem, vel dolorem, vel delirium ſedant, quod faciunt, ubi materiam noxiam concoquunt, & digerunt: de quibus Hippoc. *in 2. Aphor.* 1. ait: *In quo modo ſomnus laborem facit, mortale, ſi vero ſomnus juvat, non mortale*, ſed utilis eſt & bonus; in phlegmonum, dolorum & febrium declinatione, ſi juvat, eſt ſalutaris: ac ut uno verbo dicam, perpetuo ille ſomnus dicetur bonus, qui juvabit, ex eo, quod ſignificat calorem humores concoquere ac digerere quo ſenſu dixit Hippocrat. in eodem libro *Aphoriſmorum* 2. *Ubi ſomnus delirium ſedat, bonum*, & Galen. *in comm.* ſomnum commendat, ubi inflammationem, vel febrem, vel dolorem, vel delirium ſedat. Cognoſcitur vero bonus vel ex eo, quod, uti in 5. *Coac. præſag. text.* 151. habetur, ſit profundus neque turbulentus, hi enim habent firmum judicium. Optimus eſt ſomnus, qui plures vigilias ſequitur, ubi ægroti ſuavius dormiunt, etiamſi diu perſeveraverit. Galen. ſiquidem in 1. *Prorrheticor.* narrat quoſdam, qui quum tribus quatuorve diebus vigilaſſent, per diem noctemque dormiiſſe magno juvamento: omnium maxime pueris auxilio eſſe ſolent, atque in ipſis laudantur. Atque hæc de ſomni naturalis judicio; nunc de iis, qui præter naturam ſunt, dicamus. De quibus *in Coaciis præſagiis text.* 178. legitur: *Sopor ubique malus*. Nam etſi in ebriis, ut aliqui dicunt, ſomnus neque plane commendetur, neque damnetur, tamen plures ipſorum quum diem ſopore profundo duxiſſent, itidemque & noctem, numquam amplius revixerunt. Proinde divine quidem Hippoc. de his ita habet *in Aphoriſm. ſect.* 5. *Aphor.* 5. *Si ebrius quiſpiam derepente obmuteſcat, convulſus moritur, niſi febre corripiatur, aut qua hora crapula ſolvitur, vocem recuperet.* Sed utrum ex comatoſis ſomnis quicquam boni poſſit ſignificari? Certe quidem, quando non raro criſes, quæ ſanguinis e naribus aut parotidum eruptione fiunt, præcedant, ſanguine quippe in caput ſublato: ſed hujuſmodi judicium coctionis ſigna in excrementis, & alia critica ſigna confirmabunt. De quibus *in Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 168. legitur: *In capitis dolore coma & ſurditas abſceſſum aliquem poſt aures eructant*: & poſtea *ibidem text.* 169. *Hypochondrii contentio cum comate faſtidioſo & capitis dolore parotidas effluere faciunt*. Sed ad malos ſomnos, qui omnes tales cenſentur, ubi modum naturæ exceſſerint, & Hippocrat. *in ſecundo Aphoriſm.* 3. ita ſcribente: *Somnus atque vigilia utraque, ſi naturæ modum exceſſerint, malum*. Sed maxime dormiendi ſpectanda erit conſuetudo, quum ſit altera natura. Mali præterea omnes haberi debebunt, qui nihil juvant, & omnium maxime qui lædunt. Hippoc. de his *in 2. Aphoriſm.* 1. ait: *in quo morbo ſomnus laborem facit, mortale*: & Galen. *in comm.* ait: *quemadmodum ſomnus in acceſſionum declinatione eſt utilis, ſi juvet ægrotum, ita ſi ipſum lædat, eſſe letalem*. Docet vero ibi Galen. ſomnos lædentes eſſe in febribus, a quibus vel febres, vel ſymptomata non diminuuntur, ſed augentur, vel exacerbantur, aut nova fiunt; uti quum dolores concitantur, vel deliria, vel ubi ante ſomnum ægroti deliria loquuntur, expergefacti etiam peſeverat in delirio, aut ſi ex ſomno coma evadit, quippe ubi poſt ſomnum difficulter, vel non; excitantur. Hujuſmodi omnia fieri propter humorum malignitatem, qui cum calore naturali non concoquuntur, ad viſcera recurrunt, eaque aggravant, ut Galenus ibidem nobis prodidit. Comata vero in principiis morborum, utpote quod ſoleant fieri a multa humiditate, cerebrum diluente, nonniſi gravis ac periculoſi morbi erunt indicia, quum tantam humorum multitudinem ſignificent, atque ea cerebrum lædi cœpiſſe, quæ clarius judicabuntur ab iis, quæ poſtea illucent. Nam ſi letale ſignum illuxerit, pernicioſum eſt, ſicuti in *uxore Olympiadæ*, ut ex 7. *Epid. text.* 49. *pag.* 1221. conſtat, fuit obſervatum. Hæc enim quinta die facta comatoſa excitantes non ſenſit, voxque, quæ ei defecerat, non ſolvebatur, nec quicquam allevabatur, ſpirituſque aderat ſublimis, qui per nares trahebatur, a quibus, coma fuiſſe pernicioſum,

Somni unde cognoſcuntur boni & utiles.

Somni comatoſi aliquando boni.

Somni quinam in febribus lædunt.

Comata malitioſa.

præ-

præostendebatur. Coma itidem, quod non in principio, sed in vigore post calidissimum sævissimumque morbum apparet, est exitiale non minus quam ex virium languore concitatum, quale in *Hermocrate* fuit observatum, de quo Gal. *in 3. Epidem.* (*Vide historiam in Hippocr. lib. 3. Epid. Ægr. pag.* 1062.) ita habet: *Reliquum ergo est, per refrigerationem insignem cerebri, aut facultatis imbecillitatem Hermocrati Coma induxisse die undecimo. Verum autem sit horum, extreme est perniciosum. Nam insanabilia ea esse demonstratum est frigora, quum calidis morbis ac siccis succedant. Sed quod virium imbecillitas facit, exitium proximum notat.* Diximus aut cognosci hoc genus comatis ex Gal. *in 3. Epidem. Com.* 1 *text.* 7. ex eo, quod ita affecti, postquam oculi conniverint, aut nihil prorsus aut parum dormiunt, sed vigilant, nec attollere tamen palpebras possunt. Demum exitiosum non minus esse coma illud constat, in quo, ut Galen. *in 3. Progn. text* 11. Comatosi sublatis oculis intuentur inconniventer. Cujusmodi in congelatis seu deprehensis observatur, de quo ibi Galen. ait: *Considerari autem convenit hunc in modum suspectiones etiam oculorum per somnum; Si quid enim candidæ partis subapparet commissis palpebris, nec alvi fluor aut medicamentum in causa est, nec ita dormire consuevit, vitiosum indicium, letaleque admodum est. Quod facultatis moventis palpebras exstinctionem significet.* Quod in uxore *Theodori* ut ex 7. *Epidem. text.* 27. *pag.* 1216 apparet, fuit observatum. De qua Hippocrat. ait: *Similiter oculi demissi ad infernam palpebram magis inclinantes rigide ac stupide intuentes, albæ oculorum partes pallidæ & mortales.* Hoc modo spectant congelati, qui affectus Græcis *Catochi* & *Catalepsis* dicitur, seu *Catocho* vexati, ut Gal. in *Prorrhet.* de quibus Auctor ille in 3. *lib. Prorr. text.* 96. scribit: *cum virium exsolutione quum catochas tum aphonias esse perniciosas.* Ceterum ex comate licebit judicium facere non tantum ex ipsius causarum varietate, sed etiam ab iis quæ præcesserunt, & una cum comate illucent, atque ab iis non minus, quæ postea apparent. Veluti a prægressis signis, ubi a longa vigilia, exempli gratia, ex calidissima siccissimaque causa oborta, coma postea fiat; hoc enim esse letale signum, alias a nobis dictum est, quando nuper fuerit demonstratum, letalia esse frigora, quæ succedant calidis siccisque morbis. Hinc Medici omnes colligunt veternum a phrenitide esse exitiosissimum morbum. Quare & coma vigilias secutum, nisi criticum sit, perniciem ostendit. Eodem modo ex signis, quæ simul cum ipso comate, bonis & malis, bonum malumque fiet judicium. Nam quum simul alia gravia symptomata illuxerint, graves affectus, simul & judicium erit difficile, ut quando comatosi sunt, simul etiam vigilant, qui affectus solet denotare haud parvam malignitatem; ubi etiam comatosi vigiles quoque & deliria loquuntur, quod judicium notasse Hipp. *in 3. Epid. sect. 3. pag.* 1085. *& sparsim in historiis Ægrorum illo in libro expositis* dicemus. Quum vero cum comate etiam gravia symptomata illuxerunt, grave redditur judicium. Nam auctor *Prorrhet. in lib.* 1. *Prorr. text.* 89 ait: *Coma cum oculorum perversione malum, lib.* 1. *text.* 89.; & in *lib.* 1. *comment.* 5. *text.* 32. *& 33. Coacorum præsagior. text.* 180. *Qui comate oppressi, ab initio exsudarunt leviter, urinis coctis ardentes citra judicium refrigescentes, brevibus intervallis ardore redeunte, torpidi, oppressi comate, convulsione subinde capti, pernicioſe habent.* Neque mirum, quum concursum notet multorum letalium signorum: & sequenti ait *text.* 181. *somni similes iis, qui comate laborant, & perfrigerationes letales.* Sed hoc erit in febri ardente intelligendum, in qua ægri intus uruntur, exterius algent, in quibus coma semper pernicioſum erit. Ab iis vero, quæ postea sequuntur, probe quoque sciri potest, quid ipsum coma mali portendat. Aliquando enim criticum esse ostenditur, quum ipsum bona aliqua evacuatio sequatur, aut aliqua excretio. Proprium vero comatum esse videtur, ut critice parotides futuras soleant portendere, de quibus

Comata quid critice solent portendere.

bus in *lib. 5. text.* 181. *Coacorum præſag. text.* 183. *Comate preſſi, faſtidioſi ab Hypochondrio dolentes, pauca vomentes, in aures abſceſſus habent. Prius autem tumores circa faciem cum comate.* Aliquando vero purgationem per alvum; de qua etiam *in eodem libro text.* 182. legitur: *Qui Comate preſſi, labore & laſſitudine fracti, obſurduerunt, erumpente alvo, rubra dejiciunt circa criſin, idque juvat.* Auctor *Prorrhetic. lib.* 1. *Prorrhetic. text.* 1. *& Coac. præſag. text.* 179. dicit, *ſtillas ſanguinis in comatoſis eſſe letales*; idemque ſignificant ceteræ aliæ omnes malæ evacuationes, & omnia mala ſymptomata: ſi enim talia poſt coma illuxerint, judicium erit periculoſum, veluti ſi in comatoſis ſuccedant convulſiones, deliria, aphoniæ, anxietates, dolores viſcerum fortes, atque alia, quæ nedum non bona, ſed quinimmo apprime pernicioſa exiſtunt. Atque his claudatur ſermo de Prognoſtico a ſomnis judicando ſuſceptus.

FINIS LIBRI SECUNDI.

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS DE PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER TERTIUS.

CAP. I.

Quantum ad prædictionem cognitio motricis facultatis Medicis conducat.

PRobe cognita firmitate, imbecillitatem facultatis ratiocinatricis, atque ab ea quoque modo, quo prædicendum ſit in ægrotis, perſpecto, reſtat, ut tantumdem quoque in motrice laboremus. Cujus quidem facultatis cognitio ceteris ad prognoſin non minus eſt utilis. Hanc vero recte valere, & robore non carere, denotant partes corporis, ubi recte ac ſecundum naturam moventur, & impotentiam ſeu imbecillitatem actiones diminutæ, aut vitiatæ, aut prorſus ſublatæ declarant. Eſt vero motricis actio læſa, qua imbecillitas facultatis dignoſcitur, triplex: quippe aut imminuta, aut ſublata, aut denique vitio quopiam affecta. Diminuta hæc facultatis actio in ſenibus maxime obſervatur, qui ſane caloris innati defectu ægre partes corporis movent ſæpiuſque in his partes ob eam cauſam tremunt. In reſolutis & congelatis prorſus tollitur; vitiaturque in convulſis & epilepticis. Partibus itaque corporis ſecundum naturam admodum ſe habentibus, facultatem recte valere, roboreque non carere, ſcimus, quod in morbis perpetuo bonum ſit, licet ex hoc ſolum non debeamus judicium de morborum eventu facere: ſed tempus expoſtulat, his premiſſis, ut ſigillatim præſagium ex ſingulis hujuſce motricis facultatis ſymptomatis perſequamur a decubitu ægrotantium exordientes, quum ex ipſo motricis facultatis robur atque infirmitas maxime nobis innoteſcat.

Motricis facultatis cognitio quantum ad prædictionem.

CAP. II.

De prædictione ex decubitu, & primo de optimo, qui ſalutem præſagit futuram.

DEcubitum in ægrotis motricis facultatis potentiam ac infirmitatem, ſeu debilitatem omnium maxime oſtendere, neminem Medicorum latet: & merito ſane ex ipſo decubitu poſſumus, quanta ea ſit facultas, conjicere. Motus enim, qui in decubitu fit, a duobus quidem pendet; a facultate quidem membra movente, atque ab ipſo quidem corpore, ejuſque membris per ſe motis. Hoc in cadaveribus ſpectatur, & moribundis, qui ex gravitate deorſum

Decubitus quid in ægrotis notat.

orsum moventur, illud in recte valentibus, & in ægrotis ad sanitatem inclinantibus. Recte sane Diocles dicebat animalium corpora ἐκτὸς φέροντος καὶ τοῦ φερομένου, idest ex ferente, & ex eo quod fertur, constare. Nam anima quidem seu virtus ipsa est, quæ fert; corpus vero id, quod fertur; hoc naturaliter deorsum movetur a gravitate, illa sursum deorsum, ante, retro, in latus movet ad arbitrium, aut quasi suspensa in aere membra continet, dum musculos contrahit, tendit, sistit, ne proprio & elementari motu deorsum delabantur. Ubi itaque corpora vix moventur, convertuntur, eriguntur, sed præ gravitate facilius deorsum delabuntur, nobis significant facultatem animalem majori ex parte esse extinctam ac resolutam. Hac enim integra existente, nihiloque diminuta, corpora facile quomodolibet ab ægrotis moventur, convertuntur, eriguntur, brachia, manus, caput in aere sustinentur, atque hoc est vivere, seu vita, quæ eatenus est, quatenus anima ipsa corpori firmiter copulata manet, qua disjuncta a corpore mors succedit, seu interitus. Ubi itaque plurimum ipsa anima in corpore valet, optimos decubitus spectamus, eaque prælanguente, pessimos. Sed age de bonis modo agamus, & quomodo in acutis morbis ab ipsis liceat præsagii rationem habere. In 7. *coac. præs. text.* 497. scriptum est, optimum esse decubitum, veluti quis sanus solitus fuit decumbere. Neque mirum, quum ii, qui gravi morbo laborant, non possint eo modo decumbere, ut antea per sanitatem solebant? Fracti viribus supino decubitu oblectantur, distentis cruribus, ac brachiis jacent, inquieti ac anxii in uno decubitu consistere nequeunt, nullamque formam decubitus servant. Delirantes seipsos foras e lectulo projiciunt, pedes ac etiam pudenda nudant, aliquando prosiliunt. Moribundi præ facultatis impotentia ad pedes deorsum delabuntur. Quare decubitus, qualis fuit per sanitatis tempus, seu qui sanorum sit similis, merito optimus erit, & significat ægrotos non vexari maligno, aut periculoso morbo. Quem Hippoc. quoque *in primo Prognost. pag. 37: lin. 33. & seq.* laudavit, quum ita dixerit: *At ita cubare ut sani solent, saluberrimum est. Prognost. pag. 39. lin. 33. Optimum vero est, ubi corpus, quod laborat, facile convertatur, assurgendoque alacre sit,* decumbat, stet, membra sustineat. Hæc enim actio promta ac expedita nervorum robur, spirituum copiam, & facultatis animalis integritatem denuntiat. Atque hoc est, quod Auctor *præsag. Coac. text.* 493. ita habet: *Converti autem facile ægrum oportet, alacremque esse, dum se attollit, exsurgitque.* Hippocrat. vero *in primo Prognost. pag. 37. lin. 33. & seq.* de optimo locutus, ita habet: *Cubantem offendi ægrum a Medico oportet in latus dextrum aut sinistrum, ac manus, cervicem & crura paullulum reducta habentem & omne corpus molliter positum: ita enim plerique bene valentium cubant. At ita cubare, ut sani solent, saluberrimum est.* Ex quibus colligitur tria ad optimum decubitum expeti, primum ut ægroti in alterutrum latus cubent, quod sane, ut Galen. docet *in commento*, talis decubitus indicat robur facultatis per musculos firmantis corpus, veluti debilitatem ostendit, ubi in latus æger cubare nequit. Secundum, ut manus, cervicem, & crura paullum reducta habeat; hoc enim consuetum plerisque benevalentium est. Tertium, ut corpus molliter positum jaceat. Gal. vero *in primo libro de Humoribus text.* 24. ait, *ut totum corpus non siccum, sed humidum sit.* Non ut putant aliqui, quod corpus omne æque calidum molleque esse debeat, sed ut recte Galenus docuit *in primo Prognosticorum* loco citato, quod secundum declaret, quippe corpus ægri debere manus, cervicem, cruraque paullum reducta, minimeque immoderatius aut reducta aut extenta habere, & quod intensa sicca omnia videantur, propterea laudavit corpus molliter positum, idest, ut non siccum, sed humidum.

Decubitus quinam boni.

Quod Galenus *in Comment.* ita expressit: *Igitur immodici habitus, extentis admo-*

admodum nervis, officiunt, quomodo libro de motu muſcul. jam definitum eſt. Qui vero inter habitus immodicos incidit, nequaquam intentus eſt; quocirca talem vocavit mollem, quia corpora molliora intendi non ſolent. Quam rem clarius quoque declaravit *in lib.* 1. *de Humoribus comment.* 24. Quocirca oportet, ut ipſe conſulit, brachia, & crura parum reducta eſſe, ut totum corpus jaceat extra figuras extremas: extremas autem figuras intelligo, in quibus longa extenſio aut flexus, ſive artuum, ſive ſpinæ ſint, quæ nervis ſupra modum extentis fiunt. Atque hi ſunt optimi decubitus, qui cum aliis bonis ſignis ſalutem prænuntiant. Nunc ad ſignificantes contrarium declinemus.

CAP. III.

De malo decubitu in acutis morbis, exitium denotante.

MAlum omnem eſſe decubitum, qui recte valentium non eſt ſimilis, ex præmiſſis cognoſcitur. Quemadmodum etiam dictum eſt, optimum eſſe, ſi quis ægrotus alacriter aſſurgat, aut in lectulo convertatur, quod vigere facultatem animalem, motricem appellatam, indicat; ita ſi cum labore, & gravitate moveatur, prælanguidam oſtendit. Ex quo *in Coacis præſagiis text.* 493. legitur: *At gravitas totius corporis & manuum ac pedum mala eſt*; præſertimque non oppreſſis muſculis plenitudine, nec ſubita aliqua vacuatione aut occaſione manifeſta prægreſſa. Cum gravitate vero hac, (quæ motricem læſam denotat) *ſi digiti* (addidit auctor *Coac. præſagiorum textu eodem*) *lividi ſint, & ungues, mors eſt in propinquo*, quod gravitas corporis animalem defeciſſe facultatem, & lividitas digitorum, & unguium, caloris conſpicuam, qui a corde manat, extinctionem ſignificet. Damnatur quoque decubitus propterea ſupinus ab Hippocrate, qui extremas figuras oſtendit, quod *in primo Prognoſticorum pagina 37. lin. 39.* ita expreſſit: *Supinum vero cubare manibus & cruribus extentis, minus bonum eſt*: ſed *in Coacis text.* 497. rectius ſcriptum eſt, *bonum non eſt*. Et Gal. *in com.* dixit, talem habitum jacentibus omnino bonum non eſſe, idque vel etiam ita eſſe, ex *Hippocrate* demonſtrat, quum ipſe dixerit ibidem, ſi vero proclivior fuerit, & ſubinde ad pedes delabatur, majori cum periculo eſt; tamquam enim prædictus habitus cum periculo ſit. Hunc vero decubitum, Galeno viſum eſt, neque ad ſanitatem, neque ad mortem prædicendam, vim inſignem habere.

Decubitus quinam malus.

Decubitus ſupinus quinam malus.

Ceterum non deſunt, qui putent ſupinum decubitum eſſe bonum, & primo, quod ingenti labore fatigati eo decubitu maxime recreentur; quoniam omnes muſculi (Thoracis exceptis) quieſcunt, atque etiam, quod, ſupino corpore, in partem imam ac graviſſimam, ceu navis carinam, homines procumbant; non minus etiam, quod reſolutæ vires animales non alio decubitu magis tueri poſſint, ac etiam ad excludendos calculos e renibus, e veſica, hic jacentis habitus conducat. At ſi hac ratione bonus decubitus vocetur, quis dubitabit etiam malum eſſe? Quum muſculi Thoracis, aſcendentis inter inſpirandum, ſupino homine magis laborent, quam ipſo erecto, aut alio modo decumbente. Hic etiam decubitus, ſi diu ſervetur, multos morbos vel etiam graviſſimos parit, ut epilepſiam, incubum, paralyſin, atque apoplexiam. In ſupino enim decubitu humores, vaporeſque ad poſtremum cerebri ventriculum omnium digniſſimum deſtillationeſque facilius ad thoracem, atque ad renes deducuntur. At hoc modo nos non conſideramus, quatenus nimirum cauſa vel boni vel mali ad corpus eſſe poſſit, ſed ut ſignum ſit ad prognoſin faciens. Qua ratione perpetuo dicimus ſignificare facultatis debilitatem; omnes enim, qui ſupine jacent,

Quenam mala producit, ſi diu ſervetur.

niſi

niſi ſane ita conſueverint jacere, debiles ſunt. Hic vero decubitus, quippe ſupinus, aliquando eſt arbitrarius, & fit præ mollitie quadam & languore animi, vel præ mærore: ita aliquando decumbunt ægroti, aut præ acceſſionis vehementia, aut denique ex inſigni vacuatione. In his quicquam certi ſupinus decubitus ad præſagium non habet. Ubi vero ab iis non fit, ſed ſupine jacent, manibus cruribuſque extenſis, malum eſt; malumque itidem eſt, teſte Hippocrat. in *text.* 21. *primo Prognoſticorum pagina* 37. *lin.* 39. & 47. ſi crura cubantis ſupini admodum reducta dictractave fiant: delirium enim ſignificare Galenus docuit. *Si* vero, ait Hippocrat. *ibid. lin.* 41. *proclivior eſt, ac deorſum delabitur ſubinde ad pedes, majori cum periculo eſt.* Nos vero dicamus, hunc eſſe exitialem decubitum. Peſſimum vero erit, ubi etiam corpus ſupine decumbit, quaſi projectum cadaver, ita ut omnia membra proſtrata ſint, caputque in pulvinar erectum reflectatur, aut ſublato mento, quicquid eſt anterioris colli, emineat, aut mentum claviculis contiguum ſit. Proximæ enim mortis eſt argumentum. Soluta enim animæ poteſtate grave corpus in dorſum jacet, projectis cruribus & manibus ad pedes devolvitur, vel exſtante mento & gutture caput in poſteriorem partem recidit, vel quaſi annuens claviculis incumbit. Quo ſane decubitu in foribus exitium eſſe ſignificatur. De quo Galenus *in primo lib. de Humoribus text.* 24. ita habet: *Scito igitur nunc dejectionem appellari, quum quis modo hominis viventis decumbere non poteſt, ſed tamquam mortuum inanimumque corpus deorſum fertur.* Quum enim quis jacens ad pedes ſubſabitur, ut Hippoc. ſenſit, ſignum eſt virium ad extremam imbecillitatem perductarum; non poſſe aut ſtare, vel ſedere, vel exſurgere, eſt certe minus grave; ſed dejectum eſſe modo inanimi corporis, quum robur univerſum eſt ex omni parte exſolutum, & perditum, ἐρρίφθαι vel Erriphte, ſcilicet dejectum, idem *in ſexto Epid. ſect.* 1. *text.* 19. eſſe peſſimum docuit ubi voce ἔρριψις utitur ad oculorum projectionem denotandam. Quem decubitum ad pedes, Galen. demonſtrat *in libro tertio de motu muſculorum*, exemplo cadaverum, eſſe exitialiſſimum; quod ſi corpus hominis mortuum ſic inclinaveris, non enim ne minimo quidem tempore manebit, ſed ſupinum aut pronum ſtatim fiet, quocumque gravitate verget.

Decubitus quinam peſſimus.

Decubitus ad pedes peſſimus.

His addamus eos non minus pernicioſe ſe habere, qui hiante ore dormiunt, teſte Hippocrate *in primo Prognoſticorum pag.* 37. *lin.* 46. qui dixit: *Si vero hianti dormiat ore, exitioſum eſt.* Quod præſagium diverſo modo expreſſit Auctor *Coacorum præſagiorum text.* 497. quum dixerit: *letale autem eſt, & hiante ore dormire ſemper & crura ſupini jacentis valde incurvata eſſe ac complicata.* Oris hiatus fit vel propter facultatis maxillam inferiorem moventis imbecillitatem, vel propter ingens cordis incendium, aut ex utraque hac cauſa, vel propter particularem reſolutionem muſculorum, qui maxillam inferiorem cum ſuperiori committunt. Galen. *in 7. lib. text.* 29. vero ait: multo majorem noxam ſignificare oris hiatum citra ſomnum: & *in ſecundo, de motu Muſcul. capit. quarto*, ſcribit: ſupinum jacere & hiare, ſtertoris, aut exſolutionis, aut ebrietatis, aut ignaviæ ſigna eſſe. Ceterum non minus perniciоſum eſt, alios in delirio, alios extra manifeſtum delirium, quod ex oratione intelligetur, provolvere ſe ad margines lecti, ac primum pedes excludere, deinde quaſi deſurgere, corpus erigere, ac niſi cohibeantur, vel excidere vel ſurgere. Ex quo obſcuro delirio, ex hoc ſigno edito, Hollerius *in Coacis præſagiis* teſtatur, ſe, qui convaluerit, vidiſſe neminem. Addimus nos ex Hippocrate *in eodem primo Prognoſticorum pag.* 37. *lin.* 51. erectum ægrotum velle ſedere, in acutis, malum eſſe; peſſimum autem in peripneumonicis & pleuriticis. Hoc vero Hippocrates hiſce verbis expreſſit: *Si vero velit reſidere æger in ipſo morbi vigore, in omni morbo acuto, malum; peſſimum vero in pulmonia eſt.* Qui pulmonia infeſtantur, (ait Galenus *in comment.*) ii dicunt ſentire

Oris hiatus inter dormiendum peſſimus.

Decubitus mali.

ma-

magnam in thorace anguſtiam, dum ſupini cubant, reſidentes vero fieri ſpirantiores; decumbit enim ad ſpinam, per ſupinum jacendi habitum, pars in pectore thoracis, a qua pulmo arctatur, nec idoneum accipit aerem in ſpirando: per alios vero morbos, quoties vigent (id enim maxime conſiderandum eſt, tamquam non ſit temere additum.) exitioſiſſimum eſſe, velle ægrum reſidere in ipſo conſiſtendi vigore. Amant enim tantiſper, maxime perpeſſi, immoti cubare, & ſi quis eos excitat, conflictantur. Itaque arbitrare propter vehementem ſpirandi difficultatem, aut inquietationem, aut delirium, reſidere ægrum aggredi per conſiſtendi vigorem ægrotationis. Huic ſimilis videtur decubitus, quem Hippoc. *in eodem libro pag. 37. lin. 43.* ita tradidit: *Si vero nudos habeat pedes nec admodum calidos, ac manus, collum & crura diſpergat inæqualiter, malum eſt; ſignificat enim inquietationem.* In iis vero, qui animo molles ſunt & delicato, quicquam certi non habent, quum hi vel etiam ex leviſſima febre ita decumbant: at in aliis ſcito fieri vel vitio oris ventriculi, vel propter virium imbecillitatem. Hoc idem *in Coacis præſagiis text. 497.* ita legitur: *At pedes nudos habere & manus, ſi quis non vehementer calidus ſit, & crura diſjecta, malum eſt; anxietatem enim ſignificat.* Sed de hac anxietate in ſequenti capite nos accuratius. Demum in ventrem quoque ægros cubare, nequaquam ſolitos ita dormire, malum eſſe, ſcripſit Hippoc. *Prognoſt. pag. 37. lin. 48. & Coac. præſag. tex. 497.* deliriumque aut dolorem circa ventris ſedes ſignificare: atque hæc de prædictione ex decubitu malo dicta ſint. Nunc de anxietate & inquietudine, quæ decubitus eſt ſpecies, accurate agemus.

CAP. IV.

Quid inquietatio & anxietas, ſeu jactatio in acutis morbis ſignificet?

QUum inquietatio ſit jactatio quædam, quæ ad motricem facultatem videtur pertinere, quatenus eſt motus depravatus ſeu vitiatus, idcirco de hoc quoque ſymptomate ad præſagium nos accurate agemus, etſi de hoc etiam in capite præcedenti quædam attigimus, non inutilia tamen ad prædicendi noſtram methodum hæc quoque erunt. Ceterum in primis quid per inquietationem Medici intelligant, quidque ipſa exiſtat, atque a quibus fiat cauſis, nos cognoſcemus. Quatuor vero nomina ſynonyma, quum *in Prognoſticis* tum *in Prorrheticis*, in aliiſque omnibus libris Hippocrat. ad præſagii rationem facientibus, leguntur; quippe anxietas, inquietatio, implaciditas atque jactatio. Idemque hæc ſingula ſignificant; tametſi anxietudinem ad reſpirationem læſam, quippe ad frequentem ac inordinatam, attinere quidam voluerint, tamen ad decubitus figuram vitiatam vere pertinere, ex Galeno facile deprehendimus, quum ipſe *in libro de Humoribus text. 17.* ita ſcripſerit: *Anxietatem autem vocavit, quamquam plerique tædium ſui nominant, ajunt enim eos ægrotos anxios eſſe, qui decubitum ferre non poſſunt, ſed formas mutant, quia præſens eis ſemper moleſta eſt.* Et *in ſecundo libro Aphoriſmorum*, eodem modo & ægros illos anxios eſſe, qui accubitum non ferentes, jacendi figuram evarient, quia ſemper præſens aggravat eos. Nihil aliud vero his nominibus intelligimus, quam decubitum vitiatum, quippe quum morbi malignitate, aut vehementia in varias figuras decubitus æger transformatur, nec ullo conſiſtit loco, ſed varie ſe jactat, movet, rapit, modo ſeſe attollens, modo ſe deturbans, modo in latus alterum, modo in ventrem, modo in dorſum ſeſe provolvens, nec ullum locum, nec ullam figuram decubitus nanciſcens. Anxii vero ſeu inquieti fiunt ægroti, vel ſtomacho male affecto; aut a copia ciborum oppreſſo, cum

Inquietationis ſynonyma.

Anxietas quid.

Anxii unde fiunt ægri.

nauſea; aut magno alicujus interni viſceris phlegmone, vel virium imbecillitate, quæ non ſuſtinet morbum; aut occulta malignitate, cor, uti in peſtilente febre, obſidente; aut materia in venis, quæ ſunt circa præcordia turgentes, huc & illuc agitata; aut denique critica vehementique perturbatione, ſeu humore ad excretionem turgente. Stomachi vero vitio redduntur anxii, aut ipſo ab intempeſtivo cibo gravato, Hippoc. atque Galen. *in lib. 2. de Victus ratione in acut.* variis locis docentibus; veluti quando ægri poſt longam inediam, morborum non tranſacto vigore, copioſius nutriuntur, aut ubi in ore ventriculi, ut Galen. *in 2. Aphoriſm.* & *in 1. lib. de Humoribus*, propria quædam moleſti humoris qualitas continetur, qui humor neque multus ſit, neque in ventriculi ſpatio innatet, ſed in ipſius ſit tunicis immerſus; aut demum, quod forte idem eſt, quando, ut ex Galen. *in 2. Prorrh. text.* 42. habetur, os ventris a pravis mordetur humoribus. Cognoſcitur vero, quod anxii ex ſtomacho affecto, ut Galen. ibidem affirmavit, ſint nauſeabundi. Morbi etiam vi anxii redduntur homines, ardentibus æſtuoſiſque febribus vexati, præcipueque in vigore, quo tempore ex maximo caloris æſtu anxii fiunt, atque etiam (quod non levis malignitatis eſt ſignum) tales efficiuntur a maligna humoris biliofi corruptione, in magnis venis turgente, atque æſtuante. Quæ anxietas præſertim apparet, ubi viſcerum aliquod magna phlegmone, aut eryſipelate vexatur: hi non admodum in extimis ac extremis partibus calent, quum interius tamen urantur. Ex virium quoque infirmitate, ut *in 2. illo Prorrh. comm.* 17. Galen. docet, quum virtus a corpore gravatur; veluti ubi immodicæ vacuationes præceſſerint, aut quod virtus morbi malignitate extinguatur. Demum humoribus ad excretionem titillantibus ſeu commotis anxii & inquieti fiunt ægroti. Ex quo merito Hippoc. *in 2. lib. Aphor.* 13. dixit: *Quibuſcumque judicatio fit, iis nox gravis ante acceſſionem.* Ubi enim natura vult humores excernere, fit in toto corpore commotio, ac perturbatio, a qua anxietas & inquietatio. Addamus ſuppuratos quoque ſæpius inquietari, aut oppreſſis viribus & natura fatiſcente, aut ſublato uſu reſpirationis, aut ex æſtuante thorace, aut acrimonia puris, ſenſilibus partibus commorſis, aut deſtillatione acri ex capite ad os ventris deſcendente. Atque ab his cauſis hujuſmodi ſymptoma proficiſcitur. Quibus auditis ad præſagium deſcendimus. Dicimus itaque omnem inquietationem, cum Auctore *Prorrheticorum Text. 39. 76. lib. 1. & aliis locis*, perpetuo malam eſſe, (critica excepta quæ criſin optimam antecedit). Verum ex inquietudinibus quædam hujuſmodi ſunt, quæ quicquam certi ad præſagium non habeant. Cujuſmodi ſunt, quæ vitio ſtomachi fiunt, hæ quidem etſi malæ ſint, tamen numquam per ſe ſolæ quicquam certi ſignificant de more ac vita ægrotantium præſagienda, has vero, quippe ſtomacho affecto excitatas, ab aliis diſtingui nauſea vel vomitu, Galen. *in 2. Prorrheticorum comment.* 42. tradidit, propterea quod ea cauſa inquieti nauſeabundi ſint, & vomant. Ex quo Auctor *Coacorum præſagiorum*, (*Textum hunc nuſpiam in Coacis reperire licuit.*) merito dixit: anxietatem cum faſtidio & nauſea ventriculum læſum ſignificare. In febribus vero intermittentibus, & in aliis morbis multis, cum nauſea & faſtidio inquietationes haud ſunt malignæ, quum ſæpe oborto vomitu inquietatio tollatur. Quod Hippoc. in *Theotimi uxore* vidit, de qua ipſe *in lib. 7. Epidemiorum Pag.* 1234. *text.* 102. *Uxor Theotimi in ſemitertiana anxietates & vomitus & horror ſimul, quum febris inciperet, & ſitis. Procedente vero, quum febris inciperet, & calor ingens; quum melicratum potaſſet, & vomuiſſet, horror & anxietas ſedata ſunt.* Quare anxietas & inquietatio cum nauſea & faſtidio non eſt admodum timenda, omniumque minime, quæ ex vomitu, natura arteque procurato, ſedatur. Veluti, quæ a vomitu augetur, malignitatis non expers eſſe ſolet. Eodem modo etiam in febrium ardentium

Ex ſtomachi vitiis.

Inquietatio ex Morbi vi.

Ex virium infirmitate.

Ex critica perturbatione.

Ex ſuppuratione.

Inquietationis prognoſis.

Inquietationes quædam haud malignæ.

vigo-

vigore, calore æstuante, inquieti ægroti timeri non debebunt, & quando illud ejusmodi febrium symptoma proprium sit. Bonæ etiam non raro apparent, ante crisin futuram optimamque; nam ut alias est demonstratum, antequam crisis principium appareat, ægri anxii, inquieti, turbulenti fiunt, & merito quidem, quum universum corpus commoveatur, ac turbetur, natura humoris morbifici excretionem tentante. At hæ inquietationes criticæ criticis etiam signis ab aliis distinguuntur, maximeque cognoscentur, ubi rigor anxiis supervenerit, ab ipsoque copiosiorem sudorem ægroti sudent, aut plurimum vomant, aut alvus multa dejiciat, aut sanguis critice fluat copiosius. *Bonæ quæ critica.*

De quibus *in* 1. *Coac. præs. comm.* 1. *text.* 19. legitur: *inhorrescentes, anxii, lassitudine pressi, lumbis dolentes, in profluvium alvi incidunt*: & in lib. *Coac. præs. text.* 111. *Qui a pervigiliis anxietate repente capiuntur, sanguinem profundunt e naribus.* Anxii quoque non raro ægri fiunt, natura ad cutim putridos malignosque humores movente, ut in exanthematum apparitione, quibus erumpentibus cessant in ipsis anxietas. Et hæ sunt inquietationes in morbis non timendæ. Contra vero, veluti dictum est, non malas esse cum ardentibus febribus inquietationes, omniumque maxime in vigore, quo tempore omnes, febris calore nimis æstuante, anxii redduntur: malignæ ex his dicuntur, in febre, quæ exterius non admodum sit calida, quum tamen intus uri ægrotos observemus. Hoc enim malignarum febrium proprium videtur, quum hæ exterius placidæ ac mites appareant, interius maxime turbantes: quod fit, uti dictum est, aut propter visceris alicujus insignem inflammationem, aut erysipelas, aut ob summe putridos humores in venis circa præcordia æstuantes, aut propter virium infirmitatem, aut etiam insignem crudorum humorum copiam, qua obrui natura videtur. Hi enim anxii sese jactant in febre, quæ exterius est parum calida, quod non levis malignitatis nobis est indicium. *Quanam maligna.*

Omnium vero pessimæ existunt inquietationes, ut *in primo Coacorum præsagiorum comm.* 1. *text.* 2. legitur, *Quæ cum refrigeratione anxietudines incidunt*, partium præsertim extremarum, scilicet, pedum, manuum ac aurium. De quibus Hippoc. in 1. *lib. Progn. pag.* 37. *lin.* 43. ait: *Si vero nudos habeat pedes, nec admodum calidos, ac manus, collum, & crura dispergat inæqualiter, malum est. Significat enim inquietudinem.* *Quanam pessimæ.*

Quæ vero extremis partibus corporis refrigeratis non recalescentibus fiunt, maxime exitiales habentur, quæ in foribus exitium esse commoneant. Quales *in Sileno, lib.* 1. *Epidemiorum Ægr.* 2. *pag.* 696. & *in muliere decumbente in foro mendacium Epidem. lib.* 3. *Ægr.* 12. *pag.* 1080. Hippoc. vidit. Non minus etiam exitiales habentur, quæ cum sudore malo, die decretorio, apparent. *Cum extremis partibus corporis perfrigeratis.*

Mali sudores sunt ex Hippocrate, ut posterius docebimus, frigidi omnes in febre continua superiorum corporis partium, quippe capitis, colli, clavicularum. De quibus *in* 1. *Prorrhet. text.* 27. scriptum est: *Quæ cum refrigeratione, non sine febre, superioribus sudanti partibus, fiunt implaciditates, inquietationesque, phreniticæ existunt, & pernicioſæ, ut Aristagoræ*: & Hippoc. *in primo Epidem. comm.* 3. *Ægr.* 2. *pag.* 696. de *Sileno* moribundo: *Sexto caput parum exsudavit, extremitates algebant, livescebant, multum sese jactavit*: & de *muliere* in *mendacium foro* decumbente *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 12. *pag.* 1080. ait: *Septimo superriguit, febris acuta, sitis ingens, se jactavit, sub vesperum per totum corpus sudavit frigidum, frigus partium extremarum, nec redibat illis calor.* Quare inquietudines in refrigeratis cum malis sudoribus sunt exitiales. Quod idem est, ac si dixerimus; cum malis signis malas & cum pernicioſis esse pernicosas & letales. Sudores vero capitis frigidos, extremorumque refrigerationes, esse ex signis pernicioſis, docuit Hippocr. *Quoad primum vide Coac. præsag.* 572. & 573. *lib. progn. pag.* 38. *lin.* 21. & *lib. de Crisib. p.* 54. *Cum malis sudoribus.*

Inquietationes quando peſſimæ in diebus criticis.

lin. 8. *Quoad alterum vero vide lib. Prognoſt. pagin. 39 lin.* 30. Inquietationes quoque in diebus criticis apparentes certius habent judicium, peſſimæque exiſtunt, quæ criticis diebus, nulla optima ſubſecuta evacuatione, aut ſanguinis, per nares, aut per alvum, aut per vomitum, aut per urinam, aut omnium maxime ſudoris, de quibus *in Prorrh. lib.* 1. *text.* 61. ſcriptum eſt: *Quæ in judicatoriis diebus cum projectione & inquietatione, & abſque ſudore perfrictiones fiunt, malæ exiſtunt.* De his vero, quæ cum malis dejectionibus, Hippoc. *pag.* 393. *lin.* 9. *in* 3. *de Vict. in acut. tex.* 14. ita habet: *Dejectiones autem hujuſmodi habent quidem & alias magnas offenſas, neque hypochondriorum extinguent ardorem, ſed excitant inquietationem, & jactationem membrorum faciunt*: & Gal. *in comm.* ait, hæc eſſe flammantis in hypochondriis ipſis affectionis ſymptomata: & de his quæ cum vomitibus apparent, Auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 62. dixit: *Vomitiones ſinceræ atque implacidæ, malæ.* Quæ non ab immodicis evacuationibus, jam exinde natura prælanguente ac viribus fere collapſis, prorſus perniciales exiſtunt. Hæque in moribundis multis apparent. De his Hipp. *in lib.* 7. *Epid. pag.* 1212. *text.* 12. in hiſtoria *Chartadis* ait: *Anxietates autem circa cor & ſudor exiguus per totum fere corpus, & febricula, frigeſcere videbatur, & primum quidem mente conſtabat, procedente autem die & anxietas major & inquietudo, & ſpiritus paullo denſior, & confidentius & benignius, quam pro tempore, alloquebatur, & excipiebat, & quædam animi deliquia videbantur ſupervenire, offerentibus autem quibuſdam ſuccos, & ex farina aquam, non ſolvebantur, ſed ſpiritus ad veſperam valde erat multus, & jactatio multa, & in dextra ac ſiniſtra convertens ſeſe nullo tempore quieſcere poterat.* In morbis quoque acutis, ſi ceſſante dolore aliquo, partem aliquam ignobilium tenente, anxii omnes fiant, malum ſignificatur. Quod de *Lariſſa calvo* Hipp. *in* 3. *lib. Epid. com.* 3. *Ægr.* 5. *pag.* 1101. ita habet. *Tertio femur deſiit dolere, mentis alienatio & turbatio, multumque ſeſe jactavit. Quarto ad meridiem periit.* E vulnere quoque ac percuſſione homines anxios reddi, malum eſſe Hippocrates, ut ex 5. *Epid. pag.* 1155. *tex.* 59. conſtat, in *illo* obſervavit, cui caput lapide percuſſum fuit, & *in illo ibidem pag.* 1156. *text.* 61. cui hepar jaculo fuit percuſſum. In phreniticis quoque exitialibus inquietationes non raro ſpectari, Auctor *Prorrhet. in lib. text.* 12. ita habet: *In phreniticis in principio ſimpliciter & clementer habere, ſed cerebro permutari, malum.* Ex his ergo colligamus omnes inquietationes, ſeu anxietates, malas eſſe, iis exceptis, quæ optimas criſes antecedere ſolent; & quæ ex ſtomacho affecto fiunt, cum ſignis non perniciosis, aut ante, aut ſimul conſpectis, aut ſubſecutis. Quales fuere obſervatæ in *Sileno lib.* 1. *Epidem. pag.* 969. *Ægr.* 2. *muliere in foro mendacium decumbente Epidem. lib.* 3. *pag.* 1080. *Ægr.* 12. *Lariſſa calvo ibid. pag.* 1101. *Ægr.* 5. atque in *Chartade Epid. lib.* 7. *text.* 1212.

Cum vomitibus malæ.

Cum virium languore.

Acceſſatione doloris in parte ignobili.

Ex vulnere.

In Phreniticis.

CAP. V.

De prædictione ex tremoribus.

Tremor quid.

DE Prognoſtico a tremoribus acturi, primo quid hæc ſit affectio, & a quibus cauſis prodeat, cognoſcendum eſt. Galen. *in* 3. *Epidem. com.* 1. *text.* 2. tremorem ſpeciem affectionis facit motionis, non ſecundum naturam, ſed ſecundum arbitrium diminutæ, quod ſymptoma eſt ejuſdem facultatis, moventis partes corporis læſas, in quo partes contrario motu moventur, quando facultas conatur partem movere, quæ, præ imbecillitate aut pondere gravata, motionem facit ex motu contrario miſtam. Cujuſmodi

di affectio differt a motu convulsivo, quem plures in acutis febribus pro tremore accipiunt; ex quo Hippoc. in multis ægrotis tremorem pro motu convulsivo accepisse, quibusdam fuit suasum; qualis fuit, qui *in virgine illa pulchra Nerei*, ut 5. *Epid. pag.* 1154. *text.* 50. colligitur, apparuit: quomodo forte ex Medicis antiquis Sabinus atque Metrodorus dixere, tremorem esse parvam convulsionem; quasi affectionem mistam ex tremore & convulsione intellige re voluerint, quem tremorem motum convulsivum, atque convulsionem ex materia non proportionata, vulgus Medicorum etiam appellat. Alii etiam putant Hippoc. aliquando tremorem pro rigore accepisse; veluti quum in 4. *Epid.* 1125. *text.* 13. dicat *de adolescente peregrino* sexta die judicato: *Septima rediit & dimisit cum tremore*: idest, ut ii volunt, cum rigore; quod tamen verum esse non videtur, quando vere ibi Hipp. tremorem, minimeque rigorem, intellexisse, nobis vel ex eo persuadetur, quod in eo crisis, sexta die facta, perfecta non fuerit, sed partim excretione & partim transmissione materiæ morbificæ pituitosæ, quæ musculos nervosque gravans tremorem faciebat. Sed de his satis, atque ad tremoris generationem nunc declinemus, de qua Galen. *in lib. de tremore, rigore, palp., & convulf.* agens, scribit tremorem fieri a virium infirmitate, seu ab motricis facultatis imbecillitate, quæ aliquando per se propria ratione est imbeilla, ut in senibus, qui jam viribus defecerunt, & aliquando propter alias causas, quatenus contingit, ex ipsis ut motiva hæc facultas dissolvatur. Proinde *Gal.* dixit hujus facultatis imbecillitatem fieri aut alimenti inopia, ut in cholera, valido alvi profluvio, largo sanguinis fluxu, atque in magno jejunio, a quibus alimentum absumitur, & exinde facultas evadit imbecilla; aut vitali robore soluto, ut fit in stomachicis, cardiacis, animo defectis, frigore violento; aut denique plenitudine pondere gravante musculos, nervosque. Idem vero *in 3. Epid. comm.* 1. *tex.* 2. nobis prodidisse visus est, quum tremoris causam fecerit musculorum virtutis imbecillitatem, eamque aut propria ratione fieri, aut ob copiam humorum gravantem, aut ob famem, lassitudinem, vigilias, curas, immoderatam venerem dixerit, quæ omnia calorem nativum, seu vires resolvunt. Verum consultius erit, ipsum Galen. clarius adhuc tremoris causas, & generationem, in hoc loco tradentem audire, qui ita habet: *Fit igitur tremor non solum ex laborantibus tum musculis tum nervis; verum quoque & valentibus, ubi supra vires quis grave aliquid aggreditur, vel manibus portans cernitur. Itaque adolescentes quidam validissimi, dum prægrave quippiam gestant, cruribus obtremiscere, & præsertim ubi scalas ascendere tentaverunt, quod illis & ex gravissimo pondere, senibus vero atque aliter imbecillis ex minore accidit, nempe & hoc imbecillis grave*: & paullo post ita causas omnes tremoris complectitur, dicens: *Jure igitur optimo*, (in comm. de trem. convulf. & rig.), *tremorem ex virium infirmitate perpetuo fieri demostravimus*. At quoniam interdum quidem virtus ipsa per se imbecilla est, interdum ob animi affectum, atque etiam, quod nullo modo sua propria ratione affecta, ex gravi pondere hoc patiatur: tres itaque causarum differentiæ tremoris existunt, instrumentorum scilicet arbitrio deputatorum intemperies, passiones animi, & grave onus. Intemperies vero quum calida, tum frigida, tum humida, tum sicca poterit musculos ita reddere imbecillos, ut exinde partes obtremiscant; caliditas quidem resolvens, seu dissipans partis nativum robur; aut frigiditas violenta, extinguens calorem nativum; aut humiditas, musculos imbibendo gravans; aut siccitas demum, humidum absumens, quo calor servatur, & alitur; hinc plures letalium phrenitidum in tremores, nervorum principio, nervisque ipsis immoderatius siccatis, desinere observatur: Animi vero passio, veluti timor, tristitia, immoderatum gaudium, & alii affectus animi, qui vires dissolvunt: aut denique grave onus, quo musculi gravati nequeunt

Tremoris unde eanse.

Virium infirmitas.

Tremoris causarum differentia.

Tremores in morborum principiis quid præsagiunt.

secundum voluntatem recte moveri. Sed his præmissis ad prognosin descendamus. Itaque dicimus quosdam tremores in principiis morborum apparere, & quosdam postea; nunc de iis, qui observantur in principiis. Hi enim, ut docuit Gal. *in 3. Epid. comm. 1. text. 2.* numquam in morbi principio citra validum morbum, vel famem, vel lassitudines, vel vigilias, vel immoderatam venerem, aut ob humorum copiam gravantem. Quare quum eæ tremoris causæ non præcesserint, humorum multitudinem tantum significant, nihilque certi ad Prognosticum per se soli; tametsi morbos graves significent, ex eo, quod omnis humorum multitudo difficilem reddat morbum. De hujusmodi tremore Hippocr. ait *in Epidem. lib. 3. Ægr. 1. pag. 1059. Pythion, qui prope telluris sacrum habitabat, cœpit primo die tremor a manibus, febris acuta, deliriura*: qualis etiam tremor fuit observatus in *Chærione* tertia die, ut Hippocr. *ibid. Ægr. 5. pag. 1072.* Ceterum etsi in morborum principiis tremores copiam humorum, musculos aut nervos gravantem, nisi aut propter vigiliam, aut nimium jejunium, aut lassitudines, aut vigilias, aut immoderatam venerem, aut animi curam evenerint, significent; tamen ægroti periculo non vacabunt, si gravi ac maligno morbo, vel etiam longo, vexentur, quando nedum hi, sed vel etiam omnis morbus sit timendus in homine, quacumque de causa debilitato. Dixi illos, ob copiam humorum, per se solos quicquam certi de salute ac morte ægrotantium minime præmonstrare, verum si una alia symptomata gravia illuxerint, reddetur judicium difficile: cujusmodi in *uxore Emmyrrhis* ab Hippoc. fuere observata, de quibus *in 4. lib. Epid. pag. 1138. text. 39. uxor Emmyrrhis modo non morbosa videbatur sine febre, fatua esse, deinde in tremorem venit totius corporis & liquationem, & fastidium & sitim, & frigida erat.* Quod præsagium quoque illuxit *in sene illo*, de quo Hippocr. *in eod. libro Epidem. pag. 1139. text. 41.* scripsit, post recidivam tremulum fuisse in initiis, in labiis & voce, quo tempore cutis corporis est observata circumtensior, frigida extrema fuerunt, quique merito obiit; tametsi hujusmodi tremorem is forte a vermibus, ut aliis quoque visum est, passus fuerit. Atque hoc præsagiunt tremores in morborum principiis. Quandoque vero sine alio morbo apparent, seu morbis statim incipientibus, ubi neque ebrietas, neque aliqua externarum nuper dictarum causarum præcesserint, apoplexiæ signum esse solent. Quod præsagium indicavit Hippocr. *in eod. 4. Epidem. pag. 1136. text. 36.* hisce profecto verbis, dicens: *Incipientibus veluti subtremuli, & digiti & labia quum loquerentur, itidemque aliæ partes: & proterve lingua citiori ac volutiore præditi. Rubor in facie præcipue his erat. Hi vinum bibebant, aut vomitu commodo usi intumescebant.* Idque tremores in morborum principiis præsagiunt. Ex iis vero, qui postea apparent, quidam criticam humorum transmutationem, natura a viscеribus ad musculos propellente humorum molestorum partem, qui optimi sunt, modo una cum coctionis signis apparuerint. Cujusmodi fuit tremor in *adolescente peregrino*, sexta die judicato, ut 4. *lib. Epidem. pag. 1125. text. 13.* apud Hippoc. habetur, quem febris septima die cum tremore dimisit, quippe noxiis humoribus a principibus partibus ad musculos critice transmissis. Sæpe vero fit, ut, instante crisi per vomitum, tremor labium inferius teneat, quem tremorem Gal. inter signa futurorum in morbis vomitum *in lib. 3. de Crisibus cap. ult.* recensuit. Atque hi sunt tremores in morbis post principium observati, minime timendi. Sunt vero alii omnes in febribus ardentibus, & in cerebri inflammatione exsiccatis nervis, aut quovis modo læso principio nervorum, quippe cerebro, obortis, letales; a siccatis quidem nervis in phreniticis tremores sunt mortales; proprii enim videntur tremores exitiosarum phrenitidum. Ex quo merito Auctor *Prorrhetic. lib. 1. text. 9.* dixit: *Phreniticæ affectiones vehementer tremulæ desinunt*, aut letales

Tremores quid in morbis significent.

Quinam valde timendi.

ſequuntur phrenitides. Gal. enim *in com.* ait: *Tremorem ſequi vehementiſſimas phrenitides; nervorum enim infirmitates propter affectionis ſiccitatem phreniticis diutiſſime inſunt, exſolutaque virtute tum vigiliis, tum motionibus multis, ſimulque nervis ſupra modum arefactis, tremores fiunt.* Quare in phrenitide tremores perpetuo letales exiſtunt; multoque magis, ſi una cum convulſis partibus apparent, quæ omnia ſequi ſolent vehementes phrenitides. In principio vero phrenitidis letales non ſunt: tremores enim linguæ, & voces obtremiſcentes deliriorum tantummodo futurorum eſſe ſigna, Auctor *Prorrh. lib.* 1. *text.* 19. docuit. In obſcuris & blandis phreniticis, exſoluta virtute animali, ſolent etiam tremores obſervari, qui quidem omnes ſunt exitioſi. De quibus *in* 1. *Prorrh. text.* 34. ſcribitur: *Tremulæ, obſcuræ, blandæque & contrectabiles deſipientiæ valde phreniticæ, ut* Didymarcho *in Coo. evenit.* Hæ enim exſoluta virtute fiunt, ut nos ſuperius, ubi de phreniticis egimus, oſtendimus. Ex gravi quoque cerebri læſione, eadem ratione reddita infirma vi motrice, fiunt tremores letaliſſimi, quales fuerunt in *virgine illa pulcra Nerei*, ab Hippoc. obſervati *in* 5. *Epid. pag.* 1154. *text.* 50.

CAP. VI.

De palpitationibus, quidque in morbis præſagiant.

PAlpitationem proprie dictam Gal. ac alii Græci Medici intelligunt, quemdam motum depravatum, ut Galen. docuit *in* 2. *lib. de ſymp. cauſſis, c.* 2. non autem arteriarum pulſus, quomodo quoſdam Antiquorum palpitationem intellexiſſe, Galen. *in* 3. *Prorrh. text.* 52. nobis memoriæ prodidit, ipſamque eſſe particulæ alicujus præter naturam dilatationem, ac diſtenſionem, ibidem tradidit: veluti *in lib. de trem. convulſ. & palp. cap.* 5. ſcripſit, palpitationem eſſe diſtentionem quamdam atque ſubſidentiam, quæ aut in toto corpore fit, qualis in phrenitico ab Hippoc. *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 4. *pag.* 1100. fuit obſervata, aut in una parte, aut in multis ſimul: in una parte veluti ventris, hypochondrii, cordis & aliarum partium generantur ſeu concitantur palpitationes, ut nobis Galen. eſt Auctor *in nuper citato libro* & in omnibus corporis partibus, quæ dilatari poſſunt, maximeque in cute, ſive loco, qui inter cutem, & carnem ſubjacet; atque in muſculis facilius hic affectus etiam concitatur, quod meatus ſatis magnos habeant, in quos commode flatus craſſos, palpitationum cauſas, recipiunt. Hos affectus vero concitari ex vapore craſſo, cui non ſit tranſitus, Galen. in loco nuperrime citato ita docet: *Palpitationum cauſam eſſe pronuntio ſpiritum craſſum, & vaporoſum, cui non ſit tranſitus, hunc autem colligi oportere dico in cavitate quadam non admodum exigua, ſi pars diſtentionem ſenſibilem habitura ſit*: Quod *in primo Prorrheticorum text.* 29. confirmavit, dicens palpitationem a flatuoſo ſpiritu proficiſci. Quos ſane flatus a craſſioribus crudiſque humoribus fieri, non minuſque hos flatus atque humores propter frigiditatem congeri, ibidem prodidit. Ex bilioſorum vero ac ſumme putridorum humorum morſu, nec non a vaporibus venenoſis, os ventriculi, & omnium maxime cor infeſtantibus, cor & ventriculum non raro palpitare, *in lib. de trem. palp. convulſ.* nuper citato, Galen. docuit, quem affectum *Cardialgiam* & *Cardiacam paſſionem* quidam faciunt, cumque palpitatione confundunt, quum tamen vera non ſit. Sed his præmiſſis ad Prognoſticum deſcendamus, & primo hoc ſciamus, quippe an in morbis acutis quædam obſervetur palpitatio, ex qua ſalus ægrotis indicetur. Certe res maxime videtur dubia; quando leves quarumdam partium palpitationes per ſe quicquam certi non prædicent: ceterum ſolent aliquando critice concitari eo modo, quo vertigines, dolores, anxietates & hujuſmodi

Palpitatio quid.

Palpitationum cauſa.

Palpitationes critice apparentes. alia critica, antequam fiat in corpore perturbatio, concitari ſolent. Proinde quandoque palpitationes critice apparere ſolent, quæ facile ex futuræ criſis ſignis ab aliis interſtinguuntur. De quibus *in* 1. *Prorr. text.* 36. legitur: *Circum umbilicum dolores palpitantes, quod mentis permutationem oſtendat, quippiam habent: circa judicationem vero his ſpiritus univerſus cum vehementi contenſione penetrat.* Et poſtea *in Prorr. lib.* 1. *text.* 144. *Ventris quoque palpitationes cum hypochondrii tenſione ſublonga & tumente ſanguinis indicant eruptionem, inhorreſcunt autem hi.* Ex quibus colligamus, dari quaſdam palpitationes criticas ſalutares. His itaque exceptis, omnes palpitationes in morbis ſunt malæ, ac non ſolum in morbis acutis, ſed vel etiam abſque alio morbo hujuſmodi affectus ſunt timendis preſertimque, quæ in corde ac ventriculo obſervantur, & omnium maxime in cordis paſſione, ex venenoſis quum humoribus tum vaporibus oborta, quæ in ſyncopen deſinunt, de quibus forte Hipp. *in* 2. *Aph.* 41. *Qui frequenter ac fortiter abſque cauſa manifeſta exſolvuntur, derepente moriuntur.* Et Gal. ait: *Sicut & ille, cui, dum exſolveretur, cor fortiter palpitabat.* Atque ut uno verbo dicam, omnes palpitationes fortes, cor invadentes ſæpius, cum alia ſine cauſa manifeſta exſolutione, ad mortem breviter homines deducunt, ut Auctor eſt Gal. *in lib.* 7. *de loc. affect. c.* 2. neque hi, qui hoc ſymptomate vexantur, multos annos vivere poſſunt. Sed age, dicemus in morbis quidem acutis omnes palpitationes (criticis exceptis) eſſe malas, omniumque maxime perpetuas, totumque corpus aut nobile viſcus infeſtantes, aut plures partes ſimul; idque, quod nobis refrigerationem caloris naturalis indicent, quando propter refrigerationem, ut Gal. affirmavit; *in* 1. *Prorrh. text.* 29. omnem vero refrigerationem calidis ſicciſque morbis maxime eſſe timendam, alias a nobis eſt demonſtratum. Ex qua cauſa comatoſos lethargicoſque affectus phreniticis ſupervenientes letales eſſe, ſuperiori libro a nobis fuit demonſtratum. Cujuſmodi Hipp. ut ex *Epidemiis* conſtat, in multis moribundis obſervavit. De *Sileno Epidem. lib.* 1. *pag.* 969 *Ægr.* 2. autem, qui obiit, ſcripſit: *A primo hic ad finem uſque ſpiritum magnum habuit, & rarum, hypochondrii perpetuam palpitationem.* Quæ vero in toto corpore fiunt, ſunt peſſimæ, quod maximam caloris nativi diminutionem teſtentur, de quibus *in* 1. *Prorrh. Text.* 30. ſcribitur: *Palpitationes per totum an voce deſtituti moriantur:* & Gal. *in comment.* ait: *Quum igitur corpus totum palpitaverit, fieri poteſt, ut qui ita affectus ſit, propter frigiditatem voce deſtitutus pereat, non amplius moventibus gutturis muſculis, aut iis, qui in eos proruunt, nervis, ſuo fungi munere queuntibus.* De qua palpitatione forte Hippoc. 1. *Epid. comm* 3. *pag.* 976. *Ægr.* 4. quum *de Philini uxore* loqueretur, dixit: *Circa diem decimum quartum, palpitationes, totum corpus dolebat,* (quaſi dixerit per totum corpus palpitantes dolores) *multum loquebatur, aliquantiſper mente conſtitit, brevi rurſus deſipuit, circa diem decimum ſeptimum obmuteſcebat, vigeſimo obiit:* & de *phrenitico* adhuc clarius *lib.* 3. *Epid. pag.* 1100. *Ægr.* 4. *Poſtridie mane vocem amiſit, febris acuta, ſudavit, non intermiſit, palpitationes per totum corpus, nocte convulſiones. Tertio cuncta exacerbata ſunt, defunctus eſt.* Quare peſſimæ & letales omnes in morbis acutis ſunt palpitationes, quæ diu, & maxime totum corpus vexant; ex iis vero, quæ partes quaſdam tantum occupant, exitioſæ non minus ſunt, quæ in cordis regione eo modo obſervantur: quum in eo calidiſſimo morbo refrigerationem factam eſſe ſignant, quæ perpetuo, in acutis morbis, quaſi caloris extinctionem teſtatur, qualis forte fuit, quam in *Adoleſcente Melibæe* Hippocrat. vidit, de quo *lib.* 3. *Epidemiorum pagina* 1117. *Ægr.* 16. ait: *Cordis palpitatio ad finem uſque perpetua, minxit oleoſum.* Ex quibus colligamus, palpitationes omnes (criticis exceptis) in acutis morbis malas eſſe, perniciosaſque eſſe maxime, quæ diu totum corpus vexant, aut nobile viſcus. Has vero perpetuo malas eſſe confirmabunt ſigna alia, mala, & cruditatis, & exitii.

Palpitationes omnes in morbis malæ.

Quænam peſſimæ.

Qui-

Quibus malis signis judicari poterant letales, quæ in *Sileno*, in *uxore Philini*, in *phrenitico*, atque in *Melibææ adolescente* ab Hipp. fuere observatæ, quum omnes una cum aliis signis pernicioſis, ac morbo plane crudo, illuxerint.

CAP. VII.

De convulsionibus, quidque in morbis præsagiant.

SEd age de convulsionum etiam præsagio agamus, eæ namque quum solæ, tum una cum aliis morbis, etsi perpetuo malum, raro salutem, sæpius exitium Medicis indicant. Quales esse videntur, quæ in febribus, resiccatis nervis, concitantur. Quæ vero repentinæ ac in principio morbi fiunt, quicquam certi ad prognosticum non habent; non paucæ etiam in febribus apparent, & ex se ipsis, præter multitudinem humorum, nihil certi ad salutem (criticis exceptis) præmonstrantes. Sed de omnibus nunc accuratius, postquam quid convulsiones sint, ipsarum differentias atque causas noverimus, agendum erit. Convulsio, *spasmos* Græcis dicta est, ut Galen. auctor est *in lib. de symptom. caus. cap.* 2. ubi nervi & musculi præter voluntatem tenduntur, in eumque veniunt affectum, quem in motibus secundum arbitrium factis assumserunt. In libro etiam *definit. medic.* scribit, convulsionem esse affectum, qui nervis ac musculis accidit, quum modo corpus totum, modo pars, voluntatis injussu, trahitur, ex quo merito *tentio & distentio*, hoc genus a multis appellatum est? sed quidam convulsionem seu spasmum a distentione distinguunt, ex Hippoc. *in* 4. *Aphorism.* 57. ita scribente: *Si cui convulsione, aut distensione nervorum, detentio febris successerit, morbum solvit*. Sed hoc Gal. *in comm.* probe explicavit, quippe quum ex tribus convulsionum differentiis, Græce *tetanos* dicta proprie magis distentio, & non convulsio, vel ex eo dicatur, quod in ipsa non appareant partes convulsæ; quoniam æqualiter ante & retro tenduntur, atque ideo præcipuum illi nomen est datum distentio. Duplex vero est convulsio, una permanens perpetua ac sine motu conspicuo, cujus triplex est differentia, una quidam *distentio* Latinis, *Tetanos* Græcis, Celso *rigor* appellata, quippe ubi cervix una cum reliquo corpore immobilis manet, & in neutram partem inflectitur, sed juxta utramque recta intenditur, cui proprie magis nomen est datum ab Hippocrat. distentio, quasi a convulsione differat, quod in ipsa, ut ex Gal. dictum est, partes convulsæ non appareant. Altera *Emprosthotonos* dicitur, quæ fit, quum caput, cervix, reliquumque corpus in pectus contrahitur, quæ ob id dicitur etiam *tentio ad anteriora*. Tertia *Opistotonos*, ideo dicta a Græcis, & a nostris *tentio ad posteriora*, quando caput in scapulas flectatur. Has vero Gal. *in lib. medicarum definitionum* his verbis complexus est. *Nam & ii, quos in itinere usque ad mortem frigus oppressit, talibus rigoribus corripiuntur, quales Græci* Emprosthotonos, Opisthotonos, *ac* Tetanos *appellant, quoniam modo in anteriorem, modo in posteriorem, modo in nullam flectitur partem, sed rectum atque immobile corpus intenditur*. Altera vero cum crebro motu & interrupto. Has vero medici appellant *motus convulsivos*, ac vel etiam convulsiones ex materia non proportionata, quum a morsu, & vellicatione nervosarum partium, aut violenta contentione ac labore, qualis est *Epilepsia* Græcis dicta, atque illa, quæ per consensum ab ore ventriculi demorso, aut cerebro primo læso venit. Hanc postremam convulsionis speciem minime exquisite, & per se convulsionem dicimus, sed potius motum convulsivum, cujus quædam universalis, ubi cerebrum primario affectu læsum est, & quædam particularis prout particularis nervus aut musculus vellicatur: non secus quam etiam permanens, & sine motu; ubi totum corpus læso cerebro occupat, universalis dicatur, atque illa particularis, quæ est partis

Convulsio quid.

Convulsionum differentia.

Permanens quid.

Motus convulsivi quid.

tis cujuſpiam convulſæ. Qua ratione quidam *ſpaſmum cynicum* appellant, oris torturam, aut melius, ubi oris partes convelluntur. De partibus vero, quæ convelli & diſtendi poſſunt, ac de loco in convulſis affecto, Gelen. *in 3. de loc. affect. cap.* 6. ait omnes corporis partas convelli poſſe, quæ aptæ ſunt moveri: etenim partes in corpore, quæ moventur, ope nervorum ac muſculorum moventur. Quibus convulſis motio vitiatur, veluti dentium invita concuſſio, *Trylmos* Græcis dicta, muſculorum mandibularum eſt convulſio, ut Gal. *in* 2. *de loc. affect. cap.* 2. docuit. Ex convulſis vero partibus, an ſpinalis medulla, an cerebrum, an nervi, & quales læſi ſint, *in lib. 3. de loc. affectis* ita docuit: *Convulſio enim univerſo corpore, omnes quidem autumant affici talem quampiam partem, quæ, ut in arbore caudex ramorum, ſic ipſa ſit omnium nervorum communis velut caudex, non paucorum in una parte, quemadmodum ramus, veluti, quando vel crus, vel altera manus forte fortuna convellitur, totius membri convulſio, nervorum, qui ad ipſum perveniunt, originem affectam fuiſſe, declarat, rami cujuſpiam in arbore exemplo.* Quando autem univerſum corpus afficitur, communem originem omnium infra faciem nervorum, quæ arboris caudici proportione reſpondet, affectum eſſe putandum eſt, qui ſunt primi ſpinalis medullæ; verum etiam cerebrum ipſum putamus: etenim labra quoque ſæpenumero convulſa videmus, item oculos, frontis cutem, totas mandibulas, ſimiliter & linguæ radicem. At, quia omnes jam dictas partes a muſculis ex cerebro nervos ſuſcipientibus moveri, ex anatome didicimus, cerebrum, ipſis ſic laborantibus, credimus eſſe affectum: ubi vero, ipſis illæſis, ceteras partes convelli viderimus, dorſalis medullæ initium affectum eſſe fatemur. Sed cognitis læſis partibus ex convulſis partibus, nunc cauſas, a quibus partes convelluntur, proponamus; atque primo convulſiones perpetuæ, & permanentes ſine manifeſto motu, de quibus Hipp. *in lib. 6. Aphor. 39.* ita ſcripſit: *Convulſio fit vel ex repletione vel inanitione.* Idem Gal. *in* 2. & 3. *de loc. affect. in* 4. & 6. *Aphoriſ. in lib. de trem. palp. convulſ.* ac ferme innumeris aliis locis idem confirmavit, ſed præſertim *in* 2. *lib. de ſympt. cauſſis* ita dicens: *At convulſio in eamdem diſpoſitionem nervos muſculoſque ducit, in quam, quum pro naturæ lege ſe habebant, ab animali virtute ducebantur. Sive igitur ad principium tenſis, ſive flatus influxu impletis muſculis voluntarii motus erant, hæc eadem in convulſione accident, tum ſpiritu flatuoſo in muſculis gigni potente, tum multis, qui tenſionem creent, (e quorum numero phlegmone eſt) affectibus.* Quorum caput (ſicut Hippoc. dixit) duplex eſt; impletio, vacuatioque: in phlegmonarum generis vitiis impletio, in ardentiſſimis, ſicciſſimisque febribus vacuatio. Porro quod, impletis, vacuatiſque plus juſto nervoſis corporibus, omnia tendantur, docent, quæ in inſtrumentis muſicis intentæ ſunt chordæ, quippe, quæ ſive in humidam, humectamve, ſive in ſiccam & ſqualentem domum repoſitæ, diſrumpantur, ideoque eas artifices, priuſquam reponant, relaxant. Quam convulſionum generationem Gal. *in 3. de loc. affect. cap.* 6. hiſce verbis illuſtravit, dicens; *Etenim ſi videris nervoſa corpora, vel chordas ob ambientis aeris immodicam intemperiem, adeo vehementer, ut rumpantur, intentas, haud difficulter intelliges idem in animantium quoque nervis poſſe contingere.* Sed quomodo affecto aere tenduntur chordæ, ut rumpantur? Si vel nimis aridus vel admodum humidus fiat: nempe humor madefacit ipſas, ut in tumorem præter naturam attollantur, qui mox eas tendit; ac velut ſol, tergora arefaciens, contrahit, ita ſiccitas chordas & trahit, & tendit: ſic lora quoque; quum ad ignem ſiccantur, contrahi tendique videntur, Gal. his duabus convulſionum cauſis, tertiam addidit in *lib. 3. Aphor.* 25. quippe nervoſarum partium infirmitatem, qua ratione facile puerulos convulſionibus tentari, tum propter crudum, quo exſuperant, alimentum, tum quod nervo-

Convulſio quaſnam partes afficit.

Convulſionis cauſa.

ſas partes nondum validas habent, nobis prodidit. Replentur vero nervoſæ partes humore ſæpius crudo, a quo convelluntur, ut ex Gal. *in* 2. *de ſymp. cauſſ. cap.* 2. habetur, velut in pueris fit, qui quum exſuperent crudo alimento, & habeant nervoſas partes non uſque adeo validas, facile diſtentionibus tentantur, ut Hippoc. *in lib.* 3. *Aphoriſm.* 25. docuit, hincque *in* 2. *Epidem. comm.* 5. *pag.* 1040. *inter C. & D.* (Videtur enim juxta mentem Foeſii, non *pueris* ſed *puerperis* legendum eſſe : quum nuſpiam in Epidemicis hæc ita dicta de *pueris* reperire licuerit,) ſcripſit: *Si pueris ſpaſmus fiat, ignem fac ; qua ratione ipſarum convulſiones, vel etiam in febribus factæ, non ſunt perpetuo periculoſæ* : ad quam cauſam reducuntur convulſiones tum ex humido aere, qua ratione, ut Gal. nobis eſt auctor, *in* 1. *Epid. com.* 2. *pag.* 944. *ſub finem*, in humida & frigida aeris conſtitutione Hippoc. ſcribit, multos & maxime pueros convulſionibus laboraſſe ; tum ex immodico vino factæ. Aliquando etiam ſanguine, ac bilioſis excrementis, nervoſæ partes imbutæ tenduntur ac convelluntur, aliquando flatu, atque non raro phlegmone aliquo aut primigenio, aut conſenſu proximarum partium. Quales ſunt hypochondriorum tentiones propter aut ſepti tranſverſi, aut pleuræ membranæ, aut hepatis, ingentes inflammationes. Ad quod genus pertinere videntur convulſiones ex vulnere factæ cum phlegmone. Siccantur vero partes, ſeu, ut Hippocrat. verbis utar, inaniuntur, evacuanturve tum propter caloris incendium, tum propter immoderatum frigus. De his Hippocr. *in* 5. *Aphoriſm.* 17. ait: *Frigidum autem convulſiones, diſtenſiones*. Et paullo poſt *Aphor.* 20. *ulceribus frigidum mordax, cutim obdurat, dolorem inſuppurabilem facit, denigrat, rigores febriles facit, item convulſiones, & diſtentiones* : & Gal. *in comment.* ait: *immodicum ſcilicet frigus has facit convulſiones, & diſtentiones, & nervorum refrigerationem ; ſicuti enim non oportet ipſorum ſubſtantiam ab immodico calore diſſolvi, ſic neque ultra modum convenientem refrigerari, & in unum cogi ac cohiberi*. Frigus enim in exceſſu invadens nervos ac muſculos, tendines, ligamenta, primo in cute parit inæqualitatem, repulſo introrſum humido ac calore, deinde ſiccat exprimendo, quod tenue eſt, cogit, denſat, indurat, cogendo ſinus interiores & poros, prohibet diffflationem, & effluvium, atque alimenti receptionem, ſic rigidæ manent partes, duræ & diſtentæ ; de quibus in *Coac. præſagiis text.* 23. *Rigor convulſionem in poſteriora inferens, interficit* ; & Gal. *in lib. definitionum medicarum* ait : *Nam & ii, quos in itinere uſque ad mortem frigus oppreſſit, talibus rigoribus corripiuntur, quales Græci* emproſthotonos, opiſthotonos, *ac* tetanos *appellant*. Idem & multo efficacius immodicus calor, ſeu caloris incendium agit ; omnem enim muſculorum nervoſarumque aliarum partium humidam ſubſtantiam reſolvendo, eæ caloris incendio maxime reſiccantur, areſcunt, ac propterea diſtenduntur, ac convelluntur. Quomodo ardentes febres, veluti ignis, nervos ſiccantes, eos diſtendunt, ac convellunt, atque ut Galenus *in* 4. *Aphoriſm.* 66. docet, *perniciosas afferunt convulſiones*. Eodem item modo phrenitides exitioſæ, ſubſtantiam nervorum immodico calore diſſolventes, in convulſiones deſinere ſolent. Atque magni æſtus, eadem prorſus ratione, idem, Gal. *in* 7. *Aphoriſm.* 13. docente, ſiccando faciunt, non minus & aſſiduæ vigiliæ, atque omnes inſignes ſeu immodicæ quum vacuationes tum purgationes, ut ex Gal. *in libr. quinto Aphoriſmorum* 3. & 4. *ſexto, atque in ſeptimo Aphor.* 9. colligitur. Ipſe vero has omnes ſiccarum, ut ita loquar, convulſionum cauſas *in* 3. *de loc. affect. c.* 5. hiſce verbis eſt complexus, dicens: *Quippe quum convulſio fit vel a labore, vel vigiliis, vel fame, vel ſollicitudine, vel arida aſtuantique febri, qualem in phreniticis videre eſt, cauſam ejus ariditatem vacuationemque recte putaveris*. Quare tot cauſas habent convulſiones, perpetuæ ac permanentes, quippe aut nervoſarum partium re-

Convulſiones Repletione.

Siccatione & inanitione.

A frigore.

A calore

Ab evacuationibus.

ple-

pletionem, aut ſiccationem, evacuationem ſeu inanitionem. Quæ vero cum manifeſto motu fiunt, quales ſunt epilepticæ, ac quas motus convulſivos vocant, alias cauſas habent. Aut enim ab humore craſſo ac viſcido ventriculos cerebri obſtruente, quo modo univerſalem convulſionem, quam Græci *Epilepſiam*, alii morbum comitialem vocant, oriri, Galen. *in lib. 3. de locis affectis cap. 7.* ita ſcripſit: *Atque morbus quoque comitialis convulſio eſt omnium corporis partium non perpetua, ut in* Emproſthotono *atque* Tetano *videre eſt, ſed quæ ex temporum accidit intervallis, atque hæc convulſio cerebro primario, & per ſe læſo fit, veluti per conſenſum ipſo quoque læſo corpora ſæpius pati convulſiones obſervamus quum univerſales tum particulares.* Galen. enim ore ventriculi læſo nedum convulſiones fieri, cerebro nervorum in principio læſione communicata, ſed vel etiam graviſſimos alios affectus demonſtravit *in lib. 5. de locis affect. cap. 6.* Grammaticum enim, narrat, juvenem, qui quoties vel nimis vehementer doceret, aut cogitaret, aut inediam ſuſtineret, aut iraſceretur, comitiali morbo corripiebatur, quippe ex bilioſo acrique ſucco os ventriculi mordente. In *lib. vero 5. Aphoriſmorum 1.* Gal. narrat, quemdam Adoleſcentem ab humore æruginoſo, os ventriculi mordente, ſæpius univerſali convulſione fuiſſe tentatum, eamque ipſum non reliquiſſe, quoad per vomitum æruginem excerneret, & in *lib. de venæ ſectione* adverſus Eraſiſt. Diodorum Grammaticum, quum diu jejunus manſiſſet, convulſionibus ob eam cauſam fuiſſe tentatum. Ex contentione quoque ac labore, qui fit quum ventriculus aliquod infeſtum expellere conetur, convulſio fit, non ſecuſque fit vera epilepſia, dum expultrix in cerebro conatur a ventriculis expellere ſuccum craſſum ac viſcidum, ipſos obſtruentem, ac viam ſpiritibus animalibus prohibentem. Qua ratione recte quidem dixit Hippocr. *lib. 4. Aphor. 16.* ab Elleboro albo, ex ejus infeſtiſſima qualitate os ventriculi mordente, fieri convulſionem quam nos Patavii, ubi Medicinæ opem daremus, vidimus in quodam juvene, cui album veratrum, ſeu elleborus, a fatuo quodam pharmacopœo, nigri loco exhibitus eſt, in aliis multis, quorum ore ventriculi aut a bilioſis aut ab æruginoſis humoribus, aut ab aliquo venenorum erodentium læſo. Quare per conſenſum etiam ex ore ventriculi læſo læditur cerebrum, & homines convelluntur; ac nedum ubi hujuſmodi membrum læditur, ſed maxime etiam uterus læſus convulſionem concitat, cerebro ab ipſo communicata læſione, ex quo merito plures ex hyſtericis mulieribus convulſionibus non raro tentari ſolent. Galen. ſcribit *in 6. lib. de loc. affect. cap. 5.* Viduam quamdam mulierem ex ſemine retento, utero læſo, convulſione fuiſſe tentatam, excretoque ſemine craſſo, fœtido, fuiſſe liberatam. Hinc Auctor Prorrheticorum *lib. 1. text. 119.* ait, *convulſiones in hyſtericis mulieribus eſſe faciles*, quales Dorcadi contigiſſe meminit. At & ab hoc membro, quippe ab utero, atque ab aliis partibus venefica & maxime infeſta aura ad cerebrum adſcendente aliam epilepſiæ ſpeciem Galen. in duobus pueris (ut ex *3. libr. de hoc. affect. cap. 7.* colligitur) obſervavit, atque ab his cauſis concitari convulſiones non permanentes, ſed cum motu quæ fiunt, nobis eſto perſuaſum, omnium vero quum convulſionum tum motuum convulſivorum cauſas omnes Gal. *in lib. 12. Methodi med. cap. ult.* has eſſe perſtrinxit, quippe has fieri a ſiccitate, a repletione, a magna phlegmone, a mordente humore, atque ab ingenti frigore. Sed ſatis accurate cognitis cauſis convulſionum, modo ſigna, a quibus poſſunt futuræ præcognoſci, de quibus *in lib. 5. Coac. præſ. tex. 85.* hæc leguntur; *Leviter feroces inſaniæ ferinæ ſunt, & convulſionem ſignificant*: Et paullo poſt *text. 85. Qui capite dolent firmiter, delirantes, alvo ſuppreſſa, feroci aſpectu, rubore in facie efflorescente, in poſteriorem partem convelluntur.* Has ſequi cerebri exitioſas inflammationes rationi quadrat, quum illa ſigna phreniticorum letalium

Ex contentione & labore.

Ex partium conſenſu.

Convulſionis futuræ ſigna.

talium ſint, propriumque, ut a Galeno *in primo Prorrheticor*. habetur, ipſos, antequam moriantur, convelli, convulſoſque mori. Auctor vero Prorrhet. *in* 1. *lib.* 28. ait: *In phreniticis frequentes permutationes convulſionem indicant*. In *eodem vero* 5. *lib. Coac. præſag. text.* 171. ſcribitur: *In acutis doloribus capitis, iisdemque torpidis cum gravitate, convulſiones fieri ſolent*: Et paullo poſt *text.* 177. *Capite dolentes leviter & exſudantes, intercepta alvo, in convulſionem incidunt*. Atque hæc de notis convulſionum futurarum; quarum dolores tantum capitis vehementes. & vehementia ſeu ferina deliria certe poſſunt prædicere convulſiones, reliquæ vero notæ incertius ac infidelius, ſed Hippocrates *in* 3. *Prognoſticorum pag.* 46. *lin.* 24. de puerorum futuris prævidendis convulſionibus ita ſcripſit: *Pueris autem convulſiones accidunt, ſi febris acuta fuerit, nec alvus dejiciat, ac ſi vigilent, paveant, lugeant, colorem mutent, & viridem, aut lividum, aut rubidum trahant. Hæc igitur nuperrime editis pueris promtiſſime accidunt ad ſeptimum uſque annum. Adultiores vero pueri, virique non item in febribus prehenduntur convulſionibus, niſi aliquod indicium exſtitit validiſſimum ac deterrimum, qualia per phrenitidum accidunt*. Sed de his ſatis; nunc ad prognoſticum ex convulſionibus ſumendum declinemus, & primum de iis, quæ citra febrem affligunt, pauca attingamus. Convulſionum itaque eæ, quæ fiunt repletis humore crudo nervoſis partibus, minus periculi afferunt ægrotis, quam quæ ſiccatis arefactiſque nervis muſculiſque concitantur: cognoſcuntur vero a repletione factæ, eo quod repente fiant. Ceterum ex tribus convulſionum differentiis, *tetanus* vocata, affectus eſt acutiſſimus; ſæpiuſque cito interficiens, quippe tribus aut quatuor diebus, quum convulſis muſculis tum mandibularum, tum gulæ, non poſſint deglutire, neque nutriri cibis, neque medicamentis devorandis juvari, ſed ubi morbus in dies protrahitur, de ſalute bene ſperandum eſt. Quod Hippoc. *in* 6. *lib. Aphoriſm.* 5. ita expreſſit: *Quicumque a diſtentione corripiuntur, in quatuor diebus pereunt, ſi vero has effugerint, ſani fiunt*. Convulſiones omnes ſolent quam maxime a febribus, ſi ſupervenerint, juvari, quod abſumat calor febrilis humores nervoſas partes replentes, de quibus Galen. *in* 2. *Aphor.* 26. ita ſcripſit: *Quum ergo ſecunda valetudine quempiam derepente convelli accidat, talem a plenitudine proficiſci convulſionem neceſſe eſt, ita enim infarciuntur, viſcidis & frigidis humoribus, quibus etiam aluntur, ut ſpaſmum patiantur, cui ſuperveniens febris, frigidos illos calefacere, & lentos, attenuare humores, & diſcutere ſolet*. Hocque eſt, quod Hippoc. *in* 4. *Aphor.* 57. dixit: *Qui a convulſione aut diſtentione nervorum tenentur, febre ſuperveniente, liberantur*. Ex quo merito ipſe quoque *in* 2. *lib. Aphor.* 26. dixerat: *Febrem convulſioni ſupervenire melius eſt, quam febri convulſionem*. Hinc recte ab ipſo *in* 2. *Epid. ſect.* 5. *pag.* 1040. *lin.* 11. ſancitum eſt, quod ſi pueris ſpaſmus fiat, ignem exerceamus ſeu inuramus, quod crudos craſſoſque humores calefaciat, extenuet, & diſcutiat. Ubi tamen de *puerperis*, non de *pueris* hoc affirmatur: nec etiam licuit textum ſimilem alibi reperire, ubi de *pueris* ſermo eſt. Quo itaque convulſis ſuccedens febris vehementior erit, & vehementiore rigore eo efficacius eos ſanabit, qualis ſolet quartana, quæ quum frigus intenſum habere ſolet, tum calorem efficaciſſimum, merito ipſa liberat a magno morbo, ſi Hippoc. atque experientiæ credimus, & merito ſane; quum ipſa calorem habeat ceteris aliis febribus efficaciorem, quod ipſe in terrena craſſiori ac denſiori materia fundetur, atque hoc eſt quod nobis Hipp. innuit *in lib.* 5. *Aph.* 70. hiſce verbis: *A quartana capti non admodum a convulſionibus capiuntur, ſi vero prius capiuntur & quartana ſupervenerit, liberantur*. Hocque nedum ob calorem, qui efficaciſſime repletionem nervoſarum partium diſcutit, ſed quinetiam ob frigus quum intenſum, tum diu quatiens corpora, quid a nervoſis parti-

Convulſiones quid præſagiant.

Convulſiones, quæ citra febrem affligunt.

Convulſiones in quibus de ſalute ſperandum.

partibus humoris eo motu digeritur, quare convulsis superveniens febris, bonum, quatenus repletionem discutiendo tollat. Quod de convulsis ab ebrietate Hippoc. ita confirmavit, *in Sect.* 5. *Aphor.* 5. dicens: *Si ebrius quispiam repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur.* Atque hæ sunt convulsiones, in quibus de salute sperandum erit, ac multo plus, si in pueris fiant, qui quo facilius adultis, quum ob crudum alimentum, quo abundant, tum quia partes nervosas infirmas, (ut Gal. *in 3. lib. Aph.* 5. est auctor) habent, convelluntur, eo minoris periculi malum decernunt, at multo facilius hos superveniens febris juvabit. Ex quo neque convulsiones in febribus hoc capientes ita sunt detestandæ, in adultis vero solent esse pernicioſæ, quatenus fiunt plerumque resiccatis atque arefactis a febrili calore nervosis partibus; quo nihil pernicioſius, ut Gal. visum est, qui de ipsis *in lib.* 12. *Meth. med. cap.* 8. ita scripsit; *Scire namque licet ejusdem affectum, si modo curabitur, humectationem poscere. Cęterum curatu perdifficilem esse, vel potius, qui curari omnino non possit, si febris occasione est contractus, succedit maxime exitiali phrenitidi. Nec sanatum quempiam ita convulsorum aut ipse vidi, aut alium narrantem audivi.* In pueris vero febricitantibus non sunt ita malæ detestandæ, ut paullo post clarius ex Hippoc. *lib.* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 944. *litt. H.* demonstrabimus. Ceterum in aliis omnibus ætatibus a siccitate factæ convulsiones sunt pernicioſæ. Hinc timendæ esse videantur convulsiones, quæ in febribus fiunt, ex quo merito Hippoc. dixit, melius esse, si convulsionibus febre succedant, quam convulsiones febribus quæ a purgatione, vacuatione insigni, quod omnes hæ siccent, pessimæ sunt; de quibus Auctor Prorrh. *lib.* 1. *text.* 145. ita scribit: *Quibus ex naribus copiosa violenta, & multa fluunt, ad convulsiones trahi interdum deducuntur*: & in *Aphor. lib.* 5. *Aphor.* 3. Hipp. *Ubi sanguis multus fluxerit, singultus aut convulsio, malum*: & paullo post, quippe *in Aphoris.* 56. ait *lib.* 5. *Ex fluxu muliebri si convulsio & animi defectus advenerit, malum*, quod repetit *in lib.* 7. *Aph.* 9. quum dixerit: *A sanguinis profluvio convulsio, malum*: quam rem clarius egit *in lib.* 6. *Aphoris.* Galen. quum dixerit, convulsionem ab evacuatione esse acutissimam & pernicioſissimam, eadem ratione *in lib.* 7. *Aphoris.* 13. Hippoc. scripsit, *ab æstibus fortibus convulsionem, aut distentionem, malum*: & paullo post *Aph.* 18. *in vigilia convulsio, malum*; quod quum fortes æstus, vel febres ardentes vel inustiones, tum vigiliæ immoderatæ substantiam humidam dissolvant, evacuentque, eodem itidem modo immoderatæ purgationes siccando convulsiones pernicioſas pariunt, quod Hipp. *in* 5. *lib. Aph.* 4. affirmavit, quum scripserit: *Ex immodica purgatione convulsio aut singultus, malum*: Et in sect. 7. Aph. 25. *Ex medicamenti potione convulsio, letale*: Et *lib.* 5. *Aphoris.* 1. *Convulsio ab elleboro, letale*. Atque hæc de Prognostico convulsionum perpetuarum. Nunc pauca de iis, quæ aut contentione, aut morsu fiunt, dum natura conatur ventriculis cerebri excutere humorem viscidum & crassum, attingamus, quum hæc cumulatius sint posterius a nobis tractanda; *Epilepticos* vocamus illos. Gal. *in lib.* 5. *Aph.* scribit, Epilepsiam neque acutissimum, neque periculoſissimum esse affectum: & merito quidem, quum quod chronicus morbus sit, tum quod plures ab ipso evadunt: uti pueri, quos Hippoc. *in Sect.* 2. *Aphoris.* 45. sanari ita scripsit: *Quicumque Juvenes morbo comitiali laborent, mutatione maxime ætatis & temporum & locorum & victuum quoque liberantur.* Expressit vero, quibus sanari possunt & non possunt *in quinto lib Aphor.* 7. dicens: *Quicumque morbi comitiales fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt; Quibus vero accidunt viginti quinque annos natis, hi plerumque moriuntur.* Gal. scribit *in lib. de puero epileptico*, se plures pueros sanavisse, atque *in lib. de purg. med. facult.* plures vel etiam ex iis, qui non sanantur, in vere purgatos, atque sanguinis missione præcavisse: ceteræ vero aliæ con-

Convulsiones quædam timendæ.

Convulsione a contentione aut morsu.

vulsio-

vulsiones, quæ aut consensum ab aliquo acri humore aut veneno, aut vapore venenoso, & maligno concitantur, curantur. Cujusmodi fuit, quam patiebatur Grammaticus ob amaram bilem, & Adolescens, ab ærugine os ventriculi mordente, qui excreta per vomitum ærugine, liberatus fuit. Itemque & alia a malignis vaporibus; sed hæc sufficient nobis ad judicandos eventus convulsionum sine febre concitatarum: nunc de iis, quę in febribus acutis fiunt, agamus.

CAP. VIII.

Quid convulsiones in febribus acutis significent.

COnvulsiones omnes, quæ in principiis morborum acutorum fiunt, multitudinem humorum significant, qua partes nervosæ repletæ contendun- *Convulsiones quid in morbis significant*
tur seu convelluntur. Hæ quicquam certi in morbis non indicant, graviſſimum tamen morbum testantur, neque prorsus periculo vacantem, quando omnes morbi a multitudine crudorum humorum graves sint, nec periculo careant. Quales fuere, quæ Hippoc. ut *ex libro Epid.* constat, in multis, qui sanitati fuere restituti, fuere conspectæ. Quippe in muliere *lib. 3. Epid. Ægr. 13. p.* 990. trimestri fetu gravida, in litore decumbente; in *Pythione lib. 5. Epid. Ægr.* 1. *p.* 1059. qui prope telluris ædem habitabat, in eo *ibid. Ægr. 3. pag.* 1066. qui in horto *Dealcis* ægrotabat; in *Charione ibid. Ægr.* 5. *p.* 1072. apud Demetum, atque in morosa muliere *ibid. Ægr.* 11. *pag.* 1108. quam prima die quasi repente convulsio invasit. Hæ enim omnes (iis exceptis quæ in eo, qui in horto *Dealcis* ægrotabat, conspectæ sunt, quæ Crisin futuram indicabant) multitudinem humorum signabant, nec quicquam certi ad salutis exitiique præsagium. Ceterum in *Pythione* ac *Charione*, quod una cum urinis aliquam coctionem præ se ferentibus apparuerint, non ita erant timendæ. Criticæ fuere in illo, quæ in horto *Dealcis* conspectæ sunt; quod Gal. *in secundum Epidemiorum text.* 39. hisce verbis expressis dicens; *Nam & quod deliraverit in nona, & dextro oculo strabo fuerit, res sunt quæ solent in judiciis evenire.* Quæ etiam in febribus ex ore ventriculi per consensum cerebro læso fiunt, non sunt timendę, quum vomitione facta tolluntur. Qualis ab Hippoc. in filio Hermophyli fuit observata, de quo *in lib. 5. Epid. text.* 27. ita scripsit? *Hermophyli filius ægrotavit undecim dies, febris autem tenebat ipsum, & non descendebant cibi, & primum quidem deliravit, nocte vero cessavit, sequenti autem die sine voce iaciebat, stertens, distortos habens oculos, febricitans: Penna vero immissa vomuit bilem atram & clistere immisso stercus multum subiit.* Eodem quoque modo in utero sanatu sunt faciliores; quare *in lib* 1. *Prorrheticorum text.* 119. ita legitur: *Convulsiones in hystericis mulieribus faciles sunt, ut etiam Dorcadi contingit:* In febribus etiam, quę pueros invadunt, quod non magni recessus, a sano ipsorum statu propter multum crudum alimentum quo abundant, & nervosi generis infirmitatem, nobis indicio sint, non admodum sunt periculosę. Quod Gal. *in 1. Epid. comm. 2. text.* 24. expressit, dicens; *Pueri autem propter nervosi generis infirmitatem convulsionibus sunt opportunissimi.* Quod facilius etiam parvis de occasionibus hoc genus iis mali accidit, minusque est periculosum, ex quo mirum non est, si vel etiam, quum in febribus pueri convelluntur, non sit usque adeo, uti in aliis ętatibus timendum. Quod Hippoc. in pueris observasse *in lib.* 1. *Epid. sect.* 2. *pag* 944. *litt. H.* hisce verbis prodidit: *Multos convulsiones & maxime pueros ab initio tentabant, & febricitabant febribusque convulsiones succedebant. Erant hæc plerisque diuturniora & innocua, præter eos quibus etiam alia cuncta pernicialia essent*, quod *in* 4. *Coac. præs. text.* 357. ita fuit confirmatum; *Convulsio in febre, letalis, minime vero pueris:* quibus etiam convulsionibus succedit febris, *Quænam minus timenda.*

aut

aut si est, fiat vehementior, bonum est, quoad convulsionem, modo ex nervosarum partium repletione profecta sit. Hinc *in Coac. præsag. text.* 358. legitur, convulsionibns remedio esse acutam febrem supervenientem, quæ prius non fuit, aut si quidem prius exstitit, jam invalescentem magis. Nec non juvare urinam multum vitream, & genituræ similem, atque etiam alvi fluxum. Convulsiones quoque in febrium principiis factæ, si febres augeantur, ægroti rigere minus solent: cujusmodi fuit, quæ in uxore *Eraclitis* vita est, de qua *in 7. Epid. text.* 130. *pag* 1239. ita scripsit: *Philistidi Eraclidis uxori incepit febris acuta, rubor faciei sine ulla causa manifesta, paullo post eadem die riguit, non recalescebat, convulsio facta est in digitis manum, & pedum, paullo vero post hæc invaluit, 2. superriguit, paullo plus incaluit, & rubor minor, & convulsiones supervenerunt moderatiores.* Demum addamus quasdam convulsiones in febribus, aliquando febres ipsas diminuere & sanare, quæ criticæ dici debebunt, quæ fiunt per materiæ transmissionem a venis ad nervos musculosque, quæ si febrem in primis diebus solvant, criticæ, & bonæ erunt, quod *in* 5. *lib. Coac. præsag. text.* 156. & 157. ita scriptum est: *Convulsio in febre mota febrem solvit eadem die, aut altera, vel certo tertia; quod si tempus transgrediatur, quo ab initio tenebat, nec acquiescat, malum.* Hoc vero fit, ut etiam dictum est transmissa materia morbifica a venis ad partes nervosas, quæ transmissio materiæ potest quidem febrem minuere, vel etiam prorsus tollere, humoribus a venis excretis, non amplius in ipsis putrescentibus. Sed hęc de iis convulsionibus, quæ etsi non bonę (quum perpetuo per se omnes malę sint) tamen aliquando salutem indicare, contingit; quibus perspectis ad malas perniciosasque convulsiones descendamus. De quibus in febribus observatis Hipp. *in 2. lib. Prognost. p. 39. lin.* 45. scribit: *Si autem testes, & pudenda revelluntur, dolor vehemens, vel mors.* Perpetuo in adultis in febribus acutis convulsiones sunt malę, omniumque maxime in ardentibus, ut Gal. *in* 4. *Lib. Aph.* 66. testatum reliquit, quod hę ardentes febres veluti ignis nervos siccent ac perniciosas convulsiones faciant. Dictum est omnes convulsiones a siccatis partibus nervosis profectas, esse sanatu nedum difficiles, sed impossibiles, itaque in febribus acutis eę omnes erunt pernicioſę, quippe quę ab igneo calore febris humido consumto, siccatis nervis fiunt. De his Gal. *in* 4. *lib. Aphorism.* 35. ait: *Si vero ex febribus adurentibus totum corpus exsiccetur, & nervis deinde ex siccitate convulsio accidat, maximum est malum, & pœne insanabile, quoniam longum quidem tempus exigitur ad siccitatem nervorum removendam, vehementia autem morbi tempus non concedit naturæ, sed cito vires dissolvens exitium affert.* Ex quo Hippoc. merito *in sect.* 4. *Aphor.* 66. dixit: *in acutis febribus convulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.* Quæ si cum virium debilitate fiant, in foribus exitium prædicant. Quod Hippoc. perbelle *in Aphor.* 49' *sect.* 4. expressit, ita scribens: *In febre non intermittente, si labrum vel palpebra, vel supercilium, vel oculus, vel nasus pervertatur, vel non videat, vel non audiat, jam debili existente corpore, quicquid horum evenerit, mors proxima est.* Quod observavit Hippoc. in uxore Dromedai *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 11. *pag.* 987. qnæ post convulsiones a capite inceptas subito obiit. Quæ etiam in mente captis fiunt, maxime suspectæ erunt, sed omnium perniciosissimæ, quæ in phreniticis fiunt, proximum enim exitium significant. Nec istorum convulsorum quempiam sanatum vidit Galen. neque alium narrantem audivisse, *in lib.* 12. *meth. med. cap. ult.* mortalium memoriæ commendavit. Hippoc. in illa epidemica constitutione, quam *in* 1. *Epid. sect.* 2. *pag.* 948. *inter litt. G. & H* descripsit, plures phreniticorum meminit, qui convulsi subito moriebantur. De quibus ait: *Phreniticis convulsiones, sed & virulenta vomunt, & ex his quidam subito moriuntur.* Quod accuratius observavit in phrenitico, de quo

Convulsiones criticę.

Convulsiones quænam pernicioſę. A siccitate.

Cum virium debilitate.

In mente captis.

apud

apud ipſum *lib. 3 Epid. Ægr. 4. pag.* 1100. *Poſtridie mane vocem amiſit, febris acuta, ſudavit, non intermiſit, palpitationes per totum corpus, nocte convulſiones, tertio die cuncta exacerbata ſunt: defunctus eſt.* Proprium eſſe exitialium phrenitidum, ut in convulſiones deſinant, aliàs a nobis ex Hippoc. atque Gal. demonſtratum eſt. Veræ enim phrenitides id habent quod paulo ante mortem convulſiones faciant, quippe ab inflammatione cerebri ſiccatis nervis; in ipſis vero, ubi hæ apparent, in foribus exitium denotant, quod Hippoc. in Cononis Serua phrenitica, ut apud ipſum *in 5. Epid. text.* 84. *pag.* 1160. legitur, obſervavit, quæ quidem quum diebus quadraginta mortua eſſet, per aliquot dies ante, voce deſtituta, & convulſa eſt. Tremores in convulſiones deſinentes, ſeu ex tremoribus convulſiones, letaliſſimas eſſe, Gal. *in 3. Prorrh. 9.* affirmavit. A doloribus quoque & aſſiduis vigiliis, pernicioſæ ſunt, nec non in febribus acutis, quæ obſervantur convulſiones, ut Hippoc. *in ſect. 7. Aphor.* 18. nos docuit. Ab immoderatis vacuationibus & purgationibus eodem modo malas eſſe convulſiones in aphoriſmis nobis ſignificavit, veluti quum ait *in ſect. 5. Aphor. 4. Ex ſuperflua purgatione convulſio aut ſingultus ſuperveniens malum.* Et poſtea *Aphor.* 56. *Ex fluxu muliebri ſi convulſio & animi defectus advenerit, malum.* Ita ut omnes quum evacuationes tum purgationes immoderatæ, a quibus ægroti convelluntur, ficcent univerſum corpus, atque convulſiones ſiccatis nervis efficere alias dictum eſt. Hinc Gal. *in 7. Aphor.* 70. *comm.* dixit: *Ab evacuatione convulſionem acutiſſimam & perniciofiſſimam eſſe.* Ab ilei inflammatione convulſiones eſſe pernicioſas Hippoc. quoque *in lib. 7. Aphoriſ.* 40. tradidit: *in vulneratis etiam convulſiones plerumque letales eſſe conſueverunt*, etſi non neceſſario in omnibus ex vulnere convulſis mors ſuccedat, ut Gal. *in* 5. *Aphor. 2. ſect.* 5. etſi Hipp. *in Aphor.* 2. dixerit *e vulnere convulſionem letalem.* Plerumque vero letales ſunt, quod vel etiam ipſe Hippoc. (ut apud ipſum *in Epidem.* libris legitur), in multis obſervavit, quippe in Scamandro a ſectione, in eo, qui ex jaculo ſauciatus convulſus eſt, in illa Nerei virgine pulcra ex percuſſione, in Gubernatore navis ex fracto digito, atque in alio ex luxato digito, qui omnes convulſi objerunt. De Scamandro vero *in* 5. *lib. Epid. pag.* 1145. *text.* 15. ita habet: *Scamandrus in Lariſſa & in coxa marcorem habuit, & os diu luxatum. Hic ſectus eſt ſectione magna, etiam ad os ipſum, & deinde uſus eſt, & tunc die duodecima poſt ſectionem ſpaſmus cœpit, & obtinuit multum; contrahebatur autem crus hoc uſque ad coſtas, tranſiliebat autem & in alteram partem convulſio, contrahebatur autem crus, & extendebatur: & alia membra movebat, & maxillæ adducebantur. Hic mortuus eſt convulſus octava poſt invaſionem convulſionis.* Et de illo, qui a jaculo percuſſus eſt, poſtea *text.* 47. *pag.* 1153. *Qui jaculo acuto percuſſus eſt poſterius, paullo infra cervicem vulnus accepit; aſpectu quidem non dignum mentione, non enim in alto fiebat, non autem multo tempore poſt extracto telo, poſteriora tractus, ut opiſthotonici, & maxillæ ligatæ ſunt, atque ſi quid humidum in os acciperet, & id conaretur bibere, rurſum relidebatur ad nares, & reliqua ſtatim pejora fiebant, & die mortuus eſt.* Sed audiamus caſum virginis illius Nerei pulcræ, a percuſſione convulſæ de qua ita *text.* 50. *pag.* 1154. ita habet: *Virgo illa pulchra Nerei, quæ quidem erat viginti annorum, a muliercula amica ludente, lata manu percuſſa eſt ſecundum ſynciput, & tunc quidem vertigine tenebricoſa correpta eſt & reſpiratione caruit, & quum domum veniſſet, illico febris tenuit, & doluit caput, & rubra circa faciem erat. Quum autem ſeptima jam eſſet dies per aurem dextram pus exiit fœtidum, ſubrubrum plus cyatho & videbatur melius habere, & ſublevata eſt. Rurſus intendebatur febris, & deferebatur in ſomnum, & loqui non poterat & dextra faciei pars trahebatur, & reſpirationem habebat difficilem, & convulſionem, & tremebat lingua,*

A vera phrenitidibus.

A tremoribus.

A doloribus.

Ab immoderatis vacuationibus.

A bilei inflammatione.

Ex vulnere.

oculus ſtupidus : nona mortua eſt . Et poſtea *text.* 74. *pag.* 1159 adjunxit caſum ſatis ſpectandum , quum ait : *Magnæ navis gubernatori ancora digitum indicem , & os infernum confregit dextræ manus , inflammatio ſucceſſit , & ſphacelus , & febris , ſubpurgatus eſt moderate , calores mites & dolores . Digiti quoddam decidit , poſt ſeptem dies exibat ſanies moderata : poſt hæc dixit , ſe non poſſe omnia lingua enuntiare . Prædictum eſt fore opiſthotonicum , conferebant in hoc buccæ conſertæ deinde in cervicem . Tertia die totus convellebatur in poſteriora cum ſudore . Sexta die a prædictione mortuus .* Eodem modo de Harpali filio *text.* 75. *pag.* 1159. ex magni digiti convulſione 3. die mortuo , ita ſcripſit : *Filius Harpali , qui ex Telephane liberta luxationem infra magni digiti accepit; inflammatus eſt & cum dolore: & ubi repoſitus eſt, profectus eſt in agrum , rediens lumbus doluit , lavit : maxillæ ad noctem conſerebantur , & opiſthotonus aderat . Spumoſa ſaliva vix per dentes extra exibat . Tertia die mortuus eſt .* Eodem modo & Tychon , in obſidione circa Datum percuſſum in pectus a catapulta, 3. die convulſum ſubito obiiſſe in eod. *lib.* 5. *text.* 94. *pag.* 1161. nobis prodidit. Ex horum itaque hiſtoria apparet plerumque convulſiones ex vulneribus eſſe letales . A medicamentis quoque quum prævalide purgantibus tum venenoſis, convulſiones permanentes ſunt letales, unde Hip. dixit *in* 5. *l. Aph.* 1. *Ab elleboro convulſionem eſſe letalem .* Et *in lib.* 7. *Aphoriſm.* 25. *Convulſionem ex medicamentorum potione eodem modo eſſe letalem*, in quam, ſane letalem convulſionem, puellam quamdam a medicamento fetum corruptorio incidiſſe Hippoc. *in* 5. *Epid. text.* 53. *pag.* 1155. vidit , de qua ita ſcribit : *Ei , quæ vigeſimum ætatis annum agebat , & pharmacum corruptorium biberat , accidit labor , vomitus bilioſorum , multorum pallidorum & porraceorum . Quum bibiſſet , convulſio tenebat , linguam mandebat , quum ad quartam veniret & ipſa lingua erat magna , nigra , oculorum autem alba pars rubra : inſomnis quarta die , ad noctem mortua eſt .* Hippoc. ſcribit in eodem *lib.* 5. *Epid. text.* 85. *pag.* 1160. juvenem ex devorato ſerpente quoque convulſum periiſſe . Cujus hiſtoriam ita expreſſit : *Adoleſcens quidam , quum multum meracum bibiſſet , ſupinus dormivit in umbraculo quodam . Huic ſerpens Arges in os ingreſſus eſt , atque quum ſenſit , non valens loqui , ſtridit dentibus & ſerpentem devoravit , & dolore magno tenebatur , & manus offerebat , ut qui ſtrangularetur : & jactabat ſeipſum , & convulſus mortuus eſt . In libro vero* 7. *text.* 20. *pag.* 1215. Anginoſam mulierem die 7. convulſam interiiſſe . Atque hæ ſunt letlaes convulſiones in acutis morbis obſervatæ , quæ , ut jam diximus, in acutis ardentibusque febribus ſunt pernicioſiſſimę , omniumque maxime , quæ phreniticis ſuccedunt , multum quoque a vulneribus convulſiones eſſe timendas prædictorum ex Hippoc. narratæ hiſtoriæ ſatis vos docent. Sed dicetis illas , quæ , quum fiant in principiis acutorum morborum , ex repletis nervoſis partibus ipſas concitari neceſſe eſt , atque alias , quæ quovis modo ab eadem cauſa in iiſdem acutis morbis concitantur , qua ratione vel ſalubres vel letales eſſe , cognoſcemus ? Ex ſignis aliis tum , quæ præceſſerunt, tum una quæ illuxerunt , aut poſtea ſequenter . Omniumque maxime coctionis & cruditatis ſigna erunt attendenda, apparentibus enim convulſionibus , morbo plane crudo exiſtente , ſemper nobis malum minitantur , eodem modo pernicioſæ numquam ſolæ , ſed aliis cum ſignis perniciem indicantibus apparere ſoleant. Qua ratione convulſiones , quas in uxore Philini primo; & poſtea in uxore Dromedai , in Philiſta , in phrenitico muliere Cyzichi , atque in muliere apud frigidam aquam decumbente *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 1096. Hippoc. vidit , letales omnes fuerunt . In muliere enim Philini, ut ex 1. *Epid. Ægr.* 4. *pag.* 975. habetur , multæ convulſiones dolorificæ , cum magno delirio die 8. apparuerunt, quæ & diebus nono & undecimo

A Medicamentis.

Convulſiones ſalutares unde a letalibus dignoſcuntur.

cimo eædem manentes, cum urinis craſſis, albis, turbidis, multo tempore non reſidentibus, mortales abſque dubio fuerunt judicandæ. Non minus, & quæ in uxore Dromedai. De qua Hippoc. *in Epid. lib.* 1. *Ægr.* 11. *pag.* 1070. *Sexto die mane ſuperriguit, cito percaluit, toto corpore ſudavit, extrema frigida, deliravit, ſpiritus magnus, & rarus, paullo poſt convulſiones, a capite cœperunt; Urinis oleoſis apparentibus paucis, & cum ſtillis ſanguinis, quæ præceſſerunt. Mortua eſt.* Quæ omnia ſimul certum exitium indicabant. Idem judicium ex hypochondrii tenſione in Philiſta *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 4. *pag.* 1070. 5. *obiit, ante diem, quum ex ſepti tranſverſi magna inflammatione facta eſſet convulſa, ſimul cum peſſimis ſignis.* In phrenitico etiam *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 4. *pag.* 1100. (præterquam ut nuper a nobis ex Galeno eſt demonſtratum, quod omnes convulſiones in phreniticis exitiales) etiam id convulſiones ipſius habuerunt, ut letalia ſigna ſimul cum convulſionibus tunc illuxerint, quando virulenta vomuerit, febris eſſet horrida, ſudor copioſus prima die, aſſiduus toto corpore, multum delirium, ſecunda die aphonia, febris acuta, ſudavit, non intermiſit, quo tempore exitialiſſimæ factæ ſunt convulſiones, quæ in febribus exitium certe prædicabant. Eodem itidem modo, & quæ in muliere *Cyzichi ibid. Ægrot.* 14. *pag.* 1114. die decimoquarto, cum extremorum frigiditate, delirio, crudoque plane exiſtente morbo: atque hæc ſunt, quæ de prædictione a convulſionibus fuerant dicenda, ſub quorum genere quum & ſingultus comprehendantur, de ipſis agendum non videretur, tamen quum ſingulares ſtomachi ſint ſingultus convulſiones, de illis quoque ſigillatim agendum merito duximus, atque eo magis, quod Hippocrates de ipſis diſtincte quidem a convulſionibus ſcripſerit.

CAP. IX.

Quid ſingultus in morbis prædicant?

A Singultu quoque eventus morborum venemur, tametſi idem ſit ipſius judicium, atque convulſionis, ſiquidem & ipſe quædam convulſio ſtomachi eſt; ut Gal. docuit *in* 5. *Aphoriſm.* 3. *in lib. vero* 4. *de vict. rat. in morb. acutis*, ſingultus appellat motus convulſorios: de qua clare ſatis *in Comment. ſexti Aphor.* ita habet: *Singultus vero concedatur convulſionem ſtomachi nominari, quando aliud fuerit ſermonis propoſitum, ut ſingultus ſubſtantiam cognoſcamus, melius fortaſſis fuerit non convulſionem ipſum nominare, ſed quemdam motum ejuſdem quidem generis, cujus vomitus, intentum autem & illo vehementiorem. Nam ſtomachus apetens eorum aliquid, quæ in ipſo continentur, expellere, ad duos movetur caſus, vehementiorem quidem in ſingultibus, mediocriorem illo in vomitibus, ſiquidem in vomitibus appetit ea tantum, quæ in ventriculi ſpatio latiori continentur, expellere, in ſingultibus autem ea, quæ ſunt in ipſo ventriculi ore penitiora.* Ex quibus apparet ſingultum eſſe motum expultricis ſtomachi, aliquod noxium expellentis. Veramque ſtomachi convulſionem ſingultum dicimus, ſed eum, quæ cum motu fit, qualis in epilepticis læſo cerebro obſervatur: aut melius dicamus, ſingultus, ut Gal. *in ſect.* 4. *de vict. rat. in acut. text.* 69. nobis tradidit, eſſe quoſdam motus convulſivos. Concitantur vero ex Hippocr. *in* 6. *Aphoriſ.* 39. vel ex repletione, vel inanitione, ſcilicet partium nervoſarum, particulatimque oris ventriculi. Replent vero cibi multi, potus, humores, phlegmones, flatus. Siccant calor igneus, immoderatæ omnes vacuationes, purgationes, vigiliæ, jejunia, atque alia hujuſmodi. Ceterum ſingultum fieri ab iis cauſis, uti veræ convulſiones concitantur, prædocuit Hippoc. de vera ſtomachi convulſione locutus, quæ ab altera harum cauſarum fit. Quod vero ſæpius fiant ſingultus propter mordicationem oris ventriculi, qui motus ſunt ſimiles con-

Singultus quid.

Singultus cauſæ.

vulſionibus, quos convulſivos motus, multi merito appellent, minimeque convulſiones, proinde mirum non eſt, ſi ab aliis cauſis fiant, ab illis quippe omnibus, qui vel copia gravantes ſtomachum, vel moleſta quapiam qualitate ipſum lædentes. Nam quum ventriculus copia humorum, vel ciborum pravorum, opprimitur, aut acrimonia mordetur, aut diſtenditur flatu, aut calore aut frigore aliave qualitate irritatur, aut reſiccatur, vel revellitur eo motu convulſioni haud abſimili, noxam nititur expellere. Quæ Gal. videtur *in lib. 8. de comp. med. cap.* 8. attigiſſe, quum ait: *Similiter & ſingultus ſtomaco interdum ob frigiditatem, aut repletionem accedit, interdum ob mordacitatem humorum acrium, & medicamentaria qualitate præditorum*, & paullo poſt: *Singultum autem ſine his fieri video, acribus humoribus aut ſeroſis & medicamentis ſtomachum mordentibus, quos ubi vomitu rejecerint, ſtatim ſingultu liberantur*. Quia & multi devorato pharmaco ex tribus piperis generibus conſtante, ſi ſtatim vinum ſuperbibant, omnino ſingultiunt, ex quorum numero etiam ego ſum. Amplius autem & cibo in mordacem qualitatem corrupto aliqui ſingultiunt, & quod a vomitu ſtatim liberantur, omnibus notum eſt. Quidam etiam ex rigore oris ventris ſingultiunt. Verum pueros maxime ſingultire contingit, tum ob corruptionem alimenti in ventre, tum ob partis frigiditatem, atque ab iis cauſis ſingultus fiunt. Verum in febribus ſingultiunt homines quandoque propter pernicioſam aut ſtomachi, aut cerebri, aut inteſtini tenuis aut hepatis, inflammationem, aut preſſo ore ventris, a cava hepatis parte in tumorem elata, aut propter hepatis fervoris communicationem, aut acri humore e parte inflammata in os ventriculi defluente, & ipſum mordente itemque acris exhalatio irritans ſtomachum, ſed hæc ſatis ſint de cauſis, quibus ſingultiunt. Hinc illis cognitis ad prognoſticum declinemus, dicamuſque ex ſingultibus eos tantum non eſſe timendos, qui citra febrem ac alium morbum, ex vino aut cibis fiunt, aut etiam ab humoribus acrioribus, vel frigidis, vel calidis, vel corruptis. At in febribus quemadmodum & convulſiones perpetuo timendi ſunt, omniumque maxime febri ſupervenientes. Quædam febres dicuntur etiam ſingultuoſæ, ex eo quod in ipſis homines fere perpetuo ſingultiant, augeanturque aucta febre & remittantur eadem remiſſa, quas febres Græci *lygodes* appellant. Quarum quidem Hippocr. meminit *in ſect.* 4 *lib. de rat. vict. in acut. pag.* 401. *lin.* 39. Et Gal. *in Comment.* dixit, febrem ſingultuoſam appellari, in qua ſingultus permanet, ac per totum morbum ſimul cum febre exacerbatur, ut plurimum vero eæ non parum ſuſpectæ haberi debent, quod fiant inflammato aut ſtomacho, aut tenui inteſtino aut hepate. *Cornel. Celſus* ſcribit, frequentem ſingultum jecur inflammatum ſignificare; non tamen ſimpliciter hepate inflammato ſingultiunt ægri, ſed quando hepar ad maximam attollitur inflammationem, ex Gal. *in* 5. *lib. Aphor.* 3. licet Hippoc. dixerit ſimpliciter: *Hepati inflammationem patienti ſingultus advenit*. Quare in hepatis inflammatione ſingultus exitialis eſſe ſolet. Non minuſque fit cerebro ac ventriculo inflammato, omniumque maxime, ſi a vomitu fiat, de quo Hippoc. *in* 7. *lib. Aphor.* 3. ſcribit: *A vomitu ſingultus, & oculorum rubor, malum*. Gal. de ipſo ita ſentit: Qualis paſſio eſt convulſio muſculis, talis eſt ſingultus ſtomacho, qui humoribus infeſtatur, convenit nonnumquam totum ventriculum, nonnunquam os ejus & gulam. Quos per vomitiones abjiciens ſtatim a ſingultu liberatur, qui ſi neque per iſtas ceſſaverit, duorum alterum oſtendit, vel cerebrum nervorum principium, vel ventriculum pati non mediocrem inflammationem, quare a vomitu plerumque perniciem oſtendit concitatus ſingultus, omniumque maxime in ilei affectu, ex quo Hippoc. *in ſect.* 7. *Aphor.* 10. dixit: *Ab ileo vomitus, ſingultus, convulſio, malum*. Et Galen. *in Comment.* dixit: *non ſemper in iis*

Singultus quid præſagit.

vomitum

vomitum adesse, sed quando exitiales sunt, & si vehementius distorqueantur, stercus eis ascendit, atque singultiunt. Quare in acutis febribus a vomitu & præsertim malo singultus ascendens, mortalis erit judicandus; qualis fuit observatus ab Hippoc. *in 3. Epide. Ægrot.* 12. *pag.* 1080. in muliere ægrotante in mendacium foro, de qua ait: *Duodecimo vomuit multa, nigra, fœtida, singultus multus, sitis laboriosa: quæ postridie obiit.* In quacumque vero febre acuta singultus frequentior & molestior, futuri exitii nobis erit indicium, omniumque maxime, si a vomitu malo; dico vomitum malum ex humoribus aut fetidis, nigris virulentis, aut finceris, qui evacuantur. Ex quo merito in *sect. 4. Coac. præs. text.* 565. in vomitionibus finceris damnatur singultus. Ab immoderata etiam quum evacuatione tum purgatione singultus solet esse exitialis, quod resiccatis nervosis partibus stomachus convellatur. De quibus Hippocr. *in sect. 5. Aphor. 3. Ubi sanguis multus fluxerit, singultus aut convulsio, malum*: Et in sequenti Aphor. *Ex superflua purgatione convulsio aut singultus suprveniens, malum.* Omniumque exitialissimi sunt singultus, qui immodice purgatis corporibus, ac vel etiam suapte natura debilibus. De quibus Hippoc. forte *in lib. 7. Aphor.* 41. dixit. *Si senioribus supra modum purgatis singultus supervenerit, non bonum.* Similiter solent singultus in ictericis ex tumore aut inflammatione hepatis concitari. De quibus in *Coacis præsagiis text.* 490. hæc habentur: *Qui fœdati morbo regio non adeo acriter sentiunt, siquidem singultiunt, alvi iis exturbantur, fortasse supprimuntur atque ii valde flavescunt. Non singultiunt hi, quovis modo affecto hepate, sed ita pleno aut inflammato, ut vel præ copia exundantis bilis totus ventriculus aut stomacus gravetur, aut mordeatur, vel præ magnitudine inflammationis ac fervore opprimatur, quod tum demum evenire solet, quum affectus maximus est.* Verum, ut letalium seu exitialium singultuum judicium confirmetur, signa alia perniciosa, quum quæ præcesserunt, tum quæ una illuxerunt, tum quæ postea, quando singultus exitiales numquam soli erunt, sed alia ejusdem perniciosæ naturæ aut ante aut simul conspecta habebunt signa. Quæ auctor Prorrheticorum *in 1. lib. text.* 23. expressit, dicens: *Aphoniæ cum singultu, pessimæ.* Et in Coacis præsagiis *text.* 45. *Lassati, singultientes, stupore detenti; mali.* Pessima signa erunt, sudores frigidi, extrema frigida non recalescentia in febre ardentissima, non sitire, cibum abhorrere, sudare copiosius, & febrem non intermittere: stilla sanguinis e naribus, & alia hujusmodi multa, quæ quisque videre poterit, in historia illius mulieris, quæ in mendacium foro decumbebat, de qua, ut dictum est, Hippoc. *in lib. 3. Epidem. Ægrot.* 12. *pag.* 1080.

Singultus exitialissimi.

Singultus exitiosi unde nascuntur.

CAP. X.

De rigoribus, atque quid in morbis significent.

DE rigoribus quoque in præsentia quatenus ad prognosticum judicandum maxime faciunt, acturi, in primis ipsorum cognitionem, juxta nostrum ordinem præmittemus, neque inutiliter, quum non possit, eis non probe cognitis, de morbis judicium certum ex rigoribus haberi. Rigor itaque est naturalis caloris subita ac violenta, sive, ut ait Gal. *in lib. de trem. palp. convulf. & rigore. Dolorifica perfrictio cum quadam inæquali totius corporis concussione, agitationeque ab expultrice facultate partium sensibilium conante foras expellere humores noxios, oborta.* Distinguitur a tremore, quod tremor sit unius tantum membri vibratio, rigor totius corporis. Ab horrore, quia hic sit totius cutis & rigor totius corporis. Ceterum dicemus hoc paullo post accuratius. Rigor quandoque fit citra ullam febrem, plerumque cum febre una: absque febre rigorem concitari docuit

Rigor quid.

A tremore & horore quomodo distinguitur.

docuit Gal. *in lib. nuper citato cap.* 7. & *in ſect.* 2. *de cauſ. ſymptomatum cap.* 5. atque *in libr. de inæquali intemperie cap.* 8. qui contra antiquos fieri abſque febre rigores demonſtravit. Viditque ipſe Alexandriæ juvenem citra febrem ex dactilorum immaturorum eſu, quippe ex humore craſſo venas obſtruente, riguiſſe. Antiquis vero cognitum haud fuit, citra febrem corpora rigere. Non tamen Hippoc. quum *in primo lib. Epid. Com.* 3. *Ægr.* 5. *p.* 979. de uxore Epicratis hoc aperte ſcripſerit, dicens: *Epicratis uxor, quæ ægrotabat apud Archegetem inſtante jam partu, rigore correpta eſt, non incaluit, ut ferebant, poſtridie eadem erant.* Datur itaque rigor citra febrem, qui a Galan. *in ſect.* 6. *Comm.* 3. *text.* 9. rigor non potens calefieri & a Græcis *anechtermeton* nuncupatur, veluti ille, qui poteſt calefieri, quippe quem febris ſuſequitur, validus concutienſque ac morbidus dicitur. Sed quomodo quum a frigore, tum ab horrore rigor diſtinguatur, Galen. *in lib. nuper citato de trem. palp. convul. & rig. cap.* 6. his verbis expreſſit, dicens: *In ægrotantibus ſane non idem videtur cum eo, quod eſt horrere, aut frigere.* Dicimus igitur ſubinde acceſſionis inſultum, huic ſane cum rigore, alteri cum horrore, alii cum frigiditate ſola oboriri, & in omnium Medicorum commentariis idem uſus verborum exiſtit. Ita quum quis cum nulla concuſſione corporis & agitatione perfrigeſcit, non hic riget, verum ſi affectus rigor appellari debeat, inæqualem & præter voluntatem motum ei accidere oportet, quod ſi non accidat, ſed cutem quidem inæqualiter commoveat, perfrictionem nominant: ſin autem hanc quidem perturbet, quatiatque per quoſdam inſultus, corpus autem totum non commoveat, horrorem nominant, ut hic cutis ſolius affectus talis exiſtat, qualis totius corporis rigor. Cauſæ rigorum ſunt primo immoderata quum caliditas tum frigiditas. A calore immodico & frigore confertim corpus alterari horrore & rigere, ii, qui balneum nimis aut calidum aut frigidum ingrediuntur, probe ſciunt, & a Galen. *in lib. ſecundo de cauſ. ſympt. cap.* 5. demonſtratum eſt. Ex quo merito ab Hippocrate *lib.* 5. *Aphor.* 20. ſcriptum eſt: *Ulceribus frigidum quidem mordax cutem obdurat, dolorem inſuperabilem facit, & rigores febriles.* Quidam etiam ex vehementi timore horrent. Veluti alii tremunt ab ulceribus & abſceſſibus ſuppurantibus, nec non rigere corpora aliquando ab inuſtione & ſectione, Gal. *in ſect.* 6. *Epid. Comm.* 3. *text.* 19. nobis prodidit, quum dicit: *Sed ab his cauſis rigent, tamquam ab aliquo acri ſenſibilem carnem lædente.* Ex quo merito præcipuas rigorum cauſas, bilioſos, acres humores *Galenus* ſtatuit. Hi enim admodum ſenſibiles partes mordicantes, ſunt in cauſa, ut calor naturalis ad ipſos quidem ejiciendos, magno impetu exurgens, motum illum inæqualem concuſſivumque in toto corpore efficiat, quod Galen. *in ſect.* 2. *ſympt. cauſ. cap.* 5. docuit. Hujuſmodi rigores clare apparent in febribus bilioſis, omniumque maxime in iis, quæ intermittunt. In quibus idem, quando humores bilioſi tenues admodum mordaces extra venas expulſi ab omnibus ſenſibilibus particulis continuatim expellantur, quippe ab hac in aliam partem, atque ab illa in aliam, quouſque humores, vel ad cutim ferantur, per ejuſque poros, ſcilicet per ſudorem vacuantur, aut ad ſtomachum pervenerint, ex quo vomitu rejiciuntur, aut ad alvum, per quem foras demittuntur. Hinc rigores bilioſæ vacuationes ſequi ſolent. Quod a Gal. *in lib.* 6. *Epidem. Comm.* 1. *in text.* 6. hiſce verbis ſcriptum eſt: *In ſermonibus de rigore oſtenſum eſt amaram bilem, quæ cum impetu per ſenſibilia corpora ad excretionem fertur, conſequi rigorem.* Rigor vero hujus eſt generatio. Acres enim ac infeſti humores a venarum expultricibus pelluntur extra ad partes, a quibus non minus ii expelluntur, quum has ipſorum acrimonia infeſtet, & excitet expultricem, viciſſim in alias, hæque in alias, quouſque aut, ut nuper dictum eſt, ad cutim, aut ad ſtomachum, aut ad ventrem venerint, &

Perfrictio & horror quid.

Rigorum cauſa.

A bilioſis & acribus humoribus.

dum

dum conantur partes læſæ humorem expellere, calor naturalis ad eas, ut opem ferat, evocatur. Ex quo extremæ partes algent eo deſtitutæ. Finitaque humorum expulſione, quod eſt ubi ad cutim, aut ad alium locum extimum, per quem excerni poſſint, deventum ſit, rurſum calor foras effertur. Quo tempore extrema denuo incaleſcunt, & multoque magis ſi calor naturalis robuſtus fuerit. Quo prælanguido exiſtente tarde & parum incaleſcunt. In hac itaque humorum expulſione fit illa corporis totius inæqualis concuſſio ac vibratio, quę rigor eſt. Dunque fit hæc, extrema calore intus recurſo frigeſcunt. Hinc dum rigent corpora, una etiam frigent. Quare rigores ab acribus humoribus concitantur. Quandoque vero fiunt ab humore craſſo venis obſtruente. Cujuſmodi fuit ille, quem Gal. Alexandriæ in juvene obſervavit, de cujus ſane rigoris generatione, *in nuper citato lib. cap. 6.* Gal. ita habet: *Nunc autem naturalis caloris vi impedita rigor occurrit, cupit enim tamquam nec ſubſtantia nec robore oblæſus tum expandi, tum in omnes partes corporis diſtribui. Prohibitus autem & vi in altum repulſus ad proprium principium refugit: Quum autem ibidem manere nequeat (nam ſubſtantię ſemper mobili loco conſiſtere mos eſt.) ſeſe ligans ac veluti in unum congregans, æqualiter ſane non intro libero motu protenditur. Sed vehementi latione utens, & veluti a carcere exſiliens nonnumquam inſurgit motu adverſus ea, quæ tranſitum ipſius occupant; illa ſane impetuoſa cohibetur, totum autem corpus quum incidit, perturbat. Nam præter alia etiam vaporoſus nunc redditus, dum illiditur in ea, quæ obſiſtunt, intro rurſus reſilit, ſeu ictu repercuſſus ac iterum ad principium revertitur. Inde rurſus erumpens incidit violentius, iterumque reſilit etiam in hoc illapſu, idque frequenter per ſucceſſionem fit, quamdiu noxa perſeverat.* Incipiunt vero rigores a dorſo & lumbis, quod Hpp. *in ſect. 5. Aph. 69.* ita habet: *Rigores incipiunt mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorſum ad caput; ſed & viris parte corporis poſteriore magis quam anteriore. Velut ex cubitis ac femoribus. Sed & cutis viris rara. Hoc quidem pilus indicat.* Sed hæc ſatis pro rigorum illuſtranda notitia, nunc ad ipſorum prædictionem, quam ſane primum a bonis rigoribus venemur. Boni itaque rigores ſunt eorum, qui in febribus obſervantur, periodici, febriumque propria qui ſunt ſymptomata. Periodici, qui aut quotidie aut alternis diebus aut ternis, omnes ſalubres, febres intermittentes antecedunt, quas omnes periculo vacare Hippoc. *in lib. 4. Aphor. 43.* tradidit, eoque magis, quo major eſt intermiſſio, & quo minus eſt moleſtiarum tempus. De his enim in *Aph. 63.* ait: *Quibus quotidie rigores fiunt, quotidie febres ſolvuntur.* Quum enim ut Gal. docet in Commento, per omnem corporis habitum mota rigores accidant, atque ideo ſingulis acceſſionibus expurgetur, atque evacuetur, non abſque ratione ad infebricitationem pervenit talium febrium intermiſſio. Hoc igitur eſt, quod nunc dictum eſt ab eo, quotidie rigores fiunt, quotidie etiam febres ceſſant, ſic videlicet ſi & per tertium diem vel etiam per quartum. Quod ſcilicet fieri videtur & in tertianis, & in quartanis circuitibus, in quibus febres ſolvuntur, & rurſus redeunt, quarum proprium eſt, ut cum rigore redeant. Omnium vero optimi ſunt rigores judicatorii optimi. Cujuſmodi ſunt, qui febribus ſuperveniunt continuis in aliquo dierum judicatoriorum, cum ſignis concoctionis, a quibus aut ſudores optimi copioſi, aut vomitiones, aut alvi dejectiones aut ſanguinis e naribus eruptiones ſuccedunt, atque ex ipſis febres aut prorſus tolluntur aut maxime minuuntur. De quibus Hippocrat. *in quarto lib. Aphor. 58.* ait: *A febre ardente habito, rigore ſuperveniente, fit ſolutio.* Duo vero optimi rigoris videntur eſſe propria, primum, ut corpora a rigore maxime incaleſcant, idque fieri triplicem ob cauſam, ut Galen. *in lib. de trem. palp. rigore cap. ult.* docuit, primo quia calor naturalis ab ambiente repreſſus in altum colligitur, ut particulis conantibus noxios humores expellere, opem ferat, atque deinde, ut *in ſect. 3. lib. de temp.* docuit, humore intus exiſtente enutritus

Ab humore craſſo.

Rigorum prædictio.

Rigores boni quinam.

Rigoris optimi quinam propria.

& auctus, totus vehementer foras expanditur. Secundo quod calor ob violentam illam ad partes corporis permanſionem, motionemque non parum accendatur, veluti lapides ferrumque ex mutuo contritu atque aſſiduo motu valde incaleſcunt. Demum calor dum ex alto redit, ferventis aliquid humoris ſecum ducit, quo incaleſcit corpus. Quo vero corporis nativus calor fuerit robuſtior, eo corpus a rigore calidius fiet, & quo minus fortis, eo minus eſt calidum. Hinc corpora probe calefieri a rigoribus, bonum eſt, qui naturam firmam ac viribus potentem ſignificet, veluti e contrario, ut paullo poſt videbimus, quum nihil aut parum incaleſcunt, ex rigoribus peſſime eos ſe habere naturamque prælanguidam teſtatur. Quare a rigore corpora maxime calefieri, quocumque fiat modo, optimum erit. Quod in omnibus, a quibus quum optimæ vacuationes, tum purgationes fiunt, obſervatur. Alterum eſt optimorum rigorum proprium, quippe quod optima aut evacuatio aut purgatio ſuccedat. Addamus quoque, quæ aut febrem prorſus tollat, aut ſaltem diminuat. Quales ſane in multis ægrotis Hippoc. obſervavit, quippe in uxore Epicratis, quæ apud Archegetem decumbebat, in Charione, in Lariſſæ Virgine, in ſorore apud Timeneum decumbente, Philiſtide. De Epicratis uxore *in primo Epidem. Ægrot.* 5. *pag.* 479. ait: *Die decimo quarto ſuperriguit, febris acuta. Quintodecimo vomuit bilioſa, flava, ſubcrebra, ſudavit, libera febre, ſub noctem non febris acuta, urina craſſa cum candido ſedimento.* Et de Charione *in lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 5. *pag.* 1072. *ſeptimo ſuperriguit, febris acuta, per totum corpus ſudavit, judicatus eſt, & eodem modo poſtea in recidiva ſeptimo decimo ſuperriguit, febris acuta, ſudavit, febre eſt decretorie liberatus:* & de Virgine Lariſſæ *Epid.* 3. *Ægr.* 12. *pag.* 1110. *Sexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox ſudavit toto corpore multum & calidum, ſine febre eſt judicata. In lib. vero quarto* Epidemior. *text.* 25. *pag.* 1131. meminit ſororem, quæ erat apud Timeneum cum rigore judicatam: & *in lib.* 7. *Epidem. text.* 130. *pag.* 1239. Philiſtidem Eraclidis uxorem eodem modo cum rigore judicatam. Aliquando in ſanguinis profluvio rigor eſt bonus. De quo *in ſect.* 3. *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 150. 151. legitur: *Quibus in principio largum ſanguinis profluvium, rigor fluxionem ſiſtet.* Neque immerito aliquando ex *immodica vacuatione* calore toto una cum ſanguine intus recurrente. Nihilominus in morbis hujuſmodi rigores longitudinem prænuntiant, nam ut Galen. ait *in Comm. Ubi morbum non ſedaverit ſanguinis eruptio, exceperitque eam rigor, utrumque longum redditur ex eo, quod corpus difficulter calefiat:* Aliquando etiam decretorie per tremores judicium declarant, ut *in Coacis præſagiis* 1. *lib. Com.* 1. *tex.* 27. habetur, atque hi boni cenſentur rigores in morbis. Mali vero e contrario ſunt, a quibus primo corpora minime incaleſcunt aut parum, quod naturam prælanguidam ſignificent, de quibus in 1. *Pror. text.* 65. ſcriptum eſt: *A rigore refrigeratio non recaleſcens, malum.* Idemque *in ſecundo libro* habetur, quod, ut Gal. ſcribit in Com. caloris extinctionem ſignificat, quod in muliere in foro mendacium decumbente Hippoc. *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 12. *p.* 1080. obſervavit. Sunt etiam pernicioſi, quos aut nulla ſequitur vacuatio bona; aut mala, meritoque dicuntur Critici, ſed mali, qui non judicant. De iis Galen. *in ſect.* 2. *Pror.* ſcribit: *Nam qui univerſaliter de rigore intellexerunt, perpetuo eos meminiſſe oportet, quod ſi vel tertio vel quarto die fuerit, talium febrium peculiare eſt ſymptoma. In morbis vero poſtea apparens, ſi judicationem non intulerint, deterrimum exiſtit.* Deterrimi ſunt, qui cum mala aliqua excretione apparent, quod ſint ex judicatoriis non judicantibus, qui aut mortalia, ut Galen. affirmavit, aut judicii difficilis eſſe ſolent. De quibus in *ſect.* 1. *Prorrheticor. lib.* 1. *text.* 66. *Si ex perfrictione ſudantes non recaleſcant, malum; ex his quoque laterum æſtus, cum dolore & rigore ſuperveniens,*

Rigores mali.

Deterrimi

niens, malum. Sudores vero malos esse quum frigidos omnes, tum maxime partium superiorum, tum copiosos minime febrem tollentes. De his Hippoc. *in primo Epid. Ægr.* 11. *pag.* 987. de uxore Dromedai scribens, ait: *Tertio die circa meridiem superriguit. Febris acuta. Urinæ eædem: hypochondrii dolor: fastidiosa ac nauseabunda, nox molesta, non dormivit. Sudavit per totum subfrigida.* Et *lib. 3. Epid. Ægr.* 12. *pag.* 1080. Mulier quæ in foro mendacium decumbebat, itidem sæpius ante mortem riguit, & cum sudore frigido. Copiosus quoque etsi non frigidus, crudo existente morbo, neque febrem neque symptomata tollens, letalis est, præcipueque si aut die sexto aut octavo conspiciatur. Cujusmodi observatus fuit ab Hippoc. in eo, qui incalescens cœnavit. De quo *in primo Epidemiorum Ægr.* 12. *pagin.* 988. *Octavo riguit, febris acuta, sudavit multum, febre carere visus est, non multum dormivit, a somno frixit. Qui die undecimo obiit: Et in Coac. præsag. text.* 10. legitur: *Qui subinde exsudant & rigent, letale est.* Quare rigores omnes mali sunt, quos aut nulla vacuatio, aut mala subsequitur. Qui ad febrem vero spectant, deterrimi sunt, febrem non tollentes, aut non minuentes. Quod apud Hippocr. legitur *in sect. 4. Aphor.* 56. hisce verbis: *Febricitanti rigor superveniens, febre non deficiente, malum.* Omnium vero maxime ex aliqua copiosa vacuatione si id fiat, ut Gal. *in quarto lib. Aphor.* 46. meminit, ita dicens: *Nam si aliqua evacuatio rigorem subsequatur, quæ nullam febris facit intermissionem, propter utrumque dissolvi hominem verisimile est, & quia vis imbecilla ferre non potest rigoris agitationem, & quia ab evacuatione dissolvitur.* Quod si vires prælanguidæ fuerint ex morbo, hujusmodi rigorem letalem esse, Hippoc. *in eo lib. 4. Aphorism.* 46. ita scripsit: *Si rigor incidat febre non deficiente, ægro jam debili, letale est.* Omnes enim rigores quicumque fuerint prælanguentibus viribus, sunt perniciales, quoniam extinctionem nativi caloris nobis indicant. Cujusmodi intellexit auctor Prorrhet. *in* 1. *Prorrh. text.* 65. quum dixit: *Refrigeratio cum rigore non recalescens, malum.* Et *in sect.* 2. *lib.* 1. *Epid. pag.* 954. *inter D. & E. post oculorum perversionem in febre laboriosa rigor superveniens mortem fatetur.* Forte & de his Hippoc. quum *in lib.* 7. *Aph.* 7. ait: *Ex multa potatione rigor & desipientia, malum.* Rigent enim, auctore Galeno, ubi calor multitudine extinguitur. Cognoscuntur etiam rigores deterrimi, qui sunt ex aliis malis signis vel ante ipsos, aut una cum ipsis apparentibus, aut quæ postea apparent. Cum malis enim in febribus continuis perpetuo timendi sunt. De quibus Hippoc. *lib.* 1. *Epidem. sect.* 2. *pag.* 954. *inter D. & E.* scribit: *At, quum febres ardentes inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet: siquidem statim ab initio febris acuta eos corripiebat, a qua superrigebant, insomnes erant, graviter angebantur, sitibundi, fastidiosi.* In phreniticis, in quibus albæ urinæ aut fæces apparent rigores sunt pernicioſi, ut *in sect.* 1. *Pror. lib.* 1. *text.* 13. scriptum est. Scribitur etiam *lib.* 1. *Pror. text.* 64. *cum rigore non agnoscere familiares, seu ignorantiam, malum esse: itemque & oblivionem.* Gal. *in Com.* ex insigni refrigeratione & victum esse calorem judicandum: & postea scribit *lib.* 1. *Prorrhetic.* 67. *Æstuosi rigores quadamtenus pernicioſi, flammans quoque cum sudore facies in his, mala.* Et postea *ib.* 89. etiam de hujusmodi rigoribus scribit: *In oculorum perversione cum febre & lassitudine rigor perniciosus. Comatosi in his male habent.* Et *in primo Coacorum præsagiorum tex.* 7. *Rigores, quibus multa insomnum inclinatio inventa est, utcumque letales, quod si cum iis facies flammæ in modum exardescit cum sudore, malignum est.* Et postea *text.* 14. *malignos esse rigores* scribit, *torporem inferentes.* Quod extinctionem caloris denotent. Et postea *text.* 22. *E rigore cum capitis dolore exsolutiones, letales sunt.* Quod significent cerebrum insigni phlegmone teneri. Quare ex aliis symptomatibus malis augetur malorum rigorum judicium. Quemadmodum quoque intellexit auctor *Coacorum præsagiorum*, *text.*

Cum viribus prælanguentibus letales.

Rigores deterrimi unde cognoscuntur.

Rigores exitiales.

text. 20. quum ait : *Quibus rigor in noctem incidit, tumque afflictantur magis & ſine ſomno agunt, multum exæſtuant.* Aut quod *in lib.* 1. *Pror.* 101. ſic clarius legitur : *Supervenientes rigores & nocte magis quodammodo exacerbantes cum vigiliis & venarum agitationibus in ſomnis, atque urina præter arbitrium excernentes, in comatoſas aliquando finiunt convulſiones.* Sed dicamus non letales eſſe hujuſmodi rigores cum eis malis ſignis conſpectis. Quare in acuta febre rigores cum ſignis malis, judicium exitii augent. Sunt etiam pravi ex *Coacis præſagiis text.* 9. 10. rigores continui, aut frequentes : qui aut interni viſceris ſuppurationem indicant, aut fruſtra tentatam Criſin, aut denique nativum calorem extingui. Cujuſmodi fuere in muliere in foro mendacium decumbente, cujus hiſtoria illuſtre ſatis nobis erit exemplum ad illuſtranda ea, quæ de exitialibus rigoribus hactenus diximus. Quum hæc ſæpe in eo morbo riguerit, atque ſemper cum ſignis perniciosis. Quam quidem Hippocr. *in libro tertio Epid. pag.* 1080. *Ægr.* 12. hiſce verbis eſt complexus : *Mulierem, quæ decumbebat in mendacium foro, primum enixam cum dolore maſculum, corripuit febris. Initio ſtatim ſitibunda cor illi dolebat, faſtidioſa, lingua arida, venter turbatus tenuibus pauciſque, non dormivit. Altero die aliquantulum riguit, febris acuta, modicus ſecundum caput & frigidus ſudor. Tertio cum dolore dejecit alvus cruda, multa, tenuia. Quarto ſubriguit, omnia irrita ſunt in ſomnis. Quintum diem laborioſe tranſegit. Sexto eadem erant, alvus reddidit humida, copioſa. Septimo ſuperriguit, febris acuta, ſitis ingens, ſe jactavit, ſub veſperum per totum corpus ſudavit frigidum : frigus partium extremarum, nec redibat illis calor. Iterumque nocte ſuperriguit, extremitates calorem non recipiebant, non dormivit, nonnihil deliravit, ſtatimque ad mentem rediit. Octavo circa meridiem rediit calor, ſitibunda, comatoſa, faſtidioſa: Vomuit bilioſa, pauca, ſubflava. Nocte graviter ſe habuit, nihil quievit, multum affatim minxit inſcia. Nono omnia fuerunt remiſſa. Sub veſperam comatoſa, aliquantulum ſuperriguit, vomuit amara, bilioſa. Decimo rigor, febris exacerbata eſt, nihil dormivit: Mane multam, in qua nihil ſubſideret, reddidit urinam, extrema partes receperunt calorem. Undecimo virulenta bilioſa vomuit, non multo poſt riguit, rurſuſque extremæ partes frigeſcebant. Sub veſperam rigor, ſudor frigidus, multum vomuit, nox gravis fuit. Duodecimo vomuit multa, nigra, fœtida : ſingultus multus, ſitis laborioſa. Tertiodecimo nigra virulenta vomuit, rigor : Circa meridiem muta. Quartodecimo die ſanguis de naribus. Defuncta eſt. Huic perpetuo venter erat lubricus, horrebat.* Sed tempus eſt, ut quædam etiam de prædictione ab horroribus ſubjiciamus.

CAP. XI.

De horroribus, & ipſorum prædictione.

Horror quid. HOrrorem affectum eſſe pravorum humorum per cutim diſcurrentium. Galen. *in* 1. *lib. de humoribus text.* 17. docuit : *Hic vero affectus motus inæqualis, ſive concuſſio totius cutis eſt, veluti rigor totius corporis. Ab horroreque ex hoc diſtinguitur, atque etiam quia horror eſt motus parvus; vehemenſque, ac magnus rigor.* Ex quo merito horrorem parvum rigorem plures fecere: Gal. *in lib.* 2. *de diff. feb.* dixit medium eſſe inter rigorem & frigefactionem. *Unde.* Fiunt horrores ab omnibus cauſis rigorum, quippe obſervamus in balneis horrores quum a calido tum a frigido, ab humoribuſque commordentibus ad cutim motis, Ex Gal. *in* 7. *Aphor.* Omnes enim mali ſucci plenos, quum vehementer calefiunt, horrore vexari Gal. *in* 6. *Epid. com.* 3. *text.* 67. tradidit. Calefiunt enim quum in febribus ex febrili quidem calore, tum in phlegmone. Hinc ex interna phlegmone vel etiam hos concitari *in lib.* 2.

Pror-

Prorrh. lib. 1. 75. ſcribit, præſertim ii, qui celeriter tranſmutantur, uti ægri etiam implacidi ſint: ſed nedum a febribus, ſed quovis modo humores commotos horrores concitare, Gal. *in ſect.* 2. *de cauſ. ſympt. cap.* 5. ita ſcripſit: *Ac mihi quidem ſic videtur. Eumdemque hominem ſicuti quieſcentem quidem ſolam inæqualitatem ſentire, ita motum horrore & exercitatum rigore concutiente urgeri.* Et paullo poſt: *Jam aliquos, qui cruditate laborarunt, ſcimus, quum quieviſſent, nullo affectos dolore: Quum balneum fuiſſent ingreſſi, aut in ſole ſtetiſſent, excrementa, quæ prius quieverunt, calefaciendo, attenuando, ac in ſpiritum vertendo, ad motum excitant, quemadmodum ex animi affectibus ira.* Ubi vero excrementa, ut pituitoſa aut bilioſa acria ſint, cujuſmodi ex præexcellenti putredine fieri ſolent, ad cutim mota atque diſcurrentia horrorum ægrotis ſunt in cauſa. Sed his præmiſſis ad Prognoſticum. Horrores primo ſtatuamus numquam bonos, continuis febribus ſuccedentes, iis exceptis, a quibus continuæ febres intermittere cœperunt; boni enim hi ſunt, veluti ſi etiam in ardentibus febribus, qua hora fiebat exacerbatio, frigus, horror aut rigor appareant, indicio enim ſunt, naturam prævalidam eſſe, pravoſque humores expellere a venis foras. Optimi quoque ſunt judicatorii boni, qui concocto quadamtenus morbo apparent, ubi bona quæpiam vacuatio aut purgatio ſucceſſerit. Quod in Lariſſæ virgine Hippocrates vidit, de qua *in lib. tertio Epid. pag.* 1110. *Ægr.* 12. ita ſcripſit: *Sexto die ex naribus multum fluxit, inhorruit & mox ſudavit in toto corpore multum, & calidum, ſine febre eſt judicata.* Apparentibus itaque coctionis ſignis, ſimulque & aliis judicatoriis ſignis; ſi horreant ægri, bonum; Criticas enim vacuationes atque purgationes præcedere ſolent; De quibus *in ſect.* 1. *coac. præſ. com. text.* 19. *Inhorreſcentes, anxii, laſſitudine preſſi, lumbis dolentes, in profluvium alvi incidunt.* Non particulatim, ut nos putamus, ſangninis eruptionem denotant, ſed generatim criticam perturbationem, veluti & auctor Prorrheticorum *lib.* 1. 149. ait: *Qui ab horrore ſimul critice ſudarunt, poſtridie vero ubi inhorruerunt, præter rationem vigilent, eos ſanguinis eruptionem incurſuros, puto.* Quod quicquam certi non habere Gal. *in com.* affirmavit. Quare boni tantum horrores ſunt, a quibus continuæ febres intermittere incipiunt, atque judicatorii boni. Mali vero ſunt primo, qui purulentos ac tabidos explicant, judicatorii mali, atque ubi in principio peſtiferorum morborum fiunt. Qui quum propter maximam humorum pravitatem, atque ob naturæ infirmitatem fiunt, tentantem movere humores, at nequeuntem. Quod clarius explicare videntur, ubi ab horroribus parum incaluerint. De quibus Hippoc. *in* 3. *lib. Epid. com.* 3. *pag.* 1089. *G* ſcribit: plures eorum, qui febribus peſtilentibus laborarunt, horruiſſe: ait enim: *Horrebant, & ſub mortem delirabant.* Quod in Critone, qui tertio die ex tumore peſtilenti interiit, obſervatum eſt, de quo Hippoc. *in* 1. *epid.* 3. *pag.* 984. *Ægr.* 9. *text.* 26. ait: *Decubuit eodem die horreſcens, faſtidioſus, parum calens*: Eodem quoque modo ſcripſit *in lib.* 7. *Epid. pag.* 1222. *text.* 52. Ariſtocratem, qui die tertio ex carbunculo peſtilenti eſt defunctus, principio horruiſſe. Ex judicatoriis malis, qui ex Gal. aut difficilis ſunt judicii aut letales. Cujuſmodi eſt ut *in ſect.* 7. *Aphor.* 4. Hippoc. ait: *a ſudore horror, non bonum*: Et auctor Prorrh. *lib.* 1. 83. *Ex lumborum dolore ad os ventriculi recurſiones febriles cum horrore, aquoſa tenuia & multa removentes, mente aberrantes, voce privatæ, nigra vomentes, moriuntur.* Et *in ſect.* 1. *coac. præſ. com.* 1. *text.* 8. *Qui frequentibus e dorſo levibuſque horroribus deſudant, difficili morbo laborant.* Ex quibus colligitur horrores, qui vomitus malos & exitioſos ſequuntur, eſſe judicatorios malos, qui ut dictum eſt a Gal. *in* 7. *Aph.* 4. aut ſunt difficilis judicii, ſcilicet ubi non adſunt ſigna letalia; aut letales, ubi unum aliquod letale illuxerit ſignum, ut in ea adducta oratione appareret, in qua delirium, vocis defectio, & nigra excrementa vomitu excreta.

Horrorum prognoſticum.

Horrores boni.

Optimi.

Mali.

In

In *Coacis vero præſagiis*, loco modo allegato difficiles eſſe illos horrores, qui ſæpius fiunt, ideſt, crebros ſeu frequentes, quique etiam celeriter permutantur. Quod *in Prorrh. lib.* 1. 75. ita expreſſum eſt: *Ex dorſo frequentes horrores, celeriter in aliam tranſeuntes conditionem, implacidique, urinæ interceptionem cum dolore indicant*. Quod recte magis *in Coaco* nuper citato præſagio declaratur, quum legatur ibi: *difficiles ſunt; etenim urinæ ſuppreſſionem & laborioſum morbum ſignificant, atque iis tenuis ſudor obortus, peſſimus*. Sed de letalibus hiſce horroribus Hippoc. *in 3. lib. Epid. comm. 3. pag.* 1089. *B.* ita ſcribit: *Omnes hæ cum multa turbatione erant conjunctæ. Ventres enim pleriſque turbati, horrores, ſudores non decretorrii, cum urinis multis ſupra potum, nullam concoctionem & craſſitudinem habentibus*. Quales Hippoc. *lib. 3. Epid. pag.* 1096. *Ægr.* 2. vidit in muliere apud frigidam aquam in Thaſo decumbente; atque tales ſunt horrores decretorii mali, qui cum ſignis letalibus perpetuo exitium portendunt. Demum ſunt horrores quoque mali, qui nedum febre non tolluntur, ſed cum peſſimis apparent vacuationibus, de quibus *in Coac. præſ. com. 1. text. 36.* ſcribitur: *Laſſitudine fracti cum horrore, quum exſudaverint judicii modo & recaluerint celeriter, malum, tum alias tum ſi eo tempore ſanguis e naribus ſtillaverit, tabiſque indicia*: Quos in maxima & graviſſima illa tabe, quæ plurimos peremit, crebros apparuiſſe Hippocr. *in 3. Epid. comm. 3. pag.* 1089. *C. D.* ſcripſit, de quibus ait: *Horrebant & ſub mortem delirabant*. Sed non ſatis ſunt crebri horrores ad ſuppurationem & tabem exinde denotandam, ſed alia quoque ſigna deſiderantur, nimirum anhelitus difficultas, febris aſſidua, quæ noctu augetur, cum ſudoribus & tuſſiendi cupiditate, dolore, atque aliis ſignis, quibus Hipp. *in 2. lib. Prognoſt. pag.* 42. *lin.* 25. *& ſeq.* purulentos cognoſci docuit. Sed tamen in febre continua aut cum phlegmone interno, vel materia in pulmonibus putreſcente, perpetuo indicabunt ſuppurationem ſeu purulentiam horrores multi, frequentes, inordinati cum dolore & reſpiratione difficili. Quod in *Coacis præſagiis text.* 17. ſcriptum videtur, quum legatur: *Frequens horror & difficultas ſpiritus in doloribus, tabis indicia ſunt*, quatenus indicant pus, & ab eo tabem futuram. In ſputis enim ſanguinis malignis, aut ubi humores in pulmonibus, aut inflammatio in ſuppurationem vertitur, horrores inordinati, & tuſſes ſunt. Qui membranis pulmonum aut thoracis a putri humore acri reddito commotis fiunt.

Letales.

Quando ſuppurationem & tabem denotant.

CAP. XII.

De prædictione a torporibus ac paraplegiis.

Torpor quid. Unde.

PEr torporem affectum quemdam alias intelligendum diximus facultatis animalis cum ſenſus motuſque difficultate, & aliquando quemdam obtuſum ſenſum & motum partis alicujus. Hujus cauſa eſt, ut docuit Galen. *in 1. de cauſ. ſympt. cap.* 5. obſtructio, ſeu incraſſatio, ſeu obſcuratio nervorum, quibus cauſis ſpiritus impeditur, perinde enim nervi a frigidis craſſiſque humoribus ſolent obſcurari, ut luto aqua & nubibus aer obſcuratur; aut qualitas frigida aut exterior aut interior. In febribus vero has quoque habet cauſas, a quibus torpeſcere partes ſolent, quippe phlegmonem, ſcirrhum, luxatas intro vertebras, quibus nervi compreſſi obſtruuntur, ſeu anguſtiores ad meatus redduntur. Illius vero, quippe animalis facultatis affectus cum motus & ſenſus difficultate, cauſæ exiſtunt cerebri refrigeratio tum poſitiva, ut ajunt, tum per extinctionem caloris nativi. Sed torporum cauſis perſpectis, quid in morbis portendant, videamus, quando in ſanis apoplexiam prænuntient: de quibus *in Coacis præſagiis text.* 476. ita ſcriptum eſt: *Torpores & ſenſus privationes præter conſuetudinem ortæ futuras apoplexias denuntiant*. Et paullo poſt *text.* 478. ait: *Apople-*

In morbis quid portendit.

Elicis

Elicis perfricliones & torpores, pravum indicare. Ceterum in febribus continuis perpetuo torporem malum, omniumque maxime mentis, quem ignaviam appellant. Hi enim in acuta quidem febre plane ſunt perniciales, quum ex cerebri refrigeratione, aut caloris nativi extinctione proveniant, utrumque enim perniciale eſt. A rigoribus torpores malignos dici voluit auctor *Coac. præſ. lib. 1. text.* 14. quum dixerit: *Rigores multi torporem inducentes, maligni.* Item *in Coac. præſ.* 91. torpores animi ſeu ignaviam in phreniticis eſſe exitialem prodidit; neque immerito, quum aut refrigerato cerebro in phrenitide, quod pernicioſiſſimum eſſe ſignum alias oſtendimus, aut extinctione caloris nativi fiat. Eodem modo in *lib. 1. text.* 208. & 334. damnat torporem cum ſurditate, a qua prodeant ſtillæ ſanguinis e naribus. Quod nos nedum difficile quippiam, ſed prorſus exitioſum affirmamus. Nec minus in aliqua phlegmone interna, ignavia mentis pernicioſa eſſe videtur, quæ tantum a flammeo calore, diſcuſſo nativo calore, fiat. De qua forte etiam *in lib. 3. Coac. præſ.* 315. ait: *Dolor in pectus firmatus cum torpore, malus in febre.* Ex inflammatione etiam interna, neque reſoluta, neque ſuppurata, neque per exſpuitionem ſolum, pernicioſum eſt, torpentes ægros videre. De qua forte *in lib. 7. Coac. præſ.* 374. ita ſcriptum eſt: *Ex angina citra judicium hypochondrii dolor, cum impotentia & torpore, inſidioſe occidit, etiamſi valde modeſte habere videantur.* Quare mentis ignavia ſeu animæ torpor in acutis morbis perpetuo letalis erit. Alicujus vero partis corporis ſenſum, & motum obtuſum reddi, qui affectus torpor eſt partis cujuſpiam corporis, numquam bonum, niſi critice aliquando appareat, morboq; concocto. Non enim impoſſibile eſt, critice humorem a venis ad nervos tranſmiſſum, torporem iis partibus inducere, quæ hiſce nervis utuntur, veluti & tremorem aliquando videri criticum ſuperius fuit demonſtratum. Sed hoc raro contingit, & ex ſignis criticis facile cognoſcitur. Eodem modo paralyſin, ſeu paraplexiam, ſeu particularem apoplexiam judicabimus, quas in morbis quanque utiliter concitari, humore a venis protruſo, aut ad ſpinalem medullam, aut ad partium particularium nervos, quibus obſtructis paralyſis fit; ſed ubi cerebri vitio fit in acutis morbis, id plane eſt pernicioſum, propterea in vulneribus nuper illatis, ubi partes aliquæ reſolvuntur, haud procul abeſſe exitium prædicant. Minus periculoſum poſt apoplexiam aliquas partes motu privari, quas proprie Hip. paraplexias vocare ſolet. Fit vero aliquando, ut materia paraplexias faciens, prout ab una ruit ad aliam partem, eas reſolvat paraplectico modo, & has mutet in convulſiones. Quas mutationes auctor Prorrheticum *l. 1 Prorrh.* 118. vidiſſe his verbis, meminit: *Quæ ex lumbis ad collum, caputq; redundant, reſolvuntque paraplectico modo, convulſiva & mentis vacillationem patientia, an & alia convulſione ſolvantur? Ex his varie ægrotant per ea profecti.* Hocque ex vario humorum motu fieri affirmandum eſt. Quod & Galen. fatetur ſe vidiſſe hiſce verbis: *Nempe & ſemel ego ita affectum quemdam, permutationemque varie ſeſe mutuo excipientium ſymptomatum habentem vidi. Fiebant autem & illi hæc prægreſſis lumborum, collique, & capitis doloribus, manus tota ab his ægre tum ſentiebatur, tum movebatur, ſicuti & in dictione dictum eſt paraplectico modo, quum non eſſet exacta paraplegia, mox ſuperveniens convulſio ſenſiliorem eam, atque ad motiones expeditiorem fecit, placata autem convulſione ſenſim rurſum deterior reddebatur. Deinde rurſus tum lumborum, tum colli, tum capitis dolore correptus, univerſam ſubitamque habebat paraplegiæ in manu adauctionem, atque rurſus poſtea non parum convellebatur.* Quæ etſi veriſſima ſint, tamen quicquam certi non docent, neque enim convulſio paralyſi ſuperveniens affectum ſolvit, neque contra. Quocumque modo ægroti ex acutis febribus paraplectici evadunt, perpetuo malum. Omnium vero maxime apoplexia, & in ægrotis & in ſanis timenda erit, de qua Hippoc. *in 6. Aphoriſmor.* 51. ait: *Quicumque ſani dolore capitis repente capiuntur, & ſtatim muti fiunt, & ſtertunt, in ſep-*

Mentis torpor quando omnium maxime malus.

Torpor alicujus partis corporis numquam bonus.

Paraplexia quid.

ſeptem diebus pereunt, niſi febris eos apprehenderit. Sed de his affectibus, quum poſterius ſeorſum acturi fuſius ſimus, ſermonem hunc claudemus, & quoniam linguæ reſolutio ſeu defectio ſolet eſſe magni momenti ad venandum prognoſticum in acutis morbis, propterea de hoc ſymptomate ſigillatim quoque agendum duximus.

CAP. XIII.

De prædictione ex aphonia, ideſt, vocis interceptione, nec non ex aliis vocis differentiis.

Linguæ reſolutio.

QUum ex omnibus partibus corporis reſolutis ac torpeſcentibus, linguę reſolutio, quam teſte Gal. *in* 1. *Pror. text.* 23. Græci aphoniam appellant, non parvi ſit momenti ad aſſequendam in morbis predictionem, ideo de ipſa in præſentia agendum quoque duximus. Ceterum, quia aphonia vocis privationem ſeu interceptionem denotat, veluti vox tremula, clangoſa, acuta, querula ſeu plorabunda ejus vitium, idcirco, clarioris hujus ſymptomatis notitiæ cauſa, de voce pauca præmittemus: Hæc enim aut prorſus tollitur, aut minuitur, aut vitiatur. Vitiatam vocem dicimus raucam, clangoſam, acutam, ſtridulam, interruptam, quam plorabundam vocant, querulam, lugubrem, tremulam, quæ omnes ſunt vitiatæ vocis differentiæ, veluti obſcura, balba ſeu balbutiens, tarda, imminutæ ſunt ſymptomata. Prorſus vero ubi ægri loqui non poſſunt, ſilentium, ſed proprie magis linguæ privationem, interceptionemque dicimus. Silentii vero nomine nedum ſublatam vocem, atque ægros voce defectos, ſeu mutos, intelligimus, ſed eos quoque, qui cum nullo vocis vitio teneantur, loqui tamen non volunt. Proinde ſilentium ac taciturnitas, quod quum affectum melancholicum declaret, merito in *prorrheticis lib.* 1. 54. inſaniæ ſignum in multiloquis habetur, mutos vero ac voce defectos dicimus, qui loqui non poſſunt. Rauca vox & balbutiens, acuta, tarda, tremula, nulli eſt non cognita. Non uſque adeo nobis notum eſt, quæ clangoſa, ſtridula, interrupta, ſeu effracta, plorabunda, querula, lugubriſque dicatur. Clangoſa enim ſtridula, querula, plorabunda, ejuſdem generis cum acuta eſſe videntur, quando teſte Galen. *in lib.* 2. *Pror. text.* 12. cum ſiccatione vocificorum organorum, meatu anguſtiore affecto, in acutum maxime vox efferatur: nam acuta in morbis fit, maxime organis ſiccatis, aut ſiccatione aſperæ arteriæ comunicata, quæ, quum magis acuta fit, clangoſa dicitur, & adhuc magis, querula, plorabunda, ſtridula. Arteria enim humiditate irrigata rauca vox editur, ſiccitate exareſcens, primum quidem clara, deinde acuta redditur, quia in anguſtum coguntur vocalia inſtrumenta, hinc ſi magis adhuc intendatur ſiccitas, κλαγγώδης clangoſa, ac ſtridula exauditur, qualis eſt gruum, aut qualis a gravi tono inchoata in acutam deſinit. Alii interciſam, inæqualem & obſcuram appellant, eique ſimilem faciunt, quam temulenti edunt: Poſtremo aucta adhuc ſiccitate evadit lugubris, aut flebilis, aut querula, ac plorabunda, aut ſuſpirioſa, cujuſmodi flentibus pueris editur, quæ voces fiunt, ut nobis auctor eſt Gal. *in lib.* 6. *Aphor.* 49. eo modo quo luctuoſæ, interciſæ, atque offenſantes fiunt reſpirationes, quas Hipp. *Aph. ſect.* 6. 54. luctuoſa ſuſpiria vocat; quippe aut potentia ipſa fatigata, aut duritie inſtrumentorum, quæ cauſa eſt precipua, aut ambabus cauſis concurrentibus, aut propter aliquam muſculorum voci ſervientium ſimilem convulſioni diſpoſitionem. Effractas quoque ejuſmodi eſſe voces dicunt, ubi videntur voces in faucibus confractæ eliſo quodammodo ſpiritu. Quomodo & in follibus, qui muſica organa ſpiritu implent, ſi imbecillior is eſt, qui folles movet, ſonus interrumpitur. Ceterum jam ſa-

Vocis vitiata quales differentiæ.

tis

tis circa haſce vocis differentias. Nunc priuſquam ad aphoniam deſcendamus, brevi oratione prognoſticum perſtringamus. Omnes enim eæ voces vitiatæ in continuis acutiſque febribus malæ ſunt, omniumque maxime in phreniticis & in febribus ardentibus. In quibus ſummum vitæ diſcrimen minantur, quum maximam ſiccationem vocalium inſtrumentorum ſequantur, & aliquando prælanguidam potentiam, aut diſpoſitionem convulſioni ſimilemquæ quum a ſiccitate fiat, pernicialis erit. Proinde auctor Prorrh. *lib.* 1. 47. ait: *Vox acuta, clangoſa mala eſt*. Galenuſque *in Com.* tanto pejorem eſſe clangoſam & plorabundam, quanto majorem indicant ſiccitatis affectionem. Antea de acuta *l.* 1. 45. dixerat: *Quibus vox acuta eſt, his hypochondria introtracta ſunt*. Gal. ait, *pleriſque, qui in morbis vocem mittunt acutam, ad infernam ſedem trahi hypochondria, ſepti tranſverſi aut propter inflammationem, aut quum propter igneam caliditatem areſcit, aut quum a pleura membrana inflammata, aut ſiccatione indurata trahitur*. Ex quibus colligito in morbis cum voce acuta, ubi intro hypochondria tracta ſunt, eſſe perniciosum, quod ſi cum letali aliquo alio ſigno fuerit, periculi judicium quoque una augeri neceſſe eſt. Utpote legitur *in lib.* 1. *Prot. tex.* 17. *Ex vomitu gravi, faſtidioſoque, vox clangoſa, oculique concretum pulviſculoſum habentes, inſaniam oſtendunt, ut Hermozygæ uxori, quæ vehementer furens muta obiit*. Neque mirum, ut poſterius declarabitur, ab acuta clangoſaque voce, poſtea morbo in pejus abeunte, mutos fieri, quippe aut a ſiccitate induratis convulſiſve vocalibus muſculis. Meritoque hinc Auctor *Coac. præſ. tex.* 257. ſcripſit: *Acuta vox & lugubris, & oculorum obſcuratio, convulſiones accerſunt*. Quod indicent hæ voces maximam ſiccationem, a qua convelluntur partes nervoſæ. Clangoſam vero vocem, cum linguæ convulſione, vehementi inſania, cum tremore, & duritie, prorſus eſſe pernicialem *in lib.* 3. *Coac. præſagiorum text.* 99. & *lib.* 1. *Pror.* 19. memoriæ proditum eſt. De tremula vero voce *in lib.* 2. *Coac. præſag. ſect.* 2. *text.* 31. *Coac. præſ.* 258. ſcribit: *Cum voce tremula alvi præter rationem ſolutio in iis longiore tempore corpus male habentibus, letale*. Sed jam ſatis de prædictione ex voce vitiata ac imminuta. Nunc de iis ſcribamus, qui prorſus voce deficiunt; Græci *aphoniam*, & noſtri vocis privationem, ſeu interceptionem appellant. Gal. *in primo Pror. text.* 23. & *in* 24. ſcribit: vocis privationes fieri, & propter voci aſſervientium inſtrumentorum læſionem, & propter principium nervorum affectum. Principium nervorum cerebrum eſt, atque principium ſpinalis medullæ. Quo affecto muteſcere ægrotos cognoſcimus, vel ex eo, quod cum voce aliæ ſimul functiones lædantur, quippe ſenſus, motuſque; idque fit cerebro oppreſſo, ut in apoplexia & in comitiali morbo; aut quia venæ craſſo ſanguine intercipiuntur, ac organa valde reſiccata ſunt, aut ipſo cerebro reſoluto. Voci partes ſervientes, quarum læſione vox læditur, atque intercipitur, eſt laryngx, ejus muſculi, atque thoracis, nec non pulmones nervi recurrentes. Quibus convulſorio modo læſis, vox intercipitur aut læditur, manentibus aliis functionibus integris. Addunt alii vitalis ſpiritus reſolutionem, ut in iis, qui nimio gaudio afficiuntur, qui reſoluto calore loqui non poſſunt, aut ſuffocatione, ut in hyſtericis affectibus, aut contractione, ut in metu, ex quo multi tremuli & aphoni evadunt, aut demum ipſius refrigeratione, aut extinctione, eodem itidem modo & animalibus ſpiritibus ita affectis. Quibus quidem ita præmiſſis reliquum eſt, ut quid particulatim aphonia in morbis portendat, explicemus. An vero aphonia quicquam boni aliquando ſignificet? non per ſe, quum omnis aphonia mala ſit, ſed aliquando quidem ſalutem prænuntiat. Critica quæ eſt, a qua optima vacuatio fit, qualem meminit Hipp. *in lib.* 7. *Epid. tex.* 26. in Theoclis cognata, in qua ſudor non multo poſt judicatorius erupit. Auctor vero Coac. præſag. in 1. *Coac. præſ. text.* 27. ſcribit, quandoque tremores ſolve-

Vocet vitiatæ quid in malis præſagiunt.

Aphoniæ cauſa.

Aphonia quid in morbis portendit.

re a-

Aphonia quanam non ita mala.

re aphonias ex rigore concitatas. Quæ etiam brevi tolluntur, non ita malæ cenſeri debent, neque eæ, quas ſequantur urinæ copioſæ. De quibus, *in quarto lib. Coac. præſ. ſect. 2. text. 35. Coac. præſ. 359.* ſcriptum eſt: *In convulſionibus aphonia diutius durans, malum: quæ durat brevius, vel linguæ reſolutionem vel brachii, & partium dexterarum ſignificat. Solvitur autem derepente prodeuntibus urinis multis affatim.* In iis etiam, qui ſuffocantur, aphonia, a qua poſtea recte loquantur, non letalis eſſe ſolet. De qua Hippoc. *in quinto Aphor. 5.* ait: *Si ebrius quiſpiam repente obmutuerit, convulſus moritur, niſi eum febris corripiat, aut ad eam horam veniens, qua ſolent ſolvi crapulæ, loquatur.* Quæ etiam in principiis fiunt morborum, tametſi numquam bonæ, tamen aliquando ſolam multitudinem humorum teſtantur. Cujuſmodi in muliere, quæ trimeſtri fetu gravida in littore habitabat, conſpecta eſt *Lib. 1. Epid. p. 990. Ægr. 13.* Nonnumquam ſolent aphoni reddi ægroti ventriculo ab aliquo humore læſo, quo aut ſponte, aut arte vomitu rejecto, liberantur, de qua Hipp. *in lib. 5. Epid. p. 1152. Text. 40.* ſcribit: *Hermophili filius ægrotavit undecim dies, febris autem tenebat ipſum, & non deſcendebant cibi, & primum quidem deliravit, nocte vero ceſſavit, ſequenti die ſine voce, jacebat ſtertens, diſtortos habens oculos, febricitans. Penna vero immiſſa vomuit bilem atram, & clyſtere immiſſo, ſtercus multum ſubiit.* Quomodo etiam plures a vermibus aphonias obſervari ſine periculo. Non perpetuo etiam ex vulneribus aphoniæ ſunt perniciales, eæque præſertim, quæ parum durant, & a quibus vox probe reſtituitur ægrotis, qualem vidit Hipp. (*ut in l. 5. Epid. p. 1155. tex. 55.* legitur,) in puella, quæ a rupe ceciderat, voce ſtatim privata. Indicat tamen læſum cerebrum cum vomitu & ſanguinis fluxu. Non tamen ita affectis perpetuo aphoniæ malæ exiſtunt, ut auctor *Coacorum præſagioram* docet *Coac. præſ. 77. in lib. primo ſect.*

Quanam peſſima.

2. text. 27. 28. & 29. Peſſimæ vero ſunt, quæ ſunt ex judicatoriis non judicantibus, pernicialiſſimæ, quæ cum letalibus ſignis apparent, juxta illam univerſalem Epid. Lib. 2. *pag. 999. lin. 1.* propoſitionem, *quod judicatoriorum non judicantium quædam letalia, & quædam difficiliis judicii.* Quare aphoniæ judicatoriæ non judicantes peſſimæ ſunt de quibus *in ſeptimo Coac. præſag. text. 51. Coac. præſ. 247. Quibus vox in febre intercepta ſine judicatione, cum tremore moriuntur. Ibid. 255. Subinde rigentibus mutitates letales ſunt, iis vero moderatus capitis dolor eſt:* & in ſequenti textu: *Mutitates in febre acuta cum exſolutione non ſudanti quidem letales, minus autem exſudanti, diuturnitatem ſignificant:* & in *lib. Pror. 83. Ex lumborum dolore ad cor recurſiones febriles cum horrore, aquoſa tenuia, multa revomentes, mente aberrantes, voce privatæ, nigra vomentes, moriuntur:* hæc eſt aphonia ex non judicatoriis letalibus, quod vomitiones nigræ & deliria exitium portendentia, ſimul illuxerint, & poſtea *lib. 1. Pror. 90. In febribus ad hypochondrium dolores ſine voce, ſudore ſi (Addunt alii* non, *ut ſit,* ſi ſudore non ſolvantur) *ſolvantur, maligni, his ad coxas dolores cum ardente febre, & ſi alvus eruperit, pernicioſum:* & poſtea *text. 91. Quibus voces cum febre deficiunt, poſt judicationem, hi trementes & comatoſi pereunt:* & Gal. *in Com.* clarius ait: *Quibus apparente ſolum febre aphonia fit, & poſt judicationem, hi trementes & comatoſi pereunt.* Febribus ſcilicet, non ſine ſignis, ſed cum mala judicatione, viſis: & *in lib. 3. Pror.* ex Galeno: (*Textum Hippocratis reperies lib. 1. Pror. 94.*) *Si ex capitis dolore aphonia fiat, febriente ægro cum ſudore abſque arbitrio ſuperflua excernantur, & ſi repetitio quædam ſymptomatum pari modo fiat, in longius excidunt ejuſmodi morbi tempus.* Cum ſignis pernicioſis prorſus letales. Qualia ſunt ſudores capitis in febri vehementi, ſudores frigidi, extrema livida, quum intus urunt, vehementia deliria, comata, catochi, convulſiones, tremores, difficilis ſpiritus, frigidus, ſublimis & alia hujuſmodi multa. De quibus Hipp. *in Philiſci hiſtoria lib. 1. Epid. pag. 966. Ægr. 1.* ait: *Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem illa amplius*

redi

dibant, minxit nigra, aliquantum dormivit. Sub diem obmutuit, frigida sudavit. Extremæ partes liveſcebant. Cum vehementi delirio, aut in delirium vehemens deſinentes, aut a vehementi delirio, aphoniæ ſunt letales. De quibus *in 2. lib. Prorrheticorum* (*Verba Hippocratis lege lib. 1. Prorrhet. 94.*) ex Gal. legitur: *Si in febre aphoniæ, quæ convulſivo modo fiunt, deſinunt in eam, quæ cum ſilentio fit, ecſtaſin, perniciosum.* Auctor vero *Coacorum præſag. text. 254. in 2. Coac. præſ. ſec. 2. text. 37.* inſanias vehementes, cum vocis interceptione, letales eſſe ſcribit. Cujuſmodi fuere, quæ in phrenitico Hippoc. *Epid. lib. 3. pag. 1100. Ægr. 4.* obſervavit, atque in Hippia ſorore phrenitica ante mortem, ut *in Epidemiis lib. 7. pag. 1225. num. 62.* legitur. Quem affectum, ſcilicet aphoniam cum vehementi delirio conjunctam, & ab exſoluta facultate animali provenire mortuis aut languentibus inſtrumentis, quæ vocem edunt, affirmamus veluti in phrenitide, tremore, palpitatione ſpectatur. De quibus auctor *Prorrheticor. in primo lib. text. 24.* ait: *Quæ cum exolutione fiunt aphoniæ, peſſimæ.* Sed hic videtur de vitalis facultatis reſolutione loqui. Sunt non minus letales, quæ una cum ſpiritu ſublimi phænomeno quoque, ideſt, apparente, de quo Galen. in *primo Prorrheticor.* (*Huc pertinet lib. 1. Prorrhet. text. 25.*) dixit: Videntur autem omnes, qui talem inſpirant inſpirationem, ſcapulas movere totas, ita, ut per veſtimenta motio conſpicue appareat, tamquam valide ipſi ſuperioribus thoracis partibus operentur. De quo etiam Auctor *Coac. præſag. text. 252. in lib. 2. ſec. 2. text. 25.* ſcripſit: *In vocis interceptione ſpiritus veluti iis, qui ſuffocantur, commotis ſurſum ſcapulis redditus, malus.* Qui ita reſpirant, ſublimes thoracis partes ad omoplotas uſque movere videntur. Nam quum inſpirando diaphragma ſatis eſſe non poteſt, thoracis muſculi ſuperiores, qui e collo in thoracem protenduntur, una adjuvant. Etiam cum brevi ſpiritu vocis interceptio eſt letalis, cujuſmodi fuit, quæ altera die in Pythione viſa eſt *Epidem. lib. 3. p. 1093. Ægr. 3.* Ex convulſionibus etiam, quæ reſiccatis nervis fiunt, aphoniæ letales ſunt. In quo ſenſu Auctor Prorrhetic. *lib. primo text. 23.* habet: *aphonias cum ſingultu eſſe peſſimas.* Quæ etiam ex humorum multitudine fiunt convulſiones, ſi aphoni fiant anginoſi, letaliſſimum eſt. Cujuſmodi fuiſſe anginoſam, de qua Hippocrat. *in quint. Epidem. text. 104. pag. 1162.* ſcriptum reliquit: *Quarta die convulſa, ſine voce, ſtertor, dentium contritio, maxillarum rubor, mortua eſt quinta die.* Ceterum aphoniæ, quæ una convulſis partibus ex copia humorum fiunt, perpetuo letales non ſunt, veluti & tremores, convulſiones, & alia hujuſmodi ſymptomata, a copia humorum in morborum principiis facta: Cujuſmodi fuere obſervata ab Hippocrat. *lib. 1. Epidem. pag. 990. Ægr. 13.* in muliere trimeſtri fetu gravida, in litore decumbente, quæ tamen cum ſignis aliis exitioſis præter artis, ut Gale. viſum eſt, exſpectationem evaſit. Sed perpetuo in exitioſis morbis virium robur attendere oportet, bonam reſpirationem & recte ægrotum ſe habere ad omnia, quæ ei offeruntur. Nam his apparentibus, ut Galen. teſtatur in Herophyti hiſtoriæ commento, vel etiam in moribundis, prorſus non eſt deſperandum, indicant enim robuſtiſſimam naturam.

Aphoniæ minus perniciosæ, quomodo a lethalibus digneſcuntur.

Qui vero fiunt reſoluta facultate animali, ac vitali vel maxime languente, exitium in foribus prænuntiant, cujuſmodi fuere, quæ in Philini uxore *lib. 1. Epidemiorum pag. 976. Ægr. 4.* in phrenitico *lib. 3. Epidemiorum pag. 1100. Ægr. 4.* in muliere apud frigidam aquam decumbente *lib. 3. Epidem. pag. 1096. Ægr. 2.* in phrenitica muliere *ibid. pag. 1114. Ægr. 5.* ante mortem obſervatæ ſunt. Cum catoche quoque ſunt perniciosæ, ut docet Auctor *Prorrheticor. lib. 1. 96.* Cum comate non minus frequentes: quæ in unico morbo fiunt, ut *in 2. lib. Coac. præſag. ſec. 2. text. 33.* (*An Coac. præſ. 259.? Conſer. & lib. 1. Prorrhet. 91.*) ſcriptum eſt. Ex capitis quoque do-

lore pernicioſæ, nam phlegmonem in cerebro factum teſtantur, de quibus *in lib. 1. Prorrhet.* 55. ſcriptum eſt: *Quibus ex dolore aphoniæ, moriuntur: & in 2. Coac. præſag.* 249. ait: *Qui ex dolore muti fiunt ægri, moriuntur.* Iis etiam aphoniæ, quibus caput percuſſum eſt (quod cerebri inſignem læſionem denotant) exitium prænuntiant. Cognoſcuntur vero cerebri inſigni offenſa aphoniæ, ex aliis functionibus ſublatis. Quod Hippoc. *lib. 1. Epid. pag. 969. Ægr. 2.* ita expreſſit: *Cui caput lapide percuſſum eſt a macedone cecidit, tertia ſine voce erat, anxietas, febris tenuis, nihil audiebat, neque ſapiebat, non ſine tremore.* Chirurgi ad cognoſcendum cerebrum vulneratum, vocis interceptionem, ſanguinem ex ore aut ex auribus, vomitum, obſervant. Ut vero ex his colligam, aphonia letalis, perpetuo cum malis exitioſiſque ſignis, obſervabitur, aut ipſam aphoniam præcedent, aut ſubſequentur, veluti in Sileno *ibid. pag.* 976. *Ægr.* 4. uxore Philini *lib. 3. Epid. pag.* 1100. *Ægr.* 4. phrenitico *ibid. pag.* 1096. *Ægr. 2.* muliere apud frigidam aquam anginoſa *ibid. pag.* 1075. *Ægr. 7. pagin.* 1098. *Ægr. 3.* atque Pythione ab Hippocrate, fuit obſervatum. Sed Pythionis hiſtoriam prodamus, qui ſæpe in morbo aphonus evaſit. De quo ita *in 3. Epid. ſect. 3. Egr. p.* 1059. *text.* 55. ſcripſit: *lingua inarvit, ſitibundus erat, bilioſus, non dormivit: Urinæ ſubnigræ, ſuſpenſio ſublimis, non ſubſidebat. Altero die ſub meridiem extremæ partes frigebant, præcipue circa manus & caput, obmutuit, voce defectus eſt, diu breviſpirus, rediit calor ſitiit. Nocte quievit, circa caput modicum ſudavit. Die tertio interdum quievit. Veſperi ſub ſolis occaſum aliquantum frixit, turbatio. Nox laborioſa fuit: nihil dormivit, ab alvo pauca compacta ſtercora deſcenderunt. Quarto mane quievit, ad meridiem omnia irritata ſunt, frigus, mutus, ſine voce, in deterius,* & ſic porro. *Octavo frixit, voxque eum defecit, ſpiritus exilis & imminutus, & decimo mane ſine voce, multum frigus, febris acuta, multus ſudor. Obiit.* Sed age, finem huic libro imponamus.

FINIS TERTII LIBRI.

PRO-

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS DE PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER QUARTUS.

CAP. I.

Quantum vitalis facultatis cognitio ad venandum in ægrotis Prognoſticum conducat?

NEminem Medicorum latere arbitror, cognitionem facultatis vitalis maxime facere ad illuſtrandam in morbis prædictionem. Addimus nihil hac ipſa cognitione eſſe opportunius, ad denotandum naturæ totius robur, atque infirmitatem. Hanc facultatem ſedem habere in Corde, Medici omnes fatentur, veluti in Cerebro animalem & in Hepate naturalem fundari diximus: non minuſque etiam hujuſce facultatis (quam vires vulgus Mediocrum appellat) robur ſeu firmitatem, ad futuram ſalutis ſpem in ægrotis prædicendam, magni profecto eſſe momenti. Ex quo merito Gal. *in lib. de Pulſibus cap.* 34. dicebat: *Si facultas vitalis poteſt morbi ferre vigorem, neceſſe eſt, ſervari hominem, atque ipſa nequeunte, mori*. Cognoſcitur vero facultatis hujus firmitas, ſeu robur, a robuſtis, nulloque modo læſis, actionibus, veluti ab infirmis languor, ſeu infirmitas, nobis quoque innoteſcit. Vitales vero actiones & operationes ſunt arteriarum pulſationes, quas vulgus pulſus ſimpliciter vocat, atque reſpirationes. Ex ipſiſque facile vitæ ſtatus, qualis ſit futurus, intelligitur, præſertimque a pulſibus. Vita enim nihil aliud eſt, quam actio quædam ipſius animalis in partibus, quæ vivunt; actio vero omnis prodit a propria ejus facultate, idcirco vitæ actio a propria venit facultate, quæ vitalis appellatur. Facultas autem omnis veluti actione indiget, ut innoteſcat, ita & actio inſtrumento: actionis vero vitalis primum inſtrumentum eſt ſpiritus vitalis, qui quum a corde ad omnes corporis particulas confluat, ut cum illis communicetur, aliis quoque opus habuit inſtrumentis, ſcilicet arteriis, per quas ipſe ad quaſvis corporis partes ducitur. At quoniam vitalis hic ſpiritus calidam maxime efferveſcentemque naturam habuit, ideo, ut conſervaretur, aliqua ipſe opus habebat refrigeratione, alioquin ſeipſum ocyus conſumſiſſet, vitaque privaſſet animal. Siquidem corpus aliquod actu calidum ſine aliqua eventilatione, & refrigeratione diu manere incorruptum non poteſt. Itaque & vitalis ſpiritus a natura, ut diu conſervaretur, pluries ventilandus, ac refrigerandus erat. Hinc natura (quæ numquam in neceſſariis defecit) alia inſtrumenta animali conceſſit, quippe aſperam arteriam, & pulmones, qui quum dilatarentur, intus aerem frigidiorem exciperent, cordique per arterias com-

Vitalis facultatis cognitionis utilitas.

Robur unde noſcitur.

Actionis vitalis inſtrumenta.

municarent, quo cordis caliditas, atque igneus ſpiritus refrigeretur, compeſcatur; & quum comprimerentur, ipſum quoque calorem eventarent: expellunt enim compreſſione vapores, ſeu fumos fuliginoſos a corde, purioremque reddunt vitalem ſpiritum. Erant igitur neceſſaria omnia hæc inſtrumenta facultati vitali. Quæ quidem a quolibet vel etiam illorum vitiato læditur, & infirma redditur. Quod ſane a pulſuum accurata obſervatione nobis maxime innoteſcit, non minuſque & a reſpirationibus. Nulla vero operatio ſpectatur, quæ robur & infirmitatem hujus facultatis vitalis præclare magis manifeſtet, quam pulſus & ipſa reſpiratio. De quibus in hoc libro, ut una cum ex aliis ſuperius illuſtratis, prognoſticum in ægrotis venari poſſimus, accurate a nobis eſt agendum.

CAP. II.

Quid ſit pulſus, atque quot generibus pulſus omnes comprehendantur.

UT ex pulſibus prognoſticum in ægrotis venari poſſimus, hæc primo nos noviſſe oportet; ſcilicet quid pulſus dicatur, atque pulſuum differentias, & cauſas. Pulſus vero nihil quidem aliud eſt, quam ſenſibilis cordis & arteriarum motus, quo hæ attolluntur & ſubmittuntur, Dividitur pulſus primum in motum dilatationis, quem *Diaſtolen* nuncupant, atque in motum contractionis, quem etiam *Syſtolen* Græci dicunt. Ab hiſque duobus motibus cordis, arteriarumque, nativus calor generatur, ac conſervatur. Diaſtolis enim motu aer frigidus ad cor attrahitur, qui vitale robur, unde ſpiritus quoque vitalis generatur, excitat, ac recreat. Syſtolis vero motu fumidum excrementum, quod ex humorum deuſtione generatur, expellitur. Quamobrem ex dilatatione cordis & arteriarum perpetuo quantum caloris cor habeat, facile deprehenditur, atque non minus, quibus excrementis fuliginoſis exuberet, ex motu contractionis nobis innoteſcit. Comprehenduntur vero omnes pulſus ex Galeni doctrina, *in primo de Pulſuum differentiis*, decem generibus. Quorum primum ex motus quantitate accipitur, treſque habet differentias, utpote quoniam ipſorum alius eſt magnus, parvus, atque demum alius mediocris, quippe neque magnus omnino, neque parvus, ſed medio modo ſe habens. Dividitur vero quilibet ipſorum rurſus in latum, longum, profunqum, anguſtum, brevem, humilem. Magnus dicitur longitudine, latitudine, ac profunditate, vel omnibus iis una junctis. Veluti parvus dicitur, anguſtia, brevitate, humilitate, vel omnibus iis una copulatis. Mediocris vero dicitur, qui neque parvus, neque magnus, quod ad latitudinem, longitudinem, profunditatem, anguſtiam, brevitatem atque humilitatem attinet, exiſtit, ſed qui medio ſe habet modo. Secundum genus in motionis tempore, vel ut Galen. ait in motus qualitate conſiſtit, cujus tres ſunt differentiæ, quod alii ipſorum ſint celeres, alii tardi, & alii medio ſe habeant modo. Celeres quidem fiunt pulſus, quando arteria modico tempore movetur, atque e contrario, quum longiori movetur tempore, tardi evadunt, mediocres vero, quum medio modo ſe hebet arteria ad temporis motum. Tertium ex ictus qualitate, vel melius a virtutis potentia accipitur, cujus etiam tres obſervantur differentiæ, utpote vehementia, languiditas, ſeu infirmitas, ſeu humilitas, & quæ ad has medio modo ſe habet; ſcilicet pulſus vehemens, languidus, ſeu remiſſus, ſeu humilis, atque mediocris: vehemens autem eſt, qui tangentis manum valide percutit, & pulſat, & ex oppoſito languidus, humiliſve, ſive remiſſus, qui perdebiliter tactum ferit: mediocris, qui mediam ſervat ad utrumque proportionem. Quartum vero genus ex tunicæ arteriæ qualitate ſpectatur,

Pulſus quid.

Pulſuum differentiæ habentur.

Ex motus quantitate.

In motionis tempore.

Ex ictus qualitate.

tur, quippe aut prima aut secunda; pima quando ex temperamento arteriarum alii calidi, scilicet a calida arteria, alii frigidi ex frigida, alii humidi ab humida, alii sicci ex sicca, sentiantur. Ex qualitate secunda, alii duri ob arteriam induratam, alii molles ex arteria molli, aliique medii inter utrumque ex arteriæ duritie, & mollitie temperata: duri pulsus dicuntur, qui tactui valide resistunt, & e contrario plurimum cedentes, molles. Ii a vehementibus distinguuntur, quod duri valide tactu pressi humillimi reddantur, & vehementes perpetuo digitis pressa arteria valide percutiant, & pulsent. Quintum pulsuum genus a tempore quietis accipitur; tresque itidem habet differentias; quippe una crebritatis seu frequentiæ, altera raritatis, & tertia mediæ conditionis: pulsus creber dicitur, qui breve habet tempus quietis, contra rarus, qui longum. Sextum genus spectatur penes arteriarum, quæ digitis tanguntur, plenitudinem atque vacuitatem. Ex qua pulsus alii pleni, alii vacui appellantur, ex eo quod ii plenam & isti vacuam arteriam denotent. Septimum genus a rythmi ratione accipitur, qui quidem spectatur comparato ictus tempore cum tempore quietis, quæ proportio, ut Galen. *in sect.* 1. *de differ. puls.* docuit, temporis est ictus ad tempus quietis. Alii rythmum in pulsibus ordinem dixerunt, alii convenientiam duorum esse temporum inter sese, ictus & intervalli. Hujus generis duæ spectantur differentiæ, quippe quæ *Eurythmus* dicitur, & *Arythmus*. Idem ac si dixerimus consonum & dissonum, seu ordinem servantem, atque ordine turbatum. Eurythmus pulsus appellatur, qui secundum vel ætatem, vel tempus anni, vel regionem, temporis proportionem servat; veluti, qui temporis proportioni non respondet, Arythmus dicitur, cujus tres spectantur differentiæ, prout tribus sane modis in ipso rythmum vitiari contingit. Primus scilicet, qui mediocrem Eurythmi digressionem habet, pararythmusque ob id appellatur, & qui multum a rythmo recessit, heterorythmus vocatur, veluti Echirythmum vocat Gal. qui plane omnem rythmum seu consonantiam corrumpit. Octavum genus pulsuum spectatur penes ipsorum æqualitatem & inæqualitatem, hujusque duplex est differentia, scilicet æqualitas & inæqualitas. Æqualis pulsus dicitur, ubi multorum vel unius tantum pulsus differentiæ ad se invicem pares ac æquales existunt, & contra inæqualis. Pulsuum vero inæqualitas duplex observatur, quippe, una in uno tantum pulsu, atque altera, quæ in multis pulsuum generibus spectatur. Rursus inæqualitas in uno pulsu, aut in una parte arteriæ, aut in multis fit. His propositis, de iis modo agamus pulsibus, qui in uno pulsu & in una tantum arteriæ parte sentiuntur: qui duobus modis considerantur, uno modo penes arteriæ motæ situm spectantur, uti quando arteria sursum, deorsum, antrorsum, retrorsum, sinistrorsum, ac dextrorsum deducta. Atque altero in motu, quum aliter inceperit, & aliter finierit moveri, juxta unum digitum citatior, & desinens tradior, aut e contra incipiens tardior, & desinens citatior. Hocque fit tribus modis, quippe aut quum motus continuus apparet, vel quum intercidit, vel quum recurrit, atque veluti bis ferit: si itaque manens continuus, & non interpolatus, a celeritate ad tarditatem transierit, aut a tarditate ad celeritatem, fit pulsus a nostris *impar citatus* dictus. Quemadmodum si quiete intercisus, systole ac diastole citatior seu velocior appareat, capras salientes imitatur, quæ cito ad aliquam arborem saliunt, inibique morantes, mox cito deorsum præcipitantur, ex qua merito similitudine pulsus *caprizans* a priscis Medicis fuit appellatus. Est & alius hujusce generis pulsus *dicrotus*, atque bis feriens dictus, quod digitos arteriam comprimentes aliquando bis feriat, & pulset: qui aliquando a robusta facultate fit, arteria tamen vitiata, utpote immodice indurata. Nunc de ea pulsuum inæqualitate agamus, quæ etsi in unico pulsu fiat, tamen in multis arteriæ partibus etiam spectatur. Hæc vero bifariam fit, uno modo, quum motus manet continuus,

Ex tunica arteria qualitate.

A tempore quietis.

Ex plenitudine, & vacuitate arteriarum.

A rythmi ratione.

Ex pulsuum æqualitate.

Pulsuum inæqualitas duplex.

Prima.

Pulsuum inæqualium altera species.

& arteria juxta aliquos digitos moveatur celerius, & juxta aliquos tardius. Secundo quum motus intercidit ita, ut aliqui digiti motum ſentiant, & aliqui non. Juxta autem diaſtolis quantitatem in pluribus quidem arteriæ partibus inæqualitas eſt manifeſta. Ex quo genere plane ſunt myuri, ſive decurtati, in una diaſtole, atque illi quoque, qui innuentes, ſive circumnuentes, appellantur, veluti ejusdem generis quoque ſunt pulſus hi, quippe undoſus; vermiculans, formicans, hecticus, convulſivus, vibratus, ſive turbulentus & ſerratus. Sunt vero myuri ſive decurtatati hi, qui magnitudine in una diaſtole diminuuntur, & decurtantur, ut, ſi primum manu magnum latitudine quis tetigerit, paullo poſt anguſtiorem illum evaſiſſe, viderit, ac perinde myurum illum vocavit, quod caudæ modo imminuatur. Circumnuentes vero ſignificant diaſtolis brevitatem cum extremorum utrorumque veluti mutatione. Undoſus pulſus, a quibuſdam fluctuoſus appellatus, fit, quando non ſimul univerſa arteria dilatatur, attolliturve, ſed per ſe ejus prima, deinde ſecunda, mox tertia, ab hac quarta, motu continuo manente, in modum undarum ſeſe elevantium, ſic quidem, ut altera unda ſemper priorem excipiat. Undoſus vero, ſi totus in parvitatem deſinat, ac minuatur, vermis greſſui fit ſimilis, ex quo vermicularis & vermiculans vocatur. Formicans quoque dictus fit, quum motibus multis amiſſis in unum prorſus exiguum deſierit, eſtque omnium pulſuum languidiſſimus, & creberrimus. Hecticus etiam habita ad febrem hecticam ſimilitudine eſt appellatus, quoniam veluti hectica febris nullam magnam habet mutationem, ita & hic pulſus hecticus dicitur, quod perpetuo ſibi ſimilis conſtet, ſed duret. Convulſivus, qui convulſionis modo retractus videtur, aut ubi arteria retracta ſit. Vibratus motui jaculorum maxime comparatur, atque digiti ab arteriis quaſi jaculorum modo feriuntur. Serratus quoque dicitur, quando alia pars arteriæ magis & alia minus præ duritie dilatatur, qualis in pleuriticis obſervatur. Sed his pulſibus cognitis, tempus eſt, ut ad illos inæquales declinemus, quorum inæqualitas non in uno genere pulſuum fit, ſed in multis, quæ æqualitas a noſtris collectiva, & a Græcis ὁμοιμερικὰ dicitur. Hoc vero genere comprehenduntur pulſus, deficientes, intercidentes, decurtati, Græcis *myuri* dicti. Hi tamen differunt a myuris quos nuper explicavimus, quod hi in uno tantum pulſuum genere fiant, atque iſti in multis. Deficientes autem pulſus fiunt, ubi non ſolum in uno aut etiam in multis magis unus minor apparet, ſed aliquando totus motus ab arteria aufertur. Hos Galen. proprie magis *in* 1. *lib. de differ. pulſ.* intermitentes appellat. Tollitur vero motus arteriæ quandoque totus ita, ut per duas & plures pulſationes arteria maneat immobilis. His contrarii ſeu oppoſiti ſunt intercidentes, quippe quum exſpectata quiete in medio tamquam ſuperflua quæpiam intercidat percuſſio. Myurus autem, ſive mutilus, ſive decurtatus pulſus vocetur, ille quidem eſt, ubi primo ſecundus pulſus paullo minor fit, & tertius ſecundo, & tertio quartus, & ita uſque ad plures pulſus magnitudine ac vehementia fit minutio. Horum alii ad arteriæ immobilitatem perveniunt, ipſique myuri deficientes appellantur. Alii poſt arteriæ immobilitatem denuo pulſare incipiunt, qui ob eam cauſſam deficientes recurrentes nuncupantur; & alii non ad abſolutam immobilitatem veniunt, ſed ubi valde imbecilli & obſcuri, languidiſſimique evaſere, poſtea rurſum paullulum augeri incipiunt, hique myuri recurrentes vocantur. Demum ad poſtremum pulſuum genus accedamus, cujus quidem generis ſunt, ordinati & inordinati. Ordinatus dicitur, qui ordinem pulſando aliquem ſervat, etiamſi fuerit inæqualis. Neque obſtat, eſſe inæqualem pulſum, & ordinem poſſe ſervare: contra inordinatus eſt cujuſvis ordinis expers, tametſi etiam ex æqualium ſit numero. Et hæc ſunt, quæ breviter hic de pulſibus perſtringenda duximus, ex Galen. *lib.* 1. *de differen. pulſ.* deprompta.

Expulſibus inæqualibus in multis.

Ex pulſibus ordinatis & inordinatis.

deprompta. Qui de ipsis plura desiderant, legant libros *Galeni*, quos *de differ. puls.* scripsit, accuratius: sed his pulsuum differentiis præmissis, atque sedulo perspectis, ipsorum modo causas consideremus, ut nihil ad pulsuum notitiam desideretur.

CAP. III.

De causis pulsuum, & quales robustam facultatem, & quales imbecillam indicent?

PRæcipuæ causæ pulsuum tres numero, ex Galen. *in* 1. *de caus. pulsuum*; existunt, quippe pulsandi necessitas una, secunda facultas ipsa vitalis, & tertia instrumentum facultati serviens. Necessitas pulsandi, sive usus animalis caloris insiti tuendi gratia est factus, ut scilicet ab eo refrigeretur, &, si quid halituum fuliginosorum ex humorum ustione contractum sit, excernat; ad gignendum enim vitalem spiritum, ut calor cordis perfrigeretnr, animalis caliditas, quæ ignea est, desiderat, quod diastole sive dilatatione facile fit, perinde ac systole sive contractione fuliginosum excrementum expellitur. Ex caloris autem spirituosi seu vitalis varia quantitate, varia quoque in pulsibus fit dilatatio, veluti quum maxime igneus est spiritus frequenter, maximeque ac celeriter dilatantur, pulsusque fiunt celeres, veluti calore a frigiditate commoderato atque imminuto oppositus pulsus efficitur, quippe rarus tardus, parvus. Simili etiam modo facultas pulsationem efficiens, si multa sit, & robusta, magnum pulsum ac vehementem efficit, & exilis, imbecillave languidum & parvum. Instrumentum quoque vitiatum pulsus evariat, etenim dura arteria durum, mollis mollem, plena plenum, & vacua vacuum pulsum reddit. Possunt vero hæ causæ pulsum quum a multis causis extrinsecis, tum intrinsecis impediri, atque exinde & pulsus mutari. Extrinsecas intelligimus causas, quas vulgus Medicorum res non naturales & Gal. *in lib. artis medicinalis* conservatrices appellat, a quibus omnibus causæ pulsuum, & pulsus ipsi possunt mutari: & intrinsecus vero sunt ætates corporum, temperamenta, humores qualitate, aut quantitate, aut putredine, viscera gravantes, lædentesquæ, & omnes morbi ac symptomata, quæ pulsus permutant. Sed age singularium pulsuum causas nunc spectemus: quas qui accuratius scire desiderant, legant libros Galeni *de pulsuum causis cap.* 2. Nos circa has pauca quidem scribemus, eaque solum, quorum cognitio ad prognosin ex pulsibus indagandam nobis visa est opportuna. Sed rem ipsam aggrediamur, a pulsu magno incipientes. Magnus itaque pulsus fit ex vitalis facultatis magno robore seu firmitate, ex multo calore in corde exsuperante, sive ex usu multo, accedente quoque arteria facile dilatabili, seu quæ facile dilatari, & comprimi possit. Veluti parvum contrariis a causis fieri, Gal. *in* 1. *lib. de præsag. ex pulsib.* prodidit, quippe ubi aut facultas infirmior aut imbecillior evaserit, aut propter arterias induratas, vel denique propter paucum usum, idest, paucum calorem in corde exsuperantem. Mediocris cum medio ad hæc omnia se habet modo, atque ita de aliis omnibus, qui mediocres appellantur, utpote quorum natura, & causæ mediæ sunt inter extremas. Pulsus longus fit ob corporis seu arteriæ gracilitatem, & virtutis firmitatem, atque ob caliditatem etiam colliquantem, ut Galen. *in* 2. *lib. de præsag. ex pulsibus* docuit. Ab oppositis vero causis, scilicet a crassitie arteriarum, facultatis imbecillitate, ac a refrigeratione pulsus brevis efficitur. Angustus prodit nobis ex angustia circumpositarum regionum arteriæ, facultatis imbecillitate, atque ab instrumenti duritie, atque cutis rugositate & crassitie; veluti latus ab oppositis fit, sed potissimum propter exsu-

Pulsuum causæ præcipuæ.

Pulsuum singularium causæ.

perantem humiditatem, & ſecundum naturam, vel ab externis cauſis. Altus ob auctam facultatem, & ob arteriarum mollitiem. Humilis a diminuta & infirma facultate, & ab inſtrumenti duritie. Celeres, & propter facultatis robur, & propter uſum multum, ideſt, plurimum calorem. Tardi e contrario propter facultatis infirmitatem, diminutum calorem, præſertimque ob frigiditatem. Dicebat enim Galen. *in eodem nuper citato lib. cap.* 2. Celeriorem pulſum calidum oſtendere temperamentum, veluti tardiorem frigidius. Frequentes vero fiunt ob multum uſum, ideſt, multam caliditatem, & rari ob paucum uſum. Vehemens pulſus a facultatis robore ſemper, fit, cujus & languidi cauſas Gal. *in eodem* 2. *lib. de præſag. ex pulſibus cap.* 7. hiſce præſertim verbis expreſſit, dicens: *Vehemens pulſus a facultatis ſemper robore fit, ac quo ſit vehementior, tanto robur majus eſſe facultatis; languidus ex facultatis imbecillitate, ac quo ſit languidior, hoc facultatem quoque imbecilliorem eſſe demonſtrat.* Durus vero, uti Gal. nobis auctor eſt *in libello de pulſibus*, fit ob arteriæ corpus ab immoderato frigore congelatum, vel ab excedente ſiccitate, vel ab alicujus viſceris ſcirrho, vel a magna phlegmone, vel denique a convulſiva aliqua paſſione, in nervoſa aliqua parte facta. Mollis ab humectato inſtrumento; quippe arteria: quæ humectatio ſæpius fit arteria ab extrinſeca aliqua cauſa humectata, veluti ab uſu dulcium balneorum, ab otio & ſomno multo, & ab humida victus ratione: veluti & ab intrinſecis cauſis, omnes quum morbi, tum ſymptomata, ab humiditate concitata, arterias humectare poſſunt, qualia ſunt comata, lethargi, hydropes aquoſæ, ac alii humidi affectus. Pulſus plenus proficiſcitur, aut ab humorum copia, aut a vini potatione, aut denique a maxima ciborum repletione. Veluti a fame, inedia, evacuationeque pulſus inanis ſeu vacuus fit. Rythmum habentes in motu, & in quiete æqualem probamque corporis adeſſe temperiem teſtantur, veluti qui diaſtolen ſyſtole habent celeriorem, calorem oſtendunt corpori prævalere. Sed ad inæqualium generationem declinemus. Fiunt omnes inæquales pulſus, ut Gal. docuit *in* 2. *de præſag. ex pulſibus cap.* 4. ab obſtructionibus, aut ex compreſſione inſtrumentorum, aut humorum abundantia ad facultatem quidem collata, aut demum ex cordis inæquali intemperie. De cauſis vero intermittentium, quos etiam alii deficientes vocant, Gal. ibid. hiſce verbis ſcripſit: *humorum copia creat impedimenta, quominus motum debito tempore auſpicetur, vel per craſſitudinem, vel per copiam humorum, quæ obruat, aut oſcilla cordi vicinarum arteriarum, quæ attrahit materiam, rurſuſque emittit, aut ex oſcillis quadamtenus univerſam vaſorum capedinem, ſæpe etiam foris illis, quaſi vinculum ſit, copia ejuſmodi effunditur, nonnumquam inſtar oneris gravat, interdum etiam ſpatia, in quibus diſtenduntur, occupat. Intercidentes quoque pulſus ab iiſdem cauſis proficiſcuntur, minori tamen cum noxa fiunt, quam intermittentes. Recurrentes ex facultate quadam imbecilla, ſed renuente ac reſiſtente tamen, oriuntur.* myurorum cauſas Gal. *in nuper citato libello de pulſ. ad tyrones cap.* 5. ita complexus eſt: *Conſtat autem omnes tales pulſus fieri ob imbecillitatem facultati, quæ interdum quidem ipſa ſola ex propria ratione infirma fit, interdum vero & ob aliquam multitudinem, vel compreſſionem, vel obſtructionem arteriarum cordi vicinarum, ita, ut mixta efficiatur affectio.* Et intercurentium cauſas *in* 2. *de præſ. ex pulſibus* prodidit, dicens, *nam intercurrens ex crebritate fit in æquali, quod functionem cor obiit minus plenam, ac poſtularet uſus. Jam id ipſum fit, ubi a copia humorum oneratum cor ſit, aut inſtrumenta obſtructa, aut in arctum coacta. Caprizans pulſus ex inæqualibus interdum cordis intemperiebus efficitur: & Dicrotus, ſive bis feriens ex inſtrumenti duritie, atque a virtute valida naſcitur, & nonnumquam etiam ob inæqualem cordis temperiem. Undoſi pulſus & ipſi fiunt arteria quidem humectata, & facultate aliquando forti, ſeu robuſta.* Ex

qua

qua ſolent non raro ejuſmodi pulſus undoſi ſudorem fluxurum prænuntiare. Aliquando etiam a prælanguida facultate fiunt, qui facile in vermiculantes tranſeunt, utpote quando facultas magis ac magis eſt diminuta; ob id Gal. *in libello de pulſib. cap.* 22. ait, vermiculantes fieri pulſus prælanguente facultate, quæ ſi in pejus labatur, nulloque modo reſtauretur, & vivificetur, facillime in formicantes mutari, qui omnium ſunt exitioſiſſimi, quod ad extremum facultatem veniſſe denotent. Convulſivi excitantur principio nervorum inflammationem aliquam ſuſtinente, & turbulenti, quum uſus pulſandi magnam ſublationem requirit, & vitale robur ſua functione uti non poteſt. Vibroſi ex facultate, robore, atque caloris copia ortum ducunt. Et ſerrati a nervoſarum partium aliqua oborta inflammatione, hinc pleuriticorum proprium eſſe pulſum, non paucis viſum eſt, quoniam pleura dicta membrana coſtas ſubcingens inflammatur. Atque hæc de pulſuum cauſis ſufficiant. Quibus prę-
Pulſus quinam facultatem vitalem robuſtam, ſignificant.
miſſis facile agnoſcemus, quales pulſus facultatem robuſtam, & quales præimbecillam ſignificent. Firmam & robuſtam facultatem, quæ in corde quidem ſedem habet, judicant hi pulſus, quippe magnus, latus, celer, vehemens, dicrotus, vibroſus, undoſus, atque major, altior, longior, vehementior. Ex extremis vero ſolum vehementiſſimus robore valere facultatem demonſtrat. Horum pulſuum primo vehemens, vehementior, vehementiſſimuſque, & ſecundo loco magnus, tertio altus, quarto vibroſus, quinto undoſus, atque omnium poſtremo bis feriens, robur in facultate denotant. Vehemens enim pulſus, Gal. *in* 1. *lib. de præſ. ex pulſ. c.* 7. docente, a facultatis robore ſemper fit, ac quo ſit vehementior, tanto robur majus eſſe facultatis: & paullo poſt ait: at robuſtiſſima quum vehementiſſimum, tum etiam majorem, excitat pulſum, ſimulque, ſi nihil variet uſus, rariorem. *In libello de pulſibus* ſcribit Gal. vibroſum pulſum, quoniam robur facultatis ſignificat, caloriſque copiam, idcirco optimam aliquando Criſin prænuntiare. Horum vero pulſuum majores, & auctiores majorem quoque virium firmitatem denotant, & ad extremum deducti, excepto vehementiſſimo, qui omnium maxime robur perpetuo teſtatur, infirmam facultatem ſignificant. Pulſus prælanguidam facultatem denotantes hi profecto exiſtunt, ſcilicet, parvi, anguſti, humiles, languidive, hi intercurrentes, myuri omnes, vermiculantes, formicantes, atque ad extremum qui pervenerunt, vehementiſſimo excepto. Iſtorum quo-
Quinam prælanguidam.
que vim imbecillam declarantes, alii diminutam, alii humorum multitudine, aut vitio, gravatam ac oneratam eſſe decernunt, & alii quum per ſe infirmitatem, tum ab humoribus, ut dictum eſt, auctam, denotant, uti Galen. demonſtravit *in libello de pulſib. nuper citato cap.* 34. Ex ſe ipſa imbecillam facultatem oſtendunt pulſus, nullam habentes inæqualitatem, veluti ab inæqualibus gravatam coarctatamque aut ab humoribus, aut ab aliquo morbo, facile dignoſcitur. Horum vero omnium inæqualium vermiculantes, formicantes, intermittentes, & myuri deficientes; & ex æqualibus, languidi, parvi, ſubmiſſi, maxime ſunt exitioſi, virtutemque maxime languere decernunt, omniumque maxime languidiſſimi, minimi, tardiſſimi, humillimi. Quare ii omnes prælanguidam facultatem oſtendunt, alii ipſorum magnam, alii majorem, atque alii maximam, cujuſmodi ſunt formicantes, & languidiſſimi.

CAP.

CAP. IV.

De pulſibus ſalutem & exitium indicantibus.

Pulſus optimi quinam. PUlſus optimi, qui ſalutem in ægrotis pollicentur, hi profecto exiſtunt, quippe parum aut nihilo a ſtatu bene valentium mutati, atque æquales, ordinati, magni, vehementes, & languidi, parvi, inæquales, ac inordinati, ſi minus languidi, majores, æqualiores, atque ordinatiores evadant, quod ipſi virtutem languentem augeri atque inſtaurari ſignificent; veluti exitiales habentur, magni, vehementes, æquales, ordinati, qui minuuntur, & languidi evadunt, inæquales atque inordinati. De quibus Gal. *in lib. 3. de criſib. cap. 9.* ita ſcripſit: *Sed manifeſtiſſime ex pulſibus cognoſcuntur, neque enim parvo interſtitio differunt, qui mortis ratione citius, quam ſperabatur, ad quamdam falſam declinationem perveniunt, ab iis, qui vere declinant.* In utriſque enim febrilis calor diſſolvitur. Fit vero hoc ex cauſis maxime contrariis, ſiquidem naturæ robur maxime contraria eſt imbecillitas. Vehementior igitur fit continue magis pulſus & æqualior atque ordinatior in bona declinatione, expellit enim natura fortis omnem ſubito febrilem calorem. Debilior vero atque inordinatior & inæqualis eſt pulſus in mortalibus declinationibus. Languidi itaque inæquales, inordinati, qui continuo ſubito fortiores, æqualiores, atque ordinatiores evadunt, ſi modo in melius ipſorum mutatio conſtans ſit, ſalutem non obſcure promittunt. Sed illorum ſermonem proſequamur, qui non ex accidenti ſalutem prædicere videntur, ſed per ſe, cujuſmodi ſunt primo adnumerandi magnus atque vehemens pulſus, qui facultatis roboris indicio ſunt, omniumque maxime, ſi probam in ipſorum differentiis ſervaverint æqualitatem. Ad hoc quoque genus attinere videntur hi omnes, quippe altus, longus, latus, celer, major, longior, altior, latior, celerior, vehementior, non tamen ad extremitatem in ſua ſpecie aucti, vehementiſſimo excepto, qui omnium certiſſime ſalutem præſagit futuram. Salutares quoque judicantur, vibroſus, undoſus, & dicrotus; de Undoſo Galen. *in lib. de pulſ. ad tyr. cap. 35.* ita ſcribit: *Hic enim pulſus undoſus*, inquam, *ſudorem ut plurimum nuntiat, ac tanto magis, quanto mollior quidem fuerit, non tamen tenoris vacuus, ſi vero ipſi intercurrat altus, firmiſſimum habebis ſudoris ſignum, ſemper enim hic aliquam excretionem ſignificat: cum undoſo quidem vel abſolute magno, non tamen duro, critikum ſudorem, cum vibroſo autem, vel abſolute duro, menſtruorum potius, vel eruptionis ſanguinis e naribus, vel per hemmorrhoidas, vel alvo exturbata.* Ceterum quum dictum a nobis ſit, pulſus omnes, ſanorum pulſibus ſimiles, bonum prænuntiare, diſtinguendum erit, in quo morbo fiant, ſiquidem in quibuſdam uſque adeo maligniſſimis febribus perquam ſanis ſimiles apparent, atque quando exitio quoque proximi exiſtunt. Sed de iis poſterius accurate. Nunc de illis, qui exitium præſagiunt, ſermonem habeamus. Sed in memoriæ prius mandandum, ut numquam ex ſolis pulſibus malis judicium feramus; ſed aliis ſignis una conſpectis, ac ſimul collatis. Nam pulſus parvi, humiles, tardi, atque alii facultatem impotentem ſignificantes, ſi una alia mala ſigna illuxerint, exitioſi judicabuntur. Cauti quoque eſſe debebimus, ne ii ex aliqua extrinſecarum cauſſarum tales prodierint, ne judicium fallax reddatur. Hinc rogatos velim Medicos medicinam factitantes, ne pulſus ægrotorum tangant, ni prius cauſas procatarcticas ſeu prægreſſas intellexerint, atque cognoverint, quales ex iis pulſus fieri debeant, atque ut ſi corpus ægrotum, omni prorſus alteratione animi vacuum. Hinc prudentes Medici perdocti, antequam pulſus in ægrotis tangant, non parum temporis conterunt, ut prius jucundas hiſtorias, vel aliqua jucunda, referant,

Pulſus exitium præſagientes.

rant; ad ſedandum alteratum in ægrotis animum. Quique poſtea pulſus tangunt, neque ſubito ex eo pulſu judicant, ſed ad minimum, ubi quindecim aut plures pulſationes obſervarint, quum pleriſque ægrotorum principio pulſus a Medico contactus, vel a timore, vel aliqua alia alteratione appareat alteratus, proinde nonniſi plurimis obſervatis pulſibus de ſalute aut de morte erit judicandum. Sed ad propoſitum redeamus. Pulſus itaque nuper ſcripti, ſi una cum ſignis malis obſervantur, exitium certum portendent. Ad extremitatem quoque omnes deducti, excepto vehementiſſimo, qui perpetuo ſalutarior, letales ſunt. Minimi vero languidiſſimi, tardiſſimique omnium exitioſſimi habentur. De quibus Galen. *in libello de pulſib. cap.* 22. ita ſcribens, ea, quæ a nobis ſunt dicta confirmavit: *ſed omnes pulſus, quia naturali ſymmetria multum recedunt, non boni ſunt, at certo languidiſſimus & tardiſſimus & rariſſimus omnium eſt deterrimus, pulſus autem minimus, & molliſſimus, & duriſſimus poſtea frequentiſſimus, at non celerrimus, neque maximus, ſed hi ſunt modice periculoſi, ſolus autem in extremis optimus eſt omnium vehementiſſimus.* Sunt vero alii ex inæqualibus valde exitioſi, ſcilicet formicantes, vermiculantes, intermittentes, intercurrentes, rari & myuri. Formicantes enim omnium ſunt exitioſiſſimi, quoniam, ut Galeno nobis *in eodem citato lib. cap.* 4. eſt auctor, ad extremum naturam veniſſe denotant. Atque ſi ipſi poſtea augeantur, in foribus exitium ſignificant. Pulſuum vero intermittentium alii prorſus letales, atque alii ad exitioſos proxime accedunt, horum etiam alii in uno tantum pulſu intermittunt, ac alii in multis, & alii intervallo unius pulſationis, atque demum alii multarum. Qui in uno tantum pulſu intermittunt, maxime timeri debent, præſertimque ſi ſubſequens ipſorum motus anteriori ſit minor, quemadmodum qui motum ſubſequentem habent majorem anteriori, minori cum periculo obſervantur, eoque etiam minus periculi portendunt, ſi quies intervallum unius pulſationis non ſuperaverit. Namque Galen. *in 2. de præſ. ex pul.* multos cum iis pulſibus evaſiſſe mortalium memoriæ prodidit. Ex hiſque pulſibus maxime ſenes atque pueri evadunt, nam in juvenibus plane ſunt exitioſi, ut Galen. ibidem tradidit, dicens: *Quies vero tempore unius pulſus inter omnes intermiſſiones moderatiſſima eſt, multique ex ea ſenes pariter & pueri evaſerunt. Juvenum autem ne ex hac quidem ullus. Qui vero duorum aut plurium pulſuum tempus arteriam quieſcentem habuerunt, certum ſemper exitium indicarunt.* Ex pulſu vero unius pulſationis intervallum intermittente plures evaſerunt, puerique & ſenes facilius. *Cayri* in *Ægypto* Dominicum a rege pharmacopolam quinquagenarium vidi, qui ex mala victus ratione quum copiam vitioſorum humorum coacervaſſet, ſine febre in tantam corporis debilitatem incidit, ut vix moveri, ac vel etiam loqui poſſet. In ipſo pulſus intermittens per plures dies fuit obſervatus, qui eo uſque perſeveravit, quoad probe medicamentis purgatus atque vacuatus ſanguine vires recuperavit, quo tempore ceſſavit intermiſſio. Quare ſenes atque pueri ex hoc pulſu non ita peſſime ſe habent, ut juvenes, in quibus plane exitioſos eſſe hos pulſus intermittentes voluit *Gal.* Tamen, etſi plerumque hoc verum experiatur, *Baſſani* juvenem annos natam ſupra viginti, pleuriticam ab hinc multos annos apud Hermetem Furcaturam Juriſconſultum clariſſimum vidi, in qua uſque ad diem quintam pulſus ita intermittebat, ut prima die ſingulis ſeptem aut decem pulſibus intermitteret ſpatio unius pulſationis, & ſecunda ſingulis ſex aut quatuor, & tertia ſingulis tribus, & quarta (qua die morituram quiſque merito judicaſſet) quum delira prorſus eſſet, nihil exſpueret, difficillima reſpiratio, inquietiſſima, & quum pulſus ſingulis pulſatis duabus pulſationibus ita intermiſerit, ut immobilis multo intervallo arteria maneret, pulſuſque ſubſequentes languidi exileſque eſſent. Nihilominus præter omnium ſpem ſimul cum urina multa materia craſſa pituitoſa excreta,

ta, nulla alia obſervata vacuatione, aut judicio a natura facto. Sed hujuſmodi caſus raro fiunt, ſuntque in arte medendi veluti monſtra. Sunt vero pleriſque juvenum ejuſmodi pulſus intermittentes exitiales, quod in juvenibus maximum receſſum a ſtatu ſalubri declarent, idque propterea, quod juvenes ob validum virium robur nonniſi a fortiſſima cauſa in talem affectum incidunt, indicio enim nobis ſunt, naturam magna humorum multitudine aggravari, quos curatione ſanari maxime eſt difficile, quum fortiſſima cauſa morbifica ægerrime tolli poſſit, veluti levis cauſa facili negotio tollitur, a qua ſenes ob invalidum facultatis robur facilius juvenibus in morbum labuntur, qui etiam ob id facilius (quod facilius levis quam fortis cauſa adimatur) ſanantur. Ex intermittentibus etiam, qui ſubſequentes motus ſive pulſus anteriori habent debiliores, apprime ſunt perniciales, tametſi arteria in ipſis minus, quam ſit unius pulſus intervallum, conquieſcat. Ex ipſis facultatem magis ac magis debilitari nobis indicatur. Hiſque pulſibus myuri maxime comparantur, quod ipſi ſemper magis ac magis diminuantur, ex quo & ipſi creduntur perniciales, ipſorumque maxime myuri deficientes, ſive intermittentes, quippe qui eo uſque decreſcunt, quoad immobilis arteria remaneat, veluti qui ad imperfectam venerunt immobilitatem, quippe myuri deficientes appellati, & qui ab arteria reddita immobili denuo pulſare incipiunt, minus ſunt timendi, modo ſigna alia meliora una illuceant. Quidam etiam obſervantur, qui ex natura hos pulſus vel etiam recte valentes habeant, ex quo caute Medici ad judicandum agere debent, ne decipiantur: exitioſiſſimi quoque ſunt, languidiſſimi, minimi, tardiſſimi, atque rariſſimi, de quibus Gal. *in lib. 2. de præſ. ex pulſibus* ita ſcripſit: *Eſt autem eorum pulſuum ingens frigiditas cauſa generandorum, quæ occupet vel corpus cordis, vel ſpiritum, vel ſanguinem, quem continet ejus ſinus, vel partem aliquam vicinam. Atque ſi corpus ipſum cordis teneat ingens frigiditas, ita languidiſſimos reddit pulſus, & tardiſſimos, & minimos, ut maxime hæc viget. Quæ vero proficiſcetur ex parte alia, raritatem longius, quam cetera, quæ diximus, genera a natura avertit.* Itaque quidam in illis ſunt, quum pulſus habeant non longe minores juſto, at tardiores languidioreſque, tamen e veſtigio pereunt. Mors autem tum minus poteſt declinari, quum teneat frigiditas corpus ipſum cordis. Repentina porro & in altera differentia fit. At moriuntur priores illi inter dormiendum potius, ut jam non amplius expergiſcantur, alteri hi quum illo modo, tum etiam inter loquendum nonnulli eorum, ut imperitis commode videantur habere, ſubito, ut qui animo deficiuntur, exſpirant. Quorum quibuſdam ſimul prorupit ſudor, aliquibus non prorupit. Quamobrem ex iis apparet, raros pulſus, multoque magis rariores, ſimulque minores, languidioreſque, exitiales utique eſſe. Sed age dicamus, cur pulſus ſæpius in moribundis ſanis ſimiles appareant. Ex quibus Medici plane decipiantur, neceſſe eſt.

CAP. V.

Cur pulſus in quibuſdam febribus exitioſi appareant aliquando recte valentium ſimiles?

SÆpius fit, ut in ægrotis, malignis morbis laborantibus, pulſus ita ſanorum ſimiles obſerventur, ut non raro vel etiam doctiſſimi Medici decipiantur; non minuſque urinæ, quum boni coloris, tum ſubſtantiæ, tum etiam in quibus laudabilia contenta reſideant, in exitioſis morbis apparent: quæ artis medicæ ignaris mira, ſeu monſtra in natura, videntur, quum tamen hæc docti Medici, quibus rerum cauſæ non ſunt ignotæ, non admirentur. Nunc de pulſibus agemus, & quomodo, etſi bene valentium ſimiles ac opti-

optimi appareant. futurum exitium significent, dicemus. De urinis vero, quum hic de his loquendi non sit locus, postea suis locis agemus. Sed modo rem ipsam de pulsibus dicamus. Hujusmodi pulsuum observatio non in omnibus morbis fieri solet, sed in maligniſſimis tantum, & præsertim in febribus pestilentibus, neque in omnibus: Gal. *in lib. 3. de præs. ex pulsib. c. 3.* ait, hujusmodi pulsus in pestiferis febribus observari, quas hecticas pestilentes Medici vocant, quod æquales, exterius obscuræ, sine ulla alteratione, calore quidem exili appareant, ex quo ægrotantes se febre vexari neque putent. Distinguuntur etiam pestiferæ febres in ephemeras, putridas, atque hecticas. Ephemeras vocant, quæ ephemerarum modo invadunt, atque cordis spiritibus corruptis generantur; putridæ quoque putrefactis humoribus cordis fiunt, ab ephemeris maxime distinguuntur ex eo, quod putridæ putredinis signis non careant, nam in ipsis, urinæ crudæ, tenues, turbidæ, subjugales, cum contentis aliquando crassis malis apparent: in ipsis quoque aliquando exanthemata apparent, aliquando tumores. In ephemeris vero, quæ spatio unius diei interimunt, aut saltem tribus ad plus, nullum putredinis in humoribus signum apparet. Gal. itaque vult in hecticis quum pulsus tum urinas bonas videri, propterea quod aut arteriæ sint corde frigidiores, aut quod temperamentorum in corde sit pugnantia, de illa ita scribit: *Quocirca contingit aliquando, ut arteria, quæ frigida est, sed a corde calefit, nec parvum pulsum, qui frigidus est, edat, nec magnum, qui calidus, sed inter utrumque medium, qui moderatus est, & naturalis. Et celeritate etiam moderata pulsus erit horum affectuum, itemque & vehementia moderata.* Pugnantia vero temperamenta in corde hos facere posse non est mirum, siquidem, ut ait Galen. aliquando cordis corpus æquo sit frigidius, & humores, seu substantia contenta in ventriculis calidior, quod forte fit in pestiferis febribus, ubi ingens putredo cordis corpus affecit, ex quo calore fere extincto redditus corpus cordis frigidius, quum humores tamen contenti inflammati sint, aut aliquando contra, quippe ubi humores æquo sint frigidiores, & cordis corpus calidius, quovis horum modorum contingit fieri pulsus moderatos & fere naturales. de quibus Gal. ita scripsit: *Qui sane affectus vel optimos Medicos fallunt, quod nunc quoque in maxima pestilentia accidit. Quidam inde ab initio ad finem usque, alii per totum morbum, probum pulsum habebant, qui perparum deflexisset de natura, qui quidem præter ceteros perierunt.* Animadvertimusque eos primis statim diebus & pestilentia laborare, & pessime affectos esse ex acredine caloris, atque ipsa caloris specie, denique quod pulsus, parum præter naturam immutati, iis in eo statu perpetuo maneant; nam in speciem præcipue hecticarum, quas vocant, febrium incidunt hujusmodi pulsus. Si qui essent inter ægrotos, qui se negarent febricitare, his febris, occupato ipso cordis corpore, plane erat confirmata, & ut ita dicam, in habitu. Demum tertiam causam pulsuum moderatorum in pestiferis quibusdam & exitiosis morbis, ita expressit: *Quod vero in sermone præterivimus, ubi aer, quem spirando attrahimus, infectus putredine sit, ac putredo corpus cordis attigerit, illi pulsus fiunt.* Nec jam quicquam habet admirationis, si eos pulsus, quos memoravimus, tali affecti peste habeant, ob pestilentem respirationem; nec si omnino morituri sint: atque propter hasce causas in febribus, vel etiam letiferi pulsus recte valentium similes observari solent.

Pulsus in exitiosis morbis unde aliquando recte valentium similes. Febrium pestiferarum distinctio.

CAP.

CAP. VI.

De prædictione ex reſpiratione, quidque primo ipſa ſit, atque quot ipſius differentiæ obſerventur?

VAriarum in ægrotis reſpirationum obſervationem ad prædictionem nedum utilem eſſe, ſed quinimmo multum neceſſariam, neminem latere, certe ſcio; ſed ex ipſa firmiorem quoque quam ex pulſibus haberi in morbis prædictionem, non paucis viſum eſt, ac vel etiam eſſe certiorem, quod pulſus facile a qualibet etiam cauſa extrinſeca mutantur, hinc Medici, ſi alterationes extrinſecus pulſibus illatas incaute perſpectas habuerint, ſæpe decipiantur. Hinc Hippoc. nulla, vel ſaltem pauca, de pulſibus ſcripſiſſe, non paucis eſt perſuaſum. De reſpiratione vero, quod ab ipſa certiorem ad prognoſin notitiam Medici aſſequi poſſint, ſatis accurate multa nobis tradidiſſe, & varias non minus in multis ægrotis (ut apud ipſum in Epidemiis legitur) ſpirationum differentias ad prognoſis judicium adnotaſſe. Quare de hac quoque ad prædicendi rationem accurate nobis in præſentia eſt agendum. Sed antequam de prædictione a reſpirationibus agamus, primo quid ipſa ſit reſpiratio, quæque ipſius ſint differentiæ, atque cauſæ, cognoſcamus. Quid vero ſit non æque omnes ſentiunt. Aſclepiades reſpirationem eſſe animæ generationem affirmavit. Praxagoræ vero animæ dici corroborationem placuit. Sed Philiſtion, & Diocles caloris innati eſſe ventilationem, & refrigerationem voluerunt. Ex Hippocrat. rectius caloris nutritionem atque refrigerationem. Porro hi, cujus tantum gratia reſpiratio fiat, enarrant. Nos vero dicemus reſpirationem nihil quidem aliud eſſe, quam pulmonum pectoriſque ſenſibilem motum, quo pulmones dilatantur, ac comprimuntur. Ex quo duplex apparet, primo inſpiratio quippe & expiratio. Atque his duabus reſpirationibus duplex quies, ſive ut Galeno placuit, duæ ceſſationes æque reſpondent, una ſcilicet, quæ eſt ante dilatationem, at poſt ipſam altera, quæ ante quoque compreſſionem eſt. Dilatatione enim frigidus aer inſpiratur, quo ſane innati caloris (ſi Galeno *de libro cauſis reſpirat.* credimus) ſymmetria conſervatur, animaliſque ſpiritus ſubſtantia nutritur. Galenus ſcripſit *in primo libro de reſpirat. differ. cap. 3.* reſpirationem calori, qui circa cor eſt, eſſe utilem, ac pulſus calori, qui per totum animal eſt diſperſus: hic quidem a pulſibus refrigeratur, veluti cordis calor a reſpiratione. Exſpiratione vero fumoſum halituoſumve excrementum a corde expellitur. Ceterum, ut recte fiat reſpiratio, cerebrum recte valere eſt neceſſe, utpote, quod ſeptum tranſverſum, thoracem, ac omnes muſculos reſpirationi ſervientes facultate moveat, itemque cor, pulmoneſque. Quibus quidem membris ſeu partibus læſis, reſpirationem vitiari, eſt neceſſe. Ex quibus medicinæ ſcriptores triplicem reſpirationis cauſam faciunt, unam quidem animalem facultatem, moventem muſculos, ſeptum tranſverſum, pectus, pulmones, & quæ in cerebro ſedem habet; alteramque inſtrumenta reſpirationi ſervientia, prænarrata; atque tertiam uſum, qui eſt innati caloris refrigeratio, ſpiritus naturalis nutritio, atque genitarum fuliginum expurgatio. Sed his præmiſſis ad reſpirationis notitiam pertinentibus, reſpirationis quoque differentias in medium afferamus. Primo itaque per reſpirationem tum inſpirationem, qua frigidum aerem attrahimus, tum exſpirationem, qua fuligines excernimus, intelligimus. Cujus quidem reſpirationis duæ in primis apparent differentiæ, quippe quædam motum reſpicientes, & quædam quietem: ad motum attinentes penes magnitudinem, parvitatem, velocitatem, tarditatem, ſpectantur, quatuorque numero exiſtunt, quippe magna, parva, velox & tarda: ad quietem

Reſpiratio quid.

Reſpirationis differentia.

vero

vero quæ referuntur, ſunt frequentia reſpirandi, atque raritas. Ex quibus colligamus reſpirationis differentias eſſe, magnitudinem, parvitatem, celeritatem, tarditatem, frequentiam, & raritatem, quas Gal. *in* 1. *different. reſpir.* complexus eſt. Sunt vero hæ omnes aut in tempore motus, uti eſt velox & tarda reſpiratio, aut in quantitate diſtentionis, veluti magna, & parva, aut in quantitate contractionis, veluti eſt etiam magna, & parva, aut denique in quiete reſpirationis, quæ eſt frequentia atque raritas; atque hæ ſimplices ſunt reſpirationis differentiæ: quibus varie complicatis octo compoſitæ differentiæ depromuntur, quippe magna velox, magna tarda: parva velox, parva tarda: frequens magna, frequens parva: rara magna, & rara parva. Magnam illam dicimus reſpirationem, in qua magnam copiam aeris attrahimus, atque magnam fuliginum copiam exſpiramus, ſive expellimus; atque e contrario parvam, in qua exiguum aeris inſpiratur, & parum fuliginum genitarum exſpiratur, ſeu expellitur. Celer vero eſt, in qua parvo quidem tempore pulmones moventur, & tarda, quæ longo tempore fit. Frequens etiam ſeu denſa appellatur, cui breve eſt tempus quietis, contra cui longum eſt, rara. Addamus alias reſpirationis differentias, quarum una penes æqualitatem atque inæqualitatem accipitur, & altera penes ordinem, prout reſpirationum aliæ ſervant ordinem, & aliæ non, atque tertia penes caliditatem & frigiditatem, quod quædam calida ſit, & quædam frigida. Æquales reſpirationes illas dicimus, in quibus multarum quidem reſpirationum vel unius tantum pares differentiæ, mutuoque æquales exiſtunt. Inæqualeſque, ubi inæquales reſpirationes obſervamus. Ordinatæ quoque hæ ſunt, quæ aliquem ordinem ſervant, atque contra, inordinatæ. Et calidæ item dicuntur reſpirationes, ut poſterius accurate intelligemus, in quibus halituoſus caliduſque ſpiritus expellitur; & frigidæ, ubi frigidus. Sunt demum aliæ quoque rythmæ, & arythmæ, ideſt, quæ rythmum ſervant, & quæ non. Eæ proportionatam habent reſpirationem tempori, annis, locis, regioni, ætati atque temperiei, & ex oppoſito arythmæ. Ex quibus omnes vidimus reſpirationis differentias, quas Hippoc. quum *in lib.* 2. *pag.* 1025. tum *in* 6. *Epid. ſect.* 2. *text.* 8. *pag.* 1169. ubi quædam addita ſunt, *com.* 3. *tex.* 11. ita perſtrinxit, dicens: *Denſi ſpiritus, parvi, magni, rari, exit extra magnus, intro parvus, hic quidem tardans, ille feſtinans, duplex intro revocatio velut ſuper inſpirantibus, calidus, frigidus.*

In tempore motus.

Ex æqualitate & inæqualitate.

In reſpirationibus ordinatio, & inordinatio.

In Rythmi ratione.

CAP. VII.

De cauſis reſpirationis.

NUnc cauſas reſpirationis attingamus, quæ duplicis ſunt differentiæ; quippe quædam communes, & quædam particularium reſpirationum, quæ particulares exiſtunt; de communibus primo agamus, quæ ex Galeno in libro *de cauſis reſpirat.* ſunt facultas voluntaria motiva, quæ organa movet reſpiratoria, inſtrumenta voluntati ac reſpirationi ſervientia, atque demum uſus ſeu utilitas, in cujus gratiam reſpiratio fit. Ab his quidem cauſis omnis fit reſpiratio, ac optima ipſis nihilo a naturali ſtatu mutatis, & vitiata vel omnibus, vel aliquibus ex ipſis a naturali ſtatu mutatis. Ex voluntariæ quidem motivæ facultatis obſervatione, naturæ quum robur tum imbecillitas nobis innoteſcit, non minuſque ab inſtrumentorum reſpirationis, & utilitatis, ſeu uſus notitia. Sed quomodo fiat reſpiratio, quibuſque inſtrumentis ad ipſam agendam facultas utatur, ac ad reſpirationis utilitatem, Gal. *in* 1. *lib. de differ. reſpiration. cap.* 4. ita docuit: *facultas quædam animalis movet thoracem, quum hoc ſimul pulmo movetur, ad hujus vero motus ubi diſtenditur, ſequitur in-pi-*

Reſpirationis cauſæ communes.

inſpiratio, ubi contrahitur, exſpiratio. Demonſtratum etiam ibidem eſt, maximam & principaliſſimam reſpirationis utilitatem eſſe inſitæ caliditatis conſervationem, jam vero & animalis ſpiritus nutritionem. His itaque ſic habentibus, ſiquidem facultas, & utilitas, & unumquodque organum recte ac proſpere habuerint, juxta naturæ legem animal reſpirat. Si vero quid ex eis vitiatum fuerit, juxta illud etiam reſpirationem impediri neceſſe eſt: & hæc de cauſis reſpirationis in communi. Quibus præmiſſis ad ſingularium reſpirationum cauſas attingendas declinemus, ſine quibus ex reſpiratione quicquam certi ad prædictionem habere non poſſumus. Exordiamur vero a ſimpliciſſimis reſpirationum differentiis, & primo a magna parvaque reſpiratione. Magna vero reſpiratio, ut Gal. *in eodem libro* docuit, ab urgente fit utilitate, & parva ab utilitate exſoluta, aut ab aliquo dolore partis, moventis thoracem. Ceterum cavendum eſt, ne decipiamur, nimirum ut magnam illam eſſe reſpirationem credamus, in qua plurimum pectus dilatatur, ſed in qua plurimus ſpiritus attrahitur; nam quibus vel tumor, vel anguſtia ſine flammeo calore, ſpiritalibus membris inſidet, in his thoracis quidem dilatatio maxima eſt, id vero, quod inſpiratur, parum eſt. Aliquando etiam maxime uſu urgente, ſed facultate extincta fere fit maxime thoracis dilatatio, in qua aliquando moventur ſcapulæ, nares, quam ſpirationem ſublimem, & phænomenam, ideſt apparentem, Medici appellant. Quare prudenter ſe gerere debent Medici, per magnam quidem reſpirationem ut non magnam thoracis dilatationem intelligant, ſed in qua plurimus ſpiritus attrahitur, & contra parvam, in qua parum ſpiritus ſuſpiratur, tametſi thorax maxime dilatetur ac diſtendatur. Velox vero reſpiratio fit & ipſa ab urgente utilitate, ſeu a magno calore, ac facultate ei ſervire potente, ideſt, robuſta, atque nullo organorum reluctante. Tarda a contrariis fit cauſis, utpote a diminuta utilitate, ac virtutis imbecillitate. Frequentem vero reſpirationem, aut dolorem, aut inflammationem ſupra ſeptum tranſverſum, Gal. quum *in* 1. *Epid. com.* 3. *text.* 18. tum *in tertio lib. comm.* 3. *text.* 74. tum alibi teſtatum reliquit, quod ab Hippoc. accepit, qui *in primo lib. progn. pag.* 38. *lin.* 7. de frequenti reſpiratione ita habet: *Spiritus autem, qui creber eſt, ſignat dolorem aut inflammationem in regionibus, quæ ſupra præcordia ſunt*: quæ fit a dolore frequens ſeu denſa, ex dolore in parte affecta nobis innoteſcit: ab inflammatione ſimplici, phlogoſi Græcis dicta, perinde ſi dixerimus a flammeo calore, cognoſcitur ex eo, quod ſpiritus, præterquam quod denſus eſt, etiam calidus appareat. Addamus nos denſum ſeu frequentem reddi ſpiritum propter vel aliquam phlegmonem, aut humorem, aut tumorem, naturam gravantem, & anguſtiam inducentem, quæ quidem reſpiratio ſolet una cum ſtertore obſervari. Quæ vero longo intervallo fit, rara dicta, aut cordis refrigerationem, aut delirium ſignificat; atque hæ ſunt primarum ſimplicium reſpirationum differentiarum cauſæ, quibus tamen quicquam certi ad prognoſticum Medicis non oſtendi, Gal. *in primo de differ. reſpirat. cap.* 22. nobis prodidit, quo loco docet, judicium fieri tantum oportere a compoſitis, ut poſſimus certum de ſalute ac morte ægrotantium ferre judicium. De compoſitarum vero reſpirationum cauſis ibi ita ſcripſit: *Itaque ad ſolas illas compoſitas reſpirandi difficultates animum intendere nos oportet, in quibus ſimplices quidem communes ſunt plurium affectionum, & ob id nihil certi indicant, conjugatæ vero aliis quibuſdam ad certum ac minime fallax diſcrimen veniant. Magnitudo enim reſpirationis ipſa per ſe reſpirandi difficultas quædam eſt ſimplex, verum nullius certæ cognitionis eſt ſignum, ſiquidem & urgente utilitate, & læſa mente fieri ſolet. At vero ſi cum denſitate conſiſtat, ingentem vitalitatem, ſi cum raritate, delirium indicat. Similiter autem & parvitas, ipſa quidem per ſe ipſam, aut dolore afflictam aliquam particulam, aut utilitatem exſolutam oſtendit. Itaque*

Singularium reſpirationum cauſæ.

Reſpiratio magna unde.

Velox unde.

Tarda unde.

Frequens unde.

Rara unde.

Reſpirationum compoſitarum cauſæ.

neque

neque ipsa aliquid certi indicat. Quando vero componitur, cum densitate quidem dolorem, cum raritate vero, facultatis exsolutionem portendit. Quin etiam si ipsam densitatem per se solam aut raritatem in manus sumas, ipsarum neutram per se inveneris quicquam certi significantem, nisi hoc discrimen accedat, ut videlicet cum altera quapiam respirandi difficultatis specie copuletur. Densa enim simulque magna utilitatis augmentum indicat. Densa vero simulque parva organi alicujus, quod cum respirationibus commovetur, dolorem: ipsa etiam rara, quæ ad deliria & perfrigerationes consequitur, si quidem cum magnitudine fuerit copulata, prius ex prædictis, si vero cum parvitate, posterius indicat, & ob id sane omnium compositarum respirandi difficultatum hujusmodi conjugationes utilissimæ sunt, utpote & manifeste & constanter unamquamque affectionem indicantes. Densitas quidem cum parvitate, dolorem, cum magnitudine vero, utilitatis augmentum. Raritas autem cum magnitudine, delirium; cum parvitate, facultatis exsolutionem notat. Hactenus Gal. de simplicium compositarumque respirationum causis. Nunc ad æquales, ordinatas, & inæquales, & inordinatas descendamus, ipsarumque causas spectemus. Æquales enim, & ordinatæ respirationes fiunt a facultate vitali recte valente, nulloque instrumentorum servientium respirationi vitiato, aut quovis modo læso. Veluti inæquales inordinatæque contrariis a causis efficiuntur. Non secus quam & pulsus inæquales inordinatosque fieri diximus. Quarum quidem respirationum eadem est generatio, ut Gal. *in eod. lib. de differ. respir. c.* 17. hisce verbis tradidit: *Visum est autem aliquando, raro tamen, non alteram tantum, sed ambas totius respirationis partes in uno & eodem homine ita habere, & maxime hoc fieri, quum humorum copia in asperis arteriis coacervata hominem suffocet ex pleuritide perniciosa, aut peripneumonia non expurgata, aut suppuratione istic consistente, ita ut in hac parte respiratio cum pulsibus conveniat. Monstratum est, & in illis propter obturationes organorum, compressionesque, & omnino coarctationes inæqualitatem fieri.* Hoc idem etiam clarius scripsit *cap.* 19. ita dicens: *Quare omnium inæqualitatum, tum quæ secundum unam actionem, tum quæ circa plures ex ordine consistunt, aut asperarum arteriarum coarctatio, aut thoracis musculorum aberrans motus, aut facultatis ipsam efficientis debilitas, causa fiet.* Ab iisdem ipsis causis & inordinatæ respirationes, sed ab aliis etiam quippe convulsis musculis, moventibus thoracem; cujusmodi esse videntur luctuosæ suppurationes appellatæ, Gal. *in 6. Aph.* 54. docente. Rythmum etiam respirationes quæ servant probam, continuitatem naturalis caloris significant, veluti rythmum non servantes fiunt a coloris corrupta seu vitiata symmetria: Calidæ omnes respirationes a calore maxime aucto oriuntur, veluti a spiritu frigido exspirato illum admodum defecisse, exilemque effectum esse declarant quippe frigidæ respirationes. De his Hipp. *in Prog. p.* 38. *l.* 10. *tex.* 24. *Qui vero frigidus de naso, & ore exspiratur, admodum exitialis jam est*, quod emortuam facultatem, seu calorem extinctum, denotat. Sed caute est agendum, ne per respirationem frigidam intelligamus parvam & raram, cum & ipsa insiti caloris refrigerationem significet, sed exspirationem frigidam: atque ita de calida, ubi ex ore & nare calidum exspiratur, & non, quæ magna & frequens est, tametsi calida & ipsa, quod magnum calorem denotet, dici possit, non tamen actu calida est, de qua Hipp. & Gal. intelligunt. Sed jam satis circa respirationum causas versati sumus, nunc de prædictione ab ipsis petenda scribamus.

CAP. VIII.

Quid bene, & male, ſpirare in morbis ſignificet?

Bene ſpirare in morbis quid ſignificet.

BEne ac recte ſecundum naturam ægrotis ſpirare ad ſalutem prædicendam perpetuo magni momenti eſſe, neminem latere, arbitror. Hippoc. *in* 1. *Progn. p.* 38. *lin.* 11. *text.* 25. ita de hoc ſcripſit: *Spirationis autem facilitatem exiſtimari oportet perquam magnam vim habere ad ſalutem in omnibus morbis acutis, qui in quadraginta diebus judicantur.* Neque immerito quidem, cum, Gal. ita *in com.* docente, *bona reſpiratio thoracem, cor, pulmones, ſeptum tranſverſum, pleuram menbranam, & denique omnes partes ſervientes, reſpirationi recte valere demonſtret: neque enim fieri poteſt, aliquo ipſorum membrorum reſpirationi ſervientium læſo, ut ægroti naturaliter reſpirent.* Ex quo merito quoque Galen. bonam reſpirationem *in lib.* 1. *de Criſib.* inter bona ſigna recenſuit. Ceterum, ut a reſpiratione bona quicquam certi judicemus, duo alia quoque ſigna attendere debebimus quippe pulſus prævalidus, atque ægrotos recte ſe habere ad omnia, quæ illis offeruntur. Hæc enim tria ſigna, ſimul obſervata, quippe ægrotos recte ac ſecundum naturam reſpirare, bene ſe habere ad ea, quæ illis offeruntur, atque demum ubi pulſus ſatis robuſti apparent, magni momenti eſſe ad ſalutem prædicendam, Galen. *in* 3. *lib. Epid.* memoriæ prodidit. Hi que hæc ſigna, vel etiam in moribundis, ſalutis ſpem indicaſſe, non raro vidimus.

Male ſpirare in morbis quid ſignificet.

Quare recte ſpirare in omnibus acutis morbis, bonum eſt, atque contra, malum; quod neceſſario ſignificetur, aliquod organum reſpirationi deſtinatum non recte valere: non tamen exitium hoc ſolum ſignum exprimere poteſt, ſed una cum aliis exitialibus, omniumque certiſſimum exitium præſagit, ſi una ægrotus cibum abhorreat, non ſitiat, tameſi lingua præarida maximeque exuſta ſit, cum peſſimis excrementis, pulſuſque prælangueſcant, ſatis tuto ex his mors præſagiri poterit. Quare reſpiratio mala, ſemper mala eſt, tametſi non ſemper in acutis morbis letalis; peſſima vero, ubi cum peſſimo aliquo ſigno apparet, & plus ſi cum multis. De quibus Hipp. *in* 4. *lib. Aph.* 50. ait: *In febre non intermittente, ſi ſpiritus difficultas acciderit, & deſipientia, letale eſt.*

Reſpirationes quænam malæ.

Ceterum dicet Lector, quales malæ reſpirationes exiſtunt? Cui has eſſe reſponsebimus, quippe magnam raram, parvam frequentem, quam in moribundis Hipp. conſuevit dicere breviſpiram, ſpiritum exilem, ſpiritum imminutum: peſſimæ quoque ſunt, quæ cum ſtrepitu thoracis ſpectantur, veluti quomodo hi reſpirant, qui ex ſubmerſione ſpirant, hæque obſcuræ, ſtertoroſæ, interruptæque dicuntur, de quibus Hipp. *in eod. lib. Aph.* 68. ſcribit: *In febribus ſpiritus offendens, malum; convulſionem enim ſignificat.* Per quem ſpiritum offendentem, Gal. auctore in ejus Aph. com. intelligit ſpiritum, qui medio ſui interruptus ſubſtiterit; luctuoſæ itidem reſpirationes peſſimæ haberi debent, quod Hipp. *in* 6. *lib. Aph.* 54. nos docuit. Omnium peſſimæ, quæque in moribundis obſervantur, ſunt frigidæ, quippe quum ex naribus ac ore frigidum exſpiratur: demum ſublimes, obſcuræ, urgentes, quem ſpiritum *in lib.* 2. *coac. præſ. text.* 260. ita expreſſit, dicens: *Peſſimus autem morti propinquus, extendens, urgens, & obſcurus*: quibus verbis intelligit, primo ſpiritum ſublimem & phænomenon, ſeu apparentem appellatum, in quo pectus maxime diſtenditur, atque aliquando ſcapulæ, & pinnæ narium naſi moventur, quod vero inſpiratur, ita parum eſt, ut vix ſenſu percipiatur, denſiſſimum tamen eſt propter urgentiſſimam caliditatem: atque hæ ſunt malæ reſpirationes, de quarum quidem Prognoſtico ſigillatim a nobis erit agendum, ut accuratius ab ipſis ſingulis prædictionem aſſequi quiſque ſtudioſus poſſit.

CAP.

CAP. IX.

Quid respiratio magna velox, magna tarda, parva velox, parva tarda, & magna frequens, magna rara, in morbis significet?

Respiratio magna velox quid in morbis significat.

Magna & velox respiratio, quamquam in corporibus, ut Galen. scribit *in lib.* 1. *de difficult. respirat. cap.* 20. plurimum fuliginosorum excrementorum adesse declarat, facultatem tamen integram esse, viribusque potentem, nullumque organum ex respiratoriis vitiatum denotat, siquidem magna simulque velox fit, si utilitas urget, & organa sint promta, & facultas integram sanitatem fervet, similiter autem, & magnam simulque tardam in delirantibus fieri, nuper ostendimus, sic & parvam ac velocem, quibus est congregatum fumosum excrementum, & dolet simul aliqua particula, quæ circa respirationem movetur, aut quæpiam inflammatio; ut Hippocrat 1. *Prognostic. pag.* 38. *lin.* 7. *text.* 24. & Galen. *in* 3. *Epidem. comm.* 3. *tex.* 74. de Pythione *Lib.* 3. *Epidem. pag.* 1098. *Ægr.* 3. qui super Herculis fanum, docent, parvam simulque tardam iis fieri, quibus nullum fumosum excrementum est coacervatum, cum dolore, ut dictum est, alicujus organi ex respiratoriis, aut inflammatione: hæ duæ differentiæ respirationis cum malis signis plus duabus prioribus sunt timendæ, quod facultatem prælanguidam, aut exsolutam, aut denique partem quampiam thoracem moventem dolere, denotent. Magna & velox respiratio plurimum fuliginum, & incendii, sed cum facultate integra, & forti significat. Quæ vero simul & tarda melior est, quum ipsa ad recte valentem plus accedat, integramque & fortem facultatem, sine calore multo & absque fumosis excrementis. Hæ omnes cum aliis signis erunt a Medicis spectandæ, & ex ipsis simulque cum allis, quæ illuxerint, judicium deliberari. Sed ad magnas simul frequentes respirationes, & ad magnas simul & raras declinemus, quum ab ipsis præsagiendi ratio magis illuceat. Magna respiratio, & simul frequens ea est, in qua plurimus spiritus trahitur, & calidus, & fervens ex ore & naribus efflatur. Quæque fit aut, uti docet Hipp. *in* 1. *Prognostic. tex.* 24. (*Vide loc. modo allegat.*) quod aliqua pars ex respiratoriis seu thoracis inflammationem aut dolorem patitur. Cujusmodi sunt cor, septum transversum, pulmones, aut pleura membrana, aut musculi etiam thoracis: nam hæ partes dolentes, ac inflammatæ, quod non, ut opus est, dilatentur, spiritum frequentem seu densum fieri necesse est. Signant vero ex magnitudine cum facultatis robore hæc fieri. In quo non levis salutis sit spes. Quæ vero cum magnitudine etiam raro fit, nobis in acutis morbis delirium subesse declarat. De quibus quidem Hippocrat. *in primo Prognosticorum pag.* 38. *lin.* 8. *text.* 24. ita scripsit: *Qui vero spiratur magnus multoque interposito tempore, delirium indicat.* Sed quomodo magnum spiritum intelligemus? an ubi magna thoracis fit dilatatio? nequaquam magna thoracis dilatatione magnam fieri respirationem observamus, nam, ut umquam dictum est, quibus vel tumor, vel angustia sine flammeo calore spiritalibus membris insidet, in his thoracis quædam dilatatio maxima est, id vero quod inspiratur parum est. Ex quo magnam dicimus respirationem magni inspirati aeris, atque inspiratarum fuliginum multarum, ratione. Quod vel ipse Hipp. expressisse visus est, quum dixerit, qui vero spiratur magnus, quæ de spiritu, qui effertur, magnitudinem intelligendam denotant, minimeque de thoracis dilatatione. Addamus in differentiis respirationum sublimem ac phænomenam vocatam respirationem, in qua maxime thorax dilatatur, parvam atque exilem esse, ex Gal. constare. Qua-

Magna & tarda.

Parva & velox.

Parva & tarda.

Magna & frequens.

Magna & rara.

re dicatis ſpiritum magnum & rarum delirii nobis eſſe ſignum? Gal. *in l. 2. de difficult. reſpir.* uberiori ſermone demonſtravit hoc verum eſſe, quippe hujuſcemodi reſpirationem delirium ſignificare. Verum non exinde neceſſarium, ut omnes, qui delirant, eo modo reſpirent, fore dicamus; quando hæc fieri ſimul poſſint, quippe delirantes ut ſimul anguſtiam thoracis, vel dolorem ſentiant, vel virium languorem. Quæ omnia in ipſis quidem deliris parvum atque rarum ſpiritum efficiunt. Omnes vero, in quibus magnus & rarus fit ſpiritus, delirare non erit dubitandum. Cujuſmodi in Philiſco, Sileno, uxore Dromeadai, atque in aliis ab Hipp. fuit obſervatum. At quid ad prognoſticum hac reſpiratione? magni ſemper ad id erit momenti, idque præſagiet, quod delirium perpetuo malum eſt, non tamen ſemper exitiale, ſed ſolummodo ubi una alia ſigna prava & letalia illuxerint, quæ cum reſpiratione in Philiſco, Sileno, uxore Dromeadai, adoleſcente Mœlibeæ phrenitico, illuxerunt. De Philiſco, Hipp. *Epid. lib.* 1. *Ægr.* 1. *p.* 966. *tex.* 18. ita habet: *Spiritus huic erat perpetuo quaſi revocatus, rarus & magnus. Lien in tumorem roundum elatus erat: ſudores perpetuo frigidi, acceſſiones diebus paribus.* In hoc ſudores frigidi, ut ſuis locis demonſtrabimus, fuerunt ex ſignis exitialibus. Et de Sileno *ibid. Ægr.* 2. *p.* 969. *A primo die ad finem uſque ſpiritum magnum habuit & rarum, & hypochondrii perpetuam palpitationem*, quæ in proceſſu fuere letalia, quippe primo inter initia urinæ nigræ cum nigro ſedimento, delirium, dejectiones pingues, ſudor capitis ſexto die, extrema frigida lividaque, atque alia, quæ cum illa reſpiratione magna ac rara, miſerum Silenum nedum delirum eſſe, ſed certe moribundum, proculdubio denotabant: & de uxore Dromeadai. *Ibidem Ægr.* 11. *pag.* 987. *Sexto mane riguit, cito percaluit toto corpore, ſudavit, extrema membra frigida, deliravit, ſpiritus magnus & rarus. Paullo poſt convulſiones a capite cœperunt, ſubito obiit.* De adoleſcente vero Mœlibeæ *Epid. lib.* 3. *Ægr.* 16. *pagan.* 1117. *ſpiritus rarus & magnus per intervallum. Hypochondrii contentio ſubmollis ex utriſque oblonga, perpetua cordis palpitatio, reddidit urinam oleoſam.* Sed age de aliis reſpirationum differentiis agamus, præſertimque de parvis.

CAP. X.

Quid reſpiratio parva frequens, parva rara, ſignificet?

Reſpiratio parva & frequens in morbis quid ſignificat.

PArvum ſpiritum Gal. *Epid. com.* 3. *text.* 74. appellat exilem, atque inminutum, atque etiam obſcurum, vix enim reſpirare ægrotos videmus. Hujuſmodi reſpiratio perpetuo mala eſt, ut quod propter caloris nativi, ſeu naturæ exſolutionem fiat: quæ ſi etiam frequens ſit, ut Galen. docet eodem in loco dolorem ſignat, vel inflammationem ſupra ſeptum tranſverſum. Sed auctor Coacorum præſag. *Text.* 260. ait: ſpiritum frequentem inflammationem & dolorem in locis principibus ſignificare. Hujuſmodi reſpiratio in acuto morbo maxime eſt timenda, & plus ea etiam, ſi poſt magnam quidem reſpirationem fiat. Nobis ſane denotat, aut naturam reſolutam eſſe, ut dictum eſt, aut principem aliquam partem maxime lædi aut dolore aut inflammatione, aut utriſque ſimul vexari: judicium vero ex ſola hac reſpiratione certum non erit, niſi fuerit aliis ſignis confirmatum. Plures enim fuere ita in acuto morbo reſpirantes, qui incolumes evaſere. Sed ubi alia ſigna illuxerint prava, proculdubio ex ipſa exitium erit timendum, omniumque maxime, ſi e frequenti parva evaſerit, qualis poſtremo in tabidis ſolet obſervari: frequens itaque & parva cum pravis ſignis, letalis eſt. Qualis ab Hippoc. *Epidem. lib.* 4. *pag.* 131. *text.* 28. in ſorore *Temenei* fuit obſervatus: in qua die decima ſexta ſpiritus gracilis factus eſt & denſus, & mortua eſt. Sed age de parva & rara agamus. Quæ omnium fortaſſe eſt peſſima, quod naturam

Reſpiratio parva & rara.

viri-

viribus exsolutam morbo succumbere nobis declaret. Ex quo hunc spiritum Medici frigidum merito appellant, quia summum frigus & naturæ extinctionem ostendit, quod Gal. *in 3. Epid. com. 3. text. 74.* ita meminit: Parvum esse quemdam pariter & rarum spiritum, qui quum refrigeratur, emoritur jam vitalis facultas, & hoc symptoma esse quoddam admodum letale, hisce verbis expressit: *Hippoc. Prognost. pag. 38. lin. 10. Si frigidum e naribus exspiretur, exitiale jam est admodum.* Cujusmodi fuit observatum in *Pythione*, *lib. 3. Epid. Ægr. 3. pag. 1098.* moribundo, atque in aliis, ab Hippocrate. Sed his perspectis respirationum judiciis, breviter eas omnes perstringamus respirationes, quæ in moribundis solent observari.

CAP. XI.

De respirationibus exitialibus, quæ in moribundis fiunt.

DE respiratione rara & magna, magna & frequenti, parva, frequenti & rara, quomodo aliquando exitium portendant, satis dictum est: nunc reliquum, ut exitiales adnumeremus, cujusmodi est, frigida, sublimis seu Phœnomena appellata, stertorosa, quæ cum strepitu fit, & aliquando luctuosa & interrupta. De frigida omnium exitialissima, quæ nonnisi in proxime moribundis attenditur, Hippocr. *in lib. 6. Epidemiorum, comment. 4. text. 27. pag. 1181.* ita habet: *Signa mortifera per cutem, nares, calidus vapor, si prius frigidum spiritum reddunt:* quæ melius Gal. hisce verbis expressit: *Maxime signa mortifera, per cutem calidus vapor exiens post frigidum spiritum, prius exspiratione egressum. Sed calido vapore exspirato per nares & per cutim, non in omnibus mors erit prædicenda.* De quo quidem Galen. ibidem ita scripsit: *Illis enim solis id evenire comperies, quorum mortem calidissima febris antecessit, quæ corpus ipsum totum torruit, atque ideo postremo ipsum refrigeravit.* Vitali ergo tenore, moriente jam corde, evanescente, in aliis quidem sudores syncopen inferentes proveniunt, multis scilicet humoribus pleno corpore; illis autem, qui ex præfervida febre antea exaruerunt, pro sudoribus calidus vapor tangenti tibi difflari videbitur; hinc in *Coacis præsagiis Text. 160.* merito scribitur: *letalis autem est & febrilis & fuliginosus, verum minus quam frigidus*: ex quo Medici tria mortifera solent hæc vocare, quippe febrem urentem: frigidam exspirationem cum raritate: atque tertio vaporem in cute calidum, aliquando sudorem seu madorem, qui in febribus mortem prænuntiat. Obscuram quoque respirationem, ut quando vix respirare ægroti dignoscuntur, perinde atque frigidam esse exitialem, de qua quidem, ubi de parva & rara egimus, satis dictum est. Ceterum per obscuram respirationem intelligimus eam, quæ fit, ubi vix aliquis spiritus ex ore & naribus exspiratur. Nam fieri potest, ut obscurissima sit, & tamen manifestissima omnibus appareat, ubi scapulæ, thorax; nariumque pinnæ ad spirationem moveantur, quam respirationem sublimem & phænomenam, idest, apparentem, Medici merito appellant, tametsi pauciſſimus spiritus exspiretur, & hac ratione sit obscurissima. De qua *in 2. Coac. præs. Tex. 260.* scriptum est: *Pessima autem & morti propinqua, extendens, urgens, & obscura.* Sed jam de stertoroso, & qui cum strepitu fit: intelligimus autem per stertorosum spiritum, quando inter respirandum sentitur in gutture quædam veluti ebullitio, aut strepitus, nimirum stertor, hoc est, cujusmodi fit in stertentibus. Hic strepitus, seu sonus, seu ebullitio latinis, Hippocrat. vero ῥάγος atque ῥέγξις & alias κέρχνος dicitur. In acutis morbis perpetuo ante exitium per diem, & parum

Respirationes exitiales.

Respiratio frigida.

Obscura.

Stertorosa.

plus, hic fervor gutturis in multis auditur. Indicat enim plane facultatem extinctam, ut neque valeat a faucibus excrementa expellere; in aliis vero, pectoris morbis laborantibus, uti in pleuriticis, peripneumonicis, fit ſtertor ille propter anguſtiam, aut ſputi retentionem, quum & ſpiratio eſt parva, & non raro orthopnoica, ideſt, maxime difficilis. Proprium eſt fere omnium morientium, ut ante exitium eum fervorem, ſeu ſtertorem patiantur; ſed omnium maxime, pleuriticorum, & peripneumonicorum, ſuppurationumque. Quibus omnibus fervor, ſeu ſtertor ille, antequam moriantur, fit: eſt itaque unum ex letalibus ſignis. Sed accurate tamen diſtinguendum, quo tempore incipiat, aut in morbi principio, aut poſtea ingraveſcente morbo; nam ſi exitioſum eſt, numquam apparet priuſquam alia illuxerint ſigna exitialia. Cujuſmodi viſum fuit in *Antiphonis filio* pleuritico, *Epidem. lib. 7. text. 28. p.* 1217. atque in *Menone* pleuritico. De Menone enim pleuritico Hippocrat. *in lib. 7. Epidem.* text. 47. *pag.* 1220. habet: *Die decimaſexta, ſpiritus jam ſtertoroſus, ſudor circa frontem & cervicem, raro ad pectus, extrema & frons moderate perſeverabant frigida, ſaltatio vero venarum circa tempora detinebat, Somni comatoſi & nocte & die poſtremis temporibus.* Quare ſtertoroſus ſpiritus in morbis acutis plerumque eſt pernicialis, omniumque certiſſimum, ubi ſigna letalia ſimul, aut antea, illuxerint, cujuſmodi ab Hippoc. in *Menone* pleuritico fuit obſervatum; in quo præter alia ſigna, ſudor circa frontem & cervicem apparuit, quem Hippoc. *in Prognoſt. pag. 38. lin.* 21. letalem in acutis morbis eſſe affirmavit, & extremorum perſeverans frigiditas, quo nihil perniciosius. In principio vero pleuritidis & peripneumoniæ, & febris (ut vocant) catharralis, quæ catharrum ſequitur, vel una cum ipſo fit, aliquando ob excrementorum multitudinem, ſeu (ut dicunt) ob catharri defluentis ad fauces atque ad pectus copiam, non letaliter ſtertunt; non ſecus quam aſthmatici & orthopnoici multi, qui poſtea humore aut excreto, aut reſoluto, liberantur. Ceterum in his ſtertorem non letalem a letali diſtinguemus, quod hic nedum incipiat, ſed indies magis morbo quippe augeſcente augeatur, & magis ſentiatur. Hic enim prorſus letalis eſt, neque aliquo letalium ſignorum carebit. Ille vero, quum in principio ſtertere incipiunt, & paullo poſt augeſcente morbo, aut humore multo per tuſſim excreto, aut ab igneo calore febris conſumto, ſtertor amplius non accenditur, & fit ex multitudine humorum, neque admodum timendus ſtertor ille eſt, præſertim ubi ex ratione deſierit. Verum ille, qui in principio, licet ex multitudine catarrhi, factus non ceſſat, ſed indies magis augetur, pernicialis utique eſt, quod naturam multitudine humorum gravatam, & oppreſſam ita eſſe, ut nequeat excernere excrementa, & quaſi exinde ſuffocari, nobis certo ſignificet. Cujuſmodi in *uxore Polemarchi* Hippoc., ut *ex lib. 5. Epidem. Text. 62. pagin.* 1156. colligitur, vidit, de qua ait: *Circa quintam genu dolor, tumor ſiniſtri, & circa cor videbatur aliquid eſſe collectum, & reſpirabat, ut qui ex ſubmerſione reſpirant, & ex pectore ſubſtrepebat. Quæ obiit die ſeptima. Antiphonis* itidem *filium* ſuppuratum Hippoc. *in 7. Epidem. text. 28. pag.* 1217. ſcripſit, cum ſtertore obiiſſe. Cui addamus, quod Hippoc. *in 1. Prorrhet.* 25. ſcripſit: *Spirituſque in aphonia veluti his, qui ſtrangulantur, promtus, perniciosus.* Atque hæc de ſtertoroſa reſpiratione, quam *regmenon* & *cerchmon* quoque aliqui appellant. Nunc de ſublimi, atque phænomena, ſeu apparente appellata, quę nonniſi in moribundis quoque apparet. Vocant hunc ſpiritum alii ſublimem, alii phænomenon, ſcilicet apparentem, alii promtum, aliique perperam magnam reſpirationem dicunt, quod thoracem maxime dilatari, & moveri obſervemus. De qua Galen. *in 1. Prorrhet.* ita habet: *Strangulantur jure optimo, quoniam aeris copia non ſit*; eſtque ipſi conſuetudo, ut talem ſpiritum Phænomenum, ideſt, apparentem, dicat. Videntur autem omnes talem in-

Sublimis atque phænomena.

ſpira-

ſpirationem habentes ſcapulas movere totas, ita, ut per veſtimenta motio conſpicue appareat, tamquam valide ipſi ſuperioribus thoracis partibus operentur; μεγεθος itaque, apparentem, at ſublimem ſpiritum vocavit, quoniam, qui ita reſpirant, altiores ſublimioreſque thoracis partes movere videantur, addidit hujus reſpirationis cauſſas, ita dicens: *Poteſt ſane reſpiratio hujuſmodi fieri & propter reſpirationi delegatorum inſtrumentorum anguſtiam, & ob affectum nervorum principium. Quod ſi læſum fuerit, magnam efficere reſpirationem, recte Hippocratem exiſtimare, oſtendimus; rectius dixiſſet, non magnam reſpirationem, ſed magnam thoracis dilatationem, ex quo decepti quidam hanc falſo magnam reſpirationem appellant, etſi in hac parum exſpiretur.* Addamus nedum hanc Galenum, & Hippocratem dicere ſublimem reſpirationem, ſed vel etiam, quando, & pinnæ, ſeu alæ narium muſculique circa ſcapulas manifeſte moventur, quæ reſpiratio fit in acutis morbis propter virium abſolutam infirmitatem, aut proſtrationem. De qua reſpiratione Galen. *in lib. 3. Epidem. text.* 24. ait dicens: *Equidem illas eum reſpirare puto ſignificare ſummis naribus, qui reſpirando narium pinnas movent, ſiquidem multos nos ægros ſic vidimus ſpirare, ut eas in exſpirando contraherent, inſpirando vero dilatarent.* Quod quidem incidit iis, qui ab angina ſuffocantur, vel a peripneumonia vel ſuppuratione, præterea iis, qui infirma ſunt facultate, idque fiebat, quod ex arteriæ inflammatione præcluſum eſſet viæ ſpatium, nec jam ſpiritus attractio poſſet in pulmonem fieri, & propterea compelluntur, ut, qui ita ſuſpirant, continue omnique thorace peragant reſpirationem, contenduntque etiam qui ſuffocantur exſurgere, & toto thorace extremum aerem magna vi attrahere; ex quo forte etiam Hippoc. ſpiritum ſublimem vocavit, quod ſublime ægri velint ſe erigere, atque hæc ſublimis reſpiratio anginoſis, pneumonicis, ſuppuratis; atque has habet cauſſas. In aliis vero morbis acutis, in quibus ægri non ſuffocantur propter anguſtiam inſtrumentorum, reſpirationi deſtinatorum ſummis naribus reſpirare aliam cauſam habet, quam Galen. *in 1. de diffic. reſpir. cap.* 23. ſic habet: *Quod ſi quis ipſius reſpiratoriæ facultatis ægrotantis, atque in communi, omnis facultatis animalis, propria ſigna habere velit, & maxime perfrigeratum is alarum naſi motum habebit, & omnium muſculorum circa ſcapulas actionem & coacervatam thoracis collapſionem.* Quando enim hæc debilius, quam convenit, movetur, circa inſpirationem quidem ſpiritus ductum juvant alæ naſi, externum aerem etiam ipſum ſimul attrahentes eodem modo, quo per os aliquid attrahere volentes, labia contrahimus; rurſus vero circa exſpirationes coacervata fit thoracis collapſio, non paullatim demiſſio. Quare ex iis ſtatuamus reſpirationem ſublimem, quomodocumque fit, perpetuo letalem eſſe, aut quod ſummam inſtrumentorum reſpiratoriorum anguſtiam, ex qua natura ſuffocetur, aut virium ſeu naturæ abſolutiſſimam infirmitatem ac extinctionem denotet. Ex quo nonniſi in moribundis apparent. Verum exitialia alia ſigna, antea aut ſimul aut poſtea apparentia maxime confirmantur, quum ea reſpiratio numquam ſine aliquo ſignorum exitialium appareat. Hanc intelligens etiam auctor 2. *Coac. præſ. ſect. 2. text.* 260. dixit: *Peſſima autem & morti propinqua, extendens, urgens, obſcura.* Diximus tamen, etſi ſolum hoc ſignum mortem certam ſignificet, perpetuo ipſum alia exitialia concomitari. Uti in *uxore Olympiadis* Hippoc. vidit, de qua *in lib. 7. Epid. text.* 49. *pagin.* 1221. ita habet: *Oculi triſtes, ſpiritus ſublimis per nares trahebatur, color pravus, ſudor circa pedes & crura, quum jam circa mortem eſſet.* Non minus & in *Ariſtocrate* moribundo hæc viſa ſunt, de quo Hippoc. 7. *Epid. text.* 52. *pag.* 1222. paullo poſt ſic ſcripſit: *Ad noctem ſpiritus ſublimis eſt factus, ſudor exiguus circa frontem, infernæ partes frigidæ, anxius.* Addamus reſpirationem luctuoſam, ſed parvam & raram, quæ ex exitialibus quoque eſt reſpirationibus, ut ex Hippoc. *in 6. Aph.* 54. ita legitur: *In acutis paſſioni-* Luctuoſa.

ſionibus, quæ cum febre ſunt, luctuoſa ſuſpiria, malum: eodem modo & interrupta, exitialis eſt, quæ forte eadem eſt cum luctuoſa. Quod & Gal. nuper propoſiti aphoriſmi commentario affirmare videtur, quum dicat: *Infantes ſæpe videntur, quo plorant, tempore inſpirantes, inſpiratione interrupta, ſtante interim thorace, deinde rurſus id quod deeſt, adjiciente*: accidit hoc nonnumquam, ut ait Gal:, potentia fatigata, nonnumquam ex duritie inſtrumentorum, nonnumquam vero ambabus cauſis ſimul convenientibus, ſed & aliquando propter aliquam muſculorum pectoris ſimilem convulſioni diſpoſitionem. Quæ vero in febre acuta fit, luctuoſa & interrupta reſpiratio, alias cauſas habet, ut Galen. placuit, quippe aut duritiem inſtrumentorum, vel virium imbecillitatem, vel convulſioni ſimilem diſpoſitionem; quicquid vero horum in cauſa ſit, pravum eſt, ſi in morbo acuto contingat; maxime pernicioſum, ſi cum virium languore ægri ita ſpirant. Sed hujuſmodi reſpiratio etiam una exilis eſt, & duritiem quoque aut diſpoſitionem convulſioni ſimilem habet in acutis ardentibuſque febribus, & perpetuum prava dicitur. Non minus quam convulſiones, ſiccatis partibus nervoſis ab ea cauſa, exitioſas merito eſſe antea monſtraverimus. De qua ſpiratione Hippocr. *in lib. 4. Aphoriſm. 68.* dixit: *In febribus ſpiritus offendens, malum. Convulſionem enim ſignificat*: quæ a ſiccitatibus in calidiſſimis morbis concitatæ, curabiles non ſunt. Ex quo etiam letales eſſe in morbis acutis ſuperius nobis fuit demonſtratum. Ut vero ex ipſis recte de futuro morborum exitu prædicere queamus, alia ſigna quum antea, tum ſimul poſteaque conſpecta, erunt conſulenda, quorum nulla ſi prava erunt, ad perniciem judicium pendebit. Atque hæc ſunt, quæ ex vitalis facultatis actionibus, ad morborum prognoſin depromta conducunt. Nunc idem ex naturalis facultatis actionibus eodem modo perſcrutabimur.

CAP. XII.

Quæ a naturalis facultatis cognitione ad intelligendam præſagii rationem ſit utilitas?

AD naturalis facultatis robur, impotentiamque cognoſcendam nunc etiam declinemus, quum ipſa ceteris aliis ad prædicendi rationem non minus ſit utilis. Aliæ quidem facultates, animalis quippe ac vitalis, a naturali videntur procedere; quum ipſa materiam cordi cerebroque ſubminiſtret, a qua vitales in corde, animales in cerebro, vocati ſpiritus generantur. Præterea excrementorum in ægrotis corporibus, plurimum ad præſagii rationem facientium, cauſa ad naturalem facultatem maxime attinet: itaque de hac ipſa quidem facultate, noſtro quippe ordine ſervato, accuratius in præſentia eſt agendum. Quod ut probe fiat, videndum primo eſt iſtius facultatis robur ac impotentia, ex quibus nobis innoteſcat. Scimus vero ipſius vim a variis facultatum operibus, quæ propriis actionibus obeuntur, cognoſci. Tres ſunt actiones præcipuæ facultatis naturalis, ut Galeno viſum eſt *in libro naturalium facult.* quippe *generativa*, *augmentativa*, & denique *nutritiva*. De hac magni intereſt, ut ad prædictionem aſſequendam agamus; de aliis vero duabus nequaquam, quum ad inſtitutum noſtrum parum, aut nihil faciant. Ad nutritionem itaque corporum, partiumque ipſarum agendam omnium quatuor naturalium actionum, quippe *attractricis*, *retentricis*, *concoctricis* ſeu *alteratricis*, atque demum *expultricis*, opera requiritur, ſeu iſtarum omnium operatione nutritio omnis in corpore perficitur. Proinde ex ipſarum operatione apparet, ſeu cognoſcitur, quanta in ipſis ſit vis, aut impotentia, aut extinctio, vel denique vitium.

Naturalis facultatis robur & impotentia unde innoteſcit.

Ex

Ex quo naturalem facultatem, aut viribus potentem, aut vitiatam, aut aliquo pacto deficientem, aut denique prorsus collapsam & exstinctam, cognoscimus. Quæ cognitio, quantum ad prædictionem salutis & exitii in morbis, Medicis conducat, ex iis, quæ superioribus libris dicta sunt, liquido cuique nostrum constabit. Sed age, rem ipsam aggrediamur, ab appetentia ciborum & potus in ægrotis principium facientes.

CAP. XIII.

De appetentiæ symptomatis ad prædicendi rationem.

NAtura, ut docuit Galen. *in primo lib. de symptom. cauſ. Cap.* 7. animalibus alimenti penuriæ sensum est impertita, ut ipso ad cibum potumque proritata in tempore expleantur: vocaturque ejusmodi implendi desiderium, *appetentia*, quæ a penuriæ sensu ortum habet, quum scilicet venæ ab ipso ventriculo veluti emulgentes sugentesque aliud trahunt, non ferens autem eum suctum ventriculus, sed veluti offensæ medelam cibum comparat, quippe venæ hoc pacto ad objectos cibos convertuntur, atque ex his nutrimentum trahunt. Fitque post cibi consumtionem, ut venæ simul ad cibos se convertant, & ventriculus ex iis, quantum prius in venis collectum est, in seipsum trahat. Duplex vero dicitur appetentia, quippe cibi una, quę *fames* appellatur, altera potus, *sitis* & ipsa vocata. Cibi vero appetentia alimenti, sitis humoris fit inopia. Dividitur quoque appetentia utraque in eam, quæ est naturalis, ac in non naturalem. Illa perpetuo ex alimenti penurię sensu exitatur, innaturalis vero est, quę prętęr naturę fit desiderium. Cujus quidem symptomata, auctore *Galeno in libro de different. symptom. Cap.* 4. vel in actionibus non obitis, vel male obitis consistunt; in non obitis aut quum prorsus non appetunt, aut parum & pauca quidem. In male obitis sunt immoderatę appetentię, & ubi quicquam vitiosum appetunt. Ex quibus fit, ut quidam nedum nullos cibos appetant, sed quinimmo, ut quosvis cibos ita abhorreant, & odio habeant, ut mori malint, quam cibum aliquem assumere, quod Galen. *in lib.* 3. *Epidem. Com.* 3. *in text.* 58. multis contigisse, tradidit. Aliquando non ex toto appetitu privantur, quod detegit aliquis cibus, quem ipsi non abhorrent. Nihil vero appetentię adesse, vel ex eo scimus, quum ęgri prorsus omni careant appetitu, quicquamque nequeunt imaginari, quo appetitus excitetur: de quibus Hippoc. *in eodem lib. Epidemior. lib.* 3. *sect.* 2. *Ægr.* 6. *pag.* 1074. de virgine *Euryanactis* filia moribunda scripsit: *Quosvis cibos toto hoc tempore fastidivit, neque appetivit quicquam. Non sitiit, & nihil effatu dignum bibebat.* In similem vero inappetentiam veniunt ęgroti, aut, ut *Galen.* docuit *in* 3. *Epidem. com.* 1. *text.* 11. quando os ventriculi ab aliqua humorum aliena qualitate afficitur, aut propter insignem plethoram, seu plenitudinem, ex qua nulla in ventriculo fit consumtio, neque sensus suctus ullius in ipso sentitur, aut denique, quod in acutis morbis plerumque evenit, propter ipsius facultatis exstinctionem, cujus erat in secunda valetudine munus, indigentiam alimenti sentire. Ceterum nos interstinguere debebimus veram exstinctionem facultatis, quę sępe in delirantibus quibusdam observatur, qui quosvis cibos etsi abhorrere videantur, tamen id ex delirio, non ex facultate diminuta fit. Quemadmodum ii, qui etsi intensissimum calorem sentiant, quo maxime sitiunt, tamen potum non postulant. Quam rem Galen. *in eodem tertio Epidem. Com.* 1. *text.* 11. ita expressit, dicens: *Nam, quoniam sitiunt, nec potum appetunt quidem in morbis, vel propter delirium*

Appetentia duplex.

Appetentia innaturalis Symptomata.

rium non ſentiunt, quæ patiuntur, aut propter exſtintionem naturalis in ventriculo facultatis, ſi id citra delirium habeant, facultatem relinquetur eorum naturalem exſtingui. Vitiatur vero appetentia cibi & potus quum in quantitate tum in qualitate. In quantitate vitium appetentiæ ineſſe cognoſcitur, quum ægroti plus quam ipſis conveniat appetunt, quippe qui copioſius, quam ferat ventriculi facultas, cupiunt, atque devorant, idque aut ex humore frigido, aut ex frigiditate ventriculi fieri, Galen. *in lib. 6. Epidem.* nobis tradidit, qua ratione frigus appetentiam augere dixit. Ex quo frigidiorum ventriculorum proprium eſſe Galen. *in lib. artis medicin.* docuit ut plus appetant, quam concoquere poſſint; idem & de potu, quum immoderatius potui indulgent præ multo febrili incendio, aut ex humore ſalſo, aut bilioſo, os ventriculi occupante. In qualitate etiam ciborum & potuum vitiatam habere appetentiam dicuntur, qui alienam quum in cibo, tum in potu, qualitatem deſiderant, & appetunt, ut quædam uterum gerentes mulieres propterea ſunt, quæ carbones, aliæ terram, aliæ calcem, & aliæ lunæ flores avidiſſime appetant & eſitent: quidam vinum ardentius, quod in multis pleuriticis obſervari ſolet: ex quo vini deſiderio plures, vel etiam mulierculæ, ægroti pleuritici eſſe ſuſpicantur, alii libentius aquam, quidam omnia calida, alii actu frigida, expoſcunt. De harum vero vitiatarum appetentiarum cauſis Gal. *in primo lib. de ſympt. cauſ.* perbelle ita ſcripſit: *Vitioſæ appetentiæ, quæ in quantitate modum excedunt, vocanturque a quibuſdam caninæ, tum exſiſtunt, vel quum acidus quiſpiam vitioſus ſuccus ventriculum mordet, vel totum corpus immodico digeſtu inops alimenti redditur vitioſum; namque ſuccus, qui frigidus eſt, ſimilem ſuctui morſum infert, appetentiam vero proritat naturalis effectus ſimilitudine, alimenti at non potus deſiderium excitat propter frigus, at vitioſo ſucco, qui ſalſus & bilioſus ſit, ventrem mordente, potio magis quam cibus appetit.* Hinc merito Hipp. quoque *in 6. Epidem. Com. 4. text.* 18. *pag.* 1180. dixit: *Aqua edax*, quaſi caninæ appetentiæ frigiditatem pro una cauſſarum indicarit: Et *in lib. 2. Aphor. Aph.* 21. dixit, *Famem thorexis ſolvit*, hoc, Galeno docente, vini potio, quaſi illius appetentiæ medelam eſſe expreſſerit. Sitis quoque augetur, aut ex calore immoderato, ejuſmodi fit in ardentibus febribus, aut ex ſiccitate, quæ præcipua ſitis eſt cauſa, ex quo ubi corpora plurimum exſiccantur, plurimum ſitiunt, qualem Galen. *in primo de ſymptom. cauſ.* quibuſdam epota aqua marina contigiſſe vidit. Sed age ad optimæ appetentiæ in morbis jam prognoſticum veniamus.

Appetentia cibi & potus, quomodo vitiatur.

CAP. XIV.

Quid cibi & potus optima appetentia in morbis ſignificet.

PRius conſideremus, quid optima appetentia in morbis oſtendat, & mox de non obita & vitiata agemus. Maxime utile nobis erit ſuppoſi, ægrotos rectius agere, quum actiones omnes utriuſque faculratis recte, perinde ac in optima valetudine eſſe ſolent, obeant. Scimus enim, urinas, dejectioneſque optimas eſſe, ſi fuerint ſimiles iis, quæ antea per ſanitatem excernebantur. Eodem quoque modo bona erit in ægrotis illa quum cibi tum potus appetentia, quæ ad bene valentium appetentiam accidit, eique maxime eſt ſimilis. Ægrotos vero bene ſe habere ad ea, quæ ipſis offeruntur, perpetuo bonum, recte enim facultatem naturalem exinde valere, non minuſque & ventriculum. Itaque ægrotos integram habere appetentiam. bonum eſt, omniumque maxime in morbis diuturnis, ut docuit Gal. *in lib. 7. Aphoriſm.* a quibus qui ſunt evaſuri, vehementem appetentiam ſolent habere. Ceterum diſtincte cognoſcenda erit optima appetentia, quum

Appetentia cibi & potus quænam bona.

ſæpius

sæpius in ipsa judicanda plures decipiantur, vitiatam ac exitialem bonam putantes. Bona autem est, quæ naturalis est, quæque fit a causa naturali, quippe a penuriæ sensu: quandoque ægroti videntur bene appetere, ipsorumque creditur appetentia optima, propterea quod cibum avide appetant, & assumant, quæ tamen in multis moribundis sæpius observatur, aut propter vitiosum humorem, quod minus malum est, ad os ventriculi defluxum, quippe frigidum & acidum, aut, quod summe est pernicioſum, ubi natura a morbo maxime est resoluta a nimia substantiæ corporis digestione. Hinc plures, priusquam moriantur, cibum avide postulant, ac assumunt. Potus vero appetitus, etsi bonus censetur, qui benevalenti est similis, & moderatus seu temperatus, nihilominus in quibusdam optima erit censenda sitis, nimirum in æstuosis ardentibusque morbis, in quibus non sitire, ut posterius dicemus, perpetuo malum, & quandoque mortale, ubi scilicet linguam ægroti habuerint prearidam, squalidam, & nigram, in his melius est, ut multum sitiant, sicut etiam optimum est, ut febris exterius appareat, in primis quum urinæ coloratiores spectentur. Veluti in iisdem morbis excrementa discoloratiora spectari, & ægros non sitire, summe est exitiosum, quod aut ex delirio fit, aut quia naturalis facultas extinguitur. Non sitire vero in iis perpetuo malum, sed hujus signi perniciem alia exitialia signa tunc conspecta declarabunt. Intensissimam tamen sitim numquam utilem fore ægrotis, addimus, quæ viscera interna ardentissimo incendio uri declarat; aut maximam siccitatem; aut ex utraque simul, de qua Gal. *in primo de caus. sympt.* ait: *Inexplebili vero novimus cruciari siti, ex qua etiam tum eum, qui viperam comederat,* (erat autem fortasse dipsas) *tum messores, qui vetus vinum usque ad ebrietatem, non minus eum, qui pertinaciter sustinere sitim sibi imperaverat. Ad hæc alii in navigio, quum deficeret eis aqua dulcis, quorum qui ausi sunt marinam bibere, quum immodice supra ceteros sitirent, & alvi fluxum haberent, nec id sine morsu vehementi & celerius quam alii perierunt.* Sed age agamus de abolita quum cibi tum potus appetentia.

CAP. XV.

Quid in morbis ciborum appetentia prorsus sublata significet?

CIborum sublatam appetentiam perpetuo malam, omniumque pessimam esse, quæ prorsus, periit, ratum est. Hæc in iis, qui recte valent, gravissimum morbum minatur, quod aut ab insigni plethora, aut cacochymia fiat, quippe natura multitudine excrementorum aggravata. In iis qui ægrotant, letalis primo in morbis longis, quod significet naturam a morbo consumtam iri, priusquam morbum superare queat: de qua inappetentia Galen. *in libro 6. Aphorismorum Aph. 6.* ait: *Fastidium cibi per setpsum pravum est signum in morbis diuturnis, nam in iis, qui a talibus morbis sunt evasuri, contrarius affectus solet accidere, vehemens scilicet ciborum appetentia.* Idem fere Hippocrates scripsit *in sexto Aphorismorum, Aph. 3.* dicens: *In difficultatibus intestinorum cibi fastidium, malum, & cum febre pejus*; in longis difficultatibus intestinorum quum hic casus, ait Galen. evenerit, mortificationem quamdam ipsi jam advenisse ventriculo compatiendi ratione significat, ex qua omnino interiit appetentia, opus ad vitam necessarium. In morbis quoque acutis cibi fastidium, perpetuo malum, omniumque maxime quum prorsus appetentia fuerit exstincta. De qua Hippocr. de *Euryanactis filia in tertio Epidemiorum sect. 2. Ægr. 6. pag* 1074. ait: *Quosvis cibos toto hoc tempore fastidivit, neque appetivit quicquam.* Hujusmodi fieri inappetentiam, docuit Galen. *in 3. Epidemior. Com. 3. text.* 11. aut ore

Appetentia ciborum sublata perpetuo mala in morbis.

ventri-

ventriculi, ab aliqua humorum qualitate affecto, aut ab ipsius facultatis exstinctione, cujus erant in secunda valetudine munera indigentiam sentire, & quæ sunt se curatura appetere. De hac Hippocr. *in 1. Epidem. comment. primo, text. 30. pag. 940. lin. ult.* de tabidis in Epidemica constitutione, mortuis ait: *cibos quosvis perpetuo fastidiebant, non sitiebant.*

Inappetentiæ exitiales signa.

Hanc inappetentiam notant alia signa letalia, & quod perpetua sit, quando & si quidam quosvis cibos fastidiant, tamen non semper: addamus inappetentiam summe exitialem, ubi ægroti maxime oderint quosvis cibos. Narrat Galen. *in 3. Epid. Com. 3. in text.* 58. se quosdam vidisse in quadam pestilenti constitutione, qui mori maluerint, quam cibum aliquem assumere. Quidam tamen, ut Galen. ait, fortiores quippe, qui vim sibi ipsis afferentes cibum oblatum assumserunt, superstites fuerunt. Sed præterquam quod ciborum fastidium & odium in acutis morbis perpetuo sit per se solum satis efficax signum ad exitium prædicendum, tamen simul alia signa pernicioſa, aut una, ante, aut postea conspecta aderunt. De quibus *in Coacis præsagiis text. 67.* legitur: *Quibus vero fastidia cibi accedunt, & sudores cum bono faciei colore, & liquida alvo, aut dolore cordis, hi peripneumonicorum aut pulmonariorum more intereunt, posteaquam longius ægrotaverint.* Et *in 3. Epid. sect. 1. Ægr. 2. pag. 1063. Com. 3. text. 5.* de Hermocrate moribundo ait: *Vigesimo perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente constabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non sitiebat, obdormiscebat aliquantisper, comatosus periit vigesimo septimo.* Idem fere visum est & in *Euryanactis filia* virgine, (*Vide locum supra allegat.*) quæ quicquam gustare non sustinebat, de qua ait: *Quosvis cibos toto hoc tempore fastidivit, neque appetivit quicquam: neque sitiit, etsi acri & calida destillatione vexaretur*; quibus Galen. auctore *in lib. 1. de symptom. causis*, siticulosos fieri ægrotos, observatur. Idem in Pario *Lib. 3. Epid. Ægr. 1. Sect. 3. pag. 1093.* observasse scripsit, atque non minus in muliere, que apud frigidam aquam decumbebat *Lib. 3. Epid. Sect. 3. Ægr. 2. pag. 1096.* De qua: *Tertio a partu die, febre correpta est acuta, horrida, multo tamen ante partum febriculosa decubuerat, cibumque fastidierat. Quarto cibum fastidiebat*: Et paullo post: *Ceterum ad cibos averso animo se habuit*: Et demum ait: *Hæc perpetuo cibum fastidierat, animo liquebat*, quæ & ipsa obiit. Ex quibus ægrotantium exemplis confirmamus, quæ diximus, quippe ægrotos quosvis cibos in acutis fastidire & abhorrere, exitiale esse signum, cujus quidem pernicioſam naturam confirmare solent prava alia signa, quæ aut ante, aut una cum illa inappetentia, aut quæ postea illuxerant; cujusmodi sunt, alvus fluida, sudores mali, vomitus virulenti, æruginosi, nigri, urinæ nigræ, turbidæ non clarescentes, claræ, albæ, perspicuæ, deliria, vigiliæ, lethargicæ passiones atque alia hujusmodi omnia, quæ numquam bona sed plerumque letalia existunt, atque ita ex inappetentia ciborum in morbis prognosticum judicabimus. Nunc quid potus quoque sublatum & exstinctum desiderium ægrotis protendat, consideremus, præmisso in primis sermone de intensa siti.

CAP.

C A P. XVI.

Quid ſitis intenſa in acutis morbis ſignificet?

QUum dixerimus ſuperius, ægrotos in acutis ardentibuſque febribus ſitire, ratione fieri, qui morbis quippe calidioribus atque ſiccis conflictentur. Quando multo pejus, uti paullo poſt dicemus, ſit, hos ægrotos ſiti carere, non ſecuſque eſſe, quam urinis diſcoloratioribus, ardente febre homines vexari. Quare bonum eſt, (quod omnia præſtat ex ratione fieri) ut calidis morbis affecti ſitiant. Immoderatius vero eoſdem ſitire numquam bonum, quod interna viſcera incendio intenſiſſimo flagrare denotat, ſed plerumque malum eſt & periculoſum, quod morbi vim prævalidam expugnatuque difficillimam nobis denotet, cui facile natura languidior facta ſuccumbat. Ex quo tuto proferre iſtud poſſumus, quippe immoderatam ſitim, quod maximum morbum ſignificat perpetuo eſſe timendam in acutis morbis, ſed peſſimam & exitialem illam, quæ aut ſequitur ſigna peſſima, aut una cum ipſa appareant, vel denique poſtea. Certum enim exitium proculdubio portendet. Ex ſola vero ſiti nedum in acutis, ſed vel etiam in aliis, licebit judicium præſagii deſumere, quum ipſa nonniſi morbi maximi ſit nota. De qua Hippocr. *in* 1. *lib. Epid. Com.* 2. *pag.* 954. *lin.* 8. *text.* 75. ita ſcripſit: *At quum febres inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet, Siquidem ſtatim ab initio febris acuta invadebat, a qua parum ſuperrigebant, inſomnes erant, graviter angebantur, ſitibundi, faſtidioſi.* Qualis fuit obſervata in *Philiſco*, *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 1. *pag.* 966. de quo Hippoc. ait: *Tertio mane ad meridiem uſque febre viſus eſt liber, ſub crepuſculum autem acuta febris invaſit una cum ſudore, ſitibundus, lingua inaruit, nigras urinas reddidit*, quæ ſitis cum nigris urinis atque aliis morbum exitialem, quippe, quem natura minime poſſet vincere, denotabat. Similem quoque ſitim Hippocr. in *Pythione*, qui ſupra Herculis fanum decumbebat, obſervavit, de quo 3. *Epidem. com.* 3. *text.* 18 *Ægr.* 3. *pag.* 1098. ait: *Magnus cœpit rigor, febris acuta, lingua inaruit, ſitibundus erat, & bilioſus, non dormivit, urinæ nigræ, ſuſpenſio ſublimis non ſubſidebat*, quam ſitim uſque ad diem quintam habuit, additis aliis ſignis perniciosis, quippe frigore partium extremarum, aphonia, ſeu mutitate. Quare ſitim intenſam, una cum aliis pravis ſignis, peſſimam eſſe dicimus. Cujuſmodi forte fuit, quam *uxor Ermoptolemi*, paſſa fuit, de qua Hipp. *in lib.* 7. *Epid. com.* 3. *pag.* 1212. *Text.* 13. habet: *Tremores autem in manibus fiebant, & caput concutiebat, & oculorum intuitus pravi, & ſitis fortis, & quum potaſſet, rurſum petebat, & rapiebat, ac largiter bibebat, avellere autem non poterant, lingua ſicca & manus ambas in os ferens manducabat, quum eſſet tremula.* Non diſſimilis fuit, quæ in *Ariſtocrate*, *eodem lib. pag.* 1222. *text.* 52. qui ex peſtifero carbone quatuor diebus obiit ſiticuloſus. Quare colligamus ſitim in acutis morbis immoderatam numquam bonam, ſæpe malam, & cum ſignis aliis malis peſſimam & exitialem.

Sitis immoderata quid in morbis acutis notat.

CAP.

CAP. XVII.

Quid ſitis ſublata, ſeu non ſitire in morbis, ſignificet.

QUuid ſitis in morbis ſignificet, dictum eſt. Nunc contrario modo ſe habentes ægrotos, quippe non ſitientes; vel abſque ſiti eſſe, quid in morbis prænuntiet, cognoſcendum eſt. Perpetuo in morbis ægrotos moderate ſitire, bonum erit, atque ex ratione ſitire & multum & parum, prout natura morbi, aut calidioris aut minus calidi poſtulat. Numquam tamen, ut dictum eſt, in morbis intenſa ſiti aſſiduaque ægros vexari, bonum erit, veluti peſſimum eſt ac ſumme exitiale, eoſdem, ſi calido & ſicco morbo conflictentur, prorſus potus deſiderii eſſe expertes, ſitique omnino carere, & præſertim, qui antea ſitiebant, ſi abſque ratione ſitis illa tollatur. De qua Auctor Prorrheticorum *Lib.* 1. 57. hoc expreſſit, dicens: *Sitis, quæ non ex ratione in acutis morbis ſolvitur, mala eſt.* Galen. *in comm.* hujus rei rationem docens ita ſcripſit: *Quum igitur neque per vomitum, neque per ſudorem, neque per dejectionem, neque etiam per abſceſſum judicatorium ſolvi ſitim contingat, non quod affectio ſedata fuerit, ſed quod ſenſus elanguerit, id ſi fiat, ſignum bonum non eſt, quod & ſi, & lingua ſic manente, uriniſque crudis exiſtentibus, ſitis tollatur, certius adhuc malitiam affectionis dignoveris, atque adhuc ſi Medicus nihil tum refrigerantium, tum humectantium exterius adhibuerit; quandoquidem talia in acutis morbis magis ſitim non tollere, ſed mitigare nata ſint: prorſus autem in acutis morbis malum, ſi ſuis perfecte tollatur.* Ex quibus Galeni verbis, liquido ſatis cuique conſtabit, in morbis acutis peſſimum eſſe, ſi ſitis non ex ratione, quod eſt, ubi nulla optima præceſſerit vacuatio aut purgatio, crudoque morbo exiſtente, tollitur: omnium vero maxime exitioſum erit non ſitire, ſi exitialia ſymptomata una apparuerint. De qua quidem exſtincta ſiti, Galen. *in primo lib. Epid. Com.* 2. *text.* 75. hæc addidit: *Huc acceſſit ad cumulum aliud ſignum exitioſum, quod quum antea æſtuaſſent, amplius non ſitirent, atqui quando, qui antea ſiti flagrarent, poſtea eſſent a ſiti liberi, horum duorum ſit neceſſe eſt alterutrum, aut morbi ſolutio, aut virtutis exſtinctio, ita ut præſentia mala amplius non ſentiant. At non contingit a morbis his vindicari, ſiquidem exitialia erant ſymptomata.* Non ſitiunt vero ægroti in morbis acutis, aut propter humorem frigidum & humidum, ad ventriculum ex capite diſtillantem, ex quo merito Hipp. *Aphor. Sect. IV.* 5. dicebat. qui tuſſiunt, non eſſe admodum ſiticuloſos, quod in his pituita ex capite ad ventriculum diſtillans ſitim tollat; quæ carentia ſitis in nonnullis pleuriticis & perineumonicis obſervatur: in quibus ab hoc ſigno quicquam certi ad prognoſticum habere nequimus. Sed hos ab ea cauſa non ſitientes ab aliis diſtinguet lingua non ſicca & arida, ſed humecta; & mollis ex pituita humectante ipſam. Secundo non ſitiunt in morbis calidiſſimis, vel etiam æſtuantes ægroti, aut propterea quod delirantes, quæ patiantur, ut Galen. *in 3. Epid. com. 3. text.* 44. docet, non intelligant, aut quod facultas ſtomachi appetitrix exſtinguatur, aut propter utramque cauſam. De phreniticis auctor *prorrhet. in lib.* 1. *Text.* 16. ait: *Phrenitici modico utentes potu, ſirepitum tentantes, tremorem incurrunt.* Et Galen. de his *in comm. Prorſus item βραχυπόται ſunt phrenitici, ideſt, bibendi deſiderium his exiguum eſt, quamquam affectionem habeant calidam & ſiccam, ita ut & linguam præmulta ſiccitate aſperam habeant.* Sed docuit nos Hippocr. mentem his ægrotare *in eo Aphoriſmo, Sect.* 2. *Aphoriſm.* 6. qui ita habet: *Quicumque parte aliqua corporis dolent atque ut plurimum dolorem non ſentiunt, his mens ægrotat.* Ex quo merito de phreniticis *in* 3 *Epid. ſect.* 3. *p.* 1085. dixit: *Sane hi nihil*

Sitis ſublata abſq; ratione in morbis acutis mala.

Sitis unde tollitur in morbis acutis.

nihil ſitiebant. Cujuſmodi fuiſſe ait *Mœlibeæ* adoleſcentem phreniticum *in eodem lib. pag.* 1117. *Ægrot.* 16. prodidit. In his vero non ſitire, grave eſt, & ſi cum ſignis pravis, exitiale; tamen ab hoc tantum ſigno quicquam certi non haberi poteſt, niſi alia, ut dixi, adjunxerimus ſymptomata prava. Nam plures ſunt, qui, etſi delirent, potum non petant, tamen ſanantur. Hique ſunt quorum neque delirium ita magnum eſt, neque alia exitialia affuerint ſymptomata, atque multo facilius, ſi lingua neque arida ſit. In quibus vero nedum præarida, ſed maxime nigra & ſqualida, ſumme exitioſum erit non ſitire, maximum enim morbum adeſſe denotat, quo ægri laborant, naturamque ferme ſuperatam. Quibus vero abſque delirio in morbo calidiſſimo, linguaque præarida & aduſta exiſtente, adeſt hæc carentia ſitis, proculdubio exitium portenditur, quum exinde facultatem exſtingui, ac eſſe exſtinctam, nobis demonſtretur; omniumque maxime, quum prius ſitierint, abſque ratione ſiti carere incipiunt, exſtingui enim facultatem certo ſignificatur. Neque abs re hoc dicimus, quando naturam exſtingui a morbo fieri non poſſit, ut plura alia exitialia non etiam ſpectentur. Uti *Eræſino* contigit, de quo Hippocr. *in* 1. *lib. Epidem. comment.* 3. *pag.* 984. *Ægrot.* 8. hæc habet: *Habebat hic febrem cum perpetuo ſudore, hypocondria ſublimia contenta cum dolore, urinæ nigræ, ſuſpenſiones continebant rotundas, non ſubſidebant: linguæ prærida, non valde erat ſitibundus:* & de Hermocr. *in* 3. *Epidem. comment.* 1. *pag.* 1062. *Ægrot.* 2. *Lingua initio aduſta fuit, ſtatim obſurduit, ſomnum non habuit, ſitibundus non admodum:* Et paullo poſt: *Vigeſimo perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat, obdormiſcebat aliquantiſper comatoſus.* Idemque & in *Euryanactis filia virgine Eodem lib. pag.* 1073. *Ægrot.* 6. obſervavit. Ex quibus colligamus, perpetuo non ſitire ægrotos in acutis morbis, malum eſſe, modo ſine ratione ſitis in ipſis tollatur. Ex ratione vero ſitis ſublata, minime mala, ſed optima eſt, qualis fuit viſa in eo, qui in *Dealcis* horto decumbebat, ſanato, qui quum pluries in eo morbo fuerit ſitibundus & delirans, poſtea ex ratione ſublato morbo amplius non ſitiit, de quo Hippocrat. *in* 3. *Epidemior. comm.* 1. *pag.* 1067. *Ægr.* 3. ita habet: *Vigeſimo dormivit, plane mente conſtabat, ſudavit, liber erat a febre, non ſitiebat*. Hic plures criſes habuit, quæ antequam fierent, ſitiebat, lingua inareſcebat, delirabat, & poſtea allevabatur, ſitiſque diminuebatur, & hoc eſt ſitim ex ratione minui, & tolli. Cum ſignis vero aliis pravis, peſſimum & mortiferum eſt non ſitire. Quæ nobis ſufficiant de prædictione ex non ſitire in morbis acutis.

Sitis quando ex ratione tollì dicitur.

FINIS QUARTI LIBRI.

PRO-

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS

Philoſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum ſimplicium Profeſſoris ordinarii,

DE PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER QUINTUS.

CAP. I.

De partibus corporis, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem.

DE partibus corporis, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem, quum ex appetentia docuerimus, quomodo de morborum exitu ſit præſagiendum, nunc ex nutritione idem faciendum: quam maxime enim iſtud nobis indicabit quum totius corporis, tum ſingularum partium accurata inſpectio ac obſervatio. Habitum etenim, temperamentum, atque colorem eæ partes ex nutritiva facultate, aut recte, aut male diſpoſita habent. Ex quo, ut dictum eſt, quum totius, tum partium ſingularum varii habitus, temperamenta, colores, figuræ, atque alia, quæ ad prædictionem a Medicis obſervantur, ad naturalem quidem facultatem pertinebunt, quatenus ex ipſa aut ſana, aut male affecta prodeant, aut quatenus hujus facultatis, ſed potiſſimum nutritivæ, robur ac debilitatem nobis ipſa denotare poſſunt. Quare ab inſpectione externarum corporis partium ſalutis, exitiique futuri judicium nunc quoque indagabimus. At priuſquam hoc agamus, cognoſcendæ ſunt partes eæ, quarum inſpectio ad prædictionem maxime facit. Primum univerſi corporis inſpectio, an ſcilicet ipſum naturalem quum habitum tum colorem, tum calorem habeat; an gracilius, aut craſſius, aut felle ſuffuſum: poſt corpus, faciem ſpectabimus, mox ſigillatim oculos, maxillas, naſum, os, labia, dentes, fauces, linguam, pectus, dorſum, hypochondria, ſecur, lienem, teſtes, adenes, extrema, atque partes, in quibus tumores ac abſceſſus fiunt. Caput enim univerſum in ardentibus febribus, in phthiſicis ſuppuratis, gracillimum ſpectatur; in iis vero, quibus calor naturalis in hepate maxime reſolvitur, corpora intumeſcere obſervamus, ut in cachecticis atque hydropicis. Facies vero, oculi, tempora, maxillæ, naſus, os, lingua, dentes, aures, in acutis morbis plurimum lucis addunt, ad vitam aut exitium prævidendum, veluti fauces, cervix, collum, pectus, in anginoſis, pleuriticis, peripneumoniciſque utiliſſime ſpectari ſolent. Hypochondria itidem, ac denique extrema, maxime poſſunt futuri præſagii rationem illuſtrare. Sed agæ, hæc jam aggrediamur.

Partium corporis obſervatio quid ad præſagium in morbis facit.

CAP.

CAP. II.

Quid corpus bene valenti simile, & dissimile in morbis prænuntiet?

Corpus ægrotum simile naturali seu recte valenti habitu, colore, caloreque, optimum est, atque eo laudabilius, quo similius: quod in morbis necesse sit corpora pati, aut quidem extenuari, gracilescere, contabescereque a morbo consumente & corrumpente partes corporis carnosas, aut, ut scripsit Galen. calore nativo debilitato, qui non extendi ad extremas corporis partes queat, sed in visceribus solis exiguus observetur. Ex quo tantum sanguinis aut spiritus non affluat, quantum antea affluebat. Hinc cessare seu minui nutritionem. Quamobrem in omnibus morbis, sed præsertim in acutis, bonum est, corpora habitu, colore, caloreque recte valentibus spectari similia. Verum ex hoc tantum signo prognostici judicium non erit attendendum, sed si una alia omnia conspecta quum symptomata, tum signa, idem confirmarint. Optimum tamen est, non parumque ad spem sanitatis concipiendam faciens, ut dictum est, corpora habitu, colore, atque calore recte valentibus esse prorsus similia. Quemadmodum dissimilia spectari, etsi non magnum malum sit, quod omnes, qui ægrotant, necessario habitu, colore, caloreque mutentur, tamen numquam bonum. Pessimumque in principio acutorum morborum est, corpus extenuatum ac maxime contabescens videri, vultusque præsertim seu facies, quod facilius ipsa aliis partibus mutetur. Ceterum, ut ordinatim in prædictione hac ex habitu corporis, colore, atque calore cognoscenda procedamus, primo videndum erit quid squalidus, siccus, excarnis, ac tabidus in morbis præsagiat. Mox ex mutato ipsius quum colore, tum calore, idem perscrutabimur.

Corporis ægroti habitus quinam optimus.

Quinam pessimus.

CAP. III.

Quid in morbis corporis emaciatio, seu extenuatio, & quid ejusdem partes tumefieri, significet?

In morbis quandoque corpora extenuari, gracilescere, atque in tumorem attolli observamus, quæ habitus cognitio ad prædictionem magni momenti, atque usus est. Proinde primo quid corporum habitus gracilis, squalidus, tabescensque significet in morbis, dicemus, & mox de oppositio quippe tumescente: corpora vero gracilescere & contabescere, ob innutritionem, quam Græci *atrophiam* vocant, cuique liquido constat, ex quo hunc affectum Græci *atrophiam*, etiam nostri innutritionem, merito appellarunt; in qua, teste Galen. *in libro quarto, cap. 13. de sanit. tuenda* corpora ex alimento fructum non sentiunt. Quod fit alteratricis virtutis imbecillitate, attrahente vi infirma, aut excretrice immoderatius mota. De hac Hippoc. *in secundo Aphorismorum. Aph.* 8. ait: *Si quis a morbo cibum assumens non corroboretur, pluri alimento corpus uti significat: quod si non assumenti cibum hoc accidat, scire oportet, quod indigeat evacuatione.* Et postea *Aph.* 31. *Section.* 2. quum dixit: *Ejus qui ex ægritudine bene cibatur nihil proficere corpus malum*: atque hæc est *atrophia*, seu innutritio, quæ potius in corporibus spectatur, quæ aut non febricitant, at febre leui, sed diutina teneantur. Quamobrem in morbis longis & diutinis, etsi proprium sit corpora emaciata, atque excarnea videri, tamen si morbo declinante, nihil, etsi cibum assumant, reficiantur, malum est, quod plerumq; humorum plenitudinem,

Corporis emaciatio quid in morbis significat.

atque exinde recidivam, prædicit. Sed in hecticis, phthiſicis, peripneumonicis, corpora numquam carne repleri & reſtitui, peſſimum eſt: a ſputo ſanguinis, ubi orta febre leni, ſed aſſidua, corpora contabeſcunt, numquamque habitum carnoſum recipiunt, exitiale eſt. Hocque eſt, quod in ſuſpectis ad phthiſin omnes Medici ſuſpectum quam maxime habent, quippe febre continua laborare, ipſorumque gracilitatem ac extenuationem non emendari, atque mutari. Qui etiam febribus ardentibus diu vexati maxime emaciantur, ad maraſmodes febres accedentes, inſanabiles redduntur. Quare tabeſcentiam in corporibus, ſeu gracilitatem, ſeu extenuationem in pleuriticis, peripneumonicis non recte purgatis per ſputa tuſſi ejecta numquam emendari, letale eſt, phthiſicoſque evaſiſſe nobis ſunt indicio. Sed age, agamus de extenuatione in acutis morbis, & per initia in corporibus obſervata. Quæ ſane ad prædictionem magni momenti eſſet ſolet. De qua Hipp. *in 2. lib. Aphoriſmorum*, 28. ita habet: *Febricitantium non omnino leviter permanere corpus, & nihil minui, vel etiam pluſquam ratio poſtulat contabeſcere, malum. Hoc ſiquidem virium imbecillitatem, illud morbi diuturnitatem ſignificat.* Hippocrates, & Galenus in commento voluit, eam, quæ eſt cum ratione extenuationem, ſignum eſſe imbecillitatis.

Cum ratione vero eſt, ut febres magnæ & intenſæ citius corpora extenuent, ſicut & morbi diuturni idem faciunt, omniumque facillime puerorum, atque decrepitorum. Hæc enim, teſt. Galen. propter potentiæ imbecillitatem, illa propter temperamentum calidum & humidum, quo multum defluunt, & cito extenuantur. Addamus & regiones ac anni tempora calida & ſicca. Quare cum ratione hæc extenuantur: non minuſque etiam, ſi præceſſerit multum ſanguinis profluvium, aut ſudores multi, urinæ copioſæ, vomitus aut alvi profluvium, aut longa inedia, vigiliæ, animi curæ, addit Galen. corporis raritatem humorumque tenuitatem, cauſam eſſe, cur cito & multum corpora diffluentur & extenuentur. Hæc itaque omnia corpora conſumunt, atque extenuant, quorum extenuatio quicquam certi non oſtendit ad futuram prædictionem. Sed in initiis morborum, nulla illarum externarum cauſarum præcedente in corporibus frigidis, ſiccis, in hieme, frigidaque cæli conſtitutione, in ætate vigente, atque in corporibus craſſiorum humorum, denſioris cutis, peſſimum eſt ſubito extenuari corpora. Quam rem Galen. *in commento hujus Aphoriſmi* ita ex Hippocrat. *Lib. 2. Aphor.* 28. expreſſit, hujus rei cauſam reddens: habet enim: *Febricitantium non omnino leviter permanere corpus, & nihil imminui, vel pluſquam ratio poſtulat, contabeſcere, malum.* Nam permanere ex cutis ſpiſſitudine accidit, & craſſitudine humorum, & propterea longitudo morbi ſignificatur. Ceterum ex omnibus corporis partibus prima eſt facies, quæ extenuetur in morbis acutis, quoniam calor acris inſtar flammæ ſurſum aſcendens, abſumit parvas carunculas, cartilaginibus & oſſibus incumbentes, atque in facie evidentius ea macies apparet, quod ipſa minus carnis habeat. Quam Hippocr. *in 4. prognoſt. pagin. 36. lin.* 30. ita expreſſit: *Fuerit autem hujuſmodi naſus acutus, cavi oculi, tempora adſtricta, aures frigidæ, contractæque & fibræ eorum verſæ, & item cutis circa frontem dura, intenta, arida. Color totius viridis aut niger.* Hæc in hecticis & phthiſicis maxime extenuatis apparet. Hanc vero faciem intra biduum aut triduum ita extenuatam, quam vulgus medicorum *Hippocraticam* vocare ſolet, peſſimam eſſe, ſi nulla extrinſeca cauſa præceſſerit, quippe nulla inſignis vacuatio aut ſanguinis, aut per ſudores, aut per alvum, aut denique per urinas; nulla etiam vigilia, nulla inedia, nullaque animi cura, non in pueris & ſenibus decrepitis, qui facile vel etiam levi cauſa reſolvantur, ſed in corporibus adultis, ſpiſſi habitus, omniumque maxime in frigidis & ſiccis, in hieme, con-

Facies cur ex omnibus corporis partibus prima extenuatur in morbis acutis.

Facies extenuata quanam peſſima in acutis morbis.

me, constitutione frigida & humida, & simili cœlo. In his itaque faciem ita extenuatam spectari, summe est pernicioſum. Galen. enim ait *in commento*, fieri hujusmodi affectiones ob aliquam causam consumentem, & corrumpentem partes animalium carnosas, aut ob debilitatem nativi caloris, qui non insuper extendi in extremas corporis partes queat, sed in visceribus solis exiguus observetur, ex quo tantum sanguinis, aut spiritus, ad extremas corporis partes non affluat, quantum antea affluebat. Quare ex morbo, humidum nativum statim, aut calore præintenso resolvente, aut præ malignitate corrumpente; nativoque calore a morbi vi statim languescente, aut reddito imbecillo, fit hæc in facie extenuatio: si itaque non ex ratione, quippe ubi nulla inedia, nulla vigilia, nullaque animi cura præcesserit, hujusmodi facies ita conspecta, exitialis erit; quod Hippocrates *Prognostic. pag. 37. lin. 1. & seq.* expressit hisce verbis: *Si igitur per initia morbi talis fuerit vultus, necdum scrutari aliis signis possibile sit, interrogare oportet, num vigilaverit homo, an alvus resoluta admodum fuerit, an fame affectus, & si quid horum comprobet, minori cum periculo est: judicantur vero talia per diem & noctem, si ob has causas talis fuerit vultus, si vero nullum horum dixerit, neque prædicto tempore destiterit, exitiosum est.* Quo pacto vero quis possit cognoscere absque eo, quod interroget ægrotum, num homo vigilarit, num fame affectus sit, aut aliquam immodicam vacuationem purgationemque passus sit, hisce profecto verbis *in Comm.* docet Galen. dicens: *Quapropter licebit statim aspicienti hominem definire vehementem extitisse insomniam: etenim videbis oculos ejus admodum squalidos.* Qui vero propter evidentes & immodicas vacuationes, perinde ac propter insomniam, tales redduntur; porro videbis palpebras resurgere difficulter, & item talem habere formulam in connivendo, atque etiam & instabiles haberi, quales per somnum obstupidum, (ita enim *coma* interpretor,) existunt: quin etiam ubi nunc primum tibi appareat æger, tum vero nullo pacto, quum inspexeris, talia signa, atque ea, quæ ex pulsu percipiuntur, aliquam indicabunt dijudicationem: per immodicas enim excretiones servabit aliquod adhuc (quamquam exiguum sit) indicium formulæ significans eas, per insomniam vero chordulæ extentæ speciem referet. At si propter inopiam dumtaxat in talem vultus venerit affectionem, ex dictis indiciis neutra adsunt, neque insomniæ, neque excretiones, & ob eam rem potius ex accidentibus, quam ex propriis signis, in illis præsagire conveniet, propter inopiam alimenti deductum esse eum in talem affectionem, & adhuc magis, quoties febris proprietatem caloris discutientis, exquisita ratione consideranti tibi, nequaquam importet. Ex quibus quisque perdoctus poterit cognoscere, quibus vultus fuerit aut propter vigiliam, aut inediam, aut propter evidentem & immodicam evacuationem, extenuatus. Quare in acutis morbis per initia, absque aliqua causarum extrinsecarum, faciem extenuatam spectari, exitiale est. In Chronicis vero aliquibus, veluti in hecticis, idest, consumtis, phthisicisque, nedum facies ossea fere redditur, sed universum corpus excarne, squalidum & siccum redditur. Sed age etiam, quod corpora tumida in morbis fieri significet, consideremus. Inflari enim ac tumescere corpus, numquam bonum: in morbis enim acutis tumescit facies, aut propter sanguinem in vasis, qui venas distendit, sanguinisque plenitudinem, ac vapores, unde etiam totius corporis gravitas existit, ut in synochis febribus; vel propter inflammationem cum humoris affluxu, ut in parotidibus; denique propter cruditatem vaporosam, refrigerato hepate, ac vitiata sanguificatione, ut in pituitosis febribus, & leucophlegmatia, seu anasarca hydrope. Ex primis duabus causis tumefieri non usque adeo malum est, neque ex hac quicquam certi ad prædictionem habetur; veluti po-

Facies unde cognoscitur tumefacta a vigilia, absque eo, quod interrogetur æger. Ut ab immodicis evacuationibus.

vel ab inedia.

Corpora tumida in morbis quid significant & unde.

ſtrema cauſa, quippe a craſſo vapore; hepate quum refrigerato, tum vitiata ſanguificatione, cutim diſtendente, non raro exitium prænoſcitur. Qua ratione ait auctor Coacorum præſagiorum *in* 4. *Coacor. præſ. Text.* 139. lethargicos eſſe ſubtumidos, ipſiſque genas inflari. Non minus etiam, hac eadem cauſa refrigerato hepate in morbo calidiſſimo, ejus viſceris calorem innatum diſſolvente, in acutis mordis hypocondria, venter, pedes, coxendix, faciesque vitiantur non ſine magno ipſorum vitæ diſcrimine. Cujuſmodi ſunt, qui in hydropem incidunt. De qua Hippocrat. *in* 2. *Prognoſticorum*, *pag.* 39. *lin.* 16. *Aqua inter cutem omnis, ſi ex acuto morbo exiſtit, malum eſt: non enim ſedat febrem, ſed dolorem admodum infert ac mortem; ſereque incipit ex parte inani, ac lumbis, jecoreque.* Quid de Empyis ſeu ſuppuratis, phthiſicis, in quibus moribundis multis pedes, crura, facieſque tumida, & cadaveroſa ſpectatur? quod non aliunde evenit, quam ex calore hepatis prælanguente, vitiata ſanguificatione. Plures ex iis cognovi propius ad mortem acceſſiſſe, quum corporis univerſi molem inflatam ac tumidam habuerint. Ex quibus colligo in morbis acutis corpora inflari, numquam bonum; in Empyis, ſive ſuppuratis, atque in phthiſicis, maxime exitiale. Sed tamen, neque in acutis, neque multo minus in diuturnis morbis, tumidas partes ſpectari, perpetuo malum: in his quidem multis, longo quippe morbo debilitato calore, pedes intumeſcunt, qui calore poſtea invaleſcente rurſus diſcuſſis vaporibus, vel humoribus ſiccatis, priſtino habitui reſtituuntur. In illis vero ſæpius natura humores decretorie ad crura pedeſque demittere ſolet. Aliquando etiam in iiſdem acutis morbis facies tumet, vapore, ut dictum eſt, febrili calore concitato, neque diſcuſſo, quo cito poſtea diſcuſſo inflatione liberantur. Proinde caute ex his prædicendum erit in morbis, & nonniſi ceteris aliis ſignis vultus probe conſpectis, & conſideratis. Atque hæc erant a nobis cognoſcenda ad prædictionem ex corporibus, ipſorumque partibus extenuatis, contabeſcentibus, atque in tumorem elatis. Nunc ex colore mutato idem perſcrutemur, quæ forte cognitio non erit minoris uſus ac momenti, ad præſagiendi rationem aſſequendam.

Facies unde tumet aliquando in acutis morbis.

CAP. IV.

De prædictione ex coloribus corporis ægroti.

QUum ex habitu corporis, quomodo ſit prædicendum, dixerimus, nunc idem ex variis coloribus indagemus. De quibus acturi, primo a coloris mutatione incipiemus, quidque hæc coloris mutatio in morbis præſagit, docebimus, mox ſtabiles ac permanentes colores conſiderabimus. Corpora colore mutari dicimus, quum vel crebrius, aut rarius ex proprio nativo colore in alium mutantur, ut quum color floridus in pallidum, aut albam, aut flavum, aut æruginoſum, aut viridem, aut plumbeum, aut denique nigrum mutatur. Hæc vero coloris mutatio, quandoque ex ratione fit, quandoque citra rationem, quæ eſt peſſima, numquamque bona, niſi criticum ſignum fuerit. Tunc enim corpora morbo oppugnata quum in ſuo robore perſiſtunt, morbique pugnæ non ſuccumbunt, nativum ac proprium colorem habent, ſanguineique propterea rubram faciem, bilioſi pallentem: quum vero morbo fere oppugnantur, ex florido colore pallidum, aut flavum, aut alium colorem recipiunt. De quibus, quid potiſſimum ſinguli ſignificent, poſtea dicemus. Cognoſcitur critica hæc coloris mutatio ex ſignis aliis criticis, ac ſignis coctionis, quando, ſi Galeno credendum ſit, nul-

Corpora quando colore mutari dicuntur.

Corporis coloris mutatio critica.

Unde cognoſcitur.

ſit, nulla criſis bona appareat, cruditatis ſignis conſpectis, quod neceſſe ſit, criſes coctiones præceſſiſſe. Galen. *in lib. de præſag.* ad Poſthumum, in *juvene quodam Romano* ex facie prærubra, præſertim erupturum critice ſanguinem e naribus præſcivit. Ex ratione vero color corporis quandoque mutatur, variatis quidem morbi acceſſionum temporibus, ut quum in principio rigentibus, aut horrentibus, aut refrigeſcentibus, pallidum, aliquando album ac fuſcum colorem contrahunt, ex quo augeſcente acceſſione ad priſtinum redeunt, & mox vigente coloratiores redduntur, ac denique ad ſolitum redeunt colorem. Mutari itaque colorem ex ratione caloris, bonum: mutari itidem ſæpius ratione bonæ criſis futuræ, bonum: quæ etiam aliis ſignis produntur, ſed præſertim, ut dictum eſt, coctionis, ac aliis bonis ſignis ſimul, aut antea conſpectis. Melior quoque erit coloris mutatio, ſi ex colore malo in bonum fiat, uti quum partes nigreſcentes aut liveſcentes, vel flavæ, vel virides in pallidum, aut floridum nativum quippe reſtituantur. Contra vero omnes mutationes nulla ratione aut coloris aut criſis factæ, erunt damnandæ omniumque maxime cum malis ſignis, ſpeciatimque cruditatem explicantibus, conſpectæ, & quæ ex bono colore in deteriorem fiunt. Sed age explicemus, quid colores modo in corporibus ſignificent, a rubro exordientes. Hic color ab uno humore fit, quippe a multo ſanguine, cutim afficiente ſeu tingente, ex quo merito Galen *in 4. libro de ſanit. tuen.* tradidit, rubrum colorem ſanguinis abundantiam ſignificare. Ex quo rubram faciem, vel inflammationem teſtari ad cutem illatam, aut criſin ſanguinis e naribus fluxuri, cujuſmodi diximus Galenum in *juvene illo Romano* coram aliis Medicis prædixiſſe. Sed hoc non fiet, ni prius coctionis ſigna quædam & bona illuxerint. Ceterum, crudo morbo exiſtente, ſi facies rubeat, timenda erit inflammatio capitis, atque præſertim phrenitis, quum demonſtretur ſanguinem ſurſum in caput agi, ipſumque inflammare; de quare Auctor Prorrheticor. *Lib.* 1. 49. & *in* 1. *de hum.* (*Lib. de Humoribus pag.* 47. *lin.* 1. *ubi ait: Calor humorum, niſi hi ad interiora reſorpti ſint, velut efflorescit in cute.*) *com.* 1. ſcripſit, *Faciem rubram cum mæſtitia, malum*: propterea quod calidæ affectionis ſit ſignum, Galeno docente, qui ita de hac ſcribit: *Quum itaque florida quidem apparuerit facies, æger autem valde triſtis fuerit, quædam in cerebro valde calida affectio eſſe videtur, quæ ſanguinem exurit, eaque cauſa bilem atram, ut demonſtratum eſt, gignit.* Plerumque abſque ſignis coctionis, & cum malis ſignis phrenitidem præmonſtrat; neque immerito, quum ſanguinem ferri in caput, ipſumque inflammare rubra facies ſignificet: quod ſignum erit ſatis manifeſtum, ubi per alvum, aut per menſes, aut per hæmorrhoides ſanguis profluxerit, manente tamen eodem rubro colore in facie. Quod perbelle in *Coacis præſagiis Text.* 465. ita ſcriptum eſt: *Dyſenterica rubra, limoſa, larga excrementa alvi, in flammeis valde rubicundis coloribus, ſoluta, inſaniæ timorem inducunt.* Aliquando ſignificat convulſionem, ut in pueris, de quibus in *lib.* 3. *Coac. præſ. Text.* 109. hæc leguntur: *Pueris acuta febris, alvi ſuppreſſio cum vigilia ad hæc excalcitratio & coloris mutatio, multus rubor, convulſionem ſignificat.* Solet vero rubor faciei, ut dictum eſt, ſi ſigna coctionis fuerint conſpecta, denotare criſin futuram per ſanguinem e naribus: aliquando poſt aures judicatoriorum abſceſſuum eſt ſignum, ut Galen. *in eodem* 2. *libro prorrheticorum text.* 14. (*Hippocratis textus huc ſpectans legitur* 1. *Prorrheticorum* 165. & *Coacis præſagiis* 183.) ſcripſit: de quo ſigno in *Coacis præſagiis*, *Text.* 200. *Rubores, qui ad aures ex priori dolore fiunt, in febribus ſignum quidem ſacri ignis, qui exiſtit in facie. Sed & convulſiones ex iis incidunt cum privatione vocis & virium exſolutione.* Sed hæc eſſet admodum improbanda, nimirum ſi ei prædicta ſymptomata copularentur. Rubor etiam in faucibus, cervice ac pectore,

Corporis color quando ex ratione mutatur.

Corporis coloris mutatio quænam bona.

Corporis color ruber unde & quid notat.

Facies rubra quid in acutis notat.

Quænam mala.

Quando Phrenitidem præmonſtrat.

Convulſionem.

Criſin futuram per ſanguinem e naribus vel per parotidas.

Rubores variarum partium quid notant.

in anginosis solet esse admodum salutaris, si cum tumore multus appareat, de quo Hippoc. *in lib. 7. Aph. 49.* habet: *ei qui ab angina corripitur, si tumor & rubor in pectore supervenerit, bonum; extra enim vertitur ægritudo.* Et *in lib. 5. Prognostic. pag. 45. lin. 12. Si quibus vero fauces rubent, & cervix simul, hæ anginæ diuturniores sunt, & maxime ex eis servantur, si & cervix, & pectus traxit ruborem, nec sacer ignis intro recurrat.* In anginosa tamen, quæ ab Hippoc. *in lib. 3. Epid. pag. 1075. Ægr. 7.* describitur, etsi lingua & collum & pectus una cum rubore intumuerit, nihilominus, quoniam tota inflammatio extra non fuit versa, mortua est. Addamus in acutis morbis, si rubores in brachiis ac cruribus fiant erysipelatodes, bonum erit; quippe quod naturam fortem esse, ac longius, ad ignobiles scilicet partes, noxios humores propellat. In febribus ardentibus, synochis malignis, non raro maculis rubris dorsum ac aliæ partes corporis infectæ spectantur, quæ quo copiosiores eo pejores, ni morbum minuant. Ceterum de his posterius nos accurate, ubi ad prædictionem absessus, tumores & exanthemata con-

Corporis color flavus unde, & quid notat.

siderabimus. Colorem vero flavum fieri a bile flava, cutim afficiente, non est dubitandum. Ceterum solet esse aliquando bonus, ubi critice ad cutim flava bilis pellitur, cujusmodi fit in ictericis, de quibus in sequenti capite agemus; aliquando malus & perpetuo, ubi non critice, unaque aliis malis signis apparentibus. De quo Hippocrat. *in 1. Prognost. pag. 36. lin. ultim. text. 10.* de facie exitiosa loquutus, scripsit: *& color totius vultus viridis aut niger*; & Galen. minus malum esse, vultum chlorum seu viridem videri, quam nigrum. In venenatis solent virides colores spectari, quum a

Viridis

summa humorum fiant corruptione. Ex quo Galen. *in lib. 5. de loc. affect. cap. 7.* quempiam meminit vipera demorsum, cujus corpus peracri colore infectum se vidisse testatur. Album vero & pallidum fieri, aut calore in-

Albus.

tus recurrente, aut quod corpora sanguine frigido & pituitoso abundant, sed in acutis morbis corpora expallescere solent, nedum calore intus recurrente, sanguinisque inopia, aut ipso calore exstincto, qui color propter hanc causam mortuis solet esse familiaris. Auctor Coac. præsag. *Text. 212.* ait, *vultum pallidum esse exitialem.* Sed hoc erit cum aliis signis confirmandum.

Pallidus

Pallor vero exstincto calore qui fit, & pauco-sanguine, vel ex eo cognoscitur, quod postea in lividum, & tandem nigrum mutetur, quod in emortuis corporibus facile spectari poterit, quæ primo putrescunt, mox livescunt & nigrescunt; qualis ab Hippocrat. *in quinto Epid. Text. 61. pag. 1156.* in eo, cui hepar jaculo percussum est, fuit observatus, de quo ait, *statim color, qualis mortuorum, diffusus est*, qui statim obiit. De livido colore, &

Lividus.

nigro, quid dicemus? pessimos esse colores in morbis acutis, atque exitiales, qui nonnisi a summa humorum putredine nascuntur, aut calore nativo exstincto. Sciunt Medici omnes praxin facientes, in acutis morbis in dorso, lumbis, pudendis, naribus atque aliis partibus, maculas quum lividas tum nigras sævam ac veluti pestilentem putredinem humorum testari; inque peste affectis has esse ita familiares, ut ex ipsis tantum merito pestilens natura comprehendatur, quod inspectis maculis lividis, aut nigris, in iisce partibus corporis, sed potissimum in pudendis, (quod signum ex Hippocrat. *in 1. Coac. præsag. text. 29.* (*An Text. 66. aut 489.*) Thucydide, & Galeno pestis proprium esse, quo inspecto in emortuis corporibus, pestem grassari sit dicendum, Franciscus Stabilis in particulari quodam discursu de hac re habito, doctissime demonstravit) pestiferam denotet corruptionem, summeque venenosam. Hæc eadem signa in venenatis solent spectari quod & Galen. *in lib. 6. de loc. affect.* nobis tradidit, quum scripserit: *corpora, a venenis emortua, maculis lividis, nigricantibusque, infecta spectari.* Quare dicamus lividum colorem & nigrum esse fere perpetuo malum;

lum; etsi quandoque critice appareant hæ maculæ, quibus plures quoque servati fuerint, tamen hoc raro contingit, & illis non fidendum prorsus, ni coctionis signa apparuerint, viresque maxime constiterint, in aliis vero morbis, quippe non pestilentibus, colores lividi calorem nativum suffocari denotant, atque etiam nigricantes. De quibus auctor Coacorum præsag. *Text.* 212. *comment.* 10. ait: *Quod si vel labrum, vel palpebra, vel nasus liveat, in propinquo est mors.* Quidam in morituris multis genas lividas observant. Extrema frigida, & livida, in acutis morbis propter eamdem causam esse exitialia, posterius, ubi de prædictione extremarum partium agemus, accurate demonstrabimus, quod hæ partes nonnisi exstincto calore liveant. Non minoris sed majoris periculi erit color niger conspectus, qui fiat a majori quoque nativi caloris exstinctione, de quo Galen. *in* 1. *Prognost. comm.* 9. ait: *At vero coloris mutatio pessima est, quoties ad nigrum existat, utpote sanguine refrigerato, quemadmodum ubi foras effusus sanguis congelatur.* Demum dicimus, nigrum lividumque colorem non solum a corruptela humorum, aut a caloris nativi exstinctione, (quod omnium est pessimum, quibus ita conspectis mors sit inevitabilis:) sed conspecti hi cocolores a venenosa putredine, aliquando ubi natura critice propellit, spem salutis nobis videntur polliceri; aut humore melancholico atro ad cutem transmisso, quæ transmissio si critica fuerit, bonum prænuntiabit: quo tempore necesse est, coctionis in humoribus signa illuxisse, & quæpiam item bona signa; quod si ita non fiat, magnum quoque malum minatur in acutis morbis. Sed quo pacto quis dignoscere queat, nigrum colorem ex humoris decubitu factum, ab eo, qui emoriente calore fit, Galen. *in* 2. *Prognost.* ita docuit: *Nam interdum pars nigrescit, quia materia eo decumbit, interdum, quoniam moritur, seu quoniam modo aliquis internoscat, eam rem perspicue judicabit; si enim facile ferre malum appareat, idest, facile se habeat æger, & item aliquod aliud salutare adfuerit signum, materiæ decubitus est; sin contrarium, mortificatio.* Atque hæc sunt de coloribus, deque ipsorum judicio. Nunc unum restat, quod frequentissime accidit, intelligendum, quippe quid ægrotos felle suffundi in acutis præsagiat.

Niger.

CAP. V.

Quid morbus Regius in morbis prænuntiet?

QUod ex ictericia in morbis plurimum veritatis capiatur ad futuram prædictionem, ideo figillatim de hac agendum duximus. Hunc vero affectum *morbum regium* aliqui appellant, quod in Aulis regum molliter curetur ludis, lasciviaque, per quæ mens exhilaretur; alii *arcuatum* a colore, teste Celso, arcus cælestis æmulo; *icterumque* a volucri galbula concolore; alii & *auriginem* a colore bilis auro concolore. Symptoma est cutis colore vitiato, quod fit, bile utraque ad cutem effusa, hinc ex colore duplex ictericia spectatur, quippe flava & nigra, a flava quidem ac nigra bile, qua cutis suffunditur; cutis vero corporis eo humore, aut una cum sanguine non excreto neque purgato accedente, aut sola natura e visceribus ad cutim protruso. Quod Galen. *in* 4. *lib. Aphorism. Aph.* 62. ita docuit: *Morbus Regius fit aliquando criticos, idest, judicatorie, natura in totum corpus, & præcipue ad cutem, flavam bilem deponente. Fit autem & hujusmodi casus, hepate male se habente. Atque ejus affectiones malæ, ex quibus morbus Regius solet advenire tres sunt, tumor durus, inflammatio, & obstructio. Aph.* 64. Quomodo vero hic affectus generetur, paullo post ita expressit, dicens: *Expurgatio enim*

Morbi regii varia denominatio.

Unde producitur.

in ipso sanguine, & bile translata ex ipsius venis ad meatus bilem recipientes, a Græcis cholodochos *appellatos, sive obstructio fuerit in locis, ad quæ transfertur, sive inflammatio aliqua, vel durus tumor, necessarium omnino, non expurgari sanguinem, sed una cum ipso bilem per totum corpus differri, hinc morbum Regium generari.* Ex qua quidem perspecta generatione apparet, ictericiam in morbis neque omnem bonam neque malam esse, atque ex ipso affectu quandoque salutem, quandoque mortem præsciri posse: exitium, ubi apparet, crudo plane morbo existente, cumque signis aliis malis, salutemque, eodem affectu conspecto, signis coctionis antegressis, atque cum bonis signis. Sed quum isthæc cognitio ad judicium prognostici magni sit momenti, merito accuratius, quando & salutem, & quando exitium prænuntiat, dicendum. Primo bonam esse ictericiam in febribus dicimus, quæ fit, natura biliosum humorem ad cutem critice propellente, quod hic motus sit criticus, & ex recte juvantibus, judicantibusque. Hunc motum antecedunt signa coctionis, a ceterisque ictericis, non a natura critice excernente bilem crassiorem, sed aut vesiculæ fellis attractricis facultatis imbecillitate, aut ejusdem meatuum attrahentium, sive pellentium, obstructione, aut demum hepate læso vel ab obstructione, vel ab inflammatione, vel denique a scirrho, factis, distinguitur. Primo, quod in critica ictericia, urinæ neque sunt ictericorum modo coloratæ, neque croceo colore tingentes, & fæces minime candidæ apparent, ictericorum signorum alterutro pathognomonico. Secundo, hypochondria, sed potissimum dextrum, prorsus tumore & calore vacant. Tertio, coctionis signa præcessisse. Quarto, ubi auriginosus ille color in aliquo dierum decretoriorum illuxerit, atque demum æger recte pertulerit morbum, idest febrem, aut ex toto solverit, aut saltem aliquatenus. Quare criticus motus hic est, qui die critica & antegressis coctionis signis, incidit, sine hypochondrii duritie, cum excrementis & urinis secundum naturam se habentibus, a translatione bilis crassioris in cutem, quæ ad discutiendum contumacior est, siquidem tenuior abit in sudorem, & per insensibilem transpirationem expurgatur: atque hoc est, quod Hipp. *in lib. 4. Aph. 64.* scripsit: *Quibus in febribus morbus regius septimo, vel nono vel undecimo, vel decimoquarto supervenerit, bonum, nisi dextrum Hypochondrium induruerit, alioqui non bonum.* Hipp. itidem superius *Aph. 62.* dixit: *Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum.* Quare regulam præscripsit ut bonus sit ictericus color post diem septimam, & ante nequaquam. Galenus in comment. binos eos jungens aphorismos talem judicii regulam fecit, dicens: *Ante septimum quidem diem morbum accidere regium, malum omnino, post septimum vero, optimum, nisi dextrum ilium obduruerit, idest, nisi aliquis malus affectus ex his, quos antea diximus, visceri seu hepati acciderit.* Quare ex Hippocrate morbus regius bonus erit non ante septimum, sed post septimum, neque id perpetuo, nisi ilium dextrum tumore prorsus caruerit. Significat enim hujusmodi color ictericus, naturam critice ad cutim crassiorem bilem deponere, minimeque id fieri propter aliquem hepatis, vel vesicæ fellis, vel denique meatuum affectum. Diocles non voluit ictericiam a septimo ex toto prodesse. Averrhoes *in lib. 4. collig. cap. 82.* scripsit, se in locis calidioribus vel etiam die quinto criticam bonam ictericiam vidisse. Idem & Celsus: ac vel etiam Plinius, historicus naturalis, ausus est ab Hippocrate dissentire, quum *in lib. 26. hist. natur.* ita scripserit: *Hipp. Ilterum ante septimum diem in febre mortiferum signum esse docuit. Nos scimus vixisse aliquos etiam ab hac disparatione.* Sed Plin. est falsus; quum Hippocr. non mortiferum esse, sed malum, ante septimum in febre morbum regium conspici, dixerit. Sed ratio quidem videtur Hippocrati non favere, quum idem sit, dicere ictericiam post septimum

Prognostic. ex Ictero dubium.

Quando bonum.

Icteri criticimata.

Quo morbi tempore bonus malusve Ilterus, & cur?

Auctorum ab Hippocrate dissensus.

Ilterum.

diem

diem videri in febribus, bonum; & ante hunc diem, malum; perinde ac si dixerimus, bilem crassiorem in febribus bonum esse post septimum ad cutem critice demandari, & ante huc diem, malum. At aliquis dicet bilem hanc posse ante diem septimum & concoqui a natura, & propelli ad cutem, ex quo ante hunc diem ictericia non erit mala. Resolvemus conciliantes hos medicinæ proceres, quod fieri quandoque potest aut ratione loci calidioris, aut temporis, corporis humorem bilioſum ante septimum concoqui, & decretorie expelli ad cutem, veluti idem humor per id tempus concoctus solet non raro per ventrem decretorie expelli, aut evomi, aut per sudorem. Hippocrat. tamen regulam constituit, quod ictericia post septimum, seu septimo, & non ante, optima sit, quod plerumque eo modo recte fiat, atque etiam quod bilioſus hic humor crassior, qui ad cutem deponitur, raro ante septimum probe coquatur, & cum crudo humore existente non possit critice & utiliter expelli, idcirco prudenter statuit, bonæ ictericiæ terminum esse a septima die. Neque ignoravit Hippocrat. quosdam auriginoſos ante hunc diem conspectos sanitati fuisse restitutos. At non scripsit quosdam sexto die auriginoſos, sed tamen alia purgatione adjutos, evasisse. De quibus *in primo Epidemior. com. 2. pag. 951. text. 65.* ita habet: *Erant qui sexto die morbo regio afficerentur, sed his purgatio profuit per vesicam, vel turbata alvus, vel larga sanguinis eruptio, ut Heraclides, qui apud Aristoclidem decumbebat, cui per nares sanguis erupit, alvusque fuit turbata, & per vesicam est purgatus; vigesimo autem die judicatus, longe aliter ac Thanagoreon servus, qui, quum ipsi horum eveniret nihil, periit*: quod *in quarto de ration. vict. in acutis pag. 402. lin. 49. text. 8.* confirmavit quum dixerit: *Cum rigore, in bilioſa febre, ante septimum, morbus regius febrem solvit.* Forte & ii, quos Averrhoes, Celsus, Plinius & alii ante septimum sanatos viderant, alias evacuationes habuerant, illisque adjutos evasisse credendum est; Galen. vero regulam non in die constituit, sed in concoctione humorum, siquidem ait, regulam bonarum excretionum cognoscendarum, ut dictum est, esse concoctionem; quæ si citius appareat, etiam ante septimam diem si conspiciatur in regio morbo, bonum erit: sed quia crassior bilis, cujusmodi est, quæ icterum facit, raro aut numquam in nostro hoc cælo (quod forte in calidioribus locis nihil prohibet aliquando fieri posse) minus quam septem dierum spatio excoquitur; quare criticus morbus regius salutem ostendit, si diebus septimo, aut nono, aut undecimo, aut decimoquarto apparuerit, dextro hypocondrio minime indurato. Hippocr. etiam (ut nuper meminimus) *in lib. 7. de vict. ratione in acut. loco modo allegato text. 8.* hæc habet: *In bilioſa febre, morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus, morbum solvit, si vero absque rigore præter temporis occasionem supervenerit, pernicioſum*: quod idem a nobis prædictum, & declaratum, ostenditur, quando in febribus bilioſis, ut alias a nobis demonstratum est, rigores judicatorii appareant, testantur bonam aliquam vacuationem futuram, aut expulsionem, aut depositionem humoris ad cutem, aut ad aliam partem ignobilem, de quo Hippocrat. merito, *in Aphor. 58.* scripsit: *si febre ardente laboranti rigor superveniat, febris solvitur*. Bona quandoque est etiam sexta vel alia die, ubi una aliqua alia vel plures excretiones bilioſæ apparuerit. Cujusmodi Hippocrat. *in 1. libro Epidem. comm. 2. pag. 951. text. 65.* ut dictum est, observavit. Addamus, nos debere judicium ex ictericia bonum cum aliis bonis signis confirmari. Sed age dicamus, quando ictericia mala & exitialis sit. Plerumque, ait Hippoc. *Lib. 4. Aphorism. 62. & lib. de Crisibus pag. 53. & lib. de vict. rat. in acut. pag. 402. lin. 49.* ante sepitmum visa est mala, non tamen dixit esse mortiferam, ut quibusdam visum est. Sed cum non bonis signis, nullaque alia copiosa vacuatione, exitialis

Conciliatio.

Galeni sententia.

Ictericia quinam mala.

exitialis erit, si ante septimum appareat. Cujusmodi fuit in *Bali filio* teste Hippocrat. *in lib. 7. Epidem. text. 19.* & *in Marito Lechus*, qui prope *Sitodochi* ædes habitabat *Lib. IV. Epidem. text. 25. pag. 1130.* non parum damnanda. Quod Galen. *in lib. 3. Epidem. com. 1. text. 5.* ita expressit: *Nullum abscessum nedum auriginosum ante concoctionem proficere, is enim impeditam significat bilem, quo minus ex viscere expurgetur, & evacuetur per ventrem, vel propter oppilationem ejus, vel inflammationem; morbo autem concocto decretorie interim natura ad cutem excrementum reponit, quum quorumdam aliorum humorum, tum flavæ bilis.* Quare crudo morbo existente, mala est, & hinc sexto die, quod tunc non concoctus sit morbus, malam esse dicimus, cumque signis cruditatis, verendam, & cum malis signis inspectam, prorsus exitialem. Cujusmodi fuit, quam *Hermocrates* habuit, qui obiit eo morbo. De quo Hippocr. *in 3. Epidem. Ægr. 2. pag. 1062. Quinto die reddidit tenues urinas, suspensionem habebant, nec subsidebant, sub noctem deliravit. Die sexto auriginosus evasit, omnia exacerbata sunt, mente nono constabat.* Addidit Hippocr. malas nedum esse ante septimum diem, sed post ipsum etiam, ubi dextrum Ilium obduruerit, ictericias, statuit *lib. 4. Aph. 64.* qui ita habet: *Quibus in febribus morbus regius septimo, vel non, vel undecimo, vel decimoquarto, supervenerit, bonum: nisi dextrum alium obduruerit, alioqui non bonum.* Quum hypochondria tensa, & dura sint, adhuc etiam, si una dolent, sine dubio morbum regium fieri non a natura excernente humorem ad cutem, sed propter affectum illud viscus, aut inflammato scilicet jecore, aut obstructo, aut in tumorem scirrhosum elato. Qui affectus perpetuo malum denotat, atque una cum malis signis, exitium. Nam ictericia ex hac causa sine febre quoque pericolosa admodum est, ex Hippoc. *in 6. Aph. 52.* ita scribente: *Morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum malum.* Multoque magis augebitur mali judicium, in febribus apparente ictero, quando febris calore digerat, & discutiat plurimum illius humoris cutem defœdantis, qui quum perseveret, causam sane, a natura minime vincibilem, adesse denotat. Cujusmodi Hippocr. observavit in *Marito Lechus*, de quo *in lib. 4. Epidem. text. 25. pag. 1130.* ita scripsit: *Maritus Lechus, qui prope Sitodochi ædes ictericus, ad quem septimo die veni, octavo moriebatur, neque urinam, neque dejectionem dimittens, hypochondria magna & dura & spiritus densus.* Verum in omnibus auriginosis attendendum erit, num præcesserint signa coctionis, an quæpiam signa mala illuxerint, hoc enim & crudo morbo existente, si aurigo fiat, exitiale est; veluti cum antegressis coctionis signis, atque cum bonis signis, nullo timore in iis conspecto, perpetuo, quovis etiam die ictericia apparuerit, saltem prænuntiat: sed hisce notis, quod ante septimum appareat raro, merito Hippoc. affirmavit, ante septimum regium morbum malum esse. Supereset. absoluto sermone de prædictione ex colore corporis mutato, agendum de ejusdem corporis calore quoque mutato, de quo quum accuratius *in lib. 2. text. 63.* scripserimus, nihil sane aliud dicemus. Ex quo ad singulas partes corporis spectandas descendamus, quum satis, quum a toto corpore, tum a tota facie, præsagium perscrutati fuerimus.

Quo tempore apparens.

CAP. VII.

De prædictione ex faciei mutatione in morbis.

UT e singulis quoque partibus præsagium venemur, a facie exordimur, da qua etsi nuper plura scripserimus, nunc pauca quoque, quasi ex dictis quædam præcipua ad prædictionem colligentes, addemus. De qua primo

Hippo-

Hippocrates *in libro primo Prognosticorum pag. 36. lin. 26. &c. textu octavo* scribit: *Considerari convenit hunc in modum per morbos acutos principio vultum ægroti, sit ne similis bene valentium, potissimum sui: Ita enim optimus erit: si vero quam maxime contrarius simili sit, exitiosissimus est.* Galen. *in commen.* ait: *Conferendas esse partes affectas cum bene valentibus, quæ si similes appareant, bonum, veluti contrarium ex dissimilibus prædicitur.* At breviter dicamus: Ex facie salutem sperari, quæ in acutis prorsus similis bene valentium appareat. Significat enim morbum neque vehementem, neque malignum admodum esse. Ex mutata vero facie, quod ad habitum ipsum spectat extenuata in morborum non principiis, sed ubi in dies magis progressus sit, quicquam certi non habetur, neque etiam ut Hippoc. in eodem libro *Prog. pag. 37. lin. 1. &c.* meminit, si talis non ex morbo, aut ex alia externa quapiam causa mutata apparuerit, scilicet ex immoderata animi passione, vigilia, aut alvi dejectione, aut fame, sive inedia, aut animi passione, qua antea fuerit usus; a quibus sane causis sæpius facies extenuatur. Proinde quicquam certi ad prædictionem isthæc faciei ab istis causis facta extenuatio non habebit. Ex colore vero, facies coloratior quandoque bona erit, utpote quum nobis criticam sanguinis excretionem e naribus futuram prænuntiat, quod quidem firmius denotare sperabimus, si notæ fluxuri e naribus sanguinis aderunt. De quibus in *quarto libro Coac. præsag. text.* 142. scriptum est: *Quibus febricitantibus rubores in facie; & capitis vehemens dolor, venarumque pulsus, iis ut plurimum fluor fit sanguinis.*

Facies sanæ similis bona. Dissimilis incerti prognostici.

Coloratior quando bona.

Sed aliæ omnes erunt attendendæ simul, cujusmodi esse solent, splendores & fulgores, caligineſque, oculis obversari, cum facie rubra, capitis non raro dolor tensivus, & gravans, hypocondria tensa sine dolore, difficilis respiratio. Quod præsagium olim Galen. in *juvene Romano* coram Romanis multis Medicis habuit, de quo *in libr. de præsag. text. 13. ad Posthumum* hæc habet: *Dum Medicis hæc admiranda videntur, æger lecto se sustulit tamquam prosiliturus, interrogatusque, cur exsilire voluisset, quum nihil adesset ob quod id facere debuisset; rubri coloris serpentem, per laquearia repentem, a se visum expaviſſe respondit, ne si aliquo modo aberrasset, supra se ferretur, atque idcirco e lectulo aufugere velle: reliquis nihil ad futurum sanguinis fluxum conferre visum est: mihi vero quum alia singula perpendenti tum ruborem, qui prius in dextra nasi parte ad malam usque obscurus fuerat, auctum valde intuenti, sanguinis paullo post e dextra nare fluxuri, manifestum id attulit indicium.* Ceterum, ut jam dictum est, cetera alia signa fluxuri sanguinis cum rubra facie erunt attendenda, omniumque maxime signa coctionis. Nam in crudo morbo raro recte sanguis erumpit, & plerumque stillatim, quæ vacuatio in ardentibus febribus, omniumque maxime in phreniticis, est suspecta. Addamus rubram faciem abscessum aliquando post aures, scilicet parotides, significare, de quibus Hippoc. intellexisse *in 6. Epid. sect. 2. text. 11. p. 1169.* Gal. voluit quum dixerit: *ita vero se habent ex his plurimi & valde rubentes, & natura albidioris modi, neque de naribus sanguis erumpit, aut paucus erumpit*, & Galen. in *com.* ait: *Istis valde rubentem faciem habentibus, quum salubris ægritudo perdurat, per abscessus judicationem fore sperandum est, nisi de naribus sanguinis profluvium redundantem sanguinem evacuatione prævertat, qui in aliquem articulum impetum facturus erat.* De hac itidem Auctor *Prorrh. lib. 1. text. 165.* hæc habet: *Quibus comatosa, fastidiosa, hypochondria dolentia, & vomentia exigua, in iis parotides excitantur; antea autem faciei signa:* & Gelen. *in comment.* ait: *Ante parotidum generationem faciei signa considerare oportet; sunt hæc rubor, tumor præter naturam, oculorum humiditas, caliginosa visio, & quæcumque talia.* Colligamus itaque faciem rubram non raro bonam ex accedenti esse, criticumque signum dici, ubi nimirum e naribus sanguis est

Nonnumquam hæmorrhagiam narium notat & quando.

Aliquando parotides.

guis eſt fluxurus. Plerumque vero apparet hæc facies in acceſſionum vigore, præſertimque in ſynocho, & ardenti febre, aut ubi pulmonum adeſt inflammatio, in qua maxillæ (teſte Hipp. *in* 2. *lib. Prognoſt. p.* 42. *lin.* 31.) ruborem contrahunt. At ab hac ſola facie nihil certi ad prædictionem habetur, niſi ejus indicium aliis, vel bonis, vel malis, ſignis fuerit confirmatum. Atque hæc de bona facie: nunc de mala, quod ex eadem mutata præſagiri poteſt.

Primo ait Hipp. *in primo Prognoſticorum pag.* 36. & 37. eam, quæ nulla externa cauſa concurrente, principio morbi, diſſimilis a recte valenti evaſit, mali eſſe indicii, atque maxime contrariam eſſe pernicioſam, in acutiſque morbis exitium protendere. Cujuſmodi eſt, in qua (ait Hipp. *Prognoſt. pag.* 36. *lin.* 30.) *naſus eſt acutus, cavi oculi, adſtricta tempora, aures frigidæ contractæque, & fibræ earum verſæ, & item cutis circa frontem dura, intenta, arida, & color totius vultus viridis, aut niger, aut lividus, aut plumbeus*. Hanc enim faciem cadaveroſam merito Medici appellant, quæ ſi in principio morborum acutorum, quippe intra triduum, appareat, pernicialis erit.

Tumidam quoque eamdem viſam in morbis quibuſdam longis, hepate refrigerato, vitiataque ſanguificatione, obſervamus, non minuſque in phthiſicis, & ſuppuratis, quando in ipſis fere moribundis conſpici ſoleat. De rubra vero facie, quæ mala eſt, Auctor *Prorrhet. lib.* 1. 49. *Facies bona cum meſtitia multa malum*: & Galen. ait in *commento*, ſignificare calidam affectionem, exurentem ſanguinem, ex quo facies illa florida quibuſdam credatur propria melancholici affectus. Sed in rubra facie attendenda erunt alia ſigna, quæ ſi mala fuerint, pernicialis erit. Nam cum malis ſignis rubra facies aliquando phrenitidem oſtendit, & exitioſam, quæ in convulſiones deſinit. Nam ſi una cum rubore faciei adſit intuitus ferox, delirium, aut aliquod phreniticum ſignum, letale eſt. De qua *in Coacis præſagiis text.* 162. *Qui capite dolent firmiter, delirantes, alvo ſuppreſſa, feroci aſpectu, rubore in facie efflorescente, in poſteriorem partem convelluntur*. Sed alias *text.* 7. demonſtratum eſt, has convulſiones eſſe letales. Quum vero præter calorem etiam colorem flammeum habet, pejor adhuc erit, cum malis ſignis. De his enim Auctor *Coac. Præſag. text.* 7. ſcribit: *Rigores, quibus multa in ſomnum inclinatio juncta eſt, utcumque letales ſunt, quod ſi in iis facies in flammæ modo exardeſcit cum ſudore malignum eſt*. Sed melius hoc expreſſum eſt *in* 2. *lib. Prorrhet. lib.* 1. *text.* 67. hiſce verbis: *Æſtuoſi rigores quadamtenus pernicioſi, inflammans quoque cum ſudore facies in his mala*: & Gal. *in com. text.* 60. ait: *Neque ignoramus flammantem, ſine rigore, & cum ſudore, faciem malum eſſe ſignum, quoniam & unum ex judicatoriis ſudor ſit, quum igitur non judicaverit, malignitatem morbi oſtendit*. Quare cum ſigno aliquo judicatorio, veluti cum ſudore aut vomitu, aut alvi fluxu, aut ſanguinis vacuatione, facies flammea, ſignum erit malignitatis, & plerumque letale: ſed age addamus faciem rubram apparere in pulmonariis; ſed ruborem in iis maxillæ contrahunt, ex quo in febribus ſigno merito ſuſpicamur, aut peripneumonicos fieri, aut ſupurari. Hippocr. enim *in ſecundo Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 31. ait: purulentos habere maxillas rubras; idemque & in pulmonia ſpectari, docuit Galen. *in* 1. *lib. prognoſt. com.* 3. *Indicat enim fulginem ſanguinis in pulmone ferventis, quæ eo conſcendit propter rectum ſitum, recipiturque in laxitate, & raritate & tenuiſſima maxillarum cute, ceu per vitrum oculis repræſentante ruborem*. Qui quidem color in iis, ſi una cum malis ſignis, & præſertim judicatoriis malis, ideſt, non judicantibus, appareat, mortem præſagit. De quo auctor *Coac. præſag. text.* 67. ſcripſit: *Quibus vero faſtidia cibi accedunt, & ſudores cum bono faciei colore, & liquida alvo ac dolore cordis, hi peripneumonicorum aut pulmonariorum more intereunt, poſtquam longius ægrotaverint*; veluti *uxori Policratis* evenit de qua *in lib.* 7. *Epidem. text.* 9. *pag.* 1211. ſcriptum eſt: *Tuſſis, & excre-*

& excretio ſtatim ab initio ſimilis purulentis, intus circa arteriam, & fauces ſibilus erat. Facies boni coloris, in genis rubor non abunde coloratus, ſed moderate floridus. Hæc fuit prior peripneumonica, poſt ſuppurata, atque demum obiit tabida. Maxillarum itaque rubor aſſiduus in longis lentiſque febribus, aut pulmonis inflammationis, aut ſuppurationis, ac demum ad tabem proficiſcentium erit ſignum, modo tuſſis vel etiam leviſſima & inanis adfuerit: adde, modo hæc febris habeat inæqualis caloris exacerbationes, numquam tamen immunes.

Maxillarum rubor in longis morbis quid notet.

CAP. VII.

De prædictione ex oculis.

EX oculis quoque judicium prognoſtici venemur, idque accuratius, quod in prædicendis eventibus morborum inter partes corporis primatum obtineant. Juxta illud divini Hippocr. præceptum *Lib. VI. Epidem. Sect. 4. text. 26. pag.* 1181. *oculi ut valent, ita & corpus, & color in deterius aut melius labitur.* Si quidem oculi recte valentes, & robuſti, corpus quoque recte valere indicabunt. Nam, teſte Galeno *in commento*, ſi bene colorati oculi ſint, totum corpus ſalubriter ſe habere ſignificant. Ceterum, ut nos totum, quicquid ad morborum, ſalutis & mortis, prognoſticum facit, ordine ſcribamus, primo oculos ſalutem pollicentes, & poſtea exitium, accurate conſiderabimus.

Primo itaque dicemus, oculos bonos videri, & ſpem ſalutis non exiguam polliceri, qui recte valentium magnitudine, figura, ſitu, colore, motu, viſione, & ſplendore ſunt ſimiles; ſiquidem optimi & robuſti perpetuo boni ſunt indicii, hique ſunt, qui florido colore (teſte Galeno in *nuper citato comm.*) ſpectantur, pleniori mole, & ſplendidum humorem habent. Hos robuſtos ac optimos vocat Gal. propterea, quod iſtud fiat ex plurimo animali ſpiritu luminoſo, qui e cerebro in oculos proficiſcitur, ac e contrario infirma ex morbis corpora non ſic pati, nobis indicant, neque exinde multum periculi præmonſtrari. Quare boni ſunt ſimiles recte valentibus, & floridi coloris, pleni, ſplendidi, eminus, & ante, & in aere ſine moleſtia luminoſum videntes, palpebras recte aperientes, & claudentes, nullo rubore, livore, aut nigrore infecti, ſine lacrymis, atque ſine excrementis, qnæ *lemas* appellant, ipſorum angulis adhærentibus. Hi enim perpetuo boni exiſtunt, quum caput ſpeciatim, tum reliquum corpus recte ſe habere indicantes: ſed ut ſecurius ex ipſis judicetur, alia ſigna conſpecta ſimul erunt conſulenda, quæ ſi bona ſint, proculdubio ſalutem prædicemus. Soli autem oculi non valent judicium præmonſtrare, neque quicquam certi, cui tantum ad prognoſticum ſit fidendum, habent. Quum in aliquibus febribus continuis aliquando boni oculi appareant, quum tamen febris ad exitium inclinet, hoc tamen raro accidit, quippe oculos recte ſe habere, ægro ad exitium tendente. Proinde ex bonis oculis plerumque non levis futuræ ſalutis ſpes habetur. At non modo hi boni crediti, ſed etiam aliquando mali, poſſunt ex accidenti tamen ſalutis nobis argumento eſſe futuræ: utique lucem refugientes, eamque ferre nequeuntes, lacrymantes, intenſe rubri, ſplendidi, caliginoſi, obtuſi, hebetes, diſtorti, tumidi, cavi, clauſi, ſi ita ex criſi futura fiant. Ab his excipio, qui ita non ex morbo reduntur, ſed extrinſecus fiunt, a quibus quicquam certi habere nequimus, quos ex eo cognoſcimus ita eſſe mutatos, quia tales ſtatim in principio mutati appareant, qui per id temporis minime poſſunt critice mutari, ex

Oculi quinam boni, & ſpem ſalutis pollicentur.

quo

quo Hippocrat. *pag.* 37. *lin.* 10. ait, triduo aut quatriduo ex morbi vi oculos malos fieri ac conſpici. Externæ quoque cauſæ facile ab ægrotis intelliguntur. De his Galen. *in* 1. *Prognoſt. comm.* 2. *text.* 80. ita habet: *Igitur ex multa vini potione, nonnumquam, & vomitione vehementi, inter initia morbi, lucem refugiunt, itidem lacrymant, & pervertuntur oculi, aut ſublimes fiunt, aut tument, aut venulas habent rubras.* Ubi vero criſis eſt futura, natura quippe ac morbo invicem colluctantibus, in oculis mala iſthæc concitantur ſymptomata; lacrymantur enim exempli gratia ipſorum alii aliquando, ſanguine critice e naribus fluxuro; de quo Hippocrat. *in lib.* 1. *Epidemior. Sect.* 2. *pag.* 956. ita habet: *Quibus in febribus acutis atque adeo ardentibus ſpontaneæ effluunt lacrymæ, his* (ſiquidem reliqua non ſint exitialia) *e naribus ſanguinis eruptio exſpectanda, ſi etiam alia pernicioſe non habeant: nam his, qui incommode habent, non ſanguinis eruptionem: verum portendunt mortem.* Sed diſtinguamus lacrymas in voluntarias atque in non voluntarias, quas & ſpontaneas vocant; hæ cum ſignis criticis criticam ſanguinis eruptionem indicant, & illæ quippe voluntariæ numquam quicquam certi ad Prognoſticum præmonſtrant, quod Hippocr. nobis expreſſit *in* 4. *libro Aphoriſmor.* 52. ita ſcribens: *Quicumque in febribus, vel in aliis morbis, ſponte lacrymantur, nihil abſurdum: quod vero non ſponte, abſurdius, aut abſurdum*, uti Galeno in *commento* viſum fuit. Sed ne Hippocr. ſententia obſcuretur, quod in hoc Aphoriſmo dixerit, ſponte lacrymantes nihil abſurdum, quod vero non ſponte abſurdius: & ſuperius in loco citato, ſpontaneas effluentes lacrymas, ubi non criſin, mortem ſignificare: & *in* 6. *Epidem. Sect.* 1. *text.* 16. *pag.* 116. *lacrymæ in acutis male habentibus ſpontaneæ, quidem bonæ, involuntarie defluentes, malæ;* difficultati occurremus, dicentes ſpontaneas bifariam lacrymas intelligi: uno modo, ubi nullo intercedente ægrotantium deſiderio defluunt, & hoc eſt, quod Hippocr. ſponte & ſpontaneas appellat, quæ invitis ægrotis effluunt ſponte, ideſt, abſque ægroti voluntate; altero modo ſponte effluere dicimus, ubi ægrotis ita volentibus effluunt. Gal. vero *in* 1. *Epid. com.* 1. *text.* 131. Hippocr. lib. comm. non dixit ſpontaneas, ſed involuntarias, quo clarius & verius ſententia & veritas explicatur. Sed *ſponte* aliquando ad ægrotum, & aliquando ad morbum refertur. Sed uno verbo, diſtinguamus lacrymas in voluntarias, & in involuntarias, quas quandoque ſpontaneas dixit Hippocr. *Lib.* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956. *comm.* 2. *in text.* 80. quod ſponte, ut dictum eſt, nullo ægroti intercedente deſiderio, effluant; & alias non ſpontaneas, quæ ex ægrotis utpote fiant. Sed de his ſatis. Ad propoſitum reverſi dicamus, voluntarias lacrymas quicquam momenti non habere ad futurum Prognoſticum, atque ita in morbis acutis ægrotos lacrymare, ait *in* 4. *Aphoriſ. text.* 52. Hippoc. nihil abſurdum, nullumque malum ſignificare, & merito quidem, cum non ex morbo, ſed ita volentibus ægrotis, effluant.

Lacrymarum diſtinctio, & quid in acutis morbis notet.

Lacryma voluntaria.

Lacryma involuntaria.

Involuntariæ vero, quæ invitis ægrotis exeunt, perpetuo malæ, niſi criſin portendant ac antecedant. Atque hoc eſt, quod Hippoc. *in* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956. *text.* 85. de his ita ſcripſit, Gal. ſic *in commentario* ſcribente: *Quibuſcumque in acutis febribus, magis autem ardentibus involuntariæ lacrymæ cadunt, his de naribus ſanguinis profluvium exſpectandum eſt, niſi alia pernicioſe habeant: in male autem habentibus non ſanguinis profluvium, ſed mortem ſignificant.* Sed ut lacrymæ criticæ judicentur, neceſſe erit, ad hoc, ut optima ſit criſis, coctionis ſigna fuiſſe antegreſſa: atque hæ ſunt criticæ nullo modo in morbis damnandæ.

Lacrymæ critica.

Sanguinis fluxuri ſigna ex oculis.

Idem ſæpius demonſtrant fulgoris motus oculis apparentes, obtuſiones, ac rubores in oculis, quæ oculorum ſigna, itemque lacrymas, Galen. *in lib.* 3. *de Criſibus cap.* 11. inter notas ſanguinis fluxuri recenſuit, ita dicens: *Propria vero ſigna profluvii ſanguinis, quidam fulgoris motus oculis apparentes,*

quo-

quoniam humor est flavus; obtusiones autem, quoniam multus, & totus simul elatus ad superiora spiritus meatus obserat, ita ut & oculi lacrymentur, ob fluxus multitudinem, quod etiam accidit in inflammationibus oculorum. Eodem modo rubidi aliquando videntur, cum malis nonnumquam & naribus. Hebetudines itidem oculorum solent aliquando eruptionem sanguinis e naribus denotare, si modo etiam caput doluerit, quod Hippoc. *in* 1. *Progn. pag.* 38. *l.* 46. *tex.* 32. ita habet: *Accidit his in prima circuitione e naribus fluor, atque admodum juvat, sed requirendum est, num doleat caput, an habetudines subeant oculorum, si quid horum fuerit, eo tendet.* Non minus etiam ex perturbatione ad splendorem oculorum, una cum surditate, capitis gravitate, atque hypochondrii tensione, profluvium sanguinis significari, in *Coacis præsagiis Text.* 195. habetur. Oculos vero rubentes illud idem significare, docuit primo Auctor Prorrhet. *Lib.* 1. *text.* 137. dicens: *Cervicis dolores, impense rubri oculi, sanguinis eruptionem ostendunt.* De quibus etiam in Coacor. præsag. *Tex.* 166. ita scriptum est: *Quibus caput dolet; stupore detentis, dolorosis, prærubro oculo, sanguinem profundunt e naribus.* Sed hoc perpetuo verum erit antegressis signis coctionis, quoniam in principio, crudo quidem existente morbo, oculi rubri numquam bonum prænuntiant: sed de hoc paullo post accuratius. Aliquando etiam pervertuntur, & distorquentur ex futura crisi oculi, veluti contigit ei, qui in *Dealcis horto* decumbebat, de quo Hippocr. *Lib.* 6. *Epid. Ægr.* 3. *pag.* 1066. *Nono superriguit, febris acuta, sudavit, infrixit, deliravit, dexter oculus distortus erat, lingua arida, sitibundus erat, insomnis,* & Galen. *in com. Nam quod deliraverit in nona, & dextro oculo strabo fuerit, res sunt, quæ solent in judiciis evenire.* Clausi etiam oculi, subinde conniventes, aliquando sanguinis eruptionem significare *in lib.* 3. *Coacorum præsag. Text.* 77. in hunc modum legitur: *Qui in febre continua muti jacent, clausis oculis, subinde conniventibus, siquidem e naribus sanguis effluxerit, & vomuerint, atque ex eo loquantur, & ad seipsos redeant, servantur: quod si nihil horum evenerit, in difficilem spiritum redacti, brevi moriuntur.* Siquidem hæc plurimum humorem in caput sublatum demonstrant, atque ubi sequitur insignis purgatio, critice servantur: natura quippe excretione copiosa ab ea humorum multitudine sublevatur. Quare oculi non raro vel etiam motus eorum mutati, vitiumque patientes, crisin solent antecedere, non esseque propterea hæc oculorum symptomata mala, sed critica bona denotare, quorum judicium confirmabitur, si nullum una malum signum illuxerit, atque antea fuerint conspecta coctionis signa: quæ omnia ni una fuerint visa, nedum mala, sed plerumque perniciem significantia signa ostendunt. Tria vero criticis bonis signis observantur, primum signa coctionis antegressa, alterum mala alia signa non illuxisse, ac tertium, ægros ab aliquibus subsecutis vacuationibus fuisse non parum juvatos; & hoc est, quod Hippoc. *in* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956. *text.* 85. de lacrymarum præsagio locutus: dixit: *lacrymas involuntarias in acutis morbis sanguinis eruptionem significare, nisi alia pernicioſe habeant. In male autem habentibus, non crisin, sed mortem.* Sed age tempus est, ut ex oculis quoque exitium præsagiamus, quum de oculorum signis salutaribus satis scripserimus. Malum itaque & exitiosum est in acutis morbis, malos oculos spectari, cujusmodi sunt lucem refugientes, lacrymantes, rubri seu inflammati, quorum in albo venulæ intensæ rubeant, liveant, aut nigricent, feroces seu fixi, seu torvide spectantes, hebetes, delassati, debiles, seu non robusti, cavi, tumidi, prominentes, consumti, emarcescentes, squalidi, pulviculosi, clausi, semiclausi sive suspicientes, palpebris non conniventibus, sublimes, instabiles, concreti, stupidi, minus, nimis splendentes, obscurati, seu obtenebrati, splendore carentes, & in quibus pituitosum excrementum spectatur. Hos enim oculos perpetuo malos, numquam per se bonos esse,

Oculi ante crisin non raro solent mutari.

Oculi quomodo exitium præsagiunt in morbis.

ex

ex infra allegandis locis patebit, ni aliquando, quatenus accidit, critice natura & morbo colluctantibus, hos ita fieri, crisin prænuntient, inter criticaque signa recenseantur, quæ quomodo distincte cognoscantur, nuper a nobis monstratum est.

Hæc omnia oculorum signa itaque suspectum acutorum morborum judicium reddunt. Quorum quædam plane sunt exitialia, utpote venulas in albo oculi lividas & nigras videri, ægrotos non videre & non audire, oculos omni splendore esse destitutos, & omnia nuper dicta cum exitiali aliquo signo, omniumque maxime in die judicatoria conspecta, cum signis judicatoriis non judicantibus. Sed præstabit, ut de singulis oculorum hisce signis agamus, & primo prodamus signa oculorum præcipua ad exitium prædicendum, quæ *in primo libro Prognosticorum pag. 37. lin. 15. text. 35.* Hippocrat. ita est complexus, dicens: *Si enim lucem effugiant, aut nolentes illacrymentur, aut pervertantur, aut alter altero fiat minor, aut candidum rubidum habeant, aut lividas, aut nigras venulas, aut pituita appareat circa obtutum, aut sublimes tumide oculi, vel cavi admodum fuerint, aut obtutus squalidus, & sine splendore, vel totius vultus color evariet. Hæc omnia mala esse & exitiosa, censendum est.* Addamus si non ab aliqua causa externa hæc fuerint, utpote, neque a vigilia, neque inedia, neque immodico alvi profluvio, neque ebrietate, neque ab aliqua alia simili causa. Sed ut dictum est, singula propriis capitibus contenta accuratius consideremus, a visione ac visu ipso incipientes. Quandoque in acutis morbis fit, ut lucem refugiant, minimeque aerem lucidum oculi intueri possint, quod signum olim in *peste Patavina* multis fuit familiare, paucique peste infectorum, in quibus hoc signum fuerit observatum, fuerunt, qui superstites evaserint. Quod signum Hippocratis inter exitiosa recensuisse nuper vidimus. Neque immerito: quum ex Galeno oculi lucem refugiant propter debilitatem visoriæ facultatis, quæ nonnumquam affectione laborat orificiorum, veluti per lippitudines; & interdum ipsa facultas visoria affecta est, quod exitiale quoque est: hæc vero ab illa causa ex eo distinguitur, quod oculorum orificia minime affecta conspiciantur. Ægrotos vero in acutis morbis non videre, exitiosum est: omniumque maxime, si debili jam existente corpore id eveniat, ut Hipp. *in l. 4. Aph. 49.* hisce verbis expressit: *In febre non intermittente, si vel non audiat, vel non videat, jam debili existente corpore, mors proxima est.* Galen. in oculo totius lucis impedimentum, quod *Amaurosis* dicitur, signum imbecillæ facultatis esse, in *tertio Prorrhet.* scriptum reliquit. Obscurationes quoque oculorum malas esse, ex eod. Hippocr. *in lib. 6. Epidem. sect. 1. text. 16. pag. 1165.* constat; in acutis enim morbis ait Galen. *in commentar.* obscurari oculorum aciem, infirmitatem & interitum visoriæ potentiæ significare, nisi critice id fiat, quod indicabunt coctionis signa, ceteraque alia signa, crisin significantia. Ubi vero mala alia signa illuxerint, ac speciatim cum judicatorio aliquo non judicante, cujusmodi sunt omnes vacuationes nihil conferentes, aut has vacuationes obscuratio hæc oculorum fuerit secuta, exitiale est: de qua forte Auctor *Coac. præsagiorum text.* 105. ita habet, *Tumores juxta aures in morbis longis pravi, si inde fluor sanguinis, e naribus & tenebræ ob oculos effusæ moveantur, letale.* Ipsos vero oculos hebetes videri, extrinsecus quippe spectantibus oculos acie hebetes apparere, interioresque mortuorum oculis similes, letalissimum esse, Galen. in 2. Prorrheticor. *com. 2. text. 16.* tradidit: & hoc forte est, quod Hippocrat. *in 2. Epid. sect. 6. p. 1053. E. F.* dicit: *Quorum oculi non sunt robusti, mors in proximo.* Veluti *uxori Theodori* contigit, teste Hippocr. *in lib. 7. Epidem. pag. 1216. text. 27.* Eodem quoque modo carentes splendore, perniciales esse in *primo Prognosticor. pagin. 37. lin. 21.* docuit. Excæcatos videri in morbo mortali, proximum exitium demonstrari, *Antiphonis filii suppurati* exem-

Si non videant.

Si oculi obscurentur.

Si hebetes conspiciantur.

Si splendore carèant.

plum

plum docet, de quo *in lib. 7. Epidemior. pagin.* 1217. *text.* 28. ſcriptum eſt: *Oculus ſiniſter exæcatus eſt cum tumore ſine dolore, non multo autem poſt etiam dexter, & pupillæ valde albæ & ſiccæ fiebant, & mortuus eſt poſt cæcitatem.* Moribundis adſtantes morituros cito ægrotos, ex oculis ſplendorem amittentibus animadvertunt, cum quo & viſus prorſus perit; & hoc eſt quod Hippocrat. *in* 1. *Prognoſticorum* (*Vide ſub lit. e,*) dixit: *aut obtuſus, ſqualidus, & ſine ſplendore.* His opponuntur oculi feroces, horridi, audaces, Hippocrates *in 6. Epidem. ſect.* 1. *text.* 19. *pagin.* 1165. *text.* 15. Hoſque proprios eſſe delirantium ac phreneticorum, plerumque convulſionem accerſentes, aut mortem, cum aliis malis ſignis, Hipp. in loco citato expreſſit, dicens: *Oculi audacia, delirii ſignum eſt: & dejectio, & fractio, malum.* Et *in* 2. *Prorrh. text.* 88. Hos in phreniticis conſpectos oculos convulſionem denotare ſcriptum eſt, atque exinde mortem; quum phreniticis convulſiones ſuccedere, eſſe pernicioſum, alias demonſtraverimus, atque exitiales phrenitides in haſce finiri convulſiones. Propterea hos ægrotos Auctor Prorrh. *Lib.* 1. *Prorrhetic. text* 72. magis natura quam medicamentis, ſi Gal. credendum eſt, eſſe tractandos, ſtatuit, quum dicat: *Nigra vomentes, cibos faſtidientes, deliros, quibus oculus ferox, clauſuſque, purgare non oportet, pernicioſum enim.* Quo exemplo plures Medicorum egregie perdocti ſibi propoſuerunt, ut in moribundis prorſus a ſimilibus medicamentis abſtinerent, ne ars Medica ab ipſis infamaretur. Sed ex magnitudine quoque oculorum, quo in morbis quandoque alter altero aut minor aut major appareat, exitium prænoſcitur. Inter pernicioſa ſigna Hippocrat. *Progn. pag. 37. lin.* 17. notat, oculorum alterum fieri minorem, & Galen. *in comment.* indicare nobis, exſtingui facultatem regentem, ſtatuit. Non minus malum eſt, ſi majores appareant, in morbo pernicioſo, qui & multitudine humorum caput gravari, & facultatem extinctam, quod nimirum quicquam non repugnet humori ad oculos fluenti, indicat; quod ſignum in *puero Nicolai*, Hippocrat. *in 7. Epidemior. pag.* 1234. *text.* 100. moribundo vidit, cujus ſexta die dexter oculus major dum conſpiceretur, ſeptima mortuus eſt, quodque etiam in *Ermoptolemi uxore*, *libr. 7. Epidem. text.* 13. *pag.* 1213. *ſub finem hiſtoriæ*, moribunda notavit. Sed prominentes ſeu tumidos quoque oculos, in acutis morbis, Hippocr. *Progn. pag. 37. lin.* 20. inter ſigna oculorum letalia ſtatuit: cujuſmodi apparere ſolent in validis capitis doloribus inflammatoriis, qui commoto multo ſpiritu, & calore, ex inflammatione repleti intumeſcunt. Sed de cavis quoque dicamus, qui, niſi ab externa cauſa, per triduum, aut quatriduum, ſi in acutis appareant, perniciem notare Hipp. eſt Auctor *in* 1. *Prognoſt. pag. 37. lin.* 20. *text.* 15. Quos ita cavos fieri Gal. *in com.* docuit, propter virium quidem imbecillitatem, non omnem, at vehementem, quæ nec minimum quid alimenti oculorum abunde concoquere poteſt, quod explicat morbum uſque adeo ſævum, cui naturam ſuccumbere ſit neceſſe: quum oculi vero emarceſcant prorſus, quaſi alimento deſtituti, caloris nativi imbecillitate, qui in ſolis internis partibus exiguus manet, nec ad extimas uſque diffundi poſſit, ut poſſit aliquid ad alimentum oculorum concoquere, quo ipſi nutriantur; addo & ſpiritus eadem ratione, qui pauciſſimi quum ſint in corde ac in aliis internis membris manentes, ad ipſos quidem oculos ideo non defluere, & merito inde oculos contabeſcere, ſiccari, cavoſque conſpici eſt neceſſarium: ex eo enim, quod hepar percuſſum ſit, ſtatim oculos cavos evaſiſſe Hippocrat. *Lib. 7. Epidemiorum text. 33. pag.* 1217. vidit: & obſervatum eſt in multis ante exitium, quandoque dextrum, & quandoque ſiniſtrum oculum emarceſcere.

Oculi delirantium proprii.

Oculorum inæqualis magnitudo mala.

Oculi prominentes ſeu tumidi.

Ex motu quoque oculorum elucent in acutis morbis ſigna letalia: oculos enim ſublimes ex ſignis pernicioſis Hippocrat. eſſe ſtatuit *in eodem pri-*

Signa letalia ex oculorum motu.

mo prognoſt. pagin. 37. *lin.* 20. *text.* 15. qui ſunt, teſte Galeno, *in comm.* inſtabiles, & ſubinde commoti delirium aut tremorem portendentes; alterutrumque eſt exitioſum: ſed perpetuo, ut Medici firmum judicium exinde colligant, debent alia quoque ſigna, quæ illuxerunt, attentius cognoſcere, quando oculis inſtabilibus exitioſe conſpectis, neceſſe ſit, aliquod aliud letale ſignum una illuxiſſe. Clarius vero Galen. *in* 2. *Prorrh. comment.* 11. explicat oculos inſtabiles, dicens, eſſe non ſecus, quam, qui equum inſtabilem habent, numquam conquieſcentes, contraque concretos & ſtabiles numquam moveri, & eſſe immobiles. Ex quo merito de his *in Coac. præſag. text.* 227. legitur, oculos aſſidue nictare, eſſe pernicioſum; non minus quam fixos, quos concretos, firmos, ſtabiles, immobiles vocant. Hos perpetuo eſſe malos, Auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 46. hiſce verbis: *Hebetatus oculus, vitiatuſque, & concretus, immolibiſque, & tenebroſus ſi fuerit, malum.* Sed rectius dixiſſet, *exitioſum*, quod perpetuo fere letales ſint in morbis acutis, ni ex critica aliqua cauſa tales evaſerint. Galen. *in comm.* ſcribit, concretos oculos fieri propter moventium oculos muſculorum immobilitatem, immobilitatemque eam propter omnium ipſius muſculorum vel reſolutionem in neutram partem, vel aliquam, quę in neutram partem vergit, tenſionem proficiſci, vel propter exactam moventis muſculi potentię imbecillitatem, quod ſane admodum eſt exitioſum, ſi propter virium languorem hoc fiat, ac etiam convulſis muſculis lęſo principio nervorum in morbo acutiſſimo, in quo convelli partes pernicioſum eſſe alias demonſtratum eſt: Galen. *in* 6. *Epidem. comment.* 2. *text.* 2. ſcribit concretos oculos, quos Hippocr. *Lib.* 6. *Epidem. Sect.* 1. *text.* 16. *pag.* 1165. maxime damnavit, hoc eſt immobiles, perfectiſſimam ejus potentię extinctionem ſignificare, a qua muſculi, quum naturaliter affecti erant, movebantur. Hippocr. *in* 5. *Epidem. Tex.* 50. *pag.* 1154. de *Virgine illa pulchra Nerei*, quę a muliercula lata manu percuſſa obiit, ſcripſit, ante mortem oculum ſtupidum habuiſſe. Ex ſitu quoque oculorum, perverſiones admodum ſunt letales, ni critice appareant, cujuſmodi fuit oculus nono die in eo, *Lib.* 3. *Epid. p.* 1066. *Ægr.* 3. qui *in Dealcis horto jacebat*, ſtrabo & diſtortus. Hippoc. (1. *Prognoſt. pag.* 37. *lin.* 17 & 29. *text.* 15.) enim inter pernicioſa oculorum ſigna perverſionem recenſuit. Sed tamen hoc diſtinctione opus habet, quod aliquando oculi (teſte Galeno, *in* 1. *Prognoſt.*) pervertantur, muſculi ipſos moventibus convulſis, & ſępius fit in febribus propter humorum multitudinem, quam quum hęc perverſio oculorum tantum denotet, quicquam certi ex oculorum perverſione ſimili non poterit aſſequi. Plerumque vero pervertuntur oculi in acutis morbis, non ex hac cauſa, ſed affecto principio nervorum, quippe cerebro, eſtque ſumme exitioſum. In febribus itaque acutis oculorum perverſiones perpetuo malę ſunt, cum aut humorum plenitudine ſeu multitudine, quod minus malum eſt, aut ſiccatis muſculis, oculos moventibus, quod ſi ardentibus febribus, aut phreniticis eveniat, prorſus exitioſum eſt; omnium vero erit exitialiſſimum, has ita perverſiones videri cum facultatis extinctionis ſignis, quę languorem virium nobis fieri innoteſcent, aut aliquem ſenſum diminutum aut ſublatum.

Ex ſitu oculorum.

De quibus Hippocrat. perbelle *in libro quarto Aphoriſmorum* 49. dixit: *In febre non intermittente, ſi labrum, vel palpebra, vel ſupercilium, vel oculus, vel naſus pervertatur, vel non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente, quicquid horum evenerit, mors proxima eſt.* Quæ clarius *in* 1. *prognoſtic. pag.* 37. *lin.* 29. *text.* 15. ita habentur: *Si pervertitur, aut livida palpebra eſt, aut labrum, aut naſus cum aliquo ſigno, mortem prope eſſe, ſciendum eſt.* Quare perpetuo malum, ni critice, ut dictum eſt, appareant oculorum perverſiones, ſignificat, non tamen neceſſario letale; quod videns divinus Hippocrat. *in* 6. *Epidemior. Sect.* 1. *text.* 16. ita ſcribit: *Quibus palpebra circumtenditur,*

ma-

malum est. Fiet vero certum judicium ex signis antegressis, & una conspectis, & longe melius ex iis, quæ postea appareant. Sunt etiam malæ oculorum perversiones, si morbo infernas ac debiles opprimente partes fiant, quod denotent humorem ad partem nobilem quippe cerebrum ferri; quam rem forte Auctor *Prorrhetic. Libr.* 1. *text.* 69. ita expressit: *Ex lumborum reversione oculi perversio, mala*. Cum malis vero signis, letales judicabuntur. De quibus *in eodem libro Text.* 81. *Prorrhetic.* ita habet: *In ardentibus febribus cum aliquantula perfrictione, dejectionibusque aquosæ bilis, multisque, oculorum perversio, signum malum, tum alias, tum si catochi fiant*. Sed rectius exitiosum dixisset; cum perfrictiones in ardentibus febribus, cum evacuationibus non juvantibus, sed lædentibus, sive ex quibus ægroti in pejus delabuntur, quę profecto sunt signa judicatoria non judicantia, letalia, juxta illud Hippocrat. (*Sparsim in singulis fere Hippocratis libris, quum in genere, tum in specie, hoc pronuntiatum reperitur.*) & Galen. *si quæ juvare debent, nedum non juvant, sed ægroti ab ipsis in pejus abeunt, letale est*: suntque ex judicatoriis non judicantibus letalibus. Quare si cum his appareant oculorum perversiones nedum malum signum, sed perniciale erit dicendum. De iisdem paullo post *Prorrhetic. Lib.* 1. *text.* 89. Auctor ita quoque habet: *In oculorum perversione, cum febre & lassitudine rigor pernicioſus, Comatosique in his male habent*. Quare oculorum perversiones cum malis signis, & præsertim judicatoriis malis, letales merito judicantur: cum letalibus vero proximum exitium adesse significant. Cujusmodi fuit oculus distortus in *altera ex abortu defuncta* ab Hippocrat. observatus; de quo *in lib.* 3. *Epidemior. pag.* 1079. *Ægr.* 11. *text.* 57. ita habet: *Quarto deliravit, metus, mœstitia, dexter oculus erat distortus, sudor secundum caput, paucus, frigidus, extremitates frigidæ, quæ in acutis morbis letalia sunt signa*. Sed ex clausione quoque oculorum signa prava & exitialia perscrutemur. Quum enim oculi in acutis clausi maneant, neque aperiri queant, aut propter quamdam humorum multitudinem; convellentem musculos oculorum & palpebrarum, aut siccatis, aut resolutis virium infirmitate musculis: quæ sane clausio palpebrarum perpetuo in acuto morbo letalis, & si aliquando, uti critica, non exitiosa sit, ubi ipsam sequatur insignis aliqua vacuatio & bona; quod ni fiat, plane exitialis. Quod *in* 3. *libro Coacor. præsag. Text.* 77. perbelle ita docetur: *Qui in febre continua muti jacent, clausis oculis subinde conniventibus, siquidem e naribus sanguis effluxerit & vomuerint, atque ex eo loquantur, & ad seipsos redeant, servantur; quod si nihil horum acciderit, in difficilem spiritum redacti brevi moriuntur*. Raro vero fit, ut, cum illis signis, clausi oculi critice appareant, & nonnisi in robustissima facultate; proinde majori ex parte letale est signum. Cum signis vero malis clausos oculos videri, perpetuo letale, ut Auctor *prorrhetic. Lib.* 1. *text.* 71. meminit, qui ait: *nigra vomentes, cibos fastidientes, deliros, quibus oculus ferox claususque, purgare non oportere*, idest, medicamentis opus non habere, & prognostico soli propterea esse relinquendos. In his enim claudi oculorum palpebras contingit, ut Galen. *in comment.* expressit, vel propter claudentium oculos musculorum tensionem, vel propter aperientium imbecillitatem: utrumque in iis est pernicioſum. Sed age addamus quoque, oculorum suspectiones: pravum ac summe exitiosum signum in acutis morbis esse. De quibus Hippocrat. *in* 1. *Prognosticorum pag.* 37. *lin.* 24. *&c. text.* 14. ita habet: *Considerari convenit hunc in modum suspectiones etiam oculorum per somnum, si quid enim candidæ partis subapparet non commissis palpebris, nec alvi fluor, aut medicamentum in causa est, aut nec ita dormire consuevit, vitiosum judicium exitialeque admodum est*. Hoc signum visum fuit in *Guadagnina olim carissima mea uxore*, antequam moreretur, quod fuit exitiosum, tametsi per sanitatis tempus consueverit aliquando ita dormire,

Ex oculorum clausione.

Ex oculorum suspectionibus.

ſed una alia ſigna exitialia fuere, quippe comata, extremorum frigiditates, inquietudines, carentia ſitis cum lingua ſcabra & nigra. Quare in morbis acutis perpetuo erit timendum, quod & Auctor *Coac. præſag. Text.* 218. ita indicavit: *Et extremitatum palpebrarum curvitas, & oculi fixi & aſſidue nictare, & colores permutare, & palpebras inter dormiendum non committere, perniciosum eſt.* Ex colore quoque oculorum mala ſigna erunt. Album oculi rubrum ſpectari, ni critice ſanguinis eruptionis ſit ſignum, quod ſuperiori capite, quibus notis diſtinguatur dictum eſt exitiale, eſt. Ubi itaque minime criticum eſt ſignum, in acutis oculos rubros videri, perpetuo malum. Quod ſignum Hippocrat. *in Prognoſticis pagin. 37. lin.* 18. recenſuit inter ſigna pernicioſa, quoniam vel ex copia ſanguinis fiat, quæ in cerebro & in membranulis ſtagnet, ut Galen. *in comment.* docet, aut inflammationem inſignem cerebri & membranarum, quæ in continuis febribus perpetuo ſunt pernicioſa, non minuſque, ſi una cum malis ſignis, in diebus judicatoriis, aut quomodocumque appareant, omniumque maxime in phreniticis ſævis. De quo ſigno Auctor *Coacorum præſagiorum, Text.* 163. ita habet: *Qui morbi ſuccuſſionem aut pulſationem inferunt capiti, & prærubros oculos habent, deliriumque movent manifeſtum, pernicioſi.* A ſingultu quoque, & vomitu, timendum eſſe hoc ſignum *in libro 7. Aphoriſmorum* 3. ſtatuit; quod, teſte Galeno, rubor oculorum, vel cerebrum, vel ventriculum pati non mediocrem inflammationem, explicet. Utrumque in febribus continuis exitioſum apertiſſime Galen. *in* 3. *libro Prorrheticorum* ſcribit: *In febribus continuis oculorum ruborem accedentem aut copiam ſanguinis oſtendere in capite, ex qua oculi rubeſcunt, veluti in lippitudinibus, quæ ex eo diſcernitur, quod cerebro inflammato venulæ tantum, quæ in albo oculi ſunt, rubræ apparent, & ventriculo una quoque ſingultus aut vomitus appareat.* Ex quo merito Hippocrat. *in primo Prognoſtic. pagin. 37. lin* 18. *text.* 15 non dixit ſimpliciter ruborem oculorum, ſed venulas in candido oculi rubras apparentes, perniciem demonſtrare. Omnium vero maxime erit pernicioſum ſignum, ut ſcribit Hippocrat. in loco citato *ibidem lin.* 19. venulas has aut lividas aut nigras ſpectari: nam, Galen. ita interpretante, lividæ apparent, & nigreſcunt venulę oculorum refrigeratæ; refrigerantur extincto calore nativo. Addamus, ut finem præſenti capiti imponamus, ex iis etiam, quæ in oculis apparent, excrementis, poſſe exitium judicari. In acutis lacrymas involuntarias inter exitioſa ſigna recenſet Hipp. *Prognoſt. pag. 37. lin.* 16. *& Epidem. lib.* 1. *ſect.* 2. *pagin.* 956. quarum quidem cauſam Gal. refert, aut ad aliquam lippitudinem, aut fluxionem ex capite in oculos; ſed in acutis febribus hoc fieri propter facultatis retentoriæ debilitatem, quod ſumme eſt pernicioſum. Ubi itaque involuntarie profluunt lacrymæ in acutis morbis, neque ſigna criſis futuræ per ſanguinem, præſertim excretionem, e naribus, mortem certo exſpectandam, Hipp. *in* 1. *Epid. ſect.* 2. *pagin.* 956. tradidit. Pituitam quoque in oculis conſpectam notat inter ſigna pernicioſa *lib. Progn. p. 37. lin.* 19. Galvero *in com. tex.* 2. &c. tametſi aliquando hic humor, ſeu excrementum, in oculis ſpectetur ex aliqua fluxione, ut aliquando in lippitudinibus fit, tamen in acutis morbis propter imbecillitatem regentis oculum facultatis naturalis, quæ impos oculorum concoquere alimentum nequit. Aliquando in oculis apparet quoddam ſimile excrementum ſiccum areſactumque, quod Auctor *Prorrhetic. in* 1. *Prorrhetic. text.* 17. ſcripſit, ſignum eſſe phrenitidis; Galenuſque *in comm.* docet, conſpici quandoque in tabeſcentibus, quod ex calore nimio colliquetur id omne carnoſum, quod quum in facie, tum in temporibus, factis una, & cavis admodum oculis; in phreniticis vero hujuſmodi reſiccatum, & pulviſculoſum abſque cavitate videri. Ex qua re merito Hippoc. *in* 6. *Epidem. ſect.* 1. *text.* 16. *pag.* 1165. mala oculorum ſigna recenſens, ait:

Ex oculorum colore.

Ex lacrymis involuntariis.

Ex pituita in oculis conſpecta.

Ma-

Malum est autem, & increscens veluti spuma, quod, Gal. *in com. 1. text. 23.* interprete, fit in morbis acutis, quum summe aridi sunt, & vires imbecillæ, præexiguis lacrymulis ab oculis excidentibus; deinde ubi in arescentibus imbecillitate retentricis lacrymulæ in oculos excidentes, ab intenso calore cerebri inflammati reficcatæ, in pulvisculosa excrementa, quæ *Lemas* Græci appellant, hisce de causis signa exitialia, mutantur. Sed tempus est, ut relictis oculis ad alias partes spectandas declinemus.

CAP. VIII.

De prædictione ex genis, auribus, naso, labiis, atque dentibus.

QUum genarum, aurium, nasi, labiorum, atque dentium observatio quandoque non parum in ægrotis præsagium illustret, merito paucis quoque de ipsis agendum duxi. At quoniam hæ partes, non, nisi a suo statu naturali mutatæ, nobis ad prædictionem usuveniunt, idcirco has mutatas considerabimus. Quamquam non negandum sit, has nullo modo a suo statu mutatas, bonum quippiam significare; tamen numquam certi quicquam ad præsagium habebunt: multi enim moriuntur, hisce partibus parum mutatis a naturali suo statu. Mutatæ vero multum faciunt ad illustrandum præsagium in ægrotis. Mutantur vero aut colore, aut figura, aut denique magnitudine; *Quomodo hæ partes mutantur.* colore inquam, ubi hæ partes aut rubræ, aut lividæ, aut nigræ apparent; rubras videri quandoque capitis inflammationem, quandoque criticam fluxionem denotat, quod judicium distinguent propria utriusque signa. Livescere partes has, atque nigrescere, perpetuo malum, quod caloris aut extinctionem, aut suffocationem, aut summam putredinem nobis denotent, Mutatæ vero figura, magnitudine quippe quum maxime aut extenuantur, aut convelluntur, plurimum ad prædictionem faciunt. Sed de singulis nunc accuratius agamus, a maxillis exordientes. Diximus maxillas, seu genas, plerumque *Maxillarum seu genarum mutatio quid in morbis notat.* rubras videri, aliquando liventes & nigrescentes. Rubræ significant aut inflammationem internam vel capitis, vel pulmonum, vel pleuræ, costas cingentis membranæ; aut crisin futuram; aut pus fieri in pulmonibus: quæ capitis inflammationem ostendunt (quarum judicium cetera alia signa pathognomonica aperient) solæ non sunt, ita ut non solum genæ rubræ, sed aliæ faciei partes una rubore suffundantur: addatis propria capitis inflammati signa adesse, quippe dolorem, calorem, & reliqua, uti *in anginosa, quæ apud Metonem*. De qua *in 7. Epidemior. pag. 1215. text. 20.* scripsit. *Quarta convulsa, sine voce, stertor, dentium contritio, maxillarum rubor, mortua est quinta die.* Peripneumonicorum vero, & pleuriticorum maxillas rubras proprium esse signum, ex Galeno colligitur, qui *in libr. 2. prognosticorum text. 11.* dixit: *has & propter calorem in pulmone & propter tussim acrem rubescere, hæc enim ambo calefaciunt vultum, & totum caput, quia ex defluxione in pulmones decumbente vapores in ipsum ferantur*. Quare neque hæ quicquam certi ad prædictionem afferre possunt: non minusque & quæ in suppuratis apparent; plerumque enim fit, ut in pulmonis suppurationem futuram decernant, cujus judicium pendebit a propriis signis: sed quoniam pauci sunt suppuratorum, qui serventur, plures enim phthisici pereunt, ideo maxillæ hac de causa minantur suppurationem, phthisin, & exitium. Sed ipsarum colo- *Quomodo in suppuratis cognoscitur.* rem exinde fieri distinguent suppuratorum propria signa, quæ, ut Hipp. docet *in 2. Prognost. pag. 42. lin. 25. & seq. tex. 61.* sunt, *si in principio febris non demittat, sed interdiu tenuior, noctu vehementior sit; si copia sudoris eliciatur, ac tussiendi adsit cupiditas, nec quicquam tamen dignum commendatione exspuant; si oculi cavi reddantur, maxillæ vero ruborem contrahant, ungues ma-*

manuum curvantur, digiti vero potiſſimum ſummi incaleſcunt, atque in pedibus tumores conſiſtunt, neque cibum appetunt, & puſtulæ circa corpus erumpunt. Cujuſmodi fuiſſe *uxorem Polycratis* primum peripneumonicam, *Epid. lib. 7. pag. 1211. text. 9.* & *Metonem* pleuriticum, ſcripſit Hippoc. *in lib. 7. Epidem. pag. 1234. text. 101.* de quo ita habet: *Apprehendebant autem quandoque illum calores tenues, exiguum tempus, ſudores exigui fiebant ad noctem, ſpiritus in febre denſus, maxillarum rubor, circa latus gravitas, & ſub axillam & ad humeros, tuſſes tenebant.* Eos vero ſuppuratorum, qui ſervantur, ait Hippocrat. *in 2. Prognoſticorum pag. 42. lin. 45. & ſeq. a febre ſubito liberari, puris optimi, non bile permiſti, multam copiam neque difficulter exſpuere, cibumque appetere & rectius ſpirare*; & reliqua: poſtremo diximus maxillas rubras reddi, non raro ſanguine e naribus critice erupturo, qui color non tantum maxillas, ſed totam fere faciem, naſumque præſertim, occupabit; cujuſmodi colorem Galen. vidit in *juvene Romano*, febricitante paullulum, antequam ſanguis e naribus erumperet, ut ex libro de *Præſ. ad Poſthum.* conſtat. Ubi vero futura ſit criſis vel per ſanguinem, vel per ſudorem, alia quoque critica ſigna apparebunt, quorum præcipua ſigna ſunt in excrementis concoctio apparens, morbi tempus, quod ſtatum & vigorem vocant febris, aucta graviaque ſymptomata vel de novo oborta, vel plurimum aucta. Cujuſmodi fuerunt obſervata in *Teoclis cognata*, de qua Hippoc. *in eodem lib. 7. Epidem. text. 26. pagin. 1216.* ita habet: *Teoclis cognata, quæ ſuperius habitabat, ſub Plejades febris acuta: ſexta videbatur ceſſaſſe: lavit veluti ſedata febre. Septima mane maxilla valde rubicunda, utra non memini. Veſperi febris venit multa: Lypotymia & aphonia erat: non longe vero poſtea ſudor, & quies ceſſante morbo ſeptima die.*

Quando criſin notat.

Lividus vel niger.

Maxillæ itidem apparent aliquando lividæ & nonnumquam nigreſcentes, quæ ſi cum malis ſignis illuxerint morbo, mortem prænuntiant; nam hæ caloris extinctionem denotant. Sed de his coloribus ſuperius ſatis accurate egimus. Nunc de auribus agamus, quæ & ipſæ aut colore livido in morbis exitioſis apparent, aut contractæ, aut frigidæ, aut cum pure, aut dolore acuto, aut tinnitu, quæ itidem multum ad prædictionem faciunt. Lividæ & nigræ ſpectantur in acutis morbis, calore nativo extincto aut ſuffocato: frigidæ & contractæ in acutis ſunt letales, *Hippoc. in primo progn. pag. 36. lin. 32. text. 7.* ſcribente. Dolores quoque in auribus acutos non carere periculo docuit Hippocrates, *in tertio Prognoſticorum pag. 44. lin. 45.* dicens: *Aurium dolor acutus cum febre continua ac vehementi difficilis eſt, periculum enim delirii abolitioniſque imminet.* Sed tametſi hujuſmodi dolores non perpetuo obſervatum ſit difficillimos morbos præmonſtraſſe, ut pauci ſint, qui ab ipſis evadunt, perpetuo tamen cum febre continua & acuta pernicioſi eſſe ſolent, ob inflammationem ratione viſceris nobilioris malignam: plures vidi ita affectos periiſſe, & ſpeciatim *Guadagninam meam dilectiſſimam uxorem*; in ipſa enim, ardenti febre maligna vexata principio hujuſmodi dolor acutiſſimus apparuit: ſed ad rem noſtram. Dolor itaque, *ait Hipp.* aurium acutus in acuto morbo perpetuo difficilem morbum oſtendet. Sed tamen non raro fit, ut aures ſuppurentur, ab ipſiſque decretorie effluat pus, atque ægroti dolore liberentur. Cujuſmodi fuit *Emyris filius*, ut ſcribit Hippocr. *in 4. libro Epidemiorum pag. 1138. text. 40.* qui critice pure erumpente ſeptima die fuit judicatus. Sonus quoque aurium in iiſdem morbis magni momenti eſſe ſolet ad præſagium indagandum, ſed quum de hoc ſymptomate alias ſcripſerimus, pauca attingemus: hocque præſertim, ſcilicet in acutis febribus, principio tinnitum ægrotos ſentire, pravum ſignum eſſe, quod aut cerebri inflammationem, aut futurum delirium oſtendat, vel bilem, quæ per venas fertur, in ipſis exæſtuare, ex qua concitati ſpiritus ad caput tranſmittuntur. In ſtatu vero, conſpectis ſignis coctionis, critice ſæpe hujuſmodi ſymptomata apparere ſolent.

Aures quid ad præſagium in morbis faciunt.

Livida & nigra.

Aurium doloris acuti quid.

lent. De quo ſigno legitur in *libro* 4. *Coac. præſag. Text.* 131. *In ardentibus ſuperveniens ſonus aurium cum alucinatione oculorum & narium gravitate, hi inſaniunt, niſi ſanguis e naribus fluxerit.* De palpebris, naſo, labiis, Hippocr. *in* 1. *Prognoſtic. pag.* 37. *lin.* 29. *& ſeq. text.* 15. ita habet: *Si pervertitur, aut livida palpebra eſt, aut labium, aut naſus cum aliquo alio ſigno, mortem prope eſſe ſciendum eſt.* Et merito ſane dixit: *cum aliquo alio ſigno*, utpote pernicioſo, cujuſmodi eſt, quod alibi expreſſit, ut non videant, aut audiant ægroti, jam ſcimus exitium in foribus eſſe. Hoc idem Hippocr. *in* 4. *Aphoriſ.* 49. ita expreſſit: *in febre non intermittente, ſi labium, vel oculus, vel naſus, vel ſupercilium pervertatur, ſi non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, quicquid eorum fiat, mors proxima eſt.* Quandoque labium tremulum criticum præcedere criſin per vomitum, Galen. *in* 3. *Criſib. cap.* 1. docuit. Veluti *in Chærione Epidem. libr.* 3. *pag.* 1072. *Ægr.* 5. fuit obſervatum, & Hippocr. *in* 6. *Epidemior. comm.* 8. *Text.* 41. *pag.* 1201. ex Valeſii diviſione ſcripſit: *labia in tertianis febribus critice ulcerari*, quod ſignum criticum omnibus, vel etiam ignaris mulierculis, notum eſt. Neque Avicenna, neque alii Arabes ignorarunt. Sæpe vero fit, ut critice hæ partes convellantur, quippe criſi proxime futura, quod critica ſigna prope præmonſtrabunt. Dentium vero convulſionem exitialem eſſe quum Hippocrat. tradidit *in Prorrheticis Lib.* 1. *Text.* 48. tum ego ſæpius in praxi vidi: Hipp. *in* 1. *Prognoſt. pag.* 37. *lin.* 52. *& ſeq. text.* 21. de his ita habet. *Si quis ſtridat dentibus, non conſuetus a pueritia ita efficere, inſania ſignificatur, ac mors, ſed in utriſque futurum prædicere periculum, neceſſe eſt. Si vero mente commotus ita efficiat, admodum exitioſum jam eſt:* & Galenus in comment. *Stridere dentibus, quibus ab initio non erat conſuetum, futuri delirii accidens eſt: ſi vero abeundo interdum ægrum offendas, utrumque perpeti, delirare & ſtridere dentibus, hunc jam eſſe prope mortem arbitrare.* Idem fere *Prorrheticorum Lib.* 1. *text.* 48. ait: *Dentium ſtridorem, quibus non eſt ſanitatis tempore aſſuetus, experiri, pernicioſum*, Cujuſmodi vidit in *anginoſa, quæ apud Metronem habitabat*, quæ per diem antequam moreretur, (ut refert Hippocr. *Lib. VII. Epidemior. text.* 20. *pag.* 1215.) dentium habuit contritionem, & cum exitialibus ſignis. Itaque dentium ſtridores perpetuo in acutis morbis exitiales ſunt, quod fiunt læſo nervorum principio, aut temporum, maxillarumque muſculis ab igneo calore immoderate ſiccatis, exinde convulſis, quas convulſiones eſſe inſanabiles alias a nobis fuit demonſtratum; ſed aliquando contractum labiorum alvi bilioſam eruptionem ſignificare, *in* 2. *Coac. præſag. Text.* 240. legitur, *& Gal. in tertio, de criſibus*, labium tremulum inferius criſin per vomitum. Sed nunc ad linguam deſcendamus, quæ in morbis acutis ad præſagium aſſequendum utiliſſime a Medicis obſervatur.

Labium tremulum quid notat.

Dentium convulſio vel ſtridor exitialis.

CAP. IX.

De prædictione ex linguæ observatione.

Lingua quantum ad præsagium facit.

Linguæ inſpectio in acutis morbis ita utiliter obſervatur, ut non parvam in quibuſdam ægrotis partem præſagii habeat. Hippocr. *in 6. Epidemior. comment. 5. Text. 13. & 15. pag. 1185.* ſcribit: linguam variis coloribus varios humores exſuperantes oſtendere: Quod hiſce verbis explicavit: *lingua lotium ſignat. Linguæ virides bilioſæ: Bilioſæ autem a pingui, rubræ vero a ſanguine, nigræ ab atra bile, aridæ a fuliginoſa exuſtione, & ab uterino membro, albæ vero a pituita.* Ex quibus ſane facile eſt, humores noxios prevalentes dignoſci, quippe quod quiſque color, quo lingua infecta conſpicitur, humorem denotet particularem. Sed diſtinguendum erit, an lingua hujuſmodi mutationem ex vapore aut humore obtinuerit, aut ex potu, aut cibo, aut medicamento, aut ex deſtillatione e capite, quum ipſa totis iis cauſſis immutatur: idcirco neceſſe erit, ut dignoſcatur a nulla prædictarum cauſarum, ſed tantum a vapore aut humore e venis, & arteriis, in linguam ſublatis; facilius enim ipſa iis tingitur, quod habeat ſubſtantiam flaccidam, laxam, mollem cum amplitudine venarum. De qua re Galen. in nuper citato ita habet: *Etenim grandioribus venis prædita lingua, & inani ſubſtantia ſpongiam referens, aliis duris denſiſque particulis paratior eſt, ut ſeroſos intra ſe humores admittat, ab illiſque colores inſtar lanarum ſuſcipiat.* Sed, his præmiſſis, linguæ præſagium attingamus. In omnibus acutis morbis lingua, bene valenti ſimilis, optima eſt, dummodo non ex aliqua externarum cauſarum, quippe a potu, cibo, medicamento, aut ex defluxione ex capite, fiat. Hæc in temperatis corporibus erit, quæ colore ſubrubra, mollis, proportionata magnitudine, quæque nullo, ad guſtum, & ad loquelam, vitio tenetur. In acutis itaque morbis, ac maxime in febribus ardentibus, & ſynochis, linguam ita videri, eſt bonum; color enim ipſius ſubruber ſi apparet, ſignificat humorem noxium ac morbificum neque plurimum eſſe, neque admodum putridum ac accenſum, quo ita affecto, lingua neceſſario fiat aut flava, aut crocea, aut nigra, aut admodum rubra; quando, ut ex Hippocrate dictum eſt, neceſſe ſit, humorum in corpore exſuperantium bilioſorum, aut aduſtorum, aut pituitoſorum, linguam ipſorum vaporibus infici, ac tingi. Mollis itidem non ex cibo, potu, aut medicamento, aut deſtillatione capitis conſpecta, interius viſcera multum calorem non occupare denotat, ut propterea ægroti, propter hanc cauſam, neque multum ſitiant. Ex pituitoſa vero e capite ad fauces deſtillatione cognoſcitur ac diſtinguitur propriis ſignis, quorum eſt præcipuum, ſi ægroti plurimum dormiant, plurimumque interius ſentiant calorem. Hæc enim deſtillatio, irrigans fauces & linguam, facit, ut nedum lingua minime exareſcat, ſed vel etiam ſitim ipſius demulceat. Hinc Hippocr. *ſect. 4. Aph. 54.* dicebat, tuſſientes non valde ſitire, ac propter hanc cauſam expedite quoque ægroti loquuntur. Atque hęc eſt lingua non mala in acutis morbis. Aliquando mutata a ſuo ſtatu naturali ſolet etiam boni judicii eſſe indicium, nimirum critice, ubi in periculoſis anginis, humore ad fauces & ad ipſam linguam tranſmiſſo, admodum inflammata, & mole aucta apparet; itidem quandoque convulſa & tremula hoc modo apparet; ſed ea eſt propriis ſignis criticis judicanda, quę pręceſſiſſe eſt neceſſe: atque hęc de bona lingua, nunc de mala. Hæc eſt, quovis modo mutata ac vitiata, aut colore, aut magnitudine, aut ſubſtantia: colore quidem mala, in acutis morbis, eſt alba, craſſa, cœnoſa, quam vidi in quadam febrium Epidemicarum, olim *Genuæ in Liguria* graſſatarum, conſtitutione, quæ nobis fuerat argumen-

Lingua mollis quid notat.

Lingua quænam mala. Cœnoſa.

mento, in his corporibus multitudinem pituitoſorum craſſorumque humorum prævaluiſſe, atque magnum quoque viſcerum calorem adfuiſſe. Sed tamen hæc in iis quicquam certi de ſalute & interitu non denotabat. Quare hæc tametſi bona non ſit, quod morbos ex multa copia pituitoſorum & craſſorum humorum, bilioſis miſtorum, & putridorum, tantum foveri explicet: tamen ex hac ipſa, niſi conjunxerimus alia prava ſymptomata, minime mortem prædicemus. Sequitur flava, quam viridem Hipp. vocat. Hæc multitudinem bilis, ac ab hoc ipſo humore putrefacto morbum profectum ſignificat, illumque periculoſiorem. *Flava vel viridis.* Hac nigra eſt periculoſior, quæ aduſti ſanguinis copiam, ceteris humoribus, ut a natura corrigatur, difficiliorem, præmonſtret. *Nigra.* Hæc ignearum ſeu ardentium febrium cum ſummo ſqualore eſt propria, perpetuoque non parum timenda, omniumque maxime, ſi una adfuerint ſigna alia pernicioſa. Solet itidem ardentes peſtilentes detegere. Ex quo, ut dictum eſt, propria acutorum morborum eſſe merito videtur, quod perbelle *in Coacis præſagiis text.* 229. ita habetur: *Quæ vero valde nigreſcit, judicium fieri in quatuordecim diebus indicat.* Subdidit *periculoſiſſimam eſſe nigram & pallidam*; forte eam, quæ ex pallida nigreſcat; & merito ſane, quum in jecore incendium augeri nobis ſit indicium, quippe, quum prius bilis, ſanguinis loco, progenita eſſet, ex qua ad flavum lingua tingebatur, poſtea aucta inflammatione, aduri ſanguinem, atrumque evadere, qui eſt omnium deterrimus. *Nigra & pallida.* Tertio nigram quoque cum tremore, ſeu tremulam, ut poſtea quoque docebimus, damnat Auctor *Coac. Præſag. text.* 233. ita dicens: *Tremulæ linguæ quibuſdam alvum liquidam reddunt. Nigro vero in iis facto colore, mortem denuntiat.* *Nigra cum tremore.* Lividi coloris lingua omnium maxime eſt letalis, quod fiat in ipſa lividus color, vel ex mutatione a flavo aut rubro in nigrum, propter ingentem viſceris alicujus inflammationem, & caloris extranei abundantiam, cum defectu innati vel exſtinctione caloris nativi. *Livida.* Hanc declarant reliqua ſigna, facultatem exſtingui demonſtrantia, quæ alias ſcripſimus. Rubram quoque ſæpius in anginoſis affectibus & peripneumonicis peſſimam eſſe, Medici obſervant. *Rubra.* Sed hujus malitiam augent & confirmant pernicialia alia ſigna. Cujuſmodi fuiſſe linguam illius *anginoſæ*, quæ apud *Ariſtionem* agebat, quæ quinta die obiit, ut meminit Hippoc. *in lib. 3. Epid. pag.* 1075. *Ægr. 7. text.* 18. *& filii Balis* de quo itidem ipſe *in lib. 7. text.* 19. *pag.* 1215. ſcripſit, qui obiit die nona. Mole aucta lingua in anginis aliquando ita viſa eſt, ut vix ore poſſit contineri; ſed plures, recte curati, ſanitati fuere reſtituti, non pauci ſuffocati. *Mole aucta.* E contrario multis uſque adeo imminutæ linguæ, præ nimio calore, humido omni fere exhauſto, (quod eſt ſignum intenſiſſimi caloris, morbique maxime timendi:) apparent; ſed ad rectum judicium faciendum alia ſigna erunt conſulenda. *Imminuta.* Sed magna & nigra letalis eſt: quod exſtinctum iri innatum calorem ſignificet; qualem habuit *juvenis*, quę vigeſimum ætatis annum agebat, & a pharmaco corruptorio, ut refert Hipp. *in lib. 7. Epid. text.* 83. *p.* 1229. quarto die periit (*quamquam hoc loco de* Teſimi conjuge *iſthæc prædicentur, haud tamen alium caſum hic ab Auctore noſtro innui patebit legenti ſubnexas Foeſy Adnotat. & Epid. lib. 5. text.* 53. *p.* 1155.) Quod ad ſubſtantiam linguæ attinet, quædam admodum molles ſunt, combibita multa humiditate: quædam admodum ſiccæ, aſperæ, inæquales, horridę, ſciſſæ, ulceratæ; quædam cum parvis tumoribus; quędam harum calidæ; quædam frigidę tactui apparent; quædam cum proportione ſiti reſpondente; quædam ſine ſiti. *Magna & nigra letalis.* Siccantur & areſcunt linguę in omnibus febribus, ſed omnium maxime in ardentibus, ac non minus phreniticis: propria videtur ſicca & aſpera ardentium febrium, ut Galen. *in* 1. *Prorrheticorum text.* 3. monuit, quæ fit calore febris vehementer ſicca, immoderatique caloris eſt nota: hæ linguæ primum ſiccę, & aridę fiunt, mox inequales, durę & horridæ; & demum immoderata ſiccitate ſcinduntur & ulcerantur, *Sicca & arida.* *Inæquales.*

non

dura & horrida. non ſecus quam terra, nimis ſiccata a ſole, rimis ac fiſſuris ſæpius ſcindatur immoderata ſiccitate: durę & horridæ peſſimæ ſunt, phreniticorumque propriæ, quum propter proximam inflammationem lingua maxime ſiccetur. Hinc Auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 3. linguas denſas, ſeu duras & aridas, phreniticas appellavit. De his *in Coacis præſagiis text.* 229. ita legitur: *lingua, quæ in principio quidem inhorruit, in colore vero permanet, progreſſu autem temporis exaſperatur, liveſcit & rumpitur, letalis eſt.* Ceterum ex aridis linguis quicquam recte, niſi aliorum quoque ſignorum judicium adjunxerimus, de præſagio non habetur, quum eæ non ſint ſufficiens ſignum ad mortem prædicendam; plures enim, qui tales linguas habuerunt, gravi morbo etſi conflictati, convaluerunt. Cujuſmodi fuit, quam in *muliere trimeſtri fetu gravida Epidem. lib.* 1. *Ægr.* 13. *pag.* 990. in *litore habitante*, & in *virgine Lariſſæ*, *Epidem. lib.* 3. *Ægr.* 12. *pag.* 1110. & in aliis Hipp. vidit. Hæ *Nigra.* ſi nigræ quoque ſint, perniciales magis; ſed ut dictum eſt, debemus quoque, ex iis ut exitium prænoſcatur, alia pernicialia ſigna una obſervare, quæ in *uxore Dromedai*, *Epidem. lib.* 1. *Ægr.* 11. *pag.* 987. & in illo, *qui caleſcens cœnavit. & potavit largius*, *ibid. Ægr.* 12. *pag.* 988. *Hermocrate Epidem. lib.* 3. *Ægr.* 2. *pag.* 1062. & in aliis multis Hippocr. una cum lingua nigra vi- *Præſiccata.* dit. In anginis quoque ita præſiccatæ, peſſimæ ſunt, quod inflammationem internam maximam denotent, qua omnes ſuffocantur: qualem vidit Hpp. *Fiſſa & ulcerata.* in illa *anginoſa ibid. Ægr.* 7. *pag.* 1075. *quæ apud Ariſtionem* agebat, quinta die mortua. Hæ quoque fiſſæ atque ulceratæ apparentes argumento ſunt, malignioris inflammationis, ac efficacioris. Ego in multis, malignis febribus vexatis, ſqualore obſitas, ſ iſſaſque, ac puſtulis refertas vidi linguas, qui non omnes perierunt. Rhaſis *in lib. decimo cap.* 31. ad *Regem Almans* ſcribit nihilominus: *Quum linguæ apparuerint puſtulæ ciceribus magnitudine æquales, fueritque febris vehemens & acuta, æger in principio ſequentis diei morietur.* Quare aridæ, duræ, aduſtæque, & maxime nigræ, ſi quum aliis ſignis malis appareant, exitium præſagiunt, omniumque certiſſime, ubi, linguis ita areſcentibus, aſperiſque exiſtentibus, ægroti non ſitiunt. Hoc enim in ardentibus febribus eſſe ſignum perniciosiſſimum, in ſuperiori libro ſatis a nobis eſt explicatum: hoc quidem apparens ſignum, nota eſt aut delirii, aut exſtinctæ facultatis, ut Galenus *in primo Epidemiorum* tradidit. Ubi itaque lingua aduſta & ſicca ſine *Aduſta & ſicca ſine ſiti.* ſiti apparuerit, proculdubio aut delirium, aut mortem prædicemus: mortem, ſi una alia fuerint pernicialia ſigna, qualia in eo, *qui caleſcens cœnavit*, & in *Hermocrate* muribundis Hipp. vidit. De illo quidem *in primo Epidem. com.* 3. *Ægr.* 12. *pag.* 988. *text.* 29. ita habet: *Quidam caleſcens cœnavit & potavit largius, vomuit cuncta nocte, febris acuta. Hypochondrii dextri dolor, ſubmollis in partibus internis inflammatio: noctem moleſte tranſegit, urinæ ab initio rubræ, craſſæ, depoſitæ non ſubſidebant, lingua præarida: non valde erat ſitibundus.* Et de *Hermocrate*, *lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 2. *pag.* 1062. quum primum dixiſſet, habuiſſe initio linguam aduſtam, fuiſſe ſurdum, vigilem, non admodum ſitibundum, cum urinis craſſis & turbidis, poſtea addidit: *Die* 20. *eſt judicatus a febre liber, non ſudavit; perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat, obdormiſcebat, aliquantiſper comatoſus. Circa diem vigeſimum quintum incaluit, alvus lubrica, cum fluxione tenui & multa, proximis diebus acuta febris linguæ combuſta eſt, vigeſimo ſeptimo defunctus.* Hujus ægroti linguam aduſtam ſine ſiti, unum fuiſſe ex iis, quæ exſtingui facultatem indicant, multa una viſa ſymptomata certo affirmarunt, quippe non ſitire, a cibo perpetuo abhorruiſſe, & reliqua. Quare lingua aduſta, abſq; ſiti, in acuto morbo, uti dictum eſt, vel delirans, vel moribundum corpus præſagit. Sed caute tamen ex his duobus ſignis erit præſagiendum, quando, ut in principio hujus capitis docuimus, ſæpe lingua exareſ-

cat, ac

cat, ac aduſta videatur, ægrotique non ſitiunt, atque neque hos delirare, neque exſtingui facultatem obſervemus. Hoc fit ex humoris pituitoſi e capite diſtillatione, irrigante fauces, ſitimque compeſcente. At hoc cognoſcimus ex hac cauſa fieri, vel eo quod tota lingua in his non areſcat, nam ubi in ardente febre deſtillat humor pituitoſus, linguæ non tota ſubſtantia areſcit, ſed pars juxta radicem tantum, atque cito humore abluta lingua emolleſcit. Addatis hos non vigiles eſſe, ſed ſomno uti convenienti, quod partes corporis ſuperiores plurimum humiditatis habeant. In quibuſdam vero apertiſſime deſtillatio ad fauces dignoſcitur ex crebra, qua coguntur uti, exſcreatione, humore multo deſcendente e capite. Quare ubi, non deſtillante e capite humore, lingua in ardente febre, ſicca, aſpera, atque aduſta ſine ſiti appareat, aut delirium, aut exſtingui facultatem, prædicendum erit. Addamus aridam linguam quandoque calidam, quandoque tactui frigidam apparere; hanc exitialem eſſe, quod nonniſi in magnis inflammationibus, contracto intus calido innato atque humido, propter penuriam & exſtinctionem nativi: calida tactui aſperaque apparens, non ita eſt periculoſa, ſed in principio periculoſior, qualis in *Ermocrate Epidem. lib.* 3. *Ægr.* 2. *pag.* 1062. in principio fuit ab Hipp. obſervata. Tremulæ, ſeu trementes, quoque in acutis morbis apparent, quę, ſi intenſiſſimam ſiccitatem ſecutæ ſunt, prorſus exitiales erunt: nam ea ratione, quippe propter ſiccam ex igneo affectu intemperiem, animali facultate debilitata, linguas tremulas reddi, Galen. *in primo Prorrheticorum* docuit. In phreniticiſque exitioſis hoc ſymptoma apparere ſolet. Hinc Auctor *Prorrheticorum in* 1. *lib. text.* 20. dixit: *linguas obtremeſcentes, ſignum eſſe non conſtantis mentis*. Ex phrenitide quippe cerebro patiente, calidaque exiſtente affectione, lingua quieſcere non poteſt. Eadem ratione convelluntur linguæ, ex quo ægroti balbutiunt, neque recte loqui poſſunt ſæpe ante mortem: & hæc duo ſymptomata, linguam ſcilicet tremulam & convulſam, in perniciali phrenitide Medici deprehendunt familiarius. De quibus Galen. *in primo Prorrheticorum text.* 19. ita habet: *Tremor igitur linguæ accidit, debilitata propter ſiccam prædictæ affectionis intemperiem animi facultate*. Convulſiones vero ſiccitatem muſculorum ipſius, una cum capite affectorum, conſequuntur; ſicut & vox obtremiſcit propter infirmitatem, quæ ab humorum contracta eſt intemperie: prædicta autem hæc omnia ſymptomata, quæ ob ſiccitatis capitis intenſionem fiunt, mentis motionem fieri quoque indicant. Univerſis autem muſculis induratis, linguam tremulam & balbutientem fieri, eſt pernicioſius, quippe propter immoderatam eam, quæ in cerebro facta eſt ſiccitatem. At ne noſtrum nos fallat præſagium, diſtinguendæ ſunt cauſæ linguæ trementis & convulſæ; ſiquidem veluti dictum eſt, ſi fiant immoderate ſiccatis muſculis, ipſorumque capitibus ac nervis, exitiale profecto erit; & ſi in iiſdem nervoſis partibus, humore aliquo repletis, lingua tremat, & convellatur, non exitioſum: ex qua cauſa tremunt, & convelluntur non raro linguæ in principiis morborum, propter humorum multitudinem; ut *Pythioni* contigiſſe ſcripſit Hipp. *Epidem. lib.* 3. *Ægr.* 1. *pag.* 1059. & quando criſis aliqua ſit futura. Qui tremores & convulſiones inter judicatoria ſigna merito recenſeri debebunt. Sed de his alias, quum de prædictione a tremoribus & convulſionibus egerimus. Diſtinguamus itaque de iis ad præſagium linguarum ſymptomata a ſiccitate profecta, quæ perpetuo erunt exitialia, ab iis, quæ repletione fiunt: hæc vel in principiis morborum fiunt, aut una cum ſignis decretoriis aliis, illa vero nonniſi calidiſſimum ſicciſſimumque morbum conſequuntur.

Arida quandoque calida quandoque tactui frigida appareat.

Tremula.

Convulſa.

Tremula & convulſa quando non exitialis.

CAP.

CAP. X.

De prædictione ex faucibus, & dorso.

Fauces quid ad præsagium faciunt in morbis.

FAuces in gutturis inflammationibus, quos affectus Medici *Anginas* appellant, solent non raro magni momenti esse ad præsagium, quum in iis affectibus optimum sit fauces tumidas & inflammatas spectari, quod morbum foras verti significent. De quo Hippoc. *in lib. 3. Prognosticorum, pag. 45. lin. 20. 21.* ait: *Securissimam vero est, si tumor & rubor quam maxime foras vertatur.* At non semper, in acutissimis periculosissimisque anginis, satis est ad salutem præsagiendam, fauces rubentes ac inflammatas spectari, quum sæpius etiam in exitialibus appareant, ex magna sane inflammatione, nedum internas gutturis partes, sed quoque externas fauces, opprimente. Proinde optimum erit una cum faucibus, pectus, cervicem, aut collum rubrum ac maxime inflammatum spectari. Quam rem Hippoc. *in eodem lib. pag. 45. lin. 12. & seq. text. 20.* ita expressit: *Quibuscumque simul fauces rubent, & cervix, sunt hæ anginæ diuturniores, maxime vero ex ipsis servantur, si & cervix & pectus traxit ruborem, nec sacer ignis intro recurrat. Exitialissimas vero anginas esse, ac celerrime intermitentes,* ait, (*Paullo ante, lin. 4.*) *quæcumque nec in cervice, nec in faucibus, conspicuum aliquid efficiunt, plurimum & doloris ac spirationis difficultatem inferunt.* De his doloribus Auctor Coac. præsag. *text. 262.* ait: *Faucium dolores sine tumore, suffocantes*: & Hippoc. *in 4. Aphor. 34. Si a febre detento, tumore non existente in faucibus, strangulatio repente supervenerit, letale.* Sed de his satis. Nunc ad dorsum descendamus, cujus quidem inspectio & ad naturam malignarum febrium cognoscendam, & non minus ad præsagium, Medicis omnibus est satis familiaris, & præsertim in febribus acutis.

Dorsum quid ad præsagium in morbis.

Certum est dorsum in iis aliquando pustulis parvis, milio similibus, & aliquando maculis parvis, pulicum morsibus persimilibus, aliquando magis latisque refertum, conspici. Quod spectari, aliquando bonum, ubi natura præsertim critice excernit humores summe putridos, quandoque malum & exitiosum. Bonæ solent esse, quum pustulæ, tum maculæ ipse, si una cum signis coctionis appareant, quas omnino sequitur morbi allevatio. Ægroti enim ab ipsis erumpentibus maxime juvantur. Ex colore, rubra exanthemata meliora censentur, quæ sanguinis copia, neque ipsum igneo calore exustum, denotent. Bonæ itaque sunt criticæ, quæ cum signis coctionis apparent, & quæ, quum inceperint, numero atque magnitudine augeantur. De quibus legitur *in Coacis præsagiis text. 114. Quibus in febre continua pustulæ toto corpore excitantur, letale, nisi superveniat purulentus abscessus.* Gal. scripsit *in lib. 5. meth. med.* In quadam pestilentia illos evasisse, quibus exanthemata nigra toto corpore multa confertim apparuerint. Raro tamen quicquam certi ad salutem prædicendam ex his habetur; ubi plerumque exitialia signa sunt. Sunt vero perpetuo mala, quum maligniſſimam naturam morbi significent; pestiferorum enim morborum sunt indicia, quod & *Thucydides* non ignoravit, quum in ea sævissima pestilentia, quæ *Athenas* devastaverat, observaverit, corpora eo malo infecta scatuisse his exanthematibus. Colore deteriores sunt lividæ & nigræ. Has enim maculas insignem humorum putredinem, & caloris exstinctionem denotare, nos alias ostendimus. Quum ad copiam, parva intus recurrentia, & evanescentia exanthemata pejora existant, quod naturam cœpisse humores excernere, præ imbecillitateque non potuisse, denotet. De quibus Hippoc. *in 1. Epidem. sect. 2. pag. 946. sub finem*, dixit: *Exanthemata parva, & non pro dignitate excretionis morborum, & cito rursum evanescen-*

neſcentia, *mala*. Addamus puſtulas, ac exanthemata, mala quoque eſſe parva, nec augeſcentia & pauca, quæ meminit Hipp. *in Epidem. lib.* 1. *Ægr.* 2. *pag.* 969. & 970. de *Sileno*, dicens: *Frigidus toto corpore ſudor, papulæ cum ſudore rubentes, rotundæ, parvæ, varis ſimiles permanebant, nec abſceſſum efficiebant*. Demum pernicioſa ſunt, quæ una cum pernicioſis ſignis erumpunt. Qualia in *Sileno* atque in *Critone ibid. ægrot.* 9. *pag.* 985. moribundis apparuerunt.

CAP. XI.

De prædictione ex hypochondriis, & primo de iis, quæ ſalutem ſignificant.

EX hypochondriis præſagium venaturi, primo quid nomine hypochondrii intelligendum ſit, dicamus. Siquidem Galen. *in* 2. *lib. Aphoriſ.* 35. ſcribit: epigaſtrium, ideſt, abdomen dividi in hypochondrium, præcordium, atque ventrem inferiorem, ὑπογαστρον Græcis dictum; per hypochondrium vero eam partem intelligit, quæ a coſtis ſpuriis ad umbilicum uſque pervenit; & clarius *in lib.* 2. *Prorrhetic.* ſcripſit, partes ſupra umbilicum utrimque ad latera, ſpuriis dictis coſtis ſubjectas, hypochondria proprie dici. Ex quibus dicamus & nos quoque, hypochondria, ſive præcordia, ex partibus externis abdominis eas proprie dici, quæ nothis coſtis & iliis; (hæc vero in imo ventre inter coſtam & pubem (*Capari* Galen. vocat) poſita ſunt:) continentur, ſupra umbilicum, & in latus utrumque, aut partes cartilagineas ſupra loca inania ſitas, quæ occupantur ab hepate dextra, a ſplene vero ſiniſtra. Latius vero ſumpta voce, interiora omnia ſub hac regione comprehenduntur, quippe ventriculus, hepar, lien, ſeptum tranſverſum, quæ nomine hypochondrii intellexit Auctor *Prorr.* quum in loco nuperrime citato *p.* 38. *lin.* 30. ſcripſerit: *Febres ex hypocondriorum doloribus malignæ*. Et hęc, quod ad hypochondrii cognitionem ſpectat. Itaque per hypochondria dextram ſiniſtramque abdominis partem, ſupra umbilicum, coſtæ ſpatiis ſubjacentem, intelligamus. Hęc primo ſunt recte valentium ſimilia, quęque optima exiſtunt; ſecundo etiam, quę non bona & diſſimilia, quippe ipſorum tenſiones, dolores, tumores, atque ſuppurationes. De iis Hipp. *in* 1. *Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 30. ita habet: *Hypochondria autem optima ſunt, ſi dolore vacant, ſi mollia & æqualia ſunt dextra ac ſiniſtra parte*. Et merito ſane, quum, ipſis ita ſe habentibus, nullam partem in ipſorum regione contentam, quippe neque ventriculum, neque ſeptum tranſverſum, quę hypochondriis continentur, lęſam eſſe cognoſcimus; quum in febribus acutis has partes recte ſe habere, non leve eſt optimi prędagii argumentum, impoſſibileque eſt aliquam partium illarum læſam eſſe, & hypochondria mollia eſſe, & abſque dolore. Quare in acutis morbis optimum erit ad ſalutem prędicendam, hypochondria, ut dictum eſt, optima obſervari, quippe mollia, æqualia, dextra ſiniſtraque parte eſſe, & dolore vacare. Ex craſſis vero, & gracilibus Hipp. *in* 2. *lib. Aphoriſm.* 35. craſſitudinem habentia commendavit, ita dicens: *in quovis morbo partes ad umbilicum & imum ventrem attinentes, craſſitudinem habere, melius eſt: valde vero extenuari, ac contabeſcere, pravum*. Quare & hæc hypochondria craſſitudinem habentia erunt bona. At optimum erit, prius in ægrotis nos perſpecta habuiſſe hypochondria, qualiacumque ſint; ſiquidem ſæpius in recte valentibus & inæqualia, & non æque mollia obſerventur. Quare nedum ea, quæ optima ſunt, ſalutem præſagient, ſed quandoque inæqualia, tenſa (modo recte valentium ſint ſimilia) idem oſtendent: attamen non æque bonum erit tenſa, & inæqualia (etſi recte valentium ſimilia ſint) ſpectari, veluti mollia, æqualia, & doloris expertia. Illa vero, quippe tenſa, inæ-

Hypocondriorum quid vocatur.

Hypocondria optima quænam.

ſa, inæqualia, in tumorem elata, atque dolentia, perpetuo mala ſunt, ni talia critice apparuerint; ſæpius enim fit, ut, priuſquam aliqua criſis, fiat, hypochondria vel tendantur, vel in tumorem eleventur, aut doleant. De criticis tenſionibus hypochondriorum Auctor Prorrheticorum *Lib.* 1. *text.* 144. ita ſcripſit: *Ventris quoque palpitationes cum hypochondrii tenſione ſublonga, & tumente, ſanguinis indicant eruptionem.* Et paullo poſt *Text.* 147. *Hypochondrii tenſio cum capitis gravitate & ſurditate, & quæ ſplendores perturbant, ſanguinis denuntiant profuſionem. In tertio vero de criſibus cap.* 2. Gal. ait: proprium ſignum fluxuri ſanguinis e naribus eſſe præcordiorum tenſionem ſine dolore; & cum dolore, non fluxurum ſanguinem, ſed inflammationem teſtari.

Hypochondriorum critica tenſiones.

Ex quibus colligimus tenſionem hypochondriorum ſine dolore, & aliquando etiam, præ multa tenſione ex copia ſanguinis dolores, vel hebetudines oculorum ſubire, vel ſplendores oculis obverſari, aut caput grave eſſe, aut ſurdos fieri ægrotos, & denique faciem rubram ſeu coloratiorem obtinere, ut Gal. *in tertio de Criſibus text.* 20. & *in lib. de præſag. ad Poſthumum* ſcripſit; & Auctor Prorrhetic. *Lib.* 1. *text.* 144. 146. 147. *confer & Prorrhet. lib.* 2. *p.* 110. & 111. Criticam eſſe, & particulatim ſanguinem e naribus fluxurum ſignificare. Parotidem vero tenſionem hypocondriorum, cum æſtu anxioſo atque capitis dolore, ſignificare, notavit Auctor *Coacorum Præſagiorum text.* 289. Hipp. vero *in lib.* 1. *Prognoſt. p* 43. *lin.* 14. de futuris criticis abſceſſibus ab hypocondriorum tenſionibus judicandis, ait: *Abſceſſus fiunt hi in locis infernis, quibus circa ilia inflammatio fatiget; illi in ſupernis, in quibus ilia molliora & ſine dolore perſiſtunt.* Ex quibus liquido nobis conſtat, hypocondria, vel etiam tenſa aliquando, optima eſſe, quatenus criticæ evacuationis nobis futuræ ſunt indicium. Eodem modo & de ipſorum tumoribus dicendum; quamquam raro tamen tumores quicquam boni ad prædictionem habere videantur. Nihilominus de iis Hipp. *in* 1. *Prognoſt. p.* 38 *lin.* 50. 51. ait: *Si vero mollior tumor eſt, nec dolet, & prorſus digitis cedit, diuturniorem efficit judicationem, ac minori cum periculo eſt.* Quod clarius, *paullo poſt, lin. ult. Atqui tumores molles & indolentes tardius judicantur, & minus periculi denuntiant:* & Hipp. *in* 1. *Prognoſtic. p* 39. *lin.* 1. *Tumor, qui in ventre fatigat, minus facit abſceſſum, quam qui in iliis. Sanguinis vero fluorem maxime de ſupernis ſedibus exſpectare oportet:* & rurſus *in Coacis Præſagiis Text.* 290. ait: *Ab hypocondriorum tumore bilioſis ſpiritus magnus ac febris acuta parotides emovet*, quod in iis bilioſi humores ferantur ſurſum. Dolores itidem hypochondriorum critice fiunt ſanguine ſurſum copioſius hypochondria diſtendente. Signa ſunt, ut dictum eſt, febris acuta, capitis gravitas, aut ſurditas, aut oculorum hebetudo, facies rubra. Addamus dolores quoque hypochondriorum non malos eſſe, ſi poſtea febris ſupervenerit. De quo dolore *in lib.* 6. *Aphoriſ.* 40. Hipp. ita habet: *Quibus dolor circa hypochondria fit, abſque inflammatione, his febris ſuperveniens dolorem ſolvit.* Et in *Coacis præſagiis Text.* 281. ita habet: *Ceterum præcordiorum dolores ac tumores, ſi fuerint recentes, & non cum inflammatione, ſolvit murmur in præcordio obortum, & maxime ſi pertranſierit cum ſtercore, & urina ac flatu.* Itidem ex abſceſſibus ſuppuratis boni ſunt, *qui foras erumpunt, & quam minimum* (ut placuit *Coac. præſag.* Auctori *in eodem lib. Eod. text.*) *loci occupent, & ſi in acutiſſimum conum colliguntur:* qui de iiſdem ſuppurationibus poſtea ait: *At in iis, quæ rapiuntur intro, optima ſunt, ſiquidem nihil tumoris, doloris & caloris alieni foras edant in ſuperficiem. Quæ vero ſuppurationes his contrariæ ſunt, peſſimæ.* Atque hæc de bonis hypochondriis. Nunc de malis agamus, quæque exitium in ægrotis prædicent.

Hypochondriorum dolores non mali.

CAP.

CAP. XII.

De malis hypochondriis, quæ mortem in acutis morbis præmonſtrant.

HYpocondria in acutis morbis tenſa, dura, dolentia, inæqualiaque, mala eſſe, tradidit Hippocrat. *in* 1. *libro Prognoſticorum pagin.* 38. *lin.* 32. *text.* 30. non minus & ipſa extenuari, malam eſſe, & contabeſcere pravum, *in lib.* 3. *Aphoriſm.* 35. Ceterum, ut clarius rationis tenſorum hypochondriorum, durorum, & ipſorum dolorum, abſceſſuum, ſuppurationum (quæ omnia malum portendunt, modo mala alia ſigna conjungantur) notitiam aſſequamur, de his omnibus ſigillatim, deque cauſis ipſorum agendum, antequam præſagium ex iis indagemus, merito duximus. Horum ſiquidem aſſecutis, tum cauſis ignoratis, utique de præſagio rectum judicium facere nequimus. Hanc rem itaque declarabimus ab hypochondriorum tenſionibus inchoantes. Tenduntur itaque hypochondria, aliquando cum tumore ac duritie, ita, ut tactui dura appareant; aliquando citra tumorem, ita ut, etſi tenſa videantur, tamen vacua exiſtant, quas tenſiones Galen. vacuas, ſubmolles, citra tumorem vocat. Hippocrat. vero de his tenſionibus aliquando ait, veluti in *Hermocrate lib.* 3. *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 1062. *hypocondria molliter contendebantur*: aliquando *tenſiones ſubmolles* vocat, & nonnumquam hæc *hypochondria ſublimia* appellat, uti in *Eraſino ibid. lib.* 1. *Ægr.* 8. *pag.* 984. fecit, Hæc hypochondria habent quidem tenſiones, ſed vacuas, atque citra ullum tumorem durum. Quod ad figuram etiam attinet, tenſiones aliquando oblongquales muſculorum rectorum abdominis, aliquando latæ, aliquando rotundę ad lunæ figuram, quales hepatis tumores repræſentant. Cum duritie vero, ſeu tumore duro, hypochondria tenduntur, ab inflammatis, aut muſculis, aut hepatis convexa ſeu gibba parte, aut liene, aut ventriculo ipſo, a flatulento autem ſpiritu, vel a copioſo ſanguine muſculis repletis. Hæc ſine duritie etiam tenſio ſine dolore eſt, uti in multis, quibus per nares ſanguis copioſius erupit, obſervatur: a flatu tenſio eſt ſine duritie, & ſine gravitate: a copioſo vero ſanguine neque ſine duritie, neque ſine gravitate eſt: ab inflammatione demum, ut dictum eſt, tenſio eſt cum tumore, modo inflammatio muſculos exterius occupet, aut hepatis convexam partem, aut lienem, aut denique ventriculum: atque hæc eſt tenſionum ratio. Sed age, hanc rem declaremus propterea, quod dictum eſt ab inflammatis his viſceribus tendi hypocondria cum duritie, ex quo perpetuo videtur, hanc tenſionem ab ea cauſa proficiſci. Hoc etſi verum ſit, quippe per omnem tenſionem cum tumore, ſeu duritie, atque dolore, indicari viſcerum inflammationem; tamen hoc quoque ex Galen. doctrina verum erit, plures tenſiones non duras, ſed molles, ideſt, ut Galeno videtur, vacuas, inanes, ſublimeſque, citra viſcerum inflammationes fieri: de quibus quidem tenſionibus utile erit paullisper accuratius agere. Tenſiones itaque molles, ſeu vacuas, ſeu inanes, ſeu citra tumorem, quæ nomina idem explicant, fieri aut viſcerum internorum inflammatione, aut ſiccitate principii nervorum, ad ſeptum tranſverſum venientem: hoc modo hypochondria ſurſum trahuntur, meritoque Hipp. aliquando hæc ſublimia vocat: illo modo tenduntur quidem, ſed quum intus viſceris inflammatio nos lateat, nullus tumor vel durities exiſtit. Galen. *in* 3. *Epidem. com.* 2. *text.* 1. ſcribit: *hypochondriorum mollem renitentiam ſignificare aliquod viſcus eſſe inflammatum, quippe aut jecur, aut ſeptum tranſverſum, aut lienem*. Et *in primo Epidemiorum*, de *Sileni* tenſione in hypochondriis agens, ſcribit: *ſepti tranſverſi inflammatione hypochondrium per continuitatem ſurſum trahi, contendique abſque tumore*. De hac tenſione *in*

Hypocondriorum tenſiones malæ.

Hypochondria ſublimia quænam dicta.

lib. 3.

lib. 3. Epidemiorum, ita habet: *Ac ſi ita diceret dextrum hypochondrium intendebatur, ſed citra tumorem, vel quia non magna fuerit jecoris inflammatio, vel infimis partibus dumtaxat, quibus ventrem complectitur, quum gibba nondum una cum infimis in tumorem eſſent elata.* Quod *Hermocrati lib. 3. Epid. Ægrot. 2. pag.* 1062. contigit. Ex quibus conſtat fieri in hypocondriis tenſionem mollem, ideſt citra tumorem ex inflammatione ſepti tranſverſi, jecoris atque lienis, ſed jecore inflammato non toto, neque magna inflammatione affecto, ſed aut parva, aut tantum infima ejus parte inflammata. Ex quo tactu primo occurrens gibba nondum inflammata, apparet tenſio citra tumorem & mollis. Sed hæc tenſio numquam toto jecore inflammato apparebit, vel magna affecto inflammatione. Diximus hanc ipſam tenſionem fieri quoque non ſolum ab inflammatis viſceribus, ſed & a magna quidem exſiccatione. Quas cauſas Galen. in *primo Prognoſt. text.* 30. ita complexus eſt: *Quandoque enim intenduntur ilia ſine inflammatione proprie nominata, aut propter vehementem ſiccitatem non ſolum in illa parte, ſed etiam in ſepto tranſverſo, coſtis, membrana, præcordiis; aut propter inflammationem, cum tumore, ipſorum in iliis muſculorum conſiſtentem ſine inflammatione proprie vocata quæ quidem tumor dolens eſt.* Sed has tenſionis mollis cauſas, vel etiam clarius *in lib. 3. Epidemmiorum comm. 3. text.* 1. Galen. ita expreſſit: *Hypochondrium tenditur, ubi a ſepto tranſverſo vicinæ partes trahuntur.* At ipſum tenditur ſeptum tranſverſum interim in pleuritide ob inflammationis magnitudinem ſuccingentis membranæ coſtas; interim ob originem nervorum, ad ſe nervos, qui ad ſeptum tranſverſum pertinent, attrahentem; interim vero per ſuam ipſius inflammationem. Atque hæc erant de tenſorum hypochondriorum cauſis præmittenda, quibus perſpectis nunc ad prædictionem deſcendimus. Hipp. itaque *in lib. Prognoſt. pag. 38. lin. 38. text. 39.* ait: *tumorem durum, & dolentem in utroque hypochondrio, aut in dextro, eſſe peſſimum. Talem quoque ſignificare*, affirmavit, *ab initio mortem brevi fore*. Galen. vero *in comm.* intelligit per tumorem, inflammationem, jecur, aut ventriculum, aut lienem obſidentem, ex qua plures quum cito intereunt, præſertim ubi magna eſt; ſed præſagii judicium alia ſigna perniciosa confirmabunt. Sed ubi tumor ex muſculis inflammatis fit, raro mortalis æſtimatur. Sed Hippocrates priorem ſententiam, in qua ait, *ab initio tumorem durum cum dolore brevi mortem prænuntiare*, paullo poſt ita limitaſſe viſus eſt, quod nonniſi magnus, & non quivis mortem præſagiat, neque ſemper. Quod ita habet *Ibidem lin. 54. text. 40. Quicumque ergo tumor dolens, durus & magnus eſt, periculum mortis brevi fore ſignificat.* Quaſi dixerit, hujuſmodi tumores, ideſt viſcerum inflammationes, ſi interimere ægrotos debeant, cito id facere; nam diu quum durant, ſuppurationem potius, quam mortem denotant futuram, quod paullo antea Hippocrates tradiderat, hiſce verbis *Ibidem lin. 44. ſi febris vigeſimum tranſcendit diem, & febris detinet, & tumor non deſiſtit, in ſuppurationem verti contingit.* Quare tumores cum dolore in hypochondriis, qni non ex inflammatis muſculis, ſed aut jecore aut ventriculo, ſunt periculoſi, præſertim ſi magna inflammatio.

Hypochondriorum tenſiones dura pernicioſæ.

At hujuſce præſagii judicium confirmabunt ſigna illarum inflammationum pathognomonica, tum morem ſignificantia, quæ poſtea apparent; pernicioſe enim exitium prædicant, qualia Hippocrates vidit in *Apollonio*: De quo *in libro tertio Epidemiorum, Comm. 3. Ægr. 13. pag.* 1111. ita habet: *Somni non aderant, inflatio mala, magna ſitis, comatoſus erat, hypochondrii dextri elevatio cum tumore, extremæ partes undique ſubfrigidæ, aliquantulum delirabat, omnium obliviſcebatur, quæ locutus eſt: mente movebatur.* Non minus pernicioſæ ſunt hypochondriorum tenſiones ſubmolles citra quippe tumorem; quum oſtenderimus aut nobilium viſcerum inflammationem, aut maximam ſicci-

ficcitatem principii, vel nervorum ad ſeptum tranſverſum deſcendentium, aut membranæ coſtas ſuccingentis, pleuræ vocatæ, ſignificare. Ceterum hæ tenſiones per ſe ſolum, tametſi perpetuo malæ ſint, numquam exitium prædicunt, niſi alia prava una illuxerint ſigna. Quando non omnes inflammato jecore, aut ventriculo, aut ſepto tranſverſo, moriantur. Quare neceſſe erit, ut reliqua ſigna conſulamus; quæ ſi mala fuerint, ac ex letalibus, proculdubio mortem poterimus prædicare. Quales tenſiones fuere obſervatæ in *Sileno lib.* 1. *epid. ægr* 2. *pag.* 969. *Hermocrate epid. lib.* 3. *ægr.* 2. *pag.* 1062. *Philidæ ibid. ægr.* 4. *pag.* 1070. *adoleſcente Melibœæ ibid. ægr.* 16. *pag.* 1117. *& adoleſcentulo, qui in mendacium foro decumbebat, ibid. ægr.* 8. *pag.* 1076. quibus quum ſubmolliter hypochondria tenſa eſſent, una quoque ſigna mala & letalia affuerunt. *Non minus & ſubmolles citra tumorem.*

Eodem modo hypochondriorum dolores cum tenſione prædicta, & malis ſignis, letales eſſe ſolent, veluti *Uxori Dromeadai epid. lib.* 1. *ægr.* 11. *pagi.* 987. contigit, in qua tertia die hypochondrium quum doluerit, habebat urinas craſſas, turbidas non reſidentes, & ſudores frigidos, quæ omnia letalia exiſtunt. De eo vero, *qui caleſcens cœnavit*, ita habet Hippocr. *ibid. ægr.* 12. *p.* 988. *Quidam caleſcens cœnavit & potavit largius, vomuit cuncta. De nocte febris acuta, præcordiorum dextrorum dolor, ſubmollis in partibus externis inflammatio, noctem moleſtam duxit. Urinæ primo rubræ, craſſæ, quę depoſitæ non reſidebant, lingua præarida, non admodum ſitibundus.* Quæ in ipſo ſigna fuerunt perniciosiſſimæ ac letaliſſimæ inflammationis, qua cito exſtinctus eſt. Auctor vero *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 56. ſcribit: *Febres ex hypochondriorum doloribus, malignę:* ſed Gal. ait: non omnes, ſed eæ tantum, quæ inflammato aliquo viſcere ſuſcitantur: ſed neque omnes eſſe malignas, ſed acutas malignas eſſe, alia ſigna prava demonſtrabunt. Addamus hujuſmodi quum tenſiones, tum dolores, eſſe pravos ac letales, ſi ab aliqua ſatis copioſa evacuatione adhuc perduraverint. De quibus in *Coac. præſ. text.* 284. legitur: *Dolores qui in hypochondriis incidunt, tum alias pravi ſunt, tum ſi inde alvus perfluit.* Quod in nuper citatis ægrotis videre eſt, namque in *Sileno lib.* 1. *epid. Ægr.* 2. *pag.* 969. cum tenſione hypocondriorum fuerant dejectiones tenues ſubnigræ, & *Eraſinus lib.* 1. *epid. ægrot.* 8. *p.* 984. cum ſudore habuit tenſa hypochondria; atque hæc eſt tota ratio prædicendi ex tenſionibus malis hypochondriorum. Malæ quoque ſunt ſuppurationes hypochondriorum, in quibus alvi copioſæ dejectiones, cum magnis faſtidiis, ſyncope, vomitibus, atque omnium maxime febre nihilo diminuta, minimeque ægris exinde juvatis. Diximus eos tumores ſuppurari, qui diutius duraverint cum febre, ex Hipp. qui *in* 1. *Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 44. *text.* 35. ita habet: *Si vero viginti dies tranſgrediatur tum febris detinens, tum tumor non conſidens, ad ſuppurationem convertitur.* Et paullo poſt *Ibidem lin.* 44. ait: *Si vero tranſgrediatur ſexaginta dies febris & tumor non conſidat, ſuppuratum fore ſignificat & hunc, & eum, qui in reliquo ventre eſt eodem modo.* De eorum prognoſtico agit Auctor *Coac. Præſag. Text.* 281. ita dicens: *Inter abſceſſus letales ſunt, e quibus introrſum erumpunt; reliquorum vero ſuppurationes ex iis, quæ foras erumpunt, maxime laudabiles, ſi quam minimum loci occupent, & ſi in acutiſſimum conum colligantur. At in his, quæ repunt intro, optimæ ſunt, ſiquidem nihil tumoris, doloris & caloris alieni foras edant in ſuperficiem. Quæ vero ſuppurationes his contrariæ ſunt, peſſimæ.* Quare ex his adde, ad cognoſcendas malas ſuppurationes, in hypochondriis tumorem, vel dolorem, vel calorem ſentire, indicium eſſe latentis, non ſublatæ, inflammationis. Si itaque a ſuppuratione tenſa adhuc maneant hypochondria, minimeque laxentur, adhuc magis, ſi doleant etiam & caleant, pravum eſt, ac letale: omniumque maxime exitium prędicendum erit, ſi nedum copioſa puris excreti *Hypocondriorum dolores quinam letales.* *Hypocondriorum ſuppurationes quænam malæ.*

vacuatio ægrum juverit; atque exitiosissimum, si ipsi in pejus labantur. Hæc enim vacuatio erit ex judicatoriis, non judicantibus, letalis, eoque magis, si virium languor, aut aliud signum pravum una illuxerit: & hoc est præsagium suppuratorum hypochondriorum. Sed unum dicamus, quo cognito finem huic capiti imponemus, quippe Hipp. *in primo libro Prognosticorum pag. 38. lin. 34. text. 31. & 32.* scripsisse: *Si vero pulsus in hypochondriis insit, perturbationem significat, aut delirium.* Verum oculos talium conspicari oportet; si enim crebro obtutus movetur, exspectanda insania est. Quod *in Coacis præsagiis text. 282.* ita confirmatur: *Pulsus in hypochondriis, cum perturbatione, delirium portendit, & magis, si oculi crebrius moveantur.* Atque hoc fit verisimile, aut propter septum transversum inflammatum, aut propter humorem effervescentem, ex quo flatus multi suscitantur, qui copiosius in caput ascendentes, ac membranas cerebri calefacientes, & mordentes, delirium faciunt. Hujusmodi vero pulsus plerumque malus, etsi aliquando bonus, ubi crisin antecedit, qui criticis signis a malo distinguitur. Quum vero una cum ipso alia prava adfuerint signa, mortale esse id, affirmandum, de quo in *3. Coacor. præsag. text. 283. Oris ventriculi dolor cum hypochondrii pulsatione, refrigerata febre, malum, tum alias, tum si tenuis sequatur sudor.* Atque hæc de malis hypochondriis dicta sufficiant. Supereresset quoque agendum de prædictione ex hepate atque liene, sed quoniam ea, quæ in ipsis exterius ad prognosticum considerantur, fere omnia nunc dicta sunt, idcirco nihil aliud de his scribemus.

CAP. XIII.

De prædictione ex ignobilibus corporis partibus.

PArtium corporis, quum nobilium tum ignobilium observatio in acutis morbis plurimum ad prædictionem juvat; & merito sane, ut Galen. placet, quum nobilia membra diu graves morbos ferre nequeant: ipsis enim gravi morbo vexatis facultates omnes diminui, & tolli, cuique nostrum est manifestum. In acutis morbis, humoribus putridis ad nobilia membra motis, & ipsa obsidentibus, mors sequi solet, iisdemque a nobilibus ad ignobilia compulsis, salus. Hinc Hippoc. dixit acutorum morborum non omnino certas esse prædictiones salutis & mortis, quod incerti simus, ad quam partem corporis, vel nobilem, vel ignobilem, præ summa putredine quum tenuissimi, tum turgentes, moveri debeant. Hoc unum certum est, si transmittantur ad principem partem, magnum vitæ periculum parare, & plerumque mortem; & si ad ignobilem, a principibusque remotam, salutem. Ex quo omnium harum partium in acutis morbis observatio Medicis ad præsagium faciendum, nedum utilis, sed quinimmo necessaria erit. Per partes vero principes communiter has intelligimus, quippe cerebrum, hepar, cor, ventriculum, gulam, asperam arteriam, pulmones, sceptum transversum, intestina tenuia, pleuram, membranam costas pectoris succingentem. Has postremas principes atque nobiles fecimus, quod aut principibus proxime serviant, aut quod sint proximæ, aut quod propter colligentiam partium cum principibus magnam habent convenientiam. Non principes, sed ignobiles sunt cutis partes extimæ, extremæque, post aures, sub alis, & inguine. In iis itaque omnibus utile est, in acutis morbis quicquam videri, quod ad ipsas morbum decubuisse nobis significet. Hujusmodi denotant, dolores, diu durantes, critici, de quibus accurate in 2. libr. egimus, & quomodo aliquando in partibus ignobilibus salutem critice demonstrent, tumores itidem, in cute oborti, diu persistentes, & in cruribus, pedibus, ac in aliis partibus, a

Partes principes quænam.

Ignobiles quænam.

princi-

principibus remotis, optimi sunt; modo critice apparuerint, quippe conspectis coctionis signis. De quibus Hipp. *in* 2. *lib. Prognost. pag.* 43. *lin.* 18. *tex.* 67. ait: *Abscessus si in cruribus erumpit in pulmonia vehementi, ac periculosa, omnis utilis est*: & Galen. In Pulmonia vehementi abscessum erumpere in cruribus, prorsus bonum censetur, siquidem maxime vera sententia Hippoc. est 2. *lib. de morbis vulgaribus* inscripta; *Sect.* 1. *pag.* 1002. de bonis abscessibus, ut optimi sint, si deorsum quam longissime a morbo absistant, sed potissimum, si cum coctione pariter erumpant. Hac eadem ratione commendantur tumores in cruribus, in inguine, testibus, sub axillis, atque post aures critice apparentes, de quibus nos posterius singulis accuratius. Commendantur etiam, ut dictum est, pustulæ, exanthemata, variolæ, morbilli, pruritus scabiesque, si modo, ut dictum est, signa coctionis in excrementis præcesserint. Veluti hæc non critice, sed symptomatice conspecta, in quibusvis partibus ignobilibus mala sunt, quod vi morbi, non naturæ, prodeant. Sed de iis singulis accurate agemus, ubi de prædictione ex tumoribus omnibus sermonem instituerimus. Nunc sufficiat dixisse in acutis morbis sæpius glandulas post aures inflammari, & intumescere, quas *parotides* Medici appellant, aliquando sub axillis, & non raro in inguinibus, atque etiam testes exinde intumescere. Qui tumores aut principio febris apparentes, aut ipsos si febris sequatur pravum est, morbumque malignum ostendunt; si vero cum humorum coctione erumpant, minus malum, & plerumque salutare significant: nimirum quod naturam nobilia viscera exoneravisse, protrudendo noxios humores ad has ignobiles partes, sint indicio. Optimi vero sunt, qui diu durant, rectitudinem servant, augentur, sed qui tamen ad nimiam non venerint magnitudinem, neque minores sint, quam debeant. Hi enim pessimi existunt, non minus & qui paullo post intus recurrerint, atque evanuerint: sed de his, ut dictum, alias uberius loquemur. Hinc extremas corporis partes ad prædictionem consideremus.

CAP. XIV.

De prædictione in acutis morbis ab extremis partibus.

PArtes extremas vocat, Galen. *in Comment.* 4. *lib.* 2. *Prognost.* Hippocr. aures, nares, manus atque pedes. Hæ partes solent in acutis morbis sæpius magnam partem præsagii habere. Quando numquam mori hominibus contingat, his partibus nihilo a naturali statu mutatis: necesse est enim in moribundis, ut hæ partes refrigerentur, & colore liveſcant & nigreſcant; atque etiam in multis manus pedesque indecore moventur. Ex quo extremorum caliditas in acutis morbis numquam mala, veluti frigiditas perpetuo mala, pessimaque, ubi interiora calent, & maxime sitiant. Quod Celsus ab Hippocrate depromtum ita expressit: *Cui, febre æque non quiescente, exterior pars friget, interior sic calet, ut etiam sitim faciat, letale*. Hoc signum cum aliis malis esse letale, *in* 2. *libro*, in quo de extremorum caliditate & frigiditate accuratissime egimus, ostendimus. Summe exitiosum vero erit (quamvis perpetuo extremarum frigiditas in continuis febribus sit timenda) frigus extremorum, vix recalescens, aut numquam; omniumque maxime, si una partes liveant, & nigræ appareant.

Extremorum caliditas in acutis morbis numquam mala, contra frigiditas.

De quibus Hippocr. *in* 1. *Epidem. Comment.* 1. *pag.* 940. *text.* 28. *Frigebant his multum extremitates, ac vix calor his revocari poterat*, & paullo post *pag.* 945. *in medio*: *Multum vero frigus erat, & vix eis calor revocari poterat*. Quod in *Philisco* moribundo fuit observatum, de quo Hipp. *in* 1. *Epid. Ægr.* 1. *p.* 966. *Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem illæ amplius redi-*

Extremorum color quinam optimus.

redibant. Sed hæc ſatis de frigiditate partium extremarum ; qui hanc rem perfecte habere cupiunt, videant *cap.* 15. *lib.* 2. in quo de hac re nos fuſius. Eodem modo de colore dicendum ; optimus enim color recte valentium ſimilis erit ; nonnumquam rubeus ac inflammatus, ſi critice ſanguine ad extremas partes decumbente fiat. Omnium peſſimus ac exitialis eſt lividus atque niger, de quibus quoque ſuperius in hoc libro abunde dictum eſt. In acutis itaque morbis, extremas partes nigras aut lividas ſpectari, exitiale eſt; quum aut caloris exſtinctionem, aut ſummam humorum putredinem denotet, ut alias a nobis demonſtratum. Hos colores in extremis vidit Hipp. in *Philiſco*, *Epidem. lib.* 1. *pag.* 966. *Ægr.* 1. *Sileno Ibidem pag.* 969. *Ægrot.* 2. moribundis. De illo dixit: *Frigida ſudavit, extremitates lividæ* ; & de Sileno : *Sexto circa caput parum ſudavit, extremitates frigidæ, lividæ, multa jactatio.*

Manus & pedes indecore moti & agitati mali.

Manus etiam atque pedes indecore moti, & agitati damnantur ab Hippocr. de illis *in lib. Prognoſtic. pag.* 38. *lin.* 1. *& ſeq.* ſcripſit : *Qui in febre acuta, aut delirio, aut pulmonia, aut capitis dolore, manus ſubinde ob os fert, aut colligit feſtucas, aut de veſte evellit pilos, aut de pariete ſtipulas carpit, id omne malum, exitialeque eſt.* Non minuſque pedes, non calidos, nudos habere, de quo ſigno *in eodem lib. pag.* 37. *lin.* 43. dixerat: *Si vero nudos habeat pedes nec admodum calidos, ac manus, collum & crura diſpergat inæqualiter, malum eſt ; ſignificat enim inquietationem.* Quando etiam homines modeſti, ac præſertim mulieres, pudenda coram adſtantibus denudant, peſſimum eſt, aut enim delirium, aut exſtinctionem facultatis denotabit. Atque hæc obiter de prædictione ab extremis partibus, de qua re in ſecundo libro nos accuratius egimus.

Pedes frigides nudos habere, malum.

Invirecundia in acutis morbis, mala.

FINIS QUINTI LIBRI.

PRO-

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS

Philoſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum ſimplicium Profeſſoris ordinarii,

DE

PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER SEXTUS.

CAP. I.

De quibus ſit agendum in hoc libro, ac primo de prædictione, ex coctione atque cruditate excrementorum.

QUum potentiæ naturalis a quatuor, ut etiam dictum eſt, functionibus robur ac infirmitas innoteſcat, omniumque maxime ex alteratrice ſeu concoctrice, atque excretrice; quia ad has referuntur coctiones omnes excrementorum, & excretiones, quas Medici *criſes* appellant, atque ipſa non minus excrementa, quorum quidem omnium obſervatio magnam præſagii partem nobis perſpectam ac cognitam reddit: itaque in hoc libro, ut jam captam prædicendi methodum ex naturali facultate proſequeremur, de coctionibus, cruditatibus, excretionibus, diebus criticis atque criſibus ſigillatim a ſingulis quum excrementis, tum ipſorum excretionibus, Prognoſticum indagandum duximus. Exordiemurque a prædictione ex coctione atque cruditate excrementorum, quæ ita ad prædicendi rationem faciunt, ut ſine ipſorum cognitione nemo poſſit quicquam certi de ægrotantium ſalute vel morte aſſequi. Quod, ut probe cognoſcatur, in primis quid coctio ſit, & quid cruditas, quotupliciter accipiatur a Medicis, atque quo modo fiat, intelligendum eſt. Galen. *in lib.* 1. *Epidem. de coctione* ita habet: *Concoctio enim quædam eorum, quæ præter naturam ſunt, eſt ipſa maturatio morbi. At ipſa coctio in coquentis ſubſtantiam deductio quædam eſt ejus, quæ coquitur.* Hanc clarius Galen. *in* 3. *de natura hum. in text.* 4. *& in lib. de ſympt. diff. cap.* 4. expreſſit, quid ſit; nimirum dicens; *eſſe ciborum alterationem in propriam & convenientem qualitatem ejus, quod nutritur, quam Græci πέψιν vocant.* Hanc veram Medici ac propriam coctionem vocant, quam ad prædictionem Medici ita non conſiderant, veluti alteram, quæ penes excrementa biliosa, & ſumme putrida attenditur, quæ eſt alteratio non ciborum, ſed noxiorum humorum, in qua paucum eſt, quod in alimentum mutetur, vel nihil, quam Medici in morbis acutis maxime ad prædictionem ſpectant. Qua dicimus morbum habere excrementa concocta & cruda. De qua Galen. *in* 2. *de vict. rat. in acutis* in hunc modum: Nempe biliosa cruda ita appellavit, quoniam & excrementorum coctionem appellat; quam-

Coctio quid & quotuplex.

quam mutata nutrire non poſſunt, ut bilis utraque, & qui Græcis ἰχῶρες dicuntur. Verumtamen, quoniam & talia evincit natura, cocta quidem vocare conſuevit Hipp. excrementa hujuſmodi, quæ a natura ipſa evicta ſunt, cruda vero, quæ non ſunt evicta. Galen. *In 6. Epidem. comm. 2. text. 9.* concoctionem bilioſorum humorum vocat, mutationem in optimam qualitatem, & mediocre quoddam temperamentum, & *in 2. de vict. rat. in acutis text. 14.* ſcribit concoctum omne dici, vel quod a calore naturali mutatum nutrit, vel ſi non nutriat, quod a natura devictum ſit mutatumque in ſuum naturalem ſtatum; ut bilis, quæ in homine ſano erat pallida, parumque acris, flava & ſumme acris facta & multum fœtida, concocta dicitur, ubi minus acris minus colorata & fœtida reddita eſt. Fiunt vero eæ concoctiones bilioſorum putridorumque humorum natura, atque cruditates, morbo prævalente naturæ, ut Galen. *in lib. de conſtit. art. med.* docuit. Sed nunc ex ipſis præſagium in morbis perſcrutemur. Quum itaque dictum ſit, coctiones in excrementis naturam prævalentem demonſtrare, inde affirmabimus nihil magis ſalutem nobis ſignificare, quam excrementa videri concocta. Proinde Galen. *in lib. art. medicinalis, cap. 83.* coctionem eſſe ex ſalubribus ſignis ſtatuit: propterea etiam *in primo lib. Aphoriſm.* dixit: *Signa coctionis perpetuo bona & numquam mala*, & Hippoc. *in Epidem. lib. 1. ſect. 2. pag. 948. text. 43.* ait: *Maturationes excrementorum omnes, undique tempeſtivæ aut bonæ*, & poſtea: *Coctiones celeritatem portendunt judicii ſecuritatemque ſalubrem* & Gal. *in lib. de Criſib. cap. 18.* dixit coctionis ſigna numquam male apparere: tantique hoc ſignum eſt ad prædicendam ſalutem momenti, ut Galen. *in lib. de conſtit. art. med.* nuper citato, affirmaverit, hoc omnibus commune eſſe, numquam morbum ſolvi poſſe, niſi prius in excrementis coctionis ſigna conſpiciantur. In morbis, ventrem occupantibus, oportet concocta alvi excrementa videri, de quibus Hipp. *in 2. Prognoſ. p. 39. lin. 54. Alvi excrementum optimum eſt, quod molle atque conjunctum eſt, quodque ea hora exierit, qua tempore ſanitatis conſueverat, quantitate vero, quæ ſit pro ratione cibi aſſumti; tali enim exiſtente dejectione, inferior venter ſanus eſt.* Galen. addidit, ſubrufumque debere ſpectari nec admodum grave olens. Eodem modo in acutis febribus, inflammationibus hepatis, ventriculi, diaphragmatis, lienis, urinæ concoctæ ſpectabuntur, ſi ad ſalutem tendat morbus, de qua etiam in *Prognoſticis pag. 41. lin. 13. Urina optima eſt, ſi candidum ſedimentum fuerit, læve & æquale per omne tempus, dum morbus judicetur. Securitatem enim ac morbum fore brevem ſignificat.* In morbis vero pectoris & pulmonum ſputa concocta excerni debent, de quibus Hipp. *in eodem 2. Progn. p. 41. lin. 13. text. 43.* ita habet: *Sputum vero in omnibus doloribus, qui ſunt circa pulmonem & coſtas, cito prompteque exſpui convenit, & flavum ſputo valde permixtum apparere*, & Gal. *in 1. lib. Aphoriſ.* dixit, ſputum concoctum eſſe album, læve, æquale, non admodum vel tenue, vel craſſum, quodque facile exſpuitur. Atque hę notæ ſufficerent pro cognoſcenda coctione in urinis, dejectionibus, atque ſputis. De his poſterius & de omnibus quoque excrementis nos accuratius. Colligamus itaque coctiones excrementorum numquam malas, ſed perpetuo bonas eſſe. Addimus concoctionem uſque adeo ad ſalutem prædicendam facere, ut omnia, nedum bona ſigna, una cum ipſa coctione conſpecta, ſalutarem morbum demonſtrent, at quinimmo etiam mala cum ſignis coctionis non ſint timenda. Vigiliæ enim, deliria, vertigines, comata, dolores, convulſiones, tremores, anxietudines, reſpirationes difficiles, atque alia, quæ per ſe mala exiſtunt, cum ſignis coctionis, ſalutaris futuræ criſis ſolent non raro eſſe indicia. Omnes itidem excretiones, poſt coctionem apparentes, ſalutares exiſtunt, a naturaque prævalente fiunt, ut Galen. *in 1. Epid. comment. 2. text. 45.* docet: *Quando igitur poſt morbi coctionem aliquis humor vitioſus*

Concoctiones bilioſorum & putridorum humorum ſemper bonæ.

vitioſus exernitur, tunc corpus a natura expurgatur. Et paullo poſt : *Et propter hoc atra bilis & alius omnis hujuſcemodi humor, ubi ſigna coctionis in morbi proceſſu apparuerint, bonam ſignificant evacuationem*. Ex quo merito Hipp. *in quarto, de Vict. rat. in acut. p.* 396. *lin.* 21. *& ſeq. text.* 10. dixit: *Et ſi e naribus fluxerit ſanguis, ſolvitur ægritudo, atque ſi ſudores ſupervenerint judicatorii legitimi, cum urinis albis, craſſiſque & levibus ſubſidentiis*. Sed dicet aliquis, quo tempore morborum conſpiciuntur coctionis ſigna ? Non principio ; quum hoc tempore morbi plane crudi exiſtant : non etiam augmento, quod tunc imperfectæ conſpiciantur coctiones : reſtat, ut in ſtatu, quo tempore natura humores coxit, ex Gal. *in primo Aphoriſ.* 22. ſcribente : *coctionis ſigna numquam in morbi principio conſpici*. Hæc vero, ut Gal. *in lib. de Conſtit. art. med. cap.* 18. ſcripſit : *agnoſcentur ex propriis excrementis : eos enim morbos, qui in ventriculo, & parte cava jecoris, meſenterioque fiunt, concoctæ alvi dejectiones ſalutares denotant ; & urinæ illæ illos, qui in toto veneſo genere, in renibus atque veſica, fundantur ; atque excrementa tuſſi rejecta concocta, qui in thorace ac pulmonibus fiunt ; non minus quam in vomitibus coctiones, affectus ventris ſuperioris ac ſtomachi ; & excrementorum, quæ per palatum, aures, atque nares deſcendunt, cerebri affectus*. Atque hæc ſint dicta de prædictione in morbis ex coctione. Nunc ex cruditate idem perſequemur. Ex qua numquam quicquam boni præſagitur, ſed perpetuo malum ; adeo ut, etſi aliquando, ut docebimus, naturæ judicia & morborum ſolutiones fiant, hoc eſt tamen rarum, atque infidele ſatis, ad certam de ſalute prędictionem aſſequendam. De quo ſigno Hipp. *in* 1. *Epid. ſect.* 2. *p.* 948. *Cruda vero & incocta, atque in malos abſceſſus converſa, aut acriſias*, (ideſt judicationis carentias) *aut dolores, aut morbi longitudinem, aut mortem, aut morbi recidivam ſignificant*. Tantum ad malum præſagium poſſunt ſigna cruditatis, in urinis, alvi dejectionibus, atque aliis excrementis, ut cum ipſis quicquam boni umquam elucere nequeat. Mala enim ſigna, cujuſmodi ſunt vigilię, deliria, anxietudines, reſpirationes, pulſus mali, & alia multa, durante cruditate, in acutis morbis mortem ſignificant : bonaque viſa ſigna, cujuſmodi eſt morbi allevatio, ſudores vel etiam boni, eruptiones ſanguinis, vomitus, dejectiones, urinæ copioſę, nihil boni ſignificant, neque his eſſe fidendum, quod non ex ratione fiant, nobis perſuadetur, juxta illud Hipp. *Aph. ſect.* 2. *text.* 27. *His, quæ ſine ratione fiunt, parum eſt credendum*. Cum cruditate itaque neque bonis ſignis fidere debebimus ; quoniam ex ipſis nullum fidele judicium habetur. Hinc dixit Galen. *in lib.* 1. *de Criſib.* Decretoria ſive judicatoria ſigna non ſtatim apparere, quod tunc omnia ſint crudiſſima, & *in* 4 *lib. Aphor.* 22. quando aliquis incipit morbus, nullam vacuationem eſſe, & *in* 1. *Aphor.* judicatio cum cruditate aut perniciem, aut longum morbum ſignificat. Idque fit, quod numquam principio morbi reſolvantur, ſed iiſdem declinantibus, aut in vigore cum aliqua criſi, quia omnia inquam cruda ſint. In acutis itaque morbis, prędertim febribus atque inflammationibus attendenda erit coctio & cruditas, quę in urinis, & alvi dejectionibus, &, ſi una pulmonis vel thoracis pars lædatur, etiam in ſputis. Urinæ crudæ variis modis cognoſcuntur, quippe ipſarum ſubſtantia, contentiſque mutatis ; eodem modo dejectiones mutatæ, item & ſputa. Sed de horum coctione & cruditate cognoſcenda poſterius ſigillatim ſcribetur. Nunc ſufficiet hæc dixiſſe, quod cruda excrementa dicuntur ea, quæ & ſubſtantia & contentis mutata ab iis, quæ tempore ſanitatis fiebant, obſervantur, atque quæ notis coctionis, quas antea recenſuimus, careant : ſed non in urinis tantum, ſed in omnibus aliis excrementis hoc erit ſedulo cognoſcendum. Sed jam tempus eſt, ut de prædictione, ab excretionibus ſecundum communem viam, quippe univerſaliter (quando poſterius de iiſdem ſigillatim & accuratius ſit a nobis agendum) agamus.

Coctiones quo morbi tempore fiunt.

Cruditas quid in morbis.

Cruditas quid dicatur.

CAP. II.

De prædictione ab excretionibus.

Excretiones quænam bonæ. DE prædictione ab excretionibus & abſceſſibus in præſentia acturi, primo de bonis agemus, quæ in morbis ſalutem præſagiunt, & poſtea de malis exitialibuſque. De bonis hoc in primis affirmamus, optimas eſſe, quæ poſt manifeſtam & optimam concoctionem apparent. Juxta illud Hipp. præceptum, *coctiones quippe*, quod in *primo Epidem. ſect. 2. pag. 948.* ſtatuit, *celerem morbum atque ſalutarem denotare*. Atque hujuſmodi excretio naturæ lege fit, Auctore Galen. *in lib. 4. Aphoriſm. & in 2. de præſag. ex Pulſib.* quoniam natura prius concoquit poſtea ſeparat, atque mox excernit, proinde his prægreſſis optimæ ſunt excretiones, non minuſque abſceſſus. De quibus locutus Galen. *in eodem 4. Aph. 22.* ſcripſit: *Nobis a natura expurgari, exinde ſignificari ſtatutum eſt*. Et in primo *Aphor. 12.* de iis excretionibus judicatoriis ſcribens, dixit: *Siquidem morbo jam cocto ſupervenerint, futuram ſtatim ſanitatem denuntiant*. Quod de *Melidia* Hippocrates, *lib. 1. Epidem. Ægr. 14. pag. 991.* ita habuit; *In urinis ſubſedit album, læve, ſudavit, judicata eſt abſolute undecimo*. Ex quibus colligamus, excretiones omnes, una cum ſignis coctionis conſpectas, eſſe bonas, optimaſque, ſi plene concoctus fuerit morbus. In fedribus vero acutis urinarum concoctio erit attendenda, quum eæ ſtatum venoſi generis affectuum demonſtrent. Hinc Hippoc. merito *in lib. 4. de Vict. rat. in acut. pag. 396. lin. 21. & ſeq. text. 10.* ſcripſit: *Etſi e naribus fluxerit ſanguis, ſolvitur ægritudo, etiam ſi ſudores ſupervenerint judicatorii legitimi, cum urinis albis craſſiſque & levibus ſubſidentiis*. At ne nos turbet, quod nonnumquam intereant aliqui cum urinis ſalutaribus, atque quod in aliquibus moribundis appareant ſigna coctionis, veluti in *Philiſco, lib. 1. Epidem. Ægr. 1. pag. 966.* morti proximo, urinæ melioris coloris apparuerunt. Hoc vero coctionem non demonſtrare, poſtea, ubi de urinis agemus, demonſtrabimus. Sed nunc nobis ſufficiet, urinas colore ac ſubſtantia, contentiſque recte valentium ſimiles, in perniciosiſſimis morbis aliquando conſpici; in quibus præſertim natura prorſus morbo ſuccubuit, ac ne propterea minima, vel etiam inter ipſam & morbum, fiat pugna, & corporis agitatio. Si vero dicent, nobiſque obiicient hunc textum *Prorrheticorum, lib. 1. text. 102.* qui ita legitur: *Qui principio ſudant, urinis coctis, æſtuantque, & abſque judicatione refrigerantur, & celeriter peruruntur, torpidi item comatoſique & convulſi, pernicioſe habent*. Quaſi ex hoc pernicioſa ſymptomata cum urinis coctis ſtare poſſint: aut enim legendum erit, *non urinis coctis*, ſed *laborioſis*, ut Galen. in comment. placuit, aut forſan Auctor *Prorrhet.* coctas urinas albas, & craſſas vocavit, quoniam ſubſidentiam hujuſmodi & in vere coctis urinis vidit. His itaque non obſtantibus, perpetuo bonæ erunt urinæ coctæ in febribus, omneſque excretiones, cum urinis coctis, erunt optimæ. Gal. *in lib. 4. Aph. 37.* optimarum excretionum coctionem inter præcipuas notas recenſuit, veluti etiam bonam ægri tolerantiam. Quod ex Hipp. *2. Aph. lib. 1.* accepit, in quo ſcriptum eſt: *In perturbationibus alvi & vomitibus, quæ ſponte fiunt, ſi qualiter oportet purgetur. confert, & facile ferunt*.

Cum ſignis coctionis.

In urinis.

Quæque conferunt ægrotis. Ex quo aphoriſmo tertiam notam bonæ excretionis addimus, quæ eſt, ut excretiones conferant ægrotis. Juxta illud medicum præceptum, quod eſt, *ſi ea, quæ juvare debent, juvant, bonum*: atque hæ ſunt bonarum, & ſalutarium excretionum præcipue notæ; addantur aliæ, quod in diebus decretoriis appareant, & loci rectitudinem ſervent; ita ut læſo hepate ſanguis e dextra nare, ac ex ſiniſtra, liene; demum quod nullum ſignum pernicio-

ſum

ſum ſimul illuxerit, una cum quibus eſſe non poſſet, ut dictum eſt, urinarum coctio vera: aliquando vero in perniciosis morbis, ut nuper dictum eſt, urinæ, etſi appareant ſanorum ſimiles, concoctæ non ſunt. Sed de his inferius nos accurate. Atque de criticis boniſque excretionibus ſatis: nunc ad malas, quas *ſymptomaticas* Medici (quod ſymptomatis ratione fieri dicantur) appellant. Atque hæ ſunt, quæ, ut ſummi Medici voluerunt, quovis modo ante morbi coctionem apparent, utpote cum urinis cæteriſque aliis excrementis crudis. De his Galen. *in libro quarto Aphoriſm.* 22. ait: *Quamdiu enim a cauſis morbum facientibus natura gravatur, & humorum adeſt cruditas, tunc, ut aliquid recte evacuetur, eſt impoſſibile.* Pravarum enim excretionum cruditatem eſſe cauſam, Galenus etiam *in Epidem Epiſt.* 2. *text.* 38. ita habet: *Omnium, quæ tunc inciderent, incommodorum erat caput, incoctio humorum, quod ſignum pravum natura ad aliquos eorum excernendos aggreſſa eſſet, nihil proficiebant, immo vero ab iis ſuperata, aut in profundum recurrere permiſit, aut propter paucitatem excretionum abſceſſum moliebatur*; & propterea Hippoc. *in primo Epidem. comm.* 2. *pagin.* 948. *text.* 36. ſcripſit: *Ante coctionem excretiones, vel nullam criſin, vel dolores, vel longitudinem, vel mortem, vel recidivas.* Et Galen. in comm. *in* 1. *Epidem. comm.* 2. *text.* 37. de his quoque ita ſcripſit: *Qui procedunt morbi a coctionis difficultate & copia crudorum humorum, nullum ab excretionibus conſequuntur emolumentum.* Dixit quidem multas & violentas confeſtim opprimere vires; verum tales nihil juvant. Quæ quum etiam duplices ſint, nihil proficient, quæ concoctionem non habent adjunctam; quandoquidem, etiamſi multæ ſint excretiones, nihil tamen conferunt, ſi abſque coctione eveniant. Hinc eſt, quod in principio morbi, quod tunc omnia cruda ſint (hoc enim primum morborum tempus cruditate ab aliis, quod quicquam cocti non oſtendatur, in eo interſtingui Gal. *in lib.* 1. *de Criſibus* teſtatum reliquit) aliquid bene evacuari impoſſibile eſſe, ſcripſit *Gal. in com. Aphoriſ.* 22. & 29. *lib.* 4. non minuſque tunc temporis quicquam excerni a natura, atque excretos humores eſſe ſymptomata diſpoſitionum præternaturalium in corporibus, nullamque propterea exinde bonam criſin poſſe ſperari, ib. ſcripſit, atque *in* 1. *lib. de Criſ. c.* 8. Hinc etiam *in lib. Epid. lib.* 2. *p.* 998. *Hipp.* & *in eodem* 1. *de Criſ.* Gal. *Judicatoria non ſtatim, ideſt, in morborum principiis apparere.* Ex quibus certo certius apparet excretiones malas & perniciosas eſſe, quæ cum ſignis cruditatis apparent. Haſque ſignificare futuram nullam vel criſin, vel dolores, vel labores, vel recidivas, vel longitudinem, vel mortem, ut dictum eſt, Gal. affirmavit: quare malæ ſunt omnes excretiones, quæ ante coctionem apparent, idque, quod dictum eſt, præſagiunt: ſed intelligamus has ita ante coctionem conſpectas, ut nulla coctionis ſigna apparuerint, quæ in principio morbi apparent, quo tempore nulla coctionis ſigna cœperunt, quoniam eæ, quæ (ut ſequenti capite declarabimus) aliqua etſi obſcura coctione facta apparent, minus malæ ſunt, & quandoque imperfectas criſes ſignificant; peſſimæ ſunt, quæ nedum non juvant, ſed quinimmo lædunt. De quibus Gal. *in* 3. *Prorrh. com.* 35. & *Hipp. lib.* 2. *Epid. pag.* 999. ait: *Quæcumque ex judicatoriis nihil juvant, ſunt judicatu difficilia: Quæ vero etiam in contrarium repunt, ſunt letalia.* De quibus Hipp. *in* 1. *Epid.* 2. *p.* 945. *in medio. Sudores multi his, tantum aberat, ut recrearent, ut etiam contra læderent*, & poſtea *p.* 948. *ſub fin. Sed & virulenta vomunt, & ex his quidem ſubito moriuntur.* Peſſimæ item ſunt, immodicæ & maximæ, itemque paucæ; quod de abſceſſibus Hipp. *in eodem primo Epid. com.* 2. *p.* 946. *tex.* 35. expreſſit dicens: *His ſuccedebant abſceſſus aut majores, quam ut ferri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſe quicquam, ſed ſtatim redierunt.* Atque hæc de malis excretionibus dicta ſint. Nunc reſtat ad certiorem de prædictione ab excretionibus habendam cognitionem, ut quamdam

Excretiones ſymptomaticæ ſive malæ.

Quæ ante coctionem mala.

Quid notant.

Peſſima quænam.

dam tractemus difficultatem, quæ est, an natura ante coctionem probas habere soleat excretiones.

CAP. III.

An ante concoctionem excretiones sint bonæ atque utiles.

AT summi Medici fuere, qui plures vel etiam excretiones, ante coctionem, in morbis bonas elucere, ac non raro observari affirmarunt, quorum auctor fuit *Victor Trincavellius*, Medicus sua tempestate admirandus qui in *Tractatu de pestilenti febre*, atque *in* 1. *& lib. Epist.* voluit, dari excretiones ante coctionem, quæ nedum malæ sint, sed utiles, & propterea fovendæ, ac adjuvandæ. Pro qua re distinxit excretiones in criticas, symptomaticas, atque in medias, quæ mediam inter symptomaticas atque criticas naturam obtineant, atque hoc itidem modo distingui absessus statuit. Primam differentiam esse ait illarum excretionum, quæ natura, morbum evincente fiunt, quo tempore omnia, & evicta, & concocta sunt, hasque omnino criticas appellat, & judicatorias, quod ægrotos perfecte judicent atque liberent. Cujusmodi sunt post manifestam coctionem sudores optimi, sanguinis eruptiones, alvi dejectiones, nec non in morbis thoracis etiam sputa copiosa, & concocta. Alteram differentiam facit earum excretionum, quæ naturam morbo evincente apparent. Has plane symptomaticas vocat, quod symptomatis tantum ratione fiant. Cujusmodi sunt in acutis morbis sudores frigidi circa frontem & collum, immoderate, vires dissolventes, qui plane crudo morbo observantur. Tertiam earum excretionum, quæ mediam obtinent naturam inter criticas & symptomaticas, quas potius bonas quam malas, potius utiles quam inutiles esse, affirmavit. Probavit vero dari has tres excretionum differentias puris exemplo in ulceribus, ex Gal. *in lib. de dif. feb. cap.* 6. *&* 4. *Aphorism.* Hic enim Gal. de symptomaticis excretionibus ita est locutus: *Malæ vacuationes sunt pravarum signa dispositionum, prodeuntque sæpius eodem modo, quo in ulceribus putridis, a quibus ichores, hoc est liquores sanioſi, desinunt, nihilque dispositioni conferentes, nonnumquam vero ita sicut pus, ex abscessu disrupto bene expurgans partem patientem.* Clarius *in primo illo de dif. feb.* dixit enim in ulceribus aliquando pus effluere, omnino probum, & laudabile, nempe album, sanum, leve & æquale, citra ullum odorem gravem, quippe natura partis ulceratæ affectum evincente, quam excretionem criticis excretionibus quisque facile potest comparare: nam quemadmodum excretio critica & proba sanitatem statim prænuntiat futuram, ita hujusmodi pus ulcus ipsum sanatum iri. Aliquando vero pus ex ulceribus omnino putridum, fœtidum, & pravo colore infestum, naturali partis ulceratæ calore, ex toto ab extraneo extincto, ut in gangrenis, quod plane symptomaticam excretionem demonstrare videtur. Demum aliquando manat pus medio modo se habens, non ex alterius absoluta victoria, sed ex utriusque veluti pugna, & neutro alterum plane superante, in quo pure apparent utriusque indicia, nempe quæ & actionem nativi & externi caloris ostendunt. Nam hujusmodi pus, si album erit, nou erit leve, & si leve, non æquale, male olens. Ex prænarratis excretionibus, eas, quæ plane symptomaticæ sunt, perniciales esse; & prorsus criticas, plane laudabiles; medias vero laudabiles quidem, atque magis bonas, quam malas videri, proinde ab ipsis non raro Medicos salutem prœsagire posse. Quod eæ mediœ excretiones bonœ sint, atque etiam fovendæ & adjuvandæ, etsi ante coctionem fiant; quod erit demonstrare, excretiones & absceſſus ante coctionem, & in principiis morborum

Excretionum differentiæ tres.

Quomodo dari probantur.

Excretiones medias licet ante coctionem fiant, bonas.

borum conſpectos, contra multorum præclarorum Medicorum opinionem, bonos eſſe atque utiles : quæ veritas hiſce argumentis nobis demonſtrari eſt viſa, quippe primo humoribus turgentibus, quos utiliter educi, vel etiam in principio morborum, quo tempore crudi ſunt, ex Hippocrat. conſtat, nimirum dicente in 1. Aphor. 22. *Concocta medicari atque movere, non cruda, neque in principiis, niſi materia turgeat, plurima vero non turgent.* Itaque ſi tales humores in principio crudi exiſtentes poſſint educi, ergo etiam ipſorum ſpontaneæ excretiones erunt fovendæ adjuvandæque : idque forte fit, quod propter tenuitatem, caliditatem, atque facilitatem ad motum, non icommode arte educi, & natura excerni queant. Secundo apparet in peſte, papulas, ulcera, abſceſſus omnes, parotides, exanthemata, variolas, vel etiam ante coctionem erumpentes, magis utiles, quam inutiles ab omnibus Medicis fateri. Hinc omnes a repellentibus, & has prohibentibus excretiones, Medicos abſtinere, omniaque facere, ut leviter ipſorum motus foveatur, & adjuvetur, cucurbitulis, frictionibus calidis, inunctionibus, balneis, atque aliis multis. De quibus Galen. *in primo lib. de ſuccorum bonit. & vitio. capit.* 1. ita ſcri ſit : *Atque hæc quidem facere ea, quæ per cutim efflorescentia placidiſſime vitioſum ſucum e viſceribus profundoque corporis evacuarent.* Quis in peſte, vel in peſtiferis febribus umquam auſus fuit, parotides, tumores, in adenis obortos, carbunculos, repellere ? quis exanthemata, quis variolas, quis etiam alvi bilioſas & putridas dejectiones, quis ſudores & eruptiones ſanguinis ? Denuo demonſtrant naturam vel etiam crudos humores non raro neque inutiliter excernere, de qua re Galenus *in libro tertio, de diebus decretoriis, cap.* 8. ita habet : *Nam perturbationis violentia naturam ea, quæ moleſtant, etiam ante tempus propulſare compellit, quippe virtus ipſa eſt alienorum expultrix.* Atque clarius in lib. 3. de præſag. ex pulſibus *cap.* 12. *Semper porro omnis excretio naturæ lege perfecta ſequitur coctionem, etenim in ventre conſpicitur natura excrementum a concoctione excernere. Cæteras omnes excretiones, quæ, antequam cibus coctus fuerit, fiunt, nunc quod vellicetur ab illis, quæ continet, nunc quia depravetur ante tempus coctionis, cogitur moliri : haud aliter totius corporis facultas, poſteaquam ſatis familiarem ſuccum concoxerit ſingularium partium, tum demum excrementum excernitur, niſi quid eam, ut diximus, irritet ante tempus.* Ex quibus liquido conſtat naturam excernere ante tempus, neque omnes excretiones & abſceſſus ante coctionem conſpectos eſſe ſymptomaticos, ſed quoſdam a natura eſſe, neque inutiles. Quarto, excretiones humorum calidorum tenuiorumque eſſe faciendas, quod hi, ni turgeant admodum, facilitate, & calore futuri turgentes dici queant. Ex quo merito a Galeno ſcriptum eſt *in lib.* 3. *Prognoſticorum comm.* 23. humores corporis calidiores, tenuioreſque paratiſſimos eſſe ad excretionem. Hinc Averrhoi ac multis, hos ut purgentur, coctione non egere, viſum eſt, quod facilius ad excretionem ſint : & poſtea ait Galen. *abſceſſibus retrocedentibus motionem quamdam ineſſe neceſſario, quo nobis perſuadetur humores ipſorum proxime ad turgentium naturam accedere.* Demum probant hujuſmodi excretiones eſſe utiles & adjuvandas, etiamſi omnia cruda ſint, *Sileni* (*Vide ejus hiſtoriam lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 2. *pagin.* 969.) exemplo de quo Galen. ait : *Quum igitur virium robore ſeptimum diem*, ut dixi, *potuerit ſuperare, octavo papulas cum ſudore habuit rubentes, rotundas, parvas, nam ejus morbo repugnante & humorum ſuperfluitatem malorum ad cutem propellente, illud fuit cauſa, cur die nono non ſit mortuus, ſed undecimo.* Ex quo colligunt papularum eam excretionem fuiſſe utilem, etiam morbo plane crudo ; atque ita de aliis dicendum. Quam veritatem multorum ægrotantium hiſtoriæ, in *Epidemiis* nobis ab *Hippocr.* memoriæ traditæ, confirmabunt, & præſertim *Herophontis lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 3. *pag.* 974. *Metonis ibidem Ægr.* 7. *pag.* 983. *Sileni ibidem, Ægr.* 2. *pag.* 969. *uxoris Epicratis ib.*

Ægr.

Ægr. 5. *pagin.* 979. *Clazomenii ibidem*, *Ægrot.* 10. *pagin.* 985. *Melidiæ ibidem*, *Ægr.* 14. *pag.* 991. *Chærionis lib* 3. *Epidem. Ægrot. pagin.* 1072. atque aliorum multorum. De *Herophonte* ſcribit Hippocrates, Quinta die cum urinis nigris tenuibus lienem intumuiſſe, & octava doluiſſe inguen primum, ſecundum lienis rectitudinem, deinde dolores in tibiam utramque tranſiiſſe, urinaſque tunc melioris fuiſſe coloris, parvam habuiſſe ſubſidentiam. Ex quibus adhuc paullulum crudum eſſe morbum conjiciebatur, proinde neque lienis tibiarumque abſceſſus, neque ſudor, nona die ſecutus, inter ſymptomaticos erat ponendus, quum ab ipſis judicatus ſit, licet non integre. Quid de *Metone*? an non eruptione ſanguinis e naribus judicatus eſt, cum urinis nigris & crudis? an non Hippocrat. eo tempore, quo crudus erat morbus, lotione capitis eſt uſus, ad augendam & fovendam ſanguinis illam ſymptomaticam eruptionem? Quod commendavit Galen. etiam *in* 1. *Epidem. text.* 3. *com.* 25. dicens: *Hujus te præſentiſſimum remedium docuit*, *capitis lotionem*: *dixit enim in* libro de ratione victus in morbis acutis *pagin.* 395. *lin.* 44. *& ſeq. caput non lavandum eſſe iis*, *quibus de naribus erumpit ſanguis*, *niſi minus juſto fluat*; *nunc vero erat juſto minus*, *ſiquidem perpetuabat vigilias & deliria*. Eodem itidem modo *Uxor Epicratis* ſudores habuit, vomituſque bilioſos ſubcrebros, quibus etiam, crudo adhuc morbo exiſtente, fuit judicata. Idem in *Clazomenio*, de quo Hippo. *Dejectiones ab initio ad diem uſque decimum quartum multæ tenues aquei coloris*, *urinæ perpetuo tenues*, *ceterum boni coloris*, *& multum habebant ſuſpenſionum diverſarum*, Idem quoque in *Melidia*, quæ die ſeptimo critice ſudavit, & febris intermiſit, & rurſus dejectiones habuit tenues, bilioſas, mordaces, paucas, nigras, licet urinæ tenues & crudæ eſſent. Hoc & in *Chærione* eſt viſum, quum urinis tenuibus, licet boni coloris, die ſecunda ſudaverit per totum corpus, & fuerit judicatus. Hoc idem in longe pluribus fuit obſervatum, quippe ante coctionem excretiones multas conſpectas fuiſſe judicatorias atque bonas. Quid igitur dicendum? an non Hippocrates artis medicæ dogmata veriſſima ac certiſſima ſcripſit? an non hæc ipſa Galen. plane confirmavit? Certe quidem; neque ad contrarium demoſtrandum rationes adductæ, & veritatem hanc obſcurare poterunt, ſi, ut Alexander Maſſaria, Medicus hujus ætatis eximius, nobis hac ætate in hoc gymnaſio conceſſus, ut Hippocrat. Galenique veterem medendi artem, a multis Medicis, variis temporibus, obſcuratam, ac maxime vitiatam, priſtino candori reſtituat, ac illuſtret; quem Medici ingenui ac innocentes, veteris Medicinæ ſtudioſi, ſummis laudibus merito perpetuo extollunt, ipſiuſque de hac ipſa medendi arte clara, poſteris ab ipſo relicta, monumenta maxime ſuſpiciunt, admirantur, non indigna, ut antiquorum Medicorum illorum, qui olim ſupra omnes claruerunt, ſcriptis comparentur; in diſputatione *de purgatione*, *morborum principio inſtituenda*, reſpondebimus: *Tametſi excretiones ſine coctione*, *vel ſua ſponte*, *vel ex arte factę*, *videantur nonnumquam utiles eſſe*, *illas tamen non eſſe dignas imitatione*, *quum maxima ex parte noxiæ & periculoſæ eſſe ſoleant*. *Nam etſi quis contendat*, *ægros interdum iſtiuſmodi importunis vacuationibus liberari*, *non propterea ſtatuendum eas commodas fuiſſe*, *& quas Medicus debet imitari*: *licet enim mortem non afferant*, *alia incommoda invehunt*, *quæ profecto non inveherent*, *ſi cum ſignis bonæ concoctionis factæ fuiſſent*. *Hujuſmodi autem incommoda pręclare deſcribuntur ab* Hippocrat. *lib.* 1. *Epidemior. com.* 2. *pag.* 948. *quippe* excretiones ante coctionem vel nullam afferunt criſin, vel malam, vel dolores & labores (*quorum nomine mala omnia ſymptomata comprehendi poſſunt*) aut morbi diuturnitatem, aut mortem, aut recidivas. *Iſtud facile demonſtrant ægri*, *quorum ſuperius facta eſt mentio*: *in* Metone *lib.* 1. *Epidemiorum Ægrot.* 7. *pagin.* 983. *Criſis intempeſtiva*, *etiamſi non fuerit perniciosa*, *gravia tamen ſymptomata intulit*, *vigilias ac delirium*, *intuliſſetque adhuc recidivam*,

Excretiones ſine coctione factæ non imitanda.

vam, teſtimonio Hippoc & Gal. niſi crebro ſanguis poſt judicium profluxiſſet. Herophon. *lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 3. *pag.* 974. *in tot periculoſa incurrit ſymptomata, ut* Galen. *ſcribat præter exſpectationem eum ſuperſtitem fuiſſe, præterquam quod die quarta decima recidivam non potuit evitare. Qui in* Dealcis horto decumbebat *lib.* 3. *epidem. Ægrot.* 3. *pag.* 1066. *omnia ſubiit incommoda & pericula præter interitum, ex quo etiam evaſit, teſte* Galeno, *propterea quia maximas habuit, vires, quæ tot & tanta mala ſuſtinere potuerunt.* Hactenus *Maſſaria.* Hac hora ejus mors audita eſt magno cum omnium medicinæ ſtudioſorum dolore. Hæc omnia hic recitare placuit; quod hæc omnia noſtram de hac difficultate ſententiam maxime confirmant. Quibus addimus, ut ad objecta reſpondeamus, nos quidem fateri turgentium humorum excretiones, vel etiam in principio morborum utiles, fovendas atque adjuvandas eſſe. Proinde & exanthematum, puſtularum, abſceſſuumque omnium ad ignobiles partes talium humorum, quales ſunt calidiſſimi, tenuiſſimi, ſumme putridi & venenoſi, ad turgentium naturam accedentium, vacuationes eſſe potius fovendas, & adjuvandas, quam cohibendas; nihilominus bonas quidem per ſe non dicemus, crudo prorſus morbo exiſtente, quum plures his conſpectis interiiſſe, & Hippocr. *in Epidemiis* & Gal. itidem *in commentariis* & præſertim *in libro de ſuccorum bonitate & vitio, cap.* 1. nobis affirmarint. Quis enim parotidibus, quis carbunculis, quis exanthematis, atque aliis abſceſſibus, tametſi bonum ſit, humorem illum malignum foras effluere, fidere poterit? Quum & cauſas & morbos perniciales denotent, quibus plures pereunt, & nonniſi robuſtiſſimi ſervari ſolent.

Excretiones turgentium humorum fovendæ.

De eruptione vero ſanguinis non negandum, vel etiam multis has profuiſſe ægrotis, ut Hippocrat. *in* 1. *Epidemiorum, comm.* 2. *pag.* 951. ſe vidiſſe hiſce verbis expreſſit: *Febribus autem ardentibus hæc accidebant, quibus rite, & largiter ſanguis per nares erupit, eadem cauſa maxime ſervabantur. Nec ullum novi, ſi recte ei erupiſſet ſanguis in hoc ſtatu, mortuum. Nam Philiſcus quidem Epamenon & Silenus, quibus parum quarto die & quinto e naribus ſtillavit, mortem obieruut.* Hoc in *Cleonactide, lib.* 1. *epidem. Ægrot.* 6. *pagin.* 982. *Metone, ibidem, Ægr.* 7. *pag.* 983. *in eo qui in Dealcis horto decumbebat, libr.* 3. *epidem. Ægrot.* 3. *pag.* 1066. *Pericle, ibidem, Ægrot.* 6. *pag.* 1102. *Abderæ virgine, ibidem Ægrot.* 7. *pag.* 1103. *& Lariſſæ virgine, ibidem Ægrot.* 12. *pag.* 1110. atque in aliis *Hippoc.* obſervavit Galen. de *Metone* ait: *Largæ de naribus eruptiones ſanguinis liberant fere, ſane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet.* Ex quibus apparet, excretiones ſanguinis majori ex parte ſalubres eſſe, vel etiam ſi in principio morborum apparuerint; neque mirum, quum vel etiam in principiis, non exſpectata coctione, multitudinem minuant, plurimum venoſum genus refrigerent, caloremque tranſpirare faciant, putredinibus, ne fiant, occurrant, qua ratione Medici omnes in magnis morbis ſtatim ſecta vena ſanguinem copioſius mittunt. Hæc etſi vera ſint, nihilominus ſi eæ excretiones, ſeu eruptiones morbo concocto fiant, fidelius ſalutem prænuntiant; infidelius vero, quæ cum cruditatis ſignis conſpiciuntur, quod etiam Gal. *in primo libro de Criſibus* viſus eſt voluiſſe, quum ibi, ſi vel etiam ſanguis e naribus profluit, crudo morbo, non judicare affirmarit, & Hippocrat. *in quarto, de victus rat. in acutis, pagin.* 396. *lin.* 21. *& ſeq.* dixerit: *ſi e naribus fluxerit ſanguis cum urinis albis, craſſiſque & levibus ſubſidentiis, ſolvi ægritudinem*: & Galen. *in primo de Criſibus cap.* 8. ita habet: *Sanguinis autem profluvia, & ſudores, & tumores, qui juxta aures fiunt, & reliqui decubitus, ſi in tempore quidem fiant, opportune prodeſſe poſſunt; intempeſtiva autem nihil juvant.* Hippocrat. ſcribit: *in* 3. *Epidemiorum Ægrot.* 12. *pagina* 1080. *cap.* 7. *Mulierem, in mendacium foro decumbentem*, habuiſſe de

Excretiones quantio fidelius ſalutem præſagiunt.

nari-

naribus ſanguinis eruptionem, quæ tamen poſtea interiit. Quod *Lariſſæ Hypoſteni* eveniſſe etiam Hippocr. *in lib. 5. Epidem. text. 14. pag. 1145.* tradidit. Quod certe ego in multis vidi, ſed proxima æſtate in quadam juvene, quę, quum ex abortu febre ardenti duobus menſibus laboraſſet, eoque tempore habuerit crebras, largas, de naribus eruptiones ſanguinis, ipſiſque aliquantiſper videretur juvari, tamen, quod perpetuo urinas, alvique dejectiones crudas habuerit, ideo labores, dolores, longitudinemque paſſa eſt, ac denique mortem obiit. Non tacebo me *Venetiis* quemdam *Bononienſem* vidiſſe ardente febre conflictatum, in quo a prima die uſque ad decimum quartum, qua die perfecte eſt judicatus, ſanguis e naribus, die nocteque, una cum copioſo & aſſiduo profluvio ventris bilioſo virulento, effluxit, qui tamen, etſi dolores, deliria, vigilias & fere mortem ſuſtulerit, quia maximas vires habuerit, præter exſpectationem ſervatus eſt. Quibus tamen ſymptomaticis excretionibus non eſt fidendum. Sed quid ad excretiones, quæ abſque ſignis coctionis in *Epicratis uxore*, *Clazomenio*, *Melidia*, *Chærione* & in eo, *qui in Dealcis horto decumbebat*, & in aliis ſervatis, apparuerunt? Dixerim eas excretiones non fuiſſe ex iis, quas Galen. cum Hippocr. ſymptomaticas vocat, ſed potius criticas; quum non abſque aliqua coctione, tametſi non perfecta, illuxerint. Intelligimus ex Galeno, Hippocrateque, ſymptomaticas eſſe, quæ, nullis coctionis ſignis viſis, ſed omnino crudo morbo exiſtente, apparent: propterea dixiſſe has morborum in principio eſſe malas, neque in principio poſſe quicquam bene evacuari, ut Galen. docuit *libro 4. Aphoriſmorum 22.* hiſce verbis: *Quare quum morbi in initio ſint ſemper indicia cruditatis, omnino ut tum mala non ſit hujuſmodi humorum vacuatio, fieri prorſus non poteſt.* Et Hippocrates *in ſecundo Epidemiorum ſect 1. pagin. 998.* dixit: *Judicatoria ſigna non ſtatim apparere.* In principio vero morborum omnia eſſe cruda, vel ex eo cognoſcimus, quod Galen. *primo de Criſibus* principium fecerit primum morborum tempus, in quo morbus omnino crudus exiſtit, habereque terminum ad principium coctionis, quæ ubi incipit apparere, augmentum dicitur, eaque perfecta & abſoluta, ſtatus, quibus duobus temporibus fieri criſes omnes Medici noverunt. Quare prædictorum ægrotorum excretiones non fuere ex Hippocratis Galenique ſententia ſymptomaticæ, ſed criticæ, quum coctionis quædam rudimenta adfuerint. Namque in *Herophonte* die octava urinæ fuerunt melioris coloris, & reſidebant in iis pauca, a quibus die nono ſudore fuit judicatus; quod vero urinæ non omnino eſſent concoctæ, ideo recidivam illa excretio minabatur, quando bonarum criſium, ut poſtea dicemus, duplex ſit differentia; quædam enim perfectæ ſunt, quibus omnino ægri judicantur, & quædam imperfectæ; hæ aliquo ſigno coctionis conſpecto, ideſt in augmento, fiunt, illæ omnino coctione perfecta, in ſtatu. In *Epicratis uxore* die undecimo urinæ coloratiores cum multo ſedimento fuerunt: & de *Metone* Hippocrat. *die quinto e dextra nare affatim profluxit ſanguis merus, ſudavit, judicatus eſt; a judicio, urinæ tenues, ſubnigræ, meliores erant*, quum antea nigræ eſſent cum nigro ſedimento, quæ ſolent eſſe omnino letales. In *Clazomenio* item *urinæ perpetuo*, ut ſcripſit Hippocr. *tenues fuerunt, ſed boni tamen coloris & multum habebant ſuſpenſionum diſperſarum.* Atque itidem in *Melidia* & *Chærione* tenues, & boni coloris, quas ex colore aliquam coctionem habuiſſe, notavit Galen. Ex hiſque eſto nobis demonſtratum, poſſe quidem naturam excernere humores, vel etiam crudos, ſed hæ excretiones raro bonæ, numquamque per ſe, quæ aliquando ſalutem, quum exitiales plerumque ſint, nonniſi magnis incommodis, pollicentur; numquamque ita bonas eſſe, ut illis nos fidere debeamus. Quibus una ſi ſignum aliquod illuxerit pernicioſum, omnino exitiales erunt. Itaque colligamus naturam ante coctionem ſanguinem ſæpius critice, ideſt, utiliter excernere, ſed neque huic

ex-

excretioni perpetuo esse fidendum: atque hæc obiter a nobis de hac difficultate dicta sint. Nolui enim ita sicco, ut ajunt, pede lectores ad prædictionem ex particularium humorum singulis excretionibus, de quibus nos postea accuratius, his non præmissis ac cognitis, descendere.

CAP. IV.

De diebus decretoriis ad prædictionem facientibus.

QUum ad singulas humorum excretiones pro salutis ac mortis prædictione descendere minime possimus, ni prius & de *diebus decretoriis*, & *judicatoriis* vocatis, atque *de crisibus*, non minus accurate scripserimus; horum etenim cognitio videtur necessaria ad rectam omnium excretionum rationem ad prognosin assequendam: idcirco in primis de iis sermonem præmittemus. Dicimus itaque, diebus, in quibus morbi finiuntur, has inesse differentias; nam quidam sunt, in quibus observatum est, morbos aut simpliciter resolvi, aut cum aliqua excretione, aut cum abscessu, aut ægros in iisdem quovis modo interire. De quibus Hippocr. *in 3. libr. Prognost. pagin. 43. in fine*, & 44. *initio*, ait: *Febres autem judicantur iisdem numero diebus, & ex quibus supersunt homines, & ex quibus intereunt, simplicissimæ enim febres, ac signis firmatæ securissimis, quarto die, aut citius desinunt. Deterrimæ vero, ac signis affligentes difficillimis, quarto die aut citius interimunt.* Ex quibus Galen. in *Com.* ait: *dies decretorios* nominari, in quibus morborum fiunt mutationes, aut quod in ipsis ægroti statim liberantur, aut quod in melius mutantur, aut quod moriantur, aut quod in deterius labuntur. Hę vero mutationes, (quas *judicationes* etiam vocant) fiunt cum quadam evidenti vacuatione, excretioneve, aut abscessu. Itaque ex iis dicimus, dies, quos decretorios, judicatorios, atque criticos Medici vocant, illos esse, in quibus naturæ pugna cum morbo, vel alterius ipsorum victoria apparet; aut in quibus morbos solutos iri, quovismodo nobis indicatur; aut in quibus ægri moriuntur. Pro decretoriis vero complures ac fere innumeri passim apud Hippocrat. in libris *Epidemiorum*, *Prognosticorum*, & *Aphorismorum* leguntur ac observantur; ex quo multis visum est, quod in omni die possit solvi morbus, omnesque fere dies posse decretorios dici Hippocrat. *in 1. Epidemiorum, comm. 4. pag. 956. text. 14.* hoc expressit: *Est autem primus decretorius circuitum, qui diebus paribus judicant, quartus, sextus, octavus, decimus, decimus quartus, vigesimus octavus, trigesimus, quadragesimus octavus, sexagesimus, octuagesimus, centesimus. Et circuituum, qui judicant imparibus diebus, est primus, tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, vigesimus primus, vigesimus septimus, trigesimus primus.* Et *in lib. quarto Aph. 36.* eosdem expressit dicens: *Sudores febricitanti si inceperint boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & decimoquarto, & decimoseptimo, & vigesimo primo, & vigesimo septimo, & trigesimo quarto; qui vero non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem & recidivam.* Non desunt, qui omnes ad vigesimum usque decretorios fecerint. *Diocles*, ut Gal. *in 1. lib. de diebus decret. cap. 9.* scribit, primum & secundum diem non raro decernere affirmavit, forte, quod primo die febres varie resolvantur, atque etiam quod ex Galeno *in lib. 1. de Crisib. cap. 17.* aliquis morbus ad statum pervenire etiam prima die possit; non raroque contingit, ut una die moriantur homines, uti sunt Apoplectici, & qui repente suffocantur: sed tamen raro crises atque judicia prima & secunda die fieri possunt, quando humores longiori spatio ad maturitatem perveniunt. Tamen non negandum erit, non raro spectari excretiones prima & secunda die, sed hæ omnes pravæ existunt, ut superiori

Dies decretorii quinam dicuntur.

riori capite ſatis eſt demonſtratum. De tertio vero, quarto, & quinto nulli dubitant, hoſque dies eſſe, in quibus non raro judicia animadvertantur. Sextum quoque eſſe decretorium, *Galen. in 3. de dieb. decret.* conceſſit, ſed plerumque in ipſo difficile ac incertum fieri judicium. In quo die *Lariſſam virginem* fuiſſe integre judicatum Hippocrat. *Epidem.* 1. *Ægr.* 12. *pag.* 1110. *text.* 4. ita tradidit: *Sexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox ſudavit toto corpore multum & calidum, ſine febre, eſt judicata.* Septimum non ſolum eſſe decretorium, ſed omnium validiſſimum eſſe, omnes fatentur. Octavum ex paribus decretoriis feciſſe Hippocr. nuper vidimus. *Et in lib.* 4. *Epidem. pag.* 1121. *in fine text.* 3. plures ægrotos ea die judicatos meminit. De nono ab aliquo non dubitatur. Decimum quoque judicatorium feciſſe aliquando viſum eſt Hippocr. *lib.* 3. *Epidem. pagin.* 1059. *Ægr.* 1. *in hiſtoria Pythionis.* quum dixerit: *Decimo ſudavit, ſputa ſubcocta, judicatus eſt*; & in 6. *Epidem. ſect.* 3. *text.* 5. *pag.* 1174. *mulierem*, quam in *Cranone* curavit, decima die ſudores, ut Galeno placuit, bonos habuiſſe, ſcriptum reliquerit. Galen. *in Comment. Hiſtoriæ Pythionis* non plane e numero decretoriorum dierum detrahendum decimum diem affirmavit; idem de duodecimo & tertio decimo dicunt, quum tamen raro aut numquam, & neque recte hi dies judicent. Decimum quartum poſt ſeptimum præcipuum obtinere locum Galen. docuit. Decimo quinto, & decimo octavo, qui inter decretorios vere recenſeri non debent, dicunt, quod in ipſis & in ſingulis aliis aliquando morbi reſolvuntur. Cæterum etſi aliquando in iis omnibus morbus aliquis poſſit judicari, tamen non hos omnes judicatorios merito Gal. & alii Medicinæ Auctores fecerunt, ſed eos tantum, in quibus frequentes & multæ judicationes morborumque mutationes ſpectantur. At ut vere judicatorii cognoſcantur, Hippocratis regulæ erunt obſervandæ. Quando non omnes dies, ſed eos tantum, qui quaternis ſeptenisque circuitibus dierum fiunt, eſſe decretorios Galen. *in primo Epidemiorum*, hiſce verbis expreſſit: *Oſtendimus vero in lucubratione de diebus decretoriis, omnium eſſe decretoriorum validiſſimos, qui quaterno, val ſepteno circuitu fiunt.* Sed de horum cognoſcendorum regula Hippocratem nunc audiamus, qui *in lib.* 3. *Prognoſticorum pag.* 44. *lin.* 2. ita habet: *Itaque primus impetus hunc in modum finitur, ſecundus vero ad ſeptimum producitur, tertius ad undecimum, quartus ad decimum quartum, quintus ad decimum ſeptimum, ſextus ad vigeſimum. Hi ergo ex morbis acutiſſimis per quatuor ad viginti ex additione terminantur.* Et *in ſecundo libro Aphoriſmorum* 24. *Septenorum quartus eſt index, alterius ſeptimanæ octavus principium. Eſt autem & undecimus contemplabilis, ipſe enim quartus eſt ſecundæ ſeptimanæ. Rurſus vero & decimus ſeptimus contemplabilis, ipſe ſiquidem quartus eſt a decimo quarto, ſeptimus vero ab undecimo.* Ex quibus ſupra viginti ſi addamus quatuor, vigeſimum quartum decretorium faciemus, & ab ipſo addentes ſecundum quaternarium, cujus principium eſt vigeſimus quartus, faciemus vigeſimum ſeptimum, & hoc ordine, trigeſimum primum, trigeſimum quartum, trigeſimum ſeptimum, quadrageſimum, quadrageſimum quartum, quadrageſimum ſeptimum, quinquageſimum primum, quinquageſimum quartum, quinquageſimum ſeptimum, ſexageſimum, ſexageſimum quartum, ſexageſimum ſeptimum, ſeptuageſimum primum, ſeptuageſimum quartum, ſeptuageſimum ſeptimum octuageſimum, octuageſimum quartum, octuageſimum ſeptimum, nonageſimum primum, nonageſimum quartum, nonageſimum ſeptimum atque centeſimum. Quare tot erunt dies decretorii vocati, in quibus ſæpiſſime morborum fiunt mutationes & judicia, & ſolutiones; addunt quoque Hippocrat. & Galen. tertium, quintum & nonum, ut ex *libro quarto Aphoriſmorum. Aphoriſmorum* 36. apparet. Non minus & ſextum. Hippocrat. vero hos omnes diviſit in *decretorios* atque in *indicatorios*. Hos eſſe quartum ſeptimi unde-

undecimum decimi quarti, & decimum ſeptimum vigeſimi, & vigeſimum quartum vigeſimi ſeptimi, & trigeſimum primum trigeſimi quarti, & trigeſimum ſeptimum quadrageſimi, & ſic de aliis omnibus, primus quaternarius indicat, quod in altero eſt futurum, & tertius quod in quarto, & quintus quod in ſexto & ita de aliis. Et hoc eſt, quod Hippocr. in Aphoriſmis *ſect.* 2 24. *ſeptenorum quartus eſt index.*

De quo Hippocrat. *in* 4. *Aphoriſmor.* 71. ita habet: *Quibus ſeptima judicatur, his nubeculam habet quarta die urina rubram, & alia ex ratione*, & Galen. *in comment.* ait: *Nam quum quarta dies ſit index, quemadmodum ipſe edocuit, & qualis ſit futura ſeptima præmonſtret, omne quod ipſa dignum effatu ſignum coctionis apparuerit, futuram ſeptima die judicationem oſtendit, adeo quod non ſolum rubra aliqua nubes in urina apparens, antea non viſa, judicationem ſignificat; ſed & alba multo plus ipſa, adhuc autem magis enæorema, (latine craſſamentum quoddam ſuſpenſum, & velut conglobata nubecula, media in urina penſilis, dici poteſt) æquale atque conſiſtens, ſibique ipſi cohærens, criſin fore prænuntiant. Si vero velociter admodum morbus moveatur, & mutatio coloris & conſiſtentiæ, ſunt ſufficientia ſigna futuræ judicationis, tenuis itaque urina, ſi mediocriter craſſa efficiatur, & ſi alba rubra fiat, in tali morbo judicationem ſignificat.* Ex quibus apparet, quod coctionis ſignis non tantum in urinis, ſed in aliis quoque excrementis, quarto die, vel aliquo alio die, contemplabili, vel indice apparentibus, ſeptimo futura bona judicatio nobis indicabitur; & ſic mala, eodem die cruditatis & malignitatis ſignis conſpectis. Quam rem maxime a Galeno in *Commento* illuſtratam habemus. *Cherion* (*Ejus vide hiſtoriam libro* 3. *Epidemiorum Ægrot.* 5. *pagin.* 1072.) vigeſimo judicatus, decimoſeptimo, qui eſt vigeſimi index, habuit urinas melioris coloris cum ſubſidentia. Quare contemplabiles indiceſque dies ideo ſunt appellati, quod perpetuo indicent judicationes in altero quaternario futuras; & decretorii, quod ipſi judicent: ſed aliquando confunditur hic ordo, ut quandoque indices fiant decretorii, & decretorii indices. Quare tot ſunt dies vere decretorii & indices, quot in febribus continuis ad prædictionem conſiderantur, & ipſorum loco eſt circuitus acceſſionum numerus in febribus intermittentibus: nam, ut Hippocrat. *Aphoriſmorum Sect.* 4. 59. habet *tertiana febris ſeptenis circuitibus terminatur*; atque quarta acceſſio erit index ſeptimæ, ex ipſa poterimus ferre judicium de ſeptimæ exitu. De qua re Galen. *in libro tertio Prognoſticorum* ita ſcripſit: Ut enim per febres continuas numeramus omnes deinceps dies in præſenſionem futuræ indicationis; ita per intermittentes annotationes, ut, quod per continuas ſeptimus dies valet, id per intermittentes ſeptima circuitio præſtat: ob id igitur exquiſita tertiana ſeptem circuitibus, non diebus ſeptem; judicari natura ſolet; quinetiam, quod quartus dies a principio numeranti adverſus ſeptimum eſt, id quarta circuitio adverſus ſeptimam circuitionem. Quartus enim dies ſeptimi index eſt, & item quarta cuircuitio ſeptimæ index. Itaque in intermittentibus febribus acceſſiones, atque in continuis, dies obſervamus, qui, ut dixi, ſunt partim *judicatorii*, quod in ipſis fiant in morbis mutationes & judicationes, partim *indicatorii*, quod indicent, in altero quaternario mutationes & judicia. Adduntur alii, qui vocantur *intercalares* atque *intercidentes*, cujuſmodi ſunt, tertius, quintus, ſextus, nonus, vigeſimus primus, in quibus quandoque fiunt judicationes, ſed tamen raro, & quæ neque bonæ, neque certæ ſunt, quia nimirum fiant a natura morbo irritata ac provocata, ex quo aliquibus etiam *provocatorii* fuere nominati. Ceteri alii omnes dicuntur, *non decretorii*, uti, eſt primus, octavus, decimus, duodecimus, tertiodecimus, decimus quintus, & decimus ſextus, decimus octavus, & decimus nonus, atque alii item plures omnes, quippe qui ultra decretorios, indices, atque intercidentes

Dies Judicet quare ita vocati.

Dies intercalares atque intercidentes quinam.

ſunt; atque tot ſunt dies decretorii & ipſorum præcipuæ differentiæ, de quibus qui plura deſiderant, legant libros Galen. *de Diebus Decretoriis*, & quorumdam recentiorum Medicorum, qui de iis ſatis accurate ſcripſerunt. Nunc unum, priuſquam de prædictione ab ipſis diebus agamus, ſuperfluiſſe nobis attingendum, certe ſcimus, quod a multis ſane, quo ſcitu difficilius, eo avidius deſideratur, quippe de cauſis dierum criticorum, de quibus ſane quædam attingam, etſi meum non ſit de hac re accuratius agere. Jam ſciunt omnes, plures cauſas a viris eruditis afferri. Pythagoreorum plures ad vim numerorum retuliſſe dies decretorios dicitur, quod Deus naturaque certis numeris gaudeat: Aſtrologi ad varios aſpectus ſtellarum errantium & fixarum; alii ipſorum, ut Galen. ad lunæ aſpectus; alii ad ſolis lunæque ſpeciatim aſpectus, eo modo, quo quidam viri eruditiſſimi ſtuduerunt probare maris fluxum, & refluxum, augmentum & decretionem exinde concitari. *Amatus Luſitanus*, Medicus Hebræus, ad harmonicam conſonantiam: *Ludovicus Lemoſius*, qui de prædictione doctiſſime ſcripſit, naturam fecit criſium, criticorumque dierum, auctorem, præſertimque expultricem, humoris copiam, acceſſiones, morbos ipſos, atque ambientis naturam: *Hieronymus Fracaſtorius*, Philoſophus & Medicus præclarus, ad motum proprium humoris melancholici omnem dierum criticorum cauſam retulit: Nos vero non ad hujus ſolum humoris motum, ſed bilis atque pituitæ; ita ut ex propriis motibus humorum exuberantium mutationes judiciaque in quibuſdam terminatis diebus fiant. Humores enim bilioſos & acutos ſcimus nos alternis diebus moveri, quaternis craſſos melancholicos, atque uſtos, quotidie pituitoſos. Hinc Hippocrat. *in 4. lib. Aphoriſm. 61.* ſcripſit: *Febricitanti, niſi diebus imparibus febris reliquerit, ſolet reverti*: quaſi febres, omniumque maxime ardentes, diebus imparibus, ex acutorum humorum, a quibus excitantur, natura, apta moveri de tertio in tertium, judicari optimum ſit. Quod Galen. in libello Dogmatum Hippocrat. confirmat, dicens; *acutos morbos magna ex parte diebus imparibus judicari*. Qui etiam in *3. Epidem.* ſcriptum reliquit; eaſdem febres ſolitas eſſe accedere diebus imparibus; proinde rariſſimum eſſe notat, quod Hippocrat. *in illo Lib. 3. Epidem. pag.* 1085. dixerat, quippe pleroſque ægrotos in ea conſtitutione habuiſſe acceſſiones diebus paribus. Quod egregie Hippocrat. *in 1. Epidem. ſect. 3. pagin.* 964. ita expreſſit: *Quæ diebus paribus accedunt, paribus judicantur, quorum vero ſunt in imparibus acceſſiones, imparibus judicantur*. Ex quo Hippocr. dies criticos coincidere cum acceſſionum motibus affirmat. Quam rem Galen. *in comm.* perbelle notavit hiſce verbis: *Sæpius fieri in acceſſionibus judicia, tum quod in iis humores vehementer moveantur, & veluti ebullientes erumpant ſanguinis eruptione, vel ſudoribus, vel vomitibus, vel dejectionibus, vel hæmorrhoidibus, vel menſtruo in mulieribus; tum propterea, quod id temporis ad excernenda illa impellatur natura, ſimul quod gravata & afflicta ad excernendum irritetur, ſimul quod illis magis fuſis & diſcretio noxiorum humorum promtior & judicium fiat proclivius*. Quare ab una eademque cauſa & acceſſiones & dies judicatorios fieri, eſt neceſſarium. Hinc Hippocr. ex acceſſionum varietate, ideſt, ab ipſis paribus accedentibus pares dies criticos conſtituit, & impares ab acceſſionibus imparibus. Quos ipſe *in 1. Epidemiorum comm. 3. pag. 965. text.* 14. ita expreſſit dicens: *Eſt autem primus decretorius circuituum, qui diebus paribus judicant, quartus, ſextus, octavus, decimus, decimus quartus, vigeſimus octavus, trigeſimus, quadrageſimus octavus, ſexageſimus, octuageſimus & centeſimus. Circuituum vero, qui judicant imparibus diebus, primus, tertius, quintus, ſeptimus, nonus, undecimus, decimus ſeptimus, vigeſimus primus, vigeſimus ſeptimus, trigeſimus primus*. Quoniam vero fit, quod raro exſuperent humores puri & ſimplices, ſed mixti, bilioſis fere perpetuo melancholicorum uſtorum portio aliqua permiſcetur,

Dierum criticorum cauſa.

& non

& non raro pituitosorum; ideo non simplices bilioſorum, aut melancholicorum, aut pituitoſorum motus apparent: quare ab eadem cauſſa fient dies judicatorii, ex qua acceſſiones. Sed dicet lector, a quibuſnam fiunt acceſſiones? a motu proprio humorum; & ſi rurſus proprii humorum motus a quo fiant, petierit, dicam nondum vere cognitum eſſe, neque ad nos pertinere quæſtionis iſtius reſolutionem. Humorum itaque motui addimus quoque naturam ac excretricem facultatem; hæc excernit, quod concoctrix debito tempore concoquit, proinde ſervat certos dies ad excretionem faciendam, qui ſunt, ut dictum eſt, dies vere decretorii, quos diviſimus in *decretorios*, *indices*, atque *intercidentes* ſeu *provocatorios*, in quibus & in aliis quoque, quos *non decretorios* vocavimus, aliquando natura ante tempus excernens, irritata aut provocata humorum aut qualitate acri venenoſa, aut copia humorum, mutationes morborum atque judicia facit. Atque hæc obiter a nobis de hac re dicta ſufficiant.

CAP. V.

De prædictione a diebus decretoriis.

EX diebus criticis ſeu decretoriis & ſalutem & mortem Medici prænoſcunt, quatenus in ipſis ſigna coctionis & alia bona apparent, ex quibus, quarta die obſervatis, aut criſin futuram ſeptima, aut morbi quoviſmodo ſolutionem merito omnes ſperant. In morbis ſpirituoſarum partium ſputa, in febribus urinas, atque in ventris affectibus dejectiones Medici debent obſervare. Quæ omnia in die aliquo decretorio, aut indice, bona conſpecta, ſanitatem futuram denotant; & quæ cruda, ut dictum eſt, longitudinem, laborem, dolorem, recidivam, aut demum mortem ipſam: una vero cum ſignis exitioſis crudæ urinæ in febribus, aut ſputa in morbis ſpirituoſis, & in ventris affectibus dejectiones, mortem proculdubio in proximo altero decretorio; quod *uxori Dromeadæ*, *lib.* 1. *Epidemiorum Ægr.* 11. *pag.* 987. contigit, quum quarta die (quæ obiit ſexta) comatoſa, ſtillas ſanguinis ex naribus habuerit, cum urinis paucis oleoſis, quæ ſunt pernicioſa ſigna in quarta die, quippe ſigna decretoria. Signa vero coctionis & bona, etſi conſpiciantur in intercidentibus diebus, quicquam certi ad prædictionem non ſignificant, ſed potius mala eſſe ſuſpicandum erit; tametſi non negandum quoque ſit, quoſdam ſervatos ſexta die, ſed rariſſime & non ſine recidivis. Obſervant quoque optimum eſſe, ſi imparibus diebus morbi acuti, febreſque præſertim ardentes, ſigna bona habuerint, certumque præſagium facere dicunt; incertum, non bonum, & cui non ſit fidendum, ſi paribus diebus, in prædictis acutis morbis, vel ſigna coctionis vel mutationes conſpiciantur, ex quo Hippoc. ut dictum eſt *in* 4. *libro Aphoriſmorum* 61. dixit: *Febricitanti, niſi in diebus imparibus febris reliquerit, ſolet reverti*: quod tamen falſum eſſe Galen. *in Comment.* clare demonſtravit, ac etiam Hippocrat. *in* 3. *Epidemior. pag.* 1085. confirmavit, quum dixerit: *Acceſſiones plerique diebus paribus habebant*. Quod tamen rarum fieri, Gal. *in Comment.* docuit; quum proprium ſit omnium ardentium febrium & peracutorum morborum, imparibus diebus ut reſolvantur. Malaſque propterea, non fideles judicationes eſſe, quæ eveniant diebus paribus, Galen. *in* 3. *Epidemior.* ita docuit: *Si acceſſiones diebus paribus fiunt, a principio ſtatim ad ſextum diem, peſſimum indicium fore præ-nuntiant. Interim in longum producendum morbum. At ſi quidem admodum moveantur, quarto die pravam habentem acceſſionem ad diem ſextum de vita decedere*. At hoc plerumque veritatem habet, quoniam non pauci fuerunt recte ſexta quoque die judicati, cujuſmodi fuit *virgo Lariſſæ*, de qua Hippocr.

Salus aut mors quomodo ex diebus decretoriis cognoſcitur.

Judicationes bonæ vel malæ quibus diebus fiunt.

lib. 3. Epidem. Ægr. 12. *pag.* 1110. ita habet: *Sexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox sudavit toto corpore multum & calidum, sine febre, est judicata*, & Gal. *in 6. Epidem.* mulierem, quam Hippocrat. (*Vide lib. 6 Epidem. Sect. 3. text. 5. pag.* 1174.) in *Cranone* curavit, decima die habuisse bonos sudores statuit. Colligimus itaque, quod morbi accedentes diebus imparibus, iisdem judicari debebunt, & ubi paribus hi judicentur & resolvantur, quicquam boni ac certi non habere. Contra quoque diebus imparibus longos, ut Galen. *in lib. 3. de dieb. Decret.* tradidit, morbos judicari, qui paribus moveri deberent, bonum non erit, imparibus scilicet moveri & judicari; judiciumque neque bonum majori ex parte fiet. Atque hæc sunt de prædictione a diebus decretoriis, a quibus potius tempus futurorum judiciorum in morbis, & resolutionum prænoscitur, quam vere quicquam certi ad salutem haberi queat. Nam signa coctionis, etsi in diebus decretoriis bona esse constat, tamen eadem erunt, & idem significabunt, in omnibus diebus conspecta; etsi negandum tamen non sit, salutis signa, in diebus decretoriis conspecta, longe certius & fidelius salutem prædicere, & mortem eruditatis signa, eaque prava. Addamus regulam aliam ad prædictionem a decretoriis diebus, quam Hippoc. in *lib. 3. Prognost. pag. 46. lin. 5. & seq.* ita expressit: *Si quibus horum cœpit dolor primo die, quarto premuntur magis, septimo vindicantur. Plerique eorum incipiunt dolore vexari tertio die, quinto conflictantur magis, deinde vindicantur nono aut undecimo. Quod si quinto die incipiunt dolore vexari, & alia quoque secundum rationem ipsis ex prioribus accedant, quartodecimo morbus finietur.* Sed his præmissis potius in gratiam crisium cognoscendarum, ad ipsas modo declinemus.

CAP. VI.

Quid Crisis sit, quotuplexque, & quomodo fiat.

Præmisimus accuratam criticorum dierum tractationem, ut crisium quoque cognoscendarum cognitio illustraretur; quum diversarum crisium ratio possit commode in dierum criticorum causas referri, quod propterea tunc temporis ad excretionem natura moveatur, illisque statutis diebus humores noxios excernat. Sed hæc inferius accuratius cognoscentur, si modo quædam, etiam scitu necessaria, præmiserimus, nimiram in primis quid ipsa crisis dicatur quotque habeat differentias atque causas. Quod ad primum attinet, per crisin omnes fere intelligunt naturæ & morbi conflictum, seu melius judicium, unde dies critici, ideſt, judiciales, dicti sunt a κρίνω, quod est judico, aut a κρίσι, ideſt judicio, quod in ipsis de naturæ morbique exitu fiat judicium. Neque hoc nomen a Medicis inventum putat Galen. at a quopiam vulgari potius, qui cum istis adesset, ipsa re cogente ita pronuntiavit, quod judicium tunc de vita ægrotantis ageretur: neque enim Medicorum aliquis, ut ait Gal. primus invenit id nomen, sed omnino necessarium fuit, ut qui præsens esset, conturbaretur, atque ideo exclamaret, & crisin, ideſt, judicium rem ipsam nominaret, aut ἀπὸ τῦ κρίνειν, ideſt, secerno, quod in optima veraque crisi humores noxii secernantur, & postea excernantur, ut Galen. *in lib. 2. Aphorism.* docet. Per crisin vero plures plura intelligi voluerunt. Nam teste Galen. *in primo libro de crisibus cap. 1. & 2.* aut subitam in morbo mutationem, aut ad meliorem statum inclinationem, sive solam agitationem, quæ antecessit, vel omnem morbi solutionem, aut illam tantum, quæ bona sit. Ceterum Gal. *in libro tertio de crisibus, cap. 1. & 2.* dixit.

Crisis quid.

2. dixit: Criſin eſſe ſubitam præcipitemque in morbo mutationem, vel ad ſanitatem, vel ad exitium factam. Idem *in lib. 2. Aphoriſm.* 13. ita expreſſit: *Criſis, (ideſt judicatio) eſt ſubita in morbo, vel ad ſanitatem, vel ad mortem mutatio. Fit autem natura ſeparante a bonis mala, & ad excernendum præparante.* Hujuſcemodique permutationes, quando repente in morbo fiunt, Hippocrat. criſes, judicationes vocare ſolet, in quibus nonnumquam integra ſanitas reſtituitur, aut moritur æger; nonnumquam vero magna fit ad ſalutem, vel ad mortem permutatio, ut Galen. *in eodem libro Aphoriſm.* affirmavit. De qua etiam *in lib. 3. de Criſibus*, dixit: *Sola igitur ſubita ad ſanitatem converſio ſimpliciter criſis nominatur, & quidem omnino fit per manifeſtas quaſdam excretiones, aut effatu dignos abſceſſus. Quicumque enim aliter quieverint, malignius retrocedunt:* antecedit autem hujuſmodi excretiones & abſceſſus non mediocris perturbatio in corpore ægrotantis. Quare ex Gal. Criſis, uti dictum eſt, ſubita præcepſque in morbo mutatio eſt, vel ad ſanitatem, vel ad mortem. Hanc malam & iſtam bonam Criſin vocat Galenus *in libro tertio, de Criſibus*. Verum Galen. tametſi, ut dictum eſt, *in primo libro, de Criſibus capite primo*, ſcripſerit ſubitam in morbo mutationem, inclinationem ad meliorem ſtatum, ſolam agitationem, quæ bona tantum eſt, criſin appellari poſſe, tamen *in libro 3. de Criſibus cap.* 1. & *in* 2. *Aphoriſmorum* apertius Criſin diſtinxit a morbi ſolutione, quæ fit aut morbo emarceſcente, aut ægroti viribus paullatim diſſolutis; mutationemque ſubitam in morbo, vel ad ſanitatem, vel ad mortem, Criſin eſſe voluit, propterea-que hujuſmodi permutationes, quando nimirum repente in morbo fiunt, & in quibus nonnumquam integra ſanitas reſtituitur, aut moritur æger, nonnumquam vero magna fit ad ſalutem, vel ad mortem permutatio, Criſes, ſeu judicationes Hippocratem vocaſſe, dixit. Quas Criſeos in morbis mutationes Hippocrat. breviter ſane, ſed divine hiſce verbis *in primo Epidemiorum ſect. 3. pagin. 965.* eſt complexus: *Ad ſalutem aut mortem, vel inclinatio ad melius, aut ad pejus*: quod omnes in morbis, ut Galen. ait, mutationes ſint vel ſtatim ad ſalutem, ut optimæ criſes; aut ad mortem, ut peſſimæ; aut ad melius inclinare aut ad pejus; has imperfectas & malas criſes vocant, illas bonas & imperfectas. Sed Galen. *in lib. 3. de Criſibus cap.* 1. ſex ait eſſe omnes numero mutationes, quæ in morbis obſervantur; primas duas eſſe ad ſalutem atque interitum ſubitas mutationes, quas bonas & malas criſes vocat; duas alias, quæ paulatim, non confertim & ſubito fiunt, aut morbo quidem marceſcente, aut viribus ægroti diſſolutis; alias duas miſtas ex his atque ex primis, quippe ex iis mutationibus, quæ paulatim & confertim fiunt; quando nimirum ſubita quidem aliqua in morbo ad melius vel ad pejus mutatio facta fuerit, & deinceps uſque ad omnimodam ſolutionem, vel mortem reliquum totum emarcuerit: ita ut exempli gratia, ſi quis ſeptima die aut excretione, aut abſceſſu, aut decubitu fuerit non perfecte judicatus, poſtea nulla amplius facta mutatione, ſenſim ac ſenſim reliquum morbi conſumatur, aut ſenſim viribus diſſolutis ægri intereant. Addamus duas alias, non dixerim mutationes, ſed potius ſolutiones morborum ad ſanitatem, aut virium ad exitium. Atque tot ſunt in morbis mutationes, quas, etſi non proprie, dici criſes poſſe aſſerimus. Ceterum veræ criſes quatuor tantum ſunt, quippe ſubitæ mutationes ad ſanitatem & ad mortem, aut ad melius, aut ad pejus. Ex quibus has primo colligimus eſſe Criſium primas differentias, quippe primam ſubitam mutationem ad ſanitatem, quæ eſt perfecta optima Criſis, quod omnino ægrotum a morbo liberet; & alteram ad mortem, quæ perfecta, & peſſima, quum continuo ægrotum interimat; tertiam ad melius, quæ eſt bona ſed imperfecta, propterea, quod non prorſus hominem ſanet; atque quartam ad pejus, quæ & ipſa peſſima eſt ac

Criſium differentiæ.

imperfecta, quod & ipsa non continuo hominem perdat, sed paullo post. Longe plures differentias alii fecerunt Crisium, quippe quod ipsarum quædam bonæ, quædam malæ sint, quædam perfectæ, quædam imperfectæ, quædam fideles & certæ, quædam non, quædam manifestæ, quædam obscuræ, quædam periculosæ, & quædam citra periculum, & demum quædam per dies indicatorios significatæ, & quædam absque ulla indicatione prærumpentes. At quod eæ omnes differentiæ bonis ac malis comprehendantur, propterea de bonis tantum & malis agemus. Quandoquidem quæ bonæ sunt certe fideles, perfectæ aut imperfectæ manifestæ, aut obscuræ, diebusque indicibus significatæ, citraque periculum existunt. Contra malæ quippe infideles, non die decretorio significatæ, obscuræ, imperfectæ, periculosæque. Sed priusquam de iis agamus, videamus prius, a qua causa crises fiant, quam rem Galen. *in libro secundo Aphorism. de veris crisibus*, ita expressit: *Fit autem natura separante a bonis mala & ad excernendum præparante. Non temere igitur in tali turbatione graviter se habent.* Ex quibus patet naturam ipsam esse, quæ, humores dum studet bonos a malis segregare, malosque excernere, crises faciat. At alias a nobis demonstratum est, naturam ipsam ad crises faciendas moveri, aut ab humoribus noxiis plane secretis a bonis, aut ab iisdem etiam nondum separatis a bonis, qualitate, vel copia expultricem internorum viscerum molestantibus. Ex quo & naturam & humores crisium causas esse, liquido constabit. At has crises ab aliis in morbo factis mutationibus distinguent excretiones aut abscessus subsecuti. Propterea crises perfectas optimasque dicimus, in quibus humores noxii omnino fuerint excreti, posteaquam ipsos a bonis natura separaverit, quod concoquendo agit. Aliarum vero mutationum in morbis vere non criticarum, quas verius solutiones appellant, aliæ quidem causæ existunt, quippe vincente natura, aut humores crudi, crassi ac lenti, ad motum difficiles, sed coctione primo extenuandi, & absumendi, quo morbus paulatim marcescit, usque ad omnimodam sanitatem; aut morbo ipso vincente, eique natura succumbente, virium prostratio, qua natura paulatim a morbo consumitur; atque hoc est, quod Galen. *in tertio libro de crisibus, cap.* 10. ita habet: *Est autem primum & maximum in morbis mortalibus signum, quod sine crisi mors sit subsecuta, virium imbecillitas.* Nam virtus ita prostrata ad pugnam contra morbum non excitatur. Atque hæc de crisium causis in communi, quas accuratius etiam postea de singulis crisium differentiis acturi explicabimus. Nunc videamus, quinam morbi crisibus terminentur, seu judicentur, & qui non.

Crisium causa.

CAP. VII.

De morbis, qui per Crisim terminantur, & de iis, qui absque Crisi finiuntur.

ACutos tantum magnosque sive vehementes morbos crisibus terminari, vel ex eo cognoscetur, quod numquam in parvis crises fieri observentur. De veris autem loquimur, quæ teste Gal. *in libro tertio, de crisibus, c.* 4. omnino fiunt per manifestas quasdam excretiones, aut effatu dignos abscessus. Demonstratum quidem est has crises naturam movere, irritatam vehementer a magnitudine seu vehementia morbi, quod idem est, ac si dixerimus, a quantitate accidentium, quibus magnitudo sive vehementia morbi, ut docuit Galenus *in eodem libro de crisibus*, dignoscitur. Necessarium enim est, ut ipse quoque *in secundo libro Aphorism.* ait: *ob morborum magnitudinem, ac casuum vehementiam vel cito vires prosterni, adeo ut homo moriatur, vel ad noxiorum humorum excretionem excitari, si modo, quos invaserint, exsuperent,*

perent, *bonam ſequi judicationem*, *ſin autem exſuperentur*, *malam*. Ex quibus conſtat magnum vehementemve, quod idem eſſe ex Galeno in nuper citato *lib. 3. de Criſibus*, conſtat, morbum criſi tantum judicari ac terminari, a parvo enim natura non irritatur ad excretionem. Hinc Hipp. *in libro ſecundo Aphor.* 13. ait: *Quibuſcumque judicatio ſit, his nox gravis ante acceſſionem eſt*. Natura enim, ut in *com.* docet Gal. ſeparante a bonis mala & ad excernendum præparante, non temere in tali turbatione graviter ægroti ſe habent. Hinc præcedunt accidentia multa & magna, quæ & valde turbant exagitantque ægrotos, tum etiam quæ timorem inſpicientibus, ut ait Gal. *in tertio de Criſibus*, *cap.* 2. inducant; licet deceat Medicum generoſum neque turbari, neque futurum eventum ex ipſis ſymptomatis ignorare. Quam rem probe expreſſit Gal. *in tertio de Criſibus*, *cap.* 10. hiſce verbis: *Futuram autem præcognitionem ex eo, quod urgeatur, ac vehementer irritetur natura a morbo, atque ex ſubita præter rationem circa corpus facta perturbatione: omnino enim fit aliqua novitas, quando criſis futura eſt, vel circa reſpirationem, vel circa mentem, vel auditum, vel viſum, vel ferendi facilitatem, vel circa aliquod eorum, quæ ſæpe diximus, quæ uno nomine ſummatim judiciaria accidentia, & ſigna appellamus. Quare etiam, quod ab Hippocrate* in Aphoriſmis, *ſect. 2. Aphor. 13. dicitur*, quibuſcumque criſis fit, his nox moleſta, quæ antecedit acceſſionem, *eſt ipſum, quod nunc nos dicimus*. Addimus quod criſes, quum fiunt in morborum acceſſionibus, (concurrere enim in idem tempus criſes, cum morbi acceſſione Galen. docuit) etiam in morbis, habentibus acceſſiones, manifeſtius fient, qui omnes magni vehementeſque ſunt. Quare colligamus morbos magnos ac vehementes per criſes terminari, nequaquam vero parvos & exiles, a quorum parvitate (quando parvi dicantur, *in 3. de Criſib. cap.* 24. ex Galeno, qui multis magniſque ſymptomatibus carent) natura ad excretionem irritari nequit. Hinc Galen. *in ſecundo libro Aphoriſm.* dixit, acutos magnoſque morbos in parvo tempore magnas facere mutationes, quarum quæ repente fiunt, criſes Hippocratem appellare. Magni itaque morbi ſunt, qui per criſes judicantur, & parvi citra criſes, quod, ut dictum eſt, ab ipſis natura non irritetur ad humorum excretionem. Sed hoc tamen accuratius erit cognoſcendum; quum, ut Galen. monuit, debiles quidem & parvæ febres quandoque valde malignæ ſint. Sæpe enim Medici decipiuntur, quum febres exterius debiles & parvas obſervent, putantes vere parvas & debiles eſſe, quum tamen valde magnas eſſe reipſa comprehendatur, quum præſertim (etſi calore vehementi carere exterius videantur,) multa ſævaque accidentia habeant, a quibus magnæ & non parvæ ſunt, veluti ſunt vigiliæ, deliria, difficiles reſpirationes, inquietudines & alia hujuſmodi, quæ magnum eſſe morbum teſtantur. Hinc Hipp. phrenitides quaſdam debiles, imbecilles, & obſcuras vocavit in *Prorrheticis*, *lib.* 1. *text.* 34. valde phreniticas. Quare hi morbi (quos merito Medici malignos appellant) criſibus ſolent terminari, quod & ipſi habeant accidentia multa & magna, quibus natura ad excretionem humorum noxiorum poteſt irritari, & excitari. Sed jam doceamus, quibus ſignis futuræ criſes poſſint prænoſci.

Morbi quinam per criſin terminantur, quinam vero non.

CAP. VIII.

De ſignis criſes futuras ſignificantibus.

QUum cognitum a nobis ſit, morbos magnos vehementeſque tantum per criſin terminari ſeu judicari; nunc videndum eſt, quibuſnam ſignis criſes futuræ prænoſcantur: ſed de perfectis cognoſcendis ſermonem faciemus, quum eæ certa ratione, teſte Galeno, *in tertio de Criſibus, capite quarto*, præſciri poſſint; veluti imperfectæ non certa ratione, ſed conjectura potius poſſunt prænoſci: qua notitia Medici (quod maximum in medicina eſt) poſſunt præcognoſcere, & prædicere futuras criſes, & quo tempore fient, & etiam, ut paullo poſt docebimus, qualibuſnam criſibus ſeu excretionibus, ſive abſceſſibus, ſint futuræ. Itaque vere quidem a nobis ſcriptum eſt, nonniſi morbos magnos vehementeſque per criſin terminari, atque hos etiam non terminari per criſin, ni virtus ſatis in corporibus robuſta & firma fuerit: ſi modo verum eſt, criſin fieri morbo naturaque invicem colluctantibus; quo pacto enim natura prælanguida pugnam audebit tentare cum morbo graviſſimo? Ob morborum enim magnitudinem ac caſuum vehementiam Gal. dixit, vires vel cito proſterni & nullam fieri criſin, vel ad noxiorum humorum excretiones excitatas, moliri evacuationem. Quare in magnis vehementibuſque morbis, & in corporibus robuſtis certo poterimus criſes prædicere, & quo majores, & una robuſtiores erunt, eo certius & citius poterit criſis prædici. Ceterum quum nobis non ſatis ſit, hoc cognoviſſe, quippe in magnis morbis, viribus exiſtentibus firmis, futuras criſes certo prædicere nos poſſe, ſed opus eſſe, ut etiam inſtantes criſes animadvertamus & poſſimus aſſidentibus, ac etiam ægrotis, ſi ſalutares futuræ ſint, eas præſagire; ideo omnia illa ſigna, quibus criſes inſtantes innoteſcunt, nunc deſcribemus. Quę ex Hipp. atque Galeno, ſunt Ægrotantium corporum turbationes vehementes, morbi idea, magnitudo, natura, motus, mos, coctiones, cruditates, rigores, anni tempus, regio, præſens conſtitutio, ægrotantis natura, ætas anteacta, victus, & alia hujuſmodi ſimilia. Ex his enim Gal. *libro primo, de Criſibus, cap. 8.* & *in ſecundo libro Aphoriſ.* inſtantes, & futuras criſes prænoſci tradidit. Ceterum horum quædam particulatim videntur facere ad criſes has futuras, quædam ad bonas atque malas cognoſcendas, & quædam ad tempus, quo ſint exſpectandæ, quod interſtinguendum. Hoc enim denotare videntur dies indicatorii, in quibus aliquod criticum ſignum illuxerit, ſive in humoribus concoctio, ſive cruditas, ſive aliud ſignum. De quibus Hipp. *in libro quarto, Aph.* 71. ait: *Quibus die ſeptimo futura eſt criſis, iis urina rubram die quarto nubeculam habet, ceteraque pro ratione.* Ex motu vero morbi aut celeri, aut tardo, itidem cognoſci Hipp. *in lib.* 1. *Aph.* 12. ſic indicavit: *Exacerbationes vero & conſtitutiones morborum indicabunt tum morbi ipſi, tum tempora anni, tum periodorum proportionis inter ſe obſervatio, ſive eæ quotidie, ſive alternis, ſive majori intervallo fiant: ſed ex iis, quæ poſtea apparent, indicia ſumuntur; veluti in pleuritide ſputum, ſi ſtatim initio appareat, breve fore denuntiat, ſi vero poſterius conſpiciatur, longum.* Ad bonas vero atque malas criſes denotandas, coctiones, & cruditates facere videntur. Idem fere & morbi idea quippe videtur notare, utrum evacuatio ei proportione reſpondeat, & an ſit bona: mos morbi itidem ad bonam vel malam criſin agnoſcendam facit, qui a ſignis ſupervenientibus, teſte Galeno, aut bonis aut malis denotatur. Hæc omnia ſigna privatim ad bonas malaſque criſes cognoſcendas faciunt, de quibus poſterius nos accuratius. Reliqua vero faciunt ad judicandas criſes ſimpliciter futuras, quippe quæ

Criſes unde futura prænoſcuntur.

ſunt

ſunt, turbationes ante criſin, & ſimul omnia ſigna, quæ critica dicuntur, magnitudo morbi, virium robur, naturæ morborum, & humorum morbos facientium, non minuſque ægrotantium corporum victus, anteacta ætas, anni tempus, regio, ſtatus præſens, atque ſimilia. Ex his tamen omnibus tria videntur ſufficere ad prænoſcendam criſin, quippe acutos magnoſque morbos, magnas turbationes, atque virium robur. His quidem viſis neceſſario fiet criſis. Etenim virtus, a vehementi acutoque morbo maxime turbata, neceſſario aut exſtinguetur, aut ad pugnam vehementer irritata, ad excretiones noxiorum humorum inclinabit. Si enim prælanguida citra criſin ſuccumberet morbo, ac exſtingueretur, robuſta vero non poterit, niſi facto conflictu ſuperetur: ſed in eo conflictu neceſſe eſt aliquam humorum erumpere excretionem, aut bonam aut malam; bonam natura morbum ſuperante; malam a morbo natura ſuperata. Alia vero, etſi non præcipue criſin indicent, tamen maxime adjuvant futurarum criſium cognitionem, quæ inquam ſunt, morbi idea ſeu ſpecies ea ratione, qua ſigna appareant proportionatæ excretionis futuræ ad eam ſpeciem morbi, ut ſigna ſanguinis erupturi in febribus ardentibus, coctiones, & cruditates. Motus quoque morbi celer vel tardus; quando tardi motus morbi raro aut numquam criſi judicentur: morborum item naturæ; ætas, natura, victus ratio anteacta ægrotantis; tempus anni, præſens conſtitutio, & regio quę omnia maxime faciunt ad confirmandum futurarum criſium judicium. Sed age ſingula hæc ſigna conſideremus accuratius; & primo ex Hippocr. qui *in lib. 2. Aphoriſm.* 13. ita ſcripſit: *Quibus criſis fit, iis nox gravis ante acceſſionem, quæ vero ſubſequitur, magna ex parte levior exiſtit.* De ſignis iis, ægrotos ante criſin turbantibus, Hippocr. *in 1. Epidem. comm. 1. pag.* 948. *in fine, & initio* 949. ait: *capitis, colli dolores & gravitates cum febribus, & ſine febribus, phreniticis convulſiones, ſed & virulenta vomunt, & ex iis quidam ſubito moriuntur. In ardentibus autem ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hypochondrii contentio, neque cum dolore corripit, his e naribus ſanguis erumpit. At vero quibus totius capitis gravitates, tum autem cordis dolores & faſtidia ſunt, biliоſa poſt aut pituitoſa vomunt.* De quibus clarius Galen. *in lib. 2. Epid. & in lib. 3. de Criſibus cap.* ita ſcripſit: *Sola igitur ſubita ad ſanitatem mutatio ſimpliciter criſis nominatur, & quidem omnino fit per manifeſtas quaſdam excretiones, aut effatu dignos abſceſſus. Quicumque enim aliter quieverint, malignius retrocedunt. Antecedit autem hujuſmodi excretiones & abſceſſus non mediocris perturbatio in corpore ægrotantis. Nam & difficiles tolerantiæ, & vigiliæ, & deliria, & graves ſomni, & difficiles anhelitus, & vertigines tenebricoſæ, & difficiles ſenſus, dolores capitis, colli, & ſtomachi & multorum aliorum membrorum, nonnullis vero aurium ſonitus, & vani ante oculos apparent ſplendores, & lacrymæ involuntariæ effluunt, & urina retinetur, & labrum agitatur, aut aliquid aliud tremulum fit, oblivio, & præſentium ignorantia, & vehemens accidit rigor, & plurimum acceſſio conſuetam anticipat horam, & multus æſtus, ſitiſque intolerabilis ſequitur, clamant & ſaliunt ſicut furentes, neque poſſunt in eodem ſitu recumbere, deinde repente multus ſudor erumpit, aut vomitus aliquis non paucus inſequitur, aut venter ſubito ſolvitur, aut abundans fit fluxus ſanguinis, aut hæc omnia ſimul contingunt, unde non parvus invadit timor inſpicientes.* Addamus ex Galeno in *3. de Criſib. cap.* 80. pulſum inæqualem in pluribus criſibus fieri, & præcipue, quum non fiunt ſine pugna & periculo; multo magis, quum biliоſi humores ad ventriculum confluunt, apparentibus etiam aliis vomitus ſignis, quæ Hippoc. deſcripſit. Sed Hippoc. ſigna ex pulſibus ſumta, vel quia non noverit, vel quia non magni momenti exiſtimaverit, idcirco non eſt ſecutus. Atque hæc ſunt

Ex naturæ viribus.

Ex morbi idea.

Ex ſigni criticis.

ſigna

ſigna omnia critica, quibus ante criſin fit turbatio vehemens, præſagiens in acuto magnoque morbo, viribuſque robuſtis, aut non languentibus, criſin bonam, ſi fiant, ut alias dicemus, in ſtatu morbi, concocto jam morbo; malam in principio, natura morbo ſuccumbente. Rigores quoque privatim in febribus ardentibus aliiſque acutis morbis ſolent criſibus præire. De quo Hipp. *in lib. 4. Aphor. 29.* habet: *Quibus in febribus ſexto die rigores fiunt, difficilis ſunt judicii.* Et *Epid. libri Aphor. 46. ſi rigor incidit, febre non deficiente, jam imbecillo, letale.* Et poſtea *Aph. 58. Ei, qui ardente febre laborat, ſi rigor ſupervenerit, morbi fit ſolutio.* Et poſtea *Aph. 63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres ſolvuntur.* Inter ſigna enim decretoria ſeu critica non minimum rigor locum habet, ad criſin quippe aut bonam aut malam prænuntiandam. Motus quoque morbi celer maxime facit, cum critico aliquo conſpecto ſigno, ad prænuntiandum criſin: namque celer motus criſin futuram, & tardus acriſiam ſignificare ſolet. Celerem vero motum oſtendunt brevia morborum tempora; ſiquidem, qui morbus breve principium habuit, breve quoque augmentum, ſtatum, atque declinationem habebit. Ex brevioribus quoque acceſſionibus idem oſtenditur. Galen. *in tertio de Criſib. cap. 3.* dixit, febrem, quæ quatuor tempora acceſſionum omnia breviter percurrit, properare ad criſin: & idem *in primo libro Epidem.* ita habet: *Quare fac memineris, ubi quartus perinde ac tertius gravia habeat ſymptomata & ſigna in morbo acuto, brevi exſpectandum eſſe judicium.* Ex ſpecie vero ſeu idea morbi, quod morborum ſingulis ſpeciebus conſtitutæ quædam proprietates ſint, ut ad criſes veniant; cujuſmodi, teſte Galeno *in 3. lib. de Criſib.* ardentium febrium proprium eſſe videtur, ut ſanguinis eruptione ex naribus, aut ex alia corporis parte, aut poſt vehementem rigorem ſudore multo & calido erumpente ex toto corpore, aut per vomitum bilioſorum humorum excretione judicentur. Proinde in his ſigna omnia, quæ aliquam prædictarum excretionum prænuntiant, & ſignificant, conſpecta, criſin nedum futuram, ſed quoque ſpeciem criſis, ac vel etiam aut bonam aut malam oſtendent. De quibus Hippocr. *in Aphoriſm. 58. lib. 4.* ait: *Ei, qui ardente febre laborat, ſi rigor ſupervenerit, morbi fit ſolutio.* Ubi præſertim poſt ipſum aut ſanguinis eruptio, aut ſudor, aut bilioſorum humorum ſequatur excretio. De iis ait Hippoc. *Prorrhetic. lib. 1. text. 132. Morbi qui ſtatim turbulenti ſunt, inſomnes, ſanguinem de naribus ſtillantes, ſexto die levantur, noctu laborant, poſtridie ſudant, in ſomnum feruntur, delirantque, abunde ſanguinem profundunt.* Et in Epidem. *lib. 1. comment. 2. pag. 948. ſub finem: In ardentibus autem febribus, ceteriſque febribus, quibus colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hypochondrii etiam contentio, neque cum dolore, corripit, his e naribus ſanguis erumpit.* Atque ita de iis, qui ſudores, vel alvi dejectiones, aut vomitus bilioſos habent. De quibus *in 2. Prognoſtic. pag. 45. ſub finem: Qui vero totius capitis gravitates & oris ventriculi morſus, ac ſtomachum anxium habent, iſti bilioſa & pituitoſa evomunt*; uti *Chærioni* contigit, de quo Hippocrat. in 3. Epidemiorum *Ægrot. 5. pag. 1072. Quinto cum dolore cuncta exacerbata fuerant, nugabatur, noctem moleſtam habuit, non dormivit, ſexto nihil eſt immutatum, ſeptimo ſuperriguit, febris acuta, per totum corpus ſudavit, judicatus eſt.* Et de *Virgine* quadam Lariſſæ, *lib. 3. Epidem. Ægrot. 12. pag. 1110. Quarta ſub noctem deliravit, ſexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox ſudavit toto corpore multum & calidum, ſine febre, eſt judicata.* Ita ex aliis ſignis, in aliis etiam morbis denotantibus vacuationes, formis ipſorum proportione reſpondentes ſeu proprias, ut in tertianis febribus vomituum, dejectionum bilioſarum, aut ſudorum ſigna, criſin oſtendunt; & in quartanis ſudorum multorum & pituitoſarum excretionum; & in phreniticis ſudorum præcipue futurorum

Ex rigore.

Ex motu morbi celeri.

Ex ſignis excretionum futurarum.

ex capite

ex capite copioſiorum, eruptionis ſanguinis e naribus: non minus in pleuriticis & in hepatis lieniſque inflammationibus, atque tandem in omnibus præcordiorum inflammationibus, ſigna, vel erupturum ſanguinem, vel alvi dejectiones, vel vomitus, vel ſudores denotantia, critica eſſe affirmamus; atque ita licebit ex morborum idea criſin Medicis prænoſci. Ex coctione vero criſin, & bonam criſin, ſi aliquod criticum ſignum una illuxerit, ex prædictis nobis ſignificari certiſſimum erit. Perpetuo enim, ubi in aliquo decretoriorum ſeu indicatoriorum dierum in magno morbo, cum aut capitis dolore, aut delirio, aut gravitate, aut aliquo ſigno ex criticis, criſin in altero quaternario futuram ſignificabit. Propterea Hipp. dixit *in* 1. *Epid. ſect.* 2. *pag.* 948. *Coctiones celeritatem judicii & ſecuritatem oſtendere.* Ex diebus quoque judicantibus criſis præſagitur; Galen. enim *in* 3. *de Criſibus* ſcribit: *Ubi in* 4. *die aderit magnitudo morbi ejuſque morbi celer motus, atque ſignum coctionis, in ſeptimo judicium ſequetur, & ſi hæc ſeptimo tantum fient, judicium undecimo, aut decimo quarto erit.* Criſium vero futurarum judicium augere naturam morbi calidam, calidoſque humores & ſumme putridos, naturam itidem ægroti calidiorem, ætatem florentem, victus rationem anteactam, bilioſorum ciborum, calidam cęli regionem, anni tempus æſtivum, non opus eſt, ut ad hoc demonſtrandum diu laboremus; quum omnes ſciant, proprium eſſe calidorum humorum, ut facillimi ſint ad excretionem, atque etiam ſua qualitate naturam movere maxime atque irritare ad excretionem ipſorum; temperamentumque calidum aptiſſimum eſſe ad criſes; veluti, frigidi morbi, humores frigidi, naturæ frigidæ, cęlum frigidum atque hiemale tempus, & alia ejuſdem generis, quum criſes retardare, tum, ut ne fiant, facere, Galen. in loco citato, atque alibi in multis locis, nobis demonſtratum reliquit. Atque ſatis de ſignis criticis, quorum, ut diximus, tria tantum nobis poterunt criſes prænuntiare, quippe morbi magnitudo, corporis turbationes, uti ſunt dolores, inquietationes, deliria, & alia hujus generis critica, que ſuperius ex Galeno omnia adnumeravimus: atque virium robur. His tribus conſpectis ſignis, non dubium erit, quin criſis ſit futura: alia vero ſigna, quæ, etſi non per ſe denotent criſin, tamen aliquo modo poſſunt criſes prænuntiare, uti Galeno placuit, & a nobis jam eſt demonſtratum.

Criſium futurarum quanam augent.

CAP. IX.

De *Criſibus ſalutaribus, quæ certam ſalutem ſignificant, cognoſcendis.*

PRæmiſſis, quæ ad prænoſcendas criſes faciunt, nunc ſupereſt, ut bonas, ſalutares, atque malas, exitiales, cognoſcamus, ut ex ipſis, ſalutem & mortem ægrotantium aſſidentibus præſagire ſciamus: atque hoc eſt unum pręcipuum, propter quod nos criſium cognitioni tam accurate incumbere voluimus. Sed eſto, principium faciamus a bonis ſalutaribuſque cognoſcendis, quę omnes in morbis ſalutem proxime futuram ſignificant. Hæ vero duplices exiſtunt, quædam optimæ, fideliter ſalutem ægrotis indicantes, quædam non certam, ſed plerumque cum recidivis, & periculo. De primis nunc agimus, quæ optimæ ac ſaluberrimæ exiſtunt, a quibus certa ſalus perpetuo prædicitur. Hanc vero certo indicabunt ſigna perfectæ coctionis in excrementis, ſtatus morbi, in diebus indicatoriis fuiſſe indicatas, in aliquo judicatoriorum dierum fieri, excretiones ſubſecutas morbi naturæ convenire, morbum ab ipſis reſolvi, ægrotos coloratiores ac robuſtiores, ac, quam antea, quietiores videri, pulſus meliores evaſiſſe, quippe vehementiores, æqualiores, ordinatiores. Coctionis autem perfectæ ſigna, quæ penes excrementa noſtri corporis conſiderantur, pręcipuum optimarum criſium certiſſimumque eſſe

Criſes duplices.

Optimæ unde noſcuntur. Ex coctione.

argu-

argumentum colligitur, ex Hipp. qui *in primo Epidem. Sect. 2. pag.* 948. ita habet: *Concoctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalutarem.* Et Galen. *in 3. lib. de Criſibus cap.* 4. ita ad ſalutem in ægrotis præſagiendam coctiones facere novit, ut affirmaverit, conſpectis coctionibus, neminem morientem vidiſſe. Quod ipſe ita ſcripſit: *Primum quidem & maximum inter omnia eſt conſiderare coctiones ex urinis, alvi excrementis, & ſputaminibus. Siquidem ego millies, quum, dum criſes fierent, intereſſem, neminem umquam vidi intereuntem, qui præcedentibus coctionibus criſin habuiſſet.* Perfectæ ſeu exquiſitæ itaque coctiones in excrementis conſpectæ, ſunt certiſſima præſagia optimarum criſium. In omnibus itaque febribus vel ſine paſſione alicujus viſceris, vel cum inflammatione hepatis, vel renum, vel veſicæ, vel ſplenis, ac, ut uno verbo dicam, ſemper ubi febris affuerit, vel ex ſola humorum putredine accenſa, vel ex membro inflammationem patiente, urinæ concoctæ optimam ſecuriſſimamque criſin, teſte Galeno, pollicentur; veluti in morbis thoracis, & pulmonis primo ſputa concocta, quæ præcipua harum partium affectarum ſunt indicia, atque una cum ipſis urinæ quoque & alvi excrementa itidem concocta ſi ſpectentur, certiſſimum optimæ criſis nobis erit indicium. Non ſecus in affectibus ventris primo ad optimam criſin prænoſcendam, alvi excrementa concocta, & poſtea urinæ erunt attendendæ. Quare præcipuum certiſſimumque ſignum optimarum criſium erunt coctiones in excrementis conſpectæ. De quibus Galenus etiam *in eodem lib. 3. de Criſibus cap.* 5. ita ſcripſit: *Quum enim poſt ſigna optima, atque exquiſita coctione, facta fuerint, neceſſe eſt, ut optimæ ſint, quoniam & ſola coctio criſis celeritatem, & ſalubrem ſecuritatem oſtendit, neque enim vel animo concipi poteſt, quod poſt morbi exquiſitam coctionem criſis mala ſequatur.* Exquiſita vero coctio fit tempore ſtatus. Hinc optimas criſes, vel in ſtatu vel parum ante ipſum fieri, Galen. *in 3. de Criſib. cap.* 6. docuit, quoniam tunc omnia concocta ſunt, ut Galen. *in eodem lib. cap.* 4. docuit, perfectaſque eas criſes eſſe, quæ tunc temporis fiunt; in augmentiſque, ſi ſalus ſit ſubſecutura, imperfectas eſſe, vel non ſecuras. At diſtinguendus hic ſtatus, quem naturæ ſtatum in primo libro vocavimus, in quo optimæ criſes fiunt, a ſtatu morbi, quod numquam cum naturæ ſtatu convenit: aut enim in principio, aut denique in augmento naturæ ſeu materiæ, ut alii vocant, morbi ſtatus non raro celebratur; quo tempore dicimus morbum ultimas vires exercere, neque amplius magnitudine & vehementia augeri: de hoc ſtatu morbi nos non loquimur, ſed de naturæ ſtatu, qui non penes morbi majorem vehementiam, ſed penes coctionem exquiſitam cognoſcitur; in hoc enim optimæ, ſalutares, ſecuriſſimæ, ac perfectæ criſes apparent. Optimam quoque criſin eſſe diximus, quæ priuſquam fiat a die indicatorio aliquo fuerit indicata, veluti exempli gratia, die quarta, ſi ſeptima futura ſit criſis, de qua Hipp. *in* 4. *Aph.* 71. *Quibus ſeptima morbus judicatur, his nubeculam urina continet quarta die rubram, & alia ex ratione.* Addamus eam quoque eſſe potiſſimam, quæ in diebus criticis apparet, de quibus *in eodem libro Aphoriſm. 36.* Hipp. *ſi ſudores febricitanti inceperint, boni & tertio die, & quinto, & ſeptimo, & nono, & undecimo, & decimoquarto, & decimo ſeptimo, & vigeſimo primo, & vigeſimo ſeptimo, & trigeſimo primo, & trigeſimo quarto: ii enim ſudores morbos judicant; qui ſecus evenerint, laborem & morbi longitudinem, aut ejuſdem reditum ſignificant.* His etiam addimus cognoſci optimam criſin, primo ex qualitate humoris excreti: optima enim habet excretionem, morbi naturæ ſeu ideæ convenientem, cujuſmodi, exempli cauſa, in ardente febre, & in omnibus viſcerum inflammationibus, ſanguinis eruptio, aut copioſi ſudores, aut vomitus, vel alvi dejectiones, multæ, bilioſæ, quæ excretiones conveniunt morbi ideæ, quæ eſt calida & ſicca, atque a calidiſſimis bilioſiſque

A die quæ criſin antecedit.

Vel quæ ſit.

Ex qualitate humoris excreti.

siſque humoribus fovetur. Quo apparet etiam confirmari hanc bonam excretionem, ab ægrotantis natura bilioſa, a bilioſa victus ratione anteacta, ab ætate efflorescente, atque ab anni tempore æstivo, in calida siccaque regione, atque in tali cœli statu. Hæc enim bilioſa excretio, prægreſſis ſignis coctionis, optima erit, & ſalutaris in omni morbo bilioſo; veluti in pituitoſis, pituitoſæ, & in melancolicis atri humoris excretiones, optimæ itidem erunt. Diximus alias ex Galen. per ſudores judicari omnes febres ardentes, tertianas, efferveſcentes inflammationes; eoque magis, ſi una ſanguis ex aliqua parte corporis copioſius erumpat, aut bilioſus vomitus, vel alvi excretio bilioſa appareat; itidemque cerebri inflammationes, reliquoſque omnes capitis affectus. Sanguinis vero excretione ſeu eruptione ardentes febres, ſynochas, aliquando phrenitides, etſi eæ non frequenter, pleuritides quoque, etſi minus quam ardentes febres, aliquando etiam perineumonias, quod tamen raro fit, judicari alias docuimus. Hepatis, lieniſque inflammationes frequentiſſime e naribus eruptiones liberant; ſed hepatis ex dextra nare profluens ſanguis, & lienis e ſiniſtra, quod rectitudinem omnes bonæ excretiones & evacuationes ſervare debent. Omnes item præcordiorum inflammationes ſanguinis fluxio judicat. Sudor etiam, ut dictum eſt, juvat omnes inflammationes calidas, & acutas, quæ ſunt in præcordiis. Item hepatis partes devexæ, ſanguinis fluxu, ſudoribus, & copioſioribus urinis ſolent judicari, & convexæ alvi excrementis bilioſis, atque ſudoribus, nonnumquamque etiam vomitibus. Renum etiam & veſicæ affectus copioſioribus urinis judicari ſolent. Thoraciſque ac pulmonum affectus ſputaminibus. Hæc pauca addere ex Gal. *in lib. 3. de Criſib. cap. 2.* volui, ut lector poſſit ex ipſis pernoſcere, quænam excretiones morborum ideis conveniant, atque ex ipſis bonam criſin, quod congruat naturæ morborum vacuatio: & malam, quum nullo pacto congruat. De quibus forte Hipp. *in 1. Aphoriſ. 2.* dixit: *In perturbationibus ventris & vomitibus ſpontaneis, ſi qualia purgari oportet, purgantur, confert, & ægri facile ferent.* Quod repetit poſtea, *Epidem. libri Aphoriſm. 23.* dicens: *Quæ vacuantur: non multitudine ſunt æſtimanda, ſed, ſi qualia purgari oportet, purgantur, confert, & ægri facile ferent.* Quod repetit poſtea *Epid. libri Aphor. 23.* dicens: *Quæ vacuantur, non multitudine ſunt æſtimanda, ſed, ſi qualia oportet evacuentur, & æger facile ferat.* Itidem & locus, per quem, ut dictum eſt, fit excretio, erit attendendus, ut ſit conveniens, & ad quem natura inclinaverit. De quo etiam Hipp. *in Aphor. 21. lib. 2.* ita habet: *Quæ educenda ſunt, quo maxime tendit natura, eo ducenda, per ea videlicet loca, quæ conferunt.* Galenuſque in *commentario*, loca convenientia, per quæ excretio bona fit, intellexit, ſi, κατὰ, ideſt directo ad locum affectum fieri contingant. Ex quibus apparet, quæ omnes ſint excretiones naturæ morborum congruentes, per quas optimæ ſalutareſque criſes fiunt. Quas etiam optimas eſſe aliis ſignis cognoſcimus, & primo, quod ab ipſis ægroti aut ſanentur, aut in melius mutentur, corporaque quietiora evadunt; atque hoc eſt, quod Hipp. per hunc *Aphoriſ. 13. ſect. 2.* docuit, qui eſt: *Quibus criſis fit, iis nox gravis ante acceſſionem, quæ vero ſubſequitur, magna ex parte levior eſt.* Hocque fieri, Galen. *in comment.* ait, quia videlicet plures ad ſalutem criſes definunt. Certo ſiquidem ſcimus ex ægrotis plures eſſe, qui ſervantur, quam qui intereant, niſi forte peſtilens ſit cœli ſtatus. Optimæ quoque excretionis certiora ſigna notat Hipp. *in 1. Aph. 11. & 23.* ut ægroti facile evacuationes tolerent. De quo ſigno Gal. *in comment.* ita habet: *Nam ſi humor ſuperexcedens evacuetur, tunc ipſum ſeipſo ægrotum fieri leviorem, & melius tolerari, eſt neceſſarium.* Addit *in tertio de Criſibus cap. 2.* Fieri etiam melius coloratum pro ratione evacuationis, atque ad reſurgendum robuſtiorem, febremque reſolvi, aut ſaltem maxima ex parte diminui. Ceterum hæc optimarum

Ex loco, per quem ſit excretio.

Ex loco termine morbi.

Ex pulſibus.

marum criſium ſigna confirmabunt quoque pulſus; meliores quippe, vehementiores, æqualiores, ac ordinatiores, de quibus Galen. ſcripſit: *Vehementior igitur ſit continue magis pulſus, & æqualior, atque ordinatior in bona declinatione: expellit enim natura fortius omnem ſubito febrilem calorem, debilior vero atque inordinatior & inæqualis eſt pulſus in mortalibus declinationibus.* Atque tot ſunt, quæ optimas criſes ſignificant, eaſque, ut dictum eſt, fideles atque certas, quibus certa quidem ſalus perpetuo promitti ægrotis poterit. Quales ab Hipp. 3. *Epidem. comm.* 1. *Ægr.* 3. *pag.* 1066. in illo, qui *in Dealcis horto* decumbebat, & in aliis fuere conſpectæ; de illo ait: *Quadrageſimo alvus pituitoſa, alba, ſubcrebra, dejecit, multum toto corpore ſudavit, abſolute eſt judicatus.* Et de *Nicodemo ibidem, pag.* 1108. *Ægr.* 10. *Vigeſimoquarto multam urinam, & albam reddidit, in qua multa ſubſidebant, ſudor ei toto corpore copioſe calidus emanavit, ſine febre judicatus eſt.* Et de *Pericle lib.* 3. *Epid. pag.* 1102. *Ægr.* 6. etiam, qui fideliter per criſin fuit judicatus tertio: *Febris emollita fuit, urinæ multæ & concoctæ, in quibus multum ſubſidebat, nocte quievit. Quarto circa meridiem ſudor prorumpit toto corpore multus & calidus, ſine febre judicatus eſt, neque rediit.* Et de *Anaxione pleuritico, ibid. pag.* 1104. *Ægr.* 8. *Vigeſimo ſeptimo rediit febris, tuſſiit, multa excrevit concocta, in urina multa ſubſidebant alba, deſiit ſitire, dormivit, trigeſimo quarto die ſudavit, ceſſavit febris, in totum eſt judicatus.* Atque de *Heropytho, ibidem, pag.* 1104. *Ægr.* 9. *Jam vero circa diem octuageſimum cuncta remiſſa ſunt, nihil tamen deſtitit, etenim urinæ boni coloris, & copioſiores ſubſidentias habentes exierunt, deliriaque imminuta ſunt. Circa diem centeſimum alvus fuit turbata multis bilioſis, durabantque diu multa talia, deinde dyſenteria cum dolore, reliqua levia fuerunt, in ſumma febres eum relinquerunt, diſceſſitque ſurditas. Centeſimo eſt abſolute judicatus.* In his omnibus poſſunt omnia præcipua optimarum fideliumque Criſium ſigna pervideri, quæ eſſe diximus, coctionem manifeſtam ac exquiſitam in excrementis, quæ juxta affectuum locos affectos conſiderantur, in ſtatu morbi criſes fieri, præindicarique ab indicibus vocatis diebus, in criticiſque diebus conſpici, excretioneſque ideæ morborum reſpondere, haſque ſequi aut febrium ſolutionem, aut manifeſtam imminutionem, ceſſare ſymptomatum moleſtias, quæ ſingula in iis ab Hippocrate conſpectis criſibus fuere obſervata. Coctionis manifeſtæ ſignum in *Nicodemo* fuit multa urina alba, in qua multa ſubſidebant; & in *Pericle*, urinæ item multæ & concoctę cum multa ſubſidentia; & in *Anaxione*, multa quæ tuſſi excrevit concocta cum urina optimam ſubſidentiam habente, & in *Heropytho*, urinæ itidem melioris coloris, copioſiores ſubſidentias habentes erant. Quæ etiam concoctio perfecta, in ſtatu naturæ factas fuiſſe eas criſes indicabat. In quibus quum criſes in criticis diebus apparuerunt: tum videntur quoque antea ab indicatoriis præindicatæ. Fuereque excretiones morbum illorum naturis convenientes. In eo etiam, *qui in Dealcis horto*, quod febris ejus fuerit ex miſtione bilioſorum pituitoſorumque craſſorum humorum, ideo excrevit per alvum multa pituitoſa, & ſudore copioſo tenues bilioſi humores fuere excreti, & *Pericles* quoque ſudore multo excrevit bilem, a qua in febrem delapſus fuerat, atque ita de aliis; quas omnes & allevatio, quum febris, tum ſymptomatum, fuit ſubſecuta: & hæc de optimis fidelibuſque criſibus, ſalutem certam ægrotis ſignificantibus.

CAP.

C A P. X.

De Criſibus ſalutaribus, quæ tamen neque fideles, neque certæ perpetuo ſunt.

Apparent vero Criſes non raro bonæ ſane, ſed temen quibus Medici perpetuo fidere minime debent, quæ hiſce ſignis ab optimis fidelibuſque diſtinguuntur, quippe, quod non cum exquiſitæ coctionis ſignis; neque in ſtatu morbi, ſed in augmento; atque etiam, quæ non ab indicibus vocatis diebus fuerint indicatæ; neque in diebus decretoriis apparuerint, ſed in intercidentibus, quos etiam intercalares & provocatorios appellari ſuperius diximus, quod natura, non perfecta coctione, in iis cogatur pugnam cum morbo aggredi, ex qua raro optime morbus judicatur, ſed plerumque imperfecte & non tuto; & quemadmodum etiam (etſi appareant quædam coctionis ſigna,) non habent vacuationes neque ideæ morborum, neque naturæ ægrotantis, neque ætati, neque victui anteacto, neque anni tempori, neque cœli ſtatui aut loco congruentes: demum, etiamſi omnia bona eſſe apparuerint, ſi ægroti facile vacuationem non toleraverint, neque juventur, criſi huic non erit fidendum; & multo minus, quum ægroti pulſus meliores, quietiores, ordinatiores, ac vehementiores non habuerint. His quidem ſignis criſes conſpectę non plane certæ dicuntur, etſi pleræque ſalutem oſtendant; at cum laboribus, recidivis, & mala ægrorum tolerantia, morbos judicant. Sed ſingula hæc ſigna diligenter conſideremus, & primum de iis, quæ in augmentis morborum: quo tempore natura non plane morbum concoxit, ſed cæpit concoquere, paucaque apparuerunt coctionis indicia. Hęc ſane inceptæ coctionis, nondum abſolutæ, ſigna, in morbis non exitialibus, bonam criſin pollicentur; ſed tamen neque omnino certam ac fidelem, ex quo plerumque ſanantur, at non abſque recidivis, aut moleſtiis ſeu laboribus, ac longitudine. Quæ vero ſanguinis profluvio fiunt, certiores & fideliores ceteris exiſtunt; quum vel etiam in principio, nullis quidem conſpectis ſignis coctionis, non incertam ſalutis ſpem aliquando ſanguinis larga eruptio ſoleat polliceri. Cujuſmodi fuerunt, quæ in *Pericle lib. 3. Epidem. Ægr. 6. pag.* 1102. in quo lienoſo ſanguis prima die e ſiniſtra nare profluxit: & in *Virgine Abderæ, ibidem, Ægr. 7. pag.* 1103. quę in veſtibulo templi habitabat, prima die menſes fluxerunt, & rurſus decima ſeptima e naribus erupit, & ipſa vigeſimo, etiam plurimo erumpente cum ſudore ſanguine, fuit judicata: eodem modo in *Metone, lib.* 1. *Epid. Ægrot. 7. pag. 983.* quarta die cępit criſis per ſanguinem e naribus, quæ quinta die perfecte cum ſudore ipſum judicavit, in quo non fuit recidiva, quoniam ſanguis etiam poſt judicium erupit.

Criſes imperfecta & non certa quando.

Quæ imperfecta criſis ſanguinis eruptione clarius in *Heropytho* viſa eſt de quo Hippocrat. *in 3. Epid. Ægrot. 9. pag.* 1106. ita habet: *Vigeſimo multum deliravit, itemque ſequentibus diebus. Quadrageſimo multum ex naribus ſanguinis erupit, menteque conſtitit magis, ſurdus quidem ſed non perinde fuit, febres fuerunt remiſſæ. Proximis diebus ex naribus ſanguis, & paullatim erupit. Circa diem ſexageſimam e naribus quidem ſubſtiterunt eruptiones, ſed dextra coxendix admodum dolebat, febreſque increverunt: at ille die centeſimo tantum fuit perfecte judicatus.* Ex qua hiſtoria colligimus. Criſes vel etiam per ſanguinis excretionem, quæ ceteris aliis vacuationibus ſunt fideliores & ſalubriores, nondum cum perfecta coctione, ſcilicet ante ſtatum, apparentes, bonas quidem eſſe, ſed infideles ac incertas, quibus non ſit fidendum: verum ex his recidivas, longitudinemque morborum, laboreſque Medici præ-

Per ſanguinis excretionem.

nuntiare

nuntiare debent ; plerumque tamen ſalutares exiſtunt. At hæ in principio morborum, aut cum exitiali ſigno, ſi illuxerint, malæ erunt, quibus aut ſubito mors ſuccedit, quippe in prælanguidis corporibus, aut poſt longum tempus, in robuſtis ac prævalidis, veluti contigit *mulieri, quæ in mendacium foro decumbebat, lib. 3. Epid. Ægr. 12. pag.* 1080. quę plures criſes ante mortem habuit in principio morbi, ideſt, nullis ſignis coctionis conſpectis. Sed de hac accurate quum de exitialibus agemus. Colligamus criſes ante ſtatum non eſſe omnino bonas & certas; quod Gal. hiſce verbis expreſſit: *Eſto igitur, ut in die decimaquarta ſpes ſit fore ſtatum, & aut ob morbi magnitudinem, vel motus velocitatem, vel propter ea aliquod aliud extrinſecum irritamentum criſis die undecimo anticipet, neque ipſam perfectam, neque omnino bonam:* & poſtea dixit, *ſiquidem morbus ſalubris ſic inveniatur, ut neque ejus acumen neque magnitudo feſtinent, neque error aliquis circa ægrotum admittatur, ſtatus tempus criſis exſpectat: & hæc quidem optima criſis eſt; fit enim morbo jam cocto: ſi vero vel propter morbi magnitudinem, vel motus celeritatem, vel propter aliquod irritamentum ante ſtatum criſis venire cogatur, tanto hæc criſis deterior erit quantum ſtatum anticiparit.* Quod autem natura, etiam ante ſtatum, ac vel etiam in principio aliquando, excernat, alias a nobis demonſtratum, eſt, interim enim nondum incepta humorum coctione, & aliquando incepta, quidem, & demum ipſa perfecta : hoc tempore criſes ſunt optimæ : illæ ſunt omnino pernicioſæ; & in augmento, quo tempore, teſte Galeno in 1. *lib. de criſibus cap.* 8. & in *primo de toto morb. temp. cap.* 3. incepta eſt concoctio, in morbo non mortali, bonæ, ſed imperfectæ, & infideles: & hinc diximus alias Hippocr. & Galen. omnes excretiones in principio, & crudo omnino adhuc exiſtente morbo, letales affirmare, & in augmento bonas dici, ſed non certas, neque perfectas. Quas omnes Gal. *in libro tertio de Criſibus cap. 7. cap.* 12. nec non & *in lib.* 4. *de præſag. ex pulſib.* in hunc modum expreſſit, dicens: *Nam ea expellere, quæ moleſtant naturam, ſæpe ante tempus convenit, quippe virtus ipſa eſt alienorum expultrix, quemadmodum in opere de naturalibus facultatibus, ante demoſtratum eſt. Tempus autem coctionis poſt finem alteratoriæ facultatis eſt* : tunc enim functionem obire, omnibus ſecundum naturam abſolutis, oſtendebatur, quum illa ab actione deſticerit: verum ante perfectam coctionem interim, quæ obſtant, amoliri cogitur : ut interdum, coctione jam abſoluta, moratur adhuc, & lente, propter imbecillitatem, munus ſubit. Vtramque autem in ventriculo clare licet contemplari. Inſtigatus enim coctionis tempus non exſpectat, ſed protinus etiam idoneum, cum eo, quod moleſtat, excernit, & ubi ſatis jam coxerit, interdum lente ac cunctanter ſuperfluum, imbecillitatis vitio, expellit. Quare criſes ante augmentum quibuſdam, etſi non omnibus, ſignis coctionis conſpectis, bonæ quidem dicuntur, non tamen fideles, & certæ, quibus nos fidere debeamus. Eodem modo eæ, quæ non in diebus decretoriis fiunt, incertæ exiſtunt, morbique, qui non in diebus iis ſolvuntur, reverti ſolent. In quibuſdam vero intercidentibus, ſeu provocatoriis vocatis, eodem itidem modo criſes non omnino bonæ neque certæ apparent, de quibus Hipp. *in lib.* 4. *Aphor.* 29. ait: *Quibus in febribus ſexto die rigores fiunt, difficilis ſunt judicii.* In hac die *virginem Lariſſæ* ſanguinis profluvio fuiſſe ſimul cum ſudore judicatam, alias meminimus : & Gal. *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 12. *pag.* 1110. ait *in* 6. *Epid. comm.* 3. *in tit.* 19. aliquando bonas criſes decima die fuiſſe obſervatas. Ex quo merito Hipp. dixit *in* 4. *lib. Aphor.* 61. *Febricitanti, niſi in diebus imparibus febris deſierit, reverti ſolet.* Criſes quoque, etſi cum quibuſdam ſignis coctionis appareant, tamen cum vacuationibus, morborum ideis ſeu naturis non congruentibus, numquam perfectæ, nec certæ eſſe poterunt. Exempli gratia, in adoleſcente bilioſę naturæ, morbo itidem bilioſo laborante, anni tempore æſtivo, per alvum, aut

Ante ſtatum.

Quæ non in diebus decretoriis fiunt.

Quæ non recte ideæ morbi conveniunt.

per

per vomitum, ſi pituitoſum multum humorem excretum obſervaverimus, criſis, quod non congruat vacuatio ideæ morbi ac aliis, incerta ac infidelis erit, idem in febre pituitoſa, ſi bilioſum, & non minus ſi ſanguis, hepate affecto, e nare ſiniſtra, & liene, ex dextra copioſior profluxerit. Criſes enim hæ non recte ideæ morbi conveniunt; propterea merito, quum aliquando bonæ, & aliquando malæ ſint, infideles incertæque dicuntur. Addamus denique etiam hoc ipſum in his morbis ſignificari, a quibus ægroti, etſi parum ſtatim meliuſculi viſi ſint, tamen paullo poſt recidunt, ſymptomata, & febres redeunt. Atque hæ ſunt criſes quidem bonæ, etſi non omnino bonæ, plerumque ſalutares ſint, ſed minime certæ, & fideles, nec perfectę, neque perpetuo ſalutem prædicentes; quum aliquando ab ipſis ęgrotos mori contingat. Sed hujuſmodi judicium confirmabitur ſignis, mortem ſignificantibus, quæ ſi bona erunt, bonum quoque judicium futurum dicemus, licet non perfectum, & forte non ſine recidivis. Ceterum eſſet quoque agendum de bonis criſibus per abſceſſus futuris, ſed quoniam ſat accurate agemus de iis, quum de prædictione ex abſceſſibus particularem ſermonem inſtituemus, ideo lectorem lubens ad eum remittendum duxi. Nunc ad exitiales declinemus.

Nec morbum tollunt.

CAP. XI.

De Criſibus exitialibus cognoſcendis.

PERNICIOSÆ cognoſcentur criſes contrariis ſignis, quibus optimas internoſci diximus, quæ ſunt, quæ nullo coctionis ſigno conſpecto, quippe in principio morbi, apparent, quo tempore natura quicquam boni numquam excernit; certioreſque erunt, ſi in diebus decretoriis apparent; tertio ubi excretiones non reſpondeant ideæ morborum, uti ſuperius dictum eſt, vel locis affectis, uti ſi in hepate inflammato ſanguis exeat e nare ſiniſtra, & e dextra, liene affecto, atque itidem utero affecto a naribus, & non per uterum perfluat. Addimus, ſi excretiones ſint per ſe malæ, & exitiales, de quibus Hipp. in 1. *Epid. ſect.* 2. *pag.* 945. *lit. E.* ait: *Sudores multi, bis tantum aberat, ut recrearent, ut etiam contra læderent.* Et paullo poſt: *Ibidem, p.* 954. inter *E.* & *F. Paululum in fronte, & claviculis exſudabant, ſed nemo per totum corpus.* Et de iiſdem in 3. *Epid. pag.* 1089. *lit. E. Sudores intempeſtivi, frigidi, multi perpetuo; copia urinarum non bonarum, colliquationes malæ.* Et in 1. *lib. Epid. ſect.* 2. *p.* 948. *ante lit. H.* de vomitibus: *Sed & virulenta vomunt, & ex his quidam ſubito moriuntur.* Quare crudo plane exiſtente morbo, in principio quippe morbi, quo tempore natura nondum coxit, criſes non fiunt, niſi, ut ſuperius docuimus, natura maxime a vehementia morbi, & celeritate irritata, ut cogatur aut ſtatim ſine pugna ſuccumbere, aut pugnando cum morbo criſin faciat exitialem, qua, ſi virtus debilis ſit, ſubito exſtinguitur. Cognoſcitur quoque hęc exitialis excretio, primo, ſi non reſpondeat morbi naturæ, & quum excretio per ſe ſit prava, uti dictum eſt, aut una ſigna letalia conſpiciuntur, qualia ſunt ex urinis nigræ, turbidæ, cum nigris ſedimentis, vomitus virulenti. & colliquationes alvi, quibus in peſte, Romæ olim graſſata, multos fuiſſe interemtos, Gal. *in* 3. *Epid.* ſcripſit; prętęrea extremarum refrigerationes non recaleſcentes, de quibus Hipp. *Epidem. lib.* 1. *ſect.* 2. *pag.* 940. *litter. G. ſudabant ſemper, ſed non toto corpore, multum extremitates frigebant, ut vix calorem reciperent.* Frigidum per os expirare, reſpirare itidem per nares. Addamus quoque pernicioſas has criſes ſæpius decipere Medicæ artis ignaros, quod ab ipſis criſibus natura exſtincta, ægroti melius quieſcere videantur, & melius ſe habere, quum tamen ex pulſibus langueſcentibus, ac prioribus atque aliis, eruditi Medici exitium in foribus eſſe co-

Criſes pernicioſæ unde cognoſcuntur.

Ab excretionibus malis.

Ex pulsibus.

gnoſcunt. De iis pulſibus Galen. *in 3. de Criſibus* ita habet: *Debilior vero atque inordinatior, & inæqualis eſt pulſus in mortalibus declinationibus, nam una cum aliis tunc calor febrilis exſpirat, atque hinc ſpecies melioris exoritur, deinde paullo poſt, vel, quum ad levandum ventrem ſurrexerint, animi defectum incurrunt, & nonnulli pauco ac tenaci ſudore effuſo moriuntur, vel etiam ſine ſurrectione?* Propterea nos dicimus, criſes bonas ac ſalutares ſubſequi in ægrotis ſtatum meliorem; nam vere quidem quietiores evadunt, quum ſymptomata morbi vel prorſus tolluntur, vel multum minuuntur: ita poſt exitioſas criſes ægroti redduntur inquietiores, debiliores, & ſymptomata ſæve augentur, ni ſtatim exitium ſubſequatur; aut apparent quietiores & liberi magna ex parte a morbo & ſymptomatis, quibus gravantur, ex quibus artis Medicæ ignari putant ægrotos in melius evaſiſſe. Ceterum his non eſt fidendum, & hoc eſt, quod Hippocr. *in Aphor. ſect. 2. Aphor. 27.* dixit. *His, quæ non ex ratione levant, non oportet fidere, neque multum formidare mala, quæ præter rationem eveniunt. Plurima enim talia ſtabilia non ſunt, neque multum durare & permanere conſueverunt.* Sed hanc falſam allevationem cognoſcemus, tum quod, ut ait Hippocrat. ipſa ſtabilis non ſit, neque diu bonus hic ſtatus duret, atque etiam quod, ut dictum eſt, egri languidiores aut non robuſtiores, & pulſus debiliores, inæqualiores, atque pejores evaſerint; unde perfectas criſes continuo exitium ſequitur, veluti imperfectas mutatio in pejus. De iis Hipp. *in Epidem. lib. 1. Epid. Ægr. 9. pag.* 985. de *Critone* ita habet: *Secundo tumor toto pede & ad talum ſubrubeus cum contentione, puſtulæ nigræ, febris acuta, valde inſanivit; dejectiones crebræ, bilioſæ, periit poſtridie quam ægrotare cæperat.* Et de *muliere Dromedai, ibidem, Ægr. 11. pag. 987. Sexto die mane ſuperriguit, cito percaluit, toto corpore ſudavit, extrema membra frigida, deliravit, ſpiritus magnus, & rarus.* Paullo poſt: *Convulſiones a capite cæperunt. Subito obiit.* Et *in tertio Epidem. Ægr. tertio, p. 1098.* de *Pythone*, qui ſupra Herculis fanum decumbebat: *Decimo mane ſine voce, multum frigus, febris acuta, multus ſudor, obiit.*

Ex falſa allevatione.

Vel a Morbi in pejus mutatione.

Nunc etiam de criſibus malis & perniciofis, quæ imperfecte ad interitum judicant, quippe a quibus in pejus fit mutatio, tamen ægroti non ſubito intereunt, hocque evenit, ut vires prævalidæ contra morbum ſtrenue pugnent, & ut in exitialibus perfectis unica vice pugnans natura, præ imbecillitate, morbo ſuccumbat, ita robuſtam cogitur morbus iteratis vicibus, quod unica pugna non cedat, pugnando ſuperare. Propterea virium magnum robur facit criſes exitiales imperfectas, veluti minus robur perfectas: quo natura ſubito in pugna vincatur. Virium itaque magnum robur ſignum erit in exitialibus morbis criſium futurarum imperfectarum. Eædem notæ erunt imperfectarum, & perfectarum, hoc excepto, quod imperfectæ fiant plerumque cum incepta aliqua humorum coctione, ita ut potius in augmentis fiant, quam in principiis, & non abſque aliquo ſigno coctionis; veluti ſi alvi excrementa fuerint liquida, & poſtea parum incraſſentur, ſed tamen inæqualiter, ita ut ſi hac die craſſiuſcula apparuerint, altera rurſum liquida; & quod ad urinas, quum aliqua ſit in ſedimento bona mutatio, vel in colore; vel in contentis, quæ tamen non ſit ſtabilis, ſed ſtatim redeat ad ſolitam cruditatem. In perniciofis itaque morbis; vires robuſtę & validæ hujuſmodi imperfectas criſes multas futuras præindicare ſolent, antequam moriantur ægroti, & præſertim, ubi quędam coctionis præludia apparuerint. Nam qui fieri poteſt, ut natura robuſta, in morbum agens, aliqua levi coctione ipſum non mutet? neceſſe eſt enim morbum aliqualiter a natura pati. Hinc in morbis letalibus non raro in excrementis, præſertimque in urinis, ſolent videri quædam ſigna coctionis. Noſque ſæpius in peſtiferis, aliiſque febribus perniciofis, urinas vel tenuiſſimas, rufas, melioris coloris, & craſſiores factas, & craſſas turbidaſque

Ex virium magno robore.

Ex coctione incepta & non perfecta.

ante

ante exitium claruiſſe, ſedimentumque aliquando habuiſſe, vidimus. Sed hæc præludia coctionis neque augentur, neque ſtabilia ſunt, ſtatim enim mutantur in pejus: & hoc eſt, quod nos monuit *Hipp. Aphor.* 27. *ſect.* 2. ut dictum eſt; his urinarum aliorumque excrementorum præludiis coctionis, Medicos fidere non debere, hæcque cognoſci ait *Hipp.* quod ſtabilia non ſint, neque diu durent. Addamus, quod ex praxi didicimus, quum in morbis apparent criſes cum iis præludiis coctionis, vel etiam abſque letali aliquo ſigno, & febris perſeverat, præludiaque coctionis non augentur, ſigna letalia eſſe exſpectanda; quando illud nobis argumento ſit, naturam propter magnas vires ſe diu ſuſtentare, & ſervare, tamen quicquam morborum cauſarumque non poſſe ſuperare, proinde longo tempore morbo oppugnatam, marceſcere, ſuccumbere, atque exſtingui, eſt neceſſe. Quod proxime *Patavii*, una cum *Alexand. Maſſaria*, & *Hieronymo Aquapendente*, Medicis celeberrimis, in *Marina Teupola* Sereniſſimi Ducis *Grimani* nepote, juvene quidem ſanguinea, & moribus vere clariſſima, *Matthæo Mauroceno*, juveni clariſſimo nupta, obſervavi. Hęc enim ex abortu in febrem continuam ardentem incidit, quæ incepit cum graviſſimis ſymptomatis, quippe dolore capitis punctorio vehementi, perpetuis fere vigiliis; vertiginoſo affectu, ſiti intenſa, & perpetua jactatione corporis, ſummaque inquietudine, quæ omnia cum urinis crudis mortem ſubito minabantur; tamen ipſa morbo magnis viribus reluctata, etſi natura numquam quicquam morbi ſuperare potuit, primo ſanguine tum urinis craſſis, obſcuris, rubris, habentibus ſedimenta craſſa, e nare ſiniſtra erumpente, una cum vomitu, & per alvum rejectis copioſis excrementis pituitoſis admodum lentis, & biliioſis, interim porraceis, interim æruginoſis, itemque ſudore copioſo, fuit judicata; a qua tamen neque alvi excrementa, quæ perſeverarunt uſque ad exitium, neque urinæ probam umquam coctionem fuere aſsecutæ; neque minus, etſi ſanguinis e naribus excretione, & vomitibus, ac vel etiam aliquando ſudoribus ſæpius fuerit judicata, & exinde videretur ſatis allevata, tamen numquam, ut dictum eſt, excrementa illa probam concoctionem habuerunt, etſi aliquando viderentur, aliqua ſcilicet die, meliorem coctionem accepiſſe, tamen illa concoctio per diem, nec plus, perſeverabat, rurſuſque redibant excrementa ad priorem cruditatis gradum, quo factum eſt, ut dixi, clariſſimam juvenem, propter maximas vires, diu cum morbo pugnando plures criſes imperfectas habuiſſe, quas ego perpetuo malas eſſe ac letales prædixeram; quod nimirum coctiones in excrementis inceptæ numquam a natura augerentur, atque quod numquam immunis febre remanſerit. Sed jam morbo ingraveſcente, viribus tandem reſolutis, poſt multas imperfectas criſes, obiit.

Hanc lubens hiſtoriam adjunxi iis, quæ de his criſibus nobis fuere adnotata, ut clarius ſtudioſi aſſequantur, quomodo debeamus criſes magis imperfectas letaleſque præcognoſcere, quibuſque ſignis nobis innoteſcant; quæ ſunt: quod morbo vel omnino exiſtente crudo fiant, vel cum principio quodam concoctionis; tertium, quod illa præludia concoctionis numquam augeantur, & non durent, inæqualiterque etiam appareant; quartum quod numquam febre ægroti prorſus liberentur: atque hoc eſt, quod Hippor. *in ſecundo Epidemior. ſect.* 1. *pag.* 999. *ſub lit. E.* vocavit *judicatorium non judicans*, quod aut, ut Galen. docet, *eſt difficilis judicii, quippe nullo prælucente ſigno letali; aut letale, ubi una cum aliquo exitiali ſigno appareat.* Quintum addimus, has quoque criſes ab excretionibus, judicari ſeu cognoſci, quę aut ſunt immoderatæ & nihil juvant, aut ſunt paucæ, non reſpondentes noxiorum humorum quantitati exernendæ, de quibus Hippocrat. *in lin.* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 946. *lit. G.* ita habet: *His ſuccedebant abſceſſus, aut majores, quam ut ferre poſſent, aut minores, quam ut prodeſſe*

quicquam, ſed ſtatim redierunt, & deteriores evaſerunt. Et ab excretionibus ſudores, aut multi, aut pauciores, de quibus itidem Hippocr. *ibidem, pag. 945. lit. E. Sudores multi, his tantum aberat, ut recrearent, ut etiam contra læderent. Et Ibidem, ſect. 1. pag. 940. lit. G. ſudabant ſemper quidem, ſed non toto corpore.* Et poſtea, *ibidem, Sect. 2. pag. 934. inter E. & F. Paululum in fronte & claviculis exſudabant, ſed nemo per totum corpus.* Itidem malæ ſanguinis excretiones, de quibus Hippocr. *ibid. pag. 944. ante lit. F.* etiam dixit: *Hic ſanguis de naribus, niſi paucis, & admodum paucus erupit.* Et poſtea: *ibid. pag. 951. lit. E. Nam* Philiſcus *quidem* Epamenon, & Silenus, *quibus parum quarto die, & quinto, ex naribus ſtillavit, mortem obierunt.* Et de dejectionibus malis: *& ibidem ſect. 1. pag. 940. lit. G. Alvi turbatæ erant, bilioſis paucis, meris tenuibus mordacibuſque, & frequenter deſidebant.* Quales vidi in *Guadagnina mea uxore dilectiſſima*, cum febre ardente, quæ tunc exſtincta eſt. Alvi itidem colliquationes, de quibus etiam *in 3. Epid. p. 1086. inter B. & C. Unoque verbo, quot longis morbis, vel acutis tenebantur, ventris vitio omnes præcipue mortui ſunt*; & ſic de aliis. Demum vacuationes omnes morbi ideæ non reſpondentes; quippe veluti in pituitoſis meræ bilioſæ, & e contrario, de quibus nuper ſatis accurate egimus, aut locis affectis non reſpondentes; ut quando uterus laborat, ſi ſanguis e naribus erumpat, aut ſi hepar e ſiniſtra, & ſi lien ex dextra. Demum diſtinguuntur eæ criſes imperfectæ a perfectis, quod imperfectæ fiant nullis conſpectis ſignis coctionis, atque viribus minus robuſtis. Ex quo merito, quum natura nequeat quicquam morbi alterare, & concoquere, ſed ſtatim magno morbo, quod magnis viribus non conſtet, prima pugna ſuccumbat. Perfectę vero fiunt in corporibus robuſtiſſimis, quæ non ſemel, neque bis, ſed pluries morbis oppugnata, & nonniſi ſpatio temporis ſuperantur, quo tempore aliquid contra morbum etiam agentia, ipſa paululum alterant; hinc quædam ſolent conſpici coctionis veſtigia, licet levia, quæ tamen nedum non augentur, ſed neque diu durant. A ſalutaribus vero etiam diſtinguuntur, eo quod ipſarum coctionum augeatur, neque, ut dictum eſt, diu, ſi quod veſtigium coctionis appareat, durat. In ſalutaribus enim præterquam, quod manifeſtiora ſigna coctionis appareant, etiam in dies magis augentur, & ſtabilia videntur, atque in his quoque ægri in melius mutantur, febre aut omnino relinquuntur, aut magna ex parte liberantur. Sed unum harum exitialium imperfectarum criſium proprium eſſe diximus, quod non niſi in robuſtis corporibus fiant. Cujus veritatis exemplum nobis eſſe, ad id quippe cognoſcendum accomodatiſſimum, illius *mulieris* hiſtoriam, quæ in *mendacium foro* decumbebat, quę juvenis & robuſtiſſima, ante exitium, plures hujuſmodi pugnas a maximo morbo, & criſes ob virium robur, etſi quicquam morbum alterare non poſſet, ſuſtinuit, de qua *in lib. tertio Epidem. pag. 1080. Æ r. 12.* Hipp. ita habet: *Mulierem, quæ decumbebat in mendacium foro, primo enixam cum dolore maſculum corrupit ignis. Initio ſtatim ſitibunda, cor illi dolebat, faſtidioſa, lingua arida, venter turbatus tenuibus, pauciſque, non dormivit. Altero die aliquantulum riguit, modicus ſecundum caput, & frigidus ſudor. Tertio cum dolore dejecit alvus cruda, multa, tenuia. Quarto ſubriguit, omnia irritata ſunt, inſomnis. Quintum diem laborioſe tranſegit. Sexto eadem erant, alvus reddidit humida, copioſa. Septimo ſuperriguit, febris acuta, ſitis ingens, ſe jactavit, ſub veſperum per totum corpus ſudavit frigidum, frigus partium extremarum, nec redibat illi calor. Iterumque nocte ſuperriguit, extremitates calorem non recipiebant, non dormivit, nonnihil deliravit, ſtatimque ad mentem rediit. Octavo circa meridiem rediit calor, ſitibunda, comatoſa, vomuit bilioſa, pauca, ſubflava. Nocte graviter ſe habuit, nihil quievit, multum affatim minxit inſcia. Nono omnia fuerunt remiſſa, ſub veſperum*

Ex vacuationibus morbi ideæ non reſpondentibus Criſes imperfectæ quomodo a perfectis diſtinguuntur.

rum comatoſa, aliquantulum ſuperriguit, vomuit amara, bilioſa. Decimo rigor, febris exacerbata eſt, nihil dormivit. Mane multam, in qua nihil ſubſideret, reddidit urinam. Extremæ partes receperunt calorem. Undecimo virulenta, bilioſa vomuit, non multo poſt riguit, rurſuſque extremæ partes frigeſcebant. Sub veſperum rigor, ſudor frigidus, multum vomuit. Nox gravis fuit. Duodecimo vomuit multa, nigra, fætida, ſingultus multus, ſitis laborioſa. Tertio decimo nigra, virulenta, multa vomuit, rigor circa meridiem. Quarto decimo die ſanguis de naribus. Defuncta eſt. Annum ætatis agebat circiter ſeptimum decimum. Dignus fuit hujus mulieris caſus, ut ad cognoſcendas criſes letales imperfectas, a nobis accuratius audiretur; nam omnia ſigna exitialium imperfectarumque criſium, quæ nuper a nobis producta ſunt, in hoc caſu facile recognoſcentur. Atque hæc de cognoſcendis exitialibus: ſupereſt, ut ad criſium ſpecies, aut modos etiam exacte cognoſcendos deſcendamus, quod ſcitu certe eſt digniſſimum.

CAP. XII.

De cognoſcendis criſibus, quæ per abſceſſus, & quæ per excretionem ſunt futuræ.

PLURIMUM facit ad præſagium ſalutis vel mortis ſpecialem criſium cognitio, nimirum, an eæ fient per aliquem abſceſſum, an per aliquam excretionem. Itaque in primis eas criſes indicabimus, quæ per abſceſſum fiunt, & deinceps illas, quæ per humorum excretionem. At quum nomen abſceſſus ſit æquivocum multis diverſis competens, hoc ipſoque nomine multa diverſa intelligat Hippocr. propterea hæc omnia diſtincte ſunt cognoſcenda. Abſceſſus nomine Hippocrates aliquando intelligit humoris translationem de una parte corporis in aliam. Hoſque abſceſſus vocat per effluxionem, de quibus *in 2. Epidemiorum, Sect. 1. pag. 1002. inter B. & C.* ait, *optimos eſſe, qui per effluxionem fiunt, cujuſmodi eſt ſanguis e naribus, pus ex aure, ſputum, & urina.* Quomodo dyſenterias, lienterias, teneſmodes, ſudoreſque, abſceſſus dixit. Aliquando per abſceſſum intelligit ſuppurationem, de qua *in Prognoſticis pag. 39. lin. 1.* dixit, *tumores in ventre minus faciunt abſceſſus, quam in præcordiis*, teſte enim Galeno ibi ſuppurationem intellexit. Tertio intelligit humoris decubitum ad aliquam corporis partem, quo vel dolor & tumor aliquis concitetur. Quomodo nos dicimus, proprie magis abſceſſus nomine intelligi omnia cutis vitia, & præſertim, quicquid ſub cute a cauſſa interna humoris erumpit, quales ſunt omnes tumores. De criſibus itaque per abſceſſus, ſeu per cutem, ſeu per tumorem aliquem futuris, quæ fiunt, ubi humores abſcedunt ab internis ad cutem, quam aut maculis afficiunt, aut in tumorem levant, nunc ſermo a nobis inſtituitur.

Abſceſſus quid.

Pro qua re aſſequenda in primis videndum erit, quænam criſes per abſceſſus, & quænam per humorum excretiones fiant. Hoc vero facile cognoſcemus, quum recte humorum in corporibus inclinationem cognoverimus, utrum inquam humores tranſmittantur tantum de parte ad partem, an præterquam quod traſmittuntur; etiam foras excernentur per meatus, vacuandis humoribus deſtinatos. Hoc modo criſes per excretiones; & illo per abſceſſus fieri dicimus. De quo modo criſium Galen. *in lib. 3. de Criſibus* ita ſcripſit: *Summatim enim nihil aliud oportet conſiderare in modo criſis, præter naturæ inclinationem, quam manifeſte oſtendit* Hipp. *in Prognoſticis, pag. 45. & 46. partim quidem oris ventriculi morſum, atque rigorem memorans, in quibus vomitus ſubſecuturus eſt; partim ſpirandi, difficultatem, & oculorum alucinationes, in quibus profluvium ſanguinis e naribus exſpectatur; ac præter iſta diſtinguens de urinis, & alvi excrementis, in*

Criſe qua per Abſceſſus fiunt quomodo cognoſcuntur.

tis in quibus inquit Prognoſt. pag. 43. lin. 9. & ſeq. Si neque bilioſa fuerint alvi excrementa, neque facile ſolubilia, & impermiſta, neque urina multa valde, & multam habens ſubſidentiam. Si quid enim tale fuerit, manifeſtum eſt, quod huc repit ægritudo, & per iſta expurgatur; quum vero huc non repit, & protrahitur morbus, cum ſignis tamen ſalubribus, futurum abſceſſum exſpectare oportet. In tertio vero *Prognoſt.* Galen. ſcribit, morboſa calidioribus humoribus cum ægri viribus vehementioribus per excretionem judicari; atque his contrarias eſſe affectiones, in quibus facultas debilis eſt; & humor frigidus, quæ nec excretione nec abſceſſu deſiſtant; ſed hæc aut corrumpere ęgrum, aut perquam longo temporis ſpatio vix coqui obſervamus. At humores calidi non egent facultate valida, ut abſceſsus fiant, veluti frigidi, qui nonniſi a robuſta vi moventur ad abſceſſum. Ex quibus prętер criſis modum ex humorum inclinatione cognoſcendum, quippe ad abſceſſum inclinatum iri morbos, ubi neque ſigna vomituum, neque hæmorrhagiæ, ideſt, ſanguinis fluxus, neque alvi dejectionum, neque ſudorum, neque urinarum copioſarum apparuerint; etiam hoc itidem ex virium magnitudine, & humorum morbos foventium natura, conjici poterit: ex humoribus enim calidioribus facilius excretiones, abſceſſus vero, ubi ad excretionem natura nullam habebit inclinationem, neque hi opus habent validioribus viribus, quum ſuapte natura facile parte ad partem moveantur, & decumbant, crudi vero ac craſſi plerumque in corporibus robuſtis, ſi longius morbus protrahatur, abſque ſignis exitialibus in abſceſſum aliquem decumbent. De his Galen. *in 3. Prognoſt. comm.* ita habet: *Hos igitur aſſolet natura in partem quamdam ignobiliorem expellere, quoties per excretionem corpus nequeat.* Sępe enim definitum jam eſt, ut humores calidiores tenuioreſque paratiſſimi ſint ad excretionem, crudis vero & craſſis aut per abſceſſum, aut per concoctionem natura medeatur. Sed age ſigna modo dicamus, quibus futuros abſceſſus in morbis pręſcimus. Galen. *in lib. 3. de Criſi. cap. ult.* ſcribit in morbis acutis & calidis, ſi criſis fiat primis periodis, excretionem ſperandam eſſe; ac ſi morbus fuerit diuturnus & tardus, atque urinę fuerint longo tempore tenues & crudę, abſceſſum futurum. At hęc non ſatis ſunt ad abſceſſus prenoſcendos; plura enim addi eſt opus: & primo, quod morbus habeat ſigna ſalutaria, corporaque viribus ſatis conſtent. Quum dictum ſit, debilem facultatem non poſſe crudos craſſoſque humores movere ex viſceribus ad partes ignobiles, ad quas decumbentes humores abſceſſus faciunt. Quod morbi, longi, & tardi ab humoribus craſſis & crudis foveantur, ſatis liquido conſtat, quodque hi quoque humores non facile, vel etiam a robuſta natura, moveantur ad excretionem, ex Galeno dictum eſt, quapropter neceſſe eſt, ut aut ægrotum corrumpant; aut, ſi convaliturus ſit, ut excretis ad aliquam partem ignobilem abſceſſus fiant, vel paullatim concoquantur; tametſi hoc ipſum, ut per concoctionem medeatur, teſte Galeno, excretio quædam eſt, quę per urinam magna ex parte lapſam fit, raro per alvum.

Abſceſſus quibus ſignis in morbis prędicantur.

Signa vero futuri abſceſſus Galen. hiſce verbis complexus eſt, dicens: *Si vero ad abſceſſus convertuntur, communia quidem omnium indicia ſunt, ſalutariter ſe habente ægro, quod neque morbus ſolvatur, neque urina multa, & multam habens ſubſidentiam, ſed cruda & tenuis appareat.* Quæ ex Hipp. accepit, *in ſecundo libro Prognoſt. pag. 43. lin. 7. A ſeq. text. 26.* ita habente: *Conſiderandum eſt in hunc modum: ſi febris detinet, & dolor non deſinit, & puris excreatio non excernitur ex ratione, neque bilioſæ fuerint alvi dejectiones, neque ſolutiores, at ſinceræ, nec urina admodum multa craſſa, ac plenius obtineat ſedimentum, promittitur vero ab omnibus aliis ſignis ſalutare, his tales fore abſceſſus ſperandum eſt.* De urinis abſceſſus ſignificantibus *in ſecundo Prognoſt. p. 40. lin. 48. & ſeq. textu trigeſimoquarto* ait: *Quicumque autem mingunt urinam tenuem ac crudam multo tempore, ſi quidem alia ipſis ſigna ſalubria affuerint, his*

abſceſ-

abſceſſum exſpectare oportet, ad loca, quæ ſub ſepto tranſverſo ſunt. Idem fere & *in libro tertio, pag.* 45. *lin.* 38. & *ſeq.* ita legitur: *Si qua febris prorogatur, ſalvo affecto homine, nec dolore detinente aut ob aliquam inflammationem, aut ob aliquam cauſam evidentem, exſpectari oportet abſceſſum cum tumore aut dolore, qui in articulos maxime inferiores decumbat.* Galenus ait, ſpem eſſe futuri abſceſſus, ubi febris neque propter aliquam partem affectam curatu difficilem, neque propter commiſſum aliquem errorem prorogetur; neceſſe enim eſt ex craſſis crudiſque humoribus, quos ſæpe natura ſolet ad ignobilem partem e viſceribus protrudere, febrem prorogari. De quibus *in lib.* 4. *Aphor.* 44. dixit: *Quibus adſunt febres longæ, iis tubercula, aut dolores circa articulos fiunt.* Quare ubi febris ultra diem vigeſimum prorogatur, teſte Hipp. *in tertio Prognoſt. pag.* 45. *lin.* 46. *text.* 25. quum dies vigeſimus ſit terminus acutorum morborum, in morbo quidem ſalutari, & urina tenuis, & cruda, longo tempore mingatur, converti ad abſceſſum morbum ſperare poſſumus, eoque magis, ubi humoris alicujus craſſi purgationem ſubſequatur; ſolvitur enim morbus. De quo nos Hipp. *in* 4. *Aphor.* 74 commonuit, ita dicens: *Quibus ſpes eſt in articulis fore abſceſſum, liberat eos ab abſceſſu urina multa, & craſſa, & alba, qualis in febribus, cum laſſitudine, quarta die, quibuſdam fieri incipit.* Unum videtur neceſſario cognoſcendum, quippe, quibus ſignis morbum eſſe ſalutarem cognoſcamus. Quod Hipp. *in lib.* 3. *Prognoſt. pag.* 44. *lin.* 25. & *ſeq. text.* 10. ita habet: *Qui enim convaliturus eſt, facilius ſpirat, ſine dolore agit, noctu dormit, & alia ſigna ſecuriſſima habet.* Quare hæc erunt ſigna communia abſceſſus futuri; propria vero, quæ in partibus aut ſupernis aut infernis futuros denotent, Hipp. *in* 2. *Prognoſt. p g.* 43. *lin.* 14. & *ſeq. text.* 62. ita eſt complexus: *Abſceſſus conſiſtunt hi in locis infernis, quibus circa ilia inflammatio fatigat, illi in ſupernis, in quibus ilia molliora, & ſine dolore perſiſtunt. Si vero aliquandiu ſpiret difficulter, ſine aliqua alia cauſa deſinet.* Quæ Galenus *in tertio de Criſibus cap. ult.* etiam docuit dicens, *abſceſſus ſperandos ad loca inferiora, quibus circum præcordia, aliquid inflammationis atque caloris affuerit; & ad loca ſuperiora ubi repunt, præcordia mollia perpetuo eſſe ac ſine dolore, & æger ad aliquod tempus anhelitum habebit difficilem, ſine occaſione manifeſta, & poſtea ceſſabit.*

Loca ad quæ Abſceſſus futuri quomodo cognoſcuntur.

Sed particulatim locorum, ad quæ futuri abſceſſus fiant, ſigna paullo poſt hiſce verbis expreſſit Galen. dicens: *Propria vero (ubi morbus non fuerit valde diuturnus) ſi ſubita difficultas anhelitus laboranti ſuperveniens, mox quieſcat, eamque gravitas capitis ac dolor ſubſequatur, gravis ſomnus ac ſurditas, huic in glandibus poſt aures neceſſe eſt abſceſſus fieri. Si vero morbus jamdiu duraverit, neque ullum ex his ſignis affuerit, ſed in aliquo ex locis inferioribus, vel gravitas, vel tenſio, vel inflammatio, vel dolor apparuerit, huic abſceſſus ad partes inferiores eſt exſpectandus.* Auctor vero Prorrheticorum *in lib. Prorrhet. text.* 168. de parotidibus ita habet: *Somnus gravis cum dolore capitis, & ſurditas ſtatim adveniens ſunt ſigna parotidum.* Sed longe plura ibi de ratione futuras parotidas prognoſcendi ſcribuntur, quæ brevitati ſtudens lubens omitto; atque enim, quod, ubi de prædictione a parotidibus ex propoſito agemus, hæc omnia longe accuratius adducere cogemur. Atque hæc de criſibus per abſceſſus futuris dicta ſint. Nunc de cognoſcendis criſibus, quæ per excretionem fiunt, agendum, quippe quæ, aut per fluxum ſanguinis, aut per vomitum, aut per alvi dejectionem, aut per ſudorem, aut denique per urinam fiunt. Exordimur vero ab iis, quæ ſanguinis eruptione fiunt.

CAP. XIII.

De prædicenda criſi per ſanguinis eruptionem, ſeu fluxum.

Criſium ſpecies unde cognoſcuntur.

JAM deſcendimus ad cognoſcendas criſium ſpecies, quæ humorum excretione obſervantur, quæ quidem cognoſcentur a conſtitutione temporis, ægri natura, morbi ſpecie, motu atque naturæ humorumque inclinatione. Diximus ſuperius ex temporis conſtitutione criſes indagantes, & ægri natura, morbi ſpecie, & motu morbi, ſciri poſſe criſes, quæ per excretiones, & quæ per abſceſſus futuræ ſunt. Nunc dicemus, quo natura, & humores inclinabunt, eo criſes fieri neceſſe erit, ut docuit Galen. *in lib. de Criſib. cap. ult.* Duplex vero quum ſit ipſorum inclinatio, una ad interiora, atque altera ad exteriora; ad exteriora ubi inclinaverint humores, criſes aut per ſudorem, aut per hæmorrhagiam, ideſt, ſanguinis fluxum fient, quæ nobis innoteſcent ex pulſuum & hypochondriorum obſervatione. Ad interiora vero humoribus natura habentibus inclinationem, criſes fient aut per vomitus, aut per dejectiones, aut per urinas, aut per hæmorrhoidas, aut per menſes. Sed age, agamus primo de his criſibus, quæ per hæmorrhagiam ſeu ſanguinis fluxum, ſeu eruptionem fiunt. Hæ enim ceteris videntur anteferendæ, quod ſæpius morbos acutos judicent, tum fidelius, ac certius perfectiuſque. Plures etenim fuerunt, qui ſanguinis hæmmorragia ſeu eruptione larga e naribus fere liberati, etiamſi tuta ſigna non haberent, quod Hipp. in *Metone lib.* 1. *Epid. Ægr.* 7. *pag.* 943. vidit de quo Galen. *Epidem.* 3. *text.* 24. ait: *Largæ de naribus eruptiones liberant fere; ſane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus, & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberent.* Quare ab ipſis exordiamur, venemurque ſigna, quibus futuræ ſanguinis excretiones, ſeu eruptiones e naribus innoteſcant: ſtatuamus itaque febrem ardentem, vel ſynocham, aut ſimplicem, aut cum alicujus viſceris inflammatione, in qua, propter ipſius magnitudinem, & celerem & fortem motum ac calidam naturam, concurrentibus calidiore ægroti natura, victus & ætatis temperamento, annique conſtitutione calida, æſtivo anni tempore, itemque, loco calido, criſis per excretionem eſt ſperanda, ſi per ſanguinis hæmorrhagiam erit futura, proculdubio omnia aderunt ſymptomata, quæ ſanguinis copia concitabit, a venis ipſis, e quibus ad caput fertur, omnibus in locis permeabit: hinc fit, quod ſi per naturalia membra ad caput feratur, ægroti in primis repente in tenſionem hypochondriorum incidant, & aliquando in difficilem, propter ipſorum diſtenſionem, reſpirationem: ſed hæc ſequitur tenſa hypochondria; veluti ſi per membra ſpiritalia vocata, ſeu reſpirationi deſtinata, ſanguis tranſeat repente, in inſpirandi difficultatem veniunt, quibus tamen cito liberantur, utpote ſanguine ad caput perveniente, in ipſoque ſymptomata concitante, exindeque partes infernæ liberantur; itaque caput gravatur, dolet, & prius aliquid in collo tendi ſentitur, aut in ſincipite aurium tinnitus aliquando ſentiunt, & aliquando ſurditatem; oculorum viſio hebetatur, obſcuratur, aut ſplendores oculis obverſantur, facies rubeſcit, ſcilicet oculi, genæ, atque nares. Atque hæc erunt hæmorrhagica ſigna, quibus præcognoſcimus & prædicemus criſes per ſanguinis eruptionem e naribus. Quæ omnia Hippocr. quaſi divina mens loquens, hiſce verbis *in primo Epidem. ſect.* 2. *pag.* 948. *ſub finem*, eſt complexus: *In ardentibus autem ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hypochondrii etiam contentio, neque cum dolore corripit, his e naribus ſanguis erumpit.* Et in *libro tertio Prognoſticorum, pagin.* 44. *lin.* 34. *& ſeq.* ex Galeni ſententia dixit: *Capitis dolores vehementes, & continui, cum febre, ſi quod ex indiciis exſtiterit exitioſis, integre letales ſunt. Si vero ex iis, quæ didiciſti,*

Criſes quenam per hæmorrhagiam.

Hæmorrhagiæ futura ſigna.

de ægro

de ægro tamquam convaliturο quicquam ſperes, a principio quidem ad ſeptimum diem ſanguinis e naribus fluorem exſpectato; procedente vero tempore id quidem etiam; pus vero erumpet e naribus aut auribus in ſalutem ægri. Si vero ad vigeſimum extendatur diem doloris accidens in capite, tunc etiam ſanguinis fluorem exſpectabis varius, magis vero ſuppurationem, aut abſceſſum ad inferas ſedes exſpectato. Sed per illud tempus, quo ſanguinis fluorem exſpectabis, augebit tibi exſpectationem, ſi in temporibus ac fronte dolor vehemens perſeveret. Magis autem exſpectari ſanguinis oportet eruptionem in junioribus triginta quinque annis, in ſenioribus ſuppurationem.

Quæ hæmorrhagiæ futuræ ſigna clarius poſtea expreſſit, *in 3. Prognoſt. pag. 46. lin. 15. & ſeq. text. 33.* dicens: *Quibus vero per talem febrem dolet caput, & pro tenebris ob oculos effuſis hebetudines ſubeunt oculorum, ac ſplendor obvertitur, & pro oris ventriculi morſu, circa hypochondrium, aut læva parte, aut dextra, aliquid contenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione; ſanguinem de naribus in his fluere, pro vomitione exſpectandum eſt. Magis vero & hic in juvenibus ſanguinis fluorem exſpectare oportet. Agentibus vero trigeſimum annum, aut etiam ſenioribus, minus; ſed vomitionem in talibus exſpectari oportet.* His ſignis alia adduntur ſcripta quum in Prorrheticis, tum in Coac. præſ. *in lib.* enim 1. *Prorr. tex.* 135. ita habet: *Capitis affecti gravitate & ſincipite dolentes, pervigileſque, ſanguinem profundunt, tum alias, tum ſi quippiam in cervice tendat. Ibid. tex.* 136. *Qui pervigilaverint repente, cum inquietatione quadam, ſanguinem profundunt tum alias, tum ſi quippiam* (ut melius *in Coacis præſ. Coac.* 111. *tex.* 32. legitur) *fluxerit ante cervicis dolores. Lib.* 1. *Prorr. tex.* 137. Nec non *impenſe rubri oculi ſanguinis eruptionem oſtendunt.* Et poſtea *ibid. tex.* 143. *Per ea, quæ caput concutiunt, & quæ ſonitum faciunt, ſanguinem per nares profundere ſperandum eſt. Ibid. tex.* 144. *Ventris quoque palpitationes* (ideſt ex Galen. pulſus arteriæ ſpinam perreptantis) *cum hypochondrii tenſione ſublonga & tumente, ſanguinis indicant eruptionem. Ibid. tex.* 147. Et *hypochondrii tenſio cum capitis gravitate & ſurditate, & quæ ſplendores perturbant, ſanguinis denuntiant profuſionem.* Et in *Coac. præſ. Tex.* 142. hæc etiam leguntur: *Quibus febricitantibus rubores in facie, & capitis vehemens dolor, venarumque pulſus, iis ut plurimum fluor fit ſanguinis.* Et *in 3. lib. Coac.* 111. *ſect.* 1. *tex.* 17. *Qui e pervigiliis anxietate repente capiuntur, ſanguinem profundunt e naribus, tum alias tum ſi quid antea effluxerit.* Et *in lib.* 4. *Ib.* 131. *tex.* 26. 27. *In febre ardente aurium ſonitus ſuperveniens cum obſcuratione viſus, & gravitate in nares incumbente, vehementem inſaniam firmamque denuntiant, niſi largiter perfluat ſanguis e naribus.* Et *Coac.* 167. lib. 5. *Pulſationes in capite, ſonitus aurium, profluvium ſanguinis ſignant. Ib.* 168. Et *qui gravitate capitis laborant, dolentque ſincipite, vigiles, ſanguinem e naribus fundunt, tum alias, tum ſi quid tendi in collo ſentiant. Ibid.* 195. *Et quibus ſurditas, cum capitis gravitate & hypochondrii tenſione, & ad ſplendorem oculi perturbatione, profluvium ſanguinis ſignificatur.* Atque hæc ſunt, quæ de ſignis hæmorrhagicis quum *in libris Epidemiis* Hipp. tum *in Prognoſticis*, & *in Prorrheticis*, atque *in Coac. præſ.* nos colligere potuimus, a quibus nobis innoteſcent criſes per fluorem ſanguinis e naribus, quæ hæc erunt. In febribus ardentibus, ceteriſque aliis acutis, vehementibus, & in præcordiorum inflammationibus, omniumque maxime hepatis atque lienis, non raro etiam in phreniticis: hos enim affectus præſertim ſanguinis eruptiones judicant: vigiliæ repentinæ, & inquietudines ſunt ſigna hæmorrhagica, ſed tamen plerumque communia criſium futurarum; quibus quidem conſpectis ſignis, criſis ſperetur, ſed an per hæmorrhagiam, an per vomitum, & an alio modo, ſit futura, ex propriis ſignis diſtinguetur: quod ſi, his conſpectis, cœperit in die critico, vel hæmorrhagia, vel vomitus, vel fluxio alvi, vel ſudores, vel alia evacuatio, forte poterimus ex iis ſignis con-

ſpectis

ſpectis ſimilem excretionem prædicere. De quo *in 3. Coac. Text* 111. *præſag.* 40. legitur : *Qui e pervigiliis anxietate repente capiuntur, ſanguinem fundunt e naribus, tum alias, tum ſi quid antea effluxerit.* Galen. his duobus ſignis addidit capitis dolorem, ita ut in capitis doloribus vigiliæ repentinæ atque inquietudines ſanguinem fluxurum ſignificent, eoque magis, ſi antea fluere cœperit. Ex propriis vero ſignis eſt dolor capitis, ſine quo raro ſoleat ſuccedere hæmorrhagia. Ex quo merito, Hippocrat. *in* 1. *Prognoſt. Pag.* 38. *lin.* 45. *& ſeq. tex.* 22. ait: *Accidit in prima circuitione jam ſanguinis e naribus fluor, atque admodum juvat ; ſed requirendum eſt, num doleat caput, an hebetudines habeant oculorum, ſi quid enim horum fuerit, eo tendet.* In *Epidemiis Lib.* 1. *ſect.* 2. *pag.* 948. *ſub finem*, expreſſit *temporum gravitatem*, & *in Prognoſticis*, *Pag.* 44. *lin.* 34. *& ſeq. capitis dolorem vehementem*; in *Prorrheticis Lib.* 1. *tex.* 135. *&* 137. *ſincipitis dolorem*, aliquando *cervicis dolorem*, & *capitis gravitatem*, & in *Coacis præſagiis Text.* 142. 168. 195. *vehementem capitis dolorem*, & *capitis* etiam *gravitatem* nominat, & *dolorem ſincipitis*: addamus, qui hæmorrhagiam denotat, debere eſſe calidum, diſtendentem, ac pulſantem. Hoque eſt unum ex præcipuis ſignis, quæ ante hæmorrhagiam attendi debebant.

In *Metone*, in quo die quarto bis de nare dextra fluxit ſanguis, in die tertia capitis gravitatem fuiſſe, Hippocrat. *in Epidem. Lib.* 1. *Ægr.* 7. *pag.* 983. *text.* 77. notavit, poſteaque auctam: & in *Pericle*, *Lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 6. *pagin.* 1102. dolorem primo, & poſtea caput gravatum, præceſſiſſe ſanguinis eruptionem. Hoc ſignum vero, non proprium, ſed commune ad ſanguinis fluxum, & ad vomitum eſſe, Galen. *in libro* 3. *de criſibus cap. ult.* ſtatuit. Ceterum, qui vomitus præſagiunt, dolores mordaces eſſe, docuit. Addamus, neque perpetuo antecedere capitis dolores; ſed ſine aliquo gravitatis ſenſu, videtur impoſſibile fieri poſſe hæmorrhagiam, quum non poſſit multus ſanguis in capite aliquam moram facere, abſque quo caput gravetur: ſed tamen aliquando copioſiſſimus ſanguis repente aſcendens, & erumpens, nullam aut obſcuriſſimam gravitatem capiti infert. Hoc in febribus non acutis ſæpe obſervatur. Quod mihi contigit, qui poſt quartanam febrem, quæ nondum fuerat reſoluta, repente exſpui, & per nares rejeci ad minus ſanguinem ſex librarum ponderis, quo quartana febris quod eſt rariſſimum) prorſus fuit judicata. Ceterum in acutis febribus raro fit, ut erumpat ſanguis, non prægreſſo in capite aliquo vel gravitatis vel doloris ſenſu. Poſt dolorem capitis ſequitur ſurditas, atque aurium tinnitus, quæ ſolent eſſe ſigna quoque hæmorrhagica.

In me ante illam copioſam ſanguinis excretionem tinnitus faſtidioſus in dextra aure præceſſit. Quod ſignum notavit Hippocrat. in *Prorrhet. Libr.* 1. *text.* 143. & auctor *Coacorum præſagiorum*, *Text.* 194. Surditatem etiam ante hæmorrhagiam obſervari, quum in *Prorrheticis*, *Libr.* 1. *text.* 147. tum in *Coac. præſ. Text.* 195. habetur. Quod ſignum vidit in *Virgine Abderæ*, *Libr.* 3. *Epidem. Ægr.* 7. *pag.* 1103. atque in *Heropyto*, *Ibidem Ægr.* 9. *pag.* 1106. antequam erumperet ſanguis. His quoque addimus pulſus venarum in capite, de quo in 5. *Coac. præſ. Text.* 142. *Quibus febricitantibus rubores in facie & capitis vehemens dolor, venarumque pulſus, iis ut plurimum fluor ſit ſanguinis*. Micatio enim venarum & agitatio ferventis, & concitati ad exitum ſanguinis indicium eſt. Addimus cervicis, & colli tenſionem, de quibus ad hæmorrhagiam, auctorem *Coacorum præſagiorum Text.* 168. meminiſſe ſuperius vidimus; adduntur *in* 3. *Prorrh. Lib.* 1. *text.* 144. ventris quoque palpitationes, forte pulſus arteriæ ſpinam perreptantis.

Sed nondum attigimus propria ſolius hæmorrhagiæ ſigna, ſed quæ ad alias excretiones ſunt communia. Nam dolores capitis, vigiliæ, deliria, capitis partium tenſiones, ſurditates, tinnitus aurium, venarumque pulſus, ſunt ſigna

ſane

ſane critica non uni, ſed multis criſium ſpeciebus communia. Sequuntur ſigna magis propria, quæ ſunt hypochondrii vel dextri vel ſiniſtri tenſio, ſublonga, (tumentem addidit auctor *Prorrh.* Lib. 1. tex. 144.) quod tamen non perpetuo fit, ſed aliquando mediis muſculis, teſte Galeno, a thorace ad pubis oſſa pertinentibus, tenſis: ſed neque hæc hypochondriorum tenſio perpetuo eſt hæmorrhagica, ſed & quæ fit aut in dextro, aut in ſiniſtro; quod ſignum Hippocr. in *Epidem. Lib.* 1. *ſect.* 2. *pag.* 948. tum in *Prognoſticis*, *Pag.* 46. *lin.* 15. *& ſeq.* hæmorrhagicum fecit. Plurimum enim facit, ad hæmorrhagiam prædicendam, reſpirandi difficultas repente ſi apparuerit. Quod Gal. *in lib.* 3. *de Criſ. cap. ult.* ita expreſſit: *Eſt etiam præcordiorum tenſio ſine dolore; nam & hoc non parvum indicium eſt ſanguinis ad ſuperiora tendentis, ſicuti etiam difficultas anhelitus, nam & hæc ſanguine tranſeunte in thoracem fit.* Quum itaque (ut etiam ait Galen. *in* 1. *Epidem.*) in hypochondrii, aut dextra aut læva parte aliquid contenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione, ſanguinis his e naribus profluvium exſpectandum; eſt enim impetus humorum in caput, hypochondrii ſine dolore contentio, ſignum. Quod quidem ſi ei accidat, dolor inflammationem ſequitur viſcerum. Quando vero calore capitis, ſurſum ſanguinem trahente, & jecore impellente, contentio fiat, ſanguinis eſt exſpectanda eruptio. Non raro etiam fit, etſi ſanguis per thoracem haud tranſeat, ex magna ejuſdem ſanguinis copia, tumeſcentibus hypochondriis, ut etiam ægrotus ſpiritu difficili laboret. Feminam quondam Ægyptiam *Cayri* novi, quæ ſingulis menſibus ſanguine menſtruo, interceptis ad uterum viis, in caput ſublato, per nares erumpente vacuabatur; quo tempore aſcendebant, cum magna utriuſque hypochondrii tenſione, abſque dolore, & cum difficillima reſpiratione, vexabatur. Addo, quod quum tenſio hypochondriorum tum reſpirandi difficultas hæmorrhagica repente fiunt, atque paullo poſt ceſſant, de qua Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 43. *lin.* 17. ait: *Si vero aliquandiu ſpiret difficulter, ſine aliqua alia cauſa deſinet.* *Hæmorrhagia futura ſigna magis propria.*

Poſt hypochondriorum tenſionem, aliud ſignum eſt ex viſu ſpectandum; namque Hippocr. in *Epidemiis Libr.* 1. *Sect.* 2. *pag.* 984. *ſub finem*, ſcripſit, in iis, quibus per nares fluxurus eſt ſanguis, caliginem oculorum fieri, & *in Prognoſticis*, *Pag.* 46. *lin.* 15. viſum hebetem habere, quo fit, ut caligo oculorum, hebeſque viſus hæmorrhagiam prænuntient. Galen. vero *in lib.* 3. *de Criſ. & de præſ. ad Poſthumum*, ait: *fulgoris motus oculis obſervari, quod humor flavus ſit, atque obtuſiores viſus fieri, quoniam multus ſanguis, & totus ſimul elatus ad ſuperiora ſpiritus meatus obſerat.* Aliquando expaveſcunt ægroti ex quibuſdam rubris ſpectris, ut juveni Romano, de quo Galen. *in libro ad Poſthum* meminit, contingit, cui antequam ſanguis eruperit, ei rubri coloris ſerpentem per laquearia repentem ſupra lectulum ferri viſum fuit, proptereaque ipſum expaviſſe, & e lectulo aufugere voluiſſe. Non raro etiam oculi involuntarie lacrymant ob fluxus ſanguinis copiam, teſte Gal. de quo ſigno Hippocrat. *in* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956. *lit. F.* ait: *Quibus in febribus acutis, atque adeo ardentibus, ſpontaneæ effluant lacrymæ, his eſt (ſi quidem reliqua non ſint exitialia) e naribus ſanguinis eruptio exſpectanda. Qui incommode habent his non ſanguinis eruptionem, verum portendunt mortem.* Quare cum aliis ſignis in acutis febribus, ſi reliqua ſalutaria ſint, involuntariæ lacrymæ hæmorrhagiam prænuntiant, quod Galen. *in lib.* 3. *Prognoſt. com.* 33. docuit, atque in *ſexto* etiam *Epidem.* confirmavit. Nos vero de hoc ſigno in proximo libro ſatis accurate ſcripſimus. Nunc ex ſignis explicatis quaſi ad hæmorrhagiam acceſſimus, quæ tamen non videbitur, neque fiet etiam, ni prius facies rubore ſuffundatur; quod ſane ſignum eſt neceſſarium, numquam enim abſque hoc ſanguinis eruptio fit. Faciei enim partes omnes, & præſertim *Hæmorrhagia futura ſigna propria.*

prope

prope nares positæ, rubræ coloratioresque apparent; ex præsentia inquam sanguinis, *in Prorrh. Lib.* 1. *tex.* 137. legitur, *oculos impense rubros significare cum cervicis dolore hæmorrhagiam*, & Gal. ait: *In re ejusmodi magna præstant virtute impense rubri oculi*. Auctor de *Coac. præs. Tex.* 142. rubores in facie sanguinis fluorem significare scripsit; Gal. vero quum *in 3. de Cris. cap. ultim.* tum omnium maxime *in lib. ad Posthum. capit.* 13. malarum nariumque ruborem proximam hæmorrhagiam connotare expressit. Neque immerito, quum sanguinis copia cutis, repletis ipsius venis, coloretur; hinc etiam narium gravitatem fieri adnotatum est in *Coac. præs. Tex.* 131. Ceterum ruborem faciei distinguemus ab eo, qui aut a cerebri inflammatione fit, de quo *in Coac. præs. Text.* 7. ait: *Facies flammans cum sudore, malignum. Et in Prorrheticis, Lib.* 1. *tex.* 49. *Faciei color bonus, & mœstitia multa, malum*. Cognoscetur hæc propriis signis inflammati cerebri. Aut ab eo rubore, qui genas colorat, ex pulmonum affectu aliquo, cujusmodi fieri in peripneumonicis & asthmaticis, superiori libro declaravimus. Hæc vero, quæ hæmorrhagica est, in statu apparet, in morbo salutari, una cum aliquo, vel multis signorum nuper dictorum. Atque tot sunt omnia signa, quibus sanguinem erupturum e naribus quisque nostrum poterit præsagire. At quoniam omnia perpetuo simul non apparent, proinde si duo vel tria ex præcipuis illuxerint, sufficient ad hæmorrhagiam prædicendam. Præcipua vero sunt, ex Hippoc. & Gal. capitis dolor; quod signum inseparabile esse Galen. *in* 1. *ad Glauc.* sæpius statuit; aut sincipitis, aut cervicis, aut temporum, ac etiam colli; vel gravitas; ipsa hebetudo visus, aut fulgoris motus, aut caliginem oculis obversari; tensio hypochondrii sine dolore, aut difficilis respiratio, quæ paullo post cessant. Rubor item in facie jamjam fluxuro sanguine; in febre ardente, causove vehementi, aut aliqua magna internorum viscerum inflammatione; atque in juvenile ætate, omniumque maxime in iis, quibus solitum sit alias sanguinem erumpere. Atque hæc de crisi, quæ per eruptionem sanguinis e naribus, dicta sint. Addamus ex Galeno *in primo ad Glauc.* in quo loco de hæmorrhagiæ signis satis accurate agit, pulsus subito in tumorem elatos, non recidentes in parvitatem, neque si debiles facti fuerint, multo plus, si in altum attollantur, & vehementiam sumserint: jam faciem ægrotantis inspice. Nam si aliqua ex iis, quæ in ipsa sunt, partibus palpitet, aut una, quæ sunt in temporibus, pulsant, aut gena, vel nasus, vel oculus rubidior factus fuerit, magis etiam crisis exspectanda est: si vero & inviti lacrymentur, aut marmarigas, idest, splendores videre imaginentur, ac manus naribus, veluti scalpentes, admoveant, tunc non jam fluxurum, sed jam fluentem sanguinem inspicies; nam ubi semel aut bis scalpserint, statim erumpit: neque vero ex his perturberis, si hominem desipientem aut salientem inspexeris; nam & hæc humorum repentium ad partes superiores indicia sunt, veluti & anhelitus difficilis, & hypochondrium retractum, & collum simul cum capite aggravatum.

Hæmorrhagiæ futuræ signa præcipua.

Hæmorrhagiæ jamjam futuræ signa.

CAP. XIV.

De crisi, quæ fit per sanguinis fluxum, quum ab utero, tum ab hæmorrhoidibus.

Crisis per menses quando sit exspectanda.

SÆPIUS etiam fit in mulieribus, ut crises fiant sanguine per uterum, mensium modo erumpente, qui fluor etiam multis signis innotescet: primo enim ubi conceperimus, crisin esse futuram, videndum erit mulieribus ægrotis, an menses solito modo fluant, vel non, tempusque probe observandum, in quo fluere fuerant soliti, ætas, & temperamentum, victus ratio anteacta an sanguine responderint. Postea videndum erit, an signa aderunt hæmorrhagiæ,

rhagiæ, aut vomituum, aut ſudorum, aut dejectionum, aut copioſarum urinarum. Quum nulla quidem illuxerit, ſuſpicandum in morbo vehementi criſin per menſes fieri poſſe: quod ſi, ut Gal. *in lib. 3. de Criſ. cap. ult.* docet, adfuerint quoque menſium ſigna propria, quæ ſunt gravitas lumborum effatu digna, dolor, atque tenſio. Sed ut iſtud certum fiat, præſtabit mulierem interrogari, & quam diligenter, quibus ſymptomatis fluentibus menſibus vexari ſoleat, atque in criſi prænoſcenda eadem erunt accurate ſpectanda; quum quibuſdam, fluxuris menſibus, lumbi doleant, aliis abdomen, aliis uterus, cruraque, quæ partes ſedulo dolentes obſervatæ multum faciunt ad menſes fluxuros prædicendos. Ceterum in primis, quum criſis futura ſit, videndum erit, an alterius evacuationis futuræ ſigna adſint; quæ ſi non adſint, atque in mulieribus acuta febre vexatis lumbi doleant, ſine manifeſta cauſa, in ipſiſque tenſio ſentiatur, menſtrua fluxura erunt, teſte Galen. *in lib. 3. de Criſ.* Addidit Auctor *Prorrh. lib. 1. text.* 142. febrem laſſitudinariam, & cum rigore, hiſce verbis: *Quibus ex rigore febres laſſitudinariæ fuerint, muliebria his devertunt.* Plures mulieres, vel etiam ſine febre; ante menſtruorum eruptionem ſentiunt quamdam laſſitudinariam affectionem, ex qua una cum dolore lumborum, & tenſione, menſtrua futura prædicunt. Addunt & oris ventriculi dolorem, ſeu cardialgiam, ut Galen. notavit *in 3. Prorrhet. Copia enim ſanguinis, in venis acervata, tenue quoddam ſerum in ventrem confluens cardialgias parit, in os ipſius aſcendens, quod omnium fere partium maxime ſentiendi facultate præſtat, plurima autem abundantiæ portio ad inferum repens locum, in quem & primum deferri conſueverat, lumborum dolores efficiet.* Quibus addi-tur etiam in 5. *Coac. præſ. text.* 167. *Senſio æſtus ardoriſque circa ſpinam;* ſignum quippe recurrentis ſanguinis per magnam venam, quæ ſpinam perreptat, quæ ad lumbos, maxime fervida motione ſanguinis, æſtuat. Atque hæc ſunt ſigna fluxuri ſanguinis per uterum, quæ adhuc facient indicium magis certum, ſi menſes ſuppreſſi fuerint, atque hæc eo tempore illuceant, quo ſoliti fuerant menſes per valetudinem fluere. Quæ omnia ſigna in homine quidem melancholico, cui per hæmorrhoidas fluere ſanguis fuerit ſolitus, atque fuerit ſuppreſſus, ſanguinem per hæmorrhoidas fluxurum indicant: primum dolent lumbi ſine cauſa, & diu; os ventriculi itidem dolet, de quibus in *Prorrheticis lib. 1. tex.* 130. legitur: *Lumbis dolentibus cardialgiæ accedentes ſanguinis per hæmorrhoidas erupturi ſigna ſunt: arbitror autem & hos prægreſſæ hæmorrhoidum eruptionis ſignum eſſe.* Præſentis autem affectionis (ait Galen.) perſpicua ſymptomata, nempe copia in venis acervata, ſerum tenue quoddam; in ventrem confluens, cardialgias parit, in os ipſius aſcendens, & multa ſanguinis portio deorſum tendens lumborum dolores facit.

Sanguinis per uterum fluxuri ſigna.

Sanguinis per hæmorrhoides fluxuri ſigna.

Quare dolor lumborum, tenſio, laſſitudinis ſenſus, dolor ventriculi oris, atque æſtus & ardoris ſenſus circa ſpinam dorſi, in hominibus melancholicis, aut mali habitus, ſanguinem per hæmorrhoidas fluxurum indicant, præſertimque ſi alias fluxerit, & modo fuerit interceptus: *in 3. Coac. præſ. text.* 306. *Dolores in lumbis eruptiones ſanguinis ſignificant*, quæ ſine manifeſta cauſa in melancholicis, & quibus conſuetæ ſunt hæmorrhoides, magis accidunt. Sed ſatis de cognoſcenda criſi, quæ fit per ſanguinis eruptionem, diximus. Nunc ad eam, quæ vomitibus innoteſcit, deſcendamus.

CAP.

CAP. XV.

De cognoscenda crisi, quæ per vomitum fit.

Sanguinis per uterum fluxuri signa.

QUUM non raro soleat crisis vomitibus fieri, morbosque judicare, propterea necesse est, ut signa quoque, quibus nobis hæc innotescet, sedulo cognoscamus. Quæ Galen. *in lib. 3. de Crisibus* hæc esse statuit, quippe dolorem capitis mordicantem, seu acrem, seu acutum, oculis tenebrosum, seu caliginem obversari, morsus oris ventriculi, fastidium ac nauseam, seu subversionem, ubi præsertim est futurus pituitosus, sputum tenue abundanter ex ore affluere, labiumque inferius agitare, seu tremere, pulsusque inæquales altos atque duros; alii addunt jactationem seu inquietationem, linguæ amaritudinem, rigores, spirandi difficultatem. Ceterum, ut futuri vomitus rationem habeamus, primum sciamus, ex motu humorum ad stomachum, futurum vomitum facile cognosci; quoniam natura a venis ad ipsum ventriculum humores noxios transmittens, & expultricis stomachi irritationem ad excernendum seu expellendum movet, qua vomitus fiunt. Itaque quum humor per venas æstuat, agitatur, moveturque ad stomachum, anxios ægrotos, & inquietos reddit, quod tamen signum in omnibus fere crisibus observari solet. Primo vero ob exhalationem humorum ab ipso ventriculo, quæ meningas seu membranas cerebri afficit, capite dolent, & dolores, ut Galen. notavit, sunt mordaces ac acuti; veluti in futura hæmorrhagia tensivi, minimeque acuti, qui non a bilioso acrique humore fiant. Ob eamdem quoque fumidam exhalationem, quippe ipsius diffusione per humores ad oculos, vomituri caligine, vertigine tenebricosa, tentantur, aut ut ait Hippocrat. *in 1. Prorrhet. Text. 46. com. 30. caliginosum seu tenebrosum* oculis ipsorum observatur. Quum movetur vero humor biliosus a venis ad externas venas, ægri rigent aut horrent; dumque stomachum invasit, fastidium, oris ventriculi, (quod antiqui cor appellarunt) morsum facit, nimirum vellicans os ipsum maxime sensile. Quumque etiam humor has partes superas petit & occupat, primo partes infra hypochondria frigidores redduntur, tum, quod calidi humores ad superiora ferantur, tum maxime, quod cogatur calor nativus ad interiora contrahi & recipi. Quumque, ut dictum est, os stomachi molestat, vellicando, mordendo, ac æstuando, fiunt fastidia, jactationes, cardiogmos cordis; atque jam vomituris os sputo tenui plenum esse videtur, ut Galen. ait, propter tunicæ communitatem, quæ una est ori toti interno continua, faucibusque, & stomacho & ventriculo. Hinc fit, ut labium inferius interdum concutiatur, ventris ore ad vomitum excitato; nempe labii concussio tunicam eam, quæ ab ore in ventrem extenditur, tum morderi, tum vellicari, tum concuti ostendit. Neque mirum est, ad humorem acrem, mordicantem, æstuantem, ventriculi os exæstuare, vellicari, & excitare expultricem ad vomendum. Hinc divine sane noster Hippocrat. *in lib. 4. Aphorism.* 17. dixit: *Non febricitanti cibi fastidium, cordis dolor, vertigo tenebricosa, & oris amaritudo, purgatione per superna, opus esse significat.* Quasi innuere velit in febricitantibus hæc vomitum prædicere, qui ni succedat, hebetem naturam medicamentis esse excitandam. Quare prædictis signis seu symptomatis conspectis in febre salutari, ex ardentium genere, utique vomitus præsagire poterimus. Quæ signa ita Hippocr. *in 3. Prognost. Pag. 45. sub finem,* & 46. *init. text.* 30. habet: *Si quis per febrem non exitiosam dixerit caput dolere, aut etiam tenebricosum aliquid ad oculos observari, si ventriculi dolor in eo extiterit, biliosa vomitio aderit. Sin rigor prehendit, & inferiores in illis partes frigidæ fuerint, adhuc citius vomitio aderit. Si vero bibat, edatque hoc tempore,*

pore, *perquam cito vomet*. *Paullo post*: *Hæc accidunt viris & mulieribus potissimum in tertianis, minoribus natu accidunt etiam in illis potissimum febribus, continuis, & in veris tertianis*. Et *in* 1. *Epidem. Sect.* 2. *pagin.* 984. & 949. *text.* 44. præcipua signa ita expressit: *At vero quibus totius capitis gravitates, tum autem cordis dolores, & fastidia sunt, biliosa post ac pituitosa vomunt*. Gal. *in* 1. *ad Glauc.* dixit, dolorem capitis esse futuri vomitus signum inseparabile, non minus & cardialgiam, idest, oris ventriculi morsum necessario precedere vomitionem, & idem *in* 3. *de Crisi.* addit, labrum inferius agitatum, cum saliva ex ore excidente, vomitum jam affuturum significare. De qua *in Coacis præsagiis*. *Text.* 566. *Vomituris salivatio quædam prius accidit*. Et *in* 1. *Prorrhet. text.* 3. *Si in phreniticis cum perfrigeratione sit sputatio, nigra revomuntur*. At in phreniticis sputationem frequentem, in qua ex Galen. nihil excernitur delirium phreniticum significare Auctor *Prorrhet. Lib.* 1. *text.* 6. scripsit, malumque esse in phreniticis signum; & eam, in qua multum effluit sputum, &, ut ait Galen. os sputo tenui plenum esse videtur, jamjam vomitionem futuram significare. Quæ sputatio ante vomitum fuit observata in illo, *Lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 12. *pag.* 988. qui *calescens cœnavit & potavit largius*. Vomitu fuere judicati, teste Hippocrat. *uxor Epicratis*, *ibid. Ægrot.* 5. *pag.* 979. de qua Hippocrat. ait: *Quinto decimo vomuit biliosa, flava, subcrebra, sudavit, libera febre*. Et *mulier*, *ibid. Ægr.* 13. *pag.* 990. quæ decumbebat in litore, etiam *decimo quarto vomuit biliosa, flava, subcrebra, sudavit, febre liberata est*. In quibus ante vomitus, quum febre ardente laborarent, capitis gravitates aut dolores extiterunt, & aliqua ex signis vomitionem significantibus. Atque hæc de vomituum signis.

CAP. XVI.

De signis crisium per sudores, atque per urinas copiosiores futurarum.

Sudores quosnam morbos judicant.

FREQUENTISSIME morbi acuti sudoribus judicantur: sudores enim, ait Galen. omnibus febribus proprii existunt, & præcipue incendentibus ardentibusve; juvant omnes internorum viscerum inflammationes, parotides, lethargos, reliquosque omnes capitis affectus; non minus & febres ex intermittentibus quotidianas, quartanas, & semitertianas, sudores judicant; sed plerumque non solum has febres, sed cum biliosa pituitosaque excretione, aut per vomitum, aut per alvum, aut etiam per hæmorrhagiam; quartanas, si simul atra & varia excernantur; atque quotidianas simul cum vomitibus atque excrementis alvi pituitosis. Sed de his non agimus; quum nostrum fit institutum de his affectibus agere, qui acuti sunt, quique vel ad salutem, vel ad mortem, judicari solent. Cujusmodi sunt febres continuæ, acutæ omnes, præsertimque ardentes, quarum sudores proprii videntur; internæ quoque phlegmones, inflammationes, & calidi omnes capitis affectus. In quibus sane, ubi præcesserint signa coctionis, atque critica signa illuxerint & persteterint, quibus omnino futura crisis præmonstratur, per sudorem eam expellendam scribit Galen. *in lib.* 3. *de Crisibus cap. ult.* si hæc signa ad unguem fuerint observata: quippe, si urina & alvus supprimatur, & febris fuerit ardens, necessario sequitur sudor multus a rigore. Hinc *in lib.* 6. *Epidm. com.* 1. *text.* 9. *pag.* 1164. Hippocr. dixit: *Ante rigorem urinæ suppressiones*. Quare alvi præter rationem suppressa excrementa, aut pauciora, quam antea redita, urinæ item suppressæ, absque signis hæmorrhagiæ, vomitus, mensium, hæmorrhoidarum & alvi fluxus, sunt indicia satis certa sudoris, multoque magis, si æger increscente accessione deliraverit. At hæc necessario etiam

Crisis quomodo per sudores futura cognoscitur.

specta-

ſpectabuntur ſigna, ſcilicet, partes exteriores, maximeque facies, coloratiores, & calidiores, vapor quidam calidus, qualis antea non fuerat, ex cute exhalans, atque pulſus undoſus, inſigniter mollis. De quo Galen. *in lib. ſynopſ. de Pulſibus cap.* 22. ita habet: *Hic tamen pulſus undoſus, inquam, ſudorem ut plurimum nuntiat, at tanto magis, quanto mollior quidem fuerit, non tamen tenoris vacuus; ſi vero ipſi intercurrat altus, firmiſſimum habebis ſudoris ſignum cum undoſo quidem, vel abſolute magno, non tamen duro, criticorum ſudorum.* Hæc eadem ſigna leguntur apud Galenum *in libello dæ præſagio, experientia confirmato*; ſed addidit totius corporis cutim reddi pruriginoſam, mollem, & rubram. Neceſſario cutis præmollis obſervatur in futuris ſudoribus, quod & Hippocrat. *in* 5. *Aphoriſmorum* ita habet: *Quibus cutis circumtenditur arida & dura, ſine ſudore moriuntur; quibus vero laxa & rara, cum ſudore moriuntur.* Quidam duo præcipua ſudoris ſigna tantummodo ſtatuunt, urinæ quippe ſuppreſſionem, ex qua ſeroſa humiditas, eadem quum ſudoris tum urinæ materia, in univerſum corpus expanditur, proinde ſua vi acri vellicans rigorem concitat, qui eſt ſecundum ſignum, ita ut ſudoris ſigna duo ſint, & urinæ ſuppreſſio & rigor: atque hinc forte dixit Hippocrat. *in* 4. *Aphoriſm.* 58. *Si laboranti ardente febre rigor ſuperveniat, ſolutio fit.* Gal. *in* 6. *Epidem.* ait: *At ſi alvus fluxa non ſit, proximamque eſſe morbi judicationem prænoveris, ægrotum rigere, ſudareque neceſſe eſt.* Ceterum non perpetuo a rigore, urinæque ſuppreſſione, ſubſequitur ſudor; aliquando hæmorrhagia, aliquando vomitus, aliquando alvi fluxus fit. Quare certum erit ſudoris indicium ſeu præſagium, ubi una alvuſque ſupprimatur, rigorque ſucceſſerit, in ardente febre aut alio affectu, quem ſudor judicat eoque certius, ſi æger increſcente acceſſione deliraverit. Addimus his partes exteriores, calidiores, & coloratiores fieri, non minus & molliores & humidiores, atque in ipſis erit vaporatio quædam calida inſolita, pulſuſque apparet magnus, altus, mollis, fluitans, *undoſus* ideo vocatus, nullaque aderunt hæmorrhagiæ, vomitus, alvi perfluvii, hæmorrhoidarum, menſium, aut urinæ ſigna. Quo ſudore fuit judicatus *Cleonactides lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 6. *pag.* 982. *Melidia, ibid. Ægr.* 14. *pag.* 991. & alii, quorum caſus Hippocr. obſervavit. Sed ad urinarum quoque ſigna deſcendamus, per quas plures acutorum morborum fuiſſe judicatos, & nos vidimus, & Hippocrat. *in Epidemiis* ſe vidiſſe ſcripſit. Cujuſmodi fuerunt *Chærion lib.* 3. *Epid. Ægr.* 5. *pag.* 1072. vigeſimo urinis multis bilioſis perfecte judicatus. *Nicodemus ibid. Ægr.* 10. *pag.* 1108. cum urinis multis, albis, in quibus multa craſſa ſubſidebant. Et *Pythion, ibid. Ægr.* 1. *pag.* 1059. de quo Hippocr. ait: *Quadrageſimo ab judicio die ſuppuratio circa ſedem, & ſtrangurioſus factus eſt abſceſſus.* Eſt ſcilicet probabile, multitudine urinarum quadrageſima ſanatum. De his etiam *in primo lib. Epid. ſect.* 2. *pag.* 955. *lit. E. At vero hoc ſtatu quatuor præcipue ſignis ſervabantur; quibus ſanguis rite e naribus fluxerit, aut qui per veſicam urinas multas, cum multo bonoque ſedimento reddidiſſent.* Nihilominus, quod fortaſſe difficile eſſet invenire certa ſigna, quibus præmonſtrarentur criſes per urinarum excretionem, ideo Galenus per negationem docuit, quomodo poſſimus præcognoſcere urinas critice profluxuras; quippe, ubi abſint ſigna hæmorrhagiæ, vomitus, alvi fluxus, hæmorrhoidum, menſium, & ſudoris, ſpes erit, ut criſis per multitudinem urinarum fiat, multo magis, ſi alvus, quum copioſiora excrementa antea excreverit, nunc ſiccior evaſerit, aut ſuppreſſa; neque immerito, quod, ut ait Galen. diſtributo & in venas exhauſto humore, qui in ventre continetur, alvi neceſſario minuatur dejectio. Hinc Hippoc. *in quarto Aphoriſ.* 83. dixit: *Mictio noctu plurima, parvam dejectionem ſignificat.* Sed tamen neceſſe eſt haberi quædam ſigna certiora. Quæ, ut nos obſervavimus, hæc erunt. Nulla primo aliarum excretionum ſigna adeſſe, ſed præ-

Sudoris critici futuri ſigna certiora.

ſertim

sertim nullum capitis, vel hypochondriorum, vel stomachi, aut intestinorum dolorem, morbumque non videri admodum vehementem. Non vehementer jactari ægrotos, nec inquietari, nullamque partem prædictam dolorem sentire. Plerumque hypogastrium sensum gravitatis & aliquando dolores sentire, vesicamque inflationis sensus habere. Paullatim plerumque incipit effluere urina, raro repente, ita ut facile observetur solito copiosior, & mox augeatur. Sentiunt ægri itidem calorem seu ardorem urinæ, quo sæpius mingunt. Nam necesse est, ut partes, quum per quas ad vesicam serosa illa humiditas, seu humor, qui excernitur, pertransit, tum renes, vesica, collum, & meatus urinarius, plus ceteris partibus sensum aliquem molestum habeant. Et hæc de crisibus quum per sudorem, tum per urinam, quæ ejusdem materiæ symptomata existunt: nunc demum de signis alvi fluxus.

CAP. XVII.

De signis Crisium per alvi fluxionem.

QUOD per alvi fluxum crises sæpius fiant, ipsisque morbi complures acutorum judicentur, neminem Medicorum latet, ideo de futurę per alvum crisis quoque signis accuratius nunc est agendum. Miror tamen, quod neque Gal. neque Hipp. signa propria hujus excretionis futurę prænonstrarint. Gal. enim *in lib. 3. de Crisib. cap. ult.* de hac excretione ita habet: *Si vero per excretionem alvi crisis sit subsecutura, manifestum quidem nullum est signum, nec proprium; sed ex eo, quod adsunt crisis signa, desunt autem vomituum, vel fluxus sanguinis, vel sudoris, colligere licet.* Ex quibus patet, cognosci alvi dejectionem futuram non per signa propria, sed ex crisis futurę signis, atque ex absentia signorum aliarum excretionum. At, etsi hæc via optima sit, tamen non deerunt nobis quoque signa aliqua hoc judicium confirmantia, cujusmodi esse videntur, quę Hipp. *in lib. 4. Aphor.* 20. ita habet: *Non febricitantibus si tormina acciderint, & genuum gravitas & lumborum dolor, purgare inferius oportet.* Et postea, 73. quum dixit: *Quibus præcordia suspensa murmurantia, lumborum dolore superveniente, iis alvi humectantur: nisi flatus erumpant, aut urinæ multitudo proveniat.* Et in *Coacis præsagiis, tex.* 142. *Quibus ructus, flatus, strepitus ventris, iis extuberat venter, atque conturbatur.* Ex quibus colligimus, ad fluxuram alvum hęc signa quoque esse attendenda; quippe intestinorum tormina, ipsorum morsus, genuum gravitas & lumborum dolor, precordia suspensa; murmurantia, ructus, flatus strepitus ventris, ipsiusque extuberantia, atque turbatio. Hæc enim cum signis criticis fluxuram alvum prędmostrabunt. Necessario videtur, si per alvum humores vel bilioſi vel pituitosi sint fluxuri, ut tormina seu dolores intestinorum observentur; neque enim, docet Galen. *in libro 5. de usu partium*, quis unquam biliosum succum copiosiorem dejecit, qui prius mordicationem in intestinis non senserit; veluti bilioso vomitu cardialgiam, ob ejusdem humoris morsum, sentiri, nuper demonstratum est: quare ubi alvus biliosa, aut salsa aut melancholica adusta dejectura sit, necessario dolor & mordicatio in intestinis præcedet. Si vero humor fluxurus sit pituitosus, ac frigidus, flatus, ructus, precordia tensa, ac murmurantia, alvique perturbatio, fient. Quæ, ni peculiari vitio ipsius alvi, ac stomachi fiant, quippe coctionis defectu, aut distributionis, aut alimentorum corruptione, aut pravi humoris generatione in ventriculo, aut intestinis, in morbo acuto, ubi illuxerint critica signa, alvi profluvium denotabunt. Lumborum quoque dolor observatur, genuum aliquandoque gravitas, humoribus scilicet ad infernas partes descendentibus; non sunt tamen propria signa alvi fluxuræ; sed ubi tensio & dolor satis vehemens, circaque spinam caloris æstus

Alvi dejectio futura quibus signis cognoscitur.

senti-

ſentitur, in mulieribus menſes, atque in viris hæmorrhoidas præſagimus; aliquando vero etiam alvi dejectionem, quippe ubi materia convoluta ad craſſa inteſtina, & meſocolon, quod craſſis inteſtinis continuum exiſtens, in unam quamdam earum, quæ in lumbis ſunt pertingit vertebrarum. Qua ratione Auctor *Coac. præſagiorum text. 19.* dixit: *Inhorreſcentes, anxii, laſſitudine preſſi, lumbis dolentes, in profluvium alvi incidunt*. Hunc vero lumborum dolorem, alvi fluxionem denotantem, diſtinguemus ab ipſo, qui vel hæmorrhoidas, vel menſes, prænuntiat: præter ſigna enim fluxuræ alvi prænarrata, alia exiſtunt, ſcil: inteſtinorum morſus ac tormina, murmur, ſtrepitus, flatus, ructus, & tenſa præcordia itidem murmurantia; quæ ubi critica ſigna in vehementi morbo ſubſequentur, alvi criticam fluxionem proculdubio præmonſtrabunt. Atque hæc de ſingulis criſium ſpeciebus cognoſcendis, nunc breviter de multis ſimul complicatis futuris criſium ſpeciebus etiam agamus.

CAP. XVIII.

De ſignis compoſitarum, ſive multarum ſimul, Criſium futurarum, quibus morbi judicantur.

Criſes compoſitæ quænam.

PLERUMQUE fit, ut non unica criſi, ſed aut duplici aut multiplici, morbi acuti judicentur, quas compoſitas criſes dicimus, ſiquidem aliquando homines hæmorrhagia ac ſudore copioſo judicantur, de quibus Hipp. *lib. 4. pag. 396. lin. 21. de Vict. rat. in acut.* ait: Et *ſi e naribus ſanguis fluxerit, ſolvitur ægritudo, nec non ſi ſudores ſupervenerint judicatorii, cum urinis albis craſſis, & levibus ſubſidentiis*. Quibus *Metonem* fuiſſe judicatum Hippoc. *lib. 1. Epidem. Ægr. 7. pag. 983.* tradidit, & Galen. *in lib. 2. de motu muſcul.* quemdam tredecim diebus acuta febre delirantem, ſanguine & ſudore prorſus judicatum, vidiſſe ait: *mulieremque ibid. Ægr. 13 pag. 990. trimeſtri fetu gravidam, quæ in litore habitabat*, vomitu & ſudore: & illum, *qui in Dealcis horto decumbebat, lib. 3. Epidem. Ægr. 3. pag. 1066.* alvi pituitoſa fluxione, copioſoque ſudore: *Anaxionem lib. 3. Epidem. Ægr. 8. pag. 1104.* ſputis multis, ac ſudore: *Nicodemum, ibid. Ægr. 10. pag. 1108.* urina multa alba, in qua multa ſubſidebant, ſudoreque copioſo; atque *mulierem moroſam*, quæ in *Thaſo, ibid. Ægr. 11. pag. 1108.* ſudore, atque menſibus erumpentibus. Quare operam navare quam ſedulo debemus, ut nedum ſpecies ſimplices criſium, verum quoque plures ſimul complicatas, cognoſcamus. Quam rem ſtudioſi facile etiam aſſequentur, ſi notas ſignave, a nobis nuper ad cognoſcendas ſimplices tradita, memoria tenuerint, ſiquidem ubi duæ vel plures futuræ ſunt criſes, plurium, aut quidem duarum prælucebant ſigna.

Quomodo cognoſcuntur.

Ceterum, ut hæc clarius cognoſcantur, exempla aliqua conſiderabimus, præſertim excretionum, ſeu criſium illarum, quæ per ſudorem & aliquam aliam excretionem terminantur; plerumque enim, aut pauciſſimæ ſunt febres, vel acutæ bilioſę, vel ſanguineæ, & inflammationes internæ, phlegmoneſque, quæ abſque ſudore judicentur, etſi ſæpe non ſolo, ſed aut una cum hæmorrhagia, aut in mulieribus menſibus erumpentibus, aut hæmorrhoidibus, aut vomitu, aut ſputis, aut alvi fluxione, aut denique urina. In iis itaque, qui ſunt hęmmorrahagia atque ſudore judicandi, utriuſque ſigna præcipua aderunt; cujuſmodi erunt, capitis dolores aut gravantes, aut pulſantes, aut calidi, lacrymæ involuntariæ, aut ſurditas, aut tinnitus aurium, aut oculi rubri, aut maxillæ & nares, hypocondria tenſa abſque dolore, aliquando reſpiratio difficilis repente excitata, & paullo poſt quæ prorſus tollatur, pulſus quoque alti & magni, a ſuppreſſis tum alvi excrementis,

mentis, cum urinis, aut paucioribus factis, rigores vehementes, abſentia ſignorum aliarum excretionum, quippe menſium, hæmorrhoidarum, vomitus, & alvi fluxus, delirium increſcente acceſſione, partes externæ, & præſertim facies, calidiores, coloratiores, molliores ſeu humidiores, & ab ipſis vaporem, ſeu fumum calidum non antea ſolitum exhalare, atque pulſus mollis & undoſus. Et ſi cum ſudore menſes erunt erupturi in mulieribus, deerunt ſigna hæmorrhagiæ, vomitus, & aliarum excretionum, atque propria menſium aderunt, quæ ſunt gravitas lumborum effatu digna, dolor atque tenſio, totius corporis & præſertim lumborum laſſitudo; (hinc Auctor in *Coacis præſagiis text.* 36. laſſitudinarias has febres judicatorias vocavit) aderit itidem cardialgia, ideſt, cordis ſeu oris ſtomachi, quod cor antiqui appellarunt, dolor, atque circa ſpinam tenſio, æſtus, atque ardoris. Quæ ſigna in viris cum ſudore etiam hæmorrhoidas prænuntiant. Et cum ſudore, ſi vomitus erit futurus, ſignis ſudoris ſigna vomitus quoque conjungentur, qualia eſſe diximus, dolorem capitis acutum & mordacem, & pro ſplendore oculis caliginem, ſeu atrum quoddam, obverſari, ſtomachi faſtidium, nauſeam, ſubverſionem, anxietatem & inquietationem, cardiogmon, ideſt cordis ſeu oris ventriculi morſum, ſpiritum difficilem, pulſum inæqualem, durum, atque jam jam vomituris ſputum tenue ex ore copioſum effluens, atque labii inferioris agitationem. Et ſi urina copioſa una futura ſit cum ſudore, aderunt ſigna urinarum, quæ fuerant primo, quod abſint aliarum excretionum ſigna, alvus quum ante copioſior fuerit, nunc ſiccior ſit, nullus dolor præter in hypogaſtrio ſentitur, ſenſus gravitatis, aliquandoque ponderis, & circa veſicam inflationis obſervatur, non vehementes erunt jactationes & inquietudines, urina plerumque non confertim, ſed paullatim incipit, atque augetur, quæ aliquando infert calorem aut ardorem, aut pruritum, & voluntatem crebram mingendi. Et ſi cum ſudore alvus una erit ſolvenda, tunc ſimul aderunt ſigna alvi fluxuræ, nempe præcordia erunt tenſa, murmurantia, aut morſus in inteſtinis, flatus, ructus ventris, rugitus ſeu ſtrepitus ſentientur, lumborum aderit dolor, & genuum aliquando gravitas, ventris turbatio, ac pulſus vibroſus & durus. Si vero una cum ſudore ſputa quoque copioſa excernenda erunt, aderunt ſigna propria, quæ in morbis pulmonum, & pectoris apparent: maximeque in pleuritide, & peripneumonia, ſputorum excretiones obſervari debent, ut in *Anaxione* pleuritico fuit ab Hipp. *lib. 3. Epidem. Ægr.* 8. *pag.* 1104. obſervatum. Signa vero, quod copioſiora ſputa ſint excernenda, ſunt tuſſis, difficilis reſpiratio, & ſputa, quæ cœperunt excerni cum tuſſi copioſa, quæ vero magis cocta evaſerint, facilius educuntur. Et hæc ſunt, quę de cognoſcendis criſibus fuerant a nobis dicenda. Nunc de tempore, quo ſint obſervandæ, reſtat, ut agamus.

CAP. XIX.

De tempore Criſium, ideſt, quo nobis ſint futuræ.

POSTEAQUAM ſcriptum a nobis fuit, quo pacto Medici debeant cognoſcere, num morbi ſint criſi judicandi, aut abſque criſi; & ſi criſi, an per abſceſſus, an per humorum excretionem, & quæ bonæ ſalutareſque judicentur, & quę malæ, letales; atque demum, quum etiam ex ſignis quaslibet criſium ſpecies cognocere ſtuduerimus, reſtat ſolum, ut, quo tempore fiant ſeu obſerventur criſes, quoque accuratius aſſequamur. Atque hic ſermo eſto finis hujus libri, ad prognoſin ſane perquam utiliſſimi, quem ſi ſtudioſi Medicinæ familiarem habebunt, plurimum laudis in Medicina aſſequentur. Sed ad inſtitutum redeamus, quod eſt noſcere tempus

Tempus quo criſes futuræ ſunt, quomodo cognoſcetur.

particulatim, in quo criſes fiunt. Quæ cognitio penes multa habebitur; & quamquam ſit admodum difficilis, propterea que requirat maximam diligentiam, ſtudium, & laborem; tamen ſi accurate omnia ſigna prænarrata ipſorumque vires intellexerimus, neque multa difficultate hujus prædictionis rationem aſſequemur. Perſcrutabitur itaque hæc cognitio quippe temporis, in quo criſes ſunt futuræ, ab his, ſcilicet a ſignis criticis ſeu decretoriis vocatis; atque a tempore, in quo hæc obſervantur, quippe in quo incipiunt, augentur; (non enim critica ſigna prius tolluntur, quam criſis erumpat,) a morborum idea, natura, magnitudine, motu, temporibus ipſorum, a coctione & cruditate. A criticis enim ſignis, quippe quæ criſin antecedunt,

A Criticis ſignis.

antequam fiat, ut Hipp. docet *in 2. Aphor. 13.* nox moleſta apparet: *Antecedit enim*, ut Gal. etiam *in 2. lib. de Criſib. cap. 2.* ſcripſit, *non mediocris perturbatio in corpore ægrotantis, nam & difficiles tolerantiæ, vigiliæ, deliria, & graves ſomni fiunt, difficilis anhelitus, vertigines tenebricoſæ, & difficilis ſenſus, dolores capitis, colli & ſtomachi, & multorum aliorum membrorum, nonnullis aurium ſonitus, & ante oculos vani ſplendores apparent, & lacrymæ involuntariæ effluunt, & urina retinetur. & labrum agitatur, aut aliquod aliud tremulum fit, oblivio, præſentium ignorantia, vehemens rigor, plurimum acceſſio conſueta anticipans, multus æſtus, ſitis intolerabilis, ægroti clamant, & ſaliunt ſicuti furentes, neque poſſunt in eodem ſitu recumbere, deinde repente multus ſudor erumpit, aut vomitus, aut venter ſubito ſolvitur, aut abundans ſit fluxus ſanguinis, aut urina profluit copioſius, aut hæc omnia ſimul contingunt.* Hæc enim alias demoſtravimus cum ſignis coctionis criſin præmonſtrare. Quorum principium neceſſe eſt animadverti, ut ſcite diem, in quo criſis futura ſit, intelligamus: non enim a die, in quo hæc videri cæperunt, criſis aberit ultra quaternarium, ſi enim exempli gratia 4. die incipient, coſpectis urinis concoctis, morbuſque vehemens ſit & celer, ultra 7. criſis non producetur. Ceterum ubi cæperint manifeſta quædam coctionis ſigna, neque morbus admodum vehemens, neque celer, uſque ad ſeptimum, ideſt, in ſecundo quaternione, criſis protendetur. Quam rem ſatis perbelle expreſſit Hipp. *in lib. 3. Prognoſt. p. 46. lin. 5. & ſeq. text. 33.* ita ſcribens: *Ex iis vero, qui primo die dolore cœperint, 4. die gravantur magis quam quinto, ſeptimo vero die liberantur. Plurimi vero ipſorum dolore incipiunt tertio die, conflictantur autem quinto maxime, liberantur aut nono aut undecimo die: quicumque vero quinto dolere cœperint, & alia ſecundum rationem priorem ipſis affuerint, decimo quarto evadunt.* Quare criſis terminus majori ex parte erit ſeptem dierum ab ea die, in qua cœperunt decretoria ſigna conſpici: ſed ubi apparuerit ſignum aliquod manifeſtum, ex quo morbum in augmentum deſcendiſſe cognoſcamus, plerumque altero quaternario criſis fiet, quum non longius concoctio ſit perficienda, atque illud tempus vigoris morbi ſit proprium ſalutarium criſium, ut Gal. docuit, atque hoc eſt, quod etiam ita expreſſit: *Quum igitur primo die ſignum aliquod coctionis manifeſtum apparuerit, reliquis etiam omnibus periculum nullum portendentibus, tunc proculdubio ſciemus, quod, in primo quaternario morbi ſolutionem ſubſequi, ſit neceſſarium. At, ſi, iis ſignis decretoriis apparentibus, ſimul perfecta coctio obſervetur, futuro primo die decretorio criſin fieri erit neceſſarium.* Ex ſignis itaque decretoriis nedum criſin futuram conjicimus, at quo non minus tempore ſit futura. Ex natura quoque morborum, quum acuta, tum longa, quos morbos Græci *brachychronicos* appellant, poterimus tempus criſium ptænoſcere. Quo ad tempus enim ſeu morborum ætatem, triplex eſt differentia: namque morborum alii acuti, alii longi, alii medii dicuntur: *acutus*, ait Hippoct. *in 2. Aphoriſm. 23. quatuordecim diebus terminatur*; etſi Galen. videatur terminum morborum acutorum diem vigeſimum ſtatuere, & mediorum uſque ad quadrageſimum, quos vocat *acutos ex delapſu*, ſeu ex *converſione*, de quibus

Ex natura morborum.

bus Hippocrat. meminit, quum *in primo Prognoſt. pag. 38. lin. 12. text. 21.* ita ſcripſerit: *Oportet autem exiſtimare ſpirandi facilitatem magnam habere vim ad ſalutem in omnibus acutis morbis; quicumque febres habent adjunctas, in quadraginta diebus judicantur*: & ultra hos dies, qui judicantur, diutinos & longos vocat. Ceterum, ut accuratius ex natura morborum tempus criſium perveſtigemus, diſtinguere oportet acutos morbos in acutiſſimos, ſive maxime acutos, peracutos, atque ſimpliciter acutos. Horum ait Hippocrat. *Aphoriſm. ſect. 2. 23.* longiorem terminum eſſe, ut Galen. *in lib. 3. de Criſib. cap. 13.* ſcribit, quatuordecim dierum; & illos, quippe acutiſſimos unico quaternario reſolvi; cujuſmodi ſunt, angina, cholera, tetanos, ſynochus: atque peracutos ſeptem diebus, cujuſmodi ſunt, pleuritis, phrenitis, peripneumonia, hepatitis, diaphragmatis uterique & ſtomachi inflammatio, febris ardens, ſynochus & alii hujuſmodi multi. Ceterum acutiſſimorum aliqui vel etiam uno tantum die, alii duobus, alii tribus, atque alii quatuor judicantur; numquam vero ultra hos dies producuntur, ſed ante hos plures terminantur, ut apoplexia, ephemera peſtilens, letaliſſima phrenitis, & quæ *in Ægypto* ſæpius epidemice graſſatur, quem affectum *Demelmuia* Ægyptii appellant, eſtque eorum morborum acutiſſimorum, qui paucis horis homines interimunt. Idem quoque eſt peracutorum, quorum terminus eſt dies ſeptima, quando eorum plures antea non raro, propter morborum vehementiam, habeant judicium, uti ex Galen. phrenitis acutiſſima, qua Hippocrat. *in libro 3. Epidemiorum comm. 3. Ægrot. 4. pag.* 1100. quemdam quarto die fuiſſe extinctum, meminit; ſynochi itidem, & phrenitici & peripneumonici, præ inflammationis magnitudine, ſæpius quarto die vel quinto judicantur. Eodem modo fit de ſimpliciter acutis, quod hi aliquando ſeptimo, aut nono, aut undecimo, habent judicationem. Hoc plerumque obſervatur in malis criſibus, quæ natura, propter vehementiam morbi, aut propter multitudinem, aut praviſſimam qualitatem humorum, vehementer irritata, ante tempus excernente fiunt, atque hoc pacto poſſumus in morbis criſes, quando ſint futuræ, prænoſcere. A magnitudine quoque morborum, neceſſe erit, medium intelligere, ex virium una habita cognitione, quo tempore fieri debeat criſis. Siquidem, ut docet Galen. *in primo Epidemiorum* neceſſarium eſt, ob morborum magnitudinem ac caſuum vehementiam, vel cito vires proſterni, adeo ut homo moriatur, vel ad noxiorum humorum excretionem excitatas, ſi modo, quos invaſerit, humores exſuperent, bonam ſequi judicationem, ſin autem exſuperentur, malam. Utrumque vero intra quaternarium fieri ſolet. Quo ubi in morbo aliquo vehementiam quarta die cognoverimus, non ultra ſeptimum judicium, vel mors, producetur. De qua re Galen. *in primo Epidem.* dixit: *Quare fac memineris, ubi quartus, perinde ut tertius, gravia habeat ſymptomata, & ſigna, in morbo acuto, brevi exſpectandum judicium eſſe, ſi paribus diebus potius invadebat, in paribus, ſi vero imparibus, in his, atque judicium illis, & mors in morbis exitialibus.* De *Philiſco*, *libro primo Epidemior. Ægrot. 1. pag. 966.* qui obiit ſexta die, ait, *quarta die omnia fuiſſe exacerbata*, ipſumque maximo morbo conflictari, cum exitialibus urinis nigris, quo naturam extinctam iri neceſſario cognoſcebatur, atque id non ultra quaternarium protrahi poſſe, vires debiles ſignificabunt. Ex morborum quoque motu celeri, aut tardo, accuratius & diſtincte magis criſium futurarum tempus poterit cognoſci: namque ubi morbum judicabimus ſolutum iri ſeptima die, ſi præter vehementiam ejus etiam celeritas obſervetur, poterit vel etiam quarto aut quinto reſolvi; veluti motus tarditas, ad nonum aut undecimum uſque retardaturum judicaret. A temporibus vero morborum, atque a coctione & cruditate longe clarius & diſtinctius prænoſcent Medici criſium futurarum tempus, quando omnes bonæ criſes aut

Ex Morborum magnitudine.

Ex horum motu celeri aut tardo.

Ab horum temporibus.

in ſtatu fiant, aut in augmento; intelligimus vero ſtatum atque augmentum, non inquam morbi, ſed ipſius quidem naturæ coquentis & alterantis morbum: exitiales vero aut in principio, aut in augmento, ut Gal. *in lib. 3. de Criſ. cap.* 10. tradidit. Quare, morbo ſalutari, criſin perfectam nonniſi in vigore morbi exſpectabimus, imperfectam in augmento. Ex quibus ſigna temporum exacte interſtinguantur, quemadmodum alias ex Galen. *in 1. de Criſ.* docuimus. Quare ſi perfecta criſis erit futura, neceſſe erit, augmentum morbi prius abſolvi, cujus ſane tempus nobis innoteſcet principii augmentique notitia; namque ſi longum fuerit morbi principium, itidem & augmentum, & vigor proportioni reſpondebit: imperfecta vero tranſacto principio. Principium autem eſſe illud tempus, in quo morbus omnino crudus eſt, nullumque vel etiam ſignum concoctionis illuxerit, quod quum cœperit, augmentum eſſe, & durare, quoad perfecte concoquatur morbus, Galen. *in 1. de Criſ. cap.* 8. & *in 1. de totius morb. temp. cap. 3.* ſcriptum reliquit. In exitialibus vero criſibus, diximus, vel principium vel augmentum eſſe attendendum: in vehementiſſimo morbo, cum prælanguidis viribus, criſis non ſuperabit principium, neque primum quaternarium; cum robuſtis vero augmentum attingit. Quare in robuſtis criſis fiet in augmento: natura enim non ſuccumbet morbo, non aliquo pacto ab ipſa alterato.

Ceterum hæc erit ſervanda regula, ut diſtinctius diem, vel etiam in qua criſis fiet, prænoſcere queamus. Quippe a conſpectis ſignis vel ſalutaribus, vel exitialibus, futuro primo quaternario judicium fore exſpectandum. Tanto enim temporis ſpatio in ſalutaribus morbis utens natura ſolet morbum alterare, quoad excernere critice poſſit; atque toto ipſo itidem tempore morbus ſolet naturam robuſtam ad pugnam irritare, aut debilem extinguere, ex quo merito Hippocrat. *in 3. Prognoſt. pag. 43. lin. 54. text. 2.* dixit: *Simpliciſſimæ enim febres, ac ſignis firmatæ ſecuriſſimis, quarto die aut citius deſinunt. Pag. 44. lin. 1. text. 4. Teterrimæ vero, ac ſignis affligentes difficillimis, quarto die aut citius interimunt*: aitque *primum impetum hunc in modum finiri, ibid. lin. 2. text. 4.* Ubi vero natura maximum habuerit irritamentum, maximo morbo in principio ſuccumbet. Galen. vero *in lib. 1. de Diebus decret. cap.* 12. vel etiam horam nos poſſe cognoſcere, eamque ex acceſſionis temporum accurata obſervatione, ſcripſit. Namque ſi ſtatim morbo invadente, ideſt, in principio acceſſionis, æger vehementer refrigeretur, exempli gratia, ut vix ad calorem reduci queat, calorque diutiſſime abſit, pulſus ſit exiguus aut nullus, aut malus appareat, motus pigritia, vel ſomnus veternoſus, aut aliud quippiam obſervetur; vel ſi principium acceſſionis fuerit moderatum, & in ſtatu poſtea deliret, vel cum impetu exiliat, vel reſolvatur, vel comatoſus, aut multum inquietus, aut magnitudinem febris non toleret, ſed vehementer inardeſcat, vertiginoſus, aut capite doleat, cordiſque morſus, aut ſi moderate in principio & in ſtatu ſe habuerit, neceſſe erit ipſum mori in declinatione, quæ cognoſcetur, ſi aderit animi deliquium, ſudores inæquales, frigidi, vel circa caput ſolum, vel cervicem, vel pectus, pulſus, obſcurus exiguus, & his ſimilia, proculdubio mors ac judicium erit in ea hora, qua fiet acceſſionis declinatio. Ex coctione etiam & cruditate tempus criſium poterimus conjicere, atque ex ſignis indicatoriis; ſiquidem in ſalutari morbo numquam fiet criſis, niſi ſigna, in aliquo dierum decretoriorum, coctionis apparuerint, quæ plerumque ita conſpecta in proximo decretorio die judicium oſtenderunt: in morbis quidem ſalutaribus, magnis, inceptam coctionem tempore unius quaternarii ſolet natura abſolvere. Quod ſi in die indicante ſignum coctionis conſpectum fuerit, in proximo decretorio erit criſis. Quod Hippocrat. *in lib. 4. Aphoriſmor. 71.* ita docuit: *Quibus in febribus die ſeptimo judicium fit, iis nubeculam obtinet urina quarto die rubram, & alia ſecundum rationem.*

Ex coctione & cruditate & ſignis indicatoriis.

Quod

Quod præceptum Gal. ſecutus *in lib. 3. de Criſ. cap. 4.* ait: *Quum igitur primo die ſignum aliquod coctionis manifeſtum apparuerit, reliquis etiam omnibus periculum nullum portendentibus, tunc proculdubio ſciemus, quod in primo quaternario morbi ſolutionem ſubſequi ſit neceſſarium.* Ex quo colligimus, ubi manifeſtum apparuerit coctionis ſignum in aliquo dierum decretoriorum, in altero proximo ſuccedet judicium, quod per quaternionem natura reliquum humoris cruditatis abſolvat, quodque non minori tempore facere poteſt, proinde ſi, ut ait Galen. *in eodem lib.* ægrotus neque ſecundo die manifeſtum coctionis ſignum habuerit, neque tamen pernicioſum ſignum adfuerit, ſed omnia ſint abſque periculo, ſervabitur ſane, ſed non in primo quaternario integre, at in ſecundo, quippe primo ſecundi quaternarii die critico, qui erit vel ſextus vel ſeptimus. Eodem modo, ſi ſeptimo appareat manifeſtum ſignum coctionis, ad undecimum magis, quam ad decimum quartum, fiet criſis. Quod judicium perpetuo fiet, ſiquidem morbus ſit ſalubris, & neque ejus acumen, neque magnitudo feſtinet, atque error aliquis circa ægrotum admittatur, ſtatus tempus criſis exſpectabit, ideſt perfectam coctionem. Si vero propter morbi magnitudinem, vel motus celeritatem, vel propter aliquod aliud natura irritetur, ante ſtatum, atque inordinato tempore fiet. Ceterum æque tamen verum erit, ſi in uno dierum decretoriorum, præſertim indicium, vel ſalutare ſignum vel exitiale apparuerit, poſt quaternarium in altero die decretorio judicium fiet. Ceterum, ut dictum eſt, magnitudo morbi, motus celer aut tardus, errores commiſſi, ſunt maxime attendendi; quum horum cauſa ſæpius criſis indicio non reſpondeat. Quorum exempla plura poſuit Gal. *in lib. nuper citato*. Atque hæc erant in hoc libro ſcribenda.

FINIS SEXTI LIBRI.

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS

Philoſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum ſimplicium Profeſſoris ordinarii,

DE

PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER SEPTIMUS.

CAP. I.

De particularibus humorum excretionibus ad prædictionem.

HACTENUS in præcedenti libro Dierum Decretoriorum, atque Criſium cognoſcendarum rationem tradidimus, ad illuſtrandam hanc prædicendi methodum, a naturalis facultatis ſtatus obſervatione depromendam. Quum ex omnibus, ut dictum eſt, naturalis hujus potentiæ (circa quam nunc cognoſcendam verſamur, quatuor functionibus, concoctoria atque excretoria præcipuam ac maximam ad prædicendum viam aperiat, merito ad harum præſertim notitiam, criſium, & dierum criticorum cognitionem præmiſimus, atque nunc omnium Excrementorum particulares Excretiones, & Abſceſſus accurate conſiderabimus. Tum quod ex ipſis rurſum, concoctio, cruditas, ac malignitas morborum nobis innoteſcat, tum etiam, quod ab ipſorum excretionis modo, natura quando bene ac ſalubriter humores moveat, & tranſmittat, atque excernat, & quando male infauſteque id agat, cognoſcimus. Quare primo, ut quo ad vires hanc noſtram prædicendi rationem illuſtremus, de præſagio a Sanguinis Excretione agemus, & poſtea, a Sudoribus, Vomitionibus, Dejectionibus alvi, Urinis, Sputis, atque Abſceſſibus.

CAP. II.

De prædictione a ſalubri ſanguinis excretione.

QUOD in morbis acutis vehementibuſve ſæpiſſime obſervatum ſit, repente aut ex naribus, aut ex hæmorrhoidibus, aut ex alvo, aut ex utero in mulieribus erumpente copioſo ſanguine, ægrotos ſanitati fuiſſe reſtitutos; ideo naturam in hoc Medici cœperunt imitari, ſanguinem copioſius in morbis mittentes. Qua ratione Hippocrat. perſuaſus hujuſmodi remedium in omnibus acutis vehementibuſque, ſive magnis, febribus, aut viſcerum inflammationibus, *in lib. 4. de vict. rat. in acut. pag. 396. lin. 33. tex. 19.* (de

quibus

quibus ibi agit) hiſce verbis maxime commendavit: *In acutis morbis ſanguinem detrahes, ſi vehemens morbus videatur, floruerit que ægrotantis ætas, & virium adfuerit robur.* Hocque remedii genus Medici nedum naturæ imitatione invenerunt, ſed quibuſdam etiam animalium exemplis perdocti, præſertimque *hyppopotami*, equi marini, ut Plinius eſt Auctor, qui ingluvie obeſus crus in arundinis ſtipitem acutiſſimum adigens, venam quamdam vulnerando, copioſius ſanguinem effundit, atque ita ſuit ipſius corporis plethoram tollere ſolitus. Non diſſimili quoque argumento cœperunt Medici humores, aut per alvum purgatoriis medicamentis, aut vomitoriis per vomitum, aut ſudoriferis per copioſos ſudores, aut diureticis copioſiorem urinam moventes per veſicam, purgare.

Quare quum natura ſæpius excernendo copioſum ſanguinem ſoleat multos morbos reſolvere; proinde in primis de his ſanguinis ſpontaneis ſeu ſpontefactis evacuationibus, ſeu excretionibus, agendum duximus: quoniam non eæ omnes bonæ ſunt, minimeque ægrotos liberant a morbis, veluti etiam non omnes aliæ excretiones, aut per alvum, aut per vomitum, aut per ſudorem, aut per urinam; neque omnes abſceſſus liberant a morbis, ſed quidam tantum, qui merito a nobis primum cognoſcendi erunt, ac ab aliis non ſalutaribus diſtinguendi. Nunc itaque nos de iis ſanguinis excretionibus agimus, quæ bonæ exiſtunt, ſalutemque perpetuo ægrotis futuram pollicentur, & poſtea de malis, quæ plerumque exitium præmonſtrant.

Sanguinis excretio per nares.

Inter vero excretiones ſanguinis, ea præcipua eſſe ad prædictionem videtur, quæ in febribus continuis acutis & vehementibus e naribus ſæpius erumpit, quam Græci *hæmorrhagiam* appellant, noſtri eruptionem ſanguinis e naribus: atque hæc in morbis fit, ubi ſanguis multus per nares effluit, & evacuatur. Gal. enim in *3. lib. Prorrhet. com.* 75. ait, ſuccos ad caput recurrentes, calidos quidem & tenues, deſipientias & ſanguinis eruptiones facere: at *in* 1. *Epidem. comm.* 1. *text.* 9. ſanguinem ipſum ſurſum, incitatum calore, efferri in caput, a quo neceſſe eſt inflari, ac reſerari venas, ac etiam rumpi ob ſpiritus copiam: atque *in eod. lib.* ſcripſit, ſanguinis e naribus eruptiones in ardentibus febribus ob dominantem fieri flavam bilem, quæ ſanguini permiſta, poſtquam ſanguinem deuſſerit, cum eo multum ad caput calorem ſubvehens, venis narium diſruptis, ſanguinis efficit eruptiones.

Ex quibus conſtat nonniſi ex calidiori ſanguine, vel bile ei admiſta, fieri, atque nonniſi in corporibus calidioris temperamenti, atque in calidioribus morbis, atque acutis fieri, cujuſmodi ſunt febres ſynochæ atque continuç ardentes, quod Galen. *in eodem lib. com.* 2. *text.* 66. affirmavit, dicens, eruptiones ſanguinis in ardentibus febribus, ob caloris copiam, humoribus ad caput ſublatis, fieri. Hinc Hippocrat. *in* 6. *Epidem. com.* 3. *text.* 17. *pagin.* 1175. ait, *ſanguinis de naribus profuſio, aut iis, qui ſubvirides, nigrique ſunt, aut iis, qui rubri & virides, aut ſubviridibus*; quod propter calidiores humores ſint his eruptionibus obnoxii: propter quam etiam cauſam Hippoc. poſtea *text* 18. dixit: *Quum venere uti incipiunt, aut hircire, ſanguinis profluvio laborare*; quippe pueros, quum propter multum, tum calidiorem ſanguinem, quo exſuperant. Ab hiſce cauſis ægroti ſolent in hæmorrhagiam incidere, iique præſertim, qui ob calidius temperamentum plurimo ſanguine, & calidiori abundant, & nonniſi in morbis, ab iiſdem humoribus affectis, quales ſunt, ex Galeno, febres omnes continuæ, ac vel etiam ex intermittentibus tertianæ, at numquam quartanæ. Addimus omnes internas inflammationes præcordiorum, præſertimque hepatis & lienis, diaphragmatis, ac ſtomachi, & aliquando pleuritides, phrenitides, rariſſime aut numquam lethargos, ac vel etiam peripneumonias. In his itaque morbis hujuſmodi hæmorrhagiæ, ſeu ſanguinis eruptiones erunt attendendæ. Sed his præmiſſis ad prognoſin

decli-

declinemus. Itaque hæmorrhagiæ, & aliæ omnes, quæ per alias partes fiunt, excretiones ſanguinis; (ſcilicet per uterum in mulieribus, in viris per hæmorrhoidas, & aliquando per ſtomachum, quæ tamen raro bonæ videntur, Hippocr. *in lib. 7. Aphoriſm. 37.* ita ſcribente: *Quicumque evomuit ſanguinem, ſi ſine febre quidem, ſalutare, ſi vero cum febre, malum*, nihilominus ſunt aliqui ſanguinis etiam vomitu excretione a multis morbis judicati:) in duas differentias diſtinguuntur, quippe in *bonas criticas* & noſtris judiciales vocatas, quæ duplicis quoque ſunt differentiæ, nimirum ſunt quædam perfectæ, quod perfectę judicent morbos, & quædam imperfectæ, quod imperfecte judicent, & in *malas ſymptomaticas* dictas: quidam addunt medias, quę medium locum habere videntur inter criticas & ſymptomaticas: quas contineri ſub criticis imperfectis alias demonſtravimus. Nunc de criticis; quum hę perpetuo ſalutem præmonſtrent, perfectæ ſubito, & imperfectæ temporis ſpatio. Criticæ itaque eruptiones ſanguinis & optimæ, quæ ſalutem certam ægrotis præmonſtrant, hiſce notis nobis innoteſcent. Primo quod numquam crudo morbo appareant, ſed perpetuo cum ſignis coctionis; atque ob id perfectę in ſtatu morbi, imperfectęque in augmento, ubi quædam manifeſta non omniaque coctionis ſigna illuxerint. Itaque neceſſario ad ſalutarem hęmorrhagiam, & ad quamcumque aliam bonam ſanguinis excretionem, debent primum ſigna coctionis animadverti, quibus una ſi ſanguis excernatur, utile erit, teſte Galeno *in lib. de Criſibus cap. 7.* de qua Hipp. *in quarto, de vict. rat. in acutis, pag. 396. lin. 21. text. 10.* habet: *Et ſi ex naribus fluxerit ſanguis, ſolvitur ægritudo, atque ſi ſudores ſupervenerint judicatorii, legitimi, cum urinis albis craſſis, & levibus ſubſidentiis.* Sed aliquis forte objiciet *Metonem lib. 1. Epidem. Ægr. 7. pag. 983.* nobis, & illum, *lib. 3. Epidem. Ægr. 3. p. 1066.* qui *in Dealcis horto* decumbebat, alios, qui, cum excrementorum cruditate, ſanguinis fluxu fuere judicati, & quidem critice. In *Metone* urinę fuere nigrę, & cum nigris ſedimentis, & in altero, tenues, cum craſſioribus ſedimentis, nedum crudiſſimum morbum, ſed neque parum malignum declarabant. De hac re alias egimus, & diximus, tantum poſſe copioſam ſanguinis eruptionem ad judicandos morbos, ut vel etiam in principio, nullis ſignis coctionis conſpectis, apparens, ſępius liberet ęgrotos. Quod Gal. de *Metone* expreſſit, dicens: *Sane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet.* Excretio itaque ſanguinis, tametſi optima ſit, ac certiſſime ſalutem nuntiet, quæ morbo jam concocto apparet, quæque etiam ob id in ſtatu apparet, etiam cum ſignis cruditatis in principio morbi, non eſt ſpernenda. Quod etiam in *muliere moroſa lib. 3. Epid. Ægr. 11. pag. 1108.* viſum eſt, quæ, cum urinis nigris, menſium profluvio fuit ſanata, etſi Gal. dixerit, earum urinarum nigrum colorem nihil attuliſſe periculi, quod a retentis menſibus, qui fuerant melancholici, eo modo colorarentur urinæ: quod ſi verum etiam de *Metone*, qui, iiſdem nigris exiſtentibus, eruptione ſanguinis fuit judicatus. Quam rem Hipp. nobis expreſſiſſe viſus eſt in *1. Epid. Comm. 2. pag. 951. lit. F. text. 56.* quum ibi ſcripſerit: *Ictericis factis in febribus, ſexta die, erutionem ſanguinis profuiſſe*; eo die vero viſam ictericiam malam docet Hipp. *in 4. Aphor. 62.* qualis fuit in *Hermocrate: lib. 3. Epidem. Ægr. 2. pag. 1062.* & *in text. 67. lib. 1. Epidem. ſect. 2. pag. 953. lit. A. B.* dixit: *quum urinæ tenues eſſent in Antiphonte Critobuli filio, erupiſſe ſanguinem & poſtea ſanatum fuiſſe.* Quod vero ſanguinis excretiones hanc habuerint prærogativam, ut ita dixerim, quod etiam in crudo morbo ſalutem præmonſtrare ſoleant, quum ceteræ aliæ per vomitum, vel ſudorem, vel purgationem alvi, tunc temporis apparentes, ſymptomaticæ ſint: hoc propterea fieri crediderim, quod ſanguis per venas apertas poſſit commode quocumque tempore vacuari, nullaque egeat ſanguis

Sanguinis criticę eruptiones quomodo innoteſcunt. Cum ſignis coctionis.

guis præparatione, qua egent ceteri humores, ſi debeant per alvum ſubduci, vel per vomitum, quę in his tam facile non fit, propter ipſorum craſſitiem, aut lentorem, aut venarum anguſtiam & obſtructionem; atque hanc eſſe cauſam colligimus, propter quam Medici in principiis morborum non debeant uti purgantibus medicamentis, ut Hippocr. ſcripſerit *in Aphoriſm. ſect.* 1. *Aphor.* 22. *Concocta medicari oportere neque cruda, niſi materia turgeat.* In evacuatione vero, quæ per venas apertas fit, nullam merito exſpectamus concoctionem, & hinc Medici, ſecta vena in morbis acutis, in principio, mittunt ſanguinem; hinc & ſpontaneę ſanguinis vacuationes bonæ erunt. Addatis, ſanguinis eruptiones copioſas nedum utiles fieri, propterea quod ſanguis malus una excernatur, ſed etiam quoniam ejuſdem ſanguis vacuatio univerſum corpus refrigerat, caloremque tranſpirabilem, & corpus difflabile facit. Quare hac ratione excretiones ſanguinis optimæ erunt, quę in ſtatu apparent, plane cocto exiſtente morbo; ſed neque eæ, quæ cum cruditatis ſignis fiunt, erunt plane abhorrendæ & timendæ. Et præſertim, quę copioſe & large fluunt, quæ erit ſecunda conditio, optimam ſanguinis eruptionem indicans. De quibus Hippocr. *in lib.* 2. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 1005. *ſub lit. A.* ita habet: *Largæ de naribus eruptiones ſanguinis liberant fere.* De quibus Galen. de *Metone* locutus ait: *Sane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet.* Rurſum Hippocr. *in* 1. *lib. Epidem. Comm.* 2. *pag.* 951. *lit. E. text.* 63. dixit: *Febribus autem ardentibus hæc accidebant. Quibus rite & largiter ſanguis per nares erupit, ea de cauſa maxime ſervabantur. Nec ullum novi, ſi recte ei erupiſſet ſanguis in hoc ſtatu, quemquam mortuum.* Nam Philiſcus *quidem* Epamenon, & Silenus, *quibus parum quarta die & quinta e naribus ſtillavit, mortem obierunt.* Et poſtea: *ibidem ſub lit. F. Erant qui ſexta die morbo regio afficerentur, ſed his purgatio profuit per veſicam, vel turbata alvus, vel larga ſanguinis eruptio*: *ut* Heraclides, *qui apud Ariſtocydem decumbebat, cui per nares ſanguis erupit, alvuſque fuit turbata, & per veſicam eſt purgatus.* Et *ibidem ſub lit. G. ſanguis autem plurimis erupit, præcipue adoleſcentulis & adultis, quorum periit maxima pars, quibus ſanguis non erupit.* Et de mulieribus etiam ſanguinis excretione judicatis, ita *lib.* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 953. *ſub lit. B. Plurimis itaque menſes in febribus apparuerunt. Quibuſdam e naribus ſanguis erupit, & multis virginibus id tum primum accidit. Nonnullis ſtimul & ſanguis e naribus, & menſes apparuerunt, quod in Detharſis filia virgine tum primum animadverſum eſt largeque ex naribus ſanguis profluxit.* Ex quibus ſanguinis largas excretiones optimas eſſe, morboſque judicare demonſtratur. De qua Hipp. *pag.* 1005. *lit. A.* ita habet: *Fluxus ſanguinis largi ex naribus ſolvunt multa, ut Heragoræ.* Quomodo *in lib.* 4. *Epidem. pag.* 1131. *text.* 27. *mulierem*, cui ſanguis ex naribus quinta ſextaque fluxit, die ſeptima fuiſſe judicatam, meminit. Atque hæc erit una ex præcipuis notis optimarum excretionum, ut, inquam, large erumpant. Attamen videndum erit, ne ſæpius, larga ipſarum copia, eæ nos decipiant, putantes optimas criticaſque eſſe excretiones, quum malæ potius ſint. Nam ſæpius largis ſanguinis eruptionibus plures exſtincti ſunt. Etenim conſueviſſe in morbis vehementibus, morbo adhuc exiſtente crudo, immoderatas inanitiones fieri, Galen. *in lib. de præſag. ad Poſthumum* memoriæ prodidit; propterea ſæpius cogi medicos, eruptionem cohibere, uti Galen. fecit in *juvene Romano*, in quo ſanguis ad pondus librarum quatuor cum dimidia fluebat e naribus.

Larga ſanguinis eruptiones quando bona.

De quibus immoderatis eruptionibus in ſequenti capite nos; DEO volente; accuratius. Nunc neceſſario tradenda ſunt ſigna, ex quibus largas bonas excretiones a malis diſtinguamus: quæ hæc erunt: præter alia bonis omnibus communia, ægrotantium facilis tolerantia, & ipſos robuſtiores reddi levio-

Sanguinis largæ excretiones bonæ, quomodo a malis diſtinguantur.

leviores, quod ſi ſiticuloſi fuerint, ut non amplius ſitiant, & febris tollatur, ſymptomataque tollantur, aut diminuantur, pulſuſque meliores, vehementiores, æqualiores, & ordinatiores evadant. Memini proximo anno elapſo, in quo me a febre quartana ſanguinis copioſa excretio, in qua ad minus ſex libræ ſanguinis profluxerunt, critice liberavit, inter alia ſigna poſt illam copioſam excretionem, omnibus fere immoderatam viſam, obſervata, me nihil prorſus ſitiiſſe, quum antea perpetuo, vehementerque, ſitirem, nullumque languorem virium ſenſiſſe, levioremqne ac viribus firmiorem evaſiſſe, quæ, contra opinionem fere omnium Medicorum, mihi ſpem certam ſalutis videbantur polliceri, ſperavique exinde, eam ſanguinis copiam fore criticam, neque ullo pacto timendam, etſi majori ex parte, tuſſi repente oborta, ſanguinis profluxerit. Quare iis notis copioſam criticam ſanguinis eruptionem diſtingui a ſymptomatica mala ſciemus.

Bonæ fiditibus criticis apparcant.

Tertia conditio criticarum ſalubriumque ſanguinis eruptionum eſt, quod diebus criticis appareant. Hiſce enim diebus, a nobis alias dictum eſt, conſpectas excretiones, vel bonas vel malas, firmius judicium habere, & ad ſalutem, & ad mortem præſagiendum. Ex quo merito Auctor *Coac. præſagiorum in lib. 4. text. 45. & in 5. lib. Coac. præſag.* ait: *Acuti morbi judicantur ſanguine fluente e naribus, & ſudore multo.* Et *text. 152. die ſeptimo, nono, & quartodecimo, ſanguinem e naribus ut plurimum febres reſolvere.* Quarta, ut in aliquo dierum judicatoriorum excretio fuerit præindicata. Solet enim natura in die indice modicum aliquando ſanguinem excernere, quod eſt indicium in altero die decretorio hæmorrhagiæ copioſioris futurę. In *Metone lib. 1. Epidem. Ægr. 7. pag. 983.* quarto die bis de nare dextra paullatim fluxit, & altera die affatim multus profluxit, quo fuit judicatus. Addamus quintam, quod excretio quum ideæ, naturæque morbi, tum ægrotantis, victus anteacti, temporum, præſentis conſtitutionis anni temporum, atque cęli naturæ reſpondeat. Dictum alias a nobis eſt, quod ſanguinis excretiones ſint aptiſſimæ vacuationes in omnibus morbis acutis, cum febribus, omniumque maxime in ſynochis, atque ardentibus, in inflammationibus hepatis, lienis, diaphragmatis, non raro in pleuriticis ac in phreniticis: Quare in hiſce morbis probe & utiliter ſpectantur ſanguinis excretiones, veluti in aliis affectibus ita non utiliter: quæ itidem hac ratione utiles erunt in corporibus omnibus, quæ plurimo ſanguine eoque calidiori exſuperant; & propterea, ſi præceſſerit victus bilioſorum ciborum, plurimaque calidioris ſanguinis ſigna, aut æſtus ſit, vel calida conſtitutio, vel in cælo calidiori & alia adſint, & quæ generationem bilioſioris ſanguinis adjuvent, optimum erit, erumpere ſanguinem in prænarratis morbis. At quinimmo in ipſis ſanguinem non erumpere, non leve eſſe malum, Hippocrates, *in primo Epid. Comm. 2. pag. 951. ſub lit. G. text. 17* ita docet: *Sanguis autem plurimis erupit, precipue adoleſcentulis, & adultis, quorum periit maxima pars, quibus ſanguis non erupit.*

Si morbi ideæ & naturæ ægrotantis conveniant.

Si locis affectis congruant.

Sexto oportet has optimas excretiones locis affectis congruere, ita ut aut e directo, ut divertant, probeque a parte affecta vacuent, aut ex oppoſito, ut revellant. De his Hippocrat. *in Aphoriſmis lib. 6. Aphor. 21. Inſanientibus ſi varices, vel hæmorrhoides ſupervenerint, inſaniæ ſolutio.* Et in libro quarto *Aph 25. Inferne vero niger ſi deiiciatur, bonum:* & Galen. in comm. *Revera enim jam factæ melancholiæ maximum eſt remedium ſanguinis ex his venis, quæ hæmorrhoides appellantur, profluvium.* Et in libro quinto *Aphor. 32. Mulieres ſanguinem evomentes, ſi menſtrua eruperint, morbi ſit ſolutio.* Hinc Medicis uſus eſt familiaris ad inſanientes, ſanguinis vacuationes, per hirudines, appoſitas venis hæmorroidibus appellatis. Quod in illis, qui eas venas amplas habent, omniumque maxime, ſi per ipſas alias fluxerit ſanguis,

guis, eſt utiliſſimum; ſi modo plurem neque paucum ſanguinem, ut plerique Medicorum faciunt, quibus raro hujuſmodi vacuatio propter hanc cauſam utilis ſuccedit, evacuent.

Ut vero humores divertant, atque ſimul evacuent a parte affecta, optima erit excretio, quum natura tum arte facta, e directo lateris affecti; quam Galen. *in libro de curat. per ſang. miſſionem*, vacuationem maxime commendat, & κατ' ἴξιν vocat, ideſt directe factam, ut hepate læſo ſanguis e dextra, & liene, ex ſiniſtra effluat. De qua Hippocrates, *in libro ſecundo Epidemiorum, Commen. 3. pag.* 1027. *lit. D. text.* 13. *ſecundum rectum, & laterum tenſio doloroſa, & tenſiones hypochondriorum, & lienis elevationes, ex naribus fluxiones*: & in libro quarto *Epidem. pag.* 1129. *lit. A. Horridi, anxii, cibum averſantes, bilioſi, ſanguinem fundentes, ſplenici doloroſo modo ex ſiniſtra parte plurimi*. Hinc eruditiores Medici in pleuriticis ſanguinem ex eodem latere mittunt, minimeque ex oppoſito.

Septimo optima hæmorrhagia vel ſanguinis excretio erit, a qua morbus aut omnino tollitur, aut ſaltem diminuitur, ægrotique allevantur, tolluntur, aut minuuntur itidem ſymptomata; cujuſmodi excretio viſa eſt, quam Hipp. quum in *Heropytho*, tum in *Lariſſæ Virgine* obſervavit. De *Heropytho lib* 3. *Epid. Ægr.* 9. *pag.* 1106. ita habet: *Quadrageſimo multum ex naribus ſanguinis erupit, menteque conſtitit, magis ſurdus quidem, ſed non perinde fuit, febres fuerunt remiſſæ*. Et de *Lariſſæ virgine ibid. Ægr.* 12. *pag* 1110. *Sexto naribus largiter multum fluxit, inhorruit, at mox ſudavit toto corpore multum & calidum ſine febre, eſt judicata*. Propterea optima erit, aut quæ totum morbum & ſymptomata ſolvit, vel diminuit. Gal. ſcribit 2. *lib. de motu muſculorum c.* 6. ſe vidiſſe hominem una cum febre, tredecim dies delirum, per nares plurimo ſanguine vacuato, ſtatim convaluiſſe, ad mentemque ſubito rediiſſe. Hipp. optimam eſſe, quæ ſurditatem ſolvit, *in Aphorſmis ſect.* 4. *Aph.* 60. docet, & Auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 152. ait. *Quibus capitis dolores, cervicis labor atque totius corporis cum tremore infirmitas, hæmorrhagica ſolvunt. Ceterum & tempore iſta ſolvuntur*. His addo ægrotantes, qui plurimum ante ſitiebant, ſiti liberari, quod ad criticam ſanguinis excretionem maximum eſt; quoniam optimus ſanguis multis, non critice erumpens, nimirum ſiccando, ſitim inferre ſolet: contra criticus refrigerando febrilemque calorem compeſcendo, & difflando corpus, ſitim tollere, ac forte etiam, quod viſcera humectentur ea ratione, quod a calore amplius non hauriatur humor. Hipp. *in lib.* 4. *Aphoriſmorum* 27. ita habet: *Quibus per febres ſanguinis quacumque ex parte copia eruperit, quum reficiuntur, alvi his humectantur*. Demum ab optima ſanguinis vacuatione, ut dictum eſt, ægroti robuſtiores, faciliuſque reſurgentes, & pulſus meliores evadunt. Atque hæ notę erunt optimæ cujuſvis ſanguinis excretionis, vel per nares, vel per vomitum, vel per alvum, vel per uterum, vel per hæmorrhoides.

Si juvent

CAP. III.

De malis exitialibuſque ſanguinis eruptionibus.

CONTRARIIS notis nobis ſanguinis excretiones malæ, exitium denotantes, innoteſcent. Quę perfecto hæ erunt, quippe prima, ut hæmorrhagiæ, aliæque excretiones ſanguinis, nullis conſpectis ſignis coctionis; (etſi nuper fuerit demonſtratum, largas eruptiones ſanguinis optimas, aliquando etiam, crudo morbo exiſtente, bonas eſſe:) attamen, ni bona illuxerint ſigna, judicium faciunt difficile: quæ excretiones, ſi una cum perniciosis ſignis apparuerint, aut ipſas ſequantur, exitium portendent.

Sanguinis excretiones judicantur malæ, ex nullis ſignis coctionis apparentibus.

Ante

Ex pernicio-sis signis aut ante-gressis, aut concomi-tantibus aut sub-secutis.

Ante itaque eruptionem ſanguinis præceſſiſſe, aut pernicioſa in excrementis ſigna, uti nigredinem in urinis, cum ſedimento nigro, turbidas eaſdem urinas, ſubjugales, non clareſcentes, vel tenues aquoſas; vel vomitus fœtidos, virulentos, verſicolores, nigros; aut nigras itidem dejectiones, ac colliquationes, peſſimum eſt; aut pernicioſa aliqua ſymptomata, de quibus nos ſuperioribus libris ſatis accurate egimus, aut antegreſſa ſint, vel ex iis aliquod pravum una cum hac eruptione apparuerit, aut hanc ipſam conſequatur, exitium præmonſtrabunt. De his *in libro 3. Prorrhet. lib. 1. text.* 126. legitur: *Si ex naribus ſanguis erumpat, quum ſudores vel fuerint vel pervenerint, perfrictionem quidem ferunt, ſed indicat malum eſſe morbum*: ac quum perfrictio tum in extremis fiat, tum per totum corpus, *gravior, difficiliorque, quæ per totum corpus eſt.* Et *ibid. text.* 127. *poſt ſanguinis eruptionem dejectiones nigræ, malæ: pravæ autem prærubræ, & ſi quarto die talis eruptio fiat.* Et Galen. *in Comment. ſequentis textus* dixit, omnes ſanguinis eruptiones cum deſudatione malignas eſſe. Et *lib. 1. Prorrhet. text.* 129. *poſt modicam ſanguinis eruptionem, nigramque dejectionem, in acutis morbis, ſurditas, malum eſt: ſanguinis dejectio in his pernicioſa, ſurditatem vero ſolvit.* Nos tamen vidimus in homine robuſtiſſimo Bononienſi, febre acuta maligna vexato, perpetuo a primo die ad quartum decimum uſque, qua die fuit ſanatus, hæmorrhagiam continuam, in qua ad minus ſingulis diebus ſanguis ad libram exibat, quæ hæmorrhagia quum uſque ad ſeptimum perſeveraſſet, noſque ab ea timuiſſemus, ad cohibendam quibuſdam medicamentis uſi, non amplius e naribus fluxit, ſed cœpit per alvum eodem modo profluere, una cum copioſa diarrhœa bilioſa, quam itidem a primo die uſque ad decimum quartum copioſam, & fortem aſſiduam habuit, quæ excretiones uſque ad decimumquartum, quo die perfecte fuit judicatus, ut dixi, eodem modo perſeverarunt. Atque hic nonniſi ob maximas vires fuit ſervatus. Et rurſus Auctor *Prorrhetic. lib. 1. text.* 41. dixit: *Si intercepta alvus, parva, nigra & in ſpiras circumducta, ad neceſſitatem dimiſerit, & per nares eruptio fiat malum.* Galen. in commento ait, hoc modo, qui ſunt ſiccati atque arefacti a calore febrili, vacuationes ferre non poſſe: & *in 2. lib. Coac. præſag. text.* 40. & 342. *Profluvium ſanguinis e naribus, & paucus ſudor cum refrigeratione, malum*: & *text.* 326. *Quæ diebus criticis perfrictiones fiunt vehementes a ſanguinis profluvio, peſſimæ.* Ex his itaque apparet eruptiones ſanguinis, cum malis ſignis, malas eſſe ac pernicioſas. De quibus Hipp. *in lib. 3. Epidem. pag.* 1085. *lit. F.* ait: *Nec non decretorii aliud in ita habentibus ullum apparebat, neque ſanguis rite perfluit, neque alius conſuetus abſceſſus fiebat decretorius.* Quare ſanguinis eruptiones cum malis ſignis ſunt pernicioſæ. Non minus, quæ neque morbi ideæ, naturæ ægrotantis, cœli conſtitutionis, temporis anni, ætatis, victus anteacti, temperamento reſpondeant. In frigidis enim morbis, ac pituitoſis, numquam eruptio ſanguinis bona erit, ſed perpetuo mala. Tertio, quæ neque locis affectis congruit hæmorrhagia mala erit, quam rem expreſſit auctor *Prorrheticorum lib. 1. text* 125. dicens: *ſanguinis ad latus diverſum eruptiones malæ, ut, ſi quum lien magnus fuerit e dextra nare fluat, atque res in hypocondriis ita habet.* Qua ratione damnatur etiam ſanguis, per vomitum excretus, in febribus ab Hippocrate *in Aphoriſmis*, ſed præſertim nigri ſanguinis, omniumque maxime in extenuatis corporibus, de qua re *in lib. 4. Aphoriſm. 23.* ita habet: *Quibuſcumque ex morbis acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus, ſive quovis alio modo extenuatis, nigra bilis, ſive uti ſanguis niger, deſuper exierit, poſtridie moriuntur.* Quarto mala eſt ſanguinis excretio, a qua ægri nihil juvantur, aut alterantur; peſſimaque, qua in deterius mutantur. Quod ſit talis excretio unum ex judicatoriis non judicantibus, letalis judicii. Ait enim Galen. in 1. *prorrhet.* (*Vide & Hipp. lib. 2. Epidem.*

Si neque morbi idea neque naturæ ægrotantis reſpondeant. Neque locis affectis congruant.

A quibus ægri nihil juvantur.

2. *Epidem. sect.* 1. *p.* 999.) judicatoriorum non judicantium alia quidem esse letalia, & alia judicatu difficilia; quæ vero in contrarium repunt, sunt letalia. Addatis, pulsus satis aperte demonstrare harum exeretionum malignitatem, quum ipsi languidiores, inæqualiores, & longe pejores reddantur. Demum ex quantitate quoque sanguinis hanc eamdem malam excretionem cognoscemus; quippe qui aut immoderatius profluat, aut minus, quam deberet, aut non totus confertim, sed per intervalla, uti fit in crisibus imperfectis. Immoderatius effluere, numquam bonum, sepæ malum, quod calorem innatum maxime diminuat, & propterea facile natura morbo succumbit. Hinc Auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 133. scripsit, *a multa sanguinis eruptione alvos male affici*, quod nimis refrigerentur: & postea *ibid. text.* 134. *In judicatoriis perfrictionibus sanguinis eruptiones vehementes, pessimæ.* Quod maxime refrigerent corpora, nimirum addendo frigus frigori. Hinc frigora non recalescentia & in debilibus rigores esse pernicioſos, Hipp. *ibid. text.* 65. statuit. Ita etiam quorum corpora immoderatius, *sanguine fluente*, vacuantur, *alii in letalem desipientiam, alii in convulsiones pernicioſas* delabuntur, ut Hipp. *in* 7. *Aphorismorum Aphor.* 9. docuit. Aliquando, quod fit in morbis non vehementibus, ita ægri refrigerantur, ut in hydropem veniant; plures enim observati sunt ea de causa hydropici. Quam rem Galen. *in lib.* 2. *Aphor.* 72. hisce verbis nos docuit, dicens: *Sanguis enim quum supra modum, aut ex utero muliebri, aut ex venis, quæ hæmorrhoidæ appellantur, aut ex ulcere fluxerit, tunc vel omnes, vel plurimas operationes, ii, qui ita affecti sunt, offensas habent. Nonnulli vero ipsorum non modo hæc patiuntur, verum etiam aqua inter cutem corripiuntur.* Non minus vero paucæ, quæ stillatim fiunt, atque incipientes, statim desinentes, de quibus in sequenti capite agemus, perniciales existunt.

Ex pulsibus.

Ex sanguinis excreti quantitate.

CAP. IV.

De sanguinis excretionibus paucioribus, statim desinentibus, atque de stillis sanguinis e naribus, quidque in morbis acutis præsagiant.

SANGUIS e naribus, aut ex aliqua alia parte, paucus erumpens, aliquando bonus, ubi principium crisis in aliquo die judicatorio significat; veluti in *Metone lib.* 1. *Epid. Ægr.* 7. *p.* 983. visum est, in quo quarta die modicus effluere e naribus cœpit, & quinto largiter erumpens, judicavit. Sed hoc non fiet, ubi morbus plane crudus erit, atque minus cum aliquo signo pernicioso.

Sanguinis excretiones pauciores quanam malæ.

Hoc modo enim modicus sanguis, ac vel etiam per intervalla erumpens, perpetuo malum portendet, exitiique signum erit certissimum, ubi ab ipso morbus postea minime concoquatur, nihiloque allevetur. Aliquando optima erit excretio, ubi plane morbus crudus non erit, ceteraque signa fuerint salutaria, atque si postea, proximo decretorio die, largiter erumpat. Quæ si vel non in die indice apparuerint, ac non sequatur larga postea de judicatorio eruptio, symptomaticum signum, malumque erit, mortaleque, si signa alia pernicioſa apparuerint, atque si postea ægroti in pejus mutentur. Rarissime itaque, ut potuimus observare, contingit, sanguinis paucam excretionem bonam esse, plerumque pessimam, perpetuo longitudinem, & non raro exitium præmonstrantem futurum; & præsertim, ubi neque per convenientia loca exierit, nec quicquam ægros sublevaverit; veluti quibus hepar inflammatum est, si per sinistram narem, & quibus lien per dextram, & quibus

uterus

uterus affectus, ſi per nares aut per vomitum, minimeque per uterum exeat, & qui ab ipſa febre neque ſymptomatis allevantur. Sanguinis itaque pauca excretio hæc indicabit, nihilque certi ad præſagium, ni pariter alia ſigna conſiderentur; cum malis mala, cum non malis incerti judicii ſeu difficilis erit, cum bonis longitudinem indicabit. Quum vero paucam ſanguinis excretionem conſpectam nulla alia ſequatur, aut ſi ſtatim, quum cœperit, deſiſtat, nihil pernicioſius erit; quum ſummam virium imbecillitatem, teſte Galeno *in primo Prorrheticorum Commentar.* 1. denotet. Sed age de ſtillis quoque ſanguinis agamus, quum eæ ſæpiſſime in acutis febribus, maximeque in ardentibus ſpectentur: nam hæ excretiones pejores ſunt, teſte Galeno, ſi ſtatim, quum cœperint, deſiſtant, quam quæ nullo modo apparuerunt. Ex varia itaque quantitate ſanguinis fluentis variæ fiunt quoque eruptiones; una quantitas, multa, continua, confertim erumpens, quæ in perfecta criſi apparet; altera diſcreta, quæ quum perſeverat, aliquando criſin poſtea futuram indicat; tertia eſt, quum paucæ tantum ſtillæ e naribus exeunt, quales a cauſa externa aliquando fiunt, veluti ab inſolatione, quippe capite a ſole calefacto, ex vino meraciore & ſimilibus. Hæ, ubi fiant vi febris, criſin fruſtra tentatam indicant, idque aut morbi malignitate fieri, aut ſanguinis vitio, aut cerebri infirmitate. Hujuſmodi ſtillæ in mitioribus morbis, in quibus cetera ſigna ſunt ſalutaria, morbi diuturnitatem prænuntiant; in acutis vero certiſſimam mortem; nam indicant naturam, ut Galen. *in* 4. *de Vict. rat. in acut. text.* 67. docet, conatam eſſe, quod ſuperfluum eſt, ſive, ut *in primo* quoque *Prorrhet. Com.* 1. expreſſit, abundantiam, in cerebro collectam, excernere, minimeque potuiſſe, vel ob propriam imbecillitatem, vel ſanguinis craſſitiem, vel partium denſitatem, vel quædam ex his, vel propter omnium concurſum. Quo apparet ſtillas omnes ſanguinis in acutis morbis peſſimas eſſe, pravumque & malignarum febrium ſignum, ut Galen. *in* 3. *Epidem. Comm.* 3. *text.* 35. ſcripſit: de qua ſane conſtitutione Epidemica Hippocr. *Lib.* 3. *Epidem. pag.* 1085. *lit. D.* dixit: *Nares pauca ſtillarunt, ſignumque pernicioſum fuiſſe*; quod etiam in prima conſtitutione fuit obſervatum, de quo ſigno Hippoc. *in* 1. *Epidem. Sect.* 2. *pag.* 954. *inter lit. D. & E.* ait: *At quum febres ardentes inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet*; & quum multa ſigna enumeraſſet pernicioſa, quæ in principio febrium ardentium fuere obſervata, addidit, *ibidem inter lit. F. & G. Nec erupit e naribus ſanguis, ne his quidem, quibus hæc accidunt, ſed parum ſtillarunt.* Quare merito ſtillæ in morbis acutis omnes ſunt ex ſignis pernicioſis, de quibus Hippocr. *in eodem lib. Sect.* 2. *pag.* 951. *inter lit. E. & F.* ait: *Nam Philiſcus quidem, Epamenon, & Silenus, quibus parum quarto die & quinto e naribus ſtillavit mortem obierunt.* Certiſſimamque mortem ſtillæ ſanguinis in morbis acutis præmonſtrabunt, omniumque maxime, ſi ſanguis craſſus, atque niger ſtillaverit, de quo Auctor *Prorrhet. in* 4 *Prorrhetic. text.* 54. (*An Libr.* 1. *text.* 79. *& Coac præſag.* 57?) ait: *E naribus ſtillicidium, malum: ſi nigrum & atrum, letale.* Et Galen. *in Comm.* dixit, nigrum & merum ſanguinem, deſtillatum, non modo in caput materiam motam eſſe, ſed etiam a calore acutiſſimo, qui totam conſumſit humiditatem, ſanguinem peraſſatum, ejuſque omnem Ichorem conſumtum indicare: & ſupra dixit, quum omnes e naribus ſtillationes difficiles ſint, quoties craſſæ & nigræ deſtillationes fuerint, maxime pernicioſas reperies. Quæ etiam in aliquo dierum criticorum apparent, abſolutiſſimam perniciem oſtendunt, quod in iis diebus ſigna omnia, quum bona tum mala, magnam vim habere ad præſagium, ſuperius oſtenderimus, de quo *in Prorrheticis Libr.* 1. *text.* 1. *Stillatio e naribus his pernicioſa, tum alias, tum ſi quarto cœperit die*: & Galenum *in Comm.* ait: *Quum ſtillatio e naribus ſemper malum ſignum ſit, abſolutiſſima morbi ma-*

Qui ad præſagium faciunt.

Sanguinis ſtillæ quid præſagiunt.

In acutis morbis omnes peſſima ſunt.

Quando mortem in acutis morbis præmonſtrant.

malitia significatur, si quarto fiat die. Videtur siquidem natura collectam cerebro abundantiam conata esse ut expelleret, sed nequiviſse. Pernicioſiſſimæ non minus sunt cum malis quoque signis conſpectæ, inevitabileque exitium significantes. De quibus *in 3. Prorrhet. lib. 1. text. 141. Quæ ex naribus cum ſurditate, & ignavitate parva eſt ſtillatio, difficile quippiam habet.* Galen. vero hunc Auctorem reprehendit, quod dixerit ſtillas has difficile quippiam habere, quum omnes ſint letales. Et *in 1. lib. text. 126. Ex naribus ſi ſtillicidium ſanguinis fuerit, cum ſudore frigido & refrigeratione extremorum, letale*: Peſſimo itaque cum ſurditate, torpore, comate, vigiliis, delirio, atque ſimilibus ſignis perpetuo erunt, maximeque in phreniticis. Quæ omnino fuere viſa in *Philiſco, lib. 1. Epidem. Ægr. 1. pag. 966. Sileno, ibid. Ægr. 2. pag. 969. Uxore Dromedai, ibid. Ægr. 11. pag. 987. & in Pario lib. 3. Epidem. Ægr. 1. pag. 1093.* in quibus ſtillicidium ſanguinis letale fuit obſervatum. Atque hæc de prædictione ab excretionibus ſanguinis in morbis acutis.

CAP. V.

De prædictione ex ſudoribus, & primo quid ſudor, quotuplexque ſit, & de ipſius cauſis.

QUum non minus frequenter morbi ſudoribus judicari ſoleant, idcirco ab ipſis etiam, quomodo ægrotantium ſalus ac mors prædici queat, accuratius nunc eſt cognoſcendum. Quod ut facile & certe conſequi poſſimus, primum, quid ſudor ſit, & quot ſudorum exſtent differentiæ, explicabimus, atque de ipſorum cauſis; ut ſudorum quoque generatio nobis innoteſcat, agemus. Sudare vero eos dicimus, qui humorem per meatus cutis, actu humidum, excernunt; ad differentiam perſpirationum, ſeu vaporationum, quæ per eoſdem meatus fiunt. Medici has inſenſibiles vacuationes vocant, quod ſenſibus quidem non pateant. Ex quibus ſudor erit particularis evacuatio ſenſibilis, per poros cutis meatuſve facta. Plures vero ſudorum obſervantur differentiæ. Quæ deſumuntur ab ipſorum *ſubſtantia*, ex qua alii craſſi viſcidique exeunt, alii tenues ſine ullo lentore. Ex *figura*, quando, alii teſte Hippocr. *prognoſt. pag. 28. lin. 26.* milii formis ſpectentur, alii perinde guttæ fiant. *Colore*, quum alii flavi, alii virides; neceſſe erit ſudores eo colore ſpectari, quo humores, qui per cutim vacuantur, infecti ſunt. *Sapore*, ſiquidem omnes, teſte Galen. *in libr. 10. ſimpl. cap. de Sudore*, ſalſi, & ſubamari ſint, quibus quidem ſaporibus humores, qui vacuantur, referti ſunt. *Odore*, quum quidam fœtidi, quidam ſine fœtore exeant: & *copia*, nam quidam multi, alii pauci apparent, aliique ſtatim, quum inceperint, deſinunt. Ex *qualitatibus* item *activis*, quum omnes aut calidi ſint, aut frigidi, aut medii. *A tempore* etiam, in quo apparent, ſuas habent differentias, quando alii in principiis morborum, alii in ſtatu, & alii in declinatione prodeunt: & a *tempore*, quo durant, ſunt alii aſſidui ſive continui, alii interpolati. Quorum quidam apparent cum ſignis coctionis, quidam cum ſignis cruditatis; & quidam ſunt decretorii ſive judicatorii, quod judicent ægros; quidam ſymptomatici, quippe quod per modum ſymptomatum fiunt, & quidam periodici, quales in febribus tertianis & quartanis fiunt, atque hæ ſudorum differentiæ nobis ſufficiunt. Nunc de ipſorum generatione agamus, quam quum duo præſertim abſolvant, quippe materia ex qua, & efficiens: de his duobus itaque nunc agamus. Materiam ſudorum, & urinarum eamdem eſſe ſcribit Galen. *in libr. 10. ſimpl. cap. de Sudore*: in ſaniſque eſſe humorem ebibitum, ſed magis elaboratum, utpote qui ad cutem uſque, per meatus omnes, qui interſunt partibus,

Sudor quid.

Sudorum differentiæ.

Materia.

perveniat. Ex quo conſtat eſſe tenuiorem hujuſmodi alimenti partem, quam ſerum humorum appellant, ſeu ichorem, ſed nonnihil bilioſæ ſubſtantiæ adeptum, qui ſua tenuitate facile per poros cutis excludi a corpore poteſt; veluti craſſus humor ineptus ad ſudoris generationem videtur: atque hæc eſt ſudoris materia in ſanis. Hinc multos ſudores habent, qui copioſiori quum potu tum cibo utuntur, & corpora plethorica, quæ raros cutis meatus obtinent, non minus, & qui in jecore ac liene plurimum humorem habent. Hinc Hipocrates dicit in 4. *Aphoriſm.* 41. *Sudor multus ex ſomno factus abque cauſa manifeſta, corpus uti pluri cibo ſignificat. Si vero cibum non accipienti hoc accidat, ſcire opportet, quod evacuatione corpus indiget.* Ex quo in ſanis materia ſudoris erit, aut, ut dictum eſt, pars tenuior humidi alimenti, aut humor redundans in corpore. In ægrotis vero aliquando eſt humiditas alimenti humidioris, quæ ſane in iis obſervabitur, qui minime recta vivendi ratione uſi ſunt; plerumque vero ab humoribus tenuioribus redundantibus, quippe ſanguine, bile flava, ac pituitoſo quoque humore frigido. Atque hinc Galen. *in lib. 3. de criſibus cap. 3.* ſcripſit, ſudores omnium febrium eſſe proprios, & prçcipue ardentium, ſemitertianaſque, quotidianas, & quartanas judicare non parumque juvare efferventes, inflammationes, parotidas, lethargos, reliquoſque omnes capitis affectus; quod omnes tum calidi, tum frigidi humores, qui tamen ſunt tenues, ſudores concitare poſſunt, ſeu per ſudorem propelli, ipſorumque omnium maxime putres, quum tenuiores ſint, & facilius fluant. Demum aliquando (quod nonniſi in perniciosis affectibus fit) humiditas partium ſolidarum alimentalis, quam Medici humidum nativum appellant, quo nativus calor conſervetur, per cutis meatus colliquata, & diſcuſſa exit. Atque hçc eſt ſudorum omnis materia.

Cauſa. Sudorem vero efficit calor ipſe, vel naturalis, vel præter naturam in corpore exiſtens: humorem enim attenuat, ſecumque ducit ad cutem, ex quo corpora, ubi incaleſcunt, in ſudorem incidunt, atque hinc eſt, quod in continuis febribus, a rigore, quem ſequitur calor maximus, corpora in ſudores ſoleant erumpere: dum enim ipſa rigore vexantur, calor intus retractus, poſtea (ſi fortis eſt) foras erumpit, diffuſuſque per totum corpus, humores extenuat, ac fere in vapores mutatus, ſecumque ipſos ad cutim ducens, ſudorem facit. Hippocrates *in primo Prognoſticorum pag. 38. lin. 28. & ſeq. text. 26.* ait: *aliquos fieri aut ob corporum exſolutionem, atque alios ob inflammationis vehementiam.* Ob corporum exſolutionem non ſimpliciter ſudorem, ſed paucum ſudorem, ſeu madorem potius quemdam, quem ἱδρῶσιν Græci vocant (deſudationem Galen. vocat) fieri, aut in toto corpore, ut docet Gal. *in lib. 3. Prorrheticorum, Comm. 33.* aut in capite, atque thorace, facultatiſque retentricis imbecillitatem, vel humorum copiam, in ſudantibus partibus præmonſtrare: ob vehementiam itidem inflammationis fieri deſudationes, aut naturam opprimentem, aut reſolventem, aut, quod inflammationis incendio humiditatis copiæ extenuatæ humidior pars reſidet ad cutem. Quare ſudorum generationem fieri ex calore, humorem tenuem, qui ſerum ſeu ichor eſt ſanguinis, ab humiditate cibi potuſque profectum, aut ſanguinem, aut bilem, aut pituitam, extenuante, ac in vaporem mutante. In febribus, quas Græci *Elodes*, noſtri ſudorificas vocant, ſudor proprium eſt ſymptoma, in quibus ſuppreſſa vis humoris, concepto intus incendio, in perpetuum vaporem, & ſudorem reſolvitur. Deſudationes vero, quæ ſunt, teſte Galeno, pauci ſudores ſeu madores, nihil conferentes, aut in toto corpore, aut melius in ſuperis partibus apparentes, aliam cauſam habent, uti dictum eſt, quippe ut ait Hipp. *Prognoſt. pag. 28. lin. 28.* ob corporum exſolutionem, aut inflammationis vehementiam, aut, ut Galeno placuit, ob facultatis retentricis reſolutionem, quæ nedum redundantem humorem excre-

Deſudationes quid.

menti-

mentitium, ſed vel etiam alimentarium ex ſolidis partibus, foras reſudare ſinit. Sed age his præmiſſis, ad prædictionem e ſudoribus cognoſcendam, deſcendamus, quam primum a bonis ſalutaribus perſcrutabimur.

CAP. VI.

De bonis ſalutaribuſque ſudoribus, ſalutem in ægrotis prænuntiantibus.

Sudores boni quomodo a malis diſtinguuntur.

SÆPIUS fit, quod homines, acutis morbis vexati, bonis ſudoribus, large & critice erumpentibus, liberentur, & merito; quum per ſudorem, teſte Galeno, *in lib. art. med. text.* 99. univerſum corpus evacuetur. Hujuſmodi vero ſudores his notis; ab his, qui ſalutares non ſunt, diſtinguentur; quippe primo, quod hi, morbo concocto, cumque ſignis coctionis, manifeſte appareant, ut docuit Galen. *in* 1. *libr. de Criſibus cap.* 7. quod decernentia in melius non ſtatim, ſed vel in augmento, vel in ſtatu, quo tempore morbum vel plane concoxit, vel quum partim concoxerit, reliquum pergit alterare. Atque hæc eſt bonorum ſudorum non ſpernenda nota, ſine qua ſudores, nequaquam utiles, longos morbos, labores, recidivas, aut ipſos morbos criſi neutiquam ſolutum iri, aut exitium, teſte Hippocr. *in* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag*, 945. *lit. E.* prænuntiant: qui vero poſt coctionem apparent, criſis celeritatem, ſalutiſque ſecuritatem ſignificant: crudi vero & incocti, & in malos abſceſſus converſi vel judicii fruſtrationem, vel dolores, vel diuturnitatem, vel mortem, vel eorumdem malum reditum denuntiant. Sudores itaque ad hoc, ut ſalutares ſint, neceſſario debebunt poſt ſigna coctionis conſpici.

Optimi ſi cum ſignis coctionis appareant.

Si in die aliquo decretorio erumpant.

Secunda nota erit, ut in die aliquo decretorio erumpant, de quibus Hippocrat. *in lib.* 4. *Aphoriſm.* 36. ita ſcripſit: *Sudores febricitantibus ſi inceperint, boni ſunt tertio die & quinto, & ſeptimo, & nono, & undecimo, & decimo quarto, & decimo ſeptimo, & vigeſimo, & vigeſimo ſeptimo, & trigeſimo quarto. Hi enim ſudores judicant morbos: Qui vero non ita fiunt, laborem, & morbi longitudinem, & recidivas ſignificant.* Galen. in comm. ait, quartum diem Hippocratem vel præteriiſſe, quoniam plures morbi peracuti, quod acceſſiones habeant diebus imparibus, & criſes una in acceſſionum tempus incidant; vel ab aliquo quartum diem omiſſum negligenter fuiſſe. Nos vero divinum Hippoc. ſæpe ſumus admirati, quum quarta die optimos ſudores non ſæpius obſervaverimus.

Si criticum aliquem rigorem ſequantur.

Tertia nota erit, quod ſudores criticum aliquem rigorem ſequantur: natura ſiquidem, quum e venis tenues acutoſque humores detrudit, rigorem vehementem, iiſdem humoribus, extra venas in ambitum corporis propulſis, per carneas ſenſiles partes diſcurrentibus, ac ipſas vellicantibus, ut docet Gal. *in lib. de rig. convulſ. & palpit.* concitat, cum extremarum partium refrigeratione; quæ natura ubi fortis ſeu robuſta eſt, a rigore vehementi, & frigiditate, calore quidem foras erumpente, febris acuta & magna excitatur, cujus calore humores extenuati in ſudorem copioſum reſolvuntur: & propterea Hipp. *in Epidem. lib.* 1. *Epidem. pag.* 982. *Ægr.* 6. *in hiſtoria Cleonactidis*, optimos ſudores a rigoribus ſubſecutos notans, dicebat: *rigor, acuta febris, ſudavit.* Uti in *muliere decumbente in litore*, de qua *ibidem Ægr.* 13. *pag.* 990. *Undecimo ſuperriguit, igni eſt correpta, ſudavit, febre eſt liberata*: & de *Charione: lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 5. *pag.* 1072. *Decimo ſuperriguit, febris acuta, ſudavit, febre eſt decretorie liberatus.* Qua ratione, ut nos alibi docuimus, Hipp.

in lib. 4. Aphorism. 58. dixit : *Si ardente febre laboranti rigor superveniat, morbi fit solutio*: quod ab his rigoribus subsequantur, (ut docet Galen.) boni sudores, aut aliæ vacuationes. Quare sudores sequi rigores, optimum est: & propterea Galen. *in lib. 9. de Crisib. cap. 3.* dixit : *eos, qui rigent, optime sudare*; & Idem *in 1. Prorrhet. com. 13.* ait: *sudores, qui rigores consequuntur, boni existunt, si una cum coctionis signis appareant*. De quibus Hipp. *in 1. Epidem. 2. pag. 951. inter lit. E. & F. text. 64.* ita meminit: *Plurimi igitur ægrorum circa judicium rigebant, potissimum ii, quibus sanguis non erupisset. Qui quidem postea subriguerunt, ac exsudarunt.*

Si copiosi ex toto corpore erumpant.

Quarta conditio est, ut copiosi sint, & calidi, atque ex toto corpore erumpant; quippe qui facultatem robustam denotant, quum æque per omnes partes corporis calorem diffundat, ipsosque supervacuos humores in sudorem digerat, ac æque per omnes partes resolvat: quod ei quidem prælanguidæ non succedit, aut quum maligno morbo laborat. Sudores enim tunc inæqualiter evacuantur, in quibusdam partibus plus, in quibusdam parum, vel nihil. Quare copiosi sunt optimi sudores, si ex toto corpore erumpant, calidi, veluti qui in capite tantum aut thorace, aut in toto corpore pauci, aut frigidi, pessimi & pernicioſi existunt, ut sequenti capite demonstrabimus, quod Hipp. *in 3. Epidem. Ægr. 6. pag. 1102. text. 77.* sæpius annotavit, particulatimque *in Plericle*, de quo scribit: *Quarto circa meridiem sudor prorupit toto corpore multus & calidus, sine febre judicatus est, neque rediit* : & de *Nicodemo, ibid. Ægr. 10. pag. 1108. Sudor ei toto corpore copiose calidus emanavit, sine febre judicatus est* : & de *muliere morosa, ibid. Ægr. 11. pag. 1108. Sub hanc noctem sudor multus toto corpore & calidus prorupit, liberata febre dormivit*: & *de virgine Lariſſæ, ibidem Ægr. 12. pag. 1110. Inhorruit ac mox sudavit toto corpore multum, & calidum, sine febre judicata.*

Si cum guttis evaporant, ex toto corpore calidi & multi.

Quinta conditio optima quoque est, ut ait Hipp. *in Prognost. pag. 38. lin. 17. & 28.* quod *cum guttis evaporat*, ut dictum est, ex toto corpore calidus, & multus.

Si febrem integre solvant.

Demum sudorum optimorum notam esse singularem, docet Hippocr. *Prognost. pag. 38. lin. 15.* loco citato, ut *per sudorem integre febris solvatur*: propterea *in Epidem.* Hippocrat. notans criticos optimosque sudores perpetuo dixit *febre liber*, aut *sine febre judicatus*, aut *febris cessavit*; quod febrem tolli integre sit certissimum indicium sudoris optimi, & saluberrimi. Ceterum boni quoque sunt, teste Hipp. *Prog. pag. 38. lin. 17.* sudores, qui, ut diximus, *copiosi ex toto corpore prodeuntes*, ni febrem integre tollunt, *faciunt*, ut *ægri facilius morbum ferant*, quoniam morbum allevant, symptomata minuentes. At hi ab optimis differunt, quoniam non perfecte judicant, etsi salutem prænuntient, nonnisi longo tempore futuram. Quos Hipp. in multis observavit, sed præsertim in illo, *qui in Dealcis horto decumbebat*, de quo ait : *libro 3. Epid. Ægr. 3. pag. 1066. Decimo septimo extrema frigida, coopertebatur, acuta febris, toto corpore sudavit, allevatus est, melius sapiebat, non tamen febre liber, & vigesimo dormivit, plane mente constabat, sudavit, liber erat a febre, non sitiebat, quæ postea rediit, qui nonnisi die quadragesimo, cum alvi subcrebra pituitosa dejectione, cum multo sudore ex toto corpore, absolute est judicatus*. Atque hæ notæ sunt optimorum sudorum criticorum, quas his tantum Hipp. *Prognost. pag. 38 lin. 15. & seq.* verbis est complexus, ita dicens: *Sudores autem optimi sunt per omnes acutos morbos, si per diem eveniunt decretorium, & integre sedant febrem. Boni etiam sunt, si ex toto corpore prodeant, faciantque, ut æger ferat facilius morbum; si vero nihil tale efficiunt, nequaquam utiles sunt.* Neque hisce notis optimos sudores cognoscemus solum, sed non minus etiam, si una signa optima alia illuxerint, veluti bona hæmorrhagia, aut alia evacuatio, & uti dictum est, si ægri ab ipsis melius se habuerint. Cujus-

Sudores quandoque etiam boni.

modi

modi ſudores Hipp. *in Epidemiis* in multis vidiſſe ſcripſit, ſed præſertim in *Cleonatide*, *lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 6. *pag.* 982. *Metone*, *ibidem Ægr.* 7. *pag.* 983. *muliere quæ in litore habitabat*, *ibid. Ægr.* 13. *pag.* 990. *Melidia*, *ibid. Ægr.* 14. *pag.* 991. *in eo*, *qui in Dealcis horto*, *lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 3. *pag.* 1066. *Charione*, *ibid. Ægr.* 5. *pag.* 1072. *Pericle*, *ibid. Ægr.* 6. *pag.* 1102. *Virgine Abderæ*, *ibidem Ægr.* 7. *pag.* 1103. *Anaxione*, *ibid. Ægr.* 8. *pag.* 1104. *Nicodemo*, *ibidem Ægr.* 10. *pag.* 1108. *muliere moroſa*, *ibidem Ægr.* 11. *pagin.* 1108. *virgine Lariſſæ*, *ibidem Ægr.* 12. *pag.* 1110. & in aliis multis, in quibus ſtudioſus lector poterit prædictas optimorum notas recognoſcere, & in cognoſcendis ſudoribus ſalutaribus ſeipſum exercere.

CAP. VII.

De malis pernicialibuſque ſudoribus exitium portendentibus.

Sudores quinam modice mali.

MALOS ſudores in morbis acutis, at modice quidem malos eſſe, Hippocrat. *in lib. Prognoſtic. pagin.* 38. *lin.* 20. *& ſeq.* docet, qui neque integre febrem adimunt, ſed neque etiam faciunt, ut ægri facilius morbum ferant, ideſt, nihil allevant ægrotos, etſi ex toto corpore prodeant: his pejores, qui nec ex toto corpore, nec faciunt, ut ægri facilius morbum ferant, ideſt nihil ipſos allevantes: graviores, qui graviorem exhibent morbum, peſſimoſque frigidos, & qui circa caput tantummodo eveniant, vultum, & cervicem. Hos enim in acuta febre, mortem, & cum mitiore, longitudinem indicare tradidit. Sed omnes ſudores malos diverſis capitibus complectamur, eoſque accuratius ad accuratiorem præſagiendi notitiam aſſequendam conſideremus. Primo itaque conſiderabimus omnes, qui crudo morbo, minimeque ſignis coctionis manifeſtis apparentibus, erumpunt; ſecundo de malis ex ipſorum quantitate multa vel pauca agamus; tertio ex caliditate & frigiditate; quarto ex partibus corporis a quibus exeunt; quinto ab ægrotantium nulla allevatione, aut læſione; atque demum ex malis ſignis una obſervatis. Ut vero primum caput examinemus, & cognoſcamus, diſtinguimus ſudorem, in periodicum, criticum, atque ſymptomaticum. Periodicum eſſe dicimus, qui in febrium intermitentium periodis fit, cujuſmodi fiunt, in febribus tertianis, quartanis. Cujuſmodi fuiſſe narrat Hippocr. *in lib.* 7. *Epidem. pag.* 1207. *text.* 4. in *Pythodoro*. Criticus, de quo ſuperiori capite egimus, qui in febribus continuis, in aliquo dierum decretoriorum apparens, integre febrem tollit, aut eam diminuit, ægrotoſque allevat. Cujus effectum criſin appellamus, ſeu judicium, aut perfectum aut imperfectum. Criticorum ſudorum notas ſuperius diximus eſſe, quod antegreſſis coctionis manifeſtæ ſignis appareant, in die critico, vigere natura, ac qui ex toto corpore exeunt calidi, multi, non tamen vires reſolventes, atque febrem & ſymptomata reſolventes, aut plurimum minuentes. Symptomaticus vero critico opponitur, quod per modum ſymptomatis fiat, numquamque utilis, plerumque cum exitialibus ſignis, mortem præmonſtrans, aut ſaltem morbum fore longum, cum multis recidivis atque non abſque labore, & moleſtia. Hos itaque ſymptomaticos alias omnes fecimus, tum ceteras alias excretiones, crudo morbo erumpentes, ſcilicet in tempore, quo nulla ſigna coctionis manifeſtæ illuxerint. Tunc enim temporis quamobrem fiat, quod omnis excretio in continuis febribus ſit mala, ſatis accurate in principio proximi libri, cum de prædictione a concoctione, & cruditate, atque ab excretione ſcripſerimus, demonſtravimus. Quamobrem mali omnes ſudores apparent, morbo crudo exiſtente, nulloque manifeſto ſigno co-

Quinam peſſimi.

Sudorum diſtinctio.

In periodicum.

Criticum.

Symptomaticum.

Sudores omnes mali quando apparent.

ctionis antegreſſo: in principio ideo ſudores apparentes ſcripſit Hippocr. *in 2. Epidem. ſect. prima pag. 994. prope lit. E. text. 2.* morbum judicatu difficilem ſignificare; quod ſi hujuſmodi ſudores, vel tantum in capite, vultu, cervice, aut in collo, aut in thorace ſpectentur, eo pejores; aut ſi frigidi ſunt, aut exigui, aut ſtatim ceſſantes, aut multi, aſſidui, immoderati, peſſimi. Sed nunc de pernicialibus a copia vel multa, vel pauca, aut a non ſudantibus, agamus. Multi & copioſi ſudores vocantur, & qui confertim largiſſime erumpunt, & qui ſunt aſſidui, & qui & aſſidui, & copioſi: copioſos ſudores Galen. *in 3. de ſympt. cauſſis cap. 2.* dixit fieri, aut propter corporis raritatem, aut propter ejus, quod vacuatur, tenuitatem. Hi, & qui ob raritatem effluunt, non confertim, ſed aſſidue affluere ſolent. Quare in febribus multi ſudores, ſi neque propter tenuitatem, neque propter raritatem fiant, (nam hi teſte Galen. *in 4. Aphor. 41.* non ſunt copioſi,) perpetuo copiam humorum denotant, uti docuit Galen. *in libr. 4. Aphoriſm. 42.* Atque hinc eſt quod Hippocrat. *in eodem libr. Aphoriſm. 42.* ait: *Sudor multus ex ſomno ſine ulla alia cauſſa eveniens, corpus uti pluri cibo ſignificat; ſi vero cibum non capienti accidat, evacuatione egere ſignificat.* Multumque ſudorem, & Galen. dixit, copiam excrementorum denotare. Hi itaque in febribus conſpecti, non judicantes, mali perpetuo propter eam cauſam erunt, quippe quod multitudinem humorum ſuperandam denotent, pro qua natura longo tempore opus habet, ut concoquere & ſuperare queat; quo fit, ut non raro in acutis morbis, quibus natura brevi exſtinguitur, mortem præſagiant. Hinc Hippocrat. ait *in eodem libr. Aphoriſm. 42. Sudor multus, frigidus, caliduſve, ſemper fluens, frigidus graviorem; calidus minorem morbum ſignificat.* Quod ut Galen. *in comment.* ait, uterque copiam humorum ſignificet, quippe frigidus frigidorum, qui eſt pejor, calidus calidorum, qui priore minus eſt periculoſus. Hi enim neque febrem ſolvunt, neque allevant, crudoque, uti dictum eſt, morbo erumpunt, ideo longitudinem ſaltem, recidivas, atque laborem ſignificant: Auctor *Prorrhet. lib. 1. text. 58.* hos in acutis febribus inutiles vocat, de quibus Hippocr. *in 1. Epidem. ſect. 2. p. 945. lit. E.* ſcripſit. *Sudores multi, his tantum aberat, ut recrearent, ut etiam contra læderent.* Qui vero non copioſi; ſed tamen aſſidui ſeu continui ſunt, mali etiam exiſtunt, & plerumque exitiales, quando, aut propter corporis meatuum raritatem, aut propter virium imbecillitatem, quippe ſoluto corporis habitu, quales in ſyncope exeunt, fiant, ut Galen. quum *in lib. 3. ſympt. cap. 1. comm. 41.* tum in *41. lib. 4. Aphor.* docuit: *Nam ſi copioſus ſudor non emittatur, poterit & propter virium imbecillitatem, & corporis raritatem accidere &c.* Qui omnes in acutis morbis perniciales exiſtunt, quum naturæ languorem denotent: peſſimi vero, qui una etiam copioſi ſunt, quum & ſummam virium debilitatem & inſignem copiam humorum adeſſe oſtentant. Quibus inevitabile fatum prædicendum: Quales in *Eraſino, l. 1. Epid. p. 984. Ægr. 8.* & in *phrenitico l. 3. Epid. Ægr. 4. p. 1100.* Hipp. vidit de illo ait: *Habebat hic febrem perpetuo cum ſudore.* Et de *phrenitico* ait: *Virulenta vomuit, febris horrida, copioſus ſudor, aſſiduus toto corpore.* Alii ex aliis codicibus legunt, non ut Galen. ſed hoc modo, *ſudor multus & continuus capitis, & colli, per totum ſcilicet diem*, quum ii, qui animo linquuntur, ſudent capite, & cervice, ſed hoc non facit, ut cum Galeno *toto copore* non debeamus legere; quum cuique Medico notum ſit, phreniticos ante mortem toto corpore dum reſolvuntur, ſudare: atque ex his colligimus, ſudores copioſos in acutis morbis, non judicatorios, non ſolum inutiles eſſe, ſed plerumque letales, omniumque certiſſime exitium præmonſtrant in foribus, qui una cum virium languore fiunt. Pernicioſi itidem ſunt, aſſidui, aut ſimul copioſi, aut etiam non copioſi in iiſdem acutis morbis. Pauci quoque ſudores non minus,

Sudores perniciales unde cognoſcuntur.

A copia multa non judicante morbum.

Si non copioſi ſed aſſidui.

Si aſſidui, aut ſimul copioſi aut non copioſi.

nus, quam multi, malum prænuntiare solent Galen. *in lib. 3. de symptom. caussſ. cap.* 2. scribit, paucos sudores fieri, quum, quod superfluit, exiguum est, vel glutinosum, & crassum, aut denique propter meatuum angustiam, qui aut conniventiæ aut obstructionis ergo angustiores redduntur, obstruuntur vero glutinosis, & crassis succis, & meatus cutanei connivent sive contrahuntur, aut propter atrophiam, aut refrigerationem, aut mollitiem. Hi sudores quippe pauci, si in die decretorio eruperint, proculdubio indicabunt naturæ expellentis conatum irritum, cumque humores non posse expellere, aut crassitie seu lentore, aut meatibus angustioribus redditis: at uti meatus adstricti non sunt (quod cognoscitur, neque atrophia cutim contractam esse, neque multum fuisse refrigeratam, neque admodum mollem, vel obstructos esse meatus) atque illa adfuerint multitudinis humorum signa, pauci sudores copiam crassorum lentorumque humorum denotabunt; quod si tunc vires perdebiles fuerint, sudores erunt exitiales, quippe exitium demonstrantes, eoque magis, ut dictum est, si nullis conspectis signis coctionis eruperint. Quo tempore omnem excretionem esse symptomaticam, atque humorum multitudinem denotare, alias a nobis est demonstratum. Hujusmodi enim sudores significant naturam cœpisse expellere per cutim humores, at nisi tenuiorem ipsorum portionem potuisse; quæ solvendo morbo satis esse nequit. Hujusmodi esse solent, quod, quum cœperint, erumpere statim desinunt. Quos merito Galeno *in* 1. *Prorrhetic. comm.* 1. damnavit, dicens: *Sudores quoque, qui cœperunt quidem, sed protinus cessaverunt, pravi sunt.* Quare paucus sudor perpetuo malus. Omnium vero pessimum, ac maxime exitialem, paucum illum sudorem, quem Græci ἐφίδρωσιν appellant, nostri desudationem seu madorem, affirmamus; in ægrotis enim exit aliquando ex toto corpore; plerumque circa caput, cervicem, collum, pectus, & aliquando circa extrema, de quo Galeno *in* 3. *Prorrhetic. comm.* 33. ita habet: ἐφίδρωσις, *ideſt desudationem, jam sæpius quidem in hoc scripsit libro, sed nusquam ita lucide cognoscimus, numquid sudores, circa thoracem caputque apparentes, ita appellet, an eos, qui toto emanant corpore, ubi tum pauci, tum nihil conferentes sint*: pravum autem utrumque horum est; deterius autem, quod in superis fit partibus: nempe quum omnis desudatio demonstret vel copiam in sudantibus partibus, vel facultatis retentricis imbecillitatem; utrumque eorum, in locis tum thoracis tum capitis fuerit, deterius est signum; quam si in alia quapiam parte fuerit. De illorum, qui copiam humorum ostendunt, judicio satis nuper diximus. Nos vero perniciales esse affirmamus, quum a prælanguente natura fiunt, vel etiam humidum alimentarium solidarum partium, oppressione, aut resolutione discussum, retinere nequeunt. Distinguunt has desudationes ab iis, quæ multitudine humorum fiunt, quod plerumque circa frontem, cervicem, collum aut pectus, aut circa extrema effluant, exiguusque sit mador, non augescens, raro calidus, plerumque subfrigidus, pulsus prælanguidi, & alia signa, naturam prælanguentem denotantia, una adsint; hujusmodi sunt, quod ab immoderatis vacuationibus fiunt, de quibus *in* 3. *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 126. legitur: *A profluvio sanguinis e naribus paucus sudor cum refrigeratione, malum.* Sed quid? an *non sudare* in quibusdam etiam morbis malum est? certe quidem in omnibus morbis, quos judicare sudores Galeno *in libro tertio de Crisibus* docuit, quippe in febribus omnibus continuis, maximeque in ardentibus, quas judicari absque sudore, aut absque alia proba vacuatione, exindeque febres aut integre tolli, aut ipsas cum symptomate diminui, ægrotosque in melius mutari, infidam esse morbi remissionem, Galen. *in* 3. *Epidemior. comm.* 1. *text.* ostendit, Hippocrate *in Aphorism. sect.* 2. *Aphorism.* 27. scribente: *Iis, quæ non secundum rationem*

Pauci quinam mali. Si in die decretorio erumpant.

Sudor ille omnium pessimus desudatio vocatur.

Desudatio quid notat.

Quæ ab imbecillitate oritur quando distinguitur ab ea quæ a multitudine humorum.

Sudores nulli in morbis apparentes quando malum.

relevant, non esse habendam fidem. Quod in *Hermocrate*, *lib. 3. Epidemior. Ægr. 2. pag.* 1062. in *filia Euryanactis Virgine*, *ibidem Ægr. 6. pag.* 1073. moribundis vidit; de illo ita habet: *Quartodecimo die a febre erat liber, non sudavit, dormivit omnino, mente constabat. Urinæ eædem, circa diem septimum decimum rediit, in sequentibus diebus incaluit, febris erat acuta, urinæ tenues, deliravit: iterum vigesimo die est judicatus a febre liber, non sudavit.* Hujusmodi vero infidas morborum remissiones, sine sudore, aut alia proba vacuatione factas, signa, quæ subsequentur, mala a fidelibus distinguent, quando fideles optima, & infidas prava sequuntur, cujusmodi fuerunt, quę in *Hermocrate* post judicium subsecuta sunt. Nam dixit: *Iterum vigesimo die est judicatus a febre liber, non sudavit, perpetuo a cibo horrebat, omnino mente constabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non sitiebat, obdormiscebat aliquantisper comatosus.* Atque ita quandoque ex *non sudore* in febribus ardentibus exitium poterimus animadvertere. Restat, ut idem a sudoribus frigidis perscrutemur, quum sæpius in acutis morbis exitiales observentur. Sed ipsorum in primis generationem atque causas perspectas habere debemus: quod plurimum claritatis ab hisce sudoribus ratio prædicendi habere possit. Primum sudores, quod ex frigida crudaque materia fiant, propterea in febribus continuis crudorum humorum multitudinem ostendunt, ut Gal. *in lib. 4. Aphoris.* 42. demonstravit, præsertim ubi copiosius erumpunt. Hos Galen. *in 4. Aphor.* 37. docet, *fieri, ubi in vasis humores putrescant, & natura, solidas partes moderans, & regens (quæ secundum Hipp. est nativus calor) vel prorsus exstinguatur, vel propius ad exstinctionem accedat: quæ quidem ex iis evacuantur, frigida sentiuntur; eam vero, quæ fit ex putredine, caliditatem nihil prohibet vehementissimam esse, atque ideo signum est exitiale, ostendens in animali corpore humorum multitudinem superabundare, tantam habentium frigiditatem, ut neque a calore nativo, neque a febrili calefiant.* Ex quibus sudores frigidos primum multitudinem humorum frigidissimorum ostendere, atque naturam vel exstingui, vel propius accedere, ut exstinguatur. At quando istuc, quippe in vasis vehementissimum calorem ex putredine, tum nativum intus retractum; sunt extremorum refrigerationes, cum humore frigidissimo, absque quod in se mutuo agant; quod si agant, necesse erit, aut frigidum sudorem calefieri, aut ab ipso calorem prorsus exstingui, quod certe observatur, quando uti habet Galen. *in 4. Aphorism. 37. si morbis non acutis, sed mitioribus longo tempore calor naturalis non exstinctus ipsum calefaciat, & in vehementi, cito viribus resolutis, prorsus exstinguatur.* Hinc merito Hipp. *in eod. lib. Aphoris. 37.* dixit: *Frigidi sudores cum febre quidem acuta mortem, cum mitiore vero morbi longitudinem significant;* quippe quod, ut ait Gal. *si febris fuerit remissior, poterit homo servari, concocta scilicet longiore tempore humorum multitudine, atque evicta a natura. At acuta febris, & causa est, & signum pernicioſissimum: ac causa quidem, quando suapte natura resolvat corpora: signum vero, quia humorum multitudinem ostendit, quæ frigidissima est, quum nec a febrili calore mutetur.* Sed forte humores ii frigidi & idcirco ad motum inepti, una cum natura prę-languida, & propius ad exstinctionem accedente, quomodo ad cutem ferentur? hac inquam ratione: humor enim a calore febrili aliquatenus calefactus, etsi suapte natura moveri nequeat, fertur ad cutim, in qua, aut adventitio calore susceptо resoluto, rursus frigescit, atque ita frigidus exit. Itaque in morbis acutis perpetuo frigidi sudores exitium ostendunt, quomodocumque erumpant, aut copiosi, aut pauci, aut ex toto corpore, aut ex capite, collo, & pectore, aut ab extremis. Cujusmodi fuere ab Hippocrate observati in *Philisco, lib. 1. Epid. Ægr. 1. pag. 966.* in *uxore Dromedai, ibid. Ægr. 11. pag.* 987. in *muliere, lib. 3. Epidem. Ægr. 12. pag.* 1080. quæ in *foro mendacium* decumbebat, in *Pythione, ibi. Ægr. 3. p.* 1098. in quibus moribundis ex toto corpore

Sudores frigidi quid notant & unde.

In morbis acutis perpetuo exitium.

sudores

ſudores frigidi profluxerunt. Exitialiores etiam ſunt pauci frigidi, aut circa caput, aut circa extrema, ſcilicet manus, & pedes, qui prorſus facultate extinctioni proxima fiunt. De quibus Hippocr. *in Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 21. merito dixit: *Peſſimi vero, qui frigidi ſunt, in acutiſque morbis mortem, & in mitioribus morbi longitudinem indicant.* Itaque perpetuo frigidi ſudores mali exiſtunt. Quales Hippocr. in poſtrema conſtitutione peſtilenti vidit, de quibus *in libr.* 3. *Epidem. pag.* 1089. *litt. E.* dixit: *Sudores intempeſtivi, frigidi, multi, perpetuo.* Ipſorum perniciem confirmabunt omnia ſigna una conſpecta, quæ omnia neceſſario, & præſertim quæ ſubſequentur, erunt pernicialia. Cujuſmodi fuere quæ in *Philiſco* & in aliis ægrotis, nuper ex Hippocr. propoſitis, viſa ſunt. De *Philiſco Vide ſub lit. A.* ait: *Quintum ſub diem obmutuit, frigida ſudavit, extremæ partes liveſcebant, die ſexta ad meridiem eſt defunctus*: atque de hoc in fine dixit etiam: *Sudores perpetuo frigidi.* Et de *uxore Dromedai. Vide ſub lit. B. Sexto die mane ſuperriguit, cito percaluit, toto tempore ſudavit, extrema membra frigida, deliravit, ſpiritus magnus, rarus, paullo poſt convulſiones a capite cœperunt, ſubito obiit.* Et de *muliere libr.* 3. *Epid. Ægr.* 12. *pag.* 1080. quæ in *foro mendacium* decumbebat: *Septimo ſuperriguit, febris acuta, ſitis ingens, ſe jactavit, ſub veſperum per totum corpus ſudavit frigidum, frigus partium extremarum.* Ex quibus cuique liquido conſtabit, ſudores frigidos in morbis acutis eſſe exitiales, perpetuoque mortem præmonſtrare; eoque certius id prædici poterit a nobis, ſi in aliquo dierum criticorum eruperint, atque ipſos ſi aliquod ex perniciosis letalibuſque ſignis conſequatur. Atque hæc de ſudoribus frigidis exitialibus. Nunc eoſdem ex partibus corporis, e quibus erumpunt, conſideremus. Quemadmodum diximus optimos ac ſalutares eſſe, qui ex toto corpore erumpunt, quoniam robuſtam naturam demonſtrant, intuſque neque morbo maligno, neque cauſſis morbificis impeditam, æque ex omnibus partibus humorem excernere; ita e contrario, viſcere interno, aut vehementi inflammatione, aut humorum multitudine, oppreſſo, non æque omnes partes ſudant. Sudores itaque, qui non ex toto corpore erumpunt, ſed aut ex capite aut thorace, ut docet Hippocr. *in Prognoſticis, pag.* 38. *lin.* 21. *& ſeq.* peſſimi exiſtunt, in acutiſque morbis, vel frigidi, vel calidi ſint, mortem ſignificant, in mitioribus longitudinem, recidivas, labores. De quibus Hippocr. *in* 1. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 940. *lit. G.* ait: *Sudabant ſemper quidem, ſed non ex toto corpore.* Et paullo poſt *ſect.* 2. *pag.* 954. *lit. E.* recenſet ſigna, quibus ardentes febres, vel etiam in principio letales dignoſcebantur, quum dixit: *Paullulum in fronte & claviculis exſudabant, ſed nemo per totum corpus.* Hinc auctor Prorrheticorum *lib.* 1. *tex.* 39. ait: *Si qui ſudantes, & præſertim capite, in acutis paullulum implacidi fuerint, malum.* Omnes itaque ſudores non ex toto corpore, mali ſunt, ut qui aut mortem aut longitudinem morbi ſignificent, de quibus Hippocrat. merito ſcripſit *prognoſt. pag.* 38. *lin.* 21. *Peſſimi vero, qui frigidi ſunt, & qui circa caput tantummodo eveniunt, vultum & cervicem. Hi enim cum acuta febre, mortem: cum mitiore, morbi longitudinem indicant.* Veriſſimum hoc judicium eſt, quod Galen. *in lib.* 2. *Prorrhet. com.* 1. *text.* 24. docuit: *omnis deſudatio, ideſt, ſudor circa frontem, vel cervicem, vel collum, vel claviculas, erumpens, aut facultatis retentricis imbecillitatem, aut copiam humorum ſignificat.* Et Gal. *in* 1. *Pror. com.* 1. ait: *ob id boni non ſunt, quod quum ſuperioribus oriuntur partibus, tum geminam ob cauſſam fiunt; nempe vel ob languentem, vel principio gravatam facultatem.* Peſſimi etiam, qui in capite & ſuperius fiunt in interna ſuppuratione atque in phtiſi; de quibus auctor *Coac. præſ. in* 5. *l. ſ.* 2. *tex.* 402. *Qui ſuppurati fiunt maxime ex pleuritide vel peripneumonia, eos calores comitantur, interdiu tenues, noctu vehementes, & nihil memoratu dignum exſpuunt, ſudantque circa collum & claviculas, & his oculi cavantur,*

Sudores qui non ex toto corpore mali.

Quinam peſſimi.

maxil-

maxillæ vero rubent: meritoque in acuta febre mortem ſignificant, quum facultas extinguatur, priuſquam concoquere copiam queat humorum. Exſudantes vero facultate retentrice imbecilla, nequeunte continere humorem, vel etiam alimentarium in partibus ſolidis, cito a febre plane exitioſi, propiuſque exitium eſſe demonſtrant in morbo hujuſmodi; ſi vero etiam frigidi fuerint, eo certius exitium pollicentur, cujuſmodi fuere, qui in *Pythione*, *libr. 3. Epidem. Ægrot. 3. pag.* 1098. & in *muliere*, *ibidem Ægrot. 12. pag.* 1080. quæ in *foro mendacium* decumbebat, die ſecunda, *Metone*, *lib. 7. Epidemior. text. 47. pag.* 1220. *Ariſtocrate*, *ibidem text. 57. pag* 1222. *Phærecide ibidem text. 91. pag.* 1230. moribundis, atque in aliis multis. In morbo vero mitiore, viribus prævalidis exiſtentibus, longitudinem quidem, & non mortem. Cujuſmodi fuere in eo, qui in *Dealcis horto libr. 3. Epidem. pag.* 1066. *Ægr. 3.* decumbebat, de quo Hippocrates: *Die quarta de ſiniſtra aliquantum fluxit meri ſanguinis. Exſudavit circa caput*, & *claviculas*, *lien intumuit*, *femur e directo doluit*. Ex ægrotantium vero nulla alia vacuatione ſudores mali cognoſcuntur, atque etiam plus a læſione, quam a ſudoribus ægroti ſentiunt. Qui enim a ſudoribus nedum nihil juvantur, ſed vel etiam læduntur, hoc eſſe verum ex judicatoriis non judicantibus letale, ſcripſit Galen. *in primo Prorrheticorum comm.* 35. Hippocrateſque *in primo Prognoſticorum pagin. 38. lin.* 20. ſtatuit, eos ſudores, qui neque febrem ſolvunt, neque faciunt, ut ægri facilius ferant morbum, eſſe inutiles, atque malos, qui aut longum morbum oſtendunt, aut exitialem: & Auctor *Prorrheticorum lib. 1. text.* 58. dixit: *Sudor multus, ſi in febribus acutis fiat, inutilis*: quippe quod non ſolvat febrem. *Et in primo Prorrheticor. text. 7. Qui in hypochondrio febre refrigerata ardores relinquuntur, tum alias, tum in ſudoribus mali ſunt*: & Galen. *in Commento*: *Nempe non qui per totum corpus ita fiunt ſudores, ſed exigui, quod non flammeam illam, quæ hypochondria fatigat, ſolvunt caliditatem, ob id boni non ſunt*. Idem & poſtea *in Prorrheticorum lib. 1. text. 68. Si in ſudoribus vigiles recaleſcunt, malum*: & rurſus *ibidem text. 67. Flammans quoque cum ſudore facies in his mala*. Quum ſudor ſi bonus eſſet, calor faciei deberet reſolvi; propterea, quum non reſolvatur, ſudor malignitatem oſtendit. Idemque & clarius Hippocrat. *in libro quarto Aphoriſmorum. Aphoriſm. 56. Febricanti ſudor ſuperveniens, febre non deficiente, malum; prorogatur enim morbus*, & *plus humiditatis ineſſe ſignificat*. Qui ſudores in febre acuta mortem, & in mitiori longitudinem ſignificant. Mali omnes denique exiſtunt, qui aut poſt ſigna mala, aut una cum malis apparent, aut quos pernicioſa ſequuntur. Ex quibus præcognoſcitur certum exitium, quum ſudor, quem mala ſigna ſequantur, ſit ex judicatoriis non judicantibus letalibus, quum nedum non juvent, ſed in pejus ægrotos deducant. De his vero ſignis pernicioſis, quæ poſt ſudores malos, Hippocr. *in 1. Epidem. ſect. 1. pag.* 940. *lit. G.* ait: *Sudabant non ex toto corpore, extrema frigebant, ut vix calorem reciperent*: & auctor Prorrhetic. *lib. 1. text.* 126. *ex naribus profluvium ſanguinis, cum ſudore, perfrigeſcentia, maligna pravaque*: & paullo poſt: *ibidem text.* 102. *Qui principio ſudant urinis coctis, deurunturque*, & *abſque judicatione refrigerantur*, & *celeriter peruruntur, torpidi item comatoſique, pernicioſe habent*: & in *Coacis præſagiis text.* 40. *Qui ex rigoribus parvis ſudoribus refrigeſcunt, malum*. Qui ſudores fuere ab Hippocrat. obſervati in *Dromedai uxore*, *lib. 1. Epidemiorum Ægrot. 11. pag.* 987. *Euryanactis filia virgine*, *lib. 3. Epidemiorum Ægrot. 6. pag.* 1073. in *adoleſcentulo* qui decumbebat *in foro mendacium*, *ibidem Ægrot. 8. pag.* 1076. *in uxore Theodori*, *lib. 7. Epidemior. text. 27. pag.* 1216. *Ariſtocrate*, *ibidem text. 52. pagin.* 1222. atque in *uxore Euxenii*, *ibidem text. 58. pag.* 1224. De *Dromedai uxore*, *in* primo Epidem. text. 28. *Sexto ſuperriguit, cito percaluit, toto corpore ſudavit, extrema frigida, delira-*

Sudores illi mali qui nihil juvant.

Pernicioſi quos mala ſigna ſequuntur.

deliravit, ſpiritus magnus & rarus, paullo poſt convulſiones a capite cœperunt. Et de *filia Euryanactis in 3.* Epidemiorum 1. text. 3. ita habet: *Ab judicatione die ſeptimo riguit, nonnihil incaluit, ſudavit a judicatione octavo, aliquantulum riguit, poſtea extremæ partes ſemper algebant, circa decimum diem a ſudore quem habuerat, deliravit, confeſtimque ad mentem rediit.* Et de *adoleſcentulo*, qui in *foro mendacium* decumbebat: *Altero die omnia exacerbata ſunt, dejectiones plures intempeſtiviores, non dormivit, mente turbatus, aliquantum exſudavit. Tertio graviter ſeſe jactavit, perplexus erat, deliravit, extremæ partes lividæ & frigidæ.* Et de uxore *Theodori*: *Sudor a facie fundebat primum exiguus, deinde multus per totum corpus, & pedes; poſthac videbatur ipſi febris remiſſa, erat autem ad manus frigidius corpus arteriis, quæ vero in temporibus etiam magis ſaliebant, & ſpiritus denſior, & delirabat alias; & omnia in deterius.* Et de uxore Euxenii, *in 7. Epidemiorum tex. 46. Sedata eſt febris cum multo ſudore, & refrigerata eſt, anhelatio erat varia, mortua eſt.* Pernicioſos itaque eſſe omnes ſudores, quos ſequuntur ſigna pernicioſa, ex iis nobis liquido conſtabit. Sunt itidem pernicioſi, qui una cum pravis ſymptomatis, & ſignis exſudant. De his *in Coacis præſagiis, text. 10. Qui ſubinde ſudant & rigent, letales.* & poſtea, *text. 13. Qui ſæpius inhorreſcunt, multumque ſudant, ægre ſaneſcunt; & text. 53. Inquietatio cum ſudore, mala.* Et *text. 327. collat. Prorrheticorum libro primo text. 125. ſanguinis ad diverſum latus eruptiones, malæ, ut ſi, quum lien magnus fuerit, dextra e nare fluat. Cum ſudore deterius.* Et *text. 35. collat. Prorrheticorum libro primo tex. 74. febres cum comate, labore, lucis turbulentia, vigiliis & ſudoribus, malignæ.* Quæ mala ſigna habuit una cum ſudore *Ariſtocrates*, teſte Hippocrat. *in libro 7. Epidemiorum text. 52. pag. 1222.* Eodem modo ii ſudores mali exiſtunt, qui poſt peſſima ſymptomata erumpunt. De quibus Auctor *Prorrheticorum, libro primo text. 126.* ait: *A profluvio ſanguinis e naribus paucus ſudor, cum refrigeratione, malus.* Sed dicamus ab omni evacuatione, veluti exempli gratia, ab immoderato ſanguinis profluvio, aut a ſtillis ſanguinis in febribus ardentibus, aut ab alvi mala fluxione, ac vomitu. Quare ſudor ſequens mala ſigna, peſſimus eſt, & præſertim, ſi ea non tollat, vel allevet. Cujuſmodi fuit in *uxore Olympiadæ*, de qua Hippocr. *in 7. itidem Epidem. text. 49. pag. 1221.* ita habet: *Vox non ſolvebatur, neque ipſa quicquam allevabatur, oculi triſtes, ſpiritus ſublimis, qui per nares trahebatur, color pravus, ſudor circa pedes & crura, quum jam circa mortem eſſet.* Ac his eſto finis prædictionis ex ſudoribus.

Qui cum pravis ſignis apparent.

Vel poſt peſſima ſymptomata erumpunt.

CAP. VIII.

De prædictione a vomitibus, & primum de ſalutaribus.

QUOD per vomitus humores expurgentur quandoque bene, & quandoque male, idcirco ab ipſis itidem futuros morborum eventus prænoſci, conſtat; a malis quidem, ſymptomaticis vocatis, morborum longitudinem, vel mortem, & a bonis ſalutem. Evomunt autem ægroti in morbis acutis, ventriculo, aut copia, aut prava qualitate cibi, aut humoris vitioſi contenti, irritato; aut humore quidem ex partibus circumpoſitis inflammatis, uti hepar eſt, exſudante, atque ad excretionem id ipſum membrum movente, aut eodem modo a toto corpore, & venoſi generis cacochymia, morbo ineunte, aut per incrementa, propter copiam, aut malignitatem humorum excluſo. Quas excretiones *Symptomaticas*, & malas Medici vocant, quod has raro, aut nunquam ſalus ſequatur, atque nonniſi multo tempore, multis labo-

Vomitus in morbis acutis unde.

laboribus, ac recidivis. Demum in acutis morbis itidem ægroti repente, in ſtatu, aut paullo ante ſtatum, ſcilicet, ſignis concocti morbi prægreſſis, copioſius evomunt, atque hanc vomitionem *criticam* vocant, quod ex natura ipſa, morbum ſuperante, atque corpus expurgante, fiat, atque propterea ſaluberrima ſit, tutoque ac cito morbos judicet, atque ſolvat. Vomitus vero futuri ſigna Hippocr. *in tertio Prognoſticorum pag.* 45. *lin.* 54. *tex.* 35. ita tradidit: *Si cui in febre non exitioſa caput doleat, aut etiam caligent oculi, vel ventriculi huic dolor acceſſerit, bilioſa vomitio imminet; ſin rigor præterea apprehenderit, & partes ſubter hypochondrium algeant, adhuc citius vomitio aderit; ſi vero bibat, edat hoc tempore, perquam cito vomet.* Et *in* 1. lib. Epidem. *ſect.* 2. *pag.* 948. *ſub finem. At vero quibus totius capitis gravitates, tum autem cordis dolores & faſtidia ſunt, bilioſa poſt ac pituitoſa vomunt.* Galen. vero *in lib. de Criſibus* ait, vomituum ſigna eſſe oris ventriculi morſum, ſimul cum dolore capitis, & vertigines obortas tenebricoſas cum agitatione labii inferioris, & multo, tenui, ſputo ex ore defluente, & non adeſſe ſigna hæmorrhagiæ, vel ſudoris, aut alvi fluxus, aut copioſioris urinæ, menſium, vel hæmorrhoidarum. Sed Auctor *Coac. præſagiorum text.* 142. tribus tantum ſignis vomitus nobis innoteſcere, ſtatuit hiſce verbis: *Quibus autem cibi faſtidia ſunt, & oris ventriculi morſus, & multum ſalivæ, his vomitus fit.* In phreniticis ſolam crebram exſpuitionem vomitum præmonſtrare Galen. voluit. At hæc ſigna nobis ad prænoſcendum vomitum ſufficiunt, quum de iis ſuperiori libro longe accuratius, & fuſius ſcripſerimus. Nunc ad præcipuum inſtitutum noſtrum veniamus, quod eſt in præſenti capite, iis præmiſſis, ut bonos, utiles, ſalutareſque vomitus præmonſtremus. In corporibus itaque gracilibus ad vomendum promtis, & in æſtate, recte corpora per vomitus purgari Hippocrat. *libr.* 4. *Aphoriſm.* 4. & 6. docet, & præſertim in affectibus ſupra ſeptum tranſverſum. Qua ratione in lib. 4. *Aphoriſm.* 18. ait: *Dolores ſupra ſeptum tranſverſum purgatione indigere per ſuperiora ſignificant, & eos, qui loca inferiora moleſtant, per inferiora.* Ex iis vero, quæ per vomitum rejiciuntur; Hippocrat. ſpeciatim *in libro ſecundo Prognoſticorum pag.* 41. *lin.* 3. *text.* 38. ita habet: *Vomitio autem utiliſſima eſt, quæ pituita ac bile permiſta quam maxime eſt, & non craſſa valde neque multa.* Galen. *in libro* 4. *Aphoriſmorum* ait, bilioſos vomitus a rigore ſubſequi, bonum; quod ardentis febris cauſſa expurgata fiat ſolutio: ex quo non omnes perpetuo boni erunt, ſed ii tantum, qui critice plurimum bilioſorum humorum expurgaverint. At non tantum bilioſi, ſed pituitoſi etiam, ſi critice expurgentur, humores. In pituitoſis enim febribus, pituitoſæ vomitiones merito deſiderantur, ſicuti in ardentibus, bilioſæ. Hippoc. *in* 6. *Epidem. com.* 1. *text.* 5. *pag.* 1164. in renum doloribus, quum pituitæ, tum æruginoſi humoris vomitionem laudavit: & Galen. *in* 3. *Aphor.* convulſis vomitum æruginoſum profuiſſe, ſcribit, de quo ita habet: *Huic totum eſt inter vomitum corpus convulſum, & ſimul ut vacuata eſt ærugo; protinus febris ipſius, & convulſio ceſſarunt*: & Hippocrat. *in l. de veteri Medicina pag.* 16. *lin.* 16. & *ſeq.* perbelle hanc bilioſorum commodam purgationem attigit, ita dicens: *Itaque quum amaritudo quædam diffuſa fuerit, quam bilem flavam appellare ſolemus, quales ſtatim anxietates, & æſtus & impotentiæ occupantur, verum ubi liberi fuerimus ab illa, & purgati aut ſponte aut per medicamentum, ſi modo tempeſtive quid ipſorum fiat, manifeſte & a doloribus & a calore liberamur*: & paullo poſt, *ibidem lin.* 24. *Et quos quidem acuta, acriſque ac æruginoſa bilis affligit, quales mox rabies, & morſus viſcerum ac pectoris, & deſperatio. Non ſedantur autem hæc, priuſquam eadem expurgetur & proſternatur, & aliis permiſceatur.* Ex quibus colligimus omnes vomitiones bonas eſſe, ſi per has humores, morborum cauſſæ, probe expurgentur. Dictum eſt alias has criticas vocari, quarum notas eſſe, ut concocto

Vomitus futuri ſigna.

Vomitus boni, utiles, & ſalutares quinam.

Critici.

morbo

morbo appareant, ſcil. prægreſſis coctionis ſignis, ut in diebus decretoriis fiant, morborumque ideæ conveniant, ac omnium maxime, ut morbos ſymptomataque integre tollant, aut ſaltem allevent, diminuantque. Quod præceptum recte tradidit Hippoc. *in 1. Aph. 2.* dicens: *In turbationibus alvi & vomitibus, quæ ſponte fiunt, ſi qualia oportet, purgentur, confert, & leviter ferunt, ſin minus, contra fit.* De quibus criticarum excretionum notis Auctor *Coac. præſagiorum text. 77.* ita habet: *Qui in febre continua muti jacent, clauſis oculis ſubinde conniventibus, ſiquidem e naribus ſanguis effluxerit, & vomuerint, atque ex eo loquantur, & ad ſeipſos redeant, ſervantur.* Addamus ſalutares quoque eſſe, quæ una cum bonis evacuationibus apparent, cujuſmodi fuit vomitus bilioſus, qui die 14. in *muliere e trimeſtri fetu gravida lib. 1. Epidem. Ægr. 13. pag. 990.* quæ in litore decumbebat, cum ſudore apparuit, quibus integre fuit judicata. Ceterum hi vomitus, qui abſque ſignis perfectæ coctionis fiunt, etſi boni ſint, atque morbum allevent, ſymptomataque diminuant, tamen ſalutem nonniſi longo tempore futuram, tum multas recidivas prædicant. Cujuſmodi fuit, qui in *Epicratis uxore* quintodecimo die apparuit, de qua Hipp. 1. *Epid. Æg. 5. pag. 979. text. 26.* dixit: *Quintodecimo vomuit bilioſa, flava, ſubcrebra, ſudavit, libera febre. Sub noctem vero febris acuta, urina craſſa cum ſedimento craſſo.* Atque vomitus pernicioſi, cujuſmodi ſunt nigri, ſinceri, & alii, ſi in mitiori morbo erumpant, non mortem, ſed longitudinem & recidivas præmonſtrant, quales in ſupra dicta ægrota die vigeſimo vidit Hipp. de quibus cribit: *Circa diem vigeſimum, mane aliquantulum ſuperriguit, comatoſa, quiete dormivit, vomuit bilioſa, pauca, nigra*, quæ mulier die tantum quadrageſimo, alvi fluxione & vomitu bilioſo, fuit judicata. Eodem modo & *Cleonactides*, die tantum 80. ſanitati reſtitutus, die 24. peſſimos habuit vomitus, de quibus Hippocr. *lib. 1. Epid. Ægr. 6. pag. 982. text. 23.* ait: *Circa diem vigeſimum quartum extremas manus dolor affecit, vomuit flava, bilioſa, ſubcrebra: & paullo poſt virulenta. Cuncta remiſſa ſunt.* Hi vomitus, quum urinæ aliqualem coctionem oſtenderent (quod tenues eſſent, ſed non decolores, quippe boni coloris; quod maximum eſſe ſignum in iis, qui humorum copia laborant, ad ſalutem, docuit Galen. *in 3. Epid. com. 3. in text. 5.* quum *virginis Abderæ* caſum commentaretur) atque quum morbum & ſymptomata allevarint, merito ſalutares fuerant judicandi, atque feciſſe quidem criſin ſalutarem, ſed imperfectam. Ex quo longo tantum tempore ſalutem futuram prænuntiarent. Quare in acutis morbis vomitus omnes, morbum allevantes, facienteſque, ut ægri morbum facilius ferant, ſalutares erunt. Sed non boni ſuapte natura, quales ſunt ſinceri, æruginoſi, nigri, fœtidi, virulenti, pauci, verſicolores, in morbo mitiori, ac morbo non omnino crudo, morbum ſane longum eſſe, vel exitialem, vel recidivas, laboreſque prænuntiant. Hippoc. *in lib. 6. Aphor. 15.* ait: *A longo alvi profluvio ſpontaneus vomitus ſuperveniens morbum ſolvit.* Et *in 1. Epid.* (*An ſect. 2. pag. 949. lib. 3.*) Vomitum bilioſum in muliere bilioſa, cui menſes minore quam par eſt copia fiant, bonum eſſe ſtatuit. Atque hi vomitus boni, ſalutareſque, exiſtunt.

Qui cum bonis evacuationibus apparent.

Qui morbum allevant.

CA-

CAP. IX.

De vomitibus exitiosis, mortem præmonstrantibus.

Vomitus pravi in principio morborum & a signis cruditatis innotescunt. Ex immodica ipsorum copia prava & nihil juvante.

VOMITUS mali, exitium præsagientes, apparent in principio morbi; aut paullo post principium, quippe aut nullis signis coctionis, aut obscuris sane observatis. Tunc enim, ut dictum est, natura nihil recte excernit, juxta illud *lib. 2. Epid. sect. 1. pag. 998. sub lit. D. decernentia in melius non statim apparent.* Quare vomituum exitialium natura, primum in principio morborum, & a signis cruditatis, nobis innotescet.

Secundo immodica ipsorum copia, vires resolvens, pravam excretionem denotabit, ac multa etiam per vomitum excreta, si non juvant in morbo vehementi, exitium prædicent; & certius, si una cum aliis perniciosis signis illuxerint; omniumque certissime, si suapte natura exitialia sint, cujusmodi porracea, livida, æruginosa, nigra, versicolora, virulenta, fœtida, & meraca: de quibus sigillatim nobis est agendum. Hippocr. ea descripsit, qualia in *Phrenitica lib. 3. Epidem. Ægr. 4. pag. 1100. muliere, quæ in foro mendacium ibid. ægr. 12. pag. 1080.* & in *filio Hegotedidæ lib. 7. Epidem. text. 61. pag. 1225.* ante mortem fuere observata. Pauca vero per vomitum excerni in morbis acutis, unum quoddam ex signis est, ut Galen. docet *in 2. Prorrhet. text. 47.* quæ ex toto pravitatem habent. Nihil etenim eorum, quæ decretoria sunt, exigue secerni convenit; sed quæ ita vacuantur, omnia, duorum alterum subeunt: nam vel, quod non queant tolerari ob copiam, ab affectis effunduntur partibus; vel imbecillitatem ostendunt naturæ, quæ proponit quidem superflua excernere, sed nequit. Ex quibus paucos vomitus unum esse ex judicatoriis non judicantibus liquido constat, perpetuoque difficilis judicii, & plerumque letalibus, si præsertim suapte natura ii mali sint, nihilque nedum non juvent, sed quinimmo magis lædant, ab ipsisque ægri in deterius abeant. Sinceri quoque, seu meri, seu impermisti, in acutis morbis pessimi existunt, quod humor sincerus nedum crudus sit, sed incoctilis, quippe qui excludit tum actum coctionis, tum potestatem: Hipp. *Prognost. pag. 41. lin. 6.* ἄκρητον vocat humorem omnem mistionis expertem, vel omne excrementum fervidum & crudum, quod suo sero dilutum non est. Cujus generatio, vel partis alicujus vitio fit, vel fervore & incendio febrili exhausta aquosa & serosa parte. Hic itaque in acuta febre magnum intus incendium latere ostendit, plerumque a natura nostra invincibile. Cum signis vero aliis malis exitialis hæc vomitio erit. Hinc auctor Prorrhet. *lib. 1. text. 62.* ait: *Vomitus sinceri, anxiosi, mali.* Et Hippocrat. ait: *Prognostic. pag 41. lin. 6. Sinceriores deteriores.* Sed ipsum audiamus de malis vomitibus ex colore, ita scribentem, *loco lit. f. citato: Si vero vomitio fuerit porracea, aut livida, nigra, quicumque ex his fuerit color, malum esse censendum est. Si vero idem homo omnes vomit colores, exitiale admodum jam est. Ocyssimam vero abolitionem indicat vomitio livida, si grave olet.* Hæc omnia hisce coloribus per vomitum reddita, pessima existunt; licet porracea, æruginosa, livida, nigra, fœtida; quandoque critice excerni possint: sed hæc nonnisi morbo concocto, scilicet in statu aut decremento redduntur, atque hoc certe habebunt, quod febrem aut integre solvent, aut ipsam & symptomata allevabunt. Sed hoc rarum est, ut hujusmodi excrementa critice excernantur. Quare ut dictum est in vehementi febre continua, nondum coctionis signis conspectis, certissima mortis signa erunt.

Vomitus pauci in morbis acutis pravi.

Quando letalis

Quinam letales

runt. Sed diverſi coloris vomitiones eſſe ſuapte natura pejores conſtat ; quod ut Galenus docet , plures diverſoſque pravos affectus intus affligere denotent, ex quo auctor Prorrhet. *lib.* 1. *text.* 60. ait : *Vomitus cum varietate mali ſunt, tum alias, tum ſi propius inter ſe prodeant.* Ideſt , ſicuti Galenus habet , non multo poſt ſeſe conſequantur . Virulenti quoque ſive æruginoſi eadem ſane ratione in acutis morbis exitiales exiſtunt , omniumque maxime in phreniticis , quod ſignent cerebrum inflammatione ex bile uſta , nempe mortifera , laborare. De iis Hippocrat. merito *primo Epidem. ſect.* 2. *pag.* 948. *lit. H.* dixit : *phreniticis convulſiones , ſed virulenta vomunt , & ex his quidam ſubito moriuntur.* Quæ in *phrenitico* prima die fuiſſe reddita, *in lib.* 3. *Epidemiorum pag.* 1100. *commentar.* 3. *text.* 75. ſcripſit. De quo itidem ait: *Phreniticus primo die, quo decubuit, virulenta vomuit , & multa & tenuia , febris horrida.* A malis etiam exitialibuſque ſignis æruginoſos vomitus , quos & virulentos dici poſſe putamus, conſpici & apparere, certam ſalutis deſperationem ſignificare affirmamus; quando ubi ſigna letalia prodant ſe & alia letalia, omnino deſperandum. Hujuſmodi vomitus cum capitis doloribus, vigiliis, aut ſurditatibus, quæ ſigna inflammationem capitis teſtantur, vehementem inſaniam ſignificare, ita auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 10. expreſſit. *Qui in capitis doloribus æruginoſos vomitus habent , vigilantque cum ſurditate , cito hi vehementer inſaniunt.* Ex quibus colligamus, hos vomitus in phreniticis tria oſtendere, primo morbi exitioſi celeritatem , inſaniam , melancholiam cum ferocitate, quum ex hoc humore ferinæ deſipientiæ concitentur ; atque demum mortem cum convulſione. Quum ut alias docuimus, harum deſipientiarum, propter inſignem ſiccitatem, ab inſigni calore, proprium ſit , ut in tremores & convulſiones deſinant . His non videntur fœtidæ vomitiones minus periculum ſignificare , mortemque certiſſimam , ſuapte natura peſſimæ, ſi grave oleant . Hippocr. propterea dixit *Prognoſtic. pag.* 41. *lin.* 10. *Oxyſſimam abolitionem ſeu mortem indicare vomitionem lividam , ſi grave oleat . Atque omnes ſubputres ac fœtidi odores in omnibus vomitionibus mali ſunt . Mulier libro* 3. *Epidemior. Ægrot.* 12. *pag.* 1080. quæ in *foro mendacium* decumbebat , ante mortem vomuit nigra , graveolentia . Bilioſæ vero ſcilicet flavæ , croceæ, porraceæ omnes vomitiones cum malis ſignis , aut quæ mala ſequuntur, peſſimæ ſunt, exitialeſque, a quibus ægri læduntur , atque in deterius abeunt; eæ judicatorium non judicans , judicii difficilis , atque hæ letale judicium oſtendunt, eoque certius exitium oſtendent , ſi ſuapte natura malignæ ſint. De iis auctor *Prorebeticorum libr.* 1 *text.* 62. ita habet : *Vomitiones ſinceræ , implacidæ , malæ &c. ibidem text.* 71. *Nigra revomentes , cibos faſtidientes, deliros, in pube parum dolentes , quibus oculus ferox clauſuſque , purgare non oportet, perniciosum enim.* Et paullo poſt , *ibidem text.* 79. *text.* 36. *Si vomitus exigui bilioſique fuerint , malum , tum alias , tum ſi ægroti ſupervigilaverint; nariſque in iis ſtillans, malum .* Cujuſmodi vidit Hippocrates *in muliere*, quæ in *foro mendacium* decumbebat. De qua *lib.* 3. *Epidemiorum , Ægrot.* 12. *pag.* 1080. *text.* 47. dixit: *Duodecimo vomuit multa nigra , fœtida , ſingultus multus , ſitis laborioſa: & decimotertio nigra virulenta vomuit , rigor , circa meridiem muta.* Demum vomitiones omnes non juvantes malæ ſunt , peſſimæ, quæ ægrotos in deterius mutant , tametſi ſuapte natura malignæ non ſint. De quibus in præcitata *muliere* ita habet: *octava circa meridiem calor rediit , ſitibunda , comatoſa , faſtidioſa , vomuit bilioſa pauca ſubflava , nocte graviter ſe habuit , nihil quievit , multum affatim inſcia minxit .* Debebat enim a bilioſa vomitione , ſi bona fuiſſet , quieſcere , meliuſque ſe habere ; veluti etiam a vomitu noni diei ; decimo febris cum malis ſignis fuit exacerbata , atque itidem a vomitu virulento & bilioſo , quem die undecimo habuit , riguit, extrema frixerant & poſtea ſudavit frigidum , atque quum tunc multum

Virulenti ſive æruginoſi.

Quin in Phreniticis ſignificant.

Vomitiones fœtidæ graveolentes peſſimæ.

Bilioſæ flavæ, croceæ porraceæ cum malis ſignis exitiales.

etiam

etiam vomuerit, noctem tamen gravem habuit. Qui omnes vomitus letales fuerant; tum quod in vehementi morbo apparuerint; tum quod signa alia mala una illuxerint; tum etiam quod ipsa ægrota mulier in deterius fuerit mutata, quod est omnium excretionum non conferentium & pessimarum signum proprium. In vulneratis quoque capite vomitus bilioſi mali existunt, ex ipso Hippocrate, qui *in lib. 6. Aph. text.* 50. ita habet: *Quibuscumque præciditur cerebrum, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.* Pernicioſiſſimos quoque esse vomitus in ileo, *in lib. 7. Aphor.* 10. ita legitur: *Ab ileo vomitus, singultus, desipientia, vel convulsio, malum.* Galen. vero *in Commentar.* ait: *In ileis nihil descendit ad inferiora, & hoc est proprium inseparabile passionis. Vomitus autem non semper adest, sed quando exitiales sunt, & si vehementius distorqueantur, stercus eis adscendit, atque singultiunt.* Et *in libro 6. de loc. Affect. cap.* 2. Nullum, qui stercus vomuerit, fuisse salvatum memoriæ prodidit. Atque hæ sunt vomitiones, in acutis morbis suspectæ, quippe immoderatæ, paucæ, flavæ, rubræ, porraceæ, æruginoſæ, lividæ, nigræ, graveolentes, sinceræ, diverſicolores, quæ in morborum principiis, minimeque coctionis signis antegressis, apparent, & plerumque exitiales; quod ſi vehemens ſit morbus, aliaque mala ſigna illuceant, aut præceſſerint, aut ſubſequantur, procul dubio interitum præmonſtrabunt, eæque præſertim, quæ nedum ægrotos nihil juvarunt, at quinimmo in deterius, ut dictum eſt, ipſos mutarunt.

Bilioſa in capitis vulneribus mala.

CAP. X.

De alvi dejectionibus, & primo de iis, quæ ſalutem prænuntiant.

DE alvi itidem dejectionibus, quum bonis tum malis, quippe ægrotis ſalutem atque exitium præmonſtrantibus, acturi, a ſalutaribus exordiamur. Quarum nomine bonas omnes alvi dejectiones intelligimus, quibus Medici ſalutem in ægrotis futuram conjiciunt. Harum itaque natura, vel bona vel mala ſit, nobis primo ex coctione & cruditate eluceſcet; ſecundo ex tempore, in quo apparent; tertio ex ipſarum ſubſtantia; quarto ex copia, & paucitate; quinto ex tempore, quo perſeverant, aut ceſſant; ſexto ab utilitate & facili tolerantia; demum a ſignis, aut bonis, aut malis, a quibus capiunt certitudinem. At de bonis modo agamus, quæ bifariam ſalutem indicare poſſunt, uno modo coctionis ratione, quatenus indicant ſanitatem quum ventris inferioris, quo Galen. *in* 2. *Prognoſt. com.* 13. ſtomachum inteſtinaque intelligit, tum etiam aliarum proximarum partium, veluti jecoris, & lienis: optimam enim dejectionem, quæ eſt, ex Hippocrate *in* 1. *Prognoſt. pag* 39. *lin.* 34. *mollis, conſtansque, eoque tempore ſecreta, quo ſecundum valetudinem aſſuevit, atque copia ex ratione ingeſti cibi*, Hippocr. *ſignificare ventrem inferiorem recte valere*, ſtatuit. Altero modo humorum ex viſceribus, in ipſum ventrem decumbentium, ratione; quomodo Galen. ait, optimam dejectionem nedum indicare ventrem inferiorem recte valere, ſed nihil ex hepate aut liene in ipſum decumbere, quod exinde decumbentibus humoribus coctionis optimæ quum color, tum ſubſtantia vitietur. Utroque modo Medici ex dejectione perſcrutantur: primo in morbis ventriculi, inteſtinorum: quorum ſtatum primario fæces, ſeu dejectiones, ſignificare, Galenus *in* 1. *libro*, *de Criſib. cap.* 7. tradidit: ex optima dejectione, quæ, uti dictum eſt, & mollis excernitur, conſtans, eo tempore, quo ſecunda valetudine aſſuevit, ea copia, quæ cibis ingeſtis reſpondet, atque, ut addidit Galen. colore ſubrufa ſit, neque admodum graveoleat. Quæ vero vel hiſce omnibus, aut aliquibus, notis caret, mala

Alvi dejectiones quænam bona.

Bifariam ſalutem indicare poſſunt.

mala erit; quippe quæ aut dura, aſpera, liquida, coloratior, copioſior, aut paucior, quam ex ingeſtis cibis par eſt, inæqualis, graveolens, aut ſpumans, aut quæ neque tempore excernatur, quo ſecunda valetudine aſſuevit. Ceterum ſi ægroti ad ſalutem tendant, ab eo ſtatu in optimum (quem concoctionem appellant) permutatur. Ex quo merito Hippocr. *in eodem libr. Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 8. *text.* 17. dixit: *Corpulenta reddatur dejectio morbo eunte in judicationem.* Et *in libr.* 2. *Aphoriſ.* 14. *In profluviis alvi mutationes excrementorum juvant, niſi mala mutatio fiat.* Ex humorum vero, ad ventrem decumbentium, excretione longe certius eventus morborum perſcrutamur. Quos affectus Hippocr. vocat, abſceſſus, dyſenterias, teneſmodes, alvi fluxiones, alvi turbationes. De his *in* 1. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 940. *lin.* 4. *Plurimis erat alvus turbata, ſine moleſtia tamen, & prope nihil offendebat.* Et poſtea. *ſect.* 2. *pag.* 951. *lit. F. Erant qui ſexto die morbo regio afficerentur, ſed his purgatio profuit per veſicam, vel turbata alvus.* De dyſenteriis etiam *ibid. ſub lit. G. Senioribus vero ad morbos regios, aut turbatas alvos, aut dyſenterias res devenit, ut Bioni, qui apud Silenum decumbebat, &c. ibid. pag.* 953. *lit. D. At multi alii, qui judicati erant, ad dyſenteriam deveniebant, ut Xenophanes & Critias.* Et in eo ſtatu peſtilenti quoſdam ſervatos, ita dixit: *ib. pag.* 955 *lit. E. At vero in hoc ſtatu; quatuor his præcipue ſignis, ſervabantur. Quibus enim aut ex naribus probe ſanguis erupiſſet; aut qui per veſicam urinas multas, & multo bonoque præditas ſedimento, reddidiſſent; aut per ventrem turbida, biliosa, tempeſtive; aut qui in dyſenteriam incidiſſent.* Quare multi ſunt, qui alvi turbationibus, aut pituitoſis, aut biliosis, aut dyſentericis, fuere judicati. De *Clazomenio* Hipp. ſcribit *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 10. *pag.* 985. *Die trigeſimo venter fluebat multis aquoſis excrementis, ac qualia eſſe in dyſenteria ſolent.* Et de illo, qui in *Dealcis* horto *libr.* 3. *Epid. Ægr.* 3. *pag.* 1066. *Quadrageſimo alvus pituitoſa, alba, ſubcrebra dejecit, multum toto corpore ſudavit.* Et de Heropyto: *ib. Ægr.* 9. *p.* 1106. *Circa diem centeſimum alvus fuit turbata multis biliosis, durabantque diu multa talia, deinde dyſenterica cum dolore.* Ceterum cognoſcemus has, ſimulque alias optimas criticaſque eſſe purgationes, quod una cum ſignis manifeſtæ coctionis, in die decretorio, in morbi vigore ſeu ſtatu, apparere incipiant, vel ſint liquidæ, flavæ croceæ, rufæ, lividæ nigræ. Hæ in principio morbi, abſque ſignis coctionis erumpentes, exitiales ſunt, cum ſignis vero coctionis, criticæ ac ſalutares exiſtunt. Gal. *in lib.* 4. *Aphor.* 21. in quadam longa peſtilentia ſcribit, ſe vidiſſe dejectiones liquidas primo flavas, rufas, mox nigras, veluti ſanguinis fecem, tam in iis, qui exitio proximi erant, quam in aliis ſervandis: in his, ait, has dejectiones ad morbos, in vigore conſiſtentes, ſæpius natura ſuperfluitates expurgante, ſecutas eſſe, atque in illis in principio aut incremento. De quibus in ſequentis aphoriſmi commentario ita habet: *Quando igitur poſt morbi coctionem aliquis humor vitioſus excernitur, tunc corpus a natura expurgatur, & propter hoc atra bilis & alius omnis humor hujuſmodi, ubi ſigna coctionis in morbi proceſſu apparuerint, bonam ſignificant evacuationem: Si vero aliter excernatur, ſine ſignis coctionis, exitialis eſt caſus. Cujuſque itaque coloris, licet eo pernicioſæ videantur, cum ſignis coctionis, in ſtatu, critice apparent, ſalutem prænuntiant.* Quod ab Hippocr. didicit, qui idem *in lib.* 4. *Aphor.* 47. hiſce verbis expreſſit, dicens: *Excretiones in febribus non intermittentibus lividæ, cruentæ, fœtidæ, & biliosæ, omnes malæ: & ſi bene exeunt ſive per alvi excretionem, ſive per urinas, bonæ.* De quibus Auctor *Coac. præſ. text.* 182. ita habet: *Qui comate preſſi, fracti, obſurduerunt, erumpente alvo rubra dejiciunt circa criſin, idque juvat.* Ex quantitate quoque copioſiores, quæ diu durant. Proinde Hippoc. *in Epidemiis lib.* 1. *ſect.* 2. *pag.* 953. *lit. D.* ſcribit, ad dyſenterias, turbatas alvos, multos deveniſſe, ipſiſque judicatos fuiſſe. Sic *Heropythus l.* 3. *Epid. Ægr.* 6. *p.* 1106.

Critica quomodo cognoſcuntur.

fuit judicatus, de quo merito dixit: *Circa centesimum alvus fuit turbata multis biliosis, durabantque diu multa talia dysenterica cum dolore, reliqua levia.* Quinimmo plures cognovi, qui biliosis, porraceis, ac croceis dejectionibus, cum urinis concoctis, paullatim, assidue, multos dies, dejicientes fuere servati. Hæque dejectiones in salutaribus morbis, in quibus nulla pernicioſa signa apparent, plerumque una cum hæmorrhagia bona, aut copioſo bono sudore, aut aliquo alio simili signo, apparent: duo vero signa Hippocr. *in* 1. *Aphorism.* 2. tradidit, quibus bonas Medici cognoscunt dejectiones, nimirum, quæ vacuationis ratione considerantur, atque utiles sunt, quippe *si ægroti has facile ferant, & ipsis recte conferant.* Ex quo optimæ aut febres, symptomataque integre solvunt, aut allevant. De quibus Hippocrat. *in* 4. *Aphorism.* 28. *Quibus biliosæ dejectiones, superveniente surditate cessant, & quibus surditas, supervenientibus biliosis dejectionibus cessat.* Et *lib.* 6. *Aphorism.* 17. *Lippientem alvi profluvio corripi; bonum.* Et *ibid. Aphorism.* 48. *Lienosis difficultas intestinorum superveniens, bonum.* Et *in lib.* 7. *Aphorism.* 29. *Si a Leucophlegmatia detento fortis diarræa superveniat, morbum solvit.* Sed hæc ad cognoscendas optimas salutaresque alvi dejectiones dicta sufficiant. Nunc de malis agamus.

Dejectiones bonæ unde cognoscuntur.

CAP. XI.

De malis alvi dejectionibus, quæ exitium ægrotis prænuntiant.

Alvi dejectiones malæ unde cognoscuntur.

ALvi quoque malæ exitialesque dejectiones, ægris exitium præmonstrantes penes suam substantiam, quantitatem, colorem, odorem modum, excretionis, tempus in quo apparent, mutationem, signa alia antegressa, aut una conspecta, aut dejectiones secuta, atque demum ægrotantium tolerantiam atque utilitatem, cognoscentur. Penes enim *substantiam* complures dejectionum differentiæ existunt, quippe duræ, asperæ, liquidæ, viscosæ, aquosæ, pingues, spumantes, mistæ cum suo ichore, & sinceræ, atque colliquativæ vocatæ. Penes *quantitatem*, immoderate fluentes, pauciores, statim cessantes, suppressæ. Penes *colorem*, albæ, biliosæ, flavæ, croceæ, rufæ, virides, porraceæ, lividæ, cruentæ, nigræ, versicolores. Penes *odorem*, admodum fœtentes, & non ita fœtentes. Penes *modum excretionis*, sunt lientericæ, diarrhœæ, dysenteriæ, tenesmi: & juxta *tempus* in quo apparent, quædam in principio, nullis manifeste coctionis signis conspectis, quædam in augmento. Penes *mutationem* quoque ipsarum, quæ mutantur in deterius, substantia, quantitate, colore, & odore. Ex *signis* vero *malis* aut antegressis, aut una cum ipsis, aut postea apparentibus, dejectiones letales dignoscentur. Demum penes *tolerantiam* eæ malæ dicentur, quas ægri difficulter ferunt, nihilque juvantur, aut ab ipsis in deterius repunt. Itaque ut ex ipsis certum futuri eventus judicium prænoscendi fiat, merito de iis singulis differentiis accuratius agendum duximus, a duris asperisque, mollibus, & liquidis inchoantes. De duris Auctor Prorrheticorum *in* 1. *Prorr. text.* 41. ita habet: *Si intercepta alvus, parva, nigra & in spiras circumducta ad necessitatem laxaverit, & per nares eruptio fiat, malum.* Galen. σπυρασθῆναι, ideſt, in spiras voluta alvi excrementa, ait, fieri, & quod plusculo tempore retineantur, & propter copiam igneæ caliditatis, quæ, si etiam nigra spectentur, flagrantem ac ardentem, circa medium corporis, affectionem esse declarant, quod maligni morbi est signum, qui si vehemens quoque sit, aliudque illuxerit ex pravis signis, exitiales proculdubio fæces erunt. Liquidæ vero aliquando ex humido temperamento, ætate puerili, humida constitutione temporis, cibis humidis aut stomachi cruditate, aut, ut Galen. vult, ubi humidum alimentum

Ab harum substantia si duræ.

Si liquidæ.

tum ex ventriculo ad jecur non deducitur, aut quoties ex jecore vel liene aliquid in ventrem liquidum defluxerit, seu ubi jecur, aut lien, aut totum corpus per jecur expurgatur. Ex liquidis *aquosam* Hippocr. *Prognost. pag.* 46. *lin.* 12. esse malam statuit, quod, ut Gal. ait, hujusmodi dejectio cruditatis sit signum. Hæ dejectiones perpetuo malæ sunt, letalesque in biliosis vehementibusque morbis, si una urinæ non bonæ appareant; veluti in mitioribus morbis, in quibus nullum pernicioſum signum illuxerit, crudorum humorum multitudinem tantum significant, nonnisi longo tempore a natura alterandam. Pingues vero, sive optimæ dejectiones in acutis morbis, ut Galen. docet, *in* 2. *Progn. text.* 22. dejiciuntur, quoties pinguedo ab igneo calore absumitur; at ubi etiam viscosæ sint, significant, nedum pinguedinem colliquari, sed etiam animalis solidas partes; hisce tabescentibus redduntur pingues, viscosæ, albæ, paucæ & graveolentes, quibus notis ab his, quæ a cibis tales egeruntur, distinguuntur: hæ enim copiosiores sunt atque non semper albæ; a colliquatione factæ sunt albæ, aliquando subcroceæ, paucæ, graveolentes, quippe pingues, viscidæ, paucæ, albæ, aut subcroceæ, graveolentes, quibus notis distinguuntur a cibis pinguibus & lentis factæ, & a pituitosis multo calore viscidæ redditæ: graveolentia enim colliquationis signum esse, Galen. docuit. De quibus Hippocr. *in eodem libro Prognosticorum, pagin.* 40. *lin.* 14. *Si exigua, glutinosa, candida, subcrocea, leviſque sit, mala est.* Hæ vero perpetuo malæ existunt, quum pessimum sit, partes corporis contabescere, pinguedinemque profundi, quæ in acutis morbis magni incendii sunt indicia, & certi exitii, si aliquid ex pravis signis illuxerit, atque ut dictum est, si morbus magnus vehemensque fuerit; veluti in mitiori morbo longitudinem pro exitio præmonstrabunt. Cujusmodi in eo, qui in *Dealcis horto* decumbebat, Hippocr. vidit, de quo ait: *lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 3. *pagin.* 1066. *Sexto fuisse nigras, pingues, spumosas, viscosas, graveolentes*, qui die tantum quadragesimo fuit judicatus. Sed has non a colliquatione solidarum partium factas fuisse, sed a pinguedine, & ab humoribus viscidis putrefactis, quando eæ multæ fuerint. Quæ vero etiam solida partium substantia tabescente fiunt, prorsus exitiales existunt, atque hæ sinceræ etiam, sive meræ rejiciuntur. Quas Hippocr. *lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 2. *pagin.* 969. de *Sileno* loquutus, ita meminit: *Quinto die dejectiones fuisse meras, biliosas, leves, perquam pingues.* Sinceræ quoque dejectiones in morbis acutis merito damnantur, quod intus vehementissimum calorem, quo humorum ichores exhauriuntur, & consumuntur, vigere, *Galeno* auctore, indicent. Ex quo auctor *Prorrhetic. libr.* 1. *text.* 111. merito dixit: *Dejectiones in sinceras seu meras desinentes, malum exacerbare*, ac, ut Galen. placuit, pejorem morbum reddere, quales habuit *Silenus* (*Vide eius historiam lib.* 1. *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 969.) quinta die, *uxor Thylini ibid. Ægr.* 4. *pag.* 976. sexta, *Euryanactis filia lib.* 3. *Epid. Ægr.* 6. *pag.* 1073. duodecima, *uxor Hermoptolemi lib.* 7. *Epid. text.* 13. *pag.* 1212. quinta, *Parius libr.* 3. *Epidem. Ægrot.* 1. *pag.* 1093. septima, *Pythion ibid. Ægr.* 3 *pag.* 1098. atque alii. Eodem modo damnantur spumosæ, quod hæ aut caloris incendium, quo excrementa ferveſcentia spumam contrahunt, uti in lebete præ copia caloris fit, indicent, aut flatuosum spiritum humori commistum, ut in spumis maris, incurrentibus ventis, spectatur; illæ caloris colliquantis corpus, & hæ inæqualis perturbationis sunt effectus, ex quo auctor Prorrhet. *lib.* 1. *text.* 53. admodum spumosas alvi dejectiones malas vocat, & merito, quod aut colliquationem, aut inæqualitatem significent. Pejores vero sunt, quæ caloris incendium colliquans denotant: has cognosces ex acuta febre, atque ab excrementis calidioribus spumosis redditis, atque etiam quod sinceræ spectentur. De quibus legitur in Prorrh. *lib.* 1. *text.* 21. *In biliosis sinceriſque dejectionibus spumosa efflorescentia, mala*, &c.

Pingues et sive optimæ.

Si sinceræ.

Si spumosæ.

la, &c. *ibidem text.* 50. *Dejectiones, in ſpumoſas ſinceraſque deſinentes exacerbant*, ſeu morbum, ut ait Galen. pejorem reddunt: & *ibid. text.* 53. *In acutis bilioſis ſpumoſæ, malæ*: & in *Coacis præſagiis tex.* 602. recte hæc ita exprimuntur: *In acutis ſpumans dejectio valde bilioſa, malum*. Et poſtea *text.* 613. *Quæ in ſpumoſas, meracas, deſinunt dejectiones, graviorem morbum commovent.*

Ex quantitate ſi immoderata.

Quæ etiam ſpumoſæ ex ſpiritus flatuoſi commiſtione fiunt, malæ exiſtunt, quod in excrementis cruditatem præmonſtrent. Ex quantitate itidem tum immoderatæ, tum paucæ damnantur: eæ enim vires reſolvunt, naturamque proſternunt, ut *in ſecundo Prognoſticorum pag.* 40. *lin* 4. Hippocrat. ita habet: *At ſi univerſim & ſæpe dejiciatur, periculum defectionis animæ imminet*. Quod & Auctor *Coacorum præſag. text.* 609. ita expreſſit: *Liquida dejectio & confertim ſimul effluens, & paullatim, mala; altera enim vigilias, & altera exſolutionem, invehit*. Hinc in Aphoriſmis *lib.* 5. *Aphoriſm.* 4. ſcriptum eſt: *A ſuperflua purgatione convulſio, aut ſingultus ſuperveniens, malum*: Paucas itidem, ut alias a nobis demonſtratum eſt, omnes excretiones inutiles eſſe, tum quod vel non ſufficiant ad morbi cauſſam tollendam, multitudinemque humorum notent, in vehementi morbo plerumque letalem; aut quod virtutem prælanguidam ſignificent, quæ noxios humores excernere tentaverit, & non potuerit: atque hoc eſt, quod in peſtilenti prima conſtitutione Hippocr. obſervavit, de quo in primo *Epidemior. ſect.* 2 *pag.* 946. *ſub lit. G.* ita habet: *His ſuccedebant abſceſſus*. ideſt, dejectiones ex Galeno, *aut majores, quam, ut ferri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſent quicquam. Sed ſtatim redierunt, & deteriores evaſerunt*. Tertio, ut dictum eſt, quæ ſtatim, ubi cœperint, deſierunt, pravæ ſunt, & in acutis morbis exitiales. De his Hippocrat. in *Epidemiis ibid. pag.* 948. *lin.* 3. *Ventres etſi forte humecti eſſent, ſtatim maligno modo ſiſtebantur*: & enumerans ſymptomata & ſigna ardentium, quæ exitium ſtatim principio annuntiabant, ait *ibidem pagin.* 954. *litt. F. alvi ſiſtebantur*. Hinc Diarrhœas ac dyſenterias ſupprimi, non eſt tutum. Alio enim pravi humores converſi noxas eximias inferre ſolent, atque in acutis morbis mortem. Quod Auctor *Coacorum præſagiorum text.* 624. nos monuit dicens: *Dyſenteria ſubrubra, limoſa, larga excrementa alvi flammeis valde rubicundis coloribus ſoluta, inſaniæ timorem inducunt*. Atque ita ex quantitate malas alvi

Si paucitatis.

Ex colore.

dejectiones cognoſcemus; veluti ex colore, albæ, bilioſæ, flavæ, croceæ, ſeu vitellinæ vocatæ, ruſæ, cruentæ, aquoſæ, virides, æruginoſæ, lividæ, nigræ, atque multorum colorum verſicolores vocatæ, in acutis morbis pravæ omnes, ni critice fuerint excretæ, uti ſuperiori capite docuimus, exi-

Si Alba.

ſtunt. Albæ enim dejectiones fiunt, aut ex cibis ingeſtis, quippe pane puro, lacte, ptiſana, lupinis, alica, amygdalis, galacte & aliis; aut, ut Gal. docet *in* 1. *Prorrhet. comment.* 13. & *in* 2. *Prognoſt. comment.* 17. 19. quum bilis nullo modo pervenit ad inteſtina, atque hoc aut obſtructo canale, per quam a veſica fellis ad inteſtina fertur, ut in arquatis; aut ſurſum una cum ſanguine in caput inflammatum attracta, ubi hepatis ſuperior pars inflammata ſanguinem una cum bile ſurſum rapit; aut denique a colliquatione pinguedinis mollis & recentis. At hæ paucæ, viſcidæ & valde fœtidæ exiſtunt. Omnes eæ, exceptis quæ a cibis albeſcunt, in acutis morbis non parum damnantur, omniumque maxime, quæ, cerebro inflammato, albæ egeruntur, de quibus *in Prorrheticis lib.* 1. *text.* 13. *In phreniticis alba dejectio, malum, ut Archecrati*: & *ibidem text.* 53. *In acutis bilioſis albicantes ſpumoſæ & pericholæ dejectiones, malæ*. Malas eſſe in acutis bilioſis, ait Galen. quod ſint præter naturam, quum bilioſa excrementa in hominibus bilioſis, & bilioſis morbis, quamdam habeant cognationem, ideoque pravæ; aut propter canalis ad ventrem, per quem bilis fertur, obſtructionem, quæ affectum plerumque, vel etiam in non febrientibus, letalem facit. De

quo

quo *in* 1. *Coac. præsag. text.* 36. *in fine*: legitur: *Regio morbo admodum fœdati moriuntur, & his alba dejectio procedit*, aut propter cerebri, vel jecoris partium superiorum, convexarum, incendium, quod pessimum est, quod totus impetus ad viscera illa raptus maxime lædat. Non minus malum significare albas, paucas, viscidas, male olentes, nuperrime ostendimus, quod malignam colliquationem, teste Galeno, denotent. Flavæ itidem biliosæ, acres, croceæ seu vitellinæ, virides, malæ sunt, ni critice corpus expurgent: croceæ pejores, eruginosæ, virideisque, quod majus incendium caloris intus urere præmonstrent. Omnes vero biliosæ, non critice factæ, malæ, quod vel exitium, quippe in acutis morbis, vel longitudinem, recidivas, ac summos labores in mitioribus morbis præmonstrent. De quibus *in Coac. præsag. text.* 43. *Quibus biliosa est circa stomachi os mordicatio & amaror, malum*: quod multitudinem notet tum intestina, tum os ventris occupantem. Et Hippocrat. in 4. *Aphorismorum* 47. omnes excretiones biliosas damnavit. Hujusmodi dejectiones, crudo existente morbo, in ardentibus febribus, dysenterico ac tenesmodis modo, mordentes, plerumque exitiales esse cognovi, in multisque observavi, qui omnes obierunt, etsi longius laborarint. Quod proximo anno nimis appositè in *Guadagnina, mea carissima uxore*, expertus sum, quam ardente febre, cum diarrhœa, biliosa, dysenterica, die decimoseptimo morbi illius, magno sane dolore, & incredibili afflictione, misere interemtam, vidi. Quod divinus Hippocrates *in* 1. *Epidem. comment.* 1. *pag.* 940. *lit. G.* ad unguem in multis observavit. De quibus ita habet: *Alvi turbatæ erant biliosis, paucis, meris, tenuibus, mordacibusque, & frequenter desidebant.* Et postea *s.* 2. *pag.* 943. *lit. E. Æstate jam & Autumno, Lienteriæ, & dysenteriæ, tenesmi, alvi fluxiones biliosæ, tenues, mordaces, multæ, crudæ & mordaces, nonnullis etiam aquosæ*, &c. *ibid. pag.* 945. *inter lit. E. & F. Ventres omnibus turbati erat & pravi, ac multo his pessimi*: Et paullo post: *ibid. pag.* 946 *inter G. & H. Quæ bos infestabant, hæc erant: dysenteriæ, tenesmi, lienteriæ & fluxiones alvi*. Quales in *filia Euryanactis libr.* 3. *Epidemior. Ægrot.* 6. *pag.* 1073. duodecima die vidit Hippocrat. de qua ita habet: *Duodecimo alvus turbata fuit biliosis excrementis, paucis, meris, tenuibus, mordacibus, crebro desidebat*. Rubras vero & cruentas non minus malas esse Hippocrat. notavit, *Prognost. pag.* 40. *lin.* 12. dicens: *At valde aquosum, aut album, aut viride, aut vehementer rubrum, aut spumans dejici, hæc omnia mala*. De quibus auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 2. ait: *Ventris valde rubens profluvies, mala in omnibus morbis*: & *ibidem text.* 127. damnat *impense rubras*, idemque *in Coacis præsagiis text.* 330. 611. 613. 632. scriptum est, quippe: *Malum vero, ventris valde rubens profluvies, eoque magis, si hepatis vitio, ut in hepaticis fit, tales dejiciuntur*; ab his criticas juvantes excipimus. Virides quoque porraceæ pessimæ sunt, nimirum, quæ vi morbi fiunt, & quæ ab æruginosa bile, incendio caloris, ut docet Galen. *in primo de Crisibus cap.* 11. genita, excernuntur. Lividas quoque Hippocrat. *in secundo Prognosticorum pagin.* 40. *lin.* 16. & *in libr.* 4. *Aphorismorum Aphorismorum* 47. in febribus continuis pravas exitialesque esse, expressit. Has Galen. partium infernarum validum frigus ac veluti mortificationem præmonstrare ait. His non minus pravæ nigræ existunt, ut sunt, aut sanguinis limus, aut atra bilis; in acutis morbis nigras dejectiones, atram bilem, vel sanguinem ustum significare, Galen. tradidit. Addamus, vel sanguinis fæcem seu limum, quem non vere, teste Galeno *in libro* 4. *Aphorismorum* atram bilem, sed sanguinem melancholicum appellant, qui humor, si putrescat, fit melancholia, quam atram bilem appellamus: usta vero & nigra fit flava bile perusta, quæ prius mutatur, calore inurente, in æruginosam, & postea in nigram: de nigris dejectionibus a sanguine melancholico Hippocr. *in libr.* 4. *Aphorism. Aphor.*

Si flavæ biliosæ.

Si rubræ & cruentæ.

Si virides porraceæ.

Si lividæ.

Si nigræ.

21. dixit: *Dejectiones nigræ, qualis eſt ſanguis niger, ſponte venientes, ſive cum febre, ſive ſine febre, peſſimæ.* Has Galen. ait *in commento* notare lienis maximam debilitatem, & hepatis etiam, generantis plurimum craſſi hujus atque melancholici ſanguinis: quare eæ dejectiones in acutis morbis letales merito ſunt: non enim a natura hic humor, niſi longo tempore, concoqui & ſuperari poteſt. Plurimas vero hujuſmodi dejectiones in peſtilenti ſtatu Galen. vidit, quæ non magis in iis, qui exitio proximi erant, quam in aliis ſalvandis apparebant, illis tamen vel in principio, vel in incremento morborum conſpiciebantur. Superiori capite nos oſtendimus, in ſtatu poſt perfectam coctionem aliquando utiliter conſpici has nigras dejectiones, quæ, crudo exiſtente morbo, ſignis coctionis minime antegreſſis, perpetuo letales exiſtunt: tunc enim temporis magnam viſceris læſionem præmonſtrare Galen. etiam meminit. *Hippoc. Aphoriſ. libr.* 4 23. *Quibuſcumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, ſive quovis alio modo extenuatis, nigræ bilis, ſive uti ſanguis niger deſuper exierit, poſtridie moriuntur.* Verſicolores quoque dejectiones omnes malas eſſe Galen. docet; quoniam multas adeſſe in corporibus affectiones ſignificant, quas natura ut ſuperet, eget longo tempore, quod ab acutis magniſque morbis, vires cito exſolventibus, non conceditur. Merito itaque Hippocr. *in eodem libr. Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 18. de his dixit: *Si vero verſicolores ſint, diuturniores quidem ſed nihilominus exitiales ſunt.* Eo vero has fore exitialiores *in* 4. *lib. Aphoriſm.* 21. docuit, quo colores magis pravos plures habuerint, quales viſæ ſunt in *Apollonio lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 13. *pag.* 1111. De quibus Hippocrat. ait: *Dejectiones huic erant variæ, ſcilicet, vel nigræ, pravæ, vel virulentæ, vel pingues, crudæ & mordaces, & tandem lacti ſimiles reddidit.* Fœtidæ quoque malæ ſunt, quod ut Galen. docet, putredinis indicium ſint. Qua ratione Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 17. & *in* 4. *Aphoriſ. Aphor.* 47. fœtidas omnes, ſive graveolentes damnavit. At admodum fœtidas & liquidas, flavas, pingues in acutis febribus excretas (colliquativas vulgus appellat) obſervatum eſt eſſe valde pernicioſas, quibus conſpectis pauciſſimi ſervantur. Etenim præcellentem putredinem ac virium languorem præmonſtrant. Exitialiſſimum itaque in febribus continuis eſt ſignum; hæque dejectiones tales exiſtunt, veluti ſi quis in jure pingui luteum ovi dilutum, cum magno fœtore, dejecerit. De his Hippocr. *in* 3. *Epidem. comm.* 3. *pag.* 1086. *inter B. & C.* ita habet: *Unoque verbo, qui longis morbis vel acutis tenebantur, ventris vitio omnes præcipue mortui ſunt, cunctos namque venter ſuſtulit*: & Galen. *in comment. Et peſtis quoque illa longiſſima, quæ noſtra ætate vulgata eſt, ex iis quæ per alvum vacuantur, omnes prope peremit. Quæ evacuabantur, erat colliquatio.* Quod quidem eſſe ſymptoma videtur in perpetuum febris, quam peſtilentem privatim vocant, quum mortales vel citra peſtem corripiat. Quales *concubinam Nicolai* ante mortem dejeciſſe, Hippocrat. *in lib.* 7. *Epidem. pag.* 1221. *text.* 50. ſcriptum reliquit. Atque tot ſunt alvi dejectiones mortem minantes ex ſubſtantia, quantitate, colore, atque odore deſumtæ. Ex modo quoque, quo dejiciuntur, atque ex tempore, quo durant, exitiales ſunt, & quæ inſciis ægrotis excernuntur. Quod in acutis morbis aut delirium, aut exſolutam facultatem, ut Galen. demonſtrat, ſignificent. De quibus auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 78. ait: *Si ex ventre tenuia non ſentienti ægro exierint, ſi extra ſe non ſit, malum. Cujuſmodi ſunt, quæ in hepaticis fiunt.* Eodem modo in continuis febribus, quæ diu durant, ſine morſu, aut cum morſu, copioſæ, non juvantes, peſſimæ exiſtunt. Quibus plures fuiſſe extinctos *in Epidemiis* tradidit Hippocr. De quibus *in* 1. *lib. Epidem. comment.* 3. *ſect.* 2. *pag.* 943. *lit. E. Æſtate jam & Autumno lienteriæ & dyſenteriæ, teneſmi, alvi fluxiones bilioſæ, tenues multæ, crudæ, mordaces, nonnullis etiam aquoſæ*: & *in libr.* 3. *pag.* 1085. *lin. ult. Quæ ad ventrem ſtinebant, mul-*

Si verſicolores.

Si fœtida.

Ex modo excretionis & tempore quo durat.

Si copioſa non juvantes.

multis multa incommoda evenerunt; primum teneſmi multis cum dolore, plurimis vero pueris, omnibuſque impuberibus, quorum plurimi peribant, lienterici erant. A longa etiam dyſenteria debilitata facultate, ni ſtatim moriantur, in lienteriam, vel hydropem, quibus moriuntur, incidere Hippocr. *in lib. 6. Aphor. 43.* docuit. Quare hæ omnes ſunt exitioſæ dejectiones, ſi modo in principio morbi, abſque ſignis coctionis, appareant, quo tempore nullas excretiones commendari poſſe ſuperius oſtendimus, haſque eſſe ſymptomaticas, & malas. Quas Hippocr. intellexit, quum *in lib 3. Epid. com. 3. pag.* 1089. *ſub lit. B.* dixerit: *Ventres enim pleriſque turbati, horrores, ſudores non decretorii.* De quibus *in lib. 4. Epid. pag.* 1129. *text.* 24. hæc leguntur. *Duo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant, ſubfæculenta, edulia ex ſanguine confecta colore referentia, ex valde biliosis, ſpumoſis, chlora erant.* Cognoſcuntur vero pravæ dejectiones & a malis ſignis aut antegreſſis, aut una, aut poſtea conſpectis, atque ex eo, quod neque febrem ſolvant, ſed quinimmo magis ab ipſis ægri in deterius abeant. De his, *in 3. Epidemior. comm. 3. pag.* 1086. *ſub lit. B. Quæ autem exibant dolores non ſolvebant:* & *in Prorrhet. libr. 1. text.* 129. *Poſt modicam ſanguinis eruptionem, nigramque dejectionem, in acutis morbis ſurditas, mala eſt:* & in illis, *Prorrhet lib. 1. text.* 81. *In ardentibus febribus cum aliquantula perfrictione, dejectionibus aquoſæ bilis, multiſque, oculorum perverſio, ſignum malum, tum alias, tum ſi catochi fiunt: ibid text.* 108. *Ventris dejectiones ſubliveſcentes, cum perturbationibus, & urinæ tenues aquoſæque, ſuſpectionem habent.* Et *ibid. text.* 127. *Poſt ſanguinis eruptionem dejectiones nigræ, malæ.* Quales fuere obſervatæ in *Sileno, libr. 1. Epidem. Ægr. 2. pag.* 969. *Hermocrate, lib 3. Epidem. Ægr. 2. pag.* 1062 *Euryanactis virgine, ibid. Ægr. 6. pag.* 1073. *Adoleſcente*, qui in *foro mendacium, ibid. Ægr. 8. pag.* 1076. *muliere* quæ apud *Panthimidem, ibid. Ægr. 10. pag.* 1078. *uxore altera* abortum paſſa, *ibid. ægr. 11. pag.* 1079. in *Ea*, quæ *in foro mendacium, ib. ægr. 12. pag.* 1080. *Pario, ibid. ægr 1. pag.* 1093. *Pythione, ib. ægr. 3. pag.* 1098. *Apollonio, ibid. ægr. 13. pagin.* 1111. atque in aliis. In quibus ſtudioſus Lector poterit ea omnia, quæ nos breviter de malis dejectionibus perſtrinximus, recognoſcere, atque ad uſum prognoſtici colligere.

Ex ſignis malis aut antegreſſis, aut una cum ipſis, aut poſtea apparentibus.

CAP. XII.

De prædictione ab urinis, quid ſit urina, quomodo fiat, atque quantum faciat ad prædicendi methodum.

QUUM ex alvi dejectionibus demonſtratum ſit, quomodo ægrotantium ſalus & mors prænoſcatur, reliquum eſt, ut ad prædictionem ex urinis veniamus. Etenim ipſarum non minus, quam ceterorum excrementorum, obſervatio ad vitam & mortem ægrotantium præſagiendam facit. Galen. *in libr. 6. de loc. affect. comment. 2.* ſcribit, per urinam expurgari gibbas hepatis partes, atque omnes quotquot ſunt his ſuperiores: *& in libr. 2. Prognoſtic. capit. 4* indicia eſſe illarum affectionum, quæ in jecore, & in venis fiunt. Addidit *in libr. 2. Prorrhetic.* renum veſicæquæ affectionem indicare, vaſorumque ſanguinem continentium, & virtutis ſuccos generantis tum robur, tum imbecillitatem. Quo plures complurium corporis partium morbi urinis judicentur; non tamen omnes, ut vulgo perſuaſum eſt, ſed febres omnes, hecticis exceptis, inflammationeſque: etſi, quæ thoracis partes occupant, primo ſputis, & quæ ventris, dejectionibus ſignificentur. Verum in his urinarum etiam judicium non eſt ſpernendum. Plurimum itaque urinarum obſervatio quum ad complurium morborum prognoſin conducat, merito nunc, quo pacto ab ipſis vita ac mors ægrotantium prænoſci queat, nobis eſt cognoſcendum. Quam rem non prius aſſequemur, quam quædam de

Urinæ quid ad præſagium faciunt.

urinarum differentiis, atque *cauſis*, ſcitu ſane ad prognoſtici judicium neceſſaria, præmiſerimus, ac abſolverimus. Liquido cuique Medicorum conſtat, urinam eſſe ſeroſum excrementum ſanguinis, quod a renibus attrahitur, per urinatorioſque meatus in veſicam delabitur, atque per eam excernitur. Ceterum nos per urinam quum ſeroſam humiditatem, tum illud omne, quod per urinam excernitur, intelligimus. Hæcque omnia ad prognoſin multum faciunt. Ex materia enim urina triplex eſſe videtur, quum aliquando per urinam excernatur cibi potuſque humiditas, quæ in multum potantibus plerumque cruda aquoſaque mingi ſolet; aliquando ſanguinis humiditas ſeroſa, qualitate humoris exſuperantis infecta; atque demum humiditas a colliquatione, quippe pinguedo. Quam triplicem urinæ materiam Hippocrat. *in 6. Epidem. ſect. 5. text. 14. pag.* 1185. perbelle ita expreſſit: *Urina concolor cibo & potui, & qualis eſſe ſolet intus, quum humidi colliquatio eſt*. At ſpectemus varias urinarum differentias, quæ omnes penes ſubſtantiam ipſarum, qualitatem & contenta accipiuntur. Quod ad ſubſtantiam ſpectat, quædam tenues, quedam craſſæ, & quædam mediocres exiſtunt. Tenuium aliæ diu durant, aliæ mox craſſæ evadunt. Eodem modo & craſſarum quædam mictæ perſeverant, quædamque tenues evadunt. Quod ad qualitatem, triplex urinarum eſt differentia, quippe una, quæ ex colore, altera ex liquore, ac tertia ex odore cognoſcitur. Ex colore, albæ, pallidæ, flavæ, aureæ, rubræ, virides, lividæ, nigræ exiſtunt. Complures alii urinarum colores ab aliis recenſentur, at hi, qui ſunt præcipui, vobis ad predictionem ſufficient. Horum colorum quoſdam tenui ſubſtantiæ urinarum conjungi, quoſdam craſſæ, ſeu quoſdam tenuium eſſe proprios, & quoſdam craſſarum. Tenuium ſunt aquoſæ, rufæ, flavæ, virides, lividæ, ac non minus nigræ. Quibuſdam tamen viſum eſt, colorem pallidum, rufum, & flavum tenuium proprios eſſe. Conſtat tamen virides, lividas atque nigras cum tenui aliquando ſubſtantia obſervari, quæ in *Herophonte*, *libr.* 1. *Epidemiorum Ægrot. 3. pag. 974. uxore Epicratis*, *ibidem Ægrot. 5. pag. 979.* & *Metone*, *ibidem Ægrot. 7. pagin. 983.* fuere ab Hippocrat. obſervatæ. De Metone ait: *Urinæ tenues ſubnigræ*. Neque propterea negandum, nigras ſæpius craſſas mingi. Pallidæ vero, rufæ, atque flavæ numquam craſſæ, ſed perpetuo tenues minguntur. Hos enim colores ob materiæ inopiam fieri volunt. Ex liquore, urinarum aliæ claræ & lucidæ, aliæ turbidæ obſcuræque ſpectantur, & clararum urinarum mictarum quædam tales perſeverant, quædam mox turbantur. Eodem item modo de turbidis, quum quædam turbidæ mingantur, & turbidę perſeverent, quędam poſtea, reſidente craſſa materia, clareſcant. Eo odore quoque quædam graveolent, quædam non. Penes item quantitatem, quædam multæ, quædam paucæ, quædam mediocres exiſtunt, & quædam prorſus interceptæ, apparent. Demum ex urinarum contentis, quæ ſedimina, & ſedimenta, & hypoſtaſes vocant, complures urinarum differentiæ obſerventur: contenta vero dicimus, quæ quovis modo a ſubſtantia urinarum ſeparata in urina ſpectantur, quandoque in ſuperficie, quandoque in medio vaſis, & quandoque in fundo. Quæ in fundum reſident, Græci *hypoſtaſes*, noſtri ſubſidentiam, reſidentiam, ſedimenta, atque ſubjecta appellant. Quæ medium locum vaſis, ſeu urinæ ſubſtantiæ, occupant, ſublimationes, ſuſpenſa, ſublimia atque ſublimamenta: & quæ in ſupremo loco, juxta ſuperficiem, cernuntur, nubes atque etiam nubeculas appellant. Hypoſtaſes vero, ſive ſedimenta, variis differentiis interſtinguuntur, ſiquidem quædam craſſa, quædam tenuia, quædam continua, quædam divulſa, minimeque unita, ſed inæqualiter per ſubſtantiam urinæ ſparſa cernuntur, quædam æqualia ſpectantur per multos dies, quędam inęqualia. Propterea quędam alba, quędam pallida, quædam flava, quædam rufa, quædam rubra, vel viridia, vel livida, nigra ſpectantur,

Urina quædam materies.

Urinarum differentię. Quo ad ſubſtantiam.

Ex qualitate. Ex colore.

Ex odore. Ex urinarum contentis.

Hypoſtaſium variæ differentię.

quæ-

quædam fœtent, quædam non. Crassorum quoque sediminum, quandoque sunt pituitosi humores crudi crassique, quandoque melancholici, aut usti nigri, & quandoque rubri sanguineique residenr. Crassa hæc sedimina variis figuris spectantur, quædam enim granorum figura apparent, quas hypostases propterea Græci etiam *Oroboides* vocarunt. Nonnumquam veluti squamæ spectantur, quæ Græcis *Petaloides* dicuntur; & aliquando ut furfures, squamis angustiores, at crassiores tamen, quæ itidem *Pytiroides* nuncupantur. Demum hypostases farinæ interdum similes apparent, quas *Crimnodes* Græci appellarunt. His similes apparent, purulentæ, idest, quæ ex pure sunt. Addimus quandoque apparere in iis pituitam crassam, ac mucosum humorem. In suspensis etiam & nubeculis eædem differentiæ spectantur, quæ sunt, continuitatis, divulsionis, æqualitatis, inæqualitatis, crassitiei, tenuitatis, quantitatis & colorum diversorum nuper dictorum. Proprium sublimioris partis, quippe in superficie urinarum est, ut oleagines, atque pinguedines spectentur. At tempus est, ut singularum urinarum causas cognoscamus. *Suspensorum & nubeculariam.*

CAP. XIII.

De variarum urinarum causis.

JAM aggredimur causas variarum urinarum, a tenuibus atque crassis inchoantes. Tenues enim perpetuo in febribus concoctionem debilem denotant: fiuntque, vel propter obstructionem vasorum sanguinis, aut ureterum, aut renum, aut vesicæ, quo solus ichor, seu serosa tenuis humiditas, excernitur absque ullo humore; aut quando humores caput petunt, ut in phreniticis, quibus urinæ tenues mingi solent. Proinde colligimus tenues urinas mingi, ubi nihil humorum ipsis fuerit permistum, & crassas, ubi quippiam permistum sit; quod sane fit aut natura concoquente aut sublatis obstructionibus. In febribus tenues urinas perpetuo cruditatem significare, Galen. in multis docuit; ex quo Hippocr. *in lib. 3. Epidemiorum, p.* 1085. *lit. F.* dixit: *Urinæ multæ tenues, nihilque decretorii quicquam vel boni*. Hæ vero quandoque tenues durant, & quandoque crassiores evadunt. Has naturam cœpisse concoctionem, & illas nondum cœpisse, maximamque cruditatem denotare, Galen. docet *in lib. de urinis, cap. 3.* Crassæ vero urinæ ab humorum permistione fiunt, quæ in principio apparentes, multitudinem crassorum humorum, (teste Galen. in lib. *quæsita Hipporat.* vocato) denotant; aut in statu; naturam excernere humores. Multæ vero a potu largiori, aut a multa humiditate fiunt, ut in hydrope, atque in iis, quibus humida alvus supprimitur: atque hoc est quod Hipp. *lib. 4. Aphor. 83.* dixit: *Mictio noctu plurima facta, parvam significat dejectionem*. Aut ab inflammatis renibus, plurimam humiditatem attrahentibus, ut in diabete; a multis itidem humoribus, qui per renes purgantur, ægri copiosius mingunt. Quibus sane urinis copiosis multos judicatos vidit Hipp. *in 3. Epid. p.* 1086. *lit. D. text.* 41. A contrariis causis paucæ urinæ prodeunt, quippe aut a pauco potu, aut ubi plurima humiditas per alvum, aut per sudorem, expurgatur, aut a multo calore igneo serosam humiditatem absumente, ut in ardentibus febribus fieri solet, qua ratione in ipsis non raro etiam prorsus retinentur: aut denique pauca exit, propter obstructas vias urinæ, aut renum, aut vesicæ meatuum. At causas colorum indagemus, ab albis incipientes, quæ aut tenues sunt, aut crassæ. Hæ sunt indicia magnæ copiæ crudorum crassorumque humorum, ut Galen. docet, & præsertim quæ, quum crassæ minguntur, eædem permanent; quæ ex his non resident, summam cruditatem, concoctricisque facultatis imbecillitatem præmonstrant. Proinde in acutis morbis sunt perniciosæ. *Urinarum variarum causæ. Tenues unde.* *Crassæ unde.* *Noctu plurimæ redditæ quid notant.* *Paucæ unde.* *Urinæ albæ quid indicant.*

cujus-

cujuſmodi fuerunt, quæ ab Hipp. fuere obſervatæ in *Philini lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 4. *pag.* 976. & *Dromedai uxore*, *ibid. Ægr.* 11. *pag* 987. Quæ vero ex his tenuiores reddi incipiunt, naturam cœpiſſe concoctionem denotant. Tenuium vero albarum urinarum, quas Galen. *in lib.* 4. *Aphor.* aquoſas appellat, cauſſæ ſunt, aut imbecillitas, concoctricis facultatis, ut in ſenibus: aut obſtructio renum, uti in nephriticis, antequam lapis expurgetur; aut obſtructio itidem hepatis; aut quod non raro fit, & toto bilioſo humore in cerebrum ſublato, quas propterea phrenitim prænuntiare, Gal. *in lib. de Urina cap.* 6. tradidit. Hæ vero extremam tum cruditatem, tum magnam concoquentis facultatis imbecillitatem denotant. Ex quo in morbis bilioſis, omnium maxime, ut ait Galen. *in lib. de Criſibus cap.* 12. & *in* 2. *Prognoſtic.* perniciosæ exiſtunt. Pallidæ vero urinæ redduntur, quum parum bilis flavæ ſeroſæ humiditati permiſcetur, parumque diſtare videntur a concoctione, ſi modo non valde tenues exiſtunt. Flavæ ac rufæ, ſive croceæ, ſi tenues una ſint, teſte Hippoc. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 43. morbum plane crudum oſtendunt, vigereque magnum caloris incendium in viſceribus. Craſſæ vero concoctionem & aliquando criticam excretionem ſignificant. De qua nos ſuperioribus libris egimus. Rubras ac ſubrubras a ſanguine fieri, Galen. *in* 2. *Prognoſt. in lib. de Urinis*, ac non minus *in lib.* 3. *Epid. comm.* 1. *text.* 1. docuit, nimirum ubi ſemicoctus ſanguis per urinas expellitur. Indicant enim ut *in* 2. *Prognoſt.* & *in* 3. *Epid. comm.* 27. ait, ſanguinem abundare incoctiorem ac ſeroſiorem, qui in venis jecinoris & profundi corporis continetur. Quo hepatis ſeparatricis quoque facultatis imbecillitatem cognoſcimus. Hinc Hipp. *in Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 35. dixit, has urinas longitudinem oſtendere, quod longum temporis ſpatium ad ſanguinem concoquendum requiratur. Ceterum quæ aliæ aliquando ſubrubræ, & tenues minguntur (etſi Auctor *Libri de Urinis* noluerit tenus rubras dari urinas) a pauco ichoroſo ſanguine infectæ, aliquando craſſæ a multitudine ſanguis inconcocti, quales in ſynochis febribus ſæpe obſervamus. His ſimiles ſunt ſanguine infectę, quas cruentas & ſanguineas appellant. Quæ propter debilitatem renum, laxatis venis, quæ in ipſos renes finiuntur, quam *anaſtomoſin* vocant, aut laxatis meatibus, qui a primo ad ſecundum ſinum ſunt, minguntur: quales *Apamantiam* & *Fabrum* minxiſſe Hippocr. *in* 4. *Epid. pag.* 1133. *text.* 29. tradidit. Aliquando exit ſanguis ruptis ſcilicet venis, aut apertis, aut ulceratis renibus, vel veſica. De His Hipp. 4. *Aphoriſm.* 81. *Si quis ſanguinem & pus mingat & ſquamulas, & urinæ gravis odor fuerit, veſicæ ulcerationem ſignificat*: & de illis, *Aphoriſm.* 78. *Quicumque repente ſanguinem mingunt, iis a renibus venulæ ruptionem ſignificat.* Virides ſequuntur, quæ aut ex porracea bile in ventriculo, ut Galen. tradidit, ob eſculentorum cruditatem, genita, aut ab æruginoſo humore in vaſis, ob nimium caloris incendium, Galen. *in* 2. *Prognoſt. comment.* 39. auctore, atque flavæ bilis aſſationem genito, ortum trahunt. In ſanis, & non febricitantibus, porraceæ bilis plerumque indicia exiſtunt: veluti in acutis febribus, & inflammationibus viſcerum, hunc in urinis colorem viridem eſſe æruginoſæ bilis indicium, Gal. *in* 2. *de Criſibus cap.* 11. docuit. Huncque præſertim colorem in urinis fieri ſtatuit, quum bilis flava in atram, incendio caloris, mutatur. His colore proximę ſunt oleoſæ urinæ, quæ tamen pingues non ſunt, ſed quæ, ait Gal. *in lib.* 3. *Epid. ſect.* 3. *comm.* 72. & *in* 1. *lib. de Criſibus cap.* 12. colore & craſſitie oleo ſunt ſimiles, quas Galen. in ægrotis ſine detrimento ex morbi concoctione aliquando ſe vidiſſe, prodit. Pingues vero, ſcilicet præ pinguedine oleo ſimiles, aut quod olei modo ſupernatent, oleoſæ vocatæ, ex alia cauſſa fiunt, quippe perpetuo a colliquato adipe aut totius, aut renum. De quibus Hipp. *in* 7. *lib. Aphoriſm. Aphoriſm.* 35. *Quibus inſidens pingue ac*

Tenues alba ſive aquoſa.

Pallidæ.

Flavæ ac rufæ, ſive croceæ.

Craſſæ.

Rubræ ac ſubrubræ.

Urina cruenta vel, & ſanguinea.

Virides.

Oleoſa.

Pingues.

ſimul

ſimul totum iis renum vitium acutum ſignificatur. Ubi vero colliquatio ex calore febrili in toto corpore fit, ut Gal. *in com.* notavit, vel ex eo dignoſcitur, quod cum urina adipes paullatim exeunt, minimeque univerſim. Ex quibus colligimus, oleoſas urinas duplicis eſſe differentiæ, quippe illas, quæ colore tantum, & craſſamento oleo perſimiles apparent, atque has; quæ pingues exiſtunt, quibus in *Aphor.* Hipp. *ineſſe pinguedinem* dixit: de quibus *in* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 25. *Si pingue deſuper natans araneorum ſpeciem referat, damnandum eſt*. Gal. vero *in lib.* 4. *de ſanitate tuenda, cap.* 25. dixit, hoc pingue in urinis eſſe ſimile ei quod in ſummo refrigerati juſculi concrevit. Hanc urinam *ex lib. de Urinis* triplicem eſſe conſtat, quippe *Elæocrhoam* Græcis vocatam, quæ olei colorem habet, principium colliquationis indicantem: *Elæophanem*, exquiſitiorem miſtionem olei cum urina habentem, colliquationiſque augmentum præmonſtrantem: atque *Elæodem*, undequaque oleo ſimilem, vigorem notantem colliquationes. Gal. vero *in* 3. *Epidem.* oleoſam duplicem tantum facit, quippe colore & craſſitie oleo ſimilem, pinguedinis expertem; atque alteram pinguem, hancque duplicem eſſe, ſcilicet unam, quæ habet pinguedinem ſupernatantem, oculis boum ſimilem, quam Græci *Elæophanem* appellant, & alteram, in qua ſupernatat pinguedo, telæ araneorum modo, *Elæodem* Grecis vocatam. Has omnes fieri colliquatione pinguedinis, ab igneo calore, dictum eſt. Lividæ fiunt præ immodica frigiditate, teſte Gal. *in* 1. *de Criſib. cap.* 12. quæ propterea in acutis morbis pernicioſæ exiſtunt, quod naturę exſtinctione fiant. Fiunt tamen aliquando ex materia craſſa, livida, quas aliquando bonas eſſe, quippe critice apparentes, Hipp. (*Vid. lib.* 4. *Aphor.* 47.) non negavit. Nigras quoque urinas mingi aut propter immodicam frigiditatem conſtat, (ſed hæ obſcuræ magis quam nigræ apparent) aut propter exurentem calorem. Nigras fieri ob ſerum atræ bilis urinæ miſtum, urinam nigro colore tingens, Gal. *in* 1. *Prorrhet.* docuit; & *in* 3. *Epid. comm.* 4. dixit: has a ſanguine conſpici melancholico, perinde, ac fuligine, nigro colore ſerum inficiente. Ex quo *lib.* 1. *de Criſibus cap.* 1. ait: nigram urinam nobis atræ bilis, redundantis in corpore, aut uſti ſanguinis eſſe indicio. Ceterum hæ duplicis ſunt differentiæ ex ſubſtantia ipſarum aut tenui, aut craſſa, quippe nigræ aut tenues, aut craſſæ, minguntur. Has craſſas perpetuo ab humore craſſo melancholico, aut atra bile, aut uſto ſanguine copioſius excreto, colorari dicimus. Hinc in quartanis febribus, in melancholicis, atque in ſpleniticis, craſſas urinas nigras mingi, Galen. *in* 2. *Prognoſt. com.* 27. teſtatum reliquit. Tenues vero fieri aut propter vehementem frigiditatem, qua ratione ſanguis quoque nigreſcit, aut ob exſuperantem calorem, quippe ſanguinem urentem, Gal. *in* 2. *Progn.* & *in* 1. *de Criſibus* ſtatuit. Has vero cognoſcimus, quod, priuſquam nigræ appareant, flavæ, aut rufæ, aut croceę ſpectentur; & illas, quod lividæ prius ſpectentur, mox nigreſcant. Poſt nigras, claras atque turbidas ſpectemus, nimirum a quibus cauſſis fiunt: & primo de claris permanentibus urinis ſuperius dictum eſt, quum de coloribus, in tenui ſubſtantia urinarum ſpectatis, ſermo proxime fuerit habitus: nunc de iis, quæ claræ minguntur, & mox turbantur, agemus. Has enim crudas eſſe atque propter flatus craſſi redundantiam turbari, neminem latet, ac proinde naturam aggredi concoctionem indicare, nullis Medicis, praxim exercentibus, eſt ignotum. De hac Gal. *in lib.* 4 *de Sanit. tuenda cap.* 4. ait: *Si quum emingitur pura ſit, protinus vero turbatur, jam crudi ſucci concoctionem aggredi naturam, docet. At ſi interpoſito tempore turbetur, non protinus, ſed poſt aggreſſuram inſinuat*. Turbidarum vero urinarum, quas triplicis eſſe differentię, Gal. *in* 3. *Epid. in* 4. *Aphor.* & *in* 4. *de ſanit. tuen.* & *in* 1. *de Criſibus* ſtatuit, quippe quæ claræ minguntur & poſt turbantur, de quibus agimus; & quæ turbidæ mictæ reſident, & clareſcunt; atque demum quæ mictæ turbidę, perpetuo tales permanent. Has

Pinguium triplex differentia.

Lividæ.

Nigræ.

Urinarum nigrarum duplex differentia.

Turbidarum triplex eſt differentia.

ſubju-

Urina subjugales quænam & unde.

Urina perturbata quid notant.

Turbidæ clarescentes quid & unde.

Turbidæ manentes unde.

subjugales vulgus Medicorum appellat, quod jumentorum urinis similes spectentur quippe crassitie, colore, atque turbata substantia. Hæ sunt a crudis crassisque humoribus, a calore agitatis, atque inde multis flatibus elevatis, & sero permistis, quibus substantia confunditur, & turbatur. Hinc Hippoc. dixit *lib.* 4. *Aph.* 70. *urinas perturbatas dolorem capitis præmonstrare*, quod nimirum per ipsas nobis significetur multos vapores ad caput allevari ac subvehi. Galen. *in* 6. *Epidem. comm.* 5. *in text.* 15. ait: *has urinas eorum esse, in quibus humor, qui crudus vocatur, plurimus abundat, & a calore fusus est.* Hinc enim ipsum, in spiritum versum, flatuosas exhalationes ad caput submittere contigit. A crudis itaque & crassis humoribus, calore agitatis, fiunt urinæ turbidæ. Sed quę turbidæ clarescunt, a calore quidem naturali concoquente; & quæ perpetuo manent turbidę, plerumq; a febrili, totam massam sanguinis agitante, ac confundente. Cujusmodi sunt, quæ in principio malignarum febrium apparent, quo tempore nihil concoxit natura. Avicenna vero, ac alii Arabes medici dixerunt, urinas turbidas, non residentes, nobis prȩmonstrare humorum ebullitionem, propter vehementiam caloris extranei, & debilitatem innati caloris digerentis: & Gal. *in* 1. *lib. de Crisib. cap.* 11. dixit, urinas turbidas manentes, minimeque clarescentes, nobis prȩmonstrare, naturam cœpisse agitationem in sanguine, vigereque ad concoctionem; illas vero, quę, quum clarę fuerint mictę, mox turbantur, significare nondum cœptam esse humorum agitationem ad concoctionem, sed postea fore sperandam. Ex quo ipse his urinis bonitate prętulit eas, quę perpetuo turbidę manent; quas cœptam concoctionem denotare clarius *in lib.* 4. *de sanit. tuenda* hisce verbis expressit, dicens: *Quod si turbida sit, qualis veternorum visitur, crudis vocatis humoribus refertas venas indicat, non tamen cessare naturam, sed eos valenter concoquere.* Et de illa, quæ turbida postea, hæc addidit: *Si quum emingitur pura sit, protinus vero inturbetur, jam crudi succi concoctionem aggredi naturam, docet, &, si interposito tempore turbetur, non protinus, sed post aggressuram insinuat.* Amplius contrarium videtur etiam hic affirmare de urinis manentibus turbidis, quum dixerit: *Si vero vel omnino nulla separatio, vel id quod subsidit, malum sit, imbecillitas naturæ significatur, egetque ope aliqua ad succos percoquendos.* Quid igitur dicemus? Urinas turbidas, manentes turbidas, aliquando fieri a calore extraneo totam massam sanguinis agitante, & aliquando a calore innato, quippe a natura ipsa concoquente. Hasque urinas ab illis distingui, quoniam non in principio, sed in augmento incipiant, quo tempore natura manifeste aggreditur concoctionem, & postea aliquid residet in ipsis, aut minus turbidæ evadunt, vires constant, morbusque exitialibus signis caret. Quod nobis forte expressit Galen. *in* 4. *de sanit. tuen. cap.* 4 quum dixerit: *Verum omnium, quæ turbantur urinarum generalis nota esto ipsius crassi a liquidiore separatio, aut propere aut tarde facta, aut omnino nulla.* Ergo si protinus fiat, & quod subsidit sit album, leve, ęquale, superiorem longe naturam succis, quos concoquit, ostendit. Sin, quod subsidit, malum sit, imbecillitas naturæ significatur. Quum vero eæ principio statim apparuerint, quo tempore nondum natura aggreditur concoctionem, propter ebullitionem, & agitationem caloris febrilis, & extranei, turbari significant, quæ ob id multitudinem crudorum crassorumque humorum, a vehementi calore fusorum, indicant, quæ cum morbo vehementi, & viribus prȩlanguidis exitium merito significant. Hin Galenus *in lib.* 4. *Aphorism.* merito dixit: *Quæ vero non residunt, si vires affuerint, longum fore morbum ostendunt, si imbecillitas adsit, ægri mortem prænuntiant.* Quare quæ principio apparent turbidæ, manentque turbidæ, non a naturali, sed ab extraneo calore fiunt, quod vitium debilitas confirmabit, atque signum aliquod perniciale, & quod numquam in ipsis aliquid resideat, quod sit laudabile: atque hæc de

cauſſis turbidarum urinarum. Nunc mordacium, quæ cum dolore & mordicatione exeunt, cauſſas attingamus quæ fiunt ab humoribus ſumme calidis ac acribus redditis, qui una per urinam excernuntur; unde Hipp. *in primo Epid. ſect. 2. pag. 943. inter E. & F. text. 10.* dixit: *fieri ſtrangurioſos abſceſſus*. Et Gal. *in 2. Epid. text. 41.* dixit: *Ubi per renes excrementa purgantur totius corporis, urinæ illos ſtillicidium corripere, quum ob alia, tum præcipue propter confluentium urinarum acredinem*. Acredo vero a multo calore fit. Fœtidas vero urinas reddi propter humorum ſummam putredinem aut in vaſis, aut in renibus, vel veſica, omnibus liquido conſtat. *Urinæ mordaces unde.* *Fœtidæ unde.*

De æqualibus vero, & inæqualibus urinis Gal. *in lib. 7. Aphor. 33.* ita habet: *Si vero compagis urinæ, quam Syſtaſim dicunt Græci, inæqualitatem ita dici conceſſerimus, recte dixit vehementem ſignificari perturbationem. Nam dominante, & vincente natura omnia æqualiter unita ſunt: diverſis vero cauſſis tumultuantibus ac renitentibus ei, illud quod ſuperatur, atque concoquitur, aliam habet formam, renitens vero, ac tumultuans aliam, & quando plura hujuſmodi fuerint, variam magis oſtendunt urinarum inæqualitatem, & ejus cauſſæ perturbationem*. Atque hæ ſunt cauſæ variarum urinarum. Quibus præmiſſis ad variorum contentorum cauſſas dignoſcendas deſcendimus. In qua re primo intelligendum duximus, cur in fundo vaſis reſideant, quæ hypoſtaſes, ſubſidentias, atque ſedimenta appellant; cur in medio, quæ ſuſpenſa, ſublimia, & ſublimamenta; & cur in ſuprema vaſis parte, quæ nubes, & nubeculas, & enæoremata dicunt, Hippocr. quandoque ſublimamentum nubeculam vocat? Hæc vero contentorum diverſitas in urinis pendet ex varia flatuum generatione, & miſtione; ſiquidem ubi in urinis flatuum copia adfuerit, excrementum ad ſupremum vaſis locum defertur, ubi minus ad medium, atque ubi nulli adſint; in fundo. Quo fit, hypoſtaſem probam coctionem indicare, in qua flatus diſcuſſi nullam pariunt turbationem; etſi locus non neceſſario hoc demonſtret, quando in fundo non omne reſidens contentum coctionem denotet, ſed illud tantum, quod eſt candidum, leve, & æquale per omne tempus, uti docet Hipporates *in 2. Prognoſt. pag. 40. lin. 30.* Neque etiam nubeculæ & ſuſpenſa ſemper cruditatem præmonſtrant, de quibus Hippocr. *in 2. Prognoſt. ibidum lin. 41.* dixit: *Nubecula, quæ invehitur in urina, ſi candida eſt, eſt bona* & Galen. *in 1. de Criſibus cap. 11.* ſcripſit, in iis, qui uſi ſunt inedia, ac labore immodico, morbum ſæpius ſolvi, priuſquam aliquid ſubſideat, & plerumque ſufficere nebulam albam, aut ſuſpenſionem albam, levem, atque æqualem. Verum perpetuo contentum in fundo vaſis album, leve, ac per omne tempus æquale, coctionem denotabit; minorem ſuſpenſum, & nubes, quippe in ſuprema vaſis parte contenta, morbi adhuc minorem coctionem declarat. In qua parte excrementum, ſeu contentum elatum, circuli modo, juxta urinæ ſuperficiem, ſolet eſſe delirii certum indicium, quod *Auctor Prorrheticorum libr. 1. text. 4. 32. 37.* animadvertit, atque ego ſæpius experientia verum eſſe didici. Multa ſubſidentia, quamvis locum infimum matellæ occuparit, copiam crudi humoris vacuari, Galen. *in lib. de Criſibus cap. 11.* exemplo puerorum eorum, qui in crapulis & in otio vitam ducunt, demonſtravit, quorum corpora, quod ſcateant humoribus crudis, ideo cum urinis plurimum ejuſdem crudi humoris excernunt: & *in 2. Prognoſt.* dixit, ſedimentum in urinis apparere copioſum, ubi morbus ex crudis humoribus foveatur, atque pauciſſimum aut nullum conſpici in morbis biliioſis, atque in iis, qui inedia uſi ſunt & multo labore. Tenuia vero tenuiorum humorum ſunt indicia. Sed quæ pura ſunt, neque facile vaſe commoto aſſurgunt, magnam naturæ in ſecunda concoctione imbecillitatem indicant. Craſſa itidem craſſorum humorum nobis ſunt indicia, quod Galen. explicavit, quum *in quarto*, tum *in ſeptimo* *Æquales & inæquales.* *Contentorum diverſitas in urinis unde.*

Apho-

Aphoriſ. & *in lib. de plenitudine*, ait, *in iis, qui ſunt voraces, urinas habere ſedimen craſſum*. Quo affirmabimus craſſum ſedimen, craſſos humores, ac ideo maximæ difficiles nobis affectus indicare: Unitum ſeu conjunctum, æquale, pyramidali figura, maxime commendatur, quod optimam notet coctionem. Contra divulſum atque inæquale ſignificare, Galen. *in* 1. *de Criſib. cap.* 11. tradidit. Divulſum enim, & inæquale, craſſorum flatuum copiam in venis adeſſe, qui natura diſcuti & reſolvi nequeant, affirmat Auctor *libri de Urinis cap.* 19. Quo modo ad contentorum quoque colores, album ceteris coloribus præfertur, ut dictum eſt, ſi continuum ſeu læve & æquale; atque hoc excernitur, ubi perfecta facta fuerit concoctio. Inæquale vero, divulſum, diſtinguitur ab hypoſtaſi; hoc etenim non unitum ſeu conjunctum, ſed in exiles, & minutas veluti arenulas per urinæ ſubſtantiam diſpergitur. Hocque aut a pituita copioſiore fit, aut a pure, aut a colliquatione ſolidarum partium. Cujuſmodi eſt, quod farinæ craſſiori eſt ſimile. *Crimnodes* has hypoſtaſes Græci appellant. Rubrum & ſubrubrum cruditatem, & coctionis defectum ſignificat. Quo Hipp. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 35. merito dixit: *Si urina fuerit ſubrubra, & ſedimentum ſubrubrum, & læve, diuturnior hic morbus, quam primus, ſed admodum ſalutaris*: & Auctor *libri de Urinis cap.* 12. ait, contentum rubrum fieri a ſanguine ichoroide, coctioniſque defectum ſignificare. Flava, viridia, mala ſunt, quod morbum a flava, æruginoſaque, ſeu porracea bile foveri, denotent. Peſſima livida, & nigra. Quod prius lividum fuit, moxque nigreſcat, a caloris refrigeratione procedit; & quod prius aut flavum aut rufum, aut viride fuerit, & mox nigrum, a calore igneo, humores adurente. Merito itaque Hipp. *ibid. lin.* 43. nigram nubeculam vitioſam vocat. Quæ ex iis, quæ a colliquatione fiunt, quæque ob id variis figuris ſpectantur, *Oroboides* hypoſtaſes, quod orobis ſimilia ſint, ac etiam *Sandarachoides* Greci vocatæ, fiunt conſumto jam adipe, ubi præſertim caro conſumi cœperit, præmonſtrant enim, aut totius corporis, aut renum colliquationem. *Petalodes* vero, ideſt ſquamoſæ, laminoſæ, fiunt, teſte Galeno, ubi, poſt adipis carniſque colliquationem, partes ſuperficiariæ igneo calore abraduntur; & *Pythirodes* vocatæ, ideſt furfuraceæ, quæ ſunt ſquamoſis anguſtiores, ſtrictiores, ſed tamen craſſiores, ubi ſolidarum partium vaſa igneo calore dilacerantur, ac contabeſcunt; & *Crimnodes*, ideſt, farinæ craſſiori ſimiles, a majori adhuc ſolidorum membrorum contabeſcentia. De his Hipp. *in* 2. *Prognoſt. ibid. lin.* 38. *Si in urina ſedimentum ſpeciem referat farinæ craſſioris, malum eſt. Deterius vero, ſi ſquamularum inſtar conſiſtit, ſi vero tenue & candidum admodum eſt, vitioſum eſt. Furfuraceum vero deterius eſt.* Galen. *in comment.* dixit fieri haſce urinas calore igneo, ſanguine aſſato, aut conſumtis inæqualiter carnibus, atque hæc de urinarum cauſſis.

CAP. XIV.

De bonis urinis, ſalutem prænuntiantibus.

Urinæ optimæ quænam.

URINÆ, & alia excrementa duobus modis ſalutem & mortem in ægrotis ſolent indicare; uno modo ut ſigna coctionis, & malignitatis; atque altero, ut cauſſæ, quippe probam aut malam excretionem prodentes. De urinis, quæ ex proba concoctione quum morbi tum cauſſarum ſalutem præmonſtrant, Galen. *in* 1. *lib. de Criſibus cap.* 12. & *in* 3. *Epid.* ita ſcribit: *Quippe optimam eſſe, quæ in ſubſtantia eſt mediocris, quantitati aſſumtæ potionis reſpondens, colore ſubrufa, ſubflava, cum ſedimento ſeu hypoſtaſi alba, lævi & æquali.* De qua Hippocr. *in* 2. *lib. Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 30. ita habet: *Optima eſt, quæ candidum ſedimentum habuerit, læveque & æquale per omne tempus,*

tempus, dum morbus judicetur. Securitatem enim ac morbum fore brevem significat. Si vero intermittit, atque interdum puram emittit urinam, interdum subsidet candidum ac læve, morbus diuturnior ac minus securus. Gal. addit: *Necessario vero colore erit modice croceo, & conditione media inter tenuem, & aquosam, ac corpulentam, qualis jumentorum habet.* Idem in 1. *lib. de Crisibus cap.* 12. ait: *optimam esse magis subrufam, quam subflavam:* & *in* 1. *Epid.* & *in lib.* 10. *simpl.* modice flavam facit: & *in lib.* 2. *de sant. tuenda*, ait: *rufam biliosamque urinam coctionis perfectæ in morbis esse indicium.* In multis concoctæ urinæ sunt discoloratiores, in aliis coloratiores. Quo constat non unicum in optimis urinis colorem perpetuo observari. At divinus Hippocrat. non colorem in urinis, neque substantiam præcipue attendendam ad prognosin duxit, sed contentum; quum hoc loco optimam urinam describens, ne verbum quidem de colore & substantia, sed tantum de contento: quum dixerit *optimam esse, quæ candidum sedimentum, læve ac æquale habuerit*, coloremque & substantiam omisit, quum in omnibus non unicus color, neque unica substantiæ qualitas observetur, atque etiam quum urina habens optimum sedimentum, necessario & colorem optimum & substantiam mediocrem habeat. In temperatis corporibus tales colores solent observari, qui quum in multis ob varias corporum dispositiones evarient, proinde methodo, nobis optima quæ sit in omnibus indagandis, utemur, & primo ex Aristotele, qui *in primo lib. problem.* 52. ita habet: *Urina hæc optima & per omnia mediocris, urinæque sanorum simillima, novitio medico inspicienda est, ut scilicet quum aliquam ab hac ipsa declinasse viderit, statim ab optima & exquisita sanitate hominem hunc cecidisse statuat.* Merito hoc modo bonam & malam urinam ex Aristotele cognoscendam constat. Quum unum ex maximis artis prognosticæ principiis sit, similia & dissimilia contemplari. Quare nos quoque, hoc ipso adducti, dicimus in ægrotis optimam illam esse judicandam urinam, quę recte valentium maxime similis appareat: quam notam expressit itidem Galen. *in primo de Crisib. cap.* 12. Ceterum ut exacte optima urina dignosci queat, primo corporum temperies, viscerumque, præcipue erit attendenda, ætas, sexus, victus, atque vitæ studium: namque corpora calidiora coloratiores urinas habent, & frigida discoloratiores; & ex ætate, juvenes urinas habent pueris tenuiores & coloratiores, pueri crassiores, & senes tenuiores, & discolores. Mulieres itidem viris crassiores discoloratioresque cum multis contentis: & qui crapulis indulgent, mingunt urinas cum multo sedimento crudo; & ii, qui inedia usi sunt, cum paucis sedimentis habent itidem urinas coloratiores; eædem ex vigiliis; & laboribus. Contra multa sedimenta habent, & discoloratiores, qui in otio vitam ducunt. Unde dicimus optimam urinam esse, in pueris, quæ substantia crassiori spectatur, discoloratiori cum multo sedimento albo, levi, & per omne tempus æquali. In juvenibus & viris erit coloratior, quippe subflava vel subrusa, & tenuior, cum paucioribus contentis: & eo coloratior & tenuior, si corpora hæc fuerint temperamenti calidioris; discoloratior, si fuerint frigidioris temperamenti, & in mulieribus erit aliquando crassior, & discoloratior; & in iis, qui inedia usi sunt, laboribus, vigiliis, coloratior, tenuior, cum contentis paucioribus; & in iis, qui crapulis & otio usi sunt, discoloratior, crassior, cum copiosiori sedimento. In temperatis vero corporibus optima urina erit, colore, ut ait Galen. modice croceo, substantia mediocri, quantitate potui respondens, habens sedimentum album, læve, æquale per omne tempus, quęque denique urinis recte valentium hominum simillima sit. In omnibus optima perpetuo ejus hypostasis seu sedimentum album, æquale; minus optima, quæ habet suspensum seu sublimamentum; & adhuc minus, quæ nebulam. Verum, ut docuit Gal. *in* 3. *Epid.* aliquando bonum suspensum, & aliquando

Urinæ in multis mire variant.

Urinæ hypostasis quænam perpetuo optimæ.

quando bona nebula ſat erit ad ſalutem prædicendam, de quo Hipp. *in* 4. *Aphor.* 71. ita expreſſit: *Quibus ſeptima judicatur, in iis nebulam habet urina quarta die rubram, & alia ex ratione.* Adeo ut, ait Galenus, non ſolum rubra aliqua nubes apparens antea non viſa judicationem ſignificet, ſed & alba multo plus ipſa, adhuc autem magis & ſublimamentum album, æquale atque conſiſtens: ſi vero velociter admodum morbus movetur, & coloris & ſubſtantiæ mutatio ſunt ſufficientia ſigna futuræ dijudicationis. Hipp. *in* 2. *Prog. pag.* 40. *lin.* 41. dixit: *Nubecula, quæ invehitur in urina, ſi candida eſt, eſt bona*; & Gal. *text.* 36. ait: *Conſiderandum in nubecula eſt, utrum ſurſum fuerit an deorſum, & item color, quem obtinet, ſi enim deorſum feratur cum colore qui dictus eſt, bona commendataque eſt.* Ex ſubſtantia, tenues urinæ cum bono colore bonæ exiſtunt; de his Galen. *in primo Epidemiorum. Planum ergo eſt, tenues ſed boni coloris urinas ob coloris bonitatem promittere ſalutem, quatenus vero erant tenues, hactenus tempus requirebant concoctioni.* Hæ quidem urinæ ſalutem prænuntiant: ſed longiori tempore futuram, quod in *Cleonactide*, *lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 6. *pag.* 982. *Clazomenio ibid: Ægr.* 10. *pag.* 985. atque *Charione*, *lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 5. *pag.* 1072. fuit ab Hippocrate obſervatum. Tenues etiam diſcoloratiores, ubi ſigna adfuerint ſalutis, abſceſſum præmonſtrare, Hippocrates *in* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 48. docuit quod Gal. *in* 3. *Epid. comment. text.* 4. confirmavit dicens: *Si urinas tenues, & æquabiles diu reddat, & reliqua ſalubria ſint ſigna, his abſceſſus in locis protenditur ſepto tranſverſo ſubjectis.* Quod *Pythioni lib.* 3. *Epid. Ægr.* 1. *pag.* 1059. qui propter Telluris ædem habitabat, contigiſſe animadvertit, de quo Hipp. *Urinæ a primo adoctavum uſque diem tenues, decolores, quæ ſuſpenſionem habebant nubiloſam. Decimo ſudavit, ſputa ſubcocta, judicatus eſt, urinæ circa judicium ſubtenues. Quadrageſimo ab judicio die ſuppuratio circa ſedem, & ſtrangurioſus factus eſt abſceſſus.* Ex coloribus urinarum, ut dictum eſt, commendatur ſubflavus, ſubrufus, ſubcroceus, modice paleus, ſubluteus. Subrubram quoque urinam cum ſedimento ſubrubro, Hipp. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 35. dixit eſſe ſalutarem, etſi diuturniorem morbum ſignificet. Niger itidem color non perpetuo malus, in lienoſis, ut in *Herophonte*, *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 3. *pag.* 974. & in iis, qui abundant ſanguine melancholico, & in ſuppreſſis menſibus, qui ſint melancholici, quod Gal. *in Epid. Urinæ vero color licet eſſet niger, nihil attulit periculoſi, quod retenti menſes eſſent magis melancholici.* Copioſæ itidem nigræ urinæ, quæ in aquoſas non mutantur, critice excretæ, ſunt utiles: unde Gal. *in* 3. *Epid.* 3. *in text.* 74. ſcripſit, ſe noviſſe quamdam mulierem, quæ his urinis magna copia evacuatis plurimum fuit juvata: præterea urinæ nigræ cum larga, aut narium ſanguinis eruptione, quod in *Metone*, *ibid. Ægr.* 7. *pag* 983. aut menſium copia, quod in *muliere moroſa lib.* 3. *Epid. Ægr.* 11. *pag.* 1108. fuit obſervatum, non ſunt timendæ. Bonæ itidem ſunt ex turbatis urinis cito reſidentes, album, læve, & æquale, de quibus Gal. *in* 4. *de ſanit. tuenda* ſcripſit: *Si vero humoris ſeparatio craſſi a liquido in ea cernitur, ſitque quod ſubſidet album læve & æquale, jamjam ſuperaturam eos omnes naturam indicat.* Claræ quoquæ, quæ protinus turbantur, utiles exiſtunt, quod ſignificent naturam humorum coctionem aggredi. Ex mutatione etiam urinarum eæ bonæ judicabuntur, quæ ad probiorem vel colorem, vel ſudſtantiam, vel ſedimentum acceſſerint. Bonæ itaque plerumque cenſentur craſſiores, quæ poſt principium minguntur; Excrementa enim accedente concoctione, craſſiora quidem evadunt, ſi prius tamen fuerint tenuia; veluti e craſſis fieri tenues optimum eſſe, Hipp. *in* 4. *Aphor.* 69. ita docuit: *Quibus urinæ, grumoſæ, paucæ, non ſine febre, multitudo veniens ex his tenuis, juvat. Maxime vero tales redduntur, in quibus ſtatim ab initio, vel non ita multo poſt, ſedimentum apparuerit:* & Gal. in comment. *Hæ autem ſi multæ & tenues fiunt, juvant,*

Urinarum colores quinam boni.

Urinæ craſſiores quænam bonæ.

juvant, quoniam materiæ ſubtilitatem ſignificant. Ex turbidis clareſcentes optimæ exiſtunt, ex diſcoloratis coloratiores, & ex nimis coloratis minus coloratæ, & ex carentibus ſuſpenſis, quæ nubeculam, aut ſuſpenſum, aut demum ſedimentum habere incipiunt, & quæ alba & æqualia fieri inceperint. Atque tot modis urinæ, ut ſigna coctionis nobis ſalutem in morbis indicare poſſunt. Eodem itidem modo, idem nobis ſignificabunt, ut cauſſæ, bonam evacuationem prodentes. *Urinæ quænam bonæ.*

Proinde multæ urinæ, in die decretorio apparentes criſin ſalutarem indicant, eoque certius id præſagiunt, ſi ſuapte natura meliores exiſtunt, quales in *Nicodemo lib. 3. Epid. Ægr.* 10. *pag.* 1108. fuere obſervatæ, de quo Hipp. *Vigeſimo quarto multam urinam, & albam reddidit, in qua multa ſubſidebant, & cum ſudore fuit judicatus*: & de *Pericle ibid. Ægr.* 6. *pag.* 1102. *Tertio febris emollita fuit, urinæ multæ concoctæ, in quibus multa ſubſidebant. Charionem* multis urinis bilioſis fuiſſe ſervatum, Hipp. *ibid. Ægr.* 5. *pag.* 1071. quoque tradidit. Hac eadem ratione & de multis craſſis *in* 4. *lib. Aphoriſm.* 74. ait: *Quibus ſperatur abſceſſus futurus ad articulos, liberat eos ab abſceſſu urina multa, craſſa, & alba facta*: & *in* 6. *Epidem. pag.* 1179. *comment.* 4. *text.* 2. *Urina craſſa, alba, qualis Archigenis, in laborioſis quartanis interdum exit, & liberat ab abſceſſu.* Verum ea, quæ eſt ſimilis farinæ craſſiori, aut longitudinem morbi, aut mortem, ut docet Galen. *in* 7. *Aphoriſm.* 71. præſagit. Acres vero cum dolore, copioſæ, ſæpius in acutis morbis judicant; de his Hipp. *in* 1. *Epidem. comm.* 2. *pag.* 947. *ſub finem, text.* 42. ita habet: *Unum vero bonum, maximumque inter ſigna, quæ fiebant, quodque multos a maximis periculis vindicavit, hoc fuit, quibus ad ſtranguriam diverterent, & in hoc abſceſſus fierent*: & *paullo poſt, pag.* 948. *ſub A. Stranguria autem his diuturna & laborioſa erat. Erant his urinæ copioſæ, craſſæ, variæ, rubentes, puruleatæ cum dolore*: & poſtea *ibid. text.* 24. *Atque hi ſuperſtites omnes fuerunt, nec ullum horum periiſſe cognovi.* Quomodo *Pythionem* ſervatum Hipp. vidit, de quo *in* 3. *Epidem. pag.* 1059. *Ægr.* 1. *comm.* 1. *text.* 4. ſcripſit: *Quadrageſimo ab judicio die ſuppuratio circa ſedem, & ſtrangurioſus factus eſt abſceſſus*; hinc eſt probabiliter multitudine urinarum ſanatus. *Criſim ſalutarem præſagientes.* *Farinæ craſſiori ſimiles quid præſagiunt.*

Sunt demum quædam ex oleoſis urinis, non pinguibus, ſed tantum colore atque craſſamento oleo ſimiles, quæ bonę eſſe ſolent. Hæque nonniſi perfecta morbi concoctione apparent, & has Gal. ſicuti ſcripſit *in* 3. *Epid.* ſępius ex morbi concoctione, ſine ægri detrimento, vidit. Atque hęc de bonis urinis, ſalutem ſignificantibus. *Oleoſæ quænam bonæ.*

CAP. XV.

De malis urinis mortem prænuntiantibus.

EX urinis tenues, albæ, aquoſæ, diu perſeverantes, in morbo non ſalutari, exitioſæ, quod ſummam cruditatem ſignificent, exiſtunt in febribus acutis, teſte Galen. ſignificant enim totum flavæ bilis impetum ſurſum in caput ferri, quo delirium & phrenitim præſagiunt. de his Hippocr. *in* 4. *lib. Aphoriſm.* 72. ſcripſit: *Quibus urinæ, albæ, perſpicuæ, malæ, præſertim in phreniticis, apparent.* Galen. *in comment.* dixit, nullum vidiſſe phreniticum, in quo talis urina apparuiſſet, ſervatum. Melius ſiquidem eſt, ut, ſicuti totus morbus eſt bilioſus, ſic & urinæ appareant bilioſæ; illas in *Philiſta* phrenitico vidit Hipp. *lib. 3. Epid. Ægr.* 4. *pag.* 1070. In omnibus itaque febribus acutis, malum erit, urinas tenues & aquoſas ſpectari: aut enim mortem prænuntiabunt, aut morbi longitudinem atque recidivas; longo enim tempore natura opus habet ad illam ſummam cruditatem tollendam, quod, ubi febris non admodum ſit vehemens & acuta, & vires validæ ſint, *Urinæ quænam exitioſæ.* *Tenues, & aquoſæ.*

aliquando ſalus, longo tamen tempore ſuccedit ; in vehementi vero morbo, cum viribus prælanguidis, prorſus exitiales exiſtunt . Et hoc eſt, quod Galen. *in* 4 *Aphoriſm.* 72. de his locutus , dixit : *quum anticipaverint vires diſſolvi , eſſe perniciosas* . Addamus eas fidelius perniciem denotare , quæ & diu perſeveraverint , & poſt principium inceperint ; quales fuere , quæ in *muliere apud frigidam aquam decumbente ibidem Ægrot.2.pag.* 1069. apparuerunt: nam undecimo die habuit urinas tenues , aquoſas, quæ eædem ad diem quadrageſimum perſeverarunt . Diximus ex Hipp. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 48. alibi , haſce urinas perſeverantes , ubi ſalutaria adfuerint ſigna, per abſceſſum morbum ſolutum iri prænonſtrare . Quod *Pythioni* , qui prope Telluris ædem habitabat , eveniſſe *in* 3. *Epid. comm.* 1. *pag.* 1059. *Ægr.* 1. *text.* 4. Galenum demonſtraſſe in altero capite meminimus. Contra vero, ubi ſalutaria ſigna non illuxerint , perpetuo eæ exitiales exiſtunt. Hinc Hipp. *in* 2. *prognoſt. pag.* 40. *lin.* 47. aquoſam exitialiorem vocavit , & *in pueris eſſe deterrimam*, voluit. Craſſæ vero itidem urinæ , ex Hipp. *ibid. lin.* 46. malæ exiſtunt, ſi præſertim in principio appareant , quo tempore tenuiores , uti Galen. *in* 4. *Aphor.* 70. voluit, eſſe ſoleant . Quæ vero ipſarum nihil , aut quod malum eſt , reſident, peſſimæ exiſtunt ; de his Galen. *in* 4. *lib. Aphor. Quæ vero non reſident , ſi vires affuerint , longum fore morbum oſtendunt , ſi imbecillitas adſit , ægri mortem prænuntiant* ; & Hipp. *in* 1. *Epidem. comm.* 1. *pag.* 940. *lit. G. text.* 26. *Aut craſſitiem habentes & parvam ſubſidentiam, nec probe ſubſidentes , ſed crudo quodam , intempeſtivo ſedimento*. De quibus etiam Galen. *in* 3. *Epidem. comm.* 1. *text.* 5. dixit : *At enim quum craſſas etiam fuiſſe indicet , nec ſubſediſſe urinas , plane ſunt illæ ex conturbatis , & turbidis , ut ſolet hic appellare, quæ ſemper turbationem crudam multo præditam ſpiritu flatuoſo , ut muſtum*. Non reſidentes vero quum ex turbidis ſint, craſſæ quoque, non reſidentes, ex turbidis erunt, quæ: ut ait Galenus, præter flatuoſam & crudam turbationem toti ineſſe ſanguini, etiam craſſos humores morbum fovere ſignificant . Turbidæ vero urinæ duplicis differentiæ exiſtunt , quædam tenues , quædam craſſæ. Sed modo videamus , quid turbidæ præſagiunt in acutis morbis . Galenum tria turbidarum genera feciſſe , ſuperius diximus , quippe primum earum eſſe, quæ tenues, & claræ mictæ poſtea turbantur ; ſecundum earum , quæ turbidæ minguntur, & turbidæ permanent ; atque tertium turbidarum reſidentium , & clareſcentium Has *in primo de Criſibus* Galen. vult eſſe minus pravas , quod aliquid inæqualis turbulentiæ ſupereſſe demonſtrant , atque morbum haud multo poſt coquendum . His eſſe praviores , quæ claræ mictæ poſtea turbantur , quod hæc in urinis poſtea facta turbatio denotet , naturam debere incipere concoquere morbum , nondumque cœpiſſe concoctionem , propterea longiori tempore ac virtute forti ægrotos indigere ad concoctionem perficiendam . Inter has medias ſtatuit perpetuo turbidas manentes , nihilque clareſcentes, & reſidentes . Etenim *cap.* 4. ait , nobis indicare has turbidas urinas , vigere adhuc agitationem in ſanguine ad concoctionem, quod *in quarto de ſanitat. tuenda* hiſce verbis expreſſit . *Quod ſi turbida ſit , qualis veternorum viſitur , crudis vocatis humoribus venas refertas indicat , & non tamen ceſſare naturam docet, ſed eos valenter concoquere*. Ex quibus colligitur, urinas turbidas non clareſcentes , & reſidentes , meliores eſſe iis , quæ claræ mictæ poſtea turbantur. Quod tamen Hippocr. non videtur ſentire, quum numquam meminerit has pejoris eſſe judicii, ſed ex turbatis perpetuo non reſidentes, nihilque clareſcentes, ceteris magis damnavit , atque eſſe perniciosas ſtatuit. De his in *uxore Philini*, *lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 4. *pag.* 976. quæ obiit, ita habet : *Urinam vero reddebat una cum convulſionibus affatim multam , raro admonentibus , craſſam , qualis eſt , quæ in matellis ſubſidit , cum agitata fuerit* ,

Urinæ craſſæ quænam malæ.

Turbidæ quid præſagiunt in acutis morbis & harum differentiæ.

Non clareſcentes & reſidentes quibuſnam meliores.

rit, repoſita multo tempore non ſubſidebat, color & craſſitudo aſſimilis jumentorum urinis, hæc illius erat urina, quam ego vidi. Et de *uxore Dromedai lib. 1. Epidem. Ægrot. 11. pag. 987.* moribunda dicit: *quo riguerat, alvus commode reddidit, urinæ craſſæ, albæ, turbidæ, cujuſmodi ſunt, quæ in matulis ſubſederunt, quum agitatæ fuerint, repoſitæ multo tempore non ſubſidebant.* Eædem turbidæ non reſidentes fuere obſervatæ in eo, qui *caleſcens cœnavit, & potavit largius, ibidem Ægr. 12. pag. 988.* & in *Hermocrate, lib. 3 Epid. Ægr. 2. pag. 1062. itidem morbo letali vexatis.* Atqui Galen. quoque *in 4. Aphoriſm. 70.* id affirmaſſe eſt viſus, quum dixerit: *Nonnullæ igitur urinæ longo tempore manent perturbatæ, nonnullæ vero cito ſedimen craſſum habent, & cito morbum ſolutum iri ſignificant. Quæ vero non reſident, ſi vires affuerint, longum fore morbum oſtendunt, ſi imbecillitas adſit, ægri mortem prænuntiant.* Addo quæ *in 4. de ſanit. tuenda, cap. 4.* de his urinis nobis prodidit, quibus aperte cognoſcitur, ceteris exitialiores eſſe non reſidentes; ipſe enim ita ſcripſit: *Verum omnium, quæ turbant urinam, generalis nota eſto, ipſius craſſi a liquidiore ſeparatio, aut propere, aut tarde facta, aut omnino nulla, ergo ſi protinus fiat, & quod ſubſidit, ſi album, leve, & æquale, ſuperiorem longe naturam ſuccis, quos concoquit, oſtendit: ſin bonum ſit, quod ſubſidit, ſed quod poſt longius interpoſitum tempus colligatur, etiam naturam temporis ſpatio ſuperaturam ſuccos, nunciat. Si vero vel omnino nulla ſeparatio, vel id quod ſubſidit, malum ſit, imbecillitas naturæ ſignificatur, igetque ope aliqua ad ſuccos percoquendos.* Quare colligamus turbidas urinas, nihil reſidentes, ceteris aliis turbatis eſſe pernicioſiores, quod etiam oppoſitorum ratione demonſtratur. Quum vel etiam Galen. fateatur, eas, quæ reſident, bonas eſſe; morbumque naturam ſuperaturam indicare; ergo oppoſitæ non reſidentes, ſed perpetuo manentes turbidæ, oppoſitum indicabunt, quippe naturam morbo ſuperatum iri, Non clareſcere etiam turbidas urinas indicium eſt, eas non a calore naturali, ad concoctionem agente, turbari, ſed ab extraneo agente ad interitum: terminus enim earum, quæ a naturali calore turbantur, eſt clarefieri, veluti turbidarum a febrili calore, perpetuo turbatas manere, nihilque, aut quod bonum ſit, reſidere. Ex his, quæ in principio morbi turbidæ permanent, pejores ſunt, quam eæ, quæ in augmento turbantur, quo tempore naturalis calor, concoctionem aggrediens, ſolitus eſt aliquando urinas flatibus replendo turbare, ſed hæ paullo poſt bonum ſedimentum reponunt, ac clareſcunt. Perturbatis vero urinis, quæ claræ minguntur, & poſtea turbantur, quod praviores ceteris turbatis ſint, ut voluit Galen. *in primo de Criſibus cap. 11. in tertio Epidem. comm. 3. in text. 15.* & *in 4. lib. Aphoriſm. 70.* non equidem certe cognoſco: nam ſi per eas, quæ poſtea turbantur, præmonſtretur naturam debere concoctionem incipere, & per illas, quippe turbidas clareſcentes, non incepturam, ſed jam cœpiſſe, & aliquid concoxiſſe, indicabitur. Itaque ex turbidis urinis nihil reſidentes in acutis morbis erunt pernicioſiores, & merito ſane; quum multitudinem crudorum craſſorumque humorum adeſſe denotent, quę ut concoquatur, & ſuperetur a natura, longius temporis ſpatium requirit, quod nonniſi natura admodum robuſta abſolvet. Unde vehementibus morbis & corporibus debilibus hæ mortem præſagiunt. Ex coloribus, uti diximus, albæ, tenues, aquoſæ, in acutis morbis ſunt peſſimæ, quod, ut Galen. docuit, melius ſit, in bilioſo morbo urinas atque excrementa coloratiora ſpectari. Hippocrat. *in 2. Prognoſticorum pag. 40. lin. 42.* damnat urinam rufam, & tenuem, tamquam morbum plane crudum denotantem, ipſamque, ubi morbus diutinus fuerit, periculum ſignificare ægro, ne ipſe poſſit durare, quo ad morbus concoquatur; hocque præſagit, quoniam rufa urina, & tenuis ſit vehementis morbi indi-

Non reſidentes quando peſſimæ.

Urinæ perturbatæ quanam peſſimæ.

Albæ, tenues, aquoſæ, peſſimæ.

Rufæ & tenues malæ.

cium. Indicat enim intus magnum caloris incendium adeſse, & in hepate, aut in ventriculo, aut in ſepto tranſverſo adeſse flammeam aliquam inflammationem. In internis inflammationibus, & in acutis febribus, aurea urina diu permanens maxime eſt ſuſpecta, quod, ut dictum eſt, magnam alicujus viſceris phlogoſin, aut phlegmonem denotet. Nigra urina numquam ſine periculo in acutis morbis apparet, modo critice talis non excernatur, vel in ſuppreſſis menſibus melancholicis, copioſe prodeuntibus, aut cum larga ſanguinis eruptione per nares. Quibus modis nigras urinas conſpectas, non eſse timendas, in altero Cap. docuimus. In acutis vero morbis, aliquo illorum modorum non excretę, nigræ urinæ ſunt periculoſæ; ſanguinis enim uſti copiam, quæ non ita facile a natura concoqui poteſt, denotant. Quare Hipp. *in Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 46. dixit, nigram urinam rufa tenui eſse exitioſiorem, & in mulieribus atque in viris deterrimam. *ibid. lin.* 41. Hinc nigram quoque nubeculam in urinis damnavit, tamquam ſignum perniciale. Tenues vero nigras, & paucas urinas, fuiſse unum ex ſignis, quæ, quum febres ardentes inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet, Hipp. *in* 1. *Epidem. comment.* 2. *pag.* 944. *inter lit. E. & F.* meminit. Exitioſæ ſunt, quæ in aquoſas mutantur, cujuſmodi fuerunt, quæ in *muliere apud frigidam aquam decumbente libr.* 3. *Epidem. Ægr.* 2. *pag.* 1096. conſpectæ fuerunt. De hac Hipp. 11. *urinæ multæ, tenues, & nigræ: & vigeſimo*, ait, *Urinæ aquoſæ, & multæ, & malæ.* Quod Galen. *in comm.* notavit, quippe urinas nigras in aquoſas verſas eſſe letales. Auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 4. ſcribit, *urinas nigras in turbulentis & vigilibus eſſe phreniticas*, ideſt, phrenitides prænuntiare. Sed addimus nos ferinas ac letales in iis præſagire, quod ex atra uſtaque bile futuras prænonſtrent. Exitiales itidem eſſe nigras maleolentes, Galen. *in* 7. *Aphor.* 75. animadvertit. Demum urinæ perpetuo nigræ, tenues, aquoſæ, cum malis ſignis, mortem oſtendunt, quales in *muliere apud frigidam aquam decumbente lib.* 3 *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 1696. apparuerunt, de quibus Hippocr. in fine illius hiſtoriæ caſus, ait: *Urinæ hujus perpetuo nigræ erant, tenueſque, & aquoſæ, comaque conſequebatur, cibum faſtidiebat, animo erat dejecto, in ſomnis iracunda, implacida, animo melancholicho.* Peſſimæ omnium ſunt nigræ, cum nigro ſedimento. De his Galen. *in* 1. *lib. de Criſibus cap.* 52. ita habet: *Peſſima igitur eſt tota urina denigrata, adeo ut neminem umquam ſervatum viderim ex iis, qui talem minxerint. Minus vero pernicioſa, ſi ſolum id, quod ſubſidet, nigrum fuerit, atque adhuc minus, ſi ſolum id, quod in medio jacet, ac multo minus etiam, ſi nebula.* Oleoſæ quoque urinæ, in quibus præſertim pinguedines ſupernatantes, araneorum telis ſimiles, ſpectantur, ab Hipp. *in Prognoſt pag.* 40. *lin.* 52. damnantur. Et Galen. *in lib.* 4. *de ſan. tuen. cap.* 3. ait, haſce urinas in ægrotis eſſe pernicioſas, quod colliquationis ſint indicium: De *Pythione lib.* 3. *Epid. Ægr.* 3. *pag.* 1098. ſuper Herculis fanum decumbente, ait: *minxit oleoſum.* Poſt nigras oleoſæ ſunt peſſimæ, quod ingentis colliquationis ſint indicium, igneumque naturæ calorem prævalere ſignificent. Quales fuere obſervatæ in prædicto *Pythione*, atque in *muliere Cyzici ibid. Ægr.* 14. *pag.* 1114. hi enim urinas primo nigras, & mox oleoſas ſeu pingues, habuerunt. Non minus pernicioſæ ſunt pingues, poſt craſſas turbidas, non reſidentes, quoniam igneum ſeu febrilem calorem, a quo primo fuere turbatæ, nedum nihilo defeciſſe, at quinimmo magis plurimum auctum eſſe, ſignificant. Has in *uxore Dromedai lib. Epidemior. Ægrot.* 11. *pag.* 687. & in illo, *qui caleſcens cœnavit, & potavit largius ibid. Ægr.* 12. *pag.* 988. Hippocrates vidit. Hic enim *primo die rubras, craſſas, turbidas non reſidentes minxit, & quinto & ſeptimo oleoſas pingues, obiitque undecimo.* Illa vero *die ſecunda & tertia craſſas, turbidas itidem non reſidentes, & quarto & quinto oleoſas, obiitque ſexto.* Multæ iti-

Aurea quando malę.

Nigræ numquam ſine periculo.

Nigræ quæ in aquoſas mutantur exitioſæ.

Urinę nigræ maleolentes exitiales.

Nigræ cum nigro ſedimento omnium peſſimæ.

Oleoſæ quęnam in primis malæ.

Pingues quanam pernicioſæ.

Nihil juvantes aut quovis modo vitiata malæ.

tæ itidem tenues, aquosæ, sine contentis, nihil juvantes, aut quovis modo vitiosæ in acutis morbis, plurimum sunt timendæ. De his Hippocrat. *in 3. Epidem. comment. 3. pag.* 1058. *lit. F. text.* 41. *Urinæ multæ tenues, nihilque decretorii quicquam vel boni*; & postea *pag.* 1085. *lit. C. D.* de iisdem: *Urinæ multæ erant, neque erant illæ ex potu ingesto, sed illum excedebant, multumque etiam vitiosæ urinæ redditæ, neque enim inerat crassitudo, vel concoctio, vel purgatio proba.* Hippocrat. *in 3. Epidem. Ægrot.* 12. *pag.* 1080. *tex.* 26. dixit, *mulierem*, quæ *in foro mendacium* decumbebat, nono die multam urinam, in qua nihil subsideret, reddidisse; & quæ *apud frigidam aquam*, *ibidem Ægrot.* 2. *pag.* 1096. perpetuo habuisse urinas multas nigras, tenues, aquosas. Multæ quoque crassæ, aut turbidæ non residentes, aut quicquam non juvantes, maxime damnantur; multæque urinæ omnes in morborum principiis damnantur, & merito inutiles habentur, quoniam tunc temporis nihil concoctum excerni, nullamque probam purgationem fieri posse, alias a nobis fuit demonstratum. Paucæ tenues in ardentibus febribus, & acutis inflammationibus pessimæ existunt, quod indicent serum sanguinis igneo calore absumtum. Quæ si vitiosæ, eo pejores erunt. Quales in *uxore Dromedai ibidem Ægr.* 11. *pag.* 987. in adolescente *Melibææ lib. 3. Epidem. Ægrot.* 16. *pag.* 1117. & in filia *Euryanactis virgine ibid. Ægr.* 6. *pag.* 1073. Hæc enim, & adolescens *Melibææ* paucas tenues non boni coloris, & illa paucas tenues oleosas minxit. Paucæ itidem tenues fuere conspectæ in illa quæ apud *Tisamenum ibidem Ægr.* 9. *pag.* 1077. & in *ea* quæ apud *Pantimidem ibidem Ægr.* 10. *pag.* 1078. decumbebat. Qui omnes ægroti paullo post obierunt. Ubi vero propter igneum calorem, serosam humiditatem sanguinis prorsus absumentem, aut propter omnium functionum, ut Gal. *in 3. Epidem. comm.* 2. *in text.* 4. docuit, exstinctionem, urinæ plane restiterunt, in febribus exitium esse prænuntiatur. In *Sileno lib.* 1. *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 969. *moribundo*, ut Hipp. narrat, *sexto die restiterunt*, *atque die septimo nihil minxit*, *demum die octavo paucas reddebat cum dolore mordaces*, quæ nobis indicio fuerunt vehementis caloris, serum sanguinis tum absumentis, tum summe calidum acre facientis. In *muliere Cyzici*, *lib. 3. Epidem. Ægr.* 14. *pag.* 1114. *anginosa apud Aristionem agente*, *ibid. Ægr.* 7. *pag.* 1076. atque *adolescente Melibææ*, *ibidem Ægr.* 16. *pag.* 1117. propter facultatis exstinctionem, ante exitium restiterunt. Urinæ quoque paucæ, acres, nihil allevantes, letales existunt; quod summo caloris incendio, intus latente, seorsam omnem humiditatem absumi, humoresque inflammari, & Hippocrates animadvertit, *Silenum lib.* 1. *Epidemior. Ægr.* 2. *pag.* 969. ante mortem urinas paucas mordaces reddidisse. Ego vero *Guadagninam*, olim meam dilectissimam uxorem, atque alios, ardente febre letali vexatos, hujusmodi urinas paucas, summe acres ac vellicantes, sæpius minxisse vidi, quas paullo post exitium fuit subsecutum. Quæ etiam ex urinis nullum contextum habent, quippe neque sedimentum, neque suspensum, neque nubeculam, & malæ existunt, modo ægroti prius inediam non sustinuerint, ut Galen. *in* 2. *Prognosticorum* tradidit, aut plurimum laboraverint, aut vigilarint, aut corpora fuerint admodum biliosa, in quibus urinas absque contento spectari, non esse malum, Galen. *in* 1. *de Crisibus cap.* 13. testatum reliquit. Crassas vero absque sedimento in acutis morbis letales esse Galen. affirmavit. Malæ itidem sunt, quæ cum pauco sedimento, aut crudo, minguntur. De quibus Hippocrat. *in primo Epidemior. pag.* 940. *sub liter. G.* scribit: *Urinæ tenues & incoctæ & decolores, & paucæ, aut crassitiem habentes, & parvam subsidentiam, nec probe subsidentes, sed crudo quodam & intempestivo sedimento.* Galen. *in quarto Aphorismorum* 69. damnavit urinas crassas, propter gravitatem sedimenti: & Auctor *libri de Urinis capit.* 72. dixit, accidere aliquando, ut albus humor & crudus

Urinæ quænam inutiles.

Paucæ acres, nihil allevantes, letales.

Urinæ crassæ absque sedimento letales.

dus ſimul excernatur cum urina, & in imo ſubſideat inſtar bonæ hypoſtaſis: & Galen. *in 2. lib. Prognoſt.* dixit: crudum ſedimentum copioſum, morbum a multitudine crudorum humorum foveri, proinde reddi difficilem, indicare; craſſum itidem eadem ratione *in 4. Aphoriſm. 69.* maxime damnavit: de hoc ipſo Hipp. *in 7. Aphoriſm. 31.* ita habet: *Quibuſcumque febricitantibus in urinis fiunt ſedimina ſimilia farinæ craſſiori, longam ægritudinem fore ſignificant.* Dictum eſt alias ex Galen. *in primo de Criſibus cap. 12.* hæc ſedimenta craſſa, farinæ ſcilicet craſſiori ſimilia, quæ *Crimnodes* Græcis dicuntur, magnam ſane colliquationem præmonſtrare, & propterea in acutis morbis eſſe exitialia: & Galen. *in comment. Aphoriſm. 31.* de hiſce ſedimentis ita habet: *Liquet igitur & ex his exemplis, quod quicumque mingunt urinam ſimilem farinæ craſſiori, ſi ſalvari debeant, tarde liberantur. Quicumque vero exitialiter ſe habent, contingit hos quamcito interire:* & propterea has urinas exitiales facit, plorimoſque ait morte præripi, antequam ægritudo diutius protrahatur; & quicumque ex ipſis fuere liberati, in omnibus in longum productam fuiſſe ægritudinem: & merito ſane; quum diſpoſitio, in qua talis urina mingitur, multam requireret coctionem. Hipp. *in ſecundo Prognoſtic. pag. 40. lin. 38.* hæc ſedimenta maxime damnavit. Hoc ſedimen habuerunt urinæ *Sileni, lib. 1. Epidem. Ægrot. 2. pag. 969.* & illius, *qui in Dealcis horto decubuit, lib. 3. Epidem. Ægrot. 3. pag. 1066.* qui nonniſi ſpatio dierum quadraginta fuit ſervatus. Diximus itidem ſuperius, ſedimenta orobis ſimilia, ſquamoſa, furfuroſa, quæ Græcis *Oroboides*, *Petaloides* & *Pityroides* vocantur, quod ab eadem colliquatione fiant, ideo in febribus acutis, ubi minime vitio renum, aut veſicæ fiant, eſſe letalia. Hæc omnia Hippocrat. *in ſecundo Prognoſtic. pag. 40. lin. 38.* & *ſequenti*, hiſce verbis eſt complexus dicens: *Si urinæ ſedimentum referat ſpeciem farinæ craſſioris, malum eſt; deterius his, ſi ſquamularum inſtitutione conſiſtit: ſi vero tenue, & candidum admodum, eſt, vitioſum eſt; furfureum vero, deterius eſt.* Cognoſcimus non renum vitio fieri, ubi adſit febris acuta colliquans, nullumque læſorum renum ſignum appareat. Sedimentum quoque divulſum, quod cruditatem denotet, improbatur, quo apparente numquam tuto ſalus prædici poterit: eodem modo inæquale de quo Hippocrates *ſecundo Prognoſticorum, ibidem lin. trigeſima tertia. Si vero intermittit atque interdum pura mingitur, interdum ſubſidens candidum ac leve, morbus diuturnior, ac minus ſecurus eſt.* Subrubrum improbatur ab Hippocrates. *Ibidem linea trigeſima ſexta* quod morbum diuturnum oſtendat, etſi ſalutarem eſſe dixerit: Auctor vero *libri de Urinis* ait, ſubrubrum ſedimen defectum coctionis præmonſtrare, non tamen mortem. Verum quoniam omnis morbi longitudo eſt ſuſpecta, ideo non carere videtur pravitate, & maxime in corporibus imbecillioribus, morbiſque vehementioribus, quibus naturæ vires cito collabuntur, & ſæpius nondum concocto morbo. Nigrum ſedimentum eſt peſſimum in acutis morbis, quod cum nigra urina Galen. affirmavit eſſe omnium peſſimum; minus vero pernicioſum ſuſpenſum, & adhuc minus nubeculam eſſe. Ex ſuſpenſis improbantur clara, quod delirium ſignent, quod in *in Virgine Lariſſæ lib. 3. Epid. Ægr. 12. pag. 1110.* Hipp. notavit, & Gal. *in comm.* dixit, caſu delirium ſignificaſſe, non per ſe: quatenus, inquam, ſanguinem flatuoſiorem denotaret; quoniam ſi nullus flatus inſit ſanguini, ſuſpenſiones ad imum vaſis deferentur. Auctor *Prorreth. lib. 1. text. 4. 32. 37.* ſuſpenſum ſublime delirium portendere ſtatuit, & eo magis, ut ait Galen. ſi una aurium ſonitus adfuerit, atque ſi aliquis dolor coxæ, vel alterius partis inferioris, & a viſceribus remotæ, occultatus fuerit. Nigrum quoque ſuſpenſum, divulſum, inæquale, malum eſſe, ſed minus malum quam ſedimentum, dicit Galen. *in lib. de*

Farinæ craſſiori ſimilia ſedimenta habentes mala.

Orbis ſimilia ſedimenta habentes.

Sedimentum divulſum habentes mala.

Subrubrum.

Nigrum.

Urinarum ſuſpenſa quanam mala.

Suſpenſa in urinis clara quid præſagiunt.

Nigra divulſa inæqualia mala.

Urinis

Urinis cap. 17. Nubeculam quoque nigram damnavit Hipp. *in* 2. *lib. Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 41. Pingue itidem ſupernatans malum eſſe ait *ibidem lin.* 52. quod conſumtionem ſignificet. Ego ſæpius nubeculam juxta ſuperficiem urinæ, circuli modo evectam, atque elatam in iis, qui phrenitici obierunt, vidi. Proinde hanc in acutis turbulentiſque febribus eſſe pernicialem cognovi. Quare ubi contenta, quæ ſecundum naturam ſe habent, fuerint ad ſuperficiem urinæ multo ſpiritu evecta, pravum in capite, neque exiguum affectum prænuntiant. His addimus, urinas in non recordantibus & inſciis ægrotis mictas, de quibus *in* 1. *Prorrhet. text.* 29. hæc leguntur: *Urinæ excretio in non recordantibus, perniciosa.* Denotat namque, teſte Galeno, periiſſe naturalium functionum intellectum. Hocque aut cerebro læſo, ægrotis quippe delirantibus, fit, aut exſtincta naturali facultate. Unum reſtat admonendum, quippe urinas in multis exitioſiſſimis febribus mingi ſubſtantia, colore, atque contentis, recte valentium urinis ſimiles, haſque optimas ignaris Medicis videri, Medicoſque maxime decipere. Quæ tamen in iis mortem portendunt inevitabilem; quod nobis indicio ſint, bilem, qua colorantur urinæ, aut cerebrum, aut aliquod aliud viſcus invaſiſſe, nihilque ſuccorum noxiorum cum urinis excerni, quod ſumme exitioſum eſſe in phreniticis, ac vel etiam in pleuriticis, peripneumoniciſque, Medici obſervant: nihil enim, ut proxime dicemus, in pleuriticis eſt perniciosius, quam in ipſis ſputa non excerni, & quæ excernuntur, flavum colorem non habere permixtum.

Pinguia.

Urinæ recte valentium quare ſæpe exitiales.

CAP. XVI.

De prædictione ex ſputis, & primo quid ſit ſputum, quas partes læſas denotet, differentiæ & cauſæ.

ETSI quicquid per os non vomitione rejicitur, ſputum Medici appellent, quippe, ſcreatu, ſimplici ſpuitione, atque tuſſi; nihilominus illud ſputum proprie magis dicunt, quod tuſſi excernitur, de quo, quod ad noſtrum inſtitutum maxime faciat, nimirum ad judicandam prognoſim, in præſentia accuratius itidem ſcribemus. Hoc vero, quippe tuſſi excretum, excrementum eſt pituitoſum mucoſum, modo ſimplex exeat, minimeque aliis humoribus mixtum, quod ex cerebro in pulmones deſtillavit. Aliquando tamen bilioſa, aut purulenta mera rejiciuntur, quæ peſſimarum paſſionum ſunt effectus. Hæc inquam per tuſſim excreta, ſputa, ut diximus vocata nobis, Galen. Auctore, indicia ſunt affectionum tum pulmonum, tum thoracis, tum aſperæ arteriæ, tum gutturis, atque, ut in ſumma dicam, reſpirationi ſubſervientium inſtrumentorum omnium. Differunt vero inter ſe ſubſtantia, figura, colore, quantitate, ſimplicitate, & miſtione, odore, ſapore, ſcreationis facilitate, atque allevatione, aut auctione doloris, atque tuſſis. Subſtantia enim tenuia ſunt, craſſa, viſcida, & viſciditatis expertia. Figura plana, æqualia, rotunda, ſpumoſa, cruenta ac purulenta. Colore alba, pallida, flava, rufa, rubra, viridia, livida, nigra & quædam verſicolora. Quantitate vero multa, pauca, & nulla. Simplicitate, ac miſtione, ſimplicia *mera* vocata, atque miſta. Odore, ægreolentia, & quæ non male olent. Saporibus, inſipida, dulcia, ſalſa, amara, & acria. Facilitate exſcretionis, & difficultate, quæ facile tuſſi rejiciuntur, quæ difficulter, & quæ nullo modo. Quæ dolorem & tuſſim ſedant, quæ augent: ac demum concocta, cruda, atque maligna.

Sputum quid.

Quas partes læſas denotat.

Sputorum differentiæ.

Horum omnium cauſſæ ſunt dignoſcendæ, & primo tenuium liquidorum. Quæ (Galeno Auctore *in lib.* 6. *Epid.*) fiunt a calore debili cerebri, aquoſum excrementum minime coctum facientis, quod neque in pulmonibus, de-

Cauſa ſputa tenuia liquida unde.

fectu multi caloris, craſſeſcit. Hoc ipſum in pleuriticis principium eſſe coctionis ſtatuit. Veluti craſſum ſputum perfectæ coctionis eſt nota. Matureſcentia enim ſputa e tenuibus, ſeu liquidis, craſſeſcunt. Viſcida mediocriter fiunt ſputa, quum liquida percoquuntur. Quæ vero valide viſcida exiſtunt, indicant intenſum calorem, humidum reſolventem, qua ratione pituita, calore eximio agitata, craſſeſcit, atque lenta evadit. Hęc in pleuriticis & pulmoniis peſſima ſunt; vix enim, quia tam firmiter partibus adhæreſcunt, projici poſſunt, ſæpeque leves pulmonum arterias obſtruendo ſuffocant. Quod *Antipatro* Medico Romano contigiſſe Gal. *in lib. 4. de affect. cap. 6.* memoriæ prodidit. In pleuriticis, pulmoniis, ac vel etiam in aſthmaticis, quod projici non poſſit, ſtertorem ac ebullitionem inducit, ſæpeque ſuffocat, aut empyema facit. Dilutior vero pituita, expers lentoris, debilis caloris, humidum tenue non abſumentis, eſt nota. Plana & ęqualia tum unius ſimpliciſque eſſentiæ pituitam, tum ęque calore agitatam denotant: contra inęqualia varieque figurata. Spumoſa, diu ſpumam conſervantia, quę a pituitoſa viſcidaque ſubſtantia, caloreque multo agitante, fiunt; quod valde ſpumans merito Galen. *in lib. de totius morbi tempor.* damnavit. Fiunt vero etiam hæc ſputa flatulento ſpiritu pituitæ, vel alio humore mixto, qualia ex pulmonibus, plurimo aere excrementis permiſto, fiunt. Qua ratione *Paullus* ſcribit e gutture ſpumoſum, propter commercium reſpirationis, ſæpius ſputum rejici. In pleuriticis, & peripneumonicis non e flatu, ſed collecto igneo calore, in partibus affectis, excrementa ſpumoſa extuſſiuntur. In quibus ſi ſanguis ſpumoſus appareat, pulmonis ſubſtantia læſa, uti docuit Gal. indicatur. Quinimmo neceſſario ſanguinis ſputum ſpumoſum, ſubſtantiam pulmonis ulceratam, *lib. 5. Aphoriſ. 13.* Hipp. denotare, conſtat. Rotunda vero, quæ tuſſi excernuntur, fieri ab humore craſſo, & tenaci, in fibris pulmonis collecto, atque a calore inſigni, Galen. *in lib. 6. Epidem.* tradidit. Addimus formam rotundam, quod glutinoſus humor, in aſpera arteria contentus, eamdem cum illo formam acquirit, ſiquidem ipſa globoſa eſt, & cavitate interiore in orbem circumducta. Hæcque in quibuſdam, febre vacantibus, vidi, qui per valde longum temporis intervallum nihil mali pati videbantur, attamen iſti omnes poſtea phthiſici contabuerunt. Hæc Hippocr. *lib. 6. Epid. ſect. 3. text. 27. & ſect. 6. text. 21* delirium demonſtrare docuit, forte ex caliditate, quam notant, caput replent, ut Galen. *in 4. de loc. affect. cap. 8.* expreſſit, at numquam per ſe ſola delirium poſſe prænuntiare. His ſunt proxima, quæ grandinis granis ſimilia ſpectantur: hæc ipſa Galen. in quodam vidit, qui, quin phthiſicus contabuerit, effugere non potuit. Cruenta autem fieri a ſanguine exeunte, aut venis apertis, *Anaſtomoſin* Græci dicunt; quod ſi ita effluat, nullus dolor aderit, nulla inflammatio, nulla febris, eſtque ſanguis aquoſus & tenuis, multus ex magnis, paucus ex paucis promanans venis; aut eroſis, (*Diabroſin* & *Anabroſin* appellant) quem affectum notant, tuſſis moleſta abſque cauſſa manifeſta, ſanguis principio paucus, & nonniſi per intervalla exiens, aliquando copioſus, ubi inſignis fuerit eroſio, & magnorum vaſorum præcedunt deſtillationes; aut demum venis itidem ruptis, quem eriam affectum vocant *Peririxim*. Cujus notæ ſunt, dolor, & præſertim, ſi ex thorace & ex pulmone, juxta membranam, ſanguis copioſus, cauſſæ ruptionis antegreſſæ, veluti eſt humorum abundantia, vehemens motus, clamor, caſus, ictus & alia ſimilia. Itaque ſputa cruenta fiunt a ſanguine, ut dictum eſt, aut venis apertis, aut exeſis, aut denique ruptis. In pleuriticis vero hæc ſputa rejiciuntur, quum natura præſertim materiam aggreditur; hanc etenim paullatim attenuat, proinde laxatis viis, ex quibus vapor exhalat, tenuior pars, & vicina vapori, per raritatem pororum elabitur in interna & vicina ſpatia, ex quibus, tuſſi ſublata, & ſputo excluſo,

Viſcida an e.

Plana & ęqualia. Inæqualia, variaque figurata, ſpumoſa.

Rotunda.

Grandinis granis ſimilia. Cruenta.

cluſo, initium coctionis præmonſtratur: ſunt vero pituitæ miſta; proinde has mitiſſimas pleuritides, Galen. *in 6. Epidem. comm. 3.* eſſe ſtatuit. Valde cruenta vero ſputa in iis Auctor Coac. præſag. *text 390.* maxime damnavit, quod veluti ſincerus ſanguis exeat, atque aliud vitium denotet; aut enim vaſorum quorumdam διαβρῶσις, a bile acri, & erodente, quæ ſanguinem attenuat, & venas aperit, ſignificatur; aut ῥῆξις, ideſt ruptura a vehementiori thoracis compreſſione, quæ nihil ex phlegmone foras excludere poterat. Purulenta vero ſputa a ſanguinis ſputo phthiſin indicare futuram, Hippocrat. *in libr. 7. Aphoriſm. 16.* tradidit: at in pleuriticis, & peripneumonicis ſuppurationem, & empyema, a qua tabes: quum enim materia quatuordecim diebus non repurgatur, aut ægrotos ſuffocando interimit, aut putreſcit magis, & in pus convertitur: cujus ſigna ſunt horror, vel de novo, aut auctior, febris vehementior, & gravitas, ſeu pondus; de hoc Hippocr. *in 2. lib. Aphoriſm. 47.* ita habet: *Circa puris generationem dolores ac febres contingunt, magis, quam ubi jam eſt genitum.* Sed de purulentis ſputis poſterius etiam nos accuratius. Nunc ad varios ſputorum colores. Alba itaque cernuntur ſputa, ubi id, quod excernitur, eſt pituitoſum, aut purulentum. In morbis pituitoſis utilia ſunt, in bilioſis vero quum inutilia, tum mali indicii; quod nihil de materia, pleuritim faciente, educi præmonſtrent: de albis ex pure nuperrime ſermo eſt habitus. Flava vero, pallida, nigra, e bile flava, pallida, ac nigra reſudante fieri, Galen. *in libr. 6. Epidem. comment. 4. text. 4.* notavit. Quos ſputorum colores hiſce verbis *in libr. 2. de loc. affect. cap. 9.* eſt complexus; ſcribit enim *cap. 9. Quippe jam oſtendimus omnem inflammationem ex affluente fieri ſanguine. Quapropter ſi bilioſus fuerit ſanguis, flavum aut pallidum erit ſputum; ſi pituitoſus & ſpumans, candidum; ſi melancholicus, aut nigrum, aut lividum; ſi nihil horum ſanguinem infecerit, rubrum. Quin etiam in pleuritide ſæpe numero magis bilioſum, in peripneumonia vero magis pituitoſum.* Verſicolora multorum affectuum (Galen. auctore) ſunt indicia, proinde morbum difficilem præmonſtrant. Multa, multitudinem humorum, quæ ſi facile excernantur, ſintque alba, craſſa, concoctum eſſe phlegmonem, ac ſuperatum; ſi vero purulenta, & in ipſis pus ſit album, leve, æquale, non fœtens, denotant, phlegmonem ſuppuratum per puris excretionem finitum iri; ſi bilioſa, viridia, livida, nigra, morbum crudiſſimum & valde malignum, & vix a natura debellandum. Pauca, etſi concocta, non pro ratione morbi, inutilia ſunt: quo merito in peripneumonia ab ipſis timendum, auctor *Coac. præſ. text. 416.* nos docuit. Qualia fuere in *uxore Euxenii* ab Hipp. *in 7. Epid. pag. 1124. tex. 58.* obſervata. Nihil vero excerni in pleuriticis ac pulmoniis, ſumme eſt periculoſum; ubi potiſſimum non principio morbi, ſed poſtea quoque ſputum omnino non appareat. Nihil omnino exſpuere idem in pleuriticis ſignificare, quod in aliis febribus urinæ aquoſæ, quippe ſummam morbi cruditatem, Gal. *in 1. lib. de Criſib. cap. 18.* docuit. Quo inflammationem ſeu phlegmonem, concoctu difficilem, ac diuturnam prænonſtrari *in 1. Aphoriſm. 12* meminit: & *in lib. de conſtitut. art. medend. cap. 16.* ait, nihil exſpuere eſſe pernicioſum; partim quod ſignificet fluxionem phlegmone quaſi devinctam teneri, partim vero, quia ea unica univerſa interius contenta corrumpantur. Hinc Auctor *Coacorum præſagiorum text. 381.* ſiccas pleuritides, in quibus nihil exſpuitur, merito fecit periculoſiſſimas, & Galen. *in lib. de Criſibus cap. 10.* ait: *Nam quum paſſio exquiſite anguſta fuerit, & veluti alligans in ſeipſum univerſum fluxum cohibuerit, tunc facit morbos letales, qui ἄπτυστοι, ideſt, ſine ſputo nominantur*: & in libro *de totius morbi tempor. cap. 16.* nihil omnino exſpuere cum ingenti dolore & ſpirandi difficultate, eſſe exitiale, ſtatuit. Non minus malum eſſe, ſputum in iiſdem malis, citra rationem, ſupprimi, Galen. itidem in *libro de Conſtitut. Art.*

Sputa purulenta unde.

Alba.

Flava, pallida nigra.

Verſicolora. Multa.

Bilioſa, viridia, livida, nigra.

Sputa pauca quid notant.

Nulla in Pleuriticis quid notant.

Suppreſſa.

Art. Med. notavit; hoc fieri, aut propter humoris lentorem, & craſſitudinem, aut membranæ pulmonem continentis laxitatem, aut denique propter facultatis in ægro debilitatem, *in 2. Prognoſt.* Galen. expreſſit. De his auctor *Prorrhet. lib. 1. text. 97. Lateris dolor ex ſputis bilioſis ſi abſque ratione evanuerit, in furorem aguntur.* Galen. *in comment.* ait: *hoc non perpetuo fieri, ſed tantummodo, quum bilioſi humoris ad caput ipſum fuerit tranſitus.* In tabidis & ſuppuratis nihil pejus, quam ſputi ſuppreſſio; in his phthiſin, aut mortem, atque in illis exitium ſignificat. Gal. *in lib. 7. Aphoriſ. 16.* ait, tamdiu tabidos extenuatos vivere, quamdiu per tuſſim pulmonem expurgare poſſint, atque ubi intus pus remanet, ob reſpirationis obſtructas vias, ſubito ægros ſuffocari; quod Hippocr. *in 7. Aphor. 16.* ita expreſſit: *A puris ſputo phthiſis, quum vero ſputum retinetur, moriuntur.* Exſcreatio itidem, quæ non repurgatur, nec projicit ipſam pulmo, ſed ob nimiam plenitudinem fervet in gutture, multitudinem & lentorem, atque facultatis imbecillitatem præmonſtrat; ſed de hoc poſtea accuratius ſcribemus. In pleuriticis, peripneumonicis, empyis, atque tabidis, facile ægrotos ac cito exſpuere, optimum eſt, ut docuit Galen. *in lib. de Conſt. Art. Medend.* In pleuriticis, & peripneumonicis, naturam cœpiſſe concoquere, ſputaque prava qualitate carere, nobis oſtenditur; in ſuppuratis ſperatur pus poſſe ita repurgari, ut ad tabem ægroti non adducantur. De iis ſputis Hippocrat. *in 2. prognoſtic. pag. 41. lin. 13.* dixit: *Screatio in omni dolore, qui affligat circa pulmonem & coſtas, cito promteque ſcreetur, neceſſe eſt.* Hoc enim oſtendit quum vitalis facultatis robur, tum animalis in cerebro, & muſculos, qui naturæ inſerviunt, in efflatione, neque ductus obſtructione, aut preſſu impediri, neque materiam, aut ita lentam ex partibus eximi, aut ita craſſam, vel tenuem, ut rurſum attolli non poſſit. Sincera vero ſputa, *mera* quoque vocata, pituitoſis exceptis, fiunt, teſte Galeno *in lib. de Humoribus*, quæ nulli aquoſæ humiditati ſunt permiſta, ubi præſertim calor flammeus omnem humiditatem conſumſerit, quo fit, ut intus incendium caloris eſſe denotent, atque morbum difficillimum, quod illa ſputa ſint maligna, vixque rejici queant. Hipp. *in 2. Prognoſt. pag. 41. lin. 19. & ſeq. flava ſincera* damnavit, ſed omnium maxime *nigra*. Contra miſta aquoſo humido apparent, ubi hoc ipſum haud calore febrili abſumitur, aut plurimum pituitoſi humoris abundaverit. Miſta quoque apparent aliis humoribus, quæ *varia* vocari diximus, atque his multo pejora, quippe quod multiplicem affectum ſignificent. Fœtida itidem, quod graviter olent, inſignem humoris facientis putredinem denotant. Qua ratione Galen. *in libro de totius morbi temporibus cap. 6.* ſputum impenſe fœtidum in pleuriticis, & peripneumonicis maxime damnavit, & Hippocrat. *Coac. præſag. text. 406. 409.* ad mortem deducere ait ſuppuratos. Inſipida ſputa cruda pituita facit; concocta dulcia, itemque cruenta, & pituita ſanguini permiſta. Salſa redditur pituita, quum a calore nimium agitata & aſſata, tum, ut Arabibus viſum eſt, aut retorridis vaporibus, aut bilioſis humoribus miſta. Acria ſunt & amara ex flava, rufa, & æruginoſa bile: acida ex humore melancholico. Quæ dolorem levant, optima cenſentur, quod probam notent humorum vacuationem, juxta illud Hippocrat. *libr. 1. Aphoriſmorum 25. ſi qualia purgari oportet, purgentur, confert.* Qua ratione Hippocrat. *in Aphoriſm. libr. 2. Aphoriſ. 2.* dixit: *ſomnus delirium ſolvens, bonum. Contra malum.* Idemque in doloribus lateris, ac pulmonum fit, & ubi ſputa dolores non allevant, inutilia habentur, pejoraque, ipſum dolorem augeſcentia. Hæc ſi cum dolore pravam etiam qualitatem habeant, mortem; illa quippe per ſeipſa non prava, tamen dolorem non allevantia, ſuppurationem præmonſtrant. De his Hippocrat. *in 2. Prognoſt. pag. 41. lin. 35. Quicumque autem dolores ex his ſedibus non deſinunt, neque ſcreationum purgationibus,*

In tabidis & ſuppuratis.

Sputa Pleuriticis mala.

Quanam bona.

Inſipida unde ſalſa.

Acria & amara. Bolorem levantia.

Dolorem non allevantia.

nibus, neque ventris ſubductionibus neque venæ inciſionibus, & medicamentis, & victus rationibus, in ſuppurationem verti, ſciendum eſt. De illis quippe dolorem non ſedantibus *pag.* 41. *lin.* 33. *Omnes autem exſcreationes malæ ſunt, quæ non ſedant dolorem; peſſimæ vero nigræ, ut deſcriptum eſt, quæ vero ſedant dolorem, meliores ſunt.* Eodem quoque modo ſputa, quæ tuſſim ſedant, optima ſunt; quoniam humorem, inflammationem atque tuſſim facientem, commode purgari ſignificant: contra, quæ multam tuſſim concitant; namque aut vitio meteriæ, quæ cunctatur in pulmonibus, aut inſtrumentorum, aut facultatis infirmitate, ipſe humor, admodum craſſus, magna difficultate attollitur, & in anguſtiis quibuſdam ſic intercluditur, ut quoſdam ſuffocet, & admodum viſcidus a partibus, quibus adhæreſcit, eximi non poteſt, ac ſæpe ſublatus intra pulmonis fiſtulas, glutinis modo hærens, detinetur; tenuis denique, circa ſpiritum diffluens, ægre exſpuitur. Atque hiſce omnibus multa tuſſis excitatur, quam toilunt, atque compeſcunt, quæ moderate craſſa, non admodum viſcida, neque tenuia. Hippocrat. propterea ſputa tuſſim multam concitantia *in Prognoſticis ibid. lin.* 18. maxime damnavit. Concocta demum ſunt ſputa in pleuriticis ac peripneumonicis, alba, levia, non admodum, ut Gal. *in* 2. *Progn. text.* 45. docet, tenuia, vel craſſa, quæque facile exſpuunt, æqualiſque conſiſtentiæ. Hæc fiunt natura vincente morbum. In ſuppuratis vero, *Hipp. Auct. Progn pag.* 42. *lin.* 45. quod eſt, album, purum atque fœtoris expers. In *Prognoſticis pag.* 41. *lin.* 15. quoque ſputum, cui ſit permiſta flava bilis, maxime in pleuriticis commendavit, utpote quod denotat, plurimum materiæ facientis inflammationem recte purgari. Contra tenue, aut nimis craſſum, vel viſcidum, vel tenue, crudum eſt, nondum naturam quicquam concoxiſſe explicans. Maligna vero ſunt, ſincera flava, rufa, viridia, livida, nigra, verſicolora, impenſe fœtida, dolorem augeſcentia atque tuſſim, cum difficillima reſpiratione. Atque hæc de diverſorum ſputorum cauſis: nunc ad ſputa ſalutaria, quæ ſpeciatim ſalutem denotant, deſcendimus.

Optima.

Mala.

Sputa lœna in pleuriticis.

In ſuppuratis.

Maligna quænam.

CAP. XVII.

De ſputis bonis, ſalutem prædicentibus.

DE bonis ſputis, ſalutem denotantibus, agentes, primo hæc qualia in & abſque febre, tuſſi, reſpiratione difficili, aut dolore vexatis, ſpectari debeant, dicemus: ſecundo in pleuriticis, & peripneumonicis: atque tertio in ſuppuratis. Itaque in affectibus thoracis, abſque inflammatione & febre, optima ſunt ſputa alba, levia, æqualia, modice craſſa, parum viſcida, æqualia, nullo colore pravo infecta, quippe flavo, aut pallido, aut rufo, aut viridi, aut livido, aut nigro. Quemadmodum colore tincta, & præſertim flavo, Galen. *in lib.* 4. *de loc. affect. cap.* 8. maxime damnavit, de quibus in ſequenti capite nos accuratius. Bona itidem ſunt, quæ facile excernuntur, abſque multa tuſſi, & quæ & ipſam, & difficilem reſpirationem ſedant. In pleuriticis vero, & peripneumonicis ſputa ſalutaria exiſtunt, quæ recte valentium non diſſimilia apparent, teſte Galeno *in primo libro de Criſibus cap.* 7. neque enim fieri poteſt, ut pectoris pulmonumque partibus maxime læſis, ſputa recte valentium ſimilia excernantur, ſed quinimmo ipſa diſſimilia fieri, eſt neceſſarium. At quæ ſimilia ſunt recte valentium ſputis, nonniſi in ſtatu morbi exſcreantur, quo tempore morbus perfecte eſt concoctus. Hinc *Gal. in* 1. *Aphor.* 12. dixit, ſputa concocta eſſe alba, levia, æqualia, non admodum vel tenuia, vel craſſa, quæque promte facileque excernuntur. Et idem *in lib.* 6. *Epidemior. text.* 44. dixit, in pleuriticis, & in Peripneumonicis, in principio ægrotos, ſi ſalutari morbo laborent, aliquid exſpuere, atque hoc

Sputa quænam bona.

In Pleuriticis & Peripneumonicis.

coctio-

coctionis principium propterea indicare, quod ſi tenue exſpuant, mediocrem concoctionem, & craſſum, perfectam; & *in* 1. *Aphoriſm.* ait: in iis affectibus ægrotos nihil exſpuere, morbum ſignificare crudiſſimum; coctionis principium, aliquid exſpuere, tenue tamen; quod ubi craſſius evaſerit, majorem coctionem; & ubi craſſum, ut dictum eſt, album, leve, æquale, facile exſcreatur, perfectam coctionem præmonſtrare, Quare optimum erit ſputum album, uti dictum eſt, leve, æquale, facile eductu. Cujuſmodi in *Anaxione* Hippocr. *lib. 3. Epid. Ægr.* 8. *pag.* 1104. vidit die vigeſima ſeptima. Quod forte non videtur omnino verum, ſi Hippocr. *in 7. lib. Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 15. verum ſcripſit, dicens: *Permiſta appareat flava bilis admodum ſcreationi oportet*: & paullo poſt: *ibid. lin.* 29. *Screatio flava non multo permiſta ſanguine, in pulmonis morbo, ſi in initio excernatur, ſalutaris admodum eſt* Qua etiam ratione auctor *Coacor. præſagior. text.* 366. ſcripſit, *in doloribus pleuriticorum utile eſſe, ſputum colorari*, & *text.* 390. *in omni pleuritide & peripneumonia optimum eſſe, ſputum facile citoque excerni, miſtum flavo ſputo*: ex quo non modo ſputa alba, bona erunt, ſed flava, cruenta, pallidaque exſcreationi permiſta. Hoc quidem veriſſimum eſt, attamen non in ſtatu, ſed in principio vel in augmento; quod nulla alia ratione fit, quam quod hæc ſputa inflammationem ex bile flava, ac ſanguine fieri præmonſtrent, quæ ceteris aliis, ex aliis humoribus concitatis, minus periculoſa, ut Gal. oſtendit, exiſtit, atque etiam, quoniam humoris, inflammationem facientis, aliquid evacuari denotent. Hæc itaque ſputa in principio, & in augmento morbi educta, haud erunt inutilia. Quæ ſi tardius, ut ait Hippocr. *Coac. præſ. tex.* 385. & 390. talia excernantur, minus tuta exiſtunt; quia & morbum tardius coquendum denotant, & longitudinem morbi, numquam periculo vacantem, præſagiunt. Non ſunt tamen letalia, ſed longum modo morbum præmonſtrantia, non inutilia, uti dictum eſt, quod aliquid humoris, facientis inflammationem, purgari ſignificent, atque etiam inflammationem non eſſe malignam, ſed faciliorem, ac ſecuriorem, quam quæ ex aliis fiunt humoribus. Quo fit, ut neque viridia, neque nigra, neque verſicolora, bona ſint: ſiquidem a pravioribus ſuccis inflammationem eſſe concitatam notent, ac proinde flavis & cruentis viridia, & nigra ſputa ſint praviora. Bona itidem ſunt ſputa, ſi, præter nuper dictas notas, hoc etiam habuerint, ut facile promteque educantur. Quod Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 13. ita meminit: *Screatio in omnibus doloribus, qui ſunt circa pulmonem & coſtas, cito promteque ſcreetur, neceſſe eſt*, cito vero exſpuitur, ſi intra tertium diem aut quartum appareat, quod ſi bonum ſit, morbum quum brevem tum ſalutarem oſtendit, teſte Galen. *libr. Aphoriſ.* tum *in* 1. *lib. de Criſ. comm.* 3. *text.* 18. tum *in* 6. *Epid. comm.* 3. *text.* 79. Multum vero & concoctum in die decretorio, optimum eſt, atque unum ex judicatoriis judicantibus dicitur, quod ſi dolorem tollat, tuſſim, atque febrem, alio opus non habebit ſigno, ut optimum ac criticum ſputum judicetur. De *Anaxione Epidem. lib.* 3. *Ægr.* 8. *pag.* 1104. *text.* 95. ait: *Decimo ſeptimo cœpit pauca concocta excernere, levatus eſt. Vigeſimo ſeptimo rediit febris, tuſſiit, multa excrevit concocta, in urina multa ſubſidebant alba, deſiit ſitire, dormivit*. Addamus optima itidem eſſe, una cum alia bona vacatione conſpecta. In ſuppuratis eodem modo ex Hippocr. *in libr.* 2. *Prognoſt. pag.* 42. *lin.* 49. *ſputum optimum eſt, album, leve, concolor, vacans pituita, abſque labore & valida tuſſi eductum*. Sed addimus copioſum, quod febrem, ſitim, tuſſim, atque malam reſpirationem tollat: ſed de his paullo poſt accuratius agemus. Nunc tranſeamus ad ſputa exitialia.

In ſuppuratis,

CAP.

CAP. XVIII.

De malis ſputis, exitium prædicentibus.

NUNC ſputa mala, exitium præſagientia in iis, qui nullo morbo laborant, recenſeamus, a pituitoſis exordientes. Quorum quæ diu ex capite in pulmonem deſtillant, ſubſtantia admodum tenui, vel craſſa, viſcida, copioſa, figura rotunda, ſapore ſalſo aut acri, maxime ſuſpecta eſſe ſolent. Admodum tenuia tuſſim moleſtiſſimam concitant; & craſſa obſtruendo vias reſpirationis, ſuffocationis periculum inducunt, idem & viſcida, diu pulmonis brachiis adhærendo. Quæ, ſi ſalſa aut acria ſint, arterias exedendo ad cruentum ſputum viam parant, & ab eo ad pus, atque tandem ad phthiſin. Rotunda ſputa, quæ a tenaci craſſaque pituita, & a multo calore fieri oſtendimus, perpetuo homines ad phthiſin maxime ſuſpectos reddunt. Galen. *in 6. Epidemior.* ſcribit, hæc in febre etiam vacantibus vidiſſe, qui etſi per valde longum temporis intervallum quicquam mali pati non videbantur, tamen iſtos omnes phthiſicos contabuiſſe; & *in quarto libro de locis affectis cap.* 8. quædam ſputa grandinis granis ſimilia ſe vidiſſe ſcripſit, qui, quin phthiſicus fieret, effugere non potuit. Bilioſa quoque ſputa maxime in ſuſpectis ad phthiſin a Galeno damnantur. Hæc vero colore aut flavo, aut pallido, aut rufo, & ſapore, aut acri, aut amaro, nobis innoteſcunt. Coloribus iis hæc manifeſte deprehendimus, quod hi colores, præſertimque flavus, & pallidus bilem amaram, teſte Galeno *in libro ſecundo de locis affectis cap.* 10. denotent. Saporibus non ita certe: ſiquidem ob permiſtam pituitam ſapores iis hebeſcant, & obſcurentur. Unde Medici, alioquin eruditiſſimi, aliquando decipiuntur, quod bilioſum humorem intus in pulmone deliteſcentem non agnoſcant, quod ſputa, etſi flava, vel pallida, vel rufa appareant, minime acria vel amara obſervent. In quibus tamen exeſis pulmonibus cruenta ſputa, vel purulenta, poſtea redduntur, atque inde tabes. De his Galen. *in lib. 4. de locis affect.* ita habet: *Quidam humorem repente exſpuit liquidæ bili in colore perquam ſimilem, medium videlicet inter flavum ac pallidum, at nulla acredine infectum, atque ita quotidie majorem ejus quantitatem exſpuit, deinde levi ſuborta febricula tabeſcere incepit adeo, ut purulenta ſcrearet, poſtea tractu temporis, quatuor videlicet menſium, exiguum cum pure cruorem rejecit, atque ſic aucta febre magis conſumebatur, ac iterum atque iterum pus exſpuebat, adeo, ut magnam ſputi quantitatem redderet, quocirca magis increſcente febre, ac reſolutis viribus, eorum, qui tabe marceſcunt, exemplo, mortem obiit. Deinde alium vidi eodem fere modo ſex menſibus, ac alium quoque diutius laborantem; igitur, qui primus nobis occurrit, initio quidem nihil mali habere, ſed tandem peſſime affici viſus eſt, alterum vero quum conſpiceremus, ei ſtatim ab initio cognito malo, præſenti medicamento ſuccurrere tentavimus, ac multo magis etiam tertio. At quamvis multo negotio utrumque liberare conaremur, nihilominus neque horum ullus, neque alius poſt eos, ſervari potuit. Quum enim morti jam proximi eſſent, pulmonis ipſius putres quaſdam partes exſpuebant.* Ceterum mirum eſt, quamobrem, quum hæc ipſa ſputa nullam acredinem habeant, vel amarorem, poſſint pulmones inficere. Sed adhuc magis mirum videtur, cur fit, quod apparentibus ſputis pituitoſis, omni ſapore acri, amaro & ſalſo omnino vacantibus, pulmones inficiantur. Hoc vero fit, aut quod omnis bilioſus humor acris intus deliteſcat in pulmones, ipſorumque brachiis adhæreſcens, ipſos exedat, aut quod ipſa pituita putreſcendo acrimoniam acquirat, qua exedit, ac putrefacit pulmones. Qua ratione fortaſſe & aer phthiſico contagio infectus, quippe ſumme acris redditus, pulmones

Sputa pituitoſa mala.

Bilioſa.

Pulmones inficiuntur, & unde.

mones eorum, qui in eo habitant, inficit. Cur vero fit, quod ſputis flavis aut pallidis apparentibus, acri, amaro ac ſalſo ſapore vacantibus, homines ad tabem ducantur? Hoc vero fit, quod pituitoſi humoris miſtione in ipſis ſapor facilius, quam color occultetur, & acerrimus ſummeque putridus humor, in pulmones deſtillatus, eos exedat; vel dicetur, iiſdem ſputis flavis aut pallidis conſpectis, vobis ſignificari intus in pulmones collectum eſſe multum humorem bilioſum, quo pulmones putrefiunt, exeduntur, atque homines ad tabem provehuntur. Nigra quoque ac melancholica ſputa, peſſima eſſe, vel ex eo cognoſcitur, quod Galen. *in lib. de Conſtitut. Art. Med. cap.* 16. ſcripſerit, pernicioſiſſimum eſſe melancholicum humorem præpollentem; tum quod & præditus ipſe ſit moribus peſſimis, & maxime erodat, concoquaturque ægre, nec facile expurgetur; tum quod plurimæ ſit caliditatis index, a qua aſſatus & genitus eſt. Ab iis ſputis non raro cruenta ſuccedunt, plus in recte valentibus, quam in pleuriticis timenda. Quod Hippocrat. intelligens *in* 4. *Aphoriſm.* 25. dixit: *Sanguis quidem ſupra qualiſcumque, malum.* In iis ſanguis tuſſi rejectus perpetuo timendus, etſi non perpetuo ipſum exitium ſequatur; quum præſertim ex capite deſtillat, in fauceſque irruens, tuſſi excernatur: quomodo ego poſt quartanam febrem ſanguinem copioſiſſimum tuſſi rejeci, quæ excretio fuit criſis, me ab ea febre liberans. Ceterum, ubicumque non ex capite deſtillans, ſed e pectore & pulmonibus promanat, phthœs periculum inducit, etſi Galen. *in libr.* 5. *Meth. Med.* ſcripſerit: *Matronam Romanam, & Juvenem a ſputo ſanguinis, atque alios omnes, qui primo ſe die ei curandos permiſerunt, ſanitati reſtituiſſe, &c. verum quotquot poſt aliquot dies tandem, vel dum phlegmone eos ſic occupavit, ut urinam febricitantis inſtar jam haberent, horum nullum in totum fuiſſe perſanatum.* Quare merito dixit Hippocr. *in* 7. *Aphoriſm.* 15. *A ſanguinis ſputo puris ſputum, malum*; & Galen. *Aphoriſm.* 7. ait, non omne ſanguinis ſputum eſſe malignum, ſed illud, quod pus ſubſecutum eſt. Hoc enim phthœs accerſitur. Quod merito Hippocr. expreſſit *lib.* 7. *Aphoriſmor.* dicens: *A puris ſputo phthiſis*. Quare cruenta ſputa e pectore ac pulmonibus educta, a quibus pus ſubſequatur, exitialia eſſe, nobis liquido conſtabit. Addimus, perpetuo inutilia eſſe, ac malum portendere, qualiacumque copioſius excreta quicquam ægrotos non juvant, nec dolorem, nec tuſſim, nec reſpirationem difficilem allevantia: atque hæc in iis ſputa exitialia erunt. In pleuriticis autem & peripneumonicis, admodum tenuia poſt principium, aut admodum craſſa, aut viſcida, aut ſpumoſa, aut rotunda, multa, non juvantia, pauca, & nihil exſpuere, & ſputa evaneſcere ac ſupprimi, & frequentia, alba, flava, pallida, rufa, viridia, æruginoſa, porracea, fulva, livida, nigra, varia, fœtida, ſincera, ægerrime educta, cum ſtertore quippe in gutture ferventia, tuſſim, dolorem, malam reſpirationem non ſedantia; atque omnium exitialiſſima, prava, quæ tuſſim, dolorem & malam reſpirationem, & febrem concitant, atque augent. Admodum tenuia, craſſa & viſcida, quod ſatis crudum morbum notent, ſi principio fiant, haud inutilia cenſentur, quod tractu temporis concoqui poſſint; ſed poſtea, quippe poſt multos dies, apparentia, & ſi nihil coquant, peſſima exiſtunt; admodum vero ſpumantia eodem modo damnantur, potiſſimumque ſincera, bilioſa, rufa, viridia, liquida atque nigra. Hæc enim fieri a calore immodico, aut urente, aut colliquante, alias oſtendimus. Albicantia vero non ita periculoſa ſunt, & a flatu pituita agitata ſpumeſcentia. Qua ratione e pulmonibus educta pituita ex plurimo aere ſpumeſcit. Plerumque in peripneumonicis ſanguis ſpumoſus exſpuitur. Auctor *Coac. præſagiorum tex.* 415. ait: *ſpumoſum ſanguinem in dolore dextri hypochondrii ab hepate manantem exſpui, letale eſſe*. Rotunda itidem ſputa maxime damnantur, quod intus magnum calorem, quo humor ſiccatur, adeſſe denotent;

Nigra & melancholica.

Quæ non juvant.

Quænam in pleuriticis & peripneumonicis mala.

Admodum tenuia, craſſa, & viſcida.

Albicantia.

tent; quo fortaſſe caput replente, delirium plane ſignificaſſe, Hippocrat. *in 6. Epidem. ſect. 3. text. 27. & ſect. 6. text. 21.* voluit. Hæc in lateris morbo Auctor *Coac. præſag. text. 319.* perniciem ſignificare voluit. Hippocr. rectius *in Prognoſtic. pag. 41. lin. 20.* dixit: *Sputa rotunda, candida, in pleuriticis eſſe inutilia*. Multa quoque ſputa mala multum periculi minantur, ſi præſertim in die judicatorio appareant, nihilque ægros juvent. Sunt enim ex judicatoriis non judicantibus. Pauca itidem non minus damnantur, quod non ſufficiant ad purgandum humorem, facientem phlegmonem, omniumque maxime, quæ & cruda ſunt, & magno labore excernuntur. De his Hippocrat. in *1. Epidem. ſect. 1. pagin. 940. ſub lit. G. Tuſſiebant, ac pauca cocta coacta paullatim vix exſcreabant. Quos vero violentiſſime urgebant, his minime concocta erant, ſed perpetuo cruda ſpuebant*. In pleuriticis nihil minus mali portendit nihil exſpuere; diximus enim crudiſſimum morbum ſignificare: nam, ut ſcribit Galen. *in ſecundo de Criſibus cap. 10.* quum paſſio exquiſite anguſta fuerit, ac veluti alligans in ſeipſa univerſum fluxum cohibuerit, tunc facit morbos letales, qui ἄπτυστοι, ideſt, ſine ſputo nominantur; & *in lib. de Conſtit. Artis Medend.* ait, nihil omnino exſpuere perniciosiſſimum eſſe, partim quod ſignificet, fluxionem in phlegmone quaſi devinctam retineri, partim vero, quia ea univerſa, interius contenta, corrumpatur. Hunceque morbum concoctu difficilem, & diuturnam fore eam inflammationem, præmonſtrare, Galen. *in 1. in Aphoriſm. 10.* oſtendit. Qua ratione Auctor *Coacorum præſagiorum text. 381.* dixit, ſiccas pleuritides, in quibus nihil exſpuitur, eſſe periculoſiſſimas. In iiſdem vero biliosum ſputum, quod inceperat, evaneſcere abſque ratione, delirium portendere, Auctor *Prorrheticorum libr. 1. text. 97.* expreſſit; & ſupprimi, proximum exitium denotare, Galen. *in lib. de conſtitut. art. med. cap. 16.* memoriæ mandavit. At phthiſicos, ait Hippocrat. *lib. 7. Aphoriſm. 16.* eo uſque vivere, quoad exſpuant, atque ubi ſputum retinetur, mori. Frequens ſputum, at non tuſſi excretum, cum alio ſigno phrenitico, phrenitim notare *in 1. Prorrhetic. text. 6.* notatum eſt; & paullo poſt *text. 12.* hic Auctor in phreniticis frequentem ſcreatum maxime damnavit; & merito ſane, quod, ut Galen. expreſſit, cerebri male affecti, ideſt repleti, ſit indicium: & poſtea *text. 31.* hunc ipſum frequentem ſcreatum cum refrigeratione, nigram vomitionem (quod eſt ſignum perniciosiſſimum) prænuntiare. Alba quoque, pituitoſa, inutilia in morbis biliosis ſunt, quod Hippocrat. *in 2. Prognoſtic. pag. 41. lin. 20.* ita expreſſit: *Candida vero, glutinoſa ac rotunda inutilia*: & merito ſane, quum nihil humoris inflammationem facientis purgari, ſit indicium. Quod ſane in biliosis inflammationibus ſatis eſt pernicioſum. Ab hinc plures annos *Baſſani* & *Maroſticæ*, pleuritides peſtilentes, quæ quatuor & ad plus 7. diebus homines jugulabant, graſſatæ ſunt in quibus, quæ per ſputum excernebantur, erant pituitoſa, alba. Quibus ſane ſputis quidam Medicus, parum tamen in Galeni doctrina verſatus, perpetuo bene de iis ſperabat. Qui facile decipiebatur, ignarus hæc ſputa alba pituitoſa indicio nobis fuiſſe; nihil humoris facientis inflammationem purgari, propterea & morbum crudiſſimum, & ſumme pernicioſum prænonſtrari. Quod Hippocrat. in *uxore Euxenii lib. 7. Epid. pag. 1224. text. 58.* pleuritica, quæ eo morbo obiit, obſervavit; ea enim per ſputum pauca, candida, tenuiaque exſpuit. Flava & pallida, nec non & cruenta, non admodum ſputo permiſta, poſt principium ſi excerni incipiant, morbum concoctu difficilem, longum, atque hac de cauſa periculo minime vacantem, ſignificant. Contra, quæ in principio apparent: morbum enim, ſolutu facilem, prænonſtrare ſuperius oſtendimus. De his Hippocrat. *in 2. Prognoſtic. pag. 41. lin. 16.* ita habet: *Si enim multo poſt ab initio doloris ſcreatio flava, aut rufa, deterior*. Quam paullo poſt *ibid. lin. 32.* expreſſit, *Septimo die tardiuſque apparentem*,

Multa.

Pauca.

Biliosa.

Frequentia.

Alba pituitoſa.

Flava & pallida.

Pallida, rufa, viridia, fulva, livida atque nigra.

rentem, minus tutum morbum præmonſtrare. Idem præſagiunt, pallida, rufa, viridia, fulva, livida atque nigra. Viridia, æruginoſa, magnum caloris incendium, copiamque æruginoſæ bilis, præmonſtrant. Hippocrat. *in Prognoſtic. ibid. lin.* 21. exſcreationem vehementer viridem maxime damnavit; & Galen. *in lib. de tot. morbi temporibus*, ſputum vehementer fulvum, ſumme pernicioſum facit. Periculoſius eſt lividum, quod aut a modica atra bile, aut a caloris extinctione fiat. Quod merito Auctor *Coacorum præſagiorum*

Nigra.

text. 390. initio morbi conſpectum maxime damnandum credidit. Nigrum omnium eſt pernicioſiſſimum, cujus cauſſam diximus eſſe ex Galen. 1. *de Criſibus*, aut vehementem peraſſationem, aut refrigerationem, quippe extincto calore nativo. Merito itaque dixit Galen. magnum morbum ſignificare; & *in* 1. *de Criſibus* mortem ſignificare; & Auctor *Coacor. præſagiorum text.* 390. & 407. dixit, *eos, qui nigra rejiciunt, pernicioſe ſe habere*. Hippocrat. *in lib. de morbis, lib.* 3. *lin.* 35. & *ſeq. pag.* 492. ait, eos, qui cum ſaliva

Colore varia.

grumos nigros ſanguinis tuſſi rejiciunt, ſeptimo die mori. Non minus mala eſſe videntur colore varia, quod multiplices affectus ſubeſſe denotent. Qua-

Sincera.

re Hippocrat. hæc ſputa ſimul cum dolore acuto exitialia eſſe voluit. Sincera vero perpetuo damnantur; nam bona, ait, ſputa permiſta eſſe; contra mala, omnium maxime meraca, quod fiant omni humido ſeroſo a calore conſumto: flava itaque, ſincera, rufa, æruginoſa, fulva, livida, atque omnium maxime nigra, meraca, prava exiſtunt; ut Hippocrat. *in* 2. *Prognoſtic. pag.* 41. *lin.* 15. & *ſeq.* nobis tradidit. Hæc enim deſperatæ ſalutis

Fœtida.

morbum præmonſtrant. Fœtida etiam perpetuo in acutis morbis damnantur; quod præexcellentis putredinis nobis ſint argumentum. Graveolentiam in ſputis diſtinctim tabidos a non tabidis notare, Hippocrat. *in Aphoriſm. libr.* 5. *Aphoriſm.* 11. meminit, atque in ipſis iſtud eſſe letale. Mala quoque di-

Quæ difficulter exſecantur.

ximus eſſe, quæ difficillime exſcreantur. Quod Hippocr. *in* 2. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 940. *ſub lit. G.* in multis vidit, de quibus dixit: *Tuſſiebant, & pauca cocta paullatim vix excreabant*. Quæ itidem fervent in gutture, cerchnonque & ſtertorem inducunt, non minus prava exiſtunt. De his Hippocrat. *in* 2. *Prognoſtic. pag.* 41. *lin.* 24. *Mala etiam exſcreatio, quæ non expurgatur, nec pro-*

Quæ non juvant.

jicit ipſam pulmo, ſed ob nimiam plenitudinem fervet in gutture. Non minus mala ſunt, quæ nedum tuſſim tollunt, ſed quinimmo ipſam concitant, & augent, ut docet Hippocrat. *in* 2. *Prognoſtic. ibidem lin.* 18. Qui non minus ibidem *lin.* 33. damnavit ſputa, quæ dolorem non ſedant. Non tamen hæc ſufficient nobis ad prædictionem, niſi alia, ut docet Galen. accuratius ſpectemus. Eodem itidem modo mala ſunt, quæ neque malam reſpirationem, neque tuſſim, neque febrem, etſi multa ſint, tollunt; quæque vero in aliquo decretoriorum dierum erumpunt, ac ab ipſis ægroti in deterius abeunt, cum ſigno aliquo pravo, letalia profecto exiſtunt. Atque hæc ſunt ſputa in pleuriticis ac peripneumonicis damnanda. Nunc eadem in ſuppuratis conſideremus.

CAP. XIX.

De prædictione in ſuppuratis.

QUICUMQUE pus obtinent, ait Galen. *in* 2. *Prognoſticorum in text.* 60. intus in corpore univerſo, ſive contentum habeant in parte in-

Empyi quinam vocantur.

flammatione affecta, ſive etiam poſt eruptionem; nominare tales *empyos*, ideſt, purulentos ſeu ſuppuratos, licebit. Sed Medici aſſolent potiſſimum illos, qui in thorace ac pulmone talem habent affectionem, *empyos*, ideſt, purulentos nominare. Il vero pus poſt eruptionem inter thoracem pulmonem-

nemque continetur, & nisi cito exscreetur, tabidi intereunt, febricitantes tenuiter quidem, at calore jugiter quodammodo in nocte crescente. Veteres in qualibet parte corporis puris collectionem *empyema* dicebant, suppurantiaque ob id medicamenta, alii *ampyemata*, alii *diapyemata*: alii, quum in viscere pus collectum est: atque demum alii, ut dictum est, eos solos *empyos* esse volunt, quibus inter thoracem & pulmonem pus aggregatum est, nimirum in loco phlegmone obsesso, & ab eo pure, intra thoracem effuso, hujusmodi affectus nascitur. Fit vero hujusmodi pus, ubi materia phlegmonis non repurgatur; intus enim contenta a calore in pus vertitur. Quod Hippocrat. *in 7. lib. Aphorism.* 38. ita expressit: *Destillationes in ventrem superiorem ad suppurationem veniunt intra dies* 20. & clarius *in lib.* 5. *Aphorism.* 8. de pleuriticis: *Quicumque morbo laterali laborantes in* 14. *dieb. non repurgantur, ii ad suppurationem vertuntur*. Ubi enim pleuriticorum dolores neque purgatione per supra, neque alvi dejectione, neque sanguinis vacuatione, neque victus ratione, neque aliis medicamentis finiuntur, suppurationem excitant, aut mortem suffocatione. Quod probe Galen. *in Prognosticor.* ita expressit: *Quicumque dolores circa thoracis ad pulmonis sedes non desinunt, adhibitis subsidiis, idque malum tantummodo habent, nec ullum aliud exitiosum indicium adest, eos suppuraturos exspectabis*. Suppuratis itaque inflammationibus, ipsarumque humoribus in pus conversis, nisi per sputa repurgentur, rupta vomica pus in cavitatem thoracis & pulmonis effunditur, atque tunc vere ii *empyi* existunt. Quo pure aut suffocantur, aut liberantur, si probe spatio dierum quadraginta per tussim purgentur, quod hisce verbis Hippocrat. *in quinto Aphorismorum* 15. docuit: *Quicumque ex morbo laterali fiunt empyi, idest, suppurati, si quadraginta diebus purgantur, a die qua fit ruptio, liberantur*: & Galen. *in comment.* ait: *nisi iis diebus per sputa pus totum expurgetur, putrescit, pulmonesque putrefactum exedit, atque ad tabem conducit*, quæ est totius corporis extenuatio propter insanabilia illa pulmonis ulcera, & macies cum debili febre conjuncta, quem affectum peculiariter Græci, maximeque Athenienses, ut Galen. meminit, *phthœn* appellabant, atque Hippocrat. *phtisin*. His ad extrema redactis & deploratis accidit capillorum defluvium propter siccitatem, & alvi profluvium propter virtutis imbecillitatem, teste Galeno, atque sputa retinentur. Tamdiu enim extenuati vivunt, quamdiu extussire & per sputa pulmonem expurgare possunt, ubi vero intus ipsa remanent, respirationis obstruuntur viæ, atque ægri soffocantur. Sed ad suppuratos seu *empyos* redeamus, quorum prognosis ut illustretur, primo an pleuritici, vel peripneumonici, vel anginosi ad suppurationem inclinent, videndum erit; & postea quibus signis nobis innotescant; tertio, quando ruptio fiat; atque demum de iis, qui servantur, & quibus signis nos id deprehendimus, atque de iis, qui moriuntur, agemus. Quibus vero futuros purulentos speramus, Hippocrat. in hunc modum docuit: *Prognosticorum pagin.* 41. *lin.* 35. *& seq. Quicumque dolor in his affligit sedibus, non desinens neque screationis purgatione, neque ventris subductione, neque venæ incisione ac medicamento, & victus ratione, in suppurationem verti, sciendum est*. Sed quia circa puris generationem, ut Hippocrat *in secundo Aphorismorum* 47. docuit, dolores ac febres contingunt magis, quam ubi jam est genitum, necesse est, in suppurandis dolores ac febres augeri. Proinde de his ita habet: *ibidem pagin.* 42. *lin.* 12. *& seq. Considerare autem oportet suppurationis initium fore, colligentes a die, quo primum homo febricitavit, aut quo riger eum prehendit, & si dixerit pro dolore sibi inesse pondus in loco, quo dolore afficiebatur. Hæc enim fiunt inter initia suppurationum. Ex hoc igitur tempore suppurationum fore eruptionem ad prædicta tempora oportet*. Galen. vero in commento dixit, indicia suppurationis esse pro dolore gravitatem seu pon-

Empyema quid.

Unde.

Empyicorum prognosis.

Purulenti unde futuri digno-scuntur.

Empyematis indicia.

dus, rigorem ſeu horrorem, atque febrem, quæ multo quam ante vehementius affligat. Addit ultra gravitatis ſenſum, calorem in lateribus, aut in altero tantum, ubi ſuppuratio tantum in altero latere fuerit. Quod ita docet Hipp. *ibid. lin.* 19. & *ſeq. Si vero ſuppuratio in altero latere tantummodo fuerit, ad vertere ac ediſcere convenit in his, utrum in altero habeat latere dolorem, & utrum calidius, quam alterum ſit, atque eo in incolume latus cubante inquirere oportet, num aliquod deſuper onus illi pendere videatur, ſi enim id fuerit, ſuppuratio in altero latere eſt, utrovis onus exiſtat.* Quare his ſignis ſuppuratos deprehendemus, quippe rigore vel horrore, qui fit, teſte Galeno, a puris acrimonia, partes inflammatione affectas infeſtante, febre, anteriori quæ vehementius affligat, atque pondere in lateribus, aut in altero tantum, ubi in uno tantum pus collectum eſt; addo calorem perceptum in utroque latere, aut in altero, ubi in uno tantum, ut dictum eſt, pus collectum eſt. Quod ſane pus ſi auctum multitudine, atque a natura concoctum erumpens, per tuſſim purgetur, ita *Empyi*, ideſt, ſuppurati ſervantur. Quod ſi nullo pacto rejiciatur, quod debilibus accidit, ſuffocati, aut tabidi moriuntur. Hinc Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 43. *lin.* 30. ait: *Seniores potius interire quam juvenes*: quoniam, ut ait Galen. *imbecilles vires habent, & ut hi liberentur, magna vis requiritur, quæ per tuſſim ac ſputa expurgat; quum hi, qui ſervari debent, plurimum puris tuſſi purgare debeant.* Galen. *in* 5. *libr. de loc. affect. cap.* 3. quoſdam empyos meminit ſanatos, qui puris quantitatem quindecim uſque heminarum exſpuerunt. Quare, qui plurimum exſpuunt, liberantur: & hoc eſt, quod ait Hippocr. *in* 5. *lib. Aphoriſmor.* 15. *Quicumque ex morbo laterali fiunt empyi, ideſt, ſuppurati, ſi quadraginta diebus purgantur, a die qua fit ruptio, liberantur.* Ubi vero non exſpuunt, aut ſuffocantur, quod accidit propter puris lentorem, & craſſitudinem, & membranæ pulmonem continentis denſitatem, atque ob facultatis debilitatem, quæ dignoſcuntur reſpiratione, in qua totus thorax attollitur, nullaque purgatione per ſputa apparente. Galen. *in libr.* 4. *de loc. affect. cap.* 7. ait: *Quibus ex ſuppuratis, ob puris copiam inter thoracem & pulmonem collectam, totus thorax in reſpiratione attollitur, fieri ob virium imbecillitatem, nequeuntibus ſuppuratis pus purgare.* Ubi vero non ſuffocantur, tabidi intereunt, ut ait Galen. febricitantes tenuiter quidem, ac calore jugiter quodammodo in nocte creſcente, quo non purgatum pus intus putreſcat, pulmones exedat, & ulceret. Quæ ulcera ſequi totius corporis extenuationem, & maciem, cum debili febre conjunctam, nuper ex Galen. oſtendimus, quem affectum Hippocr. pthiſin, & Græci olim Athenienſes *phthœn* appellarunt. Quibus vero notis iſti empyi, tabidi facti, dignoſcantur, Hippocr. *Prognoſtic. pag.* 42. *lin.* 25. & *ſeq.* hiſce verbis expreſſit: *Omnes autem purulentos agnoſci his indiciis convenit: Principio ſi febris non dimittit, ſed interdiu tenuior, noctu vehementior eſt; Si ſudores multi ſuperveniunt, ac tuſſiendi cupiditas eſt, nec quicquam tamen dignum commendatione exſpuunt, ſi oculi cavi redduntur, maxillæ vero ruborem trahunt, & ungues manuum curvantur, digiti vero potiſſimum ſummi caleſcunt, atque in pedibus tumores fiunt, neque cibum appetunt, ac puſtulæ circa corpus erumpunt.* Galen. *in comment.* ait, febres non dimittere, quod partes ipſæ corporis ſolidiores incaleſcunt: ex quo calor manet aſſiduæ febri ſubſimilis, perinde ut calx, debilis contingentibus; qui calor, quod hecticorum ſignum proprium creditur, quoties ægri eſitant ac bibunt, perinde ac in calce aqua perfuſa fit, calidior evadit. Quo fit, ut tangentes exterius ægrum multo calidiorem perſentiant. Sudores item continuo elici propter virium debilitatem, & quod diductum alimentum dejiciatur. Quin etiam tuſſiendi cupiditas, ideſt, voluntas prehendit, nec quicquam dignum commendatione exſpuunt, ob puris lentorem, & craſſitudinem, & continentis pulmonem membranæ

Empyi quo modo tabidi facti dignoſcuntur.

branæ denſitatem, tum etiam debilitatem in ægro facultatis. Oculi cavi propter exſiccationem redduntur, quod omnibus longis febribus eſt commune, rubent propter calorem in pulmone, & item tuſſedinem, quæ vultum calefaciunt. Ungues curvantur, quia caro eos firmans conſumitur, & digitorum interiores ſummæ partes, quippe carnulentiores, calidiores apparent, quod calor hecticus ſolidiores occupet partes, & in iis plus apparet, ubi humor largior ineſt. Pedes intumeſcunt, inde caloris incipiente extinctione, quippe quod partes ex ab origine longiſſime abſunt. Cibum non appetunt, appetendi facultate extincta, puſtulæque erumpunt in cute, derodente ſanie ex intimis ſedibus ad cutim effuſa. Atque hiſce ſignis *empyi* tabidi dignoſcuntur, quorum caſus ſunt exitiales, qui, quoad exſpuere, puſque contentum excernere poſſunt, Hippocr. Auctore, *libr. 7. Aph. 16.* vivunt. Unum eſt, ad ſputa ipſorum attinens, ſcitu dignum, quod in ipſis quippe tabidis deſperatis, nihil concoctum obſervari, Gal. *in 3. Epid.* affirmavit; ſputum ceſſat, ac ſupprimitur; alvus humida; pedes intumeſcunt, & reliqua fiunt, quæ deſperatam ipſis ſalutem præmonſtrant. Primo itaque humor, faciens pleuritim aut pulmoniam, non purgatus, putreſcit, & in pus vertitur, mox erumpit, & tuſſi purgatur. Quod ſane determinato temporis intervallo multum collectum, & inter thoracem & pulmonem effuſum, foras erumpit, plerumque viginti diebus, & aliquando citius, & aliquando tardius. Quam rem & ſigna, quibus id agnoſcimus, Hipp. *in 2. Progn. pag. 42. lin. 38. & ſeq.* ita expreſſit: *Quæ vero citius ac tardius rumpuntur, talibus cognoſcantur ſignis oportet, ſi dolor inter initia extitit, & item difficultas ſpirandi, nec non tuſſis, atque etiam ſcreatio perſeveret, vigeſimo die exſpectari, aut etiam ante, eruptionem oportet; ſi vero continentior fuerit dolor, & alia omnia in his fuerint ex ratione, poſtea exſpectari oportet eruptionem, ſed præire neceſſe eſt & dolorem & ſpirandi difficultatem, & ſcreationem, antequam pus excernatur.* Quibus Gal. colligit ſigna futuræ vomicæ eruptionis eſſe hæc; quippe dolorem, ſpirandi difficultatem, tuſſedinem, & ſcreationem, quæ ſi continenter & vehementer affligant, celerem eruptionem exſpectari oportebit, & ſi nec continentes, nec vehementes infeſtent, tardiorem. Ceterum neceſſe eſt, eroſo obvolvente pus corpore, ab acrimonia ejus, dolorem fieri, tuſſedinem, & exſcreationem, quia ſanies quædam tenuior obductum penetret corpus; ſpirent quoque difficulter neceſſe eſt, & propter univerſam corporis conditionem, ſed præcipue ob accedentem dolorem. Ratio vero hujuſce eruptionis in naturam moventem, atque in multitudinem puris, vel ejus pravam qualitatem, expultricem ad exſcreationem irritantem, refertur. Hæc eruptio fit ante tempus, quippe ante concoctionem puris, aut propter bilem ſinceram, ſputo non permiſtam, nec ad mediocritatem, naturæ convenientem, deductam, tunicam, pus continentem, erodentem; unde dolor, tuſſis, reſpiratio difficilis & exſcreatio eruptionem antecedunt: aut propter puris copiam, vel infeſtam putredinem, vel utrumque ſimul, expultricem movens. Quæ eruptio ſymptomatica eſt & non bona: & illa, quippe pure concocto, a natura fit critice, & bona, in qua pus album, purum, æquale & læve ſpectatur; in ea vero, quæ ante tempus fit, & ſymptomatica eſt, pus crudum, verſicolor, fœtidum, aut flavum, bile permiſtum, apparet. De hac eruptione auctor Coac. præſ. *in 5. Coac. præſag. text. 392.* ita habet: *Quibus vero cum bilioſo purulentum ſputum expurgatur, ſive pus ſeorſum exeat, ſive permiſtum bilioſo, ut plurimum mors accidit decimo quarto.* Sed his præmiſſis occaſio poſtulat, nos modo in ſuppuratis prædictionem aggredi: proinde in primo, de ſuppuratis, qui facta eruptione ſervantur, agimus. Hos hiſce ſignis innoteſcere nobis, Hipp. *Progn. p. 41. lin. 47.* docuit, quæ ita expreſſit: *Bona vero hæc ſunt, facile morbum ferre, bene ſpirare, dolore vindicatum*

Vomicæ ruptio intra quodnam temporis intervallum fit.

Unde fit.

Quando ante tempus fit.

Vomica eruptionis ſymptomatica ſigna. Critica

Empyi quinam ſervantur?

eſſe, ſputum facile extuſſire, corpus æqualiter calidum videri, ac molle, ſiti non detineri, urinas, dejectiones, ſomnos, ſudores, ſingula intelligere bona, uti præſcriptum eſt, ſuccedere. Ita enim omnibus his evenientibus, homo haud ſane morietur: & paullo poſt, *ibid. p.* 42. *lin.* 45. *Hi vero potiſſimum ſuperſunt, quos febris eodem die poſt eruptionem dimiſerit, ac cibum citius appetunt, & ſiti liberati ſunt, & venter exigua ac conſiſtentia dejicit, & pus album, læve, concolorque eſt, ac vacans pituita, & abſque labore ac valida tuſſi expurgatur. Itaque optime quidem ſic ac celerrime vindicantur; ſin minus, qui ad hæc proxime accedunt.* Quantum vero ad illos, qui ſuppurati intereunt, hæc potiſſimum ſigna, *Hipp. in Progn. p.* 41. *lin.* 53. exhibuit, dicens: *Contra vero, morbum ægre ferre, ſpirationem magnam & denſam eſſe, dolorem non ſedari, ſputum difficulter extuſſire, valde ſitire, corpus a febre inæqualiter detineri, ventrem & latera vehementer calere, frontem vero, manus & pedes frigidos eſſe, urinas vero & dejectiones, & ſomnos, & ſudores, ſingula, uti ſcriptum eſt, mala eſſe cognoſcere. Si quid enim ex his ſputo ſupervenerit, morietur æger, antequam ad* 14. *dies perveniat, aut* 9. *aut* 11. *die*. Et paullo poſt *p.* 42. *lin.* 53. *Moriuntur vero*, ſcil. ſuppurati poſt ruptionem, *quos febris non dimiſerit, aut ipſos dimiſiſſe viſa, ſi ſtatim iterum accenditur, & ſiti quidem vexantur, cibos vero non appetunt, & alvus humida eſt, & pus chlorum, ſive ex viridi pallidum, & lividum, aut pituitoſam, & ſpumoſum exſpuunt. Si hæc omnia contingerint, moriuntur*, &c. Quod ſputum auctorem quoque *Coac. præſ. tex.* 390. maxime damnaſſe nuper meminimus. *Uxor Meandri Cæci*, ut ſcribit Hipp. in *Epid. lib.* 4 *p.* 1121. *text.* 4. *ſtatim chlorum & purulentum* exſpuit. *Filius Amphiphradis lib.* 7. *Epid. p.* 1215. *text.* 14. primo *purulentum & pallidum*, & mox *viride*. *Ermoptolemuſque ib. text.* 17. *pallidum*: & Hippocrat. *in Aphor. lib.* 7. *Aphor.* 44. ait: *Si empyis, quum uruntur aut ſecantur, purum & album pus effluat, evadunt: ſi vero ſubcruentum fæculentumque & fœtidum, pereunt*: & hæc ſufficiant in prædictione purulentorum, de quibus præſentem tractationem non inutiliter Medicinæ ſtudioſi legent.

Quinam pereunt.

CAP. XX.

Quid in morbis acutis Cerchon, vulgo ranticum, ſignificet.

Cerchon quid.

SOLET ſæpius in multis acutis morbis, & in omnibus quidem moribundis, quidam fervor, ſeu ebullitio in gutture obſervari, quod Græci κίρχων vel κίρχνον appellarunt, Latini fervorem ſeu ebullitionem in gutture, alii aſperitatem rancidam circa aſperam arteriam & fauces, vocant, & vulgus Medicorum *ranticum*, a rancido fortaſſe, nomine corrupto. Sed mea ſententia hæc omnia non ſunt ſynonyma, ſiquidem aliud eſt rancidum, ſeu aſperitas rancida, a gutturis fervore ſeu ebullitione, quam ranticum dicunt. Hanc enim Galen. *in lib.* 3. *com. de articulis* vocat κιρχώδην, non κι χνώδην, a κίρχειν verbo, quod ſonum notat, qui vel anguſtia loci, quo ſpiritus redditur, vel humoris multitudine accidit, & plerumque utroque concurrente, quem ſpiritum nonnulli δάσεα, ideſt, aſperum appellant: illud rancidum, ſeu aſperitatem rancidam, κιρχνώδην vocat, qui affectus, *in* 2. *l. de cauſ. ſympt.* eſt exiguus ad tuſſiendum impetus, quem tamen non perpetuo tuſſis ſequitur. Nam ea, quę fauces exaſperando tuſſim movent, Gal. *in* 3. *com. de articulis* nuperrime citato κιρχώδην vocat. Ceterum utcumque ſit, hi duo affectus maxime ſimiles exiſtunt, quippe κίρχων & κίρχνων, ideſt, gutturis fervor, ſeu ebullitio in gutture, a ſono ebullientis ac ferventis aquæ dicta, & aſperitas rancida: apparet vero inter ipſos differentia aliqua, quippe quod fervore, ſeu ebullitione, ſonus & ſtrepitus manifeſtius appareat; & in rancida aſperitate, obſcurius. His proximus

Gutturis fervor ſeu ebullitio.

Quid & unde.

Stertor.

mus est stertor, qui itidem est sonus similis, sed ambobus major, & manifestior. Plures hos affectus confundunt, differreque tantum loci varietate atque magnitudine putant, *stertorem* strepitum ullum vocantes, qui in via subauditur & fit, quæ est inter palatum & nares, qualis est dormientium; in larynge, sive in capite, seu ostio asperæ arteriæ, gutture dicto, fervor & ebullitio κέρχων dicta; & in arteria ipsa κέρχνος, ideſt, asperitas rancida secundum aliquos, & secundum alios, stridula ejusdem arteriæ asperitas. In moribundis hic affectus Græcis etiam ῥέγχος dicitur, & vulgo Medicorum *ranticum*, quasi rancidum spiritum sive sonum dixerint, qui affectus est veluti concertatio humoris & spiritus in asperis arteriis. Fiunt vero hi affectus, vel propter naturæ infirmitatem, utpote quum pulmo undique pure, vel humore plenus, quod Hippocr. *in* 2. *Prognostic. pag.* 41. *lin.* 23. expressit, dicens: *Mala etiam screatio, quæ non expurgatur, nec projicit ipsam pulmo, sed ob nimiam plenitudinem fervet in gutture*. Non expurgatur, nec sputum projicit, aut ob humoris excernendi lentorem, quo asperæ arteriæ adhærescens a spiritu agitatus fervorem seu stertorem facit, vel branchiorum obstructionem, aut ob arteriæ & guttu-ris compressionem interceptione meatus, in quo refractus & agitatus humor aliquis in gutture fervet. Hinc pectore angustos *stertorosos*, *in lib.* 3. *de dissec. resp.* Gal. vocavit. Qui duas tantum causas huic affectui assignavit, quippe loci, quo spiritus redditur, angustiam, vel humoris multitudinem, vel utrumque simul: sed necesse est, ut virtutis impotentiam addamus, ob quam ῥέγχος fit in moribundis, quippe natura quicquam purgare non valente. Quibus colligamus non perpetuo hoc symptoma, quippe fervorem seu ebullitionem esse letalem, sed ubi, multitudine humoris natura oppressa, non possit pulmo excreare sputum, aut spiritus via, arteria scilicet, graviter oppressa, qua ratione hiantes moribundi multi stertunt. Cujusmodi fuit observatum in *Menone*, de quo ait Hippocr. *in* 7. *Epidem. pag.* 1220. *text.* 47. *Arteria subsibilabat, cum stertore*: & de *uxore Theodori*, *Ibid. pag.* 1216. *tex.* 27. *Arteriæ & pectoris stridula quædam asperitas, strepitus & fluctuatio puris*: & *ibid. pag.* 1211. *text.* 9. de *uxore Polycratis*: *Intus circa arteriam & fauces sibilus erat & Cerchnon*, ideſt, asperitas, ut Valesius vertit, rancida. *Ermoptolemus ibid. pag.* 1215. *text.* 16. peripneumonicus *decimo quarto pallidum exscreabat & stertebat*: & *Anginosa ibid. text.* 20. itidem cum stertore, convulsa obiit: & in *filio Amphipbradis ib. text.* 14. pleuritico, in faucibus plerumque rancida asperitas subsibilabat. In quibus omnibus illud symptoma partim ad naturæ impotentiam, partim ad multitudinem & lentorem puris seu humoris, fuerat referendum: est vero perpetuo malum, & non parum timendum, summe vero pernicioſum post morbi principium, prælanguidis viribus redditis; quod id præmonstret, præ imbecillitate naturam quicquam non posse excernere & suffocari; cumque hoc symptomate aliquod aliud necessario una aderit exitiale signum. In principio vero sæpius fit, ut præ copia nimia in gutture ferveat humor vel præ lentore nimio materia arteriæ adhæreſcat, quo humore postea concocto, & per sputum purgato, cessat Cerchos seu ebullitio. Cognoscitur vero, quo una adsint alia signa bona, & nullum pernicioſum illuxerit, cujusmodi fuit in *Pisistrato* visum. De quo Hippocr. *lib.* 7. *Epidem. pag.* 1223. *tex.* 56. ait: *Stertorosum in faucibus, bene autem ferebat morbum, mente constabat, calor remisit, simulque excretio, & stertor; evasit*. Atque hæc de prædictione ex sputis.

Unde.

Quando gutturis fervor seu ebullitio letalis.

Quando non exitialis.

CAP. XXI.

De prædictione ab abſceſſibus.

DIXIMUS in ſexto libro, quid ſit abſceſſus, differentiaſque ac ſigna, quibus Medici futuros abſceſſus in morbis prænoſcunt. Nunc ab ipſis abſceſſibus, quomodo in acutis morbis quum ſalus tum exitium prænoſcatur, perſcrutemur, ſuppoſito illos nobis affuturos: quam rem prænoſci a morbo, qui non ſolvatur, & ab urina tenui & cruda, quam ægroti, ut docet Hippocrat. *in* 2. *Prognoſtic. pag.* 40. *lin.* 49. longo tempore mingunt, atque a ſignis ſalutaribus, Galen. *in lib.* 2. *de Criſib.* ſtatuit. At a quibus ſane abſceſſibus noſtrum prædicendi inſtitutum proſequemur? Siquidem ibidem dixerimus, nomine abſceſſus, multos affectus ex Hippoc. doctrina intelligi. Primo per abſceſſum intelligimus omnem humorum translationem ab una parte corporis in aliam, in qua translatione humores aut effluunt, aut decumbunt. Unde excretio & humoris decubitus dicitur abſceſſus. Hoc ipſo etiam nomine *abſceſſus* mutationem morbi accepimus, ut quando angina in peripneumoniam mutatur, ſuppurationem, & quicquid in cutem erumpit a cauſſa interna. Aut quod magis proprie dicitur, per abſceſſum intelligimus humoris decubitum, qui tumorem facit. Nos vero hic per abſceſſus omnia intelligemus, quæ in cutem erumpunt, atque humoris decubitum cum tumore aut inflammatione. Sed age de bonis abſceſſibus, ſalutem denotantibus, agamus. Boni itaque dicuntur, qui erumpunt cum ſignis coctionis, in die decretorio, in partibus a viſceribus, & a morbo longinquis, quique ſuapte natura boni ſint, & qui perſeverant, non diminuuntur, ac augentur, & demum qui ſuppurantur, & qui una cum bonis ſignis apparent, atque ægrotos juvant. Dictum eſt a nobis ſuperioribus libris, atque demonſtratum ex Hippocr. *in Epidemiis, lib.* 1. *ſect.* 2. *pag.* 948. *lit. F.* concoctiones celeritatem portendere judicii, ſecuritatemque ſalubrem, ac proinde coctionis ſigna numquam male apparere: quo fit, ut nedum abſceſſus omnes, ſed omnes vel etiam excretiones, concocto morbo apparentes, ſint laudandæ. Eo efficacius abſceſſus judicium præſagii confirmabunt, ſi in aliquo dierum decretoriorum eruperint. Quod eo certius præmonſtrabunt ſuapte natura boni, quippe qui laudabili ſubſtantia, figura, loco, colore, magnitudine atque copia erumpunt. Molles bonitate duris ab Hippocr. præferuntur. De iis, qui ſuapte natura commendantur, Hippocr. *in libr.* 6. *Epidem. ſect.* 1. *text.* 12. *pag.* 1165. ita habet: *Tubercula foras extumeſcentia, & acumin ta, in turbinemque gracileſcentia, æquabiliter matureſcentia, non circum dura, declivia, & non bifida, meliora. Contraria vero, mala, & ſi quam plurimum contraria, peſſima*: & in Prognoſticis, *pag.* 39. *lin.* 6. *& ſeq. Quæcumque exterius vergent, optima ſunt, parva, quam maxime extrorſum ſpectantia, & in aciem turbinata: peſſima ſunt, quæ magna, lata, & minime in aciem turbinata: at quæ introrſum rumpuntur, optima quæ externas partes minime attingunt.* Acuta itidem latis bonitate prætulit. Ex loco itidem, qui ad exteriora feruntur, ab Hippocrat. laudantur; de his *in* 6. *Aphoriſm.* 25. ait: *Eryſipelas ab interioribus ad exteriora verti, bonum.* Qua ratione in angina tumorem in collo optimum eſſe ſtatuit, *Prognoſt. pag.* 45. *lin.* 20. Optimi itidem ſunt, qui in partibus remotis & ignobilibus concitantur. Qua ratione Hippocr. *ibidem pag.* 43. *lin.* 18. 37. dixit, omnes abſceſſus, qui ad crura fiunt, in pulmoniis vehementibus eſſe utiles; & Galen. ait: *Si quidem vera ſit ſententia* Hippocr. 2. *lib. Epid. ſect.* 1. *pag.* 1002. *lit. B. præſcripta de bonis abſceſſibus, ut optimi ſint, ſi maxime deorſum, & quam longiſſime ab ægrotatione, abſiſtant, magis vero ſi concoctione pari-*

Abſceſſus unde futuri dignoſcuntur.

Abſceſſus boni.

pariter fiant. Colore etiam boni aut rubro, aut flavo, aut albo ſpectantur: magnitudine quidem etiam mediocri, ita ut neque pauciores, quam corpora purgare valeant, neque grandiores, quam ſuſtineri poſſint. Copia etiam copiæ humoris, morbum facientis, reſpondere debent; nam immoderatius apparentes non ſunt ſecuri, quod & aliquam internam partem vel principem, vel vitæ neceſſariam, obſideant. Qui cito matureſcunt, ac ſuppurantur, laudantur. De his forte Hippocrat. *in 2. prognoſtic. pag. 43. lin. 4. Quibuſcumque abſceſſus fiunt ex pulmoniis morbis circa aures & ſuppurantur ad inferiora loca, & ad fiſtulam perveniunt, iſti evadunt*. Boni etiam ſunt, qui perſeverant, quod a facultate robuſta fit, atque augentur, atque, ut diximus ſuppurantur, & qui una cum bonis ſignis apparent, atque ægrotos morbo vel liberant, vel allevant, qui merito ita apparentes ſunt ex judicatoriis judicantibus, quique, natura morbo prævalente, fiunt. Atque iſti ſunt abſceſſus ſalutares. Malos vero eſſe omnes abſceſſus, cum cruditatis ſignis apparentes, in diebus non decretoriis, ſuapte natura malos, in partibus proximis morbo, membriſque principibus, perſeverantes, non ſuppurantes, pauciores, copioſiores, parviores, majores, qui ſtatim exorti recurrunt, ſeu retrahuntur intus, atque evaneſcunt, cum malis ſignis nihil juvantes, atque lædentes. De iis, qui morbo crudo exiſtente apparent, Galen. *in 1. Epidemior.* ita habet: *Omnium, quæ tunc inciderent, incommodorum erat caput, cruditas humorum, quod ſi quando natura per vim ad aliquos eorum excernendos aggreſſa eſſet, nihil proficiebat, immo vero ab iis ſuperata, aut in profundum recurrere permiſit, aut propter paucitatem excretionum abſceſſum moliebatur. Alias a nobis demonſtratum eſt, nullam excretionem, vel abſceſſum fidelem eſſe, quæ cum ſignis cruditatis apparet, etiamſi ad probam maturationem perveniat. Concoctiones celere judicium & ſecuritatem promittunt. Sed ne nunc quidem cauſſæ febrium, quæ intra venas continentur, erant concoctæ. At parotides erant tamen maturæ, quod infrequens eſſe, & debere memoria teneri dicebam. Nam poſſe fieri quapiam in parte privatim concoctionem, toto morbo non concocto*. Mali itidem ſunt, qui decumbunt, in diebus non decretoriis; hi nobis quidem indicio ſunt, illum decubitum, ſive excretionem humoris non fieri a natura ſalubriter agente, ſed morbo acta, quippe aut humoris multitudine, aut prava qualitate, ante tempus irritata ad pugnam: quare mirum non eſt, ſi perturbato ipſius naturali ordine, in diebus non decretoriis expellat. Eoque apertius mali abſceſſus dignoſcentur, ſi ſuapte quoque natura mali exiſtant, cujuſmodi ſunt, ex Hippocrat. *in 1. Prognoſtic. pag. 38. ſub finem Tubercula circum dura, bifida, inæqualia*: & *in libr. 6. Epidemiorum ſect. 1. text. 12. pag. 1165. foras non extumeſcentia, non acuminata, neque in turbinem gracileſcentia, non æqualiter matureſcentia, circumdura, non declivia, atque bifida*. Qui vero ex abſceſſibus malignitatem habent, cum febre continua omnes exitiales ſunt. Cujuſmodi fuerunt in ea peſtilentia, quam Hippocrat. *in libro tertio Epidemiorum pag. 1083. Commentar. 1. text. 13.* recenſuit; ſcripſit enim ignes malignos multos interemiſſe, tubercula, carbunculos, fluxiones ad pudenda, Herpetes multos malignos in ea peſtilenti conſtitutione graſſatos fuiſſe, pluresque iis fuiſſe interemtos. Pauciores etiam abſceſſus, & majores damnantur, de quibus Hippocrates *in primo Epidemiorum ſect. ſecunda pagin. 946. littera G. Commentario tertio* ait: *His ſuccedebant abſceſſus, aut majores, quam ut ferri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſent quicquam:* & paullo poſt *ibidem litt. H. Papulæ parvæ, non eſſent excernendis morbis:* & poſtea de *Sileno lib. 1. Epidem. Ægr. 2. pag. 969. Papulæ cum ſudore rubentes, rotundæ parvæ, varis ſimiles permanebant, nec abſceſſum efficiebant*. Copioſiores etiam tutæ non ſunt, niſi ad purulentos abſceſſus deveniant; nam nimis copioſum humorem denotant, ex quo timor eſt, ut ne

Abſceſſus mali.

tantum cutis, ſed quin etiam pars aliqua interna, aut ex principibus, aut ex neceſſariis obſideatur. Qua ratione Auctor *Coac. præſagiorum text.* 114. merito dixit: *Quibus in febre continua puſtulæ toto corpore excitantur, letale, niſi ſuperveniat purulentus abſceſſus.* In his enim, quorum corpora acuta febre vexata, undequaque abſceſſibus, aut parvis aut magnis ſcatent, periculum eſt, ne retrocedant, principemque vel vitæ neceſſariam aliquam partem, ut diximus, occupent, quod eſt exitioſum. Hujuſmodi caſum Hippocr. *in Tymonactis puero* vidit, de quo *in 7. Epidem. pag.* 1238. *text.* 114. ita habet: *Tymonactis puero, quaſi duorum menſium, exanthemata in cruribus, & in coxis, & lumbis, Hypogaſtrio, & tumores valde rubicundi. Sedatis autem his convulſiones & epileptica fiebant ſine febre multis diebus, & mortuus eſt.* Non minoris periculi ſunt, tumores admodum rubentes, ac omnium maxime liventes, & nigricantes, quem pravum colorem in exanthematibus nec vel etiam mulierculæ ignorant; iis etenim valde rubentibus, liventibus, ac maxime nigris, merito de ægrotorum ſalute plurimum dubitandum putant, Hipp. *in 1. Epidem. ſect. 2. pag. 946. ſub finem*: (*confer. autem notas Fœſii, qui non legit* Μελανόμενα, *nigricantia, ſed μὴ λυόμενα, autem μολυνόμενα.*) in ea peſtilenti conſtitutione ait graſſatos fuiſſe *tumores ſecundum aures nigricantes, qui nihil denuntiarent*: & in *Critone lib. 1. Epid. Ægr 9. pag.* 985. moribundo puſtulæ nigræ eruperunt: & papulæ, quæ *Sileno, ib. Ægr. 2. pag. 969.* ante mortem apparuerunt, fuere rotundæ, parvæ, varis ſimiles, valde rubentes. Abſceſſibus vero ſine ratione ſublatis nedum fidere non debebimus, ſed quinimmo ab ipſis plurimum timere. Sine ratione dico, qui nulla prægreſſa aut vacuatione, aut purgatione, vel a natura, vel ab arte, intus retrahuntur, atque evaneſcunt. Hujuſmodi abſceſſus periculum delirii & mortis inferre, Hipp. *in 2. Prognoſt. pag. 43. lin. 27.* notavit. De his *in 6. Epidem. ſect. 4. text. pag.* 1179. *Quum in morbo aliquo judicationis tempore tumores ſecundum aurem exorti, prius quam ſuppurentur, inaniuntur, ideſt, retrahuntur, & evaneſcunt, exſpectare oportet ita affectis recidivam.* Gal. vero *in 1. Prorrh. com. 1.* ait: *Talium autem ſignorum genus deterrimum eſſe conſtat, nempe, quæ vel tubercula, vel puſtulæ ex imo ad cutem enata, recurrerunt, graviſſima omnium exiſtunt, omniumque maxime, ubi abſceſſus neque ob humoris fluxi tenuitatem, aut partis laxitatem, aut aeris caliditatem, aut adhibiti medicamenti diſcutiendi poteſtatem habentis, ſed ob virium lapſum intus recurrerunt.* De his Hipp. *in 1. Epid. ſect. 2. p. 946. ſub finem*: *Quibuſdam in articulos, præſertim in coxendicem decumbebant, paucis decretorie ceſſabant, ſtatimque ſuperati ad priorem ſtatum redierunt*; quod in *Anaxenore ſplenitico*, & *mali coloris* Hippocr. *lib. 7. Epid. pag.* 1239. *text.* 124. animadvertit, qui tumorem habuit in coxendice, quo evaneſcente, ipſe mortuus eſt. Ceterum utile erit, diſtinguere abſceſſus longo tempore perſeverantes, & poſtea intus recurrentes, ab his, qui ſtatim oborti recurrunt; hi enim longe majus periculum quam ii minantur, quod Gal. in 1. *Prorrhet. com* 1. confirmavit, quum dixerit, tales abſceſſus eſſe deterrimos, atque etiam ait, ſudores quoque, qui cœperunt quidem, ſed protinus ceſſaverunt, pravi ſunt, quod naturam maxime prælanguidam, excretionem quidem aggredientem, ſed præ imbecillitate non abſolventem, præmonſtrent, Hippoc. in 1. *Epid. ſect. 2. pag. 946. ſub finem*. papulas parvas, quod ſtatim evaneſcerent, peſſimas obſervavit; & paullo ante de malis abſceſſibus dixit, *ibid. lit. G. Sed ſtatim redierunt & deterius evaſerunt*. In *Euphranonis filio, lib. 5. Epid. pag.* 1161. *tex.* 92. qui mortuus eſt, exanthemata oborta parum durarunt, & abſque ratione evanuerunt. Et hæc de abſceſſibus intro recurrentibus. Ex loco itidem mali abſceſsus Medicis innoteſcunt: peſſimi enim ſunt, qui prope viſcera in cute erumpunt. Quo fit, ut abſceſsus poſt aures, perpetuo ſint ſuſpecti; nam forte ſuperveniunt fractis inde viribus.

Tumores periculoſi.

& vi-

& videntur novas cauſsas morbi attexere. Feſsus æger magnos abſceſsus, qui tempore ac virium robore opus habent, ad concoctionem & ſuppurationem faciendam, ferre nequit: parvi vero non ſolvunt. Sunt vero magis, ut dictum eſt, ſuſpecti loci ratione, quippe, quod cerebro ſint proximi: non ſecus & tumores ſub alis loci ratione damnantur, & bubones ipſi in inguinibus, qui tumores ſolent graſsari tempore peſtilenti, quo tempore interna viſcera maxime patiuntur. Cum malis ſignis nulli abſceſsus boni eſse poſsunt: ſunt enim ex judicatoriis non judicantibus. Non minus etiam ii, qui nedum febrem non tollunt, ægrotoſque quicquam allevant, ſed quinimmo ipſos non parum lædunt. Atque hæc in univerſum dicta ſint de malis abſceſſibus, mortem prædicentibus. Nunc pauca, ut rem hanc exemplis quibuſdam illuſtremus, de his abſceſſibus, qui ſecundum aures fiunt, quos parotidas Medici appellant, ſubjungamus. Hos abſceſsus hiſce ſignis prænoſcendos Hippocr. *in Prognoſt. pagin. 43. lin. 7.* docet: *In hunc modum iſta conſideranda ſunt. Si febris detinet, neque dolor conquieſcit, neque ſputum ex ratione procedit, neque bilioſæ ſunt alvi dejectiones, nec bene ſolutæ ac ſinceræ, nec urina admodum multa, multum habens ſedimentum, ſuffragantur vero ad ſalutem reliqua omnia ſalutaria ſigna, in his ejuſmodi abſceſsus orituros ſperare convenit. At hi oriuntur quidem in locis infernis, quibus circa hypochondria inflammationis quid ſubeſt: illis autem in ſupernis, quibus hypochondrium molle & doloris expers permanet, & cum ſpirandi difficultate aliquandiu laboraverint, quæ citra aliam evidentem occaſionem conquieſcat*, Propria ergo Parotidum futurarum ſigna ſunt, ubi morbus non fuerit valde diuturnus, ſi ſubita difficultas anhelitus laboranti ſuperveniens, mox quieſcat, quumque gravitas capitis & dolor ſubſequatur, & gravis ſomnus aut ſurditas, huic in glandibus poſt aures neceſse eſt abſceſsus fieri. Galen. *in 1. Prorrh. comm. 75. text. 76. & 77.* ſommum gravem, cum dolore capitis & ſurditatem ſtatim advenientem ſigna eſse parotidum ſtatuit: & Auctor *Prorrh. lib. 1. text. 168.* dixit, ex capitis dolore, comate, ſurditateque prænoſci parotidas. Ex iis abſceſſibus boni ſunt, qui magnitudine moderati, ſine dolore, integris viribus, in aliquo die critico, & antegreſſis coctionis ſignis erumpunt. Cujuſmodi fuerunt, quos Hipp. *in Epidemiis* meminit, de quibus *in lib. 1. ſect. 1. pag. 938. lit. E. & 939. lit. D.* dixit: *Tubercula vero multis ſecundum alterutram aurem, plurimis ſecundum utramque exſtiterunt, febre carebant, erant recti: nonnullis parum accendebantur, ſed exſtincta omnibus ſunt citra incommodum. Erat eorum hæc natura, laxa erant, magna, diffuſa citra phlegmonem atque citra dolorem, obſcure omnibus evaneſcebant.* Hæc fiunt a caliginoſa materia, quæ facile citra incommodum tolluntur, aut a pituita, quæ œdematoſa, aut a ſanguine phlegmonoſa, aut a flava bile eryſipelatoſa vocata, aut a materia craſſa, & viſcida: illa facillime diſcutiuntur, atque hæc ægerrime; quo fit, ut in multis ſublata febre etiam perſeverent, neque, reſidentia, neque ſuppurantia appareant: de his Hipp. *in 1. Epidem. ſect 2. pag. 956. ſub lit. F. Tubercula ſecundum aures, quæ in febribus cum dolore extuberant, nonnullis, quum febris decretorie ſedatur, non reſident, neque ſuppurant, his bilioſum alvi profluvium, aut dyſenteria, aut ſedimentum urinarum craſſarum, ea ſolvit, uti evenit Hermippo Clazomenio.* Optimæ ſunt, vel ſaltem non pravæ parotides, quæ prægreſſis vacuationibus, vel purgationibus, reſolvuntur, & præſertim cum bonis urinis, cujuſmodi forte fuerunt, quæ in Clazomenio (*Vide ejus hiſtoriam lib. 1. Epidem. Ægr. 10. pag. 985.*) exuberarunt. De his forte meminit auctor *Coac. præſagiorum*, ita dicens: *Tuſſiculæ, quæ cum ſputationibus procedunt, emolliunt parotides.* Quæ ſuppurantur itidem cum ſignis coctionis, & pus eſt album, purum, ſalutares exſtunt. Contra malæ dicuntur, quæ aut majores quam ferri poſſint, aut parviores quam purgare valeant, obſervantur, cum dolore, & fractis viribus

Parotides unde futuræ prævidentur.

Quænam boni.

Quænam malæ.

viribus erumpentes, nullis coctionis ſignis antegreſſis, in die non critico cum malis ſignis apparentes, atque febrem non allevantes, ſed quinimmo ægris ab ipſis in deterius mutatis. Præterea quæ intus recurrunt abſque cauſſa. Has recidivam præmonſtrare Hipp. *in 6. Epidem. ſect. 4 text. 1. pag. 1179.* tradidit, & Galen. deterrimum eſſe ſignum *in primo Prorrhet.* ſtatuit; quales *Nicolai Concubina Epidem. lib. 7. text. 50. pag. 1221.* habuit, quibus abſceſſibus, magnis, ſine ſigno ſublatis, mors eam eſt ſubſecuta. Auctor *Coac. Præſag. text. 138.* ait: *Si ardenti febre abſceſſus, ad aures facti, non ſuppuraverint, non valde ſervantur*: & *ibidem. text. 207. Tumores circa aures maxime ex acutis in febribus ardentibus fiunt, ſi morbum non ſolvant, neque maturent, aut ex naribus ſanguis fluat, vel urinæ deponant ſedimentum craſſum, moriuntur.* Et itidem Auctor *Coac Præſagiorum text. 201. Tumores circa aures poſt expurgata plurima graviter olentia, acuta febre, hypochondrio intento, tardius excitati, interficiunt*: & ibidem *text. 206.* ſcriptum eſt, in ſuppuratis parotidibus pure non albo effluente, letale eſſe; *ibid. text. 205.* pravaſque dici parotidas, quæ cum urinis parum coctis apparent. Quod Galen. vel etiam de iis, quæ probe ſuppurarunt, intelligi debere, nobis præmonſtraſſe, nupperrime meminimus. Unde vel etiam parotides ſuſpectæ erunt, abſque ſignis conctionis, probe ſuppuratæ. Quales in *Cratiſtonacte*, & *ancilla pictoris* ab Hipp. *lib. 1. Epid. ſect. 2. pag. 958. ſub lit. B.* (*Foeſius tamen loco pictoris legit fullonis.*) fuere obſervatæ, quibus, uti dictum eſt, probe ſuppuratis, ambo tamen interierunt. De exanthematibus, quo nomine papulæ omnes latinis, barbaris variolæ, morbilli, puncticulæ ſeu maculæ noncupatæ, comprehenduntur; deque puſtulis, carbunculis, bubonibus tumoribus hypocondriorum, nihil ſupereſt ad ipſorum prognoſin illuſtrandam dicendum, quum omnia ad prædicendi rationem pertinentia, quum in hoc ipſo capite, quod abſolvimus, tum in aliis libris ſatis accurete expenderimus.

FINIS.

HIE-

HIERONYMI FRACASTORII

Veronenſis M. D. V. Cl.

DE DIEBUS CRITICIS

LIBELLUS

Additus PROSPERO ALPINO de Præſagienda Vita & Morte Ægrotantium.

Porro judicari in Morbis eſt, quum morbi augeſcunt, aut marceſcunt, aut in alium morbum tranſeunt, aut deſinunt. Hippocr. de Affectionibus.

A Generatione ἀπὸ γενέσεως exordiri oportet. *Erotianus ex Hippocr.*



VENETIIS. MDCCLI.

Ex Typographia Remondiniana.

Superiorum permissu, ac privilegio.





HIERONYMI FRACASTORII
DE CAUSIS CRITICORUM
DIERUM
LIBELLUS.

NATURA Dei optimi munus cum tota, qua aut oculis cernitur, aut concipitur animo, admirationis multæ plena eſt, tum maxime, qua in animalibus viget; nam & animalia ipſa, & quæ ab iis fiunt ſenſus, cognitiones, appetitiones, generationes, & motus reliqui admiranda omnia ſunt; nec vero, & quæ iis accidunt, non multa ſunt, quę non parvam ſui admirationem præbent: inter quæ illæ in primis ſunt, quæ Criſes appellari conſuevere, quarum vel adeo mira natura eſt, ut neque adhuc ſatis perſpectum ſit, quam omnino cauſam habeant; nam quoſdam eſſe diæs conſtat, quos perinde ac fatales natura ante omnes deligit, in quibus de morbis decernat, quoſdam vero ita neglectos eſſe, ut nullas umquam Criſes videant, nullo naturæ munere habeantur digni; quæ admiratio ſapientes & naturæ interpretes viros in diverſas opiniones perduxit; quippe Pythagoræis viſum eſt certis numeris Deos & naturam gaudere; ante omnes ſeptenario, quem ad rationem Criſium nonnihil conferre arbitrati ſunt. Philoſophorum vero nonnulli cauſam omnem dierum in Criſibus caſui adſcribunt. Aſtronomi autem cęlo & ſideribus, Lunæ præſertim, quam per ſeptenarios ſuæ converſionis dies rebus, quæ hic ſunt, impetum quemdam ac vim immittere affirmant. Soli medici videntur mihi rerum ſuarum ſuique muneris obliti: ſoli enim ipſi quum viam facultatemque habere poſſent inquirendi inveniendique rationem Criſium, tum fortuna, neſcio qua, ab Aſtrologis ſeducti perſuaſique illorum opinionem ſecuti ſunt: quos quum omnes, tum præcipue Gal. mirari licet, qui alioqui tantus philoſophus, tam accuratus, & medicinæ parens, ac veluti Deus tam facile perſuaderi potuerit, ut facultate proprię artis neglecta, præſtigiis alienæ involvi paſſus ſit; ſed certe de magnis ingeniis illud dici par eſt, quod & de magnis venatoribus, qui ſæpe, quod multa ſectentur, quædam negligentius inſequitur: unde nihil mirum videri debet, ſi & Gal. qui tot invenit, qui tanta ſcripſit, qui ingentem illam medicinæ molem digeſſit, formavit, condidit, quædam tandem effugerint. Poſteriorum vero uti nulli ab eo recedere auſi ſunt, ita qui hac de re ſcripſere, omnes id ſolum curaſſe videntur, ut aut Galeni ſcripta, aut Aſtrologorum placita declararent; operæ pretium igitur exiſtimamus, ſi

rurſus hoc ſaxum vertatur, atque inquiſitio tam dignæ, tam neceſſariæ rei habeatur: ſi enim per ea, quę in nobis ſunt, ratio omnis & cauſa Criticorum dierum oſtendi poſſit, bene erit ab eo labore Lunam, & beata illa corpora liberare, quæ quum alioqui multa penes nos faciant, tum & multa a nobis & a natura fieri ſinunt. Equidem ſcio Galenum ſophiſtas vocare, conviciis maledictiſque proſequi, ſi qui ratione nulla malint hanc rem inquirere, quam minime Aſtrologis credere, præcipue Ægyptiis, qui aſſeveranter hæc a Luna fieri affirment: ſed certe, nedum ſi Ægyptius aliquis Aſtrologus, ſed ſi Ægyptius aliquis Deus, aut Anubis, aut Oſiris hæc mihi dixerit; non facile credam. Sophiſtam autem obſecro, ne quis me prius vocet, quam hæc amice atque æquo animo cuncta perlegerit. Referemus igitur, quę in hujus rei perveſtigatione, quam diligentiſſime habuimus, nobis tandem comperta ſunt, quæ neque prius credi audirique volumus, quam & re ipſa, ac rerum (ut ajunt) magiſtra experientia fuerint comprobata: ejuſmodi enim ſunt, ut & rationibus credi, & obſervationibus plane ſperari poſſint.

CAP. I.

DE cauſis igitur Criticorum dierum acturi, ea præmittemus in primis; quę circa morborum dies ſunt obſervata: deinde referemus, quo pacto alii eorum cauſas reddere tentavere, tum demum, quomodo & nos per magis rationabilia, & conſentanea magis naturæ reddendas exiſtimemus. In primis igitur recipiendum eſt nobis dierum, per quos ęgritudines pergunt, alios Criticos dici, in quibus, quę fiunt Criſes, majori ex parte fiunt, alios vero non Criticos vocari, in quibus perraro viſuntur Criſes: quoſdam vero medios eſſe, obſervatum enim eſſe conſtat & majorum noſtrorum experientia, & ea, quę in dies fit, certis diebus innumeras Criſes videri. certis rariſſimas, aliquibus medio modo ſe habere: item & inter Criticos vocatos, quoſdam eſſe prȩcipuos, & quaſi principes, quoſdam principatu minores, porro & alios eſſe indicativos & quaſi nuncios ejus Criſis, qnę in die principe futura eſt. Critici ergo ſunt 4. 7. 11. 14. 20. 21. 27. & ſecundum alios 28. & alii, quos recenſere neceſsarium non eſt. Prȩcipuos autem omnium eſſe conſtat 7. 14. 20. & 21. quamquam de 20. & 21. non plane inter antiquos convenit, uter magis Criticus ſit. Archigenes enim magis amare 21. viſus eſt; Hipp. vero & ejus ſectator Galenus 20. magis: ſequuntur deinde principatu minores 11. & 4. Non Critici vero ſunt 6. 8. 10. 12. 16. 19. 22. & 25. quamquam 6. quandoque Criſes nonnullas videat, verum illę non proprie Criſes ſunt, quare & ipſe inter Criticos recenſeatur: medio vero modo ſe habent 5. 9. 13. 17. 8. & 24. ſed horum 17. 13. ad Criticos appropinquant magis, 9. vero ad non Criticos. Indicativi vero ſunt 4. quidem ſeptimi, 11. decimi quarti, decimuſeptimus vigeſimi, 24. vigeſimi ſeptimi, omnes quidem quarti a die, in qua perfecta futura eſt Criſis; hęc igitur quod ita ſint, recipiendum eſt: cur autem ita ſe habeant, & unde tanta dierum diverſitas enaſcatur in morbis, nunc inquirendum.

CAP. II.

PYthagoricorum autem dogmata aut referre, aut refellere ſupervacaneum quidem videtur, quando jam ſatis manifeſtum eſt neque numeros, neque in univerſum quantitatem ullam principium actionum eſſe poſſe, niſi forte per accidens.

Philoſophorum vero quicumque rationem dierum in Criſibus caſui donant, rationabilius quidem magna ex parte loquuntur: dicunt enim quæcumque agunt & patiuntur, omnia certa inter ſe ratione proportioneque conſiſtere, & certo tempore agere, hæc quidem majori, illa minori, ut

accidit:

accidit : quare & circa Criſes , quod die ſeptima aut quartadecima humores moveantur in nobis , nulla certa alia cauſa eſt , niſi quod talem accidit eſſe proportionem naturæ ad humorem , quem tanto tempore concoquit, concoctum expellit, hunc quidem in ſeptima, illum in quartadecima : quemadmodum & ignis hoc quidem robur una die, illud duabus abſumit: & bilis quæ flava eſt, per tertias, quæ atra, per quartas movetur : ſicut igitur in his non quærimus rationem dierum , ita nec circa Criſes debemus quærere, ſed ſolum cur hoc humoris genus citius , illud tardius moveatur.

Verum enim vero, tametſi verum hi in univerſum dicunt, certam eſſe inter agentia proportionem, & certam menſuram temporis, tam ſimplicem tamen cauſam habere Criticos dies exiſtimandum non eſt, ſed magis credendum quędam etiam ad Criſes concurrere, propter quæ certis diebus multæ, certis paucæ ſpectentur Criſes: ſi enim ſola illa proportio accederet, profecto non magis ſeptimam, quam octavam & nonam diem Criticam videremus, ſiquidem paullulum immutata materia, & in octava & nona ſpectarentur Criſes.

CAP. III.

CUM Aſtrologis vero, & Medicis, qui eos ſequuntur, majus mihi negocium parari video, quorum alios Aſtrologiæ, alios Galeni amor permoveat: ſed hi certe ſi non ob aliud nobis infenſi ſint , injuſte quidem nobiſcum agant, quando & nos alioqui Aſtrologiam veneramur, & Galeni nomen ac memoriam uti ſacram ſanctamque colimus: quicquid vero molimur, id omne veritatis & philoſophiæ amore facimus, quę in nullius verba jurare addicta eſt. Referemus igitur, quę medici ex Aſtrologorum decretis ſcribunt; certum eſſe inquiunt per ſeptenarios dies Criſes incedere , circaque illas potiſſimum fieri : quum vero & Lunam quoque certum ſit per ſeptenarios dies & cęli quartas rebus, quæ hic ſunt, impetum quemdam & vim ingerere , quidnam aliud cenſendum ſit, quam Lunam, quod ſeptenarias illas commotiones immittat Criſibus? Efficax quidem atque evidentiſſimum ſignum eſt hoc rationem dierum in Lunam referendam eſſe, quum præſertim nihil aliud ſeſe offerat, quod in medium afferri poſſit. Dupliciter autem quum Lunæ converſionem dimetiamur : & per reditum ad Solem, quem menſem civilem vocant , & per reditum ad certum punctum in zodiaco, quem lunarem appellant menſem: in utroque quidem menſe manifeſtum eſſe dicunt Lunam per cœli quartas & ſeptenarios dies commotionem impetumque rebus hic inferre . Civilis enim menſis ex diebus 29. horis circiter 13. conſtat, quod tempus ſi per quartas ſuas partiaris, erit quarta quælibet dies 7. horæ ferme 9. circa cujus temporis extremas 24. horas res maxime a Luna moveri teſtimonium dicunt & illos facere, qui circa maritima verſantur, & illos, qui circa ruſtica. Similiter autem ſe habere ajunt & in Lunari menſe, qui ex diebus 27. horis 8. conficitur, quod Aſtrologi præſertim Ægyptii affirmant, quibus credendum eſſe Galenus præcipit, ac pœne minatur: cujus rei & graviſſimum teſtimonium afferunt, dicunt enim ægrotante aliquo, ſi Luna forte fortuna in eo puncto fuerit, quo ille exortus fuit, tum ei bonam vel malam conditionem allaturam, quum in quarta cœli ad eum punctum extiterit : ſi enim oriens ille in eo puncto ſalutares felices ſtellas habuit , tum Lunam ab ea quarta ſalutem elargituram , ſi vero infelices in ortu ſtellas ſortitus eſt , periturum quidem ab ea cœli quarta . Ex quo exiſtimari debet ſeptenarios Lunæ dies hic magnam quamdam facultatem & vim habere. Hæc igitur ſunt, quæ medici partim nautarum, ruſticorumque teſtimonio, partim Ægyptiorum Aſtrologorum de Criticorum dierum cauſis referre ſolent . Nos autem Aſtrologorum ac Galeni amicos rogamus, ut contenti ſint placide & ſine ſtomacho nobiſcum hanc rem inquirere: primum enim examinabimus, quæ experientia obſervationibuſque conſiſtere medici dicunt: mox aperte (ut

arbi-

arbitror) oſtendemus; quomodo quaſi faſcinationibus Aſtrologorum luſtrati, & vomere & ſudare in ſeptima & quartadecima ſine Luna poſſimus.

CAP. IV.

IN civili, inquiunt, menſe tum nautæ, tum agricolæ affirmant per cœli quartas commotionem majorem rebus Lunam dare; at certe decebat eos ab iis accipere, quænam ea eſſent in quibus major illa commotio videatur, ſi enim in univerſum ita eſſe circa maria affirment, falſum nimirum aſſerunt: primum enim circa maris crementa & decrementa (quos æſtus vocant) conſtat non majorem commotionem per quadraturas Lunæ fieri: quando per id tempus vel minimos cerni æſtus manifeſtum eſt: at vero majores & ventos, & tempeſtates non circa ſeptimam Lunæ diem, ſed circa quintam exſurgere nautis omnibus notum eſt: quod & Virgilius & Heſiodus quoque notarunt, quum quintam eſſe fugiendam præcepere; quænam igitur ea ſunt circa maria, in quibus major illa agitatio percipiatur? Teſtacea fortaſſe, & cruſtacea, & id genus dicent ſub quaduraturis Lunæ excitari magis, & nutriri, & pingueſcere melius, quod certe neque negamus: nam per conjunctiones Lunę tum & calor, tum & humor exiguus in illis eſt, vegetari autem excitarique uterque incipit tum forte, quum Luna circa quadraturas verſatur, non quidem ea de cauſa, quod Luna in quarta cœli ſit, ſed ob id magis, quod tunc tantum demittitur luminis, quantum ſufficiens eſt ad fovendum eorum animalium calorem, humoremque pro alimento ſuggerendum, cujus ſignum illud eſt, quod non ſolum per quadraturas pingueſcunt ea animalia, ſed etiam poſt, & magis; manifeſtum igitur ex his eſſe poteſt nihil ea exempla ad Criſes facere, quæ e maritimis accepta ſunt. Circa ruſtica vero quædam ab agricolis tum maxime fiunt, quum ſemiplena eſt Luna, non certe alia de cauſa, quam ut extrema effugiant, hoc eſt, conjunctiones, & oppoſitiones, quorum utrumque quibuſdam rebus obeſſe ſolet, hoc quia nimii humoris eſt, illud quia exigui caloris; quæcumque igitur ob humoris abundantiam nata ſunt aut putreſcere, aut in luxuriem abire, iis oppoſitiones Lunæ timent: quæ vero caloris inopia ſterileſcere, illis conjunctiones cavent: qua de cauſa medium tempus eligere ſolent; arbores igitur, quas duraturas volunt, multas per plenilunia non cædunt, multas per Lunæ ſilentia: in altero; enim ob nimiam humiditatem putreſcant, in altero inopia caloris emarceſcant; nihil enim refert ad putredinem efficiendam, ſive humor plus æquo acceſſerit, ſive calor, qui continet miſtionem, defecerit, ſimiliter & ſatorum quæcumque facile luxuriant, ut faba, & aphaca, & cicer, & pæne omnia, quæ ſiliquam gerunt, nec per conjunctiones, nec per oppoſitiones Lunæ ſerunt, magis vero oppoſitiones etiam timent. Idem & circa vindemiam & vina conficienda nonnulli obſervant, per plenilunia enim humidiora, quam par ſit, & aquoſiora vina fiunt, per coitus vero frigidiora & minus potentia; atque hæc fere illa eſſe exiſtimo, quæ ruſtici obſervent, non quidem quod in quartis cœli ulla vis major inſit, ſed quod lumen id mediocre aptiſſimum quibuſdam rebus conficiendis videtur; quod vero in ore vulgi eſt per quartas Lunę mutari aeris conſtitutiones, & ſerenitates, & pluvias, & id genus, vel ipſi vulgo notum eſt eſſe mendaciſſimum.

At in lunari menſe Aſtrologi Ægyptii affirmant cęli quartas vim habere maximam, exemplo eorum, qui ægrotant Luna eo in puncto exiſtente, in quo enati illi ſunt: ſed profecto (ut ſuas Ægyptiis condonemus obſervationes) mirari tamen Gal. ipſum debemus, qui quum optime alioqui naturam inductionum noſſet, tum uni tamen exemplo tam facile manus dederit. Inductionum enim aliæ neceſſariæ ſunt, aliæ probabiles tantum, & harum aliæ ſimpliciter probabiles, aliæ ſecundum quid & ad hominem. Neceſſariæ ſunt: aut in quibus inductio ad omnia ſingularia fit, aut in quibus omnia ſingularia prorſus ſimilia ſunt, & nullum accidens pati poſſunt, ut mathematica: aut in quibus inductio in paucis quidem fit,

ſed

ſed ratio ad naturam communem & ad univerſale fit. Quod ſi nec in omnibus inductio fiat, nec ſingularia prorſus ſimilia ſint, nec ratio ad communem naturam ſit facta, tum quæ fit inductio probabilis ſolum eſt, ſimpliciter quidem probabilis, ſi in valde multis ſit habita, aut ratio ad communem naturam quidem fiat, ſed per communia, ſecundum quid autem probabilis, & ad hominem, ſi in paucis inductum ſit: quid igitur dicemus de Ægyptiorum inductione? primum quidem ſi dixerint in omnibus & quartis cęli, & rebus omnibus ita obſervaſſe, rem quidem vulgo impoſſibilem affirmabunt, ſed certe nec ſingularia prorſus ſimilia ſunt, quartæ quidem enim cęli, quatenus quartæ ſunt, & mathematice conſiderantur ſimiles nimirum ſunt omnes, at quatenus agentes, & quatenus in illis Luna operatur, non ſimiles cette ſunt, ſed accidentia multa patiuntur. At vero nec factam fuiſſe ad naturam communem demonſtrationem dicendum eſt, nam quæ quidem communis eſſe ratio poteſt ad naturam quartarum cęli? niſi forte dicant in quadraturis Lunam terræ proximiorem fieri, in oppoſitionibus plus luminis ad nos demittere. Verum hoc erat in civili menſe, non in lunari, de quo nunc quærimus, quartæ autem lunaris menſis ut plurimum extra quadraturas ſunt, ex his igitur eſt videre neceſſitatem nullam habere Ægyptiorum inductiones, ſed nec ſimpliciter probabiles eſſe, quum nec in valde multis obſervationem fecerint, nec probabilem rationem ad univerſale. Cur igitur ſophiſtas Galenus vocat, cur maledictis inceſſit omnes, qui rem iſthanc velint rationibus inveſtigare? ſi enim vix probabile ſecundum quid, & ad hominem eſt, quod Ægyptii dicunt nihil neceſſitatis continens, quid prohibet aliter eſſe poſſe, quod æquum decenſque eſt a Philoſopho homine inquiri?

CAP. V.

SED quid adeo laboramus? dentur omnes Ægyptiorum obſervationes, valent nautarum, agricolarumque teſtimonia, moveat Luna fortius per quartas cęli utriuſque menſis moveat per quartas Natalicii puncti fortius, quam tamen cauſam illis Criſibus dabimus, quæ extra quartas utriuſque menſis, extra quartas Natalis fiunt? rariſſime enim contingit, ut ſeptenarii morborum dies cum ſeptenariis Lunæ coincidant.

At hic conſurgunt recentiores quidam Aſtronomi ſimul & medici, ac vocem tollunt, clamantque nos Aſtrologorum decreta non intelligere, neque enim ita eſſe, ut in ſolis menſium illorum, & puncti Natalicii quartis Luna res moveat, loco enim exempli hæc ſunt, ſed ita accipi oportere, ut quocumque in puncto quis ægrotavit, Lunam per quartas cęli ad eum punctum commotionem inferre, ut ſi heri Dion, hodie Callias in morbum incidit, per ſuam ſeptimam Dioni, per ſuam Calliæ Luna impetum dabit, quare & ad omnes Criſes concurrere, ſed per ſeptenarios cuique ſuos.

Nos vero medicos iſtos atque Aſtrologos rogamus, ut paulliſper conſideant, & vocem demittant; volumus enim quædam eos placide percuncteri, ac primum illud, numquid, quod dicunt de Luna, in morbis ſolis ſpectetur, an & omnibus aliis quæ nova fiunt: ſi quidem in omnibus ita eſſe dixerint, numquid igitur, ſi Praxiteles Jovem facturus hodie marmor incidere cœpit, die ſeptima felicius aut infelicius? & ſi fontem quis hodie derivaverit, numquid largius ille fluet, in ſeptimam? ita enim fieri oporteret, quando & in fluxu humorum noſtrorum idem contingit, & ſi colonus agrum ſtercorarit, opimiorem in ſeptima videbit quam in octava? quoniam ita ſe habet & humor, qui in nobis putreſcit; quæ certe omnia quam ridicula ſint, nemo eſt qui non videat. Si vero in ſolis morbis ſeptenarii hi Lunæ motus vim ſuam habent, mirum perfecto eſt cœli quartas virtutes has dare Lunæ in ſolis morbis, & non hoc ſolum Galenus dicit affirmari ab agricolis & nautis, ſed multo amplius teſtimonium afferre voluit; ſed quoniam placide quum his Aſtrologis agimus, placet quidem

ut in ſolis morbis inquiramus, quale ſit, quod de Lunæ ſeptimis nuper dixere. Primum autem illud ſtatuatur, Criſim eſſe localem motum humorum ſi igitur Luna hunc motum facit, querimus, an eam vim facultatemque movendi humorem per ſe, & (ut ajunt) eſſentialiter habeat, an ab alio acquirat, aut loco, aut aſpectu, aut reflexione luminis, aut alio; ſi quidem eſſentialiter id habet Luna, non igitur in ſeptima magis, quam & in octava movebit, & nona, quæ enim per ſe inſunt, ſemper inſunt, & idem ſemper operantur. Si vero ab alio acquirit, quicquid ſit illud, ſi id quidem unum eſt & determinatum, quales ſunt quadraturæ & oppoſitiones, & quartæ natalis puncti, tum ergo ſolum movebit Luna, quum in eo erit, aut loco, aut aſpectu, aut alio, recedens autem non movebit: at vero ſi unum & determinatum non eſt id, a quo virtus Lunæ datur, ſed talia ſunt omnia puncta, in quibus quis ægrotet, ut per ſeptimam cuique ſuam efficacior ſit Luna, primum quidem hoc poni valde mirum eſt, ſed tamen ponatur: ſit ergo ut hodie Dion ægrotet, cras Callias, poſtridie Plato, in aliis alii, omnes quidem eadem ægritudine & ad ſeptimum Criſim factura, per ſuam igitur cœli quartam Luna unicuique Criſim dabit, in ſeptima quidem Dioni, in octava Calliæ, quæ illi ſeptima eſt, in nona Platoni, ipſi ſeptima, & ita in aliis: at certe ſi ita fiat nimirum Luna quotidie eumdem effectum faciet, Criſim videlicet, & localem motum humorum: quod enim in Dione fit in ſeptima, in Callia fit in octava, in Platone in nona, in aliis in decima: idem autem effectus ſi fiat diebus ſingulis, oportet & cauſam continenter eamdem eſſe; diverſa enim ſi ſit, eumdem effectum non faciet; ſi igitur a loco acquirit Luna eam vim & facultatem movendi, omnia quidem loca ſucceſſive, & puncta omnia eamdem habebunt vim, quare & quocumque in loco ſit Luna, idem ſemper operabitur: igitur ita in octava movere Dionem poterit, ſicut & in ſeptima; locus enim in quo eſt in octava, eamdem vim habet per ſe.

Nec certe dici illud poſt non moveri in octava Dionem, quoniam illi ſeptima non eſt, quod enim punctus aut locus ſeptenarius alteri ſit, reſpectus quidem eſt forinſecus veniens, quem & nos facimus, reſpectus autem nihil ipſi per ſe agunt, niſi in re, & in cauſa mutatio aliqua ſit.

Si ergo locus, qui in octava eſt, eam vim per ſe habet movendi humorem, ſive ſeptimus ſit, ſive octavus, ſemper eodem modo movebit: quam ob rem nihil tandem eſſe manifeſtum eſt, quod dicunt Lunam ægrotanti cuique per ſuas ſeptimas commotionem ad Criſim dare.

Præterea pœne riſu dignum eſt dicere primum, verbi gratia, punctum arietis primo cancri & primo libræ ſolum reſpondere, ſecundum ſecundo, tertium tertio, & ita in aliis, ſimplex enim corpus eſt cœlum & ejuſdem naturæ, & virtutis per totum orbem: quod ſi diverſæ naturæ primus arietis, & ſecundus cancri eſt, quo ergo modo Luna eumdem effectum facit, & in ſecundo cancri; nam & in eo humorem in Callia movet? muſſitant ad hæc paulliſper Aſtrologi quidam, tamen aliud quid comminiſcuntur, ac dicunt eo in puncto, quo quis ægrotat, infundi a Luna neſcio quid, quod nonniſi per ſeptenarias periodos vim ſuam edit: ſed certe & hoc ridiculum eſt, & in idem redit, quod enim hodie Dioni infunditur, cras infundetur Calliæ, poſtridie Platoni, idem ergo quotidie effectus fiet, quare & eamdem oportet continenter cauſam exiſtere, unde & idem diebus ſingulis efficiet Luna, & in omni ſubjecto, ſi paratum ſit. Eadem dicantur, ſi Luna eam vim ab aſpectu acquirit, aut reflexione, aut alio.

Poſtremo (ut tandem finem faciamus, jam enim moleſti videri poſſumus aperta in re) ad hæc advertere Aſtrologorum amicos rogamus; ſupponamus autem in primis actionem omnem nonniſi contactu fieri, cœlum autem & ſidera,

ſidera, quum huc non pertingant, agere quidem per aliquid huc demiſſum, id vero aliquid ſpirituale eſſe, dico autem ſpirituale qualitatem contrario carentem, quæ & momento diffundi ſolet, quale lumen, & ſi quid aliud ejuſmodi demitti a cœlo poteſt; ſpiritualium autem actiones (ut in iis, quæ de contagione diximus) omnes hæ ſunt, & non aliæ. Primum quidem videntur poſſe qualitates illas producere, quæ primæ vocantur, ut lumen videmus calorem facere, quocumque id modo fiat.

Deinde videntur & vim trahendi ac fugandi quædam habere, quod in Magnete, Adamante, Electro, & aliis quibuſdam eſt manifeſtum; certa enim attrahunt, quod non aliter poſſe facere, quam per ſpirituale aliquid demonſtratum eſt in aliis: at vero & in Antipariſtaſi multorum palam eſt fugare ſeſe nonnulla per ſpirituales qualitates; poſſunt deinde & hæc eadem ſpiritualia in animalium membra modo triſtitiam & diſplicentiam, modo ſuavitatem & voluptatem ingerere; recepta enim in nobis neceſſe eſt aut ut grata atque amica recepi, aut ut ingrata & inimica: ſic ſonus, & ſapor, & odor, & lumen, & id genus reliqua recipi conſuevere. Poſtremo quod eadem poſſint id cognitioni repræſentare, unde effluxere, manifeſtum eſt: tot igitur & non plura poſſe facere ſpiritualium unumquodque ſupponendum eſt nobis. Si igitur aliquo horum mediante concurrit ad Criſes Luna, quærendum eſt, quonam prædictorum modo concurrat, generando ne aliquam qualitatum primarum, an trahendo, vel fugando humores, an diſplicentiam vel voluptatem ingerendo? horum enim aliquid dici neceſſe eſt, nam cognitionem ad Criſes faciendas præbere, nemo eſt qui dixerit. Sed certe quicquid horum detur, una quædam communis ratio contra eſt, particulares autem multæ, nam primum quicquid ponant, ſupervacaneum eſt, & ſine neceſſitate; ſive enim ſpirituale illud calorem generet, noſtrumque eo modo augeat, ſive trahere vel fugare dicatur, ſive diſplicentiam ſtimulumque in membra ingerere, in caſſum ponunt omnia, quando ea nobis omnia ſunt, quantum ſit ſatis, calor, propulſatio, ſtimulus; particularius autem inquirendo ſi ſpirituale illud ob id ad Criſes concurrit, quod caloris ſit productivum, lumen ergo id erit: at certe lumen non una die magis quam alia calorem ſuggerit, niſi quo plus ad terram reflecti, quod in Sole quidem accidit, quanto directior fit nobis, Luna vero quod plus luminis a Sole recipit, recipit autem continenter plus, quo magis ab eo removetur, quare quum octava & nona die abſcedat a Sole magis, utique & in iis calorem apportabit majorem ſemper, quam in ſeptima. Si vero dixerint non hoc modo ſpirituale illud operari, ſed magis aut trahendo humores, aut fugando, illi quidem primum ſciant, quæ ſeſe invicem trahunt, aut pellunt, omnia finem in natura habere, quo ſic mutuo conſerventur, hæ quidem repellendo contraria, illa trahendo affinia conſimiliaque, at inter cœlum & humores noſtros hic finis eſſe non poteſt, neque enim inimicitiam ullam cum humoribus cœlum habet, nec trahendi neceſſitatem, quo aut conſervet, aut conſervetur. Præterea, quæ ſeſe trahunt, omnia eo uſque ſeſe attrahunt, quo in unum coeant, niſi impediantur, hic enim attractionis eſt finis: trahi autem humores uſque ad cœlum neminem dicturum arbitror, niſi ſi quis etiam putare poſſit paſci ſidera, ut antiqui poetæ dixere. Impediri vero cœlum perpetuo tempore a fine ſuo divinum corpus & immortale, inconveniens non parvum eſt: ac demum ſi ſpirituale illud per ſe vim eam trahendi, aut fugandi habet, ſemper quidem per ſe trahet, & non magis ſeptima quam octava, niſi quid aliud ex parte recipientis ſubjecti obſtet, ſed neque poſtremo quis poteſt dicere ſpirituale illud uti triſte receptum diſplicentiam in membra ingerere, atque irritare ad eam expulſionem faciendam, quæ Criſis dicitur; primum quidem, quia ſic dicere quidem non poſſunt, cur majorem diſplicentiam dies ſeptima ingerat quam octava & nona, ſi per ſe eam inimicitiam cum membris habet: inde & illud valde mirum videri debet Dioni triſte eſſe

ſpirituale hoc in ſeptima, Calliæ vero non, eadem in domo eodem in lectulo jacenti: mox eidem Calliæ in octava triſte & inimicum fieri, Dioni non amplius: ac demum ſi propter ingeſtam diſplicentiam dicatur id Criſes facere, imo magis oppoſitum ſequi videtur, & impediri potius ea de cauſa Criſes quemadmodum in conſimilibus ſæpe videmus fieri, ſæpe enim futura exiſtente Criſi, accidit eam impediri ex novo recepto dolore, aut ex ira & ejuſmodi, quod jure fit, divertitur enim natura a priori ſtimulo, nova recepta ſpecie triſtitiæ alterius, ſimiliter & ſi operari illud Criſes dicatur, quod ut ſuavi recepto corroborentur membra, eadem opponi poſſunt, non eſſe enim ſuave niſi cui ſeptenarium acceſſit, & in eodem lectulo Dioni, non autem Calliæ ridiculum cęrte eſt, & philoſopho homine indignum.

Ad hæc igitur ſi quis recto reſpiciat oculo depoſito ſectæ amore, videbit Lunam & beata illa corpora non aliter ad Criſes facere, quam & ad cibi concoctioues, & generationes, & alia id genus: neque enim ſumus, qui & Solem, & Lunam, & alia ſydera negemus multa hic operari & movere, & ad Criſes quoque accedere poſſe, quemadmodum ad alia, uti univerſales multorum cauſas, proprias vero cauſas eſſe, & nihil aliud ad rationem dierum in Criſibus debere inquiri, aut inveniri poſſe, & negandum, & a Philoſopho ridendum fore exiſtimamus, ſed de his ſatis ſuperque dictum jam eſt, accedamus jam ad ea, quæ magis rationabilia ſunt, & ad medicos pertinentia magis, demonſtrantes rationem omnem dierum in Criſibus ex iis pendere, quæ ſunt in nobis.

CAP. VI.

PPrincipio illud non ignorandum eſt duo eſſe, quæ potiſſimum ad eam expulſionem faciunt, quæ Criſis dicitur, alterum eſt diſplicentia, ſtimuluſque, quem corruptus jamque inimicus humor in membra ingerit, alterum eſt digeſtio, hoc eſt præparatio illa, quæ requiritur, ſi expelli debet: utrumque enim quum ſimul convenit, tum maxime propulſatio humoris corrupti fit, quapropter rectiſſime Galenus dicebat in paroxiſmis, & circa morborum ſtatus maxime videri Criſes, in paroxiſmo enim ſtimulus atque irritamentum fit maximum, circa ſtatus vero, concocta digeſtaque materia eſt, accidit tamen quandoque tantum eſſe irritamentum, ut quamquam nec plane digeſtus ſit humor, foras tamen pellatur, conatu quodam maximo a natura facto, quod enim ea vis inſit membris, ut nocentia repellat, manifeſtum eſt, quamquam, quo principio & quo pacto id fiat, non ita eſt manifeſtum.

Ergo & quum plus nimio humor exuberat, & quum furenti eſt ſimilis, quaſdam ante tempus accidit Criſes fieri, ſed certe ejuſmodi non propriæ Criſes ſunt, ſed violentiæ quædam magis, in quibus nullus dierum, nullus naturæ ordo ſervatur.

De iis igitur, quæ Criſes non proprie ſunt, ſed irregulares quidam impetus, nullus nobis ſermo erit, ſed de iis ſolum, quæ proprie Criſes ſunt, & cauſam certam habent, & rationem dierum aliquam.

CAP. VII.

AD hæc & illud quoque conſtituendum eſt, rariſſime fieri, ut tranſeunte in humores vitio aliquo, unus tantum humor corripiatur, nam ut plurimum vel duo, vel plures vitium idem concipiunt, aut ſimul, aut poſt. Quippe ea in maſſa ſanguinis, quę intra venas continetur, confuſi commiſtique ſunt & reliqui vocati humores, cholera, phlegma, & melancholia, ſed ita ut quodammodo actu, quodammodo potentia in ea maſſa ſint, potentia quidem, quia ad minimas. & indiviſibiles particulas redacti ſunt, nec monſtrari poſſunt, hoc quidem phlegma, illud cholera, illud melancholia, niſi

niſi particulæ uniantur: at actu ſunt, quoniam tametſi ad particulas minimas deducti ſunt, proprii tamen generis rationem habent: igitur propter vicinitatem confuſionemque eorum rariſſime fit, ut infectionis cauſa communis pluribus non fiat: ſi enim contagio & putrefactio in cauſa eſt, aut liquefactio, aut obſtructio, aut aliud id genus, ægre fit, ut vitium ad unum tantum ſeſe applicet.

Incipientibus aut iis vitiari, tum quod corruptum eſt ſecernitur, quantum fieri poteſt, a reliquo, quod ſincerum eſt, ita operante natura, cui ea vis ineſt, ac tunc actu humor fit, coeuntibus in unum particulis, ac ſenſibilem humorem conflantibus, per quem modum tandem & expulſio deinde fit, & Criſis, modo per unam, modo per aliam partem, qua magis naturæ commodum eſt.

CAP. VIII.

ACcidit autem dum corruptos humores natura ſeparat, & actu facit, ita interdum commiſceri eos invicem, ut unam conficiant formam unumque motum dent, ac morbum unum, qui rationem dominantis inſequitur: unde cholerę nothæ, & pituitæ, & melancholiæ nothæ continguntur, a quibus & morbi denominantur nothæ tertianæ, nothæ quotidianæ, nothæ quartanæ: ſæpiſſime vero non unam omnes formam conflant, nec unum motum dant, nec morbum unum, ſed plures, unde & morbi compoſiti fiunt.

Si igitur, qui peccat, humor ſimplex, & unus tantum ſit, aut plures quidem, ſed in formam unam redacti, tunc nulla dierum criticorum ratio eſt expectanda, ſed paroxiſmi ſoli conſiderandi ſunt, & eorum dies, in phlegmate quidem quotidianæ, in cholera tertianæ, in melancholia quartanæ, in quibus cadent quidem ſuæ Criſes, ſed ut accidit materiam digeſtam eſſe, quod certam diem nullam per ſe habet, propter quod in tertianis, quæ puræ ſunt, videmus, & quintam indifferenter & ſeptimam & nonam, & in ſummam omnes impares dare Criſes, nec Hippocrates aliud in his præcipit attendendum eſſe, quam dies impares. At vero ubi & plures peccant humores, & non ſub formam unam commiſti, ſed confuſi ſolum, propriam naturam ſervantes, tunc ſperare poſſumus certas dies videre, in quibus Criſes permultę fiant, certas, in quibus rariſſimæ, alias medio modo ſe habentes, quorum omnium cauſam & certam rationem habere poſſumus: ac talis major eſt morborum pars, quoniam uti raro eſt humorem ſimplicem peccare, ita & plures ad unam formam convenire perrarum eſt: quare in multis morborum, aut Criſes videri poſſunt certis diebus, aut motus ſaltem humorum. Illud vero intereſt inter humores; quod ad eam miſtionem conficiendam, quæ unius formæ eſt, aptiſſimum eſt phlegma, quoniam humidum liquidumque eſt, ac bene miſcibile, ineptiſſima melancholia, quoniam ſiccior terreſtriorque eſt, & ad miſcendum durior, nihil tamen prohibet & phlegma ſeorſum morbum facere, & melancholiam ad unam formam venire.


CAP. IX.

PLures igitur quum humores in morbis peccant, non autem ſub forma una, accidit quidem interdum, ut unuſquiſque illorum manifeſtum prodat paroxiſmum, Cholera quidem tertianarium, phlegma quotidianum, melancholia quartanarium, unde & morbi manifeſte compoſiti fiunt. Interdum vero accidit, ut non omnes manifeſtum dent paroxiſmum, ſi aliqui illorum latentiorem ædant: dico autem latentiorem paroxiſmum, non quod humor non moveatur, ſed quod motus ille ſuboccultus ſit, quod nonnullis de cauſis accidit: ſæpe enim, qui movetur, humor non multus eſt, & vix perceptibile eſt, quo exacerbat: ſæpe ſenſim, & per moras putreſcit, unde nec

horrorem incutit, nec calorem acrem apportat: ſæpe & ſupervenit major febri: aut vero & quum non paucum eſt, quod movetur, & repente invadit non ſenſim & per particulas, nec majori alteri morbo ſupervenit, tum manifeſtum affert paroxiſmum, & manifeſtę fiunt compoſitæ pluresque febres & Hemitrithei, aliæ quidem ex cholera, & phlegmate, aliæ ex cholera, & melancholia. Sed certe non frequenter admodum fit, ut peccantibus pluribus humorum, manifeſtos quiſque motus prodat, verum ſæpius id videri accidit, ut unus manifeſtum ædat paroxiſmum, alius latentiorem, manifeſtum quidem ille, qui principaliter peccat, latentiorem qui non principaliter, ſed quaſi per ſequelam quamdam. Ex his ratio omnis Criticorum dierum pendet, peccantibus enim humoribus magna ex parte morborum pluribus, & iis quidem non facientibus formam unam, unoquoque autem motum ſuum pro natura faciente, cholera quidem per tertias, melancholia per quartas, inde fit, ut quibuſdam diebus humores, qui peccant, ſimul omnes commoveantur, quibuſdam aliqui ſolum: quibuſdam nulli: quare & dierum accidit quaſdam placidiſſimas in morbis eſſe, alias acerbiores, alias acerbiſſimas: placidiſſimæ illæ ſunt, in quibus nulli humores moventur, quod quidem fieri poteſt, quamquam phlegma quotidie motum faciat, ob id, quod phlegma ipſum ut plurimum formam unam cum aliis conflat, & illorum motum conſequitur, acerbiores ſunt dies, in quibus unus humor movetur: acerbiſſimæ, in quibus omnes; aptiſſimæ igitur dies illæ ſunt ad Criſes faciendas, in quibus concurſus fit humorum omnium: acerbiſſimus enim tum paroxiſmus fit ac ſtimulus & irritamentum naturæ maximum, quod præcipue ſequi ad agendas Criſes dictum eſt ſupra. Porro quoniam nec Criſis fit niſi digeſto præparatoque humore, perfecta autem abſolutaque digeſtio non eſt, donec quod craſſius eſt ac ſegnius, digeſtum ipſum non ſit, craſſior vero & ſegnior omnibus eſt melancholia: inde fit, ut potiſſimum circa melancholiæ & motus & digeſtiones attendantur Criſes, cujus natura (ut mihi videtur) non eſt a multis recte perſpecta: nam ea ſemper fere in morbis cum aliis aut principaliter peccat, aut ſubpeccat ſaltem, quod plurimum eſt: quæ, quoniam unam cum iis formam facere inepta eſt, per ſe quidem movetur, & ſuas periodos ſervat, interdum quidem manifeſte, quod tum accidit, quum & multa eſt, & principaliter peccat, ut plurimum autem latentius, quum ſcilicet ſubpeccat ipſa, & putredinem ex alio principio recipit: quibus igitur diebus cum motu aliorum humorum concurrit, acerbiſſimum paroxiſmum affert, porro & quoniam Criſis non fit, donec & ipſa non ſit digeſta, fit quidem, ut e melancholia tota ratio dierum in Criſibus præcipue pendeat per modum, quem jam afferemus, cujus rei non ab re fuerit in primis hoc exemplum apponere. Sit enim qui principaliter humor peccat, cholera, non quidem pura, ſed commiſta, commiſta autem cum phlegmate quidem ſub forma una, cum melancholia vero vicinitate ſola & confuſione, ſubpeccet autem melancholia, ac non multa, nec valde craſſa, ſed ſubtilior, & in ſumma quæ cito terminum dare poſſit: igitur putreſcente cholera, ſimul quidem & eadem die computreſcet & melancholia, moroſuſque ſatis erit paroxiſmus ille primus (utpote duorum humorum) ſecunda autem dies quietiſſima redibit, in qua nullus humorum motus fiet, at tertia paroxiſmum choleræ quidem ſentiet; Criſim tamen non faciet, tum quia ſtimulus nondum maximus, tum quia totum nondum digeſtum eſt: quarta autem dies motum habebit melancholiæ, ſed latentiorem, quia non multum eſt, quod tunc movetur de melancholia, partim quidem quia ſubpeccabat ſolum, partim quia putrefactio ejus quodammodo pendet a cholera, qua ceſſante in die quarta aliquem quidem motum dat melancholia ob concepta putrefactionis ſemina, ſed parvum, & latentem, quoniam origo & fomes putrefactionis quieſcit: quinta vero choleræ motum videbit, ſexta nullius: at vero ſeptima acerbiſſimum

omnium

omnium paroxiſmum apportabit concurrentibus ſimul humoribus, qui peccabant, omnibus ac largius melancholia, quoniam ex alterius contagione & pulſu non parum motionis recipit: qua die quoniam & digeſta eſt melancholia; fuerat enim ſubtilis, & pauca, nata cito terminum recipere, continget etiam Criſis; ſtimulus enim acerbiſſimus in ea fit, & totum digeſtum eſt, in aliis autem diebus, aut ſtimulus abfuit, aut digeſtio.



CAP. X.

SED de his latentioribus paroxiſmis operæ pretium eſt nonnulla dicere, nam quærant fortaſſe aliqui, numquid latentes hoſce melancholiæ motus effinxerimus nos, an etiam perſpexerimus in morbis; ſi enim perſpeximus, cur & alii non perſpexere, non Hipp. non Gal., & alii? ſi vero non perſpexerimus: quid effingi oportet, quæ non ſunt? ſi enim eſſent, viderentur ubique. Ad quos dicimus non effingere nos eos motus, ſed in morbis eſſe & videri, ſi diligenter quis animadvertat, nec profecto dicere poſſem, quoties non ſolum ego conſpexerim, ſed & alios, etiam medicos ſenſiſſe viderim, admiratos dies illas, quas quietiſſimas exſpectabant, rediiſſe tamen inquietas, moroſas, ægrum; jactari, & conqueri, neſcientes unde hæc contigiſſent. Interdum vidi & medicos alios, quod quartarios quoſdam motus in certis morbis percepiſſent, dubitaſſe, ne febris in quartanam deſineret, quum tamen nec quartana ſubſecuta fuiſſet, & ęgritudo ſuo tempore abſoluta; ego vero qui prius motus hoſce conſideraſſem, nullum horum timebam, aut mirabar; quin ſæpe monui dies, quas illi quietiſſimas exſpectaſſent, moroſiores eſſe futuras. Quare & Hipp., & Gal. & alios vidiſſe eoſdem motus exiſtimo, ſed fors ita tulit, ut ad cauſam non animadverterint, nam quid aliud monſtrant dies illi, qui indicativi dicuntur, qui omnes quarti ſunt a die, in qua Criſis perfecta futura eſt? quid aliud indicat totus progreſſus Criſium, qui non ſeptenarias, ſed per quartanarias periodos pergit, quarum duæ ſeptenarium unum faciunt? Hipp. quoque quaſi rem iſthanc innuere videtur mihi, quum dicit quartanarios motus in morbis ſpectandos eſſe. Sed neceſſarium non eſt fortaſſe plura hac in re adducere, quum ab unoquoque ſpectari poſſit; quod ſi medici omnes facient; & rem ita eſſe videbunt, & magnum quoddam principium ad multa nacti erunt, & multa ſimul deſinent & admirari, & timere.

CAP. XI.

SED rurſus dubitare omnes jure poſſint, quoniam per præſcriptum quidem exempium monſtrari fortaſſe poteſt, quomodo & quarta & ſeptima die Criticæ ipſæ ſint, at quomodo & undecima & quartadecima, & vigeſima, & vigeſimaprima Criticæ ſint, demonſtrari quidem non poteſt. Nam per aſſignatum exemplum melancholiæ motus ſunt 4: 7: 10: 13: 16: 19: 22: 25: & 28: in quibus nec 11: nec 14: nec 20: nec 21: nec 27: locum habent. Ergo, quo pacto & hi quoque dies Critici ſint, exſpediamus. Primum autem illud præmittamus, melancholiæ modos & conditiones multiplices eſſe, ſæpe enim pauca eſt, ſæpe multa, interdum craſſior, interdum tenuior, modo tenacior, modo ſoluta magis, modo calidior, modo frigidior: ſimiliter ſe habet & cholera; ex hac diverſitate fit, ut putreſcente cholera quandoque ſimul & eadem die computreſcat & melancholia modo in initio paroxiſmi, modo in medio, modo in fine, quod tum maxime fit, quum & pauca eſt, & ſubtilior, & calidior magiſque admiſta choleræ,

tunc enim in ipſam citiſſime tranſit infectio ; interdum non ſimul & eadem die moveri melancholiam accidit, ſed ſecunda ſolum die , interdum & tertia ſolum , fortaſſe autem & quarta ſolum; in acutis enim morbis prima die motus fit utriuſque humoris , acuti namque morbi a tenuiori , & pauca , & calidiori materia fiunt, in tardis autem morbis, quos Chronicos vocant, quoniam craſſiorem illi , & multam , & tenacem , frigentemque materiam habent, moveri quidem melancholiam accidit nonniſi die tertia, & ſi materia craſſiſſima ſit, fortaſſe nonniſi quarta; in mediocribus autem morbis, quorum & materia media eſt quantitate, craſſitie, & aliis, die quidem ſecunda repit in melancholiam putredo; igitur ſi prima die quum cholera ſimul & melancholia commoveatur, quod in acutis fit morbis , quartanariæ quidem periodi erunt 4, 7, 10, 13. raro enim ultra hos protenditur ſtatus in acutis; ſi ergo quam acutiſſima ſit ægritudo, tum Criſis in 4. fieri poteſt, in his enim materia & pauciſſima eſt, & ſubtiliſſima , & fervens : ſi vero acuta quidem ſit ægritudo , ſed tamen inter acutas ſegnior , ad 13 protendetur ejus ſtatus: ſi vero mediocriter acuta ſit, ad 7. in medio autem quum ſit, qui mediocriter acutus eſt morbus , media autem ſæpius , quam extrema , contingant , inde fit, ut in genere acutorum dies ſeptima maxime Critica ſit, rarius enim eſt morbum quam acutiſſimum eſſe, rarius quoque, ſi acutus eſt, ut ad 13 perducat ſtatum ; ſi tamen quandoque ad 13. prorogetur Criſis , totus dierum progreſſus ita ſe habet. Prima quidem dies triſtis eſt , & inæqualis , duos enim habet motus ; ſecunda placidior redit , ſi non duplex ſit febris ; tertia motum choleræ ſentit; quarta melancholiæ , ſed latentem , at moroſum tamen; quinta choleræ reverſionem videt ; ſexta mitis pergit ; ſeptima valde quidem acerba eſt, non tamen Criſim dat , quoniam non plane digeſtus eſt humor; octava ſuavior ducitur; nona gravior propter choleræ motum ; decima latentem habet melancholiæ motum ; undecima choleræ manifeſtum; duodecima placida eſt , at 13 ſæviſſima , & Criſim etiam affert , quoniam cum irritamento maximo digeſta etiam materia eſt, ut plurimum tamen in his morbis reſolutio magis morbi, quam Criſis fit in 13.

CAP. XII.

SI vero non prima die, ſed ſecunda ſolum, motum dederit melancholia, quod in mediocribus morbis accidit, tum quartanariæ periodi erunt 2: 5: 8: 11: 14: 17: 20: ultra autem rariſſime in mediocribus producitur ſtatus . Critici autem ſunt 11: 14: 17: 20: ſed undecimus Criticus quidem eſt , ſi in hoc genere materia non multa ſit , & acutis proxima ; ſi vero in eodem genere craſſior ſit, & chronicis vicinior , tum Criſis ad 20 protendetur; ſi vero in omnibus mediocris , ad 14. quoniam autem media ſæpius, quam extrema, contingunt, inde eſt, quod 14 maxime Critica ſit in mediocribus morbis , mox 11, mox 20, mox 17. illud tamen ignorandum non eſt in tertianis , quæ ſimplices ſunt , pares dies raro Criticas videri , eo quod in iis paroxiſmus non accidat, niſi anticipatio forte fiat, quare nec 4: nec 14 in his Criticæ valde videntur; quoniam tamen in tertianis ſæpe accidit, ut non ſimplices ſint , ſeu duplices , tum & ſæpe continuæ necnon & anticipatio quoque paroxiſmorum contingat , ex his evenit , ut 14 dies multas videre Criſes conſueverit, ſimiliter & 20. Quæ vero in hoc progreſſu ſint lenes dies, quæ acerbiores , quæ acerbiſſimæ , ex ſubſcriptione manifeſtum eſſe poteſt .

(1 2 3) (4 5 6) (7 8 9) (10 11 12 13)

At ſi

At ſi tertia ſolum die motum recipiat melancholia, quod in chronicis morbis fit, in quibus craſſa valde, & tenax, & multa materia eſt, periodi quidem erunt 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. raro autem ultra contingunt Criſes, maxime autem Criticus horum erit 21. mox 27, mox 15. ſi enim materia craſſa quidem, ac tenax ſit, pauca autem in eo genere, ad 15. ſtatus erit: ſi vero craſſa, ac valde multa, ad 27. ſi vero eo in genere mediocris, ad 21. quod idcirco ſæpius evenit, quoniam in medio eſt, quæ vero dies quietiores, quæ graviores, quæ graviſſimæ futuræ ſint, ex ſubſcriptione manifeſtum eſt.

CAP. XIII.

EX his omnia illa monſtrari poſſunt, quæ circa Criſes ſpectantur, ac primum illud, cur tam 20. quam 21. Critici dies ſint, in quo tantum Galenus laborat, menſem mirum componit, horas ſubtrahit: patet enim in mediocribus morbis 20. in chronicis 21. diem Criticam eſſe, utra autem Critica magis ſit, difficile certe eſt judicare, caſu enim fieri poteſt, ut aliqui plures in 20. aliqui plures in 21. Criſes perſpiciant: propter quod Archigenes magis 21. amavit, Hippocrates vero 20. magis. Illud quoque perſpicuum eſſe poteſt, cur dierum alii præſtent principatu, alii ſint principatu minores, & cur alii Critici ſint, alii non, alii medio modo ſe habeant.

Ergo inter omnes maxime Criticus dicebatur ſeptimus, quod idcirco fit, quoniam maxima Criſium pars in acutis fit morbis, in iis & ſtimulus ingens fit, & materia ſubtilis eſt, & bene mobilis, in acutis autem maxime Criticus erat ſeptimus, quoniam in medio eſt; ab hoc ſecundus principatu ponebatur 14. nam & ſi quartus, & 13. in acutis verſantur, rarius tamen eſt, ut morbus quam acutiſſimus ſit, rarius item ut in acutis ſtatus protendatur ad 13. quam ob cauſam 14. crebriores Criſes videt, quod in morbis mediocribus ſit, & in iis maxime Criticus exiſtat: propter eamdem cauſam & 20: & 21: & 11 magis etiam Critici ſunt quam 4, & 13. inter ipſos autem 20, & 21 ſuperant principatu undecimum, nam quamquam undecimus ſit in mediocribus morbis rarius, tamen in illis fit, ut ſtatus acceleretur ad 11. Non Critici autem erant 6: 8: 10: 12: 16: 19: 22: 23: 25: 26: 29: ac 6 quidem rariſſimas Criſes videt, quoniam in eo neque choleræ motus fit (quum ſit par) neque melancholiæ, niſi forte in periodis tertiæ diei: at in illis ſtatus multo longior exſpectabatur; qua de cauſa in 6 criſes non fiunt, niſi forte aut paroxiſmus ſeptimæ anticipet, aut materia furens ſit, aut exuberantiſſima: in his enim quædam Criſes apparent in 6, verum illæ (ut diximus) proprie Criſes non ſunt, ſed violentiæ quædam magis, propter quod ſævus dici conſuevit iis dies, quum Criſes dat, quippe quum illæ a prava materia fiant; octava quoque propter eamdem cauſam, quod nec choleræ motus, nec melancholiæ videt, niſi in periodis ſecundæ diei, Critica eſſe non poteſt; 10. vero motum choleræ non habet, quare fit, ut quamquam motum primæ

mæ diei habeat, non poſſit tamen Critica eſſe: at 12 & par eſt, & motum habet melancholiæ tertiæ diei, quæ ſerius ſtatum facit: 16 autem periodum habet primæ diei, ſed illuc non protenditur ſtatus in acutis morbis: conſimiliter & 19 motus habet primæ diei, unde nec ipſa Criſim videt: ſed neque 22 eadem de cauſa; vigeſima autem tertia periodum habet ſecundæ diei, ſed in morbis mediocribus dictum eſt ſtatum non protendi ultra 20: ad 25 autem tranſirent periodi primæ diei, ſi morbus non ante decerneret: idem de 26, & 29. dicatur. De vigeſima autem octava dubium apud antiquos fuit; multi enim prætulerunt eam 27, quod quidem verum eſſe poteſt, ſi forte melancholiam die ſolum quarta moveri accidat, ſic enim periodi erunt 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31. quem motum & nos ſemel obſervavimus in continua febre, in qua duplicis tertianæ correſpondentia fuit; acerbæ autem dies cæperunt eſſe 7, 10, in qua exacerbationes tertianariæ ceſſavere, abinde vero cum continua quartanarii ſolum nobis apparuere: ſæviſſimæ vero omnium dies fuere 22, 25, & 28, in qua æger ſupremam obiit diem. Medii autem dies erant 3, 5, 9, 13, 18: ac tertius quidem, & 5, & 9 ita ſe habent, quoniam in tertianis puris, & iis, quæ non puræ ſunt (habent autem formam unam) multæ contingunt Criſes. 13 autem ad Criticos propinquus eſt (ut diximus) quoniam & impar eſt, & inter periodos primæ diei cadit: quare & ipſe nonnullas Criſes videt: 17 autem periodos habet ſecundæ diei, & in eo ſæpe Criſes etiam fiunt: at 18 periodum ſortitur diei tertiæ & quaſdam etiam Criſes dat, vel anticipantibus paroxiſmis, vel in duplicibus tertianis.

CAP. XIV.

INdicativi vero dies ſunt, in quibus materia non omnino digeſta eſt, proxima autem ut digeratur: quoniam vero natura, quoties irritatur, expulſionem nocentis tentat, inde fit, ut certis diebus Criſes quædam imperfectæ contingant, nuntiæ vero ejus Criſis, quæ perfecta futura eſt. Criſim quidem atque expulſionem tentat natura, quoniam ſtimulatur, imperfectam autem facit, quoniam non omnino digeſta eſt materia, quæ tamen quoniam in parte digeſta eſt, in parte etiam exſperitur: propinquiſſima vero digeſtioni quum ſit, nunciat quidem in ſequenti periodo futuram eſſe perfectam Criſim, atque idcirco indicativi illi dicuntur dies, in quibus imperfectæ contingunt Criſes, propinquiſſimæ vero perfectis; omnes autem quarti ſunt a die perfectæ Criſis, quod apertiſſime monſtrat rationem Criſium a melancholiæ motibus potiſſimum dependere: quartus igitur nuntius ſeptimi eſt, undecimus quartidecimi, decimus autem ſeptimus vigeſimi, decimus octavus vigeſimi primi: vidimus autem nos & 8 indicativum fuiſſe undecimi in muliere tertiana febre laborante, cujus acerbiores dies fuere 2, 5 8: erat enim mota melancholia ſecunda die: in 8 autem urina facta fuit ſanguinea, unde judicavimus in undecima Criſim futuram eſſe per menſtruum ſanguinem, quod non ſecus, atque exiſtimaveram, evenit, nihil enim prohibet & eos dies (qui ut plurimum indicativi ſunt) quandoque etiam principes in Criſi fieri.

CAP. XV.

DE natura igitur & cauſis Criticorum dierum ita quidem oportet exiſtimare; ad quæ ſi qui forte medicorum animadverterint, facultatem profecto nacti erunt in omnibus pene morbis dierum progreſſus noviſſe, quæ mites, quæ acerbiores, quæ acerbiſſimæ futuræ ſint: tum & quando, & quomodo, & quorum humorum futura, aut non futura ſit Criſis, & quando conveniat,

niat, aut detrahere ſanguinem, aut medicamenta ulla afferre. Verum diligentia opus eſt, & cura, anticipationeſque paroxiſmorum conſiderandæ, & dies multo ſtudio enumerandæ, & quid in unaquaque novi accidat: quare & contemplatio hæc, atque ars negligentis medici non eſt, aut ad lucrum evolantis, ſed ſolertis, & amantis philoſophiam. Eſt autem (ſi fieri poteſt) procurandum primam ægritudinis diem accepiſſe, quo recte poſſimus, quæcumque ſunt ſecutura diligentiſſime obſervare, prævidereque; ſi igitur circa morbi initia datum fuerit acceſſiſſe, ad hæc attendere eum oportet, qui ejus progreſſum noſſe volet; in primis videat qualis nam ægritudo oblata eſt, num acuta, an chronica, an mediocris, quod ex iis ſignis cognoſcet, quæ a medicis tradi ſolent; quod ſi acutam ægritudinem viderit, materiamque aeream & ſubtilem, ſiquidem cholera plura judicabitur, ad impares tantum dies animadvertat, neque enim in ea melancholiæ periodi ſperandæ erunt: at ſi non ſincera fuerit cholera, ſed ſordidior quodammodo, tum ſperari poterunt quartanarii illi motus, qui ordinem in Criſibus præbent; quare ad primum paroxiſmum adverte, ſi ſimplex eſt, ſi tempora ſervat ſua, an magis quamdam recipit diverſitatem; quod ſi circa augmenta, aut ſtatus, aut declinationem contrahi rurſus pulſus videatur, atque extrema frigere, ſuſpicio quædam eſt motam ſimul atque eadem die fuiſſe melancholiam: quamquam non neceſſarium id eſt, poſſunt enim hæc eadem, aut ex motu phlegmatis, aut ex alia portione choleræ provenire: verum quarta dies certitudinem eo in dubio dabit, ſi enim debente ea ſine febre fieri (ut in terminis) triſtem tamen apportaverit diem, & occultam quamdam ſine via cauſa ægro perturbationem immiſerit, magnum quidem indicium erit die prima motam ſimul fuiſſe melancholiam: quare inſpecta urina, & aliis digeſtionis ſignis ad ſeptimum animadverte, in quo aut Criſis fiet, ſi judicata in quarta fuerit, aut ęgritudo ſolvetur, aut ſtatus erit.

Si vero dies prima nullum dederit ſignum motę melancholię, videris autem materiam groſſiuſculam, tunc judica morbum ultra hebdomadam tranſiturum: quare nec 4 nec 7 curato, ſi opus fuerit aut ſanguinem mittere, aut pharmacari, neque enim is te teneat timor, ne impedias Criſim; ad ſecundam vero diem reſpice, in qua vide, ſi quicquam commoveatur, an nihil: quod ſi aliquid movetur, conſiderato, an clarus ſit paroxiſmus, & priori ſimilis (forte enim febris duplex erit) an magis latens fuerit motus, & ſine manifeſta cauſa triſtior, quo caſu & ad quintum reſpicito, ſi ęvum apportarit paroxiſmum, ſi longum, inęqualem, non humoroſum, ſed ſiccum, cum declinatione longa, moroſa: quę ſi contigerint, dubitare nihil debes motam die ſecunda fuiſſe melancholiam; computa igitur periodos ſecundę diei, & metire materiam, qualitatemque ejus, & quantitatem, ac digeſtionem, ſi enim mediocris in omnibus viſa fuerit, ad 14 protende ſtatum: ſi craſſa medio modo, at multa, ad 20: ſi acutior, & non multa, ad undecimum. Cognoſces autem & quę quietiores, & quę acerbiores dies erunt.

At ſi neque prima, neque ſecunda die ſigna ulla videris motę melancholię, tum ad tertiam te converte, & materiam bene examinato: quod ſi notę ullę apparebunt, quę ſuſpicionem dent ejus motus, tunc ad periodos tertiæ diei ſpectato: ſi igitur & 6, & 9 tibi reſponderint quartanarios motus ſervanti, tunc chronicam ęgritudinem futuram time, & ſi materia craſſa quidem videbitur, mediocris autem quantitate, ad 21 decerne ſtatum: ſi vero multa, ad 27.

CAP. XVI.

QUoniam autem non ſemper advocari medicum ad initia morborum accidit, ſi quidem primas dies vidiſſe non dabitur, at percunctare tamen, quę

quæ prima fuit dies, qualeſque reliquæ præteriere. Fortaſſe enim hoc modo periodos primæ, aut ſecundæ, aut tertiæ diei noviſſe poteris: nam ſi quartanarios ullos motus deprehenderis, facta ad diem primam ſupputatione videbis, cujuſnam diei illæ periodi ſint, quod ſi nec diem primam dare, neque aliarum ordinem æger ſciverit, aut qui ægro aſtant, tu tamen morbi motus obſerva, raro enim fit, ut re diligenter ſpectata non ſeſe offerant tibi quartanarii aliqui melancholiæ motus: quos ſi ullos videre poteris, conſiderato & ſigna digeſtionis, & propinquitatem ſtatus, & diſtantiam, necnon & materiæ qualitatem. Sic enim non modo futurorum, ſed & præteritorum etiam cognitor eſſe poteris, quemadmodum non multo, jam elapſo tempore contigit mihi: quum enim accerſitus ad ægrum quemdam; multis poſt morbi initia diebus quæſiſſem, qua die primum ægritudo invaſiſſet, neſcire ſe tum æger, & adſtantes dixere; tum quæſivi, quæ ſaltem graviores præteriiſſent dies heſterna inquit æger, & dies Martis graviores fuere; fuerat autem, quam heſternam dixerat, Veneris dies, quarta quidem a die Martis. Cognovi igitur melancholiæ motus illos fuiſſe, quum vero & urinam & reliqua ſigna digeſtionis examinaſſem, vidiſſemque, quamquam jam plures a prima præteriiſſent dies, ſtatum tamen adhuc longinquum, judicavi periodos illas Veneris, Martiſque tertiæ diei fuiſſe, quare & ægritudinem ad 27 tranſituram. Facta vero diei tertiæ computatione tandem compertum eſt ægritudinem die Martis primo incœpiſſe, ac tunc decimam & nonam agi, quæ ſabbati dies erat.

m. m̃. i. v. 5. d. l. m. m̃. i. v. 5. d. l. m. m̃. i. v. 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hæc ſunt, quæ circa Criticorum dierum cauſas & rationem longa primum diligentique inquiſitione nobis comperta ſunt, mox & re ipſa obſervationibuſque comprobata: quod & reliquos quoque medicorum facere & hortor & rogo: ſic enim (ut arbitror) & laborem noſtrum commendare, & me excuſare poterunt, ſi a parente medicinæ Galeno, quem in reliquis ut Deum veneramur, & colimus, hac una in re diſcedere auſus ſum.

IN.

INDEX RERUM OMNIUM,

Quæ in toto opere continentur.

A

Abolitionis periculum ex aurium dolore acuto cum febre continua ac vehementi. 182
Abſceſſus boni & mali. 200
Abſceſſus boni quando fiunt in morbis. 200
Abſceſſus ex colore, magnitudine, copia, coctione, utilitate ſalutares judicantur. 309
Abſceſſus futurus quando in morbis acutis exſpectandus. 230
Abſceſſus mali in corpore erumpentes, naturalis facultatis impotentiam denotant. 17
Abſceſſus nullus fidelis qui cum ſignis cruditatis apparet. 313
Abſceſſus omnes ante coctionem erumpentes in peſte magis utiles quam inutiles. 202
Abſceſſus per effluxionem quales, & quinam vocantur. 229
Abſceſſus poſt aures perpetuo ſunt ſuſpecti. 312
Abſceſſus quales & quando in morbis acutis perniciales. 30
Abſceſſus qui ad crura fiunt in Pulmoniis vehementibus, ac periculoſis, omnes utiles ſunt. 4. 26. 79. 194
Abſceſſus quid ad præſagium. 248. 310
Abſceſſus quomodo noſcuntur futuri in partibus ſupernis aut infernis. 231
Abſceſſus retrocurrentes peſſimum in deliriis ſignum. 58
Abſceſſus Variæ ſignificationes. 219
Acria nimis, dolorem acutum producunt. 76
Acria ſi videntur oblata in morbis quid notant. 64
Acrimonia quomodo ſingultum producit. 116
Actiones omnes perinde ac in optima valetudine obire, optimum eſt. 154
Actiones naturæ debiles, quibus cognoſcuntur. 10. 16
Actionis vitalis primum inſtrumentum eſt ſpiritus vitalis. 131
Actio vitalis unde. 131
Adenarum dolor unde gravis obſervatur. 76
Æger ſi non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, quidquid horum evenerit, mors proxima eſt. 10
Ægri de ipſorum futura ſalute Prognoſticum audientes, facilius ac propenſius Medicorum propenſis obediunt. 1
Ægrum velle reſidere in ipſo conſiſtendi vigore, exitialiſſimum eſt. 97
Ægrorum ſalus aut interitus unde prænoſcitur. 3. 4
Aer a ſuo conſueto temperamento ad calidum maxime mutatus, & diu durantem, maximos morbos adfert. 29
Aer minus morboſus eſt, minuſque gravos morbos excitat; ad frigidum quam ad calidum mutatus. 24
Aeris nulla vel magna mutatio multum ad morbos concitandos facit. 24
Aeris ambientis temperamentorum omnium peſſimum eſt id quod humidum eſt & calidum. 29
Aeris caliditati humiditas ſi conjungatur nihil corporibus morboſius & magis peſtiferum. 29
Aeris ſiccitas acutiſſimos parit morbos, ſed ſalubriores quam humiditas. 29
Aeris varii ſtatus ad morborum cognitionem ſcitu neceſſarii. 24
Æſtus doloroſus & rigor ſuperveniens, malum. 68
Æſtus & ardores circa ſpinam quid notant, 237
Æſtus fortes quare convulſiones pernicioſas producunt. 110
Æſtus laterum cum dolore atque rigore, mali. 69
Æſtus magni effectus. 107
Æſtus multus cum delirio quando per modum judicii apparet. 52
Ætates corporum pulſuum cauſas mutare poſſunt. 135
Ætates non parum faciunt ad morbos natura potentiores cognoſcendos. 31
Alexandriæ in Ægypto unde quotannis febres peſtilentes exitialiſſimæ oriuntur. 30
Alimenti crudi abundantia quomodo convulſiones in pueris producunt. 107. 108
Alimenti inopia quomodo tremor producitur. 101
Alimenti plurimi copia calorem nativum quomodo ſuffocat. 71
Alvi colliquationes malæ. 225. 275
Alvi dejectio alba Ictericis mala. 277
Alvi dejectio aquoſa mala eſt. 274
Alvi dejectio cruenta naturalis facultatis debilitatis effectus. 18
Alvi dejectio futura non cognoſcitur per ſigna propria, ſed ex quibus. 241
Alvi dejectiones albæ unde, & quid notant. 277
Alvi dejectiones billioſæ omnes non critice factæ, malæ. 277
Alvi dejectiones bonæ bifariam ſalutem indicare poſſunt. 272
Alvi dejectiones bonæ ex copia cognoſcendæ. 274
Alvi dejectiones colliquativæ ex febribus acutis perniciosiſſimæ. 278
Alvi dejectiones criticæ facultatis expultricis robur, naturamque morbo prævalere indicant. 9
Alvi dejectiones eo ſunt exitialiores, quo colores magis pravos pluresque habuerint. 278
Alvi dejectiones exitiales ex modo quo dejiciuntur, & ex tempore quo durant. 278
Alvi dejectiones ex quantitate tum immoderata, tum pauca damnantur. 275

Alvi dejectiones in acutis biliosis albicantes, spumosæ, & periculosæ, malæ. 276
Alvi dejectiones in acutis spumantes valde vitiosæ, malæ. 275
Alvi dejectiones in ventris affectibus observandæ. 211
Alvi dejectiones liquidæ unde. 274
Alvi dejectiones malæ, quæ exitium prænuntiant unde cognoscendæ. 274
Alvi dejectiones nigræ aliquando utiliter conspiciuntur. 277
Alvi dejectiones nigræ a sanguine melancholico. 274
Alvi dejectiones nigræ in acutis morbis, malæ & unde. 278
Alvi dejectiones nigræ, sponte venientes sive cum febre sive sine febre, pessimæ. 278
Alvi dejectiones optimæ febres, & symptomata solvunt aut allevant. 274
Alvi dejectiones quæ cerebro inflammato albæ egeruntur omnium pessimæ. 276
Alvi dejectiones, quæ insciis ægrotis excernuntur, letales sunt. 279
Alvi dejectiones quæ salutem prænuntiant. 272
Alvi dejectiones quænam insaniæ timorem inferunt. 276
Alvi dejectiones rubræ & cruentæ in febribus acutis, malæ. 277
Alvi dejectiones spumosæ quare malæ & quænam pessimæ. 275
Alvi dejectiones versicolores omnes malæ. 278
Alvi dejectiones virides, porraceæ, pessimæ quænam sunt. 277
Alvi dejectionum natura unde innotescit. 272. 274
Alvi dejectionum variæ denominationes. 273
Alvi excrementa concocta in ventris affectibus optimæ crisis certissimum sunt indicium. 220
Alvi excretione biliosa quinam morbi judicantur. 221
Alvi fluxus colliquativi, qui in pestilentibus febribus observantur, letales. 65
Alvus perturbata surditatem aliquando tollit. 79
Alvi profluvium quibusnam supervenit. 123. 124
Amaurosis quid, & quando exitiosa. 176
Amentia quid. 48
Amphimerinæ febres quales. 86
Anechtermeton quid Græcis. 118
Angina ex aphonia, letalissimum. 129
Angina tonsillarum inflammationi succedens, malum. 33
Anginæ exitialissimæ, & celerrimæ interimentes quænam. 71
Anginæ insidiosæ occidentis signa. 125
Angina letali si tumor colli & pectoris apparens superveniat, magis salutaris evadit morbus. 26
Anginæ suffocantes a sanguinis copia. 26
Anginosis quinam rubor & tumor salutaris & quinam non. 166
Angores quid in morbis acutis sæpe indicant. 74
Anhelitus difficultas in tabe. 124
Anhelitus crebri senes ad mortem comitantur. 31
Anima quid efficit in corpus. 94
Animales actiones quomodo fortes vel debiles cognoscuntur, & quantum ad Prognosticum in morbis harum cognitio. 44
Animalium corpora unde constant. 94
Animi curæ extenuationis causa. 162
Animi defectiones quid in morbis acutis sæpe indicant. 74
Animi defectus ex fluxu muliebri, malus. 110
Animi passiones vehementes magnos morbos concitare valent. 31
Annonam sæpe secuta fuit Pestis. 30
Annus totus si calidus humidusque fuerit, necesse est, magna pestilentia succedat. 29
Annorum tempora prænoscenda, ut morbi cognoscantur. 24
Annorum variarum constitutionum effecta, & divisio. 29
Anxietas a dolore pedis atque coxendicis. 82
Anxietas a virium imbecillitate unde noscitur. 98
Anxietas a viscerum alicujus magna phlegmone unde noscitur. 98
Anxietas ab humoris biliosi corruptione. 98
Anxietas ab humoribus ad excretionem turgentibus. 98
Anxietas cum delirio Crisin aliquando præcedit. 54
Anxietas decubitus est species. 97
Anxietas ex stomacho affecto unde noscitur. 98
Anxietas in febribus quid notat. 40
Anxietas qui per vigilias repente capiuntur, sanguinem profundunt e naribus. 102
Anxietas unde in febribus malignis. 98
Anxietates diu perseverantes, illucente evacuatione, pessimæ. 41
Anxietates quæ cum refrigeratione incidunt, pessimæ. 41
Anxietatis prorsus letalis descriptio. 102. 100
Anxii quinam dicuntur. 97
Apepsia quid notat. 17
Aphonia a ventriculo ab aliquo humore læso. 127
Aphonia aliquando tollitur vomitu. 128
Aphonia ex capitis dolore quid notat in febribus. 128. 129
Aphonia quid in morbis portendit. 127
Aphonia quid præsagit in morbis. 126
Aphonia signum summe exitiosum in deliriis. 58
Aphoniæ comatosis succedentes, malæ. 92
Aphoniæ cum singultu pessimæ. 117. 128
Aphoniæ & catochæ cum exsolutione perniciosæ. 91
Ἄφωνοι evadunt ægri in ferino delirio. 54
Aphoniæ ex vulneribus non sunt perpetuo perniciales. 128
Aphoniæ quæ principii morborum fiunt, quid notant. 127
Aphoniæ quæ una convulsis partibus ex copia humorum fiunt, perpetuo letales non sunt. 129
Aphoniæ quænam exitium in foribus prænuntiant. 129
Aphoniæ quibus ex capitis dolore, moriuntur. 130
Aphoni si fiant anginosi, letalissimum. 129
Aphoniæ unde. 128
Aphthæ oriuntur anni constitutione Austrina calida & humida. 29
Apoplexia a supino nimis diuturno decubitu. 95
Apoplexiæ ex somno diuturno & immoderato. 30
Apoplexia quando in morbis timenda. 66
Apoplexia sæpe producit febrem continuam aut intermittentem, paralysin aut Paraplegiam. 26

Apoplexia ſi Paralyſi, & epileſiæ ſuccedat, malum. 33
Apoplexia unde ſæpe prævidetur. 65
Apoplexiam fortem ſolvere impoſſibile, debilem vero non facile. 12
Apoplexiæ ab humoribus pituitoſis & crudis. 33
Apoplexiam quando torpores in ſanis portendunt. 124
Apoplectici maxime fiunt a quadregeſimo anno ad ſexageſimum, 31
Appetentia bona in ægrotis erit illa, quæ benevalentium maxime eſt ſimilis. 154
Appetentia bona non confundenda cum vitiata & exitiali. 154
Appetentia ciborum & potus juſto major unde. 154
Appetentia ciborum ſublata quid notat & unde. 155
Appetentia integra in ægrotis, bonum eſt, omniumque maxime in morbis diuturnis. 154
Appetentia innaturalis quænam dicitur & unde. 153
Appetentia ſublata in morbis longis letalis. 155
Appetentia ſymptomata quid ad prædicendi rationem. 53
Appetentia vitiata in qualitate ciborum & potuum unde. 154
Appetentia una eſt naturalis, altera non naturalis. 152
Appetenia unde oritur in animalibus. 153
Aqua caninæ appetentiæ cauſa, 154
Aqua intercutem unde in purulentis Phthiſicique oritur. 75
Aqua intercutem omnis, quare ſi ex acuto morbo exiſtit, ſemper mala. 75. 164
Aquarum corruptarum ſeu fœtidarum uſus pravi effectus. 30
Aquarum paluſtrium uſus mali effectus. 30
Aquilonia quotidianæ conſtitutiones corpora denſant, & robuſta, & bene mobilia, coloratiora, & melius audientia faciunt. 24
Ardores qui in hypochondrio, febre refrigerata relinquuntur, tum alias, tum cum ſudoribus, mali ſunt. 19 51 69
Ariditas totius vel alicujus partis corporis, quare ſæpe infelicem morbi præſagit eventum. 76
Arteriarum pulſatio actio facultatis vitalis. 8
Arteriarum pulſatio reſpirationi addita eſt, caloris in toto corpore effuſi refrigerationis, atque purificationis gratia. 7
Arteriarum pulſationes maxime ad prædicendam ſalutem valent. 52
Arteriarum pulſationes vehementes omnium maxime vitalem robuſtam facultatem ſignificant. 14
Arteriarum pulſus magni, vehementes, æquales atque ordinati in morbis acutis, facultatis vitalis integritatis indicium. 7
Ἀσαφωδὲς quid 49
Aſaphodes deſipientiæ, quænam exitioſiſſimæ. 54
Aſaphodis ſeu obſcura deſipientia, vel hectica, numquam in morbi principio, ſed morbi progreſſu, poſt vehementem inſaniam, ſit. 49
Aſpectus audax & ferox eſt phreniticus. 56.
Aſperitas corporis quid ad prædictionem. 67
Aſpera arteriæ uſus. 131
Aſthmata quo vitæ tempore fiunt & quamdiu durant. 34
Aſthmata ſenes numquam derelinquunt. 34
Aſthmatici unde ſæpe ſtertunt. 150
Atrabilis naturæ humanæ maxime inimica, difficillimaque, & tardiſſima ut concoquatur. 33
Atrabilis omnium humorum morbos maxime exitiales parit. 33
Atra bili unde. 277
Atrophia corpora ſiccantur, & contabeſcunt. 16
Atrophia in quibus exitialis. 161
Atrophia qualis affectus & unde. 161
Auditus actiones mutatæ magni in morbis momenti ad prodeundum ægrotantium prognoſticum. 61
Aures lividæ & nigræ, unde in acutis morbis ſpectantur. 182
Aures obſurdeſcere in febre acuta furioſum eſt. 14 182
Aures quibus per febres obſurduerunt, quomodo hi liberantur a morbo. 62
Aures quid ad præſagium faciunt in acutis morbis. 18
Aurium ſonitus, quando ſanguinis eruptionem, delirium, &c. indicat 47. 74. quid in morbis acutis, 63. 183. Tinnitus, quid & unde. 64. 232. ſignum ſæpe futuræ Hæmorrhagiæ. 233.
Auſtrina conſtitutio humida, varios & calidos morbos producit. 29. 31. 64
Autumnus morbos acutiſſimos & exitiales magna ex parte producit. 30. Tabidis malus eſt. *ibid.*

B

Balnea quomodo horrores concitant. 122
Bilis acuta producit morbos punctorios. 76. æruginoſa, atra, uſta, morbos graviſſimos concitat. 42. flava, porracea, crocea, nigra, omnium periculoſiſſimos facit morbos. 51. plurimum tuſſi rejecta, malum. 32. ſi pituitæ prævalet, ægros maxime reddit phreniticos. 50
Bombus in acutis, letalis. 64
Bubones quare ſuſpecti. 312
Bumbi quid & unde. 64

C

Caliditas ad Prognoſin faciens qualis. 67. quæ bona. 2. quæ mala. 67. in facie, hypochondriis, thorace cur peſſima. 13. quid in morbis acutis. 40. Hecticorum qualis. 67. parva in externis quando maligna. 4. intenſa in ventre & Thorace cur mala. 86. immoderata peſtem producit aliquando. 29
Calor blandus ſæpe fallens in morbis malignis. 67 febrilis quinam optimus. *ibid.* ſingultum producit. 172. in morbis quomodo diſtinguendus. 45. intenſus poſt rigorem criſis ſæpe indicium, 68. nativus quomodo reſolvitur. 71
Caloris æſtus circa ſpinam quid indicat. 234. & Frigoris celeres mutationes, in morbis acutis quare malæ. 75. retractionem quæ cauſſant. 74
Capitis gravitas & dolor, quid & unde. 244
Cardialgia, fluxurorum menſium ſignum. 232
Cardiogmos Cordis unde vomituris. 238
Carus, qualis ſomnus. 87
Catalepſis, frigiditas & ſiccitatis cerebri ſignum. 88. qualis ſomnus. 87
Cataphora qualis ſomnus. *ibid.*
Cerebnon quid. 150. in acutis. 308

INDEX

Cerebrum exſiccatum vigilias excitat. 85. quomodo læditur per conſenſum ex ore ventriculi læſo. 108

Cerebri frigiditas duplex eſt. 66. pernicioſa inflammatio ſingultus cauſa in febribus. 116. refrigerationis effectus. 59

Cerebro poſt inflammationem refrigerato, in veternum delabi, letaliſſimum eſt. 54

Cholera cui ætati magis familiaris. 31

Cibus quando ægrotis eſt offerendus. 68

Cibi faſtidium in morbo diuturno, malum 20. multi vel corrupti quomodo ſingultum producunt. 115

Cibum vel potum abhorrere in deliriis letale. 56

Ciborum appetentia maxime ad prædicendam ſalutem valet. 53. appetentia, ſi cum aliis pravis ſignis appareat, ſumme pernicioſa. 155. & potus deperdita appetentia quando peſſima. 61 vapores quomodo ſomnum excitant. 88

Clamor cum delirio criſin aliquando portendit. 52

Coctio exquiſita quo morbi tempore fit. 220. optimarum excretionum præcipua nota eſt. 200. perfecta, ſi ſimul obſervatur cum ſignis decretoriis quando criſis exſpectanda. 244

Coctio quid. 197

Coctionis ſigna obſervare optimum eſt in omnibus morbis, 38. quo tempore morborum conſpiciuntur. 199. ſalutem perpetuo ſignificant. 38. ſignum aliquod manifeſtum, ubi primo die apparuit, in primo quaternario morbi ſolutio ſubſequitur. 245. urinarum, aliorumque excrementorum præludiis quando non fidendum. 227

Coctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalubrem. 38. 198. 218. excrementorum numquam malæ, ſed perpetuo bonæ. 198. quid præſagiunt. 230. ſi criſin præceſſerint, numquam moritur æger. 8

Colli tenſio quid & unde. 232

Color faciei viridis minus malus quam niger. 165. flavus bonus, ſi criticus ut in Ictericis. 166

Color Ictericus quid notat in febribus. 168. lividus & niger unde, & quid in morbis notant. 166 lividus in labro, palpebra, vel quid notat. naſo, vel genis, vel extremis, *ibid.* pallidus unde in acutis morbis, & mortuis ſo et eſſe familiaris. 167. ſæpe varians cum calore, quare utilis. 75. ruber ſanguinis abundantiam ſignificat. 165

Coloris corporis mutatio citra rationem, peſſima. 164. in pueris quid. 109. quid ad prædictionem. 67

Coma a collecto pituitoſo humore in cerebro. 59 a longa vigilia, ex caliditſima ſicciſſimaque cauſa, letale ſignum 91 cum laſſitudine quando malum. 84 malis ſtipatum ſymptomatibus, malum. 91 cum oculorum perverſione malum. *ibid.* & ſurditas in capitis dolore abſceſſum aliquem poſt aures eructant. 62 90 in acutis morbis poſt longas vigilias, exitiale. 13 in quibuſnam ſemper pernicioſum eſt. 91 quantum inſervit ad Prognoſin. *ibid.* quid. 47 88 vigil unde. 90 vigilias ſecurum, niſi criticum ſit, perniciem oſtendit. 91

Comatis pernicioſi exemplum. 90 quatuor ſunt cauſſæ. 89

Comata aliquando non letalia accedunt vigiliis. 87 letalia aliquando ſubſequuntur vigilias aſſiduas. *ibid.* cum aphonia pernicioſa in febribus. 128 129

Comatoſi affectus phreniticis ſupervenientes, letales. 2 quinam dicuntur. 92

Commotio quando fit in toto corpore. 115

Concoctiones bilioſorum humorum & putridorum quando fiunt. 298

Congelatio quid. 91

Convulſio a diſtentione a quibuſdam diſtinguitur. 105 ab Ileo malum. 12 a phlegmone unde. 110 ab æſtibus fortibus aut diſtentio, malum. 106 ab inedia & ebrietate. 30 critica labii. 183 ex angina letalis. 114 cum extremorum refrigeratione in acutis morbis ſignum maxime pernicioſum. 72 73 dentium exitialis eſt. 221 ex quibus in pueris præviderur. 86 fit vel ex repletione, vel ex inanitione. 106 imminente morte in phrenitide accidere ſolet. 55 in febre, letalis, minime vero pueris. 111 in febribus ſæpe ab exuſta bile. 50 in phrenitide peſſimum ſymptoma. 27 muſculorum mandibularum Cryſmos Græcis dicta. 105 Paralyſi ſuperveniens affectum non ſolvit neque contra. 65

Convulſione mortuorum ex vulnere plura exempla. 112 113

Convulſiones a doloribus & aſſiduis vigiliis, pernicioſæ ſunt. 91 a ſiccatis partibus nervoſis, exitioſæ. 152 ab Ilei inflammatione, pernicioſæ. 113 comatoſis ſuccedentes, malæ. 92 ex quibus ſignis futuræ poſſunt præcognoſci. 108 ex tremoribus, letaliſſimæ. 70 febribus ardentibus ſupervenientes letales. 86 in fœmina ex ſemine retento. 107 108 in febribus ex ore ventriculi non ſunt timendæ, vomitu tolluntur, 111 in Phreniticis inſanabiles. 113 in vulneratis plerumque letales. 113 114 letales a capitis vehementi dolore. 80 pernicioſæ numquam ſolæ, ſed cum aliis ſignis perniciem indicantibus apparere ſolent. 114 quæ certum exitium excitant. 114 quænam curari poſſunt. 110 quid præſagiunt. 108 pervenientibus febribus ſæpe ſolvuntur. 55

Convulſionum cauſſæ. 106 ad 103 cum chordis tenſis comparatio. 106 futurarum ſigna in pueris. 108 tres differentiæ. 106

Cor ab humore acri vel maligno affectum quid producit. 74 quibus excrementis fuliginoſis exſuperet, unde noſcitur. 132 unde ſæpe palpitat. 104

Cordis caliditas quomodo refrigeratur. 131 calor reſpirando recreatur, fitque purior. 7

Corpus a morbis defenditur tribus ipſi inſitis facultatibus. 6 inflari ac tumeſcere in morbis, numquam bonum. 163 extenuatum ac maxime contabeſcens videri in principio morborum acutorum, peſſimum. 161

Corpora calida & ſicca quibus morbis obnoxia. 32 humida ſuccique plena, ſi veneri temperate operam dent, raro morbis corripiuntur. 25 cito incaleſcere, & frigefieri, malum. 69 præ gravitate deorſum delabi, quid ſignificat. 91 quænam minus periclitantur a morbis. 80 tumida in morbis fieri quid ſignificet, ubi a ſputo ſanguinis contabeſcunt, exitiale eſt. 161

Corporis geſtus mutatio in acutis morbis delirii indicium, 46 partes, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem. 169 turbationes quæ criſin indicant. 219

Crimnodes hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 & quid notant. 294

Cxendicis dolor ſenes ad mortem uſque comitatur. 33

Criſis bona vel mala unde prænoſcitur. 216 217 218 hora cognoſci poteſt acceſſionis temporum accurata obſervatione. 245 246 in proximo die decretorio erit, ſi in die indicante ſignum coctionis conſpectum fuerit. *ibid.* letalis imperfectæ hiſtoriæ. 225 228 229 modus ex naturæ inclinatione noſcitur. *ibid.* 230 nulla bona apparet, cruditatis ſignis conſpectis. 165 optimæ certiſſima ſigna in plurimis morbis quænam. 219 223 perfecta in morbo ſalutari nonniſi in vigore morbi exſpectanda. 245 perfecta ſi futura ſit, neceſſe erit, augmentum morbi prius abſolvi. 246 quando in altero quaternario futura ſignificatur. 219 244 quando in primo futuro die decretorio ſit. *ibid.* terminus majori ex parte erit ſeptem dierum ab ea die, in qua ceperunt decretoria ſigna apparere. 244 unde ſæpius judicio non reſpondet. 246

Criſes ante ſtatum non ſunt omnino bonæ neque certæ. 223 atque judicia raro prima & ſecunda die fieri poſſunt. 207 bonæ, malæ, & imperfectæ quænam. 213 compoſitæ, quibus morbi judicantur. 242 exitiales quo morbi tempore fiunt. 246 in principio morborum, cum exitiali ſigno, malæ. 223 incertæ quomodo bonæ, vel malæ noſcuntur. 223 optimæ ſalutares, ſecuriſſimæ ac perfectæ in ſtatu naturæ apparent. 220 per dejectiones quando fiunt. 232 per ſudores prævidendæ. 239 pernicioſæ quomodo cognoſcuntur. 225 229 quomodo ſæpe fallunt artis Medicæ ignaros. 220 quę fiunt in augmentis morborum neque certæ neque fideles ſunt. 223 quænam fiunt per excretiones, & quomodo noſcuntur. 232 per hæmorrhagiam. *ibid.* 237 quando & in quibus certo & cito prædici poſſunt. 214 215 quando fiunt per menſes. 232 quomodo per urinas prævidentur. 239 tria tantum prænuntiare poſſunt. 219 verę quatuor tantum ſunt. 213

Criſium ſpecies unde cognoſcuntur. 232 tempus ex natura morborum quomodo cognoſcitur. 244 246

Cruda excrementa quænam dicuntur. 299

Cruditas quid. 197 ſemper mala in morbis & pejor ſi cum malis ſignis. 199

Cruditates & coctiones in excrementis ſunt ſigna morborum temporum. 34

Cruditates humorum quando fiunt. 198

Cura cur ſæpius ſtupeſcunt in renum dolore ex inflammatione orto. 62 69 ſupini cubantis admodum reducta, & diſtracta, in acutis morbis delirii indicium. 46

Cura tremoris cauſſæ. 101

Cutis dolor quare gravis obſervatur. 76 frigore obdoratur. 107 puſtulæ, atque efflorescentiæ præter rationem evaneſcentes in delirio ſumme pernicioſum ſignum. 58

D

Dactilorum immaturorum eſus rigorem produxit. 118

Decubitus actio unde pendet. 94 gravi morbo qualis. 94 malus ex oris ventriculi vitio, vel propter vitium imbecillitatem. 98 qui ſalutem præſagit futuram in morbis. 93 ſupinus quænam mala producere poteſt. 93

Decubitum ferre non poſſe in morbis quid notat. 41

Dejectio alba in phreniticis mala. 56

Dejectiones aquoſæ candidæ, aut admodum croceæ aut ſpumantes pravæ, 18 bilioſæ ſupervenientes quibus ſurditas, illam tollunt. 9 62 colliquativæ quando in acutis morbis peſſimę. 28 nigræ, lividæ, optimæ, fœtidæ exitiales. 18 paucæ, glutinoſæ, pingues, candidæ, ſub croceæ, læves, colliquationis indicia. 18 quales & quando in acutis morbis peſſimæ. 28 in deliriis.

Delaſſati, caliginoſi, pervigiles, in ſomnum inclinati, deſudantes, recaleſcentes, malum. 84

Delirantes quinam dicuntur. 45

Delirantium prognoſis quomodo recte aſſequitur. 48

Deliri homines ſi hianti ore dormiant, perniciosum eſt. 57 ſi evadant ægri ab evacuationibus letaliter ſe habent. 63

Delirium cui jam fractis viribus contingit, peſſimum. 57 aliquando larga ſanguinis eruptione judicatur. 51 52

Delirium cum notabili oblivione, ignavia, & ſtupiditate apparens exitii eſt indicium. 57 ex Hypochondrii pulſatione quando prævidetur. 276 in pleuriticis unde ſæpe prævidetur. 27 in quibus morbis derepente fit, profluvium ſanguinis ſignificat vel Urinæ. 52 nullum ſecurum reputatur. 57 peſſimum, poſt quod mala ſequitur evacuatio. 52 phreniticum quomodo ex ſputatione frequenti prævidetur. 239 quando ab aurium ſonitu prævidetur. 64 quid. 49 ſolvitur aliquando per ſudorem, ac ſomnum. 52

Delirii certum ſignum ex urina quodnam. 285

Delirio criſin portendentia quomodo apparent. 51 52 exitialia, quomodo a non exitialibus dignoſcuntur. 51 omnia unde concitantur. 49 quæ cum febre fiunt, Phrenitides vocantur, ſed ſæpius improprie. 49 quæ mortem prænuntiant, quomodo dignoſcuntur. 54 quæ ſalutem in morbis præſagiunt. 51 quæ ſine, febre maniæ, ſeu inſaniæ vocantur. 50 quænam ſalutarem criſin antecedunt. 51 ſi cum coctionis ſignis appareant in morbo criſin denuntiant, 24 ſolvuntur urina multam ſubſidentiam habente. 52 vehementia ſeu ferina convulſionum futurarum ſigna. 108

Deliriorum futurorum ſigna quædam, 102

Dentes quid ad præſagium faciunt in acutis morbis. 180 181

Dentium invita concuſſio quid. 105 ſtridor inſolitus in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57

Dentibus ſtridere & delirare, mortem jam prope eſſe norant. 183

Deſipientia & convulſio in vigilia, malum. 86 & rigor ex multa potatione malum. 12 ferox & furioſa unde. 50

Deſipientiæ feroces quæ in brevi deſinunt, ferinam convulſionem prænuntiant. 27 hecticæ quando non amplius ſolvuntur. 55 quæ fiunt cum febre continua, naturam viribus morbo longe infirmiorem ſignificant. 11

Deſipientiarum vehementiſſimarum propria credita ſymptomata. 55

Deſipientes ſi non videant, ſumme pernicioſum. 59

Deſtillatio quæ ex naribus cum ſurditate & ignavitate parva eſt, difficile quippiam habet. 63

Diabetes quid ſignificat. 18 quoſnam pravos effectus producit. 31
Diapyemata quid. 305
Diaſtole quid, ejuſque uſus. 132
Dies critici coincidunt cum acceſſionum motibus. 213 decretorii complures ac fere innumeri obſervantur, 207 decretorii, judicatorii, atque critici quinam vocantur. *ibid.* 208 decretorii quid ad prædictionem in morbis. 211 indices fiunt aliquando decretorii, & decretorii indices. 209 intercalares, atque intercidentes vel provocatorii quinam & quare ita dicti. *ibid.* judicatorii quomodo dignoſcendi. 208 omnes ad vigeſimum uſque decretorios aliqui fecerunt. 207 vigeſimus eſt terminus morborum acutorum. 231
Dierum decretoriorum cognitio neceſſaria. 207
Diſpepſia naturalis facultatis debilitatis ſymptoma. 12
Diſtentio quid. 105
Dolor acutus quinam & unde. 76 aurium acutus cum febre continua ac vehementi difficilis eſt, & quid inde. 220 quinam periculoſus. 80
Dolor capitis acutiſſimus in Phrenitide peſſimus. 27 & ſtomachi cum Hypochondrio contento, malignum. 81 in turbulentis, vigilibuſque mentis aberrationem indicat. 47 quando futuri vomitus ſignum. 61 quando in phrenitide letalis. 80 vehemens & aſſiduus & præſertim in auribus in acutis febribus delirium portendit. 47
Dolor cervicis in hæmorrhagia futura. 233 234
Dolor circa ventris ſedes ſignificatur a decubitu in ventrem in acutis morbis. 46
Dolor colli ſanguinis e naribus erupturi ſignum in febribus. 78
Dolor faucium quinam in acutis morbis delirium præſagit. 48
Dolor Hypochondrii citra judicium ex Angina quid, 125 non raro delirii nuntius. 48
Dolor lateris ex ſputis biliioſis, ſi abſque ratione evanuerit, in furorem aguntur. 83 in Pleuriticis, ſi abſque ratione evanuerit, portendit delirium. 48
Dolor lumborum & gravitas quid indicat. 277
Dolor manuum & pedum, in febre & convulſio maligna ſunt. 82
Dolor oris ventriculi in febribus malum. 80
Dolor pectoris quinam malus. 80
Dolor quinam in ſuppurationem vertitur. 305
Dolor ſi vigeſimum diem tranſeat, & febris detineat, quid exſpectandum. 78
Dolor ſtomachi cum Hypochondrio contento, dolorque capitis, malignum. 81
Dolor ſtrangulans cum Orthopnœa ſine apparente in faucibus, vel collo, tumore, ſumme exitioſum. 80
Dolor vehemens in pleuriticis, morbi fortiſſimi eſt indicium. 27
Dolor ventriculi oris quid indicat. 287
Dolor ventris laborioſus quinam letalis. 80
Dolor veſicæ quinam exitialis. 80
Doloris impetus e femore malignus. 82 mutatio quænam mala in acutis morbis. 75
Doloris pedis atque coxendicis peſſimi exempla. 82
Dolore coxæ occultato, ſi quippiam in urina ſublime petierit, delirium portendit. 48 83
Dolore femoris dextri occultato ſtatim delirium accidit. 48
Dolores aurium cum febre continua ac acuta cur pernicioſi. 182
Dolores boni quinam dicendi. 79 capitis quinam maxime timendi. 86 capitis vehementes convulſionum futurarum notæ. 165 circa thoracis & pulmonis ſedes quinam ſuppurationem indicant. 81 cordis vomitus biliioſi & pituitoſi futuri ſignum. 78
Dolores criſin ſæpe præſagiunt. 36
Dolores critici in aliqua partium ignobilium & remotarum a viſceribus, excitati boni. 40
Dolores crurum incepti, continuo deſinentes poſt viſus læſi ſymptomata, malum. 62
Dolores cum pulſu nonnumquam obſervantur in abſceſſibus ad ſuppurationem tendentibus. 76
Dolores exitium prædicentes. 79
Dolores fortes circa viſcera, & convulſiones in acutis febribus, malum. 12 Hypochondrii quando non mali ſunt. 190
Dolores in ignobili parte exorti, qui occultantur fere continuo, ſæpe delirium præſagiunt. 48 58 in ventre inferiori concitato quomodo ſæpe judicantur. 78 lumborum quinam mali. 83 84 magni in omnibus morbis quando malum prænuntiant. 40 palpitantes circum umbilicum, quid. 104 partium nobilium & ignobilium quinam boni, quinam mali & peſſimi. 81 82 quandoque in acutis morbis, etſi ſuapte natura ſemper mali, bonum prædicant. 77 qui a ſuperioribus partibus ad inferiores deſcendunt, optimi. 79 qui ab ægrotis non ſentiuntur quare pernicioſi. 83 qui circa umbilicum continuant in morbo acuto, non raro delirii nuntii. 48 qui cum ratione abeunt, optimam ſalutis ſpem pollicentur, 77 qui morbo progreſſo oſtenduntur, quinam optimi. *ibid.* qui progreſſo morbo manifeſtantur, quinam pernicioſiſſimi. 80 quinam delirium indicant, 46 quid præſagiunt in morbis acutis. 76 ſi convulſionum cauſæ, pernicioſum. 113 ſine voce quinam pernicioſi. 129 furæ abſque ratione derepente occultati, deſipientiam pariunt. 82 vehementes, aſſidue morbi fortiſſimi ſunt ſymptomata. 40 viſcerum fortes comatoſis ſuccedentes, pernicioſi. 92 viſcerum fortes quando in acutis morbis peſſimi. 28 quomodo judicantur. 81
Dolorum cauſſa eſt continuitatis partium ſolutio. 93
Dorſum quid ad præſagium in morbis. 188
Dyſenteria in morbis acutis quandoque bona. 12
Dyſenterie conſtitutione anni boreali oriuntur. 29 quanam ætate accidere ſolent. 31
Dyſenterici unde dolorem acutum patiuntur. 92

E

Ebrius quiſpiam repente ſi obmutuerit, convulſus moritur, niſi febre corripiatur. 30 66 88 90 110 129
Ebriis ſomnus aliquando letalis. 90
Elleborum albus quomodo convulſionem producit. 107
Emproſthotonos tentio ad anteriora. 105
Empyema pleuritidi ſuccedens, malum. 33 intra quodnam temporis ſpatium expurgatur. 307 quid. 305 Hujus indicia. 305

Ephemera peſtilens morbus acutiſſimus paucis horis interimens. 245
Epicoptici quinam vocantur. 111
Epilepſia a ſupino nimis diuturno decubitu. 86 96 unde prævideatur & quid. 65 104 104
Epileptici juvenis exemplum. 110 pueri quando maxime curantur. 111
Eriſipelas ab exterioribus verti ad interiora, non eſt bonum. 33 doloris partium internarum cauſa. 77
Evacuatio immodica calorem nativum reſolvit. 70 optima qualis quæ rigori optimo ſuccedit. 120
Evacuationes immodicæ quomodo anxietatem producunt. 118 quæ non juvant exitii, aut ſaltem difficilis ſunt judicii indicia. 42
Exanthemata aliquando apparent in febribus putridis. 170 cum exitialibus ſignis perpetuo mala. 188 in peſte erumpentia ante coctionem magis utilia quam inutilia. 189 202 parva intus recurrentis, & evaneſcentia, pejora. 188 præter rationem evaneſcentia in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 58 qualia & quando in acutis morbis peſſima. 28
Excrementa cruda & prava obſervantur in morbis mali moris. 26 diſcoloratiora ſpectari, & ægros non ſitire, in quibus morbis ſumme exitioſum. 155 157 ex corpore exeuntia maxime oſtendunt naturalis facultatis debilitatem. 18 fœtida in morbis ſemper exitioſa. 65
Excrementorum coctio atque cruditas quid ad prognoſagium in morbis. 197 coctio atque excretio facultatis naturalis robur vel debilitatem in acutis notant. 9 in ægrotis corporibus cauſa ad naturalem facultatem maxime attinet. 152 mutationes in profluviis alvi juvant, niſi mala mutatio fiat. 273 maturationes omnes undique tempeſtivæ, bonæ. 198
Excretio humorum bilioſorum febrium ardentium propria. 217 in morbis, quæ fit ex partibus corporis propria excrementa in ipſis genita excernentibus, iſtarum partium ſanitatem indicat, 9 nulla fidelis eſt, quæ cum ſignis cruditatis apparet. 278 poſt coctionem apparens in morbis, duobus modis fit. 9 quæ poſt concoctionem apparet, ſemper facultatis naturalis robur indicat, certamque ſalutem prænuntiat. *ibid.* quænam facultatis expultricis robur: & naturam morbo prævalere oſtendit. 9
Excretionis criticæ optima ſigna. 220
Excretiones febrium ardentium criticæ propriæ. 217 218 humorum particularium quid ad prædictionem. 248 in peſte, vel in peſtiferis febribus nonnumquam repellendæ. 203 in principiis morborum & ante coctiones dantur bonæ atque utiles. 202 malæ & perniciosæ ſunt, quæ cum ſignis cruditatis apparent & quid præſagiunt. 201 malæ, non allevantes, in die decretorio in morbis acutis, quando peſſimæ. 28 non raro ſpectantur prima & ſecunda die, ſed hæ omnes pravæ exiſtunt. 207 omnes in principio, & crudo adhuc exiſtente morbo, letales. 196 omnes malæ ſunt, quæ non ſedant dolorem. 42 optimæ qua ratione fiunt. 198 199 quæ in peſtiferis febribus apparent, licet utiles, tamen per ſe non bonæ ſunt. 204 205 quantum morborum præſagiis inſerviunt. 200 ſpontaneæ in morborum principiis quare fovendæ. 202 ſymptomaticæ quænam. 202
Excretionum falſo ſymptomaticarum creditarum quædam exempla. 206 207 multarum ante coctionem conſpectarum, quæ judicatoriæ & bonæ fuerunt, exempla 203 pituitoſarum ſigna in quartanis febribus criſin oſtendunt. 217
Exſcreatio bilioſa in ſuppuratis exitialis eſt. 22
Exſpuitio crebra in phreniticis vomitum præmonſtrat. 267
Exſudantes, vigiles, recaleſcentes, malum. 69 87
Extenuatio corporis vel partium per ſe ſolam non dat certum præſagium in morbis. 164 cum ratione quænam dicitur. 162 in acutis morbis, & per initia in corporibus obſervata, quantum ad præſagium. *ib.* in febribus quando mala, & quid ſignificat, *ibid.* in hecticis Phtiſiciſque qualis. 163 ſubita quando peſſima. 162
Extrema admodum algere ex malis vacuationibus, eſt perniciosum. 73 frigida difficulter recaleſcentia, livida, quando in acutis morbis mala. 27 frigida, & livida in acutis morbis unde exitialia. 201
Extremorum caliditas in acutis morbis numquam mala. 195 frigiditas nonniſi fortem dolorem ſequi ſolet. 80 frigiditas perpetuo mala, & peſſima ubi interiora calent, & magna ſitis adeſt. 195 refrigeratio unde ſæpe ante criſin producitur. 74 refrigerationes recaleſcentes malæ. 226

F

Facies bene valentium prorſus ſimilis bona in febribus. 171 mala quænam. *ibid.* 172 coloratior quandoque bona in febribus, & quid ſignificat. 171 cum ſudore flammans in acutis morbis mala. 19 146 261 flammea quando ſignum eſt malignitatis & letale. 173 prærubra ſanguinis erupturi ſignum. 165 235 quid facit ad prædictionem. 170 rubra futuras aliquando Parotides ſignificat. 171 172 cum mæſtitia, mala. 165 quid in febribus præſagit. 171 172 *ibid.* tumida in quibus morbis obſervatur, & quando. 171
Faciei color bonus, & mæſtitia multa, malum, & quid notat. 69 mutatio non ſemper aliquid certi præſagit in febribus. 171 extenuatio in acutis morbis per initia obſervata quando exitialis. 163
Facultas animalis & vitalis a naturali videntur procedere. 152 animalis quomodo reſoluta noſcitur. 12
Facultatis animalis functiones unde robuſtæ & rectæ valentes cognoſcuntur. 8 naturalis functiones & effectus. 7 naturalis robur quomodo cognoſcitur. 9 vitales functiones. 7 8
Facultatum actiones robuſtæ quomodo cognoſcuntur. 8
Fames convulſionis ſiccæ cauſa, 107 quid. 153 unde tremoris cauſa. 101
Familiares non agnoſcere in acutis morbis delirium indicat, 46
Faſtidium unde vomituris. 78 237
Faſtidia quid in morbis acutis ſæpe indicant. 73
Fauces dolentes abſque tumore cum implacidita-te ſtrangulanteſque ſupra modum, perniciosę. 80 in gutturis inflammationibus ſolent non raro magni momenti eſſe ad præſagium. 188 tumidæ & inflammatæ quando bonum. *ibid.*

Fatuitas cujuſnam facultatis læſio. 58 cum ſomno profundo ſignum frigiditatis & humiditatis. 89 quid. 49
Febris acuta quando convulſionibus remedio eſt. 112 acutæ quædam ſigna exitialia. 56 apoplecticis utilis. 131 ardens a dolore ventris laborioſo, letale. 80 rigore ſolvitur. 119 aridior, æqualior, ſine magnis mutationibus uniformis delirium præſagit. 47 aſſidua quæ noctu augetur in tabe. 124 continua aut intermittens ſupervenit ſæpe ab Apoplexia. 26 continuæ mutatio in intermittentem quomodo ex frigiditate cognoſcitur. 71 critice ſublata quomodo noſcitur. 70 ebrietati ſuperveniens quæ utiliſſima. 30 88 hectica quomodo dignoſcitur. 67 malignæ indicia. 68 quando convulſione ſolvitur. 112 quando dolorem circa hypochondria ſolvit. 190 quartana, quare omnium ſecuriſſima. 26 quartanæ per largam ſanguinis excretionem curatæ exemplum. 251 ſigna letalia. 40 tertiana ſeptenis circuitibus terminatur. 22 tertianæ quarta acceſſio eſt index ſeptimæ. 209 vehemens, aſſidua, calorem corporis reſolvere poteſt. 73
Febres acutæ & letales ex timore & metu magno. 31 acutæ ſi convulſionum cauſa, perniciosum. 112 ardentes diebus imparibus accedere ſolent. 210 ardentes, quomodo ut plurimum judicantur. 218 ardentes, ſemitertianæ, erraticæ, malignæ oriuntur anni conſtitutione boreali. 29 ardentes, unde convulſiones pernicioſas producunt. 110 107 debiles & parvæ quandoque valde malignæ ſunt. 215 Ephemeræ quænam vocantur. 141 epidemicæ, ſemitertianæ ardentes, peſtilentes cum morbillis malignis letales. 30 fumantes quænam dicuntur. 40 hecticæ maraſmodes ſi febribus ardentibus ſuccedant, malum. 33 lygodes quænam dicuntur. 116 maraſmodes quando exitiales. 162 putridæ quænam vocantur. 141 quibus diebus ſolvuntur. 207 208 ſi imparibus diebus bona ſigna habuerint, certum præſagium faciunt, & e contra ſi paribus. 211 ſimplices ſi in compoſitas mutentur, & phlegmone adjungatur, malum. 33 ſimpliciſſimæ, ac ſignis firmatæ ſecuriſſimis quarto die citius deſinunt. 23 28 teterrimæ ac ſignis affligentes difficillimis quarto die aut citius interimunt. 246 variæ primo die reſolvuntur. 217 unde horrores continent. 122
Febrium ardentium letalium ſigna. 121 ardentium malignarum proprium eſt, ut ſummas partes non calefaciant. 67 continuarum in malignas mutatio mala. 33 tertianarum & quartanarum vacuationes criticæ propriæ. 218
Febribus ardentibus hecticæ maraſmodes ſi ſuccedant, malum. 33
Febricitantes plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45
Febriles recurſiones cum horrore quænam letales. 123 128
Felle ſuffundi ægrotos quid in acutis præſagit. 167
Feſtucarum collectio in acutis morbis delirii indicium. 46 47 48
Faces albæ in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 56 retentæ & exſiccatæ ileon ſæpe producunt. 31
Fœtores in morbis quid notant. 65 66
Frigiditas corporis quid ad prædictionem. 67 70 71 extremarum partium in dolore forti ventris, malum 80 72 extremorum ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 57 die critico cum ſignis decretoriis criſin prænuntiat. 72 prælanguidis perpetuo letalis. 70 per totum corpus in acutis febribus mala. 71 plerumque in continuis febribus eſt exitialis, vel longitudinem morbi præmonſtrat. 70
Frigus comatis cauſa. 89 partium extremarum, atque ad calorem ſi non amplius redeant peſſimum in acutis. 10 partium extremarum, quum internæ uruntur, quid præſagit. 14 quando bonum in febribus ardentibus, 123 ſingultum quomodo producit. 116
Frigoris immoderati effectus in corpus. 107
Frigora ea inſanabilia cenſentur, quæ calidis & ſiccis morbis contingunt. 55 87 90
Frigidum ſi naribus & ore exſpiretur in acutis morbis, exitiale jam eſt admodum. 15 per os & nares exſpirare, malum. 149 171
Fulgoris motus oculis apparentes quid notant. 174
Fumus calidus antea non ſolitus in ſudore fatuo critico. 243

G

Galenus in prædicendi in morbis arte, poſt unum Hippocratem, maxime claruit. 2
Graveolentia omnia putredinis ſunt indicium. 65 graveolentiæ gradus prænoſcendi ſunt ad præſagium. 65
Gravitas capitis hæmorrhagiam præſagit. 258 in naribus quid in morbis. 64 *temporum* hæmorrhagiam ſolet præcedere. 233 234 totius corporis vel manuum vel pedum ſumme exitioſum in deliriis. 57
Gaudium immoderatum quomodo tremorem producere poteſt. 101 ingens mortem aliquando producit. 31
Genæ quid ad præſagium faciunt in acutis morbis. 219 rubræ pleuriticorum & peripneumonicorum ſignum eſt proprium. 219
Glandularum tumores quando boni, & quando mali. 195
Gula graviter læſa homines continuo pereunt. 37
Gutturis fervor in multis moribundis, auditur, & quid indicat. 150 quando letalis. 305 quando vero non perniciosus. *ibid.* ſeu ebullitio & unde. 308

H

Hæmorrhagia critica quænam mala ſolvit. 253 larga aliquando febris quartana fuit judicata. 234 non ſolet ſuccedere ſine capitis dolore vel gravitate. 233 234 futuræ ſigna. 229 231 238
Hæmorrhoides in vitis quænam præſagiunt. 242 delirium ſecutæ, ſalutem prænuntiant. 53 ſuppreſſæ, vel nimis fluentes morbos graviſſimos producere poſſunt. 31
Hectica febris quomodo dignoſcitur. 67
Hecticus corporis habitus unde & quid præſagit. 76

Hectici quomodo dignoſcuntur. 67
Hecticorum caliditas qualis & unde. 67 68 habitus deſcriptio. 162 306
Hepar poteſt inflammari, abſque apparente umore Hypochondrii. 191 quibuſcumque circum dolet, his febris ſuperveniens ſolvit dolorem. 77 refrigeratum corporis tumorem producit; 164
Hepatis dolor proprius gravis eſt & quare. 76 inflammatio, quomodo Hypochondriorum tenſionem producit. 129 inflammatione laborantes plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45 tumori hydrops ſuccedens, malum. 33
Hepate inflammato, ſi ſanguis exeat e nare ſiniſtra, malum. 225 percuſſo, oculi ſtatim cavi evadunt. 178
Hippocratis & Galeni & aliorum de morbi vigore ſententia. 35 quomodo concilianda. 36
Hirudinum appoſitio quibus & quomodo conducit. 253
Horror quando in febribus ardentibus, bonus. 123 ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 57 quo vexantur omnes mali ſucci pleni, quum vehementer calefiunt. 123
Horrores a febribus, Phlegmone, vel quovis modo motis humoribus. 123 crebri, ſeu frequentes quique etiam celeriter permutantur ſunt difficiles. 124 a quibus continuæ febres intermittere cœperunt, boni. 123 cerebri non ſufficiunt ad ſuppurationem, & tabem exinde denotandam. 149 decretorii mali, qui cum ſignis letalibus perpetuo exitium portendunt. *ibid.* generatim criticam perturbationem notant. 124 in acutis morbis quid. 12 torales quinam. 124 qui febre non tolluntur, ſed cum peſſimis apparent vacuationibus, mali. *ib.* qui purulentos & validos explicant, mali. 124 qui vomitus malos & exitioſos ſequuntur, ſunt judicatorii mali. 124 quid præſagiunt in morbis. 123 quinam ſuppurationem indicant. 144
Horroribus frequentibus e dorſo, levibuſque qui deſudant, difficili morbo laborant. 124
Humiditas corporis quid ad prædictionem. 167
Humor acris ſingultum producere poteſt. 116 ad caput aſcendens facit tum deſipientiam, tum aurium ſonitum. 64 æruginoſus epilepſiæ cauſa. 107 frigidus pituitoſus, quomodo fatuitatem & oblivionem producit. 55 paucus ſed valde virulentus morbos valde exitiales excitat. 42
Humoris quælibet turgentia ſemper verenda. 76 vitioſi excretio quando bona. 9
Humores ab intro foras verſi morbum ſalutarem faciunt. 26 bilioſi, multi tum tenuiſſimi, ac acutiſſimi ab aeris calore nimio in corpore abundant. 29 calidi deſipientiæ phreniticæ cauſæ. 50 quum tantum tranſmittuntur de parte ad partem, fiunt criſes per abſceſſus. 229 frigidi & pituitoſi putreſcentes in cerebro delirium concitare poſſunt. 50 in morbis a viſceribus ad exteriora converti optimum, & e contra, 33 noxios omnes corporis partes, quoad poſſunt, a ſe propellunt. 7 omnes ſanguinem, quare egent præparatione, ut evacuentur. 250 particulares morbos magnos & graves producere poſſunt, 33 pituitoſi & crudi faciunt morbos difficillimos. 33 putridi quare continuo purgandi. *ibid.* putridi quomodo anxietatem producunt. 99 qualitate & quantitate viſcera gravantes pulſuum cauſas mutare poſſunt. 136 ſimplices etiam benigniores morbos concitant quam miſti, qui graviores & plures ſimul producunt. 26 ſuapte natura, aut ob inſignem putredinem tenuiſſimi, atque mobiles redditi quando letales morbos faciunt. 19 ſumme putridi ac virulenti morbos graviſſimos concitant. 42 turgentes graves & periculoſos morbos concitare poſſunt. 42
Humorum bilioſorum & pituitoſorum excretionis per alvum ſigna. 241 calidorum copia quid præſagit. 33 calidorum & pituitoſorum in cerebro effectus. 89 proprium eſt, ut facillimi ſint ad excretionem. 219 copia gravans muſculos, tremoris ſæpe cauſa. 102 101 ſeu multitudo graves morbos parit. 32 cruditas a vigiliis aſſiduis. 41 85 crudorum inſignis copia, aliquando anxietatem producit. 99 crudorum multitudine calorem corporis quomodo ſuffocari noſcitur. 73 maligna putredo pernicioſos morbos facit. 33 omnis multitudo difficilem reddit morbum 102 particularium excretiones quid ad præſagium 248 ſpontaneæ excretiones non omnes bonæ. *ibid.* tenuitas extenuationis cauſa. 262
Hydrops e longa dyſenteria. 492 ab hæmorrhoidibus ſuppreſſis vel nimis fluentibus. 37 ex nimio ſanguinis fluxu. 255
Hydropi in primis obnoxii ſunt ſenes. 32
Hydropes quomodo producuntur ab uſu aquarum paluſtrium. 30
Hypochondrium cum dolore tenſum, & cum ipſo lecterius color in corpore in acutis morbis ante diem ſeptimum malum. 28 quid dicitur. 189 hujus contentio cum comate faſtidioſo, & capitis dolore Parotidas effluere faciunt. 90 contentio ſine dolore quid notat. 235 pulſationes quid præſagiunt. 195 ſiniſtri dolor atque tumor non inutilis in acuto morbo. 79 tenſiones quid notant. 190 tumores aliquando optimi. *ibid.* tumores quid ſæpe præſagiunt in acutis morbis. *ibid.* tumores quinam in ſuppurationem vertuntur. 192 193
Hypochondria craſſitudinem habentia, bona. 289 cum duritie & dolore tenduntur ab inflammatis partibus. 191 in acutis morbis tenſa, dura, dolentia & inæqualia, mala. *ibid.* in acutis morbis vitiata quando mala. 163 202 mollia, æqualia, dextra, ſiniſtraque parte eſſe, & ſine dolore, optimum in acutis morbis. 190 qualia eſſe debent in Ictericia critica. 168 quid in morbis præſagiunt. 189 ſi extenuantur, vel contabeſcunt malum. 190 variæ tenduntur in acutis morbis. 191 192 *ibid.* vel etiam tenſa aliquando optima. 190
Hypochondriorum dolores cum tenſione, & malis ſignis, letales. 193 pulſus cum frequenti oculorum obtuitu in acutis morbis delirii indicium. 46 ſuppurationes quænam malæ. 193 194 tenſio ſine dolore ſignum hæmorrhagiæ futuræ. 235
Hypogaſtrium quando ſenſum gravitatis vel doloris ſentit. 241
Hyſterica mulieres unde non raro convulſionibus tentantur. 108
Hyſterici affectus quomodo aphoniam producunt. 128

I

Ichi quid. 64
Ictericia ante ſeptimum diem quando mala vel bona in febribus. 168 169 170 cum hypochondriis tenſis & duris mala. 169 quænam bona in febribus. 168 quando exitialis in febribus. 170
Iterus fit aliquando critice. 167 in morbis quare non omnis bonus vel malus. 168 quid & unde. 167 vel ſalutem vel mortem quandoque præſagit & quando. 168
Ignavia quid in deliriis. 57
Ignes ſacri undique cito depaſcentes, anni conſtitutione auſtrina humida & calida oriuntur. 29
Ignorantia cum delirio criſin aliquando portendit. 52 cum rigore mala, mala quoque & oblivio. 69 cum rigore quando malum. 11 121
Ileon a fæcibus retentis & exſiccatis. 31 ſi vomitum, ſingultum, deſipientiam, vel convulſionem producat, malum. 12
Ilii dolor quomodo ſolvitur. 78
Imaginatio admodum læſa in acutis morbis, quando cerebri virtutem maxime debilem oſtendit. 11
Inappetentia cibi in morbis longis nihil eſt deterius. 17 155 156 quæ ex delirio non confundenda cum ea, quæ ex facultate extincta vel diminuta. 153 unde in ægris. 154
Inedia aliquando convulſionem producit. 32 quomodo noſcitur faciei extenuationis cauſa. 163
Infantibus quare vigiliæ aſſiduæ tam noxiæ. 86
Inflammatio capitis, in primis in phreniticis, unde timenda. 165 cerebri a ſanguine per nares non evacuatio. 64 doloris partium internarum ſæpe cauſa. 77 quæpiam interna caloris retractionis ſæpe cauſæ. 74 viſcerum unde noſcitur. 191
Inflammationis vigor ſeu ſtatus quando dicitur. 36 viſcerum pernicioſiſſimæ ac letaliſſimæ ſigna. 193 inflammationes maxime fiunt ex ſanguinis copia. 32
Inflammationibus in partibus externis, multi ſæpe morbi tum acuti tum longi judicantur. 5
Inhorreſcentes anxii, laſſitudine preſſi, lumbis dolentes in profluvium alvi incidunt. 123 241
Innutritio ſeu atrophia quid & unde. 16
Inquietatio cum ſudore eſt mala in acutis morbis. 20 42 omnis mala eſt, critica excepta. 98 quid in acutis morbis ſignificat. 96 quid & quantum ad præſagium facit. 97 ſæpe tollitur oborto vomitu. 99
Inquietationes in diebus criticis apparentes certius habent judicium. 100 febribus intermittentibus & aliis cum nauſea, & faſtidio, haud ſunt malignæ. 99 peſſimæ illæ quæ criticis diebus fiunt nulla optima ſubſecuta evacuatione. 100
Inquietudo ab æſtuoſa febre ſtabili & peſtilenti, peſſima. 41 ab humoribus virulentis æſtu turgentibus & circa præcordia ferveſcentibus, peſſima. 42 ab inſigni viſceris inflammatione, peſſima. 41 cum extremorum refrigeratione in acutis morbis ſignum maxime pernicioſum. 72 in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57 in febribus quid notat. 40 quæ propter languorem virium, ſumme pernicioſos morbos notat. 41
Inquietudines bonæ non raro apparent ante criſin futuram & optimam. 99 criſin ſæpe præſagiunt. 36 in acutis morbis quando peſſimæ. 28 quæ bonas criſes præcedunt, optimæ. 85 quæ cum ſudore malo die decretorio apparent, exitiales. 100 quænam prorſus perniciales. *ibid.*
Inſania quomodo ex vomitibus prævidetur. 270
Inſaniæ a cerebri læſione oriuntur. 49 leviter feroces ferinæ ſunt & convulſionem ſignificant. 109 vehementes in febribus, ſilente ægro, ſed non etiam privato voce, letale. 54 vocantur deſipientiæ, quæ ſine febre fiunt. 48
Inſanientibus in Melancholia ſi varices aut hæmorrhoides ſupervenerint, inſaniæ fit ſolutio. 63 353
Inſomnia conſpicua, non turbulenta, ſed quieta, bona in Phrenitide. 53 54 conſpicua quare in Phreniticis obſervanrur. 64 turbulenta ſemper mala, & Phrenitidem portendunt. 54
Inſpirandi difficultas quid & unde. 232 235 238
Inteſtinorum difficultas vel aqua inter cutem a furore, bonum, 52 tormina & morſus quid ſignificant.
Inuſtiones unde convulſiones pernicioſas producunt. 110
Ira acutiſſimas febres ſæpe producit. 31 numquam ſubito mortem produxiſſe refertur. *ib.*
Jactatio aſſidua in morbis quid notat. 41 membrorum malis dejectionibus ſuperveniens. 100 quid in acutis morbis ſignificat. 97 unde vomituris. 237. 238
Jecur conflictantes morbi graviſſimi ſunt atque difficillimi. 33 durum ac ſcirrhoſum redditur ab uſu aquarum paluſtrium. 30
Jejunium convulſiones ſæpe producit. 30 ſyncopas faſtidioſiſſimas atque hecticas febres producere poteſt. *ibid.*
Judicatio quid. 212. 213 quibuſcumque fit, his nox gravis ante acceſſionem eſt. 215
Judicationes quæ fiunt diebus paribus malæ & infideles. 211
Judicatoria non apparent in morborum principiis. 201
Judicium in morbis quando redditur difficile. 42

L

Labores qui in articulis fiunt in longis febribus non inutiles. 79 nimii quid producere poſſunt. 59
Labrum inferius tremulum criſin aliquando per vomitum ſignificat. 184 ſi pervertatur in febre non intermittente, debili jam exiſtente corpore, mors proxima eſt. 113
Labri diſtortio quando peſſima. 61
Labia in tertianis febribus critice ulcerantur. 183 quid ad præſagium faciunt in acutis. 281
Labiorum contractus aliquando alvi bilioſam eruptionem ſignificat. 183
Lacrymæ criticæ unde noſcuntur. 183 in altero oculorum acres appropinquantis delirii præſagium. 47 involuntariæ cum delirio per modum judicii aliquando apparent. 52 involuntariæ in acutis exitioſum, 181 ſpontaneæ effluentes, ubi non criſin, mortem ſignificant, 174 ſpontaneæ ſanguinem e naribus critice fluxurum aliquando notant. *ibid.*

Laſſitudinis ſenſus quid indicat. 83
Laſſitudines aliquando abſceſſus præcedunt. 83. optimæ exiſtunt, quæ aliqua evacuatione evaneſcunt. 84 quænam bonæ obſervantur ad prædicendam ſalutem. 84
Lethargus a collecto pituitoſo humore in cerebro. 59 qualis ſomnus. 87 89
Lethargici affectus phreniticis ſupervenientes, letales. 186
Leucophlegmatia laboranti fortis Diarrhœa ſuperveniens, morbum ſolvit. 48
Lien durus ac ſcirrhoſus redditur ab uſu aquarum paluſtrium. 35
Lienis inflammatione laborantes plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45 tumori hydrops ſi ſuccedat, malum. 33
Lienteria in acutis morbis malum ſymptoma. 17 letalis a longa dyſenteria. 279
Lingua alba, craſſa, cœnoſa, mala in acutis febribus & quare. 184 arida, dura, aduſta, & maxime nigra, ſi cum aliis ſignis malis appareat, exitium præſagit. 186 arida tactui frigida vel calida apparens exitialis eſt. *ib.* dura & horrida peſſima, phreniticorumque propria. *ibid.* ſi torrefacta, & non vel parum ſitiant phrenitici, pernicioſiſſimum. 56 exuſta & præarida ſine ſiti ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 57 exuſti ſi nihil vel parum ſitiant delirii metus. 47 flava, aut crocea, aut nigra, aut admodum rubra, quid in morbis acutis notat. 184 lividi coloris omnium maxime eſt letalis. 285 magna & nigra quare letalis eſt. 185 nigra cum tremore ſeu tremula mala. 185 nigra non abſolute pernicialis. *ibid.* ſolet ardentes peſtilentes febres detegere. *ibid.* qualis videri debet in acutis morbis, & maxime in febribus ardentibus & ſynochis. 183 quid in morbis præſagit. 284 quomodo a febrili calore varie mutatur. 185 rubra ſæpius in anginoſis affectibus & peripneumonicis, peſſima. 186 ſalebroſa delirium præſagit. 47 ſi valde nigreſcit, judicium fit in quatuordecim diebus. 185 variis coloribus varios humores exſuperantes oſtendit. 184
Linguæ color ſubruber in acutis morbis, quid notat. 184 denſæ delirium indicant in acutis morbis. 47 obtremiſcentes unde & quid in morbis norant. 55 præſiccatæ in anginis peſſimæ. 186 unde ſæpe ita mole imminuitur, & quid notat. 185
Lippitudo appropinquantis delirii ſignum. 47
Lippientem alvi profluvio corripi bonum. 273
Lividitas cum extremorum refrigeratione ſignum maxime letale. 72 totius corporis vel manuum vel pedum ſumme exitioſum eſt in deliriis. 57
Lumborum gravitas, dolor, atque tenſio menſium futurorum ſigna. 236 237.

M

Maculæ criticæ, & quæ quum inceperunt, numero atque magnitudine augentur, optimæ. 188 quum lividę tum nigrę quę peſſimę in acutis morbis. 166 rubræ dorſum ac alias partes inficientes in febribus, ſynochis malignis, quando malæ. 165
Macularum prognoſis unde petenda. 313
Mador unde & in quibus oritur affectibus. 257 258
Mandibularum convulſio unde. 106
Μανιώδης deſipientia. 54
Manuum geſticulationes accidunt deſipientiæ exitiali. 57
Martianus mirabilem Galeni prædicendi in morbis artem miratus, quid ipſum rogavit. 2
Maxillæ ſi apparent lividæ, vel nigreſcentes, & quidem cum malis ſignis, mortem prænuntiant. 166.
Medici unde ſæpe circa pulſus falluntur. 142 ſi ægrorum exitium antea non prædixerint, ipſorum aut ignorantiæ aut negligentiæ adſcribitur. 2
Medicamenta quænam ſingultum producunt. 56
Medullæ ſpinalis inflammatione laborantes, mente conſtare optimum. 45
Membra nobilia diu graves morbos ferre nequeunt. 135
Memoria quibus modis læditur. 49
Mente conſtare, & bene ſe habere ad ea, quæ offeruntur, bonum, contrarium vero malum. 8. 44
Menſes aliquando per nares vacuantur. 235 in mulieribus unde prævidentur. 242
Menſium erupturorum ſigna. 236 242
Menſtrua ſi plura fiano, accidunt morbi, & ſi non fiant, ex utero morbi contingunt. 32
Menſtruæ purgationes cum delirio & poſt ipſum conſpectæ judicium portendunt. 53
Morbus comitialis v. Epilepſia. 108 diuturnus & tardus quando ſolvitur per abſceſſum. 230 qui congruit naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori minus periculoſus. 25 quilibet ſalutaris quatuor habet tempora. 34 quomodo ſalutaris noſcitur. 38 ſi ab excretionibus reſolvatur, optimæ criſis ſignum. 221 ſi ſummum exercet vigorem, & natura ſit adhuc in principio, peſſimum. 38 ubi celeriori motu, quam natura movetur, malum. *ibid.*
Morbi ab aliis concitati ſæpius in magis ſalutares mutantur. 26 ab humorum crudorum & craſſorum copia debilibus exitiales. 32 accedentes diebus imparibus, iiſdem judicari debent. 211 acuti aliquando judicantur hæmorrhagia ac ſudore copioſo. 242 per hæmorrhoidas cum ſudore judicandi, quomodo cognoſcuntur. *ibid.* frequentiſſime judicantur ſudoribus. 239 plurimi judicantur per urinas. 240 quatuordecim diebus terminantur. 222 quomodo diſtinguuntur. *ibid.* ubi judicantur & reſolvuntur paribus diebus quicquam boni ac certi non habent. 211
Morbi acutiſſimi atque exitiales magna ex parte in autumno oriuntur. 30 ſæpe ante quartum diem homines interimunt. 245
Morbi augmentum quando incipere dicitur. 206 augmenti ſtatuſque tempora differunt in ſanandis & moribundis. 35 complures acutorum judicantur per alvi fluxum. 241 debiles & magis ſalutares ab humorum qualitate & ſimplicitate. 26 ex internis cauſis cognoſcendi. 25 quomodo ex horum idea cognoſcuntur. 22 & Naturæ ſtatus ſi ſimul procedant, ac una moveantur optimum. 38 exitiales ab humoribus ad vehementer putreſcendum aptis. 33 quo morbi tempore ægros perdunt. 34 35 futuri ſtatus cognitio neceſſaria ad hujus eventum præſagiendum. 33 infida remiſſio quando. 263 laterales quanam ætate accidere ſolent. 31 letalis præſagium ſanguinis exſpuitio. 32 letales ab humorum inſigni putredine. 33 letales habent unum aut duo aut tria tempora. 34 longitudi-

gitudinem quænam indicant. 75 malignitas occulta aliquando anxietatem producit. 98 maligni, quare crisibus solent terminari. 215 longitudinem quinam sudores indicant. 361 362 morem seu modum produnt symptomata quæ postea sequuntur. 20 motus celer maxime facit cum critico aliquo signo ad prænuntiandam crisin. 217 non raro fiunt exitialissimi a sanguinis plenitudine & copia. 26 omnes & symptomata, pulsuum causas mutare possunt. 135 omnium periculosissimi a bile. 26 omnino salutares sunt, si multa aut aliqua signa illuxerint. 24 pernicioſi a cibis pravi succi ac porus. 30 pestilentes ab usu aquarum corruptarum seu fœtidarum. 30 principium quodnam dicitur. 245 quando imperfecte judicantur. 240 245 qui non diebus decretoriis solvuntur, reverti solent. 224 qui senibus accidunt, illos maxima ex parte comitantur ad mortem. 31 quinam per crisim terminantur, quinam vero non. 214 215 quinam senibus letales. 31 sæpe usque adeo sunt graves, ut statim in principio ægrotos interimant. 37 statum absque ulla coctione observare, quare pessimum. *ibid.* summe pernicioſi ab immoderato vini potu. 30 tantum acuti & magni crisibus terminantur. 214 tempora a symptomatibus & morbi essentia perquirenda. 34 35 differunt a temporibus naturæ concoquentis. 34 35 valde exitiales sæpe a pauco, sed valde virulento humore excitantur. 42 vigor in morituris qualis observatur. 37 victoria quando præsagienda. 34 vigoris tempore ægroti minus quam in augmento conflictantur & turbantur. 36

Morbo qui vexantur pernicioſo, pauciſſimi aut nulli probe dormiunt. 41

Morborum acutorum terminus est dies vigesimus. 231 acutissimorum aliqui uno tantum die, alii duobus &c. & numquam ultra quatuor dies terminantur. 245 breve principium, breve augmentum, tum status, tum declinatio proportione sequitur. 37 curationis instituendæ ratio ex singulorum morborum temporum, omniumque maxime status præcognitione pendet. 1 eventus in quibusnam alvi dejectionibus certius dignoscitur. 273 grassantium ideæ habendæ, ut morbi cognoscantur. 24 naturæ Medicæ. 6 omnia tempora inter se proportione temporis conveniunt. 37 plurimorum certissima optimæ crisis indicia. 220 præsagium certius quomodo habetur. 38 robur & imbecillitas, ex quibus cognoscatur. 20 21

Morbis difficulter resistunt, quibus natura ad hos vergit. 32 sævissimis & symptomatibus pessimis a scorpionis ictu vexantur. 42

Morbos salutares & exitiales prænoscendi empyricus modus. 39

Morbillis multi sæpe morbi tum acuti tum longi judicantur. 195

Morbilli quando in acutis morbis boni. 195

Morbillorum prognosis unde petenda. 341

Mœsti aliquando sunt ægri, ubi instat delirium. 47

Mollities corporis quid ad prædictionem. 67

Mores si mutantur in acutis morbi laborantibus delirii indicium. 46

Morosis quid. 48

Mors ab ira numquam accidisse dicitur. 31 ab ingenti gaudio atque timore. *ibid.* ex quibus satis cer o præsagiri potest. 146 in acutis morbis unde sequi solet. 192 quando proxima prævidetur in febre non intermittente. 113 quando sine crisi subsecutura prævidetur. 214 subita quibus accidit in capitis dolore. 65 unde in propinquo esse noscitur. 167

Mortis instantis in ægro signa. 61 63 prognosticum a symptomatibus, quæ præcesserunt etiam indagatur in acutis morbis. 73

Mortem in acutis febribus quænam signa portendunt. 24

Motricis facultatis actio diminuta in senibus maxime observatur. 93 facultatis actio læsa triplex est. *ibid.* facultatis cognitio quantum ad prædictionem Medicis conducat. *ibid.* facultatis imbecillitas unde fit. 101 potentiæ vitiatæ actiones in acutis morbis quid notant. 12

Motus nimius quare plethoricis tam noxius. 31

Muliebria quibus decurrunt. 78

Murmur incidens circa Ilia, solvit dolorem, qui in Iliis affligit. 78

Muscas frustra venari exitiale est in febre acuta, Phrenitide, Pulmonia, capitis dolore. 81

Musculi imbecilli quomodo reddi possunt ab intemperie. 101

Mutationes in morbis, qui dolosi sunt, juvant. 75 in morbo summe maligno quænam letales. 74 quæ in morbis observantur sex sunt numero. 213 quænam delirium indicant in acutis morbis. 46

Muti quinam vocantur. 126 unde fiunt ægri in morbis. 127

Mutitates in febre acuta quænam letales, & quænam diuturnitatem significant. 128 subinde rigentibus letales sunt, iis vero moderatus capitis dolor est. 128

N

Narcotica quomodo coma producunt. 89

Narium distortio quando letalis. 61

Nasus quid ad præsagium facit in acutis morbis. 181 si pervertatur in febre non intermittente, debili jam existente corpore, mors proxima est. 112

Natura juxta Hippocratem & Galenum quid, 56 morbo robustior quomodo cognoscitur. 4 41 triplici differentia distinguitur. 6

Naturæ a morbo oppugnatæ cum arce obsessa elegans comparatio. 3 vires quomodo cognoscuntur. 5 robustissimæ signa. 129 tempora, quo magis distant a morbi temporibus, eo pejus. 38

Naturalis facultatis cognitio, quantum ad præsagium in morbis necessaria. 152 debilitatis signa. 16 197 tres sunt actiones præcipuæ. 152

Nausea quid in morbis acutis sæpe indicant. 74

Nephritis senes ad mortem comitatur. 31

Nervorum obstructio, seu incrassatio, seu obscuratio torporem inducit. 174 principium sunt cerebrum atque spinalis medullæ principium. 127 vel nervosarum partium inflammatione laborantes, mente constare optimum. 45

Nox quibus gravis in acutis. 215

Nubecula in urinis nigra, mala. 295 quare. 291 quæ invehitur in urina, quænam bona. 283

Nutritio omnis quibus actionibus in corpore perficitur. 152 præcipua actio, qua corporis partes omnes conservantur. 16 quantum morborum præsagiis inservit, & unde. 169

Nutritioni quatuor actiones famulantur. 16

O

Oblivio cum extremorum refrigeratione in acutis morbis maxime pernicioſum ſignum. 65 cum rigore malum. 121 ex delirio quando minus periculi habet. 59 in acutis morbis quando malum. 11 28 unde ſæpe futura prævidetur. 65
Obtuſiones in oculis quid notant. 174
Oculus ſi lividas aut nigras venulas habeat, quando in acutis morbis malum. 27 unus ſi altero major videatur ex morbis acutis quando malum. 28
Oculi album ſi rubrum ſpectatur, quando exitiale. 180 aliquando boni apparent in febribus, quæ ad exitium inclinant. 173 audacia, delirii ſignum eſt, & dejectio & fractio, malum. 177 cavi quando perniciem denotant. *ibidem*. conniventes unde in moribundis. 89 demiſſi quid in febribus notant. 91 diſtortio quando peſſima. 61 hebetes videri extrinſecus ſpectantibus, malum. 276 impenſe rubri ſanguinis eruptionem indicant in febribus. 78 lucem effugientes in deliriis ſumme exitioſum. 57. optimi & robuſti perpetuo boni ſunt indicii. 173 perverſi, aut alter altero major, aut candidum rubeum habentes, aut pleni ſanguine, ſumme exitioſum in deliriis. 57 prominentes ſeu tumidi in acutis morbis letales. 177 robuſti & recte valentes quid notant. 173 rubri initio morbi numquam bonum prænunciant. 175 involuntarie lacrymantes ſumme exitioſum in deliriis, 57 ſi ſplendorem amittant, peſſimum. 175 ſublimes quid in morbis acutis indicant. 176 tenebricoſi quando vomitus futuri ſignum. 60
Oculorum caligo ſanguinis e naribus erupturi ſignum in febribus. 78 ſignum futuræ hæmorrhagiæ. 236 convulſio cum delirio criſin aliquando portendit. 52 alucinatio quid in morbis. 65 hebetudines quid notant. 175 motus quid in morbis acutis indicat. 178 quænam ſigna plane ſunt exitialia. 176 179 rubor & ſingultus a vomitu, malum. 12 ſplendor cum delirio per modum judicii aliquando apparet. 52 venæ ſanguinis plenæ appropinquantis deliriі ſignum. 47
Oculos aſſidue nictare; pernicioſum eſt. 178 lucem ferre non poſſe quid in morbis notat. 60
Odores omnes graveolentes & putres in excretis ſunt quidem mali, ſed non omnes letales. 65
Opiſthotonos tentio ad poſteriora. 105
Oroboides hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 & quid notant. 294
Os ventriculi a mordentibus humoribus vehementer commorſum calorem nativum ſuffocat. 71 ab humore acri vel maligno affectu quid producit. 74
Oris tortura ſive ſpaſmus cynicus. 106 ulcera anni conſtitutio auſtrina calida & humida producit. 29
Ore hiante ſi quis dormiat, exitioſum, eſt & quare letale. 96
Orthopnoici a reſpiratione intercepta moriuntur. 15. unde ſternunt. 150

P

Pallor unde fit. 166
Palpebra ſi pervertatur in febre non intermittente, debili jam exiſtente corpore, mors proxima eſt. 112
Palpitatio circa umbilicum non raro delirii nuntius. 48 in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57
Palpitationes cor invadentes quænam letales. 104 quæ in ſyncopen deſinunt, maxime timendæ. *ibid.* quædam ſubſequentes vehementes deſipientias letales exiſtunt. 56 quid in morbis præſagiunt. 103 ventris, ſignum futuræ hæmorrhagiæ, 235 unde producuntur. 103
Papulæ parvæ quid. 313. 20 parvæ ſtatim evaneſcentes. peſſimæ. 313
Paralyſis in morbis quandoque utiliter concitatur. 125 morbum quoque ſimplicem magiſque ſalutarem producit. 26 quænam admodum pernicioſa eſt in acutis morbis, quænam minus. 12 quando in morbis timenda. 66. unde fit. 125. 126
Paralyſi ſi ſuccedat apoplexia, malum. 33
Paraphreneſis quid. 49. 69
Paraphrenitides a cerebri læſione oriuntur. 50
Paraplectici ſi ægroti evadunt ex acutis febribus, perpetuo malum. 125
Paraplegia ſæpe ab Apoplexia ſupervenit. 26. in acutis & aliis morbis quid ſignificat. 10. 124
Paraplexia qualis morbus. 125
Paraplexia poſt apoplexiam concitari minus periculoſum eſt. 125
Parotis quando futura cognoſcitur. 79
Parotides in peſte apparentes ante coctionem magis utiles quam inutiles. 202 oriuntur anni conſtitutione Auſtrina humida. 29 pravæ ſunt, quæ cum urinis parum coctis apparent. 313 quando & quænam bonæ & malæ in acutis morbis. 195. 313. quando critice erumpere ſolent. 92 quando ſurdis & comatoſis fiunt. 62 unde fiunt. 312 unde futuræ prævidentur. 313
Parotidum eruptio quando coma ſequitur. 89 futurarum ſigna. 232
Partes exteriores ſi in febribus non intermittentibus frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeant, letale. 40. 69 quid ad præſagium in morbis. 195 ignobiles quid ad præſagium. 194.
Perforatio producit dolorem acutum. 76
Perfrictiones quæ diebus criticis fiunt vehementes a ſanguinis profluvio, peſſimæ. 255. quænam malæ exiſtunt. 100
Peripneumonia pleuritidi ſuccedens, malum. 33
Peripneumonici plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45 quando ſæpe quarto vel quinto die judicantur. 244
Peripneumonicorum corpora ſi numquam carne repleantur, & reſtituantur, peſſimum. 161
Peripneumonicos erectos velle ſedere, peſſimum. 96
Permutationes crebræ in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57
Peſtilentia gravi ab immoderata aeris caliditate. 28 *ibid.*
Peſtis proprium ſignum quodnam. 165. 166
Petaloides hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 & quid notant. 294
Phlegmone ſi febribus ſimplicibus adjungitur, malum. 33 producit dolorem tenſivum. 76 hujus ſuppuraturi ſignum eſt rigor. 69

Phrenitis a continuis vigiliis. 41 aliquando judicatur per ſanguinem e naribus erumpentem. 52 duobus tantum ſymptomatibus innoteſcit, 21 eo pejor, quo plura habet ſymptomata. *ibid.* unde prævidetur. 164 *hujus* quædam ſigna. 27 exitialia. 56

Phrenitides a bile exuſta letales creduntur. 32 producuntur anni conſtitutione boreali. 29 item Auſtrina calida & humida. *ibid.* quo vitæ tempore magis accidunt. 31 vere omnes plerumque letales ſunt. 11

Phrenitidum peſſimarum proprium, & ſi lingua arefacta ſit, ægros vel nihil vel parum ſitire. 56

Phreniticæ deſipientiæ cauſæ. 49 50

Phrenitici cerebrum quomodo habent diſpoſitum. 59 qui in principio clementer ſe habent, ſed crebro permutantur, malum eſt. 56 100 quinam dicuntur. 48 49

Phreniticis exitioſis ſanguinis ſtillicidium e naribus ſupervenit. 56 in quibus albæ urinæ, aut fæces apparent, rigores ſunt pernicioſi. 121 quare vomitus virulenti ſive æruginoſi exitiales. 270 ubi varii caſus ſubinde incidunt, pravum, & convulſionem denuntiant. 56 urinæ albæ, lucidæ, malignitatem denotant. 22

Phtoe quid. 304 unde, 305 306

Phthiſis pleuritidi ſuccedens, mala. 33 producitur anni coſtitutione Auſtrina humida. 29

Phthiſici, ubi ſputum retinetur, moriuntur. 303

Phthiſicorum corpora ſi numquam carne repleantur & reſtituantur, peſſimum. 161

Pityroides hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 & quid notant. 288 294

Pituita dilutior lentoris expers, quid notat. 277 ſi bili prævalet, ægros plus lethargicos vel comatoſos reddit. 50

Platonis de natura ſententia. 6

Plenitudo calorem corporis ſuffocari indicabit. 74 laſſitudinis cauſa. 83 101

Plethoricè ab immoderatis exercitationibus in affectus inſanabiles incurrunt. 30

Pleura inflammatio, quomodo Hypochondriorum tenſionem producit. 107

Pleuritidis magnæ & debilis ſigna. 20 21 22

Pleuritides peſtilentes quales vitæ. 303 ſiccæ ſunt periculoſiſſimæ. 303

Pleuriticorum proprius pulſus eſt ſerratus. 137

Præcordia ſuſpenſa, murmurantia quid indicant. 241

Pruritus quando in acutis morbis bonus. 194

Puerorum corpora citius febribus extenuantur cum ratione. 161 162 plurimo innato calore valent, hinc ſua naturæ munera perfectiſſime præſtant. 5

Pueris quando convulſiones accidunt. 109. ſi ſpaſmus fiat, quid agendum. 110 quare hi facile convulſionibus tentantur. 106

Pulmoniæ in quanam ætate fiunt. 31 quædam ſigna exitioſa. 56

Punctcularum prognoſis unde petenda. 303

Punctio producit dolorem acutum. 76

Pulſus a ſuo ſtatu naturali mutatus vitalis facultatis læſæ ſymptoma. 14 æqualis & inæqualis horumque differentiæ. 132 133 arteriæ ſpinam perreptantis hæmorrhagiæ futuræ ſignum. 235 alti & magni in hæmorrhagia critica unde. 242 caprizans. 136 creber, rarus, & mediocris. 133 convulſivus quinam. 134 cur in quibuſdam febribus exitioſis apparent aliquando recte valentium ſimiles. 140 deficientes quinam. 134 dicrotus quinam dicitur. 133 differentiæ ex motionis tempore, vel motionis qualitate. 132 *ibid.* & variis cauſis. *ibid.* ex inæqualibus quinam ſunt valde exitioſi. 139 *Eurythmus* & *Arythmus*, eorumque differentiæ. 133 fit debilior atque inordinatior & inæqualis in mortalibus declinationibus. 221 formicans & languidiſſimus unde, & quare omnium exitioſiſſimi. 137 138 139 Hecticus quinam. 133 134

Pulſus in hypochondriis & aliis partibus delirium portendunt. 48 in malignitſſimis morbis, & in poſtiferis febribus ſanorum ſimiles ſæpe obſervantur & unde. 140 141 intercidentes quinam. 133 intermittentes qui majus & minus periculi portendunt. 139 140 intermittentes, qui ſubſequentes motus anteriori habent debiliores, apprime ſunt perniciales. 139 140 intermittentes quinam prorſus letales, alii ad exitioſos proxime accedunt. 139 140 languidiſſimi, minimi, tardiſſimi, atque rariſſimi exitioſiſſimi & quare. *ibid.* magnus, altus, mollis, fluitans, undoſus quando ſudorem indicat. 239 magnus, parvus, mediocris, longus, brevis, altus, humilis, celer, tardus &c. unde fit. 135 136 137 malus ſolus nullum certum judicium dat. 138 myurus ſive decuratus quinam. 133 134 omnes ad extremitatem deducti, excepto vehementiſſimo, letales ſunt. 139 myuri quibuſdam naturales ſunt. 140 omnes decem generibus comprehenduntur. 132 qui a naturali ſymmetria, multum recedunt non boni ſunt. 15 139 omnium languidiſſimus & creberrimus eſt formicans. 134 parvi & duri futuri delirii præſagium. 47 prælanguidi, omnium peſſimum ſignum in deliriis. 53 qualis in hæmorrhagia critica. 236 quales ſanguinis excretionis malignitatem arguunt. 255 quando fiunt celeres. 135 qui nullo modo fiunt in acutis morbis, facultatem vitalem extinctam prædicant. 15 quibus cautelis, a Medicis explorandi, antequam judicium de illis ferant. 138 139 ſalutem & exitium indicantes. 138 ſerratus Pleuriticorum proprius. 137 tardi, & intermittentes in acutis morbis. 15 vacui, & pleni quinam. 133 venarum in febricitantibus, ſanguinis eruptionem ut plurimum indicant. 78 79 234 vermicularis & vermiculans qualis dicitur. 133 vibratus quinam dictus. 134 vibroſi unde fiunt. 137

Pulſuum cauſæ neceſſitas. 135

Purgantia quibus conducunt. 286

Purgatio epilepſiam aliquando præcavet. 110 optima qualis, quæ rigori optimo ſuccedit. 110 per inferiora quando conducit. 242 per ſuperiora quibus neceſſaria. 238

Purgationes nimiæ quomodo convulſiones producunt, 107

Pus per nares effluens ſolvit aliquando capitis dolorem. 78 quodnam bonum, & malum 308 unde ſit. 305 hujus indicia. 124

Purulentiam quinam horrores indicant. 124

Purulenti unde aqua intercutem ſæpe ante exitium laborant. 75 unde cognoſcuntur. 124

Puſtulæ in dorſo apparentes, quænam bonæ. 270 parvæ, nec augeſcentes, & paucæ malæ. *ibid.* quando in morbis acutis ſalutares. 277 quibus in febre continua toto corpore excitantur, quando letale. 300 301

Putredo humorum noſtrorum ab uſu aquarum fœti-

fœtidarum. 30 humorum maligna pernicioſos facit morbos. 33
Putredines inſignes in corpore oriri poſſunt a multo cibo & potu. 30 quomodo horrores concitare poſſunt. 122

R

Ratio admodum læſa, in acutis quando cerebri virtutem maxime debilem oſtendit. 10 49
Raucedines & gravedines in valde ſenibus concoctionem non admittunt. 31
Recidivæ in morbis a criſibus imperfectis. 220 223 225
Refrigerata corpora vix recaleſcere, ſumme in morbis acutis pernicioſum eſt. 69 72
Refrigeratio a rigore non recaleſcens, malum. 12 121 corporis in acutis morbis numquam bona & ſæpe ſumme exitioſa. 70 76 74
Renes ſi graviter lædantur, homines continuo pereunt. 37
Renum inflammatione laborantes, mente concitare optimum. 45
Reſolutio ex aphonia, quomodo prævidetur. 127
Reſolutiones quænam pernicioſæ ſunt in acutis morbis. 12 27
Reſpirare per nares in acutis morbis, malum. 14 226
Reſpiratio bona & mala quid in morbis. 129 146 certius dat præſagiam in morbis quam pulſus. 142 denſa magna, parva. 147 quid notat. 145 96 difficilis atque frigida cum extremorum refrigeratione in acutis morbis peſſima. 73 e frequenti parva facta, omnium peſſima. 148 extendens, urgens, obſcura, peſſima. 151 152 frequens & parva cum pravis ſignis, letalis eſt, quænam dicitur. 143 144 frigida omnium exitialiſſima, & tantum in proxime moribundis obſervatur. 149 in morbis acutis, quæ magna eſt atque rara, præſagit delirium. 15 interrupta exitialis eſt. 152 læſa vitalis facultatis læſæ ſymptoma. 15 magna & rara delirium portendit. 49 50 quænam dicitur. 143 mala, omnium peſſimum ſignum in deliriis. 58 ſola in morbis exitium non exprimit. 146 152 maxime ad prædicendam ſalutem valet. 52 parva, & frequens &c. quid notat. 143 144 147 148 152 quæ ex magna in parvam, ex rara in frequentem mutatur in acutis morbis, mala. 14 quæ pinnis narium & pectore editur quando in acutis morbis mala. 28 quænam convulſionem ſignificat. 152 qualis in tabidis ultimo obſervatur. 148 quid præſagit in morbis. 142 quid. 142 *ibid.* ſtertoroſa in morbis acutis plerumque eſt pernicialis, & quando certo letalis. 150 ſublimis cum ſignis exitialibus perpetuo letalis. 151 ſublimis & apparens, peſſima, & quænam dicitur. 136 147 149 mala confunditur cum magna reſpiratione. 151 unde infantibus interrupta apparet tempore quo plorant. 152
Reſpirationis cauſa triplex. 143 communes quænam. 172 duæ in primis apparent. 142 *ibid.* uſus. 142
Reſpirationes æquales & ordinatæ, inæquales & inordinatæ, unde, & quid notant, 147 æquales & inæquales quænam dicuntur. 143 compoſitæ quænam. 143 harum cauſæ. 144 cum ſtrepitu thoracis peſſimæ, & quomodo vocantur. 146 frigidæ omnium peſſimæ. *ibid.* gravolentes maxime exitiales. 65 quænam malæ & peſſimæ. 146 rythmæ & arythmæ. 143
Riger ab oculorum perverſione cum laſſitudine & febre, malum. 84 convulſionem in poſteriora inferens, interficit. 106 cum ſudore frigido peſſimus. 130 121 122 & deſipientia ex multa potatione, malum. 12 120 & urinæ ſuppreſſio. 235 quid indicat. 240 eſt totius corporis vibratio. 117 febricitanti ſuperveniens, febre non deficiente, malum, & quando peſſimum. 121 in ſanguinis Profluvio aliquando eſt bonus. 120 non potens calefieri quomodo Græcis vocatur. 118 pernicioſus in oculorum perverſione cum febre & laſſitudine. 122 quando in febribus ardentibus bonus. 122 quando letalis. 121 quid. 118 quid Celſo. 105 quomodo quum a frigore tum ab horrore diſtinguitur. 118 quibus febribus proprium eſt. 119 ſuperveniens in febre laborioſa poſt oculorum perverſionem, mortem fatetur. 12 121 vehemens cum delirio quando criſin portendit. 52
Rigoris materia quomodo ſæpe ſolvitur. 117
Rigore ſuperveniente a febre ardente habito, fit ſolutio. 119
Rigores aliquando in comatoſas finiunt convulſiones. 122 continui aut frequentes quare pravi, & quid indicant. 142 in acutis morbis quid. 12 in Phreniticis, in quibus albæ urinæ aut fæces apparent, ſunt pernicioſi. 144 judicatorii quinam vocantur. 119 quando morbi longitudinem prænuntiant. 120 qui febrem non tollunt aut non minuunt, deterrimi. 121 quibus in febribus ſexto die fiunt, difficilis ſunt judicii. 224 unde bilioſæ vacuationes ſequi ſolent. 118
Rubor faciei criticus quomodo dignoſcitur ab eo qui ab aliis cauſis. 236 faciei quando criſin futuram denotat per ſanguinem e naribus vel per Parotidas. 165 166 faucium ſi quam maxime foras vertatur, quando ſecuriſſimum. 188 malarum & narium proximam hæmorrhagiam prænuntiat. 235 maxillarum aſſiduus in longis lentiſque febribus quid notat. 172 oculorum, aut maxillarum & narium in hæmorrhagia critica. 243 ſi quam maxime foras vertatur, bonum. 68
Rubores in brachiis ac cruribus eryſipelatodes ſi fiant in acutis morbis, bonum erit. 165
Ructus quibus accidunt. 242
Rythmus in pulſibus quid. 133

S

Sacer ignis ſi non intro recurrat, optimum. 68.
Saliva multa quando futuri vomitus ſignum. 61
Salus in morbis ex tribus præcipue & certo prædicitur. 52 in morbis quomodo a deliriis prædicitur. 51
Sandarachoides hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 294
Sanitas ex quibus ſignis maxime prævidetur in morbis. 58
Sanguis critice fluens copioſus anxiis bonus. 99 e naribus profluens ſurditatem al quando tollit. 62. exiens e nare dextra liene affecto, & e ſiniſtra hepate affecto malum. 307 niger vide bilis nigra, per vomitum excretus in febribus damnatur. 254 quibuſcumq; mulieribus ad mammas colligitur, furorem ſignificat. 48 ſi e naribus effluat, utero affecto, malum. 225 ſpumoſus in pleuri-

pleuriticis & peripneumonicis quid notat. 296 ubi multum fluxerit, convulsio aut singultus superveniens, malum. 12
Sanguinis copia non est salutaris. 33 critici e naribus fluxuri signum. 164 173 e naribus stillatioaes, malum semper quippiam notant, 19 ex ore aut auribus eruptio ex cerebro læso. 130 eruptio fidelius salutem prænuntiat, si cum signis coctionis appareat quam cruditatis. 205 in frigidis morbis & pituitosis perpetuo mala. 254 larga criticis diebus apparens optima. 251 252 non judicans, vel mortalis, vel judicatu difficilis. 43 quibus accidit. 78 eruptioni e naribus quinam obnoxii. 249 eruptiones bonæ sunt vel perfectæ vel imperfectæ. 250 criticæ & optimæ, quibus signis innotescunt. *ibid.* e naribus in adolescentibus magis exspectandæ. 61 immodicæ quando malæ. 251 in quibusnam affectibus maxime contingunt. 232 236 malæ exitiales. 254 excreatio in Pleuriticis morbum monstrat securiorem. 26 excretio, licet Ictericis factis in febribus, [& aliis profuit. 250 mala, quomodo ex quantitate cognoscitur. 255 per intervalla quænam perpetuo malum portendit. *ibid.* per nares in febribus acutis & vehementibus præcipua est ad prædictionem. 249 quantum ad prædictionem in morbis. 248 excretionis malignitas, quomodo ex pulsu noscitur. 255 excretionem si præcesserunt signa pernicioſa in excrementis pessimum est. 254 excretiones in duas differentias distinguuntur. 249 in quibus morbis & ægrotis sunt aptissimæ vacuationes. 252 largæ bonæ quomodo a malis distinguuntur. 251 pauciores statim desinentes quid prænagiunt. 255 fluxus criticus quando fit, & unde prævidetur. 232 fluxuri per uterum signa. 237 jamjam fluxuri e naribus signa. 236 immodici profluvii mali affectus: 254 *ibid.* largæ eruptiones e naribus post deliria bonæ. 53 missio epilepsiam aliquando præcavet. 110 nigri excretio, & omnium maxime in extenuatis corporibus, malæ. 254 omnes eruptiones cum desudatione malignæ sunt. 255 per hæmorrhoidas fluxuri signa. 237 238 profluvium e naribus, & paucus sudor cum refrigeratione, malum. 255 pauca excretio cum variis signis varia indicat. *ibid.* spumosi excretio quænam letalis. 302 303 sputum post quartanam febrem criticum. 302 sputum quodnam maxime timendum. *ibid.* stillæ e naribus cum extremorum refrigeratione in acutis morbis pessimæ. 73 e naribus in febribus acutis ac inflammationibus maxime damnantur. 19 in comatosis letales. 257 in omnibus morbis acutis pessimæ. 256 in quibus morbis, diuturnitatem prænuntiant, & in quibus mortem. *ibid.* quę in aliquo dierum criticorum apparent, absolutissimam perniciem ostendunt. *ibid.* quid in morbis significant. *ibid.* stillatio e naribus cum sudore frigido, & extremorum refrigeratione, letale. 257 e naribus cum surditate, aut ignavia, in Phreniticis signum est malum. 56 vacuationes largæ, non juvantes quando in acutis morbis malæ. 28
Sanguinem quicumque evomunt, si sine febre quidem salutare, si vero cum febre, malum. 250
Sapientes ægrotos in deliros, & e deliris sapientes fieri quare malum in acutis morbis. 75 si stulti videntur in morbis quando admodum pernicioſum. 58
Scabies quando in acutis morbis bona. 277
Scabie multi sæpe morbi tum acuti tum longi judicantur. 37
Scirrhus corporis causa. 124
Scorpionis ictus sævissimos morbos & symptomata concitare solet. 42
Sedimentum nigrum in urinis in acutis morbis pessimum. 294
Sedimenta crassa in urinis quid notant. 286
Senes potius intereunt ab Empyemate quam juvenes. 306
Senum corpora caloris innati inopia ac defectu omnium maxime languidissimis functionibus utuntur. 5 morbi ut plurimum sunt letales. 32
Sensus æstus & ardoris circa spinam dorsi quid indicat. 237
Sensuum externorum bona vel mala constitutio quid notat. 59
Septum transversum a quibus causis tenditur. 291 potest inflammari absque ullo apparente tumore externo. *ibid.*
Sermonis mutatio in acutis morbis delirium notat. 46
Sibili quid & unde. 64
Siccitas corporis ad prædictionem. 67 totius vel alicujus partis corporis quare sæpe infelicem morbi præsagit eventum. 75 vigiliam facit. 86
Signa letalia in morbis unde sæpe prævidentur. 6
Silentium in garrulo in acutis morbis, delirii indicium. 46 123 in insanientibus triplex observatur. 54
Singultus a vomitu plerumque exitialis, & omnium maxime in Ilei affectu. 117 ab humore inopia seu defectu. 32 ab Ileo malum. 11 aut convulsio quibus sanguis plurimus fluxit, superveniens, malum. 33 117 cum aphonia pessimus. 129 damnatur in vomitibus sinceris. 117 & oculorum rubor a vomitu, malum. 11 116 ex rigore oris ventris. 116 ex sanguinis fluxu quare malus. 110 113 exitiales unde noscuntur. 117 in acutis morbis quid. 11 in Ictericis unde. 117 in morbis acutis quando malus. 28 quando in hepatis inflammatione fit. 116 unde concitantur. 115
Sitis ex aquæ marinæ usu. 155 immoderata in acutis morbis quare perpetuo timenda. 157 inexplebilis ex viperæ esu. 155 intensa cum aliis pravis signis, pessima. 72 157 intensissima quare numquam utilis ægrotis. 155 157 158 intolerabilis cum deliriis quando per modum judicii apparet. 52 nulla cum aliis exitialibus symptomatibus in febribus pessima. 17 158 161 in quibusdam delirantibus, non letalis. 158 parva quando futuri delirii præsagium. 47 quænam in acutis morbis mala. 75 quænam optima censenda. 155 quænam pessima & exitialis. 157
Sollicitudo convulsionis siccæ causa. 108
Somnus ad sanitatem præstat. 25 ab assumtis cibis cur solet familiarius fieri. 85 comatosus unde. 89 delirium sedans, bonum, 87 diuturnus atque immoderatus quales morbos producit. 31 ebriis aliquando letalis. 90 in ægrotis delirantibus perpetuo magni est momenti. 53 in morbis acutis si non juvat, letale. 13 omnis naturalis bonus & contra. 90 pravus quomodo a bono distinguitur. 42 profundus humiditatis signum proprium. 89 pueris omnium maxime utilis. 88 quando fit. 90 qui ægrum oblædit, letalis. 86 solvit aliquando capitis dolorem. 78

Somni magni momenti ſunt ad ſalutem prænoſcendam in morbis. 42 lethargici quinam dicuntur. 88 veternoſi differentiarum cauſæ. 89
Sopor poſt vigilias aſſiduas, quando in deliriis letale. 57
Soporiferorum affectuum cauſæ. 89 90
Spaſmus cynicus quid. 106 ſi pueris fiat, quid agendum. 110
Splenis dolor quare gravis obſervatur. 76 indiſpoſitiones frigidæ ſenes ad mortem comitantur. 31
Spirationis facilitas in morbis acutis quid apud Galenum denotat. 8
Spiritus difficilis, frigidus, ſublimis, brevis cum Aphonia pernicioſus in febribus, & quare. 128 difficultas ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 58 flatulentus producit dolorem tenſivum. 76 vitalis eſt primum inſtrumentum actionis vitalis. 131 quare ſæpius ventilandus & quomodo. 132
Sputatio delirium ſæpe innoteſcere facit. 46
Sputum concretum quale eſſe debet. 189 in ſuppuratis quodnam optimum. 305 impenſe fœtidum in pleuriticis & peripneumonicis maxime malum. 299 nullum in pleuriticis & pulmoniis, ſumme eſt periculoſum. 297 quid proprie dicitur. 293
Sputa albicantia. 302 in quibus morbis utilia, in quibus vero inutilia. 297 admodum tenuia & craſſa quid præſtant. 301 302 bona, ſalutem prædicentia. 291 colore varia quare mala. 304 fœtida quare in acutis morbis perpetuo damnantur. 305 flava, ſincera, mala, omnium vero peſſima nigra. 298 in morbis quando bona, & quid denotant. 8 in tabidis & ſuppuratis quænam peſſima. 28 naturæ ſolita ſervandæ ſanitati utilia. 30 pauca quid notant. 297 purulenta a ſanguinis ſputo Phthiſin indicant. 297 quæ dolorem levant, optima. 298 quæ tuſſim ſedant, optima & contra. 299 quænam mortem, quænam ſuppurationem præmonſtrant. 298 quomodo differunt inter ſe. 296 ſincera quare perpetuo mala. 304
Status futuri ſeu vigoris morbi cognitio ſumme neceſſaria ad præſagiendum. 34 naturæ ſi conjungatur celeritati ac tarditati morborum, judicium magis certum habebitur. 38 quomodo diſtinguitur. 220
Stertor letalis quomodo diſtinguitur a non letali. 150 quando eſt unum ex letalibus ſignis. *ibid.* qui a principio morbi in dies augetur, quare pernicialis. *ibid.* quid, & quid notat in pectoris morbis laborantibus. 149 & unde. 309
Stomachus inſtrumentorum naturali potentiæ ſervientium præcipuus. 16
Stomachum conflictantes morbi graviſſimi ſunt atque difficillimi. 34
Straboſitas cum delirio criſin aliquando portendit. 51
Strepitus quid. 64
Stupor quid in morbis notat. 65 quomodo cognoſcitur a cerebro læſo. 66
Succus veneficus quomodo calorem nativum reſolvit. 71
Sudor circa frontem & cervicem letalis in acutis morbis. 150 criticus quinam dicitor. 261 exiguus cum extremis refrigeratis malignum atque pravum eſt. 19 in quibuſnam febribus proprium eſt ſymptoma. 258 periodicus quinam dicitur. 261 qualis Phrenitidem ſolvit. 52
Sudores ab omni evacuatione immoderata, mali. 267 boni & ſalutares quinam, 259 boni quando fiunt in morbis. 207 260 259 capitis frigidi in delirio peſſimi. 52 frigidi cum acuta febre mortem, cum mitiori longitudinem morbi ſignificant. 31 cum ſingultu, peſſimi. 111 in febribus cum aphonia pernicioſi. 128 in morborum principio apparentes quare mali. 261 multi non juvantes, mali ſunt. 20 optimi critici quinam. 259 260 ſæpe quarta die apparent. 260 pauci non minus quam multi malum prænuntiant. 263 quid præſagiunt in morbis. 237 quinam peſſimi. 262 ſyncopen inferentes quando in moribundis apparent. 149 unde fiunt. 258
Supercilium ſi pervertatur in febre non intermittente, debili jam exiſtente corpore, mors proxima eſt. 113
Suppuratio quomodo ex dolore circa thoracem & pulmones prævidetur. 81 unde. 304
Suppurationes luctuoſæ qualem reſpirationem producunt. 146 ſequuntur capitis dolores. 81
Suppurati moriuntur a reſpiratione intercepta. 14
Suppuratorum bona ſigna. 182
Surditas aliquando criſis indicium. 61 apparent cum urinis ſuſpenſionem habentibus elatam ac ſublimem delirium præſagit. 47 critica quomodo a ſymptomatica diſtinguitur. 62 cum extremorum refrigeratione in acutis morbis ſignum maxime pernicioſum. 73 delirii prænuntia quomodo judicatur. 63 in acuta febre poſt evacuationem apparens plerumque eſt letalis. *ibid.* in acutis & turbulentis, malum. 10 letalis eſt, quæ fit exſtincta facultate &c. 62 omnium maxime exitialis eſt, quæ fit cum prælanguidis viribus. 63 quid denotat. 61
Surditatis quædam delirii ſeu phrenitica ſigna exiſtunt. 63
Surreſtio cum delirio quando criſin portendit. 52
Symptomata ad quæ attendi oportet in morbis. 120 critica bona quænam indicant. 175 gravia criſin prænuntiantia. 36 plurima ſtabilia non ſunt, neque multum durare, & permanere conſueverunt. 23 quænam peſſima in ſingultu. 117 quænam morbos debiles præmonſtrant. 23
Syncipitis tenſio quid & unde. 228
Syncope oborta ex venenoſo humore ſtatim moriuntur. 35 vitalis facultatis debilis ſymptoma. 14
Synochi quando ſæpe quarto vel quinto die judicantur. 245
Syſtole quid ejuſque uſus. 132

T

Tabes a pure, ejuſque indicia. 124 ab anno decimo octavo uſque ad trigeſimum quintum ſolent concitari. 31 unde. 301 305
Tabe qui laborant, ſi capilli iis a capite defluunt, & alvi profluvium ſuperveniat, moriuntur. 17
Tabidi extenuati tamdiu vivunt, quamdiu per tuſſim pulmonem expurgare poſſunt. 294 ſeu Phthiſici moriuntur, qui a ſanguinis ſputo per tuſſim purulenta reddunt. 32
Tactus ſenſus deperditus quid in morbis notat, 66
Tnpiodes deſipientia unde. 50 & quid. 59
Temperamentum calidum aptiſſimum eſt ad criſes. 219
Tempora diverſa in ægrotis eodem tempore obſervantur. 36
Temporum gravitas ſanguinis e naribus erupturi ſignum in febribus. 78
Teneſmi producuntur conſtitutione anni borealis 34

Tenſio quid notat. 237
Tertiana ſalutares æſtate maxima ex parte vagantur. 23
Teſtes & pudenda ſi revelluntur, dolor vehemens vel mors. 112
Tetanus affectus acutiſſimus, ſæpiuſque cito interficiens. 109 ſi in dies protrahitur, de ſalute ſperandum eſt. *ibid.*
Tinnitus aurium in acutis febribus delirii indicium. 47 183
Tonſillarum inflammationi Angina ſuccedens, malum. 33
Torpor cum ſurditate, in qua ſtillæ ſanguinis e naribus, exitioſus. 125 ex angina citrà judicium quid. *ibid.* ex inflammatione interna quando pernicioſus. *ibid.* in febribus continuis perpetuo malus. *ibid.* qualis affectus & quotuplex & unde. 66
Torpores & perfrictiones apoplecticis pravum indicant. 125
Tremor a vermibus. 100 cum delirio criſin aliquando portendit. 52 ex virium infirmitate. 101 in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57 in febribus ſæpe ab exuſta bile. 50 in phrenitide peſſimum ſymptoma. 28 pro rigore ab Hippocrate non acceptus fuit. 100 qualis affectus. 100 unde producitur. 101
Tremoris letalis exemplum. 102
Tremores a ſiccatis nervis in phreniticis mortales. 103 cum aphonia pernicioſi in febribus. 128 exitiales a vigiliis aſſiduis. 42 in acutis morbis quid ſignificant. 10 12 in convulſiones deſinentes letaliſſimi, 112 in phrenitide, quinam in primis letales. 103 non uti convulſiones Phreniticorum proprii, & quibuſnam tantum ſuperveniunt. 55 nulli, exceptis decretoriis, boni exiſtunt. 56 quando apoplexie ſignum eſſe ſolent. 102 quando in acutis morbis peſſimi. 27 quid ad præſagium. 100 quinam letales. 104
Tremorum prognoſis. 101
Trementes & comatoſi quinam pereunt. 128
Triſmi quid. 64
Tubercula ſi fiant in longis febribus bona. 79
Tumor durus ac dolens in utroque Hypocondrio aut in dextro eſt peſſimus. 292 faciei in acutis morbis ortus quomodo ſæpe diſcutitur. 164 partium neque in acutis, neque multo minus in diuturnis morbis, perpetuo malus. *ibid.*
Tumores diu perſiſtentes critici, in partibus ignobilibus oborti ſalutem aliquando demonſtrant. 194 glandularum quinam boni & mali in acutis morbis. juxta aures in morbis longis, pravi. 195 quinam mali. 176 312
Turbationes vehementes & agitationes criſin ſæpe prænuntiant. 36
Tuſſis in morbis pectoris & pulmonum ſputi futuri ſignum. 243 magna, ſiccà, ſine ſputis morbum cruditiſſimum ſignificat. 21
Tuſſes quando fiunt. 207
Tuſſibus in primis obnoxii ſenes. 31
Tuſſiendi cupiditas in tabe. 124
Typhodes Græcis quænam febres dictæ. 27
Typhomania fit in principio morbi & perſeverat diu. 50 quid. 50 89 & unde. *ibid.*

V

Vacuationes bonæ vel malæ unde dignoſcuntur. 52 in febribus tertianis, quænam criticæ. 218 immodicæ quomodo convulſiones & ſingultum producunt. 107 115 quæ juvare deberent, & non juvant, ſed lædunt, letales exiſtunt. 63
Vacuationum naturalium & conſuetarum interceptarum pravi effectus. 30
Varices ſupervenientes quibus utiles. 253
Variolæ in peſte erumpentes ante coctionem magis utiles quam inutiles. 202 harum progaoſis unde petenda. 314
Venarum agitatio in ſomnis ſuperveniens rigoribus mala. 121 micatio pulſus, ſignum futuræ hæmorrhagiæ. 235
Venus immoderata tremoris cauſa. 31 101 102
Ver morbos ſaluberrimos, minime exitioſos parit. 24 30
Veſica graviter læſa homines continuo pereunt. 38 quando inflationis ſenſum habet, quid ſignificat. 240
Veſica ulceratio quomodo ex urinis noſcitur. 382
Veternum a Phrenitide eſt morbus exitioſiſſimus. 91 quid. 89 ſi Phreniticis ſuccedat, malum. 33
Victus ratio quid ad morbos vel ſanitatem. 25
Vigiles ſi evadant ægri ab evacuationibus, letaliter ſe habent. 63
Vigilia cum extremorum refrigeratione maxime pernicioſum ſignum. 73 in acutis morbis cum convulſione peſſima. 68 in morbis acutis cum ſignis coctionis criſin ſignificat. 85 inculpata eſſe non poteſt in morbo letali. 84 quænam bona judicanda. *ibid.* quid in morbis præſagit. 85
Vigilia aſſiduæ in febribus ardentibus quare convulſiones letales accerſunt. 85 quomodo convulſiones producunt. 107 112 criſin ſæpe prænuntiant. 36 cum delirio apparentes aliquando futurum judicium prædicant. 52 in febribus ardentibus unde. 85 in rigoribus malæ. 121 perpetuæ in phrenitide peſſimæ. 27 quæ ſalutem præſagiunt. 85 quænam certum exitium denotant. 86
Vigor ſeu ſtatus in morituris quinam. 37
Vini immoderatus potus ſumme pernicioſos morbos producere poteſt. 30 potio qualem appetentiam ſolvit. 154
Vires naturæ Medici quid appellant. 7 robuſtæ & validæ in pernicioſis morbis imperfectas multas, & pernicioſas criſes futuras indicant. 226
Virium imbecillitas, primum & maximum in morbis mortalibus ſignum; quod mors ſine criſi ſit ſubſecutura. 214 infirmitas coma producit & quomodo noſcitur. 89
Viſceris alicujus interni magna phlegmone producitur anxietas. 98
Viſcera natura primum curat, & maxime cor. 4 quomodo afficiuntur ab uſu aquarum corruptarum. 30
Viſcerum inflammatio unde noſcitur. 191 phlegmonum ſuppuratorum rari ſunt, qui ſanantur. 69
Viſio impedita in deliriis ſumme pernicioſum. 57 in acutis morbis læſa quid. 15 tenebricoſa quid in morbis notat. 60 61
Viſus hebes hæmorrhagiam prænuntiat. 236
Vita quid eſt. 94 131
Vita ſtatus, qualis ſit futurus, unde intelligitur. 131
Vitalis actionis inſtrumenta, quænam. 131 facultas unde infirma redditur. *ibid.* facultatis actiones debiles quomodo cognoſcuntur. 14 facultatis cognitio quantum ad prognoſticum in morbis neceſſaria. 131
Vomica eruptionis ſymptomaticæ & criticæ ſigna. 307 ruptio intra quodnam temporis intervallum fit. *ibid.*

Vomitu livida, & graveoleat, ocyſſimam mortem indicat. 271 pituitæ & æruginoſi humoris in renum doloribus bona. 268
Vomitiones fœtidæ malæ & graveolentes peſſimæ. 271 omnes bonæ, ſi per has humores morborum cauſæ probe expurgentur. 268 quænam exitiales in morbis acutis. 272 ſinceræ atque implacidæ, malæ. 100. virulentæ in vehementibus deſipientiis letales. 55
Vomitus æruginoſi a malis & exitialibus ſignis letales. 270 ſeu virulenti ſoli vel cum aliis ſignis conſpecti in febre acuta, delirii ſunt indicia. 48 aliquando aphoniam tollit. 128 biliosus in muliere biliosa, cui menſes imminuti, bonus. 269 boni & mali quid præſagiunt. 267 exitioſi, mortem præmonſtrantes. 270 futuri quomodo prævidentur. 61 102 humorum omnium colorum, exitiale admodum eſt. 26 in principio acutorum morborum copioſi, ſymptomaticique vocati, mali ſunt. 19 in Ileo pernicioſiſſimi. 272 in morbis quando boni, & quid denotant. 8 omnes morbum allevantes in morbis acutis boni. 270 pauci mali & quando letales. *ibid.* quales convulſiones tollit. 111 qui abſque perfectæ coctionis ſignis fiunt, multas recidivas prædicant. 269 quid in morbis præſagiunt. 268 271 ſymptomaticus & criticus quinam. *ibid.* virulenti biliosi quid in morbis acutis ſæpe indicant. 74
Vomituum exitialium natura unde innoteſcit. 270
Vox acuta, clangoſa, mala eſt. 126 127 cum hypochondriis introtractis pernicioſum. 127 & lugubris, & oculorum obſcuratio, convulſiones accerſunt. *ibid.* clangoſa & plorabunda quando peſſima. 126 127 vel obtremiſcens in acutis morbis delirii indicium. 47 effracta quænam dicitur. 127 quibus in febre interceptra ſine judicatione, cum tremore moriuntur. 128 vitiata quænam dicitur. 126
Vocis defectio cum horrore mala. 124 imminuta ſymptomata. 126 interceptio a cerebro vulnerato. 130 quid præſagit in morbis. 126
Vultus pallidus quando exitialis. 166
Urina aquoſa, alba, & lucida in phreniticis, mala. 56 aquoſa in pueris deterrima. 289 multam ſubſidentiam habens, ſolvit deliria. 52 multum vitrea, & genituræ ſimilis convulſiones juvat. 112 nigra quando periculoſa. 292 nigra, rufa tenui exitioſior. *idid.* optima quænam. 198 286 quantum facit ad prædicendi methodum. 52 53 quid ſit & quomodo fiat. 379 rufa & biliosa quid notat. 287 ſuppreſſa brevi homines perdit. 31
Urina albæ craſſæ quid notant. 54 55 albæ, lucidæ delirium ſignificant. 48 æquales & inæquales quænam dicuntur, & quid notant. 285 aquoſæ, albæ, lucidæ, in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 58 282 ſalutem vel mortem prænuntiantes. 286 289 color ſeu ardor, aut pruritus quando percipitur. 241 claræ, quæ protinus turbantur, utiles exiſtunt. 288 coctæ perpetuo bonæ in febribus. 200 copioſæ in Aphonia. 127 craſſæ in morbi principio apparentes quid notant. 282 289 duobus modis ſalutem & mortem in egrotis ſolent indicare. 286 excretio in non admonitis, pernicioſa. 56 295 hypoſtaſis quid notat. 285 & quænam. 279 281 materia triplex. 279 nigræ cum larga, aut narium ſanguinis eruptione menſium copia, non ſunt timendæ, 288 cum nigro ſedimento in febribus ardentibus peſſimæ. 22 craſſæ non reſidentes ceteris exitialiores. 291 nigræ in aquoſas verſæ letales ſunt. 292 nigræ maleolentes exitiales ſunt. *ibid.* nigræ unde. 283 nubes, vel nubeculæ quænam vocantur. 281 oleoſæ poſt nigras ſunt peſſimæ. 282 283 292 pingues quænam. 282 283 prævulſæ cum ſublimi delirium teſtantur. 46 purulentæ quales. 226 quæ non reſident, ſi vires adfuerint, longum fore morbum oſtendunt. 18 quæ multum contentum habent, quando malæ exiſtunt. 293 quænam coctionis ſigna præ ſe ferunt. 209 quænam delirium indicant. 47 quænam ex coloribus judicantur bonæ. 280 quænam ex coloribus judicantur peſſimæ. 291 quænam in die decretorio apparentes, criſin ſalutarem indicant. 289 quænam optimæ in temperatis corporibus. 287 quales apparent in febribus putridis. 141 quales & quando pernicioſæ in acutis morbis. 28 quales in Ictericia critica. 168 quales in mulieribus. 287 quales in Phreniticis peſſimæ. 28 quid in morbis præſagiunt. 279 rubræ & ſubrubræ unde fiunt & quid indicant. 282 ſalutares unde aliquando apparent in moribundis. 200 ſi mingantur in non recordantibus delirium indicant. 46 ſubjugales quænam & unde. 284 ſuppreſſio cum delirio quando criſin portendit. 52 tenues cum bono colore bonæ exiſtunt, & quid indicant. 288 tenues in febribus quid notent. 280 281 turbidæ quales. 281 284 virides unde. 281 unde non raro in febribus evidentibus prorſus retinentur. *ibidem.*
Urinarum colorum cauſæ quænam. *ibid.* concoctio in febribus acutis erit attendenda. 200 differentiæ unde habentur. 280 variorum contentorum cauſæ. 285
Urinis quinam morbis judicantur. 220 235 240 279
Uterus a menſtruis ſuppreſſis vel nimis fluentibus quænam mala pati poteſt. 31 læſus quomodo convulſionem concitat. 108
Uteri inflammatione laborantes, mente conſtare optimum. 45 morbi a menſtruis ſuppreſſis. 31 tumor durus ex ſuppreſſis vel nimis fluentibus menſtruis. *ibid.*
Utero affecto ſi ſanguis e naribus effluat, & non ex utero, malum. 225

FINIS.