

**Iter Helveticum anni MDCCXXXVIII et iter Hercynicum anni MDCCXXXVIII /
[Albrecht von Haller].**

Contributors

Haller, Albrecht von, 1708-1777.

Publication/Creation

Gottingae : Sumtu Reg. Univers. Offic. Liberariae, 1740.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bd46ynua>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



62569/B

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

HALLER, A. von

U6

G. K. 16

MEDICAL
SOCIETY OF
LONDON.

ALBERTI HALLER.

M. & PH. D.

ARCHIATRI REG. ET ELECTOR.
MED. ANAT. BOTAN. ET CHIR.

IN ACAD. GEORG AUG.

P. P. O.

SOC. REG. ANGL. ET SUEC. SOD.

ITER HELVETICVM

ANNI MDCCXXXVIII.

ET

ITER HERCYNICVM

ANNI MDCCXXXVIII.



GOTTINGÆ

SUMTV REG. VNIVERS, OFFIC. LIBERARIAE.

1740.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
M V O I T H V U S H I D A T I

M V O I T H V U S H I D A T I

1600

VIRO
GRAVISSIMO SAPIENTISSIMO
AVGVSTO JOHANNI
de HVGO.
ARCHIATRO REGIO ET ELECTORALI
SOC. REG. LOND. SOCIO
S. P. D.
ALBERTVS HALLER.

СМУ

САДЫБИЧЕВСКИЙ

МАНОЛ ОГРЕНЬКА

СТРИЖ

САДЫБИЧЕВСКИЙ

САДЫБИЧЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДР

Quantis me beneficiis adfeceris VIR
ILLVSTRIS, neque modestia Tua
permittit ut enumerem, neque
destinata hujus adloquii brevitas. Id
unum excito, quod cum hac mea
opera proprius conjungitur, Te nem-
pe thesauros Tuos Botanicos uberri-
mos omnes mecum communicasse,
rarissimas demum & desideratas stirpes
quam plurimas donasse, & cum stir-
pibus pulcherrimorum librorum fecis-
se participem, quibus instructior & hanc
dissertationem, & majores meos labo-

res felicius perficere potui. Quem
ergo multis adjuvisti modis, eum li-
bellum comis accipe, & homini fave,
qui Tuas virtutes gnarus veneratur.
Ex Georgia Augusta die 31. Octo-
bris 1739.

LECTV-

LECTVRIS S.

Tota æstate anni 1739. abfui, neque ullo munerum meorum defunctus, non mediocriter adfectus sum, quod Academiæ, cui totum me debeo, nihil omnino præstitissim officii.

Supererat, ut aliquam temporis, quod perierat, rationem redderem. Id hoc libello feci, quo ea continentur, quæ in itinere meo præcipua observavi, plantæ nempe in Alpibus, in Jura monte, & in Emmia valle collectæ, quarum aliquæ novæ sunt, aliæ neque novæ neque obscuræ, sed pulchræ tamen & rariores inventu.

Libelli exiguitas minus decora visa est Bibliopolæ. Ergo addidit alterius itineris descri-
ptio-

ptionem, quod anno 1738. in Bruderum M.
susceperam, similis argumenti, etiam ideo ido-
neum nupero itineri socium, quod ex utrius-
que collatione floram Helveticam cum Hercy-
nica utcunque comparare liceat.

Supersunt multa hujus generis itinera, sed
ea maturiores curas exspectabunt. Dabam in
Georgia Augusta die 31. Octobr. 1739.



§. I.

Quando eo vere, quod proxime elapsum est, ad patriam urbem iter feci, nondum adultum ver erat, & nimbofa hyems plantas, etiamsi floruissent, legi vetabat. *Bernae* me alia, & quæ mihi quidem majori momenti essent, detinuerunt. Non potui, tamen ferre aspectum eorum montium, qui patriam urbem coronant, absque dulci desiderio stirpium, quas in iis toties, innocentissima voluptate perfusus, junior legeram. Eripui me quantum licuit, urbanioribus negotiis, & quam primum humiliores montes nix deseruit, ad eos raptim iter feci. Ergo colles illos, si cum alpibus conferas, ipsis *Jurae* culminibus humiliores, qui ultimam *Emmiam* vallem a *Lucernensium* ditione separant, nondum visos, & ipsa novitate gratiosos, adii die IX. Junij: comite amico optimo, & amantissimo bonarum litterarum NICOLAO EMANUELE GATSCET, ad cuius avita & laxissima pascua, praecipuum iter nostrum fuit.

§. II.

Circá Bernam passim sylvas abiegnas praeterivimus, muscolasque atque cayas semitas, amatas muscorum sedes,

A

hy-

hybernos olim labores , nunc steriles , & aestivo sole ex-
ustas. Neque montosa illa regio , quam communi no-
mine *Wislen* vocant, plantarum quidem feracitate se com-
mendavit, animum vero mirifice recreavit dulci imagine
felicitatis, quae a libertate nascitur. Latifundia cultissima
omnes eos colles occupant, quos rustici homines , omni
stipendio , omni imperio (nisi legum) liberi , laeti , divi-
tes , & , si hominibus ea fors potest contingere, felices ha-
bitant. Solitudines avias , & anfractus reductarum vallium,
perstreput purissimi rivi , frequentant armentorum opi-
mi greges , exhilarant sparsa tuguria , omni commeatu ,
& rusticae vitae commodis ditissima.

§ III.

Poeticum plane iter hoc fuit , herbae enim vulgares
omnino erant, & ubique obviae. Trans eos colles *Emmam*,
auriferum fluvium superavimus. In ejus arenosis syrti-
bus , ad ipsum insulae caput , quod adfluentes aquas
primum excipit , solent accolae aurum arenis permistum
legere. Neque prius cum quaestu lavantur *Arolae* are-
nae , licet ubique aureis micis avariciam hominum invi-
tent , quam postquam *Emma* aquas suas immisit *Arolae*.
Sed & ipsa *Emma*, non ab ultimis fontibus aurifera est ,
debetque praecipuas divitias torrenti cui *Goldbach* no-
men est , de cuius uberrimo metallo fabulae potius
quam historiae passim narrantur. Id mirum videri po-
terit , plerosque Helvetiae flurios aureas arenas miculas-
que vehere , aurea metalla tamen nullibi certa fide repe-
riri. Certe *Rhenus* ad ipsos Batavos , (a) ad Gallos *Rho-*
danus,

a) Novam aurifodinam in arenosis montibus Bataviae ostendebat olim ORDINIBUS FOEDERATIS Joachimus BECHER. Et ex-

danus b), glebulas aureas de fert, quas Helvetiae debent. In *Arola ad Aarwangen*, & in commitatu *Badensi*, ubi vadoseae arenosaeque insulae frequentiore sunt (*bey der Stille*), non absque quaestu lavantur arenae; & conflatas ex iis massas purissimi auri, percussos nummos videre, id apud nos non rarum est.

§. IV.

Parum laetus his divitiis, qui omne desiderium posueram in thesauris valde minus invidiosis, suavissimis nempe plantulis, per vallem *Emmiam*, ad ductum illabentis fluvioli *die grune*, inter laetissima praedia, beataque mapalia hominum ultra sortem suam divitium, perveni ad sedem Praefecti *Sumiswald* ubi majores paulatim montes vallem constringere, & altius herbosa culmina erigere incipiunt. Omnes enim hujus tractus montes, absque rupium tristi horrore, absque praecipitum scopulorum metu, ex sola laetissima gleba, & confusis collium vertilium acervis congeruntur. Inter eos montes, est M. ARNI, satis apud vicinos celebris uberrimo lactis proventu & caseorum immensa mole, antiquissima familiae GATCHETIAE possessio. Is itineris no-

A 2

stri

experimentum, si non sufficiebat sumtibus, nobis tamen sufficit.

b) Vide de ejus arenis crystallinis, gemmeisque, quales omnino sunt arenae *Arolae*, cultissimum virum REAUMUR *Comment. Acad. Paris.* 1718. Crystalli moles immensae ad fontes *Arolae* nuper repertae sunt, & glebam 695 librarum ipse vidi omnium, quas vel voto mortales adtigerunt, maximam. An similes ibi gemmarum, aurique venae, quarum minuta ramenta flumen avehit? de Rubineis certe verum est, & smaragdinis aliisque fluoribus SCHEUCHZER *Jt. IV.* p. 241. 242. Sed nihil in hisce spei est avaritiae nostrae, molles enim sunt & plebeiae, neque supra crystallorum classem.

stri prima die terminus fuit , post quam per collis satis arduos , deinde per montosam planiciem , silentesque sylvas , jam solis abietibus umbrosas , per sesquihoram adscenderamus.

§. V.

Stirpium Alpinarum prima nos salutavit *Bellis media*, frequens in *Helvetia* c), etiam planiori, locis umbrosis , & in sylvarum uividis recessibus. Ejus figuram adeo exquisitam dederat *GESNERUS* d), adeo conspicuam charactere suo, ut fere adcsare liceat *TOURNEFORTIUM* e), & multo quidem severius *VAILLANTIUM* f), quod contra suas leges, pappiferam plantam immiscuerint stirpibus , quibus solida sunt, nudaque semina. Sed ingrati fuerit viros , qui tanta praestiterint , ideo culpare, quod non praestiterint omnia. Et ea quidem mente vollo ut sciant letores me scripsisse perpetuo, quoties ab his & ab aliis doctis viris dissenserо, ut ignorationem aliquam , imo evrorem , aut plusculos lapsus , nolim vel minimam partem demere earum laudum , quas grati ipsis decernimus, siue eos mors extra invidiae metum posuerit, siue nunc quoque laboribus suis de nobis bene mereantur. Nemo me certe , si recte me novi , melius cupit iis, per quos profecerit. Verum ad *Bellidem nostram* redeo. Non pe-

c) Bernae in *Eymatten* supra stagnum. Circa *Augustam Rauracorum* Sc.

d) In *compendio Matthioli CAMERARIANO* p. 654.

e) *Bellis sylvestris media caule carens* I. R. H. p. 494.

f) Cui est *Bellis media nudicaulis non ramosa*. *Comment. Acad. Reg. se. Paris. 1720.* p. 358. Nam is quidem censor perpetuus *TOURNEFORTI* , nullam errorum suorum impunitatem sperare poterat, in classe , quam sibi selegerat submovendam penitus ex imis sedibus , novasque ad leges ordinandam.

penitus certum est , num VAILLANTIUS nostram viderit , quando *Bellidem monanthon autumnalem* g) RAI addidit *Tussilaginibus* , quod & papposa esset , & scapo unifloro . Nam in eo ipso opere , in quo sedulo elaboravit PONTEDEERA h) , *Bellidem eamdem RAI* , nudo semine describit , ut omittam quod nostra verna sit omnino . Ut verum fatear tamen videtur , & RAIUS i) & VAILLANTIUS k) , de nostra dixisse . MICHELIIUS l) denique , vero charactere *Bellidis mediae cognito* , novum genus ipsi creavit *Bellidastri* m) , felici connubio certe nominis ex *Astere* , cuius characterem habet , & *Bellide* cuius faciem refert , cuiusque nomen gesserat antiquitus . Mihi enim nihil videtur intercedere , quin *Aster* dicatur , isque *caule nudo uniflorus* . Namque flos , qui amicissimo LINNAEO n) calyce visus est differre ab Astere , is equidem , & squamis & pappo seminum rufo , proxime accedit ad *Asteres* illos Alpinos , quibus ipsis *Bellidis* folia sunt , licet caulem non gerant aphyllon , & per hos intermedios *Asteres* , cum *coeruleo acri* , multisque omni-

A 3

no

g) *Caule nudo tenui praelongo flore albo rubente Histor. III.*

p. 221.

h) In plantis flore composito . vid. *Dissert.* p. 277.

i) Ob summam similitudinem descriptionis , & quod vix fieri possit , ut , plantam adeo vulgarem , ignoraverit perpetuo , nostra enim & altior est , & folia quam vulgaris majora habet , & pappum in semine .

k) Cui est , *Tussilago Bellidis folio I. c. 375.*l) *Nov. plant. gen. p. 32. Tom. 29.*m) *Bellidastrum alpinum foliis brevioribus hirsutis caule palmarie flore alba.*n) Nempe eam praecipue ob notam , quod calyx esset squamis nonnisi dupli ordine ad basin usque scissis , videtur eam addidisse *Doronicis* , nomenque fecisse *Doronicum caule nudo simplici unifloro Hort. Cliffort.* p. 500 . REYEN *Flor. Bat.* p. 160.

no speciebus conjungitur , quibus omnibus non plurimorum ordinum squamae sunt. Caeterum , ut nondum dimittam stirpem nostram , facit synonymorum obscuritas. Nempé & MENZELIUS o) nostram videtur non uno p) novo nomine proposuisse ; & dubium esse potest , num ea *Bellis media* , quam pictam a MATTHIOLO q) pene omnes Botanici receperunt , omnino sit a vulgari minore diversa. Certe MATTHIOLUS r) *medium* suam non alpibus , aut editis umbrosisque locis , sed pratis tribuit indigenam , & *hortensi* opponit *spontaneam*. Nihilque a MATTHIOLO discrepant LOBELIUS s) DODONAEUS t), LUGDUNENSIS HISTORIA u) TABERNAEMONTANUS v) aliique veterum. BAUINI x) certo nostram plantam descri-

- o) *Bellis caule bipedali nuda*, *foliis magnis latis*, *floribus rubris* & *albis* (uti & nostra solet *Alpina*) Pugill. Tab. 8. Quam VAILLANTIUS habet l. c. p. 358. & MORISON III. p. 30. & RARIUS in hist. plant. p. 349. & TOURNEFORTIUS in I. R. H. & TILIUS, *hort. pisani*. p. 22. de quo dudum miror, qua felicitate in horto suo pene omnes ex ordine TOURNEFORTII plantas alere potuerit , & eas saepé , quas ego satis certe novi, nunquam distinctas existisse.
- p) *Bellis foliis parvis floribus albis alpina* MENZEL. Pug. Plant. rar. T. 8. vix videtur differre.
- q) In Dioscorid. cum magn. fig. p. 911.
- r) In iconibus nempé p. 478. quae ad DODONAEANAM facta est. In adversariis vero videtur nostram indicare , siquidem eam PENNIO tribuit in sylvolis Germaniae lectam p. 199.
- s) Icon enim *Bellidis sylvestris* ex MATTHIOLO exscripta est.
- t) p. 264. *Pemptadum*.
- u) p. 854. ex MATTHIOLO, eodem etiam nomine.
- v) eodem nomine 329.
- x) IOHANNES quidem iconē usus est GESNERIANA III. p. 1. p. II4. CASPARVS verò & locum natalem indicavit , & in herbario vivo veram stirpem habuit.

scripserunt, de recentioribus, & ipso TOURNEFORTIO y), dubitari potest. Unicum addo, ex argumento calycis villosi omnino videri ad nostram pertinere *Bellidem*, quam novo nomine dicit SCHEUCHZERUS z), *alpinam minorem sylvestri minori similem*. Est autem hoc genus *Bellidis*, *Asterisve*, foliis *Bellidis* vulgatissimae majoribus, scapo altiori dodrantali & pedali, flore majore, & calyce aperto magis hirsutulo ex bina serie squamarum ad basin sectarum virentium factus, semine, uti dictum est, papigero, tum in semiflosculis, tum in disco.

§. VI.

Altera die, operibus primum lactariis adfuiimus, atque ex mensuris lactis opimi quadringentis, quae paulo plus quam duodecies centena pondo efficiunt, unum casuum conpingere vidimus librarum fere octoginta. Solent etiam maiores fingere, quando gramen adultius est. Atque eam lactis copiam ferē septuaginta vaccae suppeditant quotidie. Opima verō ejus lactis pinguedo his in montibus debetur fere unice *Alchimillae vulgari*, in editioribus pascuis *Plantagini angustifoliae*, & in editissimis *Muttellinae*, stirpibus adeo, quae blando cum morsū adstringunt.

§. VII.

Inde per anfractus montium in altiora cacumina divagatus, stirpes quaesivi, sed eas paucas certe inveni, cum anni praecox tempus esset, & hi montes in universum alpinum ingenium non satis exprimant, qui hortorum etiam frugumque non omnino expertes sunt. *Gentiana* qui-

y) vide notam c.

z) It. VI. p. 453. neque alia est *Bellis sylvestris minor*. It. V. p. 424.

quidem *Asilepiadis* folio uberrima ubique adfuit, sed flores nondum ostentavit, quos Augusto mense demum expandit. Ea planta, si quidem GESNERUS a) noster civis mei ARETII nomini eam consecrasset, uti constituerat animo, fuisset ex antiquissimis, quae Botanicorum nomen gerunt. Sed & ubique obvium *Geum rotundifolium majus*, per sylvas humentesque scrobes, cornubus ovarii modo ad se mutuo conversis, modo per aetatem divaricatis, punctis rubris per petala in tres lineas dispositis, calyce ex ambitu imi ovarii exeunte Deinde *Valeriana* copiose apparuit in editioribus, cuius historiam extricare, atque optimorum scriptorum sententias faciliores reddere explicando, id quidem & necessarium visum est, & difficile.

§. VII.

Duas nempé *Valerianas* communius alunt Alpes nostrae, licet neque *Celtica Spica* b) careant: sed has quidem frequentius. Et altera quidem in Alpibus ubique frequens, in *Jura* Monte mihi nondum visa est, eaque quam

a) *Epistolar.* p. 120. b. Admodum placebat optimo viro id institutum, quo stirpes, grato quasi animo motae, certam immortalitatem reddunt iis, per quos innotuerunt, conf. epist. p. 73. & p. 42. ubi *Adolphiam*, aut *Oconiam*, & *Achilleam* (pro GASSERO suo) serio offert amicis. VAILLANTIUS idem secutus consilium, mutavit in posterioribus operibus, quod nihil veri nexus esset inter stirpes & nomina clarorum virorum. Neque tamen placet, quod ejecto verissimi amici nomine, BOERHAAVIAM voce sesquipedali dixerit *Antanisophyllum*. Nam & nomina ficta ad similitudines raro effugiunt ambiguitatem, & malé poenitentis videtur, auferre quod dederat.

b) Quam nomine *Waldschiben* enumerat inter plantas *Nesti*, civis noster ARETIUS, p. 235.

quam nunc in M. *Hengst* decerpsumus, perenni, odorata, lignosa radice repit, alba quidem, sed fusco cortice. *Folia* ex radice profert ex longis pediculis, tenera, glabra, vi- rentia, acuto mucrone, acute ferratis oris, non dissecta tamen. Verum ad caulem, quales plures ex una radice pedales, & cubitales fistulosi eriguntur, perpetuo una conjugatio media est foliorum duorum, sed ternatorum, quorum medium latius est, bina acuminata subjacent, similia medio sed minora. In *Umbella* nihil novum invenio, nam & tripartita procedit divisio, & flosculi odorati, infundibuli forma, in umbellam congregantur, & terna *stamina* alba ex tubo floris proveniunt. *Tuba* bicornis in *semine*, cuius contorta corona per aetatem plumosos radios explicat. Praecipuam notam dant folia ad caulem perpetuo terna, nunquam aut pinnata ut in vulgari, aut integra, ut in ea de qua proxime dicemus, §. VIII. Haec *Valerianae* species variis nominibus innotuit variis Botanicis, neque semper eadem cum ubertate notarum. Et *Phu* quidem *saxatile* GESNERI c) hoc referto, quod in Alpibus legerit, ubi aliqua quidem est *Scrophulariae* folio *Valeriana*, sed rarer d). Deinde CLUSII *Valeriana sylvestris* *alpina* I. *latifolia* e) cum nostra eadem videtur, cum folia ad caulem in duas tresve crenas dissecta describat. A CLV- SIO ad CASPARVM BAVHINVM neminem invenio, qui ejus mentionem fecerit. Is autem stirpem nostram egregie cogniti-

c) *Hort. Germ.* p. 272, tab. collect. p. 96. *Petracum* vero dicit in append. ad *Hort. German.* p. 295.

d) In Rhaetia legit D. HUBER, ego vero in M. *Obergurnigel*. sed in *Jura* M. frequentissima est (xxviii)

e) *Histor. stirp. rarer.* LV. cum icone, quæ divisionem foliorum ad caulem non satis exprimit. In *Pannonicis* vocat *Alpinam* I. p. 512. figuram vero non addit.

cognitam habuit, foliorum ad caulem binas alas esse sollicite monuit, iconem etiam dedit, quo id exprimeretur f). In eo, ut saepe solet, non prospexit nobis, quod CLUSIANAM plantam g), proprio nomine a sua sejunxerit, quae adeo certo erat eadem. Ab eo tempore nihil novae lucis accessit. CLUSIANAM plantam repetierunt JOHANNES BAVHINVS, h) sibi etiam visam, PARKINSONVS i), RAIUS k). Nomen aut CLUSII aut CASPARI dederunt AMBROSINVS l), MORISONUS m), TOVRNEFORTIVS n), MAGNOLIVS o), PLVKNETIVS p), TITA q), SCHEVCHZERVS r), VAILLANTIVS, s) ita

- f) *Valerianam montanam primam* dixit in *Phytopinace* p. 292. *alpinam primam* in *Prodromo* p. 86. & *Pinace*. *Synonymum nullum addidit*. Legerat autem in m. *Wasserfall. Cat. plant Baf.* p. 50.
- g) Eam enim dixit *Valerianam alpinam alteram* in *Pinace*, nam in *Phytopinace* idem nomen dat illi *folio scrophulariae*.
- h) Dixit *Valerianam alpinam*, III. p. 208. neque *Fratris novam cognitam habuit*, *descriptam pridem in Phytopinace*. Ex eo CHABRAEVIS p. 411. Icon autem melior est CLUSIANA.
- i) In *descriptione major* sive *latifolia* est p. 120. in *icone minor* id p. 121. *Icones enim mutatae sunt*.
- k) *Descriptio cum nomine Alpinae Hist.* p. 390. bona est, neque tamen potuit homonymiam extricare, cum ad CLUSIANAM etiam eam voluerit referre, quae est *scrophulariae folio*. Solennis asteriscus indicat, quod *hanc* quidem, non viderit. Nostram in M. *saléve* legerat. vid. *Syll. plant. extra Brit. nasc.* p. 258.
- l) Merus, ut solet, nomenclator. *Phytograph.* p. 554. Usus vero est nomine CLUSII.
- m) *Hort. Bles.* p. 214. & *Hist. Oxon.* III. p. 112. eodem nomine: in *Umbelliferis* vero p. 51. solam habet CLUSIANAM, quam vocat *Nardum montanam alteram* & XI. loco ponit. *Primam CASPARI utrobique omittit*.
- n) *Valeriana alpina prima*, ex CASPARO *Schol. Bot.* p. 153. & I. R. H. Solam excitavit BAVHINI stirpem.
- o) Eodem nomine H. R. M. 201. & in *Char. plant.* p. 149.
- p) *Almagest.* p. 380. eodem nomine.
- q) *Hort. Maurocen.* p. 178. & in *Itinere*, ubi *alpestrem prima m* dicit.

s); ita ut eorum nemo moneat nihil a CLVSIANA stirpe differre BAVHINIANAM, utramque etiam distinctis nominibus & TOVRNEFORTIVS t), & TITA u) expreſſerint. Neque ta- men fieri poterat, ut lateret penitus Botanicos stirps adeo non rara. Ergo pro nova planta descripta est a BARRELIE- RIO w), qui cum nomine *alpinae saxatilis minoris flore albo* egregiam dedit iconem, licet ei nomen addiderit *Scrophula- riae folio* EDITOR, hic certe non felix. Sed & *Val. alpina mi- nor planta palmaris* PLVKNETII x), & ejusdem *Valeriana minima planta ut plurimum uncialis* y) manifesto ad nostram pertinent, quod & VAILLANTIVS perspicax intellexit. De MENZELIANA z) & CAESALPINIANA aa) & LOBELIANA bb) stirpe non ita certo comſtat. Reliqua ſynonyma hujus capi- tis, niſi fallor, omnia pertinent ad hanc nostram *Valeria- nam, foliis ad caulem tripteris.*

§. VIII.

Alia est, & haud paulo obſcurior, *Valerianae* ſpecies, cui radices fuscae, lignosae, repentes, plerumque inodoraе.

Cau-

- r) *Valeriana alpina* Jt. I. p. 51. cum certa deſcriptione noſtræ.
- f) Eodem nomine C. B. Comm. Acad. Paris. 1722. p. 252.
- t) Qui CLVSIANÆ peculiare nomen dedit, poſt CASPARIUM, Va-lerianæ alpinae alterius.
- u) Hort. Maurocen. l. c.
- w) ic. 742.
- x) Almag. p. 380. & Phytopraph. T. 231. f. 7.
- y) Almag. ib. & Phytopogr. ib. f. 8. Nomen repetit RAMS hiflor. plant. III. p. 242.
- z) *Valeriana saxatilis foliis Trachelii in pug.* nomen utique nostram videtur exprimere.
- aa) *Valeriana inodora* I. L. IV. c. 5. conjectura eſt utriusque BAU- HINI. Noſtra odora eſt, ſed reliqua conveniunt.
- bb) *Valeriana montana Peliterii.* Illustr. Stirp. p. 145. Deſcriptio non recedit.

Cæules, praeter umbellam, non ramosi, ex una radice saepe plures, erecti, pedales, & ultra. **Folia** ad terram, pedicellis etiam nixa, levia, & virentia, sed figuræ diversae, & ima quidem ex rotunda ellipsi acuminata, ut fere violae folia imitantur: deinde alia, nam multa ad terram sunt, longiora, & ex ellipsi lanceolata, plicata ora, & aliquando vagis incertisque dentibus non acute exsculpta. Ad caulem una conjugatio foliorum sessilium, quae longiore mucrone sunt, & **Alsines** altissimae similia, nunquam terna, neque dissecta. **Flos**, stamina, Tuba, semen, simillima. In *Jurae* nemoribus ubique reperitur; supra *Dornach*, in *M. Nodz*, *Chasseral*, *Grandvi*, & alibi frequentissimam legi, in alpibus, uti dixi §. 7. not. e. rarer est. Haec planta, uti ex herbario **CASPARI BAVHINI**, & icono **LVDVNENSIVM** certior factus sum, sollicita cura impensa, primum dicta est a **LUGDUNENSIBUS** *Valeriana montana*, a) cum icono, quae ima folia nostræ, ruditer, sed proxime exprimit. Ex eanata est *Valeriana montana subrotundo folio* **CASPARI BAUHINI**, b) ejusdemque *montana alsines folio*, c) utcunque ad diversissimam d) stirpem hoc nomen usurpaverit **VAILLANTIUS**. Deinde **PINACIS** nomen repetit **TOURNEFORTIUS** e) & **TILLIUS**. f)

Haec

- a) *Hist. gener. plant.* p. 1127.
- b) in *Pinace*.
- c) *Phytopin.* p. 293. ubi similem esse suæ, sed diversam tamen adserit, contra praesens proprii herbarii testimonium. Sed amabat **CASPARIUS** stirpium multiplicatatem, & saepissime eamdem bis tradidit, quando eam & viderat ipse, & in alio descriptam legerat. Aeo vicio **JOANNES** longe erat alienior.
- d) 1722. l. c. refert ad *Nardo Celticae similem inodoram*, quae planta, in herbario sicco **CASPARI BAUHINI** conservata, diversissima est, *Nardis* ad finis, longo folio lingulae effigie, habitu stricto duro, *Umbella exigua*, foliis ad caulem longis & striatis.
- e) I. R. H.
- f) *Hort. Pisani.* p. 170.

Haec prima est classis nominum, quibus nostra dicta est. Deinde CASPAR BAUHINUS ex vicinis montibus g) lectam stirpem a LUGDUNENSI separavit, & pro nova descriptis, *montanae alterius* h) primum nomine, deinde *alpinæ scrophulariae folio* i), quae certe appellatio minus apta est, cum nostra, neque adeo acuta, neque acute serrata folia habeat, uti ipsa BAUHINI fidissima icon satis demonstrat. Id nomen, & CASPARI BAUHINI descriptionem retinuit FRA-TER, k) deinde, ex ordine, planta plerumque non visa, neque cognita satis RAIUS l), MORISON m), TOURNEFORT n), MAGNOL o), PLUKNET p), TILLI q), VAILLANTIUS r), & SCHEUCHZERUS f), sed is gnarior, & cum ipsa notarum mentione. MUNTINGII t) & MENZELII u) nomen, & alterum, quod SCHEUCHZERO w) elapsum est, ex nomine CASPARI corrupta sunt. Haec secunda est nominum series,

- g) Conf. Catal. plant. circā Basil. nasc. p. 50.
- h) Phytopin. p. 292.
- i) Prodrom. Theatr. Botan. p. 87. & Pin.
- k) Hist. univ. plant. III. p. 208.
- l) Hist. plant. p. 390. (cum fatali asterisco, inde dubitatio num di-versa a CLUSIANA) syll. plant. extrā Brit. nasc. p. 390.
- m) Hist. exon. III. p. 102. In Umbelliferis non habet.
- n) Schol. Botan. p. 153. & I. R. H.
- o) Hort. Reg. Monsp. p. 201.
- p) Almagest. p. 380.
- q) Hort. Pisan. p. 170.
- r) I. c. p. 252. ubi conjungit, forte seductus a *Phytopinace*, *alpinam* alteram C. B. Ea vero, repetitio est *CLUSIANAE*, quae dicta est §. VII.
- f) It. Alp. I. p. 51
- t) Val. folio scrophulariae; waare oeffen. van de plant. p. 545.
- u) Eodem nomine in pugillo plantar. rarior. si quidem nostram vult.
- w) *Salix alpina scrophulariae folio* It. Alp. V. p. 428.

series: Sed tertiam inchoat denuo BAUHINUS x) minor, quando *Valeriana montanae inodora* ex Monte *Wasserfall* lectae meminit: nam de ea, quam suae conjungit, CAESALPINIANA y) *Valeriana*, nondum liquet, an nostrae sit eadem. Id nomen apud AMBROSINVM z) & TILLIVM aa) exstat.

Quarto loco est *Valeriana alpina* foliis integris radice repente *inodora*, quam RAIUS bb) in Helvetiae montibus lectam, pro nova stirpe egregie descripsit, & ex eo repetierunt MORISONVS, cc) PLVKNETVS dd), TOVNEFORTI-
VS ee) Quinto demum eadem nostrae videtur BARRELERII *Valeriana saxatilis alpina minor*, integris foliis Italica ff) quam & TILLIUS ut omnia habet gg). Toties pro diversa descripta, eadem semper est *Valeriana* foliis omnibus integris ex ovato acuminatis, levissime dentatis.

§. IX.

Adscendebamus per herbosa pascua die *Laushütte*, & jam prope culmen eramus, juxta praecipitem rupem, quales rarae sunt his in locis, quando frequentissimum offendimus

x) in *herb. viv.*

y) *Valeriana inodora altera hist. plant.* l. IV. c. 5. Brevissimus est CAESALPINVS, ut nihil definire licet. Huc pertinet *Valeriana annua* ex *Ilva CAMERARII in herbo Med.* 176.

z) *Phytograph.* p. 554.

aa) *Hort. Pisan.* p. 173.

bb) *Topographical observations* p. 438. *Syllog. Stirp. extrá Brit. na-*
scent. p. 259. *Histor. plant.* p. 389. ex *saleva M.*

cc) *Histor. Oxon.* III, p. 102.

dd) *Almag.* p. 380.

ee) I. R. H. VAILLANTIUS cum ea, quae *Nardo Celticae similis est in-*
odora, perperam conjunxit.

ff) Ic. 868. non optime nostrae respondens.

gg) L. c. p. 169.

dimus *Petasiten monanthon* dictum VAILLANTIO a). In eius flore flosculos hermaphroditicos numeravi multos ad 28. cum tubo stamineo, & bicorni *Tuba*. Circumstabilit eos corona flosculorum feminarum, numero fore decem, quibus bicornis *Tuba*, & rudimentum campanulae bifidum fuit. Quae certe & DILLENII b) observationi, & doctae LINNÆI c) emendationi conveniunt. Vicinos dumos late occupabat *Chamaecerasus alpina fructu gemino duobus punctis notato*, jam tunc delapsis floribus, ut valde praecocem esse apparereat, & *Cacalia*, de qua alibi dicemus.

§. X.

Ibi ad oram praecipitii frequens provenit *Cervaria illa* ARETIID), & GESNERI e), deinde, JVNGII f), quam ad *Caryophyllatas* primus revocavit MORISONVS negligenter admodum relictam cum *Chamaedry*. Eamdem, quod calycis segmenta petalis non plura habeat, petala vero vix unquam pauciora habeat senis, a *Caryophyllata* separandam esse jam ante

- a) *Mem. de l. acad. des sciences* 1719. p. 403.
- b) *Hort. Elthamens.* p. 310. non aliud, praeter vulgarem, *Petasiten* habere flosculos uniformes.
- c) In *flor. Lapon.* & *Hort. Cliffort.* p. 411. Is enim *Petasites* cum *Tussilagine* conjungit, quod dentur *Petasitis* species thyriferae radiato flore, & aliae *Petasitis* species facie *Tussilaginis*, mediae ergo inter *Tussilaginem* & *Petasitem*. BOERHAAVIUS nostrum inter *Tussilagines* reliquerat. *Ind. alt. hort. L. B.* p. 101. PONTEDE-RA ob alienum a *Petasite* habitum minus feliciter junxerat *Sencioni*, non observatis flosculis femininis *dissert.* p. 155.
- d) *Descr. Neff. Et Stokb.* p. 235. & in GESN. *Epist.* p. 116. b.
- e) *Descr. mont. fracti* p. 63.
- f) In *doxolog. phys. minor* inter homonymias plantar. Vir acutissimus facile vidit non esse Chamaedryn, etiam ante MORISONI *praeludia*, quae anno demum 1669. produuerunt. Eorum vid. p. 390.

ante aliquot annos g) monui. Sed idem ex propria observatio-
ne, exsecutus est LINNÆUS h), deditque stirpi in *Laponia* non
infrequenti *Dryadis* nomen. Quod nomen, et si a quercu
desumptum sit, nostra vero stirps, supra omnes sylvas, apri-
cis, asperisque locis amet provenire, a similitudine vero
foliorum, nomina imponere ipse nolit LINNÆUS, servari
tamen poterit, ne dissensiones in infinitum crescant.

§ XI.

In scrobibus editis *Acetosa montana maxima* provenit,
quae, contra consuetudinem stirpium montanarum, longe
altior est, & toto habitu laetior quam vulgaris a) illa, quae
in pratis nascitur. Sexus visa est eamdem habere differ-
entiam, nostrae enim omnes meros femininos flosculos
habuerunt, uti pridem observaveram, sed ante me VAIL-
LANTIUS b) & PONTEDERA c). *Vitis Idaea semperfurens fructu*
rubro, & ea quae *myrtillus grandis* etiam dicitur, & vul-
garis foliis *crenatis* ubique per ericeta proveniunt, & *Ran-
nunculus montanus aconiti folio albo flore* & aliae, sed vul-
garis notitia montanae. Ergo ultima vice oculos ex ea
specula per subjectos agros urbesque late dimisimus, & in
Lucernensem primum pagum, cuius caput *Lucerna* & lacus
conspicitur eminus, & *lacus Sursee*, & vallis *Endlibuch* alti-
oribus montibus separata a pago *Subsylvano*; deinde per
late patentem *Argoviam*, magnumque illum *Jurae* sinum,
quo omnis *Helvetia* terminatur ad septentrionem, lacus-
que

g) & *Cervariae* quidem nomine, quod antiquissimum est, It. in
Temp. Helvetic Tom. I. S. IV. p. 557.

h) *Flor. Lapon. 215. Char. gener. 419. & Hort. Cliffort. p. 195.*

a) Cui conjungitur a LINNAEO in *flor. Laponic.* 130, & *Hort. Clif-
fort.* 131.

b) VAILL. in *botan. Parisin.* p. 2.

c) *Epist. ad TILL. p. 179. post portum Pisayum.*

quæ a Bienna Morato, & Neocomo nomen habentes, pulcro certe, & vario spectaculo: Descendimus deinde, & protinus in aquosis frigidis que locis *Pinguiculam album* frequentem legimus, Alpinam fere stirpem & excelsa amantem. In ea, quod, praeter morem sui similium, duo tantum gerat stamina, visum est floris partes curiosius inspicere. Et calycis quidem tria superiora segmenta subrotunde excisa sunt, duo inferiora, quae intervallo distant a superioribus, acuta magis. *Ovarium* nunc subrotundum, per floris perforati fundum emittit *Tubae* loco infundibulum, album, plicatum, & fimbriatum. Fundus vero floris retrorsum recurrit in breve calcar conicum, acuto mucrone flavescens, & per siccitatem rufescens. Anterior vero floris rictus superiora duo segmenta subrotunda reflectit, inferiora tria majora, quorum medium pube maculisque flavis late distinguitur. Sub extremum fimbriatum finem *Tubae* recondunt se duo apices staminum bicornium, quorum duo cornua superna disciformes apices, inferiora fungosa flavaque corpuscula gerunt, apicum quaedam quasi imitamenta. Ea vero corpuscula, quae LINNÆI industiam fugisse videntur, conjungunt *PINGUICULAM* tetraestemonibus, uti bicornia stamina *Sclareae*, *Salviae*, & *Hormini* plantas suas uniunt *Verticillatis*, licet nonnisi duo earum apices capsulas habeant, bini vero imperfectiora tantum & fungosa corpuscula.

§. XII.

Et haec fere sunt, quae prima haec excursio dedit. Valediximus enim monti *Arni*, cuius varios districtus late per colles herbosos dispersos obiveramus. Reduces ad ripam fluvioli, qui ad pedem montis *Arni* oritur, frequenter eam speciem *Geranii* vidimus, quam alibi de-

scripsimus a), in *Desso* verò monte & *Neocomensium* dumetis montanis crebro legimus. *Gratiam Dei* vero *Germanorum*, Basileae nasci, in pratis circa ipsa munimenta urbis prope *S. Petri* aedem, didicimus ab amicissimo *STÆHELINO*.

§. XIII.

In palustribus torfaceis uliginosisque dumetis & pratīs inter *Gumlichen*, & pagum, cui antiquissimum nomen est *Muri*, creber est proventus *Vitis Idaea magna* & *Oxycocci* & *Thysellini Plinii*, & *Andromedae* foliis subtus albentibus, *Pedicularis palustris elatioris*, *Trifolii* demum *Lupulini*, quod exquisite distinxit vir solidae eruditionis *DILLENIUS* b) *minoris alterius* nomine a *minimo* c) de quo alibi diximus, in universum simile, sed foliis non ita cordatis, neque striatis, flosculis reflexis plusculis ad duodecim, habitu in universum ampliori. *GMELINI* etiam, veteris sodalis, qui nunc ex *Itinere Kamtschadkalensi* redit, observationem d) facile oculorum judicio confirmavimus, torfam nempé congeriem esse radicularum *Sphagni molliissimi candicantis*, putrescentium, & cum terra palustri intime commistarum. *Pentaphylloides palustre rubrum* ibi frequens est, & ex rogorum sède renascens *Jacobaea I. Pannonica*, & difformi flore *Chamaenerion*, cuius pulcherrimam iconem dedit de *BRY* e).

§. XIV.

a) *It. Hercyn.* XIV.

b) *Synops. RAIAN.* edit. III. p. 330. cum iconē.

c) *It. Hercynie.* p. 5.

d) In *Commerc. Liter. Phys. techn. Med.* 1731 p. 348.

e) *Florileg.* ic. 42.

§. XIV.

Diebus aliquot elapsis, ad Biennensium & Neocomensium montes, illos dudum notos, hos nondum visos, iter suscepi exeunte mense junio. In prima sylva, Bernae vicina, quae a Ruborum copia dicitur Bremgarten, non solum *Hieracium latifolium glabrum ex valle Griesbachiana f*), & *Helleborinen angustifoliam purpurascem*, & *Gallium montanum latifolium* provenit, sed elegans etiam *Grossulariae* varietas *rubro flore*, cuius aliquot stirpes juxta viam regiam in dumeto florere vidi, fructus vero maturos non inveni. Ejus, sed in hortis cultae, meminit CLUSIUS g), deinde IOHANNES BAUHINUS h), & RAIUS i), & BOERHAAVIUS k), neque facile ullus eorum, qui *floras* scripserunt. Est autem, uti recte LINNÆUS l), varietas vulgaris *Ribesii* hortorum fructu acido, cui cortice suo rubente, & omni habitu convenit. *Alpinus* autem *Ribes*, qui frequens in sylvis *Helvetiae*, & planioribus, & *Jurae* montosis, & ipso *M. Wasserfall* provenit, dulces aut insipidas baccas ferens, cortice est albo floreque vidente m). Ejus, quod diversi saporis baccas generet, duas species facit CASPAR BAUHINUS n),

C 2 &

f) I. B. II.

g) *Ribes vulgaris rubro flore*, Pannon. p. 119. Hist. p. 119.

h) Hist. plant. II. p. 98. dicitque Ribem flore rubente.

i) *Ribes fructu rubro majore hist. plant. p. 1486.*

k) Cum nomine I. B. Ind. alt. II. p. 254.

l) *Hort. Clifforian. p. 82.*

m) Si quidem satis ab hortensi diversus est. Cortex differt, et sapor baccæ, qui in sylvestri, si ejusdem esset plantæ, deberet non mitior esse. Deinde, racemi in sylvatico erecti sunt, in hortensi pendent LINNÆUS l. c.

n) Aliam *Grossulariam sylvestrem rubram*, aliam *Grossulariam vulgarem fructu dulci*, in Pinace.

& ad eam , cui fructus dicit acidos esse , refert *Ribem sylvaticum* GESNERI o). Sed is , cum tussi dicatur mederi , ad dulcem videtur pertinere , neque differre ab eo , quem in sylvis *Austriae* , *Silesiae* , *Thuringiae* , *Saxoniae* , *Laponiae* , nascentem decerpserunt CLUSIUS p) , SCHWENKFELD q) , RUPP r) , BUXBAUM s) , & LINNÆUS t) , in ipsa denique *Helvetia* IOANNES BAUHINUS u). Ut adeo possit expungi id genus *Grosulariae* , cui *sylvestris rubrae* nomen fecit CASPARUS. Ea vero species , cui folium multo est amplius , & odore ingratu , fructus niger , tingens & olidus , eam uti *Tiguri* GESNERUS v) , ita ad stagnum ego haud procul urbe patria reperi.

§. XV.

In sylva Frienisbergensi frequens est utraque *Pyrolae* vulgatior species , pistillis rectis , & mucronato serratoque folio. Ad sepes circá Belmont , Barba Caprae foliis oblongis. In fossis circá Nidoviam , *Ranunculus aquaticus* folio circinato tenuissime diviso , & Sagittae in *Helvetia* non frequentis angustiore folio varietas. In pratis humidis inter Nidau & urbem Biennam plurimum *Silaum* flore luteolo , & *Thalictrum majus* siliqua angulosa striata. Est ea urbs , lae-

- o) *Hort. Germ. app.* p. 295 b. & *Ceanothi leve genus* p. 252. l.c.
Consentientem habemus JOHANNEM BAUHINUM.
- p) *Ribes vulgaris fructu dulci Pannon.* p. 119. hist. rar. plant.
p. 119.
- q) *Stirp. siles.* p. 182. vocat *Ribes insipidum*.
- r) *Flor. Jenens* p. 40.
- s) *Enum. plant. circa Hal. nasc.* p. 284.
- t) *Flor. Lapp.* 97.
- u) In *Salève* , *Thuiri* , & circa *Basileam*. II. p. 38.
- v) *Amomum falsum* , de *hort. Germ.* p. 245.

Iaetissimo loco , ut meo quidem judicio utar , sita ad radicem vitiferam humiliorum montium , qui e *Jurae* altissimis dorsis producti , simili decursu , sed propiores planitiei ad occasum vergunt . Lacus ante portas est , vineis late septus . Ad meridiem planissima prata vicinum oppidum *Nidau* conjungunt *Biennae* , terminata in lenes & umbrosos colles . Aquarium purissimarum benigna copia , ex fonte omnium , quos unquam vidi , sed vidi plurimos uberrimo , & purissimo , qui in cavos rupium recessus immensa profunditate se demergit , & unus fere singulis civibus suum fontem praefstat .

§. XVI.

In durissimas rupes , passim ubi aliquid mollioris glebae adspersum habent , vitibus confitas , quae urbi ad septentrionem inminent , cum certa spe non inutiles laboris adscendi , comite adgnato , & vetere amico SALOMONE SCHOLL M. D. Protinus *Mahaleb* se nobis obtulit , odorato ligno frutex , longis & rectissimis virgis , folio duro *Mali sylvestris* , fructu nigro , officulum & nucleus *Cerasi* habente , sed macriori , &c. solitariis pediculis . Is ubique supra vineas , per universum *Jurae* tractum , & similibus in *Valesia* locis , plurimus nascitur . Deinde *Iris Germanica* ; & *Sedum majus vulgare* spontaneum , & *Knawel* perenne *albis calycibus* , & vulgaris *Globularia caule* folioso , *Veronica recta spicata* , & suavissimi odoris *Achillea* , floribus ochroleucis , latiori folio , & magis ad indolem *Tanaceti pinnato* , & *Emerus* , & *Gramen avenaceum lanuginosum* , quod modo rarioribus glumis est , modo densioribus : & *Oreoselinum minus* , & quae multe gratior fuit , *Saxifragia multifida* folio *Pannonica Clusii* . Ea quidem tunc non florebat , sed in *Dola M.* alio tempore cum flore legi , si quidem , ut videtur , erat eadem .

Ro-

Radix effossa, conica, alba, resinosa, aromaticā, ramos multos ex praecipuo capite spargit. Ad terram frequens capillitum *folia* nascentia ambit. Ampla hinc *folia*, & fere *pedalia*, cum viriditate glauca, striatis costis *Biennae* quidem & viridiora, & magis multiplici divisione, quam quae in *Dolaz* legi. Costae primariae pinnarum edunt pauca paria, haec secundas pinnas, eae, tertia divisione alias, quarum fere trifida est divisio, non remota a *Peucedani* indole, sed longe minor, ut vix unius tertiae partis lineae latitudinem aequent. In primis cujusvis alae foliolis saepe bifida tantum *folia* sunt, alias simplicia. *Caulis* fulcati, in *Dola M* erant semipedales, multi. *Umbellae* sparsae in cacumine multae sunt, & singulares, neque arcuatus in unam majorem congregantur. Sub iis ramis *vaginae* non magnae longae, & strictae, in foliola laciniata terminatae. *Umbellae* exiguae nullum vel universale involucrum, vel partiale habent. *Flosculi* albi, tunc quando i. Julii *Dolam* confundi, nondum se explicuerant, ut longe minus *semen* maturum viderim. Ab *Hippomarathro* RIVINI facile differt, cui habitus robustior, dura *folia*, *vaginae* ad caulem adeo crebrae, & turgidae, ut vel solo eo habitu dignoscatur, demum latis ex albo & viridi variis foliis, quae umbellis partialibus sunt pro involucro. Id addo, ut adpareat non recte conjunctam esse plantam nostram cum RIVINIANA x), quae *Selinum* est montanum pumilum CLUSII y), a RUPPIO z), LINNAEO a) & humanissimo ROYENTIO b). Nostra planta tria apud plerosque Botanicorum nomina habet. Namque prima de-

x) Cujus eximia icon est VAILLANTII, *Bot. Paris.* T. IX. f. 4.

y) Pannon. 701. 702. hislor. CXCIX.

z) Flor. Jenens. p. 226.

a) Hort. Cliffort. p. 103.

b) Flor. Lugd. Bat. Prodr. p. 112.

descriptio est CLUSII c), qui *Saxifragam Pannonicam* dixit, iconemque dedit non malam. Inde CASPARI BAUHINI *Daucus montanus multifido folio* in *Phytopinace* d), *multifido brevique folio* in *Pinace* e); *Saxifragia multifido folio Pannonica* IOH. BAUHINI f), CHABRAEI g), RAI^{II} h), PLUKNETII i), *Daucus montanus Pannonicus* PARKINSONI k, *Saxifraga montana minor multifido folio Pannonica* MORISONI l), *Seseli*, quae *saxifraga Pannonica* BOERHAAVII m). TOURNEFORTIUS non habet, & modeste facit, satis enim adparet, neminem eorum, quos auctores citavimus, CLUSII stirpem aut vidisse aut cognovisse. Sed eadem & CLUSIANAE & nostrae planta est, *Meum aliud LUGDUNENSIMUM* n), quod in Allobrogum frigidis montibus lectum, etiam natali loco cum nostra montis *Dolaz*, sed figura foliorum, umbella radice & habitu praeterea convenit. Ea est *Meum Dauci Cretici*
fac-

c) In iconе *Pann.* p. 698. lobos nimis multos integros aut bifidos fecit, & qui trifidi, ii non ad basin usque, uti pars est, secuti sunt. Habitus omnino umbellae adest, in *bifor. nar. plant.* p. CXCVI. Idem nomen est apud AMBROSINUM *phytogr.* p. 481.

d) p. 260.

e) Ex *herbarii vivi inspectione* certus adfirmo. Idem nomen habet *flora Batav.* p. 10. & MORISON in *Umbellif.* p. 84. ubi jubet a *Daucis auferri*, ob semen striatum.

f) III. p. 2. p. 19. nihil addit iis, quae a CLUSIO habuerunt, neque sibi visam dicit.

g) *Sciagraph. stirp.* p. 383.

h) *Hist. plant.* p. 461. cum asterisco.

i) *Almagest.* p. 333.

k) *Theatr.* p. 896.

l) *H. Oxon.* III. p. 273.

m) *Ind. alt. hort. Lugd. Bat.* p. 50,

n) *Hist. gener.* p. 759.

facie CASPARI o) & IOHANNIS BAUHINI p), & RAI q), Meum aliud minus PARKINSONI r), *Saxifraga montana minor humillima sive palmaris MORISONI s).* Quam plantam denuo, ut fibi non visam, sapienter omisit TOURNEFORTIUS, nemo enim eorum, qui ex LUGDUNENSIBUS eam repetierant, aliquid addidit ejus historiae, aut stirpem unquam vidit. Sed tertio denique loco, convenire videatur nostrae plantae, ex brevi utique descriptione *Daucus petraeus glauco folio IOHANNIS BAUHINI t)*, & co magis crediderim intellexisse nostram, quod minime in *Jurae asperis rara*, ejus diligentiam vix potuerit effugisse. Eam ex IOHANNE BAVHINO repetit RAIVS u) & ad *Ammi* refert MORISONVS w), nihil addens descriptioni, ex quo videatur eam cognovisse. TOVRNEFORTIVS denuo non habet.

§. XVII.

Circá Biennam passim elegantes plantulae visae sunt. *Raphanistri* genus recte dictum KNAVTIO a) ex MORISONI ob-

- o) In *Pinace*, ejus varietatis, quae longiori, & laxiori folio in *M. Wasserfall* provenit, cuius folia omnino simillima sunt. In *Phytopinace* Meum alterum *umbella alba* p. 254.
- p) L. c. III. p. 2. p. 15. & CHABR. p. 383. Quaerit, an sit *Daucus* brevissimis foliis in *M. Pilati* visus GESNERO, sed ea videtur *Daucus* fuisse.
- q) L. c. p. 460. cum asterisco.
- r) L. c. p. 888.
- s) L. c. p. 273. qui in *Umbelliferis* p. 76. removet eam a Meo, sed ex sola, ut fatetur, descriptione DALECHAMPII.
- t) L. c. III. p. 58.
- u) *Histor.* p. 460. cum asterisco, quo videtur distinxisse omnes plantas sibi non vias neque certae notitiae.
- w) L. c. p. 295.
- a) *Enumer. plant.* circu Hal. nascent. p. 21.

observatione, *dispermon*, cum BAVHINI non ignoraverint quidem duos siliquae articulos, sed negligentius dissimulaverint, dicendo *monospermon*; & *Turritis Leucoji folio*, *Germaniae*, magis quam *Helvetiae* frequens, denique *Alyssi elegans* species *fructu rugoso Coriandri monospermo*. Ita voco plantam, quae ad *Alysson arvense* folio *auriculato acuto* I. R. H. ex naturali charætere proxime pertinet, ipso fatente LINNAEO b), habitu toto, foliis & luteis flosculis, & siliculis erectis in longis pedicellis, & earum permanente Tuba ita simile, ut etiam absque VAILLANTII c) observatione, a *Rapistris* ad *Alysson segetum* debuerit revocari. Nunc & fructum novimus consentire, rugosum equidem, & rotundum, qui glaber est & conpressus *Alyssum*, sed pariter medio septulo divisum, licet omnino unum loculum in omnibus, quos multos aperui, vacuum habeat, alterum majorem, uno triquetro semine foetum. Habitum fructus rugosum, neque inventoris GESNERI d), neque CASPARI BAUHINI e), neque LOESELII f), neque MORISONI g), icon exprimit. *Paronychia* vero secunda TABERNAEMONTANI h), si quidem huc pertinet, ut visum SCHWENCKFELDIO i), omnino male

pin-

- b) Quo *Myagra* veterum, ex *Alyssi*, *Rapistris*, et *Myagri* generibus in unum revocavit, contemta fructus diversitate Hort. Cliff. p. 328. consentiente ROVENO. Flor. Lugd. p. 330.
- c) Qui septum in media silicula observavit Bot. Paris. p. 171. & ad *Myagra* jussit referri.
- d) Apud CAMERARIUM in Epit. Matth. p. 902. nomen additum est *Pseudo-Myagri* alia minor species vasculis rotundioribus.
- e) *Myagro similis* siliqua rotunda Prodr. p. 52.
- f) *Myagrum Monospermon* siliquis rotundis Flor. Pruss. p. 174. ic. 56.
- g) Sect. III. T. 23. n. 5.
- h) p. 804.
- i) p. 36.

pingitur : sed calyces ad basin silicularum certo persuadent, pertinere eam ad *Alysson campestre minus*, & verba SCHWENCKFELDI fere ea sunt, ut de eodem dixisse videatur, licet nostrae plantae nomen ex CAMERARIO excitet. Idem *Alysson* ex comitatu *Neocomensi* habuimus a D. D. DIVERNOI.

§. XVIII.

In iisdem rupibus elegans illud *Phalangii* genus provenit, *parvo flore non ramosum* dictum c. BAUHINO, quod florem *Allobrogico* illo *Phalangio* minorem gerat. Non bené fecit MORISONUS a), quod id *Phalangium* suadet conjugere cum *ramoso parvo flore* pasim in *Helvetia* frequente. Nam id foliis quidem & habitu non humilius, flore & fructu triplo est minore, licet pinguiori, quam alterum, & planiori loco nasci amet. Deinde ad ripam lacūs, in lapidoſo littore serpit *Ranunculus*, quem ante aliquot annos *Morati* decerpsi, eo omnino loco, ubi primum a BURSERO b) lectus est. Eum pro nova planta proposuit in *flora Laponica* LINNAEUS c), varietatum perpetuus hostis, & cum nova icone denuo AMMANVS d). Sed, nisi omnino fallor, hic ipse varietas est vulgaris *longifolii palustris*, maligno solo reptans, quae frequentes juxta caulem radiculas extrudit. Namque per continuos gradus, vidi recedendo a lacu, versus uliginosa prata, maiorem fieri, & latiori folio, & denique a *vulgari* non ultra

a) *Hist. Oxon.* II. p. 333.b) *Ranunculus longifolius minimus reptans* in *Catal. horti siccii BVRSERIANI*, qui exstat in *Act. suecic.* 1724. p. 505.c) *Ranunculus foliis linearibus caule repente flor.* *Lapon.* 236. cum nitida icone T. III. f. 5.d) In *Iconibus plant. Ruthenicar.* p. 80. T. XIII. f. 1. Nomen fecit *Ranunculus repens gramineis foliis e singulis geniculis radiculas agens.*

tra differre. An idem est *flammeus angustifolius* LOBLE
LII e)? In Lacu frequens est elegans *Potamogeton*, nimis
angustis foliis pictus a JOHANNE BAVHINO f), lucidis, ner-
vosis *Plantaginis* foliis g), qui ex imo lacu, ex orgyar-
um plurium profunditate caules et folia erigit. Pro-
ximus est, si foliorum habitum & fabricam spēctes,
Potamogitoni foliis latis splendentibus. Incolae vocant
bechtenkraut, quod in sylvulis hujus herbae perpetuo sub-
mersis uisque lucis sibi placeant *Lucii* pisces. Denique cre-
ber proventus est in vineis ad orientem sitis, *selenitis*
rhomboidalis quem *Pierre de Berne* h) vocaverunt acade-
mici Galli. Idem in Stokhornio M reperitur, & in omni
Helvetia non rarus est.

§. XIX.

Bienna profectus die 29. Junii comitem habui eum-
dem D. SCHOLLIVM, cuius come sodalicium in aliquot per
Jurae culmina itineribus, anno 1731. & 1734.; alioque
per alpes suscepto anno 1732. expertus fueram. Supra vi-
neas ericetum sequitur dumosum, plurima *Rosa pim-
pinellae* folio impeditum: deinde adscenditur per sylvam
quernam, in qua & alias montanas plantas legi, & *Pe-
dicularis* illam varietatem, quae cum nomine *Cristae galli*
angustifoliae montanae describitur a CASPARO BAVHINO a).
Est utique folio perquam angusto, habitu alto, & ramoso,
D 2
foliis,

e) *Illustrat.* 136. in tanta brevitate vocum definiri non potest.

f) *Fontalis lucens major* III. p. 777.

g) Recte dictus TOURNEFORTIO *Potamogeton alpinus plantaginis*
folio I. R. H. nisi quod in omnibus, etiam ab alpibus remo-
tissimis Helvetiae lacubus reperiatur.

h) *Histoire de l' acad. des scienc.* 1724. p. 84.

a) *Prodrom.* p. 86.

foliis, quae inter flores sunt, in caudas quasi productis; Nam quod rictu sit coeruleo, in eo nihil differt a vulgatissima *Crista Galli* calyce levi, quae & in *Germania* & in *Helvetia* fere semper coeruleis barbulis, vix aliquoties pallentibus visa est, loco palustri, prope *Bernam*. Sed, ut verum fatetur, folii nervi & crenae, calyx, flos ipse, ita se habent, ut non possim recedere a priori b) sententia, et confirmatior nunc hanc *Cristam Galli ramosissimam* pro varietate vulgaris *pratensis* habeam.

§. XX.

Ea sylva superata, prata sequuntur acclivia, late patentia, & fertilissima, quae multum habent de alpina indole. Sparsa per ea dumeta viam reddunt obscuriorem, quae ex *Corylis* aliquando congregantur, plerumque vero ex *Aria Theophrasti*. Ea etiam nunc nomine *Mälbaum* venit accolis. Primus inventor GESNERVS a *Sorbum alpinam* fecit, quo nomine bona exstat descriptio IOHANNIS BAVHINI b), nam icon nulla placet. LOBELIANA c) folia neque serratasatis, neque oblonga habet. Eam TABERNAE-MONTANUS d) suam fecit. LUGDUNENSIMUM e) flores quadrifidi pinguntur, folia meliora sunt. Multa ibi *Linosyris*, *Thesum* dicta LINNAEO, & *Lilium montanum* floribus reflexis, cuius petala, quando primum flos se explicat, repanda

b) *Dissert. de Pedicul.* §. IV. p. 15. 16.a) *De hort. German.* p. 282. b.

b) I. p. 1. p. 65.

c) *Adversar.* p. 425. Ic. Tom. II. p. 167.

d) Ic. omn. stirp. p. 1021.

e) p. 202.

anda sunt, uti albi *Lilii*, paulatim vero retorquentur donec mucrone fere basin adtingant f). Id vario colore aderat, etiam *album*, punctis ferrugineis adspersum.

§. XXI.

Passim ibi *Melampyrum flore minore flavo* a), mistum vulgari, & *Pyrola tuba incurva*, b) & *Dentaria* folio quino, aut septeno, neque enim veram diversitatem invenio; & coeruleo flore *Aconitum* c) sive *Napellus*, quem, nihil formidantes vulgi fabellas, & decerpsumus, & nuda manu absque noxa gestavimus d): & *Geranium batrachoides montanum* folio *Aconiti*, & *Cacalia*, tunc in primis florem explicans. Ea autem ibi nasciebatur varietas, cui folia subtus albo tomento rario pubescunt, qualis etiam in alpibus frequentior est. Altera varietas, folio utrimque glabro, in sylvis *Montis Falconarii* post aliquot dies & ipsam legi. Varietates voco, quod nihil veri discriminis, quale quidem CLVSIVS e) proposuit, in folii figura aut omni planta reperiam, tomentum vero, modo densum, & album, modo rarum &, colorem folii

vix

f) Ut in *Oxycocco* observat LINNAEUS.

a) Conf. *It. hercynic.* IX.

b) *ibid.* III.

c) Imo vero in *Britannia minore* innoxium esse, des LANDES recueil d' obs. phys. p. 98. uti neque alterum *Aconitum* in *Laponia* innoxium est LINN. flor. Lapon. 221.

d) Nam neque gustasse venenosas plantas unquam nocuit GESSNERO, non semel temeritatis exprobrationem passo Epist. p. 57. neque demum etiam adsumisse noxia Epist. p. 71. b.

e) Quod anterius non ita coeant, & pediculos non striatos habeant, sed teretes, PANNON. p. 501. hist. rar. plant. CXV. Sed in utraque invenio, modo subito mucronem in cordis speciem exire, modo longum esse. & triangulare folium.

vix mutet, modo soli nervi pubescant, donec glabrities perfecta varietatum seriem claudat. Nihil ergo differre puto *Cacaliam foliis crassis hirsutis*, eamque quae *foliis cutaneis acutioribus & glabris* dicitur. Ut eo minus curiosum esse oporteat in extricandis utriusque varietatis synonymis, neque *Clusium* carpere, quod pro varietate glabra iconem dederit LOBELII f), desumptam ex stirpe du *CHOULIANA*, montis nempe *Pilati*, quae *hirsuta* est: neque *RAIUM*, quod ad *glabram*, quam *solam* in *Jura* invenerat, ita citaverit Ioh. BAUHINUM, quasi is non utramque una voce comprehendisset, *solam* autem *glabram* proposuisset. *RAII* lapsum g) tamen non possumus dimittere, qui *tomentosam* conjunxit *hirsutae*; & BOECLERI enormem, qui *Cacaliam Alsaticam* proposuit h) nomine *tomentosae*, stirpis summarum alpium, sine dubio de nostra locutus. Fabrica floris ea fuit. *Calycis* quinque folia purpurea. ad basin connexa. *Flosculi* in uno flore non ultra quatuor, pauciores, quam in ulla, quantum novi, congenerum, hermaphroditi: *Tuba* in cincinnatas antennas revoluta. Ut adeo congener sit vulgari *Petasiti*. Cognovisse eam videtur *CORDUS*, cui *Bechium sylvestre* est i), deinde *GHIN-*
us k), eodem *Cacaliae* nomine eam demonstravit MAT-
THIOLO.

§. XXII.

Iniis pratis *Veratrum* flore albo subviridi, & *Rapunculus* folio oblongo spica orbiculari passim exit. Ejus flos non est monopetalos, neque campaniformis, recte id contra

TOUR

f) Ex *Adversar.* p. 255.g) *Histor.* p. 291.h) In HERMANNI *cynosur. mat. med.* II. p. 488.i) *Sylv. observ.* p. 222.

k) Apud MATTHIOLUM, p. 1185.

TOURNEFORTIUM DILLENIUS C.G. p.65. Quinque enim unguis albi, ex quibus singulis singulae cyaneae ligulae educuntur, in cornu coeuntes, conglutinati sunt equidem ad basin, sed per maturitatem, & cornu & unguis, in quinque partes dissiliunt. Lati unguis ex quibus stamina longa educuntur, & tres *Tubae* unius antennae antiquam cum *Campanula* adfinitatem confirmant. *Siliculae* tres rotundae in unum *ovarium* etiam connascuntur. Caeterum ab hoc nostro vulgari certe *Rapunculo*, nihil differt *Rapunculus alpinus petraeus coeruleus foliis flori substratis longis angustioribus* SCHEUCHZERI in *Itin. alp.* VI. p. 460. frequentissime enim noster folium sub flore habet unicum. Neque *alpinus corniculatus foliis ab imo caule ad summum angustioribus* id. ib. p. 461. nam & hoc commune est nostro, & praeterea specimina *Tiguro* missa non differre confirmant. Multa hic *Campanula rotundifolia alpina* quae a vulgari & habitu molliori, splendente, & foliorum ferris tenerioribus, frequentioribus, etiam ad caulem, & flore latiori quasi & magis ventricoso differt, colore variabili. Hic glaucam, & pene albam vidimus, alias etiam albam, sed plerumque saturé coerulea est. Deinde per montanam planitiem, tritico consitam, per pagos *Lamblingen* & *Deff* versus *Linieres*, in pratis fere montanis iter fecimus. Ibi multa *Gentiana major lutea*, ut in omnibus Jurae & alpium humilioribus pasuis. In ea *calyx* aperto flore dissilit, spatham efficit ad unum latus hiantem, altero in quinque dentes non profunde sectam, *flos* ex brevi tubo, ut quasi rotatus aliquando sit, in quinque vel sex segmenta ultra dimidium sectus. *Stamina* quinque longis rubris apicibus inserta. Ad ortum ovarii tot viridia tubercula, quot floris sunt laciniae. Ab extremitate ovario repanda cornua. *Semina* in fusiformi ovario mul-

multa disciformia. Ergo haec *Gentianarum* certe & ob speciosam magnitudinem, & ob vim medicam princeps, differt a pene omnibus sui generis, flore ultra dimidium tubi inciso, & glandulis sub ovario virentibus; quarum notarum priorem habet SWEERTIA a) LINNAEI, posteriorem non eamdem, sed nectaria tamen, licet speciosiora sint &c. Ergo, si quidem separandae sunt *Gentianae*, huic principi plantae possit relinquere nomen antiquum GENTII, reliquis tubulosos, & infundibuliformes & campanae effigie flores habentibus nomen inponi CENTAVRII; cum omnino ex rei veritate LINNAEUS b) minus *Centaureum* conjunxerit *Gentianae*. Sed ut verum fatear, nimia est florum *Gentianarum* varietas, qui modo ex lato tubo modice finduntur in quatuor c) & quinque d) lacinias, pene planas, cum ornamentis, aut auricularum similibus e,) aut fimbriatis f), aut nullis g), modo ex tubo gracili ad angulum rectum reflectunt floris segmenta, cum auriculis pene ad *Lychnidum* morem h), ut certe aut

a) *Char. gener.* 126. *Hort. Cliffort.* p. 53.

b) *Char. plant.* 97. & *flor. Lapon.*

c) Brevissima in *cruciata*, cui tubus modice latus est, longiora in *Gentiana coerulea* oris pilosis.

d) In *pratensi* flore lanuginoso, quae quatuor & quinque laciniis ludit, & omnibus, quae ad notas e & g recensentur.

e) Et plerumque reduplicata sunt substantia floris, segmenta minora interiiciente divisionibus majorum, uti in *Gentiana Alpina* magno flore, ea quae *Asclepiadis* folio est, *Tangustifolia* autumnali majori.

f) In utraque pilosa.

g) In *majori* purpurea, & *majori* flore punctato.

h) In *alpina pumila* verna majori; in *elegantissima* CAMERARII, in *Gentiana utriculis ventricosis*, in *alpina pumila centaurii minoris* folio.

aut plura genera , aut unum praestet statuere. *Glandulae* vero non ejus videntur dignitatis , ut nostrae genus mutent. *Gentiana* praeterea, cui fauces pilosae sunt , in *Jura M.* mense Junio abunde floret, in Germania demum Septembri. De ea, certe confusissime a scriptoribus exhibita, alias dicemus.

§. XXIV.

Ad *Neocomensem* comitatum pertinet pagus *Linieres* ex lapideis aedificiis eleganter exstructus , & late patens. Inde per dumeta descendimus ad pagum *Cressier* , qui in valle est Lacui *Neocomensi* & *Biennensi* interjecta , supra quem & *Mahaleb* iterum, & *Trifolium spica longissima* rubente magna copia nascitur. Breve inde iter *Neocomum* fuit, ubi a Medico Regio D. DIVERNOI comiter exceptus , multas elegantes plantas & vidi , & accepi , quas in *Helvetia* vel nasci desperaveram , vel non inventeram ipse , ut *Euphrasiam* folio tenuissime dissecto BOCCONE a), *Valerianoidem* , & latifoliam b), & angustifoliam c) , & alias. Comes ei fuit D. GAGNEBIN , qui in *Ferrariis* officinis vallis *Erguel* Medicinam utramque exercet , multasque & in *Cottiis Alpibus*, & in nostra *Helvetia* , *Jurae* que , quas incolit , vallibus rarissimas stirpes legit. Huic commode ex *Valle Rivaria* (*vaux de Ru*) adlatum fuerat gratissimum donum, *Limodorum Austriacum* , nova civis , quae specioso spectaculo mire mihi placuit. *Scapus* erat squamis temere sparsis obiter vestitus , sed longissima violacea spica ornataior , totus & ipse violaceus. *Siliqua* uncialis , orchidea. Ex ea supremum latum petalum, magnumque. Ad ejus

a) *Mus. di piant. T. 60.* nascitur in *Creux du vent*.b) Ad muros arcis *Neocomensis*.c) Ex *Creux du vent*. ubi invenimus inmaturam.

ejus latus duo majora petala ; totidemque intercesserunt minora, qualia solent *cucullum* efficere *Orchidum*. Lata *barba*, *integra*, qua re differt a *Nido Avis*, & facile demonstratur *Clvsium* in *historia rar. plant. d*), non *Limodorum* quod descripsérat, sed *Nidum avis* depinxisse, iconē defumta ex *LOBELIANIS e*). A Barba calcar conicum descendit, ea que ad fauces alba est. In centro floris *staminum* machina semilunaris, fungosa, in qua resident duo apices. Ea fabrica *LIMODORVM* ab *Orchide* separat, etiam si radices & habitum aphyllon repudies. Nam *Orchidi* perpetuo membranei duo cuculli sunt, in quibus petiolati apices reconduntur. Similis *Nidi avis* fabrica in mentem hic mihi redit, qua non alia evidentius *Tubae* officium demonstrat. Nempe ex suprema ovarii sede, continua erigitur spongiosa firma substantia, ex qua petala proveniunt, cylindrica fere, quae superne brevior crassum & articulatum corpusculum gerit. Id corpusculum ad superiora quidem obtusa rotunditate terminatur, inferius duos *loculos* gerit, polline luteo plenisimos. Eos sustinet *foliolum* elasticum, paulo longius, linguae figura, terminatum fine fusco & triangulari, ortum ex inferiori sede emarginata spongiosae, quam dixi, cylindri. Inter id foliolum, & loculos *staminum*, continuus *canalis* dicit in continuum ovarii cavum, conspicuo arguento, viam esse semini masculo *staminum* ad imprægnanda ova. *Orchides* eam viam habent, sed paulo obscuriorem.

§. XXV.

d) p. 270.

e) ubi certe *LOBELIUM* immerentem accusat *IOANNES BANHINUS*. Non enim *LOBELIUS* *Limodori* iconem pro *nido avis* dedit, sed *Clusius* *Nidum avis* exhibuit nomine *Limodori*. Potest error *PLANTINI* fuisse, qui omnes icones *LOBELII*. *DODONAEI* & *Clusii* possidebat,

§. XXV.

Postridie lacus opportunitate usus sum , ad montis *falconarii* radicem , comitibus iisdem amicis , D. D. DIVERNOI & D. GAGNEBIN , & D. SCHOLLO , pernoctatus . Pulcherrima certe hic terrae facies est . Lato aequore & raro minaci lacus *Neocomensis* , separat *Jurae* radices a mollissimis clivis , qui retro se positum habent lacum *Moratensem* . Urbs cultissima , elegantes villae , pagi mundissimi , fabricae omnis generis , vineae , & permisti scopuli , retroque vineas adscendentibus herbosi montes , efficiunt certe picturam , in qua vix deficit , quod placere possit . Atque jam adtigeramus plantatas ex ordine *Tilias* , quae pulcherrima ambulacra praebent , prope *Colombiers* , praedium celebre olim futurum possessore MURALTO a,) eminus videramus nascens in arenis ad lacum *Glaucium* flore luteo & speciosum illud *Chamaenerion angustifolium* b), quando resistens venti vis inter Occasum & septentrionem oriunda , quam praecipuo nomine *ventum* c) dicunt , frustra diu contra conatos repulit *Neocomum* , laboris premium id solum nacti , quod paulo propius Montem nostrum conspexissemus .

§. XXVI.

Altera die , quae I. erat IULII , molliori jam coelo , denuo lacui nos commisimus , & sereno aëre advenimus

E 2

in

- a) Auctore literarum de Anglis , Francis & Itineribus .
- b) TOURNEFORTIUS Alpinum dixit , non apposite . Arenas amat , fluviorum alveos , lacuum littora . Nascitur in *Vallesia* , planissimis locis , ad ripas torrentium & *Rhodani* , in ipso alveo fluvii *Arve* , ad ostium fluvioli *Wiese* propé *Basileam* &c .
- c) Athenis ocreatus magno suo merito & aquam fundens pictus est , nomine Σηκυών , SPON voyag. en Grèce & en Dalm. II. p 136.

in pago S. *Aubin*, qui paulo minus leuca distat a monte, quem *Falconarium* IOHANNES BAUHINUS a) vocat, vulgo a celebri *Creux du vent* nomen habet. Neque morati, postquam corpora procuravimus, inminente fine diei cepimus per agros & prata, deinde per sylvam humiliorem, & infidas umbras inclinati foli apertas adscendere. In ea, ad montis fere radicem frequens fuit *Veronica maxima*, de qua aliqua addere visum est, cum adeo in omnibus *Floris* rara sit, ut paucos inveniam etiam Clas-
sicos autores, qui certo eam viderint. *Folia* equidem & habitum habet vulgatissimae, cui *folia ima rotundiora* sunt, imo vero & hoc habet commune, unde illa nomen habet. Sed altior est, & fruticosior, ut ad pedes tres, & quatuor adscendat. Deinde *folia atrovirentia*, multo acutiora habet, quam vulgaris, & *urticae urentis* similli-
ma, acutis dentibus, longoque mucrone. Sed *floris* et-
iam evidentius est discrimin. Is in similibus racemis ex
alis foliorum prodeuntibus nascitur, sed in planta multo
majori minor, ut vix duarum linearum diametrum ex-
pansus superet, inaequalis equidem, ut maximum segmen-
tum sit supremum,imum minimum, media medio mo-
do se habeant, sed nunquam coeruleus, perpetuo lan-
guide carneus, pictus venis, quae ex albo tubo pur-
pureae veniunt. *Stamina*, *Tuba*, *Ovarium*, non eviden-
ter differunt, hoc compressum, emarginatum, & in ut-
roque loculo polyspermon est. In *Helvetia* fere ubi-
que in sylvosis frigidis. Prope Bernam in sylvula *Weiler-
holz*, ad algida ambulacra, quae toties adii, delectat-
us remota solitudine: sub clivo *Sandrein* ad *Arolam* in
dumetis. Circa balneum *Weissenburg* *Augustae Rau-
racorum*, in valle *Emmenthal*, *Creux du vent* &c. **Clusi-**
us

us a) eam non videtur descripsisse. *Teucrium enim Pannonicum I.* quod ad suam non satis dubius refert IOHANNES BAUHINUS, & ex coeruleis floribus, & ex folii figura est *Veronica supina folio Teucrii pratensis*, qualis altior in herbosis Helvetiae collibus saepè prodit. Sed LUGDUNENSES veronicam maximam b) dixerunt, cum iconē non mala, uti non incommoda est IOHANNIS BAVHINI c) icon, qui Genevæ inventam, absque synonymo, vocat *Chamaedrym falsam maximam*, an *Teucrium I. sive majus Pannonicum Clusio?* Ex LUGDUNENSIBUS dixit in pinace CASPARUS Chamaedrym spuriam majorem latifoliam. In Phytopinace vero spuriam majorem primam d). Chamaedrys vero mas utraque CAMERARII e) de quarum altera dubitavit CASPARUS, videntur omnino verae Chamaedryes esse, non Veronicae. Neque Chamaedrys fruticosa JUNGERMANNI & HOFMANNI f) huc videtur facere, sed ad CLVSIANVM illud *Teucrium I.* Apud PARKINSONUM quod non inventio, miror. RAIUS LUGDUNENSIMUM plantam non vidit g), IOHANNIS BAUHINI nomine vero dixit idem *Teucrium I. Clusii*, h) neque MORISONUS verbis, quae exscribit, LUGDUNENSIMUM, quidquam addidit i). TOURNEFORTI-

E 3

us

a) Pannon. p. 612, & ic. p. 613. quod in *bistoria* IIII. est p. 349.

b) p. 1165.

c) III. p. 2. 286. si quidem, quod dubium est nostram velit. Eadem est CHABR. p. 428.

d) p. 474.

e) Hort. p. 39.

f) Flor. Altendorf. delic. sylv.

g) Teste Asterisco, *bistor. pl.* p. 848.

h) ib. 849.

i) *Hist. oxon* II. p. 322. L. 23. S III. fig. 18. vocat *Veronicam maximam latifoliam s. quercus folio*, quae similitudo non a natura desumitur,

us k), GARIDELLUS l), TILLIUS m), MAGNOLIUS n) nomen habent LUGDVNENSIVM , absque ulla distinctionis nota : neque quidquam HERMANNVS o), & PLUKNETIUS p) & BOERHAAVIUS q) & AMMANN r) reliquerunt, ex quo constet , eam ipsis fuisse cognitam. Unus superest BUXBAVMIVS , qui *Veronica* s) pratensem omnium maximam, in Bithynia inventam ita depinxit, ut nostrae sit simillima : neque loci natalis insignis diversitas nos terret, cum *Olympus* s) & *Cappadocia* Alpinas, *Byzantinus* autem ager Pannonicas Clusii ferat , eodem teste t) BUXBAUMIO.

§. XXII.

In iisdem sylvis plurima eleganti spectáculo nascitur *Rosa non spinosa*, ramosissima, folio levi duro, flore odorato, vividissimi coloris Kermesini, centro pallente, fructu raro lenissimis spinis & ad basin solum hirto , plerumque levi , uti tota planta glabra est, praeter petiolos florigeros , qui hirsutiem aliquam habent. In ea planta observo

k) *Veronica maxima* IRH. in Schol. Bot. verò nomen habet C. B.

l) *Hist. des plant. qui naiss. aut. d'Aix* p. 485. eodem nomine.

m) *Hort. Pisan.* p. 171. Nam is fere nullam TOURNEFORTII plantam non habet.

n) *Hort. Reg. Monsp.* 203. eodem nomine.

o) *Flor. Batav.* p. 72. cum nomine MORISONI.

p) *Aimages* p. 343.

q) *Ind. alt.* p. 225. si quidem nostram intellexerit, nomen enim amicissimi ROVENII appositum plantae BOERHAAVIANAE videtur demonstrare , quod *Teucrium* I. sub nostrae nomine in horto Leydensi alatur. *Flor. Lugd. Batav.* p. 303.

r) *Char. plant. natur.* p. 327.

s) *Cent. I. rar. plant.* p. 23. T. XXXIV,

t) *Centur.* II, p. 25.

servo , I. Omnino huc pertinere , *Rosam sylvestrem*
quae a Majo nomen habet , spinis non perinde minacibus
GESNERI a). Nam idem *Rosas majales* sine spinis vocat
 alibi b). Deinde II. *Rosae sylvestris* genus tertium **TRA-**
SI e) iisdem pene vocibus describi , quibus **GESNERVS**
 usus est , & eodem pertinere : Ut adeo *Rosa sylvestris*
odoratissima rubro flore **CASPARI BAUHINI** expungi pos-
 sit , & ad *Rosam ejus* X. referri , quo & XIX. revocari de-
 bet. **CORDI** certe *quarta Cynosbatos* , d) si lanuginosa &
 incana folia habet , longe utique a nostra distat. Deinde
Rosa saxatilis minima flore ruberrimo **CAMERARII** e) cuius
 icon admista esse videtur aliis *Rosis* in una tabella depictis , fa-
 tis similis est nostrae. *Rosa Graeca* & *Cynorrhodon* leve ex
 monte *Pilati* f) odoratum **LUGDUNENSIMUM** nostra est , & fa-
 cit ut nostrae eadem sit *Rosa canina spinis carens biflora*
CASPARI BAVHINI. *Rosa alpina pumila spinis carens* ,
BVRSERS g) omnino huc pertinet. Bona vero descriptio
 est **IOHANNIS BAUHINI** h), quae & **RAII** i) est , uterque ,
 vero in *Jura M.* nostram legit . Nam in *Dolaz M.* & in
 asperis rupibus , qua ex *Vogelberg* descenditur in *Wasser-
 fall* , eamdem legi anno 1736. *Rosa Provincialis* minork,) quam

a) *Hort. Germ.* p. 126.

b) *Tabb. coll. stirp.* p. 102, b.

c) p. 988.

d) *In Dioscorid. I. c. 124.*

e) *Epic.* p. 99. **GESNERIANAM** in *horto Medico* p. 144. *Cinnamo-*
meam simplicem vocat.

f) p. 126.

g) *Act. suecic.* p. 535.

h) *Rosa rubello flore parvo simplici non spinosa* III. p. 39.

i) eodem nomine **RAII** p. 1470. & *syll. stirp. exter.* p. 219.

k) p. 1085.

quam ad nostram excitat TOVRNEFORTIVS , nihil mutata sententia per reprehensionem IOH. BAUHINI , ea manifesto spinosa est.

§. XXVIII

Paulatim *Aria* & *Ranunculus montanus* aconiti folio frequentius visi. Et hic quidem trium, quatuorve pedum altitudine, semper idem visus est cum Alpino humillimo. Deinde *Thalictrum alpinum aquileiae* folio staminibus floris, *albis*, *flavis*, & *purpur ascentibus* : *Cyanus major* ; *Oreoselinum majus* ; *Christophoriana* : *Prenanthes VAILLANTII latifolius* flore purpureo : *Melissophyllum albo*, & *carneo* flore. *Valeriana alpina* folio scrophulariae: *Geum rotundifolium majus* : *Polygonatum angustifolium non ramosum*, & aliud flore majore odoro : *Hieracium latifolium glabrum ex valle Griesbachiana*, & aliud *asperius Conyzae* folio ; *Myrrhis palustris latifolia* ; *Dentaria* ; *siler montanum* ; *Lonchitis aspera* ; *Polypodium angustifolium* flore vario, omnino alio genere, & proprio, dignum, cum inter nostras filices solum seminalia folia propria, & diversa gerat a sterilibus a). *Laserpitium foliis latioribus lobatis* : *Melampyrum floribus parvis luteis*; pluresque aliae.

§. XXIX.

Frequens erat ad viam , uti in omnibus Alpium humilioribus pascuis non infrequens est, *Cardui* genus , vulgare , sed obscurissimae notitiae. Ego *Carduum molle* voco , *foliis rigidis molliter spinosis* , *scapo longo paucifloro*. *Radix longa lignosa* est. *Caulis unus plerumque* , aut plures , erecti , cubitales , & ultra , alis foliaceis spinosis paucim obducti , quas faciunt foliorum initia , priusquam

a

a) RUPPIUS Spicant dixit. An LINNAEUS ad Acrosticha?

a caule recedant. *Folia* solida , & dura, perpetuo glabra, nervo medio conspicuo, margine omni molibus, & per exiguis spinulis aspero , alias pene integro , ut salicina aemulentur , alias dentato , alias profunde, & varie lacinato ; Color hinc sature viridis, inde caesius, sive ex glauco pene virens , non sine lutei mistura. *Rami* pauci, iisque fere non foliosi , *florem* gerentes , qui erigitur equidem , sed postquam vigor plantae declinavit, pendet et invertitur. Is magnus est , colore ex laeta purpura dilutiori. *Calycis* squamae longae, simplices , innocuae , apice non recurvo , virentes, mucrone saepe purpurascente. *Flosculi* numerosi, in quinque lacinias profundissime secti. *Tubus* longus, *Staminum cylindrus* alba eminens, purpurea : *Tuba* simplex; *Semen* striatum, coronatum, pappo simplici, argenteo, in thalamo papposo. Hujus, adeo frequentis plantae , antiquam descriptionem nulla reperio. Nam et si utcunque convenit icon *Cirsii majoris singularibus capitulis magnis*, C.B. quae exstat in *Observationibus LOBELII a)*, diversissima tamen est, habitu , & plumoso pappo. Ita *Cirsium Pannonicum primum pratense* CLUSII b) foliis quidem caesiis convenit, & loco natali , & habitu monoclono ; sed diversum esse , ex herbario vivo CASPARI BAUHINI didici, atque refero nunc ad *Cirsium* simile nostro *Carduo* , sed mollius , quod in altissimis pratis *les Mosses* inter *Aquilegiam* & *Chateau d'Oex* olim reperi. Sed BAUHINORUM prima hic est inventio. Et varietas quidem laciatis foliis , est *Carduus dictus Cirsium*, folio laciato nigrius IOANNIS BAUHINI c) lectum in *Wasserfall & Thuri* , Jurae partibus

a) *Cirsium majus* ic. 582.b) In *Pannon.* 656. & in *histor.* CXLVIII.

c) III. I. p. 43.

bus, frequens etiam mihi visum est. Inde RAIUS d), qui prope *Genevam* eamdem plantam reperit, historiam non illustravit. MORISONVS e) male retulit ad *Carduum Asphodeli radice*, neque enim tales sunt nostro, neque dixerat IOHANNES BAVHINVS, sed *Hellebori nigri* similes. Verum alter frater, CASPARVS, in eodem *M. Wasserfall*, idem invenit, descripsit, dixitque *Cirsium angustifolium* f). Inde *Cirsium angustifolium Germanicum* PARKINSONI g). Recentiores, & princeps TOVRNEFORTIVS, nihil addunt. Sed altera varietas, *foliis integris*, in eodem *M. Wasserfall* lecta est a CASPARO BAVHINO, ibique, & protinus supra *Dornach*, etiam ego inveni. Id nominavit *Cirsium capitulis singularibus parvis* h), & synonyma fecit *Cirsion DODONAEO* i), *Cirsium III. montanum I. Clvsii* k), *Cirsium alterum LOBELII* l), haec certo, CÆSALPINIANVM ex conjectura. Verum id, simile utcunque nostro, in maritimis regionum calidarum provenit, ubi & RAIUS visum est, loco certe remotissimo a subalpino, quem nostrum solum amat. LOBELIVS omnem similitudinem excludit, quando caules *teneros* dicit: DODONAEVS autem *Lactucae* foliis comparat, cum nostro folia sint duritie *Lauri*, caulisque firmus. Figura, uti in universum non

re-

d) *Syll. plant. extra Brit.* p. 85. *bistor.* p. 305.e) *III.* p. 151.f) *Prodr.* p. 155. *Catal. plant. circa Basil.* p. 102. & *Pin.* p. 377.Idem nomen exstat in RAIUS *syllog. plant. extra Brit. nasc.* p. 99. & in I. R. H.g) p. 962. *Theatri.*h) *Catal. plant. circa Basil.* p. 102. *Pin.*i) *In purgant. bistor.* p. 451. *Pemptad.* p. 737. edit 1616.k) *Pannon.* p. 655. *bistor.* p. CXLVIII.l) *Observ.* p. 314. *Advers.* p. 251. *icon.* p. 382.

recedit, ita nimis ramosa, & frondosa est. Nisi velimus CLUSIANAM plantam cum nostra conjungere, DODONAEI & LOBELII stirpem, utcunque eadem omnes icones sint usi, separare, & a nostro, & a CLUSIANO Carduo. Quod, & si non probabile videtur, forte non esset a vero remotum. Nostram enim plantam Clusivs, qua erat diligentia, vix potuit non vidisse. IOHANNES tamen BAVHINVS & RAIUS nullibi ejus in Helvetia inventae meminerunt, sed exscripserunt fere ex Cysio.

XXX.

Jamque enixi per sylvam, aliquamdiu delectati pulcherrimo prospectu per lacum Neocomensem & pagi Aventici magnam partem latisime patente, per angustam vallem, mistam sylvis & pascuis, iter nostrum ursimus. In sylvis *Cacalia glabro folio*, & *Campanula folio drabae minoris* nascuntur. Et ad hanc quidem, quod confusior sit ejus historia, aliquas animadversiones addimus. *Radix* unus est napulus scaber & teres. *Caulis* angulosus rectus, ad duos pedes, & ultra. *Folia* leniter hirsuta, & aliquando glabra a), ora acute denticulata, brevi acumine, & aliqua *urticae* similitudine. *Calyx* capillaribus segmentis; floris color semper visus est coeruleus intensus. Multi caeterum ex alis foliorum, uno fere versu prodeunt in raram spicam, & in eo, uti toto habitu, *campanulam hortensem* rapunculi radice refert. Ea est *Campanula Drabae minoris foliis* CASPARI BAUHINI b), qui ex *Thermis Valesiis* habuit, ubi copiose eam legi; nam in alpinis pratis, & praetera similibus locis &

F 2

in

a) Id ideo addo, quod JOH. BAVHINVS suam *flore dilutiori glabram* dicat, CASPARVS vero suam, *folio Drabae minoris subasperam*.

b) Prodr. p. 36. & in Pinace.

in *Ursaria* valle, & circa *Candersteg*, & in *M. Suchet*, qua parte ad pagum *Baume*, viperarum copia non incelebre, descendit, non rara est. Ex eo PARKINSONVS c), & RAI VS d), & TOVRNEFORTIVS e) eodem servato nomine. Deinde ipse TOVRNEFORTIVS huic revocavit *Rapunculi genus folio serrato rotundiore* f) JOHANNIS BAVHINI, quod ex *Stiria* habuit, consentiente SCHEVCHZERO, neque recedente iconē JOHANNIS. Erit ergo *Campanula stiriaca* nonnihil *birsuta imis foliis rotundioribus per ambitum profunde crenatis* PLVKNETI g), & *Rapunculus folio serrato rotundiore flore convolvuli* MORISONI h), qui JOHANNEM sunt secuti. Sed omnino etiam videtur huc facere *Campanula alpina urticae foliis minor*, floribus reflexis, & unico ordine dispositis flore coeruleo PONTEDE-RÆ i), quam pro nova dat, diversam solo colore a *Campanula alpina glabra flore dilutissime cœruleo* JOHANNIS BAVHINI k). Nam & haec, repetita a MORISONO l), TOVRNEFORTIO m), RAIo n), TILLIO o), nostrae eadem omnino videtur, quam siccām, quod non temere autumo, acceperat

c) *Theatr.* p. 646.

d) p. 733. cum asterisco. *Syll.* p. 81.

e) I.R.H. & *Schol. Bot.* p. 75.

f) II. p. 798. CHABR. p. 261. SCHEVCHZ. *It. alp.* i. p. 47. Simile nomen est *Campanulae foliis subrotundis* CASPARI BAVHINI, sed eam in *notis meis* invenio folio paulo rotundiori a nostra differre.

g) *Almageſt.* p. 77.

h) *Hist. Oxon.* II. p. 455.

i) *Comp. Tabular. Botan.* p. 74.

k) II. p. 806 CHABR. p. 263.

l) *Hist. Oxon.* II. p. 453.

m) I.R.H.

n) *Histor.* p. 733. cum asterisco.

o) *Hort. Pisan.* p. 29.

rat ab AGERIO BAUHINUS, colore vitiato, ut solet. Denuo, idem est p) *Rapunculum Teucrii* folio BARRELERII q), qui *Rapunculus* est *alpinus Teucrii* folio rhomboidalis Cocco-
nis r), & *Campanula alpina Teucrii* folio angulato I. R. H. Tandem eadem omnino videtur nostrae, *Campanula hor-*
tensis rapunculi radice SCHEUCHZERI s) in *valesiorum* altis
pascuis lecta, cum ea *Campanula* similis utique nostrae, &
maxime calycis latis segmentis diversa, alta loca & alpina
non amet, nostra vero, iisdem locis in *Valesia* frequens sit.

§. XXXI.

In pascuis, quae in mediis sylvis pinguissima offendimus, pulchra *Orchidum* genera proveniunt. *Orchis purpurea spica congesta pyramidalis*, cuius egregiam iconem debemus DILLENIO, a) & *Orchis rotundus DALECHAMPII* b)
frequens in *Jurae* pratis, sed & in praetaltis alpium gramineis a me repertus in *M. Rohtenborn*. Tenuis ejus est memoria. LUGDUNENSES brevem historiam habent, iconem adeo rudem, ut pene sit inutilis. CASPARUS BAUHINUS nihil addidit, praeter falsum epitheton *lutei* floris b*), quod (ad emendationem forte FRATRIS) correxit in PINACE c). Nihil JOHANNES BAUHINUS d) addidit, nihil RAIUS,

F 3

prae-

p) Consentiente SCHEUCHZERO. l. c.

q) *Icon. posth.* 567. quae bona est.r) *Mus. di Piante* p. 75. T. 61.

s) It VII. p. 510.

a) *Synops. RAIAN.* III. T. XVIII.

b) p. 1556.

b) *Phytop.* p. 122.c) Ubi dixit *Orchidem globoſo flore.*

d) Nomen retinuit DALECHAMPII. II. p. 765.

CHAER, p. 250.

praeter locum natalem e). PARKINSON f), MORISON g), TOURNEFORTIUS h), &, qui nulla stirpe caret, TILLIUS i), non videntur plantam vidisse. VAILLANTIUS k) etiam expungere conatus est. Nomen ejus habent etiam SCHEFFERUS l), KNAUT m) & BUXBAUM n), & THALIUM o) citant auctorem. Sed THALIUS quidem *umbellatum* florem dixit : Ipsí vero nihil addiderunt, ex quo discamus, quod plantam nostram viderint. Sed nimis singularis est fabrica floris, quam quae omittatur. *Testiculi* quidem de more, & *folia* oblonga modice acuminata, convenient generi. *Spica* breviori est habitu, & densissima, qualis in *nigra* est. *Foliola* sub ovaris longula. *Ovarium* longum, & gracile. *Barba* trifida, segmentis lateralibus simplicibus, medio leniter trifido, interjecta divisioni spinula, punctato. *Cuculli* vero petala ab omni alia *Orchide* remotiora, nam omnia in longam caudam gracilissimam producuntur. Eorum duo, quae interiora sunt, puncta etiam habent. Color vero ubique roseus. *Calcar* longum. *Machinula Staminum* ex more gentis. Posset ergo verissime dici, *Orchis spica brevi densa petalis caudatis.*

§. XXXII.

- e) *Histor.* p. 1216. cum nomine C. B. Invenit in montibus circa *Grenavam*. *In Syll. plant. extra Brit.* p. 191. *Orchidem rotundam* DAL. vocat & CASPARUM contra FRATREM male defendit.
- f) *Cynosorchis capitulo globoſo Theatr. Bot.* p. 1345.
- g) Cum nomine C. B. III. p. 492.
- h) Eodem. I. R. H.
- i) *Hort. Pisan.* p. 124.
- k) In *Botanic. Parisin.* p. 194. refert ad *Orchidem Pannonicam* III. CLUSII.
- l) *Orchis rotunda Dal. delic. Bot Halens.*
- m) *Orchis rotunda flore puniceo magno.* *Enum. plant. circa Hal.* p. 71.
- n) *Enum. plant. curatior.* p. 241. eodem nomine.
- o) *Orchidis species flore in umbellam* *Sylv. berceyn.* p. 81. 82.

§. XXXII.

Cum ea & hic, & in pratis *Grandvi*, uberrime provenit *Orchis palmata angustifolia Alpina nigro flore* a), odore non adeo, ut in alpibus eximio, qui oleum-caryophyllorum stillatitium aemulatur. Accolae vocant *Jalousie*. Planta nota est. Flos singularis, & ni fallor, non satis cognitus. *Spica* densa est & brevis. *Foliola* sub ovariis longa, purpurea. *Ovarium* brevissimum, valde pro portione longitudinis latum. *Flos* inversus. In angulo nempe acuto, inter ovarium & scapum intercepto, *Calcar* est brevissimum, ut pene nullum sit, & *Barba* ad latus duobus dentibus incisa, lata & triangularis, hederae folio non absimilis. Sed *Calcar* & *Barba* solent sub ovario esse, in angulo ovariis cum scapo obtuso. In eo vero loco in *nigra* Orchide cucullus est, qui quinque fit petalis, quorum duo reliquis angustiora sunt. Haec omnia ex atro purpurascunt. Domuncula staminum coccinea, apices lutei, ut in *Orchide fucum referente*, nam in plerisque speciebus sunt virides. Commode itaque diceretur *Palmata angustifolia flore supinato, calcare brevissimo*.

§. XXXIII.

Superata hac valle, per sylvam abiegnam, ingruente nocte, non absque aliquibus erroribus, per tenebras in alpinam casam, sed lautiorem, pervenimus, hand procul *Noiraigue* pago vallis *Travers*, sub ipsa ima valle, quae dicitur *Creux du Vent*. Ibi fragis melle & lacte liberaliter excepti, ut solennis jubet *Helvetiorum* monticolarum hospitalitas, quieti

a) Omnim prmo dicta RHELLICANO in Stockhorniade. quae apud GESNERUM de M. Fracto. prostat, anno 1536.

b) Neque bene descriptus a SCHEUCHZERO It. alp. IV. p. 339.

ti nos dedimus, nam ante diluculum viam denuo ingressi sumus, die II. Julii. Non *Digitalem parvo flore*, neque *Trollium* valde morati, quae plurimae ibi nascuntur, pervenimus ad scandendo in *caveam* vastissimi amphitheatri, solidis & abruptis ad perpendiculum rupibus in semicirculi speciem cinctam, nova loci facie. Patet vero & ad vallem, unde veniebamus, & ad occasum per difficilem aditum *le pertui de la bise*, ad orientem demum faciliori persylvam adscensu. Paululum substitutimus mirati altissimos quasi muros, nulla manus opera eretos, falconum, & vulturum tutissimas arces, deinde incumbentes angustae valli aeternas sylvas, ex frequenti ruina, quam dederat venti inmanis saevitia per omnes fere *Helvetiae* sylvas, etiam magis, & horridas & inpeditas. Sed statim poti ex gelidissimo fonte, diversos in calles secessimus, conventuri denuo in pascuis *Grandvi*. Ego ad Orientem adscendi, per salebrosam viam mediasque sylvas. Ibi plurima *Lunaria siliqua longiore*, & *Cardamine hirsutior*, loco subhumido & umbroso.

§. XXXIV.

In iisdem umbrosis & uidis, similibusque locis per omnia montana *Helvetiae*, multum provenit *Leucojum vernum perenne album majus* a), cuius non memini, quod aut raru[m], aut monendum sit, idem esse *Leucojum vernum perenne album minus* I.R.H. b), id enim dudum alii senserunt: sed ut comparem cum *Turritide minore* c) I.R.H. Abea enim planta, nae non facile utique distinguit, qui utramque plantam per varias aetates persecutus fuerit. Folia, flores si- liquae,

a) *Draba II.* Clus. Pannon. p. 562. hist. CXXIV. CXXV. bené.

b) *Draba III.* succulento folio Clusii hist. CXXV.

c) ZANICHELLII icon 170. & C. B. Prodr. p. 42. nomine *Erysimum similis hirsutac albae*, commoda sunt.

liquae, similia sunt. Ego sollicite comparatis multis utriusque speciminibus, invenio florem *Leucojo* paulo majorum, siliquas paulo latiores esse, habitum magis brachiatum, & procumbentem, siliquas a caule majoribus angulis recedentes, folia paulo, sed non multum, profundius ferrata. Varietas *Leucoji* incola summarum alpium saepé flores habet lividos fere violaceos. Sed & id *Turritis minor* imitatur. *Nectaria*, quae LINNAUS d) in *Leucojo* nostro inventit, & tanti facit, ut etiam genere distinguat, ea in meis sic cis invenire non potui. An quod de diversis plantis loquamur?

§. XXXV.

In iisdem nemoribus, conspicua statura erigitur *Carus mollis* foliis imis laciniatis, superioribus integris, squamis calicis reflexis. Is, quoniam paucissimis cognitus est, meritetur describi. *Folia* ejus ima valde a superioribus discrepant, suntque *Dipsaci* laciniati, aut *Acanthi* foliorum non dissimilia, costa lata, ad quam primo vagae solutaeque pinnae junguntur, deinde latiores, & ipsae non leviter ferratae, quarum ultimae in latum quasi urticae folium, longum, mucronatum, acute ferratum confluunt. Omnis margo mollissimi pilis quasi ciliis ornatur. Pars cauli obversa subhirsuta est leviter, prona album tomentum ad nervulos habet, sed tenue, & rarum. Suprema *folia* absque ullis pinnis, uno continuo ambitu terminantur, ex difformiter elliptico productiori, paulo magis tomentosa. *Caulis* altissimus est, vidi olim qui meam statuam superaret, profunde ful-

d) *Char. gener.* 544. *Hort. Cliffort.* p. 335. *Flor. Lappon.* 257. Humanissimus ROYENIUS & ipse ad *A. abim* refert *flor.* *Leid. Prodr.* p. 339.

fulcatis, alis spinosis subinde abundans, fragilis. *Flores* ad caulis & ramorum vertices congesti, & seni septenive ad unum petiolum sessiles, quam primam cum *Lappa* similitudinem habet. Sed *calyx* & ipse *Lappam* imitatur, gracilibus squamis, quarum apex mutata directione vel ad latus, vel retrorsum etiam, gracili mucrone flectitur, in eo diversus a *Lappae* calyce, quod non brevissimo hamulo, circulatiter flexo, sed longo mucrone, eoque utcunque falcato terminetur. *Flosculi* purpurei profunde dissecti. Seminis *pappus* simplex, quo a *Cirsii* VAILLANTII differt. Passim in *Jura* provenit, v. g. ad longam illam acclivemque viam, quæ ab *Orvins* versus *M. Chasseral* dicit; deinde in valle *Grindelia* in dumis, priusquam pagum subeas; in valle *Ursaria*, & circa *Thermas valesiorum* ad sepes. Non est certe nosfer, *Carduus mollis latifolius* a CASPARO BAUHINO in *Prodromo* a) descriptus, quem *Lappae* capitulo vocat in *Pinace*. b) Nam folia ei tribuuntur rumicis. Neque *Cirsium acanthoides altissimum polycephalon Lappae capitulis* VAILLANTII c) utcunque nomen conspiret; nostro enim *pappus* non est plumosus. Sed omnino videtur huc referri debere *Cirsium majus caule alato polycephalon capitulis majoribus personatae aemulis* a SHERARDO lectum in *Jura M.* prope *Gennevam* d).

XXXVI.

Passim in humidis *Chrysosplenion* provenit, quod in Germania semper alternis foliis provenire, & differre a DODONAEI a) *Saxifragia aurea*, dudum ante PETITUM b) obser-

a) p. 155.

b) p. 377.

c) *Memoir. de l' Acad. des scienc.* 1718. p. 203.

d) *In syll. Stirp. extra Brit. naſc.* p. 399.

a) *Pemptad.* p. 316. qui conjugata folia pinxit.

b) *Lettres dun Medecin Namur* 1710, *lettre III*, p. 39.

servavit JUNGIUS c). Deinde & prius, quam penitus ex sylva ad scopulos perveniantur, *Cynoglossum minus folio virente*. Tum vero paulatim tenuior sylva, graminea spacia relinquunt, quibus ad Austrum modicæ rupes opponuntur. Ibi, mutato loci ingenio, subito multæ plantæ proveniunt minutiores, & magis alpinæ.

XXXVII.

Primam memoramus *Bistortam alpinam minimam*, quæ adeo saepe repetita est apud Scriptores rei herbariæ, ut operæ precium videatur dispersas nomenclationes in unam colligere. Antiquissimum nomen est ARETHI a), qui *Bistortam minimam uno in caule foliolo legit in Neffo*. GESNERUS *Limonii speciem minorem* b) dixit in altis montibus nascentem.. Deinde CLUSIUS *Bistortam minorem* e). In ejus iconе folium imum ellipticum desideratur, nervi tamen ad oram folii exprimuntur. Sed CAMERARIUS d) iconem extimam proposuit, quæ folia ima elliptica, nervis ad oras exiguis, egregie exprimit: verum eam a GESNERO habuisse videtur, plantam ipsam parum cognovisse, siquidem alibi e) cultu in vulgarem speciem degenerasse dicit, quod in tanta diversitate seninis foliique fieri posse non videtur, CLUSIANAM vero, æque nervosis foliolis, æque longa spica & gracili præditam, a sua distinguit. LOBELIUS *minoris* & *minimæ* in *Adversariis* f) absque distinctione, in Illustrati-

G 2

ti

c) *De homon. plant.*

a) Post CORDUM. p. 234. b.

b) Add. ad p. 265. *de bort. German.*c) PANNON. p. 478. *bistor. LXVIII.*d) *Bistorta minor s. Alpina Epit.* p. 684.e) Dicitque *Bistortam alpinam minimam bort.* p. 28.

f) p. 121.

tionibus g) vero *Bistortam minimam nostratem* pro nova de-
 scribit, incertum, qua nota distinctam. JOHANNES BAUHINUS
 h) ut solet, sapiente consilio usus, CLUSII & CAMERARII
 plantas conjunxit. Contrario more FRATER Cameraria-
 nam in *Phytopinace* i) minorem, in *Pinace alpinam medium*
 dixit, CLUSIANAM vero illic quidem minorem alteram, hic
alpinam minorem. PARKINSONUS una addita ex LOBELIO tres
 habet, minorem nempe nostratem k) a LOBELIO, minorem al-
pinam l) ex CLUSIO & CAMERARIO, & minorem pumilam vari-
 am m) ob foliorum diversitatem denuo pro nova. Ab eo
 tempore etiam aucta est confusio; cum enim MORISON
 in hortensi stirpe, per ocium observato semine, id rotun-
 dum esse inveniret in *Genevensi & Westmorlandica*, PARKIN-
 SONIANAM vero, incertum ex qua traditione, existimaret
 simile semen habere vulgari, tres denuo plantas fecit, *Bi-*
stortam minorem seu Alpinam n) ex CAMERARIO o); *Bistortam pumilam* foliis variis rotundis & longis ex PARKINSO-
 NIANA varia p); *Bistortam alpinam minimam soboliferam* q)
 ex CLUSIO, nam & is suo tempore jam observaverat, Iudere
 pumilam *Bistortam* foliolis loco seminum in spica proveni-
 entibus. Minorem vero nostratem PARKINSONI omisit, aut
 tacite junxit soboliferae. Idem in iconibus etiam multiplica-
 vit

g) p. 80. Semen primus subrotundum describit.

h) *Bistorta minima* III. p. 539. ex M. Thuiri CHABR. p. 507.

i) p. 357.

k) p. 392. pro distincta a stirpibus veterum. Id nomen habet Mo-
 RISON in *hort. Bles.* p. 29.

l) Ibid.

m) Ibid.

n) *Hist. oxon.* II. p. 585.

o) Qui & ipse, si recte video, semen habet gigantinum in icona.

p) Ibid.

q) Ibid.

vit errores. Nam pro *majore radice magis intorta nostram*
pinxit, ex crenis marginalibus facile agnoscendam, CAMERARIANAM vero, quam a CLUSIANA in descriptione separaverat, conjunxit in iconē r). RAJUS, sapiens scriptor neque amans specierum inutilium, seminis figura motus, quam vere existimaverat observatam a MORISONO, *Bistortam alpinam pumilam variam* f) PARKINSONI sibi non visam, separavit a sua *Genevensi*, et si pene ultimo certitudinis gradu constare videatur non duas, diversissimo semine, *Bistortas* in alpibus nasci, quarum utraque folia ima subrotunda, reliqua longa habeat. Idem RAJUS non ausus est *Bistortam alpinam medium* t), nempe CAMERARIANAM, conjungere CLUSIANAE siue *minori* u), cum omnino evidens sit, iconem siue GESNERI, siue CAMERARII, nostram exprimere foliis ludentem, oris crenatis, *Jurae & alpium* incolam. Ergo & PARKINSONUS, & MORISON, & RAJV tres reliquerunt *Bistortae* species, quae nihil a se invicem differunt. Eadem deinde ratione HERMANNUS w) & *medium alpinam* ex CAMERARIO habet, & *alpinam minimam soboliferam* x) ex CLUSIO. SUTHERELANDUS y), SIBBALDUS z) VOLCKAMER aa), BOER-

G 3.

HA-

r) See&t. V. T. 28. f. 3. & 5.

f) Hist. p. 187. In Synopsi III. p. 147. vocat *Bistortam alpinam minimam* foliis imis subrotundis, & minutissime serratis, quod nomen, ex PLUKNETIO ortum, sere definitio est nostrae, licet pro nova, & a CLUSIANA & CAMERARIANA distincta exhibeat.

t) Syll. stirp. extra Brit. nasc. p. 77. & Hist. l. c.

u) Cat. plant. Angl. p. 42. Hist. 187. Syn. III. p. 147. quo revocat minorem nostratem PARKINSONI.

w) Flor. Bat. p. 140.

x) Flor. Bat. l. c. Hort. Lugd. Bat. p. 89.

y) Hort. Edimb. p. 50.

z) Scot. illustr. p. 13.

aa) Flor. Noric. p. 64.

HAAVIUS bb) hoc nomen repetierunt. TOURNEFORTIUS cc)
vero, MAGNOLIUS dd), TITA ee), & TILLI ff) *alpinam mi-*
norem vocaverunt post CASPARUM BAUHINUM. Et TOUR-
NEFORTIUS gg), & TILLI hh), *alpinam medium* distinxerunt,
eumdem secuti. PLUKNETUS ii) *alpinam medium* ab ea sepa-
rat, quam eo nomine dixit, quo usus est DILLENIUS in *sy-*
nopsi III. RAIJ ll). Interim in ultimo septentrione visam
vir industrius MARTENS mm) eam depinxit: MENZELIUS
nn), ex varietate CLUSIO & MORISONO visa, dixit *minimam*
spica prolixa sive foliolis ex spica prolixa, & ob eamdem
varietatem RUDBEKIUS oo) *Bistortam alpinam minimam sobo-*
liferam. SCHEUCHZERUS *alpinam pumilam variam* dixit pp).
PONTEDERA observavit, florem plerumque album esse, quod
verum est, novum nomen qq) fecit, quod non erat necesse.
WEINMANNUS rr) pro more suo, ita depinxit *Bistortam alpi-*
nam minimam, ut nemo agnoscat. LINNAEUS ss) *Bistortam*
dicit

bb) *Ind. alt. hort. Lugd. Bat.* II. p. 87.

cc) *Schol. Bot.* p. 7. I.R. H.

dd) *Bot. Monsp.* p. 33 & H. R. M. p. 33.

ee) *Hort. Maurocen.* p. 28. & *It. alp.*

ff) *Hort. Pisan.* p. 24.

gg) *Schol. Bot.* l. c. & I.R. H.

hh) l. c.

ii) *Almagest.* p. 68.

ll) *Bist. min. alp. foliis imis subrotundis & minutissime serratis.*

mm) *It. Spitzberg* c. 7. T. I. lit. a.

nn) *Pugill. plantar.*

oo) *Aet. suecic.* p. 96.

pp) *Inventam in Rhaetiae Alpibus It.* II. p. 130.

qq) *Bistorta minima candida comp. Tab. Botan.* p. 29.

rr) *Phytanthrozoiconograph.* T. 245.

ss) *Flor. Lapon.* 1; 2. *Hort. Cliffort.* p. 150. Idem nomen existat
apud ROYENIUM p. 217. cum synonymo CLUSIANO.

dicit foliis lanceolatis, & ad eam refert, post MORISONUM,
illam folio minus rugoso radice magis intorta, quam pene certus sum esse varietatem vulgaris majoris, nullas ad oram crenas, neque spicam gracilem habentem, neque folia ad terram elliptica, uti ex iconibus FUCHSII comparatis tt) satis constare potest. Eas notas, cum non habeat *Bistorta montana minima* BARRELERII uu), ad majorem potius videtur referenda esse. Tandem AMMANUS ww) *Bistortam* describit in Siberia lectam, quae procul dubio eadem nostrae est, flore albo, semine subrotundo, sobolifera. Reliqua vero omnia nomina, adeo multa hic recensita, sunt *Bistortae foliis variis ad oram nervosis, semine gigartino*, quae ubique, & in editioribus Jurae, & in asperis alpium pascuis provenit.

XXXVIII.

In illis lapidosis plurimus provenit *Ranunculus* ille albo flore minimus, de quo loco opportuniiori dicetur a), & *Saxifragia* sedi foliis serratis, & *Filicula saxatilis* caule tenui fragili, & pulchrum *Alchimillae* genus folio quinquefolii subtus argenteo a*), in alpibus & Jura passim frequens, cuius ideo memini, ut separem ab *Alchimilla alpina quinquefolia* CASPARI BAUHINI b), quae, cum eadem sit cum *Alchimilla alpina pentaphyllea minima lobis fimbriatis* BOCCONE c), nostræ aliquando

tt) p. 773. 774. conf. It. Hercynic. XIII,
uu) Icon. 489.

ww) Plant. Ruthen. n. 243. p. 199.

a) §. LXXVII. LXXXI.

a*) Cujus egregia icon est GESNERI apud CAMERARIUM epit. p. 908:
Alibi Argentariam dixit, descr. mont. fract. p. 61, & Argentariam petraeam hort. German. 248.

b) Prodr. p. 138. & Pin.

c) Mus. di piante, p. 18. T. I,

quando non optime conjuncta est ab eximio LINNAEO c); Haec enim nihil habet villosi, neque argentei, & folia multo minutius *Ranunculi* quadam forma divisa, summarum alpium incola. Character nostrae idem est cum *vulgari* quatuor staminibus, semine. Umbilicus calycis villo expletur, qui saepe fuscus & niger fit, unde singularis plantae habitus oritur.

XXXIX.

Multa etiam ibi *Androsace alpina perennis angustifolia glabra*, quae plerumque flore est multiplici, diversissima a *Diapensia LINNAEIA* a), quae mihi incognita & nova stirps visa est. Nostrae enim certe *calyx* semiquinquefidus, & *Campanulae* calyci similis est, quam praecipuam adfinitatem habet cum *Androsace altera MATTHIOLI* b). Neque enim novi, num ea decem illas nostrae *glandulas* habeat in centro tubi floris, ubi expanditur, facientes corollam, qualis est in *Scorpiuro palustri*. *Calycem* vero communem certo nostra non habet, nec peculiaris *calycis* folia serrata, neque floris segmenta integra d), neque magnam illam *calycis* ad florrem rationem e), ut folia omittam, quae non bene characteri *Androsaces* inmiscuit magnus BØERHAAVIUS f) Caeterum nostrae commodam iconem dedit CLUSIUS g) Tres alias Helveticas, adgnatas nostrae, alias dicemus.

XL.

d] In *flor. Laponica* 67. Nam in *horto Cliffortiano* sententiam mutavit.

a) *Flor. Laponic.* 88.

b) Cujus pulchra est icon in *Epit. CAMERAR.* p. 639.

c) TOURNEFORT I. R H. T. 46. A.

d) ibid ter. & KNAUT *Char. plant. gen.* 42.

e) Nostræ enim flos facile ultra *calycem* expanditur.

f) *Hort. Lugd. Bat. Ind. alt.* p. 201.

g) *Sedum alpinum alterum lacteo flore Pann.* p. 489. 490. *Sedum minus X. bispor.* LXI. IC. LXII.

§. XL.

Multa ibi *Pulsatilla alba*, & *Pinguicula GESNERI*, & *Campanula alpina rotundifolia minima*. Sed in primis, jam a JOHANNE BAUHINO eodem loco lectus, *Daucus Creticus*, cuius hic quidem varietas *rariori folio*, & *longiori* & *pene glabro* nascitur, superius in planicie montis *falconarii*, quæ summa est, altera varietas, *brevi* & *hirsuto* folio & *latiori* frequenter est. Hujus *Dauci*, in omnibus *Alpibus*, & in altioribus *Juræ* pratis non rari, historia confusissima est, ut eam expeditre non sit inutile futurum. In Dauco ergo, *breviori* & *hirsutiori* folio, radix magna conica, perennis, fuscis foliis obducta, plures caules, multaque folia fundit, squamosoque, neque piloso capite terminatur. *Folia* ad terram prodeunt ex longis, latis & striatis vaginis, quarum quaelibet vel unum, vel terna edit denuo divisa *folia totalia*. Horum *maximo*, si tria sunt, conjugatarum accedunt alarum non facile ultra sex paria: Harum alarum, quæ *primæ*, & *maximæ*, denuo quatuor fere tertia divisione pinnas educunt. Quarum denuo, quæ *maximæ*, tria congesta conjugata segmenta habent, quorum primæ trifida, aut quadrifida, secunda bifida, tertia simplicia esse solent, ultimo inpare, brevia omnia, vix trium linearum longitudine. Hæc in maximis, reliqua & minores & pauciores divisiones habent. Ultima segmenta semper aliquam latitudinem servant, ad tertiam lineæ partem, nihilque habent de capillari habitu *Mei* vel *Fœniculi*. Omnia hæc præ hirsutie albescunt ex viridi. *Caules* palmates pedalesque multi, similia, sed minora, ex latis magnisque foliis *folia* educunt, hirsuti ipsi, firmique. Sub *umbella involucrum universale* quatuor vel quinque fit *foliis* inæqualibus, longis, quorum, quæ latissima, ea lata sunt unam lineam. Octo fere umbellis *minoribus* fit major, aut parum intra eum numerum, aut ultra. Quarum denuo quælibet calycem habet ex quatuor

quinque, ad septem, latiusculis foliis hirsutis factum, ex albo virentibus, mucronatis. *Semina* hirsuta, striata. *Petala* alba; paulum inaequalia, ita profunde divisa, ut ex duobus sibi applicatis semicirculis fieri videantur, aut cordis profundius dissecti imagine. *Stamina* alba quinque. Alba etiam placenta duas *Tubas* memoria dignas edit. *Odor* & *sapor* acris & aromaticus. Reperi in M. Scheidek vallis Grindelwald, in M. Dolaz, alibique. In altera varietate, omnia simillima, sed glabra, & segmenta longiora, habitusque laxior. Et de *Dauco* quidem MATTHIOLI a), quem & utraque *Epitome*, *Italica* b), & CAMER. c) repetit, & CASTOR d), & LUGDUNENSES e), & TABERNAEMONTANUS f), de eo nihil lucis habeo, quod adferam. CASPARUS BAUHINUS g) eum diversum existimat, conjunxit FRATER non sine conjectura, MATTHIOLO suum *Daucum* parum cognitum suisle. JOHANNEM BAUHINUM plerique recentiorum h) sequuntur, BOERHAAVIUS CASPARUM i). Sed ad nostrum pertinet *Daucus montanus brevifissimis & minutissimis foliis* GESNERI k), & certo *Daucus creticus* ejusdem l), cuius etiam iconem habet inter CAMERARIANAS m). Legitimus *daucus Creticus* CLUSII n) *Daucus cretensis*

a) *Daucum* I. 779.b) *Daucum* p. 480.

c) Ibid p. 535.

d) *Herb. nuovo* p. 156.e) *Daucus* I. MATTH. p. 716.f) *Daucus creticus* p. 45.g) Dixitque *Daucum* faniculi foliis tenuissimis Pin.

h) RAJUS, MORISON, TOURNEFORT &c.

i) Qui *Creticum* MATTHIOLI vocat *Myrrhidem Orientalem* folio angustiori Peucedani semine villoso Ind. alt. p. 69.k) *Descr. mont. fract.* p. 64.l) *Hort. Germ.* p. 292. b & add. ad 256. b ex *montibus Rhæticis*.m) *Epit.* p. 35. in *barto vero Creticum verum dicit.* p. 54.n) *Pannon* p. 700. *histor.* CXLVIII. absque iconē.

tensis verus DIOFSC. LOBELII o), lectus in *Genevensium montibus;*
ειροκεχρεος THURNEISERI p), si quid in eo homine serii est;
Daucus Creticus semine hirsuto JOHANNIS BAVHINI q) ex hoc
 ipso, in quo versamur, *Falconum monte.* *Daucus montanus*
umbella candida CASPARI BAVHINI r), & ejusdem *Daucus*
montanus multifido longoque folio sive montanus umbella can-
dida s), in posterioribus operibus, cuius varietatem, *lon-*
giori & rariori t) legit in M. WASSERFALL; *Daucus alpinus Cre-*
tico similis PARKINSONI u). Et haec facile fluunt, primus
 rem impedivit MORISONVS, quando CAESALPINI w) obsecu-
 ris *Daucis* non satis intellectis, & planta, ut ex ejus verbis
 adparet, nunquam visa, & solum per descriptiones aliorum
 sibi nota, nomen c. b. bis repetiit. Inde enim factum est,
 ut *Daucum nostrum* x) SAXIFRAGAM dixerit, *multifido longo-*
que folio, quem ex suis legibus debebat *Myrrhidibus adnu-*
merasle, quæ ejus etiam in Umbelliferis y) fuerat sententia. Idem
 eundem *Daucum* denuo, conjunctis MATTHIOLI & CASPARI

H 2

BAV-

o) Advers p. 323. cum icone non bona foliis *Mei* aut *Anethi* & in observ.
 p. 416. Is minime dubitavit hoc revocare *Daucum* I. MATTHIOLI.

p) Hist. plantar. LXII.

q) III. 2. p. 56 CHABRAEUS *Daucum creticum* Sciagr. p. 389. *Dau-*
ci vero Tiburtini p. 54. brevissima est descriptio, ut non videam,
 quomodo de eo definiri queat. RAJUS certe & MORISONVS no-
 stro faciunt eundem.

r) Phytopin. p. 260.

s) Cat. plant. circa Basil. p. 45. Pin.

t) ibid.

u) Theatr. p. 896.

w) Lanuginoso Creticis simili L. VII. c. 16. & non lanuginoso monte-
 no C. 17.

x) Cum synonymo C. B. quod nostrum designat. His. Oxon. III.
 p. 273.

y) p. 84.

BAVHINI nominibus, vocat *Myrrhidem tenuifoliam annuam Creticam semine lanugine alba pubescente* z). Et ex eo tempore inter *Myrrhides* plurimi munera reverunt. *Myrrhidem* nempe *annuam* semine *striato villoso incano* vocant, ex eodem MORISONO aa), HERMANNVS bb), TOVRNEFORTIVS cc) BOER-HAAVIVS dd) MILLER ee) BOECLER ff). RAJVS JOHANNEM BAVHINVM secutus est gg). TOURNEFORTIVS in scripto priori hh), & TITA ii), & SCHEVCHZER kk) nomen CASPARI retinuerunt, PLVKNET ll) & SIEGESBECK mm) JOHANNIS appellationem. MVNTINGII *Daucus Creticus latifolius* & *angustifolius* nn) quid sint, & qua ratione differant, an deinde sint duæ nostri varietates, id quidem in ea brevitate definiri non potest. Non video, qua ratione ductus TOURNEFORTIUS nostrum alio nomine, ad aliud genus retulerit *Ligustici* oo), cui semina alata sunt, ita ut in priori nomine, *Myrrhidis*, JOHANNIS BAVHINI nomen, in hoc *Ligustici multifido longoque folio* CASPARI nomen citet, ut ut duo Fratres, non unius generis duas species, longe minus duorum generum plantas, sed eamdem certissime descripserint. Opor-

z) Cum eodem omnino CASPARI BAVHINI synonymo p. 230.

aa) Umbellif. p. 44. 67.

bb) Hort. Lugd. Batav. p. 423. Flor. Batav. p. 15.

cc) I. R. H.

dd) Ind. alt. p. 69.

ee) Gärden. dictionar.

ff) ad Hermann p. 293.

gg) Syllog. Stirp. exter. p. 114. biflor. p. 463.

hh) Schol. Botan. p. 162.

ii) Hort. Maurocen. p. 62. & in Itin. Alp.

kk) It. alp. I. p. 34.

ll) Daucus Creticus semine hirsuto Almagest. p. 129.

mm) Flor. Petropol primit. p. 40.

nn) Waare oeffening van den planten. p. 399.

tet utique, aliam a nostra, & diversissimam stirpem ob oculis versatam fuisse TOVRNEFORTII. Nihil enim nostra li-
rarum habet in semine. BESNIER pp) *Daucum creticum*
officinarum vocat. *Daucum Creticum* DALE qq), LEMERI
rr), ZORN ff), & ALLEYNE tt). LINNAEVS, determinato veris-
simo, uti solet, charactere, *Meo junctam Athamantam ha-*
bet, foliis capillaribus seminibus hisutis uu), quod nomen
retinet ROYENIUS ww), sed diversam plantam denotans,
& ab altera, simili sed latioris folii planta MORISONIANA.
Myrrhidae nempe annua semine striato villoso incano separat.
BLACKWALLIA denique iconem *Dauci Cretici* xx) propo-
nit, quæ ROYENI & LINNAEI *Athamantam* foliis capillari-
bus exprimere, & a nostra, alto atque laxissimo fœniculi
habitu differre videtur. Et revera, si *Dauci* characterem
ingrediuntur folia laciniata sub umbella cava, uti visum
est LINNAEO yy), non poterit ibi manere. Ex TOVRNE-
FORTH vero legibus non video, quare debuerit removeri
a *Daucis*. *Calycis* ratione habita certe vel *Meo* similis erit,
cum quo & habitum communem habet, petalis tamen di-
versus, quæ *Meo* integra sunt, *Dauco Cretico* cordata; vel
Myrrhidibus & *Chærophyllis*, quibus simillimum habet *caly-*
cem singularem. Tandem mirari licet, stirpis in officinis re-
ceptæ, neque rarissimæ, unam omnino iconem esse, quæ

H 3 apud.

oo) I.R.H.

pp) *Tournef. mater. medic.* III. p. 325.qq) *Pharmacol.* p. m. 197.rr) *Dictionnaire des drog.* p. 190.ff) *Botanolog* p. 60.tt) *Dispensator* p. 3.ww) *Flor. Bat.* 97.xx) *Herbal. tab.* 471.uu) *Hort Cliffort.* p. 93.yy) *Char. nat. plant.* 206.

apud CAMERARIUM est, & aliqua non habet, quæ desiderari possent.

§. XLI.

Et jam in summum montem eramus enixi, quem late occupant laetissima certe pascua, quibus pinguiora non vidi, infinita florum varietate depicta, & planissima, in lunæ crescentis speciem flexa circa oram horrendi præcipicii, quod ad imam arenam (*creux du vent*) juxta abruptissimos scopulos descendit. In ea ipsa ora *Dryas LINNAEI* plurima provenit, in pratis vero dominabatur *Anemonoides montana hirsuta polyanthos*. Multus ibi, ad rupium supercilia, *Ranunculus minimus albus*, plurima *Pulsatilla alba*, quae nihil habebat coerulei coloris, qui petala exterius pingere solet in alpibus; & *Gentiana alpina* flore magno procumbentibus floribus, & *pumila verna major*, & *Hieracium montanum latifolium villosum magno* flore, & *Thlaspi folio globulariae* petalis certe integris & æqualibus, quæ, nescio quam ob rationem, RUPPIO a), visa sunt irregularia; *Globularia ipsa montana humillima repens*, cui folia hilum excisum habent. Ejus flores, cum nondum ita viderentur descripti, ut fidum characterem ex Auctoriis decerpere ausus sit veracissimus LINNÆUS b), eam ipsam ob rationem proprius contemplatus sum. Sub quovis flore foliolum fuscum est, quorum conjunctione imbricata fit calycis generalis species. Proprius Calyx difformis quinquefidus bilabiatus, in duas partes discedens: Superioris duæ angustissimæ, tres inferiores latiores, & minus profunde excisæ sunt. Stamina libera quatuor. Tuba unica cum globulo, ex ovo, quod nunc in imo calyce minimum est. Hæc omnia cyanea.

Tout-

a) *Flor. Jenens.* p. 218.

b) *Conf. char. nat.*

TOURNEFORTII c) certe icon, quæ superius labium rese-
ctum habet, inferius trifidum, KNAUTIUM d), NISSOLIUM
e), & LINNÆUM f) seduxit, ut florem existimarent u-
nilabiūtum. BOERHAAVIUS g) nihil satis definivit, neque
PONTEDERA h), nisi quod post NISSOLIUM staminum nu-
merum addiderit. Videtur ergo nobis non longe remo-
venda a *Scabiosis*, sive *Astrocephalis*, a quibus *semine*
in medio flore, absque vagina radiata, differt, reliquis
dotibus, flore, staminibus, tuba, calyce, convenit. Ne-
que ad excludendam a *Dipsaceis* Globulariam videtur suf-
ficere, quod folia non conjugata habeat, semenque intra
florem. Neque enim *Caraxeron* semen habet coronatum,
neque aliæ *Dipsaceæ* VAILLANTII; folia vero classium certe
characteres subire non debent.

§. XLII.

Ad lapides non frequentissime reperi aliam *Dauci* spe-
ciem, si a semine hirsuto denominetur, quam in *Helve-
tia* variis locis alias videram, supra *Dornacum*, inter *Mümmeliwyl* & *Falckenstein* ad rupes, ad ipsam etiam arcem
Falckenstein. In ea planta aliqua sunt, quae merentur a-
nimadversionem nostram. Est ei *radix* acris & aromatica,
villo coronata. *Folia* insigniter varia magnitudine, vix
sui in diversis plantæ aetatibus similia videntur, mo-
do cubitalia, modo triuncialia, & tunc tenuiter ferrata,
firmaque, adultiora vero & amplis incisionibus, & mul-

to

c) Tab. 265.

d) Char. plant. p. 85.

e) Memoir. de l' Acad. des scienc. p. 446, & ex eo DILLEN. Supplément.
flor. Gieffens. p. 161.

f) I. c.

g) Ind. hort. alt. p. 131,

h) Dissert. p. 120.

to tenujora , semper tamen eumdem characterem servant , quo solo planta , quando non floret , facile dignoscitur , & quem solum fere *Carvi* , atque *Pimpinella crispa* imitantur . Nempe cujusvis secundarii folii , ad princeps folium coeuntis , prima ala , intervallo distat a reliquis ejusdem secundarii folii alis , & alia directione , ut ad earum decussim incedendo quaternæ ibi alæ crucem ad costam primarii folii efficiant . Caulis *Julio M.* exeunte florem profert , densissimis Umbellis , quibus singularis habitus globosus efficitur , quadraginta omnino minoribus coalescentibus in unam majorem . *Calyx* uterque aliquot longis , neque divisis ligulis constat . *Semen* alba hirsutie obductum . *Florem* non examinavi , cum planta junior esset , visam deinceps in scopolis , non potui adtingere , ob loci difficultatem . Huc solent referre *Apium montani genus* in *M. Legerio* prope *Badam* a) , brevissime certe descriptum ; deinde *Daucum angulosi caulis CORDI* b) , pariter non satis definitum . Longè minus *Seseli montanum II. Clusii* c) huc facit , quod nostro *Dauco* jungit *CASPAR BAUHINUS* , id enim flores habet pallentes , estque aut verum *Oreoselinum majus* , aut simillima certe planta ; Sed verius huc refertur *Libanotis alba minor seu amara THALII d)* , qui diversitatem insignem foliorum non neglexit . Deinde *Apium petræum sive montanum albicans IOHANNIS BAUHINI e)* , qui & eam notam , & se-
mina

a) *Hort. German.* 247. b.b) *Histor. plantar.* p. 103. b.c) *Pannon.* p. 691.d) *Sylv. hercyn.* p. 41.e) III. p. 105. ex *M. Wasserfall, Grenzach,* & *Bada* , cum icona non mala . *CHABRÆVS* p. 397. Cæterum fratrem culpat , quod eum *Daucum* pro tertio *Dioscoridis* dederit , non satis aequus . Eo enim

mina hirsuta, & in universum bonam descriptionem dedit, ut meruerit ejus nomen vel eam ob rationem conservari apud RAIUM f), MAGNOLIUM g), & BOERHAAVIVM h). CASPARVS nos multis difficultatibus implicuit. *Daucus montanus apii folio albicans* i) utique in Herbario vivo est noster, de quo scribimus *Daucus*. Nomen CLVSI male huc refertur. Deinde *Daucus montanus apii folio minor*, in *Prodromo* depictus, lectusque in M. Wäffserfall huc pertinet, ex fide horti siccii HAGENBACHIANI, qui CASPARO a manibus fuit, propriæque CASPARI collectionis. Tandem *Libanotis minor apii folio* k), non reperta est inter siccas ejus plantas. Ad eam CORDI & THALII nomina referuntur, non recendentia a nostra stirpe. *Libanotis* verò *Theophrasti minor* LOBELII l) omnino diversa est, itidemque eadem huic & desumpta a LOBELIO *Libanotis panacea TABERNÆMONTANI* l*); Fecit ergo sapienter RAIUS quod huic *Libanotidi minori* CASPARI BAVHINI asteriscum apposuerit m), incaute vero MORISONVS, quod post *Daucum nostrum* alibi descriptum repetierit eamdem ex CASPARO *Libanotidem*. PARKINSONUS n) ex CLUSIO *Daucum sellinoi-*

nomine in herbario C. BAVHINI planta est Oreoselini majoris similis, sed rotundiori & villoso folio.

f) *Syll. plant extra Brit.* p. 66. *Histor.* p. 460. *Synops* III p. 218. Ipse legit in *Jura M.*

g) *Hort. Reg. Monsp.* p. 20.

h) *Ind. alt. hort. Lugd. Bat.* p. 59.

i) *Pin.* p. 150. *Basil.* p. 45.

k) In *Pin. Libanotis apii folio* in *Phytopin.* p. 277.

l) *Ic.* p. 705.

l*) Ex edit, C. B. 315.

m) p. 449.

n) *Theatr. Botan.* p. 898.

linoidem maximum dixit, qui a nostro diversissimus est. MORISONUS *Pimpinellam saxifragam minorem Daucoideum sive semine lanuginoso* o), ex quadam cum *Tragoselino criso* similitudine habitus. PLUKNETIUS junioris plantae elegantem figuram dedit, nomenque fecit *Daucum montanum Pimpinelle saxifragæ hircinæ nostræ folio* p) Dubriensem, in quo nomine & seminis & habitus rationem habuit. RIVINVS r) lectum in *Gigantum* montibus *Libanotidem* dixit, genus constituit peculiare, & iconem dedit ad adultum, & latifolium, specimen, characterem non satis definivit. Id nomen mansit apud RUPPIVM s), BUXBAVMIVM t), WALTHERVM u) & HEVCHERVM w). TOVRNEFORTIUS hac planta omnino caret. An hoc facit *Daucum montanum Boemicum* SCHWENKFELDI x). Ea planta denuo, si character *Dauci* est in lacinias sub Umbella foliis, debet emigrare ad aliud genus. RIVINVS a *Dauco* breviori lanugine seminis videtur distinxisse.

§. XLIII.

Inter medios flores, & virentia pascua e longinquonivem vidi. Quare memor *Croci Alpini*, nunquam a me visi, licet in *Jura* frequens sit, & antiquum nomen *Levrette* apud incolas conservet, accurri ; neque spem fefellit flos

- o) Hist. Oxon. III. p. 285. In *Umbelliferis* p. 84. ejus meminit.
- p) Almagest. p. 129.
- r) In Pentapet. irregul.
- s) Flor. Jenens. p. 226.
- t) Enumer. plant circa Hal. p. 185.
- u) Ind. borti sui. p. 83.
- w) Prov. I. p. 69.
- x) p. 64. semen hoc facit, descriptio justo brevior;

flos amabilis, quem toties perreptatis alpibus *Juræque træctibus*, non inveneram; neque enim nisi in spongiosa flavescente terra nascitur, a qua modo ante paucissimos dies nix defluxit, & brevissimi ævi est. Duplex erat varietas. *Priori* ad imum floris tubum violaceus color subnascebat; segmenta vero petalodea omnino alba erant. *Alteri* tria petalodea folia exteriora violacea, interiora tria alba, cum crebris venis violaceis. Utrique cæterum bulbus, & folia pauca lata, media albicante linea, & *Stamina* tria *apicibus* flavis ex ortu segmentorum floris, & *Tuba apice* trifido plumoso, qui ad expansionem floris terminabatur, brevior quam ut emineret. Alias varietates in hortis yidi, flore ampliori, omnes vero nonnisi coloribus floris discrepant. Quare omnem apparatum omitto nominum, quæ multo cum labore congesseram, ex confusissimis Clvsii atque CASPARI BAVHINI *Crocis*, omnesque quotquot sunt *Helvetiæcives*, SIMLERI a), ut loquitur Clvsivs, nam sunt ARETII, & JOHANNIS BAVHINI b), & RAIJ c) & SCHEVCHZERI d) in alpibus lectos *Crocos* in unum unio vernum latifolium. autorem habeo, quem ubique maximi facio, LINNÆVM e).

§. XLIV.

Per ea pascua, ad lapides tenui gramine vestitos *Osmundam lunato folio*, & *selaginoides crispum*, *Graminumque*
I 2 spe-

a) *Croci montani speciem flore candido, flore cœruleo, & ex candido atque cœruleo mixto ARETHI in Ness. p. 235. & SIMLERI in Valles. & Alp. p. 333. Quorum priorem, & tertium in primis legi.*

b) Il. p. 641.

c) It. IV. p. 333. videtur nostrorum primum esse.

d) *Latifolius vernus flore purpureo minori in sylloge stirp. extra Brit. p. 109. in Jura lectus, est secundus ARETHI.*

e) *Hort. Cliffort. p. 18.*

species, *typhoides spica densa brevi & villosa*, aliudque *glumis variis*, tum aliud *panicula speciosa variegata*, aliaque, nunc non dicenda reperi; & bene onustus plantulis pedem retuli, conventurus socios in pascuis *Grandvi*, quæ sola in *Helvetia* a) *Meum* mihi dederunt; Sed id non obscurum est, neque quidquam habet difficultatis. Neque diu morati, in casa alpina, mundiori ut solent in *Jura* esse, reduces adtulerunt stirpes in *pertuis de la bise*, sive *orientali exitu* lectas, admodum elegantes. Aderat *Bupleuri* species, olim cognita **GESNERO** b), & inter *CAMERARIANAS* c) picta; aderat *Valerianoides angustifolia VAILLANTII*, sed inmaturior. *Tozziam* etiam adferebant, quam olim in *Biennensium* montibus d) legeram mediis in sylvis, deinde in M. *Stockhorn* lapidoſo loco. Hanc ita pulchre depinxit **MICHELIVS** e), ut nihil defit *præterstamina*, omnino quaterna, diversæ longitudinis, uti solent in floribus, quibus quatuor semina nuda subsunt, vel ovarium uniloculare, vel biloculare, paucis exceptis. *Tuba cylindrica simplex*. *Barbatrifida maculata*, & *lineata*, cum superius labium duobus, brevioribus & immaculatis flavis segmentis fiat.

§. XLV.

Adtulerunt etiam *Hesperidis* genus suavissimi odoris. Id dissimile videri poterat ejus, quod a **CLVSIO** *sylvestre* a) dictum

- a) **GESNERVS**, sed ex relatione pastoris, narrat in *Pilati M. nasci*.
Ego nullibi in alpibus, aut *Jura* vidi.
- b) *Perfoliata montana s. perennis* *Epist.* p. 110. b).
- c) *Perfoliata montana hort.* p. 38. ic. xxxviii.
- d) Vnde primum adlata est ad **CASPARVM BAVHINVM** inventorem, qui *Euphrasiam luteam radice squamata* dixit *Prodrom.* p. 111. neque debuerat *præteriria* **MICELIO**.
- e) *nov. plant. gen.* p. 20. T. XVI.
- a) *Pannon* p. 337. *bistor.* p. 299.

dictum, in *Valesta* provenit, supra *Leucam*. Nam multa folia penitus obtusa habet, omnia vero valde latiora, ut sint, quæ semunciae latitudinem habeant & excedant, margine modo obiter, modo profundius serrato, flos vero multo major est angustifolio **CLVSII**, & sativorum aut æqualis, aut major, pallidus, longo etiam pallidoque calyce. Sed collatis multis speciminiibus utriusque, iis etiam, quæ in M. Chafferal lecta dono dederat D. Schub V. D. M. plantarum amantissimus, nimis adparuit, continua serie, & angustissima folia dari, illa *Valesiae*, & quæ prope Acidulas *Mauritianas* legerat D. HUBER, mediocria, aliquando vagis dentibus ferrata ex *Chafferal*, lata, profundeque dentata ex monte Falconario. Ut nunc fidentius afferam nihil adesse veri discriminis. Cæterum, huc omnino referto, et si nostrum apprime odoratum sit, *Leucojum sylvestre inodorum flore parvo pallidiore* HORTI AICHSTETTENSIS a) *Leucojum luteum sylvestre Pannonicum serrato folio obtuso & acuto* JOHANNIS BAVHINI b) *Leucojum luteum sylvestre hieracifolium* FRATRIS CASPARI c), et si nostrum quidem constanter glabrum sit. Huc etiam pertinet *Hesperis sylvestris hieracii foijo birsuta* GARIDEL d) ex CASPARO BAVHINO. *Hesperis Leucoji folio serrato siliqua quadrangula* TOVRNEFORTII, non absque ratione adeo vicina **CLVSIANÆ**, deinde TILLII e), BOERHAAVII f), VAILLANTII g). *Keiri sylvestre folio hieracii RUPPII* h). Et hæc omnia nomina cum

I 3

sua

a) Aest. ord. II. T. 13. f. 2. bona ic. RAI p. 781. cum asterisco.

b) II. 872. cum icono; Suo jam tempore dubius fuit, annon esset varietas.

c) Prodr. p. 101. Pin.

d) plant. aut d' Aix p. 229.

e) hort. Pisani. p. 79.

f) Ind. alt. hort. L. Bat. II p. 20.

g) Botan. Parisi. p. 101.

h) Flor. Jenens. p. 61.

sua planta merito migrant ad *Leucojum sylvestre* Clvsii.
 Plantæ vero ZANONI, & BARRELERII k) a variis huc relatæ,
 diversæ sunt, & ZANONI quidem angustifoliam plantam,
 nihil a ClvsiANA nisi floris magnitudine diversam, descri-
 bit. BARRELERII *Leucojum montanum angustifolium pallido*
flore folia utrumque nostri habet, sed floris petala angusta &
 incisa, quæ nostro integra, lata, & rotunda sunt. SIEGES-
 BEKII *Hesperis Leucoji folio angusto dentato flore minore lu-*
teo l) ad nostram, flore magno, referri non potest. De
 PONÆ altissimo orgyali *Leucojo* non liquet. THALIANVM
Leucojum luteum sylvestre m) ita describitur, ut vix possim
 cum BAVHINO definire, nostrum esse, distinguere vero ab
 ipsissimo *Leucojo* ClvSIANO.

§. XLVI.

Ardulerunt etiam *Quinquefolii albi* speciem, quam anno
 1728. cum ultimo vitæ discrimine in M. Leitern Valeſiae le-
 gi, in angustissima semita super præcipitum pendente, ſæ-
 pe gradibus in rupe excisis, ſæpe ponticulis ex rudibus
 Abjetibus interrupta; deinde ad Agaunum, asperrimis etiam
 in rupibus. Ejus historia vix sola tradi potest, quæ utique
 difficultis est, & duobus affinibus *Quinquefoliis* ita implicatur,
 ut neutrum sine altero queat intelligi.

Maximum nempe Germanicum illud *Quinquefolium*
album FUCHSII non valde cauleſcit, folia vero amat edu-
 cere ex propriis pediculis, hirsutis iis, & longis, quina per-
 petuo

i) *Iſtor. Botan.* p. 110. ic. 59. ſimilis noſtræ stirpi ex Chafferal: vocat
 keiri alpinum foliis dentatis flore parvo odorato. Ex eo RAJVS
 p. 783.

k) ic. 884.

l) *Prim. flor. Petr.* p. 53.

m) *Syl. bercynic.* p. 69.

petuo, nullis alis accendentibus digitata, quorum medium maximum est, integris oris, solis apicibus & parte, quæ apici proxima est, rectis & non profundis denticulis sex septem, neque multo pluribus, inciso. Pars altera folii viridis, & glabra est, averfa tota sericea lanugine candicat. *Flores* ex petiolis parum foliosis, quinque petalis cordatis constant, sub quibus *calyx* est decem in alterno ordine segmentis, de more, constans. *Stamina* multa. *Semina* nuda oblongapappum ex vertice undique fundentia, quem & placenta plurimum delapsis floribus retinet, brevem, & argenteum. Talis in *Germaniae* sylvis provenit, eamque prope arcem *Tubingensem* ante plures annos legi.

§. XLVII.

Alia species *caulifera* pedalis & ultra, ramoso caule & folioso. Huic *folia* quina ex brevioribus caulinis, apice tribus majusculis dentibus inciso, hinc glabra, inde ora & nervo sericea pube albicante, reliqua folii parte, aut non hirsuta, aut leviter, *flore* majusculo ejusque petalis integris, longis, distantibus, venosis. *Semina* pari modo papposa a). Hæc in *herbario vivo CASPARI BAVHINI* fuit nomine *Quinquefolii erecti albi majoris*.

§. XLVIII.

Tertia a nobis lecta in *M. Leitern*, Et *Agauni*, & in *Creux du Vent*, folia habet ad terram primæ similia, apice multis denticulis inciso. Sed & caules ramosos & foliosos profert. Flores petalis ovatis lacteis, simillimi. Deinde folia differunt, non adeo sericea pube villosa, sed hinc quidem gla-

a) Villi in floribus hujus *Pentaphylli* Rajo & JOHANNI BAVHINO vias si sunt,

glabra, inde hirsuta, ita tamen, ut nihil decedat herbaceo colori, quo utrinque obducuntur. Pyriformia semina simillimum pappum educunt. Id ergo cum secundo (XLVII) petalis foliis & caule consentit, differt utcunque statura, foliis majoribus, & frequentius incisis. A primo distinguitur folio & caulescente habitu, florisque petalis. Cæterum in hujus speciminibus *stamina* luculentius vidi, latis planisque barbatis foliolis, non cylindricis stylis; *Tubas* verolongas, cylindricas, non plumosas, ex acuminato ovarii apice.

§. IL.

Multiplex hic occurrit observatio. De pappo seminum non satis dilucide scribunt Auctores rei herbariæ, qui tamen *Caryophyllatis* nostra Quinquefolia proxime unit, & in Eboracensi etiam uberrimus est, in aliis Quinquefoliis rarior, aut omnino nullus. Sed & species definire in scriptoribus Botanicis non est facile. Conabimur tamen, & ad ductis ad singulam nominibus, addemus, quid de earum diversitate de nobis videatur. Ad primam ergo speciem refero *Quinquefolium majus candidum* FUCHSII a), quod folia ex radice in peculiaribus pediculis profert. Idem est *Quinquefolium TRAGI* b) & huc etiam referri solet *Quinquefolium secundum* MATTHIOLI c) flore albo. In Epitome vero Italica d) exstat utique *Quinquefolium album* longis ex radice pediculis, idem TRAGIANO. Eodem nomine apud CAMERARIUM e) exstat, & LVGDVNENSES f), qui in eadem pagina denuo

a) *Histor. plant.* p. 623.b) *Herbar.* p. 507. edit KYPERI.c) p. 1018. in descriptione, nam icon *Pentaphylli albi* p. 1020. est luteum, cui folium *subtus argenteum* est.

d) p. 684.

e) *Epit.* p. 761.f) *Hist. gener.* p. 1265.

denuo habent idem g) *Quinquefolii albi* MATTHIOLI nomine. In ADVERSARIIS *Pentaphyllum album* h) est. GESNERUS *Pentaphyllum album Tragi Lupino simile* i) dixit, unde profecta videtur denominatio THALII, *Pentaphylli Θερμόφυλλου* k), ex quo spuria species & inutilis orta est *Quinquefolii Lupini foliol* l) CASPARI BAVHINI, AMBROSINI m), & RAJI n). TABERNÆMONTANVS *Quinquefolium sylvestre* o) dixit. Huc *Pentaphyllum alboflore* CAMERARIIP), & *Quinquefolium sylvaticum* SCHWENKFELDI q) huc potius referendum videtur. Idem etiam nomen est in *horto AICHSTETTENSIS* r). CASPAR BAVHINVS *Quinquefolium album majus* s) dixit in priori opere, in posteriori *Quinquefolium album majus alterum* t). JOHANNES BAVHINVS *Pentaphyllum album* u) nominat ex TRAGO & MATTHIOLO. Nomen CASPARI BAVHINI retinuit PARKINSONVS,

g) ib.

h) p. 307. absque iconе.

i) Hort. Germ. p. 271.

k) Sylv. hercyn. p. 88.

l) Pin.

m) Phytolog. p. 614.

n) Hist. 614. cum asterisco, ex quo constat, non visam plantam RAJO.

o) Icon. p. 620.

p) in *horto* p. 119. Siquidem non diversum videtur intellecturus fuisse nomine pene eodem.

q) Stirp. Siles. p. 174.

r) Vern. o. 7. T. VI. f. 2.

s) Phytopin. p. 650.

t) Pin. p. 325. CLUSIANVM eo refert synonymon *Pentaphylle albi* I. Clusii. Sed hoc ad speciem nostram tertiam refero post I. B.

u) II. p. 398. d. CHABR. p. 171.

SONX), RAJVS Y), TOVRNEFORT Z), BOERHAAVE aa), & SCHEVCH-
ZER bb). *Quinquefolium* seu *Pentaphyllum* I. dicit AMBROSINVS
cc); *Pentaphyllum minus rectum subtus incanum flore albo* MORI-
SONVS dd), de nostro enim dicere videtur, et si descriptionem
adferat CLVSH. Eo nomine usus est HERMANNVS ee). KNAV-
TIVS corruptit, ut sit *Pentaphyllum* sive *Heptaphyllum* minus
rectum flore albo subtus incanum ff); & alibi HERMANNVS
facit *Pentaphyllum* sive *Quinquefolium* *album majus alterum*
gg); *Pentaphyllum candidum majus* MVNTING hh); *Penta-*
phyllum foliis argenteis & splendentibus majus & minus MEN-
ZEL ii), ut videtur, *Quinquefolium Lupini folio argenteum flo-*
re albo RVPP kk) in sylvis repertum. *Pentaphyllum album*
TITA ll), & BVXBAVM mm), & GEMEINHART nn). *Pentaphyl-*
lum sylvestre majus? an minus? SCHAEFFERI oo), nemo dixerit.

Pen-

- x) *Theatr.* p. 396. sed *Pentaphyllum* vocat & CLVSH I. hoc refert.
- y) *Histor. plant.* p. 614. *syll. stirp. extra Brit.* p. 212.
- z) In *Schol. Botan.* p. 231. & I. R. H.
- aa) *Ind. alt.* p. 46.
- bb) In *itin. Alp.* VI. p. 460. si quidem de nostro loquitur; nam pet-
la subrotunda & locus videntur facere, ut sit tertium no-
strorum LI.
- cc) *Phytolog.* p. 452.
- dd) *Hist. oxon.* II. 189.
- ee) *Hort. Lugd. Bat.* p. 480.
- ff) *Enum. plant. circa Hal.* p. 112.
- gg) In *Flor. Botan.* p. 5.
- hh) *Waare effening* p. 562.
- ii) *Pugill. plant. rar.*
- kk) *Flor. Jenens.* p. 84.
- ll) *Hort. Maurocen.* p. 137.
- mm) *Enum. plant. circa Hal.* p. 254.
- nn) *Catal. plant. circa Laub.* p. 77.
- oo) *Delic. Botan. Halens.*

Pentaphyllum album majus alterum DVVERNOI pp), si quidem id est album Quinquefolium, quod prope arcem Turingensem me decerpisse memini. Pentaphyllum flore albo montanum WALTHER qq), Pentaphyllum Lupini folio flore albo SIEGESBECK rr). Potentillam denique sciliis digitatis superne conniventi ferratis caulis filiformibus dixit LINNAEVS ff) noster. TILLI tt) ex MICHELIO adeo multa habet, quæ ad nostra Quinquefolia alba referri possunt, ut ex iis me expedire non potuerim. Principes hujus notæ sunt, flores & folia ex radice, caules aut nulli, aut parum foliosi, petala cordis effigie.

L.

Alterum, & multo obscurius *Quinquefolium*, descriptum XLVII. caulescens, erectum, & foliosum, est sine dubio, cum erectum sit, & minus, CLVSII *Quinquefolium* II. a), quod in magno opere *Quinquefolium* II. minus albo flore b) dixit. *Quinquefolii albi species* GESNERI c) tantum nominatur, ut vix definiri possit, quo pertineat. CASPARVS BAVHINVSEX CLVSSIO d) dixit *Quinquefolium album minus alterum*; quod

K 2

nomen

pp) Cat. plant. circa arc. Tubing. p. 112.

qq) Ind. horti sui p. 100.

rr) Flor. Petrop. prim. p. 85.

ff) Hort. Cliffort. p. 194. & ipse cum C. B. RAJO & MORISONO album I. CLVSII huc refert: Idemque nomen habet ROTENVS flor. Leid. prodr. p. 276.

tt) Hort. Pisan. p. 141.

a) In Pannon p. 425. icon, in qua flores nimis & lati & cordis formes.

b) p. CV. & ex eo RAJV S p. 614. cum asterisco.

c) App. ad hort. p. 295. b.

d) Pin. p. 325.

nomen HERMANNVS e), TOVRNEFORTIVS f), SCHEVCHZERVVS g) retinent. Sed idem præterea pro novo descriptum est a CASPARO, *Quinquefolii albi minoris* h) nomine, lectum in faxosis circa Curiam Rhætorum, idque nomen RAJVS i) & TOURNEFORTIVS k) habent. PARKINSONVS l) ex CLVSIO dixit *Pentaphyllum album minimum*. MORISONVS n) *Pentaphyllum minus erectum birsutum flore albo*, quem PLVKNETIVS o), & alibi HERMANNVS p) sunt secuti. Porro non dubito huc referre *Pentaphyllum rectum RAI* q) in SALEVA lectum, cum & folia apice incisa, & floris petala longiuscula, & eorum distantia major, & villi tomentosi in medio flore huc respiciant. *Pentaphyllum vero foliis inferne & superne incanis* JOHANNIS BAVHINI r) ex Baldo M., ad quod fere refert CLVSIA-NVM alterum, differt a nostro in ea nota ipsa, a qua nomen habet.

§. LI.

Tertium (XLVIII), quod a priori, maxime caule non ereto, forte & petalis paulo latioribus, & foliis amplioribus differt,

- e) *Flor. Bat.* p. 5.
- f) *Schol. Botan.* p. 231. I. R. H.
- g) *It alp.* II. p. 139. multis Rhætiae locis.
- h) *Phytopin.* p. 650. *Prodr.* p. 139. *Pin.* In *herb. vivo* C. B. nomen adjectum erat *Quinquefolii erecti albi minoris*.
- i) *Syll. Stirp. extra Brit. nasc.* p. 212. & *biflor. plant.* p. 614. cum Asterisco, conjungit vero stirpem Clvsii non certissimus.
- k) I. R. H.
- l) *Theatr.* p. 397. & *Pentaphyllum album minus* ibid.
- n) II. p. 139. ex Clusio. Inter icones adjicitur nomen *primi ad hujus numerum*.
- o) *Almagest.* p. 285.
- p) *Hort. Lugd. Bat.* p. 480.
- q) *Hist.* p. 614. *syllog. Stirp. extra Brit. nasc.* p. 212.
- r) II. p. 398. e. villi in medio flore observati non recedunt. *Loblianum alpinum petrosum*, quod ibidem citat, est *Alchemilla sericea*.

difserit, a GESNERO a), lectum in muris urbis Wallenstat, *Pentaphyllum petraeum* dictum fuit, & alibi *Pentaphyllum album petraeum* b), ut mirari liceat, CASPARVM BAVHINVM in ejusdem omnino oppidi muris lectum pro novo describere; Dixit autem *Quinquefolium album majus* in *Prodromo* c), addidit caulescens esse in *Pinace*, nam caule folioso a II. *Pinacis* difserit: Et ea ipsa nota, deinde quod CLVSIVS non nisi ignota *Pentaphylla* se descripturum testetur d), persuadeor, huc pertinere, non ad TRAGI *Quinquefolium*, id, quod I. *majus albo flore* vocat CLVSIVS e), et si non dissimulem, nostrum rupes potius, quam sylvas amare. Nobiscum sentit JOHANNES BAVHINVS f), qui *Pentaphyllum album* I. CLVSII seorsim proposuit. CHABRAEV^s g) iconem flavæ speciei addidit, cui homini, non immerenti Auctori imputasset, si libuisset justum esse, *hallucinationes* plerasque operis BAVHINIANT, censor MORISONVS. Nomen CASPARI TOVRNEFORTIVS h) repetiit, & TILLIVS i). RAJVS & MORISONVS & plerique alii non habent. De MENZELII k) *petræo flore albo* non liquet.

§. LII.

Et hæc ita videntur sibi constare. Sed, ut dicam, quod verum est, non levis mihi est suspicio, tria hæc *Quinquefolia*

K 3

- a) Tab. collect. Stirp.
- b) Hort. German. p. 271.
- c) p. 139.
- d) Dudum vero illud TRAGI in hortos receptum erat conf. LOBELI^s advers. p. 307.
- e) Pannon. p. 423. bistor. p. CV. cum icone, quæ nostram omnino exprimit, a *Quinquefolio* TRAGI valde aliena.
- f) II. 398. e. Inde PLVKNET Almag. p. 285.
- g) Sciagr. p. 169.
- h) I. R. H.
- i) Hort. Pisan. p. 141.
- k) Pugill. rar.

folia tuto posse in unum uniri. Examinatis specimini bus, adparuit mihi, continua degeneratione *Erectum* illud (XLVII.) ad radicem non foliosum, & petalis longis, & folio pene glabro, degenerare in nostrum (XLVIII.) in M. Leitern & Creux du Vent lectum, cui foliosus caulis, latiora petala, folia subhirsuta flaya. Inde absque saltu conjunguntur specimin a ejusdem (XLVIII.) lecta Agauni, argenteo villo, foliis plurimis ad radicem, eisque per amplis, simile TRAGIANO, uti caule folioso, neque penitus sericeis foliis cum erecto & cum specimini bus in Creux de Vent consentit. Et si quidem, quod non existimo, petala cordata TRAGIANI sint sufficienti discrimini, certe tamen & caulescens BAVHINI (XLVIII.) & ejus erectum (XLVII.) nulla vera nota diversa sunt. Flos certe & yillosa stamina, & papposum semen, & folia apice incisa omnibus unam perpetuamque notam in pertiunt.

§. LIII.

Reduces, eamdem viam iteravimus. Circa S. Aubin, aridis locis, *Buglossum angustifolium majus*, & *Caryophyllus prolifer*, & *Linum* illud *capillaceo folio flore variabili* a) provenit; in agris vero *Astragalus*, qui *Cicer sylvestre* dicitur MATTHIOLO b). Læti discessimus, & ego quidem nave *Moratum* petii. In *Broja* fluvio, qui ex *Moratensi lacu* in *Neocomensem* fluit per media humidissima prata, passim *Solidaginem palustrem* *Persicæ folio subtus incano*, sex pedum altitudine se efferentem ex arundinibus, & *Tithymalum vere fruticosum palustrem* vidi, & utramque majorem *Nymphæ-*

a) Albo, albo cum lineis variis, subpurpureo lineato &c. quod CASPARVS BAVHINVS & *angustifolium* flore magno vocat, & *angustifolium* floribus dilute purpurascens vel carneis.

b) cum magn. fig. p. 418.

am vidi. In earum ea, quæ luteo flore est, eleganter vidi expressam *staminum* & *Petalorum* adfinitatem, qua fit, ut in floribus plenis mutata *stamina* se in petala explicent; Vnde & non alii flores frequentius pleni sunt, quam ii, in quibus abundant *stamina*, in *Gymnopolyspermis*, & adfinibus *Rosis* arboribusque *pomiferis*, & denuo aliquo modo adfinibus *Aquilegiis* &c. Nempe extima corona, facta 14. petalis, veram habebat in *Nymphæa lutea* naturam floralem. Verum, quæ interiora proprius coronabant ovarium, ea angustiora, solidiora, duabus pulverulentis lineis inscripta, degenerant paulatim in verissima *stamina*. MORATO paludosæ prata vicina sunt, plenissima *Scordio*, quo universa fere *Helvetia* inde sibi prospicit, & *Gratiola*. Ad ipsum litus lacus, denuo *Ranunculus longifolius* BVRSERI c). Inde sterilis via, & plantis rarioribus omnino destituta *Bernam* me reduxit.

§. LIV.

Post aliquot dierum moram in Montem *Neunnenen*, comite viro verissimi judicii ALBERTO HERPORT, iter repetii, quod ante octo annos non infecundum fuerat. Ex summa alpium catena passim promontoria, & secundaria juga producuntur: Id quod consendi, pars est catenæ, quæ haud longe *Aquilegia* orta ab altissimis alpibus, versus solis ortum secedit, & longa serie *Sanensem Simmiamque* vallem a *Friburgensium* ditione separat. Ad eum montem iter fit per vallem pascuis lætam, quæ ab amoenissimo pago *Belp* continua ducit ad arcem *Burgenstein*. Sed prius, relictæ valle, versus occidentem seceditur in pagum *Rieggisberg*. Inde ascenditur per prata subuda, plena olim *Sedo palustri purpureo*, nunc exusta sole, sub ipsis initiis dierum canicularium.

Deinde

Deinde per vallem *die rute* algidis aquis irriguam, modicis, sylvosisque montibus septam undique. Sed & ea valle relictâ ad meridiem nos convertimus, & adscensu non lenissimo ad sylvam venimus, atram, abiegnam, alpini ingenii, uido solo, & pene palustri. Passim procella strages ediderat immensas arborum, in earum eversis truncis, loco in perpetuum sole carente, speravimus muscorum copiam & invenimus.

§. LV.

Vberrimum ibi fuit novum genus *Bryi, capillaceum crassis capitulis per caulem excurrentibus*. Nascitur in cespites late virentes, habitu pene ejus, cui capitula globosa sunt. *Caules* fusci, aliquando vero viridissimi, unciales & ultra, erecti, recurvo vertice. *Folia* pallida & virentia, ad unum plerumque latus vergunt, mollia, capillaria, incurvata & falcata. Per caulem subinde prodeunt setæ ruberrimæ, breves, vix trium linearum. In iis crassa ovata *capitula* subrubella, aut flava, operculo conico, quo delapso ciliari rubro villo coronantur. *Calyptras* non vidi. Habui etiam a STÆHELINO nostro, ex altioribus sylvis *Juræ*. Maximo Botanico DILLENIO novum visum est. Conjecturam propono, num fuerit *Muscus Alpinus medius foliis tenuissimis & acutissime denticulatis, capitulis subrotundis unam partem spectantibus* MICHELI a).

§. LVI.

In eversarum arborum truncis plurimum nascebatur, mixtum musco plumoso eleganti VAILLANTII a), *Bryum*, quod soleo

a) *Nov. gen.* p. III. n. 41.

a) Cujus folia avulsa a caule, conicæ & dilatatæ setæ specie mihi aliquamdiu inposuerunt, donec lentis accederet verax industria.

Botan. Paris. p. 132. T. xxvii. f. 7.

soleo vocare *alternans calyptra variegata*, & *scyphulis foliosis*. Dudum notum est, sed character imperfectius cognitus. Nempe *Bryo* nostro *caules* sunt inclinati, per sex fere lineas tantum foliosi, *foliolis distinctis*, læte viridibus, ex lata basi acuminatis, serpylli, nervo medio. In summo caulinulo alias pallida *seta*, uncialis, erectum *capitulum* gerens. Id longum est, cylindricum, leniter spadiceum. *Calyptra* infra albissima, fulva superius, qua vel sola dignoscitur. Sed aliæ plantulæ, ex eadem tamen radice nascentes, nulla capitula gerunt, & alienissima sunt facie. Earum caulinulus nudus aliquamdiu terminatur velut *scyphulo*, facto ex foliolis virentibus, aut rubentibus, quando seniora sunt, conjunctis, superius cavum intercipientibus. In eo scyphulo viridissimorum foliorum rosa est, si exquisitiori microscopio utaris. Nam toti hi scyphuli nudo oculo pulverulenta capitula imitantur, & non aliter innotuerunt plerisque Botanicis. Primum DOODY nomine *Musci trichoidis parvo capitulo conglomerato sive Botryoidis* dedit RAJO b), novamque simul classem inde constituit, quod *capitula pulverulenta* absque ulla calyptra haberet. Eadem planta PLVKNETIO est *Muscus trichoides, capitulo racemoso nostras* c). TOVRNEFORTIO d) *Muscus capillaceus minimus capitulo minimo pulverulento* dicitur: deinde RVPPIO e), & VAILLANTIO f), cuius non mala est icon, melior tamen BVXBAVMII g), qui *Muscum fosiis angustis & brevibus capitulis minimis rotundis in brevibus pediculis*

b) *Hist. plant.* III. p. 39. n. 6.

c) *Almagest.* p. 217.

d) I.R.H.

e) *Flor. Jenens.* p. 285.

f) *Botan. Paris.* p. 1. 8. T. xxix. f. b. *Muscoides* vocavit, & ipse, quod solo pulvere constaret capitulum, absque membrana.

g) *Act. Petropol.* III. p. 273. T. xiv. f. 2.

diculis h). DILLENIUS, cum *Muscorum* genera constitueret, *Mniis*, quibus pollen absque calyptra & capsula nasceretur, principem hunc muscum fecit, dixitque *Mnion perangustis & brevibus foliis i)*. Sed idem, ut est veritatis amantissimus, in literis satis ostendit, se hanc sententiam mutasse, & nostrum restituere *Bryis*. Quem vero ex RAJO k) nominat MICHELIL), pingitque, adeo a nostro recedit foliis capillaceis, ut non videatur idem esse, figura etiam ad lentem facta a nostra diversa est. Similis certe huic est figura MORISONI, quando *Muscum Coronatum minimum foliolis pediculis & capitulis minimis erectis m)* depingit, cuius descriptio, repetita a RAJO n) capitulum tradens puncto non manus, omnes vero musci partes minimas, ita differt a nostro, ut diversum existimarem, nisi conjungere juberet DILLENNIO o) auctoritas. Noster enim & major dimidia *Bryorum* parte, & lato folio est, & scyphuli multorum *Bryorum* capitulis majores. Quidquid sit, capitulum certe illud pulverulentum, certissime est rosa foliorum juniorum, & planta, in qua enascitur, verissimum *Bryum*.

§. LVII.

Eadem ratione scobs illa in scyphis simillimis MARCHANTIAE visa, & ambitiose delineata a MICHELIO a), merum est foliorum

h) *Enum. plant. circa Hal. nasc.* p. 228.

i) *Cat. plant. circa Giess.* p. 214. & *nov. gen.* p. 84. cum iconе, valde angustifolia T. I & denuo in *synopsi RAJANA* p. 78. Primus, in fattor, vedit capitula.

k) *Nomen ad not. b.*

l) *Nov. gen.* p. 108. T. 59. fig. 8.

m) *Hist. oxon.* III. p. 631. sect. xv. T. 7. f. 20.

n) *Muscus capillaris omnium minimis foliis pediculis capitulis Hist. plant.* III. p. 35. n. 10.

o) In *synopsi RAJANA*.

a) T. I. ad G. H. I. M. pro seminibus,

liorum juniorum germen, ut in hac ipsa sylva observavi in *Marchantia capitulis integris*; neque forte diversa scobs fusca in roseis illis geminis *Polytrichi vulgaris* maximi, nam ex mediis scyphis novas plantas provenire certum est. Sed ad sylvam nostram redeo. In ea, & circa *Drakau* prope *Bernam*, non rarum est ad terram novum *Sphagni* genus, quod *acaulon maximum* voco, *foliis in centro ciliaribus*. Huic ex *radiculis* albis, & teneris, primo *folia* prodeunt in orbem reclinata, lætissime virentia, lineis terminata parallelis, fine etiam obtuso. In eorum foliorum medio alia prodeunt *folia*, longa, pallida, glumarum similia, fusco nervo in longum pilum educto. Amplexuntur hæc *capitulum* inter *Sphagna* maximum, raræ molis in toto *Muscorum* genere. Junius operculum habet, acuminatum, pellucidum. Id dejicit adultius, & in faccum fit e luteo rubentem, pyriformem, ore paulum contracto, & plerumque ad alterutrum latus propiori, plenum polline viridi. Longum vidi ad tres lineas, latum ad duas, DILLENIUS novum *Muscum* esse confirmavit.

§. LVIII.

In corticibus arborum nascitur elegans illud *Sphagnum*, quod *Muscum terrestre majorem ramulis compressis superficie crissis* vocat VAILLANTIVS, cum elegante icone a), quod & nomine b) & foliorum transversis undis simile est *Musco Linariæ folio majori & criso* c) TOVRNEFORTII. Sed is *Hypni* species est, & circa Zweylutschinen copiosissime provenit. Emersimus tandem ex sylva, & per breve pascuum

L 2

ad

a) T. xxvii. f. 4.

b) Nam iisdem omnino vocibus MORISONVS & RAJVS in *hist. plant.* III. p. 44. ad fine *Hypnum* intellexerunt, teste DILLENIO in *Synops.* p. 89.c) *Hist. des plant. aut de Par.* p. 504. & I. R. H.

ad medicatas *Aquas*, quæ a M. *Gurnigel* nomen habent, per-
venimus. Ibi dum corpora procuramus, aquas infectas
odore ovorum putridorum bibimus, limpidas, summo in æ-
stu innoxias, quarum multus ad vicia ventriculi, & fluores
albos, & mensium defectum usus est apud nostrates. Olim
examinata aqua multum dedit innatantis petrolei, quod cuti-
culam efficit in superficie, non semel renascituram, si
demseris. Viridi colore tingit violarum syrum, & ad-
jecto liquore Tartari magnam vim terræ teneræ albæ de-
ponit, quæ luculenta sunt indicia terræ calcariæ.

§. LIX.

A meridie prima ambulatio nostra fuit in Montem *Ober Gurnigel*, leuca fere altiore balneo, quod & ipsum subli-
mi situ positum est, ut & prospectu lætissimo fruantur in-
colæ, & sole diutissime fulgente, dies haud paulo longiores
sint, quam in vicina. Via dicit per sylvam, similem priori(LV), in qua magna provenit vis elegantis plantulæ, quam
ob semen *Aparinen* dixeris, a) nisi ob folia quaterna lata
malis *Cruciata* vocare. Descriptio JOHANNIS BAVHINI b),
& icon ejus, deinde icon BOCCONE c) sufficiunt, neque enim
video verum aliquod esse utriusque discrimen: Nostræ
certe folia subhirsuta sunt, BOCCONIANÆ plantæ similia.
BAVHINORVM d) stirps vero a nostra non diversa est. Id enim
&

- a) Ob flores in paniculis ex aliis summorum foliorum, & semina
hispida.
- b) *Rubia quadrifolia* semine bino hispido III. p. 712. CHABR. p. 547.
- c) *Rubia semine duplice hispido, latis & hirsutis foliis plant. rar. Sicil.*
&c. p. 10. T. VI. f. 1.
- d) *Rubia quadrifolia vel rotunda levis* Prodr. p. 145. Pin. & ex eo
I. B. III. p. 711. Nam peculiari, suoque nomine describit lectam
circa Thermae Valesias CASPARVS. Eam *Rubiam quadrifoliam rotun-*
dam

& locus natalis, & ipsa planta in *herbario vivo CASPARI* visa persuadet. Vox *glabra* fraudi fuit BARRELERIO e) & BOCCONE, ut novam facerent, RAJO f) MORISONO g) ut eam, BAVHINIANA distinguerent. TOVRNEFORTIVS h) BOCCONIANAM solam habet.

§. LX.

Supra eam sylvam lapidosa pascua sunt. Nihil ibi frequentius *Dente Leonis floribus croceis*. Ei in universum habitus est vulgaris *Taraxaci*. *Folia* tamen & minus profunde dentata, minusque hamata sunt, extremo segmento sub rotundo, & lenissime acuminato. *Caulis* firmior, quam *Taraxaci*, pedalis, quando altissimus est, uniflorus. *Flos* quam *Taraxaci* minor, fature aurantius & pene rubens. COLVMNA a) stirpem habet nostræ similem floris colore, folia non respondent. Ex ea *Dens Leonis minor laciniatus flore croceo* MORISONI b); *Dens Leonis alpinus minimus glaber* TOVRNEFORTII c); & *Dens Leonis spatulæ folio dentato forte*

L 3

VAIL-

dam levem dixerunt PARKINSON p. 276. RAI syll. stirp. extra Brit. p. 225. Hist. p. 278. cum asterisco. PLVKN. p. 323. & MORISON III. p. 329. qui eamdem stirpem ter in eadem pagina repetit,

e) *Cruciata major villosa flore molluginis alba* BARR IC. 324. qui I. B. plantam dixit *Cruciata minorem glabram flore molluginis albam* IC. 323.

f) Vtitur nomine BOCCONE, hist. p. 478.

g) Plantam I. B. vocat *Rubiam quadrifoliam semine duplice bispido* Hist. oxon. III. p. 329. quod nomen est HERMANNI hort. Lugd. Bat. p. 319. Plantam vero BOCCONIS eo nomine, quo usus est Auctor ib. p. 328. Idem PLVKNETVS habet p. 321.

h) *Cruciata floribus paniculatum nascentibus*, I. R. H.

a) *Hieracium alterum minus IV*, Ecph. rar. stirp. II. p. 129.

b) Hist. oxon. III. p. 74.

c) I. R. H.

VAILLANTII d), si quidem eamdem intelligit. RAJVS COLVMNÆ nomen retinet e). Sed certiora nostri synonyma sunt *Dens Leonis foliis extremo subrotundis floribus aureis* SHERARDI f), quod nomen pene definitio est plantæ nostræ. *Hieracium minus saxatile dentis Leonis folio unico caule flore flammeo* TITÆ g). *Hieracium dentis Leonis folio obtuso minus* SCHEVCHZERI h), & *Hieracium dentis leonis folio obtuso minus* flore ferrugineo ejusdem i). Mihi SHERARDI nomen aptissimum videtur, Abunde vero per alpium humiliora pascua provenit.

§. LXI.

Leucanthemum pro alpino folio rigido habitum multum ibi provenit, varietas omnino vulgaris, folio crassiusculo, firmo, acuto, flore majori pro portione plantæ, sed nihil veri habens discriminis, uti neque in *Dolaz* & *Thuiri* habet, ubi lectum RAJUS a) pro singulari describit. *Bellis* vero *alpina major rigido folio* CASPARI BAVHINI b), & a nostra, & a vulgari diversa videtur, ei enim folia ad terram eximiæ longitudinis, omnia vero acuta & profunde serrata sunt.

§. LXII.

Frequens & in *Jura* & in subalpinis est *Campanula alpina linifolia cœrulea*. Ea & hic nata fuit, foliis imis re-

vera

d) *Comment. Acad scient. Paris.* 1721. p. 231. sed is de planta COLVMNÆ dubitat; *spatulae* vero folium nostræ foliis dissimillimum est.

e) *Histor. plant.* p. 246. cum asterisco.

f) In *Syll. stirp. extra Brit.* p. 399.

g) In *itin. post hort. Maurec.*

h) *It. I.* p. 40. Planta nostra est, nomen alienissimum.

i) *It. IV.* p. 336.

a) *Syll. stirp. extra Brit. nasc.* p. 76. nam & ibi legi anno 1736.

b) In *Prodr.* p. 120. & *Pinace.*

vera rotundioribus, reliquis Lini, primis ferratis leviter, plerisque non dentatis. Ea habitu differt a *rotundifolia alpina*, & duritie, foliisque nullis, ut in hac solent, latis ferratis, sed subito gracilibus omnibus, præter ea, quæ rotunda sunt ex radice. Avulgari *rotundifolia* magnitudine floris facile differt, qua ita eam superat, ut propior sit *Campanulæ persicæ folio* cuius tamen folia nulla rotunda sunt.

Inventor CASPAR BAVHINVS a) nomen dedit & descriptio-
nem, quem HOFMANNVS b), MAGNOL C) TOVRNEFORT d) &
RAJVS e) secuti sunt. JOHANNES *linifoliam cœruleam* f) dixit, id-
que nomen PARKINSONVS g), VOLCAMER h) & magno in
opere RAJVS i) habent. LINNÆVSK) post MAGNOLIVM l) con-
jungit *alpinæ rotundifoliae*: JOH. BAVHINVS m) & TOVRNE-
FORTIVS n) vulgaris varietatem fecerant. Sed potest distincta
manere, media quasi inter *vulgarem rotundifoliam* & *persici-
foliam*. Ejus varietas o) est omnino, ad pedem Gotthardi
a me reperta, *Campanula alpina linifolia cœrulea*, flore uni-

co

a) *Phytopin.* p. 139. *Prodr.* p. 34. *Pin.*

b) *Delic. sylv. flor. Altorf.*

c) *Bot. Monspel.* p. 47. ubi & icon addita est, postea vero senten-
tiam mutavit.

d) I. R. H.

e) *Syll. plant. extra Brit.* p. 83.

f) II. p. 796.

g) *Theatr.* p. 650.

h) *Flor. Noric.* p. 79:

i) p. 740. cum asterisco.

k) *Flor. Laponic.* 74. neque certus tamen.

l) l. c. p. 291. postquam folia ima rotunda viderat.

m) Jungit enim *linifoliam THALII*; sed ea vulgaris est,

n) *Hist. des pl. autour de Par.* p. 184.

o) Folio latiori & hirsuto, flore pro humilitate plantæ magno, sed
& nostræ ima folia subhirsuta sunt,

co grandi in summo caulinco SCHEVCHZERI p), cui omnino similis est Campanula montana minor angustifolia BARRELE-RII q), neque recedit Campanula caule uniflora LINNÆI r). Campanula foliis Anchusæ floribus oblongis ibidem in saxosis aliquoties obvia fuit, a qua, ut obiter moneam, neque Campanula alpina aspera foliis Echii flore magno villoso PLVKNETII s), neque Campanula minor hirsuta Drabæ foliis t) di-versa est.

§. LXIII.

Altera die, quæ fuit 17. IULII post hanc quasi velitationem, in M. Ober Neunnen tribus aut ultra horis ab Aquis medicatis distantem, prima Aurora iter suscepimus. Primum stadium per sylvam est abiegnam, in qua magna vis *Equiseti sylvatici tenuissimis setis*, cuius spicam floralem, in folioso caule enascentem, brevem & subspadiceam tunc legi. STÆHELINI nostri hic recenseo experimentum, mutilatum certe in *Commentariis Parisinis* a), elegans, & quod vix fal-lit. *Equiseti* cuiusvis, sed in primis *arvensis*, cui flos a foliis sejunctus nascitur, primo vere vigentis, spica excutiatur su-pra Chartam, elabetur ex octenis capsulis, quæ sub scutis nutantibus adsunt, pollen viridis, adeo ponderosus, ut in aqua fundum petat. Is quando paulo siccior, neque siccissimus tamen, super vitrum effunditur, & admovetur microscopium, tripudium cernitur elegans, & aurium etiam indicio percipitur. Corpuscula nempe spermatica innato elatere se-mo-

p) *It. alp. IV. p. 454. f. 14. & parva rotundifolia flore cæruleo pentagono grandi It. alp. II. p. 131.*

q) *ic. 487.*

r) *Flor. Lapon. 85. T. 9. f. 5. 6.*

s) *Almagest. p. 136. T. 153. f. 6.*

t) *ibid f. 4.*

a) *1730. hist. p. 88.*

movent, & contorquent. Ea sunt sphærulæ fere, instructæ cruribus duobus, ad quinque usque, quæ extrema parte bifida denuo conjunguntur in laquei speciem. Ea cruscula elatere summo resiliunt, & per plura horæ minuta subsiliunt in aliquam distantiam. Ita vulgatissima planta omnes *Polypodii sensibilis*, & *Oxyoidis GARCINI*, & *Mimosæ* motus longissime superat agilitate & constantia. Sæpe in *Helvetia*, sæpe in *Germania*, elegans experimentum iteravi, quod primum apud STÆHELINVM b) videram,

§. LXIV.

Supra eam sylvam acclive pascuum est, in quo fons medicatus, lignea casa tectus, scaturit: Ibi aqua valentior bibitur, & odore graviori. Deinde alia sylva sequitur, & ipsa uligine impedita, atque hanc longissima adscendentia pascua, neque quidquam habentia, quod invitet Botanicum. Supra ea sequitur sylva suprema, ad quam ex altioribus mapalibus lignatum veniunt. Ibi præter vulgatissimam *semper virentem Vitem Idæam fructu rubro*, in cavis arboribus reperi *Chamænerium alpinum alsines folio*. Et jam ex sylva in pascua *Unter Neunnen* veneramus, ubi triste Cœlum a) expertus fueram ante octo annos, casa debili, & perflata ventis defensus ab horribili tempestate, quæ omnium intra hominum memoriam atrocissima & maxime diurna fuit. Supra ea mapalia secuti dorsum eminens inter duas convalles, paullatim vidimus stirpes rariores augeri, uti decedebat altitudini. Plurima ad viam *Myosotis alpina latifolia*, quæ variabili ingenio modo glabra, modo villosa est, folio auriculæ

b) Dom hæc scribo, reperio descriptum, in ejusdem STÆHELINI Thes. Anat. Bo. 1731. p. 4

a) Id nomen fecit SCHEVCHZERVS libro singulari, in quo ejus noctis calamitates descripsit.

culæ simili brevique, aut longiori, semper simillima *arvensis*
subhirsutæ magno flore, nisi quod folio latiori, & breviori sit.
Ibi & *Pedicularis* illa *foliis conjugatis b)*, cuius alibi descri-
ptionem dedi, & ea, quæ *Teucrii* est *folio coma atroruben- te*, nobis *STÆHELINIA* dicta *b**). In uliginosis vero pra-
tis, jam legeram vulgarem *palustrem elatiorem*, alias *albo*
flore, alias adeo exiguum, ut a cubito ad duas uncias redu-
ceretur ejus statura, semper sui similem magno flore, cuius
crassus tubus est, & folio. *Monorchis* dudum apparuerat,
hoc ipso vero loco frequens illa *Pseudorchis c)*, de qua alio lo-
co dixi. *Veronica saxatilis serpyllifolia d)* non crebra, fre-
quentior nostra, cui *calyces hirsuti*, *floresque congesti e)* sunt;
frequens etiam *RAJANA saxatilis caulinis nudis f)*. Dudum
etiam nascebatur *Phalangium alpinum palustre Iridis folio*,
cuius *stamina levempediculum* habent, siliquæ distinctæ sunt,
uti recte *MOEHRING g)* atque *LINNÆVS h)*. Plurimus ibi
Dens Leonis croceo flore i), & *Tragoselinum umbella rubente*,
elegans varietas vulgaris speciei. Plurima ad vias *Acini pul- chra species*, quam *Aquilegienses* alpicolæ ad pectoris morbos
commendant, grati aromatis plantula. Vbiique cespites fa-
ciebat *Quinquefolium alpinum minus repens aureum*, magno
flore, sericeisque villis ad oras nervosque. *Caryophyllata al- pina minor onusta hirsuto capite*; *Auricula urfi lutea*, jam
matura, *Gentiana alpina pumila verna major*, & *Gentiana*
quam

b) Diff. de *Pedicular.* v.

b*) l. c. III.

c) It. hercyn. XLII.

d) Progr. de *Veronic. alp.* II.

e) ibid. IV.

f) ibid VI.

g) Hort. priv. p. III.

h) Flor. Lappon. 137. sed is de alia specie loquitur,

i) LX.

quam voco *elegantissimam* Bavanicam CAMERARII. Ea distat a priori foliis neque acutis, neque in rosulam ad terram congestis, sed rotundioribus, & multis conjugationibus ad caulem dispositis, demum segmentis floris non acutis. Cæterum & aures albas inter segmenta floris habet, & ipsum floris centrum album est. Vulgaris certe in alpibus plantæ, neque satis notæ tamen, CAMERARIUS k) bonam iconem dedit. CASPAR BAVHINVS non bene conjunxit *pumilæ vernæ majori*. Nihil ad ejus historiam PARKINSONVS l) addidit, nihil MORISONVS m), nihil RAJVS n), qui in natali solo prope Augustam vindelicorum plantulam CAMERARIANAM legerat, neque MERRET o), neque PLVKNETVS p). TOVRNEFORT & SCHEVCHZERVVS non habent. BARRELERIVS, qui *Gentianarum* iconibus multiplicandis sibi videtur placuisse, & CAMERARII iconem habet q), & denuo videtur depinxisse cum nomine *Gentianæ alpinæ vernæ minoris* folio subrotundo flore cœruleo r).

§. LXV.

Alsines alpinæ serpyllifoliae magna vis ubique est, quæ a multicauli vulgari flore multo majori distinguitur, & Helianthemi serpyllifosii flore aureo odorato, de quo vereor, ut satis distinctum sit, a vulgatissima specie. Viola rotundifolia

M 2

lia

k) Hort. med. Ic. xv. n. I. & p. 65.

l) *Gentianella minima elegantissima* Bavarica Camerarii major. Theatr. p. 407.

m) Hist. oxon. III. p. 482. eod. nom.

n) In hist. p. 720. eodem nomine. In syllog. stirp. extra Brit. nasc. vocat. *Gentianellam minimam* flore unico cœruleo elegantissimo. p. 132.o) Si nostram intelligit, dum *Gentianellam minimam* Bavaricam recenset, quam vix existimaverim Angliæ indigenam esse. DILLENIANA certe synopsi non habet.

p) Eod. nom. Almagest. p. 167.

q) ic. 101.

r) ic. 98.

Viola lutea passim ad saxorum umbrosas intercedentes. *Viola* vero *montana lutea grandiflora*, in tenui gramine. *Plantago angustifolia alpina*, *Osmunda lunato folio*, *Rapunculus folio oblongo spica orbiculari*, *Chamæbododendros alpina glabra*, gallarum vicio ludens a), *Bistorta minima*, *Selaginoides foliis crispis*; *Lichen ille pulmonarius saxatilis tenuiter laciniatus elegantis sulfurei coloris SCHEVCHZERI b)* varius colore, & divisione, *Bryum alpinum crinum crisporum facie c)*, *Lichen alpinus corniculatus niveus*, d) *varietas pyxidati*, & alia *varietas oris fungosis ruberrimis*, tum *Lichen crustaceus saxatilis farinaceus globulis minutissimis undique refertus MICELI*, & aliis *fungosis carneis capitulis*; *Gramen typhoides spica brevi densa* & *veluti villosa*. *Gramen sparteum juncifolium*, *Gramen Anthoxantho ad fine laxiori spica e)*, *Gramen paniculatum elegans locustis proliferis f)*, *Juncoidis & Cyperoidis species aliquot*, *Hieracium latifolium villosum magno flore*, nondum maturum, Ea omnia in *M. unter-Neunnenen*, frequentia sunt, alioquin in alpibus non rara, neque adeo obscura, ut mereantur illustrari. Sed quam primum inter inaccessos solidissimarum rupium vertices *Ganterisch & Neunnenen* vallem subivimus frigidam, umbrosam, angustamque, quæ *ober Neunnenen* vocatur, jam gratiore labris nostri fructus uberrime decerpere licuit.

§. LXVI.

Ad viam *Cardui genus humile, ramosum, multiflorum*, foliis ciliaribus spinulis undique ad oras asperis, immaturum.

Id

a) SCHEVCHZ. It. II. T. xix. f. 1. 2. 3.

b) It. VI. p. 514.

c) Ejusdem T. modo cit. f. 5.

d) Ejusd. p. 137. n. 58.

e) *montanum odoratum spicatum* J. SCHEVCH.f) Gr. *montanum spica foliacea graminea* It. I. T. IV. f. 2.

Id ad *Carduum molle* retulimus dictum alibi, (xxix.) licet
folio molliori, caule multifloro, capite etiam in juniori
planta ampliori diversitatem quamdam affectaverit. Sed
alia *Acanacea* planta ibi plurima est ad semitam, quae ad ca-
sam alpinam dicit, *Cirsium nempe alpinum spinosissimum flo-*
ribus ochroleucis inter flavescentia folia congestis. Idem &
alibi per alpes in convallibus, & ad rivos provenit. Ei-
dura radix, depacta. *Caulis* humilis, ad cubitalem usque.
Folia inferiora copiosissima, *Carlinæ* facie, crispa, laciniata,
omni lacinia in spinam acutam exeunte, suprema vero fo-
lia latiora, albida, *Cnici* instar nidum efficiunt *Floribus*, sessi-
libus, in summe caule congestis. Iis, quod abunde prospe-
ctum sit vallo foliorum, nihil inest spinosi; *calyx* simplici-
bus, longis, acutis foliis fit, quae in mitem spinulam termi-
nantur. *Flosculus* profunde quinquefidus; & *Tuba* & *Tubus*
staminum ochroleuca. *Pappus* in placenta simplex, in se-
minum capite plumosus. Antiquissimus Botanicus ARE-
TIVS a) descripsit, & nomen fecit Gross Eberwurtz. *Silybum*
vocat SIMLERVS b) dum ARETIVM exscribit. *Carlina poly-*
cephalos alba foliis superioribus candidis CASPARO BAVHINO c)
est absque synonymo; & ex eo *Carlina polycephalos alba* dicta
est RAJO d), TOVRNEFORTIO e), MAGNOLIO f), TILLIO g),
SCHEVCHZERO h), cui nota fuit. Sed & TITA eam in alpi-
bus legit, fecitque nomen *Cardui alpini spinosissimi polyce-*
M 3 phali

a) *Ante hort. Germ. GESNERI* p. 234. b.b) *Valles. &c. alp. deser.* p. 327.c) *In Pinace* p. 380.

d) p. 309. cum asterisco.

e) *Schol. Botan.* p. 218. I. R. H.f) *Hort. reg. Monsp.* 44.g) *Hort. Pisan.* p. 33.h) *It. alp. II.* p. 131.

phali foliis in summitate albicantibus & albo flore i), quod nomen ita reformavit PONTEDERA, ut Cnicum alpinum humile spinosum flore pallente vocaret k). Et non videtur dubium, idem esse Circum acanthoides coma florum flavescente montis Carthusiani PLVMIER in posthumis apud VAILLANTIVM l). Ego nomen feci ex suis notis.

§. LXVII.

Ibi exoptatissimum pabulum *Phellandryum alpinum umbella purpurascente*, cum *Dauco Cretico* mixtum ubique nascitur, humile, & pene sessili umbella. Ei *calyx generalis* nullus, *particularis* vero ex aliquot longis foliolis, semina sulcata, brevia *Petala* purpurascens, inæqualiter cordiformia, inæqualia, quorum extimum insigniter majus est reliquis, apices purpurei globosi, cum duabus de more *Tubis*. In hac ergo planta felix fuit TOVRNEFORTIVS, quæ *Phellandryo* undique, flore non solum & *semine*, sed *calyce etiam* convenit.

§. LXVIII.

Ex ipsa hac valle fluvius, *die Gürbe*, tenuibus principiis oritur, deinde per vallem, quæ inter *Belp* & *Doffan* media est, descendit, & ligna in altissimis sylvis cæsa, non sine magno labore eorum, qui operi præfunt, in *Arolam* defert, civium destinata commodis. In exigua palude, quæ prima stamina generat hujus fluvii, provenit *Scorpiuri* species alpina. *Scorpiurum* voco post MORISONVM a) id genus plantarum

i) *It. alp. post hort. Maurocen.*

k) In epist. ad SHERARD p. VI.

l) Comment. acad. Reg. scient. 1718. p. m. 203.

a) III. p. 451. eum solus MARTIN sequitur catal. plant. circa Cantabrig. p. 47.

tarum, quod ab *Heliotropio* b) & *Lithospermo* c) separatum, DILLENIVS d), & LINNÆVS e) *Myosotidem* dicunt. Neque enim placet absque summa necessitate mutare classica nomina, neque *Myosotidis* nomen melius huic plantæ convenit, quam TOVRNEFORTIANÆ, imo vero *Myosotis RUPPITANA* signaturæ etiam minus respondet. *Scorpiurus* ergo *Alpina* folio est hirsuto, lato, caule humili, flore magno, vividissime cœruleo f). Hanc varietatem, nam vera est varietas speciei *palustris*, BOCCONE g) descriptis nomine *Echii scorpioidis alpini nani tomentosi supini*. Deinde *Lithospermum Alpinum tomentosum minimum* TOVRNEFORTIVS h), SCHEVCHZERVS i), TILLIVS k). *Lithospermum alpinum minus* flore purpurascente, & flore albo PONTEDERÆ l), ejus varietates sunt. Is, cum SCHEVCHZERO ad arvense potius retulit, sed flores majores facile demonstrant, ad *palustre* referendum esse. Verum nihil magis differt a palustri, *Myosotis scorpioides latifolia*.

- b) Cui adcensuerat HERMANNVS & BOERHAAVIVS, differt omnino segmentis nullis intermediis; deinde globulis luteis, qui corollam faciunt, qua fauces clauduntur.
- c) Eo retulerat TOVRNEFORTIVS ob semina, differt floris tubo breviori, & floralibus spicis Scorpii caudam referentibus, quæ vetustissima similitudo est, GESN. tab. coll. stirp. 80. b. bort. German. p. 280. & Rondelet apud GESNER epist. p. 84. b.
- d) Nov. gen. p. 99. T. III.
- e) Flor. Lapon. 75. &c.
- f) Quo solo a *palustri* recedit, & similior est arvensis: sed dudum notum est, plantas alpinas odore, sapore, vividitate coloris superare plantas soli humilioris.
- g) Mus. di piante p. 149. T. 107. ipse palustri simile facit flore, semine, perenni vita.
- h) I. R. H.
- i) It. alpin. II. p. 137.
- k) Hort. Pis. p. 106.
- l) Compend. Tabular. p. 83.

latifolia hirsuta MERRETI m) & RAJIN), neque unquam, opinor, distincta fuisset, nisi adeo animis hominum inse-
disset opinio, glabram o) esse eam speciem, quæ flore est
majori: Quare cum hirsutam hanc viderent Botanici, &
altiorem, & nascentem in dumetis, umbrofisque, factum est,
ut eam distinguerent. *Lithospermum arvense majus* dixit
SCHEVCHZERVS p), *medium* VAILLANTIVS, *Myosotidem hirsutam*
montanam & *sylvaticam* DILLENIVS q), & SIEGESBECKR), *My-*
osotidem sylvaticam præcocem latifoliam hispidam RVPP f),
BVXBAVM t), & ultimo loco inter Botanicos nominandus
ERNDL u). Ego certe nonnisi duas *Scorpiuri* species ad-
gnosco, *flore minori*, cuius varietas est illud, quod a *luteis*
floribus nomen habet non optimum w); & *flore majori*, cu-
jus tres varietates sunt *palustris vulgaris, sylvatica maxima,*
&

m) *Pin. rer. britannic.* p. 82.

n) vel DILLENII *Syn. RAJAN* p. 229. T. IX. f. 2.

o) Apparet ex nominibus HERMANNI, BOERHAAVII, MA-
GNOLII, VOLCAMERI, DILLENII, SIEGESBEKII, LIN-
NÆI. Nostra vero, ubique vulgaris, & quam ex Belgio misit
vir Clar ADRIANVS a ROTEN, pilos habent utique, & au-
gent in solo sicciori.

p) *It. alp.* II. p. 137.

q) *Cat. plant. circa Giess.* p. 46.

r) *Primit. flor. Petrop.* p. 77.

s) *Flor. Jenens.* p. 8.

t) *Enum plant. circa Hal.* p. 231.

u) *Viridar. Warsas.* p. 80. Hanc censuram meretur, vel ob solum
insignissimum plagium Fungorum omnium, quos ex HOFMAN-
NI deliciis sylvestribus ad verbum exscipit; & aliunde præterca-
patet, eum paucissimas unquam legisse plantarum, de quibus lo-
quitur.

w) *Echium scorpioides minus* flosculis luteis C. B. in *Prodr.* p. 119.
Nempe, etsi ratio luteoli umbilici ad segmenta cœrulea paulo ma-
jor sit, non tamen flos luteus dicendus est, cuius maxime conspicua
pars

& *alpina humilis*, si quidem hæc omnino etiam *varietatis* nomine digna fuerit.

§. LXIX.

In rupibus vicinis ubique *Rubeola saxatilis alpina* BOCCONE nascitur, quæ varietas est vulgaris (*allii albi minoris* a), paulo, ob loci rationem, humilior, & asperior. Plurima ibi *Lychnis alpina pumila* gramineo folio instar purpureum tenuum late saxis instrata, & *Saxifraga Pyrenaica* foliis partim integris, partim trifidis; Namque verissime, ex una radice, in unum cespitem, enascuntur *foliola* & integra, & bifida, & trifida. Solitaria vero, & in eodem loco non infrequens est *Saxifraga* alia, foliis modo integris modo trifidis, quam cum priori non bene conjunxit SCHEVCHZERV^b). Eam diu c) pro nova habui, neque certe quisquam, præter COLVMNAM d), eam descripsit, ejusque verbis recentiores nihil addiderunt, *Sedum vero alpinum pallido flore* GARIDELLI e), ut icone nostram refert utcunque, alienissimum nomen, habitum vero multo altiorem habet. Nostræ enim ex gracili *radice* folia ad terram multa in obtusam lingulam ex gracili ortu educuntur, viridia, non crassula, subhirsuta.

In

pars vividissime est cœrulea. Hæc cæterum varietas tota hispidior, calyce hirto fusco, & habitu minimo dilinguitur.

a) *Mus. di piante* T. 101.

b) *It. alp.* I. p. 49.

c) Et dixi *Saxifragam alpinam habitu androsaces villosae* Com. Lit. Phys. Med. Norimb. 1732. p. 196.

d) Nempe dixit ille *Sedi alpini* III. var. foliis integris Ecphras. II. p. 66. *Saxifragam* III. in ic. p. 67. RAJVS *Sedi alpini* tertii fr. GREGORII secundam varietatem p. 1043 MORIS. *Sedum alpinum* fr. Gregorii III. Col. Hist. Oxon. p. 476. descr.

e) p. 438. ic. 91.

N

In nostris alpibus semper integra vidi, incisa f) vero uno altero ve dente ex *Rhaetia* adtulit D. HVBERVS in hac ipsa Academia P. P. *Caulis* vix foliosus, paucos flores gerit in vertice. *Ovarium* sub flore est, uti in *Saxifragiis* folet. *Petalæ* obsolete alba ex viridi, atque lineata. *Stamina* decem, quorum quinque longiora, apicibus luteolis. Ex summo ovario *Tubæ* longiusculæ duæ apice recurvo. Voco nunc *Saxifragiam alpinam subhirsutam foliis longis raro dentatis.*

§. LXX.

In casa 'alpina M. Ober Neunnenen cibo & quieti aliquantum temporis dedimus. Circa eam casam, ut alibi in *Jura* & *alpibus* abunde provenit *Lapathum*, quod *rotundifolium* dicunt, oblongo vero & obtuso folio est; & *Napellus*. In vestigiis defluentis nivis uberrima *Soldanella alpina*, nam *majorem* & *minorem* non distinguo. *Thlaspidium Anchusæ* folio ubique, & inter lapides *Juniperus alpina*, & *Leucojum vernum perenne album majus*.

LXXI.

Supererat adscensus unius horulæ, per angustæ vallis scopulosum limitem, atque salebrosam viam, vocant *dieleiter*: id circa meridiem confecimus, non sine magna ex pulcherrimis plantis concepta voluptate. Nascebantur non remoti ab invicem *Ranunculi*, quos expedire & facile erit, & minime inutile. Ergo in *Alpibus* omnibus & hic etiam frequens provenit *Ranunculus* flore flavo splendente magno, cuius diameter etiam unciam superet, *foliis* ad caulem subramo-

f) Ea est varietas foliis incisis *Sedi alpini* III. fratriis GREGORII apud COLUMNAM l.c. p. 66. & *sedum alpinum tertium* in ico-
ne, eodemque nomine H. OXON. in icode s. XII. t. 9. f. 2. *Sedi alpini* tertii fr. GREGORII secunda varietas RAIJ p. 1043.

ramorum ortu' gracilibus, digitatis, ad terram simillimis vulgaris *erecti acris*, trilobatis, lateralibus lobis bipartitis in duas partes, quarum interior tripartita obtuse, exterior bipartita est, Medius lobus tridentatus; Omnia, ut tota planata, & ipse calyx, hirsuta.

§. LXXII.

Alter non vulgaris, ad deliquia nivis cum *albo*, sed rarior, in *Gotthardo*, *Gemmio*, & hic in *Ober-Neunenen* provenit, humilis, nisi quod aliquando lætius exsurgat ad 3. 4. ve uncias, *radiculis* multis, longis & albidis, *foliis* & habitu levi, excepto *caulicolo*, qui hirsutus est; Ad radicem *folia* trilobata lobis lateralibus bifidis obtusis, medio trifido, subrotundis dentibus incisa, ambitu toto, orisque rotundis. Ad caulem fere uno loco unum trifidum vel quadrifidum folium, latis lobulis, quorum qui cauli proximi iidem minores sunt. *Flos* luteus splendens, in cauliculo triunciali, minor.

§. LXXIII.

Tertius alio tempore (Julio M. 1736.) lectus in *M. Thuiri*, secundo (LXXII.) similis est, levitate folii, caulis hirsutie, statura; Est tamen altior, & folia ad terram molto acutioribus segmentis incisa, ad caulem vero profundius digitata sunt segmentis gracilibus.

§. LXXIV.

Quartus albo colore petalorum, eorumque figura cordis simili satis diversus, præterea unam tantum alteramve ad caulem ligulam habet ex albida vaginula, *folia* ad terram vel integra, & per ambitum rotunde dentata, vel minus profunde trilobata. Accedunt tamen ad folia ejus *Ranunculi*, quem secundo loco diximus (LXXII.) *Ovarium* longius & pene in morem *palustris apii* folio levius.

§. LXXV.

Omnis hi *Ranunculi* habuerunt suos Botanicos, a quibus distincti sunt suis nominibus. Et prior videtur esse *Ranunculus alpinus pratensi repenti similis sed minor* MICHELI a) apud TILLIVM. An & *Rannnculus* IV. MARTENS b)? non recedit. Mihi vero certissime, etsi in Gotthardo & supremis alpibus proveniat, est ipsissimus *erectus acris*, neque aliam ob rationem ejus memini, quam ut monerem, ne pro novo habeatur ab aliquo *cveptiQoitwv*.

§. LXXVI.

Alter (LXXII.) dudum a JOHANNE BAVHINO a) traditus est pro varietate *albi*, & ejus icon *albi* iconi adjecta b). Eum MARTENS pro secundo c) delineat, nisi forte ob floris exiguitatem separari debeat. LINNÆVS *Ranunculum* dixit *caule unifloro foliis radicalibus palmatis, caulinis multipartitis sessilibus* d), deditque iconem nostri simillimam, uti neque desunt mihi specimina, in quibus caulis foliis destitutus humilitate *pygmæum* e) ejus refert. Eundem, ob lanuginosos cauliculos, & folia exigua, intelligere videtur SCHEVCHZERVS, quando *Ranunculum saxatilem magno flore* f) in *alpibus* nasci dicit. Eo nomine plantam descripserat CASPAR BAVHINVS g), ita ut non recedat descriptio a nostro, sed

VIXXI

a) *Hort. Pisan.* p. 145.b) *It. Spitzberg* c. IV. T. I. ad D.

a) III. p. 861.

b) Superiorum interior, non mala.

c) I. c. T. G. f. e.

d) *Flor. Lapon.* 232. T. III. f. 2.

n) varietas I. c. T. III. f. 3.

f) *It. I.* p. 46. in *M. Joch & Laubersgrad &c.*g) *Prodr.* p. 95. Pin.

sed stirpem perpetuas nives amantem nasci *Monspelii* non visum est probabile. Neque quidquam inveneram in PAR-
KINSONO h), RAJO i), TOVRNEFORTIO k) & TILLIO l), unde plura de *Ranunculi monspeliensis* historia discerem. Hic omnino videtur a vulgaribus diversus manere posse.

§. LXXVII.

Tertius (LXXIII.) pro novo descriptus fuit a JOH. BAV-
HINO a), qui eodem in loco eum legit, quo & ego inveni,
cum *Thora* in supremis pascuis M. THVIRI nascentem. RA-
JVS b) eodem etiam loco, eundem invenit & distinxit. Fi-
gura BAVHINI rudior est, sed tenuis incisio foliorum, & ad
caulem gracilis sufficit. An satis a priori diversus? Multæ
varietates intermediæ mihi videntur conjungere utrumque.
Quia tamen JOHANNES BAUHINVS eos distinguit, & utri-
usque propriam iconem dedit, non intercedam, quin *Ranunculus tenuifolius montanus luteus* suum locum in familia
distinctum tueatur, quem, nisi invenirem distinctum, non
distinguerem, & etiam nunc invitus distinguo.

§. LXXVIII.

Quartus abunde distinctus est, neque quisquam eum
conjungere ausus est, nisi cum secundo (LXXII.) JOHAN-
NES BAVHINVS a).

N 3

rem

h) In C. B. *Theatr.* p. 338.

i) *Syll. plant. extra Brit. nasc.* p. 216. & *hist.* p. 595. cum asterisco.

k) I. R. H. *Schol. Bot. Paris.* p. 217.

l) *Hort. Pisan.* p. 144.

a) *Ranunculus montanus tenuifolius luteus* III. p. 416.

b) *Syllog. plant. extra Brit.* p. 216. *histor. plant.* p. 592.

a) Et ex eo, planta non vilis, MORISONVS & RAJVS. Cæterum icon
JOHANNIS exterior hunc exprimit.

b) A JOHANNE BAVHINO & SCHEVCHZERO IV. p. 339. &c.

rem varietatem clvsii a minori nulla vera nota separari. Vidi enim *majorem* folio rotundo integro, & *minor*, qui idem vulgatior, plerumque est divisus foliis. Is omnino videtur, licet colore floris differat, vel simillimus certe est nostro, *Ranunculus caule unifolio & unifloro foliis tripartitis*: si forte LINNÆVS c) defluxo demum flore eum legit, ut ex nudo caule & foliis pulchræ iconis satis video. *Ranunculus* III. MARTENS d) omnino idem est nostro. Non videtur necesse esse, ut nomen addam *Rauunculi alpini humilis rotundifolii*, quem CASPAR BAVHINVS *majori flore & minori flore* distinxit, non cautissime distributis in vanam diversitatem synonymis.

§. LXXIX.

Per dumeta, quæ *Chamærhododendros alpina villosa* jam sola faciebat, altiora loca amans, & quam glabra rarer, ascendimus, donec & eæ sylvulæ nos desererent. Ibi ad lapides, non uno loco, latissimo cespite plantula saxa tegebat, quam olim in *Gemmio Valesiæ*, deinde in *Gotthardo* legi, nunc uberrime ad scopulos viæ *die leiter* dictæ. Ei quidem, ex radiculis frequentibus folia in rosulas congesta eduntur, læte virentia, firmula, angusta, intra lineam, tres lata & ultra, confertissima. Si evolvatur cespes, repentes *cauliculi* apparent aliquot unciarum, cum foliolis conjugatis. Ex foliorum alis passim floriger *pedunculus*, vix duarum linearum altitudine, fert *florem* pediculo non breviorem, viridem, conniventem perpetuo. Is *calyx* quinque foliolis oblongis fit. Intra eum, nudo etiam oculo, sed ad linternam facilius, adparent sive *ungues* sive *petala*, crassiuscula, neque petalodeæ teneritatis, apice teniter emarginato. *Quinque stamina*

c) *Flor Botan. 231. T. III. f. 4.*

d) Exemplar foliosum, ut sœpe solent. Recte addit diversitatem foliorum ad caulem aradicalibus hic nullam esse. c. IV. tab. H. f. c.

stamina ex eorum corpusculorum intervallo eminent, pallentibus apicibus, *Quinque* alia oriuntur singulum ad radicem sui *cordiformis unguis f. petali*, connatum mediæ ejus linæ, & ubi hæc definit, liberum & eminens, apiceque suo onustum. *Ovarium* in medio flore pyriforme tres *Tubas* repandas emitit. Intus ad axin medium *semina* aliquot majuscula, quæ ad lentem validius objecta augentem, videntur fieri una convexa facie intercepta inter duas planas facies. Hanc plantam pro nova edidi ante aliquot annos a), neque pœnitet. Nam etsi aliquantum cum nostra convenient plantulæ aliquot scriptorum vetustiorum, ii tamen non ita stirpem descripserunt, ut quisquam posteriorum eos intellexerit. Nempe forte hic pertinet *Sedum saxatile humillimum foliolis densissime compactis flosculos fere sine pediculo præferens diligentissimi BVRSERI b), Perpusillum sedum omnium minimum LOBELII c), Sedum montanum perpusillum luteolis floribus PARKINSONI d) ex LOBELIO, cum icono, quæ a nostra planta non aliena est. *Sedum montanum perpusillum luteum*, quod MORISON e), ex PARKINSONO, excitat planta non visa. Et hi quidem eamdem stirpem videntur in mente habuisse. Sed & *Lychnis alpina muscosis foliis densius stipatis floribus parvis calyce duriore PLVKNETI f)*, iconem habet, quæ possit plantæ nostræ convenire. Neminem vero descriptionem dedisse, quæ sufficiat cognoscendæ plantæ, id facile apparebit evolventi loca, quæ excitavi. Verum & genus novum videtur requirere similitudo cum *Alpine maxima**

a) *Comm. Lit.* 1736. *hebd.* XIII. & *T.* 1. *f.* 5.

b) *Aet. succit.* p. 531.

c) *Illustr. stirp.* p. 101.

d) *Theatr.* p. 738.

e) III. p. 471. & ic. cum nomine PARK. S. XII. T. 6. f. 14.

f) *Almagest.* p. 233. *T.* XLII. *f.* 8.

xima est, foliis, calyce, staminibus, Tubis: in eo differt, quod petala non caduca, non libera habeat, sed connata staminibus, & duriora; adde, quod calyce multoties sint minoria, ex quo factum est, ut diu me latuerint. Novo generi supereft ut nomen in ponam. STÆHELINIAM quidem vocabo, quam BARTSCHIAM dicit amicissimus LINNÆVS g), cum vetustiori mihi videar jure gaudere, & scripferim de planta, ante multos annos mihi cognita. Hanc *Cardistemonem* vocare possem, malo CHERLERIAM dicere, in memoriam Botanici eximii, cui plurimas & pulchras plantas debemus, quæ apud JOHANNEM BAVHINVM exstant.

§. LXXX.

Dum lente adscendo, *Lychnis alpina linifolia multiflora per ampla radice aliquoties adparuit*, & *Linaria quadrifolia supina*, elegantissima plantularum, & uberrime proveniens *Pedicularis caule simplici foliis semipinnatis obtusis laciniis imbricatis LINNÆI*, rara planta, & hoc ipso loco primum a me lecta anno. 1731. Nihil admodum inveni, quod adderem descriptioni, quam alibi exhibui a). Cum ea *Salix pumila folio rotundo*, & alia *Salix*, de qua, cum dudum cognitæ plantulæ recentiores scriptores inventionem sibi adrogent, aliqua addere visum est. Repit per saxa alpium viridissimi plantula, neque erigitur unquam, licet ad duos pedes serpat, ramosa & frondosa. *Folia* congesta, elliptica, ovi forma, splendida, virentia, glabra, longitudine dupla & tripla ad latitudinem, terminata obtuso ambitu. Sexu distincta est. Et *Mari* supra caulem, ex congestis foliis educitur

g) *Coroll. gener. 967. & Hort. Cliffort.* eodem fere tempore, quo ego diss. de *Pedicularibus* edidi. Malim CL, BARTSCHIO Americanam stirpem, STÆHELINO alpinam dari.

a) *De pedicularib. Helvet. VIII.*

citur spica nondum uncialis florigera, quæ fit foliolis circa scapum adgestis pallidis, in quorum sinu duo *stamina* latent coccineis apicibus. *Feminæ* plantæ *spicæ* raræ paucis fiunt capsulis virentibus, erectis, longis, conicis, ex quarum apice *Tubæ* binæ erumpunt pallentes. Primus hanc plantam cognovisse videtur ARETIUS a) cui est *Balmenstritten* frutex absque flore. Ex eo SIMLERVS b). CAMERARIUS eximiam iconem habet cum nomine *Salix pusilla humilis* c), quam existimo ex GESNERIANIS esse. *Salix humilis repens* LOBELII d), *Salix pumila utrinque glabra* JOH. BAVHINI e), ex quo PLVKNET f), TOVRNEFORTIVS g) & TILLIVS h). *Salix alpina angustifolia repens* CASPARI BAVHINI i), an & eorum, qui idem nomen habent? RAIJ k), TOVRNEFORTII l)? *Salix latifolia* folio utrinque glabro superne splendente RAIJ m), an & SCHEVCH-

ZERI

a) Apud GESNER. in CORD. p. 234. b.

b) *Valles. S alp. descript.* p. 330.c) *Epit. Math.* p. 108.d) *Advers.* p. 423. non recedit. *Icon.* II. p. 138.

e) I. p. 2. p. 217. ex LOBELIO, absque alio synonymo. CHABRAEVS addit glossema cortice rubente p. 66.

f) *Almagest.* p. 327.

g) I. R. H.

h) *Hort. Pisan.* p. 150.i) Idque certo, cum & *Salicis* facie non esse post ARETIVM habeat, & brevia folia, utrinque glabra, & locum natalem Prodr. p. 159. Pin. CAMERARIANAM vero alio avocat, ad speciem CLVSII, quæ inferne sub cinerea est. LOBELIANAM male ad maritimam subincanam speciem revocat, quæ alpina, & utrinque glabra est.k) *Syllog. plant. extra Brit.* p. 226. *Histor.* p. 1423. incognitam sibi.

l) I. R. H.

m) *Syll. plant. extra Brit. nasc.* in summo Jura, & Hiſt. p. 1422. Conjungit huic pumilam I. CLVSII in Pann. p. 102. sed eis folia inferne sunt subcinerea.

ZERIN), *Salix pumila alpina latifolia glabra* o) e j u s d e m , h u c p e r t i n e n t . P o s t h o s o m n e s B O C C O N E b o n a m i c o n e m d e d i t , d i x i t q u e p). *Salicem a'pinam minimam repente m retuso serpylli folio lucido*, quod nomen & SCHEVCHZERVS q) h a b e t ,) & brevius in iconibus *Salicem alpinam serpylli folio lucido* r), uti TOVR-NEFORTIVS f)

§. LXXXI.

Jamque eram enixus ad montis culmen, quam longe accessus datur hominibus. Ibi ad rupes *Saxifragia montana ericoides* abunde provenit, sive *cæruleo flore fuerit*, sive *pureo*, semen enim solum & capsulae supererant. Nascitur ibi, sed & longe humilioribus locis Helvetiae, *Onobrychis illa* quæ plebejo nomine *Esparsette* dicitur, passimque seritur alendo pecori idonea. Sed longe fuerunt gratiore s quatuor conferti *Astragali*, qui pene unico loco gramineo, inter durissimas rupes juncti provenerant. *Astragalorum* feracissima est Helvetia. Præter *vulgarem ochroleucon* dulcibus foliis, qui hic etiam arduo in loco proveniebat, & aliud, qui *Cicer sylvestre* dicitur, arvis calidioris Helvetiae familiarem, habet planior *Valesia* a) *purpureum spicatum Pannonicum* CLVSII, pascua Rhætiæ *Astragaloïdes ochroleucum* TILLII b)

n) *It. alp. l. p. 47. non videtur.*

o) *Syllage stirp. extra Brit. p. 225. absque synonymo.*

p) *Mus. di Piante. p. 18.*

q) *It. l. p. 48. & V. p. 427. conjungit Salicem saxatilem minimam C. B. in Prodr. sed ea, ob folia rotunda, & venosa, & quod minima sit, est Salix alnifolia Bocc.*

r) *T. I.*

f) *I. R. H.*

a) *Inter Leucam & Sideram uberrime legi in itinere 1733.*

b), prata circa Grindelwald & Gemmius M. *Astragalum* foliis viciæ ramosum & procumbentem flore glomerato oblongo albo cœruleoque SCHEVCHZERI c), idemque M. Gemmi & Scheidek, Surenen, & aliæ Alpes pyrenaicum Barbæ Jovis folio non ramosum procumbentem flore ochroleuco glomerato SCHEVCHZERI d), prata demum Rhætiæ inter Lenz & Brienz *Astragalum* illum siliqua longa incurva, qui *Polygalæ* nomine a CAMERARIO e), *Onobrychidis* quartæ a CLVSIO f) depictus est. Præter hos omnes, tres alii in rupibus vicini nascebantur. Eorum primus, qui paulo vulgatior est, in Gemmio abunde, imo vero si idem est RAJANO, etiam in Jura nascitur, similis utcunque ei, cui flores ex albo cœrulei sunt, ab eo tamen multis modis diversus. *Radix* enim plurimos caules fundere solet florigeros, plurimas foliosas alas, ex brachiis, qualia alteri *Astragalo* adpinxerunt CAMERARIUS & CLVSIVS. *Folia* multo propiora sibi & acutiora, & exiliora, quam cuicunque aliorum *Astragalorum*. *Florum* spica valde conferta: *Calyx* non ut in albo cœruleoque niger, sed viridis, firmis, levis, dentibus vix inæqualibus. *Flos* ex rubro purpureus, qualem & *Polygala* CAMERARIUS habet, *Vexillum* vix erectum amplum, *Alæ* amplæ & coloratæ, longissimis auriculis præditæ, non albæ, ut in illo SCHEVCHZE-

O 2

RI,

b) p. 19. T. 14. f. 2. quæ *Astragalus recticaulis hirsuta* JOHANNIS BAVHINI & SCHEVCHZERI. It. alp. IV. p. 330. Eamdem existimo esse *Polygalo* similem luteo flore GESNERI add. ad bort. Germ. p. 260. b.

c) It. VII. p. 519. hoc loco, & in Itin. IV. p. 330. alio nomine.

d) It. IV. p. 330. Eundem in l. itinere. vocat *alpinum* foliis viciæ angustioribus flore ochroleuco. p. 31. nisi is *Astragaloides* est, & in Itin. VII. *alpinum* ramosum *hirsutum* flore ochroleuco p. 509. de quo ex loco natali mihi constat.

e) In MATTH. Epit. p. 929. bon. ic.

f) Pann. 755. histor. p. CCXL.

RI. *Carina cœrulea breviorrostrata, stamina de more. Siliqua non longa ut in Polygala CAMERARII, sed brevis, tumida, media crena divisa bilocularis.* Vno verbo, a *Polygala CAMERARII* foliis acutis, quæ *Polygala* omnino ovata habet, & siliqua brevi, ab eo vero cui *albi* & *cœrulei* flores sunt, & purpureis floribus, & foliis acutis, & calyce, atque siliqua non nigris differt. Omnino tamen huc videtur pertinere *Astragalus quidam montanus sive onobrychis aliis RAI g*), in Jura lectus, neque enim *Astragalum JOHANNIS BAVHINI*, cui idem nomen est, huic refero, cum is ex CLVSII *Onobrychide quarta* sit, quam ob longiores siliquas conjungo *Polygalæ CAMERARII*, et si foliis acutis huic nostro fit propior. Est denique *Astragalus incanus saxatilis hirsutus minor, acuminato folio, flore purpurascente TITÆ h*), *Onobrychis foliis viciæ majoribus cœrulopurpurascensibus vel foliis Tragacanthæ*, non CASPARI BAVHINI, qui CLVSIANVM vult, verum SCHEVCHZERI i) forte.

§. LXXXII.

Alius, pulchra, & speciosa planta, *caule erecto, plures conjugationes foliorum recipiente, foliis viciæ, ex ellipticis paulum ad verticem angustioribus, nervosis, glabris, spica Astragolorum omnium amplissima, laxa, in qua flores penduli.* Ii flores *calycem* habent ex albo & purpureo varium, hirsutum, cuius dentes omnes capillares hirsuti, imi vero dentes longiores sunt. *Flos ipse unciæ longitudine, purpureus, Hedyssari more splendens.* *Vexillum reliquis petalis amplius, saepe reflexum, cordis figura, nervo, & lata ovali plaga ad ortum notatum.* *Alæ extremo ovato, separatae non auritæ,*

g) *Syll. plant. extra Brit.* p. 72. hist. p. 937.

h) In *Itin. post hort. Mauroc.*

i) Nam synonymum conjungit ex T. quod alibi refert ad eum qui *flore albo & cœruleo* est It. I. p. 45.

auritæ, macula ad ortum alba, extremo purpureo. *Carina* vexillo longior, purpureo obtuso rostro definit. *Vagina* & *stamina* decem ex gentis indole. *Siliqua* pene *Orobi*, emittit *Tubam cylindricam*. Nascitur in horridis præcipitiis *M. Stockhorn*, in *Gemmio* vero supra *spitalmatt* ubique. Vix reperio synonyma: *Astragalus* enim *Helveticus* clvsii a) ita breviter dicitur, ut nemo in turba *Helveticorum* eum distinguat. SCHEVCHZERUS b) vero omnino descripsit nostrum *Alpini Helveticus* nomine. Ego *alpinum erectum spica purpurea speciosa* dixi alibi c). An *Astragalus alpinus perennis* (flore purpureo magno tñtæ d).

§. LXXXIII.

Sed nunquam neque SCHEVCHZERVS viderat, neque ipse vidi speciosum *Astragalu*m, qui coronidem itineri meo imposuit, summo in cacumine *Neunenen* lectus, neque alibi, Ei lignosa *radix* caules aliquot fundit foliosos & florigeros. Foliosi, habent decem pene paria foliorum, extremo inpare, ellipsi in acutissimum mucronem terminata, utrinque splendida, argentea lanugine obducta. Florigeri caules aphylli, firmi, gerunt spicam *florum* non multorum. *Calyx* villosissimus, longis albisque pilis, de more superius aperitus, dentibus quatuor pene æqualibus, longiori quinto, villosis omnibus, *Flos* longus replicato *vexillo* stricto & prælongo instar *Trifolii*, longe ultra reliqua petala educito, oris replicatis. *Alæ* carina longiores, *Carina* brevior lata, in mu-

O 3

cro-

a) *Hispan.* p. 468. *Histor.* ccxxxiii.

b) *It.* IV. p. 330.

c) *Comm. Phys. technic. med.* 1736, p. 101, T. I, f. 2, cum icone non bona.

d) In *Itinere post. hort.* Mauroc,

cronem singularem terminata? Hæc omnia violacea fere, absque splendore, Nomen facio *Astragalus alpinus totus serviceus foliis acuminatis.* In recentissimo opere AMMĀNI *Astragalum* reperio, cuius decriptio meum omnino imitatur. Nomen fecit, *Astragalus non ramosus, villosus & incarnatus, spicatus, floribus purpuroviolaceis* a).

§. LXXXIV.

Hic itineris terminus fuit, quod præcipitare coagiturgens iter in Germaniam. Inde per aliam viam Bernam repetii & supra pagum Thurnen frequentem legi *Alceam folio rotundo, & laciniato, quæ a tenuifolia crispa JOHANNIS BAVHINI b), & a vulgari minori FRATRIS minime differt.* Ei enim Bernæ vulgatissimæ, prima quæ prodeunt, folia rotunda sunt. Ibi *Scabiosa Dipsaci folio VAILLANTII*, quam a *Scabiosa latifolia rubro colore non distinguo.* Hanc enim in *Helvetia RAJVS b*)*, illam uterque BAVHINVS c) legit. Egovero & circa Basileam & circa Juræ radices in *Helvetia Aventicensi* eamdem omnino plantam vidi. Trans paludosum pratum, quod Gurbe fluviolus medius perfluit, dum festini ambulamus, in fossis *Sparganium non ramosum, Lentibulariam, & Potamogetonem* invenimus, folio gramineo ramosum CASPARI BAVHINI d) foliis vix tertiam partem lineæ latis

a) *Plant. Ruthenic.* n. 167. p. 126.

a) *Malva montana s. Alcea rotundifolia laciniata* COLUMNAE p. 148. cum icono opt.

b) II. p. 1067.

b*) *Syllog. Stirp. extra Brit.* p. 228. *Histor.* p. 378.

c) *Scab. maxima dumetorum folio non laciniato* I. B. III. i. p. 10. & *Scabiosa montana non laciniata rubra* c. BAVHINI cat. plant. circ Bas. p. 80.

d) *Prodrom.* p. 101.

Iatis, spicis pene *Adonidis* in brevi pediculo, crassis siliculis curvulis. Idem esse existimo cum *Potamogetone pusillo* folio gramineo caule rotundo MERRETI e) & RAIJ f).

§. LXXXV.

Berna profectus, dum Juræ humillimum dorsum supero, ab incisis rupibus dictum *Hauenstein*, non absque aliquo fructu speravi fore, si plantulas quærerem. Ergo primo ad arcem *Falckenstein* solidissimis rupibus superstructam, ascendi festinus. Ibi *Daucum illum Tragoselini crispi folio* (XLII.) in rupibus inaccessis vidi & folia legi, *Iridem etiam Germanicam*, *Acer crispum* laciniis in acutis mucrones exeuntibus, *Mespilum folio rotundiori fructu nigro subdulci maturo*, foliisque decusso omni tomento levissimis, quæ candida lana obducta Majo M. legeram, *Caryophyllum saxatilem* g), quem eodem in loco primum invenerat CASPAR BAVHINVS, foliis cruciatis, deorsum replicatis, latis, in rigidum acumen ex-euntibus, rubella lanagine in ortu petalorum; quibus notis facile didici eumdem esse *Caryophyllum* II. CLVSII h), & *Caryophyllum sylvestrem* flore magno inodoro hirsuto CASPARI BAVHINI i). Tandem & *Cotoneaster* GESNERI k) ibi nascitur, quem facile demonstrarem, eumdem esse cum ejusdem

e) *Pin. rer. Britan.* p. 97.

f) *Cat. plant. Cantabr.* p. 125. *Catal. plant. Engl.* p. 242. *biflor.* p. 190. *Syn. III.* p. 150. Ejus icon exstat apud VAILLANTIVM T. XXXII. f. 4.

g) Ita vocabatur, cum distinctionis nomine *latifolius* & *angustifolius* in *herbario vivo* CASPARI BAVHINI.

h) *Pannon* p. 317. *biflor.* p. 282.

i) Ad plantam CLVSII.

k) *Epist.* p. 94.

dem *Chamæmespilo* l), nisi idem jam docuisset JOHANNES BAVHINVS m).

§. LXXXVI

Ad viam solet *Acetosa rotundifolia hortensis* reperiri, & *Chamæbuxus* flore colute&, sed utraque planta præcox est, & evanuerat. *Digitalis* utraque, *lutea magno flore* intus maculoſo, folio hirsuto, & parvo flore foliis glabris, uberrime ad sepes. In omnibus etiam sepibus circa *Langenbrug* bicubitale *Aconitum Lycoctonum luteum*. In descensu vero ad *Wallenburg* *Stachys alpina* valde ferotina, nam paucos adhuc flores explicaverat die 25. Julii. Ejus *Calyx pentagonus* est, *Galea integra* obfolete purpurea *Barba concolor* trifida, medio segmento longiore, recta protensa; fauces albæ, *stamina* obfolete purpurea. Odor non ingratus *Melissophylli*. Ex multis nominibus meminisse placet, me neque *Alpenkraut* *LONICERIA* a) huc referre, neque *Salviam alpinam* TABERNÆMONTANI b), ut visum est CASPARO BAVHINO. Forte *Betonica longe major* CÆSALPINI c) huc facit. Sed certius *Urticæ fætide Heracleæ TRAGI similis vel stachydi* JOH. BAVHINI d). Porro *Stachys* folio obscure virente flore ferrugineo MORISONI e), RAIJ f), BOERHAAVII g) & VAILLAN-

TII

1) Ad *hort.* p. 254. b.

m) licet distinguat utrumque *Epist.* p. 91. 6.

a), p. cxlviii. ei enim flos coeruleus est in longis spicis. Est forte malia icon *Hormini pratensis*.

b) p. 372. quam referrem potius ad *Colum Jovis*, nisi florem diceret purpureum. Vide folia & *Galeam* floris.

c) L. XI. c. XLIV.

d) *Font. Boll. descr.* p. 187.

e) *Hort. Bles.* p. 198. *bist. oxon.* III. p. 382. T. X. f. 11.

f) *Hist. plant.* III. p. 304.

g) *Ind. alt.* p. 154.

TRI h), utique huc referenda, & quæ inde dependent PLVNETII i) plantæ, & WALTHERI k).

§. LXXXVII.

In sepibus, quæ descendantibus ad lævam sunt, non raro provenit elegans *Aster Pannonicus* CLVSII a), conspicua altitudine ad tres pene pedes, nutans. *Folia* imma petiolata, latiuscula, longo mucrone, ora raris denticulis serrata, eaque & nervis leniter pilosis. Superiora graciliora sunt. In summo Caule pauci, sed conspicua magnitudine *flores*. *Calyx* firmus fit multiplice ordine latarum squamarum hirsutarum. *Radii* lutei, trinervii, nervis exeuntibus in totidem denticulos, *tubus* brevis, & *Tuba* eminens aureo apice. *Flosculorum* ova minora. *Tubus floris* longior in quinque triangularia segmenta fissus. *Tuba* longa fusca, perforans *stamineam cylindrum*. Discernuntur semina erectis, gracilibus *squamis*. Sine dubio hunc *Asterem* CLVSIVS descripsit, neque enim papposum dixit semen esse, ut videtur legisse RAIVS b), sed manere in quodam villo capituli. Præter ejus synonyma magis recepta, refero huc *Conyzam majorem alteram*

h) *Botan. Paris.* p. 189. nobiscum sentit.

i) *Stachys latifolia major foliis obscure virentibus flore galeato ferrugineo Almag.* p. 358. T. 317. f. 4. non optime, consentiente RAJO III. p. 302.

k) *Stachys folio obscure virenti flore purpurascente Ind. horti sui* p. 108. T. XIX.

a) *Pannon.* p. 526. *Aster* III. *Austriacus* I. *Hist.* p. XIII. cum omnibus synonymis, *Astere* nempe luteo majori folio *Succise* C. B. &c.

b) Qui inter papposos *Asteres* habet CLVSIANVM, p. 267. Idem sentit MAGNOLIVS *Hort. Reg. Monsp.* p. 25.

ram THALII c), cuius icon plantam nostram egregie exprimit, semenque nudum habet. Superflua ergo est *Conyza montana lutea foliis oblongis* CASPARI BAVHINI, *Aster montanus luteus foliis oblongis* TOVRNEFORTII d). Porro huc revoco lectum haud procul *Aqua Helvetiorum Asterem montanum luteum flore pallido foliis non ita rigidis leviter una cum caule hirsutis* BVRSERI e). Nam in M. Boezberg, quem Basilea adveniens necessario superavit BVRSERVS, nostrum Asterem legit D. HVBERVS. In recentioribus, facile distinguitur. Est nempe *Chrysanthemum Asteris facie foliis Succise* HERMANNI f), qui verum characterem plantæ CLVSIANAE primus detexit, MORISONVS enim eam habet inter papposas g). VAILLANTIVS *Asteriscum perennem villosum serratum calyce imo non folioso* h) facit. BOERHAAVIVS ex HERMANNO *Asteriscum calyce brevi angustifolium*i), LINNÆVS demum *Bupthalmum foliis linearie lanceolatis serratis, villosis, calycibus nudis.*

§. LXXXVIII.

e) p. 21. ic. II.

d) Cum uterque sit ad THALIANAM plantam solam. TILLIVS egregie plantam repetit, quæ nunquam distincta existit, p. 19. ut manifesto deprehendatur, sive error sive fraus fuerit.

e) AET. Suecic. p. 531.

f) Flor. Batav. p. 34. hort. Lugd. Bat. p. 144.

g) *Aster luteus Pannonicus primus bist.* Oxon. III. p. 117.

h) 1720. p. 430. Folia non villosa sed subhirsuta sunt.

i) Ind. alt. hort. Lugd. Bat. p. 105. & pene maxult distinguere, nomine *Asteriscoides*, quod calycis imi foliola aberrantia non habent.

k) Hort. Cliffort. p. 114.

§. LXXXVIII.

Jamque superatis, quæ erant asperrima, lenis declivitas nos comitata est *Basileam*, urbem, quam absque gratæ mentis recordatione nefas mihi est nominare. Ibi enim audivi JOHANNEM BERNOVLLIVM; Ibi in amicitiam DROLLINGERI, STÆHELINI & KOENIGII veni, quæ mihi semper erit dulcis, dulcissima fuit olim, quando juvenis iis viris in mistus mihi vel ex eo placui, quod consortio eorum non penitus ipsis indignus viderer. Ibi primas herbulas legi, & etiam tum, cum *Botanices* rudimenta discerem, ad *historiam Stirpium patriarcharum*, ex longissimo certe intervallo speratam, audaci consilio me paravi.

§. XIC.

Conservat ibi familia BAVHINIANA, & EMANVEL BAVHINVS, qui avorum æmulatione ad medicos honores nuper adspiravit, preciosum rei herbariæ cimelium, hortum siccum CASPARI BAVHINI, in quo, non eæ solæ plantæ, quas *Pinax* habet, eodem ordine collectæ exstant, sed aliæ præterea non paucæ, neque satis cognitæ, tum numerosæ icones, quæ lucem publicam nondum viderunt. Ad sunt etiam doctorum virorum ad CASPARVM datæ literæ, ex quibus plurimæ de re herbariæ lites confici possent: ad sunt denique schedæ, ex quibus Theatro Botanico non unum volumen addi posset.

§. XC.

Sed præter eum hortum siccum, Bibliotheca publica possidet herbas HAGENBACHII, qui ex itinere in alpes Bernenses multas & elegantes plantas in CASPARI opera contulit, ut ex graminibus in Theatri I. volumine æstimare licet

licet. Pulcherrimus est etiam hortus siccus BENEDICTI STÆHELINI, a Patre botanico, & a filio felicissimo, atque industrio, stirpium inventore collectus. Eum plurimæ ab amico utriusque VAILLANTIO acceptæ stirpes decorant, pretiosiorum tamen reddunt multæ, & raræ plantæ, a BAVHINO prætervisæ, aut minus curiose cognitæ, quas in patria regione multorum annorum junctis laboribus detexit BENEDICTVS JOH. HENRICI F. STÆHELINVS.

§. XCII.

Sed eripuit me desiderabilimoræ urgens necessitas. Per beata rura *Alsatiae* rapido itinere properans, vix mihi permisi, ut plantulam aliquam decerperem. Plurimus ibi ad vim nascitur *Dipsacus foliis laciniatis*, quem eximius LINNÆVS a) cum vulgari conjungit. In iis tamen speciminibus, quæ per bidui iter cum *vulgari* copiosissime vidi provenire, visus sum mihi, non unam diversitatem reperire, etiam si ad folia non respicias. *Capitulum longum, flos albus* est, nunquam, ut in altero purpureus, statura altior, *squamaram* demum spinæ non rectæ, sed repandæ, & extrorsum converfæ. Poterit itaque, ut videtur, locum suum tueri. In *Alsatia* plurimum, *Wormatiæ*, unde ad latum esse testatur CASPAR BAVHINVS b), nullum omnino vidi.

§. XCII.

Circa *Drusenheim*, viculum in quo nihil est quod *Dru-*
forum nomine dignum sit, frequens est *Blattaria*. Ibi etiam
Raphanistrum flore melino legi, elegantem varietatem, uti
aliam flore cœruleo ostendit *Basileæ* vir felicis industriæ STÆ-
HELI-

a) *Hort. Cliffort.* p. 29.

b) In *herb. viv.*

HELINVS. Sed utrumque non a) videtur differre a vulgaris illo albo arvorum, quod utique *Helvetiae* multo familiarius est, quam nostrae *Germaniae*. *Gernsheimi* in stagno cum *Hydrocotyle*, & *Salvinia MICHELII*, magnus est proventus *Tribuloidis*, cuius stamina, ut desiderato LINNAEI b) satisfaciam, sunt quatuor; *Tuba* vero ex rostrato ovario, una, recurvo apice, & virente.

§. XCIII.

Circa *Lauterburg*, in arenosa sylva, quæ *Spiram* dicit, ceperat comitem se addere euntibus *Stæchas citrina*, ea ubique ad *Oppenheim* usque frequens est. *Spiræ Alysson* illud floribus profunde incisis, quod *Thlaspi incanum Mechliniense* dicitur LOBELIO a), & *Chondrilla viminea*, & *Eruca tenuifolia perennis*, quæ *Manhemii*, *Wormatiæ*, *Oppenheimi*, frequen-
tissima est, *Genevæ* in ipsis muris urbis familiaris. Circa *Guntersblum* in fossis *Althea officinarum* frequens est, ad aggeres vero viarum *Oreoselinum minus*, & *Onobrychis echinata capite*, quæ nobis montanæ plantæ sunt: deinde proprius *Oppenheim Ammi perenne* sive *Falcaria RIVINI*, *Millefolium nobile*, & in ipsis ruderibus arcis uberrima copia *Daucus Alsaticus CASPARI BAVHINI*. De eo, cum non in vulgum notus sit, neque absque errore descriptus a quibusdam Botanicis, aliqua, priusquam finem faciam, visum est addere.

P 3

Ei

a) Neque RAIO conf. *Syn. III.* p. 296. habet enim non habitum solum, sed & venas florum simillimas. Erit ergo exemplum, neque enim plurima sunt, floris absque cultu albo colore & flavo ludentis.

b) *Char. gen.* 899.

a) Obs. p. 108, in arenosis ubique, *Hanoveræ* similibus locis nascitur.

§. XCIV.

Ei radix unica est, non nimis acriis, dura defixa. *Caulis* ad huminam altitudinem, profunde sulcatus, ut etiam angulosus videatur, plerumque purpureus, admodum ramosus, latis vaginis ad ramorum ortum, ut junior peculiarem habitum *Hippomarathri RIVINI* non male exprimat. *Folia* ad terram amplissima, & frequenter cubitalia, magnis & sulcatis costis. Numeravi ramosarum alarum *primarum* sex paria. In quavis earum, quæ inter primas sunt maximæ, *secundarum* ramosarum tria, quatuor. In maxima *secundarum* petiolatarum *tertiarum* unum par, sessilium unum. In *tertiis* trilobatus habitus. *Lobus primus medius* denuo trilobatus, lobis *secundis* lateralibus bifidis, *medio trifido*. *Lobi primi laterales* inæqualiter quadrifidi, quinquefidi. *Lobi ultimi*, modo dicti, lati, ad sesquilineam, incisionibus ultimis profundis, rectis, laciniis spinula terminatis. Omnia firma, glabra, ex flavo viridia, aromaticæ. *Umbellarum* petioli longi, ipsæque raræ, neque pro portione plantæ, ex peculiaribus umbellulis pene duodecim. *Calyx universalis* aliquot foliolis non latis, per ætatem non reflexis, vagisve. *Calyx* peculiaris latiusculis aliquot foliolis. *Semina* immatura striata, videntur alarum rudimenta quædam habere. *Tubæ* duæ ex tumida *placentula* bifida, breves. *Petala* quinque æqualia, integra, cum viredine luteola. Et ea quidem facies erat. In CORDI *Daucis* latere existimavi hanc plantam, neque tamen eruere potui. Ergo a *Dauco Alsatico CASPARI BAVHINI* a) initium feci, cuius icon non incommoda est. Nomen apud PARKINSONVM b),

RAIVM

a) *Prodrom.* p. 77. *Pin.* ex pratis palustribus. Noster sicco loco, in ruinis arcis antiquæ.

b) *Theatr.* p. 900.

RATVM c), MORISONVM d) exstat, & in *Schola Parisina*. Deinde JOHANNES & ipse pro nova dedit *Umbelliferam alsatiam magnam* e), *umbella parva sublutea*, quod nomen RAVS f) habet alibi. MORISONVS feminis aliqua similitudine delusus, *Thyffelino* non genere, sed ipsa specie conjunxit g). Inde factum est, ut RVPIVS *Pastinacam* diceret, *palustrem altissimam folio Seseleos pratensis* h). LINNÆVS *Oreoselina Thyfelinis* & nostrum utrisque conjunxit i), sed a *Thyffelino* quidem manifesto differt, floris petalis neque cordatis k), neque inæqualibus, *calyce universali* l) non reflexo, & quantum video in semine inmaturo, semina & si alata sint, non plana sunt. Recte & ex suis notis, & ex ratione calycis videtur conjunxisse TOVRNEFORTIVS *Oreoselinis* m). Eum BOERHAAVIVS n) & LINDERN o) secuti sunt,

§. XCV.

c) *Syll. plant. rar.* p. 114.

d) *Hist. Oxon.* III. p. 317.

e) III. p. 106. cum icone & descriptione non malis. Inde CHABRÆVS p. 393.

f) In *histor. plant.* p. 414. Ipse plantam vidit, in *Palatinatu*.

g) *Umbellif.* p. 84. cum neq; lactescat, neque multas radices habeat &c.

h) *Flor. Jenens.* p. 221.

i) *Selinum foliis pinnatim laciniatis, lacinulis trifidis obtusis hort. Cliffort.* p. 92. conf. char. gen. 210. EX LINNÆO nomen conservavit ROYEN p. 106.

k) Apex replicatus est ex lata bracteola, sed vera incisio nulla. Dum vero observavit DILLENIVS flores plantarum *Umbelliferarum luteos* regulares esse. cat. plant. circa Giess. p. 7.

l) Qui in *Thyffelino Plinii* nostrate nullus est.

m) *Oreoselinum pratense cicutæ facie.* I, R, H.

n) *Ind. alt.* p. 68.

o) *Tournef. Alsat.* p. 127.

§. XCV.

Jamque *Francofurti* eram, ubi comite D. SENKENBERGIO a) nuper *Archiatro Homburgensi*, floram ejus urbis a CLVSIO laudatam, & ipse invisurus, morbo impeditus fui, neque quidquam restituto superfuit, quam ut GOTTINGAM redirem.

- a) Qui & *Francofurti*, & in *M. Hundsrück*, & in montibus sylvæ Westerwald, & circa *Moguntiam*, passim multas elegantes plantas legit, quarum aliquas ejus munere possideo, ut *Carduum molle laciniatum* I. CLVSII, *Pentaphylloides erectum* &c.



Tab. 1.



Tab. 2.







§. L

Pauculos elapsae aestatis dies inpendimus itineri per Hercyniam syluam, quo suprema eius iugater omnino superauimus, vidimus fodinas argentiferas Clausthalienses, antiquissimas Vitrioli, sulphuris, Cupri, Plumbique Venas Montis Rammelii, Montem tandem Brueterum qui in hac boreali Germania altissimus habetur; atque plusculas stirpes collegimus vel lectas olim a THALIO, sed postliminio demum in notitiam Botanicorum reuocandas, vel alioquin non ubique obvias, neque explicatas satis. Operae ergo precium duximus ut obscuriores stirpes, adeo incognitas hodie ut pene nouae sint, describeremus, enarraremus dubia synonyma aliarum, vulgatores demum alias, sed montanas tamen, ipsis saltem nominibus indicaremus.

§. II.

In Iuco WEENDAE proximo, ad primum a Goettinga lapidem PETASITES nascitur non visus in *Hel-*

A 2

vetia

vetia, & cuius nomen difficile fuerit eruere. Nascitur ad purissimam scaturiginem, quae rotas agit molendini comminuendis in Chartam scriptoriam pannis destinati. A vulgari heluetico, qui *maior vulgaris* passim audit, non foliis adeo differt, sed spica floris longiore, laxiore, pedali, rara, pedicellis longis & saepe pendulis: *Calyce* non longo adeo, neque acutis, neque reflexis, sed subrotundis squamis facto, vnico concinno ordine flosculos presse circumstantibus: *Flore* in quacunque aetate albo & quasi sene, quod vix nisi pappus seminum ultra calycem emineat, multo exiliore quam in nostro *maiori*; *Flosculis* demum androgynis paucissimis, uno vel altero, subrubellis, qui multis femininis flosculis cinguntur, quorum semen & pappus eadem sunt, sed campanulae loco bifidus *Tubus* est, emittens absque omni stamine *Tubam*. Promptum est, & Character id suadere videtur, referre nostram stirpem ad primam speciem *Petasitidis maioris vulgaris*, quam RVPIVS a) dixit duorum generum flosculos habere. Eam BVXBAVM b) repetit nomine *Petasitis in medio maioribus flosculis, reliquis minoribus*. In synopsi stirp. Britannicar. Ed III. c) vocatur *Petasites maior floribus longis pediculis insidentibus*; eodemque nomine pulcherrime depingitur in Hort. Eltham. d) Verum ab ea facile nostra distinguitur flore lato non ventricoso, & calyce, cuius in DILLENIANA iconē squamae videntur multorum ordinum pingi, a nostra fabrica diuersissimae.

Missus

- a) flor. Jenens. p. 153.
- b) Enum. plant. circa Halam nase. p. 258.
- c) p. 179.
- d) p. 309. ic. CCXXX.

Missus est hic ipse Weendensis Petasites pro *Petasiti-de minori* C. B. P. Verum licet iste manifesto flosculos duorum generum habeat, vti ex primi inuentoris CAMERARI^e iconē adparet, & haud dissimilem a nostra aut RVPPIANA stirpem a Germanis THALIO, f) SCHWENKFELDIO g) LOESELIO h) HOFMANNO i), VOLKAMERO k) DILLENIO l), a BESLERO m) demum descriptam esse, vel ipsa locorum similitudo suadeat, certum tamen est n) *Petasitidem minorem* C.B. Cacaliae tomentosae ad finem esse, & hinc molli lanugine obductum folium habere, inde fature virens & glabrum paucō goffypio pubescens. Sed & I. B. aliam stir-

A 3

pem

- c) *Petasites flore albo* Epit. Matth. p. 593. Idem vocat *Petasiten nostrum Leucanthemon* hort. p. 122. qui licet odoratus ibi dicatur, descriptus equidem videtur a LVGDVNENSIBVS nomine *Petasitis odorati*, non vero depictus p. 1054, florū enim icon & situs omnino ad vulgarem pertinet.
- f) *Petasites flore candido* hercyn. p. 91. Andersbergae.
- g) *Petasites alpina*, stirp. Siles. p. 155. quem dicit flore esse sublateo.
- h) *Petasites minor* Flor. Pruss. p. 192.
- i) *Tussilago maior altera* sive *Petasites minor*. Delic. sylv. Flor. Alt. d.
- k) Flor. Norimb. p. 325. *Petasitem minorum* vocat.
- l) Catal. plant. circa Gieff. nasc. p. 37.
- m) in hort. Eystettens. Hybern. Tab. V. f. II vbi equidem icones commutatas esse & haec quidem vulgarem, quae vero vulgarem dicitur indicare illum *flore albo* exprimere videtur, si figuræ florū propriæ species.
- n) ex herb. viv. Quare & SCHEVCHZERVS noster Itin. V. p. 425. cum *Cacalia tomentosa* eum coniunxit.

pem videtur intellexisse o), qui sexus diuersitatem descriptione sua excludit. Diligentissimus tandem RA-IVS p) Genuae suam plantam descriptis, vt vix Germanici soli videatur. Quare nostram, neque pro CAMERARIANA q) neque pro RVPPIANA stirpe tradere ausi, proponimus eruditorum disquisitioni: neque sustinemus pronunciare cuinam ex tribus propositis plantis conueniant synonyma AMBROSINI r), MORISONI s), HERMANNI t), SVTHERLANDI u), MAGNOLII x) TOVRNEFORTII y), PLVKNETTII z), RAIJ aa) PONTEDERAE bb), LEMERYI cc), TILLI

- o) v. *Petasites albus anguloſo folio*, hist. plant. III. p. 567. qui *Petasites folio anguloſo, radice geniculata caule ſtriato* dicitur CHABRAEO Sciagraph. p. 513.
- p) Syllag. Plant. extra Brit. p. 201. vti & I. B. pro exoticadeſcripsit.
- q) Quam, Germanica cum sit, & Noribergae ab eius excessu perpetuo visa, proximam noſtræ veſeamdem eſſe auguramur.
- r) *Petasites minor* Phytoplog. p. I. p. 419.
- s) *Petasites flore albo*. Hort. Bles. p. 156. *Petasites maior albus anguloſo folio* H. ox. III. p. 95.
- t) *Petasites albus anguloſo folio*. H.L.B. 488.
- v) Flor. Bat. *Petasites minor*.
- u) Hort. Edimb. *Petasites minor* p. 267.
- x) H. R. M. p. 157. eodem nomine.
- y) eod. Schol. Bot. p. 10. & I. R. H. eodem.
- z) Almageſt. p. 288. nomine I. B.
- aa) eodem Hist. plant. I. p. 261. ex I. B.
- bb) eodem Dijſſ. p. 159. vbi de floſculis femininis nulla fit mentio.
- cc) Diction. de drog. ſimpl. p. 416. *Petasites minor*.

TILLI dd), VAILLANTII ee), BOERHAAVII ff), MILLERI gg), WALTHERI hh) De vulgari maiori addere visum est, icones FVCHSII ii), TRAGI kk), MATTHIOLI ll), TABERNAEMONTANI mm), spicam nimis arctam & breuem facere, optimam vero esse, quam DODONAEVS nn), LOBELIVS oo), & CLVSIVS pp) proposuerunt.

§. III.

In omnibus circa Goettingam nemoribus, vmbrosis locis & in dumetis, prouenit Pyrolae species, cui Tuba recta est, minor quam altera cui stamina & Tuba declinata sunt, folio frequentius serrato, spica breviori, & densiori. Pau-lo rario obseruante RAIO a) est haec altera, atque montana here-

dd) hort. pisan. 133. eodem nomine.

ee) Memoir. de l' Acad. 1719. p. 403. eodem.

ff) eod. Ind. alt. hort. Lugd. Bat. p. 118.

gg) Gardeners Dictionary nomine I. B.

hh) designat. plant. hort. sui p. 96. *Petasites maior* flore albo.

ii) p. 644.

kk) eadem p. 414.

ll) p. 849.

mm) p. 749.

nn) Pempt. ed. 1616. p. 597.

oo) Icon. p. 591.

pp) Hist. plant. p. CXVI.

a) Catal. stirp. in ext. region 1673. p. 59. & in altera Editione 1694.

five Catal. stirp. Exterar. p. 211. coniecturam addidit de diversitate sexus, quam nemo fecutus est,

hercyniae syluae nemora Iurassique coryleta amat,
speciosa altitudine, spica laxa longiori, Tuba pro-
boscidis instar ex pendulo flore incurva, foliis vix serra-
tis amplioribus. Difficile est synonyma inter utramque
partiri, cum ante RAIMONDI diuersitas earum neglecta
fuerit. Manifestum tamen est, maiorem cui stamina &
Tuba deflexa sunt, proponi a CAMERARIO. b) IOH.
BAVHINO c), & post hos a RAO d) RIVINO e), RVP-
PIO f) TOVRNEFORTIO g), LEMERYO h), DIL-
LENIO i); ERNDTELIO k) LINNAEO l). Non ita
certum est eamdem proponi a LOBELIO m), aut utram-
que

- b) *Pyrola*. EPIT. Matth. p. 723. spica laxa, Tuba incurua, folia iusto longiora.
- c) descript. *Pyrolae*, vbi florem diffinem & Tubam recurvam habet hist. Plant. p. 135. Icon. ex DODONAEO est obscurius diuersitatem exprimens.
- d) HIST. plant. II. p. 1233. & synops. III. p. 363. vbi minorem Tuba recta distinguit, a maiori de qua agimus.
- e) qui diuersis iconibus, & nominibus *Pyrolae*, *Pyrolae folio rotundo* & *Pyrolae folio obtuso* maiorem nostram expressit Pen-
tapet. Irreg.
- f) cui est *Pyrola maior* & *elatior foliis oblongis pistillo florum in-*
curvo, flor. Icenens. p. 236.
- g) Mat. medic. L. II. p. 140. L. III. p. 190. ex descriptione.
- h) *Pyrola* Dict. dos Drog. p. 451. & T. 18. f. 14. ic. DODONAEI.
- i) Cat. plant. circa Giess.. p. 94. *Pyrola*.
- k) ad mentem RIVINI *pyrolam* vocat, & denuo *pyrolam* folio obtuso. Viridar. Warsav. p. 99.
- l) *Pyrola staminibus & pistillis declinatis* Fl. Lapon. 169.
- m) *Pyrola a pyrifolio* Ic. stirp. p. 294. similis CAMERARIANAE sed obscurior.

que distingui a CLVSIO n); neque satis eas distinxit BESLER o) aut MORISON p). Sed Tubam rectam adeo- que alteram speciem habent RIVIN. q) RVPPIV8 r), WAL- THER s), DILLENIVS t). Plane non liquet de stirpibus BRVNFELES u), DORSTENI x), FVCHSH y) TRAGI, z), GESNERI aa) LONICERI, bb) MATTHIOLI cc), DODO- NAEI,

- a) Varietatem facit *Pyrolae vulgatioris* folio maiori & molliori & aliam folio minori & duriort, PANN. p. 505. & Hist. CXVI. descr. sed veras notas distinguentes non tradit: Eas vari- etates servat C. B. P. & MOR.
- b) *Pyrola H. EYST. Aest. Ord. V. T. XI. f. 2.* folia & exiguitas plantae respondent, Tubae aliae rectae, aliae incurvae.
- c) *Pyrola rotundifolia maior. H. Oxon. III. p. 504.* habet de- scriptionem I. B., icones duas, aliam rectis, aliam incurvis Tubis, hancque maiorem.
- d) *Pyrola minor. Pentap. irreg. bene.*
- e) *Pyrola rotundifolia maior. flor. Ienens. p. 236.*
- f) *Design. plant. hort. sui. nomine RIV.*
- g) *Catal. plant. circa Gieff. p. 94.* eodem nomine, tum *Synops. RAIANAЕ Edit. III. p. 363.*
- h) *Pirolae HIERONYMVS HERBAR. II. p. 312.* facit marem & feminam. BRVNFELES v, III. p. 88. obscuram dat Iconem.
- i) similis icon. p. 225.
- j) *Limonium c. 175. p. 467.* Tuba brevis recta, sed spica rara, habitus altior.
- k) *Limonium sylvestre p. 707.* ead. Icon.
- l) *de collect. stirp. Pirola, nihil distincti, neque Pirola vulgo dicta hort. German. p. 272. b.*
- m) *Limonium pratense herbar. Germ. 1560. L. V. cap. 235.* ha- bet icones DORST. & FVCHSII.
- n) in DIOSC. p. 982.

NAEI, dd) CAESALPINI ee) CASTORIS ff) THALII gg)
 LVGDVNENSIVM hh), TABERNAEMONTANI ii),
 SCHWENKFELDI kk), C. BAVHINI ll) PARKISONI mm)
 AMBROSINI nn), MERRETI oo) LOESELII pp) ELSHOL-
 ZI qq), HOFMANNI rr) NYLANDI ss), COMMELINI tt)
 HERMANNI uu), KNAVTHII xx) MAGNOLI yy,)
 FRANCI zz), SIBBALDI aaa) SVTHERLANDI bbb),
 PLVK-

- dd) Pempt. ed. 1616. p. 138. *Pyrola*.
- ee) de plant. L. VIII. cap. 32.
- ff) *Pirola herb. nuovo* p. 363.
- gg) bercyn. p. 85. *Pyrola maior seu Beta sylvestris*.
- hh) ex Dodon. hist. plant. p. 841.
- ii) *Pyrola* p. 7, 8. ad minorem *Tubarecta* videtur pertinere
ob folia crenata &c.
- kk) *Pyrola maior* p. 172. *stirp. siles.*
- ll) *Pyrola rotundifolia maior*. C. B. P. & plant. Basil. p. 56.
- mm) *Pyrola nostras vulgaris* p. 508. cum icono Lobel.
- nn) *Pyrola maior* siue *beta sylvestris* Phytol. p. 450.
- oo) *Pyrola Pin. rer. Brit.* p. 99.
- pp) *Pyrola rotundifolia maior. flor. pruss.* p. 209.
- qq) eod. nomine, flor. March. p. 163,
- rr) *Pyrola Delic. sylv. altd.*
- ss) nederl. Kruyt. 6. p. 112.
- tt) *Pyrola rotundifolia maior. catal. pl. indig. boll.* p. 92.
- uu) H. L. B. p. 311.
- xx) *Enum. plant. circa hal.* p. 64.
- yy) H. R. M. p. 166.
- zz) *Pyrola limonium, Flora francica* p. 468.
- aaa) *Pyrola, spec. hist. nat. Scot.* p. 44.
- bbb) *Catal. plant. bort. Edimburg.* 281.

PLVKNETI ccc), VOLKAMMERI ddd), MVNTINGII eee),
TOVRNEFORTII fff), TITAE ggg), IOHRENII hhh),
TILLI iii), DALE kkk), LINDERI III), BOECLERI mmm),
BVXBAVMI nnn), SIEGESBECKII ooo), VAILLAN-
THI ppp).

De maiori omnino loqui videtur TOVRNEFORT
qqq), & BOERHAAVIVS rrr).

De minori DUVERNOI sss), & MICHELI ttt).

B 2 Pj-

ccc) *Almagest.* Bot. p. 309.

ddd) *Pyrola nostras vulgaris,* Flor. Nor. p. 347.

eee) *Pyrola officinarum vulgaris,* waare oeffening p. 552.

fff) schol. Bot. p. 5.

ggg) bort. Mauroc. p. 141.

hhh) Vadem. botan. p. 169.

iii) bort. pisan. p. 141.

kkk) *Pyrola pharmacol.* p. 333.

III) *Pyrola rotundifolia maior.* Tournef. Alsat. p. 100.

mmm) *Mater. Med.* p. 560.

nnn) enum. plant. circa Hal. p. 274.

ooo) *Pyrola rotundifolia maior.* Primit. flor. Petrop. p. 92.

ppp) *Botan. paris.* p. 169.

qqq) IRH. conf. Tab. 132.

rrr) Ind. Alt. p. 278. Characterem enim genericum utriusque
subit Tuba incurva.

sss) *Pyrola rotundifolia minor.* Catal. pl. circa. Arc. Tub. p. 123.

in quo natali solo ipse legi minorem vulgarem, nunquam
eam, cuius nomen dedit AVCTOR, raram & montanam
stirpem.

ttt) *Pyrola folio subrotundo leviter crenato* apud. TILL. bort.
p. 414.

Pyrola rotundifolia minor RUPPII ^{uuu)}, quam cum duriori CLVSII coniungit, videtur minoris varietas esse.

§. IV.

In sylvis inter Nürten & Soeterohr Fungus parvus lubricus, aureus, lamellis raris amplioribus pediculo crassiore 1) repertus est: cui pediculus flavus splendens, latus, in medio linea depresso notatus: Capitulum leniter pulvinatum vel planum, totum viscidum, superius aurantium, lamellis raris, paucis, crassis pallidioribus. Eam vero syluam egressi, in agello cis pagum Soeterohr elegantia sua spectabile vidimus Papauer erraticum maius flore albo, varietatem nempe vulgaris rubri, quam pro rarissima habuit C. BAVHINVS 2). Eius mentionem opinione pauciores visi sunt fecisse, MORISON 3), RAVIS 4), VOLCAMMER 5), TOURNEFORT 6), TILLI 7), VAILLANT 8), & BOER-HAAVE 9). SUTHERLANDUS 10), copiosus florum albedine variantium nomenclator, hunc quidem non habet. Ungues flavi sunt, bracteae niueae.

§. V.

^{uuu)} flor. Jenens. l.c.

1) MICH. nov. gen. plant. p. 147.

2) PIN.

3) H. OXON. II. p. 277.

4) HIST. PLANT. p. 855. syn. III. p. 308.

5) flor. Noric. p. 317.

6) IRH.

7) hort. pisani. p. 131.

8) Botan. Paris p. 156.

9) ind. alt. p. 280.

10) Vid. hort. Edimburg. p. 260.

§. V.

Pluvia intercessit diligentiae nostrae , quae ubi coelo sereniori excepta fuit , in pratis apricis sesquileuca cis Osterodam viae Regiae sinisterius adjacentibus , plantulas aliquas perelegantes legimus . Universum solum tegebatur *Trifolio Lupulino minimo* , quod primus distincta iconē & descriptione sufficiente adseruit DILLENIVS. 1) Sed primus id proposuisse videtur THALIVS , cuius vestigia legendō , non sine voluptate aliqua plantas haud paucissimas restituere didicimus , quae ut laterent , fecit iconum defectus , descriptionum brevitas , ac ipsa saepe ubertas congenerum . Describit nempe *Trifolium Lupulinum* , tum aliud , quod Medicaginis species est , sed tertium addit , 2) minus suffruticans ferme , viticulis multis exiguis , gracilibus & striatis in terra diruptans , quosdam etiam dodrantali altitudine erigens , foliis brevioribus , humani ferē cordis (qua nempe figura vulgo pingi solet) aliquam similitudinem experimentibus , ac pulchrit̄ suis nervis striatis : capitulis florū & racemis seminum iisdem cum priori (Medicagine) Reperitur in aridioribus pratis , marginibus & secus vias . Sic ille . Folia cordis humani figura & striae foliorum , manifesto indicant , non esse varietatem Medicaginis , cui folia molliora subhirsuta neque cordata sunt . Deinde nostrum esse , ipse locus natalis indicat in apricis & siccioribus hercyniae sylvae pratis , Quod capitula Medicagini similia faciat THALIVS , videtur ex familiari seculo B. 3 ante antiquū manuū illō ,

1) *Synops.* III. p. 31. T. XIV. f. 4.2) *hercyn. Saxono-Thuring.* p. 124.

illo neglectu minutioris observationis factum esse. Dignoscitur a reliquis facile, foliis concinne striatis hilo majori excisis, capitulo vix ultra novem flosculos habente, ipsa statura humiliori cum duricie tamen et fructicosa natura coniuncta. Si coniecturae locus esset, *Trifolium lupulinum alterum minus*, *Catal. plant. circa Cantab.* p. 166. & *Cat. Stirp. Engl.* p. 290. omnino cum hoc nostro coniungerem. Ea enim RAIVS locis modocitatis dicit omnium Trifoliorum Anglicorum minimaesse, cum *Trifolium Lupulinum alterum minus* in *Hist. Plant.* 949. & *Syn. III.* p. 330. caules habere dicat etiam ramosiores & maiores quam vulgare Lupulinum maius. Verum longe certiora synonyma sunt, *Trifolium luteum Lupulinum minimum* H. OX. 3) SVTHERL. 4) IRH. BVXBVM, 5) VAILL. 6) *Trifoliastrum pratense Lupulinum annuum luteum omnium minimum*, foliis cordatis, siliculis compressis, monospermis MICHEL. 7) *Lupulinum minimum* RVPP 8) & GEMEINHART. 9)

§. VI.

Abundant ea prata in primis Orchidibus. Inter quas solam excitare libuit *Monorchis*, cum altera, quae odore

- 3) II. p. 142.
- 4) *hort. Edimb.* p. 341.
- 5) *enum. plant. circa Hal.* p. 325.
- 6) *Botan. Paris,* p. 96.
- 7) *nov. gen. plant.* p. 29: Annon huc etiam *Trifolium arvense Lupulinum supinum minimum subluteum folio cordato.* MICHEL. apud TILL. p. 168 ?
- 8) *flor. Jenens.* p. 207.
- 9) *plant. circa Laub.* 69.

odore hirci minor est. MONORCHIS equidem habitu & staminum fabrica Orchis est, differt galeae duobus foliis non vt in Orchide solent simplicibus, sed ex scutulo pallido spinulam producentibus 1), defectu calcaris, radice vnicula, substantiae paulo firmioris. Odor suavis & mellitus est. Admiratio subit, quando apud CB. vnicum synonymon video CLVSII, 2) cum dubio de alio synynomio C. Gesneri. Namque praeterquam quod de C. GESNERI 3) stirpe dubium nullum sit, manifeste hoc pertinet, *Satyrii VII. prima species in apricis montibus TRAGI.* 4) deinde *Triorchides LOBELIANAE*, quibus rotundi bulbi sunt. & quas nemo mortalium post GEMMAM distinctas vidit. Sunt hae *Orchis frisia littoralis* sive *triorchis lutea* tertia LOBELII 5) ex qua nata est *Orchis Frisia littoralis* LVGDVN. 6) PARKINS 7) AMBROSI NI. 8) *Testiculus luteus*: *Orchis lutea* TABERN. 9) *Orchis*

1) conf. opt. Icon. MICH. pro labello inferiori etiam IOH. BAVHINI.

2) *Orchis pusilla alba odorata* EIVS Pann. p. 239. *Orchis VII. biflor.* p. 269.

3) *Satyrii species quam monorchin dixeris* GESN. hort. Germ. p. 279.

4) *herbar.* p. 782. altera vero species in usiginosis pratis autumno florens est *Orchidastrum* MICH. cuius & icon adest.

5) *Icon.* 186. icon exterior: folia vero hirsuta valde anomala sunt. nostram esse & radicum forma & floris effigies rudior indicat. Ejus autem *Varicias Orchidastrum* videtur.

6) *bifl. gener.* p. 1560. ic. int.

7) *Theatr. Botan.* p. 1355.

8) *Phytolog.* p. 394.

9) *Icon.* p. 670.

chis lutea hirsuto folio CB. 10) MORIS. 11) *Orchis Frisia lutea* MERRET. 12) *Orchis Frisia hirsuta* IB. 13) RALL 14) *Orchis Frisia hirsuta littoralis* Lobelii CHABR. 15) Deinde huc facit *Orchis minor Leodiensis* LOBEL. 16) AMBROS. 17) ex qua prouenerunt *Triorchis lutea Gemmae LVGD.* 18) *Triorchis lutea altera* CB. 19) RAI. 20) *Triorchis lutea Leodiensis* PARKINSONI. 21) & vti plane videtur, *Triorchis lutea I.* TABERNAEM: 22) Tandem huc etiam referenda est *Triorchis lutea flore luteo sive Basilica minor, serapias* & *Triorchis Aeginetae* LOBELII. 23) quae eadem est *Triorchis lutea flore luteo Gemmae LVGDVN.* 24) *Triorchis lutea II.* TABERN. 25) *Triorchis lutea*

10) Pin.

11) H. Oxon. III. p. 497.

12) Pin. rer. Brit. p. 87.

13) hist. univ II. p. 769.

14) hist. Plant. p. 1717. cum signo ignotas indicante

15) Sciagraph. p. 252.

16) icon. p. 187. in semine.

17) pbytolog. p. 394.

18) hist gener. II. p. 1561.

19) Cat. plant. circa Basil. p. 23. indicata in monte Wassers Gall, ubi nemo vidit distinctam stirpem a Monorchide totius helvetiae familiari planta.

20) Cat. plant. exter. p. 193.

21) Theatr. p. 1355.

22) icon. p. 677. licet paulum a LOBELIANA inmutata sit.

23) icon. p. 187. exterior.

24) hist. gener. p. 1561.

25) Icon. p. 677.

lutea folio glabro CB. 26) MOR. 27) RAI. 28) *Triorchis*
lutea altera Gemmae folio glabro PARKINSON 29) Quare non erat, cur quinque nomina noua obrutae iam
 huius herbulae historiae inferret MENZELIVS 30) neque
 erat cur in MENZELIO consisteret MICHELIVS 31),
 ante quem tot fuerant huius Monorchidis descriptores,
 & inter eos eximius CLVSIVS atque I. BAVHINVS. 32)
 Alias etiam icones dederunt LOESELIVS 33) & RVP-
 PIVS 34) non optimas tamen, & nomina PARKINS. 35)
 MORISON, 36) RAI 37) MERRET 38) PLVKNET
 39)

26) *Catal. plant. circa Basile. p. 23.* circa arcem Birseck, ubi a
 nemine hucusque alia reperta est, & Pin.

27) H. ox. III. 497.

28) *Catal. plant. extr. Brit. p. 193.* & *Hist. Plant. p. 1217.*
 cum signo indicante sibi ignotam fuisse.

29) *Theatr. Bot. p. 1355.*

30) *Pugill. stirp. var. post Lexicon,* cum figuris mediocribus
 Tab. V. Eadem exstant etiam apud RAIVM p. 1216. 1217. &
 MOR. III. p. 497.

31) in ejus historia novo nomine proposita nov. gen. plant.
 p. 30.

32) cui est *Orchis parva autumnalis lutea* II. 768.

33) *Orchis coleo unico seu monorchis flosculis pallide viridibus*
flor. pruss. p. 154. Icon n. 61. an hoc etiam referenda *Ophrys*
monophyllos bulbosa id. p. 180. & Ic. 57?

34) *Flor. Jenens. T. II.*

35) *Orchis pusilla odorata* *Theatr. p. 1354.*

36) *Orchis odorata moschatæ, sive monorchis* H. ox. III. p. 499.
 quo nomine & CB. & AMBROSINVS vsi fuerant.

37) *Hist. plant. p. 1217.* ecd. nomine & Syn. III. p. 378.
 in *Cat. stirp. Angl. p. 217.* nomine PARKINS utitur.

38) *Pin. rer. brit. p. 87.* eodem.

39) SCHEVCHZER 40) vt mirabile sit longe magis, quod omissa sit a TOVRNEFORTIO, Galliae forte non indigena. Nomen antiquum *Monorchis* efficax & breve videtur, neque mallem illud HERMINII quod inposuit CL. LINNAEVS 41)

§. VII.

Paulo proprius speculam sed in eodem prato, sicciori tamen loco, nascitur frequens *Orchis odore hirci minor*, cui *Folia* angusta cauli adpressa, *spica* florum laxa odore cimicum, *Cucullus* ita arctus ut trifolium esse iurares, colore aut viridi aut obsolete purpureo, aut mixto ex vtroque, cum lineis saturationibus: Duo Petala acutiora latent inter reliqua: *Apices* pallidi; *Barba* trifida ad ouarium reflexa, segmentis lateralibus uno alteroue dente insignibus, medio mucronato, viridis aut ex purpureo virens, punctis in medio rictu purpureis. *Calcar* purpureum parallelum ouario. Hanc speciem num DODONAEVS a) atque CLVSIUS b) descri-

39) *Almag. Bot.* p. 271. nomine CB.

40) eod. It. VII. p. 516. cum charactere.

41) *Flor. Lapon.* n. 317.

a) *Minores testiculi* *bujus generis* 4. (nempē Morionum) DOD.
pl. *Coron.* p. 216. & *Pemptad.* p. 236. videtur ex colore vario,
odore ingrato, & quod vix alia *Orchis* sit, cui hae voces
DOD. tribui possint.

b) Pro *Orchide* VI. *Histor.* p. 268. Convenit odor; sed
color, & *spica* arcta, non admodum respondent. Coniunxit tamen VAILLANTIVS. Natae sunt ex stirpe CLV-
SII

scriperint, non satis liquet; de LOBELIO c) vero res extra controuersiam est, cuius prima Icon, neque mala est, habitu etiam reflexo expresso, licet TABERNAE-MONTANI d) figura etiam magis placeat. VAIL-LANTIVS e) non nisi flores dedit. Descriptio prae-stantissima est RAI^I f) Caeterum LVGDVNENSES g) CASPAR BAVHINVS, h) IOH. BAVHINVS, i) CHABRAE-VS, k) PARKINSONVS, l) AMBROSINVS. m) MORI-SONVS n) NYLAND o), MAGNOL, p) TOVRNEFOR-

C 2

TIVS,

SII, *Orchis odore hirci minor spica purpurascente* CB. IRH.
spica purpurea H. OXON. III. p. 492. *Orchis Batavica* IB. II.
 764. CHABR. p. 250. *Tragorchis batavica* Clusii PARK
 IC 49.

- c) *Tragorchis minor* & verior C. Gemmae s. coriosmites & Corio-phora flore instar cimicum LOBEL. IC. p. 177.
- d) *Testiculus hircinus* III. minor. Icon. omn. stirp. p. 672.
- e) Bot. Paris T. XXXI. f. 30. 31. 32. absque nomine. Idem nomine a CB. adcepito describit Bot. Par. p. 149. & varietatem addit flore subviridi.
- f) Histor. plant. p. 1213. *Tragorchis minor* flore fuliginoſo.
- g) *Tragorchis minor* & verior Gemmae LVGD. 1557.
- h) *Orchis hirci odore minor* PIN.
- i) *Tragorchis minor* flore fuliginoſo II. p. 764.
- k) Sciaigraph. p. 250. eodem nomine.
- l) *Tragorchis minor* & verior Theatr. p. 1349.
- m) nomine C. B. Phytol. p. 392.
- n) eodem H. OXON. III. p. 491. S. XII. T. 12. f. 10.
- o) kleene Bockskullekens nederl. kruytb. p. 279.
- p) Bot. Monspel. p. 192. H. R. M. p. 149. nomine C. B.

TIVS. q) PLVKNET, r) DILLENIVS, s) RVPPIVS, t)
LINDERVS u) BVXBAVMIVS, x) TILLIVS, y) ERND-
TELIVS, z) &c. eius meminerunt, & hi fere in indu-
stria priorum adquieuerunt.

§. IIX.

Ad asperas rupes, quae ea prata finiunt, frequens
est *Turritis minor*, quae & ipsa videtur descripta a THA-
LIO, a) nomine *Pilosellae siliquatae maioris*. Adce-
dit locus natalis in aridis, folia ad terram longa &
aspera, siliquae & flores. Id vnum non respondet,
quod caulem foliis pene carere dicat. Et eo videtur
respicere icon b) D. quam CAMERARIVS minori spe-
ciei attribuit. Prima a THALIO descriptio est I. BAV-
HINI,

q) *Hist. des Pl. aut. de Par.* 508. IRH. eodem.

r) *Orchis foetida III. f. hirci odore minor.* Almag. Bot. p. 271.
quo & RAI Catal. stirp. Ext. p. 191.

s) *Cat. Plant. circa Giess. nasc.* p. 85. nomine C. B.

t) *Flor. Jenens.* p. 239.

u) *Tournef. Alfat.* p. 44.

x) *Enumer. plant. circa Hal. nasc.* p. 242.

y) *Hort. Pisan.* p. 124.

z) *Virid. Warsaw.* p. 85.

a) p. 84. neque videtur hanc praetervidere potuisse. Stirpem
THALIANAM peculiarem facit C. BAVHINVS, dicitque
Bursae pastoris similem siliquosam maiorem seu maioribus fo-
liis & conjungit Aizoon Telephium LVGD. p. 1131. cuius
icon mala est, descriptio non recedit. Inter stirpes CB.
nulla planta reperta est hoc nomine insignita.

b) *ic. VII. post Thal.*

HINI. c) Eadēm macilenta tota obducit *Lichen* in *Alpibus* etiam visus, cui expansio est nigricans, tuberosa, aliquando in sphaerulas ex cyaneo atras congesta, per quam denso ordine sparguntur scuta magna, variae figurae, rufa, in quibus frequentia puncta nigra absque lente conspicua. Pertinet omnino ad ordinem MICHEL. L. xxxvi. qui adeo ad finis est *Lichen-Agaricis* & in primis disci formi punctato nigro qui in ligno arescente reperitur, ut diversitatem exhibere non sit facillimum. An *Lichen pulmonarius saxatilis minimus fuluus foliis pulposis* MICHEL. d)

§. IX.

Supra OSTERODAM syluae incipiunt ex Abiete rubra, altae & late patentes. In iis adclivibus locis, & vbi arbores excisae sunt, *Digitalis purpurea*, & *Chamaenerium vulgare latifolium* vbique nascuntur speciosa pulchritudine. Ad humecta vero viarum, frequens est per omnes hercyniae sylvas *Cardamine annua exiguo flore*, quam THALIVS nomine *Nasturtii montani maioris* 1) primus descripsit, nisi eadem fuerit *Cardamine Alpina media* CLVSII, 2) quae tamen, cum folia dicatur habere hirsuta & aspera, non penitus respondet. Atque confilibus locis prouenit *Cardamine IV. Dalechampii* 3)

C 3

filiquis

c) *Herba S. Alberti Barbarea muralis, de plant. a Divis nomen bab. p. 9.*

d) O. xxxvi. p. 107. n. 2.

1) *Hercyn. Saxonothur. p. 79. Icon non mala I. BAVHINI.*

2) *PANNON. p. 455. absque icona.*

3) *quae omnino videtur primum etiam proponi a THALIO,*

filiquis, semine, flore, simillima, sed caule & foliis
hirsutis, foliis praeterea imis integris, superioribus
non eleganter tridentatis, vt in priori, sed vagis, at-
que vase incisis, pinnis rarius ad pediculos confluenti-
bus. Vulgare etiam hic est *Equisetum syluaticum tenuis-*
simis setis: Tum *Melampyrum montanum floribus mino-*
ribus flauis. Hoc primum a BVRSERO 4) dictum
videtur, nomine *Melampyri parui Alpini*, id enim locus
natalis indicare videtur, cum in Iurassi & alpium infe-
riorum syluis, & vniuersa Hercynia frequens sit. Idem
videtur *Melampyrum latifolium floribus paruis luteis*
CELSII apud LINNAEVM. 5) Hanc stirpem pro va-
riete *Melampyri vulgaris* habet amicissimus LIN-
NAEVS. Verum proportio diversissima contrari-
um videtur indicare. Est nostro habitus ramosior,
folia magis nutantia, floris hiatus magis patulus, flos
tandem vniuersus altero tanto minor in stirpe etiam
proceriore quam est vulgare, & aequabili flavo colore
tinctus, qui in vulgari albus est rictu flavo. Quod au-
tem noui generis loco sit proposita olim a nobis, vi-
sum est hic rationem indicare. Quum in syluis Iu-
rassi versus autumnum anni 1734. copiose id legerem,
manifesto vidi labium inferius trifidum esse tribus nem-
pe profundis dentibus incisum. Verum *Melampyri Cha-*
aracter

sub tertia specie *Sisymbrii aquatici* p. 167. quod jam suspica-
tus est I. BAVHINVS. Icon elegans pro parvo specimine
CAMERARII EPIT. p. 270. pro *Sio Aquatico altero.*

4) ACT. SVECIC. ann. 1724. p. 508.

5) *Flor. Lappon.* p. 240.

racter a TOVRNEFORTIO, 6) RAIO, 7) BOERHAE-
VIO, 8) KNAVTIO, 9) ita erat constitutus, vt labium
inferius integrum pro maxima distinctionis nota adesset.
Quare existimauit, nactum me esse haud obscuram di-
uersitatis notam, donec sequente aestate, sed emissa
iam irreuocabilis schedula, comperii, omnia nostra Me-
lampyra eodem modo labium inferius habere triden-
tatum, manifestius quidem hoc & vulgatius *latifolium*
luteum, & *violaceum*, quod & RIVINI Iconibus expri-
mitur, 10) obscurius illud *coma purpurascente*, 11) verum
& id satis etiam manifesto. Quare nouo arguento
didici, nunquam alienis oculis videndum esse, nunquam
praecipitandas obseruationes, quae a senioribus annis
maturitatem in usus publicos exspectant.

§. X.

Frequens in iisdem sylvis omnibus est *Dentaria heptaphyllum baccifera*, quam vbique fere floribus atque
filiquis absque vlla sobolis generatione marcescentibus
offendi, baccis vero ex aliquot acinis compactis ad alas fo-
liorum sedentibus. Quae planta quoties superior scapus
absque

6) IRH. p. 173. & icon. Characterist. T. 78. D.

7) Method. plant. p. 91.

8) Ind. alt. p. 236.

9) Meth. genuin. p. 108.

10) monop. Irreg.

11) cui labium inferius integrum pingitur a TOVRNEFOR-
TIO I. c. & RIVINO.

absque foliis imis pinnatis decerpitur, fit iconi similis, quam pro *Coralloidis* alia specie videmus apud COR-DVM, 1) & pro *Dentaria angustifolia baccifera* peculiari apud BESLER. Hort. Eyst. 2) Ex qua nata est spuria species, *Dentaria baccifera foliis Ptarmicae* CB. repetita sed cum asterisco a RAIO. 3) Obiter etiam notamus in iconе, quae a KENTMANNO communicata, adest in CORDO pro *Coralloide*, 4) male baccas omissas esse foliaque terna depicta; DODONAEVM 5) vero stirpem CORDI, quae certo nostra est, cum *pentaphylla*, & *heptaphylla* minus recte coniunxisse: Heuetia enim, vbi plurima nascitur *quinquefolia* & *septifolia* DODONAEI, caret baccifera, cuius in vniuersum habitus multo est minor & tenerior, & siliquae, si quidem perficiuntur, exiliores.

X.

§. XI.

Sylvas vbi reliquimus, iam proximi oppido CLAVS-THAL, prata humecta offendimus, in quibus immensa erat vis stirpis, quae insolita specie oculos perstrinxit, quam ipsam sequentibus diebus frequentissimam ad riumulum die Innerste prope opera metallica, & denuo GOSLARIAE, semper ad aquas vidimus. Radices erant graciles, repentes albae, *Caules*, alias *erecti*, procumbebant

1) *Hist. Plant. L. II. c. CXI.*2) *Aest. Ord. VII. tab. 12. fig. 2.*3) *Hist. plant. p. 785.*

4) l. c.

5) *Pempt. II. L. I. c. 7.*

bebant saepe admodum ramosi, glabri caeterum, teretes & striati. *Folia* virentia varia, imma subrotunda, angulosa, paucis dentibus incisa, subhirsuta: haec ex radice ante natum caulem, & ad laterales stolones. In imo caule alia, *Barbareae* foliis adfinia, praeter bracteam latam sinuatam recipientia aliquot graciles pinnas ad pedunculum eundem, haec glabra. Superiora denique glabra, sature virentia, ambitu dentato: ultima integra. *Flores* copiosi ad summos ramos non adpresso caulis, sed vagi magis. *Calyx* quadrifolius, pallens, minor petalis. *Petala* quatuor subrotunda lactea. *Siliquae* sparsae & a caule recedentes, *Viciales* & ultra, feminibus incrementibus distinctae, ut pene articulatae videantur. Quae cum videre mihi, a *Turritide vulgari ramosa*, cuius fere faciem praese fert, distinxii facile, foliis & flore maiori: *A Leucoio verno perenni albo*, cui adfinis videbatur aliquo modo, foliis glabris & pinnatis tenuibus. In scriptis Botanicorum duae obuiiae sunt stirpes nostrae similes. Altera, *Thlaspios generibus cognata planta THALII*, 1) cui coniungo *Nasturtium montanum SCHWENKFELDI* 2) *Nasturtium Barbareae foliis C. BAVHINI* 3) *PARKINSONI* 4) *RAII*, 5) *Nasturtium Alpinum Barbareae foliis BVRSERI apud C. BAVHINVM*. 6)

1) *Hercyn.* p. 122.2) *Stirp. Siles.* p. 145.3) *Pin.*4) *Theatr. Bot.* p. 828.5) *Catal. Stirp. extra Brit.* p. 188. *Hist. plant.* p. 817. cum Asterisco.

HINVM. 6) Atque de hac *Thaliana*, omissa a recentioribus, neque visa RVPPIO, DILLENIO, LOESELIO &c. dubium nullum erat, quin ipsa stirps nostra esset. Verum in recentioribus scriptis offendit *Turritidem minorem foliosam* PETIVERI apud RAIVM, 7) quae foliis imis hirsutis, superioribus glabris, siliquis a caule abscedentibus, nostrae satis videbatur adfinis. Sed Icon *Brassicae spuriae exilis hirsutioris subrotundis foliis caule magis folioso* PLVKNETI 8) admodum a nostra recedit, foliis rotunde dentatis, & habitu erecto, ita ut si adiungas hirsutiem, similius sit *Turritidi minori*. Quare cum *Nasturtii* nomen ferri non possit, *Sisymbrii* nomine insigniendam existimauit, quo *Turritis vulgaris ramosa* ob sparsas siliquas referenda videtur. Licet, ut veram fatear, limites *Leucoii*, *Hesperidis*, *Sisymbrii*, *Erysimi* & *Erucae*, non ita constituti videantur, ut certas distinctionis notas subpedinent. Dixi itaque *Sisymbrium palustre album*, *foliis imis Barbareae*, *reliquis integris dentatis*.

XII.

In iisdem elatioribus, sed humidis tamen pratis frequens nascitur ARNICA, quam in fasciculos colligatam sub fenestris aedium ubique per sylvam hercyniam siccari vidimus. Semiflosculi in ea semen habent pappo coronatum, quare a *Doronici* genere ad *Solidaginem* remota est a VAILLANTIO, 1) & eamdem ob

6) Prodr. p. 45. ex Austria.

7) Synops. p. 294.

8) Almag. Botan. p. 70. & T. 80. f. 2.

1) *Solidago* foliis oblongis nervosis plerumque coniugatis Memoir. de l'Acad. des sc. 1720, p. m. 380.

ob rationem in proprium genus constituta ARNICAE nomine a CL. MOEHRINGIO. 2) Quae eadem ratio *Doronicum latifolium magno flore iunget Solidagini*, contra quam visum est VAILLANTIO, 3) vti repetito in Alpibus Helueticis obseruauit. In hac stirpe a CLVSIO & IOHANNE BAVHINO, quod rarissime fit, & a LINNAEO dissentire cogimur, qui omnes duas faciunt huius stirpis species. Et CLVSIVS quidem, in *Pannonicis* proponit *Doronicum Austriacum III.* 4) caule in summa parte ramoso, foliis plantagineis modice acuminatis, idque coniungit cum stirpe SIMLERI, 5) *Muttervurz* dicta, in Heluetiae alpinis & subalpinis pratis frequente. Idem in magno opere, iconem eamdem pro *Doronico Pannonicco VI.* 6) cum alia descriptione ponit, descriptioni vero Austriaci quarti, nouam addit iconem, folia experimentem acutiora, atque florē unicum, altero tamen ex ala folii subnascente. In quibus eidens est, optimum Virum non satis sibi constare: Hoc etiam caput cum festinatione aliqua scriptum esse, vel inde adparet, quod sub finem *Quar-*

D 2

tum

2) *hort. priuat.* p. 106.

3) l. c. p. 390.

4) *Pannoni.* p. 520. & ic. p. 522. ut absque iusta ratione moneat I. BAVHINVS alienam iconem *Doronici* ferrati adpositam esse, ea enim ad III. spectat, ipso titulo id indicante.5) *de Vales. & Alp.* p. 333. quae tamen omnia ex ARETII, civis mei, Itinere per Stockhorn & Nessum montes exscripta sunt, exp. 234. b. apud CORDVM editionis GESNERIA-NAE.6) *Histor. Plant.* p. xviii.

tum Doronicum 7) cum SIMLERI stirpe coniungat, quod nempe quartum fuerat in Pannonicis, in historia num quintum an sextum sit, non satis liquet, quartum certe non est.

IOHANNES BAVHINVS descriptionem *Doronici Quarti in Pannonicis*, & V. in *historia*, recenset sub titulo *Doronici Germanici foliis binis ex aduerso nascentibus villoso*. 8) *Doronicum* vero nouum *Pannonicum* VI. cum stirpe MATTHIOLI & omnium Auctorum coniungit, nomenque facit *Alismatis Matthioli siue Plantaginis montanae*. 9) Vbi liquido adparet, a stirpe MATTHIOLI & aliorum scriptorum, male separari *Doronicum Quintum* CLVSII in *historia*, (vt quod in Austria, Francofurti & in Belgicae montanis nasci testatur CLVSIVS) & coniungi cum stirpe peculiari Hungarica. DALEVS certe ita secutus est CLVSIVM & IOH. BAVHINVM, vt *Doronicum germanicum* & *Arnicam officinarum* 10) suspectum habeat naturae venenatae ; *Alisma* 11) vero officinarnm pro egregio vulnerario laudet, excitatis locis in EPHEMERIDIBVS NAT. CVR. 12) manifesto de *Arnica agentibus*. CL. LINNAEVS vltimo loco causam egit CLVSII & IOHANNIS BAVHINI, & duas stirpes fecit aliam monanthon, 13) foliis acutis, quam *Doronicum foliis lanceolatis* vocat, & coniungit

7) p. xix.

8) Hist. Univ. III. l. xxv. p. 19.

9) ibid. p. 20.

10) Pharmacolog. suppl. p. 51.

11) ibid.

12) FEHR. Dec. I. Ann. IX, & X. Ob. II. cum Ic.

13) Flor. Lapon. 305.

cum Alismate IOH. BAVHINI, & cum Doronico VI.
Clusii, sed praeterea cum eodem Doronico IIII. in *Pan-*
nonicis quod in *historia V.* est. Aliam vero speciem facit
polyanthon foliis obtusioribus, quam dicit *Doronicum*
foliis oblongo ovalibus, 14) eamque absque CLVSIANO
synonymo cum stirpe MATTHIOLI 15) SCHEVCHZERI
 16), RVPPII 17) cum Arnica nempe officinarum con-
 iungit. Qua in revim infert optimus LINNAEVS CLV-
 SIO, qui Doronicum suum V. *Germanicum* nunquam
monanthon descriptis, sed ramis aliquot in summitate,
 neque depinxit etiam. Deinde CLVSIANVM *germa-*
nicum in Austria, Belgio & Francofurti nascens auellit
 a stirpe vulgata Germaniae RVPPIO, SCHROEDERO,
 MATTHIOLO & SCHEVCHZERO dicta, & peculiarem
 facit summarum alpium. Videtur omnino CLVSIANA
enarratio confusionis habere aliquid, *Iohannes* vero
 BAVHINVS stirpem V. Clvs. in *histor.* exscriptisse sibi
 non cognitam; & plantam ramosam sibi visam, cum
 ramosa etiam VI. CLVSI pro distincta posuisse. Neque
 enim facile stirpes multiplicat, nisi quando post alias
 loquitur. LINNAEVS tandem varietates duas ante oculum
 habuit. Nos ipsi in *Gotthardo M. & Valle Urserana*
Doronicum vidimus monanthon, foliis ad caulem
 aut minimis aut nullis, humile, foliis acutis asperioribus.
 In humilioribus vero *Vallis Haseliae*, & in sylva her-
 cynia, *Doronicum* caule ramoso folioso multifloro, fo-

D 3

liis

14) *Flor. Lapon.* 304.15) *Alisma*, ed. 1565. p. 933. 934.16) *It. I.* p. 36. cum nomine CB.17) *Flor. Lenens.* p. 141.

Iis mollioribus obtusis, plantagineis. Sed facilime per omnes intermedios 18) gradus demonstrare possumus, eamdem esse stirpem quae in editis & frigidioribus vti fieri solet, aliam faciem induit ab ea, quam in riguis vallibus p̄ae se fert. Quare cum CASPARE BAVHINO & VAILLANTIO, vtramque stirpem CLVSII coniungendam esse censemus, & vtramque praeterea LINNAEI, in admittendis varietatibus alioquin non facilis Botanici.

§. XIII.

Vberrime in eisdem pratis prouenit *Bistorta*, quam ab omni aeuo in duas species distinxerunt, praeeunte iam ciue nostro BRVNFELSI: 1) atque ita definiuerunt, vt alia radice magis complicata, folio vero planiori esset, qualis est icon CAMERARII 2) alia vero radice minus intorta folio vero rugoso & sinuato qualem pulchre expressit DODONAEVS. 3) Verum quando *Bistortae* exemplaria ex *Iurasso*, ex *Alpibus* variis, ex humidis ditionis *Bernensis*, ex *Bructero* & *sylua hercynia*, vario loco

18) Aliquando enim Alpina specimina biflora aut triflora sunt, alias in humilioribus vallibus nascuntur uniflora. Folia etiam omnia neruosa, acumen per infinitos gradis variabile habent.

1) Foliis rugosis Naterinurz das männlein I. p. 62. foliis vero planis icon prior p. 61. absque nomine.

2) ex GESNERIANIS Epit. p. 683. descriptio vero sinuata habet.

3) Hist. Plant. Pempt. III. L. I. c. IX. p. 332. bené, qua iconē usus est LOBELIUS Icon. p. 292.

loco & tempore lecta conseruo, fateor, me quidem veram diuersitatem non reperire. Folia alias plana, amplissima & pedalia, exigua alias & plicata. Radix aut recta aut semel, bis, ter intorta, statura denique variant. Sed ita, ut alias plana folia cum 4) simplici radice (in BRVCTERO M.) alias folia sinuata cum radice ter intorta visa sint. 5) Quare valde vellem veras & interiores diuersitatis huius notas edoceri.

§. XIV.

Altera die obiuimus operas metallicas, atque in pratis circa CLAUS FHALIAM, praeter *Violam tricolorum* repente, frequens vidimus GERANIVM, de quo dudum multa fuit nobis dubitatio. Habitus ipsi est penne qui *fusci*, foliis semper in lobos ad dimidium sectis, nunquam ad pedunculum usque, floribus binatis, calyce glabro, aut subhirsuto, aut hirsutissimo, magna enim varietas etiam in eodem specimine est: Petalis ambitu rotundo, purpureis perpetuo sed vel obsoletis magis, vel saturioribus, nunquam coeruleis, picta lineis aliquot tinctioribus, umbilico albo; Staminum apices cyanei sunt; Tuba reflexae fissae purpureae, Capsulae monospermae una cum rostris hirsutae. Hanc speciem in vniuersitate helvetia vidi, nempe ad *Birsam*, & *Suzam* in valle *Delemontana* & *S. Imier*, prope *Bernam* in prato quodam adiacenti balneo exteriori, in *Argouiae* sepibus vdis, in M. *Boezberg* supra *Brugam*. in subalpinis ad *Thermas Leucenses*,

4) qualis ferè est Icon prior BRVNFELES Ic. p. 61.

5) qualis icon est MATTHIOLI p. 946.

censes, in montanis circa Candersteg. Deinde in omni sylua hercynia in pratis, & Gottingae in prato inter sylvas Heimholz & Gottingerholz uberrime. Francofurto idem etiam misit D. D. SENKENBERG, semper ex loco palustri, & humecto. Ut facile adpareat, vulgarem & late nascentem stirpem esse. Quo magis mirum videri possit, difficilime eam extricari, atque ab adfinibus distingui posse. Ab eo quidem quod *Gratia Dei germanorum* dicitur. 1) distinguitur facile foliis simplicioribus, non ad pediculum adeo sectis, floribus neque coeruleis, neque pictis, minoribus denique. Loci certe natalis ratio efficit, vt necessario huc pertineat *Geranium batrachoides Dodonaei flore purpureo magno THALII.* 2) *Geranii tertia species similis montanae GESNERI,* 3) quam cum bistorta frequentem nasci dicit, & *Geranii montani species foliis asperioribus* quae mas eiusd. in append. 4) (ibi vero prior species, qua haec mas asperior esse dicitur, videtur ad *Geranium phaeum siue fuscum* 5) referri debere)

- Gera-*
 1) In helvetia hoc sponte nasci, & CB. in *Basil. catal.* p. 89. & IB. 111. p. 476. adfirmant. Nobis nunquam spontaneum visum est. Quare cum Fratres optimi hoc in Helyetia ponant, dubitare licet, an non idem Ipsi viderint quod nos adeo frequens inuenimus.
 2) p. 44. loco natali eodem. vidit & albo flore.
 3) *Hort. Germ.* p. 260. in pratis vdis cum Bistorta.
 4) app. p. 292. 6. hoc DILLENIVS in *Hort. Eltham.* ad suum *palustre flore sanguineo* refert.
 5) quod foliis est hirsutis & simillimiis nostro, sed minus asperis, neque omitti potuit a GESNERO, cum in Helvetia non sit infrequens.

Geranium alpinum SCHWENKFELD 6); *Geranium Batrachoides paruo flore BVRS.* act. Suecic. p. 532. ex sylvis *Helvetiae*; *Geranium batrachoides maximum minus laci-niatum folio Aconiti IOH. BAVHINI* 7), *SCHEVCHZE-RI* 8) forte & reliquorum. *Gruinalis pratensis maxima* folio aconiti minus profunde laciniato RVPPII.9); *Gerani-um Batrachoides montanum RAI* 10) & *montanum no-straras* 11) eiusdem, cuius etiam descriptio simillima. Ne-que videtur fieri posse ut diuersum sit *Geranium Ba-trachoides alterum* 12) CLVSII, cuius & icon & descriptio conuenit, cum praeterea vix potuerit nostrum effu-gisse notitiam diligentissimi viri. Verum inde deduc-ta sunt synonyma multa, quorum aliqua vix videntur ad-mitti

(6) *Stirp. Siles.* p. 85.

(7) qui & ipse cum *Bistorta* nasci dicit & descriptionem ex-hibet simillimam. Ex eo habet CHABRAEVS. p. 487. Mo-nere debemus quod I. BAVHINVS Clusianam stirpem nun-quam viderit, quare sibi obseruatam pro noua proposuit absque. synonymous.

(8) *It. Alp.* p. 512. plane ex eisdem pratis, ubi nostram, & ego & I. GESNERVS, & HVBERVS noster saepè legimus.

(9) *Flor. Ienens.* p. 103.

(10) *Cat. Stirp. Angl.* p. 129.

(11) *Hist. Stirp.* p. 1062 optima descriptio, & *Synops.* III. p. 361. Stirpem suam in *Historia* cum dubii signo, in *synopsi* iam cer-tior coniungit cuin CLVSIANA. Ex eo MILLERVS.

(12) *Pannon.* p. 417. & *histor.* p. IC. & C. Icon equidem folia habet profunda & fere ad pedunculum divisa, quod & RAI dubium fuit. Sed locus natalis alpinus & floris co-lor & foliorum ratio reliqua conueniunt.

mitti posse. Huc nempe *Geranium batrachoides rubrum minus* CAMERAR. 13) Forte & IIII. eiusdem. 14); *Geranium sanguinarium TABERNAEMONTANI* 15); *Geranium Batrachoides aliud folio Aconiti nitente* I. BAVHINI 16); *Geranium Batrachoides maximum folio Aconiti nitente* CHABRAEI. 17) *Geranium Batrachoides aliud* I. BAVH 18); *Geranium Batrachoides minus* PARK. 19) *Geranium Batrachoides folio Aconiti MORISONI* 20); & forte multorum aliorum, de quibus minus certos esse licet. Sed miscet hic C. BAVHINVS 21) cum stirpe CLVSI exquisitis verbis excludentis coeruleum colorem, varietates flore coeruleo, & coeruleo & albo, sicque suspicitionem mouet haud leuem, ipsum non satis a *Gratia Dei Germanorum* hoc nostrum distinxisse. Quare neque C. BAVHINI neque TOVRNEFORTII 22) neque RVPPII 23) neque TILLII 24) neque LINNAEI 25) stirpem ad

(13) *Hort. Med. Phil.* p. 66.

(14) in *Epit.* p. 602. exhibitum pro *Gratia Dei*, sed foliis parum diuisis nostro proprius.

(15) *Icon* p. 62. fere ad CLVSIANAM.

(16) III. p. 476. plane ex Clusio, nulla sua obseruatione.

(17) p. 487.

(18) *Font. Boll.* p. 206.

(19) *Theatr.* p. 704.

(20) *H. oxon.* II. p. 514. ex CLVS. nomine CB.

(21) *Geranium Batrachoides folio Aconiti Pin.*

(22) IRH. eodem nomine.

(23) *Gruinalis pratensis foliis Aconiti Ranunculue, flor. Ienens.*
p. 103.

(24) *hort. Pisan.* p. 66.

(25) *Geranium petiolis bifloris, foliis peltatis multifloris, caule*
erecto

ad nostram referre ullo modo possimus, qui omnes eamdem tamen CLVSII stirpem suae coniungunt. Tandem & id fateri debemus, nullas nos habere notas satis evidentes, quibus a nostro separeremus *Geranium palustre flore sanguineo* DILLENII²⁶⁾ VOLCAMERI,²⁷⁾ HOFMANNI,²⁸⁾ Calyx enim & capsulae glabrae non videntur sufficere, radix, folia & flos & locus natalis conueniunt. Cogimur ergo ab eruditis quaerere, primo, An detur *Geranium Batrachioides* folio *Aconiti coeruleo flore*, diuersum a *Gratia Dei* quod & a nostro diuersum dici queat; deinde, qua ratione a nostra diuersa sit stirps DILLENII.

§. XV.

In cliuis sterilibus & lapidosis, qui fluuiolo *die innerste* inminent, & ad arenosa viarum prope aceruos lapidum tritorum, qui metallo omni iam priuati sunt, tum *Goslariae* similibus locis, magnus prouentus est *Alsinus saxatilis* & *multiflorae capillaceo* folio. Hanc primus,

E 2

sed

erecto, flor. Lap. 266. ponit colorem ordinarium coeruleum, & admittit varietates ex albo, neque minus coniungit suam cum CLVSIANA & RAIANA stirpe.

(26) *Hort. Eltham.* p. 160. T. 134. *Geranium Geranii haematodes* folio & facie C. G. nov. sp. p. 55.

(27) *Flor. Noric.* p. 186.

(28) *Delic. sylv. Flor. Altdorff.* Reliqua synonyma a nostro non recedunt, uti icon *Geranii sanguinarii maioris* H. EYSTETT. *Cl. Vern. Ord. berb.* I. T. IX. f. 2. & aliud GESNERI. CLVSIANVM vero *haematodes* alterum omnino aliud videatur a Batrachioide altero, *Pann.* p. 422. & *histor.* p. cii.

sed breuissime, descripsit THALIVS, 1) & dixit *Alsinet*
minoris aliam adhuc speciem. BARRELERIVS, 2) iconem
>dedit *Anthyllidis Lychnitis annuae seu minoris angusti*
foliae flore albo, quae nostram satis bene exprimit. HER-
MANNVS 3) *Alsinen glabram tenuissimis foliis floribus*
albis vocavit, aliamque dedit Iconem. Tertiam PLVK-
NETIVS, 4) sed minus laudabilem, dixitque *Alsinen ca-*
ryophylloiden tenuifoliam flore albo punctato. Quartam
MAGNOL 5) sed absque flore, cui est *Alpine Saxati-*
lis Laricis folio minor & minori flore. Quintam & per-
fectissinam VAILLANTIVS, 6) *Alsinet saxatilis & mul-*
tiflorae capillaceo folio nomine, quo & TOVRNEFORTI-
VS 7) & GARIDELLVS 8) vxi sunt. Alia etiam nomina
habent 9) RAIVS, BOCCONE 10) TOVRNEFORTI-
VS, 11)

(1) p. II. lin. penult.

(2) Stirp. Gall. Hispan. Ital. ic. 580.

(3) Parad. Batav. p. 12. bené.

(4) Almag. Botan. p. 22. & T. 7. f. 3. inde RAI. III. p. 498.

(5) Hort. Reg. Monsp. p. 11. & ic. eo nomine usus est TOVRN.
in IRH. TILL. hort. Pis. p. 8. & ipse MAGNOL Nov. Char.
p. 259.

(6) Botan. Paris. T. II. f. 3.

(7) IRH.

(8) hist. des plant. aut. d' Aix. p. 25.

(9) *Alpine pusilla pulchro flore tenuissimo nostras seu saxifraga*
caryophylloides pusilla flore albo punctato Hist. plant. p. 1033.
syn. III. p. 350.

(10) Plant. ex sicil. p. 22. Tab. 12. *Alpine Bononiensis non aculea-*
ta, iuxta VAILLANTIVM, verum icon vix adgnoscitur,
neque nostra planta, etiam senex, aculeata est, neque fo-

VS, 11) SCHEVCHZER, 12) DILLENIVS 13). Differt elegans haec plantula ab *Alpine tenuifolia* I. BAVHINI 14) flore maiore, caule magis ramoso, & ramis adeo frequentibus, ut iuniorum foliorum copia, non foliorum coniugatorum adeo, sed multiplici penicillo congestorum speciem pree se ferat. Ab *Alpine Alpina iunceo folio* C. BAVHINI. siue *Auricula muri tenuissimo folio pulchro flore* IOH. BAVH. 15) flore longe minore, foliis brevioribus minus rigidis & minus congestis. A *Tunica Alpina* BVRSERI 16) toto habitu & charactere, ea enim stirps ad Knauel ad cedit alio loco dicenda.

§. XVI.

Sub *Cellerfelda*, in sylvis quae supra *Goslariam* sunt, & in omni Hercynia sylua, frequens est Filicina planta, in peculiaribus caulinis ad propria folia semen ferens

E 3 quam

Iia habent latitudinem qua pinguntur apud AMBROS (quem pungere videtur BOCCONE) nomine *Alpines spinosae minimae montanae* Phytol. p. 17.

11) ex BOCCONE.

12) *Alpine Alpina minima glabra* It. Alp. II. p. 129. quod nomen C. BAVHINVS diuersissimae stirpi inposuerat, *Lycnidi* nempe *saxifragae alpinae glabrae pumilae* PLVKNETI.

13) *Spergula Caryophylloides tenuifolia* Catal. Plant. circa Giess. p. 58.

14) III. p. 364.

15) III. p. 360.

16) in herb. vivo C. BAVHINI, & forte *Caryophyllus saxatilis*, *Polygoni minoris* foliis & facie, floribus albis, tanquam in umbella positis BVR in Act. suecie 1724. p. 507.

quam *Asplenii sylvestris* nomine primus descripsit & com-mode depinxit TRAGVS: 1) Eam in his ipfis syluis inuenit THALIVS, 2) & *Struthiopteridem CORDI* vocauit, atque vix excusabili constantia adseruit a stirpe GESNERI 3) & TRAGI diuersam esse. *Goslariensis* enim planta cum nostra *Bernae* perquam vulgari in omnibus conuenit.

In iisdem sylvis nascitur *Filix Lonchitidi adfinis*, IOH. BAVHINI, quam pro noua proposuit C. BAVHINVS, 4) cum extra dubium positum sit eamdem esse *Filicem feminam asperam* GESNERI: 5) *Filicem marem tertiam spinosam seu aculeatam* THALII 6) *Filicem spinosam seu aculeatam* SCHWENKFELDI. 7)

Vulgaris in vniuersa hercynia est *Filix mas non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissime dentatis* CASP. BAVHINI, 8) quam esse *Filicem feminam mollem* GESNERI, 9) *Pteridion masculum CORDI* 10) *Filicem marem secun-*

1) *herbar.* p. 550.

2) p. 119.

3) GESNERVS CORDIANAE *struthiopteridi* iconem & no-men TRAGIANI *Asplenii* iunxerat, CORD. hist. L. II. c. 179. p. 171, hunc adcusat THALIVS & quod diuersissimas stirpes miscuerit notat; sed pro GESNERO descriptio-nes, & ipse locus natalis loquuntur.

4) *Filix aculeata maior* PRODR. p. 151.

5) *hort. app.* p. 292. b.

6) p. 43.

7) *Stirp. Siles.* p. 78.

8) *Cat. plant. circá Bas.* p. 99. & PIN.

9) *Hort. Germ.* app. 292. b.

10) hist. L. II. c. 175. est enim diversitas non ramosae, quare nolim

secundam teneriorem & molliorem THALII 11) pene certo affirmamus.

Sed & *Dryopteris siue ramosa minor & Filix femina minor Thalii 12) quae Pteriadion Cordi. 13) Filix femina minor laeuior candidiorque GESNERI 14) Filicula saxatilis parua & elegans CAMERARII, 15) Filix muraria seu minor SCHWENKFELDI, 16) Adiantum folio filicis CASP. BAVHINI 17) hic prouenit. Quae teneritate quadam fragili, diuisione terna, raris, neque pinnatis, sed rutaë murariae similiорibus lobulis, vltimisque acute incisis, punctis flauis creberrimis distinguitur.*

§. XVII.

In eadem sylua, & in Hercyniae nemoribus, tum circa Gottingam frequens est *Lactuca sylvestris flore luteo*, quam repetito examinatam, vidimus habere caly-
cem tubulatum, qui simplex videri possit, licet ad basin
duo paria squamarum adcedentia habeat, *semen* vero
latum nigrum compressum, vtrimeque acuminatum, quod
pappum gerit in stipite notabili. Is tamen stipes in
iuni-

nolim cum THALIO ad *Adiantum album filicis folio* referre
quae ex genere ramosarum est.

(11) p. 43.

(12) p. 43.

(13) L. II. c. 176. p. 170.

(14) Hor. Germ. app. 292. b.

(15) Hort. Med. & Phil. p. 60.

(16) p. 78.

(17) Cat. Basil. p. 98. & PIN. docente *Herbaris viuo.*

iuniōribus stirpibus lactucarum omnium adeo breuis est, vt vix distinguatur. Qua in aetate, cum squamulis ad basin minimis, obseruata esse videtur Lactuca nostra a Cl. MARTYN, 1) indeque nata occasio nouo creando generi.

Suillus etiam in ea sylua visus est, bulbo crasso purpureo reticulato, Pileo ex ochroleuco subfuscō, Poris minutissimis ochroleucis. Substantia & lamellae albidæ, coeruleum colorem cito induunt quando laeduntur. An *Suillus crassus superne fulvus & leuis, inferne luteus pulpa rosea pediculo ex fulvo subrubente & velut reticulato*, MICHELI. 2) Difficile dictu, suilli enim etiam magis quam reliqui fungi colorem per aetates mutant.

§. XVIII.

Circa Goslariam, qua ad ad cuniculos montis Rammelii iter fecimus, frequens est *Statice*, quam ad pagum sieber supra Herzbergam denuo vidimus. Elegans etiam *Caryophyllus* ibi nascitur, quem primus descripsit CLVSIVS, *sylvestris* septimi nomine; 1) novam vero descriptionem nouo cum nomine dedit RAIJS, 2) historiam eius perfecit tandem DILLENIVS. 3) Multinflores

1) It. Phil. Trans. n. 407. p. 22.

2) nov. gen. plant. p. 129.

1) Hist. plant. rar. p. 285.

2) *Caryophyllus minor repens nostras*, hist. plant. p. 938. & Syn. III. p. 335.

3) Hort. Elizam. p. 402.

rus est. Petala pulchre purpurea sunt, inscripta ad vnguem circulo sature admodum purpureo, ultra quem frequentia puncta alba; Apices subcoerulei. *Caryophyllus bumilis flore unico* 4) CASP. BAVHINI caule est erecto vniifloro, nudo, foliis angustissimis ad laricina adcedentibus, flore purpureo puro, radice maxima brachiata, a nostro diuersissimus & heluetiae indigena. Hunc *Goslariensem* magna copia extra *Wernigerodam* vidimus, similibus locis arenosis & iuxta vias publicas. *Vulnerarium* flore ochroleuco hic & circa *Gottingam* aequa vulgarem atque luteam illam. Videtur de *Lagopodio* flore albo 5) TABERNAEMONTANI dubitare IOH. BAVHINVS, 6) quum notet descriptorem ob omissum locum natalem: Sed huc omnino referimus. Cum mucrone vexilli carinae & alarum purpureo, frequentem circa *Thermas Leucenses* vidi-
mus, sed albo penitus flore, quam videtur IOH. BAV-
HINVS ex *Gotthardo M.* habuisse.

§. XIX.

Visis *Goslariae* venis Vitrioli natiui & metalli mi-
sti ex Plumbo, Argento, Cupro & Sulfure, tum vber-
rima minerarum omnis generis collectione SCHLVTE-
RIANA, iis tandem fabricis quibus sulphur ex pyrite
excoquitur, *Harzburgum* petiuimus ad pedem Montis
Bru-

4) huic stirpem suam coniungebat RAIUS. I. c.

5) Icon. p. 525.

6) hist. plant. univ. II. p.

Bructeri situm, ita tamen ut lenta adclititate per montanam planitiem dumetis obsitam, ad verum demum montem sero perueniatur. Ipse Mons, ut qui a palude dictus sit, viginosus est totus, syluis nudus, circa verticem congestis absque ordine lapidibus, interceptisque haud modicis foueis molestus. Vertice nudus & lapidosus, vndique libere oculos late per vrbes agrosque errantes dimittit. In eo culmine commodum exstructa est casa, ad nocturna frigora arcenda per quam necessaria iis, qui solius spectaculi gratia montem descendunt. Altitudo rudi aestimatione, quae *Jurassi* fere, neque recedunt obseruationes Geometricae, est autem ea ad bis mille pedes Rhenanos. Descensus inde rapidus ad *Ilsenburgum*, quo paucis admodum horis descendendo peruenitur per sylvas abiegnas. Stirpes paucissimae Alpinae, sed aliae quaedam nostris inuisae, insolita sua pulchritudine mihi gratissimae fuerunt.

§. XX.

In primis nemoribus prope *Harzburg*, *Anagallis lutea* nemorum, in planioribus hic terrarum rarer, & *Dentaria baccifera* frequens est. Verum ad vias passim procumbit & serpit *Veronica supina* *Teucrii* folio, foliis suis rareribus, rotundioribus, & amplioribus, floribus minus conspicuis rubellis ex alis foliorum erumpentibus, ouariis valde latis & compressis, caule humum non relinquentे se distinguens a *rotundifolia* minori. Eam **COLVMNA** pulcherrime depinxit & nomen dedit *Alyssi Dioscoridis montani* 1) cuius Iconem

in

1) Ecphr. stirp. rar. L. I. c. 121. p. 286. Ex eo plerique alii, inde

in peruetusto codice visam non recedere a stirpe sua adseuerat. Alia icon est RIVINI in posterioribus tantum exemplaribus 2). Non in Italia solum, sed & in Germania nasci, diligentia IVNGERMANNI 3) RVPPII 4), DILLENII 5) docuit, in Anglia etiam prouenit RAO 6) teste. *Heluetia* quidem, & ager *Parisinus* ea carent.

§. XXI.

In iisdem humilioribus syluis non solum *Pyrola folio mucronato serrato*, in vniuersa Hercynia sylua frequens,
F 2 sed

inde enim nata *Chamaedry spuriæ adfinis rotundifolia scutellata* C. BAVHINI. *Alyssum montanum* COL. PARKINS. p. 590. *Veronica rotundifolia scutellata aut biscutata hederac folio* H. OXON. II. p. 321. PLVKN. *Almag. Bot.* p. 334. *Veronica supina Teucrjii folio* ELEM. BOT. MAGNOL. H. R. M. p. 203. IRH.

- 2) *Veronica procumbens*. Monop. Irreg.
- 3) nulla enim alia stirps ab eius excessu in Germania visa est, cui conueniat nomen *Chamaedryos hederaceae sive Teucrjii pratensis hederaceis foliis* HOFM. ex IVNGERMANNO. Quare neque *Chamaedrys spuria hederacea sive Scutellata repens* C. B. & RAI 7) hist. plant. p. 847. vera & distincta planta erit.
- 4) nomine TOVRNEF. flor. Jenens. p. 197. habet & GE-MEINH. fl. Laub. p. 41.
- 5) eodem nomine Cat. plant. circa Giess. p. 92.
- 6) cui est *Chamaedrys spuria foliis pediculis longis insidentibus* Cat. stirp. Angl. p. 64. hist. plant. p. 250. cum descriptio-ne aucta: In Syn. vero II. & III. p. 281. *Veronica Chamaedryoides foliis pediculis oblongis insidentibus*.

sed pulchra etiam species illa *scapo unifloro* satis copiose nascitur, in sylvis supra *Wernigeroda* denuo visa, sed in Patria mea rarissima. Primus eam depinxit CLVSIVS cui *Pyrola minima* 1) est. Altera Icon est BESLERI 2). Tertia RIVINI 3), omnes satis bonae; ultima etiam stamina habet, sed diuersa ratione ab ea quam proposuit LINNAEVS 4). Habet enim RIVINVS 1. 2. 2. 3. 2. LINNEVS 1. 2. 3. 1. 3. Observations meae pro LINNAEO faciunt, sed in iis minutis procul dubio aliquid sibi permittit Natura. Hoc vero difformitatis genus in floribus rarissimum est, nisi staminum numerus a numero segmentorum floris differat, ut in octostemonibus.

§. XXII.

Paulo altius in Montis *Winterberg* sylvis primum visa *Trientalis CORDI*, nunquam nos deseruit in toto monte *Bructera* gratissima comes, in Heluetia, Gallia, Italia, nunquam visa, & citra quinquagesimum gradum nullibi proueniens. Descriptio LINNAEI omnino conuenit. *Caulis simplex*, ligulas foliaceas exiguae primum, in vertice vero maiores, tandemque in vera folia auctas producit, folia vero ad nouem usque numeraui. *Petiolos unifloros & simplices & binos frequenter vidi*. *Flos* plerumque septemfidus, ut raro aberret, *calyce* septifido purpureo, *petalo* rotato plano exterius sub purpureo

1) *Pannon.* p. 508. *hist. plant. rar.* p. cxviii.

2) *Hist. Eyst. Class. Vern. Ord. XI. T. 12. f. 2.*

3) *Pentapet. Irreg. T. ult. Pyrola flore singulari.*

4) *Flor. Lapon.* 157.

pureo intus lacteo. *Stamina septem aureis apicibus, globosis.* Tuba simplex vnicula. Elegantia stirpis facit, ut synonymorum historiam addere visum sit. Breuissima descriptio est inuentoris CORDI 1), a quo *Herba Trientalis* dicta est; bona & vberior THALII 2) tertia SCHWENKFELDI 3). CASPARVS BAVHINVS pro noua proposuit, *Pyrolam Alsines flore Europaeam* 4) dixit, & pro more suo fecit maiorem & minorem, maiorisque dedit iconem bonam, primamque. Sed folia & vniuersus habitus *Psyllii minoris* quod idem BAVHINVS depingit alibi 5), ita se habent, ut capitula squamosa descriptionis, & fructus mori figura in icona, non persuaserint LINNAEO, aliam esse stirpem a nostra *Trientali*. Frater IOH. BAVHINVS Cordi nomen retinuit 6). CHABRAEVS indigna simia, *Herbam Trientalem pyrolae speciem secundum quosdam* 7) vocavit. PARKINSONVS pro *Pyrola Europaea Alsines flore* 8) figuram nimis serratam dedit, ipsissimam vero Casparis BAVHINI iconem quae *Trientalem* exprimit pro *Pyrola brasiliiana Alsines flore maiori & minori* 9) Nomen CASPARIS BAVHINI

F 3

reti-

1) *Sylv. obseruat.* p. 222. a.

2) Αλσινωθεμον p. 15.

3) *Stirp. Siles* p. 17.4) *Prodr.* p. 100.5) *ib.* p. 99.6) *Hist. Univ. plant.* III. p. 506.

7) p. 501.

8) *Theatr. Bot.* p. 509.

9) p. 510.

retinuit LOESELIVS 10) MORISON 11) RAI 12) & SV-
THERLAND 13). MERRETVS 14) *Pyrolam Alsines folio*
minore dixit, OELHAVEN *Alsinanthemon* 15), AMBRO-
SINVS *alsineanthemon vel alsinanthemon* 16) BARRELE-
RIVS *Pyrolam longo folio flore albo singulari* 17). PLVK-
NETVS *Pyrolae affinem alsinanthemon nostram alpinam* 18).
RVPIVS 19), qui primus Characterem dedit, *Trientalem*
CORDI & RIVINI. Idem nomen retinuit ERNDL 20)
BVXBAVM 21) SIEGESBECK 22). *Trientalem* demum
GEMEINHART 23) WALTHER 24) & LINNAEVS 25)
KRAMERI *Tentamen* nondum vidi. MOEHRINGIVS,
alſinan-

10) *Flor. Pruss.* p. 211.11) *H. Oxon.* III. p. 505.12) *Cat. Stirp. Angl.* p. 246. *Hist. plant.* p. 1101. ubi florem
facit pentapetalum.13) *Hort. Edim.* p. 281.14) *Pin. rer. Brit.* p. 99.15) *Catal. plant. circa Dant.* p. 3.16) *Phytolog.* p. 35.17) *Icon. plant. in Gall. Ital. Hisp.* 1156. icon propria non o-
ptima.18) *Almag. Bot.* p. 309.19) *flor. Jenens.* p. 15. In Charactere floris segmenta & stami-
na omisit, fructum in tres carinas dicit dehiscere.20) *Virid. Warsaw.* p. 122.21) *Plant. circa Hal.* p. 333.22) *Primit. flor. Petrop.* p. 106.23) *plant. circa Laub.* p. 11.24) *design. plant. hort. sui.* p. III.25) *flor. Lapon.* 139.26) *hort. priv.* p. 8. & 111.

alsinanthemi nomine Characterem nuperrime dedit, segmenta floris incerto numero recenset.

§. XXIII.

In eadem sylua frequens est Solidaginis species, summis Botanicis, RAO, TOVRNEFORTIO & VAILLANTIO non cognita, licet omnino peculiaris sit. Flores habet solidaginis saracenicae, *semiflosculis* raris & omni charactere simillimos: Caulis & nascendi modus idem: *Folia* differunt, serrata equidem, sed adeolatiora ut longitudi latitudinis vix sit sesquitertia, molliora, & subtus lanuginosa: In *solidagine* vero *saracenica*, folia habent longitudinem latitudinis quintuplicem, dura praeterea & glaberrima: Quare tota facies magis ad *Iacobaeam Pannonicam* IIII. CLVSII accedit, a qua vero flore & defectu aurum sub foliis, & folio minus rotundo manifesto differt. Videtur omnino inter THALIANAS consolidae species esse, forte *Consolida saracenica* alia 1), in qua tamen proportionem latitudinis nimiam facit. Deinde *Consolida sarracenica* maior LVGD. 2) ut pro rudi icone satis nostram refert; Melior tamen est icon *Virgae Aureae siue solidaginis latifoliae serratae* I. BAVHINI 3), quam CHABRAEVS 4) repetiit. Huc referremus

1) p. 27.

2) *Hist. gener.* p. 1271. flores dicit senecioni affines. Flores tamen radiati indicant non esse senecionem montium Averniae, dictum CHOMELIO.

3) *Hist. plant.* II. p. 1063.

4) p. 333. mutato nomine. *Virga aurea Solidago sarracenica* dicta *latifolia ferrata*.

mus *Solidaginem sarracenicam dictam latifoliam ferratam*
 LOESELII 5) nisi destitui lanugine moneret. An sit
Virga aurea altera solidago saracenica MORIS. PRAE-
 LVD. 6) folio minus spisso, non satis liquet: *Virgae*
aureae montanae latifoliae hirsutae H. R. P. & SCHOL.
 BOTAN 8), sola nomina habemus. PLVKNETIVS 9)
 iconem & nostrae & LVGDVNENSIVM stirpi similem
 dedit, eum nomine IOH. BAVHINI. An *Iacobaea Al-*
pina latifolia foliis longioribus ferratis PONTEDER 10).
 Omnino videtur esse *Iacobaea nemorensis latiorer rigidior*
 & *hirsuto folio* RVPPII 11), BVXBAVMI 12) ERNDTE-
 LII 13), sub nomine IOH. BAVHINI a LISCHWIZIO 14,)
 relata ad *Iacobaeas*. Verum similitudo nominum fecit,
 ut MORISONVS 15) & RAIVS 16) stirpem peculiarem I.
 BAVHINI miscerent cum vulgatissima *Virga aurea la-*
tifolia serrata fratris CASPARI diuersissima 17) certe &
 flores

5) flor. Pruss. p. 286.

6) p. 323. probabile videtur. In *Historia* non habet.8) p. 20. repetit MORISON *Hist. Oxon.* III, p. 124.

9) p. 390. T. 235. f. 1.

10) *Compend. Tab. Botan.* p. 140. non recedit.

11) flor. Jenens. p. 142.

12) *Enum. plant. circa Hal.* p. 144.13) *Virid. Wars.* p. 62. plusculas plantas rariores ex RVPPIO
 repetit, vti fungos suos ad verbum ex HOFMANNI *Deliciis*
sylvestribus exscripsit.14) *Diss. de Virg. Aureis* p. 27.15) *Hist. Oxon.* III. p. 124.16) *Hist. plant.* p. 279. cum signo stirpem sibi non perspe-
 tam fuisse.17) Cl. etiam LISCHWIZ stirpes LOBELII, & PARKIN-
 SONI,

flores gerente in spicas, quae a *Virga aurea latifolia* exterritorum non serrata, aut penitus non differt aut solis crenis: nobis enim nunquam tota absque crenis prouenit. Neque TOVRNEFORTIVS 18) neque VAILLANTIVS 19) errorem correxerunt. Iungenda fuerat apud VAILLANTIVM *Solidagini Saracenicae*, simillima sed diuersa species.

§. XXIV.

Cum ea nascitur *Virga aurea Brocenbergensis* THALII 1), varietas humilior minus serrata durior & glabra Virgae aureae vulgaris, qualem iconem elegan-tem dedit CAMERARIVS 2), & quae a BOCCONE 3) prououastirpe depicta est. *Acetosa montana maxima* 4) in iisdem syluis prouenit, speciosa varietas vulgaris Acetosae, iuxta LINNAEVM 5). Id monendum, reti-

SONI, veras Virgae Aureae varietates, ad suam veram Iacobaeam refert.

18) Qui stirpes fratribus coniungit secutus MORISONVM, p. 484.

19) nullam mentionem facit plantae IOH. BAVHINI.

1) p. 129.

2) EPIT. MATTH. p. 748.

3) *Virga aurea Alpina laurinis rigidioribus foliis*. Mus. de Pian-te p. 33. T. XVI. Inde HHR RAI. Hist. vol. III. p. 167. VAILLANTIVS equidem peculiarem facit Mem. de l' Acad. 1720, p. 396. Sed repugnat stirps simillima iconi, toties in Alpibus & Jurasso visa, diuersitate notabili, sed per gradus decrecente.

4) CB *Oxalis maior Brocenbergensis* THALII. p. 82.

5) Flor. Lap. 130.

retinere eam in hortis suam proceritatem neque unquam ad staturam pratensis speciei redire, ut in amoenissimis hortis Ill. HVGONIS vidi *Hanouerae*.

§. XXV.

Ingressi paludem, vix superabilem nisi per aggerem ligno stratum, quae accolis vocatur *Hunerbruch*, immensam vim vidi *Linagrostidis alpinae* unica spica caulem terminante. Est ea absque controversia *Gramen iuncuum lanigerum* THALII 1) inuentoris, indicante id loco natali. *Iuncus Alpinus* capitulo lanuginoso C. BAVHINI in Prodr. 2) atque THEATRO. 3) qui & ipse ex Hercynia sylua habuit, *Iuncus capitulo lanuginoso* siue *Schoenolaguros* PIN. AMBROSINI 4) SCHEVCHZERI 5). *Iuncus alpinus cum cauda Leporina* IOH. BAVHINI 6), RAI 7) PLVKNETI 8), SCHEVCHZERI maioris, *Gramen Iuncoides alterum lanatum* Danicum PARKINS. 9) MORISONI 10). *Iuncus alpinus bom-*

1) p. 55.

2) p. 23. cum icono.

3) Theatr. p. 187. 188.

4) Phytolog. p. 303.

5) in Agrostogr. p. 302. & ic. opt. Tab. VII.

6) II. p. 514.

7) bist. Plant. p. 1306. Cat. Angl. p. 132. Syn. III. 436. minorem speciem non habet.

8) p. 200. Almagest.

9) coniungit RAI. & icon conuenit. Theatr. p. 1271.

10) H. oxon. p. 224.

bombycinus PARKINS 11). (non vero C.B.) 12) *Linagrostis syluatica spica simplici* RVPP. 13) *Linagrostis spica singulari alopecuroides* VAILLANTII 14). *Linagrostis Alpina maior capitulo singulari minori* MICHELII 15) Ab hac specie Linagrostidis, differt habitu humiliori, foliis paucis breuibus, spica aut aequa magna aut maiori, vaginis rarioribus, cespitate minori *Gramen tomentosum Alpinum & minus* CASP. BAVHINI 16) MORISONI 17) *Gramen tomentosum alpinum minus* PARK. 18) *Iuncus alpinus capitulo tomentoso maior* SCHEVCHZERI 19) minoris, *Linagrostis alpina media capitulo singulari maior*, MICHELI 20). Eam nos in M. Gotbardo, Scheidek & alibi in Alpibus lectam, ita comparauius cum Hercynica, ut aliquanto latiora folia & culmum & spicam Alpina haberet, Hercynica haec omnia longiora. Id an a solo natali pendeat non dixerim. Vnam certe speciem fecit SCHEVCHZERVS 21) ma-

G 2

ior,

11) certo *Theatr.* p. 1272.12) quae rarissima stirps est summarum alpium, vid. SCHEVCHZ.
Agrostogr. Tab. iam cit.13) *Flor. Jenens.* p. 260.14) *Bot. Paris.* p. 117.15) *nov. gen.* p. 54.16) *Theatr.* p. 60. ex Alpibus Rhætic. & Vales.17) *H. oxon.* III. p. 224.18) *Theatr.* p. 1272.19) *Agrostogr.* p. 304. & icon. T. VII.

20) l. c.

21) *Junco enim Alpino cum cauda Leporina* Irin. *Alp.* I. p. 41.
quæ maior species est, & humili quem addit in alpibus nasci, quæ minor species est, nomina distincta non inponit.

ior, vnam LINNAEVS 22) nixus praeterea specimine BVRSERIANO sibi viso. Nos iuncos C. BAVHINI non vidimus.

§. XXVI.

Tota haec palus fit cespibus ex *Sphagni* 1) duabus speciebus factis, cuius ideo meminimus, peruulgati equidem, quod ea ipsa capitula quae polline plena offendimus in *M. Bructero*, offendamus descripta a THALIO 2) depicta vero a DODONAEO 3) & LOBELIO 4) Angustifolii iconem hucusque nullibi vidi, est autem diuersum omnino, & faciem suam diuersam in eodem loco natali seruans. Capitula, vti totus habitus minor est, minora, simillima tamen gerit.

§. XXVII.

Ad fluuioli die Ecker lapidosum littus, passimque in scrobibus summi etiam montis, prouenit *Ranunculus albo flore* 1), in Alpibus omnibus, sed in humiliori earum

22) cui est *Eriophorum spica erecta caule tereti* Fl. Lap. 23.

1) *palustris candidantis* &c. DILL. CG. 229. & *Synops.* III. 104. nro. 1. & 2.

2) *In Broccenbergi iugo candida musci species . . . capitulum continens pusillum, cymbali versus superiora patentis figura, coloris spadicei*, p. 78.

3) *Muscus palustris* Pempt. p. 472.

4) *Muscus terrestris vulgaris* eadem ic. Icon. II. p. 242.

1) *Ranunculus maximus Leucanthemos* sue *Aconitiformis* THAL. p. 101.

earum sede, & in *Iurasso* frequens, qui folio quinquelobato amplo splendente, caule alto brachiato, sapore non acri, floris demum colore satis se distinguit. Primus eum descripsit C. GESNERVS 2) MATTHIO-LI 3) enim icon eo referri solita *Anemonoidi montano polyanthro* longe est similior: deinde DODONAEVS 4) & alii longo ordine. Magna est apud me auctoritas ingenui & diligentissimi viri CAROLI CLVSII. Sed vix tamen possum a me obtainere, post tot per alpes itinera, ut credam diuersum esse a nostro *Ranunculum montanum* IIII. 5) in *Pannon.* & *Historia descriptum.* Facies enim, flos, sapor ipse, locus notatus conueniunt. humilior habitus, flos minor, praecocior eruptio in florem possunt a causis exterioribus profecta esse.

§. XXVIII.

Ad eumdem riuum frequens nascitur, *Myrrhis Broccenbergensis* THALII 1) & VOLCAMERI 2) *Myrrhis montana* SCHWENKFELDI 3) *Meum Silesiacum forte*
G 3)

2) *M. fract. descr.* p. 65. nomine albi maioris. In *Tabulis Collect.* vocat *Ranunculum sylvestrem album Fidertsche*, in *bortis Germaniae*, *Ranunculum montanum tertium Fidertsche Are-tii* p. 275. a., in *append. Ranunculum album maiorem foliis Platani sere sylvestre flore simplici* p. 295. b.

3) *Ranunculus* IIII. p. 613.

4) *Ranunculus albus extenororum* IIII. *bist. plant. Coronar.* p. 288. *ic. p. 286. quintus Pempt. III. L.IV. c.3. p. 430. ic. p. 429.*

5) *Pannon.* p. 369. 370. *bist. Plant. rar.* p. 236.

1) p. 77.

2) *Flor. Noric.* p. 296.

3) *Stirp. Siles.* p. 142.

CAMERARI⁴⁾: *Myrrhis palustris hercynica* IVNGER-MANNI, HOFMANNI⁵⁾, RAI⁶⁾. THALIANAM stirpem neque C. BAVHINVS⁷⁾ neque FRATER⁸⁾, neque RAI⁹⁾ notam habuit. Est vero certissime, cum omnibus Synonymis modo dictis, *Myrrhis palustris latifolia alba & rubra* IRH. ¹⁰⁾. Ad quam pertinere alibi dixi, *Seseli montanum cicutae folio fubhirsutum* C. BAVHINI ¹¹⁾: Cuius nomen repetiit, RAI¹²⁾ & MORISONVS ¹³⁾, plantam neuter cognitam habuit. De eo vero & ex herbario viuo, & ex itinere in locum natalem facto mihi constat. An huc pertineat *Cicuta sylvestris* maioribus quam vulgaris foliis CORDI ¹⁴⁾ id ex paucissimis vocibus definiri non potest. Id addendum, semina longa bicorni Tuba sua insignia, striis conspicuis non notari; sicque

4) hort. p. 101.

5) Flor. Altd. delic. sylv.

6) Hist. Plant. III. p. 257. & catal. stirp. exter. 1694. p. 185.

7) qui in Pinace recenset sub titulo *Myrrhis Broccenbergensis* quid?8) cui est *Myrrhis Broccenbergensis* foliis *Myrrhidis Italicae* flore albo radice crassa nigra III. p. 78.

9) Hist. 431. cum Asterisco.

10) cuius pulchram iconem RIVINV^s dedit nomine *Myrrhidis palustris*.

11) Prodr. Theatr. p. 85. Cat. plant. circa Bas. p. 49. Pin.

12) Catal. plant. exter. 1694. p. 236. [Obiter obseruo Montem Wasserfall ibi dici vicinum *Scaphusiae*. Sed longe abest, Basilea vix duobus milliaribus Germanicis distans.] Hist. plant. p. 452. cum signo dubii.

13) Hist. Oxon. III. p. 286.

14) Sylv. obseru. p. 222. b.

ficque recte stirpem nostram ad *Chaerophylla* relatam esse ab optimo BOERHAAVIO 15) qui nuper rebus mortali bus ereptus, omnibus veri bonique amantibus perpetuum sui desiderium reliquit; vir ex hominum memoria ingenii magnitudine, animi vero modestia & benignitate nemini secundus.

§. XXIX.

Speciosa *Sonchi species*, *coeruleus latifolius* 1), flore spicato, in ipsis crepidinibus eiusdem riui frequens est, denuo visus nobis ad littora fluuioli *die kalte bode*, prope villam venatoriam *das Elend*. Eum THALIVS 2) etiam albo flore vidit.

§. XXX.

Inde adscendimus ipsum montem qua parte propria magis voce *der Broken* vocatur. *Bryum* ibi vidi & quod icon eius non extet, sculpi curaui 1). Eius *caules* valde ramosi, eretti tamen neque ad Hypni speciem repentes; *folia* latiuscula non adeo acuta, neruo medio valde conspicuo, seriatim & imbricatim caulem contingunt,

15) *Chaerophyllum latifolium palustre* flore albo & rubro. Ind. alt. p. 70.

1) I. B. II. p. 1004, cuius pulchra icon, mutuo accepta a FRA-TRE, sculpta prostata apud CAMERARIUM Epit. Mattb. p. 280.

2) *Intybus πλατυφύλλος bercynica* p. 62.

1) fig. 2.

tigunt, atque in speciem ex terete polygonam ambiunt; adulta nigricant. *Setae* ex caulis longitudine, bulbis minus conspicuis adscendunt, rectae & saepe aristarum instar intortae, vnciales, raro ex summa stirpe prodeuntes. *Capitulum* erectum crassum ouatum fuscum, *calyptra* in acutissimam acum educta. Retuli ad *Bryum hypnoides* erectum montanum, erectis capitulis acutis DILLENII 2). Ad ligna putrida frequens ibi prouentus est *Lichenis*, qui modo simplex, modo prolifer coccineis fungosis verrucis ornatur. Eum non tam certe, ideo nomino quia THALIVS 3) longe pri-
mus eum descriptus. Quid sentiendum de fungosis istis excrescentiis, an morbus aut exuberantis succi vicium? suadet figura irregularis, prouentus in siccis & moribundis lichenibus, analogia Agaricorum. Repugnat constantia horum scutorum in eo Lichenum genere, quod ramis arbusculas exprimit.

§. XXXI.

In eadem via, quae fluuiolum sinistriorem diu obseruat, *Polyporum* cespitosum ligno haerentem decerpsumus. Tota substantia dura coriacea filamentosa fuit. Figura infundibuli, intus pilis in concentricos circulos dispositis fuluis pubescebat, externa facies albida & glabra, poris frequentibus distincta, quos efficiebant breuissimae & vix percipiendae laminae. *Polyporum* dicimus, ob adfinitatem & naturam sicciorum, tubuli vero

2) Rat. *Synops.* III. p. 94. nro. 12.3) *Lichen circa Andersbergam*, p. 73.

vero Suillum faciunt, licet duplēm substantiam non habuerit. Non absimilis erat *Polyporo exiguo Alpino fuluo infundibuliformi pediculo breuiori*) MICHELI.

§. XXXII.

Passim ibi *Osmunda lunato folio* proueniebat, & *Lichen terrestris folio Eryngii* BVXBAVM¹⁾), cuius synonyma recenset MICHELI 2). Verum ante omnes scriptores, quos excitat, CORDVS³⁾ ipse hunc Lichenum viderat, dixeratque *Muscum crispae Lactucae similem*. CAMERARIVS⁴⁾ etiam iconem eius qualem- cunque exhibuerat. Quaerit de eo LINNAEVS⁵⁾, quomodo possit in cibum recipi, cum SIBBALDO⁶⁾ & BORRICHIO⁷⁾ teste aluum vehementer ducat. Respondet BORRICHIVS⁸⁾, & ROBINSON⁹⁾, vere primo purgare, reliqua aestate exsiccatum in farinam fieri edulem,

1) nov. gen. plant. p. 130. T. 70. f. 10.

1) Centur. plant. II. p. 11. T. VI. f. 1.

2) p. 85. T. 44. f. 4. qui & scuta vidit, oppido rara, & quae offendere nunquam mihi datum est.

3) Sylv. observ. p. 221. 2.

4) EPIT. p. 783. ic. 2.

5) Flor. Lapon. 445.

6) cui est *Muscus in Islandia purgans*. Prodr. hist. natur. Scot. p. 39.

7) Act. Hafniens. A. 1671. p. 126.

8) ibid.

9) apud RAIVM. hist. p. 114. cui est *Muscus Islandicus* BAR- THOLINI.

dulem : exspirante forte ea quam semper in eo percepi summa amaritudine. Neque obstat, quod purgans cum sit, egregium vulnerarium & conglutinans dicatur a BREYNIO 10), Gratiola enim, validum utique Catharticum, pro summo vulnerario a rusticis nostris habetur.

§. XXXIII.

Plurimum ad terram ibi prouenit *Lycopodium canescens* erecto spica glabra terminato eximii LINNAEI 1) cuius inuentor videtur AGERIVS 2), mixtum vulgari *Lycopodio*. *Vitis* etiam *Idaeae* plura genera frequentia nascuntur per paludosa prata montis, propriem magis BRVCTERI nomen gerentis. Inuenimus ibi *Vitem Idaeam* foliis oblongis crenatis fructu nigricante. Deinde *Vitem Idaeam* foliis subrotundis non crenatis baccis rubris, ad quam aliquae obseruationes videntur addendae esse. Namque TRAGVM huius inuentorem fecit CASP. BAVHINVS, qui tamen in *Myrtillo exiguo* 3) non huius sed manifeste admodum *vulgaris* fructu nigro descriptionem dedit, cum icone minus bona. Inde etiam factum est, ut sub titulo *Myrtilli exigui* AMBROSINVS 4) & TITA 5) nostram

10) *Muscum pulchrum terrestrem sanguineum* dicit in E.N.C. Dec. I. ann. III. Obs. 289. cum icone non mala.

1) *Flor. Lapon.* 419.

2) apud I. BAVHINVM p. 767. sub *Musco terrestri* foliis retro reflexis.

3) p. 974.

4) *Phytolog.* p. 368.

5) *Hort. Maurocen.* p. 125.

stram proposuerint. Porro folia nostrae euidenter
subtus punctata sunt, vt valde manifestum sit CASP
BAVHINVM hanc prae oculis habuisse, quando *Viam*
Vrsi, diuersam vtique & punctis carentem, dixit *Vitem*
Idaeam foliis carnosis punctatis, quae voces diu mihi
inposuerunt. In herbario viuo C. B. vti passim aliqua
ita arbores in primis fere perierunt pluiae iniuria, ne-
que potuerunt consuli. Descriptioni floris addi potest,
quod gemelli apices quatuor cornua longiuscula edu-
cant, & ita conglutinati sint ad similitudinem staminum
in *Viola*, vt *monadelphiam* omnino imitentur, euidentius
quam *Hypericum* aut *Geranium*; *Tuba* vero apice incuruo
sit, quod RIVINIANIS sufficere deberet ad plantam in
Irregulares amouendam. *Fruictus* in patria mea edules
non habentur, multo minus ad delicias referuntur 6).
Primus eius meminit C. GESNERVS noster in descrip-
tione M. FRACTI 7). THALIVS 8) *Vitem Idaeam rubram*
dixit. Haec in omnibus syluis editioribus *Hercyniae*,
plane vti in *Iurasso* & *subalpinis* vulgatissima est.

§. XXXIV.

Paludes magis sequitur *Myrtillus grandis* 1) TRA-
GI, quod synonymon cum illo THALII 2) male ad aliam
H 2 speci-

6) vti in Suecia & Laponia testante LINNAEO flor. Lap. 144.

7) *Vitis Idaea rubris acinis* p. 63. In Collect. Tab. *Vitem Idaeam*
in alpibus rubram vocavit, ed. II. p. 115. in *hortis Germaniae*
Vitis Idaeae speciem alteram acinis rubris p. 287.

8) p 129.

1) L. III. c. 13. p. 974. absque icone.

2) *Vitis Idaea nigra maior*. p. 129. ad speciem diuersissimam foliis
oblongis alibanticibus quae III. TABERN. & CLVSII.

speciem retulit CASP. BAVHINVS. Inuentor TRAGVS est, deinde *du CHOVL* 3) eius meminit, descriptionem & iconem primam dedit CLVSIUS 4). Baccae nigrae sunt, iis inebriandi vim tribuit RVPPIVS 5) quam in vulgi sermonibus receptam de *Myrtillis* M. Bructeri, ad *Empetri* baccas refert THALIVS 6). In patria mea in visus humanos non recipiuntur.

§. XXXV.

Paludes amat etiam *Oxycoccus*, sed humiliores, cum *Myrtillus grandis* in summas Alpes adscendat 1). Eum CORDVS 2) primus proposuit & nomine donauit. Prima icon est C. GESNERI 3), elegans. Flos manifesto monopetalos, sed in quatuor portiones profundissime secedens 4): antherae non cornutae. Baccae cum saccharo edules apud Batauos 5), nobis in mensis ignotae 6).

Ad.

- 3) *humilis frutex cuius baccae Airelles*, descr. Pilat. apud GESNER, fract. p. 74.
- 4) *Vitis Idaea* II. Pannon. p. 77. 80. Hist. rar. p. 61.
- 5) *Vaccinium altissimum foliis subrotundis exalbidis flor.* Ien. p. 39. post CAMERARIVM in hort. p. 128.
- 6) p. 41.
- 1) in ipso Gemmii vertice & Gotthardo visus.
- 2) *Oxycoccum* Hist. plant. L. II. c. 63. cum bona descriptione.
- 3) ibid.
- 4) quod recte obseruat eximius LINNAEV. flor. Lap. 145.
- 5) DODON. Pempt. vi. L. ii. c. 9. p. 770. *Vaccinia palustria*.
- 6) vti neque apud Suecos & Lapones edules habentur LINN.

§. XXXVI.

Adfinis Vitibus Idaeis est *Andromeda*, foliis contractis ad margines, vt superficiem pronam eleuatae orae ambiant. Prouenit proprius iam verticem BRV-CTERI in paludosis pascuis, amoeno spectaculo, recentibus germinibus corallinis, petiolis pendulis vna cum flore pulchre purpurascens. Hanc omnino primus proposuit THALIVS, *Myrtumque tenuifoliam* dixit 1) IOH. BAVHINVS descriptionem & Iconem dedit, & dixit *Vitis Idaea affinem poliifoliam montanam* 2) quod nomen non corruptit CHABRAEVS 3), vt saepe quidem solet. Est porro *Rosmarinum sylvestre nostras* PARKINSONI 4). *Vitis Idaea Rosmarini folio auersa parte candido & nervoso* LOESELII 5). *Erica foliis roris marini flore ampio* VESLINGII 6) *Erica alpestris rorismarini incano folio flore purpureo* TITAE 7) *Rosmarinum sylvestre* MER-RETI 8), *Erica rorismarini folio* RAI 9), *Erica humilis Rosmarini folio Vnedonis flore capsula cistoide* PLVK-NET 10). *Erica palustris flore purpurascente, pendulo, pe-*

H 3

tiolo

1) p. 78.

2) Hist. Univ. Vol. I. l. V. p. 525.

3) p. 41.

4) Theatr. p. 76.

5) Flor. Pruss. p. 289.

6) Cat. plant. Patav. apud TITAM.

7) Hort. Maurocen. p. 68. omnino videtur. In Itinere vocat Ericam alpinam palustrem Rorismarini folio flore purpureo.

8) Pin. rer. Britann. p. 106.

9) hist. plant. II. p. 1489.

10) Almag. Bot. p. 136. T. 175, f. I.

tiolo longo rubro rorismarini folio RVDBEK 11) *Ledum palustre* nostras arbuti flore RAI 12). *Poliifolia* BVXBAVM 13) *Ledoides rosmarini* foliis rigidis superne laete viridibus inferne albis floribus dilute rubentibus SIEGESBECK 14), *Ericoides* flore rubro siue purpureo HEIST. 15) *Andromeda* foliis alternis lanceolatis margine reflexis LINNAEI 16). Flos Ericae figuram habet ; Staminum proportio , fructus & numerus segmentorum floris Chamaerhododendri est. CAMERARII *Vitis Idaea Bavaria* baccis rubris insipidis huc non videtur pertinere: vid. RAI ad eum titulum.

§. XXXVII.

Tandem & *Empetrum* versus verticem montis frequens nascitur, staminibus nunc onustum , & florens. Hoc a MATTHIOLO 1) primum descriptum, in Bructero M. inuenit AEMILIVS 2), deinde THALIVS 3) atque baccas inebriare atque deliria gignere monuit , quod quidem neque BORRICHIVS 4) neque LINNAEVIS 5) admittunt.

Supē-

11) *Catal. stirp. ex Lapon.* in *Aet. succic.* 1720. p. 97.12) *Syn.* III. p. 472.13) *Aet. Petropol.* vol. II. p. 345.14) *Primit. flor. Petrop.* p. 63.15) *Catal. Hort. ann.* 1731. monente LINNAEO , synonyma enim desunt.16) *Flor. Lapon.* 163. cum icone rami T. t. f. 2.

1) p. 154.

2) qui *Corin Broccenbergicam* dixit apud THALIVM.3) *Erica baccifera* Matth. p. 41.4) *Aet. Hafniens.* 1673. p. 161.5) *Flor. Lapon.* 305. an THALIVS popularem famam, a Myr-

§. XXXIX.

Superatis dumetis quae vertici proxima sunt, & in ipso culmine montis, magna vis *Pulsatillae albae* prouenit, plane similis illi quae in *Iurasso* & *Alpibus* frequens nascitur, flore albo, ad petalorum ortum exterius coeruleo colore tincto, foliis myrrhidis minute diuisis. Est tamen in vniuersum habitus minus villosus & flos ipse minor. Inuentor CORDVS 1) est, icon prima CLVSII 2). *Pulsatilla Apii folio vernalis flore minore* SCHEVCHZERI 3) sub alieno nomine est eadem nostra, ut ex descriptione adparet.

§. XXXX.

Lapidibus in culmine copiose irrepit, *Bryum hypnoides capitulis plurimis erectum lanuginosum* DILLENII 1) foliis ex latiusculo ortu in pilum crispum educatis, capitulis exiguis ouatis in setis brevibus erectis per caulis longitudinem frequenter prouenientibus. Huc aliqui *Muscum montanum* TABERNAEM. 2) ex leui coniectura. An *Muscus capillaceus densissimus lanuginosus albouridis apicibus niueis* SCHEVCHZERI 3)? non liquet, & fere mallem

tillo grandi per errorem translatis in Empetri baccas? videtur.

1) *Ranunculi XI. species hist. L. II. c. I. p. 121. b.*

2) *Anemone sylvestris II. Hist. p. 245. cum iconē, & *Anemone montana pulsatillae folio* PANN. p 382. descr.*

3) *It. Alp. IV. p. 339.*

1) *Synops. Rai. III. p. 97.*

2) p. 802.

3) *It. VII. p. 516.*

mallem referre ad *Sphagni* 4) speciem. An *Muscus ericetorum hirsutie canescens & ramosus* RVPPII 5)? non repugnat.

§. XLI.

Cum Pulsatilla vberrime prouenit *Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso*: cui *Radix* vix obsequens, lignosa, *Caulis* dodrantalis, aphyllos nonnisi ligulas quasdam graciles & sparsas paucasque adnatas habet. *Folia* cum flauedine virentia longos albos pilos educunt, longa, gracilia, ambitu alias integro, alias vagis dentibus sinuato. Ex villofissimo *calyce* nigro, cuius lanugo alba est, *Flos* flauus, petalis quinquedentatis. Inuentor THALIVS 1) est, qui *Hieracii minoris* speciem Brocembergo peculiarem vocavit. Iconem primam dedit COLVMNA, cui est *Hieracium pumilum* II. Fr. Gregor 2). Ex eo prouenit *Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso* CB. 3) VAILL. 4) *Hieracium alpinum pumilum lanuginosum* 5) PARK. *Pilosella monoclona non repens Alpina minor lanuginosa amplo flore* 6) MORISONI.

Hiera-

4) quod in *syn. Rai.* quartum est p. 105.

(5) *flor. Ienens.* p. 292.

1) p. 57.

2) *Ecpbras.* II. p. 29. ic. p. 30. exiguum specimen.

3) Pin.

4) *Memoir. de l' Acad.* 1719. p. 239. cum synonymo alieno PLVKNETI.

5) p. 799.

6) *H. Oxon.* III. p. 78. S. VII. T. 7. f. 5. ex COLVMNA.

Hieracium alpinum pumilum II. RAI 7). *Dens Leonis*
Alpinus minimus pilosellae folio TOVRNEFORTII 8) an &
SCHEVCHZERI? 9) *Hieracium alpinum angustifolium villo-*
sum 10) SCHEVCHZ. ; *Hieracium alpestre pilosum angustis*
longioribus foliis flore pallente TITAE 11) pro noua plan-
ta exhibitum. *Hieracium villosum alpinum flore magno*
singulari caule nudo RAI 12) *Hieracium caule unifolio*
& unifloro calyce villoso LINNAEI 13).

Ab hoc, caule folioso & foliis omnibus dentatis di-
uersum est, caeteroquin simillimum, *Hieracium alpinum*
folio acuto, molli, lanuginoso, dentato BVRSERI 14)
Hieracium forte alpinum lanuginosum longifolium leuiter
dentatum VAILLANTII 15).

Huic denuo ita ad fine est, vt proximum sit, aliud
quod ab eo, quod in Bructero prouenit, foliis latioribus
ad ipsum etiam ramosum caulem frequentibus, latius-
culis, sinuatis & obtusis; a stirpe, quam BVRSERO
tribuimus, foliis latis non dentatis differt, simillimum
villo foliorum & calycis, ipsoque flore. Ea est *Hiera-*
cium

7) *bis. Plant.* p. 241. cum asterisco.

8) *bis. des plant. aut. de Paris* p. 54. & IRH.

9) *It. IV. p. 333. absque descriptione;* verum cum nostra stirps
in eodem Itinere alio cum nomine recenseatur, haec potius
Pilosella videtur magis incana summarum Alpium.

10) in eodem *Itin. IV. p. 336.* certo.

11) *Itin. post hort. Mauroc.* omnino videtur.

12) *Syn. III. T. VI. f. 2*, bene nisi aliquid in habitu desideres.

13) *flor. Lap.* 283. -

14) *A.F. Suecic* 1724. p. 502. Ex Gemmio M.

15) *Memoir. l. c. p. 241.* cum synonymo I. BAVHINI, quod ad
vicinam plantam statim dicendam pertinet.

cium alpinum hirsuto folio CLVSII in Pann. 16) alpinum
V. villosum in hist. 17) Hieracium *V.* Pannonicum
 CAMERAR. 18) Hieracium alpinum hirsuto folio *V.*
 CLVSII quodammodo incanum IOH. BAVHINI 19) exscri-
 ptum ex CLVSION, & denuo Pilosella siue Pulmonaria lutea
 angustiori folio valde pilosa duplex 20) eiusdem cum pro-
 pria descriptione & iconē stirpis ex Montibus Geneuen-
 sibus petita, vbi & ipsi eam legimus. Priorem CHA-
 BAVEVS Hieracium alpinum hirsuto folio flore hieracii lu-
 teo 21) vocat, in alterius nomine vocem duplex 22) solam
 omittit, idque nomen post CHABRAEV M MORISON 23)
 & RAIVS 24) retinuit. RAIVS alibi 25) Philosellam siue
 pulmonariam luteam angustiori folio valde pilosam alteram
 dixit. Ex CLVSIANA demum stirpe natum est, Hieracium
 alpinum latifolium villosum magno flore C. BAVHI-
 NI 26) PARKINSONI 27) MORISONI 28) HERMANNI 29)
 RAIIS

16) p. 643. icon v. p. 646.

17) p. CXLI.

18) Hort. Med. p. 75.

19) II. p. 10 17. ipsum non vidisse stirpem CLVSII adparet.

20) Varietas nempe in foliis imis, quorum pediculus modo lon-
 gior modo breuior est, etiam nobis obseruata.

21) p. 320.

22) p. 325.

23) H. oxon. III. p. 31.

24) Hist. Plant. p. 240.

25) Catal. stirp. exter. p. 204.

26) PIN.

27) Theatr. Botan. p. 399.

28) H. oxon. III. p. 70.

29) H. L. E. 315. Flor. Bat. p. 21.

RAI 30) MAGNOLII 31) TOVRNEFORTII 32) TITAE 33)
 SCHEVCHZERI 34) PONTEDERAE. 35) *Hieracium V.*
villosum Clusii MVNTINGII 36) *Hieracium alpinum la-*
tiore folio pilosum flore maiore PLVKNETI 37) cum pro-
 pria & bona Icone. A montano tomentoso 38) diuersis-
 simum est. Quae omnia quando collata sunt, adparet
 tres stirpes modo descriptas, conuenire longo villo fo-
 lii, & calycis, huiusque nigredine, colore demum folii
 flauido, & mollitie, magnitudine & colore floris: Ita ta-
 men, vt primum caulem pene aphyllon, folia ad radicem
 longiora & angustiora habeat: Duo reliqua caulem fo-
 liosum & folia latiora. Et eorum prius quidem ser-
 rata, alterum, quod simul ramosius, multiflorum & re-
 liquis amplius est, integra. Secundum a primo vix satis
 differt, a tertio euidenter, quod & a primo certis-
 ime diuersum est. Primum in *Bructero & Gothardo M.*
 alterum in *Gothardo*, tertium in omnibus culminibus *Iu-*
rassi & alpibus lectum est.

I 2

Circa

- 30) *Catal. stirp. exter. p. 114. hist. plant. p. 239.* cum nota qua plantas sibi incognitas distinguit,
- 31) H. R. M. p. 98.
- 32) I. R. H.
- 33) *hort. Maurocen. p. 89.*
- 34) *It. Alp. l. p. 39.* bona descriptio.
- 35) *Dissert. p. 91.*
- 36) *waare oeffening van de Plant. p. 454.*
- 37) *Almag. p. 184. & T. 194. f. 2.* bona ic.
- 38) VAILLANTIVS hoc admiscet, breui suo tomento & toto habi-
tu distinctum, atque pulcherrime depictum in *Hort. Eltham*
ic. 181. Verum neque icon *Hieracii latifolii pilosi coccinei*
umbellati Indici PLVKNET. T. 194. f. 4. villo modo stirpi
nostrae respondet.

§. XLII.

Circa casam in vertice Bructeri M. exstructam, stirpem denuo vidi, quam in Alpinis pratis M. Scheidek & Neunen olim inuenieram, & ex Bohemiae montibus miserat amicissimus HAENELIVS Schneebergensium Medicus. Eam cum pro noua tunc haberem descripsi 1); sed cum aliqua festinatione. Quare nunc, & synonyma & descriptionem meliorem visum est addere. *Radix* ex multis teretibus fibris, absque conspicuo carpo in imum caulem coeuntibus. *Scapus* a dodrantali ad cubitalem, *folia* ad terram pluscula, lata, & obtusiora quam in plerisque Orchidibus, si *palmatam flore viridi* exceperis, ad caulem angustiora acutiora. *Spica* florum mediocriter densa, interiectis, ut in Palmatis fieri solet, foliolis paulo longioribus quam ouarium. *Ouarium* contortum de more, duarum linearum longitudine. *Flos* ex albo herbaceus dimidia parte longior. *Galeae* foliola quinque, quorum alia tria ex albo pallentia magis conspicua sunt, duo minora lutea ex virore. *Barba* 2) trifida, simplex recta protensa, segmento medio maiori. *Calcar* 3) inflatum conicum unius lineae longitudine. *Cucullus staminum* nihil peculiare habet. *Apices* lutei. Odore destituitur. Primus hanc stirpem proposuit LOESELIVS 4) deinde in montibus helueticis lectam SHERARDVS 5), cum BOBARTO communicauit, & BO-

- 1) *Orchidem palmatam alpinam spica densa albouiridi* vocaui, Com. Lit. Phys. Techn. Med. 1733. p. 20.
- 2) MICH. I. C. B.
- 3) ib. C.
- 4) cui est *Orchis palmata palmis inuersis flore albo*. Flor. Pruss. p. 132.
- 5) qui in catal. inserto Catal. stirp. exter. RAII. 1694. vocat *Orchidem Palmatam montanam latifoliam floribus in spica densa albis tantillo lutei admixto* p. 400.

BOBARTVS 6) quidem cum *Orchide pusilla alba odorata radice palmata* Angliae indigena eamdem fecit. PLVKNETVS 7) & RAIVS 8) videntur distinguere. Quam litem suam non fecit CHOMELIVS, neque nos definire possumus. CHOMELIVS pro noua planta descriptis, & ob radicis fibras in carpum non connascentes, *Limodoris* adscensuit, repugnante omni habitu, dixitque *Limodorum montanum flore albo dilute virescente* 9). MICHELIVS nouam iconem dedit, & nomen fecit *Pseudorchis alpina flore herbaceo* 10). Quamquam, ut verum fatear, radicis dignitas tanta esse non videatur, vt stirpem omni fabrica simillimam Palmatis, ab iis auellas. An etiam *Orchis palmata thyrsō specioso longo dense slipato ex viridi albente* RICHARDSONII 11)? non satis liquet. An *Orchis flore albo minimo* MERRETI 12)?

§. XLIII.

In serobibus ad verticem, *Polygonatum tenuifolium* CORDI 1) vidimus, quod quare *maius* & *minus* fecerit THALIVS 2), non video. In declivi vero parte montis, quae pagum *Ilsenburg* spectat, vnicam stirpem *Mei*. Neque praeterea aliquid singulare obuenit, ea die qua per *Ilsenburgum* pagum metallis celebrem, *Wernigerodam* petiuimus.

§. XLIV.

A *Wernigeroda* ad *Specum Baumannianam* iter facientibus aliquoties visus est pilosus in *Hieracio murorum philosissimo*

I 3

tumor,

6) cui est *Orchis palmata pusilla alba odorata* H. OXON. III. p. 499.7) *Almagest.* p. 271.8) *Cat. stirp. angl.* p. 217. *Hist. plant.* p. 1225. *Syn. III.* p. 381.9) *Mem. de l' Acad. des scienc.* 1705. p. 517. ex *Aruerniae mon-*
*tibus.*10) *nov. gener. plant.* p. 30. & T. 26.11) apud RAIUM *synops.* III. p. 382.12) *Pin. rer. Brit.* p. 86.1) *Hist.* L. I. c. 86. p. 113.

2) p. 85.

tumor, qui fuluo crine, modo adsidens radici, modo angulis caulum, aliquam & rudem imaginem musculi sedentis exhibet. In syluis *Brocomagi* visus fuerat morbus iste elegans a TRAGO, dictus etiam 1) CHEMNIZIO 2) & RUPPIO. 3) HEVCHERVS vero, vt nouum nomen ob eum tumorem faceret *Hieracio myophoro* 4) non admodum erat necesse. STOBAEVS 5) etiam, & LINNAEVS 6) eius meminerunt. In pratis, sub iisdem syluis, copiose prouenit *Filpendula*. In supercilio *specus Baumanniana* vbi que, *Geranium sanguineum maximo flore*, raro inter *Gerania* exemplo monanthos, cuius iconem non bonam CLVSIVS 7), optimam dedit BESLERVS 8).

§. XLV.

Plures omnino, pulchrasque stirpes alit Hercynia sylua, quod ex THALIO satiis adparet, & certius persuasit nobis fasciculus plantarum indigenarum Hercyniae missus ab illustri Viro Aug. Ioh. HVGONE Archiatro Brittannico. Sed plures hoc in itinere non vidimus, obstabant praeter tempestatem pluuiantia aliae quaedam difficultates. Alterius aestatis labor, vt speramus felicior erit. Comites autem nostri Itineris fuerunt *Fridericus Ludouicus Christianus CROPP*, qui hanc Dissertationem defendit, *Iohannes Christophorus Ludouicus SEIP*, celeberrimi medici Pyrmontani IOHANNIS PHILIPPI filius, *Carolus Philippus GESNER*, I. M. F. *Iohannes Arnoldus Iulius RICHERS*, Hoyensis, *Ioachimus FVRSEN* Holstatus, *Iohannes Henricus HOFMEISTER* Hildesienfis. *Fridericus Ludouicus ENGELSTAETTER* Dresdensis, omnes Medicinae Cultores. Iter exeunte Iunio perfecimus.

- | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--|------------------------------------|----------------------|---|---|
| 1) p. 77. | 2) Catal. plant. circa Brunsv. p. 43. cum propria icono in Adpendice n. 7. | 3) Flor. senens. p. 163. | 4) Nov. prov. hort. Med. Witteb. 1713. p. 74. cum icono. | 5) Act. succic. ann. 1723. p. 415. | 6) Flor. Lapon. 229. | 7) <i>Geranium haematoxylon Pannon.</i> p. 419. histor. Cl. CII. Eadem icone usus est LOB. ic. 660. | 8) H. ERST. Verñ. Ord. I. T. XVI. f. 1. |
|-----------|--|--------------------------|--|------------------------------------|----------------------|---|---|

* * *

THESES BOTANICAE.

I.

Methodus naturalis, coniungit stirpes ex maiori numero conuentium characterum, licet unus vel alter manifesto differant; Asarum & Aristolochiam, Rutam, Moschatellinam & Hypopityn.

II.

Distinguit stirpes pluribus characteribus diuersas, et si unus vel alter manifesto conueniat, Veronica a Pinguicula, Verbascum a Digitali, Saxifragam ab Umbelliferis.

III.

Methodus artificialis, coniungit plantas pluribus notis diuersas & vna conuenientes: Veronica & Salicem, Moschatellinam & Solanum, Valerianam & Echium.

IV.

Methodus artificialis, distinguit stirpes pluribus notis conuenientes, diuersas vna, Echium separat ab Asperifoliis, Saponariam & Caryophyllum a Lychnide, Aescyon ab Hyperico.

V.

An noua methodus petenda a proportione Staminum ad Tubas & ad petala, horumque ad calycem proportione? Medetur malis quibusdam a numero ortis, sed manet artificialis, separat Alfinen medium a reliquis, Myosotides a se inuicem &c.

THESES CHIRURGICAE.

VI.

Sectio calculi Rauiana vix vnuquam aperit Vesicam ipsam.

VII.

Sed fit continuatio Sectionis adparatu magno, ita ut haec anterior sit & a Vesica remotior, Rauiana posterior & ipsos ceruicis terminos aperiatur.

VIII.

Manet tamen eius praestantia, quod adtinet instrumentorum Iter facile, & minus incontinentiae atque lacerationis periculum.

IX.

Adparatus altus alias succedit, alias minime, nullo vitio Chirurgi, neque facile est distinguere quando felix futura sit operatio quando minime.

X.

Adparatus parvus a RAVIANO parum differt, & vix nisi quod directe admittat incisionem, Rauianus oblique.

XI.

THESES ANATOMICAES.

XI.

Vena alia Cordis perpetua a sinu dextro in ostium Mediae, recipiens saepe innominatas.

XII.

Vena anterior Cordis rarissima, sed visa est tamen inserta in coniunctione auris dextrae cum Vena Cava superiori.

XIII.

Vitus est vere in homine ductus a BARTHOLINO descriptus, neque infrequens est.

XIV.

Incisius ductus, in recente cadavere patulum est infundibulum setam transmittens.

XV.

Vasa lymphatica a Ventriculo amplissima pene omnium, ad receptaculum abeunt.

THESES PHYSIOLOGICAES.

XVI.

Quid fit in systemate spirituum, de spiritu qui musculum in motum egit? An refluit ad cerebrum? minime, fieret sensus: an abit in venas? cur non prius?

XVII.

Per eadem vasa & transpirari & nutriri necesse est.

XVIII.


Fit ergo vera transpiratio per Vasa generis minimi


XIX.

Diaphragma stringit Oesophagum utique, & relaxatur in vomitu.

XX.

Vomitus fit vel sola conuulsione ventriculi, vel adcedente convulsione muscularum abdominalium.





Bryum hypnoides ericum montanum
erectis capitulis acutis.

Sisymbrium palustre album foliis imis
Barbareae reliquis integris







