

**Ad virum clarissimum Ric. Mead, M.D. epistola, varias lithontripicum  
Joannae Stephens, exhibendi methodos indicans / [David Hartley].**

**Contributors**

Hartley, David, 1705-1757.  
Mead, Richard, 1673-1754.

**Publication/Creation**

Bathoniae : T. Baddely for J. Leake, etc., 1751.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/eu6mg5bf>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

A D

VIRUM CLARISSIMUM  
RIC. MEAD, M.D.

EPISTOLA,

V A R I A S

Lithontripticum *Joannæ Stephens,*

EXHIBENDI METHODOS

I N D I C A N S.

A U C T O R E ,

DAVIDE HARTLEY, A.M.

---

---


BATHONIÆ: Typis T. BODDELY.

Prostant venales apud J. LEAKE & G. FREDERICK, Bibli-  
opolas Bathonienses; & M. COOPER Londinensem.

---

M.DCC.LI.

Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library



# BOOKS

*Sold by J. LEAKE and W. FREDERICK,  
Booksellers in Bath.*

1. **A** View of the present Evidence for and against Mrs. Stephens's Medicines, as a Solvent for the STONE; containing 155 Cases, with some *Experiments* and *Observations*. By D. HARTLEY. pr. 2s.

2. An Account of some *Experiments* and *Observations* on Mrs. Stephens's Medicines for *dissolving* the STONE; wherein their *dissolving Power* is inquired into and shewn. By ST. HALES. D. D.

To which is added a SUPPLEMENT to *The View of the present Evidence, &c.* being a Collection of some Particulars relating to the *Discovery* of these Medicines, their *Publication, Use, and Efficacy*. By D. HARTLEY. pr. 1s. 6d.

3. DE LITHONTRIPTICO a Joannâ Stephens nuper invento Dissertation Epistolaris, Auctore D. HARTLEY. Ed. Sec. Cui adjicitur Methodus exhibendi Lithontripicum sub formâ commodiore. Accedunt etiam conjecturæ quædam de Sensu, Motu & Idearum Generatione. pr. 1s. 6d.

4. *Observations on MAN, his Frame, his Duty, and his Expectations.* 2 Vol. 8vo. By D. HARTLEY. pr. 10s. 6d.

# B O O K

John & J. L. VINE and W. HEDDERIDGE  
Baptists in Bristol.

A view of the Picturesque Scenery  
around Bristol, with Picturesque and  
Poetical Notices, containing 122 Plates  
and some Explanatory and Descriptive  
Notes. Hartley. £1 12s

An Account of some Exhibitions and  
Lectures on Miss Chapman's Medicine for Children  
in the Town; with their different Powers and  
Properties into one Form. By S. Hartley D.D.  
To which is added a Supplement to April 1811  
of the English Physician; or being a Collection of  
some Pictures relating to the Disease of Children  
and Diseases of Infancy. 12s and 18s  
Hartley. £1 12s

The Picturesque and Scenic  
Landscape Description of Bristol  
and its Environs. By Mr. C. M. Meijer  
Hartley. £1 12s. On the Subject of  
Education among the Poor of the Commonwealth  
Accordance with the College of St. George, More  
than Half a Century old. 12s and 18s  
Hartley. £1 12s

Observations on Man, his Frame, his Mind,  
and his Environment. A Vol. 8vo. By D. Hartley  
12s. 10s. 6d.

VIRO CLARISSIMO

**R I C . M E A D , M . D .**

D . H A R T L E Y ,

S . P . D .

**C**UM primùm ea, quæ in Lithon-  
trpticum *Joannæ Stephens*, &  
in illud sumptu publico redi-  
mendi auctores, nuper dixisti, † perlege-  
rem, incertus hæsi, quid mihi facto opus  
esset: An omnia denuo ad trutinam re-  
vocarem, & evincerem, si modò pensi-  
tentur ipsius morbi natura gravis & per-

† Monit. & Præcept. Med. Cap. 10.

tinax, atque remedii moles necessaria,  
*noxas fallaciamque* nihilo plus Huic objici  
debere, quam Opio, Mercurio vel Cor-  
tici Peruviano, nunc quidem probatissi-  
mis, sed olim pro exitialibus habitis,  
idque a viris celeberrimis; an potius  
quicquid haberem, silentio premerem, ne  
forte quod Tibi, mihique moleustum,  
nemini satis acceptum foret.

**MEDIUM** tenere cursum tandem insti-  
tui. Breviter nimirum, atque uno in-  
tuitu, ob oculos ponam varias Lithon-  
tripticum exhibendi methodos, quas me  
jam docuit experientia plus satis cumu-  
lata; adjungamque insuper monitiones,  
vel unicuique methodo proprias, vel ad  
universas simul pertinentes; omni tamen  
altercatione procul habita. Sie utique,  
si quibus hoc gratum futurum sit, lumen  
de meo lumine accendam, officioque in  
socios doloris, quod mihi demandavit  
Summus rerum Arbiter, pro virili defun-  
gar; neque tamen vel Tibi, vel probo  
cuvis, inopportunitus, uti spero, videbor.

Illud

Illud interea tanquam inopinatum, & ab æquitate tuâ alienum queri liceat, T E, qui in obvios quoscunque comis & urbanus esse, bene autem merentibus de re medicâ, vel etiam literariâ quâvis, summâ cum benignitate favere soleas, in Lithon-triptici Fautores acerbiùs invectum fuisse; & non potiùs laudi illis dedisse, quòd Ar-canum sine pretio vulgatum Virorum dig-nitate, fide, ingenio, artis nostræ peritiâ illustrium examini subjecerint, neque ali-âm viam ad præmium reportandum ape-riri voluerint, quâm quæ, veris licet rerum Inventoribus facilis & munita, Jac-tatoribus tamen & Falsoquois esset im-pervia.

## METHODUS PRIMA.

EXHIBEANTUR drachmæ tres calcis ex liquido conveniente, & unciæ duæ sapo-nis in aquæ sesquilibrâ coquendo solutæ, quotidie.

## METHODUS SECUNDA.

EXHIBEATUR calx eodem modo, sapo autem sub formâ cylindrorum mollium.

## METHODUS TERTIA.

CONTUNDANTUR partes tres calcis, partes sedecim saponis in massam mollem, adjectâ aquâ quantitate sufficiente. Exhibeatur eadem quantitas calcis & saponis, ac in methodis præcedentibus, sub formâ cylindrorum mollium.

## METHODUS QUARTA.

DILUATUR hæc massa, aquâ denuo adjectâ, ad consistentiam electarii mollis, & exhibeatur hujus electarii quantitas proportionalis, in cerevisiâ tenui soluta.

## METHODUS QUINTA.

DILUATUR aquâ ulterius ad consistentiam cremoris lactis, & exhibeatur hic tremor per se, quantitate itidem proportionali.

METHO-

## METHODUS SEXTA.

EXHIBEANTUR calcis, salis fixi alkalini, singulorum drachmæ tres ex lacte, vel cremore ejus, quotidie.

## METHODUS SEPTIMA.

EXHIBEANTUR unciæ duæ saponis sub formâ cylindrorum mollium, & libræ tres vel quatuor aquæ calcis ex testis ostreorum paratæ, paululo lacte admixto, quotidie.

## MONITIONES.

CALX, quâ ufa est *Joanna Stephens*, confecta fuit e testis ovorum. Calx verò testarum ostreorum usui accommodator est, utpote parabilior. Testæ enim ovorum aperto igni commodè exponi non possunt, sed crucibulo includendæ sunt, ideoque plūs temporis ad calcinationem perficiendam requirunt. Testæ ostreorum detinendæ sunt in igne vehementi per horas tres vel quatuor, neque demum exigendæ

mendæ nisi igne sponte extincto. Indicia calcinationis perfectæ sunt albedo, fragilitas & sapor acer calcis vivæ ex lapide calcario paratæ.

TESTÆ ostreorum calcinatæ exponendæ sunt aëri per mensem vel circiter, nimirum donec fatiscant in pulverem impalpabilem, qui a partibus crassioribus, non rite calcinatis, ope setacei separandus est, atque denuo aëri exponendus, & saepe versandus, ut mitescat. Si calx exponatur secundâ hâc vice per mensem duntaxat unum, acris etiamnum erit ut plurimum; sin per tres vel quatuor, mitis.

CALX mitescit etiam repetitis affusionibus aquæ. Quin et ex ipsis testis recens calcinatis statim parari potest calx mitis eadem ratione. Verum pulverandæ sunt prius, & per setaceum trajiciendæ. Lotione peractâ calx probè siccanda est super ignem in vase ferreo.

Quibus organa digestionis valida sunt, & dolores in viis urinariis leves, iis convenit calx acris, quippe solvendi vi pollentior. Quibus hæc contraria sunt, calx mitis. Præstat mitissimam exhibere universis sub primum remedii usum, quo organa digestionis & urinæ sensim assuescant valentiori, & tandem valentissimæ, si visum fuerit.

Sapo, quo ipse utor, Alicanticus est; illum enim Castiliensi & Veneto, qui in officinis vulgò prostant, aliquantò potiorrem esse arbitror. Verùm hi substitui possunt deficiente Alicantico.

METHODUS prima ferè eadem est cum illâ, quæ a *Joannâ Stephens* publici juris facta est. Liquidum conveniens exhibitioni calcis acris parari potest ex spiritu vinosi tenuioris, vel spiritu sacchari, parte unâ aquæ partibus duabus, vel paulò minùs, addito si libuerit saccharo. Hujus enim liquidi vis spirituosa acrem calcis saporem quodammodo obtundet, &

ventriculum

ventriculum simul muniens. Utile porro erit superbibere paululum ejusdem liquidi devoratâ saponis solutione, cum hæc et palato ingrata sit, & fauces per aliquod tempus irritet.

**I**NCOMMODIS jam memoratis occurritur per methodum secundam. Etenim post aliquot vices repetitas cylindrorum deglutitio peragitur facillimè, & ferè sine ullo sapore, tantillo liquidi præscripti, vel alijs cujusvis, in os assumpto. Verùm sapo probè contundendus est, aquâ adjectâ, idque repetitis vicibus per aliquot dies, ut admodum emolliatur, alioquin ventriculum gravabit.

Hæ duæ methodi virtute prorsus eadem sunt, & præcipue convenienter iis, qui a dolore vesicæ ferè immunes, citæ calculi solutioni unicè incumbunt. Exhiberi enim potest calx admodum acris, adeoque solvendi virtute admodum pollens, ope liquidis spirituosi, salvis interea faucibus & ventriculo. Verùm liquidum istud con-

spirat

spirat unā cum calce acri ad inflammatio-  
nem vesicæ augendam; quocirca dolore  
urgente neutiquam imperanda est harum  
methodorum utravis.

Si alvus nimium laxetur a methodo  
primâ, secundam aggredi oportebit; &  
vicissim redeundum est subinde ad pri-  
mam, secundâ ventriculum gravante.  
Etenim sapo solutus, utcunque palato &  
faucibus molestus, ventriculo tolerabilis  
est, imò nonnunquam acceptus & utilis.  
Tota quantitas calcis & saponis, quotidie  
fumenda juxta has methodos, non incom-  
modè dividi potest in doses tres, & sapo  
secundæ methodi formari in cylindros  
quindecim, ex utrâque extremitate parum  
acuminatos, & longitudinis duorum digi-  
torum transversorum. Licet autem ægroto  
de his, ut et de temporibus assumendi,  
statuere pro libitu, cum totus rei cardo  
in eo versetur, ut quantitatem justam in-  
gerat; quâ scilicet urina abunde & per-  
petim inficiatur virtute solvente calcis &  
saponis.

Possunt quidem hæ methodi accommodari iis, qui dolore calculoso admodum vexantur, si nimirum calx mitis exhibeat-  
tur e cerevisiâ tenui vel mediâ; cerevisia enim et dolores lenire solet, & calci miti obtundendæ sufficiet. Sic et vinum al-  
bum, vel purum, vel aquâ commixtum,  
erit pro vehiculo satis idoneo calci miti.  
Ægrotis autem hujusmodi potius expedit  
alicui ex tribus methodis insequentibus  
insistere.

IN methodo tertiatâ, magis etiam quam in secundâ, sedulò & vicibus quam plurimi repetitis, per aliquot item dies, contundendus est sapo cum calce, ut massa lithontripica mollissima sit; aqua vero addi debet donec massa ferè duplo ponderosior sit sapone, qui ipsam ingreditur. Porrò si calx acris adhibetur, massa aëri exponenda est, & saepe versanda, per mensem vel ultra, ut hâc ratione calx mitescat; mitescat autem citius in massâ lithontripticâ propter ejus humiditatem, quam per se. Hæc nisi rite observentur,

cylindri

cylindri e massâ istâ formati statim dureſcent, & proinde ventriculum gravabunt, ſitimque movebunt ; vel si admodum du- reſcant, per intestina transibunt integri ; quæ tamen ſingula ſi præcaveri poſſint (poſſunt autem ſæpen numero ratione habitâ cautionum præſcriptarum) omnium præſtantissima invenietur hæc methodus ter- tia, utpote nauſeæ prorsus expers. Quan- titas maſſæ lithontripticæ quotidie ſumen- da formari poſteſt non incommode in cy- lindros viginti, & horum quinque deglu- tiri facillimè quater quotidie.

FATENDUM quidem eſt et calcis et fa- ponis vim solventem imminui expositione maſſæ, ſed compensatur hæc imminutio lenimine dolorum exinde orto ; namque ſapo perinde ac calx, et virtute debilior fit, & nî multùm fallor, doloribus calculofo- rum leniendis aptior, accessu aëris libero. Quocirca, ubi dolor gravis urget, maſſa omnino exponenda eſt, & ſæpe versanda, per septimanam unam vel alteram, ut ut calx priùs mitigata fuerit. Quòd ſi hæc

virtus anodyna massæ lithontripticæ ab  
 ejus expositione ortum ducens, mihi olim  
 satis perspecta fuisset, sæuos illos cruciatus,  
 qui me nuperis annis invasere, multò ma-  
 turiùs, ut opinor, compescuisset. Porrò  
 fieri potest, & fiet, uti spero, futurâ Me-  
 dicorum solertiâ, ut methodus quemvis  
 calculosorum dolorem notabilem demul-  
 cendi ex hoc fonte derivetur. Imò non  
 est dubitandum, quin maximi progressus  
 in calculo tum allevando, tum extirpando,  
 jamdudum facti fuissent, si modò Tu,  
 Vir Clarissime, cæterique medicinæ An-  
 tistites, Lithontriptico corrigendo & per-  
 ficiendo operam dedissetis.

Si cylindri lithontriptici gravent ventri-  
 culum, vel ob aliam quamvis causam mi-  
 nùs placeant, recurrere oportet ad electa-  
 rium vel cremorem. Horum sapor non  
 admodum ingratus est, si vel massa ex  
 quâ confecta sunt, vel ipsa postea sub for-  
 mis propriis, aëri satis exposita fuerint;  
 eritque eò minùs ingratus, quò minùs  
 perfectè solvitur electarium, vel in cere-  
 visiâ

vifiâ tenui, vel in aquâ ad cremorem conficiendum. Frustula enim electarii non soluta vix feriunt palatum. Cremor oculo magis arridet, quàm solutio electarii in cerevisiâ tenui; cerevisia autem abolet ingratum saporem electarii magis quàm aqua, quâ diluitur in cremorem. Hinc patet remedium methodi quartæ statu valentiori ingeri posse, quàm remedium quintæ. Quòd si electarium solvatur in aquâ paululo vino dulci commixtâ, erit medii saporis inter electarium in cerevisiâ tenui solutum & cremorem. Si horum quodvis ventrem nimis solvat, recurrendum est subinde ad cylindros lithoncripticos. Quantitas electarii soluti, vel cremoris quotidie sumenda dividi potest in tres doses, mensuram libræ dimidiæ continentes, vel paulo minùs, si consistentia sit spissior.

DUM hæc scribo occurrit mihi alia methodus parandi massam lithontripticam, quam Pharmacopolis ulterius probandam commendō. Lquentur super ignem unicæ

ciæ sedecim saponis in vase ferreo stannato, aquæ quasi librâ adjectâ, liquatæ effundantur in mortarium marmoreum, & probè misceantur cum calcis unciis tribus. Sic e vestigio fiet massa lithontriptica mollissima, quæ deinde dilui potest in electarium & cremorem. Possunt etiam hæc singula mitigari sine morâ, aquæ affusione & super ignem lentum vaporatione repetitâ. Sapo eâdem ratione liquatus, sed aquæ quantitate minori additâ, formari potest facillimè in cylindros saponaceos methodi secundæ & septimæ ; quinetiam aliis usibus medicis accommodus erit.

MEDICIS auctor sum, ut accendentibus calculosis præcipiant aliquam ex tribus methodis proximè prægressis, & multò potius caveant a remedii nimiâ acrimoniâ, quàm a nimiâ inertîâ. Exhibeant etiam quantitatem præscriptâ minorem. Etenim longè satius est calculoso dolorum lenimen redimere tædio assumendi, quàm citam calculi solutionem cruciatu gravi.

Solutio

Solutio autem calculi lentè saltem procedet, ut ut leniantur dolores. Postea sensim augeri debet et vis, et quantitas remedii; atque tandem, si eo uti possit & velit æger, remedium primæ vel secundæ methodi imperari. Hæc omnia si rite fiant, nec me consilii dati, nec medicum vel ægrum accepti pœnitibit.

Qui fabuli & lapillorum fabulosorum generatione, atque dolorifico deinde per ureteres transitu, vel et e vesicâ ejectione, tantum vexantur, hæc mala certissimè præpedire possunt tertiam, vel quartam parte, massæ lithontripticæ præscriptæ assumptam. Eadem porrò quantitas nonnunquam sufficit doloribus calculosorum arcendis; senum imprimis, si rectè augoror.

METHODUS sexta simplex est, nec inelegans. Constat utique remedium hujusce methodi tribus corporibus simplissimis, & ubique gentium inveniendis, calce nimirum, sale fixo & lacte. Nec palato valde displicet, nec ventriculo nocet,

nocet, modò adsit justa mensura lactis  
 vel tremoris ejus, libra scilicet dimidia pro  
 singulis drachmis calcis & salis fixi. Sed  
 longè minùs aptum esse videtur doloribus  
 calculosorum leniendis quām massa li-  
 thontriptica, electarium vel tremor, aëri  
 prout oportet exposita. Si huic pulveri  
 lithontriptico affundatur aqua, fiet lixivio  
 calx æquetur dimidiæ tantūm parti salis  
 fixi, ut ab experimento bis capto conji-  
 cere licet. Varia olim tentavi, quò ve-  
 hiculum huic pulveri maximè congruum  
 invenirem, neque quidvis tunc occurrebat  
 lacte potius, quapropter illud præcepi  
*Dissertatione de Lithontriptico.* Verum  
 lactis tremor longè præstat, id quod cre-  
 dere par est, & nuper expertus sum. Si  
 quis detrahatur de virtute lithontripticâ hu-  
 jus pulveris, eò quòd solutio salis fixi per  
 se non multūm valeat ad calculos solven-  
 dos, repono, verisimile esse volatilitatem,  
 hoc est, vim solventem donari urinæ a  
 sale fixo, perinde ac a calce, pari ratione  
atque

atque hæc utraque volatilem reddunt salem ammoniacum, sicut innui in *Dissertatione de Lithontriptico*; nec non lixivium quoddam saponarium confici in primis viis, calce & sale fixo unitis. Ut taceam, virtutem lithontripticam lixivii *Juriniani* satis superque patuisse nupero exemplo, illustrissimo simul & miserrimo †; noxa verò exinde orta, me judice, debebatur defectui vehiculi idonei investientis. Namque remedium hujuscemodi et ipse aliquoties assumpsi, & aliis exhibui quantitate supra præscriptâ, quæ *Juriniana* multò major est, sine noxâ in sequente. Porrò vis ejus solvens manifestissima fuit in uno ægrotorum. Non inutile esset fortasse experiri quo usque pulvis lithontripticus mitigari posset vel aquæ affusionibus & vaporationibus iteratis, vel aëris accessu diutino, manente interea virtute calculis solvendis idoneâ.

METHODUS septima ducta est ex iis,  
quæ a doctissimo Roberto *Whytt* experi-

---

† Com. de Orford.

*mentis comperta sunt, & a Te ipso utilitatis publicæ causâ memorata.* Saponis quantitas eadem est ac in methodis quinque primis ; libræ autem tres vel quatuor aquæ calcis subeunt vicem trium drachmarum calcis ipsius. An verò methodis istis solvendi vi potentior sit, an aliis nominibus potior, tandem forsan patebit, comparatione institutâ, per ægrotorum experimenta. Quantitas aquæ calcis quotidie ebibenda pluribus tædio erit, etiam si sapor ejus ingratus paululi lactis commixtione ferè evanescat. Attamen hæc ipsa quantitas, nî fallor, dolores a calculo oriundos sæpe minuet ; quamvis in me ipso expertus optato successu frustratus sim.

**QUÆCUNQUE** e methodis descriptis elegatur, necesse erit ut æger sibi temperet a luxu, edacitate, & vini compotatione, ab aromaticis & sale conditis, ab acidis & acescentibus. Cerevisiam tenuem excipio, quanquam inter acescentia numerari possit ; lenit enim tum dolores a calculo, tum irritationem a Lithontriptico acriori oriundam

dam. Idem tenendum est de liquoris cuiusvis tenuis potu copioso; modus autem servandus est, cum et acescentia cerevisiae tenuis, & copia liquorum quorumvis pota, minuat urinæ medicatæ vim solventem.

**O**P T A N D U M effet, ut qui ordinatæ victus rationi se nolint subjicere, ab hoc remedio omnino abstinerent, ne re infectâ, vel et in pejus mutatâ, & Lithontriptico male culpato, cursum abrumperent, sibi ipsis nocivi, aliis etiam injurii.

**O**P T A N D U M effet quoque, ut remedium affumentes calculis in urinâ suâ medicatâ digerendis operam darent. Hinc enim fieret, ut vi ejus solvente oculorum fide comprobata, munirentur contra rumores in vulgus sparsos, & temerè admissam a doctis indoctisque opinionem de Lithontripticorum naturâ nimis acri quam ut vefica impune ferat; neque lentâ operandi ratione bene perspectâ, spem conceptam prorsus abjicerent propter sanationis moram longiorem. Quinetiam simul patesceret

ceret, quid valeret regimen, aut methodus remedium parandi diversa, ad vim urinæ augendam vel minuendam; unde præcepta & cautiones practicæ, non levis forsan momenti, deduci possent. Experimenta verò in ipsam urinam medicatam instituta longo vincunt intervallo, quæcunque in varias aquas calcis, vel saponis solutiones institui possunt; sive eo consilio fiant, ut urinæ medicatæ vis solvens debitâ remedii & victûs ordinatione intendatur, sive ut dubitantibus rata sit. Neque tamen hæc sunt contemnenda.

MONENDI sunt etiam calculosi Lithontriptico utentes, ut caveant quām maximè a motu corporis nimio, in quem valde proclives esse solent lenitis doloribus. Etenim ægro exercitia solita repetente, propter inducias remedii usu & quiete aliquali impetratas, ex improviso profiliat hostis, *expertus loquor,* & inflammationem vesicæ cum spasmis horrendis excitabit. In tali rerum statu imperanda est quies omnimoda, victus lenissimus, medicamenta ex opio

opio parata, Lithontripticum mitissimum, quantitate etiam supra præscriptâ minori, tentando exquirendâ. Huic regimini faveente Deo, ipse jam evasi, doloris prope modum expers; & spero me in posterum usque expertem mansurum, si modò cautior fiam malorum præteritorum experi entiâ. Imò spero me non semper mihi ipsi opprobrio, sociis autem laborantibus offendiculo futurum, sed tandem a calculo prorsus liberatum iri; quippe prodere jampridem nuclei septem, prodeunt que etiamnum indies fragmenta calculosa, parvula quidem & numero pauca, sed vera, & solutionis veræ, lentissimæ licet, documenta non convellenda.

QUEM CUMQUE verò exitum mihi dederit bonorum omnium Dator Ter Optimus, Maximus, non erit æquum ut remedii existimatio inde tollatur, utcunque immuni oporteat. Hoc interim aliorum causâ, summâ cum fide edico, me ex quatuordecim, & quod excurrit, annorum testimonio nihil hucusque colligere posse, unde pris tina

tina mea de eo sententia infirmetur. Quinimo fidissimis varij generis experimentis nixus persuasum habeo, unamquamque e methodis praecedentibus et innocentiam esse (sextam non excipio cautè initam) & parem calculis quibusvis viarum urinariarum demum solvendis; etenim cùm calculi omnes ex iisdem elementis constent, omnes iisdem menstruis subjici credendum est, uti exposui in *Dissertatione de Lithontriptico* †. Profectò si vel noxarum, vel fallaciæ suspicione justâ laboraret

† ANALOGIA porro solutionum reliquarum postulare videtur, ut menstruum (i. e. urina medicata) par solvendis tot calculis, ad omnes tandem comminuendos, ut ut multùm inter se discrepantes, efficax reperiatur. Aurum omne solvitur ab aquâ regiâ, sulphur omne ab alcali fixo, substantia omnis animalis a lixivio saponis, resinae omnes ab alcoholе, gummi omnia ab aquâ. Quod itidem dici potest de concretis quibusvis, quorum partes coagmentantur ope gummi, resinæ, &c. dissolvantur oportet concreta illa ope aquæ, alcoholis, &c. respectivè. Jam vero prædicta corpora, tam solvenda quam solventia, licet eodem generali titulo comprehensa, patiuntur diversitates majores vel minores ob causas innumeratas, propter quas etiam solutio promptius vel tardiùs perficitur. Eâdem ratione diversa sunt & calculorum & urinæ medicatæ genera, a diversis ætatis, temperamentis & id genus aliis, originem ducentia; modus item solutionis, tempusque illi absolvendæ necessarium, magnopere variantur, tum intra tum extra corpus, uti patet ex Historiis & experimentis supra recensitis, quæ idcirco se mutuo stabiliunt, simulque Analogiae allatae fidem adstruunt. Attamen non est credendum, si calculus A constet ex aëre sub formâ inelasticâ, aquâ, oleo, sale & terrâ,

laboraret remedium, nequaquam adduci possem, ut hanc Tibi moram facerem. Sin Veritatem mente sincerâ & studio indefesso quæsitam asscutus fvero, me Illius causam haud facile deserturum puto.

---

terrâ, calculum B quovis horum prorsus destitui. Ideoque, sive urina medicata alcalina aërem latentem expedit, sive oleum ad se trahat, sive tendat ad salis neutrius partem acidam, illamque a terrestri salis parte dissociet, sive magnâ vi imbibita calculum disrumpat, sive horum unumquodque quodammodo præstet, (possunt enim forsan omnia cognatione quâdam inter se conjungi,) sive quævis alia sit ejus actio, verisimillimum est, eandem actionem efficacem fore ad calculos quosvis solvendos, licet variato modo & tempore, pro variâ naturâ, & proportione mutuâ partium componentium calculi, & urinæ medicatæ. Calculus parvus I 4, granorum 21 cum dimidio, non erat integre absumptus ab urinâ medicatâ, nisi absoluto 11 septimanarum spatio; quare, positis iisdem circumstantiis intra corpus ac in experimento 3°, calculus ejusdem generis, pendens unciam integrum desideraret annos aliquot ad sui solutionem perficiendam. Laborant nonnulli per annos decem, viginti, triginta, nec tamen adest illis calculus major, quam qui in aliis subnascitur spatio multò breviori. Ubi autem calculi generantur tardè, credibile est, augmentum fieri per appositionem elementorum minorum, atque adeo hæc elementa arctius cohærere inter se, juxta observatum Newtoni, ex Phænomenis quam plurimis comprobatum, quæcumque tandem sit cohesionis causa. Quapropter expectari potest, ut calculi, tardè increcentes, tardè quoque decrescant; & ut, qui laboraverint per annos permultos, necesse habeant, semet tædio remediorum longiori subjicere. Fieri etiam potest, ut in junioribus acidi abundantia, olei verò inopia, partim in causa fint, quod eorum calculi difficilius cedant remediorum actioni. Verùm, ut tandem finem faciam, non vereor asserere, & pro asserto meo vindicando ad experientiam futuram provocare, omnes calculos viarum urinariarum plūs minūsve semper decrescere, ubi hæc remedia justâ quantitate assumuntur, cum idoneo regimine. *Dissert. de Lithontript.* In quâ Remedii vis solvens tot & tantis argumentis stabilitur, ut supervacaneum esset de eâ disputare in hâc Epistolâ.

Neque

Neque Illa me deseret, vindicem licet indignum ; sed prævalebit tandem, criminacione omni; non minùs quàm patrocinio, superior.

**A**DDAM multa me movere ut credam Lithontriptici usum Podagricis quàm plurimis profuturum ; imò, si ei adjungatur legitimus aquarum Bathoniensium usus, tum externus, tum internus, horum non nullos, pro deploratis habitos, quodammodo restitui posse ; morbum verò nondum adultum sensim quidem, at tutissimè, quasi dissipatum iri.

**R**ESTAT, Vir Clarissime, ut cum ingenuis omnibus, Tibi maximas habeam gratias pro iis, quæ in praxi medicâ apprime utilia monuisti & præcepisti, exoptemque senectutem longam, placidam, & spei melioris non fallendæ plenam.

*Dabam Bathoniæ  
Aug. 2, 1751.*

**F I N I S.**